

東醫西寶鑑

十三

東醫寶鑑雜病篇卷之五

御醫忠勤貞亮扈聖功臣宗祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

霍亂

霍亂之因

內經曰土鬱之發民病嘔吐霍亂注下又曰太陰所至為中滿霍亂吐下又曰

風乃大行民病飧泄霍亂體重腹痛筋骨搖併外霍亂之病皆因飲食非關鬼邪針○內有所積外

有所感陽不升陰不降乖隔而成非因鬼邪皆飲食所致此先哲確論也○霍亂者揮霍變亂也

凡人內素有鬱熱外又感寒一時陰陽錯亂然病本因飲食失節生冷過度以致濕熱內甚中焦失

運不能升降是以吐下瀉○霍亂或因飲冷或胃寒或失飢或以大怒或乘舟車傷動胃氣令人

吐瀉併作用藥遲緩須臾不救○霍亂多責於熱故夏秋為盛○霍亂之病由風濕腸三氣之

合筋也風者肝木也濕者脾土也腸者心火也肝主筋故風急甚則轉筋也吐者腸也心火上也故

東醫寶鑑雜病篇卷之五

嘔吐也泄者脾土也脾濕下流故泄瀉也
啓玄子曰皆脾熱所生也斯言為正

霍亂形證

霍亂證心腹痛卒嘔吐先腹下利增寒壯熱頭痛
眩暈先心痛則先吐先腹下利增寒壯熱頭痛

痛吐利並作甚則轉筋入腹即死
穀之道邪在上焦則吐而不利邪在下焦則利

而不吐邪在中焦則吐利並作病因飲食不節清
濁相干陰陽乖隔輕者只曰吐利重者揮霍變亂

乃曰霍亂因邪入脾胃故發為吐利
證夏秋為多寒月亦有之蓋有伏暑而作

之藏府冷熱不調或飲食不節生冷過多或起居
失宜露卧當風使風冷之氣歸於三焦傳於脾胃

脾胃得冷不能消化水穀致令真邪相干飲食變
亂於腸胃之間心腹疼痛發作吐利有心痛而先

吐者有腹痛而先利者有吐利俱發者有發熱頭
痛體疼而復吐利虛煩者或但吐利心腹刺痛者

或轉筋拘急疼痛者或但嘔而無物出者或
四肢逆冷煩悶昏塞而欲死者隨證治之

脉法

霍亂脉多伏或絕
○脉微遲者霍亂代氣少則難差
○脉微遲者霍亂代氣少則難差

亂又關脉滑為霍亂吐瀉又滑而不勻必是霍亂

吐瀉之候脉代勿訝也○滑數為區代者霍亂微

滑者或生澁數而虛或結或促或代皆不可斷以死脉

霍亂有乾有濕此病有乾者少蓋吐利則所傷之物得

少也泄出雖甚重胃中水穀泄盡則止矣所以死者

則所傷之物不得出泄壅閉正氣隔絕陰陽煩擾悶喘脹而死矣

乾霍亂治法吐利不得謂之乾霍亂○乾霍亂者忽然

頃刻之間便致悶絕急用鹽湯吐之續以理中湯

赤茯苓枳殼木瓜煎服或吞下蘇合香元亮妙藥

加吐以提其氣之橫格不可用涼藥宜二陳湯方

研足。絞腸沙者乃乾霍亂一名也。腹痛不可忍或

正氣。乾霍亂者氣痞於中吐利不得所傷之物壅閉

中欲出血兼服治中湯。或藿香正氣散必效。見方

薑鹽湯。治乾霍亂欲死。鹽一兩生薑切半兩右同炒

濕霍亂治法。為熱不渴為寒。熱多欲飲水宜五苓

散寒多不飲水宜理中湯。寒利濕降火四時通

用藿香正氣散。寒月虛冷用理中湯。寒方見暑

以分消上下更合益元散。香黃連散。加味薑附湯。回

生散。加減正氣散。中暑霍亂宜香薷散。附湯。桂

事南星末三錢棗三枚薑五片煎極熱服一服可

效。或半夏末薑汁點照。或白礬末一大錢沸湯點

服亦效

木萸散

治霍亂吐瀉肢體轉筋逆冷木瓜吳茱萸食鹽各五錢右同炒令焦餅盛百沸水三升入

藥同煎至二升冷煖任意服即效如無前藥枯白礬末一錢沸湯調服如無白礬只用鹽一捻醋

一盞同煎服或鹽梅醃酸等物皆可煮服

二香黃連散

治伏暑霍亂腹痛躁悶脉沉手足冷藿香厚朴半夏赤茯苓陳皮白扁豆香薷

各一錢黃連澤瀉各八分甘草三分右對作一貼水煎入薑汁一匙温服

加味薑附湯

治霍亂吐瀉多手足逆冷氣少不語六脉沉伏附子炮乾薑炮人參各一錢

半甘草炙七分右對作一貼水煎服

回生散

治霍亂吐瀉過多但一點胃氣存者服之回生藿香陳皮各五錢右對作一貼水煎温服

服

加減正氣散或吐或瀉初到他方不伏木土遂成霍亂

入砂研香附半夏甘草各一錢右剉作一貼

香薷散治中暑霍亂吐瀉腹痛轉筋四肢逆冷

益元散一名六一散治霍亂吐瀉取此

霍亂後轉筋陽明屬胃與大腸以養宗筋暴吐暴瀉

而已重者遍體轉筋入腹手足厥冷危甚風燭矣

倉卒之際以益填臍中灼艾不計壯數雖已死而

胃中有煖氣者立甦急用木萸散坊見加香甘

草紫蘇葉煎服再研大蒜塗兩脚掌心則雖昏危

入腹者亦效霍亂吐瀉過多遍體轉筋手足

厥冷氣欲絕者急灸臍中又取蓼一把煎湯泡洗

次投附子理中湯寒方即效細細霍亂後轉筋理

中湯加石膏煎服一法理中湯去

白朮加生附子一箇兩煎服一法理中湯去

加酒花蒼朮南星煎服吐瀉脇痛轉

筋脈弦者木克土也平胃散妨觀加木瓜五錢

木瓜湯 治霍亂轉筋木瓜四分右剉作一貼入薑三片紫

蘇一葉鹽一撮烏梅一箇同煎服

一法 治轉筋不止欲死男子以手挽其陰牽之女子

霍亂後煩渴 吐瀉既多津液暴亡以致煩渴引飲不止

冬湯加減 湯止渴 湯諸苓

桂苓白朮散 治中暑霍亂吐瀉煩渴滑石一兩寒水

人參桂枝各二錢半右鳥末每三錢白湯或新汲水調下生薑湯亦可

麥門冬湯 治霍亂後煩渴麥門冬二錢陳皮半夏白

五分煎服 剉作一貼入薑三片烏梅一

椒豆散

治霍亂吐瀉後煩渴不能服藥或水藥不入

水調下或水煎服
七粒菜豆二十粒為末一名胡椒湯調下

加減薤芩湯

治霍亂熱渴天花粉二錢赤茯苓一錢
猪苓澤瀉香薷乾葛各七分黃連白朮

甘草各五分右剉作
貼入薑三片水煎服

止渴湯

治同上
人參麥門冬赤茯苓桔梗瓜蒌根澤瀉

心丹

霍亂後虛煩

霍亂後虛煩不得眠或熱渴宜竹葉
石膏湯寒門參胡三白湯既濟湯

參胡三白湯

治霍亂後煩熱口乾脉數或頭身痛柴
胡白朮白茯苓白芍藥當歸陳皮麥門

冬梔子仁廿草各八分參五分
右剉作一貼入棗二枚一燈心一團煎服
十粒

既濟湯

治霍亂後虛煩不得眠
葉半夏附子炮甘草炙各一錢
冬二錢右剉作一貼

入薑五片粳米
百粒水煎服

霍亂吐法者治乾霍亂心腹刺痛煩冤吐利不得氣欲絕

飲一升須三吐使宿食盡乃止此法大勝諸治吐

訖以理中湯藿香正氣散款緩調治
以益湯一盞入童便薑汁頓服探吐
令透未透再服吐後續用熨法

霍亂熨法護頓其胃前并腹肚上以熨斗熨之氣透

則又熨續以炒鹽熨其背則十分無事
○法益炒吳茱萸熨臍下亦效

霍亂鍼法乾霍亂刺委中絞腸沙證手足指頭諸經出血

可忍以者以手蘸溫水即愈者膝腕上拍打有紫黑
點處以鍼刺去惡血即愈○又法用麻弦小竹

弓蘸香油或熱水刮手足背額項即愈
霍亂者乃寒濕太甚脾被絆而不能動氣液鬱而

不能行所以卒痛而手足厥冷俗名絞腸痧者蓋
言痛之甚也北方刺青筋以出氣血南方刮胃背

手足以行氣血俱能散病然出血法詳見救急門

霍亂灸法 霍亂轉筋入腹不計壯數立效 絕以益填臍

死而腹中有煖氣者依上法灸之亦甦 又法

灸氣海二七壯妙 霍亂吐瀉不止 垂死灸天

目綱

禁忌法 霍亂吐瀉之時切勿與穀食雖米湯一呷下咽

漸而將息 霍亂吐瀉時慎勿與粟米粥入

胃必死矣 霍亂不可遽與米飲 粥飯以助邪

氣必所傷物盡則死 稀粥漸養之 霍亂時

切不可飲熱酒 燒酒 刷牙

不治證 霍亂 筋腹 痛四 肢厥 冷氣 欲絕 其脈 洪大 可

煩躁 者不 治得 乾霍 亂吐 瀉不 得胃 腹脹 硬面

唇青 黑手足 冷過 肘膝 六脈 伏絕 氣喘 急舌 短囊

水疾吐瀉 乘船亦好 吐瀉渴飲 水者即死 飲童尿最好 自

亦好 吐瀉 渴飲 水者 即死 飲童 尿最 好自

單方 一丸 二種 十

鹽 治乾 霍亂 鹽一 大匙 熬黃 取童

鍋底墨 治霍 亂取 二錢 百沸 湯一 盞

甘爛水 治霍 亂入 藥煎

生熟湯 一名 陰陽 湯治 乾霍 亂能 吐宿 食惡 毒之 物

生薑

治霍亂欲死生薑五兩切取牛屎一升同煎取汁服即效

天南星

治吐瀉不止四肢逆冷不省人事南星為末每三錢入大棗三枚同煎服四肢漸煖神識

便省神妙

蘆花

取一名蓬蘽治霍亂氣息危急者把濃煎取汁頓服即差

皂角

乾少許調服探吐即效

木瓜

治霍亂吐瀉轉筋不止煮汁飲之

烏梅

治霍亂煩渴木漬和蜜飲之妙

林檎

青色者治霍亂吐瀉甚妙煮取汁飲或嚼食之

秫藷葉

治霍亂轉筋麤大如桃李葉濃煎湯飲之

粟米泔

治霍亂煩渴飲數升立差又研米泔和濾取汁服之主轉筋入腹

糯米 治霍亂 取汁任意飲之 水研

麥 治霍亂 轉筋 濃煎 乘熱 飲之

香薷 治霍亂 吐瀉 轉筋 濃煎 飲之 不可開也 乾

小蒜 治霍亂 吐瀉 飲之 乾

牛糞 治霍亂 吐瀉 四肢 逆冷 黃牛糞 以

烟鹿皮 取汁 頓服 治乾霍亂 即吐 神效 裕浸揉

醋 治霍亂 未得吐 下飲 一二升 良 治轉筋 取

牛涎 小兒霍亂 牛涎 一

嘔吐

嘔吐之因 甚內經曰 諸嘔 火氣 炎上 之象也 嘔吐 胃膈 著

俱屬於胃胃者總司也以其氣血多少為異耳嘔者陽明也陽明多血多氣故有聲有物氣血俱病也吐者太陽也太陽多血少氣故有物無聲乃血病也有食入則吐有食已則吐以橘紅為主歲者

少陽也少陽多氣少血故有聲無物乃氣病也半夏為主究其三者之源皆因脾氣虛弱或因寒

氣客胃或因飲食所傷而致宜以丁香藿香半夏茯苓陳皮生薑之類主之燥○濕嘔者有物有聲

食已則嘔乾嘔者空嘔無物總屬陽明氣血俱病故嘔比土為重也○劉河間謂嘔者火氣炎上

此特一端耳有痰隔中焦食不得下者有氣逆者有寒氣鬱於胃口者有食滯心肺之分新食不得

下而反出者有胃中有火與痰而嘔者○嘔家雖有陽明證慎不可下逆之故也○

寸口脈數其人即吐○寸口脈細而數數則為熱細則為寒數為嘔吐細○問曰病人脈數數則為熱

當消穀引食而反吐者何也師曰過發其汗令陽氣微膈氣虛味乃數數為客熱不能消穀胃中虛

寸緊故吐也○胃滿不能食而吐○脈滑為嘔

寸緊尺瀦其入胃滿不能食而吐○脈滑為嘔

脈法

吐則有疾最忌無他寸緊滑數微數面虛單浮胃薄

穀不化名曰胃反經脈○不磨朝食暮吐暮食朝吐完

弦者虛也胃氣無餘朝食暮吐暮食朝吐經脈○反

胃噎嘔寸緊尺瀝翻○朝食暮吐反胃脈浮緩者生沉

瀝者死脈瀝而小血不鑿鑿不足脈大而弱氣不足鑿鑿

嘔吐

治法乃嘔吐宜加冷熱二證冷者面青手足厥冷食久

湯梗○熱者面赤手足熱食已即吐宜保中湯和

加味橘皮竹茹湯○大病後胃熱虛煩而嘔者竹

葉石膏湯○加薑汁服即止○時常口吐清

水或冷涎自下涌上者脾熱所致也二陳湯加白

或水煎服或蒸餅為丸服○肝大出胃逆上嘔

苦胃虛而嘔者宜推揚穀氣四味藿香湯加減四

子湯主之○久病胃虛嘔吐宜藿香安胃散

藿香平胃散比和飲。痰飲嘔吐宜茯苓半夏湯

小半夏湯大半夏湯。痰見嘔吐宜茯苓半夏湯

水如神效。○停水而嘔者心下怔忡先渴後嘔

者宜赤茯苓湯。○先嘔後喝者宜猪苓散水入

即吐者宜五苓散。○見嘔門。○嘔家聖藥是生薑

千金之說信矣。然氣逆作嘔生薑散之痰水作嘔

半夏逐之生薑於寒證最佳。○若遇熱嘔不可無烏

梅也。○嘔吐宜服薤白粥。○嘔家有癰膿不須

治嘔膿盡。自愈矣。○

加味二陳湯。治胃冷嘔吐。二陳湯。方。一貼。

丁香安胃湯。治嘔吐噦胃寒所致。黃芪二錢。吳茱萸

加減理中湯。治胃寒冷嘔吐。清水。陳皮。藿香。丁香。半

夏。縮砂。研。桂皮。各一。錢。右。剉。作。一。貼。入。薑。三。片。烏。梅。一。箇。水。煎。服。翻。

麻當歸身陳皮甘草灸各五分黃

草豆蔻人參蒼朮各一錢丁香柴胡升

加味二陳湯。治胃冷嘔吐。二陳湯。方。一貼。

自愈矣。○

梅也。○嘔吐宜服薤白粥。○嘔家有癰膿不須

半夏逐之生薑於寒證最佳。○若遇熱嘔不可無烏

水如神效。○停水而嘔者心下怔忡先渴後嘔

者宜赤茯苓湯。○先嘔後喝者宜猪苓散水入

即吐者宜五苓散。○見嘔門。○嘔家聖藥是生薑

保中湯 因痰火致嘔吐不下飲食白朮土炒二錢黃

夏陳皮赤茯苓各八分縮砂三分甘草二分右到

之去滓稍

和中桔梗湯 治上焦熱食已暴吐脉浮而洪半夏

實赤茯苓各一錢右到作一貼薑三片水煎取清

木香檳榔末更加白芍藥

黃連竹茹湯 治胃熱嘔吐煩渴脉數黃連薑汁炒

赤茯苓白芍藥陳皮麥門冬甘草各五分

清熱二陳湯 治痰火嘔吐出涎赤茯苓

各一錢右到作一貼入薑

葛根竹茹湯

治胃熱嘔吐葛根三錢甘草一錢右剉作一

貼薑三片棗二枚竹茹一彈子大同煎服
酒嘔尤妙門〇欲知胃中有熱手足心皆熱者是

胃熱也

加味橘皮竹茹湯

治胃熱多渴嘔噦不食橘皮竹茹

錢人參甘草各五分右剉作一貼薑三片水煎服〇無枇杷葉則以蜜炙桑白皮代之

四味藿香湯

治胃虛嘔吐粥藥不停藿香人參橘皮

加減四君子湯

治久病胃弱全不納食聞食氣即嘔

香附子各一錢右剉作一貼入生薑三片水煎服

藿香安胃散

治脾胃虛弱嘔吐飲食不待腐熟橘紅

每取二錢薑三片同煎溫服

藿香平胃散

治同縮上蒼術二錢藿香厚朴陳皮各一錢甘草炙七分右

到作一枚水煎服

比和飲

治胃虛嘔吐月餘不納水穀聞食氣即嘔聞藥亦嘔人參白朮白茯苓神麴炒各一錢藿

香陳皮縮砂甘草各五分陳倉米一合右剉作一貼先以順流水三升泡伏龍肝末澄清取一升半

入藥及薑三棗二同煎至七分去滓稍冷服日二遂納而不吐別以陳倉米煎湯時時啜之全愈

醫

茯苓半夏湯

治痰飲停胃嘔吐不止半夏二錢赤茯苓陳皮蒼朮厚朴各一錢藿香八分縮

砂乾薑甘草炙各五分右剉作一貼入薑三梅一水煎服

猪苓散

治先嘔後渴嘔吐而思水解者急與之猪苓赤茯苓白朮各等分右為末每一二錢水調

服○一人每嘔水二三椀諸藥不效但吃并華水一口即止用此藥即愈

薤白粥 治嘔最效 薤白三莖 雞子三箇 去黃粟米三升 合同煮作稀粥 另用人參一兩 細剉水一升

煎取三合 去滓 右以雞薤栗粥 煖人參湯相和攪勻 頓服即止 效得入

惡心乾嘔 惡心者欲吐不得吐 見飲食則心便惡之 二陳湯加薑

惡心者欲吐不吐也 胃口有熱有痰 二陳湯加薑 炒芩連明 乾嘔者有聲無物也 乾嘔或手足厥

冷者宜生薑橘皮湯 人參惡心者無聲無物但心 中兀兀然無奈欲吐不吐欲嘔不嘔 雖曰惡心實

非心經之病 皆在胃口上 宜用生薑 又曰惡心吐 清水胃口有痰有熱有虛 皆用生薑 宜生薑半夏

湯 素熱惡心乾嘔 吐涎沫 宜半夏 乾薑散 剉月中 素熱惡心乾嘔 不止者宜梔子竹茹湯 醫

生薑橘皮湯 治乾嘔 或手足厥冷 搗皮四兩 生薑八 兩 右剉以水七盞 煮至三盞 逐旋微温

呷服活 乾嘔最妙 下一名陳皮湯 治

生薑半夏湯 治胃中憤憤然無柰者 半夏五錢 水一

盞半煎至半盞入薑汁半盞和勻緩緩服之
○大丸嘔吐藥忌一時頓服宜緩緩服

半夏乾薑散治乾嘔末每吐涎沫半夏乾薑各等分

梔子竹茹湯治胃熱惡心乾嘔不止梔子以三錢陳

煎和薑汁服

食痺吐食食痺謂食已心下痛陰陰然不可名也

納○痛而嘔為寒經云寒氣客於腸胃厥逆上出

故痛而嘔也○嘔吐而脈弦者肝勝于脾也由

先實其脾土宜茯苓半夏湯麥天湯白朮茯苓湯

茯苓半夏湯治風痰羈絆於脾胃之間惡心欲吐宜

夏神麴炒各一錢三分橘紅天麻各一錢
右剉作一貼為瓮末薑五水煎服

白朮茯苓湯

治同上。白朮、白茯苓、芍藥、五分。右坐作一貼。薑五

煎服

金花丸

治同上。半夏、製一兩、檳榔二錢、雄黃水、飛一

下三五十九丸以吐止為度。風痰羈絆于脾故飲

水煮金花丸

治風痰羈絆脾胃。飲寒水石燒各一兩

天麻五錢、雄黃一錢、半右為末。滴水為丸。度漉出生

薑湯吞下。食前。楊○風邪在胃。翻翻不○或鬱酸

宜輕用。參朮。惟久病脇痛者。木克土也。宜六君子

煎服

麥天湯

治風邪羈絆脾胃。有痰惡心欲吐。麥門冬一

陳皮各一錢右剉作
一貼薑五水煎服

吐病有三吐也。上膈屬上焦食已暴吐者今世謂之嘔

出之屬中下二焦。朝食暮吐暮食朝吐今世謂

之嘔氣反胃也。脚。吐有三因乃氣積寒也皆從

三焦論之上焦在胃口上通天氣主腐熟水穀下焦

焦在中脘上通天氣主出而不納。上焦吐者皆從

在於臍下下通地氣主出而不納。其脈浮而洪其證食已暴吐

渴欲飲水大便燥結氣上衝胃而發痛其治當降

氣和中飲水大便燥結氣上衝胃而發痛其治當降

相假為積而痛其脈浮而弦其證或先吐而後痛

或先痛而後吐治法當以小毒藥去其積木香檳榔和氣沉而遲其證朝食暮吐暮食朝吐小便清利

其脈沉而遲其證朝食暮吐暮食朝吐小便清利

大便秘而不通治法宜以毒藥通其閉塞溫其寒

氣大便漸通復以中焦藥和之不令大府結閉而

自安也

也

噎膈反胃病因

內經曰三陽結也蓋小腸熱結則津液涸三陽者大

大腸熱結則不能便膀胱熱結則不通必反而上

行所以噎食不下縱下復出乃陽火上上行而不下

理明矣○內經曰少陽所至為嘔涌溢食不下此

俱耗胃腕乾○又曰食不下者胃腕膈也○血液

物難入問或可入入亦不多名之曰噎其槁在下

與胃相近食雖可入入難盡入胃良久復出名之曰

膈亦曰反胃大便秘少若羊屎然名雖不同病出

一體○其槁在賁門食下則胃腕當心而痛須臾

吐出血食出痛乃止此上焦之噎膈也或食物可下
難盡入胃良久復出其槁在幽門此中焦之噎膈
也其或朝食暮吐暮食朝吐其槁在闌門此下焦
之噎膈也○飲食不下而大便不通名曰膈噎
膈者有拒格之意即膈食反胃也○噎膈有五
五膈者憂恚寒熱氣也○膈食反胃也○噎膈有五
結於咽喉時覺有所妨碍吐之不出燕之不下由
氣鬱痰結而然五噎者憂食勞氣思也飲食卒然

阻滯而不下反胃也。噎也。噎也。受病皆同。醫。張

難峯曰噎當是神思間病。惟內觀自養。可以治之。

其言深中。病情。神氣。中膈。噎之證。不屬虛。不屬實。不

屬冷。不屬熱。乃神氣中膈。噎之證。不屬虛。不屬實。不

於血枯。血枯則燥矣。得病。情。合經旨者。丹溪一而巳。情。

噎膈反胃治法。內噎病生於血乾。夫血者陰氣也。陰主靜。

氣有養陰血。自生腸胃津液。傳化合宜。何噎之有。

○曰胃腕乾槁。果可治乎。曰古方用人參以補肺。

御米以解毒。竹瀝以清痰。乾薑以養血。粟米以實

胃。蜜以潤燥。薑以去穢。正是此意。○噎膈反胃。大

率屬血虛。氣虛。有痰。有熱。血虛。四物湯。氣虛。四君

子湯。痰用二陳湯。熱用解毒湯。解毒湯。氣血俱虛。

八物湯。主之。必和。以童便。竹瀝。韭汁。薑汁。且多飲。

牛乳為上策。但不可童便。入竹瀝。韭汁。薑汁。且多飲。

餵之火。故也。切不可用香燥藥。宜薄滋味。○噎膈宜用

者加砂糖。驢屎入內服。以防生虫。○噎膈宜用

平鯽丸。神方。觀瓜。萋實。九香透膈湯。五膈寬中散。棗

肉平胃散。內方。觀瓜。萋實。九香透膈湯。五膈寬中散。棗

津補血湯聖灰散八仙膏○反胃宜用疏朶丸狗
米平胃九杵糠九九仙奪命丹順氣和中湯安中

調氣丸回生養胃丹定生丹安
胃湯太倉丸奪命丹附子散

平鯽丸治膈氣不食大鯽魚一箇去腸留鱗以大蒜
切片填魚腹內濕紙包黃泥固濟慢火煨熟

去鱗骨入平胃散末杵丸梧子大
每三五十九丸空心米飲吞下

神仙奪命丹治氣鬱嘔吐或噎食不下百草霜研五
錢雄黃鵬砂各二錢乳香一錢半葉豆

黑豆各四十九粒右為末烏梅三十箇水浸去核
取肉和藥末擣勻彈子大朱砂二錢為衣每箇一

丸以茶泡熟餅壓下良久不吐乃藥之效若吐再
嚙化一丸服忌油膩鹽醋怒氣○一名二豆回

香丹

丁香透膈湯治五噎十膈痞塞不通白朮一錢三分
甘草九分人參白茯苓縮砂香附子各

七分沉香藿香陳皮厚朴各五分丁香木香麥芽
青皮肉豆蔻白豆蔻各三分草果神麴半夏各二

十分右剉作一貼薑三棗二水煎服也
○

五膈寬中散 治五膈食不下厚朴香附子各一錢半

木香三分白豆蔻二分右為麩末入薑三片鹽少許水煎服

瓜蒌實丸 治噎膈胃脘痞痛楸背常急妨悶瓜蒌實

糊和丸梧子大每五七下丸薑湯吞下

神奇散 治噎膈反胃血虛有火三陽枯竭當歸川芎

芍藥白朮土炒香附子枳實烏梅肉藿香赤茯苓檳榔木通猪苓黃芩炒黃栢人乳炒知母人乳炒赤芍藥天門冬麥門冬甘草各五分右剉作一貼水煎服

當歸養血湯 治老人痰結血枯成膈壹當歸白芍藥

黃芩同炒去茶葉八分貝母炒瓜蒌仁枳實陳皮厚朴香附子川芎蘇子各七分沉香五分水磨取汁

煎入沉香汁貼竹瀝調服

生津補血湯治年少人噎膈乃胃腕血燥不潤故便

地黃白茯苓各一錢枳實陳皮黃連炒蘇子貝母

薑一分縮砂沉香木磨取汁各五分右剉作一貼

聖灰散治噎食病及回食病兩喉噎取初出雲石

乾炒黃色為度黃二難得赤色即可用罐收貯封

壯健者用四分年老氣弱只用二分或三分好燒

其病即愈如不吐下

八仙膏治噎食生藕汁生薑汁生梨汁生蘿蔔汁甘

右和勻盛飯之熟生食之

硫汞丹 治反胃吐逆水銀八錢共硫黃末二錢同入

候結成砂子再研為末以粽尖拌丸

狗米平胃丸 治反胃諸藥不效黃雄犬一口

白煎湯煮作粥臨熟入沉香二錢平胃散末和

杵糠丸 治五膈杵頭糠牛轉草各半斤糯米一斤為

大入鍋內慢火煮熟食日

元仙奪命丹 治反胃噎食其效如神枳殼二兩白礬

南星薑製各二錢人參甘草各一錢豆豉研過餅

如小錢大慢火焙乾每生一餅爵碎以

順氣和中湯 治嘔吐反胃噎膈吐痰水

薑汁炒黑各一錢白朮土炒八分
夏神麴黃連薑汁浸晒乾猪膽汁拌炒各六分
實五分縮砂三分甘草灸二分
三長流水入黃土泥攪澄清水煎入竹瀝童便薑

服汁温

安中調氣丸 治反胃及痰氣白朮土炒香附子長流
水浸三日炒黃各三兩陳皮二兩半夏

製油炒白茯苓神枳實神麴炒黃連薑汁浸猪膽汁
拌炒各一兩白芍藥八錢蘇子炒羅薑子炒各六

錢川芎當歸酒洗白豆蔻炒各五錢甘草炙三錢
木香一錢石為末以竹瀝薑汁打神麴為糊和丸

業豆大白湯
下一百丸

回生養胃丹 治脾土虛寒聚成痰涎以致大便燥澀
小便赤而多嘔吐酸水漸成反胃結腸

之證蒼朮換泔浸六日蓮肉酒浸各四兩取猪
肚一箇以壁土揉擦洗淨入蒼蓮線縫好酒煮爛

搗細捏作小餅烘乾南星細切薑汁浸一宿伏龍
肝同炒去六半夏湯洗醋浸七日蒸熟橘紅伏龍

肝同炒去土粟米薑汁浸蒸焙各四兩人參白朮
白茯苓厚朴蓬朮三稜二味並醋炒葦澄茄縮砂
白豆蔻穀芽炒麥芽甘草各一兩丁香木香沉
香各五錢右為末稀麩糊和丸梧子大米飲吞下

六七十丸

定生丹

治反胃定生死雄黃朱砂乳香半夏木香肉
豆蔻百草霜各三錢沉香一錢阿魏礪砂

各五分菜豆四粒烏梅四箇湯泡去核右為
末以烏梅肉和擣作丸彈子大百草霜為衣陰乾
每一丸噙化燕下以薑湯漱一口復以陳麥餅火燒
熟細嚼壓下噙藥即燃官香一炷如香盡藥未化
者難治藥先化香
未盡者可愈

安胃湯

治反胃白朮白茯苓山藥炒當歸陳皮半夏
藿香各一錢黃連薑汁炒蓮肉各八分人參

縮砂各五分甘草三分右剉作一
貼入薑三棗二烏梅一水煎服

太倉丸

治反胃噎膈白豆蔻縮砂各二兩陳倉米一
升黃土炒去土右為末薑汁和丸梧子大薑

湯下百丸

奪命丹 治反胃有起死回生之功 囊一箇麝香一分

四分秋六分冬八分 皆有用彈中有白糖囊即蟻蟻所轉

如蟻蟻一搯將彈小破一點蓋住火燬過大黃色

存性不要燒焦了入藥內并彈共為末燒酒調空

心服如覺飢用小米煮粥漸漸少進一日二三次

不可多吃一日進一椀半足矣多進則病復不可

治矣忌生冷厚味葱蒜酒麪氣 惱五十以後一二服即效

附子散 治反胃大附子一箇坐於磚上四面着火漸

許擣為末栗米飲調下一錢末 三服差或加丁香一錢同為末

嘔吐噎膈反胃宜通大便 故也 欲吐者切不可下逆之

順今逆而上行謹不可泄固也然嘔吐者每每大

便秘結上下壅遏氣不流行蓋思所以區畫而利

導之。道。不。通。陰。虛。邪。氣。通。上。室。塞。嘔。噦。不。足。之。病。也。

此。地。道。不。通。黃。當。歸。桃。仁。紅。花。兼。用。甘。

草。微。加。大。嘔。吐。證。忌。用。利。藥。此。言。其。常。只。嘔。吐。而。

止。矣。嘔。吐。○。大。嘔。吐。證。忌。用。利。藥。此。言。其。常。只。嘔。吐。而。

大。小。便。不。秘。泄。者。利。藥。所。當。忌。也。若。大。小。腸。膀。胱。

熱。結。不。通。上。為。嘔。吐。隔。食。若。不。用。利。藥。開。通。發。泄。

則。嘔。吐。何。由。而。止。乎。古。人。用。三。一。承。氣。湯。正。是。此。

意。研。○。通。利。大。便。以。開。下。焦。之。壅。塞。宜。用。紫。沉。丸。

厚。朴。九。附。子。大。黃。湯。潤。腸。膏。三。一。承。氣。湯。四。子。調。

中。湯。香。白。元。大。黃。湯。潤。腸。膏。三。一。承。氣。湯。四。子。調。

秘。結。虛。冷。者。用。蘇。感。元。温。而。利。之。妨。礙。若。大。便。熟。

結。用。蜜。導。法。妨。礙。或。猪。膽。汁。和。醋。灌。入。下。部。妙。法。也。

紫。沉。丸。治。中。焦。吐。食。由。食。積。與。寒。氣。相。格。故。吐。而。疼。

肉。各。三。錢。丁。香。檳。榔。各。二。錢。沉。香。木。香。杏。仁。白。朮。

各。一。錢。白。豆。蔻。巴。豆。霜。各。五。分。右。為。末。醋。糊。和。丸。

黍。米。大。每。五。十。九。薑。湯。下。紫。沉。丸。百。九。一。日。二。服。後。

生。薑。一。塊。煨。熟。煎。湯。下。紫。沉。丸。百。九。一。日。二。服。後。

大。便。通。不。揚。吐。則。止。揚。

吐。則。止。揚。

吐。則。止。揚。

吐。則。止。揚。

厚朴丸 治同上 方與萬病紫苑丸同 方

附子丸 治下焦吐食 胡椒食暮吐暮食 朝吐大便不通 附子 炮五錢 巴豆霜一錢 砥礪半錢 右研極

細熔黃蠟為丸 梧子大每一二錢 九冷水送下 利 為度 利後更服 紫苑丸常服 一丸 勿令再閉 命

人參利膈丸 治噎膈大便燥結 喘滿壅塞 治膈氣之 聖藥也 人參 當歸 藿香 枳殼 大黃 厚朴

甘草各一兩 木香 檳榔 各七錢 半 右為 末 水丸 梧子 大 白 湯 下 五 七 十 九 丸 關

三一承氣湯 治嘔吐大便秘三陽結而 不通 上為噎膈反胃 方 觀 寒 門 不

四子調中湯 治反胃痰盛 二便澀 半夏 蘇子 炒白芥 錢半 香附子 枳實 瓜蒌 仁 蘇子 炒白芥

子炒各一錢 黃連 薑汁 炒七分 青皮 陳皮 沉香 白 茯苓 木通 芒硝 各五分 剉作一貼 水煎入芒硝

攪勻 空心 服

香白元 治痰涎壅盛 嘔吐不止 大便澀滯 青州白元 方 與青木香元前陰右等分作九薑湯

下三十
九

大黃湯

治冷泄反胃其候欲發時先流冷迤次則吐

薑自然汁半盞灸大黃令燥碎入薑汁中如此滓

蓋煎至七分先食葱白次服藥不十日去根幹○

用四物湯加童便非
汁竹瀝多服為妙

潤腸膏

治腸噎反胃甚捷新採威靈仙四兩搗取汁

去沫右同入銀石器內慢火煎如
錫時時以匙挑食之一料次效

難治不治證

嘔吐非反胃比也○九吐如清葉汁者死此是乍然

碎穀不礙○胃比也○羊屎者不治血大腸無○不淡飲

食不礙房室者不治○氣血俱虛者則口中多出

沫但見沫多出者必死○反胃吐白沫者何治

吐黃沫者不可治

單方有九種

黃丹治反胃黃丹一兩白礬二兩同入罐內火煨

喘

黑鈆等分為末空黑鈆炒成灰檳榔

滑石治反胃積飲滑石末生薑自然汁澄清白脚和

蘇抄

赤石脂治痰飲吐水成反胃石脂水飛每一錢空心

之

人參治反胃毒死者人參末三錢薑汁五合粟米一

服日

生薑

凡嘔吐皆因氣逆故用生薑之辛以散之○反胃嘔服薑汁

一升即

半夏

凡嘔噦用半夏者散結氣也○反胃嘔吐○半夏

用水去則嘔自止

蘆根

治乾嘔噦及五噎煩悶蓋根五兩

竹茹

主嘔噦取青竹茹一升水煎服

鯽魚

治反胃取大鯽魚去腸留膽入綠茶瀹腹以火

主噎

蚌蛤粉

治反胃吐食取爛粉米飲下○錢○蠅燭

服

蝟皮主反胃吐逆取肉淹五味炙食

橘皮治反胃嘔吐橘皮為末每二錢淡薑湯煎服同

木瓜止嘔逆煮汁飲之佳生薑同煎服无

蒲萄根細飲之佳乾嘔煎服之

獼猴桃治熱壅反胃取汁和薑汁服之○藤汁至滑

杵頭糠主噎食不下又細糠一兩白粥清調服大

鬻子粟治反胃食不下和竹瀝

蓴和鱖魚作羹食之主

老牛口中涎主反胃噎膈取少許和水服之終身不

驢尿

主反胃吐不止朝夕垂絕取熱尿服二合

牛乳

治反胃噎膈要藥非汁二盞牛乳一盞竹瀝半盞

煮六人病反胃大便秘燥北精血耗竭也先以甘蔗汁

食諸物半月大便秘加附子大黃服且令飲牛乳勿

田螺

治反胃大田螺多取新水養之待吐出泥渣去

立愈名曰螺作丸梧子大每三十九粒食無效

螃蛤

治反胃噎膈取螃蛤洗淨入水中殺食無效

次五日去蛤留水晒乾為末每服五分淡燒酒調下即效

馬剝兒

為一名馬剝兒即玉瓜也治噎膈反胃燒存性

食則可下然後隨證調理○錢一

炊乾飯治膈噎久不納穀取隔年炊乾飯以急流順

雞穀袋治噎取袋不以多一筒入薑炒香附末半

兩神麴糊和九梧子
大薑湯吞下空心

猫胎衣治反胃取猫生子胎衣陰乾燒為末酒調服

狗膽治反胃吐黃沫辰砂一兩大黃二兩為末狗膽

下三十一
九罐

蝎虎治噎食反胃取活蝎虎飲酒即愈

却取蝎虎切爛
焙乾為末每一錢燒酒調下

鍼灸法嘔吐無度并乾嘔不止尺澤大陵皆灸三壯又

厥冷脉沉絕灸間使便通此回生起死之法
善嘔嘔有苦者邪在膽逆在胃取三里陽陵泉經

育○吐食不化取上腕中腕下腕諫○反胃神效膏

中魁腕骨心俞中腕○今日食明日吐取心俞

膈俞蠱中巨關中腕○五壺五膈取天突胃中

心俞上腕中腕下腕脾俞胃俞通關中魁大陵三

里咽○反胃灸肩井三壯即愈乃神灸也翻○又

取水分氣海灸之續

咳嗽

內經曰人感於寒微則為咳甚者為泄為痛

而咳發為痿厥○形寒飲冷則傷肺肺傷則咳

脾也大抵素秋之氣宜清而肅若反動之則氣必

留濕則雖傷肺氣亦不為痰而有痰而寒少熱多

外故風寒先能傷之也經曰五藏六府皆能使人

脉法

停以與之也所病不等寒燥濕風火皆能令人咳
 惟濕病痰飲入胃留之而不行上入於肺則為嗽
 假令濕在心經謂之熱痰濕在肝經謂之風痰濕
 在肺經謂之氣痰濕在腎經謂之寒痰所治不同
 各隨證用藥河○咳謂無痰而有聲肺氣傷而
 清也嗽謂無聲而有痰脾濕動而為痰也咳嗽者
 有痰而有聲因傷肺氣動於脾濕故咳而無嗽也
 嗽○咳者聲咳之咳俗謂之嗽者是也肺主氣形
 寒飲冷則傷之使氣上而不下逆而不收衝擊膈
 咽令痰中滯滯如痒習習如梗是冷嗽甚者續續
 不已連連不息坐卧不安言語
 不竟動引百骸聲聞四隣矣
 咳嗽所因浮風緊寒數熱細濕房勞瀉難右關瀉
 者飲食傷脾左關弦短痰極肝衰浮短肺傷法當
 受嗽五歲之嗽各視本部浮緊虛寒沉數實熱洪
 滑多痰弦澁少血形盛脉細不足以息沉小伏匿
 皆是死脉惟有浮大而嗽者生外證內脉參考秤
 停○關上脉微為變○脉弦或緊為寒○脉浮
 為風○脉細為濕○脉數為熱○脉浮軟者生沉小
 沉數為實熱○洪滑為多痰○脉浮軟者生沉小

冬之乘夏則心先受之乘至陰則脾先受之乘冬

則腎先受之帝曰何以異之咳伯曰肺受之狀咳

而喘息有音甚則咽腫喉痺肝受之狀咳則心痛

下痛甚則不可以轉轉則兩肢下滿脾受之狀咳

則右肢下病陰引肩背甚則不可動動則咳

劇腎受之狀咳何安所受病咳伯曰五歲之咳

六府之咳奈何安所受病咳伯曰五歲之咳

移於六府脾受之咳不則胃受之咳受之咳

嘔甚則長虫出肝受之咳大腸受之咳大腸受之咳

嘔心之不巳則小腸受之咳小腸受之咳

臟腑治咳藥

肺咳宜麻黃附子細辛湯
脾咳宜桔梗湯
肝咳宜小柴胡湯
心咳宜黃連湯
胃咳宜半夏湯
大腸咳宜芍藥湯
小腸咳宜黃芩湯
三焦咳宜桑白皮湯
皆聚於胃關於肺使人

風腎咳宜麻黃附子細辛湯
風脾咳宜桔梗湯
風肝咳宜小柴胡湯
風心咳宜黃連湯
風胃咳宜半夏湯
風大腸咳宜芍藥湯
風小腸咳宜黃芩湯
風三焦咳宜桑白皮湯

藥甘大腸咳宜赤石脂禹餘糧湯
甘草湯
乾薑湯
小腸咳宜
乾薑湯
各二錢
掛枝

氏入草
異薑
功煎
散三
內焦
宜
宜
錢

嗽作有四時早晏之異
凡咳最重秋是濕熱傷肺冬是火

風寒外束
○大槩春氣上升宜潤肺抑肝夏火
上炎宜清金降火秋濕熱甚宜清熱瀉濕冬風寒

重宜解表行痰
○藥發散之後以半夏等藥逐去
其痰庶不再來
○早晨嗽多者胃中有食積至

此時火氣流入肺中
○瀉白散加知母或二母散
○上半日嗽多屬胃中有火用貝母石膏降胃

火一云上半日咳多者
○前胃中有實火單石膏
丸方加知母貝母若便閉喘渴痰稠者宜涼膈

散方
○午後嗽多屬陰虛
○四物湯加知母炒黃
拍先降其火
○云午後嗽
○下也
○多屬陰虛
○四物合

二陳湯加知母黃柏麥門冬
○如寒熱盜汗遺精宜
滋陰降火湯
○方
○黃昏嗽多此火氣浮於肺不

宜用涼藥
○五味子
○五倍子
○斂而
○降之
○一云黃昏
○多者
○夜嗽
○潤肺丸
○斂之
○御丸
○肺散
○通用
○二陳湯

去半夏加貝母瓜蒌青黛梔子黃芩桑白皮○夜嗽用降陰分大胡○風寒鬱熱夜嗽者三拗湯加

知母黃芩生薑

桔梗湯除痰止咳嗽又治心咳桔梗半夏梨陳皮去

水煎服

二母散治諸般咳嗽兼治痰喘知母貝母各一兩已

斗細爵白湯下便合口聽其嗽即定亦治久嗽不愈

咳嗽諸證有風嗽寒嗽熱嗽濕嗽驚嗽勞嗽食積嗽氣

嗽通治咳嗽藥○咳因氣動鳥聲嗽乃血化為痰肺氣動則咳脾濕動則咳脾肺二藏俱動則咳

俱作也

風嗽傷風乘肺則鼻塞聲重口乾喉痒語未竟而咳燥鼻

流清涕欲語未竟而咳
欬冬花散入參荆芥散
○傷風咳嗽宜神木散

三拗湯加減

神木散

治傷風頭痛鼻塞聲重咳嗽
蒼朮二錢羌活
川芎白芷細辛甘草各一錢
右剉作一貼薑

三葱煎眼翳

欬冬花散

治寒壅相交肺氣不利咳嗽痰盛麻黃
母桑白皮半夏款冬花各五分
杏仁甘草炙各一錢知

右剉作一貼薑三片水煎服

金沸草散

治肺蒸風寒咳嗽聲重痰涎黃濁
蘇子二錢旋覆花前胡各一錢
辛麻黃赤

茯苓各一錢半夏七分細辛甘草各三分
右剉作一貼入薑三棗二梅一水煎綿瀝去滓服

三拗湯

治感風寒咳嗽鼻塞聲重失音麻黃不去根
杏仁不去皮尖甘草不炙不去皮各一錢

半右剉作一貼入薑五片水煎服

五物湯

治感風寒咳嗽聲重咽痛三拗湯加

加減三拗湯

治風喘嗽麻黃二錢杏仁桑白皮各一分右到

寒嗽

寒傷肺者變則胃緊聲啞脈緊增寒發熱無汗惡寒煩燥不渴遇寒而咳

重惡寒二陳湯加麻黃杏仁桔梗白除積梗湯

每遇寒則發乃寒包熱也解表則熱自除

反侮土寡於不畏也腹中大寒痰白作沓口甘涎沫

者胃中寒而和以辛甘熱去之

實飲華蓋散杏仁湯紫蘇飲子橘蘇散薑桂九人

九寶飲

治諸般咳嗽及寒嗽久嗽陳皮薄荷麻黃桂

皮桑白皮紫蘇葉杏仁大腹皮甘草各一錢

右剉作一筒水煎服入薑五

華蓋散

治肺感寒邪咳嗽上氣鼻塞聲重麻黃二錢赤茯苓蘇子陳皮桑白皮杏仁各一錢甘草

三錢五分右剉作一貼入薑

杏子湯

治感風寒痰盛咳嗽尤宜冷嗽人參半夏赤茯苓白芍藥細辛乾薑桂皮杏仁五味子各

一錢甘草五分右剉作一貼入薑

紫蘇飲子

治脾肺虛寒咳嗽痰盛紫蘇葉桑白皮杏仁五味子麻黃陳皮甘草各一錢入

麥半夏各六分右剉作一貼入薑

橘蘇散

治傷寒咳嗽身熱有汗脉浮數服杏子湯不

白皮貝母五味子各一錢甘草五分

薑桂丸

治寒痰咳嗽桂皮二兩南星半夏並製各一兩右為末薑汁浸蒸餅和丸黍豆大薑湯下

三五十九

人參款花膏

治肺胃虛寒久嗽不已款冬花人參五

味子桑白皮紫苑各一兩右為末蜜丸
艾實大每一丸以淡薑

半夏溫肺湯

治虛寒咳嗽中脘有痰水冷氣心下注
洋嘈雜多唾清水脉沉弦細遲此胃虛

冷也半夏細辛桂心旋覆花陳皮人參桔梗白芍
藥甘草各一錢赤茯苓六分右剉作一貼入薑五

水煎服

杏蘇湯

治傷風寒咳嗽痰盛杏仁紫蘇葉桑白皮陳
皮半夏貝母白朮五味子各一錢甘草五分

右剉作一貼入薑五

人參潤肺湯

治傷寒咳嗽人參乾葛桔梗白芷麻黃
乾薑白朮甘草各一錢右剉作一貼薑

三葱二煎服

温肺湯治肺虛客寒喘咳嘔吐痰沫 薑細辛阿膠珠

各五分右剉作一貼入

加味理中湯治肺胃俱寒 嗽入參白朮乾薑甘草

右剉作一貼入薑

八味款冬花散治肺經寒熱不調 嗽不已桑白皮

紫苑茸五味子甘草各一錢 煎去滓入黃蠟皂角子大再煎 化服之

飴薑元治冷嗽黑糖一斤 乾薑細末四兩 下許

熱嗽傷於暑熱而得咳則口燥或吐涎沫 嗽傷暑

凡受嗽面赤胃腹脇常熱 惟足有涼時其脈洪

滑者熱痰在內也宜小陷 湯乾 丸小黃丸 貢連化

肺湯貝母散參朮調中湯 苓半丸 小黃丸貢連化

痰丸四
汁膏

洗肺散

治愛嗽痰盛有熱肺氣不清利半夏三錢黃
芩二錢天門冬麥門冬五味子各一錢半杏

仁一錢甘草五分右對作
一貼入薑五片水煎服

人參瀉肺湯

治熱嗽即涼肺散坊覘去朴硝加入參
枳殼杏仁桑白皮等分對煎服

貝母散

治火嗽久嗽杏仁三錢款冬花二錢知母一
錢半貝母桑白皮五味子甘草各一錢右對

作一貼入薑三
片水煎服

參朮調中湯

除熱補氣止咳定喘和脾胃進飲食桑
白皮一錢黃芪八分人參白朮白茯苓

甘草各六分地骨皮麥門冬陳皮各四分青皮
二分五味子二十粒右對作一貼水煎服

芩半丸

治熱嗽生痰黃芩半夏各一兩右為末
薑汁糊和丸梧子大薑湯下七十九

小黃丸

治熱痰咳嗽製各一兩右為末薑汁浸蒸餅和
星半夏並製各一兩右為末薑汁浸蒸餅和

身醫寶金新卷五

三六

六

九梧子大薑湯
下五七十九丸

黃連化痰丸
治熱痰咳嗽黃連吳茱萸各一錢半陳皮五錢半夏一兩半右為末薑汁糊和

九菜豆大薑湯
吞下一百九丸

四汁膏
止咳消痰降火雪梨汁藕汁生蘿菈汁生薄荷汁右等分入砂糖屑和勻慢火熬成膏

服以匙抄

濕嗽

者濕勝肺者咳嗽則身重骨節煩疼或汗浙○濕傷者脈細骨節煩疼四肢重着有汗小便不利

○散
濕嗽宜不換金正氣

白朮湯
治濕嗽痰多身體重着脈濡細白朮三錢半夏橘紅白茯苓五味子各一錢半甘草五分

右剉作一貼入薑五水煎服

白朮丸
治濕痰咳嗽身重脈緩白朮一兩半南星半夏並製各一兩右末薑汁糊和丸薑湯下五

七
九

鬱嗽

即火咳甚者乾咳而無痰乃腎水焦枯邪火獨熒於肺宜瀉白散妨觀清化丸訶黎勒丸霞天膏見

附○火鬱者有聲痰少面赤者是也宜用清金降火湯

清化丸

治肺鬱痰嗽睡不安貝母一兩杏仁五錢言黛三錢右為末砂糖入薑汁糊和丸彈子大

明禽化

訶黎勒丸

治勞嗽乾咳及肺脹喘急訶子皮五錢海

半右為末薑汁和蜜為丸

清金降火湯

治熱嗽能瀉肺胃之火火降則痰消嗽止陳皮杏仁各一錢半赤茯苓半夏持

梗貝母前胡瓜蒌仁黃芩石膏各一錢枳殼八分甘草三分右剉作一貼入生薑三片水煎服食後

醫

東醫寶鑑卷之五

二十七

勞嗽

虛勞咳嗽也。勞嗽者，盜汗出，兼痰多，作寒熱，宜補陰清金。四物加黃柏、知母、五味子、麥門冬、桑白皮、地骨皮、鱉甲。

○好色之人，元氣虛弱，咳嗽不愈，宜瓊石膏、方規、物加黃柏、知母、五味子、麥門冬、桑白皮、地骨皮、鱉甲。

治虛勞乾咳，最捷。明○勞嗽，宜人參、清肺湯、加味。

補肺湯、溫金散、大寧嗽湯、知母湯、寧嗽膏、大阿膠。

元使燥熱，乘肺咯唾膿血，上氣涎潮，其嗽連續而。

不加橘紅、貝母、六味地黃丸、腧、覲。

入參清肺湯

治久咳勞嗽及肺痿、唾血、腥臭、入參、桑。

杏仁、桔梗、甘草、各一錢、右剉作一貼、入大棗、烏梅。

一名入參、清肺飲、煎去滓、入蜜一匙、攪勻、澄清、吸服、罇。

加味二母丸

治久嗽勞嗽、食積、嗽、知母、貝母、同、巴、豆。

味等分右為末和薑汁入蜜為丸
化點下或加麥門冬陳皮阿膠珠亦好
入參芎歸湯治乾嗽因虛勞少血燥熱乘肺咯噎膿

人參芎歸湯

治乾嗽因虛勞少血燥熱乘肺咯噎膿

一錢半赤茯苓人參半夏陳皮阿膠珠細辛五味子甘草各七分右判作一貼薑三棗二水煎服

加味人參紫苑散

治虛勞咳嗽人參五味子紫苑草陳皮紫蘇葉貝母桑白皮白茯苓

各一錢杏仁甘草各七分半加川芎半夏麩各一錢阿膠珠五分右判作一貼薑五棗二水煎

服

潤肺丸

治燥疾乾嗽勞嗽貝母一兩瓜蒌仁青黛各五錢石為末薑汁蜜調成膏噲化

補肺湯

治勞嗽桑白皮蜜炒熟地黃各三錢人參紫苑黃芪五味子各一錢右判作一貼水煎入

蜜一匙

溫金散

治勞嗽防風桑白皮黃芩甘草各五錢麥門冬去皮尖二十一粒人參茯苓神各五錢

二錢半右取前五味入米泔水浸一宿晒乾次入
入參茯苓神麥門冬同為末每取三錢入黃蠟大豆

許煎服

大寧嗽湯

治勞嗽神效半夏二錢五味子赤茯苓桑
白皮紫蘇葉陳皮枳殼杏仁阿膠珠鬻栗

殼蜜炒各一錢細辛甘草各五分右到
作一貼入薑三棗二梅一水煎服

知母湯

治虛勞咳嗽唾膿血心肺有熱黃芪蜜炙一
錢半白芍藥生乾地黃黃芩麥門冬入參白

茯苓桔梗知母各一錢甘草五分右到作
貼入薑三片竹葉三片小麥一撮水煎服

寧嗽膏

治陰虛火動咳嗽咯血天門冬白朮各八兩
百部根杏仁貝母百合各四兩款冬花五兩

紫苑三兩右麤剉以長流水一斗煎取三升又
新水煎取三升如此三次合取汁入飴糖八兩蜜

十六兩再熬入阿膠四兩白茯苓細末
四兩和勻成膏每服三四匙不以時

大阿膠元

治虛勞咳嗽吐血唾血發熱消瘦山藥五味
子熟地黃阿膠珠白茯苓各一兩麥門冬

本草綱目卷之五

三九

丹參貝母防風茯苓神栢子仁百部根杜冲各五錢
遠志人參各二錢半右為末蜜和作丸彈子六等

煎和滓呷服略
一丸以水略

食積嗽因食積生痰咳胃滿噫酸宜二陳湯加厚朴
山查子麥芽食積嗽非青黛瓜萹實不除

又云有食積人面青白黃色不常面上如蟹爪路
一黃一白者是也○食積痰嗽發熱者半夏南星

並製為君瓜萹實蘿藦子為臣青黛石礞為使薑
汁糊為丸服胡○一方三補丸檉也加二母炒嗽

親為末水瓜萹九椒核大以竹瀝藕汁吞之胡○食積
嗽宜瓜萹九青金九二母寧嗽湯温脾湯香附九

方

瓜萹九治食痰壅滯喘嗽瓜萹實半夏麴山查子神
麴各等分右為末瓜萹水和九竹瀝薑湯

下五七
九初

青金九治食積火鬱嗽劫藥也貝母知母各五錢巴
豆霜五分右末薑汁糊和九青黛為衣白湯

下二七
丸研

二母寧嗽湯

治傷飲食胃火上炎衝逼肺氣痰嗽
不愈一服即差石膏二錢貝母知母各

一錢半梔子黃芩各一錢二分桑白皮赤茯苓瓜
羹仁陳皮各一錢枳實七分生甘草二分五味子

十粒右剉作
貼薑三煎服

溫脾湯

治食飽則咳甘草四兩大棗二十枚
右剉水五升煮至二升分三服針

香附丸

治食積痰嗽蒼朮三兩香附子一兩半藜蘆
子炒瓜羹仁杏仁半夏各一兩黃芩赤茯苓

各五錢川芎三錢右為末薑汁
糊和丸淡薑湯下五七十九

氣嗽

七氣積傷成咳嗽痰涎凝結或如敗絮或如梅核
滯塞咽喉咯不出燕不下婦人多有之

宜蘇子降氣湯訪覘加味四七湯
青龍散三子養親湯蘇子煎玉粉丸星香丸橘薑

橫丸

團參飲子

治七情咳嗽勞傷肺脾多唾膿血崩成肺痿將作勞瘵人參半夏紫苑阿膠珠百合

款冬花天門冬杏仁經霜桑葉各一錢細辛甘草各五分五味子十五粒右剉作一貼薑三煎服

青龍散

治咳上氣不得聞人參陳皮紫蘇葉五味子右剉一兩薑三水煎服

三子養親湯

治咳氣急養脾進食紫蘇子藥薑子白芥子各一錢紙上微炒研煮為飲勿

煎太過味苦

蘇子煎

治老虛人上氣咳嗽紫蘇子一升另膏烏末杏仁去皮尖雙仁一升另研為泥生薑汁生

地黃汁白蜜各一升蘇杏二味以二汁澆之絞取汁其滓再擣再絞令味盡出乃合蜜攪勻盛器中

重湯煮如錫每服一大匙日三或去地黃汁代竹瀝亦佳

玉粉丸

治氣痰咳喘急陳皮二兩南星半夏各一兩右為末以薑汁浸蒸餅和丸薑湯下五七

十一九

星香丸

治氣嗽生痰南星一宿陳皮五兩白礬一晝夜去

不見火為末薑汁糊和丸梧子大薑湯下五七

秘方累驗明

橘薑丸

治久患氣嗽聖藥陳皮生薑同搗焙乾各二

下三五

痰嗽

者痰出嗽止胃膈多滿蓋溫痰在胃上干於肺則

止也呀○痰鬱肺經咳則涎多二陳湯加枳殼括

痰嗽者小柴胡湯方觀加知母白芍藥五味子桑

肺散橘甘散滴油散二母散玉芝元澄○痰嗽宜洗

半瓜丸

治痰嗽半夏瓜薑仁各五兩右為末薑汁浸蒸

見...

三二

餅和丸梧子大薑湯下五七十九丸半
夏須久浸薑汁炒黃色否則辣喉

摘甘散治氣嗽痰嗽甚效
摘皮生薑焙乾神麴炒各
等分右為末溫水和丸梧子大米飲下五七

十九日
再傳

滴油散治痰嗽面浮如盤
蚌粉新瓦上炒令通紅放
地上出火毒每半兩加青黛一錢以淡薑水

滴入麻油數點
調服即愈

玉芝元治風熱痰盛
嗽聲重半夏麴六兩入參薄
荷白茯苓白礬枯南星
泔浸焙各三兩右為

末薑汁煮麴和丸梧子
大薑湯下五七十九丸

澄清飲治痰嗽服他藥不效者
南星半夏並製蚌粉
知母貝母白礬各一錢
右判作一貼薑五煎

澄清徐
徐服

三聖丹治久痰嗽極效
半夏製二兩南星煨一兩甘
草生半兩右以半星二味為末
薑汁拌勻膏

作麩冬十夏五春秋七日取出再為末入甘草末
和勻竹瀝一椀拌和作餅子焙乾又將竹瀝沃濕
焙乾如此十數次以竹瀝盡為度再研為末凍蜜
調和如飴臨卧抄一匙於口內噙化以竹瀝漱口
燕下

藍漆煎元 治痰嗽藍漆二兩人參杏仁胡桃肉各一
兩右為末蜜九彈子大每一九薑湯或米

飲下

安肺散 治痰嗽不問新久鷲粟殼炒黃色四兩麻黃
甘草炒各二兩右麩末每三錢烏梅一箇同

煎服

人參散 痰嗽通用半夏麩二錢人參桔梗五味子細
辛枳殼赤茯苓杏仁各一錢甘草五分右剉

作一貼入薑五
梅一水煎服

白圓子 治風痰嗽有定此乃肝木尅脾土風痰壅盛
俱出盡方小定此乃肝木尅脾土風痰壅盛

乾嗽

香橘紅天麻全蝎白僵蚕水煎和薑汁服
 所致宜以白元子方作生料
 乾嗽者無痰有聲是也此證本於氣
 連咳十數聲方有痰出澀甚者雖咳
 十數聲亦無

痰出是為乾咳極難治此係火鬱之證
 乃痰鬱火邪

在肺中用苦桔梗以開之不用補陰降火
 之劑不

已則成勞須行倒倉法此不得志者有之
 用四物

湯加竹瀝炒黃柏之類
 吐之蜜煎生薑湯蜜煎陳皮湯燒生薑
 胡桃方皆

治無痰而嗽者以辛甘潤其肺也
 肺生地黃二斤洗淨杏仁二兩生薑各
 四兩

右搗如泥盛磁器置飯上蒸五七度每
 於五更挑

三匙燕下轉○又方白蜜一片生薑二
 斤取汁先

秤銅器知斤兩訖內蜜復秤知數次內
 薑汁以微

火煮令薑汁盡惟蜜斤兩在則止每服
 如棗子大

倉化日三針○乾嗽宜用瓊玉膏
 肺散加味二母九訶黎勒九抑痰丸
 潤

血嗽損而致四物湯加大黃蘇木為末
 酒調服或打水煎

血嗽損而致四物湯加大黃蘇木為末
 酒調服或打水煎

血嗽損而致四物湯加大黃蘇木為末
 酒調服或打水煎

血嗽損而致四物湯加大黃蘇木為末
 酒調服或打水煎

血嗽損而致四物湯加大黃蘇木為末
 酒調服或打水煎

服嗽宜服人桃仁七粒以韭汁送下最佳研

人參百合湯治勞嗽吐紅白痰芍藥人參五味子黃

甘草各三分右剉作一細辛紅花桂皮

桑皮散治上焦有熱血壅腥悶嗽聲連併氣不得透

右剉作一貼入薑三片棗二水煎服

當歸飲因打撲損傷肺氣咳嗽吐血大黃蘇木生

服溫酒調

酒嗽濕性大熱因傷引飲冷與熱凝於胃中不散而成

為末薑汁煉蜜和丸櫻桃大常常含化散肺毒

宜萋杏連丸又痰嗽以竹瀝煎紫蘇入韭汁就吞瓜

瓜蒌杏連丸

治酒痰嗽及積痰久嗽留肺腕粘滯如膠氣
右為末以竹瀝薑湯煮糊和丸服

蜂薑丸

治酒痰嗽及積痰久嗽留肺腕粘滯如膠氣
不升降便香附白殭蚕炒海蛤粉瓜蒌仁蜂

房杏仁神麴各等分右為末以薑汁竹瀝入蜜和
丸櫻桃大含化燕下研○一方無香附有薑根

久嗽

乃積痰久留肺腕粘滯如膠氣不升降或挾濕與
酒而作研○久嗽宜蜂薑丸加味二母丸入參清

肺湯貝母湯九加味百花生潤肺除嗽飲
肺湯馬兜鈴九加味百花生潤肺除嗽飲

貝母湯

治諸般久嗽貝母薑製乾薑生五味子陳皮
半夏製柴胡桂心各五錢黃芩桑白皮各二

錢半木香甘草各一錢二分半右為末每五錢入
製杏仁七筒生薑七片水煎服○一婦患積年嗽

服此一貼即愈神效

九仙散

治久嗽乃收功後藥收斂之劑也
炒二錢人參款冬花桑白皮桔梗阿膠珠五

味子各一錢貝母半錢右剉作
一貼入薑三梅一水煎服

入參款花散治久嗽鴛粟殼蜜炒黃色一兩入參款

右烏龍末每五錢烏梅一箇同水煎服

天鼠散治久咳上氣十年諸藥不差編

清肺湯治久咳及痰嗽肺脹嗽黃芥一錢當歸天門冬

施子杏仁麥門冬各七分五味子七粒甘草三分右剉作一貼薑三棗二水煎服

馬兜鈴丸治久嗽神效馬兜鈴半夏杏仁各一兩另

和勻以烏梅煎膏和丸梧子大雄黃為衣以烏梅湯下十九以利為度

加味百花膏治久嗽不愈紫苑冬花各一兩百部

調下食後

潤肺除嗽飲治遠年咳嗽如神款冬花紫苑韋麻黃

梅肉 罌粟殼 各七分 八分 參杏仁 薄荷生甘草 各五分 五味子 九粒 右剉作一貼 薑三片 細茶一撮 同煎服

傳煎服

火嗽

火嗽有聲痰少而赤者是或煩渴引飲脉洪數

湯二母 嗽宜貝母散 清肺飲 柴胡枳桔湯 清金降火膏 人參清鎮丸 滋陰清化膏 海青丸 霜雪梨

清肺飲

治肺熱 變嗽前胡 荆芥 桑白皮 枳殼 各一錢 知母 貝母 薄荷 赤茯苓 桔梗 紫蘇 葉 阿膠 珠

杏仁 天門冬 甘草 各七分 右剉作一貼 入薑三梅一水煎服 槿

柴胡枳桔湯

治傷寒 胃脇痛 潮熱 咳嗽 痰盛 麻黃 杏仁 枳殼 桔梗 柴胡 黃芩 半夏 知母 石膏

乾葛 各一錢 甘草 五分 右剉作一貼 入薑三水煎服 齧

抑心清肺丸

治肺熱 咳嗽 咯血 卽黃連 阿膠 元也 助

則嗽自止 齧

玄霜雪梨膏

治勞嗽久不愈消痰止咳生津止咯

者勿用藕汁十鍾生地黃汁十鍾麥門冬煎取汁
五鍾生蘿藦汁五鍾茅根汁十鍾右汁重濾去滓

火上煎煉入蜜十六兩貽糖八兩柿霜八兩薑汁
半盞火上再熬如稀糊則成膏矣每服三五匙

人參清鎮丸

治熱止嗽消痰定喘柴胡人參各一兩
半生黃芩半夏甘草各七錢半麥門冬

三錢陳皮五味子各二錢青黛六錢右末
水糊和丸梧子大白湯下三五十九丸

滋陰清化膏

化源也生地黃熟地黃並酒浸天門冬
麥門冬各二兩黃栢鹽酒炒一兩半白茯苓山藥

拘杞子白芍藥酒炒知母鹽酒炒玄參薏苡仁炒
各一兩五味子七錢甘草生五錢右為末蜜丸彈

子大每一丸空心嚙化燕下○痰嗽甚加陳皮貝
母各一兩

兩

海青丸

治火鬱嗽及肺脹氣急息重訶子皮海蛤粉
瓜蒌仁青黛半夏製便香附各一兩右為末

本草綱目卷之八

三二五

以薑汁浸蒸餅和丸菜豆
大薑湯下三五十九

夜嗽

夜間咳嗽屬陰虛治之
屬陰虛宜降陰分火
用生薑以其辛散故

也。研。凡夜嗽久嗽多屬腎氣虧損火炎水涸或
津液涌而為痰須用六味地黃元虧覲加黃柏知

母天門冬貝母橘紅以滋化源滋陰降火湯坊
亦佳。翻。冬貝母橘紅以滋化源滋陰降火湯坊

麻黃蒼朮湯

治秋冬夜嗽不絕至曉方緩口苦胃痞
脇痛痰唾涎沫不進飲食麻黃八錢蒼

朮五錢黃芪一錢半草豆蔻六分柴胡羌活各五
分防風當歸梢生甘草各四分炙甘草黃芩各三

分五味子十五粒右剉
分作二貼水煎服

天行嗽

時令不正人多感冒咳嗽宜服參蘇飲
方覲。門服散

人參飲子

治天行咳嗽痰盛寒熱人參桔梗五味子
赤茯苓半夏桑一錢半枳殼甘草各七分

右剉作一貼薑五水煎服。寒暑之交氣盛久
厚作壅忽痰盛微熱此藥最宜若作感冒發其汗

湯治咳者勿用。咳病根之藥，除陰虛、血虛、火盛、乾咳、嗽者，勿用。咳病根之藥，除陰虛、血虛、火盛、乾咳、嗽者，勿用。

清金飲

治諸般咳，嗽。杏仁、白茯苓、各一錢，半橘紅一錢，水煎服。此一名。

杏仁、五味子、湯。此一名。

備急五嗽元

嗽五曰氣，嗽二曰邪，嗽晝夜不止，面曰燥，嗽四曰冷。

不下肉桂、乾薑、皂莢、各等分，石鳥末、蜜丸。梧子、大溫、水下十五丸。

喘證有八

喘者，火氣甚，則氣盛而息。喘者，火氣甚，則氣盛而息。

促者，謂之喘。喉中有聲響者，謂之喘。虛者，氣之身。

主氣急，喘而息。數張口，擗肩，搖身，滾肚者，是為喘。

也。明有起居如故，而息有音者，乃肺之絡脈逆。

冬寒，故病寒。則氣衰而息微。病熱，則氣盛而息。冬寒，故病寒。則氣衰而息微。病熱，則氣盛而息。

寒則息遲氣微熱則息數氣盛而為喘也
非風寒傷肺則痰火脹肺風寒則祛散痰火則疎

導但火急者亦不可純用苦寒宜溫以劫之
見下凡喘未發以扶正氣為主已發以散邪

為主明喘有風寒喘痰喘氣喘火喘水喘久
喘胃虛喘陰虛喘諸病發喘嗽通治喘嗽藥儲

風寒喘尋常感冒風寒內鬱肺脹逆而為喘風宜
草散坊見麻黃散入參潤肺散九寶飲坊見涕

寒宜加味三物湯入參定喘湯小青龍湯止喘元
蘇溫肺湯五味子湯九味理中湯五虎湯

喘必有氣之表怯冷痰如冰之證
虛必冷喘則遇寒而發

麻黃散治傷風喘急痰壅涕唾稠粘麻黃二錢桂皮
一錢二分款冬花訶子皮甘草各一錢杏仁

六分右剉作一貼入
細茶一錢水煎服

人參潤肺散治感冒風寒咳嗽喘急痰壅鼻塞麻黃二
錢桔梗阿膠各五分橘紅二分煎服

剉作一貼入紫蘇葉二片同煎服

入參定喘湯 治肺感寒邪喘急亦治咳嗽粟殼蜜

麴阿膠珠甘草各一錢桑白皮

參蘇溫肺湯 治形寒飲冷則傷肺喘喝煩心胃滿短

半夏桑白皮白朮白茯苓各一錢甘草

五味子湯 治寒喘麻黃二錢五味子杏仁橘紅各一

貼紫蘇三葉煎服

加味三拗湯 治寒喘麻黃二錢陳皮一錢甘草五分

右剉作一貼薑三煎服

九味理中湯 治寒喘寒喘者手足冷脉沉細也縮砂

各一錢沉香木香各五分並水磨取汁右剉作一貼薑三水煎入沉香木香汁調服

五虎湯 治傷寒喘急麻黃三錢石膏五錢杏仁一錢甘草一錢細茶一撮桑白皮一錢半右剉作

白一貼入薑三片葱

止喘元 治冷喘革撥胡椒人參胡桃肉各等分右為末蜜和兩作三十九房一丸細嚼溫水下

痰喘 膏痰喘者九喘便痰聲門八痰喘宜千緡湯千緡導

痰化湯加減三奇湯貝母散平肺散紫蘇半夏湯定

乃痰在正發之喘正發時無痰而將愈時却吐痰者

路則易安宜拮梗瓜蒌仁枳殼杏仁蘇葉前胡等

引虛者補以 痰虛者補以 參芪歸朮

千緡湯 治痰喘數服即安半夏七枚炮四破皂角灸甘草各一錢右剉作一貼薑

服五水煎

千緡道痰湯

治痰喘不能卧
一服即安
半夏七枚
枳殼各一

錢皂角甘草各一寸
並灸右剉
作一貼
入生薑五片
水煎服

加減三奇湯

治咳嗽喘上氣痰涎不利
半夏二錢
桔梗

味子各一錢
甘草五分
右剉
作一貼
入薑三水
煎服

貝母散

治熱嗽及痰喘
辰時服
酉

平肺散

治喘嗽痰盛寒熱往來
咽乾口燥
陳皮一錢

桑白皮五味子杏仁桔梗各七分
甘草五分
右剉作一貼
薑三水煎服

紫蘇半夏湯

治喘嗽痰盛寒熱往來
桑白皮二錢
杏

菴各一錢
右剉作一貼
薑三水煎服

定喘化痰湯

治咳嗽痰喘
陳皮二錢
半夏南星並製

分款冬花人參各七分
右剉
作一貼薑五片水煎服

潤肺膏
治同上紫苑杏仁款冬花各一兩
麻黃桔梗
訶子細辛各五錢
枯白礬一錢
胡桃肉一兩

生薑二兩取汁清汁入兩蜜一
斤右先將油煉熟
次入蜜煉去沫却下藥未攪勻
每服二三匙白湯

調下臨
卧時

蘇子導痰降氣湯
治痰喘上氣蘇子二錢
半夏當歸
谷一錢半南星陳皮各一錢
前胡

厚朴枳實赤茯苓各七分
甘草五分
右剉作一貼入薑三棗二水煎服

大蘿皂丸
治氣喘痰喘風痰食痰酒痰
麩毒等證
菑子炒二兩皂角燒存性一兩
南星半

並製杏仁瓜蒌仁便香附青黛陳皮各五錢
右
未神麴糊和九梧子大薑湯吞下
六七十九丸

祛痰丸
治風痰喘嗽人參木香天麻陳皮赤茯苓
皮白木各一兩皂角九錢
槐角子半夏

錢半右為末薑汁糊和丸梧子大
每五七十九丸温酒或薑湯吞下

聖藥

氣喘七情所傷氣急而無聲響。驚憂氣鬱揚揚悶悶

引息鼻張呼吸急而無痰聲者是也。喘者上氣急促不能以息之謂也。醫氣虛氣短而喘

不可用苦寒之藥火盛故也。宜用人參蜜灸黃柏變門冬地骨皮之類。研。氣實人因服黃茂過多

而喘用三拗湯。見以瀉其氣。研。氣喘宜加味四七湯。加味白朮散。定肺湯。杏仁半夏湯。杏蘇飲。調

降湯加味四君子湯沉香降氣湯。加味四君子湯。

四磨湯治七情鬱結上氣喘急。人參檳榔沉香烏藥

服不拘時

六磨湯治同上。又治膏中氣膈甚。當四磨湯

清金湯治咳嗽喘急。膏滿氣逆。坐卧不安。陳皮赤茯苓

甘草各三分。右剉作一貼。八薑三七分。鷲粟殼。人參

煎服

加味白朮散治氣虛喘急飲食不進又治喘嗽飲酒

夏各一錢右作一服入薑三片桑白皮七寸同煎服

定肺湯治上氣喘嗽紫菀茸五味子橘皮蘇子杏仁

入薑五片紫蘇五葉水煎服

杏仁半夏湯治肺氣不足喘嗽杏仁半夏桔梗陳皮

薄荷各五分甘草一寸右麩末作一貼薑三水煎服

杏蘇飲治上氣喘嗽浮腫紫蘇葉二錢紫菀甘草各

半五味子一大腹皮烏梅肉杏仁各五分右剉作一貼入薑五片水煎服

調降湯治喘嗽上氣枳殼一錢三分甘草一錢半夏

本草綱目卷之五

四

各七分白豆蔻木香縮砂紫蘇葉各五分右剉作一貼薑五水煎服

加味四君子湯

治氣喘入參白朮各一錢三分甘草一錢當歸八分赤茯苓陳皮厚朴縮

砂蘇子桑白皮各六分沉香木香各五分並水磨取汁右剉作一貼入薑三棗二水煎和二香汁調

取汁

火喘

者手太陰之脉是動則肺脹滿膨膨而喘咳所生病者咳嗽上氣喘喝煩心胃滿

行于胃中而作也。平居則有氣平和行動則氣促而喘者是中衝脉之火上攻也。有老人素行動則氣促

唾血痰平居則不喘稍行動則氣促喘急以滋腎丸妨觀空心服七八十其證大減此泄衝脉之

進邪故如此其效也。○火炎於肺胃而喘者作

上有稠痰食入於咽墜下稠痰喘反六作俗不知此

作胃虛治以燥熱之藥以防火濟火也昔葉都督患此諸藥不愈後以導水丸防

身醫寶金新編卷五 四十一

寒方○熱喘者發于夏不發于冬
煎服神效又雙玉散亦

寒方○熱喘者發于夏不發于冬
煎服神效又雙玉散亦

寒方○熱喘者發于夏不發于冬
煎服神效又雙玉散亦

寒方○熱喘者發于夏不發于冬
煎服神效又雙玉散亦

寒方○熱喘者發于夏不發于冬
煎服神效又雙玉散亦

寒方○熱喘者發于夏不發于冬
煎服神效又雙玉散亦

雙玉散治熱喘痰涌如泉寒水石石膏各等分

麥門冬湯治火喘五分粳米一合大棗三枚右剉作一錢

貼水煎服日二匙○肺脹滿膨膨而喘咳者多用

則交兩手而脅者真氣大虛也若氣短加黃芪五

如油一婦素有痰嗽忽一日大喘痰出如泉身汗

漸少再加之瓜萸仁一錢半煎服一貼喘定汗止三貼痰

一錢服二錢餘貼而安此

加減瀉白散治陰氣在下陽氣在上咳嘔喘促桑白

人參八分陳皮一撮五味子各五分青皮甘草

加味生脉散治三脉伏喘促手足厥逆用此救之五味

單人參湯頻服之喘定者生不煎服者死或元氣素

虛傷寒汗下後氣短氣促喘目反

瀉火清肺湯治火喘片苓一錢梔子枳實桑白皮陳

分沉香五分水磨取汁朱砂五分水飛右制

作一貼水煎入沉香汁朱砂末竹瀝調服

玉液散 治喘嗽口乾煩渴瓜蒌根知母貝母炒各一

蠟二錢八米飲
同調服之

玉華散 治咳嗽上喘清肺氣利胃膈甜葶藶炒桑白

合人參各一錢百部根甘草各五分
右剉作一貼入薑四棗二水煎服

水喘 飲水氣者漉漉有聲怔忡喘息宜葶藶散
肺湯甚效 必生喘二證相因皆小便不利肺主氣先喘而後

脹者宜清金降火而行水次之脾主濕先脹而後
喘者宜燥濕行水而清金次之

夫不加短氣倚息則喘者是水氣之客也水者循津液
而流也腎者水藏主津液

也宜平肺湯杏蘇飲
也宜平肺湯杏蘇飲

也宜平肺湯杏蘇飲
也宜平肺湯杏蘇飲

也宜平肺湯杏蘇飲
也宜平肺湯杏蘇飲

葶藶散治水喘或面浮葶藶子炒黃為末
葶藶散大棗十枚濃煎去棗調二錢服

葶藶大棗瀉肺湯治肺癰喘不得卧又治支飲喘急
葶藶子炒黃色為末蜜和大如彈

丸以大棗二十枚水三升煎取二升去棗八
更煎取一升頓服之○孫兆治一人吐痰頃間已

及一升喘咳不已服此一貼已
覺宵中快利略無痰唾矣

神秘湯治上氣喘急不得卧則喘者水氣逆行上
乘于肺肺得水而浮使氣不得流通其脉沉

大宜服此柴蘇葉橘紅桑白皮各二錢人參赤茯
苓半夏各一錢木香五分右剉作一貼入生薑五

片水煎服
日二服

平氣散治濕熱喘急白牽牛頭末二兩半生半炒大
黃七錢陳皮去白五錢青皮檳榔各三錢右

細末每三錢薑湯調下○一婦人本肥盛霖雨時
因飲酒及潼乳得脹腹喘滿聲聞舍外不得安卧

大小便澀滯氣口脉大雨倍於人近沉緩有力此
因濕熱大盛而為喘邪氣盛則實實者宜下之用

此藥時一服減半再服喘止但有腎滿口

加減瀉白散 桑白皮地骨皮甘草各五分桔梗陳皮青皮各

煎服

平肺湯 肺與腎皆以至陰積水喘急咳嗽蓋水乘之

紫蘇葉各一錢麻黃七分半甘草五分右剉作一貼薑五水煎服

久喘 久病氣短不能接續似喘非喘者單人參湯或調

或人參清肺飲坊見倍八粟殼澁之門久喘未

發時服人參半夏丸已發時用沉香滾痰丸

單人參湯 治氣虛喘急人參紫菀湯定喘湯蠟煎散金久喘宜人參潤肺丸

一服野聲除目

夏冬自察監佳

四三

小蘿皂丸治久喘最妙蘿菹子蒸二兩皂角蝦五錢

右為末薑汁八蜜和勻搗
作丸櫻桃大含化嚥下

人參半夏丸化痰墜涎止咳嗽定喘治風痰茶痰食痰

寒水石各一兩人參赤茯苓薄荷南星炮各五錢
藿香二錢半右為末水糊和丸梧子大薑湯下三

十九日
三寶

人參紫苑湯治咳嗽喘急久不愈鷲粟殼薑製二錢

子桂枝各五分人參紫苑甘草各四分
右剉作一貼入薑五梅一箇水煎服

定喘湯治肺虛久喘歌曰和劑須捉定喘湯阿膠半

強鷲粟二錢須蜜灸三錢煎服用生薑多年氣喘
從今愈始信良醫有妙方

喘湯同但兩錢
之數異宜考

蠟煎散治虛勞久喘嗽或咯膿血杏仁人參麥門冬

灸各等分右為麤末每三錢入黃蠟皂角子大向水煎温服

金不換散治喘嗽久不已 鴛粟殼蜜炒五錢 枳殼四錢 杏仁甘草各三錢 右剉作二貼入薑三

梅一煎服

入參潤肺丸治肺虛咳嗽日久成勞知母三兩桔梗

甘草各二兩右為末蜜煎丸

胃虛喘胃虛極則氣上逆撞肩擗肚喘而身不休息脈散

云胃為氣逆又云紀賊風虛邪者陽受之陽受之

則入六府入六府則身熱不時卧上為喘呼又云

生者何也厥逆連臧則死連經則生此胃喘宜加減白虎湯

之類

陰虛喘

血虛則陽無所依附而上奔宜四物湯倍芍藥加入參五味子以收之

直衝清道而上宜降氣滋陰二陳湯加枳殼黃芩

知母黃柏霜雪梨膏緩則治其本宜滋陰清化膏

去死凡喘不得卧其脉浮按之虛而溢者為陰虛

宜寧肺湯治肺虛咳喘急發熱自汗阿膠一錢半川

寧肺湯

治肺虛咳喘急發熱自汗阿膠一錢半川

人參桑白皮白茯苓甘草各七分

潤肺豁痰寧嗽湯

治陰虛喘急及痰嗽陳皮半夏熟

分酒洗款冬花分黃芩酒洗桔梗當歸天門冬各六分

作一貼入薑

三水煎服

人參五味子散

治氣血勞傷虛損喘嗽膿血寒熱盜汗入參五味子桔梗白朮白朮茯苓熟

地黃當歸甘草各七分地骨皮前胡桑白皮枳殼黃芪陳皮柴胡各五分剉作一貼入薑三片水煎服

煎服三

諸傷發喘嗽

凡入夜行則喘出於腎有驚恐喘出於肺者氣行則已怯者着而為病也細骨當是之時

肺者氣傷心渡水跌仆喘出於腎與骨當是之時

宜甘膽丸九食熱致嗽宜葶藶散紫苑茸湯服

甘膽丸

治吃酸搶喉因成喘嗽不止諸藥無效甘草

五枚浸三日取出炙乾為細末煉蜜和丸菜豆大每服四五丸茶清吞下卧服神效曾有人患此

病諸藥不效用此一服愈

葶藶散

治過食煎炒及酒以致喘急不得卧及肺癰甜葶藶子炒及瓜蒌仁薏苡仁桑白皮并麻

葛根括梗各一錢甘草五分
右剉作一貼薑三水煎服

紫菀茸湯治過食煎溽邪熱傷肺咳嗽咽痒痰多喘急脇痛紫菀茸經霜桑葉款冬花百合杏

仁阿膠珠貝母蒲黃炒半夏各一錢犀角人參甘草各五分右剉作一貼薑五水煎服

杏參散治墜墮驚恐渡水跌仆喘急不安杏仁參桑白皮紫蘇葉甘草各七分

右剉作一貼薑三水煎服

喘嗽通治藥宜杏參散含膏九定喘化痰散杏膠飲雞鳴九二方

杏參散通治咳喘急杏仁參桑白皮杏仁各錢半右剉作一貼薑三棗二煎服

含膏丸通治喘嗽葶藶子一兩隔紙熬令黑知母貝母各一兩半和勻為丸如彈子大新綿裹一

丸含之徐徐無津甚者不過三九效

定喘化痰散治喘至乾每甲納半夏白礬各一字入

罐內封閉勿令烟出火吸通赤放冷細
研入麝香一錢以糯米飲調下一錢

杏膠飲

治十六般哮喘杏仁明膠各一兩馬兜鈴半
夏製八參汁草杏五錢右細末每二錢水一

盞薑三片煎至七分臨服○心嗽加乾葛○肝
嗽加烏梅一箇大米十四粒○脾嗽入薑三片棗

二枚○胃嗽入蛤粉煎○膽嗽加茯苓神茶清調下
○肺嗽入桑白皮煎○腸嗽薑汁調燕下○勞嗽

入秦艽煎○暴嗽入葱白三寸煎○血嗽入當歸
棗子煎○烏梅生薑煎○產嗽入甘草三

寸黃蠟少許煎○氣嗽入青皮煎○熱嗽蜜一匙
葱白煎○哮喘入半夏三枚煎○腎嗽入黃芪白

即效糖煎服

雞鳴丸

治十八般咳嗽哮喘吐血諸證如神知母炒
四兩旋覆花陳皮馬兜鈴麻黃甘草各一

兩桔梗人參各五錢阿膠珠款冬花加味子各四
錢杏仁葶藶子炒半夏製各三錢右烏末蜜丸彈

子大每一丸烏梅薑棗煎湯嚼下日三○十般
者肝咳心咳脾咳肺咳腎咳胃咳小腸咳大腸咳

夏冬... 卷之六

內磨愛勝脫咳三焦咳內因咳外因咳不
因咳氣咳寒咳熱咳暴咳也翻

雞鳴丸

皮通治喘嗽知母酒炒貝母炒陳皮去白桑白
皮蜜炒款冬花旋覆花天門冬麥門冬人參

各等分右為末蜜丸彈子大以烏梅湯或薑湯化
葶藶子炒桔梗杏仁麩炒半夏薑製阿膠珠甘草

下
九劑

喘嗽宜辨寒熱

因風者遇風則嗽甚因寒者值寒則嗽
劇因熱者遇熱則嗽即發更有一驗其

的但問遇夜飲酒夜間如何若喫酒後嗽甚則有
熱也喫酒了嗽減則有寒也延清白者有寒也黃

濁者有
熱也

喘嗽宜分虛實

治法最要分肺虛實若肺虛久嗽宜五
子款冬花紫苑馬兜鈴之類補之若

肺實有火邪或新嗽宜黃芩天花粉桑白皮葶藶
子之類瀉之○久病氣虛而喘宜阿膠人參五

味子新病氣實而喘宜桑白皮苦葶藶○肺之
生病嗽喘大抵秋冬則實春夏則虛若實則面赤

飲水身熱痰盛涕唾稠粘或咽乾而腫若虛則面
白脫色氣少不語喉中有聲痰唾清利。肺感微
寒八九月間肺氣大旺病嗽者
病必實非久病也宜瀉之機

喘嗽聲嘶喘嗽聲嘶乃血虛受熱青黛冷粉為末蜜丸
常喘常喘化明。宜用芩連四物湯臘馨部

喘嗽上氣出於腎虛故氣逆而上咳痰盛或喘或脹
夫腎虛為病不能納諸氣以歸元

髓虛多唾足冷骨痿胃腹百骸俱為之牽掣其嗽
愈重其聲愈乾君子當於受病之處圖之可也。

抑猶有說焉肺出氣也腎納氣也肺為氣之主腎
為氣之藏凡咳嗽暴重動引百骸自覺氣從臍下

逆奔而上此腎虛不能收氣也當以補骨脂安腎
元虧觀主之毋徒從事於寧肺也。○以下元虛冷腎

氣不得歸元上喘氣急宜安腎元八味丸見
人參湯吞下空心藥。○咳嗽煩冤者腎氣之逆也

綱

喘嗽劫藥諸喘不止後因痰目極細末每一二錢薑湯調服
止之止後因痰目極細末每一二錢薑湯調服

百一十一

研○諸喘切藥蘿菥子蒸熟一兩皂角燒灰三錢
右為末薑汁加蜜九服明○治嗽切藥五味子五

錢甘草二錢末蜜九鴉化明
硝各一錢末蜜九鴉化明

喘嗽熏藥久喘嗽非此不除南星款冬花鵝管石
留舌上次用艾燒之須令烟入喉中一方無佛耳
草有鬱金研○久咳夜咳冬咳風入肺竅者宜熏
之花○久嗽風入肺鵝管石雄黃鬱金各一錢款
冬花三錢為末每取二錢拌艾捲作筒子燒烟吸

入口中温茶常呷下○款冬花如雞子大蜜拌
潤之用有甯瓦餅中燒藥却以餅甯當口吸烟燕

之甚效○無款冬花則用
紫苑茸如上法熏之亦佳○款冬花如雞子大蜜拌

哮證哮以聲響言喘以氣息言○哮即痰喘甚而常發
者○哮吼者肺竅中有痰氣也
乎痰宜吐法吐藥中多用醋○不可用涼藥必帶表
散此寒包熱也必須薄滋味○不可用涼藥必帶表

者有二證一者屬寒包熱宜越婢加半夏湯

坊見一者屬寒包熱宜越婢加半夏湯

者見一者屬寒包熱宜越婢加半夏湯

者見一者屬寒包熱宜越婢加半夏湯

劑防見或預於八九月未寒之時用承氣湯一寒門

下其熱至冬寒時無熱可包自不發作○湯一寒門

年病哮喘十月則發一過正當九月十月之交此疾

未得汗泄宜溫散庶黃黃芩每貼用一月錢半為細

九津薑汁水煎臨候中服之與小胃丹○方

促而連續不能以息者謂之喘○響者謂之哮喘氣

用紫金丹一十九吐去其痰虛者止服二三丸則

不吐臨發時用此劫之丹溪方去豆豉更妙○水

哮喘者因幼時水蓄於肺為痰宜金沸草散○坊見

坊見○欲斷根者宜服定喘湯黃芩利膈丸勸○湯

紫金丹

治哮喘不得臥須三年後者可服信○末

陳湯○三

并和分作三分用紙筋泥包裏烘令泥乾却用炭

火煨青烟出盡為度放地上宿出火毒取為末

湯浸蒸餅和丸菜豆大食後冷茶清下類人
二十九小兒七九忌一應醜物湯水之類
二

紫金丹

凡遇天氣欲作雨便發齁喘甚至坐臥不得
飲食不進此乃肺竅中積有冷痰乘天陰寒

氣從背口鼻而入則肺脹作聲此病有苦至終身
者亦有子母相傳者每發即服不過七八次覺痰

腥臭吐出白色是絕其根本也白砒一錢生用枯
白礬三錢另研淡豆豉一兩水潤去皮蒸研如泥

右末合和燃作丸如菜豆大冷茶送下七九甚者
九九以不喘為愈不必多服久久服之奏效必矣

翻

定喘湯

歌曰諸病原來有藥方惟愁齁喘最難當麻
黃桑杏尋蘓子白果冬花更又良甘草黃芩

同半夏水煮百沸不須薑病人遇此仙丹藥服後
方知定喘湯○治哮喘神方麻黃三錢杏仁一錢

半片芩半夏桑白皮蘇子款冬花甘草各一錢白
果糊銀二十筒去殼碎炒黃色右剉作一貼水

煎服不
拘時翻

清金丸 治哮喘 遇厚味發者 羅當子 淘洗 蒸熟 晒乾 為末 一兩 皂角 燒存 性為末 二錢 右末 薑汁

九浸蒸餅和丸 如蘿當子 大每取三四十 清金丹 研

堯鈴丸 治齶齶喘 促不得卧 馬堯鈴 杏仁 蟬退 各一 兩 信砒 煨 三錢 右為末 棗肉 和丸 葵子 大臨

卧以冷葱茶清 送下 六七九

奪命丹 治齶齶喘 嗽上氣 信砒 一錢 白礬 二錢 白附 子 三錢 天南星 四錢 半夏 五錢 右先將信砒

白礬於石器內火煨紅 出火黃色為度 切不可犯 鐵器 却入餘藥末 和勻 薑汁 麩糊 和丸 如黍米 大

朱砂為衣 每服七丸 小兒三丸 井水吞下 忌食熱 毒物 此方治痰喘 劫劑也 病安之後 卽用 知母

茯苓湯 以補虛 可也 明寧

立定散 治哮喘 秘方 大皂角 一箇 劈開 去子 入巴豆 肉 鐵線 札 緊灸 焦黃色 末 每錢 用半夏 杏

仁 各一錢 香油 煮黃 俱為細末 每柿餅 一錢 香 細嚼 服之 溫水 送下 醫

解表二陳湯治哮喘乳二陳湯助陽貝母加紫蘇葉麻

右薑三煎服

五虎二陳湯治哮喘乳喘急痰盛石膏二錢麻黃杏仁

草五分木香沉香各五分水磨取汁右調和服

三白丸治乳氣大白半夏一兩生用白礞化入礞末於礞

內焙乾取出搗爛再炒成砂同前藥為末薑汁麩

黃丸

肺脹證咳而喘上氣煩燥者為肺脹欲作風如水發汗即愈

大者越婢加半夏湯主之水氣小龍湯而氣煩燥

主之肺脹主收飲用訶子青黛杏仁佐以海

化○肺脹而嗽或左或右不得眠此痰挾瘀血碍

氣而病宜養血以流動乎氣降火疎肝以清痰四

越婢湯

石膏四錢麻黃二錢甘草一錢右剉作一貼

煎服之

肺痿證

師曰或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數

或從更難又咳者宜生薑甘草湯○肺痿吐涎沫

而不咳者其人必遺尿小便數所以然者以

上虛不能制下故也此為肺中冷必眩多吐涎甘

草乾薑湯以溫之○肺痿咳唾因燥飲水者

自愈自張口者短氣也○肺痿之病若口中辟辟

燥咳宵中隱隱痛脉反滑數此為肺癰○肺痿

之證寒熱往來自汗咳唾口中涎多知母茯苓湯

主之證火盛者人參平肺散主之或為丸含化喘急

面浮者葶藶散功見大槩養肺養氣養血清金降
火附○肺痿將變為癰宜紫菀散海○咳嗽有濁
唾涎沫或咳嗽喘噤中有紅線膿血名曰肺痿熱在
上焦故也宜門冬清肺飲人參養肺湯切勞散噲

化仙
方楮

生薑甘草湯治肺痿咳吐涎沫生薑五錢人參二錢
甘草炙三錢大棗五枚右剉作一貼水煎服

煎服日
二劑

甘草乾薑湯治肺痿吐涎沫而不受甘草炙四錢
乾薑炮二錢右剉作一貼水煎服

知母茯苓湯治肺痿喘嗽寒熱往來自汗知母赤茯苓
各一錢人參半夏製各七分五

味子款冬花桔梗麥門冬柴胡各五分白朮甘草
各六分川芎阿膠珠各四分薄荷三分右剉作一

貼水煎
服

人參平肺散治心火刑肺傳為肺痿咳喘嘔痰涎
壅盛寒熱盜汗桑白皮二錢知母人參

地骨皮各五分
甘草各五分
炙各一錢
天門冬十粒
右剉作一貼
薑三分
陳皮青皮各五分
五味子二錢

水煎服

紫菀散 治肺痿咳唾膿血欲變成癰紫菀知母貝母
各一錢半
人參桔梗赤茯苓各一錢
阿膠珠

甘草各五分
右剉作一貼
薑三味
水煎服

門冬清肺飲 治肺痿證紫菀茸二錢
黃芪白芍藥甘草
各一錢半
人參麥門冬各一錢
當歸身六分
五味子十五粒
右剉作一貼
水煎服

人參養肺湯 治肺痿證
嗽有痰
午後熱并聲者
柴胡二錢
桑白皮一錢
赤茯苓五
味子

貝母杏仁枳實桔梗各七分
人參阿膠珠甘
草各五分
右剉作一貼
薑三分
棗二水煎服

劫勞散 治心腎俱虛勞嗽
二三四聲無痰
遇夜發熱
黃瘦此藥能治微嗽
瘵中有紅線名曰肺
痿若不治便成羸勞之疾也
防脫入

黃瘦此藥能治微嗽
瘵中有紅線名曰肺
痿若不治便成羸勞之疾也
防脫入

擒化仙方

治痰盛咳嗽喘吐膿血名曰肺痿甜梨汁生

各二兩五味子一兩石共熬去滓成膏入

噎逆證

於口而作聲之名也內經曰諸逆衝上皆屬於

火古方悉以胃弱言之未審孰為降火且以丁香柿蒂

之陰氣依胃為養胃土損傷則木來侮之矣陰為

火所乘不得內守木挾相火乘之故直衝清道而

上言胃弱者陰弱也虛之甚也明○孫真人云噎

逆遍尋方論無此名稱蓋噎逆者噎逆之名古人

以噎逆為噎耳大抵噎逆者即內經所謂病甚者

其聲噎是也噎者今入所謂乾嘔是也噎○噎逆

噎逆與噎為一

噎病成無已許學士謂之噎吃逆是也或以

者氣逆上衝而作聲也俗謂之噎或有連噎不絕收

或三五聲而止或七八聲而止或有連噎不絕收

氣不回者或有病久脾胃衰敗而發噎逆額上

出汗連聲不絕者最為惡候乃不治之證也醫上

咳逆

為咳逆何也然曰靈樞經云噦以草刺鼻令嚏嚏而巳無息而疾迎引之立巳大驚之亦可已詳此

三法正是治吃逆或閉口鼻氣使之無息亦立巳或作

則吃逆立止或閉口鼻氣使之無息亦立巳或作

寬盜賊大驚駭之亦巳此謂之噦吃者噦聲之得經旨也謂盜賊之噦者吃聲之重也謂之噦吃者噦聲之輕也

皆因病聲之輕重而名之也
○咳逆古入謂之餉是也
○後發其當分有餘不足者因內傷及大病

外感凡吐利及後多作噦此由胃中虛臍上熱故噦
○感凡吐利及後多作噦此由胃中虛臍上熱故噦

或至八九聲相連收氣不回至於驚人者若傷寒
及久病得此甚惡收氣不回至於驚人者若傷寒

下虛極宜橘皮乾薑湯或香散
下虛極宜橘皮乾薑湯或香散

苦胃滿脈數宜小柴胡湯
苦胃滿脈數宜小柴胡湯

皮竹茹湯半夏生薑湯
皮竹茹湯半夏生薑湯

失下而發噦者宜調胃承氣湯
失下而發噦者宜調胃承氣湯

者文下熱奔急上行而肺陰不納何其當哉便秘

者大承氣湯又有下之便軟者瀉心湯主之助

痢後逆

痢後逆以人參白朮煎湯調益元散助

作着宜補中益氣湯內加竹茹生薑炮附子

黃栢知母陳皮竹茹生薑枳殼縮砂紫蘇葉或

後由中氣虛甚也補中益氣湯調中益氣湯助

食塞逆

飲食填塞胃中或食物太甚噎而不下發

三香散入于胃胃氣上注于肺今有故寒氣與新穀氣俱

還入于胃新故相亂真邪相攻氣并相逆復出

痰閉逆

痰閉於上動於下無別證忽然發噎從

薑汁少煎服或入參薑煎湯服而吐之則愈蓋參

蘆瀉肺衰氣降而火土復位矣

發嗽宜六君子
湯方現嗽

水結咳逆

胃中虛冷不能食者飲水則嗽
水結胃而發嗽宜小陷胃湯或飲

小飲水過多而吃逆者別無惡候五苓散
青龍湯去麻黃加炮附子煎服之
方主之

細

過笑咳逆

笑噦食噦皆屬有餘之證以紙
撚探鼻取嚏或久閉氣可止

咳逆易治難治證

噦噦一聲頻密相連者為虛難治多死
在朝夕

收氣不回者難治
咳逆至七八聲相連

橘皮乾薑湯

治胃寒咳逆
草乾薑桂心甘草炙各一錢
右剉作一

貼水煎服

橘皮半夏生薑湯

治同上
陳皮半夏各二錢
乾生薑

煎服之

丁香柿蒂散 治大病後胃中虛寒 咳逆 丁香 柿蒂 人

草二錢 半生薑七錢 半右為倉末 每二錢水煎 乘

熱頓服 或調蘇合香元服之 尤妙 一方七味各一

羌活附子湯 治同上 羌活 附子 炮 茴香 炒 乾薑 炮 撮

同煎服

三香散 治胃冷 咳逆 沉香 白豆蔻 紫蘇葉 各等

橘皮竹茹湯 治胃虛 膈熱 而咳逆 橘皮 三錢 人參 二

煎服 入薑五棗二水煎 服加白芍

半夏生薑湯 治噦欲死 半夏 製 五錢 生薑 切 一兩 右

鮮陳
湯

取嚏法

一人患傷寒將愈忽患咳逆百藥無效遂用皂角末吹鼻得嚏而止少時又吃又吹又止凡百

餘次自是漸疎二三日而止此

嗅法

咳逆久不止服藥無效宜用嗅法灸法治之

硫黃嗅法

硫黃乳香各二錢以酒煎之急令患人當鼻下嗅其氣

雄黃嗅法

雄黃二錢酒一盞煎至七分急令患人嗅其熱氣即止

一方

治咳逆久不止將乳香紙捲作筒燒烟熏鼻中吸之

禁忌法

凡火嗽忌用鷓粟殼肉豆蔻等燥藥凡氣乾咽燥有痰者不可用南星半夏宜用瓜蒌仁貝母若欲水者又不宜瓜蒌恐泥膈不鬆快耳

嗽喘逆不治證

咳而羸瘦脉堅大者死凡咳喘三發熱脉小堅急者死

本草綱目卷之五

五二日

五

肺脹有咽瘡失音者必死。上氣不得卧者死。血上氣不得卧者死。○上氣面浮腫肩息脉浮大。不治。又加脹充甚。○咳嗽肺脹鬱遏不得眠者。難治。○加凡喘煩燥無脉身冷神昏者死。○髮汗如油汗出如珠不流擗肩擗肘而不休。○胃前高起手足厥冷脉散及數者皆死。○汗出髮潤喘者為肺絕。○身汗如油喘者為命絕。○直視譫語喘滿者不治。○諸有篤病正氣欲絕之時邪氣盛行多壅逆而為喘然則喘之危惡又安可以尋常目之。○瀟。○久嗽不止成勞或聲啞或喉生瘡者不治。○翻。○凡咳逆小便閉澀或腹滿者不治。○見沉微散者死。○剝。○瀉痢後咳逆及傷寒結胃發黃而咳逆俱難治。○翻。○傷寒及久病得咳逆俱為惡候服藥不效則宜灸之。○差灸而不差則必不救矣。

單方
參凡二三種有人

人參
湯主肺虛氣短氣促咳喘急人參膏獨參
功見昔有奇效明○治氣虛喘人參一胡

桃二箇去殼不去皮右剉入薑五水煎服名入參
胡桃湯一名參桃湯蓋人參定喘帶皮胡桃斂肺
也○肺虛合用參如初感風寒邪盛及久嗽
鬱熱不可用反增喘滿嗽劇宜以沙參或玄參代

明之

五味子

主嗽嗽上氣身熱○五味收肺氣乃火熱必
用之藥○氣身熱○五味子麥門冬治肺虛自

汗或少氣而喘蓋聖藥也○久嗽必用五味子
東垣之法然驟用之恐閉住其邪必先發散之或

兼用可也

生薑

主嗽嗽上氣○生與乾並治嗽乾○治嗽多用
生薑以其辛能發散也○乾薑○治嗽多用

升半砂糖五兩同煎減半常服之○久患咳
逆生薑汁半合蜜一匙煎令熟溫分三服乾

瓜蒌實

治痰嗽利胃膈取實肥大者割開取子淨洗
破瓜細切焙乾半夏四十九枚湯洗十遍

切焙為末用洗瓜蒌水并子瓢同熬成膏研細為
丸梧子大薑湯下二十九粒○瓜蒌子甘能補肺

瓜蒌實治痰嗽利胃膈取實肥大者割開取子淨洗

瓜蒌子甘能補肺

瓜蒌子甘能補肺

潤能降氣宜為
治嗽要藥也

半夏治痰嗽上氣及形寒飲冷傷肺而咳
半夏製生薑切各半兩煎服即效

葶藶子主肺氣壅上氣喘促或面浮取子
葶藶子炒黃色為末二錢棗湯調下

苧麻根治哮喘下根和砂糖爛煮時
苧麻根細嚼燕下永絕病根神效

馬兜鈴主咳嗽喘促氣急坐息不得
馬兜鈴只取裏面子童便拌炒甘草炙一兩右為末

每一錢水煎温呷或含末燕汁亦
得乾○馬兜鈴去肺熱補肺也

桑白皮治肺氣喘滿咳嗽或吐血桑皮四兩
桑白皮富剉細糯米一兩焙乾右同為末米飲調下

一二錢剉○桑白皮瀉肺氣然性不純良
用之多者當戒蓋以出士者有毒故也

皂莢主咳嗽上氣唾濁坐不得卧
皂莢蜜丸梧子大棗湯吞下三丸酥炙為末

鯉魚肉主咳嗽燒為灰糯米飲調下
鯉魚肉或取肉作膾以薑醋食之亦佳

橘皮 治咳上氣 橘紅四兩甘草炙一兩為末每二錢白湯點服 日三〇又治吃逆橘皮一兩濃煎

服乘熱頓

胡桃 治痰喘能斂肺取胡桃三箇去殼不去皮與生薑三片臨卧細嚼以溫湯呷下效

杏仁 主咳嗽上氣喘促及哮喘杏仁一兩去皮尖童便浸半月每日一換尿取出研取每服一棗子

大薄荷葉蜜水少許煎服二劑永差 〇又治老人久喘嗽杏仁散 〇胡桃仁等分蜜丸彈子大薑湯

下翻 〇杏仁散 〇胡桃仁取其利肺氣潤劑也 〇寒者為宜 〇杏仁散 〇胡桃仁取其利肺氣潤劑也 〇寒者

梨 主熱嗽 〇卒夜嗽梨一顆刺作五孔每孔納胡椒一粒麩裏煨熟停冷去椒食之 〇乾孔每孔納胡椒

取雪梨去心納蜜 〇蒸熟停冷食之

紫蘇子 治肺氣喘急咳嗽蘇子水擣取汁和梗米煮粥食之 〇和杏仁汁尤佳 〇蘇子水擣取汁和

罌粟殼 斂肺止咳 〇素壯人久嗽即效 〇粟殼蜜炒為末每

一錢蜜湯

雞子經治三日哮喘取十箇略敲損殼不得損膜浸尿缸內

研也

猪肺治咳嗽喘急肺痿吐血猪肺一箇洗去血水若

眼每眼入杏仁一箇麻扎重湯煮熟去杏仁只吃

碎煮熟入鹽豉

阿膠治肺虛損極咳嗽唾膿血非阿膠不補

獐肉主上氣咳嗽灸為末每二錢溫酒和服日二

猫頭骨治哮喘不得睡取頭骨燒為

人尿主夜喘肺痿又止勞渴嗽取溫尿飲

金雞納

五十六

鍼灸法

○咳嗽有痰宜灸天突肺俞以泄火熱瀉肺氣

乳下黑白肉際各百壯○夜不咳嗽聲破喉嘶灸天突

背心是膏肓病也灸之而愈○久嗽宜灸膏肓

次灸肺俞○喘急灸肺俞十一壯天突七壯

穴○傷寒咳嗽甚灸天突○差續○遠年咳嗽灸直骨

三壯男左女右○氣海○喘灸肺俞又取天突膻中

璇璣膻中府乳根氣海○喘滿痰實如膠取太谿

缺○喘不得卧取雲門太淵○喘肺俞三行間

逆○吃逆服藥無效灸中脘膻中乳期門必效

○肌即差一云其穴當取乳下骨間動脈處是也

可海一五壯或七壯亦立止○右足三陰交可右側者

灸左足三陰
交立安研

東醫寶鑑雜病篇卷之五