

傷寒真方歌括卷二

剛長樂陳念祖修園著

治南林壽萱校訂

陽明上篇方法

邪初傳陽明兼見頭痛惡寒是太陽表症未罷自汗脉緩宜桂枝

湯項背凡凡者凡音殊凡凡者鳥飛羽短伸頭之貌項背與頸凡

也桂枝加葛根湯主之無汗脈浮宜麻黃湯項背凡凡者葛根湯

主之或兼見下利若不下利而嘔宜葛根加半夏湯主之若誤下

脈促利不止喘而汗出宜葛根連岑湯主之

有陽明中風兼見寒熱往來脈弦大胸滿及面目悉黃小便難糊

熱時噦與小柴胡湯如脈雙弦心下硬與大柴胡湯

如太陽之邪已罷。悉傳陽明。虛煩。虛熱。咽乾。口燥。舌上白胎。腹滿。煩燥。懊憹。不得安卧。以梔子豉等湯吐之。急除胃外之熱。不使胃家之實。此以吐法為陽明解表之法也。如邪傳陽明。如前兩大渴大熱。大汗脈洪而長。為陽明經之本症。以白虎湯。白虎加入參湯。主之。汗脈其不。其當病少氣。其與而散色不澤。

陽明症煩熱不卧。小使不利。宜猪苓湯主之。若出汗過多。小便

不利者。不可用。此陽明病在經之方法也。熱太過則色

利不桂枝加葛根湯不狀。而非水病。故其色不澤。腫脾氣

太陽合病。項比几。汗出傷風。桂葛茹薑棗芍甘。不受粥。陽明纔見

即攻驅。病少血。至今不復也。脈者腎之府。腰傷

故腎脈盛也。易於

葛根四錢桂枝芍藥生薑各二錢炙草一錢五分大棗三枚先煎葛根去沫後

人諸藥同煎服覆微似汗不須啜粥。按此即桂枝症漸深將及

陽明故加葛根以斷其前路仍用桂枝以截其後路尚書云去疾

莫如盡此方得之

葛根湯以言之曰心為牡臟小腸為之使故曰

太陽項背病凡凡桂葛麻黃因汗無炙草棗薑監制用陽明合病

亦何慮連陰陽相應是以脈見於脈而形見於

葛根四錢麻黃二錢芍藥二錢生薑二錢炙草一錢桂枝各二錢大棗四枚先煮麻黃

葛根去沫入諸藥煎服不須啜粥此太陽將入陽明若下利則

為太陽與陽明合病蓋以風邪入胃主下利也

脾氣實則

桂枝葛根湯治將入陽明之有汗此治將入陽明之無汗

葛根加半夏湯

此言人過者乃邪氣有餘不及者

合病應利不下利驗之於嘔還分頰葛根湯內半夏加開闔失機

升降治 卽前方加半夏二錢

絕不至日死午數乍疎

葛如湯升劑也半夏芍藥降劑也太陽陽明兩經皆病開闔火

機故以升降法治之

死脈以上論脈平者平人之

葛根黃芩黃連湯

誤下脉促利不止外邪內陷熱傳裏葛根甘草並芩連提出太陽

喘汗已

人之受氣於穀穀入於胃五腑六

葛根四錢炙草黃芩

各三錢

黃連

一錢五分

先煎葛根去沫後入諸藥同煎

小柴胡湯 大柴胡湯 俱見少陽

梔子豉湯

治後打吐下虛煩不得眠。虛為正氣虛煩為邪氣擾懊憹心不安得安版

身不得寧實堪隣山梔香豉煎溫服胸腹餘邪一切獨

梔子五七枚替豉四錢先煮梔子後入香豉煮服得吐止後服

梔子苦能涌泄寒能勝熱梔象心而大心豆象腎而入腎煩燥不
寧是心腎之病故以苦寒之梔子得豆豉之藹氣作吐凡一切煩
燥懊憹之結於心腹者一吐而具解矣

梔子甘草豉湯 卽梔豉湯加炙草二錢煎服法梔子生薑

豉湯 卽梔豉湯加生薑五錢煎服法無物為嘔有物為吐

欲止其嘔。反令其吐。吐之而嘔反止。真匪夷所思也。

外邪內陷。熱傷風。梔子湯中甘草二。嘔逆去。草用生薑。薑能散逆。

精神粹。

梔子厚朴枳實湯

腹滿心煩。卧不安。正虛邪熾。上中搏。苦寒。梔子快胸膈。枳實能消。

厚朴寬。

厚朴 薑汁炙四錢 枳實 二錢 梔子 五六枚 水煎服。

梔子乾薑湯

誤下陰陽兩受傷。乾薑梔子合成湯。若能泄熱解煩。蒲幸以驅寒。

並復陽。

梔子五枚 乾薑二錢五分 水煎服得吐止後服

梔子蘘皮湯

身黃梔子蘘皮湯苦藉甘和甘草長熱達膚開勢外出散邪滲濕

兩無妨

梔子 六七枚 蘘皮 二錢 甘草 一錢 水煎服

附梔子湯解

按柯韻伯云陽明表症不特發熱惡熱目痛鼻乾等症一切虛煩咽乾口燥舌胎腹滿煩躁懊憹不得卧凡在胃之外者悉是陽明表症仲景製汗劑是開太

陽表邪之出路製梔子湯吐劑是引陽明表邪之出

路。但使心腹之濁邪。上出於口。一吐而心腹得舒。表裏之煩熱悉除矣。熱傷氣者。少加甘草以益氣。虛熱相搏者。多嘔。加生薑以散邪。若下後而心腹滿起。卧不安。是熱已入胃。便不當吐。故去香豉。加枳朴以泄滿。合梔子兩解心腹之妙。又小承氣之輕劑也。若以丸藥下之。身熱不去。知表未解也。心下結痛。知寒留於中也。故任梔子之苦以除熱。倍乾薑之辛以逐寒。然非吐不能以達表。故用此以探吐之。此又寒熱並用。爲和中解表之劑矣。內外熱熾。肌肉發黃。必須苦甘之劑以調之。麩皮甘草色黃而潤。助梔子以除內煩。外熱形色之病。仍假形色以通之。此皆用梔豉加減。以禦陽明表症之變幻也。韻伯此論。誠千古之特

見學者宜熟讀之。

白虎湯。白虎加人參湯。俱見太陽土救誤篇。猪苓湯

少陰不眠煩嘔逆陽明熱渴欲飲小便赤利水菜中厲有陰阿膠

猪茯苓滑石宜夏而分別邪正之在外在內也

猪苓去皮茯苓澤瀉滑石阿膠各小二杯煎一杯去滓入膠烱

化溫服。此與五苓散有天淵之別彼治太陽入本太陽同寒水故以

桂溫之此治陽明少陰結熱二經兩關津液故以甘涼之藥

滋之二症若汗多胃燥即此方亦不可與恐利水傷其液津

也。

也。

陽明中篇

有太陽陽明因汗吐下利小便亡津液胃中乾燥太陽之邪乘胃燥而轉屬陽明致小便數大便鞭論謂為脾約以麻仁丸主之有少陽陽明病已到少陽法當和解而反發汗利小便亡其津液胃中燥熱轉屬陽明以致大便燥結論謂大便難以蜜煎猪膽汁導之

有正陽陽明陽氣素盛或有宿食太陽之邪一傳陽明遂入胃腑致大便不通論謂實以三承氣湯隨輕重下之此陽明病在腑之

麻仁丸

素常脾約感風寒須用麻仁潤下丸杏仁大黃兼枳朴脾陰得潤

胃腸寬

麻仁二兩

芍藥枳實

各五錢

大黃厚朴杏仁

各一兩

煉蜜丸如梧

桐子大飲服十九漸加以知為度

脾燥宜用緩法以遂脾欲非比胃實當急下也

蜜一杯於銅器內微火煎凝如飴狀取紙撚作挺子以線

札之外以蜜厚包之如指許長二寸微熱納穀道中以手急

抱欲大便時乃去之時法醮些皂角末

猪膽汁方 猪膽一枚和醋少許以竹管灌入穀道中如一

食頃當大便出宿食惡寒甚效

津液內澗不宜攻須得欲便以法通蜜生潤腸膽泄熱兩方引導

有 equal

大承氣湯 大黃酒洗二錢 厚朴四錢 枳實二錢五分 芒硝二錢 水三

杯先煎枳實厚朴至一杯半去滓內大黃煎取一杯去滓內

硝更上微火一兩沸溫服得下勿再服 生者氣銳而先行

熟者氣純而和緩 仲景欲芒硝先化燥屎大黃繼通地道而

後枳朴去其痞滿此本方之煎法也若小承氣湯則三味同

煎即寓微和之意

小承氣湯 大黃四錢 厚朴二錢 枳實二錢 水二杯煎八分溫服初

服當更衣不爾者再服若更衣勿服 大承氣厚朴倍大黃

是氣藥為君分煎取其後來者上欲急下燥屎也小承氣大

黃倍厚朴是氣藥為臣同煎取其氣味渾勻欲微利胃氣也
燥堅痞滿大承氣枳朴硝黃共四味硬未去硝先探試邪輕小實
小承氣

調胃承氣湯

溫溫欲吐心下痛鬱鬱微煩胃氣傷甘草硝黃調胃劑心煩腹脹

熱蒸良

大黃

四錢 去皮 清酒洗

甘草

三錢

芒硝

三錢

水二杯先煮大黃甘草

取一杯去滓內芒硝更上微火煮令沸少少溫服之

熱淫於內治以鹹寒芒硝也火淫於內治以苦寒大黃也更

佐以甘草緩硝黃留中泄熱非煎硝黃傷胃而用之也少少

服之不使其速下而利也。芒硝解結熱之邪。大承氣用之。以解已結之熱。此用之以解將結之熱。

附解

按張憲公云承者以卑承尊而無專成之義。天尊地卑一形氣也。形統於氣。故地統於天。形以承氣。故地以承天。胃土也。坤之類也。氣陽也。乾之屬也。胃為十二經之長。化糟粕運精微。轉味出入而成傳化之府。豈專以塊然之形亦惟承此乾行不息之氣耳。湯名承氣。確有取義。非取順氣之義也。憲公此解超出前人。惜其所著傷寒類疏未刊行。世豈公諱孝。古吳人也。

陽明下篇

腑症雖有三而陽明之辨所尤重在能食爲胃強不能食爲胃弱
大都能食者皆可攻下但有緩急之殊惟是不能食者乃有挾虛
寒挾結熱之不同虛寒則食穀欲嘔及乾嘔吐涎沫之症宜吳茱
萸湯溫之結熱則腹滿不大便譫語而脈濇者當用蜜煎膽導否
得拘於肺病爲陽槩用寒下而禁用瀉劑也又有下利後必下
痞腸鳴乾嘔者用甘草瀉心湯以藥甘爲泄滿法寒厥熱發黃用
茵陳蒿湯從小便以逐穢法不可不知也

吳茱萸湯

陽明吐穀喜茱萸薑棗人參却並驅吐利膝煩手足冷吐涎頭痛

立殊功

吳黃泡人參各二錢

生薑

四錢

大棗三枚

水煎服

此方降濁陰扶生氣俾震坤合德土木不害

甘草瀉心湯

下利腹鳴乾嘔痞大棗三枚連薑夏使甘草瀉心湯合宜泄滿降逆

斯為美

炙草二錢黃芩乾薑

各一錢五分

半夏

一錢黃連

五分

大棗

二枚

水煎服

茵陳蒿湯

黃如橘色腹微滿

頭汗劑

餘處無汗

小便短

三倍

茵陳

梔

大黃

內

外痲熱如洗盤

茵陳六錢。梔子五枚。大黃二錢。水三杯。先煮茵陳。至杯半。後入諸藥。煮至八分。溫服。日三服。小便當利尿。如皂莢汁。色正赤。一宿腹減黃。從小便去也。

麻黃連豆湯。散太陽無汗之黃。若在太陽陽明之間。用梔子。

藥良湯。以清火。若在陽明之裏。常用此湯。以逐穢。

及則合入氣虛而喘。時或少氣而發。虛氣上逆。則血隨而上行。虛氣下逆。則聞呻吟之病。若主肺氣而時時咳嗽。則其氣大逆。則其逆于外。其不及則其逆于內。冬寒者腎虛。北方水也。萬物之類。其氣來以氣。

傷寒真方歌括卷二。冬病也。如萬物之類。冬氣之安。居于內。

心曠者此謂不及病在中
如水之流者灌漑是過也如鳥之喙者緊

也
病者何如曰太過則令人四肢不舉其

病者何如曰太過則令人四肢不舉其

病者何如曰太過則令人四肢不舉其

病者何如曰太過則令人四肢不舉其

病者何如曰太過則令人四肢不舉其

病者何如曰太過則令人四肢不舉其

病者何如曰太過則令人四肢不舉其

傷寒真方歌括卷三

閩長樂陳念祖脩園著

治南林壽萱校

少陽上篇

提綱有口若咽乾目眩之症三者能開能合相火為害故病法當清火

少陽主半表半裏寒熱相雜若邪在半表其寒熱往來於外宜以

小柴胡湯解半表之虛邪以大柴胡湯解半表之實熱若邪在半

裏其寒熱相搏於中則為嘔吐腹痛以黃連湯主之其寒熱互結

於心則為痞滿嘔逆以半夏瀉心湯主之其寒熱相阻於心下則

為拒格食入即出以乾薑黃芩黃連人參湯主之若邪全入於裏則膽

腑受病膽火下攻於脾而為自利有黃芩湯法膽火上逆於胃利

又兼嘔有黃芩加半夏生薑湯法此皆少陽正治方法也

傷寒真方歌括

卷三

蓋少陽為樞職司開合而轉運其樞全賴胃氣充滿則開合有
權其邪不能內犯胃氣不振則關鑰廢弛邪得出入矣

小柴胡湯

豚弦脅痛小柴胡夏草薑苓參棗枳和解少陽為正法陽明兼症

豈殊迷

柴胡四錢 人參黃苓炙草生薑 各一錢五分 半夏二錢 大棗二枚

水二杯煎一杯半去滓再煎八分溫服

此方以二劑合作一劑方稱原方三服之一今易作小劑徇

時好也深於醫者必照古法不待余贅小陽介於兩陽之間

須兼顧三經故藥不宜輕去渣再煎者此方乃和解之劑也

煎則藥性和合能使經氣相融不復往來出入古聖不但用藥之妙其煎法具有精義

加減法 若胸中煩而不嘔者去半夏人參加括萎二錢

若渴者去半夏加人參五分括萎根一錢 若腹中痛者去

黃芩加白芍藥一錢五分 若脇下痞軟去大棗加牡蠣二

二錢 若心下悸而小便不利者去黃芩加茯苓二錢 若

不渴外有微熱者去人參加桂枝一錢五分 溫覆取微似汗

○若欬者去人參大棗生薑加五味子七分乾薑一錢

大柴胡湯 有無胃氣之養生也

脉弦而沉沉有力相火結熱不宜亟 芩芍棗夏枳柴薑大柴湯具

小柴翼

柴胡 四錢

半夏 黃芩 芍藥 枳實 各一錢五分

生薑 二錢 煎法同小柴胡湯

此方本無大黃。所云結熱非實熱也。下解其熱非導其便也。

小柴胡湯治半表之虛。此治半表之實。即小柴胡湯之翼也。

今唐人書每以此方代承氣湯。取大便微利。重加大黃。暑變

中景之法不可不知。九分。立五腑。為根本。赤脈之至。

黃連湯 治其經之氣。某勝之經也。赤脈之至。

胸中有熱。胃邪。麗黃連。甘草。乾薑。桂人參。夏草。理陰。陽嘔吐。腹疼。

疼為妙劑

黃連 炙草 乾薑 桂枝 各一錢五分 人參 五分 半夏 一錢 大棗 二枚

水煎分二服日三夜二

即柴胡湯以桂枝易柴胡以黃連易黃芩以乾薑易生薑此

症雖無寒熱往來於外而有寒熱相搏於中所以寒熱攻補

並用仍不雜少陽和解法也半夏瀉心湯

滿而不痛則為痞心隔難開何所以夏草參連芩棗薑宜通膠滯

同歡喜

半夏三錢黃芩乾薑炙草人參各一分大棗二枚黃連五分水煎溫服

乾薑黃芩黃連人參湯

厥陰寒格用乾薑吐下芩連是所長誤治致虛參可補分途施治

不相妨

人參黃連黃芩乾薑

各一錢五分 水煎服。

入口即吐是火炎之象故苦寒倍於辛熱但吐下誤後中外之氣索然故以人參補其中氣並以助乾薑之辛衝開格逆而吐止食入矣凡嘔厥夾熱不利於桔半者服此方而晏如

黃芩湯

黃芩湯用甘草芍草太陽少陽合病討下利只須用本方兼嘔薑夏加之好

黃芩

二錢 炙甘草芍藥各二錢 大棗三枚 水煎服 日二夜一

黃芩加半夏生薑湯

即前湯加半夏二錢生薑三錢 煎服法同二陽合病邪人

少陽之裏膽火下攻於脾故自下利上逆於胃故兼嘔也此

湯苦甘相濟調中以存陰也。兼嘔者加半夏以降逆。生薑以

散邪也。

少陽中篇

少陽雖有汗吐下三禁。而法中又有口不渴身有微熱。以微熱驗

在。去人參加桂枝以取汗。傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼

微嘔。心下支結。支撐也。若有物支持在胸脇間。外症未去者以柴胡桂枝湯汗之。

下後胸結脇滿微結小便不利渴而不嘔頭汗出。邪鬱於經不

於頭而汗出也。往來寒熱用柴胡桂枝乾薑湯以汗之。又有柴胡症具

而反下之心下滿而鞭痛此為結胸大陷胸湯主之。本柴胡症

醫以丸藥下之微利胸脇滿而嘔日晡熱者小柴胡加芒硝湯下

是汗下之法不可不審用也

柴胡桂枝乾薑湯

寒熱往來頭汗出心煩胸脇滿而室柴芩薑蟬括樓甘花粉桂枝
加減七

柴胡四錢 桂枝黃芩各一錢五分 括薑根一錢 乾薑牡蠣炙各

一錢 水煎服初服微炊再服汗出而愈 合則為九九分

按本方用乾薑一以散胸之微結一以濟芩藜之苦寒使陰

陽和而寒熱已也

大陷胸湯 見太陽救誤篇

柴胡加芒硝湯

少陽邪入陽明府日哺熱潮脇滿吐
病方愈
甘夏參苓柴草薑芒硝加上

柴胡一錢二分 黃芩炙草生薑人參 各一錢 半夏七分 大棗一枚

一錢 水煎後入芒硝一二沸服

按胸脇滿而嘔少陽之邪正盛也日哺所發潮熱陽明之熱

已結也本宜大柴胡兩解之因以丸藥誤下強逼澆胃氣

大傷大柴胡中有大黃枳寔之峻必不堪受不如小柴胡湯

有人參甘草以扶之也加芒硝者勝熱攻堅速下不停無傷

胃氣是以峻攻之藥為補養法也

柴胡桂枝湯

太陽未罷少陽多支結煩疼寒熱過津液一通營衛治小柴哀內

桂枝加

柴胡

二錢 黃芩 桂枝 芍藥 生薑

各八分

人參

一錢五分

炙草

五分

棗

二枚 煎服

按此太陽邪輕少陽邪甚之方故湯名以柴胡為冠也活人
往往取代桂枝湯看似變通實亂仲景之法余推活人所以
取代之故以論中有和其營衛以通津液後自愈十一字也

少陽下篇

少陽失治壞症最多非有補天浴日手段不足以語此論云傷寒
八九日下之胸滿煩驚小便不利譫語一身盡重不可轉側也柴

胡加龍骨牡蠣湯主之

柴胡加龍骨牡蠣湯。者死。是以者承上文而言。脫肉者皮肉宛焦而

太陽誤下心煩譫語身沉小不行。春夏參朮柴薑棗伏丹龍牡

定神明。

柴胡龍骨牡蠣生薑人參茯苓錯丹黃芩桂枝半夏。各一錢五分。

大棗二枚。水煎入大黃二錢。二三沸溫服。

此乃正氣虛耗邪已入裏而復外擾三陽故現症錯雜藥亦隨症施治真神化無方也。借治癩癧痘神效。不得相

傳經發明。

按宋元以後醫書皆謂邪從三陽傳入。俱是熱症。唯有下之

法論中四逆白通理中等方俱為直中立法何以謂之直

中謂不從三陽傳入徑入三陰之臟。唯有溫之一法。凡傳經俱爲熱症。寒邪有直中而無傳經數百年來相沿之說也。余向亦深信其然。及臨症之久。則以爲不然。直中二字。傷寒論雖無明文。而直中之病。則有之。有初病卽見三陰寒症者。卽宜大溫之。有初病卽見三陰熱症者。卽宜大涼之。大下之。是寒熱俱有直中也。世謂直中皆爲寒症者。非也。有謂遞次傳入三陰。盡無寒症者。亦非也。蓋家熱二氣盛。則從化。余揆其故。則有二。一從病體而分。一從誤藥而變。何則。人之形有厚薄。氣有盛衰。臟有寒無所受之邪。每從其人之臟氣而爲熱化寒化。今試譬之於酒。酒取諸水泉。寒物也。酒釀以味藥。又

熱物也。陽藏之人過飲之不覺其寒，第覺其熱。熱性迅發，則吐血面瘡，諸熱症作矣。陰藏之人過飲之不覺其熱，但覺其寒。寒性凝滯，則停飲腹脹泄瀉，諸寒症作矣。知此愈知寒熱之化，由病人之體而分也。何謂誤藥而變？凡汗下失宜，過之則傷正而虛其陽，不及則熱熾而傷其陰。虛其陽則從少陰陰化，之症多以太陽少陰相表裏也。傷其陰則從陽明陽化，之症多以太陽陽明相傳也。所謂寒化熱化，由誤治而變者此也。至云寒邪不相傳，更爲不經之說。仲景云：下利腹脹滿，身體疼痛者，先溫其裏，乃攻其表。溫裏宜四逆湯，攻表宜桂枝湯。主之。此三陽陽邪傳入三陰，邪從陰化之寒症也。如

少陰症下利白通湯主之此太陰寒邪傳入少陰之寒症也
如下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通脈四逆湯主之此少
陰寒邪傳入厥陰之寒症也誰謂陰不相傳無陽從陰化之
鍾子

傷寒真方歌括卷三終

傷寒真方歌括卷四

卷七

閩長樂陳念祖修園著
洽南林壽萱校

太陰全篇方法

太陰爲濕土純陰之臟也故病一人太陰邪從陰化者多從陽化者少從陰化者如論中腹滿吐食自利不渴手足自溫時腹自痛宜四逆湯理中湯之類玉之從陽化者如論中發汗不解腹滿痛者急下之宜大承氣湯腹時痛者桂枝加芍藥湯大實痛者桂枝加大黃湯是也

理中圓及湯

理中白朮草薑參益氣驅寒走太陰只取中焦交上下辛甘相輔

意殊深

人參白朮乾薑炙草各等末為末。蜜丸如雞子黃大以沸湯和一

丸碎溫服之日三四服腹中未熱益至三四丸服後如食項啜粥

然丸不及湯又以四味切片作湯服之

參草甘以和陰薑朮辛以和陽辛甘相輔以處中上交於陽下交

於陰陰陽和順而百病愈矣

若臍上築者腎氣也去朮加官桂吐多者去朮加生薑下

多者還用朮悸者加茯苓渴欲飲水者加朮腹中痛

者加人參寒者加乾薑腹滿者加附子

桂枝加芍藥湯 桂枝湯加芍藥一倍 倍芍藥者能監桂

知經
極探
人陰分升舉誤下之邪出於陽分而腹痛自愈

桂枝加大黃湯
桂枝湯加芍藥一倍。大黃七分。倍芍藥者

苦以泄其堅。加大黃者。通以導其滯也。

腹痛。桂枝倍芍藥。大黃枳實更加。酌病從太陽誤下來。仍用太陽

方斟酌。

四逆湯

大承氣湯

蓋脾與胃全處腹中。腹痛腹滿兩皆有之。然腹滿為太陰病。

心下滿為陽明病。其陽明亦有腹滿者。但陽明腹滿與熱同。

化兼有潮熱自汗不大便之症。不似大陰與濕同化兼有發

天黃暴煩下利穢爛之症也。

厥於下則外不能

五臟別論曰

五臟主氣

口也。五腑之氣。皆變見於氣口。故為五臟主。此論水穀入胃。以養五腑。五腑之氣。復榮於脈。

而見於氣口。此蓋水穀之清者。於五腑水穀之濁者。出於六腑。清者榮於經脈。清中之濁者。復傳化於六腑。此論飲食於胃。有氣味清濁。上下出入之分。當知奇恆之府。亦受清中之濁。曰胃者。水穀之海。六腑之大源也。五

臟之氣。皆變見於氣口。亦太陰也。其

傷寒直方歌括卷四終。味皆出於胃。變見於氣口。

傷寒真方歌括卷五

閩長樂陳念祖修園著

東治林壽萱校

少陰症全篇 論云少陰之為病脉微細但欲寐也只此二句為提綱此篇則分析而言之

少陰腎經水火之臟邪傷其經隨人稟虛或從水化而為寒或從火化而為熱水化為陰寒之邪是其本也火化為陽熱之邪是其標也陰邪其脉沉細而微陽邪其脉沉細而數至其見證亦各有別陰邪但欲寐身無熱陽邪雖欲寐則多心煩陰邪背惡寒口中和陽邪背惡寒口中燥陰邪咽痛不腫陽邪咽痛則腫陰邪腹痛下利清穀陽邪腹痛下利清水或純青色或便膿血也陰邪外熱

面色赤裏寒。大便利。小利。白陽邪外寒。手足厥裏熱。大便秘。小便赤。此少陰標本寒熱之脈症也。凡從本之治切宜溫。寒回陽從標之治切宜攻熱。救陰其機甚微。總在臨症詳究。辨別標本寒熱。以急施其治。庶克有濟。稍緩則不及矣。

從太醫院使編訂

少陰症有化寒化熱兩途。施治不外回陽救陰二法。人固知之矣。而抑知回陽之中而有兼汗兼溫之異乎。論云少陰病始得之反發熱。麻黃附子細辛湯主之。又云少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗。以二三日無裏症故發汗也。蓋二症俱以少陰而得太陽之熱。故用麻黃以發汗。因二症之脈俱沉。用附子以固腎。

賢固則津液內守汗不傷陰。一合細辛。猶麻黃湯急汗之峻劑。一
合甘草。猶桂枝緩汗之和劑也。至于嘔逆腹痛小便不利。用真武
湯。背惡寒用附子湯。晝日煩燥夜而安靜。用薑附湯。四肢逆冷。用
四逆湯。四肢逆冷而脈細欲絕。用通脈四逆湯。吐利雖止。汗出而
脈四肢均急。脈微欲絕者。用通脈四逆加豬膽汁湯。下利脈微。用
白通湯。利不止厥逆無脈。乾嘔煩者。用白通加人尿豬膽汁湯。吐
利手足逆冷煩燥欲死者。用吳茱萸湯。惡寒脈微而利。利止者。亡
血也。用四逆加人參湯。汗下之後病仍不解。煩燥者。用茯苓四逆
湯。已上諸方。溫而兼補。皆所以回陽也。抑又知救陰之中。更有補
正攻邪之別乎。如咽痛用甘草湯。桔梗湯。半夏散及湯。苦酒湯。猪

膚湯心煩不卧用黃連阿膠湯不眠煩渴小便短赤用猪苓湯陽邪傷陰陰傷不能接陽為四肢逆冷用四逆散下利膿血用桃花湯皆救陰中之補正劑也如口燥咽乾宜急下之自利清水色純青心下必痛口乾燥者可下之六七日腹脹不大便者急下之凡曰急者不可緩之須臾致邪火燥乾津液而死以大承氣湯主之此皆救陰中之攻邪劑也

麻黃附子細辛湯

麻黃細辛

各二錢

附子一錢

水煎麻黃去沫

大諸葯同煎溫服

時師細辛

只用一錢

麻黃附子甘草湯即前方

去附子加炙草二錢

發熱脈遲屬少陰麻黃附子細辛湯細辛不用加甘草溫腎驅寒

用意深。二症俱發熱。故俱用麻黃以發汗。

脈俱沉。故俱用附子以固腎。腎固則津液內守。汗不傷陰。

合細辛。猶麻黃湯急汗之法。一合甘草。猶桂枝湯緩汗法也。

真武湯

腹痛肢疼。欬嘔。北方直。

神守。茯苓芍木。附子薑煨。土鎮水。

各入扣。

茯苓芍藥生薑各三錢白朮二錢附子錢水煎服。

附子壯元陽。則水有所主。白朮建土氣。則水有所制。合芍藥

之苦以降之。茯苓之淡以泄之。生薑之辛以行之。總使水歸

其壑。今人以行水之劑。目為溫補之劑。誤矣。

若嘔者加五味子一錢乾薑細辛各五分時法去生薑若

小便利者去茯苓若下利去芍藥加乾薑二錢若嘔者

去附子倍加生薑血氣虛脈不通真邪相攻

附子湯經氣不足經氣有餘何如
不足者精氣衰

口和脉細背憎寒火炙關元即刻安芍藥人參苓朮附身疼肢冷

是神仙

附子人參各二錢茯苓芍藥各三錢白朮二錢二杯煎八分溫服

此湯藥品與真武相當唯生熟分兩各異其補陽鎮陰只在

一味轉旋學者所當深心體會平榮氣乃洪神

乾薑附子湯逆春夏為從

而煩躁屬陽也

以虛有二一喜陽者有畏陽者大抵陰亦虛者長陽陰不虛者陰陽此因下後陰亦虛故反畏

脈見沉微誤汗餘下後豈容更發汗乾薑附子補偏歟

乾薑附子

各三錢水煎服

余於活人百問煩躁症中注此方下陰盛偏安於陰分故夜

而安靜何相反至是而不知此言陰虛者言吾身真陰之虛

也彼言陰盛者言陰寒之氣盛也陰陽二字各有所指

因逆湯

四逆薑附君甘草除陰回陽為至寶徹上徹下行諸經三陰一陽

隨搜討

炙草二錢

乾薑一錢

五分附子

生用水

一杯半煎八分服

為重虛

真經百方大書

卷五

生附子乾薑徹上徹下開闢羣陰迎陽歸舍交接十二經爲
斬旌奪關之良將而以甘草主之者從容籌畫自有將將之
能也

此方少陰用以扶元海之陽太陰用以溫藏中之寒厥陰薄
厥陰欲立亡非此不救至于太陽誤汗亡陽亦用之

通脈四逆湯卽四逆湯倍用乾薑氣若盛於外則
通肝四逆加猪膽汁方卽前方煎成入猪胆汁九茶匙

時法以黃連二分研末代之陽氣盡虛於內故主

四逆倍薑名通脈疾呼外陽歸其宅更加猪膽汁些微藉其苦寒

通柝柝清陰越於外而虛於內也清而身熱陽

而施於外也此復言陰陽之精氣脫者

名通脈者以此時生氣已離。亡在頃刻。若以柔緩之甘草爲君。豈能疾呼外陽而使返耶。故易以乾薑而仍不減甘草者。恐散渙之餘。不能當乾薑之猛。還藉甘草以收全功也。後方加猪膽汁者。速陽藥下行。

加減法。面赤者加連翹葱三莖。腹痛者去葱加芍藥二錢。嘔者加生薑二錢。咽痛去芍加桔梗一錢。利止脈不出者。去桔梗加人參二錢。

白通湯。乾薑附子各三錢葱白二莖每莖寸半水二杯煎八分溫服。

黃附片一之所苦。瀕藉葱白之辛以通之。葱白通上焦之陽。下文放腎附子。啟下焦之陽。上承於心。乾薑溫中土之陽。

以通上下。上下交。水火濟。利自止矣。白通加猪膽汁湯。

即白通湯。入人尿十五茶匙。猪膽汁七茶匙。令相得。溫服。

寒盛格熱。當用鹽制之法。人尿之鹹。勝猪膽汁之苦。猪膽汁

之苦。勝薑附之辛。辛受制於鹹。苦則鹹。苦為之向導。便能下

入於少陰。俾冷性消而熱性發。其功乃成。又為外白利也。

少陰附白。人通湯。無脉。嘔煩。膽汁將葱白入陰。通否。隔回。陽利。症

用乾薑

吳茱萸湯見陽明

生四逆加人參湯

脉微而利。更增寒利。止血亡氣。亦殘。四逆湯中。參速配。重生津液。

漸恬安。卽四逆湯加人參一錢。

茯苓四逆湯

煩燥轉增汗下後真陽擾越勢難救。四逆加參重茯苓症類。攄攄
煩互究。卽四逆湯加人參一錢茯苓六錢。

此為汗下之後厥悸不愈忽增煩燥為水氣凌心之症。然必
參以他症方不誤認為梔子豉湯症。

甘草湯 甘草六錢水三杯煎一杯分兩次服。

桔梗湯 卽前方加桔梗三錢。

緩以甘草開桔梗少陰客熱不煩。喘喘痛分合先後宜淡而不厭。

瀟靜領

半夏散及湯

陰火攻咽必挾痰風邪內薄勢相乘桂枝半夏及甘草經訓當遵勿妄談

半夏桂枝炙草各等分為末白飲和服三錢日三服不能服散者水煮七沸入散三錢更煎三沸少冷少嚥之

本經半夏治咽喉腫痛桂枝治喉痺此乃咽喉之主藥後人以二味為禁藥何也

苦酒湯

少陰咽痛且生瘡半夏雞清苦酒湯滌飲消瘡除伏熱發聲潤燥有專長

半夏洗棗核大七放切作十四片雞子黃一隻去黃內半夏脊苦
酒中以雞子殼置刀環中安火上令二沸去滓少少含嚥之不差
再服。

豬膚湯

利餘咽痛用豬膚蜜粉和中助轉輸竅主腎經膚主肺誰將妙諦
反三隅。

豬膚四兩水七杯煮三杯人白蜜七錢米粉四錢熬香分二三服
少陰之脉循喉嚨挾舌本少陰二三日咽痛是陰火上沖可
與甘草湯甘涼瀉火以緩其熱不瘥者配以桔梗兼辛以散
之之義也至下利咽痛是腎液下泄不能上濡於肺絡燥而

爲咽痛者。又非甘桔所能治。當以猪膚潤肺。腎白粉白蜜緩之於中。而上中之下燥邪解矣。此三方爲正治之輕劑也。若陰症似陽。惡寒而欲吐者。又非甘桔所能療。當用半夏之辛溫散其上逆之寒。桂枝之甘溫散其陰寒之氣。或散或湯。隨病人之意也。如喉痛且傷生瘡。不能言語者。不得卽認爲熱症。仍取半夏之辛。以豁痰。苦酒之酸。以斂瘡。雞子白之清。以咽痛。用四逆湯。詳於本方之下。宜合參之。

黃連阿膠湯

心煩不卧。主阿膠雞子苧連芍藥。交邪入少陰。從熱化。坎離交媾。

在中交

黃連二錢 黃芩五分 芍藥一錢 阿膠一錢五分 雞子黃一枚 水一

杯半煎八分去滓入阿膠盡小冷入雞子黃攪勻溫服日三服

猪苓湯見陽明

四逆散

陽邪傷陰亦四逆枳實芍草攻和策四逆四肢逆冷也熱邪結陰以枳實泄之熱邪傷陰以芍

草和之 陰為陽傷不接陽和其樞紐柴專責

枳實芍藥柴胡參草各一兩為末白飲和服日二三服

欬者加五味乾薑各兩半并主下利 悸者加桂枝五錢

小便不利者加茯苓五錢。腹中痛者加附子炮半枚。泄

利下重者。先濃煎薤白湯。內藥三錢。再煎一二沸。溫服。

桃花湯

少陰下利。便膿血。粳米乾薑赤脂。咳。陽明截住。

石脂入手陽明腎
薑米入足陽明腎

亦安腹痛。尿短。病如撤。

赤石脂一兩六錢。留少許。篩末。乾薑一錢。粳米四錢。水四杯。煎二杯。入赤脂末方寸七分。兩服。若一服愈。餘勿服。

比是手足陽明。感少陰君火熱化太過。閉藏失職。開闔盡撤。緩則亡陰。故只瀦陽明之道路。利止而腎亦安。

大承氣湯見陽明

傷寒真方歌括卷五

傷寒真方歌括卷六

閩長樂陳念祖修園者

東洽林壽萱校

厥陰全篇

厥陰之為病消渴氣上撞心中疼熱饑而不欲食食則吐衄下

利不止論云總綱

厥陰陰盡湯生之熾與少陽為表裏者也故其為病陰陽錯雜寒

熱混淆邪至其經從化各異若其人素偏於熱則邪從陽化故消

渴氣上衝心中疼口爛咽痛喉痺喉癢便血等陽症見矣大法

用烏梅丸苦寒之中雜以溫補之品以治其本而厥深熱亦深必

用大小承氣湯厥微熱亦微只用四逆散下利後重者必白頭翁

湯非一於苦寒者不能勝之也。若其人素偏於寒，則邪從陰化，故手足厥冷，脈微欲絕，膚冷藏厥，下利除中等陰症見矣。大法以四逆湯通脈，回逆湯爲主，不可雜以苦寒之品以掣其時也。如初起手足厥寒，脈細欲絕，以厥陰之藏相火遊行其間，不遽用薑附之熱，只用當歸四逆湯和之，內有久寒，再加生薑、吳茱以溫之。如乾嘔吐涎沫，吳茱萸湯主之。若夫烏梅丸溫補之中，加以苦寒，乃治寒以熱涼而行之之意，最得厥陰之和法。蓋厥陰所重在護其生氣，不專參朮之補，薑附之熱，與火陰少陰不同也。

少陽不解，傳變厥陰而病危。厥陰病衰，轉屬少陽爲欲愈。陰陽消長，大伏危機。

風水并

虛爲死

脾腎之脈

并浮是

二

厥陰爲乙木。性宜沉。水中有火。沉則火下守。而腎水溫。升則火上。撞則腎水寒。論云。消渴。心中夜熱。皆火升之病也。論云。饑不能食。食則吐。堉。皆腎水寒。胃氣因而不煖。致木氣肆逆於胃口。則不食。木盛生風。則生蟲也。論云。下之利不止。亦腎中寒。而不能閉納也。此經爲病。陰陽錯雜。唯烏梅丸可以統治之。

合參

厥陰木中有火。此火爲陰火。故有時而下。有時而上。厥爲陰。陰氣下行。極而上。則發熱矣。熱爲陽。陽氣上行。極而下。則又厥矣。調和於二者之間。切在安胃。故烏梅丸。熱於飯土。佐以人參。下以白飲。皆安胃之意。

程云他症發熱時不復厥發厥時不復熱。蓋陰陽互爲勝復也。唯此症孤陽挾其勝勢。厥自厥。熱自熱。厥深則熱亦深。厥微則熱亦微。而發熱中兼夾煩渴下利之裏症。總由陽陷於內。菟其陰於外。而不相接也。烏梅丸中細辛一味最妙。烏梅丸破陰以行陽於臟。辛入肝。棗中微加苦寒。納逆上之陽邪。順之使下。爲厥陰症之總方。

勝復之機。白胃氣。胃氣熱者陰當復而不復。則爲厥深熱深之症。胃氣寒者陽當復而不能復。則爲膚冷藏厥之症。

烏梅丸

烏梅丸內蘖連薑參桂椒辛歸附當寒熱散收相互用厥陰得此

定安康

烏梅九十枚乾薑兩當歸錢四黃連一兩蜀椒四錢桂枝個參黃藥附

子細辛各六錢各研末以苦酒浸烏梅一宿去核飯上蒸之搗成泥

和藥令相得入煉蜜共搗千下丸如桐子大先飲食白飲和服十

丸日三服漸加至二十九

內經云伏其所至先其所因或收或散或逆或從隨所利而行之調其中氣使之和平此方深得經旨為厥陰病之總法

白頭翁湯

白頭翁主厥陰利下重喜水津耗類連藥秦皮四味煎堅下兼乎

中熱熾

白頭翁一錢黃蘗黃連秦皮各一錢五分水煎服不愈更作一服

大寒以清中熱故治欲飲水大若以堅下焦故止下利

承氣湯見陽明

四逆散四逆湯通脈四逆湯俱見少陰

當歸四逆湯當歸芍藥桂枝細辛各一錢五分炙草木通各一錢

大棗如水煎溫服此方之多用大棗即建中湯之重用膠

節意也時法用此方倍加當歸細辛只用一錢

當歸四逆加吳萸生薑湯即前方加吳萸泡二錢生薑四

錢酒水各半杯煎溫服

當歸四逆甘通草桂芍細辛併大棗通脈養血此為祗索寒加大

薑黃好

吳茱萸湯見陽明

乾薑黃芩黃連人參湯見少陽

白虎湯見太陽

厥陰續篇

厥陰有用吐法者論云手足厥冷脈乍暴者邪在胸中心下滿而

煩。錢不能食者病在胸中須當吐之宜瓜蒂散。有用利水法者

論云厥而心下悸者宜先治水當服茯苓甘草湯。却治其厥不爾

水漬其胃必作利也。有熱厥下後之危症者論云傷寒六七日

大下後寸脈沉而遲脾肺陽氣下陷也手足厥冷下部脈不至舟家之陰亦復衰竭

傷寒真方歌括卷六

陰家不相順接以故咽喉不利唾膿血厥陰之跡貫膈上法師循
手足為之厥冷也。咽喉不利唾膿血厥陰之後。下後亡津液
遂成肺痿。泄利不止者為難治。陽氣下陷於陰分麻黃升麻湯主之
升陽和陰潤肺補脾調
丹莫成萬一之功。

瓜蒂散

胸中痞鞭寸微浮氣上衝身熱汗流小豆勻平瓜蒂散稀糜承載
出咽喉。

瓜蒂赤小豆各等分為末取二錢以香豉一撮用熱湯煮作稀糜
和藥散服之不吐者少少加得快吐乃止諸亡血家不可與之

茯苓甘草湯

見大陽篇

胃主者按之不可得也

麻黃升麻湯

不足也黃葉生而死

邪深陽陷脉沉遲。薑朮麻黃升桂枝歸芍天冬苓石草。萎散潤肺。

佐苓知

麻黃

二錢五分

升麻當歸

各一錢

知母黃芩萎

各五分

白朮石膏乾薑芍藥

天冬桂枝茯苓甘草

各三錢

先煮麻黃去沫後入諸藥煎服

陰陽陽差後勞復病方法

論云傷寒陰陽易之為病。其人身體重。少氣少腹裏急。或引陰中。

拘攣熱上衝胸頭重不欲舉。眼中生花。膝脛拘急者。燒視散主之。

論云大病差後勞腹者。枳實梔子湯主之。

時醫必用補中益氣湯誤人矣

若有宿

食者加大黃如博棊子大五六枚

論云傷寒差已後更發熱者。小柴胡湯主之。

不因勞食而更發食者此半表半裏之間

有留邪也故用小柴胡湯湯中有人脉浮者是熱發表表以汗解之脉

沉實者是熱發在裏以下解之有重感脉浮是脉沉實是飲食失昂

論云大病差後從腰已下有水氣者牡蠣澤瀉散主之

後人用五苓去桂加牡蠣海藻甚穩

論云大病差後喜唾久不了了者胃中有寒當以丸藥溫之不可

用湯藥驟補宜理中丸

論云傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐者竹葉石膏湯主之

新論云傷寒脉結代心動悸炙甘草湯主之

愚按人身天真之氣全在胃口津液不足即是虛生津液即是

補虛仲師以竹葉石膏湯治傷寒解後虛羸少氣以甘寒為主

以滋津爲佐。是善後第一治法。余以炙甘草湯與六經症亦不甚合。想亦是既愈善後之計。論云傷寒脈結代。氣血兩虛經陰而不能自還爲代。故緩時一止爲結止。心動悸。發汗過多血虛。氣餒故心動悸。炙甘草湯主之。此以滋津爲主。甘寒爲佐。後人不知以參耆朮苓桂附歸熟之類溫補之。寧不併餘邪餘熱留之爲害乎。張子和謂大病後養以五穀五菜卽是補法。不用參朮雞羊等助其餘熱致病。誠見道之言也。

燒裨散

傷寒何謂陰陽易病。寔交接餘熱。客方用陰前燒裨灰求其所屬。

治其劇

取婦人裙近前陰剪燒灰為末水和服一二錢小便利陰頭

腫即愈婦人病用男子裙

牡蠣澤瀉散

病後土哀下部腫括萆蠹澤蜀葶勇商根海藻泄虛邪熱撤水消

方不恐

牡蠣括萆根蜀漆葶應子商陸海藻各等分為末白湯和一錢五

分小便利止後服日三服

商陸水煎服殺人故用散

竹葉石膏湯

解後虛羸尚欲吐人參粳米炙甘藷麥冬半夏竹葉石膏清熱解煩