


聖濟總錄

三十三

内閣文庫  
漢

内閣文庫  
番號 漢 12609  
冊數 200 ( 38 )  
函號 300 212





大學東  
校典籍  
局之印

大德重校聖濟總錄卷第三十三  
傷寒門



傷寒後變成瘡

傷寒後脚氣

傷寒後腰脚疼痛

傷寒後下痢膿血

傷寒後羸瘡

辟溫疫令不相傳染

大醫重效 卷之三十三

傷寒門

傷寒後變成瘧

辨寒熱

傷寒後變成瘧

辨寒熱

傷寒後變成瘧

辨寒熱

傷寒後變成瘧

辨寒熱

傷寒後變成瘧 辨寒熱

論曰傷寒變成瘧者因病差後外邪未散真藏尚虛因

為勞事致二氣交爭陰勝則振寒陽勝則發熱陰陽更

勝即往來寒熱休作有時也一日再發者得汗必解若

傷寒八九日得之熱多寒少其人不嘔清便自調者欲

自愈也或陽明證煩熱汗出日晡所發熱者脉浮宜解

表脉實宜攻裏又有婦人熱入血室發熱而更作寒者

當詳辨之

治傷寒後變成瘧病寒熱躁渴知母升麻湯方

知母

石膏

升麻各壹兩

蜀漆

常山

甘草各壹分

烏梅去核半兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓食後溫服人下散人散人血虛者服之而更許安

治傷寒後變成瘡口乾煩渴二黃湯方治傷寒後

麻黃去根節 大黃剉 栝樓根各壹分

甘草炙剉半兩

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓食後溫服因麻黃大黃栝樓根未煎其藥向患因

治傷寒後變成瘡寒熱躁渴升麻前胡湯方

升麻

前胡

去蘆頭各壹兩半 知母

芍藥

朴消

山梔子

木通

烏梅

甘草炙剉壹分

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑一棗

大拍碎同煎至七分去滓入生地黃汁二合更煎一

沸食後溫服

治傷寒後變成瘡痰毒壅脾肺面色萎黃寒熱時作人

參常山湯方

人參

常山

甘草

陳橘皮

湯浸去白焙各壹分

燈心

壹拾兩

右五味細剉拌勻用水二盞酒一盞同煎至兩盞去滓入好茶末二錢七分作兩服溫服取吐即差

治傷寒後變成勞瘡久不差黃芩鼈甲湯方

黃芩去黑心 芩胡去苗 山梔子人

烏梅去核各半兩 鼈甲去裙襴醋炙壹兩 甘草炙壹分

右六味蠶搗篩每服五錢七用童子小便一盞半入

桃柳尖各七箇生薑一棗大拍碎豉半合同浸一宿

平旦煎至七分去滓入生地黃汁一合攪勻更煎一

沸溫服不拘時

治傷寒後肝瘡由邪熱客於足厥陰經所成顏色蒼蒼

戰掉或似熱勞蜀漆鼈甲丸方

鼈甲去裙襴醋炙 蜀漆 知母焙

烏梅去核 苦參 常山

萎蕤各壹兩 豉壹合熬 石膏貳兩

細辛去苗葉 甘草炙各參分

右一十一味搗羅為末鍊蜜和搗數百下丸如梧桐子大每服十五丸空心溫酒下晚再服

治傷寒後心瘧令人煩熱不止飲水多常渴常山石膏

湯方

常山 鼈甲去裙襴醋炙 犀角屑

蜀漆各壹兩 甘草炙 烏梅去核各壹分

山梔子人兩半 石膏壹兩半

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入豉三七粒淡竹葉二七片生薑一棗大拍碎同煎至八分去滓食後溫服日二

治傷寒後脾瘧脾藏受熱或渴或不渴熱氣內傷不得大便腹中熱痛身寒汗出常山丸方

常山貳兩 知母焙 鼈甲去裙襴醋炙各壹兩

甘草炙半兩

右四味搗羅為末鍊蜜和搗數百下丸如梧桐子大

每服十五丸未發前溫酒下發時再服

治傷寒後肺瘧痰熱聚於胸膈令人心寒甚則發熱熱則驚如有所見者三味湯方

常山壹兩 秫米半匙 甘草炙剉壹分

右三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑一棗大拍碎同煎至八分去滓臨發時溫服

治傷寒後腎瘧令人悽悽腰脊痛而宛轉大便難手足寒常山茈胡湯方

常山 茈胡去 麥門冬去心各壹兩

烏梅去核 半夏湯洗半棗 檳榔剉

枳殼去瓤麩炒各半兩

石七味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑一棗大拍碎淡竹葉二七片豉二七粒同煎至七分去滓臨發時溫服

治傷寒後變成瘧疾或取轉早陰氣結伏心下成塊或膨滿嘔逆喘促面黑脣青四肢逆冷飲食不下并氣結食毒並宜服此太一護命丸方

陽起石以酒二 硫黃

附子炮裂去皮臍各壹兩

金星石

銀星石配合人 白石英

紫石英

礞石 滑石

消石

凝水石燒赤

磁石火燒醋淬

太陰玄精石

甘錫子累經銷金銀者

不灰木各半兩

丹砂壹分

巴豆肆拾玖粒去皮心出油

杏仁肆拾玖粒湯去皮尖雙人

右一十八味搗研為末再同研極細用阿魏一分與糯米粥同納勻丸如櫻桃大每服一丸麩炭火內燒赤取出用兩隻蓋子合在內候冷細研以生薑米飲下未知再服

治傷寒後寒熱不退成瘧時作茯苓飲方

赤茯苓去黑皮

鼈甲去裙襴醋炙

地骨皮各貳兩



此胡去苗

知母焙各壹兩半

枳殼去瓢炒壹兩

右六味剉如麻豆大每服五錢匕以水一盞半煎取七分去滓入生地黃汁一合食後良久溫服如人行五六里再服

傷寒後脚氣

論曰傷寒後脚氣者緣其人腎經本虛風濕毒氣乘虛客搏腎主腰脚故邪氣沉滯則脚弱而滿雖傷寒已差邪熱未盡風濕毒氣與熱相搏上衝於心肺其狀令人心胸煩滿上氣息急甚者致死診其脉左手尺脉洪而數者脚氣也服藥後脉沉而緩者愈

治傷寒後脚氣上衝心膈煩悶羚羊角湯方

羚羊角銹壹兩

旋復花參分

茯苓去黑皮壹兩

黃芩去黑心

半夏湯洗參分

檳榔剉半兩

陳橘皮湯浸去白焙參分

吳茱萸半兩湯洗參分

炒

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑一分

拍碎同煎至七分去滓食前溫服

治傷寒後脚氣衝心心神煩亂嘔逆減食脚膝痠疼紫蘇木香湯方

紫蘇莖葉壹兩

木香

赤茯苓去黑皮各半兩

沉香

芍藥

木通

剉各壹兩

吳茱萸 湯洗參編 焙乾炒

檳榔 剉

陳橘皮

湯浸去白 焙各壹分

右九味麤搗篩每服三錢匕用水一盞入生薑半分

拍碎同煎至七分去滓食前溫服

治傷寒後脚氣攻心悶絕檳榔散方

檳榔

木香 各壹兩

郁李人

微炒 去皮

桂 去麤皮 各參分

吳茱萸

湯洗參編 焙乾炒半兩

赤茯苓 去黑皮

牛膝 去苗酒浸 焙各參分

右七味搗羅為細散每服一錢半匕食前煎桑根白

皮木通湯調下日二

治傷寒後脚氣胸中滿悶喘息促急陳橘皮散方

陳橘皮 湯浸去白 焙參分

檳榔 剉壹兩

桂 去麤皮 參分

牽牛子 微炒 壹兩

右四味搗羅為細散每服一錢半匕食前溫酒調下

日二

治傷寒後脚氣攻心悶亂腹滿如石小便赤澀茯苓湯

方

赤茯苓

去黑皮 壹兩

鼈甲

醋炙去 裙襴

木通 剉

郁李人

微炒去皮 各參分

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓食前溫服

治傷寒後脚氣心煩滿悶不下飲食嘔逆多痰半夏湯

方

半夏

湯洗柴偏焙乾

枳殼

去瓢麩炒

茯苓

去黑皮

前胡

去蘆頭

木通

剉各參分

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑一分拍

碎同煎至半盞去滓食前溫服

治傷寒後脚膝腫滿氣急大便秘澀赤小豆湯方

赤小豆

合半

桑根白皮

兩半

紫蘇莖葉

兩壹

檳榔

兩半

右四味剉三味如麻豆大同小豆用水五盞入生薑

一分拍碎煎至二盞半去滓分兩服食前溫服

治傷寒後脚氣兩脛腫滿心中煩悶犀角散方

犀角

兩鎊壹

檳榔

兩剉半

陳橘皮

湯浸去白焙參分

細辛

去苗葉半兩

吳茱萸

湯洗參偏焙乾炒壹分

右五味搗羅爲細散每服一錢半七食前生薑熟酒

調下日二

治傷寒後脚氣心腹妨悶脹痛坐卧不安吳茱萸散方

吳茱萸

湯洗參偏焙乾炒壹分

檳榔

剉

當歸切焙

木香

郁李人

微炒去皮各參分

右五味麤搗篩每服三錢七用水一盞煎至七分去

滓食前溫服

治傷寒後脚氣攻心腹脹鞭小便赤澀大戟丸方

大戟炒

芫花醋炒

苦葶藶炒各半兩

續隨子去皮炒

巴豆去皮心壓去油盡別研各壹分

右五味搗羅四味為細末入巴豆和研勻鍊蜜和丸

如梧桐子大每服三九至五九溫米飲下不計時候

傷寒後腰脚疼痛

論曰腰者腎之府腎者主水受五藏六府之精而藏之

傷寒病後精血不足腎氣既弱風邪襲虛客搏於是少

陰之經留注腰脚凝滯不散故機關不利為腰脚疼痛

亦有宿患腎經風濕腰痛因病後下經氣虛而發者各

從其證以方治之

治傷寒後風虛邪氣流注腰膝冷疼脚膝無力獨活湯

方

獨活去蘆頭壹兩

防風去叉參分

五加皮貳分

附子炮裂去皮臍貳兩

芍藥壹兩

乾薑炮裂壹兩

桂去麤皮壹兩

牛膝去苗酒浸切焙壹兩杜仲去麤皮炙

五味子炒參分

右一十味剉如麻豆每服五錢七用水一盞半煎至七分去滓食前溫服

治傷寒後腰痛或皮肉癢痺腿膝疼痛行履艱難不可俛仰防風湯方

防風去叉壹兩

麻黃去根節參分

桂去麤皮參分

牛膝

去苗酒浸切焙壹兩

丹參半兩

五加皮半兩

杜仲

去麤皮炙剉參分

芎藭參分

附子

炮裂去皮臍壹兩

細辛

去苗葉半兩

當歸

切焙壹兩

芍藥

壹兩

羌活

去蘆頭壹兩

續斷

壹兩

右一十四味剉如麻豆每服五錢七用水一盞半入

生薑半分拍碎同煎至七分去滓食前溫服

治傷寒後腎藏氣虛腰疼乳香丸方

乳香

半兩

地龍

微炒壹兩

當歸

切焙壹兩

桂

去麤皮半兩

烏頭

去皮臍生用壹分

乾蠍

微炒去足半兩

附子

炮裂去皮臍壹兩

右七味擣羅爲末用安息香一兩剉酒浸一宿細研淘濾去滓慢火煎成膏同藥末研令勻鍊蜜和丸如菉豆大每服空心溫酒下五丸至十九

治傷寒後風傷腰膝冷疼兼補益元藏杜仲丸方

杜仲

去麤皮炙剉壹兩

乾漆

炒令烟出壹兩半

牛膝

去苗酒浸切焙壹兩

巴戟天

去心壹兩半

桂去麤皮壹兩

五加皮剉壹兩

狗脊

去毛壹兩

山茱萸壹兩

防風去叉半兩

附子

炮裂去皮臍壹兩

獨活去蘆頭壹兩

山芋壹兩

右一十二味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

空心溫酒下二十九

治傷寒後腰痛行履不得敗龜散方

敗龜

醋浸炙

虎骨塗酥炙

補骨脂微炒

當歸

切焙

芍藥各壹兩

薰陸香

桂去麤皮

白芷各半兩

右八味搗羅為細散每服食前熱酒調下二錢匕日

二服

治傷寒後腰痛或腰內有冷膿及膀胱氣痛檳榔散方

檳榔

剉

陳橘皮湯去白炒乾

桂去麤皮

芍藥

附子炮裂去皮臍各半兩

乾薑炮裂壹分

牽牛子

伍兩入糯米百粒同炒米色黃即住搗羅取末參兩其滓不用

右七味搗羅六味為散入牽牛子末和令勻每服空

心溫酒調下三錢七服藥了喫少薑粥投良久利下

腰間積滯物如不利即加至四錢匕以利為度

治傷寒後腰間冷痛當歸散方

當歸

切焙

桂去麤皮各壹兩

牡丹皮

附子炮裂去皮  
臍各半兩

右四味搗羅為細散每服空心溫酒調下二錢匕晚再服

治傷寒後腰痛不可忍沒藥散方

沒藥壹兩  
研 地龍微炒  
壹兩 桂去麤皮  
半兩

右三味搗研為細散每服空心溫酒調下二錢匕

治傷寒後風虛氣滯攻腰膝疼痛坐卧艱難芫花散方

芫花貳兩 吳茱萸壹兩  
半 芸薹子壹兩

右三味搗羅為散每用散半匙以黃米糟一兩入酒煮如糊攤於蠟紙上貼痛處

治傷寒後或中風濕毒氣流注腰脊日夜疼痛牛膝煎方

牛膝去苗 天麻 附子炮裂去皮  
臍生用

羌活去蘆頭  
各貳兩 當歸切焙  
壹兩

右五味搗羅為末用黑豆二升桑枝三斤細剉生薑四兩切用水二斗煎至二升半去滓入藥末煎成膏每服空心溫酒調下半匙七日晚再服

治傷寒汗出不徹濕毒留客肢體攣急腰脚不得屈伸牛膝散方

牛膝 麻黃去根 地龍

天南星

各貳兩

惡實根

拾條

右五味先將惡實根去皮細剉并諸藥入在沙盆內  
細研後用法酒一升再研勻爛用新布絞取汁後用  
炭半秤燒一地坑子令通赤後去火掃淨投藥汁於  
坑子內再以火燒令黑色取出於乳鉢內研細每服  
半錢匕溫酒調下日三服並無所忌

治傷寒發汗吐下後體虛元藏積冷氣刺腰痛轉動艱

難方

原蠶沙

斤半

糯米

升半

右二味同炒令米色焦然後擣羅為末每用半兩以

米醋調如稀糊入銚子內煎攪令稠及熱攤於蠟紙  
上貼痛處以帛纏縛冷即易之

治傷寒後體虛元藏挾風冷腰膝疼痛行履不得杜仲

酒方

杜仲

去麤皮炙

獨活

去蘆頭

附子

炮裂去皮

仙靈脾

分參

牛膝

去苗

石五味細剉用生絹袋盛以酒五升浸密封頭經七  
日後開每日取二三合溫服日可三服未差再浸服  
傷寒後下痢膿血

論曰傷寒後變成膿血痢者本病差之後熱毒未散乘



虛客於腸胃與津液相搏故下痢膿血毒氣甚則壯熱而腹痛濕毒加之則所下如魚腦或如爛肉又傷寒未解少陰病下痢膿血者亦濕熱相搏故也

治傷寒熱毒入胃下利膿血黃連阿膠湯方

黃連去須炒 梔子人兩 阿膠炙令燥

黃蘗去麤皮炙

右四味麤搗篩每服四錢匕水一盞煎七分去滓不拘時溫服

拘時溫服

治傷寒毒熱不解日晚壯熱腹痛便利膿血地榆湯方

地榆剉 黃連去須炒 犀角鎊

茜根 黃芩去黑心 梔子人兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞薤白三寸同煎

六分去滓不拘時溫服

治少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下利膿血

不止桃花湯方

赤石脂兩 乾薑壹分 粳米貳合

右三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎米熟去滓

溫服三服得愈勿服

治傷寒後下痢膿血疼痛香連散方

木香兩 黃連去須壹兩 青橘皮去白焙

梔子人壹分

右四味搗羅為散每服二錢七米飲調下不拘時

治傷寒後濕熱不除下痢膿血晝夜無度烏梅丸方

烏梅肉焙

黃連去須炒

當歸切焙

訶梨勒炮去核各參分

阿膠炙令燥半兩

乾薑炮分壹

右六味搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大每服二十九

食前米飲下加至三十九

治傷寒熱病差後下痢膿血不止黃連湯方

黃連去須炒壹兩

黃芩去黑心參分

梔子人壹分

阿膠炙令燥半兩

右四味麤搗篩每服三錢七水一盞煎至六分去滓

食前溫服

治傷寒後下痢赤多白少所往澀痛宜服黃耆湯方

黃耆壹兩

枳殼去瓢炒

大腹皮各半兩

黃連去須參分

白茯苓去黑皮

芍藥各壹兩

甘草炙參分

右七味麤搗篩每服五錢七水一盞半煎至一盞去

滓食前溫服

治傷寒後下痢膿血方

龍骨貳兩

黃連去須炒壹兩

右二味搗羅為散每服二錢七食前米飲調下日三

夜一

治傷寒後腹痛下痢膿血日夜三五十行赤石脂散方

赤石脂兩半 乾薑炮壹分 厚朴去麤皮薑汁炙透

訶梨勒炮去核各半兩

右四味搗羅為散每服二錢七食前米飲調下日三

服

治傷寒熱病後熱毒下痢膿血黃連丸方

黃連去須炒參分 烏梅肉炒貳兩

右二味搗羅為末鍊蜜入少蠟和搗五百杵丸如梧

桐子大每服二十九空心米飲下加至三十九

治傷寒下痢膿血腹痛不止赤石脂湯方

赤石脂壹兩 乾薑炮 附子炮裂去皮臍

當歸切焙各半兩 芍藥壹兩

右五味剉如麻豆每服五錢七水一盞半煎一盞去

滓食前溫服

治傷寒後下痢膿血時復憎寒木瓜湯方

乾木瓜焙 白朮各壹兩 白芷各壹兩

黃連去須貳兩半 附子炮裂去皮臍 石膏研碎

赤石脂 桑根白皮各貳兩 桂皮去麤

芎藭 各壹兩 當歸 兩半 白豆蔻 壹分

芍藥 參 黃芩 去黑心 兩半 龍骨 兩

右一十五味咬咀每服五錢匕以水一盞半入生薑

一分拍碎同煎至八分去滓溫服

治傷寒後下痢膿血食物不得氣脹腹滿白芷黃連湯

方

白芷 壹兩 黃連 去須 壹兩 天雄 炮裂去皮 兩半

地榆 兩 厚朴 去麤皮生薑 兩半

桂 去麤皮 壹兩 當歸 剉焙 壹兩 黃耆 細剉 壹兩

赤石脂 壹兩 白朮 壹兩 訶梨勒皮 煨 兩半

黃芩 去黑心 兩半 龍骨 壹兩 吳茱萸 洗焙炒 兩半

芎藭 壹兩 乾薑 炮 兩半

右一十六味剉如麻豆每服三錢匕水一盞半煎至

八分去滓空腹溫服日三

傷寒後蠱瘡

論曰傷寒後蠱瘡者因腹中有熱其人食少胃中空虛

三蟲須食或食五藏或食下部隱僻有瘡故名蠱瘡其

候齒無色舌上盡白四肢沉重忽忽喜眠甚則脣裏有

瘡其瘡在上脣裏如米粟心內懊懣痛者此蟲食五藏

之證也若下脣裏有瘡其人喜眠者此蟲食下部之證

也若肛爛見五藏者死

治傷寒後蠱瘡桃人湯方

桃人湯浸去皮槐子微炒

大棗拾伍枚

右四味麤搗篩以水三盞煎至一盞半去滓分溫三服

治傷寒及諸病後瘡出下部黃連犀角湯方

黃連去須微炒犀角鎊壹兩

木香肆錢

烏梅柒枚

右四味麤搗篩每服五錢七水一盞半煎至一盞去

滓食前溫服

治傷寒後濕蠱蟲食下部心中煩懊槐子丸方

槐子微炒

苦參各壹兩

熊膽研半兩

乾漆參分木香

檳榔剉各壹兩

桃人湯去皮尖雙

右七味搗研為末鍊蜜和搗數百下丸如梧桐子大

每服二十九空心荆芥湯下加至三十九

治傷寒後心中煩躁唇口生瘡蟲食下部羚羊角散方

羚羊角鎊參分

龍膽兩半

黃耆剉參分

升麻兩半

玄參

芫胡去苗各參分

右六味搗羅為散每服二錢匕煎槐子湯調下空心食前日三服

治傷寒後羸瘡麝香散方

麝香研 雄黃醋煮 丹砂研各壹分

羚羊角鎊 犀角鎊 黃連去須微炒

青葙子 升麻 貝齒煨研各半兩

桃人湯浸去皮尖雙

右一十味搗研為散再同研勻每服二錢匕食後煎麥人粥飲調服又以綿裹藥半棗核大內下部中良久去之

治傷寒後羸瘡雄黃散方

雄黃壹分醋煮研 青葙子 黃連去須

苦參各壹兩半 桃人湯浸去皮尖雙

右五味搗研為散再同研勻每服一錢匕空心米飲調下若羸在下部更以綿裹藥一錢內下部中良久去之

治傷寒後羸瘡苦參湯方

苦參壹兩 槐白皮剉貳兩 熊膽半兩研

右三味除熊膽外麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓入熊膽末半錢匕攪勻空心溫服下部

有瘡者更灌下部

治傷寒後蠱蟲食下部桃皮湯方

桃皮剉

槐子

榧實各壹兩

石榴根剉半兩

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入棗三枚擘

破同煎至八分去滓食前溫服

治傷寒後脣口生瘡心中懊懺蟲食下部時或下痢犀

角湯方

犀角鎊

龍骨各壹兩

木香分

阿膠炙令燥壹兩

升麻半兩

桃人湯浸去皮尖雙人壹兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

溫服晚再服

治傷寒天行下部蠱瘡方

烏梅去核搗爛半兩

獨頭蒜壹頭搗爛

屋塵參合

右三味一處入苦酒一升和勻於銅器中煎候可丸

丸如棗核大內下部中

辟溫疫令不相傳染

論曰凡時行溫疫皆四時不正之氣感而病者長少率相似此病苟不辟除多致傳染宜有方術預為之防

辟時氣溫疫令不相染敗龜湯方

敗龜酥炙 梔子人參 大青

羚羊角鎊 芍藥 馬牙消

前胡去苗 紫苑去苗土

右八味麤搗篩每服五錢七水一盞半煎至八分去

滓溫服食前

辟時氣疫癘絕瘴散方

麻黃去節 桂去麤皮 升麻

細辛去苗葉 乾薑炮 附子炮裂去皮臍

防已 蜀椒去目并閉口炒出汗 防風去

桔梗炒 白朮 芎藭各半兩

右一十二味搗羅為細散每服二錢七空心溫酒調

下

辟傷寒溫疫瘴癘令不相染赤小豆丸方

赤小豆貳兩 鬼臼 鬼箭羽

丹砂研 雄黃醋煮研

右五味搗研為末再同研勻鍊蜜和丸如麻子大每

服五丸米飲下不計時候

辟時疫溫癘辟溫湯方

甘草 大黃各貳錢 皂莢壹錢並生用

右三味細剉用水二盞煎至一盞去滓空心熱服至



晚下惡物為効

治溫癘病轉相傳染雄黃丸方

雄黃醋煮

鬼臼

鬼箭羽

赤小豆

丹參各壹兩

右五味搗研為末再同研勻鍊蜜和丸如小豆大每服五丸溫水下

辟溫疫病真珠散方

真珠研

桂去麤皮各壹分

貝母去心半兩

雞子

貳枚去殼炒令黃黑研

杏人

湯浸去皮尖雙入炒參分

右五味搗研為末再同研勻歲旦溫酒調下一錢匕

若歲中人多病者可旦望服之如遇時行病即不拘

時

治時疫更相傳染宜預服羌活湯方

羌活去蘆頭

桂去麤皮

芎藭

牡丹皮

芫胡去苗

桔梗炒

升麻

荆芥穗

玄參

甘草炙

麻黃去根節

木香各壹分

吳茱萸

湯洗焙乾炒壹錢

牽牛炒半兩

右一十四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服不拘時候

辟瘴癘溫疫時氣預服蒼耳散方

蒼耳

重午日採暴乾參兩

右一味搗羅為散每服二錢七空心井華水調下

辟時行溫疫瘴癘方

蕪青

不限多少搗取汁

右一味立春後遇庚子日闔家大小各溫服一二盞

辟溫疫時氣流金散方

雄黃

參兩

雌黃

貳兩

鬼箭羽

兩

白礬

半兩燒灰

羚羊角

兩

鈔壹

右五味搗研為散縫小絹袋盛一兩帶於胸前別以

一袋掛於門戶上每月初以一兩許當庭燒之能辟溫氣

辟溫疫去百惡雌黃丸方

雌黃

研

雄黃

研各壹兩

虎骨

羖羊角

鈔各貳兩

龍骨

蝟皮

各壹兩

空青

半兩研

龜甲

壹兩

樗雞

柒枚

芎藭

貳兩

真珠

參兩研

鮫鯉甲

壹兩

右一十二味搗研為末再同研勻鎔蠟和丸如彈子

大正旦戶前燒一丸男左女右繫一丸於臂上遇時

行亦依此用

辟溫疫時氣塗傅方

大雄黃研 貳兩

丹砂研

菖蒲切

鬼臼各壹兩

右四味搗研為末再同研勻以水調塗五心及額上

鼻中耳門辟溫甚驗

治傷寒疫癘傳染及頭目昏重項脊拘急胸膈不通辟

瘟丸方

玄參炒 伍兩

蒼朮炒 參兩

芎藭炒

白芷炒

羌活去蘆頭 生用

甘草炙

烏頭

炮裂去皮臍各壹兩

安息香壹分

龍腦

大麝香

各半錢研

右一十味除腦麝外餘搗羅為細末入腦麝拌勻粟

米粥為丸如彈子大陰乾紗袋盛安近火處每服一

丸時疾生薑蜜水磨下陰毒面青熟水磨下

辟四時疫癘非節之氣調中丸方

大黃伍兩 剉炒

麻人壹兩 別研

枳殼去瓢 炒

白茯苓去黑皮

芍藥

前胡去蘆頭

黃芩去黑心 各壹兩

右七味搗研為末鍊蜜丸如梧桐子大每服十五丸

食後飲下微利為度日晚夜卧服之佳

食為天下之寶也...

小水則流...

黃...

白...

大...

...

...

...

...

大德重校聖濟總錄卷第三十三



...

...

