

特/15

998

醫 村 上 重 馬 編

現代模範處方一覽表

KLINISCHES REZEPHTAFELN DER GEGENWART

目次	水	24. オピウム散	40. 麥角越後新丸
1. 興奮強心利尿劑 一表 1-18	100.0 一日量、三回乃至六回分服 デキタリス丁糖極量一回 1.5 一日 5.0 實葉糖ヨリ速ニ奏功スモ更ニ迅速ヲ望ム時ハ水ニ混ジ直腸ニ注入	阿片末 0.2 白糖 2.0 分十包、毎時一包宛	麥角越後新丸 0.1 爲一丸、止血ニハ一日三回乃至三丸宛 止汗ニハ三丸頓服 麥角越後新糖量一回 0.3 一日 0.6
2. 鎮痛麻酔劑 19-32	10. 實葉散 0.3-0.4 デキタリス糖末 0.3 糖酸キニチ 1.5 三乃至六包ニ分チ一日三乃至六回分服 全量 3.0 至リ一時中止	25. ビスベラドンナ散 1.5 次硝酸蒼鉛 0.075 ベラドンナ越後新 爲三包、一日量、三回分服	41. スチプトール 0.5 分三包、一日量、三回分服
3. 止血劑 33-41	11. デキタリス葉浸 (0.5) 50.0 アラビヤゴム糖 15.0 一回適量、一日二三回適量 胃障害ノ爲内服ニ堪エザル時用之	26. ビスコデイン散 0.75 次硝酸蒼鉛 0.06 糖酸コデイン 1.0 乳糖 爲三包、一日量、三回分服	IV. 神經劑
4. 神藥劑 42-56	12. ストロホ水 0.5-1.5 ストロファンクス丁糖 100.0 一日六回分服、一日量	27. 新オルトフォルム 1.5 分三包、一日三回分服 胃潰瘍、腸潰瘍、胃痛ノ疼痛、神經性症ニハ無効	42. ストリキニーチ注射液 0.01 糖酸ストリキニーチ 10.0 一筒皮下注射 弱視、黒内障、其他運動不全麻痺、中樞性痙攣トシテ成説ニハ一日數回大量ヲ用フ、小兒遺尿症、
5. 解熱發汗劑 57-72	13. デウレチン水 5.0 デウレチン(オキシム) 200.0 水 一日量六回分服	28. ベラドンナ越後新 0.1 乳糖 1.0 分三包、一日量三回分服	43. 臭刺水 3.0 ブロムカリウム(又ハ臭刺) 100.0 一日量三回分服
6. 祛痰鎮咳劑 73-89	14. 利尿水 5.0 糖酸カリウム(糖刺) 4.0 硝酸カリウム(硝石) 2.0 苦味丁糖 100.0 一日量三回分服 糖酸カリウム液ナレハ三倍量ヲ用フ	29. 鹽莫劑 0.01 鹽酸モルヒチ 0.3 爲一包、頓服	44. 價廉藥水 2.0 ブロムカリウム 2.0 ブロムナトリウム 1.0 ブロムアンモニウム 2.0 苦味丁糖 100.0 一日量、三回分服
7. 健胃消化劑 90-106	15. サリチル酸ナトリウムカフエイン 0.5-0.8 白糖 1.0 一日量、分三包、三回分服 糖量一回 1.0 一日 6.0 安息香酸ナトリウムカフエインモ同様同量ヲ用フ	30. 偏頭痛散 0.1 カフエイン 0.25 爲一包頓服	45. 價廉藥水 1.0 ブロムカリウム 2.0 糖草丁糖 100.0 一日量、三回分服
8. 制瀉軟便防瀉劑 107-120	16. グレモール水 6.0-20.0 重酒石酸カリウム 100.0 爲假合劑一日量、三回分服	31. 價廉藥油 10.0 クロロフォルム 10.0 ヒヨス油 爲假合劑	46. ヒステイール丁糖 3.0 阿糖丁糖 3.0 糖草丁糖 1.0 エーテル糖 1.0 一日三回乃至五回宛水ニ和シ服用
9. 下劑 121-132	17. 商陸越後新水 0.6 商陸越後新 100.0 一日量、三回分服 商陸越後新糖量一回 0.5 一日 1.5	32. 齒痛液 1.0 阿片丁糖 1.0 クロロフォルム 1.0 丁香油(又ハ樟腦精) 1.0 點滴又ハ綿球トシ顔面ヘ挿入 クレオソートモ亦効アリ	47. 亞硝酸水 1.0 亞硝酸ナトリウム 100.0 一日三回分服一日量
10. 瀉劑 133-141	18. 吐松實浸 (10.0) 100.0 吐松實浸 爲假劑一日量三回分服 腎疾患ニ用フベカラズ	III. 止血劑	48. フェブ奥刺散 0.75 アンチフェブリン 3.0 ブロムカリウム 爲三包、一日量、三回分服
11. 吐劑 142-145	19. 痛水 0.5-1.0 鹽酸ノボコイン 0.15-0.25 クロールナトリウム 0.5-1.0 糖化アドリナリン 100.0 蒸餾水 爲一包、頓服	33. 麥角皮下注射液 2.0 麥角越後新 0.2 石炭酸 8.0 蒸餾水 爲一包、頓服	49. 價廉藥散 2.0 ブロムカリウム 2.0 糖草根末 0.2 一日量、爲三包、三回分服
12. 瀉劑 146-150	20. 局所麻酔注射液 0.5-1.0 化學的純製糖質糖 0.15-0.25 クロールナトリウム 0.5-1.0 糖化アドリナリン 100.0 蒸餾水 爲一包、頓服	34. ユルゴチン皮下注射液 純品 ユルゴチン(ボンベロン) 一日量回半筒乃至一筒	50. 真素カンフル糖草丸 0.05 ブロム糖草根末 0.05 爲一丸、一日三回、二乃至五丸宛
13. 強壯劑 151-166	21. シュライヒ氏液 強中弱 鹽酸コカイン 0.2 0.1 0.01 鹽酸モルヒチ 0.025 0.025 0.025 クロールナトリウム 0.2 0.2 0.2 蒸餾水 100.0 100.0 100.0 5.0% 石炭酸水 2滴 2滴 2滴	35. アドリナリン注射液 10.0% 鹽化アドリナリン水 一回一筒注射	51. 糖草浸 (20.-100.) 100.0 一日量數回分服
14. 變質劑 167-170	22. 必林注射水 50.0% アンチピリン水 一筒皮下注射	36. クロールカルチウム注射液 1.0% クロールカルチウム水 皮下注射、一回一筒 出血、結核、癆瘵、慢性疾患、破傷風、乳兒痙攣、急性腎炎 クロール石灰トシ製ス	52. ストリキニーチ丸 1.0 壯年男子
15. 止汗劑 180-187	23. 麥痛散 0.2 糖酸モルヒチ 0.25 次硝酸蒼鉛 0.2 爲一包頓服	37. カルチウム水 2.0 クロールカルチウム 100.0 一日量三回食後分服、止血、消炎、鎮痛	ヤング氏法 年齢 × 年齢 + 12 = 用量
16. 止痒劑 188-202	24. 麥痛散 0.2 糖酸モルヒチ 0.25 次硝酸蒼鉛 0.2 爲一包頓服	38. 麥角浸 100.0 麥角浸 (2-5.0) 1.0 苦味丁糖 1.0 糖酸 1.0 爲浸劑、一日量、六回分服 麥角極量一回 1.0 一日 5.0	
17. 催眠劑 203-221	25. 麥痛散 0.2 糖酸モルヒチ 0.25 次硝酸蒼鉛 0.2 爲一包頓服	39. カナデンシス水 3.0 ヒドラスチス糖酸越後新 1.0 苦味丁糖 100.0 一日六回分服	
18. 鎮咳劑 222-229	26. 麥痛散 0.2 糖酸モルヒチ 0.25 次硝酸蒼鉛 0.2 爲一包頓服		
19. 透切劑 230-232	27. 麥痛散 0.2 糖酸モルヒチ 0.25 次硝酸蒼鉛 0.2 爲一包頓服		
20. 催乳劑 233-234	28. 麥痛散 0.2 糖酸モルヒチ 0.25 次硝酸蒼鉛 0.2 爲一包頓服		
21. 痲疹及痧狀劑 235-251	29. 麥痛散 0.2 糖酸モルヒチ 0.25 次硝酸蒼鉛 0.2 爲一包頓服		
22. 合劑劑 252-258	30. 麥痛散 0.2 糖酸モルヒチ 0.25 次硝酸蒼鉛 0.2 爲一包頓服		
23. 吸入劑 259-275	31. 麥痛散 0.2 糖酸モルヒチ 0.25 次硝酸蒼鉛 0.2 爲一包頓服		
24. 驅蟲劑 276-278	32. 麥痛散 0.2 糖酸モルヒチ 0.25 次硝酸蒼鉛 0.2 爲一包頓服		
25. 檢査劑 279-297	33. 麥痛散 0.2 糖酸モルヒチ 0.25 次硝酸蒼鉛 0.2 爲一包頓服		
26. 散劑劑 298-302	34. 麥痛散 0.2 糖酸モルヒチ 0.25 次硝酸蒼鉛 0.2 爲一包頓服		
27. 膏劑 303-321	35. 麥痛散 0.2 糖酸モルヒチ 0.25 次硝酸蒼鉛 0.2 爲一包頓服		
28. 眼科劑 322-339	36. 麥痛散 0.2 糖酸モルヒチ 0.25 次硝酸蒼鉛 0.2 爲一包頓服		
29. 婦人科洗滌劑 340-351	37. 麥痛散 0.2 糖酸モルヒチ 0.25 次硝酸蒼鉛 0.2 爲一包頓服		
30. 眼科劑 352-356	38. 麥痛散 0.2 糖酸モルヒチ 0.25 次硝酸蒼鉛 0.2 爲一包頓服		
31. 眼科劑 357-363	39. 麥痛散 0.2 糖酸モルヒチ 0.25 次硝酸蒼鉛 0.2 爲一包頓服		
32. 尿道洗滌劑 364-369	40. 麥痛散 0.2 糖酸モルヒチ 0.25 次硝酸蒼鉛 0.2 爲一包頓服		
33. 肛門洗滌劑 370-377	41. 麥痛散 0.2 糖酸モルヒチ 0.25 次硝酸蒼鉛 0.2 爲一包頓服		
34. 雜劑 378-386	42. 麥痛散 0.2 糖酸モルヒチ 0.25 次硝酸蒼鉛 0.2 爲一包頓服		

大正 2. 5. 28 内交



硝酸ストリキニーチ 甘草末及水飴 爲一丸、一日三回、一乃至五丸宛	0.001 適宜	75. 遠志煎 セチガ根煎 爲煎劑一日量六回分服	(5.0) 100.0	含糖 ペアレン 次硝酸香粉 爲三包、一日量三回分服	1.0 0.8	一日量、分三包、三回分服 阿片極量一回0.15一日0.5	
53. アンチチルピン アンチフェブリン ブロームアムモニウム サリチル酸 フェブリン極量一回0.5一日1.5 一回0.5頓服又ハ1.5ヲ三回ニ分服	10.0 5.0 5.0	76. 遠志浸香水 セチガ根煎 杏仁水 爲煎劑一日量六回分服	(4.0) 100.0 4.0	92. オレキシン散 タンニン酸オレキシン(シロロロロロロ) 他藥末(又ハゲンチアナ根末) 分三包、一日量毎食二時間前オブラート ニ包ニ服用	1.0 1.0	109. サリチル酸香粉 レゾルチン 爲三包、一日量、三回分服	3.0 0.5
54. クロロフォルム水 クロロフォルム 薄荷水 水 一日六回分服	1.5 10.0 100.0	77. セチガ煎沃制杏仁水 セチガ根煎 ヨードカリウム 杏仁水 爲煎劑一日量三回分服	(5.0) 100.0 1.0 5.0	93. コンジュランゴ浸漬劑 コンジュランゴ皮 一日量、三回分服 十二時間冷浸後十二時間蒸出	(10.0) 100.0	110. タンナルビン散 タンナルビン 白糖 分三包、一日量、三回分服	3.0 2.0
55. ストリキニーチ角越幾斯丸 硝酸ストリキニーチ 麥角越幾斯 甘草末 爲六丸、一日量 硝酸ストリキニーチ極量一回0.005一日 0.015 麥角越幾斯一回0.2一日0.6	0.003 0.3 適宜	78. 吐根浸 吐根浸 一日量、六回分服	(0.35-0.5) 100.0	94. 鹽苦水 稀鹽酸 苦味丁糖 水 一日量、三回分服	1.0 1.0 100.0	111. タンニゲン散 タンニゲン(アセチルタンニン) 乳糖 爲三包、三回分服一日量	1.5 1.0
56. メチレンブラウカプセル メチレンブラウ 膠囊一個ニ入レ、一日三回一個宛	0.1	79. 吐根杏仁水 吐根浸 杏仁水 一日量、六回分服	(0.3-0.5) 100.0 4.0	95. 重那散 重炭酸ナトリウム 他藥末 一日量、分三包、三回分服	3.0 1.0	112. 乳糖水 乳糖 水 爲水劑一日量三回食前分服	3.0-8.0 100.0
<b>V. 解熱發汗劑</b>		80. 小兒咳合劑 吐根舍利別 アルタ根舍利別 一日三乃至五回4.0宛	10.0 20.0	96. 昆越幾斯水 コンジュランゴ液動越幾斯 稀鹽酸 水 一日量、三回分服食前	7.0-15.0 1.0 100.0	113. ケルツ根煎 一日量、三回又ハ六回分服	(1.0) 100.0
57. 1.0% 鹽酸ピロカルピン水 中乃至一筒皮下注射		81. ベルバサルム乳劑 ベルバサルム アラビガム 水 一日量、三回分服 氣道ノ慢性加答兒、結核、慢性下痢、 泌尿器慢性疾患	3.0 7.5 100.0	97. 重曹ビス散 重炭酸ナトリウム 次硝酸香粉 莫岩越幾斯 爲三包、一日三回、一包宛	2.0 1.5 0.06	114. 黃蘗煎 黃蘗煎 稀鹽酸 一日量三回分服	(1.5-5.0) 100.0 1.0
58. 5.0% 重鹽酸キニーチ水 惡寒一乃至二時間前一筒注射		82. 小兒咳散 安息香散 樟腦 乳糖 分六包、一日六回一包宛、	0.18 0.18 1.0	98. 香黃丸 香木龍越幾斯(ホミカキス) 大黃越幾斯 爲一丸、一日三回一乃至三丸宛 香木龍越幾斯極量一回0.05一日0.1	0.1 0.05	115. 古倫機煎 ココロ根煎 一日量三回分服	(5.0) 100.0
59. 湯水 サリチル酸ナトリウム 薄荷水 苦味丁糖 水 一日量、三回分服、食後	3.0 3.0 1.0 100.0	83. 咳丸 安息香酸 ヒヨス越幾斯 アルタ根末 爲六丸、一日六回一丸宛 ヒヨス越幾斯極量一回0.1一日0.3	0.5 0.2 適宜	99. 硫酸リモナーデ 稀硫酸 單舍利別 水 一日數回分服 淋病瘻瘻劑	2.0 10.0-20.0 200.0	116. 沒食子散丸 沒食子散 甘草末 龍膽末 爲千二百丸	10.0 20.0 76.0
60. 鹽酸ピロカルピン 乳糖 爲一包、頓服	0.01 0.3	84. D-フル重那散 D-フル散 重炭酸ナトリウム 爲一包、頓服	0.5 0.5	100. 林檍酸リモナーデ 林檍酸 單舍利別 水 一日數回分服	1.0 10.0-20.0 200.0	117. 銀丸 硝酸銀 白陶土 爲一丸、一日三回、一乃至三丸宛 硝酸銀極量一回0.03一日0.1	0.01 適宜
61. D-フルヘプリン酸 D-フル散 アンチフェブリン 爲一包、頓服	0.5 0.3	85. 咳嗽錠 鹽酸セルヒチ クロールアムモニウム(細砂) 甘草越幾斯 アラビガム 晒堅飴 白糖 水 百錠、又ハ百丸トス、一日十二乃至二十四 個服用 鹽酸極量一回0.03一日0.1 以上ニ吐根末1.0ヲ加フルモコレ夏冬ニヨ リ前及ゴムヲ加減ス	0.1 3.0 10.0 30.0 30.0 30.0 10.0	101. 糖酸リモナーデ 糖酸 單舍利別 水 一日數回分服	2.0 10.0-20.0 200.0	118. カルボル丸 石炭酸 爲一丸一日三回一乃至三丸宛	0.0
62. 鹽規丸 鹽酸キニーチ 糖粉(冬) 水飴(冬) 爲三百丸、三丸中鹽規0.1ヲ含ム	10.0 8.0 6.0 11.0 13.0	86. アボセルヒチ水 鹽酸アボセルヒチ 稀鹽酸 水 一日量、三回分服 鹽酸アボセルヒチ極量0.02一日0.06	0.01-0.03 1.0 100.0	102. 糖酸リモナーデ 稀鹽酸 單舍利別 水 一日數回	1.0 10.0-20.0 200.0	119. 阿仙藥液 三回分服一日量	(2.5) 100.0
63. キニーチフェブリン丸 鹽酸キニーチ アンチフェブリン 一丸、又ハ一包トナシ頓服	0.5 0.3	87. 鎮咳劑 鹽酸セルヒチ クロールアムモニウム 甘草越幾斯 吐根末 晒堅飴 百錠又ハ百丸トナシ頓服時半乃至二錠宛 一丸中セルヒチヲ含ム	1.0 3.0 10.0 10.0 40.0	103. 枸橼酸リモナーデ 枸橼酸 單舍利別 水 一日數回	1.0-2.0 10.0-20.0 200.0	120. サリチル酸 龍胆越幾斯 爲十二丸	1.0 0.5
64. サリピリン 爲一包、頓服又ハ一日三包	1.0	88. ヘロイン散 鹽酸ヘロイン 乳糖 分三包、一日量一包宛 極量一回0.01一日0.03	0.015 1.0	104. リーベル氏煎劑 枸橼酸 水 炭酸ナトリウム 密栓ヲ要ス禁強振盪	4.0 200.0 0.0	121. 硫苦水 硫酸マグネシウム(高利鹽) 稀鹽酸 水 一日量三回分服	8.0-20.0 1.0 100.0
65. フェナセチン 爲一包、頓服又ハ一日三包	0.25	89. デオニン 白糖 分三包、一日三回分服	0.06 1.0	105. セルナル水 重炭酸ナトリウム 酒石酸 單舍利別 枸橼油 爲四和劑	5.0 1.5 20.0 100.0	122. 甘果散 甘果 乳糖 爲一包、頓服	0.5 0.3
66. アンチフェブリン 分三包、一日量、三回分服	0.75	90. 重那水 重炭酸ナトリウム 苦味丁糖 水 一日量三回分服	1.0-3.0 1.0 100.0	106. アンタナジン(糖酸アンニセチン) チレン 糖酸マグネシウム 分三包、一日量毎食一時間前一包宛服用	3.0 1.0	123. 甘果散 甘果 乳糖 爲一包、頓服	0.5 0.3
67. アンチピリン 分三包、一日量三回分服	1.5	91. 重那ペアレン散 重炭酸ナトリウム	1.5	107. 硝石散 次硝酸香粉 乳糖 一日量、分三包、三回分服	3.0 0.1 1.0	124. 鹿茸丸 日本藥局方鹿茸ヤラツバ丸 二乃至四丸頓服	4.0-10.0
68. ラクトフェニン 分三包、一日量、三回分服	1.5	<b>VII. 健胃消化劑</b>		<b>VIII. 制瀉收軟防腐劑</b>		125. 日本藥局方地方甘草散 分三包一日三回分服、又ハ爲一包、頓服	4.0-10.0
69. ビタミジン 分三包、一日量、三回分服 極量一回0.5一日1.5	1.0	92. 硝石散 次硝酸香粉 乳糖 一日量、分三包、三回分服	3.0 0.1 1.0	108. 鹽苦水 次硝酸香粉 阿片 乳糖 一日量、六回分服、緩下	3.0 0.1 1.0	126. 小兒散 炭酸マグネシウム 大黃末 乳糖 爲一乃至二丸頓服	6.0 2.0 4.0
70. セロフェン 分三包、一日量、三回分服	1.5-3.0	<b>VIII. 制瀉收軟防腐劑</b>		109. センナ葉液 (3.0-10.0) 100.0 一日量、三回分服	3.0-10.0	127. ボドフィリン丸 ボドフィリン ペラドン越幾斯又ハ具岩越幾斯 甘草末 爲一丸四乃至六丸頓服、慢性便秘 ボドフィリン極量一回0.1一日0.3	0.05 0.005 適宜
71. アスピリン 分三包、一日量、三回分服	2.0-3.0	93. 重那水 重炭酸ナトリウム 苦味丁糖 水 一日量三回分服	1.0-3.0 1.0 100.0	128. カスカラナツタ液動越幾斯 水 一日量、三回分服	4.0 100.0	130. ママシド煎 (10.0) 100.0 一日量、六回分服、緩下	10.0
72. マルチン 爲三包、一日量、三回分服	0.5-0.7	<b>IX. 下劑</b>		129. 硫苦水 硫酸マグネシウム(高利鹽) 稀鹽酸 水 一日量三回分服	8.0-20.0 1.0 100.0		
<b>VI. 祛痰鎮咳劑</b>		<b>VII. 健胃消化劑</b>		<b>VIII. 制瀉收軟防腐劑</b>			
73. 鹽酸ヘロイン(ガアセチルセルヒチ)0.001 蒸餾水 1筒皮下注射	0.001 1.0	94. 鎮咳杏仁水 鹽酸セルヒチ 杏仁水 水 一日量、六回分服	0.02 4.0 30.0	107. 硝石散 次硝酸香粉 乳糖 一日量、分三包、三回分服	3.0 0.1 1.0	131. 硝石散 次硝酸香粉 阿片 乳糖 一日量、六回分服、緩下	3.0 0.1 1.0



131. 蓖麻子油 薄荷油 茶ノ上ニ浮ベ領服	15.0-20.0 壹滴	コード丁長極量一回0.2-1.0	148. 鹽酸モルヒネ 鹽酸コカイン 乳糖 分六包、一日量、六回分服	0.05 0.05 1.0	藜香 大黃末 キナ皮末 草合利別 爲百丸、一日三回、一乃至四丸宛	2.5 8.0 8.0 適宜	181. アガリチン丸 アガリチン ドーフル酸 アルタ根末 アラビヤゴム末 爲三十九、毎ター乃至二丸宛頓服 アガリチン一回極量0.1	0.3 2.0 適宜 適宜
<b>X. 驅虫劑</b>		<b>XIII. 強壯劑</b>		<b>XIV. 變質劑</b>		<b>XV. 止汗劑</b>		
132. 婦人科茶劑 センテ葉 フラングラ皮 茅根 煎搾シ一劑量トナス	10.0 10.0 10.0	149. 鹽酸オレキシン散 重炭酸ナトリウム 鹽酸オレキシン 分六包、一日量、六回分服、食物 忌阻ニハ尙別居安靜、臭刺、沃制、モヒ 注射	5.0-10.0 2.0	167. 昇采注射液 昇采 クロールナトリウム 蒸溜水 毎日又ハ隔日一筒注射	1.0 10.0 100.0	182. カンフル酸散 樟腦醇 爲一包オプラートニテ頓服	1.0-5.0	
133. 瘧虫カプセル劑 總馬越幾斯 膠囊ニ入レ二回ニ分服 三四時間後甘水下劑ヲ用フヒマシ油ヲ用 フル勿レ	2.0-5.0	150. レゾルチン水 レゾルチン 稀鹽酸 水 一日數回分服、一日量、忌阻	1.0-2.0 1.0 100.0	168. 撒采油 サリチル酸末 肝油(又ハ洗滌パラフィン) 一週二回半筒宛注射	1.0 10.0	183. アトロピン丸 硫酸アトロピン 甘草末 アラビヤゴム末 爲一丸、臨臥一乃至二丸頓服 硫酸アトロピン極量一回0.001-1.0	0.005 適宜 適宜	
134. 十二指腸蟲散 チモール 膠囊又ハオプラートニ入レ二回ニ分服 十二指腸蟲 前夜ヒマシ油20.0ヲ用フ(處方131)	2.0-5.0	151. 沃鐵合水 コード鐵合利別 水 一日量、三回分服	3.0-10.0 100.0	169. 磁膏筋内注射料 亞硫酸ナトリウム 蒸溜水 毎日又ハ隔日、一-二筒宛	0.1 10.0	184. 止汗布有藥 サリチル酸 酒精	1.0 100.0	
135. 複方十二指腸蟲散 チモール ナフタリン 膠囊又ハオプラートニ入レ二回ニ分半時 間ニ内服 前夜ヒマシ油15.0-20.0ヲ頓服(處方131)	2.0-4.0 0.5-1.0	152. 林鐵水 林擒鐵丁幾 苦味丁幾 橙皮丁幾 水 一日量六回分服	3.0 3.0 3.0 100.0	170. 赤色塗擦劑 赤色水銀レゾルピン 蠟紙ニ一包トナス、一日量	3.0-5.0	185. 水揚酸滑石散布料 サリチル酸 澱粉 滑石	3.0 10.0 87.0	
136. 石榴浸煎劑 石榴皮 (10.0-50.0) 生薑合利別(又ハ橙皮合利別) 早朝空腹時一時間内ニ少量服用 三時間後甘水0.3-0.5ヲ頓服(處方122) 前夜ヒマシ油15.0ヲ頓服スルモ 石榴皮ハ有鈣鹽ニ最功アリ、又新鮮ノモ ノ功多ク、根皮ハ管皮ヨリ功多シ 十二時間冷浸後煎出ス	300.0 30.0	153. 沃鐵散 合糖コード鐵 乳糖 一日量、分三包、三回分服	0.6-3.0 1.0	171. 灰白塗擦劑 水銀軟膏 蠟紙ニ一包トナシ一日一回塗擦	3.0-5.0	186. タンノフォルムタルクム散布料 タンノフォルム タルクム	10.0 20.0	
137. 蟻虫灌腸料 鹽酸キニーチ 水	1.0 100.0	154. 橋肝油 橋肝油 一日一乃至三回4.0宛服用 橋肝量一回0.001-1.0	0.01 100.0	172. 亞細亞丸 亞硫酸 黑胡椒末 甘草末 アラビヤゴム末 爲百丸一日三回一丸宛漸次増量一丸中主 藥含量0.001 亞硫酸極量一回0.005一日0.015	0.1 2.0 5.0 適宜	187. ツメノールエーテル精 ツメノール 酒精 エーテル グリセリン	2.0 15.0 30.0 60.0	
138. 海人藻煎 海人草煎 (10.0) センナ葉 海人草煎ヲ以センナ葉ヲ浸劑トス 一日量三回分服 蛔蟲	100.0 6.0	155. リパニオン 油酸 オレフ油 肝油ノ代用品、肝油ト同量ヲ用フ	6.0 94.0	173. 沃刺丸 コードカリウム 煇性石灰 爲百粒、ガラスリンヲ以テ結合シ、煇性 *石灰ヲ衣トス	5.0 3.0	188. 薄荷精 メントール 酒精 水 薄荷酸	2.0 15.0 30.0 60.0	
139. 田中式海人草煎 海人草花 一日量三回分服 蛔蟲	(10.0) 100.0	156. 日本藥局方ブロード丸 一日三回一丸宛、食後服用漸次増量一日 全量九丸ニ至ル	100.0 1.0	174. 撒采丸 サリチル酸末 甘草末及エキス 爲一丸、一日三回、一丸宛、漸次増量一 日九丸ニ至ル サリチル酸末極量一回0.02一日0.06	0.01 適宜	189. 3.0-20.0%硝酸銀水 陰門瘻瘻症	5.0	
140. 蟻虫灌腸料 肝油 卵黃 灌腸劑一回量	40.0 一筒 100.0	157. 規那煎 キナ皮煎 (5.0) 稀鹽酸	100.0 1.0	175. 沃刺水 コードカリウム(又ハコードナトリウム) 苦味丁幾 水 一日量、三回分服、食後	0.5-3.0 1.0-2.0 100.0	190. 3.0-5.0%石炭酸水 皰癬又ハ瘡布	5.0	
141. 蟻虫散 サントニン 甘采 乳糖 分三包、一日量、三回分服 サントニン極量一回0.1-1.0	0.15-0.2 0.5 1.0	158. ストリキニーチ錠丸 硝酸ストリキニーチ 鹽酸キニーチ 乳糖 爲一丸、一日三回一乃至二丸宛	0.0015 0.025 0.025	176. 法水劑 亞硫酸カリウム液 苦味丁幾 水 爲水劑一日量、三回分服 ホーレル水極量一回0.5-1.5	0.2-1.0 1.0 100.0	191. 薄荷精 メントール グリセリン 酒精	2.0-20.0 10.0 100.0	
<b>XI. 吐劑</b>		159. 強質丸 鹽酸キニーチ 乳糖 デキストリス末 爲一丸、一日三回、一乃至二丸宛	0.05 0.025 0.025	177. 10%ヨデピン 一日量、三回分服	12.0	192. カルボール精 石炭酸 グリセリン 酒精	1.0-10.0 10.0 90.0	
142. アボモルヒネ水 鹽酸アボモルヒネ 蒸溜水 半乃至一筒皮下注射 二乃至十歳ノ小兒ニハ、0.005-0.0008	0.005-0.01 1.0	160. キニーチ錠丸 鹽酸キニーチ 亞硫酸 還元鐵 爲一丸、一日三回、二乃至五丸宛	0.01 0.001 0.01	178. 法水劑 亞硫酸カリウム液 苦味丁幾 水 爲水劑一日量、三回分服 ホーレル水極量一回0.5-1.5	0.2-1.0 1.0 100.0	193. ツメノールエーテル精 ツメノール 酒精 エーテル グリセリン	1.0 3.0 3.0 3.0	
143. 吐根散 吐根末 分三包、毎十分時ニ一包宛用ヒ吐ニ至リテ 止ム	3.0	161. 亞硫酸還元鐵丸 亞硫酸 還元鐵 龍膽末 爲一丸、一日三回一丸ヨリ五丸ニ至ル	0.001 0.01 適宜	179. 弱チットマン氏煎 ナルサ根 湯湯(10度-45度ノ) 橙皮 樟皮 小豆蔻 甘草根 ナルサ根ヲ強液ト全標湯湯ニ二十四時間浸 置後他ノ四品ヲ加ヘ更ニ三十分間湯湯ニ 毎朝前夜200.0-300.0ヲ冷製シ夕湯湯ヲ 200.0-300.0宛服、後湯湯液汁ハ 三四回同持用	12.0	194. 土肥氏亞細亞藥精膏 トラガカントム グイセリン 酸化亞鉛 石炭酸(又ハ硝酸又ハメントール) 水	5.0 3.0 10.0 1.0-2.0 100.0	
144. 吐根浸 吐根浸 (2.0) 毎十分時5.0宛吐ニ至ル迄	50.0	162. 磁鐵丸 亞硫酸 炭酸 甘草末及末 爲一丸、一日三回、一乃至二丸宛	0.001 0.05 適宜	195. コカイン軟膏 5.0-20.0%鹽酸コカイン軟膏	5.0	196. ツメノール軟膏 ツメノール 單軟膏	1.0 9.0	
145. 硫酸鋁水 硫酸鋁 水 毎五分時5.0宛吐ニ至テ止ム	1.0 50.0	163. 強質丸 鹽酸キニーチ 乳糖 爲一丸、一日三回、一乃至二丸宛	0.025 0.025	197. ナイセル氏ツメノールサリチルバスタ ツメノール(獨乙局方) サリチル酸 鹽代亞鉛 澱粉 ワセリン	5.0 1.0 1.0 12.0 12.0 25.0	198. カンフルクロール軟膏 精製樟腦 抱水クロール ワセリン	1.0-2.0 1.0-2.0 10.0 10.0	
<b>XII. 鎮吐劑</b>		164. 規那煎 鹽酸キニーチ 薑 香木龍胆幾斯 爲六丸、一日三回分服一日量	0.3 0.09 0.09	199. ナフトール軟膏 ナフトール 綠石鹼 ワセリン	5.0-10.0 30.0 90.0			
146. 鎮吐散 鹽酸セリウム 鹽酸コカイン 乳糖 分六包、一日三回、一包又ハ二包宛 蘇酸セリウム極量一回0.3-1.0 鹽酸コカイン極量一回0.05-1.0	0.3 0.05 1.0	165. 規那煎丸 鹽酸キニーチ 稀鹽酸 爲一丸	0.06 0.05	200. アトロピン皮下注射液 硫酸アトロピン 蒸溜水 一筒皮下注射	0.001-0.005 1.0			
147. 鎮吐劑 コード丁幾 水 一日量六回分服	0.2-0.6 100.0	166. 沃鐵丸 コード鐵 爲一丸	5.0					



Table with 2 columns: Item number and name. Items include 201. 5.0%石炭酸軟膏, 202. メントール軟膏, 薄荷葉(メントール), 鹿麻子油, ラノリン.

XVII. 催眠劑

Table of sedatives including 203. プロムヘキソチン注射液, 204. 鹽プロムヘキソチン注射液, 205. ウレタン散, 206. 臭刺スルフォナール, 207. 臭刺クロラル, 208. 抱水クロラル, 209. 抱水クロラル水, 210. ベロナール, 211. アダリン, 212. バラアルデヒド水, 213. ヘドナール, 214. アンチピリン, 215. プロモコール, 216. ジオニン, 217. ビラミドン, 218. 鹽酸モルヒネ, 219. トリオナール, 220. ベロナールナトリウム, 221. プロムラール.

XVIII. 結核劑

Table of tuberculosis agents including 222. クレオソート, 223. 炭ダ散, 224. 苦列鐵丸, 225. 伊苦丸.

Table with 2 columns: Item name and quantity. Items include イヒチオール, クレオソート, グリセリン, 甘草末, 黄蠟.

Table of items including 226. クレオソート丸, 227. クレオソート錠丸, 228. 肺結核散, 229. オビウムタンニン散, 230. 痰強丸, 231. 痰香コロシント丸, 232. イヒタルペン散, 233. ラクタゴール, 234. 乾燥水割ケラダ糖漿.

XIX. 通經劑

Table of items including 230. 痰強丸, 231. 痰香コロシント丸, 232. イヒタルペン散.

XX. 催乳劑

Table of items including 233. ラクタゴール, 234. 乾燥水割ケラダ糖漿.

XXI. 痲疾及膀胱劑

Table of items including 235. 痲疾丸, 236. サンタル油カプセル劑, 237. 痲疾カプセル劑, 238. サロール散, 239. ヘルミトール散, 240. 烏草烏見丸, 241. ウウロトロピン水.

Table of items including 242. 0.5-2%プロタルゴール水, 243. 0.25-1.0%ラロゲン水, 244. 0.1-0.3%アルバルゲン水, 245. 0.2-1.0%硝酸基炭酸薬給水, 246. 0.01-0.1%過錳酸カリ水, 247. 0.1-1.0%硝酸鉛水(鉛糖水), 248. 0.2-1.0%硝酸鉛水, 249. 0.025-0.05%硝酸銀水, 250. 0.02-0.2%イヒタルゲン水, 251. 制痲藥.

Table with 2 columns: Item name and quantity. Items include 白糖, 分三包, 一日量三回分服, 除痒痒術性物起, 遺精, 新葎葉ハハ必林(處方 67)臭刺劑(處方 44), カンフル(處方 4)鹽酸ヘロイン(處方 88), トリオナール(處方 219)スルフォナール, デギタリス(處方 10)等参照.

XXII. 含嗽劑

Table of gargles including 252. 第一含嗽水, 253. 第二含嗽水, 254. 第三含嗽水, 255. 3.0%硝酸水, 256. 0.5-1.0%タンニン酸水, 257. 1.0-2.0%酒石酸重炭酸水, 258. 0.2-0.5%明礬水.

XXIII. 吸入劑

Table of inhalants including 259. 重炭酸吸入料, 260. 臭刺劑吸入料, 261. 臭刺コカイン吸入料, 262. 0.2-2.0%臭刺水, 263. 0.5-3.0%硝酸水, 264. 0.2-2.0%明礬水, 265. 1.0-2.0%乳酸水, 266. 0.5-1.0%石炭酸水, 267. 0.2-1.0%クロール酸カリウム水, 268. 1.0-2.0%安息香酸ナトリウム水, 269. 0.2-5.0%食鹽水, 270. 30.0%純石灰水, 271. 5.0-10.0%チム水, 272. 0.3-1.0%アレン油乳劑, 273. 0.3-5.0%重炭酸ナトリウム水, 274. 0.2-10.0%タンニン酸水, 275. 1.0-2.0%過錳酸水(一半クロール酸水).

XXIV. 電法劑

Table of electrotherapy agents including 276. ブロー氏液, 277. 硝酸鹽土水, 278. 日本藥局方稀硝酸液(ゴラルド水), 279. 痲疾華油, 280. 痲疾華油, 281. リュメン(ビツカ氏漢方藥), 282. 痲疾華油, 283. カルボランタンクノメント.

XXV. 塗布劑

Table of ointments including 279. 痲疾華油, 280. 痲疾華油, 281. リュメン(ビツカ氏漢方藥), 282. 痲疾華油, 283. カルボランタンクノメント.

Table with 2 columns: Item name and quantity. Items include 石炭酸, 酸化亜鉛, リュメント.

Table of various items including 284. トラウマチン(ダツタベルカ液), 285. 虫紙頭水, 286. 備毛液, 287. 生毛液, 288. 驚口痔水, 289. ラング氏液, 290. 0.6%生理的食鹽水, 291. 凍瘡液, 292. 誘導丁液, 293. 沃度グイセリン, 294. サリチル酸酒精, 295. ヌゴール氏液, 296. ヌゴール氏液, 297. 痲疾華油, 298. 痲疾華油, 299. 痲疾華油, 300. 痲疾華油, 301. タンノタルクム散布料, 302. 痲疾華油, 303. 痲疾華油.

XXVI. 撒布劑

Table of dusting powders including 298. 痲疾華油, 299. 痲疾華油, 300. 痲疾華油, 301. タンノタルクム散布料, 302. 痲疾華油, 303. 痲疾華油.

XXVII. 膏劑

Table of ointments including 303. 痲疾華油.



脂防、軟膏類試劑
304. ラッサー氏バスタ
酸化亜鉛 25.0
澱粉 15.0
ワセリン 10.0
含水ワセリン 10.0
夏期用
305. ラッサー氏バスタ
酸化亜鉛 1.0
澱粉 1.0
ワセリン 1.0
含水ワセリン 1.0
冬期用
306. ラッサー氏サリチールバスタ
サリチール酸 2.0
酸化亜鉛 24.0
澱粉 24.0
含水ワセリン 50.0
307. テスネル氏イヒチオールバスタ
イヒチオール 1.0
酸化亜鉛 12.0
澱粉 12.0
ワセリン 25.0
308. ラッサー氏シエールバスタ
ベタナフトール 10.0
沈降硫黄 50.0
ワセリン 25.0
綠石鹼 25.0
309. ウンナ氏チンク硫黄バスタ
酸化亜鉛 6.0
沈降硫黄 4.0
白陶土 2.0
安息香酸豚脂 28.0
310. イヒチオール軟膏
イヒチオール 1.0-10.0
ワセリン(又はワセリン) 10.0
爲軟膏、先づ主薬ヲ其半量ノ水ニトキタル後賦形薬ヲ加フ
水=可溶性ノモノハ皆此法ニヨル
311. ウネルソン氏軟膏
テール 10.0
綠石鹼 20.0
硫黄 10.0
滑石 5.0
豚脂 20.0
312. ウネルソン氏部鉛軟膏
酸化亜鉛 2.0
安息香酸豚脂 8.0
313. 複方レゾルチン軟膏
レゾルチン 5.0
イヒチオール 5.0
サリチール酸 3.0
ワセリン 100.0
314. 複方クリザロビン軟膏
クリザロビン 5.0
イヒチオール 5.0
サリチール酸 3.0
ワセリン 100.0
315. 次硝基軟膏
次硝基砒 1.0
酸化亜鉛 4.0
ワセリン 5.0
316. 硫黄レゾルチン軟膏
昇華硫黄 10.0
レゾルチン 5.0
豚脂 85.0
爲軟膏
317. ウネルソン氏軟膏
安息香酸 1.0
豚脂 30.0
酸化亜鉛 5.0-6.0
318. ビスチオール軟膏
次硝基砒 5.0
チオール 5.0
單軟膏 5.0
319. サリチール酸石鹼硬膏(ビック氏硬膏)
サリチール酸 1.0
單鉛硬膏 70.0
白蠟 10.0
藥用石鹼 5.0
精製樟腦 1.0
オレイン油 1.0
320. ホダラ氏チンクタイム
白阿膠 3.0
酸化亜鉛 50.0
グリセリン 20.0
水混和 100.0

321. 羌活膏
サリチール酸 4.0
石炭酸 2.0
ワセリン 40.0
XXVIII. 眼科劑
322. 第一點眼水
硫酸亞鉛 0.3
蒸餾水 100.0
濾過シ用フ
323. 0.3-10.0%硝酸銀水
324. 5.0-20.0%プロタルゴール水
325. 0.5-10.0%硫酸銅水
326. 硫酸銅液(稀硫酸液)
トラホームニ毎日一回又は二三日ニ一回點
膜ヲ輕ク磨過
327. 眼散布藥
蒸氣製甘汞 10.0
一日一回撒布
全時ニ沃刺内服禁忌
328. 第一黃降果軟膏
黄色酸化汞 1.0
ワセリン 100.0
二週日ヲ過ギタルモノハ不可
329. 第二黃降果軟膏
黄色酸化汞 2.0
ワセリン 100.0
330. 白降果軟膏
白降果 1.0-20.0
ワセリン 100.0
眼瞼縁炎、濕疹
331. カンフォル軟膏
カンフォル 3.0
ワセリン 97.0
カンフォルニ二滴ノエーテルヲ落シトク
332. ホマトロビン水
ブローム水素酸ホマトロビン 1.0
蒸餾水 100.0
散液藥
333. アトロピン水
硫酸アトロピン 0.5-2.0
蒸餾水 100.0
散液藥
334. 1.0-5.0%硫酸コカイン水
鎮痛、散液
335. エゼリン水
サリチール酸フイブスチグミン(サリチール酸エゼリン) 0.5-1.0
蒸餾水 100.0
縮瞳藥、防盲ノ爲ニ用ル又ハ昇眼ヲ加フ
336. ビロカルビン水
鹽酸ビロカルビン 1.0
蒸餾水 100.0
縮瞳藥
337. アドリナリンコカイン水
鹽化アドリナリン 95.0
硫酸コカイン 5.0
局部麻酔兼止血
338. サオニン水
チオニン 0.5-5.0
蒸餾水 100.0
紅疹炎、毛様體炎、縁内障ノ鎮痛、角膜炎及前房濁濁、角膜損傷ニハ禁忌
339. 眼科昇眼電法水
昇眼水 0.1
クローラトトリウム 5.0
水 1000.0
スガレットニテ着色ス
XXIX. 婦人科洗滌劑
340. 3.0%硼酸水
341. 1.0%フォルマリン水
342. 0.5%リゾール水
343. 0.3%過マンガン酸カリウム水
344. 0.05-0.1%昇眼水(食鹽加入)
345. 3.0%重碳酸ナトリウム水
346. 0.1%-0.2%硝酸銀水
347. 1.0%硫酸亞鉛水
348. 0.2%醋酸鉛水
349. 1.0%硫酸銅水
350. 1.0%タンニン酸水
351. 0.5%アレオリン水
XXX. 腔球劑
352. イヒチオール銀膠球
イヒチオール 0.15-0.3
可溶性銀(コラルゴール) 0.1-0.3
カカオ脂 3.0
爲膠球一個
注意初メ銀ヲ同量ノ温水ニ溶キ弱酸ニテ研和
353. チオノール膠球
チオノール 0.4
カカオ脂 3.0
爲膠球一個
354. イヒチオール膠球
イヒチオール 0.15
カカオ脂 3.0
爲膠球一個
355. 鹽英球
鹽酸セルヒチ 0.02
カカオ脂 3.0
爲膠球一個
356. 沃刺ロート膠球
コードカリウム 0.2
莫若越農斯 0.03
カカオ脂 3.0
爲膠球一個
XXXI. 腫タンポン
357. 沃刺グリセリンタンポン
コードカリウム 2.0
グリセリン 18.0
タンポン一個量
358. 明華タンポン
明華 4.0
グリセリン 96.0
359. チオノールタンポン
チオノール 2.0
グリセリン 18.0
タンポン一個量
360. イヒチオール膠球
イヒチオール 1.0-2.0
グリセリン 18.0
タンポン一個量
361. 沃刺偽膜單寧タンポン
コードフォルム 1.0
タンニン酸 1.0
タンポン敷布料
362. 沃刺偽膜グリセリン綿球
コードフォルム 1.0
グリセリン 10.0
363. クロール亞鉛合劑
クロール亞鉛 20.0
澱粉 5.0
酸化亜鉛 5.0
コカイン 2.0
コードフォルムガーゼニ包ミ挿入
XXXII. 尿道座藥
尿道座藥一個ノ重量0.4長サ4.0cmトス
364. 1.0%硫酸コカインカカオ脂
365. 5.0%阿片末カカオ脂
366. 1.0%鹽酸セルヒチカカオ脂
367. 2.0%タンニン酸カカオ脂
368. 10.0%コードフォルムカカオ脂
369. 沃刺偽膜單寧尿道座藥
コードフォルム 0.1
タンニン酸 0.05
カカオ脂 0.25
爲尿道座藥一個
XXXIII. 肛門座藥
370. 第一號座藥
タンノフォルム 2.0
莫若越農斯 0.1
カカオ脂 20.0
爲座藥一個
371. 第二號座藥
タンノフォルム 2.0
鹽酸コカイン 0.1
カカオ脂 20.0
爲座藥一個
372. 第三號座藥
タンノフォルム 2.0
コードフォルム 0.1
カカオ脂 20.0
爲座藥一個
373. 第四號座藥
タンノフォルム 2.0

374. 偽古座藥
鹽酸コカイン 0.1
コードフォルム 0.1
カカオ脂 20.0
爲座藥一個
375. 偽古座藥
鹽酸コカイン 0.02
カカオ脂 2.0
爲座藥一個一日二三個挿入
376. 偽古座藥
莫若越農斯 0.02
カカオ脂 2.5
爲肛門座藥一個一日二三個
尿意頻數
377. 沃刺偽膜單寧座藥
コードフォルム 0.02
タンニン酸 0.05
カカオ脂 2.0
爲座藥一個
鹽酸コカインヲ加フルモヨシ
378. オビニウムタンニン座藥
阿片 0.03
タンニン酸 0.5
カカオ脂 2.0
爲座藥一個
379. 大楓子油丸
大楓子油 20.0
黄蠟 15.0
甘草末 5.0
爲三百六十九、十八丸中主薬1.0ヲ含ム、嚙
380. 大楓子油液
大楓子油 10.0
樟腦 10.0
注射料二日一樽量
381. 綿帶液
寬麻子油 5.0
テレピン油 15.0
エーテル 100.0
コロヂウム 130.0
382. 偽膜劑
1.0%鹽酸コカイン水
1-1筒宛一日數回皮下注射 陰癬
一日全量0.05g
383. 偽膜散
スビーダル氏コカイン 0.005
爲一包、一日三乃至六包ヲ服ス
384. 肉藥汁
稀鹽酸 3.0
クロールナトリウム 5.0
細切セル牛肉 1000.0
水 1200.0
以上ヲ混和シ冷所ニ置キ、一時間後壓濾
385. 蛋白質水
蛋白質 1個
水 250.0
振盪後棉花ニテ濾過
386. ボアス氏滋養液
澱粉(糊狀トナシ) 1.0
卵黃 2個
食鹽 2.0
赤酒 30.0
牛乳 400.0
一劑量
387. 薄荷油糖
薄荷油 1.0
乳糖 50.0
研和、爲糖味矯臭ノ賦形藥

思衆生知 慢易生愛 暴微生怨 愛謂生疾
管子
大正二年五月廿二日印刷
大正二年五月廿五日發行
正價金壹圓五十錢
不許複製
著者兼發行 村上重馬
東京市京橋區西船場町廿七番地
印刷者 石川金太郎
東京市京橋區西船場町廿七番地
印刷所 株式會社秀英舎
發兌元 醫藥研究會
賣捌所 全國各書店及藥品店



特15  
998

201  
13

終