

正東醫寶鑑雜病篇卷之八

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

癰疽

下

腸癰腹癰

關元穴名屬小腸天樞穴名屬大腸丹田穴名屬三焦其穴分隱痛者爲疽上肉微起者爲癰也

靈樞○腸癰爲病小腹腫而強按之則痛

小便數似淋時時汗出發熱而復惡寒身反甲錯腹皮急如腫狀甚者腹脹大轉側有水聲或達臍生瘡膿從瘡出或有出臍中者惟大便下膿血者自愈

仲景

○溼熱鬱積腸內成癰脉遲緊者宜大黃牡丹湯或五香連翹湯

方見上

下之脉芤澀者

自愈

入

四物湯方見血門加桃仁紅花玄胡索木香豚洪數者三仁湯小腹疼尿澀者膿滯也宜牡丹散入門○腹皮急按之濡身無熱乃陰冷所成宜牡丹散或內托十宣散加茯苓甚者敗醬散小腹痞堅

按之痛身有熱乃結熱所成宜大黃牡丹湯或桃仁承氣湯方見寒門黃黑散入門○腸癰冷熱證雲母膏爲丸牛膝湯吞下利去瘀膿卽愈或蠟礬丸亦佳方見上○腹癰者生於肚腹皮裏膜外左關脉洪數而腹痛甚者是逆治法同腸癰入門

脈法腸癰難知脈滑可推數而下熱腸癰何疑遲緊未膿下以平之洪數膿成不下爲宜脉訣○跌陽脉滑而數知當屎膿也仲景○腸癰之脉滑而數滑則爲實數則爲熱滑則爲榮數則爲衛衛數下降榮滑上升榮衛相

干血爲敗濁脉經

大黃牡丹湯

治腸癰脉遲緊膿未成可下之大黃芍硝各一錢半右剉作一貼水煎服有膿卽下膿無膿卽下血○一名大黃湯一方有冬瓜仁無瓜蔞仁神效

千金

三仁湯

治腸癰。腸中疼痛，縱非癰，疑似間，便可服。薏苡仁二錢，冬瓜仁二錢，半桃仁，牡丹皮各二

錢右剉作一貼水煎服入門。

○一名薏苡湯 三因

牡丹散

治腸癰冷證。腹軟而痛時下，膿血。牡丹皮人參、天麻、白茯苓、黃芪、薏苡仁、桃仁、白芷、當歸、川芎各一錢，官桂、甘草各五分，木香三分，右剉作一貼水煎服。入門

敗醬散

治腸癰。身無熱，腹濡冷。薏苡仁二錢半，敗醬一錢半，附子炮五分，右剉作一貼水煎服。小便當下膿血而愈。入門 ○ 一

名薏苡附子敗醬散 仲景

黃黑散

治腹內癰腫。大黃一兩，取末四錢半，破故紙一兩，取末二錢，牛蒡子一兩，取末一錢，黑牽牛子一兩，取末二錢，右和勻，分二貼，每取一貼，蜜水調空心服。以利爲度。丹心

腸癰治驗

一婦腹痛，百方不效。蔡兆診曰：腹痛脉當沈細，今反滑數。此腸癰也。雲母膏作丸溫

酒吞下服一兩下膿血而安

綱目

○灸腸癰法

屈屈

兩肘正肘頭銳骨端是穴灸百壯下膿血而安

金千

臂癰

臂上手陽明經分生癰此得之八風之變者傷於風者上先受之宜服白芷升麻湯

入門

白芷升麻湯

治臂癰黃芪酒黃芩各四錢生黃芩三錢白芷一錢半升麻桔梗連翹各一錢

酒紅花甘草各五分右剉分二貼

每取一貼酒水各半煎服

東垣

臍癰

腎居小腹之後又在於下此陰中之陰也其道遠其位僻雖日多血氣運不到血亦罕來中半後不

可生癰纔有腫痛參之脉證但見虛弱便與滋補

氣血可保終吉若用尋常驅熱舒氣之藥虛虛之

丹心

禍如指諸掌

○臍癰初起未成膿者隔蒜灸再用葱熨法欲作膿者內托羌活湯痛甚者仙方

活命飲

二方見上

膿硬者托裏消毒飲

方見上

潰

後宜加味十全湯

方見上

尻臍生癰堅硬腫痛宜

內托羌活

湯方見上

懸癰

穀道前後生癰謂之懸癰此病生穀道外腎之間初發如松子大甚痒漸如蓮子數十升後始覺赤

腫如桃子卽破若破而大小便皆從中出者爲難

治宜服國老膏

精要

○此疾晉尾常服國老膏雖

患亦輕雖潰亦淺誤用寒涼則不可救○初起作

痛尿灑者

仙方活命飲

方見上

去大黃服之膿已

成者急鍼之久成漏者加味十全湯

方見上

蠟紱丸

方見上

穀道中生瘡取水中荇葉細擣綿裹

納下部日三

卽愈

入門

國老膏

治懸癰橫紋大甘艸帶節一兩四寸切以山

潤

長流水一椀文武火慢慢蘸水炙自早至

午乾則投前水再炙直待水盡看甘艸中心潤透

爲度細剉好酒二升煎取一升空心隨量飲之三

日一服二三服可保無虞此藥雖不卽消過二十

日後必盡消有人患此癰已破服兩貼瘡即合甚

妙精要

便癰

俗名便毒實血瘤也。一名騎馬癰。此奇經衝任爲

病而癰見於厥陰經之分野。其經多血故又名血

瘤或先有瘡瘍而發或卒然起核疼痛而發皆熱鬱血聚而成初發空疎利之卽散變膿後如常用

托裏內補之藥

正傳

○便毒處所上不在腹下不在腿介乎兩者之中也

直指

○便癰生於腿膀小

腹之間或一邊腫痛或左右兩邊俱發先用五苓散

氣門方見寒門

加大黃或雙解散復元通氣散

方見上

仍戒房室行動

入門

○偏癰宜蘇方散牡蠣大黃湯千金內消散

黃黑散五香連翹湯

三方見上

消毒飲玉燭散神

奇散

○便毒取大蜘蛛一箇研細熱酒調下

山居

○便毒初起射千三寸生薑如指大擣細順流水

煎服以瀉爲度因用阿膠醋煮塗患處

丹心

○生

山藥砂糖同壽塗上卽消又生薑一塊蘸米醋磨

取千步峰泥付腫處卽消千步峰卽人家行步地

上高塊是

得效

蘇方散

治便癰水鼈子當歸尾赤芍藥白芷川芎射干大黃金銀花穿山甲沒藥蘇木甘艸各八

分右剉作一貼酒

水各半煎服

正傳

壯蠣大黃湯

治同上大黃壯蠣煅各二錢生甘艸一錢黃瓜蔓一箇右剉作一貼水煎服

正傳

消毒飲

治偏毒三四日可消皂角刺金銀花防風當歸大黃瓜蔓仁甘艸各一錢三分右剉作一

貼水酒各半煎服仍頻

提掣頭中髮立效

丹心

玉燭散

治偏毒腫痛大黃芩硝各三錢川芎當歸赤芍藥生地黃甘艸各一錢右剉作一貼水煎

空心服

正傳

神奇散

治便毒魚口瘡便毒潰破者鯽魚口瘡也壯蠣大黃各三錢黃連黃芩黃柏金銀花連翹各一錢半穿山甲三片土炒木鼈子三箇去殼黃蠟三

兩右剉分作二貼酒水各半煎服

回春

雙解散

治偏毒大黃黑丑炒頭末各一錢半官桂白芍藥澤鴻桃仁各一錢甘艸七分右剉作一

貼薑五片水煎服空心先小便快

是熱從小便出也後大便利皆是稠毒得效

囊癰

者溼熱下注也有作膿者此濁氣順下將流入滲道因陰道或虧水道不利而然膿盡自安勿藥可

也或有因腹腫漸流入囊腫甚而囊自裂開署丸懸掛水出以硃炭末付之外以紫蘇葉包裹仰臥養之○癰疽入囊者曾治數人悉以溼熱入肝經處治而用補陰藥佐之雖膿潰皮脫署丸懸掛者皆不效○取紫蘇葉焙乾爲末付之如燥香

油潤之皮脫者青荷葉包之其皮自生

丹心

附骨疽

附骨疽與白虎飛尸歷節皆相類但歷節痛則走注不定白虎飛尸痛淡按之則僵止附骨疽

痛淡按之亦無益○白虎飛尸亦能作膿著骨而生及其腐潰碎骨出盡方愈然則同是一病但淺深不同耳三因○附骨疽筋骨之內痛如錐刺外則全無赤腫突起初因露臥風冷或乘涼浴水寒

溼襲深初起痛不能轉寒熱無汗經久寒鬱爲熱變而爲膿膿成卽用火鍼使毒不得內潰入門。初起宜漏蘆飲子五香連翹湯方見上疎下之次用內消升麻湯在尻臀宜內托羌活湯方見上在腿內羌活防已湯在腿外托裏黃芪湯黃連消毒飲方見上潰後久不愈宜蟾蜍膏赤朮丸平肌散入門○初起大痛而肉色不變名附骨癰三生散最妙兼用青皮甘艸節二味煎服綱目○附骨疽與緩疽石疽賦風相類宜辨而治之入門

緩疽石疽賦風辨

緩疽石疽皆寒氣伏於骨髓之間其熱緩慢積日不潰久乃紫黑皮肉俱爛故名曰緩疽○腫與皮肉相似疼而堅硬如石故謂之石疽生商陸根擣爛和鹽少許塗付日一換卽軟○賦風由風邪搏於骨髓故其痛亦徹骨遇寒則甚外證惡寒有汗痛處常欲熱熨失治則變爲掣曲偏枯○緩疽石疽宜服補虛托裏溫熱之劑賦風宜服越婢湯疎通之劑入門

東醫書卷之六

始發預防法

環跳穴痛不已，防生附骨疽急用青艸。

貼又不效，恐疽將成，急掘地坑以火燒紅沃以小便，令患人赤體坐其上，以被圍抱下體，使熱氣熏蒸，氣血暢。

而愈。

入門

漏蘆飲子

治附骨疽初起宜服。他惡瘡初起亦可服。

大黃一錢半，漏蘆白蘇黃芩麻黃枳實升麻赤芍藥朴硝甘艸各一錢。

右剉作一貼水煎服。

入門

內消升麻湯

治附骨疽疎下後服此。大黃升麻當歸黃芩赤芍藥枳實各一錢半，甘艸一錢。

右剉作一貼。

水煎服 精義

羌活防已湯

治附骨疽發於太陽厥陰太陰分者。羌活川芎蒼朮各一錢二分，防已木香連

翹射干白芍藥木通當歸尾蘇木甘艸各七分，右剉作一貼酒水各半煎服。

正傳

托裏黃芪湯

治附骨疽發於足少陽陽明分者當歸尾一錢七分柴胡一錢半白芷一錢二

分連翹鼠粘子肉桂黃芪各一錢黃柏升麻甘

艸各五分右剉作一貼酒水各半煎服

正傳

蟾蜍膏

治附骨疽久不差膿汁敗壞或骨從瘡口出大蝦蟆一枚亂髮雞子大猪脂四兩右以猪

脂煎二物令稠去滓凝如膏貼之先以桑白皮烏豆前湯淋洗瘡口拭乾然後卻貼之

得效

赤水丸

治附骨疽久不差赤水一斤泔浸去油用川椒葱白同煮黑色焙乾茴香破故紙川練子

炒赤茯苓白芷桃仁各一兩右爲末

蜜丸梧子大溫水下百丸得效

平肌散

治附骨疽成漏久不合老狗頭骨煅露蜂房亂髮灰各二錢半新桑白皮末一錢二分半

右爲末入輕粉麝香各少許溼

則乾糲乾則油調付之

直指

三生散

治附骨疽及瘡口久不合神驗露蜂房蛇退亂髮各等分燒存性爲末每取三錢溫酒調

下空心
保命

青艸蒼柏湯

治附骨疽始作宜預防青皮一錢半甘
艸節五分蒼朮黃柏各三錢右剉作二

貼水煎和薑汁三匙空心飲之冬加桂枝夏加條芩體虛加牛膝

入門

流注骨疽

流者行也注者住也或結塊或慢腫皆因素有痰火或感風寒邪氣流行至其痰注之處

而發多生四肢或曾腹腰臀關節之處初起宜葱

方見下

實膿十六味流氣飲

方見上

兼服竹

瀝達痰丸

瘀門通用榮衛返魂湯合二陳湯

方見下

兼服竹

令其自消

自潰若潰後久不斂宜以托裏爲主更

佐以豆豉餅琥珀膏

方見下

○

疏注

起於傷寒傷寒表未盡遺毒於四肢經絡澀

方見下

○

於所滯而後爲流注也蓋流注者傷寒之餘毒骨疽者流注之敗證也

同春○痰飲流注於曾背頭項腋脇腰腿手足聚結腫硬或痛或不痛按之無

血潮雖或有微紅亦淡薄不熱堅如石破之無膿

或有薄血或出清水或如紫汁又有壞肉如敗絮
或又如瘰癧在皮肉之間如雞卵可移動軟活不
硬破之亦無膿血鍼口努肉突出惟覺咽喉痰塞
作寒作熱榮衛返魂湯主之醫鑑。骨疽者由瘡
潰後氣血不榮骨自脫出膿水腐潰碎骨出盡方
愈蓋人身有正骨附骨傅合而成形附骨出則愈
如常正骨腐出則爲終身廢疾隨腫硬之處潰後
久不愈則必出碎骨外用附子餅灸或葱熨法祛
散寒邪補接榮氣則骨
自脫瘡自斂矣入門

榮衛返魂湯

主一切痰飲爲患專治痰腫又治癰疽
發背流注腫毒赤芍藥水通白芷何首

烏枳殼茴香烏藥當歸甘艸各一錢右剉作一貼
酒水各半煎服醫林。一名追風通氣散一名通
順散又名何首烏散此方宜與十宣散相間用之
並加忍冬藤入門。凡氣血逆於肉理令壅結爲
癰疽此藥大能順氣勺血自然榮衛通順不生變
證尤合內疽入門。虛加炮附子實加大黃痰盛

加南星半夏腫毒堅硬不穿加川芎麻黃葱白全
蝎穿山甲流注加獨活流注者氣血凝滯加獨活
則可以動一身血脉血脉既動豈復有流注乎入
門。此藥治流注癰疽發背至於救壞病活死肌
彈患於未萌之前拔根於旣愈之後大能順氣勺
血益氣陽也血陰也只調陽不和陰則氣耗而凝
肌必不活如五香連翹之類是也只和陰不調陽
則血旺而氣弱病必再作如內補十宣之類是也
此藥兼之真神

仙妙劑也

醫林

疔瘡

發於足上下名曰四淫其狀大癰不急治之百日
死。發於足側名曰厲疽其狀不大初從小指發
急治之去其黑者不消輒益不治百日死。發於
足指名曰脫疽其狀赤黑者死不治不赤黑者不
死治之不衰急斬之否則死靈樞。膏梁之變足
生大丁內經。疔瘡初發突起如針蓋故謂之疔
近世多見因食自外牛馬禽獸之肉而發或感襲
天地暴沴之氣而發或恣食辛辣厚味積毒而發

其形有十三種治法皆同初起僅一小瘡殺人於一二日之內比之癰疽尤毒又有紅絲疔魚臍疔其毒尤甚入門。疔瘡發無定處在手足

頭面脣背骨節間最急其餘處爲緩正傳

疔疽形證

疔疽生黃庖中或紫黑色初發必先痒後

大重則嘔逆爲難治三因

○瘡頭黑硬如釘四畔

帶赤如火盤根突起隨變焦黑未幾腫大而光轉

入門

○外證心

驚頭痛拘急惡寒四肢痛強或寒熱交作頰舌間

赤黑點點如珠

直指

○或不痛痒只麻木寒熱眼

中流火牙關緊急時時驚惕甚則嘔吐

諸證中嘔

吐最危

以鐵刺瘡不痛無血是其候也又中

精義

陷如針葢據之有根是疔也

疔疽治法

凡疔瘡毒氣攻心欲死以鐵刺瘡心若覺

血者急刺百會穴痛有血者下鍼子若無血以親人熱血代之猶活三四宜用迴瘡鍼子碧霞鍼子

迴瘡蟾酥錠子

精義

○又法急以艾炷灸之鍼疔

四邊皆令血出以迴瘡錠子紙之上用膏藥貼之

因服五香連翹湯千金漏蘆湯二方見上疎下之

○

若鍼之不痛無血者以猛火燒鐵鍼通赤於瘡上

烙之令如焦炭取痛爲效亦紙前錠子經一二日

膿潰根出服托裏湯散以取平復

精義

○治法急

用飛龍奪命丹或雄黃丸下之去其毒熱矣服化
毒丸及二活散

正傳

○實者初服賽命丹

方見上

三丸以葱酒發表虛者服保生錠子以解毒

入門

○通治紫金錠返魂丹一捻金神效奪命丹蟾酥

丸獨蟾丸五聖湯還魂

散千金消毒散選用

紅絲疔

○疔瘡或有一條如紅線直上倉卒之際急用

鍼於紅線所至處刺出毒血然後以蟾酥乳
香等膏於正瘡內塗之鍼時以病者知痛出血爲
好否則紅線入腹必致危殆

綱目

○疔生兩足多

有紅絲至臍疔生兩手多有紅絲至心疔生面部
多有紅絲入喉者俱難治急鍼其絲出血以泄其

魚臍疔

又有一種瘡頭黑淡形如魚臍破之滲出黃水四畔浮漿謂之魚臍疔其毒尤甚絲瓜葉

連鬚葱白韭葉各等分研搗如泥取汁以酒和服其滓貼腋下如病在左手貼左腋下在右手貼右腋下在左腳貼左膝在右腳貼右膝在身中貼心脾并以帛縛住候肉下紅絲皆白則安矣或蛇退燒灰雞子清調付內

服神仙解毒丸

丹心

脫疽疔

內經曰膏梁之變足生大疔蓋因膏梁酒色蘊積惡毒或久患消渴之餘多有此瘡靈樞

經所謂發於足傍名曰厲疽發於足指名曰脫疽其狀赤黑者死不治治不衰急斬之否則死正謂此也謂之脫疽以其指節潰爛脫去也

入門

○輕

者色赤自潰先用隔蒜灸內服仙方活命飲

方見

丹方見上還魂散重者色黯不痛先用隔蒜灸更服賽命及補藥庶可保生○甚者赤變爲黑急

須在指則斬在肉則割否則黑延上足必死外治
用桐油及無名異煎一沸入川椒一勺看瘡大小
剪蓼葉在內同煎浸七日後

單以此葉貼瘡上卽安入門

一方

治疗疽危篤二服卽愈輕者一服效土蜂房一
窠蛇蛻全者一條右盛器中黃泥固濟火煅存
性爲細末每一錢空心好酒調服少頃腹中大痛
痛止而其瘡已化爲黃水矣因服五聖湯

瑞竹

疔疽死證

日間害人甚速是尤在癰疽之上也

直指

○疔毒入心則口乾煩悶恍惚似醉嘔吐不定危
證也萬病解毒丹卽紫金錠也以黃連當歸煎湯
化下或賽命丹淵然眞人奪命丹皆可服

入門

疔毒入心腹則煩悶嘔逆恍惚癱眠其癰可立待
也直指○疔瘡走黃過心者難治若太重則嘔逆
嘔逆者難治姑用乳粉托裏散

方見下

止之三因

○疔疽出冷汗者死三因○人有暴死者多是疔
毒急以燈照遍身若有小瘡急灸之并服賽命丹

亦有復甦者入門

拔疗法

疔瘡有毒根在內須拔去乃可救黑牛牽於石上必撒糞候糞上生菌取焙乾與蒜瓣

艸葉等分爲末用竹筒兩頭去節套在疔上陷入肉內以線緊縛取藥末一匙滴水和之放於筒內少時藥滾起則疔自拔起未效則漸加度數其疔必拔拔去後以金銀白芷散調之正傳○宜用週濟錐子或保生錐子四聖旋疔散拔去疔根調治精義○蒼耳莖葉燒灰醋調塗疔上乾則易不過十度卽根出和雄黃尤妙本艸○蟬蛻白殭蠶爲末醋調留瘡口塗四圍崁疔根出拔去綱目○蟬蛻安濃米泔小盞中以火逼之蟲熟喫泔反因灰取腦中白肉新瓦上焙爲末熱酒調二錢服仍以少許塗疔上根自出資生○一云蟬蛻於心腹下度取之其肉稱白貼疔上根出卽愈本艸○斑貓一枚捻破以鍼刺疔上封之根卽出○取黑虱十枚置疔上以荻箔繩作炷灸風上卽根出○白狗

東醫全集卷之二
尿燒存性和酒服又塗疔上根自出○苦荳取莖中白汁塗疔上出根○馬齒莧和梳垢爛藥封疔

本艸
上根出

食疫死牛馬禽獸肉生疔

近見患疔者皆是食自死

牛馬禽獸之肉而生此疾

十患十死宜急取紫金錠半錠淡酒化下重者服一錢外用涼水磨塗疔上日夜各數次或吐或利其滓塗疔四圍留頭出毒氣○大蜘蛛一箇放疔上自啞其毒速易三五箇其毒自敗以蜘蛛入水不傷蜘蛛命又兼用蟻鍼法方見下○種杏

紫金錠

一名萬病解毒丹治癰疽發背諸腫諸瘡疔瘡惡瘡一切腫毒方見解毒每取半錠淡酒化下重者一錢外以涼水調塗患處一日

數次即效惟已潰出膿血者忌服

入門

返魂丹

治十三種疔瘡危惡者雄黃白礬枯各二錢朱砂膽礬各一錢半蟾酥血竭銅綠各一錢

輕粉沒藥乳香各五分麝香一字蠅牛生不拘多少右爲末以蠅牛蟾酥研爛和丸芡實大每一丸令病人先嚼葱自三寸許放在掌心將藥丸裹在葱內以熱酒一盞吞下緩處臥汗出爲效。內經曰汗之則瘡已蓋此藥能化毒爲汗也

瑞竹

一捻金

治疔疽卽賽命丹

方見上

爲末每服二三分

溫酒調下如服賽命丹後毒未盡起再用此

藥催之服此藥後

身涼者卽火入門

神效奪命丹

治疗瘡惡瘡及破傷風昏沈危急者朱砂三錢半爲衣輕粉血竭各二錢枯白

礬蟾酥各一錢銅線一字蠅牛二十箇右末用初男乳汁和丸梧子大朱砂爲衣患人自嚼生葱白

數根吐出裹藥一丸以溫酒吞下如吐逆以熱酒壓下遍身汗出毒氣自消

骨心

蟾酥丸

治疗瘡惡瘡無名腫毒朱砂雄黃各三錢麝香一字右末端午日取蟾酥和丸黍米大葱

酒下三
九 醫鑑

五聖湯

治疔疽皂角刺一兩大黃金銀花甘艸各五錢黃瓜蔓一箇右剉酒二升同煎至八分溫

服入門

還魂散

治疔瘡及癰疽能令內消去毒化爲黑水從小便出萬無一失知母貝母白芨半夏天花

粉皂角刺乳香金銀花穿山甲各一錢右剉作一

貼好酒一椀同煎至半椀去滓乘溫益服將渣擣爛加芙蓉葉一兩蜜水和付瘡上如

乾以蜜水潤之過一宿自消

醫鑑

千金消毒散

治疔瘡發背一切無名惡瘡腫毒初發脉洪數弦實欲作膿者當歸金銀花各

二錢大黃芒硝連翹黃芩赤芍藥各一錢皂角刺

牡蠣天花粉各五分右剉作一貼酒水各半煎服

四春

迴瘡錠子

治疗疽神效艸烏一兩巴豆肉七箇蟾酥
粳米大七粒麝香一字右爲末麪糊和作

錠子先鍼瘡頭至痛見血用此錠紙入以膏藥貼
之重者於瘡四圍紙之二三日疔根自拔出精義

○一名迴生

錠子

丹

卷

碧霞錠子

治疗瘡及惡瘡不覺痛銅線一兩硼砂二
錢蟾酥一錢右末飯和作錠子先鍼刺疔

心出血以錠子綿
之用膏貼之精義

迴瘡蟾酥錠子

治疗瘡天南星欵冬花巴豆肉黃丹
砒礦各一錢獨活五分斑貓七箇右

細末用新蟾酥和勻如黍米大作錠子先以鍼刺
疔頭有血出下錠子以膏藥貼之膜出自差精義

飛龍奪命丹

治疗瘡及惡瘡朱砂三錢砒礦一錢半
硼砂鵬砂乳香沒藥黃丹血竭各二錢

麝香一錢二分半南星半夏各一錢斑貓十二箇
去足翅巴豆十二箇去皮油右爲末蟾酥汁垂丸

紅豆大五分內取一分加入斑貓四箇然後搗成
錠子如小麥大先用鍼刺疔心下錠子用飯粧紙

封口用前四分內一丸噙

在舌上涼水送下丹心

雄黃丸

治同上雄黃鬱金皂角全蝎各一錢巴豆肉十四箇麝香少許右末滴水爲丸菉豆大茶

清下二十丸正傳

化毒丸

治同上朱砂硝砂雄黃各一錢龍腦麝香各五分輕粉一字蟬蛻二十枚右爲末蟾酥和丸菉豆大每用一丸放

於舌上取涎而愈正傳

二活散

治疗瘡羌活獨活當歸烏藥赤芍藥金銀花天花粉連翹白芷甘艸節各二錢紅花蘇木

荊芥蟬蛻乾葛各一錢半檀香一錢

右爲末每三錢蒼耳煎湯調下正傳

獨蟾丸

治疔瘡及一切惡瘡蟾酥取得丸如菉豆大一蟾或作一丸多者作二丸每取一丸置舌

上臥片時其苦水滿口卽嚥下或鍼刺

疔頭納一丸於中紙貼護之神效

正傳

保生錠子

治疗瘡癰酥三錢雄黃二錢爲末用青桑

朱砂爲衣陰乾以冷葱湯磨服八分仍用冷葱湯
吞下外用鍼刺疔頭將錠子挿入被蓋出汙二日
爛出卽愈體虛清貴人及婦

女胎前後毒淺者最宜入門

神仙解毒丸

治疗瘡魚膿瘍諸般惡瘡初發自鑿不
以多少熔化作丸如棗豆大朱砂爲衣

每十九丸葱白煎湯送
下一服立消

醫鑑

金銀白芷散

治疗疽金銀花二錢皂角刺一錢半黃
芪當歸白芷甘艸各一錢檳榔川芎防

風天花粉各五分右爲末分三貼每

取一貼酒水各半煎連渣服

正傳

四聖旋疔散

治疗瘡生於四肢勢微者先用醋調此
未全疔上次服托裏之藥其疔自出巴

豆肉五分輕粉硝砂白僵蠶各二錢半右爲細末醋調用之精義

癰疽雜證

有癰疽寒熱有癰疽嘔逆有癰疽痰盛

癰疽煩渴

乾煩渴乃氣血兩虛八物湯

方見虛門

加黃芪

麥門冬山茱萸五味子

四春

○加減八味丸

方見

虛門治癰疽渴疾首尾通用最佳老人尤宜

得效

○清臍竹葉湯竹葉黃芪湯人參黃芪湯黃芪六

一湯金銀花散五味子湯忍冬

丸忍冬湯二方見下選用諸方

癰疽嘔逆

未潰時嘔者當作毒氣上攻治之潰後當

作陰虛補之若年老人潰後嘔不能食宜

參苓白朮膏

方見內傷

補之河間謂瘡瘍嘔者溼

氣侵于胃也宜倍白朮丹

○癰疽及疔瘡惡瘡

毒氣攻心則多嘔逆宜乳粉托裏散生薑甘桔湯

○食不能下服藥而嘔六君子湯

方見痰門

加木

香繡砂回春○或用獨參湯卽愈丹心

癰疽痰盛

癰疽生痰有二一者胃寒二者鬱熱俱宜

夏入門

○痰盛喘急六君子湯加薑棗煎服或補

方見內傷

加麥門冬五味子桑白皮煎

中益氣湯

方見內傷

加麥門冬五味子桑白皮煎

服四春

癰疽寒熱

癰疽未愈之間先嘔痰而寒熱汗出而止或連日或間日宜服加味不換金正氣散

得效

○癰疽虛證寒戰明乳香研細半兩每一錢

熟水調下戰發於肝乳香著肝而溫之寒戰隨止

直指

癰疽作痛

癰疽不可不痛亦不可大痛未潰前痛者爲熱毒便祕者內疎黃連湯方見上膿腫

痛者鍼之已潰膿出而反痛者虛也入門

○癰疽寒熱虛實皆能爲痛若熱毒之痛以寒涼之劑折

其熱若寒邪之痛以溫熱之劑熨其寒虛而痛者

補之實而痛者瀉之

精義

○膿潰之後反痛者虛

也宜補之穢氣所觸者宜和解之風冷所逼者宜

溫散之補者當歸黃芪之類

綱目

○膿血既泄腫痛

類溫散者防風桂枝之類

綱目

○大補湯

方見虛門加

麥

尤甚人參黃芪湯或十全大補湯

方見虛門加

麥

門冬五味子

同春

○止痛當

歸湯二仙散香靈散選用

癰疽泄瀉

癰疽泄瀉宜乳粉托裏散以木香白茯苓

煎湯調下加味不換金正氣散佐之

直指

○腹痛泄瀉咳逆昏憒急用托裏溫中湯

○或用六君子湯

方見瘀門加

炮附子

同春

清膻竹葉湯

治癰疽煩渴竹葉升麻黃芪蜜炙瓜蔞根麥門冬各一錢生地黃黃芩赤芍藥

人參知母白茯苓甘艸炙各七分半

右剉作一貼入棗二枚水煎服

同春

義

竹葉黃芪湯

治癰疽惡瘡發渴竹葉生地黃各一錢半黃芪麥門冬當歸川芎黃芩赤芍藥

人參半夏石膏甘艸各七分半右
剉作一貼入薑五片水煎服入門

人參黃芪湯治癰疽潰後少食不眠煩熱黃芪蜜炙

麥門冬當歸神曲甘艸各五分黃柏四分右剉作一貼水煎服入門

黃芪六一湯

治癰疽煩渴黃芪蜜炙六兩甘艸炙一兩右剉每三錢入薑三棗二煎服此藥

大治渴疾常服可免癰疽之患得效○一方黃芪六兩半生用半鹽水潤蒸三天粉艸一兩半生半炙右末每二錢

白湯點服精要

金銀花散

治同上金銀花四兩甘艸炒一兩右麞末分三貼水酒相半煎服衛生

五味子湯

癰疽口燥舌乾此腎水竭也此藥治之五味子黃芪生人參麥門冬甘艸各一錢右

作一貼水煎日

服三五次精要

乳粉托裏散

(治癰疽惡瘡毒氣攻心迷悶嘔吐喉舌生瘡名曰心氣絕初起宜服此藥最能

返出毒氣不致內陷菉豆粉四錢乳香一錢右爲

末每二錢甘艸湯調時時呷下一方新水調服入

門。一名內托散一名護心散一名內托香粉散

繩目。一方癰疽疔瘡惡瘡須服此預防毒氣攻

心菉豆粉四兩乳香一兩朱砂三錢右爲末

每二錢甘艸湯調下名曰乳香護心散

丹心

生薑甘桔湯

(治癰疽毒氣上衝咽膈窒塞嘔吐不已桔梗一兩甘艸生生薑各五錢右剉井

水煎服

直指

加味不換金正氣散

(治癰疽寒熱往來或兼風邪或內氣虛餒蒼朮橘紅半夏薑蔻

香葉厚朴各一錢二分半甘艸炙一錢白茯苓川芎各七分半木香五分右剉作一貼入薑五錢二

水煎服

直指

止痛當歸湯

治癰疽穿潰疼痛人參黃芪當歸白芍藥生地黃官桂甘艸各一錢右麩末水

煎服日

三精義

二仙散

治癰疽疼痛不可忍白芷
未潰用二兩已潰用五錢貝母
巴瀉用一兩右剉每七錢半作一貼酒水相

半煎服

醫鑑

香靈散

治癰疽腹痛辣桂二錢半木香白芍藥五靈脂各一錢二分半右麩末每三錢入薑棗煎

服直指

托裏溫中湯

治癰疽陽氣下陷腹痛泄瀉咳嗽昏迷
附予炮二錢乾薑羌活各一錢二分半

甘艸炙一錢益智丁香沈香木香茴香陳皮各五分右剉作一貼入薑五片水煎服入門

癰疽通治藥

千金漏蘆湯五香連翹湯仙方活命飲升陽益胃散千金內消散仙傳化毒湯榮衛

返魂湯 紫金錠 賽命丹 淵然眞人 奪命丹 飛龍
奪命丹 忍冬丸 忍冬酒 忍冬湯 皆可選用 諸方

千金漏蘆湯

治五發癰疽及疔瘡內疽一
切熱毒惡腫皆治之 方見上

五香連翹湯

癰疽瘡癰瘰癧結核乳癰內疽
一切惡瘡毒腫皆治之 方見上

仙方活命飲

並治排膿止痛消毒之聖藥也
一切癰疽惡瘡毒腫皆治之內外諸證
方見上

升陽益胃散

五發癰疽及內外一切惡
瘡毒腫皆治之 方見上

千金內消散

五發癰疽及背癰內疽 一切惡瘡毒
腫乳癰腸癰便毒皆治之 方見上

仙傳化毒湯

癰疽發背內疽乳癰 一切
無名腫毒皆治之 方見上

榮衛返魂湯

凡氣血逆於肉理令癰結爲癰疽毒腫
此藥大能順氣勻血調和榮衛通治一

切 諸癰
方見上

紫金錠

(治內外癰疽惡瘡疔瘡無名毒腫乳癰便毒方見上)

賽命丹

(治內外癰疽發背疔瘡乳癰魚口便毒一切無名毒腫惡瘡方見上)

淵然真人奪命丹

(五發癰疽發背疔瘡惡瘡無名腫毒皆治之方見上)

飛龍奪命丹

(治五發癰疽發背疔瘡惡瘡乳癰附骨疽一切無名腫毒方見上)

忍冬丸

(通治一切癰疽諸瘍消渴後發疽尤宜服此忍冬艸不以多少根莖花葉皆可用右入瓶

(內好酒浸以糠火煅一宿取出晒乾入甘艸少許搗爲細末以所浸酒打麪糊和丸梧子大每服百丸酒飲任下精要)

忍冬酒

(治一切癰疽惡瘡背癰乳癰不問發在何處初發便當服此百發百中忍冬藤生取一把以葉入砂盆研爛入酒少許調和塗付四圍中心畱一日又取五兩槌碎甘艸生一兩剉入砂瓶內

水二椀文武火煎至一椀入好酒一大椀煎

數三沸分三服田父野老最宜服此

丹心

忍冬湯

治一切癰疽內發外發乳癰腸癰常服托裏消毒或加黃芪當歸各二兩尤妙方與上忍

冬酒方

同入門

癰疽鍼法

鍼鍼者末如劍鋒以取大膿靈樞

○夫癰氣

之息者宜以鍼開除去之註云息與癰同死肉也內經

○

○癰疽成膿以馬喚鐵作鍼形如韭菜

兩面皆利可以橫直開裂以取膿血精要

○癰疽

如椒眼數十粒或如蜂窠蓮房而膿出痛不除宜

以鍼鍼橫直裂之則毒血挾膿出而愈綱目

○癰

疽住膿若不鍼烙毒氣無從而解膿瘀無從而泄過時不鍼烙反攻其內欲望其生豈可得乎癰皮

薄惟用鍼以決其膿血不可烙也精義

○凡近筋脈骨節處不得亂行鍼烙○癰疽皮厚口小膿水

出不快者宜用鍼烙精義

○大抵用鍼只欲引

膿出如鍼刺無膿是氣伏也不可用鍼烙涓子

蜞鍼法

癰癧初發漸大以溼紙一片搭瘡上其一點先乾處卽是正頂先以水洗去人皮鹹取大

筆管一箇安於正頂上卻用大水蛭一條安其中頻以冷水灌之蛭當吮其正穴膿血皮皺內自是毒散無不差如毒大蛭小須用三四條方見效若吮著正穴蛭必死用水救活累試奇效如血不止以藕節上泥塗之得效○蜞鍼一法可施於輕小證候若癰疽大毒積在藏府徒竭其血於外無益也丹心

癰疽烙法

或問烙法何如曰膿或汪洋欲出奈何皮厚肉深難入者不用烙以開竅厭膿何由出。

膿本肉腐所成皆挾毒熱之氣若久畱肉膀則毒氣浸淫好肉亦化爲膿腐此所以烙法有功乎潰瘍也涓子○癰疽成膿宜烙可用銀鉗大二分長六寸火上燒令赤急手熨烙毒上得膿爲效精要○近代良醫只以金銀鐵錠其樣如鍼者以木炭熟火猛燒通赤蘸油烙之尤妙隨鍼烙出膿者

順也。如膿不出實者，撲髮爲紙，虛者以紙爲紙，於紙上蘸藥，綿入鍼孔，引出膿毒。如腫不退，疼不除，急服排膿丸，裹湯藥以助其勢。膿色黃。

白即好，若赤黑色，防後有鮮血出。

精要

癰疽灸法

凡癰疽之發，或因內有積熱，或因外寒鬱內，熱若於生發之處，艾灸以散其毒，治之于早。

可以移深爲淺，改重爲輕。諸項灸法皆好，惟騎竹馬灸法，方見鍼灸尤爲切要。此消患於未形之策。

一丹心。○癰疽已覺微漫，腫硬反不變色，脉沈不痛。

者當外灸之，引邪氣出而方止。經日陷下者，灸之如外微覺木硬而不痛者，當急灸之。是邪氣深陷也。淺者不可灸，如有膿水亦不可灸。當鍼之。保命

○癰疽初覺腫痛，先以溼紙覆其上，視之朱乾處是頭也。大蒜切片安頭上，以大艾炷灸之，二壯，卽換一蒜。痛者灸之，不痛不者灸至痛乃止。大槩以百壯爲準，最要早覺早灸。爲上如有頭，則不必紙覆也。三四○若十數頭，作一處生者，卽用大蒜研成膏，作薄餅鋪頭上，聚艾于餅上，灸之。三四○

初發小點一二日急以蒜片貼其中心以小艾炷灸五壯而止直指○始發一二日十灸十活三四日六七活五六日三四活綱目○灸法所以暢達拔引鬱毒此從治之意也譬如盜入人家必開門逐之使出萬一門不開無從而出必傷主乃已綱目○頭爲諸陽之會若有發宜灸艾炷宜小壯數宜少三五壯而已腹背則多灸爲效精要○多灸則內服乳粉托裏散防火氣入心丹心○有善治癰疽者皆於瘡上灸至二三百壯無有不愈但艾炷小作之小則人不畏灸灸多則作效必矣資生○隔蒜灸沃豆豉餅灸法桑枝灸法附子灸法硫黃灸法土餅灸法並治癰疽惡瘡腫毒詳見鍼灸

艾灸治驗

一人發背醫療逾月勢益甚有張生者敷以艾火灸其上至一百五十壯知痛乃止明日鑄去黑痂膿盡潰肉理皆紅不復痛乃以膏藥貼之日一易易時剪去黑爛月餘乃平復本草

灸石癰法

堅硬不潰名曰石癰當灸百壯石子當碎出資生

灸發頤法

此瘡最險頭面腫大牙齒亦脫解開頭髮尋項螺中灸二十一壯如不達灸至四十

九壯而

止直指

灸疔疽法

大蒜爛搗成膏塗瘡四圍留瘡頂以艾炷灸之以爆爲度不爆難愈灸百壯無不愈

正傳

灸便毒法

用細糞隨病人左右手量中指自手掌盡處橫紋量起通三節至指盡則住不量爪甲切斷卻將此艸於手腕橫紋量起引艸向臂當中艸盡處即是穴艾炷如麥大灸二三壯腫散痛

止即安
得效

調理及禁忌法

癰疽患時將理法避風邪○少睡臥○勿驚憂○勿瞋怒○徐行動○省言語

○戒閨房○絕思慮○防觸穢○聽好事○瘡潰洗○藥常助○盥漱聞香○二便順序○擇飲食

內充無飢飽失度。付藥運掉屈伸瘡口常加愛護。直指○妄用惡艸愈滋其毒。○不忌飲食反害其瘡。○惡肉去盡瘡口收斂欲平之際尚忌起立行步。揖待賓客酒肉宴會瞋怒沐浴勞動等事直指待瘡癒平復精神如故氣力完全方無所忌百日內慎勿觸犯精義○癰疽最宜節慎飲食其熱毒方盛或發大渴多飲冷水及水漿之類此乃毒氣攻心令口乾煩渴但以心氣藥內補藏府卽止矣丹心○凡癰疽勿食羊雞牛鵝魚麪煎燉炙炒法酒等味犯之必發熱蓋厚味能引起宿火之熱此誠富貴參養口腹者所宜謹守若冬寒與虛老人寧無權法乎略加滋味以補胃氣庶易收斂丹心○膿潰之後氣血虛弱則可食羊肉鵝鴨蔓菁蘿蔔薑醬瓜莽稀粥軟飯若肌肉漸生思想滋味則宜食白熟酥餅蠶粥羹湯熟軟溫和勿令大飽精義○諸痛痒瘡瘍皆屬於心如茯苓茯神遠志益智石菖蒲等輩須當佐助於其間抑使病人不得憂恐嗔怒勞精疲神有觸於心尤關利害直指○

背疽之人難於隱。凡用菉豆十餘粒，作一大袋隱伏，則自然心涼身安。精要○瘡瘍面赤雖伏火熱，禁不得攻。裏空發表以去之。○瘡瘍鬱冒俗呼昏迷，慎不可下汗之。則愈。東垣

單方

有陶潛膏几三十七種

朱砂雄黃

古之瘍醫以五毒攻瘍中物也。凡解瘡毒不可無雄黃、朱砂。本艸○朱砂雄黃膽礬

白礬磁石置瓦盒中，火煅三日夜，其烟上著，蓋中以雞羽掃取之，以注惡瘍，則惡肉附骨，膿血卽潰出而愈。此五

毒也。入門

伏龍肝

諸癰疽發背，一切腫毒以雞子黃和塗之或醋調或大蒜同研貼之並佳。本艸

煉石

諸惡腫及發背，取石子火燒赤醋淬十餘度，取屑爲末，醋調塗之，卽愈。此造磨礇尋常石也。本艸

甘菊

治癰毒及疔腫，瓶以菊葉擣取汁飲一升，神驗。○又取莖葉塗疔上，亦效。名曰陶潛膏。醫鑑

野菊花

治疗瘡野菊花葉豆爲末酒調飲醉睡覺痛定熱除入門

生地黃

治一切癰腫地黃搗爲泥攤布上繆木香末於中再攤地黃泥貼腫上三度差本艸

茺蔚莖葉

療疔瘡乳癬及諸毒腫毒取汁飲之滓外付本艸

白鳳仙花

治癰疽發背取花蓮根葉搗爛先以米醋洗患處後付藥一日一換如神回春

薜荔

治背癰取葉爛研取汁和蜜飲數升以滓付瘡上一方細研和酒殺取汁煎數沸服之本艸

黃芪

治癰疽久敗瘡排膿止痛濃煎服之內托陰證瘡瘍必用之藥也東垣

忍冬藤

治一切癰疽腫毒花莖與葉生擣煖酒調服直指

蒼耳

主疔瘡取莖葉燒存性醋調塗疔上當出根加雄黃尤妙。又方蒼耳一握生薑四兩搗取汁

入酒和服治疗毒入

心嘔逆者效

入門

白芷

治發背乳癰能止痛生肌化膿
○敗膿不去加白芷卽去

丹心

茅鍼

疔毒惡瘡不作頭酒煎茅鍼取汁服
一鍼一孔二鍼二孔必穿穴

本艸

大黃

治癰疽熱毒大黃酒洗剉二錢甘艸
一錢煎服脉實膏梁之人宜服

綱目

茨菰

取根莖搗竹腫毒癰上
卽消水煎服亦效

俗方

槐花

治百種瘡毒槐花四兩炒香入酒二
椀煎二三沸去滓盡服卽消

入門

黃桑葉

癰疽瘡口成大窟不斂經霜黃桑葉
爲末頻繆瘡中或煎湯洗之

本艸

乳香

止痛長肉令諸瘡內消○凡血滯則氣壅經絡
滿急而作痈腫乳香能破宿血消腫止痛爲瘡

家奇藥

也入門

皂角刺

治癰疽能鑽引至痛處亦能宣毒
燒存性爲末薄酒調下一錢

綱目

榆木皮

煎湯洗諸敗爛瘡及
乳癰諸瘡最佳 本艸

生龜

刺取血塗癰疽腫
毒卽消神驗 俗方

蜘蛛

治懸癰取大者一箇研爛調
服隨病左右側臥良 醫林

脂麻油

治癰疽發背毒瘡初作便服便
毒氣不內攻 蘆油煎十餘沸候冷一斤好酒二椀和勺分

五次溫服一日夜服盡此神仙哉

法直指○亦解陰證沈毒直指

雄雀屎

一名自丁香治癰疽已有膿未潰出以醋
調雀屎如小豆大付之卽穿出膿 本艸

甜瓜子

主腹內結聚破潰膿血最爲腸胃腹
內癰要藥爲末酒下二三錢 本艸

蜀葵花

諸癰瘡腫痛不可忍葵花根爛擣貼之立效
○黃蜀葵花葉入鹽研爛付之亦效 綱目

葫

小蒜也治癰毒瘡腫叫呼不得臥取獨頭蒜
細擣麻油調和厚付瘡上乾則易神效 本艸

人口中唾

凡癰癧微有紅頭隱疼者急用不語津唾頻頻塗之自消飲酒了不可用綢日

猪懸蹄

治癰疽潰爛取猪蹄濃煎取清浸洗妙

直指

商陸

煎除癰腫付惡瘡。一切熱毒腫瘡
陸根和少鹽擣付日一易效

本艸

苧根

癰疽發背未成膿者苧根葉熟
擣付上日數易腫消即差

本艸

醋

消癰腫歌日發背疔瘻識者稀醋磨京墨遶四
圍生薑猪膽同塗上天明恰似鬼神移

種杏

赤小豆

消熱毒癰腫作末雞子清調塗之
卽差亦治一切腫毒作痛

本艸

芙蓉

治發背瘡癰諸般腫毒及杖瘡芙蓉花及葉並
晒乾爲末醋調付杖瘡雞自清調自運尤佳

丹心

荊芥

擣爛和醋付疔腫甚效又水煎取濃汁服之亦可

本艸

人屎

癰疽發背欲死取野人乾屎燒存性醋和如泥
付腫上乾則易甚良又治疗腫封其上一日根

諸瘡

大風瘡

脉風成爲癩癩者榮衛熱腐其氣不清故使真

杜壞而色敗皮膚瘍潰

內經

。大風之源有三

種五火一種風水二種傳變三種者自不調攝。

五火者一日皮火麻木不仁二日肉火割切不痛

三日血火潰爛成膜四日筋火手足脫落五日骨

火鼻梁崩塌眼齷脣翻聲啞。又曰一風者肺受

病先落眉毛二風者肝受病而起紫胞三風者腎

受病腳底先穿四風者脾受病遍身如癬五風者

心受病先損其目。或有墳墓居址風水不吉或

父母夫妻家人遙相傳染或在外不謹糞坑房室

床鋪衣被橋上樹下歇息去處命值委火凶星遭

此惡疾宜服消風散追風散磨風丸兼用洗藥敷

藥條然子。大風病是受得天地間殺物之風古

人謂之癘風者以其酷烈暴悍可畏也得之者須

分在上在下夫在上者以醉仙散取臭涎惡血於齒縫中出在下者以通天再造散取惡物蟲積於穀道中出所出雖有上下之殊然皆不外乎陽明一經蓋陽明者胃與入腸無物不受乃脾肺二藏之府也脾主肌肉而肺主皮毛乃府及於藏病也丹心○服藥下蟲積後用防風通聖散方見風門調之重者又與換肌散夫上下同得者甚重自非醫者神手病者鐵心罕能免此若遇此疾切須戒鹽及一切口味公私世務悉宜屏去丹心○此疾雖治得愈若不絕味斷慾皆不免再發而終於不救孫真人曰嘗治四五百人終無一人免於死非真人不能治蓋無人能守禁忌耳丹心○初起白屑紫雲如癥風然或有遍身白皮脫落如蛇蛻狀丹效○起白屑者白花蛇丸眉鬚落者三蛇丹鼻崩者換朋散補氣瀉榮湯通用凌霄花散加味苦參丸換骨丸大麻風丸紫雲風丸返魂追命再造散烏蛇苦參丸可選用諸方○治癩以蒼耳葉爲君更以酒煮烏蠶魚代蛇補之或缺爲末糊丸梧

子大茶清下七八十九更入紫萍尤捷數月而安
丹心。服藥瘳後終身不得食牛馬驢騾等肉犯
者復發必死得效

消風散

第一日服白芷全蝎人參各一兩右爲末每
二錢勿食晚飯後空心溫酒調下身上微

燥爲
類聚效

追風散

第二日服瀉血追蟲錦紋大黃六兩鬱金蟬

肚者一兩八錢炒皂角刺一兩半右爲末初
服五錢或六錢入大風油一錢半朴硝少許入內
好溫酒一椀調化五更空心服之直待辰時又如
前調藥一椀入熟蜜少許勿令患人知先以水鹽
漱淨然後服藥必以蜜解口切不可臥良久痛瀉
數次不妨以薄粥補之。此藥老弱者難治五十
以下者可治精壯者十日內三服謂如正月初一
日服消風散初二日服追風散初三日服磨風
丸又如此周而復始瘦弱者十日內一服類聚

磨風丸

第三日服日進二次當歸羌活獨活川芎天

麻細辛防風荆芥威靈仙麻黃何首烏蔓荊

子牛蒡子車前子皺面艸

即蕷葵也

蒼耳艸各一

兩右晒乾爲末酒麯糊和丸梧子大溫酒下五七

十九日二服仍用後

藥熏洗擦付

類聚

洗藥

治滿身瘡爛地骨皮荊芥苦參細辛各二兩右

洗藥
剉以河水煎用大桶盛浸浴熏洗通身出血爲效

類聚

敷藥

治瘡爛遍身黑狗脊即貫衆也寒水石硫黃白

礬枯各二兩蛇床子一兩朴硝五錢右爲末臘

猪脂調付

妙類聚

浴法

治遍身癩瘡桃柳桑槐楮五般枝多水濃煎湯

盛大桶浸坐沒頸一日俟湯冷油安矣

正傳

醉仙散

治大風癩瘡胡麻牛蒡子柏子蔓荊子各一兩同炒白蒺藜苦參瓜蔞根防風各五錢

右細末每十五錢末入輕粉二錢拌勻每服一錢
茶清調下晨午夕各一服後五七日先於牙縫內
出臭黃涎渾身疼悶如醉然後利下膿血惡臭氣
病根乃去矣丹心。服此藥時須鹽醬醋諸般
魚肉油膩燒炙之物只吃淡粥及煮熟時菜并
烏蛇白花蛇淡酒煮熟食之以助藥力丹心

通天再造散

治同土皂角刺黑大者一兩半大黃根

五錢右爲末每二錢或三錢早晨面東好酒調下
當日利下惡物或膿或蟲入門。服藥後泄出蟲
視其色如蟲黑色乃是多年赤色是爲近年三四
日後又進一服直候無蟲乃止後取防風通聖散

方見風門

加苦參天麻蟬蛻

煎服調理痛癉滋味

丹心

換肌散

治大風年深毛脫鼻塌深重者取效如神烏
蛇白花蛇地龍各一兩當歸細辛白芷天麻

蔓荊子威靈仙荊芥穗甘菊苦參紫參沙參木賦
不灰木甘艸炙白蒺藜天門冬赤芍藥赤箭何首

烏石菖蒲胡麻子艸烏蒼朮木鼈子川芎各三錢半右爲末每五錢溫酒調下酒多爲妙其中紫參不灰木雖無

不妨正傳

補氣瀉榮湯

治癩風先發瘡上令惡氣消盡後服此藥連翹升麻各六分桔梗五分黃芩生

地黃各四分黃芪蘇木黃連地龍全蝎當歸各五

分白豆蔻人參各二分甘艸一分半胡桐淚一分

麝香少許桃仁三箇爲泥蜜蟲炒水蛭炒各三箇

爲末右剉除胡桐淚麝香蜜蟲水蛭另末外都作

一貼水二盞酒一盞煎至一盞去滓入細

末藥煎至七分早飯後午飯後服之東垣

凌霄花散

治癩風神效蟬殼地龍炒自殼蠶全蝎炒各七箇凌霄花五錢右爲末每二錢熱酒

調下丹心

加味苦參丸

治大風瘡苦參四兩防風荆芥蒼耳子胡麻子皂角刺各二兩半蔓荊子牛蒡

子枸杞子何首烏禹餘糧蛇床子各七錢半白芷四錢右爲末皂角煎膏和丸梧子大茶清或酒下五十九

入門

換骨丸

治癩風苦參浮萍各一兩半大黃槐花白芷川芎各一兩二錢半蒼朮一兩乳香沒藥沈

香木香各三錢麝香五分右爲末以麻黃五斤煎膏和丸彈子大每一丸溫酒化下忌風二三日

入門

大麻風丸

治大麻風初起遍身瘡點五色不知痛痒麻木證苦參一斤羌活獨活白芷白芍白

蒺藜天花粉何首烏各一兩三錢皂角刺當歸各二兩七錢右爲末別用皂角一斤剉水煎五日去滓熬膏和丸溫酒下百丸入門

紫雲風丸

治癩初起如紫雲癥風或發紫血胞瘡何首烏四兩五加皮白蘆薈苦參當歸各二

兩全蝎一兩半惡實羌活獨活白芷細辛生地黃防己黃連赤芍藥蟬退防風荊芥蒼朮各一兩右

爲末酒糊和丸梧子大溫

酒或米飲下七十丸入門

返魂追命再造散

治大風癩皂角刺一兩半大黃一

兩右爲末每二錢冷酒調下鴻蟲

出直指。一方治大風勢重不可救者皂角刺一

二斤九蒸九晒研爲末食上濃煎

大黃湯調下一

錢一句鬚髮再生肌膚悅潤

眼明倍常其效如神

本艸

烏蛇苦參丸

治癩風及惡癬苦參一斤半烏蛇肉八

兩石菖蒲四兩右爲末蜜丸梧子大茶

清下百丸集成

愈風丹

治癩疾深重一名三蛇丹治大風髮脫眉落

並酒浸三日取肉爲末

苦參一斤剉擣取頭末四

兩皂角濃煎汁熬膏

和丸梧子大以防風通聖散

煎水吞下五十

丸日二入門

白癩瘡

癩風初起白屑剥落又一種每朝瘡上退白皮一升許如蛇蛻宜服解毒雄黃丸

方見咽喉兼

服白花蛇

丸得效

白花蛇丸

治癩風白屑瘡痒皮膚皴燥白花蛇一條當歸二兩川芎白芷生地黃防風荊芥酒

芩連翹胡麻子何首烏升麻羌活桔梗各一兩右爲末將浸蛇酒和水煮麪糊和丸梧子大茶清下

五七十

丸入門

白花蛇酒法

治大風癩瘡白花蛇一條先蒸糯米二斗缸底先安酒麴次將蛇以絹袋盛之

頗於麴上然後以糯飯和勻頓於蛇上以紙封盒口候三七日開取酒將蛇去皮骨焙乾爲末每溫

酒一盞調蛇末一匙服之仍以酒腳并糟做餅食之。烏蛇釀酒法亦同上

本艸

癩風者素刺其腫上已刺以銳鍼鍼其處按出其惡氣腫盡乃止常食方食無食他食靈樞。病大

鍼法

天疱瘡

一名楊梅瘡與癩大同多由肝脾腎風溼熱之毒因男女房室傳染形如楊梅爛紅溼爛痒痛

者屬心多生乳腸○形如鼓釘黃豆者屬脾多生滿面○形如綿花者屬肺多生毛髮○形如紫荳

苟按之緊痛者屬肝腎多叢生於尻臀兩陰筋骨之處○形如魚胞內多白水按之不緊者謂之天

疱瘡乃此類之輕者入門○初起卽服防風通聖散一貼去麻黃以去內毒再用一貼去硝黃發汗以去外毒以後用加減通聖散丸多服之此方爲

普尾專藥輕者一劑重者十貼後宜服化毒散三日卻用吹藥三日瘡乾欲落欲落再服化毒散三日後量用通聖散加減入門○失治久則風毒流入經絡而成頑癬或氣血虛敗而成漏或誤服水銀輕粉而成風堆腫爛流膿出汁病至於此治之

風骨節重鬚眉墮名曰大風刺肌肉爲故汗出百日刺骨髓汗出百日凡二百日鬚眉生而止鍼內經○癩風以三稜鍼看肉紫黑處及委中穴名紫脈出外血阻不可令出太過恐損真氣正傳

爲難亦有蝕傷眼鼻腐爛玉莖拳攣肢體與癩無

異

入門

○初起宜服消風敗毒散加減通聖散加

減通聖丸

從肚皮起者裏熱發於外速服防風通

聖散

方見風門

○成頑癬者宜皂根丸○成腫塊

者宜仙遺糧丸西聖復煎丸消腫遺糧湯○筋骨

痛宜香鰐湯通仙五寶丹仙遺糧湯換骨散回生

保命丹茯苓湯○成漏宜象牙丸○通治宜用活

魂丹水硃丸六六丸天胞丸三黃敗毒散取輕粉

法○外治宜洗方擦方熏鼻方吹藥方

照藥方減癥法禁忌法鵝掌癬治方

加減通聖散

治楊梅瘡初起牛蒡子一錢二分防風

白鮮皮赤芍藥連翹黃芩各一錢金銀

花五分梔子仁當歸尾各七分荊芥槐花各六分

白僵蠶甘艸各四分右剉作一貼水煎服

入門

加減通聖丸

治同上卽前方共半斤再加苦參半斤

右爲末酒糊或蜜和丸梧子大酒飲食

東醫寶鏡卷之三

化毒散

治楊梅瘡重者生大黃一兩解熱毒穿山甲五錢解毒白僵蠶三錢去風蜈蚣一條去蟲

當歸尾五錢破血右爲末每

二錢溫酒調下日二服入門

消風敗毒散

治天疱楊梅瘡初起當歸尾川芎赤芍藥升麻乾葛黃芩生地黃各一錢黃連

黃柏連翹防風各八分羌活金銀花甘艸各五分

蟬殼二箇初服加大黃二錢巴硝一錢半利物後勿惡

周用右剉作一貼

水煎服四春

皂根丸

治楊梅瘡成潰癬當歸二兩黃芪一兩半人參陳艾各一兩麻黃五錢皂角樹根皮四兩

右爲末蜜丸榧子大土

茯苓湯下五十丸入門

仙遺糧丸

治楊梅瘡後腫塊成癬土茯苓一斤防風木通薏苡仁防己白茯苓金銀花木瓜白

鮮皮皂角刺各五錢白芥子四錢當歸身七錢右爲末蜜丸梧子大酒飲任下五七十丸或浸酒服

忌生冷雞猪魚

煎炒等物入門

西聖復煎丸

治楊梅瘡後腫塊經年破而難愈百方不效用此如神乳香沒藥孩兒茶丁香

各一兩白花蛇阿魏血竭各四錢俱爲末白薑炒

一斤蜂蜜六兩煉香油四兩煎熟大棗二十枚去

皮核右和勺擣千杵丸如彈子大每一丸土茯苓

二兩水二椀煎至一椀入藥丸再煎至半去渣溫

服回春

消腫遺糧湯

治楊梅瘡後腫塊土茯苓十五兩水通慧苡仁防風防已赤芍芩金銀花木瓜

白鮮皮皂角刺各五錢白芥子炒研四錢當歸身七錢右剉分作二十貼每一貼水煎服朝夕兩服

丹心

香鯿湯

治楊梅瘡毒筋骨疼痛茜根麻黃烏藥細茶槐花炒川椒各五錢魚鯿三錢少脂麻同炒

成珠乳香一錢右剉分作二貼每一貼

薑葱各五水煎服二三貼卽愈

同春

通聖五寶丹

治楊梅天疱綿花等瘡潰爛見骨或筋

癬或皮破肉爛口臭難當一切頑瘡惡毒並皆治

之鍾乳粉三分丹砂二分琥珀片腦各二釐真珠
二釐半右細末每服五釐另入飛白霜二分半炒

過令作一貼每日取土茯苓一斤水煎取汁十椀

以湯一椀入藥一貼攪勻晨服其茯苓湯須一日
服盡不可別用湯水服一料卽愈神驗乃治楊梅

天下古今第一仙方也

同春

○飛白霜疑是輕粉

仙遺糧湯

治楊梅風毒或誤服輕粉以致癱瘓筋骨

茯苓七錢

溼者一兩

防風木瓜木通薏苡仁白鮮

皮金銀花各五分皂角刺四分右剉作一貼水煎

日三服

入附

換骨散

治天疱瘡筋骨疼痛土茯苓四兩皂角刺一
兩乳香沒藥各一錢半右剉分作十貼每取

一貼水三椀煎至一椀分二次服之

醫鑑

回生保命丹

治楊梅天疱瘡及輕粉毒筋骨腫痛不拘新久皆效槐花一兩輕粉四錢二

分朱砂四錢川芎白芷雄黃各三錢當歸炒二錢丁香血竭孩兒茶各一錢乳香沒藥各五分牛黃四分右爲末棗肉入米粉打糊和丸黍米大用土茯苓一兩牙皂半箇同煎湯吞下日三服

醫鑑

茯苓湯

治遠近楊梅天疱瘡毒甚至腐爛肌肉膿汁流出臭不可聞痛不可忍薏苡仁皂角刺木

瓜白芷當歸尾黃柏生地黃牛膝白芍藥防風各一兩皂角川椒紅花各五錢甘艸節羌活各七錢金銀花二兩土茯苓四兩右剉分作十五貼每一貼水煎服日二次

醫鑑

象牙丸

治楊梅瘡成漏象牙三錢鼈甲猾皮並燒各一箇右爲末棗肉和丸櫻桃大每一丸空心

東醫全集卷之二十一

以童尿化下茶清亦可七日後取

三味末猪膽汁調付瘡上入門

活魂丹

治楊梅天疱瘡潰爛喉穿鼻崩膿血淋漓血竭乳香沒藥銅綠白礬枯黃丹穿山甲煅焦

各一錢輕粉蟾酥各五分麝香一克右細末蝎半研如泥和丸菉豆大每一丸重者二丸細嚼葱白

裹藥熱酒送

下空心

正傳

木硃丸

治年久楊梅頑瘡不愈者木花硃卽輕粉也一錢枯白礬朱砂各一錢半右爲末用全蝎

酒煎膏和勻分作六丸分三日服以牛肉鯉魚等湯送下丸日全愈入門

六六丸

治天狗楊梅瘡輕粉一錢三分黃丹八分朱砂雄黃各五分乳香麝香各三分右爲末糊

米糊和勻分作六丸每

日茶清下一丸治瘡方

天胞丸

治同上輕粉一錢半朱砂雄黃陳石灰各半錢右爲末陳米飯和丸菉豆大每三丸茶清

卷下 治

三黃敗毒散

通治天瘑楊梅等瘡防風荊芥連翹白芷當歸赤芍藥黃芩黃連梔子地骨皮

五加皮白鮮皮木瓜苦參蟬退金銀花薏苡仁白僵蠶皂角刺黃柏白蒺藜川芎

上部倍用木通下部倍用

部倍用

甘艸各一兩土茯苓一斤半右剉分

作二十五貼每取一貼水煎服日二

醫鑑

取輕粉法

取出腹內輕粉之毒可免後患用開口川椒每空心以土茯苓煎湯吞下三十粒卽

利輕粉於椒內從大便出洗起川椒服至椒內無輕粉乃止

入門

仙遺糧

善治久病天瘑楊梅癰漏及曾誤服輕粉肢體廢壞筋骨疼痛者能收其毒而祛其風補

其虛。右一味不蜜九梧子大川椒煎湯吞下五十丸鼻崩眉落筋緩骨拳者皆效但初起肺熱

便祕者勿

服入門

一方

治楊梅天疱諸瘡香油二斤入水一盞煎至自
烟起收貯每用黃酒一鍾入油一盞溫服日三
次服盡全愈。又方鴨一隻餓二日只與白水飲
之用輕粉一兩粳米飯四兩拌勺裝鴨待吃盡以
葦根槌碎泡水令鴨飲之解去輕粉

之毒待鴨毛落盡煮鴨食之

種杏

洗藥方

治楊梅瘡爛防風蒼耳子地骨皮荊芥苦參
細辛各三兩剉以清水煎盛大桶浸浴熏洗
通身出汗出血爲效 醫鑑。又方苦參蛇床子白
礬荊芥濃煎湯浸洗得效。又桃柳桑槐楮濃煎
湯浸浴亦

佳

入門

搽藥方

治楊梅天疱遍身瘡爛杏仁十四枚搗桃火
上燒半生半熟輕粉一錢片臘二釐爲末猪
膽汁或香油調搽入門。又野菊花棗木根煎湯
洗後防風通聖散同蚯蚓糞爲末略炒蜜調付之

極妙

入門

○又用千

金散麝香輕粉散

千金散

治楊梅瘡爛乳香沒藥血竭雄黃杏仁各二錢輕粉孩兒茶白礬枯李五分膽礬三分麝香二分右爲末先以猪膽汁洗瘡後撒上

醫鑑

麝香輕粉散

治天疱瘡爛及諸惡瘡白礬乳香各一兩輕粉五錢麝香半錢右爲末每取少

許繆付之

熏鼻方

治楊梅天疱瘡熏鼻甚奇黑鉛水銀各一錢朱砂乳香沒藥各五分血竭雄黃沈香各三分

右爲末和勻捲作紙燃七條用香油點燈放床上令病人放兩腳包住上用單被通身蓋之口噙涼水頻換則不損口頭初日用三條後日每用一條熏之丹心。又方水銀白錫百艸霜各一錢先將錫熔化入二味和勻研末捲作紙燃九條每早午晚各一條用紙作罩勿令泄氣熏鼻孔男左女右口噙涼水溫則易之一日熏三天三日九次全愈

醫鑑

吹藥方

治楊梅天瘡瘍黑鉛八分熔化入水銀一錢同結成餅銀珠即輕粉一錢半炒白礬雄黃

各一錢爲末棗肉擣勺分作六丸每取一丸放火

籠內命病人以巾包頭口吹服看其藥丸待烟盡

卽止當日早午晚各吹一丸次日早午吹二丸第

三日只早吹一丸吹後三五日或口流涎以黃連

菉豆煎湯解之又服化毒散方見上三日後

以加減通聖散丸方見上調理斷根

入門

照藥方

服茯苓湯後次用照藥水銀黃丹炒白錫各一錢血竭未五錢京香三分無麝香者右爲

末用熟艾鋪紙入藥在中捲作條放盞內人香油一椀將藥條作燈心點火安木桶內四圍用單被

圍住勿泄氣眼看燈口噙涼水

熱則換水盡藥條爲度

醫鑑

滅瘢法

治天瘡楊梅瘡愈後瘢痕紅黑用大黃白礬等分同研擦患處其痕卽去如常

同春二

禁忌法

天瘡楊梅瘡忌食牛馬狗肉雞豬魚生冷及酒
茶油膩辛熱等物痛斷酒色鹽宜炒食

同春二

鵝掌癬

凡天疱楊梅瘡服輕粉愈後手掌上發癬退皮一層生生不絕名曰鵝掌癬亦曰鵝掌風宜服

蒼耳散擦玉脂膏

醫鑑

。一方猪前蹄爪破開入

菊花蒼耳末以線縛定煮爛食之次日用白鮮皮

皂角雄黃各五分鉛炒水銀三分爲末臨臥以鵝

脂薑汁調擦次早以磁鋒磨刮去麤皮服蒼耳散

擦玉脂膏更灸勞宮或內關穴斷根

入門

。又方

黃丹輕粉等分爲末猪油調擦

。川烏艸烏何曾

烏天花粉赤芍藥防風荊芥蒼朮地丁

各一兩艾葉四兩煎水熏洗立效

同春

蒼耳散

治鵝掌癬猪牙皂角土茯苓甘艸各一錢蒼耳子金銀花皂角刺防風荊芥連翹各一錢

天麻前胡蛇床子各五分右剉作一

貼薑一片川椒一撮同煎服

醫鑑

玉脂膏

治同上牛乳拍油

無則鵝脂代之

香油黃蠟各一兩

熔化乃入胡粉二錢輕粉一錢半麝香五分

右爲末入內攪勻抹癬

上火

上烘擦再烘再擦如神

醫鑑

瘰癧

瘰癧之證內經謂之結核是也生頸前項側結核

如大豆如銀杏日瘰癧生胷脇腋下堅硬如石形

入門

如馬刀蛤曰馬刀

綱目

。結核連續者爲瘰癧形

長如蛤者爲馬刀

綱目

。繞項起核名曰蟠蛇癧

多生肩項或赤或白或沈或浮初生如豆久似核

年月浸久其大如梅或如雞卵排行成列或生二

三或生六七是也用性努力思慮過久則疼痛赤

腫早治爲上

綱目

○流注癧者婦人多有之其性

急躁其氣怫鬱其心熱著初生在項破後流注四

肢遍體結毒如梅李狀不療自破孔竅相穿寒熱

疼痛或流膿汁是也又名千歲瘡化氣調經湯主

之

綱目。瘰癧始起於少陽不守禁忌延及陽明

大抵食味之厚鬱氣之積皆此二端招引變換以

其屬膽經主決斷有相火而且氣多血少婦人見

此若月經行寒熱不作則可生稍久轉爲潮熱危

矣自非斷慾絕慮食淡雖神聖不可治也

丹心

。

膽與肝合且主筋病則筋累累如貫珠寒熱啾痛乃肝氣動而爲病也當清肝火爲王宜清肝益榮

湯

方見五藏

柴胡清肝湯

方見

癰疽

梔子清肝湯

方見

入門。肝燥火動而筋攀補中勝毒餅爲主多怒

火宜

清肝解鬱湯

方見

五藏

有寒熱單夏枯艸散

通用猶頭丸海藻散堅丸

入門

○治方大槩以地

膽斑猶爲主滲泄小便以瀉心火立應散是也然

性甚峻服後量體調治實者宣熟丹虛者托裏益

氣湯

方見

癰疽

○入門

○瘰癧之毒莫不有根地

膽斑猶製度如法能使其根從小便中出或如粉片或如塊血或如爛肉皆其驗耳但毒根之行小便必澀當以木通滑石輩導之然是毒必從小便

出者何哉

蓋諸痛痒瘡瘍皆屬於心故也

直指

通治宜化氣調經湯猶頭丸海藻散堅丸宣熟丹

三聖丸

小犀角丸散腫潰堅湯內消丸琥珀散蠟

礬丸天花散夏枯艸散○瀉肝膽火宜梔子清肝

湯○瀉

毒宜立應散薄荷丹白蛇丹四聖散○補

虛補中勝毒餅益氣養榮湯○馬刀瘡宜連翹散

堅湯消腫湯柴

胡通經湯

諸方

見醫金全集

化氣調經湯

通治流注瘰癧橘皮二兩香附子酒浸

製羌活白芷各一兩牡蠣粉天花粉皂角刺甘艸各五錢右爲末每

二錢清酒調下日三

綱目

梔子清肝湯

治肝膽火盛耳後頸項脅乳等處結核腫痛寒熱柴胡二錢梔子酒炒牡丹皮

各一錢三分赤芍荳蔻川芎赤芍藥當歸牛蒡子各一錢青皮甘艸炙各五分右剉作一貼水煎服

入門

補中勝毒餅

治瘰癧馬刀瘡黃芪一錢半連翹一錢防風升麻柴胡甘艸各五分當歸生地

黃熟地黃白芍藥陳皮人參各三分右爲末湯浸蒸餅調和捏作一餅子晒乾每一餅擣爲末白湯

調下

入門

夏枯艸散

大治瘰癧散結氣有補養厥陰血脈之功

夏枯艸末六錢甘艸末一錢右和勻每二

錢茶清調下

○又取一兩水煎服虛者多服益善

兼服十全大補湯

方見虛門

加香附遠志貝母治

瘰癧馬刀退寒熱
之聖藥也

入門

猫頭丸

治瘰癧馬刀已破未破皆效

猫頭骨一箇炙

南星白礬各一兩右爲末黃蠟化和
丸菉豆大臨臥米飲下三十丸

入門

海藻散堅丸

治瘰癧馬刀堅硬形瘦潮熱兼治癰氣
神薌四錢海藻昆布艸龍膽蛤粉通艸

貝母白蘚枯真松蘿各三錢半夏二錢右爲末蜜
丸菉豆大葱白湯下三十丸或取末二錢溫酒調
服

入門

宣熱丹

解瘰癧風熱之毒自小便出薄荷皂角連翹
何首烏蔓荊子三稜荆芥各一兩右爲末熟

醋浸豆豉二兩半搗膏和丸梧子

大熟水下三十丸日一服

入門

三聖丸

通治瘰癧丁香五十粒斑猶十箇去毒炒麝
香一錢右爲末鹽豉五十粒湯浸研如泥和

丸菉豆大每服五七丸空心溫酒送下日進三服
五七日外覺小便淋瀝或下如青筋膜之狀是病
之根也

綱目

小犀角丸

治諸癰應效如神常服去根黑丑半生半
炒取頭末犀角青皮陳皮各一兩連翹五
錢右爲末皂角二條去皮弦子湯浸絞取汁一椀
新薄荷二斤取汁同熬膏和丸梧子大連翹薄荷
湯吞下三十九丸

食後服綱目

散腫潰堅湯

治瘰癧及馬刀瘡堅而或潰或潰出膿
水黃芩一錢酒洗半生半炒艸龍膽酒
洗六分瓜蔞根酒洗黃柏酒炒知母酒炒桔梗昆
布海藻各七分柴胡六分炙甘草三錢酒洗蓬朮
酒炒連翹各五分葛根白芍藥當歸梢各四分貴
連酒洗升麻各三分右剉作一貼水浸半日煎服
食後去枕低頭而臥含一口作十次嚥下徐徐服
之另擣一料爲細末蜜丸菉豆大每取百丸以煎

藥湯送
下東坡

內消丸

治瘰癧結核熱毒鬱滯服之內消黑丑八兩

取頭末青皮陳皮各二兩右爲末以薄荷皂角各三兩煮爛取汁熬膏和丸菉豆大

以荊芥茶清吞下三十丸食後服

精義

琥珀散

治療瘰癧結核內消神效白丑頭末滑石自殭蠶黃芩各一兩木通連翹各七錢枳殼赤芍

藥柴胡各五分斑蝥三錢去翅足炒甘艸三錢琥珀二錢右剉分作六貼水煎服

同春

天花散

治療瘰癧潰爛疼痛金銀花二錢赤芍藥一錢七分天花粉一錢五分穿山甲一錢二分白芷當歸各一錢貝母七分沒藥五分乳

香二分右剉作一貼酒水煎服

醫鑑

立應散

治療瘰癧馬刀瘡連翹赤芍藥川芎當歸滑石甘艸各五錢黃芩斑蝥去毒炒各三錢白丑

頭末生土蜂房蜜水洗飯上蒸晒乾各二錢半川烏尖七箇右爲末每一錢濃煎木通湯調下臨臥

服毒從小便出如粉片血塊是也未效再服斑貓性毒濟以烏尖或衝上麻悶嚼蔥白茶清下以解之如尿澀益元散或五苓散燈心煎湯調下宣毒後繼服薄荷丹解其風熱入門

薄荷丹

角連翹何首烏蔓荊子三稜芥各一兩右爲末豉二兩半以熱醋淹豉令軟研爲糊和丸梧子大熟水下三十九直指

白蛇散

治瘰癧馬刀九癰寒熱作痛白花蛇肉二兩青皮黑丑頭末半生半炒各五錢犀角二錢半右爲末每一錢入輕粉五分研勻五更以糯米飲調下已時利下惡物乃病根也十日後再服後用四聖散補之

永鑄根入門

四聖散

治瘰癧用白蛇散取轉後用此補之海藻石決明煅羌活瞿麥各一兩右爲末每二錢米

飲調下日三服下

清水盡爲妙得效

蠟燭丸

治瘰癧馬刀惡瘡衛護內膜驅解
諸毒自然內消神妙 方見癰疽

益氣養榮湯

治懷抱抑鬱瘰癧流注日晡發熱或潰而不斂黃芪一錢半人參白朮各一錢

當歸酒洗川芎白芍藥酒炒生地黃陳皮香附子

貝母各七分柴胡桔梗地骨皮甘艸炙各五分右

剉作一貼水煎

服日一次 醫鑑

連翹散堅湯

治馬刀瘰癧流注遍體作核作瘡柴胡一錢半艸龍膽酒炒四次土瓜根酒炒

各一錢二分黃芩酒炒三次一錢當歸梢生黃芩

蓬水酒炒三稜酒炒連翹白芍藥酒炒各七分炙

甘艸五分黃連酒炒蒼朮各四分右剉作一貼水

浸半日乃煎去枕仰臥一口作十次嚥之留一日

送下丸藥另取一劑爲細末蜜丸菉豆大每

百丸以前藥水送下更以龍泉散塗之 正傳

消腫湯

治馬刀瘡連翹二錢生黃芩柴胡各一錢二分天花粉黃芪各一錢當歸梢甘艸各七分

鼠粘子黃連各五分紅花二

分右剗作一貼水煎服正傳

柴胡通經湯

治少陽經分項側有核堅而不潰名曰馬刀瘡桔梗二錢柴胡連翹當歸尾黃

芩黃連並酒炒鼠粘子三稜甘艸生各一

錢紅花一分右剗作一貼水煎服

回春

一方

治瘰癧烏雞卵一枚穿頂納斑猫一箇紙封其竅蒸熟去猫口一服煎五積散

方見寒門送下

四五枚卽

效入門

外治法

凡瘰癧馬刀在苒日久內必成膿若腫高消軟其人面色萎黃皮膚壯熱上蒸膿已成也可以

鍼決核中用追毒蝕肉錠子綻之用膏貼之

精義

○治法以火鍼刺入核中納蟾酥膏于中外用線雲膏貼之三日後取去核中搘膿盡取去核外薄膜先破初起之核一枚以繩其源服藥則後出者皆愈或不能收如銀杏者盡皆開了用藥取之其自潰者猶如木果之腐熟肉雖潰而核猶存故

膿水淋漓久難得愈治法用鐵烙燒赤烙去其破核猶存者併肉潰處次用金寶膏追去蠹惡之根遂能長肉

而愈正傳

蟾酥膏

蟾酥如大豆許自丁香十五枚巴豆肉五粒寒水石寒食麪各少許右各另研合和再研蜜丸菉豆大每一丸或二丸三丸納入鍼竅

中如膿未盡再納數丸以膿盡爲度

正傳

綠雲膏

黃連大黃黃芩玄參黃柏木鼈子肉各一錢右剉香油一兩同煎焦色去滓入松脂五兩

再煎成膏瀘入水中扯拔如金色再熬放溫入猪膽三箇汁銅綠醋浸一宿去滓三錢攬勺如常攤

貼如瘡口不乾加乳香

沒藥輕粉尤妙

正傳

金寶膏

去腐肉惡肉不傷良肉桑柴灰五椀以沸湯十椀淋瀘取汁穿山甲煅胖二兩信砒一錢

杏仁七枚三味同研細生地黃二兩朱砂一錢輕粉麝香各半錢右將灰汁下鍋煎濃下甲末等及

地黃汁候焦乾下麝香次下輕粉次下朱砂候將成膏下炒石灰末一兩以成塊子收入罐內勿見風每取付核上再付卽去舊藥併麝卽效正傳

禁忌法

人有此患不惟懲忿窒慾其於飲食百味一切戒之直指○切忌毒藥點蝕及妄用鍼刀割破

必死戒之資生

繙貼藥

凡瘰癧馬刀惡瘡宜用蠶蠣散猫蝠散代灸散龍泉散蠅牛散燒灰散生獾散遶用○初起未破十香膏琥珀膏二方見雜方常貼之可消精義○治瘰癧神效方白膠香海螵蛸降真香等分

爲末繙患處外以水紙掩之一夕而退○又方未破者蜜蜂二十一箇蛇蛻七分牛螺蛤二條端午前收者右用香油四兩同熬成入光粉二兩以桑枝七條急攪候冷出火氣七日收貯每用撣紙上貼患處○此二方不須服藥只貼上五七日可便消網目

蠶蠻散

治瘰癧瘻蠶蠻三箇白朮砒礪各一錢右並火煅爲末繆爛肉上三日其核卽下入門

貓蝠散

箇右二味俱撒黑豆上同燒存性研爲末乾

繆入門

代灸散

治瘰癧潰爛臭不可聞鉛粉雄黃各一錢輕粉五分麝香二分右爲末用槐皮一片將鐵

密密刺孔置瘡上

上繆藥一根以炭火炙熟其藥

氣自然透入瘡中痛熱爲止

二三次全愈

醫鑑

龍泉散

治瘰癧鉛粉龍泉粉炒

卽磨刀礪上

昆粉也

布蓬朮三稜各五錢三味酒浸炒乾右極細

末熱水調塗瘡上卽效

○瘰癧先出一箇用四楞

鐵環定住不令出移破作口了以油紙糊綿之勿

合了以絕其瘡源其效至速如瘡不破或

病人不宵破龍泉散塗之三日一易

網目

蝸牛散

治瘰癧潰與味潰皆可

蝸牛不拘多少以竹簽貫穿瓦上晒乾燒存性爲末入輕粉少許

取猪骨髓調勻攤紙花貼瘡上三因○一

方蠅牛內七箇丁香七粒用如上法得效

燒灰散

未破者乾繆未破者油調付得效

生獾散

治同上生獾一箇取四足臍尾觜并兩耳右燒存性爲末油調先洗瘡後塗之立效類粟

洗傅方

治瘰癧自芷荊芥煎湯溫洗拭乾貼膏藥膜
汁出盡後半夏南星血竭各一錢輕粉少許

傅得效爲末睡調

難治可治證

帝曰寒熱瘰癧生於頸腋者何氣使然

岐伯曰此皆鼠瘻寒熱之毒氣留於脉而不去者也帝曰汎死生奈何岐伯曰反其目視之其中有赤脉上下貫瞳子兒一脉一歲死見一

脉半一歲半死見二脉二歲死見二脉半二歲半

死見三脉三歲而死見赤脉不下貫瞳子者可治也靈樞○婦人患瘰癧經調及經閉無潮熱者可

治經閉有潮熱或咳者死玉燭散方見胞門治瘰

癰通經日服一貼七八日自消。男子患瘰癧有潮熱有咳乃瘰癧傷證之標也故勞瘵類有日腹中

有塊頸上有核最爲難治

入門

○瘰癧

延及胷中中府雲門肺經部分者死

得效

灸法

治瘰癧以手仰置肩上微舉肘取之肘骨尖上是穴隨患邊灸七壯或二七壯神效

得效

○又法於

掌後手腕盡處橫紋量起向臂中心直上三十半

是穴灸三壯

卽效丹心

○祕法肩尖肘尖二穴卽

肩髃肘髎二穴宜灸此穴疎通經絡

良方

瘰核上每灸七壯隔蒜片灸之尤妙

資生

結核

獨形而小核者爲結核

綱目

○結核者火氣熱甚

則鬱結堅硬如果中核也不須潰破但熱氣散則

自消

河間○結核在一身如腫毒者在皮裏膜外

多是溼痰流注作核不散問其平日好食何物此

下後用藥散核

丹心

○痰癰推動滑軟

入門

○結

核在頸項二陳湯

方見瘧門

加酒炒大黃桔梗柴

胡連翹煎服。結核在臂二陳湯加連翹防風川

芎酒芩蒼朮皂角刺白僵蠶煎水入麝香少許服

東醫寶鑑卷之三

行太陰厥陰之積痰則自消

丹心

○遍身有核多

是痰注宜加味小膏丹竹瀝達痰丸

三方見痰門

通用海帶丸含化丹入門○結核宜用消風化
痰湯開氣消痰湯內托白蘚散消解散消核丸

海帶丸

治痰核癰氣久不消海帶青皮目母陳皮各等分右爲末蜜丸彈子大食後噙化一丸

含化丹

治耳項結核酒蒸大黃白殭蠶青黛牛膽南星各等分右爲末蜜丸彈子大食後噙化一丸

丸入門

消風化痰湯

治結核因風痰鬱結白附子木通各一錢南星半夏赤芍藥連翹天麻白殭蠶

蒼耳子金銀花大門冬桔梗各七分白芷防風羌活皂角各五分全蝎陳皮各四分甘艸三分右剉作一貼薑五片

水煎服

同春

開氣消痰湯

治胷中胃脘至咽門窄狹如線疼痛及手足俱有核如胡桃者桔梗便香附白

殭蠶各一錢陳皮片芩枳殼各七分檳榔前胡半
夏枳實羌活荆芥射干威靈仙各五分甘艸四分
木香三分右剉作一貼
入薑三片水煎服

醫鑑

內托白蘞散

治腋下痰核因酒怒氣發腫痛潰膿久不差赤芍藥當歸連翹各一錢白芷白

薺片芩酒炒瓜蔞仁各八分川芎天花粉乳香各七分防風桔梗柴胡各五分白蒺藜生甘艸各四

分右剉作一貼

水煎服

回春

消解散

治咽喉結核腫痛頸項不得回轉兩腋下或有塊如石硬南星半夏各一錢陳皮枳實桔

梗柴胡前胡黃連連翹赤芍藥防風獨活白附子蘇子蓬萊蔓荊子木通甘艸各五分右剉作一貼

薑三片燈心一

同煎服

回春

消核丸

治頸項耳後結核三五歲成簇不紅不腫不作膿者橘紅鹽水拌焙赤茯苓大黃酒煨連

翹各一兩片芩酒炒梔子炒各八錢半夏麌玄參酒拌牡蠣殼童便淬另研天花粉瓜蔞仁桔梗各七錢白僵蠶炒六錢生甘艸節四錢右爲末湯浸蒸餅和丸菉豆大白湯下八九十九回春

又方

治項後少陽經中疮瘡結核或赤硬腫痛生山藥一塊去皮薜麻子三箇去皮右研勺攤貼如神海藏○治墮上塊動夏枯艸末六錢甘艸末一

錢右和勺每服一錢至二錢茶清調下丹心○又

種杏○又方南星艸烏等分爲末薑汁調塗立消方治痰核疮瘡商陸根生南星合搗爛塗之立消

回春

○又大蜘蛛研爛好酒

浸去滓臨臥溫服甚效

細目

癰瘤

人身氣血凝滯結爲癰瘤癰則憂恚所生多著於肩項瘤則隨氣凝結此等皆年數深遠浸大浸長堅硬不可移者名曰石癰肉色不變名曰肉癰筋脈露結名曰筋癰赤脉交結名曰血癰隨憂愁消長名曰氣癰五癰皆不可決破決破則膿血崩潰多致夭枉三四○癰亦氣血凝滯結聚而成初作

梅李皮嫩而光潔如盃卵瘤名有六骨瘤肉瘤膿
癰血瘤石瘤脂瘤亦不可決潰肉瘤尤不可破破
則殺人惟脂瘤決去其脂則愈三因。○癰瘤總皆
氣血凝滯結成惟憂恚耗傷心肺故癰多著頸項
及肩也勞惱邪氣乘經之虛而住故瘤隨處有之
大門○通治癰疽蠟礬丸久服則自然消縮最妙
方見二癰疽○直指○五癰六瘤或軟或硬無痛無
痒宜破結散人參化癰丹海帶丸方見上舐掌散
神效開結散治脂瘤方枯瘤方化瘤膏南星膏諸
方○服治癰瘤藥先須斷厚味丹心○凡癰瘤疣
贅等至年衰皆自內潰理於年壯可無後憂也精
義○癰瘤初起通用十六味流氣飲方見癰疽
單

蜘蛛方久服蠟礬丸，
外付南星膏入門
治五癰及瘤卽上海藻散堅丸也濟生○有
人生癰大如茄子熟形瘦百治不效得此
方去松蘿代真桑寄生一倍服

三五日其癰自消散而愈正傳
破結散

人參化癰丹

治癰瘤海帶海藻蛤粉昆布上四味皆
焙澤瀉炒連翹各一兩猪麝羊麝羊外節猪

腎乃之卵也

囊中

各十枚切片

焙乾右爲末蜜丸芡實大

細目

○癰瘤多用昆布海藻

食後噙化一丸日三

○綱目

○目

海帶鹹能軟堅

之藥治之

醫鑑

舐掌散

治癰海藻黃連各一兩右爲末取少許置掌中時時舐之津液嚥下如消三分之二止藥

正傳

○一方

海藻海帶昆布蓬朮青鹽等

分爲末蜜丸彈子大噙化嚥下日三

丹心

神效開結散

治癰瘤皆效沈香二錢木香二錢陳皮四錢真珠四十九粒火煅猪厭肉子

項下

喉嚨

龍系

一枚

如

四十九箇瓦上

焙乾

右爲末

生

猪

頭

每二錢臥時冷酒調和徐徐嚥下輕者三五服效

重者一料

全愈入門

治脂瘤方

一種脂瘤粉紅色全是痰結用鍼決去脂粉則愈或有如茄垂下根甚小者用藥點

其蒂挾茄落卽用生肌膏貼之防其出血

入門

枯癌方

砒礮硝砂黃丹雄黃輕粉各一錢斑貓生三

十箇朱砂乳香沒藥各一錢右爲末糯米粥
和丸捏作碩子樣暴乾先灸三壯於癌頂以藥餅
蓋上以黃柏末水調貼之數日自然枯落細目

化瘤膏

治肉中腫起生瘡漸大白芨一兩大黃川芎
赤芍藥黃芩黃連當歸白朮各五錢吳茱萸

二錢半右爲末雞子黃

調勺攤帛貼之

類聚

南星膏

治癰瘤生天南星大者一箇細研滴醋三五
點爲膏先將鍼刺瘤上卻以藥攤紙上貼之

頻貼取效如無生者乾者爲末醋調用之得效

○又方南星艸烏爲末薑汁調付之亦佳

醫鑑

又方

治氣癰鍼砂浸水缸中平日飲食皆用此水十
日一換鍼砂服半年自消直指

○海藻昆布等分爲末蜜丸常含化嚥汁
療癰瘤結氣海藻一斤洗去鹹酒三升漬數日稍
稍飲之。海藻昆布等分爲末蜜丸常含化嚥汁

本艸。

夏枯艸散癰結氣水煎頻服卽愈。本艸。

松蘿治癰瘤水煮服之。

本艸。

○治癰瘤大蜘蛛一

箇橘酒頓服入門。

○羊蜃鹿蜃

酒漬灸含嚥汁七日差。

本艸。

灸法

治癰灸天突三七壯又灸肩髃男左十八壯右十七壯女右十八壯左十七壯妙得效。

瘡瘻

漏者諸瘻之潰漏也狼瘻鼠瘻蠍瘻蜂瘻批瘻瘻蟻瘻浮疽瘻瘰疬瘻轉筋瘻是爲九瘻其證

穿孔一深膿汁不盡風冷併入涓涓而成漏矣直

指○漏喜發於項腋及陰僻肛門之間療治失節

卽生寒熱凡癰疽諸發苟有宿膿朽骨停蓄其間

皆爲之漏直

指○內經曰陷脈爲瘻雷連肉腠者

是也可用附子灸法蒜餅灸法

方見鍼灸

灸之

瘡口

維翠霞散或翠霞錠子維之外貼膏藥

精義

○治法溫散風冷爲急宜溫解散內塞散○收水

火之宜牽牛酒○生肌又火之宜龍骨牡蠣人齒

大牙加血竭乳麋髮灰內外相維生肌必矣或平

肌散

方見癰疽

人牙散蜂房散選用○通治宜加

味蠟礬丸內生肌丸乳麝雲母膏溫經丸。外治
宜祓瘡散雄黃膏黑靈散。熏方洗方取久漏中
朽骨方治心漏方

取漏蟲法禁忌法

溫解散

治漏瘡散風冷蒼朮厚朴陳皮藿香半夏薌
川芎白芷細辛各一錢官桂白薑甘艸炙各

七分右剉作一貼入薑

三聚二水煎服

得效

內塞散

治疳瘡久不差人參黃芪當歸白茯苓防
風白芷桔梗川芎遠志厚朴官桂赤小豆甘

艸炙各五錢附子炮一箇右爲

末每取二錢溫酒調下

精義

牽牛酒

引漏瘡中惡水自大腸出黑牽牛頭末二錢
入猪腰子內以線扎紺溼紙包慢火煖熟空

心細嚼溫酒送下入門。一名猪腎酒夫水屬腎
也腎虛水溢則滲濾於漏瘡行腎之水無如黑牽
牛取細末入猪腎服之則健腎人腎兩
得其便惡水既泄則不復淋漓矣

直指

人牙散

治漏瘡惡瘡能生肌人牙煅油髮灰雄雞內
金各等分右爲末入麝香輕粉各少許和勻
溼則乾乾則油調付之

直指

○一名齒髮散

入門

蜂房散

治久年漏瘡露蜂房炙黃七錢半穿山甲焦
龍骨各二錢半麝香少許右爲末臘猪脂調

付之

入門

加味蠟礬丸

治久新諸漏象牙五錢露蜂房白殭蠶
蛇退燒血竭木香各三錢乳香二錢白
礬二兩右爲末黃蠟四兩熔化和勻衆

手作丸

梧子大溫酒下三十九

入門

內生肌丸

治漏瘡枯白礬鹿角屑脂麻各一兩爲末
蜜丸梧子大溫酒下三十九竅塞後去鹿

角加象牙一兩黃蠟

和丸常服

斷根入門

乳麝雲母膏

治漏瘡穿山甲一百斤蚌粉同炒候焦
起泡去粉取甲爲末四兩入乳香末一

錢麝香末半錢夾和雲母膏十五貼

和丸梧子大溫酒下三十九直指

溫經丸

治陷脈久瘦附子二兩醋浸炮七次去皮臍厚朴官桂白朮乾薑木香甘艸炙各一兩右

爲末蜜丸梧子大米

飲下三五十丸

精義

截疳散

治年深疳瘻瘍白斂白芨黃丹蜜陀僧各二錢黃連一錢龍腦麝香輕粉各二分右爲末

乾膠或紙

之東垣

雄黃膏

治久年冷癰油髮灰黃蠟各五錢雄黃末硫黃末各二錢半香油二兩右和勻熔化候成

膏貼之

直指

黑靈散

通治漏癰露蜂房五錢牡蠣粉黃丹硫黃研各一錢半右同炒烟盡爲末入油髮灰二錢

半麝香少許右

和勻膠付直指

翠霞散

治漏瘡惡瘡去毒生肌滑石五錢銅綠二錢半輕粉一錢龍腦麝香粉霜各二分半右爲

末蘸紙瘡口上

以膏貼之 精義

翠霞錠子

治久冷漏瘡內有死肉銅綠寒水石煅滑石各三錢白礬輕粉砒礦雲母石各一錢

一分半右極細末合糊爲錠子如麻黃

麤細量瘡深淺紙之上貼膏藥 精義

熏漏瘡方

艾葉五倍子白膠香苦棟根右等分剉如燒香法置長桶內坐其上熏之 入門

洗漏瘡方

凡漏瘡孔中多有穢惡常須避風洗淨自芷露蜂房或大腹皮苦參煎湯熏洗拭乾

取東向石榴根皮爲末乾糲以殺淫 蟲入門○凡諸瘡切忌生水洗 得效

取久漏中朽骨方

久疽及痔漏中有朽骨宜取去之 烏骨雞脰骨砒礦實之鹽泥固濟

火煅通紅取出去泥研爲末飯丸粟米大以紙撫送入竅內外用膏藥封之其骨自出

丹心

治心漏方

胷前有孔常出血水謂之心漏此病醫書少載人多不知鹿茸酥炙附子炮鹽花各

等分右爲末棗肉和丸梧子

大空心溫酒下三十九丹

取漏蟲法

取活鱠魚數條令盤屈以竹簽串定香油塗上下覆瘡上以布巾繫定良久覺痒痛

不可忍取鱠入水中有蟲如線出焉未盡再覆蟲盡後以艾湯入白礬洗淨黃連檳榔末繆付治瘻瘡亦妙

入門

禁忌法

凡漏切忌七情房勞尤戒怒氣不然則核則大漏則水多直指

單方

凡八種有其一者皆可治漏

烏金散

橡斗子

治漏瘡瘻取十二箇一實黃丹一實白礬兩藥相合定麻皮纏了燒存性研細入麝

香少許洗淨繆之

名曰烏金散

濟生

躄螬蟲

已下至蛇膽治皆同上剪去兩頭安瘡口上以艾炷灸之七壯一易不過七枚無不效

東垣

鰻鼠

燒取膏塗之

鰻鱺魚

取膏塗之并食其肉甚效

鯉魚腸

火炙封瘡口半日許覺痒開看蟲出差

松脂

煉填瘡口令滿日三易卽效

蝮蛇膽

取汁塗之

熟犬肉

肛漏多孔蘸藍汁食之七日差得效

灸法

入漏瘡足內踝上一寸灸三壯在上則灸肩井鳩尾東垣○冷漏多在腿足之間先雖積熱所注久

則爲寒宜用附子灸法硫黃灸法一法並見久瘡成漏膿水不絕者亦宜灸

丹心

疥癬

疥瘡有五
一曰乾疥皮枯屑起宜吳茱萸散。二

疥細如砂子或痛或痒宜剪艸散。三曰砂

不知痛易於傳染宜硫黃餅。五曰膿疥含漿稠

膿色厚焮痛宜三黃散。六曰蟲疥痒亦有五一

日溼疥狀如蟲行搔之汁出。二曰頑疥全然不知痛痒

○三曰風疥又名乾疥搔生白屑。四曰馬疥微

痒白點相連。五曰牛疥如牛領皮厚且堅。六

疥深沈者爲疥疥多挾熱疥多挾溼疥狀如被介甲

疥狀如走苔蘚大槩相同。入門○治疥宜升麻和

氣飲一掃散神異膏如聖散油調立效散。○治疥

宜麻豆膏蝎猫膏胡粉散連粉散。通治疥癬宜

一上散祕傳一擦光當歸飲子何首烏散無薦散

浮萍散諸方○凡疥痛甚加寒水石痒加黑狗脊

微痒加蛇床子有蟲加雄黃喜溫熱加硫黃丹心

吳茱萸散

治乾疥及春月發者以此開鬱蛇床子三錢寒水石二錢半白礬吳茱萸各二錢黃

柏大黃硫黃輕粉各一錢樟腦半錢

檳榔一箇右爲末香油調付入門

一上散

治疥癬痛痒蛇床子炒黑狗脊

卽貫眾

白膠

三錢半硫黃吳茱萸各三錢斑貓十四箇去翅足

右爲末臘猪脂或香油調先以蒼耳煎湯洗去痂
後掌中擦藥令熟鼻中嗅二三

次卻擦瘡上一擦卽愈

丹心

剪艸散

治砂疥蛇床子三錢寒水石蕪荑各二錢剪
刀艸桔白礬吳茱萸黃柏各一錢蒼朮厚朴

雄黃各五分輕粉一錢

右爲末香油調付入門

硫黃餅

治蟲疥及喜湯火灸熨者礬製硫黃一兩爲
末用水調成餅貼磁碗底覆轉用熟艾一兩

川椒三錢爲末火燃熏乾硫黃臨用先以藥

湯水洗拭後用麻油調硫黃末擦之

入門

三黃散

治膿疮疥瘡治熱爲主黃芩黃連大黃各三
錢蛇床子寒水石各二錢白礬一錢黃丹五

分輕粉無名異白芷木香各

二分右爲末香油調付

入門

升麻和氣飲

治疥瘡痛痒乾葛二錢陳皮甘艸各一錢半升麻蒼朮桔梗各一錢赤芍藥七

分半大黃五分半夏當歸茯苓白芷各三分乾薑枳殼各二分右剉作一貼入薑五片燈心十五莖

水煎服

入門

一掃散

治一切瘡疥藜蘆皮三錢蚌粉鉛粉各一錢半雄黃七分輕粉一錢右爲末用大鯽魚

一箇入香油煎候熟去

魚攤冷調藥擦瘡

得效

神異膏

治同上全蝎七箇皂角二錢巴豆去皮七箇蛇床子末三錢雄黃另研三錢輕粉一字清

油一兩黃蠟半兩右先用全蝎皂角巴豆入油煎變色去三味入蠟熔化放冷入雄黃蛇床輕粉和

勺成膏先以藥水洗瘡拭乾

後乃上藥擦之神效

得效

如聖散

治肺藏風變生瘡疥浸展胡粉一兩黃連七錢半蛇床子五錢水銀二錢半右爲末生麻

油調塗

局方

油調立效散

治溼疥浸淫久不差輕粉綠礬黃柏硫黃各等分右爲末生麻油調洗瘡後塗

擦局方

麻豆膏

通治諸癬麻油二兩入巴豆肉萆麻子肉各十四粒斑貓毛粒熬煎至枯黑色去滓卻入

白蠟

五錢蘆薈末三錢攪勻成膏塗擦之入門

遍身生癬獨莖羊蹄根另擣自礬末以米醋調成

膏塗擦之加輕粉

黃丹尤妙

丹心

蝎猫膏

治牛皮癬全蝎斑貓各十枚巴豆肉二十枚香油一兩右同熬候色焦者先去之二盡三

物了乃入黃蠟一錢候熔收貯朝擦暮愈不損皮

肉綱目

○一方治遍身牛皮癬川烏艸烏何首烏

白芷蘇木各等分右麪剉入臘猪脂同熬至白芷
焦色去滓候冷入鹽少許常桃一匙空心酒調下
得效

胡粉散

治癬神效胡粉硫黃雄黃各二錢半砒礦二
錢二分半大艸烏生一箇斑貓一箇蝎梢七

枚麝香少許

右爲末先以羊蹄根蘸

醋擦

動患處次用藥少許擦之

得效

連粉散

治風癬溼瘡黃連胡粉黃柏黃丹枯白礬各
五錢輕粉龍骨爐甘石各五分右爲末乾糲

塗丹心

或油調

祕傳一擦光

治疥癬及諸般惡瘡神效白礬枯六錢蛇床子
苦參蕪荑各五錢雄黃硫黃川

椒大風子肉各一錢半輕粉樟腦

各一錢右爲末生豬脂調付

正傳

當歸飲子

治遍身疥癬腫痒流膿當歸赤芍藥川芎
生地黃防風荊芥白蒺藜各一錢二分酒

眞醫寶鑑卷之二

何首烏黃芪甘艸各七分右剉作

一貼入薑三片水煎服入門

何首烏散

治遍身疥癬瘡痏

荊芥穗威靈仙蔓荊子
蚯蚓蟷卽蕷葵

何首烏防風甘艸各等分

右爲末每取二錢

溫酒調下丹心

蕪荑散

治疥無問新久亦治癬白蕪荑一兩檳榔吳茱萸各五錢硫黃二錢右爲末猪脂或香油

調擦之

本事

浮萍散

治諸疥癬及癩瘡浮萍四兩當歸川芎赤芍藥荆芥穗麻黃甘艸各二錢右剉分作二貼

入葱白三莖豆豉六十

箇同煎服出汗

醫鑑

洗藥

治疥癬瘡痏生瘡細辛荆芥白芷川芎黃芩防風地骨皮甘艸各等分右剉末每取二兩水一

大碗煎十餘沸乘溫淋湯患處名曰八仙散

猶義本艸

○何首烏陳艾等分濃煎浸洗治遍身疥癬

冬瓜藤煎湯浸洗亦佳
本艸

○溫泉浴最妙
本艸

單方

凡十
二種

硫黃

生用治疥癬及惡瘡喚甚
臭不止可愈疥瘡
本艸

雄黃

治疥癬殺蟲爲
末付之
本艸

水銀滓

研臘猪脂擦疥
殺蟲立效得效
本艸

藜蘆

治疥癬作末生
麻油調塗
本艸

羊蹄根

治疥癬爛擣和
醋付之妙
本艸

槿樹皮

治頑癬加巴豆斑貓入砒
少許爲末水調付丹心
本艸

脂麻

生取油付疥癬及
惡瘡甚妙
本艸

久皮鞋底 牛皮癬燒灰入輕粉
少許油調付入明

田螺 煮熟取肉用酒醉炒熟
食除一生瘡疥 同春

臘豬脂 生礬杏仁加輕粉少許
擣擦治疥癬妙 細目

鵝鴨 治久患瘡疥食
之甚良 本艸

蛇床子 治遍身疥癬硫黃白礬各二錢水銀
淬三錢右爲末薑汁調擦立效 同春

鍼灸法

治瘡疥頑癬取絕骨三里間使解谿委中或鍼
或灸綱目○手疥取勞宮 炙天陵 綱目○渾身

瘡疥取曲池合谷三里絕骨行間委中 綱目○治

癬八月八日出時令患人正當東向戶長跪舉
兩手荷戶兩邊取肩頭小垂際骨解宛宛中左右

兩火俱下灸七壯七日愈 資生 ○一女子兩股間
溼癬下至膝痒痛流黃水百藥不效戴人以鍼當
痒時刺百餘處血出盡煎鹽湯洗之四天方除蓋

溼淫於血不可

不鍼也

子和

癩頭瘡

頭上生瘡如癩防風通聖散

方見風門

爲末酒

洗一上散

方見上

付之久不愈者神效

丹心

○鹽湯溫

瘡宜服酒歸飲外用雄黃水銀等分爲末臘猪脂

半生半熟調付之溼爛者燕窠土

黃柏爲末乾糲

○頭面瘡蜜陀

大門僧硫黃各二錢輕粉少許右爲末

○又方臘月馬脂油塗擦極妙

丹心

○又方松皮灰五錢黃丹白膠香各二錢半枯白礬大黃黃柏

各一錢三分右爲末熱油調付

丹心

○小兒癩頭瘡松脂一兩懸龍尾黃丹各二錢白芷五錢松樹

皮木銀雄黃白礬各二錢右爲末另用香油入亂

髮煎爛調勺付之

丹心

○又方爛木耳爲末蜜調付

○又炭燒紅淬長流水令熱洗之

○又胡荽子

伏龍肝懸龍尾黃連白礬爲末油調付連床散如

聖黑膏亦佳

丹心

○又兔絲子或蒺藜子煎湯洗

酒歸飲

治頭瘡酒當歸白朮各一錢半酒芩芍藥川芎陳皮各一錢酒天麻蒼朮蒼耳各七分

半酒黃柏酒甘艸各四分防風三分右剉
作一貼水煎日三服服後穩睡片時入門

神應膏

治白禿頭瘡羊糞燒存性爲末用雁油調塗一二次卽愈

醫鑑

連床散

治小兒癩頭瘡及身上諸瘡黃連五錢蛇床子五倍子各二錢半輕粉少許右爲末荆芥

湯洗後油

調付

丹心

如聖黑膏

治小兒白禿頭瘡豆豉半升艸龍膽蕪荑各二錢半右燒存性爲末香油半斤熬至

四兩下藥調勺

付之神效得效

人面瘡

多生膝上亦有臂上生者古書云冤業所生須清心悔過內服十六味流氣飲方見癰疽久者

大苦參丸 腎氣丸 方見虛勞 外用貝母爲末付之

方見虛勞

外用貝母爲末付之

著癰而愈 入門 ○人身有瘡如人面面目口鼻皆

具昔有一人左膊上生瘡以物食之皆能食灌以

酒則面亦赤色醫者教以歷試諸藥皆無苦至貝

母其瘡乃聚眉閉口其人喜曰可治卽取貝

大苦參丸

治人面瘡及臉瘡苦參二兩防風荆芥白芷川烏生芍藥何首烏川芎獨活梔子

皂角蔓荊子赤茯苓山藥白蒺藜黃芩羌活白附子各五錢艸烏炮一錢半右爲末水煮麪糊和丸梧子大每服五七十丸空心

酒下不飲酒以茶代

入門

陰蝕瘡

夫陰瘡大槩有三等一曰溼陰瘡二曰妒精瘡三曰陰蝕瘡亦曰下疳瘡也○溼陰瘡者由腎

虛風溼邪氣乘之瘡痒成瘡浸淫汁出狀如疥癬○妒精瘡者由壯年久曠房室思色動慾以致敗精流入莖內陰上生瘡赤腫潰爛作臼痛痒妨悶○陰蝕瘡者由熱結下焦經絡灑滯或婦人子宮

有敗精停畱或月水未斷與之交合房勞後又不洗浴邪穢留滯遂令陰莖連睾丸腫痛小便如淋經久潰爛侵蝕肌肉膿血不止遂成下疳瘡久不愈則必成楊梅瘡宜服仙遺糧湯方見上預防之寒熱尿澀宜八正散方見小便溼熱甚則腫痛尿澀莖中痒痛或出自白津宜龍膽瀉肝湯方見附陰腫潰後八物湯方見虛勞加柴胡梔子知母久服入門○下疳瘡日久不愈或成便毒或損爛陽物多致危篤俗云疳瘡未已便毒復來生也醫鑑○瘡一生則便毒厲風瘡次第而來先宜升麻葛根湯方見寒門發出繼服涼血解毒丸卽愈不必服輕粉毒藥醫鑑○妊娠瘡初發在陰頭如粟拂之卽痛甚出清膜作曰孔蝕之大痛婦人有生於玉門內正似疳蝕瘡但不痛爲異醫鑑○治法以大豆甘艸湯潰之洗毒散煎湯浴之磨風膏溫潤之

散涼血解毒丸四春○通用消疳敗毒

涼血解毒丸

治下疳瘡苦參四兩黃連二兩連翹一

白芷各一兩防風石膏各五錢右爲末荆芥煎

湯打糊和丸梧子大空心溫水下百丸回春

消疳敗毒散

專治下疳瘡柴胡一錢半黃柏赤芍藥

黃連蒼朮知母各七分防風獨活各六分甘

艸三分右剉作一貼燈心一團水煎服

回春

洗瘡藥

凡下部諸瘡常須藥湯淋洗以去膿汁惡水

宜洗疳瘡大豆甘艸湯洗毒散洗下疳方諸方

洗疳湯

治下疳瘡川練子黃連瓦松川椒葱根艾

醫鑑

大豆甘艸湯

治陰蝕下疳瘡甘艸一兩赤皮葱三莖

黑豆一合槐條一握右濃煎取清候溫

浸浴日

二精義

洗毒散

治陰蝕瘡及諸般惡瘡蛇床子地骨皮大薊

麻黃荊芥防風桔白礬各三錢葱白三莖煎

湯溫洗

丹心

洗下疳瘡方

黃柏 黃連 當歸 白芷 獨活 防風 朴硝 蒜
芥各三錢入銅錢五十文烏梅五箇鹽

一匙同煎取湯日洗四

五次乃付膠藥

入門

膠付藥

藥水淋洗後乃用膠付之藥宜柏蛤散津調散
鳳衣散旱螺散截疳散 方見上珍珠散磨風膏

或膠或

付諸方

柏蛤散

治下疳溼瘡黃柏以磁鋒刮取末蛤粉右末
等分膠上卽愈蓋黃柏去熟蛤粉燥溼也

津調散

治疳瘡黃連欵冬花等分右爲末先以地
骨皮蛇床子煎水洗拭乾乃津調付

入門

鳳衣散

治下疳瘡鳳凰衣煅卽雞抱卵殼黃丹各一
錢輕粉片腦各少許右爲末乾膠或鴨子清

調付

入門

旱螺散

治同上白田螺殼煅入腦麝輕粉各少許右
久殼爲
爲末香油調搽入門。治如精瘡溪港中陳

妙得效

珍珠散

治下疳瘡黃連黃柏乳香沒藥孩兒茶輕粉
鉛粉五倍子炒眞珠象牙各等分爲末以米

泔洗後繆

上醫鑑

磨風膏

治陰蝕瘡蛇床子五錢大風子十四箇杏仁
二十箇桔白礬樟腦各二錢川椒輕粉水銀

各三錢雄黃一錢半銀硃一錢右爲末生麻
油和丸彈子大每用少許呵洋遍擦之

入門

一方

治下疳瘡并玉莖蝕了盡用此藥也長出來如
初尺小元晝耳黑鉛五錢化開投汞二錢半研

不見星入寒冰石三錢半輕粉二錢半鵝砂一錢
右爲極細末先以葱艾梗煎水洗患處乾繆之亦

治舌被人咬斷

有效如神

回春

又方

治年少陽道興強當泄不泄不泄強泄脹斷嫩皮初如鍼眼畏疼不敢泄刮日久連莖潰爛痛

楚日甚用荊芥黃柏甘艸生葱地骨皮煎水洗去膿靨以詞子燒灰入麝香少許乾繆患處仍斷房事臨睡喫冷水勿令陽道興起

又方

莖頭三五孔小漏瘡出血微膿油髮灰津唾調付仍米飲調服一錢甚妙血指

○外腎疳瘡雞

卵殼黃連輕粉爲末

香油調塗得效

○妒精瘡陰

蝕瘡油

髮青黛麝香少許右爲末或繆或津唾調

付精義

○陰莖上生瘡取月經布燒灰蜜調塗卽

愈入門

○下疳瘡蠅牛焙乾枯自礬爲末溼則乾

繆或油調

付回春

不治證

下疳瘡重者心中疔痛悶絕虛煩甚者不治入門

臙瘡

生於兩腳腫爛臭穢步履艱辛此瘡生於臙脣爲重以其骨上肉少皮薄故難愈治法當先取蟲然

後外貼膏藥內服蠟礬丸方見癰疽之類須翹足

端坐勿多行履庶可全愈

醫鑑

○

○ 腻瘡生兩膝上

初起焮腫作痛三陰虛也宜八物湯

方見虛勞

患處黑黯惡寒少食屬肝腎虛宜八味丸

方見虛勞

勞久不愈者大苦參丸

方見上入門

○ 外膿瘡

先以葱湯洗次貼龍骨膏或馬齒膏溼熱者窖土

膏

○ 內膿瘡先以鹽湯洗次貼蠟礬紙

○ 內外通

用爐灰膏

方見雜方入門

點去瘀肉後貼黃蠟膏

入門

○ 腺瘡及腳膝生瘡局方虛損門黃芪丸

方見虛勞入門

○ 服之卽愈

海藏

○ 內外膿瘡宜朴麝散神捷膏

○ 馬齒膏翠玉膏白膠香散貼藥

三方鍼法洗法取蟲法

諸方

龍骨膏

治外膿瘡龍骨乳香沒藥蜜陀僧各二錢海

螺蛸一錢半皂角子五箇燒存性右爲末用

綿紙兩重以鍼焯亂孔香油調藥

夾內縛貼瘡上隔日翻貼之

入門

馬齒膏

治膿瘡馬齒莧煎取汁一釜入

入門

黃臘五兩再熬成膏塗之

東醫寶鑑卷之二十一
十一
窑土膏

治外臙瘡久年。窑龕土或龕心黃土黃柏赤石脂黃丹各五錢輕粉乳香沒藥各一錢右

爲末。香油調成膏。先以茶清洗後。油紙攤藥貼之。以巾縛定。縱痒不可忍。直待結痂去之。未愈再貼入門。

○竈心土以燥溼清熱黃柏之辛以散火邪乳香沒藥以散瘀血可謂十全矣

丹心

蠟礬紙

治內臙瘡神效。綿紙疊十二重。看瘡大小剪成方片。以紙燃針住。另用麻油二兩入川椒

四十九粒慢火熬黑。去渣入槐枝四十九寸煎枯黑去渣。入黃蠟一兩。枯蠟一錢。輕粉二分。瑛熔化卽入前紙令油滲透勿令焦黃。取起貼時先以藥水洗拭。用紙齊沓貼上。以巾緊縛。周時取下。近瘡紙一重。候紙取盡

則瘡全愈

入門

黃蠟膏

治内外臙瘡。香油一兩入油髮如梅大熬消化。入白膠杏三錢黃蠟一兩熔化入龍骨赤石脂血竭末各三錢攪勻。候冷盛磁器每用程仔

薄片貼瘡上。絹帛縛定。三日後翻過貼之

入門

仔

粉麝散

治外臙瘡臭爛數十年不愈生龜殼一箇醋一椀塗炙醋盡爲度火煅放冷右爲末入輕

粉麝香各一錢和勻先

以葱湯洗後塗上得效

神捷膏

治內外臙瘡久年不愈清油半斤先煎入黃蠟一兩松脂五錢熬至成珠候冷入乳香沒

藥輕粉血竭孩兒茶枯白礬龍骨煅各三錢川椒四錢右爲末攪勺收貯先以藥水洗淨用油紙以鍼刺孔攤藥貼瘡上一日換三次二日後

一日換一次每換藥必洗淨貼上

醫鑑

翠玉膏

治臙瘡瀝青四兩黃蠟銅綠各五錢沒藥三錢右將香油半斤同黃蠟瀝青於火上熔化

次下銅綠沒藥末旋旋攪勻成稠將藥液冷水中看瘡大小捻作餅子貼之以帛繫定三日一易目綱

白膠香散

治內外臙瘡白膠香赤石脂枯白礬各五錢黃丹乳香沒藥輕粉各二錢右爲末乾

參或油調

付入門

單方

凡六種

黃蠟

一兩猪膽一箇輕粉二錢右熔化
和勻攤油紙上貼之治廉瘡

丹心

白膠香

治同上黃柏軟石膏各一兩青黛五錢龍骨一錢右爲末香油調付

丹心

羯羊屎

治同上燒存性五錢石膏二錢半赤石脂一錢二分右爲末香油調付以巾包定除根

丹心

鹿角灰

冷廉瘡油髮灰乳香爲末清油調付得效

砂糖屑

廉瘡成臼久不乾津調塗
付日二次三日愈得效

紅絹

治同上蠶空蠶並燒灰胡粉各三分真珠煅二分枯礬髮灰白薺各一分右爲末黃蠟二兩熔化調勻貼之

神效回春

鍼法

廉瘡色紫黑先以三稜鍼刺去惡血冷水洗淨乃貼膏藥忌日光火氣陽氣如有黑腫未盡可再出

血以紫黑而

盡為度綱目

熏洗方

治臘瘡臭爛先以海桐皮石櫚皮煎湯洗後牛蒡子半兩研爲末燒熏之無海桐皮則地

骨皮代之得效○槐枝葱白川椒煎湯

或茶清淋洗罷乾後乃貼膏藥

得效

取蟲方

久臘瘡空取蟲生鱠魚數條以清油塗腹下置瘡上盤屈以帛繫定少頃覺痒不可忍然

後取視腹下有小虫皆蟲也未盡再付御用大人

脚脰骨燒灰油調付

得效○久臘瘡蟲魚腸以五

味火上炙貼蟲出卽去之本艸

腎臟風瘡

初起兩足時熱腳跟作痛多於內脰或臘上生瘡如癬漸大失治則延及腰股遍身者有

之以腎氣丸

方見虛勞

爲主佐以四生散

方見上

門黃芪丸

方見虛勞

外付白膠香散

方見上

四生散末每取二錢入猪腎內煨熟空心鹽湯嚼下

尤妙入門○血風瘡與腎臟風瘡相類乃三陰經

東醫寶鏡卷之四

風熱鬱火血燥所致瘙痒不常，服水淋漓，潮熱盜

汗症

方見足部

湯方見血門

加浮萍黃芩

或當歸芍藥

入門

○下症瘡亦與腎藏風瘡相類，生於腳脛或

打撲而成其瘡，狹皮內極開皮薄如竹膜，極痒

痛黃水淋漓，積年不愈，又染易他人患者，須忌房

室取韭菜地龍糞爲末，入輕粉清油調付，或自

犬血塗之，又付檳榔散

入門

○腎藏風瘡服活血

驅風散外用

雞心散

得效

大馬齒膏

治兩足血風瘡，馬齒莧焙乾五錢，黃丹黃柏

柏枝蓼兒茶各三錢，輕粉一錢，右爲末

桐油或麻油調勻，攤油紙上，先以

藥末淋洗，拭乾後乃貼之

入門

檳榔散

治足上生瘡，潰爛臭穢，全蝎七箇，斑蝥十四

慢火煎，先入蝎子，入檳榔一箇，香油一兩半，左

右

各二錢雄黃硫黃黃丹海螵蛸各一錢白膠香黃連杏仁輕粉各半錢右爲末入蠟油十調勻藥水洗瘡付之

立效得效

活血驅風散

治腎藏風瘡痒痛此由肝腎虛爲風溼所侵也蒼朮炒杜仲薑汁炒肉桂天麻

薏苡仁橘紅檳榔厚朴枳殼各六分當歸川芎白芷細辛白蒺藜炒桃仁白芍藥半夏五靈脂甘草

各五分右剉作一貼薑五片棗二枚

同煎入乳香未少許空心服得效

雞心散

治腎藏風發瘡疥雞心檳榔二箇破開以黃舟三錢合在內溼紙裹煅全蝎六箇硫黃四

錢入輕粉青黛各半錢麝香少許右和勻磁器收貯每用少許清油調抹兩掌掩外腎女掩兩乳各

睡至醉次日又

用之經驗得效

單方種

凡一

石榴根皮

腳肚上生瘡漸大爬搔不已痒不可忍者
取濃汁稍冷拂瘡上冷如冰雪卽成痂效得

浸淫瘡

初生甚小先痒後痛計出浸淫溼爛肌肉延至
遍身用苦棟根燒存性爲末猪脂調付溼則乾

參先用苦參大腹皮煎湯洗之入門○浸淫瘡從口流向四肢者可治從四肢流來入口者不可治

仲景○小兒浸淫瘡

宜用苦瓠散綱目

苦瓠散

苦瓠二兩蛇蛻燒灰蜂房微炒各五錢桑
上塵一合右爲末油調癩帛貼之綱目

單方種

凡五

胡麻

卒得浸淫瘡不早治周身
則殺人生爛嚼付之本艸

小薊

已下四種治皆同上
新水調付乾則易
本艸

秫米

蒸黃杵末水
調付之本艸

雞冠

熱血付
之本艸

燕窠土

水和付
之本艸

凍瘡

冬月凍傷成瘡流水俗呼爲凍瘡宜用生附散自
蘇散如神散臘享膏諸方○凍耳瘡爛骨母末或
參之入門○足凍爛生瘡黃丹猪脂調付引藥

足跟凍瘡潰破以葱椒煎湯洗利去腐肉鹹刺出

血馬勃末調牛骨髓付之綱目○凍瘡雄雞雞腦

一枚人黃蠟等分清油減半熬膏塗之六門○五

倍子煎湯洗後取兔腦

髓雀腦髓付之本艸

生附散

治凍瘡爛痛生附子爲
末麪水調付之綱目

白芨散

治凍耳成瘡黃柏白芨各五錢右
爲末鹽湯洗後油調付之得效

如神散

治凍瘡皮爛不可忍大黃細末
薪木調塗瘡上痛止立效

綱目

臘享膏

治凍瘡。猪脂、獺油各二兩半，香油二合半，海松子油一合，松脂黃蠟各三兩七錢半，右各

煉去滓和合成膏。先以

藥水洗後塗之。

俗方

湯火瘡

凡湯火燒傷初時強忍痛急向火炙強忍一時卽不痛慎勿以冷物搘之使熱毒不出免爛人

筋骨用寒木石三兩半黃柏黃連黃芩梔子大黃

赤石脂各五錢片腦少許右爲末鴨子清調付酒

調亦可入門。

諸方

○湯火瘡宜赤石脂散保生救苦散

黃柏散外霜散四黃散

諸方

○火燒以好酒洗之

以鹽付上。皮脫者酒熬牛皮膠付之。

丹心

○湯傷者以淋過第二次灰滓付之。

熟酒傷者糯米粉炒黑末酒調付之。

丹心

○湯火燒瘡天黃當歸油調付

丹心

赤石脂散

治湯火傷瘡。赤石脂寒水石大黃

各等分右爲末

新水調塗之。

丹心

保生救苦散

治湯火熱油所傷爛痛寒水石大黃

柏各等分右爲末

生麻油調塗或乾膠

各等分右爲末

或乾膠

黃柏散

治同上 雞子殼黃柏朴硝大黃寒水石各等分右爲末新水調塗之得效

冰霜散

治湯火熱油所傷皮爛內痛寒水石朴硝青黛牡蠣煅各五錢輕粉半錢右爲末新水或

油調塗

之丹心

單方

種凡八

四黃散

治同上 大黃黃芩黃連黃柏白芨各等分右爲末新水調塗之

丹心

黃蜀葵花

湯火瘡爲末油調付炒或滴水研爛付亦佳

正傳

桑葉

已下至生自繁治皆同上取經霜者焙爲末香油調付

正傳

側柏葉

擣爛如泥冷水調塗以帛繫定二三日愈

本艸

生梨

切片貼之不
爛止痛

生胡麻

爛擣如泥
付之本艸

生白礬

爲末香油
調塗醫鑑

白蜜

湯火傷及熱潰傷塗之竹半白
膜點之日一痛立止卽愈

醋泥

治同上付之無痕豆
醬汁付之妙

翻花瘡

翻出一肉突如菌或如蛇形長數寸

雄黃爲末

弊

付之內服十全大補湯或八物湯

三方並見虛

候

元氣漸復腫毒將盡時塗之則努肉自入否則

弊

入復出若誤用鍼力蝕炙必危慎之

入門

○甲

品錠子

專治翻花瘡入門○一名綿花瘡一名廣

東

瘡川芎天花粉各五錢輕粉二錢半朱砂雄黃

各

一錢二分半麝香五分右爲末蒸餅和丸其豆

大每服七丸至九

丸溫酒下正傳

中品錠子

專治翻花瘡及癰瘤。白礬三兩八錢半乳香沒藥各五錢半朱砂三錢牛黃七分牛

硝砂五分熟五分生研一兩半火煅黑烟止用淡青烟石爲末剉糊和勻捻作錠子量瘡揷入門

單方

種凡二

馬齒莧

治翻花瘡燒灰
猪脂調付本艸

柳枝葉

治同上濃煎作膏塗之本艸

漆瘡

人有惡漆者因見漆中毒生瘡面痒而腫遍身煩痛生蟹取黃塗之得效○石蟹取汁頻塗之本艸

○臘茶末油調付柳枝葉煎湯洗入門○芭硝湯浸冷洗之千金○鐵漿頻洗卽差本艸○井中苔擣付之本艸○川椒煎湯洗之卽愈本艸○生薑真汁付之亦可丹心○雞子黃塗之本艸○韭葉

研付之。本艸。○紫蘇

葉擣爛擦之。綱目

軟癤

痙小癤也。世謂之熱癤。大如酸棗或如豆色赤而內有膿血也。綱目。

○宜用猪頭散三物散大黃膏。○雞抱卵殼燒灰入輕粉少許油調付之。得效。

大枳殼一枚去瓢磨令平以稠粥糊塗四脣覆貼癤上。自破膿。

出甚妙

得效

猪頭散

治軟癤愈而復作野蜂房二三箇燒爲末另用巴豆肉三七粒清油煎三沸去豆取油調

蜂房末付之立效。○又桔白礬末油調付亦效

此方療病有效人以猪頭爲謝故名之

得效

三物散

治鬚邊生軟癤名發鬚有數年不愈用此極妙。猪頸上毛猶頸上毛各燒存性各一撮風

屎一枚右爲末加輕粉

少許清油調付得效

大黃膏

治軟癤大黃黃柏當歸各等分右爲末以生地黃汁調塗之。俗方

有名無名諸惡瘡

蒲萄瘡天行斑瘡月蝕瘡內疳瘡病瘡走皮癰瘡白蛇纏瘡魚目瘡熱毒

瘡火斑瘡此皆有名瘡也。此外皆無名諸惡瘡也。又有洗瘡法殺蟲法生肌法諸瘡中風水作痛法

蒲萄瘡

瘡頭如蒲萄色四圍腫起先追膿盡次用冰梅卷之神愈

綱目

天行斑瘡

人身發天行斑瘡一身周匝如火瘡皆戴白漿不治則數日必死差後瘡瘢黯一歲

方滅此惡毒之氣所爲取好蜜煎升麻數數洗拭塗之
本艸。又煮葵菜葉以蒜鑿啖之數日即止

綱目

月蝕瘡

小兒多有之生耳後隨月盛衰胡粉炒黃柏白礬黃丹黃連輕粉各二錢乾胭脂一錢麝香少許右爲末香油調塗

入門

○又黃連枯礬末付之妙

本艸

內瘡瘍

生於口上脣初發如蓮花根蒂小而下垂乃

大治法以鉤刀決其根燒鐵烙以止其血矣

以雄黃輕粉粉霜白芷白薇爲末付之以槐枝作枕支其牙頰間毋使口合一兩時許瘡癥定合口

自便次日出膿

庄

肌散付之

入門

瘡瘍

生手足間相對如新茱萸痒痛拆裂有孔如蠦久不愈杏仁乳香各三錢硫黃輕粉各一錢半

右爲末麻油三錢入黃蠟五錢熔化

入前藥末攪煎成膏塗之

入門

走皮瘡瘍

生滿頰項發如豆梅蔓延兩耳流汁溼爛先用桑寄生

無則

桑耳代

之桑根皮各一

猩白芷黃連各少許煎湯洗之候血盡次用皂莢

竹筍皮燒存性黃柏白芷藍葉等分爲末清油調

塗神效

入門

○手瘡瘍皂角枯礬輕粉黃柏黃連

爲末敷之

入門

○小兒胎瘡頭生紅餅瘡先以艾

葉白芷大腹皮蔥白

煎湯洗後

生藍葉生艾葉入蜜

搏付

入門

蛇纏瘡

身上生瘡有頭尾儼似蛇形初起宜隔蒜於

頭上灸之雄黃爲末醋調付之又酒調服之

方見癰疽○遍身生瘡狀如蛇頭取蠟礬丸入門

魚目瘡

遍身生瘡如魚目無膿又名征虜瘡升麻剉水濃煎入蜜二三匙鴉翎蘸拭洗瘡得效

熱毒瘡

遍身生熱毒瘡痛而不痒粘著衣被夜不得睡菖蒲作末厚布席上恣臥其間不五七日

其瘡如失應手神驗本艸○

宜用紫艸膏葵花散諸方

火斑瘡

人常近火則多生火斑瘡出汁痛痒黃柏薄荷葉爲未參之卽安或煎湯洗亦佳得效

諸般惡瘡

諸般遍身瘡及惡瘡出膿血痛痒宜涼血飲又平血飲合人參敗毒散

方見寒門連

翹飲疎風解毒散合掌散松脂貼散二黃膏貝母膏金華散爐灰膏青金錠子一掃光生肌散黃蠍膏洗藥方殺蟲方生肌方

諸瘡中風水方單方諸方

東醫金匱 卷之三
紫艸膏

治熱毒瘡紫艸茸黃柏黃連漏蘆各五錢赤小豆末菜豆粉各一合右爲末猪脂或清油

調日三

勺直指

葵花散

治一切熱瘡鬱金黃連黃柏梔子葵花各等分右爲末冷水調膏貼之神效得效

涼血飲

治血熱生瘡赤芍藥黃芩川芎荆芥生芍麥門冬天花粉甘艸各一錢右剉作一貼入燈

心十莖竹葉十

片煎服

得效

平血飲

治諸瘡遍身出膿血痛痒卽升麻葛根湯方見寒門加天麻蟬殼也右剉與人參敗毒散

合和加生薑薄荷生地

黃麥門冬煎服

得效

連翹飲

治惡瘡遍身痛痒及血風瘡連翹赤芍藥當歸荊芥防風惡實川芎施子黃芩瞿麥木通

生龜池黃瓜蔓根麥門冬甘艸各七分右剉作一貼人燈心一塊水煎服得效

疎風解毒散

治遍身瘡痒痛自芷細辛蒺藜子炒麻黃檳榔當歸鬚生乾地黃川芎赤芍藥

獨活白牽牛微炒桑白皮炒蒼朮炒枳殼甘艸炙各七分右剉作一貼入黑豆七十粒紫蘇五葉生薑五片同煎服

直指

合掌散

治遍身生瘡百藥不效檳榔五箇爲末硫黃生研五錢輕粉半錢右爲末每一錢安手掌

內油調夜臥時塗外腎不得洗手但擦手令乾一二日卽愈

得效

松脂貼散

治一切惡瘡及無名瘡黃柏黃連松脂明者膩粉土蜂窠以泥做者甘艸各一錢右

爲末另取水銀一錢放在掌心以唾擦爲泥入磁器中和藥末及清油令如稀錫先以藥水洗瘡拭乾塗之卽愈治

尤妙得效

二黃膏

治一切惡瘡清油三兩煎巴豆肉二十粒微黑色去豆入黃蠟一兩熔化又入硫黃雄黃

東醫寶鏡卷之六

末各一錢和勻成膏以藥水洗

瘡後擦付二三次神效得效

貝母膏

治諸惡瘡貝母三錢牛牛夏生用南星生用五倍子白芷黃柏苦參各二錢半黃丹一錢

半雄黃一錢右爲末

水調付或乾糲姜直指

金華散

治一切溼熱惡瘡亦療小兒黃丹一兩黃柏黃連各五錢輕粉一錢右爲末藥水洗後繆

之貼之丹心

爐灰膏

治一切惡瘡除去瘀肉最妙方見雜方

青金錠子

治諸惡瘡膿出不快及多年瘡癰瘡白丁香銅綠硼砂粉霜輕粉各五分麝香龍腦

各一字右爲末糊和撚作錠子

維入瘡口中或糊付亦可精義

一掃光

治小兒頭瘡及多虱子癩痒成瘡膿水不止細茶水銀各一錢同研細牙皂川椒各二錢

右爲末油調

擦上同春

生肌散

治一切瘡斂口大效寒水石煅滑石各一兩烏賊骨龍骨各五錢蜜陀僧枯白礬乾胭脂

定粉各二錢半右爲

末乾膠瘡中妙精義

黃蠟膏

治諸瘡能生肌香油黃蠟松脂各等分右熔化待凝貼之加油髮灰尤妙俗方

洗藥方

治諸般惡瘡黃柏茵陳荊芥葱白藿香煎水淋洗爲妙得效○洗諸般惡瘡毒艾葉細茶

蔥白桃枝柳枝川椒濃煎湯入鹽頻洗同春

殺蟲方

治惡瘡有蟲膿攀輕粉乳香各一錢硼砂雄黃土蜂房各二錢龍骨虎骨白礬露蜂房各

二錢半麝香五分片腦一字右爲末藥水洗後符之神效海藏○諸瘡殺蟲梔榔五錢黃連二錢半

穿山甲五片燒灰麝香一字右爲末茶清調塗得效○諸惡瘡有蟲須用斑貓藜蘆入門

生肌方

凡治惡瘡令生肌宜用生肌散翠霞散黃蠟膏三方見上。凡看瘡內肉黑色勿上生肌散

散宜用消蝕之藥直待黑肉去盡方可上生肌散入門。

○如開瘡口用生砒去死肉用煅砒生好肉

去砒加枯白藜

白藜入門

諸瘡中風水發腫痛

凡瘡癰未合風入爲破傷風溼入爲破傷風溼

慎之

三因

○諸瘡入阜角水及惡水熱痛不止皂角子燒存性研二錢半砂糖末五錢和勻如膏貼

瘡上

本艸

○諸瘡中風水疼腫鯉魚目燒灰研付

汁出

卽愈

諸魚目並得本艸

薺作餅

灰火煅熟斷開口封合瘡上冷則易出水

卽差本艸

○又方桑柴灰淋汁潰之冷復易本艸

本艸

○又方薤白擣爛火炙令熱付瘡上以帛裹

定冷則易出

本艸

○又方薤白擣

火炙令熱付瘡上以帛裹

單方

凡十
四種

生胡麻油

治惡瘡及諸瘡塗之。
妙生麻油亦可 本艸

馬齒莧

治同上 爛搗付上便愈 本艸○一婦人臍下連一陰患惡瘡熱痒而痛大小便澀出黃汁

百治不差 有人教先以溫水洗拭取馬齒莧四兩青黛一兩同研勺付瘡上乾則易新者仍服八正

散方見小便二

十日全愈 本艸

熊膽汁

治同上 塗之 妙

蟾蜍

燒灰油調付諸犬膽亦可 本艸

蛇蛻皮

久遠惡瘡不差燒灰猪脂調付 本艸

朝生暮落花

一名鬼葢 即朝菌也 生糞穢處如菌作末和油塗惡瘡甚佳牛糞上黑菌尤佳 本艸

蟻娘

一切惡瘡取十枚端午日收乾作末油調付本艸

臘豬脂

療惡瘡神雄黃輕粉付之妙正傳

鼴鼠膏

主惡瘡塗之妙本艸

芭蕉葉

治同上取經霜者爲末香油調付丹心

石灰

淋取汁溫洗惡瘡妙本艸

雄黃

治惡瘡爲功效同第一本艸

硫黃

功效同上本艸

貝母

諸惡瘡末入雄黃少許參之本艸

訂正東醫寶鑑雜病篇卷之八