

瘍科秘録

六之上

十武9

727

6



武  
727  
6

棗軒本間先生著

# 瘍科秘錄

自準亭藏



瘍科秘錄目錄

卷六

癰疽

疔瘡

痘疔

腦疽

流注

肺癰

腸癰

腋癰

瘍科秘錄

卷六 目次

自準亭藏

Table with multiple empty columns for text entry, likely a form for recording medical cases or prescriptions.



癩科秘錄卷之六

癩疽

水戸 本間玄調和卿著

癩疽ノ名ハ古ク孟子ニ出ツ歴史ニ亦多ク有リ醫籍  
 ニハ第一素問ニ載セテ癩腫ト連稱セリ靈樞ニ癩疽  
 篇アリテ初テ癩疽ヲニツニ別チ其證候ヲ辨ス病源  
 候論ニ至テ尤能癩疽ノ二候ヲ審ニス癩ハ六腑ノ氣  
 ノ壅リテ發シ疽ハ五臟ノ氣ノ壅リテ發スルト云フ  
 丁古今ノ通論ナレ氏靈樞ニ疽者上之皮矣以堅上如  
 牛領之皮癩者其皮上薄以澤ト云フ文ニテ癩疽ノ差

別ハ盡セリト云フヘシ癰疽ハ諸瘡瘍ノ巨魁ナレハ  
 癰疽ノ診法ヲ能ク會得スレハ諸瘡瘍ノ療治モ自ラ  
 出来ルナリ得ト注意テ診察スヘシ一體癰疽ハ原一  
 毒ナレ凡人身ノ虛實ニ因テ癰トナリ疽トナルナリ  
 一毒ノ傷寒ニ陰證陽證ノ有ルト同理ナリ癰又癰ニ  
 作り壅塞ノ義ナリ氣血ノ壅塞シテ腫ル、ナリ其毒  
 淺シテ膿ミ易ク斂リ易シ即陽證ニ屬ス常ニ膏粱酒  
 肉ニ飽クモノハ氣血自ラ凝滯シ循環アシクナリテ  
 發ス少壯ノ者ニ少ク老大ノ人ニ多キモ老衰シテ氣  
 血ノ循環不順ニナルユヘナリ凡人歳五六十二至リ

羸瘦スヘキ頃ニ却テ肥胖ニナル者ハ多クハ癰ヲ發  
 ス是モ氣血ノ壅滯スル故ナリ胸腹ヘモ四肢ヘモ發  
 シテ處ハ一定セサレ凡背脊ニ發スルモノ多シ故ニ  
 發背ノ名アリ初起ハ一通リノ熱癰ノヤウニ發シ瘡  
 頭ニ又疣瘡トシテ粟米ノ如キ小瘡ヲ生シ淺ク點  
 ト膿ヲ成シ痛痒シテ格別ノモノニモ見ヘス但背重  
 クシテ五六百目ノ物ヲ負タル心地ノスルモノナリ  
 是他ノ瘡瘍ト異ナル所ナリ一二日ノ内ニ急ニ起膿  
 シテ焮熱腫痛ヲ發シ灼カ如ク刺カ如ク紅暈四邊ニ  
 蔓延シ背脊一圓ニ及フモアリ脊骨ヲ避ル者ハ輕ク

脊骨ヲ跨ク者ハ重シトス惡寒發熱シテ宛傷寒ノ如ク脈浮數ニシテ頭項強痛シ或ハ渴シ或ハ舌上白苔或ハ黑苔乾燥或ハ自汗盜汗ノ出ルモアリ痛甚シキ者ハ胸脇ニ徹シ飲食ヲ思ハス日夜苦惱シテ安眠スルヲ能ハス十四五日ニ至レハ膿ヲ成シ小瘡ヨリ潰ヘテ膿管ニナリ兩手ニテ四邊ヨリ徐々ト推ス寸ハ膿少シク出ルモノナリ膿管初ハ窄小ナレハ漸大ニナリ孔ノ幾ツモ發シタル形ヲ蓮子發蜂窠發ナト、名クルナリ今此ニ舉ル所ノ證候ハ癰ノ常式ニテ治シ易シトス若十五六日或ハ十八九日ニ至レハ未夕

膿氣ヲ催サス其毒愈増劇シ瘡頭堅硬ニシテ鍼刀モ立ヌホトニナリ強テ斷截スルモ稀水ノミ出テ、稠膿ナク潤澤ヲ失シ其毒却テ四肢ヘ流注シテ漫腫ヲ發シ或ハ手足マテ氣血凝滯シテ紫暗色ニ變シ爪甲モ青藍色ニナルモノ或ハ精神昏憤シ呼吸促迫シ或ハ煩躁不寐或ハ嘔吐シテ水藥共ニ下ラス或ハ卒ニ羸瘦スル等ノ諸證ハ險證ニテ難治ト為スヘシ正宗ニモ五善七惡ノ歌ヲ載テアレハ熟讀シテ知ルヘシ又癰ニ純膿ニ成ルモノト腐肉ニ化スル者ト二證アリ便毒ニ膿便毒腐肉便毒ノ二證アルト同シナリ

腐肉ニ化スル者ハ今前文ニ論スル所ノ證ヲ云フ純  
 膿ニ成ルモノハ瘡頭尖圓ニ起脹シ膿ノ十分ニ充實  
 スルモノ是ナリ此證ハ自ラ潰カタシ鍼ヲ刺ス寸ハ  
 稠膿大ニ出テ、腫痛モ從テ減シ諸證遽ニ退キ腐肉  
 ニ化スル證ニ較レハ治シ易シトス然レ凡膿ノ深ク  
 催スモノナレハ初心ニテハ知リ易カラス若鍼ヲ刺  
 ス一分大早キ寸ハ血ノミ出テ、腫モ消セス却テ焮熱  
 ノ増スモノナリ又鍼ヲ刺スノ度ヲ失スル寸ハ腐リ  
 深ク入テ膿ハ少ク且ツ瘡中ニ軟肉ヲ生シ荏苒トシ  
 テ口ヲ歛メ兼ルモノナリ膿ヲ候フノ法ハ流注ノ門

ニ詳ニ疔疽ハ沮隔ノ義ニテ是モ氣血ノ沮隔シテ腫  
 ル、ナリ其毒深フシテ膿ニ難ク歛リ難シ即陰證ニ  
 屬ス至テ治シ難シ初起ハ兎角緩證ニテ輕ク見ユル  
 モノナリ腫モ少ク皮色モ變セス或ハ變スレ凡色薄  
 クシテ紅活ナラス痛モ少ク微惡寒ノミニテ發熱セ  
 ス瘡頭堅硬ニシテ膿ニ成カタク日數過多ニ至レハ  
 痛ミ筋骨ニ徹シ初テ腐化シ稀膿出テ、藍澱ノ如キ  
 臭氣アリ神思悒鬱トシテ日ヲ延キ腐敗愈深クシテ  
 筋骨マテモ及フモノナリ腐肉臭水容易ニ盡カタク  
 飲食無思羸瘦日加ハリ脈微數ニシテ盜汗止マス遂

ニ死スルモノナリ陰陽ノ歌正宗ニ載セテアレ氏癩  
疽ヲ辨別スルノ捷徑ハ痘瘡虚實ノ形色ヲ以テ知ル  
ヘシ○治法初發惡寒發熱頭項強痛等ノ表證備ハル  
モノハ葛根湯荆防排毒散十味排毒散ヲ撰用シテ專  
ニ發表スヘシ漸膿氣ヲ催サハ千金内托散ニ宜シ又  
伯州散ヲ兼用ニスルヲアリ大青龍ノ證モアレ氏癩  
疽ニハ石膏ヲ禁ス不得已用フル寸ハ石膏ヲ減少ス  
ヘシ如何ホトノ稠濃ニテモ石膏ヲ多ク用フレハ稀  
膿ニナルナリ其時又參芪ヲ用フレハ再稠膿ニナル  
ナリ十四五日ニ至テ大便秘結口舌乾燥シ或ハ黑苔

ニナリ或ハ渴シテ冷水及瓜菓ヲ嗜シ腹滿謔語等ヲ  
見スモノハ内疎黃連湯大柴胡湯三黃湯黃連解毒湯  
調胃承氣湯ヲ撰用スベシ膏ハ先鋒ヲ貼シ瘡頭へ灸  
ヲ炷ルヲ專要ナリ癩疽ニ灸炷ヲ用フルヲ古ノ遺法  
ニテ靈樞ニ癩發四五日暹熇之ト見ユ  
後陽成天皇ノ癩腫ヲ患ヒタル時今大路道三灸炷ヲ  
炷テ愈タルヲ天正記ニ載ス東照神君ノ癩疽ヲ患  
ヒ危篤ニ及タル時本多重次灸炷ヲ薦メ施シテ愈シ  
一岩淵夜話ニ見ユサレハ本邦ニテモ古ク癩疽ニ  
灸炷ヲ炷又王侯貴人ヲモ憚カラス施セシヲ知ルヘ

シ畢竟良法ナレハコソ專ニ用ヒシト見ヘタリ其  
法艾葉ヲ大豆ノ大サニ撮ミ瘡頭ヘ炷ルナリ小瘡疔  
瘡トシテ色ノ紫暗ニ變シ是非疔腐化スヘキ部分ヘ  
ハ一圓ニ炷ヘシ一日ニ一次炷ヘシ灸ハ至極熱キヤ  
ウナ理ナレ疔却テ痛快ヲ覺ヒ痛ノ減スル者ナリ若  
シ痛ムモノハ痛ノ去テ痒ノ出ルマテ炷ヘシ不痛モ  
ノハ痛ノ透ルマテ炷ルナリ若シ熱痛ニ堪カ子ル者  
ハ隔蒜灸ニスヘシ若シ此法ニテモ痛ニ堪カ子ル者  
ハ強テ炷ベカラス其時ハ格別ノ丁モナケレ疔夜ニ  
入テ煩熱スル丁アリ即火逆ナリ灸燂ハ第一毒ヲ升

提シ又早ク膿ニ化セシムルノ手段ナリ一旦焼テ腐  
肉ニナルユヘ毒勢自然ト挫銳テ増進セス一尺ニナ  
ルヘキ者ハ五寸ニテ止ミ五寸ニナルヘキ者ハ三寸  
ニテ止ムナリ實ニ良法ナリ灸ヲ炷タル跡ヘハ矢張  
先鋒ヲ貼スヘシ漸腐肉ニ化シ膿ヲ成サハ金瘡鍼ヲ  
刺シテ腐肉ノ淺深ヲ測ルヘシ知覺ノナキ部分ハ皆  
腐肉ナリ得ト腐肉ヲ鑿定シ「コロンメ」ヲ以テ縱横  
十文字ニ切り又剪刀ニテ凡ク切り廻シ腐肉ヲ去リ  
大ニ割開スベシ已ニ腐肉ニ化シ知覺ヲ失スルモ動  
静ノ二脈ハ未タ絶スシテ大ニ出血スル丁アリ心得



テ居ルヘシ血ノ出ルハ佳ナレト格外ニ出ル寸ハ害  
アリ創痕ヘハ又灸ヲ炷ル一前法ノ如クニシテ破敵  
ヲ綿片ニ捺テ貼ス明日又剪刀ヲ入レテ腐肉ヲ去リ  
又灸炷ヲ施ス一六七日ニ至ルベシ孔ノ幾ツモ明モ  
ノハヒスト口メスヲ入レテ截ルベシ或ハ毒甚深ク  
シテ瘡頭皮堅ク鍼刀ノ立カ子ルモノハ青龍鍼ニテ  
截リ灸炷モ多ク炷ベシ灸ニテ腐肉ノ去カ子ル者ハ  
烙鐵ヲ通紅燒キ燒耐ニ浸シ腐肉ノ上ヲ輕トト熨ス  
ベシ一日ニ一次施シテ佳ナリ凡カヲ施スモ烙鐵ヲ  
アテルモ腐肉ノ厚薄ヲ熟察シ好肉ヲ傷ラヌヤウニ

消息スヘシ癰疽漸腐敗シテ斷截ノ期ニ至ル寸ハ疫  
ノ胃實スルト同様ニテ其毒極テ熾盛ナリ脈浮緊壯  
熱灼人口舌乾燥煩渴シテ水漿菓瓜ノミヲ嗜ミ幾ト  
穀食ヲ絶チ精神昏悶煩燥不寐等ノ諸證並起ルニ至  
ル此時ニ至テハ死生ノ判醫者ノ巧拙ニ係レリ能ク  
療治ヲ盡ス寸ハ決シテ死スル一ナシ畫工文彬ト云  
フ者歳七十一ニテ大癰ヲ發シ長サ一尺三寸計美濃  
紙一枚ヘ先鋒ヲ攤テ貼スルホトノ大サニナリタレ  
氏截斷ノ法ヲ施シテ治シタリ若シ臆シテ術ヲ施サ  
ス緩慢スル寸ハ斃ル一踵ヲ旋サス今コソ起死回

生ノ功ヲ立ツ可キ時ナリ病人ヘモ得ト利害ヲ説キ  
聞カセ自分モ決意テ存分ニ刀ヲ施ス寸ハ膿血淋漓  
トシテ大ニ流レ出テ病勢乍ニ減シ諸證從テ退キ飲  
食モ進ミ極テ愉快ヲ覺フ活物窮理ノ術ニ非レハ此  
伎倆ヲ得ル丁能ハス所謂自當生者越人能使之起ト  
云フハ是等ノ術ノ丁ナリ割開ノ後ハ托裏消毒飲ニ  
宜シ若膿稀薄ナレハ千金内托散若腐肉除キ難ク稀  
膿ノミ出テ、穢氣薰蒸シ漸クニ腐敗シテ深ク陷リ  
脈微弱身體羸瘦微惡寒スルモノハ神功内托散ナリ  
日數ヲ經レハ腐肉自カラ分離シテ軟慢ト綿絮ノ如

クニナルモノナリ鑷子ニテ引出シ或ハ剪刀ニテ剪  
ミ去リ草綿ヲ鯨篋ニカラミ付瘡中ヲ能ク掃除シテ  
破敵ヲ綿片ニ攤瘡ノ淺深凹凸ニ從テ貼スヘシ一日  
ニ二度張更ヲ常式トスレハ膿水多ク出ルモノニハ  
三四度ニ至ルヲ良トス隅々ノ疔蝕タル處ヲ別シテ  
能ク掃除シテ膏藥ヲ入レベシ瘡ノ上邊ハ膿汁下ヘ  
能ク流ル、ユヘ疔蝕ト少シ下邊ハ膿汁流レ溜ルユ  
ヘ疔蝕ト深シ随分注意テ掃除スヘシ腐肉盡ク除キ  
去ル寸ハ好肉ヲ生シ色鮮紅ニナリ臙脂ヲ抹タルヤ  
ウニナリ粒々突起シテ楮鱸子ノ如ク又榴房ノ拆夕

ル形ニ似タリ漸長肉シテ淺クナリタルハ紫雲ノ證ナリ若紫雲ニテ新肉速ニ長シ軟肉ニナラハ又破敵ヲ貼スベシ腐肉モ除キ膿汁モ盡キタルコロニナリ氣血虚耗シテ盗汗ノ多ク出ルモノハ芪歸建中湯十全大補湯ヲ與フベシ或ハ癰全愈シテ後氣力常ニ復セス健忘スル一アリ歸脾湯補中益氣湯ノ類ニ宜シ或ハ消渴スルモノ麥門冬飲子四肢攣急スルモノハ芍藥甘草附子湯ニ宜シ何レモ津液ノ枯竭スルユヘナリ食禁ハ療治中ハ勿論愈テ後モ謹ムベシ酒肉總テ膏多キ魚類ハ忌ムヘシ就中蕎麥麻油ノ二品ハ格

別ニ害アリ愈テ後モ一箇年程ハ禁斷スベシ大癰瘡テ後ニ此二品ヲ食シ再發シテ死シタル一多クアリ先師遺談ナリ

癰疽主治方

十味敗毒散 春林治癰疽及諸瘡腫初起增寒壯熱焮痛

柴胡 桔梗 羌活 芎藭 櫻筍

荊芥 防風 茯苓 甘草 生薑



右十味煎服

麥門冬飲子 宣明論 葛根湯 大柴胡湯 三黃湯

調胃承氣湯 芍藥甘草附子湯 芪歸建中湯

歸脾湯 千金內托散 神功內托散 托裏消毒飲  
 內疎黃連湯 十全大補湯 補中益氣湯 伯州散  
 先鋒 破敵 紫雲

療癩諸具圖



癰疽圖  
卷六

癰疽圖

癰頂又生小瘡。  
粒起疔瘡或穿  
孔如蓮房蜂窠。



自  
準  
亭  
藏

其二圖

撮艾灸瘡  
煙穗簇起



易  
斗  
公  
錄


卷  
六

子

自  
準  
亭  
藏

其三圖

瘡頂已腐。木  
硬如牛皮。快  
刀割開。創口  
成十字樣。



其二圖

其四圖

腐肉已除。好  
肉紅活。如石  
榴折房。



疔瘡 痘疔

疔ハ素問ニ高粱之變。足生大丁ト見ヘテ丁ノ字ヲ古  
文トス<sup>タリ</sup>ニ從フハ後世ノ<sup>ナリ</sup>ナリ隋唐ノ頃迄ハ皆丁  
ノ字ヲ用フ元明ノ頃ヨリ初テ疔ノ字ヲ用フ單ニ疔  
ト稱シ或ハ疔腫或ハ疔瘡ト云フ病源候論ニ初作時  
突起如<sup>ニ</sup>丁蓋故謂之<sup>ニ</sup>丁瘡ト說タルニテ名義ハ盡セリ  
此病至極ノ險症ニテ旦夕ノ間ニ死生ヲ判ツ又面部  
ニ生シテ容貌奇異ニ變シ瘡色モ色々ニ易ルモノナ  
レハ先賢各其形狀ニ因テ種々ノ名稱ヲ附タリ巢元  
方ハ十種ヲ分チ孫思邈ハ十三種ヲ分チ李東垣ハ二

十三種ヲ分チ申啓玄ハ三十四種ヲ分テリ近世ニ至  
 テ名稱益多シ然レ氏實ハ一病ニシテ此ノ如ク種類  
 ノ多キモノニハ非ス畢竟此病ハ奇證異狀多キユヘ  
 ニ諸家各私見ニテ名稱ヲ立タルナリ實用ニ益ナシ  
 諸書ニ載タル所ノ種々ノ名呼一掃除シテ可ナリ外  
 科正宗ニハ約シテ火焰黃鼓白双紫燕黑靨ノ五ツヲ  
 別テ論シタレ氏強テ五藏ヘ配當シタル目ナレハ余  
 ハ是ヲモ採用セス晚輩薄學ノモノハ種々ノ名稱ニ  
 拘泥シテ適疔瘡ヲ視モ狐疑シテ決定スルヲ能ハス  
 治法ヲ誤ルモノ多シ盡信書不如無書也ト云フハ此

謂ナリ活物窮理ノ上ニテ疔ノ病源ヲ研究シテ頃發  
 明セシ一アリ疔ト癰トハ本一毒ニテ同病ナレ氏發  
 スル處異ル寸ハ輕重ヲ異ニシ證候ヲ同フセス假令  
 ハ徽毒ノ一毒下疳ニ發スルト便毒ニ發スルトニテ  
 證候ヲ異ニシ輕重ヲ同フセサルカ如シ癰面ニ發ス  
 ル寸ハ疔ノ證候ヲ見ハシ疔背ニ發スル寸ハ癰ノ證  
 候ヲ成ナリ癰ト疔トハ其證候同シカラサレ氏初起  
 小瘡ヲ發シテ痒痛スルト膿ヲ成シ腐肉ニ化スルト  
 ノ證候ヲ熟視スルニ癰疔ノ同病ナルヲ明ナリ同志  
 ノモノ活物窮理ノ術ヲ會得シテ經驗スル寸ハ余言



ノ証サルヲ知ルヘシ疔ハ先面部ニ發ス顴ノ上下  
 或ハ口角兩腮或ハ人中ノ左右或ハ耳ノ前後等ナリ  
 四肢ニモ發スルヲ諸方書ニ論シテアレハ四肢ニ生  
 スルモノハ癰癤ノ形ヲ成シ容易ニ愈テ決シテ危險  
 ニ至ラス疔ノ初發ハ先ツ面目ノ間ニ一點ノ小瘡ヲ  
 生シ或ハ膿泡ヲ為シ或ハ水泡ヲ為シ或ハ紅泡ニ變  
 シ或ハ紫泡ニ變シ或ハ黑靨スルモアリ但微痛シテ  
 麻痺スルヲ常ナラス其人輕病ト心得爪ニテ搔剥或  
 ハ風寒ヲ犯シ乍チ小瘡ノ四畔ニ焮腫ヲ發シ面目ハ  
 勿論頭項マテモ須臾ノ間ニ蔓延ス眼閉チ鼻塞リ唇

口硬腫シテ大ニナリ木通子ニ枚ヲ上下ヨリ合セタ  
 ル形狀ニナルナリ或ハ口眼喎斜ニナリ口中モ腫テ  
 舌強リ厚ク胎ヲ生シ黃色ニ變シ或ハ黑色ニ變シ唇  
 舌共ニ乾燥シ氣息臭穢ニナリ腫タル處ハ總テ堅硬  
 ニシテ爪モ立ヌヤウニナルモノナリ初發スル瘡ノ  
 四畔へ又退ミニ數點ノ小膿泡ヲ發スルナリ疼痛ス  
 ルヲ刺カ如ク煩熱スルヲ灼カ如ク脈浮緊數寒熱交  
 作り頸項強痛シ食餌日ニ減シ大便多クハ秘ス或ハ  
 渴シ或ハ嘔吐或ハ心煩昏暈或ハ謔語或ハ精神恍惚  
 或ハ煩躁シテ日夜安眠セス或ハ四體麻痛シ或ハ四

肢班マタラニ紫色ニ變シ爪甲藍色ニナリ或ハ四肢厥冷  
 スル一モアリ數日ヲ經レハ小瘡盡ク潰テ穴ト為リ  
 數穴相貫キ或ハ口ノ内へ穿モアリ或ハ頸項迄モ流  
 注シテ膿ヲナス一アリ腐化マテニ持重ルモノハ大  
 抵救フヘシ一體頭ハ諸陽ノ會スル所ニテ至極ノ要  
 處ユヘ腐化ヌ前ニ苦腦ニ堪スシテ死スルモノ多シ  
 或ハ朝ニ發シ夕ニ死スルモアリ或ハ六七日ニシテ  
 死スルモアリ或ハ十餘日ニシテ死スルモアリ此病  
 夏月暑時ニ多ク冬時ニ少シ又老幼ニ少ク壯年ノ者  
 ニ多シ○治法至テ迅速ノ病ナレハ迂遠ノ論說ヲ議

シラマシキ緩慢治法ヲ試ルヤウナル一ニテハ死スル一踵ヲ  
 旋サス疔瘡ノ死生ハ全ク刀針ノ上ニアリ如何ホト  
 ノ神丹ヲ用フルト云ヘ氏針刺刀截ノ法ヲ施サレ  
 ハ多クハ救カタシ終危篤ニ至リテ諸惡證蜂起スル  
 モ針刺刀截ノ法ヲ施ス寸ハ病勢乍ニ緩ミ諸惡證從  
 テ減シ命ヲ萬死ノ中ニ全フスルモノ亦少ナカラス  
 初起ハ先ツ患處ヲ撮ミ上ケ疔心へ披針ヲ刺ス一四  
 五分計リ抜スシテ直ニ横へ切り廣ケル一又四五分  
 計リ血ヲ出シテ後メイチヤニ破敵ヲ塗リ猛汞丹ヲ  
 衣トナシ針口へ挿入シ糊入ノ紙ヲ揉テ四文錢ノ大

サニ剪カミ先鋒ヲ攤テ瘡上ヲ蓋フ疔ノ四畔ヲモ點チホクク  
 刺シテ血ヲ出シ跡へ中黄ヲ右ノ紙へ攤テ貼ス又一  
 體ノ虚實ヲ詳ニシテ刺絡ヲ施スヘシ數日ヲ經ル寸  
 ハ小瘡膿氣ヲ催シロハ窄小ニテモ内ハ濶大ニナリ  
 テアルモノナリ此時コフ至テ大事ナリ油斷スヘカ  
 ラス瘡口ヨリ彎消息子ヲ入テ瘡中ヲサクリ甲瘡ヨ  
 リ乙瘡へ串ツラマヒテアルモノハ痔漏刀ヲ入テ斷截スヘシ  
 若シ穴ノ他へ串ツラマカサルモノハ剪刀ヲ入テ剪截スヘ  
 シ穴ノアル處ハ盡ク搜索シテ刀針ヲ施スヘシ唇ハ  
 存分ニ切テモ害ノナキ處ナレハ唇ノ紅白分肉ノ處

ヨリ披針ヲサシテ下へ抜キ前へ引テ肉ヲ切りハナ  
 ス寸ハ血能出ルモノナリ兩唇トモニ此法ニテ幾筋  
 モ切ハナスヘシ總テ斷截シタル跡へハ破敵ヲ綿片  
 へ攤テ挿入スヘシ四畔ノ紅暈ノアル處へハ中黄ヲ  
 紙ニ攤テ貼スヘシ腫タル處ハ總テ堅クシテ針刀ヲ  
 モ受ス牛馬ノ皮ヲ切ヤウナ手應テコタイノアルモノナレハ  
 随分快刀利針ヲ撰用スヘシ初發寒熱ノ甚シキモノ  
 へハ葛根湯。越婢湯。大青龍湯ノ類ヲ撰用シテ發表ス  
 へシ表熱去テ裏熱ニナルモノへハ黄連解毒湯加犀  
 角。沈香解毒湯。三黄湯加石膏。内疎黃連湯ノ類ナリ裏

熱愈甚シクシテ舌上黒胎。便秘腹滿。煩悶欲死モノハ  
大承氣湯ヲ與ヘテ急ニ下スヘシ患處膿ニ化シテ後  
荏苒トシテ往來寒熱スルモノハ大小柴胡湯ニ宜シ  
斷截シテ後膿多ク出テ腐肉盡ク去テ熱漸ク退キ痛  
ミ減スル寸ハ托裏消毒飲。千金内托散ヲ撰用ス或ハ  
元氣虚弱ニシテ怔忡驚悸。心志不寧モノハ内托安神  
散歸脾湯ノ類ニ宜シ疔瘡愈テ後氣力常ニ復セサル  
モノハ補中益氣湯ナリ疔毒口中ニ入寸ハ唇舌硬ク  
腫レ齧肉腐爛シテ齒牙ノ脱落スルモノアリ此證ハ  
面部ノ疔瘡愈テモ齧肉ノ毒急ニ去リ魚ルモノナリ

是ハ動ク齒ヲ去リテ跡ヘ金鎖ヒヲ敷キ涼膈散加石  
膏ヲ與フヘシ犀角<sup>ナニ</sup>テリアカ熱金丹等ノ解毒ノ藥品  
ハ何方ヘモ兼用シテ佳ナリ或ハ疔瘡遂ニ膿ニ化セ  
ス其毒自カラ消散シテ愈ルカ如但瘡痕紫暗色ナル  
モノハ實ニ愈ルニ非ス後ニ必ス背腰及ヒ股脚ナト  
ヘ流注シテ腫塊ヲ發スル丁アリ中黄ヲ紙ヘ攤テ瘡  
上ヘ貼シ越婢加朮附湯ヲ連進<sup>タテ</sup>テ飲シメ草兵丸ヲ兼  
用スル寸ハ消散スルモノナリ若シ消散セスシテ膿  
ヲ成モノハ流注ノ治法ニ從フヘシ疔瘡ノ痕全ク愈  
テモ瘡痕紫暗色ニナリテアルモノナリ刺シテ血ヲ

去ルヘシ○一種紅絲疔ト云フモノアリ喜テ合谷及  
 掌背指縫指節及ヒ跗上指縫指節ニ發ス初メ一點ノ  
 小瘡ヲ生シ尖圓ニシテ疥癬ノ如ク四畔微ク焮腫シ  
 紅絲瘡上ヨリ起リ立ニ走注スルモノナリ掌背ニ發  
 スルモノハ上攻シテ肱ニ至リ肩ニ至ル跗上ニ發ス  
 ルモノハ膝ニ至リ股ニ至ル惡寒發熱ノツヨキモノ  
 ナリ先哲ノ教ニ紅絲入心寸ハ即チ死スルト云フ說  
 アレ凡紅絲ハ但肌膚ノ淺キ處ヲ行テ深クハ入ヌモ  
 ノナリ縦ヒ腹ヘ至ル凡腹中ヘ深侵ス丁ハ決シテナ  
 シ迅速ノ病故油斷セヌヤウニ戒タルモノナルヘシ

此證ハ面ニ發スル疔トハ大ニ異リタルモノ也經絡  
 流注ナトニ因ルヤ疥癬或ハ竹木刺ナトニテモ合谷  
 指縫ノ邊ヨリ紅絲ヲ發スル丁アリ格別ノ丁ハナキ  
 モノナリ○治法此病疔ノ一種ト為シテアレ凡疔ノ  
 如ク大病ニハナラヌモノナリ先紅絲ノ盡處ヲ刺テ  
 血ヲ出ス寸ハ上攻セズシテ自ラ消スルモノナリ亦  
 發泡ニテモヨシ疔心ヘモ針ヲ刺テ血ヲ出シ跡ヘ中  
 黃ヲ綿片ヘ攤テ貼スヘシ膿氣ヲ催ス寸ハ破敵ニ換  
 エヘシ寒熱スルモノニハ葛根湯加防風ヲ與フヘシ  
 數日ニシテ愈ルモノナリ○瘡疔多ハ臀腿四肢ニ發

スルモノナリ又口ノ四畔ニ發スル丁アリ至テ險證  
トス順痘ニハ決シテナク逆痘ニノミアリ發班ナト  
ト同様ノモノニテ矢張痘毒ノ深キナリ故ニ何處ヘ  
發シテモ吉兆ニハ非ス凶痘ノ十五六日ニ至リ何レ  
ニモ灌膿セス七分通ハ水泡ニナリ纔ニ二分許リ膿  
氣ヲ帶ルモノナリソレトテモ大半ハ枕衾ニテ摺リ  
破リ乾燥シテ難治ノヤウニ見ユレ氏幸ニ内攻セス  
ニ居モノ必ス臀腿四肢ニ數點ノ痘疔アリ遂ニ自ラ  
潰ヒ臭膿痰水大ニ出テ痘毒從テ除キ去リ全快ニナ  
ルモノナリ初起ハ痘ト同形ニテ痘中ニ混シテアレ

ハ至テ着分カタキモノナリ丁寧ニ診察シテ明ニ辨  
別スヘシ出齊ノ頃ニハ紫泡ニナリ灌膿ノ前後ニ至  
レハ黑陷シテ平肉ヨリモ微シク凹ニナリ色ハ墨ヲ  
點スルカ如ク乾枯シテ少モ潤澤ナク四圍ニ腫塊ヲ  
生シ收靨ノ頃ニ至レハ自ラ潰テ臭水ヲ流シ疔心頑  
肉トナリ頑肉ト好肉ト自ラ分離シテ脱出スルナリ  
其形宛田螺肉ノ殻ヲ脱スルニ似リ頑肉ノ除タル跡  
ハ深ク坑ニナルモノナリ面部ニ發スルモノハ略真  
ノ疔瘡ノ證候ヲ見スナリ裏熱甚シク舌黒ク唇燥キ  
謔語煩悶シテ死スルモノアリ油斷スヘカラス○治

法疔ヲ發スルホトノ痘瘡ナレハ何レ險證ユヘ痘瘡ノ手當ヲ專一トシテ疔ノ手當マテハ行届キカ子ルモノナリ痘瘡ノ主劑ヘ犀角ヲ多ク加フヘシ疔心ヘハ針ヲ刺シ跡ヘ破敵メイチヤヲ挿入シ更ニ破敵ヲ綿片ヘ攤テ疔上ヲ蓋フ寸ハ早ク潰テ臭水ヲ流シ腐肉自ラ脱出スルナリ腐肉ノ脱出シタル跡ヘハ破敵ヲ綿片ヘ攤テ一杯ニ填ヘシ坑ニナル頃ハ痘瘡ハ收靨スルモノナレハ痘瘡ノ手當ニハ及ス專一ニ疔毒ヲ解スヘシ柴胡去半夏加桔樓大黃連翹湯ニ宜シ又黃連解毒湯加犀角五物解毒湯加連翹ノ類ヲ撰用ス

ヘシ面部ヘ發シタル痘疔ハ危險ニ至ルモノナレハ真ノ疔瘡ノ條下ヲ參考シテ治法ヲ施スヘシ

疔瘡主治方

内托安神散 正宗 治疔瘡出膿時元氣虛弱睡卧驚悸心

神不寧或毒未盡流入心竅致生健忘

人參 茯神 黃芪 白朮 麥冬

玄參 陳皮錢各一 酸棗 遠志 甘草

石菖 五味子各五分

右十二味水煎臨服入朱砂末三分

黃連解毒湯 同前 治疔毒入心内熱口乾煩悶恍惚脈實

者

黃連

黃芩

黃栢

山梔

連翹

甘草

牛旁子

各等分燈心

二十根

右八味水煎

歸脾湯

濟生

治脾經失血。少寐發熱。盜汗。健忘怔忡驚悸。

黃芪

人參

白朮

茯苓

酸棗炒

龍眼各二錢

當歸

遠志各一錢

甘草炙

木香各五分

右十味薑棗水煎。○濟生本無歸志薛已加之

葛根湯

越婢湯

大青龍湯

三黃湯加石膏

托裏消毒飲

大承氣湯

大小柴胡湯

千金內托散

補中益氣湯

涼膈散加石膏

五物解毒湯加連翹

柴胡去半夏加瓜蒌大黃連翹湯

草兵丸

赤朮丹

紫金丹

金鎖七

テリアカ

犀角

破敵

中黃





ヲ生シ疼痛スルノ常ナラス硬ク腫テ微シク色ヲ變  
 シ其毒波及シテ面目マテモ微腫シ頸項強直ニシテ  
 轉眄スルノ不自由ニナリ惡寒發熱シテ消散モセス  
 膿ニモナラス因循ト日ヲ延キ遂ニ瘡頭紫暗ニナリ  
 潰テ清稀膿汁ヲ流シ肉腐化シ筋糜爛シテ黃色ニ變  
 シ軟慢ニシテ蠶綿ヲ水ニ漬シタルヤウニナリ固ク  
 粘着シテ分離セヌモノナリ四圍深ク痂蝕テ穴ニナ  
 リ骨毛露ル、ヤウニナリ疲勞シテ遂ニ死ルモアリ  
 少壯肥健ノ人ハ初發ヨリ焮熱腫痛大ニ起脹シテ色  
 紅活ニ變シ寒熱交作十餘日ニシテ全ク腐化シ腐肉

自ラ離テ好肉自ラ生シ易キモノアリ即癰ナリ治シ  
 易シトス○治法ハ總テ癰疽ノ治法ニ從フヘシ惟頸  
 項ハ頭腦ヘ近ク咽喉トモ表裏ヲナス所ナレハ至テ  
 肝要ノ地ナリ艾灸ヲ炷ルノ進退ト刀針ヲ施スノ淺  
 深トヲ慎テ療治ヲ施スヘシ初寒熱ノ強キモノハ葛  
 根湯ナリ膿氣アラハ反鼻ヲ加フヘシ亦伯州散モ宜  
 シ潰テ後ハ托裏消毒飲千金内托散等ヲ撰用スヘシ  
 若膿水薄ク腐肉離レ難ク口舌乾燥シ微ニ惡寒アル  
 者ハ神功内托散ニ宜シ膏ハ初二先鋒ヲ紙ニ攤テ貼  
 シ潰テ後ハ破敵ヲ綿片ヘ攤テ貼スルナリ

腦疽主治方

葛根湯或加反鼻 托裏消毒飲 千金內托散

神功內托散 伯州散 先鋒 破敵

自... 癩... 鉉... 卷六... 腦疽... 主治方... 葛根湯... 或加反鼻... 托裏消毒飲... 千金內托散... 神功內托散... 伯州散... 先鋒... 破敵

