廣成先生玉函經

脈

江蘇古籍出版社

脈經

江蘇古籍出版社

宛委別藏

（清）阮元 輯

江蘇古籍出版社出版
江蘇廣陵古籍刻印社整理
江蘇省新華書店發行
上海市印刷七廠印刷
開本：七八七×一〇九二毫米 三十二開
印張：一八九七·七五 插頁：四八〇
一九八八年二月第一版
一九八八年二月第一次印刷
ISBN 7-80519-073-9/Z·13
定價：（全120册） 2650 圓

西晉王叔和撰宋林億等校定叔和高平人官太醫令甘伯宗名醫傳稱叔和博通經方精義診處尤好著述是編從宋嘉定何大任刻本影抄前有宋國子博士高保衡尚書屯田郎中孫奇光祿卿直秘閣林億等上序卷末載熙寧二年及二年進書銜名又序云臣等博求衆本據經為斷去取非私又云今考

結聖三年六月國子監雕版木子及各銜名業林億

以素問靈樞太素難經甲乙仲景之書并千金方及

冀說脈之篇以校之除去重複補其脫漏云云用力可為勤摯世傳叔和脈訣一卷乃後人依託為之與此絕不相同也

校定脉經序

臣等承詔典校古醫經内得王叔和西晉高平人性度沈靖尤好著述博通經方精意診處洞識脩養之道其行事見唐甘伯宗名醫傳中臣等觀其書叙陰陽表裏辨二部九候分人迎氣口神門條十二經二十四絡經八脉以舉五藏六腑三焦四時之病若網在綱有條而不紊使人占外以知内視死而別生為至詳悉咸可按用其文約其事詳者獨何哉蓋其為黄帝内經間有疎略未盡處而又輔以扁鵲仲景元化之法自餘奇怪異端不經之說一切不取不如是何以推尋毫髮之失乎又甘其大較

以為脉理精微其體難辨兼有數候俱見異病同脉
詳明聲色王相以此參伍決死生之分故得十全無
之惑專之指下不可以盡隱伏而乃廣述形證虛實
一失之繆為果不疑然而自晉室東渡南北限隔天
下多事於養生之書實未遑暇雖好事之家僅有傳
者而承疑習非將喪道真非大聖人曷為釐正恭惟
主上體大舜好生之德玩神禹叙極之文推錫福之
良心鑒慎疾之深意出是古書俾從新定臣等各殫
所學博求衆本據經為斷去取非私大抵世之傳授
不一其別有三有以隋巢元方時行病源為第十卷
之文別增篇目者推其本文而義無取稽是二者切
者考其時而繆自破有以撮諸篇

之未覩厥真各秘其所藏兩今則考以素問九墟靈
樞大素難經甲乙仲景之書并千金方及翼說脉之
篇以校之除去重複補其脫漏其篇第亦頗為改易
使以類相從仍舊為一十卷總九十七篇施之於人
俾披卷者足以占外而知内視死而別生無待飲上
祿卿直秘閣林億等謹上
池之水矣國子博士高保衡尚書屯田郎中孫奇光

脉經卷第一

朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林　億等類次

脉形狀指下秘決第一

平脉早晏法第二

分別三關境界脉候所主第三

辨尺寸陰陽榮衛度數第四

平脉視人大小長短男女逆順法第五

持脉輕重法第六

兩手六脉所主五藏六腑陰陽逆順第七

辨脉陰陽大法第八

辨腑藏病脉陰陽大法第九

平虛實第十

從橫逆順伏匿脉第十一

辨災怪恐怖雜脉第十二

遲疾短長雜脉第十三

平人得病所起脉第十四

診病將差難已脉第十五

脉形狀指下祕決第一 二十四種

浮脉舉之有餘按之不足 浮手下於一日浮而大

洪脉極大在指下 一日浮兩邊實 無兩傍手有下

滑脉往來前却流利展轉替然與数相似 一日浮中如有

力一曰漉漉如欲脫

数脉去來促急 一日一息六七至 一曰数者進之名

促脉來去數時一止復來

弦脉舉之無有按之如弓弦狀一曰加張弓弦按之緊為弦

緊脉數如切繩狀一曰如轉索之無常

沈脉舉之不足按之有餘一曰手下裁動一曰按之無有一曰關上沈不出名曰伏

伏脉極重指按之著骨乃得

芤脉有似沈伏實大而長微按之不足舉

實脉大而長微強按之隱指幅幅然一曰沈千金翼以芤為牢

微脉極細而軟或欲絶若有若無一曰小也一曰手下快一日浮而薄一曰按之如欲盡

濇脉細而遲往來難且散或一止復來一曰浮而短而止或一曰短一曰散也

細脉小大於微常有但細耳

軟脉極軟而浮細一曰按之無有舉之有餘一曰細小而軟如帛衣在水中輕手相得

弱脉極軟而沈細按之欲絶指下一曰按之無有舉之有

虛脉遲大而軟按之不足隱指豁豁然空

緩脉去來亦遲小駛於遲一日浮大而軟

散脉大而散散者氣實血虛有表無裏

遲脉呼吸三至去來極遲一日舉之不足按之無有

結脉往來緩時一止復來

能自還舉之有陰陽初來緩時一止按之來緩時一止

則動名結陰

代脉來數中止不能自還因而復動脉結者生代者死

動脉見於關上無頭尾大如豆厥厥然動搖

相搏名曰動陽動則汗出陰動則發熱形冷惡寒數脉

見於關上無頭尾如豆大厥厥動搖者名曰動

浮與芤相類

滑與數相類

弦與緊相類

革與實相類千金翼云牢與實相類

微與濇相類

平脉早晏法第二

黃帝問曰夫診脉常以平旦何也岐伯對曰平旦者陰氣未動陽氣未散飲食未進經脉未盛絡脉調均（内經作調勻）氣血未亂故乃可診過此非也（千金同素問太素云有過之脉）氣血已亂五色觀五藏有餘不足六腑切脉動靜而視精明察五色觀五藏有餘不足六腑強弱形之盛衰以此參伍決死生之分

分別三關境界脉候所主第三

從魚際至高骨（其骨自高）却行一寸其中名曰寸口從寸至尺名曰尺澤故曰尺寸後尺前名曰關陽出陰入以關爲界陽出三分陰入三分故曰三陰三陽生於尺動於尺寸主射上焦出頭

及皮毛竟手關主射中焦少腹至足

辨尺寸陰陽榮衛度數第四

夫十二經皆有動脉獨取寸口者脉之大會手太陰之脉行六寸人一呼脉行三寸一吸脉行三寸呼吸定息一萬三千五百息脉行五十度周於身漏水下百刻榮衛行陽二十五度行陰亦二十五度為一周（晬時也）故五十度而復會於手太陰陰太陰者寸口也即五藏六腑之所終始故法取於寸口

脉有尺寸何謂也然尺寸者脉之大會要也從關至

尺是尺内陰之所治也從關至魚際是寸口陽之所治也故分寸爲尺分尺爲寸故陰得尺中一寸陽得寸内九分尺寸終始一寸九分故曰尺寸也

脉有太過有不及有陰陽相乘有覆有溢有關有格何謂也然關之前者陽之動也脉當見九分而浮過之者法曰太過減者法曰不及遂上魚爲溢爲而沈過者法曰太過減者法曰不及遂入尺爲覆爲格此陰乘之脉也關之後者陰之動也脉當見一寸而沈過者法曰太過減者法曰不及遂入尺爲覆爲内關外格此陽乘之脉故曰覆溢是真藏之脉也人不病自死

平脉視人大小長短男女逆順法第五

凡診脉當視其人大小長短及性氣緩急脉之遲速

大小長短皆如其人形性者則吉反之者則為逆也

脉三部大都欲等只如小人細人婦人脉小軟小兒四五歲脉躁呼吸八至細數者吉（千金翼云細人大人脉大人樂）而脉寔人而脉細人而氣弱而脉大此皆為逆（脉緩性緩而脉緩性緩而脉躁人壯脉反此為順）順則易治者脉自駛肥人人脉沈瘦人人脉浮（凡婦人脉常欲濡弱於丈夫為順女小兒四五歲脉躁呼吸八至男左大於右大四五歲為順）

持脉輕重法第六

脉有輕重何謂也然初持脉如三菽之重與皮毛相得者肺部也（菽者小豆也作菽皮毛之間脉輕如三小豆之言肺部也）如六菽之重與血脉相得者心部也（心主血脉次於肺氣所行故大豆之重）如九菽之重與肌肉相得者脾部也（脾在中央主肌肉故次心如九菽之重）如十二菽之重與筋平者肝部也（脾肝下主筋故次又在之）

按之至骨舉之來疾者腎部也脈沈至骨其
脉法讚一作鳩尾下五分

兩手六脉所主五藏六腑陰陽逆順第七

魂魄穀神皆見寸口左主司官右主司府左大順男
右大順女關前一分人命之主左為人迎右為氣口
神門決斷兩在關後人無二脉病死不愈諸經損減
各隨其部察按陰陽誰與先後千金云三陰三陽誰先誰後陰病
治官陽病治府奇邪所舍如何補取審而知者鍼入
病愈

心部在左手關前寸口是也即手少陰經也與手太
陽為表裏以小腸合為府合於上焦名曰神庭在鬮

肝部在左手關上是也足厥陰經也與足
裏以膽合為府合於中焦名曰胞門一作少陽在大倉左
右三寸
腎部在左手關後尺中是也足少陰經也與足太陽
為表裏以膀胱為府合於下焦在關元左
肺部在右手關前寸口是也手太陰經也與手陽明
為表裏以大腸合為府合於上焦名呼吸之府在雲門
脾部在右手關上是也足太陰經也與足陽明為表
裏以胃合為府合於中焦名脾胃之間名曰意舍在章門在季
脇前一寸半
腎部在右手關後尺中是也足少陰經也與足太陽
為表裏以膀胱合為府合於下焦在關元右左屬腎

右爲子尸名曰三焦

辨藏腑病脉陰陽大法第八

脉何以知藏腑之病也然數者腑也遲者藏也數即有熱遲即生寒諸陽爲熱諸陰爲寒故別知藏腑之病病也（腑遲者陽行遲陽故其脉數藏者陰行疾病則遲）脉來浮大者此爲肺脉也脉來沈滑如石腎脉也脉來如弓弦者肝脉也脉來疾去遲心脉也脉來當見而不見爲病病有深淺但當知如何受邪

辨脉有陰陽大法第九

脉有陰陽大法何謂也然呼出心與肺吸入腎與肝呼吸之間脾受穀味也其脉在中浮者陽也沈者陰也故曰陰陽

心肺俱浮何以別之然浮而大散者心也浮
者肺也腎肝俱沈何以別之然牢而長者肝
耎弊指來實者腎也脾者土也寄在中州故其脈在中
而長者是脾也是以陰陽之脈也脈有陽盛陰虛陰盛陽虛何
謂也然浮之損小沈之實大故曰陽盛陰虛是陰陽虛實之意也
小浮之實大故曰陽盛陰虛是陰陽虛實之損小沈之實大
經言脈有一陰一陽一陰二陽一陰三陽有
陰一陽二陰一陽三陰如此言之寸口有六脈俱動
耶然經言如此者非有六脈俱動也謂浮沈長短滑
濇也浮者陽也滑者陽也長者陽也沈者陰也濇者
陰也短者陰也所以言一陰一陽者謂脈來沈而滑

見寸口浮而實大今輕手浮之更損減而小手按之更大而沈故言陰實

言陽虛重手按之反更實大故

也一陰一陽者謂脉來浮滑而長也一陰
脉來浮滑而長時一沈也所以言一陽一
來浮而滑也一陽二陰者謂脉來沈濇而短
三陰者謂脉來長而沈濇也一陽一
名病之逆順也凡脉大為陽浮為陽數為陽
長為陽滑為陽沈為陰濇為陰弱為陰絃為陰短為
陰微為陰陰是為三陰三陽也陽病見陰脉者反也主
死陰病見陽脉者順也主生關前為陽關後為陰陽
數則吐血陰微則下利陽絃則頭痛陰絃則腹痛陽
微則發汗陰微則自下陽數口生瘡陰數加微必惡
寒而煩挠不得眠也陰附陽則厥癲得陽
屬腑得陰屬藏無陽則厥陽則狂陽附陰
陰則嘔陽微則不能呼

陰微則不能吸呼吸不足胸中短氣依此陰陽以察
病也
寸口脈浮大而疾者名曰陽中之陽病苦煩滿身熱
頭痛腹中熱
寸口脈沈細者名曰陽中之陰病苦悲傷不樂惡聞
人聲少氣時汗出陰氣不通臂不能舉
尺脈沈細者名曰陰中之陰病苦兩脛酸疼不能久
立陰氣衰小便餘瀝陰下濕癢
尺脈滑而浮大者名曰陰中之陽病苦小腹痛滿不
能溺溺即陰中痛大便亦然
尺脈牢而長關上無有此象為陰干陽其人苦兩脛重
少腹引陰中痛

寸口脉壯大尺中無有此為陽干陰其人苦喜青背痛
陰中傷足脛寒夫風傷陰陽病順陰陰病逆
陽陽病易治陰病難治在腸胃之間以藥和之若在
經脉之間鍼灸病已

平虛實第十

人有三虛三實何謂也然有脉之虛實有病之虛實
有診之虛實脉之虛實者脉來耎者為虛牢者為實
病之虛實者出者為虛入者為實言為虛不言者
為實緩者為虛急者為實實診之虛實者寢者為虛痛
者為實外痛內快為外實內虛內痛外快為內實外
虛故曰虛實也
問曰何謂虛實荅曰邪氣盛則實精氣奪則虛何謂

重實所謂重實者言大熱病氣熱脉滿是謂重實

問曰經絡俱實如何何以治之荅曰經絡皆實是寸脉急而尺緩也當俱治之故曰滑則順濇則逆也夫虛實者皆從其物類始五藏骨肉滑利可以長久

從橫逆順伏匿脉第十一

問曰脉有相乘有從（仲景從字作縱字）有橫有逆有順何謂也師曰水行乘火火行乘木名曰從火行乘金金行乘木名曰橫木行乘火火行乘水名曰逆金行乘木木行乘火名曰順

經言脉有伏匿者伏匿於何藏而言伏匿也然謂陰部反見陽脉者為陽乘陽更相乘更相伏也脉居陰中伏陰脉居陽部反見陽脉雖時沈澀而短此陽

陰脉者爲陰乘陽也脉雖時浮滑而長此爲陰陽也重陰者癲重陽者狂

辨災怪脫陽者見鬼脫陰者目盲第十二

問曰脉有殘賊何謂師曰脉有紘有緊有濇有滑有浮有沈此六脉爲殘賊能與諸經作病

問曰嘗爲人所難緊脉何所從而來師曰假令亡汗若吐肺中寒故令緊假令欬者坐飲冷水故令緊假令發汗若吐下利者以胃中虛冷故令緊也

問曰翕奄沈名曰滑何謂師曰沈爲純陰翕爲正陽陰陽和合故脉滑也

問曰脉有災怪何謂師曰假令人病脉得太陽脉與病形證相應因爲作湯此還送湯之時病者因反大

吐若下痢仲景痢字作利病腹中痛因問言我前來
見此證今反變異故是名為災怪因問何緣作此吐
痢荅曰或有先服藥今發作故為災怪也
問曰人病形如循繩作累累然
其面白脫色
問曰人媿者其脉何等類師曰脉形如弱面形
乍白乍赤
問曰人不飲其脉何類師曰其脉自濇而脣口乾燥也
言遲者風也搖頭言者其裏痛也行遲者其表彊也
坐而伏者必心痛師持脉病人欠者無病也
伸者無病也一云病也呻也假令向壁卧聞師到不驚起而

目眴視一面仰視若三言三止脈之咽唾此為詐病假令脉自和百處乃今愈

脉遲疾短長雜脉法第十三

黃帝問曰余聞胃氣手少陽三焦四時五行脉法夫人言脉有三陰三陽知病存亡脉外以知內尺寸大小願聞之岐伯曰寸口之中外別浮沈前後左右虛實死生之要皆見寸口之中脉從前來者為虛邪從所不勝來者為賊邪從所勝來者為實邪從後來者為微邪自病一作得者為正邪外結者病癰腫內結者病疝瘕此為風也間來而急者病正在心癥氣也間來滑者為病食也脉來滑躁者病有熱也

脉來澁者爲病寒濕也脉遲而澁之道不出
師曰夫呼者脉之頭也初持之來疾去遲此爲出疾
入遲爲内虛外實初持脉來遲去疾此爲出遲入疾
爲内實外虛也

脉數則在府遲則在藏脉長而弦病在肝
脉小血少病在心扁鵲云脉大而洪病出於心脉下堅上虛病在
脾胃扁鵲云病出於肝脾胃脉滑一作澁而微浮病在肺扁鵲云病
出於肺脉大而堅病在腎扁鵲云脉小而緊病
少血多氣脉大者血氣俱多又云脉來大而堅者血
脉大而堅病在外熱脉滑者多血少氣脉澁者
氣俱實脉小者血氣俱少又云脉來細而微者血氣
俱虛沈細滑疾者熱遲緊為寒又云洪數滑疾為熱濇遲沈
盛滑緊者病在外熱脉小實而緊者病在内冷脉小

其人外熱風走刺有飲難治脈沈而緊上焦有熱下
寒得冷即痛一利重脈浮緊且滑直者外熱內冷不得大小便
脈洪大緊急病速進在外苦頭發熱癰腫脈細小緊
急病速進在中寒為疝瘕積聚腹中刺痛脈沈重而
直前絶者病血在腸間脈沈重而中散者因寒食成
癥脈直前而中散絶者病消渴一云病浸淫痛脈沈重前不
至寸口徘徊絶者病在肌肉遁尸脈左轉而沈重者
氣癥陽在胸中脈右轉出不至寸口者內有肉癥脈
累累如貫珠不前至有風寒在大腸伏留不去脈累
累中止不至寸口輭者結熱在小腸膜中伏留不去

脉直前左右彈者病在血脉中脉血也脉後而左右彈者病在筋骨中也脉前大後小即頭痛目眩脉前小後大即胷滿短氣上部有脉下部無脉其人當吐不吐者死上部無脉下部有脉雖困無所苦夫脉者血之府也長則氣治短則氣病數則煩心大則病進上盛則氣高下盛則氣脹代則氣衰細則氣少大素細作滑濇則心痛渾渾革革至如涌泉病進而危弊弊綿綿其去如紵絶者死短而急者病在上長而緩者病在下沈而紵急者病在內浮而洪大者病在外脉實者病在內脉虛者病在外在上為表在下為裏表沈為在裏

何以知之春得病無肝脉也無心脉夏得病無肺脉也無腎脉冬得病無脾脉四季之當以秋時發得病
假令肝病者西行若食雞肉得之以庚辛日也家有腥死女子見之以明要為災不者
若感金銀物得之
假令脾病東行若食雉兎肉及諸木果實得之不者
當以春時發得病以甲乙日也
假令心病北行若食豚魚得之不者當以冬時發得
病以壬癸日也
假令肺病南行若食馬肉及諸土中物得之不者當以
夏時發得病以丙丁日也
假令腎病中央若食牛肉及麞鹿肉得之不者當

以長夏時發得病以戊己日也

假令得王脉當於縣官家得之

假令得相脉當於嫁娶家得之

假令得胎脉當於産乳家得之或相慶賀家得之

假令得囚脉當於囚徒家得之

假令得休脉其人素有宿病不治自愈

假令得死脉當於死喪家感傷得之

何以知人素有陰也

何以知人素有陰也夏月得病諸陽入陰也

何以知人食飲中毒浮之無陽微細之不可知也但有陰脉來疾去疾此相為水氣之毒也脉遲者食乾

問曰假令病人欲差脉而知愈何以別之師曰寸關尺大小遲疾浮沈同等雖有寒熱不解者此脉陰陽為平復當自愈人病其寸口之脉與人迎之脉小大反浮沈等者病難已

朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞檢院上護軍臣林億等類次

平三關陰陽二十四氣脉第一

平人迎神門氣口前後脉第二

平三關病候并治宜第三

平奇經八脉病第四

平三關陰陽二十四氣脉第一

左手關前寸口陽絶者無小腸脉也苦臍痺小腹中有疝瘕王月本王字一作五即冷卜

心主在掌後橫理中即太陵穴也

左手關前寸口陽實者小腸實也苦心下急痺一作急痛

小腸有熱小便赤黃刺手少太陽經治陽一作陽者非手

陽在手小指外側本節陷中即後谿穴也
左手關前寸口陰絶者無心脈也苦心下毒痛掌中
熱時時善嘔口中傷爛刺手太陽經治陽
發之刺手心主經治陰
左手關上陽絶者無膽脈也苦心下有水氣憂恚
畏如見鬼狀多驚少力刺足厥陰經治陰在足大指
間即行間穴也或刺三毛中
左手關上陽實者膽實也苦膝疼口中苦眛目善
少陽經治陽在足小指次指即臨泣穴也
左手關上陰絶者無肝脈也苦疼遺溺難言舌下有

邪氣善吐刺足少陽經治陽

左手關上陰實者肝實也苦肉中痛動善轉筋刺足厥陰經治陰

左手關後尺中陽絶者無膀胱脉也苦逆逆冷婦人月水不通

使不調王月則閉男子失精尿有餘瀝刺足少陰經治陽

治陰在足內踝下動脉即太谿穴也

左手關後尺中陽實者膀胱脉實也苦逆冷胻下有邪氣相引痛刺足太陽經治陽在足小指外側本節後陷中即束穴也

左手關後尺中陰絶者無腎脉也苦足下熱兩髀裏急精氣竭少勞倦所致刺足太陽經治陽

左手關後尺中陰實者腎實也苦恍惚健忘目視眺

眩耳聾悵悵善鳴刺足少陰經治陰
右手關前寸口陽絶者無大腸脉也苦少氣心下有
水氣立秋節即效刺手太陰經治陰在魚際間即大淵
穴也
右手關前寸口陽實者大腸實也苦腸中切痛如錐
刀所刺無休息時刺手陽明經治陽在手腕中即陽谿
穴也
右手關前寸口陰絶者無肺脉也苦短氣欬逆喉中
塞噫逆刺手陽明經治陽
右手關前寸口陰實者肺實也苦少氣胷中滿彭彭
與肩相引刺手太陰經治陰
右手關上陽絶者無胃脉也苦吞酸頭痛胃中有冷
刺足太陰經治陰在足大指本節後一寸即公孫
穴也
右手關上陽實者胃實也苦腸中伏伏不思食

物得食不能消刺足陽明經治陽在足上動脈即衝陽穴也

右手關上陰絕者無脾脉也苦少氣下利腹滿身重

四肢不欲動善嘔區刺足陽明經治陽

右手關上陰實者脾實也苦腸中伏伏如堅狀大便

難刺足太陽經治陰

右手關後尺中陽絕者無子戶脉也苦足逆寒絕產

帶下無子陰中寒刺足少陰經治陰

右手關後尺中陽實者膀胱實也苦少腹滿引腰痛

刺足太陽經治陽

右手關後尺中陰絕者無腎脉也苦足逆冷上搶肖

痛夢入水見鬼善厭寐黑色物來掩人上刺足太陽

經治陽

右手關後尺中陰實者腎實也苦骨疼腰脊痛內寒
熱刺足少陰經治陰
平人迎神門氣口前後脉第二
右脉二十四氣事
心實
左手寸口人迎以前脉陰實者手厥陰經也病若閉
大便不利腹滿四肢重身熱苦胃脹刺三里
心虛
左手寸口人迎以前脉陰虛者手厥陰經也病若悸
恐不樂心腹痛難以言心如寒狀恍惚
小腸實
左手寸口人迎以前脉陽實者手太陽經也病苦身

熱熱來去汗出（作汗不出）而煩心中滿身重口中生瘡

左手寸口人迎以前脈陽虛者手太陽經病苦顱

際偏頭痛耳頰痛

左手寸口人迎以前脈陰陽俱虛小腸虛

左手寸口人迎以前脈陰陽俱實心小腸俱實

經俱實也病苦頭痛身熱大便難心腹煩滿不得臥

以胃氣不轉水穀實也

左手寸口人迎以前脈陰陽俱虛者手少陰與太陽

經俱虛也病苦洞泄苦寒少氣四肢寒腸澼

肝實

左手關上脈陰實者足厥陰經也病苦心下堅滿常
兩脅痛自念念如怒狀
肝虛
左手關上脈陰虛者是厥陰經也病苦脅下堅寒熱
腹滿不欲飲食腹脹悒悒不樂婦人月經不利腰腹痛
膽實
左手關上脈陽實者足少陽經也病苦腹中氣滿飲
食不下咽乾頭重痛洒洒惡寒脇痛
膽虛
左手關上脈陽虛者足少陽經也病苦眩厥痠足指
不能搖膝坐不能起僵仆目黃失精眩眩
肝膽俱實

左手關上脈陰陽俱實者足厥陰與少陽經俱實也

病苦胃脹嘔逆食不消

左手關上脈陰陽俱虛者足厥陰與少陽經俱虛也

病苦恍惚悒悒尸厥不知人妄見少氣不能言時自驚

肝膽俱虛

左手尺中脈陰實者足少陰經也

神門以後脈陰實者足少陰經也

病苦脐

腎實

脫脹閉少腹與腰脊相引痛

左手尺中脈陰虛者足少陰經也

病苦舌

燥咽腫心煩噎乾肖脇時痛喘欬汗出小腹滿腰

背彊急體重骨熱小便赤黃好怒好忘足下熱疼四

肢黑耳聾

左手尺中沈神門以後脉陰虛者足少陰經也病苦心中悶下重足腫不可以按地

腎虛

左手尺中沈神門以後脉陽實者足太陽經也病苦逆滿腰中痛不可俛仰勞也

膀胱實

左手尺中沈神門以後脉陽虛者足太陽經也病苦脚中筋急腹中痛引腰背不可屈伸轉筋惡風偏枯腰痛外踝後痛

膀胱虛

左手尺中沈神門以後脉陰陽俱實者足少陰與太陽

腎膀胱俱實

經俱實也病苦脊彊反折戴眼氣上搶心脊痛不能
自反側
左手尺中神門以後脉陰陽俱虛腎膀胱俱虛
經俱虛也病苦小便利心痛背寒時時少腹滿
右手寸口氣口以前脉陰實者手太陰經也病苦肺
脹汗出若露上氣喘逆咽中塞如欲嘔狀肺實
右手寸口氣口以前脉陰虛者手太陰經也病苦少
氣不足以息嗌乾不朝津液
大腸實

右手寸口氣口以前脉陽實者手陽明經也病苦腹滿善喘欠面赤身熱喉咽

大腸虛

中喘腸鳴虛渴脣口乾目急善驚泄白

肺大腸俱實

經俱實也病苦頭痛目眩驚狂喉痺痛手臂攣卷脣吻不收

肺大腸俱虛

右手寸口氣口以前脉陰陽俱虛者手太陰與陽明經俱虛也病苦耳鳴嘈嘈時妄見光明情中不樂或

如恐怖

右手關上脈陰實者足太陰經也病苦足寒脛熱腹脹滿煩擾不得卧

脾實

右手關上脈陰虛者足太陰經也病苦泄注腹滿氣逆霍亂嘔吐黃疸心煩不得卧腸鳴

脾虛

胃實

右手關上脈陽實者足陽明經也病苦腹中堅痛而熱

千金作病

苦頭痛汗不出如溫瘧唇口乾善嗌乳癰缺盆腋下腫痛

胃虛

右手關上脉陽虛者足陽明經也病苦脛寒不得卧

惡寒洒洒目急腹中痛虛鳴外臺作耳虛鳴時寒時熱脣口乾面目浮腫

脾胃俱實

右手關上脉陰陽俱實陽明經俱實者足太陰與陽明經俱實也

病苦脾胞脹腹堅搶脅下痛胃氣不轉大便難時反泄

利腹中痛上衝肺肝動五藏立喘鳴多驚身熱汗不出唉痺精少

脾胃俱虛

右手關上脉陰陽俱虛者足太陰與陽明經俱虛也

病苦胃中如空狀少氣不足以息四逆寒泄注不已

腎實

右手尺中神門以後脉陰實者足少陰經也病苦痺身熱心痛脊脇相引痛足逆熱煩

右手尺中神門以後脉陰虛者足少陰經也病苦足脛小弱亞惡風寒脉代絶時不至足寒上重輕行不可以按地少腹脹滿上搶猪肖胗痛引肋下

膀胱實

胞不得小便頭眩痛煩滿脊背彊

膀胱虛

右手尺中神門以後脉陽實者足太陽經也病苦肌肉振動脚中筋急耳聾忽忽不聞惡風腫聲

右手尺中神門以後脉陽虛者足太陽經也病苦肌

右手尺中神門以後脉陰陽俱實者足少陰與太陽
經俱實也病苦癲疾頭重與目相引痛厥欲起走反
眼大風多汗
腎膀胱俱實
右手尺中神門以後脉陰陽俱虛者足少陰與太陽
經俱虛也病苦心痛若下重不自收篡反出時時苦
洞泄寒中泄腎心俱痛
腎膀胱俱虛
一說云腎有左右而膀胱無二今用當以左腎合膀
脫右腎合三焦
寸口脉浮中風發熱頭痛宜第三
平三關病候并治宜服桂枝湯葛根湯針風

池風府向火灸身摩治風喜覆令汗出
寸口脉緊苦頭痛骨肉疼是傷寒宜服麻黄湯發汗
針眉衝顳顬摩治傷寒喜覆令汗出
寸口脉微苦寒為劒宜服五味子湯摩茱萸喜令
汗出
寸口脉數即為吐以有熱在胃管重煮當中宜服
之及針胃管服除熱湯若是傷寒七八日至十日熱
在中煩滿渴者宜服知母湯
寸口脉緩皮膚不仁風寒在肌肉宜服防風湯以藥
薄熨灸之摩以風喜灸諸治風穴
寸口脉滑陽實當中壅滿吐逆宜服前胡湯針太陽
巨闕瀉之

寸口脉紇心下悸幅幅微頭痛
圓針期門瀉之
寸口脉弱陽氣虛自汗出而短氣宜服茯苓湯內補
散適飲食消息勿極勞針胃管補之
寸口脉澁是胃氣不足宜服乾地黃湯自養調和飲
食針三里一作胃管補之
寸口脉乱吐血微乱者衄血空虛去血故也宜服竹
皮湯炙薑中
寸口脉伏肖中迫氣噎塞不通是胃中冷氣上衝心
肖宜服前胡湯大三建圓針巨闕上管炙膻中
寸口脉沈肖中引胷痛肖中有水氣宜服澤漆湯針
巨闕瀉之

寸口脉濡阳氣弱自汗出是虛損病宜服乾地黃湯

署預圓内補散牡蠣散并粉針太衝補之

寸口脉遲上焦有寒心痛咽酸吐酸水宜服附子湯

生薑湯茱萸圓調和飲食以煖之

寸口脉實即生熱在脾肺嘔逆氣塞虛即生寒在脾

胃食不消化有熱即宜服竹葉湯葛根湯有寒宜服

茱萸圓生薑湯

寸口脉細發熱吸吐宜服黃芩龍膽湯吐不止宜服

橘皮桔梗湯灸中府

寸口脉大肖脇滿宜服生薑湯白薇圓亦可紫菀

湯下之針上管期門章門

右上部寸口十七條

關脉浮腹滿不欲食浮為虛滿宜服平胃圓茯苓湯
生薑前胡湯針胃管先瀉後補之
關脉堅心下苦滿急痛脉堅者為實宜服芍藥湯
歸湯又大黃湯兩治之良針巨關下管瀉之

當歸湯又加大黃二兩注射千金云服芍藥湯

圓針巨關補之
關脉微胃中冷心下拘急宜服附子湯生薑湯附子湯
關脉數胃中有客熱宜服知母圓除熱湯針巨關上
管瀉之
關脉緩其人不欲食此胃氣不調脾氣不足宜服平
胃圓補脾湯針章門補之
關脉滑胃中有熱滑為熱實以氣滿故不欲食食即

吐逆宜服茯苓苑湯下之大平胃圓針胃管瀉之
服朴消麻黃湯平胃圓
關脉絃胃中有寒心下厥逆此以胃氣虛故云有熱不可大攻之熱去則寒起正宜服竹葉湯針胃管補之
茱萸湯温調飲食針胃管補之
關脉弱胃氣虛胃中有客熱脉弱為虛熱作病其說
胃管補之
關脉濇血氣逆冷脉濇為血虛以中焦有微熱宜服
乾地黃湯内補散針足太衝上補之
關脉乳大便去血數斗者以腸輸傷故也宜服生地
黃并生竹皮湯灸腸輸若重下去血者針關元甚者
宜服龍骨圓必愈

關脉伏中焦有水氣溏泄宜服水銀圓針關元利小便溏泄便止

關脉沈心下有冷氣苦滿吞酸宜服白薇茯苓圓附子湯針胃管補之

關脉濡苦虛冷脾氣弱重下病宜服赤石脂湯女萎圓針關元補之

關脉遲胃中寒宜服桂枝圓茱萸湯針胃管補之

關脉實胃中痛宜服烏頭圓附子湯茱萸烏頭圓針胃管補之

關脉牢脾胃氣塞盛熱即腹滿響響宜服茱菀圓瀉之灸胃管瀉之

關脉細虛腹滿宜服生薑茱萸蜀椒湯白薇圓針灸三管

關脉洪胃中熱必煩滿宜服平胃圓針胃管先瀉後補之

右十八條

尺脉浮下熱風小便難宜服瞿麥湯滑石散針橫骨關元瀉之

尺脉緊臍下痛宜服當歸湯灸天樞針關元補之

尺脉微厥逆小腹中拘急有寒氣宜服小建中湯

更有四順湯針氣海

尺脉數惡寒臍下熱痛小便赤黃宜服雞子湯白魚

散針橫骨瀉之

尺脉緩脚弱下腫小便難有餘瀝宜服滑石湯瞿麥

散針橫骨瀉之

尺脉沈腰背痛宜服腎氣圓針京門補之

尺脉濡苦小便難千金云脚痺宜服腥麥湯白魚散針關元瀉之

尺脉遲下焦有寒宜服桂枝圓針氣海關元補之

尺脉實腹痛小便不禁宜服當歸湯加大黃一兩以利大便針關元補之止小便

尺脉牢腹滿陰中急宜服葶藶子萊菔圓針丹田關元

平右下部尺脉十六條

脉有奇經八脉病第四

蹻有衝督有任有帶之脉凡此八脉者皆不拘於

經故曰奇經八脉也經有十二絡有十五凡二十七氣相隨上下何獨不拘於經也然聖人圖設溝渠通利水道以備不虞天雨降下溝渠溢滿霖霪妄行當此之時聖人不能復圖也此絡脉流溢諸經不能復拘也

奇經八脉者既不拘於十二經皆何起何繫也然陽維者起於諸陽之會陰維者起於諸陰之交陽維陰維者維絡于身溢畜不能環流溉灌諸經者也陽蹻者亦起於跟中循外踝而上行入風池陰蹻者起於跟中循內踝而上行至咽喉交貫衝脉衝脉者起於氣衝並少陰之經夾臍上行至胷中一云衝脉者起於氣衝並陽明之經夾臍上行至

風府衝脉者陰脉之海也督脉者陽脉之海也任脉者起於胞門子戸夾臍上行至肖中（上毛際循腹裏上關元至咽喉）帯脉者起於季肋（難經作季脇）回身一周此八者皆不繫於十二經故曰奇經八脉者也奇經（難經作奇行）之為病其内（脉緩七即脉持即失志善忘恍惚也）陽維為衛（令身不能自収持也）陽維為病苦寒熱陰維為榮（難經作営）陰維為病苦心痛（陽維為衛衛為寒熱故心痛也）陽蹻為病苦急（陰蹻在内踝上病急從内踝以上急）陰蹻為病苦緩（陰蹻在内踝以上緩從内踝以上緩）而陽急（陽蹻在外踝以上病急當從外踝以上急）病逆氣而裏急（其脉急其病逆關元氣上衝即其脉急）陰緩而陽急（陽蹻在外踝以上病急内踝以上緩）病逆氣而裏急（其脉急其病逆關元氣上衝至咽喉故而裏急）督脉為病其内（人緩）彊而厥（督脉在背病即脊強也）其

之為病其内（脉緩七即脉持即失志善忘恍惚也）陽維為衛（令身不能自収持也）陽維為病苦寒熱陰維為榮（難經作営）陰維為病苦心痛（陽維為衛衛為寒熱故心痛也）陽蹻為病苦急（陰蹻在内踝上病急從内踝以上急）陰蹻為病苦緩（陰蹻在内踝以上緩從内踝以上緩）而陽急（陽蹻在外踝以上病急當從外踝以上急）病逆氣而裏急（其脉急其病逆關元氣上衝即其脉急）陰緩而陽急（陽蹻在外踝以上病急内踝以上緩）病逆氣而裏急（其脉急其病逆關元氣上衝至咽喉故而裏急）督脉為病其内（人緩）彊而厥（督脉在背病即脊強也）其

爲七疝女子爲瘕聚任脈起於胞門子戶其病結為七疝瘕聚故帶之爲病苦腹滿腰容容難經作溶溶寒

診得陽維脈浮者鼓起目眩陽盛實苦肩息洒洒如即其脈緩故也此奇經八脈之爲病也

診得陰維脈沈大而實者苦胷中痛脅下支滿心痛如貫珠者男子兩尺脅實腰中痛女子陰中痛狀

診得陰維陽維脈左右遠臍腹腰脊痛衝陰股也

診得帶脈浮者鼓有陰陰陽皆實盛者此帶之爲病故帶脈者環身體病人溶溶如坐水中狀

兩手脈浮之俱有陽沈之俱有陰陰陽皆實盛者此爲衝督之脈也衝督之脈者十二經之道路也衝督用事則十二經不復朝於寸口其人皆苦恍惚狂癡

不者必當由豫有兩心也
不可知俱有陰脉亦復細綿綿此爲陰蹻
也此家會有病鬼魅風死苦恍惚亡人爲
診得陽蹻病拘急陰蹻病緩
尺寸俱浮直上直下此爲督脉腰背強痛不得俛仰
大人癲病小人風癇疾
脉來中央浮直上下痛者督脉也動苦腰背膝寒大
人癲小兒癇也灸頂上三圓正當頂上
尺寸脉俱牢（一作直）直上直下此爲衝脉當中有寒血也
脉來中央堅實徑至關者衝脉也動苦少腹痛上搶
心有瘕疝絶孕遺失溺加腎支滿煩也橫寸口邊丸丸
此爲任脉苦腹中有氣如指上搶心不得俛仰拘急

脉來緊細實長至關者任脉也動苦少腹痛繞臍下引
橫骨陰中切痛取臍下三寸

脉經卷第二

脉經卷第三

朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等類次

肝膽部第一

心小腸部第二

脾胃部第三

肺大腸部第四

腎膀胱部第五

肝膽部第一

肝象木冊於五行木與膽合為府膽為清淨之府其經足厥陰少陽為表裏少陽膽脉也藏陰故為表裏其脉紆紆脉紆之形也大

肝與足少陽膽脉紆紆脉紆之形也大

肝象木冊於五行木與膽合為府膽為清淨之府其經足厥陰少陽為表裏少陽膽脉也藏陰故為表裏其脉紆紆脉紆之形也大

其相冬三月冬水王春三月廢夏三月夏火王木相

四季夏六月季夏土王木囚秋三月秋金王木死冬

王時平旦日出也並木其死日入並金也其色蒼其臭臊其液泣肝其味酸其宜苦苦味也火

其死日庚辛死時晡時日入也並金其神魂肝之藏者

色其養筋肝氣所養者筋其候目肝候出目故肝寔則目赤其聲呼其色

青其臭臊肝令云臊膟其液泣出其味酸其宜苦苦味也火

膻俞在背第十椎募在期門直兩乳下一肋端

右新撰並出素問諸經昔人撰集或混雜相涉煩而難了今抄事要分別五藏各以為一部

冬至之後得甲子少陽起於夜半肝家王冬終之至者歲

故子日者陰陽更始之數也半其氣常微少故言少陽云夜半子者水也於水

而弱寬而虛春少陽氣温和柔日生焉故脉為紘肝氣養於

肝者東方木王東方應木藏府故木行也萬物始生其氣來柔

紘強示木體強強法也柔即不可下寬者開開者

通通者利故名曰寛而虚言少陽始起未止不可下之而泄利不禁故言寛虚通利也

土也萬物言土而生胃亦養五藏故肝王以胃氣為本不可犯者胃犯也

右四時經

黄帝問曰春脉如絃何如而絃伎伯曰春脉如絃而絃伎此謂太過病在外其氣來不及病在中黄帝曰春脉太過與不及則令人善忘（忘作怒）當忽忽眩冒而癲疾不及則令人胸脇痛引背下則兩脇滿黄

肝脉来濡弱招招如揭竿末梢曰平 巢源按琴
揭長竿曰平 春以胃氣為本肝脉來盈實而滑如循長竿
曰肝病 肝脉來急而益勁如新張弓弦曰肝死
真肝脉至中外急如循刀刃責責然 巢源云絃、如
琴瑟之絃、如 績、然如按琴瑟之絃
春胃微絃曰平絃多胃少曰肝病但絃無胃曰死有
胃而毛曰秋病毛甚曰今病
肝藏血舍魂悲哀動中則傷魂魂傷則狂妄不精
不敢正當人 不精不敢正當人一作其精不守舍人陰縮
脇骨不舉毛悴色夭死于秋
春肝木王其脉絃細而長名曰平脉也反得浮濇而
短者 金匱微濇是肺之来肝金之刻未為賊邪大逆
而短

十死不治一本云日月反得洪大而散者十全云浮大而洪是心之病至三息庚辛乘肝子之扶毋為實邪雖病自愈反得沈濡而滑者是腎之歸子為虛邪雖病易治反得大而緩者是脾之乘肝土之陵木為微邪雖病即差肝脉來濯濯如倚竿如琴瑟之絃再至曰平三至曰離經病四至脫精五至死六至命盡足厥陰脉也肝脉急甚為惡言微急為肥氣在脅下若覆杯緩甚為善嘔微緩為水痕痺大甚為內癰善嘔嘔而脉微大為肝痺縮攣筋效引少腹小甚為多飲微小為消癉癉滑甚為遺溺濇濇甚為淡飲微濇為痿痿躄攣筋頸血微滑為遺溺濇濇甚為淡飲微濇為痿痿躄攣筋足厥陰氣絕則筋縮引卵與舌厥陰者肝脉也肝者筋之合也一本筋者聚於陰器而脉絡於舌本故脉弗營

則筋縮急筋肉縮急則引舌與卵故脣青舌卷卵縮則
筋先死庚篤辛死金勝木也
肝死藏浮之脉弱按之中如索不來或曲如蛇行者死
右素問鍼經張仲景

心小腸部第二

心象火與小腸合為府小腸為受
之腑府也其經手少陰手少陰心脉也
其脉洪洪之大心脉形
其相春王夏三月廢季夏六月囚秋三月相王冬三月
火木火木死王時禺中日中其王日丙丁戊己其王
時晡時日入其死日壬癸死時人定夜半其藏
神心之所藏也其主臭其養血心氣血所養者血其候
言由心出也其色赤其臭焦其液汗其味苦其宜甘甘

味也其惡鹹鹹味也心俞在背第十八椎
在心下一寸小腸俞在背第十九椎
一寸

右新撰

心者南方火心主血其色赤故以
心者南方火夏王於南方應火行萬物洪盛垂枝布
葉皆下垂如曲故名曰鈎心木茂盛枝葉布
曲故謂之鈎也心脈洪大而長洪則氣無從出
脈洪者衛氣實衛氣實則榮氣萌萌洪相薄可
腠理密密則氣無從出大曰長榮者血也
以發汗故名曰長王故明且大也榮明衛之誤耳血
動通其津液也長洪相得即引水漿既灌經絡津液皮膚夏
陽氣盛故其萌當為明字之誤耳血
養皮毛猫草須兩澤以長肥膚以
毋軀幸得戊已用牢根株太陽洪大皆是
洪盛名曰太陽人引水漿潤灌
土為火子火生土相故用牢根株也
太陽夏火春木為其母陽
春始生名曰少陽到夏
陽氣上出

也月當為內薪脬中空虛醫反下之此為重虛也白來遠矣遂以傳焉乾枯燥則脬中空虛津液少也故反脈浮有表無裏陽無所使其汗而反下之損於陰氣陽為表陰為裏經言陽浮故無裏也治陰使陰為陽守相須而行脈別使不但危身并中其毋言下之心并復中不但傷肝

右四時經

黃帝問曰夏脈如鉤何如而反鉤歧伯曰夏脈如鉤鉤反此者病在中黃帝曰何如而反歧伯曰其氣來盛去反盛此謂不及方火也萬物之所以盛長也故其氣來盛去衰故曰鉤反此者病在外其來不盛去反盛此謂太過病在外其來不盛去反盛此謂不及亦盛此謂太過病在外其來不及其病皆何如歧伯

曰太過則令人身熱而膚痛為浸淫不及則令人煩心上見欬唾下為氣泄帝曰善

心脉來累累如連珠如循琅甲乙作累ヒ連屬其中微曲曰心病心脉來喘喘連屬其中微曲曰心病

前曲後居如操帶鉤曰心死

真心脉至堅而搏如循薏苡子累累然其色赤黒不

澤毛折乃死

夏胃微鉤曰平鉤多胃少曰心病但鉤無胃曰死胃

而有石曰冬病石甚曰今病

心藏脉脉舍神怵惕思慮則傷神神傷則恐懼自失

破腘脫肉毛悴色夭死于冬

夏心火王其脉洪大而散名曰平脉反得

沈濡而滑者是腎之乘心水
死不治一本云日月年數至二忌壬癸反得
子之扶毋為實邪雖病自愈反得紘細而長者是肝
之乘心毋之歸子為虛邪雖病易治反得浮千金浮作微
濇而短者是肺之乘心金之陵火為微邪雖病即差
心脉來累累如貫珠滑利再至曰離經病
四至脫精五至死六至命盡手少陰脉
心脉急甚為痺痛微急為心痛引背食不下緩甚為
狂笑微緩為伏梁在心下上下行時唾血大甚為喉
痺微小為消癉滑甚為善渴微滑為心痛引臍少腹鳴
微濇為血溢維厥耳鳴巔疾手少陰氣絶則脉不通

少陰者心脉也心者脉之合也脉不通則血不流血不流則髮色不澤故其面黑如漆柴者血先死癸死水勝火也心死藏浮之脉實如豆麻擊手按之益躁疾者死

右素問鍼經張仲景

脾胃部第三

脾象土與胃合為府胃為水穀之府其經足太陰之太陰脾脉也與足陽明為表裏陽明胃脉也其脉緩大形也其相夏三月火王土相王季夏六月廢秋三月囚冬三月死春三月其王日戊己王時食時日昳困日壬癸困時人定夜半出並時也其神意其主味其養肉其候口其聲歌其色黃其臭香其液涎其味甘

其宜辛其惡酸脾俞在背第十一椎募在章門季肋端是

胃俞在背第十二椎募在太倉

右新撰

脾者土也敦而福敦者厚也萬物衆色皆同

微弱水穀不化脾為土行於季夏土性敦厚有養萬物懸根佳莖其葉在巔蜎蜚蠕動支蠉躍喘息皆蒙土恩

萬物當此之時脾則同稟諸藏故多或青黃赤白黑色

各不同矣

其德為大

故名曰得福者廣土生養萬物

廣大

故令太陰脉緩而遲尺寸不同

血脉之類也言普天之下不被蒙土之恩福也草木之類也其次則

昆蟲無不懸根佳莖草木

微之蟲因陰陽氣變化而生者也

同者尺遲也

而寸緩也

酸鹹苦辛大一作太

沙一作涉又作妙

時而以各行皆不羣行盡可常服

脾王之時脉緩而遲

肝酸腎鹹心苦脇辛藏之味

也脾主調和五味以稟四
時其脉沙一作又作妙達於肌肉
行隨其四藏受味於脾
毛皆不一作行至一處也故
之中元行人身軀
言盡可常服也
支使其氣周匝
榮諸藏府以養皮
温土熱則生涼冬陽氣在下
名之曰金子而藏火神閉
土寒則
清涼脾氣亦然土中温煖夏陰
逐棄其母逃歸水中水自
有一子
内外不通此謂冬時也陽火
熱來熏
其身金乃畏火恐
氣在中陽為火行
火也母子相得益盛閉塞
故恐熏之金歸水
其中此為脾之衰損土
不通者言水氣充
弱固火無復得
中金性畏
往刻之者神密之
洋溢浸漬為池其
實金在
土亡其子甘
類也
皮膚面目浮腫歸於四肢
地作走擊
之而
妄行愚醫見水直往下之
以防水
虚脾空胃水遂居
水得陵
之肺為
喘浮脾胃已病宜扶養其氣通利水道愚醫
往下之此為重傷水氣遂更陵之上侵
肺金浮則木比
得水而浮
肝反畏肺故下
肺金沒
為相刺
故言喘浮肝
復刺肝

故曰之沈下有荊棘恐傷其身避在一邊以為水流沒於下

荊棘木之類肝為木今沒在下則為荊棘其身脾也土畏木是以避在一邊避木也水之復鬱木故水得流行

沈故令脉伏而沈心火肝木水相得其氣則實刻於肝脉伏而沈心衰則伏肝微則脉微也

三藏衰弱又心衰則伏水而令微火則畏水而令微金畏金土本刻水故水得流行

工醫來占固轉孔穴利其溲便治其順甘液下流亭其陰陽喘息則安逆之榮所故轉治其順甘液脾之榮衛開通水氣消除肝得還著其根

道甘液下流亭其陰陽喘息則微汗出正流行肝著其根心氣因起陽行四肢肺氣亭亭喘息則安逆之榮所故轉治其順甘液脾之榮衛開通水氣消除肝得還著其根

為母子平調故言亭亭此為端好之肺之類腎為安聲其味為鹹

為母子肝著則心氣得起肺之類腎為安聲其味為鹹

肺主聲腎為其子助於肺故言安聲鹹腎味也倚坐母敗涔臭如腥

水中此為母往從子脾氣反倚倒致敗則涔臭而腥故云然也

相刻賊倚虛五藏猶此而土得其

子則成為山金得其母名曰邱矣

黃帝曰四時之序逆順之變異也然脾脉獨何主歧伯曰脾者土也孤藏以灌四傍者也曰然則脾善惡可得見乎曰善者不可得見惡者可見曰惡者何如曰其來如水之流者此謂太過病在外如鳥之喙此謂不及病在中太過則令人四肢沈重不欲舉其不及則令人九竅壅塞不通名曰重強脾脉來而和柔相離如雞足踐地曰平長夏以胃氣為本脾來實而盈數如雞舉足曰脾病脾脉來堅兌如屋之漏如水之流曰脾死脾脉來緩而薄如水之溜曰脾死一作數色青黃不澤毛折乃死真脾脉至弱而乍疎乍數如雀之啄如屋之漏如水之流曰脾微濡弱曰平弱多胃少曰脾病但代無胃曰

死濡弱者石曰冬病石甚曰今病

脾藏榮榮舍意愁憂不解則傷意意傷則悶亂四肢不舉毛悴色夭死于春

六月季夏建未坤未之間土之位脾王之時其脉大阿阿而緩名曰平脉反得紾細而長者是肝之乘脾木之刻土為賊邪大逆十死不治反得浮（千金作微）金浮濇是肺之乘脾子之扶母為實邪雖病自愈反得沈濡而滑者腎之乘脾母之歸子為虛邪雖病易治反得（千金大而洪作浮）是心之乘脾母之紹子為虛邪雖病即差

土為微邪雖病即差

脾脉葸葸而弱（千金葸作長）來踈去數再至曰平三至曰離經病四至脫精五至死六至命盡足太陰脉也

脾脉急甚為痺痛微急為脾中滿食飲入而還出後
沃沫緩甚為痺痛微緩為風痺四肢不用心慧然若
無病大甚為擊仆微大為病氣裏大膿血在腸胃之
外小甚為寒熱微小為消癉滑甚為顛微滑為蟲
毒蚘腸鳴熱濇甚為腸顛微濇為內潰多下膿血也
足太陰氣絕則脉不榮其口脣口脣者肌肉之本也
脉不榮則肌肉濡肌肉濡則人中滿人中滿則脣反
脾死藏浮之脉大緩一云緊一作堅按之中如覆杯絜絜狀如
搖者死如灸肉

肺大腸部第四

右素問鍼經張仲景

肺衆金也與大腸合為府導之府也其經手太陰手陽明大腸為表裏脈也其脉浮大形也

相季夏六月季夏土王秋三月廢冬三月囚春三月夏火王金死王日庚辛王時晡時入其

月死夏三月夏火王金死王日庚辛王時晡時入其

囲日甲乙囲時平旦日出其死日丙丁死時禺中日

中其神晡其主聲其養皮毛其候皐其聲哭其色白

其臭腥其液涕其味辛其宜鹹其惡苦肺俞在背第

三椎五或云第推也募在中府直兩乳上一寸半各

六椎募在天樞依臍傍各

右新撰

肺者西方金萬物之所終金性剛故王西方終物萬物是以皆終於秋也割断萬

宿葉落何萎萎枝條其杭然獨在其脉為微浮毛衛

氣遲蓼落但一者零落之貌言草木宿葉得秋氣獨在此時陽氣則遲隨風而
微如毛也榮氣數數則在上有枝條杌然脈為虛
脈遲榮氣數數反言榮氣數陰得秋節諸陽脈數諸陰脈
在陽位故是以時定二陽上也此時陰始用事陽即下
藏其氣反肺脈數散如毛也以陽當陷而不陷陰當昇而不昇為
邪所中陰陽不應數反感激故為風寒所中陽中邪則
氣遲陽交易則不以時定二陽中邪則為慄寒慄相薄故名曰瘧
則發熱浮乃來出捲者謂初捲其人拘捲也緊者脈緊也此
邪則緊捲則惡寒緊則為慄寒慄相薄故名曰瘧陰中風寒之時脈緊其
寒止而脈更微弱則浮浮者瘧解人則寒
熱止則脈出也旦中旦發暮中暮
發言瘧發皆遍其初時也藏有遠近脈有遲疾周
行有漏刻有度數藏謂人五藏肝心脾肺腎也心肺
在陽下隔上是為近呼為陽其脈遲疾腎肝
在陽下吸則其氣入是為遠也吸為陰其脈遲度數
謂經脈之長短周身行者榮衛之行也行陰陽各二
十五度為一周也百刻也遲在上傷毛采數在下傷
以應漏下焦中

焦有惡則見有善則匿秋毛采也其脉遲陰氣之皮毛肺氣所應遲今反數故言變故言傷之時脉常自不見衰乃見耳故云有惡則見也陽氣下行下焦在臍下傷下焦中焦脾也其平善時節人之血脉和平言可長留竟一時

養藏諸陽反在下陰反在巔故名曰長而且留陰陽交代各順

右四時經

黃帝問曰秋脉如浮何如而浮岐伯對曰秋脉肺也萬物之所以收成也故其氣來輕虛而浮西方金也其氣急去散故曰浮反此者病黃帝曰何如而反岐伯曰太過病在其氣來毛而中央堅兩傍虛此謂太過病在外其氣來毛而微此謂不及病在中黃帝曰秋脉太過與不及其病何如岐伯曰太過則令人氣逆而背

痛溫溫作內經溫ㄈ然不及則令人喘呼吸少氣而欬上氣見血下聞病音

肺脉來厭厭聶聶如落榆莢曰肺平秋以胃氣為本

難經云厭ㄈ聶ㄈ如循車蓋按之益大曰秋平脉肺脉

下如循雞羽曰肺病藥求字源無肺脉來如物之浮如風

吹毛曰肺死

真肺脉至大而虛如以毛羽中人膚色赤白不澤毛

折乃死秋見之

肺藏氣氣舍皫喜樂無極則傷皫皫傷則狂狂者意

不存人皮革焦毛悴色天死于夏秋金肺王其脉浮

曰死毛而有紋曰春病紋甚曰今病

胃微毛曰平毛多胃少曰肺病但毛無胃

千金作浮微

千金作浮大而洪

是心之乘肺火之刻金為賊邪大逆十死不治
月年数至 四忌丙丁 反得沈濡而滑者是腎之乘肺子 為實邪雖病自愈反得大而緩者是脾之乘肺母之 歸子為虚邪雖病易治反得弦細而長者是肝之乘 肺木之陵金為微邪雖病即差肺脉來汎汎輕如微 風吹鳥背上毛再至曰平三至曰離經病四五至脫精 五至死六至命盡手太陰脉 肺脉急甚為癲疾微急為肺寒熱怠墮欠唾血引腰 背脊苦皇皇息肉不通緩甚為多肝微緩為瘘偏風作一 風濕頭以下汗出不可止大甚為脛腫微大為肺痺引 脊背起腰內小甚為消癉滑甚為上氣微滑為上下出血濇甚為嘔血微濇為鼠瘻在

頸支掖之間下不勝其上其能喜酸
手太陰氣絕則皮毛焦太陰者行氣温皮毛者也氣
弗營則皮毛焦皮毛焦則津液去津液去則皮節傷
皮節傷者則仌（仌字一作皮）枯毛折毛折者則氣（氣字一作毛）
肺死藏浮之虛按之弱如葱葉下無根者死
先死丙篤丁死火勝金也
右素問鍼經張仲景

腎

腎象水與膀胱合為府（膀胱液之府）津其經足少陰（足少陰腎脉也）
與足太陽為表裏（足太陽膀胱脉也）其脉沈（沈腎脉之大形也）
秋三月（秋金王相）其王冬三月春廢春三月夏三月其
死季夏六月其王日壬癸王時人定夜半其困日丙

丁困時罵中日中其死日戌
志腎之所藏者志也藏
黑其臭腐其液唾其味鹹其宜酸其惡甘腎俞其候耳其聲呻其色
第十四椎募在京門膀胱俞在第十九椎募在中極
横骨上一寸在臍下五寸前陷者中
右新撰

腎者北方水萬物之所藏冬則北方用事王在三時之後腎在四藏之下故王
北方也萬物春生夏長秋收冬藏蟲冬伏蟄不食百蟲伏蟄之
陽氣下陷陰氣上升陽氣中出陰氣上昇化為雪霜猛獸伏蟄蝮蛇蟄蟲蟄藏陽氣下陷者謂降於土中
雪霜猛獸伏蟄蝮蛇蟄蟲蟄藏陽氣下陷者謂降於土中
在上寒盛陽氣雖昇出而不能自致因而化作霜雪或謂陽氣中出是十月則霜降猛獸伏蟄者蓋謂龍
地冬時而替出陰氣昇出陰氣越而昇化為霜
蟄丞遷陽氣所在處螺蟲無毛甲者得寒皆伏
如此避水霜自温養也

其脈為沈

沈為陰在裏不可發汗發則蜾蠃出見其霜雪陽在下氣
故冬脉沈温養於藏府出逆治養於藏府出逆治非其法
其汗此為裏實而表虛復從外發而反出也此為裏實而表虛復從外發而反出
土見於冰霜必死不疑逆治非其法此猶百蟲伏蟄之時不
逆治者死此之謂也可發汗也下之既損於陽氣而
下下之者傷脾脾土弱即水氣妄行陽氣在藏故
水而今反傷之故令水氣得盈溢而妄行也下温養
魚出水蛾入湯言治病逆則戕人如魚出水蛾入湯火之中立死重
慎不可重之逆客其息則喘重客者猶陽氣也重
重之逆客其息則喘者尊重之貌陽氣在裏不可
無持客熱令口爛瘡不通正陽遂厥陰不往從血行
陽遂厥陰不往從會如環之無端也血為陰氣為陽
相須而行發其汗使陰陽離別脉為解散血不得陰通
戕者逆也謂陽氣逆不復相朝使為病去失所故陰通
陽氣相薄是為逆也氣上熏於上今一時在下非其常所故言客也
故令喘息尊重之貌無持者無以湯火之中立死熏謂燒外入與
火發熏其汗也熏之則火氣生瘡陰脉且解血散不通正
入裏為客熱故令其口爛瘡陰脉中氣行脉外五十周而復

陽錯迺可不慎也

氣遂弱清客熱狂入內為結肖陽錯乱外熱狂中也腜果

反清淒者是謂下刷玉刷也

黃帝問曰冬脈如營而營岐伯對曰冬脈腎也北方水也萬物之所以合藏故其氣來沈以搏甲乙作濡故曰營反此者病黃帝曰其氣來如何如而反岐伯曰其氣來如彈石者此謂太過病在外其去如數者此謂不及病在中黃帝曰冬脈大過與不及其病皆如何岐伯曰太過則令人解㑊脊脈痛而少氣不欲言不及則令人心懸如病飢耎中清脊中痛少腹滿小便黃赤腎脈來喘喘累累如鉤按之而堅白腎平冬以胃氣

脾主水穀其氣微弱水穀不化下刷水道出而清者刷也淒從入陰陽錯乱外熱狂中也

為本腎脉來如引葛按之益堅曰腎病腎脉奪索辟辟如彈石曰腎死真腎脉至搏而絶如以指彈石辟辟然色黄黑不澤毛折乃死

冬胃微石曰平石多胃少曰腎病但石無胃曰死石而有鉤曰夏病鉤甚曰今言病

凡人以水穀為本故人絶水穀則死脉無胃氣亦死所謂無胃氣者但得真藏脉不得胃氣也所謂脉不得胃氣亦死也

得胃氣者肝不絃腎不石止則傷志傷志則善忘其腎藏精精舍志盛怒而不止則傷志傷志則善忘其前言腰脊痛不可以俛仰屈伸毛悴色夭死于季夏

冬腎水王其脉沈濡而滑曰平脉反得大而緩者是

脾之乘腎土之刻水為賊邪大逆十死不治
（救至一忌戌巳反得絃細而長者是肝之乘腎子之乘腎
實邪雖病自愈反得浮（千金作微）濇而短者是肺之乘腎母之歸子
為虛邪雖病易治反得洪大而是心之乘腎火之陵水為微邪雖病即差腎脉
沈細而緊（千金作浮）者是腎之乘腎同氣相求不再至曰平三至曰離經病四至脫精五至
死六至命盡足少陰脉也
腎脉急甚為骨痿癲疾微急為奔豚沈牢洞下洞下洞下者食不收不
得前後緩甚為竹脊微緩為長不化入
咽還出大甚為陰痿微大為石水起臍下以至小腹
腫垂垂然上至胃管死不治小甚為洞泄微小為消
癉滑甚為骨痿癲癇微滑為骨痿坐不能起目無所見視

見黑花漐甚為大癰微漐為不月水沈痔
足少陰氣絶則骨枯少陰者冬脉也伏行而濡骨不濡則肉不能著骨也骨肉濡而却故齒長而垢（垢難經作枯）髮無澤髮無澤者死
肉濡而却故齒長而垢（垢難經作枯）髮無澤髮無澤者死
澤者骨先死戊篤已死土勝水也
腎死藏浮之堅按之亂如轉圓益下入尺中者死

脉經卷第三

右素問鍼經張仲景

脉經卷第四

朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等類次

辨三部九候脉證候第一

平雜病脉第二

診五藏六腑氣絶證候第三

診四時相反脉第四

診損至脉第五

診脉動止投數疎數死期年月第六

診百病死生決第七

診三部虚實決死生第八

辨三部九候脉證第一

經言所謂三部者寸關尺也九候者每部中有天地

人也上部主候從肓以上至頭中部主候從膈以下至足浮沈牢結遲疾滑濇各自異名分理察之勿怠觀變所以別三部九候知病之所起審而明之針灸亦然也故先候脉寸中寸寸中寸一作於九浮在皮膚沈細在裏昭昭天道可得長久上部之候牢結沈滑有積氣在膀胱微細而弱卧引裏急頭痛欬嗽逆氣上下心膈上有熱者口乾渴燥病從寸口邪入上者名曰解脉來至此狀如琴絃苦少腹痛女子經月不利孔竅生瘡男子病痔左右脇下有瘡上部不通者苦少腹痛腸鳴者寸口中虛弱者傷氣氣不足大如桃李實苦痺也寸口直上者逆虛也如浮虛者泄利也中部脉結者腹中積聚若在

脇胁两旁脅下有熱脉浮而大風從胃管入水脹乾嘔
心下澹澹如有桃李核胃中有寒時苦煩痛不食食
即心痛胃脹支滿膈上積者脅下有熱時寒熱淋露脉
橫出上者脅氣在脇胁即著右橫關入寸口中者
脇中不通咳中咽難刺關元入少陰下部腰背小滑
来至浮大者脾也與風集合時上頭痛引腰背小滑
者厥也足下熱煩滿逆上搶心上至咳中狀如惡肉
脾傷也主病少腹下在膝諸骨節間寒清不可屈伸脉
急如紘大風邪入少陰女子漏白下赤男子溺血陰
寒熱也大風邪入陽明者筋急足攣結者四肢重從尺邪
姜不起引少腹痛
人有三百六十脉法三百六十日三部者寸關尺也尺

脉為陰陰脉常沈而遲寸關為陽陽脉常浮而速氣
出為動入為息故陽脉六息七息十三投陰脉入息
七息十五投此其常也二十八脉相逐上下一脉不來
知疾所苦尺勝治上尺寸俱平治中央臍
以上陽也法於天臍以下陰也法於地臍為中關頭
為天足為地有表無裏有裏無表為邪之所止得鬼病何謂表裏
寸尺為表關為裏兩頭有脉關中絶不至也尺脉上
不至關為陽絶陰寸脉下不至關為陰絶而陽微
死不治三部脉或至或不至冷氣在胃中故令脉不
通也上部有脉下部無脉其人當吐不吐者死上部
無脉下部有脉雖困無治所苦所以然者譬如人之有
尺樹之有根雖枝葉枯槁根本將自生木有根本即

自有氣故知不死也寸口脉平而死者何也
二經脉者皆係於生氣之原
十二經之根本也謂腎間動氣也此五藏六
故氣者人根本也根絶則莖枯矣寸口脉平而死者
生氣獨絶於内也（一名守邪之神以命門即死矣守此腎氣先絶於内其人便死其脉不得復反入
動病也（腎間動氣謂左為腎右為命門命門者精神之所舍原氣之
故脉口脉平而死者非謂
大肖中多氣者死形氣相得者生參伍不調者病三
部九候皆相失者死上下左右之脉相應如
病甚上下左右相失不可數者死中部之候雖獨調
與衆藏相失者死中部之候相減者死目内陷者死

黃帝曰冬陰夏陽奈何歧伯曰九候之脉皆沈細懸
絶者為陰主冬故以夜半死盛躁喘數者為陽主夏
中死病風者以日夕死病水者以夜半死其脉乍數
乍疎乍遲乍疾者以日乘四季死形肉以脫九候雖
調猶死七診雖見九候皆順者不死所言不死者風
氣之病及經月之病似七診之病而非也故言不死
若有七診之病其脉候亦敗者死矣必發嗌噫必審
問其所始病與今之所方病而后各切循之其脉疾
經絡浮沈以上下逆順循之其脉疾者不病其脉遲
者病脉不往來者死皮膚著者死
兩手脉結上部者濡結中部者緩結三里者豆起弱

反在關濡反在巔微在其上濇反在下微即陽氣不足沾熱汗出濇即無血厥而且寒黃帝問曰余每欲視色持脈獨調其尺以言其病從外知之奈何岐伯對曰審其尺之緩急小大滑澁肉之堅脫而病形變定矣調之何如對曰尺緩者尺之皮膚亦緩脉小者尺之皮膚亦小脉急者尺之皮膚亦急脉大者尺之皮膚亦大脉滑者尺之皮膚亦滑脉減而少脉大之皮膚亦減而少脉濇者尺之皮膚亦濇凡此六變有微有甚故善調尺者不待于寸善調脉者不待于色能參合行之可為上工尺膚濇滑以清淖澤者風也尺膚濇者風痺也尺膚熱甚脉盛躁者病溫也其脉盛而滑者汗且

出尺膚寒甚脉小一作急者
殁人手先
亦寒熱也尺膚先熱後寒者寒熱也尺膚熱甚
熱肘前獨熱者膺前熱肘後獨熱者肩背熱
小甚則少氣色白有加者立死肘所獨熱者
以下三四寸腸中有蟲手所獨熱者腰以上
獨熱者腰腹熱掌中熱者腹中熱掌中寒者
魚上白肉有青血脉者胃中有寒
諸浮諸沈諸滑諸澁諸弦諸緊若在寸口關上胃以下病若在尺中腎以下病
寸口脉浮而遲不沈不浮不長不短為無病左右同法
寸口太過與不及寸口之脉中手短者曰頭痛中手

長者曰足脛痛中手促上擊者曰肩背痛

寸口脉浮而盛者病在外

寸口脉沈而堅者病在中

寸口脉沈而弱者曰寒熱一作氣又作中氣及疝瘕少腹痛

寸口脉沈而弱髮必墮落

寸口脉沈而緊苦心下有寒

寸口脉沈脊中短氣

寸口脉沈而緊苦時痛有積聚

寸口脉沈而喘者寒熱

寸口但實者心勞

寸口脉緊或浮膈上有寒肺下有水氣

脉緊而長過寸口者注病

脉緊上寸口者中風風頭痛亦如之千金翼云亦為傷寒頭痛

脉弦上寸
脉来過寸口者宿食降者頭痛
脉出魚際者遺尿
寸口脉微連連如蜘蛛絲陰氣衰
寸口脉偏絶則臂偏不遂其人兩手俱絶者不可治
兩手前部陽絶者苦心下寒毒啄中熱
關上脉浮而大風在胃中張口肓息心下澹澹食欲嘔
關上脉微浮積熱在胃中嘔吐蚘蟲心健忘
關上脉滑而大小不勻千金必吐蚘云逆是為病方欲進不出
一二日復欲發動其人欲多飲飲即注利如利止者
關上脉緊而滑者蚘動
生不止者死

關上脉
伏結在裏之不減有力為中焦實有
關上脉
結聚欲熱飲食
關上脉
贏劣不欲飲食如瘧狀
尺脉浮者客陽在下焦
尺脉細微溏泄下冷利
尺脉弱寸彊胃絡脉傷
尺脉虛小者足脛寒痿痺脚疼
尺脉澀下血不利多汗素問又云尺澀滑謂之多汗
尺脉滑而疾為血虛

尺脉沈而滑者寸白蟲

尺脉細而急者筋攣痺不能行

尺脉麤麤常熱者謂之熱中腰膀疼小便赤熱

尺脉偏滑疾面赤如醉外熱則病

平治雜病脉第二

滑為實為下又為陽氣衰數為虛為熱浮為風為虛動為痛為痺

沈為水為實鬼疰為弱為虛為悸

遲則為寒為濇則少血緩則為虛洪則為氣熱一作緊則為寒弦數多熱弦遲多寒微則為虛代散則死

瘧脉目弦弦數多熱弦遲多寒微則為虛代散則死弦為痛痺一作浮為風疰偏弦為飲雙弦則胷下拘急而痛

其人漐漐惡寒
脉大寒在中
伏者霍亂
安卧脉盛謂之脫血
脉並緊肺中寒飲冷水欬嗽下利胃中虛冷此等其
浮而大者中風頭重皐塞
浮大者風
浮而緩皮膚不仁風寒入肌肉
滑而浮散者攤緩風
澁而緊痺
滑者鬼症

浮洪大長者風眩癲疾
大堅疾者癲病
弦而鉤者胷下如刀刺狀如韭尸至困不死
緊而急者遁尸
洪大者傷寒熱病
浮洪大者傷寒秋吉春成病
浮而滑者宿食
浮滑而疾者食不消脾不磨
短疾而滑酒病
浮而細滑傷飲
遲而澁中寒有癥結
駛而緊積聚有擊痛

弦急疝痕小腹痛又為癖一作痺病

遲而滑者脹

盛而緊曰脹

弦小者寒癖

沈而弦者懸飲内痛

弦數有寒飲冬夏難治

緊而滑者吐逆

小弱而濇胃反

遲而緩者有寒

微而緊小者有寒

微弱者有寒少氣

實緊胃中有寒苦不能食時時利者難治一作時七唔稽留難治

滑數心下結熱盛

滑疾胃中有熱

緩而滑曰熱中

沈浮一作而急病傷寒暴發虛熱

浮而絶者氣

辟大而滑中有短氣

浮短者其人肺傷諸氣微少不過一年死法當嗽也

沈而數中水冬不治自愈

短而數心痛心煩

弦而緊脅痛藏傷有瘀血一作有寒血

沈而滑為下重亦為背脊痛

脉来細而滑按之能虚因急持直者僵什從高墮下

病在内吉冬成病

微浮秋大甚不成病不可勞

微數雖甚不成病不可勞

陽邪來見浮洪

浮滑疾緊者以合百病又易愈

陰邪來見沈細

水穀來見堅實

脉来乍大乍小乍長乍短者爲祟

脉来洪大嫋嫋者社祟

脉来沈澤澤四肢不仁而重土祟

脉與肌肉相得又持之至者可下之

弦小緊者可下之
緊而數寒熱俱發必下乃愈
弦遲者宜温藥
緊數者可發其汗

診五藏六腑氣絶證候第三

病人肝絶八日死何以知之面青但欲伏眠目視而不見人汗出如水不止一作泣一日死
病人膽絶七日死何以知之眉為之傾
病人筋絶九日死何以知之手足爪甲青
病人脾絶十日死何以知之肩息回視立死一日目亭亭一日死
病人心絶一日死何以知之髮直如乾麻不得
病人腸一云小腸絶六日死何以知之
一日八

屈伸白汗不止

病人脾絶十二日死何以知之口冷足腫腹熱臚脹泄利不覺出無時度一日五日死

病人胃絶五日死何以知之脊痛謇中重不可反覆一日死

病人肉絶六日死何以知之耳乾舌皆腫溺血大便一日腓腸平九日死

赤泄一日九日足腫死

病人肺絶三日死何以知之口張但氣出而不還一日死

病人大腸絶四日死何以知之泄利無度利絶則死

病人腎絶四日死何以知之齒為枯面為正黑目中黃色謇中欲折白汗出如流水一日人中平七日死

病人骨絶齒黃落十日死

諸浮脉無根者皆死已上五藏六腑為根也

診四時相反脉證第四

春三月木王肝脉治當先至心脉次之脾脉次之肺脉次之腎脉次之此為四時王相順行脉也到六月土王脾脉當先至而反不至反得腎脉此為腎反脾也七十日死

何謂腎反脾夏火王心脉當先至肺脉次之而反得腎脉是謂腎反脾期五月六月忌丙丁

脾反肝春肝脉當先至而反不至脾脉先至是謂脾反肝期正月二月忌甲乙

腎反肝春肝脉當先至而反不至腎脉先至是謂腎反肝也期七月八月忌庚辛

腎反心二歲死何謂腎反心夏心脉當先至而反不至腎脉乃至是謂腎反心也期六月忌戊己

云此中不論肺金之氣疎五行亦頗顛倒待求別録也

臣億等按千金略未論指

診損至脉第五

脉有損至何謂也然至之脉一呼再至曰平三至曰離經四至曰奪精五至曰死六至曰命絶此至之脉也何謂損一呼一至曰離經二呼一至曰奪精三呼一至曰死四呼一至曰命絶此損之脉也至脉從下上損脉從上下也損脉為病柰何然一損損於皮毛皮聚而毛落二損損於血脉血脉虛少不能榮於五藏六府也三損損於肌肉肌肉消瘦飲食飲不為肌膚四損損於筋筋緩不能自收持五損損於骨骨痿

不能起於牀反此者至於收病也從上下者骨痿不
能起於牀者死從下上者皮聚而毛落者死治損之
法柰何然治損其肺者益其氣損其心者調其榮衛
其脾者調其飲食適其寒温損其肝者緩其中損其
腎者益其精氣此治損之法也

脉有一呼再至一吸再至一呼再至一吸再至一呼
四至一吸四至一呼五至一吸五至一呼六至一吸
六至一呼再至脉來如此何以別知其病也然脉來一呼
一吸再至不大不小曰平一呼三至一吸三至為適
得病前大後小即頭痛目眩前小後大即胷滿短氣
一呼四至一吸四至病適欲甚脉洪大者苦煩滿沈

細者腹中痛滑者傷熱濇者中霧露一息
五至其人當困可治其人當困沈細即夜加浮大即晝加不大小雖
十死脉也沈細夜死浮大晝死一呼一吸六至為
名曰損人雖能行猶當獨一作
不足故也再呼一至再吸一至一呼五至一吸
死也人雖能行名曰行尸
扁鵲曰脉一出一入曰平再出一入少陰三出一入
太陰四出一入厥陰再出一入一出少陽三出一入一出陽明
四入一出太陽脉出者為陽入者為陰故人一呼而
脉再動氣行三寸一吸而脉再動氣行三寸呼吸定
息脉五動一呼一吸為一息氣行六寸人十息脉五

十動氣行六尺二十息脉百動為一備之氣以應四時天有三百六十五日人亦有三百六十五節晝夜漏下水百刻一備之氣脉行丈二尺一日一夜行於十二辰氣行盡則周遍於身與天道相合故曰平平者無病也一陰一陽是也脉再動為一至再至而緊即奪氣一刻百三十五息十刻千三百五十息百刻萬三千五百息二刻為一度一度氣行一周身晝夜五十度脉三至者離經一呼而脉三動氣行三寸半人一息脉七動氣行九寸十息脉七十動氣行一丈八尺一周於身氣過備之氣脉百四十動氣行一丈八尺一周於身氣過百八十度故曰離經離經者病一陰二陽是也三至而緊則奪血脉四至則奪精一呼而脉四動氣行六

寸人一息脉九動氣行尺二十
行一丈二尺一備之氣脉百八十動氣行
一周於身氣過三百六十度再遍於身不及五節一
時之氣而重至諸脉浮濇者五藏無精難治一陰三
陽是也四至而緊則奪形脉五至者死一呼而脉五
動氣行丈三寸半當行七尺人一息脉十一動氣行
寸半當行八尺人十息脉百一十動氣行丈四尺
寸當行一丈五尺人一息脉二百二十動氣行二丈六尺
一備之氣脉二百二十動氣行二丈六尺當行一丈
三丈一周於身二百六十度再周於身氣過五百四十度
於身三百六十五節氣行過五百四十度一節之氣而至此氣浮濇經行血氣竭
過百七十度一節之氣而至此氣浮濇經行血氣竭
盡不守於中五藏痿痺精神散亡脉五至而緊則死
三陰三陽是也雖五猶未如之何也脉一損一

乘者人一呼而脉一動人一息而脉再動氣行三寸
十息脉二十動氣行三尺一備之氣脉四十動氣行
六尺不及周身百八十節氣短不能周遍於身苦少
氣身體懈墮矣脉再損者人一息而脉一動氣行一
寸五分人十息脉十動氣行尺五寸一備之氣脉二
十動氣行三尺不及周身二百節凝氣血盡經中不
能及故曰離經血去不在其處小大便皆血也脉三
損者人一息備之氣脉七動氣行尺七寸不及周身
一二尺五寸當行尺五寸一備之氣脉十四動氣行
三尺七節故曰爭氣行尺七寸當行一尺五分
能相與俱微氣閉實則脅滿藏枯而爭於中其氣不
朝血凝於中死矣脉四損者再息而脉一動人十息

脉五動氣行七寸半一備之氣脉十動氣行
不及周身三百一十五節故
度身薾罷疲皮裹骨故氣血俱盡五藏失神其
脉五損者人再息復一呼而
三百二十四節故曰脉一動人十息
俱絶死矣此備之氣脉八動氣行尺二寸不及周身
至之脉也損之為言少陰主骨為重此志損也飲食
衰減肌肉消者是意損也身安卧卧不便利耳目不
明是魂損也呼吸不相通五色不華是魄損也四肢
皆見脉為亂是神損也大損三十歳中損二十歳下
損十歳損各以春夏秋冬人人長脉短者是大損

三十歲人短脉長者是中損二十歲手足皆細是下
損十歲失精氣者一歲而為陽損男子左脉短右脉長是為陰損半歲春
脉當得肝脉反得脾肺之脉損秋脉當得肺脉反得肝脉損夏脉當得
腎肺之脉損秋脉當得肺脉反得心脾之脉損冬脉當得腎脉反得心
脾之脉知損當審切寸口之脉知絶
不絶前後去為絶掌上相擊堅如彈石為上脉虚盡
下脉尚有是為有胃氣上下脉皆盡者死不絶不消者皆生是損脉也
胃氣上下脉皆盡者死不絶不消者皆生是損脉也身體粗
至之為言語音深遠視瞿瞿是志之至也語言妄見手足相引是魂
大飲食暴多是意之至也脉微小不相應呼吸
之至也蔥葉色是魄之至也脉微小不相應呼吸

自大是神之至也是至脉之法也死生相應病各得
其氣者生十得其半也黃帝曰善
診脉動一止二日死一經云一日死
一止四日死或五日死或七日死六動一止六日死
五日死或七日死四動一止八日死七動一止六日死
七日死六動一止八日死七動一止九日死八動一止
九日死又云十日死九動一止十日死十動一止十一
日死一經云十三日死
一止夏至死一經云立夏死一經云立夏死一經云
立夏死一經云十三日死十動一止十一動一止十二
十三動一止十四十五動一止立冬死一經云立冬
死一經云立冬死一經云立夏死一經云立春死一
經云立秋死一經云立冬死一經云一日死一經云
一止一歲死若立秋死二十一動一止二歲死二十
五動一止立冬死一經云一歲死或二歲死一經云一
歲死三十動一止二歲若

三歲死三十五動一止四歲死

五十動一止三歲死四十動一止五歲死

脉來五十投而不止者五藏皆受氣即無病千金方云五行

脉來四十投而一止者一藏無氣却後四歲春草生而死

脉來三十投而一止者二藏無氣却後三歲麥熟而死

脉來二十投而一止者三藏無氣却後二歲桑椹赤而死

脉來十投而一止者四藏無氣歲中死得節不動出

清明日死遠不出穀雨死矣

脉來五動而一止者五藏無氣却後五日而死

氣畢陰陽數脉通流晝夜同榮衛出入經相生

脉一來而又住者宿病在心主中治
脉二來而又住者病在肝枝中治
脉三來而又住者病在脾下中治
脉四來而又住者病在腎間中治
脉五來而又住者病在肺支中治
五脉病虛贏人得此者死所以然者藥不得而治針
不得而及盛人可治氣全故也

診百病死生決第七

診傷寒熱盛脉浮大者生沈小者死
傷寒已得汗脉大疾者生浮大者死
温病三四日以下不得汗脉沈小者生浮細小難得
者死不治

温病穰大熱其脉細小者死 千金穰作時行
温病下利腹中痛甚者死不治
温病汗不出出不至足者死厥逆汗出脉堅直而疾
生虚緩者死
温病二三日身體熱腹滿頭痛食飲如故脉来細彊急者
者八日死四五日頭痛腹痛而吐脉来細彊十二日
死八九日頭不疼身不痛目不赤色不變而反利脉
来牒牒按之不彈手時大心下堅十七日死
熱病七八日脉不軟喘一作
日温汗不出者死
熱病七八日其脉微細小不散数一作者當音後三
焦乾黒者死
便不利加暴口燥脉代舌

熱病未得汗脉盛躁疾得汗者生不得汗者死
熱病已得汗脉靜安者生脉躁者難治
熱病已得汗常大熱不去者亦死 大一作專
熱病發熱甚者其脉陰陽皆竭慎勿刺不汗出必下利
診人被風不仁痿躄其脉虛者生堅急疾者死
診癲病虛則可治實則不可治
癲疾脉實堅者生脉沈細小者死
癲疾脉搏大滑者久自已其脉沈小急實不可治
小堅急亦不可療
診頭痛目痛久視無所見者死 久作視一作視

診人心腹積聚其脉堅彊急者生虛弱者死又實
彊者生沈者死其脉大腹大脹四肢逆冷其人脉形
長者死腹脹滿便血脉大時絶極下血脉小疾者死
心腹痛不得息脉細小遲者生堅大疾者死
腸澼便血身熱則死寒則生
腸澼下白沫脉沈則生浮則死
腸澼下膿血脉懸絶則死滑大則生
腸澼之屬身熱脉不懸絶滑大者生懸濇者死以藏
期之
腸澼下膿血脉沈小流連者生數疾且大有熱者死
腸澼筋攣其脉小細安靜者生浮大緊者死
洞洩食不化不得留下膿血脉微小連者生堅急者死

洩注脉緩時小結者生浮大數者死

墨蝕陰症其脉虚小者生緊急者死

欬嗽脉沈緊者死浮直者生緊急者死

欬嗽羸瘦脉形堅大者死

欬脫形發熱脉小堅急者死肌瘦腹脹且洩其脉弦急欲絶者死

欬而嘔血腹脹且洩其脉弦急欲絶者死一本云不脫形熱不去者死

吐血衄血脉滑小弱者生實大者死

汗出若衄其脉小滑者生大緊彊者死

唾血脉緊彊者死滑者生

吐血而欬上氣其脉數有熱不得卧者死

上氣脉數者死謂其形損故也

上氣喘息低昂其脉滑手足温者生脉澁四肢寒者死

上氣面浮腫肩息其脉大不可治加利必死
上氣注夜其脉虛寧伏匿者生堅強者死
寒氣上攻脉實而順滑者生實而逆澁則死
上盡脉滿實而滑則生實而逆則死太素云
滿何如曰實而順則生逆則死何謂順逆
曰舉形盡滿者脉急大堅尺滿而手足温也
者手足寒也謂逆
消痺脉沈大病久可治一作又甚
痺癉脉實大病久可治微細者不可治
消渴脉數大者生細小浮短者死
消渴脉沈小者生實堅大者死
水病脉懸小堅急病久不可治
水病脉洪大者可治微細者不可治
水病脹閉其脉浮大軟者生沈細虛小者死
水病腹大如鼓脉實者生虛者死
卒中惡吐血數升脉沈數細者死浮大疾快者生

卒中惡腹大四肢滿脉大而緩者生緊大而浮者死
緊細而微者亦生
病瘡腰脊彊急瘈瘲者皆不可治
寒熱瘈瘲其脉代絶者死
金瘡出太多其脉虛細者生數實大者死
金瘡血脉沈小者生浮大者死
斫瘡出血一二石脉來大二十日死
斫刺俱有病多少血出不自止斷者其脉來大
者七日死滑細者生
從高頓仆內有血腹脹滿其脉堅彊者生小弱者死
人為百藥所中傷脉浮澁而疾者生微細者死洪大
而遲者生 千金 遲作達

人病甚而脉不調者難差
人病甚而脉洪者易差
人内外俱虚身體冷而汗出微嘔而煩擾手足厥逆
體不得安靜者死
脉實滿手足寒頭熱春秋生冬夏死
老人脉微陽贏陰彊者生脉炎大加息（一作如急）者死陰
弱陽彊脉至而代奇（一作寄）月二而死
尺脉濇而堅為血實氣虚也其發病腹痛逆滿氣上行此為婦人胞中絶傷有惡血久成結瘕得病以冬
尺脉細而微者血氣俱不足厥逆時黍稑赤而死
尺脉細而來有力者是穀氣不充病得節觧動棗葉生而死此病秋時得之

左手寸口脉偏動乍大乍小不齊從寸口至關關至尺三部之位處處動搖各異不同其人病作花落而死作葉一葉

此脉桃花落而死作葉一葉

右手寸口脉偏沈伏乍大乍小不至關關至尺三部之位處處動搖各異不同其人病作葉一葉

浮大即下大過上出魚際沈伏即下不至關關中往來無暮夜沈伏

常時時復來者榆葉枯落而死作葉一葉

右手尺部脉三十動一止乍有頃更還二十動一止乍

動乍踈連連相因不與息數相應其人雖食穀猶不

愈藜草生而死

左手尺部脉四十動而一止而復來來逆上如循直木

如循張弓弦緪緪然如兩人共引一索至立冬死作金千

診三部脉虛實決死生第八

三部脉調而和者生

三部脉廢者死

三部脉虛其人長病得之虛而濇長病亦死虛而緩亦死虛而滑長病得之生

三部脉弦急癲病亦死

三部脉實而大長病得之死實而滑長病得之生

病得之死實而緩亦生實而緊亦生實而緊急癲癎

可治

三部脉强非稱其人病便死

三部脉强非稱其人（一作脉）得之死

三部脉麤長病得之死卒病得之生

三部脉細而軟長病得之生細而數亦生微而緊亦生

三部脉大而數長病得之生卒病得之死

三部脉微而伏長病得之死

三部脉軟（一作濡）長病得之不治自愈治之死卒病得之生

三部脉浮而結長病得之死

數長病風得之生卒病得之死

三部脉弦而數長病得之生卒病得之死

三部脉革長病得之死卒病得之生

三部脉堅而數如銀釵股蟲毒病必死數而軟蟲毒病得之生

三部脉滋如羹上肥長病得之死卒病得之生

三部脉連如蜘蛛絲長病得之死卒病得之生

朝散大夫守光禄卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等類次

扁鵲陰陽脉法第二

扁鵲脉法第三

扁鵲華佗察聲色要訣第四

扁鵲診諸反逆死脉要訣第五

張仲景論脉第一

張仲景論脉法第六

張仲景論脉第七

脉有三部陰陽相乘榮衛氣血在人體躬金作而呼吸出入上下於中因息遊布津液流通隨時動作

一時之間變無經常尺寸參差或短或長上乖下乖錯

或存或亡病轉改易進退低昂心迷意惑動失紀綱
願為縷陳令得分明
師曰子之所問道之根源脉有三部尺寸及關榮衛
流行不失經常不失
銖分出入昇降漏刻周旋水下二刻臣億等詳水下二刻舊本如此
脉一周身旋復寸口虛實見焉變化相乘陰陽相干
風則浮虛寒則緊弦沈潛水溜支飲急弦動弦為痛
數洪熱煩設有不應知變所緣三部不同病各異端
太過可怪不及亦然邪不空見終必有証
三焦別分知邪所舍消息診看料度腑藏獨見若神
為子條記傳與賢人

扁鵲陰陽脉法第二

脉平旦一曰太陽日中曰陽明晡時曰少陽黄昏曰少
陰夜半曰太陰雞鳴曰厥陰是三陰三陽時也
少陽之脉乍小乍大乍長乍短動摇六分王十一月
甲子夜半正月二月甲子王
太陽之脉洪大以長其來浮於筋上動摇九分三月
四月甲子王
陽明之脉浮大以短動摇三分大前小後狀如科斗
其至跳五月六月甲子王
少陰之脉緊細動摇六分七月八月甲子王五月
太陰之脉緊細以長乘於筋上動摇九分九月十月
甲子王

厥陰之脉沈短以緊動搖三分十一月十二月甲子王
厥陰之脉急弦動搖至六分已上病遲脉寒少腹痛
引腰形喘者死脉緩者可治刺足厥陰入五分
少陽之脉乍短乍長乍大乍小動搖至六分已上病
頭痛脇下滿嘔可治擾即一作傴即死治傴即死刺兩季肋端
足少陽也入七分
陽明之脉洪大以浮其來滑而跳大前細後狀如科
斗動搖至三分已上病眩頭痛腹滿痛嘔可治擾即
死刺臍上四寸臍下三寸各六分
從二月至八月陽脉在表從八月至正月陽脉在裏
附陽脉強附陰脉弱至即驚實則痺癖細而沈不痺
癖即泄泄即煩煩即渴渴即腹滿滿即擾擾即腸澼

澼即脉代乍至乍不至大而沈即欬欬即
甚則肩息肩息甚則口舌血出血出甚即鼻血出
變出寸口前後溢者勞風陰陽表裏以互
也寸口中外實內不滿者三
風四温寸口者勞風勞風者大病亦發駛行汗出亦
發奕風者上下微微扶骨是其診也表緩腹內急者
奕風也猥雷實夾者飄風從陰趨陽者風邪一來調
一來速鬼邪也陰緩陽急者表有風來入藏也陰急
者風已抱陽入腹上逯逯下宛宛不能至謂陽流飲也
上下血微陰強者為漏澼陽強者酒澼也偏偷不過
微反陽澹水也陰扶骨絶者從寸口前趨於陰汗
水也來調四布者欲病水也陰脉不偷陽脉傷復少

津寸口中後大前允至陽而實者僻食小過
者七日愈二分者十日僻三分者十五日僻四分者
二十日僻二分者十日僻三分者半歲僻敦敦不
一分飲餔餌僻也外勾者久僻也內卷者十日以還
外強內弱病暑食粥一作微有浮而弦者汁核并浮緊需
數如沈病暑食粥一作微有浮而弦者汁核并浮緊需
脉倚陽緊細以微瓜菜皮也若倚如緊薺藏菜也瞶
瞶無數如沈病暑食餅寸口內緊而伏麥飥若
故生麥豆肉僻也附陽者炙肉僻也小倚生浮大如
豆也

扁鵲脉法第三

扁鵲曰人一息脉二至謂病脉一息四至謂
平脉體形無苦人一息脉
痺者脫脉氣其眼睛青者

死人一息脉五至以上死不可治也都一作設息病脉
來動取極五至病有六七至也扁鵲曰平和之氣不
緩不急不極不滑不濇不存不亡不短不長不俛不
從不橫此謂平脉腎一作緊受如此一作剛身無苦也扁
鵲曰脉氣弦急病在肝少食多厭裏急多言頭眩目
痛腹滿筋攣癲疾上氣少腹積堅時時嗌血咽喉中
乾相病之法視色聽聲觀病之所在候脉要訣豈不
微乎脉浮如數無熱者風也若浮如數而有熱者氣
也脉洪大者又兩乳房動脉復數加有寒熱此傷寒
病也若浮如數而有微熱此瘧長病如脉浮溢寸口復有微熱此庄氣病
也如復加多熱乍劇者易
差不效又多熱乍差難治也又療無劇者易治也

扁鵲華佗察聲色要訣第四

病人五藏已奪神明不守聲嘶者死

病人循衣縫譫言者不可治

病人陰陽俱絕掣衣撮空妄言者死

病人妄語錯亂及不能語者不治熱病

病人陰陽俱絕失音不能言者三日半死

病人兩目皆有黃色起者其病方愈

病人面黃目青者不死青如草滋死

病人面黃目赤者不死赤如衄血死

病人面黃目黑者不死黑如灺死

病人面黃目白者不死白如枯骨死

病人面目俱等者不死

病人面黑目青者不死
病人面青目白者死
病人面黑目白者不死
病人面赤目青者六日死
病人面黃目青者九日必死是謂亂經飲酒當風邪
入胃經膽氣妄泄目剔為青雖有天救不可復生
病人面赤目白者十日死憂恚志思慮心氣內索面
色反好急求棺槨
病人面白目黑者死此謂枯榮華已去血脉空索
病人面黑目白者八日死腎氣內傷病因留積
病人面青目黃者五日死病人著牀心痛短氣脾竭
內傷百日復愈能起傍徨因坐於地其亡倚牀能治

此者可謂神良

病人面無精光若土色不受飲食者四日死

病人目無精光及牙齒黑色者不治

病人耳目鼻口有黑色起入于口者必死

病人耳目及顴頰赤者死在五日中

病人黑色出於額上髮際下直鼻脊兩顴上者亦死

病人黑氣出天中下至年上顴上者死

病人及健人黑色起入目及鼻口死在三日中

病人及健人面忽如馬肝色望之如青近之如黑者死

病人面黑目直視惡風者死

病人面黑脣青者死

病人面青脣黑者死
病人一面黑兩脇下滿不能自轉反者死
病人目回回直視肩息者一日死
病人頭目久痛卒視無所見者死
病人陰結陽絶目精脫恍惚者死
病人陰陽絶竭目眶陷者死
病人眉系傾者七日死
病人口如魚口不能復閉而氣出多不反者死
病人口張者三日死
病人脣青人中反三日死
病人脣反人中滿者死
病人脣口忽乾者不治

病人卒腫其面蒼黑者死
病人手掌腫無文者死
病人臍腫反出者死
病人陰囊莖俱腫者死
病人脉絶口張足腫五日死
病人足跌腫嘔吐頭重者死
病人足跌上腫兩膝大如斗者十日死
病人卧遺尿不覺者死
病人尸臭者不可治
肝病皮黑肺之日庚辛死
心病目黑腎之日壬癸死
脾病唇青肝之日甲乙死

肺病頰赤目腫心之日丙丁死
腎病面腫脣黃脾之日戊己死
青欲如蒼璧之澤不欲如藍
赤欲如帛裹朱不欲如赭
白欲如鵝羽不欲如鹽
黑欲重漆不欲如藍
黃欲如罗雄裹雄黃不欲如黃土
目色赤者病在心白在肺黑在腎黃在脾青在肝黃
色不可名者病肖中
診目病赤脉從上下者太陽病也從下上者陽明病
也從外入內者少陽病也
診寒熱瘧癉目中有赤脉從上下至瞳子見一脉一

歲死見
二歲半一歲半死見一脉半一歲半死見二脉二歲死見
診齲齒痛按其陽明之脉來有過者獨熱在右右熱
在左左熱在上上熱在下下熱

診血者脉多赤多熱多青多痛多黑為久痺
黑多青皆見者寒熱身痛面色微黃齒垢黃
黃黃疸也安卧少黃赤脉小而濇者不嗜食

扁鵲診諸反逆死脉要訣第五

扁鵲曰夫相死脉之氣如羣鳥之聚一馬之駈糸水
交馳之狀如懸石之落出筋之上藏筋之下堅關之
脉病人不病脉來如屋漏雀啄者死屋漏者其來既
絶而止時七復

起而不相連屬也崔啄者脉來甚數而疾絶止復頃來
如屋漏崔啄者死彈石數而隨散亂無復次緒也
脉囷病人脉如彈石者辟辟急也解索者動
者死彈石數而隨散亂無復次緒也
脉囷病人脉如彈石者辟辟急也解索者動
如黍米也手脉來如彈石去如解索
如屋漏崔啄者死脉彈人
脉如蝦之游者死蝦
沒不知所在乂乃復起
翔者似魚不行而但掉尾
脉如魚之翔者死魚
脉如懸薄卷索者死脉如轉豆者死脉如
脉涌涌不去者死脉忽去忽來暫止復來
脉如轉豆者死脉如偃刀者死
侈者死脉分絶者死上下分散也
脉有表無裏者死經名曰結去即死何謂結脉在指
下如麻子動搖屬腎名曰結去死近也脉
不復增減者死經名曰代何謂代脉五來
七來是人一息半時不復還增減亦名曰代正死不疑

經言病或有死或有不治自愈或有連年而不已
其死生存亡可切脉而知之耶然可具知也設病者
若閉目不欲見人者脉當得肝脉弦急而反得肺
脉浮短而濇者死也病若開目而渴心下堅者脉當
得緊實而數反得沈滑而微者死病若吐血復衄
者脉當得沈細而反浮大牢者死病若譫言妄語身
當有熱脉當洪大而反手足四逆脉反沈細微者死
病若大腹而洩脉當微細而澀反得緊大而滑者死
此之謂也
經言形脉與病相反者死奈何然病若頭痛目痛脉
反短濇者死

病若腹滿而喘脉反滑利而沈者死
病若四肢厥逆脉反浮大而濇者死
病若耳聾脉反浮大而濇者死 千金翼云脉大者生沈遲細者難治
病若目眴脉反大而緩者死
左有病而右痛右有病而左痛下有病而上痛上有病而下痛此為逆逆者死不可治脉來沈之絶濡浮之不止推手者半月死 一作半日
脉來微細而絶者人病當死
人病脉不病者生脉病人不病者死
人病尸厥呼之不應脉絶者死脉當大反小者死
肥人脉細小如絲欲絶者死
羸人得躁脉者死

人身澁而脈來往滑者死
人身滑而脈來往澁者死
人身小而脈來往大者死
人身短而脈來往長者死
人身長而脈來往短者死
人身大而脈來往小者死
尺脈不應寸時如馳半日死（千金云尺脈上口太遲者半日死）應寸
肝脾俱至則穀不化肝多即死
肺肝俱至則瘫疽四肢重肺多即死
心肺俱至則痺消渴懈怠心多即死
腎心俱至則難以言九竅不通四肢不舉腎多即死
脾腎俱至則五藏敗壞脾多即死

肝心俱至則熱甚痸瘛汗不出妄見邪
肝腎俱至則痸瘛少腹痛婦人月使不來肝滿腎滿
肺滿皆實則為腫肺之雍喘而兩胠滿肝雍兩胠滿
卧則驚不得小便腎雍脚下至少腹滿脛有大小髀
眡行大跛易偏枯心脉滿大癲痸筋攣肝脉小急
筋攣肝脉驚暴有所驚駭脉不至若瘖不治自已
腎脉小急肝脉小急心脉小急不鼓皆為瘕腎肝并沈為
石水并浮為風水并虛為死并小弦欲驚腎脉大急
沈肝脉大急沈皆為疝心脉搏滑急為心疝腎肺脉沈
搏為肺疝脾脉外鼓沈為腸澼久自已肝脉小緩為
腸澼易治腎脉小搏沈為腸澼下血温身熱者死心
肝澼亦下血二藏同病者可治其脉小沈濇者為腸

澼其身故熱者死熱見七日下胃脉沈鼓濇胃外鼓大心脉小堅急皆腸偏枯男子發左女子發右不痦舌轉可治三歲起年不滿二十者三十日起其順者痦三歲死脉至而搏血衄身有熱者死脉來如懸鈎浮為熱脉至如喘名曰氣厥氣厥者不知與人言甲乙素問作暴厥脉至如數使人暴驚上是為經氣不足也微浮合浮合如數一息十至十至以上是為經氣予不足也草乾而死脉不至如火新然是心精之予奪也草乾見九十日死脉至如散葉是肝氣予虛也木葉落而死素問作枣葉脉至如懸去枣脉至如泥丸是胃氣予不足也榆莢華而死脉至如橫格是膽氣予不足也禾熟而死脉

至如弦縷是胞精予不足也病善言下霜而死甲乙經作脉至如交漆交漆者左右傍至也微見
可治脉至如涌泉浮鼓肌中是大陽氣予不足也五色先見黑白黑望一作黯作脉至如委土素問作頽土之狀按之不
少氣味非英而死脉至如發死脉
得是肌氣予不足也五色先見黑白黑望一作黯作脉至如委土素問作頽土之狀按之不
至如懸癰懸癰者浮揣切之益大是十二俞之予不足也
水凝而死脉至如偃刀偃刀者浮之小急也按之堅
大急五藏菀熱寒熱獨并於腎也如此其人不得坐
立春而死脉至如丸滑不直手不可得
也是大腸氣予不足也秦葉生而死脉至如弦
人善恐不欲坐卧行立常聽是小腸氣予不足也季
秋而死

問曰尝以春二月中脉一
秋當死其病反愈到七月復
復記言至冬死
問曰二月中得沈脉何以故
月之時其脉自當濡弱而弦得沈脉見
浮即死故知到秋當死也
處之至七月之時脉復得沈何以
經言王相囚死冬脉本王脉不再見故知至冬當死師曰沈脉見
也然後至冬復病王以冬
故此
脉經卷第五

脉經卷第六

朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等類次

肝病證第一

膽病證第二

心病證第三

小腸病證第四

脾病證第五

胃病證第六

肺病證第七

大腸病證第八

腎病證第九

膀胱病證第十

肝氣虛則夢見園苑生草得其
時則夢伏樹下不敢起肝足厥陰經病證
則夢山林樹木
病在肝平旦慧下晡甚夜半靜
病先發於肝者頭目眩脇痛支滿一日之脾閉塞不
通身痛體重二日之胃而腹脹三日之腎少腹腰脊
痛脛痠十日不已死冬日入夏早食肝脉搏堅而長
色不青當病墜墮若搏因血在脇下令人喘逆若奠
而散其氣盛則夢怒厥氣客於肝
色澤者當病溢飲溢飲者濕暴多飲而溢一作易
入肌皮腸胃之外也

肝脉沈之而急浮之亦然苦脇下痛有氣支滿引少腹而痛時小便難苦目眩頭痛腰背痛足為逆寒時

瘧女人二月使不來時有得之少時有時至也長而左右彈診曰有積氣在心下支肱名曰肝痺得之寒濕與疝同法腰痛足清頭痛

肝中風者頭目瞤兩脇痛行常偃令人嗜甘如阻婦狀

肝中寒者其人洗洗惡寒翕翕發熱面翕然赤熱熱

有汗當中煩熱肝中寒舌本大又作

燥善太息當中痛不得轉側時盜汗欲食已吐其汁

肝主當中喘怒罵其脉沈當中乂窒欲令人推按之

有熱鼻窒

凡有所墜墮惡血留內若有所大怒氣上而不能下

積於左脇下則傷肝肝
張時時手足青目瞑瞳人痛此為肝藏傷所致也
肝脹者其人脇下滿而痛引少腹
肝水者其人腹大不能自轉側而脇下腹中痛時時
津液微生小便續通
肺乘肝即為癰腫心乘肝必吐利
肝著者其病人常欲踧其脅上先未苦時但欲飲熱
肝之積名曰肥氣在左脇下如覆杯有頭足如龜鱉
狀久久不愈發欬逆瘧連歲月不已以季夏戊巳
日得之何也肺病傳肝肝當傳脾脾適以季夏王
王者不受邪肝復欲還肺肺不肯受因留結為積故知
肥氣以季夏得之

肝病其色青手足拘急脇下苦滿或時眩冒其脈眩長此為可治宜服防風竹瀝湯秦艽散春當刺大敦夏刺行間冬刺曲泉皆補之季夏刺太衝秋刺中郤皆瀉之又當灸期門百壯背第九椎五十壯

肝病者必兩脇下痛引少腹令人善怒虛則目眩眩無所見耳無所聞善恐如人將捕之若欲治之當取其經足厥陰與少陽氣逆則頭目痛耳聾聾不聰頰腫取血者邪在肝則兩脇中痛寒中惡血在內脘善廢節時腫取之行間以引脇下補三里以温胃中取血脈以散惡血取耳間青脈已去其瘀足厥陰之脈起於大指聚毛之際上循足跌上廉去內踝一寸上踝八寸交出太陰之後上腨內廉循股入陰毛中環陰器抵少腹俠胃屬肝

絡膽上貫膈布脇肋循喉嚨之後上入頏顙連目系
上出額與督脈會於巔其支者從目系下頰裏環脣
內其支者復從肝別貫膈上注肺中是動則病腰痛
不可以俛仰丈夫頽疝婦人少腹腫甚則嘔逆洞泄狐疝遺溺閉癃盛
色是主肝所生病者肖滿嘔苦乾面塵脫
者則寸口大一倍於人迎虛者則寸口反小於人迎
足厥陰之別名曰蠹蝨溝去內踝上五寸別走少陽其
別者循經上睾結於莖其病氣逆則睾腫卒疝實則
挺長熱虛則暴癢取之所別肝病肖滿脇脹善恚怒
叫呼身體有熱而復惡寒四肢不舉面目白身體滑
其脉當弦長而急今反短濇其色當青而反白者此
是金之刻木為大逆十死不治

膽病者善太息口苦嘔宿汁心澹澹恐如人將捕之嗌中介介然數唾候在足少陽之本末亦見其脉之陷下者灸之其寒熱刺陽陵泉善嘔有苦汁長太息心中澹澹善悲恐如人將捕之邪在膽逆在胃膽液則口苦胃氣逆則嘔苦汁故曰嘔膽刺三里以下胃氣逆刺足少陽血絡以閉膽氣逆則上溢口苦太息膽脹者脇下痛脹口苦太息厥氣客於膽則夢鬬訟足少陽之脉起於目兌皆上抵頭角下耳後循頸行手少陽之前至肩上却交手少陽之後入耳中出走耳前至兌皆後其支者別

允皆下大迎合手少陽於頰（一本云迎手少陽於頰）
下加頰車下頸合缺盆以下（一本云別允皆上
循脇裏出氣街遶毛際橫入
下腋循胸中過季脇下合髀厭中以下循髖
外廉下外輔骨之前直下抵
前循足跌上出小指次指之
之間循大指歧內出其端還貫入爪甲出三毛是動
則病口苦善太息心脇痛不
無膏澤足外反熱是為陽厥是主骨所生病者頭痛
角頷痛目外
出振寒瘧發
節皆痛小
指次指不用盛者
則人迎大一倍於寸口

虛者則人迎反小於寸口也

心氣虛則悲不已實則笑不休心氣虛則夢救火陽物得其時則夢燔灼心氣盛則夢喜笑及恐畏氣

客於心則夢丘山煙火

病在心日中慧夜半甚平旦靜

病先發於心者心痛一日之肺喘欬三日之肝脇痛支滿五日之脾閉塞不通身痛體重三日不已死冬夜半夏日中

心脉搏堅而長當病舌卷不能言其耎而散者當病消渴自已

心脉沈之小而緊浮之不喘苦心下聚氣而痛食不

下喜咽唾時手足熱煩滿時忘不樂喜大息得之憂思
赤脉之至也端而堅診曰有積氣在中時害於食名
曰心痺得之外疾思慮而心虛故邪從之
心脉急名曰心疝少腹當有形
為之使故少腹當有形其以心為牡藏小腸
邪哭使魂魄不安者血氣少也血氣少者屬於心心
氣虛者其人即畏一作衰合目欲眠夢遠行而精神離
散魂魄妄行陰氣衰者即為癲陽氣衰者即為狂五
藏者魂魄之宅舍精神之所依託也魂魄飛揚者其
五藏空虛也即邪神居之神靈所使鬼而下之脉短
而微其藏不足則魂魄不安魂屬於肝魄屬於肺肺
主津液即為涕泣肺氣衰者即為泣出肝氣衰者

魂則不安肝主善怒其聲呼
心中風者翕翕發熱不能起心中飢而欲食食則嘔
徹心如蟲注其脉浮者自吐乃愈
愁憂思慮則傷心心傷則其人病心如噉蒜狀劇者心痛徹背背痛
人勞倦即頭面赤而下重心中痛徹背自發煩熱當
臍挑手其脉弦此為心藏傷所致也
心脹者煩心短氣臥不安
心水者其人身體重一作腫而少氣不得臥煩而躁其
陰大腫
腎乘心必瘡
眞心痛手足清至節心痛甚旦發夕死夕發旦死

心腹痛悗悗懷懷發作腫聚往來上下行痛有休作心腹中熱苦渴涎出者是蚘咬也以手聚而堅之久持之毋令得移以大針刺之久持之蟲不動乃出針門腸中有蟲不可取以小針心之積名曰伏梁起於臍上大如臂久久不愈病煩心心痛以秋庚辛日得之何也腎病傳心心當傳肺肺適以秋王王者不受邪心復欲還腎腎不肯受因留結爲積故知伏梁以秋得之

心病其色赤心痛短氣手掌煩熱或啼笑罵詈悲思愁慮面赤身熱其脉實大而數此爲可治春當刺中衝夏刺勞宮季夏刺太陵皆補之秋刺間使冬刺曲澤皆瀉之此是手厥陰又當灸巨闕五十壯背第五

椎百壯

心病者胸內痛脇支滿兩
臂內痛虛則胸腹大脇下
手少陰太陽舌下血者其變病刺郄中血者其經
邪在心則病心痛善悲時眩仆視有餘不足而調之
其輸

黃帝曰手少陰之脉獨無輸何也岐伯曰少陰者心
脉也心者五藏六腑之大主也心為帝王精神之所
舍其藏堅固邪不能客客之則傷心心傷則神去神
去則身死矣故諸邪在於心者皆在心之包絡包絡
者心主之脉也故少陰無輸焉少陰無輸心不病乎
對曰其外經腑病藏不病故獨取其經於掌後兌骨

之端也

手心主之脉起於胸中出屬心包下膈歷絡三焦其支者循胸出脇下腋三寸上抵腋下循臑內行太陰少陰之間入肘中下臂行兩筋之間入掌中循小指次指出其端其支者別掌中循小指次指出其端是動則病手心熱肘臂攣急腋腫甚則胸脇支滿心中澹ヒ大動面赤目黃善笑不休是主脉所生病者煩心心痛掌中熱盛者則寸口大一倍於人迎虛者則寸口反小於人迎也

手心主之別名曰內關去腕二寸出於兩筋間循經以上繫於心包絡心系氣實則心痛虛則為煩心取之兩筋間

心病煩悶少氣大熱熱上溢心嘔吐欬逆狂語汗出如珠身體厥冷其脉當浮今反沈濡而滑其色當赤而反黑者此是水之刻火為大逆十死不治

小腸病證第四

小腸手太陽經病也小腸者少腹痛腰脊控睾而痛時窘之狀獨有上熱及手小指次指之間熱若脉陷者此其候也

少腹控睾引腰脊上衝心邪在小腸者連睾系屬於脊貫肝肺絡心系氣盛則厥逆上衝腸胃動肝肺散於肓結於厥齊一作故取之肓原以散之刺太陰以與之取厥陰以下之取巨虛下廉以去之按其所過之經以調之

小腸有寒其人下重便膿血有熱必痔
小腸有宿食常暮發熱明日復止
小腸脹者少腹脘脹引腰而痛
厥氣客於小腸則夢聚邑街衢
手太陽之脈起之於小指之端循手外側上腕出踝
中直上循臂骨下廉出肘內側兩骨之間上循臑外
後廉出肩解繞肩甲交肩上入缺盆循頸上腕
下膈抵胃屬小腸其支者從缺盆循頸上頰至目兌
皆却入耳中其支者別頰上頗抵鼻至目內皆斜絡
於顴是主液所生病者耳聾目黃頰頷腫頸肩臑肘臂外
是主液所生病者耳聾目黃頰頷腫頸肩臑肘臂外
後廉痛盛者則人迎大再倍於寸口虛者則人迎反

小於寸口也

脾足太陰經病證第五

脾氣虛則四肢不用五藏不安實則腹脹逕泄不
脾氣虛則四肢不用五藏不安實則腹脹逕泄不
盛則夢歌樂體重手足不舉其時則夢飲食不足得其時則夢築垣蓋屋脾氣
大澤壞屋風雨
病在脾日晡慧平旦甚日中持下晡靜
病先發於脾閉塞不通身体痛體重一日之胃而腹脹
二日之腎少腹腰脊痛脛痠三日之膀胱挑背胎筋痛
小便閉十日不已死冬人定夏晏食
脾脉搏堅而長其色黃當病少氣其耎而散色不澤
者當病足骭腫若水狀

脾脉沈之而濡浮之而濡浮之而虛苦腹脹煩滿胃中有熱不
嗜食食而不化大便難四肢苦痺時不仁得之房內
月使不來來而頻併
黃脉之至也大而虛有積氣在腹中有厥氣名曰厥
疝女子同法得之疾使四肢汗出當風
寸口脉弦而滑弦則為實痛即為急實即
為踊痛滑則為實痛即為急實即為踊痛相搏即胷脇搶急
跌陽脉浮而澁浮即胃氣微澁即脾氣衰微衰相搏
即呼吸不得此為脾家失度
寸口脉微雙緊即為入其氣不出無表有裏心下痞堅
跌陽脉微而澁微即無胃氣澁即傷脾脾寒積在於腸而
反下之寒積不消胃微脾傷穀氣不行食已自噫寒

在胷膈上虛下實穀氣不通爲秘塞之病

寸口脉緩而遲緩則爲陽其氣長遲則爲陰榮衛俱和剛柔相得三焦相承其氣必強

趺陽脉滑而緊滑即胃氣實緊即脾氣傷得食而不消者此脾不治也能食而腹不滿此爲胃氣有餘腹滿而不能食心下如飢此爲胃氣虛也得食而滿者此爲脾家不治

脾中風者翕翕發熱形如醉人腹中煩重皮肉瞤瞤

而短氣也

凡有所擊仆若醉飽入房汗出當風則傷脾傷則中氣陰陽離別陽不從陰故以三分候死生

脾氣弱病利下白腸垢大便堅不能更衣汗出不止

名曰脾氣弱或五液注下青黃赤白黑病人皐下平者胃病也微赤者病發癰微黑者有熱青者有寒白者不治脣黑者胃先病微燥而渴者可治臍反出者此為脾先落一云先終

脾脹者善噦四肢急體重不能衣一作枚

脾水者其人腹大四肢苦重津液不生但苦少氣小便難

趺陽脈浮而澁浮則胃氣強澁則小便數浮澁相搏大便則堅其脾為約脾約者其人大便堅小便利而反不渴

凡人病脉以解而反暮微煩者人見病者差安而強與穀脾胃氣尚弱不能消穀故令微煩損穀則愈

脾之積名曰痞氣在胃管覆大如盤久久不愈病四
肢不收名曰痿痿黃癉食飲不爲肌膚以冬王王者不得之何也
肝病傳脾脾當傳腎腎適以冬壬癸日得之
欲還肝不肯受因留結爲積故知痞氣以冬得之
脾病其色黃飲食不消腹苦脹滿體重節痛大便不
利其脈微緩而長此爲可治宜服平胃圓瀉脾圓茱
萸圓附子湯春當刺隱白大都冬刺陰陵泉皆瀉之夏刺
大都季夏刺公孫秋刺商邱皆補之又當灸章門五
十壯背俞第十一椎百壯

脾病者必身重苦飢足痿不收（素問作善肌行善痿）
脚下痛虛則腹脹腸鳴濇泄食不化取其經足太陰
陽明少太陰血者

邪在脾胃肌肉痛陽氣有餘陰氣不足則
陽氣不足陰氣有餘則寒中腸鳴腹痛陰陽俱有餘
若俱不足則有寒有熱皆調其三里
足太陰之脉起於大拇之端循拇內側白肉際過移
骨後上內踝前廉上腨內循脛骨後交出厥陰之前
上循膝股內前廉入腹屬脾絡胃上膈挾咽連舌本
散舌下其支者復從胃別上膈注心中是動則病舌
本強食則嘔一作吐胃管痛腹脹善噫得後與氣則快
然而衰身體皆重是主脾所生病者舌本痛體不能
動搖食不下煩心心下急痛寒瘧溏瘕泄水閉黃疸
好臥不能食肉脣青強立股膝內痛厥足大指不用
盛者則寸口大三倍於人迎虛者則寸口反小於人迎

足太陰之別名曰公孫去本節後一寸別走陽明其別
者入絡腸胃厥氣上逆則霍亂實則腹中切痛虛則
鼓脹取之所別

脾病其色黃今反青視脣反張爪甲青飲食吐
逆體重節痛四肢不舉其脈當浮大而緩今反弦急
其色當黃今反青此是木之刻土為大逆十死不治

胃病第六

胃病者腹脹胃管當心而痛上支兩脇膈咽不通飲
食不下取三里

食不下取陽明經病證足陽明胃管心而痛上支兩脇膈咽不通飲
飲食不下隔塞不通邪在胃管在上管則抑而刺之
在下管則散而去

胃脉搏堅而長其色赤當病折髀其耎而散者當病

食痺脾痛

胃中有癖食冷物者痛不能食食熱即能食

胃脹者腹滿胃管痛皐聞焦臭妨於食大便難

診得胃脉病形何如曰胃實則脹虛則洩

病先發於胃實脹滿五日之間腎少腹腰脊痛脛

之膀胱背胳筋痛小便閉

痛體重 靈樞上之心云六日不已死冬夜半後夏日晡六日一作三日

脉浮而乳浮則爲陽乳則爲陰浮乳相搏胃氣生熱

其陽則絕

趺陽脉浮者胃氣虛也趺陽脉浮大者此胃實

煩悶必日再行乳而有胃氣者脉浮之大而柔微按之

乳故知乳而有胃氣也

跌陽脉數者胃中有熱即消穀引食跌陽脉濇者胃中有寒水穀不化跌陽脉麤而浮者其病難治跌陽脉虛則遺溺實則失氣動作頭痛重熱氣朝者屬胃厥氣客於胃故久病跌陽脉則夢飲食

足陽明之脉起於鼻交頞中旁約太陽之脉下循鼻外入上齒中還出挾口環脣下交承漿却循頤後下廉出大迎循頰車上耳前過客主人循髮際至額顱其支者從大迎前下人迎循喉嚨入缺盆下膈屬胃結脾其直者從缺盆下乳內廉下挾臍入氣街中而合以下髀關抵伏菟下入膝臏中下循脛行外廉下足跗入中指內

間其支者下膝三十而別以下入中指外間其支者別跗上入大指間出其端是動則病悽悽然振寒善伸數欠顏黑病至證人與火聞木音則惕然而驚心動欲獨閉戸牖而處甚則欲上高而歌棄衣而走賁(血一作胃)濁腹脹是主骭厥(一作痿)所生病者狂癡温淫汗出勃軌血衄口喝唇緊痛循膺乳街股伏菟骭外廉足跗上皆痛中指不用氣盛則身以前皆熱其有餘於胃則消穀善飢溺色黄氣不足則身以前皆寒慄胃中寒則腹滿盛者則人迎大三倍於寸口虚者則人迎反小於寸口也

肺手太陰經病證第七

肺氣虚則鼻息利少氣實則喘喝胸憑仰息肺氣虚

則夢見白物人斬血藉藉得其時則夢見兵戰肺氣盛盈則夢恐懼哭泣厥氣客于肺則夢飛揚見金鐵之器奇物

病在肺下脯慧日中甚夜半靜

病先發於肺出喘欬三日之肝脇痛支滿一日之脾閉塞不通身痛體重五日之胃腹脹十日不已死冬日入夏日出

肺脉搏堅而長當病嗇血其濡而散者當病漏汗（漏一作灌）

至今不復散發

肺脉沈之而數浮之而喘洗洗寒熱腹滿腸中熱痛從腰已上汗出得之房內汗出當風

小便赤肩背痛而浮大上虛下實驚有積氣在胷中

白脉之至也喘而浮大上虛下實驚有積氣在胷中

喘而虛名曰肺痺寒熱得之因醉而使內也

肺中風者口燥而喘身運而重冒而腫張

肺中寒者其人吐濁涕

形寒寒飲則傷肺以其兩寒相感中外皆傷故氣逆而上行肺傷者其人勞倦則欬唾血其脉細緊浮數皆吐血此爲躁擾所致

肺脹者虛而滿喘欬逆倚息自如脫狀其脉浮

肺水者其人身體重而小便難時時大便鴨溏肝乘肺必作虛

脉耎而弱反在關耎反在顛浮反在上弱反在下浮則爲陽弱則血不足必弱反此爲虛浮弱自別浮則自出弱則爲入浮則爲出不入此爲有表無裏弱則爲

入不出此為無表有裏陽出極汗齊腰而還此為
表有裏故名曰厥陽在當汗出不汗出
跌陽脉浮緩少陽微緊為微寒為血虛緊為鼠
乳其病屬肺
肺之積名曰息賁在右脇下覆大如杯久久不愈病
洒洒寒熱氣逆喘欬發肺癰以春甲乙日得之何也
心病傳肺肺當傳肝肝適以春王王者不受邪肺復
欲還心心不肯受因留結為積故知息賁以春得之
肺病其色白身體但寒無熱熱時時欬其脉微遲為可
治宜服五味子大補肺湯瀉肺散春當刺少商夏刺
魚際皆瀉之季夏刺太淵秋刺經渠冬刺尺澤皆補
之又當灸膻中百壯背第三椎二十五壯

肺病者必喘欬逆氣肩息背痛汗出尻陰股膕脹足
手太陰之外厥陰內少陰血皆痛虛則少氣不能報息耳聾嗌
邪在肺則皮膚痛發寒熱上氣喘汗出欬動肩背
取之膺中外輸背第三椎之傍以手痛按之快然乃
刺之取之缺盆中以越之
手太陰之脉起於中膲下絡大腸還循胃口上膈屬
肺從肺系橫出腋下下循膲內行少陰心主之前下
肘中後循臂內上骨下廉入寸口上魚循魚際出大
指之端其支者從腕後直次指內廉出其支者從腕後直次指內廉出其端是動則
病肺脹滿膨膨而喘欬缺盆中痛甚則交兩手而瞀
是為臂厥是主肺所生病者欬上氣喘喝煩心胸滿

臑臂内前廉痛掌中熱氣盛有餘則肩背痛風汗出
小便數而欠氣虛則肩背痛寒少氣不足以息溺色
變卒遺失無度盛者則寸口大三倍於人迎虛者則
寸口反小於人迎也

手太陰之經直入掌中散入於魚際出大指之端
明其別者並太陰之經直入掌中循魚際出於大指之
則手兌掌後一寸半分間別走陽明名曰列缺起於腕下一云脈上
肺病身當有熱欬嗽短氣唾出膿血其脈當短澀今
反浮大其色當白而反赤者此是火之刻金為大逆
十死不治

大腸手陽明經病證第八

大腸病者濯濯冬日重感于寒則泄

當臍而痛不能久立與胃同候取巨虛上廉腸中雷鳴氣上衝胸喘不能久立邪在大腸刺肓之原巨虛上廉

大腸有寒鶩溏有熱便腸垢

大腸有宿食寒慄發熱有時如瘧狀

大腸脹者腸鳴而痛寒則泄食不化

厥氣客於大腸則夢田野

手陽明之脉起於大指次指之端外側循指上廉出合谷兩骨之間上入兩筋之中循臂上廉上入肘外

合谷兩骨之間上入兩筋之中循臂上廉上入肘外廉循臑外前廉上肩出髃骨之前廉上出柱骨之會

上下入缺盆絡肺下膈屬大腸其支者從缺盆直入

上頸貫頰入下齒縫中還出挾口交人中左之右右

之左上俠鼻孔是動則病齒痛頰腫是主津所生病
者目黃口乾鼽衄咳痺肩
氣盛有餘則當脈所過者熱腫虛則寒慄不復盛者
則人迎大三倍於寸口虛者則人迎反小於寸口也

腎足少陰經病證第九

腎氣虛則厥四肢正黑腎氣盛則夢見
舟船溺人得其時夢伏水中若有畏怖腎氣虛則厥氣盛則夢
腰脊兩解不相屬厥氣客於腎則夢臨淵没居水中
病在腎夜半慧日乘四季其下晡靜
病先發於腎少腹腰脊痛脛痠閉二日上之心心
痛三日之小腸脹四日不
痛小便閉已死大食夏晏晡

腎脉搏堅而長其色黃而赤當病折腰其
當病少血
腎脉沈之大而堅浮之大而堅緊苦手足骨疼
不興腰脊痛少腹腫心下有水氣時脹閉小便
浴水中身未乾而合房內及勞倦發之至也上堅而大有積氣在少腹與陰名曰腎
痺得之沐浴清水而臥
凡有所用力舉重若入房過度汗出如浴水則傷腎
腎脹者腹滿引背央央然腰髀痛
腎水者其人腹大臍腫腰重痛不得溺陰下濕如牛
鼻頭汗其足逆寒大便反堅
腎著之為病從腰以下冷腰重如帶五千錢

腎著之病其人身體重腰中冷如冰狀（一作如水洗狀）
（形如水狀）反不渴小便自利食飲如故是其證也病屬下
腫從身勞汗出衣裏冷濕故久久得之腰以下冷痛如冰
腎之積名曰奔豚發於少腹上至心下如豚奔走之狀上下無時久久不愈
（一作如水流狀）
日得之何也脾病傳腎腎當傳心心適病喘逆骨痿少氣以夏王王者
不受邪腎復欲還脾脾不肯受因留結為積故知奔
豚以夏得之水流夜疾何以故師曰土休故流疾而
有聲人亦應之人夜臥則脾不動搖脈為之數疾也
腎病其色黑其氣虛弱喘吸吸少氣兩耳苦聾腰痛時
時失精飲食減少膝以下清其脈沈滑而遲此為可
治宜服大補內補散建中湯腎氣圓地黃煎春當刺涌泉

秋刺伏留冬刺陰谷皆補之夏刺大溪
皆瀉之又當灸京門五十壯背第十四椎百壯
腎病者必腹大脛腫痛喘欬身重寢汗出憎風虛即
肾中痛大腹小腹痛清厥意不樂取其經足少陰太
陽血者則骨痛陰痺陰痺者按之而不得
邪在腎肩背頸項強痛時眩取之涌泉崑崙視有血
大便難肩背頸項強痛時眩取之涌泉崑崙視有血
者盡取之
足少陰之脉起於小指之下斜趣足心出然骨之下
循內踝之後別入跟中以上腨內出腘中內廉上股
內後廉貫脊屬腎絡膀胱其直者從腎上貫肝膈入
肺中循喉嚨俠舌本其支者從肺出絡心注肾中是

動則病飢而不欲食面黑如炭色一作地色
喉鳴而喘坐而欲起目眩眩無所見心懸若飢狀氣
不足則善恐心惕惕若人將捕之是為骨厥一作痿
主腎所生病者口熱舌乾咽腫上氣嗌乾及痛煩心
心痛黃疸腸澼脊股內後廉痛痿厥嗜卧足下熱而
痛灸則強食而生害一作內緩帶被髮大杖重履而步
盛者則寸口大再倍於人迎虛者則寸口反小於人
迎也

足少陰之別名曰大鍾當踝後繞跟別走大陽其別
者並經上走於心包下貫腰脊其病氣逆則煩悶實
則閉癃虛則腰痛取之所別腎病手足逆冷面赤目
黃小便不禁骨節煩疼少氣於心其脉當

沈細而滑今反浮大其色當黑而反黃此是水為大逆上十死不治

膀胱證第十

膀胱病者小腹偏腫而痛以手按之則欲小便而不得肩上熱若脉陷足小指外側反脛踝後皆熱若脉陷者少腹滿而氣塞痛小便閉五日之間腎少腹病先發於膀胱膀胱者背胎筋亦痛一日之間腎少腹膀胱閉者少腹滿而氣塞痛小便閉五日之間腎少腹腰脊痛脛痠一日之脾閉塞不通身厥氣客於膀胱則夢遊行足太陽之脉起於目內眥上額交巔上其支者從巔

至耳上角其直者從巔入絡腦還出別下項循肩髆
內俠脊抵腰中入循膂絡腎屬膀胱其支者從腰中
下貫臀(肺作)過髀樞循髀外後廉過下合腘中以下貫
腨內左右別
腨內出外踝之後循京骨至小指外側是動則病衝
頭痛目似脫項似拔脊痛腰似折髀不可以曲腘如
結腨如裂是為踝厥是主筋所生病者痔瘧狂顛疾
頭腦項痛目黃淚出鼽衄項背腰尻腘腨脚皆痛小
指不用盛者則人迎大再倍於寸口虛者則人迎反
小於寸口也

三焦證第十一

三焦病者腹脹氣滿小腹尤堅不得小便急溢則

為水留則為脹俠在足太陽少陽之外大絡在之間赤見於脉取委陽

少腹病腫不得小便邪在三膲約取太陽大絡視其結脉與厥陰小絡結而血者腫上及胃管取三里

三膲脹者氣滿於皮膚殼殼然而堅不疼若熱在上膲取之大絡熱在中膲因堅溺血因熱在下膲因溺血

手少陽之脉起於小指次指之間循手表腕出臂外兩骨之間上貫肘循臑外上肩而交出足少陽之後入缺盆交膻中散絡心包下膈偏屬三膲其支從膻中上出缺盆上項俠耳後直上出耳上角以屈下額至頰其支者從耳後入耳中出走耳前過客主人前交頰至目兌皆是動則病耳聾煇

煇煒㬎暗腫咳痺是主氣所生病者汗出目允皆痛
頰腫耳後肩膊肘臂外皆痛小指次指不用盛者則
人迎大一倍於寸口虛者則人迎反小於寸口也



脉經卷第十七

朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等類次

病不可發汗證第一

病可發汗證第二

病發汗以後證第三

病不可吐證第四

病可吐證第五

病不可下證第六

病可下證第七

病發汗吐下以後證第八

病可温證第九

病不可灸證第十

病可灸證第十一

病可刺證第十二

病可刺證第十三

病可水證第十四

病可水證第十五

病可火證第十六

病可火證第十七

熱病陰陽交并少陰厥逆陰陽竭盡生死證第十八

重實重虛陰陽相附生死期日證第二十

熱病生死日證第二十一

熱病五藏氣絶死日證第二十二

少陰病脉細沈數病為在裏不可發汗證第一

脉浮而緊法當身體疼痛當以汗解假令尺中脉遲者不可發其汗何以知然以此為榮氣不足血微少故也

少陰病脉微一作濡而微弱不可發其汗無陽故也

脉濡而弱反在關濡反在顛微反在上澁反在下微則陽氣不足澁則無血陽氣反微中風汗出而反躁煩澁則無血厥而且寒陽微發汗躁不得眠

動氣在右不可發汗發汗則劇而渴心苦煩飲即吐水動氣在左不可發汗發汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤

動氣在上不可發汗發汗則氣上衝正在心端
疼目運惡寒食即反吐穀不得前一云穀不消化
咽中閉塞不可發汗發汗則無汗心中大煩骨節苦
欲得踡臥不能自温
諸脉數動微弱並不可發汗發汗則吐血氣微絶手足逆冷
一云小便難脫中乾
胃燥而煩其形相似
異源
脉濡而弱弱反在關濡反在顛弦反在上微反在下
弦為陽運微為陰寒上實下虚意欲得温微弦為虚
不可發汗發汗則寒慄不能自還欬者則劇數吐涎
沫咽中必乾小便不利心中飢煩時時而發其形似

瘧有寒無熱虛而寒慄欲發汗咳而苦滿心痛
腹中復有堅
厥不可發汗發汗則聲亂咽塞言亂睛眩者死
諸逆發汗微者難愈劇者亡
太陽病得之八九日如瘧狀發熱而惡寒少
其人不嘔清便續自可一日再三發其脈微而惡寒
此為陰陽俱虛不可復發汗也
太陽病發熱惡寒熱多寒少脉微弱則無陽也不可
復發其汗咽乾燥者不可發汗
亡血家不可發汗則寒慄而振
衄家不可攻其表汗出必額陷脉上促急而緊直視
而不能眴不得眠

汗家重發其汗必恍惚心亂小便已陰疼可與禹餘
粮圓
淋家不可發汗發其汗必便血
瘡家雖身疼痛不可攻其汗汗出則痙一作痓下同
冬時發其汗必吐利口中爛生瘡
下利清穀不可攻其表汗出必脹滿
欬而小便利若失小便不可攻其表汗出必則厥逆冷
傷寒一二日至四五日厥者必發熱前厥者後必熱
汗出多極發其汗亦堅
厥深者熱亦深厥微者熱亦微厥應下之而反發其
汗必口傷爛赤病人脉數為有熱當消穀引食反
吐者醫發其汗陽微膈氣虛脉則為數數為客陽不

能消穀胃中虛冷故令吐也

傷寒四五日其脉沈煩而喘滿脉沈者病爲在裏反發其汗津液越出大便爲難表虛裏實久則譫語

傷寒頭痛翕翕發熱形象中風常微汗出又自嘔者

下之益煩心懊憹如飢發汗則致痙身强難以屈伸

熏之則發黃不得小便久則發斂唾

太陽病發其汗因致痙

傷寒脉弦細頭痛而反發熱此屬少陽不可發

太陽與少陽併病頭項强痛或眩冒時如結胷心下

痞堅者不可發其汗

少陰病欬而下利譫語者此被火氣劫故也小便必

難以強責少陰病但厥無汗而強發之必動其血未知從何道出或從口鼻或從目出（一本作耳目）者是爲下厥上竭爲難治

傷寒有五皆熱病之類也同病異名同脉異經病雖俱傷於風其人自有痼疾則不得同法其人素傷於熱風因復傷於熱風熱相薄則發風溫四肢不收頭痛不解治在少陰厥陰不可發汗汗出譫言獨語內煩躁擾不得臥善驚目亂無精出不解治在少陰厥陰不可發汗汗出譫言獨語內煩躁擾不得臥善驚目亂無精其汗如此者醫殺之也

傷寒濕溫其人常傷於濕因而中暍濕熱相薄則發溫病苦兩脛逆冷腹滿又肖頭目痛苦妄言治在

足太陰不可發汗汗出必不能言耳聾不知痛所在

身青面色變名曰重暍如此者死醫四殺之也右二首出醫律

大法春夏宜發汗

病可發汗證第二

凡發汗欲令半足皆周至熱熱一時間益佳但不欲

如水流離若病不解當重發汗亡陽陽虛不

得重發汗

凡服湯藥發汗中病便止不必盡劑也

凡云可發汗而無湯者圓散亦可用要以汗出為解

然不如湯隨證良

太陽病外證未解其脉浮弱當以汗解宜桂枝湯

太陽病脉浮而數者可發其汗屬桂枝湯證

陽明病脉遲汗出多微惡寒表爲未解可發其汗屬桂枝湯證

桂枝湯證

夫病脉浮大問病者言但堅耳設利者爲虛大逆堅爲實汗出而解何以故脉浮當以汗解今反利故知虛也脉不弦緊而弱弱者必渴被火必譫語弱者發熱脉浮解之當汗出愈

病者煩扑虛汗出即解復如瘧狀日晡所發熱此屬陽明脉浮虛者當發其汗屬桂枝湯證

病常自汗出此爲榮氣和榮氣和而外不解此衛不和也榮行脉中爲陰主內衛行脉外爲陽主外復發其汗衛氣和則愈屬桂枝湯證

病人藏無他病時發熱自汗出而不愈此衛氣不和

也先其時發汗即愈屬桂枝湯證

脈浮而緊浮則爲風緊則爲寒風則傷衛寒則傷榮

太陽病不解熱結膀胱其人如狂血必自下下者即愈其外未解者尚未可攻當先解其外屬桂枝湯證

太陽病下之微喘者表未解故也屬桂枝加厚朴杏子湯證

傷寒脈浮緊不發其汗因衄屬麻黃湯證

陽明病脈浮無汗其人必喘發其汗則愈屬麻黃湯證

太陰病脈浮者可發其汗屬桂枝湯證

太陽病脈浮緊無汗發熱其身疼痛八九日不解表候續在此當發其汗服湯微除發煩目瞑劇者必

卽卽乃解所以然者陽氣重故也屬麻黃湯證

脉浮者病在表可發其汗屬桂枝湯證

傷寒不大便六七日頭痛有熱與承氣湯其大便反青（一作清）者此爲不在裏故在表也當發其汗頭痛者小

必卽屬桂枝湯證

下利後身體疼痛清便自調急當救表宜桂枝湯

太陽病頭痛發熱汗出惡風若惡寒屬桂枝湯證

出嗇嗇惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔屬桂枝湯證

太陽中風陽浮而陰濡弱浮者熱自發濡弱者汗自出欲救邪風屬桂枝湯證

太陽病發熱汗出此爲榮弱衛強故使汗出欲救邪風屬桂枝湯證

太陽病下之氣上撞可與桂枝湯不可與之
太陽病初服桂枝湯而反煩不解者法當先刺風池
風府却與桂枝湯則愈
燒針令其汗針處被寒核起而赤者必發貴脉氣從少
腹上撞心者灸其核上一壯與桂枝湯則愈
太陽病項背強几几反汗出惡風屬桂枝加葛根湯
太陽病項背強几几無汗惡風屬葛根湯
太陽與陽明合病不下利但嘔屬葛根加半夏湯
太陽與陽明合病而自利不嘔者屬葛根湯證
太陽病桂枝證醫反下之利不止其脉促者表未
解喘而汗出屬葛根黃芩黃連湯
太陽病頭痛發熱身體疼痛骨節疼痛惡風無汗

而喘屬麻黃湯證

太陽與陽明合病喘而胸滿不可下也屬麻黃湯證

太陽中風脈浮緊發熱惡寒身體疼痛不汗出而煩躁頭痛屬大青龍湯脈微弱汗出惡風不可服之服之則厥筋惕肉瞤此為逆也

傷寒脈浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰證者大青龍湯發之

傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或噎或小便不利小腹滿或微喘發熱不渴服湯已而渴者此寒去欲解屬小青龍湯證

傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴服湯已而渴

陽明中風脈弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛久

按之氣不通一作按之不痛皐乾不得汗嗜卧一身及目悉黃小便難有潮熱時時噦耳前後腫刺之小差外不解病過十日脉續浮與小柴胡湯但浮無餘證與麻黃湯證

黃湯不溺腹滿加噦噦不治

太陽病十日以去脉浮細嗜卧此爲外解設胷滿脇

痛與小柴胡湯脉浮者屬麻黃湯證

中風往來寒熱傷寒五六日

欲飲食煩心喜嘔或胷中悸小便不利或不渴外有微熱

或胷下結堅或心中悸小便

或脇下痞堅或心中悸小便不利或不渴外有微熱

或欬者與小柴胡湯

傷寒四五日身體熱惡風頸項強脇下滿手足温而

渴屬小柴胡湯證

傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結
外證未去者屬柴胡桂枝湯
少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二
三日無證故微發汗也
脉浮小便不利微熱消渴與五苓散利小便發汗
病發汗以後證第三
二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出復不徹因
轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽證不罷不可
下下之為逆如此者可小發其汗設面色緣緣正赤
者陽氣怫鬱在表當解之熏之若發汗不大徹不足
言陽氣怫鬱不得越當汗而不汗其人躁煩不知痛
處乍在腹中乍在四肢按之不可得其人短氣但坐

汗出而不徹故也更發其汗即愈何以知其汗不徹
脉澁故以知之
未持脉時病人叉手自冒心師因教試令欬而不即
欬者此必兩耳無所聞也所以然者重發其汗虛故也
發汗後飲水多者必喘以水灌之亦喘
發汗後水藥不得入口為逆若更發其汗病已差其汗必
陽明病本自汗出醫復重發其汗亡津液胃中乾燥故
不了了此大便堅也以亡津液胃中乾燥故令其堅
當問小便日幾行若本日三四行今日再行者必
大便不堅也以小便數少津液當還入胃中故知
必當大便也
發汗多復發其汗此為亡陽皆譫語脉短者死脉

自和者不可復治假令發汗而反吐之者亦死

傷寒發其汗身目為黃所以然者寒濕相搏在裏不解故也

病人有寒復發其汗汗出必厥又重發其汗遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸屬桂枝加附子湯

太陽病發其汗因致不解又復發汗胃中冷必吐蚘

服桂枝湯大汗出若脈洪大與桂枝湯若其形如瘧一日再三發汗出便解屬桂枝二麻黃一湯

服桂枝湯大汗出大煩渴不解若脈洪大屬桂枝二麻黃一湯

傷寒脈浮自汗出小便數煩仲景煩復字作心煩微惡寒而脚攣急反與桂枝欲攻其表得之便厥咽乾煩躁吐逆當作甘草乾薑湯以復其陽厥愈足温更作芍藥

甘草湯與之其脚即伸而胃氣不和譫語可與承氣
湯重發其汗復加燒針者屬四逆湯
傷寒發汗已解半日許復煩其脉浮數可復發其汗
屬桂枝湯
發汗後身體疼痛其脉沈遲屬桂枝加芍藥生薑人
參湯
發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱可以麻
黃杏子甘草石膏湯
發汗過多以後其人叉手自冒心心下悸而欲得按
之屬桂枝甘草湯
發汗後其人臍下悸欲作奔豚屬茯苓桂枝甘草大棗湯
發汗後腹脹滿屬厚朴生薑半夏甘草人參湯

發其汗不解而反惡寒者虛故也屬芍藥甘草附子湯不惡寒但熱者實也當和其胃氣宜小承氣湯

太陽病發汗若大汗出胃中燥煩不得眠其人欲飲水當稍飲之令胃中和則愈

發汗已脈浮而數復煩渴者屬五苓散

傷寒汗出而渴屬五苓散證不渴屬茯苓甘草湯

太陽病發其汗汗出不解其人發熱心下悸頭眩身瞤而動振振欲擗地屬真武湯

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞堅乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴而利屬生薑瀉心湯

傷寒發熱汗出不解心中痞堅嘔而下利屬大柴胡湯

胡湯

太陽病三日發其汗不解蒸蒸發熱者屬於胃也調
承氣湯
大汗出熱不去內拘急四肢疼下利厥逆而惡寒屬
四逆湯

發汗多亡陽譫語者不可下與柴胡桂枝湯和其榮
衛以通津液後自愈

病一日發
太陽病當惡寒而發熱今自汗出反不惡寒不發熱關
上脉細而數此醫吐之過也若得病一日二日吐之
上脉細而數此醫吐之過也若得病一日二日吐之
腹中飢口不能食三日四日吐之不喜糜粥欲食冷
食朝食暮吐此醫吐之所致也此為小逆
太陽病吐之者但太陽病當惡寒今反不惡寒不欲

近衣此為吐之內煩也

少陰病飲食入則吐心中溫溫欲吐復不能吐始得之手足寒脉弦遲此胷中實不可下若膈上有寒飲乾嘔者不可吐當温温之

諸四逆厥者不可吐之虛家亦然

病可吐證第五

大法春宜吐

凡服湯吐中病便止不必盡劑也

病如桂枝證其頭不痛項不強寸口脉微浮胷上有寒當吐之

堅氣上撞咽咳不得息此爲胷有寒當吐之

病胷上諸實胷中鬱鬱而痛不能食欲使人按之而反有濁唾下利日十餘行其脉反遲寸口微滑此可

動氣在左不可下下之則腹裏拘急食不下動氣
劇身雖有熱卧反欲踡
動氣在上不可下下之則掌握熱煩身浮冷熱汗自
泄欲水自灌
動氣在下不可下下之則腹滿卒起頭眩
穀心下痞堅
咽中閉塞不可下下之則上輕下重水漿不下卧則
欲踡身體急痛復下利日十數行
諸外實不可下下之則發微熱亡脉則厥當臍握熱
諸虛不可下下之則渴引水者易愈惡水者劇
脉濡而弱弱反在關濡反在巔弦反在上微反在下
弦為陽運微為陰寒上實下虛意欲得温微弦為虛

虛者不可下微則為欬欬則吐涎沫下之欬則止而
利不休尚中如蟲齧粥入則出小便不利兩脇拘急
喘息爲難頸背相牽臂則不仁極寒反汗出軀冷若
冰眼睛不慧語言不休穀氣多入則為除中口雖欲
言舌不得前
脉濡而弱弱反在關濡反在巔浮反在上数反在下
浮則為虛数則為無血浮則生熱浮則為陽虛数則為陽痛振而寒慄微弱在關首
下為急發熱汗出而惡寒数則為痛振而寒慄微弱在關首
下為急喘汗不得呼吸呼吸之中痛在於脇振寒相
搏其形如瘧醫反下之令脉急數發熱狂走見鬼心
脉濡而緊濡則陽氣微緊則榮中寒陽微衛中風發

熱而惡寒榮緊胃氣冷微嘔心內煩鬱以為大熱解
肌而發汗亡陽虛煩躁心下苦痞堅表裏俱虛竭卒
起而頭眩客熱在皮膚脹快不得眠不知胃氣冷緊
寒在關元技巧無所施汲水灌其身客熱應時罷慄
慄而振寒重被而覆之汗出而冒顛體惕而又振小
便為微難寒氣因水發清穀不容問嘔亦變反腸出顛
倒不得安手足為微逆身冷而內煩遲欲從後救安
可復追還
脉浮而大浮為氣實大為血虛血虛為無陰孤陽獨
下陰部小便難胞中虛今反小便利而大汗出法當
家當微今反更實津液四射榮竭血盡干煩不眠血
薄肉消而成暴液鬱復以毒藥攻其胃此為重虛客

陽去有期必下如汚泥而死

跌陽脉數則動脾此非本病醫經跌陽脉浮而數遲而緩胃氣如經跌陽脉浮則傷胃數則動脾此非本病醫特下之所為也榮衛內陷其數先微故知脾氣獨留心中則飢

堅氣噫而除今脉反浮其數改微邪氣因前後度不治大便不殺穀潮熱發渴數脉當遲緩脉反因前後度仲景前字作法病者則飢數厥不時則生惡瘡

脉數者久數不止止則邪結正氣不能復正氣却結於藏故瘡邪氣浮之與皮毛相得脉數者不可下下之必煩利不止

少陰病脉微不可發其汗無陽故也陽已虛尺中弱

澀者復不可下之

脉浮大應發其汗醫反下之此為大逆

脉浮而大心下反堅有熱屬藏攻之不令發汗屬府

溲數則堅汗多即愈汗少便難脉遲尚未可攻

二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出復不徹因

轉屬陽明欲自汗出不惡寒若太陽證不罷不可下

下之為逆

結胸證其脉浮大不可下下之即死

太陽與陽明合病喘而胸滿不可下之

太陽與少陽併病心下痞堅頸項強而眩勿下之

諸四逆厥者不可下之虛家亦然

病欲吐者不可下之

太陽病有外證未解不可下之為逆
病發於陽而及下之熱入因作痞
之因作痞脉浮堅而下之緊反入裏因作痞
夫病陽多者熱下之則堅
本虛攻其熱必噦
無陽陰強者熱而堅下之必清穀而腹滿
太陰之為病腹滿而吐食不下下之益甚腹時自痛
厥陰之為病消渴氣上撞心中疼熱飢而不欲食甚
者則欲吐下之不肯止
少陰病其人飲食入則吐心中温温欲吐復不能吐
始得之手足寒脉弦遲此胸中實不可下也

傷寒五六日不結胸腹濡脈虛復厥者不可下下之亡血死

傷寒發熱但頭痛微汗出發其汗則不識人熏之則喘不得小便心腹滿下之則痛背強加温針則必衄

傷寒其脈陰陽俱緊惡寒發熱則脈欲厥者脈初來大漸漸小更來漸大是其候也惡寒甚者翕翕汗出喉中痛熱多者目赤睛不慧醫復發之因咽中則傷若復下之則兩目閉寒多清穀熱多便膿血熏之則發黃慰之則咽燥小便利者可救難者必危殆

傷寒發熱口中勃勃氣出頭痛目黃鼻衄不可制貪水者必嘔惡水者厥下之咽中生瘡假令手足温者下

重便膿血頭痛目黃者下之其脈
必厥其聲嚶咽喉塞發其汗則戰慄陰陽俱虛惡水
者下之裏冷不嗜食大便完穀出發其汗口中傷舌
上胎滑煩躁脈數實不大便血復發
其汗小便即利七日後必自利
得病二三日脈若無太陽柴胡證而煩躁
四日雖能食以承氣湯少與微和之令小安至六日
與承氣湯一升不大便六七日小便少者雖不大便
但頭堅後溏未定成其堅攻之必溏當須小便利定
堅乃可攻之
藏結無陽證寒而不熱傷寒往來寒熱論云不
胎滑者不可攻也
其人反靜舌上

傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之
陽明病潮熱微堅可與承氣湯不堅不可攻之
便六七日恐有燥屎欲知之法可少與小
中轉失氣者此為有燥屎乃可攻之若不
此但頭堅後溏不可攻之必腹滿不能食欲飲
水者即噦其後發熱者必大便復堅以小承氣湯和之若
不轉失氣者慎不可攻之
陽明病身合色赤者不可攻也必發熱色黃者小便
不利也
陽明病當心下堅滿不可攻之攻之遂利不止者死
止者愈
陽明病自汗出若發其汗小便自利此為
約內竭雖堅

不可攻之當須自欲大便宜密煎導而通之若土瓜根及猪膽汁皆可以導

下利其脉浮大此為虛以強下之故也設脉浮革因

爾腸鳴屬當歸四逆湯

病可下證第七

大法秋宜下冬宜吐春宜汗夏宜汗

凡可下者以調胃承氣湯勝圓散中之屬大柴胡湯

陽明病發熱汗多者急下之屬大柴胡湯

少陰病得之二三日口燥咽乾者急下之屬承氣湯

少陰病六七日腹滿不大便者急下之屬承氣湯證

少陰病下利清水色青者可下之屬大柴胡湯承氣湯證

下利三部脉皆平按其心下堅者可下之屬承氣湯證
陽明與少陽合病而利脉不及貧者為順及貧者為失也元
相刻賊為貧
滑而數者有宿食當下之屬大柴胡承氣湯證
傷寒後脉沈沈為內實玉函云脉沈實者下之解屬大
柴胡湯證
傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大便難
微熱者此為實急下之屬大柴胡湯承氣湯證
太陽病未解其脉陰陽俱停必先振汗出解但陽微
者先汗之而解屬大柴胡湯
證陰微一作尺實
脉雙弦遲心下堅脉大而緊者陽中有陰可下之屬

承氣湯證

結胸者項亦強如柔痙狀下之即和

病者無表裏證發熱七八日雖脉浮數可下之屬大

柴胡湯證

太陽病六七日表證續在其脉微沈反不結胸其人

發狂此熱在下膀少腹當堅而滿小便自利者下血

乃愈所以然者以太陽隨經瘀熱在裏故也屬抵當湯

太陽病身黃其脉沈結少腹堅小便不利者為無血小

便自利其人如狂者血證諦屬抵當湯證

傷寒有熱而少腹滿應小便不利今反利者此為血

當下之屬抵當圓證

陽明病發熱而汗出此為熱越不能發黃但頭汗出

其身無有表齊頸而還小便不利渴引水漿此為瘀熱在裏身必發黃屬茵蔯蒿湯

陽明證其人喜忘必有畜血所以然者本有久瘀血故令喜忘雖堅大便必黑屬抵當湯證汗出而譫語者以有燥屎在胃中此風也過經乃可下之下之若早語言亂以表虛裏實故也下之則愈屬大柴胡湯承氣湯證

氣湯證

病者煩熱汗出即解復如瘧狀日晡所發者屬陽明

脉實者當下之屬大柴胡湯承氣湯證

陽明病譫語有潮熱而反不能食者必有燥屎五六

枚若能食者但堅耳屬承氣湯證

太陽中風下利嘔逆表解乃可攻之其人欬汗出

發作有時頭痛心下痞堅滿引脇下痛嘔則短氣汗出不惡寒此為表解裏未和屬十棗湯

太陽病下之後脈促胸滿而微喘此為表未解也桂枝去桂加茯苓白朮湯

其外未解尚未可攻當先解外外解小便利飲水者乃可攻之屬桃人承氣湯

傷寒七八日身黃如橘小便不利少腹微滿屬茵蔯蒿湯

葛湯證

傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱屬大柴胡湯證

但結胸無大熱此為水結在胸脇頭微汗出與大陷胸湯

傷寒六七日結胸熱實其脈沈緊心下痛按之如石堅與大陷胸湯

陽明病其人汗多津液外出胃中燥大便必堅堅者
則譫語屬承氣湯證
陽明病不吐不下而心煩者可與承氣湯
陽明病其脉遲雖汗出而不惡寒其體（一本作人）必重短
氣腹滿而喘有潮熱如此者其外為解可攻其裏若
手足濈然汗出者此大便已堅屬承氣湯若腹滿大不
未可與承氣湯若腹滿而不大便者屬小承氣湯
微和胃氣勿令至大下
陽明病譫語發潮熱其脉滑疾如此者屬承氣湯因
與承氣湯一升腹中轉失氣者復與一升如不轉失
氣者勿更與之明日又不大便脉反微澁者此為裏
虛為難治不可更與承氣湯

三陽併病太陽證罷但發潮熱手足漐漐汗出大便
難而譫語者下之愈屬承氣湯證
病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能
臥者有燥屎也屬承氣湯證

辨太陽病脉證第八

師曰病人脉微而澁者此為醫所病也大發其汗又
數大下之其人亡血病當惡寒而發熱無休止時夏
月盛熱而與仲景作欲著複衣冬月盛寒而發熱故
體所以然者陽微即惡寒陰弱即發熱故仲景作醫發其
汗使陽氣微又大下之令陰氣弱五月之時陽氣在
表胃中虛冷以陽氣內微不能勝冷故仲景作欲著複
衣十一月之時陽氣在裏胃中煩熱以陰氣內弱不能

勝熱故與
太陽病三日已發其汗又陰脉遲澁故知仲景祇裸其體
桂枝復不中與也觀其脉證知犯何逆隨証而治之
脉浮數法當汗出而愈而下吐下温針而不解此為壞病
發其汗當汗出而愈而下之則身體重心悸不可
須表裏實津液和即自汗出而解所以然者尺中脉微此裏虚
凡病若發汗若吐若下若亡血無津液而陰陽自和
者必自愈
大下後發汗其人小便不利此亡津液勿治其小便
利必自愈
下以後復發其汗必振寒又其脉微細所以然者内
外俱虚故也

太陽病先下而不愈因復發其汗表裏俱虛其人因
冒冒家當汗出自愈所以然者汗出表和故也表和
然後下之
得病六七日脉遲浮弱惡風寒手足温醫再三下之
不能多作食其人脇下滿面目及身黃頸項強小便
難與柴胡湯後必下重本渴飲水而嘔柴胡湯復不
中與也食穀者噦
太陽病三日終不能臥但欲起者心下必結其脉
微弱者此本寒也而反下之利止者必結胸未止者
四五日復重下之此挾熱利也
太陽病下之其脉浮者必結胸其脉緊者必咽痛其脉弦者必兩脇拘急其

脉細而數者頭痛未止其脉沈而緊者必欲嘔其脉沈而滑者挾熱利其脉浮而滑者必下血

太陽少陽併病而反下之成結胸心下堅

止水漿不肯下其人必心煩

脉浮緊而下之緊反入裏則作痞按之自濡但氣痞耳

傷寒吐下發汗虛煩脉甚微八九日心下痞堅脇下

痛氣上衝咽喉眩冒經脉動惕者久而成痿

陽明病不能食下之不解其人不能食攻其熱必噦

所以然者胃中虛冷故也

陽明病脉遲食難用飽飽即發煩頭眩者必小便難

此欲作穀疸雖下之其腹滿如故耳所以然者脉遲

故也

太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱而汗出復惡寒不嘔但心下痞者此為醫下之也傷寒大吐大下之極虛復極汗者其人外氣怫鬱復與之水以發其汗因得噦所以然者胃中寒冷故也吐下發汗後其人脈平而小煩者以新虛不勝穀氣故也

太陽病醫發其汗遂發熱而惡寒復下之則心下痞此表裏俱虛陰陽氣併竭無陽則陰獨復加火針因而煩面色青黃膚瞤如此者為難治今色微黃手足温者易愈

服桂枝湯下之頭項強痛翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利屬桂枝去桂加茯苓朮湯

太陽病先發其汗不解而下之其脉浮者不愈浮為在外而反下之故令不愈今脉浮故在外當解其外則愈屬桂枝湯

下以後復發其汗者則晝日煩躁不眠夜而安靜不嘔不渴而無表證其脉沈微身無大熱屬乾薑附子湯

傷寒吐下發汗後心下逆滿氣上撞胷起即頭眩其脉沈緊發汗即動經身為振搖屬茯苓桂枝白朮甘草湯

發汗吐下後虛煩不得眠劇者反覆顛倒心中懊憹屬梔子豉湯若少氣梔子甘草湯若嘔梔子生薑湯

湯若腹滿者梔子厚朴湯

發汗若下之煩熱胷中塞者屬梔子豉湯證

太陽病過經十餘日心下温温欲吐而胸中痛大便反溏其腹微滿鬱鬱微煩先時自極吐下者與承氣湯不爾者不可與欲嘔胸中痛微溏此非柴胡湯證以嘔故知極吐下也

太陽病重發其汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡所小有潮熱從心下至少腹堅滿而痛不可近屬大陷胸湯

傷寒五六日其人已發汗而復下之胸脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩此為未解屬柴胡桂枝乾薑湯

傷寒汗出若吐下解後心下痞堅噫氣不除者屬旋

大下以後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱可以
麻黃杏子甘草石膏湯
傷寒大下後復發其汗心下痞惡寒者表未解也不
可攻其痞當先解表表解乃攻其痞解表屬桂枝湯
攻痞屬大黃黃芩黃連瀉心湯
傷寒吐下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時
惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升屬白虎湯
傷寒吐下後未解不大便五六日至十餘日其人日
晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼神之狀若劇者發
狂欲走以其人素有畜血故也可下之
澀者死微者但發熱譫語屬承氣湯若下者勿復服
則不識人循衣妄撮怵惕不安微喘直視脈弦者生
三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁面垢譫語遺

承氣湯和之則愈

大汗若大下之而厥冷者屬四逆湯證

太陽病下之其脉促胷滿者屬桂枝去芍藥湯

寒屬桂枝去芍藥加附子湯

傷寒五六日大下之身熱不去心中結痛者未欲解也屬梔子湯

傷寒下後煩而腹滿卧起不安屬梔子厚朴湯

傷寒醫以圓藥大下之身熱不去微煩屬梔子乾薑湯

傷寒醫下之續得下利清穀不止身體疼痛急當救表救裏宜四逆湯救

表宜桂枝湯

太陽病過經十餘日反再三下之後四五日柴胡證

續在先與小柴胡湯嘔止小安嘔不止小心安下一云急其人鬱ㄴ微煩者為未解與大柴胡湯下者止小安嘔不止小心安下一云急其人

傷寒十三日不解肎脇滿而嘔日晡所發潮熱而微利此本當柴胡湯下之不得利今反利者故知醫以圓藥下之非其治也潮熱者實也先再服小柴胡湯以解其外後屬柴胡加芒消湯

傷寒十三日過經而譫語内有熱也當以湯下之小便利者大便當堅而反利其脉調和者知醫以圓藥下之非其治也自利者其脉當微厥今反和者此為内實屬承氣湯證

傷寒八九日下之肎滿小便不利譫語一身不可轉側屬柴胡加龍骨牡蠣湯

火逆下之因燒針煩躁屬桂枝甘草龍骨牡蠣湯

太陽病脈浮而動數浮則為風數則為熱動則為痛數則為虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒其表未解醫反下之動數則遲頭痛即止一云膈內拒痛胃中空虛客氣動膈短氣躁煩心中懊憹陽氣內陷心下因堅則為結脇滿也結胸證具而小便不利身必發黃

傷寒五六日嘔而發熱柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在復與柴胡湯此雖已下不為逆也必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而堅痛者此為結胸屬大陷胸湯若但滿而不痛者此為不中與也屬半夏瀉心湯

本以下之故心下痞與之瀉心其痞不解其人渴而口燥小便不利者屬五苓散一方言忍之一日乃愈

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞堅而滿乾嘔而煩不能得安醫見心下痞堅服瀉心湯已後

中虛客氣上逆故使之痞堅屬甘草瀉心湯

傷寒服湯藥而下利不止心下痞堅服瀉心湯已後以佗藥下之利不止醫以理中與之利益甚理中理下之利不止心下痞堅屬甘草瀉心湯

中脘此利在下脘屬赤石脂禹餘粮湯若不止者當利其小便

太陽病外證未除而數下之遂挾熱而利不止心下痞堅表裏不解屬桂枝人參湯

傷寒吐後腹滿者與承氣湯
病者無表裏證發熱七八日脉雖浮數者可下之假令下已脉數不解今熱則消穀喜飢至六七日不大便者有瘀血屬抵當湯若脉數不解而不止必失血
便膿血
太陽病醫反下之因腹滿時痛為屬太陰屬桂枝加芍藥湯
大實痛屬桂枝加大黃湯
傷寒六七日其人大下後脉沈遲手足厥逆下部脉不至喉咽不利唾膿血泄利不止為難治屬麻黃升麻湯
傷寒本自寒下醫復吐下之寒格更遂吐逆（本作更下作吐）

食入即出屬乾薑黃芩黃連人參湯

大法冬宜服温熱藥及灸火

病可温證第九

師曰病發熱頭痛脉反沈若不差身體更疼痛當救其裏宜温藥四逆湯

下利腹滿身體疼痛先温其裏宜四逆湯

自利不渴者屬太陰其藏有寒故也當温之宜四逆輩

少陰病其人飲食入則吐心中温温欲吐復不能吐始得之手足寒脉弦遲若膈上有寒飲乾嘔者不可吐當温之宜四逆湯

少陰病脉沈者急當温之宜四逆湯

下利欲飲食者就當温之宜四逆湯

下利脉遲緊為痛未欲止當温之得冷者満而便腸垢
爾腸鳴當温之宜當歸四逆湯
少陰病下利脉微澁者即嘔汗出必數更衣反少當
温之
傷寒醫下之續得下利清穀不止身體疼痛急當救
裏宜温之以四逆湯
病下利不可灸證第十
微数之脉法為邪則為煩逆追虚逐實不可灸因火為邪則為煩逆追虚逐實
脉浮當以汗解而反灸之邪無從去因火而盛病從
血散脉中火氣雖微内攻有力焦骨傷筋血難復也
腰以下必當重而痺此為火逆若欲自解當先煩煩

乃有汗隨汗而解何以知之脉浮故知
脉浮熱甚而灸之此為實實以虛治因
必唾血

病下利一

燒針令其汗針處被寒核起而赤者必發貴脉氣從
少腹上撞者灸其核上一壯一本作各一壯與桂枝加桂湯
少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之
少陰病其人吐利手足不逆反發熱不死脉不至者
灸其少陰七壯
少陰病下利脉微澁者即嘔汗出必數更衣反少當
温其上灸之一云灸厥陰可五十壯
諸下利皆可灸足大都五壯十一云壯商邱陰陵泉各三壯

下利手足厥陽者為順也傷寒六七日其脉微手足厥煩躁灸其厥陰厥不還者死

傷寒脉促手足厥逆可灸之為可灸少陰負趺陽者為順也傷寒六七日其脉微手足厥煩躁灸其厥陰厥不還者死

病不可刺證第十二

大怒無刺已刺無怒（已作新一）

大勞無刺（大作新一）已刺無勞

已刺無內無刺

大醉無刺已刺無醉

已刺無飽無刺大飽無刺

大渴無刺已刺無渴

無刺熇熇之熱無刺漉漉之汗無刺渾渾之脉身熱

甚陰陽皆爭者勿刺也其
所謂勿刺者有死徵也無
未生其次刺未盛其次刺
已衰粗工逆此謂之伐形
病可刺證第十三
太陽病頭痛至七日自當愈其經竟故也若欲作再
經者當針足陽明使經不傳則愈
太陽病初服桂枝湯而反煩不解者當先刺風池風
府乃却與桂枝湯則愈
傷寒腹滿而譫語寸口脈浮而緊者此為肝乘脾名
縱當刺期門
傷寒發熱面面惡寒其人大渴欲飲酢漿者其腹必
滿而自汗出小便利其病欲解此為肝乘肺名曰橫

當刺期門
陽明病下血而譫語此為熱入血室但頭汗出者當
刺期門隨其實而瀉之濈然汗出者則愈
婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除脈
遲身涼胸脇下滿如結胸狀其人譫語此為熱入血
室當刺期門隨其虛實而取之平病云熱入血室無
犯胃氣及上三焦與此相反豈謂藥不謂針耶
太陽與少陽併病頭項強而眩時如結胸心下
痞堅當刺大杼第一間肺輸肝輸慎不可發汗發汗
則譫語譫語則脈弦譫語五日不止當刺期門
婦人傷寒懷身腹滿不得小便加從腰以下重如有

水氣狀懷身七月太陰當養不養此心氣實當刺寫
勞宮及關元小便利則愈
傷寒喉痺刺手少陰少陰在腕當小指後動脈是也
斜入三分補之
問曰病有汗出而身熱煩滿煩滿不為汗解者何對
曰汗出而煩滿不解者厥也病名曰風厥風厥者厥
厥也太陽主氣故先受邪少陰與為表裏也
得熱則上從之從之則厥治之表裏刺之飲之湯
熱病三日氣口靜人迎躁者取之諸陽五十九刺以
寫其熱而出其汗實其陰以補其不足所謂五十九
刺者兩手外內側各三凡十二病五措間各一凡八
病足亦如是頭入髮一寸傍三分各三凡六病更入

髮三寸邊各五凡十痏耳前後口下項中各一凡六
痏顛上一寸一
熱病先膚痛窒皐充面取之皮以第一針
菌為軫一作苛軫二皐索皮於肺不得索之火火心也
熱病嗌乾多飲善驚臥不能安取之膚肉以第六針
五十九目皆赤索肉於脾不得索之木木肝也
熱病而脅痛手足躁取之筋間以第四針針於四
達一作逆筋辟目浸索筋於肝不得索之金金肺也
熱病數驚瘈瘛而狂取之脉以第四針急寫有餘者
癲疾毛髮去索血一脉作
熱病而身重骨痛耳聾而好瞑取之骨以第四針五
十九骨病食齧牙齒耳清索骨於腎無一作本不得索之

土土脾也

熱病先身濇傍教 傍教太煩悶乾脣嗌取之以第一針五十九膚脹口乾寒汗 攝一作顳顬 目脉緊善衄厥熱也不足寒熱病三針視有餘不足寒熱病體重腸中熱取之以第四針於其輸及下諸指間索氣於胃絡得氣也

熱病俠臍痛急脅肋支滿取之涌泉與太陰陽明以第四針針嗌裏

熱病而汗出反脉順可汗者取之魚際大淵大都太白寫之則熱去補之則汗出汗出太甚者取踝上横文以上之

熱病七日八日脉口動喘而眩者急刺之汗且自出
淺利手大指間
熱病先胃脇痛手足躁刺足少陽補手太陰瀉
五十九刺
熱病先手臂痛刺手陽明太陰而汗出止
熱病始於頭首者刺項太陽而汗出止
熱病先身重骨痛耳聾目瞑刺足少陰病甚為五十
九刺一云少陽刺
熱病先眩冒而熱胃脇滿刺足少陰少陽
熱病始足脛者先取足陽明而汗出
病不可水證第十四
發汗後飲水多者必喘以水灌之亦喘

傷寒六吐下之極虛復極汗者其人外氣怫鬱復與之水以發其汗因得噦所以然者胃中寒冷故也

陽明病潮熱微堅可與承氣湯不堅勿與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法可與小承氣湯若腹中不轉失氣者此為但頭堅後溏不可攻之攻之必腹滿不能食欲飲水者即噦

陽明病若胃中虛冷其人不能食飲水即噦

爾腸鳴當温之與水即噦

病在陽當以汗解而反以水潠之若灌之其熱却不得去益煩皮上粟起意欲飲水反不渴宜文蛤散若不差與五苓散若寒實結胸無熱證者與三物小陷

肖湯白散亦可身熱皮粟不解欲引衣自覆若以水噀之洗之益令熱却不得出當汗而不汗則煩假令汗出已腹中痛與芍藥三兩如上法

寸口脉浮大逆浮即無血大即為醫反下之此為大逆浮即為腸鳴醫乃不知而反飲水令汗大出水得寒氣相搏即冷必相搏其人先冷即發熱濡弱濡即惡寒弱即即煩

寸口脉濡而弱濡即惡寒弱即發熱濡弱相搏藏氣衰微肖中苦煩此非結熱而反薄居水漬布冷飽貼之陽氣遂微諸府無所依陰脉凝聚結在心下而不肯移胃中虛冷水穀不化小便縱通復不能多微則可救聚寒心下當柰何也

病可水證第十五

太陽病發汗後若大汗出胃中乾燥煩不得眠其人
欲飲水當稍飲之令胃中和則愈
厥陰病渴欲飲水者與水飲之即愈太陽病寸口緩
關上小浮尺中弱其人發熱而汗出復惡寒不嘔但
心下痞者此為醫下也若不下其人復不惡寒而渴
者為轉屬陽明小便數者大便即堅不更十日無
所苦也欲飲水者但與之當以法救渴宜五苓散
寸口脉洪而大數而滑洪大則榮氣長滑數則胃氣
實榮長則陽盛怫鬱不得出身胃實則堅難大便則
乾燥三焦閉塞津液不通醫發其汗陽盛不周復重
下之胃燥熱甚火皐乾面赤舌燥齒黃焦故大渴過經
發熱兩眼如火皐乾面赤舌燥齒黃焦故大渴過經

成壞病針藥所不能制與水潅枯槁陽氣微散身寒
温衣覆汗出表裏通然其病即除形脉多不同此愈
非法治但醫所當慎妄犯傷榮衛
霍亂而頭痛發熱身體疼痛熱多欲飲水屬五苓散
嘔吐而病在膈上後必思水者急與猪苓散飲之水
亦得也

病不可火證第十六

太陽中風以火劫發其汗邪風被火熱血氣流洪
其常度兩陽相熏灼其身發黃陽盛則欲衄陰虛小
便難陰陽俱虛竭身體則枯燥但頭汗出齊頸而還
腹滿而微喘口乾咽爛或不大便久則譫語甚者至
噦手足躁擾捻衣摸床小便利者其人可治

太陽病醫發其汗遂發熱而惡寒復下之則心下痞
此表裏俱虛陰陽氣併竭無陽則陰獨復加火針因
而煩面色青黃膚瞤如此者為難治今色微黃手足
温者愈
傷寒加温針必驚
陽脉浮陰脉弱則血虛血虛則筋傷其脉沈者榮氣
微也其脉浮而汗出如流珠者衛氣衰也榮衛俱不行更發熱而躁煩也
燒針血留不行而醫以火迫劫之亡陽驚狂臥起不安屬
桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯
問曰得病十五十六日身體黃下利狂欲走師脉之
言當下清血如脉肝乃愈後如師言何以知之師曰

寸口脉陽浮陰濡弱陽浮則為風陰濡弱為
虛受風少血發熱惡寒淒甚客熱因火而發佛欝蒸肌膚身目
令汗出惡寒淒甚客熱因火而發佛欝蒸肌膚身目
為黃小便微難短氣從鼻出血而復下之胃無津液
泄利遂不止熱瘀在膀胱畜結成積聚狀如腸肝當
下未下心亂迷憒狂走赴水不能自制畜血若去目
明心了此皆醫所為無他禍患微輕得愈極者不治
傷寒其脉不弦緊而弱者必渴被火必譫言弱者發
太陽病以火熏之不得汗其人必躁到經不解必有
熱脉浮緩之當汗出愈

清血

陽明病被火額上微汗出而小便不利必發黃

陽明病其脉浮緊咽乾口
不惡寒反偏惡熱其身體重發其汗則躁
反譫語加温針必怵惕又煩躁不得眠
少陰病脉沈而弦為被火氣劫故也少便必
難為強責少陰汗出
太陽病二日而燒瓦熨其背大汗出火氣入胃胃中
竭燥必發譫語十餘日振而反汗出者此為欲解其
汗從腰以下不得汗其人欲小便反不得嘔欲失溲
足下惡風大便堅者小便當數而反不數及多便已
其頭卓然而痛其人足心必熱穀氣下流故也
下利穀道中痛當温之以為宜熬末鹽熨火
病可火證第十七

熱病陰陽交并少陰厥逆陰陽竭盡生死證第十八

問曰溫病汗出輒復熱而脈躁疾不為汗衰狂言不能食病名為何對曰名曰陰陽交交者死人所以汗出者生於穀穀生於精今邪氣交爭於骨肉而得汗者是邪却而精勝精勝則當能食而不復熱熱者邪氣也汗出而輒復熱者邪勝也不能食者精無俾也汗而熱留者壽可立而傾也

夫汗出而脈尚躁盛者死此今脈不與汗相應此不勝其病也狂言者是失志失志者死有三死不見一生雖愈必死

熱病已得汗而脈尚躁盛此陽脈之極也死其得汗

而脉靜者生也

熱病脉尚躁盛而不得汗者此陽脉之極也死脉躁盛得汗者生也

熱病已得汗而脉尚躁喘且復熱勿膚刺喘甚者死

熱病陰陽交者死

熱病煩已而汗脉當靜太陽病脉反躁盛者是陰陽交死復得汗脉靜者生

熱病陰陽交者熱煩身躁太陰寸口脉兩衝尚躁盛是陰陽交死得汗脉靜者生

熱病陽進陰退頭獨汗出而汗出亦死陰進陽退腰以下至足已熱如故亦死陰陽俱進汗出已熱不止鼻口氣冷亦死

古熱病陰陽交部

熱病所謂并陰者熱病已得汗因得泄是謂并陰故治一作治法

雖不汗出若劒是謂并陽者熱病已得汗脉尚躁盛大熱汗之

少陰病惡寒踡而利手足逆者不治

少陰病下利止而眩時時自冒者死

少陰病惡寒而踡其脉不至其人不煩而躁者死

少陰病四逆惡寒而踡其脉不至其人不煩而躁者死

少陰病六七日其人息高者死

少陰病脉微細沈但欲卧汗出不煩自欲吐五六日自利復煩躁不得卧寐者死

少陰病下利若利止惡寒而踡手足温者可治

少陰病惡寒而踡時時自煩欲去其衣被者可治

少陰病下利止厥逆無脈干煩（一本作乾嘔）服湯藥其脈

暴出者死微細者生（右陰少部）

傷寒六七日其脈微手足厥煩躁灸其厥陰厥不還

者死

傷寒下利厥逆躁不能臥者死

傷寒發熱下利至厥不止者死

傷寒厥厥逆躁發熱而利者生其人汗出

利不止者死但有陰無陽故也

傷寒五六日不結胸腹濡脈虛復厥者不可下下之

亡血死

傷寒發熱而厥七日下利者為難治（逆右部厥

熱病不知所痛不能自收口乾陽熱甚陰頗有寒者
熱在髓死不治
熱病在腎令人渴口乾舌焦黃赤晝夜欲飲不止腹
大而脹尚不厭飲目無精光死不治
脾傷即中風陰陽氣別離陰不從陽故以三分候其死生
傷寒下利日十餘行其人形損故也
病者脇下素有痞而下在臍傍痛引少腹入陰使陰
筋此為藏結死
夫實則譫語虛則鄭聲鄭聲者重語是也直視譫語
喘滿者死若下利者亦死
結肯證悉具而躁者死

吐舌下卷者死唾如膠者難解舌頭四邊徐有津液此為欲解病者至經上唇有色脉自和為欲解色急者未解病猶右陰陽竭盡卻

重實重虛陰陽相附生死證第十九

問曰何謂虛實對曰邪氣盛則實精氣奪則虛重實熱病氣熱脉滿是謂重實問曰經絡俱實何如對曰經絡皆實是寸脉急而尺緩也皆當俱治故曰滑則順濇則逆夫虛實者皆從其物類始五藏骨肉滑利可以長久寒氣暴上脉滿實實而濇逆則死形盡滿脉急大堅尺滿而滑順則生實而濇逆則死不應順則

生逆則死所謂順者手足温所謂逆者手足寒也

問曰何謂重虛對曰脉虛氣虛尺虛是謂重虛也所

謂氣虛者言無常也尺虛者行步匡然也脉虛者不
象陰也如此者滑則生濇則死氣虛者肺虛也氣逆
者足寒也非其時則死餘藏皆如此也
脉實滿手足寒頭熱者春秋則生冬夏則死脉浮而
濇濇而身有熱者死絡氣不足經氣有餘脉熱而尺
寒秋冬為逆春夏為順經虛絡滿者尺熱滿而寒濇
春夏死秋冬生絡滿經虛名陰刺陽經滿絡虛刺陰
灸陽問曰秋冬無極陰春夏無極陽何謂也對曰無
極陽者春夏無數虛陽明虛則狂無極陰者秋
冬無數虛太陰太陰虛則不至足熱腰以上寒陰氣
下爭逆心腹滿者死所謂陽附陰者腰以上至頭熱

右重實部

重虛部

腰以下寒陽氣上爭還得
太陽之脈色榮顴骨熱病生死期日證第二十
時自已與厥陰脈爭見者死期不過三日其熱病氣
內連腎少陽之脈色榮頰前熱病也榮未天曰今且
得汗待時自已與少陰脈爭見者死期不過三日
熱病七八日脈微小病者溲血口中乾一日半而死
脈代者一日死
熱病八日脈不躁喘不數後三日中有汗三日不
汗四日死未曾汗勿膚刺作膚一作粛
生傳曰始府入藏終陰復陽故得汗
熱病三四日脈不喘其動均者身雖煩熱今自得汗

熱病七八日脈不喘其動均者生微熱在陽不入陰今自汗也

熱病七八日脈不喘動數均者病當瘖期三日不得汗四日死

熱病身面盡黃而腫心熱口乾舌卷焦黃黑色身痲臭伏毒傷肺中脾者死

熱病瘈瘲狂言不得汗瘈瘲不止伏毒傷肝中膽者死

熱病汗不出不至足嘔膽吐血善驚不得臥伏毒在肝腑足少陽者死

熱病十逆死證第二十一

熱病腹滿膜脹身熱者不得大小便脈濇小疾一逆見死

熱病腸鳴腹滿四肢清泄注脈浮大而洪不已二逆見死

熱病大衄不止腹中痛脉浮大絶喘而短氣三逆見死

熱病嘔且便血奪形肉身热甚脉絶動疾奪形肉五逆見死

熱病欬喘悸浮眩身熱脉小疾奪形肉而脹四肢清奪形肉短氣六逆見死

熱病腹脹便血脉大時時小絶汗出而喘口乾舌焦七逆見一旬死

視不見人人便血目眶陷妄言手循衣

縫口乾躁擾不得卧八逆見一時死

熱病瘈瘲狂走不能食腹滿脅痛引腰臍背嘔血九逆見一時死

熱病嘔血欬煩滿身黃其腹鼓脹泄不止脉絶十

熱病肺氣絶死日證第二十二

言語死魄夢足腹腫面黃振慄不能

熱病脾氣絶喘逆欬唾血手足

得入狂言譫語腹大滿四肢

氣俱去故肺先死丙日篤丁日死

熱病心主氣絶煩滿骨痛奭作嗌腫不可咽欲欬不

能欬歌哭而笑死神與榮脉俱去故心先死壬日篤

癸日死

熱病肝氣絶僵仆足不安地嘔血恐懼洒淅惡寒血

妄出遺尿溺死魄與筋血俱去故肝先死庚日篤辛

日死

熱病腎氣絶喘悸吐逆腫疼尻癰目視不明骨痛短氣喘滿汗出如珠死精與骨髓俱去故腎先死戊日篤巳日死

熱病脈四至三日死脈四至者平人一至病人脈四至也

熱病脈五至一日死時一大至半日死忽忽眩亂者死

熱病脈六至半日死忽急疾大至有頃死

熱病脈損日死證第二十四

熱病脈四至病人脈損者平人四至病人脈損三日死所謂四損者平人四至病人脈

熱病胃氣絶喘滿汗出如珠死精與骨髓俱去故腎先死戊日篤巳日死

熱病脈四至三日死脈四至者平人一至病人脈四至也

熱病脈五至一日死時一大至半日死忽忽眩亂者死

熱病脈六至半日死忽急疾大至有頃死

熱病脈損日死證第二十四

熱病脈四至病人脈損者平人四至病人脈損三日死所謂四損者平人四至病人脈

熱病胃氣絶喘悸吐逆腫疼尻癰目視不明骨痛短氣喘滿汗出如珠死精與骨髓俱去故腎先死戊日篤巳日死

熱病脈四至三日死脈四至者平人一至病人脈四至也

熱病脈五至一日死時一大至半日死忽忽眩亂者死

熱病脈六至半日死忽急疾大至有頃死

熱病脈損日死證第二十四

熱病脈四至病人脈損者平人四至病人脈損三日死所謂四損者平人四至病人脈

一至名曰四損

熱病脉一至名曰五損一日死所謂五損者平人五至病人脉

一至名曰五損

熱病脉六損一時死所謂六損者平人六至病人脉

一至名曰六損若絶不至或久乃至立死

治傷寒形證所宜進退晉王叔和集仲景評脉要論

脉經卷第七

脉經卷第八

朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等類次

平卒尸厥脉證第一

平陽毒陰毒百合狐惑脉證第二

平霍亂轉筋脉證第四

平中風歷節脉證第五

平血痺虛勞脉證第六

平消渴小便利淋脉證第七

平水氣黃汗氣分脉證第八

平黃疸寒熱瘧脉證第九

平肖痺心痛短氣貴脉證第十

平腹滿寒疝宿食脉證第十一

平五藏積聚脉證第十二

平驚悸衄吐下血胸滿瘀血脉證第十三

平嘔噦嗽下痢脉證第十四

平肺痿肺癰欬逆上氣喘飲脉證第十五

平癰腫腸癰金瘡侵淫脉證第十六

平卒尸厥脉證第一

寸口沈大而滑沈則爲氣實氣相搏血氣入於藏即死入於腑即愈此爲卒厥不知人唇青身冷爲入於藏即死入於腑即愈此爲入腑而復自出爲入腑而復自愈

太陽病發熱無汗而反惡寒者名剛痙

平痙濕暍脉證第二

作痙

太陽病發熱汗出而不惡寒者名柔痙一云惡寒

太陽病發熱其脉沈而細者爲痙

病者身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目脉赤

獨頭動搖者爲痙論云發其汗多因致痙

太陽病無汗而小便反少氣上衝胷口噤不得語欲

作剛痙葛根湯主之

剛痙爲病胷滿口噤卧不著席脚攣急其人必齘齒

可與大承氣湯

痙病發其汗已其脉洽洽如蛇暴腹脹大者爲欲解

脉如來按之築築而弦故反伏弦者必痙一云痙脉出欲已

痙脉上下行

痙家其脉伏堅直上下
夫風病下之則痙復發其汗必拘急
太陽病其證備身體強几然脉沈遲此爲痙桔樓
桂枝湯主之
痙病有灸瘡難療
瘡家雖身疼痛不可發其汗汗出則痙
太陽病關節疼煩脉沈而緩者爲中濕
人小便不利大便反
快但當利其小便
病者一身盡疼一云疼煩發熱日晡即劇此爲風濕汗出
所致也
濕家之爲病一身盡疼發熱而身色熏黃也
濕家之爲病其人但頭汗出而背強欲得
被覆向火

若下之早則噦或脅滿小便利（一云不利）舌上如胎此爲丹田有熱胸上有寒渴欲飲而不能飲則口燥也濕家下之額上汗出微喘小便利（一云不利）者死若下利不止者亦死

問曰風濕相搏身體疼痛法當汗出而解值天陰雨不止師云此可發汗而其病不愈者何也答曰發汗病不愈者但風氣去濕氣續在是故不愈若治風濕者發其汗微微似欲出汗者則風濕俱去也

濕家身煩疼可與麻黃湯加朮四兩發其汗爲宜慎不可以火攻之

風濕脈浮身重汗出惡風者防己湯主之

病人喘頭痛鼻塞而煩其脈大自能飲食腹中和無

病病在頭中寒濕故鼻塞內藥鼻中即愈論云濕家身疼痛

發熱頭痛面黃而喘鼻窒而煩

傷寒八九日風濕相搏身體疼痛不能自轉側不嘔不渴脈浮虛而澁者桂枝附子湯主之

不渴脈浮虛而澁者桂枝附子湯主之若其人大便自利者去桂枝附子湯主之

鞕小便自利者去桂枝附子湯主之

風濕相搏骨節疼煩掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草附子湯主之

出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草附子湯主之

附子湯中熱瞗是也其人汗出惡寒身熱而渴也白虎湯主之

太陽中暍身熱疼重而脈微弱此以夏月傷冷水水

湯主之

太陽中暍發熱惡寒身重而疼痛其脉弦細芤遲小便已洒然毛聳手足逆冷小有勞身熱昼前開板齒燥若發其汗惡寒則甚加温針則發熱益甚數下之淋復加甚

一 平陽毒陰毒百合狐惑脉證第三

陽毒爲病身重腰背痛煩悶不安狂言或走或見鬼或吐血下痢其脉浮大數面赤班班如錦文或唉咽痛唾膿血五日可治至七日不可治也有傷寒一二日便成陽毒或服藥吐下後變成陽毒升麻湯主之

陰毒爲病身重背強腹中絞痛咽唉不利毒氣攻心心下堅強短氣不得息嘔逆脣青面黑四肢厥冷其脉沈細緊數身如被打五六日可治至七日不可治

也或傷寒初病一二日便結成陰毒或服藥以上至十七八日變成陰毒甘草湯主之

百合之爲病其狀常默默欲臥復不能臥或如強健人欲得出行而復不能行意欲得食復不能食或有美時或有不用聞飲食臭時至口苦小便赤黃身形如寒無寒無熱朝病各隨證治之百合病見於陰法救之見陽攻陰者以陽法救之百合病見於陽者以陰法救之見陽攻陰復發其汗此爲逆其病難治見陰攻陽乃復下之此亦爲逆其病難治千金方云見在於陰而攻其陽則陰不得解也復發其汗見在於陽而攻其陰則陽不得解也復下之其汗其病不愈也

狐惑爲病其氣如傷寒默默欲眠目不得閉臥起不安蝕於喉爲惑蝕於陰爲狐狐惑之病並不欲飲食

聞食臭其面目乍赤乍白乍黑其毒蝕於上者則聲
喝其毒蝕下部者咽乾下部苦參湯淹洗之蝕於肛者雄黃熏之
下部苦參湯淹洗之蝕於肛者雄黃熏之
其人脉數無熱微煩默欲卧汗出初得三四日目
赤如鳩眼得之七八日目四皆黃黑若能食者膿已
成也赤小豆當歸散主之
病人或從口入或從下瞧蝕其肛陰蝕上
呼吸上蝕其咽或從下瞧蝕其肛陰蝕上
爲惑蝕下爲狐狐惑病者猪苓散主之
爲狐狐惑病者猪苓散主之

平霍亂轉筋脉證第四

問曰病有霍亂轉筋脉證第四
問曰病有霍亂嘔吐而利此爲霍亂
問曰病者發熱頭痛身體疼惡寒而復吐利當屬何
病師曰當爲霍亂霍亂吐利止而復發熱也傷寒其

脉微澁本是霍亂今是傷寒却四五日至陰經上轉入陰必吐利

轉筋爲病其人臂脚直脉上下行微弦轉筋入腹雖屎白散主之

平中風歷節脉證第五

夫風之爲中風歷節脉證第五

微而數中風使然

頭痛脉滑者中風風脉虛弱也

寸口脉浮而緊緊則爲寒浮則爲虛虛寒相搏邪在皮膚浮者血虛絡脉空虛賊邪不瀉或左或右邪氣反緩正氣則急正氣引邪喎僻不逐邪在於絡肌膚不仁邪在於經則重不勝邪入於腑則不識人邪入

於藏舌下即難言口吐於涎
寸口脉遲而緩遲則爲寒緩則爲虛榮緩則
衛遲則爲中風邪氣中經則身癢而癮瘾心氣不足
邪氣入中則胃滿而短氣
跌陽脉浮而滑滑則穀氣實浮則汗自出
少陰脉浮而弱弱則血不足浮則爲風風血相搏則
疼痛如瘧濇小短氣自汗出歷節疼不可屈伸此皆飲
盛人脉濇小短氣自汗出當風所致也
酒汗出當風所致也
寸口脉沈而弱沈則主骨弱沈則主筋沈則爲腎弱則
爲肝汗出入水中如水傷心歷節黃汗出故曰歷節也
味酸則傷筋筋傷則緩名曰泄鹹則傷骨骨傷則痿

名曰枯竭衛俱微三焦無所御四屬機關不利脛冷假令發熱便爲歷節也病歷節疼痛不可屈伸身烏頭湯主之

黃汗出腫絕身體盡瞤瘦獨足腫大諸肢節疼痛身體魁瘣脚腫如脫頭眩短氣温温欲吐桂枝芍藥知母湯主之

平血痺虛勞脈證第六

問曰血痺從何得之師曰夫尊榮人骨弱肌膚盛重形如風狀被微風遂得之或汗出臥不時動搖加被微風遂得之其狀如風所吹但以脈自微濇在寸口關上小緊宜針引陽氣令脈和緊去則愈

因疲勞汗出臥不時動搖加被微風遂得之或汗出當風或久坐濕地或強力舉重血痺虛勞脈證並治第六

血痺陰陽俱微寸口關上微尺中小緊外證身體不

仁如風狀黃者桂五物湯主之

夫欲治病當先知其證何趣乃當攻之耳

男子平人脉大爲勞極虛亦爲勞

男子勞之爲病其脉浮大手足煖春夏劇秋冬差陰

寒精自出酸削不能行少陰虛滿

人年五十六十其病脉大者痺俠背行苦腸鳴馬刀

俠嬰者皆爲勞得之

男子平人脉虛弱細微者喜盜汗出也

男子面色薄者主渴及亡血卒喘悸其脉浮者裏虛也

男子脉虛沈弦無寒熱短氣裏急小便不利面色白

時時目瞑此人喜劒少腹滿此爲勞使之然

男子脉微弱而澁爲無子精氣清冷

夫失精家少腹弦急陰頭寒目眩痛一云目眩髮落脈極
虛芤遲爲清穀亡血失精
脈得諸芤動微緊男子失精女子夢交通桂枝加龍
骨牡蠣湯主之
脈沈小遲名脫氣其人疾行則喘喝手足逆寒腹滿
甚則溏泄食不消化也
脈弦而大弦則爲減大則爲芤減則爲寒芤則爲虛
寒虛相搏此名爲革婦人則半産漏下男子則亡血
失精

平消渴小便利淋脈證第七

師曰厥陰之爲病消渴氣上衝心心中疼熱飢而不
欲食食即吐下之不肯止

寸口脉浮而遲浮則爲虛遲則爲勞虛則生寒氣不足緊（要略作堅）則消穀而爲消渴小便反多以飲一斗小便一斗腎氣虛主之

男子消渴小便如粟狀少腹弦急痛引臍中寸口脉細而數（結一作下）膽則溺血亦令人淋閉不通淋之爲病小便如粟狀少腹弦急痛引臍中寸口脉細而數數則爲熱細則爲寒數數則消穀引食大便必堅（緊要略作堅）

熱則消穀引食大便必堅緊（要略作堅）緊則爲寒食則吐逆強吐跌陽脉數胃中有熱小便則數少陰脉數婦人則陰中生瘡男子則氣淋

淋家不可發汗發汗則必便血

師曰病有風水有皮水有正水有石水有黃汗風水
其脉自浮外證骨節疼痛惡風皮水其脉亦浮
外證附腫按之沒指不惡風其腹如鼓（如或作一不作不）
渴當發其汗正水其脉沈遲外證自喘石水
沈外證腹滿不喘黃汗其脉沈遲身體發熱
胠頭面腫久不愈必致癰膿
脉浮而洪浮則爲風洪則爲氣風氣相搏風
癉瘅身體爲癢癢爲泄風氣強則爲水難
以俛仰風氣相擊身體洪腫汗出乃愈惡風則虛此
爲風水不惡風者小便通利上膲有寒其口多涎此
爲黃汗
寸口脉沈滑者中有水氣面目腫大有熱名曰風水

視人之目裏上微擁如新臥起狀其頸脉動時時欬按其手足上陷而不起者風水太陽病脉浮而緊法當骨節疼痛而反不疼身體反重而酸其人不渴汗出即愈此為風水惡寒者此為風水惡寒者此為風水惡寒者此為極虛發汗得之渴而不惡寒者此為皮水身腫而冷狀如周痺能食反聚痛暮躁不眠此為黃汗痛在骨節欬而喘不渴者此為脾脹其形如腫發汗即愈然諸病此者渴而下利小便數者皆不可發汗

風水其脉浮浮為在表其人能食頭痛汗出表無佗病病者言但下重故從腰以上為和腰以下當腫及陰難以屈伸防已黃耆湯主之 一云風水脉浮身重汗出惡風者防已黃耆湯主之

風水惡風一身悉腫脉浮不渴續自汗出而無大熱

者越婢湯主之
師曰裏水者一身面目洪腫其脉沈小便不利故令
病水假如小便自利亡津液故令渴也越婢加朮湯
主之一令云皮水其脉沈面浮腫小便不利故也
皮水之為病四肢腫水氣在皮膚中四肢聶動者
防已茯苓湯主之
趺陽脉當伏今反緊本自有寒疝腹中痛或下
之下之則胸滿短氣
趺陽脉當伏今反數本自有熱消穀一作消渴小便數今
反不利此欲作水
寸口脉浮而遲浮脉潛熱潛相搏名曰沈趺
陽脉浮而數浮脉熱數脉止熱止相搏名曰伏沈伏

相搏名曰水沈則絡脉虛伏則小便難虛難相搏水走皮膚則爲水矣

寸口脉弦而緊弦則衛氣不行衛氣不行則惡寒水不沾流走在腸間

少陰脉緊而沈緊則爲痛沈則爲水小便不利後渴飲水小便不利者當有水身體腫重水病脉出者死

脉得諸沈者當有水身體腫重水病脉出者死

夫水病人目下有臥蠶面目鮮澤脉伏其人消渴病

水腹大小便不利其脉沈絶者有水可下之

問曰病下利後渴飲水小便不利腹滿因腫者何也

答曰此法當病水若小便自利及汗出者自當愈

水之爲病其脉沈小屬少陰浮者爲風無水虛脹者爲氣水發其汗即已沈者與附子麻黄湯浮者與杏

子湯

心水者其身重而少氣不得臥煩而躁其脈沉急奪者發汗後水藥不止心下逆滿氣上衝咽喉不得息者此為水氣其人若喘口燥而渴者發汗則動經身為振振搖者茯苓桂枝白朮甘草湯主之

肝水者其腹大不能自轉側脇下腹中脹滿時時津液得通

微生小便續通

肺水者其身腫小便難時時鴨溏

脾水者其腹大四肢苦重津液不生但苦少氣小便難

腎水者其腹大臍腫腰痛不得溺陰下濕如牛鼻上汗其足逆冷面反瘦一云大便反堅

師曰諸有水者腰以下腫當利小便腰以上腫當發汗乃愈

汗出而喘無大熱者可與麻黃湯

跌陽脈伏水穀不化脾氣衰則鶩溏胃氣衰則身腫

少陽脉甲
不通經爲血血不利則爲水名曰血分
問曰病者
之不言水反言肖中痛氣上衝咽狀如炙肉當微汗
喘審如師言其脉何類師曰寸口脉沈而緊沈爲水
緊爲寒沈緊相搏結在關元始時當微
衰之後榮衛相干陽損陰盛結寒微動腎氣上衝喉
咽塞噎脇下急痛醫以爲留飲而大下之氣擊不去
其病不除後重吐之胃家虛煩咽燥欲飲水小便不
利水穀不化面目手足浮腫又與葶藶圓下水當時
如小差食飲過度腫復如前肖脇苦痛象若奔豚其
水揚溢則浮汗出喘逆當先攻擊衝氣令止乃治汗汗

止其喘自差先治新病病當在後

黃汗之病身體洪腫一作發熱汗出而渴
如風水狀一作不渴狀發熱汗出而渴
問曰黃汗之病從何得之師曰以汗出入水中浴水
從汗孔入得之黃者芍藥桂枝苦酒湯主之

黃汗之病兩脛自冷假令發熱此屬歷節食已汗出
又身常暮卧盜汗出者此榮氣也若汗出已反發熱
者久久其身必甲錯發熱不止者必生惡瘡若身重
汗出已輒輕者久久必發身瞤瞤則筋中痛又從腰以
上必汗出下無汗腰冀弛痛如有物在皮中狀劇者
不能食身疼重煩躁小便不利此爲黃汗桂枝加黃
芪湯主之

寸口脉遲而濇遲則爲寒濇爲血不足跌陽脉微而遲微則爲氣遲則爲寒寒氣不足則手足逆冷手足逆冷則榮衛不利榮衛不利則腹滿腸鳴相逐氣轉膀胱脫榮衛俱勞陽氣不通則身冷陰氣不通則骨疼陽前通則惡寒陰前通則痺不仁陰陽相得其氣乃行大氣一轉其氣乃散實則失氣虛則遺溺名曰氣分心下堅大如盤邊如旋杯水飲所作桂枝去芍藥加麻黃細辛附子湯主之

平黃疸寒熱瘧脉證第九

凡黃候其寸口脉近掌無脉口皐冷並不可治脉沈渴欲飲水小便不利者皆發黃

黃疸病小便色不變欲自利腹滿而喘不可除熱熱
除必噦噦者小半夏湯主之
夫病酒黃疸必小便不利其候心中熱足下熱是其
證也
心中懊憹而熱不能食時欲吐名曰酒疸
酒黃疸者或無熱靖言了了腹滿欲吐鼻燥其脉浮
者先吐之沈弦者先下之
酒疸心中熱欲嘔者吐之愈
酒疸黃色心下結熱而渴煩
酒疸黃色目青面黑心中如噉蒜薤狀
大便正黑皮膚爪之不仁其脉浮弱雖黑微黃故知之
寸口脉微而弱微則惡寒弱則發熱當發不發骨節

疼痛當煩不煩而極汗出跌陽脉緩而遲少陰脉微則傷精陰氣飽則煩滿則發熱客熱消穀發已復飢熱則腹滿微則傷精陰氣寒冷少陰不足穀氣反強陽明病脉遲精穀強則瘦名曰穀寒熱難此欲作胕腫者食難用飽飽則發煩頭眩穀疸雖下之腹滿如故所以然者脉遲故也師曰寸口脉浮而緩浮則為風緩則為痺非中風四肢苦煩脾色必黃瘀熱以行跌陽脉緊而數數則為熱熱則消穀緊則為寒食即滿也尺脉浮為傷腎跌陽脉緊為傷脾風寒相搏食穀則眩穀氣不消胃中苦濁濁氣下流小便不通陰被其寒熱流膀胱脫身體盡黃名曰穀疸

額上黑微汗出手足中熱薄暮則發膀胱急小便自利名曰女勞疸腹如水狀不治

黃家日晡所發熱而反惡寒此爲女勞得之腹滿者難治

少腹滿身盡黃額上黑足下熱因作黑疸其腹脹如水狀大便必黑時溏此女勞之病非水也腹滿者難治

水狀大便必黑時溏此女勞之病非水也腹滿者難治

治消石礬石散主之

夫瘧脉自弦也弦數者多熱弦遲者多寒弦小緊者可下之弦遲者可温藥若脉緊數者可發汗針灸之

浮大者吐之脉弦數者風發也以飲食消息止之

瘧病結爲癥瘕名曰瘧母鱉甲煎圓主之

瘧但見熱者温瘧也其脉平身無寒但熱骨節疼煩時嘔朝發暮解暮發朝解名曰温瘧白虎加桂枝湯

主之

瘧多寒者牡蠣也蜀漆散主之

師曰夫脉當取太過與不及平肾痺心痛短氣貴脉脉證第十

所以然者以其極虛也今陽微陰弦則肾痺而痛

心痛者貴其極虛知在上膲所以肾痺

肾痺之病喘息欬唾肾背痛短氣寸口脉沈而遲關

上小緊數者栝樓薤白白酒湯主之

平人無寒熱短氣不足以息者實也

貴豚病者從少腹起上衝咽喉發作時欲死復止皆

從驚得其氣上衝肾腹痛及往來寒熱貴豚湯主之

師曰病有貴豚有吐膿有驚怖有火邪此四部病皆

從敬馬發得之

平腹滿寒疝宿食脉證第十一

趺陽脉微弦法當腹滿不滿者必下部閉寒大便難兩胠（云脚）疼痛此虚寒從下上也當以温藥服之

病者腹滿按之不痛為虚痛者為實可下之舌黄未下者下之黄自去腹滿時減減復如故此為寒當與温藥

趺陽脉緊而浮緊則為痛浮則為虚虚則腸鳴緊則堅滿

脉雖弦而遲者必心下堅脉大而緊者陽中有陰也可下之

病腹中滿痛為實當下之

腹滿不減不足言當下之
病腹滿發熱數十日脉浮而數飲食如故厚朴三物
湯主之
腹滿痛厚朴七物湯主之
寸口脉遲而緩遲則爲寒緩即爲氣氣寒相搏轉紋
而痛
寸口脉遲而澁遲爲寒澁爲無血
夫中寒家喜欠其人清涕出發熱色和者善嚏
中寒其人下利以裏虛也欲嚏不能此人肚中寒癖
夫瘦人繞臍痛必有風冷穀氣不行而反下之其氣
必衝不衝者心下則痞
寸口脉弦者則脇下拘急而痛其人喜寒也

寸口脉浮而滑頭中痛趺陽脉緩而遲緩則
則爲虛
寸口脉微尺中緊而澁緊則爲寒微則爲虛
不足故知發汗而復下之也緊在中央知寒尚在此
本寒氣何爲發汗復下之耶
夫脉浮而緊乃弦狀如弓弦按之不移脉數弦者當
下其寒脇下偏痛其脉緊弦此寒也以温藥下之宜
大黄附子湯
寸口脉弦而緊弦則衛氣不行衛氣不行則
則不欲食弦緊相搏則爲寒疝
跌陽脉浮而遲浮則爲風虛遲則爲寒疝寒疝繞臍
痛若發則自汗出手足厥寒其脉沈弦者大烏頭湯

主之

問曰人病有宿食何以別之師曰寸口脉浮大按之反澁尺中亦微而澁故知有宿食

寸口脉緊如轉索左右無常者有宿食

寸口脉緊即頭痛風寒腹中有宿食不化

脉滑而數者實也有宿食當下之

下利不欲食者有宿食當下之

大下後六七日不大便煩不解腹滿痛此有燥屎也

所以然者本有宿食故也

宿食在上管當吐之

五藏積聚脉證第十二

問曰病有積有聚有緊氣（一本緊下一同作緊）何謂也師曰積者

藏病也終不移聚者腑病也發作有時展轉痛移為可治繫氣已愈不得復發今病復發為繫氣也則愈愈復發為繫氣夫病諸積大法脈來細而附骨者乃積也（細一作結）寸口積在胸中微出寸口積在喉中關上積在臍傍上關上積在心下微下關積在少腹上關上積在右脈出在左脈出在左積在右積在右脈兩出積在中央各以其部處之

診得肺積脈浮而毛按之辟易脇下氣逆背相引痛少氣善忘目瞑皮膚寒秋差夏劇主皮中時痛如蟲緣之狀甚者如針刺時癢搔其色白

診得心積脈沈而芤上下無常處病嘗滿悸腹中熱

面赤嗌乾心煩掌中熱甚即唾血主身痹痛
夏差冬劇其色赤
診得脾積脈浮大而長飢則見瞋起與穀爭
重足脛腫厥不能卧是主肌肉損其色黃
減心下累累如桃李起見於外腹滿嘔泄腸鳴四肢
診得肝積脈弦而細兩脇下痛邪走心下足腫寒脇
痛引少腹里急苦脊與腰相引痛飢則見飽則
甲枯黑春差秋劇其色青
診得腎積脈沈而急苦脊與腰相引痛飢則見飽則
減少腹裏急口乾咽腫傷爛自眩眩骨中寒主髓厥
善忘其色黑
男子積疝女子瘕淋身無膏澤喜轉筋爪
寸口脉沈而橫者脇下及腹中有橫積痛其
脉弦腹

中急痛腰背痛相引腹中有寒疝痕脈弦緊而微細者癥也夫寒痒癥痕痕積聚之脈皆弦緊若在心下即有積在臍左右上下也一曰關脈弦長又脈癥法左手脈橫癥在右脈頭小者在下大者在上頭小者在右積在左偏得洪實而滑又法橫脈見左積在右見右積在左見在胃管即關弦緊在臍下即尺弦緊亦為積弦緊亦為積積為寒痒為疝痛內有積不見脈難治見一脈一脈一作暢相應為易治諸不相應為不治

左手脈大右手脈小上病在右脇下病在右足右手脈大左手脈小上病在左脇下病在左足有病不可轉也必死不治

脉來細而沈時直者身有癥腫若腹中有伏梁
脉來小而沈而實者胃中有積聚不下食食即吐

寸口脉動而弱動則爲驚弱則爲悸

跌陽脉微而浮浮則胃氣虛微則不能食食即吐
脉憂迫所作也驚生病者其脉止而復來此恐懼之
不轉不能呼氣

寸口脉緊跌陽脉浮胃氣虛微則不能食食即吐
寸口脉緊寒之實也寒在上膲肖中必滿而噫胃氣
虛者跌陽脉浮少陽脉緊心下必悸何以言之寒水
相搏二氣相爭是以悸

寸口脉弦而大弦則爲減大則爲乳減則爲寒乳則爲虛寒虛相搏此名爲革婦人則半産漏下男子則亡血

亡血

亡血家不可攻其表汗出則寒慄而振

問曰病衄連日不止其脉何類師曰脉來輕輕在肌脉浮一云尺溢目睛暈黄衄必未止暈黄去目睛慧了知衄今止

肉尺中自溢

師曰從春至夏發衄者太陽從秋至冬發衄者陽明

寸口脉微弱尺脉澁弱則發熱澁爲無血其人必厥

微嘔夫厥當吐不吐而反頭痛痛爲實下虛上實必衄也

太陽脉大而浮必衄吐血

病人面無血色無寒熱脉沈弦者衄也

凡病人身熱脈小絶者吐血若下血婦人亡經水不止此爲寒

脈遲者胸上有寒悸氣喜唾

脈有陰陽跌陽少陰脈皆微其人不吐下必亡血

脈沈爲在裏榮衛內結胸滿必吐血

男子盛大其脈陰陽微跌陽亦微獨少陰浮大必便

能眴不得眠

脈浮弱手按之絶者下血煩欬者必吐血

寸口脈微而弱氣血俱虛男子則吐血女子則下血

嘔吐汗出者爲可

跌陽脈微而弱春以胃氣爲本吐利者爲可下利不者此

爲有水氣其腹必滿小便則難

血而失精設言淋者當小便不利

趺陽脉弦必腸痔下血

病人脉浮弦而滿脣痿舌青口燥其人但欲漱水不欲嚥無寒熱脉微大來遲腹不滿其人言我滿為有瘀血當下之

汗出不止為亡血病者如熱狀煩滿口乾燥而渴其脉反無熱此為陰伏是瘀血也當下之

下血先見血後見便此近血也先見便後見血此遠血也

嘔吐噦下利脉證第十四

嘔而脉平嘔吐噦下利脉微熱見厥者難治

趺陽脉浮者胃氣虛寒氣在上憂氣在下二氣並爭但出不入其人即嘔而不得食恐怖而死寬緩即差

夫嘔家有癰膿者不可治嘔膿盡自愈
先嘔却渴者此為欲解先渴却嘔者為水停心下此
屬飲家本渴今反不渴者以心下有支飲也
問曰病人脈數數為熱當消穀引食而反吐者何也
師曰以發其汗令陽微膈氣虛脈乃數數為客熱不
能消穀胃中虛冷故吐也
陽緊陰數其人食已即吐
寸緊尺遲其人當滿不能食而吐吐止者為下之故
不能食設言未止者此為胃反故尺為之微遲也
寸口脈緊而乳緊則為寒乳則為虛虛寒相搏脈為
陰結而尺遲其人則噎噎關上脈數其人則吐
脈弦者虛也胃氣無餘朝食暮吐變為胃反寒在於

上醫反下之今脈反弦故名曰虛
趺陽脈微而澁微則下利澁則吐逆穀不得入也
寸口脈微而數微則無氣無氣則榮虛則血不足血不足則肖中冷趺陽脈浮而澁浮則為虛澁則傷脾脾傷則不磨朝食暮吐暮食朝吐宿穀不化名曰胃反脈緊而澁其病難治
夫吐家欲脈來形狀如新病人欲吐者不可下之
病人欲吐不吐而下之病在膈上後思水者解急與之思水者猪苓
嘔吐而病在膈上後思水者解急與之思水者猪苓
散主之
噦而腹滿視其前後知何部不利利之即愈
夫六腑氣絕於外者手足寒上氣脈五藏氣絕於

內者下利不禁下甚者手足不仁
下利脉沈弦者下重其脉大者為未止脉微弱數者
為欲自止雖發熱不死
脉滑按之虛絶者其人必下利
下利有微熱其人渴脉弱者今自愈
下利脉數而微熱其人渴脉弱者今自愈
下利脉數若微發熱汗自出者自愈設脉復緊為未解
下利寸脉反浮數尺中自澁其人必清膿血
下利手足厥無脉灸之不温若脉不還反微喘者死
少陰負趺陽者為順也
下利脉數而浮渴作者今自愈設不差其人必清膿血
以有熱故也
下利後脉絶手足厥冷時脉還手足温者生脉不

愛者死
下利脈反弦發熱身汗者自愈
下利氣者當利其小便
下利清穀不可攻其表汗出必脹滿其藏寒者當下之
下利脈沈而遲其人面少赤身有微熱
下利清穀必欝冒汗出而解其人微厥所以然者其
面戴陽下虛故也
下利腹脹滿身體疼痛先温其裏乃攻其表
下利脈遲而滑者實也利未欲止當下之
下利脈反滑者當有所去下乃愈
下利脈反滑者當有所去下乃愈
下利差至其年月日時復發此為病不盡當復下之
下利而讝語者為有燥屎也宜下之

下利而腹痛滿為寒實當下之
下利腹中堅者當下之
下利後更煩按其心下堅者當下之
下利後脉濡者為虛煩也
下利脉三部皆平按其心下堅者可下之
腸鳴當温之
病者痿黃躁而不渴胃中寒實而下利不止者死
夫風寒下之後心下堅痛脉遲者為寒但當温之亦然脉大浮弦下之當已
寒但當温之脉沈緊下之逆上氣淡飲脉證等

平肺痿肺癰欬逆上氣第十五

問曰熱在上膲者因欬為肺痿肺痿之病從何得之
師曰或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從

便難數被駛藥下利重亡津液故得之
寸口脉不出而反發汗陽脉不出陰脉不澀身體反冷其內反煩多唾脣燥小便反難此為肺痿傷於津液便如爛瓜亦如豚
脳但坐發汗故也
肺痿其人欲欬不得欬欬則出乾沫久久小便不利
甚則脉浮弱
肺痿吐涎沫而不欬者其人不渴必遺溺小便數所以然者以上虛不能制下也此為肺中冷必眩多涎
唾甘草乾薑湯以温其藏師曰肺痿欬唾咽燥欲飲
水者自愈自張口者短氣也滑此為浮寒非肺痿也
欬而口中自有津液舌上胎

問曰寸口脉數其人欬口中反有濁唾涎沫者何也
師曰此為肺痿之病若口中辟辟燥欬則肺痿
痛脉反滑數此為肺癰
欬唾膿血脉數虛者為肺痿脉數實者為肺癰
問曰病欬逆脉之何以知此為肺癰當有膿血吐之
則死後竟吐膿死其脉何類師曰寸口脉微而數微
則為風數則惡寒風中於衛呼
氣不入熱過於榮吸而不出風傷皮毛熱傷血脉風
舍於肺其人則欬口乾喘滿咽燥不渴多唾濁沫時
時振寒熱之所過血為凝滞蓄結癰膿吐如米粥始
欬而胸滿振寒脉數咽乾不渴時ヒ出濁唾腥臭久

久吐膿如粳米粥者為肺癰桔梗湯主之
肺癰胷滿脹一身面目浮腫鼻塞清涕出不聞香臭酸辛欬逆上氣喘鳴迫塞葶藶大棗瀉肺湯主之
寸口脉數趺陽脉緊寒熱相搏故振寒而欬趺陽脉
浮緩胃氣如經此為肺癰
問曰振寒發熱寸口脉滑而數其人飲食起居如故
此為癰腫病醫反不知而以傷寒治之應不愈也何
以知有膿膿之所在何以別知其處師曰假令膿在
胷中者為肺癰其人脉數欬唾有膿血設膿未成其
脉自緊數緊去但數膿為已成也
夫病吐血喘欬上氣其脉數有熱不得臥者死上氣
面浮腫喘息其脉浮大不治又加利尤甚上氣躁而

喘者屬肺肺脹欲作風水發汗則愈（一云脹其脉沈而上氣肺水氣也要畧千金外臺作浮）

夫酒客欲者必致吐血此坐極飲過度所致也

欬家脉弦為有水可與十棗湯下之欬而脉浮弦者非虛也此為肖中寒實所致也當吐之欬家不欬不欲食如是四十日乃已（一云三十日）欬而時發熱脉卒弦者欲行吐藥當相人強弱而無熱乃可吐之其不可發汗久欬數歲其脉弱者可治實大數者不可治其脉虛者必苦冒其人本有支飲在肖中故也治其脉虛者必苦冒其人本有支飲屬飲家

溢飲有支飲有四何謂也師曰有淡飲（一云留飲）有懸飲有

問曰夫飲有四何謂也師曰四飲何以為異師曰其人素盛今

瘦水走腸間瀝瀝有聲謂之
痰飲飲後水流在脇下
欬唾引痛謂之懸飲飲水流行歸於四肢當汗出而
不汗出身體疼重謂之溢飲欬逆倚息短氣
形如腫謂之支飲
留飲者胸脇下痛引缺盆欬嗽轉甚一云轉已
胷中有留飲其人短氣而渴四肢歷節痛其脉沈者
有留飲
夫心下有留飲其人背寒冷大如手
病者脉伏其人欲自利利者反快雖利心下續堅滿
此為留飲欲去故也甘遂半夏湯主之
病淡飲者當以温藥和之
心下有淡飲胷脇支滿目眩甘草一作草遂湯主之

病溢飲者當發其汗小青龍湯主之
支飲亦喘而不能卧加短氣其脉平也
膈間支飲其人喘滿心下痞堅面色黧黑其脉沈緊
得之數十日醫吐下之不愈木防已湯主之
心下有支飲其人苦冒眩澤瀉湯主之
嘔家本渴渴者為欲解今反不渴心下有支飲故也
小半夏湯主之
夫有支飲家欬煩胷中痛者不卒死至一百日或一
歲可與十棗湯
膈上之病滿喘欬吐發則寒熱背痛腰疼目泣自出
目泣自出其人振振身瞤劇必有伏飲
一作目眩
夫病人飲水多必暴喘滿凡食少飲多心下水停甚

者則悸微者短氣
脉雙弦者寒也皆大下後喜虛脉偏弦者飲也肺飲
不弦但喜短氣
病人一臂不隨時復轉移在一臂其脉沈小細非風也
必有飲在上膲其脉虛者為微勞榮衛氣不周故也
久久自差 一云冬自差
腹滿口苦乾燥此腸間有水氣也防已椒目葶藶大
黃圓主之
假令瘦人臍下悸吐涎沫而癲眩者水也五苓散主之
先渴却嘔為水停心下此屬飲家半夏加茯苓湯主之
水在心心下堅築短氣惡水不欲飲水在脾少氣身重
水在肺吐涎沫欲飲水水在肝脇下支滿嚏而痛

水在腎心下悸

脉數身無熱内有癰也（一云腹無積聚身體作一本元和本云腹無積聚身體有膿意苡附子敗醬湯主之）

脉數應當發熱而反洒淅惡寒若有痛處當發熱而不熱者為無膿

諸浮數脉應當發熱而反洒淅惡寒若有痛處當發熱而不熱者為有膿不熱者為無膿

脉數而遲必發熱弱而數為振寒當發癰腫

脉微而澀必發熱弱而數為振寒當發癰腫

其癰

脉浮而數身體無熱其形喎ヒ肖中微躁（一作胃微燥）不知痛之所在此人當發癰腫

脉滑而數ヒ則為熱滑則為實滑則主榮數則主衛榮衛相逢則結為癰熱之所過則為膿也

師曰諸癰腫欲知有膿與無膿以手掩腫上若熱者為

問曰官羽林婦病醫脉之何以知婦人腸中有膿為下之則愈師曰寸口脉滑而數滑則為實數則為熱滑則為榮數則為衛衛榮相干血為濁敗少腹痞堅小便或澀或時汗出或復惡寒腫為病其身體甲錯腹皮一作支急按之濡如腫狀腸癰之為病其身體甲錯腹皮急按之濡如腫狀少腹腫按之則痛小便數如淋時發熱自汗出復惡寒其脉遲緊者膿未成可下之當有血脉洪數者膿已成不可下也大黃牡丹湯主之

問曰寸口脉微而澀法當亡血若汗出設不汗者云何苔曰若身有瘡被刀器所傷亡血故也侵淫瘡從四肢者可治從四肢流來入口

者不可治

脉經卷第八

朝散大夫守光禄卿直祕閣判登聞檢院上護軍臣林億等類次

平妊娠分別男女將產諸證第一

平妊娠胎動血分吐下腹痛證第二

平產後諸病鬱冒中風發熱煩嘔下血居經證第四

平帶下絶產無手亡血居經證第四

平鬱冒五崩漏下經閉不利腹中諸病證第五

平咽中如有炙腐喜悲熱入血室病證第六

平陰中寒轉胞陰次陰生瘡脫下證第七

平婦人病生死證第八

平妊娠分別男女將產諸證第一

平小兒雜病證第九

脉平而虛者乳子法也
是血氣和調陽施陰化也診其手少陰脉
子也少陰心脉也心主血脉又腎名胞門子戸尺中
腎脉也尺中之脉按之不絶法妊娠也三部脉沈浮
正等按之無絶者有娠也妊娠初時寸微小呼吸五
至三月而尺數也脉滑而疾重以手按之散者胎已
月也脉重手按之不散但疾不滑者五月也婦人妊
娠四月欲知男女法左疾為男右疾為女俱疾為生
二子
又法得太陰脉為女太陽脉為男得太陽脉沈太陽
脉浮
又法左手沈實為男右手浮大為女左右手俱沈實

猥生二男左右手俱浮大猥生二女
又法尺脉左偏大為男右偏大為女左右俱大産二
子大者如實狀
又法左右尺俱浮為産二男不爾則女作男生左右
尺俱沈為産二女不爾則男作女生也
又法遣姙娠人面南行還復呼之左迴者是女右迴
迴首者是男
又法看上圖時夫從後急呼之左迴首是男右迴首
是女也
又法婦人姙娠其夫左乳房有核是男右乳房有核
是女也
婦人懷娠離經其脉浮設腹痛引腰脊為今欲生也

但離經者不病也

又法婦人欲生其脉離經夜半覺曰中則生也

婦人懷胎一月之時足厥陰脉養二月平旦娠胎動血分水分吐下腹痛證第二

三月手心主脉養四月手少陽脉養五月足太陰脉

養六月足陽明脉養七月手太陰脉養八月手陽明

脉養九月足少陰脉養十月足太陽脉養諸陰陽各

養三十日活兒手太陽少陰不養者下主月水上為

乳汁活兒養母懷娠者不可灸刺其經必墮胎

婦人懷娠三月而渴其脉反遲者欲為水分復腹痛

者必墮胎

脉浮汗出者必閉其脉數者必發癰膿五月六月脉

數者必向壞脉緊者必胞漏脉遲者必腹滿而喘脉
浮者必小便不利水壞為腫
問曰有一婦人年二十所其脉浮數發熱嘔欬時下
利不欲食脉復浮經水絶何也師曰法當有娠何以
故此虚冷家法當微弱而反浮數此為戴陽陰陽和合
法當有娠到立秋熱當自去何以知然數則為熱熱
者是火火是木之子死於未未為六月位土王火休
廢陰氣未生秋節氣至火氣當罷熱自除去其病即愈
師曰乳後三月有所見此便是
軀有兒者護之恐病利也何以故懷娠陽氣內養乳
中虚冷故令兒利
婦人懷娠六月七月脉弦發熱其胎踰腹痛惡寒

寒者小腹如扇之狀所以然者子藏開故也當以附子湯温其藏

婦人妊娠七月脉實大牢強者生沈細者死

婦人妊娠八月脉實大牢強弦緊者生沈細者死

婦人妊娠六月七月暴下斗餘水其胎必倚而墮此非時孤將預下故也

師曰寸口脉洪而濇濇洪則為氣濇則為血氣血俱動丹田其形即温濇在於下胎冷若冰陽氣胎活陰氣必終欲別陰陽其下必殭假令陽終畜然若朳

問曰婦人妊娠病師脉之何以知此婦人雙胎其一獨生而為下其一獨死者其病即愈然後竟免

師曰寸口脉衛氣平調榮氣緩舒陽施陰化精盛有餘陰陽俱盛故成雙軀今少陰微緊血即濁凝經養不周胎則偏夭少腹冷滿膝臗疼痛腰重起難此為早去害毋失胎

師曰婦人有胎腹痛其人不安若胎病不長死令人摸之如覆杯者則下男如肘頭參差起者女也欲知生冷在何面冷者為死温者為生

師曰婦人生後因續下血都不絶者有妊娠下有漏下者有半生後因續下血都不絶者有妊娠下有漏下者有半產後因續下血都不絶者有妊娠腹中痛為胞漏云阻膠艾湯主之

婦人妊娠經斷三月而得漏下下血四十日不止胎欲動在於臍上此為妊娠六月動者前三月經水利

時胎也下血者後斷三月衄也所以下血不止者其癥不去故也當下其癥宜桂枝茯苓圓

問曰婦人病經水斷一二月而反經來今反脉反微澀何也師曰此前月中若嘗下利故令妨經利止月經自斷而有軀其脉反弦恐其後必大下不成軀也

婦人懷軀七月而不可知時時衄血而轉筋者此為軀也

軀也衄時噦而動者非軀也

脉來近去遠故曰反以為有軀而反斷此為有陽無陰故也

婦人經月下但為微少師脉之反言有軀其後審然

其脉何類何以別之師曰寸口脉陰陽俱平榮衛調和按之滑浮之則經陽明少陰各如經法身反洒淅不欲食飲頭痛心亂嘔噦欲吐呼則微數吸則不驚陽多氣溢陰滑氣盛滑則多實六經養成所以月見陰見陽精汁凝胞散散者損墮設復陽盛雙妊二胎今陽不足故令激經也

婦人妊娠小便難飲如故當歸貝母苦參圓主之

婦人妊娠有水氣身重小便不利洒洒惡寒起即頭眩葵子茯苓散生之

婦人妊娠宜服當歸散即易產無疾苦

師曰有一婦人來診一作脉自道經斷不來師言一月為衂二月名為血三月為居經是定作軀也或名為血積譬

如雞乳子熱者為祿寒者多濁且當須後月復來經當入月幾日來假令以七日所來因言且須後月十日所來相問設其主復來以此為候若漏下亡血者定為有軀其人不復不安設言當奈何當為是宜當護之今經微弱恐復閉二月若有若無三月為血積譬如雞伏子試取雞伏子中寒即合藥治之

師曰有一婦人來診自道經斷即去師曰一月血為濁中熱即祿欲令胎壽當治其母俠寒懷子命則不壽也譬如雞伏子試取雞伏子遍中寒者濁今夫人有軀少腹寒一毛拔去覆子不孚手掌反逆奈何得有軀婦人因言當奈何師曰當與溫經湯設與夫家俱來者

有軀與父母家俱來者當言寒多久不作軀
師曰有一婦人來診因言急當治恐經復下設令
短但出不入去近來遠故曰反以為有軀宜入
斷來幾日反以為有軀宜入去近來遠故曰反以為有軀宜入
宮中人若寡婦無夫曾夜夢寐交通邪氣長陰氣
瘕瘕急當治下服二湯設復不愈因言髮浮或懷久作
胎而反不下此何等意邪可使且將視赤烏一作赤馬
師曰若宮里張氏不差復來相問臣億等詳此文理
校以示闕疑
餘皆倣此
師曰脉婦人得平脉陰脉小弱其人渴不能食無寒
熱名為軀柱枝主之法六十日當有娠設有醫治逆
者却一月加吐下者則絶之方在傷寒中

婦人脉平而盧者乳子法也平而微者實奔
而反微濇其人不亡血下利而反甚其脉虛
大兒及乳小兒此自其常不能令甚虛竭病與亡血
虛等必眩冒而短氣也

師曰有一婦人好裝衣來診而得脉濇因問曾乳子
下利乃當得此脉耳曾半生漏下者可設不者經斷
三月六月設乳子漏下可為奄續斷小兒勿乳乳須利
止復來相問脉之

師曰寸口脉微遲尺微於寸遲為寒在上膲但當
吐耳今尺反虛復為強下之如此發脊滿而痛者必
吐血少腹痛腰脊痛者必下血師曰寸口脉微而弱
氣血俱虛若下血嘔吐汗出者可不者跌陽脉微而

弱者以胃氣為本吐利者可不者此為水氣其腹必滿小便則難
婦人常嘔吐而胃反若常喘一作多唾其經又斷設來者必少
師曰有一婦人年六十所經水常自下設久得病利少腹堅滿者為難治
師曰有一婦人來診言經水少不如前者何也師曰亡其津液故令經水少設經下反多於前者當所苦困當言曾更下利若汗出小便利者可何以故師曰亡其津液故令經水少設經下反多於前者當所苦困當言恐大便難身無復汗也
跌陽脉沈而遲沈則為水遲則為寒寒水相搏伏水穀不化脾氣衰則為溏胃氣衰則身體

腫少陽脉卑少陰脉細男子則小便不利婦人則經水不通經為血血不利則為水名曰血分水分一作
師曰寸口脉浮而大浮為虛大為實虛則為血血不利則為水名曰血分水分
實入則為陰結趺陽脉微而弦微則無胃氣弦則不得息少陰脉沈而數數則為出沈則為入入則為陰
搏血結胞門其藏不瀉經絡不通名曰血分
問曰病有血分何謂也師曰經水前斷後病水名曰血分
血分此病名為難治
問曰病有水分何謂也師曰先病水後經水斷名曰水分此病易治何以故去水其經自當下
脉濡而弱反在關濡反在顛遲在上竪在下遲則為寒名曰霧緊則陰氣慄脉反濡

弱濡則中濕弱則中寒寒濕相搏名曰痺
苦煩胗為不仁此當為痺而反懷軀遲歸
下脚為腑腫按之沒指腰脊骨節
息小便不通緊脉為嘔血氣無餘此為水不分榮衛乖
七此為非軀

平

問曰新産婦人有三病一者病痙鬱冒中風發熱煩嘔下利證第三
三者大便難何謂也師曰新産亡血虚多故令鬱冒師曰亡血復汗寒多故令鬱
冒何故大便難師曰亡津液胃燥故大便難産婦鬱
風故令病痙何故鬱冒師曰亡血虚以血
者血虚而厥厥而必冒冒家欲解必大汗出所以然
痙亦作痓

下厥孤陽上出故但頭汗出所以生婦喜陰血虛陽氣獨盛故當汗出陰陽乃復所以便堅者嘔不能食也小柴胡湯主之病解能食七八日而更發熱者此為胃熱氣實承氣湯主之方在傷寒中

婦人產得風續之數十日不解頭微痛惡寒時時有熱心下堅乾嘔汗出雖又陽旦證續在可與陽旦方

在傷寒中柱枝是也

婦人產後中風發熱面正赤喘而頭痛竹葉湯主之

婦人產後腹中疠痛可與當歸羊肉湯

師曰產婦腹痛煩滿不得臥法當枳實芍藥散主之

假令不愈者此為腹中有乾血著臍下與下瘀血湯

婦人產後七八日無太陽證少腹堅痛此惡露不盡

不大便四五日趺陽脉微實再倍其人發熱日晡所煩躁者不能食譫語利之則愈宜承氣湯以熱在裏結在膀胱也方在傷寒中

婦人產中虛煩亂嘔逆安中益氣竹皮大圓主之

方又加阿膠

婦人熱利重下新產虛極白頭翁加甘草湯主之 金千

師曰婦人平帶下絶產無子亡血君經證第四

為腹中痛數則為陰中瘡痛則生瘡弦則陰疼掣痛浮則為腸鳴腹滿緊則

師曰帶下有三門一曰胞門二曰龍門三曰玉門

產屬胞門未產屬龍門未嫁女屬玉門

問曰未出門女有三病何謂也師曰一病者經水初

下陰中熱或有當風或有扇者二病者或有以寒水洗之三病者或見丹下驚怖得病屬帶下師曰婦人帶下九實中事假令得鼠乳之病劇易當庚辛為期餘皆倣此

問曰有一婦人年五十所病但苦背痛時腹中痛少食多厭喜瞋脹其脉陽微關尺小緊形脉不相應願知所說師曰當問病者飲食何如假令病者言我不欲飲食聞穀氣臭者病為在上膲假令病者言我少多為欲食不食亦可病為在中膲假令病者言我自飲食如故病為在下膲為病屬帶下當以帶下治之婦人帶下經水不利少腹滿痛經一月再見土瓜根

婦人帶下脉浮惡寒漏下者不治

師曰有一婦人將一女子年十五所來診言此女

四時經水自下今經反斷其母言恐怖師曰之

為是夫人親女非耶若親者當相為說之婦人因荅

言自是女爾師曰所以問者無他夫人年十四時亦

以經水下所以斷此為避年少者得之此為無子年大者

婦人少腹冷惡寒久年少者得之此為絶産

得之絶産

師曰脉微弱而澀年少得此為無子中年得此為絶産

師曰少陰脉浮而緊緊則亦痛浮則亡血緊浮俱動

浮則亡血緊則寒疝腹中痛半産去而墮傷

師曰肥人脉細胞有寒故令少子其色黃者當上有寒

婦人少腹
反斷膀胱
拘急

問曰婦人年五十所病下利數十日不止暮則發熱
少腹裏急痛腹滿手掌熱
屬帶下何以故曾經半產瘀血在少腹中不去何以
知之其證唇口乾燥故知之當與温經湯

問曰婦人病下利而經反斷者何也師曰但當止
利經自當下勿怪所以利反斷者但下利亡
津液故經斷利止津液復
婦人血下咽乾而不渴其經必斷此榮不足本自有
微寒故不引飲渴而引飲者津液得通榮衛自和其

經必復下
師曰寸口脉微而濇微則衛氣不足濇則血氣無餘
衛不足其形逆榮衛俱虛言息短其形燥血不足其形逆榮衛俱虛言語謬誤跌陽脉浮而濇濇則胃氣虛虛則短氣咽燥
而口苦胃氣濇則失液少陰脉微而遲微則無精遲濇則陰中寒濇則血不來此為足下
則陰中寒濇則血不來此為無精
師曰脉微而濇微則衛氣不足濇則血氣俱虛言亡血也乳子下利為可
不者此為足下
經三月一來
問曰婦人妊娠三月師脉之言此婦人非軀人今月經
當下其脉何類何以別之師曰寸口脉衛浮而大榮
反而弱浮大則氣強反弱則少血孤陽獨呼陰不能
吸二氣不得衛降榮竭陰為積寒陽為聚熱陽盛不

潤經絡不足陰虛陽往一作實故令少血時發洒淅咽燥
汗出或溲稠數多唾涎沫此人非軀畜煩滿洫月禀一經三月一來陰盛則瀉名曰
居經
問曰婦人年五十所一朝而清血二三日不止何以
治之師曰此婦人前絶生經水不下今反清血此為
居經不須治當自止經水不下五日止者五日愈
婦人月經一月再來者經來甚而反微
不利不汗出者其經二月必一發其脉欲自如常
平
問曰婦人病經水適下而發其汗則鬱冒五朔漏下經閉不利腹中諸病證第五
也師曰經水下故為裏虛而發其汗為表復表虛此為知人何

寸口脉弦而大弦則爲減大則爲芤減則爲寒芤則爲虛寒虛相搏脉則爲革婦人則半産漏下

婦人陷經漏下黑不解膠薑湯主之

湯主之

婦人經水不利抵當湯主之在傷寒中

婦人經水不利抵當湯主之在傷寒中

婦人經水閉不利藏堅癖不止中有乾血下白物礬石圓主之

石圓主之

婦人腹中諸疾痛當歸芍藥散主之 一云治腹中疼懷妊痛

婦人腹中痛小建中湯主之 一云腹中痛小便利理中湯主之

婦人咽中如有炙臠 半夏厚朴湯主之

婦人咽中如有炙臠狀半夏厚朴湯主之

婦人藏燥喜悲傷欲哭象如神靈所作數欠甘草小

麥湯主之

婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除脈遲身涼胸脇下滿如結胸狀譫語此為熱入血室其人譫語此為熱入血室但頭汗出者當刺期門隨其虛實而取之

婦人中風七八日續有寒熱發作有時經水適斷者此為熱入血室其血必結故使如瘧狀發作有時小柴胡湯主之方在傷寒中

婦人傷寒發熱經水適來晝日了了暮則譫語如見鬼狀此為熱入血室無犯胃氣若上二膲必當自愈（疑二字）

陽明病下血而譫語此為熱入血室但頭汗出者當刺期門隨其實而寫之濈然汗出者則愈

婦人少腹滿如敦ㇾ狀（要略云熱）小便微難而不渴生

後生疑

婦人陰寒温中坐藥蛇床子散主之

婦人陰寒者此為水與血并結在血室大黄甘遂湯主之

婦人陰中寒轉胞陰吹冷痛脫下證第七

婦人坐藥強下其經目眶為痛足跟難以踐地心中狀如懸

婦人病飲食如故煩熱不得臥而反倚息者何也師曰得病一婦人病飲食如故煩熱不得臥而反倚息者何也師曰得病轉胞不得溺也何以故師曰此人故肌盛頭舉身滿今反羸瘦頭舉中空感減一作胞系了戾故致此病但利小便則愈宜服腎氣圓以中有茯苓故也方在虚勞中

師曰脉得浮緊法當身軀疼痛設不痛者當射云何因當射言若腸中痛腹中鳴欬者因失便婦人得此

脉若法當陰吹
師曰寸口脉浮而弱浮則為虛弱則無血浮
弱則有熱而自汗出趺陽脉浮而濇浮則氣
有寒喜噫吞酸其氣而下少腹則寒少陰脉
微則少血弱則生風微弱相搏陰中惡寒胃氣下泄吹
吹而正喧
師曰胃氣下泄吹而正喧此穀氣之實也膏髮導之
少陰脉滑而數者陰中則生瘡
少陰脉濇而數則氣淋陰中生瘡
婦人陰中蝕瘡爛狼牙湯洗之
婦人藏腫如瓜陰中疼引要痛者杏人湯主之
少陰脉弦者白腸必挺核又

表裏俱虛故令鬱冒也

問曰婦人病如癲疾鬱冒一日二十餘發師脈之反言帶下其脈何以別之師曰皆如師言其脈何類何以別之師曰寸口脈濡而緊緊則陽氣微緊則榮中寒陽微衛氣虛血竭濡則陽氣微緊則榮衛俱虛故令鬱冒也

凝寒陰陽不和邪氣舍於榮衛疾作候一起年少時經水來以合房室移時過度精感命門開經下血虛百脉皆張大中極感陽動微風激成寒因虛舍榮衛冷積於丹田發動上衝奔在肖隅津液掩口入涎唾涌溢出眩冒狀如厥氣衝髒裏熱粗醫名為癲灸之因大劇

問曰婦人病苦氣上衝肖眩冒吐涎沫髒裏氣衝熱師脈之不名帶下其脈何類何以別之師曰寸口脈沈而微沈則衛氣伏微則榮氣絶陽伏則為疹陰絶

則亡血病當小便不利津液閉塞今反小便通微汗出沈鬱為寒欬逆嘔沫其肺成痿津液竭少亡血損經絡因寒為血厥手足苦痺氣從毋田起上至肩脇沈寒怫鬱於上肖中窒塞氣歷陽部面翕如醉形體似肥此乃浮虛醫反下之長針復重虛榮衛夕發眩冒故知為血厥也

問曰五崩何等類師曰白崩者形如漬赤崩者形如絳汁崩者形如爛瓜青崩者形如藍色黑崩者形如蹄甲如屋漏水如下利而言如衂不因言夫人年幾何夫人年七七四十九經水當斷

師曰有一婦人來脉反得微濇法當吐若下利而反至今不止以故致此虛也

少陰脉浮而動浮則為虛動則為痛婦人則脫下

平

診婦人漏血下赤白日下血数升脉急疾者死遲者生

診婦人漏下赤白不止脉小虛滑者生大緊實数者死

診婦人新生乳子脉沈小滑者生實大堅弦急者死

診婦人新生乳子脉沈小虛滑者生實大緊實数者死

寒清者死

診婦人生産因中風傷寒热病其脉懸小四肢温者生

浮緩者生小急者死

診婦人生産之後寸口脉炊疾不調者死沈微附骨

金瘡在陰處出血不絶陰脉不能至陽者死接陽而復出者生

平一

小兒脉呼吸八至者平九至者傷十至者困

小兒雜病證第九

診小兒脉法多崔闕要以三部脉為主若緊為風癇沈者乳不消弦急者客忤氣小兒是其日數應變蒸之時身熱而脉亂無汗不出不欲食食輒吐哯者脉亂無汗若也

小兒脉沈而数者骨間有熱欲以腹按冷清也

小兒大便赤青辨飡洩脉小手足温易已

小兒病困汗出如珠著身不流者死

小兒病其頭毛皆上逆者必死耳間青脉起者痙痛
小兒病而囟陷入其口唇乾目皮反口中氣出冷足
與頭相抵卧不舉身手足四肢垂其卧正直如得縛
其掌中冷皆死至十日不可復治之

脉經卷第九

脉經卷第十 手檢圖三十一部

朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞檢院護軍臣林億等類次

經言肺者人之五藏華蓋也上以應天解理萬物主行精氣法五行四時知五味寸口之中陰陽交會中有五部前後左右各有所主上下中央分為九道浮沈結散知邪所在其道奈何岐伯曰脉大而弱者氣實血虛也脉大而長者病在下候浮直上下交通者陽脉也堅大在腎急在肝實在肺前如外者足太陽也中央如外者足陽明也後如外者足少陰也中央直中央如內者足厥陰也中央如內者足太陰也前者手少陰也後如內者足少陰也前部左右彈者陽蹻也中部

左右彈者帶脉也後部左右
厥陰者陰絡也維也從少陰之大陽者陽維也
者陰絡也來小時大者陽絡也
前如外者足太陽也動苦目疼項腰痛浮為風濇為寒
熱緊為宿食
男子陰下濕女子月水不利少腹痛引命門陰中痛
子藏閉浮為風濇為寒血滑為勞熱緊為宿食鍼入
九分却至六分
中央如外者足陽明也動苦頭痛面赤微滑苦大便
不利腸鳴不能食足脛痺
中央如外者足陽明也動苦頭痛面赤熱浮微滑苦

大便不利喜氣滿滑者為飲濇為嗜卧腸鳴不能食
足肘痺鍼入九分却至六分
後如外者足少陽也動苦腰背肘股時肢節痛
紘為勞鍼入九分却至六分
右足三陽脉
前如內者足厥陰也動苦少腹痛月經不利子藏閉
前如內者足厥陰也動苦少腹痛與腰相連大便不
利小便難莖中痛女子月水不利陰中寒子門壅絶
內少腹急男子疝氣兩丸上入淋也鍼入六分却至
三分
中央如內者足太陰也動苦胃中痛食不下欬唾有

血足脛寒少氣身重從腰上狀如居水中
中央如內者足太陰也動苦腹滿上管有寒食不下
病以飲食得之沈濇者苦身重四肢不動食不化煩
滿不能卧足脛痛苦寒時欬血泄利黃鍼入六分却
至三分
後如內者足少陰也動苦少腹痛與心相引苦背痛淋
從高墮下傷於內小便血
後如內者足少陰也動苦小腹痛與心相引苦背痛淋
從高墮下傷於尻內便血裏急月水來上搶心脊脅
滿拘急股裏急也鍼入六分却至三分
前部左右彈者陽蹻也動苦腰背痛微濇為風癇取
右足三陰脉

陽蹻

前部左右彈者陽蹻也動苦腰痛癲癇惡風偏枯僵

仆羊鳴喜痓痺皮膚身體強（一作淫）痺直取陽蹻在外踝

上三十直絶骨是

中部左右彈者帶脉也動苦少腹痛引命門女子月

水不來陰絶繼復下止陰辟寒令人無子男子苦少腹

拘急或失精也

後部左右彈者陰蹻也動苦癲癇寒熱皮膚強（一作淫）痺

後部左右彈者陰蹻也動苦少腹痛裏急腰及體窅

下相連陰中痛男子陰疝女子漏下不止

右陽蹻陰蹻帶脉

中央直前者手少陰也動苦心痛微堅腹脇急實堅

者為感忤純虛者為下利腸鳴滑者為有娠女子陰
中癢痛痛中央直中央直後者手心主也動苦心痛面赤食苦咽多喜
怒微浮者手太陰也動苦悲傷恍惚不樂也濇為心下寒沈為恐
怖如人捕出王門上一分前
中央直後者手太陰也動苦欬逆氣不得息浮為內
風緊濇者脅中有積熱時欬血也有沈熱
從少陰斜至太陽是陽維也動苦肌肉痺癢
右手三陰脉
從少陰斜至太陽是陽維也動苦肌肉痺癢
相引甚者太陽是陽維脉也動苦顛僵仆年鳴手足
在外踝絕骨下二寸

從少陽斜至厥陰是陰維也動苦癲癎僵仆羊鳴

從少陽斜至厥陰是陰維也動苦僵仆失音肌肉淫

瘧痺汗出惡風

脉來暫大暫小是陰絡也動苦肉痺應時自發身

洗洗也

脉來暫大者是陽絡也動苦皮膚痛下部不

仁汗出而寒也

肺脉之來也如循榆莢曰平如風吹毛曰病狀如連

珠者死期丙丁日禺中日

心脉之來也如反筍莞大曰平如連珠曰病前曲後

居如鉤者死期壬癸日人定夜半

肝脉之來也搏而弱曰平如張新弓絃曰病如雞踐

地者死期庚辛日晡時入
脾脉之來也阿阿如緩曰平來如雞舉足曰
之啄如水之漏者死期甲乙日平旦日出
腎脉之來也微細以長曰平來如彈石曰病如
索者死期戊己日食時昳黃昏雞鳴
寸口中脉躁竟尺關中無脉應陽干陰也動苦腰背
腹痛陰中若傷足寒刺足太陽少陰直絶骨
灸大陰五壯
尺中脉堅實竟尺寸口無脉應陰平陽也動苦兩脛
腰重少腹痛癲疾刺足太陰踝上三寸鍼入五分又
灸太陽陽蹻在足外踝上三寸直絶骨是也
寸口脉緊直至魚際下小按之如持維千雞毛作狀其

病腸鳴足痺痛酸腹滿不能食得之寒濕刺陽維在外踝上三寸間也入五分此脉出魚一作際
寸口脉沈著骨反仰其手乃得之此腎脉也動苦少腹痛腰體酸癲疾刺腎俞入七分又刺陰維入五分
初持寸口中脉如細堅狀久按之大而深動苦心下有寒脅苦痛陰中痛不欲近丈夫也此陰逆刺期門入六分又刺腎俞入五分可灸胃管七壯
初持寸口中脉如躁狀洪大久按之細而牢堅動苦腰腹相引痛以下至足脛重也不能食刺腎俞入四分至五分亦可灸胃管七壯
尺寸俱沈但有關上脉苦寒心下痛尺寸俱沈關上無有者苦心下喘

尺寸俱数有熱俱遲有寒
尺寸俱微微厥血氣不足其人少氣
寸口沈濡弱發熱惡寒汗出
尺中沈心痛上吞酸
關上沈肾中痛引背（一云短氣）
關上伏肾中痛引背（一云內熱）
寸口伏逆冷汗出
尺中伏有水氣泄溏
關上伏有水氣不消
寸口紘胃中拘急（一作心下惙）
尺中紘胃中有寒心下拘急
關上紘胃中有寒心下拘急
尺中紘少腹臍下拘急

寸口緊頭痛逆氣

關上緊心下痛

尺中緊臍下少腹痛

寸口濇無陽少氣

尺中濇無血厥冷

關上濇無陰厥逆

寸口微無陽外寒

關上微中實一作胃虛能食故裏急一作胃氣無

尺中微無陰厥冷腹中拘急

寸口滑肩滿逆

關上滑中實逆

尺中滑下利少氣

寸口數即吐

關上數胃中有熱

尺中數惡寒小便亦黃

寸口實即生熱虛即生寒

尺中實即小便痛虛即腹滿

寸口乳吐血微乳刎血

關上乳胃中虛

尺中乳下血微乳小便血

寸口浮其人中風發熱頭痛

關上浮腹痛心下滿

尺中浮小便難

寸口遲上焦有寒
關上遲弱無胃氣有熱
尺中遲下焦有寒脊痛
寸口濡陽弱自汗出
關上濡下重
尺中濡少血發熱惡寒
寸弱陽氣少
少關元閥
尺弱少血

脉經卷第十



慰寧二年七月十四日

朝散大夫右諫議大夫兼知政事護軍長安郡開國侯食邑二千二百戶賜紫金魚袋臣 者

推忠佐理功臣奉大夫行右諫議大夫兼知政事上柱國南陽郡開國侯食邑二千戶賜紫金魚袋臣趙 卉

推忠協謀同德守正亮節佐理功臣開府儀同三司行尚書左僕射兼門下侍郎同中書門下平章事上柱國南陽郡開國侯食邑二千戶賜紫金魚袋臣趙 卉

下平章事集賢殿大學士上柱國魯國公食邑二千一百戶食實封叁阡捌伯戶臣曾 鞏

推忠協謀同德守正亮節佐理功臣開府儀同三司行尚書左僕射兼門下侍郎同中書門下平章事上柱國鄭國公食邑二千戶食實封肆阡貳伯戶臣富 弼

館參士監修國史兼譯經潤文使柱國鄭國公食邑二千戶食實封肆阡貳伯戶臣富 弼

國子監
准 監關准 尚書禮部符准 紹聖元年六月二
十五日
勅中書省送到禮部狀據國子監狀據翰林
醫學本監三學看治任仲言狀伏覩 本監先准
朝旨開雕小字聖惠方等共五部出賣今有千金翼方金匱要
略方王氏脉經補注本草圖經本草等五件暨書日
十部餘州外州軍尤不可得欲乞開作小字重行校
用而不可闕本監雖見印賣皆是大字醫人往往無
錢請買兼外州軍施行本部看詳欲依國子監申
請事理施行伏候指揮六月二十三日奉

聖旨依奉　勅如右牒到奉行　都省前批六月二
十六日未時付禮部施行仍關合屬去處主者一依
勅命指揮施行
紹聖三年六月　日雕

集慶軍節度推官監國子監書庫向
承務郎監國子監書庫曾
延安府臨真縣令監國子監書庫鄧
頴州萬壽縣令監國子監書庫郭
宣義郎國子監主簿王
通直郎國子監丞武騎尉檀
朝散郎守國子監司業上輕車都尉賜緋魚袋趙
朝奉郎守國子司業兼侍講雲騎尉龔

原　挺之　宗益　仲錞　直卿　平　繰　宗恕