

大德重校聖濟總錄卷第一百五

四

妊娠門

妊娠惡阻

妊娠漏胎

妊娠驚胎

妊娠胎動

妊娠胎動下血

聖濟  
總錄

妊娠統論

其成烈主

論曰妊娠一月謂之始形二月謂之始膏三月謂之始胎當是之時血脉不流形象始化男女於此儀則未分緣感而應所以孕婦欲令見榮貴端正之人不欲見偃倮侏儒之輩及猿猴犬馬怪禽異獸仍夜臥宜息心靜意慎勿亂思恐形異夢而感不祥也妊婦所以擇食者蓋假五氣五味生成五藏氣味各隨所喜而歸之陰陽應象論曰酸生肝苦生心甘生脾辛生肺鹹生腎此五藏假五味以生也六節藏象傳曰臊氣湊肝焦氣湊心香氣湊脾腥氣湊肺腐氣湊腎此五藏假五氣以成也

若形藏未備則隨其不足而孕婦必欲其氣味食之蓋陽爲氣陰爲味氣化則精生味化則形長誠以人之生也氣本於天形本於地內經謂天食人以五氣地食人以五味正此之謂若夫天合既分形質不完者皆孕婦擇食之時不得其氣味故視斜覷短偏聾雙盲手攣足跛腰偻背僂此肝形之不備也言遲語吃或啞或瞶神氣昏塞此心形之不備也胸背凹凸舌短脣缺此脾形之不備也毫毛踈薄髮鬢禿落或毫毛通白皮膚偏赤此肺形之不備也毛髮焦黃形體黑小五鞭五鞮數歲不能行此腎形之不備也由是孕婦擇食假其氣味生成五藏一有不備病輒隨之譬猶陶冶成器一或苦窳是水火之劑不謹豈曰工之良哉

妊娠惡阻

論曰婦人所食穀味化爲血氣下爲月水凡妊娠之初月水乍聚一月爲媾二月爲胚三月爲胎胎成則男女分乃食於母而口以焉在媾胚之時血氣未用五味不化中氣壅實所以脾胃不思穀味聞見於物故惡心有所阻也其病心中憤悶頭重目眩四肢怠惰惡聞食氣是矣

治妊娠惡阻嘔逆惡心四肢疼痛頭痛惡聞食氣心忪煩

門多損墜宜安胎調勻血脉茯苓湯方

白茯苓去黑皮

旋復花

生乾地黄微炒各

陳橘皮湯浸去白

細辛去苗葉

芎藭

人參

芍藥

桔梗去蘆頭炒

甘草炙令赤色各壹兩半

右一十味麤搗篩每服三錢匕以水一盞入生薑一分

分拍碎同煎至六分去滓溫服日二

治妊娠惡阻病心中憤悶見食嘔吐惡聞食氣肢節煩

疼身體沉重多臥黃瘦麥門冬湯方

麥門冬去心焙

人參各分

白茯苓去黑皮

陳橘皮湯浸去白焙各半兩

甘草炙剉壹分

右五味麤搗篩每服三錢匕以水一盞入生薑一分

拍破棗二枚擘同煎至六分去滓溫服食前

治妊娠一兩月惡食手足煩悶人參湯方

人參

知母焙

枳殼去瓤炒

黃芩去黑心各壹兩

大腹壹枚并皮子用剉碎

右五味麤搗篩每服三錢匕以水一盞入生薑半分

切煎至七分去滓溫服食後日二

治妊娠阻病心中憤悶頭目眩四肢沉重懈怠惡聞食

氣好喫酸鹹果實多臥少起三月四月皆多嘔逆百節

不能自舉者凡參飲方

人參兩

白茯苓皮去黑

厚朴去麤皮塗生薑汁炙

白朮各壹兩半

陳橘皮湯浸去白燥

葛根剉各壹兩

右六味麤搗篩每服三錢匕以水一盞入生薑五片

同煎至六分去滓溫服日再

治妊娠阻病心中憤悶虛煩吐逆惡聞食氣頭目眩重

四肢百節疼痛沉重多臥少起汗出疲極黃瘦半夏湯

方

半夏湯洗去涎 陳橘皮浸去白炒

芍藥

桔梗剉

人參各壹兩

旋復花

甘草炙

細辛去苗

芎藭

熟乾地黄焙各壹分 白茯苓去黑皮壹分

右二十一味麤搗篩每服三錢匕以水一盞入生薑

半分切棗二枚擘同煎至六分去滓溫服兩劑後宜

服橘皮丸以間之

治妊娠阻病心中煩悶頭眩惡聞食氣聞便嘔吐悶亂

顛倒四肢怠墜不自勝舉先服半夏湯兩劑後次服此

陳橘皮丸方

陳橘皮湯浸去白炒乾 白茯苓去黑皮各壹兩 白朮

甘草炙

乾薑炮

半夏湯洗去

枳實各貳兩

右七味搗羅為末，鍊蜜和塗酥為劑，搗令勻，熟丸如梧椰子大，每服二十九，生薑湯下食前服。

治妊娠惡阻嘔吐不下，食宜服橘皮湯方。

陳橘皮湯浸去白焙 竹茹 人參

白朮各參 厚朴去蘆皮塗生薑汁炙

右五味搗篩，每服三錢匕，以水一盞，生薑五片同煎至七分，去滓溫服，不拘時候。

治妊娠阻病頭疼肩背煩悶氣脹不思飲食，宜白朮丸方。

方

白朮 厚朴去蘆皮塗生薑汁炙

當歸微炒 陳橘皮湯浸去白焙

白茯苓去黑皮 熟乾地黄微炒各壹兩

右六味搗羅為末，鍊蜜搗和塗酥為劑，搗令勻，熟丸如梧椰子大，每日空心米飲下二十九，早晨日晚各一服。

一服

治初妊娠惡阻食即吐逆頭痛顛倒寒熱前胡飲方。

前胡去蘆頭 細辛去苗葉 白茯苓去黑皮

甘草炙 厚朴去蘆皮塗生薑汁炙

右五味搗羅為末，每服二錢匕，水一盞，生薑一分。

切同煎六分去滓溫服不拘時日二服

治妊娠阻病頭疼四肢羸弱不思食飲唯思眠睡此胡

飲方

苳胡去 赤芍藥 麥門冬去

人參 黃耆微炒 甘草炙各

生地黃壹兩半研

右七味擣羅六味為麤末每服三錢匕以水一盞入

地黃汁一分同煎至六分去滓溫服日再

治妊娠阻病胎不安寒熱嘔逆氣滿不思飲食宜服麥

門冬飲方

麥門冬去 人參 白茯苓去

阿膠炙令燥 甘草炙

右五味擣為麤末每服三錢匕以水一盞入生薑

分拍破棗二枚擘同煎至六分去滓食後溫服日二

治妊娠阻病心中憤悶虛煩吐逆惡聞食氣頭眩體重

四肢疼痛煩熱多臥少起惡寒汗出羸瘦桔梗湯方

桔梗剉 半夏湯洗 白茯苓去

細辛去 芎藭 人參

甘草炙 芍藥壹 熟乾地黄微炒

右九味擣篩每服五錢匕水一盞半生薑五片同

煎至六分去滓溫服食後日二服

治妊娠惡阻心中煩悶頭眩體重惡聞食氣聞便嘔吐  
憤悶顛倒四肢怠惰不自勝舉茯苓丸方

白茯苓去黑皮

人參各壹兩

桂去蟲皮

乾薑炮

半夏湯浸洗

陳橘皮去白

白朮

葛根碎

甘草炙

枳實去瓢麩

右一十味搗羅爲末鍊蜜爲劑搗令勻熟丸如梧相

子大每服二十九米飲下漸加至三十九日再服

治妊娠惡阻嘔吐涎痰不能食薑橘湯方

生薑母壹兩

陳橘皮去白

青竹筍各半

前胡去苗

檳榔剉

右五味剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分去

滓溫服不拘時候

治妊娠阻病心中煩悶嘔噦吐逆惡聞食氣頭眩重四

肢百節疼痠嗜臥汗出疲極黃瘦人參飲方

人參

麥門冬去心

白茯苓去黑皮

生薑各分

陳橘皮湯浸去白

甘草炙

大棗伍枚

右七味剉如麻豆大分爲二劑每劑以水五盞煎取



二薑去滓食前分爲三服如人行三五里再服  
治妊娠惡阻見食吐逆頭痛前胡湯方

前胡去薑

細辛去苗

白茯苓去黑皮

人參

厚朴去麤皮生薑汁炙甘草炙別各

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑五片煎至八分去滓溫服不拘時

治妊娠悲阻頭旋嘔吐腰腹痛胎動不安桑寄生飲方

桑寄生

阿膠炒

此胡苗

麥門冬去心

人參

大蓴各壹兩

郁李人去皮炒

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候

治妊娠惡阻心中憤悶聞食氣即吐逆肢節痠疼多汗黃瘦半夏飲方

半夏湯洗去滑生薑汁製過

白茯苓去黑皮各參分

細辛去苗

旋復花

桔梗

赤芍藥

陳橘皮去白

甘草炙各

熟乾地黄焙壹兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑五片同

煎至七分去滓溫服空心食前  
治妊娠阻病心中煩悶頭眩重憎聞食氣聞便嘔逆四  
肢垂不自持茯苓飲方

白茯苓去黑皮 防風去 人參

白朮 枳殼去瓤炒 生薑各半兩

甘草壹分炙

右七味剉如麻豆大分為二劑每劑以水四盞煎取  
一盞半去滓食前分溫二服如人行三五里再服

治妊娠惡阻憤悶頭旋聞食氣便嘔逆四肢多熱茯苓  
丸方

白茯苓去黑皮 人參 陳橘皮去白焙

乾薑炮裂 白朮 半夏湯洗去滑生薑汁製過

葛根剉 麥門冬去心焙壹兩 甘草炙剉各壹兩

枳實去瓤炒參分

右一十味搗維為末鍊蜜和丸如梧桐子大每  
十九空腹米飲下

妊娠漏胎

論曰妊娠將理失宜經血時下謂之漏胎由衝任虛弱  
不能固養胞胎故令經血時下如器之漏也久漏不已  
則胎氣無所稟養必致萎燥矣

治妊娠漏胎下血不止腹內疼痛續斷丸方

續斷 皮臍 附子 炮裂去 蒲黃

乾薑 炮 芍藥 芎藭

山茱萸 各壹兩半 白朮 肉苳蓉 酒浸切焙

菟絲子 酒浸別搗 黃耆 剉炙 山芋

熟乾地黄 焙各貳兩

右一十三味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

二十九空心日晚溫酒下

治妊娠漏胎下血不止臍腹疼痛續斷飲方

續斷 剉貳兩 艾葉 去梗焙乾 熟乾地黄 焙

當歸 切焙各壹兩 竹茹 新者 阿膠 炙

雞蘇 去根莖各半兩

右七味搗為麤末每服三錢匕用水一盞煎至七分

去滓空心溫服早晚各一

治妊娠漏胎淋瀝不止艾葉飲方

艾葉 陳者半兩 乾薑 炮 當歸 炙剉各

芎藭 壹兩

右四味搗為麤末每服三錢匕以水一盞入生薑一

棗大拍碎同煎至七分去滓熱服空心日午晚後各

治妊娠漏胎淋瀝下血臍腹疼痛桑寄生湯方

桑上寄生

炙令黃剉碎半兩

當歸

剉半兩

芎藭

剉壹兩

右三味麤搗篩每服三錢匕以水半盞酒半盞同煎

取六分去滓溫服早晨午時晚間各一

治妊娠漏胎下血過多膠艾湯方

阿膠

炙燥半兩

艾葉

焙乾壹兩

右二味麤搗篩每服三錢匕以水一盞煎至七分去

滓溫服早晨午時晚間各一

治妊娠漏胎下血過多腹中刺痛止血安胎芎藭飲方

芎藭

當歸

竹筴

阿膠

炙燥參分

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服早晨午時至晚各一服

治妊娠胎漏下血不止腹痛薑黃湯方

薑黃

當歸

熟乾地黄

艾葉

焙乾

鹿角膠

炒燥各壹兩

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分

切棗三枚擘破煎至八分去滓食前溫服

治妊娠胎動不安及漏胎腹中痛阿膠湯方

阿膠煉妙

白朮

當歸切焙

甘草炙各兩

桑上寄生剉

熟乾地黄焙各兩半

白茯苓去皮黑

龍骨研

芎藭各參分

乾薑炮半兩

右一十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半聚三枚擘

破煎至八分去滓不計時候稍熱服

治妊娠五月六月血不止黃耆湯方

黃耆炙剉壹兩半

桑寄生炙

地榆剉

熟乾地黄焙各兩 艾葉乾

龍骨研各參分

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑半分切

棗三枚擘破同煎至六分去滓食前溫服

治妊娠胎漏下血不止腹痛地黃散方

熟乾地黄焙 乾薑炮各參分

右二味搗羅爲散每服二錢匕食前溫酒調下

治妊娠胞漏月水時下此由衝任脉虛不能制約太陽

少陰之經故令血下蓋衝任之脉爲經絡之海皆起於

胞內今不能制其經血故爲漏胞血乾卽死黃耆飲方

黃耆剉

地榆

桑寄生各壹兩半

艾葉半兩

白龍骨研貳兩

生地黄貳兩

生薑半兩

成林五大...

右七味剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎取八分去滓食前溫服如人行三五里再服

治妊娠漏胎心腹疔痛或時下血竹筴寄生湯方

竹筴

桑寄生

阿膠炙燥

艾葉

芍藥

白朮各等分

右六味剉如麻豆大拌勻每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

治妊娠胎漏下血不止阿膠湯方

阿膠燥炒

劉寄奴

赤石脂

黃連去須

白龍骨各壹兩半

烏梅伍枚碎焙

桑寄生

甘菊花

當歸切

旋復花炒

地榆

白朮各壹兩

枳殼去瓢

艾葉炒

石膏碎

右一十五味麻搗篩每服五錢匕水二盞半入生薑五片同煎至八分去滓溫服不拘時

治妊娠胎漏下血艾葉湯方

艾葉炒

黃芩去黑心

黃連去須

茯苓去

桑耳

代赭

正厚朴去

白茅根切

白芷

阿膠炒

白朮炒

白朮炒

右一十一味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑五片同煎至八分去滓溫服不拘時

治妊娠胎漏方

生地黃汁貳合

清酒貳半

黃蘗生

右二味相和煎三四沸空腹分溫二服

治胞漏妊娠下血不止地黃散方詳詳

赤石脂各貳兩

熟乾地黃煨

乾薑炮

赤石脂各貳兩

全薑

右三味搗羅為散酒服方寸匕日三服

治漏胎下血不止當歸阿膠散方

當歸切

阿膠炙

龍骨炙

地榆

蒲黃炒

熟乾地黃煨

黃牛角炙

熟艾半

右八味搗羅為散每服方寸匕空腹米飲調下日再

妊娠驚胎

論曰胎處胞內隨母聽聞纔覺受氣便宜將慎若妊娠月滿或欲逼生形體完具精神已成母忽驚動遂為驚胎則轉移不常宜速治之不爾則精氣併居令子發癩治妊娠驚胎轉動不定阿膠湯方

阿膠炒

桑上寄生剉

大腹皮剉

麥門冬焙

黃耆剉

防風去

丹參

羚羊角屑

栝子人微炒

縮沙人各半兩

人參

白朮各壹兩

右一十二味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分

去滓空心溫服

治妊娠因驚胎內轉動人參湯方

人參

芫胡苗去

桑上寄生

青橘皮湯浸去白焙

甘竹茹

續斷

芎藭各壹兩

艾葉焙乾半兩

右八味麤搗篩每服三錢匕以水一盞入棗三枚擘

破同煎至七分去滓空心溫服

治妊娠驚胎寧麻散方

寧麻根壹握剉

訶梨勒煨去核

山芋

茯神去木各壹兩

人參貳兩

右五味搗羅爲散每服一錢匕以米飲調下不拘時

治妊娠驚胎定神丸方

陟釐

生乾地黄煨

大參人參米半合

當歸炙令香剉碎

龍骨炙

赤石脂合

厚朴去麤皮生剉

禹餘糧碎

赤芍藥剉

吳茱萸炒各壹兩

右一十味搗羅爲末鍊蜜和丸梧桐子大每服空心



熟水下二十九

治妊娠外因驚動胎內不安轉移不寧艾葉湯方

艾葉炙乾

桑上寄生剉炒壹兩半

人參貳兩

茯神去木參分

阿膠炙令燥參分

右五味廬搗篩每服三錢匕以水一盞入糯米半合

葱白三寸并鬚切同煎至七分去滓溫服食前

治妊娠驚胎胎動不安時時轉易黃芩湯方

黃芩去黑心

白朮剉

白芍藥剉炒各半兩

黃耆剉

人參

山芋各壹兩

右六味廬搗篩每服五錢匕水一盞糯米半合葱白

三寸細切煎至八分去滓溫服食前

治妊娠因驚胎動不安當歸湯方

當歸炙香

生乾地黄剉

艾葉炒

甘草炙剉各壹兩

芎藭

芍藥剉

阿膠炙令燥各參分

人參貳兩

右八味廬搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服食前

治妊娠胎不穩鎮心安胎扶神散方

茯神去木

芍藥剉

桑根白皮剉

當歸剉

芎藭各壹兩

人參貳兩

右六味壽羅爲散每服三錢匕以米飲調服不拘時  
治妊娠外有驚動令胎內不穩芎藭湯方

芎藭貳兩

人參兩

當歸切焙壹兩

甘草炙半兩

阿膠炙令燥半兩

右五味廬壽節每服三錢匕水一盞葱白二寸拍碎

同煎七分去滓溫服食前

治妊娠驚胎生銀湯方

生銀五兩以小一盞入葱白三寸切阿膠半兩炒

同煎至七分去銀并滓溫服之若要作粥服入糯

米二合煮爲粥服之甚佳

### 妊娠胎動

論曰妊娠胎動有因母病以動胎有因胎動以病母二者皆不得安也或因母病則先治其母胎自安矣或因胎病則先治其胎母自安矣間有誤食毒物或起居不慎氣疾爲梗寒熱更作胎漏血下皆致胎動又宜隨其所因以調護之

治妊娠胎動不安腰腹疼痛止痛安胎阿膠湯方

阿膠

炒令燥半兩

當歸

半兩

桑白

寄生

半兩

右三味廬壽節每服三錢匕以水一盞煎至六分去

滓空心熱服

治妊娠胎動內結疼痛血下運悶當歸湯方

當歸炒

芎藭

側柏葉至六分

阿膠炒

桑上寄生剉

艾葉炒

淡竹筴

續斷兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片棗二

枚擘同煎至七分去滓溫服日三

治妊娠二三月至七八月胎動不安腰腹痛及胎奔

上搶心短氣膠艾湯方

阿膠炒

當歸切

艾葉炒

芎藭

甘草炙

芍藥炒

生乾地黄切

各兩

生乾地黃切

一訶梨勒取

右七味麤搗篩每服三錢匕水半盞酒半盞同煎至

七分去滓溫服日三

治妊娠胎動不安桑寄生湯方

桑上寄生剉

當歸切

赤茯苓去黑皮

木通剉

生乾地黃切

一訶梨勒取

陳橘皮去白

白朮剉

芎藭各

兩半

莎草根去毛

木香剉

各兩

兩半

右十一味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑二

片同煎至六分去滓溫服日三

治妊娠胎動腹痛腰痛續斷湯方

續斷一兩 當歸切 三錢 芍藥入心煎二

桑上寄生剉 糯米各壹兩

阿膠炒令燥

艾葉炒 竹茹各半兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治妊娠胎動不安腹痛阿膠湯方

阿膠壹兩 芍藥壹兩

當歸切焙

甘草壹兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

空心日午臨臥服

治妊娠胎動腹痛大安散方

藜香子參兩

白茯苓去黑皮 阿膠炒令燥

芎藭

當歸切

桑上寄生剉

甘草炙

陳橘皮湯去白焙

右八味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下食前服

治妊娠胎動不安腰腹疼痛安胎飲方

當歸半兩

蒸白壹分

右二味先以水三盞煎至二盞入好酒一盞更煎數

沸去滓分作三服

治婦人妊娠偶有所觸或墜高傷打致胎動不安腹中痛不可忍者方

縮沙

和皮不以多少燒灰炒令熟透去盡

右一味搗羅爲散每服二錢匕溫酒調下須臾覺腹

中胎動處熱卽胎已安矣

治妊娠胎動不安腰腹疔痛小艾葉湯方

艾葉

炒壹兩

當歸

焙

阿膠

炒燥各

芎藭

壹兩

甘草

炙劉各

右五味搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服空心食前

治婦人胞胎不安安胎湯方

槐花

炒香

貝母

去心

當歸

剉

芎藭

壹兩

桑寄生

各半

芎藭

壹兩

右四味各等分搗篩每服三錢匕酒水各半薑重

子小便二合同煎至七分去滓溫服

治妊娠胎動煩熱滿悶安胎當歸飲方

當歸

切

桑寄生

各半

芎藭

壹兩

阿膠

炒燥

人參

壹兩

甘草

炙

右四味搗篩每服五錢匕水一盞半入葱白三寸

切豉三十粒同煎至八分去滓食前溫服

治妊娠胎氣不安腹痛煩悶安胎飲方

芎藭

阿膠炙

艾葉入酒中

當歸切

人參

甘草炙

白茯苓去黑皮

黃耆剉

麥門冬去心焙

右九味搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓空心溫服不拘時

治胎動不安腰腹疼痛大腹湯方

連皮大腹剉微炒

草豆蔻去皮

陳橘皮浸去白炙

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治妊娠因墜損胎不轉腹痛腰重芎藭散方

芎藭剉

人參

白朮剉

右一味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下

治妊娠胎動欲墮腹痛不可忍葶藶散方

葶藶根去皮切 銀伍兩水一盞半入葱白三十

右三味以清酒一升水一升同煎取一升分溫五服

治婦人胞胎不安杜仲丸方

杜仲剉

右以杜仲不計多少去麤皮細剉瓦上焙乾搗羅為

末煮棗肉和丸加彈子大每服一九爛膏以糯米湯

下蒸黃丸  
治妊娠胎動腰痛下血安胎當歸湯方  
當歸 芍藥 芎藭 各半  
艾葉 炒 壹

六味麻根湯  
一鹿角膠  
參 炒 燻 各 壹  
代 壹 伍 伍

右五味麤搗篩每服四錢匕水一盞半入葱白三寸  
切同煎八分去滓溫服空心食前

治妊娠腹中冷胎不安當歸飲方  
當歸 切  
人參  
生薑 切 各 壹

厚朴 去 薑 皮 生  
陳橘皮 湯 浸 去 白 筋 切  
大棗 擘 伍 枚

右六味剉如麻豆大分為二劑每劑以水四盞煎取  
一盞半去滓食前分溫二服如人行三五里再服

治胎動不安心腹痛厚朴橘皮丸方  
厚朴 去 薑 皮 生 薑  
陳橘皮 湯 去 白 筋 切

木香 壹 兩  
白朮 壹 兩  
阿膠 半 兩

當歸 兩 半  
乾薑 兩 半  
訶梨勒皮 兩 半

吳茱萸 洗 貳 分  
食前米飲下

右九味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九  
治妊娠五六月胎動不安寒熱往來身體驚戰卒有所

下腹痛如欲產麥門冬飲方

麥門冬去心 人參

甘草炙

阿膠炙 黃芩去墨

熟乾地黄焙

烏梅去核炒

右七味廔搗篩每服五錢匕水一盞半生薑三片棗

二枚擘煎至八分去滓不拘時溫服

治胎動不安艾膠湯方

熟艾炒 阿膠炙 蔥各壹兩

右三味咬咀分作三服每服水三盞煎至一盞去滓

溫服

妊娠胎動下血

論曰妊娠之人將護為難若觸冒風寒飲食生冷及喜怒勞動之過悉致胎動胎動則氣血失度故下血也古又云母有宿疾子藏為風冷所乘者亦令胎動下血皆失將護所致

治妊娠胎動腹痛下血運悶阿膠湯方

阿膠炙 生薑切炒 芎藭

續斷各半 側柏 當歸切

桑寄生 艾葉各分 竹茹雞子大

右九味廔搗篩每服三錢匕水一盞入棗二枚擘煎



至七分去滓溫服

治妊娠胎動血下不止或胎漏腹痛桑寄生湯方

桑寄生

壹兩半

阿膠

炙燥

當歸

切焙

白茯苓

去黑皮

芎藭

白朮

熟乾地黄

焙

甘草

炙各壹兩

龍骨

燒

乾薑

炮各壹分

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞棗二枚擘煎

至七分去滓不拘時溫服

治妊娠胎動漏血不止鹿角膠湯方

鹿角膠

炙燥壹兩

人參

白茯苓

去黑皮各半兩

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

治妊娠忽胎動下惡血腹痛不可忍心神煩悶芎藭散方

芎藭

壹兩

當歸

切微炒壹兩半

鹿角膠

碎炒壹兩半

麋

桑寄生

壹兩

熟乾地黄

壹兩

右五味搗篩為散每服四錢匕水一中盞入生薑五片棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

治妊娠胎動時有所下血腹脇疼痛宜服阿膠散方

阿膠

參分碎碎黃燥艾葉半兩微炒

當歸

參分微炒

赤石脂兩半

龍骨兩半

芎藭分

黃耆壹兩

熟乾地黃壹兩

乾薑壹兩  
炮

甘草壹分  
炙

右十味搗篩為散每服四錢匕用水一中盞入生薑

五片棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

治妊娠損動胎氣腹內結痛血下不止運悶阿膠散方

阿膠炙

桑上寄生各貳兩  
續斷壹兩

熟乾地黃焙

白芷

人參各壹兩

右七味搗羅為散每服三錢匕煎青竹茹糯米湯調

下不拘時

治妊娠胎動下血不止臍腹疼痛櫻灰散方

櫻欄皮煨

原蠶沙炒各壹兩

阿膠炙

右三味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下不拘時

治妊娠胎動下血身體煩熱倦怠秦芫湯方

秦芫去苗

鹿角膠炙

地榆剉

甘草剉

芎藭各半

右七味搗篩每服五錢匕水一盞半糯米五十粒

煎至一盞去滓不拘時溫服

治妊娠胎動下血不止臍腹疔痛迷悶昏塞芍藥散方

白芍藥壹兩

牡蠣煨半兩

熟乾地黄煨半兩

木賊剉炒壹兩

烏賊魚骨去甲

乾薑地各半兩

右六味搗羅為散每服三錢匕米飲或溫酒調下食

前

治妊娠胎動不安下血不止臍腹疔痛烏賊魚骨散方

烏賊魚骨去甲壹兩

芎藭

龍骨

赤石脂各半兩

右五味搗羅為散每服二錢匕米飲或溫酒調下食

前

治妊娠胎動臍腹疔痛下血不止側柏丸方

側柏

芍藥各壹兩

代赭研

黃耆剉

木賊剉炒

芎藭

禹餘糧煨各半兩

右七味搗羅為末酒煮麵糊和丸如梧桐子大每服

二十九濃煎木賊酒下食前服

治妊娠胎動腹痛下血不止禹餘糧丸方

禹餘糧煨碎兩

木賊剉炒半兩

乾薑炮

龍骨

附子炮裂去皮臍各壹兩

白芷

當歸剉

芎藭各半兩

右八味搗羅爲末煮麵糊和丸如梧桐子大每服三十九溫酒下食前服

治妊娠胎動不安腹內疼痛下血不止伏龍肝湯方

伏龍肝

桑寄生

續斷

芎藭各壹兩

龍骨參分

當歸切

阿膠炙燉各壹兩

乾薑炮

甘草炙各壹兩

右九味麤擣篩每服五錢匕水一盞半入生薑三片

棗二枚擘破同煎至八分去滓空心食前溫服

治妊娠胎動下血不止當歸散方

當歸切

桑根白皮剉

續斷

芍藥

芎藭各壹兩

乾薑炮半兩

右六味搗羅爲散每服二錢匕酒調下不拘時

治妊娠胎動腹痛下血蠟酒方

蠟壹錢

右一味以清酒二盞煎三五沸投蠟令銷頓服

治妊娠胎動腹痛下血當歸飲方

當歸切

葱白細切壹握

右二味拌勻每服五錢匕酒一盞半煎至八分去滓

溫服

治妊娠卒胎動下血不止阿膠飲方

阿膠炙

熟乾地黃焙各  
貳兩

右二味麤搗篩每服三錢匕水酒共一盞煎至七分  
去滓溫服以效爲度

治妊娠胎動不安腰腹痛血下不止人參飲方

人參

芎藭

當歸焙切

阿膠炙

杜仲去鹽皮炙  
各貳兩 艾葉搗

熟乾地黃焙 甘草炙剉各  
壹兩

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半棗一枚擘煎  
至一盞去滓溫服不拘時

治妊娠胎不安卒下血不止當歸散方

當歸切

阿膠

蒲黃

熟乾地黃焙各  
參分 龍骨

芎藭

牛角燒灰各  
半兩

右七味搗羅爲散每服二錢匕煎艾湯調下米飲亦  
得

大德重校聖濟總錄卷第一百五十四

大德重校聖濟總錄卷第一百五十五

妊娠門

妊娠卒下血 妊娠胎萎燥

妊娠胎不長養 妊娠心痛

妊娠腹滿 妊娠腹痛

妊娠心腹痛

妊娠卒下血

論曰妊娠經血暴下少腹或痛者由冷熱之氣內擊於胞絡或舉重勞煩暴傷衝任之經其血忽下隨其經養而補之所下不已腰腹痛者其胎多墮

治妊娠卒下血胎動腹痛保血安胎膠艾湯方

阿膠炙令燥

芎藭

甘草炙各兩

艾葉炒

當歸切焙各參兩

芍藥

生乾地黄焙各肆兩

右七味搗羅為麤散每服五錢匕水一盞半煎至一

盞去滓稍熱服

治妊娠卒下血不止胎上逼心手足逆冷欲死艾葉湯方

生艾葉構紋取壹盞阿膠炙令燥半兩蜜壹合

右三味取艾葉汁一盞入阿膠及蜜二合煎取一盞去滓分為二服溫溫服之

治妊娠卒下血令胎不安臍腹撮痛蒲黃散方

蒲黃微炒當歸焙令香龍骨

阿膠炙令燥生乾地黃焙各半兩牛角觶者炙令焦

壹兩芎藭半兩

右七味搗羅為散研勻細每服二錢匕用煎艾煮米

飲調下食前服之

治妊娠卒然下血不定令胎不安小腹疼痛杜仲湯方

杜仲去麁皮剉人參壹兩阿膠炙令燥

芎藭壹兩當歸微炙艾葉壹把

右六味搗篩每服三錢匕酒一盞入棗三枚擘同

煎至七分去滓溫服相次三服腹中當暖即血止

治妊娠八九箇月或胎動不安因用力勞之心腹痛卒

然下血面目青冷汗出氣息欲絕釣藤湯方

釣藤去茯神去人參

當歸微炙枳梗炒桑上寄生壹兩



右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

温服

治妊娠驚胎勞傷心腹急痛卒下血胎動不安桔梗湯方

桔梗壹兩

茯神去木壹兩

人參兩

當歸炙剉兩

鈞藤皮壹分

桂去麤皮兩

獨活去蘆頭兩

芍藥剉兩

生乾地黄兩壹

桑上寄生微炒兩

石膏兩

甘草炙兩

右一十二味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分

去滓空心温服日三

治妊娠八九月或臨月因用力勞乏便即胎動忽然下

血心腹急痛面目青黑冷汗出氣息欲絕茯神湯方

茯神去木壹兩

熟乾地黄兩壹 甘草炙兩

鈞藤兩

桔梗炒

人參

當歸切兩

芍藥剉兩壹

右八味搗爲麤散每服三錢匕以水一盞煎至七分

去滓温服

治妊娠卒下血不止腹痛手足寒熱腰背痠疼半夏湯

方

半夏湯洗柒兩

麥門冬去心兩

甘草剉兩

當歸微炙

黃耆剉各壹兩半

阿膠炙令燥貳兩

人參壹兩

黃芩去黑心壹兩

旋復花兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞入葱白二寸生薑半分切同煎至七分去滓空心溫服

治妊娠胎動不安忽然下血寒熱往來腹痛如欲產手足煩悶麥門冬湯方

麥門冬去心焙貳兩

甘草炙

人參

生乾地黄焙

黃芩去黑心

阿膠炙令燥各壹兩

右六味搗為麤散每服三錢匕水酒各半盞入生薑半分切棗三枚擘同煎至七分去滓食前溫服

治妊娠卒下血致胎不安少腹疼痛人參湯方

人參

當歸切微炒

阿膠炙令燥各貳兩

甘草炙令亦

芍藥

黃芩去黑心

艾葉各壹兩

吳茱萸湯洗焙

生乾地黄微炒各貳兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑一棗大切同煎至七分去滓空心溫服日三

治妊娠卒下血胎動不安或連腰疼痛甘草湯方

甘草炙令亦

阿膠炙令燥各壹兩

生乾地黄焙半兩

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服

治妊娠卒下血胎不安少腹痛連腰人參湯方

人參

阿膠炙令燥

芎藭各壹兩

當歸切 炙

杜仲去鹽皮切 炒各貳兩

右五味廔搗篩每服三錢匕以水酒共一盞煎至七

分去滓食前溫服

治妊娠已數月卒然下血不定芎藭湯方

芎藭

當歸焙各貳兩

艾葉焙壹兩

甘草炙半兩

阿膠炙令燥壹兩

右五味廔搗篩每服三錢匕以水一盞煎至七分去

滓溫服

治妊娠卒下血不止方

艾葉如雞子大以酒三升煮取二升去滓分為兩服

不拘時溫服

治妊娠無故卒下血不絕方

阿膠貳兩

右一味以酒一升半煮膠令消分三服連併服之

治妊娠卒下血不止四肢厥冷悶絕欲死方

青竹茹搗大貳枚

艾葉

阿膠炙令燥各貳兩

白蜜合

右四味以水六升煮三味取二升去滓內蜜又煎一

沸分二服立差

治妊娠卒下血不止腰腹疼痛地黃艾葉湯方

熟乾地黃

焙

艾葉

炒各兩

人參

地榆

乾薑

地

阿膠

炒

當歸

切焙各兩

右七味蠶繭篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服不拘時

治妊娠卒下血腰腹疼痛當歸散方

當歸

切

桑寄生

續斷

各半兩

赤芍藥

壹分

右四味搗羅為散每服三錢匕空心食前溫酒調下  
有冷加乾薑一兩腹痛加芍藥一兩

妊娠胎萎燥

論曰人由受氣至於有生十二經脉迭相滋養猶之物  
也得寒溫之正土地之宜無物不長凡胎處胞中或有  
萎燥者蓋由妊婦所稟怯弱不足自周陰陽血氣偏餘  
非冷即熱胞胎失於滋利所以萎燥而不長也日月雖  
過不能生育亦有後時致失者惟宜資母血氣俾陰陽  
調通本末相應則胎從而有養矣

治妊娠胎萎燥羸瘦不長熟乾地黃湯方

熟乾地黄 焙 白朮

甘草 炙

白茯苓 去黑皮 阿膠 炙

木香 各壹兩

細辛 去苗 葉 人參

防風 去

白芷 各半兩

右一十味 麤搗篩 每服三錢匕 以水一盞 煎至七分

去滓 溫服 日三

治妊娠胞中虛冷 致胎萎燥 不長 艾葉湯方

艾葉 炒

芎藭

當歸 炙

乾薑 炮

白朮 各壹兩

右五味 麤搗篩 每服三錢匕 以水一盞 煎至七分 去

滓 溫服 日三

治妊娠胞中虛胎不榮 長致令萎燥 當歸湯方

當歸 切

甘草 炙

乾薑 炮

芎藭 各壹兩

白朮 貳兩

右五味 麤搗篩 每服三錢匕 以水一盞 入大棗三枚 擘破 同煎至七分 去滓 空心 溫服

治妊娠胎萎燥 漸覺羸劣 面色黃黑 腹藏虛冷 白朮湯

方

白朮 剉 貳兩

厚朴 去鹽 皮 生薑 汁 芎藭

芍藥

當歸 切

人參

甘草

炙 剉 去核 各半兩

右八味麤搗篩每服三錢匕以水一盞入生薑一分

煎至七分去滓溫服日三

治妊娠胎萎燥當歸飲方

當歸

芎藭

阿膠 炙 炮 各 參分

白朮

兩

右四味搗為麤末每服三錢匕以水一盞煎至七分

去滓溫服日三

治妊娠胎萎燥胎漏腹痛不可忍白朮當歸湯方

白朮

當歸

芎藭

人參

阿膠 炙 炮 各 兩

艾葉 焙 乾 壹兩

右六味麤搗篩每用五錢匕以水一盞酒半盞入棗

三枚拍碎同煎至一盞去滓分溫二服空心一服午

食前一服

治妊娠虛冷胎萎燥不長橘皮湯方

陳橘皮

湯浸去白

厚朴 去 麤皮 生薑 汁 炙 各 參分

當歸

人參

阿膠 炙 炮 各 壹兩

白朮

兩

右六味麤搗篩每服三錢匕以水一盞入生薑一分

切棗三枚擘破同煎至七分去滓溫服日三

治妊娠胎萎燥不能轉動心中急痛桑寄生湯方

桑寄生剉

白茯苓去黑皮

人參

萎蕤各壹兩

白朮貳兩

右五味麤搗篩每服三錢匕以水一盞入粳米半合

生薑一分切同煎至七分去滓溫服日三

治妊娠胎萎燥養胎榮血芎藭湯方

芎藭

艾葉去梗炒

當歸切焙

白朮各壹兩

甘草炙剉半兩

右五味麤搗篩每服三錢匕以水一盞煎至七分去

滓溫服日三

治妊娠胎萎燥過時未產滋氣血益胞藏熟乾地黃湯

方

熟乾地黃炒

當歸切焙

熟艾炒

芎藭各壹兩

阿膠炙燥

甘草炙剉各半兩

右六味麤搗篩每服三錢匕以水一盞煎至七分去

滓溫服日三

治妊娠胎萎燥全不轉動阿膠湯方

阿膠炙燥壹兩半

當歸切焙壹兩

甘草炙剉半分

白朮貳兩

右四味麤搗篩每服三錢匕以水一盞煎至七分去

洋溫服日三

妊娠胎不長養

論曰妊娠將理無方脾胃不足飲食減退不能行榮衛  
化精微養衝任故令胎藏內弱子氣不足生化稍虧巢  
元方謂母病藥母則胎安是也若使脾胃和而能飲食  
水穀化而運氣血則何慮胎氣不長也

治妊娠胎不長養白朮散方

白朮貳兩

芎藭

芍藥

人參

阿膠炙令燥  
各壹兩

甘草炙剉  
半兩

右六味搗羅為散每服三錢匕以葱粥飲調下日三

治妊娠養胎芎藭散方

芎藭

白朮各壹兩

蜀椒去目及閉口  
炒出汗參兩

牡蠣

煨研為粉  
半兩

右四味搗研為散每服二錢匕食前溫酒調下米飲

亦得

治妊娠氣血不足胎瘦不長乾地黃湯方

熟乾地黃

焙

阿膠米炒  
沸

芎藭

當歸

切米炒  
各貳兩

赤芍藥

甘草炙

人參各半兩

右七味搗篩每服三錢匕水一盞入粳米少許同



煎七分去滓溫服日三

治婦人血衰不足經候愷澁致子宮不榮妊娠多病胎不長成地黃丸方

熟乾地黃不拘多少

右一味切焙搗為末鍊蜜為丸如彈大每服一九空

心煎當歸酒嚼下溫酒亦得

治妊娠氣血虛弱令胎不長和氣養胎地黃芎藭丸方

熟乾地黃兩

焙壹分 芎藭參分

白茯苓去黑皮半兩

人參

當歸切焙各參分

此胡去黃芩各參分

刺藺

桑寄生焙乾各半兩 厚朴去蘆皮壹兩

龍骨

阿膠沸炒

白石脂各參分

黃耆剉半兩

甘草炙剉壹分

右一十四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九不計時候粥飲下日三

治妊娠胎不長安胎和氣思食黃耆湯方

黃耆剉

白朮

人參

麥門冬去心

陳橘皮湯去白焙各參分

芎藭半兩

白茯苓去黑皮壹分 前胡去蘆頭參分

甘草炙剉半兩

右九味麤搗篩每服三錢匕以水一盞入生薑二片

棗三枚煎至六分去滓食前溫服

治妊娠胎不長養胎人參丸方

人參

白茯苓去黑皮 當歸切

芫胡去苗

厚朴去蘆皮塗生薑汁炙各壹兩

枳殼去瓢炒參分

桑寄生焙 刺薊

阿膠炙燥兩

甘草炙兩

右一十味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三

十丸食前溫水下

妊娠心痛

論曰妊娠心痛者蓋因痰飲冷癖或風寒邪氣上乘於

心之別絡致攻擊疼痛休作有時若傷心之正經而痛者旦發則夕死夕發則旦死所以然者心為五官之主不受外邪故也

治妊娠心痛痰逆不思飲食沉香湯方

沉香剉壹兩

白豆蔻去皮各半兩

草豆蔻去皮各半兩

白朮剉炒

人參

白茯苓去黑皮各半兩

厚朴去蘆皮生薑汁炙壹兩

半夏半兩薄切生薑汁拌炒熱

陳橘皮湯浸去白焙參分

木香半兩

乾薑炮壹分

甘草炙半兩

右一十二味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片

棗一枚擘同煎至七分去滓稍熱食前服

治妊娠心痛煩悶地黃湯方

生乾地黄焙 淡竹筴剉各壹兩 桂去麤皮半兩

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎取一盞去

滓溫服不拘時

治妊娠心痛溫中調氣金粟湯方

粟米 半夏生薑汁浸伍宿切焙各貳兩

甘草炙壹兩 人參半兩 白朮

桂去麤皮各壹兩 檳榔剉碎

右七味麤搗篩每服二錢匕水一盞生薑三片煎六

分去滓溫服

治妊娠心痛竹筴湯方

青竹筴剉碎參兩

右一味麤搗篩每服三錢匕水一大盞煎七分去滓

溫服不拘時

治妊娠心痛不思飲食橘皮湯方

陳橘皮湯浸去白焙肆兩

厚朴去麤皮生薑汁炙剉 白朮各肆兩

甘草剉炒貳兩 草豆蔻去皮貳兩

右五味將葱一握細切拌藥卷一宿炒令黃色搗為

麤末每服二錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

治妊娠心膈脹滿不思飲食枳實湯方

枳實去穢

人參

赤茯苓去皮

芫胡去苗

木香炮

桂去粗皮

草豆蔻去皮各半兩

白木參分

檳榔生剉壹兩

右九味麤搗篩每服二錢匕水一盞煎取七分去滓

溫服不拘時

治妊娠心痛嘔逆不思飲食芎藭湯方

芎藭

甘草炒

芍藥

草豆蔻去皮

檳榔剉各貳兩

右五味麤搗篩每服二錢匕水一盞棗一枚擘生薑

三片煎至七分去滓溫服不拘時

治妊娠心痛脹滿胎不安大腹湯方

大腹皮剉

芎藭

赤茯苓去穢

陳橘皮湯浸去白焙

人參各一分

當歸焙切

苧麻根剉

紫蘇莖葉各壹兩

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎取一盞去

滓溫服不拘時

治妊娠心痛不可禁忍沉香湯方

沉香剉

厚朴去麤皮生薑汁炙壹兩

附子炮裂去

陳橘皮湯浸去白焙

甘草炙各半兩

白朮

芎藭各貳兩

右七味剉如麻豆每服二錢匕水一盞生薑三片棗

一枚擘同煎至六分去滓溫服

治妊娠心痛胸脘不利嘔吐冷痰七寶湯方

半夏半兩生薑汁浸透切炒

大腹皮剉

甘草炙

草豆蔻皮去

訶梨勒炮去核

白朮各壹兩

郁李人去皮分

木香半兩

乾姜去土炒

人參

白茯苓皮去黑

芎藭各壹兩

右一十二味麤搗篩每服二錢匕水一盞生薑三片

棗一枚擘同煎至七分去滓溫服

治妊娠心脾痛嘔逆不下食厚朴湯方

厚朴去麤皮剉生薑汁浸壹宿炒熟

白朮各肆兩

白芷貳兩

乾薑炮壹兩

甘草炙

益智炒去皮

陳橘皮切炒

縮砂炒去皮各貳兩

右八味麤搗篩每服二錢匕水一盞煎七分去滓溫

服不拘時候

治妊娠心痛時多痰逆飲食無味腹脹滿肉豆蔻湯

方

肉豆蔻人煨

附子去皮臍切鹽湯浸暴乾炒

縮砂炒去皮各半兩 木香壹分

白朮

芎藭各壹兩

右六味剉如麻豆每服二錢匕水一盞生薑三片煎

七分去滓溫服不拘時

治妊娠心痛胸膈不利不思飲食如聖散方

人參

白朮各壹兩

乾薑壹兩

丁香炒各半兩

縮沙人炒

檀香剉

桔梗炒各壹兩

胡椒炒壹分

甘草炙壹兩

右九味搗羅為散每服二錢匕鹽湯點服

治妊娠心痛腹脇脹滿不思飲食嘔逆不止人參飲方

人參

桑寄生

阿膠炒燥

陳橘皮去白焙

白茯苓去黑皮各壹兩 白朮

甘草炙

厚朴去麤皮生薑汁炙到各參分

右八味麤搗篩每服四錢匕水一盞半煎至七分去

滓溫服不拘時候

妊娠腹滿

論曰妊娠脾氣不和痰飲留滯則中焦生寒寒則胃受

水穀不能消化令人胃脹胃脹者腹滿也

治妊娠腹滿飲食遲化寬中勻氣建脾和胃白豆蔻丸

方

白豆蔻

去皮 貳兩

枳殼

用漿水煮令饑 去蠟焙乾半斤

陳橘皮

貳兩 醋漿水煮令饑 去白紙剉炒令黃色

訶梨勒

去核貳兩 壹兩煨壹

兩生用

木香

貳兩

當歸

切焙 貳兩

右六味搗羅為末將棗用漿水煮去皮核爛研和藥

九如梧桐子大每服二十九至三十九切生薑入鹽

炒焦黑色煎湯下不計時候

治妊娠腹滿兩肋妨悶不思飲食人參湯方

人參

厚朴

去麤皮生 薑汁炙

訶梨勒皮

煨取

阿膠

搗碎炒 令燥

赤茯苓

去黑皮 各壹兩

陳橘皮

湯浸去 白焙

白朮

各參分

甘草

炙壹分

右八味搗篩每服三錢匕以水一盞入生薑半分

切棗二枚擘同煎取七分去滓不計時候溫服

治妊娠腹滿脹急可進飲食利心胸止乾嘔丁香散方

丁香

壹分

白朮

蒼朮

各壹兩

前胡

去蘆頭

胡椒

高良薑

乾薑

炮

葛根

厚朴

去麤皮生薑 汁炙各半兩

藿香

訶梨勒

去核

旋復花

各壹分

甘草

炙貳兩

右一十三味搗羅為散每服二錢匕沸湯點服不計

時候

治妊娠腹滿氣衝胸膈煩悶訶梨勒飲方

訶梨勒煨去核 赤茯苓去黑皮 前胡去蘆頭

大腹皮剉 陳橘皮 桑根白皮剉各分

白朮 芎藭 枳殼麩炒去瓢各半兩

右九味麩搗篩每服三錢匕以水一盞入生薑半分

切棗二枚擘同煎取七分去滓溫服不計時候

治妊娠腹滿喘逆脹悶阿魏丸方

阿魏麩裏煨熟細研 丁香 木香

懷香子微炒 白芷 陳橘皮湯洗去白焙

檳榔剉 香附子炒各分 甘草炙剉

生薑去皮薄切暴乾各半兩

右一十味搗羅爲末鍊蜜和納三五百杵丸如櫻桃

大每服一丸爛嚼煎蘿蔔湯下溫酒或鹽湯生薑湯

下亦得此藥大能下氣療心腹虛脹

治妊娠腹脹不欲飲食厚朴煮散方

厚朴去麩皮生薑汁炙壹兩半 白朮

芎藭 乾薑炮 當歸切焙

訶梨勒煨去核 陳橘皮湯浸去白焙各壹兩

人參 芍藥各半兩 甘草炙壹分

右一十味麩搗篩每服三錢匕以水一盞入大棗二



枚擘煎取七分去滓不計時候稍熱服

治妊娠腹滿可思飲食勻氣利膈沉香散方

沉香

陳橘皮湯浸去人參各半

木香

茯苓去黑皮甘草炙各壹兩

白朮貳兩

右七味為細散每服二錢匕入鹽少許以沸湯點食

前服

治妊娠腹滿溫胃氣化冷痰利胸膈思飲食藿香丸方

藿香葉

木香各壹兩肉豆蔻去殼

丁香各半兩

半夏貳兩生薑汁浸參宿透切焙乾

右五味搗羅為末生薑汁煮麩糊和丸如梧桐子大

每服二十九食前生薑湯下

治妊娠腹滿少食多脹白朮湯方

白朮參兩

陳橘皮湯浸去白焙壹兩

木香半兩

甘草炙壹兩半

厚朴去麩皮生薑汁炙貳兩

丁香半兩

乾薑炮貳兩

半夏壹兩生薑汁浸壹宿切焙

乾

右八味麩搗羅篩每服三錢匕水二盞入生薑五片

同煎至一盞去滓不計時候溫服

治妊娠腹滿可思飲食嘔逆不止木香丸方

木香

莎草根炒去毛

蓬莪茂剉

青橘皮

湯浸去白焙

甘松各壹兩

甘草炙半兩

右六味搗羅爲末水浸炊餅和丸如彈丸大每服一丸濕紙煨生薑一塊如皂子大與藥同嚼溫湯下食

前服

妊娠腹痛

論曰妊娠藏府虛弱冒寒濕之氣邪氣與正氣相擊故令腹痛病不已則傷胞絡令胎不安治法宜祛散寒濕安和胎氣則痛自愈

治妊娠腹痛和氣思食治中滿薑茂湯方

薑黃

蓬莪茂蠟

藿香葉各壹兩

甘草

炙半兩

右四味麤搗篩每服二錢匕水一盞煎至六分去滓

溫服不拘時

治妊娠腹內疝痛如刀所刺人參湯方

人參

大腹參

檳榔參

枳殼

去穢炒

芍藥各肆兩

此胡去苗

附子

炮裂去皮

右七味剉如麻豆每服三錢匕水一盞半生薑三片

煎至八分去滓空心食前溫服

治妊娠腹痛脹悶芎藭散方

芎藭

當歸切焙

陳橘皮湯浸去白焙各壹兩

乾薑炮半兩

右四味搗羅為散每服二錢匕用糯米飲調下不拘

時

治妊娠內挾寒冷腹中疝痛安和胎氣黑神散方

杉木節半斤燒留性 乾薑壹兩燒留性

右二味搗羅為散溫酒調下一大錢匕不拘時

治妊娠腹痛不可忍安胎止痛芎藭散方

芎藭

當歸切焙各壹兩

右二味搗羅為散溫酒調下二錢匕不拘時

治妊娠腹痛一切氣疾枳殼丸方

枳殼貳兩漿水浸壹日去瓢煮令爛研作糊

木香炒壹兩

右二味將木香搗羅為末入枳殼糊內和丸如梧桐

子大每服二十九溫酒下不拘時

治妊娠腹痛疝刺安胎白朮湯方

白朮剉越炒 桂去蟲皮貳兩

陳橘皮湯浸去白焙貳兩半

厚朴去鹽皮生薑汁炙貳兩

甘草炙

芍藥

芎藭各壹兩

右七味麤搗篩每服二錢匕水一盞生薑三片棗一

枚擘破煎至六分去滓食前熱服

治妊娠腹痛不思飲食真白湯方

木香

沉香

丁香各壹分

芎藭

蓬莪茂煨

當歸切焙

芍藥剉

棟實炒去核

藜香子炒各半兩

甘草炙壹兩

益智去皮

陳橘皮湯浸去白焙各半兩

右一十二味麤搗篩每服三錢匕水一盞棗一枚擘

破煎至六分去滓食前溫服

治妊娠兩脇脹悶腹中疼痛嘔逆不思食妙薑丸方

乾薑炮

桂去粗皮

木香

沉香

當歸切焙

甘草炙

白豆蔻去皮

白茯苓去黑皮

青橘皮湯浸去白焙各半兩

芍藥剉壹兩

乾木瓜

薑黃各半兩

右一十二味搗羅為末湯浸蒸餅為丸如小彈子大每服一丸細嚼溫酒下食前服

治妊娠腹中冷痛丁香散方

丁香參

當歸切焙

蓬莪茂煨

益智去皮

甘草炙

芎藭

木香各壹分

青橘皮湯浸去白焙半兩

右八味搗羅為細末每服二錢匕沸湯調下食前服

治妊娠內積冷氣腹中切痛沉香散方

沉香剉半兩

蜀椒去閉口及目炒出汗壹分

甘草炙

烏藥剉

當歸切焙

芎藭各壹兩

右六味搗羅為末每服二錢匕溫酒調下熱湯亦得

不拘時

治妊娠羸瘦腰冷腹痛不欲食安胎澤蘭丸方

澤蘭

當歸切焙

桂去麤皮各貳兩

乾薑炮壹兩半

芎藭

阿膠炙令泔灑

蕪荑

藁本去苗土

石膏研

白芷

柏子人炒

人參

白朮

細辛去苗葉

甘草炙剉各壹兩

右一十五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

十五丸溫酒下日再服

妊娠心腹痛

論曰妊娠心腹痛者由妊娠失於將護外受風冷內挾宿寒邪客於心脾之經心之經手少陰是也脾之經從胃別上膈注心中是也二經為風冷宿寒所攻邪正交擊故令心腹俱痛久不差則妨害飲食耗弱氣血傷動胞絡

治妊娠心腹疼痛思進飲食桔梗丸方

桔梗壹兩

訶梨勒煨去核

木香各半兩

白朮

厚朴去鹽皮生薑汁炙各貳兩

細辛去苗葉半兩

右六味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九

溫米飲下食前服

治妊娠心腹痛胎動不安阿膠湯方

阿膠炙燥

芎藭

桑寄生

陳橘皮湯浸去白焙各壹兩

艾葉炒

枳實去軀麩沙各半兩當歸切焙參分

高良薑

甘草炙各壹分

右九味麤搗篩每服三錢匕以水一盞入棗二枚煎

至七分去滓不拘時稍熱服

治妊娠胃冷心腹刺痛氣逆嘔噦吳茱萸湯方

吳茱萸湯浸焙乾炒半兩

人參

厚朴去鹽皮生薑汁炙茯苓去黑皮

桔梗炒

當歸焙切

芍藥

芍藥各壹兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服日三

治妊娠心腹引痛當歸湯方

當歸切焙

桂去麩皮

乾薑炮

木香各半兩

草豆蔻去皮

陳橘皮湯浸去白焙

白朮

熟乾地黃焙各兩 芍藥分

右九味麤搗篩每服三錢匕以水一盞入棗二枚去

核煎取七分去滓稍熱服不拘時候

治妊娠心腹俱痛引脇肋妨悶不思食人參湯方

人參

厚朴去麩皮生汁炙 訶梨勒核去

阿膠炙令燥

赤茯苓去黑皮各壹兩 白朮

陳橘皮湯浸去白焙各參分

甘草炙壹

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑五片棗

二枚擘破煎取七分去滓溫服不拘時候

治妊娠心腹痛脇肋脹滿煩躁參朮湯方

人參

白朮

枳殼去麩炒

赤茯苓去黑皮各貳兩 檳榔煨剉參分

肉豆蔻去麩肆枚

此胡去苗壹兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片棗一

枚擘破煎至七分去滓食前溫服

治妊娠心腹氣攻疼痛當歸湯方

當歸切焙

麥門冬去心焙

芍藥

赤茯苓去黑皮

甘草炙各壹兩

大薊去

此胡參去苗各分

右七味搗篩為麤末每服三錢匕水一盞入生薑五

片棗三枚煎至八分去滓不計時候稍熱服

治妊娠冷氣攻心腹疼痛或不納飲食厚朴散方

厚朴貳兩去鹽皮生薑汁炙令香熟

陳橘皮壹兩湯浸去白麩焙

草豆蔻壹兩去皮

人參參分去蘆頭

芎藭參分

白朮參分

阿膠參分搗碎炒令黃燥

乾薑半兩炮裂炒

吳茱萸壹分用湯浸洗米泔曝乾微炒

訶梨勒壹兩煨用皮

甘草壹分炙微赤剉

右一十二味搗篩為麤散每服三錢匕以水一中盞

半入生薑三片大棗三枚擘去核同煎至一盞去滓不計時候稍熱服之日三服

治婦人妊娠心腹疼痛及兩脇肋內妨悶嘔逆惡心不止飲食不下體倦四肢少力或時發氣脹喘息羸大胎不安穩宜服大腹皮飲方

大腹皮剉參分

人參

赤茯苓去黑皮各壹兩

當歸焙切

枳殼去麩炒

此胡去苗

白朮各壹兩半

右七味搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片棗一枚擘煎至七分去滓溫服日三



治妊娠心腹痛面青汗出悶喘無力地黃飲方

生乾地黃焙

人參

當歸切

桑寄生

芍藥

赤茯苓去黑皮

桔梗剉炒各壹兩

桂去麤皮

釣藤剉

甘草炙剉各半兩

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片棗

一枚擘煎至七分去滓溫服日三

治妊娠心腹疼痛木香散方

木香

枳殼去麤殼炒

白芷

蓬朮茂剉

白朮炒

益智去皮炒

甘草炙各貳兩

桂去麤皮半兩

青橘皮湯浸去白焙

人參

京三稜煨剉各壹兩

右一十一味搗羅為散每服二錢匕不拘時候沸湯

調服

治妊娠心腹冷痛霍亂吐瀉木香和脾飲方

木香

丁香

白朮

甘草炙

芎藭

人參

草豆蔻去皮

沉香

大腹皮剉

訶梨勒煨去核各半兩

右一十味麤搗篩每服二錢匕水一盞入生薑五片

同煎至七分去滓溫服空心食前

治妊娠心腹痛芍藥散方

芍藥貳兩

白木壹兩

黃芩去黑心壹兩

陳橘皮湯去白壹兩 木香參分

丁香兩

右六味搗羅爲細散每服二錢匕空心炒生薑湯調下

治妊娠心腹痛祛散寒濕安和胎氣保生湯方

紫苑去苗

此胡去苗

龍骨

赤石脂各壹兩

艾葉炒

白木各參分

黃連去須

厚朴去麤皮生薑汁炙

阿膠炙令燥

枳殼去瓤炒

地榆壹兩

肉豆蔻去殼

益智去皮

乾薑炒

旋復花炒

黃芩去黑心各半兩

右一十六味搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八

分去滓溫服

治妊娠心腹疝痛當歸湯方

當歸切

甘草炙各壹兩

乾薑炮半兩

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞入棗二枚擘煎

至七分去滓溫服

治妊娠心腹氣脹疝刺疼痛胎不安鷄蘇飲方

鷄蘇

人參

赤茯苓去黑皮

大腹皮

芎藭各半兩

苧麻根兩壹

右六味剉如麻豆大每服三錢匕水一盞入生薑三片煎至七分去滓溫服

治妊娠心腹痛不能食白朮湯方

白朮

黃芩去黑心各壹兩

芍藥兩貳

右三味麤搗篩以水八盞煎至五盞去滓分溫五服

大德重校聖濟總錄卷之五十五