

本草備要

清 汪昂輯著



清 汪昂輯著

本草

本草綱目

商務印書館

本草備要

清 汪昂輯著

商務印書館出版

北京東總布胡同10號

(北京市書刊出版業營業許可證出字第107號)

新華書店總經售

商務印書館上海廠印刷

統一書號 14017·13

1918年2月初版

開本 787×1092 1/32

1955年4月重印第1版

印張 129/16

1968年6月上海第5次印刷

印數 23,001—35,000

定價(10) 1.30

出版說明

本書係清汪昂輯著，經謝觀等評校，於一九一八年初版印行，會再版十餘次。茲據原版，對照汪刻詳校一次，凡排印有錯誤的，均加改正；其經謝等校訂而與汪著有出入的，均仍其舊。

商務印書館一九五四年十二月

本草備要序

醫學之要。莫先於切脈。脈候不真。則虛實莫辨。攻補妄施。鮮不夭人壽命者。其次則當明藥性。如病在某經。當用某藥。或有因此經而旁達他經者。是以補母瀉子。扶弱抑強。義有多端。指不一定。自非兼貫博通。析微洞奧。不但呼應不靈。或反致邪失正。先正云。用藥如用兵。誠不可以不慎也。古今著本草者。無慮數百家。其中精且詳者。莫如李氏綱目。考究淵博。指示周明。所以嘉惠斯人之心。良云切至。第卷帙浩繁。卒難究殫。舟車之上。攜取爲難。備則備矣。而未能要也。他如主治指掌藥性歌賦。聊以便初學之誦習。要則要矣。而未能備也。近如蒙筌經疏。世稱善本。蒙筌附類。頗著精義。然文拘對偶。辭太繁縟。而闕略尙多。經疏發明主治之理。制方參互之義。甚者刊誤以究其失。可謂盡善。然未暇詳地

道明製治。辨真偽。解處偶有傳會。常品時多芟黜。均爲千慮之一失。余非岐黃家。而喜讀其書。三餘之暇。特爲諸家本草。由博返約。取適用者。凡四百品。彙爲小帙。某藥入某經治某病。必爲明其氣味形色。所以主治之由。間附古人畏惡兼施。制防互濟。用藥深遠之意。而以土產修治。畏惡附於後。以十劑宣通補瀉冠於前。既著其功。亦明其過。使人開卷瞭然。庶幾用之不致舛誤。以云備則已備矣。以云要則又要矣。通敏之士。由此而究圖焉。醫學之精微。可以思過半矣。題曰本草備要。用以就正於宗工焉。休寧訥庵汪昂題於延禧堂。

增補本草備要序

言之可貴而足以垂後者。必性命之文也。其次則經濟之文也。余於理學。既無所窺。又六經四子之書。燦如星日。卽漢疏宋註。且有遺譏。況余

愚瞽凡民。安敢以管蠡仰測高深也哉。性命之文。吾無及矣。若經濟之文。必須見諸實事。方能載諸簡編。余少困棘闈。壯謝制舉。長甘蓬蘽。終鮮通榮。經濟之文。吾無望焉耳。至於詞章詩賦。月露風雲。縱極精工。無裨實用。揚子所謂雕蟲篆刻。壯夫不爲。不其然乎。竊謂醫藥之書。雖無當於文章鉅麗之觀。然能起人沉疴。益人神智。弱可令壯。鬱可使寬。無關道脈。而能有助剛大之形軀。不係政刑。而實有裨生成之大德。言不墮綺語之障。用有當施濟之仁。羣居飽食之餘。或可以愧小慧而勝猶賢也乎。是用寄意此中。思以壽世。初則謂醫學與堪輿不同。堪輿當有祕奧。天機不欲輕泄。若醫集所以濟生救疾。自應無微不闡。無隱不彰。恣意極言。不遺餘蘊。及泛覽諸書。惟靈素難經。仲景叔和。奧衍宏深。不易究殫。自唐宋而下。名家百氏方書。非不燦陳。而義蘊殊少詮釋。如本

草第言治某病某病。而不明所以主治之由。醫方第云用某藥某藥。而不明所以當用之理。千書一律。開卷茫如。卽間有辨析病源。訓解藥性者。率說焉而不詳。語焉而不暢。醫理雖云深造。文字多欠通明。難以豁觀者之心目。良用憮然。不揣固陋。爰採諸家之長。輯爲本草備要醫方集解二篇。理法全宗古人。體裁更爲創制。本草則字箋句釋。倣傳註之詳明。醫療則詮證釋方。兼百家之論辨。書分兩帙。用實相資。要令不知醫之人。讀之瞭然。庶裨實用。兩書甫出。幸海內名賢頗垂鑑許。今本草原刻字已漫滅。特再加釐訂。用酬世好。抑世尙有議余藥味之簡者。余惟歌賦湯液藥。僅二百四十種。拙集廣至四百種。不爲少矣。如食物僅可充口腹。僻藥非治所常需者。安能盡錄。蓋旣取其備。又欲其要。應如是止也。茲因重梓。更增備而可用者約六十品。聊以厭言者之口。仍不

礙攜者之艱。苟小道之可觀。倘不至致遠之恐泥也乎。

康熙甲戌歲陽月。休寧八十老人。詔庵汪昂書於延禧堂。

本草備要凡例

(一) 註本草者。當先註病證。不然。病之未明。藥於何有。從前作者罕明斯義。第云某藥入某經治某病而已。淺術視之。蓋茫如也。唯李氏綱目。哀集諸家。附著論說。間及病源。經疏因之。釋藥而兼釋病。補前人之未備。作後學之指南。茲集祖述二書。更加增訂。藥性病情。互相闡發。以便資用。若每處皆釋。則重複煩瑣。反生厭瀆。故前後間見。或因藥論辨。讀者彙觀而統會之可也。

(二) 藥品主治。諸家析言者少。統言者多。如治痰之藥。有治燥痰者。有治溼痰者。諸書第以除痰槩之。頭痛之藥。有治內傷頭痛者。有治外感頭痛者。諸書唯言治頭痛而已。此皆相反之證。未可混施。舉此二端。其餘可以類推矣。又每藥之下。止言某病宜用。而不言

某病忌用。均屬闕略。茲集並加詳註。庶無貽誤。

(一) 每藥先辨其氣味形色。次著其所入經絡。乃為發明其功用。而以主治之證。具列於後。其所以主治之理。即在前功用之中。不能逐款細註。讀者諒之。

(二) 徐之才曰。藥有宣上行、升下、通、補、瀉、澇、滑、燥、溼溼即潤也、輕、重十種。是

藥之大體。而本經不言。後人未述。凡用藥者。審而詳之。則靡所遺

失矣。今為分闡。以冠於諸藥之首。此十劑也。陶宏景加寒熱二劑。茲不具述。然本集燥劑即陶氏

之熱劑。通劑乃徐氏之燥劑。而寒劑則多寓於瀉劑也。

(一) 藥品主治。已註明入某臟某腑者。則不更言入某經絡。以重複無用也。

(二) 藥品稍近遐僻者。必詳其地道形色。如習知習見之藥。則不加

詳註。

(一)陰陽升降浮沉。已詳於藥性總義中。故每品之下。不加重註。

(二)藥目次第。每藥稍從其類。以便查閱。

(一)先哲名言。有言以人重者。有人以言重者。須當仍其名氏。庶乎後學知所稟承。或是或非。有可裁斷矣。奈何醫集之中。率掠古人之言。混入己作。使讀者蒼黃莫辨。涇渭難分。習俗移人。賢者不免。甚有合數人之言。砌掇成篇。首尾欠貫。詞意多乖。以故醫學每鮮佳編。良深慨息。本集採用諸家。悉存原名。使可考據。間有刪節數行數句者。以限於尺幅也。有增改數句數字者。務暢其文義也。亦有錄其言而未悉其名氏者。以藏書既寡。目力不充。難於盡考也。或時附入鄙見。必加昂按二字。以聽時賢之論定。其間旁搜遠討。

義圖貫通。取要刪繁。詞歸雅飭。庶幾豁觀者之心目云耳。

(一)是書篇章雖約。多有補綱目經疏之所未備者。故曰備也。

(二)藥有氣味形色經絡主治功用禁忌數端。藥性歌賦雖便記誦。然限於字句。又須用韻。是以不能詳括。茲集文無一定。藥小者語簡。藥大者詞繁。然皆各爲杆軸。煅煉成章。使人可以誦讀。

(三)本草一書。讀之率欲睡欲臥。以每藥之下。所註者不過臟腑經絡甘酸苦瀉寒熱溫平升降浮沉病候主治而已。未嘗闡發其理。使讀之者有義味可咀嚼也。卽如證類諸本。採集頗廣。又以衆說繁蕪。觀者罔所折衷也。是編主治之理。務令詳明。取用之宜。期於確切。言暢意晰。字少義多。作者頗費匠心。讀者幸毋忽視。

(四)是書之作。不專爲醫林而設。蓋以疾疢人所時有。脫或處僻小

本草備要目錄

卷一 草部

黃耆

甘草

人參

沙參

丹參

玄參

白朮

蒼朮

萎蕤

黃精

狗脊

石斛

遠志

石菖蒲

牛膝

甘菊花

五味子

天門冬

麥門冬

款冬花

紫菀

旋覆花

百部

桔梗

薺苳

馬兜鈴

白前

白芨

半夏

天南星

貝母

栝樓仁

天花粉

夏枯草

海藻

昆布

獨活

羌活

防風

藁本

葛根

升麻

白芷

細辛

柴胡

前胡

麻黃

荆芥

連翹

紫蘇

薄荷

雞蘇

木賊

浮萍

蒼耳子

天麻

秦艽

豨薟草

威靈仙

鈎藤鈎

茵芋

當歸

芍藥

白芍藥

生地黃

乾地黃

熟地黃

何首烏

牡丹皮

續斷

骨碎補

益母草

澤蘭

白薇

艾葉

延胡索

紅花

茜草

紫草

凌霄花

大小薊

三七

地榆

蒲黃

卷柏

菴藟

菴藟子

鬱金

薑黃

蓬莪朮

荊三稜

白茅根

蘆根

苧麻根

薔薇根

芭蕉根

大黃

黃芩

黃連

胡黃連

苦參

知母

龍膽草

青黛

大青

牽牛

防己

葶藶

甘遂

大戟

商陸

芫花

萹花

澤漆

常山

藜蘆

木通

通草

澤瀉

車前草

燈草

瞿麥

篇蓄

天仙藤

地膚子

石韋

海金沙

茵陳

香薷

青蒿

附子

草烏頭

白附子

破故紙

肉蓯蓉

鎖陽

巴戟天

胡盧巴

仙茅

淫羊藿

蛇牀子

菟絲子

覆盆子

蒺藜子

使君子

益智子

砂仁

白豆蔻

肉豆蔻

草豆蔻

香附

木香

藿香

茴香

甘松香

山柰

高良薑

萹荑

煙草

金銀花

蒲公英

紫花地丁

土牛膝

鶴蝨

山豆根

牛蒡子

山慈姑

漏蘆

貫衆

射干

續隨子

馬蘭子

蓖麻子

白頭翁

王瓜

王不留行

冬葵子

白鮮皮

葶藶

土茯苓

白蘇

預知子

旱蓮草

劉寄奴草

馬鞭草

穀精草

青葙子

決明子

蓼實

馬勃

木鱉子

卷二 木部

茯苓

茯神

琥珀

松節

柏子仁

側柏葉

肉桂

桂心

桂枝

枸杞子

地骨皮

山茱萸

酸棗仁

杜仲

女貞子

楮實

桑白皮

桑寄生

梔子

豬苓

黃蘗

枳實枳殼

厚朴

檳榔

大腹皮

槐實

苦楝子

蔓荊子

石南葉

辛夷

郁李仁

金櫻子

訶子

烏藥

五加皮

椿樗白皮

榆白皮

秦皮

海桐皮

蕤仁

密蒙花

芙蓉花

山茶花

木槿

杉木

烏臼木

水楊柳

皂角

肥皂莢

椶櫚

茶

吳茱萸

川椒

胡椒

蘇木

沉香

檀香

紫檀香

降真香

丁香

乳香

沒藥

楓脂香

冰片

樟腦

蘇合香

血竭

阿魏

蘆薈

胡桐淚

燕夷

沒石子

衛矛

漆

巴豆

大風子

荆瀝

竹瀝

竹茹

淡竹葉

天竹黃

雷丸

赤檉柳

卷三 果部

大棗

桃仁

杏仁

烏梅

栗

陳皮

青皮

柿乾

木瓜

山查

梨

枇杷葉

橄欖

白果

石榴皮

枳椇子

胡桃

龍眼肉

荔枝核

榧實

海松子

落花生

蓮子

蓮蕊鬚

藕

荷葉

芡實

甘蔗

荸薺

菱

西瓜

卷四 穀菜部

粳米

糯米

穀芽

大麥芽

小麥

稷

粟

蕎麥

黑大豆

赤小豆

綠豆

白扁豆

淡豆豉

刀豆

胡麻

大麻仁

薏苡仁

御米殼

神麴

紅麴

醋

酒

韭

蔥

大蒜

薤

胡荽

生薑

乾薑黑薑

山藥

百合

萊菔

白芥子

蔓菁子

薑薑

馬齒莧

甜瓜蒂

冬瓜

絲瓜

茄根

卷五 金石水土部

金

銅綠

自然銅

鉛

鐵

密陀僧

丹砂

水銀

輕粉

空青

雲母

石膏

滑石

朴硝芒硝

玄明粉

太陰玄精石

赤石脂

禹餘糧

浮石

礪砂

礪砂

磁石

礪石

代赭石

花蕊石

爐甘石

陽起石

石鍾乳

白石英

紫石英

雄黃

石硫黃

石蟹

無名異

礬石

砒石

石灰

白礬

膽礬

皂礬

青鹽

食鹽

急流水

逆流迴瀾水

甘瀾水

井泉水

百沸湯

陰陽水

黃蘗水

露水

臘雪水

冰

地漿

孩兒茶

百草霜

墨

伏龍肝

鹼

卷六 禽獸部

雞

烏骨雞

鴨

五靈脂

本草備要卷一

清休寧汪 昂詵庵著

武進謝 觀 鎮海董豐 培 兆基 評校

草部

黃耆 補氣固表瀉火

甘溫生用固表無汗能發有汗能止朱丹溪曰黃耆大補陽虛自汗若表虛有邪發汗不出者服此

又能自汗○朱震亨溫分肉實腠理瀉陰火解肌熱灸用補中益元

氣溫三焦壯脾胃脾胃一虛上不能生金則肺氣先絕脾胃緩和小生

血生肌氣能生血血充則肉長經曰血生肉是也排膿內托瘡癰聖藥毒氣化則成膿補氣故能內托癰疽

不能成膿者死不治毒氣新安汪機治痘證不起陽虛無熱者宜之痘證虛寒不

起用四君子湯加黃耆紫草多效問有枯萎而死者自咎用藥之精思之至忘寢食忽悟曰白朮燥溼茯苓滲水宜痘漿之行也乃

減去二味加官桂糯米以助其力因名保元湯人參白朮茯苓甘草名四君子湯王好古曰黃耆實衛氣是表藥益脾胃是中州藥治傷

寒尺脈不至補腎元是裏藥。頸權謂其補腎者氣為水母也。日華謂其止崩帶者氣盛則無陷下之憂也。蒙荃曰補氣藥多補血藥亦從而補氣。補血藥多補氣藥亦從而補血。益氣湯雖加當歸因勢寡。功被參耆所據。補血湯數倍於當歸亦從當歸所引而補血。黃耆一兩當歸二錢名補血湯。氣藥多而云補血者氣能生血。又有當歸為引也。○表旺者不宜用陰虛者宜少用。恐升氣於表而裏愈虛矣。○汪機號石山著本草會編。○王好古號海藏著湯液本草。○甄權著藥性論。○陳日華著大明本草。○陳嘉謨著本草蒙荃。為補藥

之長。故名耆。俗作芪。皮黃肉白。堅實者良。入補中藥。槌扁。蜜炙。達表生

用。或曰補腎及治崩帶淋濁宜鹽水浸炒。昂按此說非也。前證用黃耆非欲抑黃耆使入腎也。取其補中升氣則腎受蔭而帶濁崩淋

自止。即日華所謂氣盛自無陷下之憂也。有上病而下取。有下病而上取。補彼經而益及此經者。此類是也。茯苓為使。惡

龜甲白鮮皮畏防風。李東垣曰黃耆得防風其功益大。乃相畏而更以相使也。○李東垣著用藥法象。

甘草。有補有瀉。能表能裏。可升可降。

味甘。生用氣平。補脾胃不足而瀉心火。火急甚者必以此緩之。炙用氣溫。補三

焦元氣而散表寒。入和劑則補益。入汗劑則解肌。解退熱。入涼劑則

瀉邪熱。白虎湯類。入峻劑則緩正氣。蓋附加之。恐其峻下。皆緩之之意。加入

潤劑則養陰血。炙甘草類。能協和諸藥。使之不爭。生肌止痛。土主肌肉。甘能緩痛。

通行十二經。解百藥毒。凡解毒藥。並須冷飲。熱則不效。小兒初生。故

有國老之稱。中滿證忌之。甘令人滿。亦有生用為瀉者。以其能引諸

已。故別錄甄權並云。除滿脾健。運則滿。除也。仲景治痞滿。有甘草瀉心湯。又甘草得茯苓。則不資滿。而反泄滿。○陶宏景著明醫別錄。發

性。明藥。大而結者良。補中灸用。瀉火生用。達莖中。莖。腎。用梢。梢。止痛。瀉。發

之用。白朮苦參乾漆為使。惡遠志。反大戟芫花甘遂海藻。然亦有並用

者。胡洽治痰癖。十棗湯加甘草。東垣治結核。與海藻同用。丹溪治勞

途大戟等分。棗十枚。仲景治傷寒表已解。心下有水氣。喘欬之劑。李

時珍曰。甘草外赤中黃。色兼坤離。味濃氣薄。資全十德。協和羣品。有

元老之功。善治百邪。得王道之化。贊帝力而人不知。參神功而已。不

氣補中瀉火解毒諸劑皆倚甘草為君必須重用方能建效此古法也奈何時師每用甘草不過二三分而止不知始自何人相習成風附記於此以正其失

人參 大補元氣瀉火

生甘苦微涼。甘補陽微苦微寒。又能補陰。熟甘溫。大補肺中元氣。李東垣曰肺主

藏之氣皆旺。精自生而形自盛。十劑曰補可去瀉。火瀉得升麻補上焦

補下焦瀉腎火得麥冬瀉火而生脈得黃耆甘草乃甘溫退大熱李

東垣曰參者甘草瀉火之聖藥合用名黃耆湯按煩勞則虛而生熱

得甘溫以益元氣而邪熱自退故亦謂之瀉。益土。生金。明目。開心益智。添精神。定驚

悸。邪火退正氣旺則除煩渴。瀉火故除煩。通血脈。氣行則血行。賀汝

者以其通經活血則脈自生也。古方解散破堅積。氣運則消痰水。旺

則痰行。治虛勞內傷。傷於七情六欲飲食作勞為內傷。傷於風寒暑

甚無休內傷惡寒得暖便解外感惡寒架火不除內傷頭痛則口淡

歇外感頭痛連痛無停內傷則手心熱外感則手背熱內傷則口淡

無味。外感則鼻塞不通。內傷則氣口脈盛。多屬左人迎。主溫宜補氣口。
 外感則人迎脈盛。多屬右人迎。主散。每用潤肺。
 主裏也。昂按東垣辨內傷外感最詳。恐人以治外感者治內傷也。今
 人緣東垣之言。凡外傷風寒發熱。欬嗽者。概不輕易表散。每用潤肺。
 退熱藥。間附秦艸。蘇梗。柴胡。少陽藥。於太陽。有味。而羌活。防風。等絕不
 不思。秦艸。陽明藥。柴胡。少陽藥。於太陽。有味。而羌活。防風。等絕不
 熱不止。變成虛損。殺人多矣。此又發熱自汗。自汗屬陽虛。盜汗屬陰
 以內傷治外感之誤也。附此正之。又發熱自汗。自汗屬陽虛。盜汗屬陰
 反盛者。以陽盛陰虛。陽愈補而陰愈虧也。又宜清熱養血而汗自止。多夢紛紜。嘔噦反胃。虛欬喘促。
 愈虧也。又宜清熱養血而汗自止。多夢紛紜。嘔噦反胃。虛欬喘促。
 曰。歌有肺熱還傷肺之句。惟言寒熱不辨。虛實若肺中實熱者。忌之。
 虛熱者。服之何害。又曰。諸痛無補法。不用參耆。若久病虛痛。何嘗忌之。
 此。瘡痢滑瀉。始病宜下。久病宜補。治瘧意同。朱丹溪曰。葉先生患痢
 耶。必過飽。傷胃。與參朮陳芍十餘帖。三日後。胃氣稍完。再與承氣湯。
 二帖而安。又曰。補未至而下。則病者不能當補。已至而弗下。則藥反
 添病。匪急匪徐。其間不容髮。噫。微哉。昂按。此先補後下法之變者。
 也。非胸有定見者。不可輕用。然後學亦宜知之。大承氣湯。大黃。芒。硝。者
 厚。實。淋瀝脹滿。發明曰。胸脇逆滿。由中氣不足。作脹者。宜補之。而脹
 積。實。淋瀝脹滿。發明曰。胸脇逆滿。由中氣不足。作脹者。宜補之。而脹
 厚。實。淋瀝脹滿。發明曰。胸脇逆滿。由中氣不足。作脹者。宜補之。而脹
 所以少導之也。○皇甫嵩著本草發明。中暑中風。及一切血證。曰。李東垣
 所以少導之也。○皇甫嵩著本草發明。中暑中風。及一切血證。曰。李東垣

治大吐血脈洪者並用人參脫血者先益其氣蓋血不自生須得生陽氣之藥乃生陽生則陰長之義也若單用補血藥血無由而生矣凡虛勞吐血能受補者易治不能受補者難治黃潤緊實似人形者良去蘆用補劑用熟

瀉火用生煉膏服能回元氣於無何有之鄉有火者天冬膏對服參生時背陽

向陰不喜風日宜焙用忌鐵茯苓爲使畏五靈脂惡皂莢黑豆紫石

英人洩鹹鹵反藜蘆言聞曰東垣理脾胃瀉陰火交泰丸內用人參卓莢是惡而不惡也古方療月閉四物湯加人

參五靈脂是畏而不畏也又療痰在胸膈人參藜蘆同用而取其涌越是激其怒性也非洞奧達權者不能知

人參蘆能涌吐痰涎體虛人用之以代瓜蒂朱丹溪曰人參入手能

瀉太陰之陽亦納麻黃根苗不同痰在上隔在經絡非吐不可吐中就有發散之義一婦性躁味厚暑月因怒而病呃作則舉身跳動昏

不知人其人形氣俱實乃痰因怒鬱氣不得降非吐不可以參蘆半兩逆流水煎服吐頑痰數碗大汗昏睡而安

沙參 補陰瀉肺火

甘苦微寒味淡體輕專補肺氣清肺養肝兼益脾腎脾爲肺母久嗽

肺痿。金受火尅者宜之。寒客肺中作嗽者勿服。人參補五臟之陰。肺熱沙

者用之以代人參。似人參而體輕鬆白實者良。生沙地者長大。生黃土者瘦。

小畏防己。反藜蘆。北地真者難得。鄭奠一曰。能療胸痹心腹痛。邪熱結去皮膚游風疥癬惡瘡疝氣崩帶。

丹參。補心生血去瘀。

氣平而降。本經微寒。宏景曰。性應熱。味苦色赤。入心與包絡。破宿血。生新血。瘀去

新安生胎。養血。墮死胎。去瘀。調經脈。風寒溼熱。變傷營血。則經水不調。先

滯痰阻之不同。大抵婦人之病。首重調經。經調則百病散。除煩熱。功兼四物。一味丹參散。為女科

要藥。治冷熱勞。骨節痛。風痺不隨。手足緩散。不隨人用。經曰。足腸鳴

腹痛。崩帶癥瘕。音征。加。瘕者有塊。可徵。瘕者。假也。移動聚散無常。皆血病。血虛血瘀之候。又治目

赤疝痛。瘡疥腫毒。排膿生肌。鄭奠一曰。丹參養神定志。通利血脈。實有神驗。畏鹹水。忌醋。反

藜蘆。

玄參

補水。瀉無根之火。

苦鹹微寒。色黑入腎。能壯水以制火。散無根浮游之火。腎水受寒。真陰失守。孤陽

無根。發為火病。益精明目。利咽喉。通二便。治骨蒸傳屍。傷寒陽毒發斑。陰亦有證

發斑者。懊懣不舒。煩渴。溫瘧灑灑。喉痹咽痛。本腎藥而治上焦火證。壯水以制火也。腎脈貫肝膈。

入肺中。循喉嚨。系舌本。腎虛則相火上炎。此喉痹咽腫。欬嗽吐血之

所由來也。潮熱骨蒸。亦本於此。○此與黃耆能治下焦帶濁崩淋同

義。瘰癧結核。寒散火。癰疽鼠瘦。漏。脾虛泄瀉者。忌用。蒸過焙用。勿犯

白朮。補脾。燥溼。

苦燥溼。經曰。脾苦溼。急食苦以燥之。甘補脾。溫和中。在血補血。在氣補氣。同補血藥

同氣藥。無汗能發。有汗能止。溼從汗出。溼去汗止。止汗同味。燥溼則能

利小便。生津液。既燥溼而又生津何也。汪機曰。脾惡溼。溼勝則氣不

津液。止泄瀉。○凡水瀉溼也。腹痛腸鳴而瀉。火也。○水火相激則在腸鳴。

生矣。○痛甚而瀉。瀉而痛減者食也。完穀不化。氣虛也。在傷

寒。下利則為邪熱不殺穀也。久瀉名脾泄。腎虛而命火衰不能生土

也。有積痰壅滯。肺氣不能下降。大腸虛而作瀉者宜豁痰。有傷風泄

瀉者宜散風。如脾虛溼瀉者宜消痰水腫滿。黃疸溼痹。補脾則能進

白朮。凡治瀉丸散優於湯劑。飲食。祛勞倦。脾主四肢。止肌熱。脾主

為丸。脾運則積化也。和中則能已嘔吐。定痛安胎。同黃耆則安胎。黃芩除胃熱。

則積化也。和中則能已嘔吐。定痛安胎。同黃耆則安胎。黃芩除胃熱。

間血。蓋胎氣繫於脾。脾虛則帶無所附。故血燥。無溼者禁用。能生膿。

易落。和腰臍血者。溼除則血氣流行也。作痛潰瘍。忌之。朮閉氣。故也。凡脹滿者忌用。白

朮。燥白者出宣歙。名狗頭朮。差勝於浙。用糯米泔浸。借殺氣。陳壁土

炒。藉土氣。或蜜水炒。人乳拌用。潤以制其燥。千金方曰。有人病牙齒

愈。朮。補脾。燥溼。宜升陽散鬱。

甘溫辛烈燥胃強脾發汗除溼能升發胃中陽氣李東垣曰雄壯上

陰使邪氣不傳入脾許叔微曰蒼朮能治水飲之辟囊蓋燥脾止吐瀉逐痰水以去溼崇土以填科日用蒼朮一助大棗

五十枚朱丹溪曰實脾土燥脾溼洵是治痰之本消腫滿辟惡氣辟

神丸朱丹溪曰實脾土燥脾溼洵是治痰之本消腫滿辟惡氣辟

子切風燥邪惡鬼氣著溼月焚之佳夷堅志曰有士人遊西湖遇女子

疾而亡今非人也但君浸陰氣深當暴瀉宜服平胃散以補安精血

士驚愧曰藥味皆平何得取效女散風寒溼為治痿要藥宗陽明虛則

帶脈不引故痿歷為二妙散加牛膝名三妙散又能總解痰火氣血

取陽明合黃藥為二妙散加牛膝名三妙散又能總解痰火氣血

溼食六鬱朱丹溪曰諸鬱皆因傳化失常氣不得升降病在中焦將

附蒼朮能徑入諸經疎泄陽明之溼通行斂滯及脾溼下流腸風帶

濁帶濁赤者溼傷血分從心小腸來白者溼傷氣分從肺大腸燥結

多汗者忌用南陽文氏值亂逃往壺山腹飢因有人教以餌朮遂不

名山薑導仙錄曰子欲長生當服山精子欲輕翔當服山蕒昂按蒼
朮善發汗安能長遠服食文氏仙錄之說要亦方書誇張之言也

出茅山堅小有硃砂點者良糯米泔浸焙乾同芝麻炒以制其燥二

朮皆防風地榆為使主治略同第有止汗發汗之異古文本草不分

蒼白陶隱君即宏言有兩種始各施用

萎蕤平補而潤去風溼

甘平補中益氣潤心肺悅顏色除煩渴治風淫溼毒目痛背爛風溼寒

熱痞瘡詩廉切亦瘧也中風暴熱不能動搖頭痛腰痛凡頭痛不止者屬

乍止者屬內傷宜補虛又有偏頭痛者左屬風與血虛右屬痰熱與
氣虛腰痛亦有腎虛氣滯痰積血瘀風寒溼熱之不同凡挾虛挾風

溼者宜按昂莖寒自汗一切不足之證用代參者不寒不燥大有殊功

萎蕤溫潤甘平中和之品若蜜製作丸服之數斤自有殊功與服之
首烏地黃者同一理也若僅加數分於煎劑以為可代參者則失服之

遠矣大抵此藥性緩久服方能見功而所主者多風溼虛勞之緩證
故羅仙以之服食南陽用治風溫千金外臺亦間用之未嘗特之為

重劑也。若急虛之證，必須參耆，方能復脈回陽。斯時即用萎蕤斤許，亦不能敵參耆數分也。時醫因李時珍有可代參耆之語，凡遇虛證，輒加用之，曾何益於病者之分毫哉。拙著方解，欲採萎蕤，似黃精而古方可以入補劑者，終不可得，則古人之罕用，亦可見矣。

差小黃白多鬚。二藥功用相近。竹刀刮去皮節，蜜水或酒浸蒸用。畏

鹹鹵。陶宏景曰：本經有女萎，無萎蕤，別錄有萎蕤，無女萎，功用正同，疑名異爾。

黃精。平補而潤。

甘平。補中益氣，安五臟，益脾胃，潤心肺，填精髓，助筋骨，除風溼，下三

蟲。以其得坤土之精粹，久服不飢。氣滿則不飢，脂川有人，虐使婢

飢夜宿樹下，見草動疑為虎，上樹避之，及曉而下，凌空若飛鳥，家人探薪見之，告其主，設網捕不得，或曰：此豈有仙骨，不過服食靈藥耳。

遠設酒饌於路，果來食之，食訖遂不能去，謫而詢之，指所食之草，乃黃精也。俗名山生薑。九蒸九曬用。家仙

以為芝草之類，服之長生。

狗脊。平補肝腎。

苦堅腎。甘益血。能強溫養氣。治失溺。不節。腎虛腳弱腰痛。寒溼周痹。曰經

內不在臟腑。而外未發於皮。獨居除風虛。強機關。利俛仰。滋腎益肝。則骨健而

筋強。有黃毛如狗形。故曰金毛狗脊。去毛切。酒拌蒸。草薺為使。熬膏良。

石斛 平補脾胃。

甘淡入脾。而除虛熱。鹹平入腎。而瀉元氣。益精強陰。暖水臟。平胃氣。

補虛勞。壯筋骨。療風痺。腳弱。發熱自汗。夢遺滑精。囊澀餘瀝。雷斅曰。石斛鎮

髓。昂按。石斛。石生之草。體瘦無汁。味淡難出。置之煎劑。猝難見功。必須熬膏。用之為良。光澤如金。釵股短而中

實。生石上者良。名金釵石斛。長而虛者名水斛。不堪用。去頭根。酒浸

用。惡巴豆。畏殭蠶。細剉水浸。熬膏更良。

遠志 補心腎。

苦洩熱。溫壯氣。辛散鬱。主手少陰。心。能通腎氣。上達於心。強志益智。

補精壯陽。聰耳明目。利九竅。長肌肉。助筋骨。治迷惑善忘。驚悸夢洩。

能交心腎。李時珍曰。遠志入足少陰腎經。非心經藥也。強志益精。故治健忘。蓋精與志皆藏於腎。腎精不足。則志氣衰。不能上通於心。故

健忘夢洩也。腎積奔豚。一切癰疽。酒煎服。經疏曰。癰疽皆屬七情憂鬱。憤

者多矣。何獨遠志。三因曰。蓋亦補腎之力耳。○繆希雍著本草經疏。去心甘草水浸一宿用。畏眞珠藜

蘆。得茯苓龍骨良。

石菖蒲。宜通竅補心。

辛苦而溫。芳香而散。補肝益心。開心孔。利九竅。明耳目。發音聲。去溼

逐風。除痰消積。開胃寬中。療噤口毒痢。楊士瀛曰。噤口雖屬脾虛。亦

溫。山藥失之閉。唯參苓白朮散加高蒲米飲下。胸次一開。自然思食。○菖蒲黍米酸酒治一切風。風痹驚癩。崩帶胎

漏。消腫止痛。解毒殺蟲。李士材曰。仙經稱爲水草之精。英神仙之靈

有殊常之效。又曰。芳香利竅。心脾良藥。能佐地黃天冬之屬。資其宜導。若多用。獨用亦耗氣血而爲殃。○李士材著藥性解。本草通玄。宜

根瘦節密。一寸九節者良。去皮微炒用。秦朮爲使。惡麻黃。忌飴糖羊

肉鐵器。

牛膝。補肝腎。瀉惡血。

苦酸而平。足厥陰少陰經藥。能引諸藥下行。酒蒸則甘酸而溫。益

肝腎強筋骨。治腰膝骨痛。足痿筋攣。筋舒血行則痛止。陰

痿失溺。久瘡下痢。傷中少氣。生用則散惡血。

破癥結。治心腹諸痛。淋痛尿血。淋瀝餘瀝勞淋房勞即發。

冷淋寒戰後溲。齊淋便出如膏。石淋精結成石。尿血即淋也。鮮色

者。心與小腸實熱。色於者。腎與膀胱虛冷。張子和曰。石淋乃肝經移

熱於胞中。日久熬煎成石。非腎與小腸病也。牛膝法治淋宜通氣清心

用之。杜牛膝亦可。又有中氣不足致小便不利者。宜經閉產難。下效

誤用。喉痹齒痛。下火。癰腫惡瘡。金瘡傷折。惡血之功。出竹木刺。搗爛

即出。縱瘡口。然性下行而滑。竅夢遺失精及脾虛下陷因而腿膝腫痛者。禁用。出西川及懷慶府。長大肥潤者良。下行生用。入滋補藥酒。浸蒸。惡龜甲。畏白前。忌羊肉。

甘菊花 祛風溫補肺腎明目

味兼甘苦。性稟平和。備受四氣。冬苗春葉夏蕊秋花。飽經霜露。得金水之精。居

多能益金水二臟。腎肺。以制火而平木。肝心。木平則風息。火降則熱除。故

能養目血。去翳膜。與枸杞相對蜜丸久服永無目疾。治頭目眩運。風熱。散溼痹遊風。

以單瓣味甘者入藥。花小味苦者名苦薏非真菊也。收署閒談曰真菊延齡野菊瀉人。尤枸杞地骨

皮為使。黃者入陰分。白者入陽分。紫者入血分。可藥可餌。可釀可枕。

仙經重之。

五味子 補肺腎。瀦精氣。

性溫。五味俱備。皮甘肉酸核中苦辛都有鹹味。酸鹹爲多。故專收斂肺氣而滋腎水。

氣爲水母。經曰。肺欲收。急食酸以收之。王好古曰。入手太陰血分。足少陰氣分。益氣生津。肺主氣。斂故能生津。夏

月宜常服。以補虛明目。強陰瀆精。仲景八味丸。加之補腎。蓋內核似腎象形之義。退熱斂汗。

止嘔住瀉。寧嗽定喘。感風寒而喘嗽者。當清降。宜二陳及蘇子降氣湯。水逆而喘嗽者。當表散。宜羌防蘇桔。痰壅氣

湯。氣逆而喘嗽者。宜小青龍。半夏茯苓。除煩渴。消水腫。解酒毒。收耗散。

之氣。瞳子散大。嗽初起。脈數有實火者。忌用。朱丹溪曰。五味收肺氣。非除熱乎。補腎非暖火

之驟也。乃火熱嗽必用之藥。寇氏所謂食之多虛熱者。收補之驟也。○閑守泉。每晨吞北五味三十粒。固精氣。益五臟。北產紫黑

者良。入滋補藥。蜜浸蒸。入勞嗽藥。生用。俱槌碎核。南產色紅而枯。若

風寒在肺。宜南者。菴蓉爲使。惡萎蕤。熬膏良。

天門冬。瀉肺火。補腎水。潤燥痰。

甘苦大寒。入手太陰。肺氣分。清金降火。益水之上源。肺爲腎母。下通足少

陰腎。苦能堅腎。寒能去腎。滋腎潤燥。止渴消痰。蒙荃曰：腎主津液，則痰化，所謂澤肌膚，利二便，治肺痿腫癰。肺痿者，感於風寒，欬嗽短

則痰化，所謂澤肌膚，利二便，治肺痿腫癰。氣鼻塞胸脹，久而成痿，有

寒痿熱痿二證。肺癰者，熱毒結，欬吐膿血，胸中隱痛，痿重而癰，稍

輕，治痿宜養血補氣，保肺清火，治癰宜瀉熱豁痰，開提升散，癰為邪

實，痿為正虛，吐膿吐血，苦泄血滯，甘益元，痰嗽喘促，消渴噎乾，引渴

不可誤治。多食善飢，為消渴，由火盛津枯，足下熱痛，虛勞骨蒸，陰虛有火之證，然性冷利，胃虛

無熱及瀉者，忌用。取肥大明亮者，去心皮酒蒸，地黃貝母為使。惡鯉

魚。二冬熬膏並良。天冬滋陰助元，消腎痰。麥冬清心降火，止肺欬。

麥門冬。補肺清心，瀉熱潤燥。

甘微苦寒。清心潤肺。李東垣曰：入強陰益精，瀉熱除煩。微寒能瀉肺

清，金旺則水生，陰得水益，消痰止咳。午前嗽多屬胃火，宜茶連梔藥知

養，則火降，心寧而精益。屬陰虛，宜五味。行水生津。肺清則水道下行，故治浮腫，火

麥冬知母四物。降則腎氣上騰，故又治消渴。治嘔吐火

上衝則嘔。宜麥冬。又有因痿。手足緩縱。曰痿。陽明溼熱。上蒸於
寒。因食因痰。因虛之不同。痿。手足緩縱。曰痿。陽明溼熱。上蒸於

冬實足陽明。客熱虛勞。脈絕短氣。同人參五味。名生脈散。蓋心主脈。
胃經之正藥。客熱虛勞。脈絕短氣。同人參五味。名生脈散。蓋心主脈。

復。又有脈絕將死者。服此能復生之。夏月火旺。灼金而清。水源。五味
垣。曰人參甘寒。瀉火熱而益元氣。麥冬苦寒。滋燥金而清水源。五味

酸溫。瀉丙火而補庚金。益五臟之氣。肺痿吐膿。血熱妄行。經枯乳閉。
也。○丙火小腸。庚金大腸。並主津液。肺痿吐膿。血熱妄行。經枯乳閉。

明目悅顏。益水。但性寒而泄氣弱。胃寒人禁用。肥大者良。去心用。入
清火。但性寒而泄氣弱。胃寒人禁用。肥大者良。去心用。入

滋補藥酒浸。制其寒。地黃車前爲使。惡款冬花苦參青葙木耳。
寒。地黃車前爲使。惡款冬花苦參青葙木耳。

款冬花。潤肺。瀉熱。止咳。
潤肺。瀉熱。止咳。

辛溫純陽。瀉熱潤肺。消痰除煩。定驚明目。治欬逆上氣。喘渴。肺虛。喉
瀉熱潤肺。消痰除煩。定驚明目。治欬逆上氣。喘渴。肺虛。喉

痹。肺痿肺癰。欬吐膿血。爲治。嗽。要藥。燒烟以筒吸之。亦良。百合。欬。冬
欬吐膿血。爲治。嗽。要藥。燒烟以筒吸之。亦良。百合。欬。冬

血。凡陰虛勞嗽。通用。款冬。紫苑。百部。百合。沙參。生地。麥冬。五味。知。藥
通。用。款冬。紫苑。百部。百合。沙參。生地。麥冬。五味。知。藥

者。爲陰虛。嗽而發熱不止。寒熱虛實。皆可施用。春開。放。得。腎。之。冬。體。先。秀。先
嗽而發熱不止。寒熱虛實。皆可施用。春開。放。得。腎。之。冬。體。先。秀。先

之用。故為溫肺理嗽之最。大抵效必因寒。寒為冬氣。入肺為逆。款冬非肺家專藥。乃使肺邪從腎順流而出。○肺惡寒。○郭佩蘭著本草

匯。十一月開花如黃菊。微見花未舒者良。生河北關中。世多以枇杷蕊偽之。揀淨

花。甘草水浸一宿。曝用。得紫苑良。杏仁為使。惡阜莢硝石玄參。畏黃

耆貝母連翹麻黃青葙辛夷。雖畏貝母。得之反良。

紫苑。潤肺瀉火。

辛溫潤肺。苦溫下氣。補虛調中。消痰止渴。治寒熱結氣。欬逆上氣。欬

吐膿血。專治血痰。為血勞聖藥。肺經虛熱。小兒驚癇。亦虛而有熱。能開喉痹。取惡涎。

然辛散。性滑不宜多用。獨用。本草匯曰。若能達下。辛可益金。故吐血保肺。收為上劑。雖入至高。善於達下。使

氣化及於州郡。小便自利。人所不知。李士材曰。辛而不燥。潤而不根。補而不滯。誠金玉君子。非多用獨用。不能速效。○州郡。勝脫也。根

作節紫色潤軟者良。人多以車前旋覆根偽之。誤服誤人。去頭鬚蜜水浸。焙用。款冬為

使。惡天雄瞿麥藁本遠志。畏茵陳。白者名女苑。李時珍曰。紫入血分。白入氣分。

旋覆花。一名金沸草。瀉下氣消痰。

鹹能軟堅。苦辛能下氣行水。溫能通血脈。入肺大腸經。消痰結。堅痞。

唾如膠漆。噫氣不除。噫於介切。俗作噫。胸中氣不暢。故噫以通之。屬不足。亦有挾痰挾火者。屬有餘。仲景治汗吐下。

後痞。轉噫氣。有代。緒旋覆湯。大腸水腫。去頭目風。然走散之藥。冷利大腸。虛者慎。

用。類金錢菊。去皮帶蕊。殼蒸用。根能續筋。筋斷者。搗汁。滴傷處。用滓敷。其上半月不開。筋自續。

矣。

百部。潤肺殺蟲。

甘苦微溫。能潤肺。治肺熱欬嗽。苦能瀉熱。有小毒。殺虻。蠅。蠅。蝨。一切樹木。

蛀蟲。蝨。即烟死。治骨蒸傳尸。疳積疥癬。皆有蟲。李時珍曰。百部亦天冬之類。故皆治肺而殺蟲。但天冬寒熱。

嗽宜之。百部。溫寒嗽宜之。根多成百。故名。取肥實者。竹刀劈去心皮。酒浸焙用。

桔梗。宜通氣血。瀉火散寒。載藥上浮。

苦辛而平。色白屬金。入肺分氣。瀉熱兼入手少陰心。足陽明胃經。開提

氣血。表散寒邪。清利頭目咽喉。開胸膈滯氣。凡痰壅喘促。鼻塞不利氣

目赤。喉痹咽痛。兩少陰火。齒痛風熱。口瘡。肺癰乾欬。火鬱在肺。胸膈刺痛。火鬱上焦。

下痢腹痛。腹滿腸鳴。肺火鬱於大腸。並宜苦梗以開之。為諸藥舟楫。載之上

浮。能引苦泄峻下之劑。至於至高之分。成功。既上行而又能下。氣何

行耳。養血排膿。補內漏。故治肺癰。李時珍曰。枳桔湯治胸中痞滿不

口舌諸病。取其苦辛散寒甘平除熱也。宋仁宗加荊芥防風連翹。遂

名如聖湯。王好古加味甘桔湯。失音加訶子。聲不出加半夏。上氣加

陳皮。涎嗽加知母貝母。欬渴加五味。酒毒加葛根。少氣加人參。嘔加

半夏。生薑吐膿血加紫菀。肺痿加阿膠。胸膈不利加枳殼。宿滿加枳

實。目赤加梔子。大黃面腫加茯苓。癰痛加黃善。發斑加荊防。疫毒加

牛蒡。大黃不得眠加梔子。昂按。觀海藏所加。則用藥之大較。亦可識

薺危 補和中解毒

去浮皮。泔浸微炒用。畏龍膽白芨。忌豬肉。

寒利肺。甘解毒。能解百藥及蛇蠱毒。和中止嗽。治消渴強中。消渴證下

與盛不交精出名強中。癰腫疔毒。如人參而體虛無心。似桔梗而味

甘不苦。奸賈多用以亂人參。李時珍曰。薺芩卽甜桔梗。

馬兜鈴。瀉肺下氣。

體輕而虛。熟則四開象肺。故入肺寒。能清肺熱。苦辛能降肺氣。李時珍曰。

錢乙補肺阿膠散用之。非取其補肺。取其清熱降氣。則肺自安也。其中阿膠糯米乃補肺之正藥。昂按清熱降氣。瀉之卽所以補之。若專

一於補適以助。治痰嗽喘促。血痔瘻瘡。大腸經熱。瘻。漏也。音閭。亦音

火而益嗽也。與肺爲表裏。肺移熱於大腸。故腸風痔瘻。清臟熱。則亦可吐蠱。湯劑

之。多。蔓生實如鈴。去筋膜。取子用。

白前。瀉肺降氣下痰。

辛甘微寒。長於降氣下痰。止嗽。治肺氣壅實。胸膈逆滿。虛者禁用。似

牛膝粗長堅直易斷者。白前也。短小柔輒能彎者。白微也。近道多有形色頗同。

以此別之。去頭鬚。甘草水浸一伏時。即一晝夜。焙用。忌羊肉。

白芨。瀉補肺。逐瘀生新。

味苦而辛。性瀉而收。得秋金之令。入肺止吐血。摘玄曰。試血法。吐血者內浮者。肺血也。沉者

肝血也。半浮沉者。心血也。各隨所見。肺損者能復生之。以有形生有五

以羊肺。肝心。薰白芨末。日日服之。佳。肺損者能復生之。以有形生有五

臟。惟肺葉損壞者。可以復生。台州獄吏。憫一重囚。囚感之。曰。吾七犯死罪。遭刑拷。肺皆損傷。得一方用白芨末。米飲日服。其效如神。後囚

凌遲剖開胸。見肺間竅穴數十。皆白芨填補。色猶不變也。治跌打折骨。酒服二錢。湯火灼傷。油調末敷。惡瘡

癰腫。敗疽死肌。去腐逐瘀生新。除面上疔。皰。疔音千。去聲。面黑氣。皰音砲。面瘡也。塗手

足皴裂。令人肌滑。紫石英為使。畏杏仁。反烏頭。

半夏。燥溼痰。潤腎燥。宜通陰陽。辛溫有毒。體滑性燥。能走能散。能燥能潤。和胃健脾。去溼。補肝。辛散。潤腎。

除溼化痰發表開鬱下逆氣止煩嘔發音聲利水道燥去溼故利水

故潤燥朱丹溪謂二陳湯救暴卒葛生曰凡遇五絕之病用半夏末

五絕謂絕死瀾死也治欬逆頭眩火炎痰厥厥頭痛眉稜骨痛與痰咽

痛成無己曰半夏辛散行水氣而潤腎燥又局方半硫丸治老人虛

不生非二物之性燥也古方用治咽痛喉癢吐血下血非禁劑也二

物亦能散血故破傷撲打皆主之惟陰虛勞損則非溼熱之邪而用

利竅行溼之藥是重竭其津液醫之罪也豈藥之咎哉甲乙經胸脹

用治不眠是果性燥者乎半夏硫黃等分生薑糊丸名半硫丸

仲景用之傷寒寒熱湯用之痰瘧不眠素問曰胃不和則臥不安

靈樞曰陽氣滿不得入於陰陰氣虛故目不得眠飲以半夏湯陰陽

既通其臥立安又有喘嗽不得眠者左不得眠屬肝脹宜清肝右不

得眠屬肺反胃吐食痰多消腫止汗孕婦忌之王好

腎主五液化為五溼本經為唾入肝為淚入心為汗入肺為涕入脾

為痰痰者因欬而動脾之溼也半夏泄痰之標不能治痰之本治本

者治腎也欬無形痰有形無形則潤有形則燥所以為流脾溼而潤

柴胡為之使。故柴胡湯用之。雖云止嘔。亦助柴胡之寒。熱往來。是又為足少陽也。時珍曰。脾無溼不生痰。故脾為生痰之源。肺為貯痰之器。按有聲無痰。或曰。欬或因火。因風。因寒。因溼。因虛。勞因嗽。蓋動於脾。證論治。聲有痰曰欬。嗽或因火。因風。因寒。因溼。因虛。勞因嗽。蓋動於脾。證論治。大法治嗽。當以治痰為先。而治痰又以順氣為主。宜以半夏南星燥其溼。枳殼橘紅利其氣。肺虛加溫。斂之味。肺熱加涼。瀉之劑。趙繼宗曰。二陳治痰。世醫執之內有半夏。其性燥烈。若風寒溼食諸痰。則相宜。至於勞痰。失血諸痰。用之反能燥血。液而加病。按古有三禁。血家汗家。渴家。忌之。然亦間有用之者。○俗以半夏專為除痰。而半夏之功。用不復見。知於世矣。小柴胡湯。半夏瀉心湯。皆用半夏。豈為除痰之平。火結為痰。氣順則火降。而痰消。圓白而大。陳久者良。浸七日。逐日換水。瀝去涎。切。

片薑汁拌。

性畏生薑。用之以制其毒。得薑而功愈彰。

柴胡射干為使。畏生薑。秦皮龜甲雄

黃。忌羊肉海藻飴糖。惡皂角。反烏頭。

合陳皮茯苓甘草。名二陳湯。為治痰之總劑。寒痰佐以乾薑芥

子。熱痰佐以黃芩。枯樓。溼痰佐以蒼朮。茯苓。風痰佐以南星。前胡。痞痰佐以枳實。白朮。更看痰之所在。加導引藥。惟燥痰非半夏所司也。

韓飛霞造麴十法。

一盤汁浸造。名生薑麴。治淺近諸痰。一磐水煮透。兼薑糊造。名礬麴。礬最能卻水。治清痰。一煮。水

角汁。煉膏。和半夏末為麴。或加南星。或加麝香。名皂角麴。治風痰。開經絡。一用白芥子等分。或三分之一。竹瀝和成。略加麴糊。名竹瀝麴。

治皮裏膜外結核。隱顯之痰。一麻油浸半夏。三五日。炒乾爲末。麴汁略造。成油以潤燥。名麻油麴。治虛熱勞欬之痰。一用臘月黃牛膽汁。略加熱蜜和造。名牛膽麴。治癩癩風痰。一用香附蒼朮。撫芎等分。熬膏。和半夏末作麴。名開鬱麴。治鬱痰。一用芒硝居半。夏十分之三。煮透。爲末。煎大黃膏和成。名硝黃麴。治中風卒厥。傷寒宜下。由於痰者。一用海粉一兩。雄黃一兩。半夏二兩。爲末。煉蜜和造。名海粉麴。治積痰。沉痼。一用黃牛肉煎汁。煉膏。即霞天膏。和半夏末爲麴。名霞天麴。治沉痼病痰。功效最烈。以上並照造麴法。草盒

天南星。燥溼宜祛風痰。

味辛而苦。能治風散血。是齋方。南星防風等分爲末。名玉真散。治破傷風。刀傷撲傷。如神。破傷風者。藥敷瘡口。溫酒調下二錢。打傷至死。童便調灌二錢。連進三服。必活。氣溫而燥。能勝溼。除痰。性緊而毒。能攻

積拔腫。補肝風虛。凡味辛而散者。皆能補肝。木喜條達故也。爲肝脾肺三經之藥。治驚癇

風眩。朱丹溪曰。無痰不作眩。身強口噤。喉痹舌瘡。結核疝瘕。癰毒疥癬。蛇蟲咬

毒。調末。破結下氣。利水墮胎。性更烈於半夏。胎半夏皆燥而毒。故墮

辛而不守。然古安胎。陰虛燥。痰禁。用根似半夏而大。形如虎掌。故一方中亦有用。半夏者。

名虎掌。以礬湯或皂角汁浸三晝夜。曝用。或酒浸一宿。蒸。竹刀切開。

至不麻乃止。或薑渣黃泥和包煨熟用。造麴法與半夏同。造膽星法。

臘月取黃牛膽汁。和南星末納入膽中。風乾。年久者彌佳。畏附子乾。

薑防風。得防風則不麻。火炮則毒性緩。得牛膽則不燥。且膽有益肝膽之功。

貝母。宜散結。瀉熱。潤肺。清火。

微寒。苦。瀉心火。辛。散肺鬱。入肺經。氣分。心火降則肺氣寧。詩曰。潤心言采其靈。靈即貝母也。取其解鬱。

肺。清虛痰。治虛勞煩熱。欬嗽上氣。吐血咯血。肺痿肺癰。喉痹。君相

眩。火熱上攻。淋瀝。小腸邪熱。心與小腸相表裏。肺為氣化之源。瘰癧。化乳閉產難。功專散結除。

熱。傅惡瘡。唐時有人膊上生瘡。如人面。能飲酒食物。亦無他苦。徧投諸藥。悉受之。至貝母瘡乃墜。眉灌之數日。成痂而愈。斂。

瘡口。火降邪散。瘡口自斂。非貝母性收斂也。○俗以半夏燥毒。代以貝母。不知貝母寒潤。主肺家燥痰。半夏溫燥。主脾家溼痰。設

誤用。貽誤匪淺。故凡風寒溼食諸痰。貝母非所宜也。宜用半夏。南星。川產開瓣者良。獨顆無瓣者不堪。

用去心糯米拌炒黃搗用。厚朴白薇為使。畏秦艽。反烏頭。

栝樓仁。俗作瓜。萋瀉火。潤肺。滑腸。止血。治熱痰。

甘補肺。本草。寒潤下。能清上焦之火。使痰氣下降。為治嗽要藥。肺受火逼。

故生痰作嗽。又能蕩滌胸中鬱熱垢膩。生津止渴。朱丹溪曰。清咽利

腸。通大便。是齋方。焙研酒調。或米飲下。治小便不通。通乳消腫。治結胸胸痹。仲景小陷胸湯

證口渴者。小柴胡湯。以此易半夏。酒黃熱痢。二便不通。炒香酒服。止一切血。寒降瀉

者。忌用實圓長如熟柿子。扁多脂。去油用。枸杞為使。畏牛膝。乾漆。惡

乾薑。反烏頭。

天花粉。瀉火。潤燥。治熱。

酸能生津。甘不傷胃。微苦微寒。降火潤燥。滑痰解渴。古方多用生肌。

排膿消腫。行水通經。止小便利。膀胱熱解。則水行而小便不數。治熱狂時疾。胃熱疽黃。口燥唇乾。腫毒發背。乳癰瘡痔。脾胃虛寒者。禁用。即枯樓根。畏惡同。澄粉食。大宜。虛熱人。

夏枯草 補陽散結消癭

辛苦微寒。氣稟純陽。補肝血。緩肝火。解內熱。散結氣。治癭癧溼痹。目

珠夜痛。樓全善曰。目珠連日本。即目系也。夜痛及點苦寒藥更甚者。夜與寒皆陰也。夏枯氣稟純陽。補厥陰血脈。故治此如神。以

藥和陰也。按目白珠屬陽。故晝痛。點苦寒藥反劇。冬至生。夏至枯。故名。用莖

葉。

海藻 瀉熱軟堅痰消癭瘤

鹹潤下而軟堅。寒行水以泄熱。故消癭瘤。結核陰瘻之堅聚。腹痛曰疝。丸痛

音頰痰飲腳氣水腫之溼熱。消宿食。治五膈。山東海有大葉馬尾二

種亦作海菜食。洗去鹹水用。昂按其用在鹹似不宜過洗。反甘草。東垣治癩瘰馬刀。海藻甘草並

昆布。

功用海藻而少滑。性雄。治水腫癭瘤。陰癘膈噎。含之出登萊者搓如

繩索。出閩越者大葉如菜。洗去鹹味用。

獨活。宜搜風去溼。

辛苦微溫。氣緩善搜。入足少陰。腎氣分以理。伏風治本經傷風頭痛。

頭運目眩。宜與細辛同用。風熱齒痛。文潞公藥準用獨活地黃等分爲末。每服三錢。瘰癧溼痹。項背

手足反張曰瘰。溼流關節痛而煩。奔豚疝瘕。腎積曰奔豚。風寒溼客。日溼痺。風勝溼。故二活兼能去溼。於醫家所致。痲疝亦然。

有風不動。無風反搖。又名獨搖草。故治本經云獨活一名羌活。古方

惟用獨活。後人云是一類二種。遂分用。以形虛大有白如鬼眼。節疎

色黃者為獨活。色紫節密。氣猛烈者為羌活。並出蜀漢。又云自西羌

來者名羌活。故又名胡王使者。今採諸家所分經絡。主治各證。以便施用。

羌活。宜搜風發表。勝溼。

辛苦性溫。氣雄而散。味薄。上升入足。太陽膀胱。以理遊風。兼入足少陰。

厥陰腎。氣分瀉。肝氣搜。肝風小。無不入。大無不通。治風溼相搏。本經

頭痛。同川芎。治太陽少陰頭痛。凡頭痛多用。風藥者以巔頂之上。唯風藥可到也。督脈為病。脊強而厥。督

並太陽。剛瘳柔瘳。脊強而厥。即瘳證也。傷寒無汗為剛瘳。傷風有汗為柔瘳。亦有血虛發瘳者。大約風證宜二活。血虛忌用。

中風不語。按古人治中風。多以攻裏。至河間出。始云。中風非外來之風。良由心火暴甚。腎水虛衰。東垣則以為本氣自病。中風非外來之風。痰生熱。熱生風。世人復分北方風勁質厚為真中。南方地卑質弱為

類中。不思岐伯云。中風大法有四。一偏枯。半身不遂也。二風痺。四肢不收也。三風癱。奄忽不知人也。四風癰。諸風類癰狀也。風證盡矣。何

嘗有其類中之說乎。此證皆由氣血虧虛。醫者不知養血益氣。以固本。徒用烏附。羌獨。以驅風。命曰虛虛。誤人多矣。○真中。定重於氣。類

固本。徒用烏附。羌獨。以驅風。命曰虛虛。誤人多矣。○真中。定重於氣。類

中焉有類中既屬內傷真中單屬外感乎河間
東垣皆北人安能盡舍北人而專治南病乎
頭旋目赤目赤要藥散肌

表八風之邪利周身百節之痛為卻亂反正之主藥若血虛頭痛偏

身痛者此屬內證二活並禁用

防風 宜發表去風勝溼

辛甘微溫升浮為陽搜肝瀉肺散頭目滯氣經絡留溼主上部見血

用之為使亦能治崩上焦風邪頭痛目眩脊痛項強周身盡痛太陽勝經證徐

才曰得蔥白又行脾胃二經為去風勝溼之要藥凡風藥皆能勝溼東垣曰卒伍卑賤

之職隨所引而止乃風藥中潤劑若補脾胃非此引用不能行散目赤瘡瘍若血虛痙急頭痛不因

風寒內傷泄瀉不因寒溼火升發嗽陰虛盜汗陽虛自汗者並禁用

同黃耆芍藥又能實表止汗合黃耆白朮名玉屏風散黃潤者良上
固表聖藥黃耆得防風而功益大取其相畏而相使也

部用身下部用梢畏葶藶惡乾薑白蘇芫花殺附子毒

藟本 宣去風寒溼。

辛溫雄壯。為太陽經膀胱風藥。寒鬱本經頭痛連腦者必用之。凡巔頂痛宜藟

本防風酒治督脈為病。脊強而厥。督脈並太陽經貫脊又能下行去溼。治婦人

疝瘕。陰寒腫痛。腹中急痛。皆太陽寒溼胃風泄瀉。夏英公病泄醫以虛治不效。霍翁曰此風客於

胃也。飲以藟本湯而愈。蓋藟本能除風溼耳。粉刺酒醯。音查。和白糖作面脂良。根紫色似芎藭而輕

虛氣香味麻。

葛根 輕宜解肌升陽散火。

辛甘性平。輕揚升發。入陽明經。能鼓胃氣上行。生津止渴。風藥多燥。葛根獨能

止渴者以能升胃氣入肺而生津耳。兼入脾經。開腠發汗。解肌退熱。脾主肌肉為治脾胃虛

弱泄瀉之聖藥。經曰清氣在下則生瘰。泄葛根能升陽明清氣。療傷寒中風。陽明頭痛。張曰

頭痛者不可便服。升葛湯發之。反引邪氣入陽明也。仲景治太陽明而

明合病。桂枝湯加葛根麻黃。又有葛根黃芩黃連。血痢溫瘧。日治瘧。

解肌湯。是用以斷太陽入陽明之路。非太陽藥也。陽瘧有汗。加參蒼白朮以斂之。無汗。加芩葛蒼朮以發之。若

無汗。要有汗。散邪為主。帶補。有汗。要無汗。扶正為主。帶散。若

疹。不能發。痘疹。朱丹溪曰。凡斑疹已見紅點。又能起陰氣。散鬱火。解酒

毒。尤良。利二便。殺百藥毒。多用反傷胃氣。升散太過。

生葛汁。大寒。解溫病大熱。吐衄諸血。

升麻。輕宜。升陽解毒。

甘辛微苦足陽明。太陰。胃脾。引經藥。參者上行。亦入手陽明。太陰。大腸肺。

表散風邪。引蔥白。散手陽明風邪。同葛根。能發。升發火鬱。能升陽氣。

於至陰之下。引甘溫之藥。上行以補衛氣之散。而實其表。柴胡引少陽清氣上。

行。升麻引陽明清氣上行。故補中湯用為佐使。治時氣毒癘。頭痛。明

若下元虛者。用此升之。則下元愈虛。又當慎用。連齒頰痛。寒熱。肺痿吐膿。下痢後重。而後能下降。有病大小便秘者。用

通利藥而罔效。重加升麻而反通。朱丹溪曰。氣升則水自降。久泄。經曰。地氣上為雲。天氣下為雨。天地不交。則萬物不通也。

清氣在下。脫肛。崩中帶下。能緩帶脈。足寒陰痿。目赤口瘡。痘瘡。湯升。萬則生。殮泄。

發熱時可用。痘出後氣弱。或泄瀉者。可少。斑疹。成朵如錦紋者為斑。隱隱見紅點者為疹。用。否則見點之後。必不可用。為其解散也。

蓋胃熱失下。衝人少陽。則助相火。而風熱瘡癰。解百藥毒。吐蠱毒。殺成斑。衝入少陰。則助君火。而成疹。

精鬼。性陽氣升。陰虛火動者忌用。朱肱活人書。言瘀血入裏。吐衄血犀角也。朱二允曰。升麻性味相遠。何以為代。蓋以升麻能引諸藥同入

氣清心肝之火。使血下行歸經耳。倘誤用升麻。裏白外黑。緊實者良。血隨氣升。不愈湧出。不止乎。古方未可盡泥也。

名鬼臉升麻。去鬚蘆用。或有參耆補劑。須用升柴。而又恐其太升。發

麻。繆仲醇用治。滯下。每每有驗。

白芷。宜發表。祛風。散溼。

辛散風溫。除溼芳。香通竅。而表汗。行手足陽明。大腸。入手太陰。肺。色白。味

辛。故。而。爲。陽。明。主。藥。陽明之脈營於面。故治頭面諸疾。治陽明頭目昏痛。楊吉老方。

四五偏。蜜九。彈子大。名都梁丸。每服一丸。荆芥點臘茶。眉稜骨痛。風

咽下。○楊吉老。名介。治王定國病時在都梁。因以名丸。鼻淵。肺主鼻。風熱乘肺。上

與痰同。酒浸黃。牙痛。上齧。屬足陽明。下齧。鼻淵。熱。鼻淵。熱。於腦。故鼻多濁涕。

而淵。經曰。腦滲爲涕。目癢淚出。面肝干。去聲。癩疵。可作。皮膚燥癢。三

經風熱之病。及血崩血閉。腸風痔瘻。癰疽瘡瘍。三經溼熱之病。活血

排膿。腸有敗膿。血淋露腥穢。生肌止痛。解砒毒蛇傷。先以繩紫傷處。

五錢。種白。又治產後傷風。血虛頭痛。白魚尾上攻。多在日晚。宜四物。

芫能辟蛇。宜芎藭。倍參。蒼保壽堂。治正偏頭痛。白芫。川芎。各三錢。搽。然其性升。

散。血熱有虛火者。禁用。色白氣香者佳。或微炒用。當歸爲使。惡旋覆

花。
細辛。宜散風溼。補肝。潤腎。

辛溫散風邪。故諸風痺痛。欬嗽。上氣頭痛。脊強者。宜之。專治少陰頭痛。獨活為使。

辛散浮熱。故口瘡喉痹。少陰火。鼻淵齒齩者。蟲蝕膿爛。宜之。辛益肝膽。故膽

虛驚癇。風眼淚下者。宜之。水停心下。則腎燥。細辛之辛。能行水氣。以

潤之。腎燥者。心亦燥。火屈於水。故燥也。經曰。腎苦燥。急食辛以潤之。雖手少陰心。引經。乃足少陰腎。

本藥能通精氣。利九竅。故耳聾鼻鼈。音甕。鼻塞不聞香臭也。風寒入腦。故氣不宜通。寒宜表。熱宜清。

有瘰肉者。為末吹鼻。倒睫便澇者。宜之。散結溫經。破痰下乳。行血發汗。能發少汗。

仲景治少陰證。反發熱。麻黃附子細辛湯。乃治邪在裏之表劑。然味厚。性烈。不可過用。不可過一錢。多則氣不通。

悶絕而死。雖死無傷。可驗。味極辛。產華陰者真。杜蘅。兗督郵。徐長卿。皆可亂之。揀去

雙葉者用。惡黃耆山茱。畏硝石滑石。反藜蘆。

柴胡。宜發表。和裏。退熱。升陽。

苦平微寒。味薄。氣升為陽。主陽氣下陷。能引清氣上行。而平少陽厥。

陰之邪熱。少肝膽心包三焦相火。李時珍曰：行宣暢氣血散結調經。按

人第知柴胡能發表而不知柴胡最能和裏。故勞藥血藥往往為足

少陽膽表藥。膽為清淨之府無出入其經在半表半裏。法當和解

則重虛其表最宜詳慎。治傷寒邪熱。仲景有大小痰熱結實虛勞

肌熱。寇宗奭曰：柴胡本經並無一字治勞。藥性論曰：華勞在肝膽心

心包有熱則柴胡乃手足厥陰少陽必用之藥。勞在脾胃有熱或陽

氏一槩擯斥殊非通論。昂按楊氏秦芑扶羸湯治肺痿成勞。欬嗽聲

嘔吐心煩。邪在半表半裏。諸瘧寒熱。李東垣曰：諸瘧以柴胡為君。佐以

慎用。喻嘉言曰：瘧發必有寒有熱。蓋外邪伏於半表半裏。適在少陽

所主之界。入與陰爭陽勝則熱出與陽爭陰勝則寒。即純熱無寒為

必返還少陽之界。使陰陽協和而後愈也。謂少陽而造其極偏補偏救。亦

病瘧熱時如火。年餘骨立。醫用葦附諸藥。熱益甚。孫琳投以小柴胡湯。三服脫然。琳曰。此名勞瘧。熱從髓出。加以剛劑。氣血愈虧。熱有在

皮膚者。力減。故三服乃效也。李時珍曰。觀此則得用藥之妙矣。歸南方者。力減。故三服乃效也。李時珍曰。觀此則得用藥之妙矣。歸

按。據孫氏之說。是柴頭眩目赤。胸痞脅痛。凡脅痛多。是肝木有餘。宜胡亦能退骨蒸也。

芎。又左脅痛。宜活血行痰。口苦耳聾。皆肝膽婦人熱入血室。衝為血海。氣。右脅痛。宜消食行痰。

男女皆有之。柴胡在胎前產後諸熱。小兒痘疹。五疳羸熱。散十二經。臟主血。在經主氣。

瘡疽血凝。氣聚功同。連翹治血熱。柴胡陰虛火炎。氣升者禁用。

銀州者根長尺餘。微白。治勞瘵良。北產者如前胡而軟者良。南產者

強硬不堪用。外感生用。內傷升氣酒炒用根。中及下降用梢。有汗欬

者蜜水炒。前胡半夏為使。惡皂角。

前胡 宜解表。瀉下氣。治風痰。

辛以暢肺解風寒。甘以悅脾理胸腹。苦瀉厥陰肝之熱。寒散太陽膀胱。

之邪。微寒一性陰而降功專下氣氣下則火降而痰消。
火有餘便是

能除實熱。治痰熱哮喘。欬嗽嘔逆。痞膈霍亂。小兒疳氣。有推陳致新

之績。明目安胎。無外感者忌用。
按柴胡前胡均是風藥。但柴胡性升。前胡性降。為不同。肝膽經風痰。非前

胡不能除。皮白肉黑。味甘氣香者良。半夏為使。惡皂角。忌火。

麻黃。輕發汗。

辛溫微苦。僧繼洪曰。中牟產麻黃。地冬不積雪。性熱。故過服。服泄真氣。入足太陽。勝兼走手少陰陽

明。心大腸而為肺家專藥。能發汗解肌。去營中寒邪。衛中風熱。調血脈。

通九竅。開毛孔。治中風傷寒。中猶傷也。頭痛溫瘧。欬逆上氣。風寒鬱於肺經。經曰。諸氣

膈鬱皆屬於肺。痰哮喘。哮喘證宜瀉肺氣。雖用麻黃。而不出汗。本草未載。赤黑斑毒。胃熱一曰斑證。表虛不得再汗。

非便閉亦不可下。毒風疹癩。皮肉不仁。目赤腫痛。水腫風腫。過劑則

汗多亡陽。夏月禁用。汗者心之液。過汗則心血為之動搖。乃驍悍之劑。朱丹溪以人參麻黃同用。亦攻補法也。李東

垣曰：十劑曰輕可去實，葛根、麻黃之屬是也。邪客皮毛，腠理閉，拒營衛不行，故謂之實。二藥輕清，故可去之。李時珍曰：麻黃、太陽經藥，兼入肺經。肺主皮毛，故謂之實。二藥皆輕揚，入肺經，而所入不同。王好古曰：麻黃治衛實，桂枝治衛虛。雖皆太陽經藥，發散而所入不同。王好古曰：麻黃治衛實，桂枝治衛虛。雖皆太陽經藥，藥其實營衛藥也。心主營，為血。肺主衛，為氣。故麻黃為手太陰肺之劑，桂枝為手少陰心之劑。李時珍曰：仲景治傷寒，無汗用麻黃，有汗之用桂枝，未有究其精微者。津液為汗，汗即血也。在營則為血，在衛則為汗。寒傷營，營血內滯，不能外通於衛，衛氣閉固，津液不行，故無汗。發熱而惡寒，風傷衛，衛氣外滯，不能內護於營，營氣虛弱，津液不固，故有汗。發熱而惡風，然風寒皆由皮毛而入，皮毛虛弱，津液不固，故有汗。閉則邪熱內攻，故用麻黃。甘草同桂枝，引出營分之邪，達之肌表。佐以杏仁，泄肺而和氣。汗後無大熱而喘者，加石膏。活人書：夏至後，加石膏，知母，皆泄肺火之藥。是麻黃湯雖太陽發汗重劑，實散肺經火鬱之藥。腠理不密，則津液外泄，而肺氣虛。虛則補其母，故用桂枝。同甘草，外散風邪，以救表。內伐肝木，以防脾。佐以芍藥、泄木而固脾。使以薑棗，行脾之津液，而和營衛。下後微喘者，加厚朴、杏仁，以利肺氣也。汗後脈沉遲者，加人參，以益肺氣也。活人書：加黃芩為陽旦湯。以瀉肺熱也。是桂枝湯雖太陽解肌輕劑，實為理脾救肺之藥也。○湯諸家皆以麻黃桂枝為肺經藥，謂傷發汗用莖去節，煮十餘沸，掠去寒傳足不傳手者，誤也。○桂能平肝，發汗用莖去節，煮十餘沸，掠去浮沫，或用醋湯略泡，曬乾備用。亦有用蜜炒者。庶免太發。止汗用根節。無時。

浮沫。或用醋湯略泡。曬乾備用。亦有用蜜炒者。庶免太發。止汗用根節。無時。

出汗為自汗。屬陽虛。夢中出汗為盜汗。屬陰虛。用麻黃根。給粉。粟米。等分為末。袋盛撲之。佳。李時珍曰。麻黃發汗。駛不能禦。根節止汗。效如影響。物理不可測如此。自汗有風溼傷風。溫氣虛。血虛。脾虛。陰虛。胃熱。痰飲。中暑。亡陽。柔痙。等證。皆可加用。蓋其性能行周身肌表。引諸藥至衛分而固腠理。○汗雖為心液。然五臟亦各有汗。經曰。飲食飽甚。汗出於胃。驚而奪精。汗出於心。持重遠行。汗出於腎。疾走恐勞。汗出於肝。搖體。厚朴。白薇為使。惡辛夷。石膏。

荆芥 一名假蘇。輕宜發表。祛風理血。

辛苦而溫。芳香而散。入肝經氣分。兼行血分。其性升浮。能發汗。止冷。

汗虛散風。溼清頭目。利咽喉。治傷寒頭痛。中風口噤。身強項直。口面

喎斜。目中黑花。其氣溫散。能助脾消食。入脾。通利血脈。治吐衄腸風。

崩中血痢。產風血運。產後去血過多。腹內空虛。則自生風。故常有崩

風。華佗愈風散。荆芥三錢。微焙為末。瘰癧瘡腫。清熱散瘀。破結解毒。

豆淋酒調服。或童便服。諸家云甚效。其入風木之臟。即是藏血之地。結散熱清。則為風病血病瘡家聖藥。其入風木之臟。即是藏血之地。

也。李士材曰：風在皮裏膜外，刺連穗用。穗在於巔，故善升發。治血炒黑用。凡血藥，凡血

等皆應炒黑者，以黑勝紅也。反魚蟹河豚驢肉。

連翹 輕宜散結瀉火。

微寒升浮形似心。實似蓮房有瓣。苦入心。故入手少陰厥陰。包心。氣分而瀉。

火兼除手足少陽。三焦。手陽明經。大腸。氣分溼熱散諸經血凝氣聚。營

滯。遂成瘡腫。利水通經殺蟲止痛消腫排膿。皆結者散之，凡腫而痛者為實邪腫而不痛為

虛邪腫而赤者為結熱。為十二經瘡家聖藥。經曰：諸瘡痛癢皆屬心火。

紫蘇 宜發表散寒。

味辛入氣分。色紫入血分。香溫散寒通心利肺開胃益脾。入氣香發汗

解肌和血下氣寬中消痰祛風定喘止痛安胎利大小腸解魚蟹毒。

多服泄人真氣。李時珍曰：同陳皮砂仁行氣安胎同藿香烏藥。溫中止痛同香附麻黃發熱解肌同芎藭當歸和血散血。

同桔梗枳殼利膈寬腸同薔子杏仁消痰氣香者良宜橘皮忌鯉魚

定喘同木瓜厚朴散溫解暑治霍亂氣鬱子與葉同功潤心肺尤能下氣定喘止嗽消痰利膈寬腸溫中開

鬱有蘇子降氣湯

蘇梗下氣稍緩虛者宜之葉發汗散寒梗順氣安胎子降氣開鬱消痰定喘表弱氣虛者忌用葉腸滑氣虛者

忌用炒研用

薄荷輕宜散風熱

辛能散涼能清本經溫蓋體升浮能發汗搜肝氣而抑肺盛消散風

熱清利頭目治頭痛頭風中風失音痰嗽口氣語澇舌胎含眼耳咽

喉口齒諸病辛香通竅皮膚癢疹瘰癧瘡疥驚熱凡小兒治驚藥骨

蒸破血止痢能治血痢血痢病在凝滯辛能散涼能清虛人不宜多服能發汗疎表夏月

蘇產氣芳者良薄荷貓之酒也莽草魚之酒也犬虎之酒也蜈蚣雞之酒也桑椹

之塗。

雞蘇

一名水蘇。一名龍腦薄荷。輕宜散熱理血。

辛而微溫。清肺下氣。理血辟惡而消穀。治頭風目眩。肺痿血痢。吐衄

崩淋。喉腥口臭。邪熱諸病。

局方有龍腦雞蘇丸。

方莖中虛。似蘇葉而微長。密齒

而皺。氣甚辛烈。

木賊

輕發汗。退日翳。

溫微甘苦。中空輕揚。與麻黃同形。性亦能發汗。解肌升散。火鬱風溼

入足厥陰。少陽血分。益肝膽。治目疾。退翳膜。翳乃肝邪鬱遏。不能上通於目。及疝痛

脫肛。腸風痔瘻。赤痢崩中諸血病。

浮萍

輕發汗。利溼。

辛散輕浮。入肺經。達皮膚。能發揚邪汗。

朱丹溪曰。浮萍發汗甚於麻黃。

止瘙癢。消渴。

搗汁 生於水。又能下水氣。利小便。治一切風溼癱瘓。浮萍一味。蜜九酒服。治三十六

種風。濃煮汁浴。治惡疾。瘡癩。偏身。 燒烟辟蚊。紫背者良。

蒼耳子。一名泉耳。即詩卷耳。輕發汗。散風溼。

甘苦性溫。善發汗。散風溼。上通腦頂。下行足膝。外達皮膚。治頭痛目

暗。齒痛鼻淵。肢攣痹痛。瘰癧瘡疥。採根葉熬。名萬應膏。 偏身瘙癢。作浴湯佳。 去刺。酒

拌蒸。忌豬肉。聖惠方曰。葉搗汁。治產後痢。

天麻。宜祛風。

辛溫。入肝經。氣分。益氣強陰。通血脈。強筋力。疎痰氣。治諸風眩。掉頭。

旋眼。黑語言不遂。風溼痛。音頑。 痺。小兒驚癇。諸風。眩掉。皆屬肝木。肝病不能榮筋。故見前證。天麻

入厥陰而治諸疾。肝氣和平。諸疾自瘳。 血液衰少。及類中風者。忌用。風藥能燥血。故也。昂按。風藥中須兼

養血藥。制其燥也。養血藥或兼搜風藥。宜其滯也。古云。治風先治血。血行風自滅。 根類黃瓜。莖名赤箭。有風

不動。無風反搖。一名定風草。明亮堅實者佳。溼紙包煨熟。切片。酒浸

一宿焙用。

秦艽。宜去寒溼。

苦燥溼。辛散風。去腸胃之熱。益肝膽之氣。養血榮筋。風藥中潤劑。散藥中補劑。治

風寒溼痺。經曰。風寒溼三氣雜至。合而為痺。風勝為行。溼在筋則拘

仁。在肉則不寒。在皮則寒。通身攣急。血不榮筋。虛勞骨蒸。李時珍曰。手足陽明。經藥兼

痛。寒熱。有熱則日晡潮熱。骨蒸。聖惠方治急勞煩熱。秦艽柴胡各一

兩。甘草五錢。為末。每服三錢。治小兒骨蒸潮熱。食減瘦弱。秦艽炙甘草

錢。錢乙加薄荷五錢。疸黃酒毒。腸風瀉血。口噤牙痛。齒下。經。張。深

古曰。秦艽能去下。溼勝風淫之證。利大小便。牛乳點服。兼治。形作羅

豨薟草。宜去風溼。

豨薟草。

苦辛。生寒熟溫。治肝腎風氣。四肢麻痺。筋骨冷痛。腰膝無力。風溼瘡瘍。若癩痛。由脾腎兩虛。陰血不足。不由風溼而得者。忌服。風藥能燥血。江

東人呼豬爲豨。其草似豬豨臭。故名。唐成訥有進豨豨表。宋張詠進豨豨表云。其草金稜銀線素莖。

紫莖對節而生。頗同蒼耳。臣喫百服。眼目清明。即至千服。鬚髮烏黑。筋力輕健。效驗多端。以五月五日。六月六日。

七月七日。九月九日。採者尤佳。去粗莖。留枝葉花實。酒拌蒸曬九次。

蜜丸。甚益元氣。豨豨辛苦氣寒。故必蒸曬九次。加以酒蜜。則苦寒之陰濁盡去。而清香之美味見矣。數不至九。陰濁未盡。

則不能透骨搜風。而卻病也。搗汁熬膏。以甘草生地煎膏。煉蜜三味收之。酒調服。

尤妙。

威靈仙。宜行氣祛風。

辛泄氣。鹹泄水。本草苦甘。氣溫屬木。其性善走。能宣疏五臟。通行十二

經絡。治中風痛風。頭風頑痺。溼熱流於肢節之間。腫屬溼。痛屬熱。汗多屬風。麻屬氣虛。木屬溼。痰死血。十指

麻木亦是胃中有溼痰死血脾主四肢故也痛風當分新久新痛屬寒宜辛溫藥久痛屬熱宜清涼藥河間所謂暴病非熱久病非寒是也大法宜順氣清痰搜風散溼養血去瘀為要威靈仙傳曰一人手足不遂數十年遇新羅僧曰得一藥可治入山求之乃威靈仙也服

之而愈。癥瘦積聚。痰水宿膿。黃疸浮腫。大小腸祕。風溼痰氣。一切冷痛。

性極快利。積疴不痊者。服之有捷效。然疎泄真氣弱者。慎用。和砂仁

沙糖醋煎。治諸骨鯁。根叢鬚數百條。長者二尺餘。色深黑。俗名鐵腳

威靈仙。忌茗麪湯。

鈎藤鈎。宜除風熱。定驚。

甘微苦寒。除心熱。平肝風。治大人頭旋目眩。小兒驚啼。瘰癧。音熾。縱筋急而

縮為瘰。筋緩而弛為瘰。伸縮不已為瘰。瘰。俗謂之搐。搦是也。客忤胎風。發斑疹。主肝風相火之病。

風靜。火息。則諸證自除。相火散行於膽三焦心包。有刺。類鈎鈎。藤細多鈎者良。用純

鈎。其功加倍。久煎則無力。

茵芋。宜去風溼。

辛苦微溫。有小毒。治風溼拘攣痹痛。李時珍曰：古方治風痲，有茵芋丸。治風痹，有茵芋酒。治產後風。

有茵芋膏。風溼諸證多用之。茵芋石南莽草皆治風妙品。近世罕知。莽草辛溼有毒。治頭風癱腫乳癰疔瘰蘇頌曰：古方風溼諸酒多用。

之。今人取葉煎湯熱含。治牙蟲喉痹甚效。甄權曰：不入湯。莖赤。葉如石榴而短厚。莖炙用。

當歸。補血潤燥滑腸。

甘溫和血。辛溫散內寒。苦溫助心散寒。諸血屬心。凡通脈者必先補心。當歸苦溫助心。入心。

肝脾。心生血。肝藏血。脾統血。為血中之氣藥。治虛勞寒熱。欬逆上氣。血和則氣降。溫。

瘡。肝邪陰。癖痢。曰：使血。頭痛腰痛。心腹諸痛。散寒和氣。風痙無汗。痙音擊。上聲。身強項直。角。

弓反張曰痙。無汗為剛痙。有汗為柔痙。當歸辛散風。溫和。痿痹癰瘰。血產後亦有發痙者。以脫血無以養筋也。宜十全大補湯。癰疽瘡。

筋骨緩縱。足不在地曰痿。風寒溼客於肌肉。血脈曰痹。血凝。癰疽瘡。氣聚。按之堅硬曰癰。雖堅硬而聚散無常曰瘰。尙未至癰也。

瘍。衝脈為病。氣逆裏急。帶脈為病。腹痛腰溶溶如坐水中。衝脈起於腎下。出於

氣衝挾臍上行至胸中上頰額滲諸陽灌諸經下行入足滲三陰及
滋諸絡為十二經脈之海主血帶脈橫圍於腰如束帶總約諸脈及

婦人諸不足一切血證陰虛而陽無所附者潤腸胃澤皮膚養血生

肌血旺則排膿止痛血和則然滑大腸瀉者忌用當歸為君白芍為

為使名四物湯治血之總劑血虛佐以人參黃耆血熱佐以條芩梔

連血積佐以大大黃牽牛昂按血屬陰四物能養陰陰得其養則血自

生非四物能生血也若氣虛血弱之人當用人參取陽使氣血各有

旺生陰血之義多有過服四物陰滯之藥而反致害者所歸故名血滯能通血虛能補血枯能潤血亂能撫蓋其辛溫能行

而中守尾破血而下流全活血而不走雷斅王海藏並曰頭破血川

李時珍曰治上用頭治中用身治下用尾通治全用一定之理也產力剛善攻秦產力柔善補以秦產頭圓尾多肥潤氣香者良名馬

尾當歸尾粗堅枯者名饒頭當歸只宜發散用治血酒製有痰薑製

昂按當歸非治痰藥薑製亦臆說耳芎藭補血潤燥宜行氣搜風畏菖蒲海藻生薑惡溼麩

辛溫升浮。爲少陽膽。引經入手足厥陰肝心包。氣分。乃血中氣藥。助清。

陽而開諸鬱。朱丹溪曰：氣升則鬱自降。爲通陰陽血氣之使。潤肝燥而補肝虛。肝以瀉爲補。所謂辛以散

補之。辛以上行頭目。下行血海。衝脈。搜風散瘀。止痛調經。治風溼在頭。血

虛頭痛。能引血下行。頭痛必用之。加各引經藥。太陽羌活。陽明白芷。少陽柴胡。太陰蒼朮。少陰細辛。厥陰吳茱萸。朱丹溪曰：諸經

能鬱亦。腹痛脅痛。氣鬱血鬱。溼瀉血痢。寒痹筋攣。目淚多涕。肝熱。風木

爲病。諸風眩掉。皆屬肝木。及癰疽瘡瘍。癰從六腑生。疽從五臟生。皆陰陽相滯而成。氣爲陽。血爲陰。血行脈中。氣行脈外。

外相並周流。寒溼搏之。則凝滯而行遲。爲不及。火熱搏之。則沸騰而

行速。爲太過。氣鬱邪入血中。爲陰滯於陽。血鬱邪入氣中。爲陽滯於

陰。致生惡毒。然百病皆由此起。男婦一切血證。然香竄辛散。能走泄

也。芎歸能。和血行氣。而通陰陽。眞氣單服久服令人暴亡。單服則臟有偏勝。久服則過劑生邪。故有

地酸寒爲陰。芎歸辛溫爲陽。故四物取其相濟。以行血藥之滯耳。川芎辛散。豈能生血者乎。治法曰：驗胎法。婦人過經三月。用川芎末。空

川產大塊。裏白不油。辛甘者勝。白芷為使。畏黃連。硝石。滑石。惡黃耆。

山茱萸。

白芍藥。補血。瀉肝。瀉。斂陰。

苦酸微寒。入肝脾。血分為手足。太陰脾。行經藥。瀉肝火。斂斂肝以散。

補為安脾肺。固腠理。旺主皮毛。脾主肌肉。肝木不剋土。則脾安。土和血。

脈收陰氣。斂逆氣。散惡血。利小便。斂陰生津。小便自緩。中止痛。

李東垣曰。經曰。損其肝者。緩其中。即調血也。益氣除煩。斂汗安胎。補勞退熱。治瀉痢後重。

能除胃脾虛腹痛。瀉痢俱太陰病。不可缺此。寒瀉冷痛。忌用。虞天民中溼熱。脾虛腹痛。曰。白芍不惟治血虛。大能行氣。古方治腹痛。用白

芍四錢。甘草二錢。名芍藥。甘草湯。蓋腹痛因營氣不從。逆於肉裏。白芍能行營氣。甘草能斂逆氣。又痛為肝木剋脾土。白芍能伐肝。故也。

天民又曰。白芍止治血虛腹痛。餘不心痞脅痛。脅者。肝膽二經往來

治以其酸寒收斂。無溫散之功也。白芍能理中瀉肝。肺脹喘噫。癰腫疝瘕。其收降之體。又能入血。

海衝脈為血海。而至厥陰。肝。治鼻衄。鼻血曰衄。自瀉。肝血不足。退火。

肝血自足。婦人胎產。及一切血病。又曰產後忌用。朱丹溪曰。以其酸寒伐

酒妙用之可耳。李時珍曰。產後肝血已虛。不可更瀉也。寇氏曰。減芍藥以避中寒。微寒如芍藥。古人猶諄諄告戒。况大苦大寒。可肆行而

莫之忌耶。○同白朮補脾。同參耆補氣。同歸地補血。同芍藥瀉肝。同甘草止腹痛。同黃連止瀉痢。同防風發痘證。同藜蘆溫經散溼。

赤芍藥。主治略同。尤能瀉肝火。散惡血。治腹痛。墜積血。癍疔。疔。疔。邪聚

為疔腹內為癍。經閉。腸風。癰腫。目赤。皆散瀉之功。白補而收。赤散而瀉。白益脾。能

於土中瀉。木赤散。邪能行血中之滯。產後俱忌用。赤白各隨花色。單

瓣者入藥。酒炒用。寒其。婦人血分醋炒。下痢後重不炒。惡芒硝石斛。

畏鱉甲小蘗反藜蘆。

生地黃。大瀉火。

甘苦大寒入心腎瀉丙火。小腸為丙火。心與小腸相通。用清燥金。胃火消

瘀通經平諸血逆治吐衄崩中。或唾血者。血隨唾出。咯血者。隨痰咯出。

上吐出者。屬肝經。衄血者。血溢於腦。從鼻而出。欬血者。欬出痰內有血。並屬肺經。吐出嘔出成盆成碗者。屬胃經。經漏不止。曰崩。血熱則

妄行。宜以此涼之。虛人傷寒陽強。痘證大熱。痘證用之甚多。服損胃。忘用。用乾地黃可也。

生掘鮮者。搗汁飲之。或用酒製。則不傷胃。生則寒。乾則涼。熟則溫。分

為三條。以便施用。

乾地黃 補陰涼血。

甘苦而寒。沉陰而降。入手足少陰。腎心。厥陰。肝。心包。及手太陽經。小腸。滋陰

退陽生血涼血治血虛發熱。經曰。陰虛生內熱。勞傷欬嗽。欬嗽陰虛者。地黃丸為要藥。亦能除

痰。朱丹溪曰。久病陰火上升。津液生痰。不生血。宜補血以制相火。其痰自除。痿痺驚悸。有觸而心動曰驚。無驚而自動曰悸。

即怔忡也。有因心虛火動者。有因肝虛膽怯者。有因水停心下者。火畏水。故悸也。地黃能交心腎而益肝膽。亦能行水。故治之。吐衄

尿血。痛為血淋。不痛為尿血。由心腎氣結。或憂思房勞所致。多屬虛寒。不可專作熱治。血運崩中。經曰。陰虛

崩。足下熱痛。折跌絕筋。生地一斤。瓜蒌糖一斤。生薑四兩。炒熟。暴傷折處冷則易之。又生地汁三升。酒一升半。煮

服下撲損瘀血。填骨髓。長肌肉。利大小便。調經安胎。又能殺蟲。治心腹急痛。

海上方。搗汁和麪作餅。能利出蟲。忌用鹽。本草匯曰。朱丹溪云。氣病補血。雖不中病。亦無害也。不知血藥屬陰。其性凝滯。若胃虛氣

弱之人。過服歸地等劑。反致痞悶。飲食減少。變證百出。至死不悟。豈不惜哉。大抵血虛固不可專補其氣。而氣虛亦不可徒補其血也。凡

勞病。陽虛宜四君補氣。陰虛宜四物補血。陰陽俱虛者。宜合用。名八珍湯。江浙生者。南方陽氣力微。北方

生者。純陰力大。以懷慶肥大菊花心者良。酒製則上行外行。薑製則

不泥膈。惡貝母。畏蕪荑。忌萊菔。蔥蒜銅鐵器。得酒門冬丹皮當歸良。

熟地黃。平補肝腎。養血。滋陰。

甘而微溫。入手足少陰厥陰經。滋腎水。補真陰。填骨髓。生精血。聰耳

明目。耳為腎竅。目為肝竅。目得血而能視。耳得血而能聰。黑髮烏髭。治勞傷風痹。胎產百病。為

補血之上劑。朱丹溪曰。產前當清熱養血為主。產後宜大補氣血。為

誠至當不易之論。後人不善用之。多有風寒未解。瘀血未盡。妄施補。反致大害者。不可不察。王碩曰。男子多陰虛。宜熱地。女子多血熱。

地。宜生。以好酒拌砂仁末。浸蒸曬九次用。地黃性寒。得酒與火與日則溫。性泥。得砂仁則和氣。且能

引入丹田。六味丸用之為君。尺脈弱者加桂附。所謂益火之原。以消陰翳也。尺脈旺者加知朮。所謂壯水之主。以制陽光也。

何首烏 平補肝腎。滿精。

苦堅。腎溫。補肝。甘益。血澆。收斂。精氣。添精益髓。養血祛風。治風先治血。血活則

散。強筋骨。烏髭髮。故名首烏。令人有子。為滋補良藥。氣血太和。則勞瘦風

虛。崩帶瘡痔。瘰癧癰腫。諸病自已。營血調則癰腫消。赤者外科呼為瘡帶。止惡瘡。益陰補肝。

瘰癧要藥。而本草不言治瘰。李時珍曰。有赤白二種。夜則藤交。一名不寒不燥。功在地黃。天冬諸藥之上。

交藤。有陰陽交合之象。赤雄入血分。白雌入氣分。以大如拳五瓣者

良。三百年者大如栲栳。服之成地仙。凡使赤白各半。泔浸。竹刀刮皮

切片。用黑豆與首烏拌勻。鋪柳甑。入沙鍋。九蒸九曬。用茯苓為使。忌

諸血無鱗魚萊菔蔥蒜鐵器。唐時有首烏者。祖名能嗣。父名延秀。能嗣五十八。尚無妻子。服此藥七日而

思人道。娶妻連生數子。延秀服之。壽百六十歲。首烏又服之。壽百三十歲。髮猶烏黑。李翱為立何首烏傳。然流傳雖久。服者尚少。明嘉靖

初方士邵應節進七寶美髯丹。世宗服之。連生皇子。遂盛行於世。方用赤白首烏各一斤。黑豆拌九蒸曬。茯苓半斤。乳拌當歸。枸杞。菟絲

各半斤。俱酒浸。牛膝半斤。酒浸。同首烏第七次蒸。至第九次。破六味

四兩。黑芝麻炒。蜜丸。並忌鐵器。昂按地黃何首烏。皆君藥也。故六味丸。即以地黃為君。七寶丹。以何首烏為君。各有配合。未可同類。而共施

也。即有加減。當各依本方。隨病而施。損益。今人多以何首烏加入地黃丸中。合兩方而為一方。是一藥二君。安所適從。乎。失製方之本義也。

牡丹皮。瀉伏火而補血。

辛甘微寒。入手足少陰。腎心。厥陰。肝。心包。瀉血中伏火。時色丹故入血分。李

火也。陰火即相火也。世人專以黃藥治相火。不知丹皮之功更勝。故仲景腎氣丸用之。和血涼血而生血。則血枯

涼則生。破積血。積瘀不去。則新血不生。通經脈為吐衄必用之藥。血屬陰。本靜。因

出上治中風五勞驚癇瘵。筋脈伸縮。抽掣為瘵。或手足抽掣。口

為癩皆陰虛血熱風火相搏痰隨火湧所致除煩熱療癰瘡血下胞胎退無汗之骨蒸元張

素曰丹皮治無汗之骨蒸地骨皮治有汗之骨蒸神不足者手少陰志不足者足少陰故仲景腎氣丸用丹皮治神志不足也按內經曰

水之精為志故腎藏志火之精為神故心臟神單瓣花紅者入藥肉厚者佳酒拌蒸用畏貝

母菟絲大黃忌蒜胡荽伏砒李時珍曰花白者補赤者利人所罕悟宜分別之

續斷 補肝腎理筋骨

苦溫補腎辛溫補肝能宣通血脈而理筋骨主傷中補不足經疏曰味甘故

然暖子宮縮小便破瘀血治腰痛胎漏懷妊崩帶遺精腸風血痢是

方平胃散一兩川續斷二錢半每服二錢米飲下治時痢亦驗癰痔腫毒又主金瘡折跌以功止痛命名

生肌女科外科需為上劑川產良狀如雞腳皮黃皺節節斷者真去

向裏硬筋酒浸用地黃為使

骨碎補 補腎治折傷

苦溫補腎。故治耳鳴。耳鳴必由腎虛。及腎虛久瀉。研末入豬腎煨熟。空心食之。腎主二便。久瀉多屬腎

虛不可專責脾胃也。腎主骨。故治折傷。以功命名。粥和敷傷處。○經曰。腎者胃之關也。前陰利水。後陰利穀。牙痛。

炒黑為末。擦牙。嚥下亦良。又入厥陰。心包。肝。能破血止血。入血行傷。故治折傷。粥和末裹傷處。根似薑

而扁長。去毛用。或蜜拌蒸。

益母草。一名茺蔚。通行瘀血。生新血。

辛微苦寒。入手足厥陰。心包。肝。消水行血。去瘀生新。調經解毒。則瘀血去。經調。

治血風血運。血痛血淋。胎痛產難。崩中帶下。帶脈橫於腰間。病生於此。故名為帶。赤屬血。白

屬氣。氣虛者。補中益氣。而兼升降。血虛者。養血滋陰。而兼調氣。為經產良藥。消疔腫乳癰。亦取其散瘀解毒。

通大小便。然辛散之藥。瞳子散大者忌服。

益母子。主治略同。調經益精。明目。血滯病目者。則宜之。活血順氣逐風。氣行則血行。血

活則風散。行中有補。治心煩頭痛。血虛血熱之候。胎產帶崩。令人有子。有補陰之功。李時珍

曰益母根莖花葉實皆可同用若治瘡腫胎產消水行血則宜並用
 若治血分風熱明目調經用子為良蓋根莖花葉專於行子則行中
 有補也產寶濟陰返魂丹小暑端午或六月六日採益母
 莖葉花實為末蜜丸治胎產百病近效方搗汁熬膏亦良
忌鐵子微

炒用。

澤蘭 通行血消水。

苦泄熱甘和血辛散鬱香舒脾入足太陰厥陰肝脾通九竅利關節養

血氣長肌肉破宿血調月經消癥瘕散水腫防已治產後血瀝腰痛。

未行於行吐血鼻血目痛頭風癰毒撲損補而不滯行而不峻為女科要

藥古方澤蘭丸甚多李時珍曰蘭草澤蘭一類二種俱生下溼紫莖素枝赤

節綠葉葉對節生有細齒但以莖圓節長葉光有歧者為蘭草莖微

方節短葉有毛者為澤蘭嫩時並可按音那而佩之楚詞所謂級秋蘭

以為佩是也朱文公離騷辨證曰必花葉俱香燥溼不變方可刈佩吳

人呼爲香草。俗名孩兒菊。夏日探置髮中則髮不腫。浸油塗髮去垢香澤故名澤蘭。蘭草走氣分。

故能利水道。除痰癖。殺蟲辟惡。而爲消渴良藥。經曰：數食肥甘。傳爲消渴。治之以蘭。除陳

也。澤蘭走血分。故能消水腫。塗癰毒。破瘀除癥。而爲婦人要藥。以爲

今之山蘭者誤矣。防己爲使。寇宗奭朱丹溪並以蘭草爲山蘭之葉。李時珍考衆說以譏之。按別本曰：蘭葉

甘寒。清肺開胃。消痰利水。解鬱調經。閩產者力勝。○閩產爲勝。則是建蘭矣。○李士材曰：蘭葉稟金水之氣。故入肺臟。東垣方中嘗用之。

內經所謂治之以蘭。除陳氣者是也。余屢驗之。李時珍又謂東垣所用乃蘭草也。其集諸家之言曰：陳遜齋閑覽云：楚騷之蘭。或以爲都

梁香。或以爲澤蘭。或以爲猗蘭。當以澤蘭爲正。今之所種如麥門冬者名幽蘭。非真蘭也。故陳止齋著盜蘭說以譏之。○既名幽蘭。正合

騷經矣。○方虛谷訂蘭說言：古之蘭草。卽今之千金草。俗名孩兒菊者。今之所謂蘭。其葉如茅者。根名土續。斷因花積郁。故得蘭名。楊升

菴曰：世以如蒲。蒼者爲蘭。九腕之受誣也。久矣。又吳草處有蘭。說曰：蘭爲醫經上品。有根有莖。草之植者也。今所謂蘭。無枝無莖。因黃山

谷稱之。世遂謬指爲離騷之蘭。寇氏本草。溺於流俗。反疑舊說爲非。夫醫經爲實用。豈可誣哉。今之蘭果可以利水殺蟲。而除痰癖乎。其

種盛於閩。朱子閩人。豈不識其土產而辨析若此。世俗至今猶以非蘭爲蘭。何其惑之甚也。昂按：朱子辨蘭。援離騷。紉佩以爲證。竊謂紉

佩亦騷而英。致之詞耳。如所云。飲木蘭之堅露。豈秋菊之落英。豈芙蓉可飲。而英可餐乎。又云。製芰荷以爲衣。集芙蓉以爲裳。豈異芰荷。蘭則非芙蓉可裳乎。宋儒釋經。執泥恐未可爲定論也。第騷之經。言秋屬本經之澤蘭無疑也。然離騷不嘗曰。春蘭兮秋菊乎。不又曰。結幽蘭而延竚乎。不又曰。疏石蘭以爲芳乎。若秋蘭既屬之澤蘭。將所謂春蘭之品。古今評者。又不得爲山蘭。當是。何等之蘭乎。且山蘭。爲花中。最上之品。古今評者。列之。梅菊之前。今反屈於孩兒菊之下。以爲盜襲其名。世間至賤之草。皆收入本草。獨山蘭。清芬佳品。擯棄不錄。何其不幸。若斯之甚也。本草殺蠱之藥。良多。皆未必有驗。至於行水消痰。固山蘭之葉力所優爲者也。蓋李時珍。陳方吳。楊輩。皆泥定陳藏器。以澤蘭。蘭草爲一類二種。遂併騷經而疑之。崇澤蘭而黜山蘭。遂令蘭草無復有用之者。不思若以爲一類。則本經蘭草。一一入氣分。一出何以本經。蘭草反列之上品。而澤蘭止爲中品乎。況一入氣分。一入血分。迥然不同也。又騷經言。蘭者凡五。除木蘭。人所共識。其餘春蘭。秋蘭。幽蘭。石蘭。若皆以爲孩兒菊。是不特一類二種。且四種一類矣。而以爲九畹之受誣。豈理也哉。蓋本經言澤蘭。所以別乎山也。言蘭草。明用葉而不用其花也。騷經言秋蘭。所以別乎春也。言石蘭。所以別乎澤也。愚謂秋蘭。當屬澤蘭。而春蘭。石蘭。定是山蘭。其曰幽蘭。則山蘭之別名。以其生於深山窮谷故也。寇氏朱氏之論。又安可全非也。姑附之。士說。

白薇 瀉血熱。

苦鹹而寒。陽明衝任之藥。利陰氣。下水氣。主中風身熱支滿。忽忽不

知人。陰虛火旺則內熱生風。火氣焚灼。故身熱支滿。痰隨火湧。故不知人。血厥。汗出過多。血少。陽氣獨

尤多。此證宜白薇湯。白薇當歸各一兩。參五錢。甘草錢半。每服五錢。熱淋。溫瘧。洒洒。寒熱酸痛。則營氣

不能內營。婦人傷中淋露。血熱千金白薇散。治胎前產後遺尿。不知

故酸痛。河間所謂熱甚。廷孔鬱結。神無所依。不產虛煩嘔。仲景安中益氣竹

能收禁之意也。○廷孔。女人溺孔也。古方調經種子。往往用之。蓋不孕緣於血熱。血少而其源起於真陰

不足。陽勝而內熱。故營血日枯也。益陰清熱。則血自生旺而有子矣。

須佐以歸地芍藥。杜仲菴蓉等藥。似牛膝而短小柔輒。去鬚酒洗用。惡大黃大戟山

茱薑棗。艾葉。宜理氣血。燥逐寒溼。

苦辛。生溫熟熱。純陽之性。能回垂絕之元陽。通十二經。走三陰。太少

理氣血。逐寒溼。暖子宮。止諸血。溫中開鬱。調經安胎。胎動腰痛下血。膠艾湯良。阿膠

艾葉煎服。治吐衄崩帶。治帶要藥。腹痛冷痢。霍亂轉筋。皆理氣血逐寒溼之效。殺蛇

治癰。醋煎。外科有用。乾艾作湯。投白礬二三錢。洗瘡。然後敷藥。以之

灸。音九。火能透諸經。而治百病。血熱為病者。禁用。灸火則氣下行。入藥則熱上衝。不可過劑。

○丹田氣弱。臍腹冷者。以熟艾裝袋。兜臍。陳者良。揉搗如綿。謂之熟

艾。灸火用。婦人丸散。醋煮搗餅。再為末用。入茯苓數片。煎服宜鮮者。同研則易細。

苦酒醋也。香附為使。艾附丸。調婦人諸病。宋時重湯陰艾。自明成化來。則以蘄州艾為勝。云灸酒壘。一灸便透。蒙筌發明。

並以野艾為真。斬艾。雖香實非艾種。

延胡索。宜活血利氣。

辛苦而溫。入手足太陰。脾肺厥陰。肝心包。經能行血中。氣滯氣中。血滯通

小便。除風痹。治氣凝血結。上下內外諸痛。通則不痛。癥瘕崩淋。月候不調。

氣血不和。因而凝滯。不以時至。產後血運。暴血上衝。折傷積血。疝氣危急。爲活血利。

氣第一藥。然辛溫走而不守。獨用力迅宜。兼補氣血藥。通經墜胎。血熱氣虛者禁。

用。根如半夏。肉黃小而堅者良。酒炒行血。醋炒止血。生用破血。炒用。

調血。

紅花。古名紅藍花。通行血。潤燥。

辛苦甘溫。入肺經。而破瘀。血活血。瘀行則血活。有熱結於中。暴吐紫。

紅花行之。大抵鮮血宜止。瘀血宜行。潤燥消腫止痛。凡血熱血瘀。則作腫作痛。治經閉便難。血運口。

噤。胎死腹中。非活血行。不能下。痘瘡血熱。本草不治痘。喉痹不通。又能入心經。生。

新血。須兼補益。藥爲佐使。俗用染紅。併作胭脂。胭脂以油胭脂敷之良。少用養。

血多則行血。過用能使血行不止而斃。任紅花汁與相類。故治血病。

有產婦血悶而死。名醫陸氏以紅花數十斤煮湯。寢婦於上而薰之。湯冷再加。半日而蘇。金匱有紅藍花酒。云治婦人六十二種風。

茜草 通·行·血·

色赤入營。氣溫行滯。味酸走肝。而鹹走血。苦寒。入厥陰。肝心包。血分能

行血止血。能行故能止。消瘀通。酒煎一兩。治風癩黃疸。有

五黃疸。殺酒疸。黃汗。女勞疸。此蓋蓄血發黃。不專於溼熱者也。女勞疸必屬腎虛。亦不可以溼熱例治。常用四物。知藥壯其水。參朮

培其氣。隨證而加。利溼清熱藥。崩運撲損。痔瘻瘡癩。血少者忌用。根可染絳。忌鐵。

紫草 瀉·血·熱·滑·腸·

甘鹹氣寒。入厥陰。肝心包。血分涼。血活血利。九竅通二便。鹹寒性滑。治心腹

邪氣。即熱也。水腫五疸。癩癬惡瘡。血熱所致。及痘瘡血熱毒盛。二便閉澇者。

血熱則毒閉。得紫草涼之。則血行而毒出。大便利者忌之。活幼心書曰。紫草性寒。小兒脾實者可用。脾虛者反能作瀉。古方惟用茸。取其

初得陽氣。以類屬類。用發痘瘡。瀉者忌用。去頭髮酒洗。今人不達此理。一概用之。誤矣。

凌霄花 一名紫葳。瀉·血·熱·

甘酸而寒。入厥陰肝包。血分能去血中伏火。破血去瘀。主產乳餘疾。

崩帶癥瘕。腸結便不大。血閉。淋瀝風痒。血熱生風之證。女科多用。孕婦

忌之。本經曰。養胎經疏云。破血之藥。非所宜也。○肺癰有用。之為君藥者。凌霄花為末。和蜜陀僧睡調。敷酒。難甚驗。藤生。花

開五瓣。黃赤有點。不可近鼻。嗅之傷腦。

大小薊。瀉涼血。

甘溫。大明曰。涼。皆能破血。下氣行而帶補。治吐衄腸癰。女子赤白濁。安胎。

涼血之功。小薊力微。能破瘀生新。保精養血。退熱補虛。不能如大薊之消

癰毒。朱丹溪曰。小薊治下焦結熱。血淋。本方。一煎。兩薊相似。花如髻。人冷氣。入陰囊。腫滿疼痛。煎大薊汁服。立瘥。

大薊莖高而葉皺。小薊莖低而葉不皺。皆用根。

三七。一名山漆。瀉散瘀定痛。

甘苦微溫。散血定痛。治吐血衄血。血痢血崩。目赤癰腫。醋磨塗。即散。已破者為末。

之。推。為。金。瘡。杖。瘡。要。藥。杖時先服一二錢則血不衝心杖後敷之去藥消腫易愈大抵陽明厥陰血分之藥故治血病

此藥近時始出軍中恃之從廣西山洞來者略似白芨地黃有節味

微甘頗似人參以末搽豬血中血化為水者真。近出一種葉似菊艾而勁厚有歧尖莖有

赤稜夏秋開黃花蕊如金絲盤紐可愛而氣不香根大如牛蒡味甘極易繁衍云是三七治金瘡折傷血病甚效與南中來者不同

地榆 瀉止血

苦酸微寒性沉而瀉。本草未嘗言瀉然能收汗止血皆酸斂之功也入下焦除血熱治吐衄

崩中。血虛禁用腸風。血鮮者為腸風隨感而見也血瘀者為膿毒積久而發也糞前為近血出腸胃糞後為遠血出肺肝血

痢。蘇頌曰古方斷下多用之寇宗奭曰虛寒瀉痢及初起者忌用○蘇頌著本草圖經似柳根外黑裏紅取上

截炒黑用梢皮行血得髮良惡麥冬

蒲黃 生滑行血炒瀉止血

甘平厥陰肝心包血分藥生用性滑行血消瘀通經脈利小便祛心腹

膀胱寒熱。同五靈脂。名失笑散。治心腹血氣痛。療撲打損傷。瘡癬諸腫。以蒲黃。舌。頻。滿。口。

曉乃愈。宋度宗舌脹滿口。御醫用蒲黃。乾薑末等分。搽之愈。李時珍曰。觀此則蒲黃之涼血活血可知矣。蓋舌為心苗。心包相火。乃其臣

使。得乾薑。是炒黑性。瀋止一切血崩帶泄精。陰陽相濟也。

香蒲花中蕊屑湯成入藥。

卷柏。生用破血。炙用止血。

生用辛平。破血通經。治癥瘕淋結。炙用辛溫。止血。治腸風脫肛。生石

上。拳攣如雞足。俗呼萬年松。凡使鹽水煮半日。井水煮半日。焙用。

菌茹。瀉破血。

辛寒有小毒。蝕惡肉。排膿血。殺疥蟲。除熱癩。破癥瘕。內經同烏鱗骨。治婦人血枯。

根如萊菔。皮黃肉白。葉長微闊。折之有汁。結實如豆。一顆三粒。甘草

為使。

菴蘭子。瀉。行水。散血。

苦辛微寒。別錄微溫。入肝經血分。行水散血。散中有補。治陽痿經澀。腰膝

骨節重痛。產後血氣作痛。閃到折傷。多用之。能制蛇。見之。葉似菊而

薄。莖似艾而粗。薏苡爲使。

鬱金。宜。行氣。解鬱。瀉。泄血。破瘀。

辛苦氣寒。純陽之品。其性輕揚。上行入心。及包絡。兼入肺經。涼心熱。

散肝鬱。下氣破血。行滯氣亦不損正氣。治吐衄尿血。婦人經脈逆行。

經不下。行上爲吐衄。諸證用鬱金末。加薑汁。薑汁。薑便服。其血自清。痰中帶血者。加竹瀝。血氣諸痛。產後敗血攻

心。顛狂失心。頗多喜笑。尚知畏懼。證屬不足。狂多忿怒。人莫能制。證屬有餘。此病多因驚憂。痰血塞於心竅。所致。鬱金七兩。

白礬三兩。米糊丸服。名白金丸。鬱毒入心。鬱金一兩。甘草二錢。半。金入心散。惡血明。礬化頑痰。故也。痘毒入心。煮乾焙研末。冰片五分。

斑痘始有。白泡忽搐入腹。紫黑無膿。下蠱毒。同升麻服。不吐則下。出川廣體

銳圓如蟬肚。外黃內赤。色鮮微香。味苦帶甘者真。市人多以黨黃偽之。

薑黃 瀉破血行氣。

苦辛 本草大寒。藏器大明曰熱。色黃。入脾兼入肝經。理血中之氣。下氣破血。除風。

消腫功力。烈於鬱金。治氣脹血積。產後敗血攻心。通月經。療撲損。片

子者。能入手臂。治風寒溼痹。血虛臂痛者勿用。李時珍曰。入臂治痛。其兼理血中之氣可知。出川廣。

陳藏器曰。鬱金苦寒。色赤。薑黃辛溫。色黃。薑味苦。色青。三物不同。所用各別。經疏曰。薑黃主治介乎三稜。鬱金之間。李時珍曰。薑黃鬱金

我。薑形狀功用大略相近。但鬱金入心。專治血。薑黃入脾。兼治血中之氣。薑入肝。治氣中之血。稍為不同。今時以扁如乾薑者為片子。薑

黃圓如蟬腹者為蟬肚。鬱金並可染色。薑形雖似鬱金。而色不黃也。

蓬莪朮 瀉破血行氣消積。

辛苦氣溫。入肝經。血分破。氣中之血。能通肝經聚血。消瘀通經。開胃化食。解

毒止痛。治心腹諸痛。冷氣吐酸。奔豚疝癖。酒醋磨服。疝音賢。小腹痛。積

藥良。昔有人患癩癧死。遺言開腹取之。得病塊如石。文理五色。削成刀柄。因砍三稜。柄消成水。乃知此藥。可療癩癧。消腫止痛。通乳墮胎。功近香附。而力峻。虛者慎用。色黃體重。若鯽魚而小者良。醋浸炒。或麪裹煨。

白茅根。瀉火。補中。止血。止嘔。

甘寒。入手少陰。心。足太陰陽明。脾。補中益氣。除伏熱。消瘀。血利小便。

解酒毒。治吐衄諸血。心肝火旺。逼血上行。則吐血。肺火盛。則衄血。茅根甘和。血寒涼。血引火下。降故治之。撲損瘀血。

搗汁服。名茅花湯。亦治鼻衄產淋。血閉寒熱。血瘀則閉。閉則熱作矣。淋瀝崩中。血熱則崩。傷寒嘔逆。

即呃逆。說文曰。嘔。氣。悟也。東垣作乾嘔之甚者。未是。肺熱喘急。內熱煩渴。黃疸水腫。清火。行水。

良藥也。世人以微而忽之。惟事苦寒之劑。傷冲和之氣。烏足知此哉。

茅鉞。潰癰癧。酒煮服。一鉞潰一孔。二鉞潰二孔。

蘆根。瀉熱。止嘔。

甘益胃。寒降火。治嘔噦反胃。胃熱火升則嘔逆。食不消渴。客熱傷寒。

內熱。止小便數。肺為水之上源。脾氣散精。上歸於肺。始能通水道。下輸膀胱。腎為水臟。而主二便。三經有熱。則小便數。

甚至不能少忍。火性急速。故也。蘆中空。故入心肺。清上焦熱。熱解則肺之氣化行。而小便復其常道矣。能解魚蟹河豚

毒。取逆水肥厚者。去鬚節用。

苧麻根 瀉熱散瘀。

甘寒而滑。補陰破瘀。解熱潤燥。治天行熱疾。大渴大狂。胎動下血。諸

淋血淋。搗貼赤遊丹毒。癰疽發背。金瘡折傷。止血。易癒。雞魚骨鯁。搗如龍眼。雞骨

雞湯下。魚骨魚湯下。汁能化血為水。

苧麻皮與產婦作枕。止血運安腹上。止產後腹痛。散瘀之功。漚苧汁。療消

渴。

薔薇根 瀉溼熱。

苦澇而冷。入胃大腸經。除風熱溼熱。生肌殺蟲。治泄痢消渴。牙痛口

糜。煎汁含漱。遺尿好眠。癰疽瘡癬。花有黃白紅紫數色。以黃心白色粉紅

者入藥。

薔薇子名營實。酸溫。主治略同。千金曰：薔薇根角高，口瘡之神藥。角高所在多有，開淡紅紫花。角微彎長

二寸許，辛苦有小毒。治惡瘡有蟲及口齒瘡。

芭蕉根。瀉熱。

味甘大寒。治天行熱狂。煩悶消渴。產後血脹。並搗汁服。塗癰腫結熱。為末調

敷霜後者佳。

大黃。大瀉血分溼熱。下有形積滯。

大苦大寒。入足太陰。脾。手足陽明厥陰。大腸胃心包肝。血分。其性浮而不沉。

其用走而不守。若酒浸亦能引至至高之分。仲景太陽門調胃承氣湯。大黃註曰酒浸。陽明

門大承氣湯。大黃註曰酒洗少陽陽明小承氣湯。大黃不用酒製。皆

有分別。李東垣曰邪氣在上非酒不至。若用生者則遺至高之邪熱。

病愈後或日赤喉痹。用以蕩滌腸胃。下燥結而除瘀熱。治傷寒時疾。

發熱譫語。大腸有燥囊故譫。語宜下之。譫音占。溫熱瘴瘧。下痢赤白。腹痛裏急。黃疸水

腫。癥瘕積聚。積久成形謂之積。屬陰。聚散無常謂之聚。屬陽。積多是血。或食或痰。聚多是氣。留飲宿食。心腹

痞滿。二便不通。皆土鬱。吐血衄血。血閉血枯。損傷積血。一切實熱。血

中伏火。行水除痰。蝕膿消腫。能推陳致新。然傷元氣而耗陰血。下多

若病在氣分。胃虛血弱。人禁用。病在氣分而用之。是為誅伐無過。李

東垣曰能推陳致新。如定禍亂以致

太平所以有將軍之號。李時珍曰仲景瀉心湯治心氣不足吐衄血

者用大黃黃連黃芩乃瀉心包肝脾胃四經血中之伏火也。又治心

下痞滿按之硬者用大黃黃連瀉心湯亦瀉脾胃之溼熱。非瀉心也。

病發於陰而反下之則痞滿乃寒傷營血邪結上焦胃之上院當心。

故曰瀉心。經曰太陰所至為痞滿。又曰濁氣在上則生脹。脹是已病

發於陽而反下之則結胸乃熱邪陷入血分亦在上院故大陷胸湯

丸皆用大黃亦瀉脾胃血分之邪而降其濁氣也。若結胸在氣分只

用小陷胸湯痞滿在氣分只用半夏瀉心湯或問心氣不足而吐衄。

何以不補心而反瀉心。朱丹溪曰：少陰不足，元陽無輔，致陰血妄行。故用大黃瀉其亢甚之火。又心本不足，肝肺各受火邪而病作。故用黃芩救肺。黃連救肝。肺者陰之主，肝者心之母，血之合也。肺肝火退，則血歸經而自安矣。寇宗奭曰：以苦泄其熱，就以苦補其心。蓋一舉而兩得之。李士材曰：古人用大黃治虛勞吐血，意甚深微。蓋濁陰不降，則清陽不生，瘀血不去，則新血不生也。川產錦紋者良。有酒浸酒蒸生熟之不同。生用更峻。黃芩爲使。欲取通利者，不得穀食，便不能通利耳。夷堅志：湯火傷者，搗生大黃醋調敷，止痛無癢。

黃芩 瀉火除溼

苦入心。寒勝熱。瀉中焦實火。除脾家溼熱。治澀痢腹痛。便血曰澀。腹痛忌用。凡腹

痛有寒熱虛實食積瘀血痰溼之不同。寒宜溫，熱宜清，虛宜補，實宜下。食宜消導，瘀血宜行散，痰溼宜化，痰利溼痛時手不可按者爲實。

痛按之痛止者爲虛痛。寒熱往來。邪在少陽。黃疸五淋。血閉。實熱在血分。氣逆。癰疽瘡瘍。

及諸失血。消痰。朱丹溪以黃芩降痰，假其降火也。按痰因火動，當先降火。利水。解渴安胎。胎孕宜清熱涼

血。血不安。養陰退陽。補膀胱水。酒炒則上行。瀉肺火。利胸中氣。肺主氣，熱

傷氣瀉熱。所以保肺。治上焦之風熱溼熱。朱丹溪曰：黃芩火嗽喉腥。五臭肺目

赤腫痛。過服損胃。血虛寒中者禁用。得柴胡退寒熱得芍藥治痢得厚朴黃連止腹痛得桑皮瀉肺

火得白朮安胎之聖藥。李時珍曰：仲景治少陽證小柴胡湯。太陽少陽合病下利黃芩湯。少陽證下後心滿瀉心湯。並用之。蓋黃連苦寒。

入心瀉熱。除脾家溼熱。使胃火不流。入肺不致刑金。即所以保肺也。肺虛不宜者。苦寒傷土。損其母也。少陽證雖在半表半裏。而心膈痞。

滿實兼心。肺上焦之邪。心煩喜嘔。默默不欲食。又兼脾胃中焦之證。故用黃芩以治手足少陽相火。黃芩亦少陽藥也。楊士瀛曰：柴胡退。

熱不及黃芩。李時珍曰：柴胡乃苦以發之。散火之標也。黃芩乃寒能勝熱。折火之本也。李東垣治肺熱身如火燎。煩躁引飲。而晝盛者。宜。

一味黃芩湯。以瀉肺經氣分之火。黃明者良。中虛名枯芩。即片瀉。芩一兩煎服。本事方用治崩中暴下。瀉大腸火。補膀胱水。上行酒炒。

肺火清肌表之熱。內實名條芩。即子。瀉肝膽火。豬膽汁炒。山茱萸龍骨為使。畏丹皮丹砂。

瀉肝膽火。豬膽汁炒。山茱萸龍骨為使。畏丹皮丹砂。

黃連 瀉火燥溼。

大苦大寒。入心瀉火。王海藏曰：瀉心實瀉脾也。實則瀉其子。鎮肝涼血。凡治血防風為

爲中下部之使地燥溼開鬱解渴治單用能除煩益肝膽厚腸胃消心痰

能去心竅惡血止盜汗涼治腸澼瀉痢便血曰澼有膿連丸溼熱鬱而爲痢

人參煎湯呷之但得下咽便好嘉言曰下痢必先汗解其外後調

其內首用辛涼以解表次用苦寒以攻裏機要曰後重宜下腹痛宜

和身重宜除溼脈弦宜去風風邪內結宜汗身冷自汗宜溫膿血稠

黏宜重劑以竭之下痢赤屬血分白屬氣分戴氏曰俗謂赤熱白寒

者非也通作溼熱處治痞滿下痞五等瀉心湯皆用之腹痛清心

痛伏梁積目痛背傷分煎湯熱洗散熱活血癰疽瘡疥諸痛癢瘡酒

毒胎毒小兒初生合甘草明目傳信方羊肝一具黃連一兩搗定驚

鎮止汗解毒除疔同豬肚爲丸殺虻虻得苦虛寒爲病者禁用久服黃連

從火化也昂按炎上作苦味苦必燥燥則熱矣且苦寒沉陰殺伐

傷生和之氣也韓悉曰黃連與肉桂同行能交心腎於頃刻李時珍

曰治痢用香連丸薑連丸用黃連乾薑黃散用黃連生薑左金丸

用黃連吳茱萸治口瘡用黃連細辛止下血用黃連大蒜一陰一陽

良。去毛。治心火。生用。盧火。醋炒。肝膽火。豬膽汁炒。上焦火。酒炒。有吞酸

難等證亦有吐酸者名醉心宜黃連吳茱萸降火開鬱醉音醋中焦火。薑汁炒。下焦火。鹽水或童便

炒。食積火。黃土炒。治溼熱在氣分。吳茱萸湯炒。在血分。乾漆水炒。點

眼赤人乳浸。李時珍曰諸法不獨為之引導蓋辛熱制其寒苦鹹寒制其燥性用者詳之黃芩龍骨為使。

惡菊花玄參殭蠶白鮮皮。畏款冬牛膝。忌豬肉。李時珍曰方有臟連丸黃連豬肚丸豈忌

肉而不忌殺烏頭巴豆毒。黃連瀉心火佐以龍膽瀉肝膽火白芍瀉

臟腑乎胡瀉肝膽火。黃連佐之。瀉三焦火。黃芩佐之。鄭奠一曰熱鬱惡心。兀

兀欲吐用黃連數分甚效

胡黃連 瀉熱療驚疳

苦寒。去心熱。益肝膽。厚腸胃。治骨蒸勞熱。五心。心窩左右煩熱。三消

渴而多飲為上消肺熱也心移熱於肺傳為膈消是也多食善飢為中消胃熱也瘰成為消中是也渴而小便數有膏為下消腎熱而水

也。五痔。牝痔。牡痔。脈痔。腸痔。血痔。溼熱下流。傷血分。無所施洩。則逼肛門。而為痔腫。溫瘧瀉痢。女人胎蒸。

消果子積。為小兒驚疳良藥。朱二允曰。解吃烟毒。合茶服之。甚效。性味功用同黃連。故名。

出波斯國。今秦隴南海亦有之。心黑外黃。折之塵出如烟者。真畏惡同黃連。

惡同黃連。

苦參。瀉火。燥溼。補陰。

苦燥溼。寒勝熱。沉陰主腎。補陰益精。養肝膽。安五臟。溼熱去則血氣和平。而五臟自

安。利九竅。生津止渴。明目止淚。淚為肝熱。治溫病血痢。純下清血者。風傷

下如豆汁者。溼傷脾也。宜清熱滲溼。腸風溺赤。黃疸酒毒。熱生風。溼生蟲。又能祛風逐

水殺蟲。治大腸疥癩。然大苦大寒。肝腎虛而無熱者勿服。張從正曰。凡藥皆毒

也。雖苦參甘草不可不謂之毒。久服必偏勝為患。經曰。五味入胃。各歸其所喜攻。久而增氣。物化之常也。氣增而久。天之由也。王冰註曰。

氣增不已。則臟有偏勝。偏勝則臟有偏絕。故令人暴夭。筆談曰。久用苦參擦牙。遂病腰痛。由其氣傷腎也。經又曰。大毒治病。十去其六。常用

毒治病十去其七。小毒治病十去其八。無毒治病十去其九。穀肉果

菜。食養盡之。無使過之。傷其正也。按人參補脾。沙參補肺。紫參補肝。

丹參補心。玄參補腎。苦參不在五參之內。然名參者。糯米泔浸去腥

氣。蒸用。玄參爲使。惡貝母。菟絲子。漏蘆。反藜蘆。醋煮。能吐。天行時毒。

知母。瀉火。補水。潤燥。滑腸。

辛苦寒滑。上清肺金而瀉火。瀉胃熱。勝膀胱邪。下潤腎燥而滋陰。入二

經氣分。二黃藥入二經血分行。故消痰定嗽。止渴安胎。莫非清火之用。治傷寒煩

熱。葶勞。勞產骨蒸。退有汗燥渴虛煩。久瘡下痢。治嗽者。清肺火也。治渴

瀉腎利二便。消浮腫。小便利則腫消。李東垣曰。熱在上焦。氣分結。祕

火也。利二便。消浮腫。而渴乃肺中伏熱。不能生水。膀胱絕其化源。宜

用滲溼之藥。瀉火清金。滋水之化源。熱在下焦。血分便閉而不渴。乃

真水不足。膀胱乾涸。無陰則陽無以化。宜用黃蘗。知母。大苦寒之藥。

滋腎與膀胱之陰。而陽自化。小便自通。朱丹溪曰。小便不通。有熱有

溼。有氣結於下。宜清宜燥。宜升。又有隔二隔三之治。如肺不通。燥。但勝

因脾熱。宜瀉膀胱。此正治。如因肺熱。不能生水。則燥胃健脾。此隔二之治。如

瀉膀胱黃藥知母之類清肺車前茯苓之類燥脾二
尤之類昂按凡病皆有隔二隔三之治不獨便闕也然苦寒傷胃而
滑腸多服令人瀉李士材曰苦寒肅殺非長養萬物者也世以其滋
陰施之虛損之人則如水益深矣特表出以爲戒

得酒良上行酒浸下行鹽水拌忌鐵。

龍膽草瀉肝膽火下焦溼熱

大苦大寒沉陰下行益肝膽而瀉火相火寄於肝膽有瀉無補兼入
瀉其邪熱卽所以補之也

膀胱腎經除下焦之溼熱與防己同功酒浸亦能外行上行治骨間
寒熱腎主骨驚癩邪氣肝經風火時氣溫熱熱痢疽黃寒溼腳氣足傷溼熱
則成腳氣

腫而痛者爲溼腳氣宜清熱利溼搜風又有擊擊
縮枯細痛而不腫者名乾腳氣宜養血潤燥咽喉風熱赤睛努肉

瀉肝膽火能明目張元素曰柴胡爲主龍膽爲使使
目疾要藥昂按若目疾初起宜發散忌用寒涼癰疽瘡疥過服損

胃甘草水浸一宿曝用小豆貫衆爲使忌地黃

青黛瀉肝散鬱火

鹹寒。色青。瀉肝散。五臟鬱火解。中下焦蓄蘊風熱。衍義曰：一婦患溼疥

熱癩而痛。出黃汁。二便澀。用鱧鱗松脂黃丹之類塗之。熱痛愈甚。其

婦嗜酒。喜食魚蝦。發風之物。乃用馬齒莧四兩研爛。入青黛一兩和

塗。熱痛皆去。仍服八正散而愈。此中下焦蓄蘊風熱毒

氣若不出。當作腸風內痔。婦不能禁酒。物果仍發痔。 治傷寒發斑。

吐咯血痢。陰虛火炎者忌用。合杏仁研置。 小兒驚癇。疳熱丹熱。敷癰

瘡蛇犬毒。即旋花。取嬌碧者。水飛淨用。內多石灰。故須淘淨。

大青。瀉心胃熱毒。微苦鹹。大寒。解心胃熱毒。治傷寒時疾熱狂。陽毒發斑。熱甚傷血。裏

斑。輕如疹子。重如錦紋。紫黑者熱極而胃爛。 黃疸熱痢。丹毒喉痹。處

也。多死。活人書。治赤斑煩痛。有犀角大青湯。 處有之。高二三尺。莖圓葉長。葉對節生。八月開小紅花成簇。實大如

牽牛。大瀉氣分溼熱。

辛熱有毒。屬火。善走入肺經。瀉氣分之溼熱。肺主氣。火能平金而泄肺。能達右腎

命門。走精隧。通下焦鬱遏。及大腸風祕氣祕。利大小便。逐水消痰。殺

蟲墮胎。治水腫喘滿。疝瘕。氣塊。若溼熱在血分。胃弱氣虛。人禁用。李東

垣曰。牽牛苦寒誤矣。其味辛辣。久嚼猛烈。壯所謂苦寒安在哉。乃瀉氣之藥。比諸辛藥泄氣尤甚。若溼從下受。下焦主血。血中之溼。宜

苦寒之味。而反用辛熱之藥。泄上大焦之氣。是血病瀉氣。使氣血俱損也。王好古曰。以氣藥引。則入氣。以大黃引。則入血。李時珍曰。一婦腸

結。年幾六十。服養血潤燥藥。則泥結。服硝黃藥。則若罔知。如此三十餘年。其人體肥膏粱。而多鬱。日吐酸痰。乃寬此。乃三焦氣滯。有升無

降。津液皆化為痰。不能下潤腸腑。非血燥也。潤劑留滯。硝黃入血。不能入氣。故無效用。牽牛為末。阜角膏丸。纔服便通。外甥素多酒色。病

二便不通。脹痛呻吟。七晝夜用通利藥不效。予言此乃溼熱之邪。在精。道路壅塞。病在二陰之間。故前阻小便。後阻大便。病不在大腸。勝

胱也。用棟實。茴香。穿山甲。諸藥。倍牽牛。三服而平。李東垣補下焦陽虛。天真丹。用牽牛鹽水炒黑。佐沉香。杜仲。肉桂。破故紙。諸藥。深得補

之妙。施有黑白二種。黑者亦名力速。取子淘去浮者。春去皮用。得木

香乾薑良。此藥漢前未入本草。故仲景方中無此。別錄始載之。宋後始多用者。

防己

通行水瀉下焦血分溼熱。

大苦大寒。本經平。別錄溫。太陽膀胱經藥。能行十二經。通腠理。利九竅。瀉下焦。

血分溼熱為療風水之要藥。治肺氣喘嗽。水溼熱氣諸癩。降氣下痰。溼瘡腳

氣。足傷寒溼為腳氣。寒溼鬱而為熱。溼則腫。熱則痛。防己為主藥。溼

加苳仁蒼朮木瓜木通熱加苓藥風加羌活草薢痰加竹瀝南星。痛加香附木香活血加四物大便秘加桃仁紅花小便秘加牛膝澤瀉痛連臂加桂枝威靈仙痛連脅加膽草又有足跟痛者屬腎虛不

與腳氣同論。水腫風腫癰腫惡瘡或溼熱流入十二經致二陰不通者非

此不可然性險而健陰虛及溼熱在上焦氣分者禁用。十劑曰通可去滯通草防

己之屬是也。通草即木通。是徐之才亦以行水者為通。與燥劑無以別矣。木通甘淡瀉氣分溼熱。防己苦寒瀉血分溼熱。○本集以行水

為通劑改熱藥為燥劑。出漢中根大而虛通心有花紋色黃名漢防己黑點黃

腥木強者名木防己不佳。陳藏器曰治風用木防己治水用漢防己。酒洗用惡細辛畏葶

藶。

葶藶

大瀉氣秘通。行水。

辛。苦。大。寒。屬。火。性。急。大。能。下。氣。行。膀。胱。水。肺。中。水。氣。臍。急。者。非。此。不。

能。除。破。積。聚。癥。結。伏。留。熱。氣。消。腫。除。痰。止。嗽。定。喘。水。溼。泛。溢。為。腫。脹。為。痰。嗽。為。喘。滿。

通。經。利。便。久。服。令。人。虛。十。劑。曰。洩。可。去。閉。葶。藶。泄。陽。分。氣。閉。氣。味。俱。厚。不。

減。大。黃。然。有。甜。苦。二。種。甜。者。性。緩。苦。者。性。急。泄。肺。而。傷。胃。宜。大。棗。補。之。仲。景。有。葶。藶。大。棗。瀉。肺。湯。治。肺。氣。喘。急。不。得。臥。昂。按。輔。以。大。棗。補。

土。所。以。制。水。子。如。黍。米。微。長。色。黃。合。糯。米。微。炒。去。米。用。得。酒。良。榆。皮。為。使。

甘遂

大。通。瀉。經。隧。水。溼。

苦。寒。有。毒。能。瀉。腎。經。及。隧。道。水。溼。直。達。水。氣。所。結。之。處。以。攻。決。為。用。

為。下。水。之。聖。藥。仲。景。大。陷。胸。湯。用。之。主。十。二。種。水。大。腹。腫。滿。名。水。臍。喻。嘉。言。曰。腎。為。水。臍。之。海。五。

臟。六。腑。之。源。脾。不。能。散。胃。之。水。精。於。肺。而。病。於。中。肺。不。能。通。胃。之。水。道。於。膀。胱。而。病。於。上。腎。不。能。司。胃。之。關。時。其。輸。泄。而。病。於。下。以。致。積。

水。浸。淫。無。所。底。止。○腎。者。胃。之。關。也。前。陰。利。水。後。陰。利。穀。○王。好。古。曰。水。者。脾。肺。腎。三。經。所。主。有。五。臟。六。腑。十。二。經。之。都。分。上。頭。面。中。四。古。

敗下腰脚。外皮腐中肌肉。內筋骨。腫有尺寸之殊。浮沉之別。不可輕
 瀉。當知病在何經何臟。方可用之。按水腫有痰。裏食積。瘀血。致清不
 升。濁不成者。證屬有餘。有濕熱相生。陰道阻塞而成者。有燥熱沖擊。結
 不通而成者。證屬有餘。有濕熱相生。陰道阻塞而成者。有燥熱沖擊。結
 後正氣衰。體而成者。有小便不通。水液妄行。脾莫能制而成者。證屬
 不足。宜分別治之。然其源多由中氣不足而起。朱丹溪曰。水病當以
 健脾為主。使脾胃實而氣運。則水自行。宜參苓為
 君。視所挾證。加減。苟徒用利水藥。多致不效。瘦疝積聚。留飲宿食。

痰迷癩癩。虛者忌用。皮赤肉白。根作連珠。重實者良。麩裏煨熟用。或

甘草。薺苳汁。浸三日。其水如墨。以清為度。再麩裏煨。瓜蒂為使。惡遠志。反甘草。張仲景治心下

腫處。濃煎甘草湯服之。其腫立消。二物相反。感應如此。

大戟。大瀉。通臟腑水溼。

苦寒有毒。能瀉臟腑水。溼行血。發汗。利大小便。治十二種水。腹滿急

痛。積聚癥瘕。頸腋癰腫。風毒脚腫。通經墮胎。誤服損真氣。李時珍曰。痰涎為物。

隨氣升降。無處不到。入心則迷。成癩癩。入肺則塞。竅為欬喘。背冷。入
 肝則脅痛。乾嘔。寒熱往來。入經絡則麻痺。入筋骨則牽引。隱痛。

入皮肉則癩癧腫。陳無擇並以控涎丹主之。殊有奇效。此乃治痰之本。痰之本水也。溼也。得氣與火則結爲痰。大戟能泄臟腑水溼。甘遂能行經絡水溼。白芥子能散皮裏膜外痰氣。惟善用者能收奇功也。又曰：錢仲陽謂腎爲真水。有補無瀉。復云：痘證變黑歸腎者。用百祥膏下之。非瀉腎也。瀉其腑則臟自不實。腑者膀胱也。百祥爲大戟一味。能行膀胱之水。故也。竊謂非獨瀉腑乃腎邪實而瀉肝也。實則瀉其子。大戟浸水青絲。肝膽之色也。痘證毒盛火熾。則水益涸。風挾火勢。則土受虧。故津液內竭。不能化膿。而成黑陷之證。瀉其風火之毒。所以救腎扶脾也。昂按：瀉心乃所以補心。瀉腎卽所以救腎。邪熱退。則真陰復矣。機要用大戟一兩。棗三枚。同煮焙乾。去戟。用棗丸服。名棗變丸。杭產紫者爲上。北產白者傷人。漿水煮。去骨用。得大棗則不損脾。畏菖蒲。反甘草。

商陸 大通行水。

苦寒有毒。諸家辛酸。李時珍苦寒。沉陰下行。與大戟甘遂同功。療水腫脹滿。屬脾。腫屬肝。腫則陽氣猶行。如軍脹而不腫者。名臑脹。爲木橫剋土。難治。腫脹朝寬暮急。爲血虛。暮寬朝急。爲氣虛。朝暮俱急。爲氣血兩虛。

腫脹由心腹而散四肢者。吉。由四肢而入心。瘦疝癰腫。喉痹不通。切。腫者危。男自下而上。女自上而下。皆難治。

喉中良。溼熱之病。瀉蠱毒。敷惡瘡。墮胎孕。令人見鬼神。取花白者根。

赤者傷人。只堪貼臍。入麝三分搗貼。小便利則腫消。黑豆湯浸蒸用。得蒜良。

芫花。大通。行水。

苦寒有毒。去水飲痰癖瘵。五水在五臟皮膚脹滿喘急痛引胸脅欬

嗽瘴瘡。五水者風水皮水正水石水黃汗也。水積胸中。堅滿如石。名

傷寒之表已解。有時頭痛。汗出惡寒。心下有水。乾嘔發熱。或喘或利者。小

或嗽者。十棗湯主之。蓋青龍散表邪。使水從汗出。內經所謂開鬼門

也。十棗逐裏邪。使水從兩便出。內經所謂潔淨府。去陳莖法也。十棗

湯芫花甘遂大戟等分。棗十枚。葉似柳。二月開花紫碧色。葉生花落。陳久者良。醋煮

過水浸曝用。根療疥。可毒魚。反甘草。關認者。取葉擦皮膚。輒

辛散結。苦洩熱。行水捷藥。主治略同芫花。

薺花。大通。行水。

澤漆 通行水。

辛苦微寒。消痰退熱。止嗽殺蟲。利大小腸。治大腹水腫。益丈夫陰氣。

生平澤。葉圓黃綠。頗類貓睛。一名貓兒眼睛草。莖中有白汁黏人。李時

珍曰。別錄云。是大戟苗。非也。功相類耳。

常山 宜吐痰。截瘧。通行水。

辛苦而寒。有毒。能引吐。行水。祛老痰。積飲。痰有六。風痰。寒痰。溼痰。熱痰。食痰。氣痰也。飲有五。流

於肺為支飲。於腸胃為痰飲也。常山力能吐之。經絡專治諸瘡。然悍暴能

損真氣。弱者慎用。李時珍曰。常山蜀漆。刮痰截瘧。須在發散表邪及

食瘧鬼之別。須分陰陽虛實。不可概論。常山蜀漆。得甘草則吐。得大黃則利。得烏梅穿山甲。則入肝。得小麥。竹葉。則入心。得秫米。麻黃。則

入肺。得龍骨。附子。則入腎。得草果。檳榔。則入脾。蓋無痰不作瘧。一與

世。人泥於雷敷。老人久病。忌服。之說。使良藥見疑。沉痾難起。抑何愚

也。○常山吐痰。痰瓜蒂吐熱痰。烏附尖。雞骨者良。酒浸蒸或炒用。栝

樓爲使。忌蔥茗。莖葉名蜀漆。功用略同。古方有蜀漆散。取其苗性輕揚。發散上焦邪結。甘草

水拌蒸。

藜蘆。宜引吐。

辛寒至苦有毒。入口卽吐。善通頂。令人噫。風癩證多用之。張子和曰。一婦病風。

癩。初一二年一作後。漸日作。甚至一日數作。求死而已。值歲大饑。探百草食。見野草若蔥。採蒸飽食。覺不安。吐膠涎數日。約一二斗。汗出

如洗。甚昏困。後遂輕健。如常人。以所食蔥訪人。乃愁蔥苗。卽藜蘆是矣。李時珍曰。和王妃年七十。中風不省。牙關緊閉。先考太醫吏目月

池翁診視。藥不得入。不獲已。打去一齒。濃煎藜蘆湯灌之。少頃噫氣。遂吐痰而甦。藥不瞑眩。厥疾不瘳。誠然。取根去頭用

黃連爲使。反細辛芍藥諸參。惡大黃。畏蔥白。吐者服蔥湯卽止。

木通。古名通草。輕通行水。瀉小腸火。

甘淡輕虛。上通心包。降心火。清肺熱。心火降則化津液。肺爲水源。肺熱清則津液

化水道通。下通大小腸膀胱導諸溼熱由小便出。故導赤散用之。凡利小便者多不利大便。以利小

水愈通。大便愈燥也。木通利九竅。血脈關節治胸中煩熱。偏身拘痛。

楊仁齋曰。偏身隱熱疼痛。拘急足冷。皆伏熱傷血。血屬於心。宜木通以通心竅。則經絡流行也。大渴引飲。中焦淋瀝

不通。下焦火。心與小腸相表裏。水腫浮大。利小便耳聾。泄腎火。目眩。口

燥舌乾。心苗。喉痹咽痛。上焦鼻鼈。熱壅清道。則失音。清脾熱好眠。脾

四肢倦則好眠。心為脾母。心熱清脾熱亦除。除煩退熱。止痛排膿。破血催生。行經下乳。不火

亢於內。氣順血行。故汗多者禁用。李東垣曰。肺受熱邪。津液氣化之

閉約束。則小便不通。宜此治之。寒水。太陽膀胱也。○朱二允曰。火

在上則口燥眼赤鼻乾。在中則心煩嘔噦浮腫。在下則淋祕足願。必

藉此甘平之性。瀉諸經之火。火退則小便自利。便利則諸經火邪皆

從小水而下降矣。○君火宜木通。相火宜澤瀉。利水雖同。所用各別。

通草。古名通脫木。輕通利水退熱。

藤有細孔。兩頭皆通。故通

色白氣寒。體輕味淡。氣寒則降。故入肺經。引熱下行。而利小便。味淡則升。故入胃經。通氣上達。而下乳汁。治五淋水腫。目昏耳聾。鼻塞失

音。淡通竅。寒降火。利肺氣。退熱催生。

澤瀉。通利水。瀉膀胱火。

甘淡微鹹。入膀胱。利小便。瀉腎經之火。邪功專利溼行水。治消渴痰

飲。嘔吐瀉痢。腫脹水痞。腳氣疝痛。淋瀝陰汗。陰間有汗。尿血洩精。既利水而止。

洩精。何也。此乃溼熱為病。不為虛滑者言也。虛滑則當用補澀之藥。溼熱之病。溼熱既除。則清氣上行。

又能養五臟。益氣力。起陰氣。補虛損。止頭旋。有聰耳明目之功。脾胃有溼

熱則頭重耳鳴目昏。溼去其溼。則熱亦隨去。土乃得令。而清氣上行。故本經列之上品。云聰耳明目。而六味丸用之。今人多以昏目疑之。

多服昏目。小便過利。而腎水虛故也。眼中有水。屬膀胱。過利則水瀉。而火生。張仲景八味丸用澤瀉。寇宗奭謂其接引桂附入

腎經。李時珍曰。非接引也。乃取其瀉膀胱之邪氣也。古人用補藥。必兼瀉邪。邪去則補藥得力。一闔一關。此乃玄妙。後人不知此理。專一

於補必致偏勝之患矣。王履曰：地黃山茱萸茯苓丹皮皆腎經藥。右腎命門之偏藥，何待接引乎？錢仲陽謂腎為真水，有補無瀉，或云桂附虛腎旺，故瀉腎扶脾，不知腎之真水不可瀉，瀉其伏留之邪耳。○脾喜燥，腎惡燥，故兼補為難。○易老曰：去脾中留垢，以其微鹹能瀉伏水故也。昂按：六味丸有熟地之溫，丹皮之涼，山藥之濡，茯苓之滲，山茱萸之收，澤瀉之瀉，補腎而兼補脾，有補而必有瀉，相和相濟，以成平補之功。乃平淡之神奇，所以為古今不易之良方也。即有加減或加紫河車一具，或五味麥冬杜仲牛膝之類，不過一二味，極三四味而止。今人或疑澤瀉之瀉而減之，多揀本草補藥，恣意加入，有補無瀉，且客倍於主，實成不專而六味之功，且退處於虛位，失製方配合之庸師之誤也。

鹽水拌。或酒浸用。忌鐵。

車前草。通行水。瀉熱。涼血。

甘寒。涼血去熱。止吐衄。消癥瘕。明目通淋。凡利水之劑，多損於目，惟此能解肝與小腸之熱，溼

熱退而目清矣。雷斅曰：使葉勿使莖萎。

車前子。甘寒。清肺肝風熱。滲膀胱溼熱。利小便。而不走氣。與茯苓同。

功。強陰益精。令人有子。腎有二竅，車前子能利水竅而固精竅，精盛則有子。五子衍宗丸用之。枸杞菟絲各八兩。

五味覆盆各四兩。車前二兩。蜜丸。慎遺洩者。車前易蓮子。李時珍曰。人服食。須佐他藥。如六味丸之用。澤瀉可也。若單用。則過瀉。治

溼痹五淋。暑溼瀉痢。歐陽文忠患暴下。國醫不能愈。夫人雜他藥進之。一

服而愈。問其方。乃車前子為末。米飲下二錢。一云。此藥利水。而不動氣。水道利。則清濁分。穀臟自止矣。目赤障翳。能除

催生下胎。酒蒸搗餅。焙研。酒蒸搗餅。入滋補藥。炒研。入利水瀉瀉藥。

燈草。輕。通。利。水。清。熱。

甘淡而寒。降心火。入心。能清肺熱。利小腸。心與小腸相表裏。心火清。則

出。通氣止血。治五淋水腫。燒灰吹喉痹。塗乳止夜嘔。擦癬最良。把。成

摩極癢時。蟲從草出。浮水。可見十餘次。則能斷也。

瞿麥。通。利。水。破。血。

苦寒。降心火。利小腸。逐膀胱邪熱。為治淋要藥。大故。八正散用之。五淋

宜。八正及山梔滑石之類。血淋宜小蘗牛膝。膏腎虛淋宜補腎。不可獨瀉。老人氣虛者。宜參朮兼木通山梔。亦有痰滯中焦。作淋者。宜行

痰兼通利藥最忌。發汗汗之必便血。破血利竅。決癰消腫。明目去翳。通經墮胎。性利善。

下。虛者慎。用。寇宗奭曰：心經雖有熱而小腸虛者服之則心熱未清而小腸別作病矣。花大如錢。紅白斑。

爛。色甚斌媚。俗呼洛陽花。用蕊殼。丹皮為使。惡蝶蛸。產後淋當去血。擗麥蒲黃皆為

藥要

蕭蓄。一名扁竹。通淋。

苦平。殺蟲疥。利小便。治黃疸熱淋。虻咬腹痛。蟲蝕下部。煮服。葉細如竹。

弱莖蔓引。促節有粉。三月開紅花。

天仙藤。通活血消腫。

苦溫。疏氣活血。治風勞腹痛。妊娠水腫。有天仙藤散。專治水腫。葉似葛圓而小。

有白毛。根有鬚。四時不凋。一云即青木香藤。

地膚子。通利水補陰。

甘苦氣寒。益精強陰。入膀胱。除虛熱。利小便。而通淋。李時珍曰。無陰則陽無以化。亦

猶東垣利小便不通。用知藥滋腎之意。王節齋曰。小便不通。或頻數。古方多以爲寒。而用溫澀之藥。殊不知屬熱者多。蓋膀胱火邪妄動。

水不得寧。故不能禁。而頻數也。故老人多頻數。是膀胱血少。陽火偏旺也。治法當補膀胱陰血。瀉火邪爲主。而佐以收澀之劑。如牡蠣山

茱五味之類。不可獨用。病本屬熱。故宜瀉火。因水不足。故火動而致便數。小便既多。水益虛矣。故宜補血。補血瀉火。治其本也。收之瀉之。

治其標也。治癩疔。散惡瘡。煎湯洗瘡。疥良。葉作浴湯。去皮膚風熱。丹腫。洗眼除雀

盲澀痛。葉如蒿。莖赤。子類蠶沙。惡螻蝻。

石章。通淋。補勞。

甘苦微寒。清肺金。以滋化源。凡行水之藥。必先清肺火。必通膀胱。而利水道。益精

氣。補五勞。利溼清熱之功。高陽生對。宜帝治勞傷。用石章汁。治淋崩發背。妙末冷。調酒服。生石陰。柔

韞如皮。背有黃毛。去毛微炙用。杏仁滑石射干爲使。得菖蒲良。生古

瓦上者名瓦章。治淋。

海金砂 通淋瀉溼熱。

甘寒淡滲。除小腸膀胱血分溼熱。治腫滿五淋莖痛。得梔子牙硝礪

砂。治傷寒熱狂。大熱利小便。此釜底抽薪之義也。莖細如線。引竹木上。葉紋皺處。有

砂黃赤色。忌火。

茵陳 通利溼熱。治諸黃。

苦燥溼寒勝熱。入足太陰膀胱經。發汗利水。以泄太陰陽明胃脾之溼熱。

為治黃疸之君藥。脾胃有溼熱則發黃。黃者脾之色也。熱甚者身如橘色。汗如藥汁。亦有寒溼發黃。身薰黃而色暗。大

抵治以茵陳為主。陽黃加大黃梔子。陰黃加附子乾薑各隨寒熱治之。又治傷寒時疾。狂熱瘴瘧。頭痛

頭旋。女人瘦疝。皆溼熱為病。

香薷 宜通利溼清暑。

辛散皮膚之蒸熱。溫解心腹之凝結。屬金水而主肺。為清暑之主藥。

肺氣清。則小便利而熱降。暑必兼溼。治暑必兼利溼。若無溼。但為乾熱。非暑也。治嘔逆水腫。熱

服小便利則消。脚氣口氣。煎湯含敷。單服治霍亂轉筋。李時珍曰。暑月乘涼飲冷。致陽氣為陰邪所遏。反中。

入內。遂病頭痛發熱。惡寒。煩躁。口渴。吐瀉。霍亂。宜用之。以發越陽氣。散暑和脾。則愈。若飲食不節。勞役作傷。之人。傷暑大熱大渴。汗出如

雨。煩躁喘促。或瀉。或吐。者。乃內傷之證。宜用清暑益氣湯。人參白虎湯之類。以瀉火益元可也。若用香薷。是重虛其表。而濟之熱矣。蓋香

薷乃夏月解表之藥。如冬月之用麻黃。氣虛者尤不宜多服。今人謂能解暑。槩用代茶。誤矣。李士材曰。香薷為夏月發汗之藥。其性溫熱。

只宜於中暑之人。若中暑者。誤服之。反成大害。世所未知。按潔古云。中暑為陰證。為不足。中熱為陽證。為有餘。經曰。氣盛身寒。得之傷寒。

氣虛身熱。得之傷暑。故中暑宜溫散。中熱宜清涼。○身寒寒字當熱字看。傷寒必病熱。陳者勝。宜冷飲熱服。令人瀉。

青蒿 瀉熱補勞

苦寒。得春木少陽之令最早。二月生苗。故入少陽厥陰肝膽血分。治骨蒸勞

熱。童便搗葉取汁熬膏。葶勞虛熱。凡苦寒之藥。多傷胃氣。惟青蒿芬香入脾。獨宜於血虛有熱之人。以其不犯胃氣也。風

毒熱黃久瘡久痢。癢疥惡瘡。鬼氣尸疰。李時珍曰。月令通纂言。伏內庚日採蒿懸門庭。可辟邪。冬

至元旦各服一錢亦良則青蒿之治鬼疰蓋亦有所伏也。補中明目。童便浸葉用。熬膏亦良。使子

勿使葉使根勿使莖。

附子。

大燥。回陽補腎命火。逐風寒溼。

辛甘有毒。大熱純陽。其性浮而不沉。其用走而不守。通行十二經。無

所不至。能引補氣藥以復散失之元陽。引補血藥以滋不足之真陰。

引發散藥開腠理以逐在表之風寒。同乾薑桂枝溫經散寒發汗。引溫暖藥達下。

焦以祛在裏之寒溼。能引火下行亦有津調貼足心者。治三陰傷寒。

吳綬曰：附子陰證要藥。凡傷寒傳變三陰。中寒夾陰。若待陰極陽竭而沉細者。或厥陰腹痛甚。則唇青囊縮者。急須用之。

用之已遲矣。東垣治陰盛格陽。傷寒面赤。目赤。煩渴。引飲。脈七八至。但按之則散。用薑附湯加人參。投半觔。得汗而愈。此神聖之妙也。

中寒中風。卒中曰中。漸傷曰傷。輕為感。氣厥痰厥。虛寒而厥者宜之。

身冷脈伏。熱厥似寒者。誤欬逆寒。嘔噦。胃膈噎。冷胃。槁而成。飲可下。

而食不可下。槁在吸門。喉間之厭會也。食下胃脘痛。須臾吐出。槁在賁門。胃之上口也。此上焦名噎。食下良久吐出。槁在幽門。胃之下口

也。此中焦名膈。朝食暮吐。槁在闕門。大小腸下口也。此下焦名反胃。又有痰飲。食積。痰血。壅塞。胃口者。如寒痰。胃冷。則宜藜附。參朮。胃槁

者。當滋潤。宜四物。牛乳。羊乳。血痰者。加韭。脾泄。命火不足。冷痢。寒瀉。霍亂。轉

筋。脾虛。寒客中焦。為霍亂。寒客下。拘攣。風痺。癥瘕。積聚。督脈為病。脊

強而厥。小兒慢驚。痘瘡灰白。癰疽不斂。一切沉寒痼冷之證。經曰。陰

寒外寒。助陽退陰。殺邪辟鬼。本草。通經墮胎。凡陰證。用葶附藥。宜冷

在下。虛陽上浮。治之以寒。則陰益盛。治之以熱。則拒格不納。用熱藥

冷飲。下隘之後。冷體既消。熱性便發。情且不違。而致大益。此反治之

妙也。又有寒藥。熱飲。治熱證者。此寒因熱用。義亦相同也。經曰。正者

正治。反者反治。如用寒治熱。用熱治寒。此正治也。或以寒治寒。以熱

治熱。此反治也。經所謂必伏其所主。而先其所因。蓋借寒藥熱藥。為

附子。連生者為側子。細長者為天雄。兩歧者為烏喙。五物同出異名。

陰虛之人。久服補陽之藥。則虛陽益熾。真陰愈耗。精血日枯。而氣無所附麗。遂成不救者多矣。母為烏頭。附生者為

附子以西川彰明赤水產者爲最。皮黑體圓。底平八角。重一兩以上

者良。或云二兩者更勝。然難得。生用發散。熟用峻補。趙嗣真曰。仲景麻黃附子細辛湯。熟附配麻黃。發中有補。

四逆湯生附配乾薑補中有發。其旨微矣。朱丹溪曰。烏附行經。仲景八味丸用爲少陰嚮導。後世因以爲補藥。誤矣。附子走而不守。取其

健悍走下。以行地黃之滯耳。相習用爲風藥及補藥。殺人多矣。昂按。附子味甘氣熱峻補元陽。陽微欲絕者。回生起死。非此不爲功。故仲

景四逆真武白通諸湯多用之。其有功於生民甚大。况古人日用常方用之最多。本非禁劑。朱丹溪乃僅以爲行經之藥。而云用作補藥。

多致殺人。言亦過矣。蓋丹溪法重滋陰。故每營陽藥。亦其偏也。王節齋曰。氣虛用四君子湯。血虛用四物湯。虛甚者俱宜加熟附。蓋四君

四物皆平和寬緩之劑。須得附子健悍之性行之。方能成功。水浸麩附子熱藥。本不可輕用。但當病則雖暑熱時月亦可用也。

裹煨。令發坼。乘熱切片炒黃。去火毒用。又法。甘草二錢。鹽水薑汁童便各半盞。煮熟用。今時人用黑豆煮亦佳。畏人參黃耆甘草防風犀角綠豆童

便。反貝母半夏栝樓白芨白蘞。中其毒者。黃連犀角甘草煎湯解之。

黃土水亦可解。

烏頭功同附子而稍緩。附子性重峻。溫脾逐寒。烏頭性輕疎。溫脾逐

風。寒疾宜附子。風疾宜烏頭。

烏附尖吐風痰。治癩癩。取其鋒銳。直達病所。

朱丹溪治許白雲。屢用瓜蒂。梔子。苦參。藜蘆等。

劑吐之不透。後用附子尖和漿水與之。始得大吐。膠痰數碗。

天雄補下焦命門陽虛。

寇宗奭張元素皆曰補上焦。朱丹溪曰。可為下部之佐。李時珍曰。其尖皆向下生。故下行。

然補下乃所以益上也。若上焦陽虛。則屬心肺之分。當用參耆。不當用雄附矣。治風寒溼痹。為風家主藥。發

汗又能止陰汗。

側子散側旁生。宜於發散四肢。充達皮毛。治手足風溼諸痹。

草烏頭 大燥開頑痰。

辛苦大熱。搜風勝溼。開頑痰。治頑瘡。以毒攻毒。頗勝川烏。然至毒。無

所釀制。不可輕投。野生狀類川烏。亦名烏喙。薑汁炒。或豆腐煮用。熬

膏名射罔。敷箭射獸。見血立死。

白附子。燥。祛風溼。治面疾。

辛甘有毒。大熱純陽。陽明經藥。能引藥勢上行。治面上百病。陽明之脈繫於

而白附能去頭面游風。作面脂消斑疵。補肝虛。祛風痰。治心痛血痺。諸風冷氣。中風失

音。陰下溼癢。根如草烏之小者。長寸許。皺紋有節。炮用。陶宏景曰。此藥久絕無復

真者。今惟涼州生。

破故紙。一名補骨脂。燥。補命火。

辛苦大溫。入心包命門。補相火。以通君火。暖丹田。壯元陽。縮小便。治亦

遺尿。治五勞七傷。五臟之傷。七情之傷。腰膝冷痛。腎冷精流。腎虛泄瀉。腎虛則命門火衰。不

能薰蒸脾胃。脾胃虛寒。遲於運化。致飲食減少。腹脹腸鳴。嘔涎泄瀉。如鼎釜之下無火。物終不熟。故補命門相火。即所以補脾胃。破故紙四

兩。五味三兩。肉苁二兩。吳茱一兩。婦人血氣。婦人之血脫氣陷。亦猶男子之腎冷精流。墮

胎出南番者色赤。嶺南者色綠。酒浸蒸用。亦有童便乳浸。鹽水炒者。

得胡桃胡麻良。惡甘草。唐鄭相國方。破故紙十兩。酒浸蒸為末。胡桃

水調服。白飛霞曰。破故紙屬火。堅固元陽。胡桃屬水。潤燥養血。有水火相生之妙。忌芸薹羊血。加杜仲名青娥丸。○芸薹油菜也。

肉蓯蓉 補腎命。滑腸。

甘酸鹹溫。入腎經。血分補命門相火。滋潤五臟。益髓強筋。治五勞七

傷。絕陽不興。絕陰不產。腰膝冷痛。崩帶遺精。峻補精血。李時珍曰。補而不峻。故有

從蓉之號。驟用恐妨心。滑大便。長大如臂。重至斤許。有松子鱗甲者良。酒

浸一宿。刷去浮甲。劈破。除內筋膜。酒蒸半日。又酥炙用。忌鐵。蘇恭曰。今日所

用。多草從蓉。功力稍劣。

鎖陽 補陽。滑腸。

甘溫補陰。益精興陽。潤燥養筋。強筋故能興陽。治痿弱。滑大便。便燥者。啖之。

佳。粥。鱗甲櫛比。狀類男陽。酥炙。

巴戟天。補腎祛風。

甘辛微溫。入腎經。血分強。陰益精。治五勞七傷。辛溫散風溼。治風氣

腳氣水腫。根如連珠。擊破中紫而鮮潔者偽也。中雖紫微有白糝粉

色。而理小暗者真也。蜀產佳。山葎根似巴戟。但色白。人或醋煮以亂之。去心。酒浸焙用。覆

盆子為使。惡丹參。

胡盧巴。燥。潤腎命。除寒溼。

苦溫純陽。入右腎命門。暖丹田。壯元陽。治腎臟虛冷。陽氣不能歸元。

同附子 瘦疝冷氣。同茴香巴戟川 寒溼腳氣。出嶺南番舶者良。云是

番萊菔子。酒浸曝。或蒸或炒。

仙茅。燥。補腎命。

辛熱有小毒助命火益陽道明耳目補虛勞治失溺無子心腹冷氣

不能食胃溫腰腳冷痺不能行骨暖筋相火盛者忌服葉如茅而略闊根

如小指黃白多涎竹刀去皮切糯米泔浸去赤汁出毒用忌鐵唐羅門

始進此方當時盛傳服之多效照前製陰乾蜜丸酒服禁牛乳牛肉許真君書曰甘能養肉辛能養節苦能養氣鹹能養骨酸能養筋滑

能養膚和苦酒服之必效也

淫羊藿 一名仙靈脾補腎命

辛香甘溫入肝腎補命門李時珍曰手足陽明三焦命門藥益精氣堅筋骨利小便

治絕陽不興絕陰不產冷風勞氣四肢不仁手足麻木北部有羊一日百

合食此藿所致故名去枝羊脂拌炒山藥爲使得酒良

蛇牀子 補腎命去風溼

辛苦而溫強陽益陰補腎祛寒祛風燥溼治陰痿囊溼女子陰痛陰

癢。溼生蟲。同。子臟虛寒。產門不閉。炒熱製之。腎命之病。及腰酸體痛。帶下。

脫肛。喉痹齒痛。溼癬惡瘡。殺蟲止癢。風溼諸病。煎湯浴。止風癢。李時珍曰。腎命三焦。

氣分之藥。不獨補助男子。而且有益婦人。世人舍此而求補藥於遠域。豈非貴耳賤目乎。似小茴而細。微炒。殺毒。

則不辣。以地黃汁拌。蒸三遍佳。惡丹皮貝母巴豆。

菟絲子。平。補三陰。

甘辛和平。凝正陽之氣。入足三陰。脾。肝。腎。強陰益精。溫而不燥。不助相。

火。治五勞七傷。精寒淋瀝。口苦燥渴。脾。虛。腎。燥。而。生。內。熱。菟。絲。益。陰。清。熱。祛風明目。補。

衛氣。助筋脈。益氣力。肥健人。補。肝。腎。之。效。老。學。庵。筆。記。予。族。弟。少。服。菟。絲。子。凡。數。年。飲。食。倍。常。血。氣。充。盛。忽。

因。浴。見。背。腫。隨。視。隨。長。乃。大。疽。也。適。值。金。銀。花。開。飲。至。數。斤。腫。遂。消。菟絲過服。尚能作疽。以此知金石藥不可不戒。○昂按。此人或感他。

毒。未。可。盡。歸。咎。於。菟。絲。也。無根蔓延草上。子黃如黍粒。得酒良。淘去泥沙。酒浸一。

宿。曝乾搗末。山藥為使。

覆盆子

平補肝腎

甘酸微溫。益腎臟而固精。補肝虛而明目。起陽痿。縮小便。

寇氏曰服之當覆其

溺器故名。澤肌膚。烏髻髮。

榨汁塗髮不白。

女子多孕。同蜜為膏。治肺氣虛寒。

李士材曰。

強腎無燥熱之偏。固精無凝滯之害。金玉之品也。

狀如覆盆。故名。去蒂淘淨。搗餅。用時酒拌。

蒸葉絞汁。滴目中。出目弦蟲。除膚赤。收溼止淚。

蒺藜子

平補肝腎

苦溫補腎。辛溫瀉肺氣而散肝風。益精明目。

肝以散為補。凡補肝藥皆能明目。

治虛

勞腰痛。遺精帶下。欬逆肺痿。乳閉癥瘕。痔漏陰瘡。

音頽。

腎肝肺三經之

病。催生墮胎。

刺蒺藜主惡血。故能破癥下胎。

沙苑蒺藜。綠色似腎。

故補腎。

炒用。

亦可代茶。

刺蒺藜。三角有刺。去刺。酒拌蒸。

風家宜刺蒺藜補腎。則沙苑者為優。餘功略同。

瑞竹堂方齒牙

打動者。痰藜根燒灰敷之。

使君子。

補脾。殺蟲。消積。

甘溫。健脾胃。除虛熱。殺臟蟲。治五疳便濁。瀉痢瘡癬。為小兒諸病要

藥。經疏曰。五疳便濁瀉痢腹脹。皆由脾胃虛弱。因而乳停食滯。溼熱

珍曰。凡能殺蟲之藥。多是苦辛。獨使君子。榧子。甘而殺蟲。每月上旬

蟲頭向上。中旬頭橫。下旬向下。道藏曰。初一至初五。蟲頭向上。凡有

死而出也。○按地黃。胡麻。皆殺蟲。出閩蜀。五瓣有稜。內仁如榧。亦可煨食。久則油。不可用。忌飲熱茶。犯之作瀉。

益智子。

燥脾腎。補心腎。

辛熱。本脾藥。兼入心腎。主君相二火。補心氣。命門三焦之不足。心為脾母。

補火故能生土。能瀆精固氣。本草未載。又能開發鬱結。使氣宣通。味辛能散。溫中進食。

攝涎唾。胃冷則涎湧。縮小便。腎與膀胱相表裏。益智子。溫固腎。鹽水炒。下同。

治嘔吐泄瀉。客寒犯胃。冷氣腹痛。崩帶泄精。瀉精固氣。因熱而崩瀉者。禁用。出嶺南。形如棗核。用仁。

砂仁。即縮砂。宜行氣調中。

辛溫香竄。補肺益腎。和胃醒脾。快氣調中。通行結滯。治腹痛痞脹。

有傷寒下早裏虛邪入而痞者。有食滯痰塞而痞者。有脾虛氣弱而痞者。須分虛實治之。不宜專用利氣藥。恐變為鼓脹。鼓脹內脹而外

有形痞脹。惟覺痞悶而已。皆太陰為病也。噎膈嘔吐。上氣欬嗽。赤白瀉利。溼熱積滯。客於

大小腸經。霍亂轉筋。奔豚崩帶。祛痰逐冷。消食醒酒。止痛安胎。氣行則痛止。氣順則

安。散咽喉口齒浮熱。化銅鐵骨鯁。王好古曰。得檀香豆蔻入肺。得人參益智入脾。得黃蘗茯苓入腎。得

赤石脂入大小腸。醫通曰。辛能潤腎燥。引諸藥歸宿丹田。地黃用之拌蒸。亦取其能達下也。經疏曰。腎虛氣不歸元。用為嚮道。殆勝桂附

熱藥為害。出嶺南。研用。

白豆蔻。宜行氣暖胃。

辛熱流行三焦溫暖脾胃。三焦利脾胃運則諸證自平矣。而為肺家本藥。肺主氣。散滯

氣消酒積除寒燥溼化食寬膨治脾虛瘡疾感寒腹痛吐逆反胃。胃肺

火盛及氣虛者禁用。白睛翳膜。白睛屬肺能散肺滯。太陽經目背紅筋。太陽脈起目背。番舶者良。

研細用。

肉豆蔻。一名肉果燥脾瀉腸。

辛溫氣香理脾暖胃下氣調中逐冷祛痰消食解酒治積冷心腹脹

痛。挾痰挾食者並宜之。中惡吐沫小兒吐逆乳食不下又能瀉大腸止虛瀉冷

痢。初起忌用。出嶺南似草蔻外有皺紋內有斑紋糯米粉裹煨熟用忌鐵。

草豆蔻。一名草果燥溼祛寒除痰截瘧。

辛熱香散暖胃健脾破氣開鬱燥溼祛寒除痰化食治瘴癘寒瘧。佐常

山能截瘧或與知母同用取其一陰一陽治寒熱瘧。瘧蓋草果治太陰獨勝之寒知母治陽明獨勝之火寒客胃痛。散利

膈痰因滯因寒者多效。因霍亂瀉痢噎膈反胃痞滿吐酸痰飲積聚解口臭氣酒

毒魚肉毒用之過劑助脾熱耗氣損目閩產名草慈如龍眼而微

長皮黃白薄而稜峭仁如砂仁而辛香氣和滇廣所產名草果如訶

子皮黑厚而稜密子粗而辛臭雖是一物微有不同麪裏煨熟取仁

用忌鐵。

香附 一名莎草根宜調氣開鬱。

性平氣香味辛能散微苦能降微甘能和乃血中氣藥通行十二經

八脈氣分主一切氣病人身以氣為主氣盛則強虛則衰順則平逆則

緩悲則氣消驚則氣亂思則氣結勞則氣耗此七情之氣也以香附為君隨證而加升降消補之藥○素問中仍有寒則氣收熱則氣泄

名九利三焦解六鬱痰鬱火鬱氣鬱止諸痛通則不痛治多怒多憂痰飲

痞滿胸腫腹脹飲食積聚霍亂吐瀉腎氣腳氣癰疽瘡瘍血凝氣滯所致香附

一味末服。名獨勝丸。治癰疽。由鬱怒得者。如瘡初作。以此代茶。漬後亦宜服之。大凡瘡疽。喜服香藥。行氣通血。最忌臭穢。不潔觸之。○故古人治瘍。多用五香連翹飲。○康祖左乳病癰。又臆間生核。痛楚。吐半載。禱張王夢授。以方。薑汁製香附。為末。每服二錢。米飲下。遂愈。吐

血便血。崩中帶下。月候不調。將行而痛。氣血因氣行。後成塊者。氣之凝也。色淡亦虛也。色紫氣之熱。色黑則熱之甚也。錯經者。氣之亂。肥人痰多。而經阻。氣不運也。香附陰中快氣之藥。氣順則血和。暢然須輔以涼血補氣之藥。朱丹溪曰。能引血藥。胎產百病。能推陳致新。故諸

書皆云益氣。此理耳。李時珍曰。凡人病則氣滯而餒。香附為氣分君藥。臣以參耆佐以甘草。治虛怯甚速也。去毛用。生則上行。胸膈外達。皮膚熟則下走。肝

腎旁徹腰膝。童便浸炒。則入血分而補虛。鹽水浸炒。則入血分而潤燥。水或蜜炒。青鹽炒。則補腎氣。酒浸炒。則行經絡。醋浸炒。則消積聚。且斂薑汁炒。則化痰飲。炒黑又能止血。忌鐵。李時珍曰。得參朮則補氣。得歸地則補血。得木香則散滯。

和中。得檀香則理氣醒脾。得沉香則升降諸氣。得芎藭蒼朮。則總解諸鬱。得梔子黃連。則清降火熱。得茯神。則交濟心腎。得茴香。破故紙。

本草備要 卷一 草部 香附 一七

則引氣歸元得厚朴半夏則決壅消脹得紫蘇蔥白則發汗散邪得
 三稜莪朮則消積磨塊得艾葉則治血氣暖子宮乃氣病之總司女
 科之仙藥也大抵婦人多鬱氣行則鬱解故服之尤效非宜於婦人
 不宜於男子也李士材曰乃治標之劑惟氣實血未大虛者宜之不
 然恐損氣而燥血愈致其疾矣世俗泥於
 女科仙藥之一語惜未有發明及此者

木香 宣行氣

辛苦而溫。三焦氣分之藥。能升降諸氣。泄肺氣。疏肝氣。和脾氣。
肝怒則

上肺氣調。則金能制木。而治一切氣痛。九種心痛。
皆屬胃脘曰寒痛 熱痛氣痛血痛溼

痛痰痛食痛。虻痛。悸痛。蓋君心不易受。嘔逆反胃。霍亂瀉痢。後重。
積同

邪。真心痛者。手足冷過腕節。朝發夕死。臍閉。痰壅氣結。疝瘕癥塊。腫毒。蠱毒。衝
臍用劉河間曰痢疾行血則除

脈為病。氣逆裏急。殺鬼物。禦瘴霧。去腋臭。實大腸。消食安胎。
胎逆則不安

過服損真氣。
朱丹溪曰味辛氣升若陰火衝上者反助火邪當用黃 藜知母少以木香佐之王好古曰本草主氣劣氣不足

補也。通壅導氣。破也。安胎健脾胃。補也。除痰癖癥塊。破也。不同如此。
汪機曰與補藥為佐則補與瀉藥為君則瀉李時珍曰諸氣積鬱皆

屬於肺。上焦氣滯用之者。金鬱泄之也。中氣不運。皆屬於脾。中焦氣滯用之者。脾胃喜芳香也。大腸氣滯則後重。膀胱氣不化則癱閉。肝氣鬱則為痛。下焦氣滯用之者。塞者通之也。

番舶上來。形如枯骨。味苦黏舌者良。名青木香。今所用者皆廣木。香土木香。

實腸。止瀉。畏火。

藿香。宜去惡氣。

辛甘微溫。入手足太陰。肺脾。快氣和中。開胃止嘔。胃弱胃熱而嘔者忌用。去惡氣。

進飲食。治霍亂吐瀉。心腹絞痛。肺虛有寒。上焦壅熱。能理脾肺之氣。古方有藿香正

氣散。正氣通暢。則邪逆自除。出交廣。方莖有節。葉微似茄葉。古惟用葉。今枝莖亦

用之。因葉多偽也。

茴香。古作藿香。燥。補腎命門。治寒疝。

大茴辛熱。入腎膀胱。暖丹田。補命門。開胃下食。調中止嘔。療小腸冷。

氣。癩。疔。陰。腫。

疔有七種。氣血寒水筋狐癩也。肝經病不屬腎經以厥陰肝脈絡陰器也。多因寒溼所致。亦有挾虛者。當加參

虎於溫散藥中。

乾溼脚氣。多食損目。發瘡。小茴辛平。理氣開胃。亦治寒疝。食

料宜之。大如麥粒。輕而有細稜者名大茴。出寧夏。他處小者名小茴。

自番舶來。實八瓣者。名八角茴香。炒黃用。得酒良。得鹽則入腎。發腎

邪。故治陰疝。

受病於肝。見證於腎。大小茴各一兩為末。豬胞一箇。連尿入藥。酒煮爛。為丸服。

甘松香

宜理氣醒脾。

甘溫芳香。理諸氣。開脾鬱。治腹卒然滿痛。風疔齒齲。脚氣膝浮。煎湯

淋洗。出涼州及黔蜀。葉如茅。用根。

根極繁密。

山柰

宜溫中辟惡。

辛溫。暖中辟惡。治心腹冷痛。寒溼霍亂。風蟲牙痛。生廣中。根葉皆如

生薑。入合諸香用。

高良薑 宜燥暖胃散寒。

辛熱暖胃散寒消食醒酒治胃脘冷痛。凡心口一點痛俗言心氣痛非也乃胃脘有滯或有蟲及

因怒因寒而起以良薑酒洗七次香附醋洗七次焙研因寒者薑二錢附一錢因怒者附二錢薑一錢寒怒兼者每錢半米飲加薑汁一

匙鹽少許服初梁纈患心脾痛夢神授此方二味等分服後入各妙方用。霍亂瀉痢吐惡噎膈瘴瘧冷癖。

肺胃熱者忌之出嶺南高州。

良薑子名紅荳蔻溫肺散寒醒脾燥溼消食解酒。李東垣脾胃藥中常用之。並東

壁土炒用。

華菱 菱一作撥燥除胃冷散浮熱。

辛熱除胃冷溫中下氣消食祛痰治水瀉氣痢。牛乳服。虛冷腸鳴。亦入大腸

經冷痰惡心嘔吐酸水。祛癖陰疝辛散陽明之浮熱治頭痛。偏頭痛者口含

溫水隨左右以末吹一字入鼻效。牙痛。寒痛宜乾薑華菱細辛熱痛宜石膏牙疳風痛宜皂角殭蠶蜂房二烏蟲痛宜石灰雄黃。

鼻淵。多服。泄真氣。動脾肺之火。損目。出南番。嶺南亦有。類椹子而長。青色。去挺用頭。醋浸。刮淨皮粟。免傷人肺。

煙草。新增。宜行氣。辟寒。

辛溫有毒。治風寒。溼痹。滯氣。停痰。山嵐瘴霧。其氣入口。不循常度。頃刻而周。一身令人通體俱快。醒能使醉。醉能使醒。飢能使飽。飽能使飢。人以代酒代茗。終身不厭。故一名相思草。然火氣薰灼。耗血損年。人自不覺。耳聞產者佳。煙筒中水。能解蛇毒。

金銀花。瀉熱解毒。

甘寒入肺。散熱解毒。清熱即解毒。補虛。凡物甘者皆補。療風。養血止渴。朱丹溪曰。癰疽安後。

發渴。黃耆六一湯。吞忍冬丸。切當。忍冬養血。黃耆補氣。渴何由作。治癰疽疥癬。楊梅惡瘡。腸澼血痢。

五種尸疰。經冬不凋。一名忍冬。又名左纏藤。花葉同功。花香尤佳。釀酒代

茶熬膏並妙。忍冬酒治癰疽發背一切惡毒。初起便服奇效。乾者亦
一碗。再入酒一碗略煎。分三服。一日一夜。喫盡。重者日二劑。服至大
小腸通利。則藥力到。忍冬丸。照前分兩。酒煮曬乾。同甘草為末。以所
煮餘酒打糊為丸。陳藏器曰。熱毒血
痢。濃煎服之。為末。糖調常服。能稀痘。

蒲公英

一名黃花地丁。瀉熱解毒。

甘平。花黃屬土。入太陰陽明。

脾胃

化熱毒。解食毒。消腫核。治乳癰。頭

屬厥陰。乳房屬陽明。同忍冬煎。少入酒服。搗敷亦良。

疔毒亦為通淋妙品。

諸家不言治淋。試之甚驗。擦牙烏

髭髮。

瑞竹堂有還少丹。方取其通腎。李東垣曰。苦寒腎經。君藥。

白汁塗惡刺。

凡螳螂諸蟲。盛夏孕育。游諸物上。必遺精

汁。乾久則有毒。人手觸之成疾。名狐尿刺。慘痛不眠。百療難效。取汁厚塗。即愈。千金方極言其功。

葉如萵苣。花如單

瓣菊花。四時有花。花罷飛絮。斷之莖中有白汁。

鄭方升曰。一莖兩花。高尺許者。掘下數尺。

根大如拳。旁有人形拱抱。搗汁酒服。治噎膈如神。

紫花地丁

瀉熱解毒。

辛苦而寒。治癰疽發背。疔腫癩癧。無名腫毒。葉如柳而細。夏開紫花。結角。生平地者起莖。生溝壑者起蔓。

土牛膝

一名天名精。一名地菘。瀉熱吐痰。破血解毒。

甘寒微毒。能破血。

一婦產後口渴氣喘。面赤有斑。大便泄。小便秘。用血利水藥不效。用牛膝濃煎膏飲。下血一桶。小

便通而愈。

能止血吐痰。除熱解毒殺蟲。治乳蛾喉痹。砂淋血淋。

良方曰。濃煎加乳麝

少許神效。

小兒牙關緊閉。急慢驚風。

不省人事者。絞汁入好酒。灌之。即甦。以醋拌渣敷項下。

服汁吐

瘡痰。

驚風服之亦取其吐痰。

漱汁止牙痛。搗之敷蛇蟲螫毒。根白如短牛膝。地

黃為使。

煎湯洗痔。渣塞患處良。

鶴虱

瀉殺蟲。

苦辛有小毒。殺五臟蟲。治虻蝮腹痛。

面白唇紅。時發時止者。為蟲痛。肥肉汁調末服。

沈存中

筆記曰。是土牛膝子。

或曰非也。別是一種。

最黏人衣。有狐氣。炒熱則香。

山豆根

瀉熱解毒。

苦寒。瀉心火。以保金氣。去肺大腸之風熱。

心火降則不灼肺而金清。肺與大腸相表裏。肺金清。

則大腸亦清。

消腫止痛。治喉癰喉風。齧腫齒痛。

含之嚥汁。

喘滿熱欬。腹痛下痢。

五痔諸瘡。解諸藥毒。敷禿瘡蛇狗蜘蛛傷。療人馬急黃。

血熱極所致。

苗蔓

如豆。經冬不凋。

牛蒡子

一名風黏子。一名惡實。瀉熱解毒。

辛平。潤肺解熱。散結除風。利咽膈。理痰嗽。消斑疹。利二便。行十二經。

散諸腫瘡瘍之毒。利腰膝凝滯之氣。

性冷而滑利。痘證虛寒泄瀉者忌服。

實如葡萄而

褐色。酒拌蒸。待有霜拭去用。根苦寒。竹刀刮淨。絞汁。蜜和服。治中風。

汗出乃愈。搗和豬脂。貼瘡腫及翻花瘡。

肉翻出如花狀。

山慈姑

瀉熱解毒。

甘微辛。有小毒。功專清熱散結。治癰瘡疔腫。瘰癧結核。醋磨解諸毒。

蠱毒。蛇蟲狂犬傷。根與慈姑小蒜相類。去毛殼用。玉樞丹中用之。廣筆記曰：出處州遂

昌縣洪山無毛云。真者有毛誤也。

漏蘆。瀉熱解毒。

鹹。軟堅。苦。下泄。寒。勝熱。入胃大腸。通肺小腸。散熱解毒。通經下乳。排

膿。止血。生肌。殺蟲。治遺精尿血。癰疽發背。古方以漏蘆湯為稱首。及預解時行

痘疹毒。取其寒勝熱。又能入陽明故也。出閩中。莖如油麻。枯黑如漆者真。甘草拌蒸。

連翹為使。

貫衆。瀉熱解毒。

味苦微寒。有毒。而能解邪熱之毒。治崩中帶下。產後血氣脹痛。破癥

瘕。發斑痘。王海藏快斑散用之。化骨鯁。能殺三蟲。根似狗脊而大。汁能制三

黃化五金。伏鍾乳結砂制汞。解毒軟堅。以此浸水缸中。日飲其水能辟時疾。

射干。瀉火解毒散血消痰。

苦寒有毒。能瀉實火。火降則血散。腫消而痰結自解。故能消心脾老

血。行太陰。肺脾厥陰。肝之積痰。治喉痹咽痛。為要藥。播汁醋和。噙之引涎。千金方治喉痹。

有烏扇膏。治結核癩疔。便毒瘡母。蟹甲煎丸治瘰母用之。通經閉。利大腸。

鎮肝明目。扁竹花根也。葉橫鋪如烏羽及扇。故一名烏扇。烏鑿。泔水浸一日。篋竹葉煮

半日用。

續隨子。一名千金子。瀉行水破血解毒。

辛溫有毒。行水破血。治癥瘕痰飲。冷氣脹滿。蠱毒鬼疰。利大小腸。下

惡滯物。塗疥癬瘡。玉樞丹用之。治百病多效。去殼取色白者。壓去油

用。李時珍曰。續隨子大戟澤漆甘遂莖葉相似。主療亦相似。長於利水。用之得法。皆要藥也。

馬蘭子。一名蠶實。瀉溼熱解毒。

甘平。治寒疝喉痹。癰腫瘡癤。婦人血氣煩悶。血運崩帶。利大小腸。久

服令人瀉。叢生。葉似薤而長厚。結角子如麻大。赤色有稜。炒用。治疝

用醋拌。根葉同功。

蓖麻子。瀉通竅。拔毒。出有形滯物。

辛甘有毒。性善收。亦善走。能開通諸竅。經絡。治偏風不遂。喎斜。搗餅左貼

左右貼口噤。鼻窒耳聾。搗爛綿裹塞耳塞鼻喉痹舌脹。油作紙燃烟薰能利水氣。治水

癥浮腫。研服。當下青黃水。能出有形滯物。治鍼刺入肉。搗敷傷處。類

藥恐勞。竹木骨鯁。以蓖麻子一兩。凝水石二兩。研勻。胞胎不下。蓖麻一

一粒。麝香一分。貼臍中。併足心。胎下即收。能追膿拔毒。敷瘰癧惡瘡。外

用屢奏奇功。鵝油能引藥氣入內。蓖麻油。然有熱毒氣味。頗近巴

豆內服不可輕率。去皮黃連水浸每晨用浸水吞一粒至三四粒治大風疥癩。形如牛蟬黃褐有

斑鹽水煮去皮研或用油忌鐵。食菹麻一食炒豆犯之脹死。

白頭翁 瀉熱涼血。

苦堅腎寒涼血入陽明。胃大腸血分治熱毒血痢。張仲景治熱痢有白頭翁湯合黃連黃蘗

秦皮李東垣曰腎欲堅急食苦以堅之痢則下焦虛故以純苦之劑堅之。溫瘧寒熱齒痛骨痛。腎主齒骨

鼻衄禿瘡癩癧疔瘰血痔偏墜。搗敷患處明目消疣有風反靜無風則搖。

近根處有白茸得酒良。

王瓜 即土瓜根瀉熱利水行血。

苦寒瀉熱利水治天行熱疾黃疸消渴。搗汁飲便數帶下月閉瘀血利

大小腸排膿消腫下乳。通乳藥多用之單服亦可。墮胎根如栝樓之小者味如山

藥根子通用。經疏曰主治略似栝樓傷寒發斑用王瓜搗汁和伏龍肝末服甚效。

王不留行 通行血

甘苦而平。其性行而不住。能走血分。通血脈。乃陽明衝任之藥。陽明氣

多除風去痹。止血定痛。通經利便。下乳。俗云。穿山甲。王不留。婦人服之。乳長流。催生治

金瘡。止血。散血。癰瘡。出竹木刺。孕婦忌之。花如鈴鐸。實如燈籠。子殼五稜。

取苗子蒸。漿水浸用。

冬葵子 滑腸。利竅。

甘寒淡滑。潤燥利竅。通營衛。滋氣脈。行津液。利二便。消水腫。用榆皮等分煎

服。通關格。下乳滑胎。秋葵復種。經冬至春作子者。名冬葵子。根葉同

功。春葵子亦滑。不堪入藥。

蜀葵。花赤者治赤帶。白者治白帶。赤者治血燥。白者治氣燥。亦治血

淋關格。皆取其寒潤滑利之功也。

白鮮皮

通祛風溼。

氣寒善行。味苦性燥。

行水故燥。

入脾胃除溼熱兼入膀胱小腸。行水道。通

關節。利九竅。為諸黃風癰之要藥。

一味白鮮皮湯治產後風。李時珍曰。世醫止施之瘡科淺矣。

兼

治風瘡疥癬。女子陰中腫痛。

溼熱乘虛客腎與膀胱所致。

根黃白而心實。取皮用。

惡桑螵蛸桔梗茯苓萆薢

萆薢

通祛風溼。補下焦。

甘苦性平。入足陽明厥陰。

胃肝。

祛風去溼以固下焦。

陽明主肉屬溼。厥陰主筋屬風。補

肝虛。堅筋骨。

風溼去。則筋骨堅。

益精明目。治風寒溼痺。腰痛久冷。關節老

血。膀胱宿水。陰痿失溺。莖痛遺濁。痔瘻惡瘡。

諸病皆陽明溼熱流入下焦。萆薢能除濁分清。

古方有萆薢分清飲。史國信曰。若欲與陽先滋筋力。若欲便清。先分肝火。萬金護命方曰。凡人小便頻數。便時痛不可忍。者此疾必因大

腸祕熱不通。水液只就小腸。大腸愈加乾竭。甚則身熱心燥。思水即重證也。此疾本因貪酒色。或過食辛熱葷膩之物。積有熱毒。腐物瘀

血乘虛流入小腸。故便時作痛也。此便數而痛。與淋證瀆入大腸。仍以蔥宜用葶藶一兩。鹽水炒。為末。每服二三錢。使水道轉入大腸。仍以蔥

湯頻洗穀道。令氣得通。則便數及痛自減也。有黃白二種。黃長鞭。青

○腎有二竅。淋證出於溺竅。濁證出於精竅。有黃白二種。黃長鞭。青

白虛軟。軟者良。薏苡為使。畏大黃。柴胡。前胡。忌茗醋。李時珍曰。葶藶

不同。而主治不甚相遠。豈一類數種乎。
葶藶根細長淺白。莖葉根作塊而黃。

土茯苓。通祛溼熱。補脾胃。
甘淡而平。陽明胃大主藥。健脾胃。祛風溼。脾胃健則營衛從。風溼除

則筋骨利。利小便。止瀉泄。治筋骨拘攣。楊梅瘡毒。楊梅瘡古方不載。明正德間起於嶺

表。其證多屬陽明厥陰。而兼及他經。蓋相火寄於厥陰。肌肉屬於陽

明。故也。醫用輕粉刮劑。其性燥烈。入陽明。刮去痰涎。從口齒出。疔即

乾愈。然毒氣竄入經絡。筋骨血液枯槁。筋失所養。變為拘攣。癱漏。竟

致廢癈。土茯苓能制輕粉之毒。去陽明溼熱。用一兩為君。苡苡仁。金銀

花防風。木通。木瓜。白鮮皮。各五分。皂角子。四分。氣。瘰癧瘡腫。溼鬱而

虛。加入人參七分。血虛加當歸七分。名搜風解毒湯。溼鬱而

衛不和。則生瘡腫。經曰。溼氣害人。皮肉筋脈是也。大如鴨子。連綴而

生。俗名冷飯團。有赤白二種。白者良。可煮食。亦可生啖。忌茶。

白蘇。瀉火散結。

苦能泄。辛能散。甘能緩。寒能除熱。殺火毒。散結氣。生肌止痛。治癰疽。

瘡腫。面上疱瘡。金瘡撲損。箭鏃不出者。同丹皮。或半夏為末。酒服。斂瘡方多用之。故名。每與

相須。白芨。末油調。搽凍耳。同黃藥。末油調。蔓赤。枝有五葉。根如卵而長。三五枝同窠。皮烏。

肉白。一種赤蘇。功用皆同。鄭奠一曰。能治溫瘧。血痢。腸風痔瘡。赤白帶下。

預知子。補勞。瀉熱。

苦寒。補五勞七傷。治疝癖氣塊。天行溫疾。蛇蟲咬毒。殺蟲療蠱。顯衣。領中。

凡遇蠱毒。則聞其名。而預知之。故名。利便催生。藤生子如阜角。褐色光潤。出蜀中。云亦

難得。

旱蓮草。一名鯉腸。又名金陵草。補腎。

甘鹹。汁黑。補腎止血。黑髮烏髭。

千金曰：當及時多收，其效甚速。經疏曰：性涼，不益脾胃，故千金方金匱煎

丸用蘆

苗如旋覆。實似蓮房。斷之有汁。須臾而黑。熬膏良。

劉寄奴草

瀉。破血。止血。

苦溫。破血通經。除癥下脹。止金瘡血。多服令人吐利。一莖直上。葉尖

長。糙澀。花白蕊黃。如小菊花。有白絮如苦蕒絮。子細長亦似苦蕒子。

莖葉花子皆可用。

劉裕小字寄奴。微時曾射一蛇。明日見童子林中搗藥。問之。答曰：吾王為劉寄奴所傷。合藥敷之。裕

曰：王何不殺之。童曰：寄奴王者不可殺也。此之不見。乃收藥回。每遇金瘡敷之立愈。

馬鞭草

瀉。破血。消脹。殺蟲。

味苦微寒。破血通經。殺蟲消脹。治氣血癥瘕。癰瘡陰腫。

搗汁塗敷。

墟陌甚

多。方莖。葉似益母對生。夏秋開細紫花。穗如車前草。類蓬蒿而細。根

白而小。用苗葉。

穀精草

輕明目。

辛溫輕浮。上行陽明。

胃兼入厥陰。

肝明目退翳之功在菊花之上亦

治喉痹齒痛。陽明風熱。收穀後。荒田中生。葉似嫩秧。花如白星。

小兒雀盲

者。羯羊肝一具。不洗。竹刀割開。入穀精煮熟食之。或作丸。茶下。

青箱子

一名草決明。瀉肝明目。

味苦微寒。入厥陰。

肝祛風熱。鎮肝明目。治青盲障翳。蟲疥惡癰。瞳子

散大者。忌服。

能助陽火。

類雞冠而穗尖長。

決明子

瀉肝明目。

甘苦鹹平。入肝經。除風熱。治一切目疾。故有決明之名。又曰益腎精。

瞳子神光屬腎。陳日華曰。明目甚於黑豆。作枕治頭風。

狀如馬蹄。俗呼馬蹄決明。搗碎煎。惡大

麻仁。

薺實 宜溫中。

辛溫。溫中明目。耐風寒。下水氣。李時珍曰：古人種薺為蔬，收子入藥。今惟酒麪用其汁耳。以香薺青薺紫薺。

良。薺為有香薺青薺紫薺赤薺木薺水薺馬薺。

馬勃 輕解熱。外用敷瘡。

辛平輕虛。清肺解熱。李東垣普濟消散。血止嗽。治喉痹咽痛。吹喉中

白礬或硝掃喉。取吐痰愈。鼻衄失音。外用敷諸瘡。良。生溼地朽木上。狀如肺肝。紫

色虛軟。彈之粉出。取粉用。

木鱉子 瀉熱。外用治瘡。

苦溫微甘。有小毒。利大腸。治瀉痢疝積。瘰癧瘡痔。乳癰蚌毒。消腫追

毒。生肌除黥。音早。黑斑專入外科。核扁如鱉。綠色。揀去油者。能毒狗。

本草備要卷一終

本草備要卷二

清休寧汪 昂訥庵著

武進謝 觀礪恆 鎮海董豐 培兆基 評校

木部

茯苓 補心脾通行水

甘溫益脾助陽淡滲利竅除溼色白入肺瀉熱而下通膀胱能通心氣於腎

使熱從小便出然必其上行入肺寧心益氣調營理衛定魄安魂營能清化源而後能下降利水也

血衛主氣肺藏魄肝藏魂治憂恚驚悸心肝不足心下結痛寒熱煩滿口焦舌乾脾口為

舌為心苗火欬逆火嘔噦胃火膈中痰水脾虛水腫淋瀝泄瀉溼滲遺精益

腎若虛寒遺溺泄精者又當用溫熱之劑峻補其下忌用茯苓淡滲之藥小便結者能通多者能止溼除

自生津止渴溼熱去退熱安胎松根靈氣結成以大塊堅白者良去

皮乳拌蒸多拌良白者入肺膀胱氣分赤者入心小腸氣分李時珍曰白入

氣赤。補心脾白勝。利溼熱赤勝。惡白麩。畏地榆秦艽龜甲雄黃。忌醋。

茯苓皮專能行水。治水腫膚脹。以皮行皮之義。五皮散用之。凡腫而

擊飲不煩渴。大便溼。小便數。屬陰水。宜實脾飲。流氣飲。腰以上腫。宜汗。腰以下腫。宜利小便。

茯神 補心。

主治略同。茯苓但茯苓入脾腎之用多。茯神入心之用多。開心益智。

安魂養神。療風眩心虛。健忘多恚。即茯苓抱根生者。昂按以其抱心。故能補心也。

去皮及中木用。

茯神心木名黃松節。療諸筋攣縮。偏風喎斜。心掣健忘。心木一錢。石器

妙研名松節散。每服二錢。木瓜湯下。治一切筋攣疼痛。乳香能伸筋。木瓜能舒筋也。

琥珀 通行水。散癆安神。

甘平。以脂入土而成。實故能通塞。以寧心。定魂魄。療癩邪。從鎮堅藥。則安心神。

色赤入手少陰足厥陰肝心血分故能消瘀血破癥瘕生肌肉合金瘡

從辛溫藥則破血生肌其味甘淡上行能使肺氣下降而通膀胱經曰飲食入胃游溢精氣

上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱凡滲藥皆上行而後下降故能治五淋利小便燥脾土

從淡滲藥則利竅行水然石藥終燥若血少而小便不利者反致燥急之苦又能明目磨翳松脂入土年

久結成或云楓脂結成以摩熱拾芥者真市人多煮雞子及青魚枕偽之摩呵亦能拾芥宜辨

用柏子仁末入瓦鍋同煮半日搗末用

松節燥溼去風

松之骨也堅勁不凋故取其苦溫之性以治骨節間之風溼朱丹溪曰能燥

血中之溼杵碎浸酒良史國公藥酒中用之

松脂苦甘性燥祛風去溼化毒殺蟲生肌止痛養生家鍊之服食今

熬膏多用之鱗齒有孔松脂經塞蟲即從脂出

松毛釀酒煮汁代水亦治風痹脚氣。

柏子仁 補心脾 潤肝腎。

辛甘而潤。其氣清香。能透心腎而悅脾。昂按凡補脾藥多燥此潤藥而香能舒脾燥脾藥中兼用

最良。養心氣。潤腎燥。助脾滋肝。王好古曰肝經氣分藥益智寧神。養心聰耳明目。益甘

血香通竅益血止汗。心生血汗為心液除風溼。愈驚癇。澤皮膚。辟鬼魅。炒研去油。

油透者勿用。畏菊花。

側柏葉 補陰 涼血。

苦澆微寒。本草微溫養陰滋肺而燥。土最清。血分為補。陰要藥。止吐衄崩。

淋。腸風尿血。痢血。一切血證。去冷風溼痹。歷節風痛。肢節大痛。查靜夜劇。名白虎歷

節風亦風寒溼所致塗湯火傷。搗爛水調塗生肌殺蟲。炙罨凍瘡。汁烏髻髮。取側者。

朱丹溪曰多得月令之氣隨月建方取或炒或生。用桂牡蠣為使。惡菊花。宜酒。萬木皆向陽。柏

獨四指受金之正氣。堅勁不凋。多壽之木。故元旦飲椒柏酒以辟邪。

肉桂。大燥。補腎命火。

辛甘大熱。氣厚純陽。入肝腎血分。補腎。補命門。相火之不足。兩腎中間。先天

祖氣乃真火也。人非此火不能有生。無此真陽之火。則無以蒸糟粕而化精微。脾胃衰敗。氣盡而亡矣。益陽消陰。治痼

冷沉寒。能發汗。疏通血脈。宣導百藥。辛則善散。熱則通行。去營衛風寒。表虛自

汗。陽虛。腹中冷痛。欬逆結氣。桂能引火歸宿。丹田木得桂而枯。削桂釘

木即死。又能抑肝風而扶脾土。肝木盛則剋脾土。辛散肝風。甘益脾土。從治目赤腫痛。以熱

名曰從治。及脾虛惡食。命火不足。溼盛泄瀉。土為木剋。不能防水。古行水方中。亦多用桂。如五苓散。滋腎丸之類。

補勞明目。通經墮胎。辛熱能動血。故也。出嶺南桂州者良。州因桂名。色紫肉厚。味

辛甘者。為肉桂。入肝腎命門。去粗皮用。其毒在皮。去裏外皮。當中心者。為桂心。

入心。枝上嫩皮。為桂枝。入肺勝臍及手足。得人參甘草麥冬良。忌生蔥石脂。本草

有菌桂筒桂牡桂版桂之殊今用者亦罕分別惟以肉厚氣香者良

桂心 燥補陽活血

苦入心辛走血能引血化汗化膿內托癰疽痘瘡同丁香治痘瘡灰塌益精明

目消瘀生肌補勞傷暖腰膝續筋骨治風痹癢癢噎膈腹滿腹內冷

痛九種心痛一蟲二症三風四悸五食六飲七冷八熱九去來痛皆邪乘於手少陰之絡邪正相激故令心痛

桂枝 輕解肌調營衛

辛甘而溫氣薄升浮入太陰肺太陽膀胱經溫經通脈發汗解肌利能

肺氣經曰辛甘發散為陽治傷風頭痛無汗能發中風自汗有汗自止中猶傷也古文

君芍藥甘草為佐加薑棗名桂枝湯能和營實表調和營衛使邪從汗出而汗自止亦治手

足痛風脅風痛風有風痰風溼溼痰瘀血氣虛血虛之異桂枝用作引經脅風屬肝桂能平肝李東垣曰桂枝橫行手臂以

其為枝也又曰氣薄則發澁桂枝上行而解表氣厚則發熱肉桂下行而補腎王好古曰或問桂枝止煩出汗仲景治傷寒發汗數處皆

用桂枝湯。又曰無汗不得用桂枝。汗多者桂枝甘草湯。此又能閉陰也。二義相通否乎。曰仲景云太陽病發熱汗出者此為營弱衛強。陰虛陽必湊之。故以桂枝發其汗。此乃調其營氣。則衛氣自和。風邪無所容。遂自汗而解。非若麻黃能開腠理。發出其汗也。汗多用桂枝者。以之調和營衛。則邪從汗出。而汗自止。非桂枝能閉汗孔也。○亦惟有汗者宜之。若傷寒無汗。則當以發汗為主。而不獨調其營衛矣。故曰無汗不得服桂枝。有汗不得服麻黃也。傷寒例曰桂枝下咽。陽盛則斃。承氣入胃。陰盛則亡。

枸杞子。平。補而潤。

甘平。本草潤肺清肝。滋腎益氣。生精助陽。補虛勞。強筋骨。肝主筋。去

風明目。目為肝竅。瞳子屬腎。利大小腸。治噎乾消渴。昂按古諺有云。出家千里。勿食枸杞。其色赤屬火。能

補精壯陽。然氣味甘寒。而性潤。仍是補水之藥。所以能滋腎益肝。明目而治消渴也。南方樹高數尺。北方並是

大樹。以甘州所產紅潤少核者良。酒浸搗用。根名地骨皮。見下。

枸杞葉名天精草。苦甘而涼。清上焦心肺客熱。代茶止消渴。李時珍曰。皆三

焦氣分之藥。

地骨皮 瀉熱涼血補正氣

甘淡而寒。降肺中伏火。瀉肝腎虛熱。能涼血而補正氣。故內治五內

邪熱。熱淫於內。治以甘寒。地骨一斤。生地五斤。酒煮服。治帶下。吐血。尿血。搗鮮汁服。欬嗽消渴。肺清。外治

肌熱虛汗。上除頭風痛。能除風者。肝腎同治也。肝有熱。則自生風。與外感之風不同。熱退則風自息。中平

胸脅痛。清肝。下利大小腸。療在表無定之風邪。傳尸有汗之骨蒸。李東垣曰。

地為陰。骨為裏。皮為表。地骨皮瀉腎火。牡丹皮瀉包絡火。總治熱在表。無汗而骨蒸。知母瀉腎火。治熱在內。有汗而骨蒸。四物湯加二皮。

治婦人骨蒸。朱二允曰。能退內潮。人所共知也。能退外潮。人實不知。病或風寒散而未盡。作潮往來。非柴葛所能治。用地骨皮走表。又走裏。

之藥。消其浮游之邪。服之未有不愈者。特表明之。李時珍曰。枸杞地骨。甘寒平補。使精氣充足。則邪火自退。世人多用苦寒。以芩連降上。

焦。知柏降下。焦致傷元氣。惜哉。子。腸滑者忌。枸杞。腎以青蒿佐地骨退熱。累有殊功。甘草水浸一宿用。子。中寒者忌。地

骨皮。搗鮮者同鮮小蘗煎濃汁。浸下疳甚效。

山茱萸 補肝腎。澹精氣。

辛溫酸澹。補腎溫肝。入二經氣分。固精。祕氣。強陰。助陽。安五臟。通九竅。濟聖

曰：如何瀆劑以通九竅。經疏曰：精氣充則九竅通利。昂按：山茱通九竅。古今疑之。得經疏一言而意旨豁然。始嘆前人識見深遠。不易測

讀。多有如此類者。即經疏一語而擴充之。實可發醫人之慧悟也。暖腰膝。縮小便。治風寒溼痹。溫肝

逐風。鼻塞目黃。肝虛邪客。耳鳴耳聾。腎虛則耳鳴耳聾。皆固精通竅之

收之。仲景八味丸用之。為君。其性味可知矣。昂按：別錄甄權曾云：能發汗。恐屬誤文。酸劑斂澹。何以反發。仲景亦安取發汗之藥。以為君

者。乙癸同源也。○肝為乙木。腎為癸水。去核。滑精。能用。惡桔梗。防風。防

己。

酸棗仁。補而潤。斂汗。寧心。

甘酸而潤。凡仁皆潤。專補肝膽。炒熟酸溫而香。亦能醒脾。湯用之。助陰氣。

堅筋骨。除煩止渴。斂陰生津。斂汗。經疏曰：凡服固表藥而汗不止者。用棗仁炒研。同生地白芍五味麥冬竹葉龍

眼肉。煎服多效。寧心。心君易動。曾由膽怯所致。經療膽虛不眠。湯中

或加用之。肝虛則膽亦虛。肝不藏魂。故不寐。血不歸脾。臥亦不安。金匱治虛勞。虛煩不眠。用酸棗仁。湯棗仁二升。甘草一兩。炙。知母。茯苓。

芍藥各二兩。深師加生薑二兩。此補肝之劑。經曰。臥則血歸於肝。蘇頌曰。一方加桂一兩。二方棗仁並生用。治不得眠。豈得以煮過便為

乎。痿痹久瀉。酸收。瀉脾。生用酸平。療膽熱好眠。李時珍曰。今人專以為

膽熱必有心煩口苦之證。何以反能好眠乎。溫膽湯治不眠。用二陳

加竹茹枳實二味。皆涼藥。乃以涼肺胃之熱。非以溫膽經之寒也。其

杜仲 補腰膝。

甘溫能補。微辛能潤。色紫入肝。經氣分潤。肝燥補肝虛。子能令母實。

故兼補腎。肝充則筋健。腎充則骨強。能使筋骨相著。骨相著有絲有筋。

治腰膝酸痛。經曰。腰者腎之府。轉移不能。腎將憊矣。膝者筋之府。屈

氣治不效。孫林曰。此腎虛也。用杜仲一兩。半酒半水煎服。六日全愈。

按腰痛不已者。屬腎虛。痛有定處。屬死血。往來走痛。屬痰。腰冷身重。

遇寒即發。屬寒溼。或痛或止。屬溼熱。而陰下溼癢。小便餘瀝。胎漏。懷

其原多本於腎虛。以腰者腎之府也。

瀝胎墜。慣墜胎者。受孕一兩月。用杜仲八兩。糯米煎湯浸透。炒斷絲。續斷二兩。酒浸。山藥六兩。爲糊丸。或棗肉爲丸。米飲下。二藥。

大補腎氣。托住胎元。則胎不墜。出漢中。厚潤者良。去粗皮剉。或酥炙酒炙蜜炙。鹽酒

炒薑汁炒。斷絲用。惡玄參。

女貞子。平。補肝腎。

甘苦而平。少陰之精。隆冬不凋。益肝腎。安五臟。強腰膝。明目。烏髭

髮。補風虛。除百病。女貞酒蒸。曬乾二十兩。桑椹乾十兩。早蓮草十兩。蜜丸。治虛損百病。如四月。即搗桑椹汁。七月。即搗

早蓮汁。和藥。不必用蜜。李時珍曰。女貞冬青。本草作二種。實一物也。

冬至採佳。酒蒸用。近人放蠟。於此樹。

楮實。平。補助陽。

甘寒。助陽氣。起陰痿。補虛勞。壯筋骨。明目充肌。李時珍曰。別錄大明。皆云。楮實大補益。而

修真祕書。又云。久服。令甚骨痿。濟生祕覽。治骨。屢用。楮實煎湯。豈非。輭骨之徵乎。本草發明。甚言其功。而云。今補藥中罕用。乃未之察耳。

取子浸去浮者酒蒸用。

楮皮善行水。治水腫氣滿。皮可為紙。楮汁和白芨飛麪調糊接紙。永不解脫。

桑白皮。瀉肺行水。十劑作燥。以其行水也。

甘辛而寒。瀉肺火。羅謙甫曰。是瀉肺中火邪。非瀉肺氣也。火與元氣不兩立。火去則氣得安矣。故本經又云。益氣。李東

垣曰。甘固元氣之不足。而補虛。辛瀉肺氣之有餘。而止嗽。然性不純良。不宜多用。錢乙瀉白散。桑皮地骨各一兩。甘草五錢。每服二錢。入

粳米百粒煎。李時珍曰。桑皮地骨皆能瀉火。從小便出。甘草瀉火。緩中。粳米清肺。養血。乃瀉肺諸方之準繩也。一婦鼻久不聞香臭。後因

他疾。纏仲醇為處方。每服桑皮利二便。散瘀血。下氣行水。止嗽清痰。至七八錢。服久而鼻塞忽通。

發明曰。肺中有水。則生痰。而作嗽。除水氣。正所以瀉火邪。實則瀉其子也。火退氣寧。則補益在其中矣。十劑曰。燥可去溼。桑白皮赤小豆

之類也。治肺熱喘滿。唾血熱湯。水腫臃脹。肺氣虛及風寒作嗽者。慎用。

為線可縫金瘡。刮去外皮。取白用。如恐其瀉氣。續斷桂心為使。忌鐵。

桑乃箕星之精。其木利關節。養津液。行水。錄驗方。枝皮細。祛風。一升。

細到妙香。水三升。熬至二升。一日。其火拔引毒氣。祛風寒溼痹。凡癰疽。

起。痰肉不腐。癩癧流注。膿頭惡瘡。不愈。用桑木煎補藥。熬諸膏。宜用片。扎成小把。燃火吹息。灸患處。內服補托藥良。

桑柴。內亦宜桑枝攪。

桑椹。甘涼。色黑入腎而補水。利五臟關節。安魂鎮神。聰耳明目。生津

止渴。煉膏治服金石藥熱渴。利水消腫。解酒烏髭。晒乾為末。蜜丸良。取極熟者。

濾汁熬膏。入蜜煉稠。點湯和酒並妙。入燒酒經年愈佳。每日湯點服。亦治癩癧。名

文武膏。以椹名。文武實也。

桑葉。甘寒。手足陽明胃大腸之藥。涼血。刀斧傷者。為末乾貼之。妙。燥溼。去風明目。經探

霜者。煎湯洗眼。去風淚。洗手足。去風痺。桑葉黑芝麻等分。蜜丸。名扶桑丸。除溼去風。烏鬚明目。以五月五日。六月六日。立冬日。採者佳。一

老人年八十四。夜能細書。詢之。云得一奇方。每末服止盜汗。嚴州有僧。每就

枕。汗出偏身。比旦。衣被皆透。二十年不能療。監寺教採帶露桑葉。焙乾為末。空心米飲下二錢。數日而愈。代茶止消渴。

桑寄生 補筋骨散風溼

苦堅腎助筋骨而固齒長髮齒者骨之餘甘益血止崩漏而下乳安

胎三證皆由血虛外科散瘡瘍追風溼他樹多寄生以桑上採者為真雜樹

恐反有害莖葉並用忌火

梔子 瀉心肺三焦之火

苦寒輕飄象肺色赤入心瀉心肺之邪熱使之屈曲下行從小便出

王海藏曰或用為利小便藥非利小便清而三焦之鬱火以解

熱厥厥有寒熱二證心痛以平朱丹溪曰治心痛當分新久若初起因寒因

痛添病乎古方多用梔子為君熱藥為之嚮導則邪易吐衄血淋血

痢之病以息最清胃腕之血妙黑末服吹鼻治衄本草匯曰治實火

止先氣壯則自能攝血朱丹溪曰治血不可單行單治心煩懊懣不眠

仲景用梔子豉湯。王好古曰：煩者氣也，燥者血也，故用梔子治肺煩。香豉治腎燥，亦用作吐藥，以邪在上焦吐之，則邪散，經所謂其高者

因而越之也。按梔豉湯吐虛，五黃古方多用梔子茵陳五淋亡血津枯口渴目煩客熱瓜蒂散吐痰食宿寒。

赤紫癍白癩。皴皴瘡瘍。皮腠肺所主故也。生用瀉火。炒黑止血。薑汁炒止煩。

嘔。內熱用仁。表熱用皮。

豬苓。通行水。

苦泄滯。淡利竅。甘助陽。入膀胱腎經。升而能降。開腠發汗。利便行水。

與茯苓同而不補。治傷寒溫疫大熱。經疏曰：大熱利小便亦分消之意。懊懣消渴。腫

脹淋濁。瀉痢痲瘡。瘡多由暑。暑必兼溼。經曰：然耗津液。多服損腎昏目。

腎水不足則目昏。仲景五苓散。豬苓茯苓澤瀉白朮桂。為治水之總劑。昂按。經曰：膀胱者州都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。用肉桂辛

熱引入膀胱。所以化其氣也。除桂名四苓散。資生經曰：五苓散能生津液。亦通大便。曾世榮治驚風。亦用五苓散。白茯苓安心神。澤瀉導

小便。小腸利而心氣平。木得桂而枯。能多生楓樹下。塊如豬屎故名。抑肝而風自止。可謂善用五苓者矣。

馬屎曰通。豬屎曰芥。肉白而實者良。去皮用。

黃蘗 瀉相火。補腎水。

苦寒微辛。沉陰下降。瀉膀胱相火。引足經太陽。補腎水不足。堅腎潤燥。

曰非真能補也。腎苦燥。急食辛以潤之。腎欲堅。急食苦以堅之也。相火退而腎固。則無狂蕩之患矣。按腎本屬水。虛則熱矣。心本屬火。虛

則寒矣。除溼清熱。療下焦虛骨蒸勞熱。陰虛生諸痿癱瘓。熱勝則傷血。

輒短而為拘。溼勝則傷筋。筋不束骨。則弛長而為痿。合蒼朮名二妙散。清熱利溼。為治痿要藥。或兼氣虛血虛。脾虛腎虛。溼痰死血者。當

隨證。曰赤耳鳴。腎火消渴便閉。黃疸水腫。王善夫病便閉。腹堅如石。腿

乾澀。小便不化。李東垣曰。此奉養太過。膏粱積熱。損傷腎水。致勝則

便藥。偏服不效。李東垣曰。此奉養太過。膏粱積熱。損傷腎水。致勝則

乾澀。小便不化。李東垣曰。此奉養太過。膏粱積熱。損傷腎水。致勝則

乾澀。小便不化。李東垣曰。此奉養太過。膏粱積熱。損傷腎水。致勝則

乾澀。小便不化。李東垣曰。此奉養太過。膏粱積熱。損傷腎水。致勝則

乾澀。小便不化。李東垣曰。此奉養太過。膏粱積熱。損傷腎水。致勝則

乾薑散火之標。甚者加附子。或噉官桂。引火歸元。殺蟲安虻。久服傷胃。尺脈弱者禁用。火若虛

炎。服此苦寒之劑。有寒中之變。李時珍曰。知母佐黃蘗。滋陰降火。有

金水相生之義。古云黃蘗無知母。猶水母之無蝦也。蓋黃蘗能制命

門。膀胱陰中之火。知母能清肺金。滋腎水之化源。朱丹溪曰。君火者。

人火也。心火也。可以水滅。可以直折。黃連之屬。可以制之。相火者。天

火也。龍雷之火也。陰火也。不可以水溼制之。當從其性而伏之。惟黃

蘗之屬。可以降之。按火有虛火。實火。燥火。溼火。鬱火。相火。之異。虛火

宜補。實火宜瀉。燥火宜滋潤。鬱火宜升發。溼火由溼鬱為熱。多病。肝

腫。經所謂諸腹脹大。皆屬於熱。諸病。肝腫。皆屬於火。是也。宜利溼。清

熱而兼補脾。相火寄於肝腎。乃龍雷之火。非苦寒所能勝。宜滋陰。養

血。壯水之主。以制陽光。又按諸病之中。火證為多。有本經自病者。如

忿怒生肝火。焦思生心火。之類。是也。有臟腑相移者。如子母相剋者。如心火剋肺金。

肝木剋脾火之類。是也。有臟腑相移者。如肺火剋嗽。久則移熱於大

腸。而泄瀉。心火煩焦。久則移熱於小腸。而為淋閉之類。是也。又有別經相移者。有數經合病者。當從其重者而治之。川產肉厚

色深者良。生用降實火。蜜炙則不傷胃。炒黑能止崩帶。酒製治上。蜜

製治中。鹽製治下。又未乳調。能塗凍瘡。

枳實枳殼

瀉。破氣。行痰。枳實小。枳殼大。

苦酸微寒。其功皆能破氣。氣行則痰行。喘止痞脹消。脾無積血。心下

則生腹脹。李東垣曰。枳實治下而主血。枳殼治上而主氣。痛刺息後重。除治胸痹結胸。食積五膈。

痰癖癥結。嘔逆欬嗽。水腫脅脹。肝瀉痢淋閉。痔腫腸風。除風去痹。辛

風。開胃健脾。所主略同。但枳實利胸膈。枳殼寬腸胃。枳實力猛。大承氣

湯皆用之。朱丹溪曰。枳實瀉痰。能衝牆倒壁。枳殼力緩為少異。孕婦及氣虛人忌用。按本草

實皆云。明目。思之不得其解。然目疾方中多用之。豈以其破濁氣。即能升清氣乎。本經又言枳實益氣。想亦同此理也。故厚朴調中。亦有

益氣明目之文。王好古曰。枳實佐以參朮乾薑。則益氣。佐以硝黃牽牛。則破氣。此本經所以言益氣而復言消痞也。張元素曰。枳殼泄肺

走大腸。多用損胸中至高之氣。昔湖陽公主難產。方士進瘦胎飲。用枳殼四兩。甘草三兩。五月後日服一錢。張潔古改以枳朮名束胎丸。

寇宗奭明其不然。蓋孕婦全賴血氣以養胎。血氣充實。胎乃易生。彼公主奉養太過。氣實有餘。故可服之。若概施。則誤矣。李時珍曰。八九

月胎氣盛。壅滯用枳殼。蘇梗以順氣。胎前無滯。則產後無虛也。氣弱者大非所宜矣。皮厚而小為枳實。殼薄虛

大為枳殼。陳者良。麸炒用。李時珍曰。殼實上世未分。魏晉始分。殼古東垣始分。殼治上。實治下。海藏始分。殼

主氣實主血然仲景治上焦胸痹痞滿用枳實諸方治下血痢痔腸
秘後重用枳殼則實不獨治下而殼不獨治高也蓋自飛門至魄門
皆肺主之三焦相通一氣而已○飛門口也魄門即肛門

厚朴 瀉下氣散滿

苦降能瀉實滿辛溫能散溼滿王好古曰別錄言厚朴溫中益氣消痰下氣是也與橘皮蒼朮同用則除溼

大黃同用則瀉實滿所謂消痰下氣是也與橘皮蒼朮同用則除溼

用則承氣湯同橘皮蒼朮即平胃散○按脹滿證多不同清補貴得其

宜氣虛宜補氣血虛宜補血食積宜消導痰滯宜行痰挾熱宜清熱

溼盛宜利溼寒鬱者散寒怒鬱者行氣蓄血者消痰不宜專用行散

藥亦有服參者而服反甚者以挾食挾入足太陰陽明胃脾平胃調中

佐蒼朮為平胃散平溼消痰化食厚腸胃行結水破宿血殺臟蟲治

土之太過以致於中和消痰化食厚腸胃行結水破宿血殺臟蟲治
反胃嘔逆喘欬瀉痢冷痛霍亂誤服脫人元氣孕婦忌之榛樹皮也
肉厚紫潤者良去粗皮薑汁炙或醋炒用乾薑為使惡澤瀉硝石忌

豆犯之動氣。

檳榔 瀉氣。行水。破脹。攻堅。

苦溫破滯。辛溫散邪。瀉胸中至高之氣。使之下行。性如鐵石。能墜諸藥。至於極下。攻堅去脹。消食行痰。下水除風。殺蟲醒酒。治痰癖癥結。

瘴癘瘡痢。水腫腳氣。腳氣衝心。尤須用之。治大小便氣祕。裏急後重。

同木香用。木香能利氣。過服則損真氣。嶺南多瘴。以檳榔代茶。其功有四。醒能

泄臟氣。無瘴之地忌用。雞心尖長。破之作錦紋者良。程星海曰。陰毛生。殺世鮮良方。以檳榔煎水洗。即除。

又方。以心紅擦之亦好。

大腹皮 瀉下氣。通行水。

辛泄肺。溫和脾。下氣行水。通大小腸。治水腫腳氣。痞脹痰膈。瘴瘡霍

亂氣虛者忌用。

大腹子似檳榔。腹大形扁。故與檳榔同功。取皮酒洗。黑豆湯再洗。煨用。鳩鳥多棲。

其樹故宜洗淨。

槐實。即槐角。瀉風熱。涼大腸。

苦寒純陰。入肝經。氣分。疎風熱。潤肝燥。涼大腸。治煩悶風眩。痔血腸

風。囊前有血名外痔。囊後有血名內痔。穀道努肉名舉痔。頭上有孔名痔瘻。瘡內有蟲名蟲痔。大法用槐角地榆生地以涼血。芩連梔

藥以清熱。防風秦艽以祛風。溼芎歸人參以和血。生血。枳殼以寬腸。升麻以升提。治腸風。略同。不宜專用寒涼。須兼補劑收功。陰瘡

溼癢。明目止淚。清肝。溼。為肝熱。固齒烏髭。十月上已採。漬牛膽中。陰乾百日。食後吞一枚。明目補腦。髮白還黑。

腸風痔血。尤宜服之。殺蟲。根皮皆能洗痔。墮胎。去單子及五子者。銅槌槌碎。牛乳拌蒸。

槐乃虛星之精。

槐花苦涼。入肝大腸血分。而涼血。血涼則陰自足。治風熱目赤。赤白泄痢。五

痔腸風。吐崩諸血。舌上無故出血如線。者名血衄。妙研搽之。陳者良。

苦楝子

一名金鈴子。瀉溼熱。治疝。殺蟲。

苦寒有小毒。能入肝舒筋。能導小腸膀胱之熱。因引心包相火下行。

通利小便。為疝氣要藥。亦治傷寒熱狂熱厥。腹痛心痛。殺三蟲。療瘍

疥。夷堅志。消渴證有蟲耗其津液者。取根皮濃煎。加少麝服。下其蟲而渴自止。脾胃虛寒。忌之。川產良。酒

蒸。寒因熱用。去皮取肉去核用。用核則槌碎。漿水煮一伏時。去肉用茴香

為使。

蔓荆子

輕宜散上部風熱。

辛苦微寒。輕浮升散。入足太陽陽明厥陰勝經。搜風涼血。通利九

竅。治溼痺拘攣。頭痛腦鳴。太陽脈絡於腦。目赤齒痛。齒雖屬腎。為骨之餘。而上攻。則動搖腫痛。頭面風虛之證。明目固齒。長髮澤肌。去膜。打碎用。

亦有酒蒸炒用者。惡石膏烏頭。

石南葉

宣去風補腎

辛散風。苦堅腎。補內傷陰衰。利筋骨皮毛。為治腎虛脚弱風痹要藥。

婦人不可久服。令思男。

李時珍曰。今人絕不知用。蓋為藥性論有。令人陰痿之說也。不知此藥能令腎強。人或藉

此縱欲以致痿弱。歸咎於藥。良可慨也。昂按。石南補陰祛風。則有之。然味辛不熱。不助相火。亦未聞淫邪方中用。石南者。別錄思男之說。

殆不可信。關中者佳。灸用。

辛夷

即木筆花。宜散上焦風熱。

辛溫輕浮。入肺胃氣分。能助胃中清。陽上行。通於頭腦。溫中解肌。通

九竅。利關節。主治鼻淵鼻塞。

肺主鼻。膽移熱於腦。則鼻多濁涕而淵。風寒客於腦。則鼻塞。經曰。腦滲為涕。王

冰曰。膿液不澄。則為濁。涕如泉不已。故曰鼻淵。

及頭痛面黧。

音早。黑斑。可作面脂。

目眩齒痛。九竅風熱。

之病。然性走竄。氣虛火盛者忌服。

李時珍曰。肺開竅於鼻。陽明胃脈。環鼻上行。腦為元神之府。鼻為命

門之竅。人之中氣不足。清陽不升。則頭為之傾。九竅為之不利。吾鄉金正希先生嘗語余曰。人之記性。皆在腦中。小兒善忘者。腦未滿也。

老人健忘者。腦漸空也。凡人外見一物。必有一形影留於胸中。昂按。今人每記憶往事。必閉目上瞪而思索之。此即凝神於腦之意也。不經先生道破。人皆習焉。而不察矣。李時珍曰。腦為元神之府。其於此義。殆暗符歟。去外皮毛。毛射肺。令人欬。微炒用。

芎藭為使。惡石脂。畏黃耆。菖蒲。石膏。

郁李仁。潤燥。瀉氣。破血。

辛苦而甘。入脾經。氣分。性降。下氣。行水。破血。潤燥。治水腫。瘰癧。大腸

氣滯。關格。不通用。酒能入膽。治悸。目張。不眠。目一婦因大恐而病。愈後目張不眠。錢乙曰。目系

內連肝膽。恐則氣結。膽橫不下。而目瞑矣。然治標之劑。多服。滲人津液。能散結。隨酒入膽。結去。膽下。而目瞑矣。

去皮尖。蜜浸研。

金櫻子。瀋精。固腸。

酸澆。入脾肺腎三經。固精。祕氣。治夢洩遺精。和芡實為丸。泄痢便數。

朱丹溪曰。經絡隧道。以通暢為平和。而味者以瀋性為快。熬膏食之。自作不靖。各將誰執。李時珍曰。無故而食。以恣慾。則不可。若精氣不

之固者服似榴而小黃赤有刺取半黃熟則去刺核用熬膏亦良筆

甘全失瀉味

訶子瀉腸斂肺瀉氣

苦以泄氣消痰酸以斂肺降火李東垣曰肺苦氣上逆急食苦以泄

能補肺故嗽藥中不用瀉以收脫止瀉溫以開胃調中治冷氣腹脹膈氣嘔逆

痰嗽喘急肺挾痰水或破火傷瀉痢脫肛腸風崩帶皆取其開音止

渴肺斂則音開火降則渴然苦多酸少雖瀉腸而泄氣氣虛及嗽肺

初起者忌服同烏梅倍子則收斂同陳皮厚朴則下氣得人參治肺

久瀉佐梲皮治腸癖便血同蛇牀從番舶來番名訶黎勒嶺南亦有

六稜黑色肉厚者良酒蒸一伏時去核取肉用肉則去核生用清

金行氣煨熟溫胃固腸海魚放涎凝滑船不能行投訶子湯尋化為水其化痰可知

烏藥 宜順氣

辛溫香竄。上入脾肺。下通腎經。能疏胸腹邪逆之氣。一切病之屬氣

者皆可治。氣順則風散。故用以治中氣中風。厥逆痰壅口噤脈伏身

又有痰為中風無痰為中氣局方治此亦用烏藥順氣散許學士曰

暴怒傷陰暴喜傷陽憂愁不已氣多厥逆往往得中氣之證不可作

治中風及膀胱冷氣小便頻數反胃吐食宿食不消瀉痢霍亂女人血

凝氣滯小兒蛻蛔外如瘡癩疥癬皆成於血逆理氣亦可治之療貓

犬百病氣虛氣熱者禁用。李時珍曰四磨湯治七情鬱結上氣喘急

沉香檳榔各濃磨汁七分合煎縮泉丸用同益智連珠者良酒浸一宿用。亦有煨

五加皮 宜祛風溼補壯筋骨

辛順氣而化痰苦堅骨而益精溫祛風而勝溼逐肌膚之瘀血療筋

骨之拘攣

肝得其養則妄水去而骨壯。治五緩虛羸。

五臟筋脈緩縱。千金方補曰：五

月五日採莖七月七日採葉九月九日採根合為末治五勞

陰痿囊溼女子陰癢

溼生

小兒腳弱

明目愈瘡釀酒尤良

王綸曰：風病飲酒能生痰火惟五加皮酒益人

莖青節白。花赤皮黃根

黑上應五車之精。芬香五葉者佳。遠志為使。惡玄參。

椿。樗。白皮

瀉腸燥溼

苦燥溼寒勝熱瀉收斂入血分而瀉血去肺胃之陳痰治溼熱為病

泄瀉久痢崩帶腸風夢遺便數有斷下之功

痢疾滯氣未盡者勿遽用。勉強固澀必變他證。

去疔齧。樗皮尤良

李時珍曰：椿皮入血分而性瀉。樗皮入氣分而性利。凡血分受病不足者宜椿皮。氣分受病有鬱者宜樗皮。乾坤生意治瘡腫下藥用樗皮水研服。汁取利是其驗矣。昂

宜樗皮止瀉痢終是瀉劑。寇氏曰：一婦年四十餘耽飲無度多食魚蟹積毒在臟口夜二三瀉便與膿血雜下大腸連肛門甚痛用

止血痢藥不效用腸風藥益甚蓋腸風有血無膿也服熱藥腹愈痛

血愈下服冷藥注瀉食減服溫平藥則若不知年餘待斃或教服人參散。樗皮人參各一兩為末空心溫酒或米飲下二錢遂愈。昂按此人

方仍是作 痢疾治。香者為椿。肌實而赤嫩。其苗可茹。臭者為樗。肌虛而白。主

治略同。根東引者良。去粗皮。或醋炙。蜜炙用。忌肉麪。

榆白皮。滑。利竅。

甘滑下降。入大小腸膀胱經。行經脈。利諸竅。通二便。滲溼熱。滑胎產。

或胎死腹中。服汁可下。下有形留著之物。治五淋腫滿。喘嗽不

眠。枯康養生論。療疥癬禿瘡。消赤腫妬乳。乳癰汁不出。內結成腫。名

易效。十劑曰。滑可去著。冬有赤白二種。去粗皮。取白用。採皮為麪。荒

黏劑以之調和。黏滑勝於膠漆。

秦皮。瀋而補。明目。

苦寒。色青。性瀋。補肝膽而益腎。以能平木。故治目疾。洗目赤。驚

癩。以其收瀋而寒。故治崩帶下痢。以其瀋而補下焦。故能

仲景白頭翁湯用之

能除肝熱

洗目赤。驚

益精有子。李時珍曰。天道貴畜。惟收瀦故能補。今人只知其治目一節。幾於廢棄。良為可愧。出西土。皮有白

點。漬水碧色。書紙不脫者真。大戟為使。惡吳茱萸。

海桐皮。宜祛風溼。

苦溫。經疏曰。應兼辛。入血分。祛風去溼殺蟲。能行經絡。達病所。治風蹶頑癩。

腰膝疼痛。傳信方。海桐。薏苡。各二兩。芎藭。羌活。地骨皮。五加皮。各二兩。甘草。五錢。生地。七兩。酒二斗。浸。此方不得增減。早中晚

飲常令醃。應令疔。蠶疥癬。目赤。煎洗。牙蟲。煎服。或含漱。出廣南。皮白堅韌。作索不爛。

蕤仁。亦名白梭。補明目。

甘溫。別錄徵寒。入心肝脾三經。消風散熱。益水生光。三經皆血臟也。血得其養。則目疾平。凡目

病在表。當疏風清熱。在裏屬腎。虛血少神勞。宜補腎養血安神。遠視為腎水虧。近視為火不足。治目赤腫痛。皆爛淚

出。亦治心腹邪熱。結氣痰痞。今人生治足睡熱。治不眠。叢生有刺。實如

五味。圓扁有紋。紫赤可食。取仁浸。去皮尖。研用。

密蒙花 潤肝明目。

甘而微寒。入肝經氣血分。潤肝燥。治目中赤脈青盲。膚翳赤腫。眇音

脂。淚。小兒疳氣攻眼。產蜀中。葉冬不凋。其花繁密蒙茸。故名。揀淨酒

浸一宿。候乾。蜜拌蒸。曬三次。

芙蓉花 瀉涼血解毒。

辛平。性滑澀黏。清肺涼血。散熱止痛。消腫排膿。治一切癰疽腫毒。有

殊功。用芙蓉花或葉或皮或根。生搗或乾研末。蜜調塗四圍。中間留

者則易斂。瘍科秘其名為清涼膏。清露散。鐵箍散。皆此

山茶花 瀉涼血。

甘微辛寒。色赤。入血分。治吐衄。腸風麻油調末。塗湯火傷。用紅者為

末。入童便薑汁酒調服。可代鬱金。

木槿 瀉熱。

苦涼活血潤燥。治腸風瀉血。痢後熱渴。作飲服。令人得睡。川產者治

癬瘡。癬瘡有蟲。用川槿皮肥阜水浸。或浸汁磨雄黃尤妙。用根皮。

杉木 宜散腫脹。

辛溫去惡氣散風毒。治腳氣腫痛。心腹脹滿。洗毒瘡。柳子厚纂救死方曰得腳氣夜

半拈絕。骨塊如石昏困且死。鄭洵美傳杉木湯。食頃大下。塊散氣通。用杉木節一升。橘葉一升。無葉以皮代。大腹檳榔七枚。連子槌碎。童

便三升。煮分二服。若一服得快利。即停後服。有赤白二種。赤油斑如野雞者。作棺尤貴。性

直燒炭。最發火藥。

烏白木 瀉熱毒。

苦涼性沉而降。利水通腸。功勝大戟。療疔腫。解砒毒。極能瀉下。凡患腫毒中砒毒者。

不拘根皮枝葉。搗汁多飲。得大利即愈。虛人忌用。

白子可作燭。

水楊柳 官行氣血。

苦平。痘瘡頂陷。漿滯不起者。用枝煎湯浴之。此因氣凝血滯。或風寒

達。漿隨暖而行。再用助氣血藥更效。

柳枝煎汁。治黃疽。

阜角 通關節。搜風。

辛鹹性燥。氣浮而散。入肺大腸經。金勝木。燥勝風。故兼入肝。搜風泄

熱。吹之導之。則通上下。關節而涌吐痰涎。搐鼻立作噴嚏。治中風口

噤。胸痹喉痹。凡中風不省人事。口噤不能進藥。急提頭髮。手招人中。

氣已絕死。或用稀涎散吐之。阜角末一兩。白礬五錢。每用一錢。溫水調灌。或加藜蘆少麝。鵝翎探喉。令微吐稀涎。再用藥治。年老氣虛人

忌服之。則除溼去垢。最去油膩。消痰破堅。取中段湯泡服。殺蟲下胎。

治風溼風癩痰喘腫滿。堅癥囊結。厥陰肝脈絡陰器。寒客肝經則為囊結。塗之則散腫。

消毒煎膏貼一切瘰癧。合蒼朮焚之。辟瘟疫溼氣。一種小如豬牙。一

種長而枯燥。一種肥厚多脂。多脂者良。去粗皮子弦。或蜜炙酥炙。絞

汁燒灰。用柏實為使。惡麥冬。畏人參苦參。性能消鐵。不結莢者。鑿樹

錘礪見之。久則成孔。故此木不能燒爨。

皂角刺辛溫。搜風殺蟲。功同皂莢。但其鋒銳能直達患處。潰散癰疽。

治癰毒妬乳風癘惡瘡。癰同癩。癘乃營氣熱附風寒客於脈而不去。經曰脈風成爲癘。脈與營皆血也。蒸曬爲末。

大黃湯調下。胎衣不下。癰疽已潰者。禁用孕婦忌之。

皂角子通大便燥結。煨存性用。汪機曰其性得溼則滑。李時珍曰亦辛以潤之。之義非得溼則滑也。

肥皂莢 瀉熱毒。

辛溫。除風溼。去垢膩。故澡身鹽面用之。療無名腫毒。有奇功。不拘奇癘惡毒。用生肥皂莢去子。

弦及筋搗爛。醋和敷立愈。不愈再敷。奇驗。此方書未載。若貧人僻地倉卒無藥者。用之甚便。故特著之。集成曰。生肥阜。火煨存性。生

油膩粉調敷諸惡瘡。

櫻櫚。瀉。止血。

苦能泄熱。瀉可收脫。燒黑能止血。紅見黑則止。不可燒過。櫻櫚側柏卷柏燒存性。飯丸。止遠年下血。亦

可煎服。治吐衄下痢。崩帶腸風。失血過多者。初起未可遽用。年久敗櫻

尤良。與髮灰同用更良。

茶。瀉熱。清神。消食。

苦甘微寒。下氣消食。去痰熱。除煩渴。清頭目。得春初生發之氣。故多肅清上膈之功。湯液曰。

茶苦寒。下行。如何是清頭目。醒昏睡。清神。解酒。食油膩。燒炙之毒。利大蒙。釜曰。熱下降。則上自清矣。清矣。

小便多飲消脂。最能去油。寒胃。故濃茶能引吐。千金療卒頭痛如破。非中

煮茶。恣飲。取吐。直吐出。磨汁。乃已。渴而即瘦。酒後飲茶。引入膀胱腎經。患癩疝水腫。空心

亦忌之。與薑等分濃煎。名薑茶飲。治赤白痢。茶助陰。薑助陽。使寒熱平調。並能消暑解酒食毒。陳細者良。粗者

損人。

吳茱萸。燥。祛風寒溼。宜下氣開鬱。

辛苦大熱。有小毒。入足太陰。脾。血分。少陰厥陰。肝腎。氣分。入肝而旁及

腎。脾。潤肝燥脾。溫中下氣。除溼解鬱。去痰殺蟲。開腠理。逐風寒。治厥陰

頭痛。仲景有吳茱萸湯。陰毒腹痛。小腹痛。嘔逆吞酸。俗名醋心。亦有吐酸者。宜

蔡中丞苦痰飲。率十日一發。頭痛背寒。嘔酸不食。得一方。伏痞滿噎

膈。胃。冷。食積瀉痢。血痺陰疝。痔疾腸風。腳氣水腫。口舌生瘡。為末。醋調

引熱下行。衝脈為病。氣逆裏急。宜此。性雖熱。而能引熱下行。言椒性

善下。吳萸性上。似不盡然。寇宗奭曰。此物下氣甚速。李東垣曰。濁陰

不降。厥氣上逆。膈塞脹滿。非吳萸不可治也。昂按。吳萸辛熱。故性上。氣味俱厚。利大腸壅氣。故治腸風痔痢。下產後餘血。必用之。然走氣動火。昏

目發瘡。血虛有火者禁用。陳者良。泡去苦烈汁用。須泡數次。止嘔黃連水

炒。治疝鹽水炒。治血醋炒。惡丹參硝石。

川椒。宜散寒溼。燥補火。

辛熱純陽。入肺發汗散寒。治風寒欬嗽。入脾暖胃燥溼。消食除脹。治

心腹冷痛。吐瀉癖痢。痰飲水腫。千金方有人冷氣入陰囊腫滿生椒擇淨帛裹著丸囊厚半寸須臾熱氣

大通日再易取消瘥。入右腎命門補火。治腎氣上逆。能下行導火歸梅師用桂末塗亦良。

粒大能溫。陽衰洩數。陰汗洩精。下焦虛寒。堅齒明目。破血通經。除癥安虻。

蟲見椒則伏。仲景虻厥烏梅丸用之。殺鬼疰蟲魚毒。最殺勞蟲。危氏神授丸。川椒炒

凡蟲嚙腹痛者。面白唇紅。時發時止。殺鬼疰蟲魚毒。神授丸。川椒炒

出汗為末。米飲下三錢。有人病傳尸勞。遇異人傳此方。服至二斤。吐出蟲如蛇而安。肺胃素熱者忌服。朱丹溪曰。食椒

既久。則火自水中。秦產名秦椒。俗名花椒。實稍大。蜀產肉厚皮皺為生。多被其毒也。
川椒閉口者殺人。微炒去汗搗去裏面黃殼。取紅用。名椒。得鹽良。入腎。

使杏仁畏款冬防風附子雄黃麻仁涼水。椒乃玉衡星之精辟疫伏邪故歲旦飲椒柏酒。

川椒子名椒目。苦辛。專行水道。不行穀道。能治水蠱。除脹定喘。及腎

虛耳鳴。

胡椒。燥。快膈。消痰。

辛熱純陽。暖胃快膈。下氣消痰。治寒痰食積。腸滑冷痢。陰毒腹痛。胃

寒吐水。牙齒浮熱作痛。合華葦散之。殺一切魚肉鱉輩。音尋上聲。毒食料宜之。

嗜之者衆。多食損肺。走氣動火。發瘡痔。臟毒。齒痛目昏。

畢澄茄一類二種。主治略同。

蘇木。瀉。行血。解表。

甘鹹辛涼。入三陰血分行血去瘀。發散表裏風氣。宜與防風同用。治產後血

暈。肘後方。煮汁服。海藏方。加乳香酒服。脹滿欲死。血痛血瘦。經閉氣壅。癰腫撲傷。排膿

止痛多破血少和血出蘇方國交愛亦有忌鐵。

沉香 重宜調氣補陽。

辛苦性溫諸木皆浮而沉香獨沉故能下氣而墜痰涎。怒則氣上平則下氣

能降亦能升氣香入脾故能理諸氣而調中。李東垣曰上至天下至泉用為使最相宜其

色黑體陽故入右腎命門暖精助陽行氣不傷氣溫中不助火治心

腹疼痛噤口毒痢癰癖邪惡冷風麻痺氣痢氣淋色黑沉水者良香

甜者性平辛辣者熱入湯劑磨汁用入丸散紙裹置懷中待燥碾之

忌火。鷓鴣斑者名黃沉如牛角黑者名黑沉咀之輒削之卷者名黃蠟沉甚難得浮者名棧香半沉者名煎香雞骨香雖沉而心空

並不堪用。

檀香 宜理氣。

辛溫調脾肺利胸膈去邪惡能引胃氣上升進飲食為理氣要藥。內典

曰：柑檀塗身，能除熱惱。昂按：內興慾念，亦稱熱惱。蓋諸香多助淫火，惟檀香不然。故釋氏焚之，道書又以檀為俗香，不可以供上真。

紫檀香 重和血。

鹹寒。血分之藥。和榮氣。消腫毒。敷金瘡。止血定痛。

降真香 焚之能降諸真。故名。宣辟惡。止血生肌。

辛溫。辟惡氣。怪異療傷。折金瘡。止血定痛。消腫生肌。周崇遜寇被傷。

蕊石散不效。軍士李高用紫金藤散敷之。血止痛定。明日結痂無癢。曾救萬人。紫金藤即降真香之最佳者也。

丁香 燥。暖胃。補腎。

辛溫純陽。泄肺溫胃。大能療腎。壯陽事。暖陰戶。治胃冷壅脹。嘔噦呃。

逆。朱丹溪曰：人之陰氣，依胃為養。土傷則木挾相火，直冲清道而上。作欬逆。古人以為胃寒用丁香。柿蒂不能清痰利氣，惟助火而已。

按呃逆有痰阻氣滯，食塞不得升降者，有痢疾下焦者，有傷寒汗吐下後中氣大虛者，有陽明內熱失下者，有痢疾下焦者，有傷寒汗吐

冲者，李時珍曰：當視虛實陰陽，或泄熱，或降氣，或溫，或補，或吐，或下可也。古方單用柿蒂取其苦溫降氣，濟生加丁香生薑取其開鬱散

痰。蓋從治之法。亦當有收效者矣。痲痺奔豚。腹痛口臭。朱丹溪曰。脾

肺中濁氣上行。發為口氣。治以丁香。腦疔齒齩。痘瘡胃虛灰白不發。熱

香。是揚湯止沸耳。唯香薷甚捷。證忌用有雌雄二種。雌即雞舌香力大。若畏鬱金火。

乳香。一名薰陸香。宜活血。伸筋。

香竄入心。苦溫補腎。辛溫通十二經。能去風伸筋。筋不伸者。敷藥加用。活血調

氣托裏護心。香微瘡孔。能內使毒氣外出不致內攻。生肌止痛。治心腹諸痛。口噤耳聾。癰

疽瘡腫。產難折傷。皆取其活血止痛。亦治癩狂。以能去風散瘀。靈苑辰砂散。

酒下。恣飲沉醉。聽睡一二日。勿動。驚醒。則不可治。本事加人參一兩。名寧志膏。出諸番。如乳頭明透者良。市人

多以楓香偽之。性黏難研。水飛過。用鉢坐熱水中研之。或用燈心同研則易

細。

沒藥。宜散瘀。定痛。

苦平。應兼辛。入十二經。散結氣。通滯血。消腫定痛。生肌。寇宗奭曰：血

急則經絡滿痛。能則經絡滿痛。補心膽虛。肝血不足。推陳致新。治金瘡杖瘡。故瘀而發。

痛熱作。惡瘡痔漏。翳暈目赤。血熱。產後血氣痛。破癥墮胎。乳香活血。皆能

消腫止痛。生肌。故每兼用。瘡疽已潰者。忌用。膿多者。勿敷。出諸南番。赤色類於琥珀者良。主治與

乳香同。

楓脂香。即白膠香。宣調氣血。

苦平。活血解毒。止痛生肌。治吐衄咯血。齒痛風疹。癰疽金瘡。外科要

藥。色白微黃。能亂乳香。功頗相近。

冰片。一名龍腦香。宣通竅。散火。

辛溫。香竄善走。能散先入肺。傳於心脾。而透骨通諸竅。散鬱火。治驚

癩痰迷。李東垣曰：風病在骨髓者。宜之。若在血脈肌肉。反能引風入骨。如油入麪。目赤膚翳。乳調日點。數

冰片大辛熱用之點眼取其拔出火邪蓋火鬱發之從治法也世耳人誤以為寒而常用之遂致積熱害目故云眼不點不瞎者此也耳

聾鼻瘕鼻中瘕肉點之自喉痹舌出散骨痛齒痛治痘陷引酒服或

紫草湯服之引入產難三蟲五痔甚似乎涼耳諸香皆屬陽豈有香散之心經能發之

至者而反寒乎昂幼時曾問家叔建侯公曰蓋性何如叔曰體熱而用涼蓋味辛者多熱然風熱必藉辛以散之風熱散則涼矣此即本

草所云冰片性寒之義向未發明之者附記於此出南番云是老杉脂以白如冰作梅花片

者良以杉木炭養之則不耗今人多以樟腦升打亂之

樟腦宜通竅除溼

辛熱香竄能於水中發火置水中通關利滯除溼殺蟲置鞋中去腳

氣集要曰和烏頭為末醋丸彈子大盪足心微火烘之汗出為效薰衣篋辟疰蟲以樟木切片浸水

煎成升打得法能亂冰片

蘇合香宜通竅辟惡

甘溫走竄。通竅開鬱。辟一切不正之氣。殺精鬼。出諸番。合衆香之汁煎成。以筋挑起。懸絲不斷者真。

血竭 補和血。斂瘡。

甘鹹色赤入血分。補心包肝血不足。專除血痛。散瘀生新。為和血之聖藥。治內傷血聚。金瘡折跌。瘡口不合。止痛生肌。性急不可多使。引

膿 血竭單入血分。乳香沒藥兼入氣分。皆木脂也。出南番。色赤。以染透指甲者為真。 假者是海母血。

味大鹹。有腥氣。單碾用。 同衆藥搗。則作塵飛。

阿魏 瀉消積殺蟲。

辛平。 一曰溫。入脾胃。消肉積。殺細蟲。去臭氣。 諺曰：黃芩無假。阿魏無真。劉純曰：阿魏無真。卻有真。

臭而止臭。是為珍。解葶菜自死牛馬肉毒。治心腹冷痛瘡痢。 瘡痢多由積滯而起。傳尸

疔勞疔蟲。出西番。木脂熬成。極臭。試取少許。安銅器一宿。沾處白如

銀汞者真。人多以胡蒜白質之。用鉢研細。熱酒器上薰過入藥。

蘆薈。瀉熱殺蟲。

大苦大寒。功專清熱殺蟲。涼肝明目。鎮心除煩。治小兒驚癇五疳。敷

齒齩溼癬。甘草末和敷。吹鼻殺腦疳。除鼻癢。小兒脾胃虛寒作瀉者勿服。

出波斯國。木脂也。味苦色綠者真。

胡桐淚。瀉熱殺蟲。

苦能殺蟲。鹹能入胃。軟堅。大寒能除熱。治咽喉熱痛。磨掃取涎。齒齩風疳。

瘰癧結核。蘇頌曰。右方稀用。今口齒家多用為要藥。出涼肅。乃胡桐脂。入土得斥鹵之氣。

結成。如小石片。木淚狀如膏油。

燕夷。宜散風溼。瀉積殺蟲。

辛散滿苦殺蟲。溫燥溼化食。諸蟲皆因溼而生。氣食皆因寒而滯。祛五臟皮膚肢節風。

溼心腹積冷。癥痛繁瘕。直指方曰。嗜酒人血入於酒為酒繁。多氣人

如蟲之行。上侵人咽。下蝕人肛。或附脊背。或隱胸腹。惟用炒蕪夷。兼暖胃理氣益血之藥。乃可殺之。痔瘻瘡癬。小兒驚

疳冷痢。得詞子豆。莖良。胃中有蟲。食即作痛。和鈣炒黃為末。米飲下。形類榆莢。陳久氣

羶者良。

沒石子。瀉精。外用染蠶。

苦溫入腎。瀉精固氣。收陰汗。烏鬚髮。出大食諸番。顆小紋細者佳。炒

研用。蟲食成孔者揀去。忌銅鐵器。

衛矛。一名鬼箭羽。瀉。破血。

苦寒。李時珍曰。酸瀉。破陳血。通經落胎。殺蟲祛崇。幹有三羽。葉似野茶。酥炙

用。

漆。瀉。破血。消積。殺蟲。

辛溫有毒。功專行血殺蟲。削年深堅結之積滯。朱丹溪曰：漆性急而飛補用之中節積滯。

去後補性內行。人不知也。破日久凝結之瘀血。能化瘀血為水。續筋骨絕傷。損傷必有瘀血停滯。治

傳尸勞瘵癩疔虻蟲。炒令烟盡入藥。或燒存性。用半夏為使。畏川椒。

紫蘇雞子蟹。漆得蟹而成水。

巴豆。大燥。大瀉。

辛熱有大毒。生猛而熟少緩。可升可降。能止能行。開竅宣滯。去臟腑。

沉寒最為斬關奪門之將。破痰癖血瘕。氣痞食積。生冷硬物所傷。大

腹水腫瀉痢驚癇。口喎耳聾。牙痛喉痹。纏喉急痹。緩治則死。用解毒丸。雄黃一兩。鬱金一錢。巴豆

十四粒。去皮油為丸。每服五分。津嚥下。雄黃破結。氣鬱金散。惡血。巴豆下稠涎。然係厲劑。不可輕用。或用紙撚蘸巴豆油。燃火刺喉。或搗

巴豆綿裹。隨左右納鼻中。吐出惡涎。紫血即寬。鼻雖小。生瘡無礙。其毒性又能解毒殺蟲。療瘡瘍蛇

蠍諸毒。峻用大可劫病。微用亦可和中。通經爛胎。巴豆稟火烈之氣。爛人肌肉。試以少

許擦皮膚。即發一泡。況腸胃耶。不可輕用。王好古曰。去心皮膜。油生用。爲急治水穀道路之劑。炒去烟令紫黑用。爲緩治消堅磨積之劑。可以通腸。可以止瀉。世所不知也。李時珍曰。一婦年六十餘。溏瀉五載。犯生冷油膩肉食。即作痛。服升澀藥。瀉反甚。脈沉而滑。此乃脾胃久傷。積冷凝滯。法當以熱下之。用蠶匾巴豆丸五十粒。服二日。不利而愈。自是每用治瀉痢。愈者近百人。一名剛子。雷斅小色黃者爲巴。三稜色黑者爲豆。小而兩頭尖者爲剛子。剛子殺人。李時珍曰。此說殊乖。蓋緊小者爲雌。有稜及兩頭尖者是雄。雄者更峻耳。用之得宜。皆有功力。不去膜則傷胃。不去心則作嘔。○藏器法連白膜服。或用殼用仁用油。生用炒用。醋煮燒存性用。研去油。名巴豆霜。芫花爲使。畏大黃黃連涼水。中其毒者。

以此解之。或黑豆綠豆汁亦佳。得火良。

巴豆油作紙燃。燃火吹息。或薰鼻。或刺喉。能行惡涎惡血。治中風中惡。痰厥氣厥。喉痹不通。一切急病。性寒。肺病多熱者宜之。但大黃

臚病多寒者宜之。故仲景治傷寒傳裏多熱者。多用大黃。東垣治五積屬臚者。多用巴豆。與大黃同服。反不瀉人。

大風子。燥痰。外用治瘡。

辛熱有毒。取油治瘡癬疥癩。有殺蟲劫毒之功。朱丹溪曰：粗工治大風油，殊

不知此物性熱，有燥痰之功，而傷血，至有病將愈而先失明者。出南番。子中有仁。白色。久則油黃。不

可用。入丸藥。壓去油。

荆瀝 宜通經絡，滑痰，瀉熱。

甘平。除風熱。化痰涎。開經絡。行血氣。治中風失音。驚癇痰迷。眩暈煩

悶。消渴熱痢。為去風化痰妙藥。氣虛食少者忌之。延年秘錄曰：熱多用竹瀝，寒多用荆

瀝。朱丹溪曰：虛痰用竹瀝，實痰用荆瀝，並宜薑汁助送，則不凝滯。

牡荆。俗名黃荆。截取尺餘，架磚上，中間火炙，兩頭承取汁用。

竹瀝 瀉火，滑痰，潤燥。

甘寒而滑。消風降火。潤燥行痰。養血益陰。竹之有瀝，猶人之有血也。故能補陰清火。利竅

明目。治中風口噤。痰迷大熱。風癩癩狂。煩悶。產乳方：妊娠苦煩，名子服。

梅師加消渴。血虛自汗。然寒胃滑腸有寒溼者勿服。經疏曰：中風要有茯苓煎。

不因陰虛火旺痰熱壅結所致。如果外來風邪安得復用此寒滑之藥治之哉。朱丹溪曰：痰在經絡四肢皮裏膜外者非此不能達行。又

曰：味甘性緩能除陰虛之有大熱者寒而能補胎後不礙虛胎前不損子。世人因本草大寒二字棄而不用。然人食筍至老未有因寒而

病者。歷即筍之液也。又假火而成何寒如此。竹類甚多。淡竹肉薄節之甚耶。治法曰：竹瀝和米煮粥能治反胃。

間有粉。多汁而甘。最良。篁竹堅而節促。皮白如霜。苦竹本粗葉大。筍

味苦入藥。惟此三種功用略同。竹茹即刮取青皮。竹瀝如取荆瀝法。

薑汁為使。薑能除痰且濟其寒。

筍尖發痘瘡。本草未載。昂按：筍蕨多食皆能燥血。故筍有刮腸筍之名。惟同肉煮食則無害也。

竹茹。瀉上焦煩熱涼血。

甘而微寒。開胃土之鬱。清肺金之燥。涼血除熱。治上焦煩熱。皮入肺主上焦。

○溫膈。溫氣寒熱。噎膈嘔呃。胃熱。吐血衄血。清肺涼胃。齒血不止。浸醋含之。肺痿驚癇。

散肝 崩中胎動。涼胎氣。

淡竹葉。瀉上焦煩熱。

辛淡甘寒。涼心緩脾。消痰止渴。除上焦風邪煩熱。葉生竹上。故治上焦。仲景治傷寒發

熱大渴。有竹葉石膏湯。乃假其辛寒。以散陽明之邪熱也。欬逆喘促。嘔噦吐血。中風失音。小兒驚

癇。竹生一年以上者。嫩而有力。

天竹黃。瀉熱豁痰。涼心。

甘而微寒。涼心經。去風熱。利竅豁痰。鎮肝明目。功同竹瀝。而性和緩。

無寒滑之患。治大人中風不語。小兒客忤驚癇。為尤宜。出南海。大竹

之津氣結成。即竹內黃粉。片片如竹節者真。

雷丸。瀉消積殺蟲。

苦寒有小毒。入胃大腸經。功專消積殺蟲。揚動得異疾。每發語。腹中

道士曰。此應聲蟲也。但讀本草。取不應者治之。讀至雷丸。不應服之而愈。竹之餘氣。得霹靂而生。故名。大小如栗。竹刀刮去黑皮。甘草水浸一宿。酒拌蒸。或炮用。厚朴芫花爲使。惡葛根。

赤檉柳

一名西河柳。宜解毒。

能使疹毒外出。末服四錢。治痧疹不出。喘嗽悶亂。沙糖調服。治疹後痢。

本草備要卷二終

本草備要卷三

清休寧汪 昂訥庵著

武進謝 觀 鑾 恆 評校
鎮海董 豐 培 兆 基

果部

大棗 補脾胃 潤心肺 和百藥

甘溫。脾經血分藥。補中益氣。滋脾土。潤心肺。調營衛。緩陰血。生津液。悅顏色。通九竅。助十二經。和百藥。傷寒及補劑加用之。以發脾胃升

騰之氣。多食損齒。齒屬腎。土剋水。中滿證忌之。甘令人滿。大建中湯。心下痞者。減錫棗與甘草同例。成無

己曰。仲景治奔豚用大棗者。滋脾土以平腎氣也。治水飲脅痛。有十棗湯。益脾土以勝安水也。北產肥潤者良。昂按。金華

南棗更勝於北。徵事所產。亦有佳者。殺烏附毒。忌蔥魚同食。

桃仁 瀉破血 潤燥

苦平微甘。孫思邈辛。孟詵溫。○孫思邈。厥陰肝包。血分藥。苦以泄血。

滯甘以緩肝氣而生新血。成無己曰：肝者，血之源。血聚則肝氣燥，肝苦急，宜急食甘以緩之。通大腸。

血祕治熱入血室。脈。衝。血燥血痞。損傷積血。血痢經閉。欬逆上氣。血和則氣

降。皮膚血熱。燥癢蓄血。發熱如狂。仲景治勝胱蓄血。有桃仁承氣湯。即調胃承氣湯加桃仁桂枝。又抵

當湯用桃仁大黃。蠱蟲水蛭。水蛭。即馬蟻。蛭食血之蟲。能通肝經聚血。性最難死。雖炙為未。得水即活。若入腹中。生子為患。田泥和水飲

下之。蠱蟲。即蚊蟲。因其食血。故用以治血。血不足者。禁用。行血連皮尖生用。潤燥去皮尖

炒用。俱研碎。或燒存性用。雙仁者有毒。不可食。香附為使。

桃花苦平。下宿水。除痰飲。消積聚。利二便。療風狂。范純佑女。喪夫發狂。夜斷窗樞。登桃

樹食花變盡。自是遂愈。以能瀉痰飲滯血也。

桃葉能發汗。凡傷寒風痹發汗不出。以火燉地。用水灑之。鋪乾桃葉厚二三寸於上。臥上。溫覆。取大汗。敷粉極燥。即瘥。麥麩

蠶沙。皆可如此法用。○桃為五木之精。其枝葉花仁。並能辟邪。食醫心鏡。桃仁煮粥。治鬼證。咳嗽。生桃食。多生癰癤。

杏仁。瀉肺。解肌。潤燥。下氣。

辛苦甘溫而利。瀉肺解肌。能發汗除風散寒。降氣行痰。潤燥消積。豆豉粉

近之通大腸氣。祕治時行頭痛。上焦風燥。欬逆上氣。杏仁炒研。蜜和為丸。含嚥。煩

熱喘促有小毒。能殺蟲治瘡。制狗毒。可毒狗。消肉積。錫毒。肺虛而欬者禁。

用。李東垣曰。杏仁下喘治氣。桃仁療狂治血。俱治大便祕。當分氣血。晝便難。屬陽氣。夜便難。屬陰血。婦人便祕。不可過泄。脈浮屬氣。用

杏仁陳皮。脈沉屬血。用桃仁陳皮。肺與大腸相表裏。賁門上主往來。魄門下主收閉。為氣之通道。故並用陳皮佐之。○賁門。胃之上口。魄

門。即肛門。○杏仁紫苑。並能解肺鬱。利小便。去皮尖炒研。發散連皮尖研。雙仁者殺人。得

火良。惡黃耆黃芩葛根。

烏梅。瀉腸。斂肺。

酸澀而溫。脾肺血分之果。斂肺。肺欲收。急食酸以收之。瀉腸。涌痰消腫。清熱解

毒。生津止渴。醒酒殺蟲。治久嗽瀉痢。梁莊肅公血痢。陳應之用烏梅。胡黃連。下土等分為末。茶調。

服而愈。曾魯公血痢百餘日。國醫不能療。應瘡瘡者。皆忌用。霍亂吐

逆反胃。勞熱骨蒸。皆取其酸收。安虻厥。則伏。仲景有虻厥。烏梅丸。去黑痣。

蝕惡肉。癰瘡後生惡肉。燒梅存性。研末敷之。多食損齒傷筋。經曰：酸走筋。筋病無多食酸。

白梅功用略同。治痰厥僵仆。牙關緊閉。取肉搗擦牙齦。涎出即開。若用酸先入筋。齒軟則易開。

鐵器搗開。恐傷其齒。驚癇喉痹。敷乳癰腫毒。刺入肉中。嚼爛罌之即出。瘡中努肉。搗餅貼之即收。

青梅薰黑為烏梅。稻灰汁淋蒸。則不蠹。孟詵曰：烏梅十顆。湯煮去核。納肛中。通大便。鹽漬為白梅。李時

珍曰：梅花於冬而實。於夏得木之全氣。故最酸。膽為甲木。肝為乙木。人舌下有四竅。兩通膽液。故食酸則津生。○食梅齒變者。嚼胡桃。即

解。衣生黴點者。梅葉煎湯洗之。搗洗葛衣亦佳。

栗 補腎

鹹溫。厚腸胃。補腎氣。寇宗奭曰：小兒不可多食。生則難化。熟則滯氣。能解羊羶。

陳皮 能燥。能宜。有補。有瀉。可升。可降。

辛能散。苦能燥。能瀉。溫能補。能和。同補藥。則補。瀉藥。則瀉。升藥。則升。

降藥則降為脾肺氣分之藥。脾為氣母，肺為氣籛，凡補藥必佐陳皮以利氣。調中快膈導

滯消痰。古曰：陳皮枳殼利其氣，而痰自下。利水破癥宣通五臟統治

百病皆取其理。氣燥溼之功。人身以氣為主，氣順溼除，則百病散。金匱曰：能解魚毒食毒。多服久

服損人元氣。入補養藥則留白。入下氣消痰藥則去白。聖濟曰：不去白反生痰。

去白名橘紅。兼能除寒發表。散皮能發核治疝痛。葉散乳癰。皆能入厥

消腫散毒。腰腎冷痛。橘核炒酒服良。十劑曰：宜可去壅。生薑橘皮之

屬是也。泊宅篇曰：莫強中食。已輒胸滿不下。百治不效。偶家人合橘

皮湯。嘗之似有味。連日飲之。一日坐廳事。覺胸中有物墜下。目瞪汗

濡。大驚。扶歸。腹痛。連下數塊。如鐵彈。臭不可聞。自此胸次廓然。蓋脾

之冷積也。半年服藥不知功。乃在橘皮。方用橘紅一斤。甘草鹽各四

兩。煮乾點服。名二賢散。蒸餅丸。名潤下丸。治痰特。有驗。世醫惟知半

夏南星。枳殼。茯苓。之屬。何足語此哉。朱丹溪曰：治痰利藥過多。則脾

虛。痰易生。而反多。又曰：胃氣亦賴痰以養。不可攻盡。攻盡則虛而愈

劇。廣中陳久者良。故名陳皮。陳則烈氣消。無燥散之患。半治痰欬童

便浸曬。治痰積薑汁炒。治下焦鹽水炒。去核皮炒用。

青皮

瀉肝。破氣。散積。

辛苦而溫。色青氣烈。入肝膽氣分。疏肝瀉肺。柴胡疏上焦肝氣。凡瀉氣藥。

皆云破滯。削堅。除痰。消痞。治肝氣鬱積。脅痛多怒。久瘧結癖。入肝散邪。入脾

除痰。瘧家必用之品。疝痛乳腫。朱丹溪曰。乳房屬陽明。乳頭屬厥陰。故清脾飲以之為君。

陰之氣不行。故竅不得出。陽明之血騰沸。故熱甚而化膿。亦因其子。有滯痰。膈熱。含乳而睡。噓氣致生結核者。初起便須忍痛揉軟。吮令

汁透。白可消散。治法以青皮疎肝滯。石膏清胃熱。甘草節行濁血。枯樓消腫。導毒。或加沒藥。橘葉。金銀花。蒲公英。英。阜。角。刺。當歸。佐以少酒。

若於腫處灸三五壯。尤捷。久則凹陷。名乳巖。不可治矣。最能發汗。皮能達皮。有汗及氣虛人禁。

用。陳皮升浮。入脾肺。治高。青皮沉降。入肝膽。治低。炒之以醋。所謂肝欲散。急食辛以散之。以酸泄之。以苦降之也。橘之青而

未黃者。醋炒用。古方無用者。宋以後始與陳皮分用。

柿乾。潤肺。瀉腸。寧嗽。

甘平性濇。生柿性寒。脾肺血分之藥。健脾濇腸。潤肺寧嗽。而消宿血。治肺

痿熱欬。咯血反胃。

有人三世病反胃。得一方。柿乾同乾飯。日日食。不飲水。遂愈。

腸風痔漏。

肺與大腸相表裏。臟清則腑熱。亦除。泊宅篇。

忌蟹。
柿乾燒灰飲。服二錢。治下血。

柿霜。乃其精液。生津化痰。清上焦心肺之熱。為尤佳。治咽喉口舌瘡痛。

痛。

柿蒂。止呃逆。

古方單用。取其苦溫降氣。濟生加丁香。生薑。取其開鬱散痰。亦從治之法。產寶曰。產後呃逆。煩亂。柿餅一個。煮

飲。汁熱。

木瓜。

補和脾。舒筋瀆。斂肺。

酸澆而溫。入脾肺血分。斂肺和胃。理脾伐肝。化食。

酸能斂。斂則化。與山查同。止渴。

生津。氣脫能收。氣滯能和。調營衛。利筋骨。去溼熱。消水脹。治霍亂轉。

筋。
夏月暑溼。邪傷脾胃。陽不升。陰不降。則揮霍。撩亂。上吐下瀉。甚則肝木乘脾。而筋為之轉也。食療曰。煮汁飲。良。李時珍曰。肝雖主筋。

而轉筋。則因風寒溼熱。襲傷脾胃。所致。轉筋必起於足。脾。脾音肥。足肚也。脾及宗筋。皆屬陽明。木瓜治轉筋。取其理筋。以伐肝也。土病則

金衰而木盛。故用酸溫以收脾肺之耗散。而藉其走筋以平肝邪。乃土中瀉木以助金也。陶宏景曰：凡轉筋呼木瓜名。寫木瓜字皆愈。乃

瀉痢脚氣。脾主四肢。或寒溼傷於足絡。或胃受溼熱之物。上輸於脾。下流至足。則成脚氣。惡寒發熱。狀類傷寒。第脛腫掣痛。為

異耳。宜利溼清熱。忌用補劑。及淋洗。昔有患足痺者。趁舟見舟中。腰一袋。以足倚之。比及登岸。足已善步矣。詢袋中何物。乃木瓜也。

足無力。多食損齒。骨病癢閉。世用治水腫腹脹。誤矣。有瓜酸澆之品。陵愛其芬馥。購數百顆。置之舟中。舉舟人皆病溺。不得出。醫以通利

藥罔效。迎予視之。聞四面皆木瓜香。笑謂諸人曰：徹去此物。溺即出矣。不必用藥也。於是盡陳者良。香齋飲用之。取其和

投江中。頃之。溺皆如舊。陳者良。脾去溼補肺生金。忌鐵。

山查。查古字作榘。一名棠。棊子。瀉滯氣。消積散痰。化痰。

酸甘鹹溫。健脾行氣。散痰化食。磨積。消油膩腥羶之積。與麥芽

硬肉。投數枚。則易爛。其消肉積可知。發小兒痘疹。止兒枕作痛。惡露積於太陰。少腹作

多食令人嘈煩。易飢反伐脾胃。生發之氣。破泄太過。中氣受傷。凡服

一解。一補氣也。有大小二種。小者入藥。去皮核用。力化食磨積。

梨。潤腸瀉火清熱。

甘微酸寒。潤肺涼心。消痰降火。止渴解酒。利大小腸。治傷寒發熱熱

嗽痰喘。中風失音。搗汁頻服。聖惠方。梨汁煮。小兒心曠風熱昏躁。切片貼湯火傷。多食冷

利脾虛泄瀉及乳婦血虛人忌之。生者清六腑之熱。熟者滋五臟之

仕宦病消渴。醫謂不過三十日死。亟棄官歸。途遇一醫。令致北梨二

擔。食盡則瘥。宦如其言。食及五六十枚。而病愈。楊吉老介醫術甚著。

疽。死不可為也。士不樂而退。聞茅山一道士。醫術通神。但不肯以技

自名。乃衣僮僕之服。詣山拜之。願執席下。道士喜留。祇事左右。歷

兩月久。覺其與常隸別。扣所從來。再拜謝過。始以實告。道士笑曰。世

間那有醫不得的病。試診脈。又笑曰。吾亦無藥與汝。使可下山買好

梨。口食一顆。梨盡。取乾者。泡湯。和滓食之。疾自當平。士人如戒。經一

膏亦良。

加薑汁。蜂蜜。佳。清痰。止咳。○與萊菔相

以告。楊衣冠。焚香。望茅山。設拜。蓋自咎其學之未至也。

搗汁用熬。

枇杷葉

瀉肺降火。

苦平。清肺和胃而降氣。氣下則火降痰消。氣有餘便是痰。火則生痰。治熱欬嘔逆。

口渴。李時珍曰：火降痰順則逆者不逆。嘔者不嘔。欬者不欬。渴者不渴。矣。一婦肺熱久嗽，身如火炙，肌瘦將成勞，以枇杷葉、款冬花

紫苑、杏仁、桑皮、木通等分，大黃減半，蜜丸。櫻桃大，食後夜臥，各含化一丸，未終劑而愈。葉溼重一兩，乾重三錢。

為氣足。拭淨毛。毛射肺，令人欬。治胃病薑汁炙。治肺病蜜炙。

橄欖 宜清肺。

甘澆而溫。肺胃之果。清咽生津。除煩醒酒。解河豚毒。投入佳。及魚骨鯁。

如無橄欖，以核磨水服。橄欖木作舟楫。魚撥着即浮出。物之相畏有如此者。

橄欖核燒灰敷疔瘡良。

白果 一名銀杏。澆斂肺去痰。

甘苦而溫。性澆而收。熟食溫肺益氣。色白屬金。故入肺。定痰哮。斂喘嗽。縮小

便。止帶濁。生食降痰解酒。消毒殺蟲。花夜開。人不得見。性陰。有小毒。故能消毒殺蟲。多食則

收瀉太過令人壅氣臚脹。小兒發驚動疳。食千枚者死。

白果漿。澤手面浣油膩。李時珍曰。去痰濁之功。可以類推。

石榴皮。瀉腸。外用染髮。

酸澆而溫。能瀉腸止瀉痢下血。煨末服。崩帶脫肛。瀉痢至於脫肛者。以石榴皮陳壁土加明

倍。少許。濃煎。薰洗。再用五倍子炒研敷托而止之。浸水汁黑如墨。烏鬚方綠雲油中用之。勿

犯鐵器。客座新開曰。一人患腹脹。夏成診之曰。飲食如常。非水腫。蠱脹。乃溼熱生蟲之象也。以石榴椿樹東引根皮檳榔各五錢。

空心服。腹大痛。瀉蟲長丈餘。遂愈。

枳椇子。一名木蜜。潤解酒。

甘平。止渴除煩潤五臟。解酒毒。葛根解酒。而發散不如枳椇。屋外有枳椇樹。屋內釀酒多不佳。趙以得治

酒毒。房勞病熱者。加葛根於補氣血藥中。一貼微汗。反懈怠。熱如故。知氣血虛。不禁。葛根之散也。必得枳椇。方可偶得乾汗者。加入即愈。東

坡集曰。楊穎臣病消渴。日飲水數斗。飯亦倍進。小便頻數。服消渴藥。日甚。延張肱診之。笑曰。君幾誤死。取麝香當門子。以酒濡作十許丸。

枳棋子煎湯吞之遂愈問其故肱曰消渴消中皆脾弱腎敗土不制水而成今穎臣脾脈極熱腎脈不衰當由酒果過度積熱在脾所以
多食多飲飲多澁不得不多非消非渴也麝香壞酒果枳棋能勝酒
故假二物以去其酒果之毒也雷斅曰凡使麝香用當門子尤妙

俗名雞距。以實拳曲如雞距。蜀呼為棘枸。經霜黃赤。甚甘。其葉入酒。

酒化為水。

胡桃 補命門肉潤皮濇

味甘氣熱。皮濇皮斂肺定喘固腎濇精今藥中罕。肉潤。皮汁青黑屬

水入腎。通命門。利三焦。溫肺。潤腸。補氣。養血。佐補骨脂。一木一火。大

補下焦。胡桃屬木破故紙無胡桃猶水母之無蝦也李時珍曰三焦者元氣之母

別使命門者三焦之本原命門指所居之府而言為藏精係胞之物

三焦指所治之部而名為出納腐熟之司一為體一為用也其體非

脂非肉白膜裹之在脊骨第七節兩腎中央系著於脊下通二腎上
通心肺貫腦為生命之原和火之主精氣之府人物皆有之生人上
命門皆由此出內經所謂七節之旁中有小心是也難經誤以右腎為
命門高陽生承謬譏脈訣至朱肱陳言戴宗始闢之夫腎命相通

藏精而惡燥。胡桃類其狀。汁青黑。故入北方。佐破故紙。潤燥而調血。使精氣內充。血脈通利。諸疾自除矣。○男女交媾。皆稟此命火。而

結胎。人之窮通。三焦通利。故上而虛寒喘嗽。能溫肺化痰。洪邁有痰痔。天皆根於此。

枚薑三片。臥時嚼服。即飲湯。復嚼薑。桃如前數。靜臥必愈。迺如旨服。且而痰消嗽止。洪輯幼子病痰喘。夢觀音令服人參胡桃湯。服之而

愈。明日剝去皮。喘復作。仍連皮用。信宿而瘳。蓋皮下而腰腳虛痛。能斂肺也。胡桃葱白薑茶等分。搗煎。能發汗散寒。補

腎。內而心腹諸痛。外而瘡腫諸毒。能調中。皆可除也。然動風痰。助腎

火。連皮同燒酒細嚼。三枚能久戰。有痰火積熱者。少服。油者有毒。故殺蟲治瘡。殼外

青皮。壓油烏髭髮。潤燥養血。去皮用。斂瀉連皮用。

龍眼肉。補心脾。

甘溫歸脾。益脾長智。一名養心補血。脾心為母。故歸脾湯用之。治思慮勞

傷心脾。及腸風下血。心生血。脾統血。思慮過多。則心脾傷。而血耗。致

血不歸脾。而妄行。生補之。腸風亦由。

荔枝核 宜散寒溼。

甘瀉而溫。入肝腎。散滯氣。辟寒邪。治胃脘痛。婦人血氣痛。煨存性一

兩為末。名獨痛散。每服二錢。鹽湯或米飲下。單服醋湯下亦效。其實雙結。核似辜丸。辜音臯。腎子也。故治癩

疔卵腫。有述類象形之義。煨存性。酒調服。加茴香青皮。各炒為末。酒服亦良。殼發痘瘡。燒存

性用。荔枝連殼煨研。止呃逆。生荔枝多食則醉。以殼浸水解之。此即食物不消。還以本物解之之義。

樞實 潤肺。

甘瀉。潤肺。本草未嘗言潤。然潤劑也。故寇氏曰。多食潤腸。殺蟲。有蟲積者。宜上旬日日食之。食一斤。蟲乃絕。

海松子 潤燥。

甘溫。潤肺。溫胃。散水除風。治欬嗽。松子一兩。胡桃二兩。煉蜜和服。治肺燥欬嗽。虛秘。同柏子仁。

麻仁。溶蠟為丸。名三仁丸。出遼東雲南。松鬚五鬣。

落花生 補脾。潤肺。

辛能潤肺。香能舒脾。果中佳品。出閩廣。藤生花落地而結實。故名。按

花生本草未收。本無當醫藥之用。然能益脾潤肺。實佳果也。因世人謗之者多。附見於此。明其有利無害也。炒食。

蓮子。補脾。瀉腸。固精。

甘溫而瀉脾之果也。脾者黃宮。故能交水火而媾心腎。安靖上下。君

相火邪。古方治心腎不交。勞傷白濁。有蓮子清心飲。補心腎有瑞蓮丸。益十二經脈血氣。瀉精氣。厚

腸胃。除寒熱。治脾泄久痢。白濁夢遺。女人崩帶及諸血病。大便燥者

勿服。去心皮。蒸熟焙乾。用得茯苓山藥白朮枸杞良。

黑而沉水者為石蓮。清心除煩。開胃進食。專治噤口痢淋濁。諸證。石蓮

入水則沉。入鹵則浮。煎鹽人以此試鹵。蓮浮至頂。鹵乃可煎。落田野中者。百年不壞。人得食之。髮黑不老。肆中石蓮。產廣中樹上。其味大

苦。不宜入藥。

蓮心為末。米飲下。療產後血竭。

蓮蕊鬚 澆精

甘溫而澆。清心通腎。益血固精。烏髮黑髮。止夢洩遺精。吐崩諸血。略與蓮子同功。

藕 涼血散瘀

澆平。解熱毒。消瘀血。止吐衄淋痢。一切血證。和生地汁。良。藕生甘寒。涼

血散瘀。宋大官作血略。誤落藕皮。血遂渙散不凝。一人病血淋。痛服欲死。李時珍以髮灰二錢。藕汁調服。三日而愈。梅師方。產後

餘血上冲。止渴除煩。聖惠方。藕汁蜜和。解酒毒蟹毒。搗爛熟酒調服。煮熟甘

溫。益胃補心。多孔象心。止瀉。能實大腸。止怒。久服令人歡。益心之效。生擣罨金瘡傷

折。熟擣塗坼裂凍瘡。肘後方。卒中毒箭者。藕汁飲。多多益善。孟詵曰。產後忌生冷。獨藕不忌。為能散瘀血也。澄

粉亦佳。安神益胃。

荷葉 輕宜。升陽。散瘀。

苦平。其色青。其形仰。其中空。其象震。震仰。感少陽甲膽之氣。燒飯合

藥。裨助脾胃而升發陽氣。潔古枳朮丸用。痘瘡倒靨者用此發之。蠶

等分爲末。胡荽湯下。聞人規曰。勝於人牙龍腦。能散瘀血。留好血。治吐衄崩淋。損傷產瘀。香

末。一切血證。洗腎囊風。李東垣曰。雷頭風證。頭面疙瘡腫痛。憎寒惡

誅割無過。宜清震湯治之。荷葉一枚。升麻蒼朮各五錢。煎服。鄭奠一曰。荷葉研末。酒服三錢。治遺精極驗。

芡實。一名雞頭子。補脾。瀋精。

甘瀉。固腎益精。補脾去溼。治泄瀉帶濁。小便不禁。夢遺滑精。同金櫻

名水陸。腰膝痠痛。吳子野曰。人之食芡。必枚嚼而細嚼之。使華液流

二仙丹。腰膝痠痛。通轉相灌。既其功勝於乳石也。經驗後方。煮熱研

甘蔗。補脾。潤燥。

甘寒。和中助脾。除熱潤燥。止渴。治消。消痰。解酒毒。利二便。外臺方。嚼

治發熱口乾便瀉。治嘔噦反胃。梅師方。蔗汁和服。大便燥結。蔗汁熬之。名石蜜。即白霜糖。唐大曆間有

鄒和尚始傳造法。性味甘溫。補脾緩肝。潤肺和中。消痰治嗽。多食助熱損齒。生蟲。紫沙糖功用略同。

李薺。一名薺。一名烏芋。一名地栗。補中瀉熱。消食。

甘微寒滑。益氣安中。開胃消食。飯後宜食之。除胸中實熱。治五種噎膈。五

愛膈。志膈。氣膈。熱膈。寒膈。噎亦五種。氣噎。食噎。勞噎。憂噎。思噎。消渴黃疸。血證蠱毒。未服辟蠱。能毀銅。機

曰。食銅錢。食之則錢化。可見為消堅削積之物。故能開五膈。消宿食。治誤吞銅也。

菱。俗名菱角。一名菱。瀉暑。止渴。

甘寒。安中消暑。止渴解酒。有兩角三角四角老嫩之殊。武陵記。以三角四角者為

菱。兩角者為菱。菱花隨月而轉。猶葵花之向日。

西瓜。瀉暑。

甘寒。解暑除煩。利便醒酒。名天生白虎湯。西瓜甜瓜皆屬生冷。多食傷脾助溼。衛生歌曰。瓜桃

生冷宜少食。瓜曝則寒。油煎則冷。物性寒。曝之尤寒。稍食。瓜曝則寒。油煎則冷。物性寒。曝之尤也。

本草備要卷三終

本草備要卷四

清休寧汪 昂訥庵著

武進謝 觀礪板
鎮海董豐培兆基 評校

穀菜部

粳米。粳，硬也。補脾清肺。

甘涼。得天地中和之氣。和胃補中。色白入肺。除煩清熱。煮汁止渴。仲景

白虎湯。桃花湯。竹葉石膏湯。並用之。以清熱。補不足。張文潛粥記。粥能暢胃氣。生津液。每晨空腹食之。所補不細。昂按。今人終日食粥。不知其妙。迨病中食之。覺與臟腑相宜。迥非他物之所能及也。 粳乃稻之總名。有早中晚三收。晚者

得金氣多。性涼。尤能清熱。北粳涼。南粳溫。白粳涼。紅粳溫。新米食之動氣。

陳倉米。沖淡。可以養胃。煮汁煎藥。亦取其調腸胃。利小便。去溼熱。除

煩渴之功。集成曰。陳米飯。熬作團。火煨。存性。麻油。膩粉。調敷。一切惡瘡。百藥不效者。

糯米。糯，糯也。本草名稻米。按詩黍稷稻粱。禾麻菽麥。名八穀。此稻與禾。所以有異乎。補溫脾肺。

甘溫。補脾肺虛寒。堅大便。縮小便。收自汗。同龍骨牡蠣能撲汗。發痘瘡。化解毒。

然性黏滯。病人及小兒忌之。糯米釀酒則熱。熬湯尤甚。餉即餉。糖潤肺和脾。化痰止咳。嗽。仲景建中湯用之。取

其甘以補脾。緩中。多食發溼熱。動痰。火損齒。

穀芽。健脾。消食。

甘溫。開胃。快脾。下氣。和中。消食。化積。炒用。

大麥芽。開胃。健脾。行氣。消積。

鹹溫。能助胃氣上行。而資健運。補脾寬腸。和中下氣。消食除脹。散結

祛痰。鹹能化一切米麩果食積。通乳下胎。外臺方。麥芽一升。蜜一升。服。下胎神驗。薛立齋治一

婦人。喪子。乳脹。幾欲成癰。單用麥芽一二兩炒。煎服。立消。久服消腎

其破血散氣。如此良方。曰神麩亦善。下胎皆不可輕用。

氣。王好古曰。麥芽神麩。胃虛人宜服之。以伐戊己。腐熟水穀。李時珍曰。無積而服之。消人元氣。與白朮諸藥。消補兼施。則無害也。○胃

為戊土。脾為己土。炒用。豆蔻砂仁烏梅木瓜芍藥五味為使。

小麥 補。

味甘微寒。養心除煩。利洩止血。李時珍曰：素問屬火。心之穀也。鄭玄謂屬木。許慎謂屬金。別錄云：養肝。

與鄭說合。孫思邈云：養心與素問合。當以素問為準。按麥秋種夏熟。備受四時之氣。南方地暖下溼。不如北產者良。張仲景治婦人臍燥。

證：悲傷欲絕。狀若神靈。用甘麥大棗湯。大棗十枚。小麥一升。甘草一兩。每服一兩。亦補脾氣。聖惠方：小麥飯治煩熱少睡多渴。

麩粉甘溫。補虛養氣。助五臟。厚腸胃。然能壅氣作渴。助溼發熱。陳者

良。寒食日紙袋盛懸風處。名寒食麩。年久不熱。入藥尤良。

浮小麥。即水淘起者。鹹涼。止虛汗盜汗。勞熱骨蒸。汗為心液。麥為心穀。浮者無肉。故能涼心。麥麩

功同。

麥。麩醋拌蒸。能散血止痛。熨腰腳折傷。風溼痹痛。寒溼腳氣。互易至

汗出良。麥之涼。全在皮。故麩去皮即熱。凡瘡瘍痘瘡潰爛。不能著席者。用麥麩裝褥臥。性涼而軟。誠妙法也。

稷 補和中。

甘平。益氣和中。宣脾利胃。

陶宏景曰。稷米人亦不識。書記多云。黍與稷相似。而

粒殊大。食之不宜。人發舊病。詩云。黍稷稻粱。禾麻菽麥。此八穀也。俗

猶不能辨。證況芝英乎。按黍稷辨者頗多。皆無確義。李時珍曰。稷黍

一類。分二種。黏者為黍。不黏者為稷。昂謂詩人既云八穀。何必取一類

者。強分二種。是仍為七穀矣。蓋稷同音。故世妄謂稷為稷。不知稷

乃黍類。似粟而粒大。疎散。乃北方下穀。南土全無。北人亦不之重。安

能度越。粳糯而高。踞八穀之上乎。陶氏所說。因是稷黍。所以疑也。若

粟。補腎。

甘鹹微寒。養腎益氣。治胃熱消渴。止霍亂。利二便。

千金方。粟米粉水。九。梧子大。煮七枚。

納醋中。細吞之。即梁米。有青黃赤白黑諸色。陳者良。

蕎麥。瀉。利腸。下氣。

治反胃吐食。

薄海蕃滋。本草乃指蘆稷為蜀黍。其名義亦不倫矣。此實從來之誤。敢為正之。以質明者。又蘆稷最能和中。煎湯溫服。治霍亂吐瀉。如神。

昂嘗病一腹中啾啾。經兩月。有友人見招。飲以蘆稷燒酒。一醉而積病暢然。性之中和。又可見矣。

甘寒。降氣。寬腸胃。沉積。孟詵曰。能鍊五臟垢。穢。昂按。亦解酒積。泄痢帶濁。敷痘瘡潰爛。

湯火灼傷。脾胃虛寒。人勿服。

黑大豆。補腎。解毒。

甘寒色黑。屬水似腎。腎之穀也。豆有五色。各入五臟。故能補腎。鎮心。腎水足。則心火事。

明目。腎水足。則目明。利水下氣。古方治水腫。每單用。或加他藥。散熱祛風。炒熱酒沃。飲其汁。治產後中風危篤。

及妊娠腰痛。兼能發表。千金曰。一以去風。一以消血結。活血。產書曰。熬令烟絕。酒淋服。下產後餘血。解毒。蘇頌曰。古稱大

豆解百藥毒。試之不然。消腫止痛。搗塗一切腫毒。煮食稀痘瘡。緊小又加甘草。其驗乃奇。

者良。小者名馬料豆。每晨鹽水吞。或鹽水煮食。補腎。畏五參龍膽豬肉。忌厚朴。犯之動氣。得前胡

杏仁牡蠣石蜜諸膽汁良。

赤小豆。通行水。散血。十劑作燥。

甘酸。孫思邈云。鹹冷。色赤。心之穀也。性下行。通小腸。利小便。心與小腸相表裏。行水。

散血消腫排膿清熱解毒治瀉痢脚氣。昔有患脚氣者用袋盛赤小

煮食汁能消水腫。雞子白調未粘之性極黏乾則難揭入

能取赤小豆四十九粒呪之雜他藥敷之而愈。中貴任承亮親見後

任自患惡瘡傅永投以藥立愈問之亦小豆也。承亮始悟道士之呪

偽也後過豫章見醫治骨疽甚捷任曰莫非赤小豆耶醫驚拜曰用此活三十餘口願勿復宣。止渴解酒通乳下胎。

然溲津液久服令人枯瘦。十劑曰燥可去溼桑白皮赤小豆之屬是也按二藥未可言燥蓋取其行水之功然

綠豆 瀉熱解毒

甘寒行十二經清熱解毒。一切草木金石砒霜毒皆治之利小便止消渴治瀉痢連

皮用。其涼在皮

綠豆粉撲痘瘡潰爛良。一市民誦觀音經甚誠出行折一足哀叫苦

厚敷紙貼杉木紫定其效如神

白扁豆

補脾除溼消暑

甘溫腥香。色白微黃。脾之穀也。調脾暖胃。通利三焦。降濁升清。消暑

除溼。能消脾胃之暑。止渴止瀉。專治中宮之病。正氣自旺。解酒毒河豚毒。急備

方新汲水調末服能解砒毒。多食壅氣。子粗圓色白者入藥。連皮炒研用。亦有浸

去皮及生用者。

淡豆豉。宜解表除煩。

苦泄肺寒勝熱。陳藏器曰。豆性生平。炒發汗解肌。調中下氣。治傷寒

頭痛煩躁滿悶。懊懣不眠。發斑嘔逆。凡傷寒以逆之。淡豆豉合梔子。名

梔子豉湯。血痢溫瘧。李時珍曰。黑豆性平。作豉則溫。既經蒸罨。故能

能吐虛煩。得瘥則治痢。得蒜則止血。炒熟又能止汗。孟詵治盜汗。炒香漬酒服。肘後合蔥白煎。名蔥豉湯。用代麻黃湯。通治傷寒發表。亦治溫病。

造淡豉法。用黑大豆水浸一宿。淘淨蒸熟。攤勻。蒿覆。候上黃衣。取曬。

簸淨水拌乾溼得所。安甕中。築實桑葉厚蓋。泥封。曬七日取出。曝一時。又水拌入甕。如此七次。再蒸。去火氣。甕收用。

刀豆。宜下氣。

甘平。溫中止呃。煨存性服。勝於柿蒂。

胡麻。即芝麻。一名巨勝子。種出大宛。故曰胡麻。補肝腎。潤五臟。清腸。

甘平。補肺氣。益肝腎。潤五臟。填精髓。堅筋骨。明耳目。耐飢渴。可以辟穀。但滑

腸與白朮並用為勝。烏髭髮。利大小腸。逐風溼氣。劉河間曰。麻木穀而治風。又曰。治風先治血。血活則風散。

胡麻入肝益血。故風藥中不可闕也。鄭奠一用紫葢胡麻。佐苦參蒺藜。治大瘋疥癩。屢有愈者。涼血解毒。生嚼敷小

兒頭瘡。皮肉俱黑者良。入腎。

麻油。滑胎療瘡。熬膏多用之。涼血解毒。止痛生肌。

栗色者名鱉蝨。胡麻更佳。九蒸九曬。可以服食。陶宏景曰。八穀之中。惟此為良。昂按。若云。

自大宛來。則非八穀之麻。明矣。又按。月令。仲秋之月。天子以犬嘗麻。則其爲八穀之麻。又可見矣。種出大宛之說。何以稱焉。豈白者產中原。黑者產大宛乎。

大麻仁

大麻卽作布之麻。俗作火麻。潤燥。滑腸。

甘。平。滑。利。脾。胃。大。腸。之。藥。緩。脾。潤。燥。治。陽。明。病。胃。熱。汗。多。而。便。難。者。

皆燥也。汗出愈多。則津枯而大便愈燥。張仲景治脾約有麻仁丸。成無己曰。脾欲緩。急食甘以緩之。麻仁之甘。以緩脾潤燥。張子和曰。諸

燥皆三破積血。利小便。通乳催生。又木穀也。亦能治風。極難去殼。帛

裹置沸湯。待冷。懸井中一夜。曬乾。就新瓦上按去殼。搗用。畏茯苓白

薇牡蠣

薏苡仁

補脾胃。通行水。

甘。淡。微。寒。而。屬。土。陽。明。胃。藥。也。甘。益。胃。土。勝。水。淡。滲。溼。瀉。水。所以。益

土。故。健。脾。治。水。腫。溼。痹。腳。氣。疝。氣。泄。痢。熱。淋。益。土。所以。生。金。故。補。肺

清熱。色白入肺。微寒清熱。治肺痿肺癰。咳吐膿血。以豬肺煎。苡仁米服。扶土所以抑木。故

治風熱筋急拘攣。厥陰風木主筋。然治筋骨之病。以陽明為本。陽明

宗筋縱弛。故經曰。治痿獨取陽明。又曰。肺熱葉焦。發為痿躄。蓋肺者

相傳之官。治節出焉。陽明溼熱上蒸於肺。則肺熱葉焦。氣無所主。而

失其治節。故痿躄。蓋理脾而兼清熱補肺。○筋寒則急。熱則縮。溼

則縱。然寒溼久留。亦變為熱。又有熱氣薰蒸。水液不行。久而成溼者。

御米殼。即粟殼。瀉腸斂肺固腎。

酸澆微寒。斂肺瀉腸。而固腎。治久嗽瀉痢。遺精脫肛。心腹筋骨諸痛。

李東垣曰。收瀉固氣。能入腎。故治骨病尤宜。嗽痢初起者。忌用。朱丹溪曰。此是收。一名麗

春花。紅黃紫白。豔麗可愛。凡使殼。洗去蒂及筋膜。取薄皮。醋炒。或蜜

炒用。性緊瀉。不製。多令人吐逆。得醋烏梅陳皮良。罌中有米極細。甘寒潤燥。煮粥

食。治反胃。加參尤佳。

神麴 宜行氣化痰消食。

辛散氣。甘調中。溫開胃。化水穀消積滯。醫餘曰：有傷粽子成積，用麴末少加木香鹽湯下，數日口

中開酒香積遂散。治痰逆癥結。瀉痢脹滿。回乳。炒研酒服二錢日二。下胎。產後血暈亦

治目病。啓微集曰：生用能發其暴氣。造麴法。以五月五日。六月六日。用白

麴百斤。赤豆末杏仁泥青蒿蒼耳紅蓼汁各三升。以配青龍白虎朱

雀玄武騰蛇勾陳六神通和作餅。罽生黃衣曬收。陳者良。炒用。

紅麴 宜破血燥消食。

甘溫色赤。入營而破血燥。胃消食活血和血。治赤白下痢。跌打損傷。

產後惡露不盡。李時珍曰：人之水穀入胃中焦溼熱薰蒸游溢精氣化爲營血。此造化自然之妙也。紅麴以白米飯雜麴。

母溼熱蒸鬱即變爲真紅。此人窺造化之理。紅入米心陳久者良。昂按：巧者也。故治脾胃營血得同氣相求之理。

溫燥。能腐生物。使熟。故魚肉鮮用之。不特取其色也。

醋。一名苦酒。散瘀。斂氣。消癰腫。

酸溫。散瘀解毒。下氣消食。食斂縮則消矣。開胃氣。令人嗜食。本草未載。散水氣。治心腹

血氣痛。磨木香服。產後血暈。以火淬醋。使聞其氣。癥結痰癖。疽黃癰腫。外科敷藥多

壅熱散瘀解毒。昂按。只母性散而斂。瘡口蓋能散。所以能斂。醋性酸收而散。癰腫蓋消則內散。潰則外散。收處即是散處。兩者一義也。

口舌生瘡。含漱。損傷積血。能散之。穀魚肉菜蕈諸蟲毒。多食傷筋。收縮太過。

酒醋無所不入。米造陳久者良。寇宗奭曰。食酸則齒樞者。齒屬腎。酸屬肝木。氣強水氣弱故也。

酒。宜行藥勢。

辛者能散。苦者能降。甘者居中而緩。厚者熱而毒。淡者利小便。用爲嚮導。可以通行一身之表。引藥至極高之分。熱飲傷肺。溫飲和中。少飲則和血行氣。壯神禦寒。遣興消愁。辟邪逐穢。暖水臟。行藥勢。過飲

則傷神耗血。亦能亂血。故飲損胃燦精。動火生痰。發怒助慾。酒是色

致生溼熱諸病。過飲則相火昌炎。肺金受燦。致生痰嗽。脾因火而困。

因火而忘懼。腎因火而精枯。以致吐血。消渴勞傷。盡膈癰疽。失明。為害無窮。汪穎曰。人知戒早飲。而不知夜飲更甚。醉飽就牀。熱壅三焦。

傷心損目。夜氣收斂。酒以發之。亂其清明。勞其脾胃。醇而無灰。陳久停滯。動火。因而致病者多矣。朱子曰。以醉為節。可也。

者良。畏枳。根葛。花赤。豆花。綠豆。粉鹹鹵。得鹹則解。水制火也。

韭。補陽。散瘀。

辛溫微酸。肝之菜也。入血分行氣。歸心益胃。助腎補陽。一名土鍾。乳言溫補。

也。除胃熱。充肺氣。散瘀血。逐停痰。治吐衄損傷。一切血病。搗汁童便和服。噎。

膈反胃。能消痰。血停痰在胃口。致反胃及胃脘痛。朱丹溪曰。有食熱物及鬱怒。致死血留胃口。作痛者。宜加韭汁。桔梗入藥。開提。

氣血。有腎氣上攻。致心痛者。宜韭汁。和五苓散。為丸。空心。尚香湯下。治反胃。宜用牛乳。加韭汁。蘘汁。細細溫服。蓋韭汁散瘀。蓋汁下氣消。

痰和胃。牛乳解熱潤燥。補虛也。單方總錄曰。食不得入。是有火也。食久反出。是無火也。治法雖有寒熱虛實之別。要以安其胃氣為本。使。

陰陽升降平均。唯逆自順而愈矣。**解藥毒食毒。狂犬蛇蟲毒。多食昏神。忌蜜牛肉。**昂按。

今人多以韭炒牛肉。其味甚佳。未見作害。○經曰：毒藥攻邪，五穀為養。五畜為益，五菜為充，五果為助。氣味合而服之，以補精益氣。五菜為

韭。韭，蔥、葵、菘也。五果，桃李棗杏栗也。

韭子辛甘而溫。補肝腎。助命門。暖腰膝。治筋痿遺尿。洩精溺血。白帶。

白淫。經曰：足厥陰病則遺尿。思想無窮，入房太甚，發為筋痿。及白淫。韭子同龍骨桑螵蛸能治諸病。以其入厥陰補肝腎命門。○命

門者藏精之府也。**蒸曝炒研用。**燒烟薰牙蟲。

蔥。輕發表。和裏宜。通陽。活血。

生辛散。熟甘溫。陶宏景曰：白冷青熱。傷寒湯中不得用青。**外實中空。肺之菜也。肺主皮毛。**

其合陽明。大腸。**故發汗解肌。以通上下。陽氣。**仲景白通湯。並加之以通脈。回陽。益

目睛。白睛。屬肺。**利耳鳴。通二便。**李時珍曰：蔥管吹鹽入玉莖中。治小便不通。及轉脬危急者。極效。**治傷寒**

頭痛。時疾熱狂。陰毒腹痛。陰證。厥逆。用蔥臍上熨之。**氣通則血活。**氣為血帥。**故治吐**

血衄血。便血痢血。食醫心鏡。蔥煮粥食。治赤白痢。薤粥亦良。折傷血出。火熨研封。止痛無癢。乳癰風

痹。通乳安胎。婦人妊娠傷寒。蔥白一物湯發汗而安胎。加生薑亦佳。刪繁方。合香鼓阿膠。治胎動。通氣故能解

毒。殺藥毒魚肉毒。蚯蚓毒。獾犬毒。諸物皆宜。故曰菜伯。又曰和事草。

取白連鬚用。亦有用青者。同蜜食殺人。同棗食令人病。百一方。患外痔者。先用木

蟹煎湯薰洗。以青蔥涎對蜜調敷。其涼如冰。獨行方。水病足腫。煮湯漬之。日三五度佳。

大蒜。張鷟使西域。始得種入中國。故一名葫。宜通竅辟惡。

辛溫。開胃健脾。通五臟。達諸竅。凡極臭極香之物。皆能通竅。去寒溼。解暑氣。辟瘟

疫。消癰腫。搗爛麻油調敷。破癥積。化肉食。殺蛇蟲蠱毒。治中暑不醒。搗和地漿溫服。

鼻衄不止。搗貼足心。能引熱下行。關格不通。搗納肛中。能通幽門。敷臍能達下焦。消水利

大小便。切片燻艾。灸音九一切癰疽。惡瘡腫核。獨頭者尤良。李迅曰。癰疽著灸。勝

於用藥。緣熱毒中隔。上下不通。必得毒氣發泄。然後解散。初起便用獨頭大蒜。切片灸之。三壯一易。百壯為率。但頭項以上。切不可灸。恐

引氣上更生大禍也。史源曰：有灸至八百壯者，約艾一箇，初壞肉不痛，直灸到好肉方痛，至夜火熾，滿背高阜，頭孔百數，則毒外出，否則內逼五臟而危矣。綱目曰：精要謂頭上毒不得灸，此言過矣。頭為諸陽所聚，艾宜小如米粒，灸宜三五壯而已。又按李東垣灸元好問腦疽，艾大如兩核許，灸至百壯始覺痛而痊，由是推之，頭毒若不痛者，艾大壯多亦無妨也。然其氣薰臭，多食生痰

動火散氣耗血損目昏神。五葦皆然而蒜尤甚，楞嚴經曰：五葦熟食發淫生嗔增恚，故釋氏戒之。釋家以大蒜

小蒜與渠慈蔥蒼蔥為五葦，慈蔥冬蔥也，蒼蔥山蔥也，與渠西域菜云即中國之萎，道家以韭蕪蒜胡荽薑薑為五葦，薑薑油菜也。忌

蜜

蕪 一名葛子，葛音叫，滑，利竅，助陽。

辛苦溫滑。調中助陽。散血生肌。泄下焦大腸氣滯。治泄痢下重。王好古曰：

下重者氣滯也。四逆散加此以洩滯。按後重亦有氣虛血虛火熱風燥之不同。胸痹刺痛。張仲景用栝樓

氣喘急。安胎利產。塗湯火傷。和蜜搗用。肘後方中惡卒死。葉似韭而

中空。根如蒜。取白用。忌牛肉。其葉光滑。難貯。故云。蕪露亦

胡萎 宜發痘疹辟惡氣

辛溫香竄內通心脾外達四肢辟一切不正之氣痧疹痘瘡不出煎

酒飲之心脾之氣得芳香而運行含噴偏身勿嚙頭面痘疹家懸掛辟邪惡故萎入食令人多忘病人不宜食胡萎黃花菜

生薑 宜散寒發表止嘔開痰

辛溫行陽分而祛寒發表宣肺氣而解鬱調中暢胃口而開痰下食

治傷寒頭痛傷風鼻塞辛能入肺氣散寒欬逆嘔噦有聲有物為嘔有聲無通氣散寒

其證或因寒因熱因食因痰氣逆上沖而然生薑能散逆氣嘔家聖藥李東垣曰辛藥生薑之類治嘔吐但治上焦氣壅表實之病若胃

虛穀氣不行胸閉塞而嘔者惟宜益胃推揚穀氣而已勿作表實用辛藥瀉之朱丹溪曰陰分欬嗽者多屬陰虛宜用貝母勿用生薑以

其辛散也昂按人特知陳皮生薑能止嘔不知亦有發嘔之時以其性上升如胃熱者非所宜也菴香亦然 胸壅痰膈寒

痛溼瀉消水氣行血痺產後血上沖心及汚穢不盡煎服亦良 通神明去穢惡救暴卒

凡中風中氣中暑中惡暴卒等證薑汁和童便飲效薑汁開痰童便降火也 療狐臭薑汁頻塗 搽凍耳熬膏 殺

半夏南星茵蕈野禽毒。野禽多食半夏。故有毒。生薑能解之。辟霧露山嵐瘴氣。早行之。搗

汁和黃明膠熬。貼風溼痹痛。久食兼酒。則患目發痔。積熱使然。瘡癰人忌。

食。秦椒為使。惡黃連黃芩夜明砂。糟薑納入蟬蛻。雖老無筋。

薑皮辛涼。和脾行水。治浮腫脹滿。以皮行皮。五皮散用之。成無己曰。薑蕞辛甘。能行脾胃之津液。而和

營衛。不專於發散也。李東垣曰。夜不食薑者。夜主闔而薑主開也。秋不食薑者。秋主收而薑主散也。妊婦多食。令兒歧指。象形也。

乾薑黑薑。燥。回陽。宜通脈。

生用辛溫。逐寒邪而發表。炮則辛苦大熱。除胃冷而守中。辛則散。炮則

止而不移。非若附子走而不守。溫經止血。炮黑止吐衄。諸血紅見黑則止也。定嘔消痰。去臟腑沉寒。

痼冷。能去惡生新。使陽生陰長。故吐衄下血有陰無陽者宜之。亦能

引血藥入氣分而生血。故血虛發熱產後大熱者宜之。此非有餘之熱。乃陰虛生

內熱也。忌用表藥寒藥。乾薑能入肺利氣。能入肝引血。藥生血。引以故與補陰藥同用。乃熱因熱用。從治之法。故亦治目睛久赤。

黑附。能入腎而祛寒溼。能回脈絕無陽。仲景四逆白通湯皆用之。同五味利肺

氣而治寒嗽。肺惡寒。燥脾溼而補脾。脾惡溼。通心助陽而補心氣。苦入心。開

五臟六腑。通四肢關節。宣諸絡脈。治冷痺寒痞。反胃下利。多用損陰。

耗氣。孕婦忌之。辛熱能動血。王好古曰。服乾薑以治中者必信。上宜大棗輔之。李東垣曰。宜甘草以緩之。母薑曬

乾者為乾薑。炮黑為黑薑。

山藥。古名薯蕷。補脾肺。瀉精氣。

色白入肺。味甘歸脾。入脾肺二經。補其不足。清其虛熱。陰不足則內熱。補陰故能

固腸胃。潤皮毛。化痰涎。止瀉痢。溼淫故化痰。止瀉。百一方。山藥熱。半生半炒。米飲下。治噤口痢。肺

為腎母。故又益腎強陰。治虛損勞傷。王履曰。八味丸用之以強陰。脾為心子。故又

益心氣。子能令母實。治健忘遺精。昂按。山藥性瀉。故治遺精。泄瀉而諸家俱未言瀉。生搗敷癰瘡。

消腫硬。山藥能消熱腫。蓋補其氣。則邪滯自行。朱丹溪曰。補陽氣生者。能消腫硬是也。色白而堅者入藥。

百合 潤肺止咳。

甘平。潤肺寧心。清熱止嗽。益氣調中。止涕淚。涕淚肺肝熱也。經曰肺為涕。肝為淚。心為汗。脾

為涎。腎為唾。利二便。治浮腫臃脹。痞滿寒熱。瘡腫乳癰。傷寒百合病。行住坐臥

不安。如有鬼神狀。蘇頌曰。病名百合。而用百合治之。不識其義。李士材曰。亦清心安神之效耳。朱二允曰。久嗽之人。肺氣必虛。虛則宜斂。

百合之甘斂勝於五味之酸收。花白者入藥。

菜菔 俗作蘿蔔。宜行氣化痰消食。

辛甘屬土。生食升氣。熟食降氣。寬中化痰散瘀消食。朱丹溪曰。氣升則食自降。治

吐血衄血欬嗽吞酸。利二便。解酒毒。制麪毒豆腐積。昔有人病。夢紅裳女子引入宮。

殿。小姑歌曰。五靈樓閣曉玲瓏。天府由來是此中。惆悵悶懷言不盡。一丸菜菔火吾宮。一道士曰。此犯大麥毒也。女子心神。小姑脾神。醫

經。菜菔制麪毒。遂以麪併菜菔治之。果愈。腐漿見菜菔則難收。生搗治噤口痢。止消渴。塗跌打湯火

傷。多食滲血。故白人髭髮。服何首烏地黃者忌之。生薑能制其毒。夏月食其菜數斤。秋不患痢。冬月以菜葉

攤屋瓦上。任霜雪打壓。至春收之。煎湯飲。治痢得效。有人避難入石洞中。賊燒烟薰之。口含萊菔一塊。烟不能毒。嚼汁濡水飲之。亦可。王荊公患偏頭痛。搗萊菔汁。仰臥。左痛注右鼻。右痛注左鼻。或兩鼻齊注。數十年之患。數注而愈。

萊菔子。辛入肺。甘走脾。長於利氣。生能升。熟能降。升則吐風痰。散風

寒。寬胸膈。發瘡疹。降則定痰喘。欬嗽。調下痢後重。止內痛。皆利氣之功。朱丹溪

曰。萊菔子治痰。有衝膈倒壁之功。食醫心鏡。研湯煎服。治氣嗽痰喘。吐膿血。炒用。

白芥子。宜利氣。豁痰。

辛溫入肺。通行經絡。溫中開胃。發汗散寒。利氣豁痰。消腫止痛。痰阻則腫行

消氣行則痛止。爲末醋調敷。消癰腫。治欬嗽反胃。痺木腳氣。筋骨諸病。痰阻氣滯。久嗽肺虛。

人禁用。朱丹溪曰。痰在脅下及皮裏膜外。非此不能達行。古方控涎丹用之。正此義。韓悉三子養親湯。白芥子主痰。下氣寬中。紫

蘇子主氣。定喘止咳。萊菔子主食。開痞降氣。各微炒。研看病所主爲君。治老人痰嗽喘滿。懶食。北產者良。煎湯不可

過熟。熟則力減。

芥菜子 豁痰利氣 主治略同。

蔓菁子 卽蕪菁 瀉熱 利水 明目。

苦辛。瀉熱解毒。利水明目。古方治目用之最多。治黃疸。腹脹。搗或研濾汁飲。或

寬得汗愈。癥瘕積聚。小兒血痢。蜜和服。一切瘡疽。凡瘡疽搗敷皆良。醋調敷

用。敷蜘蛛咬毒。陳藏器曰：蔓菁園中無蜘蛛。李時珍曰：蔓菁子可升

世罕知用。何哉。

蔓菁根 搗敷陰囊腫大如斗。末服解酒毒。和蔓菁油菜根搗汁。雞子

清調塗諸熱毒。單鹽搗不用。蔓菁亦可。

蔓菁 宜散血消腫。

辛溫。散血消腫。搗貼乳癰丹毒。孫思邈曰：搗貼丹毒。動疾發瘡。卽油

菜。道家五葷之一。

藟子與葉同功治產難。

馬齒莧

一名九頭獅子草瀉熱散血。

酸寒散血解毒祛風殺蟲治諸淋疔痢海上方搗汁合雞子白服治赤白痢血癖惡瘡。

多年惡瘡敷兩三徧即瘥燒灰煎膏塗禿瘡溼癬小兒丹毒搗汁飲以利腸滑產葉如馬齒。

有大小二種小者入藥性至難燥去莖用亦忌魚鱉同食

甜瓜蒂 宜涌吐與淡豉赤小豆並為吐藥。

苦寒陽明吐藥能吐風熱痰涎上膈宿食吐去上焦之邪經所關

者涌之木鬱達之是也越以瓜蒂淡豉之苦涌以赤小豆之酸吐去

上焦有形之物則木得舒暢天地交而萬物通矣當吐而胃弱者代

以參蘆朱丹溪曰吐中就發散之義張子和曰諸汗法古方多有

之惟以吐發汗世罕知之故予嘗曰吐法兼汗以此夫昂按汗吐下

和乃治療之四法仲景瓜蒂散梔豉湯並是吐藥子和治病用吐尤

者多矣。時醫背棄古法。治風眩頭痛。懊懣不眠。癩癩喉痹。頭目溼氣。

水腫黃疸。或合赤小豆煎。或取出黃水。溼熱諸病。上部無實邪者。禁用。耗氣。語

曰。大吐。亡陽。大下。亡陰。凡取吐者。須天氣清明。巳午以前。令病人隔

夜勿食。卒病者不拘。類編曰。一女子病。胸喘不止。遇道人教取瓜蒂。隔

七枚為末。調服其汁。即吐。痰如膠黏。三進而病如掃。

冬瓜。又名白瓜。瀉熱補脾。寒瀉熱。甘益脾。利二便。消水腫。止消渴。散熱毒。癰腫。

切片敷之。朱丹溪曰。冬瓜性急而走。久病陰虛者忌之。昂按。冬瓜日

食常物。於諸瓜中尤覺宜人。且味甘而不辛。何以見其性急而走乎。

冬瓜子補肝明目。凡藥中所用瓜。子皆冬瓜子也。

絲瓜。瀉熱涼血。宣通經絡。甘平。蘇頌曰。冷。涼血解毒。除風化痰。通經絡。行血脈。老者筋絡貫穿。象人

引。消浮腫。稀痘瘡。入硃砂蜜水調服。治腸風崩漏。疝痔癰疽。滑腸下

乳。

茄根。

瀉散血消腫。

散血消腫。煮汁漬凍瘡。

史國公藥酒。用白茄根為君。茄根以馬尿浸三日。曬炒為末。點牙即落。

茄子甘寒。散血寬腸。動風發病。

本草備要卷四終

本草備要卷五

清休寧汪 昂訥庵著

武進謝 觀 鑛恆 評校
鎮海董豐 培兆基

金石水土部

金 重鎮心肝定鬱悻

辛平有毒

生金屑服之殺人昂按金性至剛重墜與血肉之體不相宜故服之致死非其性有毒也人被金銀灼者並不潰爛

無毒可知矣精金粹玉金制木重鎮怯故鎮心肝安魂魄亦藉其實世之寶器豈有毒氣哉

氣也古方有紅雪紫雪皆並金銀煮汁亦假其氣耳治驚癇風熱肝膽之病肝經風熱則為驚癇失志魂魄飛揚

肝屬木而畏金與心為子母之臟故其病同源一治丸散用箔為衣煎劑加入藥煮畏錫水銀

遇鉛則碎五金皆畏水銀

銀 功用略同

銅綠 即銅青宜去風痰

酸平微毒。治風爛淚眼。惡瘡疔瘡。婦人血氣心痛。吐風痰。合金瘡。止

血殺蟲。治皆肝膽之病。亦金勝水之義。用醋製。銅刮用。

自然銅。重。續筋骨。

辛平。主折傷。續筋骨。散瘀止痛。折傷必有死血。瘀滯經絡。然須審虛實。佐以養血補氣。溫經之藥。銅非煨

不可用。火毒金毒相煽。復挾香藥熱毒內攻。雖有接骨之功。必多燥散之禍。用者慎之。產銅坑中。火煨醋淬七

次。細研。甘草水飛用。昔有飼折翅雁者。雁飛去。故治折傷。

鉛。重。墜痰。解毒。

甘寒屬腎。稟壬癸之氣。水中之金。金丹之母。八石之祖。丹竈家必用之。安神

解毒。墜痰殺蟲。烏鬚制為梳。以梳鬚。明目。

鉛丹。即黃丹。用黑鉛加硝黃鹽礬鍊成。鹹寒沉重。味兼鹽礬。內用墜痰去怯。消積殺

蟲。治驚疔瘡痢。外用解熱拔毒。去瘀長肉。熬膏必用之。藥。用水漂去鹽硝砂石。

微火炒紫色。攤地上。去火毒用。

鉛粉主治略同。

亦名胡粉。錫粉。李時珍曰。鉛粉亦可代鉛丹熬膏。然未經鹽礬火煅。又有豆粉。蛤粉雜之。只入氣分。不能

入血分也。

鐵

重。墜。痰。鎮。驚。

辛平重墜。鎮心平肝。定驚療狂。消癰解毒。諸藥多忌之。

李時珍曰。補腎藥尤忌之。

畏磁石。阜莢。

阜莢。木作薪。則釜裂。

煅時砧上打落者名鐵落。素問用治怒狂。如塵飛起。

者名鐵精。器物生衣者名鐵鏞。鹽醋浸出者名鐵華。

李時珍曰。大抵借金氣以平木。

墜下解毒。無他義也。

鍼砂。消水腫黃疸。散癭瘤。烏髭髮。

烏髭髮方多用之。

密陀僧

重。鎮。驚。刮。痰。消。積。

辛鹹小毒。感銀鉛之氣而結。墜痰鎮驚。止血散腫。消積殺蟲。療腫毒。

愈凍瘡。用桐油調敷。解狐臭。油調搽腋以饅頭蒸熱下亦佳。染髭鬚。出銀坑難得。

今用者乃傾銀鑪底入藥煮一伏時。

丹砂。重鎮心定驚瀉熱。

體陽性陰。內含陰汞。味甘而涼。色赤屬火。性反涼者。離中虛有陰也。味瀉不苦而甘者。火中有土也。

心經邪熱。心經血分主藥。鎮心清肝。明目發汗。汗為心液。定驚祛風。辟邪。胡玉少

夢遇推官胡用之。胡曰。昔常患此。有道士教解毒。胎毒痘毒宜之。止渴安胎。

博救方。水煮一兩。研酒服。能下死胎。李時珍曰。同遠志龍骨之類。養心。同丹參當歸之類。養心血。同地黃枸杞之類。養腎。同厚朴川椒。

祛風。○多服反令人癡呆。辰產。明如箭鏃者良。名箭鏃。細研。水飛三

次用。生用無毒。火煉則有毒。服餌常殺人。惡磁石。畏鹽水。忌一切血。鄭康成註。周禮以

石磁石為五毒。古人用以攻瘍。

水銀。重。外用殺蟲。

辛寒。陰毒。功專殺蟲。治瘡疥蟻蝨。性滑重。直入肉。頭瘡切不可入。筋骨拘攣。解金

銀銅錫毒。能殺五金。墮胎絕孕。從丹砂燒燬而出。畏磁石砒霜。得鉛則凝。

得硫則結。併棗肉入唾研則碎。散失在地者。以花椒茶末收之。

輕粉。燥。刮痰涎。外用殺蟲。

辛冷。李時珍曰。燥有毒。殺蟲治瘡。刮痰消積。能消涎積。十棗湯加大黃。善入。

經絡。瘰癧藥多用之。不可過服常用。李時珍曰。水銀陰毒。用火煨丹。砂而出。再加鹽礬煉為輕粉。輕

揚燥烈。走而不守。今人用治楊梅毒瘡。雖能刮風痰。溼熱從牙齦出。邪鬱暫解。然毒氣竄入經絡。筋骨血液耗亡。筋失所養。變為筋攣骨

痛。腫疔漏。遂成廢痼。貽害無窮。上下齒齦。屬手足。陽明腸胃經。毒氣循經上行。至齒齦。薄嫩之處。而出。土茯苓黃連

黑鉛鐵漿陳醬。能制其毒。

空青。重。明目。

甘酸而寒。益肝明目。通竅利水。產銅坑中。大塊中空有水者良。

雲母 補中

甘平屬金。色白入肺。下氣補中。堅肌續絕。治勞傷瘡痢。瘡腫癰疽。同黃

丹熬膏貼之。千金翼用敷金瘡。青城山人康道豐有雲母粉方。能治百病。有五色。以色白光瑩者為上。古

人亦有煉服者。雲母入火。經時不焦。入土不腐。故云服之長生。使澤瀉惡羊肉。

石膏 禮重瀉火氣輕解肌

甘辛而淡。體重而降。足陽明經。胃大寒之藥。色白入肺。兼入三焦。諸

氣分寒能清熱。降火辛能發汗。解肌甘能緩脾。益氣生津。止渴治傷

寒鬱結無汗。陽明頭痛。發熱惡寒。日晡潮熱。肌肉壯熱。經曰。陽盛小

便赤濁。大渴引飲。中暑自汗。能發汗。又自汗。舌焦。胎厚無津。牙痛。陽明經熱。為末。擦牙固齒。

又胃主肌肉。肺主皮毛。為發斑發疹之要品。色赤如錦紋者為斑。隱見紅點者為疹。斑重

而疹輕。率由胃熱。然亦有陰陽二證。陽證宜用石膏。又有內傷陰證。見斑疹者。微紅而稀少。此胃氣極虛。逼其無根之火游行於外。當補

益氣血。使中有主。則氣不外游。血不反掌。醫者宜審。但用之甚少。則難見功。以之為

外散。若作熱治。死生反掌。醫者宜審。但用之甚少。則難見功。以之為

者。或自一兩加至四兩。竹葉麥冬。知母粳米。亦加四倍。甚

胃弱。血虛。及病邪未入陽明者。禁用。傷成無已。解大青龍湯曰。風陽邪

傷。則非輕劑所能獨散。必須重劑。而表也。○質重氣輕。又成氏以桂

營衛俱和。石膏乃重劑。而又專達肌表也。○質重氣輕。又成氏以桂

麻為輕劑。石膏為重劑也。○李東垣曰。石膏足陽明藥。仲景用治傷

寒。陽明證。身熱。目痛。鼻乾。不得臥。邪在陽明。肺受火制。故用辛寒以

清肺氣。所以有白虎之名。西方也。按陽明主肌肉。故身熱。脈交

額中。故目痛。脈起於鼻。循鼻外。金燥。故鼻乾。胃不和。則臥不安。故不

得臥。然亦有陰虛發熱。及脾胃虛勞。傷寒陰盛格陽。內寒外熱。類白

虎湯證。誤投之不可救也。按陰盛格陽。陽盛格陰。二證。至為難辨。蓋

陰盛極而格陽於外。外熱而內寒。陽盛極而格陰於外。外冷而內熱。

經所謂重陰必陽。重陽必陰。重寒則熱。重熱則寒。是也。當於小便分

之。便清者。外雖燥熱。而中實寒。便赤者。外雖厥冷。而內實熱也。再

口中之燥潤。及舌胎之淺深。胎黃黑者。為熱。宜白虎湯。然亦有舌黑

屬寒者。舌無芒刺。口有津液也。亦名寒水石。李時珍曰。古方所用寒

急宜溫之。誤投寒劑。即死矣。亦名寒水石。李時珍曰。古方所用寒

方用寒水石。即石膏。凝水石。乃鹽精滲入土中。年久結成。瑩白者良。

清瑩有稜。入水即化。辛鹹大寒。治時氣熱盛。口渴水腫。瑩白者良。

研細甘草水飛用。近人因其寒。或用火煨。則不傷胃。味淡難出。若入煎劑。須先煮數十沸。雞子為使。忌巴豆鐵。

滑石。滑利竅。通行水。體重。瀉火氣。輕解肌。

滑利竅。淡滲溼。甘益氣。補脾胃。寒瀉熱。降心火。白色入肺。上開腠理。

而發表。肺主皮毛。下走膀胱。而行水。通六腑。九竅。津液為足。太陽經。膀胱本

藥治中暑積熱。嘔吐煩渴。黃疸水腫。腳氣淋閉。偏主石淋。水瀉熱痢。散加一

乾薑治赤痢。加吐血衄血。諸瘡腫毒。為蕩熱除溼之要劑。消暑散結。

通乳滑胎。李時珍曰。滑石利發。不獨小便也。上開腠理而發表。是除

三焦寧而表裏和溼去則闕門通而陰陽利矣。○闕門分別清濁。乃

小腸之下口。○河間益元散。通治上下表裏諸病。蓋是此意。益元散

一名天水散。一名六一散。取天一生水。地六成之。義滑石六錢。甘

誤服中和而渴。自止耳。若無溼。小便利而渴者。內有燥熱。宜滋潤。或

白

而潤者良。石韋爲使。宜甘草。走泄之性。宜甘草以和之。

朴硝芒硝。朴硝即皮硝。大瀉潤燥。輒堅。

辛能潤燥。鹹能輒堅。苦能下泄。大寒能除熱。朴硝酷澀性急。芒硝經

煉稍緩。能蕩滌三焦腸胃實熱。推陳致新。按致新則瀉亦有補。與大

不能復也。治陽強之病。傷寒。經曰。人之傷於寒也。必病熱。蓋寒鬱而爲熱也。疫痢積聚結癖。留血

停痰。黃疸淋閉。癰瘰瘡腫。白赤障翳。通經墮胎。豐城尉家有貓。子死腹中啼叫欲絕。醫以

硝灌之。死子即下。後有一牛。亦用此法。得活。本用治人。治畜亦驗。經

疏曰。硝者消也。五金八石。皆能消之。況臟腑之積聚乎。其直往無前

之性。所謂無堅不破。無熱不蕩者也。病非熱邪深固閉結不通。不可

輕投。恐誤伐下。焦真陰故也。成無己曰。熱淫於內。治以鹹寒。氣堅不可

以鹹輒之。熱盛者以寒消之。故仲景大陷胸湯。大承氣湯。調胃承氣

湯。皆用芒硝。以輒堅去實熱。結不至堅者。不可用也。佐之以苦。故用

柔五金。化七十二種石為水。生於鹵地。刮取煎鍊。在底者為朴硝。在

上有芒者為芒硝。有牙者為馬牙硝。置風日中。消盡水氣。輕白如粉。

為風化硝。大黃為使。本經別錄。朴硝硝石雖分二種。而氣味主治略同。後人辨論紛然。究無定指。李時珍曰。朴硝下

降。屬水性寒。硝石為造炮。餘硝上升。屬火性溫。昂按。世人用硝。從未有取其上升而溫者。李氏之說。恐非確論。

玄明粉。瀉熱。潤燥。輕堅。

辛甘而冷。去胃中之實熱。蕩腸中之宿垢。潤燥破結。消腫明目。血熱去。則

腫消。而目明。昂按。瀉痢不止。用大黃。玄明粉以推蕩之。而瀉痢反止。蓋宿垢不淨。疾終不除。經所謂通因通用也。朴硝煎化。

同萊菔煮。再用甘草煎。入罐火煨。以去其鹹寒之性。陰中有陽。性稍

和緩。大抵用代朴硝。若胃虛無實熱者。禁用。俱忌苦參。

太陰玄精石。瀉熱。補陰。

太陰之精。鹹寒而降。治上盛下虛。救陰助陽。有扶危拯逆之功。正陽丹用

治傷寒壯熱來復。出解池通泰積鹽處。鹹鹵所結。青白瑩徹。片皆六丹。用治伏暑熱瀉。

稜者良。今世用者。多是絳石。

赤石脂。重。瀉。固。大小腸。

甘而溫。故益氣生肌而調中。酸而澀。故收溼。獨行方。煨末。治小兒。臍中。汁出。赤腫。止血。

而固下。經疏曰。大小腸下後虛脫。非瀉劑無以固之。其他澀藥輕浮。不能達下。惟赤石脂體重而瀉。直入下焦陰分。故為久病泄。

癰要藥。張仲景桃花湯用之。加乾薑粳米。療腸癖泄痢。崩帶遺精。癰痔潰瘍。收口長肉。催

生下胞。經疏曰。能去惡血。惡血化。則胞胎無阻。李東垣曰。胞胎不出。瀉劑可以下之。又曰。固腸胃有收斂之能。下胎衣無推蕩之

峻。細膩黏舌者良。赤入血分。白入氣分。五色石脂。各入五臟。研粉。水飛用。惡莩

花。畏大黃。

禹餘糧。重。瀉。固下。

甘平性瀉。手足陽明大腸胃。血分重劑。治欬逆下痢。血閉癥。血崩。能固

下。李先知曰。下焦有病。人難會。須用餘糧赤石脂。又能催生。石中黃粉。生於池澤。無砂者良。

牡丹爲使。

浮石。一名海石。瀉火。輭堅。

鹹潤下。寒降火。色白體輕。入肺清其上源。肺爲水上源。止渴止嗽。通淋輭

堅。除上焦痰熱消癭瘤結核。頑痰所結。鹹能輭堅。俞琰席上醫談曰。肝屬木。當浮而反沉。肺屬金。當沉而反

浮何也。以肝實而肺虛也。故石入水則沉。而南海有浮水之石。木入水則浮。而南海有沉水之香。虛實之反如此。水沫日久

結成。海中者味鹹更良。

礪砂。潤生津。去痰熱。

甘微鹹涼。色白質輕。故除上焦胸膈之痰熱。生津止嗽。治喉痹口齒

諸病。初覺喉中腫痛。含化嚥津。則不成癆。能柔五金而去垢膩。故治噎膈積塊。結核努

肉。目翳骨鯁。鹹能輭堅。含之嚥汁。出西番者白如明礬。出南番者黃如桃膠。能

制汞啞銅。可作金銀錐。

礪砂。瀉消肉積。

鹹苦辛熱有毒。消食破瘀。治噎膈癥瘕。去目翳努肉。暖子宮。助陽道。

性大熱。能爛五金。本草稱其能化人心為血。亦甚言不可多服耳。凡

煮硬肉。投少許。即易爛。故治噎膈癥瘕。肉積有殊功。雞蜂方曰。人之

臟腑多因觸胃成病。而脾胃最易受觸。飲食過多。則停滯難化。冷熱

不調。則嘔吐瀉痢。而膏粱者為尤甚。口腹不節。須用消化藥。或言飲

食既傷於前。難以毒藥反攻其後。不使礪砂。巴豆等。只用麴蘖之類。

不知古今立方。用藥各有主對。麴蘖只能消化米穀。如傷肉食。則非

礪砂。阿魏不能治也。如傷魚蟹。須同橘葉。紫蘇。生薑。傷菜果。須用丁

香。桂心。傷水飲。須用牽牛。芫花。必審所傷之因。對用其藥。則無不愈。

其間多少。則隨患人氣血。以增損之而已。又有虛人沉積。不可直取。

當以蠟。置其藥。蓋蠟能久留腸胃。又不傷氣。能消磨至盡也。又有脾

虛。飲食遲化者。正宜助養脾胃。自能消磨。更不須用消導藥耳。病久

積而成癥瘕者。須用三稜。鱉甲之類。寒冷成積者。輕則附子。厚朴。重

則礪石。硫黃。瘀血結塊者。則出西戎。乃鹵液結成。狀如鹽塊。置冷溼

用大黃。桃仁之類。用者詳之。醋煮。乾如霜用。忌羊血。

磁石 重補腎

辛鹹。色黑屬水。能引肺金之氣入腎。補腎益精。除煩祛熱。通耳明目。

耳為腎竅。腎水足則目明。治羸弱周痺。骨節酸痛。腎主骨。驚癇。重鎮怯。腫核。鹹。輕。誤吞

鍼鐵。末服。止金瘡血。十劑曰重。可去怯。磁石沖和。無悍猛之屬。是也。經疏曰。石

精然體重。漬酒優於丸散。李時珍曰。一士病目漸生翳。珍以羌活勝

溼湯加減。而以磁石丸佐之。兩月而愈。蓋磁石入腎。鎮養真陰。使神

水不外移。磁砂入心。鎮養心血。使邪火不上。侵佐以神麴。消化滯氣。

○黃婆。脾也。姪女。心也。嬰兒。腎也。色黑能吸鐵者真。火煨醋淬碾末。水飛。或醋煮三日夜用。柴胡為使。殺鐵消金。惡牡丹。

礞石 重瀉痰

甘鹹有毒。體重沉墜。色青入肝。製以硝石。能平肝下氣。為治驚利痰

之聖藥。吐痰水上。以石末搽之。痰即隨下。王隱君有礞石滾痰丸。能治百病。礞石饒硝各二兩。煨研水飛淨。一兩。大黃酒蒸八兩。

黃芩酒洗八兩。沉香五錢。爲末。水丸。量虛實服。李時珍曰。風木太過。來制脾土。氣不運化。積滯生痰。壅塞上中二焦。變生諸證。礞石重墜。硝性疎快。使痰積通利。諸毒自除。氣弱脾虛者。禁用。堅細青黑。中有白星點。硝石礞石等分。打碎拌勻。入坩鍋煨至硝盡。石色如金爲度。如無金星者。不入藥。研末水飛。去硝毒用。

代赭石。重。鎮虛逆。養陰血。

寒苦養血氣。平血熱。入肝與心包。專治二經血分之病。吐衄崩帶。胎動產難。小兒慢驚。赭石半錢。冬瓜仁湯調服。金瘡長肉。張仲景治傷寒。汗吐下後。心下痞。嘔氣。用代赭旋覆湯。取其重以鎮虛逆。赤以養陰血也。今人用治膈噎甚效。煨紅醋淬。水飛用。乾薑爲使。畏雄附。

花蕊石。澀。止血。

酸澀氣平。專入肝經血分。能化瘀血爲水。止金瘡出血。刮末敷之。即合。仍不作膿。

局方治損傷諸血。胎產惡血。血運。有花蕊石散。下死胎胞衣。惡血化。則胞胎無阻。出陝華代地。體堅色

黃煨研水飛用。

爐甘石 燥溼治目疾。

甘溫。陽明胃經藥。受金銀之氣。金勝木。燥勝溼。故止血消腫。收溼除

爛。退赤去翳。為目疾要藥。產金銀坑中。金銀之苗也。狀如羊腦。鬆似

石脂。能點赤銅為黃。今之黃銅皆其所點也。煨紅童便淬七次。研粉。水飛用。

陽起石 重補腎命。

鹹溫。補右腎命門。治陰痿精乏。子宮虛冷。腰膝冷痺。水腫癥瘕。寇宗奭曰。

凡石藥冷熱皆有。毒宜酌用。按經曰。石藥發癩。芳草發狂。芳草之氣美。石藥之氣悍。二者相遇。恐內傷脾。出齊州陽起山。

雲母根也。雖大雪徧境。此山獨無。以雲頭兩腳鷺鷥毛色白滋潤者

良。真者難得。火煨醋淬七次。研粉。水飛用。亦有用燒酒樟腦升煉取粉者。

桑螵蛸為使。惡澤瀉菌桂。畏菟絲子。忌羊血。

石鍾乳

補陽

甘溫。陽明胃氣分藥。木石之精。強陰益陽。通百節。利九竅。補虛勞。下

乳汁。服之。令人陽氣暴充。飲食倍進。形體壯盛。然其性慄悍。須命門

真火衰者。可偶用之。若藉以恣欲。多服久服。不免淋濁癰疽之患。出

洞穴中。石液凝成。下垂如冰柱。通中輕薄。如鵝翎管。碎之如爪甲光

明者真。煉合各如本方。蛇牀爲使。惡牡丹紫石英。忌參朮羊血蔥蒜

胡荽。

白石英

重潤肺。

甘辛微溫。肺大腸經氣分之藥。潤以去燥。利小便。實大腸。治肺痿吐

膿。欬逆上氣。但係石類。祇可暫用。十劑曰。溼可去枯。白石英紫石英之屬是也。○溼卽潤也。○按潤藥

頗多。石藥終燥。而徐之才取。白如水晶者良。二石英爲潤劑。存其意可也。

紫石英 重鎮心潤補肝

甘平性溫而補重以去怯溼以去枯入心肝血分故心神不安肝血

不足女子血海虛寒不孕者宜之衝為血海任主胞胎經疏曰女子

之故不孕紫石英辛溫走二經散風寒鎮下焦為暖子宮之要藥色深紫瑩徹五稜火煨醋淬七次

研末水飛用二英俱畏附子惡黃連石英五色各入五臟

雄黃 重解毒殺蟲

辛溫有毒得正陽之氣入肝經氣分搜肝強脾散百節大風殺百毒

辟鬼魅治驚癩痰涎頭痛眩暈暑瘡癖痢泄瀉積聚虞雍公道中冒暑泄痢連月夢

至仙居延之坐壁中有詞曰暑毒在脾溼氣連脚不泄則痢不痢則癩獨煉雄黃蒸餅和藥甘草作湯食之安樂別作治療醫家大錯如

方服之遂愈又能化血為水燥溼殺蟲治勞瘠瘡疥蛇傷赤似雞冠明徹

不臭重三五兩者良孕婦佩之轉女成男醋浸入萊菔汁煮乾用生山陰者名

雌黃。功用略同。劣者名薰黃。燒之則臭。只堪薰瘡疥。殺蟲蝨。

石硫黃。燥。補陽。殺蟲。

味酸有毒。大熱純陽。硫黃。陽精極熱。與大補命門真火不足。性雖熱

而疏利大腸。與燥瀉者不同。熱藥多泄。惟硫黃連肥腸而止瀉。寒藥多泄。惟黃連肥腸而止瀉。若陽氣

暴絕。陰毒傷寒。久患寒瀉。脾胃虛寒。命欲垂盡者。用之亦救危。妙藥。

也。治寒痺冷癖。足寒無力。老人虛祕。局方用硫丸。婦人陰蝕。小兒慢驚。暖

精壯陽。殺蟲療瘡。辟鬼魅。化五金。能乾汞。王好古曰。太白丹來復丹。皆用硫黃。佐以硝石。至陽

佐以至陰。與仲景白通湯。佐以人尿。豬膽汁。意同。所以治內傷生冷。外冒暑溼。霍亂諸病。能除扞格之寒。兼有伏陽。不得不爾。如無伏陽。

只是陰虛。更不必以陰藥佐之。夷堅志曰。唐與正亦知醫。能以意治病。吳巡檢病。不得洩。臥則微通。立則不能涓滴。徧用通藥。不效。唐問

其平日自製黑錫丹。常服。因悟曰。此必結砂時。硫飛去。鉛不死。鉛砂入膀胱。臥則偏重。猶可洩。立則正塞。水道故不通。取金液丹。三百粒。

分十服。瞿麥湯下。鉛得硫則化。水道遂通。家母舅童時亦病瀉。服通淋藥罔效。老醫黃五聚視之曰。此乃外皮竅小。故溺時亦難。非淋。

證也。以牛骨作楔。塞於皮端。竅漸展開。勿藥而愈。使重服通利藥。得不更變他證乎。乃知醫理非一端也。○硫能化鉛為水。修煉家尊之。

為金丹。番舶者良。得。取色黃堅如石者。以萊菔剗空。入硫合定。糠火煨

熟。去其臭氣。以紫背浮萍煮過。消其火毒。以皂莢湯淘其黑漿。一法

絹袋盛。煮酒三日夜。一法入豬大腸爛煮三時用。畏細辛諸血醋。

土硫黃。辛熱腥臭。止可入瘡藥。不可服餌。

石蟹。重。瀉。明目。

鹹寒。治青盲。目翳。天行熱疾。解一切金石藥毒。醋磨敷。癰腫出南海。

身全是蟹。而質石也。細研水飛用。

無名異。重。和血。行傷。

鹹入血。甘補血。治金瘡。折傷。癰疽。腫毒。醋磨。止痛生肌。人受杖時。須

甚痛。生川廣。小黑石子也。一包數百枚。

礬石

重燥祛寒積

辛熱有大毒治堅癖癩冷寒溼風痺

蘇恭曰攻寒冷之病最良別錄曰不鍊服殺人此石生於山無

雪入水不冰李時珍曰性氣與砒石相近博物志言鶴伏卵時取此石暖足謬也

有蒼白數種火燒但解散

不能脫其堅置水不凍者真惡羊血

砒石

大燥刮痰

辛苦而鹹大熱大毒砒霜尤烈專能燥痰可作吐藥療風痰在胸膈

截瘡除疔外用蝕敗肉殺蟲枯痔出信州故名信石衡州次之錫之

苗也

故錫壺亦云有毒

生者名砒黃鍊者名砒霜畏綠豆冷水羊血

石灰

重燥溼止血生肌

辛溫性烈能堅物散血定痛生肌止金瘡血

臘月用黃牛膽汁和納膽中陰乾用殺瘡

蟲

有人腳肚生一瘡久遂成漏百藥不效自度必死一村人見之曰此鱗漏也以石灰溫泡熏洗覺痒卽是也洗不數次遂愈蝕

惡肉。滅癥。疵。和藥點痣。解酒酸。酒家多用之。然有灰之酒傷人。內用止瀉痢崩帶。收陰挺。

陰肉挺出。亦名陰菌。或產後玉門不閉。熬黃水泡。澄清暖洗。脫肛。消積聚結核。風化者良。

礬。灰火毒已出。主頑瘡膿水淋漓。斂瘡口尤妙。

白礬。漚。燥溼。墜痰。

酸鹹而寒。性瀉而收。燥溼退涎。化痰墜濁。解毒生津。除風殺蟲。止血

定痛。通大小便。蝕惡肉。生好肉。除痼熱在骨髓。髓為熱所劫。則空。故骨痿而齒浮。治

驚癇黃疸。血痛喉痹。齒痛風眼。鼻中瘻肉。崩帶脫肛。陽蝕陰挺。陰肉挺出。

肝經之火。疔腫癰疽。瘰癧疥癬。虎犬蛇蟲咬傷。李時珍曰。能吐風熱痰涎。取其酸苦涌泄也。治諸血

崩帶。取其收而燥溼也。治喉痹癰蠱蛇傷。取其解毒也。多服損心肺

傷骨。寇宗奭曰。刮水故也。書紙上水不能濡。故知其性刮水也。李迅曰。凡發背。當服蠟礬丸。以護膜防毒氣內攻。礬一兩。黃蠟七錢。

溶化和丸。每服十九。漸加至二十九。日服百丸。則有力。此藥護膜。托裏解毒。化膿之功甚大。以白礬芽茶搗末。冷水服。解一切毒。取

潔白光瑩者煨用。又法以火煨地。灑水於上。取礬布地。以盤覆之。四

面灰攤。一日夜。礬飛盤上。掃收之。為礬精。未盡者更如前法。再以陳

苦酒也。醋。化之。名礬華。七日可用。百日彌佳。甘草為使。畏麻黃。惡牡蠣。

生用解毒。煨用生肌。

膽礬。一名石膽。宜吐風痰。瀉欬逆。

酸澀辛寒。入少陽膽經。性斂而能上行。涌吐風熱痰涎。發散風木相

火。治喉痹醋調。吐痰。延立效。欬逆。瘰癧崩淋。能殺蟲。治牙蟲瘡毒陰蝕。產銅

坑中。乃銅之精液。故能入肝。膽治風木。磨鐵作銅色者真。形似空青鴨嘴色為

上。市人多以醋揉青礬偽之。畏桂芫花辛夷白薇。

阜礬。一名綠礬。瀉燥溼。化痰。

酸涌瀉收。燥溼化痰解毒殺蟲之功。與白礬同。而力差緩。主治略同。

白礬利小便消食積同健脾消食藥為丸散喉痹腫瘡痢疳疾方往往用之其

源則自仲景用礬石硝石治女勞黃疸方中變化而來深青瑩淨者良煨赤用煨赤名絳礬能

燥脾溼張三丰治腫滿有伐木九蒼朮二斤米泔浸黃酒麴四兩炒絳礬一斤醋拌曬乾入瓶火煨為末醋糊丸酒下或云阜礬乃銅

之精液用醋製以平肝勝於鍼鐵不必忌鹽後亦不發多服令人瀉

青鹽 即戎鹽補腎瀉血熱

甘鹹而寒入腎經助水臟平血熱治目痛赤澇吐血溺血齒舌出血

堅骨固齒良明目烏髮餘同食鹽出西羌不假煎煉方稜明瑩色

青者良

食鹽 瀉熱潤燥補心通二便宜引吐

鹹甘辛寒鹹潤下故通大小便鹹走血而寒勝熱故治目赤癰腫血

熱熱疾鹹補心故治心虛以水制火取既濟之義故補心藥用鹽炒

注

經曰：神有餘則笑不休，神心火也。用鹽水制鹹入腎而主骨。故補腎藥用鹽。

湯下故堅肌骨。治骨病齒痛。敷齦上，滌涎盡，乃臥。或問鹹能硬堅，何以

堅肌骨？不知骨消筋緩，皆因溼熱。熱淫於內，治以鹹。鹹潤燥而辛泄

肺。煎鹽用阜角，故治痰飲喘逆。惟哮喘證忌之。鹹軟堅，故治結核積聚。

又能涌吐醒酒。水勝火，解毒能散火涼血殺蟲。浙西將軍中，蚘毒每夕

湯浸身數次而愈。定痛止癢。體如蟲行，風熱也。鹽湯浴三四次，佳。亦治一切

藥敷多食傷肺走血滲津發渴。經曰：鹹走血，血病毋多食鹹。食鹹凡血

病哮喘水腫消渴人為大忌。鹽品頗多，江淮南北鹽生於海，山西解

生於土，光明鹽或生於階，或山崖，或產於五原鹽池，狀若水晶，不假

煎煉，一名水晶鹽。石鹽生於石，木鹽生於樹。蓬鹽生於草，造化之妙，

誠難窮矣。

急流水通。

性速而趨。下通二便。風痹藥宜之。昔有病小便閉者。醫不能瘥。張子

洩。李時珍曰。天下之水。滅火濡枯則同。至於性從地變。質與物遷者。未嘗同也。

逆流迴瀾水。宜。

性逆而倒上。中風卒厥。宜痰飲之藥宜之。

甘瀾水。補。

用流水以瓢揚萬徧。亦曰勞水。水性鹹而重。勞之則甘而輕。仲景用

煎傷寒勞傷等藥。取其不助腎氣而益脾胃也。

井泉水。補。

將旦首汲。曰井華水。出甕未放。曰無根水。無時初出。曰新汲水。解熱

悶煩渴。凡熱病不可解者。新汲水浸青色衣服。飲妙。煎補陰之藥宜之。井

有地脈山泉者為上。從江湖滲來者次之。其城市近溝渠汚穢者。鹹而有鹼。煮粥煎茶。味各有異。以之入藥。其可無擇乎。

百沸湯

宜助陽氣。

助陽氣行經絡

汪穎曰：湯須百沸者佳。寇宗奭曰：患風冷氣痹，人行以

四時暴瀉，痢四肢臍腹冷，坐深湯中，浸至腹上，生陽之藥，無速於此。張從正曰：凡傷風寒酒食，初起無藥，便飲太和湯，或酸薑水，揉肚探

吐，汗出即已。昂按：感冒風寒，而以熱湯澡浴，亦發散之一法。故內經亦有可湯熨可浴及摩之浴之之文。備急方治心腹卒脹痛欲死，煮

熱湯以漬手足，冷即易之。

陰陽水

一名生熟水，宜和陰陽。

治霍亂吐瀉有神功

陰陽不和而交爭，故上吐下瀉，而霍亂飲此。定者，分其陰陽使和平也。按霍亂有寒熱二證，

藥中能治此者甚多，然未嘗分別言之。倉卒患此，脈候未審，慎勿輕投。偏熱寒之劑，曾見有霍亂服薑湯而立斃者，惟飲陰陽水為最穩。

霍亂邪在上焦則吐，邪在下焦則瀉，邪在中焦則吐瀉兼作。此溼霍亂證，輕易治，又有心腹絞痛，不得吐瀉者，名乾霍亂，俗名絞腸痧，其

死甚速。古方用鹽熬熱，童便調飲，極以沸湯半鍾，井水半鍾和服。

黃蘗水

宜瀉吐。

為得治，勿與穀食，即米湯下咽亦死。

以沸湯半鍾，井水半鍾和服。

酸鹹吐痰飲宿食酸苦涌泄為陰也。

露水 潤肺。

甘平。止消渴。宜煎潤肺之藥。秋露造酒最清冽。百花上露令人好顏

色。霜殺物。露滋物。性隨時異也。露能解暑。故白露降則處暑矣。癘必由於暑。故治癘藥露一宿服。

臘雪水 瀉熱。

甘寒。治時行瘟疫。宜煎傷寒火喝音謁之藥。抹痲良。

冰 瀉熱。

甘寒。太陰之精。水極似土。傷寒陽毒熱甚昏迷者。以一塊置臚中乳兩

間。良。解燒酒毒。陳藏器曰。盛夏食冰。與氣候相反。冷熱相激。卻大

中丸。上曰。服之屢矣。介曰。疾因食冰。臣請以冰煎此藥。治受病之源也。果愈。

地漿 瀉熱解毒。

甘寒。治泄痢冷熱赤白。腹內熱毒絞痛。解一切魚肉菜果藥物諸菌

毒。菌音郡。生朽木溼地。上亦名輩音尋。上聲。及蟲蟻入腹。如誤食馬蟻蟻入腹。生子為患。用地漿下之。中喝熱。

卒死者。取道上熟土圍臍。令人尿臍中。以熱土大蒜等分。搗水去渣。灌之。即活。以新水沃黃土攪濁。再

澄清用。凡跌打損傷。取淨土蒸熱。以布裹更互熨之。勿太熱。恐破肉。雖瘀血凝積。氣絕欲死者。亦活。宋神宗皇子病瘵。瘵國醫不

能治。錢乙進黃土湯而愈。帝問其故。對曰。以土伏水。水得其平。風自止矣。

孩兒茶。瀉熱生津。瀉收溼。

苦瀉。清上膈熱。化痰生津。止血收溼。定痛生肌。塗金瘡口瘡。等分。砂陰

疳痔腫。出南番。云是細茶末。納竹筒埋土中。日久取出。搗汁熬成塊

小潤澤者上。大而枯者次之。

百草霜。輕。止血消積。

辛溫。止血。鼻衄者。水調塗之。紅見黑則止。水剋火也。消積。治諸血病。傷寒陽毒發斑。疔膈

瘡癩。咽喉口舌白禿諸瘡。李時珍曰。皆兼取火化從治之法。竈突上烟煤。

墨。

辛溫。止血生肌。飛絲塵芒入目。濃磨點之。點鼻止衄。豬膽汁磨。塗諸

癰腫。亦可。酒磨服。治胞不下。

伏龍肝。重調中。止血。燥溼。消腫。

辛溫。調中止血。去溼消腫。治欬逆反胃。吐衄崩帶。尿血遺精。腸風癰

腫。醋調。敷。臍瘡。丹毒。臘子白。調敷。催生下胎。博救方。子死腹中。水調。三錢服。其土當兒頭上。

戴出。釜心多年黃土。一云竈額內火氣。積久結成如石。外赤中黃。研細

水飛用。

驗。一作蘇。瀉。磨積。去垢。

辛苦。瀦溫。消食磨積。去垢除痰。治反胃噎膈。點痣。壓疣贅。與礦灰等分。用小麥

釋灰。煎乾爲末。搗破。瘧三點。卽瘧。發麩浣衣用之。取蓼蒿之屬。浸曬燒灰。以原水淋汁。每百斤入粉麩二三十斤。則凝定如石。

本草備要卷五終

本草備要卷六

清休寧汪 昂訥庵著

武進謝豐 觀彌恆 鎮海董豐 培兆基 評校

禽獸部

雞補

屬巽屬木。故動其肉甘溫。補虛溫中。陳日華曰：黑雌雞補產後虛勞。馬益卿曰：妊婦宜食牡雞。取陽

精之全於天也。雀行功曰：婦人產死多是富貴擾攘致產婦驚亂故耳。屏人靜產更爛煮牡雞汁作粳米粥與食自然無恙。雞汁性滑而濡不食其肉恐難化也。俗家每產後即食雞啖卵壯者幸無事弱者因而致疾矣。龔雲林曰：四五年老母雞取湯煮粥食能固胎。

雞冠居清高之分。其血乃精華所聚。雄而丹者屬陽。故治中惡驚忤。

以熱血滌口塗面吹鼻良。本乎天者親上。故塗口眼喎斜。用老者取其陽氣充足

也。能食百蟲。故治蜈蚣蚯蚓蜘蛛咬毒。

雞子甘平。鎮心安五臟。益氣補血。清咽開音。散熱定驚。止嗽止痢。醋

食治赤利產安胎。胞衣不下者吞卵黃二三枚解髮刺喉令吐即下。多食令人滯悶。

哺雞蛋殼細研麻油調搽痘毒神效。

雞肫皮。一名雞內金一名雞胗。甘平性瀉。雞之脾也。能消水穀。除熱止煩。通小

腸膀胱。治瀉痢便數。遺溺溺血。崩帶腸風。膈消反胃。小兒食瘡。男用

雌。女用雄。

雞矢醴。微寒。下氣消積。利大小便。內經用治臑脹。臘月取雄雞屎白收之。醋和塗蚯蚓

蜈蚣咬毒。合米炒。治米癥。

烏骨雞。補虛勞。

甘平。雞屬木。而骨黑者屬水。得水木之精氣。故能益肝腎。退熱補虛。

治虛勞消渴。下痢噤口。煮汁益胃。帶下崩中。肝腎血分之病。鬼擊卒死者。

用其血塗心下效。啜車志。夏侯弘捉得一小鬼。問所持何物。曰。殺人以此矛戟。中心腹者。無不輒死。弘曰。治此有方否。

鬼曰以鳥雞血敷之即瘥。骨肉俱黑者良。舌黑者骨肉俱黑。男用雌。女用雄。女科有鳥

雞丸治百病。

鴨補陰。

甘冷。入肺腎血分。滋陰補虛。除蒸止嗽。利水道。治熱痢。白毛烏骨者。

為虛勞聖藥。取金肅水寒之象也。萬可久有白鳳膏老者良。酒或童便煮。熱

血解金銀丹石砒霜諸毒。及中惡溺死者。

鴨卵甘鹹微寒。能滋陰。除心腹膈熱。鹽藏食良。

五靈脂。宜行血止痛。

甘溫純陰。氣味俱厚。入肝經血分。通利血脈。散血和血。血閉能通。用生

經多能止。用妙治血痺血積。血眼血痢。腸風崩中。一切血病。圖經曰血暈者半炒

服半生末一錢。心腹血氣。一切諸痛。又能除風化痰。殺蟲消積。諸痛皆屬於木諸蟲皆生

於風。治驚疖瘡。蛇蠍蜈蚣傷。血虛無瘀者忌用。五靈脂一兩。雄黃五錢。酒調服。滓數患處。

治毒蛇咬傷。李仲南曰。五靈脂治崩中。非正治之藥。乃去風之劑。衝任經虛。被風襲傷。營血以致崩中。暴下與荆芥防風治崩義同。方悟

古人識見深遠如此。李時珍曰。此亦一說。但未及肝虛血滯。亦自生風之意。按衝為血海。任主胞胎。任脈通衝脈。盛則月事以時下。無崩

漏之患。且北地鳥名。寒號蟲矢也。即曷旦鳥。夜鳴求旦。夏月毛采五易有子。

寒而號。曰得過且過。高士奇曰。月令仲冬之月。鷓鴣不鳴。似與寒號之名未協。黑色氣甚臊。惡糖。心潤澤者

真。研末酒飛。去砂石用。行血宜生。止血宜炒。惡人參。

夜明砂。一名天鼠矢。瀉散血明目。

辛寒。肝經。血分藥。活血消積。治目盲障翳。加石決明。豬肝煎。名決瘡。

魅音奇。小兒鬼魅。驚疖。疖。蝙蝠及矢。並治驚疖。痲厥陰之病。血氣腹痛。經疏曰。辛能散。內外滯。

目之外。餘皆可略。吳鶴臯曰。古人每用強蟲水。蛭治血積。以其善吮血耳。若天鼠矢。乃食蚊而化者也。當亦可以攻血積。本草稱其下死

胎。則其能攻。同驚甲燒烟辟蚊。蝙蝠矢也。食蚊砂皆蚊眼。故治目疾。

淘淨焙用。惡白薇白蘇。

豬肉。臟腑引經。

水畜。鹹寒。肉反黃連烏梅桔梗。犯之瀉痢。李時珍曰。方有臟連丸。黃

曰。臟腑乎。昂按。別錄曰。豬肉閉血脈。弱筋骨。虛人肌。不可久食。陶弘景曰。豬為用最。多。惟肉不可食。孫思邈曰。久食令人少子。發宿病。筋骨

碎痛之氣。孟詵曰。久食殺藥。動風發疾。尤甚。若將為大禁者。然。今人終補。李時珍曰。南豬味厚。汁濃。其毒尤甚。若將為大禁者。然。今人終

日食肉。內滋外腴。子孫蕃衍。未見為害。若斯之甚也。又曰。合黃豆蕎麥。葵菜。生薑。胡荽。吳茱。牛肉。羊肝。龜鱉。鯽魚。雞子。食之。皆有忌。然。餚

饌。中合食者。多未見絲毫作害也。大抵肉能補肉。其味雋永。食之潤腸。胃生精液。豐肌體。澤皮膚。固其所也。惟肉食。則助熱生痰。動風作

溼。傷風寒。及病初愈。人為大忌。耳。先王教民。畜牧養。為先。豈故為是以厲民歟。明太祖釋家字之義。亦曰。無豕不成家。諸家之說。稽之

於古。則無徵。試之於人。則不驗。徒令食忌不足。取信於後世而已。○傷寒忌之者。以其補肌固表。油膩黏。風邪不能解散也。病初愈。忌

之者。以腸胃久枯。難受肥濃厚味也。又按。豬肉生痰。惟風痰。溼痰。寒痰。忌之。如老人。燥痰。乾咳。更須肥濃。以滋潤之。不可執泥於豬肉生

說痰之也。

豬心。血用作補心藥之嚮導。蓋取以心歸心。以血導血之意。延壽丹書曰。豬

臨殺驚氣入心。絕氣入肝。皆不可多食。

豬尾。血和龍腦。冰片。治痘瘡倒靨。能發之。李時珍曰。取其動而不息。亦有用心血者。

豬肝。主藏血。補血藥用之。入肝明目。雄者良。同夜明砂作丸。治雀目。雀目者。夜不能視。溼痰及肝火

也。盛

豬肺。補肺。治肺虛咳嗽。咳血者。藥薏仁末食。

豬肚。入胃健脾。張仲景治消渴。有黃連豬肚丸。用雄豬肚一枚。入黃連。連末五兩。枳椇根白朮。米各四兩。知母三兩。麥冬二

兩。縫定。蒸熟為丸。如梧子大。每服三十丸。米飲下。直指方治小兒疳熱。黃連五兩。入豬肚。蒸爛。飯丸。米飲下。仍服調血清心藥。佐之。且曰

小兒之病。非疳即熱。常須識此。

豬腎。鹹冷而通腎。治腰痛耳聾。陳日華曰。補水臟。暖腰膝。又曰。久食

時珍。建之。謂其鹹冷。能瀉腎氣也。昂按。枸杞玄參。知母。黃藥。性皆寒而能補腎。豬腎乃肉食。何獨瀉腎。若斯之酷也。古今補腰腎藥。用豬

腎者頗多。未見作害。大抵諸家食忌。不可盡信。瑣碎錄。豬腎一對。量便二分。酒一分。瓦罐煨。五更食之。治勞瘵。一月愈。經驗後方。豬腎。枸

杞葉。或汁。入蔥椒鹽。作羹。治陰痿。羸瘦。

豬腸入大腸。治腸風血痢。奇效方。治臟毒。有臟連丸。

豬膽汁苦入心。寒勝熱。滑潤燥。瀉肝膽之火。明目殺疳。沐髮光澤。醋

和灌穀道。治大便不通。張仲景治陽明證。內無熱者。便雖秘。勿攻。故用膽汁外導之法。不欲以苦寒傷胃。膽也。成

無己曰。仲景治厥逆。無脈。用白通湯。加豬膽汁。蓋陽氣大虛。陰氣內勝。純與陽藥。恐陰氣格拒。不得入。故加豬膽汁。苦入心。而通脈。寒氣補

肝而和陰。不致格拒也。昂按此即熱因寒用之義。浴初生小兒。永無瘡疥。

豬脬胞亦作治遺溺疝氣。用作引經。

豬脂甘寒。涼血潤燥。行水散風。解毒。千金方。凡中惡及牛肉毒。殺蟲百獸肝毒。服豬脂一斤。佳。

故瘡藥多用之。利腸能通大便。黃滑產。煎膏藥。主諸瘡。臘月者佳。古方用之。最多。治咳嗽亦用之。

豬蹠煮湯。通乳汁。加通草。二兩。佳。洗敗瘡。

豬懸蹄甲治寒熱痰喘。痘瘡入目。五痔腸癰。古人有用左甲者。有用後甲者。

犬肉 補虛寒。

酸而鹹溫。暖脾益胃。脾胃暖則腰腎受蔭矣。補虛寒。助陽事。兩腎陰

黃者補脾。黑者補腎。畏杏仁。忌蒜。道家以為地厭。黃犬血酒服二碗。治腸癰。

羊肉 補虛勞。

甘熱屬火。補虛勞。益氣血。壯陽道。開胃健力。通氣發瘡。張仲景治虛羸勞。有當

歸羊血湯。十劑曰。補可去弱。人參羊肉者。皆補血虛。陽生則陰長也。人肉肝

青羖羊良。膽青羯羊良。乳白羖羊良。骨煨用。反半夏菖蒲。忌銅器。羊

曰羖曰羝。去勢曰羯。子曰羔。羔五月曰羖。

羊肝 苦寒。蘇頌曰。溫。色青。補肝而明目。肝以瀉為補。羊肝丸。治日疾。加黃連。

羊膽 苦寒。點風淚眼。赤障白翳。臘月入蜜膽中。紙套籠住。懸釜下。候霜出。掃取點眼。又入蜜膽中。蒸之。候

乾研爲膏。每含少許。或點之。名二百味草花膏。以羊食百草。蜂採百花也。李時珍曰。肝竅開於目。膽汁減則目暗。目者肝之外候。膽之精華也。故諸膽皆治目病。

羊脛骨入腎而補骨。燒灰擦牙良。李時珍曰。羊脛骨灰可以消鐵。誤吞銅錢者。脛骨

三錢。米飲下。

羊血解金銀丹石砒硫一切諸毒。

羊乳甘溫。補肺腎虛。潤胃脘大腸之燥。治反胃消渴。口瘡舌腫。含。蚰

蛛咬傷。有渾身生絲者。飲之。瘥。

牛肉。補脾土。

甘溫屬土。安中補脾。益氣止渴。倒倉法。用牡黃牛肉二十斤。洗淨。煮

食。至日空腹坐密室。取汁每飲一鍾。少時又飲。積數十鍾。身體覺痛。如病在上則吐。在下則利。在中則吐而利。後必渴。即飲已。溺數碗。

以滌餘垢。飢倦先與米飲。二日與淡粥。次與厚粥。飯將養一月。沉痾悉安矣。須斷房事半年。牛肉五年。朱丹溪曰。牛坤土。黃中色。肉。胃

藥液無形之物也。積聚既久，回薄腸胃，曲折之處，豈銖兩九散所能窺犯乎？肉液充滿，流行無處不到，如洪水泛漲，一切凝滯，皆順流而去矣。此方傳於西域，異人中年後行一二次，亦卻疾養壽之一助也。王綸曰：牛肉補中，非吐下藥，借補為瀉，因瀉為補，亦奇方也。丹溪治林德方咳而咯血，謂肺壅非吐不可，血耗非補不可，惟倒倉二法兼備。服之而愈，又治蕭伯善便濁滑精，亦用倒倉法而愈。又治許文懿公病心痛，用燥藥靈丹艾灸雜治，數年不效，自分為棄人。丹溪先以防風通聖散下其積滯，而病稍起，思食，然兩足難移。次年行倒倉法，為節應手，復生子。活十四年，又瀉海林兄久嗽吐紅，發熱消瘦，衆以節療，百方不應。丹溪脈之，兩手弦數，日輕夜重，計無所出。時冬月也，仍以倒倉法而安。

牛乳味甘微寒。潤腸胃。解熱毒。補虛勞。治反胃噎膈。
胃槁胃冷脾不磨食故氣逆而不

成反胃。氣血不足，其本也。曰痰飲，曰食積，其標也。胃槁者，滋血生津，胃冷者，溫中調氣。李東垣曰：上焦吐者，由乎氣治；在中而降氣；中焦吐者，由乎積治；在行氣而消積；下焦吐者，由乎寒治；在溫中而散寒。朱丹溪曰：反胃噎膈，大便燥結，宜牛羊乳。時時嚙之，兼服四物湯為上策。不可服人乳。人乳有五味之毒，七情之火也。昂按：噎膈不通，服香燥藥，取快一時，破氣而燥血，是速其死也。不如少服藥，飲牛乳，加韭汁或薑汁或陳酒為佳。江南臬司多公患噎口痢，粒米不進，鄭奠一令服牛乳，久之亦瘥。

白水牛喉。治反胃吐食。腸結不通。除兩頭去脂膜醋浸炙末每服二錢陳米飲下。

酥酪醍醐。皆牛羊乳所作。滋潤滑澤。宜於血熱枯燥之人。

牛膽。納石灰於內。懸掛風處百日。治金瘡良。

牛黃。瀉熱利痰止驚。

甘涼牛有病。在心肝膽之間。凝結成黃。故還以治心肝膽之病。曰經疏

食百草其精華凝結成黃猶人之有內丹故能散火消痰解毒為世神物或云牛病乃生黃者非也。清心解熱利痰止

驚通竅辟邪治中風入臟驚癇口噤。心熱則火自生。火相搏膠痰上壅。遂致生風。風火相搏。膠痰上壅。遂致

中風不語。李東垣曰。中臟宜之。若中腑及血脈者。用之反能引風入骨。如油入麪。按中風中臟者重。多滯九竅。中腑稍輕。多著四肢。若外

無六經形證。內無便溺阻隔。為中經絡。為又輕。初宜順氣開痰。次宜養血活血。不宜專用風藥。大抵五臟皆有風。而犯肝者為多。肝屬風

木而主筋。肝病不能營筋。故有舌強口噤。喝斜癱瘓。不遂不仁等證。若口開為心絕。手散為脾絕。眼合為肝絕。遺尿為腎絕。吐沫鼻衄為

肺絕。髮直頭搖。面赤如赭。汗綴如珠者。小兒百病。皆胎毒痰熱所生。皆不治。若止見一二證。猶有可治者。

用三五盤合黃連甘草末蜜調令啞之良發痘墮胎善通竅牛有黃必多吼喚以盆水承之

伺其吐出迫喝即墮水名生黃如雞子黃大重疊可揭輕虛氣香者

良觀此則非病乃生黃矣殺死角中得者名角黃心中者名心黃肝膽中者名

肝膽黃成塊成粒總不及生者但磨指甲上黃透指甲者為真駱駝黃極

易得能亂真得牡丹菖蒲良聰耳目人參為使惡龍骨龍膽地黃常山

白馬溺瀉殺蟲消癥

辛寒殺蟲破癥積治反胃祖臺之志怪曰昔有人與奴皆患心腹痛病奴死剖之得一鰲尚活以諸藥投口中

不死有人乘白馬觀之馬溺墮繫而繫縮遂以灌之即化成水主乃服馬溺而愈

驢溺瀉殺蟲

辛寒殺蟲治反胃噎膈須熱飲之張文仲備急方曰昔患反胃奉敕調治竟不能療一衛士曰服驢尿極驗遂服

二合只吐一半再服二合食粥便定宮中患反胃者五六人同服之俱瘥

阿膠。平補而潤。

甘平。清肺養肝。滋腎益氣。腎主氣。肺納氣。和血補陰。肝主血。血屬陰。除風化痰。潤燥

定喘。利大小腸。治虛勞咳嗽。肺痿吐膿。吐血衄血。血淋血痔。腸風下

痢。傷暑伏熱成痢者。必用之。妊娠血痢尤宜。腰痠骨痛。血痛血枯。經水不調。崩帶胎動。或

酒煎服。癰疽腫毒及一切風病瀉者忌用。大抵補血與液為肺大腸

取其發散皮膚之外。用烏者取其屬水以制熱。則生風之義。故又治

後。睡人不正者。以阿膠倍人參服最良。阿膠育神。人參益氣也。按阿

井乃濟水伏流。其性趨下。用攪濁水則清。故治痰濁及逆上之痰也。

用黑驢皮阿井水煎成。蘇頌曰。本經阿膠亦用牛皮。皮則二膠以黑光

帶綠色。夏月不輒者真。剉炒成珠。或麪炒。蛤粉炒。去痰。蒲黃炒。止酒化

水化。童便和用。得火良。山藥為使。畏大黃。

甘平。功與阿膠相近。亦可代用。同蔥白煮粥。通大便。李時珍曰：真阿膠難得，牛皮膠亦可權用。其性味皆平補，宜於虛熱之人。張仲景治瀉痢，阿膠與黃

膠黃蠟並用。陳藏器曰：諸膠皆能療風補虛，止洩，驅皮主風為最。經

驗方曰：癰疽初起，酒頓黃明膠四兩，服盡，毒不內攻。唐氏方。加穿山甲四片，燒存性，用昂謂此方若驗，勝於服蠟礬丸也。

虎骨。宜去風，健骨。

味辛微熱。虎屬金而制木。故嘯則風生。追風健骨，定痛辟邪。治風痺

拘攣疼痛，驚悸顛癩，犬咬骨鯁。為末水服。犬咬數處。以頭骨脛骨良。虎雖不

仆，其氣力皆在前脛。李時珍曰：凡辟邪疰，治驚癩瘧，頭風。當用頭骨。治手足風。當用脛骨。治腰脊風。當用脊骨。各從其類也。

虎肚。治反胃。取生者，存滓，穢勿洗。新瓦固煨，存性為末，入平胃散一兩，每服三錢，效。昂按：虎肚丸宜於食膈。若寒膈，氣膈，血

膈痰膈，恐難見功。

虎睛為散。竹瀝下。治小兒驚癩夜嘔。

犀角。瀉心胃大熱。

苦酸鹹寒。涼心瀉肝。清胃中大熱。祛風利痰。辟邪解毒。治傷寒時疫。

發黃發斑。傷寒下早熱乘虛入胃則發吐血下血蓄血譫狂痘瘡黑

陷消癰化膿定驚明目妊婦忌之。能消胎氣李時珍曰五臟六腑皆稟氣於胃風邪熱毒必先干之飲

食藥物必先入胃角犀之精華所聚足陽明胃藥也故能入陽明解一切毒療一切血及驚狂斑痘之證抱朴子曰犀食百草之毒及棘

故能解毒飲食有毒以角撻之則生白沫烏而光潤者勝角尖尤勝。鹿取其犀取其現精氣盡在是也

成器物多被蒸煮不堪入藥入湯劑磨汁用入丸散剉細紙裏納懷

中待熱搗之立碎。歸田錄曰犀粉升麻為使忌鹽。

羚羊角瀉心肝火

苦鹹微寒羊屬火而羚羊屬木入足厥陰肝手太陰少陰心肺經目為

肝竅此能清肝故明目去障肝主風其合在筋此能祛風舒筋故治

驚癇搐搦骨痛筋攣肝藏魂心主神明此能瀉心肝邪熱故治狂越

僻謬。夢魘驚駭。肝主血。此能散血。故治瘀滯惡血。血痢腫毒。相火寄

於肝膽。在志爲怒。經曰。大怒則形氣絕。而血菀於上。此能下氣降火。故治傷寒伏熱。

煩懣氣逆。食噎不通。羚之性靈。而精在角。故又辟邪而解諸毒。昂按。痘科

多用以清肝火。而本草不言治痘。出西地。似羊而大。角有節。最堅勁。能碎金剛石。與

獬骨。獬音麥。能食鐵。夜宿防患。以角掛樹而棲。角有掛紋者真。一邊有節而疎。乃山驢山羊。非羚也。多

兩角。一角者勝。剉研極細。或磨用。

鹿茸。大補陽虛。

甘溫。一曰熱。鹹。純陽。生精補髓。養血助陽。強筋健骨。治腰腎虛冷。百一方。鹿角屑

熬黃爲末。酒服。主腰脊虛冷刺痛。四肢酸痛。頭眩眼黑。崩帶遺精。一切虛損勞傷。惟

脈沉細。相火衰者。宜之。鹿角初生。長二三寸。分歧如鞍。紅如瑪瑙。破

之如朽木者良。太嫩者。血氣未足。無力。酥塗微炙用。不傷。酥塗或酒炙。不可嗅之。

有蟲恐入鼻類。獵人得鹿，繫之取茸，然後斃鹿。以血未散故也。最難得，不破未出血者，沈存中筆談曰：凡含血之物，血易

長筋次之，骨最難長，故人二十歲，骨髓方堅，麋鹿角無兩月長，至二十餘斤，凡骨之長，無速於此。草木亦不及之。頭為諸陽之會，鍾於茸

角，豈與凡血比哉？○鹿陽獸，喜居山，麋陰獸，喜居澤，麋似鹿，色青而大，皆性淫，一牡輒交十餘牝。麋補陰，鹿補陽，故冬至至麋角解，夏至鹿

角解也。麋鹿茸角，罕能分別。雷斅曰：鹿角勝麋角，孟詵蘇恭蘇頌並云：麋茸麋膠勝於鹿。李時珍曰：鹿補右腎精氣，麋補左腎血液。

鹿角鹹溫。生用則散熱行血，消腫。醋磨塗腫毒，為末酒服，治折傷，涼餘曰：有膿瘡，赤腫而痛，用黃連涼

藥久不愈者，卻當用溫藥。如鹿角灰髮辟邪，治夢與鬼交。酒服一撮，灰乳香之類，此陰陽寒暑往來之理也。

能逐陰中邪氣惡血，鍊霜熬膏，則專於滋補。李時珍曰：鹿乃仙獸，純陽多壽，能通督脈，又食良草，故其角肉食之。

有益無損。鹿一名斑龍，西蜀道士嘗貨斑龍丸，歌曰：尾闕不禁滄海竭，九轉靈丹都漫說。惟有斑龍頂上珠，能補玉堂門下穴。蓋用鹿茸

與膠造膠霜法。取新角寸截，河水浸七日，刮淨，桑火煮七日，入醋少

許，取角搗成霜用。其汁加無灰酒熬成膏用。畏大黃。
鹿峻鹿相交之精也，設法取之。

大補
虛勞

麝香 宜通竅。

辛溫香竅開經絡通諸竅透肌骨暖水臟治卒中諸風諸氣諸血諸

痛痰厥驚癇。

嚴用和曰中風不醒者以麝香清油灌之先通其關李東垣曰風病在骨髓者宜之若在肌肉用之反引風入

骨如油入麪李時珍曰嚴氏言風病必先為東垣謂必不可用皆非通論若經絡壅閉孔竅不利者安得不用為引導以開通之耶但不

可過耳昂按據李氏之言似乃以嚴說為長癩瘕瘡瘡鼻窒耳聾目廣利方中惡客忤垂死麝香一錢醋和灌之

翳陰冷辟邪解毒殺蟲墮胎壞果敗酒故治果積酒積。

李東垣曰麝香入脾治肉

牛黃入肝治筋冰片入腎治骨研用。凡使麝香用當門子尤妙。忌蒜。不可近鼻。防蟲

入腦。麝見人捕之則自剔出其香為生香尤難得。其香聚處草木皆黃市人或攪荔枝核偽之。

熊膽 瀉熱。

苦寒涼心平肝明目殺蟲治驚癇五痔。塗之取瘥通明者佳。性善辟塵。撲

塵水上投膽少許則豁然而開。

象皮 外用。斂金瘡。

象肉壅腫。以刀刺之。半日即合。治金瘡不合者。用其皮灰。亦可以熬

膏入散。

象膽亦能辟塵。與熊膽同功。

獺肝 補肝腎。殺傳尸。

甘鹹而溫。益陰補虛。殺蟲止嗽。治傳尸。鬼疰有神功。尸疰之鬼疰乃五

三十三種。乃至九十九種。其證使人寒熱。沉沉默默。不知病之所苦。而無處不惡。死後傳人。乃至滅門。古方有獺肝丸。獺肝烘乾。炙為末。

水服二錢。日三次。以瘥為度。 諸肝皆有葉數。惟獺肝一月一葉。其間又有退葉。須

於獺身取下。不爾多偽。吳鶴皋曰。獺陰物。晝伏夜出。故治鬼疰。昂謂不然。緣其肝獨異於他獸也。

獺皮 瀉涼血。

苦平。治腸風瀉血。五痔。燒末。油調敷。 陰腫。脂滴耳中。治聾。膽點痘後

鼠眼似鼠而圓大。褐色。攢毛外刺如栗房。煨黑存性用。

兔矢。一名明月砂。宜明目。殺蟲。

殺蟲明目。治癩瘵五疖。痘後生翳。

兔肝瀉肝熱。故能明目。

兔肉治消渴。海上方。澄汁冷飲。小兒食之稀痘瘡。陶弘景曰。孕婦食之。令小兒

兒永不出痘。雖出亦稀。臘八日取生兔刺血。和蕎麥麩。加雄黃。四五分。和丸。如綠豆大。初生小兒。乳汁送下。二三丸。徧身發出紅點。此其

也。驗

殺鼠矢。宜調陰陽。

甘而微寒。治傷寒。勞復發熱。男子陰易。腹痛。婦人傷寒初愈。即與交

女人與傷寒。男子交者。名陽易活。人有鼠矢湯。兩頭尖者。為雄鼠屎。

鼠膽明目。汁滴耳中。治二十年老聾。陶弘景曰。鼠膽隨死。輒消。不易得也。

鼠肉。治兒疳鼠瘦。劉河間曰。鼠性善穿。而治瘡。瘦。因其性爲用也。

本草備要卷六終

本草備要卷七

清休寧汪 昂訥庵著

武進謝 觀 海 董 豐 培 兆 基 評 校

鱗介魚蟲部

龍骨 瀉瀉固腸鎮驚

甘瀉微寒。入手足少陰腎心。手陽明大腸。足厥陰肝。經能收斂。浮越之正。

氣瀉腸益。腎安魂。鎮驚辟邪。解毒治多夢紛紜。驚癩瘡痢。吐衄崩帶。

遺精脫肛。利大小腸。固精止汗。定喘氣不歸元則喘。斂瘡。皆瀉以止脫之義。

十劑曰瀉可去脫。牡蠣龍骨之屬是也。 白地錦紋。舐之黏舌者良。人或以古礦灰偽之。 酒浸一宿。

水飛三度用。或酒煮酥炙火煨。亦有生用者。又云水飛曬乾。黑豆蒸。

通用。否則著人腸。胃晚年作熱。 忌魚及鐵。畏石膏川椒。得人參牛黃良。許洪曰。牛黃惡龍骨。

而龍骨得牛黃更良。有以制伏也。

龍齒 瀉。鎮驚。

清涼。鎮心安魂。治大人瘧癩狂熱。小兒五驚十二癩。衛生寶鑑曰。龍齒安魂。虎睛定

魄龍屬木。主肝。肝藏魂。魄也。 虎屬金。主肺。肺藏魄也。 治同龍骨。

鯉魚 通。行。水。

甘平。下水氣。利小便。治欬逆上氣。腳氣黃疸。妊娠水腫。古方治水腫。有鯉魚湯。鯉

魚粥。劉河間曰。鯉之治水。鴨之利水。所謂因其氣相感也。

鯉魚骨。燒灰。療魚骨鯁。

鯽魚 補。土。和。胃。

甘溫。諸魚屬火。獨鯽屬土。土能制水。故有和胃實腸行水之功。作。治。食。治。

腳氣及上氣。 忌麥冬芥菜沙糖豬肝。

石首魚 補。調。胃。

甘平。開胃消食。治暴痢腹脹。菽園雜記曰：痢疾最忌油膩生冷。惟白

腸胃也。即乾白魚鯊。首中有石故名。石治石淋。昂按：今人多以石首魚

云：援精種子。而本草全未之及。何也。

青魚膽。瀉熱。治目疾。

苦寒。色青。入肝膽。治目疾。點眼消赤腫障翳。嚙津吐喉痹痰涎。塗火

熱瘡。療魚骨鯁。臘月收陰乾。

鱧魚膽。瀉熱。

凡膽皆苦。惟鱧魚膽甘。昂按：味終帶苦。喉痹將死者。點入。即瘥。病深者。水調

灌之。俗名烏魚。即七星魚。首有七星。夜朝北斗。道家謂之水厭。雁為天厭。犬為地厭。衛生歌曰：雁行有序。犬有

義。黑魚拱北。知臣禮。人無禮。義反食之。天地鬼神皆不喜。楊拱。醫方摘要曰：除夕黃昏時。取大黑鱧魚一尾。小者二三尾。煮湯浴兒。偏身

七竅俱到。能免出痘。不可嫌腥。而以清水洗去也。如不信。留一手。或一足不洗。遇出痘時。不洗處痘必多。此乃異人所傳。不可輕易。食醫

心鏡。鱧魚一斤以上。和冬瓜。蔥白作羹。治十種水氣。

鱧魚。宜去風。

甘溫。補五臟。除風溼。

尾血。療口眼喎斜。

少和麝香。左喎塗右。右喎塗左。正即洗去。滴耳治

耳痛。滴鼻治鼻衄。點目治痘後生翳。

李時珍曰。鱧善穿穴。與蛇同性。故能走經絡。療風邪。及諸竅之

病。風中血脈。用血主之。從其類也。

鱧。補虛。殺蟲。

甘平。去風殺蟲。

按蟲由風生。故風字從蟲。治骨蒸勞瘵。溼痹風瘙。陰戶蝕癢。皆有蟲。張

鼎曰。其骨燒煙。蚊化爲水。薰竹木。辟蛀蟲。置衣箱。辟諸蠹。補虛損。有病瘵者。相染已死。數人。乃絕

傳染。漁人異之。開視。見一女子。尚活。取置漁舍。多食。鱧鱧。病愈。遂以爲妻。聖惠方。鱧鱧。淡炙。食。治諸蟲心痛。多吐冷氣。上攻滿悶。

蚘蛇膽。瀉熱。明目。謹心。

蚺音：稟已土之氣。膽屬甲乙風木。氣寒有小毒。其味苦而帶甘。涼血

明目。療疔殺蟲。主厥陰太陰脾肝之病。取膽粟許置水上。旋行極速

者真。膽上句近頭中句近心下句近尾能

蚺蛇肉極腴美。主治略同。

白花蛇。宜祛風溼。

甘鹹而溫。蛇善行數蛻。如風之善行數變。花蛇又食石南。食石南藤

治風。故能內走臟腑。外徹皮膚。透骨搜風。截驚定搐。治風溼癱瘓。大

風疥癩。開寶本草曰：治中風口眼喎斜。半身不遂。經疏曰：前證定緣

宜辨。凡服蛇酒藥。切忌見風。出蘄州。龍頭虎口。黑質白花。脅有二十四方勝紋。腹

有念珠斑。尾有佛指甲。雖死而眼光不枯。他產則否。頭尾有毒。各去

三寸。亦有單用頭尾者。酒浸三日。去盡皮骨。大蛇一條。只得淨肉四

兩。

烏梢蛇。

宜去風溼。

功用同白花蛇。而性善無毒。不噬物。眼光至死不枯。以尾細能穿百錢者佳。重七錢至一兩者為上。十兩至一鎰者中。大者力減。去頭與皮骨。酒煮或酥炙用。

蛇蛻。

輕宜去風毒。

甘鹹無毒。

甄權曰。有毒。

性靈而能辟惡。故治鬼魅蠱毒。性竄而善去風。故

治驚癇風瘡。重舌。

聖惠方。燒末敷。

喉風。性毒而能殺蟲。故治疥癬惡瘡。疔腫

痔漏。屬皮而性善蛻。故治皮膚瘡瘍。產難目翳。用白色如銀者。皂莢

水洗淨。或酒或醋或蜜浸炙黃用。或燒存性。或鹽泥固煨。各隨本方。

海狗腎。

一名臘肺臍。補腎助陽。

甘鹹大熱。補腎助陽。治虛損勞傷。陰痿精冷。功近菘蓉鎖陽。出西番。

今東海亦有之。似狗而魚尾。置器中。長年溼潤。臘月浸水不凍。置睡

犬旁。犬驚跳者為真。或曰連臍取下故名臍。或曰乃臍肭獸之臍也。昂按兩名不類。恐一是海魚之腎。一是山獸之

臍也。綱目以此條入獸部。

穿山甲。一名蛟鯉。宣通經絡。

鹹寒。善竄山。專能行散。通經絡。達病所。某處病用某處之甲更良。入厥陰陽明。

肝。治風溼冷痹。通經下乳。消腫潰癰。止痛排膿。和傷發痘。元氣虛者慎用。風

瘡瘡科須為要藥。以其穴山寓水。故能出入陰陽。貫穿經絡。達於營分。以破邪結。故用為使。以其食蟻。又

治蟻瘻。漏也。音閭。亦音漏。有婦人項下忽腫一塊。漸延至頸。偶刺破。出水一碗。瘡久不合。有道人曰。此蟻漏也。緣飯中偶食蟻。得

之。用穿山甲燒存性。為末。敷之。立愈。劉伯溫多能鄙事。曰。油籠滲漏。刮甲裏肉。鱉投入。自至漏處。補住。永州記曰。不可於隄岸殺之。恐血

入土。則岸隄滲漏。觀此。二癰瘍已潰者。忌服。如鼉而短。似鯉有足。尾說。其性之善竄可知矣。

甲力更勝。或生或燒。酥炙醋炙。童便油煎土炒。隨方用。

海螵蛸 一名烏賊骨。宜通血脈。

鹹走血。溫和血。入肝腎血分。通血脈。祛寒溼。治血枯。內經血枯治之以烏鱗骨。血

瘦。血崩血閉。腹痛環臍。陰蝕腫痛。燒末酒服。瘡痢疳蟲。目翳淚出。聾耳出

膿。性燥。膿收水。為末。加麝少許。摻入。厥陰少陰。肝腎。經病。出東海。亦名墨魚。腹中有墨。書字逾年。

乃滅。常吐黑水。自置其身。人即於黑水處取之。取魚骨齒浸炙黃用。惡附子白芨白蘇。能淡

鹽。

龜板 補陰。益血。

甘平至陰。屬金與水。補心。益腎。滋陰。資智。性靈。故資智通心。益腎以滋陰。治陰血不

足。勞熱骨蒸。腰腳痠痛。久瀉久痢。能益大腸。久嗽痰瘡。老瘡也。或經數年。中有痞塊。名瘡母。

瘰癧崩漏。五痔產難。為末酒服。或加膏歸煨髮。陰虛血弱之證。益陰清熱。故治之。李時珍曰。龜鹿皆

靈而壽。龜首常藏向腹。能通任脈。故取其甲以補心補精補腎補血。以養陰也。鹿首常還向尾。能通督脈。故取其角以補命補精補氣。以養陽也。昂按本草有鹿膠而不及龜膠。然板不如膠。誠良藥也。合鹿膠一陰一陽名龜鹿二仙膏。大者良。上下甲皆

可用。酥炙或酒炙醋炙豬脂炙煨灰用。洗淨搗碎。水浸二日用。桑柴

熬膏良。自死敗龜尤良。得陰氣更全也。惡人參。

龜尿走竅透骨。染鬚髮。治啞聾。以鏡照之。龜見其影。則淫發而尿出。或以豬鬃松毛刺其鼻。尿亦出。

鱉甲。補陰退熱。

鹹平屬陰。色青入肝。治勞瘦骨蒸。往來寒熱。溫瘧瘧母。瘧必暑邪。類

瘧久不愈。元氣虛羸。邪陷中焦。則結為瘧母。瘧必暑邪。類鱉甲能益陰除熱而散結。故為治瘧要藥。腰痛脅墜。血瘦痔核。能

堅。經阻產難。腸癰瘡腫。驚癩斑痘。厥陰血分之病。李時珍曰。介蟲陰

木物屬金與土。故入脾肺而治諸證。色綠九肋。重七兩者為上。醋炙。若治勞童便炙。亦

可熬膏。

蟹肉涼血補陰。亦治瘡痢。煮作羹食。加生薑沙糖。不用鹽醬。名蟹糖湯。惡礬石。忌莧菜雞

子。蟹色青。故走肝益腎而遲熱。龜色黑。故通心入腎而滋陰。陰性雖同。所用略別。

蟹膽味辣。可代椒解腥。

蟹 瀉散血。

鹹寒。除熱解結。散血通經。續筋骨。筋絕傷者。取蟹黃足髓。熬納瘡中。筋即續生。骨節脫離者。生搗熱酒

調服。渣塗半日。骨內谷谷有聲。即好。塗漆瘡。能敗漆。然寒胃動風。

蟹爪墮胎。產難及子死腹中者。服蟹爪湯。即出。其蟹燒煙。能集鼠於庭中。蟹毒者。搗藕節熱酒調服。醃蟹中入蒜。則不沙。

蝦 補陽。

甘溫。托痘瘡。下乳汁。吐風痰。中風證。以蝦半斤。入葷蔥醬料。水煮。先

藥。證用。壯陽道。

牡蠣 瀉腸。補水。硬堅。

鹹以軟堅化痰消瘰癧結核老血瘦疝瀋以收脫治遺精崩帶止嗽

斂汗或同麻黃根糯米為粉撲身或加入煎劑固大小腸微寒以清熱補水治虛勞煩熱

溫瘡赤痢利溼止渴為肝腎血分之藥王好古曰以柴胡引之去膏下硬茶引之消頸核大黃引

之消股間腫以地黃為使益精收瀉結鹽水煮一伏時煨粉用亦有生用

者貝母為使惡麻黃辛夷吳茱萸得甘草牛膝遠志蛇牀子良海氣化成

純雄無雌故名牡

蛤粉

蛤蜊殼煨為粉與牡蠣同功王海藏曰腎經血分藥宋徽宗寵妃病痰嗽面腫不寐李防禦治之三日不效

當誅李枝窮憂泣忽聞市人賣嗽藥一文一帖喫了今夜得睡色淡

夕疑安嗽止而腫亦消帝大悅賜直萬金李不知其方懼得罪伺得

服聖惠方白蜆殼研粉米飲調治咳嗽不止

蛤肉鹹冷。止渴解酒。牡蠣蛤蜊海蛤文蛤並出海中。大抵海物鹹寒。功用略同。江湖蛤蚌無鹹水浸漬。但能清熱利。

溼不能
輕堅。

文蛤。背有花紋。兼能除煩渴。利小便。

瓦楞子。即蚌殼。瀉消癥散痰。

甘鹹。消血塊。散痰積。煨紅醋淬三次。為末。醋膏丸。治一切氣血癥瘕。

田螺。瀉熱。

味甘大寒。利溼清熱。止渴醒酒。利大小便。能引熱下行。熊彥誠病前後不通。腹脹如鼓。乘

醫莫措。遇一異人曰。此易耳。奉施一寸。藥即脫靴入水。探得一。大螺曰。事濟矣。以鹽和殼搗碎。帛繫臍下。一寸三分。曾未安席。嗇然暴下。歸

訪異人。無所見矣。董守約以腳氣攻注。或教搥數螺繫兩股。便覺冷氣趨下。至足既而亦安。治腳氣黃疸。噤口毒

痢。用螺少加麝香。搗餅烘熱。貼臍下。引熱下行。自然思食。目熱赤痛。入鹽花取汁點之。搽痔瘡狐臭。

石決明。瀉風熱。明目。

鹹平。除肺。肝風熱。青盲內障。水飛點目外障。亦治骨蒸勞熱。通五淋。

能清肺肝故也。古方多用治瘍疽。解酒酸。為末投熱酒中即解。如蚌而扁。惟一片無對。七孔九

孔者良。鹽水煮一伏時。或麪裏煨熟。研粉極細水飛用。惡旋覆花。

眞珠。瀉熱定驚。

甘鹹性寒。感月而胎。語云。上巳有風。黎有水精所孕。水能制火。入心。

肝二經。鎮心安魂。肝藏魂。昂按。雖云瀉熱。亦藉其寶氣也。大抵寶物多能鎮心安魂。如金箔琥珀眞珠之類。龍齒安魂。

亦假其神氣也。墜痰拔毒。收口生肌。治驚熱痘疔。下死胎胞衣。珠末一兩。塗苦酒服。

面好顏色。點目去翳膜。絲裏塞耳。治聾。取新潔未經鑽綴者。乳浸三

日。研粉極細用。不細傷人臟腑。陸佃曰。蛤蚌無陰陽也。牡須雀化成。故能生珠。專一於陰陽也。

蛤蚧。補肺潤腎。定喘止嗽。

鹹平。補肺潤腎。益精助陽。治渴通淋。定喘止嗽。肺痿咯血。氣虛血竭。

者宜之。能補肺益水源李時珍曰補肺止渴功同人參益氣扶羸功同羊肉經疏曰咳嗽由風寒外邪者不宜用出廣南。

首如蟾蜍背綠色斑點如錦紋雄為蛤鳴聲亦然皮粗口大身小尾

粗雌為蚘皮細口尖身大尾小雌雄相呼屢日乃交兩兩相抱捕者

擘之雖死不開房術用之甚效不論牝牡者只可入雜藥口含少許

奔走不喘者真藥力在尾見人捕之輒自嚙斷其尾不全者不效凡使去頭足雷斅曰其毒在

眼用須去眼洗去鱗內不淨及肉毛酥炙或蜜炙或酒浸焙用。

蜂蜜 亦名石蜜 饘蜜 補中 潤燥 滑腸。

草木精英。合露氣以釀成。生性涼。能清熱。熟性溫。能補中。甘而和。故

解毒。柔而滑。故潤燥。甘緩可以去急。故止心腹肌肉瘡瘍諸痛。甘緩

可以和和中。故能調營衛。通三焦。除衆病。和百藥。故丸藥多用之而與甘草同

功。止嗽治痢。解毒潤腸最治痢疾薑汁和服甚佳明目悅顏。同薤白搗塗湯火傷。煎鍊

成膠。通大便秘。乘熱納穀道中。名蜜煎導。然能滑腸泄瀉。與中滿者忌用。之以白

如膏者良。汪穎曰。蜜以花為主。閩廣蜜熱。川蜜溫。西蜜涼。安宜州有黃連蜜。味小苦。點日熱良。西京有梨花蜜。色白如脂。用

銀石器。每蜜一斤入水四兩。桑火慢熬。掠出浮沫。至滴水成珠用。忌

蔥鮮萵苣同食。昂按。生蔥同蜜食。殺人。而萵苣蜜漬。點茶者頗多。未見作害。豈醃過則無患乎。抑藥忌亦有不盡然者乎。

黃蠟甘溫。止痛生肌。療下痢。蜜質柔潤。故滑腸胃。續絕傷。按。蜜蠟皆蜂所

釀成。而蜜味至甘。蠟味至淡。故今人言無味者。謂之嚼蠟。

露蜂房。宜解毒殺蟲。

甘平有毒。治驚癇瘈瘲。附骨癰疽。根在臟腑。和蛇蛻亂髮燒。灰酒服。按。附骨疽不破。附骨成

膿。故名。不知者誤作賊風治。附骨疽痛處發熱。四體乍熱乍寒。小便赤。大便秘。而無汗。瀉熱發散。則消。賊風痛處不熱。亦不發寒。熱覺身

冷。欲得熱熨。則小寬。塗瘰癧成瘻。音漏。炙研。止風蟲牙痛。煎水含漱。時有汗。宜風藥治之。豬脂和塗。

陽明藥也。取其以毒敷小兒重舌。燒灰酒和敷。陰上敷。取懸攻毒兼殺蟲之功耳。敷小兒重舌。燒灰酒和敷。陰上敷。取懸

於樹受風露者炙用。治癰腫醋調塗洗瘡煎用。

蠶。輕宜去風化痰。

辛鹹微溫。蠶而不腐。得清化之氣。故能治風化痰。散結行經。蠶病風則蠶。故

因以治風能散相火逆結之痰。其氣味俱薄。輕浮而升。入肺肝胃三經。治中風失音。

頭風齒痛。喉痹咽腫。妙為末。薑湯調下。一錢當吐出頑痰。丹毒瘙癢。皆風熱為病。瘰癧結核。

痰瘡血病。崩中帶下。風熱乘肝。小兒驚疳。膚如鱗甲。由氣血不足。亦名胎垢煎湯浴之。下

乳汁。滅癥痕。若諸證。由於血虛而無風寒客邪者。勿用以頭蠶色白

條直者良。糯米泔浸一日。待桑涎浮出。漉起焙乾。拭淨肉毛。口甲搗

用。惡桑螵蛸。茯苓。神桔梗。萆薢。

蠶。甘溫。能瀉膀胱相火。引清氣上朝於口。止消渴。蠶與馬並屬午。為離主心。作齒。

退藏之際。故緣絲湯飲之。能抑心火而治消渴。癰疽無頭者。燒灰酒服。服一枚。出一頭。二枚。出二頭。

雄蠶蛾氣熱性淫。主固精強陽。交接不倦。蠶退紙燒存性。入麝少許。蜜和敷走馬牙疳。加白礬。

尤妙。百一方。蠶紙燒灰。酒水任下。能治邪祟發狂悲泣。

原蠶沙 燥溼去風。

蠶食而不飲。屬火性燥。燥能去風勝溼。經曰。燥勝風。燥屬金。風屬木也。其沙辛甘而

溫。炒黃浸酒。治風溼為病。支節不隨。皮膚頑癩。腰腳冷痛。冷血瘀血。

史國公藥酒中用之。炒熱熨患處亦良。寇宗奭曰。醇酒三升。拌蠶沙五斗。蒸熱鋪暖室席上。令患冷風氣痹人以患處

就臥。厚覆取汗不愈。麻油調敷。治爛弦風眼。目上下胞屬脾。脾有風溼。則蟲生弦爛。又新瓦

夾為末。少加雄黃。麻油調敷。治蛇串瘡。有人食烏梢蛇。渾身變黑。漸生鱗甲。見者驚縮。鄭奠一令日服。晚蠶沙五錢。盡一二斗。久之乃退。

晚蠶矢也。淘淨曬乾。

桑螵蛸 補腎。

甘鹹。入肝腎命門。益精氣而固腎。治虛損陰痿。夢遺白濁。血崩腰痛。

傷中疝瘕。肝腎不足。通五淋。縮小便。能通。故能縮。腎與膀胱相表裏。腎既得

則水道安常。故又能止也。寇宗奭治便數有桑螵蛸散。桑螵蛸伏神遠志。菖蒲。人參。當歸。龍骨。鱉甲。醋炙。各一兩。為末。臥時。人參湯下。二

錢能補心安。炙飼小兒止夜尿。螳螂卵也。桑樹產者為好。房長寸許。神亦治健忘。

芒種後。齊出。故仲夏。螳螂生也。如用他樹者。以桑皮佐之。桑皮善行水。能引達腎經。炙黃。或醋煮湯泡。煨用。畏

旋覆花。螳螂能出箭。鐵螳螂一箇。巴豆半箇。研敷傷處。微癢且忍。極

出後。敷生肌散。○螳螂。皆治驚風。今人罕用。螳螂兼治腹痛。便秘。下痢。脫肛。瘡。疔。蟲痔。

蟬蛻。輕。散風熱。

蟬乃土木餘氣所化。飲風露而不食。其氣清虛而味甘寒。故除風熱。

其體輕浮。故發痘疹。其性善蛻。故退目翳。催生下胞。其蛻為殼。故治

皮膚瘡瘍癩疹。與薄荷等分。為末。酒調服。其聲清響。故治中風失音。又晝鳴夜息。

故止小兒夜啼。蟬類甚多。惟大而色黑者入藥。洗去泥土翅足。漿水

煮曬乾用。攻毒
生用。

炸蟬治小兒驚癇夜啼殺疔去熱出胎下胞。李時珍曰治皮膚瘡癩
風熱當用蟬蛻治臟腑

經絡當用蟬身
各從其類也。

五倍子。瀉斂肺。

鹹酸其性瀉能斂肺其氣寒能降火生津化痰止嗽止血斂汗。鄭贊
曰

焙研極細以自已漱口水
調敷臍上治盜汗如神。解酒療消渴泄痢瘡癬五痔下血脫肛膿

水溼爛子腸墜下散熱毒消目腫。煎水
洗之。斂瘡口。熱散瘡
口自斂。其色黑能染

鬚。朱丹溪曰倍子屬金與水
浮肺中不宜用涼藥宜五倍五味斂而解熱毒黃昏咳嗽乃火

虛而滑精屢與加味四物湯吞河間秘真丸及珍珠粉丸不止後用
五倍子一兩茯苓二兩丸服遂愈此則倍子斂瀉之功敏於龍骨始

粉也昂按凡用秘瀉藥能通而後能秘此方用嗽由外感瀉非虛脫
茯苓倍於五倍一瀉一收是以能盡其妙也。

者禁用生鹽膚木上乃小蟲食汁遺種結毬於葉間。故主治之證與
鹽膚子葉同功。

五倍子殼輕脆而中虛。可以染皂。或生或炒用。

白蠟 外用生肌。

甘溫屬金。生肌止血。鄭贊襄曰。汪御章年十六。常患尿血。屢醫定痛。不效。予以白蠟加入沖血滋腎藥中。遂愈。定痛。

補虛續筋接骨。外科要藥。

斑蝥 大瀉。以毒攻毒。

辛寒有毒。外用蝕死肌。敷疥癬惡瘡。內用破石淋。拔癰癧疔腫。甫曰。

癰癧之毒。莫不有根。大抵治以斑蝥。地膽為主。制度如法。能令其根。從小便出。如粉片血塊爛肉。此其驗也。以木通滑石燈心輩導之。○

斑蝥捕得。屁射出。臭不可聞。故奔走下。察酌直下。獬犬毒。九死一生。至精溺之處。能下敗物。痛不可當。用須斟酌。下獬犬毒。候急用斑蝥之。

七枚。去頭翅足。糯米炒黃。為末。酒煎。空心下。取小。狗三四枚。如。數少。再服。又方。糯米炒黃。為末。酒煎。空心下。取小。狗三四枚。如。

發。取米為粉。冷水入。清油少許。空心下。取利。下毒物。如不利。再進。急。後忌。聞鐘鼓聲。復發。則不可治。服之。肚痛急者。用酸汁。或黃連水。解。

之。潰肉之肌。肉近。爛。墮胎。豆葉上蟲。黃黑斑文。去頭足。糯米炒熟。生用。則。

吐瀉。人亦有用米取氣不取質者。畏巴豆丹參。惡甘草豆花。斑螫上青

亭長地膽四蟲。形色不同。功略相近。食茺花為茺青。青綠色。尤毒。春生。食葛花為亭長。黑身赤頭。夏生。食豆花為斑螫。斑色。秋生。冬入地。

為地膽。黑頭赤尾。陶隱居曰。乃一物而四時變化者。蘇恭曰。非也。皆極毒。須慎用。

蠍。宜去風。

辛甘有毒。色青屬木。故治諸風眩掉。皆屬肝木。驚癩搐掣。口眼喎斜。白蠶附

全蠍等分。為末。名牽正散。酒服。二錢。甚效。瘡疾風瘡。耳聾帶疝。厥陰風木之病。李東垣曰。凡疝氣帶

下。皆屬于風。蠍乃治風要藥。俱宜加而用之。汪機曰。破傷風。宜以全蠍防風為主。類中風慢脾。驚屬虛者。忌

用。全用去足焙。或用尾。尾力尤緊。形緊小者良。人被螫者。塗蝸牛即解。

蜈蚣。宜去風。

辛溫有毒。入厥陰肝經。善走能散。治臍風撮口。炙末。豬乳調服。驚癩瘰癧。蛇

瘰。能制瘡甲。趾甲內惡肉突出。俗名雞眼。睛蜈蚣。焙研敷之。以南星末醋調敷。四圍。殺蟲墮胎。取赤足

黑頭者。火炙。去頭足尾甲。將荷葉火煨用。或酒炙。畏蜘蛛蜈蚣。過不敢

行之路。屬雞屎桑皮鹽。中其毒者。以桑汁鹽蒜塗之。被咬者。捕蜘蛛。置咬處。自吸其毒。蜘蛛死。放水中吐而活之。

蟾蜍。即癩蝦蟆。瀉療疔。拔毒。

蟾土精而應月魄。辛涼微毒。入陽明胃。發汗退熱。除溼殺蟲。治瘡疽

發背。未成者。用活蟾蜍繫瘡上。半日。蟾必昏憤。置水中救其命。再易一個。三易則毒散矣。勢重者。剖蟾蜍合瘡上。不久必臭。不可聞。

如此二三易。其腫自愈。小兒勞瘦疔疾。

蟾酥。辛溫大毒。助陽氣。治疔腫發背。小兒疔疾腦疔。即蟾蜍眉間白汁。能爛人肌肉。

惟疔疔或合他藥服一二釐。取其以毒攻毒。腦疔乳和滴鼻中。外科多用之。蟾蜍肪塗玉刻之。如蠟。○肪音方。脂也。

白頸蚯蚓。瀉熱利水。

蚓土德而星應軫水。味性鹹寒。故能清熱。下行故能利水。治溫病大

熱狂言。大腹黃疸。腎風腳氣。蘇頌曰。腳氣必須用之為使。白頸者乃老蚯蚓。治大

熱搗汁井水調下。入藥或曬乾爲末。或鹽化爲水。或微炙。或燒灰。各

隨本方。中其毒者。鹽水解之。張將軍病。蚯蚓咬毒。每夕。蚓鳴於體。濃煎鹽水浸身。數過而愈。

蚯蚓泥。即蚯蚓屎。甘寒。瀉熱解毒。治赤白久痢。敷小兒陰囊熱腫。腫腮丹

毒。

五穀蟲。即糞蛆。瀉熱療疳。

寒治熱病譫。音占。妄語。妄毒痢作吐。小兒疳積疳瘡。漂淨曬乾。或炒。或煨

爲末用。

本草備要卷七終

本草備要卷八

清休寧汪 昂訥庵著

武進謝 觀 鎮海董 豐 培 兆 基 評校

人部

髮一名血餘補和血

髮者血之餘。味苦微寒。入足少陰厥陰。肝腎補陰消痰。通關格。利二便。

治諸血疾。能去心竅之血。故亦治驚癩。血痢血淋。舌血。煨末。茅根湯服。鼻血。燒灰吹鼻。轉胞不

通。燒灰服。小兒驚熱。合雞子黃煎為汁服。雞子能去風痰。合諸藥煎膏。涼血去瘀。長肉。髮

心。髮屬肝。稟木氣而生。眉屬肝。稟木氣而側生。鬚屬腎。稟水氣而下生。或曰髮屬肝。稟木氣而直生。眉屬金。稟金氣而橫生。金無餘氣。故短。而

不長。至老金氣鈍。則眉長矣。昂按。肺主皮毛。毛亦短而不長者。也以獨無所屬乎。毛既為肺之合。自當屬肺。屬金。眉當屬肝。屬木。以其

側生象木枝也。此乃臆說。附質明者。經曰。腎者精之處也。其華在髮。王冰註曰。腎主髓。腦者髓之海。髮者腦之華。腦髓減。則髮素。李時珍

曰。髮入土。千年不朽。以火煨之。疑為血質。煎飲至枯。復有液出。稱陳藏入腹。化為癥。蟲煨鍊服食。使髮不白。故本經有自還神化之稱。陳藏

器曰。生人髮掛果樹上。則烏鳥不敢來。又人逃走。取其髮於緯車上縛之。則迷亂不知所適。此皆神化。子母祕錄。亂髮燒灰。亦治尸疰。豬脂調塗。小兒燕口。即兩角生瘡也。宋丞相王郇公。小腹切痛。備治不效。用附子。硫黃。五夜叉丸。之類。亦不瘥。張駙馬取婦人油頭髮。燒灰。研篩。酒服二錢。其痛立止。○內經。腦為髓海。衝為血海。命門為精海。丹田為氣海。胃為水穀之海。為

阜莢水洗淨入罐

固煨存性用。胎髮尤良。補衰潤。

頭垢。治淋及噎膈勞復。

人牙。宜發痘。

鹹溫有毒。治痘瘡倒靨。服涼藥而血澀倒陷者。麝香酒調服。李時珍曰。欲其竄入腎經。發出毒氣。蓋刮劑也。若伏毒在心。不省人事。氣虛色白。痒塌無膿。及熱癩紫泡之證。只宜補虛解毒。苟誤服此。則鬱悶

聲啞。反成不救。煨退火毒。研用。

人乳。補虛潤燥。

甘鹹潤五臟補血液止消渴澤皮膚治風火證。昂按。老人便秘。本血

所化。目得血而能視。用點赤澀多淚。熱者黃。連浸點。然性寒滑。臟寒胃弱人。

不宜多服。李時珍曰。人乳無定性。其人和平。飲食沖淡。其乳必平。其躁暴。飲酒食辛。或有火病。其乳必熱。又有孕之乳為忌。

乳最有毒。小兒食之吐瀉。成疳。魁之病。內亦損胎。昂按。乳乃陰血所化。生於脾胃。攝於衝任。未受孕則下為月水。既受孕則留而養胎。已

產則變赤。為白。上為乳汁。以食小兒。乃造化之玄微也。服之益氣血。補腦髓。乃謂以人養人也。然能滑腸溼脾。膩膈。天設之。以為小兒。非

壯者所當常服。惟製為粉。則有益無損。又須旋用。久則油。須用一婦人之乳。為佳。乳雜則其氣雜。乳粉參末等分。蜜丸。名參乳丸。大補

血。取年少無病婦人乳。白而稠者。如兒食良。黃赤清色。氣腥穢者。並

不堪用。或曝曬用茯苓粉收。或水頓取粉尤良。取粉法。小鍋燒水滾。

用銀瓢如碗大。錫瓢亦可。傾乳少許入瓢。浮滾水上頓。再浮冷水上立乾。

刮取粉用。再頓再刮。如攤粉皮法。

紫河車。即胞衣。一名混沌皮。大補氣血。

甘鹹性溫。本人之血氣所生。故能大補氣血。治一切虛勞損極。虛損。

肺皮槁毛落二損心。血脈衰少。三損脾。肌肉消脫。四損肝。筋緩恍惚。不收。五損腎。骨痿不起。六極。曰氣極。血極。筋極。肌極。骨極。精極。恍惚。

失志癩癩。以初胎及無病婦人者良。有胎毒者害人。以銀器插入。焙不黑則無毒。

長流水洗極淨。酒蒸焙乾研末。或者爛搗碎入藥。反損其精汁。亦可。

調和煮食。李時珍曰。崔行功小兒方云。胞衣宜藏天德月德吉方。深埋緊築。若為豬狗食。令兒癩狂。螻蟻食。令兒瘡癬。烏雀食。

令兒惡死。棄火中。令兒瘡爛。近社廟井窰街巷。皆有所忌。此亦銅山。西崩洛鐘東應。自然之理。今人以之炮炙入藥。雖曰以人補人。然食。

其同類。獨不犯崔氏之戒乎。以故本集如天靈蓋等。概不入錄。

童便。一名還元水。飲自己溺。名輪迴酒。平瀉火。補陰。散瘀血。

鹹寒。李時珍曰。能引肺火下行。從膀胱出。乃其舊路。降火滋陰。甚速潤。

肺散瘀血。鹹走。治肺痿失音。吐衄損傷。凡跌打損傷。血悶欲死者。擊開口。以熱尿灌之。下咽即醒。一切。

金瘡受杖。並宜用之。不傷臟腑。若胞胎不下。皆散瘀之功。凡產後血暈。敗。

血入肺。陰虛久嗽。火蒸如燎者。惟此可以治之。晉褚澄勞極論曰。降火甚速。降血甚神。飲。

溲溺百無一死服。取十二歲以下童子少知識無相火。不食葷腥酸鹹者佳。

去頭尾。取中間一節。清澈如水者。用當熱飲。熱則真氣尙存。其行自

速。冷則惟有鹹寒之性。入薑汁行痰。韭汁散痰。更好。冬月用湯溫之。李士材曰。

煉成秋石。真元之氣漸失。不及重便多矣。普濟方。治目赤腫痛。用自已小便。乘熱抹洗。即閉目少頃。此以真氣退其邪熱也。

秋石。補腎水。潤三焦。

鹹溫。滋腎水。潤三焦。養丹田。安五臟。退骨蒸。軟堅塊。治虛勞咳嗽。白

濁遺精。為滋陰降火之聖藥。若煎煉失道。多服誤服。反生燥渴之患。

鹹能走血。且經煨煉。中寓暖氣。使虛陽妄作。則真水愈虧。蒙筌曰。每月取童便。每缸用石膏七錢。

桑條攪澄。傾去清液。如此二三次。乃入秋露水攪澄。故名秋石。如此數次。

滓穢淨。鹹味減。以重紙鋪灰上曬乾。刮去在下重濁。取輕清者為秋

石。世醫不取秋時。雜收人溺。以皂莢水澄曬為陰煉。火煨為陽煉。盡

失於道。安能應病。況經火煉。性卻變溫耶。秋石再研入罐。鐵蓋上。鹽泥固濟。升打。升起。蓋上。

者名秋冰。味淡而香。乃秋石之精英也。保壽堂方。用童男童女小便。各煉成秋石。其色如雪。和勻。加乳汁。日曬。夜露。取日精。月華。乾即加。

乳待四十九日。足收貯配藥。摘玄。曰。腫脹忌鹽。只以秋石拌飲。食佳。

人中黃 瀉熱。

甘寒入胃。清痰火。消食積。大解五臟實熱。治天行熱狂。痘瘡血熱。黑

陷不起。納甘草末於竹筒中。緊塞其孔。冬月浸糞缸中。至春取出洗。

懸風處陰乾。取甘草用。亦有用阜莢末者。竹須削去青皮。一云即糞缸多年黃泥。煨

存性用。

糞清 一名金汁。瀉火熱。

主治同人中黃。用椶皮棉紙。上鋪黃土。淋糞濾汁。入新甕。碗覆埋土

中一年。清若泉水。全無穢氣用。年久者彌佳。野間殘糞下土。篩敷。癰疽如冰著背。

人中白 瀉火。

鹹平。降火散瘀。治肺癆鼻衄。刮人中白。新瓦火止。勞熱消渴。痘瘡倒陷。

牙疳口瘡。即溺堊。煨研用。以蒙館童子便桶山中老僧溺器刮下者尤佳。