

農政全書卷之三十

上海徐光啓原本

上海太原氏重刊

明 東陽張國維
穀城方岳貢原刻

樹藝

果部下

荔枝上林賦曰離枝蜀都賦曰荔枝一名丹荔一名
鈞坐真人其類有三四十種以狀元香爲最然不如長樂勝肉厚而味甘爲種中第一第乾之不能如狀元香風味記曰此木以荔枝爲名者以其結實時枝弱而帶牢不可摘取以刀斧剔去其枝故以爲名生嶺南巴中泉福漳興化蜀渝涪二廣州郡皆有之其品閩爲最蜀川次之嶺南爲下樹形團圓如帷蓋葉如冬青華

如橘子如蒲萄核如枇杷殼如紅繪膜如
紫綃肉白如肪花於二三月實於五六月

農桑通訣曰荔枝根浮必須加糞土以培之性不耐
寒最難培植纔經繁霜枝葉枯死玄扈先生曰亦云冬夏不凋遇

春二三月再發新葉初種五六六年冬月覆蓋之以護
霜雪種之四五十年始開花結實其木堅固有經四
百餘年猶能結實者

熟時人未採百蟲不敢近人纔採摘諸鳥蝙蝠之類
羣然傷殘故採者必日中而衆採之最忌麝香遇之

花實盡落凡果皆然

曬荔採下卽用竹籠朗晒經數日色變核乾用火燒
可以致遠成朵晒乾者名爲荔錦其肉生以蜜漑作
煎嚼之如糖霜然名爲荔煎北方無此種自漢南粵
以備方物於是

荔枝始通中國

農桑通訣曰漢唐時命驛馳貢洛陽取於嶺南長安來於巴蜀雖曰解獻傳置之速然腐爛之餘色香味之存者無幾蓋此果若離本枝一日色變二日香變五日味變四五日外色香味盡皆去矣非惟中原不嘗生荔之味江浙之間亦罕焉今閩中歲首亦晒乾
齋李直方箋果實或薦荔枝自當擧之首魏文帝

譜郡臣曰。南方果之珍異者。有荔枝龍眼焉。今閩中荔枝初著花時。商人計林斷之。以立券。一歲之出。不知幾千萬億。水浮陸轉。販鬻南北外。而西夏新羅日之實。生於海濱巖險之遠。而能名徹上京。外被四夷。重於當世。是亦有足貴者。

龍眼

附山龍眼
龍荔

廣雅曰。益智龍眼也。

一名驪珠。一名龍目。一名比目。一名

圓眼。

一名蜜脾。一名燕卵。一名繡水團。

一名用彈子。一名亞荔枝。一名荔枝奴。

龍眼花與

荔枝

同開樹亦如荔枝但枝葉稍小。殼青黃色形如

丸核如木院子而不堅肉白而帶漿其甘如蜜熟

荔枝過卽龍眼熟故謂之荔枝奴福州興化泉州有之此荔枝特罕木性畏寒北方亦無此種今充歲貢焉玄扈先生曰乾龍眼肉勝荔枝且能補心氣大益人鮮食之大不如荔真堪作奴

臘龍眼採下用梅鹵浸一宿取出晒乾用火焙之以核乾硬爲度如荔枝法收藏之成朵乾者名龍眼

錦

附山龍眼

出廣中夏月熟可啖此亦龍眼之野生者

龍荔

出嶺南狀如小荔枝而肉味如龍眼其身葉亦似二果故名曰龍荔不可生啖但可熬食

橄欖

附餘甘一名青果一名忠果一名諫果生嶺南及

閩廣州郡性畏寒江浙難種樹大數圍實長寸許形

如訶子而無稜瓣其子先生者向下後生者漸高有

枝

過卽龍眼熟故謂之荔枝奴福州興化泉州有之此荔枝特罕木性畏寒北方亦無此種今充歲貢焉玄扈先生曰乾龍眼肉勝荔枝且能補心氣大益人鮮食之大不如荔真堪作奴

樹藝

野生者。波斯橄欖生邕州色類相似但核作兩瓣蜜漬食之。綠欖色青綠核內無仁有亦乾小烏欖色青黑肉爛而甘取肉搥碎乾自有霜如白鹽謂之欖醬仁最肥大有紋叢疊如海螺蛸色白外有黑皮最甘嫩。方欖出廣西兩江洞中似橄欖有三角或四角。

農桑通訣曰樹峻不可梯緣但剗其根方寸許內鹽於其中一夕子皆自落蜜藏極甜生噉煮食之並消

酒解諸毒人悞食鰐鮀卽河鮀魚肝迷悶欲死者飲其

汁立解以其木作楫撥著魚皆浮出物之相畏有如此者此果南人尤重之可作茶果其味苦酸而澀食久味方回甘故昔人名爲諫果然消酒解毒亦果中

之有益於人者

一云以木釘釘之其子亦自落

附餘甘

惟泉州有之乃深山窮谷自生之物非人家所種其樹稍高其子梭形又如梅實兩頭銳

始嚼味酸澀

飲水乃甘九月採比

之橄欖

酷相似以蜜藏之亦佳

櫻桃

附山

爾稚曰楔荆桃

郭璞注曰今櫻桃廣雅

畏八分者有白色者凡三種

孫炎云大而甘者謂

之崖蜜

櫻桃一名楔一名荆一名英桃

一名鶯桃

記列櫻桃舍桃爲二種

蘇頌曰櫻桃處處有之洛

中者最勝其實深紅者謂

之朱櫻紫色皮裏有細黃點者謂之紫櫻味最珍重又有正黃明者謂之蠟櫻

小而紅者謂之櫻珠味皆不及極大者

齊民要術曰二月初山中取栽陽中者還種陽地陰

中者還種陰地。

若陰陽易地。則難生。生亦不實。此果性生陰地。既入園圃。便是陽中。故多

難得生。宜堅實之地。不可用虛糞也。又法

二月間分有根枝栽土中糞澆即活。

李時珍曰三月熟時須守護否則鳥食無遺也。

以其法以二

破竹相擊鳥聞聲自去或以網張其上鳥亦不至熟時以糞置其下則一樹齊熟。

鹽藏蜜煎。

皆可久食或同蜜擣作糕唐人以酪煎食之。

櫻桃經雨則蟲

自內生人莫之見用水浸良久。

則蟲皆出乃可食也試之果然。

附山嬰桃

本草釋名朱桃麥櫻英豆李桃孟詭曰此嬰桃俗名李桃又名柰桃前櫻桃名櫻

辨桃也。

別錄曰櫻桃卽今朱櫻實大如堯多毛四月採陰乾

而實乖異山間時有之

李時珍曰樹如朱嬰但葉

陶弘景曰

櫻桃

卽今朱櫻可煮食者嬰桃形相似

而味甘美亦不光潔而朱色

楊梅博物志云地瘴處多生楊梅。一名杌子。生江南嶺南山谷間。會稽產者爲天下冠。楊梅種類甚多。大葉者最早熟。味甚佳。次則木山。本出茗溪。移植光福山中尤勝。又次爲青蒂白蒂。效大小松子。揚州呼白者爲聖僧。樹若荔枝葉細青如龍眼。二月開花。結實如楮實子。肉在核上。無皮殼。五月熟。生素熟。則有白紅紫三色。

便民圖纂曰。六月間取糞池中浸過核收盒。二月鋤地種之。待長尺許。次年三月移栽。三四年後取別樹盤子枝條接之。復栽山地。其根多留宿土。臘月開溝於根旁高處。離四五尺許。以夾糞壅之。不宜著根。每

肥水滲下則結子肥大

物類相感志云桑樹接楊梅則不酸樹上生癩以甘草釘釘之則去

鹽藏蜜漬糖製火酒浸皆佳

林邑記云邑有楊梅大如盃盤青時酸熟則如蜜用以釀酒號爲梅花酣甚珍重之

葡萄

附野

張騫復大宛取葡萄實於離宮別館旁盡

種之

三種

一名蒲萄一名腸紫櫻桃廣志曰有黃白黑

味甘

紫葡萄黑色有大小二種酸甜二味

綠葡萄

水晶葡萄暈色帶白如著粉形大而長

出蜀中熟時色綠至苦西番之綠葡萄名魂睛珠

勝者無核則異韌也。瑣瑣葡萄出西番實小如胡椒小兒常食可免生痘又云痘不快食之卽出今中國亦有種者一架片間生一二穗雲南者大如棗味尤長波斯國所出大如雞卵可生食可釀酒最難乾不乾不可收齊民要術曰蔓延性緣不能自舉作架以承之葉密陰厚可以避熱

便民圖纂曰二三月間截取藤枝插肥地待蔓長引上架根邊以煮肉汁或糞水澆之待結子架上剪去繁葉則子得成雨露肥大冬月將藤收起用草包護以防凍損其根莖中空相通暮溉其根至朝而水浸其中澆以米泔水最良以麝入其皮則葡萄盡作香氣以甘草作鉢針其根則立死三元延壽書云葡萄架下不可飲酒恐虫屎傷人玄扈先生曰須春分便插太遲則有漿出損本

又法宜栽棗樹邊。春間鑽棗樹作一竅。引葡萄枝從竅中過。候葡萄藤長。塞滿竅子。斫去葡萄根。托棗以生其實如棗。十月申去根一步許掘作坑收卷葡萄悉埋之近枝莖薄安黍穰彌佳無穰甫安土亦得不宜溼溼則冰凍二月中還出舒而上架性不耐寒不埋卽死其歲久莖根粗大者宜遠根作坑勿令莖折其坑外處亦掘土並穰培覆之玄扈先生曰北方必須舒卷年遠亦難南方竟以穰草裹根可也。

正月末取嫩枝長四五尺者。卷爲小圈。先治地令鬆沃之以肥。種時止留二節在外。春氣萌動發芽盡萃。丁出土二節。不一年成大棚。實大而多液。生子時去。

其繁葉遮露則子尤大忌澆人壅

齊民要術曰摘葡萄法逐熟者一一零疊一作摘取從本至末悉皆無遺世人全

房折

殺者。

作乾葡萄法

極熟者一一零疊。刀子切去蒂勿令汁出蜜兩分和內葡萄中煮四五沸。

漉出陰乾便成矣滋

味倍勝又夏月不敗

藏葡萄法

極熟時全房折取於屋下作廕坑坑內近地鑿壁爲孔插枝於孔中還築孔使堅屋子置土覆之

經冬不異也。

李扈先生曰葡萄作酒極有利益然非西種不可亦可作醋作糖今山西亦作酒然不眞也、

附野葡萄

一名蔓葛。一名山葡萄。蔓生苗葉花實與葡萄相似。但實小而圓。色不甚紫。堪爲酒

銀杏、一名白果、一名鴨腳子

銀杏以白得名。鴨腳取其葉之似鴨脚。其葉之似鴨腳者爲

年。其大或至連抱。可作棟樑。多生江南。以宣城者爲

勝。二月開花成簇。青白色。二更開花隨卽卸落。人罕

見之一枝結子百十狀如棟子。

經霜

乃熟爛去肉

取核爲果

便民圖纂曰、春初種於肥地、候長成小樹、來春和土、
移栽、以生子樹枝接之、則實茂、

農桑通訣曰、春分前後移栽、先掘深坑、水攬成稀泥、
然後下栽子、掘取時、連土封用草要或麻繩纏束、則
不致碎破、土封其子、至秋而熟、初收時、小兒不宜食、

食則昏霍惟炮煮作裸食爲美以漬油甚良顆如綠李積而腐之惟取其核卽銀杏也

其木有雌雄之意雄者不結實雌者結實其實亦有雌雄雌者二稜雄者三稜須雌雄同種其樹相望乃結實或雌樹臨水照影或鑿一孔納雄木一塊泥之亦結

採摘熟時以竹箋籠樹木

擊箋則銀杏自落

枇杷上林賦曰盧橘
枇杷易種葉微似栗冬夏不凋
冬花春實夏熟大者如雞子小者如龍眼白者爲上黃者次之無核者名
焦子出廣州李時珍曰枇杷非盧橘也

便民圖纂曰以核種之卽出待春移栽三月宜接

橘

附柑柚佛手
相金橘金豆

禹貢曰厥包橘柚錫貢注云大曰柚

小曰橘然自

是兩種橘有數種有綠橘有紅橘有蜜橘有金橘而

洞庭橘爲勝今充土貢又有黃橘扁小多香霧爲

上品

芳塲橘

狀大而扁外緣心紅巨瓣多液春熟

甚美

色橘

外薄內盈隔皮可數

綿橘

微小極軟

美可愛不多結

凍橘

八月花開冬結春采

橘實

大皮光心虛可穿

又有沙橘

早黃橘

宋心

橘

荔枝橘

乳橘

油橘

橘之下品

生南山川

谷及江浙

荆襄皆有之木高可丈許刺出於莖間夏

初生白花至冬

實黃踰淮則化爲枳

閩中柑橘以

漳州爲最

福州次之樹多接成惟種成者氣味尤勝

便民圖纂曰正月間取核撒地上冬月搭棚春和撤

去待長二三尺許二月移栽澆忌猪糞旣生橘摘後

又澆有重則鑿開畦處以鐵線鉤取其孔。則虫自死。
取虫訖。以硫黃
和土塞其竅。

農桑通訣曰。種植之法。種子及裁皆可以柳樹截接。或掇栽尤易成。宜於肥地種之。冬收實後。須以糞糞。培壅。則明年花實俱茂。乾旱時。以米泔灌漑。則實不損落。

立臺先生曰。此樹極畏寒。宜于西北種竹。以蔽寒風。又須常年搭棚。以護霜雪。霜降搭棚。穀雨卸却。樹未不可搭棚。可用蘋糠槐根。柴草裹其幹。或用蘆席寬

卷之二十一
裹根幹碧糠實之

須記南枝掘深坑。糞河泥實底。方下樹下鬆土。滿半坑築實。又下糞河泥。方下土。平坑。又下糞河泥。又加築實。則旺。凡樹耐肥者。皆用此法。

以死鼠浸坑中浮起。取埋根中。極肥。

種樹書曰。南方柑橘雖多。然亦畏霜。不甚收。惟洞庭霜雖多。無所損。橘最佳。歲收不耗。正謂此焉。燻死鼠。浸溺缸內。候鼠浮。取埋橘樹根下。次年必盛。涅槃經云。如橘得鼠。其果子多。

橘見尾

立扈先生曰。冬寒無損。正因種者多且培植有方耳。
惟閩廣地。煖卽無損耗。而實甚佳。勝浙者十倍。
橘柚橙柑等。須於臘月。根邊寬作盤。連糞三次。不
著根。遇春旱。以水澆之。雨則不必。花實並茂。橘之種
不一。惟扁橘蜜罐甜瓶爲佳。湘橘耐久。

最忌猪糞。以茅灰及羊糞壅之。多生實。

農桑輯要曰。西川唐鄧多有栽種成就。懷州亦有舊
日橘樹。北地不見此種。若於附近面訪學栽植。甚得

濟用。
畏寒多死

述異記曰。越多橘柚園。越人歲出橘稅。

收藏

十月後將金橘安錫器內。或芝麻雜之。經久不壞。藏菜豆中尤妙。近米即爛。

蘇軾

又法鋪乾松毛藏於不近酒處。多不壞。

蘇軾

農桑通訣曰。惟皮與核堪入藥。用皮之陳者最良。又

宜作食料。其肉味甘酸。食之多癆。不益人。以蜜煎之。

爲煎則佳。食貨志曰。蜀漢江陵千樹橘。其人嘗爭

矣等。夫橘南方之珍果。味則殊同。皮核愈疾。遼并盤

俎。遠備方物。而種植之獲利又倍焉。其利世益人。故

非可與他果同日語也。

柑，一名木奴，一名瑞金奴。

農桑通訣曰
甘者也
華葉無異于橘但

無刺爲異耳。生江漢唐鄧郡而泥山者名乳柑。地不
褊一里所其柑大倍常皮薄味珍脈不粘辦食不留
滓。一顆之核纔一二間有全無者然又有生柑有鄂
柑。有海紅柑。有衢柑雖品不同而溫旨之柑最良歲
充土貢焉江浙之間種之甚廣利亦殊博。又有山
柑。洞庭柑出洞庭皮細味美熟最早。甜柑每顆
八瓣未霜先黃。饅頭柑。生枝柑。平蒂柑大如
升。出成都。朱柑。大柑。黃柑。白柑。平蒂柑大如
江南嶺南爲盛蜀次之實似橘而圓大。
未經霜猶酸霜後始熟柑樹猶畏冰雪。

栽種與橘同

種樹書曰：柑樹爲虫所食取蟻窠於其上則重員去。
柑之大者擎破氣如霜霧。

李衡於武陵龍陽洲上種柑千樹謂其子曰吾州里有千頭木奴不責汝衣食歲上一疋絹亦足用矣及相成歲輸絹數千疋故史游急就篇註云木奴千無凶年蓋言可以市易穀帛也

柚爾雅曰柚條又曰櫟根郭璞曰柚屬也似橙而實大於橘橘皮薄味辛苦柚皮厚而肥甘其肉有甘酸酸者名胡柑一名條一名櫟一名壺柑一名臭橙廣雅謂之鑄實有大小二種小者如柑如橙俗呼爲蜜橘大者如升姬瓜俗呼爲朱欒有圍及尺餘者俗呼香欒閩中嶺南江南皆有之南人種其核云長成以接柑橘甚良呂氏春秋曰果之美者有雲夢之柚佛手柑木似朱欒而葉尖長枝間有刺植之近水乃生其實如人手有指有枝足余者皮數而光

澤味不甚佳，而清香襲人，置衣笥中，雖形乾而香不
歇。可糖煎蜜煎作果，甚佳。搗蒜，其薙香更充溢。浸
汁洗葛，葛綺絕勝。

酸稼

金橘

名金柑

一名夏橘。吳越江浙川廣間出。營道

者爲冠。五月開白花。秋冬黃熟。大者徑寸。小者如指頭。糖造蜜煎皆佳。廣人連枝藏之入貽醋。尤香美。

便民圖纂曰：金橘三月將枳棘接之，至八月移栽肥地，灌以糞水爲佳。

金豆

一名山金柑

一名山金橘。木高尺許。實如櫻桃。

可蜜

生青熟黃。形圓而光溜。皮甜可食。味清而香美。

漬

橙，埤雅曰：橙柚屬可登而成，故字從登。

一名棖，一名鵝

殼葉有兩刻缺者是也似橘樹而有刺葉大而形圓皮甚香厚而皺其瓢味酸唐鄧間多有之江南尤盛北地亦無此種過淮則化爲枳

種植與橘同

其皮香氣馥郁可以薰衣可以芼鮮可以和俎醢可以爲醬齋可以蜜煎可以糖製爲橙丁可以蜜製爲橙膏嗅之則香食之則美誠佳果也

其瓢洗去酸汁細切和蜜鹽煎成食之亦佳

桑甚栽種別見蠶桑部爾雅曰桑辨有甚梔

農桑通訣曰嘗攷之史傳三國魏武祖軍乏食乃得

乾甚以濟飢魏志武祖軍無糧新鄭長楊沛進乾甚後遷沛爲鄴令後漢王莽時天下大荒有蔡順採甚赤黑別盛之赤眉賊見而問之順曰黑者奉母赤者自食蓋桑甚乾溼皆可食可以救儉昔聞之故老云前金之末飢歉民多餓莩至夏初青黃未接其桑甚已熟民皆食甚獲活者不可勝計凡植桑多者甚黑時悉宜落箔上晒乾平時可當果食歉歲可禦飢餓雖世珍異果實未可比之適用之要故錄之

玄扈先生曰桑生甚者葉小而薄故蠶桑之家不得

有甚。

木瓜爾雅曰楙木瓜

郭璞注曰實如小瓜酢可食一名鐵脚梨山陰蘭亭尤多西京

亦有之而宣城者爲佳

李時珍曰其葉光而厚其

實如小瓜而有鼻津潤味不木者爲木瓜圓小於木瓜味木而酢濃者爲木桃似木瓜而無鼻大於木桃味濃者爲木李亦曰木梨卽楨楂及和圓子也鼻乃

花脫處非

臍蒂也

農桑通訣曰木瓜種子及栽皆得壓枝亦生栽種與桃李同法秋社前後移栽至次年率多結實勝春栽者

宣城人種蔞最謹始實則簇紙花薄其上夜露日曝

漸而變紅花又如生本州以充土貢故有天下宣城
花木瓜之稱

廣志曰木瓜子可藏枝可爲數號一尺百二十節
詩疏義曰欲啖者截著熟灰中令萎蔫淨洗以苦酒
頭汁蜜之可案酒食蜜封藏百日乃食之甚美凡腰
腎脚膝者服食不可闕以蜜漬食亦堪益人蜜漬之
法先切皮煮令熟著水中拔去酸味却以蜜熬成煎藏之又宜去子爛蒸搗作泥入
蜜與薑作煎飲用冬月尤美夫木瓜得木之正故入
筋試以鉛霜塗之則失醋味受金之制也五行相剋

之義於此蓋亦可驗此果既愈疾又宜飲啖兼用
有益誠可貴焉陶弘景曰木瓜最療轉筋如轉筋時但呼其名及書土作木瓜字皆愈此理亦不可解俗人挂木瓜枝云利筋脈也

楂子爾雅云似梨而酢澁埋雅曰木桃

陶隱居本草注云木瓜利

筋脛又有楨楂大而黃可浸酒去痰楂子澁斷痺禮記曰楂梨曰攢之鄭公不識楂乃云是梨之不臧者雷公炮炙論和圓子卽此也李時珍曰楂子乃木瓜之酢澁者小於木瓜色微黃帶核皆粗核中之子小

圓也

淮南子曰樹粗梨橘食之則美嗅之則香莊子曰楂梨橘柚皆可於口者蓋古人以楂列於名果今人罕

食之耳。西川唐鄧多種此，亦足濟用。然櫟味比之梨與木瓜雖爲稍劣，而以之入蜜作湯煎，則香美過之，亦可珍也。

楨櫧，詩經曰：木李。埤雅曰：木梨。

鄭樵通志曰：蠻櫟，拾遺曰：癩櫟。

李時珍

曰：楨櫧乃木瓜之大而黃色無重蒂者也。

可浸酒去痰，置衣箱中，殺蠹蟲。

檻檸，李時珍曰：即楨櫧之生於北土者。

蘇頌曰：今

多毛昧，尤甘其氣芬。

馥置衣笥中，亦香。

寇宗奭曰：食之須淨去浮毛，不爾，損人肺。其果最多。

卷之三十一
生蟲少有不蛀者。

山楂爾雅曰：杌子。繫梅。又名赤瓜子。鼠楂。猴楂。茅楂。於田原茅林中。猴鼠喜食之。故有諸名也。

九月熟。取去皮核。搗和糖蜜。作為楂糕。以充果物。亦可

入藥。令人少睡。有力悅志。

甘蔗說文曰：諸蔗也。

或爲芋蔗。或子蔗。或邯鄲。或甘蔗。或都蔗。所在不同。漢書離

騷。俱作柘。有數種。曰杜蔗。卽竹蔗。緣嫩薄。皮味極醇厚。專用作霜。曰白蔗。一名荻蔗。一名劣蔗。一名蠟蔗。可作糖。江東爲勝。今江浙閩廣蜀川湖南所生。大者圍數寸。高丈許。又扶風蔗一丈三節。見日則消遇

風則折。交趾蔗長丈餘。取汁爆之。數日成餚。入口即消。彼人謂之石蜜。叢生莖似竹。內實直理。有節無枝。

長者六七尺短者三四尺八九月收穫可留至來年春夏玄扈先生曰甘蔗糖蔗是二種

農桑輯要曰種法用肥壯糞地每歲春間耕轉四遍耕多更好擺去柴草使地淨熟蓋下上頭宜三月內下種迤南暄熱二月內亦得每栽子二個截長五寸許有節者中須帶二三節發芽於節上畦寬一尺下種處微壅土高兩邊低下相離五寸臥栽一根覆土厚三寸栽畢用水澆澆止令溼潤根脈無致渰沒栽封旱則二三日澆一遍如雨水調勻每二十日澆一遍其苗高三尺餘頻用水廣澆之荒則鋤之無不開

花結子直至九月霜後品嚐稽稈酸甜者成熟味苦
若未成熟將成熟者附根刈倒依法卽便煎熬外將
所留栽条稽稈斬去虛稍深掘窖坑窖底用草襯藉
稽稈豎立收藏於上用板蓋土覆之毋令透風及
凍損直至來春依時出窖截栽如前法大抵栽種者
多用上半截儘堪作種其下截肥好者留熬沙糖若
用肥好者作種尤佳

稈去稍葉截長二寸碓搗碎用密筐或布袋盛頓壓
煎熬法若刈倒放十許日卽不中煎熬將初刈倒稽

擣取汁卽用銅鍋內斟酌多寡以文武火煎熬其鍋隔牆安置牆外燒火無令煙火近鍋專令一人看視熬至稠粘併黑棗合色用瓦盆一隻底上鑽箸頭大竅眼一個盆下用礪承接將熬成汁用瓢豁於盆內極好者澄於盆流於礪內者止可調湯水飲用將好者止就用有竅眼盆盛頓或倒在瓦礪內亦可以物覆蓋之食則從便慎勿置於熱炕上恐熱開花大抵煎熬者止取下截肥好者有力糖多若連上截用之

亦得

玄扈先生曰
熬糖法未盡于此

家法政曰、三月可種甘蔗、

雩都縣土壤肥沃、偏宜甘蔗、味及菜色、餘縣所無、一
節數寸長供獻御、

農政全書卷之三十

農政全書卷之三十一

上海徐光啓原本

上海太原氏重刊

明 東陽張國維
穀城方岳貢原刻

蠶桑

總論

易曰、神農氏沒、黃帝堯舜氏作、通其變、使民不倦、垂衣裳而天下治、蓋取諸乾坤。乾坤者、帝已上衣鳥獸之皮。其後人多獸少事或窮乏故以絲麻布帛而製衣裳使民宜也。○玄扈先生曰、可以通于北虞。

禮記月令曰、季春無伐桑柘。鄭玄注曰、愛養蠶食也。

周禮曰馬質禁原蠶者注日質平也主買馬平其大小之價直者原再也天文辰爲馬蠶書蠶爲龍精月直大火則浴其蠶種是蠶與馬同氣物莫能兩大故禁再蠶者爲傷馬與

尚書大傳曰天子諸侯必有公桑蠶室就川而爲之大昕之朝夫人浴種于川

春秋考異郵曰陽物大惡水故蠶食而不飲陽立於三春故蠶三變而後消死於三七二十一日故二十日而繭

淮南子曰原蠶而一歲再登非不利也然王者法禁之爲其殘桑也

俞益期牋曰日南蠶入熟繭軟而薄椹採少多楊泉物理論曰使人之養民如蠶母之養蠶其用豈徒絲而已哉

五行書曰欲知蠶善惡常以三月三日天陰如無日

不見雨蠶大善

又法埋馬牙齒於柵下令宜蠶

王禎蠶繅篇曰淮南王蠶經云黃帝元妃西陵氏始蠶蓋黃帝制作衣裳因此始也其後禹平水土禹貢

所謂桑土既蠶其利漸廣禮月令曰季春之月具曲植籩筐后妃齋戒親東鄉躬桑禁婦女毋觀容省婦使以勸蠶事婦使謂縫線紐串之事蠶事既登分繭稱絲蠶事既登分繭稱絲效功以供郊廟之服無有敢惰及考之歷代皇后與諸侯夫人親蠶之事昭然可見況庶人之婦可不務乎

王禎蘭館序曰蘭館皇后親蠶之所古公桑蠶室也周制天子諸侯必有公桑蠶室近川而爲之築宮仞有三尺棘牆而外閉之后妃齋戒享先蠶而躬桑以

勸蠶事。后妃親蠶儀目。皇后躬桑始擇一條執筐受
桑捋三條。女尚書跪曰。可止執筐者以桑授蠶母。以
桑適金室。前漢文帝紀。詔皇后親桑以奉祀服。景帝
詔后親桑爲天下先。元帝王皇后爲太后幸繡館率
皇后及列夫人桑。明帝時。皇后諸侯夫人蠶。魏文帝
黃初中。皇后蠶于北郊。遵周典也。晉武帝太康中。立
蠶宮。皇后躬桑。依漢魏故事。宋孝武立蠶觀。后親桑。
循晉禮也。北齊置蠶宮。皇后躬桑于所。後周制皇后
至蠶所桑。隋制皇后親桑於位。唐太宗貞觀元年。皇

后親蠶顯慶元年皇后武氏先天二年皇后王氏乾
元二年皇后張氏並見親蠶禮玄宗開元中命宮中
食蠶親自臨視宋開寶通禮郊祀錄並有后親蠶祝
辭此歷代后妃親蠶之事采之史編昭然可見茲特
冠於篇首庶有國家者按圖考譜知繭館之不徒名
也賦云惟蠶有功於世歸美廣物產之貨貲作生人
之衣被中春之月天子詔后以躬桑大昕之朝內宰
告期而命祀於是詣靈壇降寶殿翠障夾乎道周鳳
輦翔于畿甸順春氣於東方朝先蠶於北面具夫青

縹之服

皇后蠶服青
上縹下深衣

佈以芳馨之薦九官領動謫然

臨祭以陪班三獻禮成沛矣迎祥於回眷當其疊承

寵命適對韶光擇世婦於吉卜受鞠衣於明堂

月令
三月

薦鞠衣祭先帝于明堂

所以崇開禁館始入公桑援條有三聽

女尚書之勸止執筐不再受宮夫人之是將體之以

坤儀之柔順視之以母道之慈良破蟻以來庶養至

子于薄獻繭之後諒化被於多方是以命繅治之成

絲就趨工而俟織立黃朱綠染各精明黼黻文章

古者

獻繭使繅遂朱綠之立黃之以爲黼黻文章參同晶色不載

玉禎先蠶壇序曰先蠶猶先酒先飯祀其始造者壇

築土爲祭所也黃帝元妃西陵氏始蠶卽先蠶也

按黃

帝元妃西陵氏曰儻祖始勸蠶稼月大火而浴種夫
人副楫而躬桑乃獻繭稱絲織紝之功因之廣織以
供郊廟之服皇圖要覽云伏羲化繭西陵氏養蠶淮
南王蠶經云西陵氏勸蠶稼親蠶始此下禮月令季春是月也后妃齋戒享先蠶而躬桑以勸蠶事

周禮天官內宰仲春詔后帥外內命婦始祭於北郊

蠶于北郊漢禮儀志皇后祀先蠶禮以中牢魏黃初
以純陰也漢禮儀志皇后祀先蠶禮以中牢魏黃初
中置壇於北郊依周典也晉置先蠶壇高一丈方二
丈四出陛陛廣五尺皇后至西郊親祭躬桑北齊先

蠶壇五尺方二丈四高陞陛各五尺外兆四十步而開一門皇后升壇祭畢而桑後周皇后至先蠶壇親饗隋制宮北三里壇高四尺皇后以太牢制幣而祭唐置壇在長安宮北苑中高四尺周圍三十步皇后並有事於先蠶其儀備開元禮宋用北齊之制築壇如中祠禮通禮義纂后親享先蠶貴妃亞獻昭儀終獻夫蠶祭有壇稽之歷代雖儀制少異然皆遞相沿襲餼羊不絕知禮之不可獨廢有天下國家者尙鑒茲哉有圖不載

王禎蠶神序曰、蠶神天駟也、天文辰爲龍、蠶辰生、又與馬同氣、謂天駟卽蠶神也、淮南王蠶經云、黃帝元妃西陵氏始蠶、至漢祀宛窳婦人、寓氏公主、蜀有蠶女馬頭娘、此歷代所祭不同、然天駟爲蠶精、元妃西陵氏爲先蠶、實爲要典、若夫漢祀宛窳婦人、寓氏公主、蜀有蠶女馬頭娘、又有謂三娘爲蠶母者、此皆後世之溢典也、然古今所傳立像而祭、不可遺闕、故併附之、稽之古制、后妃祭先妣蠶、壇墳牲幣如中祠、此后妃親蠶祭神禮也、蠶書曰、臥種之日、詰旦升香割雞

設醴以禱先蠶此庶人之祭也自天子后妃至于庶人之婦事神之禮雖有不同而敬奉之心一是諒爲知所本矣乃作祈報之辭曰祈惟蠶之神伊駟有星惟蠶之神伊昔著名氣鍾於此孕卵而生既桑而育既眠而興神之福汝有消皆盈尙冀終惠用彰厥靈簇老獻瑞繭益效成敬獲吉卜願契心盟神宜享之

祈祀惟馨報龍精一氣功被多方繼當是歲神降于桑載生載育來福來祥錫我繭絲製此衣裳室家之慶閭里之光敬帥長幼詰旦升香設設于俎奠醴於

觴工祝致告神德彌彰。有圖不載。

郭子章蠶論曰。木各有所宜土。惟桑亡不宜桑亡不宜。故蠶無不可事。幽風之詩曰。女執懿筐。遵彼微行。爰求柔桑。則幽可蠶。將仲子之詩曰。無折我樹桑。則鄭可蠶。車鄰之詩曰。阪有桑。隰有楊。則秦可蠶。氓之詩曰。桑之未落。其葉沃若。桑之落矣。其黃而陨。桑中之詩曰。期我乎桑。中則衛可蠶。皇矣之詩曰。攘之剔之。其糜其柘。桑柔之詩曰。菀彼桑柔。其下侯甸。則周可蠶。禹貢兗州桑土既蠶。厥筐緘文。則魯可蠶。青州

厥筐廩絲管子亦曰五粟之土其糜其桑則齊可蠶
荊州厥筐支縲則楚可蠶孟子告梁惠王曰五畝之
宅樹之以桑十畝之詩曰十畝之間桑者閒閒則梁
可蠶蠶叢都蜀衣青衣教民蠶桑則蜀可蠶猶之農
夫之於五穀非龍堆狐塞極寒之區猶可耕且獲也
今天下蠶事疎濶矣東南之機三吳越閩最夥取給
於湖繭西北之機潞最工取給於閬繭予道湖閬女
桑嫁桑參差牆下未嘗不羨二郡女紅之厯而病四
遠之情也夫一女不績天下必有受其寒者而況乎

半天下女不績也、豈第五十之老、帛無所出、不績則逸、逸則淫、淫則男子爲所蠹鈍而風俗日以頽壞、今天下門內之德、不甚質貞、每歲奏牘、姦淫十五母亦蠶教不興、使然與、公父文伯母曰、王后親織立紈、公侯夫人加之以絃綻、卿之內子爲大帶、命婦成祭服、列士之妻加之以朝服、自庶士以下、皆衣其夫、社而賦事、烝而獻功、男女效績、愆則有辟、古之制也、彼大夫之家而主猶績、奈何令天下女習於逸、以趨於淫乎、國家蠶桑載在令甲、凡民田五畝至十畝者栽桑

麻木綿各半畝十畝以上者倍之。田多者以是爲差。
特廢不舉耳。故月令躬蠶之禮魯毋績愆之辟與令
甲桑麻之數此三者不可謂迂而不講也。

養蠶法

永嘉記曰：永嘉有八輩蠶。蛻珍蠶、三月柘蠶、四月蛻蠶、
初續四月愛珍、續五月愛蠶、六月未續寒珍、七月末續四出蠶、九月初續
寒蠶、十月續。凡蠶再熟者前輩皆謂之珍。養珍者少養
之愛蠶者故蛻蠶種也。蛻珍三月既續出蛾取卵。七
八日便剖卵。蠶生多養之。是爲蛻蠶。欲作愛者取蛻

珍之卵藏內器中隨器大小亦可拾紙蓋覆器口安
砌泉冷水中使冷氣折其出勢得三七日然後剖生
養之謂爲愛珍亦呼愛子績成繭出蟻卵卵七日又
剖成蠶多養之此則愛蠶也藏卵時勿令見人應用
二七赤豆安器底臘月桑柴二七枝以麻卵紙當令
水高下與種相齊若外水高則卵死不復出若外水
下卵則冷氣少不能折其出勢不能折其出勢則不
得三七日不得三七日雖出不成也不成者謂徒績
成繭出蟻生卵七日不復剖生至明年方生耳欲得

陰樹下亦有泥器三七日亦有成者。

雜五行書曰、二月上壬取土泥屋四角宜蠶吉。

案今世有

三臥一生蠶。四臥再生蠶。自頭蠶。頸石蠶。楚蠶。黑蠶。
有一生再生之異。次兒蠶。秋母蠶。秋中蠶。老秋兒蠶。
秋末老獣兒蠶。錦兒蠶。同繭蠶。或二蠶。三蠶。共爲一
繭。凡三臥四臥皆有絲綿之別。凡蠶從小與大者。乃
至大入簇。得銅刑魯二桑。小食則。

桑中與魯桑刑有裂腹之患也。

齊民要術曰、收取種繭必取居簇中者。

近上則絲薄
下則子不

生。屋欲四面開窗紙糊厚爲籬。屋內四角著火。

火若在二

處。則冷不均。初生以毛掃。

用荻掃則傷蠶。玄扈先生曰毛
掃亦傷蠶。用桑葉蓋覆。卽自上
熱則焦燥。

調火令冷熱得所。

冷則長遲。此至在眠常須三箇。

中箔上安蠶。上下空置。

下箔障土氣。上箔防塵埃。小時採桑著懷。

中令煖然後切之。

蠶小不用見露氣。得人體則衆惡除。每飼蠶卷窗幃。

飼訖還下。

蠶見明則食。食多則生長。老時值雨者則壞繭。宜於屋

裏簇之。薄布薪於箔上。散蠶訖。又薄以薪覆之一。槌

得安十箔。

又法以大蓬蒿爲薪。散蠶令遍懸之於棟梁椽柱。或

垂繩鈎戈鴉爪龍牙。上下數重。所在皆得懸訖。薪下

微生炭火以煖之。得煖則作速。傷寒則作遲。數入候

看熱則去火。蒿蓬生涼無鬱泡之憂。死蠶旋墜無污。

繭之忠沙糞不住無瘢痕之此鬱泡則難練繭近
絲散瘢痕則無用蓬蒿簇亦良立居先生曰勝今簇
故其外簇者晚遇天寒則全不作繭用火易練而絲

明日曝死者雖白而漕脆廉練長衣著幾將倍矣甚
者虛實失歲功堅脆懸絕資生要理安可不知哉

崔寔曰三月清明節令蠶委治蠶室除隙穴具梃持

箔籠

王禎曰育蠶之法始於擇種收繭取簇之中向陽明
淨厚實者蛾出第一日者名苗蛾末後出者名末蛾

皆不可用次日以後出者取之鋪連於糙箔雄雌相
配至暮拋去雄蛾將母蛾於連上勻布所生子環堆
者皆不用黃省曾曰放子必覆而暗之見光則其子遊散連必柔皮紙出於南潯

數足更就連上令覆養三五日

黃省曾曰覆三五日則氣乃固掛時

須蠶子向外恐有風磨損其子

黃省曾曰貫連須用桑皮忌苧麻之線懸

于涼處忌煙

薰日炙之所冬節及臘八日浴時無令水極凍浸二

日取出復掛年節後瓮內豎連須使玲瓏每十數日

日高時一出每陰雨止卽便曬暴

黃省曾曰臘月十二浸之于鹽滷至

二十四而出則利於繅絲或曰臘八日以桑柴灰或草灰林汁以蠶連浸焉一日而出蠶以舊水浸至

乾或懸桑木之上以晴雨晝夜宿而取之則耐養二月十二浴清明之曉則綿紙裹之藏於厨內俟桑芽如茶匙大則綿絮蓼之暮也覆以所服之緩衣晨也覆以所蓋之緩披既出也溫以火未出也禁以火焙其浸也用桑條之灰溼其連而後摻之捐而浸之於泔中卽鹽化之水有分兩恐其浮也以磁器壓之其至二十四出也用河水涤去其灰或置之扁中而沃而後涼之掛之則至春生否者陰不至於費葉至二月十三浴以菜花野菜花韭菜桃花白豆花採之水中而浴之蟻之放子也一夜而生否則生蟻不齊蠶子變色要在遲速而已勿致損傷自變桑葉已生自辰巳間將瓮內取出舒卷提掇亦無度數但要第一日變三分第二日變七分却用紙密糊封了還瓮內收藏至第三日午時又出連舒卷須要變至十分。

其蠶屋火倉蠶箔並須預備。蠶屋宜高廣。窗戶虛糊。易辨眠起。仍上於行檣。各置照窗。每臨早暮。以助高明。下就附地。列置風竇。令可啓閉。以除溼鬱。若新泥溼壁。用熱火薰乾。窗上用淨白紙新糊。門窗各掛葦簾。藁薦下蟻之時。勿用雞翎等物。掃拂惟在詳款。稀勻。不至驚傷。稍疊生齊。取葉著懷中。令煖。用利刃切極細節。於器內。蓐紙上。勻薄。將連合於葉上。蟻聞葉香。自下。或過時。不下連。及緣上。連背者。並棄養蠶蟻。時先辟東間一間。四角挫壘空龕狀。如參星。以均火。

候謂屋小則易收火氣也。停眠前後則徹去。擇日安
撻。每撻上下閑鋪三箔。上承塵埃。下隔溼潤。鋪砌碎
稈草於上下箔。以備分擣。用細切搗軟稈草。勻鋪爲
蓐。又採淨紙粘成一片。鋪蓐上。安蠶。初生色黑。漸漸
加食。三月後漸變白。則向食。宜少加厚。變青。則正食。
宜益加厚。復變白。則慢食。宜少減。變黃。則短食。宜愈
減。純黃。則停食。謂之正眠。眠起。自黃而白。自白而青。
轉青復白。白白而黃。又一眠也。每眠。例如此。候之。以
加減食。凡葉不可帶雨露。及風日所乾。或浥臭者。食

之令生諸病常收三日葉以備霖雨則蠶常不食溼葉且不失飢採葉歸必疎爽於室中待熱氣退乃與食蠶時晝夜之間大概亦分四時朝暮類春秋正晝如夏夜深如冬寒暄不一雖有熟火各合斟量多少不宜一例自初生至兩眠正要溫煖蠶母須著單衣無爲體測自覺身寒則蠶必寒便添熟火自身覺熱蠶未必熟約葷去火一眼之後但天氣晴明已午之間時暫揭起窗擗簾薦以通風自南風則捲北窗北風則捲南窗放入倒溜風氣則不傷蠶大眠起後銅

罷三頓剪開窗紙透風日必不頻驚生病大眼之後捲簾薦去窗紙天氣炎熱門口置瓮旋添新水以生涼氣如遇風雨夜涼却當將簾薦放下其間自小至老蠶滋長則分之沙燠厚則擡之失分則稠疊失擡則蒸溼蠶柔軟之物不禁揉觸小而分擡人知愛護大而分擡或懶倦而不知顧惜久堆亂積遠擲高拋損傷生疾多由於此蠶自大眠後十五六頓卽老得繫多少全在此數北蠶多是三眼南蠶俱是四眼日見有者者量分數減飼候十蠶九老方可入簇值雨

則壞繭。南方例皆屋簇。北方例皆外簇。然南簇在屋。以其蠶少易辦。多則不任。北方蠶多露簇。率多損壓壅閼。南北簇法俱未得中。今有善蠶者一說。南北之間蠶少。疎開窗戶。屋簇之則可。蠶多。選于院內。構長脊草廈。內制蠶簇。週以木架。平鋪蒿梢。布蠶於上。用席泊圍護。自無簇病。實良策也。

蠶簇見
蜀譜

又有夏蠶秋

蠶。夏蠶自蟻至老俱宜涼。惟忌蚊蠅。重秋蠶初宜涼。漸漸宜暖。亦因天時漸涼故也。簇與繅絲法同春蠶。南方夏蠶。不中繅絲。惟堪線纏而已。凡繭宜併手忙。

擇涼處薄攤蟻自逕出免使抽繅相逼恐有不及則
有瓮泡籠蒸之法士農必用云繅絲之訣惟在細圓
勻緊使無褊慢節核絕惡不匀也繅絲有熱釜冷盆
之異然皆必有繅車絲軒然後可用熱釜要大置於
籠上甌須接口添水至甌中八分滿甌中用一板欄
斷可容二人對繅也水須當熱旋旋下繭多下則繅
不及鬻損此可繅龜絲單繳者雙繳者亦可但不如
冷盆所繅潔淨光瑩也冷盆要大先泥其外用時添
水八九分水宜溫煖長匀無令乍寒乍熱可繅全繳

細絲中等繭可繅雙綈比熱金者有精神而又堅韌也南北蠶繅之事摘其精妙筆之於書以爲必效之法業蠶者取其要訣歲歲必得庶上以廣府庫之貨資下以備生民之纊帛開利之源莫此爲大

元孟祺農桑輯要論蠶性曰蠶之性在速則宜極寒成蟻則宜極緩停眠起宜溫大眠後宜涼臨老宜漸緩入簇則宜極緩黃省曾曰蠶之性喜靜而惡喧故宜靜室喜緩而惡溼故宜版室室靜可以避人聲之喧鬧室密可以避南風之襲吹室版可以避地氣之蒸鬱

務本新書曰養蠶之法繭種爲先今時摘繭一槧併

堆箔上。或因繅絲不及。有蛾出者。便就出種。卷壓熏蒸。因熱而生。少無完好。其母病則子病。誠由此也。今後繭種開簇時。須擇近土向陽。或在苦草上者。此乃強良好繭。農桑要旨曰。繭必雌雄相半。簇中在上者多雄。下者多雌。○陳志弘云。雄繭尖細緊小。雌者圓慢厚大。另摘出於通風涼房內淨箔上。二單排。目數既足。其蛾自生。免熏捲鑽延之苦。此誠胎教之最先。若有拳翅禿眉焦腳焦翅焦尾熏黃赤肚無毛黑紋。黑身黑頭。先出末後生者。揀出不用。止留完全肥好者。勻稀布於連上。擇高明涼處置箔鋪連箔下。

地須灑掃潔淨。蠶連厚紙爲上。薄紙不禁浸浴。

野語云連

用小灰候。蟻生足移蟻下連。屋內一角空處豎立柴
綫更妙。候蟻生足移蟻下連。屋內一角空處豎立柴

草散蟻於上。至十八日後西南淨地掘坑貯蟻上用
柴草搭合以土封之庶免禽虫傷食蓋有功於人理
當如此。

農桑旨要云將蟻作三坑埋種田地內能使地中數
年不生刺芥。

士農必用曰蠶事之本惟在謹於謀始使不爲後日
之患蠶眠起不齊由于變生之不一變生之不一山

于收種之不得其法故曰惟在謹于謀始

又曰取簇中腰東南明淨厚實繭蟻第一日出者名
苗蟻不可用屋中置柴草上放不凡蟻次日以後出者可用每
日所出爲一等輩各於連上寫記後來下蟻時各爲
一等輩二日相次爲一輩猶可次三日者則不可爲
將來成蠶眠起不能齊極爲患害另作一輩養則可
未後出者名末蟻亦不可用鋪連於撻箔上雄雌相
配當日可提掇連三五次去其屎也至未時後款摘去雄

蟻放在苗一處

務本新書曰深秋桑葉未黃多廣收拾曝乾搗碎於無煙火處收頓。春蠶眠後用。

土農必用曰桑欲落時捋葉未欲落捋傷來年桑眼已落者短津味泥封收固至臘月內搗磨成麵臘月內製者能消蠶熱病。瓮器內可多收飼蠶餘剩做牛料牛食甚美。

務本新書曰臘八日新水浸菉豆每箇約半升薄攤曬乾又淨淘白米每箇約半升控乾以上二物背陰處收頓以備大眠起用拌葉飼蠶。

務本新書曰冬月宜收牛糞堆聚春月旋拾恐春暖

踏成墼子曬乾苦起燒時香氣宜蠶

土農必用曰臘月曝牛糞春礮搥碎一半收起一半

用水拌勻杵築爲墼

務本新書曰臘月刈茅草作蠶蓐則宜蠶

土農必用曰收黃蒿豆稍桑梢其餘梢乾勁不臭氣者亦可

土農必用日修治苦薦穀草黃野草皆可但必令緊密一頭截

齊一頭留梢者爲苦兩頭齊截者爲薦也野語云苦用茅草上簇輕快又不蒸熱

土農必用日蠶具及繅絲器皿務要寬廣搥箇橡切刀鎌斧轆

金等熟絲則金宜大冷絲則金宜小盆欲大其竈臨時治之春磨米麵蠶忙時不及也

黃省曾曰。切桑之刀宜澗而利。其方筐之制。縱八尺。廣六尺。其圓筐之造。在盤門張公橋。有火箱。蠶自蟻而三眠用之。

齊民要術曰。修屋欲四面開窗。紙糊爲籬。崔寔曰二月清明治蠶屋塗隙穴收拾火氣。蠶小時。將牛糞整子燒令無煙。移入龕內頓放。如無壁龕等。止於搥箔四向。約量頓火近兩則止。若寒熱不均。後必眠起不齊。又今時蠶屋內素無禦寒熟火。止是旋燒柴薪。煙氣籠熏大甚。蠶蘊毒多成黑焉。

土農必用曰治火倉屋當中掘一坑闊狹深淺量屋

大小

謂如一三間四椽屋四方一面可闊四尺隨屋大小加減

坑周圍塹接壘

高二尺長粘泥泥了通計深四尺細碎乾牛糞坑底

上鋪攤一層厚三四指

臘月所收搥碎者

帶根節籠乾柴於

糞上鋪一層

五寸以上徑者凡榆槐等堅硬者皆可

柴上又鋪糞一層

於柴空隙處築得極實

幅不可虛虛則火焰起

傷屋又熟火不能長久

糞柴

相間椿坑滿上復用糞厚蓋了約蠶蛾生前七八日糞

上熾熟火黑黃煙五七日於蠶蛾生前一日少開門

出盡煙卽閉了

恐氣出

其柴糞陷下已成熟火

蠶小喜煙

不可用生火。又生火或驟或歇。不能均勻。此火既熟。絕無煙氣。一兩月不滅不動。便如無火。用柴枝剔撥。便煙氣熏騰也。上必壘高二尺者。欲使火氣上升。騰至室中。散布均勻。又防寅夜人行。誤陷入也。其屋乾透。其壁皆煖。黑婆等諸虫。盡熏了牛糞熏屋。大宜。

蠶也。

蠶喜牛糞。

糊窗。窗上故紙。却用淨白紙替換。外

捲草薦。旋扯故紙糊。

半喜蠶沙。

糊窗。每窗上嵌四大捲窗。宜

密。

士農必用曰。上下二箔。上皆鋪切碎稈草。中一箔用切碎搗軟稈草爲蓐。鋪案平勻。仍須四邊留箔。楂五寸。揉淨紙粘成一段。可以鋪蓐。大鋪於中箔蓐上。

揉紙極軟如綿。○要旨云。底箔須鋪三領蠶蟻。生後
每日。由高捲出一領。颶至。斜復布于生蠶蟻箔底。則

日久縣城出曬曝如前覆鋪藉使受自然陽和之氣停眠起食然後徹去

務本新書曰清明將到中所頓蠶連遷於避風溫室、
酌中處懸掛太高傷風
太下傷土穀雨日將連取出通見風日

那表爲裏。左捲者却右捲右捲者却左捲每日交換捲那捲罷依前收頓比及蠶生均避風日生發均齊要旨云清明後種初變紅和肥滿再變尖圓其中如春柳色再變蟻周盤其中如遠山色此必收之種也若頂平焦乾及蒼黃赤色便不可養此不收之種也

主農必用曰蠶子變色惟在遲速而已不致損傷自變齊爲准農譜云蠶欲三齊子齊蟻齊蠶齊是也其

法桑葉已生自辰巳間於風日中將瓮內連取出舒

卷提掇舒時速背向日曬至溫不可至熱

凡一舒一
捲時將元

捲向外者却捲向裏元向裏者却捲向外橫捲時將元
者豎捲豎者橫捲以至兩頭捲來中間相合舒捲無

度數但要第一日十分中變灰色者變至三分收了

次二日變至七分收了此二日收了後必須用紙密

糊封了如法還瓮內收藏至第三日於午時後出連

舒捲提掇

展連手提之凡半日數遍

須要變至十分

第三次必
須至午時

後出速者恐第一次先變者先生蛾也

蛾生在巳午時之前過午時便不生

桑蠶直說曰欲疾生者頻舒捲之須虛謾欲遲生

者少舒捲捲之須緊實。

土農必用曰生蟻惟在涼暖知時開指得法使之莫有先後也。生蟻不齊則其蠶眠起至老俱不能齊也

其蠶眠

變灰色已全

以兩連相合鋪於一淨箔上緊捲了兩頭繩束卓立於

無煙淨涼房內第三日晚取出展箔蟻不出爲上若

有先出者雞翎掃去不用

名行馬

蟻招則蠶不齊

每三連虛捲

爲一卷放在新煖蠶屋內

柵匣下隔箔上

候東方白將連於

院內一箔上單鋪

如有露於涼房中或棚下待半頓飯時移連入

蠶房就地一箔上單鋪少閒黑蟻齊生

並無一先和後者

蟻秤速記寫分兩

博聞錄曰。用地桑葉。細切如絲髮。摻淨紙上。却以蠶種。覆於上。其子聞香自下。切不得以鷺翎掃撥。

務本新書曰。農家下蟻。多用桃杖。番連敲打蟻下。後却掃聚。以紙包裹。秤見分兩。布在箔上。已後節節病生。多因此弊。今後比及蟻生。當勻鋪蓐草。蓐宜
搗軟。火內燒聚一二枚。先將蠶紙秤見分兩。次將細細摻

在蓐上。蟻要勻稀。速必頻移。生盡之後。再秤空速。便知蠶蟻分兩。依此生蠶。百無一損。今時謂如下蟻二

兩往往止布一席重疊密壓不無損傷今後下蟻三
兩決合勻布一箔若分兩多少驗此差分又慎莫貪多謂如已

力止合放蟻三兩因爲貪多便放四兩以致桑葉房
屋椽箔人力柴薪俱各不給因而兩失

士農必用日下蟻惟在詳款稀勻使不至驚傷而稠

疊是時蠶母沐浴淨衣入蠶屋蠶屋內焚香又將院內雞犬等畜逐向遠處恐驚新蟻也又蟻生

既齊取新葉用快利刀切極細須不蟻時旋切則葉

切下則查查上有津若用刀預

乾無津用篩子篩於中箔蓐紙上務要勻薄須用

能勻不勻則食偏篩用竹編篩子亦可林黍蕪亦可如小椀大篩底方眼可穿過一小指也將連

合於葉上。蟻自緣葉上。或多時不下連。及緣上連背。

翻過又不下者。並連棄了。此殘病蟻也。

一箔席上。不老可分三十箔。每蟻一錢。可老蠶一箔也。係長一丈。

濶二尺之箔。如箔小。可減蟻下。蟻多。則蠶稠。爲後患也。

養蠶過三十箔者。可更加下蟻。箔養蠶少者。用筐可也。蓐。如前法。

士農必用日加減涼煖。

蠶成蟻時。宜極煖。是時天氣尚寒。大眠後。宜涼。是時天氣

已暄。又風雨陰晴之不測。朝暮晝夜之不同。一或失宜。蠶病卽生。惟蠶屋得法。則可以應之。屋之制。周置捲窗。中伏熟火。謂如蠶欲煖而天氣寒。閉苦窗。撥火。

則外寒不入。和氣內生。若遇大寒。屢撥熟火。不能勝其寒。則外燒糞塹。絕煙。置屋中四隅。和氣自然熏蒸。寒退。則去餘火。蠶欲涼而天氣暄。閉火而捲苦窗。則火氣內息而涼氣外。人若遇大熱。盡捲苦窗。不能解其熱。則去其窗紙。上捲照窗。下開風眼。窗外。追下。

使其蠶自初及終。不知有寒熱之苦。病少。繭成。則生黃輒等疾。熱不可驟加。煖熱當漸漸益火。寒而驟熱。則生黃輒等疾。熱不可驟加。風涼當漸漸開窗。熱而禁口。不食。卽用鏹子盛無煙熟牛糞火。用板托。燉於搥箇下。往來擗去寒氣。蠶自食葉。

務本新書曰。蠶必晝夜銅。若頓數多者。蠶必疾老少者。遲老。二十五日老一箇。可得絲二十五兩。二十八日老。得絲三十兩。若月餘或四十五日老一箇。止得絲兩。銅蠶者。慎勿貪眠。以懶爲累。每銅蠶後再宜十餘兩。銅蠶葉要均匀。若值陰雨天寒。比及銅透箇看一遍。銅蠶葉要均匀。若值陰雨天寒。比及銅

蠶。先用乾桑柴。或去葉稈草一把點火。繞箇照過。幅邊箇看一遍。銅蠶葉要均匀。若值陰雨天寒。比及銅

出寒溼之氣然後銅之則蠶不生病一眠候十分眠纔可住食至十分起方可投食若八九分起便投葉銅之直到老決都不齊又多損失停眠至大眠蠶欲向眠時見黃光便住食擡解直候起齊慢銅葉宜薄摻厚則多傷慢食之病蓋因生蠶得食力須勤銅最忌露水溼葉并雨溼葉銅之則多生病

韓氏直說曰抽銅斷眠法蠶向眠時量黃白分數抽減所銅之葉漸次細切薄摻頻銅如十分中有一分
黃光者卽十分中減葉三分比尋常稍宜細切薄摻頓數亦宜稍頻如
十分中有一分黃光卽減五分此先次又細切薄參

減葉三分比尋常稍宜細切薄摻頓數亦宜稍頻如
十分中有一分黃光卽減五分此先次又細切薄參

其頓數亦宜加頻。如十分中有八分黃光，卽減去候八分。比先次切令極細，摻令極薄。其頓亦令極頻。候十分黃光不間陰晴。早夜急須擡過。預備箔蓆，可無失誤。擡過時住食起齊時投食。此爲抽飼斷眠之法。謂抽減蠶之葉，不致覆壓專飼未眠之蠶。使之速眠，不惟眠起得齊，且無葉罨燠熱之病。前人謂學取抽飼斷眠法。年年歲計得絲蠶，不可不知也。

務本新書曰：擡蠶要衆手疾擡。若箕內堆聚多時，蠶身有汗後必病損，漸漸隨擡減耗。縱有老者，簇內多作薄皮蠶沙，宜頻除。不除則久而發熱，熱氣熏蒸後。

多白殭每擡之後。箔上蠶宜稀布稠則強者得食弱者不得食必逃箔遊走。又風氣不通忽遇倉卒開門暗值賊風後多紅殭布蠶須要手輕不得從高摻下如或高摻其蠶身遞相擊撞因而蠶多不旺已後簇內懶老翁赤甥是也。

要旨云

蠶有白殭是小時陰氣蒸損天晴急用箋箕三四具轉

蠶中庭使日氣煦照。一箔則復布一箔得日氣則盡解矣。野語云蠶煥乾鬆者其蠶無病。蠶煥成片溼潤自積者蠶爲有病速宜擡解如正可擡却遇陰雨風冷則不敢擡用茅草細切如豆每一箔可用一斗或二斗。勻撒_蠶上上再摻葉移時蠶因食葉沿上其茅草能隔幾沙。天晴再擡如無茅草稈草次之。

士農必用。勿擡之便惟在頻款稀。可使不致先溼

損傷也

蠶滋多必須分之沙燠厚必須清之失分則不勝惆悵失擡則不勝蒸溼故宜頻蠶者柔

輒之物不禁觸弄小而分之猶能愛護大而擡之莫能顧惜也未免久堆亂積遠擲高拋生病損傷寔由

于此故宜安款而稀有也或有不齊頻銅以督其後者使之相及

而各取其齊也

蠶眠不齊病原于初今既然矣當從此以治之如于純黃之中雜見其退

白而向黃者是與純黃不相懸遠頻銅以督之則猶得相及銅頻則可速其眠故爾如已見純黃又多青自此與純黃既遠雖銅之之頻則亦莫及蓋蠶之變色爲變之小其眠則絕食退膚爲變之大也爲蛹爲蛾則變之尤大而至于化也凡至純黃則結嘴不食而眠如人之大病周身之氣血一爲變換一晝夜靜安不擾則眠爲得所今以青白者尚多銅而亂之動而躁之則眠而失其所矣比其青白者變黃而向眠則此已過眠而動起動起之初欲得少食亦如人之病起欲得少食以接氣血也以後者方眠勒其食而

不投以困以餓又必待後者動起而飼之多病少絲
端爲可惜故蠶經云眠起不齊絲減少良謂此也
務本新書曰初飼蟻法宜旋切細葉微篩切刀宜快
停匀不住頻飼一時辰約飼四頓一晝夜通飼四十九
頓或三十六頓懶者頗疑煩冗子曰新蟻止食桑葉
脂脈若頓數不多譬如寸乳嬰兒小時失乳後必羸
弱病生蟻初生須隔夜採東南枝肥葉瓮中另頓旋
取細切

士農必用曰飼蟻之法當宿澆共桑旋摘其葉宿澆
則多液旋擣則不乾利刃以
細切之疎篩以薄布之非利刃則無液非細切則蓋
我。非篩則不角。非角則漏食然葉過之微故不能久

故須旋加而飼也。

第一期飼也。第二期飼也。第三期飼也。

九頓第二日飼至三十頓。

葉微

第三日飼至二十餘

頓又稍加厚

宜極煖宜暗，大凡初蛾宜暗，眠宜暗，將眠及

眼起宜微明，向食宜明，後倣此

土農必用曰學黑法，第三日已午時間于別棧上安

三箔，如前初安柵法微帶燠薄揭蟻，款手擘如小棊子大布

於中箔可盈滿，不留植也可漸漸加葉飼，早晴可捲東窗

苦使受及當日背風窗。

自此後常日宜如此天陰早暮且不宜至夜則閉，凡迎風

窗苦及西照窗苦，不可開，蠶畏風也，後皆倣此，雖大眠後喜涼，亦可以避其猛風也，漸漸變色

隨色加減食至純黃則不飼是謂頭眠不以早晚擡

過。

士農必用曰擡頭眠

蠶眠結觜不食皮膚退換蠶之一大變也

別槌上布

四箔

上下隔塵潤中二
箔安蠶用蓐如前

薄帶沙燠揭蠶分如大棊子

大布滿中二箔

沙燠厚則蒸蠶生病

一復時可六頓次日可漸

漸加葉可開捲窗一半

初向黃時宜極緩眠定宜緩

起齊宜微緩

擡頭眠飽食

正食時擡

食名擡飽食分如小錢大

布滿三箔

辨色加減食

士農必用曰擡停眠分如小錢微大布滿六箔起齊

頭食宜薄一復時可四頓次日可漸加葉

辨色或全

開捲窗

惟遇當

初向黃時宜暖眠定宜微暖起齊宜

溫。擡停眠飽食。

如前

蠶可撥可摻不須分揭可布

滿十二箔。

然不可高拋遠置恐損蠶身辨色加減食

務本新書曰大眠起燠宜頻除蠶宜頻飼或西南風

起將門窗簾薦放下此際不宜擡解箔上布蠶須相

去一指布蠶一箇取臘月所藏菉豆水浸微生芽曬

乾磨作細麵。

臘月所藏白米蒸熟作粉亦可

第四頓投食拌葉勻飼

解蠶熱毒絲多易繅堅韌有色。

如葉少去秋所收桑葉再搗爲末水酒新

葉微溼摻末拌勻接闕飼蠶比食豆麵係本食之物又蒿苣亦可接蠶屋南簷外先所

架立搭棚標柱、此時搭蓋、

土農必用曰、擡大眼、分如折二錢大、布滿二十五箔、

起齊投食、一復時可三頓、第一頓宜薄、但可覆白、第二頓

比前又薄。不覆白、第三頓如第一頓。覆白此三頓食如

慢食次日可漸加葉。辨色加減頓數可全開捲窗照窗。

遇熱則更剷開窗紙。但不至熟。則不拘此例。初向黃時宜微暖、眠定宜溫、齊宜涼

可落蓐。大眼起投食後第六七頓可落蓐全去沙燠蓐草也。即是擡飽食可分至三

十箔。辨色加減食正食時每餉後可挾葉筐遠槌巡之、但

見箔上有班黎處、卽摻葉補合。第五天眼後正食時漏一分葉卽減一分

絲也。但見有班黎處。是蠶先食葉透也。
卽當補令不如此。則後來多有薄繭也。拌米粉。內成
造者至第七八頓食後。於已午時間。將切下葉攤在箔
上。立扈先生曰。大眠後。尙切葉食。今人全不爾。不知
北土何如。宜詳問之。亦不知今人不切無害否。宜
兩試。新水酒拌極勻。待少時。細羅白粉子拌令極勻。
每葉一筐。用新水一升。粉子四兩。如無止。用新水
頓。 拌桑麵。 令蠶體充實爲繭堅厚爲繭。切葉酒拌新水極勻。
羅桑麵拌勻。于大眠後間。飼三五頓。假令每頓飼葉
筐減葉一半。如蠶盛葉滿大眠後間。飼之五頓。亦無妨。蠶食不可用。 摾沙于大眠
後飼食。第十二頓間可擣。 擣如前法。全去沙燠。 不
禁蒸鬱臨老。

生病難蠶。欲老飼之宜細薄，宜頻。養老如養小，亦人老多食則傷。若不如此，則食葉不淨。其葉蒸濕，帶葉入簇，所結繭亦溼潤，如經鹽水。此名簇汁，繭難抽繭。宜微暖，如人老不禁寒涼，然亦可相度當時天氣涼暖消息斟酌。大意比大眠後未老時宜微暖也。依按其法，蠶自蛾至老，不過二十四五日。過此日數愈多，桑愈費而絲愈少也。

韓氏直說曰：蠶自大眠後十五六頓，卽老得絲多少，全在此數日。葉足則絲多，不足則絲少。見有老者，依抽飼斷眠法飼之，候十蠶九老，方可就箔上撥蠶入簇，如是則無

簇汗蒸熱之患。繭必早作而多絲。養蠶無巧，食到便老。桑蠶直說曰：四眠蠶別是一種，與養春蠶同，但第三

眠止擡開十五箔，擡飽食二十箔。大眠擡三十箔。
黃省曾曰：蠶之自蟻而三眠也，供用切葉其替擡也。
用糠籠之灰繆焉，則蠶體快而無疾。或布網而擡替。
其飼火蠶也，必勤葉盡卽飼母使饑不火氣而病其
替蠶也。食半而替，則功省而蠶不勞。其三眠之起也。
斤分於一筐，一筐之蠶可以得繭八斤，爲絲一車而
十六兩。其蟻之初出也，以薔薇之葉，焙燥揉碎之繆
之蟻上，聞香而集之於上，乃以鴛翎拂下，其厝火也。
炭之團爇之，而灰以遏之，瓦以覆之，溫溫然而已。綿

被以隔之而後置之於被之上焉。若熾焉或饑焉則傷於火其長也焦黃不食而死勿食水葉食則放白水而死雨中之所採也必拭乾之或風戾之

簇以稻草爲之殺疏之必潔則不牽絲乃握而束之厚籍以所殺疏之草殼可以禦地溼可以承墜蠶乃以握許登之勿覆以紙至次日少以稻稈繆焉以屬其作綴之未成者勿用菜箕善糾擾而薄繭七日而摘半月而蛾生交五月節梅風吹之則生凡蠶色之青也爲老之候其在簇而有雷則以退紙覆之以護其畏

繭長而瑩白者、細絲之繭、大而晦色青蔥者、粗絲之
繭、皆擣去其蒙戎之衣、其內潰而漬溼者、謂之陰繭、
及薄而雜者、綿之繭、可謂粗絲、不可以經日、經日則
絲爛而難抽、不可以焚香、焚香則蛆穴而難抽、大者
謂之龜工、

繅之不可及也、淹而壅之泥之、每大缸用鹽四兩。荷葉包之於缸瓮之口。
又塞實荷葉。至七日而蛾死、泥之也、仍數視之、有少鏽則
蛾生、凡拈絲綿之線、一分銀是拈一兩、其爲綿也、蛾
口爲最上岸次之黃繭、又次也、繭衣者爲最下蛾口

者出蛾之繭也上岸者繅湯無緒撈而出者也繭衣繭外之蒙茸蠶初作繭而營者也

蠶不可以受油鑊之氣不可以受煤氣不可以焚香亦不可以佩香零陵香亦在所忌否則焦黃而死不可以入生人否則遊走而不安箔蠶室不可以食薑暨蠶豆養之人後高爲善以筐計凡二十筐庸金一兩看繅絲之人南潯爲善以日計每日庸金四分一車也六分其上簇也而無火則繅之也必不淨蠶婦之手不可以擷苦賈手有苦賈之氣令蠶青爛食之

者亦不可以入蠶之室

韓氏直說曰。植蠶疾老少病省葉多絲。不惟收却今年。蠶又成就來年。桑植蠶生於穀雨。不過二十三四日。老方是時。桑葉發生。津液上行。其桑斫去。比及夏至。夏至後一陰生。津液不上行。可長月餘。其條葉長盛。過於往歲。至來年春。其葉生又早矣。積年既久。其桑愈盛。蠶自早生。

韓氏直說曰。晚蠶遲老。多病費葉。少絲。不惟晚却今年。蠶又損却來年桑。世人惟知婪多爲利。不知趨早。

之爲大利。壓覆蠶連以待桑葉之盛。其蠶旣晚。明年之桑其生也尤晚矣。

務本新書曰。蠶有十體。寒熱饑飽稀密。眠起緊慢。謂銅

時緊慢也。

蠶經曰。蠶有三光。白光向食。青光厚飼。皮皺爲饑。黃光以漸住食。

韓氏直說曰。蠶有八宜。方眠時宜暗。眠起以後宜明。蠶小并向眠時宜暖。宜暗。蠶大并起時宜明。宜涼。向食時宜有風。迎風窗。開下風窗。宜加葉。緊飼。新起時怕風。宜。

薄葉慢飼蠶之所宜不可不知反此者爲其大逆必
不成矣。

蠶經曰、蠶有三稀下蟻上箔入簇

蠶經曰、蠶有五廣一火二桑三屋四箔五簇

謂苦蓆蒿梢等

務本新書

蠶忌

曰忌食溼葉

忌食熟葉

蠶初生

時忌屋內掃塵

忌煎、燂魚肉

不得將煙火紙撫

於蠶房內吹滅

忌側近春搗

忌敲擊門窗槌箔

及有聲之物

忌蠶房內哭泣呼喚

忌穢語溼辭

夜間無令燈火光忽射蠶屋窗孔

未滿月產婦

不宜作蠶母。 蠶母不得頻換顏色衣服洗手長要潔淨。 忌帶酒人將桑飼蠶及擡解布蠶。 蠶生至老大忌煙燻。 不得放刀于竈上箔上。 竈前忌熱湯滌灰。 忌產婦孝子入家。 忌燒皮毛亂髮。 忌酒醋五辛羶腥麝香等物。 忌當日迎風窗。 忌西照日。 忌正熱著猛風暴寒。 忌正寒陡令過熱。 忌不潔淨人入蠶屋。 蠶屋忌近臭穢。

務本新書曰。 簇蠶地宜高平。 內宜通風。 命布柴草。 布蠶宜稀密則熱。 热則繭難成。 絲亦難繅。 東北位并養。

六畜處樹下坑上糞惡流水之地不得簇野語如天
宜日氣曬曝故也

士農必用日治簇之方惟在乾暖使內無寒溼

簇中
繭病

有六一簇汗二落簇三遊走四變赤蛹五變殭六黑色簇汗之病蠶老食葉不淨其葉蒸溼帶葉入簇故繭亦溼潤此爲簇汗其餘五病皆地溼天寒所致○○玄扈先生曰亦不止爲地溼天寒自擇種至土簇無時不可蠶欲老可簇地盤燒令極乾除掃灰淨於上得病也

置簇

玄扈先生曰此是北法南方正值梅雨萬難作此所以皆須屋內簇定須着火

韓氏直說曰安圓簇於阜高處打成簇腳一簇可六箔蠶十分中有九分老者宜少摻葉名上馬桑就箔上用

簸箕般去、宜款手摻於簇上、

自東南起頭

不令落地

務令稀勻、

上復覆梢蒿、

或荳
薰

復摻蠶如前、至三箔覆梢倒根在

上、如此則簇圓又穩

自後蠶可近上摻、至六箔覆蒿、令簇圓、

上用箔圍苦繳簇頂如亭子樣、

防雨

至晚又用苦、將簇

從下繳至上苦相接、日出高時、捲去、

至晚復繳、三日

外繭成不用、

馬頭簇亦依上苦繳柴薪要廣簇又玲瓏中間宜架起蠶多者宜馬頭簇簇脚

宜南北

曬簇、上蠶後第三日辰巳時間開苦箔、日曬至

未時、復苦蓋如前、如當日過熱、上摻單箔遮日色、

翻簇、上蠶時、被雨霑溼、雨纔止纔晴、卽選一簇地盤、

如雨溼了，則取乾牆土，不以成繭不成繭，翻騰遷移，厚覆治簇之法，如前。

別簇封舌如前，小雨則不須，但可曝曬。又有一法，臨蠶屋中，本榧下地而上安簇，開了門窗，使透風氣。旱夜或陰雨變寒，則閉門窗，添牛糞火，比翻簇之法，又爲妙也。又一法，榧箔上虛撒蒿柵，周圍簇梢與蒿箔苦圍之，蠶自作繭，猶勝於雨中簇也。

務本新書曰：繭宜併手忙擇涼處，薄攤蛾自遲出，免使抽繩相逼。

士農必用曰：繩絲之訣，惟在細圓勻緊，使無褊慢節核。接頭爲節，疣痘爲核。籠惡不匀也。生繭繩爲上，殺過繭慢，慢慢繩殺繭法，有三日晒，二鹽浥，三蒸蒸最好。人手不及，人多不會，日晒損繭，鹽浥者穩，熱釜者雙繖，粗絲單繖亦可，但

不如冷盆所繅。釜要大，置于竈上。如蒸竈法釜上大盆，餌者潔淨光瑩也。

釜要大，置

如蒸竈法

釜上大盆，餌

接口添水至甌中八分滿，甌中用一板欄斷，可容二

人對繅也。繭少者止可用一小甌，水須熱，宜旋旋下

繭，多下則繅絲冷，益可繅全繳細絲，中等繭可繅雙

繭比熱釜者有精神而又堅韌

雖曰冷益亦益要大，先泥其外。

口徑二尺五寸之上者預先翻過用長粘土

泥泥底，并四圍至脣厚四指，將

用時添水八九分，水

至脣漸薄，日晒乾，名爲出益。

口徑一下者小則下繭少令乍寒乍熱

釜要小。

口徑一尺以下者小則下繭少繭欲頻下多下則煮過又不勻

也用突竈半破壞圓壘一遭，中空，直桶子樣，其高比繩

人身一半，其圓徑相益之大小當中壘一小臺。

徑

盆底坐串盆於小臺上其盆要比圓壘高一層靠元

壘安打絲頭小釜竈比圓壘低一寸半揜火透圓壘

後火煙過與揜火相對圓壘面近上開煙突口微

臥突長七八尺以上先於安突上面壘一臺比突口

微低又相去七八尺外安一臺高五尺或就用牆或

用木爲架子

用長一丈椽二條斜磴在二臺上二椽相去闊一轉

坏許用壞泥成一臥突邊側立上平鋪壞一層兩

成一臥突也須與竈口相背謂如竈口向南突口向

北是也繩益居中火衝益底與益下臺煙燭遠益過

煙出臥突中故得益水常溫又勻也又得煙火與

繩益相遠其繩絲人不爲煙火所逼故得安詳也

轎車床高與盆齊。軸長二尺。中徑四寸。兩頭三寸。用榆

槐木四角或六角。臂通長一尺五寸。六角不如四角。轉

者輻條也。或雙輻。或單輻。雙輻者穩。須腳踏。又繅車竹筒子宜細。細似

穗筒。鐵條子串筒兩樁子亦須鐵也。

兩豎樁子上橫出鐵條。鐵條穿

筒子既輕又利也。不如此則不能成絕妙好絲。○打

古人有言。工欲善其事必先利其器。餘如常法。

旋添

絲頭人

小釜內添水九分滿。籠不燃籠乾柴。柴細

火不候水大熱。下繭於熱水內。下繭宜少。不宜多。用

勺停多則煮過。綠絲少用。筋輕剔撥。令繭滾轉盪勻。挑起囊頭。

粗絲頭名囊頭

手捻住。於水面上輕提撥數度。復提起其囊頭。下即是清

絲摘去囊頭

如重手攬撥囊頭又於手揚子纏數遭可長五七尺將繭上好絲十分半去了

三二分實爲可惜如輕手剔

撥起囊頭長不過一尺也

一手撮捻清絲

一手用

漏杓綽繭

款送入溫水盆內。杓底上多鑽眼子爲漏杓漏瓢更好

將清

絲掛在盆外邊絲老翁上。

盆邊釘插一櫃子名絲老翁

得極

勻爲安詳故

郎熟釜亦宜如此

○繅絲人

將絲老翁上清絲約

十五絲之上

黃絲粗

總爲一處穿過錢眼

錢下繭攢聚名絲窩

又名繳過箇頭蛾眉杖子上兩繳杖子下兩繳掛於

絮盤

右脚踏軛右轉長切照觀撥掠兩絲窩於內有繭絲

右腳踏軛右轉長切照觀撥掠兩絲窩於內有繭絲

右腳踏軛右轉長切照觀撥掠兩絲窩於內有繭絲

先盡蛹子沉了者繭絲斷了繭浮出絲窩者其絲窩減小卽取清絲約量添加務要兩絲窩大小長均專觀手頻撥頻添添不過三四絲失添則細了多添則粗了如或手添不迭腳慢踏軒其絲較爭細手腳相應亦可取添得多了脚緊踏軒其絲較爭細手腳相應亦可取匀也○玄扈先生曰緊慢可爲粗細却無此理○添絲搭在絲窩上便有接頭將清絲用指面喂在絲窩內自然帶上去便無接頭也此名全繳絲圓緊無疣痘上等也中作紗羅上等疣段如蛾眉杖上只兩繳名雙繳絲不甚圓緊有小疣痘中等也不中紗羅中中等疣段如蛾眉杖上只一繳名單繳絲又名歇口絲偏慢有大疣痘不中疣段只中絹帛亦不堅壯此單繳歇口絲多只是熟釜中繅也○玄扈先生曰今各處繅絲皆只雙繳亦無蛾眉杖而秦王諸家亦并不言全繳雙繳單繳之異蓋古法之廢已久著書者亦只抄寫節畧舊文而已未見今北繅車不知有蛾

眉杖否。宜案

一具觀之。

玄扈先生曰。愚意要作連冷盆。釜俱改用砂鍋或銅
鍋。比鐵釜絲尤光亮。以一鍋專煮湯供絲頭釜二具。
串盆二具。繅車二乘。五人共作一鍋。二釜共一竈。門
火煙入於臥突。以熱串盆。一人執爨。以供二釜。二盆
之水爲溝。以瀉之。爲門以啓閉之。二人直釜。專打絲
頭。二人直盆。主繅。卽五人。一竈可繅繭三十斤。勝於
二人一車。一竈繅絲十斤。也是五人當六人之功。一
竈當三繅之薪矣。并具圖于後。

卷之三十一

三十一

韓氏直說曰蠶成繭硬紋理粗者必繅快此等繭可以蒸餚繅冷益絲其繭薄紋理細者必繅不快不宜蒸餚此止宜繅熟益絲也其蒸餚之法用籠三扇用獸草扎一圈加於釜口以籠二扇坐於上其籠不以大小籠內勻鋪繭厚三四指許頻於繭上以手背試之如手不禁熱可取去底扇却續添一扇在上亦不要蒸得過了過了則軟了絲頭亦不要蒸得不及不及則蟻必鑽了如手背不禁熱恰得合宜於蠶房梃箔上從頭合籠內繭在上用手微撥動如箔上繭滿

打起更攤一箔候冷定上用細柳梢微覆了其繭只
於當日却要蒸盡如蒸不盡來日必定蛾出如此繆
絲一月一般繆快釜湯內用鹽一兩油半兩所蒸繭
不致乾了絲頭如鑄繭多

油鹽旋入

務本新書曰凡養夏蠶止須些小以度秋種慮恐損
壞萌條有誤明年春蠶桑葉今時養熟蠶以紙糊窗
因避飛蠅遮盡往來風氣天晴罨熱病生陰則溼生
白醭陰晴俱不便當以紗糊窗陳稈草作蓐紙條先
貼紗邊

餘紙就糊窗上中間以線繫紗在窗上或用荻簾粗麻
櫺上蠶罷以水潤紙揭下明年再用

織

凡窗繫定不當泥之遮蔽飛蠅透脫風氣勿關一

房不令雜人出入。

決要南北
北窗

以剪剪葉旦暮擰分兼夜

頻飼。○秋蠶初生時去三伏猶近暑氣仍存蠶屋多

生溼潤正要四通八達風氣往來益初生却要涼快

以陳稈草作蓐勿用麥稽一日一擰失擰多生白醭

一眠宜溫再眠如春門窗俱掛薦簾屋內須用無煙

熟火大眠全要暄暖大忌北風寒氣勿飼雨露冷葉

春秋蠶法首尾顛倒深宜體測○簇蠶時相次秋高

恐值夜寒風冷不能作繭可於簇西北埋柱繫椽箔。

遮禦北風寒氣三兩夜之間便可作繭。

立扈先生斟酌用火

土農必用曰夏蠶

此別是一等俗謂三生蠶春養出夏種夏養出秋種秋養出來春種

不可間闕。闕則絕其種○立扈先生曰今人呼二蠶種甚細然余家用春蠶種夏月養之仍得良繭也

自蟻至老俱宜涼忌蠅重先於蠶生前用麥糠擁於蠶房壁脚下燒之

去溼氣及虫子

及等黑後須一日早晨一

擡其餘並與養春蠶同

此蠶不可多養止欲收秋蠶種多則損葉然只可科採桑

中冗條一名原蠶採葉不無傷桑春蠶不幸

取葉也○秋蠶遇天災不得已養之以補歲計然不宜

稱也初宜涼漸漸宜暖與養春蠶正相反

其間體候須欲

所初可摘葉蠶大則持葉初欲紗糊窗漸漸天寒上

復用紙糊留捲窗簇與織絲法如前亦要旨

熱蠶糙底

宜用麥糠麥

薰燒之又大路上踏踐起乾塵土收三四石生蠶日于桶底撈平可避暑溼簇秋蠶多于簇心用熟火或致焚燒不若止于映北風處爲簇簇底用麥糠均鋪簇則用乾桑柴爲梢新乾麥糠爲草得自然溫暖之氣不須用火矣經雨則倒簇○玄扈先生曰今人不養秋蠶止以夏蠶作來春種亦生又云秋蠶以補歲計此言甚妙秋時多晴更比春蠶爲穩今人先言二蠶不食頭葉致昧秋蠶補歲計之理不知二蠶何故俱要計算除蚊蠅