

未16

442.

徽瘡祕錄

下

惟亨按經云不治其虛何問其餘故以各

藏之虛察邪毒之聚

與否處方劑善矣然

此疾大抵下疳瘡爲

始而後便毒而後徵

瘡而後筋繫骨痛爾

來變化爲種種壞症

癰瘍則異候蜂起不

可得量矣然標本略

同而治法稍異今強

而五藏謾說所見諸

症是反非治法良策

而醫家之舊弊也

## 徽瘡方法

海寧陳司成九韶甫著

夫徽瘡爲患正氣不虛則邪毒不入如肝氣虛邪毒乘之則發橫痃或成魚口甚則筋疼瘡形如砂仁腎氣虛邪毒乘之則生下疳或爲蛀梗甚則骨痛瘡形如爛柳肺氣虛邪毒乘之則毒聚於上不爲筋疼必

生瘡如花脾氣虛邪毒乘之則毒流四肢  
不作骨痛必生瘡如痘心氣虛邪毒乘之  
則發大瘡形如楊梅左右相對而作楚有  
一經獨虛而邪氣獨盛者有兩經三經同  
虛而齊病者有見於外而滿身生瘡者有  
伏於內而遍體骨痛者所以出入無常而  
隱見不一也當詳究脉理按其毒氣有無  
輕重應發表則當發表應攻裏則當攻裏

應疎利則當疎利應溫補則當溫補應涼

解則當涼解勿令虛實顛倒劉削元神蓋

猶言正之劉削元神也

淮南子曰聖人則制物也

惟亨按病重而云云是治病之準則也又欲標本兼治者非獨此症百病皆然如此症則有劇易之分不可必兼治者甚多臨病之工必不可拘也

病重而藥輕者但無近效病輕而藥重者必生佗變所以治此症者須標本兼治不

可偏施以攻邪補元爲主

### 主方

凡染有毒之妓或與患者接談稍有所

惟亨按凡微毒傳染之由染有毒之妓而

以理髮者曰梳細者曰梳  
感不拘便毒疳瘡或髮際生瘡梳下薄

梳音疏懈也

音字小麦屑皮也

得者固然矣與患者接談而得者未嘗聞之薄膚如麩者或手足肌膚紅點如班隱肉者其謂梅瘡將發之徵乎但未明了也

屬如麩或手足肌膚紅點如班隱肉當服此方使正氣足而邪自除也若間服牛黃化毒丸取効甚捷

人參 黃芪 川芎 甘艸 各一  
錢 當

歸 錢 忍冬花 漢防已 各一  
錢 各一分

麻 防風 川山甲 各八  
分

用水二大鍾加生薑三片煎至半餳時

服渣再煎

鍾音草酒器也又俗謂酒卮

惟亨按化毒丸配合

生生乳者非全無効

予亦嘗用之有試驗

然立許多類方者徒

飣餌而已未可信也

於是新立改定化毒

丸一方不得已則時

五用之約言嘗載之

## 牛黃化毒丹 治已上初見形症

基於近來和產者有上品亦烏金黃之類也

牛黃 四分

須用西黃色鮮黃者用之

烏金黃亦可

肝黃形如筆管厚實

者功次之廣黃味薄功不及半

琥珀 分

血竭 製

大黃 雄黃

朱砂

須擇鏡面大塊不涉沙石者用之

有煉丹不就轉與藥店賣者有大毒不入服藥

白蘚皮 川

山甲 乳香 木香

各取頭末一錢五分

蟬退

生 生 乳

一錢

沒藥

七分一錢

川貝

母 錢

二三

母 錢

右各製爲末用神麴末五錢打稠糊入  
蜜也多道

藥擣勻丸如梧桐子大另研朱砂爲衣

每早空心服十五丸每炮空腹服十丸

砂糖湯送下中病則已如餘毒未盡藥

不可徹服此丸切忌煩勞惱怒焦躁茶

酒止可用十分之三

惟亨按通篇服法皆  
可疑且送下之藥總  
未知何等義也

### ○養榮湯

治肝經形症益其正氣兼服甲子化毒

惟寧按五藏方及十干化毒本出於一方陳九韶強分別之乎要之其人徒立方法未能盡用乎如何凡治法不簡將失其要陳氏亦蓋能知之然今新欲立言作方著書故反失其實也

### 丸標本同治

惟寧按此方血虛發

當歸  
錢三

白芍

川芎

丹皮

遠志

龍膽草  
錢一

夏枯草

青皮

柴胡

熱脣腸苦滿盜汗者可用

各八分

用水二鍾煎八分服渣再煎七分服

### 甲字化毒丸

治肝經內外前後形症

惟亨按百日而成成則生生不息是何語勢未可解且此藥配合毒石假令性吳平和未可言王道聖藥也妄誕虛高欺人太甚矣

## 升麻

二錢

## 牛黃

四分

## 生生乳

配礬石用佐藥煉百

日而成成則生生不息乃此症始末要藥但製度繁費不易修令如火候不到者服之無驗余識此方三年始得礬石煅煉得法十年間屢用屢効誠千古不易王道之聖藥也未有此藥不可依方修合議余方之不靈方法已著名醫會編因刻未竣今錄本方附後

## 雄黃

須擇舊坑所產透明不臭者用

之各

一錢

各

一錢

各

一錢

即血餘見壬子

年

## 硃砂

## 乳香

各

七分

即血餘見壬子

年

化毒丸注

## 白僵蠶

川山甲

白蘚皮

各取頭末

一錢五分

## 廣木香

## 熟大黃

牡丹皮

各二錢

五分

蓋下方所注之製大黃

惟亨按人參湯炒米  
湯効同者也乎其理  
似無據此書送下丸  
藥之藥通舉二品而  
氣味効用大違之品  
味未知爲何等之義  
以下不盡辨者皆成  
之

又按逢三六九日增  
丸數之法不知何義  
且醫書所未嘗言不  
可爲法也

### 補真湯

右各製爲末用神麴末五錢打稠糊入  
藥擣勻丸如桐子大另研硃砂爲衣每  
早空心服十三丸每廻空腹服九丸人  
參湯送下炒米湯亦可病重者逢三六  
九日加服三丸元弱者不必加病去藥  
減如餘邪未盡藥不可徹服此丸切忌  
惱怒焦躁茶酒止可用十分之三

治腎經形症益其正氣兼服壬字化毒

丸標本同治

何首烏

川牛膝

枸杞子

各三錢

五

加皮

當歸身

石斛

各二錢

杜仲

黃柏

各一錢

壬字化毒丸

用水二大鍾煎八分食前服渣再煎服

治腎經內外前後形症

惟亨按亂髮灰一名  
血餘今此書私立奇  
名者不知爲何義也

虎脛骨 酥 砂 各一錢 六分 灸

龜版 酥 月月紅 即血餘用童子頭髮月剃者煅一錢 灸

川山甲 脆 砂 各一錢 六分 灸

硃

五 分

蟬退末 二錢

沒藥

乳香

白蘚

皮

雄黃

各一錢 五分

生生乳 一錢

牛黃

五 分

土貝母 二錢

沈香 七分

色黑味甜香者 取沈水

用 分

琥珀 七分

右各製爲末用神麪末五錢打稠糊入藥擣勻丸如桐子大另研硃砂爲衣每

早空心服十五丸每丸空腹服十丸人參湯送下枸杞湯亦可病去藥減如餘邪未盡藥不可徹禁忌同前

保脾飲

治脾經形症益其正氣兼服戊字化毒丸標本同治

金釵石斛

薏苡仁

忍冬花

各二錢

本草曰光澤如金釵股短而中實生石上者名金釵石斛

山藥 茯苓 牡丹皮

陳皮

人參 甘艸 木香

各六分

用水二大鐘加棗二枚煎八分服渣再

煎服

戊字化毒丸

治脾經內外前後形症

牛黃

四分

升麻

生生乳

各一錢

一

木香

硃砂

雄黃

川山甲

白鮮皮

乳

香

各一錢五分

擇滴

製大黃

二錢宜九

乳不  
襍沙石者  
火用

蒸九曬每黃十兩當耗煮酒  
五十兩入藥則瀉中有補

威靈仙

沒藥 血竭 貝母

各一錢八分

右各製爲末用神麴末五錢打稠糊入  
藥擣勻丸如桐子大另研硃砂爲衣每  
早空心服十五丸每廻空腹服十丸人  
參湯送下奇良湯亦可病去藥減如餘  
邪未盡藥不可徹禁忌同前

非真抄人參奇良効  
用遼異而猥言亦可  
其可笑

益衛散

治肺經形症益其正氣兼服庚字化毒

丸標本同治

人參 貝母 白芨 百合 阿膠

桔梗 天門冬

各一錢

山藥 木香

甘艸

各七分

用水二大鍾煎八分通口服渣再煎服

欲而盡也

庚字化毒丸

治肺經內外前後形症

蟬退

淨去沙土

川山甲

炙

貝母

各二錢

圖基按細注紫背

天葵甘艸二種也

本綱硃石修治入

紫背天葵石龍芮

二味火煅用甘艸

水浸與此相類也

鐘乳石

須擇湖廣產者長大脆白用天葵甘艸水煮一日研萬遍用之

色穠性堅

鬱金

二錢

生生乳

一錢

牛黃

四分五釐

木香

月月紅

乳香

白鮮皮

雄黃

各一分

硃砂

一錢七分

早空心服十五丸每丸空腹服十九人

右各製爲末用神麴末五錢打稠糊入藥擣勻丸如桐子大另研硃砂爲衣每

參湯送下竒良湯亦可病去藥減如餘

邪未盡藥不可徹禁忌同前

安神散

治心經形症益其正氣兼服丙字化毒

丸標本同治

人參 茯苓 黃連

甘艸各一錢

遠

志

七分

石菖蒲

柏子仁

生地

赤

芍 木通

各一錢  
二分

用水二鍾加圓肉七枚煎八分服渣再

龍眼肉也

煎服

丙字化毒丸

治心經內外前後形症

牛黃 珍珠

各五分

犀角

蜜色味香有棕紋者用之

瓜兒血竭

紫艸

硃砂

雄黃

白

鮮皮 乳香

月月紅

各一分

一錢

僵蠶

酒拌炒去絲

蟬退

川山甲

各三分

生

生乳

一錢

赤芍藥

二錢

右各製爲末用神麴末五錢打稠糊入  
藥擣勻丸如桐子大另研硃砂爲衣每  
早空心服十六丸每晚空腹服十一丸  
人參湯送下龍眼湯亦可病去藥減如  
餘邪未盡藥不可徹切忌惱怒焦躁茶  
酒止可用十分之三

凡服十全丸先用滾湯

汨音  
水水流也

噙清胸中濁氣

嗣服丸藥藥後啖糕果之類壓丸藥下  
胃日宜遵法毋忽

、通氣飲

惟亨按此方兼輕利解毒之品而初起通氣之要方他方書所未說也氣實人濕熱

未甚者及婦人帶下濕熱發橫痃之類宜試焉

治橫痃初起或兩髀俱腫作痛肉未堅實應服此方

木通

瓜萎子

各五錢

忍冬花

粉甘

艸各三錢

貝母

紫蘇葉

各二錢

用水二大鍾煎八分空腹服渣再煎七

分服

○消毒飲

治便毒單生腫硬大作痛者服此方

歸尾

粉艸

熟大黃

黑丑

擣碎各三錢

僵蠶

貝母

各二錢

用水酒各一大鍾煎八分空腹服渣煎

七分服

、單方 治同前

惟亨按欲內消者宜此方然用黑丑汗者吾未信之

黑丑頭末七錢 空腹熱酒調服或汗或下下後以粥飲止之

惟亨按治同前者則宜用

前方簡便且此方中

有蜈蚣班毛爲大毒

物非元氣充實毒勢

猛烈者不可與服之

當大與前方有分別也

又按人無真元氣者即死故

以有無字言

之則不通

○○ 內托散

治便毒腫痛將作膿者服之

五虎湯 治同前有元氣者服之

藥勢類聚有情毒勢如虎故名

全蝎 僵蠶

川山甲炙各一錢五分

蜈蚣

三條 班毛三個去頭尾糯米拌炒

生大黃二錢

右研爲末分二次空腹酒服

惟亨按地榆換反鼻  
則佳

地榆一

黃芪

粉艸

忍冬花

川

山甲

白芷

各一  
錢

用酒二大鍾煎至一鍾空腹服渣再煎

服

透膿散

治便毒有膿未破作痛作脹

皂角刺

黃芪

牛膝

各三  
錢

川芎

一  
錢

當歸尾

川山甲

忍冬花

漢防已

各一錢  
五分

用水二大鍾煎八分空腹服渣再煎七分若服前方不効者感毒必重當服甲子化毒丸收功

解毒湯

治下疳初起

連翹 荊芥 木通 黃連 生地

牛膝 忍冬花 滑石 甘草 何首

烏 各等分

用水二大鍾煎八分服渣再煎七分服

解毒丸 治同前

惟亨按僻藥不勝用

白芷 一兩 班毛 四十  
九箇

二物和一處用

酒拌溼透文火炒燥揀出班毛用白芷

全蝎胡桃肉各一兩二物新瓦上焙

微焦 生大黃一兩晒燥四物共研細

末酒麵打糊爲丸如菉豆大每服三錢

熱酒送下

摻藥方

惟亨按急乾瘡口之  
劑也宜斟酌

治下疳瘡

海巴子

煅存性  
名貝子

研極細每一兩末

見結毒方法

加冰片五分五色粉霜三分再研盛磁

罐聽用

又方

惟亨按僻藥不勝用  
也

雨前芽茶

麻黃

細切各一  
錢五分

連四紙

方七寸許用鉛粉錢半擦在紙上銷前

當用  
列記未錄法

二味捲筒火灼存性研細加冰片一分

再研盛罐聽用

薰洗方

苦參 川椒 忍冬花 各兩  
許

用水三

惟亨按凡瘡瘍甚痒者以此湯洗之後宜用約言藥丹散

藥從四沿摻之用薰洗摻藥不効者毒中必深當服壬字化毒丸收功

、加味化毒飲

治下疳瘡腐爛陷下有凹或包皮腫如  
鷄肫或肌膚見形如班如疹將發瘡者  
當服此方

漢防已 當歸 忍冬花 白鮮皮

連翹 差活

川芎

各三兩

牙皂

五錢

右切片分作七帖每帖加奇良四兩

豬瘦

子一枚水四盞煎至二鍾分二次服

渣再煎一鍾服七帖後倘或不効者當  
服化毒丸收功

解表飲

治下疳便毒同起內作筋骨疼痛者服  
之

麻黃

紫蘇

桔梗

各三錢

川芎

升

麻

當歸

忍冬花

各三錢

僵蠶

蟬

退

各三錢

子羊肉

十兩

五錢

嫩羊也

兩

惟亨按汗下之法古頗備而未聞浸其被棄其大便除其毒之法且此藥平穩當未至大汗下而

方後云云之

言大似失其旨矣

### 加味風流飲

治瘡初起不生瘡瘍便毒者服之

防風 茉莉 川芎 升麻 鼠粘子  
花粉 白鮮皮 僵蠶 甘艸 川山  
甲 牛膝 何首烏 赤芍 木通

五加皮

各等

用水三大鍾加猪腹半

隻奇良一兩煎至一盃熱服取微汗爲  
度渣再煎服兼服庚戌二字化毒丸

牛黃蟾酥丸

發毒化毒能治一切疔腫癰疽瘡瘍

西黃一錢 蟾酥二錢 蘇香二分 硃砂

雄黃 乳香各五分一錢 先以蟾酥切片

熱酒化軟將五味細末和蟾酥擣丸如  
黍米大每服七丸葱頭熱酒送下出冷  
汗之義不可解

惟亨按服此丸後出

汗爲度

萬病解毒丹

惟序按畏大黃克伐  
胃氣反用續隨子大  
戟有毒之劫藥抑有  
何所據乎

胃氣

山茨姑

二兩

須擇嚴處土產色紫而  
價重者方是白者用之効薄

紅芽大戟

去木切薄片取即續隨子

千金子

去殼

頭末一兩五錢

去油淨

文蛤

三兩

硃砂

雄黃

各五錢

麝香

二錢

須擇當門子  
乾燥者抵三錢用

右製爲細末以糯米稀粥擣成錠子量

人大小虛實服一錢上下白滾湯磨化

凡患瘡瘍便毒未愈有生瘡之兆預煎此

惟亨柏油髮煎當毛

而坊升降之氣

藥類禁厭之比而非  
正法吾邦俗恐不能

飲也

油服之可免面部生瘡

麻油八

用白芷頭髮三五錢煎化作

二次服再服亦可

凡患瘡頭面及不便處者先薰洗後點藥

惟亨按瘡生不便處  
者用薰洗點藥欲速

愈者強蘊蓄毒物大  
右害必勿用

服藥者忌之

薰洗方

番打麻

雷丸

各五錢

朴硝

地骨皮

各一兩

黃芩

半兩

用河水五盃煎藥味

出先薰後洗用後方藥點

點藥方

大杏仁

二十個鹹刺火上燒透存性

膽礬

四分

輕

粉一錢

三物共研如膏點患處每日先

薰後洗點藥其効甚速

製生生乳 方著明醫會編因刻未竣先

圖書嘗有便法製樣別記以國字曉之

附於此

煅煉礬石

三錢

雲母石

二錢五分

硝石

一兩

六錢卽盆硝

六錢

朱砂液

九錢六分

卽朱汞

色粉紅者爲上

晉州產土品

一兩

朱砂

一兩

朱砂

八錢

食鹽

半兩

枯

惟亨按舉石舶來甚難得今藥舖賣者皆紅砒之類而非真物又石州所產之稱藥殺物皆殺銀々毒聚如石也殆非石品也必矣

礬

五錢六分

青鹽

三錢卽戎鹽也

五分

右件共研不見

星入羊城確內三方一頂火俟藥化面

羊或作陽

入羊城確內三方一頂火俟藥化面

上有霜頭起離火候冷用鐵盞蓋扎鹽  
也

泥固濟待確口泥乾入八卦爐內先用

文火候盞底熱透微微擦水加炭平口

用武火三香足離火先用甘草牙皂各

二錢煎濃汁收盞底白丹砂棉紙包裹

浸汁內片時取出連紙埋土中三日夜

取來晒乾每兩加冰麝各七釐辰砂九

分共研極細外用乳香錢二分滾水燉

化和前末研勻爲丸每重一錢一分外  
以黃蠟封固卽名生生乳炤方配合服  
之刻日奏効每見公子王孫沾染此疾  
百藥無効者皆因方之不當藥之不真  
也余願此方公之海內而後世易爲采  
擇永無差悞然世之毒藥古方往往用  
之各有製度耳如水銀一物得雲母譽  
石同煉其毒卽解不比粉霜輕粉之酷

惟亭按得雲母譽石  
解水銀毒有何據且  
水銀之酷烈甚於粉  
霜輕粉非同日論亦

妄誕而已

又按配合諸藥治諸  
疾之說無誓之甚勿  
誤爲據

又按凡藥有相惡相  
畏之殊未嘗需効於  
一藥者且生生乳有  
毒異品何廣用之如  
此乎頗似鬻藥家猥

說効需售於世上者  
之語甚可陋也

又按凡藥性與稟性  
有異殺毒與不殺亦

有殊礬石不鍊服之  
殺人砒石得火尤烈

不可一概論之巧言

烈也余用生生乳配風藥而治大麻瘋  
配癆藥而治傳屍癆配蟲藥而治諸蟲  
疾配膈藥而治噎塞翻胃配瘡藥而治  
頑毒頑癬久漏骨痛種種奇効不獨治  
廣瘡毒氣之聖藥也夫凡藥性與稟性  
有異人有殺藥者毒藥服之竟不覺察  
奏功亦緩性有不殺藥者服之便覺眩  
冒奏効亦速所以爲醫全在活潑經曰

欺人覽者宜熟察之  
以勿被欺也

大積大聚衰其大半而止不必盡劑須  
要體察病情功效未全者再宜進藥或  
間日再服或停兩三日再服務宜消息  
增除毋使過劑以生藥病

製金鵠砒方法

淨白砒

二兩五錢  
研爲細末

出山鉛

十六兩開  
單生鉛  
如大荳許

敲爲  
薄片

用小城罐一個

以鉛片挑砒末  
重重疊在罐內

用文火鎔化俟青煙起白煙來霜飛罐  
口方離火冷定鉛面清如水色如金者

無渣質者爲妙若色青黑  
非出山鎔也用之無効

# 結毒方法

海寧陳司成九韶甫著

夫結毒者徽瘡毒氣結於四肢百骸孔竅  
經絡不易散解作痛作腫久則塊破潰爛

不已治此症者不外乎攻補攻則毒氣去

補則正氣強經曰邪之所湊其氣必虛虛

者空也無也譬諸國內虛則人民離散百

惟亨按治病者七方  
十劑盡不出攻補何曾治此症而已乎贅言而已

出寒熱論篇

禍易起人之虛者亦猶是已又曰不能治

其虛安問其餘蓋言虛者爲百病之本宜

首舉以冠諸症也

黃書師古注冠謂居其首

毒結於肝膽二經者內作筋痛攻走脇肋

上至於頭下至於足轉側艱難手不能

舉足不能步或頸項發塊或破爛上下

或傳他經致生別病當用乙字化毒丸

惟亨按傳他經生別病則宜以他經施治法勿以此經論之後

倣之

兼用煎劑調理

惟寧按於結毒方用陰干益結毒也者以證屬陰分用之乎而類聚同品藥類錯綜二三似立其方法徒具釘餽強飾其私要之陳氏當未嘗列用此方法然臨著書欲其備苟作之也夫凡

用方不約則不能專

効故予療此症首尾

## 乙字化毒丸

治已上諸症

大同少異於約言已  
言之

牛黃 丁香 牙皂 各五 分 琥珀 須擇

燥者 麝金 生生乳

各五 分

一硯

硃砂

用之

雄黃 月月紅 白鮮皮

各一

錢

硃砂

山甲 各一錢

製大黃 二

錢

僵蠶

四錢

右製爲末用神麴末五錢打稠糊入藥

惟亨按凡大勞大怒  
食餌房慾諸禁忌之  
類服藥後百日必加  
謹不然則病必復是  
大法也

擣勻丸如桐子大另研硃砂爲衣每早  
空心服十三丸每炮空腹服九丸人參  
湯送下炒米湯亦可病去藥減如餘邪  
未盡藥不可徹百日內勿使大勞大怒  
順時調理

煎藥方

當歸	二錢	芍藥	一錢	川芎	七分	人參	
丹皮	各八分	膽艸					
		柴胡					
		紅花	各五分				

枸杞二錢 石斛一錢 用水二鍾加蓮

子十粒煎八分服渣再煎

惟亨按胃氣虛弱用  
奇良吾未能信之

胃氣弱加奇良一兩薏苡三錢 魂不

寧加酸棗仁二兩 氣不順加烏藥香附

青皮各一錢 泄瀉加白朮山藥各一錢  
五分

毒結於膀胱并腎經者內作骨痛流注上

下抽掣時痛發塊百會委中湧泉等穴

惟亨按百會督脈也  
今係腎經者未知何  
義也

或陽物腐爛不已或陰囊腫脹作潰或

生獨腳陽徽瘡或傳他經致生別病當

用癸字化毒丸兼用煎劑調理

癸字化毒丸

治已上諸症

牛黃

五分

鹿角屑

三分

沈香

生生乳

各一錢

硃砂

雄黃

月月紅

白鮮

皮

乳香

川山甲

各一錢

五分

神水

一錢

取神水便法

一貼

用出山鉛十筋打薄片二十塊塊上貼  
銀箔取狀底缸二隻一樣的上缸開一

以國字錄別記

孔底中繩穿鉛片懸上缸下缸盛米醋  
火酒各十觔缸口架磁盤一個將缸合

好用麪條封固以文火下燒  
俟酒醋乾取出盤中者是人中白

二錢五分擇鄉間誠實人家不  
生瘡毒疾病者取製入藥有効  
製

### 何首烏

三錢

右製爲末用神麴末五錢打稠糊入藥  
攜勻丸如桐子大另研硃砂爲衣每早  
空心服十五丸每廻空腹服九丸人參  
湯送下枸杞湯亦可病去藥減如餘毒

未盡藥不可徹禁忌同前

煎藥方

牛膝 柏子仁 山茱萸 五加皮 當

歸  
各二錢

何首烏

補骨脂

淫羊藿

川石斛

山藥  
各二分

一錢

澤瀉

七分

用水二鍾加川椒一撮煎八分服渣再  
煎

精氣不固加菖蒲人參  
各一錢

五味子  
四分

內熱加熟地黃柏牡丹皮

各一錢

盜汗

加白芍酸棗仁麥門冬

各二分

毒結於脾胃二經者外爲小塊肌肉蛀爛

蔓延或發大塊破潰腿膝或手足生鵝

掌風癬或傳他經致生別病當用己字

化毒丸兼用煎劑調理

己字化毒丸

治已上諸症

牛黃 牙皂

各五 分

木香

二 錢

生生乳

一 乳香 没藥

各一錢 七分

川山甲

白鮮皮

硃砂

雄黃

月月紅

各一錢

分

熟大黃

僵蠶

各二 錢

血竭

一錢 七分

右製末神麴末五錢打稠糊入藥擣勻  
丸如桐子大另研硃砂爲衣每早空心  
服十三丸每晚空腹服九丸人參湯送  
下沙糖湯亦可病去藥減如餘邪未盡

藥不可徹百日內勿大勞大怒順時調  
理

煎藥方

茯苓 山藥 石斛 陳皮 錢 各一  
薏

苡仁 三

當歸 錢 二

白芍

丹皮 錢 各一

各八分

丹皮 分

木香

甘艸 各五  
分

肉桂 三  
分

用水二鍾加砂仁六分煎至八分服渣  
再煎服 飲食少進胸中脹悶加厚朴

荳仁各一 有痰加半夏枳實白朮各一

錢

泄瀉加肉果訶子各七

分減當歸

內  
豆蔻

惟亨按當言肺大腸  
二經直稱大腸肺經  
者不成語也

毒結於大腸肺經者爲喉癬多作痰唾久

則成

天白蟻言腐爛漏之類狀也

漸蝕鼻梁低陷或肌膚生

癬硬靨如錢色紅紫褪過卽成白點或

不生癬竟成赤白癥風或傳他經致生

別病當服辛字化毒丸兼以前煎劑調理

辛字化毒丸

治已上諸症

白花蛇

真蘄州產者佳

羚羊角

白鮮皮

各二錢

錢

牛黃

五分

鍾乳粉

生生乳

各一錢

川山甲

月月紅

乳香

硃砂

雄

黃

各一錢  
五分

槐花

二錢

神水

七分

川貝

母

二錢

蜂房

炙淨末  
一錢

右製末神麴末五錢打稠糊入藥攜勺  
丸如桐子大另研硃砂爲衣每早空心

服十三丸每空腹服九丸人參湯送  
下熟蜜湯亦可病去藥減如餘邪未盡  
藥不可徹百日內勿大勞大怒順時調  
理

煎藥方

人參 茯苓 天門冬 貝母 當歸  
沙參 玄參各一錢二分 麥門冬 白  
芍 黃芩各八分 五味子四分

用水二鍾加枇杷葉三片煎八分服渣  
再煎

痰多加白朮天麻橘紅各一錢

喘急加

桑白皮甘艸紫蘇子各一錢

一

毒結於心小腸經者毒注瞳仁似乎內障

或見或不見或毒聚舌本作腫或十指

慘痛無時或瘡生遍體內有不易結痂

而腐爛不已者或傳他經致生別病當

惟亨按眼中瞳仁屬  
腎大小皆屬心今以  
瞳仁爲心見症者可  
怪又以十指慘痛屬

此經未知有何據

服丁字化毒丸兼以煎劑調理

丁字化毒丸

治已上諸症

牛黃 珍珠 蜈蚣

去頭足炙燥各四分

犀角

去頭足炙燥各四分

犀角

生生乳 牙皂

各一錢

月月紅

白鮮

皮 硃砂

各一錢  
七分

雄黃

乳香

山甲

各一錢  
五分

琥珀

五分

貝母

二錢

川

竭

鬱金

各一錢

製大黃

一錢

右製末神麴末五錢打稠糊入藥攜勻  
如桐子大另研硃砂爲衣每早空心服  
十五丸每炮空腹服十丸人參湯送下  
圓眼湯亦可病去藥減如餘邪未盡藥  
不可徹百日內勿大勞大怒順時調理

煎藥方

人參 茯苓 柏子仁 當歸 生地

黃各一錢 二分 遠志 麥門冬 牡丹皮

黃連 甘艸 各八分 用水二鍾加圓眼

肉十枚煎八分服渣再煎

不眠加棗仁梔子 各一錢

各二分

咳嗽加貝

母知母桑白皮 各一錢

各二錢

咽喉乾燥加玄

參連翹 各二錢

各一錢

心經元陽虛怯畏寒者

加大附子八分倍人參

拔毒丸 治生瘡時悞服輕粉粉霜服前  
以下雜方當別段落

方無効者當用此丸間服

惟亨安凡方中用象牙者予嘗解毒利水  
方中多用此藥屢奏其効然今爲丸者其  
効恐減也

槐花一

川椒二兩

象牙末一兩  
酥炙

黃

丹乳香

沒藥

人中白各二錢

金頂砒

竭 蟠蚣

川山甲各一錢

金頂砒

生生乳

各一錢

本經蓬原云色白有黃華者名金脚砒以之見之頭有蓄筋或謂金脚砒乎未詳

右製末用神麴末一兩五錢打稠糊入藥擣勻丸如桐子大另研硃砂爲衣每日早服二十丸炮服十五丸茯苓湯送下百日忌房勞惱怒日宜食猪肉數兩

惟亨按與前方藥品  
遯異則別當有所主  
而不舉主症但曰又  
方大使覽者不知所  
適從耳全非著書之  
言也

又方

用出山鉛九觔打造壺瓶一大把盛火

酒十觔奇良二十一兩乳香紅花各一

兩川椒龜版各二兩封瓶口坐鍋中水

煮一日夜取出埋地中三日去火毒每

日早翹任意飲數盃

、加味地黃丸 治病愈後精血未復者宜

服

熟地黃

八兩  
酒煮

山茱萸

山藥

各四  
兩

茯苓

牡丹皮

各二兩  
五錢

澤瀉

二兩

當

歸身

枸杞子

各三  
兩

右各製末擣熟地極爛和藥如乾加煉蜜再擣千杵如梧桐子大每日早炮服二錢淡鹽湯送下

補髓丸 治病愈後精髓空虛者必宜服

之

人參二

地黃四

當歸四

鹿茸一

五錢

枸杞三

兩

柏子

茯神

白朮

各二

麥門冬一兩

五錢

鍾乳粉七

錢

沈

香五

石斛二

兩

右各製末煉蜜和丸如桐子大每日早  
匙服七十丸秋石點湯送下醇酒亦可  
以人尿造之

安神丸

治病愈後精神恍惚升痰動火

煩渴

人參 柏子 當歸 麥冬 藜仁 各一

兩 生地 遠志 菖蒲 玄參 貝

母 黃連 五味 各七錢

右各製末龍眼肉七兩熬膏和丸如菉  
荳大辰砂爲衣每服五十丸燈心湯送

下

加味養榮丸 治婦人病愈後氣血衰少

發熱作嗽

當歸

三兩

熟地

二兩半

白芍

丹皮

各兩

半

香附

四兩

人參

貝母

阿膠

山藥

茯苓

黃芩

川芎

各一兩

白

朮

一兩

右各製末煉蜜擣和丸如桐子大每日早空服八九十丸淡鹽湯送下

助胃膏 治脾胃虛弱飲食少進肌膚不

澤

惟亨按飴餳建中湯  
雖曰潤胃和脾良劑

多食則發濕熱動瘀

火溫熱損齒而今此

方藥以飴餳煎煉解  
毒之藥品用之恐失  
配合之妙

奇良二十兩  
敲碎

甘艸二兩  
炙

枸杞子四  
兩

炒補骨脂三兩  
即破故紙

八兩  
蕙苡仁

炒

先用大棗二觔水三十盞煎至水減一  
半去大棗加前藥文火熬濃約存汁四

鍾加飴糖十兩再熬數沸盛磁瓶坐冷

水內一日每日服五六次每次服三錢

七後飲人參湯其効更速

凡患筋骨疼痛先服化毒丸七日外用後

# 方熨烙

## 、、熨烙方

惟亨接熨烙之方暫時止疼之工夫耳所

謂飯上逐蠅之類也

然不得已則用之在臨時之權耳必不在一定之方法矣

川烏  
艸烏  
肉桂  
軍薑

即子薑

胡葱  
各等

分擣  
細  
煮糯米飯和藥擣勻敷患處外

以火熨之

凡患喉癬久不愈者先服化毒丸七日外用後方吹之

## 、、吹藥方

西黃一  
即牛黃上品也

冰片一  
分

珍珠二  
分

珠砂八  
分

象牙末七

龍骨一  
錢

瑤珠一  
錢五分

裏金店內

用者  
是

右製共研極細盛磁罐患者先用苦茶  
汨漱日吹三五次

凡患鵝掌風癬先服化毒丸九日外用後

方薰洗方可擦藥

薰洗方 用桐油一觔內活蟾四隻文火

鵝冠血也醣盡之義也

煮之洗患處拭乾嗣用生雞腦醣五色  
粉霜擦患處以肉熱爲度日一次中病  
則已

五色粉霜 是外科要藥點黴瘡去腐肉  
長新肌能愈諸瘡殺諸虫敷諸毒

水銀二兩 鉛一兩 火硝四兩 白礬三兩

青鹽八錢

研勻入陽城罐內文火煨一香去其溼

氣用鐵油蓋口以鐵線扎緊鹽泥封  
固先文後武武火時蓋上擦水到三香  
離火取出埋土中二日夜取出晒乾研  
細盛罐聽用

膏藥方 貼楊梅瘡及癬瘡鵝掌風結毒  
破爛拔毒呼膿暖筋骨長肉生肌

千里光自然汁十兩煮酒六兩內當歸

圖某按胡面莽一名千里光和名世  
牟利胡摩與石决明同名異物

大黃赤芍肉桂生地玄參苦參躑躅花

各五錢文火煎濃約存汁一盃許收汁  
用麻油二十四兩加頭髮三兩煎至滴  
水成珠入煎藥汁文火煎和加研細鉛  
粉蜜陀僧各五兩緩緩攪轉俟火候卻  
好滴水不老不嫩離火加入研細乳香  
沒藥即黃藥 即白蠟黃占白占各三錢麝香三分粉霜  
一錢收罐坐水中出火毒攤貼須用重

湯頓軟

余按臟腑感染陰陽傳遞配製化毒十千  
凡以爲定法而服藥亦有條約但人之稟  
性不同有素服藥素不服藥素欲素不欲  
之殊在患者當請上工酌擬詳脈氣稟賦  
占也言合法則也  
藥性時候攻補不失始獲全功尊生者不  
可不察也

御  
批  
錄  
卷

三

惟亨按周禮有食醫

之職詳飲食宜忌凡

諸病有宜忌料固然

矣至如徽瘡一症嚴

不守禁忌則不能根

治而此症大概病因

循經出于一途故始

終禁忌法大同如此

書分各藏虛實立其

法則繁雜失正路予

約言禁忌法庶無差

謬乎

## 徽瘡宜忌

海寧陳司成九韶甫著

夫宜忌者卽所苦所欲也五臟各有所宜

五臟各有所忌如徽瘡一症舉世未諳

茲物宜忌并飲食宜忌混同施治殊不

知從其氣則和違其性則有偏勝之害

故凡有益於陽者必不宜乎陰有益於

陰者必不宜乎陽宜於燥者不宜乎溼

宜於溼者不宜乎陽宜於燥者不宜乎溼

治虛能收斂者不可以治實故藥物有

良毒之難齊氣味之莫測有相益相濟

相畏相惡相忌相制之不同不諳宜忌

者則其失也罔請以余所見聞者陳之

一友患便毒其勢熾盛欲速愈單服大

黃五錢不利又服七錢亦不利後加至

惟亨按凡用方藥與  
病情相近則必動伏  
火以激病而致其變  
乎必非大黃毒氣也

明矣 又按此書所舉者病家自服單方或自製藥餌而不任事於醫所以招過也  
宜爲病家覆轍之戒未宜戒醫也今之庸流作此等伎倆者或有之矣然未足與議  
云

兩許終不能通而大黃毒氣上攻七孔  
流血而斃一人染廣瘡服敗毒散不效  
後服商陸根汁遂吐瀉經兩日不止藥  
食俱不受六日而死一人患楊梅瘡毒  
結百會穴破爛兩年諸醫不効偶遇方  
士傳靈砒方卽製服之經七日齒落喉  
閉飲食不進而亡一人生棉花瘡無力

首枕用價取血也

音廣空也

贖藥用毒蛇一條酒煮罄飲即時昏暈

膚理腫裂出水至五日方知痛苦其瘡

猶不愈一人患瘡瘍便毒兼之筋骨疼

痛敷服艸藥不効又取活蟾七隻內豬

脂煮食食未畢作吐不已水漿不進方

延余治余胗之曰胃氣傷也非大劑人

參不治遂咀人參五錢加烏梅七個同

煎漸飲之又服一劑纔能進粥後用化

惟亨按小便下無不利字則義不通

毒甲字丸一料服盡而愈一人生魚口  
不痊服大料五虎湯少頃小便作脹日

方見上

夜叫噉苦不能溺邀余胗之余曰乃班

毛毒氣爲患當速解之卽用豬脂二兩

糯米五合粉艸五錢長流水煎頓服外

以葱白食鹽煎湯揉洗解出血筋數條

始通其毒仍不減後又生瘡如砂仁從

余調治方愈噫今之庸愚襲不經之方

惟亨按襲不經之方投有毒之藥者陳氏

故倉必保票已

卷下

七

爲太甚所謂以五十步當百步之類也耳

投有毒之藥外患未盡內毒尚存諸如此類悞莫能拔寧知脈症相對名實相

符方可投劑今以五臟苦欲藥物宜忌

謹錄于後

出赤問靈蘭秘典論

五藏生成篇

心爲君主之官神明出焉其華在面充在

惟亨按輯綴經語鑑演說修飾言辭凡五藏苦欲藥物忌宜爲醫者固所當講究也別有全書存焉非此書所能盡也

血脈爲陽中之太陽爲牡臟通於夏氣神能固守則氣血流通萬物係之以興亡思慮大過則虛邪從之病於內傷者

十居六七病於外感者百無四五調治

者當以安神養血爲主味忌鹹多食鹹

成篇

水克火  
出素問五藏生

則脈凝泣而變色味宜苦羊肉小麥杏

薤之屬心苦散緩急食酸以收之五味

藏氣法時論

子之屬是已歛則寧靜清明故宜酸以

收其緩也軟者和調之義也心君本和

調邪熱乘之則燥急故復用芒硝之酸

寒除其邪熱以軟其燥急堅勁之氣使

復其平也以鹹補之澤瀉導心氣以入腎也煩勞則虛而生熱故用參芪甘艸之甘溫以益元氣而虛熱自退故爲之瀉也心以下交於腎爲泰炒鹽地天泰卦交通之義之鹹以潤之卽得心與腎交也火空則發鹽爲水味得之使心氣下降是旣濟之道也有補之義焉故軟卽補也

心經藥食所宜

藥宜

惟亨按羅列忌宜藥食反使觀者茫洋迷津蓋因經藏見症而用方則忌宜在其中斯之謂得方之要也

**補** 人參 茶神 遠志 當歸 柏子 石菖蒲 紅花 天雄 桂心

血餘 紫石英 甘艸 苜蓿 辰砂

琥珀 乳香

即紫河車

胎元

**瀉** 升麻 細辛 麻黃 紫艸 木

通 川山甲 連翹 貝母 鐘金

赤茯苓 蜂房 牛角 珍珠 血結

即乳髮

片腦 赤小豆 忍冬花 黃連 牛

黃 麻

食宜

羊肉 鹿肉 雞卵 牛乳 犬肉

豬心

炙肉之類  
火肉

乾魚之類  
風魚

即東海夫人  
淡菜

雞卵

牛乳

犬肉

荔枝

芝麻

菜莢

蓴菜

橙

藕

梨

杏

棗

心經藥食所忌

藥忌

死砂 生砒 輕粉 苦參 麥冬

蛇 韶粉 蝸牛 硝

食忌

石首魚 蟹 螳 豬肝 鴨卵 鵝  
蜆 蛤 南麌 豆 茄 菜苔 詣

牲血

肝爲將軍之官謀慮出焉血之本魂之居

素問靈蘭秘典論

王城篇

也其萃在爪其充在筋爲陽中之少陽爲牡臟通於春氣魂靜則至道不亂木性易動動則有摧折之意焉怒甚則血不歸肝而溢於外病於外感內傷者居

半味忌辛多食辛則筋急而爪枯味宜

生成篇

酸犬肉小荳李韭之屬肝苦急急食甘

素問藏氣法時論

以緩之甘艸之屬是已扶蘇條達木之象也升發開展魂之用也故其性欲散

舒暢貌

素問藏氣法時論

書經曰曲真作酸食酸則木平火潤

急食辛以散之解其束縛也是散卽補  
不伸食辛解之也

也辛可以散川芎之屬是已若其大過  
則屈制之母使逾分酸可以收芍藥之  
屬是已急也歟也肝性之所苦也違其  
性而苦之肝斯虛矣補之以辛是明以  
散爲補也細辛生薑陳皮之屬是也

肝經藥食所宜

藥宜

補

當歸

川芎

地黃

山萸

酸

棗仁 遠志 茯神 日艸

阿膠

桂皮 木瓜 鳥梅 琥珀

辰砂

龍齒 鱷甲 牛黃

瀉

芍藥

膽艸

柴胡

青皮

忍

冬花 香附 丹皮 瓜蔞 菊花

升麻 木通 射干 秦皮 皂角

薄荷 全蝎 川山甲 降香 羚羊

乳香 片腦 珍珠 膽礬 疣蠶

麝

食宜

犬肉 鴨 雁 鹿肉

鱸魚

火肉  
多之類

風魚

豬腎

鷄卵

葡萄

橄欖

李

薺

林檎

馬齒莧

肝經藥食所忌

藥忌

死砂 生砒 輕粉 木鱉 胡黃連

商陸

食忌

石首魚 水鷄 鵝 鴨卵 猪肝

蝦 茄 蒜 芋 杏 諸血

脾  
同上

臓營之居也其華在脣四白其充在肌此爲至陰之類通於土氣爲牝臟意平

則智無散越宜健而不宜滯溼則滯矣

滯則邪氣從之病於內傷者多半調治

者當以去溼導滯味忌酸多食酸則肉

肺脾散也

抵腸而脣揭味宜甘牛肉粳米棗葵之

屬脾苦溼急食苦以燥之使復其性之

法時論

所喜脾斯健矣白朮之苦溫是已過燥

則復欲緩之以甘甘艸之屬是已稼穡  
之化故甘先入脾性欲健運氣旺則行

素問五藏生成篇

酸成篇

補之以甘入參是已長夏之令溼熱主

人脾氣斯困故當急食苦以瀉之黃連

之苦寒是已

素問厥論作虛則

法時論補之

虛則宜補炙甘艸之甘以

益血大棗之甘以益氣乃所以補其不

足也

脾經藥食所宜

藥宜

補

白朮

茯苓

人參

黃芪

薏

苡仁 山藥 陳皮 甘艸 蒼朮

扁荳 川石斛 荳蔻 天麻 常歸

奇良 雄黃 辰砂 丁香 姜麯

山楂

鴉

升麻 白芍 防風 白芷 砂

仁 烏藥 艋果 大黃 靈仙 鼠

粘 忍冬花 山甲 皂子 沈香

沒藥 乳香 山豆根 烏蛇 牛黃

卷

麝

食宜

牛肉 猪脂 鴨 犬肉 鹿肉 鰻

鱈 蝷 時魚 鷄卵 火肉 羊

鯽魚 猪腹 芡 蓮肉 栗 荔枝

橄欖 松子 川椒 薑 莱菔 芥

脾經藥食所忌

藥忌

死砂 生砒 苦參 胡黃連 地黃

膽艸 蝦蟆 蟠蚣

食忌

石首魚 鵝 猪肝 鴨卵 雉 蝦  
南麪 菱 梅 奈 糟 醋 榴

韭 諸血

肺爲相傳之官治節出焉氣之本魄之居也其華在毛其充在皮爲陽中之太陰

爲牝臟通於秋氣魄安則德修壽延氣常則順氣變則逆逆則違其性矣病於

外感者居半調治者當以清肅上焦而

使氣平味忌苦

多食苦五藏生成論

則皮枯而毛折

本支法時論

味宜辛鷄肉黃黍桃蔥之屬

肺苦氣上本支法時論

逆急食苦以瀉之

黃芩之屬本支法時論

是已其政

之屬本支法時論

歛肅故其性善收宜食酸以收之白芍

本支法時論

之屬是已

克金本支法時論

賊肺者熱也肺受熱邪急食

辛以瀉之桑白皮之屬是已不斂則氣無所管束是肺失其職也故宜補之以酸使遂其收斂之性是卽補也五味子之屬是已

肺經藥食所宜

藥宜

補

人參 黃芪 茯苓 阿膠

飴

荳仁 木香 桂枝 砂參 蛤蚧

薑

琥珀 鍾乳粉 辰砂 牛黃

瀉 麻黃 杏仁 防風 升麻 川

貝母 桔梗 羌活 荊芥 橘紅

射干 檳榔 薜皮 花粉 牙皂

蘭葉 槐花 鼠粘 山甲 僵蠶

神水 片腦 白花蛇 膜

食宜

鷄 猪肺 火肉 風魚 猪腹 羊

肉 鷄卵 牛乳 鴿 鵝 胡荽

菜菔 芥 麻油 松子 榛子 梨

榧 桤 葱 蜜

肺經藥食所忌

藥忌

死砂 生砒 苦參 黃連 班毛

胡連 天門冬 鉛粉 硫黃 荆蘚

食忌

石首魚 蝦 蟹 鴨卵 猪肝 麵

筋 杏 奈 楊梅 銀杏 萍草

諸血

腎爲作強之官伎巧出焉封藏之本精之

同上

處也其華在鬚髮其充在骨爲陰中之

少陰爲牝臟通於冬氣志營則骨髓滿

實屬真陰其性本潤故惡燥涸病於腑  
者多外感病於臟者多內傷調治者當

以滋陰益精味忌甘多食甘則骨痛而

齒落味宜鹹豕肉大豆栗藿之屬

法時論腎苦

燥急食辛以潤之知母之屬是已欲堅

急食苦以堅之蓋腎非堅則無以稱作

濟時論

強之職四氣以遇溼熱則軟遇寒冷則

堅五味以得鹹則軟得苦則堅故宜急

食苦以堅之黃柏味苦氣寒可以堅腎

故宜急食以遂其欲堅之性也以苦補

之是堅卽補也地黃黃柏是已鹹能軟  
堅卽瀉也澤瀉是已虛者精氣奪也然  
非益精無以爲補故宜熟地黃黃柏補  
之

腎經藥食所宜

藥宜

補 熟地 柏子仁 山萸 五味 狗脊  
川牛膝 當歸 杜仲 首烏

故紙 益智仁 鹿茸 敗龜 鱷甲

附子 肉桂 五加皮 蛇床 羊霍  
淫

鍾乳 磁石 虎骨 陽起石 蛇床

腎 紫河車 紅鉛 天靈蓋

製造法見四春

瀉 黃柏 知母 澤瀉 獨活 沈

香 川山甲 蟬退 全蝎 血竭

烏藥 琥珀 牛黃 麝

食宜

豕肉 猪腎 醃鷄 甲魚 鰻鱺

鹿肉 犬肉 雞卵 火肉 風魚

雀 芙 胡桃 乾筭 栗

腎經藥食所忌

藥忌

靈砂 李師 紅白有造法 靈砒 輕粉 胡連 蟾酥

蜣螂

食忌

牛肉 鵝 石首魚 鴨卵 清肝

蝦 蛙 鯿魚本名鮰魚 茄 甜菜 蕃麥

南麪 柑 糖 青梅

宜忌一則雖不及於傷寒痘疹投劑少差  
死生立判是証少錯輕必變而爲重重  
死生立判是証少錯輕必變而爲重重  
必至於傾危易曰君子慎始差若毫釐謬以千里千里毋得忽略且宜  
忌不爲智者道也如產後無虛肝無補  
法痘瘡不宜汗下傷寒不宜進補此數

圖基按至真要大

論云大毒治病十

去其六中毒治病

十去其八

者皆謂粗工不諳病之進退故有是戒  
余觀上古哲人治疾或以毒藥攻之投  
毒藥者不盡劑也所以有十去其幾之  
約殊不知十去其幾之約爲最難而又

難於識病氣之淺深也明於病氣淺深

者又不拘於藥之良毒矣如扁鵲投人

毒藥名聞諸侯五石散不忌參朮感應

出昇劑

惟亨按仲景備急丸  
巴黃併用何故引感

應丸可謂不明古方  
也乎

丸巴黃竝施產後以人參五靈脂同劑

此皆古人心契意會立方之妙故良將  
用兵奇正虛實互施者神算故也業此  
術者豈不亦猶良將乎哉傳曰神而明  
之存乎其人信夫

徵瘡祕錄畢