

丹溪心法附餘十二卷

風熱門

斑疹

五十九

已集

丹溪心法

○斑屬風熱挾痰而作自裏而發於外通聖散中消息當以微汗散之切不可下 內傷斑者胃氣極虛 身火遊行於外所致宜補以降於陰証略例中求之 發斑似傷寒者痰熱之病發於外微汗以散之若下之非理 疹屬執蘊痰在肺清肺六降痰或解散出汗亦有可下者 疹即瘡疹汗之即愈通聖散中消息之 癩疹多屬脾隱熱在皮膚之間故言癩疹也發則多痒或不仁者是蕪風蕪濕之殊色紅者蕪火化也 黃瓜

水調伏龍肝去紅點斑

戴云斑有色點而無頭粒者隨地嘔吐又出是也非若

斑之無頭粒者當明辨之

附諸方

玄參升麻湯 三因方治 寒失下熱毒在胃發斑或汗下吐後

餘毒不散表虛裏實發於外甚則煩躁譫妄

玄參 升麻 甘草 炙各等分

右呖咀每服四錢水一鐘煎七分溫服濕毒發斑亦宜服之

陽毒升麻湯 活人方治 陽毒赤斑狂言咽喉痛出膿血

升麻 三分 犀角 干 黃芩 人參

甘草 炙各二分

右咬咀水二鍾煎至一鍾去滓溫服不拘時

梔子仁湯 活人方 治發斑煩燥面赤咽痛潮熱

梔子仁

赤芍藥

大青

知母 各一兩

升麻

黃芩

石膏

甘草

各二兩 炙半兩

杏仁

去破尖 柴胡 一兩五錢

右咬咀每張四錢姜三片豉百粒水煎溫服

化癍湯 治傷寒汗吐下後癍發脉虛

人參

石膏

知母

甘草

守真加白朮一方加玄參

右咬咀時時煎服

黃連橘皮湯

治濕毒發斑

黃連四錢 陳橘皮 杏仁去皮 枳實

麻黃湯去節 葛根各二兩 厚朴姜製 甘草各一兩

右咬咀水煎服

調中湯 治內傷外感而發陰斑

蒼朮一錢 半陳皮一錢 砂仁 藿香 芍藥炒

甘草炙 桔梗 半夏 白芷 羌活

枳殼各一錢 川芎五分 麻黃 桂枝各五分

右咬咀姜三片水煎服

消毒犀角飲子

牛旁子六錢 荆芥 防風銕 三甘草一錢

右咬咀水煎服

通聖散出丹溪經驗方

川芎

當歸

麻黃

薄荷

連翹

白芍

各半

黃芩

石膏

桔梗

各一

滑石

三

荊芥

梔子

白朮

各二

甘草

二

右剉水煎服

如身疼加蒼朮羌活一痰嗽加半夏

每服細末三錢生姜三片搗細盪起煎沸服之

已集

豆眩

六十

丹溪心法

○頭眩○痰挾氣虛併火○治痰為主挾補氣藥及降火藥○
无痰則不作眩痰因火動又有濕痰者○濕痰者多宜二陳湯

丹溪心法附余

火者加酒苓挾氣虛者相火也治痰為先挾氣藥降火藥如東垣半下白朮天麻湯之類○眩暈不可當者以大大黃酒炒為末茶湯調下○火動其痰用二陳加黃芩蒼朮羌活散風行濕○左手脈數執多脈瀆有死血○右手肺實有痰積脈大是久病久一虛久病之人氣血俱虛而脈大痰濁不降也○昔有一老婦患赤白帶一年半豆眩坐立不得睡之則安專治赤白帶七愈其眩亦安

附脈理

脈訣華要曰風寒暑濕氣鬱生涎下虛上實皆暈而眩風浮寒
系濕細暑虛涎弦而滑虛脈則无治眩暈法尤當審諦生理
痰氣次隨證治

附諸方

獨活散

楊氏家藏方

消風化痰治豆目眩暈

細辛

去葉 一刃

石膏

研

甘草

炙各 一刃

防風

去芦

藁本

去土

旋覆花

蔓京子

川芎

獨活

去青各一刃

右為末每服二升水一鍾姜三片煎至六分食後熱服

川芎散

本事方

治風眩豆暈

山藥

井菊花

人參

茯神

小川芎各五升

山茱萸肉

一刃

右為末每服二升酒調不拘時日三服不可誤用野菊花

芳木湯

濟生方

治冒雨中濕眩暈吐逆豆重不食

川芎

半夏

白朮

礞石

甘草

炙各 一刃

右或咀每服四升水一鍾姜七片煎七分濕服不拘時

芎朮除眩湯

直指方

治感寒濕豆目眩暈

甘草

炙

川芎

附子

白朮

官桂等分

右或咀每服三升姜七片水煎濕服食前

荆黃湯

張子和方

治豆眩

大黃

荆芥穗

防風各等分

石為粗末大作劑料水煎去滓服以利為度

芎辛湯

濟生方

治風寒在腦或感邪濕豆重痛眩暈欲倒嘔吐

不定並皆治之

川芎

一刃

細辛

洗去土

白朮

甘草

各半刃

右或咀每服一二兩姜五片茶芽少許水一鍾半煎八分臨臥

温服或食後服亦可

豆量方 利痰清氣降火

南星分灸五 半夏一分 桔梗七分 枳殼一分 陳皮一分

甘草二分 茯苓一分 黃芩一分

右作一服姜七片水煎服食後

香橘飲 治氣虛眩暈

木香 白朮 半夏 麩 橘皮 茯苓

砂仁各半 丁香 甘草灸二分五分

右剉散水二鍾姜五片煎服 加当归川芎官桂治血虛眩暈

白附子丸 治風痰上厥眩暈豆疼

全蝎炒半 白附子炮 南星炮 半夏 旋覆花

耳菊

天麻

川芎

橘紅

僵蚕炒

干姜

生各一刃

右為末生薑半斤取汁打糊丸梧子大煎荊芥湯下五十九

人參前胡湯

治風痰豆暈日眩

半下麴

木香

枳殼炒

紫蘇

赤茯苓

南星炮

甘草

炙各五各

人參

三各

前胡

橘紅

各五各

石劉散每服五名姜五片水煎服

川芎茶調散

治風眩豆痛

見傷風

卞白朮天麻湯

見豆痛

喝起散

大金良方

治婦人血風攻腦豆旋悶倒不知人事喝起

草即苍耳草也

右取嫩心不以多少阴干為末每服二升酒調下

里錫丹 治早起眩暈須臾自定以為常此因老痰鬱痰所作

必須此藥劫之 見痰類

○廣按豆眩之症多主於痰无痰則不作眩有因寒痰濕痰

者有因熱痰風痰者有因氣虛挾痰者有因血虛挾痰者

其証不一也夫寒痰濕痰作眩或因外感寒濕或因內傷

生冷熱痰風痰作眩或因外感風暑或因內動七情氣虛

眩暈或因脾虛不進飲食或因胃弱嘔吐泄瀉血虛眩暈

男子每因吐血下血女人每因崩中產後而作也已上數

方雖各有所主未能尽其變在智者擴充之也又嘗論之

夫咳嗽豆痛豆眩三者乃病之標必治其病之本而病方

已如產後眩暈只補其血如脾虛眩暈只補其氣是治其病之本也

豆痛

六十一 附眉眶痛

丹溪心法

○豆痛多主於痰痛甚者火多可有吐者可下者 清空膏治諸豆痛除血虛豆痛不可治 出東垣試効方 血虛豆痛自魚尾上攻豆痛用芎歸湯古方有追涎藥

附諸賢論

王節齋曰久豆痛病畧感風寒便發寒月須重綿厚帕包裹者此屬鬱熱本熱而標寒世人不識率用辛溫解散之藥暫時得効誤認為寒殊不知因其本有鬱熱毛竅常踈故風寒易

入外寒束其內熱閉逆而為痛來熱之藥雖能開通閉逆敵
其標之寒邪然以熱濟執病本益深惡寒愈甚矣唯當瀉火
涼血為主而佐以辛溫散表之劑以從治法治之則病可愈
而根可除也 ○附脈理

脈訣舉要曰頭痛陽弦浮風緊寒風執洪數溫細而以蒼廬頭
痛雖弦必瀆痰厥則滑腎厥空實

頭痛治例

心法附錄曰頭痛須用川芎如不愈各加引經藥

太陽川芎 陽明白芷 少陽柴胡 太陰蒼朮

少陰細辛 厥陰吳茱萸

如肥人頭痛是溫痰宜半夏蒼朮

如瘦人頭痛是熱宜酒製黃芩防風

如感冒頭痛宜防風羌活藁本白芷

如風熱在上頭痛宜天麻蔓荊子台芎酒製黃芩

如白人頭痛是氣虛宜黃芪酒洗生地黃南星秘藏安神湯

如形瘦蒼黑之人頭痛乃是血虛宜當歸川芎酒黃芩之類

如苦頭痛用細辛

如頂顛痛宜藁本防風柴胡東垣云頂顛痛須用藁本去川芎

且如太陽頭痛惡風脈浮桑川芎羌活獨活麻黃之類為主

少陽頭痛脈弦細往來寒熱柴胡為主

陽明頭痛自汗發熱惡寒脈浮緩長實升麻葛根石膏白芷

為主

木陰頭痛必有痰体重或腹痛脈沉緩以蒼木半夏星為主
少陰頭痛是寒氣逆為寒厥其脈沉細麻黃附子細辛為主
厥陰頭痛或吐痰沫厥冷其脈浮緩以吳茱萸湯主之
血虛頭痛當歸川芎為主

氣虛頭痛人參黃芪為主

氣血俱虛頭痛調中益氣湯內加川芎三分蔓京子三分細

辛三分其効如神

又有痲厥頭痛所感不一是知方者體也法者用也徒知伏
而不知用者弊體用不失可謂上工矣

附諸方

加減三五七散

和劑方治八風五痺肢體不仁大治風寒入腦

陽虛頭痛畏聞人声目旋運搏耳內蟬鳴應有濕痺脚氣緩弱並皆治之

山茱萸 去核三月

細辛 一月半

乾姜 炮三

防風 去声四月

茯苓 玄皮三月

附子 三个半炮去皮脐

右為細末每服温酒食前調服

川芎茶調散 治諸風上攻頭目偏正頭痛

見傷風

都梁丸 和剂方 治風吹項背頭目昏眩以及腦痛婦人產前產後傷風頭痛

後傷風頭痛

杏白芷揀大者沸湯洗五次剉晒乾

右為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸紙嚼用荆芥湯下

小弓辛湯 齊生方

治風实在腦頭痛眩暈嘔吐不已

川芎 一刃

細辛 洗去土

白朮

甘草 炙各半刃

右吹咀每服四升水一盞姜五片茶芽少許煎服

一方 治傷風感風一切豆痛

甘菊 一刃

細辛 半刃

甘草 七升

白芷 羌活

香附子

薄荷 各三刃

荆芥 二十枝

茵陳 半刃

蒼朮 洪浸

川芎 各一刃

右為末每服二升茶清調下婦人產後當歸石膏末調下

定風餅子 秘方 治偏正頭痛

草烏豆 半刃

香白芷 一刃

川芎 一刃

防風 天麻

耳草 炒各一刃

細辛 半刃

右為末姜汁丸如龙眼大捏作餅子每服一餅食後茶湯下

川芎丸 圣惠方 消風壅化痰涎利咽膈清豆目旋暈心忪煩熱

頸項緊急肩背拘蹇肢體煩疼皮膚瘙癢痒腦昏目疼鼻塞声

重面遊風

川芎 薄荷 各七刀 甘草 细辛

防風 各二刀五刀 桔槔 十刀

右為末煉蜜丸每兩半作五十九丸每服一丸細嚼茶清食後

臨卧时下

三芎餅子 濟生方

川芎 抚芎 干姜 炮 甘草 藁本 去声

天南星 炮去皮 防風 去声 白朮 各等分

一方有苍耳死白朮

右為末妻汁蒸餅為劑如雞豆大捏作餅每服五餅細嚼

茶清下

徹清膏

蔓京亭

細辛各一分

薄荷葉

川芎各三分

生甘草

炙甘草各五分

藁本一分

右為末茶清調下二分

神靈散 治偏正豆疼不止暫止及破傷風等疾

焰硝一刀

黃丹乳香

雄黃各三分

沒藥

右為細末令患人用酪溫水用竹筒吹藥入鼻中少許

一方 治偏豆疼以雄黃細辛等分研末每服一字左边疼吹

右鼻內右边疼吹左鼻內

○已上諸方辛温外散風寒之劑

天麻散

治豆項痛豆面腫拘急風傷衛發躁熱方見風熱

生朱丹

御藥院方 治諸風痰盛豆痛目眩氣鬱積滯胸膈不利

朱砂

一刃二分半 雀腦一分

白附子

炮去皮臍半斤

石膏

燒通紅令冷半斤

右為末燒粟米飲為丸如小豆大硃砂為衣每服三十九食

後茶酒任下

大川芎丸

治首風暈眩外合陽氣風寒相搏胸膈痰飲偏正

豆疼

川芎

一斤

天麻

四刃甘州者

右為末煉蜜為丸每兩作十九每服一丸細嚼茶酒下食後

上清散 集成 治因風頭痛眉骨眼眶俱痛不可忍者

川芎 郁金 芍藥 荆芥穗 薄荷葉

芒消 各半 乳香 沒藥 各半 腦子 一分半

右為末每服一字鼻內搐之

菊花散 和劑方 治風熱上攻頭痛不止

石膏 其菊花 防風 旋覆花 只壳

蔓荊子 甘草 羌活 各一各半

右用水二盞生姜五片煎至一盞去渣溫服

芩芷散 直指方 治風壅頭痛

川芎 白芷 荆芥穗 軟石膏

右為末每服一匙食後沸湯調下

川芎散 按粹方 治偏頭痛神効

甘菊花 石羔 川芎各三

右為細末每服一匙茶清調下一方有白姜蚕六匙生用

石膏散 按粹方 治頭痛不可忍

麻黃節去根 右羔各二 何首烏半斤 乾姜七匙半

右為細末每服三匙臘茶清調服

占頭散 聖惠方 治偏正頭痛

川芎生二刀 香附子去毛四刀

右為末每服一匙好茶調下常服除根

一方 治頭痛去風痰

南星一个 皂角十四个 白梅一个 姜三片

者七片 生七個

芽茶 一撮

葱頭

一寸四分

右將前藥俱在石器內搗碎水一盞半煎至一盞去渣溫服不可輕犯鉄器搗

一方 治頭痛連眼痛 此風痰上攻須用白芷開之

兩前茶

川芎

白芷

防風

藁本

細辛

當歸

右用水煎服

川芎散 聖惠方 治頭風偏正頭痛

羌活

細辛

川芎

香附子

槐花

耳草 灸

石膏

荊芥穗

薄荷

菊花

茵陳

防風

各一兩

右為末每服二升茶清調食後服忌動風物

○已上諸方辛平外散風寒內消風熱之劑

清空膏 治偏正頭痛年深不愈者又治風濕熱頭上壅及腦

痛除血虛頭痛不治餘皆治之

川芎五升 柴胡七升 黃連酒炒 防風 羌活各一升

炙甘草一升五升 細挺子黃芩三升去皮一半酒製一

右為末每服二升熱盞內入茶少許湯調如膏抹在口

用白湯送下臨卧 如苦頭痛每服加細辛二分 痰

痛脉緩減羌活防風川芎甘草加半夏一兩五升 如偏正

頭痛服之不愈減羌活防風川芎一半加柴胡一倍 如發

熱惡熱而渴此陽明頭痛只與白虎湯加吳白芷白虎湯方見濕熱類

聖砂丹 後葉院方 治風執鬱結氣血蘊滯頭目昏眩鼻塞聲重

鼻流清涕口苦舌乾咽盜不利胸膈痞悶咳嗽痰實腸胃燥
澁小便赤黃或腎水陰虛心火熾甚及偏正頭疼髮落牙痛
遍身麻木疥癬瘡瘍一切風執並皆治之

大麻 獨活 羌活 細辛 石膏

防風 連翹 薄荷 各一兩 川芎 梔子

芍藥 荆芥穗 當歸 黃芩 大黃 生

全蝎 去毒 菊花 人參 白木 各半兩 硃砂 二兩為末

寒水石 生 桔梗 各一兩 縮砂仁 二錢半 生甘草 一兩

滑石 四兩

右為末煉蜜丸每兩作十九硃砂為衣每服一丸細嚼茶清

送下

真珠散

聖惠方

治偏正頭痛頭風

盆硝

七錢

白滑石

半兩

乳香

一錢

片腦

少許

右研細用一字口噙水啗鼻內

豆粉丸

聖惠方

治風熱頭疼

川芎

細辛

苒草

白芷

豆粉

各二分半

薄荷

右膏

各半

朴硝

二錢

右為細末煉蜜和丸如彈子大石膏末為衣每服一九細嚼

茶清下

川芎散

聖惠方

治風盛膈壅鼻塞清涕熱氣攻眼下淚多眵

間緊急作偏頭痛

川芎

柴胡各一兩

半夏麩

甘草炙

其菊花

細辛

人參

前胡

防風各半兩

右咬咀每服八錢水一盞半生姜三片薄荷少許煎至八分

溫服

安神湯

聖惠方

治頭痛頭旋眼黑

羌活

黃蘗各一兩

防風二錢

柴胡

升麻

知母

酒浸

生地黄

各半兩酒浸

黃芪

三兩

生甘草

二錢

加葛荆子

半錢

川芎

三分

炙甘草

三錢

右咬咀每服八錢水一盞半煎至八分去渣溫服食後

治頭痛

片苓酒浸透晒乾為末茶清調下 治諸般頭痛亦治

虛頭痛

治頭痛如破

酒炒大黃半兩一半茶煎

○已上諸方辛涼內消風熱之劑

定風餅子 治風寒客於陽經和傷腠理背脊強直言語蹇澀

體執惡寒痰厥頭痛肉攣筋陽手顫鼻淵

方見傷風

如聖餅子 和劑方 治風寒伏留陽經氣厥痰飲一切頭痛

防風 天麻 各半兩 南星 洗 乾姜 川芎

甘草 川烏 各一兩 半夏 生半兩

右為末小丸作餅子每五餅同荆芥細嚼茶酒下瘡寮方加

細辛

二生丸 濟生方 治痰厥頭痛

半夏

白附子

天南星 各等分

右為末 生姜自然汁浸蒸餅為丸 如菘豆大 每服四十九食

前姜湯米飲任下

大香散

開易方

治年久頭風頭痛不得愈者

天南星

半夏

湯洗去滑盡

川芎

去皮

白芷

各等分

右咬咀 每服四錢 水一盞 煎一半 入姜汁半盞 煎八分 溫服

九龍丸

聖惠方

治男女八般頭風一切頭痛

川芎

石膏

白芷

川芎頭

半夏

南星

各半兩

加細辛

全蝎

各二錢半

右為末薑汁為丸如梧桐子大每服五十九茶清送下

一不卧散 治頭痛不可忍者

玄胡索 七枚 青黛 二錢 猪牙皂角 肥實者刮去皮及子一兩

右為末用水調丸成小餅子如杏仁大用寺令病者仰卧以

水化開用竹管送入男左女右鼻中竟藥味至喉少酸令病

者坐却令咬定銅錢一箇於當門齒上當見涎出成盆即愈

士真丸 濟生方 治腎厥頭痛不可忍其脉舉之則弦按之則堅

生硫黃 二兩 研 石膏 便者 煨 半夏 湯洗 七次 硝石 別研各一兩

右為末研勻用生姜汁煮糊丸如梧子大每服四十九食前

姜湯米飲任下虛寒甚者去石膏用鍾乳粉一兩

芎烏散 治氣厥頭痛因氣所觸心腹脹滿嘔吐酸水頭昏

川芎

天公烏藥 各等分

右為細末每服二錢臘茶清調服

芎桂湯

三因方

治胃濕頭痛身重眩暈痛極

附子

生去皮
臍半兩

白木

川芎

桂心 各二錢半

甘草

一錢半

右咬咀每服四錢水一盞姜七片棗子一箇煎食前服

○已上諸方治痰厥腎厥着濕之劑

順氣和中湯

治氣虛頭痛此藥升陽補氣頭痛自愈

黃芪

半錢

人參

一錢

甘草

炙五分

白木

陳皮

當歸

芍藥

各五分

升麻

柴胡

各三分

細辛

蔓荊子

川芎

各二分

右作一服水煎食後服 亦治氣血俱虛頭痛

半夏白朮天麻湯 治服胃証已經服疎風丸下二三次元證

不瘳增以吐逆痰唾稠粘眼黑頭旋目不敢開頭苦痛如裂

四肢厥冷不得安卧此氣虛頭痛也

黃柏酒洗 乾姜三分 澤瀉 白茯苓 天麻

黃芪 人參 蒼木各五分 炒神麩 白朮各一錢

麥芽 半夏易洗 陳皮各一錢半

右每服五錢水煎熱服

芩歸湯 治血虛頭痛

川芎 當歸等分

右每服五錢水煎服

回邪散 入全良方 治婦人血風眩暈頭痛

菊花 當歸 旋覆花 荆芥穗

右等分為細末每服二錢葱白三寸茶末二錢水一盞半煎至八分去滓食後溫服

調中益氣湯 治氣血俱虛頭痛

內加川芎三分蔓荊子三分細辛二分 方見脾胃

○已上諸方治氣虛血虛之劑

丹溪心法

○冒暈痛屬風熱與痰 作風痰治類痛風

又方

黃芩 酒浸燒 白芷

右為末茶清調二錢

又方

川烏

草烏

二味為君童便浸炒

羌活

黃芩

甘草

等分為佐

右為細末茶清調服

一本加南星

附諸方

選奇方

治眉骨痛不可忍大有効

羌活

防風

各二錢

甘草 二錢 夏月生冬炒

酒黃芩

一錢 冬月不用有熱者用

右每服三錢水煎食後溫服水一鍾煎七分

上清散 治因風頭痛眉骨眼睡俱痛不可忍者

一方治頭痛連眼痛

俱見頭痛

已集

頭風

六十二

丹溪心法

○傷痰者多有執有風有血虛 在左屬風薄荷荆芥屬血

虛川芎當歸 在右屬痰蒼木半夏屬執酒苓為主又屬溫

痰川芎南星蒼木 偏頭風在左而屬風者用荆芥薄荷此

二味即是治之主藥有君臣佐使之分凡主病者為君而多

臣次之佐又次之須要察其煎見何症而佐使之如有痰即

以二陳湯治痰而佐之他症皆倣此又須察識病情全在活

法出入加減不可執方

入方

酒片苓一又蒼朮

羌活

防風各五分

細辛二分

蒼耳三分

右為末每服三錢生姜一大片同搗勻茶湯盪起服之

又方

酒片苓

五分

蒼朮

二分

羌活

蒼耳

川芎

生甘草

酒黃連

各一分半

半夏曲炒

三分半

右為末服法同前

瘦人搗藥

軟石膏

朴硝

各五分

腦子

荆芥

檀香皮

薄荷

各一分

白芷

細辛

各一分

右為末痛鼻內

頭痒風骨髮黃

用大黃酒浸炒為末茶調服

粒金搐鼻方 治偏頭風

藁本

玄胡索

白芷

川芎

青黛各一 尊搥不以多少研細用獾猪膽汁拌勻再入膽

內懸陰乾與前等分

右為末入製華搥末一兩半用無根水丸每服一粒長流水

化開搐鼻以銅錢二三文口咬定出涎

治頭風

烏頭尖

七箇

荆芥

防風

甘草

蔓荊子

台芳

桔梗

麻黃

右為末茶調

一人頭風鼻塞

南星

蒼朮

酒苓

辛荑

川芎各分

右為末茶調

附諸方

川芎散

拔粹方

治偏頭痛頭風神効

其菊花

石膏

川芎

各三升

右為末每服一錢茶清調下一方有白姜蚕六錢生用

消風散

和劑方

治諸風上攻頭目昏眩偏正頭風及婦人頭皮

腫痒並皆治之

川芎茶調散和劑方治諸風上攻頭目昏重偏正頭痛頭風並

見傷風

菊花茶調散治諸風頭目昏重偏正頭痛頭風鼻塞

菊花

川芎

荆芥穗

羌活

甘草

白芷

各

細辛

洗淨

防風

去蘆

一

蟬蛻

殭蚕

薄荷

各五分

右為末每服二錢食後用茶清調下

芎辛湯治膈痰風厥頭目昏疼鼻塞聲重肩背拘急

川芎

五

細辛

三

甘草

多

一

分

右用水煎食後服

一方 治一切頭風

用猪牙皂角炮玄胡索各一錢青黛半錢為末滴水為丸如
梧子大捏作餅子晒乾每用一餅新水化開男左女右仰面
以蘆筒鼻內灌之口咬銅錢一十五文其涎便出更不再發
亦治痰疾妙

一方

天麻

防風

川芎

等分

右為末每服三錢溫酒食後調下以豆豉湯洗頭避風即愈
方 治偏頭風

用草脫為末令患者口中含水如左邊痛左鼻吸一字右邊
痛右鼻吸一字甚効

金花散 治頭風

川芎

川烏

白芷各等分

右為末 每服二錢 生葱三寸 薄荷葉三四皮 同煎食後服

灸法

宜灸顛會百會前頂上星等穴瘡

已集

眼目 六十三

丹溪心法

○眼黑睛有翳皆用知母黃柏 眼睛疼知母黃柏瀉腎火當

婦養陰水 眼中風淚出食後吞龍會丸數粒日三次 冬

月眼暴發痛亦當解散不宜用涼藥

入方

神効七宝膏

治暴發眼熱腫有翳膜者

麩仁

去油

白礪砂

片腦

硃砂

右用蜜調成膏點眼

爛眶眼

薄荷

荆芥

細辛

右為粗末如燒香狀燒之以青碗塗蜜少許於內覆香烟上
取烟盡之後以小言罐收烟藏之凡眼有風熱多淚者皆可
點此是陽明經有風熱所致

生熟地黃丸

治血虛眼

見後

龍會丸

見協痛

一人病眼至春夏便常作翳治

黃芩

酒浸

南星

善製

香附

童便浸

蒼朮

童便浸

各二兩

道芽

酒浸

一兩半

山梔

炒一兩

龍膽草

酒浸

陳皮

連翹

蘿蔔子

蒸青

各半兩

柴胡

三兩

右為末神麩糊丸

附諸食論

玉節齋曰眼赤腫痛古方用藥內外不同在內湯散用苦寒辛

涼之藥以瀉其火在外點洗則用辛熱辛涼之藥必散其邪

故點藥莫要於冰片而冰片大辛熱以其辛性甚故借以拔

出火邪而散其熱氣古方用燒酒洗眼或用乾姜末生薑汁

點眼者皆此意也蓋赤眼是火邪內炎上攻於目故內治用

苦寒之藥是治其本如鍋底之去薪也然火邪既客於目從
內出外若外用寒涼以阻逆之則鬱火內攻不得散矣故點
藥用辛熱而洗眼用熱湯是火鬱則發因而散之從治法也
世人不知冰片為劫藥而誤誌為寒常用點眼遂致積熱入
目而昏暗瘴翳故云眼不點不瞎者此也又不知外治忌寒
涼而妄將冷水冷物冷藥搨洗嘗致昏瞎者有之

附諸方

明目流氣飲 和劑方 治肝經不定內生風熱上攻眼目視物不
明常見黑花當風多淚癢澁難開或生障翳婦人血風時行
暴赤一切眼疾並皆治之

大黃 炮

牛蒡子 炒

川芎

菊花

去皮

白蔞黎炒去刺

細辛去苗 防風去苗

玄參去蘆 山梔子去皮 黃芩去蘆 甘草炙

蔓荊子去白

荊芥去梗 木賊去根節 各一兩

草决明一兩半

蒼朮米泔浸炒 二兩

右為末每服二錢臨卧用冷酒調下

洗心散和劑方 治風痰壅滿心經積熱邪氣上衝眼澁睛痛或

腫或赤迎風多淚怕日豈明並皆治之 方見火類

洗肝散和劑方 治風毒攻上暴作赤目腫痛澁多淚

薄荷去梗 當歸 羌活 防風各去 川芎

甘草 大黃各一兩

右為末每服三錢食後熱水調下

丹溪八法附錄
密蒙花散和劑方治風氣攻注兩眼昏暗多淚羞明并暴赤腫

蜜蒙花揀淨 杜蒺藜炒去尖 羌活去蘆 木賊 菊花

石决明用鹽同東流水煮沸時取研粉等分

右為末每服一錢臘茶清食後調下

撥雲散和劑方治男子婦人風毒上攻眼目昏暗翳膜睛怕日

羞明一切風毒損疾並皆治之

羌活 防風 柴胡 甘草炒各一斤

右為末每服二錢水一鍾煎服食後薄荷湯調茶并菊花苗

煎湯皆可服忌諸毒物

蟬花散和劑方治肝經蘊熱毒氣上攻眼目赤腫多淚羞明一

切風毒并宜服之

穀精草 去土

菊花 去梗

蟬蛻 洗去土

羌活

甘草

白蒺藜

少去刺

草决明

防风 去蘆

山梔子

去皮

川芎 不見火

密蒙花

去枝

荆芥穗

去梗

黃芩 去土

蔓荆子

去皮

木賊

洗淨各等分

右為末每服二錢食後茶清調服或荆芥湯調亦可

菊花散和劑方治肝生風毒眼目赤腫昏暗羞明多淚澀痛

菊花

去梗

羌活

去蘆

白蒺藜

少去刺

木賊

去節各三兩

蟬蛻

去而足翅三兩

右為末每服二錢食後茶清調下

四生散 治肝腎風毒上攻眼赤痒痛不時羞明方見風熱

豈窮丸 御藥院方治遠視不明常見黑花久服明目

芫窮

菊花

荊芥

薄荷

其草各一兩

蒼朮

二兩米泔浸

右為末陳蜜丸如梧子大每服五十九食後茶清下

荊芥散

三因方

治肝經蘊熱眼目赤腫

荊芥穗

當歸

赤芍藥

各一兩

黃連

一兩

右吹咀每服三錢水一鍾煎三沸濾去滓溫服或洗

十全神麴丸

三因方

明眼目百歲可讀細書常服有效

神麴

四兩

光明珠

砂

一兩

磁石

二兩

煨醋重淬

右為末煉蜜丸如梧子大每服二十九食後茶飲下

黃連丸

本事方

治肝經風熱上攻眼目澁痛不可用藥補者

乾熟地黃

一兩半

黃連

決明子

各一兩

後藥

光明硃砂

甘菊花

防風

羌活

桂心各半兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服三十丸食後熟水下

決明子散

濟生方

治風毒上攻眼目腫痛或卒生翳膜或赤澁

翳肉或痒或痛羞明多淚

黃芩

甘菊花去枝梗

木賊

決明子

石膏

赤芍藥

川芎

川羌活去芦甘草

蔓荆子

石決明各一兩

右為末每服三錢水一鍾姜五片煎至六分食後服

草龍膽散至惠方治風毒熱氣攻衝眼目暴赤滲澁羞明及腫

痛多眵迎風有淚翳膜攀睛翳肉癢痛

龍膽草洗去 菊花去梗 木賊洗淨 草決明微炒

甘草炙各二兩 香附子炒去毛 川芎不見火各四兩

右為末每服三錢用麥門冬湯入沙糖少許調服食後或米

泔調下亦得

又方和劑方治眼目暴赤腫痛風毒熱氣上衝睛痛連眶臉皆

赤爛瘵肉侵睛時多熱淚及因忿怒逆損肝氣又勞瞻視風

沙塵土入眼澁痛致成內外障翳等疾

龍膽草 蒺藜炒去刺各六兩 茯苓去皮四兩 菊花去枝五兩

赤芍藥八兩 防風去皮核 甘草炙 羌活各三兩

右用為末溫酒調二錢食後服

散熱飲子板粹方 治眼暴赤暴腫

防風

羌活

黃芩

黃連

右等分水一鍾半煎八分去滓溫服食後如大便秘加大黃

一兩痛甚加當歸地黃各一兩如煩燥不眠加梔子一兩

○已上諸方散風熱之劑

石膏羌活散 宜明方 治久患雙目不覩光明遠年近日內外氣

障風昏暗拳毛倒睫一切眼疾

羌活

治腦熱頭風

蜜蒙花

治羞明怕日

木賊

退翳噎

香白芷

清利頭目

乾菜子

細辛

二味起到睫

蘇子

起奉毛

川芎

治頭風

蒼朮

開鬱行氣

甘菊花

明目去風

荆芥穗

治目中生翳

石膏

黃芩

二味先心退熱

藁本

治偏頭痛

甘草

和諸藥各等分

右為末每服一錢至二錢食後臨卧用蜜水一盞調下或茶

清亦可日進三服至十日漸明至二十日大驗此方醫數十

餘人矣 後人加當歸枸杞子梔子仁連翹柴胡薄荷葉防

風天麻桔梗各等分為小丸服

蟬花無比散 和荆方 治大人小兒風毒傷肝或為氣攻一切眼

目昏暗漸生翳膜及久患頭風牽搐兩眼漸漸細小連眶赤

爛小兒瘡疹入眼白膜遮睛赤澁癢痛並治

茯苓 甘草 炙

防風 去芦各四兩

川芎

羌活

當歸 洗焙各三兩

赤芍藥 十三兩

蛇蛻 炙一兩

蒺藜 炒去皮尖半斤

蟬蛻 去頭足翅二兩

石决明 用蓋

水煮研細為末

蒼朮 去皮炒十二兩

右為末每服三錢食後米泔調服茶清亦可忌葷食

明眼地黄丸 和劑方 治男子婦人肝虛熱積上攻眼目翳膜遮

睛羞澁多淚此藥多治肝腎兩經俱虛風邪所乘並治暴赤

挽服

牛膝 去蘆酒浸三兩 石斛 去苗 生地黄 一兩 熟地黄 一兩 洗焙

防風 去蘆四兩 杏仁 去皮尖炒去油研細

枳殼 去白炒各四兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服三十九食前鹽湯溫酒任下

羊肝丸 濟生方 治肝經有熱目赤睛疼視物昏

羊肝 一具生用 黃連 去鬚另研為末

右先將羊肝去筋膜於沙盆內搗爛入黃連末杵和丸如梧

子太每服五十九熟水送下利濟方用白羊子肝

上清丸 秘方 治風熱上壅眼目昏花迎風冷淚羞明赤爛

羚羊角 犀角 黃連 厚朴 各一兩

牛黃 黃芩 川芎 羌活 蟬退

白芷 菊花 大黃 防風 草決明

地膚子 滑石 各五 生地黄 熟地黄 各七 牽牛 八

右為末煉蜜丸如梧子大每服三五丸茶清下食後

杞苓丸 魚氏家傳 專治男子腎臟虛耗水不上升眼目昏暗遠

視不明漸成内障

白茯苓 去皮 真枸杞 酒浸 當歸 酒洗 青鹽 一兩別研

兔絲子 二兩酒浸蒸

右為末煉蜜丸如梧子大每服七十九食前熱湯下

道赤散魯氏家傳 治心臟積熱上攻眼目兩背浮腫血侵白睛

羞明洒淚一切治之

牛蒡子炒

榆子

槐子炒

生乾地黄

黃芩各等分

右為末每服二錢食後麥門冬湯調下

車前散曾氏家傳 肝經積熱上攻眼目逆順生翳血灌瞳人羞

明多淚

蜜蒙花去枝

甘菊花去枝

白蒺藜炒去刺

羌活

粉草

草決明

車前子各炒

黃芩

龍膽草洗各等分

右為末每服二錢食後飯湯調下

五味子丸 魯氏家傳 治心肝二經蘊積風邪并腎臟虛耗眼目

昏暗或生翳膜

阿膠 蛤粉炒 熟地黃 各一兩 白茯苓 麥門冬 各半兩

芍藥 五味子 杜仲 去皮姜汁炒斷絲各二兩

貝母炒 栝子仁 茯苓 去木 遠志 去心

人參 百部 防風 去芦各一兩

右為末煉蜜丸如彈子食前姜湯嚼下一丸

蔓荆湯 聖惠方 治勞役飲食不節內障眼疾此方立効

黃芪 人參 各一兩 蔓荆子 二兩 甘草 炙八分

白芍藥 二兩 黃芩 二兩 酒浸晒四次

右吹咀每服五錢水二盞食後臨用溫服

助陽和血補氣湯衛生寶鑑治眼

白睛經 眼淚無

疼痛而臆澁難開此服苦寒藥太過而真氣不能通九竅故
眼昏花不明宜助陽和血補氣

防風 七分

黃芪 二錢

甘草 炙一分 蔓荊子 一錢

當歸身 半錢

白芷 五分

升麻

柴胡 各五分

右吹咀作一服水一鍾半煎一鍾臨卧進口服忌風寒及食

冷物

地黃湯援粹方治眼久病昏澁因發而久不愈者

防風

羌活

黃芩

黃連

地黃

當歸

人參

茯苓

右等分為粗末水一鍾半煎八分食後臨卧通口服

四物龍膽湯 拔粹方治目赤暴發作雲翳疼痛不可忍者

當歸

川芎

芍藥

地黃各五錢

羌活三錢

草龍膽二錢

防風三錢

防已二錢

右咬咀每服八錢水一鍾半煎八分食後通口服

○已上諸方散風熱兼補虛之劑

菊睛丸 和劑方治肝腎不足眼目昏暗常見黑花多有冷淚一

拘杞子 三兩

菴蓉

酒浸炒

其菊花

四兩

巴戟天

去心一兩

楊氏家藏方加五味子 三兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服五十九食後溫酒鹽湯下

加減駐景丸

簡易方

治肝腎氣虛兩眼昏暗視物不見

車前子炒一兩 熟地黄洗 當歸身各五錢 五味子

枸杞子各一兩 兔絲子酒製半斤 楮實子無翳膜則勿用

川椒炒出火毒各一兩

右為末蜜糊丸如梧子大每三十丸温酒盪湯下食前

養肝丸濟生方 治肝氣不足眼目昏花或生眵淚

當歸去蘆酒浸 車前子酒蒸 防風去蘆 白芍藥

麩仁另研 熟地黄酒蒸 川芎 楮實各等分

右為末煉蜜丸如梧子大每服七十丸熟水下不拘時

生熟地黃丸 治血虛陰虛眼目昏花

生芋 熟芋 玄麥 金釵石斛各一

右為末煉蜜丸如梧子大每服五十丸空心服

東垣執乾地黃丸 治血少神勞腎虛眼目昏黑

熟地黃 一兩 生地黃 一兩 天門冬 五錢 些胡 八錢

甘草炙 枳殼 地骨皮 黃連

五味子 錢三 人參 二錢 當歸身 酒浸 焙乾 黃芩 各五錢

右為末煉蜜丸如菉豆大每服百丸茶清下

○已上諸方補虛之劑

白龍散 御藥院方 去翳膜明眼目

用芒硝五兩取真白如雪者置踏金銀鍋子內以新瓦蓋又用熱炭火用一小磚火內放先燒磚執然後下藥在鍋磚上四面有火慢慢熬溶良久鍋內有聲先去頂上火并瓦鍋中觀未沸顯清明汁以鉄鉗鉗出鍋傾藥汁在別器中凝潔如

五色者方好研如極細入龍腦各等分用點退下翳或吹入

鼻中立有神効

黃連膏

宣明方

治一切眼目癢肉攀睛風痒淚落不止

黃連

半斤

白丁香

五升水一瓠淘淨去土攪細用朴硝

一斗以水半瓶淘淨去土陰乾

右取水入硝香釜內熬至七分淘出令經宿水面浮牙者取

出控乾以紙袋子盛風中懸至風化將黃連細末熬清汁瞭

乾硝用猪羊膽和加蜜點之効矣

撥雲散

秘方

點眼中有翳雲膜遮障近日疼痛眼不可點

礪砂

去煖石研細末

礪砂

黃丹

水飛

青鹽

盆硝

各五錢

礪耳石

半斤煨七次入童子小便淨如雞黃為度研細末

輕粉

一錢

麩仁

六十箇去皮用白仁黃色者不用

右為極細末研無聲為度忌雞魚一切辛熱之物

碧霞丹 宜明方 點一切惡眼風赤者

龍腦

射香

硃砂 各二錢

沒藥

血竭

乳香

銅青 各一錢

礪砂 二錢

右為末滴水和丸如梧子大每服一丸新汲水化開點之効

撥雲膏 秘方

礪甘石

黃丹 一兩

川烏 七錢半

犀角

乳香

沒藥

硃砂

輕粉 各一錢

青鹽

血竭

片腦 半錢

射香

麝仁 各七
分半

當歸 二錢半

黃連 一兩
五錢

蜜 一斤

銅綠

鷹條 各一錢
二分半

右件脩合各如法研細用白沙密十五兩慢火初沸下黃丹
二沸下礬耳石三沸下諸藥不粘手為度用磁盞內熱水泡
開執點不拘時

捲簾散

楊氏家藏方

治久新痛眼昏溢難開翳膜遮睛成翳肉

或暴發赤腫疼痛並皆治之

礬耳石

四兩

黃連

六錢 槌碎用木一碗 煮煑沸除去前滓

朴硝

五錢 細研

已上先將礬耳石末入沙鍋內開口煑令外有霞色為度次
將入黃連朴硝水中浸飛過候乾又入黃連半錢水飛過再
候乾次入

白礬

二錢一錢生 用一半飛過

膩粉

另研一字

黃連末

半兩

青鹽

膽礬 各七錢

丁香

另研

乳香

另研

鉛白霜各一字 銅錢七錢

硃砂另研一字

右為末同前件藥和合令勻每用少許點眼

○已上諸方點攀睛肉之劑

黃連散

楊氏家藏方

治肝受風熱眼眩赤爛

乳香

一名半另研

黃連去鬚半兩

荊芥

六百穗

燈心一百莖

右吹咀每服二錢水二鍾煎一鍾瀝去渣熱洗

光明湯

秘方

治一切暴眼

白礬一字

銅綠一錢

杏仁

甘草各一字

乾姜

三分俱各搥末

右件用生絹袋盛貯頓放於磁器內以沸湯浸用紙封蓋定待冷臨卧洗之

湯 治暴赤眼

當歸尾

黃連 各一

赤芍藥

防風 各半

杏仁

四个去皮尖

右用水半鍾將小孩乳汁少許蒸過澄清點洗不拘時

消毒散

御藥院方

治眼赤腫疼痛不定兼治瘡腫不消

大黃

生五

黃芩

黃栢 各一兩

右為末每用生蜜水調藥如糊攤在繡絹花子上隨目赤左

右貼於太陽穴如乾用溫水頻潤

五黃膏

御製院方

治目赤

黃栢

一兩

黃連

黃芩

黃丹

大黃

各半兩

右為細末每一錢蜜水調成膏攤繃上隨左右眼赤貼於
太陽穴

赤眼方 秘方

鷄爪黃連

銅綠 半餅

大艾葉

右將黃連銅綠研末用淨水調膏攤於磁器蓋內却將艾葉
軟為丸燒艾炮黑盞內桑乾用沸湯炮澄清以銀簪蘸藥
鹽其石散 海上方 治一切目疾不問得病之因悉治之

鹽其石真者半斤黃連四兩判如豆大於銀石器中用水

二碗煮二次再揀去黃連取出其石細研

片腦二錢半別研

右二味同研勻每用半字白湯泡時時洗之點亦可

又方 論上方

礞耳石 半兩飛三
次去少石

礞砂

礞砂各一兩

白礬

腦子 各半斤

射香 少許

右為極細末用沸湯泡點洗俱可

乳香散 治眼赤腫痛疼不可忍

欝金 二斤半

盆硝

黃連

各一斤 雄黃

乳香

沒藥

片腦

各半斤

右為末鼻內搗少許點亦可

復明方 秘方 點遠年近日雜患眼目昏花

黃連

一斤洗淨去鬚剉

當歸

半斤洗淨擘開取鬼

柯子

三兩洗淨搗碎

黃柏

三兩去粗皮

右四味用臘水一大椀磁器內浸十五日入銅鍋內熬至數
十沸濾去滓礪石半斤桑柴火煨七次用前藥四味汁蘸
七次如雞子黃色為用研極細末水飛過鴉黎二十五個搗
爛用生絹袋濾去滓黃丹半斤水飛過去為用蜜二斤半水
二升半葱一把熬水盡去滓猪胰子十五個擇淨脂油用捍
草袴一大把同搗爛泥生絹袋濾去滓再過一以同前藥汁
下入銅鍋內煎熬成稀膏下後六味

青鹽

盆硝

各一兩

銅綠

所極細末

礪砂

礪砂

熊胆

各五錢

右為極細末入鍋再熬一時欵成稠膏子下後四味

射香

三系水
研細

龍腦

輕粉

粉霜

各二錢
研細

再熬從緊至慢漸々微火熬成膏出鍋入磁器內盛放土中埋一個月去火毒可用已後若乾時却用乳汁化開點每日可點三五十筋若腫時歇一二月再點以効為度二月九月修合為妙

珊瑚膏

秘方

治遠年近日不觀光明一切雜患病眼五輪不損者並皆治之新患眼尅日見効每用皂角子一大塊冷水半鍾雞子殼少許於小盞內浸化研開點眼或洗眼亦得臨卧點用奇効不可具陳除內障氣眼不治

紫金膏

秘方

同珊瑚膏治証每過病眼用藥如菜豆許點眼角內點五七遍看病大小用此膏與珊瑚膏方並見片腦膏

龍膽膏

秘方

治暴赤眼腫痛癢澁難開怕日羞明迎風淚出視

丹溪心法附錄 十一卷 十五
物昏花每用豆許點眼大角內少時連點數節大有功效今
具藥品于後

玄精石 一斤 桂府滑石 一斤 俱為細末 黃連

秦皮 切細 龍胆草 苦練根 五味子 各用十兩

當歸 赤芍藥 大枝子 麩仁 搗碎

杏仁 各五兩 槐枝 二斤切 三寸許 柳枝 二斤切 三寸許

玄精石至五味子七味用大鍋盛水二大桶煎至一半去滓
將細生絹濾過磁器盛放又當歸至柳枝七味亦要用水二
桶煎至一半去滓再將細生絹濾過亦用磁器盛放白沙蜜
五斤先用少油搽鍋內慢火煉蜜紫色為度將前二次煎成
藥水同煎數沸再用生絹濾過再熬至一半入銅鍋內下礬

砂五兩猪膽大者五個慢火煎用鉄鏟不住手撓熱成稀膏
除二斤於磁器內盛放一宿將上等片腦六錢研細入藥內
攪勻用油紙封固一宿名為片腦膏○下礮甘石六兩黃丹
六兩用水飛過硃砂九錢撓藍九錢益硝九錢銅綠九錢輕
粉三錢粉霜二錢俱研細用水一椀用細生絹濾過盡入煎
熱成三斤藥內將鉄鏟不住手攪慢火再熬成稀膏又除二
斤半用磁器內盛放經一宿再用上等片腦一錢射香二錢
研細入藥內攪勻將油紙封固一宿名為紫金膏○又以珊
瑚半兩為粗末用水一大碗煎數沸去滓不用入煎熬成稀
膏半斤於內又下礮甘石二兩黃丹二兩用水飛過將鉄鏟
不住手攪煎成稠膏再下上等片腦一錢研細入藥內攪勻

於磁器內盛放名為珊瑚膏

脩煉礪其石黃丹之法

礪其石不拘多少砂器盛填木炭火煉通赤用黃連水蘸七次水飛淘澄為泥用之

黃丹不拘多少以砂銚炒候紫色用水飛過淘澄為塵用

光明撥雲鏡子 治遠年近日一切眼疾

礪其石一斤煨過用黃連半斤水一碗煎五七沸淬七次

止取淨末二兩

礪砂 一兩 片腦 一糸 海螵蛸 一斤 射香 二分

珍珠 一糸 血竭 三糸 乳香 沒藥 各一糸

右研極細以後黃連膏子和劑槐成鏡子淨水磨化點

劑藥黃連膏子

黃連 半斤

龍胆草

當歸

芍藥

大黃

黃柏

黃芩

川芎

生地黃

白芷

防風

木賊

薄荷葉

羌活

紅花

菊花 各等分

右用水七八碗浸藥三日煎成膏子和劑前藥成錠子

開光錠子

礪甘石

煨黃連水滌
角末二兩

硼砂 五錢

珍珠

片腦

各三分

牛黃

雄黃 各一錢

右為細末熬黃連膏為錠子磨點

春雪膏

於春天雪冷凍之時取明淨朴硝三四斤爲末或不拘多
少用黃連防風赤芍藥當歸尾各五錢牙皂三個各剉片
與硝拌和入雪與硝一般多同拌勻爲水過一宿瀝去黃
連等藥却將硝雪水用瓦盆或銅盆盛之於露天淨處受
霜露之氣其盆弦上自然結成砂却用烏盆一個以紙筋
墊盆底內用厚皮紙盛砂於盆內紙筋上使砂中水氣盡
滲於紙內候砂乾爽以磁器收貯封固如用每硝砂一錢
加礪砂半錢片腦三分研細點睛

○已上諸方點洗之劑

○廣按眼疾所因不過虛實二者而已虛者眼目昏花腎經
真水之微也實者眼目腫痛肝經風熱之甚也苟實焉則

散其風熱苟虛焉則滋其真陰苟虛實相似則散風熱滋
真陰兼之夫何眼疾之不瘳哉此內治之法也至於久而
失調熱壅血凝而爲攀睛瘀肉翳膜赤爛之類不暇點洗
外治之法則何出而全愈乎蓋病情有標本治法有內外
故也又嘗論之氣有餘便是火而散火在於破氣血不足
則陰虛而滋陰在於補血也常使血能配氣水能制火則
眼疾胡爲而作也歟

耳聾 六十四

已集

丹溪心法

○耳聾皆屬於熱少陽厥陰熱多當用開痰散風熱 通聖散
滾痰丸之類 大病後耳聾者須用四物湯降火 陰虛火動

耳聾者亦用四物湯因鬱而聾者通聖散內大黃酒煨再用酒炒三次後入諸藥通用酒炒耳鳴因酒過者大劑通聖散加枳殼柴胡大黃甘草南星桔梗青皮荆芥不愈用四物湯炒耳鳴必用龍會丸食後服氣貫入樞柳丸或神芎丸下之聾病必用龍會丸四物湯養陰濕痰者神芎丸樞柳丸耳濕腫痛涼膈散加酒炒大黃黃芩酒浸防風荆芥羌活服腦多麝少濕加枯礬吹耳內閉然亦是陰虛戴云亦有氣閉者蓋亦是熱氣閉者耳不鳴也

入方

草麻子

四十九粒

取肉

十個

右入人乳汗搗成膏石上罌晒乾便丸如指大綿裹塞耳中

又方

鼠膽汁滴入耳中尤妙

又方

將龜放在漆桌上尿出用綿淬之掬入青葱管中滴入耳中

附諸賢論

王節齋曰耳鳴證或鳴甚如彈或左或右或時閉塞世人多作腎虛治不効殊不知此是痰火上升鬱於耳中而為鳴鬱甚則壅閉矣遇此疾但審其平昔飲酒厚味上焦素有痰火只作清痰降火治之大抵此症多因先有痰火在上又感惱怒而得怒氣上少陽之火客於耳也若是腎虛而鳴者亦是膀胱相火上升故也其鳴不甚其人必多怒當見勞怯之證

附諸方

犀角飲子 濟生方 治風熱上壅兩耳聾閉內外腫痛膿水流

犀角 菖蒲 木通 玄參 赤芍藥

赤小豆 炒 甘菊花 去枝梗各 甘草 炙半刀

右咬咀每服四錢水一盞半生姜五片煎七分溫服

清神散 治風氣壅上頭目不清耳常重聽

姜蚕 炒去 乾菊花 各一刀 荆芥穗 羌活

木通 川芎 香附 防風

石菖蒲 甘草 各三冬

右為末每服三錢食後臨卧茶調下

復聰湯 姚方伯傳 治痰火上攻耳聾耳鳴

半夏製

陳皮去白

白茯苓去皮

甘草炙

篇蓄

木通

瞿麥

黃柏

去粗皮炒褐
色各一斤

右用水二茶鍾生姜三片煎至一茶鍾空心臨卧各一服

涼膈散

治風熱上攻耳聾

見濕熱

通聖散

治風熱上攻耳聾

見斑疹

滾痰丸

治熱痰濕痰耳聾

見痰類

神芎散

治濕熱濕痰耳聾

見火類

栴柳丸

治濕熱濕痰耳聾

見病類

龍會丸

治肝火上升耳聾

見脇痛

和劑流氣飲

治氣閉耳聾

見氣帶

內加菖蒲生姜葱白同煎服 凡治聾須開鬱行氣

六味地黄丸 治陰虛火動耳聾

見補填

內加知母黃栢菖蒲遠志

地黄丸 治勞損耳聾

熟地黄

當歸

川芎

辣桂

兔絲子

川椒 炒

故紙 炒

白蒺藜 炒

胡蘆巴 炒

杜仲 炒

白芷

石菖蒲 各二不半

磁石 火燒醋率七次研水飛一不二分半

右為末煉蜜丸如梧子大每五十九葱白温酒下

磁石羊腎丸 治諸般耳聾補虛閉鬱行氣散風去濕

磁石三兩火煨醋淬七次用葱子一合木通三兩用水同

煎一晝夜去葱子木通不用取淨二兩

川芎

白朮

川椒 去目

東肉 去核

防風

茯苓

北細辛

山藥

遠志去心 大川烏炮

木香

當歸

鹿茸

酒浸 宿炒

羌活

酒浸

黃芪 各一兩

肉桂 六錢半

熟地黃 二兩

石菖蒲 一兩半

右為末用羊腎兩對去皮膜以酒煮爛研細好酒糊丸如梧子大每五十九空心温酒下塩湯亦可

○廣按丹溪云耳聾皆屬於執而已上二方又用辛執之藥不無使人疑議殊不知耳聾多屬痰火鬱結非磁石之鎮墜川烏之流通與夫川椒細辛肉杜菖蒲之辛散則老年鬱火何由而開耳聾何由而愈哉雖然耳聾由此而愈亦為劫劑後當以通聖散和之可也

○已上諸方內治之劑

一方 治耳聾久不聞者

紫磁石 一塊如豆大

山川甲 燒存性為末一字

右用新綿子裹塞於患耳內口中含些生鉄覺耳內如風聲即愈

一方 用并遂末吹入左耳并草末吹入右耳立効

一方 治耳痛及聾

用巴豆十四粒研爛以鷲脂半兩鎔化和巴豆末為丸如小豆大以綿裹塞耳中

耳鳴方

草烏燒

石菖蒲

右等分為末用綿裹塞 中一日三度

鳴暴聾方

川椒

石菖蒲

松脂各二錢半

山豆肉半斤

右為末溶蠟丸如棗核大塞入耳

聾耳方 治風執搏之津液結韌成核塞耳

生猪脂

地龍

釜下墨等分

右件細研以葱汁和捏如棗核薄綿包裹入耳令潤即挑出

紅綿散 治聾耳有膿及黃水

海鱧鮓

枯礬各一斤 射香 一字

乾胭脂五分

右為末用管吹入耳中

方

用五倍子焙乾一两全蝎三錢燒存性為細末吹入耳中

一方

用枯白礬一錢胭脂一字射香少許研細以綿杖子先輾去耳中膿水即用別纏杖子送藥入耳中 一方加龍骨亦佳

一方 治耳內膿出或黃汁

石膏新瓦上煨明礬枯

黃丹炒

真蛤粉

龍骨各等分射香少許

右為末綿纏竹筒拭耳換綿蘸藥入耳

一方 治耳作膿者

用耳遂一塊如棗核大以綿裹塞耳中以甘草口中徐徐嚼

耳爛 用貝母研末乾摻

治百虫入耳

一方用香油灌入耳即出

一方用雞冠血滴入耳即出

一方驢牛乳最良灌入耳即出

治一切虫物入耳

用竹管入耳門 口氣盡方吸出最妙

一方 治凍耳

用橄欖核燒灰清油調敷雀腦亦可

○已上諸方外治之法

○廣按卅溪云耳聾皆屬於熱誠哉斯言然有左耳聾者有右耳聾者有左右耳俱聾者不可不分經而治也夫左耳聾者少陽火也龍會九主之右耳聾者太陽之火也六味

地黃丸主之左右耳俱聾者陽明之火也通聖散滾痰丸
主之何以言之有所忿怒過度則動少陽膽火從左起故
使左耳聾也有所色慾過度則動太陽膀胱相火從右起
故使右耳聾也有所醇酒厚味過度則動陽明胃火從中
起故使左右耳俱聾也蓋左耳聾者婦人多有之以其多
忿怒故也右耳聾者男子多有之以其多色慾故也左右
耳俱聾者膏粱之家多有之以其多肥甘故也總三者而
論之忿怒致耳聾者為多舟溪云厥陰少陽火多當用開
痰散風執其此之謂乎

鼻病 六十五

已集

舟溪心法

○酒瘡鼻是血熱入肺 治法用四物湯加陳皮又云栝皮
花酒炒黃芩煎入好酒數滴就調炒五靈脂末同服格致論
於上藥有茯苓生薑氣弱者加黃芪

入方

用桐油入黃連末以天吊藤燒灰熱傳之 一云用桐油入
天吊藤燒油熟調黃連末拌傳之

又方

用山梔末蜜蠟丸彈子大空心嚼一九白湯下

治鼻中瘰肉 胃中有食積執痰流注治本當消食積

蝴蝶礬 二錢

細辛 一錢

白芷 半錢

右為末內鼻中

治鼻淵

南星

半夏

蒼朮

白芷

神麩

酒芩

辛夷

荊芥

各等分

右末水調食後服

附諸賢論

王節齋曰鼻塞不聞香臭或但遇塞月多塞或畧感風寒便塞不待舉發者世俗皆以為肺寒而用解表通利辛溫之藥不効不知此是肺經素有火邪火鬱其前喜得熱而惡見寒故遇寒便塞遇感便發也治法清肺降火為主而佐以通氣之劑若如常鼻塞不聞香臭者再審其平素只作肺熱治之清金瀉火消痰或丸藥喻化或末藥輕調緩服久服無不効

矣此予所親見而治驗者其平素稟賦無鼻塞舊證一時偶感風寒而致窒塞聲重或流清涕者自作風寒治

附諸方

葛蒲散 御藥院方 治鼻內窒塞不通不得喘息

葛蒲

白角 等分

右為末每用一錢綿裹塞鼻中仰臥片時

增損防風通聖散 治鼻塞不利肺氣不清

鼠粘子

桔梗

桑白皮

紫苑

荆芥穗

三兩

甘草

生二兩

右咬咀每服八錢水一鍾半姜五片煎八分食後溫服

羌活散

治腦有爵執遇寒鼻塞

見傷風

仙木芎散 治腦有鬱熱遇寒鼻塞

見風熱

川芎石膏湯 治腦有鬱熱遇寒鼻塞

見中風

○已上數方治鼻塞之劑

蒼耳散 三目方 治鼻流濁涕不止名曰鼻淵

辛荊仁 半兩 蒼耳子 炒二 香白芷 一兩 薄荷葉 半錢

右為末每服二錢葱茶清食後調下

辛荊散 濟生方 治肺虛為四氣所于鼻白壅塞涕出不已或氣

息不通或不聞香臭

川芎 木通 去節 防風 去蘆 甘草

辛荊仁 細辛 洗去上 藁本 升麻

香白芷 各等分

右為末每服三錢茶清調下

防風湯 治鼻淵腦熱滲下濁涕不止久而不已血

防風 二兩半 黃芩 人參 甘草灸

川芎 麥門冬 去心各一兩

右為末每服二錢沸湯調食後服

○已上攻方治鼻痛之劑

鉛紅散 治風熱上攻向鼻生紫赤刺癢疹俗乎肺風

舶紅硫黃 白礬 枯各半兩

右為末黃丹少許染與病人面色同每上半錢津液塗之臨卧再塗兼服升麻湯下瀉青丸以除病根也

局方升麻湯

熟半夏

茯苓

白芷

當歸各二錢

蒼朮

乾葛

桔梗

升麻各一兩

熟枳殼

乾姜各半錢
大黃蒸半

芍藥七錢半

陳皮

甘草各一兩半

右咬咀每服五錢生薑燈心水煎食前服

瀉青丸

見中風

白龍丸

治酒瘡鼻并滿面紫赤酒刺

川芎

藁朮

細辛

白芷

甘草等分

右為末每四兩入煨石膏末一斤水丸逐日用此丸末洗面如澡豆法更罨少時方用湯洗去

又方

用黃栢苦參栴榔等分為末傅以猪脂調尤妙

又方

用青黛槐花杏仁研傅之

又方

用杏仁研乳汁傅之

○已上敷方治酒瘡鼻之劑

白黃散簡易方治鼻鼽瘰因鼻痔等症

雄黃

白礬

細辛

瓜子各等分

右為末搐入鼻中

辛黃膏

御藥院方

治鼻生瘰肉室塞不通有時疼痛

辛荑華二兩

細辛

木香

木通

白芷

杏仁湯炮去皮尖所各五錢用

右將羊髓猪脂二兩和藥於石器內慢火熬成膏取赤黃色
放冷入龍腦射香一錢為丸綿裹塞鼻中數日肉脫即愈

欝金散

治鼻中生瘰肉

用欝金猪牙皂角各一兩二味水浸一宿火煮透欝金為度
去皂角不用以欝金焙乾再用比細辛半兩射香硃砂各一
錢同為末煉蜜丸如茶子大每服一丸食後細嚼茶湯嚥下

輕黃散

治鼻中瘰肉

雌黃

半兩

射香少許

輕粉

杏仁湯炮去皮尖

雙着仁各一各

右於乳鉢內先研杏仁如泥餘藥同研細勻磁盒蓋定每有
患者不問深淺夜即用筯頭點糝米入絰鼻中隔夜一次半
月効

又方

用狗骨燒灰加硃砂少許每用搗盪中瘰肉自化

又方

以胡荽搽爛塞鼻中一夕自然落出

又方

用白礬燒為末面脂和綿裹塞鼻中數日瘰肉墮藥落

又方

用雄黃一塊如棗塞鼻中過十餘日瘰肉自落

○已上數方治瘰肉之劑

口舌 六十六

已集

丹溪心法

○口瘡服涼藥不愈者因中焦土虛且不能食相火衝上無制
用理中湯人參白朮甘草補土之虛乾姜散火之標甚則加附
子或噙官桂亦妙 一方生白礬為末貼之極効或噙良久以
水漱之再噙 一方治口瘡甚者用西瓜漿水徐徐飲之冬月
無此用西瓜皮燒灰傅之 又方黃連好酒煮呷下立愈 又
方遠志醋研鷲毛掃患處出涎
八方

細辛

黃栢 炒 寺分 一云黃連

右為末貼之或摻舌上吐涎水如再傳須旋合之若台下既
久甚効

治滿口白爛

葶撥為末一兩

厚黃栢一兩

右用栢火炙為末醋煎數沸後調上藥漱涎再用白湯漱口
則愈

附諸方

立効散

端効方

治長緊瘡疼痛

訶子肉

五倍子

右為末乾貼唇上立効

赴癘散

端効方

治赤白口瘡

黃栢

青黛

奚陀僧

右為末乾貼瘡

棋柳散應驗方治口瘡疼痛大有神効

五倍子 三斤 寒水石半兩 蒲黃

黃丹 三斤半

右為末每服少許乾貼瘡上

龍石散和劑方治大人小兒上隔癰毒口舌生瘡咽噎腫寒疾
病妨悶每用少許搽貼患處燕津小兒瘡疹毒氣攻口齒先
用五福化毒丹掃後仍再用此藥搽貼立効

硃砂一斤半 寒水石煨通赤三斤二分半

生腦子 二斤半 研

右為末每日三五次用夜卧搽貼妙

清金散 端効方 治大人小兒白口瘡急惡狀似木耳

五倍子去土青黛四

右為末好油調貼瘡上咽喉中瘡攔用竹管吹入喉中有

津吐出

蕪金散三因方治執毒生瘡於舌

細辛 黃連各等分

右為末先以布帛蘸水揩淨患處搽藥於上涎出即愈

赴庭散澹寮方治口瘡疼痛

五味子一及滑石半及研黃栢半及蜜炒

右為末每服半錢乾搽瘡上良久便可飲食

治口瘡張子和方

白礬一及枯黃丹一及煨火紅放下再炒紫色為度

右為末摻於瘡上即愈

一方 治蠱蚤

用黃栢一兩去粗皮以五倍子二錢蜜陀僧甘草各少許
三味為末水調敷在黃栢上灸三五次藥未盡為度後將
黃栢切作片子臨卧時貼於患處天明則愈

一方 治爛疔瘡

用橄欖燒灰存性為末先用米泔水洗淨後摻上藥

一方 治舌腫

用百草霜為末以好醋調敷立効

柳花散 治口舌生瘡

玄胡索 一兩 黃栢

黃連 各半兩 蜜陀僧 三錢

青黛 二升

右為末傳貼口內有津即吐

○已上諸方治標之劑

升麻散 濟生方 治上膈壅毒口舌生瘡咽喉腫痛

升麻

生用 五分

升麻

赤芍藥

人參

桔梗

乾葛

各一兩

右改咀每服四錢水一鍾半姜五片煎八分溫服

瀉毒飲子 濟生方 治風熱蘊於脾經唇燥折裂口舌生瘡

白芷

升麻

枳殼

去日炒

黃芩

防風

半夏

湯洗

石斛

各一兩

甘草

炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎七分溫服

黑參丸 治口舌生瘡久不愈

黑參

天門冬

麥門冬 去心各炒一兩

右為末煉蜜丸如彈子大每用一九綿裹噙化嚥津

增損如聖散

治上焦熱壅口舌生瘡

桔梗 二兩

甘草 炙一兩半

防風 半兩

枳殼 製二兩半

黃芩 一兩

右為末每服三錢水煎食後服

○已上諸方治本之劑

○廣按口舌証中治標之劑毛靜而治本之劑利各宜於火類風熱類之中選而用之

丹溪心法

○牙痛梧桐淚為末少加射香擦之 牙大痛必用胡椒葶撥
能散其中浮熱間以升麻寒水石佐以幸涼荊芥薄荷細辛之
類 又方用清涼藥便便痛不開必須涎治葶撥川芎薄荷荊
芥細辛樟腦青鹽

治牙痛甚者

防風

羌活

青鹽 合同

細辛

葶撥

川椒

右為末擦噙

又方

南星為末霜梅五個取其引涎以荆芥薄荷散風熱青鹽入
腎入骨擦噙

又方

蒲公英燒灰香附末

白芷

青鹽

右為末擦噙

治陰虛牙出鮮血氣鬱

用四物湯加牛膝香附生甘草側柏

蛀牙

廬薈白膠香塞蛀孔中

陽明熱而牙痛

大苗香附各燒灰存性為末入青鹽少許不時擦牙上

固齒

用羊脛骨燒存性二錢當歸白芷猪牙皂角青鹽各一錢煎末擦牙上

刷牙藥

燒白羊骨灰一兩升麻一兩黃連半錢擦用

附諸賢論

王節齋曰牙床腫痛齒痛動搖或黑爛脫落世人皆作腎虛治殊不知此屬陽明濕熱蓋齒雖屬腎而生於牙床上下床屬陽明大腸與胃猶木生於土也腸胃傷於美酒厚味膏粱甘滑之物以致濕熱上攻則牙床不清而為腫為痛或出血或生虫由是齒不得安而動搖黑爛脫落也治宜瀉陽明之濕

熱則牙床清寧而齒自然安固矣

附諸方

血竭散 應驗方 牢牙定痛治牙齒根注復連膾骨疼痛久而不

愈者

血竭

石膽

乳香

五靈脂

密陀僧

各等分

右研令勻每用一字以指蘸貼牙病處候少時荊芥湯漱

立効散

銜藥

治牙疼不可忍

百草霜

細研

澹鹽

牙各一分

射香

淨

乳香

研紙各半

右拌一處再研勻每用少許口噙溫水隨牙疼一邊鼻內搗

之用無時尤妙

又方

用蒼耳草細辛芫花小麥川椒各等分判碎水煎時時噙嗽吐去藥不可嚥下 又細辛芫花二味擦漱尤妙

青龍散

御藥院方

治陽經風熱齒斷腫痛

香白芷

川芎

盆硝

細辛各半兩

青黛 三錢

薄荷葉 二錢

右為末以指蘸藥擦牙腫處吐津誤嚥不妨

宣牙膏

御藥院方

治齒牙動搖不牢疼痛不止斷肉出血

射香 一字

龍骨

定粉

另研各二分半

右二味為細末後入射香勻用黃蠟一兩磁蓋內鎔開入藥於內攪勻放冷取出熨斗燒鋪紙內藥攤之勻薄每用剪作

紙條兒臨臥於齒患處齒斷間封貼一宿至次日早晨取出藥每夜用之此半月消牙齒腫忽生斲肉治疳蝕去風邪牢

牙齒大有神效

梧桐淚散

御藥院方

治牙齒斷腫悶宣露血出

梧桐淚

川芎

細辛

白芷

各半錢

生地黄

一錢

青鹽

二分

寒水石

燒熟二分

右件同為細末每用塗貼患處吐涎候燕不妨無時日五七次

露蜂房散

御藥院方

治牙齒疼痛經驗神效

露蜂房

炒黃

細辛

各二分

大戟

七錢半

防風

一錢

一分半

右咬咀每五錢水一鍾煎七分去滓熱嗽冷吐無時

消毒散

御藥院方

治齒斷并口唇生瘡腫痛

晚蚕蛾

五倍子

蜜陀僧 各一錢

石為細末每用少許乾傅瘡上有津吐出

開關散應驗方治牙關緊急不開因風熱攻注牙齒

川芎

薄荷

盆硝

白芷

全蝎 各一錢 僵蚕

天麻 各半錢 細辛 一錢

右為末每用少許以指蘸藥滿口擦牙斷斷嚙半時用溫水

漱吐

太和散 御藥 治牙齒動搖斷肉浮腫虫 蚰發痛

梧桐淚

白茯苓

生地黄

各半

川芎

香白芷

升麻 各三分

華陰細辛

三分

青鹽

一分

射香 半分

牙皂

燒存性 二分

右為末青鹽射香另研拌勻每用藥少許指蘸藥擦牙病處

常用去疔牢牙定疼止痛

消風定痛散應驗治牙齒疼痛風熱攻注斷肉腫悶

荆芥 四錢

白芷

防風

細辛

全蝎

升麻

川芎 各二錢

膽礬 二分

青黛 各八

右為末每用一指蘸藥擦於牙上務半時有津吐出

赴遙散和劑方治風牙重牙攻疔疼痛不可忍者

良姜 去蘆

草烏 去皮

細辛 去土

荆芥 去梗各等分

右為末每用少許於痛處擦之有涎吐出不得吞嚥良久用

鹽湯灌漱其痛即止用腐炭末一半根常使擦牙

細辛散

和劑方治風重牙疼或牙齦宜爛腮頰浮腫皆治

荆芥去梗 一兩 硝砂 半兩 細辛 二兩 川椒去目 白芷 二兩

鶴虱 牙皂 萹撥各半 草烏 一兩

右為末每用少許於痛處頻頻擦之有涎吐出仍用漱鹽湯

丁香散御藥 治牙齒疼痛

丁香 萹撥 蝟稍 大椒各等分為末 擦法同前

定痛散御 悅方 治牙風疼痛立効

細辛 草烏生 一全蝟半兩 乳香 二錢

右為末每用少許擦牙痛處引涎吐之須臾以鹽湯灌漱即止

雄黃定痛膏楊氏家藏方 治牙齒疼痛

盆硝 三錢 雄黃一錢 別研細辛 二錢 大蒜 二枚 牙皂 四牙 二錢

右為末同大蒜一處搗為膏丸如梧子每用一丸將綿子裹

藥左邊牙痛放在左耳右邊牙疼放在右耳內良久痛止取出藥丸可治數人亦皆治之

一方 治一切牙痛

川升麻

當歸

川鬱金

細辛

萹撥

白芷

荊芥各等分

右為末用瓦合子貯之緊閉合口勿令泄氣每用少許指在牙痛處以溫荊芥湯灌漱立効

一方 治牙疼

鶴虱

細辛

白芷

牛松各等分

右為末拭牙上或煎湯噙漱立効

一方 治風牙疼

防風

麻黃

生地黄

羌花

蜂窩各五枚

花椒三升

浮麥一把

右為粗末入葱白三根同水煎熱漱不可嚥下

一方治虫牙疼不可忍者

用漢椒為末以巴豆一粒研成膏餒丸如蛀孔大綿裹安於

蛀孔內立効

蕪撥散 治風虫牙疼

蕪撥二升

蝎稍

良姜各一升

草烏去皮尖五分

右為末以指蘸藥擦於患處

一方取疼牙落不犯手

草烏

蕪撥各半兩

川椒

細辛各一兩

右為末每用少許擦於患牙處其牙自落

○已上諸方外散治標之劑

獨活散

御藥院方

清豆目發散風熱治陽明經不利邪毒攻注

牙齒斷肉虛浮宣露腿下動搖發痛又治偏豆痛漸七攻注

眼目發疼痛視物不明其藥功效不可具述

川子

獨活

羌活

防風 各一升六分半

細辛 七分

薄荷

生地黄

荊芥 各一升

右粗末作一服水二鍾煎一鍾去滓溫服食後日進三兩服愈

上清防風散

御藥院方

治上焦不利風熱攻衝氣血鬱滯牙齒

悶痛斷肉虛腫鼻塞走重且目昏眩並皆治之

防風

細辛

去苗葉

薄荷葉

各二升

川芎 一升七分

獨活去豆芦

天麻

荆芥穗

甘草炙

白檀

白芷

各二分

片腦

一分五厘

右同為細末入腦子再研勻細每服二小盞茶清調勻稍熱漱冷吐不拘時如竟昏目痛牙齒腫悶用熱茶清調三小食後服

茸露飲子

御藥院方

治男子婦人胃中客熱口氣齒斷腫悶宜

露心中多煩飢不欲食嗜卧及咽喉中有疔並皆治之

黃芩

天門冬

枇杷葉

甘草

枳殼

麥門冬

生干地黄

山茵陳

石斛

熟地黄

各等分

右為粗末每服五小水一大鍾煎至七分去滓溫服食後若

齒齦宣露腫悶煎藥熱漱之極驗

敗毒散 御藥院方 治風熱攻注牙齒疼痛久而不愈

細辛 五分 薄荷葉 一兩半 地骨皮 五兩 荊芥穗 三兩半

右為粗末每服七兩水二鍾煎至一鍾去滓溫漱冷吐煎服

尤妙

地骨皮散 應驗 治牙齒虛熱氣毒攻衝斷肉腫痛口舌生瘡此

藥如神

柴胡 四兩 地骨皮 三兩 薄荷 二兩

右咬咀作一服水一鍾半煎至一鍾去滓熱漱冷吐煎服愈好

升麻散 御藥院方 治牙齒疼痛生齦去熱毒解外風寒

防風 去苗 當歸 升麻 各二兩 蒿本 去苗七

甘草炙

白芷

細辛

芎藭各一升

木香半分

右件搗羅為散於乳鉢中研細塗貼齒斷粗者以水二鍾藥
五錢煎至七沸去滓熱漱冷吐秋冬牙痛用此煎服解散妙
地黃散 御藥院方 治風熱攻注陽明牙痛斷腫或血出宜露

生地黄半一升 防風

細辛

薄荷葉

地骨皮

藁本各一升 茵草葉

當歸

荊芥穗各半升

右同為粗末作一服水一鍾半煎至一鍾去滓微挽漱口冷

吐之前服尤妙

玉池散 御藥院方 治牙痛或動搖不牢

地骨皮

白芷

升麻

防風

細辛

川芎

槐花

當歸去蘆頭 藁本去上

甘草生各一糸

右為粗末作一服水一鍾半煎至一鍾去滓溫熱漱口冷則

吐之前服尤妙 張龍圖去地骨皮加獨活治牙流膿血

骨槽風者及骨已出者俱效

○已上諸方內消治本之劑宜於火類風熱類選用

血竭散應驗 治牙疳并惡瘡不差如神

寒水石燒熟四及細研 龍骨一及 蒲黃二及

血竭五糸 枯白礬一及

右為末每用少許貼在瘡口上紙封貼

櫛連散應驗治牙齒疳蝕口生瘡立效

寒水石燒熟一兩細研 蒲黃五分 黃丹五分

右為末每用小許乾貼瘡上驗多時吐出

一方治走馬牙疳

黃楮 藜蘆 石膏 銅青 膽礬

射香少許 龍骨病急多用病輕少用

右以火焙存性為末每用五分擦於患處

一方治牙疳

青黛三分 銅綠 晉礬 黃栢 藜蘆

枯礬 人言用紅棗十枚去核各分入內以火煨作灰用

芒硝各二分 射香半斤 輕粉四十分 黃連二分

右為末後入輕粉射香研勻少許擦患處

方

五倍子炒焦 銅青

明礬各一兩 射香少許

右研末先以鹽醋湯洗患處拭乾搽藥松上

○已上諸方治疳之劑

固齒茯苓散應驗牢牙固齒固密不生疳疾

龍骨 寒水石燒熟 升麻 香白芷

茯苓各一及 細辛 青鹽各三斤 石膏四斤

射香半斤 石燕大者半對火燒醋淬七次

右為末每日早晨以指蘸藥擦牙後用熟水漱口吐出

曰牙藥御藥院方 治牙齒黃黑不瑩淨

零陵香

白芷

青塩

升麻

名二錢半

石膏

細末一兩

細辛

一錢

射香

半錢

砂鍋

細末一兩

右除砂鍋膏香三味外五味同為細末加上前三味共八味

調勻再研每日早晨以指蘸藥擦牙後用溫水漱口吐出

上蒺藜散

每藥院方

治牙齒疼痛斷腫搖動常用擦漱固齒

上蒺藜

去角主用不以多少

右為粗末每服五錢淡漿水半碗煎至七八沸去滓入塩末

一捻帶熱時時漱之別無所忌然雖藥味不衆蓋單方之藥

取效急速兼神仙秘旨云若人服蒺藜一年已後冬不寒夏

不熱服之二年老若復少髮白復黑齒落重生服之三年輕

身長生今雖不作湯散服餌久而漱之其驗亦同

沉香白牙散

御藥院方

揩齒瑩淨令白及治口臭

沉香

射香

各五分

細辛

升麻

藁本

藿香葉

甘松

白芷

各一錢二分半

石膏

一兩

寒水石

一兩

右為末每日早晚揩牙

齒藥方

三四

西嶽蓮花峰神傳

猪牙皂角及生姜

西國升麻熟地黃

木律旱蓮槐角子

細辛荷帶要相當

青蘊等分同燒毀

研細將來使最良

揩齒牢牙髭髮黑

誰知世上有仙方

右用新瓦罐盛藥合口以麻縛定塩泥固濟日乾穿一地穴

先煨新磚後放藥以罐口向下用炭火燒令青烟出稍存性
去火經宿取為末每用擦牙溫水漱去 一方旱連作黃連

一方 固齒烏髭髮

毋丁香 沉香 各半兩 石燕子 一隻火煨醋淬七次

龍骨 一錢 海馬 一雙酥炒 茴香 一兩 生地黃 三兩

射香 二錢 青塩 半兩

右為末每用一撮空心擦牙縫噙片時溫水漱去

羌活散 應驗 漱牙藥去風止痛

薄荷 二錢 大黃 一錢

右用水二鍾煎至一鍾去滓溫漱冷吐之燕亦無妨

○已上諸方固齒之劑

○廣按牙痛之症其人腸胃染有濕熱上出於牙齦之間適
被風寒或冷飲所鬱則濕熱不得外達故作痛也其病情
有標本之分所用藥有溫涼之異何則牙痛之症寒是標
故外擦漱之藥宜辛溫以散寒開鬱熱是本故內服餌之
藥宜辛涼以散熱清中如此則內外交攻標本而治其病
豈有不愈者乎

醫經綱目十二卷終

綱目十二卷終