

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

九九五・子部・醫家類

本草綱目拾遺十卷正誤一卷（卷七至卷十）〔清〕趙學敏撰……………一

本草求真九卷〔清〕黃宮繡撰……………一六九

神農本草經讀四卷〔清〕陳念祖撰……………四四五

本草經解要四卷附餘一卷〔清〕姚球撰……………四九九

銅人腧穴鍼灸圖經三卷附穴腧都數一卷修明堂訣式一卷避鍼灸訣一卷〔宋〕王惟一撰……………六一一

十四經發揮三卷〔元〕滑壽撰……………六七九

2428/05

本草綱目拾遺藤部目錄

雞血藤膠 七金藤 鹿角藤

買麻藤 紅木香 紅皮藤 雷公藤

藤黃 金鎖銀開 乳藤

蝙蝠藤 皆治藤 無根草

麥裏藤 白毛藤 天菟草

松蘿 松上寄生 楓上寄生

蛇莆藤 李頭藤 龍鬚藤

臭藤根 黃練芽 木龍藤

萹油

本草綱目拾遺 卷七目錄

本草綱目拾遺花部目錄

梅花 梅梗 雪荷花 雪芝花 水仙花 子

催生蘭 珠蘭 建蘭花 葉根

玫瑰花 金雀花 金蓮花

佛桑花 寶珠山茶 粉團花 根附

玉簪花 玉蘭花 丁香花

紫茉莉 根 野薔薇 秋海棠

茶菊 城頭菊 金鈴菊 金 睡蓮

端香花 子午蓮 桃金娘

假素馨 千金花 梧桐花

本草綱目拾遺 卷七目錄

金鳳毛 十姊妹 雨韭

罌粟子油 佛前舊供花

本草綱目拾遺果部上目錄

延壽果 櫻額 倒吊果

飛松子 茶朥子 椰油椰中酒 椰皮

肉 宜母果 天師栗即娑羅子

化州橘紅橘瓢上絲 糖橘紅 橘餅 藥

荳蔻檳榔 瑣瑣葡萄 南棗山棗 藏棗

落花生油 核桃油 阿月渾子

薯良 無漏果 昨大海

藕粉節粉 菱粉蒂殼 芡粉

本草綱目拾遺

卷七目錄

三

本草綱目拾遺卷七

錢塘趙學敏恕軒氏輯

藤部

雞血藤膠

產猛緬去雲南昆明計程一月有餘乃藤汁也土人取其汁如割黍然濾之殷紅似雞血作膠最良近日雲南省亦產其藤長亘蔓地上或山崖一莖長數十里土人得之以刀斫斷則汁出如血每得一莖可得汁數升彼處有店市之價亦不貴乾者極似山羊血取藥少許投入滾湯中有一線如雞

本草綱目拾遺

卷七雞血藤膠

一

血走散者真。雲南志順寧府出雞血藤熬膏可治血症。滇遊雜記雲南順寧府阿度里地方有一山綿亘數十里產藤甚異粗類樺梁細似蘆葦中空如竹剖斷流汁色赤若血故土人名之為雞血藤每歲端陽日攜帶金甌入山砍取熬煉成膏泡酒飲之大補氣血與老人婦女更為得益或不飲酒者早晚用開水化服亦能奏效。按順寧府順寧府順寧縣阿度吾山產此又云阿度吾里萬名山寺龍潭等所產載于郡志有二種其一種起鼓丁刺者尤佳或盤屈于地或附樹而生伐之通細窠汁凝如脂煮之有香者真或云兩種糯者為雌放者為雄應昌附注

壯筋骨已酸痛和酒服於老人最宜。治老人氣血虛弱手足麻木癱瘓等症。男子虛損不能生育及遺精白濁。男婦胃寒痛。婦女經水不調赤白帶下。婦女乾血勞及子宮虛冷不受胎。陸象威云曾見婦人合藥服之多年不育者後皆有子。滇志雞血藤膠治風痛濕痺性活血舒筋患在上部飽食後服在下部空心酒服不飲酒者滾水調服其色帶微綠有清香氣酒服亦能興陽尤明府佩蓮云此膠治跌打如神其太夫人一日偶閃跌傷臂痛不可忍用山羊血參三七治之多

本草綱目拾遺 卷七 雞血藤膠

不驗有客教服此膠沖酒一服其疾如失其性捷走血分可知
順甯土人加藥料煎熬雞血膏其煎膏之時忌有孕婦看見決熬不成亦神物也統治百病能生血和血補血破血又能通七孔走五臟宣筋絡治婦人經水不調四物湯加減八珍湯加元胡索為引婦女勞傷氣血筋骨酸痛轉筋牛膝杜仲沈香桂枝佛手乾木瓜穿山甲五加皮砂仁茴香為引大腸下血椿根皮煎湯送下男子虛弱八味加減為引服此膠忌食酸冷

吾杭龔太守官滇帶有雞血藤回里予親見之其藤皮細潔作淡黃色切開中心起六角稜如菊花樣色紅四圍仍白色乾之其紅處輒突出二三分許竟成紅菊花一朵亦奇物也聞其藤最活血暖腰膝已風癱戊申長兒景炎在四川叙州府與滇之昭通接界因囑其往覓此藤所寄來者外形不殊而中心惟作小紅點乾之亦不突起據來書云實金沙江土司山所得然與龔太守所帶來者絕不相類豈此藤亦有二種耶附記於此以俟考

本草綱目拾遺

卷七 雞血藤膠

三

○辛亥予在臨安患臂痛胡春熙明府長君名什曾宦滇南歸里蒙贈雞血藤膠皆方塊每塊一二兩不等外塗以廬灰作白色剖視其內皆黑色如膏藥膠狀云風癱痺痛有效其外灰見水即脫去據言其藤產騰越州銅壁關外新街所屬地遍山谷皆是新街守弁每歲輒命卡兵斫取熬膏除餽遺各上司及僚友外餘剩者轉市客商販入中土藉沾微利以為守資渠所有即售自彼處也外必以廬灰飾之庶久藏不壞因帶歸以示兒子景炎則又全非其所見景炎曾館昭通大關司馬白公家見其所藏雞血藤膠猩紅成塊儼如赤玉光潤

可愛今胡公所贈內作黑色或係年久色黯抑係新街所產與大關有別惜不能親歷其地為之細核附筆於此以俟後之君子考訂焉

也金藤

性溫無毒治中風痰迷半身不遂左癱右瘓不省人事痰涎上壅攻心作咽用一錢白湯磨下。小兒急慢驚風大者五分小者一二分白湯磨下立效如神

鹿角藤

一名白毛刺汪連仕方云木本藤也刺長傷人皮肉立腫疼不休又名不薪木山人不砍性大熱氣臭打痞積治風氣如神皆用根搗其香糟卷之

葉 蒸酒服能鑽筋透骨

子 食之大能醉人

買麻藤

職方典出肇慶緣樹而生有子味苦可食山行斷取其汁飲之可以止渴。粵志買麻藤其莖多水渴者斷而飲之滿腹已餘水尚淋漓半日性柔易治以製履堅韌如麻故名買藤得麻也

治蛇咬 鮮者乾者俱效

紅木香 紅皮藤

一名廣福藤又名紫金皮立夏後生苗枝莖蔓延葉類桂畧尖而軟葉蒂紅色咀之微香有滑涎根入土入藥用須以水洗淨去外粗皮取內皮色紅者用之入口氣味辛香而涼沁如龍腦治風氣痛傷力跌撲損傷胃氣疼痛食積痧脹等症俱酒煎服紫金錠中必不可少

雷頭風腫痛貼痛法紫金皮獨活赤芍白芷菖蒲葱頭煎濃如膏調敷藥到立止如神

本草綱目拾遺

卷七

紅木香 紅皮藤 雷公藤

五

汪連仕云金谷香今人呼紫骨香即紅木香一名木臘正名紫金皮土產者功淺入膏用行血散氣

紅皮藤

朱煥齋任城日鈔錢塘門外道姑橋下有紅皮藤凡患半肢風及大麻風者取藤四兩浸無灰酒一大壺入鍋內隔湯煮三炷香取起飲酒量好者以醉為度每酒一碗入藥酒三四匙陸續飲至藥酒完則風氣自愈其風從指甲縫中出對指尖以竹紙鋪几上驗之紙能吹動即是指尖風出也

雷公藤

生陰山瀨下立夏時發苗獨莖蔓生莖穿葉心莖上又發葉葉下圓上尖如犁耙又類三角風枝梗有刺。物理小識犁頭刺藤其葉三角如犁頭多在籬邊生可治療癰亦可截瘡。一名霹靂木方勝板倒金鈎烙鐵草倒挂紫金鈎河白草犁尖草括把草龍仙草魚尾花三木棉出江西者力大土人採之毒魚凡蚌螺之屬亦死其性最烈以其草烟熏蠶子則不生養蠶家忌之山人採熏壁蝨治脚脹水腫疔積黃白疽瘡疾久不愈魚口便毒癰痺跌打除壁蝨莖燒牀下一切毒蛇傷萬病回

本草綱目拾遺 卷七 雷公藤 六

春云凡被蛇傷用板扛歸不拘多少此草四五月生至九月見霜即罕有葉尖青如犁頭尖樣藤有小刺子圓如珠生青熟黑味酸用葉搗汁酒調隨量服之渣罨傷處立愈

白火丹 救生苦海用雷公藤五錢平地木三錢車前四錢天青地白葉三白草各三錢煎服。又洗方雷公藤河白草煎浴

水腫脹 救生苦海平地木三錢雷公藤五錢車前草四錢天青地白草三錢路路通五個打碎煎服重者十服愈

坐板瘡 秋泉家祕烏賊骨五錢雷公藤三錢其為細末擦之乾則以菜油調敷

汪連仕方蒸龍草即震龍根山人呼為雷公藤蒸酒服治風氣合巴山虎為龍虎丹入水藥魚人多服即昏

治翻胃噎膈瘧疾吐血便血喉痺食積心疼虛飽腹脹陰囊腫大跌打閃肭發背疔瘡乳癰產後遍身浮腫 王安采藥方

藤黃

綱目主治條下祇言點蛀牙自落無他治也張石

本草綱目拾遺 卷七 藤黃 七

頭云藤黃性毒而能攻毒故治牙蟲蛀齒點之即落毒能損骨傷腎可知葉氏得宜本草云服藤黃藥忌吃烟按三黃寶蠟丸黎峒丸俱用藤黃以其善解毒也有中藤黃毒者食海蜃即解。百草鏡藤黃出外洋及粵中乃藤脂也以形似筆管者良大塊者名牛屎藤黃不佳入藥取色嫩純明者用水蒸化濾去渣盛磁器內隔水煮之水少時再添煮乾以三炷香為度以帛紮磁器口埋土中七日取出如此七次曬乾用。粵志廣中產黃藤熬汁即藤黃也性最寒以青魚膽和之治眼疾間有白

者葉如土茯苓身小而長外有籜包以莖浸水洗
目並除腫痛

性酸澇有毒治癰疽止血化毒欬金瘡亦能殺蟲

治刀斧木石傷及湯火傷竹木刺入肉一切諸傷

神效膏 用真麻油一觔藤黃八兩白蠟八兩先

將油入銅鍋次將藤黃搥碎熬透以麻布濾去渣

加入白蠟至滴水成珠為度貯磁罐其膏夏老冬

嫩為宜敷之即能止痛止血收口取效如神○金

不換 治跌打刀傷 蘇州周慎庵傳藤黃一兩

研細末麻油四兩白蠟五錢黃蠟一兩將二蠟入

本草綱目拾遺 卷七 藤黃

麻油內銅杓熬化取起放地上一人徐徐下藤黃

末一人不住手攪勻以盡為度即成膏敷於患處

用油紙攤貼網帕縛好一二日即愈

治一切無名腫毒風氣膏 王站柱不藥良方藤

黃四兩白蠟八兩小磨麻油十二兩先將油煎熟

將成珠入水不散再加黃白攪勻磁瓶收面上仍

以麻油養之臨用攤貼○祝氏效方一筆消 用

大黃二兩藤黃一兩明礬麝香各五錢麝香乳香

沒藥各二錢用蝸牛搗爛作錠遇小瘡毒未出癩

頭以此醋磨新筆蘸藥圈外愈圈愈小圈毒消盡

而止○又一筆消方治一切癰腫 雄黃膽礬

砂藤黃銅綠皮硝草烏各一兩麝香二錢為細末

和蟾酥為條如筆管大金箔為衣用時以醋磨濃

新筆蘸藥塗毒四圍數次即愈○消毒散 治癰

疽痛毒及初生多骨疽 良方彙選大黃一兩芙

蓉葉曬乾為末五倍子各一兩麝香冰片各三分

藤黃三錢生礬三錢共為末米醋調成如厚糊塗

於多骨疽之四週中留一頭如豆大以醋用鴨翎

不時搗之若不搗任圍則無益一日夜即內消其

餘癰癩亦以此敷之神效 又方雄黃二兩麝香

本草綱目拾遺 卷七 藤黃

三錢藤黃一兩人中白五錢硃砂白芨生白欬各

二錢蟾酥一兩其研末用廣膠三錢烱化和藥末

為錠遇毒將此藥磨醋水塗之○消毒方 治一

切無名腫毒及對口發背 救生苦海用滴花燒

酒磨藤黃敷不住手敷之不至半日即消○無回

丹治一切疔癰腦疽 泉妙方用鹼藤黃雄黃大

黃各一兩蟾酥麝香各二錢血竭甲片炒各五錢

醋磨塗立效○移毒方 救生苦海云如毒生在

肢節穴道險要處不成漏症即為癢人須用此藥

只塗半圈即移過一邊用白芨白欬三七五倍子

續修四庫全書第...

大皂角山茨菰藤黃各等分俱剉薄片除藤黃餘
皆入砂鍋內水浸一日煎汁傾出入水再煎如此
數次濾淨熬膏以藤黃將水蒸烱加入攪勻再熬
入碗曬乾用時以雞蛋清磨出濃汁新筆蘸塗
又方藤黃銀硃等分醋和敷趕毒至他處出膿如
用穀樹汁調可搽癬一二次即消。大提藥方
圍毒初起凡對口發背惡疽四五日即消。良方
彙選雄黃藤黃麝香各一錢硃砂三分草麻肉三
錢紅昇丹一錢五分先將草麻研如泥後和各藥
研爛用象牙匣封藏外以虎皮包之方不泄氣

本草綱目拾遺 卷七 藤黃

種福堂提藥方治諸毒不起敷之立起藤黃雄黃
各三錢蟾酥紅藥各二錢冰片麝香各一錢草麻
肉一兩先將草麻肉去皮打如魚凍水入諸藥打
成膏磁罐收貯勿令洩氣或云宜紅藥三錢冰片
蟾酥勿用止加麝三分辰砂一錢 又黃提藥方
鬱金雄黃藤黃各二錢牛黃蟾酥硃砂冰麝各五
分巴豆肉八錢草麻肉一兩共搗爛磁瓶貯遇症
放膏藥上少許貼之治一切惡毒未成可消已成
用之化腐疔毒更妙 諸毒圍藥 祝氏效方南
星炒四兩五倍子炒黑白芫炒各二兩藤黃黃黃

炒各一兩共為細末醋調塗重者加牛黃一錢鹿
茸五錢 又種福堂方無膿即消有膿即潰五倍
子一兩白芷六錢藤黃百草霜各三錢生半夏生
南星白芫陳小粉飛麩各四錢共為末紅醋調敷
○箍毒 活人書五倍子略焙一兩藤黃四兩銅
青少許小粉炒八兩作錠用時醋磨塗。一切無
名腫毒 藤黃五錢五倍子二兩白蜜蔥頭各一
兩用米醋調圍患處留頂勿敷。五色蟾酥墨
能立消腫毒雄黃銀硃膽礬韶粉藤黃銅綠礪砂
各一兩麝香一錢共為末蟾酥為條如筆管大水

本草綱目拾遺 卷七 藤黃

磨塗
疔瘡 吳興楊氏便易良方銀硃蛭蟻白甘菊人
中白芫根內白心雄黃藤黃大黃共搗敷上即退
坐板瘡 仙遺拾珠藤黃搗碎用雄猪網油青布
一長條將藤黃糝在網油之上青布捲成條子線
紫緊浸菜油內一夜火燃取滴下油杯積埋土中
一夜出火毒塗瘡即效
五黃散 治一切頑癬 雞脚大黃硫黃雄黃薑
黃藤黃各等分為細末菜油調塗患處七日勿洗
浴全愈

金氏離洞膏 治癩瘡如神 萬應油五兩藤黃
一兩五錢淨黃蠟二兩共熬黑櫻色攤貼熬萬應
油法香油六十兩以十六兩官秤作準浸桃枝一
兩柳枝一兩槐枝一兩桑枝一兩葱一兩男髮四
兩花椒五錢草麻二兩馬前四兩葶撥五錢桂枝
一兩白芷二兩夏浸三日冬七日春秋五日然後
熬至渣枯去渣每筋生油熬熟汁得八折此油凡
一切膏藥可作地子

金鎖銀開

百草鏡云俗名鐵邊箕處處山野有之葉似天門

本草綱目拾遺 卷七 金鎖銀開

冬葉又似土茯苓葉但差狹小耳藤生或緣石砌
樹上竹林內亦有之非海金沙也其根黑色兩旁
有細刺如邊箕樣故名入藥用根 敏按今俗所
用治一切喉症金鎖銀開乃天蕎麥之根形如粟
丸黏結成塊產山上者皮黃汗泥中者皮黑與百
草鏡所言各別或名同而物異耶。李氏草秘天
蕎麥亦名金鎖銀開形若蕎麥治乳癰風毒入諸
散毒藥內取根二分生薑一分水煎服愈治敗血
久病不痊又洗痔血皆佳。李氏草秘又云小青
草藤上蔓有倒摘刺細如稻芒開粉紅花生藍子

葉似蕎麥又名野蕎麥煎洗痔漏之聖藥

治白濁用根搗汁沖酒服

喉中風火。孫玉庭云其根專治喉閉故得此名

喉風喉毒用醋磨漱喉涎痰去而喉閉自開矣

一痰核瘰癧 不拘何等癰痺結核初起者梁湖陳

府祕方用金鎖銀開須鮮者將來搗汁沖酒服其

莖葉用白水煮爛和米粉作餅餌食之不過二三

服立消若破爛者以梁上烏龍尾揉去粗屑納瘡

中外貼膏藥亦服根汁吃餅餌五六次自結痂而

愈

本草綱目拾遺

卷七 金鎖銀開

乳藤

三

洗痔漏治蛇傷木蛇毒搗汁和酒服 草藥

汪連仕采藥書金鬚針俗呼金鎖銀開其苗柔而

堅性不斷今名象毛力能軟堅化痞台米醋搗汁

盪口能開鎖纏喉風雖枯根亦可透鎖喉

乳藤

粵志乳藤蔓如懸鉤倒挂葉尖而長斷之有白汁

如乳婦人產後以藤搗汁和米作粥食之乳腫自

通。初生嫩條可食其大實曰冬榮子大如椰子

中有瓢瓣瓣相疊白如猪脂炙食皆甘美身懷數

日香不減秋末冬初間采以相餉矜為服食之珍

行血通乳粵志 ○李氏草祕乳汁藤生山麓林中

高二三尺葉似葡萄子藍色一叢根皮搯之出汁如乳為諸乳毒癰瘡中之聖藥

排膿散毒生肌止痛消腫益血痛不可忍者罨之即止已成未成已潰未潰始終皆不可少李氏草祕

汪連仕草藥方乳門草即乳汁草又名土媪嬌性寒涼行乳汁通氣而能入血分根止痢疾 細藤者即遍地金又名雞盲草合雞肝蒸服專治小兒一切疳眼

蝙蝠藤

本草綱目拾遺 卷七 乳藤 蝙蝠藤皆治藤 無根草 十四

此藤附生岳壁喬木及人牆茨側葉類葡萄而小多歧勁厚青滑絕似蝙蝠形故名

治腰疼癩癧

腰疼 瘡寮試效方用蝙蝠藤二兩老人用三兩酒煎服二劑即痛止不可再服若多服一劑腰反傾倒不支

皆治藤

蔓延牆壁間長丈餘葉似泥藤中暑者以根葉作粉食之虛損者雜豬胃煮服

無根草

采藥錄此草無根無葉生在柴草上纏結而生名

無根金絲草色有紫有黃。百草鏡無根金絲草一名大焰草即兔絲苗也生毛豆莖上者佳此草

與女蘿相似以色黃如金而細如線者真若色紅紫粗類燈心者名女蘿又紫背浮萍亦名無根草

與此別。藥鑑無根金絲草莖細而赤無葉無根惟有青色細纒附於莖際蔓延極長多纏草木上

其性涼味甘利水治溼熱三四月採。李氏草祕纏豆藤一名豆馬黃無葉有花子即兔絲子最

本草綱目拾遺 卷七 無根草 十五

治血解豆瘡毒難產酒煎服

藥性考金絲草無根葉用苗此藥功在涼血散血故治癰疽腫毒諸症味苦性寒吐衄崩便咳咯諸

血服之能止解諸藥毒瘡癩疔癰惡瘡。臺志利水通淋。葛祖方治狐臭騷氣辟汗愈瘡。百草

鏡治癩淋濁痢帶下黃疸預解痘毒敷紅絲疔消毒保嬰丹 王之才醫便凡小兒未出痘瘡者

每過春分秋分日服一丸其痘毒即漸消化若只服一二次者出痘稀少若服三年六次者永不出痘此方屢驗萬勿輕視 纏豆藤一兩五錢其藤八月收取毛豆莖上纏繞細紅絲採取陰乾以此

為君妙在此藥上黑豆三十粒赤豆七十粒山豆
肉一兩新升麻七錢五分生地黃荆芥防風川獨
活甘草當歸各五錢連翹七錢五分黃連赤芍藥
桔梗各五錢牛蒡子一兩硃砂另研甘草同煮過
去甘草一兩五錢苦絲瓜二個各長五寸隔年經
霜者妙燒灰存性右藥為極細末砂糖拌勻其膏
干餘下丸如李核大每服一丸濃煎甘草湯化下
其前項藥預辦精料遇春分秋分或正月十五日
或七月十五日修合務在虔誠忌婦人雞犬猫孝
服見之合藥須淨室焚香向太陽祝藥云神仙真
本草綱目拾遺 卷七 無根草 麥裏藤

麥裏藤
各麥地皆有臨安縣鄉間尤多四月採之莖纏麥
上葉類神仙對坐草而畧尖微有毛葉對節生莖
細節微紫葉小者佳葉大者無力

跌撲 張氏傳方以乾者一錢酒煎服
白毛藤

亦名天燈籠又名和尚頭草白毛藤生人家墻壁
上莖葉皆有白毛八九月開花藕合色結子生青
熟紅烏雀喜食之。百草鏡白毛藤多生人家園
圃中墻壁上春生冬槁結子小如豆而軟紅如珊
瑚霜後葉枯惟赤子纍纍懸墻壁間俗呼毛藤
果採其藤乾之浸酒云可除骨節風溼痛

止血淋瘧疝氣汁滴耳中止膿不乾入藥內保腫
毒不大治癩痺用煮牛肉精者食之。清溼熱治
本草綱目拾遺 卷七 白毛藤 天毯草

黃疸水腫小兒蛔結腹痛。採藥志云性熱活血
追風生血治鬼箭有效

風痛 楊氏驗方桑黃二兩白毛藤二兩切碎用
紹興原壇酒六觔煎三炷香每日服一飯碗

黃疸初起 百草鏡白毛藤神仙對坐草大茵陳
三白草車前草各等分白酒煎服

大氣脬 不藥良方用白毛藤無灰酒服
天毯草

一名盒子草俗呼盒兒藤好生水岸道旁苗高三
四尺葉如波斯花有小絨五月結實為毳毳內生

黑子二片生時青老則黑每片渾如龜背又名龜
兒草丹術家取其汁伏硫汞根伏雌雄○百草鏡
鴛鴦木鼈一名水荔枝盒兒藤葉長尖有鋸齒生
水涯蔓生秋時結實狀如荔枝色青有刺殼上中
有斷紋兩截相合藏子二粒色黑如木鼈而小孫
氏丹方盒子草子及葉有小毒蔓生岸旁葉尖花
白子中有二片如盒子 綱目附於榿藤後花實
根形俱不甚詳

性有小毒主蠱毒及蛇咬搗敷瘡上即愈

瘡積初起 百草鏡云鴛鴦木鼈二錢煎服愈

本草綱目拾遺 卷七 天華草 松蘿 松上寄生

敏按此草似預知子近時人罕用而吳氏遵程著
從新以預知子為近日所無直不知即天毯草也
世不用而草醫又易以他名

松蘿

山川志出武當山生高峰古木上長者丈餘

治蛇虎傷湯火烙傷及頑瘡等症 藥性考松蘿

甘平能平肝氣瞋怒痰熱溫瘧吐痢頭風頭瘡癩

癩結聚亦能探吐膈痰去熱

松上寄生

利水導痰除胸中熱

楓上寄生

汪連仕云吊殺糊絲一名上樹糊絲又名鐵角絲
兒乃楓樹上風木藤至年遠結成連珠傀儡能追
風不換時刻酒蒸服加金雀根土當歸石床花根
石蠶治癱瘓勾急之要藥

蛇蒲藤

職方典產福宜莖細葉如猴耳

治喉齒百病

李頭藤

職方考產福宜其藤腐朽者可代香用

本草綱目拾遺 卷七 松蘿 松上寄生

止嘔血活經絡

龍鬚藤

粵東小錄藤產東莞微細如髮直起數丈無一節

常飛越數樹如千百游絲牽綴紅者名紅龍鬚紫

者名紫龍鬚有五色然生無根蒂以穢物投之即

消釋不知所去土人以其液和細土石灰塗壁糖

釜其堅如鐵雖猛火不裂其花與子皆入藥

浸酒服補筋骨祛風解毒能循脈絡無微不至

藥性考五色龍鬚藤細如髮生無根蒂掛樹長藤

臭藤根

草寶云此草二月發苗蔓延地上不在樹間係草藤也葉對生與臭梧桐葉相似六七月開花粉紅色絕類牽牛花但口不甚放開搓其葉嗅之有臭氣未知正名何物人因其臭故名爲臭藤其根入藥本年者細小二三年者大如萊菔可用。李氏草秘云臭藤一名卻節對葉延蔓極臭煎洗腿足諸風寒濕痛拘攣不能轉舒如神。汪氏藥錄臭葡萄蔓延而生子如葡萄而臭治風又云野葡萄氣重味臭功能敗腸胃之癰

本草綱目拾遺

卷七

臭藤根 黃練芽

三

敏

治風痛腸癰跌打損傷流注風火痺毒散鬱氣洗疝合紫蘇煎湯 汪連仕方

黃練芽

今呼黃連芽一名黃棟頭春初采嫩芽小兒生食之取其清香可口味帶苦澹如黃連故名亦可以鹽湯焯食漉出曝乾爲鹽菜暑月食之。百草鏡此物藤生引蔓大樹上葉如桑寄生尖長柔滑頗光潤肥厚二三月枯枝生芽淡紅色如椿芽生食苦中帶甘入口生津安徽人家多醃以爲菜與芹

芽椿芽蘆芽並重。藥性考云葉似槐而尖嫩時揉乾代茶勝茗木甚細膩苦中帶甘味如橄欖鹽食酸甜解喉痛咽哽消熱醒酒舌爛口糜嚼汁可解

味苦澹性寒解暑止渴利便 食物宜忌 生津明目

清積熱解毒 藥檢

敏按方以智物理小識黃棟頭一名回味俗呼黃連頭樹分葉如椿大者合抱春采其葉味苦而甘皮可合香入藥治痢及霍亂綱目遺此未收如方氏所云則木也與百草鏡所云互異或地土有不一

本草綱目拾遺

卷七

黃練芽 木龍藤 蔓油

三

木龍藤

同耶抑其物本有二種耶並存俟考 周益生家寶方藤出錢塘橫山喜沿人家牆壁及石崖上土人多識之

治肺癰肚癰腸癰脇癰四症搗汁老酒沖服冬月以酒搗取汁二碗服立消

蔓油 按蔓即扶留藤

蔓即蒟也嶺南人取其葉合檳榔食今人名檳葉用其葉封固曬半載收貯待用可留數十年非獨疏積滯消瘴癘治病亦夥惟西洋人有之

治手足紅腫或疼以萹葉油揉擦用布包裹滴耳
治耳痛刀傷刺傷以棉花浸萹油貼裏傷處又治
背癰及癩毒貼之初起者即解散已成即速潰膿
亦可敷貼楊梅毒瘡漏痔以上俱泰西應振鐸本
草補

本草綱目拾遺

卷七 萹油

三

花部

梅花 梅梗

綱目載梅花無治方止言點湯煮粥助雅致而已
食物宜忌云梅花味酸澆性平並無主治殆亦不
知梅花之用入藥最廣而功效亦最大 百草鏡
梅花冬盡春開其花不畏霜雪花後發葉得先天
氣最足故能解先天胎毒有紅白綠萼千葉單葉
之分惟單葉綠萼入藥尤良採能不犯人手更佳
含苞者力勝性寒或曰平味酸澆清香開胃散鬱
煮粥食助清陽之氣上升蒸露點茶止渴生津解

本草綱目拾遺

卷七 梅花

三

暑滌煩。談撰卉木皆感春氣而生獨梅開以冬
蓋東方動以風風生木故曲直作酸則酸者木之
性惟梅之味最酸乃得氣之正北方水爲之母以
生之則易感故梅先衆木而華癸辛雜識梅花無
仰開者蓋亦自能巧避風雪耳驗之信然 粵志
惟嶺南梅花最早冬至雷動地中則梅開地上蓋
其時火之氣不足於地而發其最初之精華故梅
開水之氣上足於天而施其最初之滋潤故雪落
雪洩也從肅殺之中洩其一陽之精以爲來春之
生生者也雪深則水氣足梅早則火氣足火氣足

而為天地陽生之始陰殺之終使萬物皆復其元
梅之德所以為大天地一陽之復不可見見之於
梅又其得氣之先也韶州梅長至已花臘月復開
尤盛有於舊蒂而作新花者其地屬嶺北故梅以
臘以正月開氣盛則開而又開瓊州梅有六出者
予謂梅五出者也五陽數也冬至一陽始復梅吐
花得陽之先者今六出乃得陰數矣蓋以地氣而
變苦於嚴寒故不用五而用六同於雪花也以梅
為體以雪花為用人見其六而不見其五藏五在
於六之中猶河圖之五在十中也河圖之一生水

本草綱目拾遺

卷七 梅花

三

梅得水氣之先故花於冬至與雪同時雪者水氣
所凝梅者水形所結卦皆屬坎水在天而凝雪水
在地而發梅水之數六寒極則雪花與梅皆六出
應其數也

花微酸濇無毒清頭目利肺氣去痰壅滯上熱

本草

始安神定魂解先天痘毒凡中一切毒

治瘰癧雞蛋開一孔入綠萼梅花將開者七朶封

口飯上蒸熟去梅花食蛋每日一枚七日全愈

脣上生瘡 赤水玄珠白梅瓣貼之神效如開裂

山血者即止

紫金錠 宜端午日製合飛硃砂紅芽大戟處州
山茨菇千金霜川文蛤淨粉草河車以上六味各
二兩珍珠琥珀明雄黃冰片陳金墨各五錢梅花
蕊西牛黃各一兩川麝香四錢右各藥為末乳篩
極細以糯米粉糊杵為丸研用

稀痘神方 白梅花蕊三錢採飽綻者須預備曬

乾生地黃三錢當歸三錢生甘草一錢臍帶小兒

自己落下時去灰或礬用新瓦炙存性研末極細

同煎濃汁濾清熬膏作一日吃完小兒永不出痘

萬病回春載尹蓬頭混元丹治小兒諸虛百損用

本草綱目拾遺

卷七 梅花

三

梅花合混元衣注梅花解痘先天之毒

九仙奪命丹 集聽云又名十聖丹治七十二般

無名腫毒惡瘡流注火痺等症硃砂三錢雄黃乳

香沒藥冰片血竭各二錢石膽礬青麝香枯礬

熊膽飛過黃丹各一錢五分蜈蚣蚯蚓蠶各二

條微炒黃色去嘴梅花一升寒水石牛黃蟾酥白

官粉硼砂各一錢全蝎九個蝸牛七條以土廿三

味為末研極細以硃砂一錢五分為衣其修合之

法先將蟾酥用乳汁化開其為丸如丸不起畧加

麵糊如桐子大每服一丸令病人口嚼生葱一根

咽下又嚼一根極爛吐在手心上裹藥用滾熱老酒吞下量冷暖時候蓋被出汗如病人不能嚼人代嚼之亦可如無汗再服一丸自愈凡諸毒醫遲毒走攻心必不可救若汗來遲以熱酒催之不可以手按摩患處如癢以舊木梳梳之自止

稀痘 集聽用綠萼梅花七朵須預養於花瓶內春分日摘花半開者只用淨瓣搗爛白糖三匙滾水服之毒即全消免出痘矣小兒滿月後即可服梅花點舌丹 集驗治一切疔毒及惡瘡初起天

本草綱目拾遺 卷七 梅花

無根水送下次取一粒噙於舌下化之乳香去油一二兩珍珠豆腐煮過麝香水飛熊膽各六分沒藥去油京牛黃苦葶藶砂礪砂蟾酥人乳泡血竭雄黃水飛各二錢片腦一錢另研沉香一錢白梅花陰乾一錢二分共為細末用人乳汁化蟾酥丸黍米大金箔為衣

預稀痘疹 不藥良方每年臘月清晨摘帶露綠萼梅蕊一百加上白糖搗成小餅令食之

三花丹 赤水玄珠將出痘之時用此能稀痘梅花桃花梨花取已開未開盛開者陰乾為末等分

鬼腦為丸雄黃為衣用赤小豆菜豆黑豆湯送下

梅桃丹 赤水玄珠治痘已出未出不起不發隱在皮膚並治麻症斑症用梅花一兩桃仁辰砂甘草各二錢絲瓜五錢為末每服五分參蘇湯下痘不問前後凡黑陷咬牙寒戰用梅花六錢穿山甲一兩仙靈脾五分麝香一錢為末每服三五分咬牙寒戰加入牙二三釐內托散送下

青梅散 錫山衣德堂稀痘良方用生青果核七個打碎去仁曬乾研極細末不宜火焙又不宜沾

本草綱目拾遺 卷七 梅花

生水再用玉蝶梅花二十一朵去蒂共白蜜兩茶匙搗濃恰交春分時與小兒服永不出痘即出亦不過三粒此方傳自江甯王培德家已九世無痘殤之兒真異方也

二氣丸 新安汪偉公先生傳其家親友凡小兒服此丸永不出痘其方即前稀痘神方臍帶日坎氣梅花先天之氣故名二氣丸

七仙丹 張琰種痘新書治痘氣血兩虛灰白水泡瘡場等症黃芪二兩人參一兩甘草五錢紫河車一兩梅花一兩五錢鹿茸一兩天靈蓋一個其

為末每服八九分用內托散煎湯送下氣實者加
 山查陳皮各五錢應昌按天靈蓋即或有益亦不
 可用况二方功效全不在此乎
 二花散 種痘新書云能起五陷黃蠟梅花素心
 者尤良陰乾不拘多少去毛殼確盛聽用桃花陰
 乾山查去核炒為末小絲瓜陰乾為末陳皮去白
 人參黃芪炙甘草炙硃砂紫河車酒洗去筋蒸焙
 乾鹿茸酒酥炙穿山甲取首尾四足者炒仙靈脾
 去四弦刺酒焙人牙火煨韭汁焯七次天靈蓋洗
 淨去酥各為末用。按綱目梅花條下並無主治
 而於蠟梅花下亦僅言解暑生津而已不知蠟梅
 本草綱目拾遺卷七梅花

亦並非梅種其主治亦廣不僅治痘也
 龍腦骨 種痘新書云治痘出未透心狂見鬼陷
 伏等症用梅花不拘多少曬乾為末加水片少許
 共研為末以猪心血和勻為丸狂譫者燈心湯引
 紫陷者以紫草煎湯調之加酒數茶匙化下
 絕痘 楊春涯驗方用南方綠萼梅蕊未放採藏
 風乾逢四時入節節前一日用雞蛋一個打孔入
 蕊紙糊好飯上蒸熟吃數次永不出痘即出亦不
 過數粒
 解痘毒 劉氏得效方立春前後三日採紅梅蕊

半含半開者一鍾去蒂仍安鍾內磁碟蓋住一週
 時足氣汁升上用新搗益水經五辛者搗研如泥
 拏成餅樣加明硃砂水飛一錢勻糝於上緩緩研
 勻再加白蜜少許丸如彈子曬半乾金箔為衣遇
 四絕日每服一丸甘草湯下忌鐵器葷腥服過一
 丸後當日晚間微微發熱次日遍身發出細瘰是
 其驗也。種福堂方梅花丸治痘疹有起死回生
 之功又換痘丹中梅蕊犀角麻黃膏並用
 朱禹功仙傳稀痘方赤豆黑豆菜豆各一兩研末
 入新竹筒中削皮留節鑿孔入藥杉木塞緊用蠟
 本草綱目拾遺卷七梅花 梅梗

封固臘月浸厠中一月取出風乾每藥配梅花片
 三錢每服一錢以經霜絲瓜藤煎湯下神效
 千里梅花丸途中備用 醫學指南用枇杷葉乾
 葛末百藥煎烏梅肉臘梅花甘草各等分為末用
 蠟化開投蜜每蠟一兩加白蜜二錢和藥末搗二
 三百下丸如雞豆實大夏月長途含化一丸津液
 頓生寒香滿腹妙不可言
 梅梗
 諸梅樹皆可用以綠萼者佳凡梅有氣條青翠色
 此條無葉止光梗出枝鱗薛徵君生白曾言用以

通上下膈氣有效此氣條而非梗也用梗以帶葉成枝者入藥綱目梅部載梅實及核仁根葉獨不及梗

保產神效方 道聽集云凡婦人三月久慣小產百藥不效者以梅梗三五條煎濃湯飲之復飲龍眼湯無有不保者

雪荷花

雪草
雪裏花

產伊犁西北及金川等處大寒之地積雪春夏不散雪中草類荷花獨莖亭亭雪間可愛戊戌春予於史太守處親見之較荷花暑細其瓣薄而狹

本草綱目拾遺

卷七

梅部

雪荷花

三

長可三四寸絕似筆頭云浸酒則色微紅彼處土人服之為助陽要藥 憶舊遊詩話雪蓮花千年不化元雪深處有之形似蓮花高可丈許取以釀酒倍增春色蓋陰極而陽生之意耳亦產巴里坤等處 西北域記雪蓮產積雪中一莖並蒂浸酒色碧性熱人稱其功同仙茅枸杞而不知其禍乃同砒鴆也蝦蟇比蓮尤甚 予甥屠澗南自哈密回帶有雪荷花因訪其功效據言其地有天山冬夏積雪雪中有蓮以產天山峯頂者為第一然不可得山腰次之其生也有雌雄土人採乾之成對

以市性大熱能補陰益陽老人陽絕者浸酒服能令八十者皆有子

性大熱治一切寒症 此物產於極冷之地乃陰極陽生故也 朱排山柑園小識雪蓮生西藏藏中積雪不消暮春初夏生於雪中狀如雞冠花葉逼肖花高尺許雌雄相並而生雌者花圓雄者花尖色深紅性大熱能除冷疾助陽道家爭致之以治房中之藥 灤陽銷夏錄塞外有雪蓮生崇山積雪中狀如今之洋菊名以蓮耳其生必雙雄者差大雌者小然不並生亦不同根相去必一兩

本草綱目拾遺

卷七

梅部

雪荷花

三

丈見其一再覓其一無不得者蓋如兔絲茯苓一氣所化氣相屬也凡望見此花默往採之則獲如指以相告則縮入雪中杳無痕迹即斷雪求之亦不獲草木有知理不可解土人曰山神惜之其或然歟此生寒極之地而性熱二氣有偏勝無偏絕積陰外凝而純陽內結坎卦以一陽陷二陰之中剝復二卦以一陽居五陰之上下是其象也然浸酒為補劑多血熱妄行或用合媚藥其禍尤烈蓋天地陰陽均調萬物乃生人身之陰陽均調百脈乃和故素問曰亢則害承乃制自丹溪立陽常有

餘陰常不足之說醫家失其本旨往往以苦寒伐
生氣張介賓輩矯枉過直遂偏於補陽而參耆桂
附流弊亦至於殺人是未知易道扶陽而乾之上
九亦戒以亢陽有悔也嗜慾日盛羸弱者多溫補
之劑易見小效堅信者遂眾故余謂偏伐陽者韓
非刑名之學偏補陽者商鞅富強之術初用皆有
功積重不返其損傷根本則一也雪蓮之功不補
患亦此理矣

治痘不起發及悶痞悶痘止用一瓣入煎藥中立
效屢試皆驗陳海曙云

本草綱目拾遺 卷七 雪荷花 雪之 雪裏花 三

雪芝

南中紀聞衡岳間有之乃冰霰所結歲久蒸積而
成產陰崖絕壁間晶瑩如玉懸挂峻坂非攀蘿捫
級不可擷取

療肺疾降火清心

雪裏花

朱楚良在鎮海土人有采雪裏花者冬月嚴寒此
花始生在招寶山龍潭旁環渚而發苗甚短小如
六月雪狀高不過二寸許每雪時開白花如豆大
土人采得乾之入藥

敷痔瘡 以雪裏花為末濕者乾摻乾者麻油調
搽一二度其痔即消縮

水仙花子

能去風澤肌膚潤毛髮治五心煩熱嘈雜不甯同
荷葉芍藥為末服

催生蘭

粵志一名報喜蘭風蘭之族並非風蘭也花如蠟
梅而色紅紫香味亦同每莖作七八枝懸樹間勿
侵地氣遇有吉事則開寤生者以花懸戶上即生

○關涵嶺南隨筆報喜遇吉事始開種法以空為
根以露為命與風蘭同

本草綱目拾遺 卷七 水仙花 催生蘭 三

主催生

珠蘭

藥性考珍珠蘭味辛香茶香郁其根有毒可磨敷
癰瘡 今名雞爪蘭花經云真珠蘭一名魚子蘭

枝葉似茉莉花發長條細莖與建蘭同時香亦相
似而濃郁過之好清者取其莖焙茶尤妙但性毒

止可取其香氣故不入藥張篁壬云中條山有老
道士教人治狐魅有一女子為雄狐所祟教以用

珠蘭根搗爛置牀頭俟狐來交時塗其莖物上狐

大曝窺去次日野外得一死狐道士云此根狐肉沾之即死性能毒狐尤捷效也

建蘭花 葉根 草蘭

建蘭有長葉短葉闊葉諸種其花備五色色黑者名墨蘭不易得乾之可治瞽目能生瞳神治青盲最效紅花者名紅蘭氣臭濁不入藥黃花者名蜜蘭可以止瀉青色者惟堪點茶或蜜浸取其甘芳通氣分素心者名素心蘭入藥最佳蓋建蘭一葉數花實蕙而非蘭也綱目以薰草為蕙即今零陵香於蘭草下正誤條申言蘭草可佩乃孩兒菊古

本草綱目拾遺 卷七

名都梁香是也且斥寇氏丹溪二家所解蘭草混入世俗之蘭花為非而以蘭花為幽蘭與蘭草迥異然何以不立幽蘭一條不能無缺畧之憾因急補之

素心建蘭花乾之可催生除宿氣解鬱蜜漬青蘭花點茶飲調和氣血寬中醒酒開小記建甯人家點茶芳香如初摘

葉 丹溪云建蘭葉稟金水之氣而似有火不知其能散久積陳鬱之氣甚有力今時醫用以通舒經絡宣洩風邪亦佳。本草匯云蘭葉稟金水清

芬之氣似有火獨走氣道入西方以清辛金不獨開胃清肺消痰善能散積久陳鬱之結氣今人但賞花香不知用葉亦缺典耳况葉味載內經甚少蘭獨擅名所謂治之以蘭除陳氣也故東垣方中每常用之與藿香枇杷葉石斛竹茹橘紅開胃氣之神品入沉香鬱金白芷蘇子蘆根汁下氣開鬱治噎膈之將成者產閩中者力勝江浙諸種力薄辛平甘寒陰中之陽入手太陰足陽明經亦入足太陰厥陰經生津止渴開胃解鬱潤肌肉調月經養營氣本經主利水道因其走氣道故能利水消

本草綱目拾遺 卷七 建蘭花葉

渴除胸中痰癖殺蠱毒不祥之氣者蓋肺主氣肺氣鬱結則上竅閉而下竅不通胃主納水穀胃氣凝滯則水穀不以時化而為痰癖蠱毒不祥之氣辛平能散結滯芬芳能除穢惡則上症自除本草按綱目蘭草條不指幽蘭而本草匯草部有蘭草所言皆指建蘭即瀕湖所云幽蘭是也今從其說補之

根 名土續斷治跌打和血物理小藏幽蘭建蘭茹葉以浸油黑髮又云都梁蘭根名土續斷當是此也。五雜俎蘭根食之能殺人忌內服治痰嗽後吐血。劉羽儀經驗方云先痰嗽後吐

血而氣急者用天冬麥冬生地白芍紫苑山梔桑皮地骨皮等藥如氣急去天冬加眞蘇子取蘭花根搗汁沖服尤妙。江夏程雲鵬著慈幼筏痘門載清地散花飲凡痘見標三日此方主之有夾疹者加蘭花根額上灰滯色加菊花蘭花梅花或蘭花根亦可又玉液春膏飲中治背癢不足加酒炒土蘭花

草蘭

葉短而狹小春花者名春蘭秋花者名秋蘭皆一幹一花有一幹數花者名九節蘭其萼中無紅斑本草綱目拾遺 卷七 蓮蘭花根 草蘭 玫瑰花

點色純者名草素尤香入藥以一幹一花者良

根 治瘋狗咬行篋檢秘取根四兩水淨入黃酒

玫瑰花

二碗煎成一碗服完其毒即從大小便化血而出
有紫白二種紫者入血分白者入氣分莖有刺葉如月季而多鋸齒高者三四尺其花色紫入藥用花瓣勿見火。百草鏡云玫瑰花立夏前採含苞未放者陰乾用忌見火
氣香性溫味甘微苦入脾肝經和血行血理氣治風痺。藥性考云玫瑰性溫行血破積損傷瘀痛

浸酒飲益

治吐血玫瑰膏 救生苦海用玫瑰花一百朵初開者去心蒂河水二碗煎半再用河水一碗煎半去渣和勻共有碗半復煎至一碗白糖一觔收成調膏不時服之

噤口痢 用玫瑰花陰乾煎服

治乳癰玫瑰花七朵母丁香七粒無灰酒煎服自愈

腫毒初起 百草鏡玫瑰花去心蒂焙爲末一錢好酒和服

本草綱目拾遺 卷七 玫瑰花

乳癰初起 鬱症宜此 百草鏡玫瑰花初開者

陰乾燥者三十朵去心蒂陳酒煎食後服

肝胃氣痛 用玫瑰花陰乾沖湯代茶服

新久風痺 百草鏡玫瑰花去淨莖蒂陰乾三錢

紅花全當歸各一錢水煎去渣好酒和服七劑除根永不再發

吐紅 集聽用玫瑰花不拘多少去蒂搗汁熬膏

貯瓶內每早空心茶匙挑四五匙白滾水沖服一二日即愈

少林拳經玫瑰花能治跌打損傷

風痺藥酒 救生苦海用白蓮花大紅月季花玫瑰
花去蒂各一兩開羊花五錢風茄花五朵龍眼
肉北棗肉各一兩紹酒五壺浸封七日隔水煮之
罈上置白米一撮米熟成飯爲度取出每服二三
杯蓋暖卧避風卽愈

保真丸 朱排山柑園小識保真丸能通經絡和
百脈壯腰腎健脾胃加飲食健步履除一切痼疾
能固真元用玫瑰花去蒂摘瓣以竹紙糊袋裝之
薄攤曬乾取淨末一觔不宜見火此花色能益血
香能補氣妙難盡述補骨脂一觔淘淨泥土用甘

本草綱目拾遺

卷七

金雀花

三

木芪苓各五錢煎汁一碗拌曬以汁盡曬燥炒兔
絲子一觔用芎歸芍生地各五錢煎汁去渣以汁
煮兔絲子俟吐絲爲度曬乾炒胡桃仁六兩連皮
搗如泥杜仲四兩鹽水炒去絲子四兩淘淨微
火炒各爲細末煉蜜爲丸如桐子大每晨空心白
湯服四錢忌羊肉薑薑並諸血一方加魚膠四兩
男婦共服可以種子極效或加鹿角膠枸杞子

金雀花

一名黃雀花似六月雪而本高正二月開花色黃
梗有刺根入藥。花鏡金雀花枝柯似迎春葉如

槐而有小刺仲春開黃花其形尖秀開兩瓣勢如
飛雀可愛其花鹽湯焯過控乾入茶供。百草鏡
金雀花生山土中雨水時開花色黃而香形酷似
雀白花者名銀雀最難得其莖有白點花後發葉
碎小葉下有軟刺取根入藥去外黑皮及內骨用
別有霞雀花更不可得。嘉興府志金雀一名飛
來鳳鹽浸可以點茶。成化四明志金雀兒花產
奉化。丁未余館奉化劉明府署時明府幼孫患
痘瘡以其得先春之氣故能解毒攻邪用花

本草綱目拾遺

卷七

金雀花

三

性平和血祛風入肝脾二經亦入乳癰用 百草
鏡跌撲傷損以金雀花乾者研一錢酒下
根 治跌打損傷又治咳嗽痰筋骨痠痛風性能
追風活血兼通血脈消結毒。濟世良方金雀根
搗汁和酒服渣毳傷處治跌打損傷

金蓮花

廣羣芳譜出山西五臺山塞外尤多花色金黃七
瓣兩層花心亦黃色碎蕊平正有尖小長狹黃瓣
環繞其心一莖數朵若蓮而小六月盛開一望徧
地金色爛然至秋花乾不落結子如粟米而黑其

葉綠色瘦尖而長五尖或七尖。五臺山志山有早金蓮如真金挺生陸地相傳是文殊聖蹟。張

壽莊云五臺山出金蓮花寺僧採摘乾之作禮物

餉客或入寺獻茶盞中輒浮一二朶如南人之茶

菊然云食之益人 查慎行人海記早金蓮花五

臺山出瓣如池蓮較小色如真金曝乾可致遠有

分餉者以點茶一甌置一朶花開沸湯中新鮮可

愛後扈從出古北口外塞山多有之開花在五六

月間一入秋莖株俱萎矣。金蓮花出五臺山又

名旱地蓮一名金芙蓉色深黃味滑苦無毒性寒

本草綱目拾遺

卷七 金蓮花

佛桑花

早

治口瘡喉腫浮熱牙宣耳疼目痛煎此代茗

明目解嵐瘴

恕軒

疔瘡大毒諸風

山海草函

佛桑花

粵語佛桑枝葉類桑花丹色名朱槿一名福桑又

名扶桑重臺者曰愛老多以爲蔬綱目木槿後有

扶桑條止載外治故補之

吳震方嶺南雜記扶桑粵中處處有之葉似桑而

畧小有大紅淺紅黃三色大者開泛如芍藥朝開

暮落落已復開自三月至十月不絕佛桑與扶桑

正相似而中心起樓多一層花瓣今人以扶桑佛

桑混一非也紗緞黑退變黃搗扶桑花汁塗之復

黑如新

潤容補血

粵語

美顏潤血 陳述齋瑣語朱槿花蒸醋食之粵中婦女多以此美

姿 敏按兩粵瑣語載朱槿與佛桑皮微有異云朱

槿一名日及亦曰舜英葉如桑光潤而厚高止四

五尺而枝婆娑自仲春花至仲冬一叢之上日開

數百朶朝開暮落色深紅五出大如蜀葵瓣捲起

勢若飛鷲層出如樓子有莖一條比瓣稍長上綴

金屑日光所燦疑有火焰粵女多種之插枝卽生

蘇子瞻詩焰焰燒空紅佛桑謂朱槿也然佛桑又

本草綱目拾遺

卷七 佛桑花

寶珠山茶

早

有殷紅水紅黃紫各色比朱槿差小稱小牡丹四

時有花白者以爲蔬菜甜美可口女子食之尤宜

據陳述齋所云則佛桑與朱槿一類而二物要其

功用亦不甚遠故粵語以爲卽朱槿今並附錄其

功用以補李氏所未備

寶珠山茶

雲溪方以落地花仰者爲貴山茶多種以千葉大

紅者爲勝入藥。百草鏡山茶多種惟寶珠入藥

其花大紅四瓣大瓣之中又生碎瓣極多味渣二

三月採陰乾用之若俱是大瓣千葉者名洋茶不

一入藥單辦者亦不入藥羣芳譜寶珠山茶可代鬱
金研末麻油調塗湯火灼傷

味微辛甘性寒破血消癰跌打吐血症用之又治
腸風瀉血湯火傷鼻衄灸瘡均焙研七朶空心酒
一服○百草鏡云涼血破血止血瀉劑也消癰腫跌
撲斷久痢腸風下血崩帶血淋鼻衄吐血外敷灸
瘡

赤痢 救生苦海用大紅寶珠山茶花陰乾爲末
加白糖拌勻飯鍋上蒸三四次服

鼻中出血 何明遠方千葉大紅山茶花二三月
本草綱目拾遺卷七寶珠山茶

采陰乾用時取五六朶煎服卽止 又張氏必效
方鼻衄用寶珠山茶大紅者焙研三五錢砂糖滾

水和服
吐血咳嗽 不藥良方寶珠山茶瓦焙黑色調紅

砂糖日服不拘多少 又方寶珠山茶十朶紅花
五錢白芩一兩紅棗四兩水煎一碗服之渣再服

紅棗不拘時亦取食之
蔣儀藥鏡拾遺賦山茶花吐血衄血腸風下血之

良將
宋春暉云曾見有人患乳頭開花欲墜疼痛異常

有教以用寶珠山茶焙研爲末用麻油調搽立愈
痔瘡出血 汪子明方用寶珠山茶研末沖服

粉團花 根附
有大小二種其花干瓣成簇大者曰玉粉團初青

後白小者曰洋粉團青色轉白白後轉紅藍色入
藥用大者

性寒熏臭蟲同水龍骨雷公籐和燒熏之立除
草鏡

洗腎囊風 姚伯玉方用粉團花七朶水煎洗○
良方集要用蛇牀子牆上野莧球花煎湯洗之

本草綱目拾遺卷七粉團花 玉簪花
根 治喉爛 傳效方取入土內者好醋磨以翎

毛蘸掃患處涎出愈
玉簪花

綱目玉簪條載根葉之用獨不言其花今人取其
含蕊實鉛粉其中飯鍋上蒸過云能去鉛氣且香

透粉內婦女以勻面無黧痣之患 其葉乾之熏
花性微毒治小便不通彙集方玉龍散中用之

治癬第一靈丹 寶誌遺方鮮玉簪花三百朶爲
泥母丁香六兩沉香四兩冰片三錢麝三錢山西

城磚十二兩共爲末用眞麻油三觔半熬熟陳年

石灰半觔滴水成珠為度候冷收磁罐內黃蠟封固埋土內二十一日取出敷患處自愈此藥可久貯勿使洩氣

治杖破 玉簪花手排熟貼傷處

清涼膏 張卿子秘方貼耳瘋毒大黃黃柏黃連

黃芩鬱金皮硝白芨獨腳蓮天花粉玉簪花共研

細末雞子清調敷留頂 又二香追毒飲治肚心

癱羌活連翹紫蘇甘草白芷防風銀花天花粉肉

桂黃芪乳香木香沉香芍藥生地枳殼黃芩柴胡

前胡茯苓玉簪花水煎食後服

本草綱目拾遺 卷七 玉簪花 玉蘭花 四

山海草函玉簪花入韶粉內敷疔瘡疔梗

玉龍散 治小便不通用玉簪花蛇蛻各二錢丁

香一錢共為末每服一錢酒調送下 醫學指南

玉蘭花

瀕湖綱目辛夷集解下惟云有花白者人呼為玉

蘭並不另立主治即辛夷亦用苞蓋不及其花之

用也今采龍柏藥性考補之

性溫香滑消痰益肺和氣蜜漬尤良

痛經不孕 良方集要玉蘭花將開未足每歲一

朶每日清晨空心水煎服

丁香花

未詳形狀藥性考

味辛微溫嘗茶弔露清利頭目

紫茉莉

此草二三月發苗莖逢節則粗如骨節狀葉長尖

光綠前銳後大小暑後開花有紫白黃三色又有

一本五色者花朝開暮合結實外有苞內含青子

成簇大如豌豆久則黑子內有白粉宿根三年不

取大如牛蒡味微甘類山藥 陳扶搖花鏡紫茉莉

一名狀元紅本不甚高但婆娑而蔓衍易生葉

本草綱目拾遺 卷七 丁香花 紫茉莉 野薔薇 聖

似蔓青。按紫茉莉入夏開花至深秋未已白花

者香尤酷烈其花見日即斂日入後復開亦不經

久一日即萎西人有食之者去其外皮鹽漬以佐

饌云能去風活血無濁淋等症然其性秉純陰柔

中帶利久食恐骨軟陽虛人尤忌之性惡鐵凡取

用忌鐵器

根治乳癰白濁 花可浸酒 子名土山柰取其

粉可去面上疵痣粉刺 性寒 藥性考

野薔薇

百草鏡山野與家種無異但形不大花皆粉紅色

單瓣無千葉者春月山人採其花售與粉店蒸粉
貨售爲婦女面藥云其香可辟汗去黧黑。花鏡
野薔薇一名雪客葉細而花小其本多刺蔓生籬
落間花有純紅粉紅二色皆單瓣不甚可觀但香
最甜似玫瑰人多取蒸作露採含蕊拌茶亦佳患
瘡者烹飲卽愈 六研齋筆記通元子服餌法春
時服薔薇嫩頭一月卽可每日服信二釐漸增至
一分卽可入水坐卧不病如是經年卽可蠟塗身
體挾利刃潛遊江湖劫睡龍之珠得珠而行空自
如觸石無礙三界八寰可縱浪矣此飛仙之業也

本草綱目拾遺

卷七 野薔薇 秋海棠

吳

而始於嚙薔薇頭談此於客未有不盧胡而笑
花治瘡。伍涵芬讀書志白野薔薇花拌茶煎服
可驅瘧鬼。婦人鬱結吐血。劉克中云香烈大
耗真氣虛人忌服之
根治肺癰吐膿痰酒煎服口瘡煎湯漱口。子名
石珊瑚治產後軟癱。婦人禿髮用薔薇嫩枝同
猴薑煎汁刷之。

秋海棠

嶺南隨筆海棠本無香惟清遠歸猿洞秋海棠肇
慶瓊羊峽春海棠其香特盛。羣芳譜一名八月

本草綱目拾遺 卷七

春草本花色粉紅甚嬌豔葉綠如翠羽此花有二
種葉下紅筋者爲常品綠筋者開花更有雅趣。
大觀錄秋海棠亦名斷腸草其根葉有毒犬馬食
之卽死浸花水飲之害人。漳州府志秋海棠歲
每生苗其莖甚脆葉背作紅亂紋云是相思血也
相傳昔人有以思而噴血階下遂生此故亦名相
思草其花一朵謝則旁生二朵二生四四生八具
太極象雅豔異常。花鏡秋海棠一名八月春爲
秋色中第一本矮而葉大背多紅絲如胭脂作界
紋花四出以漸而開至末朵結鈴子生極枝花嬌

本草綱目拾遺

卷七 秋海棠

吳

治柔媚其異種有黃白二色一名斷腸花。周開
郭云秋海棠俗傳其花中黃心有大有毒人食多死
子一日悞食此驚惶一夜倉卒旅邸無藥可解但
委命聽之而已次日亦無恙丁憲榮云秋海棠葉
初生山左小兒爭采食之味微酸生津能益唇色
如塗朱然則其無毒可知。藥性考海棠喜背陰
而生故性寒凡大熱症可用

味酸性寒無毒和蜜搽而澤肌潤肉其幹搗汁治
咽喉痛藥性考百草鏡云擦癩殺蟲用葉花浸蜜入
婦人面藥用。物理小識白銀以烏梅三葉酸秋

二五

海棠葉皆可

海棠蜜 救生苦海紅秋海棠採花去心白蜜拌勻蒸曬十次令化為度冬月早晨洗面後敷之能令色豔并治吹花癬疥癩。慈航活人書有製海棠蜜法上白蜜一大杯紅秋海棠現取花片用拌入蜜內將花畧搗爛日日曬或蒸數次自爛如泥其蜜色如海棠或加入好芙蓉粉少許光絕可愛且免面皮凍裂

茶菊 城頭菊 金鈴菊 金箭頭 菊米 菊根

茶菊較家菊采小多心有黃白二色杭州錢塘所屬良渚檜葬地方鄉人多種菊為業秋十月採取花挑入城市以售黃色者有高腳黃等名色紫蒂者名紫蒂盤桓白色千葉名千葉玉玲瓏徽人茶舖多買焙乾作點茶用常中丞安宦遊筆記鳳凰山產菊花不甚大蒂紫味甘取以點茶絕佳又浙省城頭一帶產菊名城頭菊皆生城上石縫中至秋開花花小於茶菊香氣沁腹點茶更佳此則茶菊之野生者性味不同臨安山中所產一種野菊名金鈴菊花小如豆與城頭菊彷彿山人多采入藥舖作野菊花用實與野菊又不同野菊食之瀉

本草綱目拾遺 卷七 茶菊

人而鈴菊又不作瀉野菊瓣疎此則旁瓣密為別也瀨湖綱目菊牙家野而此數種獨未言及今杭俗以茶菊作餉遺客為用最廣予故不惜觀縷言之兼補瀨湖所未備焉。百草鏡云甘菊即茶菊出浙江江西者佳形細小而香產於亳州者不可用白而微臭近日杭州笕橋安徽池州紹興新昌唐公市湖北餘州皆產入藥用陰乾者去蒂以白木枸杞子地骨皮為使反河鮑及無鱗魚園菊花大不入藥止可裝枕去風其根治疔腫卻效。羣芳譜一名真菊一名家菊一名茶菊花正黃小如

本草綱目拾遺 卷七 茶菊

指頂外尖瓣內細萼柄細而長味甘而辛氣香而烈葉似小金鈴而尖更多亞淺氣味似薄荷枝幹嫩則青老則紫實如葶藶而細種之亦生苗人家種以供蔬茹凡菊葉皆深綠而厚味極苦或有毛惟此葉淡綠柔莖味微甘咀嚼香味俱勝擬以作羹及泛茶極有風致。萬歷嘉善縣志花黃梗紫為甘菊最良野菊叢生花小性涼家菊花大氣弗聚矣。黃茶菊以紫蒂為佳明目去風搜肝氣治頭暈目眩益血潤容入血分。食物宜忌黃菊花即甘菊味苦微甘性平益肺腎去風除熱補血養

目清眩運頭風。白茶菊千葉者佳通肺氣止欬
逆清三焦鬱火療肌熱入氣分其根治疔腫喉疔
喉癰。海甯出茶菊名金井玉欄杆其花心黃邊
白點茶絕佳。聖惠方云黃甘菊雖能燥濕祛風
亦能助火泄氣

性平專入陽分治諸風頭眩解酒毒疔腫

撲打損傷。王阮亭居易錄云四川提督吳英說
昔得撲打損傷秘方雖重傷瀕死但一絲未絕灌
下立甦其方以十一月采野菊花連枝葉陰乾用
時取一兩加童便無灰酒各一碗同煎熱服

本草綱目拾遺 卷七 城頭菊 五子

紅絲疔 立效驗方以白菊花葉無白者別菊亦
可冬月無葉取根加雄黃錢許蜒蟻二條共搗極
爛從頭敷至絲盡處爲止用絹條裹緊隔夜即清
眞神方也

城頭菊

朱排山柑園小識杭城石鱗生菊枝葉極瘦小九
月開花如豆香而且甘雍正初禁人採取以充貢
品宮闈以作枕城上之菊旣爲野生而味甘亦一
異也蘇頌圖經云有一種開小小花瓣下如珠子
謂之珠子菊豈卽此歟

明目去頭風喉痺癩毒涼血其枝葉鮮者生搗搗
疔瘡并服其汁兼治蛇咬瘰癧痔瘡眼癰煎洗天
泡瘡亦效

金鈴菊

百草鏡云采花乾之作枕除頭風目疾內熱洗風
火眼止熱瀉痔瘡一切腫毒諸蟲咬螫有效胃虛
便滑無實熱者忌用以其苦寒傷胃能作瀉也。
羣芳譜載金鈴菊花小如鈴其幹長與人等凡菊
葉皆五出此葉獨尖長七出花與葉層層相間不
獨生於枝頭此乃家種金鈴菊非野生金鈴菊也
然功用要亦彷彿

金箭頭

馬伯州菊譜花長而未銳枝葉可茹名金箭頭又
名風藥菊專治頭風較他菊十倍

菊米

處州出一種山中野菊土人采其蔬乾之如半粒
菜豆大甚香而輕圓黃亮云敗毒散疔去風清火
明目爲第一產遂昌縣石練山

菊根

張介賓本草正云白菊根善利水搗汁和酒服之

大治癰閉

瘰癧未破 醫學指南採野菊根搗爛煎酒服渣塗上自消不消自破

睡蓮

廣志睡蓮布葉數重葉如荷而大花有五色當夏晝開夜縮入水底晝復出與夢草書入地夜即復出相反廣州有之諺曰毋佩睡蓮使人好眠綱目蔬部載睡菜而睡蓮獨遺故補之。張翥大觀錄綽菜夏月生於池沼之間葉類茨菰根如藕條食之令人思睡又名瞋菜。嶺南雜記睡蓮菜一名

本草綱目拾遺 卷七 睡蓮 睡蓮菜

至

瑞蓮花瓣外紫內白幹如釵股心似雞頭以水淺深為短長日沉夜浮必雞鳴采之始得出高州

佩之多好眠廣清香爽脆消暑解嶺南醒雜記

瑞香花

粵語乳源多白瑞香冬月盛開如雪名雪花刈以為薪雜山蘭芎藭之屬燒之比屋皆香其種以攀枝為上有紫色者香尤烈雜衆花中衆花往往香皆為所奪一名奪香花乾者入藥用綱目芳華內瑞香條止載其根治急喉風用白花者研水灌之亦不言其花之功用故補之

稀痘治乳岩初起

藥性考瑞香花馥糖饒芳甘清利頭目齒痛宜含子午蓮

綱目水草部入蘋以為此即大葉之蘋也古人以為食品祭用蘋蘩即此今浙人呼為子午蓮生水澤陂蕩中葉較荷而小缺口不圓入夏開白花午開子歛子開午歛故名采花入藥
治小兒急慢驚風煎湯服用七朶或十四朶杭城張子元扇店施此救人多年矣

桃金娘

本草綱目拾遺 卷七 子午蓮 桃金娘

至

粵志草花之以娘名者有桃金娘叢生野間似梅而未微鏡似桃而色倍頰中莖純紫絲綴深黃如金粟名桃金娘八九月實熟青紺若牛乳狀產桂林今廣州亦多有之粵歌云攜手南山陽采花香滿筐妾愛留求子郎愛桃金娘。花鏡金絲桃一名桃金娘出桂林郡花似桃而大其色更頰中莖純紫心吐黃鬚鋪散花外儼似金絲八九月實熟青紺若牛乳狀味甘可入藥用如分種當從根下劈開仍以土覆之至來年移植便活
花行血

子味甘入脾養血明目

假素馨

出廣中青藤仔花也。○粵語青藤仔葉長三四寸多芒刺莖大如指而堅韌人家日用之猶北地之用柳條

煎湯洗瘡疥良

千金花

此即千金草花千金草即本經蘭草今所呼孩兒菊省頭草是也二月宿根再發莖素枝赤節綠葉對節生光澤有歧嫩時可採可佩入九月漸老

本草綱目拾遺 卷七 假素馨 千金花 梧桐花 五

枝頭成穗作花紅白狀似雞蘇久之花瓣轉白絨裂如毬毬中有子一粒絨著于上色黑味苦臭香氣烈即千金花也瀕湖綱目僅載其葉之用本草乘雅云以千金花煮酒臭類木香苦甚黃連用治滯痢獲效頗捷予故采其說入花部以補所未備花氣香味苦浸酒治滯下以其能闢辟不祥利水道宜氣四達之功耳 乘雅

梧桐花

山海草函治杖丹癩頭湯火傷

金鳳毛

汪連仕云今人呼翠翎草翠翎如翎細葉塌地而生與翠雲草鳳尾不同 按此種即葛蘿今人編竹為亭臺植之盆中秋開大紅小花者是也 治耳疔痔漏

寸姊妹

一名佛見笑汪連仕云取其根葉陰乾為末蜜糖湯調服治傷寒危篤立效乃元升觀之秘方

雨韭

汪連仕草藥方云雨韭生水澤旁即青茨菇花去濕之功同茵陳

本草綱目拾遺 卷七 金鳳毛 寸姊妹 雨韭 罌粟子油 佛前舊供花 雲谷醫抄 治瘰癧爛腿用佛前多年陳久供花取

散一切疔腫消痔漏明目

罌粟子油

固精 物理小識

佛前舊供花

雲谷醫抄 治瘰癧爛腿用佛前多年陳久供花取來用香油浸貼即愈

果部上

延壽果

乃鹿銜草之子又松潘衛志有延壽果云果生於土味甜似山藥並無樹果此或名同而物異也

按鹿銜千金方名鹿藥草其葉大而面綠背青者

為真蘇恭言有大小二種保昇言葉似茺蔚叢生

有毛者吳風草也此草惟生於秦地者有子土人

名曰延壽果

仁恕堂筆記張掖河西地有草根一種形如黃連

盤根屈曲有若缺然邊人取之實邊豆用之供餽

本草綱目拾遺

卷七

延壽果

櫻額

五

遺名曰延壽果俗又稱鹿跑草其味甚甜

理血中邪濕溫補下元去風痺歷節痛小兒食之

定驚悸

三邊紀畧

本草逢原云味微瀋而甘不特有

益老人而嬰兒先天不足者尤為上藥惜乎南方

罕得也

櫻額

果屬也產關東烏喇口外其樹叢生果形如野黑

葡萄而稍小鮮實甚美曬乾為末可以致遠。盛

京志一名稠梨子實黑而澀土人珍之間以作麵

暑月調水服之可止瀉

按宦遊筆記郁李即棠棣結子如櫻桃南產者酸

澀不堪食盛京出者又名櫻額味甘鮮曬乾為末

更佳

味甘澀性溫煖補脾止洩瀉

倒吊果

御製幾暇格物編俗名吊搭果形似山梨而小體微

長味酢肉多沙長蒂諸果始生時皆向上此果花

實皆下垂故名生時堅澀熟乃沙樹枝葉俱如梨

為秦中物產今遵化沿邊有之而考之書籍草木

諸譜皆不載倒吊之名惟上林賦云答遯離支答

本草綱目拾遺

卷七

櫻額

倒吊果

飛松子

五

遯音近打拉張揖注云答遯果名按梅堯臣牡丹

詩用打拉二字北人方言以欹垂為打拉是答遯

名果或因其下垂也說文海篇俱作榕榧果今名

吊搭或是答遯音之轉耳

性暖利胸膈健脾消食

飛松子

雲南土司志邊境各土司深山中產一種飛松子

結實熟時人欲取之子輒飛去夜則仍歸根下土

人記其處俟夜過子掘其根而取之饋遺以為珍

品味絕香美。徐霞客遊記飛松一名狐實亦作

一第〇六下冊續修四庫全書第3版反列

梧實正如梧桐子而大倍之色味亦如梧桐子而殼薄易剝坐密樹中一見輒伐樹乃可得遲則樹即存而子俱飛去成空株矣故曰飛松惟巔堂關外野人境有之其葉如柳味絕類土豆。滇畧梧實大如豆殼脆易剝不與他處類俗謂之山松子亦曰飛松。朱排山柑園小識飛松出滇南似梧桐子稍大而微長內外色味俱肖而香美過之蔓生松樹上土人甚珍之

下氣消痰通和血脈能返魂凡有人魂神不安及驚越失魂神不守舍一切等症此為要藥故靈璧

本草綱目拾遺

卷七

飛松子

茶腦子

五

趙氏天王補心丹治怔忡用之張棻猗言十香返魂丹加飛松子殼更效

茶腦子

邊輿考其樹出遼東塞外高有三尺許葉如南方棟樹背有黃白點花四出形如手碧色或有八出者結子大如拳熟便可食其甘如飴其樹浸水可為油燃燈入藥用子

治一切病遠塞無藥土人有病者取茶腦子啖之即愈

椰油 椰中酒 椰膏 椰皮 椰肉

臺灣使槎錄云可佐膏火或云用火炙椰其油自

出凡揀椰子以手搖之聽水聲清亮則心大而甜

其肉厚水聲濁則否。瀨水燕談錄椰子生安南

及海外諸國木如椶櫚大者高百餘尺花白如干

葉芙蓉一本花不過三五顆其大如斗至差小外

有黃毛軟皮中有殼正類檳榔殼上有二穴牙出

穴中殼內類蘿菔皮味苦肉極甘脆蠻人甚珍之

。劉恂嶺表錄異椰殼中有液數合如乳亦可飲

之冷而動氣。廣果錄椰樹高六七丈直竦無枝

至木末乃有葉如束蒲長二三尺花如千葉芙蓉

本草綱目拾遺

卷七

椰油

五

白色終歲不絕葉間生實如瓠繫房房連累一房

二十七八實或三十實大者如斗有皮厚苞之曰

椰衣皮中有核甚堅與膚肉皆緊著皮厚可半寸

白如雪味脆而甘膚中空虛又有清漿升許味美

於蜜微有酒氣曰椰酒蘇軾詩美酒生林不待儀

言椰中有自然之酒不待儀狄而作也。廣東名

勝志文昌縣玉陽山椰子最多大三四圍高二三

丈通身無枝至百餘年纔有葉二月花連著實房

房三十或二十七八子至六月熟七月收

療齒疾凍瘡粵志祛暑氣華夷花治消渴塗髭髮立

黑澗水燕
談錄

椰中酒 食物考緬甸有樹頭酒即椰子中漿汁

也華夷花木考載林邑王與南越王有怨遣刺客

七其首鼻之樹上化為椰子樹當刺時王方大醉

故椰漿如酒飲之醉人

祛風消水腫止吐血塗頭黑髮然多食昏人動氣

增渴性溫故也久服可烏鬚食物考

椰膏 粵載椰子殼土人取以熬膏色黑如漆塗

癬良

椰皮 煮汁止血療吐逆澗水燕
談錄

本草綱目拾遺 卷七 宜母果

椰肉 益氣生風澗水燕
談錄

楊梅下疳筋骨疼痛 不藥良方椰子殼燒存性

臨燒以滾酒泡服二三錢暖卧取汗其痛即止

宜母果

嶺南雜記似橘而酸又名宜濛子。元吳萊有宜

濛熱水歌。粵語宜母子似橙而小二三月熟黃

色味極酸孕婦肝虛嗜之故曰宜母元時於廣州

荔支灣作御果園栽種里木樹大小八百株以作

渴水里木即宜母子也一名黎濛子吳萊詩廣州

園官進渴水天風夏熱宜濛子百花醞作甘露漿

南園烹成赤龍髓蓋以里木子榨水煎糖也蒙古

以為舍里別即渴水也一名藥果當熟時人家競

買以多藏而經歲久為尚汁可代醋染大紅以其

汁調乃上。藥性考黎濛子大如梅形似橘孕婦

宜食能辟暑即宜濛子孕婦食之能安胎故又名

宜母

醜食下氣和胃懷妊不安食之良製為漿辟酷暑

又能解渴。宜母子以鹽醃歲久色黑可治傷寒

痰火粵語

天師栗 即娑羅子

本草綱目拾遺 卷七 宜母果 天師栗

一名娑羅子治胃痛最驗綱目於主治下失載。

通雅娑羅外國之交讓木也葉似栲皮似玉蘭色

葱白最潔鳥不棲蟲不生子能下氣。益部方物

記生峩嶺山中類枇杷數葩合房春開葉在表花

在中或言根不可徙。吳船錄木葉如海桐又似

楊梅花紅白色春夏間開長安客話卧佛寺內娑

羅樹二株子如橡栗可療心疾。宸垣識畧娑羅

花苞大如拳葉似枇杷凡二十餘葉相杳捧苞類

桐花一簇三十餘朵經月方謝。留青日札娑羅

樹出西番海中予在潯州時官圃一株甚巨每枝

生葉七片有花穗甚長而黃如栗花秋後結實如栗可食正所謂七葉樹也藥性考娑羅子一枝七葉九葉苞如人面花似牡丹香白

肉味苦微涼寬中下氣治胃脘肝膈膨脹疝積瘧痢吐血勞傷平胃通絡用陰陽瓦炙灰或酒煨食俱效單用不入他藥或稱天師栗非也○葛祖遺方味甘溫無毒治心胃寒痛蟲痛性溫殺蟲

胃痛○百草鏡用莎婆子即娑羅子也以一枚去殼搗碎煎服能令蟲從大便出三服除根

九種心痛 楊春涯驗方娑羅子即武吉燒灰沖酒服

化州橘紅 橘瓢上絲 糖橘紅 橘餅 藥製柑橘餅 青鹽陳皮 橘苓

嶺南雜記化州仙橘相傳仙人羅辨種橘於石籠之腹至今猶存惟此一株在蘇澤堂者為最清風樓次之紅樹又次之其實非橘皮厚肉酸不中食其皮釐為五片七片不可成雙每片真者可值一金每年所結循例具文報明上臺屆期督撫差親隨跟同採摘批製官斯土者亦不多得彼土人云凡近州始聞譙樓更鼓者其皮亦佳故化皮廣者多真者甚難得○關涵嶺南隨筆化州署橘樹一

月生一子以其皮入藥痰立解後為風折即其地補種氣味便殊今稱化州橘紅者皆以增城香柚皮偽代之能化物而不能自化○粵語化州有橘

一株在署中月生一子以其皮為橘紅淪湯飲之痰立消曩亦進御今為大風所拔新種一株味不及化州故多橘紅售於嶺內而產署中者獨異○

本草乘雅云橘柚專精者實實復專精者皮皮布細竅宛如人膚即脈絡肉理筋膜子核各有屬焉故力能轉入為升轉升為合即轉合為開也種種形證悉從入從合故胸中痼熱水穀失宣神明不

本草綱目拾遺 卷七 化州橘紅

通氣逆及氣臭耳下氣者出已而降玉衡機轉之妙用也○識藥辨微云化橘紅近日廣中來者皆單片成束作象眼塊或三五十片兩頭以紅繩繫之成一把外皮淡紅色內腹皮白色周身亦有猪鬃皮此種皆柚皮亦能消痰又有一種為世所重每個五片如爪中用化州印名五爪橘紅亦柚皮所製較掌片為佳究之真者遠甚也真化州橘紅煎之作甜香取其汁一點入痰孟內痰皆變為水此為上品○梁氏家藏蘇澤堂化州橘紅每一個七破反摺作七歧曬乾氣甚香烈有橘紅歌云

石龍靈異不可測首向青霄尾潛澤有時聲吼洪如鵝有時噴沙白似雪鳴或宰相應期生鳴或科甲蟬聯翼由來州牧履其常惟恐怪奇駭愚俗亭碑鼓吹鎮其頭重鑊纍石填其穴天生靈異無可憑離奇屈曲化為橘橘之為性溫且平能愈傷寒兼積食消痰止嗽功更奇誰先辨此真龍脈價值黃金不易求寄語人間休浪擲

治痰症如神消油膩穀食積醒酒寬中氣虛者忌服解蟹毒慈惠編食蟹中毒橘紅煎湯服

辰砂五香丸 治翻胃噎膈嘔吐張氏秘效方用

本草綱目拾遺 卷七 化州橘紅

金

血竭乳香沒藥辰砂各一錢五分元胡一錢化州橘紅一錢共為末每三分酒服

羊癩瘋 良方集要雄黃天竺黃川貝母各五錢

真琥珀一錢麝香一錢陳膽星一兩以上各另研

全蝎十四個去足酒洗遠志肉甘草汁製鈎藤防

風化州橘紅薑衣羌活茯苓天麻石菖蒲各五錢

以上不可見火曬乾蟬退三十個白附子六錢共

為末煉蜜為丸如龍眼大每服一丸開水下

按百草鏡廣東高州府化州出陳皮去白者名橘

紅今亦罕得土人以柚皮代之出售外方價亦不

貴辨別之法須先看皮色筋味如皮皺粗色黃而厚內多白膜味反甜帶辛者乃乳柑皮也只堪點茶不堪入藥皮極厚而泡鬆紋極粗而色黃內多膜無筋味甜多辛少者乃柚子皮也性忌冷服紋細色紅潤而皮薄多有筋脈味苦辛入口芳香者乃真化州橘紅也入藥以此種為貴然其性峻削能伏生氣消痰雖捷破氣損人不宜輕用近日有一種產仁和塘棲鎮蜜橘皮所製曰甜橘紅清香入肺醒脾消痰之功不下化產而性不峻削名為香金板南人體弱者宜之。○本草乘雅武林棲水

本草綱目拾遺

卷七

化州橘紅

橘瓢上絲

金

出蜜橘凡數十品名金鈔穿心者雖秀色可觀又不如佛肚臍形小皮癩甘美可口霜降採取氣足味足密藏至春剖皮抽脈破囊吮汁亦可振醒精神為得句破疑之助

橘瓢上絲

金御乘云橘絲專能宣通經絡滯氣子屢用以治衛氣逆於肺之脈脹甚有效綱目橘瓢上筋膜只引大明治口渴吐酒而沒其專功何耶因仍其說以補之

通經絡滯氣脈脹驅皮裏膜外積痰活血

糖橘紅

仁和塘棲鎮者佳以皮去白切小塊用糖霜製

味甘辛性溫理氣快膈治嗽消痰食物宜忌

橘餅

閩中漳泉者佳名麥芽橘餅圓徑四五寸乃選大

福橘蜜糖釀製而成乾之面上有白霜故名肉厚

味重為天下第一浙製者乃衢橘所作圓徑不及

三寸且皮色黯黑而肉薄味亦苦劣出塘棲者為

蜜橘餅味差勝然亦不及閩中者又興化出金錢

本草綱目拾遺

卷七 糖橘紅 橘餅

宋

開膈捷於砂仁荳蔻又可醒酒醉後點茶允為妙

供

味甘性溫下氣寬中消痰運食食物宜忌黃疸臃脹除

膈止消經疏廣集

治諸色痢 行篋檢秘橘餅一兩圓眼肉五錢水

糖五錢水二碗煎一碗露一宿溫服不露亦可至

重者不過二三服無不神驗

治瀉 梁氏集驗夏月喫瓜菓太多以致洩瀉不

休用漳州好橘餅一枚細切薄片作二次放茶鍾

內沖服○橘餅湯 經驗廣集治傷食生冷瓜菓

泄瀉不休橘餅一個切薄片放碗內以沸湯潑蓋

住泡汁出即飲湯連餅食一餅可作數次服

百菓酒 香椽佛手各二個核桃肉圓眼肉蓮肉

橘餅各半觔柏子仁四兩松子三兩紅棗二十兩

黑糖三觔乾燒酒五十觔浸此酒補虛益腎乃河

中李太守秘方

藥製柑橘餅

北硯食規用元明粉半夏青鹽百藥草天花粉白

茯苓各五錢訶子甘草烏梅去核各二錢礪砂桔

梗各三錢以上俱用雪水煎半乾去渣澄清取湯

煮柑橘炭擊微火烘日翻二次每次輕輕細捻使

藥味盡入皮內如捻破則不妙能清火化痰寬中

降氣

青鹽陳皮

百草鏡製青鹽陳皮即蘇州宋公祠遺法也陳皮

二觔河水浸一日竹刀輕刮去浮白貯竹筐內沸

湯淋三四次用冷河水洗淨不苦為度曬至半乾

可得淨皮一觔初次用甘草烏梅肉各四兩煎濃

汁拌曬夜露俟酥捻碎如豆大再用川貝母去心

消痰降氣生津開鬱通脾調胃解毒安神

橘苓

橘樹上生如木草棗皮紅色

治乳癰煎酒服

荳蔻檳榔

此即綱目檳榔註內所云蒟子是也形如雞心

頭尖一頭圓僅如小指大外有殼包之殼白色如

荳蔻形尖如橄欖長不及半寸藥肆每於荳蔻中

檢出每荳蔻一觔不過數粒價亦倍廣南檳榔亦

無有專貨之者或云此種始為雞心檳榔廣南所

本草綱目拾遺

卷七

橘苓

荳蔻檳榔

六

市者皆山檳榔及大腹子而已時珍循竺氏說以

山檳榔為蒟子恐悞

治反胃噎膈餘功與廣檳榔同

按百草鏡檳榔今藥肆所市者形扁而圓大乃大

腹子俗名雌檳榔廣東文昌縣出者名文昌子尖

小者名主賜檳榔又名喫子其形長尖狀如雞心

內有錦紋又名雞心檳榔即雄檳榔也另有一種

雞心檳榔來自洋船從白荳蔻內揀出極罕有形

亦長尖極小外有殼儼如棗核故又呼棗核檳榔

入藥最勝

耳聾灸法 經驗廣集用雞心檳榔一個將臍內

挖一窩如錢眼大實以麝香坐於患耳內以艾炷

灸之不過三四次即效

小兒疳積 胡開甫方史君子五個生五個熟荳

蔻內檳榔用薑湯磨汁空心蘸史君子肉食一二

次即愈

聾耳出膿 荳蔻檳榔為末吹入立愈 救生苦海

口瘡 荳蔻內檳榔煨存性加輕粉敷之 廣果錄

瑣瑣葡萄

出土魯番北京貨之形如胡椒係葡萄之別種也

本草綱目拾遺

卷七

荳蔻檳榔 瑣瑣葡萄

六

回疆志葡萄一 根數本藤蔓牽長花極細而黃白

色其實有紫白青黑數種形有圓長大小味有酸

甜不同一種色綠而無核較黃豆微大味甘美一

種色紫而小如胡椒即瑣瑣葡萄一種色黑形長

寸許一種色白而大皆七八月熟晾乾可致遠。

本經逢原云瑣瑣葡萄似葡萄而瑣細故名生於

漠北南方間亦有之其幹類木而係藤本其子生

青熟赤乾則紫黑能攝精氣歸宿腎藏與五味子

功用不甚相遠凡藤蔓之類皆屬於筋草木之實

皆達於藏不獨此味為然此物向供食品不入湯

藥故本草不載近時北人以之強膏南人以之稀痘各有攸宜。五雜俎西域白蒲桃生者不可見其乾者味殊奇甘有鬼眼蒲桃無核又有瑣瑣蒲桃形如菜萸小兒食之能解痘毒于文定筆塵云瑣瑣即駁娑之訛。黎魏曾仁恕堂筆記瑣瑣葡萄于文定引西京羽獵賦謂瑣瑣當為駁娑固屬附會而以為別有一種亦非河西葡萄雖引根牽蔓不異中土而結實大長如馬乳色深紫味亦殊甘一枝千百顆大者在上細者下垂取而乾之者為白葡萄細者名瑣瑣非兩種也故俗呼為公本草綱目拾遺卷七 瑣瑣葡萄 下

領孫惟綠葡萄則來自西域非中土所有味甘核細微鹹。痘學真傳云味甘酸性平溫。百草鏡云性熱入脾胃二經作酒彌佳治筋骨濕痛利水甚捷除遍身浮腫痘瘡不出酒研和飲神效

強腎 瑣瑣葡萄人參各一錢火酒浸一宿侵晨塗手心摩擦腰脊能助腎力強壯若臥時磨擦腰脊力助陽事堅強尤為得力

稀痘 瑣瑣葡萄一歲一錢神黃豆一歲一粒杵為細末一陽夜蜜水調服并擦心窩腰眼能助腎

本草綱目拾遺 卷七

祛邪以北地方物專助東南生氣之不足也然惟稟質素弱者用之有益若氣壯偏陽者勿服恐其助長淫火之毒也

按紫桃軒雜綴瑣瑣葡萄神農九草之一中土久有不俟博望從西域帶來也吾里東塔朱買臣墓有之戊子余曾歷平湖幕署有一枝蔓延滿架夏開瑣瑣碎花結實如菜豆望不可見吾杭螺螄山汪姓家亦有此然食之味薄不若甘肅者味厚也入藥自宜以西北者為優

南棗 山棗 藏棗

本草綱目拾遺卷七 瑣瑣葡萄 南棗 下

出金華東陽縣茶場以透明如血七枚長一尺者佳陳者入藥。宦遊筆記金華東陽縣茶場出棗其大如拳核尖細如黍決之即脫清甘香脆以此名聞天下明中葉尚存數柯今此種已絕矣惟東南諸鄉於高阜地種之雖不及茶場亦美甲於他處其製法不一未熟輒擊以湯沃之使變色謂之湯紅乾則其色紫已熟者名樹頭紅乾則其色丹過熟者以所煮餘汁煮之色味似蔗糖謂之糖棗此則以時食為美不作乾也又有一種棘差小而圓味殊勝棗。物理小識南棗出蘭溪搖而知之

三七

其肉離核

味甘微酸性溫補赤入心酸欬肝

博記單方眼疾中有一種名紅線鎖目乾治法取南棗核二十一粒將核截兩斷去仁淨以銅絲塞孔中仍將棗核合上以紙粘封一起放爐中燒紅取出以碗蓋存性每日只用七個研極細末調生男乳水抹三日立效

腸紅下血 南棗五枚同黃芪二錢煎湯五更服神效。又方不藥良方南棗十枚槐米一兩同煎去米食棗日三次即愈

本草綱目拾遺

卷七 南棗

三

痔瘡 救生苦海南棗一枚去核髓頭骨一個擣

碎銅青裝滿棗內紫紫火煨烟盡伏土存性研細用秋海棠煎洗然後用藥和水敷之三日消

除壁蝨 集聽大南棗去核入水銀火煨熏

走馬牙疳 不藥良方陳年南棗核燒灰研末摻之

棗參丸 醒園錄用大南棗十枚蒸軟去皮核配

人參一錢布包藏飯鍋內蒸爛搗勻為丸如彈子大收貯用之補氣最捷

仙果不饑方 醒園錄大南棗一觔好柿餅十塊

芝蔴半觔去皮炒糯米粉半觔炒將芝蔴研成細末棗柿同入飯中蒸熟取出去皮核子蒂搗極爛和蔴米二粉再搗勻為丸曬乾收貯加參更妙

本經逢原云古方中用大棗皆是紅棗取生能散表也入補脾藥宜用南棗取甘能益津也其黑棗助濕中火損齒生蟲入藥非宜

山棗

出廣西肇慶府葉如梅果似荔枝九月熟可食。柳貫打棗譜山棗狀如棗而圓色青黃而味甘酸出廣州

本草綱目拾遺

卷七

南棗 山棗 藥棗 落花生

三

甘溫無毒生和脾胃益血壯神

藏棗

朱排山柑園小識藏棗來自西藏實產於天竺大者長二寸許形味絕似南棗能補氣功同人參藏中亦不易得其核似蠶蛹形而無仁

補虛勞定神志治怯如神

落花生 油

一名長生果福清縣志出外國昔年無之蔓生園中花謝時其中心有絲垂入地結實故名一房可二三粒炒食味甚香美康熙初年僧應元往扶桑

覓種寄回亦可壓油今閩省產者出興化爲第一
 名黃土味甜而粒滿出臺灣名白土味澁而粒細
 其油煎之不熟食之令人瀉一名土豆。彙書近
 時有一種名落花生者莖葉俱類荳其花亦似荳
 花而色黃枝上不結實其花落地卽結實於泥土
 中亦奇物也實亦似荳莢而稍堅硬炒熟食之作
 松子之味此種皆自閩中來。物理小識番豆名
 落花生土露子二三月種之一畦不過數子行枝
 如薤菜虎耳藤橫枝取土壓之藤上開花絲落土
 成實冬後掘土取之殼有紋豆黃白色炒熟甘香
 似松子味又云番豆花透空入土結豆當通潤臟
 腑。酉陽雜俎又有一種形如香芋蔓生藝者架
 小棚使蔓之花開亦落土結子如香芋亦名花生
 ○花鏡落花生一名香芋引藤蔓而生葉極開小
 白花花落於地根卽生實連絲牽引土中纍纍不
 斷冬盡掘取煮食香甜可口南浙多產之。萬歷
 仙居縣志落花生原出福建近得其種植之。嶺
 南隨筆花與葉不相見爲換錦花莢與蒂不相見
 爲落花生種法以沙壓橫枝則蔓生花不生莢其
 莢別在根莖間亦稱落花生。逢原云長生果產

閩地花落土中卽生從古無此近始有之味甘氣
 香能健脾胃飲食難消運者宜之或云與黃瓜相
 反予曾二者並食未蒙其害因表出之花生殼韌
 柳生云焙研極細末著入身體沾肉卽生奇癢。○
 敏按劉啟堂經驗秘方長生果一名落花生又名
 落地生不可與黃熟瓜同吃吃則立死黃熟瓜卽
 香瓜非長而白色可以醃吃之黃瓜也始知俗傳
 之誤。兩蓑翁食物便覽香芋一名落花生久服
 多男
 多食治翻胃然其性能動火生痰常人只宜少吃
 從新云辛甘而香潤肺補脾和平可貴食物宜忌
 云性平味甘舒脾廣志云暖胃藥性考云生研用
 下痰炒熟用開胃醒脾消腸乾嗽者宜餐滋燥潤
 火
 按落花生乃花謝落土感土氣而成實故有入脾
 和胃之功又能通肺氣曾見興化令王翁一子酷
 嗜此物後患軟癱豈非動火生痰之明驗歟近見
 人以花生入糖湯煮浸醬油入素供更爲生痰老
 人尤不宜多食
 俞友梁有烏鬚簡便方止用落花生淨肉炒極焦

研極細然鬚一二日後色黑如漆

日兩頓瘡即三

安定臣云昔曾患此諸方莫

療有人教服炒熟花生每日食一二兩不半月而愈

王神庵尼清慧言花生人云服之生痰有一大家

婦咳嗽痰多醫束手不治庵尼雲上勸服花生每

日食二三兩漸覺稀少不半年服花生二十餘觔

咳嗽與痰喘皆除想亦從治之法也童鹿葦言花

生本有滌痰之功予家凡患咳嗽止用花生去

殼膜取淨肉沖湯服痰嗽自安豈非化痰之功善

本草綱目拾遺 卷七 薯蕷 薯蕷油 阿月渾子

於瓜萋貝母世俗以火炒食反能生痰又凡被馬

踢傷者忌服花生服之瘡愈增痛

花生油 一名果油色白甘平氣腥滑腸下積膩

膈生痰

核桃油

好者補火若壞核桃榨取者有毒味劣不宜食

阿月渾子

與榛子同類性更溫良能止痢煖腎開胃除腸穢

積得木香山黃能興陽

薯蕷

形如柚圓蔓生紅色浸酒服能活血

無漏果

此即海椶乃鳳尾蕉之子或稱為棗實非棗也以

刀剝去青皮石灰湯瀹之蜜浸瓶封可久藏寄遠

不壞

味甘美性溫消食寬中除痰止咳益氣潤顏久食

令人肥美

胖大海

出安南大洞山產至陰之地其性純陰故能治六

經之火土人名曰安南子又名大洞菓形似乾青

菓皮色黑黃起皺紋以水泡之層層脹大如浮藻

然中有軟殼核殼內有仁二瓣

味甘淡治火閉痘服之立起並治一切熱症勞傷

吐衄下血消毒去暑時行赤眼風火牙疼蟲積下

食痔瘡漏管乾咳無痰骨蒸肉熱三焦火症諸瘡

皆效功難盡述

藕粉 節粉

冬日掘取老藕搗汁澄粉乾之以刀削片潔白如

鶴羽入食品先以冷水少許和勻調次以滾水沖

入即凝結如膠色如紅玉可愛加白糖霜摻食大

能和營衛生津綱目藕下止載澄粉作食輕身延年而不知其功用更專益血止血也凡一切症皆不忌可服養餘月令有澄藕粉法取粗藕不限多少洗淨截斷浸三日夜每日換水看極淨漉出搗如泥以布絞淨汁又將藕渣搗細又絞汁盡卻輕濾去渾腳以清水少和攪之然後澄去清水下即好粉曬乾收貯和糯粉白糖蒸食之或以白糖開水沖服俱可菱粉芡粉俱用此法

本草綱目拾遺

卷七 藕粉節粉

天

味甘氣芬芳性平調中開胃補髓益血通氣分清表熱常食安神生智慧解暑生津消食止瀉

節粉 出淮安寶應一帶多有之乃藕節搗澄取粉曬乾其價較藕粉數倍

味甘微帶苦性平開膈補腰腎和血脈散一切瘀血生一切新血產後及吐血者食之尤佳

宦遊筆記准以南皆澤國居人蒔藕暇則濾為粉淘汰既淨去其渣滓存其甘液風吹日曝漸成碎珠以湯沃而食之純任天然別有風味亦野物之可尚者矣尤著名者曰片粉澤藕之極佳者淘曬人工十倍尋常及其既成則如白雲片片纖塵不染味亦絕勝非大有力者不能製也

八仙藕粉 經驗廣集此粉滋胃保元治一切虛勞雜症白花藕粉白茯苓白扁豆炒蓮肉川貝母山藥白蜜各等分人乳另入滾水沖不拘時食

人紅丸 濟世養生集專治童子勞怯神驗之極

用人龍二十一條即蛇蟲童便洗淨不破皮紅棗

三十個飯上蒸熟蘿葡子一錢五分炒研大熟地

五錢煮爛杵膏真藕粉一兩五錢研真川連六分

酒拌炒研末右將紅棗肉熟地膏和諸藥末搗勻

為丸如桐子大每早以白滾湯送下七粒逐日加

增二粒至二十一粒止以後不必再加服一料全

本草綱目拾遺

卷七 八仙藕粉

菱粉帶

天

愈子屢試皆效切勿泛視

菱粉帶

湖州府志菱本兩角者有果菱差小有湖跌菱色

紅而大有青菱色青角曲而利四角者野菱最小

者角極銛有泰州菱實豐而美近又有無角者名

餛飩菱德清有雞腿菱文武菱

菱有多種老則皆可為粉造粉之法與造藕粉同

食菱粉而腹脹者用薑湯或酒解之

補脾胃強腳膝健力益氣耐饑行水去暑解毒

蒂 疣子俗名飯館用鮮水菱蒂搽一二次即自

落

殼 治頭面黃水瘡 醫宗彙編隔年老菱殼燒

存性麻油調敷即愈

無名腫毒 販翁醫要老菱殼燒灰香油調敷即

愈并治天泡瘡

指生天蛇 醫宗彙編以風菱角燈火上燒灰存

性研末香油調敷未潰者即散已潰者止痛立愈

治脫肛 張氏必驗方先將麻油潤濕腸上自去

浮衣再將風菱殼水淨之即刻縮上不脫矣

芙蓉粉

本草綱目拾遺

卷七 菱殼

芙蓉粉

今

嘉泰會稽志芙蓉一名雞頭山陰梅市產之最盛有

數等小白皮最佳大白皮中白皮其皮甚堅難齧

黃嫩者太軟皆不逮也造粉與藕菱同法

益精氣強智力靈耳目固精添髓

養餘月令

九龍丹 販翁醫要治腎水不足邪火淫動遺精

淋濁等症枸杞子酒蒸金櫻子焙山查肉炒石蓮

肉炒蓮鬚焙熟地搗膏芙蓉粉炒白茯苓當歸等分

共為末煉蜜丸如桐子大每服三錢空心白滾湯

下

本草綱目拾遺果部下目錄

諸荔 殼

龍眼核 殼

蜜望

蒲桃樹

葶藶粉

野葶藶

櫻桃核

山櫻桃

栗殼

刺菱 沙角

烏欖仁

刺梨

枇杷核

羊桃

倒捻子

甘蔗滓皮

猴蘭子

瓜子殼

蒲桃殼

橙餅

津符子

必思答

黃皮果

甘劍子

楊搖子

海梧子

木竹子

櫛呂子

本草綱目拾遺

卷八 果部

榧子

羅晃子

夫編子

白緣子

繫彌子

人面子

四味果

干歲子

候驢子

仙掌子

酒杯藤子

藥果

蘭子

楸子

櫻支

呂宋果

本草綱目拾遺諸穀部目錄

沙米 西國米珠兒粉 陳倉米 朱公米

山穀 青稞黃稞 米油

錫焦陳久年糕 阿迷酒 酒釀酒草

神黃豆細豆 回回豆 穉豆葉附

蠶豆殼青花豆 真甯豆 醬油糟油 腐漿沫 渣鍋巴

麻腐 芝麻殼

本草綱目拾遺卷八目錄

本草綱目拾遺諸蔬部目錄

甘儲梗粉 酒 山百合 石衣石耳

野芋芳青芋 土芋 藤 鬼芋 野毛豆

野蘿蔔地骷髏 三生 蘿蔔 辣茄 刀豆根殼附 地腎 南瓜蒂穉附

葛乳 鮮草果 眞珠菜

鷓鴣菜 葛仙米 黃矮菜

白茄葉 蒂 天茄 牛心茄子

緬茄 醬茄糟茄 玉瓜

節瓜 穿腸瓜 天骷髏

本草綱目拾遺卷八目錄

鬼骷髏 白鼓釘 三寶薑

彎薑 川薑 沙葱

風葱 番蒜 蒜梗

刺兒菜 波斯菜 乾冬菜陳冬菜 漬 陳芥菜

油子 糞 麒麟菜 諸筍乾笋

紅海粉

本草綱目拾遺卷八

錢鼎超學敏軒氏輯

果部下

諸荔

陳定九荔枝譜有奇荔能治病經兵燹後亦僅有存者今錄之於左以備用

粵語南方離火之所出荔枝得離火多故一名離枝亦曰麗枝麗離也文從兩日天地之數水一而火二故麗從兩日日為五行之華月為六氣之精日麗乎支猶之乎日出於扶桑也麗枝乃震木之

本草綱目拾遺

卷八

諸荔

大者震木以扶桑為宗子而麗支其支子故曰麗支日出於離離盡午中故麗支以夏至熟離為坤之中其色黃故曰黃離麗支之核外赤內黃則黃離之美也坤之中其味甘故曰甘節麗支之肉少酸多甘則甘節之吉也荔支以臘而萼以春而華夏至而翕然于赤生於木而成於火也皮紅肉白而核復純丹火包其外復孕其中也肉白為金金為內外火所煉故味醇和而甘其液乃金水之精甘又屬土備五行之粹美而以火為主者也粵以火德王凡花多朱色皆火花實多朱實皆火實太

陽烈氣之所結火實之屬凡百種而荔支為長火為母荔支則火之長子也荔支多食未嘗傷人飲蜜一杯即解或以青鹽調白火酒飲或飲荔支酒過醉則以荔支殼浸水飲之又荔支多露有過食者味爽就樹間先吸其露次嚙其香使氤氳若醉五內清涼則可以消肺氣滋真陰卻老還童○荔支歲初而蕾二月而花發發時多電則花落實小多雨則花腐少雨則花液相膠而不實估計者視其花以知其實多少而判之藏荔支法就樹摘完好者留蒂寸許蠟封之乃剪去蒂以蠟封剪口以

本草綱目拾遺

卷八

諸荔

二

蜜水滿浸經數日味色不變
保和枝 產泉郡北陳巖山蓮花峯實大色黃可消胸膈煩悶調逆氣導營衛其核燒灰酒下可已痢止腹痛
回春果 產漳郡康仙祠葉大如掌色翠與眾荔殊其實味苦澀酸辣不可口采以浸酒能已風去癘治癩如神葉亦然 以上圖產
紫玉環 產四川瀘洲曝乾啖一枚可除瘡癩即早行大霧中嵐氣不得侵也 以上川產
玉露霜 產廣東新會崖門山白殼丹肉不摘經

冬不落其味甘酸啖之止嗽降肺火療怯症

妃子笑 產佛山色如琥珀大如鴛卵核小如豆

漿滑如乳啖之能除口氣使齒牙經宿猶香

牟尼光 產潮州大浦山中味如乳飲之功同參

苓 以上廣東產

墨荔 產廣西平樂萬山中皮肉俱黑如墨味臭

而苦辣不可啖或曰出賀縣山中或曰荔浦脩仁

二邑山中多有之味臭有大毒誤食之必心腐腸

爛而死

按荔枝名品最多有綠皮者綠核者有黃皮者白

本草綱目拾遺

卷八

諸荔類

龍眼核

三

皮者三月四月七月熟者然其性大約相同惟此

數品治療各異故類及之

殼 痘出無漿心不爽快以荔枝殼煎湯飲

○王聖俞云荔枝殼能理血透發分標凡一切疹瘡

不能透達痘出模糊一片者非此不能解表成漿

血崩 同壽錄用荔枝殼燒灰存性研末好酒空

心調服每服二錢輕者一服即止至重者三服愈

龍眼核 殼附

綱目龍眼核主治多言其肉至其核之功用最廣

止載其能治胡臭他皆未之及又不及其殼今悉

採他本補之

腦漏 黃氏醫抄用廣東圓眼核入銅爐內燒烟

起將筒熏入患鼻孔內數次即愈

一切瘡疥 高只元傳世方用龍眼核煨存性麻

油調敷即愈

治癬 祝氏效方圓眼核二個去外黑皮槌碎雄

黃硫黃陀僧枯礬川椒末各三分共為細末以生

薑蘸擦患處即愈○集聽方患癬用龍眼核去外

黑殼用內核米醋磨搽

滅斑生髮 張觀齋云桂圓核仁凡人家有小子

女者不可不備遇面上或磕傷及金刃傷以此敷

本草綱目拾遺

卷八

龍眼核

四

之定疼止血生肌愈後無癢若傷鬢髮際愈後更

能生髮不比他藥愈後不長髮也

小腸疝氣 不藥良方荔枝核龍眼核各七枚俱

燒灰大茴二粒炒熟為末好酒調下外用生薑搗

爛敷腎即消○經驗廣集治疝氣偏墜小腸氣痛

神效荔枝核炒龍眼核炒小茴香炒各等分為細

末空心服一錢以升麻一錢水酒煮送下

念珠丸 張氏必效方治陰疝偏腫囊中疼痛難

忍乳香去油淨二錢圓眼核三錢黃蠟二兩和藥

末成丸彈子大分為一百零八丸蛤粉為衣用線

穿起露一宿收貯遇症每服三九乳香湯下

小便不通 用龍眼核去外黑殼打碎水煎服如

通後欲脫者以圓肉湯飲之

足指癢爛 藥鏡用桂圓核燒灰摻之立效

無名種毒 黃氏醫抄桂圓核以水調塗俱效能

止折傷出血療金創滅斑

烟筒傷喉 萬近蓬云凡烟管誤戳傷喉出血不

止者用桂圓核去外黑皮惟取內核仁焙搗為極

細末着喉中傷處用筆管安末吹之即定疼止血

而愈屢試果驗

本草綱目拾遺 卷八 龍眼核殼 五

治刀傷出血 殷仁趾傳方以龍眼核炒搗磨細

敷之

刀斧傷 黃販翁醫抄桂圓核不拘多少用火燒

枯存性研末摻患處即愈

按陳杰回生集大興李振祖西平云龍眼核末敷

金刃傷昔在西秦及巴里坤軍營救愈多人查本

草綱目及別集本草俱未紀載可知世間有用之

材自古迄今湮沒者不可勝計矣

龍眼殼○乃龍眼外裹肉之殼本殼黃色聞人恐

其易蛀輒用薑黃末拌之令黃且易悅目也廣中

桂圓多不用薑黃拌故今廣圓猶存本色入藥用

殼須洗去外色黃者

敷湯泡傷 行篋檢秘用圓眼殼煨存性為末桐

油調塗患處即止痛愈後又無斑痕真良方也

泉州府志龍眼最小者呼鬼眼龍眼是其中者今

不復識別

蜜望 粵志其子五月色黃味甜酸颺洋者兼金購之有

天桃與相類六七月熟大如木瓜味甜酢以羹魚

尤善凡渡海者食之不嘔浪

本草綱目拾遺 卷八 龍眼殼 蜜望 六

肇慶志蜜望子一名莽果樹高數丈花開極繁蜜

蜂望之而喜故名交廣錄蜜望二月開花五月子

熟色黃一名望果其類有天桃正月開花六七月

子熟年歲荒則結實愈多粵謠云米價高食天桃

故廣人貴望果而賤天桃貴之故望之蜂望其花

人望其果也

止船暈

按船暈北人謂之苦船苦音庫此症多嘔吐不食

登岸則已胃弱人多有之蜜望果甘酸能益胃氣

故能止嘔暈

蒲桃樹

羅浮志蒲桃樹高二三丈其葉如桂四時有花叢
鬚無瓣如剪出絲毳長寸許色兼黃綠結實如蘋
果殼厚半指絕香甜核與殼不相連屬搖之作響
羅浮洞中多有之猿鳥含啄之餘隨流而出山人
阻水取之動盈數斛以之釀酒曰蒲桃春經歲香
不減作膏尤美

芋薺粉

童北硯食規出江西虔南土人如造藕粉法製成
貨於遠方作食品一名烏芋粉又名黑三稜粉

本草綱目拾遺

卷八

芋薺粉

甘寒無毒毀銅銷堅除腹中痞積丹石蠱毒清心
開胃去肺胃經濕熱過飲傷風失聲蒼毒乾紫可
以起發北硯食規

野芋薺

生山土中春有苗三葉似韭而細葉上有光其根
如豆大年久則愈大入藥用根一名山芋薺
磨粉水中濾過曬乾點眼去翳障如神取粉忌
鐵器
按山芋薺喜燥其生必於高原乾土尤最易蕃衍
有人移八圍圃一經汗濕根即朽爛然其生不易
長百年纔如錢大耳昔客東甌聞馬氏點眼藥粉

為天下第一見其脩製乃用此磨粉合海鯀目珠
粉加入藥中著效異常云其性能去面黝斑疔消
痞去目星努肉較產池澤者尤峻利也

磨光散 種福堂方點眼藥用野芋薺粉洗淨
去皮石臼中搗爛密絹絞汁如做藕粉法再用清
井水飛曬乾爐甘石用黃連黃柏黃芩甘菊薄荷
煎水煨再用童便煨一次將藥水飛曬乾珍珠入
豆腐內煮過研細水飛每芋薺乾粉一兩配製過
甘石五錢珠末三錢各將磁瓶收貯臨用漸漸配
和加冰片少許點之

本草綱目拾遺

卷八

野芋薺

八

明目去翳秘方 種福堂方錦紋大黃一兩北細
辛四兩將二味用上高泉水一百二十兩將藥入
一砂鍋煎至二十兩以細絹濾去渣用大銀碗一個
盛藥碗下以磚三塊放定碗底下將燈蓋注麻油
用燈草七根燃燈熏碗底內煎藥成膏滴水成珠
每膏一兩用野芋薺粉五錢多些亦不妨冰片三
分和勻作錠如多年厚翳每兩加水飛過蟬退末
五分須要去頭足泥沙水洗曬乾為末水飛三次
用。又方野芋薺粉猪胰各等分搗和用鷄子殼
半個放藥在內臨臥合印堂上俟水流入目中翳

隨淚出二十日即愈并治田螺頭眼

櫻桃核

今人常用以洗疹瘡服之亦發透瘡痘以其得春氣早而性熱善達表也綱目不載豈以發風熱故耶逢原云櫻桃核今人用以升發麻疹力能助火大非所宜春夏時尤忌入藥用山櫻桃核佳發麻疹瘡痘滅斑痕凍瘡

出痘喉啞 王永光方用甜櫻桃核二十枚砂鍋

內焙黃色煎湯服

眼皮生瘤 醫學指南用櫻桃核磨水搽之其痛

本草綱目拾遺

卷八

櫻桃核 山櫻桃 栗殼 刺菱

漸漸自消

山櫻桃

有毛與櫻桃別是一種

辛平味劣止瀉腸癖除熱調中

栗殼

綱目載其治反胃消渴瀉血此外無他不知其能解參之力勝於萊菔故急錄之。楊春崖驗方解人參栗子殼煎湯服之良

刺菱

沙角 乃小菱也生杭西湖裏六橋一帶多有之以其四

角尖如針芒刺手故名春盡時兒童採取入市賣賣菱生水中根苗與大菱不殊其葉下有氣管故其性通肝腎凡一切病多忌生冷惟此菱不忌最能開胃生津其菱大者如蠶豆小者如黃豆味絕鮮美雖至秋老亦不甚大蓋地土使然誠水仙佳種也。陳湊花鏡一種最小而四角有刺者曰刺菱野生非人所植花紫色人曝其實為菱米可以點茶

味甘鮮性平無毒生。補脾健胃止渴生津平肝

氣通腎水益血消食老者煮食健脾止洩痢

本草綱目拾遺

卷八

刺菱 沙角 烏欖仁

根 利水通淋

沙角

乃菱中一種小者止兩角臨平湖一帶多產之出嘉興者名餛飩青以其似餛飩也較他菱體小味甘沙角較餛飩菱尤小色紅味甘異常

味甘平大補脾土不滯氣 餛飩青性寒生食解

積暑煩熱生津煮食健脾和胃益氣 花鏡云遲熟

餛飩菱藥性考餛飩沙角生熟俱得老 則甘香補中益氣生者解酒能壓丹石

烏欖仁

出廣東今果肆皆有市者皮黃黑色肉白有文層

叠如海蝶蛸狀酒筵中以為豆筵食品綱目集解
 下云烏欖青黑肉爛而甘取肉搥碎放乾自有霜
 如白鹽謂之欖醬其子仁肥大名欖仁而主治所
 載悉言白欖即今常食之青果又所載欖仁可治
 吻燥者亦指青菓核中仁而言非指烏欖仁也今
 採嶺南果錄中補其遺按粵志木語橄欖有青烏
 二種閩人以白者名青果粵中止名白欖不曰青
 果也白欖利微人少種焉烏欖下番禺諸鄉皆種
 之種至二年其秧長八九尺必扞之乃結實扞至
 三年而子小收十年而大收矣其樹本高而端直
 本草綱目拾遺 卷八 烏欖仁 上

仁可食白者陽故仁小而成此其別也
 仁味甘淡潤肺下氣補血殺諸魚毒
 刺梨
 宦遊筆記刺梨形如棠梨多芒刺不可觸味甘而
 酸澆漬其汁同蜜煎之可作膏正不減於楂梨也
 花於夏實於秋花有單瓣重臺之別名為送春歸
 密萼繁英紅紫相間植之園林可供玩賞獨黔中
 有之移於他境則不生殆亦類優曇花之獨見於
 南滇耶
 食之已悶消積滯 筆記
 本草綱目拾遺 卷八 刺梨 枇杷根 上

枇杷核
 本經逢原云枇杷其核大寒伐肝脾以之同落蘇
 入麩醬則色青翠同蟬入鍋則至熟不赤性寒走
 肝可知敏按石頑所說以其核能駐色不變斷為
 性寒不知枇杷獨具先天四時之氣其性溫平其
 核能化一切毛羽觀花圃人貯雞鵝毛水以灌花
 者患其難化輒擣枇杷核數枚投於缸水中不三
 日則雞鵝毛皆爛化知其直走厥陰更捷利也
 治肝有餘諸症氣實者可用
 敏按祝士校遊戲方枇杷核煮蛤蚧能脫丁則其

性又善離豈枇杷具四時全氣其實能令分者合
故肺嗽能斂核能令合者離故肝實可疎一合一
離正見互為乘除之妙物理小識枇杷核能去微
垢故能化痰

羊桃

粵語其種來自大洋一曰洋桃高五六丈大者數
圍花紅色一蒂數子七八月開熟色如蠟一名三
斂子亦曰山斂斂稜也俗語誤稜為斂也亦以其
味酸能斂顏色也有五稜者名五斂以糯米水澆
則甜名糯羊桃廣人以爲蔬綱目五斂子即羊桃
本草綱目拾遺 卷八 羊桃

惟言其主治風熱生津止渴他功效皆未及今依
粵語補之。爾雅長楚銚芑註今羊桃也或曰鬼
桃葉似桃花白子如小麥亦似桃陸機疏云葉長
而狹花紫赤色其枝莖弱過一尺引蔓於草上鄭
氏曰藤生子赤狀如鼠糞故亦名鼠矢兒童食之
一名羊腸一名御弋蜀本圖經子細如棗核苗長
弱蔓生不能爲樹今呼爲細子根似牡丹羣芳譜
羊桃福州產其花五瓣色青黃詩檜風隔有萋楚
倚籬其枝即指此也
酸甘清平無毒久食能辟嵐瘴之毒中蠱者擣自

然汁飲毒即吐出脯之或白蜜漬之持至北方不
能水土與瘡者皆可治。嶺南雜記有食猪肉咽
喉腫痛食羊桃即解
藥性考羊桃生時極酸不可食熟則帶甘過食寒
中內熱者宜之多食冷脾胃動洩瀉可曬乾歌曰
獼猴桃寒酸甘止渴調中下氣解煩除熱骨節風
痛能壓丹石通淋療痔瓢可煎食

倒捻子

綱目都念子即倒捻子僅言其治痰嗽噦氣暖腹
臟益肌肉而已時珍曰食之必倒捻其蒂故謂之
本草綱目拾遺 卷八 羊桃 倒捻子

倒捻子訛爲都念子也味甚甘軟粵語都念子樸
椒叢生花如芍藥而小春時開有紅白二種子如
軟柿外紫內赤亦小有四葉承之子汁可染若胭
脂花可爲酒葉可麴皮漬之得膠以代柿蘇子瞻
名爲海漆非漆而曰漆以其得乙木之液凝而爲
血可補人之血與漆同功逾青黏故名以其爲
用甚衆食治皆需故名都念產羅浮者高丈許子
尤美嶺南酒有以花爲釀而雜以諸果者花則以
檳榔花爲最果則以倒捻子爲最倒捻子又名黏
子花於暮春實於盛夏諺曰六月六黏子熟熟以

為酒色紅味甘人與猿猴爭食之所在皆然

東坡雜記吾謫居南海以五月出陸至滕州自滕

至儋野花夾道如芍藥而小紅鮮可愛樸嫩叢生

土人云倒黏子花也至儋則已結子爛紫可食殊

甘美中有細核嚼之瑟瑟有聲亦頗苦沁兒童食

之使大便難野人夏秋下痢食葉輒已

子活血補血研瀝為膏餌之又止腸滑

甘蔗滓皮

綱目甘蔗條瀕湖特補蔗滓言其治小兒白禿燒

烟入目令目暗其他未能悉今復廣之

救生苦海收口長肉背疽惡瘡用之屢效收甘蔗

滓曬燥煨存性研極細以小竹管如瘡口大者一

筒以細夏布紮緊於上篩藥填滿瘡孔內膏藥蓋

住自能收口

醫鏡云對口一名鼻疽用甘蔗滓焙燥為末白色

狗屎焙末和勻將竹管一箇稀絹包竹管頭入藥

篩膏藥上貼之垂死者亦生

痘疔 經驗單方用甘蔗滓曬乾真香油點燈燒

成灰以津液調勻銀簪挑破點上立效一方加珍

珠油胭脂調塗更效。敏按蔗有數種紫皮者名

崑崙蔗青皮者乃扶風蔗也黃海若云凡痘疹不

出及悶痘不發毒盛脹滿者此痘屬急症宜青皮

甘蔗榨汁與食不時頻進則痘立起其寒散解毒

之功過於蚯蚓白鴿惜人不知其功用入藥如用

滓亦宜以青皮蔗滓為上

蔗皮 綱目止載治口疳而不知其皮可入香料

海外三珠有四葉香餅乃用蔗皮又乾者墊卧可

去鬱熱本草匯有接氣沐龍湯亦用其皮故為補

其說

臘梨初起 百草鏡紫甘蔗皮煨存性香油調搽

接氣沐龍湯 專治陽衰久痿滑精不用內服惟

主外治大約患此者或由稟弱或由縱慾或憂鬱

所致或心腎不交用此最妙紫綃花甘草甘遂良

薑文蛤母丁香巴戟天川烏附子吳茱萸川椒細

辛淫羊藿蛇床子棟樹子甘松各一兩瑣陽菴蓉

官桂羊皮紅蔗皮滿山紅罌粟殼水泡去筋各二

兩紅豆七十粒須擇酒藥內所用辣者白頸蚯蚓

七條炙倭鉛八兩切薄片勻七劑每日一劑瓦鍋

內煎湯先熏後洗以冷為度晚重溫藥湯再洗如

此七日內禁房事

本草綱目拾遺 卷八 甘蔗滓皮

本草綱目拾遺 卷八 甘蔗滓皮

坐板 甘蔗皮燒存性香油調塗家方

竹衣乖 經驗廣集此藥治竹衣乖并無皮膚膿

血淋漓赤剝楊梅一切胎毒用爐甘石煨淬入黃

連汁三次童便四次一兩黃柏豬膽塗炙七次紫

甘蔗皮燒存性孩兒茶赤石脂各五錢菉豆粉炒

七分冰片五分爲末先用麻油將雞蛋黃煎黑去

黃候冷調塗即愈

猴闖子

宦游筆記出臨海深山茅草中土名仙茅果秋生

冬實樵人采食并可磨粉其性溫補然城市亦無

本草綱目拾遺

卷八

蔗皮 猴闖子 瓜子殼

七

食之者綱目有猴闖子形與此別又臨海出猴總

子一名土柿每年九十月間生形與红柿同皆非

一物臨海異物志猴闖子如指頭大味苦可食他

處所無

性溫暖丹田益五臟健脾增氣力

瓜子殼

傳信方治腸紅不論新久三服全愈用地榆炒黑

一錢白薇一錢五分蒲黃炒黑一錢桑白皮一錢

五分瓜子殼二兩煎湯代水不藥良方單用瓜子殼一味煎服治腸風

血下

吐血 不藥良方瓜子殼一茶鍾煎湯一碗吃下

血即止

蒲桃殼

止呃忒如神

橙餅

同壽錄有製橙餅法方擇半黃無傷損橙子太青

者性硬難酥將小刀花成稜入淨水浸去酸澁水

一二天每日須換水待軟取起擠去核再浸一二

天取起將簪腳插入每縫觸碎內瓤然後入鍋用

清水煮之勿令焦約有七八分爛取出拌上潔白

本草綱目拾遺

卷八

蒲桃殼 橙餅 津符子

其

洋糖須乘熱即拌即日曬之待糖吃進再摻再曬

令糖吃足將乾糖再塞入橙肚內畧壓扁入瓶貯

用亦可點湯服

消頑痰降氣和中開胃寬膈健脾解魚鱉毒醒酒

若氣虛瘵瘵者勿服

津符子

產緬甸見千金方

味苦平性滑主益心血養肺金止渴生津液多食

口爽失滋味安和五臟久食輕身明目治瀉痢不

止男女虛勞咳嗽吐膿血肺癆肺痿聲啞欲死者

每日啖十枚一月不間斷即愈

必思答

產回回國地見忽必烈飲膳正要

味甘無毒治調中順氣滋肺金定喘急久食利人

三陰瘧百藥不效必思答三枚酒一盞煎半飲之

即止

難產不下或子死腹中必思答七枚酒煎服之即

下又治胞衣不下

黃皮果

廣志黃皮果狀如金彈六月熟其漿酸甘似葡萄

本草綱目拾遺

卷八

必思答

黃皮果

九

與荔支並進荔支饜飫以黃皮果解之諺曰饜食

荔支飽食黃皮綱目於果部附諸果條下僅引海

槎錄云出廣西橫州狀如棟子及小棗味酸至其

功用並未之及焉今依廣志補之

消食順氣除暑熱廣志酸平無毒主嘔逆痰水胸膈

滿痛虻蟲上攻心下痛食物本草

敏按廣東瑣語載果中有白蠟子與黃皮果絕相

似而味尤勝諺有云黃皮白蠟甜酸相雜想功亦

亦不甚遠也

廣東通志黃皮果大如龍眼又名黃椰子皮黃白

有微毛瓢白如肪有青核數枚甚酸澀食荔支太

多用黃皮果解之

甘劍子

狀如巴欖子仁附肉有白鬚不可食能發人病北

人呼為海胡桃

味甘氣烈治脾胃虛寒食少洩利不止形體羸

洩下虛脫百方不效用甘劍子七枚連殼煨為末

空心酒下三服即止再服調理藥

揚搖子

生閩越其子生樹皮中體有脊形甚異長四五寸

本草綱目拾遺

卷八

甘劍子

揚搖子

海梧子

十

味甘無毒通百脉強筋骨和中益氣潤肌膚好顏

色○花鏡此果長五寸色青無核臨海異物志揚

搖有七脊子生樹皮中其體雖異味則無奇長四

五寸色青黃味甘

海梧子

出林邑樹似梧桐色白葉似青桐子如栗肥甘可

食○南方草木狀占城即林邑產海梧子與中國

松子同但結實肥大形如小栗三角肥甘樽俎間

佳果也

味平無毒利大腸小腸益智慧開心胸明目

心下怔忡夜多惡夢健忘每日空心食海梧子十數枚月餘自愈

疝氣囊大如斗海梧子七箇燒衣服之即愈

木竹子

出廣西皮色形狀如大枇杷肉味甘美秋冬實熟味甘性平治吐逆不食關格閉拒不通脾虛下陷肛門墜脫不收清熱涼大腸去積血利百脉通調水臟止渴生津解暑消酒利耳目治咳嗽上逆

桂陽虞衡志出廣西大如半升碗數十房攢聚成

本草綱目拾遺

卷八

木竹子 檣梧子 榘子

三

毬每房有縫冬生青至夏紅熟

味甘補脾胃固元氣制伏亢陽扶持衰土壯精神

益血寬痞消痰解酒毒止酒後發渴利頭目開心

益志

婦人不孕用榘子浸好酒內三日日日飲之百

日有孕又目生翳障漸漸昏暗視物不明榘子

浸白蜜內每日連蜜啖一枚一月即退

榘子

出九真交趾子如桃實長寸餘二月開花連著子

五月熟色黃鹽藏食之味酸如梅

性涼平清心潤肺止渴生津制亢極之陽光消炎蒸之暑氣又降三焦實火治鼻中出血又牙宣牙齦出血用榘子核連仁燒存性調水含咽即止

羅晃子

出廣西夏熟味如栗狀如橄欖其皮七層出橫州者皮九層剝至九層方見肉故又名九層皮果思恩府志羅晃子俗名九層皮形類蠶豆可茹味如煨栗外有黑殼連肉有皮九層故名產於山樹中

味甘性溫治臟腑生蟲及小兒食泥土腹痛癩瘡

本草綱目拾遺

卷八

羅晃子 夫編子

三

積硬

養肝瞻明目去翳止渴退熱解利風邪消煩降火翻胃吐食或食下即吐或朝食暮吐暮食朝吐用羅晃子七枚斷存性每日酒調下方寸匕服完為度即愈

腹中虻蟲上攻心下痛欲死面有白斑用羅晃子

牽牛子各七枚水煎服蟲自下

夫編子

南方草木狀出交趾武平山谷中三月開花連著

子五六月熟入雞魚猪鴨羹中味最美亦可鹽食

味甘性平主甯心志養血脈解暑渴利水道生津液止逆氣喘急除煩清熱潤肺滋命門益元氣骨蒸勞熱四肢瘦削如枯柴用夫編子同白鴨爛煮不用鹽醬日日啖之吃鴨三頭見效

白緣子

出交趾樹高丈餘味甘美如胡桃

味甘平主潤肺止渴清熱消食祛風暑濕氣治疥癬及山嵐瘴氣所侵變成痰瘧寒熱往來頭痛痰逆

足膝屈弱難行寒濕邪氣所侵用白緣子一升春本草綱目拾遺卷八未編子 白緣子 繫彌子 人面子

爛浸酒日飲一次月餘全愈

繫彌子

廣志狀圓而細色赤如軟棗其味初苦後甘可食味平無毒主益五臟悅澤人面去頭面諸風產後痢疾不止用繫彌子一合酒水各一盞煎八分空心服下片刻即效

人面子

出海南又出廣中樹似含桃子如桃實春花夏實至春方熟蜜煎甘酸可食其核兩邊俱似人面耳目口鼻無不畢具

廣志人面子大如梅李其核類人面兩目口鼻皆具肉甘酸宜為蜜煎仁絕美以點茶如梅花片光澤可愛茶之色香亦不變以增城水東所產為佳其核中仁搖之即脫去他產則否此樹最宜沙土沙土鬆易發數歲即婆娑偃蓋山民植之以為利味甘性平無毒醒酒解毒治風毒著人遍身疙瘩成瘡或痛或癢食之即愈

難產不下產母手握人面子一箇單日右手握雙日左手握即下

嶺南雜記人面子煮肉及鴨必用搥爛熬膏甘酸本草綱目拾遺卷八人面子 四味果

益津

四味果

出祁連山木生如棗剖以竹刀則甘鐵刀則苦木刀則酸蘆刀則辛行旅得之能止饑渴

味甘辛酸無毒明目養肝甯神定志和胃進食下氣止效

腎虛腰痛不能反側用四味果同狗腰子煮熟並食每日一次一月愈

敏按東方朔神異經云南方大荒有樹名如何結子味如飴有核形如棗子長五尺圍如長金刀割

之則酸蘆刀剖之則辛食之者地仙不畏水火白
刃又啟蒙記如何隨刀而改味或曰此即仙經所
謂大棗據此二說即今四味果也

干歲子

南方草木狀出交趾蔓生子在根下鬚綠色交加
如織一苞恒二百餘顆皮殼青黃色殼中有實如
粟味亦如之乾則殼肉相離撼之有聲如肉豈蔻
○關嶺橫南隨筆干歲子多子根鬚乾則殼肉相
離撼之有聲

味甘平主和中益胃利肺除熱止渴醒酒解暑

本草綱目拾遺

卷八

干歲子

侯騷子

五

小便閉塞干歲子十數枚打碎水煎清飲下即通
利

發背惡瘡干歲子不拘多少搗爛如泥調塗三次
見效

侯騷子

蔓生大如雞卵味甘性冷消酒輕身王太僕曾獻
之見酉陽雜俎

甘寒無毒食之不饑延年強健消酒除濕治黃疸
小便不利渴如黃金色口渴煩熱齒痛牙宣出血
不止

小兒重舌木舌侯騷子核燒灰擦之或用蜜調塗
亦可

浮腫發背侯騷子煎湯飲之再搗塗之大效

仙掌子

乃仙人掌上所生子也粵語仙人掌多依石壁而
生葉勁而長若齟齬狀開花儼如鳳形子生花下
名曰鳳栗葉曰鳳尾笏發苞外類芋渠內攢瓣如
球各擎子珠於掌一枝一掌自下而上子自青赤
而黃有重殼外厚內薄熟其仁食之味甜兼焚栗
可以延年又名干歲子此草可辟火廣人多植之

本草綱目拾遺

卷八

仙掌子

五

堂側性宜沙土惡肥膩○明黃佐仙人掌賦序仙
人掌奇草也多貼石壁而生惟羅浮黃龍金沙洞
有之葉勁而長若齟齬狀發苞時外類芋魁內攢
瓣如翠球各擎子珠如掌然青赤轉黃而有重殼
剖之厚者在外如小椰可為匕勺薄者在裏如銀
杏衣而裏圓肉煨食之味兼焚栗可補諸虛久服
輕身延年俗呼為干歲子此與蔓生者名同物異
也○雲南通志仙人掌葉肥厚如掌多刺相接成
枝花名玉英色紅黃實似山瓜可食
味甘性平補脾健胃益腳力除久瀉

敬按羣芳譜仙人掌出自閩粵非草非木亦非果
疏無枝無葉又并無花土中突發一片與手掌無
異其膚色青綠光潤可觀掌上生米色細點每年
只生一葉於頂今歲長在左來歲則長在右層累
而上植之家中可鎮火災如欲傳種取其一葉切
作三四塊以肥土植之自生全掌矣近日南浙亦
有據所載當另是一種與此全別或名同物異歟
酒杯藤子

出西域藤大如臂花堅硬可以酌酒文章映澈實
大如指味如荳蔻食之消酒相傳張騫得其種於
本草綱目拾遺卷八仙掌子 酒杯藤子 藥果 簡子

大宛

甘辛平無毒消食下氣消酒止渴辟邪癩消癰腫
殺蚊蟲治尸蛙勞瘵蟲蠱瘰癧癭結核癰疽潰
爛食果成積用酒杯藤子燒灰糖拌服下五七錢
自效

飲酒過量成病用酒杯藤子煎服極驗

藥果

關涵嶺南隨筆藥果似橙而味酸可染紅
治噦

簡子

出交趾合浦藤緣樹木正月開花四五月熟如梨
赤如雞冠核如魚鱗

甘平無毒主中惡氣飛尸邪蠱心腹卒痛狂邪鬼
神鬼疫瘟瘧夢寐邪惡氣心神顛倒不甯昏冒如
癡

治驚癇恍惚或言語不倫歌笑不徹用簡子核七
枚燒末入硃砂少許薑湯下方寸七自愈

椒子

食物考甘酸小於沙果色黃紅黑如櫻桃類產於
代北味頗清香作脯點茶俱可此與林禽同名異
類本草未分故正之多食滯氣令人好睡子宜去
盡食之煩心

本草綱目拾遺

卷八

簡子

椒子

限支

天

限支

益部方物畧記生邳州山谷中樹高丈餘枝修而
弱開白花實大如雀卵狀如荔枝肉黃膚味甘

味甘無毒治七種疝氣及一切瘡瘍疥癬

以上自津符子至限支止諸果品綱目附錄諸果後
僅載其形狀不錄其主治而沈雲將食纂云諸果
都出外國及邊瘴地方雖不常見但俱屬異品不
惟可口兼可療治百病凡行歷遠方者即當攜其

種流傳中土有功於世不小故附錄而兼細核其
主治予因取之以補李氏之遺至其形狀綱目已
詳載而復列之者亦欲覽者便於解悉後日遇物
能名故不厭重贅也

呂宋果

本草補呂宋島中產一果名加它弄外肉而內核
味苦不堪食其初惟有一處深山峻嶺生此樹甚
高大土人多不識旅人至島百年後始知其中果
可用近三十年頗悉其療治各病極有奇驗遂攜
至中國若果之皮肉其效尤捷有呼為寶豆者豆
本草綱目拾遺 卷八 限支 呂宋果 无
言果之形狀寶言其貴重也

治中毒服毒將果或磨或刮以清水或清油調服
毒即吐蛇蝎蜈蚣等傷磨清水服之并刮敷患處
疾疾中風昏仆磨水服之腹痛瀉利磨水服瘧疾
初作時磨水服。刀斧傷血漏刮末敷患處即止
血止痛。蛔蟲疳積磨水服蟲即吐出。難產磨
水服。頭瘡癢爛臘梨切碎此果以油煎之乘熱
徧擦向火取暖隨以布向火取熱覆病人身上而
睡又以被蓋不見生風即愈。潮熱磨水服漸減
而愈

諸穀部

沙米

延綏鎮志苗莖如麻葉類艾而稍圓有刺高尺許
生子成房粒細如黍杵去皮用羊葉作食服之不
饑邊外名黍喇棘。瀚海記沙蓬米凡沙地皆有
之鄂爾多斯所產尤多枝葉叢生如蓬米似胡麻
而小性暖益脾胃易於消化好吐者多食有益作
為粥滑膩可食或屑之可充餅餌茶食之需。人
海記張家口內保安沙城一帶地產沙蓬實如蒺
藜中有米如稗子食之益人。藥性考云蓬蒿之
本草綱目拾遺 卷八 沙米 西國米 三子
實名曰沙米清熱消風饑荒食旨

味甘性溫通利大腸消宿食治噎膈反胃服之不
饑

西國米 珠兒粉 竹米

嶺南雜記出西洋西國煮不化而色紫柔滑者真
偽者以葛粉為之。通雅今南楚兩粵專採葛根
作粉食其粉可作丸曰葛粉丸廣人以假西國米
能醒酒。朱排山柑園小識西國米來自閩廣洋
艘大如綠豆以色紫煮不化者真健脾運胃功最
捷久病虛乏者煮粥食最宜

益胃和脾病起宜食

珠兒粉

洋船帶來粵澳門杭甯波乍浦通舶市者皆有形
絕細如蘇子勻圓而白云係外洋人採葛根及薇
箕根或茹粉所造煮之須滾水沖泡粒粒分明如
魚子樣極柔滑以糖霜和食或淡食

氣清香味甘滑明目運脾開胃解酒生津久服尤
能強腎

東西洋考太泥即古浮泥今隸暹羅土產有西國
米亦名沙孤米其樹名沙孤身如蕉空心取其裏

本草綱目拾遺

卷八

珠兒粉

竹米

三

皮削之以水搗過春以為粉細者為王米最精粗
者民家食之以此代穀今買舶慮為波濤所濕只
攜其粉歸自和為丸。庚申十月予在陳夔友家
見有胡西菽盛以玻璃小筆管瓶內菽白而細與
珠兒粉無別云得自王撫軍嘗可入藥大能消痰
其甥女一夕患肺風痰喘危極見醫多言不效用
此一錢調薑汁灌下其痰如失

竹米

物理小識竹結實斑文兩兩相比謂之竹米
下積如神

陳倉米 朱公米

嶺南記武昌漢陽門內舊為陳友諒倉基甲子年
有掘得黑米者色如漆堅如石炒之即鬆。秋燈
叢話康熙甲子武昌郡廣福坊掘得黑米數十斛
堅如石炒研為末治膈症如神傳為偽陳友諒積
粟所又天門學宮前明改建北郭倉基地亦掘得
黑米治疾頗驗乾隆丙申黃州重修郡學疏濬泮
池池底積粟甚夥色如漆而堅治病效如前人爭
取之太守王公廷棟恐係前人鎮壓物禁而掩之
敏按西陽雜俎乾陀國尸毗王倉庫昔為火所燒

本草綱目拾遺

卷八

陳倉米

朱公米

三

其中粳米燻者於今尚存服一粒永不患瘧
炒研治膈症如神 不藥良方陳年倉米治卒心
痛燒灰和蜜服之即止

朱公米

南中紀聞靖州南二十里飛山岩相傳為元末朱
都督屯兵之所牆礫時有米粒色微黑而不腐云
是朱公所遺兵糧游客謁神祠取輒得之至今尚
存

山穀

療脾疾

宦游筆記出塞外土人名烏爾格納莖長尺餘細如草節如竹葉亦如竹每一節一葉秀穗類蓼花結粒似穀而色紅採之曬乾去其皮煮粥粥如穀香蒙古用以充饑兼碎麩合茶商民均雜粟食之色紅豔可愛而味與穀無辨故名之曰山穀實生於水濱或山溝爾

味甘香行氣利水清大小腸火亦補脾胃

根 蒙古人名墨克爾外皮微細內實粉白味甘

美蒙古生啖商民合肉熬食秋冬之際蒙古搜掘

鼠穴得食物盈筐內多此物長二三寸俱野鼠嚙

本草綱目拾遺 卷八 山穀 青稞黃稞 米 三

截運藏者

味甘生津滋潤血脈調營衛利水

青稞黃稞

藥性考青稞黃稞仁露於外川陝滇黔多種之味

鹹可釀糟弔酒形同大麥皮薄麩脆西南夷人倚

為正食

下氣寬中壯筋益力性平涼除濕發汗止渴多食

脫髮損顏色

米油

此乃滾粥鍋內煎起沫酸滑如膏油者是也其力

能實毛竅最肥人用大鍋能煮五升米以上者其油良越醫全丹若云黑瘦者食之百日即肥白以其滋陰之功勝於熟地也每日能撒出一碗淡服最佳若近人以熟粥絞汁為米油未免力薄矣味甘性平滋陰長力肥五臟百竅利小便通淋精清不孕 紫林單方用煮米粥滾鍋中面上米沫浮面者取起加煉過食鹽少許空心服下其精自濃即孕矣

鍋焦 陳久年糕

一名黃金粉乃人家煮飯鍋底焦也取僧寺中米

本草綱目拾遺 卷八 米油 鍋焦 三

多焦厚者入藥良

味苦甘性平補氣運脾消食止泄瀉入珍粉用之

鍋焦丸 小兒常用健脾消食家寶方用鍋焦炒

黃三筋神麩炒四兩砂仁炒二兩山查四兩蒸蓮

肉去心四兩雞肫皮一兩炒共為細末加白糖米

粉和勻焙作餅用

老幼脾瀉久不愈 梁侯瀛集驗方鍋焦為末四

兩蓮肉去心淨末四兩白糖四兩共和勻每服三

五匙日三次食遠下

白瀉不止 種福堂方乾飯鍋粬二兩松花二兩

炒臘肉骨頭五錢烘脆其爲末砂糖調不拘時服
脾胃不健 祝氏效方鍋焦二筋蓮肉一筋白糖
半筋蜜一筋丸如桐子大每服數十九丸空心白湯
下

玉露霜 治老人脾泄最效白朮炒二兩陳皮一
兩五錢蓮肉去心四兩薏苡仁四兩炒糯米一升
炒菘豆一升炒熟陳米鍋粬一升炒糖霜量加其
爲末每用二三錢滾水調勻服之行篋檢秘
預稀痘疹 不藥良方銀花金者不用陰乾鍋粬每一
升入銀花一兩共研末用洋糖或做糕餅或開水

本草綱目拾遺 卷八 鍋焦 陳久年糕 阿迷酒

調和每日令小兒食之

陳久年糕

燒灰治痢

阿迷酒

出東洋氣味香冽頗醲厚每服不過半盞大能助
元氣驟長精神估舶帶來凡督撫大員輒多備貯
爲不時之需或遇要事疲憊一滴入口精神百倍
較鴉片尤速○物理小識吉利重耐以紅花芫胡
桃入麴釀者醫洩數效
味甘辛竄達能捷通百脉益元生氣每日少飲一

二滴理性如神
酒釀 酒薑

俗名酒窩又名浮蛆乃未放出酒之米醇也味醲
厚多飲致腹瀉性善升透凡火上行者忌之
味甘辛性溫佐藥發痘漿行血益髓脉生津液
赤眼淹纏 祝氏效方杜仲厚朴桑白皮檳榔各
一錢取雄雞肝一個忌見水去紅筋入白酒釀六
兩隔湯蒸熟去渣以湯肝食下隔二日再服一次
全愈

本草綱目拾遺 卷八 酒釀

小兒鼻風吹乳腫痛 劉起堂經驗方用酒釀和
菊花葉敷上立愈無葉用根甘菊葉尤佳搗汁沖
和服更效

吹乳方 周氏家寶用苧麻根嫩者炒和白酒釀
少許共搗爛敷患處一日夜即消忌食發物

頭風 用蒼耳子白芷殼精草各五錢川芎三錢
甜酒釀四兩老酒二碗煎一碗服妙淨方

夢遺白濁 酸梅草二錢孩兒菊二錢搗取汁加
不見水酒釀空心量服救世青囊

難產 用酒釀麻油蜂蜜童便雞子白各半盞煎
溫服即下

痘出不起 不藥良方用狗糞七枚冬日取糞在狗耳內搗

爛和酒釀服即日發起紅潤可觀。痘瘡不起

良方集要葶藶搗汁和白酒釀頓溫服之但不可

頓大熱大熱則反不妙慎之

保元丹 千金不易方此丹張氏家傳已五世矣

黃精一筋甘枸杞四兩酒釀五筋好黃酒五筋入

確煮一炷香每飲一茶杯藥渣搗為丸加胡桃肉

八兩大黑棗八兩青州柿餅一筋

酒葦

生酒罈中不恆有凡藏酒之家千百罈酒間有一

本草綱目拾遺 卷八 酒 酒葦

罈啟之中空無酒下有葦結於中其葦初結之時

酒上薄凝如衣膜久則漸厚一二寸便能滲酒將

酒中精華醇醱之氣盡攝於膜內膜乃漸厚酒亦

漸少久久則酒乾所存十不餘一啟視之其膜如

鮮海蟄濡潤而軟嗅之作酒香微帶徽蒸氣識者

取之焙乾乾者如瓜皮面青黑背作肉紅色濕軟

如棉可入藥蓋酒能生葦必罈係新出窰未脫火

氣而置酒之地又為濕熱所蒸致中變而成此故

造釀家用罈貴舊而不貴新也金御乘自慈谿歸

帶有酒葦出以相示云彼土亦罕得間有之然不

多見也

治一切酒傷酒勞酒疸因酒成病諸症服之立效

神黃豆 蘇豆 回酒豆 青花豆 眞甯豆

池北偶譚產滇之南徼西南夷中形如槐角子視

常豆稍巨用筒瓦火焙去其黑殼碾末白水下之

可永除小兒痘毒服法以每月初二日十六日為

期半歲每服半粒一歲每服一粒一歲半每服一

粒半遞至三歲服三粒則終身不出矣或曰按二

十四氣服之以二十四粒為度或云水畢閉日服

之。珍異藥品云出雲南近西地方痘將發未發

本草綱目拾遺 卷八 神黃豆

時用神黃豆連殼焙炒燥用豆研細水服。本經

逢原云神黃豆產緬甸形如槐子近時稀痘方用

之一陽日用清水磨服。痘學真傳云神黃豆出

雲南能稀痘生熟各一粒甘草湯咀服。甯陽張

琰種痘新書云凡痘自胸以上自臍以下俱有而

中間一截全無者名兩頭痘此氣血不能貫通上

下而腰臍之間為寒毒凝滯也若不急治七日之

後必變灰白之症矣見點時急用生芪當歸赤芍

桔梗防風荆芥厚朴續斷白芷山查木通神黃豆

三十粒服此中間方有痘乃可無虞

南詔備考普洱府及永昌府皆出神黃豆能稀痘
青花豆可治瘡有客帶滇產神黃豆來其形如細
竹筒長可三四寸搖之有聲其中如竹節片片相
叠剖出如棋子樣白色包裹中含一豆黃色光亮
形如瓠子中有線痕堅實而扁服之解痘毒

按神黃豆有二種百草鏡云出雲南普洱府又四
川亦產莢如連翹畧短內有豆微紅色產雲南者
形如槐角子比蠶豆畧大瓦上焙乾去外黑殼用
二種形狀不同係地土所產各別然其稀痘解毒
之性則一也○寶笈方痘將出時用神黃痘按一

本草綱目拾遺 卷八 神黃豆 蠶豆

歲一粒剝去外殼并內皮將瓦焙熟一半留生一
半芫荽湯調服毒重者稀毒輕者更稀十餘歲者
亦不過七粒倘未出痘者亦如法以水調服之竟
不出痘宜三月三五月五七月七九月九等日

緬豆

滇畧緬豆如豆蔓生子大如粟斑文點點咀之傳
惡瘡良然性迅惡誤服之吐瀉致死五雜俎云滇
中有神黃豆似五楮子能令兒童稀痘然亦不甚
驗也

回回豆

五雜俎云出西域狀如椿子磨入麪中極香能解
麪毒

青花豆

宦遊筆記雲南永昌府有青花豆出於外地夷人
帶來易貨者治瘡

真甯豆

出陝西慶陽真甯地味甘平能解諸藥毒

穉豆 菜附

蓬原云細黑豆一名穉豆俗名料豆今人以飼馬
故俗又呼馬料豆○杭州府志黑豆之細者曰穉

本草綱目拾遺 卷八 回回豆 真甯豆 穉豆

豆細而扁者曰零烏豆俗名馬料豆可肥馬○從
新云黑大豆之小者為馬料豆不知料豆雖小而
形長微扁與黑豆形迥別當另是一種綱目穉豆
下僅載其能去賊風風痺治婦人產後冷血而已
其他一切功用全未之及今為補之

味甘溫無毒壯筋骨止盜汗補腎活血明目益精
入腎經血分同青鹽旱蓮草何首烏蒸熟但食黑
豆則鬚髮不白其補腎之功可知今人以製何首
烏取以引入腎經也炒焦淋酒治頭風腳氣以其
直達腎經血分煮汁服解烏附丹石藥毒

藥性考本經黑大豆即今之馬料豆也其色黑而形如人腰故入腎經益水明目多服令人身重一年後復原久服身輕非花豆中之黑大豆也凡服豆忌草麻子厚朴猪肉歌云黑大豆甘腰子樣式所以補腎藥餌宜入即是馬料煮寒炒熱調中下氣止痢擊急利水除脹追風活血生研敷腫吞止煩渴解一切毒甘草煎汁傷中淋露產後諸疾明目悅顏製服有益。又云稽豆即小黑豆因其粒細稱驢豆別馬料也治產後血風冷痛其粒細不及馬料歌云稽豆黑小甘逐邪風冷痺血滯浸酒

本草綱目拾遺

卷八

稽豆

四

和融。雨簑翁食記小黑豆入鹽煮久食大能補腎。事親述見稽豆補五臟益中助十二經脈調中煖腸胃殺鬼氣舒筋。紫虛子吞豆法黑料豆淘淨晒乾以淨瓶裝之初服每日一粒以白湯生吞之次日吞二粒每日加一粒至百日吞百粒從此每日吞百粒但初起服之腸胃未剛每遇大便須看豆化不化如豆化則漸加倘未化仍照舊勿加必待食之能化然後遞加至百粒為度服之能益精補髓壯力潤肌髮白後黑久則轉老為少終其身無痰病也

救生苦海有嫦娥奔月方與紫虛吞豆法同但其法按太陰盈虧之數初一日吞一粒逐日加一粒至望日十五粒而止十六日又逐日減一粒至晦日一粒而止月初則又加起與紫虛之法微有不同并附以備用

煮料豆方 明太醫劉浴德有增補內經拾遺四卷其種子論後載有煮料豆藥方云老人服之能烏鬚黑髮齒齒明目當歸四錢川芎甘草廣皮白朮白芍丹皮菊花各一錢杜仲炒黃芪各二錢牛膝生地熟地各四錢青鹽六錢首烏枸杞子各八

本草綱目拾遺

卷八

稽豆

四

錢同馬料豆煮透曬乾去藥服豆。又義復方馬料豆五升桑椹半觔枸杞子四兩肉蓯蓉半觔竹刀切去筋青鹽龍骨各二兩全豆煮熟和藥同曬乾貯確用常食大有補益。又方呂逸儒傳方何首烏一觔用馬料豆汁煮或老酒亦可要九蒸九曬枸杞一觔酒蒸用乾藥末搗勻曬馬料豆一斗再用料豆五升煮汁以汁煮豆曬乾九蒸九曬或用好酒煮亦可免絲子一觔酒煮曬焙補骨脂一觔酒洗焙真川椒四兩曬烘青鹽二兩川牛膝一觔酒煮焙煉蜜為丸服之。又方何首烏二觔青

鹽一兩棗仁杜仲枸杞各二兩遠志小茴香陳皮各一兩肉蓯蓉苡仁香附白茯苓川芎各二兩五味子牛膝補骨脂木瓜各一兩五錢歸身三兩肉桂五錢防己一兩二錢甘草八錢黑豆一斗用水煎藥數十滾漉出渣以藥汁煮豆汁盡為度曬乾每服百粒開水下

延齡廣嗣仙方 淮生地酒製何首烏酒煮旱蓮草鹿銜草真者絕少用仙靈脾代之以以上各三兩按四時乾山藥乳拌白茯苓乳拌當歸身酒炒真青鹽以上各一兩按分至石菖蒲兔絲子肉蓯蓉

本草綱目拾遺

卷八

糖豆

望

酒浸去膜補骨脂五加皮骨碎補淮牛膝白甘菊原杜仲酒炒斷絲枸杞子蛇床子槐角子金櫻子覆盆子川黃柏建澤瀉以上各五錢按十六節以上二十四味俱合二十四氣除去青鹽鍋內煎汁至半漉渣再將渣煎過半漉清沖和煎濃入馬料豆三升七合女貞子一升七合按陰陽二氣二至二分台年月日時週天度數餘一合半以置閏煮數十滾將青鹽研細傾入同煎以汁盡為度取豆曬乾收貯磁瓶每晨四錢滾湯送下如遇出門饑餓即可嚼食代點此豆謹按陰陽二十四氣合週

天度數製法得中和補益之妙久服能令人鬚髮再黑齒落更生耳目聰明手足便利壯陽補腎固本還元多育子息多增年壽常服不斷可成地仙凡腎虛目暗上盛下虛者尤為切合

四寶大神丹 家寶方能治五勞七傷服藥後忌腥臭發物房事馬料豆五升用混堂油製九次黃芪八兩人乳製七次白當歸酒洗四兩金櫻子二斗去內子與毛外去刺淘淨熬膏臨收時加童便一二盞聽用右將前三味和金櫻膏丸如梧子大每服三錢桂圓湯下

本草綱目拾遺

卷八

糖豆

望

明目補腎兼治筋骨疼痛○不藥良方小紅棗十二枚冷水洗淨去蒂甘州枸杞子三錢小馬料豆四錢水二碗煎一碗早晨空心連湯共食之絕瘡製首烏劑下黑料豆可以絕瘡凡四日兩頭瘡用豆煎湯服即愈○截三日瘡祝穆效方常山雲苓官桂甘草檳榔各三錢小黑豆四十九粒酒水各二碗慢火煎二碗當晚先服一碗蓋暖而睡留一碗至次日須將發前早兩個時辰服要熱服蓋暖卧待瘡至至亦輕鬆亦有當日而愈愈後忌房事戒食生冷勞碌風霜忌食雞羊牛蛋白扁豆

半月永截不發。又秘方集驗治瘧積榔蘿蒲子常山甘草各一錢紅棗四枚烏梅七枚馬料豆每歲一粒水二碗煎一碗服忌三日葷油永不再發痰喘氣急 同壽錄用梨剉空中心納小黑豆令滿留蓋合住紮紫糠火煨熟搗作餅每日食之中風口噤 文堂集驗方馬料豆一升煮濃汁如飴含汁在口即能言也

黑白丸治痞積開胃消食健脾補腎。百草鏡方馬料豆白蒺藜去刺各一筋炒磨末蜜丸梧子大每服二三錢開水送下

本草綱目拾遺

卷八 雜豆

豆

治陰症手足紫黑 集驗方黑料豆三合炒熟好酒烹滾熱服加葱鬚同烹更妙

盜汗 文堂集驗方蓮子七粒黑棗七枚浮麥馬料豆各一合水煎服三次愈

腎虛腰痛并治陰虧目昏 活人書用腰式烏甕豆馬料豆各一兩煮湯入鹽少許五更時乘熱服忌鐵器

陰虧目昏老眼失明 活人書馬料豆甘枸杞女貞子各十兩陰虧目昏除女貞子為末煉蜜丸梧子大早晚服二三錢自效

赤白帶下 白果去皮煮熟蜜餞每日清晨吃七枚再食炒馬料豆一兩白滾水送下數日愈 妊娠腰痛酸軟 產家要覽馬料黑豆二合炒焦熟白酒一大碗煎至七分空心下

治產後中風口噤目瞪角弓反張 姚希周集驗用黑料豆鍋內炒極焦沖入熱黃酒內服之立效再服回生丹全愈

華真君三豆湯稀痘 楊春涯驗方綠豆赤飯豆馬料豆等分每日煮湯與小兒吃出痘自稀如遇痘毒亦用此湯飲之搗搽敷上其毒自消

本草綱目拾遺

卷八 雜豆

豆

痘風爛眼 集驗云風爛眼用醃白梅一箇去核入綠礬少許川椒三十粒以五銖錢二個夾之用苧蔴紮住無根水浸洗自愈若出痘得此症再加馬料豆一歲一粒投水中

眼藥丸方 周氏家寶用馬料豆一升炒蟬退四兩酒洗去頭足木賊草四兩去節菟絲子一筋炒甘菊花四兩曬乾白蒺藜一筋各為末水法為丸每服二三錢晚服滾湯下如若年高桂圓湯下各種癬 陳別駕彬曾任太醫院官有治各種癬方用馬料豆以瓦罐不拘多少裝入罐內罐口以

銅絲單格定使豆不能倒出然後用大高邊火盆
一個盆鑿一孔將罐倒合孔上四圍以乾馬糞壅
之火然罐底盆底下用磚墊空安碗一個接油上
火煨罐內豆自焦有油從盆底滴入碗中色如膠
漆以此搽癬三次即愈

解藥毒 凡服藥過多以致頭面浮腫唇裂流血
或心腹飽悶臍下撮痛者用馬料豆菜豆各四兩
合煎汁連豆服病好為度
中附子川烏天雄斑蝥毒 不藥良方馬料豆煎
汁服之即解

本草綱目拾遺 卷八 蠶豆 蠶豆殼

稽豆葉治瘤 急救方頸後粉瘤馬料豆葉辟腐
香草同搗敷患處其瘤漸軟漸消破則手擠去粉
疙瘩不破聽其自消

蠶豆殼

治癰疔 行篋檢秘用油鹽蠶豆殼一鍾麻油浸
一週時取起將豆殼瓦上焙研為末麻油調搽患
處立愈

膈食 指南云用蠶豆磨粉紅糖調食數次即愈
小便日久不通難忍欲死 慈航活人書蠶豆殼
三兩煎湯服之如無鮮殼取乾殼代之

黃水溜瘡 毛世洪經驗集云凡大人小兒頭面
黃水瘡流到即生蔓延無休者用蠶豆殼炒成炭
研細加東丹少許和勻以真菜油調塗頻以油潤
之三日即愈

治漏 種福堂方用炒熟蠶豆殼磨末每服三四
錢加沙糖少許調服

癩瘡 張卿子外科秘方用鮮蠶豆搗如泥塗瘡
上乾即換之三五次即愈如無鮮者用乾豆以水
泡胖搗敷亦效

吐血 張卿子方以新蠶豆殼四五年陳者炒煎
湯飲之即愈

本草綱目拾遺 卷八 蠶豆殼 醬油

天泡瘡 蠶豆黑殼燒灰存性研末加枯礬少許
菜油調敷一次即愈

藥性考云蠶豆苗能醒酒

醬油 精油

以麩豆拌罨成黃鹽水漬成之伏造者味厚秋油
則味薄陳久者入藥良

味鹹性冷殺一切魚肉菜蔬草毒塗湯火傷多食
發嗽作渴

解食荔作脹以陳年醬油飲少許即消

中輕粉毒以三年陳醬油化水類激之藥方

藥性考摩風癢腰膝痛開胃暖熾止嘔噎解諸毒

腐漿 沫 渣 皮 乳

瀕湖綱目於荳腐集解註腐皮堪入饌而漿乳皆遺之又胡麻亦可作腐綱目胡麻條亦遺之今悉為補概名曰腐

腐漿 味甘微鹹性平清咽祛膩解鹽滯毒 藥性考云味甘微苦性涼清熱下氣利便通腸能止

本草綱目拾遺 卷八 腐漿 腐漿 腐漿

淋濁銀杏研漿

傷寒十日不汗 張卿子妙方用未點豆腐漿一

大碗調好白蜜熱服即出汗愈神效

腳氣腫痛難走者熱豆腐漿加松香末搗勻敷過

夜即好行走永無後患

大便下血 古今良方葶薺一筋三斗筋豆腐漿

不沖水者一大碗將腐漿頓極熱搗葶薺汁乘熱

沖入飲之

鹽哮喘 救生苦海用豆腐漿加糖少許日口早服

一碗不間斷過百日自愈

治黃疸 劉羽儀驗方每日空心冷吃生豆腐漿一碗吃四五次自愈忌食生蘿蔔

痰火吼喘 經驗廣集飴糖二兩豆腐漿一碗煮化頓服愈

治勞及自汗 回生集方用黑豆淘淨磨成腐漿鍋內熬熟結成皮每食一張用熱黑豆漿送下即效○凡人每日清晨吃黑豆腐漿大有補益可以免癆病之患

肺癰肺痿 用芥菜瀼陳年者每日將半酒杯沖豆腐漿服後胸中一塊必塞上塞下塞至數次

本草綱目拾遺 卷八 腐漿 腐漿 腐漿

方能吐出惡膿日服至愈

血崩 不藥良方生豆腐漿一碗生韭菜汁半碗入漿內空心服一二次

五妙湯治產後并弱症 郁文虎傳方用頭鍋腐

漿一碗腐皮一張生雞蛋一個打碎沖入漿內再

加圓眼肉十四枚白糖一兩入漿內滾服五更空

心食

陳廷慶云豆腐漿入陰分瀉火通淋濁凡淋症用

六一散沖腐漿食最妙五更沖雞蛋白糖點服甯

嗽補血粵人以腐漿煮粥食名甜漿粥大能補虛

腐

腐沫 卽豆腐泔水上結沫是也治鵝掌癬生手

掌及足掌層層剝皮血肉外露此沫熱洗卽愈

腐渣 此造豆腐所剩之渣人以飼猪入藥須用

生腐渣

治一切惡瘡無名腫毒神效不藥良方用豆腐渣

在砂鍋內焙熱看紅腫處大小量作餅子貼上冷

卽更換以愈爲度

大便下血 古今良方用不見水豆腐渣炒黃清

茶調服卽愈

本草綱目拾遺

卷八

腐沫 腐渣

三

治癩瘡裙邊瘡爛臭起沿 養素園方生豆腐渣

捏成餅如瘡大小先用清茶洗淨絹帛拭乾然後

貼上以帛纏之一日一換其瘡漸小肉漸平此費

啟彰親試有效之方也可敷腳蛙

腳上皮膚生水孔而皮濕爛者 不藥良方豆腐

渣貼三日卽愈不要落生水

腸風下血 慈航活人書雪花菜卽豆腐渣用未

曾濾出漿者帶水鍋內炒燥爲末每服三錢紫血

塊者白糖湯下紅血塊者砂糖湯下日三次雖遠

年垂危者服之神效

腐皮 味甘性平養胃滑胎解毒

小兒遍身起羅網蜘蛛瘡癩癢難忍 仁惠編用

豆腐皮燒存性香油調搽自愈

落頭疽 慈惠小編用壁上蟾子五六隻腐皮包

好吃完卽愈

冷嗽 劉羽儀驗方乾豆腐衣燒灰存性爲末熱

陳酒調下吃四五十張卽愈

水鼓脹 種福堂方陳芭蕉扇去筋燒灰存性五

分千金子去油殼二分五釐滑石二分共爲細末

以腐衣包滾水送下十服愈

本草綱目拾遺

卷八

腐皮 腐乳 腐巴

三

腐乳 一名菽乳以豆腐醃過加酒精或醬製者

味鹹甘性平養胃調中

腐巴 此卽腐漿鍋底所結焦巴也入藥曬焙研

末或生搗作丸皆可用藥性考名鍋炙開胃消滯

逐積

治淋濁補血 慈航活人書有五效丸用豆腐鍋

粃一兩加川連一錢同搗丸如桐子大每服五錢

赤帶蜜糖滾水吞下白帶砂糖湯下熱淋尿血白

湯下腸風下血陳酒下 血風瘡先將豆腐泔浸

洗去腥以布拭乾用前末藥川連腐粃粉真麻

油調搽乾則再塗三四次自愈

翻胃 神方珍記用豆腐鍋巴黃色者佳炒研末

每服三錢沙糖湯調服白湯下

痢疾 神方珍記陳冬米炒豆腐鍋巴二味各等

分爲細末空心白湯調服二三錢服後宜餓半日

自愈

腐泔 卽豆腐所瀝下之水也藥性考云豆腐有

鹽滷點者有石膏點者俱能清熱

性清涼能通便下痰通癰閉洗衣去垢膩

蘇腐 乃胡麻小粉所造者味甘性平潤肌滑腸

本草綱目拾遺

卷八

雜

腐泔

蘇腐

芝蔴殼

佳

解毒 蔣儀藥鏡滋生賦云蘇腐豆粉清腸消胃

芝蔴殼

此乃芝蔴外殼也綱目載其苗曰青蕻又有麻枯

餅麻花麻稽無麻殼因補之

湯火傷 楊春涯驗方芝蔴殼燒存性研細過火

傷者用麻油調搽卽愈倘溼爛乾摻之

半身不遂 千金不易方芝蔴殼五錢酒煎服出

汗卽愈

諸蔬部

甘藷 薯粉 甘藷酒

一作甘薯又名朱薯以其皮有紅者也一名金薯

今俗通呼爲番薯或作番茹有紅皮白皮二色紅

皮者心黃而味甜白皮者心白而味淡南方各省

俱植之沿海及島中居民以此代穀其入藥之功

用亦廣而諸家本草皆未載李瀕湖特補列綱目

中惜其所言者惟補虛乏益氣力健脾胃強腎陰

而已他皆未之及焉乾隆五十一年冬令

上特允閣學侍郎張若淳之請勅直省廣勸栽植甘

本草綱目拾遺

卷八

甘藷

薯

佳

薯以爲救荒之備陸中丞耀有甘薯錄之輯所載

衛生一門實足補李氏所未及因擇錄之以補其

遺陸公原序云甘薯卽薯蕷之屬見於陳祈暢異

物志稽含南方草木狀中土之有此物其來舊矣

第不甚貴重栽植者少明季有閩人陳經綸復自

呂宋移其種歸巡撫金公學曾勸民樹藝閩人德

之號爲金薯然自是長樂謝肇浙黃州李時珍新

城王象晉各有論述皆不及經綸事而其裔孫世

元父子復爲金薯傳習錄盛侈其先世傳自呂宋

之功一似中國素非所產者此考證之疎也夫以

一物之微足以備荒療疾而又不費功力其爲功於民食實不淺歟前任布政使李公渭嘗舉以教山東之民其性又喜沙土高地於山海之區尤屬相宜五雜俎百穀之外有可以當穀者芋也著積也而閩中有蕃薯似山藥而肥白過之種沙地易生而極蕃衍饑饉之民多賴全活此物北方亦可種也羣芳譜朱薯一名番薯大者名玉枕薯形圓而長本末皆銳皮紫肉白質理膩潤與芋及薯蕷自是名種氣香生時似桂花熟者似薔薇露撲地纏生一莖蔓延數十百莖節節生根一畝種數十

本草綱目拾遺

卷八 甘薯

薯

石勝種穀二十倍閩廣人以當米穀有謂性冷者非二三月及七八月俱可種但卵有大小耳卵八九月始生冬至乃止生便可食若未大者勿頓掘令居土中日漸大到冬至須盡掘出不則敗爛金氏學會曰薯傳外番因名番薯形如王瓜藕臂如拳如指如卵如棗大小不一實同種別皮有紫有白有深淺紅有濃淡黃肉亦如之蒸熟勻膩如脂甘平益胃性同薯蕷海隅人以供饗殮蔓延極速節節有根入地卽結每畝可得數千筋勝種五穀幾倍徐氏元扈曰昔人謂薯蕷有六利柿有七絕

予謂甘薯有十二勝收入多一也白色味甘諸十種中特爲最絕二也益人與薯蕷同功三也偏地傳生剪莖作種今歲一莖次年便可種數十畝四也枝葉附地隨節生根風雨不能侵損五也可當米凶歲不能災六也可充饘實七也可釀酒八也乾久收藏屑之旋作餅餌勝用錫蜜九也生熟皆可食十也用地少易於灌溉十一也春夏下種初冬收入枝葉極盛草穢不容但須壅培不用鋤耘不妨農十二也陸公薯錄有溉種藏製諸法雖無關於藥病而有濟於備荒故併錄之種薯宜高地

本草綱目拾遺

卷八 甘薯

薯

沙地起脊尺餘種在脊上遇旱可汲井澆灌卽遇澇年若水退在七月中氣候既不及薯五穀卽可剪藤種薯至於蝗蝻爲害草禾蕩盡惟薯根在地薦食不及縱令莖葉皆盡尙能發生若蝗信到時急令人發土偏壅蝗去之後滋生更易是天災物害皆不能爲之損人家凡有隙地但只數尺仰見天日便可種得石許此救荒第一義也歲前深耕以大糞壅之春分後下種若地非沙土先用柴灰或牛馬糞和土中使土脈散緩與沙土同可行根重耕起要極深將薯根每段截三四寸長覆土深

半寸許每株相去縱七八尺橫二三尺俟蔓生既盛苗長一丈留二尺作老根餘剪三葉為一段插入土中每栽苗相去一尺大約二分入土一分在外即又生薯隨長隨剪隨種隨生蔓延與原種者不異凡栽薯須順栽若倒栽則不生節在土上則生枝在土下則生卵約各節生根即從其連綴處斷之令各成根苗每節可得卵三五枚凡藤蔓已遍地不能容者即為游藤宜剪去之及掘根時捲去藤蔓俱可飼牛羊豕或曬乾冬月喂皆能令肥脂二三月種者每株用地方二步有半而卵偏焉

本草綱目拾遺 卷八 甘薯

每官畝約用薯三十六株四五月種者地方二步而卵偏焉約六十株六月種者地方一步有半而卵偏焉約一百六株有奇七月種者地方三尺以內得卵細小矣畝約九百六十株種種疎密畧以此準之九月畦種生卵如箸如棗擬作種此松江法也金氏曰薯苗入地即活東西南北無地不宜得沙土高地結尤多天時旱澇俱能有秋養苗地宜鬆耕過須起町高四五寸春分後取薯種科置町內發土薄蓋縱橫相去尺許半月即發芽日漸蔓延長一丈或五六尺割七八寸為一莖勿割

盡留半寸許當割處復發生生不息若養薯作苗須用稍長尺許密密栽豎如養葱蒜法栽莖使牛耕町寬二尺許高五六寸將莖斜插町心約以七分在町內三分在町外町內者結實町外者滋蔓每莖相去一尺餘十餘日町兩旁使牛耕開令曬又七八日以糞壅之仍使牛培上每町可得薯三四勛若兩多須將薯撥町一毋令浮根匝地然實結地內蟲不能災葉如食盡亦能復發早栽宜稀晚栽宜密三四月栽者實粗大七八月栽者實細小秋末實始加大冬至前當掘盡不掘盡亦不能

本草綱目拾遺 卷八 甘薯

大熟時須先割薯置町下俟乾捲起冬月剉喂牲畜若北地早寒則遲一個月栽早一個月掘宜遲宜早亦看天氣寒暖耳甘薯蔬云江南田汗下者不宜薯若高仰之地平時種藍種豆者易以種薯有數倍之獲大江以北土更高地更廣即其利百倍不啻矣倘慮天旱則此種畝收十石數口之家止種一畝縱旱甚而汲井灌溉一至成熟終歲足食又何不可取種之法羣芳譜云九月十月間掘薯卵近根先生者勿令損傷用軟草包裹掛通風處陰乾一法於八月中揀近根老藤剪七八寸長

每七八根作一小束耕地作畦將藤束栽如栽韭法過月餘每條下生小卵如蒜頭狀冬月畏寒稍用草蓋覆至來春分種一法霜降前取近根卵稍堅實者陰乾以軟草作襯另以軟草裹之置無風和暖不近霜雪不受冰凍處一法霜降前收取根藤曬令乾於竈下掘窖約深一尺五六寸先用稻糠三四寸次置種其上更加稻糠三四寸以土蓋之一法七八月取老藤種入木甯或磁瓦器中至霜降前置草笥中以稻糠襯置向陽近火處至春分後依前法種金氏曰存薯之法不一在人變通

本草綱目拾遺

卷八

甘藷

五

或存木斛草團磁甕竹籠中俱可但性畏寒又畏熱置避風和暖處用草浮蓋俾通氣若封固則發熱壞爛敏前在東甌玉環見其島民少穀食多以茹爲糧彼土有地率多種茹土人云其利十倍於穀以茹糧多者爲富其收茹之法多曝乾切條以竹席圍如囤儲之久亦不蛀用則以水煮代飯云食之多力鮮病蓋其味甘能補脾土故也金氏曰薯初結即可食味淡多汁及時則甜煨食煮食燂食蒸食亦可生食切片曬乾碾作饅粥磨作粉餌滾水灼可作丸拌麵可作酒春細水濾去渣澄曬

成粉其葉可作蔬○范咸臺灣府志長而色白者是舊種圓而黃赤者出自文來國金姓者攜回故名金薯○諸羅縣志他物下種必用子用仁或原物根芽獨薯不然取一條片片切之只留皮一面種之發根生苗亦一異也

氣味甘平無毒主治補中和血暖胃肥五臟白皮白肉者益肺氣生津中滿者不宜多食能壅氣煮時加生薑一片調中與薑棗同功紅花煮食可理脾血使不外洩敏按甘藷俗傳能發諸病患痔漏者愈後食之復發亦以性能下行而滯氣故也

本草綱目拾遺

卷八

甘藷

六

痢疾下血 傳習錄云痢疾之起多因脾胃先虛而後積滯成痢其有脾氣虛甚欲健中焦者必宜甘溫之藥其有命門不暖欲實下焦者必宜純熱之藥至若溼熱所致煩熱口燥腹痛純紅小水黃赤以及下血者用此薯蒸熟以芍藥湯頻頻嚼服或薯粉調冬蜜服亦愈

酒積熱瀉 傳習錄云泄瀉之症不一或水土相亂併歸大腸而瀉或土不制水清濁不分而瀉或小腸受傷氣化無權而瀉或真陰虧損元陽枯涸而瀉者此皆各從其類治之若酒溼入脾因而瀉

泄者用此薯煨熟食

溼熱黃疸 黃疸之症有四一曰陰黃由氣血敗

也一曰表邪發黃即傷寒症也一曰膽黃驚恐所

致也更有陽黃一症或風溼外感或酒食內傷因

溼成熱因熱成黃者用此薯煮食其黃自退

遺精淋濁 遺精之與淋濁症有不同故治亦不

同然大要責在心脾腎故凡遇此症無論有夢無

夢有火無火或氣淋血淋膏淋勞淋總宜調養心

脾每早晚用此粉調服大有奇功

血虛經亂 婦人血虛或遲或早經多不定故陽

本草綱目拾遺 卷八 甘薯 薯

虛補其陽陰虛補其陰氣滯順其氣其有不宜辛

燥寒涼而宜於清和者用此薯養飡頻服調養其

脾使脾健生化經期自定

小兒疳疾 疳者乾也在小兒為五疳在成人為

五勞其病由於哺食乾燥之品嗜啖肥厚之物妄

服峻利之藥以致津液乾涸延而成疳此薯最能

潤燥生津安神養胃使常服之則舊積化而疳愈

矣

甘薯粳 羣芳譜一造粳將糯米水浸五七日以

米酸為度淘淨曬乾搗成細粉看晴天將糯米粉

入生水作團子如杯口大即將薯根拭去皮洗

淨沙石土徐徐磨作漿要極細勿攪水將糯團煮

熟撈入瓶中用木杖盡力攪作糜候熟得所大約

以可入手為度將薯漿傾入每糯粉三斗入薯漿

一筋攪極勻先將乾小粉篩平板上次將糜置粉

上又著乾粉捍薄曬半乾切如骰子樣曬極乾收

藏用時慢火燒鍋令熱下二合許慢火炒少刻漸

軟漸發成圓球子次下白糖芝麻或更加香料炒

勻候冷極浮脆每梗二升可炒一斗芋漿山藥漿

俱可作按此物食之厚腸胃健脚力縮痰涎解毒

本草綱目拾遺 卷八 甘薯 薯

活血甚妙

甘薯粉 功同甘薯造法用薯根粗布拭去皮水

洗淨和水磨細入水中淘去浮渣取澄下細粉曬

乾同豆粉用此粉水作丸與珍珠沙谷米無異按

此粉余前在閩中及玉環俱有土人造以售客販

行遠方近日甯波及乍浦多有販客市粉價賤於

麵粉近日餅餌舖中率多買此攪和麥麵中作果

餌以售其粉亦高低不等有曰淨粉則依前法所

造者滾水沖之儼如藕粉故藕粉店中亦多買此

攪和非有識者莫辨有日行粉則連浮渣一切皆

磨細和入只可作餅餌用其色亦黃而不自然其
又有甜苦二種沙土細潔者則其茹作粉甜倘先
一年種烟其地次年種茹則苦澀人不售之惟堪
作粉味亦苦矣但以味甘有清香化開色如玉者
佳

甘薯酒 和脾暖胃止瀉益精造法用薯根不拘
多少寸截斷曬乾飯炊熟取出揉爛入瓶中用酒
藥研細搜和按實中作小坎候漿到看老如法下
水用絹袋濾過或生或者熟任用其入飯寒暖酒
藥分兩下水升斗或用麩葉或加藥物悉與米酒
本草綱目拾遺 卷八 甘薯粉 酒 山百合

同法若造燒酒即用薯酒入鍋如法滴糟成頭子
燒酒即用薯糟造當用燒酒亦與酒糟造燒酒同
此酒福建最多土人名土瓜酒燒酒曰土瓜燒其
酒味微帶苦峻烈不醇不善飲者食之頭目微有
昏眩亦無大害閩中紹酒價貴此酒值廉土人相
率飲此亦以餉客

山百合

此百合之野生者瓣狹長而味甘山人採貨之。
藻異云百合有三種一名山百合花遲不香二名
檀香百合可食三名虎皮百合食之殺人。百草

鏡百合白花者入藥紅花者名山丹黃花者名夜
合今惟作盆玩不入藥百合以野生者良有甜苦
二種甜者可用取如荷花瓣無蒂無根者佳能利
二便氣虛下陷者忌之

逢原云余親見包山土罇中蚓化百合有變化未
全者大畧野生百合蚓化有之其清熱解毒散積
消痰乃蚓之本性耳。應驗方癰疽無頭野百合
同鹽搗爛敷

甘入肺清痰火補虛損治肺癰救生苦海取白花
者三兩搗爛白酒和絞取汁一碗不拘時服七服
全愈
本草綱目拾遺 卷八 山百合 石衣

石衣 石耳

台州仙居有之生峻嶺絕壁海崖高處乃受陰陽
雨露之氣漸積石上年久則生衣鮮者翠碧可愛
乾者面黝黑背白如雪土人以作羹餉客最為珍
品煮法用滾水一碗投鹽少許泡石衣於中用手
細細擺揉去其細砂待軟如綿其細砂去淨色即
變紫如玫瑰必得鹽水則所銜細砂始能吐盡再
過清水二三次以雞湯下食滑脆鮮美味最香甘
為山蔬第一台州六屬惟仙居有之或云各處深

山皆有非仙居人不能取故仙居人有專業此爲生者近則一二百里遠則數百里外向深巖危壑人跡莫能躋攀者壁上始有此物其取之法人則藤兜飛架衣雞毳躡鞋趨捷如猿猱取之則銛鈎鋒鏟輪緬入山有祭買路有楮非仙土人莫能盡其術也然結侶雖多其采取止許一人往不得兩人並採亦奇也每年必損人故其值昂而貪利者且競趨之

味甘氣清性寒無毒清隔熱利小水化痰消癭結滯氣有補血明目之功婦人食之能潔子宮易於受孕胎男子食益精增髓

本草綱目拾遺 卷八 石耳 石耳

石耳

羣芳譜石耳一名靈芝生天台四明河南宣州黃山巴西邊微諸山石崖上遠望如烟廬山亦有之狀如地耳山僧採曝饒遠洗去沙土作茹勝於木耳○粵志韶陽諸洞多石耳其生必於青石當大雪後石滋潤微見日色則石生耳大者成片如苔薛碧色望之如烟亦微有蒂大小朵朵如花烹之面青紫如芙蓉底黑而破每當味爽擷取則肥厚見日漸薄亦微化爲水凡香葷感陰溼之氣而成

善發冷氣多和生薑食乃良惟石耳味甘腴性平無毒多食饑人能潤肌童顏在木耳地耳之上。南粵瑣記凡青石以烈日輒出汗汗凝結則成石耳青爲木氣故生耳若白石則否或曰此亦葶之類厚者葶薄者耳或曰凡乳牀必因石脉而出不自頑石出其在陰洞者爲乳牀在陽崖者爲石耳石耳之美見稱於伊尹其言曰漢上石耳蓋上古已珍之矣

性寒或曰平味甘腴無毒。藥性考石耳寒平石崖懸珥氣並靈芝久食色美益精悅神至老不毀

本草綱目拾遺 卷八 石耳 野芋

瀉血脫肛灰服愈矣。名勝志安吉州梅溪石門中產石耳食之止熱

野芋芳 青芋 土芋 藤芋 野芋頭 鬼芋

野芋之農書芋有六種五野芋六青芋野芋有大毒殺人凡芋三年不收即成野芋性滑下石毒服食皆忌之青芋亦有毒必須灰汁易水煮之堪食只宜蒸啖之中野芋毒者令人戟喉音啞煩悶垂死以大豆漿或糞汁解之薑汁亦可

葛祖遺方合麻藥治跌打損傷痔漏麻風敷腫毒止痛治瘡癬搗敷蛇傷

乳癰 野芋頭和香糟搗敷

青芋

療冷熱止渴

土芋藤

土芋即黃獨俗名香芋肉白皮黃形如小芋一名
土卵與野芋不同綱目野芋附家芋內土芋另立
一條可知然所引僅據陳藏器一說不知其功能
稀痘小兒熟食大解痘毒其藤燒灰傳痘爛成瘡
可無癍痕○羣芳譜土芋其根惟一顆而色黃故
名黃獨

本草綱目拾遺

卷八

青芋 土芋藤 野芋頭 鬼芋

七

野芋頭

文堂集驗一名仙人掌同野芋一種但此種葉較
小畧似茨菇葉有尖此又與草本形如鞋底者不

同仙人掌形如鞋底

治諸物食積已成痞塊者用野芋頭磨爛和糯米
粉淡煮粥每早食一茶鍾不用油鹽十服後其積
自消試驗無害 集驗

鬼芋

羅浮志深谷中產物如薯芋狀山人得之剖作四
片入砂盆磨作膠漿鍋煮成膏待冷則凝結如餅

塊一復剖為四片添水再煮成膏膏成照前三煮

四煮乃可食令飽一芋所煮可充數十人之腹故
稱鬼芋焉芋有四異初生不藉根苗葉上朝露著
地即成種子一異也採製不令婦人雞狗見之見
即化水二異也磨時煮時七須順旋逆之即化水
三異也一芋之成由一而四四而十六十六而六
十有四如卦象之數四異也聞廬山衡嶽各有鬼
芋採製又不同

野毛豆

野毛豆生園隙中蔓生枝細弱葉細尖兩兩排枝
本草綱目拾遺 卷八 鬼芋 野毛豆

七

對生清明後開淡紫細花結實如毛豆立夏後可
採初生苗絕似金鳳花花葉其莢似角蒿中有
子二圓如小菘豆小滿前後皆黑老便枯落矣。
生田塍間莖葉及莢較家者細小一名勞豆

沈氏效方性微寒平肝火治疴疾目疾。百草鏡
治黃白疸性能發汗。救生苦海治痘毒八九月
時田塍邊採連莖根用煨存性研單用其豆更妙
麻油和敷不問初起日久未潰已潰俱效

按通雅引焦弱侯曰野田小豆曰瞭音勞陳留耆
舊傳云赤眉以豎豆與桓牧隋末子通攻江都夏

侯端採登豆食之身之日野豆也魯刀切勞豆或
瞭登二字之訛也然考古今註登豆一名治豆葉
似葛而實長尺餘可蒸食一名登菽綱目鹿藿一
名登豆又名鹿豆即今野菜豆爾雅釋草藿鹿藿
注今鹿豆也唐書夏侯端傳擷登豆以食則似又
非野毛豆之屬今野毛豆亦名勞豆豈名同而物
異歟並書之以俟考

肝疔初起 百草鏡野毛豆鮮者七錢乾者五錢
雞疔一具同煮食煎服亦可

野蘿葡 地骷體 三生蘿葡

本草綱目拾遺 卷八 野蘿葡 地骷體

一名紫金皮又名巴壁虎。百草鏡云野菜菔苗
葉根形與家種者無二肉雖白而皮色帶黃為異
○王氏博濟方以乾菜菔為仙人骨俗又呼地骷
體

雁山志山蘿菔性寒狀如圃種者土人用治癰疽
搗汁服之渣塗亦可 庚戌子來臨安署內有廢圃
此名同 多商陸土人呼為山蘿菔與
物異

治肺癰 百草鏡以七枚搗汁服

地骷體

按地骷體乃刈菜菔時偶遺未盡者根入地瘦而

無肉老而多筋如骷體然故名能大通肺氣解煤
炭熏人毒非乾菜菔也王禹中所言尚未明晰
痞塊 醫宗彙編陳年木瓜 一個 地骷體 即蘿菔
四個 種枯根 煎汁時常服一小盞數日除根氣痞食痞俱
治

萬應丹 海昌方治黃疸變為臃脹氣喘翻胃胸
膈飽悶中脘疼痛并小兒疳疾結熱噤口痢疾結
胸傷寒傷力黃腫并脫力黃各症用人中白以路
天不見糞者方佳火煨醋淬七次一兩神麩白葡
子地骷體即土中蘿菔各五錢砂仁二錢以上俱

本草綱目拾遺 卷八 地骷體 三生蘿菔

炒陳香圓一個其為末蜜丸桐子大每服三五七
丸或燈草湯下或酒下

三生蘿菔

此乃人工製造者唐正聲傳此法云得自秘授取
水蘿菔一枚周圍鑽七孔入巴豆七粒入土種之
待其結子取子又種待蘿菔成仍鑽七孔入巴豆
七粒再種如此三次至第四次將開花時連根拔
起陰乾收貯罐內遇鼓脹者取一枚搥碎煎湯服
之極重者二枚立愈

南瓜蒂 種附

綱目南瓜主治止言補中益氣而已至其子食之
脫髮今人以爲蔬多食反壅氣滯膈昔人皆未知
也吳秀峯言凡瓜熟皆蒂落惟南瓜其蒂堅牢不
可脫昔人曾用以入保胎藥中大妙蓋東方甲乙
木屬肝生氣也其味酸胎必藉肝血滋養胎欲墮
則腹酸肝氣離也南瓜色黃味甘中央脾土之精
能生肝氣益肝血故保胎有效
神妙湯保胎用黃牛鼻一條煨灰存性南瓜蒂一
兩煎湯服永不墮

本草綱目拾遺 卷八 茄瓜類 南瓜 辣茄

油調塗立效

南瓜穰

治湯火傷慈航活人書伏月收老南瓜穰連子裝
入瓶內愈久愈佳凡遇湯火傷者以此敷之卽定
疼如神

辣茄

人家園圃多種之深秋山人挑入市貨賣取以熬
辣醬及洗凍瘡用之所用甚廣而綱目不載其功
用陳旻堯食物宜忌云食茱萸卽辣茄陳者良其
種類大小方圓黃紅不一惟一種尖長名象牙辣

茄入藥用○又一種木本者名番薯范咸臺灣府
志番薯木本種自荷蘭開花白瓣綠實尖長熟時
朱紅奪目中有子辛辣番人帶殼啖之內地名番
椒更有一種結實圓而微尖似柰種出咬嚼吧內
地所無也○藥檢云辣茄一名臘茄臘月熟故名
亦入食料苗葉似茄葉而小莖高尺許至夏乃花
白色五出倒垂如茄花結實青色其實有如柿形
如秤錘形有小如豆者有大如橘者有仰生於頂
者有倒垂葉下者種種不一入藥惟取細長如象
牙又如人指者作食料皆可用

本草綱目拾遺 卷八 辣茄

食物宜忌云性辛苦大熱温中下氣散寒除溼開
鬱去痰消食殺蟲解毒治嘔逆療噎膈止瀉痢祛
腳氣食之走風動火病目發瘡痔凡血虛有火者
忌服○藥檢云味辛性大熱入口卽辣舌能祛風
行血散寒解鬱導滯止瀉瀉擦癬
百草鏡薰壁蝨洗凍瘡浴冷疥瀉大腸經寒滯
外痔 百草鏡以象牙辣茄紅熟者剉細甜醬拌
食
毒蛇傷 百草鏡用辣茄生嚼十一二枚卽消腫
定痛傷處起小泡出黃水而愈食此味反甘而不

辣或嚼爛敷傷口亦消腫定痛

祛臭蟲方 經驗廣集用羊骨頭一個秦椒半觔

共入火盆內同錫木屑燒之門窗閉緊勿令出烟

其蟲自死敏按木屑用樟木者佳

凍瘡 蔡雲白方剝辣茄皮貼上即愈

痢積水瀉 醫宗彙編辣茄一個為衣清晨熱豆

腐皮裹吞下即愈

敏按花鏡番椒一名海瘋藤俗呼辣茄本高一二

尺叢生白花秋來結子儼如禿筆頭倒垂初綠後

朱紅懸掛可觀其味最辣人多採用研極細冬月

本草綱目拾遺 卷八 辣茄

以代胡椒蓋其性熱而散能入心脾二經亦能祛

水溼癸亥子在臨安有小僕於暑月食冷水卧陰

地至秋瘡發百藥罔效延至初冬偶食辣醬頗適

口每食需此又用以煎粥食未幾瘡自愈良由胸

膈積水變為冷痰得辛以散之故如湯沃雪耳又

名秦椒李成裕遠載秦椒一名番椒形如馬乳色

似珊瑚非本草秦地之花椒即中土辣茄也

龍柏藥性考秦地乃草本辣椒綱目諸註誤為秦

地花椒不知即今之辣茄又名辣虎性熱味辣温

中散寒除風發汗去冷癖行痰逐溼多食眩旋動

火故也久食發痔令人齒痛咽腫

刀豆根 穀附

綱目穀部刀豆條發明下註刀豆本草失載惟近

時小書載其煖而補元陽近有人燒其子存性白

湯調服止呃逆有效故瀕湖特為增入而不知其

用甚廣今悉補之

治頭風 集聽云刀豆根乃治頭風之神藥每用

須五錢酒煎服

治鼻淵 年希堯集驗方老刀豆文火焙乾為末

酒服三錢重不過三服即愈

本草綱目拾遺 卷八 刀豆根 穀

殼 治腰痛萬氏家抄用刀豆殼化灰好酒調服

外以皂角燒烟薰之

牙根臭爛 洪氏一盤珠刀豆殼燒灰加水片擦

涎出即安

治久痢 種福堂方用刀豆莢飯上蒸熟洋糖蘸

食一二日即愈

治婦女經閉腹脇脹痛欲死并消血痞 經驗廣

集陳年刀豆殼焙燥為末好酒服一錢加麝香五

釐亦妙

喉解 張氏必效方刀豆殼燒灰以二三釐吹之

立效

楊梅瘡 萬氏濟世方當歸川芎苡仁木通木瓜
生地熟地金銀花防已防風荆芥黃柏白芷知母
甘草皂莢猪苓去皮各二兩人參二錢山紅花刀
豆殼各五錢硬飯團二兩水煎一鍋濃汁不拘時
當茶服忌魚腥生冷四劑全愈

地腎

粵志羅浮多地腎一名松黃且松黃未落為松實
已落而英華未散為地腎其狀若彈丸大者如雞
卵紅黃相錯一一晶瑩熟之可入饌其生無根蒂

本草綱目拾遺

卷八

地腎

葛乳

散布松下土鬆石潤處有之或亦松蕈之類也乍

浦九山補志松花蕈山之有松者皆產惟陳山東

麓為多三月間松花入土至四五月經雨後即生

至八九月又生鮮肥滑嫩素品之上味也
味甘性平生津消痰治洩瀉不禁

葛乳

一名葛花菜名山皆有亦產高州粵志高州多種
葛雷州人市之為絺綌秋霜時有葛乳涌生地上
如芝如菌赤色味甘脆微苦乃葛之精華也亦曰
葛蕈瀕湖僅據太和山志載其醒酒與酒積成疾

他皆未及故特補之

性涼解肌熱散風火及陽明風熱癩疹

鮮草果

粵志人多種之為香料即杜若非藥中草果也其
苗似縮砂三月開花作穗色白微紅五六月結子
其根勝於葉

味辛溫能除瘴氣久服益精明目令人不忘

真珠菜

六安有真珠菜如真珠。益部方物畧記真珠菜
戎瀘等州有之生水中石上翠縷纖蔓首貫珠蜀

本草綱目拾遺

卷八

鮮草果

真珠菜

鷓鴣菜

真

人以蜜熬食之或以醯煮可致千里不壞。黃山

志真珠菜藤本蔓生暮春發芽每芽端綴一二莖
圓白如珠葉翠綠如茶連莖葉脂之香甘鮮滑他
蔬讓美

利水通淋結消腹脹下氣癢閉

鷓鴣菜

連江志生海石上色微黑。漳州府志鷓鴣菜散
碎花微黑出漳浦

療小兒腹中蟲積食之即下如神

葛仙米

生湖廣沿溪山穴中石上遇大雨衝開穴口此米隨流而出土人撈取初取時如小鮮木耳紫綠色以醋拌之肥脆可食土名天仙菜乾則名天仙米亦名葛仙米以水浸之與肉同煮作木耳味大約山洞內石髓滴石所成性寒不宜多食四川亦有之必遇水衝乃得歲不常有他如深山背陰處大雨後石上亦間生然形質甚薄見日即化或乾如紙不可食矣。梧州府志葛仙米出北流縣勾漏洞石上為水所漬而成石耳類也采得曝乾仍漬以水如米狀以酒泛之清爽襲人此原非穀屬而本草綱目拾遺卷八 葛仙米名為米傳云晉葛洪隱此之類采以為食故名。嶺南雜記韶州仁化縣丹霞山產仙米偏地所生粒如粟而色綠煮熟大如米其味清腴大抵南方深山中皆有之。宦遊筆記出粵東葛仙洞外有流泉噴薄石上遂生苔菌之類其狀如米粒青色莖以為美味極鮮美土人呼為葛仙米有未識者疑是青螺按韶州府志丹霞出仙米頗與此相類但一生沙土一生水石為異耳。陸祚蕃粵西偶記道書寶圭洞天即今北流縣勾漏山洞口前後產葛仙米采而乾之粒圓如黍揉麵釀酒極芳香

性寒味甘爽解熱清腸利腸胃

按葛仙米本屬石耳之類憶庚子歲曾於劉明府席間食之時以為羹饌如青螺狀翠碧可愛味極甘鮮滑脆適口入蔬為宜藥性考云清神解熱痰火能療或云久服延年益亦能清臟熱者

黃矮菜

一名黃芽菜咸信臨安志冬間取巨菜覆以草積久而去其腐葉黃白鮮豔故名黃芽萬歷杭州府志杭人訛為黃雜菜戒庵慢筆黃矮菜杭州呼為花交菜。羣芳譜燕京園人以馬糞入窖壅培茲

本草綱目拾遺

卷八

葛仙米 黃矮菜

庄六

菜令不見風日長生苗葉皆嫩黃色脆美無滓謂之黃芽菜乃白菜別種莖葉皆扁

甘溫無毒利腸胃除胸煩解酒渴利大小便和中止嗽冬汁尤佳。食物宜忌味甘性溫滑利竅。陳堯士云補虛羸

按黃矮菜有南北二種南產者惟杭城太平門外沙地產者為最他處悉高大粗鬆絕無捲心密菜味亦較遜北產種艘帶來者味更美質更細且無粗筋有重至十餘筋一顆者南中亦不易得也陳確齋云食之潤肌膚利五臟且能降氣清音聲惟

性滑洩患痢人勿服

白茄

汪連仕方一名玉盤茄有大小二種大者如雞卵小者如指頭初生色白老則皮黃能入骨追風治一切癱瘓根名白風藤合酒蒸服茄實蘸硫黃擦白點風除大麻風東粵茄園產者良名茄丸
葉 治腸紅大便下血劉羽儀驗方用白茄子葉經霜方採刷淨毛去焦黃葉陰乾取三四葉煎濃湯如此吃三四次其血即止永不復發此方曾經邪犬咬過之人勿服

本草綱目拾遺

卷八

白茄葉 茄

七五

茄蒂 治發背及一切毒癰初起味水軒雜記用白茄蒂七個生首烏等分酒煎服即消

天茄

出廣中如大姆指其形如茄而有稜黑色堅如石擊之不得碎其蒂黃黑如醬色一種牽牛花嫩子蘇人采為蜜餞入食品者亦名天茄大能破氣與此迥別

胃脘痛 救生苦海水磨服之每服一枚見效

蠍毒 五雜俎關中有天茄可治蠍毒

牛心茄子

產瓊州一核者入口立死兩核者可以糞清解之入外科膏藥用麻藥用此藥只可外敷不宜內服

緬茄

高濂珍異藥品云緬茄一作馮茄形如大栗上有單帽如畫皮樣出滇南緬甸地方堅如石。滇畧緬茄枝葉皆類家茄結實似荔枝核而有蒂土人雕刻其上而繫之拭眼去翳亦解瘡毒。滇南雜記緬茄出緬甸大而色紫蒂圓整蠟色者佳。粵志廣東高州府出木茄上有方蒂拭眼去昏瘴即緬茄也

本草綱目拾遺

卷八

牛心茄子 緬茄

七五

水磨塗治牙疼抹眼睡去火毒又能解百藥毒

治疔瘡走黃 良朋彙集此方出寶坻張相公百發百中真神效方凡疔瘡走黃毒攻入內不知人事但有氣者可救用緬茄一枚以磁碗盛黃酒將茄放碗內磨得下磨不下只管於酒內磨一鍾約

熱茶時將酒裝入長頸錫壺內再入連鬚葱二根

牙咬不令斷白豇豆七粒如蕎麥開花時加蕎麥

七粒別時不用又用小麥令衆人口嚼成麵筋封

固壺口放水鍋內煮一炷香取出熱服出汗即愈

醬茄

醬茄

醬茄

此卽人家醬中食茄入藥宜陳年者佳

治耳癢出膿 妙藥方醬茄擠汁滴之

治牙疼 周氏家寶方醬茄燒灰存性爲末掩患處

處

腹內驚癢 壽域方陳年醬茄燒存性入麝香輕粉少許脂調貼之

糟茄

糟茄

山海草兩燒灰存性治鷺口疔

玉瓜

卽廣昌土瓜出江西常中丞宦遊筆記廣昌土瓜

本草綱目拾遺

卷八

醬茄 糟茄 玉瓜

全

本草不載形甚拙圓者如瓠或磊砢如贅疣無瓣

無瓢長沙土中外汗內潔細肌密理剖之白如水

玉入口清甘無滓消煩釋滯或熟食之亦佳殆瓜

中異品也其性蔓生春種而秋成冬初始入市無

種春深後切瓜連皮成小塊用沙土覆於室內久

之芽生於是就沙地爲窖令深而寬藉以茅欲其

中通而根可旁達既長密葉蔓生纍纍挿竹引之

上行培以雞糞乃繁碩土人又名玉瓜抱朴子云

五原蔡謫入山而還語家人口予至崑崙得玉瓜

以玉瓜井水洗之乃軟可食是豈其遺種耶江西

他縣亦有產者然小而渣多惟廣昌附郭五里內

爲佳予食於元宵後喜其味美至郡覓之東風送

暖瓜卽不可留矣

味甘性平調中益氣舒鬱化滯消食清大小腸火

生津滋血和營衛熱食補脾健胃

節瓜

粵草志節瓜乃冬瓜中一種小者白皮蔓地生一

節生一瓜得水氣最多故解暑毒

止渴生津驅暑健脾利大小腸

穿腸瓜

本草綱目拾遺

卷八

玉瓜 節瓜 穿腸瓜

全

吉雲旅鈔穿腸瓜乃大便解出甜瓜子生苗結實

土人名糞甜瓜不拘大小皆可入藥採來曬乾新

瓦焙焦爲末乳鉢研極細攤地上出火毒收貯聽

用但此瓜不易有須以人力製造其法將爛熟甜

瓜與七八歲小兒空心帶子食之令其勿嚼碎子

次日解出大便秘子裏糞內帶糞曝乾時早卽於本

年下出倘時晚不及生瓜花亦可用否則藏於次

年下種更好大人便出者子亦可種此瓜生在夏

秋若春冬要用必須預備

治痔漏 吉雲旅鈔有秘授消痔神方不論遠年

一書中... 升... 廣東... 廣東... 廣東...

近日痔漏三服除根用穿腸瓜焙存性爲末每末一兩加蟬退末三錢五分以金銀花五錢浸酒一二日煎數滾調藥末每服二錢七分空心金銀花酒下外以白海南花並根葉煎湯不時先熏後洗三日卽愈海南花春冬無鮮者預收陰乾備用蓋痔漏乃大腸鬱火臟腑積熱發而爲腫爲痛爲瘡久而成管今用此藥以散火消毒去積除壅其管自退不問新久屢試屢驗忌房事惱怒煎炒辛辣熱物並發氣之類百日永不再發此方傳自西洋僧有洋客患痔漏痛甚不能上海船其僧出此藥本草綱目拾遺卷八穿腸瓜天骷髏鬼骷髏全

與服三日卽愈求其方送洋布十疋黃金五兩始得此方用無不效

天骷髏
此乃鄉野村中桑樹及屋籬上所掛霜打絲瓜也其子名烏牛子

治婦人白帶血淋臃脹積聚一切筋骨疼痛並宜服之汪連仕方
鬼骷髏
汪連仕云乃殘老之向日葵其子性烈通氣透膿合麝香急性子搗爛爲膏貼臍能落胎

敏按冬日桃園中有樹上乾枯殘桃亦名鬼骷髏與此名同物異

白鼓釘

官遊筆記口外白鼓釘卽內地蒲公英葉有锯齿婆娑鋪地與內地生者迥殊內地者花早開單瓣生沙漠者花開於夏至前宛似黃菊一望燦然滿地其莖瓣重疊顏色嬌媚暮春草甫萌芽口外啖此味用之不竭不啻春韭秋菘也採食之清火亦爲通淋妙品其莖中折斷有白汁諸蟲盛夏孕育人手觸之成疾百藥難效取汁厚塗卽愈鄭方升本草綱目拾遺卷八鬼骷髏白鼓釘三寶薑全

云一莖兩花高尺餘者掘下數尺根大如拳旁有人形拱抱搗汁酒服治噎膈如神按上所載皆綱目未及言者且口外所產又與內地異綱目蒲公英入柔滑類歸草部今沙漠所產人以作菜茹故入菜部亦各從其類也

清火毒鬱熱通乳通淋消腫治膈噎瘵一切毒蟲蛇傷

三寶薑

香祖筆記產臺灣鳳山縣相傳明初三寶太監所植治百病有效

薑

滇程記產雲南百夷中餌一刀圭終其世斷絕人道土人以飼牡馬不之宜也

川薑

出川中屈曲如枯枝味最辛辣絕不類薑形亦可入食料用。包汝楫南中紀聞云扶叢鄉人攜木薑土茶餉余受其木薑作羹味如茱萸醬即此物也

味辛性熱治胃寒散冷積寒滯痰氣

沙葱

本草綱目拾遺

卷八

鱗鱗 川薑 沙葱

全五

西北遊記口外沙石中生野葱一名楞葱一名沙葱石楞中所產故名楞沙石中所產故名沙其葉與家葱同大更過之味辣於家葱根絕似蒜頭大更過之味亦辣於蒜善食辣辛者不能罄一枚雖細如草莖攢生於沙磧甚密醃之調羹勝於韭雉羹兔羹尤宜又有沙葱草與沙葱相似人食之心迷亂馬食之腹隱痛惟宜於橐駝採者折以辨之沙葱本脆折易斷此草柔韌難折入藥取根。西域聞見錄不雅斯類野蒜頭大如雞子葉如葱而不中空味辛甘肅人呼為沙葱回人嗜之

寬中下氣消食解肌活血發汗表風寒滌宿滯

風葱

臺志出臺灣 療風疾

番蒜

徐昆柳崖外編番蒜出臺灣番地外形似木瓜中似柿有浮山張氏宜於閩一婢食鱉肉後誤食竟遂病面黃腹脹破欲死者數矣半載後有饋番蒜者婢偶食之遂大瀉有物如小鱉者數十少頃爽然疾若失方知番蒜可治鱉毒也

治鱉痕解食毒水毒

本草綱目拾遺

卷八

風葱 番蒜 蒜梗

全六

蒜梗

此大蒜近瓣處中心短梗也乾者入藥用

治瘡成管 年希堯集驗方用大蒜梗燒灰存性

搽患處其管自消

坐板瘡 黃氏醫方用蒜梗燒灰為末先洗淨去

膿將藥末搽上

洗漏立驗 良朋彙集云夏應遴試效過防風荆

芥地骨皮川椒蘄艾瓦松各五錢槐條一兩陳蒜

梗二兩共入麻布袋內熬滾熱盪止疼神效

瘰疬瘡 救生苦海蒜梗陰乾以火盆置微火將

梗投入移火盆於木桶中令患者坐熏之四圍以衣被塞緊勿走洩烟三次自愈

凍瘡 種福堂方大蒜煎湯洗之

刺兒菜

西北遊記即內地之紫花地丁俗呼刺兒菜葉如柳有刺毛夏開紫花生平地者起莖生溝壑者起蔓內地有之生口外沙漠者花開於夏至後大如蒜頭色紫可愛人多採食之暮春萌芽之際挖其根狀如大枝人參色較微白巨者如蘆菔煎調適口誠塞外鮮品然乾其根帶回內地入藥其

本草綱目拾遺 卷八 刺兒菜 波斯菜 乾冬菜

清火之功勝於金銀花解毒之用更捷於山茨菇

一物而兼二物之用如此

清火疎風豁痰解一切疔瘡癰疽腫毒如神

波斯菜

即今紅菜一名洋菜汪連仕云生長海陽者佳根

本紅艷色鮮麗

止血治刑杖瘀血攻心搗汁沖酒服即散可理跌

打

乾冬菜 陳冬菜 菜油 糞金子 陳芥

冬菜乃白菜流俗小雪前後居人率市白菜以鹽

醃之作蓋藏為禦冬及春時所食名曰冬菜頗利膈下氣其滷汁煮豆及豆腐食能清火益肺誠食中佳品也至春分後天漸暖菜亦漸變黑色味苦不堪食以之曬作乾飯鍋上蒸黑再曬再蒸如此數次乃曝之極燥貯缶器中可久藏不壞名曰徽乾菜即乾冬菜也年久者出之頗香烈開胃噤口痢及產蓐以之下粥大有補益蓋白菜本能和中下氣利三焦通二便含土德之精有生金之用乾之則苦返其初而從母化也久蒸久曬則味反甘全其德故有中和之運功與參耆等惜乎世多忽

本草綱目拾遺 卷八 乾冬菜

而不知余故特為表之瀕湖綱目菘下無乾菜之用殊為缺畧近日篋橋人所市者乃蘿蔔英所乾與芥菜乾蒸曬成者皆不入藥須人家冬白菜醃作蒸曬年久者為佳○羣芳譜有造黑醃法用白菜如法醃透取出挂於桁上曬極乾上甑蒸熟再曬乾收之極耐久藏夏月以此醃和肉炒可以久留不臭即今乾冬菜也

開胃下氣益血生津補虛勞已痰嗽年久者泡湯飲治聲音不出和酒搗爛塗湯火傷
白火丹 黃氏傳方此症形如水脹肢體俱腫皮

膚色白飽脹不食畏見燈火用冬菜勿落水陰乾
陳三年者可用愈陳愈妙煎湯洗浴并煎服之立
消如神

陳冬菜滷汁

清肺火痰嗽解咽喉腫毒

物理小識鹽乾菜水滴蜈蚣即
死以鹽菜炒雞蜈蚣亦不食

陳芥菜滷汁

味鹹性涼治肺癰喘脹用陳久色如泉水緩呷之
下痰清熱定嗽真能起死回生○作法以芥滷貯
甕中埋行人處三五年取用

本草綱目拾遺

卷八 陳冬菜滷 陳芥菜滷 糞金子 八十九

糞金子

凡油白菜收子作種者其中心老根內必有一子
枯時搖之有聲剖出名糞金子以其得糞力而花
實幹中子又得菜之生氣大能益人曰金子重之
也田種者其子更佳○王聖俞云糞金子在收菜
種子時其中幹內剖出形如鼠糞而黑色如麥粒
大小千百幹中不過數十粒蓋有生不生之別不
能每幹皆產也

治血症取三錢炒研白湯調服立愈

治慢驚神效 王聖俞

麒麟菜

出海濱石上亦如瑤枝菜之類瓊州府海濱亦產
周海山 燈 琉璃國志載雞腳菜麒麟菜皆生海邊
沙地上又名鹿角菜今人蔬食中多用之煮食亦
酥脆又可煮化為膏切片食綱目鹿角菜云甘大
寒滑陳芝山食物宜忌云微鹹性平大有消痰功
用瀕湖反引孟詵一說以為有微毒不可久食能
發痲疾且其主治止載下食風氣小兒骨蒸治丹
石熱結解麵毒何味其功用乃爾耶茲特表之○
朱排山柑園小識石花菜生海中沙石間高二三

本草綱目拾遺

卷八 麒麟菜 九十九

寸狀如珊瑚有紅白二種洗去沙土煮化凝成膏
糟醬俱佳又有細如牛毛者呼牛毛石花味稍劣
郭璞海賦所謂土肉石華是也
味鹹性平消痰如神能化一切痰結痞積痔毒○
敏按盛京志龍鬚菜生於東南海邊石上叢生狀
如柳根長者至尺餘白色以醋浸食亦佳蔬也土
人呼為麒麟菜出金州海邊鹿角菜生東南海中
大如鐵線分了如鹿角紫黃色乾之為海錯水洗
醋拌則如新味今金州海邊有之據志則似一類
二種也

石花膏 毛世洪養生集治辛苦勞碌之人或嗜酒多慾忽生外痔發作疼痛步履艱移服此或大便瀉一遍或不瀉亦即止痛可以行走再用搽洗等藥自能斷根用麒麟菜洗去灰一兩用天泉水煮烱和白糖五錢食之此方乃李治運臬司傳靈隱寺僧杭人蕭成子患此症僧往候授以此方服之隨愈予記之後治數人多效

諸笋 乾笋

綱目竹入苞木類以笋附菜部所載亦止苦竹筍竹淡竹冬竹諸笋且於義類多未詳盡不知春冬本草綱目拾遺 卷八 諸笋

所出性皆各別鮮乾諸品味亦迥殊則入經絡主治目不能合一陳芝山食品真一笋譜及食纂所載較詳頗近時尙即取以補之

春笋 笋譜其佳者曰猪蹄紅冬月即生理頭土中以鋤掘之可三寸許其味極鮮甲於他笋未出土名猪蹄紅若長尺許則其籜圓故人名圓笋亦名蚤笋蓋冠諸笋而先出者

味甘性微寒下氣養血利膈消痰化熱爽胃解渴利水療風邪止喘嗽

毛笋 即茅竹笋笋之大者笋譜毛笋爲諸笋之

王其籜有毛故名俗呼爲猫笋者非也大者重幾二十餘觔猶未出土肉白如霜墮地即碎以指搯之其軟嫩如腐嗅之作蘭花香毛笋大者清明後方有其出於臘月及正月者形短小籜亦有毛土人名猫兒頭食之多嗜心然消痰之力較勝他笋味甘性平利九竅通血脉化痰涎消食脹多食令人易饑

鞭笋 即發於竹邊者夏秋有之其生於四月者曰梅邊蓋感梅雨濕蒸之氣而生頗早味淡肉硬不如秋生者笋譜邊笋即毛笋之旁出者方笋盛本草綱目拾遺 卷八 諸笋

時生氣上升笋皆豎生氣既衰根即橫生盡其力可橫亘十餘丈至地之邊際與竹之長短相稱謂之竹邊故名邊笋其狀類鞭亦名鞭笋地肥者軟嫩長尺許其籜紫色而兼白其味恬淡而鮮其氣醇而有蘊藉不類毛笋之精英盡發洩於外也味甘性寒開胃利腸消痰渴

冬笋 即潭笋沈雲將食纂猫竹冬生笋不出土者名冬笋又名潭笋

味甘溫 陳芝山宜忌 利九竅通血脉治吐血衄血及產後心腹痛一切血症食之肥白人 食消痰滑

腸透毒解醒發痘疹中諸笋毒者生薑麻油解小兒及脾虛者多食難化食物宜忌痘疹不出採未出土

冬笋煮粥食即有生發之意不藥良方

青笋 卽青竹笋竹細小故出笋色青山間遍地

有之係野竹所生笋也卽時下俗呼水竹者是也

胡承謀湖州府志天目出笋乾其色綠聞其煮法旋湯使急轉下笋再不犯器卽綠矣

味甘止肺痰吐血鼻衄治五痔并妊娠食禁

青笋乾 卽青竹笋鹽湯煮曬乾者出杭臨安天

目者最佳色如鸚哥綠有尖上尖毬子二尖等名

味鹹甘性平爽胃消痰

本草綱目拾遺 卷八 諸笋

鹽笋乾 以春笋鹽湯煮曬而成有泥黃烏尖直

脚等名

味鹹甘性平行氣清痰

衛笋乾 以笋用鹽湯煮熟熏乾而成

味鹹甘性平利膈化痰

羊尾笋乾 主治同

處笋片 俗名素火腿以毛笋微醃湯煮熏乾而

成

味甘微鹹性平利血消痰

菘笋片 卽玉版笋以毛笋淡煮曬乾者浙閩江

西多有有草鞋底蝴蝶尖玉版等名湖州府志菘笋大者謂之潤絲有名滬裏黃者尤美

味甘性平治實喘消痰張石頑云乾笋淡片利水

豁痰水腫葶藶丸用之

紅海粉

蟲語海珠生嶺南狀如蛞蝓大如臂所茹海菜於

海濱淺水吐絲是爲海粉鮮時或紅或綠隨海菜

之色而成或曬晾不得法則黃有五色者可治痰

或曰此物名海珠母如墨魚大三四寸海人冬養

於家春種之瀨湖田中遍插竹枝其母上竹枝吐

本草綱目拾遺 卷八 諸笋 紅海粉

出是爲海粉乘濕舒展之始木成結以點羹湯佳

治赤痢風痰

疳積壞眼 慈航活人書穀精草小青草俱炒青

黛水飛海粉刺莖藜使君子肉各一兩爲末早用

羊肝七片拌藥三錢蒸熟食

本草綱目拾遺器用部目錄

番打馬 老材香 縛木藤

敗琉璃浮子 油胭脂 木套皮

火漆 七氣罌口 紅羯白褐

舊布 舊帽沿 綿珠

紅絨 棉紗 舊頭繩

北雁砂 烏金紙皮金紙 舊繖紙

包烟紙 粗草紙廁草紙 酒罈上紙

燒酒草 古瓦 青龍背

絹篩籬 陳年竹燈蓋 銅燈盞青

本草綱目拾遺

卷九目錄

料絲 烏龍翅 船蓬箬

洋船璞 檣種 漆盤上漆

油木梳 衣帶 刀鞘

舊竹筍 草鞋鼻上布 織機上草辮

肉臺上屑 盛米栲栳爛籬底 砂壺

靈鶴盞 花簪 小兒破鞋

夏布舊蚊帳 廁上椽木尿板 白秋霜

本草綱目拾遺禽部目錄

燕窩素燕窩 石燕 蝙蝠腦

石鋪 鷓鴣涎蛋 翠鳥舌

白鷓鴣 鬱雞 鶻雞

雪雞 洋鴨 烏鴉膽

鷲毛屎 腿骨 雁 喉管 蛋殼 鷹吐毛鷹條

雄雞卵

本草綱目拾遺

卷九目錄

本草綱目拾遺獸部目錄

獅子油血 象糞象尾毛 犴血

醉虎油脂 鹿胎乳餅 猴經

犬豕胎糞 獺油 海狗油

狐麝 獺糞 狼脂

山羊血油糞 石羊膽 山狸

犀皮 貂尾 七葛

香鼠 鼠血 猫尿胎髮尾血

浙驢皮膠 霞天膏 羊哀

蘭薰家鄉肉 雄猪眼肉 猪頂上肉 製火法

本草綱目拾遺 卷九 目錄

本草綱目拾遺卷九

錢塘趙學敏恕軒氏輯

器用部

番打馬

形長尺許內藏油膏外裹椶皮可代火把又可鞭馬番舶上來哈喇叭出。方輿勝覽做打麻乃樹脂結成夜點有光塗舟水不能入華夷考曰做打麻乃樹脂流落膠汁土內掘出如松香瀝青狀內有明淨好者都似金珀一般出滿刺加國性專殺蟲不可服有毒入外科瘡瘍膏用

本草綱目拾遺 卷九 番打馬

治陰癬救生苦海用番打馬和鉛水銀雄硫樟腦各等分猪油和搽效。癩疥膿瘡積善堂良方麻黃膏中用之。疥瘡救生苦海番打馬三錢楓子肉五錢水銀杏仁蛇牀子各一錢川椒樟腦雄黃各二錢用紅燭蓋油共研勻擦之神效。治疥瘡應驗良方用全蝎乳香枯礬大楓子蛇牀子土木鱉川椒雄黃水銀番打馬輕粉樟腦為末用燭油為丸擦之即效此方番打馬作番答木 擦諸瘡并楊梅風毒經驗 濟世良方黃柏去皮一錢黃連去蘆一錢川大黃五分三味另研雄黃

膽礬銅青兒茶青黛輕粉枯礬各二分冰片一分
半另研入大楓子七個去殼去油人言壯人七釐
弱者五釐用番打馬卽番舶打火把之物另爲末
瘡毒盛而人壯健能食者每分五分毒盛而人弱
者每分用三分不健不弱之人每分用四分和入
前藥內研勻水銀壯健人每分用一兩中等人用
五錢弱極人用三錢不可多藥須研極細否則粒
粗恐傷皮肉右先將水銀一分并前藥末一分入
盞內加真芝麻油少許以指研開逐漸添油研至
不見水銀爲度大約如稀糊可矣於兩手兩足掌

本草綱目拾遺 卷九 番打馬

後動脈處週圍擦之每一分藥擦三日每日早晚
各擦一次每次以七八百擦爲止大率擦使熱透
則住擦時凡週身破傷處俱用無麝香膏藥貼之
每日一換不可經風避帳幔內冬月用煖床厚被
褥卽春夏秋暖時亦不可見風擦至七日必口吐
臭涎若口齒破爛出血者用黃蜂窩煎湯候冷漱
解勿嚥下輕則用花椒湯漱之擦處多皮破不可
畏痛而少擦忌魚腥生冷發風等物及醋茶醬一
個月尤忌房事其牛肉燒酒團魚之類忌二三年
若蕎麥麵與羊肉則終身忌之每次擦畢以藍布

本草綱目拾遺 卷九

尺許包裹所擦處此治楊梅風毒法也如楊梅瘡
初發者擦五六日全愈所用藥皆同惟水銀止用
四五錢足矣不必貼膏藥○久遠瘰癧應擦處如
有破爛可於脚手心擦之其藥料照中等者亦包
布貼膏如前○下疳及蛙幹重者亦照中等藥擦
治貼膏○喉內瘡癰潰爛不能進飲食者亦照前
用中等藥擦○遍身牛皮風癬作癢作痛出水者
亦照前用中等藥擦凡擦藥仍須內服煎藥兼之
煎藥方 防風荆芥銀花防己白芷連翹苡仁白
鮮皮桔梗川芎當歸赤芍生地黃連黃柏知母牛

本草綱目拾遺 卷九 番打馬

膝木通陳皮羌活獨活粉草梔子各等分加土茯苓
苓乾者四兩鮮者八兩水六碗煎至三碗分三次
一日早午晚服完自擦起之日服至七日發口止
虛人加人參二三錢
痔漏消管藥線 妙靈方用藥先用燈心試其深
淺頂至極痛處爲率以藥條如式送入漏口三日
後又試內根漸漸生肉條漸漸短用藥直至滿而
止玉簪花根白者佳焙乾四兩番打馬焙乾三兩
馬兜鈴炒乾二兩磁石三錢煨紅醋淬三次共研
極細末以麵打條或粗或細候瘡管用之通始化

九三

去始再插

廣瘡 仙遺拾珠用膽礬三錢皂礬石黃青黛各

二錢番打馬二錢硃砂五分爲末猪脂一塊搗勻

夏布包擦手足心候腹鳴卽止病自愈

膿窠瘡 慈航活人書斑毛三個麻黃二錢番打

馬三錢樟冰五錢臘猪油二兩先熬化次入斑毛

煎焦撈起再入麻黃煎焦撈起再加番打馬末同

樟冰調勻搗破瘡頭以藥點上立時結痂次日全

愈

老材香

本草綱目拾遺

卷九

香

老材香

四

山陝等省無漆民間棺殮俱用松香黃蠟塗於棺

內數十年後有遷葬者棺朽另易新棺其朽棺內

之香蠟名曰老材香土人用合金瘡藥按脂蠟乃

先天流液之精又得土以固其力藉血肉餘氣以

凝其神是一物合三才之用故入藥功效倍於他

草木也○藥性考北地古棺中松脂合金瘡藥止

血極效

治跌打損骨止金瘡血出生肌定疼神效盧氏仙

縛木藤

方金瘡鐵扇散中用之

綱目藤部有省藤卽紅藤集解云堪縛物主治止
言去風殺蟲無腦漏治法

治腦漏 急救方用縛木紅皮藤燒存性爲末每

用酒服三錢服後覺有一線從鼻至脊背而下股

其腦漏隨愈一人一年服一次效

腸癰 經驗廣集凡腸癰生於小肚角微腫而小

腹隱痛不止皮色不變是也紅藤一兩許好酒二

碗飲醉卧午後用紫花地丁一兩許亦以好酒煎

服後痛必漸止再服

敗琉璃

浮子

本草綱目拾遺

卷九

縛木藤

敗琉璃

五

係羊角所造有五色惟白者入藥佛前十餘年者

良去淨油垢新瓦煨研

退管漏湯火傷乳痛 急救方用琉璃片燒灰存

性食後酒服一錢卽消

救生苦海退一切管秘方手指甲炙黃研細象牙

剉末研細山甲炙黃研細乳香沒藥俱炙硃砂水

飛舊琉璃燈底佛前白者用三十年者佳如若難

得十餘年者亦可用打碎麩炒爲極細末各三錢

合勻再研用黃蠟四兩化和爲丸如椒大初服五

粒次服六粒每日加服一粒加至十四粒止其服

十日計服九十五粒至十一日每日減一粒至五粒仍舊逐日加上一粒加至十四粒又逐日遞減一粒如此週而復始或服至十四粒每從五粒服起更妙每日空心陳酒送下管漸褪出褪盡爲度如若未盡再從頭服起神效秘之秘之

內消痞管神方 陳直夫躬行錄載此方治痔管如神有一小兒從高墜下傷背脊骨月餘後生毒潰爛成漏蛔蟲從漏孔中出經云外癰透膜者死內癰透膜者死此症已屬不治直夫用此藥一料而愈亦奇方也凡諸般漏管皆可服不獨痔管耳

本草綱目拾遺

卷九

敗琉璃

琥珀燈心研末象牙屑焙血餘須自製蝟皮陰陽瓦台好泥封煨存性甬前芽茶舊琉璃底剪碎製法同蝟皮蟬退炒人指甲不拘手足俱可用瓦上焙脆爲末穿山甲炒脆當歸白茯苓猪懸蹄甲殼夾剪剪碎製同蝟皮蟬退瓦炙牛皮膠酒煮化和藥如不足加煉白蜜以上之藥各三兩小蜂房十個製同蝟皮火候更宜輕勿煨成灰蛇退十條剪碎瓦上炙烱自作汁將凝卽覆存性否則過性矣爲末同阿膠和搗搯丸每日早午晚服三錢滾水送下一料自愈已驗過數十人

痔潰成管 俞曉園鈔方尅蛇龜活者一個泥裏

擇朝南牆下背陰處煨烟盡爲度去泥用多年白

琉璃底一具琥珀象牙各三錢珍珠西黃冰片各

五分爲末摻之此藥亦可服每服九分

肺癰 傳信方陳年琉璃煨灰存性陳年油絮漆

匠店有煉成灰和勻酒服試驗神效

尿血 救生苦海用舊琉璃燈洗淨剪碎入磁罐

內泥封火煨以紅爲度待冷取出酒下三錢

輕粉結毒 救生苦海用舊琉璃燈燒存性研每

服二錢毒在上者川芎湯下毒在下者牛膝湯下

輕者十日重者一月全愈○濟世方用佛前照過

舊琉璃燒存性酒調下日一二次一月全愈

凡人火燒 取廟中琉璃浮子松樹厚皮做的燒

灰放地上上用碗覆蓋灰上存性研末用洪塘真

香油調敷

臘利瘡 百藥備遺用陳年佛前琉璃只取底用

瓦上煨存性爲末真麻油和搽

喉癰 選奇方用陳年琉璃煨爲末一錢加薄荷

末白礬砂各五分冰片少許和勻吹入立愈

敗毒散 不問新久腫毒癰疽發背疔瘡皆治家

寶方琉璃陳年破損者一個棟樹子四兩舊髮網巾一頂鳳凰衣四十九個三七一錢敗龜板炙五個共為末每服五分棟樹子湯下

男女癩瘡 家寶方先用白蘿蔔打爛貼瘡口上一日一換三日毒血去盡再用後藥松香一兩杏仁三十粒去皮尖油黃丹八錢輕粉五錢舊琉璃燈三錢火焙為末研細麻油調搽一日一換數次即愈

癩痺 雲谷醫鈔多年佛前舊琉璃焙存性麻油調搽癩痺即消

本草綱目拾遺 卷九 敗琉璃

散結核 石臨初結核論凡馬刀癩癧一切結核用破舊琉璃煨存性為末每服二錢取微汗此物乃羊角製成能療節中結氣佐以養血和榮清熱解毒之品標本並治乃佳。散結湯熟地當歸白芍川芎丹參丹皮柴胡桔梗元參白蘇各等分水煎沖琉璃末同服
頸上癩瘡 舊琉璃燈燒灰菜油調搽神效
長明酒 種福堂方治痔漏神效用積年舊琉璃燈洗淨油膩火煨研細以紅酒服四錢不過七日管自退去

治遍身漏 醫宗彙編云驗過良方用陳年琉璃底三錢人指甲麩皮炒一錢象牙末一錢辰砂一錢蟬退去土五分沒藥去油八分白礬八錢如漏在上身加川芎六分在下身加牛膝六分共為細末以黃蠟三兩溶化入前藥和勻衆手急丸如菉豆大初服七八丸每日加一丸至十六七丸止無灰好酒送下上身飽服下身饑服最忌雞及一切有葱之物

油胭脂

藥性考油胭脂平豕膏合就潤膚習裂活血點痘

本草綱目拾遺

卷九 敗琉璃

油胭脂

九

西北風高塗舒面皺不龜手藥古名非謬。一名碗兒胭脂用小錫碗盛故名色紅潤如膏。百草鏡製造油胭脂法紅花汁一杯白蠟二兩微火熔化攪勻傾於磁盤內待成薄餅用碾麵杖碾數百遍則膠粘如膏藥矣假者係胭脂腳所造不入藥治血解毒治痘疔塗蜂咬王氏準繩同珍珠末塗治痘瘡燕窩疔。救生苦海痘初起時預免壞眼用臨清濟甯好油胭脂點眼大皆。普濟方有四聖丹治小兒痘中疔或紫黑而大或黑壞而臭或中有黑線此痘十死八九惟牛都御史得秘傳此

方點之最妙用豌豆四十九粒燒存性頭髮灰三分真珠十四粒炒研爲末以油胭脂同杵成膏先以簪挑破唾去惡血以少許點之卽時變紅活也乳頭破裂 油胭脂蛤粉水飛敷之不用蛤粉亦可治疹子眼 眼科要覽用雞膽將油胭脂調勻塗上雖眼突出能好無雞膽用田雞膽代之亦可木套皮

古爲屐今名木套

治血風瘡 救生苦海用木套皮燒灰東丹礬各一錢爲末菜油和搽

本草綱目拾遺 卷九 油胭脂 木套皮 火漆

火漆乃造胭脂紫梗水以染脂胚所漉之渣滓也紫梗本名紫鉚出波斯真臘南番等處有小蟲如蟻緣樹枝造成正同造白蠟一般吾杭造胭脂者藉以染製然第用紫梗一味則色不能紅必須配以黃葉水同煎色始紅豔其所餘之渣則火漆也入藥只須研極細用之中有枝梗不受研者篩去物理小識火漆一名紫膠

治血崩 救生苦海火漆不拘多少入無油淨鍋內令化炒黃烟淨見白烟起退火取出研末空心

時好酒和服三錢重者不過三服腸風下血 不藥良方火漆三錢研細末以豆腐皮分包作三十包白滾水送下至重三服卽愈九種心痛 神方考用火漆一味燒灰存性每服一錢送下卽愈七氣罌餅

此乃人家屋簷脊上用壓鎮不祥者以七小罌橫疊相聚如七星狀外以灰泥粘覆入藥用年久者王子接絳雪園方罌小口瓶也七氣者日月風雨露霜雪也七罌人家多置古屋上廣漢前上層生

本草綱目拾遺 卷九 火漆 七氣罌餅

餅年深者良火土結成堅剛性利復藉天之七氣能透骨入髓理傷續絕入藥取純鋼剉生剉末研至無聲水飛用○慈惠編接骨七釐散中用朝天寶卽人家屋上瓦將軍前小瓶也愈久愈妙必要取其朝天之得精華者研末入藥用接骨丹 絳雪園方七氣罌口剉末水飛一錢占文錢有半兩五銖自秦漢鑄紅銅者佳唐時開元錢亦可用火煨醋淬七次研至如塵粉無聲爲妙用五分與罌末和勻每服七釐先用甜瓜子仁去殼三錢嚼爛吐出拌藥再服下清酒過口此方用

七氣罌口古文錢功專腐蝕壞肉陳藏器云能直入損處鐸人斷骨甜瓜子仁開腸胃之壅遏通筋骨之機關因丹藥釐數微甚助以入胃轉輸為丹藥之嚮導也

紅褐 白褐

紅褐乃毛布今名褐子西人多以牛羊毳雜織而成以茜草染則色紅

治疔瘡 醫便用紅褐燒灰存性五錢乾桃樹上乾者燒灰存性五錢爐甘石火煨黃色童便淬七次二錢五分共為細末臨搽入片腦少許其瘡先用椒葱湯洗淨再搽藥三次即愈

本草綱目拾遺

卷九

七氣罌

紅褐

十一

血崩 醫便六合散治血崩不止諸藥不效用此立止此急則治其標也杏仁皮燒存性香附童便浸三日炒黑舊紅褐子燒存性地膚子炒舊棕薦燒存性壯血餘燒存性蟹殼燒存性陳蓮蓬燒存性共為末每服三錢用酸漿草汁一鍾沖上熱酒一鍾空心熱服按此方初服反覺多以漸而少由紫色而紅以至於無即止既止之後用十全大補湯二十劑調補方斷根矣
走馬牙疔 祝氏效方黃蜆殼煨存性研末一錢

五分黃連忌鐵器為末五錢括蕞根瞻礬煨五穀蟲要尾全者佳瓦上煨存性紅褐煨存性以上各五錢為末加水片二分和勻先以米泔水漱口連吹數次即愈吹後仍用泔水漱口淨去

治臍血臍濕 救生苦海用紅褐燒灰油和敷或用裁衣店中百家碎五色布燒灰摻之

清香散 治癖疾生牙疔潰爛臭穢 萬病回春

用乳香沒藥孩兒茶輕粉炒象牙炒灰象牙焙黃

紅褐炒灰珍珠焙黃海巴焙乾各等分為細末搽

患處立時止痛生肌如神

本草綱目拾遺

卷九

紅褐

白褐

白布

十一

治小兒牙疔集驗方銅綠水飛雄黃水飛五倍子炒焦枯礬白褐燒存性烏梅肉炙乾細辛去葉蘆炒焦胡黃連炒焦共八味各等分用老茶葉葱根煎湯以雞翎洗去腐肉見鮮血然後用此藥搽上

醫布

粵山錄出新安南頭醫本芒蔴所治漁婦以其破敝者剪之為條縷之為緯以棉紗經之煮以石灰漂以溪水去其舊染薯蕷之色使瑩然雪白布成分為雙單雙者表裏有大小絮頭單者一面有之

絮頭以長者為貴摩挲久之歲縫然若西羶起絨
更好或染以薯蕷則其絲勁爽可為夏服不染則
柔以禦寒粵人甚貴之亦奇布也
小兒服之可辟邪魅

舊帽沿

治疔毒 外科正宗下疔用油透羅緞舊帽沿燒
灰杭粉瓦上煨黃色等分研極細先用紅棗十五
枚甘草三錢煎湯洗後

金瘡 集聽方用舊氈帽油口沿燒灰摻之愈

綿珠

本草綱目拾遺

卷九

醫部 雜考 綿珠 紅絨

十五

綿有木綿絲綿二種惟絲綿製服則有珠新製衣
每每有絲珠透出衣外周履靖羣物奇制云伏中
裝綿布衣無綿珠秋冬則有以燈草少許置綿上
則無珠也入藥用舊衣內綿珠取其襲人氣既久
其新衣透出衣外綿珠無用也

治蝎虎咬香油調塗神驗

紅絨

治秤勾瘡此症小兒月內糞門上忽有瘡孔即此
症也救生苦海用紅絨燒灰二錢珍珠五分輕粉
五分兒茶二錢血竭一錢乳香一錢為末乾摻

棉紗

養素園方此乃草綿花所紡線也吳松人以之織
布名曰棉紗本色者白或染藍靛作青色為婦人
縫紉之用古用木棉今用草棉綱目服器部有綿
乃絲綿故從絲

性平能透斑疹 傳信方風疹斑瘡出不透快用
白棉紗二兩檉柳一兩共煎湯浴之避風頃刻透
發無檉柳以櫻桃核代之亦可煎服

藍棉紗 此乃經靛染者煎湯解毒與藍汁同功

舊頭繩

本草綱目拾遺

卷九

棉紗 舊頭繩 北雁砂

十五

百草鏡俗名紫根乃婦人以之紫髮入藥取油透
棄去者良綱目有巾及繳腳布而無此

治紅絲疔蛇傷紫束肉上能令毒氣不透

小兒一切頭瘡 秦中用云燒灰油塗立愈

治難產 經驗廣集用婦人舊頭繩一條燒灰加
人參一兩煎服不論橫生逆生服之順流而下矣
神奇不可思議

北雁砂

出關東菜豆色如玳瑁顆粒擲碗中有響聲者真明
目

治一切眼病 洪清遠方用明目砂五分用針刺入紅者佳北雁砂三錢再用羊肝一具連膽不落水刺開數路不要割開將二味砂為末入肝內以無灰酒二觔蒸熟煎刺二碗空心一服晚飯後一服以盡量為度羊肝配之一服完不論眼病內障外障黑暗不明無不神效

烏金紙 皮金紙

江浙造紙處多有兩面黝黑如漆光滑脆薄不中書畫惟市舖用以裹珍寶及藥物作襯紙又呼薰金紙以其熏黑撻研而光也

本草綱目拾遺

卷九

北雁砂 烏金紙

其

物理小識造金箔隔碎金以藥紙揮巨斧捶之金已箔而紙無損紙初褐色久則烏金色○魏良宰云烏金紙惟杭省有之其造紙非城東濱佑橋左右之水不成其法先造烏金水刷紙俟黑如漆再熏過以槌石研光性最堅韌凡打金箔以包金片打之金成箔而紙不損以市遠方價頗昂值蓋天下惟浙省城人能造此紙故也

治下疳 集聽用烏金紙銅杓內炒末加水片少

評塗

復明散 陳嘉木眼科要覽專治翳膜遮睛瞽者

亦可復明用七八歲童子口中吐出虻蟲一條用竹刀剖開清水洗淨將新瓦以炭火焙乾勿焦研極細末烏金紙包好再用礪砂四兩將虻蟲包藏其中一七日取出以骨簪蘸藥點眼一日三次後將骨簪腳擦去眼中翳膜熱水洗之少頃又點點完此藥無不重明

皮金紙

又名羊皮金出廣東凡金箔店皆有售者呼皮金紙

治跌仆擦傷釘鞋打傷足跟病久陰瘡擦痛并凍

本草綱目拾遺

卷九

烏金紙

皮金紙

舊繖紙

其

瘡足跟癰爛流水凡小擦傷刀傷腫潰紅赤皮光潮濕皆效看患處大小以此剪取將金面貼傷處過宿即愈 毛世洪養生集

舊繖紙

綱目有桐油繖紙止言治蛙幹陰瘡及疔瘡疔汗而已無他治法今補之

治纏腰丹 急救方用舊繖紙燒存性為末香油

調敷

對口瘡 祝氏效方淡底白色者佳一兩陳繖紙燒灰五錢將烏梅肉一兩先打爛入末再加生桐

油搗勻敷患處漸愈

發背立效方 周氏家寶千年石灰研為細末鐵杓內炒紫色傾出磚上待畧冷微有熱氣不可太冷太熱三錢大川芎研細末二錢和勻入真麻油五六點用井水或河水調服遍身大汗出即散矣若遇惡瘡可加黑繖紙灰三分照前服

癩瘡 蔡毓晉方用人家蓋牆頭舊繖須多年經霜雪者取繖衣依瘡大小剪成一塊上用木針刺洞貼上三日另換一張每日翻貼貼上三張即愈

○集聽方癩瘡以輕粉猪骨髓研勻攤舊繖紙上

本草綱目拾遺 卷九 癩瘡 包烟紙 貼之

周氏家寶諸瘡隔紙膏癩瘡經驗膏隔紙膏脫身隔紙膏俱用舊繖紙夾藥貼

包烟紙

此乃烟舖內包烟外一層厚白紙係石灰槽浸造灰氣未去紙亦不韌止可包烟用名建紙近人食烟以其紙擦烟筒頭嘴令銅潔白可擦錫器武原朱進士醒莽言北方朝士多貼此紙每日清晨盥類後以之拭面久之能轉黝為白令光發如玉拭面去黝汗斑美容顏發光豔

粗草紙 廁草紙

此乃稻草所造南貨店以之包物有厚薄二種厚者名銅板草紙入藥用

發疹瘡 百草鏡折角草紙半張南貨店包物厚者是也煎服較檉柳尤透發

小兒臍瘡 不藥良方急用大草紙燒灰敷之則不致變瘋癩或加枯礬或再加龍骨燒灰等分入麝香少許撒之

腸風下血 不藥良方粗草紙燒灰砂糖拌勻開水服

本草綱目拾遺 卷九 粗草紙 廁草紙 貝母團 經驗廣集治羊兒瘋百發百中用川貝母去心一兩研粉用羅篩過鋪大草紙一百張一層草紙篩一下百張草紙篩百下然後用線縫之入四碗水煮乾每清早取一張紙成團煨過滾湯泡汁飲之服盡全愈神妙無比

廁草紙

此乃坑廁中拭過糞草紙棄於地者同壽錄云傷寒內有一症名略帶傷寒非用此不能除也覓此紙四十九張燒灰為末水二碗煎一碗去渣飲之效

酒罈上紙

此乃蓋封酒罈口上紙陳久者佳以其得酒氣多
嫩爛不堅韌又脫去灰性也

治皮膚間忽然血澱出同壽錄用此紙碎扯如楊
花攤於血出處即止

燒酒草

此即燒酒罈頭泥中之草慈航活人書有此一種
入藥故補之

治剪刀風 活人書云其症腰生紅瘰如物纏緊
作痛用針挑出血取此草加鹽擦出汗即愈

本草綱目拾遺

卷九

酒罈上紙 燒酒草 古瓦 青龍背

古瓦

綱目土部有烏古瓦不言治癰毒

治小兒生毒 救生苦海已成形 多年古瓦

研末用細茶葉煎極濃汁和敷留頭即散

蟻拱癰 用瓦片火煨醋淬七次為末菜油和搽

消渴 用舊屋上瓦兩片洗淨槌碎以水煮濃汁

食後溫服一小盞 同壽錄

青龍背

龔廷賢回春云鍋蓋面上垢膩名青龍背可治瘰
癧潰爛久不愈者用此入烏龍膏治之

烏龍膏 木鼈帶殼炒存性去殼側柏葉焙人中
血即亂髮也燒灰青龍背紙錢灰飛羅麵各一錢
俱為末好涼米醋調成膏塗瘡上外用紙貼
絹篩羅

今呼篩子有馬鬃織作底者有絲絹作底者入藥
以絲絹者良

治過月難產 彙集有急救過月難產仙方用陳
篩羅底一個捲筒燒碗內與產婦服即下如產生
之兒身上皆有羅其驗如神

陳年竹燈盞

本草綱目拾遺

卷九

絹篩羅 陳年竹燈盞

治多年陰陽諸癰 救生苦海用陳竹燈盞油透

者入尖底瓶內瓶口安一鐵絲髻將地挖一土坑

內安大碗一隻將瓶倒覆碗上瓶底朝天週圍用

糞糠填滿燒之取滴下碗中之油搽之效驗○文

堂驗集治癰多年油竹燈挂一個火上烤出油汁

如膠者良另將五倍子去蟲炒研為末二味和一

處用陳醋火上溫熱和勻搽之甚效

臘梨頭瘡 張子卿秘方集驗以酒飯店油透陳

竹燈臺一個劈碎裝於磁瓶內口上用舊髻鐵絲
覆於餅上倒轉下再用一空磁餅以此餅合於下

餅口上用火煨之其汁溜下取汁搽瘡其效如神
腦漏 百草鏡竹燈絡子十年者須覓鄉村中有
油垢者勿淨煨成炭伏土存性研細每用一二錢
包豆腐皮清晨滾水吞下陸續服盡自愈
腸癰肚癰神效方 便易良方云右腳拘急是腸
癰左腳拘急是肚癰取數十年舊油印竹燈臺俗
名善福以一隻燒半過不用水息悶合成灰研爲
細末陳三白酒沖服二錢或三錢卽愈王站柱不
藥良方云此藥又治肺癰極神效

銅燈盞青

本草綱目拾遺 卷九 雜錄 烏龍翅

卽盞內之油垢起銅綠者入藥良

治燕窩瘡 救生苦海本名髮際瘡生頭枕骨下

髮盡處以銅燈盞內青垢刮下研爛擦之如神

料絲

物理小識滇金齒衛用碼礪石英屑汁以北方天

花點之乃凝練爲絲以作燈近日丹陽松江皆能

作料絲李西涯書作縹絲大內青瑣卽此物

磨漿能止血破血

烏龍翅

汪連仕草藥方烏龍翅卽焦火把零落泥土中經

霜雪者佳

治足爛至凶者燒炭油搽燒斑痧焮神鬼箭神效

船篷箸

治耳內腫爛脹痛 救生苦海用多年船篷箸燒

灰存性加水片少許研細吹入

洋船璞

此乃海船底中間有櫟木舟人名曰龍骨藥生其

間形如菌蕈乾之入藥

治胃脘疼痛

按潘之恒廣菌譜舵菜卽海船舵上所生菌也不

可多得果爾則宜入蔬部留以俟考

檣箱

治奶串○毛世洪經驗集凡乳癰串爛年久不愈

洞見內腑深陷不愈者取搖船之檣上首手捏之

處舊藤箱剪下以陰陽瓦上煨末竹管紮棚篩日

日摻之如乾處以香油調搽不過半月全愈

漆盤上漆

治羊眼漏 救生苦海此症生足脛骨上生一孔

無膿無血惟流清水大痛用多年漆盤刮下漆燒

灰摻之愈

油木梳

木梳以木製成用以通髮黃楊木者能清火石楠木者理風其器以此二木造者為最餘雜木及駝骨牛角等梳不入藥或曰牙梳可辟邪皂角木梳不腫髮柏木鉛梳皆能烏髮總不若常用黃楊石楠二木為佳也綱目梳篦合一不分所載治法亦夥惟油梳尚遺其功用因補之

治肺痿 救生苦海油木梳須二三十年者一個燒存性滾水和服甜酒亦可

治五淋 同壽錄以多年木梳燒存性空心冷水

本草綱目拾遺

卷九

油木梳

衣帶

三

調下男用男梳女用女梳神效

拘頸 海上名方此病俗呼落枕乃頸項夜間悞落枕下或偶被閃挫血滯而強作酸疼以舊油梳

火上烘熱梳背於疼處極力刮之自愈
誤食螞蝗 俞潛山云曾誤食此腹中作瀉不時疼痛瀉血以黃土漿水他藥試之多不效有教以取多年舊油梳煨灰酒調服一夕蝗皆化水而下

真神方也

衣帶

治蛇纏 救生苦海用繫腰帶煨存性研細和好

膏塗或加水龍骨和柿漆水塗

刀鞘

治中惡腹痛 救生苦海用刀鞘燒灰水服

舊竹筍

治蜈蚣傷 救生苦海將小頭燒過伏土取少許

研細敷之立愈

草鞋鼻上布

綱目屨屨鼻繩下有草鞋鼻無取布法亦不知其

有發瘡之功今補之

治兒患瘡疹不發取破草鞋鼻上所裛之布七八

本草綱目拾遺

卷九

刀鞘

舊竹筍

草鞋鼻

衣帶

三

條煎湯服立效如神周寶生醫通

織機上草辯

楊春涯驗方治白蛇纏此物以陳為好燒灰存性

麻油調搽紅蛇纏亦治

丙臺上屑

綱目故木砧條列几上屑止言治癢瘡唇耳等瘡

乾霍亂蟲牙等症急救方言其治手毒如神因急

補之

治手掌連虎口邊腫毒用猪肉臺上刮下木屑如

膏作餅貼患處即愈

吐血 慈航活人書醃臘肉店中切肉木墩上刮取肉垢火上燒枯勿令成白色存性研末酒沖服狗咬 楊春涯驗方刮取切肉墩上油垢和砂糖拌敷神效

盛米烤栲 爛籬底

治血毆 楊春涯驗方用二三十年盛米烤栲一雙擊碎煎湯服一二次即消

爛籬底

此乃人家盛米竹器折人呼為淘籬以竹絲織成用以浙米者舊者多用以貯柴灰淋水洗衣年久則爛

本草綱目拾遺

卷九

藥考 籬底 砂壺

五

截經 同壽錄云婦人行經不止服此可截用頭紅花爛籬底爛入搭草鞋鼻子蓮房此四味俱燒灰存性其為末每服一錢黃酒送下不過三服其紅立止

砂壺

出宜與紫泥者佳入藥吸毒用取其口光滑而薄不傷肌肉也

治傷寒不出汗用吸法以二砂壺各盛燒酒八分重湯煮滾將酒傾去即將壺口對臍上合住使吸

之緊輪換汗出即愈。瘰癧破爛拔毒法將先破處麵糊作餅貼上用小砂壺二個燒酒煎滾去酒以熱壺口覆於麵餅上熏瘡如拔火壺一樣壺冷又易一壺如此數次將毒氣拔盡即愈熏後用猪膽熬成膏貼瘡口此方神效。治獸蟲咬傷并風寒一切毒用砂燒酒壺二個盛大半壺燒酒先以一壺火上令滾無聲傾去酒即按在破口上拔出汚黑血水滿則自落再以次壺仍按瘡上輪流提拔以毒盡為度。見經按王站柱不藥良方治瘋狗咬傷用砂壺吸法與此同吸後再拔去頂上紅髮即愈

本草綱目拾遺

卷九

砂壺 靈鶴蓋

五

靈鶴蓋

李金什曾客淮南言山陽一帶洲渚皆蘆葦產鶴多卵育於中村人有能識其期者俟鶴下卵後竊歸入鍋煮熟急以涼水沃之看卵殼不熱復置其窠鶴不知而尤煦伏之過三七日其卵中黃白復鮮如故又竊之歸急煮而又納窠鶴又伏之如是者三次則鶴卵外殼厚如紫玉而益成矣復竊之歸鏟去其頂外則鑲飾金玉令成盃形名靈鶴蓋注酒其中輒有一小鶴影浮酒上云食之益壽延

年且能治心疾不易得有市者價亦不貲

安神魂定心悸小兒用之除驚癇孕婦用之養胎

稀痘出外帶之辟蛇蠱及一切毒

花簪

楊春涯驗方治乳癰初起時將女人頭帶花簪對

向日中打圈口中默念天上一朶黑鳥雲地下女

子害乳疼我今特授金簪上金簪化去永不疼如

此七遍將簪交付婦人圈患處即好

小兒破鞋

接骨 家寶方用市鎮上乞小兒破鞋一隻燒灰

本草綱目拾遺

卷九

花簪 小兒破鞋 夏布舊蚊帳

天

白麵等分好醋調成糊敷患處以絹束之杉木板

夾好須臾疼止骨接有聲為妙

夏布舊蚊帳

江西麻布染藍入夏作蚊帳名夏布今人以此舊

帳作漆器坯最佳

治走游風 王化九簡便方用青夏布舊蚊帳燒

灰存性麻油調敷如再發再敷

陰奇癢難忍 不藥良方用青夏布舊蚊帳燒灰

存性麻油調搽即愈

廁上椽木 尿板

此即毛坑上椽子多年為糞氣熏漬其解毒之功
不下糞清也

治紅絲疔 敬信錄紅絲疔先將針挑斷其絲將

多年糞坑上碎木椽子煨灰研細用飴糖拌塗留

頭疔即拔出

尿板 治手足瘡無力不能收口家寶方用多年

尿浸爛白色木板煨存性為細末加水片摻之立

時收口

白秋霜

萬表積善堂方白秋霜即多年糞缸底結成白霜

本草綱目拾遺

卷九

尿板 白秋霜

天

須經風雨者入藥炭火煨紅醋淬九次用綱目人

部溺白塗為人中白乃溺塗也且所列主治及附

方皆無接骨治傷之說特補其缺

治跌撲損傷閃挫骨傷極重者研極細末每服五

分好酒調下 萬表

陳海曙云凡多年廁坑底石板背後有白胎如雪

結其間鑿取微有穢氣陳久亦無然糞力透石故

其精華凝聚於此能清火毒。王聖俞云一名糞

霜曾見小兒瘡痘初愈者忽然肺燥咽乾唇裂目

中出火滿面紅赤此火毒壅遏未化滯於上焦每

服此藥一二錢不數日全愈。敏按蔣儀藥鏡云
泥宿糞坑之底疔二里發背止痛當塗而霜又其精
華也大抵清火解毒功用亦不甚相遠

本草綱目拾遺

卷九

白秋

三

禽部
燕窩素燕窩

一名燕蔬菜從新云出漳泉沿海處有之乃燕啣
小魚春壘之窩中人取之閩小記云燕取小魚粘
之於石久而成窩有烏白紅三色烏色品最下紅
者最難得能益小兒瘰癧白色能愈痰疾泉南雜
志閩之遠海近番處有燕名金絲者首尾似燕而
甚小毛如金絲臨卵育子時羣飛近沙汝泥有石
處啄蠶螺食之蠶螺背上肉有兩肋如楓蠶絲堅
潔而白食之可補虛損已痢勞症此燕食之肉化

本草綱目拾遺

卷九

燕窩

三

而筋不化并津液嘔出結爲小窩附石上久之與
小雛鼓翼而飛海人依時拾之故曰燕窩也似此
則形狀功用時候族類俱有可信。嶺南雜記燕
窩有數種日本以爲蔬菜供僧此乃海燕食海邊
蟲蟲背有筋不化復吐出而爲窩綴於海山石壁
之上土人攀援取之春取者白夏取者黃秋冬不
可取取之則燕無所棲凍死次年無窩矣。香祖
筆記燕窩紫色者尤佳。崖州志崖州海中石島
有玳瑁山其洞穴皆燕所巢燕大者如烏啖魚輒
吐涎沫以備冬月退毛之食土人皮衣皮帽秉炬

探之燕驚撲人年老力弱或致墜崖而死故有多獲者有空手而返者是為燕窩之菜。粵錄海濱石上有海粉積結如苔燕啄食之吐出為窩繫繫巖壁之間島人俟其秋去以修竿接鏈取之海粉性寒而為燕所吞吐則暖海粉味鹹而為燕所吞吐則甘其形質盡化故可以清痰開胃云凡有烏白二色紅者難得蓋燕屬火紅者尤其精液一名燕蔬以其補草木之不足故曰蔬榆肉產於北燕窩產於南皆蔬也。宦遊筆記燕窩出南海日本諸國春間取者色白為上秋間取者色黃次之一

本草綱目拾遺 卷九 燕窩

種微黑而多毛是揀擇所遺者價亦不能廉怯症人久服之亦能潤肺止咳功等參苓。查浦輯聞南燕歸海外水邊難達因啄小魚肉作窩口啣之而飛飛倦即投窩水中棲止其上少息復啣之而飛故東南風則飄掠近岸人就取之。阮葵生茶餘客話許青巖 松信 方伯語予云燕窩產海島中窮巖邃谷足力繩竿之所不及估舶養小猿猴善解人意至山島間以小布囊繫猿背上縱之往升木深巖盡剝塞囊中而歸猿之去也苦不得食三數日始返海客以果餌充囊中俾之遠出不餓拙

者出即剝塞囊中歸而傾囊不過數片為果餌占地也其點者將果餌傾巖竇間剝塞滿囊盡燕窩矣空而復去尤為便捷猿一值數百金價數倍於拙者云許謹齋黃門每晨起食蔗漿燕窩一巨觥以融軟為度謂他人皆生食也終日不渴

味甘淡平大養肺陰化痰止咳補而能清為調理虛損勞瘵之聖藥一切病之由於肺虛不能清肅下行者用此皆可治之開胃氣已勞痢益小兒痘疹可入煎藥或單煮汁服。從新云今人用以煮粥或用鷄汁煮之雖甚可口然亂其清補之本性

本草綱目拾遺 卷九 燕窩

豈能已痰耶有與冰糖同煎則甘壅矣豈能助肺金清肅下行耶。物理小識燕窩能止小便數。逢原云甘平無毒烏啣海粉作窩得風日陽和之氣化鹹寒為甘平能使金水相生腎氣上滋於肺而胃氣亦得以安食品中之最馴良者惜乎本草不收方書罕用今人以之調補虛勞咳吐紅痰每兼冰糖煮食往往獲效然惟病勢初淺者為宜若陰火方盛血逆上奔雖用無濟以其幽柔無剛毅之力耳。張石頑云暴得咳嗽吐血乍止以冰糖與燕窩同煮連服取其平補肺胃而無止截之

患也惟胃中有痰濕者令人欲嘔以其甘膩戀膈故也。○食物宜忌云壯陽益氣和中開胃添精補髓潤肺止久瀉消痰涎。○嶺南雜記紅色者治血痢入梨加冰糖蒸食治膈痰。

何惠川云翻胃久吐有服人乳多吃燕窩而愈者老年痰喘。○文堂集驗方用秋白梨一個去心入燕窩一錢先用滾水泡再入冰糖一錢蒸熟每日早晨服下勿間斷神效。

噤口痢。○救生苦海白燕窩二錢人參四分水七分隔湯頓熟徐徐食之立效。

本草綱目拾遺 卷九 燕窩 素燕窩 三十四

素燕窩 月湖筆藪近時素食中盛行一種素燕窩甯波洋行頗多形白而細長空心虛軟儼如食舖中餛子而細有七八寸至尺長不等望之晶瑩握之輕虛每三十餘枝作一束厨人買得湯沃之即起脹蕤然凝白類官燕以入素饌為珍品食之亦淡而少味不知何物造成或曰糯粉山穀為之何以見沸湯反脆美或曰銅鉛之苗產海外深山食之可明目近日始知有用者不知然否附記俟考。○北硯食規有製素燕窩法先入溫水一盪伸腰即浸入滾過冷水內俟作料配菜齊集另鍋

製好箊籬撈出燕窩將滾湯在箊籬上淋兩三遍可用軟而不糊拌燜用

解食烟毒

石燕

粵語產西樵巖穴中大如乳燕足生翼末綱目石燕條引日華子本草無治疔之說今廣人用之頗驗故補之

治兒疔小兒羸瘦取食即愈諺曰嬰兒瘦探石巖即此

蝙蝠腦

本草綱目拾遺 卷九 燕窩 蝙蝠腦 石錘 三十五

李氏蝙蝠腦丸中用之治癰疽內陷服之能令毒不攻心

石錘

張氏日鈔乃大鵬之精也鵬獨運無鷗海靜不波之日見影在下以為鷗也其精溢出墮土上為土錘木上為木錘惟石上為不失本性最佳或墮水中以婦女和衣投水自能躍出

按石錘乃慎恤膠之類

浸酒服壯陽令人有子以薑酒解之

鷗鷁涎蛋

鷓鴣形如鷺而色黑面紅俗呼摸魚公水鄉人家多養之以捕魚十月後飼以狗肉則身暖不畏寒雖破冰入水亦不瘵死

治腎咳俗呼頓嗆從小腹下逆上而咳連嗽數十聲少住又作甚或咳發必嘔牽掣兩脇涕淚皆出連月不愈者用鷓鴣涎滾水沖服下咽即止

蛋 能打胎有不欲留孕者取一個白水煮服胎即化為血水從小便出多則二服無有不驗

翠鳥舌 本草綱目拾遺 卷九 鷓鴣 翠鳥舌 白鷓鴣 三十一

翠鳥即魚翠也其舌大而可用細目魚狗下止言其肉可治魚骨哽而附以翡翠亦云方書無用此者其功效大約相同今為補其舌之用

針頭風 集聽翠鳥舌一個以桐油浸曬乾又浸又曬硬如三稜針方病發時將鳥舌於頭上亂針即愈

白鷓鴣

珍異藥品文首白翼黃足

治瘰癧

鷓鴣

珍異藥品 西廣中。孫硤川云此物在山中多食鬱金苗故肉鬆脆

解鬱散結氣

豁雞

出廣中雞頭而鳥喙色黃腹毛純黑尾長下垂鳴聲豁豁性嗜蛇其哺子時取雞折其兩足乃以蛇飼之三日即復屢折屢復

捕食之能治骨節折傷

雪雞

生西陲千百成羣棲止雪中西域聞見錄喀什噶

本草綱目拾遺 卷九 鷓鴣 豁雞 雪雞 洋鴨 三十七

爾雪雞羣飛極肥美人以為食惟性燥耳入藥雄者良

煖丹田壯元陽除一切積冷陰寒痼癖之疾較雪蓮尤效

洋鴨

朱排山柑園小識洋鴨種出海洋形如鴨紅冠羣羽馴而善飛雄者重至十觔雌者如常其性淫雌雄相交日必四五次故房術用之卵大如鷺子味極美以母雞伏之約一月餘則雛出矣雛極易長大

助陽道健腰膝補命門煖水臙

烏鴉膽

此乃慈烏之膽浙東最多悉體肥黑而大所在多有予門人奉化徐朋圭居白巖其地山僻徑幽古木叢雜言其土人有取鴉膽者云烏鴉膽汁晝則散注身目故精聚而能見烟霄外物夜則汁歸於膽取之法須伺鴉夜睡時乘其罔覺以利刀斷其頭急剖腹取之膽汁全飽並無漏溢然後以線穿陰乾入藥用若取之不得法或鴉被驚覺縱殺得其膽亦空皮無汁不堪用

本草綱目拾遺

卷九

烏鴉膽

鴉毛

三十八

明目開瞽功勝空青點青育最驗解藤黃毒

爛弦風眼及翳障 不藥良方烏鴉膽點之即愈

鵝毛

尿 涎 蛋殼 腿骨 喉管

綱目驚下載其毛治射工毒通氣辟癩開噎其尿

治小兒驚口蒼鷺者可傳蟲蛇咬而不知毛可治

癯屎更治犬咬悉為補之

治癰毒 集驗方用鷺毛煨灰一兩明礬二兩研

末麵糊為丸每服二錢好酒下

大麻風 赤水元珠參毛丸治大麻風神效苦參

一筋鷺毛八兩煨存性為末陳米糊為丸桐子大

每服五十九酒送下一日二次

神功至寶丹 王秋泉家傳秘方專治男婦溜膿肥瘡膿窠瘡臘梨頭遍身風癩癰疹疥癬瘙癢異常麻木不仁諸風手足酸痛皮膚破爛陰囊癢極并婦女陰瘡濕癢酒丸散擦藥洗貼如神隨病上下茶湯送下日進二次戒暴怒房勞灸燻發毒之物苦參一筋為末鷺毛香油炒存性六兩黃米糊丸硃砂為衣此方與元珠治大麻風所用大同小異因並存之

本草綱目拾遺

卷九

鷺毛

三十九

按鷺白者能疎風瀕湖謂其氣味俱厚發風發瘡莫此為甚而駁韓悉醫通以為疎風大悞殊不知鷺能發瘡生濕火熏者并發火毒宿疾害誠有之而疎風之功亦不可盡誣至其毛與肉則性尤不同本經逢原云昔人治癩風方中取純白鷺通身之毛及嘴足之皮與肫肝內皮固濟煨灰存性和風藥用之為風藥之嚮導也然不可遺失一處遺一處即不能愈又不可用雜色者若有一處色蒼風愈之後其處肌膚色黑正取其疎利而不燥能和風藥之燥烈而不用蒼色者以純白鷺無毒耳絕胎方 保和堂秘方用血管鷺毛燒灰百草霜

各一錢行經後酒調下終身無孕。又周氏家寶方用鷺毛一把煨細茶煎湯經後服永不生方此二存不可輕用

寶生論有受打不痛法用血管鷺毛七根地龍七條煨過同乳香白蠟為丸好酒送下

治瘰癧初起 傳信方白鷺大者二隻取週身毛翎并口腳黃皮新瓦焙焦為末分作十服每日食後服之服完即愈

治腫毒 救生苦海用血管鷺毛一握銅鍋炒焦腐皮包裹酒吞下即內消初起者效。諸腫毒痛

本草綱目拾遺 卷九 鷺毛

四十

甚有膿即潰無膿即消用鷺毛燒灰一兩雄黃三錢川烏草烏各錢半黃蠟鎔化入前藥為丸每服一錢好酒送下嚴氏方諸毒內消方吳涵宇用鷺毛二個炒蜈蚣十條醋炒穿山甲一兩炒蠶蠶一兩炒全蝎五錢洗廣膠二兩炒桑黃二兩炒羊角屑二兩炒共為末每服三錢砂糖調好酒下以醉為度

發背疔瘡對口風毒 醫宗彙編穿山甲蛇蛻蟬退蜈蚣俱為末鷺毛全副燒灰存性全蝎血管雞毛二翅燒灰人指甲用十分之一敗龜板一個煨

鷺俱為末每用一錢酒下

候吞銅錢及鈞線 慈惠方用鷺毛一錢燒灰磁石皂角子火煨象牙一錢燒存性為末每服五分新汲水下

艾火帶 乃炙火所傷爛痛不可忍同壽錄用雞毛同鷺毛燒灰敷之效

喉嚨癰 傳信方用鷺毛灰三分兒茶二錢牛黃三厘雄黃一錢人中白一錢半煨存性如吃深加珍珠煨存性一分為末先將生桐油探刷一番後用藥吹入加膽礬更妙

本草綱目拾遺 卷九 鷺毛

尿 涎 蛋殼 腿骨

四十一

鷺尿 救生苦海治犬咬以鷺尿敷之不爛痛

鷺涎 網目止載治咽喉殺賊今人治小兒鷺口瘡甚效

鷺蛋殼 急救方癰疽無頭用新生鷺蛋殼燒灰存性為末醋調敷立出膿血妙

鷺腿骨

奇效方犬傷日久發者用鷺腿腿骨煨存性研末摻之

鸞喉管

家寶方治喉症用鸞喉氣管一個陰陽瓦灸黃色水片一分共為細末吹二三次愈

治赤白帶 家寶方取鸞水喉管煨存性研末酒

調臨臥服之

鷹吐毛

鷹條

百草鏡鷹每日食雀時連毛與食肉化而毛不化聚成一團如芡實大次早吐出收用入藥綱目有鷹毛無吐毛故補之。按鷹稟西方兌金之氣其性猛烈而竄捷故余居士以其頭治眩暈王燾以

本草綱目拾遺

卷九

鸞喉管

鷹吐毛

鷹條

四十一

其糞治食哽皆取其得庚辛銳氣一往無滯反胃之症食而復吐久積於胃不能運化故旋出大概由於憂鬱者居多取此復吐之意而又得其爽猛之性為治其義精矣

治反胃煨存性研 醫方集聽查將軍家傳噎膈方用牙烏灑出毛肘即鷹吐鳥毛也要七個不可落地用布接在架中微火煨燥為末服之營內凡喂毛肘但在下午次日天明即吐出最易得不可使肘落地落地則不驗

鷹條 本經逢原云鷹屎中化未盡之毛謂之鷹

條入陰丹陽丹用不特取其翮之善脫以治難脫之病并取屎中未化之羽以消目中未脫之翳可謂妙用

雄雞卵

茅崑來云雞本南方積陽之象於卦為巽五更則日臨巽位故鳴凡鳥雌卵而雄否惟雞則雄者間亦生卵乃陽極而陰乘之其卵較小於雌雞卵殼堅如石殼色微紅入藥用可安胎稀痘。王械秋燈叢話古北口叭噠嶺有喇嗎令巡檢張某市雄雞卵張笑曰雄雞馬能生卵故相難也曰非也俗

本草綱目拾遺

卷九

鷹條

雄雞卵

四十二

有斯言即有斯物第覓之可得也張漫應之語其役役日聞前村民畜雄雞連生三卵眾以為不祥姬異而藏之命役取送喇嗎收其一給價五十金張詢所用曰能醫眼疾年遠醫者得其汁點之即復明與空青同。陳藏器本草今雞有白臺如卵而硬有白無黃云是牡雞所生名父公臺二申野錄成化二十三年吳縣湯惟信家雄雞生卵平湖縣志萬歷四十八年四月施太史家公雞生子形如雀卵色紫史異纂天啟二年陝民王進榜家白雄雞生卵三岡識畧壬申二月二十九日提標左

營章元鼎屨中雄雞連生二卵述異記康熙甲戌十二月松江吳南林家雄雞生卵大如鴿蛋殼甚堅厚椎破之亦有黃白白如凝脂不散黃帶赤色。質直談耳嘉定湖南村民錢嵩家雄雞生卵與雌無異乾隆壬寅夏間事。紀曉嵐先生云雄雞卵大如指頂形似閩中落花生不能正圓外有斑點向日映之其中深紅如琥珀以點目皆甚效德少司空成汪副憲承需皆嘗以是物合藥然不易得一枚可以值十金阿少司農廸斯曰是雖罕睹實亦人力所為以肥壯雄雞閉籠內縱羣雌繞籠

本草綱目拾遺

卷九

雄雞卵

四

外使相近而不能相接久而精氣團結自能成卵此亦理所宜然然雞秉稟風之氣故食之發瘡毒其卵以盛陽不洩鬱積而成自必蘊熱不知何以反明目又本草之所未載醫經之所未言何以知其能明目此則莫明其故矣汪副憲曰有以蛇卵售欺者但映日不紅即為偽托亦不可不知也。敏按諸書所載雄雞生卵自古有之原非有異據陳藏器所說有白無黃而述異記所載則有黃有白想本間氣所生其形色亦無一定乾隆庚戌臨安慈聖寺有放生雄雞忽生卵日產其一如是旬

餘人以爲異其卵較小色紫而殼堅爲一錫匠索去子時適館臨安聞而索之已無有矣錫匠徽人亦云其卵白可入藥故乞之歸里然此物又不特入藥李懷白先生云曾見喇嗎誦黑經用雄雞蛋川中鬼師有用雄雞蛋以行禳者白蓮教則又需以解魔迷術今人徒詫其異而不知天生此正所爲世用也。安胎稀痘開瞽

本草綱目拾遺

卷九

雄雞卵

四

獸部

獅子油血

辛温有毒色微黑者真善透經絡凡用勿多。沈
良士云塗指甲上涼透指甲者真又方以黍許入
沸湯湯即不沸者真。逢原云獅為百獸之長性
最難馴一吼則百獸辟易爾雅言其食虎豹熊太
古言其乳入牛羊馬乳中皆化成水西域人捕得
取其油入貢以供宮人滌除衣垢之用又能去紙
上墨跡刮少許隔紙熨之即脫予嘗試用垢雖去
而衣易毀紙易脆僅供一時之用雖係方物方藥

本草綱目拾遺

卷九 獅子油

吳

罕用近世醫者以之治噎膈病蓋噎膈皆鬱痰滯
積所致用取滌痰之意試之輒驗由是方家爭為
奇物但性最猛利力能墮胎孕婦忌用象油亦能
去垢滌痰但不能去墨跡耳。椿園聞見錄温都
斯坦西域一大回國從葉爾羌西南行百日可到
其國西隅有巨澤圍數千里澤中有山圍逾千里
萬峰聳峙高入雲天或曰人間第一高山也名曰
摩各里麻瞻達喇斯山中產獅子於新月皎潔輒
負雛於山中往來頭大而毛虬尾形帶黃質黑章
如虎皮長六七尺時登山絕頂望月垂涎咆哮跳

本草綱目拾遺 卷九

擲猛飛吞月有飛去八九里十餘里而墜死山谷
中者其國人以養獅子為上戶每當秋月其汗
使人取獅以精鐵作柱大如碗密布層遮圍畜之
於中飼以牛時而吼如雷霆滿城震動人畜不甯
取之法擇炮手之最精者開地為阱人匿其中遇
有負雛者來乘其不備發炮斃之而取其雛倘一
炮不中則拋山裂石而人無唯類矣。張棻漪有
此油云熬之可挑絲一二尺不斷他油則不及也
○陳海曙曾在京邸簡親王府見獅油堅如石絕
如雞卵白潔可愛

本草綱目拾遺

卷九 獅子油

吳

朱排山柑園小識獅子油白膩如猪肪氣味俱薄
利小便凡人小便不通雖腹脹莖痛病在危急者
以酒或白湯送下三四釐或半牙即通嘗有一丐
因受暑熱遂致小便不通每月一發發至二三日
後莖痛如割至不可忍屢投繯祈死人以獅油少
許投之片刻即通奏效之速無逾於此而本草不
著其功用何哉豈當時未知用歟第虛秘者似宜
酌而用之。敏技獅油性最猛烈內服尤不可單
用更勿多服嘉慶元年三月子友邵某得獅油少
許因病欲服之未果為一鄉人轉乞去市於人獲

一一五

重價其人市得服半黍許夜半而死鄉人懼罪亦投水死蓋外用不妨內服尤宜審慎以人之腸胃太弱不任峻利之攻削耳

消熱結治膈大小便不通 救生苦海用獅油酒服二三釐自效

獅血

沈雲將食物會纂獅血殺百蟲燒之去鬼氣

獅糞

王沂堂藏有獅糞一段用鐵匣盛之四圍以鐵屑養之其形至堅如鐵石磨之作紅色云非鐵屑養

本草綱目拾遺

卷九

獅子油

血

糞

象糞

象尾

白

則易朽爛也

治一切腿足下部惡瘡年久不愈者塗之即痂而落

象糞

象尾

按象有家野二種京師者食俸料滇廣山產者食

竹木雜草入藥以野象糞良京象糞銷皮坊皆多

取濺黃貂黃狼能令毛黑如漆綱目象下凡牙肉

睛皮膚骨俱入藥不及其糞為補之

治驚掌風以象糞燒熏自愈

起死回生散 李文炳經驗廣集治痘瘡至七八

日忽然變黑收入腹內遍身抓破吭喘死在須臾服此從新另發出立可回生當歸川芎白芍生地升麻紅花上陷加白芷下陷加牛膝遍身黑陷加麻黃象糞微炒如一歲兒用二錢六兒用至三五錢右到一劑水酒各半煎服從新發出腳下黑疔至七八日用針挑去以太乙膏貼之即拔去毒連進二三服

痘疹 良朋彙集方治小兒大人出痘疹回在心

胸作喘發燒用象糞八錢升麻二錢水二鍾煎一

鍾服即刻透出

本草綱目拾遺

卷九

象糞

白

象尾

狂血

白

白

象白

乃象交於水其精浮水面象房人用磁餅收貯入

藥敷面不皺亦可入房藥用

象尾毛

通雅云今人剔牙杖極重象尾謂可去火

狂血

孫含懿云有客自川中來帶有狂血言此獸乃星

禽為天上并宿五百年一降於世以濟人其降也

必於蜀降之前三日天乃大風振屋拔木為降狂

風左右村落居民知狂必降悉遷避之求鐵工造

蓮萼箭鏃如橄欖形而窪其中鏃上刻名以記狂
降之日形如胡犬有鱗大十倍於象首必朝歲星
蹲踞不動土人從其後射之矢集其身如猶三日
後乃去遺矢於地各認所鏃以歸矢人無爭者其
鏃頭有血一塊大如欖核可入藥土人亦甚珍寶
之不輕售自明洪武時曾一降至今幾四百年所
珍藥亦罕有存者縉紳舊族或有之亦寶同和璧
矣

治一切陰疽發背一切大毒凡癰疽必死之症無
藥可救者每以一釐潰則敷膏外貼未潰則調酒
服一夕自愈合治癰等藥一觔加入分許即奏效
如神

醉虎油 膽

三岡識畧王子正月初十日福山戍卒遇一醉虎
縛獻王大將軍轅門將軍剖肉分贈郡紳之小兒
食之可以稀痘按虎食人與楊柳及狗皆醉
宜遊筆記載山人捕虎法云虎嗜食犬食之必醉
如人中酒虎匿深谷峻嶺往來不時難尋其踪人
以劣犬縛於山凹犬嗥不已虎聞聲而前果腹而
醉不能遠去人迹犬血而捕之則無所遁矣此縛

醉虎之法也

主稀痘

虎油

物理小識虎一身皆入藥而本草未載虎油之功
效愚於獵戶取其油以塗臘梨瘡一二次即愈亦
可治大麻瘋。藥性考虎油療禿塗狗咬傷五痔
下血反胃酒嘗

虎脂

治打傷垂死飲食不進前後不通乃瘀血在心命
在旦夕可用此方虎膽五分去外皮用老黃酒在
碗內研細爲末白茯苓二錢爲末用熟陳酒調灌
下出可不死矣

本草綱目拾遺

卷九

虎油 膽 脂

辛

虎脂

治打碎頭骨蓋方用虎脂一兩浸好熱酒內俟化
勻服之汗出爲度如患處青者不治
反胃 不藥良方虎脂八兩清油一觔瓦瓶浸一
月密封勿令洩氣每以油一兩入無灰酒一盞溫
服以瘥爲度油盡再添
按虎膽虎脂綱目雖載其用而未言及入折傷料
之用此二方出錫山華氏經驗錄並屢試有效故

補其說以濟急

鹿胎乳餅

瀕湖綱目鹿條精髓筋膽胎糞俱各備載張璐達原另列鹿胎一條頗詳辨可採錄出以補其遺略曰胎中鹿其嘴尾蹄胎與生鹿無異者為真其色淡形瘦者為鹿胎若色深形肥者為麋胎慎勿誤用能損真陽又獐胎與鹿胎相類但色皎白且其下脣不若鹿之長於上脣也其他雜獸之胎與鹿胎總不相似也入藥取真者酥炙黃用

本草綱目拾遺

卷九

鹿胎

乳餅

三

宜之不特茸角莖胎入藥而全鹿丸合大劑參耆桂附大壯元陽其胎純陽未散宜為補養天真滋益少火之良劑然須參耆河車輩佐之尤為得力如平素虛寒下元不足者入六味丸中為溫補精血之要藥而無桂附辛熱傷陰之患但慎勿誤用麋胎反傷天元陽氣也

鹿乳餅

若陰札記孝豐深山產鹿土人計其產子時輒於夜半伺其洞側鹿乳子必五更乳畢出洞至暮方歸每日祇乳小鹿一次小鹿食乳於腹結十二小

餅每一時輒消一餅土人候母鹿出洞即將乳鹿抱歸剖腹出餅持貨遠方為珍藥價值兼金其餅如雲南棋子大色微黃乾者作老黃色腥氣最烈食之大能強陰益命門火衰於老羸最宜理怯弱虛損發痘漿通女子乾血勞

鹿脛骨

綱目鹿條有骨乃指全體而言至脛骨不聞有用法今時醫有斑龍散純取其脛為用因載其方以補之

本草綱目拾遺

卷九

鹿乳餅

脛骨

猴經

犬豕胎糞

三

生肌收口 救生苦海用斑龍散取鹿脛骨濕紙包固灰火煨之以黃脆可研為度若焦黑色者為過性勿用摻大毒生肌甚速

猴經

入藥名申紅深山羣猴聚處極多覓者每於草間得之色紫黑成塊夾細草屑云是母猴月水乾血也廣西者良

治乾血勞

犬豕胎糞

史長惺有不服藥而點眼發汗方以初男胎糞煉而升之加水磨磁甕收有當發汗者男左女右以

乳點之卧卽汗出本草所未載小識云犬豕初生糞皆可合煉不必定嬰孩也

獭油

獭卽獾字所在山澤有之穴居食蟲鼠劉仲旭云北直河堤一帶尤多穴岸而居最爲堤防之患守河兵卒多捕之一說獭入螿時必食蜂始過冬不饑有人於初冬發其螿穴得獭破腹其肚胃中猶有蜂糞腹中皮爲蜂螿輒厚數寸或藉此不饑此說亦未可深信堤民得獭脂多市煤廠作地燈非此不可他油輒爲地風吹滅惟備由作燈能禦地

本草綱目拾遺

卷九

獭油

海狗油

風也

入膏中拔濕如神 繆仲淳廣筆記趙府膏藥中用之

治頭上白禿 集驗用獭油火烤擦三四次卽愈如年久者恐不生髮以枸杞子煎湯飲

痔瘡 劉怡軒云一切內外痔獭油塗上立效效血胸中哽噎怵怵如蟲行者 不藥良方猪獭油入酒和服或下或吐或自消也

海狗油

海狗出遼東登州海中卽膾肭獸也綱目載膾肭

濟不言及其油之用故爲補之○蓬萊李金什言

其地登州海口出海狗皮可作裘帽俗美其稱曰

海龍卽此其腎乃藥中膾肭膾土人取海狗名曰

打狗此物晝夜潛海底惟孳乳時登島產子稍大

卽相率入水人不可得須冬月極凍時海崖水口

結冰天晴海狗羣出處水上曝日必候其卧冰時

驟入水以木棍擊其腰方可得之若冰裂或步履

有聲非其睡時皆不可得然每年打狗墮水溺死

者亦多因利重人亦不惜軀命以往

性熱而降善消利治三焦濁逆之氣能清水臟積

本草綱目拾遺

卷九

海狗油

狐麝

寒停飲觀近海人取鮫魚海參者用其油滴海面

海水卽清見底砂石畢見可知其性之分利也

近有人自關東帶來其油綠色如乾糊以塗皸瘡

卽愈次年不復發其性熱烈可知

狐麝

金沙江志產東川昭通二府較常麝香氣尤烈佩

之辟邪絕惡夢定壓

獾糞

綱目獾條載其屎治魚臍瘡及下疳而已不知有

消瘤之功今補之

王氏檢秘消瘡用獺糞一兩天南星三錢麝香三錢共研末醋調塗上即愈

狼脂

本經逢原云狼性追風逆行故其糞燒烟能逆風而上燒灰水服治骨鯁以其性專逆行而無阻滯也狼脂摩風首推而本草不錄亦一欠事按周禮冬獻狼取其膏聚也內則食狼去腸古人以為食品綱目獸部狼膏下瀕湖僅據飲膳正要載其能潤燥澤肌塗惡瘡而已不知其大功用乃能驅風散逆結之氣何可昧耶故急補之

本草綱目拾遺

卷九

獺糞 山羊血

美

入風氣膏中能去積久風痺調酒服散逆結之氣

常中丞筆記山羊生平樂山崖間能陟峻坂躡捷若飛其血可治跌損傷及諸血症凡跌撲死者未絕氣以一牙許調酒飲之遂甦神效立見第捕甚難每見人則決驟而去馳迅非常非足力所能及必密布繩網草間罾其足始能生得之刺其心血待乾凝結成塊可以攜遠蓋凡血皆患凝滯山羊踰高歷險旦夕不休則其血活矣而心為主故心血最良語云流水不污戶樞不蠹觀此益信。本

經逢原云山羊產滇蜀諸山中性善走逐好鬪內能療冷勞山嵐瘴痢婦人赤白帶下其心血瀕湖綱目失載苗人取血法以糜竹通節削鋒利活刺心血收乾者良宰取者不堪用。柑園小識山羊血產廣西諸土郡山羊似羊而大善鬪能上絕壁每登高處失足或至骨折少頃如故喜食三七苗其血主治損傷極妙輕者服數釐重者二三分以心血為上身血次之色黑有光而質輕者為真。陸祚蕃粵西偶記試山羊血取雞血半盃投一粒過宿變成水或以久凝臭雞血一塊投入山羊血

本草綱目拾遺

卷九

山羊血

美

過宿反變成鮮血乃真。瀕湖綱目云山羊即野羊也一名羴羊非今之家山羊也時珍於山羊主治條僅載其肉之功用不及油與血之用此並附之。今人收得乾血成塊者必用糯米養之云可久留不枯。性温味鹹無毒逢原云為和傷散血之神藥其治跌撲損傷單用酒服取醉醒其骨目續每用不過分許不可過服雖不耗傷元氣而力能走散陰血然必初患便服得效最速若過三五日血凝氣滯無濟於治矣價等牛黃心血亦不易得滲血丹

用之眞虛勞失血之續命丹也。藥性考山羊血味鹹療跌撲損傷咯吐嘔衄便溺諸血能止血消瘀和酒服其皮作茵褥愈筋骨疼痛角作火罐灸頭風以入水一絲不散者眞

吐血。蔣莘田經驗方臨卧時用廣西眞山羊血每服三分能引血歸源不過二三服其血自止

黎峒丸 治跌打及一切癰腫天竺黃八分牛黃四分冰片四錢三七四錢血竭四錢兒茶四錢麝香四分沒藥四錢阿魏二錢雄黃二錢藤黃四錢

孩兒骨一兩山羊血製浸藤黃入藥共爲細末煉

本草綱目拾遺

卷九

山羊血

三五

蜜爲丸如龍眼大陰乾外用蠟爲殼封固三白酒服

祝氏效方 山羊血能解鮮菌河純毒傷損惡血治痘內無漿不起發 集驗良方用眞山羊血三分用甜酒釀調服痘漿立起

太乙神鍼方 人參四兩三七八兩山羊血二兩

千年健一觔鑽地風一觔肉桂一觔眞川椒一觔

乳香一觔沒藥一觔穿山甲半觔小茴香一觔蒼朮一觔眞蘄艾四觔甘草二觔麝香四兩防風四觔以二共爲細末用綿紙一層高方紙三層紙寬

裁尺二寸五分長一尺二寸將藥末薄薄鋪勻在上一針約用藥七八錢緊捲如花炮式務要緊實兩頭用紙封固外用印花布包面亦要齊整好看此針能治一切痛風寒濕筋骨疼痛諸症用時將針以火焯著或按穴道或在痛處下襯以方寸新紅布數層將針按上若火旺布薄覺疼多墊布數層但針必須三四枝一針已冷再換一針連進七針無不立驗

治喉癰 喉症惟此最遲久則失音不可救種福堂方西牛黃一分眞山羊血二分川連五分血珀

本草綱目拾遺

卷九

山羊血

三五

三分冰片一分硼砂一錢青果核灰三分燈草灰五分共爲細末每一茶匙藥用一茶匙蜜調放舌尖上徐徐嚥下一日五次兩月可愈或加蠅蜚梅灰更妙

馬氏夾棍神方 吉雲旅抄山左馬家市夾棍藥極效方用蝮蛇膽二錢山羊血一錢半琥珀一錢

大白頸地龍七條去泥珍珠三分辰砂一錢兒茶八分金箔一帖爲衣爲細末蜜丸桐子大金箔爲

衣每服一錢五分好酒下如不打夾者用刀破皮藥白出

治急心痛。集驗方用山羊血一分燒酒化下中遇邪鬼。醫鈴此症乃陽氣衰而陰甚治須急補其陽以存正氣則陰邪自平即或治痰然亦當如意補正為本人參二錢當歸六錢白朮一兩葛蒲二錢半夏三錢白芥子三錢丹參五錢皂角刺五分山羊血八分附子一錢此方用山羊血皂角刺為開關聖品以通邪崇之要路半夏白芥消其寒痰無寒之侵斷不中鬼大用參以扶其陽陽生陰滅此不易之理也

救絕仙丹 石室秘錄此丹專救五絕及有邪崇

本草綱目拾遺 卷九 山羊血

存

昏迷一時卒倒者皆可灌之以起死回生實神奇之極宜端午日修合備用濟急大可救人山羊血三錢葛蒲二錢人參三錢紅花一錢皂刺一錢製半夏三錢蘇葉二錢麝香一錢各為末蜜丸如龍眼核大酒化下
敏按山羊血以產滇黔及蜀者佳以其地深山多三七苗及理血定風諸草山羊每食之嗣人追逐得之山羊本迅躍無一刻之停其體血自頂貫尾終日旋運如飛又被逐捕則躁性頓發血隨氣運矯捷尤甚黎峒人捕得以竹鎗刺入其心取血用

此上品也其血成條深紫有光以少許入水中自然旋運如飛蓋矯捷之性猶存也若網取刀剖而得者血色黯滯入水亦不能迅捷他省產者亦能如峒苗之合眾追逐令其騰躍上下而後刺取其心血用亦可較次於滇黔山羊血惟今之各處所獲山羊皆用網取其或鎗斃而後剖其死血以偽充心血則力微性緩更有以他血代充者則尤屬贗質無用故今市中每多此物高索重價非親歷其地真知灼見而得者勿用也

山羊油

本草綱目拾遺 卷九 山羊血 油 糞

存

張卿子秘方集驗治主心疝用山羊油不落水者荷葉包裹挂風處陰乾不可著雨遇此症取三五錢沖熱酒服不飲酒者滾湯亦可并治諸疝
按文堂集驗主心疝用山羊血其言與此同然細釋文義有不落水句則用油非血矣文堂誤以油為血故並正之南方亦有山羊但不及粵產者其血尤為迅捷也

山羊糞

山羊糞同水粉各一升浸一夜絞汁頓熱午刻服治疳痢

祝西葺本草山羊屎煨灰療潰爛生肌

入外料收口藥用 祝氏效方大棗丸用山羊屎

曬乾入鍋炒炭存性研細收藏每久爛不堪將見

內腑者以大棗去皮核搗爛如泥後入前粉搗至

成丸每服四錢黑棗湯送下此物大能斂潰爛諸

口神效無比

山蓮散用大活鮑魚一尾破腹去雜以山羊屎塞

實魚腹放瓦上慢火炙乾存性研末加麝香一錢

封貯如遇潰瘍爛見內腑止隔一膜者以此藥摻

上立愈

本草綱目拾遺 卷九 山羊糞 石羊膽

雷頭風 祝氏效方云諸藥不愈惟山羊糞炒炭

研粉甚效歌曰雷霆頭裏震山羊糞有綠酒送二

錢下不在腦門喧

治心痛不論遠年近日 玉泉方山羊糞七粒油

頭髮一握同燒為末好酒和服永不再發

石羊膽

廣東通志石羊色黑類人家羊而躡捷其角燒紙

為火罐能收頭風其皮作褥可愈筋骨疼痛其血

能療跌打損傷猶秦中山羊也。肇慶志石羊出

高要山中似羊而高大長角厚耳此羊一孔三毛

服用柔而能久 內兄朱問亭官粵曾寄石羊膽

一對盛以銀匣大如小指以絨線紮其一頭乃乾

者據言此物不易得試驗之法以此膽藥掛胸前

急行不喘者真治折傷勝於山羊血也

治一切目疾勞眼青盲人乳調點風火防風汁調

點此物去翳障如神水調亦可

跌撲功同山羊血

曹閨亭先生曾宦黔中云邊邑皆產石羊形小如

兔趨捷難獲有得之者須即破其腹取膽少遲則

裂於腹內矣其膽乾之可療肝厥暴絕酒服一二

本草綱目拾遺 卷九 石羊膽 山狸 犀牛皮

釐即甦其心血能治真心痛頗有效骨皮熬膠去

風活血如神

山狸

坤輿圖說利未亞國有山狸似麝臍後有一肉囊

香滿輒病就石上剔出始安其香似蘇合油黑色

療耳病

犀牛皮

物理小識近有從船上來者此真是海犀其皮入

藥

治風活血最效

貂尾

貂出西北塞外食松栗即南中松狗之類其行捷穿樹枝如飛蓋以尾為用者故其力在尾綱目貂鼠條止載其皮毛拭目去眵而遺其尾故為補其

功用

凍瘡用貂尾燒存性為末摻爛處自愈未破者用舊貂皮毛煨研香油和搽養素園驗方

七葛

回疆志出伊犁西番一帶用馬乳裝皮袋內以繩繒口手提袋提壓半時許放於熱處一夜即成名

本草綱目拾遺

卷九

貂尾 七葛 香鼠

李四

之日七葛飲之熱而補人若日日服之有返老還

少之功云

性熱補虛羸長力怯弱者宜之

香鼠

珍異藥品云出雲南形如鼠僅長寸許周櫟園書影云密縣西山中多香鼠較凡鼠小死則有異香蓋山中之鼠多食香草亦如獐之有香臍也山中人捕至篋筒中經年香氣不散桂海志云至小僅如指摩大穴於柱中行地上疾如激箭治疝甚驗

鼠血

此乃家鼠血綱目於鼠下獨遺鼠血今補之。木經逢原云生鼠血蘸青鹽擦牙宣有效牡者良

猫尿

胎尾 白松香

取蒜片擦猫牙溺即下

鳳聯堂驗方治偷糞老鼠用猫尿并底泥和勻圍之立愈。急救方塗蝎毒螫傷。蟲入耳中不出以猫尿滴之立死

猫胞衣

為治膈噎之神藥瀕湖綱目猫下雖附胞衣惟引

本草綱目拾遺

卷九

鼠血 猫尿 胞衣

奎

楊氏經驗方治反胃吐食燒灰入硃砂服其他概未之及焉且取之有法食之有忌均為補之

膈噎 同壽錄用猫初生胞衣以新瓦焙乾研細

末每服一二分好酒送下口含竹筆管睡恐咬牙

及咳嗽米不下者五六服即愈取猫胞法猫將產

以木枷枷之恐生出即食也忌燒酒

翻胃 鳳聯堂經驗方猫胞衣三個好酒洗用猪

肉四兩淡煮熱服之數年者立效。莫際華云胃

脘痛非服猫胞不能斷根

金御乘云猫胞衣凡患小產婦於產後或為羹或

爲未食嗣後卽不小產極驗

貓胎

祝氏效方治癱痺用貓胎一個泥裹煨有性菜油

調搽

貓尾血

不藥良方急驚風剪破貓尾滴血沖滾湯下

白松香

汪連仕云卽瓦上多年貓糞色白火煨用治鹽哮喘厥作痛更理瘟疫鼠瘡立刻見效

浙驢皮膠

本草綱目拾遺

卷九

貓胎

貓尾血

白松香

浙驢皮膠

空

黃雲盛言近日浙人所造黑驢皮膠其法一如造

阿膠式用臨平寶莊水煎熬而成亦黑色帶綠頂

有猪鬃紋與東阿所造無二入藥亦頗有效蓋阿

膠真者難得有浙膠則較勝於用雜膠也寶莊在

臨平湖西岸有寶莊泉土人名爲大力水云食之

多力向聞虎跑泉水注大缶中平口投錢於中能

吞一百六十青錢而水不溢他水至又十已浸漫

於外矣故虎跑泉食之益氣力寶莊水能吞二百

青錢不溢其力更可知以此水作膠自可敵伏流

之濟水然于每索此膠於市遍詢藥客皆云造者

亦少不易得而雲盛言之甚詳姑存之以備異日

考証

補血潤燥功同阿膠治內傷腰痛強力伸筋添精

固腎尤別有殊能也

霞天膏

綱目書部牛下附倒倉法而無霞天膏製法近時

用之頗多故附錄之本草經疏亦載爲專品其法

用肥嫩黃牛肉三四十筋洗極淨水煎成糜濾去

滓再熬成膏用膠仲醑曰胃屬土爲水穀之海無

物不受胃病則水穀不能以時運化羈留而爲痰

本草綱目拾遺

卷九

浙驢皮膠

霞天膏

空

空

空

飲壅塞經絡則爲積痰老結痰痰等症陰虛內熱

生痰則爲偏廢口眼歪斜留滯腸胃則爲宿飲癖

塊隨氣上湧則爲喘急迷悶流注肌肉則爲結核

王隱君論人之諸疾悉由於痰然而痰之所生總

由於脾胃虛不能運化所致惟用霞天膏以治諸

痰証者蓋牛土畜也黃土色也內者胃之味也熬

而爲液雖有形而無濁質也以脾胃所主之物治

脾胃所生之病故能由腸胃而滲透肌膚毛竅搜

剔一切留結也陰虛內熱之人往往多痰此則由

於水涸火熾煎熬津液凝結爲痰膠固難散者亦

須以此和竹瀝貝母橘紅蘇子栝樓根枸骨葉之類消之或以橘皮白茯苓蘇子白苧蔻仁半夏蒼朮為麩治脾胃積痰或以橘皮貝母蘇子栝樓根及仁蓬砂為麩治積熱痰結

味甘溫無毒主中風偏廢口眼歪斜痰涎壅塞五臟六腑留痰宿飲癰塊手足皮膚中痰核

羊哀

形圓如彈大小不等產羊腹在胃中惟山羊有之胡羊不能成也蓋羊食百草其精氣聚於胃久則成此物俗呼百草丹亦牛黃狗寶之類牛黃細膩

本草綱目拾遺 卷九 羊哀

而疎鬆且香烈故以黃名狗寶花白而堅凝如石故以寶名此則如爛草團成輕鬆而氣膾人多惜其不能如牛黃狗寶之精美而亦產於羊腹得日月精華又食異草孕結乃不堅重香凝僅成此物故哀之因名曰哀。常中丞宦遊筆記載軍營於羊腹中得石子名鮮答形如鴨卵色紫黃兩頭有二白圈圓如黃豆腰有束帶寬如韭葉色青藍束帶上亦二白圈質細如玉滋潤如水較耕錄亦載蒙古求雨取淨水一盆浸石子數枚持咒播弄其石子名鮮答產畜腹中牛馬皆有不必定羊也而

羊哀又與鮮答異鮮答堅重細潤此則輕鬆膾膈亦無束帶白圈庚戌冬友人李金什在臨安西關外屠羊肆見屠者剖一羊胃中忽湧出一彈如鴨卵黃勻圓光潔淨水盃上購歸示予予曰此羊哀也氣燥而鬆非鮮答之類彼云屠者呼為百草丹云業此三十年止取得三枚亦不易遇也此物惟山羊始生因山羊食百草偶嚙得異草或石乳其膏液注胃中日久凝成胃為精氣往來之所日為氣運動故所結之物多圓如丸鮮答結於腹不為

氣擾動故形匾圓如石金什即以此贈予予復取細視其質鬆而亦堅嗅之作羊臊氣外則色澤光膩儼如油潤其體質非石非酥如腐草融結始信說畧所載羊哀如濕茅紙之說為不謬因附記於此以待折衷於格物諸君子按百草鏡羊胎結成在羊腹中色微黑可治反胃或即此歟

本草綱目拾遺 卷九 羊哀

解百草藥毒治噎膈翻胃
敏按慈航活人書端五日收羊屎名百草丹可絕瘡與羊胃所積草有別不可不知
蘭蕪 家鄉肉 陳火腿骨 猪頂上 豬眼梢肉 製火腿法
俗名火腿出金華者佳金華六屬皆有惟出東陽

浦江者更佳其醃腿有冬腿春腿之分前腿後腿之別冬腿可久留不壞春腿交夏卽變味久則蛆腐難食又冬腿之中獨取後腿以其肉細厚可久藏前腿未免較遜蓋金華一帶人家多以木甌撈米作飯不用鑊煮飯湯醃厚者以飼猪其養猪之法擇潔淨欄房早晚以豆渣糠屑餵養兼煮粥以食之夏則兼飼以瓜皮菜葉冬飼必以熟食調其饑飽察其冷暖故肉細而體香茅船漁戶所養尤佳名船腿其腿較小於他腿味更香美凡金華冬腿三年陳者煮食氣香盈室入口味甘酥開胃異

本草綱目拾遺

卷九

醃臘

常爲諸病所宜。東陽縣志薰蹄俗謂火腿其實烟薰非火也醃曬薰收如法者果勝常品以所醃之鹽必台鹽所薰之烟必松烟氣香烈而善入製之及時如法故久而彌旨另一種名風蹄不用鹽漬名曰淡腿浦江爲盛本邑不多。陳遠夫藥鑑浦江淡腿小於鹽腿味頗淡可以點茶名茶腿陳者止血痢開胃如神。陳芝山食物宜忌火腿醃過晾燥高挂至次年夏間者愈陳愈妙出金華府屬邑者佳。常中丞筆記蘭薰金華猪腿也南省在在能製但不及金華者以其皮薄而紅薰淺而

香是以流傳遠近目爲珍品然亦惟出浦江者佳其製割於冬月用鹽勻稱使肉堅實不敗最上者曰淡腿味美香潔可以佐茶各處皆無此製蓋此地畜豕闌圈清潔俟其將茁壯時卽宰剝醃曬或曰其豕種原異他處而又得香溪等水飼之亦近乎理。陳瑤藏藥秘訣凡收火腿須擇冬醃金華猪後腿爲上選皮薄色潤日照之明亮通體隱隱見內骨者佳用香油遍塗之每個以長繩穿腳排勻一字式下以毛竹對破仰承以接油置之透風處雖十年不壞倘交夏入梅上起綠衣亦無害或

本草綱目拾遺

卷九

醃臘

生毛蟲見有蛀孔以竹簽挑出用香油灌之如剖切刺者須用鹽塗切口肉上荷葉包好懸之依此可久留不壞。朱氏僕葛三言少時曾備金華習其業知醃腿法甚詳云火腿金華六屬皆有總以出浦江湯家村者爲第一村止一二千戶皆養猪作腿其猪不甚大極重者不過七八十觔製爲腿乾之不過三四觔或五六觔不等四時皆可醃惟冬腿爲第一冬醃者皮細無粟眼手摸之潤膩切開無黃膿爪灣可久留不蛀他時者皆易蛀春腿多粟眼夏腿爪直秋腿皮粗醃法每腿十觔用炒

鹽四兩以木刻植如人手掌狀糝鹽後用掌植輕
輕揉擦四圍兼到侯皮軟如綿然後入缸缸面蓋
以辣蓼竹匾覆之待七日後有酒翻攪一轉令上
下勻再以炒鹽四兩如前法以手揉醃入缸十日
後出缸即用缸中原計洗淨一一以草繩縛足挂
懸風處惟冬醃者不滴油

味鹹甘性平。陳芝山云和中益腎養胃氣補虛
勞。陸瑤云生津溢血脈固骨髓壯陽止泄瀉虛
痢尋勞怔忡開胃安神

本草綱目拾遺 卷九 嘉香肉

腹痛或三四日不止。筆苑仙丹火腿肉煎湯入
真川椒在內撇去上面浮油乘熱飲湯立愈累驗
久瀉。救生苦海陳火腿腳爪一個白水煮一日
令極爛連湯一頓食盡即愈多則三服此子宗人
柏雲屢試屢效之方也百草鏡云火腿出浦江縣
脛骨細者真陳者佳皮上綠徽愈重其味愈佳須
洗去垢及黃油用

嘉香肉

食物宜忌云又名家鄉肉出浦江者最佳。藥鑑
云家鄉肉金華屬邑俱有之秋即醃給客販入省

城市賣其肉皮白肉紅鮮氣香美不似他處醃猪
肉色少鮮澤也但一入杭城店便加硝滷投缸中
浸透然後出售蓋不爾則肉味淡反不美而秋時
尚暖不漬透硝滷又易腐臭也肉為硝漬食之恐
乏補益不似火腿冬醃陳久者為佳然今店中所
售火腿均以家鄉肉腿風乾至次年皮上起綠衣
充陳火腿賣人多不察若療病作食餌須真金華
腿方有效也

味鹹甘性平。陳芝山云補虛開胃。百草鏡云
平肝運脾和血生津。藥鑑云滋腎健足力

本草綱目拾遺 卷九 嘉香肉

敏按芝山所言乃未經杭肆滷漬之肉故能補虛
若經滷漬透便能燥肺凡肺痿陰虛咳嗽者恐非
所宜產婦虛勞須補者亦忌其肥肉得硝滷入腹
即成痰體肥作痰者亦不宜多食倘食之作痰者
仁研食可解
附治箭鏃不出方 家寶方用陳年醃肉去皮取
紅活美好者同其肥細切剉濃將象牙末及人所
退爪甲為末共為研細拌入所剉肉內再為勻剉
令其合一厚敷箭鏃周圍約一飯頃其鏃即自迸
脫竟有迸至二三尺遠者

陳火腿骨

百草鏡云煨黑研用治食積及痢

治痢 救生苦海用陳火腿骨二根炭火煨灰篩

過加上白糖一兩米湯飲或滾水或酒調服無不

效。又方治赤白痢陳火腿骨灰陳皮炙草各一

兩為末蜜丸如棗豆大空心服一錢白痢用薑赤

痢用白湯送下。神錦方生火腿骨焙燥研極細

末無灰酒送下即止。醫林集秘用陳火腿骨煨

灰六兩飯鍋巴煨灰五兩砂仁炒三兩南山查炒

五兩共為末每服三錢久痢人參湯下紅痢紅糖

本草綱目拾遺

卷九

陳火腿骨

五

湯下白痢白糖湯下糞痢炒焦白朮三錢煎湯服

霍亂吐瀉藿香湯下

噤口痢 筆珠萃火腿骨煨一兩蓮肉二兩木香

七錢烏梅三錢醋糊為丸桐子大每服七丸麩餅

湯下

大人小兒積食諸藥不能消者 不藥良方陳年

火腿骨煨黑色研末三錢用火肉一觔煮熟去汁

上肥油取清湯一碗將末送下

鼠咬 救生苦海陳火腿骨燒灰香油和敷

小兒臙梨瘡 販翁醫要陳火腿骨燒灰如搗加

礬少許麻油調敷不生髮用老薑擦

猪項上蜻蜒骨

燒灰塗一切頭頂疽毒凡腦疽鬢發對口等症麻

油調敷立愈 王聖俞手集

雄猪眼梢肉

能拔殭肉散毒滯劉羽儀經驗方治對口瘡用雄

猪眼梢肉三錢剝爛如泥加滑石末四錢和勻敷

患處頂上以膏藥蓋之拔去殭肉放出黃水即愈

製火腿法

李化楠醒園錄有醃火腿法每十觔猪腿配鹽十

本草綱目拾遺

卷九

猪腿醃法

五

二兩極多加至十四兩將鹽炒過加皮硝末少許

乘猪鹽兩熱擦之令勻置大桶內用石壓之五日

一翻候一月將腿取起晾有風處四五個月可用

金華做火腿每觔猪腿配炒鹽三兩用手將鹽擦

完石壓之三日取出又用手極力揉之翻轉再壓

再揉至肉軟如綿挂風處約小雪後至立春後方

可挂起不凍。戴義養餘月令有製火腿法十一

月內圈猪方殺下只取四隻精腿乘熱用鹽每一

觔肉鹽一兩從皮擦入肉內令如綿軟以石壓竹

柵上至缸內二十日次第三番五次用稻草灰一

重間一重疊起用焰草烟熏一週時挂在烟處初夏以水浸洗仍前挂之按此乃村鄉土醃火腿法要不及金華之蘭薰也然較之杭市醃臘店所買火腿則又不啻霄壤矣故並載其法。造火腿醬法用南火腿煮熟切碎丁如火腿過鹽先用水泡淡再煮去皮單取精肉用火將鍋燒得滾熱將香油先下滾香次下甜醬白糖甜酒同滾煉好然後下火腿丁及松子核桃瓜子等仁速炒翻取起磁罐收貯其法每腿一隻用好麵醬一觔香油一觔白糖一觔核桃仁四兩去皮打碎花生仁四兩炒

本草綱目拾遺 卷九 製火腿法

去衣打碎松子仁去衣四兩瓜子仁二兩桂皮五分砂仁五分

本草綱目拾遺鱗部目錄

脆蛇 環蛇 翠蛇

碧飛 鱗油 斷草烏

龍涎香龍泄 西榜魚 鱗魚鱗

苦魚 金魚 阿羅魚

溪陂魚 四足魚 河豚目子

蜣蝦魚 蜜姑魚 雪齡

帶魚 血鱗 沙魚翅

土附 烏魚蛋 青魚膽

白皮子 鮓魚

本草綱目拾遺 卷十 目錄

本草綱目拾遺介部目錄

海龍 海牛 白鼈

鼈膽 煙殼 海螂

吐鐵 田螺涎 蛤蜊肉

蜆腊 蚌淚 西施舌

石蚶 乾蝦蝦米 鶯爪

蝦醬 石上螺螄

本草綱目拾遺卷十目錄

本草綱目拾遺蟲部目錄

雪蝦蟇 海參 隊隊

風蛤 飯蒼蠅 蠨蜂

蜜蜂 苦蜜 蜜虎

蟾皮舌 土檳榔 蝦螯黃

藥蜂針 驢龍 龍蝨

淨蟲糞 蟋蟀 蛇蟻

淮東子 燈蛾 蠅虎

竈馬 水馬 壁蝨

叩頭蟲 沙雞母 禾蟲

本草綱目拾遺卷十目錄

茄裸蟲 梭蟲 蔗蛄

桃絲竹蠶 牙皂樹蟲 黃麻梗蟲

芝麻蟲 桐蛀 牛膝蛀

山螞蟻窠子 蛆窠 死人蛆人疥

虹蟲

本草綱目拾遺卷十

錢塘趙學敏恕軒氏輯

鱗部

脆蛇

雲南志順甯府出脆蛇見人則斷人去復續取而乾之可治腫毒○滇黔記遊出滇黔土司長尺餘伏草莽見人輒躍起跌數段頃復合一色如白金光亮悞拾之觸毒即斃○陳鼎蛇譜脆蛇產貴州土司中長尺有二寸圓如錢嘴尖尾禿背黑腹白暗鱗點點可玩見人輒躍起數尺跌為十二段須臾復合為一不知者悞拾之即寸斷兩端俱生頭鬚人即斃出入往來恆有度捕之者置竹筒於其逕側則不知而入其中急持之方可完稍緩則碎矣故名曰脆于家多蓄奇藥曾購得其腊見寸斷處皆光潤如新截然亦一異也○查慎行人海記脆蛇出崑崙山聞人聲即寸斷人伺其斷鉗取之須寸各異處待風乾入藥若少頃無人聲寸寸仍續成蛇

本草綱目拾遺卷十 脆蛇

治色癆及驚疑喪膽諸症玉鏡新談
肉熬膏箍癰疽去風癘其骨醋磨圍腫毒良

接斷骨 滇黔記遊脆蛇人得而腊之用接斷骨

價值兼金視其上中下治頭腹脛股無不效

大麻風 痢 滇暑脆蛇一名片蛇產順甯大候

山中長二尺許遇人輒自斷為三四人去復續乾

之色如黃金治惡疽腰以上用首以下用尾又治

大麻風及痢近人貨之為夾棍藥

環蛇

蛇譜云出三佛齊國如環大數圍至數十圍者逐獸即疾走如轉車輪於千仞山獸入環中即斃其口眼俱生環之半與尻相對

本草綱目拾遺卷十 脆蛇 環蛇 碧飛

脂 服之刀劍不能傷

翠蛇

珍異藥品云形如曲蟮長可五六寸蟠旋作圈

治癩毒癰疽良

碧飛

湖州府志武康山多蝮蛇名碧飛大者如團囊小亦如杯案斧首出目鋸齒方交而綬色厥雄赤紫厥雌青黑色睛睛如蜃甲光目亦如之山中人謂有目而無視也春夏布絲草篠人物觸絲激射迅於矢忽不見已攫肉去矣殺人至死霜降絲脆升

高樹杪施吐白涎烏鵲下啄則吞之惟鹿以為膳
獵獲之前左足扼其腰中首尾盤繞右足又趾寸
解啖無餘者人得而腊之可入藥凡西北諸山自
餘英嶺而內皆是物也

治風痺蝟傷人被其齧者還食其肉則生

敏按湖志所言碧飛吾杭山鄉多有之土人名方
勝板以其遍身花紋如錦中方勝形匾似板故名
蟻人最毒惟野猪能食之土人言冬日蛇蟄地中
野豕嗅其氣輒翻石掘土出而啖之蛇性大熱野
猪食三條即能過嚴冬綱目蝟虺為二蝟即方勝
本草綱目拾遺 卷十 碧飛 蟻油

蝟油

爾雅蝟王蛇注蛇中之最大者故曰王蛇今深山
處處有之大小不一色如菜花蛇而較黃頭上皆
有王字亦有黑色者土人名曰烏蝟捕蛇者有呼
蛇法不拘何種蛇呼之即至末後俟蝟到則諸蛇
皆圍伏不動聽其擇取惟不敢傷蝟蝟傷則諸蛇
無主環起噉人聞其人云蝟蛇自有此種生而皆

有王字故不論大小也蝟至則諸毒蛇皆不敢傷
人

治漏瘡 集驗取蝟油銅鍋內熬熟隨將黃蠟入
油內攪勻油紙攤膏貼患處十餘日便封口全愈
按蝟蛇名王字蛇其首天生有一王字子於庚子
在奉化長橋見丐者手握此蛇乞錢其蛇亦不甚
大性頗馴良因以千錢買得縱之綱目諸蛇獨遺
此因急補之

斷草烏

粵志斷草烏出廣中蛇也大僅指許長五六寸頭
本草綱目拾遺 卷十 斷草烏 龍涎香

如龍形而小身純烏其行也百草沾之立斷人見
斷草輒跡得之故蛇每離地丈許使身如矢直以
入穴使不沾草人莫得而跡之此亦烏蛇中一種
綱目烏稍蛇不載龍頭者一種故錄其遺

治大麻風煮酒服

龍涎香

通雅龍涎有嶼在花面國傍獨立南海中彼人言
於樹收之最收香氣今大內甜香用之○澳門記
畧大食國產龍涎香為上西洋產於伯西兒海焚
之則翠烟浮空結而不散坐客可用一翫以分烟

縷。○嶠南璣記龍涎香新者色白久則紫又久則黑白者如百藥煎黑者次之似五靈脂其氣近臊和香焚之則翠煙浮空不散試法將結塊者奮力投沒水中須臾突起浮水面或取一錢口含之微有腥氣經宿其細沫已噉餘膠結舌上取出就濕秤之仍重一錢又乾之其重如故雖極乾枯用銀簪燒極熱鑽入枯中乘暖抽出其涎引絲不絕驗此不分褐白褐黑俱真海東札記海翁魚大者三四千觔小者千餘觔即海鯨也皮生砂石刀箭不入或言其魚口中噴涎常自為吞吐有遺於海濱

本草綱目拾遺

卷十

龍涎香

五

者黑色淺黃色不一即龍涎香也聞上淡水有之欲辨真贋研入水攪之浮水面如膏以口沫擦成丸擲案有聲噲之通宵不耗分毫者為真每兩值數十金廣志新安有龍穴洲每風雨即有龍起去地不數丈朱鬣金鱗兩目如電其精華在浮沫時噴薄如澹泉如雨土人爭承取之稍緩則入地中是為龍涎或謂龍涎多積於海上枯木如鳥遺狀其色青黛其香腥雜百和焚之翠烟千結蜿蜒蟠空經時不散可以翦分香縷然多不真從番舶來者出大秦波斯於雨中焚之膈膊有聲者真坤輿

圖記龍涎香黑人國與伯西兒兩海最多有大塊重千餘觔者望之如鳥每為風濤湧泊於岸諸蟲鳥獸亟喜食之汪機本草龍吐涎沫可制香。星槎勝覽錫蘭山國卜刺哇國竹步國木骨都束國刺撒國佐法兒國忽魯謨斯國溜山洋國俱產龍涎香。稗史彙編龍涎香白者如百藥煎而膩理極細黑者亞之如五靈脂而光澤其氣近於臊似浮石而輕香本無損益但能聚香耳和香而用真龍涎焚之則翠烟浮空結而不散坐客可用一翦以分烟縷所以然者入鼻氣樓臺之餘烈也泉廣

本草綱目拾遺

卷十

龍涎香

六

合香人云龍涎入香能收斂腦麝氣雖經數十年者香味仍存。廣東通志龍涎在水采者褐黑色在山采者褐白色。東西洋考海傍有花若木芙蓉花落海大魚吞之腹中先食龍涎花噉入久即脹悶昂頭向石上吐沫乾枯可用惟糞者不佳若散碎皆取自沙滲力薄。范咸臺灣府志龍涎香傳為鯨魚精液泡水面凝為涎能止心痛助精氣以淡黃色嚼而不化者為佳出淡水者皆淡黃色無黑色。朱國楨大政記龍涎香出蘇門答刺國西有龍涎嶼時南巫里大洋之中羣龍交戲其上

遺涎焉國人駕獨木舟伺採之舟如龍形浮海面人伏其中隨風潮上下傍亦用漿龍遇之亦不吞也每一觔值其國金錢一百九十二枚准中國銅錢九千文嘉靖三十四年下戶部取香百觔遍市京師不得下廣東藩司採買部文至臺司集議懸價每觔銀一千二百兩僅得十一兩上進內驗不同姑存之亟取眞者部文再至廣州夷囚馬那別的貯有一兩三錢上之黑褐色密地都密地山夷人繼上六兩白褐色細間狀之黑者採在水白者採在山皆眞不贗尋有密地山商再上通前共得

本草綱目拾遺

卷十 龍涎香

七

十七兩二錢五分次年進入內辨驗是眞許畱用自後夷船聞上供稍稍挾來市始定價每一兩價百金龍涎之爲用也入香合和能收斂腦麝清氣雖數十年香味仍存得眞者和香焚之翠烟裊空不散涎沫有三品曰汎水曰滲沙曰魚食汎水則輕浮水面善水者伺龍出取之滲沙則凝積年久氣滲沙中魚食則化糞於沙磧惟汎水者可食香用又言魚食亦有二種海旁有花若木芙蓉春夏間盛開花落海大魚吞之若腹腸先食龍涎花嚥入久卽脹悶昂頭向石上吐沫乾枯可用惟糞

者不佳○嶺南雜記諸香龍涎最貴市值每兩不下百千次亦五六十出大食國近海有雲氣罩山間知有龍睡下或半年一二載土人守視雲散則龍已去必得其涎五七兩或十餘兩眾共分之又大洋中有渦旋處龍在其下湧出之涎日燥成片風漂至岸取之又嶺外雜記龍枕石而睡涎浮水積而堅新者色白久紫甚久者黑氣近燥形如浮石而輕膩理光澤入香焚之翠烟浮空結而不散又出沒海上吐出涎沫有三品一汎水二滲沙三魚食汎水輕浮水面善水者伺龍出隨取滲沙凡

本草綱目拾遺

卷十 龍涎香

八

風浪飄泊舟嶼積年氣盡於沙土中魚食涎作糞散沙磧氣腥穢進貢亦不過四兩按龍涎論色則瑣記言有白與紫黑之分而札記又有淺黃色廣志有青鱗色辨眞僞亦諸說互異大抵不必論其色總以含之不耗投水不沒雨中焚之能爆者良東壁綱目鱗部龍下龍腦龍胎俱有主治而於龍涎獨遺之惟附其名云龍涎方藥鮮用惟入諸香云能收腦麝數十年不散出西南海洋春間羣龍所吐涎沫浮出者番人採貨之亦有從大魚腹中剖得者其狀初若脂膠黃白色乾

則成塊黃黑色如百藥煎而膩理久則紫黑如五靈脂而光澤其體細飄似浮石而腥臊其說亦未確核蓋所云魚腹中得者即札記所云海鯨魚之精也亦名龍涎出臺灣不若大洋中產者佳夫龍腦龍胎世上所無龍涎則閩粵貨售者多東壁何得於罕見者載之於所有者反畧之耶則甚矣該博之難也入藥用隔湯頓化如膠糖狀者佳

氣腥味微酸鹹無毒。藥性考味甘氣腥性潛。張瑤實云夾砂者有小毒乃土人於砂磧上收取之入藥須以甘草水煮過用。酉陽雜俎云龍蔡

本草綱目拾遺 卷十 龍涎香

遇烟煤則不散入藥忌鐵器及石膏

活血益精髓助陽道通利血脈。廖永言驗方云利水通淋散癥結辟精魅鬼邪消氣結逐勞蟲尸疰。陳良士云在澳門見倭夷用合船硫及他藥作種子丸云漢時術士和丹用此倭夷皆有其方祕不傳中國。札記云出淡水者止心痛助精氣。周曲大云龍涎能生口中津液凡口患乾燥者含之能津流盈頰微若有腥氣粵中夷人合龍涎丸和以他藥便不腥入口亦不耗滅一丸可用數十年不敗如單用龍涎入藥須先用雞湯將龍涎

制死則入腹便化否則入腹絲毫不損蓋極難化者方書云焚之其烟能入水孟子嘗試之多不驗

按龍乃東方之神其體純陽能噓氣成雲陽之質輕浮故雲上升其骨反入手足少陰厥陰經者蓋凡知覺運動之物皆肖陰陽以立體孤陽則不生龍秉純陽而骨反屬陰入藥能收陽中之陰治心腎諸病所謂一陰一陽之謂道也其質靈其齒能治魂遊不定鎮驚癇凡病在肝而龍主肝木治之最神涎乃陽中之陽故其氣絕香龍屬木木之氣

本草綱目拾遺

卷十 龍涎香 龍泄

十

得太陽多者必香故諸香以龍為最得孟水徑撲其中不落空外龍以水為用見水則精入焉入藥所以能利水道分陰陽能殺精魅鬼邪者亦以至陰之物見真陽而立解也

龍泄 河南薛姓客言曾在嘉興永太守處見有龍泄結成大塊其質亦輕有六七兩及觔許不等每塊皆起螺旋紋如象牙花紋其色有純黑有褐白二種欲辨真偽刮屑少許以滾水泡之其氣悉滲而成雲遇婦人雲輒撲入髮際旋繞不散蓋龍性好淫故也人服之入腹亦不耗惟見雞湯輒化

如服後不食雞湯次日糞出其藥仍在色亦不改
淘出洗淨復可再用氣亦不臭其功效食之能煖
婦人子宮冷男子下元虛冷入房術中用又史良
宇言曾見龍血結塊如棋子大光滑可鑿觸手冷
如冰夫龍純陽也而血獨冷又不解何故龍泄又
何物也其涎與血歟抑精與溺歟俱不可知悉存
其說以俟証

西楞魚

坤輿圖說大東洋海產魚名西楞上半身如男女
形下半身則魚尾其骨入藥用女魚更效

本草綱目拾遺

卷十 龍泄 西楞魚 鱒魚鱗 十一

止血治一切內傷瘀損等症

鱒魚鱗

本經逢原鱒魚性補溫中益虛而無發毒之慮其
生江中者大而色青味極甘美生海中者小而色
赤味亦稍薄觀其暗室生光迥非常魚可比○綱
目主治言其肉補虛勞油塗湯火傷於集解下記
其鱗花婦人鈿飾不及入藥功用○張佳時云鱒
魚須乘活時拔划水邊二鱗尖長者佳若死魚鱗
便減藥力

湯火傷 逢原云用鱒魚鱗香油熬塗立效茅集

之云鱒魚鱗貼腿瘡疼痛立效

治疔 陳氏傳方疔瘡用鱒魚鱗貼上則咬緊先
須與酒飯吃飽然後將魚鱗邊畧畧揭起些須用
力急揭去疔根便帶出也但揭出疔根時極痛無
比非醉飽卽暈倒也○傅氏方水疔用鱒魚腮下
近腹處有划水二瓣瓣間有長鱗二瓣最佳但難
得今人以背上大鱗代之貼上卽消○毛世洪經
驗集鱒魚鱗用手刮下不可見水陰乾收貯此拔
疔第一妙藥也用時以銀針撥開疔頭將一片貼
上以清涼膏蓋之俟一宿揭開其疔連根拔出後

本草綱目拾遺

卷十 鱒魚鱗 苦魚 十二

用生肌散收功予治兩貴婦大腳趾患瘡二三年
不收功將鱗一片以銀花湯浸軟拭乾貼之不數
日而愈

下疳 救生苦海鱒魚鱗焙乾煨研白色名白龍

丹敷之卽愈得此可包醫

血痣 蔡雲白言人生血痣挑破血出不止者用

鱒魚鱗貼之卽痂而愈

苦魚

劉基苦齋記匡山在處州龍泉縣劍溪之水出焉
注入大谷其中多斑文小魚狀如吹沙味苦而微

辛可食故名

解酒毒可以醒酒

藥性考苦魚微辛形細色斑烹食腴美消酒除癆
金魚

此魚自宋南渡始有一名硃砂魚乃人家蓄玩於
盆盎中者有三尾四尾品尾金管銀管之分有蛋
魚名龍蛋文蛋虎頭反鱗諸品純紅純白或紅白
相間體具五色極大者三四寸小者寸許綱目金
魚條云主治痢而所用乃金絲鯉魚按金魚雖有
鯉鯽諸種殊不知鯉魚中一種紅鯉名金鯉鯽

本草綱目拾遺 卷十 苦魚 金魚

魚中一種紅鯉名金鯉皆有金魚之名與此全別
而東壁台為一則誤矣

味苦微鹹有小毒食之令人吐綱目本條氣味下
云甘平無毒此指紅鯉而言並非今之金魚也

解服滷毒用金魚一二枚搗之灌下吐出涎水自
甦

治瘋癲石殿水殿黃疸 慈航活人書俱用紅色
金魚一個取三尾者甘蔗大者一二枚同搗爛絞
汁服立刻即吐出痰涎愈

阿羅魚

一首十身背如吠犬亦可禦火珍異

療癰疽

美陂魚

輿地志鄆縣美陂出魚味美可入藥

治痔

四足魚

物理小識游子六日閩高山源有鱉魚如指大其
鱗即皮四足可調粥入藥

治小兒疳

河豚目子

本草綱目拾遺 卷十 四足魚 鱉魚 河豚目 鱉魚 古

逢原云挾河豚目拌輕粉埋地中化水拔婦人腳
上雞眼瘡可以脫根

河豚子

性有毒可絕壁蝨行篋檢祕同鱉殼樟冰各五分
拌棉花子安牀下燒烟熏之

蜆蝦魚

三才藻異產撫仙湖狀如龜殼青大如蟹無尾八
足腹白

食之辟瘴毒

蜜姑魚

宦遊筆記自光溪入四明二十餘里有蜜巖峭壁千尋下臨深溪窅洞無底巖頭舊有蜂窠聚蜂數百萬其蜜滴下溪魚食之故魚味甘絕曰蜜姑魚其釣法倍多曲折魚性極喜苔須懸崖下有水衣演漾深碧而細者則以爲餌魚性暴遇釣則跳宕卒不可制而蜜巖下溪水清甚用粗縷則恐魚之瞥見而驚遊也用細絲則又恐不足以勝魚跳宕之力釣者乃取絲長十餘丈盤於竿上遙望見深波中魚翻翻鼓鬣而至則取絲徐徐放之如小兒之送紙鳶者使得縱其所往魚入鉤果躍數

本草綱目拾遺

卷十

蜜姑魚

十五

尺翻波跋浪橫激溪面其鱗光閃爍如千片碎金雜珠顆中隨風散灑觀者莫不目眩心動已而徐徐力倦乃可取之

性溫味甘食之生胃津益肺氣補血脈增髓去熱除虛羸壯筋骨止嗽定喘功同燕窩蛤蚧也按此魚最潔惟食苔蜜苔寒而蜜溫得水火既濟之力大能補土生金燕窩性清肅而下行蛤蚧性和中而溫臟此則故能兼之其勞嗽虛羸之食品上藥也柳崖外編載張方海浙人少年讀書四明山斷炊者數月山澗谷多竹峭壁有蜜蜜入江化

爲魚名蜜鮎張遂搨笄釣鮎而食自言笄味淡以清蜜鮎濃而美有天台胡麻所不如者嗣後遂輕身耐寒暑不復思烟火味據此則其功用信不誣也

雪鮎

粵語鮎魚廣人池塘多蓄之以魚秧長成與鮎性相反鮎屬土其性沉長潛水中鮎屬水其性浮長躍水上鮎食之可以實腸鮎食之可以行氣鮎守而鮎行性各不同如此其物以冬而肥故名喜泳浮波上得湊流則跳躍尋丈生食之益人氣力○

本草綱目拾遺

卷十

蜜姑魚

雪鮎

帶魚

十六

梧潭雜佩鮎魚形似鱣而稍短味甚美作膾尤佳健筋骨活血行氣逐水利濕

帶魚

出海中形如帶頭尖尾細長者至五六尺大小不等無鱗身有涎乾之作銀光色週身無細骨止中一脊骨如邊箕狀兩面皆肉裹之今人常食爲海鮮據漁海人言此魚八月中自外洋來千百成羣在洋中輒啣尾而行不受網惟釣斯可得漁戶率以乾帶魚肉一塊作餌以釣之一魚上釣則諸魚皆相啣不斷掣取盈船此魚之出以八月盛於十

月霧重則魚多霧少則魚少率視霧以為貴賤云
 綱目無鱗魚條獨遺此品故為補之。五雜俎閩
 有帶魚長丈餘無鱗而腥諸魚中最賤者獻客不
 以登俎然中人家用油沃煎亦甚馨潔。福清
 志帶魚身薄而長其形如帶無鱗入夜爛然有光
 小者俗名帶柳。物鑿帶魚形纖長似帶脚尾而
 行漁人取得其一則連類而起不可斷絕至盈舟
 溢載始舉刀割斷捨去其餘。玉環志帶魚首尾
 相脚而行釣法用大繩一根套竹筒作浮子順浮
 洋面綴小繩一百二十根每小繩頭上拴銅絲一
 尺銅絲頭拴鐵鈎長三寸即以帶魚為餌未得帶
 魚之先則以鼻涕魚代之凡釣海魚皆如此釣期
 自九月起至次年二月止謂之魚汛。朱排山相
 圓小識帶魚生海中狀如鰻銳首扁身大眼細齒
 色白無鱗脊骨如篋肉細而肥長二三尺形如帶
 亦謂之裙帶魚冬時風浪大作輒釣得之藁為鯨
 以致遠

味甘性平和中開胃食物
 帶魚形長扁薄似帶色白無鱗肉細佳膾醃鮑風
 乾久藏不敗煎烹味美多食發疥註帶魚脚尾而

行得一可連數十醃食佳黑夜有光故有毒藥性
 血鱈
 出浙江甯波府慈谿縣以白龍潭產者為第一他
 產者尾尖尚黑不能通體如硃砂紅也葛三春言
 白龍潭血鱈周身紅如血每年所產亦稀取其血
 沖酒飲可以驟長氣力行伍中學習入段錦工夫
 者多服之
 增氣力壯筋骨益血填髓
 沙魚翅
 沙即鮫魚種類甚多皆可食綱目鮫魚條集解下
 本草綱目拾遺卷十血鱈 沙魚翅

瀕湖註云沙魚腹下有翅味並肥美南人珍之主
 治下特載其肉皮膽之功用翅獨畧焉今人習為
 常嗜之品凡宴會餽饌必設此物為珍享其翅乾
 者成片有大小率以三為對蓋脊翅一划水翅二
 也煮之折去硬骨檢取軟刺色如金者淪以雞湯
 佐饌味最美漳泉有煮好剔取純軟刺作成團如
 胭脂餅狀金色可愛名沙刺片更佳
 味甘性平補五臟消魚積解蠱毒食物益氣開膈
 托毒長腰力閩部清痰開胃進食藥性
 土附

嘉興縣志一名菜花魚以其出於菜花時最肥美故名程大昌演繁露土部吳興人呼為鱸鱧以其質圓面長與黑鱧相似其鱗斑駁又似鱸魚故兩名之長興謂之蕩部又曰蕩魚湖州府志鮒魚今呼土部此魚質沉常附土而行不似他魚浮水遊也故又名土附錢塘縣志土驚俗名土哺以清明前者佳藻異云吐哺產杭本名土附以其附土而生也色黑味美兩航雜錄吐哺或曰食物嚼而吐之故名攷按以上諸說皆無杜父之名而綱目載杜父魚云其色黃黑有斑脊背上有鬚刺整人又本草綱目拾遺卷十土附

名渡父魚黃魴魚船釘魚伏念魚似與土附絕不相類沈雲將食纂陳芝山食物宜忌皆以為今之土部魚即杜父魚也此乃承山堂肆考之誤今土部杭城甚多一年皆有惟正二三月獨旺背黑亦有淡黑帶土黃色者不聞能刺人俗云此魚立冬後則伏土閉眼不食冬至後出土附土而行清明後開眼遍食小蟲蝦故有葶陳芝山云土部清明後頭上生紅蟲不可食細核其形狀食性與杜父全不相類何能強合予故於禽蟲考中魚類辨之甚詳以杜父入吹沙類而另立土附本條蓋不敢

附古人而欺後世也土部綱目所無復為補之味甘性溫。補脾胃治噎膈除水腫濕氣療一切瘡疥此物又能扶陽其子用燒酒醉食頗能興腎與對蝦同功以其食蝦力也

子 助相火煖腰腎

烏魚蛋

產登萊乃烏賊腹中卵也藥性考以為即雉魚白味鹹開胃利水

青魚膽

梧潯雜佩青魚膽出藤縣之福福字不見字書讀如萱郡人亦有此

本草綱目拾遺卷十土附 烏魚蛋 青魚膽 白皮子

姓州州在江中長可五六里許其上居民甚多小多石上青苔此魚食之其膽極涼可入藥他處即不堪用魚大者百餘觔漁人網得必以聞官剖取其膽乃鬻於市

白皮子

蟬史蛇生南海四五月初生如帶至六月漸大如盤形似白綠絮而無耳目口鼻鱗骨一段赤色破碎者謂之蛇頭其肉如水晶以明礬醃之吳人呼為水母鮮从則漸薄如紙俗呼為白皮紙按今所云白皮紙乃海蜇外面之皮非陳久之海蜇也一

名秋風子。朱排山柑園小識海蛇上有白皮潔白脆美過於海蛇謂之白皮子。綱目載海蛇名水母人以石灰礬水醃之去其血水色乃白其形最厚者謂蛇頭味更勝云而不錄其外皮之用且其言性暖可治河魚腹疾而農田餘話云水母本陰海凝結之物食而暖其性未詳東壁亦無發明敏曾居東甌數年見土人販鮫為生者詢之據言其物確係海水所結東南海俱鹹遇春夏天雨在海中者一滴雨水入海輒有一小泡凝聚海面初則大如豆隨波逐蕩受日烘染漸長大成形如笠

本草綱目拾遺

卷十 白皮子

王

上頭下腳塊然隨潮而行土人撈鮫者每於海塗間插竹為小城以稻草作網圍之潮長鮫隨潮而來入竹城為網所絡不得去然後取之以刃斃其中段若然而開有似腸胃穢積者落落交下名蜚花食之亦最美再以礬灰醃而售之按海為陰水天雨水屬陽相入而感便生此物受太陽真氣所以日漸長大而性暖也

味鹹濇性溫消痰行積止帶祛風

貼爛腿 救生苦海用白皮子照瘡大小剪作膏貼內摻銀硃

無名腫毒 集聽方用白皮子一片白糖霜揉軟中開一孔貼土重者瀆輕者散又止痛

流火 文堂集驗取海蜚皮薄者貼上燥則易之

頭風 貼兩太陽能拔風濕外出

膝贖風濕 以白皮子貼之

消痞 王聖俞云有二方一用白皮子同葶薺燒酒浸服一用白皮子葶薺同煮止食葶薺自消痞也。程克庵云凡小兒一切積滯用葶薺與海蜚同煮去蜚食薺則諸積自消亦以積非寒不滯而成海蜚能暖水臟葶薺化堅相因而用其效故捷

也同壽錄載其方治痞用大葶薺一百個古錢二十個海蜚一筋皮硝四兩燒酒三筋共浸七日後每早喫四錢加至十個止即愈

本草綱目拾遺

卷十 白皮子

鮫魚

王

鮫魚

滇程記雲南百夷中有小孟貢江產鮫魚彼夷食之日御百婦故夷性極淫貴賤俱數妻其地亦產鸞薑。說畧云鮫魚產孟貢江壯者恆多牝而遊夷人常食其肉一日能御百女入藥用雄者壯陽道固精髓八十老翁服之多子

介部

海龍

赤嵌集海龍產澎湖澳冬日雙躍海灘漁人獲之號為珍物首尾似龍無牙爪大者尺餘入藥譯史此物有雌雄雌者黃雄者青

功倍海馬益房箔催生尤捷效握之即產

百草鏡云海馬之屬有三小者長不及寸名海蛆不入藥中等者長一二寸名海馬尾盤旋作圈形

扁如馬其性温味甘煖水臟壯陽道消痕塊治疔腫產難血氣痛海龍乃海馬中絕大者長四五寸

本草綱目拾遺

卷十

海龍

海牛

三

至尺許不等皆長身而尾直不作圈入藥功力尤倍雖同一類形狀微有不同此物廣州南海亦有之體方周身如玉色起竹節紋密密相比光瑩耀目誠佳品也。介語蝦姑一名海馬其扁如蜈蚣者燒服主夜遺

海牛

本草原始海牛生東海海蠃之屬頭有角如牛故名其角硬尖銳有紋身蒼色有龜背紋腹黃白色有筋頂花點魚尾今房術中多用之氣味鹹温無毒主治益腎固精與陽

白鼈

粵志白鼈可以治痰火其初得之神授廣人甚珍之有口號曰烏耳鱗白甲魚滋陰降火只須與一名玉鼈龍以其背上儂起如鼉龍也連首白者長甲白而首足仍青者不及

補虛勞愈痰火滋陰降氣養血益精

隨膽

盧之頤云鼈無耳以眼聽故其目不可嘗識精於明復識於聽也不惟精專肝竅膽亦異衆而味大辛穹脊連脇脇亦少陽膽府所屬此木金交互故

本草綱目拾遺

卷十

白鼈

鼈膽

鱗殼

三

得聲色叠用而肝為膽藏取決更相親耳

本草乘雅云味辛開聲替除癥瘕痞積息肉惡陰

蝕痔核今人以入房術用風斯下矣

痔瘡痔漏 家寶方鼈膽一個取汁磨香墨入麝

香水片少許雞毛蘸塗

物理小識云鼈膽最辣通竅尤捷此人所未知者

鱗殼

綱目鱗條止載其肉云治冷痢補勞不及其殼之功用

治喉風急痺 萬選方用鱗殼置瓦上日曬夜露

經年取下色白如雪擣細水漂淨末曬乾同冰片吹喉專治咽喉一切急症立愈

海螵

杭州府志海螵杭俗立夏以為應時之味以花椒灑之麻油拌食。從新云此螺螵身細而長殼有旋紋六七屈頭上有厝春初起有海崖石壁海人設網於下一掠而取治以鹽酒椒桂按海螵有大如指長一二寸許者名釘頭螺温台沿海諸郡多有之海螵螺生海塗中立夏後有人見其羣變為童今人所稱豆娘是也或云此螺能跳丈許蓋

本草綱目拾遺

卷十 海螵 吐鐵

五

遷其處此物又能食蚶明州奉化多蚶田皆取苗於海塗種之久則自大時田者不時擣視恐有海螵苗蓋蚶不畏他物惟畏海螵蚶田中一有此物蚶無遺種皆被其吮食盡玉環出者大如指名釘頭螺

鹹寒治癩癧結核能降鬱氣

辟蛆 雲客傳方立夏日食海螵後以殼七枚勿令人見撒廁中或馬桶內暑日不生蛆蟲頗驗

吐鐵

沈雲將食物本草曰吐鐵海中螺屬也大如指中

有腹如凝膏白其殼中吐膏大於本身光明潔白可愛姑蘇人享客佐下酒小盤為海錯上品一名麥螺一名梅螺產甯波者大而多脂餘姚者不及生食之令人頭腫土人以鹽漬之去其初次涎便縮可食。海味索隱曰土鐵一名泥螺出甯波南田者佳五月梅雨後收製。會稽志吐鐵歲時舍以沙黑似鐵至桃花時鐵始吐盡見只編云九月可食蓋此物產泥塗以泥為食八月至九月不復食泥吐白脂晶瑩塗上比他月出者佳。福州府志吐鐵為海錯上品色青外殼亦軟肉黑如鐵

本草綱目拾遺

卷十 吐鐵

五

吐露殼外人以醃藏糟浸貨之四方別有小如菜豆者桃花時方有名桃花吐鐵產泉州者名曰麥螺。楷弟觀頤錄云吐鐵出海甯者無脂多泥肉韌不堪食出甯波者極大多脂無泥肉脆水洗三次用甜生白酒浸半日待鹽味出換白酒釀加燒酒或單用燒酒浸亦可必多入白糖藏久不壞。柑園小識吐鐵生海中微似扁螺殼薄而白肉青黑色大者多脂以鹽漬之可以致遠

甘酸鹹寒補肝腎益精髓明目

按吐鐵色青得甲木之氣以斥鹵為食不復他食

更得土之餘潤而生脂膏八九月不食土者以秋
金盛而木氣衰故吐泥而不食其能補肝腎益精
髓亦猶脾土得養化津液上升而并及耳目也東
壁以蓼螺爲泥螺味酸入肝二物形質不同性味
亦異則強合爲一誤矣此物又能潤喉燥生津予
庚申歲二月每患燥火入夜喉咽乾燥舌枯欲裂
服花粉生津藥多不驗一日市吐鐵食之甘至夜
咽乾亦愈可知生津液養脾陰之力大也

田螺涎

保元方田螺涎能去水腫用田螺不拘多少水漂
加香油一盞於水內其涎自然吐出取曬乾爲末
每服不過三分酒調下水自小便下氣自大便出
腫卽消再服養脾胃藥全愈

蛤蜊肉

厚殼紫口而圓者曰蛤蜊綱日本條下載其肉性
寒而關高武宗痘疹正宗以爲可發疹及治痘毒
入目取其汁點之說爲謬不知其肉惟性寒方能
解熱藥之毒正取其與丹石相反爲用耳
治癰疔痘毒 集聽載一捻金方治一切癰疽腫
毒初起最驗兼治疔瘡喉風蛇傷犬咬及小兒痘

毒乳香一錢雄黃三錢血竭錢半此三味不必製
沒藥一錢明礬一錢硃砂三錢紅信六錢麝香六
分蟾酥一錢蛤蜊肉二錢蜈蚣三錢甲片炒三錢
殭蠶一錢川烏一錢牙皂四錢共爲末以磁罐貯
之大人一分五釐小人七釐強者二分亦可將蔥
白三寸搗爛和藥爲丸好酒服下取汗再服不必
汗

蜆腊

蜆生沙泥中江湖溪澗多有其類不一有黃蜆黑
蜆白蜆金口玉口等名黃蜆殼薄肉肥黑蜆殼厚
肉薄又番禺章涌地方產無耳蜆更甘美異常凡
蛤之屬皆能孕子而黃蜆化蛾而散卵白蜆藉霧
以生形則又一異海南介語蜆在沙者黃在泥者
黑蜆老則肉出小蛾而蜆死小蛾復散卵水上爲
蜆凡南風霧重則多白蜆北風霧則否蓋白蜆之
生生於霧霧味鹹鹹爲白蜆所生之本始生時白
蜆之形如霧自空而下若無若有人見以爲霧也
漁人知之以爲天雨蜆子也蜆子既成以天暖而
肥寒而瘠在菱塘沙灣二都江水中積厚至數十
百丈是曰蜆塘其利頗大綱目蜆下集解尙欠詳

本草綱目拾遺

卷十

蛤蜊肉

三

石瀾海濱者為第一此物生沙中仲冬始有過正月半即無取者先以石礫礱磨沙岸使沙土平實少頃視沙際見有小穴出泡沫即知有此物然後掘取之綱目海蛤蛤蜊條中獨遺此今依吳氏從新本補之

甘鹹平益精潤臟腑止煩渴為補陰要藥從新

宦遊筆記西施舌似車螯而扁生海泥中一名沙蛤長可二寸常吐肉寸餘類舌俗以其甘美故名石蠅

俗呼龜腳煙海濱多有之古未聞入藥瀕湖獨增本草綱目拾遺卷十西施舌石蠅乾蝦

此品止載其能利小便不知其別有功用今依介語補之

朱排山柑園小識龜腳形似龜腳生海中石上殼如鱗螯其色紫可食即石蠅也江淹有石蠅賦

下寒游消積痞濕腫脹虛損人以米酒同煮食最補益介語

乾蝦蝦米 鶯爪 蝦子 對蝦

蝦生淡水者色青生鹹水者色白溪澗中出者殼厚氣腥以其得土氣薄也湖澤池沼中者殼薄肉滿氣不腥味佳海中者色白肉粗味殊劣入藥以

晰且其主治下殼肉蜆水皆載而蜆脂無聞焉特采介語以補解蠱并治不服水土介語

蚌淚

蚌中水也蚌生淡水中色蒼入肝故有清熱行濕治雀目夜盲之力綱目載蚌肉及蚌粉功用獨遺其殼內所含之水不知此水乃真陰天一之精入藥最廣特為補其缺

清熱安胎消痰除濕解酒積丹石藥毒

初生小兒啞驚逢原云用活蚌水磨墨滴入口中少頃下黑糞而愈

湯火傷用生蚌炙水塗之

西施舌

屠本峻曰沙蛤土匙也產吳航似蛤蜊而長大有舌白色名西施舌閩部疏曰海錯出東四郡者以西施舌為第一蠣房次之西施舌本名車蛤以美見諡產長樂灣中本草從新西施舌浙温州有之生海泥中似車螯而扁常吐肉寸餘類舌故名。敏按臨安館劉芳洲明府署中劉為諸城相國胞姪言介屬之美無過西施舌天下以產諸城黃

湖澤中者為第一以蝦煮曬乾去殼大者曰鶯爪小者曰蝦米又蝦子名曰蝦春錢唐入月朔盛時江濱人俟潮退後率於江沙淺水處撈取蝦子入市貨買黠者以腐渣攪和須取少許置銅銚中和鹽炒之色純紅者乃真多醃藏貯作來春食品綱目蝦及海蝦分條明晰於蝦內集解下載蝦米海蝦集解下載對蝦皆不立主治僅云充饌品而已故悉為補正其缺

本草綱目拾遺

卷十 蝦子

三

蝦米 味甘性平逐風痰 胡潛法製編有蛤蚧

蝦製法云食之補腎益陽蝦米一觔蛤蚧二枚茴

香蜀椒各四兩並以青鹽化酒炙炒以木香末一

兩和勻乘熱收新餅中密封每服一匙空心鹽酒

嚼下其妙

鶯爪 味甘性平治疣去癬 食物宜忌

治無乳及乳病蝦米酒 鮮蝦米一觔取淨肉搗

爛黃酒熱服少時乳至再用猪蹄湯飲之一日幾

次其乳如泉

宣吐風痰 不藥良方連殼蝦米半觔入葱薑醬

煮汁先吃蝦後吃汁緊束肚腹以雞翎探引取吐

赤白遊風 不藥良方蝦米搗碎敷之

蝦子 鮮者味甘醃者味鹹甘皆性溫助陽通血脈俱見食。敏按粵語云蝦春非蝦子也江中有水蠶大僅如豆其卵散布取之不窮然則蝦春之性當與蝦性有別陳芝山助陽之說或未加精核耳

本草綱目拾遺

卷十 蝦子

三

對蝦 粵志蟬蝦產鹹水中大者長五六寸出水則死漁人以絲粘網其深四尺有五寸六寸者爪立海中絲柔而輕蟬蝦至則鬚尾穿骨弗能脫也兩兩乾之為對蝦鮮者肉肥白而甘。朱排山柑園小識海蝦殼鬚鉞鼻背有斷節尾有硬鱗多足

而好躍大於溪河所生長尺餘鬚可為簪土人兩

兩乾之謂之對蝦以充上饌。宦遊筆記淮海產

對蝦長數寸兩兩乾之勾結如環烹以為羹味鮮

美居人往往以享客且可致遠或曰以雌雄為對

但當懷子既散之後雌雄亦無從辨至其出時自

正月望後始二三四月大盛端陽而後即香不可

得亦物理之不可推者也

補腎興陽燒酒浸服

治痰火後半身不遂筋骨疼痛 醫學指南核桃

仁棉花子仁杜仲炒巴戟砂骨碎補枸杞子續

斷牛膝各二兩大蝦米四兩兔絲餅四兩用燒酒二十觔煮服如年高者加附子肉桂各一兩酒服完將渣曬乾為細末蜜丸每服二錢酒送下

蝦醬

粵語蝦醬以香山所造為美曰香山蝦其出新甯大襟海上下二川者亦香而細頭尾與鬚皆紅白身黑眼初醃時每百觔用鹽三觔封定缸口候蝦身潰爛乃加至四十觔鹽於是味大佳可以久食解毒樹蠱 廣有毒樹蠱其樹無花結子如牛奶食之立死以蝦醬解之

本草綱目拾遺

卷十 石上螺螄

三

宦遊筆記遼東大凌河出蝦醬蝦油皆甘美平海又出一種小蝦名紅毛子作蝦醬尤佳今浙江甯波及蘇皆有蝦醬味亦佳

石上螺螄

俗名鬼螺螄形如海螄而小秋冬常在牆脚石隙中夏月在濕地青苔上取用洗去土

治黃疸 慈航活人書取石上螺螄半碗搗如泥無灰白酒頓熱沖服之

疔 濟世良方黃風膏治疔瘡及頭面熱毒瘡雄黃一兩釘銹白梅肉各五錢消風散一兩夏月加

鬼螺螄二十個共研細末苦鹽酒調勻貯磁罐內凡患疔腫毒瘡用銀針挑破毒頂敷上此藥以綿紙蓋定其毒收斂不走三日後即愈。黃氏醫抄取細長小鬼螺螄搗爛連殼敷患處露頭出膿次日即可消

拔疔 保合堂秘方鬼螺螄一個荔枝核三個煨存性白梅肉六個共搗爛成膏貼之取出疔根後用八寶丹收功

鼻疔 慈航活人書花盆中青螺二三個同鹽搗塗立效

本草綱目拾遺

卷十 石上螺螄

三

白火丹 集聽丹有五種青黃赤白黑黃白易治黑丹莫救青丹十日內可治赤丹亦然俱不可見燈火食鹽物治法取溪澗中鬼螺螄酒煮食即消瘰癧氣悶者食數次愈

三漏丸 活人書治穿屁漏通腸漏瓜藤漏皆濕熱之邪毒殺蟲退管穩當之劑土蜂窩煨鬼螺螄煨蟬蛻煨各七錢乳香沒藥川草薜酥炙陳棕煨管仲煨各五錢猪懸蹄甲煨十個刺蝟皮炙一個雷丸三錢黃蠟四兩化開加麻油六七匙入藥為丸桐子大每服六七十丸空心白湯下

145 20 (一) 升 黃參 日華本草 卷 0 反 巳 句

通經 周氏家寶鬼螺蛳十四個研碎油紙攤貼
臍上縛定週時此螺生在陰處

本草綱目拾遺

卷十 石上螺蛳

三五

蟲部

雪蝦蟇

憶舊遊詩話巴里坤雪山中有之醫家取作性命
根源之藥軍中人爭買之一枚價至數十金且不
易得也○朱退谷曾於吳門見之云遍身有金線
紋其形絕似蝦蟇

性大熱補命門益丹田能回已絕之陽功兼參附
火盛者不可服

內造伏虎丹 秘方集腋與陽種子強腎助神用
真川貝母四兩須四製第一次用大附子一個童

本草綱目拾遺

卷十 雪蝦蟇

三五

便一湯碗蒸切細乾燒酒三湯碗韭菜汁三湯碗
同入砂鍋將貝母煮乾去附子不用第二次用雪
蝦蟇一兩無則以大蛤蚧一對代之用石敲碎亦
用燒酒韭汁各三碗同貝母煮乾去蛤蚧不用第
三次用吳茱萸一兩亦用酒韭汁各三碗同貝母
煮乾去茱萸不用第四次用公丁香五錢亦用酒
韭汁各三碗同貝母煮乾去丁香不用製完其貝
母爛如泥置石臼中舂再入真阿芙蓉一錢乳製
蟾酥二錢麝香五分拌勻作條焙乾收貯用時唾
津磨搽

雪裏蝦蟇性熱微辛壯陽卻冷痿弱能興藥性考

海參

閩小記云閩中海參色獨白類撐以竹簽大如掌與膠州遼海所出異味亦淡劣入藥以產遼海者良紅旗街出者更勝於綠旗街有刺者名刺參無刺者名光參入藥用大而有刺者佳一名海男子有梗糯二種而黑膩者尤佳人以腎為海此種生北海鹹水中色又黑以滋腎水求其類也。百草鏡云南海泥塗亦產海參色黃而大無刺肉亦硬不中食品土人名曰海瓜皮言其如瓜皮之粗韌

本草綱目拾遺

卷十 海參

尾

也以其充庖煨猪肉食可健脾入滋補陰分藥必須用遼東產者亦可熬膏作膠用。藥鑑海參出盛京奉天等處者第一色黑肉糯多刺名遼參刺參出廣海者名廣參色黃出福建者皮白肉梗糙厚無刺名肥皂參光參出浙江甯波者大而軟無刺名瓜皮參品更劣矣。關東韓子雅言海參生東海中大小不一體滑如蜒蚰能伸縮羣居海底遊行迅疾取參者用海狗油滴水海水乃清見底見有海參即入水取之此物沾人氣便不動先以兩手探握置頸兩傍再取置助下次及兩腿胯及

膝皆可夾取此物一沾人氣即不動然後出水以刀割去腸胃石灰醃去腥涎令體肉緊密乾之乃縮至寸許其實生者大如瓜長尺許也若乾者寸外生時體更大可知。蓬萊李金什言海參亦出登州海中與遼東接壤所產海參亦佳彼土人言海參多伏海中大石上水深不可見取參者必用海狗油滴入水中則有一暈散開清澈見底然後入水取之每每遭鯊魚毒害故其價亦不廉其體生者身多滑涎去腸胃以灰醃去腥涎乾之出售每多灰鹹氣也。福山陳良翰云海參生北海者

本草綱目拾遺

卷十 海參

尾

佳為天下第一其參潛伏海底至二三月東風解凍時多浮出水面在海塗淺沙中孳乳入水易取然腹中出子後惟有空皮皮薄體鬆味不甚美價亦廉識者賤之名曰春皮四五月則入大海深水抱石而處取之稍難體畧肥厚至伏月則潛伏海中極深處石底或泥穴中不易取其質肥厚皮刺光澤味最美此為第一名曰伏皮價頗昂入藥以此種為上若秋冬時則又蟄入海底不可得矣。五雜俎海參遼東海濱有之一名海男子其狀如男子勢然淡菜之對也其性溫補足敵人參故名

曰海參。藥性考海參遼產者佳。吳淞閩粵者肥大無味。虛火燥結。同木耳切爛。入猪大腸煮食。歌云海參鹹寒降火滋腎通腸潤燥除勞怯症。遼產小佳刺密脆硬。南產厚大肉味稍遜。

甘温。食物宜忌味甘鹹補腎經益精髓消痰涎。攝小便壯陽療痿殺瘡蟲。

生百脈血。臨安儒醫盛天然語予云曾往青山里視一婦人病眼鼻口耳髮根皆出血下部亦然。其人已昏不知人詢其夫得症之由數日前受驚而起時天酷暑大旱又中燥烈之氣致血溢奔騰。

本草綱目拾遺

卷十 海參

五

上下散出即不救矣。諸醫皆束手無策。盛有叔曾於都中得一方專治此症。幸尙記憶。遂急喚人取山泉一桶燒酒一觔挾婦起坐裸其小腿先以燒酒淋之俾酒從踝下即滴入水桶內淋訖然後將腿置水中一飯頃其上下血即止。婦亦甦。面色如粉。急叫人覓壯年乳婦以乳哺之。再用海參半觔切片焙爲末。每次調服三錢。日三服。蓋海參能生百脈之血。若失血過多必須以此補之。其生血之功捷於歸芍也。

治休息痢。宋春暉云餘姚有孝子某其父患休

息痢經年垂危。孝子日走神廟祈求醫藥。如是月餘一日途遇老人教以用海參每日煎湯服不數日全愈。

治潰瘍生蛆。慈谿楊靜山云曾有人患癰破爛內生蟲蛆纍纍千百計。治以殺蟲藥無效。一老醫以海參片焙末敷之。蛆皆化黃水。然後以生肌膏貼之。愈。據言凡一切金創及疽毒破爛交暑內潰生蛆。惟海參末可療。不藥良方。夏月潰瘍生蛆。係陰濕所化。海參爲末。摻之。或皂礬飛過爲末。摻之。皆化爲水。

本草綱目拾遺

卷十 海參

四

隊隊。游宦餘談。隊隊形如壁蝨。生有定偶。緬甸有之。夷婦有不得於夫者。飼於枕中。則其情自合。故不惜金珠以易。詹景鳳小辨。同年蘇侍御民傑按雲南。還語予。雲南有小蟲名曰隊隊。狀如蝨。出必雌雄隨人。偶得之以賣富貴家。價至四五金。富貴家貯以銀匣。置枕頭內。則夫妻和好。無反目。此則物氣之正人也。

風蛤

入媚藥治夫婦不和

職方考閩邵武府出風蛤類蝦蟇蟻蝟蟾蜍之數
村每春初東南風起則此物滿牀厨間土人取而
肺之

性温煖治風及手足拘攣折傷

飯蒼蠅

謝天士云蟲中各種俱入藥用惟飯蠅無用故本
草不載其主治予精思十年求其主治不可得嘉
慶庚申偶在東江晤柴又升先生云昔在台州患
面疔初起即麻木癢幾入骨不可忍山中倉卒無
藥有教以用飯蠅七個冰片一二釐同研爛敷之
本草綱目拾遺 卷十 風蛤 飯蒼蠅 蟻蜂 臣

即不走黃如言果癢定次日漸痊旬日而愈

束疔根不走黃塗瘡疤即生髮

吳秀峯用以塗小兒癩愈後脫疤不長髮用此搗

塗立生

塞鼻治拳毛倒睫 藥性考

蠟蜂

粵志陽春有蠟蜂嘗附橄欖樹而生雖有首足與
木葉無別須木葉凋落乃得之土人以置篋筒每
遇蠟毒必鳴鳴則自呼又以其聲之清濁卜禍福
佩之辟蠱

蜜蜂

綱目止用子云入足陽明太陰而無用蜂者赤水
元珠有治瘰癧方用之為補於後

赤水元珠云蜜蜂同杏仁葉蝙蝠蛇蛻治瘰癧神
效

苦蜜

出處州劉基苦齋記匡山之巔四面峭壁風從北
來大率不能甘而善苦故植物中性之苦者莫不
布族而羅生焉野蜂巢其間采花髓作蜜味亦苦
山中方言謂之黃杜初食頗難久則彌覺其甘按
本草綱目拾遺 卷十 蜜蜂 苦蜜 蜜虎 臣

綱目言蜜有黃連蜜味苦不知更有天成自然之

苦蜜故補之

除積熱已煩渴解熱痢暑積驅風丸藥中用之更

佳老人腸燥以一盞和酒食尤宜

蜜虎

似蜂而大首尖身圓壯如橄欖形有兩翼亦如蜂
翅遍身生毛花斑色尾有短毫鋪張如鷲尾鼻上
有鬚二根喜入花心中以鬚鈎取花蕊而出其鬚
能伸縮屈曲如象鼻然以捲物登州人呼古路哥
子安嶽人呼為蜜虎養蜜者最忌之。臺灣府志

蜂虎蟲屬狀似燈蛾而大頭有斑點入蜜蜂窠則盡食其蜂。汪杭葦言蜜虎多喜入鳳仙花叢中散子於葉背日久生小灰色蟲如青蠅體上有黑白斑暈食其花葉長大及老則下根底變為蛹頭粗尾尖如海螵狀作老黃色久則蛹出為蛾即成蜜虎如此循環生生不已。

治咽喉腫痛生蛾 陳良翰云蜜虎登州最多人捕得裝入布袋懸挂簷下陰乾遇有咽喉腫痛或生單蛾雙蛾取一枚瓦上火焙去其週身絨毛剪去頭足尾翅再用火焙為末加冰片少許吹入喉

本草綱目拾遺

卷十 蜜虎

中即愈此神方也又入壯藥用

治心痛 鞠子靜方用囉哥即蜜虎五六月飛行墻壁山東甚多取置竹筒中此物難死必待二十日方乾死在筒中自能撲打體上絨毛盡落有患心痛者及腹痛者瓦焙研末酒服一二枚即止諸城王遜亭云古路哥有雌雄者身瘦小雌者腹大入藥用雄者以線穿陰乾可合房術藥用其老僕王三云此蟲山東極多能食蜂養蜂家最忌之其蟲口中有黑絲常捲若入蜂窩即吐直其絲以刺蜂蜂即斃然後食之蓋蜂針在尾而此蟲之

針在首想亦有毒針在尾者陰在首者陽以陽尅陰故蜂為所刺無不立斃其蟲於初秋散子在豆莢中則為豆蟲如青蠅狀食豆在黍穰上則為朝天猴如刺螫狀後黍葉自下食而上最為莊田之患然可食莊人候日未出時此蟲着露體重翅輕不能飛易於撲取人捕得去其翅羣置瓦罐內令其自相撲擲其體上細毛自落然後以油鹽椒薑炒食之味勝蠶蛹但其體上毛不可着人眼着眼即損目

蟾皮

本草綱目拾遺

卷十 蜜虎 蟾皮

此乃癩蝦蟆皮也能拔大毒外出又能回毒功效不可殫述綱目蟾蜍條主治皆全用無單用其皮者惟附方引孫真人千金方中治腸頭推出用蟾皮一片燒熏并傳僅錄其些小功用反遺其大者故特著明補之

貼大毒能拔毒收毒。黃汝良行篋檢秘方載指頭紅腫生毒用活蟾一隻生剝皮將皮外面向患處包好明日其毒一齊拔出或發背對口等症毒忽收內如又起再貼切記不可將其皮裏面着肉即咬牢難揭凡痘疹後回毒亦可用此治

瘰癧歛口膏藥。治瘰癧膿已盡腫已平瘡口未
斂以此貼之。蝦蟆皮二個要活剝者鼠皮二張
蛇退二條蜂房大者一個右四味俱煨灰將水膠
一兩用井花水一酒鍾化開後加蜜一兩蜈蚣煎
麻油一小鍾攪勻前四味灰臨起入麝香一分將
絹攤來不濕為度

靈秘丹藥云凡患癰疽瘡毒者用土中大蝦蟆一
個剝全身癩皮蓋貼瘡口於蟄皮上用針將皮刺
數孔以出毒氣自覺安靜且能爬住瘡口不令長
大又免蜈蚣聞氣來侵神妙神妙

本草綱目拾遺 卷十 鱗皮舌 土檳榔 蝦蜚黃 四十五

舌

拔疔 外科全書夏月患疔用蝦蟇舌一個研爛
蟾肚皮蓋貼其根自出

土檳榔

粵西鼓載狀如檳榔在孔穴間得之新者猶軟相
傳蟾蜍矢也不常有之

主治惡瘡

蝦蜚黃

物理小識余岸少養蜘蛛以小者飼大者久之以
硃砂飼大者數十日滿身皆赤其腹有黃入藥用

去管開管

藥蜂針

物理小識取黃蜂尾針合硫燉加冰磨為藥置瘡
瘍之頭以火點之灸瘡上本草未載此法須先以
濕紙覆瘡先乾者即瘡頭灸之

驢龍

物理小識驢腹中虬也方體方目有足可以小使
入房術用與臯厭黑兜蟲瓦雀卵衛子莖墮蛤蚧
吉弔脂同功

龍龜

本草綱目拾遺 卷十 藥蜂針 驢龍 龍龜 洋蟲 四十六

閩小記云龍龜形如小螳螂又似金龜而黑色每
八月十三至十五日飛墮漳州海口餘日絕無

除面上黧點赤氣食之良兼美男女顏色活血

物理小識智少隨老父福甯曾見龍龜後在姚有
僕署中食此云自濠鏡來則他處亦出此何漳獨
異也蓋是甲蟲大如指頂甲下有翅熏乾油潤去
甲翅啖似火魚之變味

洋蟲

一名九龍蟲出外洋明末年始傳入中國或云出
大西洋康熙初年始有此物形如米蚱子初生蟻

如小蠶久則變黑如豆瓣有雌雄今人用竹筒置
穀花飼之性極畏寒天冷須藏之懷袖中夜則置
衾褥間否則凍死得人氣則生極蕃衍有飼以茯
苓屑紅花交桂末者則色紅而光澤可愛入藥尤
良

性溫行血分煖脾胃和五臟健筋骨去濕按風壯
陽道治怯弱。附治各症兼引。老人不寐茯苓
引。小兒夜啼。硃砂引。女童夜渴。枸杞引。少
婦陰寒。附子引。癰疽發背。沉香末引。舌燥作
渴。麥冬引。眼目閉痛。甘草引。耳鳴耳聾。當歸

本草綱目拾遺 卷十 洋蟲

四

引。感冒風寒。防風引。中濕瘟毒蒼朮引。跌
打損傷全蝎引。酒醉傷人葛花引。怒氣傷人
沉香引。絞腸痧痛青蒿引以上十四症俱用蟲
十四個好陳酒沖服

治刀斧傷用蟲搗敷即愈。瘋癱用蟲九個木香
湯送。打傷用九個黑棗薄荷湯送。黃疸炒用
十二個薄荷燈心湯送。哮喘用九個薄荷湯送
。眼脹用七個薄荷湯送。傷食用九個薑湯送
。水毒用九個薄荷燈心湯送。氣痛用九個檳
榔湯送。中風不語用二十四個薄荷燈心湯送

。小肚痛用九個薑湯送。急慢驚風用九個薄
荷杏仁湯送。喉痛用二十四個薄荷銀花湯送
。脾風用二十四個酒送。胃痛心疼用七個木
香末沖酒服。無名腫毒用十六個陳酒送五更
服。痘疹用七個米湯沖服。膨脹用二十四個
薄荷陳皮湯送。嘔吐痰火用七個淡薑湯送。
乍寒乍熱口乾舌燥用七個陳皮半夏煎酒沖服
。五勞七傷白茯苓三錢用七個搗爛每日空心
酒沖服以復元爲止。瘧後寒熱不調用七個以
未發之先沖酒服三次即止。夢遺白濁血淋白

本草綱目拾遺 卷十 洋蟲

四

帶以芡實三錢微炒研末白果五枚去皮心先將
藥搗爛再加淫羊藿二錢去邊廣皮二錢韭子三
錢同煎用蟲七個酒沖服。赤白帶及產後等症
以香附炙芪烏鰂骨各入分酒煎用蟲七個沖服
即愈。氣急咳嗽以川貝母二錢牛蒡子當歸陳
皮淮牛膝各入分水煎服如婦人去牛蒡子加益
母炒香附各三錢水煎沖服三次神效。腰痛以
破故紙二錢雄豬腰一對竹刀剖開去衣將破故
紙內入酒蒸熟爛加桔梗二錢爲末用七個搗沖
酒服神效。痢疾白痢用紅糖紅痢用白糖陳酒

沖蟲七個服。水瀉不止猪苓白朮各一錢陳酒煎沖七個服之忌油膩魚腥等物。偏正頭風以川芎防風荆芥蟬蛻各一錢細辛八分陳酒煎沖七個服之忌生冷葱韭等物。骨節酸痛胃寒等症以川芎白朮各八分酒煎沖蟲七個服三次即愈。吐血不止喘息燥熱等症以古墨研濃貝母三分研末蟲七個陳酒沖服七次愈。小便不通以燈心車前各七根蟲七個陳酒沖服。飽悶成痞肚腹腫脹用酒沖七個服三次。翻胃隔食以生薑七片裝布袋內入糞坑浸七日取起清水洗

本草綱目拾遺

卷十 洋蟲

陸

淨埋土中一層薑一層土七日取起用陰陽瓦焙乾研末每次一分用蟲七個沖酒服三次愈。吐血以藕節茅草根洗淨酒煎用人乳酒各半沖七個服三次愈。筋骨疼痛以核桃肉三錢陳酒沖蟲七個服。勞嗽以牛骨髓三錢核桃肉三錢其為末入蟲七個再搗為丸每丸三錢每日五更脚化一九九日見效。痿症蛇床子三錢煎湯沖蟲九個服三次即愈久服延年種子。經水不調以香附陳皮益母草當歸元胡索各八分水煎和酒沖蟲七個服之即愈久遠者連服數次其效如神

。產後崩症以香附白芍益母草當歸陳皮茯苓白果蘇木各八分酒沖蟲七個服三次即愈。藥性考洋蟲色黑形如壁蝨活吞數枚止血勞怯糞如蠶砂狀金御乘云研末敷金刃傷立結痂止血最效

蟋蟀

綱目於鼯馬下附促織僅列其名云古方未用附此以俟考

性通利治小便閉。藥性考蟋蟀辛鹹温能發痘勝於桑蟲。

本草綱目拾遺

卷十 洋蟲

蟋蟀

辛

治跌撲傷小肚尿閉不出。養素園集驗方用蟋蟀一枚煎服立驗。

小兒遺尿 慈航活人書取全蟋蟀一個焙末滾水下照歲服如兒十一歲者每次服一個服至十

一個為止

治男婦小水不通痛脹不止。集聽用蟋蟀一個陰陽瓦焙乾為末白滾湯下小兒半個即通

催生 趙際昌云關蟲之戲蟋蟀最盛其百戰百勝者俗呼為將軍其蟲至冬必死勿輕棄去留以

救產厄神驗凡產不下用乾者一枚煎湯服即生

并無橫倒之患許京尼云屬蟋蟀家冬則封盈待其自死成對乾之留為產科痘科用須成對者入藥

治水蠱 朱煥齋任城日鈔云促織可治水蠱昔

有人患水蠱百治不效一日偶飲開水水中先有促織一對在內其人倉卒一併吞之越數日其病漸消方知促織可治此症後傳此方數人無不驗者一對不足連服二三對自效

蚱蜢

綱目蟲錄僅引拾遺佩藥一條並無主治

按蚱蜢初夏大火始有得秋金之氣而繁性竄烈本草綱目拾遺卷十 蟋蟀 蚱蜢

能開關透竅一種灰色而小者名土礫不入藥用

大而青黃色者入藥有尖頭方頭二種救生苦海五虎丹中用之治暴疾氣閉大抵取其竄捷之功為引也

味辛平微毒性竄而不守治咳嗽驚風破傷療折損凍瘡癩疹不出

治鷓鴣瘟 王氏效方鷓鴣瘟其症咳嗽不已連

作數十聲類哮喘非哮喘小兒多患此取穀田內蚱蜢十個煎湯服三劑愈。百草鏡云鷓鴣鬱小兒有之其症如物哽咽欲吐難出之狀久之

出痰少許日久必死治以乾蚱蜢煎湯服

破傷風 救生苦海治破傷風用霜降後稻田內

收方頭灰色蚱蜢同穀裝入布袋內曬乾勿令受濕致生蟲蛀壞常曬為要遇此症用十數個瓦上煨存性酒下立愈

痧脹 養素園集驗方用蚱蜢五六個煎湯溫服

凍瘡 養素園待驗方用方頭黃色蚱蜢風乾煨研香油和搽擦亦可

小兒驚風 李氏表方用蚱蜢不拘多少煨存性

砂糖和服立愈。一方治急慢驚量大小人多寡本草綱目拾遺卷十 蚱蜢

用之煎服。王立人易簡方用螞蟥焙乾為末薑湯調服少許立愈

急慢驚風 百草鏡霜降後稻田中取方頭黃身

蚱蜢不拘多少與穀共入布袋內風乾常曬勿令受濕蟲蛀遇此症用十個或七個加鈎藤鈎薄荷

葉各一撮煎湯灌下渣再煎服重者三劑愈李東

來常施此藥據云山東王蟲尤妙每服只須二個。王站柱不藥良方急慢驚風先用白鳳仙花根汁半盞服下即用方頭蚱蜢焙乾研末滾水調下即愈

產後冒風 王良生救急方乾蚱蜢數十個瓦上煨存性好酒調服

淮東子

今名跳蝦蟲生濕土中形如跳蚤而大逾倍色如蝦青腹下多足如蝦善跳躍兒童以器置於水中捕得輒投入便不能躍出秋時鬪蟋蟀家多畜之凡蛭遇鬪傷及虛羸必每日以此飼之云能益蛭力也其性最竄捷能達透經絡皮裏膜外無不行到

治風痺去濕腫

本草綱目拾遺

卷十

淮東子

燈蛾

蠅虎

臣

燈蛾

今古方無入藥者祝氏效方有治痔管法用蜣螂一個同撲燈蛾十個放罐內一宿加麝香一錢陰乾為末吹入管內自能出水水乾即愈

蠅虎

古今註蠅虎蠅狐也形似蜘蛛而色灰白善捕蠅一名蠅虎子潛確居類書一名蠅豹身黑嘴有雙肉爪攫蠅而食兩目似虎炯然生光易曰震來虩虩雅俗稽言曰蠅蠅虎也常若多懼故取象焉。按蠅虎亦蜘蛛之屬腹亦有絲而不能結網惟居

墻壁捕蠅食其體灰褐色身上有微毛嘴有兩鉗翁吸頻動跳躍如虎亦有純白色兩目朱色絕可愛兒童捕置器中捉蠅以飼之視其搏躍為戲此物未聞入藥故瀕湖綱目壁錢蟠蟻皆列入而此獨遺之今徐氏驗方云其性頻動而不靜取以調血脈治跌打因錄其方以備品云
治跌打損傷 徐順之驗方取蠅虎數個研爛好酒下

竈馬

今之竈馬俗呼賊郎又作蟬螂綱目所謂蜚蠊也

本草綱目拾遺

卷十

蟬螂

竈馬

臣

綱目蟲部亦有竈馬形如蟋蟀今人名竈壁雞又與蟬螂別瀕湖於蜚蠊條下無治疔疔諸法今備錄之

拔疔 集聽竈上蟬螂不拘多少搗爛敷之其疔根自出。卿子妙方蟬螂蟲具黃紫色甚臭者取數個用患者自吐唾沫幾口研爛敷瘡四圍頂上露孔使毒氣從孔出一日愈矣。邵仲達方治疔瘡取蟬螂大者七個去頭足殼將砂糖少許同搗爛敷疔四圍露出頭晝夜即愈
藥性考竈馬拔刺搗塗有效

解諸疔毒。傳信方竈上紅蟑螂五個研爛熱酒沖服取汗爲度。

紅絲疔。傳信方蟑螂一個去頭和青糖搗爛搽上卽效。

白火丹。葉氏方用蟑螂瓦上焙乾爲末白滾湯服一二個立效兼治疔瘡。

對口。活人書桂州荔枝肉二三枚蟑螂二三個同搗如泥敷露頭數次卽散。

無名腫毒。慈航活人書蟑螂十個鹽一撮同搗爛敷之留頭。

本草綱目拾遺 卷十 竈馬

治諸毒惡瘡。嚴氏家用方蟑螂搗石灰敷之。

痧症。周廷園方活蟑螂蟲二三個用紙包竈上焙乾研細冷水和灌或吐或瀉卽愈。

吐血。徐雲生方取蟑螂五個止去翅淨在火盆淨瓦上焙乾爲末紙包安土上存性用濕腐皮包一個滾湯吞下每日如此吞五日不可間斷。

氣虛中滿。醫宗彙編以蟑螂七個爲末用地枯體煎湯送數服愈。

臃脹。家寶方蟑螂一個焙乾蘿蔔子一撮共炒爲末好酒吞十日全愈。

一切兒疔。集聽云凡小兒患疔疾不拘何等疔垂死者皆效取竈上蟑螂焙乾與之食患者但聞其香不知有腥臭之氣猶中蠱者食豆無辛含礬不苦也有患此症治之無不效只須食一二次卽愈愈後體更肥白且屢試屢驗。百草鏡云兒疔初起用蟑螂去頭足翅新瓦焙乾常與食之百個病愈。

水馬

綱目名水黽於主治下云令人不渴殺雞犬不知有治痔之功更爲補之按水馬四五月內出浮水

本草綱目拾遺 卷十 竈馬 水馬 壁蝨

面身硬腳長池沼中甚多性喜食蠅子在甌親見小兒捕之嬉戲用釣竿繫繩繩頭穿一蠅擲水面誘之卽來以四足抱蠅不放因而獲之。

治痔。東醫寶鑑有水馬散夏月三伏內於止水

中採婆子一名水馬兒高腳水面跳走是也採取三十個用三個紙包每包十個於背陰處懸掛陰

乾每包作一服研爛空心酒調下良久乃吃飯三日連三服十日內效久痔膿血者二三十服絕根

壁蝨

俗呼臭蟲以其氣腥穢觸鼻故名行必南向爲南

方穢濕所產今江南北人家多有之稍不潔即生此物亦有遠行於旅店驛舍中帶入衣被歸家即生極易蕃育一日夜生九十九子與益斯同其形儼如半粒豌豆老則黑次則棗皮紅初生者色黃而細小其子如蟻子白色卵生與蚤同初生便嚙人生一二日即能褪殼愈褪愈大漸漸而老色轉紅而黑老者嚙人愈毒多藏藁薦中及壁內或桌櫬牀縫間其身扁而易入至冬則入蟄多藏泥沙山穴中及古樹根下交春皆啟蟄而出入人家壁木內藏性畏蟻山中有一種紅蟻喜食之故近山

本草綱目拾遺

卷十 蟻

五

及山寺僧舍此物甚少有帶入者輒為山蟻啣去其嚙人尤狡黠不與蚤蝨同昔人謂暑時有五大害乃蠅蚊蝨蚤臭蟲也然蠅蚊迭為晝夜蠅可揮拂蚊可設帳蝨則暑時裸浴生者絕少蚤則因土濕而生夏時土乾亦不甚患惟此最可惜無分晝夜潛身牀蓐及几闌間善識人氣伺人一徙倚即嗜其膏血腫塊纍纍如貫珠然愈爬搔則愈大痛癢難禁小兒肉嫩尤遭其苦輒叫號不已或云其物口有白氣一二寸嚙人能隔席穿膚吮血索之不可得在牀褥輒夜聚曉散率其醜類待人倦睡

而恣傲焉古方辟除之法甚多無一驗者惟席下鋪零陵香草及樟腦可稍殺其勢然隔一二日藥氣滅則橫虐愈甚惟用真揚州安息香塗上好銀珠為衣燃牀下周圍以蓆護令烟薰透則壁蝨盡死子亦不能復生第香氣惡烈觸鼻令頭痛須熏後停一二日方可臥宿貧家何能辦理古云南方淫氣生短狐此亦淫濕腥穢之氣所感而生凡勤潔之家鮮有之閩人云此蟲滾水泡死者能復生惟以冷水浸死不能復生山堂肆考壁蝨身扁而臭不能跳善齧人名曰菱蚤又名扁蝨五雜俎壁

本草綱目拾遺

卷十 蟻

五

蝨閩人謂之木蝨多杉木所生治者以蕎麥葉燒灰水淋之江南壁蝨多生木中惟延綏生土中遍地皆是入夜則緣牀入幙嚙人遍體成瘡雖徙至廣廈懸牀空中亦自空飛至事物紺珠壁蝨一名壁虱扁小褐色歿而嚙人六書故扁蝨着牛馬食其血產薦藁間差小嚙人膚俗謂薦蠅又名菱蝨今人訛為壁大是古人雖有其名從無入藥者綱目并不列其品近來治療有用此者故錄之見天下無棄物也

凡用壁蝨須置溫水中令其臭氣散

盡入

治咽痛 集聽方用壁蝨十枚滴花燒酒浸服

飯館 百草鏡云用臭蟲研塗

賺瘡臭爛 西亭藥鏡用臭蟲同水龍骨搗和麻

油調敷出盡黃水立愈

眼生偷針 臭蟲血點之即散

海上方有用壁蝨治小兒驚風用壁蝨於淨水中

漂去臭氣焙乾入藥

拔疔 楊氏經驗方臭蟲同米飯搗勻搽疔上能

立拔疔根外出

本草綱目拾遺 卷十 壁蝨 叩頭蟲 五五

鯀魚刺戮 醫宗彙編四谷茴香葉使鹽花燒酒

搗糊瘡上如口久爛用臭蟲剉去頭傳之

叩頭蟲

形黑如大豆以手按其身其頭能俯屈剝剝有聲

出南方者小而力微北土者大而力厚小兒捕之

為戲入藥用大者試法取蟲置桌翻其背令仰少

頃便跳起三四寸有跳起過五六寸及尺許者力

更大綱目以之附阜蝨後亦不言主治之功此蟲

北人謂之跳百丈

治腰腳無力與山螞蟻子並入壯藥用百草鏡云

外用可絕瘡叩頭蟲一個安眉心蟲頭向上膏藥

蓋住過時自愈

大力丸 彙集此馮嘉寶方蒺藜酒洗炒去酒刺

白茯苓白芍從蓉酒洗杜仲酥油炒兔絲子酒煮

續斷當歸覆盆子威靈仙破故紙薏苡仁各一兩

五錢牛膝酒洗無名異自然銅醋煨七次一兩乳

香沒藥硃砂飛過血竭青鹽各五錢天雄二兩童

便浸五日象驚一個去頭足翅如無用土驚代之

跳百丈十個去足虎骨二兩酥油炙上藥俱為細

末煉蜜丸二錢半重早晚鹽湯或黃酒送下少時

本草綱目拾遺 卷十 叩頭蟲 沙雞母 禾蟲 六

沙雞母

物理小識土鼈是象房屎中所生或以旋土成窩

者充之不知旋土窩者乃沙雞母非土鼈也

同金墨磨塗口瘡

禾蟲

閩廣浙沿海頃多有之形如蚯蚓閩人以蒸蛋食

或作膏食餉客為饑云食之補脾健胃廣志夏暑

雨禾中蒸鬱而生蟲或稻根腐而生蟲稻根色黃

蟲乃稻根所化故色亦黃大者如筋許長至丈節

節有口生青熱紅黃霜降前未熟則蟲亦熟以初
 一二及十五六乘大潮斷節而出浮游田上網取
 之得醋則白漿自出以白米泔濾過蒸為膏甘美
 益人得稻之精華者也其醃為脯作醢醬則貧者
 之食。吳震方嶺南雜記禾蟲絕類螞蝗青黃色
 狀絕可惡厭潮所淹沒淡水田禾根內出數尺長
 至丈餘寸寸斷皆活能游泳午後即敗不可食滴
 鹽醋一小盃裂出白漿蒸雞鴨蛋牛乳最鮮。粵
 錄禾蟲狀如蠶長一二寸無種類夏秋間早晚稻
 將熟禾蟲自稻根出潮長浸田因乘潮入海日浮
 本草綱目拾遺 卷十 禾蟲 茄稜蟲 六五

夜沉浮則水面皆紫采者以巨口狹尾之網繫於
 杙逆流迎之網尻有囊重則傾瀉於舟
 補脾胃生血利濕行小便瘡瘍勿食能作膿
 茄稜蟲

此蟲生茄稜內梗上有蛀眼內即有蟲其蟲帶綠
 色黑嘴者是

治男女童癆 劉羽儀經驗方云男女童癆其症
 不必如大人咳嗽吐血溲精只是身體瘦弱皮毛
 焦枯肌膚微熱急宜早治用野茄稜內蟲取數十
 條私和在食物之內與病者吃數次即愈

棧蟲

滇南各甸土司記棧蟲產騰越州外各土司中穴
 居椽欄木中食其根脂汁狀如海參粗如臂色黑
 土人以爲珍饌土司餉貴客必向各峒丁索取此
 蟲作供連椽木數尺解送剖木取之作羹味絕鮮
 美肉亦堅韌而腴絕似遼東海參云食之增髓益
 血尤治帶下彼土婦人無患帶者以食此蟲也
 治赤白帶腸紅血痢其行血而又能補血功同當
 歸

蔗蛄

本草綱目拾遺 卷十 棧蟲 蔗蛄 牙皂樹蟲 六五

漳泉種蔗田中出一種蟲如蠶食蔗根名蔗蛄土
 人食之味甚甘美
 發痘行漿托癰清毒化痰醒酒和中利小便
 桃絲竹蝨

此桃絲竹上所生竹蝨李氏草秘云罨疔瘡痘疔
 最妙

牙皂樹蟲

救生苦海云此樹大如錢粗者方得有蟲但取之
 有法以利刀速斫其樹遲則蟲即下行入根不可
 得其蟲子時下行過午則上行須午後伐取

治一切腫毒初起其蟲有大小大者用一條小者用二條證輕者用一條證重者用二條或三條搗爛酒調服已膿者不治

黃麻梗蟲

須秋時先收取以葱管藏之。百草鏡麻蟲生麻梗近根上一節中二月化為飛蟲穿穴去山左人每於刈麻時將蟲連麻梗寸斷布袋裝盛帶至南方貨與養禽鳥家飼畫眉百翎之用云其蟲性暖去風行血鳥食之可以禦寒蟲形如小蠶細長明淨入藥須連麻梗蒸焙用如用生者須以葱藏

本草綱目拾遺

卷十

牙皂樹蟲黃麻梗蟲之麻蟲

生

治疔 程林即得方用黃麻梗內蟲以葱葉包貯挂風頭令乾將疔瘡挑破以麻蟲少許入於所挑之處瘡即化為水而愈。陶節菴治疔蟻螂膏用蟻螂三個肚白者佳黃麻蟲十個二味搗勻撥破患處貼之如患在手足有紅絲上臂絲盡處將針挑斷出血仍用前藥毒重者更服敗毒藥。葉氏方用黃麻梗中蟲一條焙乾為末酒調服下疔化為水

芝蔴蟲

生芝蔴梗中三更輒從下而上至頂食露五更輒

下取之以夜性熱助陽入幃箔用去痔管 用芝蔴蟲如蠶綠色取焙乾為末開水送下每日一錢服七日其管自出

桐蛀

李氏草秘生桐油樹中即木蠹也最治惡腫毒取七根焙末沖酒服即愈

牛膝蛙

李氏草秘蟲生牛膝草節中香油浸製

治指頭毒晝夜痛不可忍者敷上即愈

山螞蟻窠

本草綱目拾遺

卷十

芝蔴蟲桐蛀牛膝蛙山螞蟻窠

生

朱樂只云山草中有之係草樹之葉結成大者如斗冬月取之蟻在土而不在窠矣。救生苦海山蟻窠深山內大樹根中有之十一月或正月草枯時尋取有二種一種大如升斗色黃柔軟形如乾黃爛葉又若柔皮紙窠皮上層層有刷紋成暈若虎頭俗呼虎頭螞蟻窠不知何物所造惟內中多筋其筋係松毛草莖之類也抽去內中筋及泥土用之一種色白係是泥土所為其形有類松皮研入藥久不收口爛瘡貼之即收口

治刀傷出血 救生苦海用山蟻窠抽去內中筋及泥土包裹傷處再用布縛即血止收口沈氏傳云冬月用之有驗如神

禿瘡 周氏傳方山蟻窠中土鹽淘調敷數日即愈

生皮結靨。凡瘡膿腐已盡新肉已生不肯收口用山蟻窠搓去草泥等物扯開貼之即結靨生肉

○張聖來云山蟻生深山窮谷中頭如虎有牙鉗甚銛利有翼能飛凡虎食人過飽則醉醉後即吐蟻食其唾餘則形變虎頭而生翼即以其所吐涎

本草綱目拾遺 卷十 山蟻窠 子 在

嚼樹汁草漿和山土釀如泥緣樹枝成窠其窠重疊如蜂窩內有臺外則黃白紋大如斗挂樹枝上

山人見其窠以烟薰去蟻採之入藥

窠敷金刃傷止血定痛生肌收口

窠中臺治發背百鳥朝王毒

窠上緣枝治蛙脊

子 白如糶米俗呼狀元子大力丸用之然微有

毒食之作脹綱目蟻下僅存其名無主治近行伍

中營醫以此合壯藥頗效

益氣力澤顏色

敏按蟻有各種入藥用窠則取山蟻窠蓋山蟻形大在草中或樹根內作窠其子粗如粒米入藥力太猛用于以黃色細蟻所生子為佳蓋此蟻力最大能舉等身鐵故人食其子亦力大也。宦遊筆記廣人美味有蟻子醬於山間收蟻卵淘淨滓垢鹵以為醬詫為珍品則其子亦無毒矣

蛆窠

王安采藥錄大窖坑內有蛆蟲窠如白蘭子樣挂在蓬塚內者取來淨去泥灰曬燥焙用

治疔瘡疔疔一切蟲蛀爛孔外科收口藥用

本草綱目拾遺 卷十 山蟻窠 子 在 人蛆蟲

疔瘡蛀梗 柴氏獨妙方用糞坑內蛆蟲窠在蓬

塵內者形如白蘭子而小取來不拘多少放在罐

中焙燥為細末貯小口瓶內瓶口以細絨紗包紮

覆轉輕輕敲彈少許藥末於瘡口內如有小蛀眼

藥末不能入用麥草稈吹藥入細孔內每日三五

次其蛀爛者肉孔自能長平神效無比

死人蛀蟲

此檢尸場中棺內死蛆也唐怡士云凡人死後魂魄散盡其生氣有未盡者肉爛後悉腐而為蛆攢嚼筋骨久之蛆亦隨死故強死者棺中無不有黑

蛆凡用須間作於尸場收之

治大麻瘋癩疾。赤水元珠治大麻瘋癩疾秘方

用死人蛆蟲洗淨鋼片上焙乾為末每用一二錢

皂角刺煎濃湯調下若腫而有疙瘩者乃陽明經

濕熱壅盛先以防風通聖散服二三帖然後再服

此藥有補功以皂針為引故能達表能久服之極

有神效非泛常草木可比也。醫學指南有治大

麻瘋秘方用人蛆一升細布袋盛之放在急水內

流之乾淨取起以麻黃煎湯將蛆連布袋浸之良

久取起曬乾再用甘草煎湯浸曬乾又用苦參煎

本草綱目拾遺 卷十 死人蛆蟲

湯浸曬乾又用董便浸曬乾又用葱薑煎湯投蛆

入內不必取起就放鍋內煮乾焙為末每一兩加

麝二錢蟾酥三錢共為一處入磁器內每服一錢

石薺花煎湯下花即山中石上生白薺如錢樣用

蒼耳草煎湯洗浴然後服藥七日見效體壯者一

日一服體弱者二日一服即愈

治勞瘵能驅尸蟲以賊攻賊之義跌蹠絕邪瘧尸

蛙石疣

驅癆蟲。吳秀峯虛勞論云癆有蟲為濕鬱所化

在外為蠱在臟腑為蟲用死人身上的蛆蟲製令潔

淨焙乾和藥服之則癆蟲化為水下

人蚘

陳所安今見錄近有一種不肖奸徒輒於攢殯左

右勾賄寄尸寄尸者以產賃人厝棺杭人呼為開

寄場每有七日內之出厝棺木到場即被昏夜啟

棺竊取人蚘貨與方術家及走醫為夾棍藥并治

跌打絕邪瘧等用予初不解人蚘為何物後詢唐

博士與宜博士家有老僕來升曾見之云凡人死

七日外遍身肌肉腐如漿心氣散漫蒸為人蚘形

如九龍蟲而小色赤如血光滑異常男女皆有入

本草綱目拾遺 卷十 人蚘 虹蟲

藥男棺者佳其取之法用大鑽於棺和頭前鑽一

大孔以香糟塗孔外內蟲聞糟氣皆從孔出其蟲

雖有甲而不能飛用手搗投入小瓶中燒酒浸陰

陽瓦二焙乾用

按人死血肉腐為蟲或為蛆或為蚘形各不一或

云二物並生或云一物先後互化又有云貧窮者

多蛆少蚘富厚者多蚘少蛆第勿深考並存其說

以俟博雅君子折衷焉

虹蟲

物理小識虹為淫氣方士於東海見虹處掘地得

蟲紅色得之入術用

媚藥益幃箔同紫稍花功力更大

本草綱目拾遺

卷十 虹蟲

三

本草綱目拾遺跋

本草綱目拾遺十卷乾隆間吾杭趙恕軒先生所著利濟十二種之一也十二種者醫林集腋養素園傳信方祝由錄驗囊露集本草話串雅花藥小名錄升降祕要攝生閒覽藥性元解奇藥備考及是編也全目及總序備載於是編卷首鮑氏彙刻書目亦載十二種之目但有傳鈔本皆未刻至嘉慶末年傳鈔本則止有是編與串雅二種其十種已不傳且是編每藥品下論列各條顛倒錯亂眉目不晰余因訪知杭醫連翁楚珍藏其稿本假閱乃先生手輯未繕清本

本草綱目拾遺

跋

者初稿紙短續補之條皆黏於上方黏條殆滿而未注所排序次故傳鈔錯亂耳余乃按其體例以稿本校正排比傳鈔本之誤然後各條朗若列眉還其舊觀原稿本仍歸返連翁迨庚申寇亂翁家原稿本亡失串雅亦佚余編繕此本幸攜帶僅存得存先生遺著之一亦足寶重矣余又聞雍乾間杭人汪君懷著有草藥綱目一書哀然大部與瀕湖綱目等其稿未傳鈔訪諸其族人皆未見想已湮沒失傳恨未得其書與李氏趙氏鼎峙為本草之大全也惜哉同治甲子秋日錢唐張應昌仲甫氏撰

鈔成之後偶於閱書時有可補輯參攷者綴注一二聊以備考愧未能博搜旁證也

遭亂貧困無力獨刊鉅公摯友頗多賞是編者助資勸梓既集腋因亦自措補足之而眾施義舉未可掠美也備誌于後

捐助刊刻刷印姓氏

南皮張子青督部

之萬

長白恩竹樵方伯

錫

秀水杜小舫方伯

文瀾

錫山秦澹如都轉

湘業

吳縣潘順之侍讀

遵祁

吳縣潘季玉方伯

曾璋

歸安吳平齋觀察

雲

元和顧子山方伯

文彬

本草綱目拾遺

跋

吳縣吳語樵部

嘉蔭

海甯沈問梅大令

錫華

錢塘吳曉帆方伯

煦

錢塘丁松生大令

丙

錢塘濮少霞觀察

詒孫

錢塘周麟叔觀察

家勳

仁和高白叔孝廉

雲麟

錢塘吳子厚明府

同培

續捐

吳江蒯士薌廉訪

歸安沈仲復方伯

秉成

夏邑李薇生都轉

銘院

錢唐薛頌唐大令

振鉉

江寧秦繼泉先生臨定 並奉
部憲 覈請
方解嗣出

本草綱目摘

要求求真

內附主治

是書初經... 綱目齊藏板

本草求真 上諭

乾隆三十七年正月初四日內閣奉
上諭朕稽古右文聿資治理幾餘典學... 因
思策府縹緲載籍極博其鉅者羽翼經訓垂範方
來固足稱千秋法鑒卽在識小之徒專門撰述細
及名物象數兼綜條貫各自成家亦莫不有所發
明可謂游藝養心之一助是以御極之初卽詔由
外搜訪遺書並命儒臣較勘十三經二十一史編
布帛官嘉惠後學復開館修纂綱目三編通鑑輯
覽及三通諸書凡藝林承學之士所當戶誦家絃

本草求真 上諭
者既以蒼萃畧備第念讀書固在得其要領而多
識前言往行以資其德惟苑羅益廣則研討愈精
如康熙年間所修圖書集成全部兼收並錄極方
策之大觀引川諸編率屬因類取裁勢不能悉載
全文使閱者沿流溯源一一徵其來處今內府藏
書插架不爲不富然古今來著作之手無慮千百
家或逸在名山未登柱史正宜及時採集彙送京
師以彰千古同文之盛其令直省督撫會同學政
等通飭所屬加意購訪除坊肆所售舉業時文及

民間無用之族譜尺牘屏幃壽言等類又其書本無實學不過錄名馳騫編刻酬倡詩文瑣碎無賞者均無庸採取外其歷代流傳舊書內有闡明性學治法關係世道人心者自當首先購覓至若發揮博註攷厥典章旁暨九流百家之言有神實用者亦應備為甄擇又如歷代名人洎本朝士林宿望向有詩文專集及近時沉潛經史原本風雅如顧棟高陳祖范任啟運沈德潛輩亦各著成編並非勸說卮言可比均應概行查明在坊肆者或具

本草求真 上諭

為給價家藏者或官為裝印其有未經鐫刊紙條抄本存留者不妨繕錄副本仍將原書給還並嚴飭所屬一切善為經理毋使吏胥藉端滋擾但各省蒐輯之書卷帙必多若不加之鑑別悉令呈送煩複皆所不免著該督撫等先將各書叙列目錄注明某朝某人所著書中要指何在簡明開載具摺奏聞候彙齊後令廷臣校覈有堪備閱者再開單行知取進庶幾副在石渠用儲乙覽從此四庫七畧益昭美備稱朕意焉欽此

敘

維乾隆三十有七年恭逢

聖天子稽古右文

特詔徵購遺書用儲

乙覽而余以向任館職奉 上游委以彙覈之

任凡江右諸書所得見者幾千百種其間

純駁互出固不盡為不朽之業然巨編單

本草求真 奏文

帙盈積箱案固已顯晦無遺矣得與寓目

者洵洋洋乎大觀也哉宜黃黃太學宮繕

以其故父為鶚所著理解體要二卷并所

自著醫學求真錄數卷並本草求真數卷

來上兼請敘余惟義理之學至宋儒而大

明發明宋儒之蘊更元明諸儒而大備宜

黃古臨川郡也計是郡之談理者宋有象

山元有草廬明則康齋皆以絕人之資發其自得之學黃君之書其資既與數先哲相若且能於章句訓詁之餘不溺於口耳詞華之習蒼粹儒家者流以為此書可不謂能自拔於流俗之外者歟太學於敬讀父書餘暇肆力軒岐夫古人以良醫之功比方良相蓋古仁者及人利物之心類如此

本草求真 秦敏

是耳否則博施惠衆其事靡窮而良相良醫厥人有數矣願固欲悉反於仁之術隘矣今太學之為此書也於史為方技家言而能歸重立品正情則不獨藉以寄其良相之思亦將自溥其返譬之念固迥與世之醫技者殊矣爰不徇其請以所上二書郵申書局以備採擇而非敘其概如此云

本草求真 叙

昔

乾隆三十八年季冬月

賜進士出身

誥授中憲大夫江西分巡廣德九南兼管水利

兵備道加二級紀錄一次前

日講起居注官翰林院侍講左春坊左贊善

翰林院編修江寧秦承恩撰

本草求真

秦敏

三

錄風



本草求真

岐黃一術小之雖為技業之精大之即為參贊之道其功甚鉅其理甚微自非有真學問真識見者出而為醫亦烏能博極羣書探本窮源而得其真於不謬哉蓋天下有真備則始有真醫必為真備以為真醫則其醫始真而不偽必求真讀醫書以為真醫則其醫尤真而不偽顧世之醫者不然或讀書而止記數方或臨症而偶值一說拘牽附會害不勝言其幸而濟則以自鳴其術而不知求其

本草求真 王敘

卷四

精不幸而不濟則且同委諸命而不復知其失嗚呼以千萬人之死生係一人之工拙而固若是以術審哉然此非獨攻醫者之過即古諸書亦與有責焉余向羽舉業未諳醫理承

簡命以來簿書刑錢日夕不遑問或公事稍暇考諸本草所載藥品氣味非不既繁且備然多以隔一隔二為言推說反說見意徒令人茫乎不知其津涯浩乎不知其畔岸則欲以求真適以亂真無怪乎寡見滯聞之士終不能得其真也宜川太學姓

黃諱宮緒號錦芳者其父諱為鸞曾以理解體要問世知生本為儒家子其漸漬於儒者久矣一日手禁本草求真請序於余余閱是書即已瞭如指掌對若目星更知於醫研究有素故能開真摘要訂偽辨訛發前人所未發俾習為儒而未學夫醫者固一覽而知其道即素未為儒而始學夫醫亦甫讀而得其要斯豈庸醫淺儒所能道其萬一者乎方今

聖天子嘉惠元元萬物一體痼疾恒切節屋皆春倘得

本草求真 王敘

卷四

見書而廣佈之將見濟世無窮活人甚眾其功非止見於方隅自必及於四海而皆被其效非止垂於一時自必綿於萬古而不替也是為敘

昔

乾隆己丑季冬知宜黃縣事晉陵王光燮書於鳳岡公署



本草求真

凡例

一本草一書首宜分其形質氣味次宜辨其經絡臟腑終宜表其證治功能歷觀諸書無不備載然理道不明意義不疏徒將治效彰著淺學醫士其奚辨焉況有補不實指瀉不氣說或以隔一隔二以爲附會反借巧說以爲虛明幾難可通意蓋印信茲從往昔諸書細加考訂其有一義未明一意未達無不搜剔靡遺率引混說概爲刪除俾令真處

本草求真

凡例

凡例

悉見所不隨莽附和語作影響以致欺人耳目也一藥品補瀉或陰或陽或氣或血或燥或潤原自有別遍釋諸書無有實載如白朮味苦性燥是能入脾補氣山藥味甘氣平是能入脾補陰人參黃耆味甘性溫是能入肺而補氣麥冬蜂蜜甘平甘溫是能入肺而補陰龍眼甘溫是能入心而補氣當歸柏子仁辛甘溫潤是能入心而補血山茱萸杜仲辛溫酸溫是能入肝而補氣首烏阿膠甘平微溫是能入肝而補血至附桂辛熱則能入腎以補

本草求真 凡例

陽熱地枸杞甘潤甘溫是能入腎以補陰補劑如斯瀉劑亦然而書僅以補瀉混指是集論補論瀉俱以陰陽氣血分辨概不敢以影響混等語塞責庶使開卷瞭瞭無有錯誤

一本草藥性最宜就實請明不可一牽率引如書既言桑白皮入肺瀉火是明於氣無補而又混引葶氣之說以相淆枳殼枳實木爲下氣最峻之味而書又引益氣明目之說以爲質枯梗木屬升氣之品而書又摘其義曰降赤小豆本非大熱之味而

本草求真

凡例

凡例

書又別其義曰燥紫石英白石英之甘與溫本非最濕之品而書又反其詞曰濕此惟上哲之士始可以悟其蘊若使粗工褊淺又曷克以明其義乎是集凡有義蘊難明之處逐一詳解不令稍有含混
經絡臟腑他書亦有載係某藥主入某經某藥兼入某經然衆書繁雜持論不一如知母味辛而苦沉中有浮降中有升本能清肺以寧腎而書偏置潤肺不語止言於水有滋牽強混引殊多不解是

一七三

篇凡有類此不明無不從實發輝庶主輔攸分而經腑與臟之藥自不致誤

一是集論症論治論效總以藥之氣味形質四字推勘而出則藥之見施於病者既有其因而藥之見施於病而即有效者又有其故如劉寄奴之能破瘀通經行血又治金瘡使血頓止一通一泄似不相合他書止載治效無有詮釋使人自悟是篇凡其藥有類是無不按實考明盡情開發俾今後學始有津涯

本草求真 凡例

一藥多有形質相同氣味相等若使各為註釋而不比類合觀則疑似莫辨如訶子栗殼共為澀藥之類白蔻砂仁共為燥胃之類猪苓澤瀉共為利濕之類羌活獨活共為驅風之類大戟甘遂共為瀉水之類枳殼枳實共為破氣之類附子肉桂共為補火之類地黃枸杞共為滋水之類牛黃貝母共為清熱祛痰之類乳香沒藥共為行血破血之類人參黃耆共為補肺補氣之類本草分論雖多而合論則少是篇尚論藥味凡有氣味相同無不先

於篇首合同開列再於各味之中又取相類以為分別庶使毫釐千里無有差謬

一藥有宜有忌宜者可用而忌者不可用也有其宜之當用即有其忌之不可用是篇既於藥品之宜反覆申明復於藥性之忌多為詳誠俾其喜忌並知而無臨症岐亡之弊矣
一本草藥味他氏多以草木昆蟲金石類為編次以便披閱然形質雖同而氣味不統一處合編則諸藥諸性又已分散各部而不可以共求矣是編開

本草求真 凡例

列藥品總以氣味相類共為一處如補火等藥則以補火為類滋水等藥則以滋水為類間有一味而兼數治數性者則不得不就一處以為品列不必彼此重見是亦限於編次之一道也再於分別氣味之下又註是草是木是金是石以為類次俾氣味既得依類而處而形質亦得分類合觀庶淫潤攸分而學者自無亡津之嘆
一本草本經出自神農其理自屬不易然考論中所載藥性多有安五臟定神志並延年益壽身輕器

髮及桑白皮紫茸補中益氣等說按此語多庸腐
不無可疑且考神農嘗草流傳至今是時文字未
開當有識識相因不爾何由得聞所詳藥出郡縣
多有後漢地名故寇宗奭陶道明掌禹錫皆謂是
書攷之於漢已有不能斷自何代所作淮南子雖
言神農嘗百草以和藥亦無本草之名至稱桐
本此載在簡編應與素問同類何以後人多為更
飾故有疑為他氏所著厥後代為損益其真愈失
而其論愈訛無怪李氏瀕湖纂集本草僅以本經

本草求真 凡例

綠圖

王治冠列諸首而不力為著解日有疑其經論未
確留此以為存年之意非故厚今薄古實以語多
腐廓故不敢以疑信相參之書等於素問同作于
古組豆觀也惟有長洲郡玉極力尊崇而其中多
有強為組合之心仍非首崇本意故余尚論藥性
每從實處追求既不泥古以薄今復不厚今以廢
古惟求理與病符藥與病對俾炎帝救世之真心
然與余論相合而不失其尊崇之意是亦余心之
素望也矣

本草求真 凡例

他書皆有陶點勾勒取其易於披閱然滿紙細圈
稠密不空余素不尚且此非屬文藝僅求意義通
達不蔓不支便慳余志故集止就第一要處以為
圖飾餘則或點或某以為甄別

本草求真 凡例

本草求真目錄

以補火之精... 類以散之... 次以知... 立以知... 次以知... 家以知...

卷之一

補劑 滋中 平補 補火 滋水 滋腎

人參 黃耆

當歸 白朮

荔枝 饒糖

雞肉 雞血 雞肝 雞屎 雞子

牛肉 魚翅 魚肚 魚鱗 魚子

甘草 黃精

子部

杏仁 冬子 柏子 女骨

山藥 高麗 鹿茸

鳴肉 鴨血 鴨卵 鴨肝 鴨屎

阿膠 牛膠 燕窩 羊乳 羊血 羊肝 羊膽

補火

附子 天雄 烏頭 仙茅 仙茸

胡椒 補藥 遠志 小草

肉桂 沉香

硫黃 起石 鹿茸 鹿胎 鹿子

雄雞 海馬 蛤蚧 龍子

滋水

卷之二

滋腎	桑螵蛸	龜板	猪脂	猪心	猪肺	猪肝	猪肉	麻仁	火仁	白皮	榆皮	牛膠	川膠	地黃	乾黃
人乳	龜膠	猪心	猪肺	猪肝	猪肉	麻仁	火仁	白皮	榆皮	牛膠	川膠	地黃	乾黃	冬子	莫子
鹿膠	鹿筋	鹿角	鹿胎	鹿肉	鹿筋	鹿胎	鹿肉	鹿筋	鹿胎	鹿肉	鹿筋	鹿胎	鹿肉	鹿筋	鹿胎
狗脊	磁砂	杜仲	巴天	鎮陽	首烏	肉桂	從子	續斷	胡肉	桃肉	鹿膠	海膠	狗脊	大	大

本草求真 目錄

收斂	濕滯	肉桂	石	不子	逆子	西	餘	寒	五	五	五	五	五	五	五
龍骨	龍骨	龍骨	龍骨	龍骨	龍骨	龍骨	龍骨	龍骨	龍骨	龍骨	龍骨	龍骨	龍骨	龍骨	龍骨
龍骨	龍骨	龍骨	龍骨	龍骨	龍骨	龍骨	龍骨	龍骨	龍骨	龍骨	龍骨	龍骨	龍骨	龍骨	龍骨
龍骨	龍骨	龍骨	龍骨	龍骨	龍骨	龍骨	龍骨	龍骨	龍骨	龍骨	龍骨	龍骨	龍骨	龍骨	龍骨

金沸石	磁石	石	卷之三	散劑	散劑	麻黃	紫微	黨參
代石	代石	代石	散劑	散劑	麻黃	紫微	紫微	黨參
代石	代石	代石	散劑	散劑	麻黃	紫微	紫微	黨參
代石	代石	代石	散劑	散劑	麻黃	紫微	紫微	黨參
代石	代石	代石	散劑	散劑	麻黃	紫微	紫微	黨參

本草求真 目錄

獨活	獨活	獨活	獨活	獨活	獨活	獨活	獨活	獨活
獨活	獨活	獨活	獨活	獨活	獨活	獨活	獨活	獨活
獨活	獨活	獨活	獨活	獨活	獨活	獨活	獨活	獨活
獨活	獨活	獨活	獨活	獨活	獨活	獨活	獨活	獨活
獨活	獨活	獨活	獨活	獨活	獨活	獨活	獨活	獨活

烏頭	桂枝	水片	皂角	虎骨	麝香	蛇退	蜈蚣	散瀉
烏頭	桂枝	水片	皂角	虎骨	麝香	蛇退	蜈蚣	散瀉
烏頭	桂枝	水片	皂角	虎骨	麝香	蛇退	蜈蚣	散瀉
烏頭	桂枝	水片	皂角	虎骨	麝香	蛇退	蜈蚣	散瀉
烏頭	桂枝	水片	皂角	虎骨	麝香	蛇退	蜈蚣	散瀉

本草求真 目錄

升麻	柴胡	淡豉	山	木	子	散	散	散
升麻	柴胡	淡豉	山	木	子	散	散	散
升麻	柴胡	淡豉	山	木	子	散	散	散
升麻	柴胡	淡豉	山	木	子	散	散	散
升麻	柴胡	淡豉	山	木	子	散	散	散

15087 丹黃參日年三書 2 反三

本草求真 目錄

小香	苗香	山奈	良薑	藿香	排香	半夏	延胡	白香	安香
益智	甘松	乾薑	薑香	石菖	烟草	丁香	合香	烏藥	
						雞香			

艾葉	附米	稀米	君使	豆草	溫散	卷之四	瓜蒂	甜蒂
藜蘆	草撥	木香	白菴	草菓			葶子	麻根

本草求真 目錄 七

青皮	石菖	燕莖	鹿皮	白芨	冬花	欒花	浮萍	木香	香薷	稀草
荷葉	橘皮	加皮	菱核	枳櫛	麝鈴	什菊	野花	紫菊	白菊	黃菊
	橘葉			蒴菓						

木賊	平散	伏肝	雄黃	胡荽	大蒜	松脂	川椒	朱砂
耳茶			薑黃	白子	雄雞	麥非	胡椒	樟腦
			石炭	芥菜			麻根	

本草求真 目錄 八

神麩 大音	石英 三音	石英 三音	甘露 石 九音	蠶沙 三音
----------	----------	----------	---------------	----------

卷之五

海劑 海瀝 下氣 河水 降痰 海熱

通草 兩音	扶苓 三音	扶神 七音	心水
赤苓			

本草求真 目錄

濕瀉

六瀉 三音	前子 三音	扁蓄 三音	海沙 三音	茵陳 三音	白皮 三音	蛇頭 三音	赤豆 三音	小豆 三音
木通 三音	燈草 三音	華薹 三音	防已 三音	廣子 三音	苦參 三音	猪苓 三音	滑石 三音	
		藜蘆	木已					

不燕 三音	刺皮 三音	刺蟻
----------	----------	----

大戟 三音	海滋	芫花 三音	廿途 三音	梅炭 三音	白箭 三音	翟麥 三音	紫貝 三音	蝎蝓 三音
海瀝								

本草求真 目錄

降痰

括仁 古音	貝母 三音	白蕒 三音	白礬 三音	牛黃 三音	牽牛 三音
天粉 三音	竹瀝 三音	礞石 三音	蓬沙 三音	角黃	大黃 三音
天貝	竹瀝				

本草求真 目錄

海石	石膏	皮菴	明玄粉	雲水	熊膽	石明	金汁	瀉火
空青	青鹽	朴硝	寒石	水石	兒茶	珍珠	秋石	
					魚鱗		秋水	

本草求真 目錄

西瓜	柿蒂	練子	川子	天黃	竹茹	質象	紫苑	白微	連翹
銅青	梨	紫花	紫皮	竹葉	雅子	青子	藍根	白欬	前胡
								赤欬	

麥冬	沙參	平瀉	枳實	杏仁	三稜	下氣	卷之七	人中白
					草三			童便

本草求真 目錄

犀角	地葉	樞子	山子	黃蘗	天冬	玄參	竹葉	胡連	黃芩
羊角	茶茗	骨皮	地皮	白皮	丹皮	射干	膽草	知母	黃連

地黃	生血	兔屎	墨	酒	桂心	仙	天	精	穀	小	大	雞	溫	血	劑	紫	米	山	青	鈎	百	
黃	血	屎	墨	酒	心	仙	天	精	穀	小	大	雞	溫	血	劑	紫	米	山	青	鈎	百	
紅		海	百	龍	乳	骨	不	王	沙	甘	白	澤					陽	梗	雙	茅	石	
花		蛇	霜	菜	香	補	得	得	糖	蔗	糖	蘭					水	米	草	根	斛	
白		三	天	天	美	酒	香	香	平	子	子	草					墨	四	元	尾	斛	

蘇	母	益	蒲	我	紫	三	危	下	魚	青	尼	猪	辰	槐	公	滿	卷	赤	紫
木	草	黃	黃	木	參	七	之	血	血	血	血	血	砂	角	英	英	芍	芍	草
仁	子	子	子	子	子	子	八		公	公	公	公	公	公	公	公	公	公	公
乾	沒	商	丹	藍	糖	茜			明	夜	兔	名	無	相	君	淡	銀	地	蓮
漆	藥	奴	參	黃	金	草			砂	夜	肉	與	與	葉	花	胡	榆	草	草
全	全	全	全	全	全	全			全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全

本草求真 目錄

蟾蜍	楓香	麻子	發毒	輕粉	水銀	大楓子	蒼苔	鶴虱	雄蟲	維劑	絞蟲	水蛭	榜子	皂礬	古錢	蓮藕	血竭
蟾蜍	楓香	麻子	發毒	輕粉	水銀	大楓子	蒼苔	鶴虱	雄蟲	維劑	絞蟲	水蛭	榜子	皂礬	古錢	蓮藕	血竭
人牙	象牙	芙蓉		穀齒	銀珠	樞實	阿魏	雷丸		解毒	解毒			五脂	花石	自然	桃仁
										解毒	解毒						

本草求真 目錄 十五

豆腐	豌豆	蠶豆	黑豆	穆	麩	食物	卷九	砒石	仙鳳子	毒物	人黃	蚯蚓	慈姑	山翁	白翁	山根	麥子	解毒
豆腐	豌豆	蠶豆	黑豆	穆	麩	食物	卷九	砒石	仙鳳子	毒物	人黃	蚯蚓	慈姑	山翁	白翁	山根	麥子	解毒
豆皮	豆皮			黍稷	黍稷	內有食物		礬砂	巴豆									
						不再替												

本草求真 目錄 十六

芥菜	薤菜	白甘	菠薐	荜莢	白甘	南瓜	胡瓜
五胃	五胃	三胃	三胃	老胃	老胃	老胃	老胃
木芹	同蒿	苦菜	苧莖	菊菓	荊菓	茄菓	胡菓
荊菓	菜油	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓
胡菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓
菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓

本草求真

十七

越瓜	絲瓜	醬瓜	諸筍	李	青梅	栗子	枇杷	馬苧
三胃	三胃	五胃	老胃	老胃	老胃	老胃	老胃	老胃
甜瓜	冬瓜	芋子	青桃	楊梅	橄欖	花生	橋樑	橋樑
瓜菓	瓜菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓
菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓
菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓

菱角	木耳	雉	鳩	鳧	竹鴉	猪	鮑魚
八胃	六胃	三胃	三胃	三胃	三胃	三胃	三胃
香草	鹿朮	鷹	鷓鴣	鷓鴣	班鳩	班鳩	鮑魚
菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓
菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓
菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓

本草求真

十八

鱘魚	白魚	鱒魚	石魚	斑魚	鯉魚	鯽魚	鱉魚	鱉魚
四胃	八胃	八胃	三胃	三胃	三胃	三胃	三胃	三胃
鱘魚	青魚	銀魚	鱒魚	烏魚	鮑魚	鮑魚	鮑魚	鮑魚
菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓
菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓
菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓	菓菓

主治卷上

肝

心

脾

肺

腎水

腎火命門

三焦

膽

胃

大腸

小腸

膀胱

主治卷下

風

寒

本草求真 目錄

十九
錄圖

暑

濕

燥

火

熱

痰

氣

血

積

痛


消渴

總義

本草卷後目錄 七頁

本草求真目錄終


本草求真 圖



本草求真 圖

草部






本草求真圖



本草求真圖 草部



本草求真圖 草部






本草求真 圖 草部



本草求真 圖 草部



七 綠圖








木部求真圖 草部

十二



木部求真圖 草部

十三





本草求真 圖

草部

十四



本草求真 圖

草部

十五



凌霄花

本草求真 圖


草部

十六





本草求真圖 草部



本草求真圖 梓印木部





本草求真 圖 木部 十八



本草求真 圖 木部 十九



本草求真圖



木部求真圖

木部

三十一



本草求真圖

木部

三十二





一第〇七册 續修四庫全書第 4 版及內

本草求真圖





本草求真

穀部




本草求真

菜部



本草求真圖





本草求真圖



本草求真圖 獸部 獸部 獸部 獸部 獸部



本草求真圖 魚部 魚部 魚部 魚部 魚部





本草求真圖 虫部

三四



本草求真圖 虫部

三五



本草求真卷一 第一册

補類 溫中 平補 補火 滋水 溫腎

溫中 人身一小天地 耳火地外陰 陽五行以爲 氣血之 人身外 天地不 陰陽五 行以爲 氣血之 人身外 天地不 陰陽五 行以爲 氣血之 人身外 天地不 陰陽五 行以爲 氣血之

滋水 滋水之味 鹹而性 寒有宜 於水火 之中而 不取用 於氣之 味者中 而不敢 用必宜 潤於水 火之中 而不取 用於氣 之味者 中而敢 用必宜 潤於水 火之中 而不取 用於氣 之味者

此藥性溫平 補氣血 治虛弱 諸症

本草求真 卷一

人參 人參能補 肺中元氣 於垂絕之 鄉能回陽 氣於垂 絕之鄉 邪功與地 並行不悖 是猶聖帝 御世撫 育萬民 參贊位育 功與天地 並立爲參 此參之義 所由起而 參之冬所 由立也 李時珍曰 人參年深 形有神故 謂之人參 神草也 參字從 蔞亦浸之 義 參字從 蔞亦浸之 義 參字從 蔞亦浸之 義

凡遇傷寒 發熱及勞 役內傷發 熱等症 參能助火 助氣 凡遇傷寒 發熱及勞 役內傷發 熱等症 參能助火 助氣 凡遇傷寒 發熱及勞 役內傷發 熱等症 參能助火 助氣

既發熱復以助火助熱之藥入而投之不更使熱
 益甚乎詎知參以補虛非以填實其在外感正氣
 堅強參與者木附桂同投誠為助火彌熾若使元
 氣素虛邪匪不出正宜川參傾佐如古參燕飲散
 毒散小柴胡湯白虎加人參湯石膏竹葉湯黃龍

湯皆用人參內入傾邪外出
 益人受外感之邪必先汗以驅之惟元氣壯者外
 邪始乘藥勢以出若素弱之人藥雖外行氣從中
 候輕者牛出不重者反隨元氣縮入發熱無休
 矣所以體虛之人必用人參三五七分入表藥中
 少助元氣以為驅邪之主使邪氣得剋有並非外
 感一湧而出全非補養衰弱之意也矧有並非外
 感止因勞役發熱而可置參而不用乎夫參之所
 以能益人者以其力能補虛耳果其虛而短氣虛
 而泄瀉虛而驚恐虛而倦怠虛而自汗虛而眩暈
 虛而飽悶食滯等症因常用參填補即使虛而嗽
 血虛而淋閉虛而下血大血與夫虛而喘滿煩燥

口渴便結等症又何可不以虛治而不用以參乎
 况書有云參同升麻則可以瀉肺火同茯苓則可
 以瀉腎火同麥冬則可以生肺同黃耆甘草則可
 以退熱素是參更為瀉火之劑則參曷為不用
 惟在虛實二字早於平昔分辨明確則川自不見
 悞耳要治痼疾古謂其喘嗽不用以其痰實氣壅之
 故若使腎虛氣短喘促豈能禁而不用乎仲景謂
 其肺寒而嗽勿用以其寒束熱邪壅滯在肺之故
 若使自汗惡寒而嗽豈能禁而不用乎東垣謂其

久病鬱熱在肺勿用以其火鬱於內不宜用補之
 故若使肺虛火旺氣短汗出豈能禁而不用乎丹
 溪謂其諸痛不宜驟用以其邪氣方銳不可用補
 之故若使裡虛吐利及久病胃弱與虛痛喜按之
 類豈可禁而不用乎節齋謂其陰虛火旺吐血勿
 用以其血虛火亢之故若使自汗氣短肢寒脈虛
 豈可禁而不用乎夫虛實二字最宜相較言則曰
 白面黃而青蓋悍者皆肺腎氣不足可用也面
 赤面黑者氣壯神強不可用也脈之浮而濡虛
 大遲緩無力沉而澀弱細結代無力者皆虛而
 不足可用也若強長擊實消數有力者皆火鬱內

本草求真 卷一 沖人參

實不可果其氣衰火熄則參雖同附桂可投如其
 火旺氣促則參即同知相切忌至於陰氣稱虛陽
 氣更弱陰不受火薰蒸者則可用參為君陰氣稍
 衰陽氣更弱而火稍見其盛者則可用參為佐益
 陽有生陰之功陰無益陽之理參雖號為補陽助
 氣而亦可以滋陰生血耳是以古人補血用以四
 物而必兼參同用者義實基此宋曰古人不血脫者
 須得生陽氣之藥乃生陽生則陰長血乃旺也皆
 平用補血藥血無由而生矣素問言無陽則陰無
 以生無陰則陽無以化故補氣非若黃耆性寒
 須用人參血虛者亦須用之非若黃耆性寒

陽陰氣絕少而於火盛血燥不宜沙參甘淡性寒
 功尚瀉肺而補絕少玄參苦鹹寒滑色黑入腎止
 治腎經無根之火攻於咽喉不能於氣有益斐斐
 甘平雖能補中益氣而質潤味淡止能潤肺止咳
 兼治風濕仍非肺分氣藥耳故書載參益土生金
 明目開心益智添精助神定驚止悸正氣得補解
 邪火自退
 渴除煩氣補則火不浮而燥自除通經生脈氣補
 則血
 而脈氣以行破積消痰氣旺則水可利而痰自消
 發
 熱自汗陽得固多夢紛紜
 神定驚反胃虛咳

本草求真 卷一

喘促氣補而肺久病滑泄氣補而清
 淋瀝脹滿
 而渴得中甘中風氣補而邪
 一切氣虛血損之症
 得內固血皆所必用至云參畏鬻脂而亦有參同
 用以治月閉是畏而不畏也參惡皂莢而亦有參
 同用以名交泰丸是惡而不惡也參反藜蘆而亦
 有參同用以取涌越足蓋借此以激其怒雖反而
 不反也然非深於醫者不能以知其奧耳山言但
 參本溫積滯亦能成熱故陰虛火亢咳嗽喘逆者
 為切忌焉參以黃潤聲實似人者佳上黨雖為上

產道地然民久置不採時珍曰上黨今潞州也
 取今所用者今有所云黨參者皆是假物時珍曰
 以沙參辨危枯梗根造作亂之沙參體虛無心
 而味淡莖葉體虛無心枯梗體堅有心而味甘
 甘微帶苦其次百濟所出力薄上黨又其次高
 麗遼東所出力薄百濟川皆忌鐵久留經年須用
 淋過灶灰曬乾及或炒米同參納入籠器收藏參
 鬻性注下泄與紫菀當歸之尾破血意義相同滑
 脫則忌參蘆功主上涌氣虛火炎亦忌但體虛痰
 壅用之可代瓜蒂山西太行新出黨參其性止能

清肺並無補益與於久經封禁真正之黨參絕不
相同另有義詳黨參論內所當並考察觀

黃者山草

黃者專入肺味甘性溫質輕皮黃肉白故能入肺
補氣入表實衛為補氣諸藥之最是以有者之稱
且著其功曰生用則能固表無汗能發有汗能收
是引指其表實則邪可逐故見無汗能發表固則
氣不外洩故見有汗能止耳又著其功曰熟則生
血生肌排膿內托是若指其氣足則血與肉皆生

本草求真 卷一 補劑類

勢化膿成而為癰瘍聖藥矣至於痘疹不起陽虛

無熱極日係元湯用黃芪原出東垣治慢驚土衰
外護衛氣滋助陰陽作公服水其知藥異其理則
同故去白芍加生薑改名曰保元湯多黃者三錢
人參二錢炙甘草一錢 書言於者最宜皆是取其
生芪一水煎服之 質輕透表功專實衛色黃人肺色白入肺而能升
氣於表又言力能補腎以治崩帶淋漓是蓋取其
補中升氣則腎受陰而崩帶淋漓自止然與人參
比較則參氣味甘平陽兼有陰者則秉性純陽而
陰氣絕少蓋一宜於中虛而泄瀉痞滿倦怠可除

一更宜於表虛而自汗亡陽遺精不起可治且一

宜於水虧而氣不得宣發一更宜於火衰而氣不
得上達之為異耳黃者書言性畏防風其功益大
蓋謂能以助者達表相畏而更相使是以如斯若
使陽盛陰虛上焦熱甚下焦虛寒肝氣不和肺脈
洪大者則並戒其勿用矣出山西黎民大而肥潤
箭並良瘦小色黑堅硬不軟者服之令人胸滿震
目宜服三錢為使感藥甲白鮮皮反其性畏五
拘湯以酒沃之為使感藥甲白鮮皮反其性畏五
靈脂防風血虛肺燥帶漏寒多發表生用氣虛肺

本草求真 卷一 補劑類

寒酒炒腎虛氣薄益湯蒸潤切片用

當歸 三

當歸 辛甘溫潤諸書載為入心生血上品緣
脈為血府諸脈皆屬於心無血養則脈不通血
無氣附則血滯而不行當歸氣味辛甘既不慮其
過散復不慮其過緩得其溫中之潤陰中之陽故
能通心而血生號為血中氣藥故凡一切血症除
虛陽無所附而見血枯血燥血閉血脫等症則
用此法治按當歸頭則止血上行身則養血中法

尾則破血下流全則活血不左出東古方合白芍
 芍藥地黃同用名爲四物湯總劑蓋謂得芍以爲
 長養生發之機地黃以爲滋補化源之自白芍以
 爲救陰斂陽之本則血始能以生張景岳曰治血
 四物爲主然亦有宜與不宜者蓋補血行血無如
 高歸但當時之性動而滑凡因火動血者忌之因
 火而嗽因濕而滑者皆忌之行血散血無如川芎
 然川芎之性升而散凡火帶血上者忌之氣虛者
 宜火不歸元者皆忌之生血涼血無如生地黃
 清血無如芍藥然二物皆涼凡陽虛者非宜也
 宜也故凡用四物以治血者不可不察若血虛
 而氣不同則當佐以人參黃耆血熱佐以芥苳梔

本草求真 卷一 中篇

連血積佐以大黃瘁牛與夫營虛而表不解則當
 佐以柴葛麻桂衛熱而表不斂則當佐以大黃蓮
 其病之所向以爲出入加減要使血滯能通血虛
 能補血枯能潤血亂能撫俾血與氣附氣與血固
 而不致散亂而無所歸耳書命其名曰歸即是此
 意是以氣逆而見欬逆上聞者則當用此以和血
 血和而氣則降矣寒鬱而見瘧痢腰腹頭痛者則
 當用此以散寒散而血則和矣血虛而見風痺
 無汗者則當用此以養血血養而風則散矣他如

本草求真 卷一

瘡瘍癰疽而見痛苦異常肌肉失養而見皮膚不
 潤並衝脈爲病而見氣逆裡急帶脈爲病而見腹
 痛腰如坐水衝脈起於腎下出於氣街俠膈上行
 入足滯諸絡爲十二經脈之海主血亦何莫不因
 帶脈橫圍於腰如束帶約諸脈血亦何莫不因
 血虛氣無所附之意得此則排膿止痛消毒去
 膚澤皮潤而無枯槁不榮之患矣然此味辛則散
 氣虛火盛者切忌味甘則寒脾胃虛寒者則忌
 潤性滑大腸泄瀉者則忌不可不熟晰而明辨耳
 至書既言當歸入心而又曰入肝入脾無非因其

本草求真 卷一 中篇

血補而肝與脾皆有統藏之意肝統血脾統肉素產於
 所頭圓尾多色紫氣香肥潤名馬尾當歸其性力
 柔善補川產尾粗堅枯名饒頭當歸其性力剛容
 攻只宜發散收貯晒乾乘熱紙封裏內用宜酒洗
 畏蒼蒲海藻生薑惡濕麩
 白木山草
 白木人緣何專補脾氣蓋以脾苦濕急食苦以
 燥之脾欲緩急食甘以緩之內白木味苦而甘既
 能燥濕實脾復能緩脾生津燥則脾實且其性

二〇七

最濕服則能以健食消穀為脾臟補氣第一要藥也。五臟各有陰陽。白木。昔言無汗能發有汗能收。通利止泄消痰治腫止熱化毒安胎。胎氣繫於脾。所附。故止嘔。脾胃俱有。為嘔。有物無聲。為吐。東垣。易。謂。氣。不。行。而。以。參。功。功。甚。多。想。因。脾。濕。則。汗。木。補。胃。推。揚。氣。而。已。功。功。甚。多。想。因。脾。濕。則。汗。不止。脾。健。則。汗。易。發。凡。水。濕。諸。邪。虛。不。因。其。脾。健。而。自。除。吐。瀉。及。胎。不。安。胃。之。上。口。為。胃。門。水。穀。於。水。穀。之。滓。穢。自。此。而。入。小。腸。又。自。小。腸。下。一。十六。而。水。穀。始。下。小。腸。下。口。關。門。水。穀。自。此。別。在。六。腑。不。別。則。皆。入。於。大。腸。而。成。半。上。升。天。脾。土。強。者。

本草求原 卷一 濕中白木

自能勝濕。濕則不燥。燥則不濕。燥於五臟者。若十。亦。虛。不。能。勝。濕。則。風。寒。與。熱。皆。得。乎。而。為。助。亦。不。因。其。脾。健。而。悉。不。矣。故。向。根。積。則。能。治。瘧。向。其。考。則。能。安。胎。同。澤。瀉。則。能。利。水。同。乾。薑。桂。心。則。能。消。飲。祛。癖。同。地。黃。為。丸。則。能。以。治。血。瀉。萎。黃。同。黃。要。了。香。薑。汁。則。可。以。治。小。兒。久。瀉。同。牡。蠣。石。斛。麥。麩。則。可。以。治。脾。虛。盜。汗。然。血。燥。無。濕。腎。間。動。氣。藥。築。燥。湯。便。閉。者。忌。服。謂。其。燥。腎。閉。氣。則。其。氣。益。矣。劉。涪。子。云。癰。疽。疔。疔。白。木。以。其。燥。腎。而。閉。氣。故。反。生。燥。何。補。之。有。此。最。易。候。故。特。表。而。出。之。

寒濕過甚。水滯中宮者。亦忌。謂其水氣未決。若不。勝。水。甘。徒。滋。壅。必。待。腎。陽。倍。補。水。氣。漸。消。腎。氣。安。位。木。始。可。投。退。方。可。培。土。象。水。此。又。不。得。不。精。變。換。於。其。中。也。補。退。方。進。理。中。等。藥。蓋。補。脾。藥。不。一。白。木。專。補。脾。陽。除。邪。之。功。勝。而。益。陰。之。功。不。及。病。病。除。血。虛。血。虛。精。不。足。內。熱。骨。蒸。口。乾。唇。燥。或。嗽。吐。痰。血。鼻。衄。齒。齦。便。秘。滯。下。者。法。咸。忌。之。生。則。較。熱。性。更。鮮。補。不。滯。膩。能。治。風。寒。濕。痺。及。散。腰。膝。間。血。并。衝。脈。為。病。逆。氣。視。急。之。功。非。若。山。藥。止。補。脾。臟。之。陰。甘。草。止。緩。脾。中。之。氣。而。不。散。於。上。

本草求原 卷一 濕中白木

下俾血可生。燥症全無。蒼木氣味過烈。散多於補。人參一味。沖和燥氣。悉化補脾。而更補肺。所當分。別。而。異。視。者。也。出。浙。江。於。潛。地。者。為。於。潛。木。最。佳。水。川。浸。和。用。壁。土。拌。炒。助。脾。上。氣。人。荷。燥。藥。蜜。水。炒。制。燥。入。滋。陰。藥。人。乳。拌。用。血。制。燥。入。消。脹。藥。麩。皮。拌。炒。用。入。中。能。眼。爽。五。能。眼。潤。人。氣。味。甘。溫。多。有。似。於。大。棗。但。此。甘。味。更。重。潤。氣。尤。多。於。補。氣。之。中。滋。潤。又。更。存。有。補。血。之。

痛之病矣李時珍曰荔枝氣味純陽性最熱食之令人食後即覺口痛或動血也病齒者及火病人尤忌之開寶本草言其性平蘇氏謂多食無後皆誤說也按物類相感志云荔枝多則醉以殼浸水飲之即解此即食至核味甘氣溫專入肝腎散滯辟瘴雙核形似翠丸尤治瘰癧卵腫以其形類相似有感而通之義也治瘰癧如斗用香青皮各炒香痘瘡不起用殼煎湯以服蓋取殼末用酒送下性溫補內托之意然要皆屬性燥用當酌症所宜非若龍眼性主溫和而資益甚多也川建產者良

本草求真 卷一 濕中荔枝節糖

下五 祛風

節糖入肺氣味甘溫據書言能補脾潤肺化痰止咳嗽並仲景建中湯用此以為補中緩脾益以米麥本屬脾胃之穀而節糖即屬穀麥所造凡脾虛而肺不潤者用此氣味甘緩以補脾氣之不足成無膠欲緩急食甘以緩之兼因甘潤以制肺燥之有餘是以脾虛而痰不化固可用此以除痰脾虛而嗽不止固可用此以除嗽即中虛而邪不解亦得用此以發表中虛而煩渴時亦得用此以除煩止渴寒食大麥一升水七升煎五他如草烏毒中

其性橫裂固可用此以為甘緩止刺快吞痛楚異常更可用此以為柔軟然糖經煉成濕而且熱其在氣虛痰盛中虛火發固可用此溫除若使中滯氣逆實火實痰非惟治痰且更動痰非惟治火且更生火震亨曰節糖屬上而處於大火發濕中至於小兒多食尤易損齒生蠱土補而水勉不可不慎辛白者不入藥用

本草求真 卷一 濕中雞肉

下六 祛風

雞肉原食補虛溫中載之本經不為不是然雞屬巽而動風外應乎木內通乎肝得陽氣之具早故先病而鳴宗典曰雞鳴於五更日鳴必鼓翅火動風生之象時珍曰雞鳴於天產作鳴地產作鳴陰精宜屬風木是陽中之陰也故風火易動而易散人之陽事不力者不宜食雞是以昔人有利婦人不和男子之說而東南之人肝氣易動則生火生痰病邪得之為有助也故陰虛火盛者不宜食雞食則風火益發矣脾胃虛弱者不宜食雞食則肝邪益甚而脾益敗矣味者不察既犯陰虛火動

脾虛不食兩症又不樽節口與反執補虛溫中之
 說殊為可惜至於婦人小產胎動尤不宜食其
 益動而血益損惟有一鳥骨一鷄別是一種獨得
 益虛而胎益墮惟有一鳥骨一鷄別是一種獨得
 水木之精性偏走肝腎血分補血益陰為補虛除
 癆祛熱生津止渴及下痢喉口帶下崩中要藥
 所治皆血分之病各從其類也如古方有用鳥骨
 鷄丸以治婦人百病取此補血擊卒死用鷄血以
 塗心下即甦此鷄指心下冷乃藥之道送妙
 冠位處至高精華所聚凡年久雄鷄色赤尤為陽

氣充虛故可刺血以治中惡驚悸及或中風
 口眼喎斜用血塗其頰上即正其能走血透
 和酒調服可以便即發對口毒瘡可用血塗即散
 風勢者行中蜈蚣舌服出口可用冠血浸舌并
 以酒調服其物性之有甚效至於雄鷄肝味
 咽即消畏惡而得爾伏其效甚眾至於雄鷄肝味
 甘微苦而溫何書哉治除痰不起三其能免經子
 一物為末卵雀和共如小及小兒疳積眼目不明
 正大參服五六十九酒下及小兒疳積眼目不明
 並肝經實熱虛熱實熱用雄鷄肝並切黃連白
 用鷄肝同明雄鷄去藥食皆以取其肝以入肝
 鷄肉全為末酒蒸去藥食皆以取其肝以入肝

本草求真 卷一

類相感之意鷄屎白性寒不溫用之以治鼓脹者
 方云治鼓脹且食不能食由脾虛不能制水水
 友勝土水氣不運氣不宣故令中滿其脾沉實
 而精氣不發人主之何大矣云諸腹脹大皆於
 無精氣不發人主之何大矣云諸腹脹大皆於
 故成服也小知人主之何大矣云諸腹脹大皆於
 師之費也小知人主之何大矣云諸腹脹大皆於
 三法為未服三錢亦可石淋古今驗錄以酒醋
 以酸漿飲服方寸匙亦可石淋古今驗錄以酒醋
 日二酸漿飲服方寸匙亦可石淋古今驗錄以酒醋
 北當歸各一兩兩兩兩兩兩兩兩兩兩兩兩兩兩
 未入鷄屎白兩兩兩兩兩兩兩兩兩兩兩兩兩
 東地類濕服令醉亦以取其消導利濕清熱除
 風之義惟鷄子性稟生化痰初之氣兼清濁而為

體味甘氣寒性專除熱療火為風熱癩瘡及傷寒
 少除咽痛必用之藥卵清微寒性專治熱解毒為
 目痛赤痛煩滿欬逆小兒下瀉婦人難產胞衣不
 出癰疽敗腫必用之藥卵黃微溫性偏利產安胎
 但多食則滯閉日勿多食令人腹中有聲動風氣
 共蟹肉食和共蟹肉食和共蟹肉食和共蟹肉食和
 病地端以鷄子共蟹肉食和共蟹肉食和共蟹肉食和
 兒生他如卵殼研末磨除障及或敷下疳瘡益
 以取其殼脫之義傷寒勞復用此敷合黃黑為末
 熱湯調服亦以取其風性發散之意地內黃皮性

女男

當消殺除熱止煩通瀉並卵中白皮能散久欬結
 氣皆以取其性氣上行下入之妙然要鷄中其有
 濕性則能動火助風具有寒性則能清熱利濕其
 有不性則能益陰秘陽用雞而在於肝則可通肝
 以治疝用鷄而在於脾於尿則可入腑以消食用
 鷄而在於地出皮殼則可入目以磨睛而仍不感
 乎異木風動以為之主故能直入厥陰而不收耳
 此血虛筋掣及陰虛火起骨蒸服此大忌請鷄推
 烏骨烏肉白毛最良

本草求真 卷一 雜中 鷄肉 牛 十九

牛肉 屬土 若屬黃牛色猶得正治能補土
 固中 益氣止渴 氣逆則止 功與黃者無異
 三癆久病日服黃牛湯能令日漸強而無腫脹
 之病其效可知即丹溪倒倉法治停痰積血膠聚
 於腸胃迴腸曲折之處發為癰痰癆瘵並脹膈膈
 非九散所能及者用此因瀉為補借補為瀉其
 曲折如洪水泛漲陳朽順流而下沉苛悉去大有
 再造之功中後行一二次亦却疾養壽之一助

朱震字 論曰 腸胃為積穀之室故謂之倉
 者推陳以新也胃積則血不和而為癰瘕
 五味有傷中宮積血不和而為癰瘕
 瘵為癰瘕成積血不和而為癰瘕
 意和自非成積血不和而為癰瘕
 法用黃肥壯牛所成積血不和而為癰瘕
 取液再成積血不和而為癰瘕
 鐘煉月溫飲病在積血不和而為癰瘕
 命吐而利在積血不和而為癰瘕
 神強可瀉積血不和而為癰瘕
 房事年沈疴悉去也須斷此為補中之劑非若汗
 吐下藥能以傷人亦奇方也但病非腸胃者不得
 進行是法牛有黃牛水牛之分故黃牛性溫而水
 牛性平白水牛可治反胃吐食腸結不通牛乳味

本草求真 卷一 雜中 牛 魚

甘微寒亦治脾胃枯槁噎膈反胃
 積滯氣逆上攻所致故食不能入
 下也日人脈斷不食然旋生痰
 香煤腦液未枯道然旋生痰
 愈可以入液不枯道然旋生痰
 一法前更腎水既竭火偏勝於上
 結前更腎水既竭火偏勝於上
 吸門喉閉食多噎不吐必反於上
 胎朱炭等日反胃噎膈大便燥結
 人乳之兼服四味之物為七情之
 黑身白頭者切忌同指肉食則生寸白蠱

魚 十一

鯽魚入脾氣味甘溫諸魚性多屬火惟鯽魚則
 性屬土土能制水故書載有和胃實腸行水之功
 凡腸風下血瀉氣吐食俱可用此救治且性與厚
 朴反朴則泄氣鯽則益氣也至於生搗可塗痰核
 乳癰堅腫以猪油煎灰服可治腸癰合赤小豆煮
 汁食則消水腫炙油則治婦人陰瘡同白礬燒研
 則治腸疝血痢入絛蠶泥同煎則治反胃吐食
 胡椒煨則治喘氣痞滿皆以借其制水之意但椒
 不可去蠶以蠶有止血之功也烏背者味美忌食

本草求真 卷一 雜中 鯽魚 二十二

冬芥菜沙糖猪肝
 蜜入脾肺 水花木精英春生露氣曬得醱而成
 生則性涼清熱熱則性溫補中為至純至粹之味
 凡人五臟不足燥結不解營衛不調三焦失職心
 腹急痛肌肉瘡瘍咳嗽熱疔眼目眩花形色枯槁
 無不借其潤色以投如仲景治陽明燥結大便不
 解用蜜煎導乘熱納入穀道取其能通結燥而不傷脾胃
 也滋補藥俱用白蜜為丸取其和胃潤肺也至於

本草求真 卷一

赤蜜食之使人心煩以其味酸者故惟降火藥用
 之白蜜雖補脾肺然性涼質潤若脾氣不實腎氣
 虛滑及濕熱痰滯胸痞不寬者咸須忌之白如膏
 者李時珍曰凡試蜜以燒紅火筋用銀石磨每
 蜜一觔入水四兩桑火慢熬掠去浮沫至滴水成
 珠用忌蒸餅葛同食蜂房味苦鹹辛氣平有毒
 為清熱軟堅散結要藥是以驚癇癰疽癩疔瘰癧
 疔疔風毒等症得此則除也時珍曰蜂房房陽明藥
 攻亦能散之功可以毒以其辛能散結苦能泄熱鹹

本草求真 卷一 雜中 蜂房 二十二

能軟堅且取其氣類相從以游攻毒之義也有同
 亂髮蛇皮三物合燒灰酒服治惡瘡附骨癰根在
 臟腑歷節疔疔腫惡脈諸毒者又以煎水漱齒
 止風虫疼痛洗乳癰蜂疔惡瘡者皆以取其攻毒
 散邪殺虫之意并得陰露之寒及蛻脫之義耳但
 癰疽潰後禁用去外粗皮酒淨炒用

本草求真 卷一 第一冊終

本草求真卷一 第二册

平補不實而用則重味投補是虧已在於精而補
 而於血有損而補亦不常用以平劑而於下有補氣
 得下而於上補而於下補則平補也
 陰之平者也相子合穀皮肉筋骨是補陰之至
 陰之平者也相子合穀皮肉筋骨是補陰之至
 平者也相子合穀皮肉筋骨是補陰之至
 也相子合穀皮肉筋骨是補陰之至

本草求真 卷一 平補黃精

則能補木以安心至於含米補豆一能養胃以除
 苦辛兼淡以潤肺不火而氣
 味苦辛兼淡以潤肺不火而氣
 萎蕤入肝脾兼一名玉竹味甘性平質潤據書載
 能補肺陰及入肝脾腎以祛風濕與人參地黃稱
 為補劑上品如本經所論以治中風暴熱等病別
 中寒日痛背痲淚所論以治心腹結氣虛熱等病
 虛勞客熱頭痛不安千金以治風濕自汗身重
 藥不足皆以萎蕤為主并云可以當參其說本
 嘗不是但此氣平力薄既與人參力厚不若復以

地黃味濃不令仰使用至劬許未有奇功較之人
 參之補元地黃之滋陰不啻天淵矣矧可用此當
 參以挽垂絕之傾乎况書載云祛風除濕不無疎
 泄於補更云不及於云可稱上劑耶肥白者良似
 黃精而差小黃白多鬚竹刀刮去皮節發散用生
 補劑用蜜水拌飯上蒸熟用

本草求真 卷一 平補黃精

下三蠱且得坤土之精粹久服不飢其言極是時
 日黃精受戊巳之津氣故為真黃古之勝品土者
 萬物之母土得其養則水火既濟木金交合而
 邪自去矣但其所述地婢一事云其服此能飛不
 無可疑究其黃精氣味止是入脾補陰若使挾有
 痰濕則食反更助痰况此未經火煨食則喉舌皆
 痺何至服能成仙若使事果屬實則人參更得夫
 地中和之粹又曷云不克成仙耶細繹是情殊覺
 謠謬因并記之根紫花黃蕤如竹葉者是俗名出
 生蕤九蒸九晒用

甘草十五

甘草味甘性平質中外赤肉黃生寒熱熟甘

人言其有火能瀉是因火性急迫用此甘味以緩

火勢且取生用性寒以瀉炎燥耳至書有云炙

用補脾是能緩其中氣不足調和諸藥不爭

五味之用苦泄辛散酸收鹹軟甘上行而發而水

草言甘下氣何也益味甘主中而升降浮沉可

上可下可外可內有和緩有補有泄居中之道

盡矣張仲景用甘草理中湯用甘草其性上甘

胡氏有柴胡黃芩之寒人參牛夏之瀉而用甘草

者則有調和之意建中湯用甘草以補中而緩肝

色鳳髓川用甘草以緩腎急而生元氣也乃甘補

之意故入和劑則補益入涼劑則瀉熱入汗劑則

解肌入峻劑則緩正氣入潤劑則養血并能解諸

藥毒如湯沃雪有中鳥頭巴豆毒甘草入腹即定

之不效加人甘草為甘豆湯其驗乃奇也及兒胎

毒以致尊為國老然使胃虛寒及或挾有水氣

脹滿等症服此最屬不宜未可云其補脾而凡脾

胃虛寒皆可得而服也若使滿屬虛致則甘又能

瀉滿不可不知王好古曰甘者令人中滿中滿者

也凡不滿而用炙甘草為之補苦中滿而用生甘

草為之瀉能引甘藥虛至滿所甘味入脾歸其所

桑寄生

補之此以甘瀉之理也經云以甘稍止莖中泄痛

於下節消癰疽焮腫及除胸熱節節功各有宜但

用宜取大而且結至書所載甘反大戟芫花甘遂

又云亦有並用不悖惟深達精微者始可知之如

治痰癖有用十棗湯加甘草東垣治結核與海藻

同用丹溪治癆瘵遠心飲與芫花同用皆以反其

之鏡

桑寄生 十六 桑寄生 寄生木 桑寄生 寄生木

不寒不熱號為補腎補血要劑絲腎主骨髮主血

苦入腎腎得補則筋骨有力不致疲痺而酸痛效

甘補血血得補則髮受其滋蔭而不枯脫落矣效

凡內而腰痛筋骨痠疾胎前外面金瘡肌膚風濕

何一不藉此以為主治乎第出桑寄生者真須

述桑葉者和葉葉細則陰乾忌火服則其效如神

若雜樹所出性氣不同恐反有害

柏子仁 十七 柏子仁 杏仁

柏子仁 入 辛甘平潤考書俱言四臟皆補究之

止屬心藥耳益香雖能補脾而實可以通竅而入

此屬心藥耳益香雖能補脾而實可以通竅而入

此屬心藥耳益香雖能補脾而實可以通竅而入

此屬心藥耳益香雖能補脾而實可以通竅而入

心潤雖可以補肝而益腎而實可以寧神而定驚
甘雖足以和胃而固中而實足以益血而神守是
以風濕可除驚癇可療邪熱可辟皮膚可澤惟見
神恬氣適耳聰目明而無枯槁燥寒之患矣然性
多潤滑凡陰寒泄瀉者切忌氣多香洩體虛火
盛者亦忌昔云不似不老延年輕身雖出經典仍
當活視毋為青執蒸熟茶乾白炙入藥炒研去油
用畏菊花

冬青子十八
木中味辛 卷一平補相子

冬青樹入女貞樹骨載之本草已屬不同如冬青
即今俗呼凍青樹者女貞即今俗呼蠟樹者樹骨
即今俗呼猶兒刺者冬青女貞花繁子盛葉滿
樹冬月鸚鵡喜食木肌皆白葉厚而柔長綠色面
青背淡形色相似但女貞則葉長四五寸子黑色
冬青則葉微圓子紅色之為異耳今人不知女貞
即屬蠟樹僅以女貞茂盛呼為冬青致令兩物同
名樹骨樹若女貞肌白葉長青翠而厚葉有五刺
子若冬青樹以致混將是物亦列女貞項下究

之三物合論在冬之甘而涼諸書雖言補肝強
筋補腎健骨筋葉方冬至日取凍青樹子滋酒浸
七十粒研而補仍兼有清女貞氣味苦平按書稱
為補虛上品可以滋水黑髮如古方之用早進草
桑椹子同入以治虛損然亦須審脾胃氣堅厚稍涉
虛寒必致作泄樹骨氣味苦平按書有言能補腰
膝及治勞傷失血用樹骨載夫刺入紅亦是補
水培精之味但性多陰不燥用以陰虛則宜而於
陽虛有碍枝葉可以淋汁煎膏以塗白癩風脂亦

本草求真 卷一平補冬青子

可以為鴉粘香三藥氣味不同至就其子紅黑以
推大約色紅則能入肝補血色黑則能入腎滋水
色紅則能入血理血故於失血血瘀有效色黑則
能補精化血故於烏髮黑髮有功然色紅而潤其
性陰兼有陽色黑而潤其性純陰不雜故書有言
女貞補中安臟而又議其陰樂至極凡此似同而
異在人平昔細為考核免至臨岐亡羊耳冬日採
佳酒浸蒸潤晒乾用

合歡皮十木

合歡兼人心因何命名謂其服之臟腑安養令人
 歡欣怡悅故以歡名第此味甘氣平服之雖能入
 脾補陰朱震亨曰合歡補上補陰之入心緩氣而
 令五臟安和神氣自暢及單用煎湯而治肺癰唾
 濁年山獨合阿膠煎湯而治肺痿吐血皆與白
 臘葵膏而為長肉生肌續筋接骨之藥然氣緩力
 微用之非止錢許可以奏效故必重用久服方有
 補益怡悅心志之効矣若使急病而求治即歡悅
 其能之乎合歡即合昏木極於庭除幹似梧桐枝

本草求真 卷一 補劑 合歡皮

甚桑葉似皂角極細繁密葉則夜合者是也粗
 皮炒用
 陳倉米造陳即米多年陳積於倉而未用者
 也時珍曰陳米北人多用東南人多用陳及和
 赤氣過色變故古人謂之此米存積未久則性仍
 舊米赤煮汗則膠粘不爽食亦壅滯不消至於
 病將愈胃氣未復猶忌食物總屬熱與食爵而煩
 以生必得冲淡甘平以為調劑則胃乃適陳米津

液既枯氣味亦變服此正能養胃除濕祛煩是以
 古人載此既有煮汁養胃之功復有祛濕除煩之
 力一切惡瘡百藥不效者用此作飯成團火煨存
 性麻油膩粉調敷可知冲淡和平力雖稍遜而功
 則大未可忽也若以無病之時而用此日為飽飯
 則又未見其有克合者矣

本草求真 卷一 補劑 山藥

脾氣雖溫而却平為補脾肺之陰時珍曰接氣
 太陰二經補其不足清其虛熱是以能潤皮毛長肌肉與麩同食
 不能益人動氣為不能製麩也不似黃耆性溫
 能補肺陽白朮苦燥能補脾陽也且其性溫滋
 而諸家俱未言能治遺精不禁味甘兼鹹又能
 益腎強陰故六味地黃丸用此以佐地黃然性雖
 陰而滯不甚故能滲濕以止泄瀉生搗敷癰瘡消
 腫硬亦是補陰退熱之意至云補陽消腫補氣除
 滯理雖可通語涉牽混似非正說至入湯劑以治

六虛危症難圖近功必多川之方愈以其秉性利
緩故可入滋陰藥中宜生用入補脾內宜妙黃用
淮產色白而堅者良建產雖白不佳

扁豆 二十三

扁豆 如何補脾益緣脾喜甘扁豆得味之甘
故能於脾而有益也脾得養而能舒扁豆氣芬
芳故能於脾而克舒也脾苦濕而喜燥扁豆得性
之溫故能於脾而克燥也脾土既實則水道自通
三焦不混而太陰暑濕之邪指太陰自爾克消矣

本草求真 卷一 平補扁豆 三十一

能復藏於脾而有滑瀉之病乎但多食壅滯
不可不知子粗圓色白者佳入藥連皮炒研用亦
有浸去皮及生用者

鴨肉 二十三

鴨肉 味甘溫 通火而生 噴水而長 未
出則時先得火氣故不憚冰雪偏喜滂雨而尾脾
膈濁最甚故羣雌一被其氣皆得化生之機不待
鷲尾之通也溫中補虛扶陽利水也治水利小便
宜用青頭雄鴨 是其本性此主性溫者而言也

有言其性微冷能入肺腎血分滋陰補虛除癆止

嗽化痰利水消腫為要
黑嘴白鴨一隻取血入酒
酒補之將鴨乾持去毛腸
東肉二升參苓平月散末一升
置鴨在內以炭火慢燻將陳酒一
酒乾為度取起食服之陰虛亦不見燥陽虛亦
見冷非其性平烏能若是乎但唯則微溫而雄則
微冷不可不辨若黑竹白毛者為虛勞聖藥亦金
水相生之義耳老者良血解全銀丹石硫霜百毒
及中惡湯死者卵甘鹹微寒能滋陰除心腹膈作

本草求真 卷一 平補鴨肉 三十二

炒鹽藏食佳

鴨肉 二十四

鴨肉 味甘 鹹氣平 性稟金水 故能入腎入肺
久患虛癯要藥凡人肺野受傷多緣精虧氣弱精
愈損者則氣益祛氣愈祛者則精益虛行氣無精
不服此味鹹溫平則精既見其有補而氣益見其
有益也此為甘平溫鹹之品其性不涼不燥故於
治虛之外更能兼理癆疥 凡一切皮膚惡癬及
癩風瘰癧癆風等症煮熱酒服無不成宜并辟諸

般藥毒誠虛癆患亦之良藥補精與氣之要藥也
但鶴形色甚多而珍貴者惟白者最良射能
預解痘毒以卵和辰砂三錢九菜豆大每服三
丸三五飲下亦尿亦能殺涼虛癆家咸多畜之
阿膠 二十五

阿膠 入肺入肝 味甘氣平質潤專入肝經養血
書又言除風化痰益以血因熱燥則風自生阿膠
得阿井純陰之濟水又得純黑補陰之驢皮宗
皮煎膠取其發散皮膚之外也用烏者取烏色
木以制熱則生風之義如烏卵烏雞之類皆然
本草求真 卷一 平補何阿膠

氣味俱陰既入肝經養血復入腎經滋水水補而
熱自制故風自不生滋器曰諸膠皆主風止
又膠潤而不燥膠性既能潤肺復能趨下降濁使
痰不致上逆耳至於痔漏瘍風血淋下疳疔
成慶經枯崩帶胎動癰腫治克有效亦是因血枯
燥伏熱而成故能得滋而解此為血分養血潤燥
養肺除熱要劑不似首烏功端入肝補血祛風烏
鬚黑髮而於肺經潤燥定喘則未及鹿膠性溫濕
腎與筋以益其血而於肺經清熱止咳則未有

膠力補至陰通達於任通熱除蒸而於陰中之陽
未克有補古人云阿膠養神人參益氣正謂此也
以黑光帶綠至夏不軟者其削炒成珠或麴炒蛤
粉炒去蒲黃炒血或酒化水化為用以山藥為使
惡大黃牛膠功與阿膠相似陳自明云補虛用牛
時珍云阿膠難得真牛皮膠亦可攪用其性味皆
所宜不可於虛熱若鹿角膠則性味熱補非虛熱者
不詳辨也治能養血祛風然總不如阿膠養血治
風之為最耳
羊角 二十六

本草求真 卷一 平補何阿膠羊角

羊肉 氣味甘溫東垣載能補形此一句已盡
羊肉大概矣復於十劑方中又云補可去弱人參
羊肉之屬是明指參補氣而補形端在羊肉又何
疑哉夫氣屬陽血屬陰體輕而燥者屬陽體重而
潤者屬陰羊肉氣味雖溫然體潤肉肥其於肌膚
血液則易及時珍曰凡味辛者使泥於書載壯陽
補氣健力等說及以陽生陰長之理牽引混指其
何以清眉目而別治用哉况據書載羊肝羊膽皆
指屬寒而能明目以祛熱時珍曰肝開於目者肝

外候之精華也故諸脈皆治目病諸月取
 下之神經各二百味草花年骨則止補骨燒灰
 膏以年食百草蜂採石花也年骨則止補骨燒灰
 擦牙則止四腎年精年服則止潤骨澤肌年血則
 止解此補諸毒外毒云凡服丹石人忌食年血上
 水銀粉生銀砂此霜硫黃乳石鍾乳年乳則
 空青甘青緩母石陽起石孔公康等毒年乳則
 止潤燥消滯年續則止敷疔瘰癧而於氣血未有
 補者有年肉一味功備入肺補氣而於形血精液
 竟不補及者乎但其氣薄於血則雖日服甘肥而
 血不生血薄於氣則雖日服參耆而氣不長於此

本草求真 卷一平補年肉

不可不知反半夏菖蒲忌銅器同蕎麥豆醬食礙
 痼疾同醋食傷人心
 燕窩原係入肺書中稱為食物上品及為補虛除痰
 之用考之本草不益謂此物由於鳥脚海粉作窩
 懸於石崖得陽和風日之氣而成者也海粉本屬
 寒鹹得鳥脚於風高之處而為甘平洵可入肺生
 氣肺處至入腎滋水腎入胃補中甘入俾其補
 不致燥潤不致滯而為藥中至平至美之味者也

是以虛勞藥者難進此吐紅痰者用此往往獲效
 義由於此然使火勢急迫則又當用至陰重劑以
 為拯救不可恃此輕淡以為扶衰救命之本而致
 委靡自失耳
 蠟二十八
 蠟加生入本有二一出於蜂蜜之滓而成即蜜凝結
 之粗者也其蠟有黃有白一出於樹之蠟其味由
 木之虫而得故又名虫白蠟白蠟二者氣味不同
 性亦微別如蜜蠟味淡性平其蠟木由窠成窠本

本草求真 卷一平補蠟

潤物則蠟亦潤故能主潤臟腑經絡而有絕續補
 傷生肌之妙與推治孕婦胎動下血不絕飲死以
 立蠟止存窠粗粗其性最濡故又能止渴絕痲作
 治府有調氣飲千金治痲有眼蠟湯華陀治下府
 食人而吐用白蠟方寸匙鴉子黃一枚不窠苦相
 味亦黃連末各半鴉子殼先煎蠟苦酒鴉子四
 味令勻乃隨連末灰髮熱至可光乃止二日服盡
 故今人以情不投而曰嚼蠟即味淡之意也又凡
 蕩除下焦之藥以此製丸亦其免傷上部之意窠
 蠟之用如此至於虫蠟係生蠟樹所產蠟樹屬金
 性最堅強虫食其葉而成味由氣溫按甘莖血補

中濕能通經活絡故膏職能止痛生肌補虛絕續
 與桑螵蛸同有補虛之意可為外科聖藥是以如
 符寰云汪御章尿血用白蠟加於涼血滋腎藥中
 遂愈又書云用此合合獸皮同入長肉膏中神效
 又治下疳服之未成即消已成即斂以半兩入鯽
 魚腹中煮食治腸紅神效則知虫蠟亦皆生肌活
 血之味但蜜蠟味甘淡清微溫虫蠟則味甘不淡
 而溫也蜜蠟因有清性可以止瀉治痢虫蠟清性
 差減而痢則解用也蜜蠟本於蜂窠之氣僅得甘

本草求真 卷一 牛補類

三七

之餘氣而成而所主在胃虫蠟得樹收斂堅強之
 氣而所治專在筋肉骨血也二者微似之中惟此
 之際不可不知

本草求真卷一 第二册

本草求真 卷一

本草求真卷一

補火 按李時珍云命門為精之源此非
 大下通二府上通心膈生為命之節兩野中此
 主精氣之府此火則神機息生而山此出又按
 謂火可以折惟火中之火不可折故必擇
 其同氣引歸宅則始不為補而折矣此火
 之所由補也第世計及更不知其附桂因何相
 必用之補越外氣不計及更不知其附桂因何相
 寒腹則知必用氣素而厥則必用仙茅火衰則必用
 既黃火衰則必用氣素而厥則必用仙茅火衰則必用

本草求真

卷一 補火附子

三八

附子 命門味辛大熱純陽有毒其性走而不守
 若其性走而不守非通行十二經無所不至為補
 附子 命門味辛大熱純陽有毒其性走而不守
 若其性走而不守非通行十二經無所不至為補

一一一

寒

先天命門真火第一要劑凡一切沉寒痼冷之症
 用此無不奏效吳越三陰及中寒痼冷身大熱
 而脈沉者急須用之或疑陰陽不交者用之
 功近世除症傷寒往疑似不效者內外皆陰
 極陽竭而用之已遲矣且其原佐以故昔皆
 氣弱必用急用人參以益其原佐以故昔皆
 能治寒毒厥逆者曰陰不將何原佐以故昔皆
 之謂也凡厥有陽者陰也逆者氣也故昔皆
 惡寒後則四肢厥冷但脈象沉而手足厥冷
 是為陽厥宜用承氣白虎等湯以清其熱
 身熱頭痛便惡引衣被四肢厥冷者用此
 瓜甲清熱散引衣被四肢厥冷者用此

霍亂轉筋拘攣風痺癱瘓積聚腎脈為病脊強而
 虛寒色之紅赤而澤者為寒熱能合色冷痢寒
 小無方又謂但察脈大有力者為熱反胃為
 反胃久吐諸書皆以於胃門胃之上下其症
 須臾吐是稿在於胃門胃之上下其症
 咳即返是稿在於胃門胃之上下其症
 有吐利後氣虛寒中而喘者經曰膈噎
 內發而相火衝中於胃而致食不化
 以治呃逆嘔噎喘嗽心而致食不化
 逆脈來沉而無力者用此
 逆脈來沉而無力者用此
 逆脈來沉而無力者用此
 逆脈來沉而無力者用此

厥小兒慢驚癇瘡灰白癰疽不飲者其虛
 氣藥中則迫失散之元陽人發微藥中則能開腠
 理以逐在表之風寒入溫煖藥內則能以滋不足之
 之寒濕虞獨書所云入補血藥則能以滋不足之
 真陰緣陰與陽相為依附補陽即所以滋陰若使
 水虧火盛用以辛熱純陽不更使火益盛而水益
 虧乎好古曰非身涼而四肢厥逆者不故羅氏八
 味丸中用此以為補陰導導使陰從陽復然丹溪
 謂其雄悍無補而且殺人其言似謬制府都昌上

者良冰浸麵裹煨命發拆乘熱切片反半裏烏頭
 彰明赤水產者為最皮黑體圓底平八角重三兩
 類用補附子宜熟如仲景麻黃附子須生細辛以
 火益此反治之妙也發散附子須生細辛以
 熱愈不違其情而後發散附子須生細辛以
 寒則陰氣益甚而後發散附子須生細辛以
 論但陰極似陽服之不宜熱投虛時陽上治之
 其臟腑藥賦之偏服之有益無害若不數人者皆
 支壽至九十他服之有益無害若不數人者皆
 常張百斤以附子煎湯飲之黃如十歲世所
 衛張百斤以附子煎湯飲之黃如十歲世所
 附湯至九十他服之有益無害若不數人者皆
 支壽至九十他服之有益無害若不數人者皆

吐風痰以治癰疽取其直達病所常山吐痰痰積
吐風痰以治癰疽取其直達病所常山吐痰痰積
吐風痰以治癰疽取其直達病所常山吐痰痰積
吐風痰以治癰疽取其直達病所常山吐痰痰積
吐風痰以治癰疽取其直達病所常山吐痰痰積

本草求真 卷一 補大劑子仙芽

亦解
仙芽 命門人辛熱微毒據書皆載功補火助陽
精比下元虛弱陽衰精冷失溺無子並腹冷不食
冷痺不行藥不服之有效以其精為火宅火衰則
精與血皆衰而精自兩厥逆不溫溺亦自兩失候
不禁矣此與附桂硫黃胡巴破故紙淫羊藜蛇床
子遠志同為一側但附子則能以除火衰寒厥肉
桂則能以通血分寒滯胡巴則能以除火衰寒厥

本草求真 卷一

而年登則能以除火衰風冷蛇床子則能以祛火
衰寒濕疏黃則能以除火衰寒結破故紙則能以
理火衰腎海遠志則能以除火衰怔忡雖其所補
則同而效各有攸建未可云其補火而不分其主
治於其中也故凡火衰病見川之不離附桂餘則
視症酌增然亦須視寒風素怯則宜
賦賦於人但動則身冷如遊者既覺須令人之
其久乃能動當服仙芽蛇床子破故紙黃耆知母
則宜 若相火熾盛服之反能動火為害巨測
老說云一人中仙芽黃耆舌服出口漸大與行齊
只小刀秀之隨破隨秀至百數始有血一出

本草求真 卷一 補大劑子仙芽

鐵器
胡巴 命門人苦溫純陽亦能入腎補命故書我煖
丹田壯元陽治腎臟虛冷並疝瘕冷氣小腸偏
寒濕脚氣時珍曰胡巴在腎命門藥也元陽不
相劑局方有胡巴九治大人小兒小腸疝氣
盛及小腹有形如卵上下走痛不可忍者用胡
巴入錢煎香六錢巴戎去心川烏頭泡去皮各二
錢揀黃去枝四錢吳茱萸五錢並炒為末酒糊丸

一一三

悟子大每服功與仙茅附子硫黃恍惚相似然其力則終遜於附子硫黃故補火仍須兼以附硫菡香吳茱萸等藥同投方能有效係海外胡蘿子因聲音相近故名酒浸暴乾炒用

淫羊藿 三十二

山草 淫羊藿 入命門 辛香甘溫 諸書皆載能治男子

絕陽不興 女子絕陰不產 且能治冷風勞氣 四肢

麻木不仁 腰膝無力 時珍曰 淫羊藿味甘氣香性

明三焦命門藥也 蓋因氣味甘溫則能補火助陽

本草求真 卷一 補火 胡巴 淫羊藿 四十三

兼有辛香則冷可除而風可散耳至云久服無子 恐其陽旺多慾精氣耗散無他故也 一日百食 食此 養去枝年脂拌炒山藥為使得酒頁

蛇床子 三十二

蛇床子 命門 辛苦性溫 功能人腎補命 祛風燥濕

故凡命門火衰而致風濕內消病見陰痿 蛇床子

見孫子等分為 萎濕及女子陰戶出蝕 蛇床子

末 煎酒下 錢煎湯 子職虛寒 少許和勻加棗 蛇床子

不閉 暨腰痠體痺帶下 脫肛 蛇床子 甘草

敷與夫一切風濕疥癬等病 蛇床子 一兩 煎粉 四 服之則陽莖舉 關節利 腰背強 手足遂 瘡疥掃 至 於大瘋身癢難當 作湯浴洗 產後陰脫不收 用此 約袋 熨收 但性溫燥 凡命門火熾及下部有熱者 切忌 惡丹皮貝母巴豆去皮殼取仁微炒

遠志 三十四

遠志 入 辛甘而溫 入足少陰腎經 氣分 強志益

精 凡夢遺善忘 喉痺失音 小便赤澀 因於腎火衰

薄而致者 宜用是藥 以補益精與志 皆藏於腎 腎

本草求真 卷一 補火 蛇床子 遠志 四十四

氣充則九竅利 智慧生 耳目聰明 邪氣不能為害

腎氣不足 則志氣衰 不能上通於心 故 迷 惑 善 忘

時珍曰 遠志入足少陰腎經 非心經藥也 其功專

於強志 益精 治善忘 益精與志 皆腎經之所藏也

上通於心 故 迷 惑 善 忘 不能 登 閉 封 藏 故 精 氣

不固也 昔人治喉痺失音 作痛 喉痺 遠志末 吹之

涎出為度 非取其通腎氣而開竅乎 一切癰疽 背

發 從七情憂鬱 而得 單煎酒服 其渣外敷 投之 皆

愈 非苦以泄之 辛以散之 之意乎 小便赤澀 用遠 志 甘草 決神 益智 為丸 棗湯 服効 非取遠志 歸陰

以為獨導之藥乎。但一切陰虛火旺便溺遺精咳
痺癰腫慎勿妄用去心用甘草水浸一宿暴乾焙
乾用石則令人煩悶。苗各小草亦能刊殺兼散
少陰風氣之結也。畏珍珠藜蘆得扶芩龍骨良

肉桂 三十五

肉桂 門命 氣味純陽辛甘大熱。並透肝腎血分

大補命門相火。相火即兩腎中之真火。先天之氣

入胃全在益陽治陰。趙養葵云益火之原以消凡

沉寒痼冷管衛風寒陽虛自汗腹中冷痛欬逆結

本草求真 卷一 補火建志肉桂

四十五

氣脾虛惡食濕盛泄瀉。特珍治寒痺風濕陰虛失

結之力也。古方治小兒驚癇及泄痢病。五苓散

以酒入。血脈不通。死胎不下。官而破。血崩。子

赤脈痛。因寒因滯而得者。用此治無不效。益因氣

味甘辛。其色紫赤。有鼓舞血氣之能。性體純陽。有

招導引誘之力。昔人云。此體氣輕揚。既能補命

門。復能竄上達表。以通管衛。非若附子氣味雖

辛復兼微苦。自上達下止。固真陽而不兼入後天

之用耳。故凡病患寒逆。既宜溫中及因氣血不和

欲其鼓舞。起必用。則不必用。附子慎以暖補血氣

之內加以肉桂以為佐使。如十全大補水。參養營

之類。用此即是此意。今人勿細體會。徒以附桂均

屬辛溫。任意妄投。不細明別。豈衛生救本辨藥者

所應爾爾歟。但精虧血少肝盛大起者。切忌桂山

嶺。南色紫肉厚體鬆皮嫩辛甘者。佳得人參。其忌

生葱石脂。列入藥。勿見火

沉香 三十六

沉香 門命 辛苦性溫。體重色黑落水不浮。故

本草求真 卷一 補火建志肉桂

四十五

香能下氣。匿痰。氣香能散。故書載能入脾。調中

色黑。體陽。故書載能補火。煖精壯陽。是以心腹疼

痛。禁口。毒痢。癰癤。邪惡冷風。麻痺。氣刺。氣淋。冷

宜。審其病。因屬虛。屬寒。俱可用此。調治。益此溫而

不燥。行而不泄。同藿香。香附。則治諸虛寒熱。並婦

人強忍入房。或過忍尿。以致胞轉不通。同丁香。肉

桂。則治胃虛。呃逆。同紫蘇。白豆蔻。則治胃冷。嘔吐

同扶芩。人參。則治心神不足。同川椒。肉桂。則治命

飲沉香化氣非痰痰凡用之取其降泄也沉香降
氣散用之取其散結導氣也黑錫丸用之取其納
氣歸元也但降多升少氣虛下陷者切忌色黑中
實沉水者良教曰沈於水下者為上香甜者性平
辛辣者熱入湯劑磨汁用入丸散紙裝置懷中待
燥碾之忌火

硫黃 三十七
石硫黃 命門玄壽先生曰硫是礬之泥礬是
硫黃立味酸有毒燥曰有大毒以大熱純陽流為
本草求真 卷一 補火真香

本草求真 卷一 補火真香

四十七

火精時珍曰凡產硫黃處 益人一身全賴命門
真火周佈始能上貫心肝以主云為中及脾胃以
蒸水穀下司開闔以送二便旁達四肢以應動後
李時珍曰命門為精係胞之物其體非脂非肉
白膜裹之在脊骨第七節兩腎中央系著於脊上
通二腎上通心肺腦為生命之原相火之主精
氣之府人物皆有之生人生物皆由此出即經所
謂七情之勞中有小心是也以此火既衰陽微陰
相能代心君行事故曰小心也
盛內寒先生外寒後中厥氣逆胸旁及於脾胃為
腎關外寒斷關並入由是無熱惡寒手足厥逆二
便凝結繼以機槍攻下猪澤瀉利則二便不通

凝結益損是猶竹冰不解非不補火消除疎陽
胃則寒莫去而結莫消書云命門火衰服附桂不
能補者須服硫黃補之按硫黃純陽與大黃一寒
一熱並號將軍凡陽氣暴絕陰毒傷寒久也寒瀉
脾胃虛寒命欲垂盡者須用此主之又治老人
一切風秘冷秘氣秘熱藥多泄惟黃連肥腸而止瀉
為補虛助陽聖藥且能外殺瘡疥一切虫蠱惡毒
並小兒慢驚婦人陰蝕皆能有效但必製造得宜
始可以服余用法另詳難症凡遇一切虛癆中

本草求真 卷一 補火真香

四十八

寒冷痢冷痛四肢厥逆并面赤戴陽六脈無力或
細數無倫煩燥欲吐并口中苦咽乾漱水而不飲
啗審屬虛火上浮陽散陰格者服無不效王好古
白丹來復丹皆用硫黃佐以硝石至陽佐以至陰
與仲景白通湯佐以人尿猪膽汁大意相同所以
治內傷生冷外日若熱霍亂諸病能去格拒之寒
兼有伏陽不得兩如無伏陽只是陰虛更不必
以陰藥 今人不曉病機一見秘結不解不分寒熱
概用承氣以投詎知寒熱不同冰炭迥異用之無
益適以致害可不慎歟但火極似水症見寒厥不
細辨認輒作寒治遺用此藥其害匪淺孫升淡用

仙藥也每歲三伏日... 陽起石 命門 即雲母根也... 稟純陽之氣以生味鹹氣溫無毒能補命門相火... 凡因火衰寒氣內停宿血留滯而見陰痿精滑子... 陽起石 命門 即雲母根也... 稟純陽之氣以生味鹹氣溫無毒能補命門相火... 凡因火衰寒氣內停宿血留滯而見陰痿精滑子...

性稟純陽者故耳是以育龜丸用此以為補... 桃之基 陽起石合石龍子蛤蚧生犀角生附子... 爲末 鱈魚血爲丸砂不可以房術論也... 類於硫黃但硫黃大熱號爲火精此則其力稍遜... 而於陽之不能起者克起陽起之號於是而名出... 齊州雲頭雨脚鷲鷄毛色白滋潤者良火煨醋淨... 七次研粉水飛用... 惡澤瀉茵桂雷石石葵蛇皮惡兔絲忌羊血不入

本草求真 卷一 補火硫黃陽起石 四光

石鐘乳 命門 即雲母石者是也味辛而甘氣溫... 質重故凡欬氣上逆脚弱冷痛虛滑遺精陽事不... 舉者服此立能有效的以其氣不歸元壅堅鎮虛得... 此火不上浮氣不下脫而病俱可以愈耳且以辛... 溫之力又兼色白故能通竅利孔背人取名鐘乳... 即是此意但金石性悍服之陽氣暴充形體壯盛... 飲食倍進得此肆流則精竭火燥發爲癰疽淋濁... 本草求真 卷一 補火陽起石石鐘乳 五光

音不勝言即古有焚香透隔散... 人疾 以治胸膈勞嗽痞滿之病然暫用則可久... 用恐損人氣出洞穴中石液凝成下垂如水柱通... 中輕薄如鶩翎管碎之如瓜甲光明者真煉合各... 如本方蛇床爲使惡牡丹畏紫石英忌參朮羊血... 葱蒜胡荽

鹿茸 命門 甘鹹氣溫稟純陽之質含發生之... 氣號爲山獸性活而遊山夏至得陰氣而角解... 鹿茸 命門 甘鹹氣溫稟純陽之質含發生之... 氣號爲山獸性活而遊山夏至得陰氣而角解...

生陽退之象也。至於六於鹿者為麋，麋是澤獸，陰性濡而遊澤，冬至得陽氣而角解，陽生陰退之象也。陰陽相反如斯，故鹿氣味純陽，其性能於右腎補其精氣不足，大為補精煖血之劑。是以書載能補髓養血，強筋健骨，凡腰腎虛冷遺精崩帶等症，服皆有效。麋雖屬陰，而茸又屬陰中之陽，故能入於左腎，補其血液不足。且諸茸皆發督脈之背，鹿鼻帶反向尾，能通督脈，其茸在角，督為腎脈外取以補命門，補精氣，皆以發陽也。督為腎脈外垣，外垣既固，腎氣內充，命門相火不致妄動，血氣

本草求真 卷一 補大藥類

五十一

精津得以凝聚，故鹿茸又云能補督脈之真陽，糜茸能補督脈陰中之陽，不可不細為明辨耳。但鹿茸與糜茸，平能辨大抵其質粗壯，角背堅厚，毛色蒼黑而雜白毛者，則為糜茸，形質差瘦，角背差薄，毛色黃澤而兼白毛者，則為鹿茸。糜鹿雖分有二，然總不外填補精髓，堅強筋骨，長養氣血而為補肝滋腎之要藥也。鹿茸性常和百北，是腎氣有陰之鹿角初生長二三寸分岐如鞍紅如瑪瑙，彼之如朽木者，良酥塗微炙用，茸有小白虫視之不見。

為獸恐出入鼻

鯢

鯢，魚名，入心，味最甘，脂品所尚，性善跳躍，風火湯助是以書載小兒切勿妄食，恐其發驚動氣也。陰虛火動者尤忌，以其性易洩陰也。惟乳汁不下及風痰不吐，或制藥壯陽為差宜耳。時珍曰：時豬肉游馬種亦鯢屬，雌雄如勿，首類馬身似鯢，浮於水而亦主下胎催產及佐房術之用也。

蛤蚧

本草求真 卷一 補大藥類

五十二

蛤蚧，人稱絕與蛤蚧不類，生於廣南，身長七寸，首如蟾蜍，皆綠色，斑頭圓肉，漸鱗小而厚，鳴則上下相呼，雌雄相應，情洽乃交，兩相抱負，自墜於地，往捕斃之，至死不開，大助命門相火，故書載為房術要藥。且色白入肺，功兼人參羊肉之用，故用能治虛損痿弱，消渴喘嗽，肺癆吐沫等症，專取交合肺腎諸氣入藥，去頭留尾，酥炙口含，少許雖疾走而氣不喘，則知益氣之功為莫大焉。但市多以龍子混冒，舉世亦不深辨，如龍子則剖開而身長

赤斑皮前助陽火雞治陽痿性少止瀉蛤蚧則

束多對通身白鱗兼濕肺氣故肺虛喘之最宜

亦同但其藥力在尾見人捕之尾不全者不放去

頭足須去其頭洗去鱗內不淨乃肉毛酥炙或寒

多或酒浸焙用

雄蠶蛾命門即二蠶所出之雄者也味鹹性溫其

性最溫出齒便婿諸書皆載能起陰痿益精強志

飯於生有交接不倦并敷諸瘡或敷止尿血煖腎

治丈夫陰痿不起用此一夜每服一丸可御數女

止為陽痿求嗣而見若使陰虛火盛而用此為瀉

故古補方多不具載恐人藉此以為所喪之具也

取未交雄者佳蠶退紙燒灰可敷走馬牙疳

本草求真 卷二

本草求真卷二 第一節

滋水身之寶也天一一生水故腎為萬物之源乃人

作矣熱則精血枯惟耳鳴耳聾遺精便血汗

淋源失音咳嗽等症不固是悉形非不

水源火無以制其燥等症不固是悉形非不

地黃以通便燥之症則有人則有大麻胡麻則

把水而血矣至於水則有目不明則須以精

腎水則有精氣不足則有虛火則有燥熱則

子則有精氣不足則有虛火則有燥熱則有

收及血不行則有虛火則有燥熱則有

有治於血不行則有虛火則有燥熱則有

乾地黃即生地黃之乾者也味苦而性陰而寒

考諸長洲張璠謂其心紫入心中黃入脾皮黑歸
 腎味厚氣薄內專涼血滋陰外潤皮膚未澤病人
 虛而有熱者咸宜川之無熱須臾元禮曰陰微陽
 盛相火熾強來乘陰位日漸煎熬陰虛火旺之證
 宜地黃以滋陰退陽同人參茯苓石蜜名瓊玉膏
 治虛勞咳嗽唾血專補肺陰同天麥門冬熟地人參各
 因木九治老人精血枯稿兼固本於固本九中加地
 杞煎膏名集靈膏治虛羸喘嗽乏力兼固其瓊玉
 膏須用鮮者搗汁桑火熬膏散中寓止與乾者無

本草求真 卷二 水乾地黃

異固本九集靈膏並用乾者而集靈變九作膏
 之固本差勝易簡方曰男子多陰虛宜熟地黃
 子多血熱宜生地黃因人虛搏云生地黃涼血而
 胃氣弱者悉妨食熟地黃補血而痰飲多者悉妨
 膈妨食泥膈而症最宜計較何或言生地黃酒炒
 則不妨胃熟地黃薑制則不泥膈然須詳病人先
 氣病氣之淺深而用之治病須明若產後惡食泄
 瀉小腹結痛虛勞脾胃薄弱大便不實胸腹多痰
 氣道不利升降窒塞者咸須遠之以其有損漸進

者於涼血潤燥病人元氣本虧因熱邪閉結而
 舌乾焦黑大小便秘不勝攻下者用此於清熱藥
 中其秘結最佳以其有潤燥之功而無滋潤之
 患也愚按木經地黃雖列上品而實性稟陰柔與
 鄉屬不異臂諸育人內藏隱隙外示優容攝虛陰
 是以前舉世名家靡不藉為滋陰上品止血神丹
 仍不攻雖或用非其宜得以稍清旺氣服之仍得
 暫安非若人參之性稟陽明象類君子有過必知
 病不合便知是以師家欽手不敢用病緩口不

本草求真 卷二 水乾地黃

敢嘗故亦用以地黃門冬陰柔最甚之屬以至於
 死不覺川除藥殺人人多不張璐所論如此然非
 深究病情通達世故洞悉藥品亦安有討論而如
 斯乎生於江浙者陽氣力微生於北方者純陰力
 大生於懷慶肥大菊花心者良酒製則上行外行
 姜製則不泥膈惡貝母畏蕪荑忌萊菔葱蒜銀鉄
 器得酒門冬丹皮當歸良

冬葵子四十五
 冬葵子濕草
 冬葵子大小腸 冬葵子大小腸 冬葵子大小腸

凡婦子難產不下，當取一味炒香為末，以
 歸湯下三錢則易生。專行血取其晨夕向日轉動
 靈活，耳婦人乳房脹痛，同砂仁等分為末，熱酒服
 三錢，其腫即消。且能破五腫利小便，並臍
 腑寒熱，羸瘦同榆皮等分煎服，亦效。十劑方云，滑
 可去着，冬葵子、榆白皮之屬是也。故滑則去着，宜
 滑劑以利之。經冬至春，作子者各冬葵子、春葵子
 亦滑，不堪入藥。蜀葵赤者治血燥，白者治氣燥，亦
 治血淋，皆取其寒潤滑利之功。

本草求真 卷二 溫水冬葵子

川牛膝 溫水
 牛膝 肝腎 苦酸而平 按據諸書 雖載酒蒸溫補 肝
 腎 強健筋骨 凡足痿筋癱 陰痿失溺 久瘧下痢 傷
 中 少氣 治皆有效 又藏生川 則能活血 破瘀消腫
 治痛 通淋 引藥 下行 淋屬 熱致 其莖 痛不可忍 手
 淋 出如 沙如 石 膝下 妨礙 煩燥 熱六 脈沉 數不
 力 後淋 屬虛 致久 則止 或登 小痛 或喜 大便 燥於
 屬色 痿黃 飲食 少思 或語 言極 六脈 虛浮 無力
 有力 飲食 少思 或語 言極 六脈 虛浮 無力
 腹則 無砂 石青 血脈 結牛 膝難 淋症 要藥 然亦

本草求真 卷二

則又當知忌戒，不可因其氣虛而概用之。時珍曰
 可盡以牛膝治也。然味薄氣厚，性沉炙滑，用於下
 部，經絡血分，鮮氣則可。若使肺分氣薄，道脈泄瀉
 則又當知忌戒，不可因其氣虛而概用之。時珍曰
 足厥陰少陰所主之病，大抵得新則能補，肝腎生
 用則能去，惡血二者而已。其治腰膝骨痛，足痿
 消失，治久非傷中少氣，諸病非取其折傷之功
 與續斷相似，服之可無精滑之弊。然肝主司疎泄
 腎主閉藏，此則疎泄獨具，而鮮因蟄書云益腎殊
 覺未是。杜牛膝氣味更涼，嚼之味甘而不苦，主治

本草求真 卷二 溫水冬葵子

多足解毒，破血，濕熱，吐痰，如解，癰疽，疔毒，疔毒，疔毒
 微覺有別，牛膝出西川及懷慶府，長大肥潤者，食
 下行生用，入滋補藥酒，蒸惡，甲畏白前，忌牛肉
 拘杞，入腎，甘寒性潤，據書皆載祛風明目，滋筋
 從陽長水至風炮，故能明目強筋，是明指為滋水

一一三

之味故書又載能治消渴性珍曰子則甘平而潤
 能補腎潤肺生精益氣此乃平補今人因見色赤
 之藥所謂精不足者補之以味也妄謂枸杞補陽其失遠矣
 有甘潤無寒之品而尚可言補陽耶若以色赤為補陽則紅花紫草其
 色更赤何以不言補陽而曰活血鳴呼醫道不明
 總由看書辨藥不細體會者故耳試以虛寒服此
 不惟陽不能補且更見有滑脫泄瀉之弊矣可不
 慎歟出甘州紅潤少核者其根名地骨皮另詳於
 後

本草綱目 卷二 木部 補劑 六

諸實四十八
 補實味甘氣寒雖於諸臟陰血有補得
 此顏色潤筋骨壯腰膝健肌肉充水腫消以致陰
 痿起陽氣助是明指其陽用陰弱得此陰血有補
 故能使陽不勝而助非云陽痿由於陽衰得此可
 以助陽也若以純陰之品可以補陽則於理甚不
 合矣况書又云骨鯁可用楮實煎湯以服及紙煇
 灰存性調服以治血崩血暈並用衙門印紙燒吞
 以斷婦人生育與脾胃虛人禁服用久服令人忤瘥

補劑 諸實

非性屬陰寒虛則受其益過則增其害之意乎
 軟骨之說未嘗不是取浸水中不浮者酒蒸用
 榆白皮香木
 榆白皮大小腸與冬葵子性皆滑利味亦相同故
 五淋腫滿及胎產不下皆宜服此以治味甘高自
 皮為木和菜類食其美令人能食仙家在榆有二
 種曰赤曰白白榆皮服能止喘除嗽而使人睡較
 之赤榆皮之除邪氣稍有不同然其滑利則一若
 脾胃虛寒服之恐損真耳李時珍曰本經所謂久

本草綱目 卷二 木部 補劑 七

胡麻五十一
 胡麻木經名巨勝子千金名烏麻子本屬潤品故
 書載能填精益髓又屬味甘故香熱能補血煖脾
 耐饑抱朴子云用上胡麻三斗淘淨飯蒸令氣
 耐饑抱朴子云用上胡麻三斗淘淨飯蒸令氣
 去皮洗淨炒香為末胡麻三斗淘淨飯蒸令氣
 索青為丸服之能令不使胡麻三斗淘淨飯蒸令氣
 滋鬚髮不烏風濕內乘猴為疥千金方用烏麻
 末煎膏為丸服之能令白髮反黑聖惠方熱淋
 痛用烏麻子度青子各五合炒黃胡麻三斗淘淨飯蒸令氣
 水三升每食煎服一錢胡麻三斗淘淨飯蒸令氣
 胡麻三斗淘淨飯蒸令氣胡麻三斗淘淨飯蒸令氣

補劑 胡麻

歸腎經。凡用赤芝麻，見有燥象者，宜以甘緩滑利之味以投，若使下元不固，而見便溏腸癆精滑白帶，皆所忌用。麻油甘寒滑胎利腸，凡胞衣不下，用蜜同煎，溫服，解血熱，除腫惡，瘡疥亦用。此煎膏以治涼血解毒，皮肉俱黑者，良時珍曰：胡麻取油以煎，為良。胡麻者，尤妙。取其黑者，白者為勝。服食以星麻也。赤者，狀如老茄子，殼厚油少，但可食，不可藥。出於胡種大窠者尤佳。

大麻仁

大麻仁，尚人解，即今作石火麻之麻，所產之子也。

本草求真 卷二 麻仁 八

與胡麻之麻絕不相似，味甘性平，按書皆載緩脾利腸潤燥，如傷寒陽明胃熱，汗多便閉，治多用此。蘇以胃府燥結，非此不解。汪昂曰：胡麻，汗多便閉，則津液而大便愈燥，仲景治之，約有麻仁，成無已曰：麻仁，味甘，潤腸，能止渴，通乳，及婦人難產，老人血虛，產後便秘，最宜。弘景曰：麻子，中仁，合九藥，并後汗多，則大便秘，難於用藥，惟麻子，得力也。至云不惟產後可服，凡人諸虛，風秘，皆得力也。至云初服作瀉，其說固是，久服能令肥健，有補中益氣之功，亦是燥除血補，而氣自益之意。若云竟能益

氣則又，使人咳嗽矣。但性生走熱，守生用破血利產難，麻衣，不入藥，微炒，初用入丸湯，泡去，取帛包，煮沸湯中，浸至出之，垂井中，一夜勿著水，次日日中曝乾，搗去殼，雞揚取仁，具茯苓白微

黑鉛 五十二 金 甘寒，聚北方極陰之氣，為水中之金，丹之母，入石之祖，專主下降力，能入腎補水，功有過於地黃，疑以昔人有云：水精之說，凡一切水虧

火熾而見噎膈反胃嘔吐眩暈痰氣上逆等症服此立能見效，但必假製得宜，不令滲入膠膜，以致又生他變。時珍曰：與磁石不得同用，磁石則致與正同，其平日自製，黑錫丹，帶服，因磁石不致砂時，經飛去，鉛不致，鉛砂入膠，膠則此必結，洪立則正，墨水，不致，不通，取金液，丹三百，分，為十，煎，煎，麥，麥，麥，麥，得，得，得，得，化，藥，水，道，下，病，愈，如，何，方，黑，錫，丹，宜，明，補，真，丹，皆，用，黑，鉛，內，入，無

本草求真 卷二 黑鉛 九

非取其補陰退陽之意，至云能以解毒殺蟲，亦是水歸火伏，陰陽互根，而毒斯化，而蟲自絕，然金石之藥，與人身氣無情，用之最宜，合病鉛粉一名甜

粉係黑鉛煅煉變黑為白故有萬金之謂乃五金之祖
 者之稱其能伏五金而死八石也此非黃丹之
 苗而中其氣是金之祖矣此有金之
 之祖矣惟其氣伏於鉛而化於汞於
 於全公煉於汞而化於鉛於此而
 三變而成金丹一變而成金丹
 四變而成金丹氣味辛寒體用與鉛相似但有
 豆粉蛤粉同人故止入氣而不入血其功能止
 痛生肌膏藥每取為用且力能化毒殺金價其
 草粉蜜湯用此以為除毒殺蟲藥也鉛丹即名黃
 丹係用黑鉛兩錢煅煉而成故味兼鹹而走

血其性亦能殺蟲解熱除痰祛積且更拔毒去腐
 長肉生肌膏藥每取為用且力能化毒殺金價其
 陽功效
 猪肉 五三
 猪肉味甘性平能補氣養血生津液豐肌
 體澤皮膚時為補肉補形之要味然性屬陰物別
 三猪肉用血脈筋骨虛人不可食久食陶弘景曰
 子猪肉用血脈筋骨虛人不可食久食陶弘景曰
 動風發疾筋骨碎補氣養血久食令人少
 臟氣純陽火盛水衰服則以水濟火血脈周流自

有豐潤澤膚之妙若使臟體純陰少食或未見損
 多食必有阻滯痰濕生痰動脈作渴之虞耳時珍
 多食則助熱生 况風寒初感血脈有礙其於猪肉
 固不可食久病初愈血復其於猪肉更不宜食時
 日傷風寒及病初 雖曰先王教民畜彘為先非是
 起人為大忌耳 宜節飲食之說乎
 厲民又解不開大易之順有云宜節飲食之說乎
 江昂云傷寒忌之者以其補肌固表油膩極風
 邪不能解也初愈忌之者以腸胃久積受
 肥甘厚味也又按猪肉生痰助風寒痰濕受
 之若老人痰疾咳嗽更須肥膩以滋潤之不可
 加之於肉生 猪之為用最多其在心血氣味鹹平

合以硃砂能治驚癇癩疾取其心以入心肝血合
 以夜明砂作丸能治雀目夜不能視在肝用其
 肝入肺合薤苳能治肺虛咳嗽入肺以合黃連等
 藥為丸能令脾胃堅強食心飽云仲景猪肚黃
 四麥門冬二兩錢定蒸熟如白米各四兩知母三
 十九米飲下時珍曰猪水而治胃猪腎氣味鹹冷
 不能補腎精氣止可借為腎經引導時珍曰猪腎
 命門精氣方藥所用借其引導而已別錄謂理腎
 氣通勝脈理字通字最為有理腎有虛熱者宜之
 此理往往食猪腎為補不可不審 腸合黃連為

本草綱目 卷二 五十五 猪肉

本草綱目 卷二 五十六 猪肉

凡以服能治腸風臟毒方效膽汁味苦氣寒質滑

潤燥瀉肝和陰用灌殺道以治大便不通且能明

目殺疔沐髮光澤成無已日仲景以猪膽汁和醋

就陰潤燥而通便也治少陰下利不止厥逆無脈

逆者冷熱必以白通湯加猪膽汁主之若熱厥之

熱性便難故行則熱物冷服下之使人尿後冷厥

之物於白通湯劑之中使其所和入尿後冷厥既

氣相從而無拒格之患也猪肝能治瘰癧中遺溺

疝氣墜痛陰囊濕痒王莖生瘰癧時珍曰猪地所主

從死斷有一妓病轉用小便不通腹脹如鼓數月

衛生寶鑑中加者少亦機巧妙用也天蓋猪膽氣

本草求真 卷二 猪胆

味甘寒力能涼血潤燥行水散血解毒殺蟲利腸

滑痰止咳猪乳氣味甘鹹而寒能治小兒驚癇時

日小兒體弱純陽其驚癇亦生於風猪蹄同通草

煎湯能通乳汁然總視其物之氣質以治人身之

病耳肉反黃連桔梗烏梅他必

龜板 平四 利溼則去其濕也 之清

龜板 兼入膏 甘鹹微寒稟北方之氣而生乃陰中

至陰之物入足少陰腎經兼龜性有神故能入心

以通腎 龜板補水以通心陰凡陰虛血弱而見勞

龜板 龜板補水以通心陰凡陰虛血弱而見勞

熱骨蒸 至陰骨蒸以治腰膝酸疼老瘡瘰癧必有

瘰癧瘰癧用瀉五瀉雖理小兒顛門不合等症

背脊必服此皆能見效時珍云龜鹿膠而補腎首

常藏向腹能通任脈行腹故取其版以通心補腎

補血皆養陰也鹿身背反向尾能通督脈行背故

取其角以補命補精補氣皆養陽也龜性治與鱉

用相類但鱉甲色青鹿未走肝益腎以除熱龜甲

色黑應水通心入腎以滋陰然皆至陰大寒多用

必傷脾土過大自死者其膠多蝦灰用惡人參龜

本草求真 卷二 猪胆

尿以猪膽其尿即出走痰透骨染髮髮治啞聲若寒

服板不宜中濕中濕則板未移為瘰癧

本草求真 卷二 猪胆

龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠

龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠

龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠

龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠

龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠

龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠

龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠

龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠

龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠

龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠

龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠

龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠

龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠 龜膠

不致獅耳否則陰虛仍以熱地為要服之陰既得滋而陽仍得隨陰而不絕也其以古人滋陰多以地黃為率而龜板龜膠止以勞熱骨蒸為用其意實基此矣使不辨明晰僅以此屬至陰任意妄投其不損陽敗中者鮮矣因并記之川白死收龜得陰洗淨搗碎浸三日用桑火熬數晝夜其膏始成今人疑膠止在釜中

桑螵蛸五十六
 桑螵蛸即桑枝上螳螂子也一生九十九

子用一枚便傷百命勿輕用之稟秋金之陰氣得桑木之津液味鹹甘氣平無毒入足少陰腎足太陽膀胱蓋人以腎為根本男子腎經虛損則五臟氣微或陰痿夢寐失精遺溺螺蛸鹹味屬水內含於腎腎得之而陰氣生長故能愈諸疾及益精生子腎與膀胱為表裏腎得所養則膀胱自固氣化則能出故利水道通淋也宗稟治小便數用桑螵蛸為未卧時人參湯調下而愈女子疝瘕血閉腰痛皆肝腎二經為病鹹能入血軟堅是以主之甘能

補中故主傷中益氣腎足則水自上升克與心交故能養神也至書既言功詣收濟又言利便能利義由是矣產桑樹者朱日雄樹上生者名蠶他樹者以桑桑白皮代之桑白皮炒用其皮浸花皮行水以接蠶蛸其性也其子之母名蠶蠶主消小兒驚積並出筋族入肉時珍曰古方風藥多用蠶蛸則蠶蛸治風同一理也又醫林集要出箭族用蠶蛸一個巴豆半箇同煎敷傷處即非且恐傷少賦板之以黃連其性燥熱不火敷之

人乳至七
 人乳腎入肝氣味甘潤按諸書有言此為陰血

所化生於脾胃攝於衝任未受孕則下為月水既受孕則留而養胎已產則變赤為白上為乳汁以養小兒乃造化之玄微也服之益氣血補腦髓所謂以人補人也張氏曰張氏年老者無齒妻妾百若大人服之則能止渴澤府潤燥日得血能視此赤遊多淚可用黃連浸點宗稟曰上月為乳汁則血也相宜寶為補虛潤燥聖劑取無病婦人乳水時珍曰其人乳無定性其人和平飲食沖淡其必熱此服之須熱飲若病後人乳而食尤佳商史

本草綱目 卷二 桑螵蛸 十四 綠圃齋

本草綱目 卷二 人乳 十五 綠圃齋

惟飲會孫結乳也 頰如攤粉皮法取用各為乳
 丹丸但臟寒胃弱作泄者不宜急服 有孕之乳銀
 飲之多成吐瀉疝疝 之病最為有勞也

本草求真

本草求真卷二 第二

溫腎 腎虛而在於火則當用辛用熱腎虛而在於
 寒則當用甘用潤至於水火並濟則宜以
 之補則取其性溫而潤之能自得其宜矣
 按地黃則於水不溫因於火日蒸則而為
 溫腎則其性不溫因於火日蒸則而為
 溫腎則其性不溫因於火日蒸則而為
 溫腎則其性不溫因於火日蒸則而為
 溫腎則其性不溫因於火日蒸則而為

狗行溫燥以潤而制其燥食鹽青鹽鹹以殺其燥
 滋潤不用燥藥其性溫而潤至於水火並濟則宜以
 滋潤不用燥藥其性溫而潤至於水火並濟則宜以
 滋潤不用燥藥其性溫而潤至於水火並濟則宜以
 滋潤不用燥藥其性溫而潤至於水火並濟則宜以
 滋潤不用燥藥其性溫而潤至於水火並濟則宜以

熟地黃

熟地黃 入腎甘而微溫味厚氣薄專補腎臟真
 水兼培真氣后土土厚載物諸臟皆受其蔭故又
 曰能補五臟之真陰熟地功力甚鉅在景岳謂其
 真陰虧損有為發熱為頭痛為焦渴為喉痺為嗽
 痰為喘氣或脚腎寒逆為嘔吐亦有不宜或虛火

載血於口鼻或水泛於皮膚或陰虛而泄利腸汗而狂燥或陰脫而仆地陰虛而神散者非熱地之守不足以聚之守以制散陰虛而火升者非熱地之重不足以降之重以制升陰虛而燥動者非熱地之靜不足以鎮之靜以制動陰虛而剛急者非熱地之甘不足以緩之緩以制急陰虛而水邪上沸者舍熱地何以自制水以舍熱地何以歸元陰虛而精血俱損脂膏殘薄者舍熱地何以厚腸胃厚以滋薄且猶有最元最妙者則熟地兼散劑能發汗以汗化於血陰陽而

本草求真 卷二 溫腎藥地黃 十八

無陰不作汗也熱地兼濕劑能回陽以陽生於五引陽而無陰不同也然而陽性速故人參少用亦可成功陰性緩熱地非多難以奏效而今人有具其滯膩者則崔氏何以用於腎氣丸而治痰淨痰本痰於有畏其滑濕者則仲景何以用於八味丸而醫腎本腎加地因故謂腎氣不有謂陽能生陰陰不能生陽者則陰陽之理原自互根無陰則陽彼此相須缺一不可無陽則陰無以生無陰則陽無以化內經曰精化為氣得非陰亦生陽乎景岳尚論熱地最為

明確獨中所論脾胃寒逆為嘔可用地黃以治是亦干虛之一失耳天既脾胃虛寒則脾胃已受寒累正宜用以辛熱以為掃除如太陽既至整水自解乃復墮以霜雪投以陰劑不更使寒滋甚乎余讀景岳全書見其所論語語透關字字箴規可為法守獨於所論地黃有宜脾胃虛寒尚有未及雖曰熱地性溫寒從溫散然寒至上逆為嘔則寒已甚豈有熱地之溫而可令寒外散乎但或陽陰微陽藉陰化仍有感冒用此雜於溫散之中或

本草求真 卷二 溫腎藥地黃 十九

有見效若真純陰無火厥氣上逆而嘔則此又為探息至於制用地黃宜用好酒砂仁末同入久蒸久曬使其轉若為甘變紫為黑方能直入腎經耳汪補云或黃性燥得神與火與日則溫性燥得神在則利氣且能引入丹田六味丸用之為君尺脈弱者加桂附所謂益火之原以消陰也尺出脈旺者加知柏所謂滋水之主以制陽也出核慶肥大者佳

何首烏 三十九

何首烏 補入肝諸書皆言滋水補腎黑髮輕身備極贊賞時珍曰何首烏足厥陰少陰藥也白者入氣分赤者入血分腎主開藏肝主疏泄此

物氣滋味苦酸補腎溫補肝能收斂精氣所以
 能養血滋肝固精益腎健筋骨烏髮為滋補良
 藥不寒不燥功在地黃天門冬諸藥之上與地黃
 氣血太和則風虛癆瘵諸疾可知矣
 功力相似獨馮兆張辨論甚晰其言首烏滋陰微
 溫陰不甚滯陽不甚燥得天地中和之氣熟地首
 烏雖俱補陰然地黃稟仲冬之氣以生蒸雖至黑
 則專入腎而滋天一之真水矣其兼補肝者因滋
 腎而旁及也首烏稟春氣以生而為風木之化入
 通於肝為陰中之陽藥後天故專入肝經以為益
 血祛風之用風散則其兼補腎者亦因補肝而兼

本草求真 卷二 溫腎助陽

及也一為峻補先天真陰之藥故其功可立救孤
 陽亢烈之危一係調補後天營血之需以為常服
 長養精神却病調元之劑先天後天之陰不同奏
 功之緩急輕重亦有大異也解况名夜合又名能
 嗣則補血之中尚有化陽之力豈若地黃功端滋
 水氣薄味厚而為濁中濁者堅強骨節之用乎斯
 言論極透開五冠先賢未有不可忽視以大如參
 五辨者其三百年者大如栲栳服之成地仙有赤
 雄雌白二種凡使赤白各半泔浸竹刀刮皮切片

本草求真 卷二

用黑豆與首烏拌勻鋪餅餛人砂鍋九蒸九晒伏
 芩為使忌猪肉無鱗魚菜菔慈蒜蘇枳等物何
 何首烏者順州南河縣人祖名能嗣父名延秀能
 嗣年五十八無妻忽見是藥以服因思人道要
 迎生數子延秀服之延壽百六十歲一秀小首烏
 甘烏服藥亦生數子年百三十歲髮猶黑李安期
 與首烏里親善竊謂方服其高亦長遂存其傳
 之又謂應節進七寶美劑丹其方用赤白首烏各
 一筋黑豆拌九蒸酒浸牛膝酒浸同首烏第七次
 蒸各半第九次成散氣味甘潤用黑地黃為君之
 器是方以首烏為君若用六味以地黃為君之意
 相同注謂人或首烏加入六味九中是合兩
 方為一方一藥有二君殊非製方本意其說甚
 固按首烏山草

本草求真 卷二 溫腎助陽

肉菴菴謂人胃甘酸鹹溫體潤色黑諸書既言
 峻補精血又言力能興陽助火是明因其氣溫力
 專滋陰得此陽隨陰附而陽自見與耳惟其力能
 滋補故凡瘵瘵積塊得此而堅即消惟其滋補而
 陽得助故凡遺精夢泄寒熱時作亦得因是而除
 若謂火衰至極用此甘潤之品同於附桂力能補
 陽其失遠矣况此既言補陰而補陰又以菴菴為
 名是明因其功力不燥氣溫潤燥是以宜於便閉
 而不宜於胃虛之人也謂之滋陰則可謂之補火

二二九九

正未必然長大如臂重至筋許有松子鱗甲者良
酒浸刷去浮甲劈除內筋膜酒蒸半日酥炙用忌
鐵器

鎖陽 六十一
山草

鎖陽 地野人醫兼人大腸經耕錄云鎖陽生燒粗日
上豐下儉鱗甲齒龍遺精入地久之發起如笋
絡絕類男陽即肉苁蓉之類本與苁蓉同為一類
甘鹹性溫潤燥養筋凡陰氣虛損精血衰敗大便
燥結治可用此以啖并代苁蓉煮粥彌佳則知其
性雖溫其體仍潤未可云為命門火衰必用之藥

本草求真 卷二 溫腎鎖陽

也故昔有載大便不聚結者勿用蓋知性屬陰類
即有云可補陽亦不過云其陰補而陽自興之意
豈非性歸附桂而為燥熱之藥哉但古表著藥功
多有隔一隔二立說以致性若觀火究之細從藥
之氣味形質考求則孰陰孰陽自爾立見又奚必
沾沾於書治功也求者乎狀類男陽用宜酥炙

菟絲子 六十二

菟絲子 前人肝腎 辛甘溫平質粘溫而不燥補而不
滯得天地中和之氣故昔稱為補髓添精強筋健

性止遺固泄燥暖濕膝明日祛風血熱斯為補肺
腎脾氣要劑合補骨脂杜仲用之最為得宜但杜
仲補骨脂氣味辛溫性帶趨下不似菟絲氣味甘
平而不重降耳如學應年記云放前服菟絲子
菟若服之而見陽強不痿大便燥結小便赤清者
以性主補故也包菟絲子最難得真賣者有以水
芹草子種出形象似瓊肆所買多為此物然服
之亦有微功酒浸煮爛作餅蒸乾山藥為使

巴戟天 六十三
山草

本草求真 卷二 溫腎菟絲子

巴戟天 前人辛甘微溫據書稱為補腎要劑能治
五勞七傷強陰益精以其體潤故耳好古曰巴
也補日病人虛然氣味辛溫又能祛風除濕故凡
腰膝疼痛風氣脚氣水腫等症服之更為有益
日有人嗜酒日須五七盞後患脚氣甚危或教以
巴戟牛兩糯米同炒米微乾色米不用大煎
兩對炒同為米熟單炒守真地黃飲子用此以治
風邪義實此未可專作補陰論也川產中雖色
紫微有白粉粉色而理小暗者真如連珠擊破
偽又出祥根似巴戟但去心酒浸焙用覆盆子為
色白入後以酒煮之

使惡丹參

續斷 補草

續斷 補草 補草 補草 補草 補草 補草 補草 補草 補草

入腎經以補骨又凝其味辛能入肝經以補筋辛

而筋活 味兼甘又入中州以補虛 補不其端凡

跌撲折傷癱瘓筋骨曲節血氣滯之處服此即

能消痰 實筋散 止痛生肌且其味清故能止血

治滯並補小便固精安胎 補者宜此 久服能氣

力倍增 不滯 筋斷復續故曰續斷 實疏通 疏通二

本草求真 卷二 補草類

二四

續斷

氣血筋脈第一藥也第因氣薄而見精脆胎動

血失血等症則又深忌以性下行者故其功與地

黃牛膝杜仲巴戟相等但存溫補細微之別不可

不知川產者其狀如龜脚皮黃嫩節斷者其去

裏硬筋酒浸川地黃為使 辨見今人氣虛血脫

斷安胎 補 補 補 補 補 補 補 補 補 補

杜仲 補木

杜仲 補木 辛林酸溫諸書皆言能補腰脊為筋骨

氣血之需以其色紫入肝為肝經氣藥蓋肝主筋

腎主骨腎充則骨強肝充則筋健杜仲利用皆

於筋故入肝而補腎天能令其性辛溫也

除陰寒去痰濕接痺癱軟必藉脚氣疼痛必用

元氣以不效路少新得後得脚軟痛且其甚醫

折氣以不效路少新得後得脚軟痛且其甚醫

日全愈淋之日此乃腎虛非脚氣也杜仲能治

痛以酒行之則 胎前產後切要若使遺精有痛用

此益兒精脫不巳以其氣味辛溫能助肝腎旺氣

也胎因氣虛而血不固用此益兒血脫不止以其

氣不上非反卦下降也功與牛膝地黃續斷相佐

而成則杜仲性補肝腎能直達下部筋骨氣血不

似牛膝達下走於經絡血分之中熟地滋補肝腎

寬大筋骨精髓之內續斷調補筋骨在於曲節氣

血之間之為其乖獨怪今世安胎不審氣有虛實

輒以杜仲牛膝續斷等藥外血下行在腎經虛寒

者固可用此溫補以固胎元如古方之於三月

杜仲八兩糯米煎湯浸透炒斷者於兩月前以

山藥六兩為末物九或紫肉為丸米飲下因腎

胎之類編見今時醫士不審虛實若氣陷不升血

實用此安胎甚多殊為可惜 氣脫而胎不固者用此則氣益降不升其血必

本草求真 卷二 補草類

三五

續斷

愈脫無已故凡用藥治病須察脈症虛實於下之處有宜不宜以為審用若徒守其一曲甚多若不細心揣以應無窮之變非惟無益且以增害是辨可謂可惜出淡中厚潤者良去粗皮剉或酥或酒或蜜以炙或蒸或鹽或酒以炒在人隨症活變耳惡黑參今醫士守備要以求藥性皆前

覆盆子

味甘酸微溫性稟中和功能溫腎而不燥同稱而不礙李士材曰強腎無燥熱之備因故服

本草求真 卷二 溫腎補益子

陰痿能強肌有能澤臟腑能和鬚髮不白女子服之多孕既有補益之功復多收斂之義名為覆盆子者服之能使溺盆皆覆也但其甚少藥肆多以樹芽代充酒浸色紅者是真否則屬假去蒂淘淨搗餅用時酒拌蒸同車前五味菟絲子為五年無子加人已成我眼胸膈補骨脂鹿茸白膠山茱萸肉蓯蓉加陽水陰痰膠房不舉精寒精竭宜去蒂酒

狗脊山草 味甘平微溫何書既言補血滋水又

又曰去濕除風能使肺動腸痛失溺周痺但治肉耐痛即內經所謂內不在臟腑外未發於皮骨不能周故曰周痺是則因其味苦苦則能以燥濕又因其味甘甘則能以益血又因其氣溫溫則能以補腎養氣蓋濕除而氣自周氣周而筋不失補而筋自強筋強而風不作是補而能走之藥也故凡一切骨節諸疾有此藥味燥入則機關自強而俯仰亦利非若巴戟性兼辛散能於風濕則直除耳去毛有黃土如狗形切片酒蒸草燻為使

本草求真 卷二 溫腎補益子

膏良

胡桃肉六十八 味甘氣熱皮瀉肉潤汁黑諸書皆言能通命火助相火利三焦溫肺潤腸補氣養血飲氣定喘瀉精固腎與補骨脂一水一火大補下焦有同氣相生之妙韓愈曰破故紙屬火能生木潤血養血而陰燥故油以潤之任破故紙無木火相生之妙故古有云黃蘗無知母破故紙無胡桃猶水母之無鱉也

胡桃山草 味甘氣熱皮瀉肉潤汁黑諸書皆言能通命火助相火利三焦溫肺潤腸補氣養血飲氣定喘瀉精固腎與補骨脂一水一火大補下焦有同氣相生之妙韓愈曰破故紙屬火能生木潤血養血而陰燥故油以潤之任破故紙無木火相生之妙故古有云黃蘗無知母破故紙無胡桃猶水母之無鱉也

命人肥健能食潤肌黑髮固精治燥潤血之功也

一頁四行 丹黃參日車全書 6 文三

命門通則三焦利故上通於肺而通於心
 宜之通於腎而通於虛者宜之內而心腹諸
 痛可止外而虛者宜之內而心腹諸
 若使冬食則能動風脫人者志曰多食動風
 痰動同錢細嚼則即與銅俱化與甘其同嚼則其
 消融益因味甘則三焦可利汗黑則能入腎通
 命皮滿則氣可飲而喘可定肉潤則肺得滋而
 可補氣熱則食不敢多而有動風脫毛火燥消融
 化銅之弊耳是以痰腫鼠瘦痰核取其用能通
 解結惟肺有熱痰經命門火熾者切忌
 本草求真 卷二 滋腎補肺肉

入腎肺者宜之而效燒灰存性治乳癰瘰
 痰火積熱者不宜多食耳
 塗鬚髮皆黑志曰仙方取青皮壓油和髮血去皮
 用欬滴連皮用
 靈砂六十九
 靈砂六十九 又名神砂係水銀硫黃二物同水火煅
 煉而成煨微曰用水銀壹兩硫黃六銖細研
 者成就也時珍曰後入水火既成細研
 勻至陰服陰反陽故曰靈砂蓋水銀性秉最陰硫
 黃性秉純陽同此煎煅合為一氣則火與水交水
 與火合而無亢騰飛越之弊矣故凡陽邪上浮下

不交而致虛煩狂燥寤寐不安精神恍惚者
 鹽湯交陰則精神鎮攝而諸病悉去謂之曰靈砂
 是扶危拯急若有神使之意時珍曰硫黃精也
 而夫婦之道純陰純陽二體合璧故能化之
 不可久服陰陽既濟水火為法 故能化之
 吐逆小兒驚悸後人不明辰砂即屬丹砂混以靈
 砂入於益元散內草一加辰砂記知一神一靈
 音同字別一水一火天淵各判烏可以此烹煉燥
 烈之品以代辰州甘寒之味耶市肆與醫妄用如
 本草求真 卷二 滋腎補肺肉

斯附記以俟高明並參
 鹿膠七十
 鹿膠七十 由角煎熬書載補陽益陰強精活血
 不出通督脈補命門之用但其性力緩味甘不能
 如茸之力峻蒸茸有通交陽離之功陽離起於
 持諸膠有緣合衝脈之用衝脈起於
 柱同用以通其陽則不能除寒熱驚癇膠非假
 膠同用不能達任而治癱瘦腰痛任脈行腹
 膠非假地黃當歸同投不能引八衝脈而治婦

人血則胎滿至若膠治傷中絕勞即昔所謂能主
 漏下惡下也膠之能以補中益氣即昔所謂能以
 益氣強志也膠之能以輕身延年即昔所謂能以
 生齒不老也然惟平臍服之得宜若使純陰無陽
 服此反能泥膈先不免有腹脹便滿之弊矣生角
 味鹹氣溫其性之粘滑為角所合血之物肉易長
 廉直角無彎曲之骨最難長故人二十歲骨始堅
 此時水亦不及之頭為諸陽之會血於頭角豈與
 比哉生能散熱行血消腫辟惡以氣能入腎散邪
 其能益腎補虛強精活血角霜連汁煎乾膏載能

本草求真 卷三 滋腎鹿膠

綠圖書

治脾胃虛寒便泄取其溫而不滯若以前過膠者
 代充其膠既去服之矣蓋鹿胎鹿肉鹿筋力能補
 陽若藥胎藥肉藥筋則反損陽而傷陰矣不可不
 慎鹿胎須以色淡形瘦者為是若色深形肥則為
 藥胎矣若色皎白其胎下唇不若鹿之長於上唇
 則為藥胎其他獸胎總與鹿胎不侔鹿筋亦須筋
 骨細者為是若粗即非鹿筋不可妄用

海狗腎

海狗腎入即溫胸膈係西蕃獸物足似狗而通

尾時口拔膚謂云筋血出通
 則似狐之說非無也若似鹿者其毛色而
 藥用外腎而日膈者連取之也 今東海亦有
 味甘而鹹其腎即獸之筋按於睡熟犬邊大即驚
 跳麻月浸置水內不凍其性之熱外可見矣故昔
 載治宿血痰癖疔瘡症者取其鹹能入血軟堅溫
 能通行消散也用以佐其房術者取鹹溫入腎補
 虛固精壯陽道也 大抵與鹿膠之功相近亦
 可同類求法 此藥雖置器中長年溫潤然能入水
 煎服

本草求真 卷三 滋腎海狗

綠圖書

不凍大不同於他藥若云功近從者銷陽潤燥相
 若氣實不尋不無厚脫從蓉鎖陽而薄視此物也
 但脾胃挾有寒濕者亦忌以濕過濕故耳恐相礙
 也酒浸紙裹炙香到搗或於銀器中以酒煎熟食
 藥用時珍曰以炭煨炒

海狗肝

海狗肝有在山在水之別山狗
 其性最溫非不可飲無偶則常荒木而枯
 蓋可治陽虛陰痿精寒取陰一枚信值數金若以

婦人摩熱則莖躍然而動水瀨口水為主水性最
靈猶亦多慧性最嗜魚魚之精氣皆聚於肝故隨
亦得諸魚之氣而聚於肝者也珍肝諸畜皆有定
數惟猶一月一葉間有退葉因其漸落復生者故
耳猶味性寒惟肝性溫味鹹微毒專入肝腎補虛
除勞伴五臟安和邪氣自却而鬼疰毒因得退
除矣葛洪言屍疰屍疰五疰之一病則使人寒熱
不惡損月累年危至死後復惟取猶肝一且陰
傳於他人乃至城門覺有此病惟取猶肝一且陰
乾為末水服方寸匙日三以瘕為度如無瘕肝瘕

本草求真 卷二 肝腎補肝

灰亦可小兒鬼疰及諸魚骨燒灰酒服故仲景
治冷勞崔氏治瘕疰皆有猶肝丸之用耳
大肉七十三
犬肉骨入肝味鹹性溫屬土有火故及人侵地雖
臥必糜其肉食之能令脾胃溫暖且脾胃溫則五
臟皆安故又能補絕傷壯陽道煖腰膝益氣力補
血脈厚腸胃實下焦填骨髓也色黃者則於脾益
補色黑者則於腎更妙而腎能助陽事但肉食
益熱令人消渴如婦食之令子無脾熱病後及中

本草求真 卷二

紫河車人味甘鹹性溫雖曰本人血氣所生故能
以人補人也凡一切虛勞損極毛落於心則見
血脈不榮於五臟六腑於脾則見肌肉消瘦不
能飲食損於肝則見筋絡不能收持損於腎則見
骨痿不起損於肺則見自汗及下是肺先受其損
然後及心及脾及肝及腎而後見也損於脾則見
由下及上及傷脾自汗及下是脾先受其損
而後及心及脾及肝及腎而後見也損於脾則見
可治故以得飲食為貴不恍惚失志癩癩肌肉羸
等症川之極為得宜紫河車受精血結孕之餘

本草求真 卷二 補腎大劑紫河車

補腎如禾類鈔方用此合以山藥參苓以補其陰
所謂精不足者然究皆屬滑腸之品故合天冬麥
冬黃蘗生地龜板同服則於胃氣有損如吳球解
類况乾食則等肉脯入藥亦鮮致至於收藏不
密或令猪雀螻蟻所食於子尚屬有碍如銅山西
應矧可取同人藥以錢厥于且藥補劑甚多在人
別為取用慎毋於此懸懸不置也用取初生色紫
者良米泔攪淨長去筋膜蒸搗和藥用
本草求真卷二 第二冊終

二四五

本草求真卷二 第三州

收瀉 溫瀉 寒瀉 收斂 鎮虛

溫瀉 收者收其外散之意... 寒瀉 收者收其內散之意... 收斂 收者收其散漫之意... 鎮虛 收者收其虛散之意...

理脾 助胃 補氣 養血 潤燥 除痰 止咳 平喘 化痰 止咳 平喘 化痰 止咳 平喘...

溫胃瀉腸 豆蔻之辛溫理脾胃而治吐利行滯治... 膨消脹 凡脾胃虛寒挾痰食而見心腹冷痛泄瀉... 不止服此氣溫既能除冷消脹復能瀉腸止痢若... 合補骨脂同用則能止腎虛泄也至書所云能補... 脾氣以其脾胃虛寒服此則溫而脾自健非真具... 有甘補之意也氣逆而服即下以其脾胃既舒而... 氣即下非若厚朴枳實之下為最峻也但此止屬... 溫胃瀉腸之品若鬱熱暴注者禁用山嶺南似草... 魁外有皺紋內有班紋糯米粉裹熟去油用忌鐵...

補骨脂 補骨脂 補骨脂 補骨脂 補骨脂 補骨脂 補骨脂 補骨脂 補骨脂 補骨脂...

最為得宜許叔微學士本中云補脾不若補腎
 胃脾氣虛令人胸膈痞塞不進飲食
 或腹脹虛或嘔吐痰涎或腸鳴泄瀉
 中之物無力雖終日不熱何能消化
 丸用破故紙補腎肉豆蔻補脾二藥
 餘糜食糜空虛則受物矣屢用見效不可不知
 認症不真或因氣膈氣短而見胎墮
 盛而見精流泄瀉兼以清利
 殺入榛於利器尖鹽水炒得胡麻良惡甘草
 沒石子入腎養 味苦性溫色黑功歸入腎固氣

本草求真 卷二 滋補骨脂沒石子 三六 綠園齋

凡夢遺精滑陰痿齒痛腹冷泄瀉瘡口不收陰汗
 不止一切虛火上淫腎氣不固者取其苦以堅腎
 溫以煖胃健脾果以入腎益氣補精俾氣接納并
 川不為走泄則諸病自能克愈矣至書所云安神
 定魄亦是神氣既收不為外浮之意他如燒黑灰
 煎湯以治陰癆合他藥以染鬚髮為末以擦牙齒
 皆是賴其收滯之力以為保護耳無他道也但味
 苦性降多川恐氣過下不可不慎氣虛下川外帶
 藥小煎細者佳炒研用盡蝕成孔者揀去忌銅鐵

本草求真 卷二

蓮子入心腎 苦能入心脾腎三滯然氣藥清
 芳味得中和甘溫而清究皆脾家藥耳中和則土
 下安養君合臣恭而無不交之患矣馮非張日
 而不藥生不自節節合義中合白肉內應府心
 根鬚花葉節皮心皆為其藥果芬芳之氣合
 合金木者也上旺脾中黃所以交結水火會
 書載能補心與腎清心伏及通十二經絡血脈即
 是此意且其味清則能化氣不流而遺道崩帶失
 血等症可理分白濁遺精用不遺肉離骨益腎仁等

本草求真 卷二 滋補蓮子 三七 綠園齋

味清則腸胃亦因而無五更洩泄之虞同菟絲子
 參補骨脂巴戟天 治脾腎俱虛五更洩瀉人樞大
 便燥者勿服去心皮蒸熟焙乾用得茯苓山藥白
 朮枸杞良蓮心味苦性寒能治心熱故產後血渴
 者最宜不遺色黑入水則沉入肉則浮煎鹽用此
 鹹味苦性寒能除燥口熱勞淋濁果因熱成亦可
 以解然必本於遺實老於遺房墜入汚泥經久堅
 黑如石者方佳若使出自粵東產於樹上大苦大
 寒不宜入藥

一四七

蓮蕤水菓

蓮蕤尚入甘溫而清功與蓮子畧同但清性居多服能清心通腎益血固精烏髮黑髮止崩住帶如三因固真丸巨勝子丸並皆用之凡慾勤精薄而見滑脫不禁治當用此秘清但不似能清寒滑有收陰定魂安魄之妙牡蠣鹹滲微寒兼有化堅解熱之功金櫻徒有止清之力而無清心通腎之理耳毫釐千里不可不辨在細審玩忌地黃蒜葱

芡實入十水菓

本草求真 卷二 滋清蓮蕤芡實 三八

芡實入十水菓如何補脾以其味甘之故脾人芡實如

何則腎以其味清之故惟其味甘補脾故能

利濕而使泄瀉腹痛可治補脾同山藥茯苓白朮

惟其味偏固腎芡實一味尚未整金櫻子魚和

故能閉氣而使遺帶小便不禁皆愈便遺散精氣小

用秋石芡實扶芡實連肉各四兩為末和功與山

藥相似然山藥之陰木有過於芡實而芡實之清

更有甚於山藥且山藥兼補肺陰而芡實則止於

脾胃而不及於肺用或蒸熟搗粉或連殼同服

負荷入十水菓

荷荷入種類不一此以負負名者因其形似荷荷類細不大故以負負名也張璠論之甚詳言此生於漢北南方亦謂有之其幹類木而像藤木其子生青熟亦乾則紫黑氣味甘鹹而溫能攝精氣歸腎臟與五味子功用不甚相遠此籐蓂之類皆馮於筋形類相似草木之實皆達於臟實則入入故多入腹不獨此味為然此物向供食品不入湯藥故本草不載近時北人以之強腎南人以之

本草求真 卷二 負荷負荷 三九

稀痘各有攸宜強腎方用負負荷人多各一錢

火酒浸一宿滴晨塗手心摩擦腰脊能助筋力強

壯若卧時摩擦腰脊力助陽事堅強服之尤為得

力稀痘方用負負荷一錢一錢神黃豆一錢一

粒杵為細末一晝夜蜜水調服并擦心窩腰眼能

助腎祛邪以北地方物前助東南生氣之不足也

然乘質素弱宜服反是則不免有助人之害矣

阿芙蓉入十水菓

阿芙蓉附入即鸞粟花之津液也一名鴉片一名

之味乎詎知火浮肺中無處不形在上則有痰結
咳嗽汗出口乾吐衄等症在下則有泄痢五疳疔
血脫肛膜水濕爛子腸疝疔等症溢於皮膚感膏
寒邪則必見有風癩癢癩疥口不飲攻於眼目則
又見有赤腫翳障用此內以心腹則能飲肺止咳
因脫住汗常出自汗中出為汗汗用五倍子
以治膚癢洗則能秋風除濕殺蟲一切疥癬疔
燒酒各等分為末藥雖一味而治分內外用各不
同非謂既能人肺收欬治黃昏又能浮遊於表裏

本草求真 卷二 藥性五倍子

為驅逐外邪之藥耳膏載外感勿用義實基此
豨皂物最妙生於豨膏木上乃小蟲食汁遊穢結
越於葉間食其津液結成故與豨膏木功同
藥或生或炒用

百草煎 八十五

百草煎 肺入係五倍子末同藥作餅而成者也
助同桔梗甘草真茶各一兩人其性稍洋味酸
滑而帶餘甘五倍子性主收欬加以甘桔同製則
收中有緩緩中有散凡上焦痰嗽熱渴諸症

含化最宜加以火煨則胎下焦血脫腫毒金瘡
瘡口瘡等症用之即效以黑能入下焦故也

粟殼 八十六

御米殼 入肺大腹清微擊功倚欬肺瀉腸固腎
凡久瀉久痢肛脫久嗽氣之並心腹筋骨諸痛者
最宜 果曰收瀉固氣能入腎故治骨痛尤宜時珍
咳喘諸病既久則氣散不收而肺脹痛劇故若嗽
俱宜此瀉之因之收之氣之但要有神佐耳若嗽
痢初起寒熱未淨用此以為收瀉致令邪留不解
則殺人如劍不可不慎歟 震亨曰治瀉多用粟殼不
本藥求真 卷二 藥性五倍子

本草求真 卷二 藥性五倍子

收後藥也治瀉亦同凡痢須先飲邪行帶豨可據
投粟殼治骨之藥以因寒腸胃邪氣蓋邪得痛愈
甚所以變症作洗去積膜或醋炒蜜炒取用得烏
梅陳皮良罌中有米極細審言氣味甘寒煮粥能
治反胃亦須分臍偏純及痢症陰陽虛實以治

龍骨 八十七

龍骨 入肝大腸兼入心甘澆微寒功能入肝
除中之陽燥之長 飲魂不令浮越之氣遊散於外故書載能驚鎮辟
邪止汗定喘 馮非張曰龍之物也靈則能飲邪
氣得欬攝而歸 氣喘逆者氣不歸元也
元則喘逆自止 瀉可去脫故書載能以治脫肛遺

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

精崩帶瘡口不飲等症功與牡蠣相同但牡蠣鹹
 清入腎有軟堅化痰清熱之功此屬甘滯入肝有
 收斂止脫鎮驚安魄之妙如徐之才所謂滑可止
 脫龍骨牡蠣之屬白地錦紋紙之粘舌者佳時珍
 胃本經以為死龍其說似非錄曰生龍地川各
 及太山巖水岸上穴中近龍處抹無時注昂曰今
 人或以古酒煮火煨用忌魚及鐵畏石膏川椒得
 人參牛黃良牛黃更良有以制伏也龍齒入肝敗
 魂安魄比驚癇狂因於肝魂不收者即當用此
 以療肝魂能變化故魂起但無止瀉滑精之用

本草求真 卷二 藥類彙編 四則 綠圖者

牡蠣 八十八
 牡蠣 兼入腎 鹹 滋 微 寒 功 能 入 腎 軟 堅 化 痰 散 結
 收 瀉 固 脫 故 瘰 癧 結 核 血 癥 遺 精 崩 帶 咳 嗽 盜 汗
 遺 尿 滑 泄 燥 渴 濕 瘡 赤 痢 等 症 皆 能 見 效 惟 曰 痼
 熱 宜 同 地 黃 小 草 用 之 好 曰 牡 蠣 入 足 少 陰 經
 軟 堅 之 劑 以 柴 胡 引 之 能 去 腸 下 硬 以 茶 引 之 能
 清 項 上 結 核 以 大 黃 引 之 能 消 股 間 腫 以 地 黃 為
 使 能 益 精 收 瀉 以 小 便 引 之 能 消 分 之 藥 也 成 無 已
 曰 牡 蠣 之 鹹 以 消 胸 膈 之 滯 以 泄 水 氣 使 痼 者 不
 硬 者 軟 也 元 素 曰 牡 蠣 之 主 以 鎮 陽 光 則 渴 飲 不
 類 能 止 渴 也 然 鹹 味 獨 勝 走 腎 欬 瀉 居 多 入 服 亦
 能 寒 中 或 生 或 鹽 水 煮 成 粉 用 此 本 海 氣 化 為

本草求真 卷二

純性無味故曰牡蠣其母為使得甘草中酸建
 性味子夏惡肺黃辛夷吳茱萸伏硝砂
 蛤蜊粉 六六
 蛤蜊粉 入肺肝 即海內水蚌殼煨而為粉也
 江海淡水蚌殼不同功與牡蠣相似但此止有軟
 滑化堅解熱之力時珍曰其製火而鹹潤下故能
 焉學者家之以其其其水而性潤也退故能清
 者燥之以漆取其火化而利小便也
 痰止咳消腫若宋慈宗師如患此李防禦竟得市
 人海蚌蛤粉少加青黛以淡蘇水加麻油致清

本草求真 卷二 藥類彙編 四則 綠圖者

調服而愈亦是欬肺清熱之意無他治也昔蘇州
 司陳通如泥入蛤粉七食前白湯下服盡小便下數
 桶而肉鹹冷解酒熱文蛤背有紫斑紋較此蛤蜊
 殼稍厚性味主治頗近但此性菲利水止渴除煩
 並治血熱崩中帶下總以取其菲鹹滌飲之義耳
 成無已曰文蛤之鹹走腎以勝水氣如仲景傷寒
 太陽病不用水却益煩意欲飲水反不得及金匱病
 欲飲水不止反用文蛤湯以治海蛤係海內罔殼
 水而食飲者皆用文蛤湯以治海蛤係海內罔殼
 混雜沙泥火煨為粉亦屬利水消腫止嗽之品然
 總不類牡蠣功專收清同脫解熱為事也 第四

二五

本草求真卷二 第五

收飲酸主收故收當以酸為主也然徒以酸為主
 道矣故酸收之藥其性多然大要性寒而收者
 測有白芍則有白芍則有白芍則有白芍則有白芍
 收而收者則有五味木則有烏梅則有石脂等味
 但五收則有五收則有五收則有五收則有五收
 醒脾為赤石脂則有烏梅則有石脂則有石脂則
 痰降火赤石脂則有烏梅則有石脂則有石脂則
 補精要則有赤石脂則有烏梅則有石脂則有石
 收多於於不為收徒具力而補性絕少山茱萸更
 收多於於不為收徒具力而補性絕少山茱萸更

本草求真 卷二 散論 四六

大肝血
 氣

白芍 入 有白有赤白者味酸微寒無毒功入
 肝經血分飲氣緣氣屬陽血屬陰陽亢則陰衰陰
 凝則陽伏血盛於氣則血凝而不行氣盛於血則
 血燥而益枯血之盛者必煩幸為之散故川芎號
 為補肝之氣氣之感者必賴酸為之收故白芍號
 為斂肝之液收肝之氣而令氣不妄行也至於膏
 藏功能益氣除煩飲汗安胎同桂枝則飲風汗同
 補癆退熱及治瀉痢後重痞脹胸滿之為肝厥二

江西濟寧縣人
 生員官
 明倫彙編

則能理肺脹逆癰疽疔瘡鼻淵
 活濁閉果目白芍能益陰滋潤而
 肝氣之過盛而致陰液之不飲耳
 者為收飲停濕之劑故主手足大陰
 素曰白芍入脾經補中焦乃下利
 利皆大陰病故不可缺此得炙甘
 濟痛六安月少加黃芩寒加桂枝
 用凡六安月少加黃芩寒加桂枝
 也止瀉利因血脈五也四脈六也
 書言能理脾肺者因其肝氣既收
 安則金亦得所養故脾肺自安亦
 即調而後其也產後不宜妄用者
 以氣血既虛芍

本草求真 卷二 散論 四七

藥恐伐生氣之意也桂枝以酒
 方之可執哉倘腹痛非因血虛者
 腹痛宜辛散而芍藥收故耳者不
 則其本連視子視之常要藥此後
 實其本連視子視之常要藥此後
 陽浮越致令虛然用之得宜亦何
 者則補氣同歸地則補血同芍藥
 止腹瀉同黃連止瀉痢同芍藥
 經散如仲景黑神散芍藥湯非皆
 在相症明確耳出杭州佳酒炒用
 紫甲小菊反藜蘆赤芍其義另詳
 五味子 九

五味肺入味雖有五中苦辛皆鹹而酸鹹俱多其性亦温故書載能飲氣滋水益氣生津補虛明目
 強陰消精止嘔除瀉寧嗽定喘除煩止渴消腫解
 酒收耗散之氣腦子散大為保肺滋腎要藥成無
 肺欲收急食酸以收之震亨曰五味大能收肺氣
 宜其有補腎之功收肺氣非除熱于補腎非暖水
 八味丸用此補腎亦兼通逆類象形也
 於腎出於肺若陰虛火起則氣散而不收而煩渴
 咳嗽遺精汗散等症因之互見故必用以酸鹹則
 氣始有歸宿而病悉除至云能以除熱者是即氣

本草求真 卷二 酸味五味子 四八

收而火不外見之意也所云能暖水厥者是即腎
 因得温而氣得煖而蕪之也但寒邪初冒脉實有
 火者禁用果日有外邪者不可暖用以開北產
 黑者良入補藥蒸嗽藥生用惡菱莖
 酸棗仁九十一
 酸棗仁入肝膽甘酸而潤仍有生熱之分生則
 能導虛熱故療肝熱好眠神昏燥倦之症熱則收
 飲津液故療肺虛不眠煩渴虛汗之症志曰按五
 利石藥驗云酸棗仁睡多生使不得睡炒熱陶云
 食之醒睡而經云療不得眠蓋其子則味酸食之

本草求真 卷二

使不思睡按肝虛則陰傷而心煩而魂不能藏肝
 因其氣香味甘故又能舒大陰之邪專以爲心家
 此理 按肝虛則陰傷而心煩而魂不能藏肝
 是以不得眠也故凡傷寒虛煩多汗及虛人盜汗
 皆炒熟用之取其收斂肝脾之津液也如心多勝
 仁一兩炒香棗仁金匱治虛勞虛煩用棗仁湯
 二仁升甘草一兩多知母枳殼芍藥仁湯
 以滋腎氣亦以營氣得養則肝自藏魂而彌安血
 自歸脾而卧見矣其曰酸熱好眠可療因其酸被

本草求真 卷二 酸味棗仁 四九

熱活神志昏冒故似好眠其症仍兼煩燥用此同
 療熱熱療則神清氣爽又安有好眠之弊乎注昂
 膽湯治不眠內用二陳加竹茹枳實味乃涼肺
 瀉胃之熱以温膽之寒也其以温膽各湯者以膽
 欲不寒不燥耳但仁性多潤滑世最忌縱使香能舒
 脾難免潤不受滑矣附記以補書所未及炒研用
 炒久則油乾不乾碎久惡防已
 則氣味俱失便難見功
 金櫻子九十二
 金櫻子入腎脾肺生者酸濇熟者甘濇用當於
 其將熟之際得微酸甘濇之妙取其濇可止脫甘

一一五三

可補中酸可收除故能管理夢遺崩帶遺尿且能安魂定魄補精益氣壯筋健骨此雖收澀佳劑然

無故痰滑頻服而令經絡陰道阻滯非惟無益反

致增害取濟性為快聚金櫻膏為煎食之自作不

請各將諸凡藥品須當審視不可不知似相而小

黃赤有刺取半黃者此則去刺核痰膏甘多清少

訶子九十三木 訶子九十三木 訶子九十三木

訶子九十三木 訶子九十三木 訶子九十三木 訶子九十三木 訶子九十三木

本草綱目 卷二 木部 訶子

降火止喘定逆以酸補之訶子苦重瀉氣酸澀不

能補肺故嗽且於虛人不宜獨用其味苦而

性急氣實者宜之若氣虛者似難輕服如肺則

必同於人參補則必同於白朮欬肺則必同於

五味下氣則至於嗽初起用最切忌以其止有

劫截之功耳但嗽未久者不可驟用服此能調

日和中亦止消脹去服使中自和並非脾胃虛弱

於中實有補也波斯國人行亦遇大魚涎滑數里

舟不能行投於訶子其滑即化此船今多用則其

化涎消痰慨可見矣第收澀性兼外邪未除其切

藥酒出者船及嶺南色黑肉厚者良酒蒸去核用

肉但生清肺行氣熱溫胃固腸

山茱萸九十四木 山茱萸九十四木 山茱萸九十四木

山茱萸九十四木 山茱萸九十四木 山茱萸九十四木 山茱萸九十四木

山茱萸九十四木 山茱萸九十四木 山茱萸九十四木 山茱萸九十四木

山茱萸九十四木 山茱萸九十四木 山茱萸九十四木 山茱萸九十四木

山茱萸九十四木 山茱萸九十四木 山茱萸九十四木 山茱萸九十四木

本草綱目 卷二 木部 山茱萸

補味酸而主酸故精且清木補收閉何毒殺使

氣益而腰膝強也且清木補收閉何毒殺使

竅皆通耳鳴耳聾皆治亦是因其精氣充足則九

竅利又易為治而不通乎好古曰滑則氣脫清

味九用之為君其性可知矣按別錄魏權云

服能發汗多是服此精氣足而汗自出之意亦非

誤文但令後去核用恐桔梗防風防已

赤石脂九十五石 赤石脂九十五石 赤石脂九十五石

赤石脂九十五石 赤石脂九十五石 赤石脂九十五石 赤石脂九十五石

赤石脂九十五石 赤石脂九十五石 赤石脂九十五石 赤石脂九十五石

本草綱目 卷二 石部 赤石脂

生肌也取赤石脂之重入下焦血分而固脫 養之幸温後下焦氣分而補虛 禹餘甘平性 之甘温佐石脂乾薑而固腸胃也 禹餘甘平性 清其重過於石脂此則功擅主清其曰鎮逆終逐 禹餘之力耳是以石脂之温則能益氣生肌石脂 之酸則能止血固下至云能以明目益精亦是精 血既脫得此因欲始見目明而精益矣催生下胎 亦是味兼辛温化其惡血惡血去則胞與胎自無 阻耳故曰固腸有收斂之能下胎不無推蕩之峻 細膩粘舌者其味主治不甚相遠 赤入血分

白入氣分研粉水飛用惡花畏大黃

木瓜入肝肺 酸清而温止属收斂之品何嘗備 著其功曰理脾舒筋斂肺緣暑濕傷人揮霍撩亂 吐瀉交作未有不累脾胃而傷元氣損營衛而敗 筋骨木瓜氣味酸清既於濕熱可疎復於耗損可 斂時珍曰木瓜所主吐利轉筋脈氣本皆脾胃虛 非時病也肝雖主筋而轉筋則由濕熱乘之 邪傷脾胃所致故轉筋必起於足脾及宗筋 皆屬陽明木治轉筋非益筋也 土病則金衰而木盛故用酸温以收脾而伐肝也 而精其走筋以平肝邪乃土中木以助金也

平則土得令故能於脾有補於筋可飲於肺可飲 而金受蔭矣故能於脾有補於筋可飲於肺可飲 豈其脾肺虛弱可為常用之味哉然使食之太過 則又損齒與骨及犯癰閉經云多食酸令人癰 入於胃其氣滯以收 兩焦之氣不能出入 軟得酸則縮卷約而不通故水道不利而癰滯也 劉仲厚曰食薑木瓜三物所收同件散人皆病也 疾以問天益木瓜三物所收同件散人皆病也 陰之所生木在五味陰之所生木在五味 過者能傷人木在五味陰之所生木在五味 如者用此可理如昔有患足已善步詢袋中何物 供以足倚之此及登岸足已善步詢袋中何物

木瓜也苦寒濕傷於足者用此或謂木瓜曰而不審 利濕而於寒不克除恐非利濕佳劑耳

烏梅入肝肺 酸澀而温似有類於木瓜但此入 肺則收急無已曰肺欲收入腸則清後用烏梅肉 二十個水一盞煎六分食前服之日二次用烏梅 肉之核燒存性研末未飲服之日二次用烏梅 效益血得酸則斂得寒則止得苦則清故也 筋與骨則軟筋入蟲則伏酸入於死肌惡 肉惡瘕則除 上夜立盡聖惠川烏梅肉燒存性研散惡肉

貼者其力難簡便方云起臂生一痲麻痛日方
 再上一日而平夫起用此方試之一日其去其大半
 乃知世有奇方刺入肉中則拔故於久瀉久痢氣
 逆煩滿反胃皆蒸無不因其收滯之性而使下脫
 上逆皆治且於癰瘡可敷已潰未潰均可用此燒灰
 香油調中風下關閉可開取肉膠膜人筋骨出使
 乾蛇蟲上攻疔仆可治疔上攻取烏梅汁日渴可止
 時珍曰人之去下有四竅兩竅通於肝氣以通
 津生者類相感應也素問云味過於酸肝氣以通
 又云酸走筋筋病無多食酸不然物寧不為酸結
 之味酸者多矣何獨梅能生津加酸不為酸結
 收飲之一驗乎不似木瓜功指理泄脾胃筋骨濕

本草求真 卷二 治法烏梅 五十四

熱收飲脾胃耗散之元而於他症則不及也白梅
 出於鹽清味鹹則能軟堅亦用若牙關緊閉
 良純肉黑蒸白粉用之更捷即初起有微熱者嚼梅
 末煎湯洗之也 但肝喜散惡收久服酸味亦伐生
 氣生氣者止於諸症初起切忌

本草求真卷二 第五冊終

本并求真卷二 第五冊
 鍾虛則而功不實非有實以鎮之則易變味虛
 陰之不審其氣味以別亦非治通活之妙藥以
 治而宜以清熱如代精不珍珠之治心肝二經熱
 也者宜以清熱如代精不珍珠之治心肝二經熱
 之治心肝二經熱也者宜以清熱如代精不珍珠之治
 也者宜以清熱如代精不珍珠之治心肝二經熱也
 也者宜以清熱如代精不珍珠之治心肝二經熱也
 也者宜以清熱如代精不珍珠之治心肝二經熱也

本草求真 卷二 五十五

藥品氣味治用各自有別其不容紊如此然
 要病有勿邪不可輕投與邪得瀆而愈固耳
 金銀薄 九八
 金剛健之性最能殺人故欲尋短者服一
 二錢則心腹刺痛即斃惟作薄乃無傷耳銀薄亦
 然二薄性皆辛平其治俱屬除邪殺毒無斃顯安
 魂定魄養心和血止瀉除狂療驚祛風幼科鎮心
 丸衣以為飾皆取金能平木重以鎮怯之意云耳
 風熱多生於肝肝屬木故得金為之制魂似銀薄
 魄飛揚者其神散而不收必得重為之鎮似銀薄
 色白入氣金薄色黃入血差各有別貝鈔水銀遇

本草求真卷二 第五冊終

明碎五入丸為衣入湯劑水費用

鐵粉九十九

鐵粉入氣辛性不燥... 驚療狂消癩解非數效... 就鐵重墜之意起見故云... 源之治裁暫用則可久用... 綠園齋

本草求真 卷二 鐵質金銀粉 五十六

日凡諸草藥皆忌鐵器而補腎藥尤忌... 畏磁石皂... 煎則釜裂煨赤醋沃七次用

磁石一百

磁石即能引是以有磁之說也... 寒無毒得冲和之氣能入腎鎮陰... 得上升故千金磁珠丸用此以治耳鳴... 腎虛瞳神散大... 不得外移殊砂入心鎮養心血使邪火不得上侵

本草求真 卷二

耳目胃受熱矣... 磁味鹹鹹軟堅磁質重鎮怯... 見肢體酸痛驚癩腫核... 何莫不用此以為調治... 劑篇云重可去快磁石鐵粉之屬是也... 浮宜重劑以鎮之然亦不可與鐵同用... 鐵者真火煨醋淬礮末水飛用柴胡為使殺鐵消... 金惡牡丹并草長黃石脂... 代赭石一百

本草求真 卷二 磁石代赭石 五十七

代赭石味甘氣寒無毒... 崩帶瀉痢胎動產難... 之即能有效... 花三兩代赭石一兩... 兩半... 三服... 血之力寒有勝熱之義... 解熱鎮快祛毒... 痿下部虛寒者忌之... 善載能治慢驚其說似非

二五七

碎有乳孔者真火燥醋淬三次研細水飛用乾煎
為使畏雄附

雲母石 一百二

雲母 入肝肺 兼生於泰山山谷氣味甘平而溫諸

青皆言遠肌溫肉安臍定魄補中絕續故凡死肌

收肉惡毒陰疽及車船眩暈痰飲頭痛皆常用此

調治以其溫有陽和之力重有鎮攝之能故能使

之辟邪而鎮怯也為方要母膏治一切癰毒仲景

下小便淋疾及一切惡瘡深而赤飲頭痛何傷

本草未真 卷二 靈芝 雲母石

五八

數之止血最速且無腐爛之虞陰但書有言八服
血陽毒亦多用之皆取助陽之力因是物經時不焦入
身輕旋解不過極為贊揚且因是物經時不焦入
土不腐故云服可長生其說即出本經豈真事哉
但此性偏助陽陰虛火炎者勿服以色白光瑩者
真雲母石使淨瀉惡爭皮

密陀僧 一百三

密陀僧 入係出銀坑之中真者難得今用多屬

傾銀爐灰味辛而鹹氣平小毒大率多屬燥濕

熱消積滌痰鎮墜之品故書載能絕瘡毒安

定解止血散腫消積殺蟲及涼肺毒效凍瘡
解狐臭錢用水洗淨制一箇切開搽末夾之
非其效祛熱消風除重鎮軟堅則病易克去乎
故能止血散腫消積殺蟲及涼肺毒效凍瘡
此者用者性微寒氣入心絡痛不能止消瘡瘡
銀爐裏則有銅氣雜入不堪入藥且只可以外敷
不可以作服餌也若入藥須表一伏時

本草未真 卷二 靈芝 密陀僧

五九

本草求真 卷三 第一川



散劑 散寒 散風 散濕 散熱 吐散 溫散

散寒 凡傷於七情者宜補傷於六淫者宜散... 散風 傷於風者宜散... 散濕 傷於濕者宜散... 散熱 傷於熱者宜散... 吐散 傷於吐者宜散... 溫散 傷於寒者宜散...

麻黃 麻黃之品然則辛則肺氣... 麻黃 味甘辛... 麻黃 治肺熱... 麻黃 治風寒... 麻黃 治咳嗽... 麻黃 治痰喘... 麻黃 治氣逆... 麻黃 治胸膈... 麻黃 治小兒... 麻黃 治婦人... 麻黃 治老人... 麻黃 治一切... 麻黃 治百病...

汗 汗者津液也... 汗 汗為心之液... 汗 汗出則心氣... 汗 汗出則皮膚... 汗 汗出則筋脈... 汗 汗出則肌肉... 汗 汗出則骨節... 汗 汗出則精神... 汗 汗出則飲食... 汗 汗出則睡眠... 汗 汗出則百病... 汗 汗出則萬難...

其氣是麻黃雖太陽發汗重劑實散肺經火鬱之邪... 其在十劑有口嗝可去實為根麻黃之屬是也... 汗 汗者津液也... 汗 汗為心之液... 汗 汗出則心氣... 汗 汗出則皮膚... 汗 汗出則筋脈... 汗 汗出則肌肉... 汗 汗出則骨節... 汗 汗出則精神... 汗 汗出則飲食... 汗 汗出則睡眠... 汗 汗出則百病... 汗 汗出則萬難...

於發汗之邪，虛弱津液，不得有汗，故有汗，則邪隨汗而解。其所以然者，汗者，心之液也。心火炎於上，則汗出於上；腎水寒於下，則汗出於下。故發汗之法，必先調其心火，後調其腎水。心火炎者，宜用石膏、知母、甘草以清之；腎水寒者，宜用附子、白朮、桂枝以溫之。此乃發汗之要法也。

本草求真 卷三 經國齊

麻黃附子湯，治少陰病，手足微重，身體疼痛，脈沉。此乃陽虛陰盛，故以麻黃發汗，以附子助陽。其所以然者，汗者，心之液也。心火衰則汗少，故以附子助心火，以麻黃助汗。此乃發汗之要法也。

小便利者，若大者不可發汗，汗多則亡血。此言發汗之法，必先調其心火，後調其腎水。心火衰則汗少，故以附子助心火，以麻黃助汗。此乃發汗之要法也。

本草求真 卷三 經國齊

麻黃湯，治太陽病，頭痛，發熱，汗出不止。此乃陽明病，故以麻黃發汗，以杏仁潤肺。其所以然者，汗者，心之液也。心火炎於上，則汗出於上；肺金燥於下，則汗出於下。故發汗之法，必先調其心火，後調其肺金。此乃發汗之要法也。

一萬五千冊 丹黃參日車之書 8 頁之可

使惡辛夷石辛

細辛 山草

細辛 人形 味辛而厚氣溫而烈為足少陰腎

濕經至藥凡風寒邪入至陰而見本經頭痛

角厥陰頭痛在額少陰頭痛在兩腰脊俱強

口津吹痺身淵齒痛水停心下口吐涎沫成無已

心下不行則腎氣凝立辛以潤耳聾鼻癢倒睫便

澀者並宜用此調治或用獨活為使俾在表之陽

邪可表而在裡之伏邪可除故書載能通關利竅

本草求真 卷三 紫蘇

破痰下乳行血發汗 附子細辛湯以發少陰之汗

且走腎者必兼肝與脾膽虛驚痛及風眼淚下者

得此辛散宜通而令淚收驚除至書所云服能入

腎潤燥非是火盛水衰陰被陽潤而成實因陰盛

陽衰火枯於水而致也遇此辛以除寒溫以燥濕

則陰得解而不凝矣豈剛燥不撓之謂也乎

之厚者能發陽中之陽也辛溫能散故諸風寒

濕頭痛痰飲胸中滯氣驚者宜用之口瘡喉痹

之義也辛能泄肺故風寒咳嗽上氣者宜用之辛

能散燥故通少陰及世之論藥性者每鮮如此

本草求真 卷三

會但知就燥論燥而致因執不通獨不思經有云

腎苦燥急食辛以潤之乎然味厚性烈所用止宜

數分過則氣壅命傾者死雖死無傷近世開不通

中辨治此若血虛頭痛者尤宜戒焉

時珍曰葉似小莠葉細根而色紫味極

辛者細辛也杜衡鬼督郵徐長卿并可亂之去雙

葉者用之害人 惡黃耆山茱萸枳石滑石反蘇

紫蘇 一百六

紫蘇 入心脾 背固俱紫辛溫香實五月端午採

本草求真 卷三 紫蘇

用凡風寒偶傷氣閉不利心膨氣脹並暑濕泄瀉

熱閉血衄崩淋喉腥口臭俱可用此調治取其辛

能入氣紫能入血香能透外溫可煖中使其一身

舒暢故命其名曰蘇 蘇與是以時珍謂其同橘皮

砂仁則能行氣安胎同藿香烏藥則能快氣止痛

同麻黃葛根則能發汗解肌同芍藥當歸則能和

營散血同木瓜厚朴則能散濕解暑同桔梗枳殼

則能利膈寬中同杏子葶子則能消痰定喘要皆

疎肺利氣之品雖其氣味淺薄難以奏效但久服

一一六一

葶藶

亦能泄人真氣... 用之不過取其辛香... 用大用以順虛虛之禍... 葶藶下氣... 蘇子降氣... 藥性至疎泄氣虛陰虛喘逆者並禁宜橘皮忌鯉魚子炒研用

本草求真 卷三 葶藶 七

行 葶藶

桔梗 入肺 辛苦而平... 行又感能以下氣其義何若... 本貴通利一有寒邪阻滯... 或風熱相搏而見齒痛其在少陰... 肺癰乾咳火鬱上焦則見胸膈刺痛... 腸則見下痢腹痛腹滿腸鳴總皆寒入於肺閉其

痰道諸病... 桔梗味苦氣平質浮色白... 葶藶下氣... 蘇子降氣... 藥性至疎泄氣虛陰虛喘逆者並禁宜橘皮忌鯉魚子炒研用

本草求真 卷三 葶藶 七

梔子大黃... 痰癆加牛蒡大黃不得眠加梔子... 以爲開提... 仲景傷寒論... 散寒... 連翹... 湯極... 行其... 痰入嗽不宜妄用以其通腸泄氣之故陰虛不宜

妄用以其拔火上乘之故其虛能吐肺上風熱痰
實生研末水調服探吐去浮皮消浸微妙用畏龍
膽草白芨忌猪肉

黨參

人參而有上黨之號肺人蒸緣隋文帝時上黨有

八宅後每夜聞人呼求之不得去宅一里許見參
異常掘得人參一如人體四肢畢倫呼聲遂絕又
上黨人參根頗長根下垂有及一尺餘者或十
岐者其價與銀相等遠東高麗伯濟諸參均莫及

本草求真 卷三 散寒黨參

緣國膏

焉李時珍云上黨潞州也民以人參為地坊害不
復採取今所用者皆是遼參觀此則知諸參惟上
黨為最美而上黨既不可採豈復別有黨參之謂
哉近因遼參價貴而世好奇居異乃以山西太行
山出之苗及以防風桔梗薺危偽造相繼混行詎
知參有不同性有各異防風桔梗乃屬表散風寒
傷氣之味人參甘溫乃屬補肺益氣之味即山西
太行山新出之黨考之張璠亦謂甘平清肺並非
等於真正黨參確有補益今人但見參貴而即以

此代參不亦大相逕庭乎且余嘗見虛弱之症亟
當人參峻補以救垂絕而醫者用黨參替代以致
病卒不起并介家貴之家朝夕代茶以致肺受剝
削病潛滋長此皆誤用之害人但習而不察耳附
記以為世之粗工妄用黨參戒

生薑

生薑辛氣味辛寬走而不守按者開散主治甚
多然總發表除寒開鬱散氣辟邪除邪散端而已
其性惡寒其曰傷寒頭痛傷風鼻塞可用者以其

本草求真 卷三 散寒生薑

緣國膏

至有直散肺之力也辛咳逆口噦而必用者
以其共有開提散鬱之義也孫真人云薑為喉家
乃氣逆不散此藥行陽而散氣也或問生薑辛溫
入肺何以云入胃曰俗以心下為胃口者非也
咽門之下受有形之物及胃之系便是胃
口與肺系同行故能入肺而開胃口也 水氣濕
瀉血痺而必用者以其有逐陰行陽除濕開導
之力也血痺冲心不下生薑 他如凍耳可擦 辛以
五兩水入升煮服 能祛寒辟穢 諸毒可解 凡牛要南星茵
狐臭可療 能祛寒辟穢 諸毒可解 凡牛要南星茵
解亦何莫不山宜發之力以為辟除而不草去邪
辟惡生痰熱食醋醬糟並宜煎調和無夫辛入肺
不宜之可蔬可和可菓可藥其利溥矣

肺旺則一身之氣皆為吾用中焦之元氣充而足
脾胃出納之令壯而行邪氣不能容矣凡中風中
暑中氣中毒中酒食厥症厥厥厥厥冷厥霍亂昏暈
一切暴病得之必救暴病方宜方宜心云凡一切
立可解效以重能開卒暴之症用薑汁與童便服
下氣重便降火也早能含薑不犯露露之氣
及山嵐不正之邪皆能以正神明而辟穢惡真
藥中之神聖也但積熱患目及因熱成疔者切忌
時珍曰食積火積熱患目及疔疔人多食兼酒其
發甚速宜非人多食則生惡肉此皆昔人所未言
也至書有言夜至闔而薑不宜食秋至收而薑不

本草求真 卷三 散寒生補

十一

宜食與孕婦食薑而令兒指象形此雖就其時令
及以物類相感立說然亦未可盡拘薑皮辛涼和
脾利水消腫取其皮以行皮之義秦皮為使惡黃
連黃芩夜明砂相感志云糟姜瓶內人蟬蛻雖老
葶辛
葶葉入肺生辛而散熱甘而溫外實中空能入
肺經發汗解肌以通上下之陽治人皆治傷寒
白湯仲景治少陰病下利清谷裏寒外熱厥逆
微用白通湯若白色赤者四逆湯加葱白皆取
通陽故書號為肺葉其力則能明目利耳通便

及治傷寒頭痛時疾熱狂陰毒腹痛之謂則邪
散又氣通則血活氣為血帥故醫又載能止諸般
血出不調如赤白痢有川葱煎其止痛無效即有
川葱煎阿日氣通則毒解故書又言能治諸般惡
毒如魚肉蠱爛爛即是思則知氣血之凝聚是
即寒氣之未散寒氣之既散是即血氣之既理不
安有毒氣不解而云是藥之莫治乎豈非一回草
木甲折其勢然也故葱號為葱伯又曰和事草其
意在斯取白連蠶川亦有川青者引自葱有寒
熱白冷青熱傷

本草求真 卷三 散寒生補

十一

得川青也但過食亦損鬚髮以辛劫及有虛氣上
冲汗出不止之弊以辛散同案食如何殺人以毒
性最服葱性最發同葱則脹益發而不可解矣不
死何待思避口正月食生葱令人面土起痘風生
人同食食亦令人病其義可以例推因并記之

本草求真卷第三 第一冊終

痛皆能却亂反正而治無不效者也蓋羌活獨活
 雖皆治風之品在張介賓曰風之為病最久誤治者
 之所中也內風者五臟之病也外風者八
 則絕無外症而忽病如身熱等症五臟內而
 者則於七情故多陰虛此由內傷可知也內
 者或體或多痰飲在腎志者或在骨節或在
 音或不血脈或在筋脈或在血脈或在心
 有在二陰虛中者然則病在陰虛者不可
 病在神氣蓋陽衰則氣去神志為昏亂非
 以神形則形壞則氣散故神志為昏亂非
 燥則風生是風木之道言之其象亦燥則陰
 燥則風生是風木之道言之其象亦燥則陰

本草綱目 卷三 風類 十五

故凡治類風者專宜辛溫以散其邪則風
 自除矣昔至有元氣素弱平然以散其邪
 則參附安望此後真氣於將之頃發後多
 表知風藥不能辨其虛實但於將之頃發
 不傷外感以不復傷陰風藥皆散後招風
 有餘是促人之死也為此治太陽之邪上
 於頭旁及周身肌表不似獨活專理下焦
 在足少陰腎氣分而不連及太陽經也但羌
 雄力非柔懦凡血虛頭痛及遍身肢節痛者皆非
 所宜損血氣

獨活 山草

獨活 羌人 辛苦微溫比之羌活其性稍緩凡因風
 于足少陰腎經伏而不出發為頭痛 筋在則能善
 搜而治矣以故兩足濕痺不能動履非此莫痊
 濕故二活 風 筋痛者皆之餘 頭眩目暈非此莫
 攻 酒後方用 獨活 緣此有風不動無風反搖故名
 獨活草 意故各獨活因其所勝而為制也且有風
 自必有濕故羌則療水濕遊風而獨則療水濕伏
 風也羌之氣清行氣而發散營衛之邪獨之氣獨
 行血而溫養營衛之氣羌有發表之功表之獨有

本草綱目 卷三 風類 十五

助表之力 表之羌行上焦而上理 羌活人氣 則
 遊風頭痛風濕骨節疼痛可治獨行下焦而下理
 下焦血故云 則伏風頭痛兩足濕痺可治二活
 獨活人血 則伏風頭痛兩足濕痺可治二活
 屬治風而用各有別不可不細審耳去皮焙用
 實為使

防風 山草
 防風 兼入脾胃味甘微溫雖人足太陽膀胱以治
 上焦風邪頭痛目眩脊痛項強周身盡痛之才目
 能行 然亦能入脾胃二經 某日若補胃非以為去
 周身 然亦能入脾胃二經 此引川不能行以為去

防風 山草

風除濕能勝濕者蓋此等於甲賤卒伍任主使與能循諸經之藥以為追隨故同解毒藥則能除濕掃瘡同補氣藥則能收汗升舉或同黃耆芍藥以爲玉屏實爲風藥潤劑比之二活則質稍輕氣亦稍平凡屬風藥皆可通用但血虛症急頭痛不因風寒泄瀉不因寒濕陰虛盜汗陽虛自汗火升發嗽者則前當知所禁矣凡表藥多有損於臟腑氣血出北地黃潤者佳酒風車風不堪入藥上部用身下部用稍異草薺惡乾蓋白飲芫花殺附子毒

本草求真 卷三 風濕

荆芥 入肝 辛 苦 而 溫 芳 香 而 散 氣 味 輕 揚 故 能 入 肝 經 氣 分 驅 散 風 邪 凡 風 在 於 皮 裡 膜 外 而 見 此 膚 灼 熱 頭 目 昏 眩 咽 喉 不 利 身 背 疼 痛 者 用 此 治 無 不 效 時 珍 曰 其 治 風 也 實 不 相 稱 爲 再 生 丹 許 肅 存 敬 呼 爲 一 捨 金 陳 無 擇 爲 舉 不 似 防 風 氣 邪 在 拜 散 夫 豈 無 故 而 得 此 降 舉 哉 不 似 防 風 氣 不 輕 揚 驅 風 之 必 入 人 骨 肉 也 是 以 宜 散 風 邪 用 以 防 風 之 必 兼 用 荆 芥 有 以 其 能 入 肌 膚 宜 散 故 耳 且 既 入 於 肝 經 風 木 之 曠 則 肝 即 病 藏 血 之 地

本草求真 卷三

故 又 能 以 通 利 血 脈 俾 之 以 助 腸 風 崩 漏 產 後 血 暈 瘡 癤 癰 腫 血 熱 等 症 靡 不 藉 其 輕 揚 以 爲 宣 泄 之 具 寧 於 風 木 之 曠 既 於 其 氣 而 理 者 復 不 於 血 而 治 乎 本 入 肝 經 氣 分 玩 吉 方 產 後 血 暈 風 起 過 血 去 則 風 自 內 生 故 常 有 崩 漏 有 用 荆 芥 爲 末 同 酒 及 之 患 不 待 外 風 襲 之 也 二 有 用 荆 芥 爲 末 同 酒 及 或 煎 使 調 治 崩 中 不 止 者 用 炒 黑 荆 芥 以 治 於 此 可 見 其 概 矣 速 補 用 治 血 須 炒 黑 種 在 於 崩 故 善 故 必 友 魚 蟹 河 豚 驢 肉 炒 黑 一 百 五 五 方 草

本草求真 卷三 風濕

芎藭 入心 包 膽 辛 溫 升 浮 爲 肝 膽 心 包 血 分 中 氣 藥 故 凡 肝 因 風 鬱 而 見 腹 痛 脇 痛 血 痢 寒 痺 筋 攣 目 淚 及 癰 疽 一 切 等 症 治 皆 能 痊 自 五 臟 成 皆 屬 血 氣 相 緣 人 一 身 血 氣 周 流 無 有 阻 滯 則 百 病 不 生 若 使 寒 濕 內 搏 則 血 滯 而 不 行 爲 不 及 其 熱 濕 內 搏 則 血 急 而 妄 沸 爲 太 過 其 氣 鬱 於 血 則 當 行 氣 以 散 血 血 鬱 於 氣 則 當 活 血 以 通 氣 行 氣 必 用 芎 歸 以 血 得 歸 則 補 而 血 可 活 且 血 之 氣 又 更 得 芎 而 助 也 沈 川 芎 上 行 頭 目 元 素 曰 川 芎 其 用 有 四 爲 少 陽 引 經 一 也

一六七

| |
|---------------------|
| 邪血因風鬱得芍入而血自活而風自滅又 |
| 何亦疝存疝存疝而致病變多端哉是以四 |
| 物用之以散川經之風頭痛必用以除其 |
| 必用川芎如不愈加各引經藥太陽羌活 |
| 其少陽柴胡太陽蒼朮厥陽吳茱萸少陰細辛 |
| 也然氣味辛竄能泄氣單服久服令人暴亡 |
| 且芳用藥性藥性藥性藥性藥性藥性藥性 |
| 偏勝金木水火土五臟六腑則偏絕 |
| 胎動一妊服藥中微動者胎不動者是 |
| 產大塊裡白不油辛甘者長江南產者為撫芬秦 |

本草求真 卷三 藥性論

一九

| |
|------------------------|
| 產為西芳白芷為使畏黃連硝石滑石惡黃耆山 |
| 菜英 |
| 白芷 芳草 |
| 入肺入肝入脾入大腸色白味辛氣溫力厚通竅行表為 |
| 足陽明經祛風散濕去藥故能治陽明一切頭 |
| 而諸疾陽明之脈起於鼻絡如頭目昏痛 |
| 云下疳疔病風頭痛至都求明醫楊介 |
| 進三九即疔病失懸求則用香白芷一味洗晒 |
| 未煉蜜丸彈子大如葡萄以茶肩稜骨痛 |
| 清或煎芥湯化下遂命各都梁九 |
| 葛治風熱與痰白芷片外酒炒 |
| 等分為末每服二錢茶清下 |
| 豎牙齦骨痛 |
| 川香 |

| |
|---------------------|
| 一錢味砂五分為末案九頻川擦牙 |
| 或以白芷末茶葉等分浸水漱洗 |
| 是也口其風熱乘肺上燥於肺滲為淵游移於大 |
| 腸變為血崩血閉腸風痔瘻癰疽風與濕熱發於 |
| 皮膚變為瘡瘍燥疥皆能溫散解托而使厥理之 |
| 風悉去閉結之癰疽淋滯祛風上達散濕之要 |
| 劑也如古曰同辛夷細辛川芎升麻入內托散川 |
| 用治帶下腸有敗膿淋瀝不 |
| 腹冷痛者山敗膿所飲須此 |
| 紅蜀葵二兩白芍藥白林器各半兩為末以蠟化 |
| 九括了大每空米飲下依醫以他藥補之 |
| 解蛇身皮膚黃黑色一 |
| 頭通身皮膚黃黑色一 |

本草求真 卷三 藥性論

二〇

| |
|---------------------|
| 未一劑瀝之覺膈中指指然黃水自口出 |
| 人其久消縮如故云以參冬湯調沈妙仍以未 |
| 之然其性非散血熱有虛火者禁用色白氣香者 |
| 佳或微炒川當歸為使惡旋覆花 |
| 薄荷 芳草 |
| 入肺入肝氣味辛涼功備入肝與肺故皆載 |
| 辛能發散而於頭痛頭風發熱惡寒則宜卒能通 |
| 氣而於心腹惡氣痰結則治涼能清熱而於咽喉 |
| 口齒眼耳癢疹疥熱骨蒸血則妙是以古 |
| 方造遙用此以為開散氣之具小兒驚癇用此 |

以為宜風向導之能腸風血痢用此以為疎氣清
利之法辛能散涼能清然亦不敢多用所用不過二三分
而止恐其有泄真元耳氣虛食之令人氣汗不止
濕蘆產氣芳者其猶傷用汁塗之最妙
酒也虎骨酒也柔桂湯
之酒也魚之酒也

蒿本入勝據書載屬半溫氣雄能治太陽
風犯嶺頂腦後俱痛是經要藥凡治嶺頂頭
痛必兼防風
柴胡人且復言治奔強而厥行於背並婦人

疝瘕急迫腫痛此雖病下見及係太陽本經
寒濕所致然非風邪內犯則病易形蒿本氣味辛
溫性雖上行而亦下達非謂用此以治太陽嶺頂
頭商頰痛功止上走而於奔強而厥竟不循經下
行也且據書言能治胃風泄瀉霍亂風客於胃
蓋菜本能又治粉刺酒粉同白芷亦是風干太陽
連累而及治則與之俱治豈但治風頭痛而已哉
錢謂其性頗有類於芍藥皆能以治頭痛然一主
於肝膽雖行頭目而不及於巔頂一主太陽及督

雖其上下皆避而不兼及肝膽之為異耳但春夏
溫熱頭痛及血虛火炎頭痛者切忌根紫色似芍
藥而輕虛氣香味麻惡菌茹畏青箱子

白附子百九

白附子入胃時珍曰與附子類也辛甘有毒性
燥而升為風藥中之陽草東垣謂其純陽能引藥
勢上行於面為陽明經要藥又按諸書皆載能治
頭面遊風斑斑陽明之脈行於頭面及中風不語
諸風冷氣血痺冷疼陰下痲瘖皆當用此調治玩

天麻百千

此藥非性燥何以可治冷氣虛癢設非冷氣冷癢
又曷可用燥烈之藥以治乎是以陰虛類中並小
兒脾虛瘦驚皆不宜用以其氣味辛烈者故耳辛
能切陰此與白芷同為一類但白芷則兼肌熱同
理而不專及陽明風邪此則專散陽明風冷而於
濕邪則未及耳此藥久無真者今惟涼州生形
如草烏頭之小者長寸許乾者皺紋有節入藥妙
用

天麻 人 辛平微溫無毒性升屬陽為肝家氣分
 定風藥蓋諸風眩掉皆屬肝木肝燥不能榮筋故
 見頭旋眼黑語言不迷等症天麻乃辛平之味能
 於肝經通脈強筋疎痰利氣辛而不燥得氣之平
 則肝虛風作自爾克治故又名為定風草若久服
 則遍身發出紅斑是驅風之驗也是以小兒驚癇
 亦用此味以治若使肝虛在血症見口乾便閉及
 犯類中等症者切不宜服以其辛能燥血者故耳
 血燥須用養血之劑則風不除而自根類黃瓜菜
 去矣古云治風先治血血行風自滅

本草求真 卷三 風天麻

綠圖

各赤筋有風不動無風反搖明竟結實者佳濕紙
 包裹熟切片酒浸一宿焙用
 天南星 草
 天南星 人 味辛而麻氣溫而燥性緊而毒惟
 其味辛則凡中風不語偏枯半身不遂也二風非
 四肢不收也三風癱瘓也四風及或破傷風痰
 散治破傷風刀傷撲傷如神用南星防風等分為
 末如破傷風用藥散酒調下打傷至死為
 便調灌二錢連故書載能克治以其辛能散風故
 也惟其性燥則凡痼疾固一結筋脈拘攣得以能通

以其燥能除濕而痰自去也惟其性緊則凡疝瘕
 結核胎產難下水腫不消得以攻逐以其性緊急
 迫而堅自去也性雖有類半夏然半夏專走腸胃
 故嘔逆泄瀉得之以為嚮導南星端走經絡故中
 風麻痺亦得以之為嚮導半夏辛而能散仍有內
 守之意南星辛而能散決無有守之性其性烈於
 半夏也南星專主經絡風痰半夏專主腸胃濕痰
 功雖同而用有別也但陰虛燥疾服之為切忌耳
 血虛風中急宜養血滋陰固本若根似半夏看如
 補用南星等藥驅風逐痰誤矣

本草求真 卷三 風天南星

綠圖

虎掌者良以攀湯或皂角汁浸三晝夜暴用或酒
 浸一宿蒸竹刀切開至不麻乃止或薑泔黃泥和
 包煨熟用造麵法以薑汁礬湯和南星末作小餅
 子安藍內精葉包蓋待上黃衣乃晒收之火炮則
 膽製味苦性涼得牛膽則不燥其法臘月取黃牛
 久者能解小兒風痰熱滯故治小兒急驚最宜畏
 附子乾薑防風附防風
 威靈仙 草
 威靈仙 人 入腸胃諸經辛鹹氣溫其性善走能宣疎

五臟十二經絡凡一切風寒濕熱而見頭風頭疼
 癥瘕積聚黃疸浮腫大小腸秘風濕痰氣腰膝腿
 脚冷痛等症 肝屬氣虛木為濕痰死血肝熱濕痛
 注耳末可以盡病情也仍須分其臟氣偏純以此死
 力止是寒氣奔迫未可為痛必與手按脈脈堅實有
 與木與痛與腫皆屬熱候且有實脈實症可証則其
 痛久病不可按不得謂屬熱候且有實脈實症可証則其
 熱也初起亦寒故有履川附注方愈不得謂屬熱候
 等症初起亦寒故有履川附注方愈不得謂屬熱候
 病根初起亦寒故有履川附注方愈不得謂屬熱候
 誤此謂之管見有如此也 得此辛能散邪溫能泄
 水苦能淡堅服此性極快利通經達絡無處不到

本草求真 卷三 藥用 風濕 仙

二十五

誠風藥中之善走者也 先時商州有人手足久廢
 知是成是以威喻其性還喻其效仙喻其神耳氣
 壯者服之神效若氣弱服此則能泄真氣夫凡辛
 氣劫陰不獨和砂仁砂糖煎治諸骨哽根叢鬚數
 成聖仙是也和砂仁砂糖煎治諸骨哽根叢鬚數
 百條長者二尺餘色深黑為鐵脚威聖仙良忌茶
 麵湯

白蒺藜 百葦

白蒺藜 蒺藜入肝腎 質輕色白辛苦微溫按據諸書
 能較溫能補腎可治精遺溺失暨腰疼勞傷等症

然總宜散肝經風邪凡因風盛而見目赤腫翳并
 通身白癩癢難當者以此治無不效且此味辛
 入兼苦入則凡癥瘕結聚痰痺乳癰暨胎產不下
 服此力能破鬱宣結益肝雖藏血之經而血非可
 留之物若竟認此作補而不審兼苦泄辛散以明
 其治其失靡輕綠此可升輕可降味可散辛可補
 微故服涼劑則宜連刺刺有主擣用補劑則宜去刺
 酒拌蒸若沙苑蒺藜質細色綠似質功專入腎故
 書載能益精強腎 補腎用沙苑蒺藜亦須炒用但

本草求真 卷三 藥用 白蒺藜

三十一

不辛香宜散耳 蒺藜根燒灰
 決明子 蒺藜 氣稟清陽味鹹苦甘微寒無毒能入
 肝經除風散熱凡人目淚不收眼痛不止多屬風
 熱內滯以致血不上行治當即為驅逐按此苦能
 泄熱鹹能軟堅甘能補血力薄氣浮又能升散風
 邪故為治目收淚止痛要藥並可作枕以治頭風
 但此服之太過搜風至甚反招風害故必合以蒺
 藜甘菊枸杞生地女貞實槐實各精草相為補助

入肝腎

決明子 蒺藜 氣稟清陽味鹹苦甘微寒無毒能入
 肝經除風散熱凡人目淚不收眼痛不止多屬風
 熱內滯以致血不上行治當即為驅逐按此苦能
 泄熱鹹能軟堅甘能補血力薄氣浮又能升散風
 邪故為治目收淚止痛要藥並可作枕以治頭風
 但此服之太過搜風至甚反招風害故必合以蒺
 藜甘菊枸杞生地女貞實槐實各精草相為補助

則功更勝謂之決明。即是此意。狀如馬蹄。俗呼馬蹄決明。痔碎用。惡大麻仁。

草烏頭百其

草烏頭兼入肝辛苦大熱。按書論此惟長洲張璐辨之。明晰言此與射罔乃至毒之物。草烏係野所生。狀類川烏。亦名烏喙。煎汁炒。或豆腐裏煮。非若川烏頭附子。膏名射罔。厥箭狀見血立死。之比自非風頑急疾。不可輕投。此藥止能搜風勝濕。開頑痰。治頑瘡。以毒攻毒而已。本經治惡風洗汗出。但能去惡風而不能回陽散寒。可知昔人病

本草求真 卷三 藥風決明子 草烏頭 二十七

片癩服草烏頭木鱉子藥過多。甫入腹。遂麻痺不救。烏附五種。主治攸分。附子大壯元陽。雖偏下焦。而周身內外無所不至。天雄峻溫。不減於附。而無頃刻回陽之功。川烏尚搜風濕。痛痺却少溫經之力。側子善行。回表不入臟腑。草烏悍烈。僅堪外治。此烏附之同類。異性者。至於烏喙。藥氣不純。服食達之可也。

茵蘘百其

茵蘘兼入肝木腐毒物。味辛而苦。氣溫有毒。據書所

新編

述治症多是風濕。為川如治風痺。則有茵蘘尤治。風痺則有茵蘘。酒後風則有茵蘘。皆凡風濕。痺症多用茵蘘。與石南皮草同為一類。有毒能治。頭風。癱腫。乳癰。疔瘡。其藥若云能療虛瀉寒熱。恐魚湯熱念能治牙疳。喉痺。若云能療虛瀉寒熱。恐莫及耳。茵蘘出彭城海。莖赤葉如石榴而短。厚者佳。採莖葉陰乾炙用。

桂枝百其

桂枝兼入肝係肉桂枝梢。其體輕其味辛。其色赤。故人有升無降。故能入肺而利氣。入膀胱化氣。

本草求真 卷三 藥風茵蘘桂枝 二十八

新編

而利水。且能橫行於臂。調和營衛。治痛風。喘風。其在靈樞謂之賊風。素問謂之痺症。金匱謂之節後世又更其名曰白虎。歷節。且有別名曰節風。箭袋。然總謂之行痺。其症則有因風。因濕。因寒。因痰。因熱。因虛。之異。須用桂枝以為導。導風本為於用。止治筋脈之痛。止煩出汗。驅風散邪。為解肌。第一要藥。時珍曰。麻黃透骨。故書皆言無汗能發有汗能收。然其汗之能發止。是其衛實營虛。陰被陽湊。故用桂枝以調其營。營調則衛氣自和。而賊邪莫害。遂合汗而解。非若麻黃能開腠理。以發其汗也。其汗之能收止。因衛受風傷。不能內護。

於營管氣虛弱津液不固故有汗發熱而惡風其
 用桂枝湯為治取其內有芍藥入營以收陰外有
 桂枝人衛以除邪則汗自克見止非云桂枝能閉
 其汗孔味者不察桂枝發汗止汗是何意義徒以
 順口虛喝其失遠矣經曰脈浮發熱無汗者不
 盜竇而汗愈難出矣傷寒例曰桂枝下咽陽盛則
 乾承氣入胃陰虛則亡陽後曰風既傷衛則
 氣疎不能內陷於營而汗自出矣汗者血之液也
 苟非用血藥以桂枝和營散邪以芍藥和營固
 則不外邪出邪出則和自為理矣然後知利
 而汗自止矣外邪出則和自為理矣然後知利
 治傷寒發汗數處皆用桂枝湯又曰無汗不得用

桂枝湯多者桂枝甘草湯此又能開汗也二義相
 通去手曰仲景云太陽病發熱汗出者此為營
 衛氣則虛陽必發之故用桂枝發其汗此則調其
 麻黃能開腠理發汗也汗多則桂枝能開汗之
 和營衛則邪從汗出而汗自止非桂枝能閉汗
 也
辛夷 百其
 辛夷 入 辛溫氣浮功專入肺散風熱綠人鼻
 氣通天肺竅開鼻鼻至肺風熱移於肺則鼻多濁
 涕而淵風寒客於腦則鼻寒經曰腦為涕腦液
 不澄則為濁涕如泉不已故曰鼻淵鼻淵在長洲張

海益楚眼指為伏火會精指為肝火發並頭痛
 面黑目眩齒痛九竅不利皆是風熱上攻是宜用
 此芳香上竅明目兼逐陽分風邪則諸症自愈但
 辛香走竅血虛火熾及偶感風寒不聞香臭者其
 並禁焉時珍曰鼻氣通於天者頭也肺也肺開
 則之府而鼻為命門之竅人之中氣不足清陽不
 升則頭為之傾九竅為之不閉辛香走陽氣
 而人肺其體輕浮能助陽中之清陽上行通於天
 其能溫中治頭而目鼻九竅之病在腦中凡小兒善
 正希先生謂語余曰人之記性皆在腦中凡小兒善
 忘者腦未滿也老人健忘者腦漸空也凡小兒善
 一物必閉目上瞤而思索之此即腦神於腦之意
 往事必閉目上瞤而思索之此即腦神於腦之意

也 不釋先生道破人即木筆花去外皮毛微炒惡
 昔習焉而不察矣
石脂 畏黃耆葛蒲蒲黃黃連石膏
冰片 百其
 冰片 入 辛香氣清無往不達汪昂曰子幼時曾
 性如何叔曰體熱而用涼藥味辛者多熱然風熱
 者必結辛以散之風熱散則涼矣此即本草所云
 冰片性寒之義同能治一切風濕不留內在引火
 未之氣自外而出然必風病在骨髓者宜之若風
 熱之氣自外而出然必風病在骨髓者宜之若風
 在血脈肌內間用之反能引風益火骨髓如油入
 麵故凡外人風邪變而為熱仍自外解得宜若使

火自内生而用此為攻逐其失遠矣昔王綸云世人以冰片為寒不知辛散性甚似涼耳諸香為皆屬陽豈有香之至極而尚可言寒者乎是以驚痲痰迷挾氣及精衰血耗氣薄之異風暴入骨病應是治火僻不散九竅不通如耳聾鼻癢喉癢類治應是行目赤腐翳水片外點止屬劫藥如薑為寒而朝夕常點遂致積熱人目而增昏障之害故曰眼不點不昏若此也皆屬風寒病應外解天邪從治法也他如瘡瘍腫熱餅不微亦當用此發達或令人油煎膏或研末吹捺然

本草求真 卷三 藥風水片

三一

瘡瘍能出不可多用則真氣立耗而有亡陽之矣矣更有目病陰虛不宜入點出南香老杉脂白如冰作梅花片者良但市人每以樟腦代克

海桐皮言三 膏水 入 辛苦而溫能入肝經血分祛風除濕及行經絡以達病所是以腰膝脚痛能療之府者皆不能將德矣膝者筋之府屈伸不能行則傷筋筋將德矣脚氣不腫者為乾脚氣腫者為濕脚赤白瀉痢能止蠱牙風痛煎湯漱之能愈疔疥疥瘡腐汁塗之能消目赤腐鱗浸水洗之能退一

皆風祛濕散之力凡者須審病自外至則可若自內成未可妄用須隨症酌治可耳

皂角言三 膏水 入 肝 辛 鹹 性 燥 功 能 通 竅 驅 風 故 凡 風 邪 內 入 而 見 牙 關 緊 閉 口 噤 不 語 胸 滿 喉 痺 腹 脹 胎 結 風 痰 癩 喘 腫 滿 堅 癢 糞 結 等 症 用 此 吹 之 導 之 則 通 上 下 之 竅 煎 之 服 之 則 治 風 痰 喘 滿 塗 之 擦 之 則 能 散 腫 消 毒 以 去 面 上 風 氣 蒸 之 蒸 之 則 通 大 便 秘 結 燒 烟 薰 之 則 治 麻 癩 濕 毒 中 風 不 省 人

本草求真 卷三 藥風皂角

三一

入中用皂角末或半夏末吹入鼻中存疑則生無

大皂則治濕痰更優牙皂則治風痰更勝也一種皂角刺氣味辛溫功治畧同但其鋒銳直透患處潰散癰疽及妬乳風厲惡瘡經曰風盛為癰病者殺厲之氣藥之則血脈凝滯氣血不流其氣不流故謂之癰須用此直達病所出風毒於其血中

皂子治大便秘結瀉存性用結木非大結成幸則

之能以制惡寒冬畏人參苦參皂角以肥厚多脂者
夏炙酥煉灰用肥皂氣味辛溫亦治風溫及數無
名腫毒去垢膩必用

肥皂蘇木

肥皂英蘇木生於六陽之盛成於秋金之月氣味
辛溫有毒不滅皂液皂刺之性凡因腸胃素有垢
膩穢惡發於外則為癩癧惡瘡腫毒泄於下則為
腸風下痢膿血俱可用此以除以其力能滌垢除
膩潔臟腑故也是以癩病勝金丹用此滌發不

本草求真

卷三

三十三

肥皂

肥皂

使砒性烈於腸胃療癩用此去核和藥為丸以追
其毒疥癩加入肥皂去核入班猶在內紫紫蒸去
以腹痛為效且能潔身洗面及療無名癩腫疥癩
其子亦治大腸風秘及頭向微癢有效疥癩
金銀花皂角刺芭蕉根紅五加皮土茯苓皂
炭子白蠟蘇木瓜蠟退白芷皮又臘梨頭藥用皂
去核入沙糖并巴豆二枚茶定醋泡四版存性
再入研粉六七分研勻香油調搽先以湯洗
淨拭乾乃搽但其仁須炒研為用庶於腎氣不傷
虎骨百三

虎骨

虎骨指人味辛微熱號為四方之獸通氣於金風
從虎虎嘯風生風屬木虎屬金木為金制故可入
骨搜風按五味惟辛為散而骨又能入骨散風故
書載能強筋健骨定痛辟邪能治風痺拘攣疼痛
驚悸癲癩犬咬骨哽然虎之一身佈佈氣力皆出
前足故膝脛為勝而前左脛尤良以則必用左脛
為虎也虎死而脛在立不仆是骨勝於他骨百倍
借其氣之有餘以補其力之不足其功自爾立見
若腰脊痛者當用脊骨以黃酒為是若中箭藥

本草求真

卷三

三十三

虎骨

其骨必有微黑不可入藥虎睛能治狂邪酒浸炙
乾用虎胆能治反胃吐食江昂云虎胆九上有宜
腸惡難虎爪尤至辟邪殺鬼虎牙尤治犬咬用骨
搥碎去髓塗腫或酒或醋炙各隨方法入藥
山甲百三
山甲指人味鹹寒善竄其性穴山而居寓水而食
惟其善竄所以通經達絡無處不到且能入肝與
胃而治驚啼悲傷大腸蟻瘻弘景曰山甲能除能
甲如死狀誘蟻入甲即閉而水日中出岸張開蟻
因接而食之昆蟲日有蟻人頭下忽蟻一塊者延

至頸側刺破出水一或淋久不合外治瘡癤腫
 此藥漏也，錄似中其食蟻得之。下乳發痘之需，婦人乳了乳長流，總因善走之。
 功而為行氣破血之藥耳。肉屬投入自不瀾處補任，又永州記云：此物不可
 於地片發之，恐血入土，則堤岸滲漏，觀此性之走
 知。故或燒灰敷毒，即消同五積散加全蠍，慈蓮
 煎服，則治風濕冷痺，而見上下強直，痛不可忍。同
 水香自然銅搗末，酒調以治乳癰腫，同蠟皮豆蔴
 仁為末，湯下以治氣疔來膿及破水濕癩邪并瘰
 患在某處，即以某處之甲用之，尤臻奇效。尾脚力

更勝然，總破氣敗血，其力峻猛，虛人切戒。投服如
 膏而短，似鯉有足，或生或燒，夾醋炙，童便炙，油煎
 土炒，隨方用。
 麝香 高入經辛溫芳烈開闢利竅無處不到如邪
 氣着人掩閉不起，則開闢閉塞，昏時眼翳手攣，僵
 仆昏地，故必用此辛香自內達外，則毫毛骨節俱
 開，而邪始從外出，是以邪鬼精魅，三蠱諸毒，皆能
 治也。諸風諸氣閉之關竅，而不用此驅除，則病安

祛但不可過為用耳。麝香氣味香，宜用開
 加鐵用和所謂中風宜用是為實中風邪者設法
 若非中風，中風用半東垣云：風在骨體者宜用
 若風在肌肉，用之為引，風入骨則油入骨，故用自
 分虛實及識。至於婦人難產，噴胎尤善。小兒驚癇
 病之淺深耳。客竹鎮心安神，鼻塞不開，香臭服此，即開目疾，內
 弱，熱此即除痔漏，惡瘡，面黑，斑疹，鮮鼠咬，虫傷，成
 瘰，用磨封固，即愈。痘瘡開之則磨服之，即發藥之
 辛香，雖同水片，然水片入口，貼肉即冷，和項熱性
 即發，不似麝香，香氣悍烈，人取與肉而不冷，不冷，不

辨真假須於火炭上有油滾出而成焦黑者，此即
 真類，真若假則化白灰而為水類也。泉曰：麝香
 牛黃入肝治癰，研用凡使麝香用當門子尤妙。忌
 水片人腎治骨研用凡使麝香用當門子尤妙。忌
 蒜不可近鼻防虫入。麝香最人捕而別其香為生
 市人或捕蕩。枝核以偽之。
 白花蛇 龍 入何以名為搜風定搐之品，不知蛇善
 數啖如風之善行，數變此蛇性，竄尤急，又食石南
 藤，其餘辛香治風，故能內走臟腑，外徹皮膚，透骨

本草求真 卷三 風濕山甲

本草求真 卷三 風濕香

搜風截驚定痛並治風濕癱瘓筋脈弛緩然不用大麻疥癩若陰虛血少內熱生風者非其所宜凡用蛇同糯米並麴造酒服酒時切忌見風并於開罈時須避其氣免致面目浮腫以其峻厲之氣先有犯其清道也瘋風用大楓子仁服此而無效者以其大楓子氣燥傷血服此血益受傷也出衛州龍頭虎口黑質白花腸有二十四方勝腹有念珠班尾有佛指甲雖死而眼光不枯他產則否頭尾有毒各去三寸亦有單用頭尾者酒浸三日

本草求真 卷三 風白蛇

去盡皮骨大蛇一條只得淨肉四兩烏梢蛇性善不噬物無毒功用亦同眼光至死不枯以尾細能者為上十兩至一錢者中大者力減去頭與皮骨酒煮或酥炙用
 蛇退能 尚入肝兼味甘而鹹氣平無毒凡治小兒驚癇風毒等症無不用此為主蓋此具有四能一則性善辟惡而凡邪魅蠱毒者不敢迫以其飲風吸露氣極清虛故也二則性能驅風而凡驚癇痲仆偏正頭風喉舌諸疾者皆能除以其性極走竄力

四蛇

能驅風故也三則性能殺蟲而凡惡癬疥癩疥癬無不用之即效以其此屬毒物以毒攻毒故也四則能去皮屑之疾而凡眼目翳膜胎衣不下得此即為解脫以其氣以類聚即從其類以除也色白如銀者佳皂次水洗淨或酒或醋或茶浸炙黃或燒灰存性或搗泥固煨各隨本方

全蝎百六 卵生 味辛而甘氣溫有毒色青屬木故專入肝祛風皆屬於肝凡小兒胎風發搐大人半邊不

本草求真 卷三 風白蛇

遂口眼喎斜語言蹇塞手足抽掣瘡疾寒熱耳聾帶下皆因外風內客無不用之故方書有用蝎尾膏以治胎風發搐內用蝎梢二十一枚入麝香少許屢效又用牽正散以治口眼喎斜用全蝎同白附蠶蠶為末酒服甚效又有同羌活柴胡當歸生地各丁香柴胡湯以治月事不調寒熱帶下亦許蝎以散血分之風熱耳但帶下非風非熱不用并一切內虛似風等症切忌全用去足焙或用尾尾力尤緊形緊小者良忌蝎牛被蝎傷者塗蝎牛即解

四蛇

蜈蚣 百元

蜈蚣 人本屬毒物。性善咬蛇。故治蛇瘕毒者無
 越。是物能刺蛇。且其性善走竄。故瘟疫鬼怪得此
 則療。又其味辛。辛則能以散風。故凡小兒驚癇風
 搐。臍風。喉口。得此入肝。則治。又其性溫溫
 則能以療結。故凡瘀血。胎心。腹寒。熱結。聚得此
 則祛。至於瘰癧。便毒。等症。皆能以調治。內有惡
 肉。突。出。各。名。眼。睛。用。蜈。蚣。焙。乾。為。末。亦。是。以。毒。攻
 毒。之。意。耳。赤。足。黑。頭。者。住。火。煨。用。其。蜘蛛。蜈。蚣。煉。油。煉

本草求真 卷三 風濕類

三十九 綠國

蜈蚣 之 雞 屎 桑 皮 渣 中 蜈 蚣 毒 以 桑 汁 煎 之 即 愈

蜈蚣 化生

蜈蚣 入 肝 兼 止 一 虫 殼 味 甘 氣 寒 如 何 主 治 甚
 多 蓋 蟬 本 木 條 氣 所 化 飲 風 露 而 不 食 其 言 能 治
 肝 經 風 熱 者 因 體 氣 輕 虛 而 味 甘 寒 之 意 也 其 言
 能 治 婦 人 生 子 不 下 及 退 騎 膜 浸 睛 弩 肉 滿 特 者
 因 其 性 有 善 脫 之 意 也 其 言 能 治 皮 疔 疥 癩 癬 疹
 者 以 其 所 取 在 殼 之 意 也 皮 以 治 皮 疔 疥 癩 癬 疹 治

用 蜈 蚣

治 癩 癬 經 絡 當 用 其 言 能 治 中 風 不 語 者 以 其 蟻
 聲 清 響 之 意 也 通 聲 以 其 言 能 治 小 兒 夜 啼 者 以 其
 書 鳴 夜 息 之 意 也 古 人 立 藥 治 病 何 在 不 有 義 存
 惟 在 人 細 自 審 用 耳 色 黑 而 大 者 良 入 藥 洗 去 泥
 止 翅 足 漿 水 煮 晒 乾 用 全 用

本草求真 卷三 風濕類

四十

本草求真卷第三 第二冊

本草求真卷三 第三册

醫部全錄卷之...

散濕也... 經曰... 半身以上... 受風之也... 半身以下... 濕受之... 治法... 山... 諸法...

本草求真 卷三 散濕

四十一

如五加皮... 散者如香... 治法... 山... 諸法... 內入... 諸法... 山... 諸法... 內入... 諸法... 山... 諸法...

本草求真 卷三

升陽

此病民局... 治法... 山... 諸法... 內入... 諸法... 山... 諸法... 內入... 諸法... 山... 諸法...

本草求真 卷三 散濕

四十二

氣平... 治法... 山... 諸法... 內入... 諸法... 山... 諸法... 內入... 諸法... 山... 諸法... 內入... 諸法...

蘇炒以制其燥防風地榆為使

厚朴百四二

厚朴百四二人辛苦。書言同枳實大黃即承氣湯則於

實滿能瀉同蒼朮栝皮即平胃散則於濕滿能除

同解利藥則於傷寒頭痛可治同瀉痢藥則於腸

胃能厚大抵氣辛則散故於濕滿則宜味苦則降

故於實滿則下經曰太陰所至為中滿又曰諸濕

熱又曰清氣在下則生痰濕濁氣在上則生痰

治宜察其腹滿而痛者屬實腹滿不痛者屬虛

瀉不減按之愈痛者屬實腹滿不痛者屬虛

瀉不減按之愈痛者屬實腹滿不痛者屬虛

瀉不減按之愈痛者屬實腹滿不痛者屬虛

瀉不減按之愈痛者屬實腹滿不痛者屬虛

瀉不減按之愈痛者屬實腹滿不痛者屬虛

瀉不減按之愈痛者屬實腹滿不痛者屬虛

瀉不減按之愈痛者屬實腹滿不痛者屬虛

瀉不減按之愈痛者屬實腹滿不痛者屬虛

瀉不減按之愈痛者屬實腹滿不痛者屬虛

瀉不減按之愈痛者屬實腹滿不痛者屬虛

瀉不減按之愈痛者屬實腹滿不痛者屬虛

瀉不減按之愈痛者屬實腹滿不痛者屬虛

瀉不減按之愈痛者屬實腹滿不痛者屬虛

瀉不減按之愈痛者屬實腹滿不痛者屬虛

即榨樹皮以肉厚紫色者良去粗皮薑汁炒用乾

使惡澤瀉硝石寒水石忌豆犯之動氣

秦艽百四三

秦艽百四三人肝勝苦多於辛性平微溫凡人感冒風

寒與濕則身體酸痛肢節煩疼拘攣不遂如風勝

則為行痺痺者三氣皆有寒勝則為痛痺濕勝

則為着痺痺在於骨則體重痺在於脉則血滯痺

在於筋則拘攣痺在於肉則不仁痺在於皮則膚

寒至於手足酸疼寒熱俱有則為陽明之濕潮熱

骨蒸則為陽明之熱推而直黃便澀腸風瀉血口

噤牙痛秦艽能除風濕牙痛亦何莫不由陽明

濕熱與風所成用此苦多於辛以燥陽明邪辛兼

以苦以除肝膽風熱實為祛風除濕之劑風除則

芫為風藥中潤劑濕去則補故秦芫為散藥中

劑聖惠方治急癆煩熱身體酸疼用秦芫柴胡一

兩甘草五錢為末每服三錢白湯調下治小兒

蒸潮熱減食瘦弱川秦芫炙甘草各一兩每用一

二錢水煎服之然火痛虛羸血氣失養下體虛寒

加薄荷葉五錢然火痛虛羸血氣失養下體虛寒

瘦瘠枯瘦小便利者咸非所宜形作羅紋相交長

大黃白左紋者良右紋勿用葛蒲為使畏牛乳

大黃白左紋者良右紋勿用葛蒲為使畏牛乳

大黃白左紋者良右紋勿用葛蒲為使畏牛乳

蔓荆子 一百四十四

蔓荆子 蒟入膀胱 辛苦微温 善言至治太陽膀胱

兼理足陽明胃足厥陰肝緣太陽本屬寒水之經

因風邪內容而致顛頂頭痛腦鳴太陽脈肝屬風

臟風既內犯則風必挾肝木上浸而致淚出不止

肝氣筋精血養則血亦被風犯而致筋亦不榮齒

亦不堅矣商者骨之餘上酸屬足陽明下風

自必有濕與風搏則胃亦受濕累而致肉痺筋

絡由是三氣風寒濕交合則九竅口鼻耳啟塞而病

本草求真 卷三 蔓荆子 四十五

斯則蔓荆體輕而浮故既可治筋骨間寒熱而令
濕痺拘急斯去氣升而散復能祛風除寒而令頭
面虛風之症悉治且使九竅皆利白蠱能殺是亦
風寒濕熱俱除之一驗耳但氣虛血虛等症用此
禍必旋踵不可不知去膜酒蒸炒或打碎用惡烏
頭石膏

本草求真卷第三 第三 終

本草求真卷三 第四十四

蔓荆子 蒟入膀胱 辛苦微温 善言至治太陽膀胱

散熱自外生者宜表宜散熱自內生者宜清宜

審其邪未深入即當急散而不表之仍從表散

論乎散者已成有清無散而止就熱以言散者如升

出葉胡之引少陽外熱乾外野之散之升脈熱外

出也若胡之引少陽外熱乾外野之散之升脈熱外

出也若胡之引少陽外熱乾外野之散之升脈熱外

出也若胡之引少陽外熱乾外野之散之升脈熱外

本草求真 卷三 蔓荆子 四十六

言散者如蒸氣能散皮骨熱毒而言散者如噴
言散之能升散火熱毒外有散者如噴
言散者如蒸氣能散皮骨熱毒而言散者如噴
言散之能升散火熱毒外有散者如噴
言散者如蒸氣能散皮骨熱毒而言散者如噴
言散之能升散火熱毒外有散者如噴

升麻 入脾胃 以與 為根一類但此辛甘微苦
能引慈白入肺發散風寒出汗引石膏能治陽明
頂痛頭痛齒痛引參耆 能入脾胃補脾且同柴胡

能引歸者白朮甘溫之藥以補衛氣之散而實其
 表并治一切風陷下痢後重神急者不一端有應
 柴上升者要在辨症明確以承氣大下者有應川升
 降之宜耳不得藥以升舉為事也久泄在日清氣
 發脫肛足寒陰痿經毒精鬼陰陽則與一切風
 熱斑疹斑疹有虛有實須審其症以治之若治成
 胃熱失下衝人少陽則功相火而疾疹毒靡不隨手
 成班衝入少陰則助君火而成疹毒靡不隨手
 輒應以升其陽而散其熱俾邪盡從外解而濁自
 克下降故又曰能以解毒不似葛根功專入胃升
 津解肌而不能引諸藥以實衛氣也但升麻佐於

本草求真 卷三 散熱升麻

四十七 葛根

葛根則入陽明升津解肌有效同柴胡升氣則柴
 能升少陽肝經之陽升麻能升陽明胃經之陽一
 左一右相需而成時珍曰大人年五十以後其
 少秋冬之令多而春夏之令少若受時而升者
 諸般陽虛等症者並宜以升陽等藥活法治之但
 陰火動及氣虛汗出切忌朱肱活人書言升麻地
 麻以代意在引藥以入陽明耳朱二允言升麻地
 黃湯不宜用升麻以代升麻角意在升麻能引陰血
 上河二若見解低是但須察其病裡白外黑紫實
 氣淺深脈氣偏純以明治之得失
 者良名鬼臉升麻細切煮青綠色謂雞骨升麻去
 蟻蘆蒸暴用入補劑蜜水煎

葛根 兼入胃 辛甘性平 輕揚升發 能入足陽明胃
 經鼓其胃氣上行生津止渴江昂曰風藥多燥葛
 能升胃氣入脾經開腠發汗解肌退熱
 肺而生津耳兼入脾經開腠發汗解肌退熱
 緣傷寒太陽病罷傳入陽明則頭循經而痛胃被
 寒蔽而氣不得上升入肺則渴胃主肌肉氣不宜
 通則熱故當用此以治俾其氣升津生肌解熱退
 因其體輕故解肌而無復傳之勢矣時珍曰本草
 因其氣升故生津而無復傳之勢矣時珍曰本草
 夫實麻黃葛根之屬若麻黃乃太陽經藥兼入肺
 經肺主皮毛葛根乃陽明經藥兼入脾經脾主肌

本草求真 卷三 散熱升麻

四十八 葛根

肉所以二味藥皆輕揚發散而所入迥然不同也
 補入脾而通入肺因共體輕但葛根一味必其於
 頭額俠之處於面頰行痛如刀劈方謂邪傳陽明
 其藥可用張元素曰頭額痛如刀破乃若使未入
 陽明又是引邪內入不可用也即邪在於太陽而
 畧見於陽明則以方來之陽明為重故必用葛根
 以絕其路仲景治太陽陽明合病桂枝湯加葛根
 以斷太陽陽明之黃又有葛根黃芩黃連解肌湯是用
 路非大陽藥也若使陽明症備而止兼有太陽
 則又以葛根之太陽為重故又不用葛根且陽明

一第 冊 頁 7 反

主肌肉者也而用葛根大開肌肉則津液盡從外泄恐胃愈虛而陰立亡至於疹未發則可用此升提酒醉則可用此解醒火鬱則可用此升散但亦須審中病輒止如月溪云治疹無汗要有汗散為之無汗散若湯藥有汗加參者以不可過用以致胃氣有傷也如丹溪云斑疹已見紅點不可更服升葛湯恐表虛反增斑爛

柴胡 山草 味苦微辛氣平微寒據書載治傷寒熱傳足少陽膽經脈為清淨之府無出入邪入是

經正在表裡之界汗吐與下當禁惟宜和解故仲景之治傷寒邪人少陽而見寒熱往來胸脘耳聾少陽衛於身側其脈循胸通耳邪由陽明而傳少陽故必口苦咽乾胸滿耳鳴熱往來胸脘耳聾俱婦人熱入血室用之以泄其邪血室也凡婦人男女皆有惟婦人所主在血故病多胎前產後小兒痘疹五疳癩熱諸症先寒後熱謂寒癩先不寒謂癩癩亦謂溫並癩疔癩癩成宜用之其寒熱所至之往來適在心陽所主之地偏陰則多寒偏陽則多熱其純熱無寒而為癩癩溫癩純寒無熱而為壯癩要皆自少陽而造其極補救寒熱亦必返還少陽之界陰陽兩協於和而後愈

此藥汗吐下之法以治實熱如偏少陽之法以治虛寒無非欲和其平耳病如偏少陽之法以治虛寒有餘及即正昂日奔之不離乎少陽猶咳之不離肺也若病在太陽用之太早猶引賊入門病在陰經用之則重傷其表必得邪至少陽而藥始可用矣李士材曰非至云能治五癆必其諸臟諸腑其癆挾有實熱者暫可用此解散內熱是外邪真虛而挾實熱亦當酌其所宜雖引清陽之氣左旋上行然升中有散若無歸者同投其散滋其虛熱不可寒血衰火毒者不可燥豈容誤哉識此三藥則

有誤宗稟日經驗方中治勞熱育滿煎用柴胡此愈其藥至死亦不怨目擊甚多日華子又謂補五癆七傷藥性論亦謂治癆之藥瘦若此等病若無實熱者而用之不死何待時珍曰此病非通論兼之性滑善通凡澆泄大便者當善用之熱結不通者當佐當歸黃芩以投差無誤耳是以陰虛火炎骨蒸勞熱腎虛泄瀉書載不應服解故宜北柴胡虛熱宜海陽軟柴胡為良酒炒用半夏為使惡皂莢畏女苑藜蘆時珍曰行手足少陽厥陰以黃

香薷

香薷 入脾 氣味香 似屬性溫 並非沉寒 然香

氣既除 涼氣即生 所以薤蒸 濕熱得此 則上下通

達 而無滯滯之患 搏結之陽邪 得此 則煩熱頓解

而無固結之弊 矣是以用為清熱利水 要劑 然必

審屬陽臟 其症果屬陽結 而無陽弱之症 若氣弱

用此 差為得宜 若使寒賦 素陽飲食 不倍 其症有

似燥渴 而見吐瀉 不止者 用此 等於代茶 寧無誤

乎 時於日 世醫治暑病 以香薷 散為首 藥然暑有

本草求真 卷三 散香薷

五十一

惡寒煩燥 口渴或吐 或瀉 或嘔 或食 不節 勞役 作喪 之人 傷暑 大熱 大渴 汗泄 如雨 煩燥 喘促 或瀉 或吐 者 乃暑 傷內 傷之 症 必用 東垣 清暑 益氣 湯 人參 白 虎湯 之類 以瀉 火益 元可 也 若用 香薷 之藥 是為 虛其 表而 又瀉 之 以熱 矣 蓋香 薷乃 夏月 解表 之藥 如冬 月之 用 麻黃 氣虛 者 尤不 可多 服 而令 人 不知 暑傷 元氣 不拘 有無 病 藥用 代茶 謂能 辟 暑 痲也 今人 但知 暑即 是熱 熱即 是暑 暑為 陰 陽症 經曰 氣盛 身熱 得之 陰寒 氣虛 身熱 暑熱 混 得之 傷暑 故中暑 宜溫 散中 熱宜 清涼 暑熱 混 為一 氣而 不知 暑病 何形 熱屬 何象 暑陰 暑何 因 是而 名熱 何因 是而 號暑 何因 何體 氣而至 暑熱 熱何 因何 體氣 而召 暑熱 暑何 用於 香薷 不宜 虛氣

暑熱所加 香薷 熱何 用於 香薷 則效 邪而 熱自 除 散氣 是益 虛矣 熱何 用於 香薷 則效 邪而 熱自 除 其中 旨趣 在人 領會 未可 為粗心 人道 也 陳者 其 宜冷 服 時珍 曰 熱 淡豆 豉 入脾 氣味 苦 似屬 性溫 並非 沉寒 然香 氣既 除 涼氣 即生 所以 薤蒸 濕熱 得此 則上下 通達 而無 滯滯 之患 搏結 之陽邪 得此 則煩熱 頓解 而無 固結 之弊 矣 是以 用為 清熱 利水 要劑 然必 審屬 陽臟 其症 果屬 陽結 而無 陽弱 之症 若氣 弱用 此 差為 得宜 若使 寒賦 素陽 飲食 不倍 其症 有似 燥渴 而見 吐瀉 不止 者 用此 等於 代茶 寧無 誤乎 時於 日 世醫 治暑 病 以香 薷 散為 首 藥然 暑有

淡豆豉

淡豆豉 入脾 氣味 苦 似屬 性溫 並非 沉寒 然香 氣既 除 涼氣 即生 所以 薤蒸 濕熱 得此 則上下 通達 而無 滯滯 之患 搏結 之陽邪 得此 則煩熱 頓解 而無 固結 之弊 矣 是以 用為 清熱 利水 要劑 然必 審屬 陽臟 其症 果屬 陽結 而無 陽弱 之症 若氣 弱用 此 差為 得宜 若使 寒賦 素陽 飲食 不倍 其症 有似 燥渴 而見 吐瀉 不止 者 用此 等於 代茶 寧無 誤乎 時於 日 世醫 治暑 病 以香 薷 散為 首 藥然 暑有

本草求真 卷三 散香薷

五十二

又能 止汗 是以 邪在上 而見 煩燥 頭痛 滿悶 懊懣 不眠 嘔吐 逆者 合於 梔子 則能 引邪 上吐 不致 陷入 而成 內結 之症 也 然必 江左 製者 方堪 入藥 按古 製法 用黑 大豆 水浸 一宿 淘淨 蒸熟 攤勻 高覆 候上 黃衣 取晒 蕪淨 水拌 乾 濕得 所安 甕中 築實 桑葉 蓋厚 泥封 晒七 日 取出 曝一 時 又水 拌入 甕如 此七 次再 蒸去 火氣 甕收 用

本草求真卷第三 第四冊終

本草求真卷三 第五

吐散邪在表宜散在裡宜攻在上宜吐在下宜
 之反在是則悖矣背人謂邪在上吐亦須分其
 因所治以爲別如常山蜀漆是吐積飲在於心
 下者也藜蘆皂角二藥皆瀉心胃也風痰在
 於膈者也生來服子吐氣痰在於膈者是吐胃
 附是吐濕痰在於膈者也胡桐痰在於膈者是
 上攻於膈而見石也僂子痰在於膈者是吐胃
 膈而攻者有木然青木香以引之痰涎不至於
 有熱毒則有木然青木香以引之痰涎不至於
 燒以瀉之但吐藥最峻過用必致生變不可不慎
 此石木然青木香用必致生變不可不慎

本草求真 卷三 吐散

五三 綠圖

常山 百五

常山 常山人辛苦而寒有毒功專引吐行水爲除痰
 疾老痰積飲要藥蓋痰無不換痰挾熱以成然亦
 有風痰寒熱食氣之分風痰宜於星鳥寒痰宜於
 宜於植髓氣痰宜於鳥藥痰宜於星鳥寒痰宜於
 解痰在四肢皮裡膜外非姜汁竹瀝不達痰在胸
 下非白芥子不除痰在背脊非麻黃木香
 桂枝不和痰在手背非麻黃木香
 實結非用下藥不愈治須分其陰陽虛實表裡以
 定如癆果因傷寒寒熱及時氣溫疫而致黃涎聚
 於胸中心下平回不解則當用此引吐然亦須在

本草求真 卷三

痰散表邪及提出陽分之後而用之其用又當審

其所見部位及藥佐使以治如常山得甘草則吐
 水在上焦者宜之得烏故山甲則入肝水在脇下
 者宜之得大黃則利水邪熱交結而成內實者宜
 之得小麥竹葉則入心得秫米麻黃則入肺得龍
 骨附子則入腎得葶藶栝柳則入脾然此陰毒之
 草其性悍暴雖有破瘵逐飲之能而亦終損真氣
 所以仲景治癆方中從無及此勝曰太陰在泉濕
 又曰歲土太過則濕流行其則飲發益飲有五流
 於肺爲支飲於用爲懸飲於心爲伏飲於經絡爲

本草求真 卷三 吐散常山

五四 綠圖

瀉飲於腸而裏傷於暑秋必癰瘡及癰在三陰元
 氣虛寒人則常山等藥皆爲戈戟或問吐藥甚多
 何以癰疾必用常山蜀漆蓋以常山性兼逐疫癰
 疾本於濕疫故於常山蜀漆則宜猶之瓜蒂烏附
 尖萊菔子藜蘆皆爲吐劑而瓜蒂則止宜於熱痰
 烏尖附則止宜於濕痰萊菔子則止宜於氣痰藜
 蘆則止宜於風痰也酒浸炒川椒即蜀漆功用畧
 同但苗性輕揚其於上焦邪結治之更宜

藜蘆 百五

二八五

吐屬

蘇蘆能反五參細辛芍藥及一服即吐其義
 何居蒸綠苦雖屬降而亦善涌蒸蘆辛少苦多故
 能入口即吐是以風痰膈結而見欬逆上氣者當
 用是藥以投使其膈部之邪悉從上出也但此宜
 作散劑以投散上切勿湯藥以服備門事云一
 二年一作後漸日作甚至一日數作求死而已
 歲大儀採百草食見野草若慈林蒸餾食覺不安
 吐膠涎數日約一二斗汗出如洗甚昏困後迷輕
 健如常人以所食是慈訪人乃慈慈前即慈意是
 已時珍曰我朝和玉妃劉氏年七十中風不省
 牙關緊閉先考人醫更日月逾旬診視藥不能入
 不獲已打去一齒齒齒齒齒齒齒齒齒齒齒齒齒
 氣迷吐痰而甦藥勿服服服服服服服服服服服
 至於

本草求真 卷三吐散蘇蘆 五五 綠圖

腸癖泄痢如何書載克治亦是因吐除其實積積
 去而利與瀉亦可止矣吐雖等於常山瓜蒂烏附
 尖萊菔子但常山則吐瘵瘵瓜蒂則吐熱瘵烏附
 尖則吐濕痰風痰此則專吐風痰者也況此氣善
 通頂治喉痺及鼻中癰肉為末吹效然亦並非得
 已即有中蠱等毒及成老痰積塊止可借其宜泄
 切勿沾口以自損其津液耳取根去頭用黃連為
 使反細辛芍藥諸參惡大黃畏慈白服慈湯
 水驚千百五

木驚

木驚科外治本有二種一名土驚有發一名番木
 驚無殼木驚味苦居多甘辛畧帶諸書皆言性溫
 以其味辛者故耳究之性屬大寒狗食即斃人若
 誤用中寒口噤多致不救常有因病錯用而斃者
 矣故其功用多從外治如腫毒乳癰疔漏腫痛喉
 痺用此醋漱於喉間引痰吐出以解熱毒不可咽
 下或同硃砂艾葉捲筒蒸亦殺蟲最效或用麻油
 裝擦亦可總不可入湯劑以致寒毒內攻耳聾
 然即馬功與木驚大同而寒烈之性尤甚所治熱

本草求真 卷三吐散木驚子 五五 綠圖

木驚

病喉痺亦止可同山豈根青木香磨汁內含使其
 痰涎引吐逆流而上不可咽下疔瘡人眼可用膏
 木驚半個輕粉冰片麝香為末左目吹右耳右目
 吹左耳日吹二次即住狗性大熱用此大寒內激
 使之相反立見斃耳止入外科治療用時除油
 胡桐淚香木
 胡桐淚兼入腎苦鹹大寒治咽喉熱痛齒齲風
 疔瘰癧結核綠此熱盛於內上攻口齒發為諸病
 非不用此味苦則正莫制用此味鹹則堅莫除用

木驚

此大寒則熱莫解經曰熱滯於內治以鹹寒又曰
 在高者因而越之可知大熱大毒必用大苦大寒
 以為引吐方能以除口商家為最要之物正俗所
 云有病病當之者是耳但此不宜多服恐其引吐
 不休結如小石片者佳時珍曰石淚入地受齒氣
 能入骨木淚狀如膏油係樹脂流出者
 甜瓜蒂一百五十
 甜瓜蒂出人脾即俗名苦丁香是也味苦氣寒有
 毒益此氣味純陰功治瀉泄凡因熱痰聚脈而見

本草求真 卷三 吐酸 甜瓜蒂 五七

面目浮腫欬逆上氣皮膚水氣黃疸濕熱諸症則
 常用此調治或兼他藥同入涌吐如仲景合赤小
 豆之酸甘以吐胸中寒邪金匱瓜蒂湯以治中腸
 無汗之類胸中若清陽之府諸邪入胸皆阻陽氣
 施惟以瓜蒂極苦赤小豆味酸相須相非汗下可
 益能除胸中實邪為吐劑中第一品也若不因其
 高而越則為喘為嗽勢所必至但非實熱實症不
 可輕用
 萊菔子一百五十
 萊菔子出人脾氣味甚辛生川研汁能吐風痰有倒

本草求真 卷三

增推壁之功迅利莫禦若醋研敷則癰腫立消炒
 熟則下氣定喘消食寬膨一生一熱性氣懸殊服
 根性亦類子生升但生則剋血消痰治痢汪昂云
 其萊數則不患痢秋以萊葉煎湯飲治痢得效夏月食
 生痰助濕以故火傷垂絕用生萊煎汁灌之即甦
 方人避難入石洞中賊燒煙薰之日含萊打撲損
 傷青紫搗爛晉之即散煨熟擦凍凍二三日即
 和偏頭風取近蒂青色半寸許搗汁滴鼻孔左痛
 滴右右痛滴左左右俱痛兩鼻皆滴滴後少頃日

本草求真 卷三 吐酸 萊菔子 五八

滴一次不過六七日永不再發飲合鬚髮白者以
 生地黄汁一升合生萊菔汁飲之即白傷血之驗
 可徵也生地黄涼血萊菔汁破血鬚髮安得不白
 惟用生小兒疳積遊風塗之即愈并能消癰毒消
 志云齊州有人患狂病云夢中見紅裳女子引
 宮殿中來是此中歌曰蓬萊宮中五靈樓閣曉玲瓏
 天宮有道是此中歌曰蓬萊宮中五靈樓閣曉玲瓏
 吾宮有道是此中歌曰蓬萊宮中五靈樓閣曉玲瓏
 火者道是此中歌曰蓬萊宮中五靈樓閣曉玲瓏
 首不道是此中歌曰蓬萊宮中五靈樓閣曉玲瓏
 成并解附子毒但其性總屬耗氣傷血故脾胃
 虛寒食不化者為切忌焉炒川

一一八七

膽礬

膽礬 尚人 膽礬 又名石膽 產於銅坑之中 得銅精

氣而成 味酸而辛 氣寒而澁 功尚人 膽涌吐風熱

痰涎 使之上出 蒸五味 惟辛為散 惟酸為收 五性

惟寒勝熱 風熱盛於少陽 結為痰垢 汗之氣橫而

不解 下之沉寒 而益其凡 因濕熱 滯火 提出見為

陰 腫崩淋寒熱 風痰毒氣 結聚牢固 見為咽喉痰

疝 乳蛾 風熱痰垢 結聚見為 欬逆 疝疔 口痛 難忍

及金瘡 不愈 諸毒 內閉 膠結 見為 齒痛 牙疳 疔種

本草求真 卷三 吐酸 膽礬 五九 綠圖 齊

等症 服此力能 涌吐 上去 其膠 痰化 其結 聚則

諸症 悉除 故古人之治 喉痺 乳蛾 用米醋 煮其鴨

嘴 膽礬 為末 醋調 搽吐 膠痰 即瘥 又治 紫白 腐風

同 牡蠣 生研 醋調 摩之 即愈 又治 胃脘 鬱痛 以茶

清 調 膽礬 末 吐之 即除 又治 馬牙 疳 疔 疔 疔 疔 疔

膽礬 蝦赤 研末 敷之 追出 痰涎 即效 百啞 入耳 用

膽礬 和醋 灌即 出 諸症 在 膽 按此 功尚 涌吐 何書

又言 酸寒 能收 不知 醫言 收斂 乃是 取辛 收其 熱

毒上 涌而出 非以 收其 入內 而不 宜散 出表 之意

也 為散 凡書 所論 藥性 每有 以收 為用 以散 在 前

不為 割析 明白 多有意 義難 明以 致用 之者 之誤

耳 磨欬 作銅 色者 真形 似空 青鴨 色為 上 市人 各

青礬 畏桂 花辛 夷白 薇 此用 吐法 宜先 少服 不

偽之 畏以 藥投 之不 吐再 投且 投日 探無 不吐 者

此至 而安 眠勿 驚疑 但飲 冷水 新水 立解 強者 可

已而 不安 則邪 之引 之未 盡也 吐後 忌飽 食酸 鹹

物 井忌 房室 悲憂

本草求真 卷三 吐酸 膽礬 五九 綠圖 齊

等症 服此力能 涌吐 上去 其膠 痰化 其結 聚則

諸症 悉除 故古人之治 喉痺 乳蛾 用米醋 煮其鴨

嘴 膽礬 為末 醋調 搽吐 膠痰 即瘥 又治 紫白 腐風

同 牡蠣 生研 醋調 摩之 即愈 又治 胃脘 鬱痛 以茶

清 調 膽礬 末 吐之 即除 又治 馬牙 疳 疔 疔 疔 疔 疔

膽礬 蝦赤 研末 敷之 追出 痰涎 即效 百啞 入耳 用

膽礬 和醋 灌即 出 諸症 在 膽 按此 功尚 涌吐 何書

又言 酸寒 能收 不知 醫言 收斂 乃是 取辛 收其 熱

毒上 涌而出 非以 收其 入內 而不 宜散 出表 之意

本草求真 卷三 第五冊終

本草求真卷四 第一册

濕散熱氣久積於中自當清涼以解寒氣久滯於
濕散熱氣久積於中自當清涼以解寒氣久滯於
濕散熱氣久積於中自當清涼以解寒氣久滯於
濕散熱氣久積於中自當清涼以解寒氣久滯於
濕散熱氣久積於中自當清涼以解寒氣久滯於
濕散熱氣久積於中自當清涼以解寒氣久滯於
濕散熱氣久積於中自當清涼以解寒氣久滯於
濕散熱氣久積於中自當清涼以解寒氣久滯於
濕散熱氣久積於中自當清涼以解寒氣久滯於
濕散熱氣久積於中自當清涼以解寒氣久滯於

本草求真 卷四 濕散

麥芽則止消食於中而脂則止祛風如濕而有
相兼及者逆至香之醒脾而兼之惡行胸中
散胸膈寒逆至香之醒脾而兼之惡行胸中
散胸膈寒逆至香之醒脾而兼之惡行胸中
散胸膈寒逆至香之醒脾而兼之惡行胸中
散胸膈寒逆至香之醒脾而兼之惡行胸中
散胸膈寒逆至香之醒脾而兼之惡行胸中
散胸膈寒逆至香之醒脾而兼之惡行胸中
散胸膈寒逆至香之醒脾而兼之惡行胸中
散胸膈寒逆至香之醒脾而兼之惡行胸中
散胸膈寒逆至香之醒脾而兼之惡行胸中

本草求真 卷四

江西撫州府... 本草求真

見於上 見於下

草豆蔻 芳艷 草豆蔻 芳艷 草豆蔻 芳艷
草豆蔻 芳艷 草豆蔻 芳艷 草豆蔻 芳艷
草豆蔻 芳艷 草豆蔻 芳艷 草豆蔻 芳艷
草豆蔻 芳艷 草豆蔻 芳艷 草豆蔻 芳艷
草豆蔻 芳艷 草豆蔻 芳艷 草豆蔻 芳艷
草豆蔻 芳艷 草豆蔻 芳艷 草豆蔻 芳艷
草豆蔻 芳艷 草豆蔻 芳艷 草豆蔻 芳艷
草豆蔻 芳艷 草豆蔻 芳艷 草豆蔻 芳艷
草豆蔻 芳艷 草豆蔻 芳艷 草豆蔻 芳艷
草豆蔻 芳艷 草豆蔻 芳艷 草豆蔻 芳艷

本草求真 卷四 濕散

本草求真

草豆蔻 芳艷 草豆蔻 芳艷 草豆蔻 芳艷
草豆蔻 芳艷 草豆蔻 芳艷 草豆蔻 芳艷
草豆蔻 芳艷 草豆蔻 芳艷 草豆蔻 芳艷
草豆蔻 芳艷 草豆蔻 芳艷 草豆蔻 芳艷
草豆蔻 芳艷 草豆蔻 芳艷 草豆蔻 芳艷
草豆蔻 芳艷 草豆蔻 芳艷 草豆蔻 芳艷
草豆蔻 芳艷 草豆蔻 芳艷 草豆蔻 芳艷
草豆蔻 芳艷 草豆蔻 芳艷 草豆蔻 芳艷
草豆蔻 芳艷 草豆蔻 芳艷 草豆蔻 芳艷
草豆蔻 芳艷 草豆蔻 芳艷 草豆蔻 芳艷

太陰濁勝之寒濕也。開產名草薏如龍眼而微長。治陽明獨勝之火也。皮黃白薄而稜峭仁如砂仁而辛香氣和淡廣所產名草薏如訶子皮黑厚而稜密子粗而辛臭雖是一物微有不同。義另詳薏製煨熟取仁忌鐵器。
 草薏一百六 與草薏諸書皆載氣味相同功效無別服之皆能溫胃逐寒然此氣味淨散出自凡胃巖霧不正瘴癘服之直入病所而皆有效故合常山川則能以截久瘧同知母川則能以除瘴癘寒

熱豆義同楠半用則能以除膈上痰同柑薤用則能以解麪濕魚肉若使非由瘋瘴或因濕熱而見痰滯與傷暑而見暴注洩赤口乾者則並禁焉。
 使君子一百五 味甘氣溫功尚補脾殺虫除積凡人症患五疳便瀉瀉痢腹虫皆脾胃虛弱因而乳停食滯濕熱痰塞而成服此氣味甘溫以助脾胃則積滯消濕熱散水道利而前症盡除矣時珍曰凡

殺虫之藥多苦辛獨使君子樞子而殺虫亦異也。每月上旬虫頭向上中旬虫頭向中下旬虫頭向下於上旬空心服此數枚則虫皆死而出也。但忌熱茶同服則令人作瀉矣。出閩蜀五瓣有稜內仁如樞亦可煨食久則油黑不可用。
 白荳蔻一百六 兼入肺脾胃本與縮砂密一類氣味既同功亦莫別然此另有一種消痰妙氣上入肺經氣分而為肺家散氣要藥且其辛溫香流流行三焦

濕煖脾胃而使寒濕膨脹虛痞吐逆反胃腹痛並翳膜必白睛見有目昏紅筋等症悉除不似縮砂密辛溫香竄兼苦功尚和胃醒脾調中而於肺腎他部則止兼而及之也是以肺胃有火及肺胃氣薄切忌故凡用藥治病最宜審諒氣味分別形質以為考求不可一毫忽畧竟無分別於其間耳。
 縮砂密一百六 辛溫而清故書號為醒脾調胃要藥然亦兼入肺腎大小腸膀胱是以同樞

香白芷能入肺同人參益智則能入脾同黃
 蘗茯苓則能入腎同赤石脂則能入大小腸其言
 醒脾調胃快氣調中則於腹痛痞脹有功按此石
 之別若使病在手按多屬脾因寒治須用此石
 則切禁症有因寒熱因暑因濕因痰因氣因血
 因食之別亦須審其兼症也 人大腸則於赤白
 以求不可盡以砂仁為治也 濕痢有效人肺則於咳嗽上氣克理濕者宜川
 濕者勿用至云止痛安胎並咽喉口齒浮熱能消亦是
 中和氣順之意胎氣虛者始宜用若因實熱而云
 胎氣不和水衰而見咽喉口齒燥結者服之豈能

本草求真 卷四 濕散

五 詳圖

是乎故虛實二字不可不細辨而詳察耳出嶺南
 砂碎用
 木香入脾味辛而苦下氣寬中為三焦氣分要藥
 然三焦則又以中為要故凡脾胃虛寒凝滯而見
 吐瀉停食肝虛寒入而見氣鬱氣逆服此辛香味
 苦則能下氣而寬中矣中竅則上下皆通是以號
 為三焦宣滯要劑宗爽曰木香尚油快胸腹間滯
 氣生而相佐使納氣效尤速好古曰本草云生
 劣氣不足補地通氣導一切氣破也反胎健脾

本草求真 卷四

再補也除痰癆破也其不同如 至書所云能
 升能降能散能補非云升類升柴降同沉香不過
 因其氣鬱不升得此氣克上達耳况此苦多辛少
 言降有餘言升不足言散則可言補不及一不措
 顧任書泥投非其事矣昔船上來形如枯骨味苦
 粘舌者良名青木香非今所用馬兜鈴根者是也
 今川香屬木 人理氣藥磨汁生用若實大腸麵煨
 熟用今醫妄以西香代木香治痢殊謬
 香附言三

本草求真 卷四 濕散 木香香附

六 詳圖

香附入脾味辛香燥據書條極實能入
 肝膽二經開鬱肝有痰滯火鬱氣散滯活血通經
 兼行諸經氣分張子和平謂聖人當氣如持至實
 因有所屬而怒悲恐反傷太和人當氣如持至實
 分蓋怒則氣上喜則氣緩恐則氣下寒則氣收熱
 則氣泄驚則氣亂思則氣結勞則氣耗凡鬱亂吐
 泄瀉崩漏候須詳病用藥如將行而痛者
 虛痛而虛按者屬虛痛而拒按者屬實痛而喜按
 血淡者屬虛痛而拒按者屬實痛而喜按
 因氣虛血熱而痛者屬實痛而喜按
 須涼血補氣為要故三焦不利等症上焦如嘔中
 如治皆有效又云生則上行胸膈外達皮膚熱則

二九一

下走肝腎，外徹腰足，炒黑則止血分補虛，益水澄炒，則入血分潤燥，青鹽炒，則補腎氣，酒浸炒，則行經絡，醋浸炒，則消積聚，薑汁炒，則化痰飲，得參朮則補氣，得歸地則補血，得木香則疎滯，和中得檀香則理氣，附脾得沉香則升降諸氣，得川芎蒼朮則總解諸鬱，得梔子黃連則能降火熱，得茯苓則交濟心腎，得茵香補骨脂則引氣歸元，得三稜莪朮則消磨積塊，得厚朴半夏則決壅消脹，得紫蘇蔥白則解散邪氣，得艾葉則煖子宮，乃氣病之摠

本草求真 卷四 濕散香藥

七

司大抵婦人多鬱，氣行則鬱解，故服之尤效。非云宜於婦人，不宜於男子也。時珍曰：婦人以血用事，血閉惟氣是資，小兒氣日克，則形乃固。大凡病以氣滯而飯故香，附於氣分爲君，舉世所罕知，臣以治虛快其速也。按此端屬開鬱散氣，與木香行氣貌同，實異。木香氣味苦劣，故通氣甚捷，此則苦而不甚，故解鬱居多，且性和於木香，故可加減出入，以爲行氣通劑，否則宜此而不宜彼耳。但氣多香燥，陰虛氣薄，禁用，或酒或童便，或菴水浸炒，各隨本方製用，忌鐵。

華撥

華撥，人脾，氣味辛熱。凡一切風寒，內積逆於胸膈，而見惡心嘔吐，胃府見於下部，而見腸鳴冷痢，水瀉，陽勝發於頭面，而見齒牙頭痛，鼻淵，明目，停於肝腹，而見中滿痞塞，疼痛，經太陰，俱可用此。投治以其氣味辛溫，則寒自爾，見除其口鼻沸，頭痛，滯而與者，爲滯，滯而不與者，爲熱，鼻生有鼻痔，亦是取其辛熱，能入陽明以散浮熱之意，是以病患偏頭痛風，須先口含溫水，隨左右以此末吹

本草求真 卷四 濕散香藥

六

身最效。牙疼必同乾薑細辛，調治亦取能以除寒之意。然蜂房、二烏、虫、痛、石、灰、雄、黃、總之氣味既辛，則凡病，痛、寒、起，皆可以投然，亦洩人真氣，不可任意多服，以致喘咳目昏，腸虛下重，喪其真氣也。

艾葉 音空 蒿草

艾葉，兼入肝脾，辛苦性溫，其氣芳烈，純陽故可用以取火服之，則走肝脾與腎，能除沉寒痼冷。凡一切病，因寒濕而見血，衄崩帶，腹痛冷痢，霍亂轉筋，胎動腰痛，氣鬱經水不調，子宮虛冷，墮動瘡疥者

本草求真

諸病俱就 服之立能見效 寒濕起見 若其陽氣將
 絕之候 炙之即能回陽 且能通諸經 以治百病 亦就
 寒濕論 注昂曰 艾用火 灸則氣下入藥則熱氣上衝 故古方有同阿膠以
 治虛痢及胎前後下血 同香附製丸以誦經血而
 温子宮 兼除心腹諸痛 同乾薑以蜜為丸 以除冷
 惡鬼邪諸氣 陰氣 同白礬為末 以治瘡疥 又以
 熟艾布兜 以治寒濕脚氣 及老人臍腹畏冷 用絹
 裹以擦風 搗瘰癧 皆取辛温則散之 義若使症非
 寒濕而用 是藥燥烈 以治其失 匪輕胎不齊 寒熱

虛實 輒用艾葉 是以書載 氣虛血熱者 禁用 包盡
 以投 殊為荒謬 是以書載 氣虛血熱者 禁用 包盡
 病取 斬州艾 陳者 良搗搗 如綿 謂之 熟艾 炙火用
 婦人 九散 醋煮 搗餅 再為 末用 煎服 生用 溫熱用
 則苦 酒香 附為 使
 大茴香 百全
 大茴香 小茴香 皆入肝 兼入腎 膀胱 辛甘 性燥 功香 所載
 功專 入肝 燥腎 凡一切 沉寒 痼冷 而見 瘰癧 疔疔
 陰肺 腰痛 及乾濕 脚氣 并肝 經虛 火從 空上 衝頭
 面者 用之 服皆 有效 腫腫 謂乾 脚氣 蓋茴 香與 肉

桂吳茱萸 皆病厥陰 燥藥 但莖則 走腸胃 桂則能
 入肝腎 此則體輕 能入經絡 也必得 並引入腎 發
 出陰邪 故能治 疔疔 有效 若按 陽邪 若休 用按 疔疔 有
 分其病 亦有寒 熱虛實 不同 所當 分疔疔 疔疔 疔疔
 能散厥 陰經絡 陰症 於腎 以肝 脈絡 陰器 故也 茴香
 邪故 多用 此施 帶 余按 茴香 形類 不一 據書 所載
 有言 大如 麥粒 輕而有 細稜 者名 大茴 出寧 夏市
 鮮他 處小 者名 小茴 自番 舶來 實八 兩者 各八角
 香今 市所用 大茴 皆屬 八角 而寧 夏之 茴未 見余
 細嚼 審八角 茴味 其香 雖有 其味 甚甘 其性 温而

不裂 較之 吳茱 萸艾 葉等 味更 屬不同 若以 八角
 大茴 甘多 之味 甘多 而謂 能除 沉寒 痼冷 似於 理
 屬有 碍 似應 用字 則端 見如 斯未 知有 合後 之同志
 否益 水炒 用得 酒長
 小茴香 百全
 小茴香 皆入肝 胃兼 入 形如 粟米 辛香 氣温 與寧 夏
 大茴 功同 入肝 燥腎 温胃 但其 性力 稍緩 不似 大
 茴性 熱仍 看症 候緩 急分 別用 之耳 性時 珍曰 小茴
 日夏 月祛 蟻辟 臭食 料宜 之大 茴性 酒炒 搗水 炒
 熱多 食傷 目發 瘡食 料不 宜獨 用

名隨病症活用

益智

兼入脾胃氣味辛熱功尚燥脾溫胃及飲脾

腎氣逆藏納歸源散寒為急非收飲之欲也故又

號為補心補命之劑是以胃冷而見涎唾則用此

以收攝溫由於胃冷收攝亦是脾虛而見不食

脾虛亦是脾寒不食則用此溫理只是散腎氣不

溫而見小便不縮則用此溫炒與烏藥等分為未

酒煮山藥粉為丸搥湯下名縮泉丸以投以溫與

本草求真 卷四溫散小商香益類

經圖考

夫心腎不足而見遺精帶則用此以為秘製固
氣以溫為固非以若因熱成氣虛而見崩漏遺
等症者則非所宜妄用益智固精甚此雖難於
縮砂密同為溫胃但縮砂密多有快滯之功此則
止有逐冷之力不可不分別而審用耳出嶺南形
如棗核者益炒用

山柰

氣味芳香功能暖胃辟穢凡因邪氣而

見心腹冷痛寒濕蕪亂暨風濕牙痛用此治無不

益智

效乘熱和藥吹入鼻內痛即止搗生方川炮炙

多少填滿包煎紅取研日川擦牙漱夫不拍以其

氣味芬芳得此則能溫胃辟惡耳頭川山柰甘松

香零陵香一錢樟腦二分滑若使諸症概非濕穢

不得妄用出廣東根葉與生薑同合諸香藥用

甘松人甘溫無毒考昔俱載芳香升竅功能醒

脾開胃凡因惡氣卒中而見心腹滿痛風疔齒齲

本草求真 卷四溫散小商香益類

經圖考

各二錢半夜後吐之有涎吐出若脚氣腫脹煎
湯淋洗熱濕者休用此雖有類山柰但山柰氣多
辛窳此則甘多於辛故青藏能入脾開胃也出涼
州葉如茅根緊密者佳此屬草部與松木松香不
同

良薑

氣味辛熱治無他病凡因客寒外至寒

邪積於胃脘而見食積不消絞痛殆甚暨蕪亂瀉

痢吐惡膈膈瘴瘧冷癖皆能溫胃却病故同薑附

紅苳

則能入胃散寒同香附則能除寒祛鬱若傷暑泄
瀉實熱腹痛切忌此雖與乾薑性同但乾姜經炮
經制則能以去內寒此則辛散之極故能以辟外
寒之氣也心口痛方云此男女心口一熱痛者乃
起遂致終身俗言心氣痛非也因怒極受寒而
七次同香附子醋洗七次研各記收之因寒加
蘇末為君附末在之因怒附末為君蘇末在之寒
怒兼有平凡以木飲入生薑汁一匙蓋一捻服之
宜子名紅苳氣味辛甘而溫炒過入藥亦是散
寒燥濕補火醒脾溫肺之味且善解酒餘並治風
寒牙痛與良薑性同然有火服之傷目致眼不可

本草求真 卷四 溫散 頁前 十三

溫中散

不知
乾薑 百三
乾薑 味甘辛 其味本辛炮制則苦大熱無毒守而不
走凡胃中虛冷元陽欲絕合以附子同投則能回
陽立效故書則有附子無薑不熱之句與仲景四
逆白通姜附湯皆用之元素曰乾薑氣薄味厚平
沉半浮可升可降陽中之
陰也又曰大辛大熱陽中之
陽一也臟腑沉寒痼冷二也發諸經之寒氣三
也治感寒且同五味則能通肺氣而治寒嗽同白
朮則能燥濕而補脾同歸芍則能入氣而生血故

本草求真 卷四

黑薑

凡因寒內入而見臟腑癱蔽關節不通經絡阻滯
冷痺寒痢反胃膈絕者無不藉此以為拯救除炒
黑其性更純味變苦鹹力主下走黑又止血辛熱
之性雖無而辛涼之性尚在故能去血中之鬱熱
而不寒止吐血之妄行而不滯較之別藥徒以黑
為能止血為事者功勝十倍矣血寒者可多用血
熱者不過三四分為得尊而已白淨結實者良毋
薑烟乾為乾薑炒炮為炮薑炒黑為黑薑

本草求真 卷四 溫散 頁前 十四

薑香

薑香 百三
薑香 味甘辛 入脾 辛香微溫香甜不峻但馨香氣正能
助脾醒胃以辟諸惡故凡外來惡氣內侵而見養
亂嘔吐不止者須用此投服如薑香正氣散用此
以理脾肺之氣俾正
氣通而俾其胸開氣寬飲食克進正寒去故同烏藥
順氣散則可以利肺同四君子湯則可健脾以除
口臭但因熱作嘔勿服

本草求真 卷四

止痛

寒聚得此能以散寒故耳又言能除鼻中瘴肉鼻
竅以鼻得香則開得臭則閉之意耳至云多服作
喘亦以香能耗氣溫服則氣上應而作喘耳但此
服之則少痛孤感下劑等症而香舖用以作料
甚多有婦人用此是亦衆香中之不可缺也矣出
湖嶺者佳

排草香 百金

排草氣味芳香婦人據書載能祛惡辟臭除魅與
天時行並宜燒之水腫浮氣風痰可用生薑芥子

本草求真 卷四 溫散 蕙香排草香 十五 綠圖齋

煎湯浴洗玩此氣味芳香僅可以辟邪魅鬼惡使
之氣不克勝至於水腫浮氣亦須香以通達使之
氣伸浮散故止可入外用今婦人用此若使作湯
以服則經絡通佈雖曰祛邪扶正而正氣或虛則
又因香而斷敗矣香散之極故古人制方有宜於外者
則即以外爲主而內不投有宜於內者則即以外
爲要而外不行即云諸香有類於斯內亦見用然
此補少泄多古人獨於此味別爲外治而不內入
未必不有意義於其中也

石菖蒲 百金

石菖蒲尚人辛苦而溫香芳而散諸書尙
論未透惟張璐發揮本經最明指此實爲心氣不
足要劑時珍云高皇御製碑中載之菖蒲氣溫味
之虛則補其母也肝其言能補五臟以心爲君主
五臟係焉首言治寒濕痺是取其辛溫開發脾氣
之力治欬逆上氣者痰濕壅滯之喘咳故宜搜滌
若肺胃虛燥之喘咳非菖蒲可治也其開心孔九
竅明耳目出聲音摠取辛溫利竅之力心孔開九

本草求真 卷四 溫散 石菖蒲 十六 綠圖齋

竅利則癰瘡之毒可解腸胃寒濕惡寒腸胃既傷
則膀胱之虛寒小便不禁自止久服輕身者除濕
之驗也不忘不惑延年益智高壽不老皆補五臟
通九竅氣之力也其釋本經如此又言能主肝虛
心腹痛蠶亂轉筋消伏聚癩癩善通心脾痰濕可
知千金治胎動不安半產漏下或捨心下血及產
後崩中不止並以菖蒲一味煎服皆取辛能開竅
血氣安養之意觀此菖蒲實爲宣氣通竅之劑故
在楊士瀛亦謂噤口下痢可用石菖蒲加於參苓

主治大要矣。芎不詳悉。註明猶未有解。益牛夏味辛。辛則液化而便利。故云能潤腎燥也。成無已曰。行水而潤腎燥。蓋燥去濕則水利。辛化液則燥潤。局方牛夏丸。治老人虛秘。皆取其潤滑也。俗以牛夏南星為性燥。誤矣。濕去則脾苦濕。必得味辛。燥痰涎不生。非二物之性燥也。脾苦濕。必得味辛。氣溫以為之燥。牛夏辛溫。能於脾中滌痰除垢。痰去而脾自健。故云能以健脾也。王好古曰。腎主五為唾。在肝為淚。在心為汗。在肺為涕。在脾為痰。痰者因咳而動。脾之濕也。牛夏在脾。為涕。在脾為痰。之水。津木者。潤脾之濕也。牛夏在脾。為涕。在脾為痰。有聲則燥。所以為流。脾濕而潤。腎燥之劑也。潤胃為痰氣。痰則胃不和之極。牛夏既能溫脾以除

本草求真 卷四 濕散牛夏 十七

白米散內以開其胸。則其義益著。楊士瀛曰。下痢亦熱氣閉。隔心胸所致。俗用木香。失之。溫用山藥。失之。閉。惟參苓白朮散。加石菖蒲。梗米。飲調下。或用參苓石蓮肉。少人菖蒲。但陽亢陰虛。發寒失合。服則次一開。自然思食。者禁用。以其能動心胞之火耳。取一寸九節。紫花根。瘦者佳。去皮。微炒。用秦艽為使。惡麻黃。忌節糖。羊肉。鐵器。

牛夏 入脾胃。善言辛溫。有毒。體滑。性燥。能走能散。能燥。能潤。和胃健脾。補肝潤腎。數語業已道其

慎。趙繼宗曰。二陳治痰。世醫就之內。有牛夏。其性燥。裂若風。濕食諸痰。則相宜。至於勞痰。失血。諸痰。及合生。姜。芎。以除。若合。柴。芎。以治。少。陽。寒。熱。往。來。則。胃。更。見。和。諸。故。云。能。以。和。胃。也。王。好。古。曰。牛。夏。為。肺。藥。非。也。止。嘔。為。足。陽。明。除。痰。為。足。太。陰。柴。胡。為。之。使。故。柴。胡。湯。用。之。雖。云。止。嘔。亦。助。柴。芎。不。生。痰。故。往。來。是。又。為。足。少。陽。藥。也。時。珍。曰。脾。無。痰。日。欬。益。傷。於。肺。氣。有。痰。無。聲。日。嗽。蓋。動。於。濕。也。有。聲。有。痰。日。於。肺。氣。有。痰。無。聲。日。嗽。蓋。動。於。虛。勞。因。食。積。宜。分。症。論。治。因。火。因。風。日。嗽。蓋。動。於。先。而。治。痰。又。以。順。氣。為。宜。大。法。治。咳。當。以。治。痰。為。補。紅。利。其。氣。順。氣。加。溫。飲。他。如。氣。逆。能。下。氣。除。而。之。結。能。閉。與。結。亦。開。暴。死。以。末。吹。鼻。能。救。死。如。死。之。類。不。眠。以。牛。夏。湯。通。其。陰。陽。得。胃。素。問。曰。

本草求真 卷四 濕散牛夏 十八

則。則。不。安。牛。夏。能。和。胃。氣。而。通。陰。陽。靈。樞。曰。陽。氣。滿。不。得。入。於。陰。陰。虛。故。目。不。得。瞑。飲。以。牛。夏。湯。陰。陽。既。通。其。肝。右。不。得。眠。屬。肺。脈。宜。清。肺。左。胸。脹。不。得。眠。屬。肝。脈。右。不。得。眠。屬。肺。脈。宜。清。肺。左。胸。脹。合。括。萹。等。藥。各。小。陷。胸。湯。以。除。少。陰。咽。痛。生。瘡。聲。不。出。合。鷄。子。苦。酒。各。苦。酒。湯。以。服。仲。景。用。此。以。亦。何。莫。非。牛。夏。之。妙。用。而。為。開。竅。利。濕。之。藥。合。陳。甘。草。名。二。陳。湯。為。治。痰。之。總。劑。乘。積。佐。以。乾。薑。并。子。積。熱。佐。以。黃。芩。括。蕪。痰。佐。以。枳。實。白。木。更。看。痰。之。所。在。加。導。引。藥。性。燥。痰。非。牛。夏。所。能。司。也。但。陰。虛。火。盛。熱。結。胎。滑。痰。湧。等。症。則。非。所。宜。不。可。不。慎。趙。繼。宗。曰。二。陳。治。痰。世。醫。就。之。內。有。牛。夏。其。性。燥。裂。若。風。濕。食。諸。痰。則。相。宜。至於。勞。痰。失。血。諸。痰。及。合。生。姜。芎。以。除。若。合。柴。芎。以。治。少。陽。寒。熱。往。來。則。胃。更。見。和。諸。故。云。能。以。和。胃。也。王。好。古。曰。牛。夏。為。肺。藥。非。也。止。嘔。為。足。陽。明。除。痰。為。足。太。陰。柴。胡。為。之。使。故。柴。胡。湯。用。之。雖。云。止。嘔。亦。助。柴。芎。不。生。痰。故。往。來。是。又。為。足。少。陽。藥。也。時。珍。曰。脾。無。痰。日。欬。益。傷。於。肺。氣。有。痰。無。聲。日。嗽。蓋。動。於。濕。也。有。聲。有。痰。日。於。肺。氣。有。痰。無。聲。日。嗽。蓋。動。於。虛。勞。因。食。積。宜。分。症。論。治。因。火。因。風。日。嗽。蓋。動。於。先。而。治。痰。又。以。順。氣。為。宜。大。法。治。咳。當。以。治。痰。為。補。紅。利。其。氣。順。氣。加。溫。飲。他。如。氣。逆。能。下。氣。除。而。之。結。能。閉。與。結。亦。開。暴。死。以。末。吹。鼻。能。救。死。如。死。之。類。不。眠。以。牛。夏。湯。通。其。陰。陽。得。胃。素。問。曰。

牛黃

痰用之反能燥血澀而加病按古半夏圓白而大有二禁汗家渴家忌之然亦間有用者陳久者良浸七日逐日換水滌去涎同皂莢白礬其薑煑熟牛黃畏薑備用或七日夜用淨水淘浸以其再用皂莢水浸七日夜同皂莢可又用灰水淘浸七日夜可治又用白礬水淘浸七日夜可治痰又用薑水淘浸七日夜可治又用甘草水淘浸七日夜可解其毒及洗淨焙乾用柴胡射干為使畏生薑秦皮龜甲雄黃忌半血海藻節糖膩甘忌惡皂莢反烏頭烏頭辛燥其用薑汁浸造名

本草求真 卷四 溫散州草 二十九

牛黃

生薑麩水煑造兼薑入名麩同皂莢煑造各皂角麩同白芥子等分煑造有竹瀝三名竹瀝麩同麻油浸造炒乾為末造成名麻油麩同黃牛膽與蜜造名牛膽麩同香附蒼朮撫芩和半葵膏造各開礬麩同芒硝十分煑與大黃煎膏造名硝黃麩同海粉雄黃各十分煉蜜造名海粉麩同黃生牛肉熬膏名霞天麩並照造法草愈七日待生黃衣懸乾掛風處至用麩治之症則隨制藥能治病症之性以為治焉如生薑治寒痰皂角治風痰白礬治濕痰牛肉治沉苛固

本草求真 卷四 溫散州草 二十九

煙草

煙草與入表下咽即能醉人且或醉倒而復甦其性力之猛殆非他物所能比類者矣景岳云吸其味則辛而鮮甘審其氣則溫而且熱凡書所述相草皆言在表則能散陰助陽如山巔惡毒瘴濕而致腠理閉密筋骨脾痛服此可以見效因散在裡則能開胃和中凡因風寒食滯而致霍亂嘔吐宿食難消膨脹鬱結下咽後此亦克有功因性

本草求真 卷四 溫散州草 二十九

且其氣一入人口不比常度頃刻而周一身命人通體俱快善走醒能使人醉醉能使人醒饑能使人飽飽能使人饑以之代酒代茗終身不厭卒不能以妨人其故何耶蓋燥性猛人不能勝故下咽即醉醉因氣耗辛散理固然也然烟氣易散而人氣隨服陽性留中旋亦生氣雖散仍補此惟陰滯者用之如神陰臟若陽盛氣越冬燥多火不可及氣虛氣短多汗者皆不宜用閩產者佳

延胡索 山草

延胡索 苦平 入心肝氣味辛溫無毒入足厥陰肝手少陰
 心經能行血中氣滯氣中血滯故凡月水不調月
 或先或後多心腹卒疼小腹脹痛胎產不下筋縮
 疝瘕產後血衝血暈跌仆損傷不論是血是氣積
 而不散者服此力能通達氣血滯服此力能通
 達以其性溫則於氣血能行能暢味辛則於氣血
 能潤能散所以理一身上下諸痛往來獨行功多
 方寸酒它編云一人病遍體作痛不可忍都下
 凝滯或中風中濕脚氣悉不效用離字言是氣血
 凝滯所致用延胡索當歸桂心等分爲末溫酒服
 三四錢隨量頻進以止爲度遂爾止蓋延胡索能

破血炒川調血
 牛夏肉黃小而堅者良酒炒行血醋炒止血生用
 虛人當兼補藥同用否則徒損無益熱切忌根如
 無益氣之情後少養營之義徒仗辛溫攻凝逐滯
 導引失節肢體拘攣亦用此數服而愈然此藥
 破血炒川調血
 丁香 辛溫純陽細嚼力直下達故昔載能
 泄肺溫胃煖腎非若縮砂密功溫肺和中木香
 功溫胃行滯沉香功溫入腎補火而於他臟則

止兼而及之也是以亡陽諸症一切嘔噦逆查
 胃并養亂嘔噦心腹冷疼並痘瘡灰白諸症皆就
 服此逐步開闕而入丹田逐步開闕而使寒去
 陽復胃開氣縮不致上達而爲病矣張晞曰呃逆
 寒熱不辨用藥立斃凡此之有力而逆者雖有
 手足厥逆大便必堅定屬大熱下之則愈高舉有
 全若胃中無實火何以激搏其熱上而逆者雖有
 聲低怯而無實火何以激搏其熱上而逆者雖有
 定屬虛寒非不達於喉或時聲上而逆者雖有
 何至聲音低怯不達於喉或時聲上而逆者雖有
 則帶怯痰以柿蒂煎服此爲煖胃補命要劑故
 治之倉扁不能復生矣此爲煖胃補命要劑故
 逆得溫而逐而呃自可以止若止用此逐滯則木

香較此更利但此熱症忌用有雌雄二種雌即雞
 舌香力大若用雄去丁蓋孔子畏爵金火
 白檀香 辛平 入肺氣味辛溫薰之清爽可愛
 凡因冷氣上結飲食不進氣逆上吐抑鬱不舒服
 之能引胃氣上升力且能散風辟邪消腫疔痛
 外散功溫入脾與肺不似沉香力溫至降而能引
 氣下行也時珍曰枳殼經云白旃檀塗身能除
 取此義也杜寶大業錄云南諸香旃檀諸香塗身
 五香飲濟人沉香飲檀香飲丁香飲澤蘭飲甘松

飲皆以香為主，更加別藥，有味而止，病發但此動，補益人也。道書謂之浴香，不可燒供上真。但此動，火耗氣陰，虛火盛者，切忌。取白潔色白者佳，色紫為紫檀，氣寒味鹹，專入血分。

蘇合香 一百八二

蘇合香 諸人 味甘氣溫，出於天竺、崑崙、諸國、安南、三佛齊，亦皆有之。治能辟惡殺鬼，凡溫瘧、癩、毒癩、瘰癧、痰積、氣厥、山嵐、瘴濕、瘵於經絡、塞於諸竅者，非此不除。昔文正公氣羸多病，末真宗西賜藥酒，公飲之大覺安健。次日稱謝，上曰：此蘇合香酒也。每酒一斗，入蘇合香半斤，一兩同煮，能調和五臟。

本算求真 卷四 溫散白香蘇合香

二二二 蘇合香

却腹中諸疾，每用寒風，與則飲一盃而安。按香皆能辟惡除邪，此合諸香之氣，煎就而成一物，其通竅逐邪殺鬼，逆神除，履絕瘴毒，宜其然矣。以筋挑起，懸絲不斷者，真但血燥氣弱勿用。

安息香 百八三

安息香 心 入係西戎及南海波斯國樹中之脂，其香如膠，如飴其氣馨，其味苦而兼甘，其性平。按凡香物皆燥，惟此香而不燥，香物皆烈，惟此沉而不烈。洵佳品也。以此祀神，則異香滿室而神若依以。

烏藥 一百八四

之常薰則惡氣悉絕而心肺皆沁，神氣通暢，故凡傳屍癆瘵、霍亂、逆盛、毒惡、侵凌、癩鬼、交等症，無不用此調治。伸其邪辟正復，所以蘇合香、九紫雪、丹七香、九錢香、附子、細砂、密芥、甘草、各五錢，為末，小兒肚痛亦皆用此。以其獨得香氣之正也。但元氣虛損、陰火旺者，其切忌焉。書言燒之能集鼠者，真。

烏藥 一百八四

烏藥 人 脾肺膀胱，辛溫香，竅青，載上入脾肺下通。

本草求真 卷四 溫散安息香烏藥

二二四 烏藥

烏藥

腎經如中風中氣，膀胱冷結，小便頻數，反胃吐食，泄瀉，霍亂，女人血氣凝滯，小兒疝氣，外而瘡癩疥，瘰癧，并凡一切病之屬於氣逆而見胸腹不快者，皆宜用此。此藥性溫，能通氣，治中風中氣之症，不可作中風治。時珍曰：烏藥力治中風中氣，諸症同烏藥，順氣散者，先歸其氣，喘急用烏藥，煎湯者，降中兼升，湯中兼合煎，細細嚼之，烏藥丸服者，取其通陽明少陰經功，與木香、附子同為一類。但木香苦溫入脾，也。痰滯，每於食積則宜，香附、辛香入肝膽，二經開鬱。

散結每於憂鬱則妙此則逆邪橫胸無處不達故
用以爲胸腹逆邪要藥耳氣行則風自散故不須
若氣虛內熱而見胸膈不快者非其所宜治風不須
用氣根有車轂紋形而連珠者良酒浸一宿或煨研

吳茱萸 一百分

吳茱萸 入肝脾人辛苦燥熱微毒當入厥陰肝
氣分散寒除脹東垣云濁陰不降厥氣上逆甚而
脹滿非吳茱萸不可治也多用損人元氣故吞酸

本草求真 卷四 溫散吳茱萸

吐酸等症俱用熱燥吞吐酸水河間丹溪專指其
在醫於病所見兼症與脈及平昔感氣偏寒熱俱有
純審宜明辨可耳不可專祖一家治法至如明
喉口舌生瘡以茱萸末醋調貼兩足心一夜便愈
者以熱下行也兼入脾胃以除胸中寒冷又脾經
血分濕滯介其表裏宜通而無拒閉之患矣又兼
入腎而治膀胱受濕陰囊作疝久滑冷瀉陰寒小
腹作疼暨脚氣水腫并口舌生瘡除蟲殺虫諸症
陰寒要皆氣味辛燥所致但走氣動火久服令人
目昏發瘡以濕煎經血虛有火者尤忌陳者良泡

去苦烈汁用止嘔黃連水炒治疝益水炒治血醋
炒蘇丹參硝石

樟腦 一百分

樟腦 入性稟龍火辛熱香竄能於水中發火其
破益熾治能通閉利竅凡中惡卒死者可用樟木
燒制薰之并能除濕殺虫置鞋中去脚氣方書每
和烏頭爲末醋九彈子大置於足心火烘汗出爲
效且能薰衣使辟蛀虫出部郡諸山以樟木蒸汁
煎煉結成樟腦升打得法能亂水片

本草求真 卷四 溫散樟腦

川椒 一百分

川椒 入肺辛熱純陽時珍曰其味辛而麻其氣
方之無處不達治能上入於肺發汗散寒中入於
脾煖胃燥濕消食下入於命補火治氣上逆冷氣
凡因火衰寒病提出諸而見陰衰波數陰汗精洩
前齒動搖目睛經滯癢癢疝疝鬼疝血毒者服此
辛熱純陽無不奏效上清決云凡人吃飯傷飽
板即散以其能通三焦引正氣下惡食消宿食也
載原則動動則藥出而蛇不出但於嘔吐藥中
加川椒長蓋既見椒則頭伏也觀此則仲景城

椒
 烏枝九中用椒亦此義耳按此椒有腹痛面白
 紅時發時止等症可察許叔微云此入腎氣上逆
 須以川椒引之歸腎危氏神授九治傷風以其寒
 勞用川椒炒出汗米飲送下二劑而愈
 去臘溫故能所治皆應此雖與胡椒同為一類但
 胡椒則止溫胃除寒逐水此則更兼入腎補火殺
 蠱而於逐水不甚專也出四川肉厚皮皺者是秦
 產名秦椒味辛過烈閉口者有毒殺人微炒去汗
 搗去裡而黃殼取紅用得鹽良使杏仁畏款冬防
 風附子雄黃麻仁涼水子名椒目苦辛歸行水道
 不行穀道能治水蠱除脹定喘及腎虛耳鳴

胡椒
 胡椒人辛熱純陽比之蜀椒其熱更甚凡因火
 衰寒入痰食內滯腸滑冷痢及陰毒腹痛胃寒吐
 水牙齒浮熱作痛者同搗火煨治皆有效以其寒
 氣既除而病自可愈也但此止有除寒散邪之力
 非同附桂終有補火益元之妙况走氣動火陰熱
 氣薄最其所忌畢茹向陰所生性遜胡椒主治畧
 同
松脂
 松脂百斤
 香木

松脂
 松脂脂人即松木津液流於皮幹之中經久結
 成其液如脂芳香燥結內可祛風除濕去痺外可
 貼瘡長肉殺蠱殺人風濕內滯則氣血受阻故
 疥癬腫身重痺痛等症靡不因是而生得此苦以
 洩熱溫以祛風除濕則病悉愈然必蒸鍊得法始
 堪服食至云久服輕身延年雖出經解未可盡信
 其亦過為稱譽之意也乎但火實有熱者忌服
麥芽
 麥芽造釀
 味甘氣溫功尚入胃消食又味微鹹能

麥芽
 麥芽造釀
 味甘氣溫功尚入胃消食又味微鹹能
 軟堅溫主通行其生發之氣能助胃氣上行以資
 健運故能消食化穀及治一切宿食冷氣心腹脹
 滿溫中下氣除煩止霍亂消痰飲破蒸結等症然
 真火不充則精液不澆徒以溫胃之品以為殺虫
 之具王好古曰麥芽神效胃虛人宜服之以伐戊
 氣補氣白木諸藥消雖於逐堅破積偶有見效而精
 華實失腎氣先損豈胃長服之味也乎是以孕婦
 勿食恐墜胎元外臺方麥芽一升服下胎神驗
 癰中服麥芽一二兩炒煎虛者少煎防消腎水故

必雜於補劑內用則無慮耳妙用荳蔻砂仁烏梅
木瓜芍藥五味為使

大蒜

大蒜 蒜人脾胃諸病時珍曰按孫愐唐韻云張騫
而大蒜出西域始得大蒜胡荽則小蒜乃中土舊有
地故一各胡氣味辛溫開胃健脾宜散辟惡為祛
寒除濕解暑散痰消腫散毒第一要劑然寒皆因
味辛則氣可通性溫則寒可辟而諸毒諸惡諸濕
諸熱諸積諸暑莫不由此俱除矣是以書云功能
破堅化肉殺虫臭時珍曰胡蒜極草置其肉反能通五

本草求真 卷四 濕散大蒜

二九

綠圖膏

臍達諸瘵去寒濕辟邪惡消豎用此貼足則身
能止引陽用此導閉則幽明能通辛以用此敷臍
則下焦水氣能消辛能用水用此切片艾炙則毒惡
毒於臍核能起是江字府紫極宮刻石記其事云但
與皆不可不計壯數惟要痛者灸至不痛初起有
者灸之如神通而止痛數灸之類灸於亦便成熱毒
其效如神通而止痛數灸之類灸於亦便成熱毒
獨上切大不可切必得三壯一易百壯為率但頭頂
以灸至八不可切必得三壯一易百壯為率但頭頂
好肉至八不可切必得三壯一易百壯為率但頭頂
肉通於肉之裏則但其氣真多食恐能生痰

本草求真 卷四

動火散氣耗血損日昏神疲器日初食不利且多
使毛髮白時珍曰久食傷肝損眼亦忌與蜜同食
今北人嗜蒜宿病故百弊最多

薤白

薤白 薤白入肺大亦動滑藥耳故書皆載調中助陽散
血疏滯定喘安胎利產及治湯火傷損綠薤味辛
則散散則能使在上寒滯立消味苦則降降則能
使在下寒滯立下氣溫則散散則能使在中寒滯
立除體滑則通通則能使久病寒滯立解是以下

本草求真 卷四 濕散薤白

三十

綠圖膏

痢可除也四逆散加此以洩滯瘀血可散金瘡瘡
敗取辛以洩氣喘急可止是風寒喘急水腫可敷
是風寒水腫生胸痺刺痛可愈白濁用酒湯和
產可治淋而湯火及中惡卒死可救湯火傷和
方治中惡卒死用薤白通氣滑痰助陽佳品也
功用有類於薤但非則止入血行氣及補腎陽此
則當通寒滯及兼滑竅之為異耳取白用忌牛肉
黃帝云薤不可同牛
肉作羹食之成瘕

胡荽

胡荽 胡荽

三〇三

通心脾
運小脈
益精氣

胡荽心脾人辛溫香膩內通心脾小腹外行肢理達四肢散風寒及除一切不正之氣是以發熱頭痛能除穀食停滯俱消痘瘡不齊煎酒噴之即出時

白芥子辛溫

本草求真 卷四 溫散 胡荽 白芥子

除肺下
及皮膚
痰涎

白芥子肺入氣味辛溫書載能治脇下及皮裡膜外之痰非此不達古方控涎丹用之正是此義蓋辛能入肺溫能散痰在脇下皮裡膜外得此辛溫以為搜剔則內外宜通而無阻隔痰留滯之患矣是以咳嗽反胃痺木脚氣筋骨癱毒腫痛因於痰氣阻塞法當用溫用散者無不藉此以為宜

壯氣

壯氣
行氣
解毒

忌之芥菜豁痰利氣至治畧同但較此芥子力微有別
雄黃石雄黃生山之陽得氣之正味辛而苦氣溫有毒凡人陽氣虛則邪易侵陰氣勝則鬼易憑負二氣之精者能破群妖受陽氣之正者能辟幽暗故能治寒熱鼠疫惡瘡疔毒死肌疥癬諸症皆由濕熱侵於肌肉而成服此辛以散結溫以行氣辛溫相合而虫殺故能搜剔百節中風寒積聚也

本草求真 卷四 溫散 雄黃

三二

是以聖惠方之治狐惑雄黃於瓶中即止肘後方之治陰腫如斗雄黃各二兩家秘方之消瘡母急救方之治風狗咬傷聖濟之治白禿頭瘡雄黃之何一不用雄黃以為調治虞雍公允文感暑下官延坐壁間有藥方其辭云暑毒在脾濕氣連脚不泄則病不病則瘡雄黃餅和藥別作治公依方服愈至云能解蛇虺藜蘆等毒以其蛇屬陰物藜藜陰草也宗與去之瘰癧肉癖氣能治者以其一屬氣結一屬積滯也目痛能愈者以其肝得辛散之意也明徹不臭者良孕婦佩之醋浸入

藥煎汁煮乾用生山陰者名難黃功用畧同劣者名難黃燒之則臭止可煎瘡疥殺虫虱

右灰

石灰 入脾 燥壯火之烈性非溫柔味非甘緩其治亦屬肌膚骨髓瘡瘍惡毒時行熱氣刀刃金傷炸腮腫毒等症其藥止屬外敷而內竟不用及則知性氣之烈無是過也故書所言能去黑子瘰癧肉腫眉者以其火氣未散性能灼物故也書言能至疽瘍疥癩熱氣惡瘡癩疾死肌附骨疽者以其風熱

本草求真 卷四 溫散石灰

三三

毒氣浸淫於骨肉皮膚之間得此辛溫以散之也汪昂曰有人脚腫生一瘡久遂成漏百藥不效自洗覺痒即見愈也書言能蝕惡肉而生新肉者以其燥能化濕而肉自克生新之意也書言能治金瘡者以其性能堅物使不腐壞且血見灰即止之意也時珍曰石灰止血神品也但氣味辛烈其用敷治務必視症酌施如殺痔瘻等症則必用以烏頭炮等為丸敷刀斧傷則必用以牛膽以灰納於膽內陰乾點疣痣去根則必和白糖米蒸透止漏痢

本草求真 卷四

畏

崩帶陰挺則必煎水洗收造酒味酸則必投以少許即解救溺死則必用化過洗灰下視以滲其水總皆燥濕止血散血之味耳風化自裂者良瘡灰火毒已出至頑瘡膿水淋漓欬瘡尤妙

伏龍肝

伏龍肝 入脾 係竈心赤土因其色赤如肝故以肝名味辛氣溫無毒按土為萬物之母在人臟腑則以脾胃應之故萬物非土不生人身五臟六腑非脾胃不養是以上能補人脾胃伏龍肝經火久熬

本草求真 卷四 溫散伏龍肝

三四

則土味之甘已轉為辛土氣之和已轉為瀉矣凡人中氣不運則是氣是血靡不積聚為缺是痰是水靡不蔓延作祟書言欬逆反胃腫脹腹痛瘕可治者以其得此補土燥濕之謂也書言吐衄崩帶尿血遺精腸風可治者以其失血過多中氣必損得此微溫調和血脈也癰腫可消者以其辛散軟堅之意也日華子取其能催生下胞者取其溫中而鎮重下墜也錢服其土當兒頭上戴出要之皆為調中止血燥濕之劑耳研細水飛用

卷四 終

或作湯浴自然風除濕祛血活氣行而病即愈但此通頂連腦下達督脈服此最忌猪肉猪肉及風邪觸犯則遍身發出赤丹而致病益增其耳夫刺酒并蒸用

藉菘草二百

味苦而辛性寒不温故書載須蒸晒

至九於九加以酒蜜同制則濁陰之氣可除而清

香之氣始見是以至治亦止宜於肝腎風濕而見

四肢麻木筋骨冷痛腰膝無力風濕瘡瘍等症以

本草求真 卷四 藉菘草

三七

其苦能燥濕寒能除熱辛能散風故也若使並非風濕而見腰膝無力等症則又屬於血虛而不可用辛散之味矣然熟用猶可其性不甚傷正若生用不製則又令人作泄不可不知以五月五六月六七月七八月九月九採者尤佳至云服能益氣止是風濕既除之驗宋張詠表進輕身之說亦是神同膚廓之語非實詮也宋張詠進表云其草金稜銀線素莖紫葉對節而生頗同若耳臣契百服眼目清明積至丁服髮烏黑筋力輕健效驗多端夫相草留枝葉花實酒并蒸晒九次蜜九搗汁熬膏煉

本草求真 卷四

或三味收之加以酒治始可投服

夏枯草二百

辛苦微寒按書所論治功多言散結

解熱能治一切癭癧濕痺目珠夜痛等症似得以

寒清熱之義矣注昂曰按目珠屬陽故書痛點苦

寒燥反刺時珍寒則效黑珠屬陰故書痛點苦

痛及頰少邊腫痛用黃連青點之反其諸藥不效

兩下附二兩廿四錢為末每服一錢牛茶清煎

得毋自相矛盾乎評知氣雖寒而味則辛凡結得

本草求真 卷四 平散夏枯草

三八

辛則散其氣雖寒猶温故云能以補血也是以

切熱鬱肝經等症得此治無不效以其得藉解散

之力耳若屬內火治不宜用又藥何以枯名以其

冬生而夏枯也莖葉同用

青木香二百

青木香即馬兜鈴根又名土木香者是也味

辛而苦微寒無毒諸書皆言可升可降可吐可利

凡人感受惡毒而致胸膈不快則可用此上吐以

其氣辛而上達也感受風濕而晁陰氣上逆則可

三〇七

用此下降以其苦能泄熱也故肘後治蠱毒同酒
水煮服使毒從小便出矣惟虛寒切禁以其味辛
與苦泄人真氣也禿瘡癢痒可敷出精

野菊花 三百三

野菊花 肺人 一各苦蕙為外科癰腫藥也其味辛

而且苦大能散火散氣故凡癰毒疔腫癩瘰眼目
熱痛婦人瘀血等症無不得此則治以辛能散氣
若能散火者是也是以經驗方治癩瘰未破用根
煎酒熱服酒敷自消孫氏治毒方用此連根葉搗

本草求真 卷四 浮萍 浮萍 三九

爛煎酒熱服取汗以渣敷貼或用蒼耳同入或作
湯服或為末酒調自無不可衛生簡 但胃氣虛弱
切勿妄投震亨曰野菊花

浮萍 三百四

浮萍 肺人 浮於水上體輕氣浮辛寒古人謂其發
汗勝於麻黃下水捷於通草一語括盡浮萍治功
故凡風濕內溢癰瘰不舉在外而見肌膚搔癢一
身暴熱在內而見水腫不消小便不利用此疎肌
通竅俾風從外散濕從下行而難與痰其悉除矣

八廿散

至本經載長鬚髮者以毛竅利而血脈榮也風去
止消渴者以經氣和而津液復也熱去 勝酒者以
陽明通達而能去酒毒也總皆因其體浮故能散
風因其氣寒故能勝熱因其產於水上故能以水
利水耳用浮萍其背紫色為末蜜丸彈子大空心
酒服然必大實大熱方可用此若表虛自汗者其
切禁焉燒州辟蚊亦佳但氣虛切勿近此婦人有
用此辟蚊其兒
兩週耳因此即

甘菊 三百五

甘菊 肺人 生於春長於夏秀於秋得天地之清

芳時珍曰菊春生稟金精之正氣其味辛故能祛
風而明目其味甘故能保肺以滋水其味苦故能
解熱以除燥凡風熱內熾而致眼目失養翳膜遮
睛與頭痛眩暈風浮濕痺等症服此甘和輕劑平
木補金制火補水 滋腎肺衰則 俾木
平則風熄火降則熱除而病無不愈矣金水二 是
以除目翳膜有同枸杞相對蜜丸久服永無目疾
以單瓣味甘者入藥景煥收監閉談云真菊延齡
野菊泄人正如黃精益壽鈞

桂鹿安
肺浮萍
明目

本草求真 卷四 浮萍 浮萍 四十

黃入陰分白入陽分紫入血分木及枸杞

根桑根白皮為使

欬冬花濕草入按書既載辛溫純陽又載濕熱消痰

除煩定驚明目治欬逆上氣喘渴喉痺肺痿肺

雜咳吐膿血等症其藥似屬兩岐詎知所謂神陽

者因其氣味上達入陽而不入陰解且經霜雪而

秀故謂其氣純陽所謂能治咳逆者因其咳因寒

入得此溫暖以為疎滯則寒自順而下矣故能所

謂能除熱痰而嗽者亦是熱因寒入痰因熱成陰

寒而熱可清除熱亦除熱而寒自解肺為清淨之

一有外感則氣逆而不伸一有內傷則氣鬱而不

潤所以內成者宜潤而宜補故外宜於疏而宜收

最忌內則宜於滋潤而宜於火則宜於散而宜於

可以疎勞嗽帶蒸則有宜於丹皮地骨於所謂能治

肺痿肺癰咳吐膿血者亦是肺虛得此以為溫潤

故能服之即止若使血因實致則此斷屬難投况

此雖云純陽於火更不克助故辛溫之內仍有和

緩之意是以書載可為寒熱虛實通用生河北關

中者長把其偽以根揀淨花甘草水浸暴用得紫嫩

反得之連翹麻黃青箱辛杏

馬兜鈴蔓草入辛苦性寒體輕而虛熱則四開象肺

因苦則能入肺降氣因寒則能瀉熱除痰因辛則

於寒中帶散故肺熱痰喘聲音不清者服此最宜

且其體輕則性上涌故蔡要治蛇蠱毒一味濃煎

服之探吐其毒即解多作吐之至有云服馬兜鈴

能補肺陰者取其熱滯氣降而肺自安之意錢氏

用此同阿膠糯米補肺其功原在糯米阿膠耳豈

馬兜鈴之謂哉又云可治腸風痔瘻以肺與大腸

為表裡腸胃之熱本於肺臟所移肺清而腸之熱

與之俱清耳日華本草治痔瘻腫痛以馬兜鈴煎

喘嗽失音者切忌去筋膜取子用

白芨山草入味甘而辛性澀而收微寒無毒方書既

載功能入肺止血又載能治跌撲折骨湯火灼傷

三〇九

八脈

惡瘡癰腫收疽死肌得非似收不收似瀉不瀉似
止不止乎不知書言功能止血者是因性澁之謂
也而血出於鼻是由清道而血出於口是由濁道
而血出於心口由心口由肝血出於腎血出於脾
略者肺血也加者肝血也半淨半沉者心血也
白者須臾所見以幸書言能治癰腫損傷者是因
味辛能散之謂也此藥清中有散補中有破故書
又載去腐逐瘀生新至云雷因肺有白皮一事因
剖面見色猶不變雖云肺葉損壞可以復生然終
涉於荒唐未可盡信 台州獄吏劉一重囚因感
本神水煎 卷四牛散自校

皆損傷得一方用白皮末米飲日服其效如神
手足皸裂面上黑點 血跌打損傷 調湯
火灼傷 調用治亦效紫石英為使杏仁反烏
頭

楫 二部 九
楫 人辛 苦而溫 書何言其至高之氣 彼獨能
瀉使之下行 以至於極 以其味苦至降性如鐵石
之重故爾有墜下之力 且是以無堅不破 無脹不
消 無食不化 無痰不行 無水不下 無氣不除 無虫

藥

不殺 此如陰水 洗 用 無 不 開 內 參 有 川 此 故 凡
裡急後重 同木 嵐瘴癘症 如達原飲 此而水腫脚氣
酒醉不醒 無不因其苦溫 辛澁之性 以為開泄行
氣 破滯之地 耳至書所云 能使之饑 醉能使之
醒者 以其能下氣也 饑能使之飽 醒能使之醉者
以板榔必用 荷葉裝嚼 莖葉氣味 辛溫得此 能除
中外之氣 以散 癘之邪 也 檳榔 代茶 然非 瘴
之地 不可常服 恐其能洩 真氣 耳 體心尖 長勞之
作錦紋者 良 時珍曰 嚼南地 熱四時 出汗人多 黃
本神水煎 卷四牛散自校

耳朱胸 藥 檳榔 詩云 檳榔 亦為 患 未 思
藥 煎 知 有 用 若 盤 誰 能 同 疾 收 殊 效 修 真 錄 雲
功 三 氣 如 不 避 糜 爛 七 非 亦 以 其 治 疾 殺 虫 之
代 茶 之 俗 也

大腹皮 二部 子
大腹皮 夷藥

腹皮 楫 人 腸胃 時珍曰 大腹 以形 名所以 別 雞心
也 辛熱 性溫 比之 楫 榔 大有 不同 蓋 檳榔 性苦 沉
重 能泄 有形之 滯 積 腹皮 其性 輕浮 故能 散無
形之 積 滯 故痞 滿 膨脹 水氣 浮腫 脚氣 壅逆 者宜
之 惟 虛 脹 禁 用 以 其 能 泄 真 氣 也 子 似 檳榔 腹大

藥

之惟虛脹禁用以其能泄真氣也子似檳榔腹大

形扁... 取皮酒洗後以豆汁洗過晒乾根切

用... 故宜洗淨

... 眼科藥也凡眼多因風熱乘肝以致血

... 虛而目不得明故病必見上下眼胞風腫

... 赤者為實熱兩背呈露生瘡肉者為虛熱

血旺... 時取出研膏入藥

蕪荑... 味辛而苦時珍曰蕪荑有大小兩種

... 為蕪荑味辛人葉皆用大蕪荑別有種氣溫無毒功

... 專煥脾去風化食殺蠱綠虫生於人腹多因濕為

... 之兆滯為之得風為之助寒為之成直指方云嗜

... 酒人血人於酒為酒釐多氣人血人於氣為氣釐

... 虛勞人收血雜痰為血釐播頭掉尾如蟲之行上

... 於人咽下蝕人肛或附腸背或隱胸腹大則如蠶

... 小則如錢治法惟當用此煎服兼用煖胃益血理

... 中之類乃可殺之且不獨殺虫如是即其皮膚骨

... 節濕熱內入留連不解以致穉垢不清得以合其

... 辛散等藥亦能去風除濕而使氣血調和肢節安

五加皮... 今人僅知此能理脚氣而不知其脚

濕熱

氣之病因於風寒濕三氣而成風勝則筋骨為之
拘攣濕勝則筋脈為之緩縱男子陰痿濕女子
陰癢虫生小兒脚軟寒濕則血脈為之凝滯筋骨
為之疼痛而脚因爾莫行服此辛苦而溫辛則氣
順而化痰苦則堅骨骨痛而益精溫則祛風肝主
而勝濕凡肌膚之瘀血筋骨之風邪靡不因此而
治蓋濕去則骨壯風去則筋強而脚安有不理者
乎但此雖祛理脚之劑仍不免有疎泄之虞須於
此內參以滋補之藥則用之歷久而不變矣勿謂

本草求真 卷四平散五加皮 四七

有五加之說遂信竟為理脚聖藥而置金玉滿車
於不問也昔孟綽子董士固相與言云寧得一把
功良深仙家所述雖若過情蓋獎辭多溢亦常理
耳 莖青節白骨硬皮黃根黑芬香五葉者佳遠志
為使惡玄參

石南葉

石南葉 味辛而苦按辛則有發散之能苦則

其有堅腎之力若使辛苦而熱則云婦人久服思
男其理或可信矣然此止屬辛苦而性不熱則治

祛風

止可以言祛風而補陰之說亦非因昔堅腎而腎
不泄因辛散風而陰不受其燥端也解若竟以為
補陰滋水則理已病有碍而尚可云補火以思男
者乎如此惑人多若果有之則凡類於此者何莫不
為思男之品而附桂之類又將他之於何等也矣
李時珍亦明醫中人何竟附和而有是言耶誠慮
之開宜其有是也然味辛不熱不助相火亦未聞
別思男之說如不可信 出關中者多用五加皮
為使惡小菊

本草求真 卷四平散石南葉 四八

橘皮

祛風

橘皮 味辛而溫治雖尚主脾肺時珍曰
故橘皮為二經氣分藥調中快膈導痰消滯利水
破癥宜五臟理氣燥濕 氣為主潔古曰陳皮枳
殼利其氣下然同補劑則補同濕劑則濕同升劑則
升同降劑則降各隨所配而得其宜必在陳皮以
氣且同生薑則能止嘔生薑橘皮之凝是也同牛
夏則豁痰同杏仁則治大腸氣閉同桃仁則治大
腸血閉至其利氣雖有類於青皮但此氣味辛溫

九方用荷葉燒飯為丸取其以為升發脾胃之氣
 果曰素問云履端於始片則不登荷葉生於水土
 之下汚穢之中既然獨立其色青其形仰其中空
 象震卦之體食藥感此氣之化汁氣何由不升乎
 川此為引可謂遠識合道矣更以燒飯和葉與白
 木協力滋養補令胃厚東垣清震湯用此以治頭
 不致內傷其利廣矣
 而風痛等症取其以為升發風寒之具荷葉湯用
 升麻若木各聞人規用此以治痘瘡風寒外襲變
 五錢煎服
 異例勝取其以為溫肌散邪之白開人規論云痘
 寒外襲則痘閉而凝其熱不長或變黑色此為倒
 厥必身微四肢微厥但溫肌散邪則熱氣復行而
 斑自出也宜紫荷葉散治之蓋荷葉能升發陽
 氣散瘀血留癖血積毒能解結滯之氣故也此藥

本草求真 卷四 荷葉

易得而人其象証治要訣用此一味燒成單服
 以治湯水浮腫取其溫以行水之意至入脾胃須
 用其蒂謂之荷鼻取其味厚獨勝他處但服荷葉
 過多令人瘦劣非可常用試觀丹土縮銀用荷葉
 同煨而銀質頓輕於此可知其概矣

神麩 音大
 造醱
 神麩 音大 入 辛甘氣溫其物本於白麩杏仁赤小豆
 青蒿蒼耳紅蓼六味作餅蒸醇而成 造麩法以五
 六日川白麩百觔赤豆末杏仁泥青蒿蒼耳紅蓼
 汁各三升以配青龍白虎朱雀玄武騰蛇勾陳六

神通和作餅生黃 其性六味為一故能散鬱
 中濕胃化痰逐水消滯小兒補脾輕平等藥醫多
 用此以為調治 養胃九治脾胃俱虛用神麩六兩
 四兩為末水下文又改微集云神麩治目病蓋取辛
 生用能發其生氣熱用能飲其熱氣也
 不甚散甘不甚溫不見燥也然必合以補脾等
 藥並施則佳若孕婦無積及脾陰不足胃火旺者
 並勿用耳義與麥芽同也

燭甘石 音石
 燭甘石 音石 人係金銀之苗產於金銀坑中造化精
 木草求真 卷四 燭甘石

廿石受黃金白銀之氣狀如羊脂能點
 薰陶三十年方能結成
 赤銅為黃甘辛而游氣溫無毒其性專入陽明胃
 益五味惟甘為補惟溫為暢是能通和血脈故腫
 毒得此則消而血自能克止肌亦自克能生也辛
 溫能散風熱性滑能粘膜故凡目翳得此即能
 撥雲也 宜明方燭甘石青礬朴硝等分為
 治下疳陰濕並齒疎陷物者亦此義耳 燭甘石火
 次一兩孩兒茶三錢為末麻油調敷立愈又集五
 方因齒疎陷物用燭甘石煨寒水石等分為末
 用少許擦牙忌川時珍常用甘石煨飛海螵蛸
 銅刷久久自落

砂等分爲細末，硃砂依分減半，同入點諸目病皆妙。煨用童便良。

白石英 言石

白石英 味甘而辛性溫無毒。按理似非潤藥，濕藥矣。而十劑偏指此爲濕劑，謂枯則爲燥，宜用白石英。紫石英之屬，以濕之不幾令人眩惑乎。詎知書之言濕，有以濕爲濕者，有以燥爲濕者。以濕爲濕，人易知；以燥爲濕，人難明。茲而曰濕是以燥以濕，爲濕矣。濕從溫言，石、英性本辛溫，辛則能以化液。

本草求真 卷四 平散 白石英

五三 續圖

濕則能以滋潤，故雖辛若濕，始濕是以寒燥不潤之症。燥從寒字，得此辛以暢達而滯不致見枯。此十劑所以以辛以溫爲濕而言也。書曰服此可治欬逆、胸寒、消渴、陰痿、風痺、溺閉、肺痿、肺癰、吐膿、吐血等症，是亦辛溫潤肺之一驗矣。但係石類，祇可暫用。頌論乳石謂乳者陽中之陰，石者陰中之陽，故用陽生十一月後甲子服，乳石陰生五月後甲子服。石然而相反，畏惡動則爲害不淺，故乳石之比服發方治雖多而罕有濟者，誠不可輕餌也。凡服宜食冬瓜、龍葵以壓石氣，忌芥、蔓菁、蕪荑、葵、薺、芫白如、水、銀、着、良。

紫石英 言石

紫石英 即係石英之紫色者，故爾別其名曰紫。性味俱同，而紫則能直入血分，不似白石英因其色白，功尚潤肺止，就肺部之病而言之也。紫能入血治瘵，凡婦人子戶因於風寒內乘，絕孕男子寒熱咳嗽驚悸，憂魂不安，服此則能鎮魄安神，爲心、肝、經、溫、血、要藥。時珍曰：上能鎮心，重以去性也。肝藏血，其性暖而補，故心神不安，肝血不足，及女子血海虛寒不孕者，宜之。別錄言其補心氣，甄權言其養肺氣，殊味氣，但陰虛火旺者，切忌醋煨，碎陽血除營衛之別。

本草求真 卷四 平散 紫石英

五四 續圖

七次研末水飛用，畏附子、惡黃連。

續圖 言石

濕化痰，溫行血脈之品，故書載能入肝兼入肺，以治中風失音、頭風齒痛、喉痺咽腫，是皆風寒內入結而爲痰。時珍曰：續圖之病風者，也。治風化大結而爲痰，痰散結行經，所謂因其氣相感而化。意使者也。又人指甲軟薄者，用此燒爛薰之，則厚亦。是此義益厥陰陽明之藥，故又治諸血病。瘵病亦病，合薑湯調下以吐，假其辛熱之力以除風痰之害耳。仁存開關散用白石英，妙自卷半生牛燒等分爲末，每以一錢用自然薑汁調津得。

吐瀉痰立效小兒加薄荷聖藥方用白細糖三七
 枚乳香一分為末每以一錢燒烟薰入喉中涎出
 即愈王氏博濟如聖散治喉痺用白細糖天南星
 等分生研為末每服一字薑汁調灌即愈後以生
 薑炙過含之怪症力酒後咳文云能治丹毒瘰癧
 嗽用白殭茶焙研末茶服效
 亦是風與熱熾得此辛平之味拔邪外出則熱自
 解又云能治癩癧結核痰瘰血病崩中帶下亦是
 風木乘肝得此辛溫之味以行血脈則血氣安和
 而病自消又云能治小兒驚疳疔如鱗甲亦是胎
 元氣血不足得此辛鹹煎湯除垢則鱗自去疔如
 病名即是諸症以推則知古之用藥悉從物理勘

出豈有他謬奇巧於其中者哉但此非由外感而
 用是藥則非治耳頭益色白條直者良米泔浸一
 日待桑漚浮出取起焙乾拭淨肉毛口甲搗用惡
 桑螺蛸茯神茯苓梗草蘇
 鱗沙三三三
 鱗沙生
 鱗沙入肝脾即晚鱗所出之尿也阮書所著治
 功多有祛風陰濕之能所述治症多是肢節不遂
 皮膚頑痺腰膝冷痛冷血瘀血腸鳴消渴爛弦風
 眼絲蠶食而不飲其食出則氣燥燥則可以勝濕

去風凡一切皮膚等疾因於風濕而至者上症俱
 言無不得此以為調治且味辛而兼甘故比水火
 相激而見腸鳴得此甘以和之燥熱而見消渴不
 止得此辛以潤之燥滑仍屬風邪是以用此炒黃
 袋盛浸酒以去風緩不隨皮膚頑痺冠氏曰醇酒
 五斗蒸熱鋪板室席上令患冷風氣痺人以此
 處就卧厚覆取汗不愈間日再作須防昏悶此
 爛弦風眼用此油浸塗患即愈注曰目上胞
 出生強爛川新瓦火為末少加雄黃麻油調敷又
 治蛇中瘡有人食烏梢蛇身變黑漸生鱗甲見
 沙者驚縮鄭真一合日服晚蠶昔史國公用此浸酒
 沙五錢盡一二斗久之乃愈

色清以治風痺義多根此然惟晚者為良早蠶者
 不堪入藥以伺火烘故有毒也
 本草求真卷第四 第二册終

江蘇州府...



渴劑 下氣 渴濕 渴水 降痰 渴火 渴熱

之平濕果是勿水火 滲濕 渴劑 下氣 渴濕 渴水 降痰 渴火 渴熱

本草求真

卷五 渴劑

綠圖

起衝射搏學其可名狀此火之不得真陰立稿也熱

本草求真 卷五 渴劑

通草 蔓草 蔓草 蔓草 蔓草 蔓草 蔓草 蔓草 蔓草 蔓草

本草求真

卷五 渴劑

綠圖

兩頭皆通故名通草 乃古之通脫木也 須臾即今所謂木通也

人厥陰非取通草以通營衛之意乎但孕婦勿服

土茯苓

土茯苓味甘淡氣平功有等於草解治能

除濕消水去清分濁然此尤解楊梅瘡毒益楊梅

瘡多由寒瘴蘊蒸與濕熱之邪交互而成

及因方諸毒而衣風土卑寒風瘴蒸於表

其症多屬陽明胃厥陰而兼及他經若相火寄

於厥陰肌肉腐於陽明故也如兼少陰六陰則發

本草求真 卷五 瘡毒土茯苓

於咽喉兼太陽少陽發於兩角若用輕粉劫發

氣竅入經絡筋骨莫之能出變為筋骨掣痛發

結痛遂成痼疾時珍曰水銀性走而不守加以

隨大上丹從喉之液此物入門氣歸腸故凝被

開莫之能出痰涎既去血則毒氣入經絡筋骨

外川金銀花防風木通木瓜白蘚皮各五分皂莢

子四分人參當歸各七分日服三劑能健脾胃去

風濕脾胃健則營衛健風濕去則筋骨利故諸症

多愈又云此名搜風解毒湯化輕粉病深者月餘

凡仰愈忌飲茶酒肉麪醋并戒房勞百日渴飲

土茯苓湯半月方愈取其濕熱斯除而濁陰得解

矣白者良忌茶

茯苓

茯苓味甘入脾胃色白入肺味甘入脾味淡滲濕故

書皆藏上滲脾肺之濕下伐肝腎之邪其氣先升

化源後降利水凡人病因水濕而見氣逆煩滿心

下結痛呃逆嘔吐口苦舌乾水腫淋瀝憂悲驚恐

及小便或澀或多者諸病皆從水而生服此特能有效

本草求真 卷五 瘡毒茯苓

故治亦從故入四君則佐參苓以滲脾家之濕入

六味則使澤瀉以行腎邪之條最為利水除濕要

藥書曰健脾即水去而脾自健之謂也又曰定魄

魄自開安有癡閉之慮乎水去則內濕已消安有小

便多見之謂乎故水去則胸膈自寬而結痛煩滿

不作水去則津液自生而口苦舌乾悉去故效亦

而見惟水衰精滑小便不禁非由水濕致者切忌

恐其走表洩氣故耳苓有赤白之外赤入小腸白

入胃

入膀胱白微有補赤則止瀉濕熱一氣一血自不
容混如此至皮專治水腫膚脹以皮行皮之義
而煩渴便閉赤屬陽水有五皮散疏鑿飲不煩
渴人便溺小便數不赤澀屬陰水宜實脾飲疏利
飲腰以上腫宜汗腰以下腫者宜利小便以大塊堅白者良係松根
成惡白斂異地榆秦芫梔甲雄黃忌醋

扶神 音芝 寓木

扶神 音芝 寓木 功與茯苓無異但神抱心以生苓則不
從心抱故苓能入脾與腎而神則多入心耳書
曰服此開心益智安魂肝藏魂肺藏魄無非人心

本草求真 卷五 扶神

導其痰濕故能使心與腎交通之謂耳解的心木膏

名黃松節味苦性溫能治諸筋攀縮偏風鳴絆心

擊健忘江昂曰方用心木一兩乳香一錢石器炒

筋攀疼乳香能伸亦是人血滲濕之意取苓有

心者是注昂曰以其抱去皮及中木用

鯉魚 音其八 魚

鯉魚 音其八 魚 氣味甘平每於急流之水跳躍而下是
鯉已存治水之功且甘能入脾故書載能下氣利
水凡因水氣內停而見欬氣上逆黃疸水腫脚氣

利水

等症服此則能以消河澗云鯉之治水因其氣以
相感猶鷺之 是以外臺秘要用赤小豆一升水二
升煮作三升餘搗去渣頓盡服利盡即愈又治
孕婦水腫亦效然性稟六陰陽氣初生故為陰 故
多食則能動風發熱也鯉鱗燒灰存性可治產後
血滯鯉骨燒灰可療魚骨哽

本草求真 卷五 鯉魚

本草求真 卷五 第一冊終

本草求真卷五

社生醫官敬校訂
社生醫官敬校訂
社生醫官敬校訂

濕濕平濕與濕受濕不潤多其藥既須甘淡以須
 不燥以濕者受濕始從熱解故曰濕熱黑車須
 其膜如濕則在肺但宜用杏仁黑車牛車前
 子黃芩白微之類但宜用杏仁黑車牛車前
 熱淋黑車牛車前則治來氣腫則小治便移黃芩
 寒閉濕邪白微則治來氣腫則小治便移黃芩
 勝如濕邪白微則治來氣腫則小治便移黃芩
 耳如濕邪白微則治來氣腫則小治便移黃芩
 不寒白微則治來氣腫則小治便移黃芩
 不調白微則治來氣腫則小治便移黃芩

伏熱鬼症備極熱毒白礬則能酸收漏吐逐熱去
 未寒水石則能解熱利水之有別耳如濕在胃
 胃參則除濕熱反胃之類除濕熱反胃之類
 苦皮則除濕熱反胃之類除濕熱反胃之類
 用燈草黃連木通通則治來氣腫則小治便移黃芩
 熱水閉通則治來氣腫則小治便移黃芩
 水脹不消苦練子治來氣腫則小治便移黃芩
 分耳苦在苦練子治來氣腫則小治便移黃芩
 以除之消苦練子治來氣腫則小治便移黃芩
 則有赤之消苦練子治來氣腫則小治便移黃芩
 有防已消苦練子治來氣腫則小治便移黃芩
 類數則消苦練子治來氣腫則小治便移黃芩
 治之消苦練子治來氣腫則小治便移黃芩
 滑石消苦練子治來氣腫則小治便移黃芩
 宜於消苦練子治來氣腫則小治便移黃芩
 矣症消苦練子治來氣腫則小治便移黃芩

參之能入腎除濕又自可見肝有邪濕症見驚悸
 夜有宜於草薛矣而遠翹珍珠琥珀之能入肝除
 濕又自可推凡此皆屬濕熱之劑也至於水勢測
 在似不必於此項發云

澤瀉味甘淡微寒能入膀胱氣分以瀉腎經
 火邪功肅利水除濕故五苓散用此以除濕熱
 景治傷寒有大小澤瀉湯五苓散皆用澤瀉
 利停水為最要藥又治水蓄渴煩小便不利或吐
 或瀉五苓散主之方用八味丸用此以瀉腎經
 澤瀉故知長於行水用茯苓澤瀉者乃取其瀉
 火時珍曰地黃引也古人用補藥必兼瀉邪去
 之邪氣非接引也

本草求真 卷五 瀉濕瀉瀉

則補藥得力所以久服必能補力
 山朱之收地之濕補腎之功
 為古和相濟以成補之功
 具或五味今冬或杜仲牛膝之功
 補藥而止今冬或杜仲牛膝之功
 而六味之意加人或有補之功
 近世味師之功反退補之功
 之誤也師之功反退補之功
 瀉補陰功同於地黃之列哉第其濕熱不除則病
 症莫測故有消渴嘔吐痰飲腫脹脚氣陰汗尿血
 洩精種種等症諸症皆因用此甘淡微鹹以為滲

泄精洩安可利因於濕則濁氣既降而清氣上
行故有耳鳴所謂一除而百病與之俱除也但小
便過利則腎水愈虛而目必昏招垢故明目小便
利腎氣虛此一定之理耳鹽水炒或酒拌忌鐵
木通言平

木通今入心兼人小腸古名通草甘淡輕虛據書
開載治效甚多然定不外清火通竅利水數端而
已緣人一身上下外無風寒暑濕六淫鬱而為熱
內無火氣薰蒸則水道順暢一身安養上自咽喉

本草求真 卷五 濕熱水通

以迄心胸下自大腹以迄二便而無腸結不通之
弊矣東垣曰凡入肺受熱邪津液氣化之源絕
源則泉水漸流源絕則膀胱受濕熱癰閉約束則
小便不通為濕熱朱二尤曰火在上則口燥眼赤鼻
乾在中則心煩嘔噦在下則淋閉足腫木通廉細
有北兩頭皆通體輕質浮味淡氣滲能瀉君火火
退則小便自利相表裏小腸便利則諸經火邪皆從
心水而下降矣是以行經下乳火不內亢則破血
除蒸熱除則血破止煩住痛心熱清則排膿生肌

必熱除則氣血開關利節行故關節亦通流非凡
得黃而肌肉生開關利節行故關節亦通流非凡
因於濕熱而成者無不藉此以為開導此雖類澤
瀉同為滲利但君火動則宜木通相火動則宜澤
瀉也惟神氣虧損汗多外出及虛弱孕婦者切忌
以性通利故耳

車前子 性平 味甘 鹹性寒 據書皆載能治膀胱濕熱
以通水道然余謂膀胱之清由於肝肺之肅凡人
濕利暴作小水不通並濕痺五淋暑熱瀉痢難產

本草求真 卷五 濕熱車前子

目赤雖有膀胱水涸不能化陽然亦有由肝肺兼
受風熱以致水不克生故須用此以清肝肺兼
下降以清水道聖惠方風熱目睛用車前子宜州
景隆九治肝腎俱虛名一錢為末食後溫服效
源久服補肝腎增口力車前子熟地黃酒蒸三兩
葉絲子酒浸五兩蜜丸時珍曰服此治目須佐他
藥如六一味地黃丸之用澤瀉也若單用則走泄
過恐非久服之物又歐陽公常得藥下病國醫不
能治夫人買市人藥一帖進之而愈方即其方則
市前子一味為市人藥一帖進之而愈方即其方則
而不動氣水道利則濁濁分各藏自止矣利水是
五子衍宗丸同此以為四子之佐杞菟絲各八兩
五味覆盆各四兩車前二兩金匱腎氣丸用此以

為諸藥之助且此肝肺既清風熱悉去則肺不受熱而化源有自肝不被風而疎泄如常精與溺二竅本不相兼水得氣而通精得火而泄故水去而火益盛精盛而氣益固所謂服此令人有子明醫云服此藥日久則及涉利而不走氣西此張氏所製此行房即有子及涉利而不走氣利勝於水而真愈則熱去而日自明也與茯苓同功者正謂此也但氣虛下陷腎氣虛脫切勿服耳酒蒸搗餅焙研用

燈草

本草求真 卷五 海藥 前子 燈草

燈草 味甘而寒體小氣微諸書皆稱能降心火以其心治心也心火清則肺金肅故書曰心與小腸相表裏則熱盡從小便而出矣且熱去而血亦寧故能止血通淋洵上焦伏熱五淋之聖藥也五淋有氣血之分燈草可治痰瘰一方燈草二錢沙青等石之分燈草可治痰瘰末一錢次一方燈草兼紅花燒灰酒服及以灰塗乳上則見飼不夜啼縛把擦瘰則蟲從草出淨水可見且能斷根矣氣虛小便不禁者忌服

扁蓄

燈草

巨菹 味甘氣平功能利水消熱除濕殺蟲是以小兒蚊病女子陰蝕浸淫瘰癧疔毒諸病無不藉此以為主治耳仙上散云心頭急痛不能當我則便安其以其味苦則熱泄味苦則蟲伏但此止屬標治不能益人勿常用也葉細如竹筴莖引便節有粉三月開細紅花

草薺

草薺 味甘入味苦氣平功能祛風除濕因腎厄人大便燥結小便頻數辨於便時痛不可忍者此必大

本草求真 卷五 海藥 前子 燈草

便熱閉積熱瀉等物同液乘虛入小腸故於便時即作痛也如子建為命方云凡大小便時加此必先大便熱不運水被以此小腸痛也此水因食酒色積有餘毒物瘀血之類而痛與此水同痛者不同也宜用草薺一兩煎水炒為末每服二錢使水道轉入大便仍以此藥小兒便數及痛自除也且水過不清則濕熱不除而肝火愈熾筋骨愈疼草薺氣味苦平既能入肝祛風之功長於去風燥所以能治瘰癧疔毒諸惡疾諸病之復能引水歸入大腸以通殺道即水

液澄清而無痛苦之患矣。又安有痲痛腰冷膀胱

宿水與陰痿失溺痔漏惡瘡之累乎昔人云既有

逐水之功復有燥精之力濕熱除則精洵不誣耳

菝葜土茯苓與車蘼相類而功用不遠白虛軟

者良葶苈為使畏大黃柴胡前胡忌茗醋細長

白接骨根作塊赤黃

海金沙入味甘而淡氣寒無毒為主通利小腸

血分要藥凡小腸熱閉而見五淋赤痛不止者服

之使熱盡從小便而出且於傷寒熱閉而見腹滿

狂燥則當於此加梔子朴硝蓬砂投治俾熱亦從

小便而出此壯裏抽薪之一義也但腎臟真陽不

足切忌淘淨取浮者晒乾燃之不沾指者真忌火

防已入辛苦大寒性險而健善走下行長於除

濕通竅利道能瀉下焦血分濕熱及療風水要藥

某曰本草十劑云瀉可去滯通草防已之屬是也

去防已大苦寒能瀉血中濕熱通其滯塞亦能瀉

六便補陰瀉陽比之於人則險而健者也非故

六劑能首為瀉劑然常用之亦可散兇穴險

本草求真 卷五

元水濕喘嗽熱氣諸痛濕痹脚氣小腫風腫癰腫

惡瘡及濕熱流人十二經以致二陰不通者皆可

用此調治若屬脚氣腫痛濕則腫如濕則加蒼朮

薏苡木瓜熱加黃芩黃蘗風加羌活草薢癩加竹

瀝南星痛加香附木香血虛加四物大便秘加桃

仁紅花小便秘加牛膝澤瀉痛連臂加桂枝威靈

仙痛連脇加鱉草隨症通活斯為善矣但此氣味

苦寒藥力猛迅若非下焦血分實熱實濕木通甘

分濕熱防已苦及非二便果不通利妄用此藥投

治其失匪輕不可不知此雖有類黃蘗地膚子但

黃蘗之瀉膀胱濕熱則非入腎瀉火味苦而不辛

此則辛苦兼見性險而健故於風水脚氣等症兼

理地膚子之瀉膀胱濕熱味苦而甘力稍遜於黃

蘗此則健險異常有幸無甘而為亂階之首也其

一瀉熱與濕而氣味怡功各別如此已有二種曰

漢口木治風須用木防已治水須用漢防已漢已

根大而虛通心有花紋色黃木已黑點黃歷木瀉

酒洗用惡細辛畏草薢

本草求真 卷五

三四三

茵陳

茵陳人勝味苦微寒諸書皆言濕熱伏於陽明
胃用此以人太陽膀胱發汗利水伸太陽陽明濕
熱之邪盡得於藥而解矣且治傷寒時疫狂熱癰
疔頭痛頭旋女人疝瘕亦是濕熱為病但黃原在
陰陽寒熱之分陽黃者申熱蘊於脾上如茵陳於
大旱則茵必燥而黃是茵因燥而黃者也太濕則
茵必濕而黃是茵因濕而黃者也熱為陽藥為陰
故黃亦以陰陽分也陽黃身如橘色汗如柏汁是
其黃黃而色晦當細辨別是

水

水其 卷五 五 日 茵陳 十五

以仲景立有茵陳蒿湯施子藥皮湯麻黃連翹湯
小豆湯以治陽黃之症又立茵陳附子湯以治
黃之症茵陳治黃極劑在人審其所因而附治其
若蓄血發黃則治不在茵陳之列以茵陳本屬氣
分藥也於血則不能治矣茵陳本有二種葉細而
青蒿者可用若生子如鈴則為山茵陳矣附於後
蠱及治口瘡

地膚子

地膚子人勝治淋利水清熱功頗類於黃蘗但

藥其味苦烈此則味苦而甘黃蘗大海膀胱濕熱
此則其力稍遜此小便因熱而見頻數及或不禁
用此苦以大陰寒以勝熱而使濕熱盡從小便而
出也類數既調之熱則不禁當不得以熱名然不
禁亦自因於膀胱邪火妄切而致者但類數
出於膀胱則為陽火偏勝用以實治則可出
於心火偏旺而熱得恣固常用以清利若不佐
以補味同大則小水既利而血益虛血虛則熱益
生熱生而淋其益甚矣故宜佐以牡蠣山藥五味
收清之劑俾清者清補者補通者通清者清滋潤

條達而無偏勝為害之弊矣且能以治因熱癰疔
並煎湯以治瘡疥至書所謂益精強陰非是具其
補益之能不過因其熱除而即具有堅強之意耳
類數既調而多發者加地膚子甘草

水 卷五 五 日 地膚子 十六

白蘞皮

白蘞皮人勝味苦與鹹性寒無毒益陽明目土喜
燥惡濕一有邪人則陽破鬱不伸而熱生矣有熱
自必有濕濕滯則熱益盛而風更乘熱至相依為
害以致關節不通九竅不利見為風瘡疥癬毛脫

地

痲黃濕痺便結溺閉陰腫欬逆狂叫飲水種種等
症熱以論治宜用此苦泄寒鹹之味以為開
通發汗水行熱除風息而症自克平已後治痲
用白蘧皮黃汁服一升當吐若鼠子也又除濕
帶產後中風人虛小可服此藥者一物白蘧皮湯
服奈世不察假以此為粉粉之外用其亦未遠本
經主治之意耳然此止可施於脾胃堅實之人若
使黃濁虛寒切勿妄用根黃白而心實者取皮
用惡桑螵蛸扶苓栝栲草藤

苦參 言卑
山草

苦參 人解胃 味苦至極古書有云雖在五參之
外人參沙參紫參參亦屬有補然究止屬除濕
熱之品於補其益濟焉補按五參除人參外
味惟甘為正惟濕為補苦參味等黃藥寒類大莖
陰似朴硝的號為極苦極寒用此殺蟲除風逐水
去積掃疥治癰開通道清刺解毒或云有益若
謂於腎有補縱書立有是說亦不通從濕除熱祛
之後而言豈真補陰益腎之謂哉况有用此擦于
而更見有腰痠傷腎之症其可謂之補腎者乎

琥珀 言卑
高木
琥珀 入小腸腎 甘淡性平 成於陽 生於陰 而
為使惡貝母菟絲子漏蘆反藜蘆

而或按昔雖曰脂入土而成實合以鎮墜等藥
能安魂定魄色赤能入心肝二經血分合以辛
等藥則能消痰破癥生肌合口其味甘淡上行合
以滲利等藥則能治淋通便燥脾補土經曰飲食
精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調且能明
水道下輸於腎凡滲藥皆上行而後下降且能明
目退翳之效退翳逐鬼殺魅即安魂謂是水去熱陰
安鎮之意但此性屬清磨則於真氣無補氣屬滲
利則於本源有耗此惟水盛火衰者用之得宜若
使火盛水涸用之不能無虞血衰而小便不利者

者反致燥 松脂入土年久結成或楓脂結成以摩
熱拾芥者其 市人多養雞子及青魚胆偶之用稍
子仁末入瓦鍋同煮半日搗末用

猪苓

猪苓 味甘淡微苦性平無毒得楓根之餘氣
以成形如猪屎故以猪名凡四苓五苓等方並皆

用此 仲景用茯苓澤瀉白朮與桂枝各五苓散為治
氣以化則能利方中用以肉桂辛熱所以化其氣也除
後日五苓散為濁而小便不利者設若不潤性雖有
則茯苓甘草足矣若如淋則四苓足矣

類澤瀉同入膀胱腎經解熱除濕行氣利水然水
清則脾必燥水盡則氣必走澤瀉雖同利水性亦
類燥然鹹性居多尚有潤存澤瀉治火性亦損氣
然潤能滋陰尚有補在故諸必合澤瀉以同用則
潤燥適均而無偏勝之患矣至於茯苓雖屬滲劑
有濕自可以去然茯苓入氣而上行此則入血而
下降且與降濕利水消腫治癰止痛等藥皆屬暑
邪濕熱內閉無不藉此以為宣導之需 若多由是
古人已云清利小便無若此賦以故破陰藥皆止

有澤瀉而不川及猪苓正謂此可謂六味丸有但
此可謂引水津液易耗久服多致損目凡服利水
水藥而失明者因其走泄真氣也白而實者夏去
皮用

赤小豆

赤小豆 味甘酸色赤心之穀也其性下行入陰
通小腸而利有形之病故與桑白皮同為利水除
濕之劑 皮赤小豆 是以前以水氣內停而
見滿閉腹腫手足身重等症非此莫治 朱氏

赤小豆 味甘酸色赤心之穀也其性下行入陰
通小腸而利有形之病故與桑白皮同為利水除
濕之劑 皮赤小豆 是以前以水氣內停而
見滿閉腹腫手足身重等症非此莫治 朱氏
方書朱氏在東晉時得此藥命道十餘年治
後世得此藥者多矣朱氏之而愈中貴人任亮
亮曰得此藥者多矣朱氏之而愈中貴人任亮
勿復言有性最粘如小豆即解其用此治之
人下乳 藥無效偶用赤小豆一升煮粥食之
行五十劑取此為燥亦以水行而燥自生之意
非因其藥性本燥而言也故書又戒多服則令人
津液枯槁而燥取緊小而赤黯色者良 若牛馬
子非赤 小豆也

滑石 音石

滑石 勝入 何以滑名因其性滑而名之也滑石味
甘氣寒色白服則能以清熱降火通竅利便生津
止渴為足太陽膀胱經藥故凡中暑積熱嘔吐煩
渴黃疸水腫脚氣淋閉水熱瀉痢吐血動血諸症
煎膏乳汁不通胎產難下服此皆能蕩熱除濕通
汁滑胎 六一散 然其開竅利濕不獨盡由小便
而下蓋能上開腠理而發表 肺所生 是除上中之
濕熱下利便溺而行是除中下之濕熱熱去則三

焦寧而表裏安濕去則關門通而陰陽利矣 河

益元散 六一散 用此通治上下表裏諸病其虛

在此滑石既屬滲利如何又言止渴因其濕熱既
滲則脾胃中和而渴自止耳故書又載能理脾胃

義亦由此白而潤者良石韋為使宜甘草 江易云

之劑宜用

石燕 音燕

石燕 前入脾胃 味甘氣寒出於祈陽西北江畔
上其形似蚪而小與堅不同功皆利竅除濕解熱

故凡口弊不閉熱淋不利婦人難產等症治當用

此無有不效 必審諸病果因 但書所云難產令婦

兩手各握一枚其胎即下合之於理似屬詭妄未

可盡信 唐汁服 中出胎兩飛胎者 詳

刺蝟皮 音蝟

刺蝟皮 勝入 其皮如刺因以刺名其獸屬胃而入

胃因以刺號 功 其字從蟲從胃深有理焉 何書

載治五痔陰蝕以其濕熱下注得此味辛入腸金

屑大腸故能以破其血耳何書又載能治腹膈反

胃 善治 反胃用刺蝟皮燒灰酒 以蝟屬獸兼味辛

苦故能散邪泄熱使其胃氣調和而不上逆故耳

但食肉切宜除骨若誤食則令人瘦劣節節漸小

也似鼠而圓火弱色攢毛外刺如栗房煨黑存性

用

本草求真卷五 第三州

江西廣濟府江寧縣 醫學博士 吳其濬 撰

濕水 濕水者因其水勢急迫有非甘淡所可滲者
辛燥所可濕正如洪水橫流以爲次則水始死
此濕水之說所由起也然水在人則如大戟花
即人用藥以治水之勢也然水在人則如大戟花
甘遂同爲治水之藥然水在人則如大戟花
花則通裏外水道其花則爲人則如大戟花
新則合肺中水氣以爲治水之藥然水在人則如大戟花
爲治也商陸入脾行水功用不減大戟花
熱散結軟堅故療癰疽疔瘻道閉塞其必用之
本 草 求 真 卷 五 第 三 州

大戟 性急而毒故能消水拔毒出燥性寒至陰故能
利水以消脹積隨子有下氣之逆凡積聚滿
滯服之立皆有功效其有和利水道通泰之能故於
水腫虛身日弱用之自爲有功至於瀉海心宿
毒而肺非利水最妙然體虛氣弱用亦增
害本可視爲利水淺劑而不審實以爲用也

大戟 入肺腎氣味苦寒性寒純陽峻利居首上
瀉肺氣下泄腎水兼因味辛勞行經脈無處不到
浸水色綠又入肝膽故書皆能治十二水毒
結腹滿急痛等症 好古曰大戟與甘遂同爲泄
時珍云凡痰涎爲物隨氣升降無處不入於心

則注痰而頸痛入於肺則痰塞而成欬唾稠粘
急背冷入於肝則留伏蓄聚而成脇痛乾嘔寒熱
往來入於經絡則癱痺疼痛入於筋骨則頸項
背腰手足牽引墜痛三因並以控涎丹主之益
有大戟能泄臟腑之水濕甘遂能行經脈之水濕
白芥子能散皮裏膜外之痰氣要必實証真熱實
脈方可以用非實則濕肺傷腎害人不淺時
思按白芥子用大戟一味百祥則濕肺正實則濕
其子也腎邪實而濕其肝也淫白芥子治痰變
歸腎症用宜風散代百祥亦非白芥子之意蓋
勝火燥則水益潤風散火焚則土受虧故脾血內

大戟 不能化膿而成黃黑乾陷之症 若中其毒者惟
其共風火之毒所以救腎扶脾也 若中其毒者惟
菖蒲可解抗產色紫者其北產色白者不堪入藥
水漿煮去骨用得大戟則不損脾畏菖蒲反甘草
苗名澤漆亦行水道生治畧同

大戟 入肺腎氣味苦寒性寒純陽峻利居首上
瀉肺氣下泄腎水兼因味辛勞行經脈無處不到
浸水色綠又入肝膽故書皆能治十二水毒
結腹滿急痛等症 好古曰大戟與甘遂同爲泄
時珍云凡痰涎爲物隨氣升降無處不入於心

多寒之有異耳此雖取效甚捷誤用多致天拆不
 泄臟腑水濕芫花與此氣味雖屬相同而性較此
 則腹不似甘遂苦寒止泄經隧水濕大戟苦寒止
 肺則咳在胃則嘔在頭則眩在心則悸在背則冷
 右脈不似甘遂苦寒止泄經隧水濕大戟苦寒止
 沉重注瀉或作水氣肺腫又水有風水皮水正水
 滿或注瀉或作水氣肺腫又水有風水皮水正水
 盆兩流於心下則為伏飲令人胸膈吐水膈支
 熱吐沫背寒流於肺則為懸飲令人咳唾引飲
 氣鬱蓄而為留飲流於胸則為支飲令人喘咳寒
 之異李時珍云夫飲有五皆由內傷水漿外受濕
 殆甚者用此毒性至緊無不立應飲有痰飲懸飲

本草求真 卷五 瀉水芫花 二五

可不慎根多蜀桑止可敷瘡毒為及搗汁浸線繫
 落痔瘻他不宜用葉似柳花紫碧色葉生花落陳
 久者良醋煮過水浸暴用反甘草葉可搗傷
 芫花音莞
 芫花音莞人雖與芫花形色相同而究絕不相似蓋
 芫花葉尖如柳花紫似荆芫花苗莖無刺花細色
 黃至其性味芫花辛苦而溫此則辛苦而寒若論
 主治則芫花辛溫多有達表行水之力此則氣寒
 多有人裏走泄之效故書載能治利宗真曰張仲

本草求真 卷五

但藥肆混收亦可見效以其主治差同故耳
 甘遂音遂 肺腎膀胱皮赤肉白味苦氣寒有毒其性純
 陰故書皆載能於腎經及或隊道水氣所結之處
 奔湧直決使之盡從穀道而出為下水濕第一要
 藥景大附 藥元素曰水結胸中非此不能除故仲喻嘉言曰
 胃為水穀之海五臟六腑之源脾不散胃之水精

本草求真 卷五 瀉水芫花 甘遂 二六

於肺而病於中肺不能通胃之水道於膀胱而病
 於上腎不能司胃之關時其膏泄而病於下以致
 積水浸淫無所底止水腫有風水皮水正水
 氣短臥不克安 水腫引少腹水腫則於胸膈
 則腫下流滿引少腹水腫則於胸膈
 重不能衣水腫引少腹水腫則於胸膈
 水腫引少腹水腫則於胸膈
 不速每自下而上 水腫引少腹水腫則於胸膈
 黃其皮不自下而上 水腫引少腹水腫則於胸膈
 身痛或及臍腹 水腫引少腹水腫則於胸膈
 主而內傷按則臍腹 水腫引少腹水腫則於胸膈
 虛則水無所主而妄行 水腫引少腹水腫則於胸膈
 利水終引水歸腎之理 水腫引少腹水腫則於胸膈
 必得和氣引水歸腎之理 水腫引少腹水腫則於胸膈

三二九

矣故凡因實邪元氣壯實必壯實方可而致隨道
阻塞見為水腫蠱脹疝瘕腹痛無不仗此迅利以
為開決水道之首如仲景大陷胸湯之類然非症
屬有餘祗因中氣衰弱小便不通水液妄行脾莫
能制誤用泄之之品益虛其虛水雖暫去大命必
隨甘草書言與此相反何以二物同用而功偏見
亦以甘行而下益急又按劉河間三凡水腫脹藥
去二物相反而感應如此非深於斯道者未易
語此皮亦肉白根作連珠重實者良麩麥煨熟用

本草求真 卷五 瀉水 白甘遂 二七
綠園齋

用甘草齊煎汁浸三日其水瓜蒂為使惡遠志
如墨以清為度再麵煨燥
商陸 味甘 辛 酸 苦 寒 有毒 功入脾行水其性下
行最峻有排山倒海之治功與大戟芫花甘遂相
同故凡水腫水脹瘰癧腫喉痺不通濕熱蠱毒
惡瘡等症服此即能見效身面俱腫者俱治
若只單腹脹則難治過身俱腫者俱治
有見單腹脹則難治過身俱腫者俱治
時卑卑腹脹則難治過身俱腫者俱治
安敢用乎明乎此則有培養一法是也則
有拾納一法宜而互製是也則有解散一法

天冠水
運下行

門結淨府是也凡腫脹則必傷腎則足
必平偽肺則背背其後則必死如仲景
四散者可治先起四肢後歸於腹者必死
壯礪澤瀉散之用商陸以治大病後腰以下腫用
此悉迫以散之也若脾虛水腫因服輕劑未愈遂
用苦芳有毒純陰之藥迅迫效雖和見未幾即發
决不可救取花白者良赤者只堪貼臍入臍三分
利則腫消蓋讀曰去讀云其味酸辛其形黑豆湯
煎人煎水貼臍其效如神斯言盡之矣

本草求真 卷五 瀉水 白甘遂 二七
綠園齋

海藻 前人書載性反甘草能治項頸一切瘰癧瘰
瘕疝疔腹痛日病及痰飲脚氣水腫等症其故蓋
似蓋結苦能洩結寒能除熱鹹能軟堅海藻氣味
俱備與甘草木屬不合凡其水因熱成而致墜道
閉塞小便不通硬結不解者用此堅軟結泄邪退
熱解使熱盡從小便而出而病自無不愈也丹溪
氣初起用海藻一兩黃連二兩至有病非實結最
為未時時能咽先斷一切厚味至有病非實結最
不宜用非獨海藻為然即凡海中諸藥無不如是
海帶似海藻而粗柔勒而長主治無異昆布亦

本草求真 卷五 瀉水 白甘遂 二七
綠園齋

同海藻海帶俱性帶滑且雄凡瘰癧如石者非此
不除且其下氣最速久服多令人瘦至云海島人
常食以其水土不同故耳皆反甘草畧洗去鹹水
用備有同甘草以治癰瘰益激之以瀉其耳

葶藶

葶藶

葶藶入肺辛苦大寒性急不減硝黃大瀉肺中
水氣肺急下行勝肌故凡積聚癥結伏留熱氣水
腫痰壅嗽喘經閉便塞至極等症諸症皆就水
不當用此調昔本草十劑篇云洩可去閉葶藶大

本草求真

卷五 葶藶

二十九

葶藶

黃之屬但大黃則瀉脾胃陰分血閉葶藶則瀉肺
經陽分氣閉葶藶有苦有甜甜者性緩雖濕而不
傷苦者性急無濕肺而復傷胃故必用以大棗補
土以制水但去則止不可過劑觀金匱所云用
葶藶以治頭暈藥氣入腦殺人其意大可知矣子
知黍米微長色黃糯米微妙用得酒良榆皮為使
榆皮性亦利水

白前

白前

白前入肺甘辛微溫為降氣祛風除痰要藥緣人

葶藶

氣實則痰壅痰壅則風作風與痰氣膠固則肺
而不寧而有喘嗽喘從體腫之病矣非不用此以
泄肺中實痰風邪則氣易降而嗽易止是以金匱
用以治咳嗽脈沉深師白前湯用此以治久咳上
氣寒解方體腫氣脹滿者夜倚壁不得卧者作
三兩大戟七合葶藶皆取降肺除痰之意非若白
微氣味鹹寒泄肺胃燥熱細辛辛熱泄腎中
寒邪也此惟實者用之虛者不宜用耳似牛膝粗
長堅直易斷者良若短小柔軟能彎者是白微去

本草求真

卷五

葶藶

二十九

葶藶

頭鬚甘草水浸一晝夜焙用忌羊肉白前出地前
同類以此辨之
續隨子葶藶
續隨子入即世所名千金子者是也味辛氣溫
有毒諸毒皆截下氣最速時珍曰續隨子大戟
長於利水惟在煎之凡積聚脹滿痰飲諸滯等症
得法亦皆要藥也
服之最宜以其以痰攻毒故也氣味形質功用類
有類於大戟澤漆言遂故書亦載此屬劫伐之味
若脾胃虛寒泄瀉服之必死黑子癰贅用此搗

葶藶

時塗之自落或以黃線繫病時葉之漸脫去取
色白膠去油用

紫貝

雞交人小腸味苦性寒功補瀉心利水故書載

利小便決腫疔去癰閉拔肉刺下胎產除目翳然

其氣稟純陽必其小腸氣厚服此疏泄之味病始

克除淋症有虛有實如淋果屬熱致其淋不可

如石脈下妨悶煩燥熱渴六脈沉微有力而為屬

然如其在中不痛痛喜手按或於弱後能痛積久

食少思語言懶怯六脈虛弱無力是為屬虛

使小腸素虛經云心屬有熱不推其熱不除則虛

而益虛必致變生他症矣娠妊產後小便利及

脾虛水腫均宜禁焉惡燥燥

石韋

石韋肺入苦甘微寒功補清肺行水凡水道不行

化源不清以致水道益閉化源不清則石韋莫延

石上生葉如皮味苦氣寒若則氣行而金肅寒則

熱除而水利是以勞力傷津伏有熱邪而見小便

不通及忠背凝等症治常用此調治仰肺肅而

通亦淋除而毒去去梗及黃毛微炙用生於左

上名无草亦治淋

紫貝

紫貝肝人即貝子之色赤者也味鹹氣平其物出

於雲南白入氣紫入血紫而功補利水通道逐

蠱下血凡人症患脚氣小兒斑疹目睛五瘡水腫

瘰癧鬼性用此的能解除蓋因鹹有軟堅之力脚

症濕熱用此得以透骨逐邪其骨堅硬和以諸藥

使其蒸蒸作汗次第而解也目翳用此粉點亦以

本草求真 卷五 海水石韋紫貝

能除濕熱而使血得上營但與貝子相類甚多如

砂礫之類皆能相混分別用之項曰貝類極多

其尤貴後世不用貝子背深紫有黑點者良生研

細末用

田螺

田螺肺入味甘大寒難於水田性寒至陰故能

引熱下行凡人目患赤痛只取田螺以珍珠末黃

連末納入裏久取汁點目神效以寒能除熱也且

治喉口疔疾用活大田螺二枚搗爛入麝香三分

作餅烘熟貼臍間半日熱氣下行即思食矣至治
 熊彥 小便腹脹如鼓只取田螺一枚鹽進速殺搗
 碎敷臍下一寸三分即通并能止渴醒酒以除餘
 熱此雖止屬外治亦見其性引下行之力耳

蝮蛇
化生

蝮蛇 入氣味寒鹹而居性甚奇特書言將此分
 為上下左右四截若以上截治腫則腫即見上消
 下截治腫則腫即見下消左截治腫則腫即見左
 消右截治腫則腫即見右消又截自腰以上以治

本草求真 卷五 蝮蛇

則能拔水上行而使二便皆清自腰以下以治則
 能使便立下弘景曰自腰以下甚能止大小便
 人難產亦可照此以治而產即解癰腫癩瘰癧肉刺
 若生搗汁以塗則刺與腫皆消骨硬入喉不下未
 吹即能見愈外此備猴入內用此塗貼患處則箭
 即克見拔又牙齦疼痛用土狗一個將精暴定
 其治效總因性善攻穴其性急迫故能如此取效
 世類曰今方家治石淋導水用蝮蛇七個鹽二兩
 味鹹氣寒作名土狗凡用此藥宜審其體質方可

本草求真 卷五

切取者使體虛氣薄但見青載治功任意安施其
 不傷人性命者鮮矣朱震亨曰蝮蛇治水其此與
 草薺子等藥同為一類用時須當細審取雄或云
 燒地赤並燒於上任其去翅足炒用

本草求真 卷五 蝮蛇

本草求真卷五第第四册

降痰之見病甚多痰之立治不少如痰之在肺者宜直降之在胃者宜直降之在脾者宜直降之在肝者宜直降之在肺者宜直降之在胃者宜直降之在脾者宜直降之在肝者宜直降之

本草求真 卷五降痰括蕒仁

括蕒仁 味甘寒 成無已乃謂味功 降火下氣降痰綠肺受火逼則水必停而痰生痰

渴之病矣括蕒性寒味甘寒能除上焦傷寒胸膈 鬱結痰氣使之入脾胃而下降 震亨曰括蕒實性潤甘能補肺潤能降氣胸中有痰者乃肺受火

胸膈中痰熱為治消渴之神藥故仲景小陰

天花粉 味甘寒 實圓長如熟柿子扁 多脂去油用枸杞為使畏牛膝乾漆惡乾薑反烏 頭 天花粉 味甘寒 實圓長如熟柿子扁 多脂去油用枸杞為使畏牛膝乾漆惡乾薑反烏 頭

本草求真 卷五降痰括蕒仁天花粉

同括蕒能降膈上熱痰兼因味酸又能生津止渴 故凡口燥唇乾腫赤癰乳疔漏時熱狂燥便數等 症服之立能解除 時珍曰括蕒味甘微苦酸其性 能止渴潤枯微苦降火甘不傷 胃昔人言其苦寒似未深察 但此較之括蕒其 性稍平不似蕒性急迫而有推牆倒壁之功也至 經有言安中絕續似非正說不過云其熱除自安 之意痰色清稀者忌服澄粉食大宜水衰有熱人 畏惡反同括蕒

貝母 味甘寒

貝母 入肺 辛 苦 微 寒 世 多 用 為 治 咳 之 藥 殊 不
 知 痰 有 因 燥 因 濕 之 不 同 痰 有 風 痰 寒 痰 濕 痰 火
 痰 在 臨 如 果 肺 因 火 形 水 飲 不 化 憐 而 為 痰 此 痰
 因 於 燥 者 也 脾 胃 虛 寒 水 飲 停 積 窒 而 不 通 此 痰
 因 於 濕 者 也 因 以 燥 者 非 用 苦 以 濕 火 辛 以 散 鬱
 寒 以 折 熱 莫 治 因 以 濕 者 非 用 辛 以 散 寒 溫 以 燥
 濕 莫 投 貝 母 味 苦 而 辛 其 性 微 寒 止 於 心 肺 燥 熱
 痰 食 壅 盛 及 虛 勞 煩 熱 肺 痿 肺 癰 喉 痺 咯 血 吐 血
 於 肺 目 眩 淋 瀝 小 腸 癰 疔 閉 難 產 惡 瘡 不 飲 等

本草求真 卷五 降痰貝母 三七

症 服 之 卒 能 有 效 亦 曰 貝 母 能 散 心 胸 之 氣 故
 以 不 得 志 而 言 今 用 治 心 中 不 快 多 愁 鬱 者 亦 有
 功 信 矣 又 唐 人 記 其 事 云 江 左 常 有 商 人 左 肺 上
 有 瘡 如 人 面 亦 無 他 苦 商 人 以 酒 滴 口 中 其 面
 赤 色 以 物 食 之 亦 能 食 矣 則 肉 內 服 或 不 食 則
 一 時 瘡 焉 有 名 醫 試 則 肉 內 服 或 不 食 則 瘡 類
 悉 無 所 苦 至 有 名 醫 試 則 肉 內 服 或 不 食 則 瘡 類
 商 毀 其 口 灌 之 數 日 成 瘡 若 使 因 於 脾 虛 而 見 咳
 嗽 不 寧 混 以 貝 母 妄 代 其 失 遠 矣 蓋 一 宜 半 夏 一
 宜 貝 母 况 半 夏 兼 治 脾 肺 貝 母 獨 清 肺 金 半 夏 用
 其 辛 貝 母 用 其 苦 半 夏 用 其 溫 貝 母 用 其 涼 半 夏
 性 速 貝 母 性 緩 半 夏 散 寒 貝 母 清 熱 氣 味 陰 陽 大

本草求真 卷五

有 不 同 諸 痰 貝 母 非 所 宜 也 彼 此 誤 投 為 害 不
 淺 大 者 為 土 貝 母 大 苦 大 寒 如 浙 江 貝 母 清 解 之 功
 居 多 小 者 川 貝 母 味 甘 微 寒 滋 潤 勝 於 清 解 不 可
 辨 川 產 開 辦 者 良 獨 辦 不 堪 入 藥 去 心 米 拌 炒 用
 厚 朴 自 微 為 使 貝 秦 芫 反 烏 頭
 竹 瀝 音 商 木
 竹 瀝 音 商 木 入 經 絡 甘 寒 而 滑 治 淋 消 風 降 火 潤 燥 行
 痰 養 血 益 陰 凡 小 兒 疳 積 疔 陰 虛 癆 熱 口 噤 胎
 產 血 暈 痰 在 經 絡 四 肢 皮 表 膜 外 者 服 之 立 能 見

本草求真 卷五 降痰竹瀝 三七

效 蓋 瀝 之 出 於 竹 由 血 之 出 於 人 也 極 能 補 陰 長
 於 清 火 補 陰 亦 由 性 滑 流 利 走 竅 逐 痰 故 為 中 風
 要 藥 以 中 風 莫 不 由 於 陰 虛 火 旺 煎 熬 津 液 成 痰
 壅 塞 氣 道 不 得 升 降 服 此 流 利 經 絡 使 痰 熱 去 氣
 道 通 而 外 症 愈 矣 故 火 燥 熱 者 宜 之 時 珍 曰 竹 瀝
 抵 胃 火 燥 熱 而 有 痰 者 宜 之 苦 寒 濕 胃 虛 腸 滑 之
 人 服 之 則 反 傷 腸 胃 寒 性 滑 利 多 食 瀉 人 俗 家 謂
 之 利 腸 篋 即 此 義 朱 氏 謂 大 寒 言 其 功 不 若 脾 胃
 言 其 氣 味 特 於 理 謂 大 寒 為 氣 何 害 於 功 若 脾 胃
 腸 滑 寒 痰 濕 痰 食 積 生 痰 不 可 用 也 荆 瀝 性 味 相
 近 但 氣 寒 多 用 劑 氣 虛 熱 多 用 竹 丹 淡 止 言 虛 痰

三三五

蓋汁為使以美公服竹瀝同但竹類甚多惟取竹薄節用二尺長劈開以

白菓

白菓山菓入雖屬一物而生熟攸分不可不辨如生

食則能降痰解酒消毒殺蟲以漿塗鼻面手足則
去破胞煎點油膩及同汞浣衣則死蟲融其花不
得見性陰有小毒何其力銳氣勝而能使痰與垢
之悉除也至其熟用則竟不相同如稍食則可再

本草求真 卷五 痔瘡白菓

三九

食則令人氣壅多食則即令人臃脹昏悶昔已有
服此過多而竟腹悶欲死者食干枚然究其實則
生苦未經入華而性得肆其才而不室熟則經火
煨制而氣因爾不伸要皆各有至理並非空為妄

說已也

礞石

礞石人稟石中剛猛之性沉墜下降味辛而鹹

色青氣平功能入肝平木下氣為治驚利痰要藥
喻嘉言曰驚風二字乃古人妄懸空談不知小兒
初生以及童幼肌肉筋骨脈血脈俱未克長陽

陰麻

則有餘陰則不足故易於生熱然其病且謂此病
亦有入候以其插頭手動也而亂插之名以其卒
口際脚急也而反立口斜插之名以其存強
背反也而無不以為奇特而不知小兒脾理不密
遇此等症無不以為奇特而不知小兒脾理不密
易於感風寒則筋脈牽引不通名色而用金石等
藥鎮壓外邪為再造奇功遂致名守諸門雖日殺
斃兒而不蓋風木太過脾土受制氣不運化積氣
生痰壅塞膈上變生風熱治宜用此重墜下泄則
風木氣平而痰積自除今人以玉隱君滾痰丸內
用礞石通治諸般痰怪症殊為未是痰痰丸礞石

本草求真 卷五 痔瘡礞石

四十一

服研水飛淨一兩大黃酒蒸八兩黃
本酒洗八兩沉香五錢為末水丸 不知痰因熱
盛風木挾熱而脾不運故爾痰積如膠如漆用此
誠為合劑如其脾胃虛弱食少便澀服此泄利不
止小兒服之多成慢症以致束手待斃可不慎歟

硝煨水飛研用

白礞

白礞人氣味酸寒則其清熱收熱可知何書又

言燥痰若於寒字相悖言能治風痰若於收字
滴字相殊不知書之所云能燥痰者非其氣味溫

下生

熱而可以燥而即化實以收其燥熱初起使之下
 降不使留滯而不解也是收且其酸而兼鹹則收
 滿之中尚有追涎逐降之力非即不燥之燥乎所
 謂能治風痰者其酸苦涌泄兼因風邪初客合以
 阜筭等味研服則能使之上涌豈其風熱煎灰深
 入不解而即可以上涌乎是以風痰泄痢崩帶用
 此以收即愈收諸血脫肛陰挺人崩帶風眼疾飲
 磨粉川此以滿即效治喉痺症蛇傷癰毒用此
 酸寒以解即除治雖有凶然總取其酸滿寒酸

本草求真 卷五 痰白

為功以為逐熱去涎之味但暫用則可久服則於
 精血有損宗稟曰損心脾却水故也水化者紙上
 不方云一人病毒無不效背不問老少皆宜服黃
 凡人不可勝數用明亮白粉一兩生研以好黃蠟
 七效送下如未破則內消已破即愈古言服損
 如服金石參膏以白粉末酒服即效
 心脾傷骨義根於是豈正本求源之治歟取紫白
 光瑩者佳火燉用以火燉地酒水於上布地以盤
 上掃收之為精未盡者更如前法再日以甘草為
 陳苦酒化之名藥七日可用百日更佳
 使畏麻黃惡牡蠣

本草求真 卷五

蓬砂 頁六

蓬砂 附 人又名鵬砂辛甘微鹹氣溫色白質輕功
 市人上除熱故云能除胸膈熱痰也是以痰嗽喉
 那噎膈積聚骨硬結核眼目翳障口齒諸病凡在
 胸膈以上者無不可以投治頌曰今醫家用礪砂
 真曰含化明津治喉中腫痛膈上痰熱初覺便治
 不能成喉痺時珍曰礪砂味甘微鹹而氣涼色白
 而質輕故能去胸膈上焦之熱素問云熱濕於內
 治以鹹寒以甘緩之是也其性能柔五金而去垢
 其柔物也治膈積聚骨硬結核惡肉陰瘻用之者取
 况性能消金豈有垢膩塊積而不可以消導乎第

本草求真 卷五 痰白

常審實而治勿輕投也出西番者白如明礬出南
 番者黃如桃膠甘草湯煮化微火炒鬆用

牛黃 音充

牛黃 附 味苦性涼古人用此解心經熱邪及平
 肝木通痰利痰定驚及痰涎上壅中風不語等症
 肝風須辨真偽真則外有表症可察偽則內有虛
 症可尋真則表症見而神志無恙偽則表症既無
 而精氣全失真則本氣或虧木血或損加以外邪
 內藥而成偏廢偽則真陰既耗真陽既耗迨其將
 絕不因而見厥仆真則新邪復發真則而致新舊
 交感偽則裏虛既甚而更損虛益危真則尚赤唇
 焦成偽則裏虛既甚而更損虛益危真則尚赤唇
 與黑痰喘昏亂上視多汗甚則手足厥逆脫症全

其真則陽浮而數陰沉而微及或浮沉微虛
指弦滑洪數又中風閉口則心經手厥則脾絕用
合則肝絕遺尿則腎絕氣喘而鼻息則肺絕用
藥始宜辛熱以祛外邪綠牛有黃牛之病也牛
宜辛潤甘調以固血脈
黃在於心肝膽之間凝結成黃故選以治心肝膽
之病取其長於清心化熱故爾用此以除驚痰之
根耳至於中風不語必其邪已入臟九竅多滯
便閉舌短方可投服若使中腑而見四肢不省
鼻息塞目翳方可投服若使中腑而見四肢不省
中經而見口眼喎斜不為開痰順氣養血活血使
用此藥投治引邪深入如油入麵莫之能出小兒

本草求真 卷五 降痰牛黃 四三 綠國香

純陽病多胎熱痰熱燭於心肝二經之病命在須
臾者用此多有回生之力兒初生未食乳用三五
最宜之性脾胃虛寒者其切忌之取磨指甲者真牛
有黃必多吼喚以盆水承之同其吐出迫喝即應
水名生黃如鴉子黃大重盂可揭殺死自角中得
者名角黃心中得者名心黃肝膽中者名肝膽黃
成粒須防喉脫得牡丹菖蒲良人參為使尋龍骨
龍膽地黃常山
本草求真卷五 第四冊終

本草求真卷六 第一冊

濕熱內經帝曰人傷於寒而傳為濕熱也
氣不宣通濕氣內結中外相薄寒盛熱生
知熱之所由作悉皆外邪內入而熱是即木身元陽
為邪所逼一步而邪內入而熱是即木身元陽
然不乘勢以除則熱更大有進而相爭之變而為熱
入有乘勢以除則熱更大有進而相爭之變而為熱
之謂余按三黃石青及考之方書其氣非使然其大
黃在肺則止在胃則止在脾則止在肝則止在膽則止
則止用以青黛龍麝在胃則止在脾則止在肝則止在
則止用以青黛龍麝在胃則止在脾則止在肝則止在

本草求真 卷六 濕熱 綠國香

在肺又有他劑以瀉其熱初成未盛則或
以百子仁嗽肺痰則或沙參氣喘則或
牛黃以仁嗽肺痰則或沙參氣喘則或
用而氣逆或不舒則或竹茹熱則或
煎以乳水不通則或通乳則或
當用生地紫起兼血燥熱之大概兼有
劑以中虛蓋以起兼血燥熱之大概兼有
宜不中虛蓋以起兼血燥熱之大概兼有
行乳痛時宜起兼血燥熱之大概兼有
矣乳痛時宜起兼血燥熱之大概兼有
矣乳痛時宜起兼血燥熱之大概兼有
地榆角槐花蘇木三漆乾漆此瀉胃熱之大概兼有

李射也干紫貝黃蓮葛草芎藭血然亦須藥症
 其藥者又可其地子茵陳黃芩此考醫之
 赤石脂骨所必也若使熱在血則牛膝出
 童便者骨所必也若使熱在血則牛膝出
 熱便者骨所必也若使熱在血則牛膝出
 骨便者骨所必也若使熱在血則牛膝出
 川也者骨所必也若使熱在血則牛膝出
 在也者骨所必也若使熱在血則牛膝出
 豈有以投此以秋如能防已為閉者必
 審實以投此以秋如能防已為閉者必
 歸尾以投此以秋如能防已為閉者必
 貝藥以投此以秋如能防已為閉者必
 玃藥以投此以秋如能防已為閉者必
 玃藥以投此以秋如能防已為閉者必

尾血紫草夜明砂兔耳草芎藭血然亦須藥症
 花地榆槐木則有赤芍石無不界突山甲
 大約人肝用帶血則有赤芍石無不界突山甲
 昏胃宜用帶血則有赤芍石無不界突山甲
 用蓋皆以咳痰逆則全胡以流其藥神
 以治之咳痰逆則全胡以流其藥神
 以治之咳痰逆則全胡以流其藥神
 以治之咳痰逆則全胡以流其藥神
 以治之咳痰逆則全胡以流其藥神

濕熱濕自下受宜用苦寒以折牽牛氣味辛辣
 有損之藥以為投治是以血病瀉氣不使氣血俱
 損乎氣之味辛則動大便多則泄下如水乃
 安在哉故腫受濕氣不得施化致大小便不通
 宜用之若濕從下受下焦血中泄宜苦寒
 之味傷人以元氣惟是水氣在肺喘滿腫脹等症
 用以為開泄俾氣自上達下而使二便頓開以快
 一時病旬日一宗室大人年六十月生若腸結
 不快服確黃連和藥則若如吐酸鹹盈盆

牽牛入大小腸兼有白有黑白者其性入肺肅於上
 焦氣分除其濕熱故氣逆壅滯及大腸風秘者得
 此以治黑者其性兼入右腎能於下焦通其遺
 故腫滿脚氣及大小便秘俱得以治但下焦血分
 牽牛入大小腸兼有白有黑白者其性入肺肅於上
 焦氣分除其濕熱故氣逆壅滯及大腸風秘者得
 此以治黑者其性兼入右腎能於下焦通其遺
 故腫滿脚氣及大小便秘俱得以治但下焦血分

許乃克又多火病此乃三焦之氣壅滯有升無降
 津液胃化為痰飲不能下滋麻肺非血燥比也
 刺留滯確黃徒入血分不能通氣但為痰阻故無
 效也乃用牽牛末皂莢芥子與服即便通利自是
 但覺腸結一服就順亦若果下焦虛腫宜查選當
 不妨食且復精爽也
 佐以沉香補骨脂等味以為調補俾補瀉兼施而
 無偏吸損泄之害矣
 時珍曰外甥柳秀素多酒色
 坐臥立哭呻吟者七晝夜降用通利藥不效遣人
 叩予予思此乃熱之邪在精道來脈路前在
 二陰之間故前阻小便後阻大便病不在太陽膀胱
 就也乃用揀實茴香穿山甲諸藥入牽牛加倍水
 煎服一服而取子洵去浮者春去皮得水香乾薑
 煎服三服而取子洵去浮者春去皮得水香乾薑

本草求真 卷六 瀉熱藥 四 綠圖考

天黃 毒七
 大黃 脾入大苦大寒性沉不降用走不守前入腸
 明胃府大腸大瀉陽邪內結宿食不消三承氣湯
 內入仲景治傷寒邪由太陽而入陽明之府者則
 用調胃承氣取其內有甘草之緩不令有傷胃府
 之意也治邪由陽明之經直入陽明之府者則用
 大承氣取其由中而有枳實之急得破氣之聖也
 治邪由少陽之經而入陽明之府者則用小承氣
 氣取其中無枳實之鹹致令泄下以傷其胃也故
 凡傷寒邪入胃府而見日晡潮熱於申酉諸語班
 狂便秘硬痛手不可近拒按屬實及瀉熱瀉下
 痢赤白腹痛裡急黃疸水腫積聚留飲宿食心腹

痞滿二便不通與熱結血分一切痲瘦血燥血秘
 實熱等症用此皆能推陳致新定亂致消故昔人
 云有將軍之號成無已曰熱陷所勝以苦泄之大
 胃然苦則傷氣寒則傷胃下則亡陰故必邪熱黃
 結宿食不下用之得宜不效難在量其虛實而心
 須曰聚武而因發熱欲服大黃姚僧坦曰大黃乃
 是劫藥至尊年高不可極服宜勿從幾至委頓
 武帝常有腹痛疾諸醫咸謂宜用平藥可漸宜
 僧坦曰脈洪而實此有宿積非用大黃無理
 便謂之迷愈今醫用一劑藥而攻病偶中若使病
 在上脘雖或宿食不消及見發熱只須枳實黃連

本草求真 卷六 瀉熱藥 五 綠圖考

以消痞熱宿食自通若誤用大黃推瀉不下反致
 熱結不消為害不淺時珍曰大黃病在五經血分
 謂諸伐無過心陽者宜用之若在氣分用之是
 血者乃真心之氣不足而心包肝胃之邪火也
 治心下痞滿按之軟者用大黃連瀉心湯以
 此亦治胃中不和腹中脹滿心下痞硬者用大
 之則作瀉劑之熱非用大黃連瀉心湯於陰而反
 所上為瀉劑之熱非用大黃連瀉心湯於陰而反
 於上為瀉劑之熱非用大黃連瀉心湯於陰而反
 上之瀉劑之熱非用大黃連瀉心湯於陰而反
 分心之瀉劑之熱非用大黃連瀉心湯於陰而反
 消心之瀉劑之熱非用大黃連瀉心湯於陰而反
 日心之瀉劑之熱非用大黃連瀉心湯於陰而反

脾黃連較肝脾者陰之。肝者心之。而論之合也。肺病外症未解不可下。脈浮大不可下。惡寒不可下。喘多病明病不可下。反下之。此為大逆。大逆者。不可下。必喘而胸滿不可下。少陰病。虛大脈。弱不可下。下之。脈數不可下。惡水者不可下。諸四逆脈者不可下。虛家不可下。陽微不可下。諸四逆脈者不可下。况先輩立藥治病原有成則如大黃芒硝則瀉腸胃之燥熱。牽牛甘遂則瀉腸胃之濕熱。巴豆硫黃則瀉胃之寒結也。雖其所通則一。而性質有不同。當為分視。至於老人虛秘腹脹少食。婦人血枯陰虛寒熱。脾氣痞積。腎虛動氣及陰血色白不起等。

本草求真 卷六 瀉熱人

症不可妄用以取虛虛之禍。川產鋪紋者良。生用峻熱用純忌進穀食。能通利。黃芩為使。連翹 入 味苦微寒。質輕而浮。昔雖載瀉六經。然其輕清氣浮。實為瀉心要劑。連翹形似心。為火主。心清則諸臟與之皆清矣。然濕熱不除。病疔百出。是以癰毒五淋。寒熱風痰癰瘻惡毒。結熱毒等症。書載皆能以治。在指日。凡癰而痛者。為腫而赤者。為熱結。腫而紅。經有言諸痛癢皆屬。不結者。為熱結。腫而紅。經有言諸痛癢皆屬。

本草求真 卷六

心火連翹實為家聖藥也。然多川胃虛食少。脾胃不足者。慎之。况清而無補。癰疽潰後。勿服火熱。由於虛者忌投。
前胡 入 味苦微寒。功瀉下氣。凡因風入肝膽。火盛痰結。腎氣實喘。喘氣有餘。咳嗽逆。逆病膈塞。亂及小兒疝氣等症。升藥難投。須當用此。苦泄伴邪。去正復不似柴胡性。上升邪外出。而無實痰。實氣固結於中也。按二胡均是風藥。一升一降。

本草求真 卷六 瀉熱人

用各不同。若使兼有外感風邪。與痰火實結。而用柴胡上升。不亦如火益熱乎。故必用此下降。但症外感絕少。祇屬陰虛火動。並氣不歸元。胸脇逆滿者。切忌。以其性皮白肉黑。味甘氣香者。良。半夏為使。惡皂莢。忌火。當歸片料可也。
白微 入 味苦而鹹。性寒無毒。凡人陰虛火動。則肉熱生風。火氣焚灼。身體壯熱。支瀝痰湧。忽不知人。與大汗出血。厥酸痛淋。閉其在。婦人則或廷孔。

三四一

轉結通孔也。人神無所依，而見淋瀝不淨，並血枯
 熱勝而見虛煩上嘔，非不用此苦泄，鹹降利水，使
 陰氣自上而下，則熱何由泄乎？是以金匱安中益
 氣竹皮丸用此以治婦人產中虛煩嘔逆。經云
 經種子，在往用之，益不於血熱而少其源，起
 於真陰不足，陽勝而內熱，故營血日枯也。蓋陰清
 以備地芍藥，杜仲、茯苓等藥，千金萎蕤湯用此以
 治風濕身熱汗出身重，又有白微芍藥湯以治婦
 人遺尿。白微芍藥等不拘胎前產後皆能補陰平
 陽而兼行肺以清膀胱之源，並非虛寒不禁之比。
 本草求真 卷六 瀉熱白微

也。但胃虛泄瀉腸氣外越者，禁用似生膠而短小
 柔散去黏酒洗用，惡大黃大戟山茱萸。
 白欬言主
 白欬肝人敷腫瘡瘍，清熱解毒，散結止痛，久為外
 科所用要藥。然目赤驚癩，溫癰陰腫，滯下淋濁，失
 精，金瘡失血，凡因濕熱濕毒而成者，何一不可以
 為內科之用？如金匱薯蕷丸用此以解風氣百疾。
 蘊蓄張璠曰其湯全以桂枝湯和者，散邪合理中
 補益又書載同地膚子則可以治淋濁失精，同白

芩則可以欬金瘡失血。故曰同甘草則可以解瘋
 毒之毒，豈盡癰腫解毒而已哉？但此味辛，欬主散
 味苦，王降味甘，主緩，故止可以散結解熱，若胃氣
 虛弱，癰疽已潰者，均非所宜。蔓赤菴有五葉根如
 卵，長有三五枚，同窠皮黑，肉白，代赭石為使，反烏
 頭，色赤為赤欬，功用皆同。
 紫菀言主
 紫菀肺人辛苦而溫，色赤，雖入至高之職，仍兼下
 降。故書載入肺，金血分辛入肺，能治虛勞咳嗽，喘

悸，吐衄諸血，又能通調水道。若可以以治溺瀉便血
 用此上下皆宜。且此辛而不燥，潤而不滯。李士材
 玉君子非多用，於肺實為有益。然疎泄性多，培養
 力少，與桑白皮杏仁同為一類。但桑白皮杏仁則
 瀉肺經氣，分此則專瀉血經氣分也。故肺虛乾咳
 禁用，乾咳類多。血紫色潤軟者，其人多以車前其
 藥雖分上中與下，然下疎泄尤甚。蜜炒用，欬冬為
 使，白者名女紫，入氣分大泄肺氣，肘後方用此三
 分，鉛丹一分，煎酸漿服一丸，日進三服，至二十

一日能令面黑轉白過服不宜去頭鬚蜜水炒用
欬冬為使惡天雄雞麥藁本遠志畏茵陳

盧根言老

盧根入肺胃治無他奇惟清肺降火是其所能

凡人胸中有熱則火升上咽逆氣不下脾肺熱起

則消渴便數甚至不能少忍金匱王喻治心膈氣

五兩到以水故必以此若寒以治則諸症悉除汪

三日為水之源氣散於上歸於肺始能通調

小便數其手不能小便火性急速故也虛中虛故

入心肺清上焦熱解則肺之氣化行而小便復

本草求真 卷六 濕熱 盧根 貫衆

其常且解鯀魚中毒酒毒然此止宜實熱不宜虛

寒若誤用之必致見害取逆水土內甘美者效若

露出水而者損人去蘆節

貫衆言老

貫衆人即俗稱為管作者是也味苦微寒無毒

世遇天時行不正之氣人多用此置之水缸使人

食之不染且獨力能解毒凡過胸中帶下並癩

痕斑疔虫蠱竹硬皆可用之蓋以若能殺蟲毒能

散熱故也以諸症皆昔王隱百一選方言食狸魚

本草求真 卷六

後為骨所硬百藥不效或介以貫衆煎濃汁連進

一啜而出可見軟堅之功其殆若是之神矣形似

狗脊而大汁能制三黃化五金伏鐘乳結沙制汞

解毒軟堅

青箱子言老

青箱子入即雞冠花子者是也備要又言即草

决明味苦微寒無毒入足厥陰肝凡人一身風癢

虫疥得德口唇色青青百病多緣熱盛風熾所

致亦有不盡風熱者善言服此日疾皆愈唇青即

本草求真 卷六 濕熱 青箱子

散三蠱皆殺風癢即絕無非因其血熱除勝熱血

脉和而病自可愈耳無他義也但虛子散大者切

忌以能類鷄冠而種尖長為用

竹茹言老

竹茹入味甘而淡氣寒而滑凡因邪熱客肺肺

金失養而致煩渴不寧肺喘逆嘔阻嘔吐血

衄血等症若皆當服此諸病皆效蓋味甘則中可

安而煩不生味寒則熱得解而氣悉寧又皮入肺

湯用所以金匱之治產後虛煩嘔逆則有竹皮大

三四三

九千金之治產後內虛煩熱短氣則有甘竹茹湯
竹茹一升甘草茯苓黃芩各二兩水煎服產後虛煩頭痛短氣悶亂不
解則有淡竹茹湯皆有至理內存不可不知取竹
刮去外膜取二層如麻縷者良

淡竹葉 音公

竹葉 音公 體輕氣薄味甘而淡氣寒微毒據書皆
載涼心緩脾清痰止渴為治上焦風邪煩熱咳逆

喘促嘔噦川血一切中風驚癇等症 果日除新入
止喘逆氣 無非因其輕能解上卒能散散甘能緩

本草求真 卷六 竹茹竹葉竹葉

十一

脾涼能入心寒能療熱故耳然大安總極利之
品合以石膏同治則能解胃熱而不致煩渴不
止也 藥生竹上故治上焦仲景治傷寒發熱大渴
邪竹生一年嫩而有力者良

天竺黃 音公

天竺黃 音公 係天竺國之竹精氣結成其粉形如
竹節味甘氣寒與竹瀝功用畧同皆能逐痰利痰

但此涼心去風除熱為小兒驚癇風熱痰湧失音
較之竹瀝其性和緩而無寒滑之患也 味甘今市

肆多骨灰葛粉雜入不可不辨

秦皮 音公

秦皮 音公 味苦氣寒色青性清功歸入肝以除
熱入腎以瀉氣是以因風而見濕痺驚癇目障之

症者則當用此苦燥苦降之味以除因脫而見崩
帶腸辟下痢之症者則當用此收瀉寒氣以固如

仲景白頭翁之用秦皮苦瀉之類 白頭翁黃芩黃

老子云天道貴清惟清故補服此不惟泄熱止脫
而且益腎有子矣至治赤眼腫痛則合黃連等分

類點並秦皮一味煎湯以洗甚効 或加滑石黃連

但此氣寒傷胃總不宜於胃虛少食之人耳 出外

西上皮有白點漬水碧色書紙不脫者真大戟為
使惡吳茱萸

川練子 音公

川練子 音公 即苦練子因出於川故以川名
又名金鈴子練實者是也味苦氣寒微毒凡人冬

時感冒寒邪至春而發則為溫以致症見狂燥並
疝瘕熱被寒束症見囊腫莖強掣引作痛與夫寒

疝瘕熱被寒束症見囊腫莖強掣引作痛與夫寒

疝瘕熱被寒束症見囊腫莖強掣引作痛與夫寒

疝瘕熱被寒束症見囊腫莖強掣引作痛與夫寒

疝瘕熱被寒束症見囊腫莖強掣引作痛與夫寒

疝瘕熱被寒束症見囊腫莖強掣引作痛與夫寒

疝瘕熱被寒束症見囊腫莖強掣引作痛與夫寒

疝瘕熱被寒束症見囊腫莖強掣引作痛與夫寒

本草求真 卷六 秦皮

十一

熱積聚積由五臟所生三蟲內蝕者俱宜用此調
 治有虫耗其津液而渴須以苦主有泄熱之功寒
 有勝熱之義故能使熱悉除而毒盡痕亦得因
 其自心下降由於小便而乃泄矣但人止知此為
 除痂之味內經七痂曰痂曰瘡曰癩而不知有逐
 熱解狂之力以致廢而不治即其治痂亦不分其
 是寒是熱是偏是平與夫偏有錯雜多寡之異其
 痂亦不分其所痂之處是否白下而上從上而下
 治痂要惟計古方茜香川練歷為治痂千古祖豆

詎知痂屬於熱則痂必見囊腫莖強其痛亦必從
 下而上用以川練內入以為嚮導則熱可除熱痂必用
 如其痂並非熱其痛自上而下痛引入腹且有厥
 逆吐涎非用辛溫不能見效若以川練同入則於
 理不免岐而二矣寒痂不宜用然古人立方治亦偏以
 川練同投其意奚似豈緣邪有錯雜則治不得不
 爾若以錯雜之邪而概用以辛燥不更使病相左
 乎繡膏語諸同人凡人用藥治病須當明其偏平
 偏症偏治平症平治錯雜多寡不一之症則即當

以錯雜不一以治病種類皆繡治一族叔字次周
 陰亦其症是偏不平毫無一症混雜乃有附城一
 降必執古方用以川練繡謂病症不雜何須用是
 然終謂其古方所用川練繡昔何無一語活動間
 有指屬反佐亦無一語申明以致蒙混不解昔言不
 繡只據理投服隨手輒應而不為方所執及閱張
 耶不經逢原其辨川練功用分為陰陽二疔及有
 錯雜之邪必用川練之說始嘆理道本同而古人
 耶我而獲繡益信已所治族叔之病而不敢

用川練者未始不有理存而竟所揆而如一也
 易否則幾為古方所誤矣故凡痂因熱邪及因蟲
 虫內蝕宜於川練若使脾胃虛寒症屬陰痂則川
 練其切忌焉練以川產為正去皮取肉去核小根
 有雌雄二種雄根色赤無子大毒忌火雌根白子
 多微毒可採去青留白單味酒煎投服殺蟲治瘡
 煎湯洗之可治中熱即時吐出茴香為使

蒙花百金
 密蒙花肝 因冬不凋花開蒙密故以蒙名甘而

治諸

微寒功前入肝經除熱養營蓋肝開於目目得血而能視虛則青盲翳熱則赤腫淚淚目中赤脈及小兒痘疹餘毒肝氣攻眼得此甘能補益寒能除熱肝血足而諸症無不愈矣然味薄於氣佐以養血之藥更有力焉取蜀中產者良酒浸一宿候乾蜜拌蒸晒三次

柿蒂 味甘 性平

柿蒂 味甘 性平 入胃味苦氣平 時珍謂其雖與丁香同爲止呃之味然一辛熱而一苦平合用深得寒熱兼濟

本草求真 卷六 海熱家花柿蒂

治諸

之妙 以器通本草謂漸生方治呃逆專取柿蒂之清 寒如係有寒無熱則丁香在所必用不得固執從治必常佐以柿蒂有熱無寒則柿蒂在所必需不得泥以兼濟之必雜以下香是以古人用藥有合數味而見效者有單用一味而效者要使藥與病對不致悖謬而在施耳 竹茹蘆根則柿霜清肺胃之熱能治咽喉口舌疼痛風痔漏然必元氣未離始可投服若虛煩喘嗽切忌柿乾同於柿霜但力少緩俱忌

梨 味甘 性寒

梨 味甘 性寒 入肺成於秋花皆白得西方金氣之最味苦微酸氣寒無毒功前入肺與胃凡胸中熱結熱嗽痰咳便秘狂煩咽乾喉痛中風因熱反胃不食 反胃 致成有因寒並湯火傷瘡癰疽目障丹石熱氣一切屬於熱成者惟食梨數枚即能轉重爲輕消弭於無事 以爲反胃轉食梨物不下用大雪梨一個方治小兒風熱昏憒開胃不能食川消梨三枚切破同煎米飲無時珍曰按類編云一士人狀極氣血消燥此去三年當以症死士人不樂而去

本草求真 卷六 海熱家梨

綠圖

開茅山有道士醫術通神而不欲自鳴乃衣僕衣以賣白道士道士診之笑曰汝便下山但日飲好梨一箇如生梨已盡則取乾者泡湯食津飲汁疾自當平士人如其戒經一歲復見吉老見其理士人信告吉老曰君必冠冕望異人不然豈有各其學之未至此與否言之說彷彿夫二條則梨之功豈小補哉然惟梨之說彷彿夫二條則梨之功可食餘梨則亦不能去病也然必元氣素虛大便素堅方可與食 宗與曰梨多食動脾少則不潤煩渴人食之甚若使元氣虛弱脾少則不投服恐血得寒益凝豈可慨謂能食而不滯而別

之乎搗汁熬膏良藉治蜜製消痰止咳用萊菔與梨相間收癩則不爛

西瓜 言六

西瓜 謂入心 內稜今人遇值三伏天燥不論男婦大小朝夕恣食誠以燥渴之極得此味甘色赤能引心胞之熱下入小腸膀胱而出令其心胸頓冷煩渴冰消故書載治太陽膀胱陽明胃中嘔及熱病大渴等病宜投 如春溫夏熱等症 並有天生白虎湯之譽惟是稟氣素厚遇熱消渴及伏氣發瘟得此如湯

滌雪若以脾胃素虛恣服轉渴朝夕恣食必待膈滯上湧或瀉或腫或脹元陽已削方為覺謬悔莫及矣衛生歌云瓜桃生冷宜少食免至秋來成癰病又瓜木寒曝之寒氣益聚而寒矣猶之油切木熱經火煎焚則其性稍革而不熱矣因述此以為好食瓜者一箴

銅青 言九
銅青 謂入 卽俗所云銅綠者是也與空青所產不同銅青氣稟地陰英華外見藉階結成故味苦酸

同銅青氣稟地陰英華外見藉階結成故味苦酸

滿氣寒能入肝膽二經按酸入肝而飲所以能合

金瘡止血苦寒能除風熱所以能去膚赤及鼻癩

肉苦能洩結所以醋醃喉中則吐風痰而使血氣

心痛皆止為散能療喉痺牙疳醋調搗腋下治胡

臭薤汁調點爛沿風眼 謂用黃川連三錢杏仁

分膽藥一分銅青三分大 謂用生甘草六

元藥一投水煎乘熱搽 謂用生甘草六

之病時珍曰吐痰須觀 謂用生甘草六

海石 言九 海石 謂入 卽書所云浮石者是也其石係水沫結

成浮於水上故以浮名色白體輕味鹹氣寒 謂其

質玲瓏肺蓋既有升上之能復有達下之力其白

能治上焦痰熱目翳痘癰者以其氣浮上達之謂

也能治諸淋積塊癭瘤者以其鹹潤軟堅之意也

余痰痞上腐談云肝屬木常浮而反沉肺屬金常

沉而反浮何也肝實而肺虛也故石人水則沉而

南海有浮水之石木人水則浮而至於實則宜投

虛則忌服者以其忌有尅削之氣也味鹹者良根

過水飛用

空青 言九

空青肝人感銅精氣而結故尚入肝明目蓋人得
 水氣之清者為肝血其精英則為膽汁開竅於目
 血者五臟之英注之為神膽汁充則目明滅則目
 昏銅亦清陽之氣所生其氣之清者為綠猶肝血
 也其精英為空青之漿猶膽汁也其為治目神藥
 蓋亦以類相感耳出時况人多怒則火起於肝水
 虛則火起於腎故生內外翳障得此甘酸大寒以
 除積熱及火兼之以酸則火自斂兼得金以平水
 故治赤腫青盲其空青所含之漿可取點眼效亦

本草求真 卷六 湯熱空青

磨翳要藥書云不怕人間多暗眼只愁世上無空
 青但空青中永久則乾必須驗其中空內有青綠
 如硃者即是如無綠青亦可不必拘泥聖濟錄治
 用空青石研細日點貝子四枚
 石青石兼入胃肝甘辛而涉體重而降其性大寒功
 尚入胃清熱解肌發汗消澀緣傷寒邪入陽明胃
 府內鬱不解則必日晡熱蒸口乾舌焦唇燥堅痛
 不解神昏譫語氣逆驚喘溺閉渴飲雖中晷自汗

胃熱發斑牙痛等症皆常用此調治成無已曰
 邪也風傷陽寒傷陰皆陰陽為風寒所傷
 則非輕劑所能衝散必須重劑之劑同散之乃得
 除陽之邪但去管衛之氣但和是以大青能湯以
 以石青為使不青乃重劑而又專達肌表也
 幸能發汗解熱其能緩脾益氣生津止渴寒能清
 熱降火故也按石青是足陽明府藥邪在胃府肺
 受火制故必用此辛寒以清肺氣所以有白虎之
 名肺至西方故也果曰石青是陽明藥也故仲景
 不眠以身以前胃之經也胸而肺之室也但西有
 邪在陽明肺受火制所以有白虎之名也但西有
 肅殺而無生長如不得已而用須中病即止切勿

本草求真 卷六 湯熱石青

過食以損生氣時珍曰此皆少壯脾胃火盛能食
 胃弱者惡况有貌枯熱症裡屬陰寒而見斑黃狂
 燥日晡潮熱便秘等症服之更須斟酌惟細辨
 明辨詳求其真可也在島曰按陰盛格陽陽盛格
 而格陽於外熱而內寒陽盛極而格陰於外
 冷而內熱經所謂重陰必陽重陽必陰陰於外
 重熱則寒也高於小便分必便清者外熱而
 中實寒便赤者外熱而內實熱也再口出
 之熱潤及舌胎之淺深胎黃者為熱宜白虎湯
 亦有胎黑屬寒者若無胎刺口有津液急宜白
 誤投寒劑則始矣又按熱在胃熱者為斑疹然必
 色赤如錦紋者為斑隱隱紅點者為疹斑重而
 疹輕斑疹亦有陰陽之分宜不其又有內傷陰症
 見斑疹者微紅而稀少此以氣極虛瀉其無虛之

火時行於外。黃帝蓋氣血。使中有至。則氣不外。游血不外。散若作熱。治生死反。寒時者宜。毒。瑩白者良。土中結成之。寒水石也。研細或甘草水飛。或火煨。各隨本方用。鷄子為使。忌豆。鐵。

青鹽

青鹽。兼入心。即名戎鹽。稟至陰之氣。凝結而成。不經煎煉。生於滌溪之陰。其味鹹。氣寒。無毒。能入少陰。腎臟。以治血分實熱。故凡病因腎起。而見小便不通。胃中痰赤。滯吞及吐血。溺血。齒舌出血。牙齦熱痛。暨蠱毒邪氣。因結不解者。宜以此味投治。

方治風眼。爛弦。用戎鹽。化水。點之。作景金。方。小便不通。用戎鹽。研丸。大一枚。茯苓。半。勛。白。木。二兩。水煎。仰腎。補而熱。除。鹹。入。而。堅。軟。經。曰。熱。滯。於。內。治。以。鹹。寒。正。此。謂。耳。出。西。羌。不。假。煎。煨。方。發。明。潤。色。青。者。良。

食鹽

鹽。人。之。品。類。甚。多。有。生。海。南。北。生。池。山。西。生。井。田。川。生。土。鹽。生。階。鹽。明。生。石。鹽。生。樹。水。生。草。鹽。之。各。異。然。寒。氣。味。則。一。蓋。鹽。味。鹹。氣。寒。加。以。皂。角。同。煎。則。味。又。兼。微。辛。五。味。惟。鹹。潤。下。故。凡。大。小。便。閉。

者得此則通五味惟鹹走血故凡血熱血痛者得此則入五味惟鹹入骨故補腎藥必當鹽湯送下而諸骨筋痛藉此則堅竹消筋緩皆因熱所發譬如生肉易消得鹽性寒鹹則能堅五味惟鹹潤火不壞時珍曰腎主骨鹹入骨也五味惟鹹潤燥而辛又能泄肺故凡痰飲喘逆得此則降時珍藥用之者鹹引水聚也五味惟鹹軟堅故凡結核能取豆腐山此河義五味惟鹹軟堅故凡結核積聚得此則消五味惟鹹補心故凡病因心起而見喜笑不休則當用此沸飲過止亦用鹽煨赤而飲至於癰腫惡毒眼目暴赤酒醉顛狂湯火急起凡

其因熱而起者無不藉此以寒勝熱而使之諸症其悉平矣但鹹能走血多食則血即凝鹹雖下趨過鹹則反水上吐所以雜亂臭毒頭疼腹痛等症則可引涎上咽而吐之也水腫如何忌食恐其以水助水之意也橫生逆生如何用鹽即便縮入正產千金方用鹽摩產婦臍并以其力存上舒之意也水蛭蚯蚓及蟻如何得此即化將車張部煎此每夕蚯蚓鳴於體一宿以其高石以水濟火之意也孫真人治喉中牛肉用綿裹於喉內鹽指之

食鹽煎 多食如何口渴以其滲去胃中津液也

朴硝 石

朴硝 人腸胃 即皮硝生於鹵地刮取初次煎成
為朴由朴再煎為其性最陰善於消物故以硝
名其味苦而辛凡五金八石用此俱能消除况
人臟腑積聚乎然必熱邪深固閉結不解用以
鹹以為劑伐則藥與病符自不見因時珍曰硝
之子也氣寒味寒走血而潤下善除積滯利小
便熱腸強之病乃治火邪也如古曰硝利小便
而胎胎然傷寒紅脈可下者用此兼大黃引之
人大腹劇烈煎取汁而服下俱安若云有故無

本草求真 卷六 硝石 朴硝

綠面齋

頰亦無頰也此之謂頰以在下言之則便溺俱陰
以前後言之則前氣後血以腎言之則主大小便
難溺澀閉結俱為水少火盛成無已曰熱滯於內
治以鹹寒作之以苦故用芒硝大黃相須為用也
汪昂曰豐城尉家有猫子死腹中啼叫欲絕醫如
以硝灌之死于即下後有一牛亦用此法得活如
仲景大陷胸湯大承氣湯調胃承氣湯之類雖其
用有大黃可以除熱然亦不得不假軟堅之藥耳
若使病非實熱及或熱結不堅妄用承氣朴硝等
以為消劑其不傷人性命幾希唐時贈日賜羣臣
用此硝鍊成者通治積熱諸病但朴硝初煎性急芒
硝久煎差緩耳大黃為使

善

玄明粉 石

玄明粉 人係芒硝再煎而成其色瑩白辛甘而
冷功用等於芒硝皆有軟堅推陳致新之力除不
因通用之意若熱閉不解亦當用此下奪然焮過
多遍其性稍緩不似芒硝其力迅銳服之恐有傷
血之虞耳王好古曰玄明粉治陰毒一切非依陽
時珍曰神農本草言朴硝鍊成之性以神仙益
方上氣入之言發人因此制為玄明粉燥多偏
在少壯年氣壯者服之亦有三焦腸胃實熱積
滯及陰虛火動者服之若佐甘草同按則膈上熱痰胃
之是速其答矣

本草求真 卷六 硝石 玄明粉

綠面齋

中實熱腸中宿熱又克見其治矣兼洗眼目消腫
續族兄式和用玄明粉搽眼初覺一二次甚明召
續同族婦孺服病非熱不得用是因未允趁後疾
信余言不謬 忌苦參

寒水石 石

寒水石 入又名凝水石又名白水石生於鹵地
因鹽精滲入土中年久結聚清瑩有稜而成也味
辛而鹹氣寒無毒善能治時行大熱口渴水腫
益以性稟純陰故也經曰熱滯於內治以鹹寒又
曰小熱之氣涼以和之大熱之氣寒以收之服此

神效

治熱利水... 傷若虛人熱浮。其切忌焉。榮白金之即化者真否。即是偽。但真者絕少。

雪水

雪水... 氣藥太陰。水極似土。雖於冬時置而不問。然值傷寒。陽毒。瘟疫。時毒。丹毒。內熾。並盛夏暑熱。內滯。而見燥熱。殆甚者。並可用此調治。

孩兒茶

孩兒茶... 孩兒茶... 味甘微清。性涼無毒。功尚清上。膈熱。化痰生津。收濕涼血。生肌。凡一切口瘡。喉痺。時行。癩瘡。煩燥。口溺。並一切吐血。衄血。便血。尿血。血痢。及婦人崩淋。經血不止。陰疔。痔腫。者服之立能見效。

殺出南... 氣質莫考。用宜慎之。

熊膽

熊膽... 味苦性寒。無毒。功尚涼心平肝。所以能治目赤。翳障。惡瘡。疔漏等症。且能入脾。而治黃疸。濕邪。入大腸。而治久疝。疝濕熱。并治小兒風痰。寒熱。發作。驚刺。要皆除熱涼血。而病自除。

魚鱗

魚鱗... 底不散者。其... 轉如。老。其。少許。研。水中。掛如。線。直至。水。

伏上勝水... 死可用肉與冬瓜。葱白。以治。且煮湯浴兒。可以稀。

石決明

石決明一名千里光得水中陰氣以生其形如蚌而扁味鹹氣寒無毒入足厥陰肝經除熱...

磨弊消障之品綠熱熾則風必生風生則血被風阻而降以起久而固結不解非不用此鹹寒軟堅...

水旋細製熟為末水飛懸旋覆

珍珠

珍珠蚌蛤... 珍珠味甘能益脾寒能除熱體堅復能磨積...

金汁

以及手足皮膚皆腫也經曰諸濕腫滿皆屬脾...

金汁謂入係取糞入罈埋於土內三年取出塗消
如水者是耳味苦氣寒置於土中時久得其土氣
最厚故能入胃大解熱毒凡熱時行毒勢衝迫
勢危莫制者用此灌之下咽稍減以其氣味相投
故能入人其巢而破其毒耳的即初生小兒周時
內毒氣方張用此服一二分既能化毒且能免後
痘疹此最靈驗但藥體氣寒體瘦色白者不可誤
用恐其反奪天真耳不可不審燕花用此最良
秋石三百五

秋石謂人本於人溺因秋露水摻滲晒乾刮取而
成故名秋石味鹹氣溫擣書載能滋陰潤燥退蒸
軟堅治癆止咳通溺利便瀉精固氣且云經火煨
煉去其鹹寒性為溫補溫而不燥潤而不滯清不
損元降不敗胃為滋陰降火之聖藥為精大則然
補竊謂補處少而清處多溫處少而寒處多止
大取而非中濁氣虛勞火重服此似不甚其
其有補之性也也功亦非補中正劑補中惟參貴
之性耳大開有微功亦非補中正劑補中惟參貴
滋水惟地菜乃若使氣薄心哀水泛縱經煨煉終
神中劑耳

本草求真 卷六

不免有虛虛之禍矣大貴總煨亦不能以他
也法於秋時取童便每用石膏七錢桑椹澄傾
去清液如此二三次乃入秋露水攪如此數次
穢淨鹹鹹以重紙鋪上晒乾刮去存下重淘取輕
清為秋石再研入罐鎖蓋定鹽泥固濟升打升
起蓋上者名秋水味淡而香乃秋石之精英也

本草求真卷第六 第一册終

本草求真卷六 第二册

臨濟府真真堂主人真真堂主人真真堂主人

湯火 趙養 莫日 其火 有立 命之本 為十二 經之主
 無此 則三焦 之氣不 能化而 水道不 行矣
 則不能 斷而謀 慮不出 矣
 而無二 則而心 無此則 明皆無 此則事 不化矣
 病者之 宜以命 門之火 為君而 加意以 火之
 字者此 則火不 宜有餘 則火亦 能為害 矣
 便是火 惟是火 而果有 餘則火 亦能為 害矣
 治氣味 不火之 則所發 木有其 基藥之 所至自 有
 故便閉 痼痛其 必治用 焉不苦 如大黃 是瀉胃 之藥

口渴 燥熱 其必用 焉黃芩 生地是 瀉肺火 之藥
 熱血 燥熱 各呈焉 火盛則 氣必阻 是宜於 桑白皮
 記盛 則粉火 盛則水 宜於地 骨皮火 盛則三 白皮
 大盛 則粉火 盛則水 宜於地 骨皮火 盛則三 白皮
 然於 天冬 寒氣 必逆而 嗽是有 越燥則 化源不 清是
 宜於 天冬 寒氣 必逆而 嗽是有 越燥則 化源不 清是
 羊角 火氣 必逆而 嗽是有 越燥則 化源不 清是
 則必 火氣 必逆而 嗽是有 越燥則 化源不 清是
 時之 火氣 必逆而 嗽是有 越燥則 化源不 清是
 木前 火氣 必逆而 嗽是有 越燥則 化源不 清是
 水盛 火氣 必逆而 嗽是有 越燥則 化源不 清是
 煩燥 火氣 必逆而 嗽是有 越燥則 化源不 清是
 有宜 火氣 必逆而 嗽是有 越燥則 化源不 清是
 大盛 火氣 必逆而 嗽是有 越燥則 化源不 清是
 鬱時 火氣 必逆而 嗽是有 越燥則 化源不 清是
 於青 火氣 必逆而 嗽是有 越燥則 化源不 清是
 者方 火氣 必逆而 嗽是有 越燥則 化源不 清是

黃芩 入肝 入心 肺熱 嗽味 苦入 心又 載入 肺經
 火人 脾除 濕入 大腸 以治 腸泄 腹痛 痢疾 有身 熱者 宜之
 病屬 於熱 則其 形氣 堅強 脈必 滑實 有力 身熱 則宜 之
 熱毒 冷熱 欲其 形氣 堅強 脈必 滑實 有力 身熱 則宜 之
 按非 或頭 疼身 熱痛 下疳 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒
 崩於 或頭 疼身 熱痛 下疳 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒
 力無 神則 其形 體弱 痛下 疳疔 毒疔毒 疔毒
 或雜 有紫 紅白 脈而 痛下 疳疔 毒疔毒 疔毒
 或至 腹如 絞痛 不食 或瀉 而飲 飲而 飲而
 症之 虛者 也其 入小 腸膀胱 以治 淋閉 目治 中焦 實
 火及 邪在 少陽 膽經 得此 以為 清理 一藥 而上 下

黃芩 入肝 入心 肺熱 嗽味 苦入 心又 載入 肺經
 火人 脾除 濕入 大腸 以治 腸泄 腹痛 痢疾 有身 熱者 宜之
 病屬 於熱 則其 形氣 堅強 脈必 滑實 有力 身熱 則宜 之
 熱毒 冷熱 欲其 形氣 堅強 脈必 滑實 有力 身熱 則宜 之
 按非 或頭 疼身 熱痛 下疳 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒
 崩於 或頭 疼身 熱痛 下疳 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒
 力無 神則 其形 體弱 痛下 疳疔 毒疔毒 疔毒
 或雜 有紫 紅白 脈而 痛下 疳疔 毒疔毒 疔毒
 或至 腹如 絞痛 不食 或瀉 而飲 飲而 飲而
 症之 虛者 也其 入小 腸膀胱 以治 淋閉 目治 中焦 實
 火及 邪在 少陽 膽經 得此 以為 清理 一藥 而上 下

表理皆治其功乃之泛涉始有難為指至者耳不
 知內火衝激外邪傳大皆能恣害上如胸膈咽喉
 下如肚腹二便中如表裡之所陰陽之界無不病
 症悉形以故腹痛腸瀉 寒熱往來 黃疸淋瀝
 胸高氣喘癰疽瘡瘍火嗽喉腥經閉胎漏口渴津
 枯一皆濕之所滯熱之所熾火之所勝 提出為
 病之 黃芩味苦性寒枯而大者輕飄上升以清肺
 肺清則痰自理矣 動常先降火 實而細者沉重
 下降以利便便利則腸腑自去酒炒則膈熱可除

本草求真 卷六 大黃 三四

而肝膽火熾生用則實熱堪投而腹痛斯愈 時珍
 景治少陽症小柴胡湯大陽少陽各病下痢黃芩
 黃芩味苦性寒枯而大者輕飄上升以清肺
 不授胃人上則故能收肺少陽之火而除胸膈
 以治手少陽相火又兼脾胃中焦之熱故用黃芩
 之起也 乃其能散火之標也 且得白朮
 仁以安胎得厚朴黃連以除腹痛得芍藥以治痢
 得柴胡以治寒熱往來此雖合上與下表裡皆治
 而究止為土中二焦濕火除熱與濕之味矣

本草求真 卷六

熱身如火燎煩燥引飲而虛者宜一兩 但肺
 虛腹瀉痛寒者切忌 時珍曰肺虛不宜苦 黃明
 者良中虛者為枯芩即芩茶肉實者名條芩即子
 芩上行酒炒瀉肝膽火猪膽汁炒山藥龍骨為使
 製丹皮丹砂
 黃連 山草
 黃連 大心 大苦大寒據書所載治功備極表
 著且以別錄中有厚腸胃一語互為傳播以至於
 今謬尤莫測貽害無窮詎知黃連止屬瀉心之品

本草求真 卷六 大黃 三五

除濕之味 心者其黃芩則瀉其子也
 云腸辟能止口乾能除病消腹痛能消癰疽瘡瘍
 能愈肝虛能鎮與夫婦人陰蝕小兒疳積並火眼
 赤痛吐血衄血諸毒等症無不由此調治亦何莫
 不因濕熱火退而言豈於濕除火退之外尚有治
 效之著哉 元素曰黃連其用六瀉心火一也
 瀉四也赤眼暴發五也山黃連中都見血六也朱震
 曰下痢赤白膿血者用黃連人參煎湯終日呷
 之如吐瀉強飲但得一二劑下痢便好 寒藥
 力以黃連為強治痢之最蓋治痢惟宜苦寒藥
 能發散開通積滯若能深濕寒能勝熱使氣直
 而已諸苦寒藥多濕推黃連黃連黃連黃連黃連

治痰
伏熱
以通

緣人水腫癰閉本有腐血腐氣之分肺伏熱邪不
能生水膀胱絕其化源便秘而渴此當清肺以利
水者也熱結膀胱真陰乾涸陽無以化便秘不渴
此當清膀胱以導濕者也黃柏氣味純寒雖能下
行以除膀胱濕熱但肺金不肅則化源無滋又安
能上達於肺而得氣分俱肅乎知母味辛而苦沉
中有浮降中有升既能下佐黃柏以泄腎水復能
上行以潤心肺汪昂曰黃柏入二經血伴氣清肺
肅而濕熱得解是以肯人有云黃柏無知母猶水

本草求真 卷六 以知母 三八

母之無蝦誠以見其金水同流子母一義不可或
離之義震亨曰小便不通有熱有濕有氣結於下
不燥但膀胱熱宜濕升又有隔二隔三之治如肺
生水則清肺此隔二之治如因脾濕不運而津不
上故肺不能生水則燥胃健脾此隔三之治如
膀胱黃疸知母之類清肺車前茯苓之類燥脾二
類之故書皆言用此在上則能清肺止渴却痰癆
潤心肺解虛煩喘吐血衄血去痰中脘臭在中
則能退胃火平消癰在下則能利小水潤大腸去
膀胱肝腎濕熱腰脚腫痛并治癆瘵內熱陰火熱
淋崩渴等症若謂力能補陰則大謬矣補陰惟地

本草求真 卷六

最苦謂此性最沉寒本無生氣用以清火則可
用以補陰則何補之有第其陰柔異顯似乎有德
猶之小人在朝國家元氣受其剝削而有陰移而
莫之覺者是不可不見之真而辨之早也讀此可
為妄用知母黃柏一箴得酒浸上行酒浸下行豈
水抹忌談

青熊熊膽 係藍靛汁沫攪澄掠出取乾而成味鹹
性寒也青大瀉肝經實火及散肝經火鬱初義曰

本草求真 卷六 青熊 三九

肺腹二陰起生熱燥熱并而痛此黃柏二便滋潤
藥類以脂黃丹之類塗之熱痛愈甚其類皆潤
食魚蝦蟹風之物乃用此散四兩研細入青
一兩和酒熱飲若不出仍服八正散而愈此小下焦
內痔如不能禁酒物果仍發痔故凡小兒風熱
驚癇疔毒丹熱癰瘡蛇犬等毒金瘡血出腫腐
食並天行頭痛瘟疫熱毒發斑吐血咯血痢血等
症或應作丸為衣或用為末乾滲或同水調敷或
入湯同服或作餅子投治如聖餅子治喉血川
根皆取苦寒之性以散風熱燥結之義即云功與
藍等而止血拔毒之功與治隔化蠱之力似較藍

三五七

而更勝也。和濁白鹽水片吹口亦最妙。取麝香者水飛淨石灰用鹽澱兼有石灰敷瘡殺蟲最奇。禹下膈非此不除。藍葉與黃印名大青大渴肝膽。買火以祛心胃熱毒。故於時疾陽毒發斑喉痺等症最利。功山神膏去虛而得。故斑得以透肌。如紫黑者其熱重而胃弱也。右藍子止能解毒除疔。故於鬼疫蠱毒之症最妙。

龍膽草

龍膽草 龍人肝膽兼大苦大寒性寒純陰大瀉肝

膽火邪之蒸肝膽之氣。正以其能瀉肝膽之邪也。兼入膀胱腎經。除下焦濕熱。與防已功用相同。故書載治骨間寒濕。驚癇。腦天行瘟疫熱利。疔黃寒濕脚氣。脚氣因是傷於寒濕而成。但腫而枯細痛而不腫者。名咽喉風痺。並酒炒同柴胡。治赤睛。舒肉。宜發散。忌用涼藥。但此苦寒至極。馮兆張云。其等於嚴冬。噴淡慘肅。萬草凋殘。苦寒伐標。宜暫而不宜久。如聖世不廢刑罰。所以佐德意之無窮。苟非氣壯質熱者。率爾輕投。其敗也必矣。

甘草水浸。葵用小豆貫衆。砂使惡地黃。

玄參

玄參 若鹹微寒。色黑。入腎。善雖能壯水。以制浮遊無根之火。攻於咽喉。循喉嚨。系舌本。凡喉痛。喉腫。喉乾。吐血。等症。謂其腎水受傷。真陰失守。孤陽無根。發為火病。得此色黑性潤。微寒以爲節制。則陽得陰歸。而咽喉不致腫痛。而莫已也。然此只可暫治。以熄其火。非若地黃性稟純陰。方能溫腎壯水。以制陽光。即昔有言服此玄參可以益

精明日消。痰除嗽及治一切骨蒸傳屍癩瘡。有陽此止就。慎慎煩渴癩癰疽等症。皆是從其半遊火熄起見。而言病無不治。非真陰虧損。藉此以爲之壯。以折其性微寒。故止可。若使病非火起。則服此寒滑之味。不更使病轉劇乎。是以書載。脾虛泄瀉。服此黑參爲大忌。耳蒸過焙。用勿化。鍊器惡黃者。山茱萸。東坡。藜蘆。

射干

射干 射干 形如烏羽。烏扇。又以烏羽烏扇爲名。

辛苦微寒。膏截瀉火解毒散血消痰。然究毒之所
胎血之所聚。痰之所積。又皆因火結聚而成。火
為射干若能降火寒能勝熱。兼因味辛上微俾火
降熱除。而血與痰與毒無不因之而平矣。是以喉
痺咽痛。結核疔瘡。便毒瘰癧等症。因於七血結於
心脾痰涎積於太陰。厥陰者。無不可以訓治
如金匱之治欬氣之用射干。麻黃治瘧母熱中煎
九川烏扇燒過千金之治喉痺。川烏扇膏。抑降之
治便毒之用射干。同生此煎服皆取性至寒降功

本草求真 卷六 海火 射干

多於上服則必瀉之意。若脾胃虛寒。切忌泄瀉者
熟炒用

天冬 蔓草

天門冬。補人。性苦大寒。據昔截瀉肺火。及兼補腎
然究止傷。若寒安能滋腎而補水乎。解所云能補
水者。以肺木清虛。涼則氣平。而不擾熱。則氣行而
不生。且肺為腎母。肺金火衰。則腎亦燥而不寧。腎
氣上攻。則肺益燥。而受乾。而此咳嗽。吐衄。痰結。
涕肺癰。肺痿等症。靡不因之。畢。肺。木。火。及。胃。氣。

清火 以化 星之 日

本草求真 卷六

上蒸與外感風寒內動。熱結而成。本於
津液枯竭。不能上行於肺。及熱傷而後。傷
力。痰咳。有血。而無沫。而便多。下。陰。虛。則。邪。傷。於
衛。故。味。有。沫。而。無。血。而。便。多。下。陰。虛。則。邪。傷。於
汗。作。故。味。有。沫。而。無。血。而。便。多。下。陰。虛。則。邪。傷。於
而。氣。不。振。則。胸。中。隱。隱。而。痛。瘦。則。胸。中。不。痛。
宜。於。外。下。痰。則。宜。潤。而。實。法。因。於。內。者。從。內。而
治。因。於。外。者。從。外。而。解。因。於。虛。者。養。血。補。氣。保。肺。
因。於。實。者。開。胃。升。散。得。此。清。肅。之。品。以。為。化。源。之。自。則
腎。木。必。即。補。而。補。腎。之。基。未。必。不。於。所。清。而。先。具
也。是以又云。補腎但其性滑利脾胃虛寒及無熱
而泄者最忌。若泄熱者。則不得用。取肥大明亮者

本草求真 卷六 海火 射干

良去心皮酒蒸用。地黃貝母。為使。惡鱈魚。二冬。聚

膏良

丹皮 蔓草

壯丹皮。歸心。辛苦微寒。能入手少陰。心足少陰
腎足厥陰。肝以治三經血中伏火。時珍曰。伏火即
陰火也。陰火即相火也。相火熾則血必枯。必燥。必
滯。與火上浮。而見為吐衄。因相火所屬。陰本靜
上。虛損與風。與痰。與火。相搏。而見五勞。七傷。癆瘵。
癆。則。筋。急。而。縮。癉。則。筋。緩。而。伸。或。伸。或。縮。手。如。掣。
筋。而。之。癆。癉。即。俗。所。謂。筋。為。搖。驚。則。外。有。所。觸。心。無。

清火 以化 星之 日

三五九

所謂則卒然昏仆身軟吐痰時發時止
 曰志勞二日心勞三日思勞四日憂勞五日度勞
 厥結而見瘡毒難毒產難並無汗骨蒸
 無汗用此不特味辛而散血中之實熱且有涼相
 火之神功世人專以黃柏治相火而不知丹皮之
 功更勝蓋黃藥惡寒而燥初則傷胃久則敗陽若
 燥之性徒存而補陰之功絕少丹皮赤色象離能
 潤陰中之火使火退而陰生所以大足少陰而佐
 滋補之用較之黃藥不啻霄壤矣張元素曰丹皮
 治無汗之骨蒸地骨皮治有汗之骨蒸神不足者

手少陰心志不足者足少陰腎氣丸用丹皮
 治神志不足也內經曰水之精為志故腎氣丸用丹皮
 性小而泄性多凡虛寒血崩經行過期不盡者
 煎藥焉赤者利血白者兼補氣酒拌蒸用忌蒜胡
 荻伏磁
 黃藥黃藥
 黃柏黃柏 背人同知母用於六味丸中各為
 知藥八味丸又同知藥各一兩酒洗焙研人桂各
 為滋腎丸時珍曰如佐黃藥滋陰降火有金水相

火知母能清肺金滋腎水之化源謂其可
 陰此說一出而天下翕然宗之以至於今卒不可
 破詎知黃柏性專至陰味苦性寒行陰冬肅殺之
 令故獨入少陰瀉火入膀胱瀉熱好古曰黃藥
 心黃柏入腎燥濕所歸各從其類也震亨曰火有
 二若火者人火也心火也濕法可以水滅火也
 以血折黃連之病可以水濕折之火者天火也
 之火也陰火也不可以水濕折之當從其性而伏
 之惟黃柏之凡人病因火亢而見骨蒸勞熱目赤
 耳鳴消渴便閉及濕熱為病而見諸痿癱瘓
 氣虛血虛脾虛腎虛熱死血之別但因其傷血
 血不養筋而致痺痺而拘濕則傷筋筋不束骨而

致強長而功在利水水瀉熱利黃連水腫長
 黃藥名二妙散以治木水瀉熱利黃連水腫長
 破出水雙腫出飲食不下痛甚其引名狀治
 利小便便濁之藥服之勝於此乃奉治
 過管架黃連上而為水以勝於此乃奉治
 不化火又逆上而為水以勝於此乃奉治
 便格則吐逆者遂處以此方大苦寒之劑
 月各一兩酒洗焙研人桂各為滋腎丸
 百九少兩酒洗焙研人桂各為滋腎丸
 成流顧盼之間時血癆風濕赤白為病
 諸痛瘡癢虻虫山攻之外生瘡用黃柏
 吐就冠氏行義治心脾有熱舌燥用黃柏
 相背黃各一分為大人生能腦一用黃柏
 分亦黃用細辛等分為木能腦一用黃柏
 分亦黃用細辛等分為木能腦一用黃柏

是虛火上炎宜用參朮甘稷乾薑 脰其尺果洪大
附子之類或喻官桂引火歸元 按之有力可炒黑斬用使其濕熱順流而下陰火
因爾潛伏則陰不受煎焚而陰乃得長矣非謂其
陰虛損服此即有滋潤之力也 發明曰非真陰虧
以謂之腎欲緊急食苦以堅之也 相火起而身
則無狂瀉之患矣 按腎木屬水虛則火起而身
虛則 故於實熱實火則宜黃柏為君 腎火
寒則 故於實熱實火則宜黃柏為君 腎火
血漸潤故陰虛火動之病須之然必少壯氣壯則陰
食者用而於虛熱虛火則徒有損而無益也 中
不足而邪火熾盛者大服則有寒中之變也 時
損及縱能求嗣之人用補除藥行存以此二味為

君曰日服個降合太過房胃受傷其陽竭精氣
不眠致生他病蓋不知此苦寒而清泄且苦味加
帶有味反從火化之害故藥氏醫學統旨有曰物加
知味黃柏火燥火傷胃不能生陰之戒 壯日拔火
有虛火實火燥火傷胃不能生陰之戒 壯日拔火
胃火宜清燥火宜潤火宜清燥火宜潤火宜清燥火
為肺肝肺病於火是也所謂清潤火宜清燥火
寄於肺者乃能制之非苦寒所熱而兼補於熱相火
血北水之主以制陽火非苦寒所熱而兼補於熱相火
是有木經白病者如怒生肝火焦思之心火症為多
是也 有子相者如怒生肝火焦思之心火症為多
之類是也 有子相者如怒生肝火焦思之心火症為多
於大腸而泄瀉心煩移者如移移於小腸而移移
濕周之類也 有子相者如怒生肝火焦思之心火症為多
滋潤之類也 有子相者如怒生肝火焦思之心火症為多
不問虛實竟有為去熱治勞之妙藥而不知陰寒

本草求真 卷六

之性能損人氣減人食命門真元之火一見而消
亡脾胃運行之職一見而吐衄元氣既虛又用苦
寒過絕生機莫此為甚川產肉厚色深者良生用
降實火滋炙則不傷胃炒黑能止崩帶酒製治土
寒製治水鹽製治下
桑白皮 三草七
桑白皮 性寒善入肺中氣分瀉火利水
除痰泄氣練氣與水與痰止咳病標其氣逆不利
與水飲膠結米有不因火結而成 肺中火邪非
本草求真 卷六 桑白皮

肺氣也火與元氣不兩 久而不治則痰結便秘喘
立火去則氣得安矣 嗽胸消唾血口渴水腫脹脈不色色而見桑白
皮辛甘而寒能於肺中治火利水俾火去而水自
消水去而火即滅而氣因爾而治 時珍曰桑白皮
實則濁其子也故肺中有水氣及肺火有餘者宜
之十劑云燥可去濕桑白皮赤小豆之屬是也朱
散用桑白皮炒氣盛咳喘而後兩兩分 兩兩分
每服一二錢人瘦米百粒水煎食後溫服桑白皮
地骨皮皆能瀉火從小便去甘草瀉火而燥也桑
米清肺而養血此乃至書有云能補元氣之不足
海肺諸方之準繩也 不過云其氣得自安若以甘寒之味可以補氣則

三六一

桑

尚謂甘溫於何地乎。况本草十劑篇云燥可去濕。桑白皮赤小豆之屬是也。故濕則為重宜燥劑以除之。而字從濕去重除之後。但此性寒而裂。其裂雖有甘味。不能以制。故古人有戒勿多用之。條及肺虛火衰水涸風寒作嘔者為切忌。為緣可縫金瘡。刮去皮取白。或恐瀉氣。蜜炙用。續斷桂心。為使忌。誠桑乃其木之精。其木能開。開利水。扎把。然火則能去風除痺。故煎藥。麥膏宜用。時珍曰。取其能利關節。除風寒。濕痺。諸痛也。假藥。經治寒痺。內熱。用桂酒法。以桑炭。炭布巾。煨。藥。經治。

桑

用時。膏法。以桑。鈎。鈎。其。月。及。坐。桑。灰。上。皆。取。此。也。又。種。種。殊。持。不。起。發。或。瘡。肉。不。腐。潰。及。陰。瘡。瘰。癧。流。注。腫。痛。疔。毒。癰。疽。惡。瘡。久。不。愈。者。用。桑。木。灸。法。去。風。寒。火。性。暢。達。出。清。毒。之。意。其。法。以。乾。桑。木。成。細。片。葉。作。小。把。燒。火。吹。息。氣。患。處。每。吹。桑。木。以。敷。於。肉。腐。動。為。度。內。桑。椹。甘。涼。色。黑。治。能。除。熱。陰。止。渴。烏。鬚。黑。髮。百。種。風。又。確。可。以。汁。熬。燒。酒。能。力。愈。佳。味。桑。耳。散。血。除。痰。破。癥。攻。癥。桑。葉。清。肺。胃。涼。血。燥。濕。去。風。明目。聖。藥。研。碎。治。吐。血。不。止。晚。服。止。後。川。補。肝。肺。藥。千。金。方。治。頭。髮。不。長。用。桑。葉。煎。汁。水。沫。之。七。次。可。長。數。尺。集。簡。治。風。眼。下。淚。用。脂。不。落。桑。葉。煎。湯。日。洗。或。入。芒。硝。分。桑。生。除。風。濕。烏。鬚。明。目。用。黑。芝。同。桑。葉。等。分。為。

九。黃。字。曰。經。雷。桑。葉。研。末。米。飲。服。止。盜。汗。
山。梔。子。三。言。大。木。
梔。子。味。苦。大。寒。輕。飄。象。肺。色。赤。入。心。腎。言。能。瀉。心。肺。熱。邪。使。之。屈。曲。下。從。小。便。而。出。肺。清。則。氣。能。利。小。便。充。之。皆。化。而。化。故。曰。而。三。焦。之。傳。火。以。解。熱。厥。心。痛。以。平。心。痛。因。熱。清。而。成。熱。此。止。就。其。大。勢。論。耳。若。使。痛。喜。手。按。則。痛。而。成。熱。此。止。就。其。之。兼。症。兼。脈。以。分。病。之。是。當。以。膜。之。陰。陽。及。今。所。見。溫。宜。涼。則。得。之。矣。不。可。以。治。熱。成。熱。為。泥。吐。衄。血。淋。血。痢。之。病。以。息。而。血。不。歸。不。可。妄。用。本。草。經。以。

本草綱目 卷六 潤火 山梔子

治。黃。火。之。血。順。氣。為。先。氣。行。則。血。自。歸。經。而。虛。不。論。寒。熱。虛。實。但。見。病。血。即。能。攝。血。歸。經。見。今。醫。士。熱。治。妄。用。梔。子。連。芩。柏。等。藥。為。可。惜。且。能。治。心。煩。懊。黃。五。淋。亡。血。津。枯。口。噤。目。赤。風。癩。等。症。此。數。語。業。已。道。其。大。要。矣。然。更。就。其。輕。清。以。推。則。浮。而。上。者。其。治。亦。上。故。能。治。心。肺。之。火。而。凡。在。上。而。見。消。渴。煩。燥。懊。憹。不。眠。頭。痛。目。赤。腫。痛。等。症。得。此。以。除。氣。燥。梔。子。神。效。梔。子。或。湯。用。梔。子。以。治。肺。煩。香。或。以。治。腎。燥。又。用。梔。子。作。吐。藥。以。散。在。腸。之。邪。與。湯。所。謂。高。者。因。而。越。之。是。也。故。梔。子。散。就。其。味。苦。而。論。則。苦。而。下。者。其。治。亦。下。故。能。瀉。肝。腎。膀胱。之。水。

而凡任下而見淋閉便結黃痢氣吐衄血崩漏
傷血瘀等症得此以泄易簡方治血不止用山
梔子燒灰吹之屢效普濟
方治小便不通用梔子仁十四箇同煎治痢疾
傷少許用梔子仁及黃連大即通怪症方治痢疾
此皆治痢疾用梔子仁燒灰水服一錢是結按
其則宜日惟其氣浮故使景用此以吐上焦之
痰滯惟其味苦能降故丹溪用此以降內鬱之邪
耳但治上宜生治下宜炒宜黑雖其上下皆入而
究則由自肺達下故能旁及而皆治者也此惟實
邪實熱則宜若使前非實熱概為通用恐不免有

根食泄瀉之虞矣生用瀉火炒黑止血煎汁服之

煩嘔內熱用仁表熱用皮

地骨皮音五

地骨皮音五即枸杞根也味甘氣寒雖與丹皮同

治骨蒸之劑但丹皮味辛能治無汗骨蒸此為味

甘能治有汗骨蒸且丹皮原屬入血散瘀之品汗

者血也無汗而見血瘀則於辛於寒最宜若有汗

骨蒸而更用丹皮辛散不竟使毒汗無血乎經

曰熱滯於內馮以甘寒地骨皮是也按地骨皮人

肺降火入腎涼血涼骨凡五內熱滯而見肌肉
熱二便癰閉胸脅痛是與夫於頭而見風痛不休
外感之風宜散而內生之於表而見潮熱無定
風宜清熱除而風自熄於表而見潮熱無定
煎外而達於表知病或風其散而表虛作潮能
非柴葛所能治用皮走表又走裡之藥用於
其香遊之邪服之未有不愈者特表而出之
肺而見消渴咳嗽不寧上腎火不用此解除令人
但知琴述以治上焦之火知琴以治下焦之火而
不知地骨皮之甘淡微寒深得補陰退熱之義矣
時珍常以青蒿佐此退熱屢有殊功李東垣曰地

為陰骨為裡皮為表服此既治內熱不生而於表

裡浮遊之邪無有不愈此為表裡上下皆治之藥

而於下為尤切焉但脾胃虛寒者禁服汪昂曰

杞子中寒者忌地骨皮蘇頌甘草水浸用

枇杷葉音平

枇杷葉音平味苦氣平諸書皆言瀉肺治嗽綠嗽

多由胃氣不和肺氣不順以致火氣痰塞因而咳

嗽不已丹溪云氣有餘便是火火起則痰生服此

味苦而平則肺金清肅而氣不患上逆而順矣氣

順則痰血火皆順類而逆者不逆睡者不
嘔咳者不咳渴者不渴是以昔人用此合以款冬
花紫苑杏仁桑皮木通等分大黃減半蜜丸以治
肺熱火嗽身如火次令其食後夜卧念化一九劑
未終而病即愈則知此為清肺治火止咳之要劑
也取葉乾重三錢者為氣足挾淨毛以免射肺作
咳或薑炙或蜜炙各依方用

茶茗 言世

茶茗 謂人大者為茗小者為茶茶稟天地至清之

氣得春露以培生意克足纖芥滓穢不受味甘氣
寒故能入肺清痰利水入心清熱解毒是以垢膩
能滌炙博能解凡一切食積不化屬滯頭目不清
熱痰涎不消二便不利消渴不止及一切便血吐
血衄血血痢火傷日疾等症服之皆能有效湯液
若寒下行如何是清頭日蒙但熱服則宜冷服聚
若日藥下降則上自消矣精至於空心飲茶既宜
痰多服少神入腎則火復於脾胃生寒除服之不宜煎
服茶之症處甚多有以陽羨名者謂之真益茶治

能降火以清頭目有以臘茶名者以其經冬過臘
佐劉寄奴治衄血最效有以松蘿名者生於微
尚於化食有以日鑪名者生於浙紹尚於清火有
以建茶名者生於閩地尚於辟瘴有以苦丁名者
產於六合尚於止痢有以普洱茶名者生於滇南尚
於消食辟瘴止痢至於蒙山世所罕有且有許多
偽克其偽莫辨然大要總屬導痰宣滯之品茶與
同煎名茶散能治赤白痢蓋茶雖一日之利暫
快而終身之累斯大損多益少服宜慎矣

本草求真 卷六 湯火茶茗

犀角 言世

犀角 入胃兼入心苦鹹大寒功尚入胃清熱及入心涼
血蓋胃為水穀之海無物不受口鼻為陽明之竅
凡毒邪必先由於口鼻而大以及於陽明胃腑
時珍曰五臟六腑皆稟氣於胃風邪犀角為神靈
熱毒必先干之飲食藥物必先入胃犀角為神靈
之獸食百草之毒及象木之棘角尖精力盡聚用
此苦寒之性使之尚入陽明以清諸熱百毒也熱
邪既去心經自明所以狂言妄語熱毒癰腫驚癇
目赤吐血衄血蓄血時疫斑黃痘瘡黑陷等症無

五

不由於入胃入心散邪清熱涼血解毒之功也然
痘瘡心火初用不無水伏之虞後用不無引毒入
心之患故必慎用始無碍耳至於蠱毒之鄉遇有
飲食以犀筋攪之有毒則生白沫無毒則無若云
可以發表取汗則必毒熱閉表合以升發等味同
投則見魄汗淋漓若微毒單用則不及矣錫成以
熱掌摸之香者真尤須身而光潤不香者假成器多被蒸
其無力入湯剉磨汁入丸劑剉細納懷中待熱搗
之立碎升麻爲使忌鹽

本草求真 卷六 海大犀角

五十四

羚羊角 三言

羚羊角 入心肝兼 苦鹹大寒功歸入肝海火兼入
心肺二經考書所論主治多屬冗雜惟李時珍剖
晰甚明言羊火畜也而羚羊則屬木故其角入厥
陰肝經甚捷同氣相求也肝主木開竅於目其發
病也目睛障翳而羚羊角能平之肝主風在合爲
筋其發病也小兒驚癇婦人子癇大人中氣抽搐
及筋脈纏急歷節掣痛而羚羊角能舒之魂者肝
之神也發病則驚駭不寧狂越僻謬癡瘖卒死而

羚羊

羚羊角能安之血者肝之味也發病則痰滯下注
疝痛毒痢瘰癧癰瘻產後血氣而羚羊角能散之
相火毒於肝膽在氣爲怒病則煩懣氣逆噎塞不
通寒熱及傷寒伏熱而羚羊角能降之羚羊之性
而筋骨之精在角故又能辟惡而解諸毒碎佛牙
而燒烟走蛇虺也本經別錄甚著其功而近俗罕
能發揚惜哉時珍之論如此但此雖能清肝及肺
若使過用久用則更有伐生之氣耳多兩角一角
者勝若一處有節而疎乃到研極細或磨用

本草求真 卷六 海大羚羊角

五十五

人中白 三言

人中白 入肝 即溺白垂之物故以白名味鹹氣
平能瀉肝經膀胱火邪使之盡從小便而出蓋膀胱
係溺白之故道用此正以由其故道耳今人病
口舌諸瘡用之有效降火之驗也張景岳云李
存喘息張思順用人中白散即時血止又延陵
官魯棠鼻如傾白衣變紅頭空然張潤之用
人中白藥治之即止並不故可以治癆熱消渴痘
瘡倒陷牙疳口瘡等症但儘堪以滌熱清火而不
可以言補耳煨研用
尾上取

人中

童便

童便 人肺肝心 係孩童津液濁氣滲入膀胱而
出味鹹氣寒無毒為除癆熱骨蒸咳嗽吐血婦人
產後血衄暈悶絕之聖藥褚澄遺書云降火甚速
降血甚神飲瘦弱百不一死非真不死其言功力
之優也又言人痰有痰則咳血殺人咳不停物奪
經云飲入於胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上
歸於肺通調水道下輸膀胱故人服小便入胃亦
隨脾之氣上歸於肺下通水道而人膀胱乃尋其

本草求真 卷六 四火人中白前

五

舊路也故能治肺病引火下行凡人精氣清者為
氣濁者為血濁之清者為津液濁之濁者為小便
與血同類也故味鹹而走血鹹寒能伏虛熱使火
不上炎血不妄溢是以能療諸血症也凡人久嗽
失音勞傷煩燥吐衄損傷皮膚皴裂人咬火燒絞
腸痧痛難產胞衣不下法當乘熱飲之
覆車被傷七人仆地呻吟俱命在斯已云予
腹或作痛或發熱煩燥口渴推脈此宜服此若
不傷氣血萬無一失軍蓋熱則尚存真氣其行自
中參用此屢試有效

速冷則惟有鹹味寒性矣若救陰却痰必以童便
為優蓋取混元之氣清純而不有雜耳但得寒食
今人類用秋石雖亦能入腎除熱但經水澄火煉
真元之氣全失其功不及童便多矣况多服火服
則鹹能走血令血凝氣滯為病矧有陽氣素虛食
少腸滑者其可用之為治乎取童子十歲以下相
火未動不食葷腥酸鹹者佳去頭尾取中間一節
清微如水者用痰用薑汁擦用薑汁冬月用湯溫
之

本草求真 卷六 四火人中白前

五

三稜代緒石湯

下氣者人身之實月能一身頃刻無間稍有或
 之使河間謂人五志過極皆為人身大患也氣以
 哉便虛者宜補氣之降者宜升氣之散者宜通氣
 餘之迫者宜寬氣之鬱者宜泄氣之破者宜降氣
 之勝者宜固氣之實而堅者則又宜破之出於肺
 而巳蓋氣之源發於腎統於脾而氣之出於肺
 則降之藥海出於肺於腎與脾氣之出於肺
 其一二而已如馬兜鈴非因入肺寬胸消痰止咳
 其氣乎藉子非因入肺寬胸消痰止咳喘定喘而

其氣乎杏仁非因入肺開散風寒而肺萎下其氣乎
 把葉非因入肺熱而肺散風寒而肺萎下其氣乎
 通其氣乎花非因入肺熱而肺散風寒而肺萎下其氣乎
 乎括非因入肺熱而肺散風寒而肺萎下其氣乎
 隨子非因入肺熱而肺散風寒而肺萎下其氣乎
 寬胸非因入肺熱而肺散風寒而肺萎下其氣乎
 之胸非因入肺熱而肺散風寒而肺萎下其氣乎
 肝二經三破而氣則在肝經血分之中降而中
 脾中下血而氣則在脾經血分之中降而中
 子則下血而氣則在子經血分之中降而中
 真火則下血而氣則在真經血分之中降而中
 下氣則下血而氣則在下經血分之中降而中
 之者則下血而氣則在之經血分之中降而中
 思而詳辨乎

三稜肝味苦氣平皮黑肉白大破肝經血分之
 氣故凡一切血瘀氣結痞硬食停老塊堅積靡不
 藉此味苦入以血分行其氣滯仰血自氣而下但
 此若以血藥同投則於血可通以氣藥同入則於
 氣可治仍須和以補氣健脾之味方良

小者良今世所用皆草三稜醋浸炒或麴製煨
 反不行而積增矣出荆地色黃體重若鯽魚而
 刀柄不無訛誣若使專用剋伐則胃氣愈虛氣
 辟死遺言開腹取之得病塊如石交理五色削成
 刀柄有云三稜柄消成水續按其人患癰腹內血
 刀柄不無訛誣若使專用剋伐則胃氣愈虛氣
 反不行而積增矣出荆地色黃體重若鯽魚而

旋覆花

旋覆花 大腸 即本經所名金沸草者是也其性
 雖兼辛溫凡陰虛勞嗽風熱燥欬不可誤用用之
 其嗽必甚究之味苦而鹹性主下降凡心脾伏飲
 脇下脹滿胸上痰結唾如膠漆風氣濕痺皮間死
 肉服之即能更有效更能續筋敷傷筋斷搗汁滴傷
 月即愈時珍曰凡瘰癧之屬象人之筋所以多
 治筋病旋覆花瘰癧如筋可啖故能續筋敷傷是
 以仲景之治傷寒汗下後心下痞堅噎氣不除有
 旋覆代緒石湯噎氣即噎氣也經曰五氣所病心

上散使出於胃故為噎噎氣多屬胃氣也...
 失職消無所歸...
 以扶正...
 升而...
 參甘大...
 疑...
 兩脅...
 性專...
 其不...
 數用...
 杏仁...
 本草求真 卷七下氣旋覆花杏仁

杏仁...
 力緣...
 痰杏...
 欬逆...
 毒錫...
 能消...
 研慮...
 升去...
 每用...
 也弱...
 東垣...
 論杏...
 仁與...
 紫...
 均...
 屬...
 宣...
 肺...
 除...
 解...
 開...
 瀉...
 而...
 一...

主於肺經之血...
 仁俱...
 仁一...
 杏仁...
 表虛...
 切忌...
 毒而...
 則氣...
 門在...
 手收...
 本草求真 卷七下氣杏仁

久服...
 治陰...
 血之...
 殺入...
 枳殼...
 枳殼...
 凡凡...
 胸滿...
 風濕...
 痺等...
 症治...
 皆能...
 除至...
 昔有...
 云枳...
 殼能...
 氣明...
 目...

似屬証誕但人臟腑本貴清利清利則氣自益而
 目自明枳殼體大氣散解較之枳實功雖稍遜而
 枳氣寬胸請之益氣非其宜乎王好古曰枳殼佐
 氣佐以硝黃牽牛則破氣此本以參木乾薑則益
 經所以言益氣而復言消痞也但多用則能以損
 胸中至高之氣雖求胎瘦胎亦有進用枳殼之味
 昔湖陽公主難產方士進瘦胎飲用枳殼四兩其
 草二兩五月後日服一錢原古改以枳木各束胎
 丸然必氣實可抄若使氣虛而用則不免有虛虛
 之禍矣婦人胎前無滯則產後無疎者良
 虛也氣弱者大非所宜矣陳者良
 枳殼音子
 澀木

枳實音子
 澀木人
 因實厚月氣味與枳殼皆酸微寒無異但實小性
 醇下氣較殼最迅故書載有推牆倒壁之功不似
 枳殼體大氣散而僅為利肺開胸寬腸之味耳是
 以氣在膈中則用枳殼氣在胸下則用枳實氣滯
 則用枳殼氣堅則用枳實雖古有云枳殼治氣枳
 實治血然氣行則血自通究皆利氣之品而非通
 血之劑耳故同白水則可謂脾同大黃則可推痰

時珍曰枳殼自飛門至魄門皆
 肺主之三焦相通一氣而已若氣虛痞滿而用枳
 實枳殼則與抱薪救火者無異矣
 蘇麥音三
 麥入
 蘇麥味甘性寒治能降氣寬腸消積去穢凡
 白帶白濁泄痢痘瘡潰爛湯火灼傷氣盛濕熱等
 症是其所宜且炒焦熱水衝服以治絞腸沙腹痛
 醋調塗之以治小兒丹毒赤腫亦妙蓋以味甘大
 腸性寒濕熱氣動而降能使五臟津滯皆鍊而去
 也俗言一年沉積在
 腸胃者即去也若使脾胃虛弱不堪服食食

則令人頭眩作嘔和猪羊肉食食則令人鬚眉脫
 落又不可合黃魚以食皆是其性動降之故時珍
 云最降氣寬腸故能破腸胃滯滯而治瀉若
 減前腹痛上氣之疾氣虛有熱者宜之
 燒灰淋汁即鹼用化石灰能去腐肉

本草求真卷七(第二册)

平海平者從輕酌減之意也凡人臟氣不固或
 故僅酌其微苦則發流至平至輕之劑以進如海
 同以熱不微苦則發流至平至輕之劑以進如海
 四中以熱不微苦則發流至平至輕之劑以進如海
 肺大熱而必用除肺寒鬱金合清肺熱沙參清
 肺理濕把把把把把把把把把把把把把把把把
 熱消勞必進用除肺寒鬱金合清肺熱沙參清
 而火伏留節蒸早逆草入肝飲氣鈞血青蒿草清
 而火伏留節蒸早逆草入肝飲氣鈞血青蒿草清

本草求真 卷七(第二册)

補面齋

通起清心以解毒竹葉清心以消煩萱草清心以
 已發汗竹葉清心以解毒竹葉清心以消煩萱草清心以
 無汗竹葉清心以解毒竹葉清心以消煩萱草清心以
 陰陽散或用以除皮以除有汗骨蒸而已至於調劑
 或用散行血則陰陽水止咳消渴解毒開胃則
 或用散行血則陰陽水止咳消渴解毒開胃則
 也。用之得宜自有起死回生之力。未可忽為淺常已

沙參

沙參味甘苦而淡性寒體輕故能入肺以泄熱
 及瀉肺火凡久嗽肺萎金受火尅者服此最宜蓋
 以熱氣薰蒸非用甘苦輕淡不能以制焚燼之勢

肺火

故嗽必藉此止若寒客肺中作嗽切勿妄用以嗽
 既精寒成復以寒藥為治不更使寒益甚乎至書
 有言補肺養肝及益脾腎皆從肺子母受累推
 究而此服此肺不受利子母皆安即肝亦不受累
 諸臟並見安和耳非真能以補陰也然在於肺宜
 陰不受累故書言人參補五臟之陰凡書所載藥性補瀉
 類多如斯不獨沙參為然似人參而體輕鬆白實
 者良生沙地長大生黃土者瘦小惡防已反藜蘆
 慈苡仁

本草求真 卷七(第二册)

補面齋

慈苡仁味甘入肺書載上清肺熱下理脾濕以其色
 白入肺性寒濕熱味甘入脾味淡滲濕故也然此
 升少降多凡虛火上乘而見肺萎肺癰因熱生濕
 而見水腫濕痺脚氣血氣泄痢熱淋並風熱筋急
 拘攣等症皆能利水而使筋不縱弛主筋為厥陰所
 陽明胃土以爲長養蓋筋明胃土內無濕熱以滋
 則筋上不至蒸熱而筋亦潤宗筋而筋則筋力
 束而筋則筋力束而筋則筋力束而筋則筋力束而
 而治筋則筋力束而筋則筋力束而筋則筋力束而
 能成病故濕之為病因於濕熱而筋力束而筋力束而
 能成病故濕之為病因於濕熱而筋力束而筋力束而

燥動升平香皆致濕之固也筋急寒熱皆有因熱
筋急當用慈苳清熱除濕因寒筋急法當散寒除
濕似不宜用慈苳清熱之劑注非若白木氣味苦
昂不然苳義之說亦非確論
溫寒性不見號為補脾要藥矣此止清熱利水之
味用於湯劑性力和緩須倍他藥若津枯便秘陰
寒轉筋及有孕婦女不宜妄用以性偏下泄也較
虻取根同糯米炒熟或鹽湯煮過川

麥冬

麥冬 溫草
麥冬 心 肺 入 有 類 天 冬 然 麥 冬 甘 味 甚 多 寒 性 差 少
天 冬 所 主 在 肺 而 麥 冬 所 主 則 更 在 肺 而 在 心 是

本草求真 卷七 平瀉 麥冬

以書載功能消痰止咳
日夜無度痰涎稠粘而喘急則聲嘶而濁先緩後急
其發必暴或早甚或暮甚或為清痰少氣而喘乏外
痛者必暴或早甚或暮甚或為清痰少氣而喘乏外
或為形有各瘦或兩漸以甚其氣或為內傷其聲重
亦微數重必所除煩去痰除嘔按經言其脈輕
急薄以若則上為足弱不能以行之症心熱火炎
下喉而生疔疔不能任地之症肌肉不仁發熱而
成拘攣筋痠之症脾熱不舉背枯髓竭肉骨不仁發
內痠之症腎熱腰脊不舉背枯髓竭肉骨不仁發熱而
症獨肺熱而兼焦高源化絕而諸臟不得仰肺而
滋既故痠痲推於肺而治痲又責重於陽明肺而皆
又載同人參則能復脈生津脈散非合心而皆

本草求真 卷七

治乎蓋肺朝於百脈脈屬心燥則肺失養而脈
絕心清則氣即充而脈復麥冬氣稟清肅能於心
中除煩生肺潤水得譬如人當盛暑則燥灼不寧
若值秋風一玉則炎熱頓解而無燥鬱不堪之候
矣 東垣曰人參甘寒潤火熱而益元氣麥冬苦寒
益五臟而清水源五味酸溫潤內火而補真金
之氣也至於乳汁不開用此則能通活熱血妄行
用此則能即止他如膈上之稠痰得此則消心下
之支滿得此則除脾有積熱則化胃有火嘔則止
色因血枯即潤嗽久不止即愈誠保肺之津梁清

本草求真 卷七 平瀉 麥冬

心之指南也但氣寒而虛人禁用肥大者良去心
用入滋補藥酒浸地黃車前為使惡寒冬畏苦參
青箱木耳
百部 溫草
百部 肺 入 甘 苦 微 溫 功 尚 殺 虫 能 除 一 切 蠱 毒 及
傳屍竹蒸樹木蛀虫疔積疥癬即死然亦能治
寒嗽及泄肺熱以其氣味甘溫故也李時珍云二
冬亦屬治嗽但二冬性寒治熱此則氣溫治寒耳
百部雖云微溫而苦過於甘於氣總屬有碍似於

三七一

虛人不宜... 不可不知... 根多成百故以百名取

百合

百合... 味甘微寒... 功有利於肺心而能欬氣養

心安神定魄... 除熱利濕之品... 因其氣味稍緩

於心肺最宜而不致與血有礙... 是以餘熱未靖

坐臥不安... 咳喘不已... 肺氣必虛

收... 作熱治... 但此專就餘熱言... 經曰肺為涕肝為淚

本草求真 卷七 平陽百部百合

心為汗... 胸膈無脈狀有鬼神... 用此治其餘孽

收其殘膏安養撫恤... 慰感不驟... 故能安享無事豈

非寧神益氣之謂乎... 仲景用此以治百合病症... 義

亦由此... 但初嗽不宜遽用... 花白者入藥

石斛

石斛... 生於石上... 體瘦不肥... 色黃如金

斂甘淡微苦鹹平... 故能入脾而除虛熱... 入腎而滋

元氣及能堅筋骨... 強腰膝... 凡骨痿痺弱... 痰濕精少

小便餘瀝者... 最宜以其本生於石... 體堅質硬故能

本草求真

補虛弱... 強筋助骨也... 但形瘦無汁味淡難出非經

久癸氣味莫泄... 故止可入平劑... 或養膏用以治虛

熱補性雖有... 亦惟在人諒病輕重施用可耳... 取光

潤如金釵股... 短中實者長而虛者名水斛... 不堪

入藥去頭根... 酒浸用... 惡巴豆畏蠶

鉤藤... 味甘微苦... 氣平微寒... 為手少陰心厥陰

肝經要藥... 緣肝主風... 心主火... 風火相煽則風因火

而愈熾... 火亦因風而益盛... 其在小兒則病必在驚

本草求真 卷七 平陽鉤藤

痛癢癢眼... 翻抽掣... 筋急而縮... 為癢筋緩而抽

是大人則病必見頭旋目眩... 婦人則病必見赤白

帶下... 故必用此... 輕平宜泄以為下降... 則風靜火熄

而驚風熱自爾其克除矣... 筋類象筋故抽掣病此

惟小兒風熱初熱... 病未見甚者用之得宜... 若使風

火至極勢難驟過... 則此輕平疎泄效難克奏... 又當

細審所因... 用以重劑以為投服... 則藥始與病當而

無病重藥輕之弊矣... 取藤細多鉤者良... 有久煎則無力

白茅根 音五

茅根 音入味甘性寒清熱瀉火消痰利水凡苦寒之藥未有不傷氣敗胃此藥味甘性純專理血病凡一切吐血衄血血瘀血淋血崩血閉並噦逆喘急煩渴黃疸水腫等症因熱因火而成者服之熱除而血即理大退而氣與水即消次則血山於此上行與血由於肺火所致者皆用且能解酒毒此水煎服或為末水調服且能解酒毒恐爛五臟用茅瀝癰疽及疔毒諸瘡或用根搗敷或用以黃汁調敷等藥或以酒煮亦無不可此

本草綱目卷之七

青蒿 音四

藥甘不泥腸寒不傷中為治虛羸客犯中州之劑時珍曰良藥也世人以微而忽之惟至云能以苦寒之劑傷中和之氣為足知此哉至云能以補中益氣雖出本經然亦不過因胃熱既除而中氣自復豈真補益之謂哉經解之說似未可信茅以白者為良初生茅針可以生噉甚益小兒功用亦同屋上敗茅止衄效最妙

青蒿 音四

青蒿 音入性稟芬芳味甘微辛氣寒無毒陰中有陽降中有升能入肝腎三焦血分以療陰火伏

留竹節 音四

留竹節故凡竹蒸勞熱及風毒熱黃久瘧久痢瘧疾惡寒鬼氣屍疰等症皆須服此時珍曰月令謂亦蒿懸門庭可辟邪冬主元日各服二錢以其苦有泄熱殺蟲之能陰有退熱除蒸之用辛有升發舒脾之功而又於胃中氣不犯以其得春升之介最早也其形有類山茵陳又能清上虛熱以治目疾且燒灰淋汁點治惡瘡癰肉腐癩生搗可敷金瘡止血止痛但性偏寒不溫雖曰於胃不犯亦止就其血虛有熱服之得宜而言若使脾胃虛及

本草綱目卷之七

萱草 音四

見泄瀉則於此終焉有忌矣童便浸葉用焚膏良使子勿使葉使根勿使莖

萱草 音四

萱草 音入何以萱各以其草屬蔚茂值可以解憂詩曰焉得萱如慈葉食可以適口味甘而氣微涼能去濕利水除熱通淋止渴消煩開胸寬膈令人心平氣和無有憂對是以命名時珍草即今東人採其花附乾而售之名為黃花草又曰萱屬水性下走陰分各宜男無微意存焉但氣味輕淡服之功未即驗不似氣味猛烈藥一

人口而即見其有效也。

山楂 言四

山棗 謂人 甘酸鹹平何書既言健脾又口能伐脾

胃生化之氣得非自相矛盾乎使明其理以推則

知所謂健脾者因其脾存食積用此酸鹹之味以

為消糜俾食行而痰消氣破而泄化謂之為健止

辱消等之健矣。如係胃味之輩便以補益為名以

為用藥進步詎知實而用此輕平消導得此則健

虛而用此保無害云。伐生之說乎按楂味酸與鹹

本草求真 卷七 平瀉者 山楂

最能消化肉食 與麥芽消穀食 凡養老鷄瘦肉但

投棗肉數枚則易爛 其消肉積 且人多食則嗜煩

易饑服參太過阻用山楂即解豈非伐脾伐生之

驗歟 時珍曰凡脾胃食物不化胸膈酸利脹悶者

也 至於兒枕作痛力能以止痘疹不起力能以

發猶見通瘀運化之速 兒枕痛猶於惡露積於太

亦有大小二種小者入藥去皮核 核亦能以行其

餅子曰乾用 時珍曰生食多令人嗜煩易出比地

大者曰

梗米 三百三

梗米 謂人 即人常食之米也稟天地中和之

氣味甘性平 時珍曰此梗稟而梗溫赤梗熱白梗

生米久成米 稔治 人非此物不能養生故性尚主

脾胃而兼及他臟 凡五臟血脈靡不因此而灌溉

五臟精液靡不因此而充溢他如周身筋骨肌肉

皮膚靡不因此而強健故凡白虎桃花竹葉石膏

等湯靡不用此以為固中清熱然米既有早晚之

不同復有地土出處之各異 類曰新米乍食動風

本草求真 卷七 平瀉者 梗米

早米受氣既早性雖溫而質多粘食之反能戀膈

者最忌 晚米受氣既遲其性稍涼服之不無稍

清而自晚性滯尤覺滋害出於高地則米硬而質

潔出於窪處則米潤而性陰然總於中是固諸方

用此佐助益恐藥性苦寒得此甘緩同入俾胃氣

不致頓損而熱與煩亦得與之俱安矣此雖常食

之物服之不甚有益而一黍以藥投則其力甚巨

未可等為泛常而忽視也。

米醋 言四

米醋 人本濕熱之氣而成味則酸苦氣溫酸主
 飲故書多載散於解毒下氣消食且同木香磨服
 則治心腹血氣諸痛以火淬醋入鼻則治產後血
 暈且合外科藥敷則治癰結痰癖疔黃癰腫暨口
 嗽以治舌疔通達以散損傷積血及殺魚肉菜單
 諸毒時珍曰無非取其酸收之功至醋既酸又云能
 散癰腫以消則內散潰則外散收處即是散處故
 下解目多食傷筋軟齒日酸縮太過則筋受傷時珍
 酸傷脾胃以酸入筋過飲則於筋有傷過酸則木
 筋而唇揭以酸入筋過飲則於筋有傷過酸則木

強水弱而於齒多軟者須得醋而收其性
 收飲不其米造陳久者良月砂膽藥常山諸藥
 陰陽水 地水
 陰陽水 入即湯沸半杯合井冷水半杯而煎用
 之也緣人陰陽不和則吐瀉並作而霍亂不寧斯
 時病屬倉卒寒熱難分陰陽莫測若使投以偏劑
 如單服薑湯則不克有誤治之失矣惟急用此投
 之類以斂則不克有誤治之失矣惟急用此投
 治則陰陽克協故倡有形調和之質以平無形不
 和之氣也若使心腹絞痛止有吐瀉之勢而無吐

瀉之實者是為乾薑亂即為絞腸沙得吐瀉者
 乾薑亂吐瀉有物各濕霍亂蓋病在上則又另有
 則吐在下則瀉和在中則吐瀉並作則又另有
 法在但不可用煎食米湯下咽以致立斃而此
 此水所能治矣

驚甲 味鹹氣平色青青雖載為補肝青入
 龜藏屬補腎黑入各別然究皆屬除熱劑肝之品
 介虫皆屬陰非真滋肝藥也凡厥陰血分積熱而
 寒故能除熱非真滋肝藥也凡厥陰血分積熱而
 見勞嗽竹蒸寒熱往來溫瘧痞母及腰腹脇堅血

痲痔核經阻產難癆瘵腫癰驚癩斑痘等症服此
 鹹平能以消除故用驚甲入陰除熱散結若肝虛
 無熱切忌驚以七肋九肋者作以其得陽之數耳
 其用必取乎肋以助筋肝故耳但食品中惟驚巨
 卿如三足兩頭並項強腹赤皆有大有毒能以殺人
 不可不慎

本草求真卷第七 第二册終

本草求真卷七 第三册

血劑 温血 凉血 下血

温血 始人身氣以衛外而凡目營內有氣以統血則血
血以聽手不得藉血以攝掌得指血以視耳得精血
以步者靡不本其氣之所運有血以附氣則氣始
能升者出而不凡其巧能應者不本其血以
謀慮能斷二便無送巧能應者不本其血以
所至此有血不勝氣則血而流不有必用血以
附也第以行氣於則血而流不有必用血以
燥清涼之藥以行氣於則血而流不有必用血以
賴清涼之藥以行氣於則血而流不有必用血以

本草求真 卷七 血劑 温血 凉血 下血 十九

致不類破氣損血之藥以經年累月無病者則病自
得不可類破氣損血之藥以經年累月無病者則病自
愈以愈又接血於氣則氣必得其氣以司血於主
此味厚故凡用藥之品自必得其氣以司血於主
症見不腫用藥之品自必得其氣以司血於主
其用可除腫用藥之品自必得其氣以司血於主
治子不腫用藥之品自必得其氣以司血於主
散其子不腫用藥之品自必得其氣以司血於主
不經以治子不腫用藥之品自必得其氣以司血於主
能運血以治子不腫用藥之品自必得其氣以司血於主
草拾水以治子不腫用藥之品自必得其氣以司血於主
能運血以治子不腫用藥之品自必得其氣以司血於主
草拾水以治子不腫用藥之品自必得其氣以司血於主

似不能少血脫不固則肉消心腹卒則不能
切是症不兼脾胃不如此或見有心腹卒則不能
碎血不若於肝脾不補氣不暢則安息不兼心腹
如此矣若於肝脾不補氣不暢則安息不兼心腹
得不用血於肝脾不補氣不暢則安息不兼心腹
通肺不血於肝脾不補氣不暢則安息不兼心腹
疾不藥以解肝脾不補氣不暢則安息不兼心腹
堅硬經者又肝脾不補氣不暢則安息不兼心腹
解冷痛在香可除已此桂心可於用血見大概器
有血之變則不致在除已此桂心可於用血見大
藥 山草 之自不致在除已此桂心可於用血見大

本草求真 卷七 温血 凉血 下血 二十

雞 蘇 其 性 稍 温 功 有 類 於 蘇 薄 其 性 稍 凉
之物 味 辛 微 温 功 有 類 於 蘇 薄 其 性 稍 凉
蘇 其 性 稍 温 功 有 類 於 蘇 薄 其 性 稍 凉
薄 多 於 氣 分 疎 散 水 蘇 多 於 血 分 温 利 故 凡 肺 氣
上 逆 而 見 頭 風 目 眩 與 血 瘀 血 熱 而 見 肺 痿 血 痢
吐 衄 崩 淋 喉 腥 口 臭 邪 熱 等 病 者 皆 當 用 此 宜 泄
太平 和 劑 局 方 仰 熱 除 血 止 而 病 自 可 以 愈 矣 但
有 龍 腦 薄 荷 九 仰 熱 除 血 止 而 病 自 可 以 愈 矣 但
表 疏 汗 出 其 切 忌 焉 方 莖 中 虛 似 蘇 葉 而 微 長 齒
而 嫩 氣 甚 辛 烈

澤蘭

澤蘭 肝脾 苦甘而辛 即今婦人採置髮中除垢者 是也 玩書所論澤蘭與本經蘭草同為一類其生 澤旁紫莖素枝赤節綠葉對節生有細齒但蘭草 則莖圓節長葉光有岐澤蘭則莖微節方短葉有 毛之為異耳二物並於嫩時皆可刈佩以其花葉 皆香置於髮中能辟垢省頭故雖呼為香草俗 則呼為孩兒菊與於山蘭其花雖香而葉絕無氣 者迥不相同 時珍曰蘭草澤蘭一類二種雖生水 旁下濕處但以莖圓節長而葉光有

本草求真 卷七 溫血澤蘭

澤蘭

岐者為蘭草莖微方節短而葉有毛者為澤蘭朱 文公離騷辨證云必花葉俱香燥濕不變方可刈 佩今之蘭草花雖香而葉無氣質弱易萎不可刈 佩在昂昂本經言澤蘭則非山蘭明矣是離騷 之秋蘭當病本經之澤蘭無疑也吳草蘆曰蘭為 醫經上品之藥有枝有莖今所謂蘭無枝無莖 指為離騷之蘭耳 蘭草莖圓葉光其性專主入氣 雖書載有久服益氣輕身不老膚語然究止屬利 水除痰殺蟲辟惡而為消渴良藥即內經所謂飲 食肥甘傳為消渴治之以蘭以除陳氣是也 東垣 湯生津飲用蘭葉蓋本於此又此草油塗髮去 風垢令香潤史記所謂羅襪解微問香澤者是 也 澤蘭草方集毛雖書載有和血行脾長養肌肉

本草求真 卷七

大小薊

之妙然究皆屬入脾行水入肝治血之味是以 竅能通關節能利宿食能破月經能調癥瘕能消 水腫能散產後血淋腰痛能止吐血衄血目痛 癰毒撲損能治時珍曰蘭草澤蘭氣香而溫味 經藥也脾喜芳香肝喜辛酸中之陽足太陰厥陰 而正氣和肝鬱散則鬱行而病解則三焦通利 氣道澤蘭走血分正氣和肝鬱散則鬱行而病解 和血不過因其水消血除之意豈真舒脾和血之 味也乎入補氣補血之味同投則消中有補不致 損真誠佳品也防已為使 地黃

本草求真 卷七 溫血澤蘭

大小薊

大小薊 雖書載屬甘溫可以養精保血 然 寃精之養血之保則又類於血榮一身周流無滯 若使血瘀不消而致見有吐衄唾咯崩漏之症與 血積不行而致見有癰疹腫痛之病則精血先已 不治安有保養之說乎用此氣味溫和溫不致燥 行不過散痰滯得溫則消痰塊得行斯活靈靈既 淨自有生新之能癰腫消自有固益之妙保養 之說義由此起豈真具有補益之力哉 恭曰大小 薊皆能破

三七七

但小効力微不如大効力述小効只可退熱涼血若大効則於退熱之中猶於氣不甚傷也大効藥療腫而小効專能理血疾不治外科若脾胃虛寒飲食不思泄瀉不止者切勿妄服兩効相似花如薯大効莖粗而葉嫩小効莖低而葉不嫩皆用莖

沙糖言手瓜

沙糖謂人瓜本於甘蔗所成甘蔗氣稟冲和味甘氣寒已為除熱潤燥之味其治則能利腸解煩消痰

本草求真 卷七 瓜類 人小沙糖

缺

止渴至於沙糖經火煅煉性轉為溫色變為赤與蔗又似有別時珍曰沙糖本草言其性寒故能行血化痰是以產婦血暈多有此與酒沖服取其得以人血消瘵也小兒丸散用此調服取其溫以通滯也烟草用以解毒亦取其有開導之力也然性溫則消則下故虛熱過服則有損齒消肌之病味甘主緩主壅故痰濕過服則有戀膈脹滿之弊此又不可不深思而熟察耳時珍曰沙糖性溫殊與魚鱗之類同食皆不益人今人每用為白糖因冰即徒取其適口而不言陰受其害也

晒淨結而成和類造體輕味甘色白至治亦頗相似然紫入血而白入氣久食反有熱壅上膈之虞書言能以清熱似非正談時珍曰石蜜糖比之紫人藥勝之然不冷利若久食試以口燥之會食此則助熱損齒生虫之害也其燥益甚口冷之會食之其冷即除口燥轉為燥消生痰於此可覘大概矣又奚必過為辨論哉

穀精草言草

穀精草謂人瓜本穀餘氣而成得天地中和之氣味辛微苦氣溫故能入足厥陰肝及足陽明胃

本草求真 卷七 瓜類 穀精草

缺

此辛能散結溫能通達凡一切風火齒痛喉痛血熱瘡瘍痛癢肝虛目翳流淚雀盲至晚不見並痛疾傷目症後星障服之立能有効且退翳明目功力獨於白菊而去星明目尤為專劑時珍曰穀精上行陽明分野先治目中諸病加而用試看星月之甚更明目退翳似在菊之上也沙係鬼所食此草而成望月沙亦能治眼則知此更為眼家要藥矣取嫩秧花如白星者良

土不留行言草

土不留行謂人在古已命其名謂此雖有王命其

人經

日

性走而不守，不能以留其行也。又按古書有云：穿山甲王不留，婦人服之乳常流，亦云行血之力也。觀此數語，已得氣味主治大要矣。又著其味曰辛，曰甘，曰平，其氣曰溫，其功則能入足厥陰肝經，血分去風除痺，通經利便，下乳催生，散癰腫，拔竹刺，與瞿麥同功。則知氣味疎泄洵爾至極，又安能有血而克止乎？何書又言止血定痛，能治金瘡，似與行血之意又屬相悖。然曰：張仲景治金瘡有王不留，有王不留行，詎知血瘀不行，得此則行，血出不止，湯皆最效。

本草求真 卷七 溫血王不留行

二五

得此則止，非故止也。得其氣味以為通達，則血不於瘡口長流，而血自散各經，以致其血自止，其痛即定，豈必以止為止哉。彰明但古人表著治功，多有如此立說，以留後人思議，不可不細審焉。花如鈴鐸，實如燈籠，子殼五稜，取苗子蒸漿水浸用。

天仙籐 言三

天仙籐 入肝即青木香馬兜鈴籐也，味苦氣溫。觀書所論主治，止屬妊娠子腫，始自兩足漸至喘悶，及腹痛風癆等症，而於他症則未及焉。即其所

氣子

治之理亦不過因苦至於疎泄性溫得以通活故能活血通道而使水無不利風無不除血無不消痛與腫均無不治故也。昔有天仙籐散附子陳皮甘草烏藥等分為末用木瓜生薑蘇葉煎湯服以治子腫其亦可以知其概矣葉似葛圓而小有白毛根有鬚四時不凋者是。

骨碎補 言三

骨碎補 入心味苦而溫功溫入腎補骨且能入心破血是以腎虛耳鳴耳屬腎久瀉腎同開闢之機久瀉多責於腎。

本草求真 卷七 溫血天仙籐骨碎補

二六

跌打損傷骨痛牙痛血出無不川此調治未入腎煨食牙痛炒黑為末擦牙折傷粥和末裹傷處俾其腎補骨堅破瘀生新而病即除至命其各曰骨碎補以其骨碎能補骨故耳雖與補骨脂相似然總不如補骨脂性固腎通心而無逐瘀破血之治也去毛蜜拌蒸用。

桂心 言三

桂心 入心本於肉桂去外粗皮取當中心者為桂心味甘辛熱溫營分之裡藥凡九種心痛二症三風四悸五食六飲七冷八熱九去來痛人又補其義而亦別之九日飲日食日氣日

止痛

日冷日熱日燥日濕日虛皆腹內冷痛痙癖等症
明邪乘手少陰之絡而成
皆能奏效以其所治在心故治亦在於裡而不在
於軀殼之外耳非若肉桂未去外層皮肉其治在
於通經達絡以除風寒濕痺而不專入心腹之內
也

乳香

乳香入心經即書所云蕪陸香者是也香為性
溫不潤諸書易言於血有補詎知血因氣逆則血
凝而不通以致心腹絞痛痛因氣滯則血聚滯不

本草綱目 卷七 溫血 桂心 乳香

二七

入心行

散以致痛楚異常乳香香入心既能使血宜通
而筋不伸藥宜加乳香其性不伸者數復能入腎
溫補使氣與血互相通活伸氣不令血阻血亦不
被氣碍故云功能生血究皆行氣活血之品耳非
如沒藥氣味苦平功專破血散瘀止有推陳之力
而無致新之妙是以書載乳香功能活血調氣托
裡護心外用入瘡孔能使毒氣生肌止痛治心腹諸
痛日嘔耳聾以燒癰腫折傷癩狂治癩狂用香
或加人參酒下恹恹沉醉醒但遇癰疽已潰及膿血

過多者不可妄投恐其復開走洩之路其意已可
見矣豈若當歸辛潤而為補血第一要藥也出諸
苗如乳頭明透者只惟粘難研水飛過川餅坐熱
水研之或用燈心同研則易細市人多以楓香偽
售勿用

酒

酒入脾性種類極多然總由水穀之精熟穀之
液醱而成故其味有甘有辛有苦有淡而性皆
主熱冰明其性熱惟冠羣物不入胃則氣逆上壅

本草綱目 卷七 溫血 酒

二八

滿胸則用浮腫橫等於勇士不可過矣若引經用
為導則其勢最速辛則通身達表引入至高巔
頂之分炎者忌甘則緩中熱者忌苦則降下血弱
者淡則通利小便而速下也水者忌熱酒傷中溫
飲和胃怡神壯色通經活脈且霧露嵐瘴風寒暑
濕邪穢得此亦可暫辟樽物志云王康張衡均
一人飽食一人空腹空腹者死飽食者病若恣飲
飲酒者健此酒勢將惡勝於作食之效也若恣飲
不節則損胃燥情動火生痰發怒助慾濕熱生病
始不堪言震亨曰木草止言酒熱而有毒不言其

飲寒涼其熱內傷其始也病淺或散
 或自汗或疥疥或鼻衄或泄利或心脾痛或可散
 而去之其久也病深或消渴或內疽或疔瘡或鼓
 疔漏為難名之病非只眼木易處也至於夜飲更
 屬不宜蓋夜氣主收斂氣密則固若用酒宜發醉
 飲就枕熱壅三焦傷心損目亂其清則勞其脾胃
 停濕動火致病甚多至入藥共釀合劑則燥逆
 容忤色紫則理惡癰疽風熱鼓則解煩熱而散風
 寒桑椹則益五臟以明耳目狗肉汁則大補元陽
 葡萄酒則其消痰癖牛膝乾地則滋陰枸杞仙靈

本草求真 卷七 溫血酒

皮則扶陽痿等社酒指納嬰兒口中可合速語噴
 屋及壁則逐蚊蠅燒酒則散寒結然燥金酒血敗
 胃傷膽水酒藉麴醱其性則熱酒藉水成其質
 則寒少飲未至有損多飲自必見害如陰虛暗好
 其臟本熱加以酒熱內助其熱益增不致過血妄
 出不止陽虛暗好其臟本寒加以酒寒內入其害
 益甚不致飽脹吞酸吐瀉不止此有歷無發明
 極糟糖跌傷行瘀止痛亦敗蜂毒及禽凍瘡醇而
 無灰陳久者良畏枳椇葛花赤豆花綠豆粉鹹鹵

本草求真 卷七

得熱則解以
 木制大意
韭菜 辛
 韭菜 歸人肝味辛微酸氣溫無毒按辛則能散濕
 則能行滯氣客於腸胃則血因氣而益阻胃氣不
 通於五臟則腰膝冷而疔癩生肝主疎泄腎主閉
 藏肝腎虛則啟閉非時經曰足厥陰病則為遺尿
 及為白濁服此氣行血散肝補腎因而病安有不
 愈乎故書有云韭菜最利病人凡一切血瘀氣滯
 等症俱能使之立效震亨曰心痛有食熱物及怒

本草求真 卷七 溫血酒

宜用非汁枯槁加入藥中開提氣血有腎氣
 以致心痛者宜用非汁和五苓散為丸空
 湯下蓋非性急能散胃氣血滯也又反胃宜用
 非汁二盞大盞汁氣消痰和胃各一盞細細服
 也中力總錄曰氣消痰和胃各一盞細細服
 火也士材又謂此不必拘但食久反出是
 黃白而熱能合色虛無紅赤而無如犬蛇傷用此
 者為買熱能合色虛無紅赤而無如犬蛇傷用此
 爛如泥加鹽少許作厚餅煨則安被利杖及打
 血凝薄敷運動即散久病下痢不止同鯽魚煮食
 即止但火甚陰虛用之為最忌焉忌密牛肉注昂
 人多以非炒牛肉其味甚佳亦未見其作害又按
 經曰青藥攻邪五莖為養五畜為養五菜為充

等

東為助氣味合而加之以補精益氣五來其壯經
 葵藿也五葉桃李栗杏棗也使韭果忌牛肉則經
 何以又不言莊子功治畧同但治遺精白濁更勝
 其有忌乎
 素問曰足厥陰病則遺尿思無窮人房太甚發
 為筋痿及為白淫小便頻數而女子帶下能人厥
 子之治遺精濁淋小便頻數而女子帶下能人厥
 陰補下焦用及命門之不足命門者藏精之府故
 同治蒸暴炒研用救急易方用瓦片煨紅安韭子
 引至痛處良久以溫水嗽吐
 有小虫出為效也蓋再薰
 音光
 也蓋黑能勝紅紅見黑而即止以火不勝水者故

本草求真 卷七 血部

止血

耳辛能散血血散則血歸經而不外溢是以遇辛
 而即止也溫能行血血行則血周流經絡而血不
 聚於所傷之處是以得溫而即止也指出行血故
 凡血熱過下如瘟疫鼻衄產後血暈崩脫金瘡並
 絲纏眼中皆可以治如止血則以苦酒送韭汁投
 消腫則以猪膽汁蘸醋調並眼有絲纏則以墨磨
 鷄血速點客忤中腹則磨地漿汁吞各隨病症所
 用而治之耳但瘟疫熱病初起遂用此以止血則
 非所宜

止血

百草霜 土
 百草霜 入胃即吐哭上烟煤及釜裡鍋煤也因
 燒雜草故名味辛氣溫視其所至與伏龍肝相以
 凡血兒黑即止之惡毒惡氣得辛溫則散故本經尚
 主蠱毒中惡吐血血暈以酒或水或醋細研溫服
 亦塗金瘡止血生肌至於傷寒發斑毒陰毒疽腸
 癰疔咽喉口舌白禿諸瘡亦須用此以取火化從
 治之義
 兔屎 音杰
 兔屎 人即名望月沙者是也兔屎太陰之精復

本草求真 卷七 血部

止血

兔屎 人即名望月沙者是也兔屎太陰之精復
 餌穀精草明目之藥是以尿能明目以除目中淫
 翳且癩瘡五疳痔漏熱食痘瘡等症服之皆治亦
 由熱結毒積而成治此寒以解熱辛以散結即以
 象目故能服之有功時珍曰兔屎能解毒殺虫故
 用之諸家本草並不言及亦缺漏也按洗存中長
 方云江陰萬融病眼四圍如焚寒熱煩燥一夜夢
 一人腹癰一月光眼使人心中皆寒及將而元
 現使人遺藥服之遂平扣之則明月也乃塞而
 夢若陰氣上乘目障不清未可用焉兔肉另詳
 海螵蛸 音三
 海螵蛸 音三

寒故書皆載其性鮮補但入手少陰心足少陰腎
定厥陰肝並足太陰脾手太陽小腸力導清熱瀉
火涼血消瘀錢仲陽謂赤散生地與木通同用能
止及產後血上薄心胎動下故凡吐血咯血崩血
崩血漏血崩中帶下審其症果因於熱成者無不
用此調治血出於鼻是山道血出於口是山濁
是出於肝血見於吐是出於心血見於痰涎而帶是
出於脾血見於血山鼻血見於口鼻血見於大便
由而詳其血各名曰血山鼻血山鼻血山鼻血
虛實以治其或傷寒陽強痘毒盛血燥與折跌

本草求真 卷七 血分 五
三五

傷筋而見血瘀血痺之症者無不採其同入以為
活血生新之用第書有言服此長肉生肌止是熱
除血活血以後長養之語久服輕身不老止是病去
身安力健之詞未可因此認為辟殺成仙屬實也
若使血因寒滯而猶用以生地不更使寒益甚而
血愈出不返乎攝生肥大者洗淨搗汁以飲或用
酒製以免傷胃忌鐵

紅花 三言五
紅花端入心辛苦而溫色紅入血為通瘀活血要

狗血之蒸血下而精者屬火發血而之而熱者
與泄物並下者屬火或因屬火而發血而之而熱者
者黑而枯白尺脈沉者屬火而發血而之而熱者
則氣水化而見色紫而紫者屬火而發血而之而熱者
山於大腸而後行血在後者為血而發血而之而熱者
有升無降蓋血生於心任藏於肝歸於衝任一有
外邪內侵則血滯而不行紅花汁與血類故凡血
尿而見喉痺不遊痘疹不起肌膚腫痛因血熱作
痛經閉便秘久服此血滯枯之血口紫子

本草求真 卷七 血分 五
三五

死腹中治當用此通活故能行男子血脈女子經
水多則行血少則養血故能行男子血脈女子經
婦病極重者已死而脈猶動者服此名曰救死
此得紅花數十筋乃可活其靈驗如此凡大渴者
少頃指動但用不宜過多則合當歸能生多
用則血能行過用則血下行不止而斃腦脂
係紅花藥出可治小兒疳疔五錢為末以紅花枝
淨吹之無花則用并解痘疹毒腫山有痘瘡挑破
以油調服

紫草 三言五
紫草山草

紫草 入心下 鹹寒 色紫 質滑 為人厥陰血分
 涼血 血涼則九竅通 二便利 故凡血熱毒閉而見
 心腹急痛 水腫不消 五疔癩疥 癰毒及痘瘡 血熱
 毒盛 二便閉澀者 治當用此 俾血得寒而涼 得鹹
 而降 得滑而通 得紫而入血 涼毒清而二便因以
 解矣 質滑者可用 膠漆者反能作渴 奈世誤以為宜
 發之藥 不論毒閉與否 輒用殊失 用藥意義矣 馮
 若思服此得陽氣之早 用宜取葦為正 酒洗用
 去頭壞木 經云能 補中益氣 似非

本草求真 卷七 涼血藥

三七

旱蓮草 入腎 即昔所云 雙腸草 金陵草 者是也 味
 甘而酸 性平 色黑 功補人肝 人腎 為止血 涼血 要
 劑 是以血病煎膏用之 其血即止 驗白汁塗變白
 為黑 火瘡發紅 其紅即退 齒牙動搖 擦之即固 合
 冬青子 名二至丸 以補肝腎 但性陰寒 雖善涼血
 不益脾胃 殊非不同 以薑汁 椒紅 相兼 修服者 必
 腹痛 作瀉 苗如旋覆 實似蓮房 斷之有汁 須臾而
 黑 焚膏耳

本草求真 卷七

赤芍

赤芍 入肝 與白芍 並治 零同 仙白 則有 缺陰 益營
 之力 赤則 止有 散邪 行血 之意 白則 能於 土中 濕
 木 赤則 能於 血中 活滯 故凡 腹痛 墜積 血疲 痲痺
 經閉 目赤 疔瘡 外腎 為因 於積 熱而 成者 用此 則
 能涼 血逐 痰 成無 已甘 以補 而亦 為自 收而 赤故
 補陰 血逆 氣與 白芍 主補 無濕 大相 遠耳 大明 指
 為赤 白皆 補其 說不 切曰 華子 指為 赤能 補氣 白
 能治 血其 說尤 不切 耳不可 不知 至云 產後 忌用

本草求真 卷七 涼血藥

三八

赤須 齊其 脈症 及臟 偏勝 若何 耳不可 盡拘 如
 症俱 實者 雖在 產後 亦所 不忌 雖陰 脈症 俱虛 宜
 在產 前不 得妄 施凡 治病 以能 通脈 脈症 虛實 為
 是 懸世 所不 解畏 然耳 小倘 及藜 蘆

地榆 入肝 昔酸 微寒 性沉 而滑 諸書 皆言 因其
 苦寒 則能 入於 下焦 血分 除熱 俾熱 悉從 下解 又
 言性 沉而 滑凡 人症 患吐 衄崩 中腸 風血 痢等 症
 腸風 下血 消而 色鮮 四射 如澀 乃風 性使 然素 閉
 所謂 火風 入中 則為 腸風 強泄 是也 若用 門射 血
 者如 線或 熱瀉 之血 耳得 此則 能清 血不 解按 此不 無

三八五

兩岐詎知其熱不除則血不止其熱既清則血自安且其性主收斂既能清降又能收清則清不虛其過泄瀉亦不慮其或滯實為解熱止血藥也但血熱者當用虛寒者不宜用久病者宜用初起者不宜用作膏可貼金瘡搗汁可塗虎火蛇虫傷毒飲之亦可以柳根外黑裡紅取上截炒黑用梢反行血得髮良惡麥冬

卷栢 言元

原屬草部並非側栢生於石上形如拳

本草求真 卷七 原血地栢卷栢 三九 續圖考

卷故以卷名即俗所謂萬年松者是也氣堅質厚味甘性溫入足厥陰肝經血分其治有分生熟生則微寒力能破血通經故治癥瘕淋結等症炙則辛溫能以止血故治腸紅脫肛等症性與側栢葉懸殊治亦稍異側栢葉使金氣以制木借炒黑以止血不可不辨鹽水煮半日并水煮半日焙用

銀柴胡 言元

能入胃而除虛熱但不解則兼入腎瀉氣固筋骨

此則入腎涼血之為異耳故和劑局方用此治上下諸血及於虛癆方中參人同治如肝癆之必用此為至且不類於北胡蓋北胡能升少陽清氣上行升清發表必有此則氣味下達入腎與彼迥不相符若用北胡以治虛癆則咳嗽發熱愈無寧日除火愈可不辨而混用乎由銀州者良故以銀胡號之

蒲公英 言元

蒲公英即黃花地丁草也味甘性平能入陽

本草求真 卷七 原血銀柴胡蒲公英 四十 續圖考

明胃厥陰肝涼血解熱故乳癰乳巖為首重焉且能通淋淋症多屬熱結擦牙染鬚塗刺此藥斷有白諸虫游諸物上必避精汁乾火則有毒人手觸之成痰名風尿刺作痛不眠百療難效取汁厚塗即極言其功及解食毒疔毒綠乳頭屬肝乳房屬胃乳癰乳巖多因熱盛血滯用此煎入二經外敷散腫毒效同忍冬煎入少內消須同夏枯貝母連翹白芷等藥同治况此屬土花黃故於食滯可解毒氣可散又能入腎涼陰故於鬚髮可染獨莖一花者是行極者非

稱爲補益似精米是但塗湯火傷損生肌殺虫
瘡凍瘡汁染髮最佳酒浸或炒或生用桂牡蠣
爲使惡菊茆花宜酒元旦飲椒

辰砂

辰砂人即書所云丹砂朱砂者是也因砂出於
辰州故以辰名鴻鳴性陰外顯丹色內含其汞不
熱而寒離中有坎也不苦而甘火中有土也嬰兒
婦女交會於中故能入心解熱而神安魄足丹
純陰能解游之火而安神是以同滑石甘草則清

本草綱目卷七

辰砂

暑同遠志龍骨則養心氣同丹參則養心血同地
黃枸杞則養腎同厚朴川椒則養脾同南星川烏
之類則祛風且以人參扶神濃煎調入丹砂則治
離魂病要于蓋疾方云凡人自覺本形作兩人
錢五少胡用之夜多惡夢通背不寐自慮非吉遇邱州
族者一胡用之日昔常如此有道士教以辰砂末
一錢和生鷄子黃三枚攪勻頓服則妊娠胎動即
安胎死即出慎勿經火及一切烹鍊則毒等於砒
硝况此純除重滯即未煎鍊久服瘵問以其虛

之氣破其鎮墜也辰砂明如筋簇者良惡磁石畏
鹽水忌一切血雄黃石雄黃石爲五毒古人以
攻毒瘡而水經以丹砂爲無毒故多鍊治服食
鮮有不爲藥毒者豈五毒之說勝乎當以爲戒

無名異

無名異人即俗所名乾子者是也味甘而鹹微
寒無毒諸書皆言能治癰腫損傷接骨金瘡合口
其義何居以其鹹有入血之能甘有補血之力寒
能勝熱之較者故耳是以人於受杖時每服三五
錢其於傷處不甚覺痛用醋磨塗腫處即消要皆

本草綱目卷七

無名異

外治之品非內服之味也生川廣小黒石子也一
包數百枚
猪尾血音老
猪尾血人肝兼即猪尾尖之處割刮而出者也
凡人血燥不活用以辛溫以爲搜剔則血益燥而
不活矣按猪本屬陰物血亦更屬陰味以至陰之
物而治至陰之血則熱自得陰化而熱以解然必
得一活動以爲疏剔則血不爲熱凝惟猪通身皆
室食飽即卧其活止在一尾而尾尖則又活中之

猪尾血

無名異

至活者也故吳費建中補有治虛凡逢毒盛而
 見乾紅崩滯紫燥之象輕則用以桃仁地丁
 紅花赤芍重則用以猪尾尖血取一盞二盞入藥
 同投兼佐水片開腹理通達內外誠發千古未
 發之奇秘也費建中治血熱氣滯用大黃一兩
 芍藥半兩木通八分升麻二錢半桃仁四錢紅花
 芍藥二錢白芷兩錢二錢半升麻二錢半桃仁
 牛膝二錢六分山梔兩錢二錢半升麻二錢半
 此是勢急之厚用以大劑若勢未急或分作三
 濕不以石膏在相煎酌治耳大瘀血一活則
 一身之血與之俱活凡治痘而見乾紅崩滯內症

本草求真 卷七 補血和凡血

具備其可不藉此血以為通活之具乎但血因虛
 而燥因寒而凝而不用以辛溫辛熱以為通活則
 血愈見其有礙者矣取雄猪尾血者佳

兔肉入肝兼人言可治虛癆人多食而不忌不
 知兔肉性寒久食絕人血脈損元氣陽事令人痿
 黃故時珍載之以為涼血解熱利腸之劑藏器曰
 孔子從口出故好婦忌之非獨為缺唇也大抵凡
 食寒人血脈損元氣陽事令人痿黃八月至十月
 可食餘月傷人神氣况虛癆一症脾胃兩虛即在

本草求真 卷七

醫者用藥挽救亦難兩全無藥若復加兔肉甘寒
 又安能力補脾胃而為虛癆要藥乎今人不察動
 用兔肉治瘵以致陽氣日虛而陰氣日竭余因先
 慈曾患虛癆服藥將愈後食兔肉而病復發故特
 拈出以為妄食兔肉者戒

魚肝油本屬苦寒可以點目去障以膽入膽故
 也至於青魚之膽氣味亦同且色青入肝開竅於
 目故膽有明目治雙之功目睛生汗注眼能累夜

本草求真 卷七 補血和凡血

視物以其好嗜蠅蝶能明目也又味苦氣寒
 能涼血熱故又至聖痔瘡擦火瘡吹喉痺功與藍
 膽相同臘月收陰乾

夜明沙入肝即名天鼠屎也其尿因食蚊虫而化
 蚊虫善食人血是即蚊虫之尿故能入肝經血分
 活血為治目障翳之聖藥在日之靈凡人目生障
 翳多緣肝有血積以致上攻於目其或見為驚疳
 疳疔血氣腹痛得此辛以散邪寒以勝熱則血自

三八九

活而病無不可愈本早精以其蚊善食血
每用蚊水煙治血故即可以食血者治其血
以其善吃人血故耳并准煉烟辟蚊甲燒是
耳明夜露散后幾自根
即以蚊治蚊之意淘淨焙川照白微白飲


血餘

血餘 補人肝心 味苦微溫 補氣壯氣然
總不知地菜參善為補精補氣之最耳
王水許云醫云補腦者補之非髮首腦之華髮
則髮素清而証云水出高源故腎華在髮髮者血
之餘血者水之類也今方家呼髮為血者蓋本血
也葉世傑草木子云精之榮以髮氣之榮以骨血

本草求真

之榮以髮類苑云髮屬心稟火氣而上生髮屬腎
稟水氣而下生髮屬肝稟木氣而側生故男子腎
氣外行而髮髮不異也又故功能療驚癇理咳
嗽固筋帶止血餘血痢血淋舌血鼻血暨轉胞不
通及塗疥癩入膏敷毒治皆有效陳藏器曰生人
鳥不敢來食其寶又人逃走取其髮於梳車上却
轉之則迷亂不知所適此皆神之髮也髮者血
之候埋之七中不可不極服之至枯復有液出
食人腹變為癪山藥治服令髮不白此正神化
驗也然總皆屬通開竅涼血散赤生新之品
秘煎治小兒疳積川髮灰三錢飲汁服若胃虛用
小兒兩角生髮川髮灰三錢飲汁服若胃虛用
之多有吐瀉之弊草焚洗髮用 本草求真卷七

本草求真卷八 第一册



下血 血為人身之寶安可言下然有血瘵之極積
疎動而走泄苦熱之徒以增熱涼之或以血明不
疑於治方不謬如血下血寒熱其要不在解則宜
則於治方不謬如血下血寒熱其要不在解則宜
以於治方不謬如血下血寒熱其要不在解則宜
以於治方不謬如血下血寒熱其要不在解則宜
以於治方不謬如血下血寒熱其要不在解則宜
以於治方不謬如血下血寒熱其要不在解則宜

本草求真

至有借食人血以治血則有瘵虫水疔紫貝瘵虫
賦味引血下走則有瘵虫水疔紫貝瘵虫
賦味引血下走則有瘵虫水疔紫貝瘵虫
賦味引血下走則有瘵虫水疔紫貝瘵虫
賦味引血下走則有瘵虫水疔紫貝瘵虫
賦味引血下走則有瘵虫水疔紫貝瘵虫
賦味引血下走則有瘵虫水疔紫貝瘵虫

乾除濕而用生藥則為通調津液而用也
發乾漆三七水蛭蟅蟲虻蟲虯蟲
九為諸劑中下血敗血之最用之須當辨
不可稍有忽畧以致損人元氣於不測中也
三七
山草

三七 嵩人肝日兼人心大腸又各山漆時
珍曰或云能合金瘡如漆精物也 甘苦微
寒而溫世人僅知功能止血在病殊不知痛因血
瘀則痛作血以敷散則血止三七氣味苦溫能於
血分化其血瘀試以諸血之中入以三七則血旋
化為水矣此非紅花紫草類也故凡金刃刀剪所
傷及跌仆杖瘡血出不止嚼爛塗之或為末溲其

本草求真 卷八下血三七

血即止則血不衝後尤宜服之 且以吐血
血下血血崩崩漏經水不止產後惡露不下俱宜
白嚼或為末米飲送下即愈并虎咬蛇傷血出可
治此為陽明厥陰血分之藥故能治一切血
病一種庭砌栽植者以苗搗敷腫毒即消亦取散
血之意 標有在黃夏高三四尺葉似菊艾而勁
綠藍細厚有岐尖葉有赤稜夏秋開黃花莖如金
葉味甘而大如牛勞根與南中水者 廣產形如人
不類恐是劉寄奴之病甚易繁 廣產形如人
參者是時珍曰此藥近時出白南人 有佈非研

入經
脈
分
為
氣
血

川良

西草 嵩人肝日兼人心大腸又各山漆時
但紫草則止大肝涼血使血白為通活此則能人
肝與心胞使血必為走泄也故凡經閉風痺黃疸
瘡有黃疽或酒毒黃汗症女勞瘵皆有寒濕熱
濕之別此則專就黃血以論大抵寒濕宜用西草
附子西草則專就黃血以論大抵寒濕宜用西草
大黃血瘀宜用桃仁承氣之類 因於瘀血內阻者
服之固能使瘀下行如值吐崩尿血因於血滯而
見艱澀不快者服之更能逐瘀血止總皆除瘀去

本草求真 卷八下血黃草

綠國膏

血之品與於紫草血熱則涼之意貌同實異不可
混也但血虛發熱者忌用根可染絳忌鍊

紫參

紫參 嵩人肝日兼人心大腸又各山漆時
肝逐瘀破血兼入胃腑膀胱使血白為通利故凡
寒熱血痢癰腫積塊心腹積聚因於血瘀阻滯而
成者無不可以調治以其味苦則泄味辛入肝寒
則勝熱而使血從二便出矣仲景治下痢腹痛而
用紫參湯以除亦取散其積血之意 聖惠方治吐

人參加甘膠等分為末烏梅湯服一錢一法去
酒刺用紫參升參人參苦參沙參各
一百為木胡桃仁梓和為丸茶下 但市人罕識
其真川以紫參為代唯其寒熱不同而其疎利則
一反紫參古方治婦人腸單病烏梅

其論所治則有瘵寒除冷之謂究之體輕氣窳其
氣先上行而微下達凡有宿血凝積及有惡血不
其論所治則有瘵寒除冷之謂究之體輕氣窳其

其血在於膈上而難消者須審宜溫宜涼同於他
味兼為調治之 痰行逆宜行治之 痰行逆宜行治之
自清痰中帶血者加竹瀝又鼻血上行者得金其
物服之如敗血衝心加以薄荷汁童便去心癩類明
禁為丸砂為衣與受熱者加以升麻之類
有心下痛用真博金七兩明辨三兩為末博
有物脫去神氣滿然再服而過此驚痰血結
心竅所聚神氣入心去惡血明辨化頑痰故也
范石湖文葉云南有挑生之書於飲食中行
勝法魚肉能反生於人腹中而人以死則除其

寒則得覺脘腹脹滿次日則生於腹中
凡胸膈痛即川升參或嘔吐之若屬下痛即以
米湯調升參金末二錢服即消出惡若使惡血惡痰
物或合升參金末服之不吐則下若使惡血惡痰
惡痰惡淋惡痔在於下部而難消者俟其辛氣既
散苦氣下行即為疎泄而無滯難留之弊矣此

藥木屬入心散瘀 傷寒論云研烏梅有白海葱搗
碎五分每用一錢以生豬血五七滴新汲水下
因瘀去而金得泄故命其名曰鬱金書云此藥純
陰而寒者因性至下而言也有云是藥性溫而言
者因氣味辛香至下而言也各有論說不周以致

理難盡一耳因為辨論正之出川廣固如蟬肚外
黃內赤色鮮微香帶甘者真市人多以薑黃偽充
我木 鬱金 辛苦氣溫大破肝經氣分之血蓋人血
氣安和則氣與血通血與氣附一有所偏非氣盛
而血得即血壅而氣滯三種氣味苦平既於肝經
血分透氣我木氣味辛溫復於氣分透血故凡氣
因血窒而見積痛不解吐酸并脈痛癢癢等症
者須當用此調治 假物或形為根是因傷血所得

見於脈府可見為病是四脈所傳結於左脈
 下形如覆杯有頭有足如魚鱗狀心積曰伏梁起
 於大如盤肺積曰息疝在右膝下積曰疝氣在胃
 或下亦無定時少腹上至心下如豚奔走之或上
 半而過者死故去積須以甘溫調養又曰壯者
 無積惟虛人則有之故養正則邪自除人仰氣自
 血而凝而不致閉結不解矣但逢木雖屬磨積之
 味血積宜用佛手山甲乳香大黃蘇木蓬朮瓦楞
 化積消痞子海蛤粉木積宜用大戟甘遂芫花
 蓬朮牛膝積宜用黃芩山黃連黃連乾薑花
 菴木巴霜大黃肉積宜用山積阿膠石燕積宜

本草求真 卷八 下血 菴木 綠圖

用雄黃錫灰極細而九蒸使若若虛人服之最
 子鶴虱積宜用桃仁紫甲草藥若虛人服之最
 積可危須得參朮補助為妙大者為廣木物極堅
 硬難 灰火煨透乘熱搗之或醋磨酒磨或煮熟用
 薑黃 音介 芳菲
 薑黃 音介 芳菲 味辛而苦氣溫色黃功用頗類鬱金
 赤三稜 音平 皮白 味苦 延胡索 音苦 但鬱金大
 心專為心包之血我木大肝治氣中之血三稜大
 肝治血中之氣延胡索則於心肝血分行氣氣分
 行血此則入脾既治氣中之血復兼血中之氣耳

本草求真 卷八

陳藏器曰此藥辛少苦多然不冷性氣過於鬱
 金破血立通下氣最速凡一切結氣積氣癥瘕瘕
 血血閉癥瘕並皆有效以其氣血兼理耳古方以
 痺湯用片了黃黃治風寒濕氣手足臂痛或原
 訣云片了黃黃能入手足臂痛其兼理血中之氣
 可知若血虛腹痛臂痛而非瘀血凝滯者用之反劇
 蜀川產者色黃質嫩有蠶折之中空有眼切之分
 為兩片者為片子莖黃和濟方治胎寒腹痛啼哭
 出冷汗服黃一錢沒藥二錢乳香二錢為末蜜丸
 失子大黃一兩桂三兩為廣生者質粗形扁如乾莖僅
 未醋湯服一錢立效

本草求真 卷八 下血 菴木 綠圖

可染色不可入藥服之有損無益
 蒲黃 音介 水菴
 蒲黃 音介 水菴 味甘氣平功用無他但以生用熟用炒
 黑分其治法耳以生而論則凡瘀血停滯腫毒積
 塊跌仆傷損風腫癰瘡溺閉不解服之立能宜泄
 解除時珍曰一婦舌腫滿口以蒲黃頻塗比曉乃
 分探之愈宋度宗舌腫滿口御醫用蒲黃乾薑末等
 煎心包相火乃其臣使乾薑是陰陽相濟也失
 笑散用此同五靈以熟焦黑則凡吐血下血腸風
 脂治血氣痛以熟焦黑則凡吐血下血腸風
 血尿血痢服之立能止血然此止屬外因可建奇

三九三

功若內傷不足之川，則非此所能治者矣。

川參 言九

丹參 補人心包 味苦色赤性平而降 時珍曰五色配五臟

故人參 補人脾 曰黃參沙參入肺曰白參玄參入腎

參則有腎命門藥也 古人格 青載能入心包絡破

瘀一語已盡丹參功效矣然有論其可以生新安

胎調經除煩養神定志及一切風痺崩帶癢瘕目

赤痢痛瘡疥腫痛等症 時珍曰按婦人明理論云

本草求真 卷八下血益母草

胎止崩中帶下調經脈其功大總皆由其瘀去以

見病無不除非真能以生新安胎養神定志也凡

妊娠無故大便不實者切忌畏鹽水忌醋反藜蘆

益母草 言九

益母草 補入心 一名茺蔚辛微苦寒功能入肝心

胞絡消水行血去瘀生新調經解毒為胎前胎後

要劑是以無胎而見血淋血閉血崩帶下血痛

帶下白濁為白帶屬氣虛宜補中益氣下赤則為赤

帶屬血虛宜養血既胎而見胎漏臨產而見難產

已產而見血暈疔腫乳癰等症服此皆能去瘀生

新時珍曰益母草根莖花葉實並香人藥若治用

因根莖花葉專於行血而子則行中有補也蓋明

辛則於風可散血可活味苦則於瘀可消結可除

加以氣寒則於熱可療並能隨症酌施則於母自

有益耳外此皆沙腹瀉嘔之川此濃煎飲亦取

能散惡血 若其病非惡然氣味辛散腫毒散火者

其切忌之益母子至治畧同但行中有補非若益

本草求真 卷八下血益母草

六日採取良 濟陰返魂丹六月六日採花葉實為

良忌鍊子微炒用 未奈丸治胎產百病近效方採汁蒸

劉寄奴 言九

劉寄奴 補入 因何而有是名據書載是劉裕小字

寄奴曾射一蛇目見童子持藥問之答為寄奴所

傷被駱駝而收藥每遇金瘡敷之即愈故以寄奴

是名但此雖非屬真而藥味苦微溫多能破瘀通

經除癥下脹及止金瘡血出大小便血湯火傷毒

綠血之在人身本貴通活滯而不行則血益滯而

不出而癥瘕脹滿愈甚行而不止則血亦滯而不收而使血出益甚等奴總為破血之品故能使滯者破而即通而通者破而即收也。按此破血古書止言治功而不詳釋其義殊覺疎漏但性多走泄不可過服令人吐利不止莖葉花子皆可用。

蘇木 蘇木 蘇木

蘇木 蘇木 蘇木 甘鹹辛涼功用有類紅花少用則能和血多用則能破血但紅花性微溫和此則性微寒涼也故凡病因表裡風起而致血滯不行暨產後

本草求真 卷八下血崩奇奴蘇木

血氣脹滿以死及血痛血癥經閉氣塞癰腫跌撲損傷等症皆宜相症合以他藥調治如疎散則與防風同用行血則與乳香同用。蘇藥但性平疎泄產後惡露已盡大便不實者均應禁用出蘇方交

沒藥 沒藥 沒藥

沒藥 沒藥 沒藥 入肝 苦平兼辛。諸書亦載能補心膽與肝蒸則瘀血不除則氣血安生乳香氣味辛溫既能行氣活血又有沒藥之苦以破其瘀則推陳致新

公認

自有補益之妙。宗曰沒藥大能通滯血血滯則滯急故痛且腫凡打撲跌傷皆傷是以古方乳香必同沒藥兼施相兼而用謂其可止疼痛義由此也今人不明藥品氣味動以書載補益豈不誤甚出南香色赤類琥珀者良治同乳香

郁李仁 郁李仁 郁李仁

郁李仁 郁李仁 郁李仁 世人多合胡麻同用以為潤燥通便之劑然胡麻功止潤燥煖中活血非若郁李仁性潤其味辛甘與苦而能入脾下氣行水破血之

本草求真 卷八下血崩藥有李仁

八股

劑也故凡水腫癰急便閉開格不通得此體潤則滑味辛則散味苦則降與胡麻實異而又可以相需為用者也。按宋史錢乙傳云一乳婦因悸而病之所謂即愈所以然者日係內連肝膽志則氣結能順之妙者郁李仁去結隨酒入膽結去膽下則目而益燥結不解耳去皮尖蜜浸所

乾漆 乾漆 乾漆

乾漆 乾漆 乾漆 入肝 味辛氣溫有毒。以景曰生漆毒烈人以鴨腸有降無升崩破日久凝結之血及前年深堅

血分

結之積緣人感受風寒暑濕鬱而為病則血不舒
胃中有物留滯不消久而生虫血積不化結而為
瘀由是陽氣竭澤津液枯槁難瘳風痺因之不免
用此辛溫毒烈之性雖除瘀積中氣得復絕傷皆
藥而緩急和矣按血見漆化水故能化盡破血千
金三蠱方皆賴以之為君震亨曰漆性急而飛用
之中節積滯去後補性
內行人不知也本經古能輕身者以其蠱去而身自輕之
謂也所謂中氣可復絕傷可納者亦因瘀去而中
自復與傷自納之謂也但無積血者切忌以其大

本草求原 卷八下 血分

十二

血分

傷營血損胃氣耳炒令烟盡為度試漆訣云微風
似鈎城成琥珀若患漆瘡以生蟹汁紫蘇解之
色打者有汗唯若患漆瘡以生蟹汁紫蘇解之
志云漆得蟹而成水蓋物性相制也
凡人畏漆者嚼蜀椒塗口鼻則可免
血竭音決
血竭音決入係南南柝樹木之液猶人之膏脂者是味
甘而鹹性平色赤按五味惟甘主補鹹主消血蠶
味甘雖能和血收口止痛生肌然味鹹則消却能
引膿性滯入肝經血分破瘀故凡跌仆損傷氣血
攪刺內傷血聚並宜同酒調服通氣乳香沒藥雖

至血病而亦兼入氣分此則備入血分而不兼及
氣分者也但性最急迫引膿甚利不可多服解凡
血病無積瘀者不必用之以藥透指甲燒灰不變
色者佳藥肆偽造甚多有川椒同藥藥真者絕
少同藥藥搗川椒則作得蜜陀僧真

桃仁音七

桃仁音七入心辛苦甘溫為厥陰心胞肝血分主藥
夫血者陰也有形者此周流乎一身一有凝滯則
為癥瘕瘀血血閉或婦人月水不通或跌撲損傷

本草求原 卷八下 血分 桃仁

十三

積血及心下宿血堅痛皆從足厥陰受病以其為
藏血之臟也昔能泄滯辛能散結甘溫通行而緩
肝故並主之所以為高血必需之藥成無已曰肝
聚則肝氣燥肝若急食甘以緩之桃仁之甘以
緩肝以散血故張仲景抵當湯川之以治傷寒八
九日內有蓄血發熱如狂小腹滿痛小便不利者
又有當汗失汗熱毒深入吐血及血結胸煩燥謔
語者亦以此湯下之與且桃為五木之精能鎮辟
不祥故至辟邪味苦而辛故能殺小蠱雖云苦能
去滯甘能生新但苦重甘微氣薄味厚沉而下降
故海多補少散而不收用之不當及過用多用使

血下不止。損傷真陰。不可不慎。張璠曰。大抵氣血
 泣不能流。溫則消而去之。此軒岐之論也。但世之各
 於醫者。一見血症。即以寒涼清陰為務。其始非不
 應。而取效於一時。屢屢而後。而病之虛弱。非
 真。必以陰虛。而食滯。而為力未達。而病不
 苦寒。有陰不濟。而為力未達。而病不
 陰。而見其害。不若陰虛。而為力未達。而病不
 免。而見其害。不若陰虛。而為力未達。而病不
 俗。而見其害。不若陰虛。而為力未達。而病不
 言。而見其害。不若陰虛。而為力未達。而病不
 或燒存性。用雙仁者。有毒。不可食。香附為使。能
 丹。石。毒。生。者。尤。損。人。補。日。棟。與。
 驚。同。食。慮。必。腹。痛。服。水。人。忌。之。
 蓮藕言九入
 水藕言九入

本草求真 卷八 下血諸病

蓮藕入出瘀泥而不染。其根通達諸竅。聯絡
 絡。尤為交搆黃宮。通調津液之上品。味甘性寒。入
 心脾血分。冷而不泄。澀而不滯。故凡產後血積煩
 悶。酒後煩渴。和服。盛怒血暈。以灰髮二錢。痛脈
 菴。亂虛渴失血。血痢。並金瘡折傷。酒毒。癩毒。熱爛
 腫。一切精熱。癩疾。服之。立為解除。若非熱非癩。以
 其有破血止熱之力也。煮熱甘溫。益胃補心。實腸
 久服。令人心懽。并搗塗折裂凍瘡。熱癩。塗
 產後忌生冷。獨藕。不思謂其能散瘀血也。散字作

不作表。口疳。服能止結。真自下。胃氣自開者。亦
 以熱除血解而。者忌服。熱服止瀉。實腸者。以
 其有溫補之力也。益脾補心者。以其味甘。入胃。多
 孔象心之謂也。時珍曰。生於卑汚。而潔白。自若
 珠。絲。結。內。時。生。於。燠。而。穿。堅。居。下。而。有。飾。孔。廢。珍
 矣。故。其。所。主。者。皆。心。脾。血。分。之。疾。與。逆。之。功。稍。不
 同。云。弘。景。曰。味。時。太。官。作。血。通。音。勸。危。人。削。藕。皮
 家。川。以。使。血。多。效。者。血。黃。也。但。世。搗。澄。藕。粉。多
 以。豆。麥。菱。粉。偽。充。真。者。絕。少。藕。節。味。倘。同。生。地。汁
 宜。便。善。止。一。切。吐。衄。血。症。忌。鉄。水。相。感。志。云。藕。以。豎

本草求真 卷八 下血諸病

百然銅言九入
 金

自然銅入因何川能接骨。蓋綠骨被折。傷則血
 瘀。而作痛。得此。幸以散瘀破氣。則痛止。而傷自和
 也。而骨安。有不接乎。且性乘堅剛。於骨頗類。故能
 入骨而接。是以有合乳香。沒藥。龜虫。五銖。古錢。麻
 皮。灰。血。蝎。胎。等。作。九。煎。富。歸。地。黃。續。斷。牛。膝。丹。皮
 紅。花。濃。湯。送。下。以。治。跌。撲。損。傷。最。效。但。病。即。已
 不可過服。以致真氣走泄耳。虞寧曰。自然銅。世以

方德多入抵宜補氣補血補胃倍工惟在
速效過合病人之意而銅非煨不可用若產後
血虛者忌服產銅坑中火煨醋淬七次細研
其火毒全消相煨挾香藥熱毒雖
有接骨之功燥散之腐甚於刀劍甘草水飛用

古文錢 四百

古文錢 肝腎氣味辛涼雖曰屬銅有毒然歷久氣

化其毒無多時珍曰古文錢但得五者其主治有

曰能治目赤翳障婦人生產橫逆者是能閉其血

氣癱塞之路也宗真曰予少時常患赤目腫痛數

年去皮以古青銅錢刮汁點之初其苦熱淚度面

然終無損後有患者教之往往疑感信士點之無

不一點遂愈更不須再 有曰能治心腹痛者是能

散其血氣凝結之意也有曰能治月解不來者是

能解其胞脈也有曰能治五淋者是能通其衝在

熱藥也有曰能治跌撲損傷者火煨醋淬是能入

其受傷凝滯之所而消其血瘀也故治目赤翳障

則須用以生薑汁塗刮青點目生內障生花不用

治婦人逆產五淋則須煮汁以服治便毒初起則

與胡桃肉同嚼食二三枚即消以金伐木者故耳

或煨湯或刮青或醋服各依本方製用

乳慈石 四百一

花慈石 肝 雖產硫黃山中流為性溫然其味酸
而滴其氣亦平故有化血之功其是以損傷諸血

胎產惡血血運並子死腹中胞衣不下服之體即

疏通瘀血化為黃水金瘡血流敷即合口誠奇方

也項曰近世以合硫黃同煨研末敷金瘡其效如

效但此原病劫藥其功專於止血能化血為水

酸以收之也東垣所謂胞衣不出滴劑可下後止

以下之蓋赤石脂亦能下胞胎與此義同下後止

後須以獨參湯救補則得之矣若使過服則於肌

血有損不可不謹以確固濟頂火煨過出火毒研

細水飛晒乾用

皂礬 四百三

皂礬 入膠兼入 等於白礬味亦酸鹹而滑有收

痰除濕去蟲殺虫之功但力差於白礬而稍緩耳

且此色綠味酸燒之則赤用以破血分之積垢其

效甚速如金匱之治女勞黑瘰硝石礬石丸專取

皂礬以破積瘀之血且治喉痺用此以取酸漏作

涎之力同米醋研食惡瘡疥癬用以收燥濕解毒

之劑汁立盡

本草求真 卷八下血花慈石 十七

之功賜風瀉血用此以收消散濕熱之後又有收
瀟之功也然而諸治之外又善消積滯凡腹中堅
積諸藥不能化者以紅紫同健脾胃消食藥為丸投
之輒消按張三丰仙傳云治脾土衰弱肝木氣盛
木丸方用蒼朮二兩木香中滿或黃腫如土色日伐
妙赤色皂莢一兩醋拌曬乾水浸同黃酒麴四兩
服三四次九好酒米湯下日三服時珍但胃弱人
常以此加平胃散治腹中腹脹果驗但胃弱人
不宜多用服此者終身忌食蕎麥犯之立斃青盤
淨者良煨赤用豈醋

五靈脂四百三

本草求真 卷八下血五靈脂

五靈脂崑山人即此地寒號虫鳥矢也時珍曰崑山
也五靈脂山甚多其狀如小鷄四足有兩翅夏月
毛采五色自鳴若日風風不如我至冬毛落如鳥
雛怨寒而號日得過且過其矢恒集一處氣甚腥
以砂石潤滑者為真以其受五行之靈其矢狀
如凝脂故有五靈脂之號其氣腥臭難聞其味苦
酸而辛惟其腥穢難聞故能入血凝臭穢之處而
療其病惟其味苦酸而辛故能入心與肝而泄其
滯是以心中血氣刺痛婦人產後少腹兒枕塊痛
及痰挾血成窠囊血凝作痛目翳往來不定等症

皆為血分行氣必需之藥宗爽曰有人病中
也肝受血則能視目病不治血為片理也川五靈
脂之藥而愈又有人破血所傷長久不愈者以
酒調藥二錢灌之遂姓仍以俾放處少頃後復
為末耳又李仲問之乃五靈脂也非黃半兩同
藥力去風之劑也動物也衝任經虛治風傷
人識見深遠如此此亦一說但及肝血虛帶亦
肝風之症按此為血海任為胎任脈通衝
女中血崩經水過多赤帶不止宜半炒半生酒調
服之亦治氣逆癩瘡及解虫毒藥毒但此氣味俱
厚辛燥不堪綱目指為甘溫張氏謂非正論改為

本草求真 卷八下血五靈脂

綠園齋

性寒不為無見故僅可治有餘之滯若使氣血不
足服之夫損真氣腥更使人動吐所當避也酒飛
去砂石晒乾入藥行血宜生止血宜炒惡人參
老楞子崑山人即今所謂蚶干殼者是也味鹹而甘
性平故治多至消血化痰除積為婦人血塊癥瘕
男子痰癖積聚要藥積者除氣也五臟所生其始
下有所終始左有右所歸處謂之積聚者陽氣也
六腑所成其始無根木上無所歸其積聚也
常處謂之聚積聚之症非止根於何爾食積不化
之可用以化氣消導之劑味鹹有言卒然飽食多

飲則腸滿起居不節用力過勞則筋脈傷於腸
筋則血外溢血外溢則筋動筋動則血傷於內
血內溢則後血傷於腸胃之筋則血溢於腸
外有寒汗沫與血相搏則非合凝聚不得散而積
成矣且以胃之大絡名曰虛里貫膈結於左
乳之下其動應衣是即陽明宗氣所出之通於人
於食不節漸以停滯而致積成是以昔人有云
此與驚甲蟲同為一類皆能消瘕除積但蟲與
其性最迅此與驚甲其性稍緩耳蝦紅醋淬三次
用

斑蝥 四百五
卵生

斑蝥 入最屬惡物聞人捕捉即於尾尾射山
本草求真 卷八下血无初干功

本草求真 卷八下血无初干功

二十

斑蝥

氣令人臭不可聞近人肌肉則潰入胎則墮其毒
概可知矣。神農本草經云春食其花為光青夏食
中為地膽按花為青長食其花為斑蝥冬入地
黑身赤頭身紫斑色地膽黑頭赤尾其味辛其氣
寒其性下走而不上。走下散血至精潤之故書
言外用止可以蝕死肌敷疥癬惡瘡內治止可以
破不淋拔療癰疔腫下大傷惡毒而已取其以毒
攻毒也。然惟實者可用其拔療癰毒則以斑蝥法
製使令毒根從便出如粉片血塊爛肉之形楊登
瘰癧之毒莫不有根大抵治以斑蝥地膽為三制
度如法能令其根從小便出如粉片血塊爛肉

次以木通滑石燈心草輩導之但下犬毒之初先
於患人頭上拔去血髮二三莖以斑蝥七枚去根
足炙黃用蟾蜍搗汁服之瘡口於無風處搨去惡
血小便洗淨髮炙敷之服後小便當有瘀毒泄出
三四日當有狗肉三四十枚為盡如數少再服七
枚若愈後忌聞鐘聲復發則不可治矣去頭足糯
米炒熟生用則吐瀉人亦有用米取氣不取質者
畏巴豆丹參惡甘草芫花

水蛭 四百六
卵生

本草求真 卷八下血无初干功

二十

水蛭

水蛭 入 卽馬黃蟻生於陰濕之處善食人血味
鹹與苦氣平有毒與蠱虫功用相似通利水道破
血墮胎改月閉血瘕積聚無不並腫毒惡瘡折傷
皆能有效然蝦之存性見水復能化生噉人臟腑
破瘕之藥甚多何須用此如犯之者止用黃泥作
丸吞之必入泥而出以土制水故也。時珍曰昔有
食水菜誤吞水蛭入腹生子為害噉啞血腸痛
黃瘦者推以田泥或搗黃土飲數升則必盡下出
也蓋蛭在人腹凡用須預先熬黑七日置水中不
得土氣而下耳。凡用須預先熬黑七日置水中不
活者方用畏石灰食鹽。柯琴曰水蛭水物陰於食

血虫化生

蘇虫化生 微苦微鹹氣寒有毒善啗牛馬猪血因其性以為用故以之治一切血結諸病故凡病血蓄而見身黃服結腹痛如狂小便利並堅瘕積塊瘰母九竅閉塞者服之自克有效以苦泄結鹹走血故也且色青入肝服之宜入肝臟血分而散之矣河間云蘇食血而治仲景合水蛭用此以治大腸蓄血如狂亦是此意但性燥惡毒以此治病是山荆謂之治盜賊非得已也去翅足炒用惡麻黃

小神味鹹 性寒 入心 血 蟲 化 生

腐虫化生

腐虫化生 即腐地蠶又名土蠶者是也味鹹性寒其物生於土中伏而不出善攻隙穴以刀斷之中有汁如漿鬪接即連復能行走故書載跌撲損傷續筋接骨義由此耳真奇物也且人陰血貫於周身雖賴陽和亦忌燥烈若熱氣內鬱則陰陽阻隔而經絡不通因而寒熱煩生得此鹹寒入血軟堅則凡血聚積塊瘕癥瘕不因是而除而血脈調和營衛暢達凡事時至又安有血枯血閉而不見其

持性

服法

血毒

生育者乎故又能治諸般血症而使挾孕而有子也是以古人用此以治跌撲損傷則多合自然創龍骨血蝟乳香沒藥五銖錢黃荆子麻皮灰狗頭骨以治下腹痛血痛血閉則合桃仁大黃以治日張仲景治雜病方及久病積結有大黃蠶虫九又有大驚甲光及婦人藥並用之以其有破壁下血之功各隨病症所因而用之耳陰乾臨時研入畏身英蒿蒲屋遊

蝟蝟化生

蝟蝟化生 最屬陰寒故書所述利藥大令人駭如

本草求真 卷八 下血 蝟蝟 化生

能與柿同食則令人泄瀉及痰癥瘕與孕婦食則

能使胎即下明曰孕婦食而爪尤甚以蟹燒烟則

能集鼠於庭弘景曰以黑犬血灌蟹同銀硃燒烟

則能使臭虫即斃蟹近於漆則能化漆為水筋骨

損斷用蟹搗爛微炒納入瘡中則能使筋即連他

如胸中熱結喘辟而腫及蓄血發黃婦人乳癰硬

腫小兒顛解凡因熱結熱滯而成者無不用之立

效其化血為水逐熱消痰未有若是其神者矣括

筆談云關中無蟹土人收乾者懸門總緣性屬鹹上辟瘴不但人不識鬼亦不識也

寒外骨內生青熱赤陽包陰象陰氣純佈故克見其迅利耳若血因寒滯及腹中疼痛喜熱惡寒者其切忌焉醃蟹宜入蒜投則不沙蔽中蟹勃者宜搗勑節熱酒調服

宗爽曰此物極動風風疾人不可食屢見其事

本草求真卷八下血辨類

三四 綠國春

本草求真卷八 第一册終

本草求真卷八 第二册

殺蟲 殺蟲 殺蟲 殺蟲

殺蟲 病不外乎虛實寒熱治不越乎攻補表裡所殺蟲 以百病之生靡不根於虛實寒熱所殺蟲 亦不越乎一理以爲其通又安有雜治雜劑之謂殺蟲 惟是虛實寒熱散聚或內滯不消而爲殺蟲 或鬼疰外結不散而爲殺蟲 或疫癘表裏之異升降有虛實之殊寒熱之辨而毒亦所以必治之也至於治別此藥 尤須審其氣味冲和於人身氣血相宜治用若使 辛熱燥烈用不審顧必旋踵而於劑之中又將 惡毒之品另爲編

舊唐書食醫錄卷之八 治風濕痺痛方 治風濕痺痛方 治風濕痺痛方

三四 綠國春

本草義總或巳得其過乎云又按蠱之生本於人之正氣虧損而成諸毒乘虛內蓄則即爲致害音易殄滅體虛者其虛乘空內蓄則即爲致害音則非易治也考之方書所載治蠱藥品甚多治亦錯雜不一如黃連苦參黑石脂黃蘗苦楝子青黛藍子大黃朴硝是殺蠱也雷九蒼蠱是殺蠱也熱子是以殺蠱也雷九蒼蠱是殺蠱也雷九蒼蠱是殺蠱也

本草求真 卷八 雜藥部 鶴虱 凡入氣味苦平。功專入肝除逆故凡
一身疾凝氣滯得此甚以疎泄則痰氣頓解而出
自無安身之地矣。况虫得苦則伏如小兒疝瘕
痛用以鶴虱研末納於肥肉汁中投服其蟲自正
蟲痛而白唇非其蟻因苦遂竭亦在是但藥肆每
紅時作時止以葫蘆子代充不可不辨。大率有九一伏生虫
長四分爲羣虫之主二曰虻虫長一寸于孫相
貫心而殺人三日白虫即寸虫長一寸于孫相
生

使氣血除痰食積滯以殺蟲也。故其藥味以
又氣溫肝是補劑則能清肺散熱以殺蟲。故其藥味以
而氣溫肝是補劑則能清肺散熱以殺蟲。故其藥味以
肺氣溫肝是補劑則能清肺散熱以殺蟲。故其藥味以
寒燥之味且盡得其酸平。得苦則下凡大黃黃連
是酸之味且盡得其酸平。得苦則下凡大黃黃連
苦則伏是川椒之味且盡得其酸平。得苦則下凡大黃黃連
辛則伏是川椒之味且盡得其酸平。得苦則下凡大黃黃連
其藥之味且盡得其酸平。得苦則下凡大黃黃連
引其藥之味且盡得其酸平。得苦則下凡大黃黃連
上出藥之味且盡得其酸平。得苦則下凡大黃黃連
非子藥之味且盡得其酸平。得苦則下凡大黃黃連
槐皮藥之味且盡得其酸平。得苦則下凡大黃黃連
虎骨藥之味且盡得其酸平。得苦則下凡大黃黃連
苦酸清推使石推實治書以甘取義實有

本草求真 卷八 雜藥部 鶴虱 功專入肝除逆故凡

雷丸 味甘而鹹性寒小毒。本竹餘氣所結得
露露而生故有雷丸之號功歸入胃除熱消積化
瘕故凡濕熱內鬱癩疔狂走汗出惡風蟲積殆甚
腹大氣脹蠱作人聲者服之即能有人恐佈服
雷丸 味甘而鹹性寒小毒。本竹餘氣所結得
雷丸 味甘而鹹性寒小毒。本竹餘氣所結得
雷丸 味甘而鹹性寒小毒。本竹餘氣所結得
雷丸 味甘而鹹性寒小毒。本竹餘氣所結得

中赤熱四肢腫急在肺使人咳嗽氣喘以其秉性
純陰兼味至苦感其神靈故能去其邪魅也。所云
惟利男子不利婦人亦以婦人病陰故於陰物不
宜耳。合久陰瘕之果腐腎熱亦又何利。但無盡
積不得妄用皮黑肉白者良若肉紫黑者殺人甘
草水浸一宿酒拌蒸或泡用厚朴芫花爲使惡葛
根補按綱目述揚動腹有小聲應人後讀至本
盧茸 香木 大苦大寒功專殺蟲除瘵
盧茸 香木 大苦大寒功專殺蟲除瘵

本草求真 卷八 殺蟲部 雷丸 功專入胃除熱消積化

安心明目最為小兒驚癇疳積上品... 色絨者真

阿魏

本草求真 卷八 殺蟲毒者阿魏

阿魏... 氣平而溫... 既兼辛與溫則氣更活不滯故書載治疳辟穢是

無真之說矣用鉢細研熱酒器上煨過入藥

大楓子

大楓子... 熱其藥止可取油以殺瘡疥若用此以治大風病

性不可多服惟用外敷不入內治其功或不沒也

本草求真 卷八 殺蟲大楓子

樞實

樞實... 甘清微苦... 故有解燥除熱之功非若所云能除濕熱之意乎

毒在人食既無病又能以此療病毒何由見非毒
 所云無毒之說乎又其苦清兼能清燥潤肺
 復於熱性味不合令其即化為水非書所云有
 毒之說乎究之止腐潤肺解熱殺蟲之品其言有
 毒止是毒虫之毒而非毒人之毒也其言無毒因
 非毒人之毒而為毒虫之毒也故凡一切肺燥而
 見咳嗽不寧腹中不和五疳惡毒並小兒黃瘦便
 秘不解等症服之無不奏效好食茶葉面黃每日
 食糗子七枚以愈為
 度治寸白蟲日食糗子七
 枚滿七日虫皆化為水 背東坡詩云驅除三彭

本草求真 卷八 後部 毒蟲

三十

蠶愈我心腹疾義正是矣但多食則有滑腸之虞
 炒食味即香酥甘美更有引火入肺大腸受傷之
 慮不可不細察耳忌鴨肉反菘豆能殺人物類知
 權灸素羹味更甜美猪肺炒極黑
 皮自脫糗子同甘蔗食其油自軟
 水銀醫石
 水銀走而不守從石中迸出者為石汞從丹砂中出者
 為硃裡汞皆丹砂液也性喜至陰辛寒有毒質
 重着而流利得鹽礬為輕粉加硫黃為銀硃煬成
 礬同硃黃打火昇煉則為靈砂同皂礬則為升降

本草求真 卷八

靈丹藥之飛騰靈變無有過是故以之殺諸虫疥
 瘡也然至陰之性近於男子陰器則必消瘻無氣
 入耳能蝕人腦至盡頭者以人肉令百箇癩疥外
 敷尚防其毒之害內服為害不待言而可知矣今
 有水銀煬成丹砂人得果肉入嚼同研則散得
 不晚誤用不可不識時珍曰水銀陰毒之物無似
 鉛則凝得硫黃則結之者而大明言其無毒本經
 言其久服成仙此極言其毒丹砂亦抱子以爲
 長生之藥六朝以上食生者服食至成癩而安
 厥藥不知若下人矣方士固不足道本草其可矣
 言哉水銀但不可食耳而其治病之功不可掩
 也同黑錫結砂同鎮墜又知同硃黃結砂則救
 危病此乃應變之兵在川者能得青塔而其性

本草求真 卷八 後部 水銀

三十一

要得紫河車則伏得川椒則收水銀失在地者以
 花椒茶末收之
 銀硃醫石
 硃砂係水銀同煬煉成硃性燥味辛方書用以
 殺蟲治瘡亦是以前解毒而已用以食服古人切
 戒謂其性悍烈良非所宜時珍曰功過且同蠶殼
 燒之則臭虫絕跡和麋肉熏之則疥疥蝨枯於此
 可徵其概矣

輕粉醫石
 輕粉醫石係水銀加鹽礬昇煉而成水銀一兩白
 礬二兩食鹽

四〇五

一商八錢器內益覆封固升銀又法水銀一兩
 按水銀金之煉製成粉無鹽則色不自氣雖是化純
 陰而為辛燥然陰毒之性猶存故能殺虫治疥
 痰消積烈毒之性走而不守今人用治楊梅瘡毒
 雖能燥風痰濕熱從牙根而出暫得寬解日銀粉
 能傷牙齒益下齒根腐牙是陽明之毒毒氣感
 於陽明而精血水氣既不勝其毒則毒即循
 經上行而齒然毒氣入筋骨血液耗損久
 猴為結毒遂成廢人仍須用水銀昇鍊入三白丹
 引拔毒之藥同氣搜逐癘風醉仙丹通天再造散

本草求真 卷八 殺蟲藥類

用以搜剔毒邪仍從齒縫而出再以錢氏利驚丸
 白餅子並川取痰積從大便而出矣時珍曰黃連
 無錫可畏磁石石黃一切血本出於丹砂故也
 制其毒用輕粉滑石杏仁去皮尖等分為未蒸過入腦
 少許以雞子清調勻名太真紅玉膏洗面果傳之
 如紅玉
 殺虫卵生
 殺虫蟲入味苦性寒出於糞中故仍取其入腹消
 積俾其不傷正氣也其法潔淨炙黃為末調服又
 用蝦蟆數十隻打死置於罈內取殺虫入內食盡

然後消除穢惡取殺虫焙乾凡小兒疳積腹大脚
 弱膜遮積及大人熱結諸毒利作嘔並宜服
 之無不立效是以鼻齒疔瘡取此有尾者燒灰一
 錢同褐炭灰和勻類吹最效與利骨取米用白馬
 腦上肉虛或劬待生蛆與烏骨白鷄一隻食之取
 糞陰乾每一錢入鹽砂一錢研勻用少許擦瘡
 疔時即落皆取穢以入穢遇骨與肉鑽入之意無
 他義也

本草求真 卷八 殺蟲藥類

本藥求真卷第八 第二册終

發毒內細痛痞疔氣不從逆於肉起乃生癰疽又曰
因陰陽相滯而生則已也癰疽之發因合內外皆
而不僅於肉裡所見已也癰疽之發因合內外皆
寒邪初在表其藥止宜升發而毒氣未深等其
毒氣外發必死為之候矣手按發毒之類甚多
毒氣攻心必死為之候矣手按發毒之類甚多
何三不為發毒之方至於蜂蟻則能散火逐氣
為行則能散火逐氣
行則能散火逐氣
行則能散火逐氣

本草求真 卷八 癰疽

解香力能透透外風邪火毒象牙力能散毒外脫
力能透透外風邪火毒象牙力能散毒外脫
力能透透外風邪火毒象牙力能散毒外脫
力能透透外風邪火毒象牙力能散毒外脫

以貼手臂腫痛一夜即效
以貼手臂腫痛一夜即效
以貼手臂腫痛一夜即效
以貼手臂腫痛一夜即效

胞衣不出用此研膏以塗脚心即下中風日眼
斜偏左貼石手心偏右貼左手心即止至於口噤
鼻塞耳聾喉痺舌服用油煙蒸即開水漱淨腫用
仁研服一枚即消可五粒針刺好肉用仁搗敷患
處即接癰癧惡瘰用仁敷立愈能引藥氣入內
痛氣出外 凡此皆病外用以奏奇功但不宜於
服耳昔人有以汁點舌根下即不能食點舌根
門內即下血死非云服葶藶者一生不得服豈犯
即服死非毒可知臨水表去皮研取油用忌鉄

芙蓉花 潤木
芙蓉花 潤木
芙蓉花 潤木
芙蓉花 潤木

本草求真 卷八 癰疽

陰毒其勢莫甚則非輕小平劑所能治矣此又不
為未功效殊甚然必毒輕不重川此方可若大毒
即膿出已消者即易斂或加赤小豆若耳子同人
處乾則類初起者即覺清涼痛止腫消已成者
論花葉及根皆可搗研為末調密塗四圍留中患
肺涼血散熱止痛消腫排膿比一切癰疽腫毒無
散銀箍散即是此物蓋此味辛氣平質滑功清涼
芙蓉花 潤木
芙蓉花 潤木
芙蓉花 潤木
芙蓉花 潤木

可不知也

楓香 香木

楓香 脂入 係楓膏脂所成結而為香故曰楓香又曰白膠香按楓性鼓疎通故木易蛀外科用以透齒金瘡末收即效筋斷即續齒頰腫痛燒灰指牙甚上咳唾膿血同藥服之即止皆取透發病氣之意時珍曰楓香性溫可亂乳香其故能見其首治也以蘇水煮二十沸入冷水中揉扯數十次晒乾用

本草求真 卷八 藥毒藥 花楓香 三六 續圖齋

象牙 獸

象牙 齒入 味甘性寒按象性至剛猛而牙則舊脫故凡皮肉間有形滯物及邪魅驚悸風癩並驅瘡內有毒未拔者服之立能拔效以其具有脫性故能以脫引脫耳 時珍曰時人知犀可見水是以癩腫不解川牙磨水服之并到末蜜調塗之即效諸鐵竹木刺入肉刮削煎湯溫服即愈諸骨鯁入於喉刮下薄片類服即吐不吐再服以吐出為度象皮味鹹氣溫專治金瘡不合川皮煨灰存性敷

本草求真 卷八 藥毒藥 象牙 三六 續圖齋

之亦可焚膏入散

蟾酥 生

蟾酥 脂入 即蟾蜍俗名蠹 其間內有白汁者是也味辛氣溫有毒能拔一切風火熱毒之邪使之外出蓋邪氣着人肌肉鬱而不解則或見為疔腫發背陰瘡陰疽疔癩惡瘡故必用此辛溫以治蓋辛至散溫至行使邪盡從汗發不留內入而熱自可消除矣但性有毒止可外治取效如發背未成者上牛日漿必昏慎置水中救其命再易一箇三易則毒散矣勢重者剖蟾蜍合塗上不久必臭不可

本草求真 卷八 藥毒藥 蟾酥 三七 續圖齋

聞再易二三次即愈 或用丸劑亦止二三四粒慎勿以微物見輕也

而巳多則能使毒入其用作丸投服亦宜雜他藥內入如牛黃明礬乳香沒藥之類毋單服也故書一截接諸毒只宜用酥一錢白麵二錢硃砂少許作錠諒病輕重酌與不可盡服又治背發無名等毒取酥三五分廣膠水化米醋入銚火化乘熱手刷不已以散為度刻玉塗之等於刻蠟房術用之更善總皆外科奪命之功 括註輕用爛人肌肉至若蟾蜍氣味辛寒凡癰疽積塊風犬咬傷小兒疳積

本草求真 卷八 藥毒藥 蟾酥 三七 續圖齋

瘋疫癘斑瘡疽發背用之與酥膠同以其辛有發散之能寒有逐熱之功外敷則見神功內服除去頭足腹腸疝亦能去積除熱如風狗咬傷用蟾蜍後足搗汁生食先於患人頂心拔去血髮三四莖於小便內見沫其毒即解發背初腫用活蟾數個更易繫於腫上法詳則毒其亦散矣唐珍曰蟾蜍應月魄而性靈異穴土食虫又伏山楮樹蜈蚣故能入陽明經退虛熱行濕氣而為疔病癰疽諸毒要藥總皆具有外拔內攻之力勿輕用也蟾酥以油單紙裹眉裂之酥出紙上陰乾用蟾蜍焙乾去

本草求真卷八 蟾蜍 三九

皮瓜酒浸去肉用
人牙四百五十五
人牙齒味鹹性溫功尚治痘倒靨癩瘡或出不快及見黑陷多因毒氣深入故須用此內斡時珍曰齒者腎之標骨之餘也痘毒則毒自腎出方長之餘外為風寒穢氣所冒腠理閉塞血流不行毒不能出或變黑倒靨宜用此物以酒磨達之氣入腎經務出毒氣使熱分復行而痘自紅活蓋劫劑也若伏毒在心昏胃不省人事及氣虛色白炸塌

不能作膿熱癩紫泡之症止宜解毒補虛苟誤用此則傷胃損腎反成不救可不慎哉高武痘疹管見云左仲恕既醫腎疾人牙豈能復治之乎蝦退火毒用

本草求真卷八 人牙 三九

本草求真卷第八 第三四

解毒... 解毒之藥... 解毒之法... 解毒之功... 解毒之效... 解毒之理... 解毒之由... 解毒之因... 解毒之果... 解毒之理... 解毒之由... 解毒之因... 解毒之果...

牛蒡子... 牛蒡子之性... 牛蒡子之功... 牛蒡子之理... 牛蒡子之由... 牛蒡子之因... 牛蒡子之果... 牛蒡子之理... 牛蒡子之由... 牛蒡子之因... 牛蒡子之果...

人止言解毒凡遇瘡瘍腫疽疔等症無不用此
投治然尤未釋其義此人毒氣之結多緣外感風
寒營氣不從逆於內裡故生癰毒牛蒡味辛且苦
既能降氣下行復能散風除熱兩解之義是以感
受風邪熱而見面目浮腫咳嗽痰壅咽喉腫痛瘡
瘍斑疹及一切臭毒癰疽瘡紫黑使閉等症無
不藉此表解裡消但性冷滑利多服則中氣有損
且更令表益虛矣至於脾虛泄瀉為尤忌焉實如
葡萄而褐色酒拌蒸待有霜拭去用

金銀花
金銀花 肺入 經冬不凋故又名忍冬味甘性寒無
毒諸書皆言補虛養血又言入肺散熱能治惡瘡
腸癰癰疽疔漏為外科治毒通行要劑按此似屬
而峻礫不知書言能補虛者因其芳香味甘性雖
入內逐熱而氣不甚迅利傷損之意也書言能養
血者因其毒精血凝服此毒氣頓解而血自爾克
養之謂也究之止屬清熱解毒之品耳確是以一
切癰疽等病無不藉此內入取其氣寒解熱力主

通利至云能治五種屍疰事亦不虛
五種病因不一但此專主風濕內結為熱而屍疰須用酒少許冬生取一把以藥入研碎入生餅子酒少許稀稠得所至於四圍中留一口破氣其
人無同五兩瓶內以水二盆文武火慢煎至一服
藥方則如謂久服輕身延年益壽不無過謬凡古
人表若藥功類多如是但在用藥者審認明確不
盡為藥治效所感也花與葉同功其花尤妙
以此代茶

本草求真 卷八 雜考 四一

山莖根 即云
山莖根 入 大苦大寒功端瀉心保肺及降陰經
火逆解咽喉腫痛第一要藥綠少陰之脈上循咽喉咽喉雖處肺上而肺通近於心故凡咽喉腫痛
多因心火挾其相火炎熾以致逼迫不寧耳治當
用此以降上逆之邪俾火自上達下而心氣因爾
以除且能以祛大腸風熱肺與大腸相表裏肺氣
及解藥毒殺小蟲并腹脹喘滿熱厥心痛逆則心
腹皆 煎療人馬急黃 熱夫 磨汁以飲五痔諸瘡服

本草求真 卷八

之悉平總賴苦以泄熱寒以勝熱耳但脾胃虛寒
作瀉者禁用

薺芩 即 甜桔梗似人參而體虛無心似桔梗
而味甘不苦按據諸書有因味甘能和中止嗽
消渴然力專主解毒以毒性急迫甘以和之故也
觀葛洪肘後方云一藥而解寒毒者惟薺芩汁饑
飲一升或煮啗之亦可作散服此藥在諸藥中
皆自解也又張鷟胡野金載云名醫言虎中藥箭

本草求真 卷八 雜考 山莖根 四一

食清泥而解野豬中藥箭 雁薺芩而食物猶知解
青何況於人乎觀此洵為解毒之良且更能治強
中精出消渴之後發為癰疽之症 千金有薺芩丸
亦以取其清熱解毒之功無他 義耳 薺芩丸用薺
磁石 括參 熟地 黃地 骨皮 玄參 石 鹿茸 各一
兩 人參 沉香 各半 兩 為末 以猪肚 淨 煮 薺芩
五 兩 上 等 藥 湯 下 猪 腎 薺芩 湯 用 猪 腎 一 具 薺芩
根 薺芩 汁 兩 人參 扶 芩 石 母 葛 根 黃 芩 括 參
大 豆 汁 兩 人參 扶 芩 石 母 葛 根 黃 芩 括 參
名 為 子 但 市 肆 多 取 此 苗 以 亂 人 參 又 有 取 此
者 其 性 即 不 可 不 察

四一

白頭翁 山草

白頭翁 入胃 味苦性寒何書用此以治痢便膿血
得云胃欲堅急食苦以堅之痢則下焦虛損故以
純苦之劑以堅如仲景之治挾熱下痢之用白頭
翁湯之屬是也 湯用白頭翁黃連 若使熱結不除則
腎愈虛愈解而痢莫愈又書何以用此以治溫瘧
寒熱齒痛骨痛鼻衄赤痢疔瘻等症亦因邪結腸
明服此熱解毒清則腎不燥接而骨同 齒屬胃不
受邪而齒安 陽明毒不上渡而止熱不內結而

疔與瘰皆却 劫數 此風無熱熾而小兒頭禿得除
矣總皆清解熱毒之力也近根有白茸得酒良

漏蘆 草

漏蘆 人 味苦而鹹氣寒有毒凡苦則下泄鹹則
軟堅寒則勝熱漏蘆氣味俱備其性肅入助明胃
經故凡癰疽背癢乳汁不通及預解時行遊毒者
咸須仗此以解毒邪俾邪盡從便出而解矣 非虛
熱毒而起然書又云遺精尿血能止亦因毒解熱
不得妄用 漏蘆膏有收滴之力也但氣虛
除自止之意非因漏蘆

疔毒不起及孕婦有病者切忌出園中葦如油麻
枯黑如漆者真甘草并連翹為使

山慈姑 山草

山慈姑 人 味苦微辛氣寒微毒功清濕熱消結
解毒故凡症患癰疽無名疔腫癰疹惡瘡蛇虺齒
傷瘰癧結核等症用此外敷 毒 固可解散內服
亦可調治總為結毒散結之方 昔書在漏蘆洋而
流但性寒涼不可過服根與慈慈小蒜相類去毛
致用

紫豆 豆

紫豆 人 味甘氣寒據書條極利善有言能厚腸
胃潤皮膚和五臟及資脾胃按此雖用參耆歸朮
不是過也 第書所言能厚能潤能和能資者緣因
毒邪內藏凡臟腑經絡皮膚脾胃無一不受毒擾
服此性善解毒故凡一切癰腫等症無不用此奏
效 非解一切草木 煮汁則止消渴磨粉合以乳香
丹砂則能護心使毒不入 護心 築枕夜臥則能
明目疎風杖瘡疼痛則用鷄子白調敷即愈皮猶

涼於紫豆退翳明目如神粉撲痘潰尤妙
粉新錢出折一尾其叫苦薩交僧授一方紫豆
神皆有除熱解毒之功而無補益滋助之力且與
撰子相反同食則殺人

蚯蚓

蚯蚓人服最屬寒味腥穢所載甚明其言味鹹
性寒無毒其論所治則云能主伏蛇鬼疔傷寒伏

熱狂謬熱病發狂血熱癩疥斑多紫黑癰疽黃疽
損傷垂危瘰癧潰爛流串腎風脚氣倫極熱毒疔

本草求真

卷八

四

症皆能調治宗與曰腎臟風下在病不可關也須
有人因册病藥中用此果得奇效病愈服之不礙
至二十餘日原情但欲飲水不已遂至頭面大抵
攻利川青藥中則其氣味之爽不待言矣究其所
病即當止也
以致治則因此物伏處室處以鑽土飲泉是其本
性故能除其鬼疔解其伏蛇且味鹹主下處濕而
以入濕為功故於濕熱之病濕熱之物遇之即化
停癢膏水觸着即消而使濕從小便而出其性寒
而下行故能解諸熱疾下利
利小便治濕痰而通經絡也
能化血之力而凡跌仆受傷血瘀經絡又安有任

其條甚而不為之消化乎但審認不確妄為投用
良非所宜取老蚯蚓白頭者長搗汁并水調下入
藥或晒乾為末江昂云其毒者鹽水煎之張鼎
煎鹽水洗身或微炙或燒灰各隨本方用

蝮牛

蝮牛人經絡即帶殼大蝮牛是也生下濕地陰
雨即出性稟至陰味鹹小毒故古方用此以治真

陰虧損肢節不密致風中於經絡而見口眼喎斜
筋脈掣拘及風熱脫肛痔瘡腫痛疔發疔疔疔

本草求真

卷八

四

等症皆能見效須日入蜈蚣總以取其鹹寒解其諸
熱之性耳并解蜈蚣毒取形尖小綠桑木佳
人中黃 晉美

人中黃 晉美
人中黃 晉美
於黃紅之內經春取出懸掛風處陰乾取用味甘
性寒書載功備人同解毒以其味甘故也甘入其
肺五臟實熱以其氣寒故也寒勝 又治濕疫諸毒
班狂及發瘡瘰癧不起以其臭與不正相類故
能以毒攻毒也然遇急難得可取坑塢以代卷

本草求真卷八 第五册

補劑宜其性寒者

毒物之氣沖淡和平不寒不熱則非毒矣。即或乘
亦非毒矣。至於陰寒之極。燥烈之甚。有失冲淡和
平之氣者。則皆為毒。然亦有可法製以療人病。則
藥雖毒而不得以毒稱。若至氣味燥烈。或純陰
無陽。強為制伏。不取種種。則其為毒最大。而不
可以安用矣。如砒礞石。巴豆。麻子。草烏。射罔
狗。吻。之類。皆殺人之毒。而水銀。鉛粉。木鼈。商
非。冲。和。之。殺。人。者。也。草。毒。而。亦。能。以。殺。人。者。也。然。其
痛。謂。價。之。治。病。凡。屬。毒。物。因。勿。妄。投。即。其。性。非。毒
烈。而。有。毒。不。真。煎。服。不。實。則。其。為。毒。最。大。而。不。可

四

以救矣。况毒人之藥。人所共知。人向知禁。若屬非
毒。視為有益。每不及防。故余竊見人病。常有朝服
無毒之藥。而夕見其即斃者。職是
故也。因附記以爲妄用藥劑一戒。

鳳仙子 毒草

苗人

又名急性 是俗所謂金鳳花子是也

其性急猛異常 味苦氣溫 小毒 凡人病患頑痰積
塊 噎膈骨哽 服之立刻見效 以其氣味急迫 能於
骨穴 堅硬 處所 極力 搜治 是以 勝金丹 用之以治
狂 瘋 取其 急 便 礬 毒 吐 泄 同 礬 以 點 牙 疼 即 落 同
獨 蒜 搗 汁 以 塗 疥 塊 即 消 咳 食 不 下 用 鳳 仙 花 子
酒 浸 三 宿 曬 乾 爲 末 酒

藥性

凡菜豆大 每服八粒 溫酒下 加麝香阿魏尤捷 投于
下 不可多用 即急性子也 加麝香阿魏尤捷 投于
以煮硬肉即爛 但此生不出蟲 蜂蝶不近 且多食
則載人喚似 非無毒川之當細審量可耳

巴豆 附片六

巴豆 附片六
巴豆 附片六
降能行能止 開竅宣滯 去膿消沉寒 爲斬關奪命
之將 大能宜滯通竅 則藥能降能行 何書又言
能升能止 即此數字 不無令人少疑 究之書之所
言 降者 因有沉寒 痼冷 積聚於腸 深入不毛 故欲

去不能不去 不得其無辛熱 迅利斬關 亟入掃除
陰結 推陳致新 亦安能蕩滌而如斯哉 是即書之
所謂能降能行者耳 至有久病瀉泄 服升提瀉藥
而傷反甚 脈滑而沉 是明脾胃久傷 陰積凝氣所
致 法當用以熱下 則寒去利止 而脈始得上升 是
即所謂能升能止者是也 時珍曰 一婦年六十餘
肉食 卽作痛 服升瀉藥 反甚 脈沉而滑 此乃脾
胃久傷 積冷凝滯 法當以熱下之 用蠟煎巴豆丸
五十粒 服一二日 不利而愈 白夫醫理玄遠 變化
是每用治瀉痢愈者 近百人耳 夫醫理玄遠 變化
靡盡 在人引伸觸類 毋爲書執 則用藥不岐 卽如

大黃亦屬通開便之品然惟肺病多熱者最宜
 若以肺病多寒而用大黃通利不亦自相悖謬乎
 故仲景治傷寒傳裡多熱者多用大黃東垣治
 五積屬勝者多用巴豆與大黃同服反不瀉人故
 曰誤用有推墻倒壁之虞蓋用有勸亂調中之妙
 元素曰世以治酒病膈氣而以巴豆辛熱通開腸
 胃熱結之氣巴豆煎火 芽樹結難通而液隨亡其陰
 損傷寒結胸膈小兒疳積用之不死亦危藥何廣
 人畏大黃而不畏巴豆以其性熱劑小耳試以少
 許輕擦皮膚須臾發泡沉下腸胃能無潰灼蒸爛

之思乎即有急症不得已而用之注 治則
 解毒九雄黃一兩附金一錢巴豆十四粒去皮用
 為丸每五五分注下雄黃破結氣散去毒
 巴豆下開泄然係屬劑不可輕用或用細碎
 豆油煎火刺喉或搗巴豆細碎隨左右納於
 出惡涎紫 壓去其油取霜少許入藥可也時珍曰
 小者為細有稜及兩頭尖者是雄者則峻耳
 之得宜者有功力不夫膜則傷胃不夫心則作嘔
 或用殼用仁用油生用炒用醋煑燒存性用研去
 油名巴霜芫花為使畏大黃黃連涼水以此煎者
 或黑豆亦得火良
 砒石醫完

砒石出於信州故者信石即錫之苗故錫亦
 云有毒色白有黃者名金脚砒煉過者曰砒
 色最劣性味辛苦而鹹大熱大毒煉砒時人
 立上風十餘丈其下風所近草木皆死毒氣鼠死
 猶大食亦死人服至一錢者立斃烟人家用少許
 烈之性若酒服及燒酒服則腸胃腐爛傾刻殺人
 可知矣若酒服及燒酒服則腸胃腐爛傾刻殺人
 雖茶豆冷水亦無能奈何以必死之藥治不死
 之病惟膈噎牢胃為哮喘為癆果因寒結不得已借
 此酸苦涌泄吐之時珍曰凡寒毒及結喘用此真

之不引可以飲食同後詳附一日或一夜亦不作吐
 少物引吐即作吐也一婦病心膈數年不愈一醫
 用人言半分茶葉一分白及殺蟲等藥石錫綠
 湯調下吐痰血一塊而愈及殺蟲等藥石錫綠
 效如神 枯痔外敷畏醋菜豆冷水竿血
 砒砂砒砂
 砒砂砒砂
 之精其味苦鹹與辛其性大熱五金八石俱能消
 磨本草言能化硬肉難化入砂即爛成治暗瘡瘰癧
 功其性猛烈始不堪言况人脆腸薄胃其堪用此
 消導乎第或藥與病對有非峻迫投治不能奏效

時珍曰... 必用以... 芥菜不消則必用以丁香桂心水飲不消則必用... 砂而不用... 藥與病... 可法也... 如其審症不明妄為投治禍猶指掌不可

不惟山西戎如牙硝尤淨者良用水飛過醋煮乾如新刮下用之忌羊血

本草求真卷第八 第五册終

本草求真卷九 增補

食物... 而不得... 為調劑... 神而... 乎奈... 人只... 益而... 可却... 病藥... 行治... 生不... 合則... 於一... 人臍... 臍有... 而即... 陰有

本草求真 卷九 食物

菜

病促... 傳也... 物以... 穀之... 黃豆... 此穀... 非此... 若也... 瓜也... 至也... 肉也... 為也... 則多... 生白... 菜平... 乾之... 而補... 助濕... 生燥... 性燥... 則多... 助熱... 而功... 此燥

之補中益氣及止虛寒泄瀉並縮小便收自汗發
痲疹皆其性粘不利留滯在中上壅不下之故非
如參者性主溫補仍兼通活而無如此陰滯之甚
也凡物滯不其溫而謂之緩中則可謂之溫中而
熱也其可乎謂之中虛宜服則可謂之虛寒宜服
亦鳥見其可乎凡老人小兒久病均忌

稷稷人有燕稷黍稷之分蓋稷者其形高如燕
既香美性復中和所以為五穀之長而先王以之

本草求真 卷九 食物類

名官也味甘氣平故食可以益氣和中宜脾利胃
煎湯以治霍亂吐瀉如神用此燒酒可治腹中沉
疴啾唧若黍稷之稷形狀似粟但粟穗則叢聚攢
簇黍稷之粒則疎散成枝黍與黍稷分別粘者
為黍而不粘者則為黍稷之稷昔人於此紛紛置
辨而不盡一足亦未分二稷之說矣黍稷味甘性
寒作飯疎爽香美可愛服之可以清熱涼血解暑
止渴故書載治癰疽背癩瘰癧之症但多食則有
冷氣內發飲黍稷燒黍稷則氣必死忌同附子服

粟米

粟米人理味甘鹹氣寒而毛長粒粗者為粟
小而毛短粒細者為粟功專入腎養氣及消胃
凡入病因腎邪而見小便不利消渴泄痢與脾胃
虛熱而見反胃吐食鼻衄不止者須當用此調治
以寒能療熱鹹能入腎淡能滲濕粟為穀類穀又
能養脾胃故也七粒方粟米粉丸內但此生者硬
而難化即化熟者滑而難消故書言此屬食則
有足重難飛之虞與杏仁同食則有吐瀉之慮不

本草求真 卷九 食物類

可不熟悉而明辨也陳者良

黑豆

黑豆入理味甘性平色黑體潤核圓形象似腎
木為腎穀而黑豆則尤通腎加以鹽引則豆即能
入於腎也時珍曰豆有五色惟黑豆屬水性寒
腎為寒水之經故能治水消脹下氣制風熱而活
血解毒所謂同氣相求也故書有言服此令人澤
肌補骨止渴生津非其補腎之力歟身而浮腫水
痢不止疔瘡濕爛得此則消非其人腎去水之力

嗽頭項強痛卒中失音得此則除非其制風之力
 此風內中則不須此脚氣攻心胸膈卒痛單服此
 味則效非其下氣之力歟熱毒攻眼乳疔發熱得
 此則愈非其解熱之力歟便血赤痢折傷墮墜得
 此則其非其活血之力歟風癱瘓亦丹辨蛇蠱得
 此則化非其解毒之力歟然體潤性壅多服令人
 身重極冷道黃及生黃卷則平牛食之溫馬食之
 冷一能之中加甘草則解百藥毒
 黃大豆按書既言味甘服多壅氣生痰動喘

本草求真 卷九 食物類大黃大豆

黃大豆按書既言味甘服多壅氣生痰動喘
 又曰寬中下氣利大腸消水服腫毒其理似屬兩
 岐詎知書言甘壅而滯是即炒熟而氣不洩之意
 也書言寬中下氣利腸是即生冷未炒之意也凡
 物生則疏泄熟則壅滯大豆其味雖甘其性雖溫
 然生則水氣未洩服之多有疏泄之害故豆須分
 生熟而治則有補瀉之為別耳生熟大豆生是
 以昔載誤食毒物須生搗研水吐之諸毒不得
 吐者濃煎汁飲鹹內癰及與赤腹痛並與生黃豆

本草求真 卷九

嚼利而不惡心者是即吐部結有癰膿及中臭臭
 癰痧之真候惟有痘後餘毒發癰炒熟研末以並
 痘後風癰以豆殼煎湯洗後生瘡未存油潤燥睡瘍背
 癰等症生炒熟以敷則或煎湯炒黑為末以治川
 補則須假以炒熟然必少食則宜若使多服不節
 則必見有生痰壅氣動嗽之弊矣豆油辛甘而熱
 與豆氣味稍別能塗瘡疥解髮痘諸燒灰點惡瘡
 去惡肉豆忌猪肉

本草求真 卷九 食物類大豆

黃豆按書既言味甘服多壅氣生痰動喘
 運行若使中氣稍振雖服有形之物碍於腸胃用
 此合以溫藥同投即能以解積善堂方一女子
 治有人教令煮黃豆同非菜食之針入腹諸醫不
 誤下金銀物者用之皆效可證其性之利臟腑也
 如其中氣既後稍服滯滯即能作脹况多食乎此
 性疏利已見一斑與於陰潤之物過人則滯絕
 不相同惟在喉症相人體氣及多食少食以別耳

四一九

白豆

白豆 屬人腸 即飯豆中小豆之白者也 亦有土黃
如綠豆而長四五寸種之 氣味甘平無毒按據
膏穢腎病宜食並補五臟緩腸胃益氣和中兼調
經脈益絲凡物質大則氣浮質小則氣沉味甘則
中守味鹹則腎入白豆質小味甘故能入腎
而治鬼疰入血調經復入大腸與胃而使中和氣
其也然必假以炒熟則服始見有益若使假以生
投保無嘔吐泄瀉傷中之候乎須細詳之可耳

本草求真 卷九 食物白豆

豌豆

豌豆 屬人腸 即赤豆也 一名翠豆味甘氣平無毒故善
載入脾胃利濕除熱凡入病因濕熱而見腹瀉
瀉瀉閉寒熱熱中吐逆泄瀉者服此最宜與病因
濕熱而見症時紫黑而大或黑壞而臭或中有紫
線用此治無不效 牛脾史四聖丹用豌豆十九
四粒研為末以油煎同作成膏先以膏挑破
或氣虛病脈用此同羊肉煮食亦能奏功 綠豆
豆屬土故治亦在脾胃之病但須假以佐使如治

痘疔入肌活血必兼滋陰同投人脾與胃補氣必
兼羊肉同入各有至理非僅豌豆一味所能施也
出胡地大如杏仁者是

豇豆

豇豆 屬人腎 味甘而鹹性平無毒考之時珍云豇
豆可菜可菓可穀備用最多乃豆中之上品又曰
豇豆開花結莢必一兩而並垂存習坎之義豆象微
曲有似人腎所謂豆為腎穀者宜此當之是以腎
氣虛損必賴此為主治 川豇豆入煎少且此味甘

本草求真 卷九 食物豇豆

而平入腎而更入胃故凡胃津不生胃渴不止吐
逆泄痢小便頻數草莽中皆得甘以調劑而使
諸症其悉平也 補珍方云中風毒者以豇豆煮
升湯之便 書載諸疾無禁惟水腫忌補腎氣不宜
多食耳

豆腐

豆腐 屬大腸 經豆腐燻加以石膏及或鹵汁內入
而成其性非溫故書皆載味甘而鹹氣寒微毒其
謂寒能動氣凡服豆腐過甚而致腎中寒氣發動

本草求真 卷九

並生瘰癧疔頭風等症者須用柴胡湯及或杏仁以
解之然香云有人好食豆中莢醫不能治作腐家
愈頭風杏仁可解惟有用火衝擊內熱鬱蒸症見
消渴脹滿並休息久病腐食赤眼腫痛川消風
服夜用鹽取豆腐片杜毒青腫用豆腐切片燒酒
以醋醃者勿用片杜毒青腫用豆腐切片燒酒
色紅印身燒酒醉死者必頭熱者用燒豆腐切
當用此以投至云能和脾胃止是火去熱除以後
安和之謂並非裏虛無熱無火溫補之謂也豆皮
性同豆腐能除斑痘癩瘡黃腫故豆芽充莢須防

本草求真 卷九 食物豆腐豆醬

祭齋動氣 藥之義

豆醬 醬入 本豆與麩蒸桂加鹽與水晒成雖曰經
火經日煎然味鹹性冷火不勝水仍為解熱解
毒瀉火之劑耳是以書載一切魚肉菜蔬宜皆
當用此以調蛇蟲蜂蟻犬咬湯火疔毒瘰癧皆宜
用此以解與夫手足皸痛用醬湯和之 瘰癧風癢
細末和石確膏 大便不通川醬汁灌 飛蟲入耳
川醬酒蒸 浸淫瘡 用醬和輕粉弄中 川三年
耳中取出 浸淫瘡 人尿以塗 輕粉弄中 川三年

本草求真 卷九

水以身上乾燥用豆醬以滋之 妊娠下血尿血等症
用豆醬二升去汁取豆炒研服方寸匙房血川無
豆醬煎乾生地二兩為末每服一匙米湯以下無
不當用此以治但此氣鹹性冷小兒過服則恐生
痰動氣妊娠合雀肉以食則礙合兒面野所當避
也取豆醬陳久者佳 小童皆宜

芥菜 芥入肺 地出有本有早其味有苦有甘有辛
有酸之類考之張璠有言早芥得青陽之氣而生
氣味辛寒能理胃中濕濁水芥得濕清之氣而生

本草求真 卷九 食物芥菜

氣味辛潤考之類且有言早芥氣味甘寒能除
下煩澀水芥氣味甘平能治女子赤沃而說絕
相類詎知早芥種類或有得於陽氣之厚故味
辛而燥得於陽氣之微故味苦而多濕水芥種
得於陽氣之極則氣難濁而仍清得於陰氣之
則味既苦而且濕不相謂水芥蓋屬陰類早芥
屬陽類也世察辛多於苦則芥多燥而不涼苦
於辛則芥多寒而不膩辛勝於苦則治當如本經
所云能治女子赤沃俾濁濕去胃氣清而精血

難令人肥健... 康本所云能治疔腫... 陰以助精入肝以保血乎... 於葉間... 面青... 傷二三筋吐出便... 令人發瘡亦以其濕熱之氣最盛也... 齒有齧痕人不可食

胡蘿蔔

本草求真 卷九 食物并藥別類

胡蘿蔔... 以是名按書所列主治止是寬中下氣及散腸胃... 邪氣數種他則無有論及... 和質重則除... 下氣而使腸胃之邪與之俱去也... 健食非是中虛得此則補中虛不食得此則健實... 因邪去而中受其補益之調耳... 作食料

芥菜

芥菜... 氣滯痰... 察人瘡瘡是明指其於目有害... 目其故何居... 痰氣閉塞者服此痰無不除... 寒濕而氣不得宣通... 熱其目愈覺不明... 索問云辛走氣氣病無多食辛食則肉脈而... 此之謂歟... 芥不必多服... 因是即形又矣... 至於食芥而... 液不... 食為戒芥子義詳溫散部內所當合參

同蒿

本草求真 卷九 食物并藥別類

同請端入心脾 一名蓬蒿其味辛而止甘其性溫
 其氣潤凡相火內熾症見諸般燥候者服之令人
 氣滿頭昏目眩心煩舌強是即氣溫助火之一驗
 也若使素稟火衰則食又能消痰利水安脾和胃
 養心是即千金所言能安心氣之說也總之凡物
 辛溫流於陰脈無火則宜施於陽脈有火為大忌
 耳

蔓中空如莖以之橫地節節生根號為南方奇蔬
 又言專解野葛毒生搗服之尤良取汁滴野葛毒
 當時即死搗汁和酒服能治難產則其性氣通滑
 可知是以脾胃虛寒大便滑脫服最深忌但此其
 氣稱平較之菠薐莖菜莖菜為更勝耳凡平服服
 之最宜

本草求真 卷九 食物類

氣血不甚傷損則或投以辛散而真氣不失自不
 得以涼名如其用辛破血審於真氣有碍則辛氣
 既投涼氣自至又易能使辛為溫而其氣不得以
 涼名乎油菜氣味雖辛 油菜道家號為五葷之一其用長於行
 血破氣如產後一切氣痛血痛並諸遊風丹毒熱
 腫瘡疔等症其咸用之與經水行後加八四物湯
 服之云能斷產並治小兒驚風貼其頂額引氣上
 出婦人難產亦同 歌云黃金花結粟米實細研
 能救急而究氣行而氣無復血破而血莫生謂之

為涼誰曰不宜是以舊載下產須以藏久者為佳
 否則恐有泄瀉之虞又曰舊患脚氣者不宜食
 臭人不宜食食之加劇及或動疾發瘡使果是溫
 非涼亦為服之而有若是之症乎予打油善治
 癰疽及瘡疔漏中蟲 煎肉生蟲以此油塗即滅
 自菘菜 謂先
 自菘菜 謂人 因何命名以其經冬不凋故以菘稱
 因色青白故以白菘但菘有三一曰牛肚菘其葉
 最大而味甘一曰紫菘即菘菘一曰白菘根堅小

本草求真 卷九 食物類

而不可食三種南北通有時珍曰補莽言南北
言紫松根似蔓菁而氣則一本草言其性溫大明
而葉又不同耳言其性涼蓋涼則是而溫則非也時珍云氣虛胃
 冷人多食則惡心吐沫氣壯人則相宜託曰祭風
 冷內虛人不可食有熱人食不祭病則其性冷又
 屬可知時珍曰夏有小瘡不可多食多則以生薑解之
 即據別錄載能通利腸胃除胸中煩解渴蕭炳載
 能消食下氣治瘰氣止熱氣嗽冬汁尤佳南源載
 能和中利大小便並列丹方載治小兒赤遊赤遊

本草綱目 卷九 食物白菀菜

錄

生用白菀菜亦何莫不是氣涼之故而能使
 其涼病悉除也後人不解其意反以味辛曰溫則
 則甘寒嗟嗟性既溫矣安有止煩除渴消食下氣
 解熱之功乎於此可徵其概矣

性冷利能治熱結血痢蠱毒之症恭曰赤菀辛寒
 菀並令利瘵亦下而不堪食震亨曰紅菀入血分
 善走故無馬菀同能下脂或煮食之令人易產

即人服之者亦無不謂其通腸利便是亦菜中長
 冷最滑之味也且又戒其多食則令人動氣煩悶
 又曰不可與蟹同食生蟹試取蟹肉切如豆大
 以菀菜封裝置土坑內用土掩蓋一宿盡變成蟹
 按此事即未有而其氣味之寒氣味之冷與於
 蟹同為一類故有如此箴規之詞矣豈止藥性冷
 孫之味哉然果勝陽不陰及於於時挾有真正熱
 候亦又何忌惟在食之者之能審其所用可耳子
 治肝經風熱上攻眼目赤痛生翳遮障不明青盲

本草綱目 卷九 食物白菀菜

赤眼並宜服之為末每服方寸匙

菀菜

波菀出自西域何嘗嘗言能利腸
 胃益因滑則通痰波菀質滑而利凡人久病大便
 不通及痔漏閉塞之人宜咸用之又言能解熱毒
 酒毒蓋因寒則瘵熱波菀氣味既冷凡因癰腫毒
 發並因酒濕成毒者須宜用此以服且毒與熱未
 有不先山胃而始及腸故藥多從甘入波菀既滑
 止冷而味甘故能入胃清解而使其熱與毒盡

從腸胃而出矣然此服之過多為害不淺張璠云

凡蔬菜皆能疏利腸胃而破積冷消九甚又曰多

食令人脚弱發腰痛動冷氣與鯽魚同食發瘧疾

則知此即可以供蔬而用又當斟酌於其中也人

多食肉則食此則平南人多食魚鮓水米食此則冷

苦菜
苦菜

苦菜入心 稟氣至陰故味苦寒而不溫而經所

列病症有言能治五臟邪氣者邪熱客於心也胃

痺渴熱中痰者熱在胃也腸澀者熱在大腸也惡

本草求真 卷九 食物苦菜

十八

亦者熱痰傷血也苦寒總除諸熱故主之也熱

去則神自清故久服安心益氣聰明少味也耐饑

耐寒輕身不老若總言其熱去陰生心安氣益之

神功也此與苦苣同為一物而形色稍異治與苦

苣相同 宗與曰苦苣搗汁敷疔瘡殊驗青苣陰乾

者宜用 若苣菜或鮮或乾煮之連湯至盡其

橫安一板坐之先蒸後洗冷即止日洗數次費用

效在脾胃虛人切忌 張氏曰野苣不可共食合

白苣
白苣

不可拈取令蟻子青 爛其婦亦忌食之

白苣 腸胃入有似苣苣 苣苣有白毛味苦氣寒無毒

治亦載開胸利膈通腸消厚然冷氣人食之其氣

益冷產後食之寒入小腸而痛甚迫與酪酥同食

則能生蟲之為害耳

高苣
高苣

高苣 腸胃人由於白苣國來故以高名味苦氣冷微

毒 苣苣以苣汁解之苣苣有毒人燒煉用江

方 苣苣實以苣汁解之苣苣有毒人燒煉用江

殺蟲凡人病因熱濕而見胸膈填服眼目昏暗乳

本草求真 卷九 食物白苣苣苣

十九

汁不通小便閉塞等症用此治無不效如乳汁不

通則用高苣菜煎酒以服小便不解及或尿血則

用高苣菜搗敷臍上沙蠶水藥則用高苣菜搗汁

以塗地與蟲入耳則用高苣菜搗汁以滴及或

和雄黃等分為丸煎油入耳以引之類凡此因寒

味苦苣則能以降氣因其氣寒寒則能以解熱故

耳至膏既言治能明目而又言其多食則使人目

昏無非因其熱極傷目則目得此以明過服生寒

而目不明則目又得因此而暗無他義也子能下

乳利水並治陰腫疔下血傷損作痛功與萬意

菜苦功

秦菜

秦菜即俗所言苦達菜者是也味苦而甘太

寒體滑微毒氣平考書言此搗汁以飲能治時

行壯熱及解風熱諸毒夏月以菜作粥及或搗汁

亦能解熱治毒止痛止血生肌搗菜以敷疥瘡諸

傷炙瘡此皆以寒療熱之法耳若使脾虛人服之

則有腹痛之患氣虛人服之則有動氣之虞與服

本草求真 卷九 食物類聚

滑人服之則有泄瀉之虞至云治能補中理脾皆

是書中語欠分闕徒以砒人妄用之階非實義也

莖燒灰淋汁洗疥潔白如玉

瓠瓜

瓠瓜小腸人心中大種類其形有大有小有長有短

其味有甜有苦西瓜者各隨腰細頭銳者各稱瓠

柄底底者各稱子為菜瓠有苦甜二種其苦者

大者者小又曰或以為菜瓠之甘或變為苦其

性有平有寒苦多寒其用有利有害利則不但可

作器用時形日虛脆之屬既可煎服久可以為器

以利水為第一可以澆燭其利薄矣且能下水降氣

利水通道以治淋閉疽疔面目浮腫之症腫用黃

者白湯下十餘日見效又用汁滴鼻內即來黃水

人心曲肺以除煩熱消渴之症服升石燒灰存性

研末以擦液下瘦瘡之症長柄胡搗菜為茹孫思

邈稱其甘平可以耐饑花鬚陰乾李時珍指其煎

湯可以解疔稀痘經方七八月取莖蘆煎如瓠

兒可以至子則能人腎以治諸般齒病及或目翳

鼻塞齒齦或腫或痛或合漱口三四次鼻塞血弱

鼻寒兩分服五錢煎水合漱口三四次鼻塞血弱

本草求真 卷九 食物類聚

煎肉用子此皆有利之處蓋天生此一物以為暑

時必用之需也其言有害之處亦復不少扁鵲云

患虛脹者不得食之食則患永不瘥苦者尤傷胃

氣不可輕試此苦寒藥皆能伐胃不獨此也本經

治大小浮腫又云下水令人吐大傷中氣今人治

黃疸水氣大小便不通或浸火酒飯上蒸或實糖

霜煨存性必禁病實病庶可救之若久病胃虛誤

服必致吐利不止往往致斃可不慎歟

用瓜

瓜

南瓜人脾味甘氣溫體潤質滑食則令人氣脹
濕生。故書載此品類之賤食物之所不屑。凡人素
患脾氣於此最屬不宜。服則濕生氣逆。黃疸濕痺。
川此與牛肉同食則病尤見劇。迨惟有太陰燥土
口渴舌乾。服差見其有益耳。至經有言補中益氣
或足津枯燥。潤得此津。同氣復以爲補益之。自乎
否則於理其有不合矣。

茄子胃火性稟地陰。外假陽火。皮赤肉白。陽包乎
陰。花實香紫。故書載治寒熱。厥癆。並或散血止痛。
寬腸利氣。然味甘氣寒。質滑而利。服則多有動氣
生瘡。損目腹痛泄瀉之虞。孕婦食之尤見有害。此
瓜菜中無益之物也。李延壽曰。秋後食此損目。生
宗爽曰。令人食此。帶治腸風下血。及擦癩風。時珍
動氣。發瘡。及病後。同。花治金瘡。牙痛。燒灰。塗
瘰癧。用煎帶。燒灰。同。花治金瘡。牙痛。燒灰。塗
黃末。搽之。取其滲血也。及枯根葉皆治凍瘡。皴裂。煮湯潰之。

胡瓜胃火味甘氣寒。服此止能清熱利水。別無
瓜菜

本草求真 卷九

俾益故北人坐炕用此。以爲席。珍。南人值暑用此
以爲供蔬。井或咽喉腫痛。用此入藥。以爲吹消。老
黃瓜。去子。以苦。噴。填。滿。齒。
能爲末。每以少許吹之。杖。瘡。火。眼。用此。納。硝。刮
粉。以爲點。搽。湯。火。傷。灼。用此。拍。碎。入。糖。取。水。以。爲
刷。敷。水。病。肚。脹。用此。連。子。醋。煮。空。心。以。爲。投。服。小
兒。熱。痢。用此。同。蜜。以。爲。投。治。皆。以。取。其。甘。寒。解。毒
之。意。然。使。賊。寒。氣。陰。復。則。能。以。動。氣。發。熱。作。瘡。且
發。脚。氣。生。毒。小。兒。過。服。尤。易。作。濕。生。疳。不。可。不。慎
葉。則。苦。平。小。毒。能。治。小。兒。閃。疔。一。歲。用。一。葉。生。搗
攪。汁。服。得。吐。下。以

苦瓜胃火即錦荔枝。其種有長有短。何書載言
曰。長宜取青皮。去子。煮肉充蔬。益。謂。生。則。性。寒。熟
則。性。溫。用此。生。青。性。寒。以。爲。除。熱。解。煩。清。心。明。目
之。品。何。書。又。言。用。短。宜。待。熟。赤。取。子。爲。食。益。謂。其
子。苦。甘。內。藏。真。火。用。此。性。熱。以。爲。壯。陽。益。氣。之。功
其。此。一。味。而。生。熱。不。同。寒。熱。迥。異。故。其。所。用。其。亦
各有別如此。

越瓜胃火瓜菜

本草求真 卷九 食物 南瓜 茄子 苦瓜 越瓜

解暑

越瓜腸胃即栝瓜以瓜本生於越故以越名今湖
州等處亦有服之於人無益但取味甘性寒能解
酒毒利小便燒灰傅吻瘡及陰莖熱瘡而已若多
食之則令人心痛腹痛泄瀉凝結脾弱不能以行
並大行病後食之能以發病與於胡瓜之性恍惚
相似皆為通腸助冷之品也小兒尤不可食

甜瓜胃

甜瓜胃入暑月解止渴之品也味甘性寒有毒此
人因於暑熱內伏症見腹瀉惡痢痛不可忍須以

本草求真 卷九 食物越瓜甜瓜 三四

解暑

水浸甜瓜數枚食之即愈若瓜經日曝其寒尤甚
故書有言瓜寒於曝油冷於煎即是此意但此陽
氣素盛亦宜少食若使脾胃素冷服之則有寒痼
疴黃動氣反胃陰下生痰生瘰癧熱作脹之變須
用鹽花少許磨香與酒則解脾氣癢癖食之患不
不除瓜蒂專主瀉吐已詳吐散部內但有兩鼻兩
蒂者殺人皮可取收作藥或蜜收晒為菓

絲瓜胃

絲瓜胃人經絡性屬寒物味甘體滑其瓜經絡貫

解暑

串房腸連屬凡八風痰濕熱毒血積留滯經絡
發為癰疽瘡癤崩漏腸風水腫等症者服之立能
有效以其通經達絡無處不至小兒痘出不快用
此近帶三寸連皮燒灰存性為末沙糖水調服并
可以敷腫脹鼻淵時流濁水用此瓜藤近根三寸
燒灰存性為末酒服方寸匙亦效小兒預防出痘
於立冬後用小絲瓜煨入硃砂服之亦應皆以情
其寒滑通達之性耳但過服亦能滑腸作泄故書
有言此屬菜中不足食之當視臟氣以為可否也

本草求真 卷九 食物絲瓜冬瓜 二五

菜搗汁生服可解一切蛇傷之毒淨金患處亦佳

冬瓜胃

冬瓜胃味甘性甚冷利故書所泄治效多
是消腫定喘楊氏家藏方治十種水氣浮腫用大
在肉根定以紙筋泥固濟乾用細絲兩火雜人瓜
九旬服七十九煎取出切片同赤小豆焙乾為末糊
湯下日服三次煎冬瓜子止渴及治癰腫熱毒切
則易之歷丹不貴然惟臟腑有熱者最宜若虛寒
腎冷瓜病滑泄及小衰氣弱體瘦服之則水氣益
泄而有痰逆滑眩燥渴之虞矣汪昂既言性能止

渴消腫而又謂性不走服甚宜人是何自相矛盾耶子能補肝明目凡藥中所用瓜瓜皮可作同類以色

白故

瓜本寒物即某瓜別種其形如枕生時可開脆食經荷西人謂人腸胃氣不甚溫按書有言味鹹而甘性寒有痰治利腸胃止消渴不可多食其說非謬蓋以背經蒸暑濕熱內積毒自克有瓜性甘寒加以儲入則寒反得下達是以渴熱之症得此

本草求真卷九 食物部瓜芋子

芋子

則消腸胃之燥得此則潤且其長於利口而致日服不厭則濕又得內積而成而寒又得因是而生故又戒其宜節而不可以多食以致病生於不則中也

芋子

芋子類甚多芋有六種青芋紫芋真芋白芋形葉相似如一根有大葉並殺人不食一名土芋一名人取黃作餅名曰鳥花饅時珍曰芋不開花之如半蓮按書述其功能有言生用則可以治

芋子

腹中疝氣用生芋子壹兩破五助清頭上軟疝川大半指熟用則充飢澤膚冬十月後曬乾收之有小赤須以蘇同煮過解勞稀痘之良兒食冷啖則能止渴生津養熱除煩通腸開結和血食則能下氣寬中養汁產婦食則能破血通瘀及浴身上遊風燒灰則能以治瘰癧風邪腫痛用芋塊煎則發喉熱則滑滯以下不毒故書載此多食則不免有動氣發冷泄瀉及難化之弊矣若在芋菜與蒸味辛冷滑功能除煩止渴療疝心煩迷悶

本草求真 卷九 食物部芋子

芋子

胎動不安并敷蛇蟲癰腫疥癩瘡潰爛成瘡用此山芋形葉與芋相似芋種三年不採成根亦能殺入食之宜用土漿糞汁大豆汁以飲

諸竹

諸竹味甘微寒無毒按竹雖載品類甚多如箬竹筍即中能治消渴風熱等症淡竹筍氣味甘寒能除痰熱狂燥頭暈風顛仆驚悸等症桃竹

刺竹

薯

薯

薯
薯
薯
薯
薯

本草求真 卷九 食物部

二八

竹有小毒出廣中皮滑而黃犀絞瘦能治六畜瘡

中刺等症刺竹時珍曰生交廣中叢生大者圍

如車輻一名芭竹氣味甘苦微有小毒食之令人

落髮酸竹出粵南竹大如臂摘至用沸湯泡去苦

提入中州成軍物云氣味苦涼無毒食之令人止

渴解醒利膈蘆竹氣味甘溫能治噎膈煩悶不食

等症然總多食助冷動氣以甘則氣壅而寒則發

人冷瘕惟素患有痰疾在於皮裏膜外者得此則

愈如竹瀝同蓋可以治人痰疾之意他符其味皆

甘惟苦竹筍則苦食之可以治人氣逆而不作瘕

以苦主於下氣故也况筍初食難化而脾虛尤甚

服藥不效後吐時珍曰贊寧符謂云符雖甘美而

久食則腸受利滑利大腸無益於脾俗謂之刮腸

良惟用生薑麻油始可以解蘇州等處竹筍氣味

苦勸食尤不美如蘇州蘇竹匡廬扁竹溫州方

世猥用竹筍以祭痘瘡其害匪輕笋味多發最乾

人喉服須先以灰湯煮過再煮乃良或以薄荷數

片同煮亦去發味惟有冬笋生冬而土不出陽氣

木泄故食則能通脉利痰凡吐血衄血血滯不通
之症皆可投服痘瘡不出取尖同米煮粥食之且
泄瀉者忌筍性味亦然乾笋淡片利水辨痰消

李

李五葉以李名多子故也時珍曰李木其子大

者如杯如卵小者如彈如櫻其味有甘酸苦澆數

種其色有青綠紫朱黃赤縹緗紫灰胭脂青皮之

殊其形有中心馬肝奈李杏李水李離核合核無

本草求真 卷九 食物部

二九

核區縫之異其產有武陵房陵諸李早則四月熟

遲則十月十一月熟故味甘而酸或苦而澆而性

微溫苦澆者不可食不素問言李味屬肝故治多

在於肝正思逆所謂肝病宜食李之意也中有瘡

熱不調骨節間有癆熱不治得此酸苦性入則熱

得酸則飲得苦則降而能使熱悉去也且皆既言

除熱而苦又言多食令人臃脹及祭虛熱蓋因心

物生則難化熟則易消李屬生硬之物多食則物

在胃不化故又轉為臃脹祭熱之病矣推之昔言

濕者食李則能以發疾癰合雀肉與密食則能以損五臟合漿水以食則能以化霍亂並服木人不與食無非李屬濕物少食則宜多食則痰與熱俱聚單食而不雜以濕熱之物尤可多食而更合以濕熱之物則食烏見其有可乎故但指其勿食正以使人自思可耳

青桃

青桃肺人肺家藥耳然却列此為下以桃味甘而酸性熱微毒故書皆載食則使人發熱生癰作濕

本草求真 卷九 食物青物

形服成淋及發丹石之毒與鯨同食則使人心痛不休與服白朮人則忌究其主治止有作肺可益顏色一語他無有及則知桃性同熱生食而桃不化其熱益甚安得有利無害而不見有滿腹發熱發勞生疔之病乎冬桃差勝可解癆熱

青物

青梅人肝花開於冬而熟於夏張璠謂此得木全氣故其味最酸而人脾平人之舌下有四竅兩竅可通膽液食則通膽使液外出類相感也酸主

本草求真 卷九

收故治皆主酸收之病如本經所言下氣除熱煩滿安心止肢體痛是已然惟藏人則佳若青梅則源滯滯氣非偏枯不仁等症所宜用也梅之種類甚多惟野梅最勝相傳其武折梅枝兼柳樹株而皆曰苦道若成花開果實其種從均州太和山來即梅樹中之一種其梅如杏而鬆脆異常故近世謂之消梅食之開胃生津清神安睡乃柳樹之本性也然多食亦能發血滯氣皆細審食可耳

楊梅

本草求真 卷九 食物青物

楊梅人肝入心兼入體赤入心味酸入肝及甘入脾故書載為心家血分之藥兼入肝脾心胞又載性溫而熱張璠曰能治心煩口渴消熱解勞且於噎噎則能止嘔除吐燒灰則能斷痢若或食則有損傷動血致蠅之虞緣人陰虛熱淨氣血不歸清之因屬不能表之更屬不得惟借此為酸收則於浮熱可除煩渴可解并或因其過食而致見有以傷動血之變矣設使熱從實致則食此味必不能效熱果因於清涼可解則食此味必不見燥又

四三一

為而有燥熱損傷之戒乎性熱之說於此可徵
根皮煎湯能解穢毒燒灰油調塗湯火傷核仁瘰
脚氣然須多食以補涼并核燥即自裂也

栗

四百八二

栗人腸胃兼腎之藥也味鹹性溫體重而實故能
入腎而補氣凡人胃氣虧損而見腰脚軟弱並胃
氣不充而見腸鳴泄瀉服此治無不效弘景曰相
使能起行此是補腎之義然須風乾連液吞咽為
佳時珍曰風乾之栗勝於日作粉為食勝於麥
作眼而大燥油炒勝於蒸者

本草

卷九 食物

三二

若使栗不風乾或生水氣未除食則助濕發氣生
蟲蒸去炒熱食則氣滯扇而於風水之人尤忌
小兒多食令齒不生栗核係栗中難能療筋骨風
痛冷積痰癖生嚼可卷惡刺出箭頭破瘰癧腫毒
疔瘰癧肉上燒灰有性能治骨鯁在喉吹入即
下栗殼煮汁能治反胃消渴栗殼印外煮汁洗火
丹芬腫栗花能治瘰癧栗樹皮煮汁可洗沙虱瘰
癧并丹芬瘰癧根酒煎能治偏墜腎氣皆以取
其下氣解癆之功耳

橄欖

橄欖味甘入稟受土陽其味先酸後甘氣溫無毒肺
胃家藥也性能生津止渴酒後嚼之最宜故昔載
能以解酒毒人服河豚魚肝及子迷悶至死取此
煮汁即解故昔又載能解諸魚之毒魚食橄欖渣
即能食橄欖渣
橄欖汁即下無
橄欖木作橄欖其魚及治魚骨之硬橄欖用核末
流亦調至於痘瘡不起痘痕振碎成粉解赤瘰
水亦效至於痘瘡不起痘痕振碎成粉解赤瘰
瘰癧風下血橄欖燒灰存性研末耳是凍瘡
瘰癧風下血橄欖燒灰存性研末耳是凍瘡
瘰癧風下血橄欖燒灰存性研末耳是凍瘡
瘰癧風下血

本草求真 卷九 食物

三二

生脂麻一口吐唾和藥細包如東核大皮兒口中
待啞一箇時辰方可與乳此藥取下腸胃積毒令
兒少疾及出唇裂生瘡橄欖和塗牙齒風疔有蟲
疔瘰癧少也疔瘰癧少也橄欖和塗牙齒風疔有蟲
疔瘰癧少也

枇杷

四百八二

枇杷山菓

枇杷入肺 脾家菜也味甘而酸色黃據書載

其極熱則有止渴下氣潤五臟之功生食則有助

肝伐脾之力食之令人中滿泄瀉且指其性曰平

曰溫又指其性曰寒皆屬有意緣此稟受雖溫而

質多挾水濕於熱時取食則內水氣漸消熱氣漸

平而有下氣潤臟之功若使未至熱取而即用此

為食則物水氣未化而有寒中脹滿泄瀉之虞與

酸氣未收而有扶肝抑脾之害此書之所謂溫而

又謂其性平性寒者是也但於席品之中用其極

熟佐此以解酒熱最為得宜若使中寒氣壅雖曰

佐以解酒則又當知所忌耳葉另詳於上篇

花生四時金

花生入肺味甘而辛體潤氣香性平無燥按書言

此香可舒脾辛可潤肺菓中佳品誠佳品也然云

炒食無害論亦未周蓋此氣味雖純既不等於胡

桃肉之熱復不類烏芋菱角之涼食則清香可愛

適口助茗最為得宜第此體潤質滑施於體燥堅

實則可施於體寒濕滯中氣不運恣啖不休保無

害脾滑腸之弊乎仍當從其體氣以為辨別則得

之矣

烏芋入肝 止一水菓即芋 何穉皆言力能毀

之其錢即化 破積攻堅 黑三稜者即此物也

血大便下血用 率葵根汁大半理 下痢亦

取完好半碗 洗心溫服三日見效 治痢五

之一月酒過 取一二枚細嚼空心酒下 佳

研末酒服之 擦瘡 小兒口瘡用 解毒發痘 症

白起酒 燒法 取即起 清解酒 其效若是之 益

以味甘性寒則於在脾實熱可除而諸實脹滿可
消體熱則以力善下行而諸血痢血毒可祛是以
冷氣勿食食則令人每患脚氣熱嗽勿用用則於
人有集大氣之為害耳

檳榔入脾 與皮共屬一物而性懸殊檳皮味辛而

苦而檳核則變味甘而酸也皮有散痰開痰理氣

之功而核則更助痰作伙及有滯氣之害也

簡章之秀其氣喘促至極服翻手搥已有其

生之勢結胎其核有開浮滑而弦知有痰氣與寒

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>香薷<small>芳九</small> 食中佳品。凡菰粟土熱毒惟香薷味甘。性平大能益胃助食。及理小便不禁。蓋此本於桑。指諸木所出。得受桑性。餘澤而成也。有種出於深。小於茵而薄黃然。此性極滯。滯中虛服之有益。中。黑色味共香。</p> | <p>然亦止供食品。而於治療則無。且於過食則有膠。滿填脹損腸瘵。莖之虞。必取麝香生薑果菜莖。作。湯。及或沉香。磨汁以導。是亦味甘性寒。助濕增滯。之一。証也。乎。性平之說。似不足信。</p> | <p>菱角<small>習六</small> 菱角。人。所。難。多。味。武。陵。記。曰。三。角。四。角。老。嫩。之。菱。而。所。為。為。菱。滯。則。一。即。青。有。言。安。中。消。水。止。渴。解。酒。療。疾。治。痢。及。有。紅。瀉。白。補。生。降。熱。升。之。說。</p> | <p>內結姑以老薑取汁先投不踰時而胸至膏有直。能治消渴開胃並除胸中膈氣。此為內熱。尤極。胃。氣。不。寒。者。而。言。若。使。水。虧。脾。弱。發。為。咳。嗽。而。日。用。此。恣。啖。保。無。生。痰。助。氣。之。弊。乎。今。之。虛。癆。好。食。此。物。類。多。受。害。人。特。習。而。不。察。耳。但。用。蜜。煎。作。菓。佳。</p> |
|--|--|--|--|

| | |
|---|---|
| <p>麝香<small>芳九</small> 麝香。入。腸。本。於。柔。栢。諸。木。埋。於。土。中。澆。以。米。泔。而。生。味。甘。氣。寒。正。要。曰。有。毒。李。色。白。柔。軟。中。空。狀。如。未。開。玉。簪。花。品。又。有。形。如。羊。肚。蜂。窠。眼。故。又。有。別。其。名。曰。羊。肚。菜。味。甘。如。鷄。故。又。有。別。其。名。曰。鷄。</p> <p>下血。用。五。錢。酒。服。研。一。切。牙。痛。等。症。煎。湯。煎。分。性。稟。陰。濕。生。於。枯。木。徒。有。衰。精。冷。腎。之。害。而。無。滋。脾。益。胃。之。功。也。本。經。言。其。益。氣。不。饑。輕。身。強。志。遊。譽。詞。耳。豈。真。謂。哉。</p> | <p>寒與滯食之不無滋害。取冬產肉厚細如錢大者。木耳<small>習六</small> 木耳。人。大。生。非。一。木。耳。枯。莫。辨。桑。樹。上。者。其。木。者。次。之。其。餘。樹。木。多。動。風。氣。發。病。疾。令。人。木。木。生。者。令。人。笑。不。止。採。歸。色。變。者。有。毒。有。毒。光。微。爛。不。生。蟲。者。並。有。毒。類。生。搖。冬。瓜。蔓。汁。解。之。撰。書。所。載。能。治。痔。瘡。搗。腫。崩。中。漏。下。未。川。此。為。思。眼。流。冷。淚。用。木。耳。燒。存。性。木。賊。一。兩。為。煎。服。血。注。脚。察。用。桑。耳。指。耳。末。每。用。二。錢。以。清。水。煎。服。血。痢。女。用。桑。耳。指。耳。末。每。用。二。錢。以。清。水。煎。服。血。痢。</p> |
|---|---|

通屬

腿拔竹與香草諸草同為一類但香草色白而平磨拔則色白而寒也香草能益胃氣不饑及治小便不禁磨拔則能理氣化痰而於腸胃亦有功也然皆體潤性滯多食均於內氣有阻而病多發不獨磨拔然也

雞

原禽

雞原禽入心由異氣所感靈蛇所變俾雅云蛇交雉入大木則化水經云蛇遠於地而為不得山川之氣遂其飛騰則得滄溟之氣恣其吞吐是與虹

本草求真 卷九 食物類

崑山沒無異時珍云雉屬離鷄屬異故凡鷄者則冠變雉者則冠紅飛必先鳴食多蟲蟻此雖食品

之貴食可補中益土胃土及治蟻瘻下痢然終性熱有毒故書言其八九兩月可食齊夏不可食者

以其雉食蟲蟻及與蛇交變化有毒也發痔發瘻

發痢與家鷄子同食令人發疔周身疼痛者謂此雉食蟲蟻有毒兼性暴烈有火也但詩既言發痢

發痔而書又曰可治蟻瘻與痢亦以雉素好食蟻故可以制蟻瘻而治其毒耳

本草求真 卷九

鴈

原禽

鴈原禽人肺兼狀考之時珍謂有蒼白二種今人以白而小者為鴈大者為鴻蒼者為野鵞亦曰野鵞爾雅謂之鴻鵠也鴈有四德寒則自北而南止於衡陽熱則自南而北歸於鴈門其信也飛則有序而前鳴後和其禮也失偶不再配其節也夜則羣宿而一奴巡更晝則啣蔗以避網繳其智也而捕者察之為媒以誘其類是則一愚矣故鴈謂之信鳥人不宜食道家謂之天厭味甘氣平其性逆利

本草求真 卷九 食物類

血氣故能補勞瘦逐風擊取肉炙熟以點多服長毛髮生

幾久服壯筋骨助氣昔黃帝製指南於鴈雁骨空

中製針取其能定南北但瓦之不易後人於鯉魚

腹中製之以其性專伏土定南北不移可定水土

之方尚也今又傳用午時和花水煮取鴈南來時瘦不可食北鴈時乃肥可取之

鴈原禽人肺兼肉按書有言味甘性平有言味辛性涼有言氣味俱厚而毒有言服則解熱解毒有言

四三五

服則發風發瘡發毒持論不同臆見各一究之味
 甘不補味辛不散體潤而滑性平而涼人服之則
 可以解五臟之熱及於服丹之人最宜者因其病
 弱體實氣燥得此甘平以解之也黃汁能止渴者
 以其肉多肥膩而瘦不渴之意也發風發瘡發毒
 因其病多濕熱得此濕勝氣壅外發熱出者意也
 是以為體之潤在脊與脾脾即胃可以潤皮膚而
 合而脂泄孔耳而治卒難塗皴裂而消癰毒在滌
 可以入喉而治殺毒一皆體潤和燥之九即那經

味甘溫可以補中益氣而解有多食發疾之戒非
 性屬膩滯易為其有是乎血兼熱飲可治血脈吐
 逆不食病根非是以血引血之意乎血與毛可治
 射工之毒異物製云癩州蠻人選禽皮毛為文
 非驚能食此蟲以物制物之意乎多於東川
 以辟之又曰毒未必食射工益以威和屎可以治
 小兒驚口疳用食草白鳥下清糞渣汁入沙糖少
 許煎之或川雅雜藥煎者及散蛇咬之毒非藉
 機以入穢解毒之意乎麻可以解熱毒疔毒白

三枚以汁人龍膽二分片腦半分與勻非其為性
 不溫而膩亦能潤燥之意乎凡此所見治暑皆有
 義存不可僅執是溫是冷之說以致忘其主腦也
 為器曰茶毒食積射工毒
 為良白登不食蟲並瀉為勝
 危 小倉
 危 人肺胃即野鳴又類鴻屬夏藏冬見羣飛
 日味甘氣平無毒其肉肥而不脂美而易化凡
 下泄瀉喘欬上氣失血產後之症服此最宜以其
 具有補中利水之功也但在九月以後立春以前

服之味美他時不及血吐桃生蠱毒可服以血引
 血之故同氣用應之驗也
 鳴 鳴 鳴
 其身其性好潔常食烏頭半夏故書載其氣
 味甘溫但有小毒食之者須防咽喉頭腦腫痛犯
 此宜用生薑甘草解之類說云揚去之通則廣州
 咽喉間生瘡潰而血不止寤食但腐醫夫東手
 通楊吉老赴琴慈診之日但先啖生薑一觔乃可
 投藥初食覺甘香至半觔覺納寬盡一觔覺平涼
 斯食人口下無滯得此為好半夏毒發耳片以滋

製之也又至相... 而其功用又言服此能解嶺南野葛菌子並溫... 久病欲死... 此則解之忘也乎... 臆益心亦令人聰明猶是冗統之辭未有確指無... 足信也... 竹食則小腹痛。

竹鷄

竹鷄... 狀如小鷄無尾性好食蟻又食牛... 竹鷄... 狀如小鷄無尾性好食蟻又食牛...

苗故諺有言家有竹鷄啼白蟻化為泥又唐小說... 有言崔魏公暴亡太醫梁新診之曰中食毒僕曰... 好食竹鷄新曰竹鷄多食牛夏苗命搗薑汁扶苗... 淮之遠颺則知竹鷄其味雖甘其性雖平而亦有... 食牛夏之毒非究其主治止言養食可以殺毒並... 治野鷄... 亦與燕畏鷄之意不爾易為其有是即無毒之說... 似不足信

班鳩

班鳩... 補肺益氣與於家鴿氣味治功恍惚相似是以范... 治治... 則謂班鳩明目是即補腎腎補而目始明時珍又... 謂班鳩因於益氣故能明目不獨補腎也... 古者仲春羅氏獻鳩以養國老仲秋授老者以鳩... 枝云鳩性不噎食之且復助氣則知鳩之明目是... 即補腎補氣之治驗矣鳩血熱飲可以解毒尿同... 夜明砂等分為末以吹時耳出膿疼痛諸疾

班鳩

貓... 貓... 肉作羹則能以治鼠瘻... 食貓肉則... 頭骨則能以治瘡... 則謂... 香連... 黑... 存... 用紙上陰乾同莽草等分則能以治瘰癧鼠瘻... 爛... 中... 貓... 舌... 貓... 皮與毛則能以治瘰癧

貓

鼠

鼠瘻如用時以治瘰癧鼠瘻則燒灰合井水服
 瘻方寸許用酒洗淨而毛尤能以治瘻邊生瘻
 瘻內則取肚下毛而毛尤能以治瘻邊生瘻
 上毛一粒研細油塗數之鼠血鼠頭鼠尾
 鼠一毛一粒研細油塗數之鼠血鼠頭鼠尾
 鼠一毛一粒研細油塗數之鼠血鼠頭鼠尾
 鼠一毛一粒研細油塗數之鼠血鼠頭鼠尾

治鼠瘻

鼠瘻如用時以治瘰癧鼠瘻則燒灰合井水服
 瘻方寸許用酒洗淨而毛尤能以治瘻邊生瘻
 瘻內則取肚下毛而毛尤能以治瘻邊生瘻
 上毛一粒研細油塗數之鼠血鼠頭鼠尾
 鼠一毛一粒研細油塗數之鼠血鼠頭鼠尾
 鼠一毛一粒研細油塗數之鼠血鼠頭鼠尾
 鼠一毛一粒研細油塗數之鼠血鼠頭鼠尾

鱈

鼠瘻內實則能助濕發熱若使病從濕至縱云鼠
 瘻猶當審視未可書言能治而不竟為分別也取
 尾長腰短日如金銀及上膈多稜者良
 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚
 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚
 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚

鱈

塗湯火傷效
 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚
 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚
 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚
 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚

百而鱗則首大而黑也鯉則水動而躍而鱗則水
 即動而不躍也且鯉之美在腹而鱗之美在頭鯉
 之性動而燥而鱗之性則稍亞於鯉也時珍曰鱗
 品故有庸究其所論主治在鱗則能補中益氣性
 常之味出故於氣分則補而鱗則能溫胃益人非其所論
 多食之戒則亦有動風陰於發熱之虞豈鱗鯉二
 物同為一類之性乎否則何其適相合矣藏經曰
 食別無功用
 鮠魚五十三

本草求真 卷九 食物鱗魚鮠魚 四六

鮠魚謂人食品味長江湖與池皆有以草為飼常
 食青鯉混雜故名曰鮠又各曰鯉時珍曰鯉因其
 第在池中則味甘溫無毒時珍言其煖中和且血
 是此物若在江湖所蓄則何非蓋青草常有穢惡
 混食故書又言食能發瘡但魚性多濕無論在池
 在湖施於陽臟之人則自發熱燥施於陰臟之
 人不惟其燥全無且更鮮有溫和之力矣食物之
 宜當先視人臟氣以為轉移非獨鮠魚然也瞻味
 苦寒能治一切竹木刺在喉中以酒化二三枚溫

本草求真 卷九

服取吐即出
 鱖魚謂人江湖小魚耳時珍曰長僅數寸形狹
 如扁狀似柳葉鱗細而整潔白可愛性愛羣遊漁
 小魚中之最善者也味甘性溫無毒據書言其主
 治有曰煖胃止瀉是其性溫之力又曰煮食已愛
 得非性愛羣遊而能使人之愛自已乎於此可見
 食物之助矣
 鱖魚五十五

本草求真 卷九 食物鱖魚鱖魚 四七

鱖魚謂人即俗所云桂魚者是也味甘性平小毒
 按書言此性最疏利此腹內聚有惡血小蟲服此
 最為有效故於瘳瘵最宜昔有邵氏年十八病瘳
 累年不愈偶服鱖魚而痊非其性最疏利能治惡
 血蟲熱之意乎但此有紫刺十二以應十二月之
 數若人誤受硬骨則惟取梳核磨水以解以魚最
 畏厥故也尾端小兒軟痲佳脂治骨鯁竹木刺
 人咽喉不拘大人小兒或人腹刺痛服之皆出時
 收大鱖魚膽懸於簾下陰乾過鯉者川白子大酒
 時溫服得吐則鯉隨涎出未出再服以出為度酒

四三九

臨量飲無 如無鱖魚膽鮫魚青魚膽鯽魚膽亦用

白魚 五十六

白魚 鮫人肝味甘氣平形窄腹扁鱗細頭尾向

上肉有細刺 或王白魚功專入肺利水開胃下氣

故金匱治淋每用白魚同滑石以投各日滑石白

魚散取其長以治水兼佐亂髮以破血血氣通調

而淋瀝止矣但此性亦滑利故同稟食脾胃氣泄

必致腰有痛楚脾胃過食不濕必致飽脹不快惟

有炙食差可及或醃或精以為食耳至青有言補

本草求真 卷九 食物白魚青魚 四八

肝功日調五臟理十二經絡者時珍亦謂此屬滋

青魚 五百七

青魚 鮫人肝味甘性平色青 鮫而滑青故謂能

入肝通氣入肺利水凡人因於濕熱下注而見脚

氣疼腫濕熱上蒸而見眼目不明皆當用此調治

以此好啖蛇蝎蜈蚣能利水故此亦能利水以

除脚氣且痔之病也 服木人然治脚氣服此必須

兼以非白同投則內始有溫和之力矣所當合參

青魚

味與服石人相反 不可合生胡荽生葵頭中坑

竹狀如琥珀磨水可治心腹疼痛亦可作伴作飲

器解熱眼睛汁治注目能夜視 勝另詳於涼血部

肉所當合參

鱖魚 五百八

鱖魚 鮫人即南方溪澗中之小魚非海中鱖魚也

海中鱖魚本名鮫魚溪澗沙魚因居沙溝吹沙而

遊啞沙而食故以鱖名味甘氣平無毒先其主治

止日暖中益氣因其味甘性平而然服之可使中

氣溫和無有虧損非云中氣虛極必得此魚以作

治療也

銀魚 五百九

銀魚 鮫人即青所云鱸魚者是也 博物志云吳

其餘於水氣味甘平不入治療療膏止言出於松

江浙江大者不過三四寸身圓無鱗潔白如銀小

者尤勝鮮食最美曬乾亦佳作羹食之可以寬中

健胃而無油膩傷中之患

石斑魚 五百十

本草求真 卷九 食物鱖魚銀魚 四九

石斑魚 屬毒物凡服之者無不劇患 頸痛作
 泄 蓋此生於南方溪澗水石之處長數寸白鱗黑
 斑浮遊水可聞人聲則泐然深入其魚有雌無雄
 二三月與蜥蜴合於水上其胎產人又與蛇交南
 方有土蜂土人殺此魚標於樹上引鳥食而土蜂
 盡退是以服之而致見有諸病之作耳但肉食之
 差可而子及腸尤甚今時捕魚多雜此魚賣與人
 食須宜慎之

本草求真 卷九 食物石斑魚 五十

鱈魚 屬人肝腎稟上陽氣以生性善穿穴力堅而
 銳無足能竄與蛇同性時珍曰南溟鱈魚中以紅
 其鱗有花者必項下有白點此魚身亦水即藥之
 或以蒜瓣投以紅中則身點即不見亦物性相
 制故青背載道經遠絡能治十二經風邪重耳目
 諸竅之病如風中血脈以眼喎斜用尾血同煎少
 許在喎邊左有喎塗右正即洗去 此血和伏能助
 其 耳痛鼻衄症後以鱈魚用血滴點即愈 用血主
 結 疔疔爛用鱈打死香油抹腹 鱈腹繫於疥上
 俟痛取下看鱈有蟲上人即去 未盡更作後以人

本草求真 卷九

其後惡露淋漓腸鳴濕痺用此羹食即除老人虛
 痢不止用此暴乾煨灰存性調服即絕且能通力
 乳筋故大力丸取此同熊筋虎骨當歸人參等分
 以進 用大鱈魚重筋條者取肉 陽道不長不能
 養嗣用此血同蛤蚧等藥以人 鱈內 皆以併其
 作方相助但此味甘性熱其力能補若病弱虛熱
 及時行病後陰虛火燥食則必有氣驟動風與氣
 之變不可不慎

本草求真 卷九 食物鱈魚 五十一

鮫魚 屬人 即游中之鯨魚者是也生於南海背皮
 粗錯可備刀把其肉作胎 鮮若切片沃以能補五
 臟功亞於鮑蓋鮑補脾利水想此亦補利水之品
 故有功亞於鮑之說也皮治屍疰瘰癧瘰癧
 頰魚毒
 烏賊魚 屬人 肝肉按背止百氣味酸平又言其味
 珍美食則助風與氣其治能益氣強志及通絡
 人月經可知其性得陰故能入肝補血入腎滋水

四四一

人醫
水
強志而使月事以時而下也。又考書言烏賊魚既能吸波巽墨令水濁黑自衛以妨人害又能日淨水上詐死以啄鳥是其性陰而險。固不待言。月其腹中血出與膽有如墨黑手染色變青字則逾年跡滅惟存空紙已爾是其色惡入腎又不待言。是以陰臟服之則能助風與氣。泄瀉腹痛腸脹服之則能錄陰秘陽。故在其骨名爲螺蛸亦能以治血枯氣竭肝傷之病也。惟是其肉久不入食故義亦不甚明。今則南北通用。覺血枯陰燥服則有益無

本草求真 卷九 食物烏賊魚 五

損而血衰氣寒服反見害豈非性陰不燥之義歟。柔魚無骨形質與氣皆與烏賊骨魚肉相若但味勝於烏賊魚越人重之。

鱈魚 五百五
鱈魚 鱈魚 入 卽泥鰍伏於泥中得土陰氣以養性動而僂故能入土以補脾。昔言煖中益氣者義根是也。得水則浮而出泥則入泥而不見故能下入而治病。書言同米粉煮美下人而收痔者義由斯也。他魚水濁卽斃惟鱈常自染涎以自養伏泥而不

潤故人服之而津生。書言醒酒消渴者義亦由茲起也。清濁用泥鰍十頭陰乾去頭尾燒灰。始時若沃焦烏鬚指牙泥鰍塊。後把草各壹兩。雄雞子鑽內。鹽泥因膏。先文後武。燒灰。兩兩。成團。人死如何取。日用一月以來白者皆黑。陽事不起。食之如何用之立應。以其筋強力銳。故能人骨以烏鬚入腎與肝以起陽也。鰵泥形似牛狗羸瘦。用鰵收從口鼻。如何用無不效。以其具有補土之能。故能使之而立肥也。若在喉中骨硬用此入喉牽拽而出。先用鰵魚線縛其頭以尾。此則人之所易知者。

本草求真 卷九 食物鰵魚 五

矣。但不可合白犬血食。

鮑魚 五百五
鮑魚 鮑魚 入 考之長州張璐有言其魚腥穢。止可淡曝而不可炙。鹽乾則形如塊。肉性溫無毒。尚取腥穢以滌一切痰積。同氣相感也。入肝散血。煮汁送四烏鯽一蘇茹。治女子血枯經閉。內經以察傷肝利腸而不傷伐元氣。惜乎世罕用之。今危人用以煮肉。則脂沫盡解。滌除垢膩之驗也。昔秦皇死沙丘。令若屍。蘇令輜車載鮑魚以亂其臭。始皇

本旨不韋萌草潤兩官樟非取其滌除遊臭之義

雙鯢魚 音夫 無鱗魚

雙鯢魚 音夫 兼人欠疾類有分潤嘴者為雙尖嘴者為

鯢皆稟土中陰氣以生味甘氣寒其形類蛇常與

水蛇同穴故其性有小毒力善走竄鑽穴故昔謂

能祛風殺蟲 按此由於風生 故風字從蟲 如骨蒸癆瘵五痔瘡

瘰癧尸仙瘡濕痺風癩虛損等症人常食之為有

益也 虛損癆瘵多有虛熱有病瘵者相染已死數 人乃取病者釘之棺中弃於流水永絕傳染

本草求真 卷九 食物製藥魚海蛇 五十四

綠圖

漁人異之聞見一女子向酒取置漁舍多食 鱸病愈遂以為妻聖惠方用蝦蟇淡炙食治諸蟲 氣上攻滿悶張鼎云此以骨燒烟則可以辟蚊蠊

蠶屋竹木則可以斷蛙並竹於衣箱中則可以斷

毒惟脾胃虛泄並孕婦食之則大忌耳 性滑氣凡 寒故

昂頭行水及重三四觔者腹下有黑斑背上有點

海蛇 五百七 無鱗魚

海蛇 音夫 俗曰游拆即廣所云水田者是也按書

言此生於東海狀如血蚺大者如斗小者如斗無

海蛇

眼目腹胃以蝦為目蝦動蛇沉故曰水母目又目
水母形渾然凝結其色紅紫無口眼腹下有物如
懸絮翠蝦附之唾其涎沫浮沉如飛為湖所礙則
蝦去而蛇不得歸人因割取浸以灰漿去其血注
而色遂白厚為蛇頭其味更勝究其主治大約多
能下血消痰清熱解毒而氣亦不甚溫蓋綠此屬
血類血味多鹹鹹則能以入腎血藏於肝海蛇形
如血蚺則蛇多人於肝蛇產於水腎屬水則蛇又
多人腎故也是以勞損積血得此則消小兒丹疾

本草求真 卷九 食物製藥海蛇 五十五

綠圖

火傷得此則除河魚之疾得此則療但忌白糖同
流則蛇隨即消化而不能以久藏以土尅水者故
耳無他義也

蚌

蚌 音夫 乃海中蚌耳與江湖蚌蛤相類聞人

以田種之候潮泥來沃謂之蚌田其肉可為乾以

充海錯 蚌生海泥中二三味甘性平煮食可治胸

中邪熱煩悶飯後食之與服丹石人適合並治婦

人產後虛熱可知性體屬陰故能解熱除煩然惟

水或火盛者則宜若使脾胃素冷服之必有動氣
泄瀉之虞矣昔言可治冷痢似屬巧說未可深信

蛙 音九
濕生

蛙 端人 喉 與螺蚌皆產於水其味雖甘而性則寒
故能清熱利水解毒如水燕腹大用乾青蛙二枚
以酥炒乾螻蛄七枚炒苦葫蘆半兩為末空心酒
服三錢即愈通身水腫以青蛙一二枚去皮炙熟
食之即治毒痢噤口以水蛙一個并肚腸搗碎无
焙入麝香五分作餅貼臍上即通時行向赤項腫

蟹

本草求真 卷九 食物蟹蟹肉

五法本草 綠圖

癰癤用金線搗汁水調空腹頓服即效然肉雖寒
而骨善跳則熱性雖動而氣善蓄則閉食之令人
作淋及或食令人尿閉臍下酸痛治須插以車
前頓水或燒酒行氣之類以解 臍熱者須用車前
以至於孕婦食尤有忌 壽夭不可不知

蟹肉 五百廿

蟹肉 入肝 止有雌無雄與此與龜為匹形多變
幻故昔有言蟹有三足一足者不宜食獨目者不
宜食頭足不縮者不宜食目凹陷者不宜食腹下

蟹

有王宇士字支蛇文者不宜食生於山上者名是
蟹不宜食腹赤如血者名味蟹 宜食此有毒殺
人不宜食蟹之說也又言蟹合雞子菟菜食則令
人生蟹同猪兔鴨食則能損人同芥子食則生惡
疥與好婦食則生子項短同薄荷食則能殺人此
合他味同食之有見害於人也至於冷瘠食之則
能發冷病須合葱與椒薑同煮並刺蟹甲少許
以入可知蟹性冷故須假以熱椒以為之製蟹肉
衆故須假以蟹甲之殼以為之佐耳 蟹甲下有軟
骨如龜形者

鐵圖

食之令人患 然惟婦人素挾血熱症見血痕血漏
水病須去之 並瘰癧諸症服之得宜若使中氣有虧謂可補中
益氣縱出別錄亦屬庸語不足信也

閩陳脩園著

本草經讀

檀蔭書屋重鐫

神農本草經讀序

陳修園老友精於岐黃之術自負長沙後身世醫場而嬉笑之及遇危症輒斷梳橫萬手齊束修園往脫冠几上探手舉脈目霍霍上聳良久乾笑曰侯本不奇治之者擾之耳主人曰某名醫曰悞矣曰法本未 王李曰更快矣天下豈有朱張王李而能愈疾者乎口吃叱然罵手仇仇然書方具則又自批自贊自解自起調刀圭火齊促服之服之如其言嘗以李時珍綱目為謗陋著有神農本草經註六卷其言簡其旨該其義奇而不執於正其鈎深索隱也

本草經讀

序

元之又元如李將軍之畫不肯使一直筆其更闢奧啟也仍復明白坦易如白香山詩句雖寵下老姬亦可與之觴解不可解而後解及其解之了不異人也可謂金心在中銀手如斷矣出山後斂抑才華每診一病必半日許纔出一方有難之者其言訥訥然如不能出壬戌冬向籍讀禮閉門謝客復取舊著六卷中遴其切用者一百餘種附以別錄分為四卷俱從所以然處發揮人替者頗異名曰本草經讀蓋欲讀經者讀於無字處也修園為余言所著尚有傷寒論注四卷重訂柯注傷寒論八卷重訂活人百問

八卷金匱淺註十六卷醫醫偶錄二卷醫學從眾錄八卷
真方歌括二卷景岳新方秘四卷傷寒論讀四卷金匱讀
四卷醫約二卷醫訣三卷雖依類立言義各有取要其闡
抉古經之旨多與此書相發明假日余將遍讀焉
嘉慶八年歲次昭陽大淵獻皋月既望候官愚弟蔣慶齡
小榕氏序

本草經讀

序

凡例

一明藥性者始自神農而便尹配合而為湯液仲景傷寒
金匱之方即其遺書也闡陰陽之秘洩天地之藏所以
效如桴鼓今人不敢用者緣唐宋以後諸家之臆說盛
行全違聖訓查對與經方所用之藥不合始疑之終且
毀之也

神農本草藥止三百六十品字字精確遵法用之其效
如神自陶宏景以後藥味日多而聖經日晦矣張潔古
李東垣輩分經專派徐之才相須相使相惡相反等法

本草經讀

凡例

皆小家伎倆不足言也是刻只錄一百餘種其餘不常
用與不可得之品闕之其注解俱遵原文逐字疏發經
中不遺一字經外不溢一辭

是刻足錄時用之藥其品第及字樣不盡遺舊本功陶
隱居本草有朱書墨書之別朱書為神農本經墨書為
名醫別錄開寶開重定印本易朱書為白字茲因其近
古而遵之○是刻遵古分去中下三品別錄等本採附
於後

一藥性始於神農用藥者不讀本草經如士子進場作制

藝不知題目出於四子書也渠輩亦云藥性大抵係珍
珠藥性賦本草備要及李時珍本草綱目之類雜收
眾說經旨反爲其所掩尙可云本草耶
近傳本草崇原越之張隱菴若也本草經解吳之葉天
士著也二書超出諸羣書之上然隱菴專言運氣其立
論多失於蹈虛天士固於時好其立論多失於膚淺而
隱菴間有精實處天士間有起脫處則修園謝不敏矣
故茲刻多附二家之註

一上古以司歲備物謂得天地之專精如君相二火司歲

本草經讀

凡例

二

則收取薑桂附子之熱類如太陽寒水司歲則收取黃
芩大黃之寒類如太陰上氣司歲則收取菝葜參苓山
藥黃精之土類如厥陰風木司歲則收取羌活防風天
麻鈎藤之風類如陽明燥金司歲則收取蒼朮桑皮半
夏之燥類蓋得主歲之氣以助之則物之功力倍厚中
古之世不能司歲備物故用炮製以代天地之氣如製
附子曰炮炙其熱也製蒼朮曰炒助其燥也製黃連以
水浸助其寒也今人識見不及每用相反之藥而反制
之何異束縛手足而使之戰鬪哉信山堂之說最精故

節錄之○按製藥始於雷公炮製荒謬難以悉舉要知
此人名數宋時人非黃帝時之雷公也

熟地黃枸杞取其潤也市醫炒熟則上浮燒灰則枯燥
矣附子乾薑取其烈也市醫泡淡則力薄泡黑則氣浮
矣以及竹瀝鹽鹹枳實之類皆庸醫兩可之見不足責
也至於棗仁生則令人不服熟利令人熟睡黃芪生用
則托裏發汗炒熟則補中止汗麥門冬不去心令人煩
燥桑白皮不炒大瀉肺氣之類數百年相沿之陋不得
不急正之

本草經讀

凡例

三

一本經每藥主治不過三四證及六七證而止古聖人洞
悉所以然之妙而得其專長非若後世諸書之泛泛也
最陋是李時珍綱目泛引雜說而無當李士材汪認菴
每味必摘其所短俱是臆說反以時輩聚訟紛紛修園
爲活人計不得不痛斥之
一神農嘗草而作本草經實無可考其爲開天明道之聖
人所傳張仲景華元化起而述之陶隱居之說不誣也
漢時去古去遠二公爲醫中之傑遺所聞而記之
神農所著可也謂爲神農所著亦可也

每藥注解必透發出所以然之妙求與內經難經仲聖等書字字吻合而後快古云率言穢亂衷於聖願同志者取法乎上

本草經續

凡例

四

神農本草經讀目錄

卷一

上品

人參

黃耆

白朮

甘草

薯蕷

肉蓯蓉

地黃

天門冬

麥門冬

細辛

柴胡

黃連

防風

續斷

牛膝

巴戟天

石斛

澤瀉

五味子

薏苡仁

卷二

本草經續

目錄

上品

菟絲子

葳蕤

沙參

遠志

菖蒲

赤箭

車前

羌活

升麻

茵陳

菊花

龍膽草

紫蘇

藕實

雞頭實

黑脂麻

益母

茵草

茯苓

猪苓

牡桂

菌桂

橘皮

枸杞

木香

杜仲

桑根白皮

桑上寄生

槐實

柏實

大棗

朴硝

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-----|-----------------------|
| 丹砂 | 滑石 | 紫石英 | 赤石脂 <small>附五</small> |
| 禹餘糧 | 髮髮 | 龍骨 | 阿膠 |
| 白膠 | 牛黃 | 麝香 | 石蜜 |
| 龜板 | 牡蠣 | 桑螵蛸 | |
| 卷三 | | | |
| 中品 | | | |
| 乾薑 | 生薑 | 葱白 | 當歸 |
| 芎藭 | 淫羊藿 | 荆芥 | 麻黃 <small>附根節</small> |
| 葛根 <small>附葛</small> | 黃芩 | 元參 | 丹參 |
| 本草經讀 目錄 | | | |
| 貝母 | 栝樓根 <small>附栝</small> | 芍藥 | 木通 |
| 白芷 | 苦參 | 水萍 | 欒冬花 |
| 厚朴 | 卮子 | 枳實 | 黃蘗 |
| 山茱萸 | 吳茱萸 | 杏仁 | 烏梅 |
| 犀角 | 鹿茸角 | | |
| 卷四 | | | |
| 中品 | | | |
| 鹿茸 <small>附角</small> | 鼈甲 | 白殭蠶 | 蚱蜢 |
| 石膏 | | | |

| | | | |
|---------|----------------------|-----|-----|
| 下品 | | | |
| 附子 | 半夏 | 大黃 | 桃仁 |
| 旋覆花 | 桔梗 | 葶藶子 | 連翹 |
| 夏枯草 | 代赭石 | | |
| 附錄 | | | |
| 何首烏 | 延胡索 | 肉豆蔻 | 補骨脂 |
| 白豆蔻 | 縮沙仁 | 鬱金 | 神麴 |
| 藿香 | 前胡 | 紅花 | 香附 |
| 金櫻子 | 茯神 | 丁香 | 蜀椒 |
| 本草經讀 目錄 | | | |
| 沉香 | 烏藥 | 琥珀 | 竹茹 |
| 竹瀝 | 青橘皮 | 木瓜 | 枇杷葉 |
| 龍眼肉 | 小麥 | 馬料豆 | 綠豆 |
| 菹豆 | 穀芽 <small>附麥</small> | 豆豉 | 飴糖 |
| 薄荷 | 香薷 | 白芥子 | 五靈脂 |
| 虎骨 | 小茴香 | 上茯苓 | 葶藶 |
| 檳榔 | 牽牛子 | 忍冬 | 馬兜鈴 |
| 鈎藤 | 人乳 | 小便 | |
| 三 | | | |

後叙

上古聖人仰觀天之六氣俯察地之五行辨草木金石禽獸之性而合於人之五藏六府十二經脈著為本草經論古義深難於窺測漢季張長沙傷寒論金匱要畧多採中古遺方用藥之義悉遵本經應驗如響自李唐而後千金外臺等書有驗有不驗者蓋與本經之旨有合有不合也沿及宋元諸家師心自用藥品日增經義日取只云某藥治某病某病宜某藥因陋就簡愈趨愈下而流毒之最甚者莫如宋之雷斅竊古聖之名著為炮製頭倒是非不知

本草經讀

後叙

本經為何物潔古曰華東垣輩因之而東垣純盜虛名無稽臆說流傳至今無有非之者李頴湖綱目卷帙浩繁徒雜採世俗之說以多為貴不無喧客奪主之嫌注詁菴照綱目而約為備要遂末忘本不足道也余友孝廉陳修園精通醫學起死回生指不勝屈前著有本草經註六卷字櫛句解不遺剩義繕本出紙貴一時茲復著本草經讀四卷視前著又高一格俱從所以然處發揮且以內經之旨金匱傷寒之法融貫於中一書堪為醫林之至書洵神農之功臣也余自髫年以慈闈多病矢志於醫因本草向無

善本集張隱菴葉天士陳修園三家之說而附以管見名為本草經三注而集中唯修園之說最多今得修園之本草經讀則余三注之刻可以俟之異日矣喜其書之成而為之

本草經讀

後叙

二

神農本草經讀卷一

閩吳航陳念祖修國書著

男元豹道彪古愚全校字

上品

人參氣味甘微寒無毒主補五藏安精神定魂魄止驚悸除邪氣明目開心益智久服輕身延年

陳修園曰本經只此三十七字其提綱云至補五藏以五藏屬陰也精神不安魂魄不定驚悸不止目不明心腎不足皆陰虛為亢陽所擾也今五藏得甘寒之助則

本草經讀

卷一

上品

有安之定之止之明之開之益之之效矣曰邪氣者非指外邪而言乃陰虛而壯火食氣火即邪氣也今五藏得甘寒之助則邪氣除矣余細味經文無一字言及滋補回陽故仲景下汗吐下陰傷之症用之以救津液而一切回陽方中絕不加此陰柔之品反緩黃附之功故四逆湯通脈四逆湯為回陽第一方皆不用人參而四逆加人參湯以其利止亡血而加也茯苓四逆湯用之者以其在汗下之後也今人輒云以人參回陽此說倡自宋元以後而大盛於薛立齋張景岳李士材輩而



李時珍本草綱目尤為雜沓學者必於此等書於去方可與言醫道○仲景一百一十三方中用人參者只有一十七方新加湯小柴胡湯柴胡桂枝湯半夏瀉心湯黃連湯生薑瀉心湯旋覆代赭石湯乾薑黃連黃芩人參湯厚朴生薑半夏人參湯桂枝人參湯四逆加人參湯茯苓四逆湯吳茱萸湯理中湯白虎加人參湯竹葉石膏湯炙甘草湯皆是因汗吐下之後亡其陰津取其救陰如理中吳茱萸湯以剛燥劑中陽藥太過取人參甘寒之性養陰配陽以臻於中和之妙也

本草經讀

卷一

上品

二

又曰自時珍之綱目盛行而神農之本草經遂廢即如人參本經明說微寒時珍說生則寒熟則溫附會之甚甚藥有一定之性除是生搗取汁冷服與蒸晒八九次色味具變者頗有生熟之辨若人煎劑則生者亦熟矣况寒熱本屬水炭豈一物蒸熟不蒸熟間遂如許分別乎嘗考古聖用參之旨原為扶生氣安五藏起見而為五藏之長百脈之宗可清濁之運化為一身之靈籟者肺也人參性微寒清肺肺清則氣旺氣旺則陰長而五藏安古人所謂補陽者即指其甘寒之用不助壯火以

食氣而言非謂其性溫補火也○陶宏景謂功用同甘草凡一切寒溫補瀉之劑皆可共濟成功然甘草功兼陰陽故本經云至五藏六府人參功尚補陰故本經云至五藏仲景於咳嗽病去之者亦以形寒飲冷之傷非此陰寒之品所宜也

黃耆氣味甘微溫無毒主癰疽久敗瘡排膿止痛大風癩疾五痔鼠瘻補虛小兒百病生用鹽水炒酒炒醋炒蜜炙白水炒

陳修園曰黃耆氣微溫稟少陽之氣入膽與三焦味甘無毒稟太陰之味入肺與脾其主癰疽者甘能解毒也

本草經傳

卷一

三

久敗之瘡肌肉皮毛潰爛必膿多而痛甚黃耆入脾而入肌肉入肺而入皮毛也大風者殺人之邪風也黃耆入膽而助中正之氣俾神明不為風所亂入三焦而助決瀆之用俾竅道不為風所壅入脾而救受鬼之傷入肺而制風木之動所以至之癰疾又名大麻風即風毒之甚也五痔者五種之痔瘡乃少陽與太陰之火陷於下而此能舉其陷鼠瘻者瘰癧之別名乃膽經與三焦之火鬱於上而此能散其鬱也其曰補虛者是總結上文諸症久而致虛此能補之非泛言補益之品也葉天

士云小兒稚陽也稚陽為少陽少陽生氣條達則不病所以概至小兒百疾也余細味經文俱主表症而言如六黃湯之寒以除熱熱除則汗止者附湯之溫以回陽陽回則汗止玉屏風散之散以驅風風平則汗止諸方皆藉黃耆走表之力領諸藥而速達於表而止汗非黃耆自能止汗也諸家固表及生用發汗炒用止汗等說貽誤千古茲特正之

元氣味甘溫無毒主風寒溼痺死肌痲疽止汗除熱消食作煎餌久服輕身延年不飢仲景有赤龍即蒼朮也功用畧同偏長于消導汗多者大

本草經讀

卷一

上品

四

陳修園曰此為脾之正藥其曰風寒溼痺者以風寒溼三氣合而為痺也三氣雜至以溼為主死肌者濕侵肌肉也痺者濕流關節也疽者溼鬱而為熱熱則發黃也溼與熱交蒸則自汗而發熱也脾受濕則失其健運之常斯食不能消也白朮功在除溼所以至之作煎餌三字另提先聖大費苦心以白朮之功用在燥而所以妙處在於多脂張隱菴云上有濕氣始能滲漉四今以生朮削去皮急火炙令熟則味甘溫而質滋潤久服有寒

年不飢之效可見今人炒燥炒黑土蒸水漂等製大失經旨

甘草氣味甘平無毒主五藏六府寒熱邪氣堅筋骨長肌肉倍氣力金瘡癰腫毒久服輕身延年生用清火炙用補中

陳修園曰物之味甘者至甘草為極甘主脾脾為後天之本五藏六府皆受氣焉藏府之本氣則為正氣外來寒熱之氣則為邪氣正氣旺則邪氣自退也經者肝所主也骨者腎所主也肌肉善脾所主也氣者肺所主也力者心所主也但使脾氣一盛則五藏皆循環受益而本草經讀

卷一

上品

五

得具堅之長之倍之之效矣金瘡者為刀斧所傷而成瘡瘡甚而癰脾得補而肉目滿也能解毒者如毒物入土則毒化也土為萬物之母土健則輕身延年也

著黃氣味甘平無毒主傷中補虛羸除寒熱邪氣補中益氣力長肌肉強陰久服耳目聰明輕身不飢延年

陳修園曰此藥因唐代宗名諱改為山藥山藥氣年入肺味甘無毒入脾脾為中州而統血血者陰也中之寸也啞能益血故主傷中傷中愈則肌內豐故補虛羸防主氣氣虛則寒邪生脾統血血虛則熱邪生血氣

充而寒熱邪氣除矣脾主四肢脾血足則四肢健肺主氣肺氣充則氣力倍也且此物生搗最多津液而稠粘又能補腎而填精精足則陰強目明耳聰不飢是脾血之旺輕身是肺氣之充延年是誇其補益之效也

凡上品俱是尋常服食之物非治病之藥故神農方指出八服二字可見今人每取上品之藥如此物及人參熟地麩芩阿膠菟絲子沙苑蒺藜之類合為一方以治大病誤人無算蓋病不速去元氣日傷傷極則死凡上品之藥法宜久服多則終身少則數年與五穀之養人

卷一

上品

六

相佐以臻壽考若大病而需用此藥如五穀為養脾第一品脾虛之人強令食穀即可畢補脾之能事有是理乎然操此技者未有不得盛名薛立齋張景岳馮楚瞻輩倡之於前而近日之東延西請日診百人者無非是術誠可慨也

肉苁蓉氣味甘微溫無毒主五勞七傷補中除莖中寒熱痛養五藏強陰益精氣多子婦人癥瘕久服輕身陳修園曰肉苁蓉昇馬精落地所生取治精虛者同氣相求之義也凡五勞七傷人而不愈未有不傷其陰者

從腎補五藏之精精足則陰足矣莖中者精之道路精
虛則寒熱而痛精足則痛已矣又滑以精生於五藏而
藏之於腎精足則陽舉精堅令人多子矣婦人癥瘕皆
由血瘀精足則氣充氣充則瘀行矣葉天士註癥瘕之
治謂其鹹以稟堅滑以去着溫以散結猶淺之乎惻從
蓉也○張隱菴曰馬為火蓄精屬水陰從蓉感馬精而
生其形似肉氣味甘溫蓋稟少陰水火之氣而歸於太
陰坤土之藥也土性柔和故有從蓉之名

地黃氣味甘寒無毒主折跌絕筋傷中逐血痺填骨髓長

本草經讀

卷一 上品

七

肌肉作湯除寒熱積聚除痺生者尤良久服輕身不老

參地黃氣寒人足少陰腎經味甘無毒入足太陰脾

經氣味重濁陰也陰者中之守也傷中者守中真陰傷
也地黃甘寒補中焦之精汁所以主之血痺者血虛閉
而不運也地黃味甘以滋脾血氣寒以益腎氣氣血行
而閉者開矣腎主骨益腎則水足而骨髓充脾土肌肉
潤脾則土滋而肌肉豐也作湯除寒熱積聚者湯者盪
也或寒或熱之積聚湯能盪之也蓋味甘可以緩急性
滑可以去着也又曰除痺者言不但逐血痺更除皮肉

筋骨之痺也除皮肉筋骨之痺則折跌絕筋亦可療矣
久服輕身不老以先後二天交接元氣與穀氣俱納也
生者尤良謂其本性俱在也

陳修園曰地黃本經名地髓爾雅名芑又名芑唐以後
九蒸九晒為熟地黃苦味盡除入於溫補腎經丸劑頗
為相宜若入湯劑及養血涼血等方甚屬不合蓋地黃
專取其性涼而滑利流通熱則膩滯不涼全失其本性
矣徐靈胎辨之甚詳無何若輩竟執迷不悟也

又曰百病之極窮必及腎及腎危症也有大承氣湯之

本草經讀

卷一 上品

八

急下法有桃花湯之溫固法有四逆湯白通湯之回陽

法有猪苓湯黃連雞子黃湯之救陰法有真武湯之行

水法有附子湯之溫補法皆所以救其危也

張景岳自創邪說以百病之生俱從腎治誤以神農本

經上品服食之地黃認為治病之藥內經云五穀為養

五菜之類也玩久服二字可見聖人藥到病除何以云

去病多取毒藥滋潤膠粘反引邪氣斂藏於少陰而無

出路以後雖服葢附不熱服芩連不寒服參朮不補服

確黃不下其故何哉蓋以熟地黃之膠粘善羞女人有

孕服四物湯為主隨症加入攻破之藥而不惕以四物湯中之熟地黃能護胎也知其護胎之功便可悟其護邪之害膠粘之性最善着物如油入麪一着遂不能去也凡遇有邪而誤用此藥者百藥不效病家不救其用熟地黃之害反以為會用熟地黃而猶不效者定為敗症豈非景岳之造其孽哉

天門冬氣味甘平無毒主諸暴風淫偏痺強骨髓殺三蟲去服尸久服輕身益氣延年不飢

參天門冬稟寒水之氣而上通乎天故有天冬之名主

本草經讀

卷一

上品

九

治諸暴風濕偏痺者言風濕之邪暴中於人身而成半身不遂之偏痺天冬稟水天之氣環轉運行故可治也強骨髓者得寒水之精也三蟲伏尸皆濕熱所化天冬味苦可以祛濕氣平可以清熱濕熱下逐三尸伏蟲皆去也太陽為諸陽主氣故人服輕身益氣天氣通貫於地中故延年不飢

張隱菴曰天冬門冬皆稟少陰水精之氣麥門冬稟水精而上通於陽明天門冬稟水精而上通於太陽天冬主閉藏門主開轉咸名門冬者咸能開轉閉藏而上達

也後人有天門冬補中有瀉麥門冬瀉中有補之說不知何處引來良可嘆也

麥門冬氣味甘平無毒主心腹結氣傷中傷飢胃脈絕羸瘦短氣久服輕身不老不飢

張隱菴曰麥冬一本橫生根顆連絡有十二枚者有四枚者有十五六枚者蓋合於人身之十二絡加任之屏翳營之長強為十四絡又加脾之大絡名大包共十五絡又加胃之大絡名虛里共十六絡唯聖人能體察之用之以通脈絡並無去心二字後人不詳經義不窮

本草經讀

卷一

上品

十

物理相沿去心久矣今特表正之經云主心腹結氣傷中傷飢胃脈絕者以麥冬根頗連絡不斷能通達上下四旁令結者解傷者復絕者續皆藉中心之貫通也又主羸瘦短氣者補胃自能生肌補腎自能納氣也久服輕身不老不飢者先天與後天俱足斯體健而耐飢矣

崇原曰麥冬氣味甘平質性柔潤凌冬不凋翠蓋稟少陰水之精與陽明胃土相合

又曰凡物之涼者其心必熱熱者陰中之陽也人但知去熱而不知用陽得其陽而後能通陰中之氣

細辛味氣辛溫無毒主欬逆上氣頭痛腦動百節拘攣風

風濕痺痛死肌久服胡目利九竅輕身長年

張隱菴曰細辛氣味辛溫一莖直上其色赤黑稟少陰泉下之水陰而上交於太陽之藥也少陰為水藏太陽為水府水氣相通行於皮毛內合於肺若循行失職則病欬逆上氣而細辛能治之太陽之脈起於目內皆從巔絡腦若循行失職則病頭痛腦動而細辛亦能治之太陰之氣主皮毛少陰之氣主骨髓少陰之氣不合太陽則風濕相侵痺於筋骨則為百節拘攣痺於膝理則為死肌而細辛皆能治之其所以能治之者以氣勝之

本草經讀

卷一上品

十一

也久服明目利九竅者水精之氣滿於空竅也充竅和則輕身而延年矣○又曰宋元祐陳承謂細辛卑用未不可過一錢多則氣閉不通而死近醫多以此語忌用而不知辛香之藥豈能閉氣上品無毒之藥何不可多用於書之言類此者不少學者不善詳察而遵信之伊昔之門終身不能入矣

柴胡氣味苦平無毒主心腹腸胃中結氣飲食積聚寒熱

邪氣推陳致新久服輕身明目益精

按經文不言發汗仲聖用至八兩之多可知性純不妨多服功緩必須重川也

知性純不妨多服功緩必須重川也

葉天士曰柴胡氣平稟天中正之氣味苦無毒得地炎

上之火味膽者中正之官相火之府所以獨入足少陽膽經氣味輕升陰中之陽乃少陽也云主心腹腸胃中結氣者心腹腸胃五藏六府也藏府共十二經凡十一藏皆取決於膽柴胡輕清升達膽氣膽氣條達則十一藏從之宣化故心腹腸胃中凡有結氣皆能散之也其主飲食積聚者蓋飲食入胃散精於肝肝之疎散又藉少陽膽為生發之主也柴胡升達膽氣則肝能散精而飲食積聚自下矣少陽經行半表半裏少陽受邪邪併

本草經讀

卷一上品

十二

於陰則寒邪併於陽則熱柴胡和解少陽故主寒熱之邪氣也春氣一至萬物俱新柴胡得天地春升之性入少陽以生氣血故主推陳致新也久服清氣上行則陽氣日強所以身輕五藏六府之精華上奉所以明目清氣上行則陰氣下降所以益精精者陰氣之精華也黃連氣味苦寒無毒主熱氣目痛皆傷淚出明目腸澀腹痛下痢婦人陰中腫痛久服令人不忘

陳修園曰黃連氣寒稟天冬寒之水氣入足少陰腎味苦無毒得地南方之火味入手少陰心氣水而味火一

物同具故能除水火相亂而為濕熱之病其云至熱氣者除一切氣分之熱也目痛皆傷淚出不明皆濕熱在上之病腸澀腹痛下利皆溼熱在中之病婦人陰中腫痛為濕熱在下之病黃連除濕熱所以至之久服令人不忘者若入心即能補心也然苦為火之本味以其味之苦而補之而寒能勝火即以其氣之寒而瀉之千古唯仲景得本經之秘金匱治心氣不足而吐血者取之以補心傷寒寒熱互結心下而痞滿者取之以瀉心厥陰之熱氣撞心者合以烏梅下利後重者合以白頭翁

本草經讀

卷一

上品

七

等法真信而好古之聖人也

防風氣味甘溫無毒主大風頭眩痛惡風風邪目盲無所見風行周身骨節疼痛久服輕身

陳修園曰防風氣溫稟天春木之氣而入肝味甘無毒得地中土之味而入脾主大風三字提綱詳於巴戟天註不贅風傷陽位則頭痛而眩風寒皮毛則為惡風之風邪風害空竅則目盲無所見風行周身者經絡之風也骨節疼痛者關節之風也身重者病風而不能躡捷也防風之甘溫發散可以統主之然溫屬春和之氣入

肝而治風尤妙在甘以入脾培土以和木氣其用獨神此理證之易象於剝復二卦而可悟焉兩土同崩則剝故大病必顧脾胃土木無忤則復故病轉必和肝脾防風驅風之中大有回生之力李東垣竟目為卒伍卑淺之品真門外漢也

續斷氣味苦微溫無毒主傷寒補不足金瘡癰瘍折跌續筋骨婦人乳難久服益氣力

參此以形為治續斷有肉有筋如人筋在肉中之象而色帶紫帶黑為肝腎之象氣味苦溫為少陰陽明火土

本草經讀

卷一

上品

四

之氣化故寒傷於經絡而能散之癰瘍絡於經絡而能療之折跌筋骨有傷而能補不足續其斷絕以及婦人乳難而能通其滯而為乳久服益氣力者亦強筋壯骨之功也

牛膝氣味苦酸平無毒主寒濕痿痺四肢拘攣膝痛不可屈伸逐血氣傷熱火爛墮胎入服輕身耐老

陳修園曰牛膝氣平稟金氣而入肺味苦得火味而入心包味酸得木味而入肝唯其入肺則能通調水道而寒濕行胃熱清而痿愈矣唯其人肝肝藏血而養筋則

拘攣可愈膝亦不痛而能屈伸矣唯其入心包若能泄實則血因氣滯之病可逐也若能瀉火則熱湯之傷與火傷之爛可完也苦味本伐生生之氣而又合以酸味而遂大申其漏泄之權則胎無不墮矣久服輕身耐老者又統言其流通血脈之功也

巴戟天氣味甘微溫無毒主大風邪氣陰痿不起強筋骨安五藏補中增志益氣 酒焙

陳修園曰巴戟天氣戟溫稟天春升之木氣而入足厥陰肝味辛甘無毒得地金土二味入足陽明燥金胃雖本草經讀

卷一

上品

五

氣味有水土之分而其用則統歸於溫肝之內佛經以風輪主持大地即是此義本經以主大風三字提綱兩見一見於巴戟天一見於防風陰陽造化之機一言返出金匱云風能生萬物亦能害萬物防風主除風之害巴戟天主得風之益不得滑口讀去蓋人居大塊之中乘籍以行鼻息呼吸不能頃刻去風風即是氣風氣通於肝和風生人疾風殺人其主大風者謂其能化疾風為和風也邪氣者五行正氣不得風而失其和木無風則無以遂其條達之情火無風則無以遂其炎上之性

金無風則無以成其堅勁之體水無風則潮不上土無風則植不蕃一得巴戟天之風則刺處皆春而邪氣去矣邪氣去而五藏安自不待言也況肝之為言敢也肝陽之氣行於宗筋而陰痿起行於腎藏腎藏志而志增腎主骨而骨強行於脾藏則震坤含德土木不害而中可補益氣二字又總結通章之義氣即風也逐而散之風散即為氣散生而亦死益而和之氣和即為風和死可回生非明於生殺消長之道者不可以語此

葉天士云淫羊藿治陰虛陰痿巴戟天治陽虛陰痿

本草經讀

卷一

上品

六

石斛氣味甘平無毒主傷中除痺下氣補五藏虛勞羸瘦強陰益精久服厚腸胃

葉天士云石斛氣平入肺味甘無毒入脾甘平為金土之氣味入足陽明胃手陽明大腸陰者中之守也陰虛則傷中甘平益陰故主傷中痺者脾病也風寒濕三氣而脾先受之石斛甘能補脾故能除痺上氣肺病也火氣上逆則為氣喘石斛平能清肺故能下氣五藏皆屬於陰而脾名至陰為五藏之主石斛補脾而陰及五藏則五藏之虛勞自復而肌肉之消瘦自生矣陰者宗筋

也精足則陰自強精者陰氣之精華也納穀多而精自儲腸者手陽明大腸也胃者足陽明胃也陽明屬燥金久服甘平清潤則陽明不燥而腸胃厚矣張隱菴曰石斛生於石上得水長生是稟水石之專精而補腎味甘色黃不假土力是奪土中之氣化而補脾劑乃量名主出入能運行中土之氣而愈諸病也澤瀉氣味甘寒無毒主風寒濕痺乳難養五藏益氣力肥健消水久服耳目聰明不飢延年輕身面生光能行水上陳修園曰澤瀉氣寒水之氣也味甘無毒土之味也生

本草經讀

卷一上品

七

於水而上升能散水陰之氣上滋中土也其主風寒濕痺者三氣以濕為主此能散水氣上行而復下其痺即從水氣而化矣其主乳難者能滋水精於中土而為汁也其主養五藏益氣力肥健等句以五藏主藏陰而脾為五藏之原一得水精之氣則能灌溉四旁俾五藏循環而受益不特肥健消水不飢見本臟之功而肺得水精之氣而氣益心得水精之氣而力益肝得水精之氣而日明腎得水精之氣而耳聰且形得水精之氣而全體輕色得水精之氣而面生光澤一生得水精之氣而

延年所以然者久服之功能行在下之水而使之上也此物形圓一莖直上無下行之性故其功效如此令人以鹽水拌炒則反制其肘矣五味子氣味酸溫無毒主益氣欬逆上氣勞傷羸瘦補不足強陰益男子精

陳修園曰五味子氣溫味酸得東方生長之氣而主風人在風中而不見風猶魚在水而不見水人之鼻息出入頃刻離風則死可知人之所以生者風也風氣通於肝即人身之木氣莊子云野馬也塵埃也生物之息以

本草經讀

卷一上品

六

遂木氣之發榮酸以斂木氣之歸根生息休息皆所以益共生生不窮之氣倘其氣不治治安欬逆上氣者風木挾火氣而乘金也為勞傷為羸瘦為陰痿為精虛者則金匱所謂虛勞諸不足風氣百疾是也風氣通於肝先聖提出虛勞大眼目惜後人不能申明其義五味子益氣中大具開闔升降之妙所以概主之也唐宋以下諸家有謂其具五味而兼治五藏者有謂其酸以斂肺色黑入腎核似腎而補腎者想當然之說究非定論也然肝治五藏得其生氣而安為本經言外之正旨仲景

佐以乾薑助其溫氣俾氣與味相得而益彰是補天下

段 薏苡仁氣味甘微寒無毒主筋急拘攣不可屈伸久風濕痺下氣久服輕身益氣

陳修園曰薏苡仁夏長秋成味甘色白稟陽明金土之精金能制風土能勝濕故治已上諸症久服輕身益氣者以濕行則脾健而身輕金清則肺治而氣益也

神農本草經讀卷之一終

本草經讀

卷

上品

九



神農本草經讀卷二

閩吳航陳念祖修園甫著

上品

男元符道彪舌愚全稜字
元元犀道照靈石

菟絲子氣味辛平無毒主續絕傷補不足益氣力肥健人汁去面黚久服明目輕身延年

陳修園曰菟絲氣平稟金氣味辛得金味肺藥也然其用在腎而不在肺子中脂膏最足絕類人精金生水也主續絕傷者子中脂膏如絲不斷善於補續也補不足

本草經讀

卷

上品

者取其最足之脂膏以填補其不足之精血也精血足則氣力自長肥健自增矣汁去而黚者言不獨內服得其填補之功即外用亦得其滑澤之效也久服腎水足則目明腎氣壯則身輕華元化云腎者性命之根也腎得補則延年

蕨蕨氣味甘平無毒主中風暴熱不能動搖跌筋結肉諸不足久服去面黑黚好顏色潤澤輕身不老

張隱菴曰蕨蕨氣味甘平質多津液稟太陰濕土之精以資中焦之汁主中風暴熱不能搖動者以津液為邪

熱所燥也跌筋者筋不柔和也結肉者肉無膏澤也諸不足者申明以上諸症皆屬津液不足也久服則津液充滿故去面上之黑一好顏色而肌膚潤澤且輕身不老也

又曰陰柔之藥豈堪重用古人除治風熱以外絕不敢用自李時珍有不寒不燥用代參者之說時醫信為補劑虛症仗此自無一生咎其誰職耶

沙參氣味苦微寒無毒主血結驚氣除寒熱補中益肺氣

參葉天沙參氣微寒稟水氣而入腎味苦無毒得火味而

本草經讀

卷二

上品

二

人心謂其得水氣以瀉心水之有餘也心火亢則所生之血不行而為結而味之苦可以攻之心火亢則所藏之神不寧而生驚而氣之寒可以平之心火稟炎上之性火鬱則寒火發則熱而苦寒能清心火故能除寒熱也陰者所以守中者也苦寒益陰所以補中補中則金得土生又無火尅所以益肺氣也

遠志氣味苦溫無毒主欬逆傷中補不足除邪氣利九竅益智慧耳目聰明不忘強志倍力久服輕身不老

按遠志氣溫稟厥陰風木之氣入手厥陰心包味苦得

少陰石火之味入手少陰心然少包為相火而主之者心也火不刑金則欬逆之病愈火歸土中則傷中之氣愈主明則下安安則不外興利除弊兩大事即補不足除邪氣之說也心為一身之主宰凡九竅耳目之類無一不待其使令今得遠志以補之則九竅利智慧益耳聰目明善記不忘志強力壯所謂天君泰百體從令者此也又云久服輕身不老者即內經所謂主明則下安以此養生則壽之說也夫曰養生日久服言其為服食之品不可以之治病故經方中絕無此味今人喜服藥

本草經讀

卷二

上品

三

凡為補養久則增氣而成病唯以補心之藥為主又以四臟之藥為佐如四方諸侯皆出所有以貢天子即乾綱克振天下皆寧之道也諸藥皆偏唯專於補心則不偏抱朴子謂陵陽子仲服遠志二十七年有子三十七人開書所視記而不忘著其久服之效也若以之治病則大失經旨矣

菖蒲氣味辛溫無毒主風寒溼痺欬逆上氣開心孔補五藏通九竅明目出音聲主耳聾癰瘡溫腸胃止小便利久服輕身不忘不迷惑延年益心智高志不老

陳修園曰：菖蒲性用畧同遠志，但彼苦而此辛，且生於水石之中，得太陽寒水之氣，其味辛合於肺金，而主表其氣溫合於心包絡之經，通於君火，而主神，其主風寒濕痺，欬逆上氣者，從肺驅邪以解表也。開心竅至末句，皆言補心之效，其功同於遠志，聲音不出，比能入心而轉舌入肺以開竅也。瘡癰為心火，而此能寧之心火，下濟而光明，故能溫腸胃而止小便利也。但菖蒲稟水精之氣，外通九竅，內濡五藏，其性自下，以行於上，與遠志自上以行於下者有別。

本草經讀

卷二 上品

四

赤箭氣味辛溫無毒，主殺鬼精物，蠱毒惡風，久服益氣力，長陰肥健。

張隱菴曰：赤箭氣味辛溫，其根名天麻者，氣味甘平，蓋赤箭辛溫屬金，金能制風，而有弧矢之威，故主殺鬼精物。天麻甘平屬土，土能勝濕，而居五運之中，故能治蠱毒惡風。天麻形如芋魁，有遊子十二枚，周環之以做十二辰，十二子在外，應六氣之司，天天麻如皇極之居中，得氣運之全，故功同五芝，力倍五參，為仙家服食上品，是以久服益氣力，長陰肥健。○李時珍曰：補益上藥，天

麻第一，世人止用之，治風良可惜也。

車前子氣味甘寒無毒，主氣癰止痛，利水道，通小便，除濕痺，久服輕身耐老。

張隱菴曰：車前草本經名當道毛，詩名茅苳。○乾坤有動靜，天坤其靜也，倉其動也。聞車前好生道旁，雖牛馬踐踏不死，蓋得土氣之用，動而不靜者也。氣癰膀胱之氣閉也，閉則痛，痛則水道不利，車前得土氣之用，土氣行則水道亦行而不癰，不癰則不痛，而小便長矣。土氣行則濕邪散，濕邪散則濕痺目除矣。久服土氣升而水

本草經讀

卷二 上品

五

氣布，故能輕身耐老。○神仙服食經云：車前雷之精也，震為雷，為長男，詩言采采芣苢，亦欲姪娠而生男也。

羌活氣味苦甘辛無毒，主風寒所擊，金瘡止痛，奔豚癰瘕，女子痲癩，久服輕身耐老。一名獨活

陳修園曰：羌活氣平稟金氣而入肺，味苦甘無毒得火味而入心，得土味而入脾，其主風寒所擊者，入肺以禦皮毛之風寒，入脾以禦肌邊之風寒，入心助太陽之氣以禦營衛之風寒也。其主金瘡止痛者，亦和營衛長肌肉完皮毛之功也。奔豚乃水氣上凌心火，此能入肺以

降其逆補土以制其水入心以扶心火之衰所以主之
痛瘧者木動則生風風動則挾木勢而害土土病則聚
液而成痰痰逆於心則為瘧為癩此物稟金氣以制風
得土味而補神得火味以寧心所以主之女子疝瘕多
經行後血假風濕而成此能入肝以平風入脾以勝濕
入心而主宰血脈之流行所以主之久服輕身耐老者
若其扶陽之效也

張隱菴曰此物生苗一莖直上有風不動無風自動故
名獨活後人以獨活而出于西羌者名羌活出於中國
本草經讀

卷二 上品

六

處處有者名獨活今觀肆中所市竟是二種有云羌活
主上獨活主下是不可解也

升麻氣味甘平苦微寒無毒主解百毒殺百精老物殃鬼
辟瘟疫瘴氣邪氣蠱毒入口皆吐中惡腹痛時氣毒癘
頭痛寒熱風腫諸毒喉痛口瘡久服不天輕身延年

張隱菴曰升麻氣味甘苦平甘者土也苦者火也主從
中上而達太陽之氣太陽標陽本寒故微寒蓋太陽稟
寒水之一而行於膚表如天氣之下連於水也太陽在
上在天日當空光明清泄清泄故主解百毒光明故殺

百精老物殃鬼太陽之氣行於膚表故辟瘟疫瘴氣邪
氣太陽之氣行於地中故蠱毒入口皆吐出治瘧毒則
中惡腹痛自除辟瘟疫瘴氣邪氣則時氣毒癘頭痛寒
熱自散寒水之氣滋於外而濟於上故治風腫諸毒喉
痛口瘡久服則陰精上滋故不天陽氣盛故輕身陰陽
充足則長年矣

當考凡物紋如車輻者皆有升轉循環之用防風秦艽
烏藥防己木通升麻皆紋如車輻而升麻更覺空通所
以升麻甚捷也

本草經讀

卷二 上品

七

茵陳蒿氣味苦平微寒無毒主風濕寒熱邪氣執結黃疸
久服輕身益氣耐老面白悅長年白兔食之仙

張隱菴曰經云春三月此為發陳茵陳因舊苗而春生
蓋因冬令水寒之氣而具陽春生發之機主治風濕寒
熱邪氣得生陽之氣則外邪自散也結熱黃疸得水寒
之氣則內熱自除也久服則生陽上升故輕身益氣耐
老因陳而生新故面白悅長年免乃結陰之物喜食陽
春之氣故白兔食之成仙

甘菊花氣味苦平無毒主諸風頭眩腫痛口欲脫決出皮

膚死肌惡風濕痺久服利血氣輕身耐老延年

徐靈胎曰凡芳香之物皆能治頭目肌表之疾但香則

無不辛燥者惟菊得天地秋金清肅之氣而不甚燥烈

故於頭目風火之疾尤宜焉

龍膽氣味苦澀大寒無毒主骨間寒熱驚癇邪氣積絕傷

定五藏殺過毒

張隱菴曰龍乃東方之神膽主少陽甲木苦走骨故主

骨間寒熱澹類酸故除驚癇邪氣膽主骨肝主筋故續

絕傷五臟六腑皆取決於膽故定五藏山下有風曰蠱

本草經讀

卷二 上品

八

風氣升而盛毒自殺矣

紫蘇氣味辛微溫無毒主下氣殺骨除飲食辟口臭去邪

毒辟惡氣久服通神明輕身耐老

述紫蘇 溫稟天之春氣而人肝味辛得地之

而入肺主下氣者肺行其治節之令 殺穀除飲食者

氣溫達肝肝疎暢而脾亦健運也辟口臭去邪毒辟惡

氣者辛中帶香香為天地之正氣香能勝臭即能解毒

即能勝邪也久服則氣爽神清故通神明輕身耐老其

子下氣尤速其梗下氣寬脹治噎膈反胃止心痛旁小

枝通十經關脈絡

葛質莖氣味甘平主補中養神益氣力除百疾久服輕身

耐老不創延年

雞頭貫氣味甘平主濕痺腰脊膝痛補中除暴疾益精氣

強志令耳目聰明久服輕身不飢耐老神仙

黑脂麻氣味甘平無毒主傷中虛羸補五內益氣力生長

肌肉填髓腦久服輕身不老色黑者良

益母草子氣味辛甘微溫無毒主明目益精除水氣久服

輕身今人奉為女科藥往往誤事且其狗具之長反掩

本草經讀

卷二 上品

九

茜草氣味苦寒無毒主寒濕風痺黃疸補中

陳修園曰氣味苦寒者得少陽之氣化也風寒濕三氣

為痺而此能入手足少陰俾上下交通而旋轉則

愈矣上下交通則中土自和斯有補中之效矣中

和則濕熱之氣氣化而黃疸愈矣又素問以蘆茹一

兩烏鱔 骨四兩丸以雀卵飲以鮑魚汁治氣竭肝傷

脫血血枯婦人血枯經閉丈夫陰痿精傷名曰四烏鱔

骨一蘆茹丸蘆茹即茜草也亦取其入少陰以生血補

中宮以統血汁可染絳以血而能行血歟後人以此三味入烏鱔骨

絲毛雞腹內以陳酒童便煮爛烘乾為丸以百勞水下
五七十丸治婦人倒經血溢於上男子咳嗽吐血左平
關脈弦皆上畏
寒有瘀血者

茯苓氣味甘平無毒主胸脇逆氣憂恚驚邪恐悸心下結
痛寒熱煩滿欬逆口焦舌乾利小便久服安魂養神不飢
延年

陳修園曰茯苓氣平入肺味甘入脾肺能通調脾能轉
輸其功皆在於利小便一語胸為肺之部位脇為肝之
部位其氣土逆則憂恚驚邪恐悸七情之用因而弗調
心下為太陽之部位水邪停留則結痛水氣不化則煩

本草經讀
卷二 上品 十

滿凌於太陰則欬逆客於營衛則發熱惡寒內有宿飲
則津液不升為口焦舌乾唯得小便一利則水行而氣
化諸疾俱愈矣久服安魂養神不飢延年者以肺金為
天脾土為地位一身之天地而明其上下交和之效也
豬苓氣味甘平無毒主痰癰解毒蠱疰不祥利水道久服
輕身耐老

陳修園曰豬苓氣平稟金氣而入肺味甘無毒得土味
而入脾肺主治節脾主轉輸所以能利水道又攷此物
出土時帶甘久則淡然無味無味則歸於膀胱膀胱為

太陽其說有二一曰經絡之太陽一曰六氣之太陽何
謂經絡之太陽其腑在下而主水得上焦肺氣之化中
焦脾氣之運則下焦愈治所謂上焦如霧中焦如瀝下
焦如瀆俾決瀆之用行於州都則州都中自有雲行雨
施之景象利水如神有由來也且不獨利水道也六氣
之太陽名曰巨陽應天道居高而衛外乃心君之藩籬
也凡風寒初感無非先入太陽之界治不得法則留於
膜原而為瘧久則為痰即傷寒雜病似瘧非瘧者皆在
此例但得猪苓之通利水道水行氣化水精四布漆漆

本草經讀
卷二 上品 十一

汗出則營衛和而諸邪俱解仲景五苓散桂枝去桂加
茯苓白朮湯非於此得其悟機乎若陽明之渴欲飲水
小便不利少陰之咳嘔而渴心煩不眠熱瘧多兼此症
總於利水道中布達太陽之氣使天水循環滋其枯燥
即仲景猪苓湯之義也且太陽為天光明清湛清湛則
諸毒可解光明則蠱疰不詳自除又云久服輕身耐老
者溺得陽氣之化而始長溺出不能遠射陽氣衰於下
也溺出及溺已時頭搖者頭為諸陽之會從下以驗其
上之衰也此皆老態得猪苓助太陽之氣而可耐之然

此特聖人開太陽之治法非謂猪苓之淡可賴也

牡丹氣味辛溫無毒主上氣欬逆結氣喉痺吐吸利關節
補中益氣久服通神輕身不老

牡陽也牡桂者即今之桂枝桂皮也菌根也菌桂即今
之內桂厚桂也然生發之機在枝幹故仲景方中所用
俱是桂枝即牡桂也時醫以桂枝發表禁不敢用而所
用肉桂又必刻意求備皆是為施治不愈卸罪巧法
張隱菴曰桂本凌經不凋氣味辛溫其色紫赤水中所
生之木火也肺腎不交則為上氣欬逆之證桂散水中

本草經讀

卷

二上品

十二

之生陽上交于肺則上氣平而欬逆除矣結氣喉痺者
三焦之氣不行於肌腠則結氣而為喉痺桂稟少陽之
木氣通利三焦則結氣通而喉痺可治矣吐吸者吸不
歸根即吐出也桂能引下氣與上氣相接則吸入之氣
直至丹田而後出故治吐吸也關節者兩肘兩腋兩髀
兩脰皆機關之室周身三百六十五節皆神氣之周行
桂助君火之氣使心上之神而出入於機關遊行於骨
節故利關節也補中益氣者補中焦而益上下之氣也
久服則陽氣盛而光明故通神明三焦通會元真於肌

腠故輕身不老

徐忠可曰近來醫氣丸十全大補湯俱用肉桂蓋襟溫
煖於滋陰藥中故無礙至桂枝湯因作傷寒首方又因
有春夏禁用桂枝之說後人除有汗發熱惡寒一證他
證即不用甚至春夏則更守禁藥不敢用矣不知古人
用桂枝取其宣通血氣為諸藥嚮導即腎氣丸古亦用
枝其意不止於溫下也他如金匱論虛損十方而七方
用桂枝孕婢用桂枝湯安胎又桂苓丸去癥產後中風
面赤桂枝附子竹葉煎用產後乳子煩亂嘔逆用竹皮

本草經讀

卷

二上品

十三

大丸內加桂枝治熱煩又附方於建中加當歸為內補
然則桂枝豈非通用之藥若肉桂則性熱下達非下焦
虛寒者不可用而入反以為通用宜其用之而多誤矣
余自究心金匱以後其用桂枝取效變幻出奇不可方
物聊一拈出以破時人之惑
陳修園曰金匱謂氣短有微飲宜從小便去之桂苓甘
朮湯主之腎氣丸亦主之喻嘉言注呼氣短宜用桂苓
甘朮湯以化太陽之氣吸氣短宜用腎氣丸以納少陰
之氣二方俱藉桂枝之力市醫不曉也第桂枝為上品

之藥此時却塞於遇而善用桂枝之人亦與之同病癸亥歲司馬公之媳孀居數載性好靜長日閉戶獨坐得咳嗽病服生地麥冬百合之類一年餘不效延余診之脈細小而弦緊純是陰霾四布水氣滔天之象斷為水飲咳嗽此時若不急治半月後水腫一作盧扁莫何言之未免過激診一次後即不復與商嗣腫病大作醫者用檳榔牽牛葶子厚朴大腹皮蘿蔔子為至如焦白朮熟地炭肉桂附子茯苓車前子牛膝當歸芍藥海金沙澤瀉木通赤豆商陸猪苓枳殼之類出入加減計

本草經讀

卷二

上品

五

服二個月其腫全消人瘦如柴下午氣陷脚腫次早亦消見食則嘔冷汗時出子午二時煩燥不寧咳嗽輒暈醫家以腫退為效而病人時覺氣散不能自支又數日大汗嘔逆氣喘欲絕又延余診之脈如吹毛指甲黯四肢厥冷余驚問其少君曰前此直言獲咎以致今日病不可為余實不能辭其責也但尊大人於庚申夏間將入都沾恙一月余進藥三劑全愈迄今三載尚守服舊方精神逾健豈遂忘耶茲兩次遵命而來未准一見此證已束手無策未知有何面諭渠少君云俾求氣喘尋

平所以然者非人力也余不得已以金匱桂枝甘草湯小劑應之按此二藥自尤桂枝各一錢次日又延余知術拙不能為力固辭之別延醫治後一日奴旋聞醫輩私議桂枝甘草湯為發表之劑於前證不宜夫桂枝甘草湯豈發表劑哉只緣湯中之桂枝一味由來被謗余用桂枝宜其招謗也噫桂枝之屬於不知已將何時得以大申其用哉

本草經讀

卷二

上品

五

桂枝性用自唐宋以後罕有明其旨叔父張張隱菴之注字字精確又引徐忠可之論透發無遺附錄近日治按幾於痛哭垂涕而道之其活人無已之心溢於筆墨之外吾知桂枝之功用從此大彰矣又按仲景書桂枝條下有去皮二字葉天士醫林指月方中每用桂未甚覺可笑蓋仲景所用之桂枝只取稍尖嫩枝內外如一者無皮骨者去之非去枝上之皮也諸書多未及特補之受業姪鳳騰鳴岐注

南桂氣味辛溫無毒主百病養精神和顏色為諸藥先聘通使久服輕身不老面生光華媚好常如童子陳修園曰性用同杜桂養精神者內能通達藏府也和

顏色者外能通利血脈也為諸藥先聘通使者辛香能分達於經絡故主百病也與牡桂有輕重之分上下之別凡陰邪盛與藥相拒者非此不能入

橘皮氣味苦辛溫無毒主胸中痰熱逆氣利水穀久服去臭下氣通神

陳修園曰橘皮氣溫稟春氣而入肝味苦人心味辛入肺胸中為肺之部位性其入肺所以主胸中之痰熱逆氣疎泄為肝之專長唯其入肝所以能利水穀心為君主之官唯其入心則君火明而濁陰之臭氣自去又推

本草經讀

卷二

上品

去

其所以得效之神者皆其下氣之功也總結上三句古人多誤解

又曰橘皮筋膜似脈絡皮形似肌肉宗脈似毛孔人之傷風咳嗽不外肺經肺主皮毛風之傷人先於皮毛次入經絡而漸深治以橘皮之苦以降氣辛以發散俾從脾胃之大絡而外轉於肌肉毛孔之外微微從汗而解也若削去筋膜只留外皮名曰橘紅意欲解肌止嗽不知汗本由內而外豈能離肌肉經絡而直走於外雷斂去白留白之分東垣因之何不通之甚也至於以橘皮

製造為膏更屬無知妄作查其製法橘皮用水煮三次極爛嚼之無辛苦味晒乾外用甘草冬青鹽烏梅元明粉硼砂熬濃汁浸晒多次以汁乾為度又以人參貝母研未拌勻收貯數月後用之據云能化痰療嗽順氣止渴生津而不知全失橘皮之功用橘皮治嗽妙在辛以散之今以烏梅之酸收亂之橘皮順氣妙在苦以降之今以麥冬人參甘草之甘壅亂之橘皮妙在溫燥故能去痰寬脹今以貝母麥冬元明粉青鹽之鹹寒亂之試問橘皮之本色何在乎余嘗究俗人喜服之由總

本草經讀

卷二

上品

十七

由人口之時得甘酸之味則滿口生津得鹹寒之性則堅痰暫化一時有驗彼此相傳而陰被其害者不少也法製半夏亦用此藥浸造罨發黃衣收貯貽害則一之枸杞氣味苦寒無毒主五內邪氣熱中消渴周痺風濕久服堅筋骨輕身不老耐寒暑

陳修園曰枸杞氣寒稟水氣而入腎味苦無毒得火味而人心五內即五藏五藏為藏陰之地熱氣傷陰即為邪氣邪氣伏於中則為熱中熱中則津液不足內不能滋潤藏府而為消渴外不能灌溉經絡而為周痺熱甚

則生風熱鬱則成濕種種相因唯枸杞之苦寒清熱可以統主之久服堅筋骨輕身不老耐寒暑三句則又申言其心腎交補之功以腎字從堅補之即所以堅之也堅則身健而輕自忘老能兒腎水足可以耐暑心火寧可以耐寒洵為服食之上劑然苦寒二字本經概根苗花子而言若單論其子嚴冬霜雪之中紅潤可愛是稟少陰水精之氣兼少陰君火之化為補養心腎之良藥但性緩不可以治大病急病耳

木香氣味辛溫無毒主邪氣辟毒疫溫鬼強志主淋露久服不夢寤寤寐

本草經讀

卷二上品

六

張隱菴曰木香其數五氣味辛溫土徹九天稟手足太陰天地之氣化主交感天地之氣上下相通治邪氣者地氣四散也辟毒疫溫鬼者天氣光明也強志者天生水水生則腎志強主淋露者地氣上騰氣騰則淋露降天地交感則陰陽和開闔利故久服不夢寤寤寐者寤中之夢寤寐者寐中之覺也

杜仲氣味辛平無毒主腰膝痛補中益精氣堅筋骨強志除陰下瘰濕小便餘瀝久服輕身耐老

杜仲氣味辛平得金之氣味而其皮黑色而屬水是稟陽明少陰金水之精氣而為用也腰為腎府少陰主之膝屬大筋陽明主之杜仲稟少陰陽明之氣故腰膝之痛可治也補中者補陽明之中土也益精者益少陰之精氣也堅筋骨者堅陽明所屬之筋少陰所主之骨也強志者腎藏志腎氣得補而壯氣壯而志自強也陽明燥氣下行故除陰下瘰濕小兒餘瀝也久服則金水相生精氣充足故輕身耐老也

桑根白皮氣味甘寒無毒主傷中五勞六極羸瘦崩中絕

本草經讀

卷二上品

九

脈補虛氣舊本列為中品今從崇原

葉天士曰桑皮氣寒稟水氣而入腎味甘無毒得土味而人脾中者中州脾也脾為陰氣之原熱則中傷桑皮甘寒故主傷中五勞者五藏勞傷真氣也六極者六府之氣虛極也藏府俱虛所以肌肉削而羸瘦也其主之者桑皮甘以固脾氣而補不足寒以清內熱而退火邪邪氣退而脾陰充脾主肌肉自然肌肉豐而勞極愈矣崩中者血脈也脈者血之府血脫故脈絕不來也脾統血而為陰氣之原甘能益脾所以主崩中絕脈也火與

元氣勢不兩立氣寒清火味甘益氣氣亦 虛得補而氣安益矣

陳修園曰今人以補養之藥誤認為清肺利水之品故用多不效且謂生用大瀉肺氣宜塗蜜炙之然此藥忌火不可不知

張隱菴曰桑刈而復茂生長之氣最盛故補續之功如此

桑上寄生氣味苦平無毒主腰痛小兒背強癰腫充飢膚堅髮齒長鬚眉安胎

本草經讀

卷二

上品

三

張隱菴曰寄生感柔氣而寄生枝節間生長無時不假土力奪天地造化之神功故能資養血脈於空虛之地而取效倍於他藥也主治腰痛者腰乃腎之外候男子以藏精女子以繫胞寄生得桑精之氣虛繫而生故治腰痛小兒腎形未足似無腰痛之證應有背強癰腫之疾寄生治腰痛則小兒背強癰腫亦能治之充飢膚精氣外達也堅髮齒精氣內足也精氣外達而充肌膚則髮眉亦長精氣內足而堅髮齒則胎亦安蓋肌膚者皮肉之餘齒者骨之餘法與鬚眉者血之餘胎者身之餘

以餘氣寄生之物而治餘氣之病同類相感如此槐實氣味苦寒主五內邪氣熱止涎唾補絕傷五痔火瘡婦人乳癢子藏急痛

柏實氣味甘平主驚悸清心養安五藏之功益氣壯火食則氣除風濕痺得秋金之令能久服令人潤澤美色耳目聰明及諸瘡不飢不老輕身延年補之性不假灌徐靈胎曰柏得天地堅剛之性以生不與物變遷經冬彌翠故能寧心神斂心氣而不為邪風遊火所侵也

○人之生理謂之仁仁藏於心物之生機在於實故實

本草經讀

卷二

上品

三

亦謂之仁凡草木之仁皆能養心氣以類相應也大棗氣味甘平無毒主心腹邪氣安中養脾氣平胃氣通九竅助十二經補少氣少津液身中不足大驚四肢重和百藥久服輕身延年

陳修園曰大棗氣平入肺味甘入脾肺主一身之氣脾主一身之血氣血調和故有已上諸效

朴淮氣味苦寒無毒主治百病除寒熱邪氣逐五藏六府積聚固結留瘕能化七十種石煉餌服之輕身神

張隱菴曰雪花六出完精石六稜六數為陰乃水之成

數也朴硝硝石面上生牙如圭角作六稜乃感地水之氣結成而稟寒水之氣化是以形類相同但硝石遇火能焰兼得水中之天氣朴硝止稟地水之精不得天氣故遇火不焰也所以不同者在此

丹砂氣味甘微寒無毒主身體五藏百病養精神安魂魄益氣明目殺精魅邪惡鬼久服通神明不老

陳修園曰丹砂氣微寒入腎味甘無毒入脾色赤入心主身體五藏百病者言和平之藥凡身體五藏百病皆可用而無顧忌也心者生之本神之居也腎者氣之源

本草經讀

卷二

上品

三

精主處也心腎交則精神交養隨神往來者謂之魂並精出入者謂之魄精神交養則魄自安氣者得之先天全賴後天之穀氣而昌丹砂味甘補脾所以益氣明目者以石藥凝金之氣金能鑿物赤色得火之象火能燭物也殺精魅邪惡鬼者具天地純陽之正色陽能勝陰正能勝邪也久服通神明不老者明其水升火降之效也

滑石氣味甘寒無毒主身熱洩瀉女子乳難癰閉利小便瀉胃中積聚寒癰益精氣久服輕身耐飢長年

按滑石氣寒得寒水之氣入手足太陽味甘入足太陽且其色白兼入手太陰所主諸病皆清熱利水之功也益精延年言其性之循不比他種石藥偏之為害也讀者勿泥

紫石英氣味甘溫無毒主心腹欬逆邪氣補不足女子風寒在子宮絕孕十年無子久服溫中輕身延年

陳修園曰紫石英氣溫稟木氣而入肝味甘無毒得土味而入脾欬逆邪氣者以心腹為脾之部位人之呼吸出心肺而入肝腎脾居中而轉運何欬逆之有惟脾虛

本草經讀

卷二

上品

三

受肝邪之侮不能下轉而上衝故為是病其主之者溫能散邪甘能和中而其質又重而能降也補不足者氣溫味甘補肝脾之不足也風寒入於子宮則肝血不藏脾血亦不統往往不能生育脾土之成數十所以十年無子也紫石英氣溫可以散子宮之風寒味甘可以益肝脾之血也久服溫中輕身延年者誇其補血納氣之功也

按白石英治畧同但紫色屬陰主治衝脈血海功多在下自為金色主治消渴兼理上焦之燥

赤石脂氣味甘平無毒主黃疸洩痢腸澼膿血陰蝕下血赤白邪氣癰腫疔瘡惡瘡頭瘍疥瘡久服補髓益氣肥健不飢輕身延年五色石脂各隨五色補五藏

陳修園曰赤石脂氣平稟金氣味甘得土味手足太陰藥也大陰濕勝在皮膚則為黃疸在腸胃則為洩利甚則為腸澼膿血下注於前陰則為陰蝕並見赤白濁帶下注於後陰則為下血皆濕邪之氣為害也石脂具濕土之質而有燥金之用所以主之癰腫疔瘡惡瘡頭瘍疥瘡等症皆濕氣鬱而為熱熱甚生毒之患石脂能燥

本草經讀

卷二

上品

五

濕化熱所以主之久服補髓益氣肥健不飢延年者濕去則津生自能補髓益氣補髓助精也益氣助神也精神交會於中土故有肥健不飢輕身延年之效也

禹餘糧氣味甘寒無毒主欬逆補中降氣不使上逆寒熱除滯之寒熱非謂可以煩滿性寒除熱即可以上煩下利赤白除濕熱通治寒熱煩滿質重降逆即可以津滿血閉癥瘕消濕熱所積大熱必甚此能除之鍊餌服之不飢其質類穀粉而補脾土所輕身延年補養後天以謂之糧而能充飢也

按李時珍曰生池澤者為禹餘糧生山谷者為太一餘糧本經雖分兩種而治體則同

髮髮氣味苦溫無毒主五癰關格不通利小便水道癰小兒驚大人瘧仍自還神化以皂莢水洗淨復用甘草水洗餘灰研極細用

陳修園曰心主血髮者血之餘也屬手少陰心經云腎之合骨也其榮髮也屬足少陰腎又云皮毛者肺之合也髮亦毛類屬手太陰肺肺為水源小腸為心府故主五癰關格不通水道不利等證調肺氣寧心神除心肺之痰故主小兒癰大人瘧等症其口仍自還神化者謂髮為血餘乃水精奉心化血所生今取以煉服仍能入

本草經讀

卷二

上品

五

至陰之藏助水精而上奉心藏之神以作其血也後人惑於以人補人之說每用紫河車增熱為害十服十死不如用此藥之驗

龍骨氣味甘平無毒主心腹鬼疰精物老魅欬逆洩痢膿血女子漏下癥瘕堅結小兒熱氣驚癇

陳修園曰龍得天地純陽之氣凡心腹鬼疰精物皆屬陰氣作祟陽能制陰也肝屬木而得東方之氣肝火乘於上則為欬逆奔於下則為洩痢膿血女下漏下龍骨能斂戢肝火故皆治之且其用變化莫測雖癥瘕堅結

難療亦能穿人而攻之至於驚癩顛癲皆肝氣上逆
挾痰而歸遊入心龍骨能斂火安神逐痰降逆故為驚
癩癩癲之聖藥仲景風引湯必是熟讀本經從此一味
悟出全方而神妙變化亦如龍之莫測余今詳註此品
復為之點睛欲飛矣之痰水也隨火而升龍屬陽而潛
於海能引逆上之火泛濫之水而歸其宅若與牡蠣同
用為治痰之神品今人只知其性濘以止脫何其淺也
阿膠氣味甘平無毒主心腹內崩勞極酒酒如瘧狀腰腹
痛四肢酸疼女子下血安胎久服輕身益氣
本草經讀

卷二 上品

二十六

陳修園曰阿膠以阿井之水入黑驢皮煎煉成膠也內
經云手少陰外合於濟水內合於心故能入心又云皮
毛者肺之合也以皮煎膠故能入肺味甘無毒得地中
正之上氣故能入脾凡心包之血不能散行經脈下入
於腹則為崩墜阿膠入心補血故能治之勞極氣虛皮
毛酒酒如瘧狀之先寒阿膠入肺補氣故能治之脾為
後天生血之本脾虛則陰血內枯腰腹空痛四肢酸疼
阿膠補養脾陰故能治之且血得脾以統所以有治女
子下血之效胎以血為養所以有安胎之效血足氣亦

充所以有輕身益氣之效也

東阿井在山東兗州府陽穀縣東北六十里即古之東
阿縣也此清濟之水伏行

中歷于里而發於此井其水較其旁諸水重十之一二
不等人之血脈宜服而不宜見宜沉而不宜浮以之製
膠正與血脈相宜也必用黑皮者以濟水合於心黑色
屬於腎取水火相濟之義也所以妙者驢亦馬類屬火
而動風肝為風臟而藏血今備驢皮動風之藥引入用
經又取阿水沉靜之性靜以制動俾風火熄而陰血生

卷二 上品

二十七

逆痰降此本經性與天道之言得聞文章之後猶難語
此况其下乎
白膠氣味甘平無毒主傷中勞絕腰痛羸瘦補中益氣婦
人血崩無子止痛安胎久服輕身延年
陳修園曰白膠即鹿角煎成膠何以本經白膠列為
上品鹿茸列為中品乎蓋鹿茸溫補過峻不如白膠之
甘平足貴也功川畧同不必再釋其主婦人血閉止痛
安胎者皆補衝脈血海之功也輕身延年者精足血滿
之效也

牛黃氣味苦平主驚癇寒熱盛狂症除邪逐鬼
麝香氣味辛溫無毒主辟惡氣殺鬼精物去二蟲蠱毒溫
症驚癇久服除邪不憂癩癧

麝香食相葉香草及蛇蠍其香在臍為諸香之冠香
者天地之正氣也故能辟惡而殺毒香能通達經絡故
能逐心竅凝痰而治驚癇驅募原邪氣以治溫處而歷
寐之證當熱寐之頃心氣閉塞而成麝香之香氣最盛
今閉者不閉塞者不塞則無此患矣○孕婦忌之

石蜜氣味甘平無毒主心腹邪氣諸驚癇瘧安五藏請不
本草經讀

卷二上品 三六

足益氣補中止痛解毒除眾病和百藥久服強志輕身不
飢不老

陳修園曰石蜜氣平稟金氣而入肺味甘無毒得土味
而入脾心腹者自心下以及大小腹與脇助而言也邪
氣者六淫之氣自外來七情之氣自內起非固有之氣
即為邪氣也其主之者甘平之用也諸驚癇瘧者厥陰
風木之為病也其主之者養胃和中所謂厥陰不治取
之陽明是也脾為五藏之本脾得補而安則五藏俱安
而無不足之患矣真氣者得於天而充於穀甘味益脾

即所以益氣而補中也止痛者味甘能緩諸急解毒者
氣平能勝諸邪也諸花之精華採取不遺所以能除眾
病諸花之氣味醞釀合一所以能和百藥也久服強志
輕身不飢不老者皆調和氣血補養精神之驗也

龜板氣味甘平無毒主漏下赤白破癥瘕瘵五痔陰蝕
濕痺四肢重弱小兒顛不合久服輕身不飢

陳修園曰龜甲諸家俱說大補真水為滋陰第一神品
而自余視之亦不盡然大抵介蟲屬陰皆能除熱生於
水中皆能利濕其甲屬金皆能攻堅此外亦無他長本

本草經讀

卷二上品 三六

經云主治漏下赤白者以淫熱為病熱勝於濕則漏下
赤色濕勝於熱則漏下白色龜甲皆除濕熱故能治之
也破癥瘕者其甲屬金全能攻堅也瘵瘵老瘵也瘵久
不愈濕熱之邪痼結陰分唯龜甲能入陰分而攻之也
火結大腸有生五痔濕濁下注則患陰蝕肺合大腸腎
主陰戶龜甲性寒以除其熱氣平以消其濕也脾主四
因濕成痺以致重弱龜居水中性能勝濕甲屬甲質
主堅強故能健其四肢也小兒顛骨不合腎虛之病龜
甲主骨故能合之也久服身輕不飢者言陰精充足之

效也

牡蠣氣味鹹平微寒無毒主傷寒寒熱溫虛酒酒驚志怒
氣除拘粉鼠瘻女子帶赤白久服強骨節殺邪鬼延年
陰則生搗用者煨過則成灰不能補陰矣方書注云服用
者皆取粉外治之法荒經者誤收遂相沿不改之者矣
陳修園曰牡蠣氣平者金氣也入手太陰肺經微寒者
寒水之氣也人膀胱經味鹹者其水之味也人足少陰
腎經此物得金水之性凡病起於太陽皆名曰傷寒傳
人少陽之經則為寒熱往來其主之者藉其得秋金之
氣以平水火之遊行也溫瘧者但熱不寒之瘧疾為陽

本草經讀 卷二 上品 三


明經之熱病酒酒者即陽明白虎證中背微寒惡寒之
義火欲發而不能往達也主以牡蠣者取其得金之氣
以解炎暑之苛白虎湯命名亦同此意也驚志怒氣其
主在心其發在肝牡蠣氣平得金之用以制木味鹹得
水之用以瀉火也拘者筋急緩者筋緩為肝之病鼠瘻
即瘰癧之別名為三焦膽經火鬱之病牡蠣之平以制
風寒以勝火鹹以堅所以咸主之止帶下赤白與強
骨節二句其明互見於龜板註中不贅殺鬼邪者補肺
而申其清肅之威能延年者補腎而得其益精之效也

神農本草經讀 卷二

桑螵蛸氣味鹹平主傷中疝瘕陰痿益精生子女子血閉
腰痛通五淋利小便水道

陳修園曰螵蛸蝗螂之子也氣平屬金味鹹屬水螵蛸
於諸蟲中其性最剛以其具金性能使肺之治節申其
權故主疝瘕女子血閉通五淋利小便水道也又具水
性能使腎之作強得其用故陰痿益精生子腰痛也其
主傷中者以其生於桑上得桑氣而能續傷也今人專
取其縮小便雖日能開而亦能閉然要其本性在此而
不在此

本草經讀 卷二 上品 三



神農本草經讀卷之三

闕吳航陳念祖修園甫著

男元豹道彪古愚全校字
元犀道照靈石

甲品

乾薑氣味辛溫無毒主胸滿欬逆上氣溫中止血出汗逐風濕痺腸澼下痢生者尤良

陳修園曰乾薑氣溫稟厥陰風木之氣若溫而不烈則得沖和之氣而屬土也味辛得陽明燥金之味若辛而不偏則金能生水而轉潤矣故乾薑為厥寒之要藥也

本草經讀

卷三

甲品

胸中者肺之分也肺寒則金失下降之性氣壅於胸中而滿也滿則氣上所以欬逆上氣之症生焉其主之者辛散溫行也中者土也土虛則寒而此能溫之止血者以陽虛陰必走得煖則血自歸經也出汗者辛溫能發散也逐風濕痺者治寒邪之陷於筋骨也治腸澼下痢者除寒邪之陷於腸胃也已上諸治皆取其雄烈之用如孟子所謂剛大浩然之氣塞乎天地之間也生則辛味渾全故又申言曰生者尤良即金匱治肺痿用甘草乾薑湯自注炮用以肺虛不能驟受過辛之味炮之使

辛味稍減亦一時之權宜非若炮黑炮灰全失薑之水性也葉天士亦謂炮黑入其陋歟

生薑氣味辛微溫無毒久服去臭氣通神明

陳修園曰凡藥氣溫屬厥陰風木大溫為熱屬少陰君火微溫稟春初之木氣則專入足少陽膽經也味辛屬陽明燥金大辛屬手太陰肺手陽明大腸微辛為土中之金則專入足陽明胃經也仲景桂枝湯等生薑與大棗同用者取其辛以和肺衛得棗之甘以養心營合之能兼調營衛也真武湯茯苓桂枝湯用之者以辛能利

本草經讀

卷三

甲品

肺氣氣行則水利汗止肺為水之上源也大小柴胡湯用之者以其為少陽本經之藥也吳茱萸湯用之者以其安陽明之氣陽明之氣以下行為順而嘔目止矣少陰之氣上交於陽明中土而利亦止矣凡此之類本經雖未明言而仲景於氣味中獨悟其神妙也久服去臭氣通神明者以臭氣為濁陰之氣神明為陽氣之靈言其有扶陽抑陰之效也今人只知其散邪發汗而不知其有匡正止汗之功
湯近效白朮湯輒疑生薑而妄去之皆讀書之過也又病家每遇方

中有生莖則曰素有血疾或曰曾患眼赤及喉痺等症不敢輕服是亦自置死地也又何怨哉

葱白氣味辛平無毒作湯治傷寒熱中風面目浮腫能出汗

陳修園曰葱白辛平發汗太陽為寒水之經寒傷於表則發熱惡寒得葱白之發汗而解矣風為陽邪多傷於上風勝則面目浮腫得葱白之發汗而消矣此猶人所易知也至於仲景通脈四逆湯面赤者加葱非取其引陽氣以歸根乎白通湯以之命名者非取其葉下之白

本草經讀

卷三 中品

三

領蓋附以入腎宮急救自利無脈命在頃刻乎二方皆回陽之神劑回陽先在固脫仲師豈反用發汗之品學者不參透此理總屬誤人之庸醫

當歸氣味苦溫無毒主欬逆上氣溫瘧寒熱洗洗在皮膚中婦人痛中絕子諸惡瘡瘍金瘡煮汁飲之

參路當歸氣溫稟木氣而入肝味苦無毒得火味而入心其主欬逆上氣者心主血而肝藏血血枯則肝木挾心火而刑金當歸入肝養血入心清火所以主之也肝為風心為火風火為陽陽盛則為但熱不寒之溫瘧而肺

受風火之邪肺氣怯不能為皮毛之主故寒熱洗洗在皮膚中當歸能令肝血足而風定心血足而火息則皮膚中之寒熱可除也肝主藏血補肝即所以止漏也手少陰脈動甚為有子補心即所以種子也瘡瘍皆屬心

火血足則心火息矣金瘡無不失血血長則金瘡瘳矣煮汁飲之四字別言先聖大費苦心謂中焦受氣取汁變化而赤是謂血當歸煮汁滋中焦之汁與地黃作湯同義可知時傳炒燥土炒反洵其自然之汁大失經旨芎藭氣味辛溫無毒主中風入腦頭痛寒痺筋攣緩急金

本草經讀

卷三 中品

四

瘡婦人血閉無子

陳修園曰芎藭氣溫稟春氣而入肝味辛無毒得金味而入肺風為陽邪而傷於上風氣通肝肝經與督脈會於巔頂而為病芎藭辛溫而散邪所以主之血少不能熱膚故生寒而為痺血少不能養筋故筋結而為攣筋縱而為緩筋縮而為急芎藭辛溫而活血所以主之治金瘡者以金瘡從皮膚以傷肌肉芎藭稟陽明金氣能從肌肉而達皮膚也婦人以血為主血閉不通則不生育芎藭辛溫通經而又能活血所以治血閉無子也

荊芥氣溫稟木氣而入肝膽味辛無毒得金味而入肺氣勝於味以氣為主故所主皆少陽相火厥陰風木之症寒熱往來風痲痺癱生瘡等症通少陽之為病也荊芥辛溫以發相火之鬱則病愈矣飲食入胃散精於肝肝不散精則氣滯而為積聚肝藏主血血隨氣而運行肝氣一滯則血亦滯而為瘀滯厥陰之為病也荊芥辛溫以達肝木之氣則病愈矣其除濕疸者以疸成於濕荊芥溫而兼辛辛入肺而瀉水道水道通則濕疸除矣今人炒黑則變為燥氣而不能達失其辛味而不能

本草綱目 卷三 中品

發且謂為產後常用之品味甚

麻黃氣味苦溫無毒主中風傷寒頭痛溫瘧發表出汗去

邪熱氣止欬逆上氣除寒熱破癥堅積聚去節

陳修園曰麻黃氣溫稟春氣而入肝味苦無毒得火味

而入心心主汗肝主疎洩故為發汗上藥其所主皆係

無汗之症太陽症中風傷寒頭痛發熱惡寒無汗而喘

宜麻黃以發汗但熱不寒名曰溫瘧熱甚無汗頭痛亦

宜麻黃以發汗欬逆上氣為下太陰之寒症發熱惡寒

為足太陽之表症亦宜麻黃以發汗即癥堅積聚為內

原缺

病亦係陰寒之氣凝聚於陰分之中曰積月累而漸成得麻黃之發汗從陰出陽則癥堅積聚自散凡此皆發汗之功也○根節古云止汗是引止汗之藥以達於表而速效非麻黃根節自能止汗舊解多誤

葛根氣味甘辛平無毒主消渴身大熱嘔吐諸痺起陰氣解諸毒○葛穀氣平味甘無毒主下利十歲以上

葉天士曰葛根氣平稟天秋平之金氣入于大陰肺金味甘辛無毒得地金土之味入足陽明燥金胃其土潤渴者辛甘以升騰胃氣氣上則津液生也其主身大熱

本草經讀

卷三

中品

七

者氣平為秋氣秋氣能解大熱也脾有濕熱則壅而嘔吐葛根味甘升發胃陽胃陽鼓動則濕熱下行而嘔吐止矣諸痺皆起於氣血不流通葛根辛甘和散氣血活諸痺自愈也陰者從陽者也人身陰氣脾為之原脾與胃合辛甘入味鼓動胃陽陽健則脾陰亦起也甘者土之沖味平者金之和氣所以解諸毒也

張隱菴曰元人張元素謂葛根為陽明仙藥若太陽初病用之反引邪入陽明等論皆臆說也余讀仲祖傷寒論方有葛根湯治太陽病項背几几又治太陽與陽明

合病若陽明本病止有白虎承氣諸湯並無葛根湯證况葛根主宣通經脈之正氣以散邪豈反引邪內入耶前人學不明經屢為異說李時珍一概收錄不加辯正學者看本草發明當合經論察究庶不為前人所誤黃芩氣味苦寒無毒主諸熱黃疸腸澼洩痢逐水下血閉惡瘡疽蝕火瘍

陳修園曰黃芩與黃連黃蘗皆氣寒味苦而色黃主治大暑相似大抵氣寒皆能除熱味苦皆能燥濕色黃者皆屬於上黃而明亮者則屬於金金借土之色以為色

本草經讀

卷三

中品

八

故五色以黃金為貴也但黃芩中空似腸胃腸為手陽明胃為足陽明其主諸熱者指腸胃諸熱病而言也黃疸為大腸經中之鬱熱腸澼洩痢者為大腸腑中之鬱熱逐水者逐腸中之水下血閉者攻腸中之蓄血惡瘡疽蝕火瘍者為肌肉之熱毒陽明主肌肉濕陽明之火即所以解毒也本經之言主治如此仲景於少陽經用之於心下悸易茯苓於腹痛易芍藥又於本經言外別有會悟也

凡參氣味苦微寒無毒主腹中寒熱積聚女子產乳餘疾

補腎氣令人明目

陳修園曰元參所以治腹中諸疾者以其取腎氣上交於肺得水天一氣上下環轉之妙用也張隱菴詮解甚妙詳於丹參註中共云主產乳餘疾者以產後脫血則陰衰而火無所制治之以寒涼既恐傷中加以以滋補又恐拒隔惟元參清而帶微補故為產後要藥令人明目者黑水神光屬腎補腎自能明目也
丹參氣味苦微寒無毒主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱積聚破癥除瘕止煩滿益氣

本草經疏 卷三 中品 九

張隱菴曰丹參元參皆氣味苦寒而得少陰之氣化但元參色黑稟少陰寒水之精而上通於天丹參色赤稟少陰君火之氣而下交於地上下相交則中土自和故元參下交於上而治腹中寒熱積聚丹參上交於下而治心腹寒熱積聚君火之氣下交則土溫而水不泛溢故治腸鳴幽幽如走水破癥除瘕者治寒熱之積聚也止煩滿益氣者治心腹之邪氣也夫止煩而治心邪止滿而治腹邪益正氣所以治邪氣也
陳修園曰今人參一味丹參功兼曰物湯共認為補血

行血之品為女科之尚藥而丹參之真功用掩矣
丹皮氣味辛寒無毒主寒熱中風癰瘕驚癇邪氣除癥堅瘀血醫舍腸胃安五藏療癰疽

陳修園曰丹皮氣寒稟水氣而入腎味辛無毒得金味而入肺心火具炎上之性火鬱則寒火發則熱丹皮稟水氣而制火所以主之肝為風臟中風而害其筋則為癰瘕中風而亂其魂則為驚癇丹皮得金味以平肝所以主之邪氣者風火之邪也邪氣動血則舍腸胃瘀積癥堅丹皮之寒能清熱辛能散結可以除之肺為五臟

本草經疏 卷三 中品 十

之長肺安而五臟俱安癰瘕皆屬心火心火降而癰瘕可療
防己氣味辛平無毒主風寒濕痺熱氣諸癰除熱利大小便
述防己氣平稟金之氣味辛無毒得金之味入乎太陰肺經風寒濕痺者感風寒而患也熱不寒之瘧也而氣諸癰者心有熱而患牛馬猪羊鷄諸癰也濕熱皆為陽邪癰瘕皆屬風水防己辛平可以統治之除邪者又申言可除已上之邪氣也肺為水之上源又與大腸為表

裏防已之辛平調肺氣則二便利矣

張隱菴曰經云水道不行則形消氣索是水有隨氣而運行於膚表者有水火上下之相濟者如氣滯而水不行則為水病痰病矣防已生於漢中者破之紋如車輪莖籐空通至通氣行水以防已土之制故有防已之名金匱方治水病有防已黃耆湯防已茯苓湯治痰病有本防已湯防已加茯苓芒硝湯千金治遺尿小便澀有三物本防已湯蓋氣逆於上而水能就下也而李東垣有云防已乃下焦血分之藥病在上焦氣分者禁用又

本草經讀

卷三

中品

十一

云如險健之人幸災樂禍首為亂階善者用之亦可敵兇突險此顯眩之藥故聖人存而不廢意如此議論不知從何處察出夫氣化而後水行防已乃行氣利水之品反云上焦氣分不可用何不通之甚乎防已能運行去病是運中有補本經列於中品之前奚為存而不廢緣其富而貪各無格物實學每為臆說使後人遵之如格言畏之若毒藥非古人之罪人乎李時珍乃謂千古而下惟東垣一人誤矣嗟嗟安得伊賈人再世更將經旨復重宜也

狗脊氣味苦平主腰背強關機緩急周痺寒濕膝痛頰利老人

秦艽氣味苦平無毒主寒熱邪氣寒濕風痺肢節痛下水利小便

張隱菴曰秦艽氣味苦平色如黃土羅紋交斜左右旋轉稟天地陰陽交感之氣蓋天氣左旋右轉地氣右旋左轉左右者陰陽之道路主治寒熱邪氣者地氣從內以出外陰氣外交於陽而寒熱邪氣自散矣治寒濕風痺肢節痛者天氣從外以入內陽氣內交於陰則寒濕

本草經讀

卷三

中品

十二

風三邪合而成痺以致肢節痛者可愈也地氣運行則水下天氣運行則小便利

紫苑氣味苦溫無毒主欬逆上氣胸中寒熱結氣去蠱毒瘰癧安五藏

張隱菴曰紫者黑赤之間色也黑赤水火之色也紫苑氣味苦溫稟火氣也其質陰柔稟水氣也主治欬逆上氣者散太陽寒水之氣從皮毛而合肺也治胸中寒熱結氣者助少陰火熱之氣通利三焦而上達也蠱毒在痺屬土火能生土故去蠱毒瘰癧在筋屬木水能生木

故去瘵覺水火者陰陽之徵兆也水火交則陰陽合故安五臟

知母氣味苦寒無毒主消渴熱中除邪氣肢體浮腫下水補不足益氣

葉天士曰知母氣寒稟水氣而入腎味苦無毒得火味而人心腎屬水心屬火水不制火火燥津液則病消渴火薰五內則病熱中其主之者苦清心火寒滋腎水也除邪氣者苦寒之氣味能除燥火之邪氣也熱勝則浮火勝則腫苦能清火寒能退熱故主肢體浮腫也腎者

本草經疏

卷三

中品

三

水藏其性惡燥燥則開合不利而水反著矣知母寒滑滑利關門而水自下也補不足者苦寒補寒水之不足也益氣者苦寒益五臟之陰氣也摠按金匱有桂枝芍藥知母湯治肢節痺痛身體在羸脚腫如脫可知長沙諸方皆從本經來也

貝母氣味辛平無毒主傷寒煩熱淋瀝邪氣疝痛喉痺乳難金瘡風莖

陳修園曰貝母氣平味辛氣味俱屬於金為手太陰手陽明藥也其主傷寒煩熱者取西方之金氣以除酷熱

傷寒論以白虎湯命名亦此義也其主淋瀝邪氣者肺之治節行於膀胱則邪熱之氣除而淋瀝愈矣痲瘋為肝木受病此則金平木也喉痺為肺氣內閉此能宣通肺氣也乳少為陽明之汁不通金瘡為陽明之經肺受傷風痲為陽明之宗筋不利貝母清潤而除熱所以統治之今人以之治痰嗽大失經旨且李士材謂貝母主燥痰半夏主濕痰二物如水炭之反皆臆說也括樓根氣味苦寒無毒主消渴身熱煩滿大熱補虛安中續絕傷

本草經疏

卷三

中品

三

陳修園曰括樓根氣寒稟天冬寒之水氣而入腎與膀胱味苦無毒得地南方之火木而人心火盛燥液則消渴火浮於表則身熱火盛於裏則煩滿大熱火盛則陰虛陰虛則中失守而不安括樓根之苦寒清火可以緩主之其主續絕傷者以其蔓延能通陰胎而續其絕也實名括樓金匱取治胸痺傷寒論取治結胸蓋以能開胸前之結也

張隱菴曰半夏起陰氣於脈外上與陽明相合而成火上之燥花物起陰津於脈中天癸相合而能滋其燥金

傷寒金匱諸方用半夏以助陽明之氣滿者燥熱太過
即去半夏易花粉以滋之聖賢立方加減必携用理所
以然

芍藥氣味苦平無毒主邪氣腹痛除血痺破堅積寒熱痢
瘕止痛利小便益氣

陳修園曰芍藥氣平是夏花而稟燥金之氣味苦是得
少陰君火之味氣平下降味苦下泄而走血為攻下之
品非補養之物也邪氣腹一小便不利及一切諸痛皆
氣滯之病其主之者以苦平而泄其氣也血痺者血閉

本草經讀

卷三

中品

五

而不行甚則為寒熱不調堅積者積久而堅實甚則為
痼癥滿痛皆血滯之病其主之者以苦平而行其血也
又云益氣者謂邪氣得攻而淨則元氣自然受益非謂
芍藥能補氣也今人妄改聖經以酸寒二字易苦平誤
認為微陰之品殺人無算試取芍藥而嚼之酸味何在
乎張隱菴云赤芍白芍花異而根無異今肆中一種赤
芍藥不知何物之根為善殊甚

木通氣味辛平無毒主除脾胃寒熱通利九竅血脈關節
人不忘去惡蠱木通本經名通草陳士良撰食性本草
改為木通今復有所謂通草即古之通

此木也與

張隱菴曰木通藤葛空通其色黃白氣味辛平稟土金
相生之氣化而為通關利竅之藥也稟土氣故除脾胃
之寒熱藤葛空通故通利九竅血脈關節血脈通而關
竅利則令人不忘真金氣故去惡蠱○防己木通皆屬
空通葛草防己取用在下之根則其性自下而上從內
而外木通取用在上之莖則其性自上而下自外而內
花根升稔降一定不易之理後人用之主利小便須知
小便之利亦必上而後下外而後內也

本草經讀

卷三

中品

六

白芷氣味辛溫主女人漏下赤白血崩陰腫寒熱風頭侵
目淚出長肌膚潤澤可作面脂苦參氣味苦寒主心腹結
氣癥瘕積聚黃疸滿有餘滯逐水除癰腫補中明目止淚
徐靈胎曰此以味為治也苦入心寒除火故苦參專治
心經之火與黃連功用一近但黃連似去心藏之火為
多苦參似去心府小腸之火為多則以黃連之氣味清
而苦參之氣味濁也按補中二字亦取其
苦以燥脾之義也

水萍氣味辛寒主暴熱故能除熱身癢浮熱在下水氣入
水不濡故能消水勝酒酒氣散矣長鬚髮益皮毛至消渴得水氣

久服輕身亦如萍之輕也

徐靈胎曰水萍生於水中而能除水上且其葉入水不濡是其性能敵水者也故凡水溼之病皆能治之其根不著上而上浮水面故又能主皮毛之疾

欬冬花氣味辛溫無毒主欬逆上氣善喘喉痺諸驚癩寒熱邪氣

張隱菴曰欬冬生於水中花開紅白氣味辛溫從陰出陽蓋泉水中之生陽而上通肘金之藥也太陽寒水之氣不從皮毛外交於肺則欬逆上氣而善喘欬冬稟水

本草經讀

卷三

上品

七

氣而通肺故可治也厥陰少陽水火之氣結於喉中則為喉痺欬冬得金水之氣金能平木水能制火故可治也驚癩寒熱邪氣為病不止一端故曰諸驚癩寒熱邪氣欬冬稟太陽寒水之氣而上行外達則陰陽水火之氣自相交會故可治也

厚朴氣味苦溫無毒主中風傷寒頭痛寒熱驚悸氣血痺死肌去二蟲生用則解肌而達表炙香則連上而助肺

陳修園曰厚朴氣溫稟木氣而入肝味苦無毒得火味而人心然氣味厚而主降降則溫而專於散苦而專於

泄故所主皆為實症中風有便溺阻隔症傷寒有下之微喘症有發汗後腹脹滿症大便鞭症頭痛有濁氣上冲症俱宜主以厚朴也至於溫能散寒苦能泄熱能散能泄則可以解氣逆之驚悸能散則氣行能泄則血行故可以治氣血痺及死肌也三蠱本濕氣所化厚朴能散而泄之則三蠱可去也雷腹下氣經無明文仲景因其氣味苦溫而取用之得本經言外之旨也

厄子氣味苦寒無毒主五內邪氣胃中熱氣面赤酒飽皸鼻白癩赤癩瘡瘍

本草經讀

卷三

中品

六

陳修園曰梔子氣寒稟水氣而入腎味苦得火味而入心五內邪氣五藏受熱邪之氣也胃中熱氣胃經熱煩懊懷不眠也心之華在面赤則心火盛也鼻屬肺酒飽皸鼻金受火尅而色赤也白癩為濕赤癩為熱瘡瘍為心火梔子下稟寒水之精上結君火之實能起水陰之氣上滋復導火熱之氣下行故統主已上諸症唯生用之氣性尚存若炒黑則為死灰無用之物矣仲景梔子豉湯用之者取其交媾水火調和心腎之功加香豉以引其吐非厄子能涌吐也俗本謂梔子生用則吐炒黑

則不吐何其陋歟按仲景云舊有微澁者勿用

枳實氣味苦寒無毒主去風在皮膚中如麻豆苦痒除寒熱結止痢長肌肉利五藏益氣

張隱菴曰枳實氣味苦寒冬不落葉稟少陰標本之氣化臭香形圓花白多刺穰內黃白又得陽明金土之氣化主治大風在皮膚中如麻豆苦痒者得陽明金氣而制風稟少陰水氣而清熱也除寒熱結者稟少陰火熱之氣而除寒標陰之氣而除熱也止痢長肌肉者得陽明中土之氣也五藏發原於先天之少陰生長於後天

本草經讀 卷三 中品 九

之陽明故王利五藏得少陰之陰故益氣得陽明之氣故輕身○仲祖本論有大承氣湯用炙厚朴炙枳實小承氣湯用生厚朴生枳實生熟之間有意存焉學者不可不察按本經有枳實無枳殼唐開寶始分之然枳殼即枳實之大者性宜發而氣散不如枳實之完結然既是一種亦不必過分

黃蘗音百俗作黃栢省筆之譌氣味苦寒無毒主五藏腸胃中結熱黃疽腸痔止洩利女子漏下赤白陰陽蝕瘡

陳修園曰黃蘗氣寒稟天冬寒之水氣味苦無毒得地

南方之火味皮厚色黃得太陰中土之化五藏為陰凡

經言主五藏者皆主陰之藥也治腸胃中熱結者寒能清熱也治黃疸腸痔者苦能勝濕也止洩利者溼熱洩痢唯苦寒能除之而且能堅之也女子脂漏下血因血熱妄行亦白帶下及陰戶傷蝕成瘡皆因濕熱下注黃蘗寒能清熱苦可燥濕所以主之然皆正氣未湯熱毒內盛有餘之病可以暫用否則不可姑試也凡藥之燥者未有不熱而寒者未有不濕黃栢於清熱之中而兼燥濕之效

本草經讀 卷三 中品 十

山茱萸氣味酸平無毒主心下邪氣寒熱温中逐寒濕痺去三蟲久服輕身去核

陳修園曰山萸色紫赤而味酸平稟厥陰少陽木火之氣化手厥陰心包足厥陰肝皆屬於風木也手少陽三焦足少陽膽皆屬於相火也心下巨關穴乃手厥陰心包之募又心下為脾之分曰邪氣者脾之邪實為肝木之邪也足厥陰肝木血少氣亢則剋脾土并於陽則熱并於陰則寒也又寒熱往來為少陽之病山萸稟木火之氣化故威主之山萸味酸收斂斂水歸於下焦火在

下謂之少火少火生氣所以溫中山莢味酸入肝肝主藏血血能充膚熱肉所以逐周身寒濕之痺三疊者厥陰風木之化也仲景烏梅丸之酸能治虻厥即此物性出肝者故也生氣生血之藏也孫真人生脈散中有五味之酸能治倦怠而輕身亦從此物悟出

張隱菴曰仲祖八味丸用山茱萸後人去桂附改為六味丸以山茱萸為固精補腎之藥此外並無他用皆因安於苟簡不深計故也今詳觀本經山茱萸之功能如此學者能於本經之內含悟而廣其用庶無拘隘之

本草經讀

卷三 中品

三

藥

吳茱萸氣味辛溫有小毒主溫中下氣止痛又除濕血痺逐風邪開腠理欬逆寒熱用

陳修園曰吳茱萸氣溫稟春氣而入肝味辛有小毒得全味而入肺氣溫能驅寒而大辛之味又能俾肺令之獨行而無所旁掣故中寒可溫氣逆可下胸腹諸痛可止皆肺令下行坐鎮而無餘事仲景取治陽明食穀欲吐症及乾嘔吐涎沫症從本經而會悟天言外之旨也肺喜溫而惡寒一得茱萸之大溫大辛則水道通調而

濕去肝藏血血寒則滯而成痺一得茱萸之大辛大溫則血活而痺除風邪傷人則腠理閉而為寒熱欬逆諸症茱萸大辛大溫開而逐之則欬逆寒熱諸症俱平矣然猶有疑者仲景用藥悉遵本經而少陰病吐利手足逆常煩煩欲死者吳茱萸湯主之二十字與本經不符而不知少陰之臟皆木陽明水穀以資生而復交會於中土若陰陽之氣不歸中土則上吐而下利水火之氣不歸中土則下燥而上煩中土之氣內絕則四肢逆冷而過肘膝法在不治仲景取吳茱萸大辛大溫之威烈

本草經讀

卷三 中品

三

佐人參之沖和以安中氣蘊棗之和胃以行四末專求陽明是得絕處逢生之妙張隱菴葉天士之解俱淺

杏仁氣味甘苦溫冷利有小毒主欬逆上氣雷鳴喉痺不氣淫乳金瘡寒心奔豚湯泡去皮尖雙仁者大湯勿用

陳修園曰杏仁氣味甘苦其實苦重於甘其性帶濕其質冷利冷利者滋潤之意也下氣二字足以盡其功用肺貴而膜則為欬逆上氣雷鳴喉痺者火結於喉為痺痛痰聲之響如雷鳴也杏仁下氣所以至之氣有餘便是火氣下即火下故乳汁可通瘡口可合也心陽虛則

寒水之邪白下上奔犯於心位杏仁有下氣之功伐寒水於下即所以保心陽於上也凡此皆治有餘之症若勞傷咳嗽之人服之必死時醫謂產於吠噎者味純甘可用而不知純甘非杏仁之正味既無苦降之功徒存其濕以生痰甘以壅氣陰受其害至死不悟惜哉

烏梅氣味酸溫平澀無毒主下氣除熱煩滿安心止肢體痛偏枯不仁死肌去青黑痣蝕惡肉

陳修園曰烏梅氣平稟金氣而入肺氣溫稟木氣而入肝味酸無毒得木位而入肝味澀即酸之變味也味勝

本草經讀
卷三
於氣以味為主梅得東方之味放花於冬成熟於夏是稟冬令之水精而得春生之氣而上達也其下氣者生氣上達則逆氣自下矣熱煩燥心不安傷寒論厥陰症以氣上撞心心疼熱等字該之能下其氣而諸病皆愈矣脾主四肢木氣尅土則肢體痛肝主藏血血不灌溉則偏枯不仁而為死肌烏梅能和肝氣養肝血所以主之去青黑痣及蝕惡肉者酸收之味外治能青痣與肉也張隱菴云後人不體經義不窮物理但以烏梅為酸收收瀉之藥而春主上達之性未之講也惜哉

犀角氣味苦酸鹹寒無毒主百毒蠱疰邪鬼瘴氣解鉤吻

犀角氣味苦酸鹹寒無毒主百毒蠱疰邪鬼瘴氣解鉤吻
陳修園曰犀角氣寒稟水之氣也味苦酸鹹無毒得木火水之味也主百毒蠱注邪鬼瘴氣者以犀為靈異之獸借其靈氣以辟邪也解鉤吻蠱疰邪毒者以牛屬土而犀居水得水上之精游物投水土中而俱化也不迷惑履寐輕身者言水火既濟之效也今人取治血症與經目不合

鹿茸角氣味鹹寒無毒主明目益氣起陰去惡血注下辟

本草經讀
卷三
蠱毒惡鬼不祥常不履寐
鹿茸角氣味鹹寒無毒主明目益氣起陰去惡血注下辟
鹹寒以補水水足則目明也益氣者水能化氣也起陰者陰器為宗筋而屬肝肝為木木得烈日而萎得雨露挺也味鹹則破血故主去惡血氣寒則清熱故止注下也蠱毒為濕熱之毒也鹹寒可以除之辟惡鬼不祥常不夢履寐者誇其靈異通神之妙也

神農本草經讀卷之三終

神農本草經讀卷之四

固本航陳念祖修周甫著

男元豹道彪古鼎全校字

中品

鹿茸氣味甘溫無毒主補下惡血寒熱驚瀾益氣壯志生齒不老

陳修園曰鹿為仙獸而多壽其臥則口鼻對尾固以通督脈督脈為通身骨節之主腎主骨故又能稱腎腎得其補則志强而齒固以志藏於腎齒為骨餘也督得其

本草經讀 卷四 中品

補則大氣升舉惡血不漏以督脈為陽氣之總督也然角中皆血所貫衝為血海其大補衝脈可知也凡驚瀾之病皆挾衝脈而作陰氣虛不能寧謐於內則跗陽而上升故上熱而下寒陽氣虛不能周衛於身則隨陰而下陷故下熱而上寒鹿茸入衝脈而大補其血所以能治寒熱驚瀾也至手長而為角別錄謂其主惡瘡逐惡氣以一點胚血發洩七盡只有拓毒消放之功也
髓甲氣味酸平無毒主心腹癥瘕堅積寒熱去痞疾蝕肉陰蝕痔核惡肉

述髓甲氣平稟金氣而入肺味鹹無毒得水味而入腎心腹者合心下大腹小腹以及脇肋而言也癥瘕堅硬之積致發寒熱為厥陰之肝氣凝聚髓甲氣平可以制肝味鹹可以更堅所以主之也痞者肝氣滯也鹹平能制肝而更堅故亦主之蝕肉陰蝕痔核惡肉一生於鼻鼻者肺之竅也一生於二便二便者腎之竅也入肺腎而軟堅所以消一切惡毒也

白蠟氣味鹹辛平無毒主治小兒驚癇夜啼去三蟲滅黑點令人面色好男子陰痿病凡稟金氣色口之藥俱不宜炒

本草經讀 卷四 中品

述蠶蠶氣平為秋氣味辛為金味味鹹為水味稟金水之精也治驚癇者金能平木也治夜啼者金屬乾而主天天運旋轉晝開夜闔也殺三蟲者蠶為風木所化金主肅殺也滅黑點令人面色好者脾水氣上滋也治男子陰痿者金能制風鹹能除痿也
徐靈胎曰蠶蠶感風而殭凡風氣之疾皆能治之蓋借其氣以相感也○或問因風以殭何以反能治風曰邪之中人也有氣而無形穿經透絡愈久愈深以氣類相反之藥投之則拒而不入必與之同類者和人諸藥使

爲神道則藥力至於病所而邪與藥相從藥性漸發或從毛孔出或從二便出不能復留矣此卽從治之法也風寒暑濕莫不皆然此神而明之道不專恃正治奏功矣

寒熱 陳修園曰：小兒驚癇夜啼癲病，氣味鹹寒，主小兒驚癇夜啼癲病。

陳修園曰：蚱蟬氣寒，稟水氣味鹹，得水味而要其感涼風清露之氣，以生得金氣最全。其主小兒驚癇者，金能平木也。蚱蟬日出有聲，日入無聲，故止夜啼也。癲病寒

本草經讀 卷四 中品 三

熱者肝膽之風火也。蚱蟬具金水之氣，金能制風水能制火，所以主之。

張隱菴曰：蟬脫蠶皆稟金水之精，故本經主治大體相同。但蟬飲而不食，溺而不糞，蠶食而不飲，糞而不飲，何以相同？經云：飲入於胃，上歸於肺，穀入於胃，乃傳之肺。是飲食雖殊，皆由肺氣之通調，則尿糞雖異，皆稟肺氣以傳化矣。

石膏氣味辛微寒，無毒，主口風寒，熱心下逆，氣驚，而口乾，古焦不能息，腹中堅痛，除邪鬼，產乳，金瘡。

陳修園曰：石膏氣微寒，稟太陽寒水之氣，味辛無毒，得陽明燥金之味，風爲陽邪，在太陽則惡寒發熱，然必審其無汗煩燥而喘者，可與麻桂並用；在陽明則發熱而微惡寒，然必審其口乾舌焦大渴而自汗者，可與知母同用。曰：心下氣逆，卽傷寒論氣逆欲嘔之互詞。曰：不能息，卽傷寒論虛羸少氣之互詞。然必審其爲解後裏氣虛而內熱者，可與人參竹葉半夏麥冬甘草粳米同用。腹中堅痛，陽明燥甚而堅，將至於胃實不大便之症，邪鬼者，陽明邪實妄言妄見，或無故而生，驚若邪鬼附之。

本草經讀 卷四 中品 四

石膏清陽明之熱，可以統治之。陽明之脈從缺盆下乳，石膏能潤陽明之躁，故能通乳。陽明主肌肉，石膏外糝，又能愈金瘡之潰爛也。但石品見火則成石灰，今人畏其寒而燬用，則大失其本來之性矣。

下品

附子氣味辛溫，有大毒，主風寒，欬逆，邪氣，溫中，金瘡，破癥，堅積，聚血，瘕寒，濕痿，攣拘，癱瘓，痛不能行步。以刀削去皮，西塊，湯液水微溫泡三日，一日一換，去鹽味，晒半燥，剖十六塊於銅器炒熟用之。近世以便者之非法也。耶。陳修園曰：素問謂以毒藥攻邪，是回生妙手，後人立補。

養等法是稜巧術究竟攻其邪而正氣復是攻之即所以補之也附子味辛氣溫火性迅發無所不到故為回陽救逆第一品藥本經云風寒救逆邪氣是寒邪之逆於上焦也寒濕痿痺拘攣膝痛不能行步是寒邪著於下焦筋骨也癰堅積聚血瘕是寒氣凝結血滯於中也攷大觀本效逆邪氣句下有溫中金瘡四字以中寒得煖而溫血內得煖而合也大意上而心肺下而肝腎中而脾胃以及血肉筋骨營衛因寒濕而病者無有不宜即陽氣不足寒自內生大汗大瀉大喘中風卒倒等

本草經讀

卷四 中品

五

症亦必仗此大氣大力之品方可挽回此本經言外意也

又曰附子主寒濕諸家似能解到而仲景用之則化而不可知之謂神且夫人之所以生者陽也亡陽則死亡字分二字一無方切音亡逃也即春秋傳出亡之義也一微夫切音无無也論語亡而為有孟子問有餘曰亡矣之義也誤藥大汗不止為亡陽如唐幸幸獨仲景用四逆湯真武湯等法以迎之吐利厥冷為亡陽如周之守府仲景用通脈四逆湯薑附湯以救之且太陽之標

陽外呈而發熱附子能使之交於少陰而熱已少陰之神機病附子能使自上而上而脈生周行通達而厥愈合苦甘之芍藥而補虛合苦淡之苓芍而溫固元妙不能盡述按其立法與本經之說不同豈仲景之叛見歟然本經謂氣味辛溫有大毒七字仲景即於此悟出附子大功用溫得東方風木之氣而溫之至則為熱內經所謂少陰之上君火至之是也辛為西方燥金之味而辛之至則反潤內經所謂辛以潤之是也凡物性之偏處則毒偏而至於無可加處則大毒因大毒二字知附

本草經讀

卷四 中品

六

子之溫為至極辛為至極也仲景用附子之溫有二法雜於苓詭甘草中雜於地黃澤瀉中如冬日可愛補虛法也佐以薑桂之熱佐以麻辛之雜如夏日可畏救陽法也用附子之辛亦有二法桂枝附子湯桂枝附子去桂加白朮湯甘草附子湯辛燥以祛除風濕也附子湯芍藥甘草附子湯辛潤以溫補水臟也若白通湯通脈四逆湯加人尿豬膽汁則取西方秋收之氣保復元陽則有大封大固之妙矣後世虞天民張景岳亦極贊其功然不能從本經中細釋其義以圖發經方之妙徒逞

臍說以極贊之反爲蛇足矣

半夏氣味辛平有毒主傷寒熱心下堅胸脹欬逆眩暈咽喉腫痛腸鳴下氣止汗

陳修園曰半夏氣平稟天秋金之燥氣而入手太陰味辛有毒得地西方酷烈之味而入手足陽明辛則能開諸結平則能降諸逆也傷寒寒熱心下堅者邪結於半表半裏之間其主之者以其辛而能開也胸脹欬逆附喉腫痛頭眩上氣者邪逆於巔頂胸膈之上其主之者以其平而能降也腸鳴者大腸受濕則腸中切痛而鳴

本草經疏

卷四 中品

七

濯濯也其主之者以其辛平能燥濕也又云止汗老另著其辛中帶澁之功也仲景於小柴胡湯用之以治寒熱瀉心湯用之以治胸滿腸鳴少陰咽痛亦川之金匱頭眩亦用之且嘔者必加此味大得其開結降逆之旨用藥悉遵本經所以爲醫中之聖

又曰今人以半夏功專祛痰概用白礬煮之服者往往致吐且致酸心少食製法相沿之陋也古人只用湯洗七次去澁今人畏其麻口不敢從之余每年收乾半夏數十斛洗去粗皮以生薑甘草水浸一日夜洗淨又

用河水浸三日一日一換攪起蒸熟曬乾切片隔一年用之甚效蓋此藥具太陰陽明少陽之大藥祛痰却非專長故仲景諸方加瀉俱云嘔者加半夏痰多者加茯苓未聞以痰多加半夏也

大黃氣味苦寒無毒主下瘀血血閉寒熱破癥瘕積聚留飲宿食蕩滌腸胃推陳致新通利水穀調中化食安和五臟

陳修園曰大黃色正黃而臭得土之正氣正色故專主脾胃之病其氣味苦寒故主下泄凡血瘀而閉則爲

本草經疏

卷四 下品

八

寒熱腹中結塊有形可徵曰癥忽聚忽散曰瘕五臟爲積六府爲聚以及留飲宿食得大黃攻下皆能已之自游蕩腸胃下五句是申明大黃之效末一句是總結上四句又大申大黃之奇效也意謂人只知大黃游蕩腸胃功在推陳抑知推陳即所以致新乎人知大黃通利水穀功在化食抑知化食即所以調中乎且五臟皆稟氣於胃胃得大黃運化之力而安和而五臟亦得安和矣此本經所以有黃良之名也

用生用者有
用清酒洗者
桃仁氣味苦甘平無毒主瘀血血閉癥瘕邪氣殺小蟲

陳修園曰桃仁氣平為全氣味苦為火味味甘為土味所以瀉多而補少者以氣平主降味苦主洩甘味之少不能與之為敵也

徐靈胎曰桃得三月春和之氣以生而花色最鮮明似血故凡血鬱血結之疾不能調和暢達者此能入於其中而和之散之然其生血之功少而去瘀之功多者何也蓋桃核本非血類故不能有所補益若瘀瘕皆已敗之血非生氣不能流通極之生氣皆在於仁而味苦又

本草經讀 卷四下

九

能開洩故能逐舊而不傷新也

旋覆花氣味鹹溫有小毒主結氣脇不澁驚悸除水去五藏間寒熱補中益氣

陳修園曰旋覆花氣溫稟風氣而主散味鹹得水味潤下而更堅味勝於氣故以味為主唯其更堅故結氣脇下滿等症皆能已之唯其潤下故停水驚悸及五藏鬱滯而生寒熱等證皆能已之藉鹹降之力上者下之水氣行痰氣消而中氣自然受補矣本經名金沸草爾雅如金錢菊相傳葉上露水滴地即生

桔梗氣味辛微溫有小毒主胸脇痛如刀刺腹滿腸鳴幽咽驚恐悸氣

張隱菴曰桔梗治少陽之脇滿上焦之胸痺中焦之腸鳴下焦之腹滿又驚則氣上恐則氣下悸則動中是桔梗為氣分之藥上中下皆可治也張元素不察經義謂桔梗乃舟楫之藥載諸藥而不沉今人熟念在口終身不之以元素杜撰之言為是則本經幾可廢矣醫門豪傑之士能明神農之本經軒岐之靈素仲祖之論畧則千百方書皆為糟粕設未能也必為方書所囿而蒙蔽

本草經讀 卷四下

十

一生矣可畏哉

葶藶味苦寒主癥瘕積聚結氣水飲所結之疾飲食寒熱破堅逐邪亦皆水通利水道肺氣降則水道自通

徐靈胎曰葶藶滑潤而香專瀉肺氣肺為水源故能瀉肺即能瀉水凡積聚寒熱從水氣來者此藥主之○大黃之瀉從中焦始葶藶之瀉從上焦始故傷寒論中承氣湯用大黃而陷胸湯用葶藶也

連翹氣味苦平主寒熱風痺痺癰腫惡瘡癭瘕結熱毒

夏枯草氣味苦辛寒上寒熱瘰癧鼠瘻疔瘡破癥散癭結
氣脚腫濕痺輕身

代赭石氣味苦寒無毒主鬼疰賊風蠱毒殺精物惡鬼腸
中毒邪氣女子赤沃漏下

〔述〕代赭石氣寒入腎味苦無毒入心腎為坎水代赭氣
寒益腎則腎水中一陽上升心為離火代赭味苦益心
則心火中一陰下降水升火降陰陽互藏其室而天地
位矣故凡疰賊風精魅惡鬼以及蠱毒腹中邪毒皆可
主之腎主二便心主血血熱則赤沃漏下苦寒清心心

神農本草經讀 卷四 下 十一

腎相交所以主女子赤沃漏下仲景代赭旋覆花湯用
之極少後人昧其理而重用之且賴之以鎮納諸氣皆
荒經之過也

本草附錄

附錄

別錄○唐本草○拾遺○藥性○海藏○蜀本○開寶

○圖經○日華○補遺

○何首烏氣味苦溫無毒主瘰癧消癰腫瘰癧頭面風瘡治
五痔止心痛益血氣黑髮悅顏色久服長筋骨益精神

延年不老亦治婦人產後及帶下諸疾

陳修園曰後世增入藥品余多置而弗論唯何首烏於
入瘧人痢多取用之蓋瘧少陽之邪也久而不愈少陽
之氣憤為瘧邪所侮俯首不敢與爭任其出入往來絕
無忌憚縱舊邪已退而新邪復乘虛入之則為瘧縱新
邪未入而營衛不調之氣自襲於少陽之界亦為瘧首
烏妙在直入少陽之經其氣甚雄雄則足以折瘧邪之
勢其味甚瀟瀟則足以堵瘧邪之路邪若未淨者佐以
柴苓橘半邪若已淨者佐以參朮耆歸一二劑效矣設

神農本草經讀 卷四 下 十一

初瘧而即用之則閉門逐寇其害有不可勝言者矣久
痢亦用之者以土氣久陷常於少陽求其生發之氣也
亦以首烏之味最苦而瀟苦以堅其腎瀟以固其脫宜
溫者與薑附同用宜涼者與芩連同用亦捷法也此外
如疝瘕五痔之病則取其蔓延而通經絡瘰癧之病則
取其入少陽之經精滑泄崩崩漏之病則取其滑以固
脫若謂首烏滋陰補腎能烏髮益氣血悅顏色長筋
骨益精神延年皆耳食之誤也凡物之能滋潤者必其
指液之多也物之能補養者必氣味之和也試問瀟滯

如首烏何以能補苦劣如首烏何以能補今之醫者竟奉為補藥上品者蓋惑於李時珍綱目不寒不燥功居地黃之上之說也余二十年來目擊受害者比比以醫為蒼生之司命不敢避好辯之名也

○延胡索氣味辛溫無毒主破血婦人月經不調腹中結塊崩中淋露產後諸血症血暈暴血衝上因損下血煎酒或酒磨服 開寶

○肉苳蔻氣味辛溫無毒主五勞七傷風虛冷骨體傷敗骨冷精流及婦人血氣墮胎 開寶

本草經讀

卷四 下品

三

陳修園曰墮胎者言其人素有墮胎之病以此藥治之非謂以此藥墮之也上文主字直貫至此蓋胎藉脾氣以長藉腎氣以舉此藥溫補脾腎所以大有固胎之功數百年來誤以黃芩為安胎之品遂疑溫藥碍胎見開寶有墮胎兩字遂以墮字不作病情解另作藥功解與上文不相連貫李瀕湖汪詒菴葉天士輩因之貽害千古或問本經牛膝本文亦有墮胎二字豈非以墮字作藥功解乎曰彼頂迷血氣句來唯其善逐所以善墮占書鉅綜變化難與執一不通者道

○白豆蔻氣味辛溫無毒主積冷氣止吐逆反胃消穀下氣 開寶

○縮砂仁氣味辛溫無毒主虛勞冷渴縮食不消赤白洩痢腹中虛痛下氣 開寶

○鬱金氣味苦寒無毒主血積下氣生肌止血破惡血血淋尿血金瘡 唐本

陳修園曰時醫稱名有二誤一曰生脈散因其有生脈二字每用之以救脈脫人咽少頃脈未生而人已死矣一曰鬱金因其命名為鬱往往取治於氣鬱之症數服

本草經讀

卷四 別錄

而

之後氣鬱未解而血脫立至矣醫道不明到處皆然而江浙間粵尤其甚者

○神麴氣味辛甘溫無毒主化水穀宿食蠶絲積聚健脾 開寶

陳修園曰凡麴葉皆主化穀穀積服此便消或腹中如聞酒香藥性所言主治亦不外此癥結積聚者水穀之積久而成也健脾煖胃者化水穀之效也除化水穀之外餘無他長令人以之常服且云祛百病怪其放造麴之法六月六日是六神聚會之日用白麴自煎清高妙

耳野麥各自然汁三升杏仁研泥赤小豆為末各三升以配青龍白虎朱雀元武勾陳騰蛇六神通和作餅麻葉或楮葉包罨如造醬黃法待生黃衣晒乾收之陳久者良藥用六種以配六神聚會之日醫發黃衣作麴故名六神麴今人除去六字只名神麴任意加至數十味無非尅破之藥大傷元氣且有百草神麴害人更甚近日通行福建神麴其方於六神本方中去赤小豆惡其易蛀加五苓散料平胃散料及麥芽穀芽史君子樞子大黃黃芩大腹皮砂仁白蔻丁香木香藿香附良薑

本草經讀 卷四 附錄 五

芍藥防風秦艽羌活獨活川芎蘇葉荆芥防黨參茯苓萊菔子苡米木通茶葉乾薑乾葛枳椇山查檳榔青皮木瓜薄荷蟬退桃仁紅花三稜莪朮鬱金菖蒲柴胡菊花等為末製為方塊以草罨發黃衣晒乾此方雜亂無序誤人匪淺而竟盛行一時者皆誤信招牌上誇張等語而憤以肥甘自奉之輩單服此尅化之品未嘗不通快一時而損傷元氣人自不覺若以入方則古人之方立法不苛豈堪此雜亂之藥碍此碍彼乎且以藥未右五穀罨造發黃而為麴只取其速乎酸化除消導之外

余無他長何以統治其病且表散之品因罨發而失其辛香之氣攻堅之品以罨發而失其雄人之權補養之藥氣味中和以罨發而變為臭腐穢濁之物傷脾胃更不待言明者自知余臨症二十年而泉州一帶先救誤服神麴之害者十居其七如感冒病宜審經以發散若服神麴則裏氣以攻伐而虛表邪隨虛而入裏矣傷食新病宜助胃以尅化傷食頗人宜承氣以攻下若服神麴則釀成甜酸穢腐之味滯於中焦漫無出路則為惡心脹痛矣吐瀉是陰陽不交泄瀉是水穀不分赤白

本草經讀 卷四 附錄 六

痢是溼熱下注噎隔是賁門乾稿翻胃是命門火衰痰飲是水氣泛溢與神麴更無干涉若誤服之輕則致重重則致死可不慎哉唯范志字號藥品精製法妙余與查市中多假其字號宜細辨之 吳先生名餘光同年因知其詳可

○藿香氣味辛甘溫無毒主風水毒腫去惡氣止霍亂心腹痛 別錄

○前胡氣味苦寒無毒主一滿胸脇中痞心腹結氣風眼痛去痰下氣治傷寒寒熱推陳致新明目益精 別錄

○紅花氣味辛溫無毒主產後血暈口噤腹內惡血不盡

絞痛胎死腹中並酒煮服亦主蠱毒開寶

○香附氣味甘微寒無毒除胸中熱充皮毛人服令人益氣長鬚眉別錄

○金櫻子氣味酸澁無毒主脾洩下痢止小便利澆精氣久服令人耐寒輕身

○茯苓氣平味甘無毒主辟不祥療風眩風虛五勞口乾止驚悸多悲怒善息開心益智安魂魄養精神則錄

張隱菴曰離松根而生者為茯苓抱松根而生者為茯神總以茯苓為勝○茯苓皮茯苓木後人收用各有主本草經讀

卷四附錄

七

治然皆糟粕之藥益無精華之氣不足重也

○丁香氣味辛溫無毒主溫脾胃止霍亂壅脹風毒諸腫齒疳能破諸香開寶

○蜀椒氣味辛溫有毒主邪氣欬逆溫中逐骨節皮膚死肌寒溼痺痛下氣久服頭不白輕身延年去開口 椒日 同巴

豆菖蒲松脂黃蠟為提納耳中治聾

○沉香氣味辛微溫無毒療風水毒腫去惡風別錄

○烏藥氣味辛溫無毒主中惡心腹痛蠱毒瘕疝鬼氣宿食不消天行疫瘴膀胱腎間冷氣攻衝背脊婦人血氣小

兒腹中諸蠱拾遺

○琥珀氣味甘平無毒主安五藏定魂魄殺精魅邪氣消痰血通五淋別錄

○竹茹氣味甘微寒無毒主嘔吐溫氣寒熱吐血崩中崩張隱菴曰此以竹之脈絡而通人之脈絡也人身脈絡不和則吐逆而為熱矣脈絡不和則或寒或熱矣充膚熱肉澹滲皮毛之血不循行於脈絡則上吐血而下崩中矣竹茹通脈絡皆能治之

○竹瀝氣味甘大寒無毒療暴中風風痺胸中大熱止煩本草經讀

卷四附錄

六

悶煩消渴勞復別錄

○青橘皮氣味苦辛溫無毒主氣滯下食破積結及臍氣圖經

○木瓜氣味酸溫無毒主濕痺脚氣霍亂大吐下轉筋不止別錄

○枇杷葉氣味苦平無毒主卒嘔不止下氣桐去毛 別錄

○龍眼肉氣味甘平無毒主五藏邪氣安志厭食除蠱毒去三蟲久服強魂聰明輕身不老通神明別錄

○山楂子氣味酸冷無毒煮汁服止水痢沐頭洗身治瘡

癢

○小麥氣味甘寒無毒主除客熱止煩渴咽燥利小便
肝氣止漏血唾血令女人易孕 別錄

○馬料豆氣味甘平無毒主研塗癰腫煮汁殺鬼毒止痛
令人身重

○綠豆氣味甘寒無毒主丹毒煩熱風疹藥石發動熱氣
奔豚主研絞汁服亦煮食消腫下氣壓熱解比石毒用法
皮令人小瘻 別錄

○備豆氣味甘微溫無毒主和中下氣 別錄
本草經讀

卷四 附錄

五

○穀芽氣味苦溫無毒主寒中下氣除熱 別錄

陳修園曰凡物逢春萌芽而漸生長今取乾穀透發其
芽更能達木氣以制化脾土故能消導米穀積滯推之
麥芽黍芽大豆黃卷性皆相近而麥春長夏成尤得木
火之氣凡佛鬱致成膨脹等症用之最妙人但知其消
穀不知其踈肝是猶稱驥以力也

○豆豉氣味苦寒無毒主傷寒頭痛寒熱瘴氣惡毒煩躁
滿悶虛勞喘吸兩脚疼冷 別錄

○飴糖氣味甘大溫無毒主神虛之止渴失血 別錄

○薄荷氣味辛溫無毒主賊風傷寒發汗惡氣心腹脹滿
霍亂宿食不消下氣煮汁服亦堪生食 唐本

○香薷氣味辛微溫無毒主霍亂腹痛吐下散水腫 別錄

○白芥子氣味辛溫無毒發汗主胸膈痰冷上氣面目黃
赤醋研敷射工毒 別錄

○五靈脂氣味甘溫無毒主療心腹冷氣小兒五疳辟疫
治腸風通利血脈女子月閉 酒研

○虎骨氣味辛微熱無毒主邪惡氣殺鬼疰毒止驚悸治
惡瘡鼠瘻頭骨尤良 別錄

本草經讀

卷四 附錄

三

○小茴香氣味辛溫無毒主小兒氣脹霍亂嘔逆腹冷不
下食兩筋痛滿 拾遺

○土茯苓氣味甘溫平無毒主治食之當穀不飢調中止
洩健行不睡藏治拘攣骨痛惡瘡癰腫解汞銀水毒 時珍

○草薺氣味苦平無毒主腰脊痛強骨節風寒濕周痺惡
瘡不瘳熱氣 本經傷中志怒陰痿大溺老人五緩關節老血
別錄

○檳榔氣味苦辛澀溫無毒主消穀逐水除痰辟殺三蟲
伏尸療寸白 別錄

○牽牛子氣味苦寒有毒主下氣療脚滿水腫除風毒利小便別錄

陳修園曰大毒大破之藥不堪以療肉病惟楊梅瘡或毒發周身或結於處甚則陰器剝鼻在喉頭潰不合其病多從陰器而入亦必使之從陰器而出也法用牽牛研取頭末以土茯苓自然汁泛丸又以洗視散為衣每服一錢生槐蕊四錢以土茯苓湯送下一日服服牛月效

○念冬氣味甘溫無毒主寒熱身腫久服輕身長年益壽本草經讀

卷四 附錄

三

別錄

陳修園曰氣溫得春氣而入肝味甘得土味而入胃何以知入胃不入脾以此物質輕味薄偏走陽分胃為陽土也其主寒熱者忍冬延蔓善走花開黃自金色黃入營分白人衛分營衛調而寒熱之病愈矣其主身腫者以風木之氣傷於中土內則病脹外則病腫昔人統名為蠱取卦象山風之義忍冬甘入胃胃為艮土艮為溫入肝肝為風木風為內能使土木合德外能使營衛和諧所以善治之也久服長年益壽者誇其安內調外之

功也至於瘡毒腫毒等症時醫重其功而別錄反未言及者以外科諸效特疏風祛濕調和營衛之餘事耳

○馬兜鈴氣味苦寒無毒主肺熱咳嗽痰結喘促血痔瘻瘡開寶
陳修園曰氣寒得水氣入腎味苦得火味入心雖云無毒而偏寒之性多服必令吐利不止也內經云肺苦溫而惡寒若開寶所云肺熱咳嗽為絕少之症且所主咳嗽痰結喘促症與血痔瘻瘡外症同一施治其為涼瀉攻堅之性無疑今人或於錢乙補肺阿膠散一方取用

本草經讀

卷四 附錄

三

以治虛嗽百服百死

○鈎藤氣味微寒無毒主小兒寒熱十二驚癇別錄

○人乳氣味甘鹹平無毒主補五藏令人肥白悅澤別錄

○小便氣味鹹寒無毒療寒熱頭痛溫氣童男者九良別錄
按蠱蟲水虺及莖花大戟甘遂等不常用之藥集驗不能具載柯韻伯抵當湯十棗湯方論極妙宜熟讀之

神農本草經讀卷之四全和終

夫立言者不其難哉或敷陳繁蹟而
或梗槩痛呈而源流俱昧失則維均
若職要而明其當然又必抉其所以
籍漢唐注疏亦云詳矣宋賢則略名物而窮義
理斯道始朗如星日今醫之本草而有綱目猶
經籍之有注疏也終身學而未知注疏者衆矣
而醫之於綱目亦然畏其煩重記誦維艱也
猶河漢會歸不易也於是乎曰陋就蘭承謫襲

序

一

謬凡地地然乃圭漫註自翻良工與夫陸推舉
此居然名宿滔滔皆是堪一歎也古吳葉先生
儒者也邃于易而善醫即以易之盈虛消息通
乎劑之緩急輕重著書等身其一為本草經解
要于本經三百六十五種而損之而益之凡一
百七十有四其詮釋也縷析詳明其制方也甚
酌盡善蓋東壁之書淹通博大此則撮其至要
潔靜精微固義文家法一立言而三不朽其焉

本草經解要 序

者也其錫山王君悅田為海文殿元之羣從學
易于先生無得活人之術焉聞出此跡予予尋
緝再四謂是論衡也忍終秘乎頃者家大人於
政事餘暇刊布方書數種補子惠所難周技斯
人於耆艾顧藥物則其權輿也並缺是書欲學
者咸奉為指南譬若經生即未遑遠稽討矜與
博但力守宋賢傳注深思潛玩融會貫通已無
媿真儒此葉先生著書本懷也悅田兄尊聞雅

序

二

隨事力行敢勉余兄弟之素志也工竣為識諸
首簡
雍正甲辰歲午月上浣河東楊緝祖書於六署
之敬德堂

四九九

凡生養補救之術率肇端隆古而歷代聖哲以漸修
 明如炎帝味百草軒皇究息脈流傳舊矣然無命據
 今素問子程子謂出周秦之際蓋非誣矣嘗草遇毒
 本淮南子王安道亦嘗著論非之舊有本草經三卷
 自弘景以下各增益宋馬志等合併凡屬最初白字
 別之吾家升庵好奇謂白字本草乃神農之舊也或
 謂上世未立文字但師學相承謂之本草漢季張機
 華陀輩始附以新說由是見於經錄此為近是蓋雖
 本草經解要附錄

簡古可善而多絕其實又好言神仙不老固漢魏人
 習氣然也歷宋元明編纂益衆嘉隆間楚人瀕胡李
 時珍撰綱目五十二卷載藥千八百七十一種時稱
 大備顧讀者難之多約畧擷採各為小帙然毛膚畧
 具而義蘊缺如今姚先生學易草廬本則更貴精而
 不貴多於諸品準時定位分五行以配臟腑藥與疾
 相應之故源委莫不瞭焉其闡義若金在鎔其立言
 如珠就貫易奇而法所由來矣於斯道信精義入神

必先明理明理在於讀書始是之謂矣
 其及門悅用王君偶過吾六尊聞行知湯液所投應
 如影響遠齋公子與之遊而善之謂是書雖便誦習
 然傳鈔難免脫誤慨付開雕公諸寓內洵不朽盛事
 也僕前者借觀隨考證數條畧及音訓今並附載庶
 便初學他日先生見之當復一莞爾謂是猶劑之有
 佐使也夫古六城南種竹人楊友敬希洛氏題昔午
 月望日也

本草經解要附錄

考證

本經不分蒼白功用正同宋元以來始分用謂白

尤苦甘氣和補中焦除脾胃濕用止汗若尤苦

辛氣烈能上行除上濕發汗功大白尤欵產

者勝陳壁土炒蒼朮山者良糯泔浸焙也

山藥本經各著黃其改稱山藥避唐代宗英宗御

地此種實佳有自河北來者云在彼喪服尚不逮

六產也里有寡人生兒之乳困瘁已甚或致棄山

乘制之始終此一物竟得長成且肥自無疾勝他

兒則本草稱補虛羸信有微矣綱目云入藥宜野

生者今六國產者熱去皮色白微碧而堅實山中

有自生者更勝然但充果菜若依法修治入藥應

不在懷慶下耳

綱目列於部

考證

經解要附錄

本經主中風暴熱不能動搖筋結肉諸不足

久服去面黑野好顏色潤澤輕身不老解要主

別錄也綱目云治諸不足用代參者不寒不燥大

有殊功解要內同漆葉方即華陀漆葉青黏散青

黏世無能議或云黃精之正葉者或云即萎蕤也

乃五加皮葉本經名對漆也里有兵子臂痛不能

挽弓或教用萎蕤一斤五加皮四兩浸酒飲盡一

自健旺勝常壹古方正兩綱目殆誤附漆樹下耶

漆本有毒本經久服輕身及抱朴子云通神長生

皆難信綱目謂因貨漆人雜桐油故多毒亦非有

割漆人誤覆漆遍體瘡至莫救向在山中視見况

服食乎弘景云生漆毒烈是也古無用葉

者故氣味缺綱目殆因古方總立主治耳

芍藥本經不分赤白東垣云赤者利小便下氣白者

止痛散氣血俗云白補赤瀉綱目云白芍益脾

本草經解要 附錄

能於土中瀉木赤芍散邪能行血中之滯產後

血已虛不可更瀉故禁用非僅以其酸寒也目

子謂主女人一切病重及產後

用宜酒炒愚意不若勿用為穩

石斛名醫別錄稱生六安山谷蘇頌謂廣南者佳

蟻牌所謂蜀中者勝今其石斛乾者色正黃形如

小瓦松叢生根連種之磁盤亦堪愛玩然六境罕

有產英邑深山中峭壁千尋可望而不可即採者

曰頂頂地巨組而下及山腰用器極力搜剔合紛

紛墜落始就澗谷斂取亦至危險矣且每斤乾後

數兩故採者絕少今地誌誤入合肥方物好事者

問向徵求李虛舟大令云境無崇山何山得此每

用為多近友人歸自粵西偶及三七云彼地亦甚

貴以上官熬膏需索無厭也取之銖錡用之土直

吾鄉玉面金芽尤物非幸其不及此猶喜未有讀

經解要附錄

本經

者耳

高蒲石高蒲陶隱居謂一寸九節者良葉有赤如劍

可用李頌湖謂高類有五惟生木石間葉有劍

瘦根密節尚尺餘者乃石高蒲移植盆盎以為觀

玩愈剪愈細也凡用泔浸飯上蒸藉穀氣尤佳今

六之西南諸山溪石上多有且一寸不啻九節移

植亦極易生但露根甚

多採者未必能審擇矣

疾藜綱目稱刺藜藜子有三角所在有之治風明目

痛云今人稱刺者為白藜藜其關中產但稱沙苑

藜藜解要白藜藜即綱目刺藜藜也吾鄉昔一老

儒偶病目服此乃大下不

羌活 卽獨活一物二種本經不分後人乃別用謂羌

活氣清屬陽善行氣分入足太陽獨活氣屬屬

陰善行血分入足少陰至逐風勝濕透關節功

用正同羌活理遊風獨活理代風但真氣不足者

忌之惟虛虛也羌活色紫獨活色黃藥肆

多以老宿前胡及土當歸充獨活宜辨之

藥本方云同木香治霧露清邪中於上焦清去聲寒

香澤也本張潔古其同白芷作面脂取祛風濕非僅

已也

益母草子 根莖花葉俱入藥濟陰返魂丹及益母膏

謂根莖花葉專於行而子則行中有

補此解要所以獨有取於花子也歟

貝母 一名荷蕢前詩采荷取能散心胸鬱結也本草

稱治乳難蓋乳病多由鬱結故相宜又唐時有

本草經解要附錄 考證 五

病入而齋者用貝母愈正曼情酒澆怪哉取散鬱

獨念意也蘇子容謂類全瘡故宜貝母豈其然乎

天麻 本經主殺鬼積物蠱毒惡氣久服益

氣力長陰肥健解要所主乃開寶也

師江右人也指投此為真淡竹用之已數十年嘗

胎余合他藥浸酒未知是否湯液本草竹淡竹但

載本經於淡竹引日華子並用根莖所主瘧熱驚

瘧等症也按詩絲竹鄭策絲為工芻竹為編竹郭

意當是風痺淋閉大腸痛原誤二字故不可解淋

閉多鬱熱熱痛多氣逆林開者清陽不升則濁陰

不降殼主高主氣用以埋上患自除矣氣逆刺痛

亦皆近上喘言大者別於下之季脇也散留結乃

統言胸膈痰滯其一耳蓋用實治下主血用殼治

高主氣潔古東垣

皆如此非臆說也

竹葉 竹類極繁本草陶蘇二家云入藥宜薑竹淡竹

又謂甘竹似而茂即淡竹也六地多竹此所

指似俗呼水黃連者余庭前舊植數十竿鄰近每

採用今醫家好言淡竹葉倫父認以鴨跖草當之

本草草部另載淡竹葉云苗高數寸似竹米落地

所生甘寒無毒葉去煩熱利小便清心今六之西

山有一種草高不盈尺莖中空有節葉亦全肖竹

而稍薄生叢棘間凌冬不凋僅一痘醫識之云其

本草經解要附錄 考證 六

然此則實指今竹蓋竹既多種難辨又有草本混

之故迄無定論記

此質諸博雅君子

蓮子 稱石蓮子以秋深沉水堅黑如石得各綱目載

別有石蓮子狀如土布而味苦不知何物也

大棗 卽北地晒乾赤棗肉厚多脂宜用人藥其蒸熟

色黑是為膠棗亦有用者至南藥以糖蜜并蒸

更甘而潤食多損脾動濕熱

未堪用也東仁陳久者補良

本草經解要附錄 考證 七

積效 開寶首云風淋淋下云大腸風綱目諸刻皆

同惟湯液本作風淋淋下云大腸風綱目諸刻皆

積效 開寶首云風淋淋下云大腸風綱目諸刻皆

積效 開寶首云風淋淋下云大腸風綱目諸刻皆

積效 開寶首云風淋淋下云大腸風綱目諸刻皆

積效 開寶首云風淋淋下云大腸風綱目諸刻皆

積效 開寶首云風淋淋下云大腸風綱目諸刻皆

積效 開寶首云風淋淋下云大腸風綱目諸刻皆

積效 開寶首云風淋淋下云大腸風綱目諸刻皆

積效 開寶首云風淋淋下云大腸風綱目諸刻皆

積效 開寶首云風淋淋下云大腸風綱目諸刻皆

積效 開寶首云風淋淋下云大腸風綱目諸刻皆

龍眼 本草注治云安志厭食脈平聲飽也綱目稱其開胃益脾補虛長智即安志厭食之謂也

杏仁 綱目云氣溫味甘苦冷利令利者其性也凡用湯浸去皮尖炒黃然治風寒肺病有連皮尖用者取其發散也

用者取其發散也 桃仁行血宜連皮尖生用者潤燥活血則宜湯浸去皮尖炒黃用也

鐵衣 本經名鐵落主風熱惡瘡疔瘡瘰癧疥癬在皮膚中癩脫文訓乾湯疥有甲故曰疥昔外乾燥邪鬱皮膚痛癢不可耐全以制木木平則邪熱自清故主之千金方用治小兒丹毒亦此意也煎汁服亦治水腫蓋借鐵氣以制肝木使不能尅土不受邪水自消矣愈後仍斷鹽以鹽性濡潤恐致復病也

芒消 綱目依本經朴消消石並列而以芒消獨消石謂消有水火二種形質雖同性氣迥別朴消即芒消經煎煉有細芒者為芒消如馬牙者為牙消氣大溫而味鹹消石即火消經煎煉亦有芒牙二種水消也信然則氣溫味辛之火消既不用芒牙皆以性寒常用之芒消另屬消石且稱消石為火消矣湯液本草載朴消益消消石于朴消稱氣溫益消消石稱氣寒又云消石者其總名不經火者為生消有稱經火者為益消其諸家皆稱朴消一物而有精靈之別固是但今藥肆朴消一名皮消工以治皮鍊淨則名芒消並入藥用正是水消產河南睢州其火消得火即然一名酸消產壽春今禁私販重火器也至本經消石氣味主治與朴消無大異正蘇頌所稱又有生消亦出蜀地不

本草經解要附錄

考證

七

因煑煉類朴消而小堅則消石始自然銅之比未易多致且既有芒消可用亦不更求耳綱目辨論紛紜惜水畫一宋惠民和劑有碧雪方治諸熱病

本草經解要 附錄

內朴消芒消馬牙消消石並用皆水消也業岐黃者於此等處亦宜研窮未容姑信

代猪石 方稱研末真金湯下治小兒驚症綱目載也宜治肝水飛代猪石末每用半錢冬瓜仁煎湯調下果愈考冬瓜仁專末服補肝明目故用煎湯此更簡易

硬木 梗同梳粘者為糯不粘者梗入藥晚梗良其早熟者為稻綱目另列云氣溫主溫中除濕先秋登場江淮間於糯之外統名為稻不復稱梗於此種早稻謂之白稻以其米色獨白本草列稻梗和三種稻即糯蓋專稱糯為稻也

神麴 紅麴 神麴出藥性本草用白麴合藥汁取配六神於諸神聚會日作之故名紅麴出

本草經解要附錄

考證

八

丹溪補遺用梗米造以入酢醱鮮紅可食二麴製法俱載綱目

生薑 蘇頌曰病時人多食兼酒立發難瘥人多食則生惡肉是皆昔人所未及所謂好而知其惡者此也

乾薑 造法以老薑水浸三日去皮置流水中六日更淨結實者為良又名白薑綱目言孕婦不可食恐使胎內消以其性熱而辛散也人藥宜炮黑本經云生者尤良蓋指上文濕病諸病東垣云生則逐寒邪而於表炮則除胃冷而守中是也六地產薑業肆所貨或連皮者湯液本草於生薑稱氣溫味辛氣附載乾生薑者湯液本草於生薑稱氣溫味辛氣味俱輕陽也謂薑屑比之乾薑則不熱比之生薑則不濕薑屑即乾生薑也於乾薑稱氣熱味大辛

則不濕薑屑即乾生薑也於乾薑稱氣熱味大辛

味薄氣厚陽中之陽也蓋附門逆理中等湯用之則不獨生薑乾薑有別即乾薑乾生薑禾可概論矣明

白膠 鹿角膠藥性本草謂白膠一名黃明膠非是黃明膠乃牛皮膠也

阿膠 一名傳致膠本經阿膠者牛皮為之今世惟重烏驢皮膠風勝阿膠必用烏者取色屬木以制

熱則生風之義貴阿非貴以濟水所注清而重其性超下故治痰濁及逆上之痰糯米粉炒成珠用

然真者難得或依法波鹹苦井水白造用可也並造白膠法俱詳綱目

石蜜 即蜂蜜以生山中色白如膏者良今用河南白蜜蓋採梨花釀成殊勝他產綱目果部別載

冰糖也

本草經解要附餘 考證 九

也謂及天且列人部蓋藥本經人重在人拾遺綱目雖收而采以為是則行功益有

拾遺綱目雖收而采以為是則行功益有

拾遺綱目雖收而采以為是則行功益有

拾遺綱目雖收而采以為是則行功益有

拾遺綱目雖收而采以為是則行功益有

拾遺綱目雖收而采以為是則行功益有

拾遺綱目雖收而采以為是則行功益有

拾遺綱目雖收而采以為是則行功益有

拾遺綱目雖收而采以為是則行功益有

拾遺綱目雖收而采以為是則行功益有

拾遺綱目雖收而采以為是則行功益有

拾遺綱目雖收而采以為是則行功益有

幸其舍視飲食訪逮其術推朝散大夫尋卒年一百三歲所撰脈經賦方明堂等圖傳於時其弟立言亦精醫藝文志載甄權脈經一卷鍼經鈔三卷鍼方一卷明堂八形經一卷立言本草音義七卷又本草藥性三卷古今錄驗方五十卷則藥性屬立言然多一卷恐並非立言本綱目實指甄權未穩不若但稱藥性本草也

卷鈔次第 古本但列上中下三品不分部類自後各

草曰木曰苞木曰金石曰人曰獸曰蟲曰果曰

菜穀今改總先草木之類次竹竹之類次果實

名之其實非草非木自為一種解要依綱目稱苞

木不若竟稱竹部次果實蓋不離乎草木次金石

古本草首金石固藥所重也次穀菜禽獸蟲魚強

半日用所需兼馬已疾人則依綱目最後綱目謂

本草經解要附餘 考證 十

由後至貴愚意藥物已必欲近取諸身以其餘

附載庶幾

附載庶幾

附載庶幾

附載庶幾

附載庶幾

附載庶幾

附載庶幾

附載庶幾

味薄氣厚陽中之陽也蓋附門逆理中等湯用之則不獨生薑乾薑有別即乾薑乾生薑禾可概論矣明

白膠 鹿角膠藥性本草謂白膠一名黃明膠非是黃明膠乃牛皮膠也

阿膠 一名傳致膠本經阿膠者牛皮為之今世惟重烏驢皮膠風勝阿膠必用烏者取色屬木以制

熱則生風之義貴阿非貴以濟水所注清而重其性超下故治痰濁及逆上之痰糯米粉炒成珠用

然真者難得或依法波鹹苦井水白造用可也並造白膠法俱詳綱目

石蜜 即蜂蜜以生山中色白如膏者良今用河南白蜜蓋採梨花釀成殊勝他產綱目果部別載

冰糖也

本草經解要附餘 考證 九

也謂及天且列人部蓋藥本經人重在人拾遺綱目雖收而采以為是則行功益有

拾遺綱目雖收而采以為是則行功益有

拾遺綱目雖收而采以為是則行功益有

拾遺綱目雖收而采以為是則行功益有

拾遺綱目雖收而采以為是則行功益有

拾遺綱目雖收而采以為是則行功益有

拾遺綱目雖收而采以為是則行功益有

拾遺綱目雖收而采以為是則行功益有

拾遺綱目雖收而采以為是則行功益有

拾遺綱目雖收而采以為是則行功益有

拾遺綱目雖收而采以為是則行功益有

拾遺綱目雖收而采以為是則行功益有

音訓

一諸藥

藥有五形金木水火土五氣腥膻五色青赤黃白黑五味

酸苦甘辛鹹五性寒熱溫涼平五用升降浮沉凡使用別除陽

補瀉酌君臣佐使不待言矣凡作湯液用水各別火

欲緩恒令小沸利湯欲生補湯欲熟凡用諸香諸角

丹砂芒消蒲黃阿膠等須另研俟湯熟去粗納入和

服加酒亦然凡服藥疾在胸膈以上者食後服在心

本草經解要附餘音訓

腹以下者食先服在四肢血脈者宜空腹而在旦在

骨髓者宜飽滿而在夜凡云等分者多寡相等云方

寸七者七是也匙挑藥末不落為度正方一寸也刀

圭者寸七十一之一也一錢七七大如錢者五七將五

銖錢取藥僅當五字不落蓋一錢之半又云一字是

也一撮者四刀圭也茲於解要內藥及制方同用之

藥宜音釋者並列之

何首烏同諸藥治血痢內有草石蘇見本草綱目

子氣平主除風破血和五臟蟲部另有石蠶生溪
澗石上一名石蠶氣寒主五瘧石淋除熱解結石
部又有石蠶生海岸狀如蠶其實石也氣
熱主石淋血結治金瘡三者世皆罕用也
音咸 紫苑宛郁二音 秦艽音交以根作羅紋
柴胡紫舊作此此別音 消入水即消又能消
硝山檀俗作 牡荊子即黃荊與葉如 飴音
米糖 錫徐盈切 香薷音殊此讀 茹蘆音如
也 凡使黃蘗地黃忌鐵器 陽曰腎有補而無瀉
又曰虛者補其母實者瀉其子腎乃陰中之少陰
為涵養真元之水藏忌鐵蓋防伏木瀉肝恐字能令母虛也

本草經解要附餘

音訓

主

廣品宜辨 龍骨古墟 麝香核 輕粉石膏 藿香茄

攪黃精兼 龍金黃 防己木通 款冬批 阿膠充

廣膠入 香虎骨 鹿膠鹿 龍腦香 番消南

麥麩充 元胡索 小半夏 草荳蔻充 草仁南 木香西

充鐘乳合 白細辛 水漬當 歸酒酒 枸杞合 蜜排玢

舊用雞子魚枕偽造今更能吸人參廣品 不止齋

芥或云楓脂為之本具粘性也人參 近有首尾

真參中插土參會被款 試味帶苦辣也此外 未易枚舉宜細察之方

免因誤致損也

諸症

無病服藥如壁裏添柱蓋藥性各偏周禮醫師掌醫
 以令聚毒藥以共醫事是也信如節嗜好慎寒暑夫
 復何患穀若果蔬儘堪頤養參朮雖良亦姑舍是否
 則六淫之邪乘虛而入疾乃未免而藥始奏功仲景
 於傷寒著三百一十三方於雜病著金匱要畧廿有
 二門備矣今葉先生於二書闡微辨惑別開生面稱
 南陽經解又有刪補慎齋遺書誠滄溟之慈航中宵
 本草經解要附錄 音訓 圭

之寶炬學者熟讀而精思之庶臨症瞭如而無昧於
 施治也今姑以解要所及諸症音釋以便讀者

癩 音漏 痺 音秘 詳素問痺論靈樞周痺篇周痺
 擊上聲風強病俗作痺 音且黃病 痿 音威
 虛痿 癱 宜行氣勝 癱 同癱足 擊 音驚手
 濕痿 宜清燥滋陰 癱 同癱足 擊 音驚手
 疾 末四支也風溼 癱 同癱足 擊 音驚手
 末疾 見左傳 癱 同癱足 擊 音驚手
 癥 音徵 加下焦之疾 見於臍下 婦人 三蟲伏
 尸 解要但有云濕熱 癩 音陽 疝 音疝 心腹痛曰疝

女子多 此疾 翕 音胸 蹇 音碧 一足廢曰 疰 音注

噦 淵入聲有聲無 驚 音上 音木 夢 寤 寤 寐

寐息也寐覺而有言曰寤 謂夢而寤 寤於寐也蓋
 火起於下而痰閉於上 心血虧而神失守 非真有
 異物作 痰 音伏 溢 音生 於 濕 然 金 匱 但 稱

祟也 痰 音伏 溢 音生 於 濕 然 金 匱 但 稱
 飲有四痰 懸 音支 姚 音註 謂 留 飲 即 痰 飲 也 支 飲 不
 得息 支 者 如 果 在 枝 旁 而 不 正 其 人 喘 滿 胃 眩 有
 礙 呼 吸 故 云 癰 癰 音 縱 即 搗 癰 音 頰 癰 音 頰

不得息也 癰 癰 音 縱 即 搗 癰 音 頰 癰 音 頰
 音 僻 即 癰 音 隆 小 水 皮 水 風 水 脾 虛 不 能 制
 下 利 也 癰 音 隆 小 水 皮 水 風 水 脾 虛 不 能 制

匱 血 泣 音 同 匱 音 匿 食 炮 音 砲 相 也 金

匱 血 泣 音 同 匱 音 匿 食 炮 音 砲 相 也 金

匱 血 泣 音 同 匱 音 匿 食 炮 音 砲 相 也 金

匱 血 泣 音 同 匱 音 匿 食 炮 音 砲 相 也 金

宛 扶 音 沃 音 屋 水 從 上 滯 音 膩 黠 同 虧 音 幹

癩 本 音 例 又 音 瀉 下 日 沃 滯 音 膩 黠 同 虧 音 幹

癩 本 音 例 又 音 瀉 下 日 沃 滯 音 膩 黠 同 虧 音 幹

癩 本 音 例 又 音 瀉 下 日 沃 滯 音 膩 黠 同 虧 音 幹

癩 本 音 例 又 音 瀉 下 日 沃 滯 音 膩 黠 同 虧 音 幹

癩 本 音 例 又 音 瀉 下 日 沃 滯 音 膩 黠 同 虧 音 幹

癩 本 音 例 又 音 瀉 下 日 沃 滯 音 膩 黠 同 虧 音 幹

癩 本 音 例 又 音 瀉 下 日 沃 滯 音 膩 黠 同 虧 音 幹

癩 本 音 例 又 音 瀉 下 日 沃 滯 音 膩 黠 同 虧 音 幹

癩 本 音 例 又 音 瀉 下 日 沃 滯 音 膩 黠 同 虧 音 幹

癩 本 音 例 又 音 瀉 下 日 沃 滯 音 膩 黠 同 虧 音 幹

癩 本 音 例 又 音 瀉 下 日 沃 滯 音 膩 黠 同 虧 音 幹

本草經解要目錄

卷一

草部上

人參 黃耆 朮 甘草

山藥 苡仁 何首烏 百合

兔絲子 淫羊藿 巴戟天 肉蓯蓉

地黃 天門冬 麥門冬 麥蘗別錄

牛膝 續斷 五味子 沙參

本草經解要目錄

芍藥 當歸 紫苑 知母

秦艽 石斛 延胡索別錄 細辛

小茴香拾遺 遠志 菖蒲 肉豆蔻別錄

附子 補骨脂別錄 益智子拾遺 木香

半夏

卷二

草部下

白豆蔻開寶 白蒺藜 縮砂仁別錄 薑黃唐本

鬱金丹唐本 欽冬花 旋覆花 藿香別錄

前胡別錄 羌活 升麻 川芎

防風 葛根附葛穀 麻黃附根節 白芷

藥木 柴胡 桔梗 茵陳

夏枯草 丹參 益母子附莖 紅花別錄

杏附別錄 貝母 亭藎子 元參

天花粉附實 牛蒡子別錄 甘菊花 丹皮

黃連 黃芩 連翹 天麻別錄

本草經解要目錄

水鍾 車前子 澤瀉 蔓菁

防己 木黃 檉心別錄 使君子別錄

卷三

木部

枸杞子 金櫻子蜀本 杜仲 茯苓

茯苓別錄 松花綱目 山萸肉 栝子仁

酸棗仁 女貞子 肉桂別錄 桂枝

吳茱萸 丁香開寶 蜀椒附目 沉香別錄

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 烏藥 <small>拾遺</small> | 降香 <small>海</small> | 蘇方木 <small>唐</small> | 蔓荊子 |
| 桑皮 | 桑葉 | 槐花 <small>日</small> | 黃柏 |
| 枳仁 | 琥珀 <small>別錄</small> | 豬苓 | 枳實 |
| 枳殼 <small>開寶</small> | 檳榔子 <small>別錄</small> | 厚朴 | |
| 竹部 | 竹茹 <small>別錄</small> | 竹瀝 <small>別錄</small> | |
| 果部 | 蓮子 | 陳皮 | 大棗 |
| | | 清皮 <small>日</small> | |
| | | | 三 |
| 天寶 | 木瓜 <small>別錄</small> | 烏梅 | 枇杷葉 <small>別錄</small> |
| 龍眼肉 <small>別錄</small> | 山柰子 <small>唐</small> | 杏仁 | 桃仁 |
| 卷四 | | | |
| 金石部 | 丹砂 | 芒消 | 消石 |
| 鐵系 | | | |
| 石膏 | 礬石 | 代赭石 | 紫石英 |
| 赤石脂 <small>別錄</small> | | | |
| 穀菜部 | | | |

| | | | |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 梗米 | 小麥 <small>別錄</small> | 馬料豆 | 綠豆 <small>開寶</small> |
| 藎豆 <small>別錄</small> | 脂麻 | 穀芽 <small>別錄</small> | 豆豉 <small>別錄</small> |
| 紅麴 <small>補遺</small> | 神麴 <small>性</small> | 醋 <small>別錄</small> | 酒 <small>別錄</small> |
| 餠 <small>別錄</small> | 乾薑 | 生薑 | 荊芥 |
| 薄荷 <small>唐</small> | 香薷 <small>別錄</small> | 蘇葉 <small>別錄</small> | 蔥白 |
| 白 | 白芥子 <small>別錄</small> | | |
| 禽獸部 | | | |
| 五靈脂 | 龍骨 | 鹿茸 | 白膠 |
| | | | 四 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 人部 | | | |
| 人乳 <small>別錄</small> | 小便 <small>別錄</small> | 紫河車 <small>唐</small> | |
| 本草 | 百一 <small>別錄</small> | 唐本草 | 拾遺 |
| 味 | 十六味 | 開寶 | 四藥性 |
| 味 | 蜀本 | 開寶 | 味 |
| 味 | 開寶 | 味 | 日華 |
| 味 | 開寶 | 味 | 補遺 |

味綱目一

共一百七十四味

本草經解要卷一

古吳葉桂天士集註

河東楊緝祖遠齋閱定

同里門人王從龍校刊

草部上

人參氣微寒味甘無毒補五藏安精神定魂魄止驚悸除邪氣明目開心益智久服輕身延年

人參氣微寒稟天秋令少陰之氣人手太陰肺經

本草經解要卷一

人參

味甘無毒稟地中正之土味入足太陰脾經氣厚於味陽也肺為五藏之長百脉之宗司清濁之運化為一身之榮衛王生氣人參氣寒清肺肺清則氣旺而五藏俱補矣精者陰氣之精華神者陽氣之精靈也微寒清肺肺旺則氣足而神安脾屬血人身陰氣之原味甘益脾脾血充則陰足而精安隨神往來者謂之魂並精出入者謂之魄精神安魂魄自定矣氣虛則易驚血虛則易悸人參微寒

益氣味甘益血氣血平和驚悸自止邪之所奏其氣必虛人參益氣正氣充足其邪氣自不能留故一能除邪氣五藏藏陰者也五藏得甘寒之助則精氣上注於目而目明矣心者神之處也神安所以心開開者明也腎者精之舍也精充則伎巧出而智益久服則氣足故身輕氣足則長生故延年也

制方

人參同五味子麥冬名生脈散補陰生津液 同

本草經解卷一

人參

七

辰砂治驚 同炮薑煎補氣溫中 同白朮炮薑

甘草名理中湯治胸中寒邪痞塞 同白朮白朮

甘草名四君子湯治脾濕不思飲食 同半夏陳

皮治脾濕生痰 同附子名一氣湯追散失元陽

同半夏生薑治食入即吐 同陳皮生薑治霍

亂吐瀉煩躁不寧 同炮薑等分末生地汁九治

妊娠吐水 同蘇木治產後發喘加童便治血暈

同歸身治產後諸虛 同甘草歸身五味麥冬

治血虛發熱 同炮薑北味白朮甘草白芍治中

氣虛喘 同黃耆甘草天冬麥冬生地熟地北味

茯苓治腎虛水泛成痰 同乳香各一錢丹砂五

分末雞蛋清和薑汁調服治橫生倒產 同歸身

麥冬五味治聞雷即暈 同赤茯苓龍齒辰砂治離

魂 同陳皮治房後困倦 同柴胡大棗生薑治

虛勞發熱 同赤茯苓麥冬治齒縫出血 同蓮肉

川連治噤口痢 同白朮吳萸治脾洩 同五味

本草經解卷一

人參

三

吳萸肉果各四神九治腎洩 同白芍甘草治血

虛腹痛 同附子肉桂炮薑治寒厥 同附子北

味治氣脫中寒 同白朮麥冬五味治中暑倦怠

同白芍沉香治氣虛胸滿 同升麻補上焦元

氣瀉肺中伏火 同白朮補下焦元氣瀉腎中伏

火 同沉香夜神治心虛邪客作痛 同黃耆白

芍北味治汗多亡陽 同知母石膏粳米甘草各

人參白朮湯治氣虛傷暑 同附子白朮白芍白

茯苓草治小兒慢驚 同葛蒲蓮肉治產後不語

同附子肉桂麥冬五味治下虛寒而上大熱

同黃耆天冬北味牛膝杞子菖蒲治中風不語

同大棗白芍甘草棗仁圓肉治脾陰虛 同木瓜

養香橘紅治氣虛反胃 同薑皮各兩許水煎露

服治氣虛瘡久不止

黃耆氣微溫味甘無毒主癰疽久敗瘡排膿止痛大

風癩疾五痔鼠瘻補虛小兒百病 酒炒醋炒蜜炙白木炒

本草經解要卷一

黃耆

四

黃耆性微溫味甘無毒主癰疽久敗瘡排膿止痛大

手少陽三焦經味甘無毒其地和平之土味甘入足

太陰脾經氣味俱甘陽也脾主肌肉甘能解毒濕

能生肌所以主癰疽久敗瘡排膿止痛也風濕熱

痺於肌肉筋脈中則筋壞肉敗而成大麻風癩疾

矣脾主濕膽主風主焦主熱邪之所溱其氣必虛

黃耆甘溫補益氣血故治癩疾也腸澀為痔腸者

手陽明經也 脾為陽明行津液者也甘溫益

脾健運則腸澀行而痔愈也鼠瘻者瘰癧也乃

少陽經風熱鬱毒黃耆入膽與三焦甘能解毒溫

能散鬱所以主之人身之虛萬有不齊不外乎氣

血兩端黃耆氣味甘溫溫之以氣所以補形不足

也補之以味所以益精不足也小兒稚陽也推陽

為少陽少陽生氣係連小兒何病之有黃耆入少

陽補生生之老氣所以補主小兒百病也

制方

本草經解要卷一

黃耆

五

黃耆同桂枝白芍甘草黃耆名黃耆建中湯治

脾陰虛 同桂枝白芍甘草防風治表虛自汗

同茅朮生地等分牛膝黃柏減半丸治濕毒膿

久不愈 用鹽水炒五錢白朮一兩末治氣虛

瀉 同甘草治虛渴 同麻仁陳皮白蜜治老人

虛閉 同川連治腸風下血 同川芎糯米

不安 同生地熟地黃柏黃連黃芩歸身

陰虛益汗 同生地熟地歸身人參

表虛自汗 同人參甘草名保元湯治陽

痘症 同白芷白芨甘草金銀花皂刺排

元氣渴味甘無毒主風寒濕痺死肌痺疽止

消食作煎餅久服輕身延年不飢

元性溫稟太陽明之燥氣入足陽明胃經味甘無

毒稟地中正之土味入足太陰脾經氣味俱升陽

也風寒濕三者合成癰疽者拘攣而麻木也蓋地

之濕氣感則害人皮肉筋骨也死肌者濕邪侵肌

本草經解卷一

九

九

肉也 逆者濕流關節而筋動急也疽者濕乘脾土

肌肉發黃也皆脾胃濕症元性甘燥所以主之胃

土濕則濕熱交蒸而自汗發熱元性燥濕故止汗

除熱也脾者為胃行其津液者也脾濕則失其健

運之性而食不消矣元性溫益陽則脾健而食消

也煎餅久服則胃氣充足氣盛則身輕氣充則不

饑氣納則延年所以輕身延年不饑也

制方

元同枳實作湯治水飲作丸名枳朮丸治面黃食

不化 同人參治脾肺俱虛 同白芍白芨甘草

治脾虛肌熱 同澤瀉治心下有水 同牡蠣浮

麥石斛治脾虛盜汗 同薑酒煎治產後嘔逆

同陳皮治脾虛脹滿 同穀芽豬肚丸治脾虛少

食而瘦 同白芍肉果丸治脾虛洩瀉 同茯苓

糯米棗肉丸治久瀉腸滑 同熟地丸治瀉血色

黃 同熟地炮薑北味丸名黑地黃丸治下血

本草經解卷一

九

七

同半夏丁香治小兒久瀉 同澤瀉車前治水瀉

暑瀉 同苦參牡蠣豬肚丸治胃濕熱而瘦 同

麥冬石斛黃柏白芍木瓜苡仁北味治瘵

甘草氣平味甘無毒主五藏六府寒熱邪氣堅筋骨

長肌肉倍氣力金瘡癩解毒久服輕身延年 生用清

中補

甘草氣平稟天秋涼之金氣入手太陰肺經味甘

無毒稟地和平之土味入足太陰脾經氣降味升

陽也肺主氣脾統血肺為五藏之長脾為萬物之
母味甘可以解寒氣平可以清熱甘草甘平入肺
入脾所以主五藏六府寒熱邪氣也肝主筋腎主
骨肝腎熱則筋骨爽氣平人肺平肝生腎筋竹自
堅矣脾主肌肉味甘益脾肌肉自長肺主周身之
氣氣平益肺肺益則氣力自倍也金瘡熱則燻氣
平則清所以治瘡味甘緩急氣平清熱故又解毒
久服肺氣清所以輕身脾氣和所以延年也

本草經解要 卷一 六

制方

甘草佐黃耆少風治氣虛痘症 同白芍黃耆名
黃耆湯治痢 同白芍名甲已湯治洩 同人參
炮薑肉桂則溫中 同麥冬枇杷葉蘇子則下氣
同川連白芍升麻滑石治熱痢 同人參菖蒲
益智圓肉棗仁遠志治健忘 同桔梗元參牛蒡
花粉利咽喉 同麥冬石膏竹葉知母名竹葉石
膏湯治煩悶燥渴 同川連木通赤茯苓地瀉心

火 同桂枝人參生地麥冬阿膠麻仁薑棗酒名
復脈散治心脾血枯 甘草一味水炙熬膏治懸
壺如神

山藥氣溫平味甘無毒主傷中補虛羸除寒熱邪氣
補中益氣力長肌肉強陰久服耳目聰明輕身不饑
延年 補

山藥氣溫平味甘無毒主傷中補虛羸除寒熱邪氣
補中益氣力長肌肉強陰久服耳目聰明輕身不饑
延年 補

本草經解要 卷一 七

水陸兩濟氣升肺和助也脾為中州而統血血清
除也中之守也甘平益氣故主傷中脾主肌肉甘
濕益脾則肌肉豐滿故補虛羸肺主氣氣虛則寒
邪生脾統血血虛則熱邪生氣溫益氣味甘益血
血氣充而寒熱邪氣除矣脾為中州血為中守甘
平而益脾血所以補中脾主四肢脾血足則四肢
健肺氣充則氣力倍也陰者宗筋也宗筋屬肝氣
溫稟春升之陽所以益肝而強陰也久服氣溫益

肝開竅於目得血則明氣平益肺而生腎腎
開竅於耳得血則聰味甘益脾脾氣充則身輕
脾血旺則不饑氣血調和故延年也

制方

山藥同生地杞子牛膝甘菊白蒺藜五味治肝腎
虛怯 同蓮肉扁豆人參白芍白茯苓甘草陳皮治
脾虛洩瀉 同羊肉肉苁蓉作羹治虛羸

意以仁氣微寒味甘無毒主筋急拘攣不可屈伸久

本草經解卷一

黃連仁

十

風濕痺下氣氣服輕身益氣糯米炒

甘無毒得地中平之土味入足太陰脾經氣降味

和陰也經云濕熱不攘則大筋軟短而拘攣故仁

氣微寒清熱利溼所以主筋急拘攣不可屈伸也

久風長久之風也風淫則末疾所以手足麻木而

濕痺生焉黃仁甘寒其主之者甘以行之寒以清

之也微寒稟秋金之燥氣而益肺脾氣治則下行

故主下氣久服輕身益氣者濕行則脾健而身輕
金清則肺實而氣益也

制方

黃仁同木瓜石斛葶藶黃柏生地麥冬治痿厥

同五加皮牛膝石斛生地甘草治筋拘急 專一

味多服久服治濕火傷肺肺癰肺痿及痿症

何首烏氣微溫味苦澁無毒主瘰癧消癰腫療頭面

風瘡治五痔止痛益血氣黑髮悅顏色久服長

本草經解卷一

何首烏

十

筋骨益精髓延年不老亦治婦人產後及帶下諸疾

馬豆蒸用

何首烏氣微溫稟天卷升少陽之氣入足少陽膽

經手少陽三焦經味苦澁無毒得地水火之味入

手少陰心經足少陰腎經氣味升少降多陰也瘰

癧少陽之鬱毒首烏人少陽氣溫則通達所以主

之癰腫及頭面風瘡皆屬心火味苦入心氣溫能

行所以主之腸胃為痔痔者濕熱傷血之症也味

苦清血故亦主之心為君火火鬱則痛苦能散濕
能行故主心痛心主血腎藏氣味苦益血味澁益
氣也髭髮者血之餘也心者生之本其華在面心
血通流則髭髮黑而顏色美矣其黑髭髮悅顏色
者苦益血而溫能通也肝主筋腎主骨藏精與髓
膽氣疎則肝血潤心血充則腎精足其堅筋骨益
精髓者氣溫益膽味苦澁而交心腎也心腎交則
火降水升自延年不老矣治產後及帶下諸疾者

本草經解要卷一

何首烏

主

以氣溫能升少陽之生氣味苦澁交心腎之陰陽
也

制方

首烏同牛膝龍甲陳皮青皮治瘧邪在陰分如表
虛脾弱加人參三五錢 同金銀花地榆川連白
芍汁麻葛根甘草滑石山豆根犀角草石蠶治痢
純血諸藥不效者 首烏日日生嚼治瘰癧或破
或不破并用葉搗塗 同牛膝九治腰膝痠疼及

風痰久瘧

百合氣平味甘無毒主邪氣腹脹心痛利大小便補
中益氣

百合氣平稟天秋平之金氣入手太陰肺經味甘
無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣降味和
陰也肺主氣氣逆則腹脹心痛謂之邪者蓋非其
位則為邪也氣平下降所以主之膀胱者州都之
官津液氣化則出肺在氣而與大腸為合脾者又

本草經解要卷一

百合

主

為胃行津液者也百合甘平平則氣降氣化及於
州都則小便利甘則脾潤脾行胃之津液則大便
利也脾為中州補中者味甘益脾也肺主氣益氣
者氣平肅肺也

制方

百合同麥冬白芍甘草木通利大小便 同知母
柴胡竹葉治寒熱邪氣通身疼痛 同麥冬五味
白芍甘草補中益氣 同白芍白茯苓前桑皮治

皮毛浮腫

菟絲子氣平味辛甘無毒主續絕傷補不足益氣力

肥健人酒蒸

菟絲子氣平稟天秋平之金氣入手太陰肺經味

辛甘無毒得地金土二味入足太陰脾經足陽明

燥金胃經氣味升多於降陽也其主續絕傷者肺

主津液脾統血辛甘能潤潤則絕傷續也肺主氣

脾主血胃者十二經之本氣平而味辛甘則氣血

本草經解卷六

菟絲子

山

俱益故補不足也氣力者得於天充於穀辛甘益

脾胃則食進而氣力充也脾胃為土辛甘能潤土

潤則肌肉自肥也

制方

菟絲子單服補血 同熟地丸治陰損 同杜仲

丸治陽虛 同白茯苓蓮治白濁 同麥冬丸治

心腎不足口乾怔忡 同牛膝治腰膝痛

淫羊藿氣寒味辛無毒主陰痿絕傷莖中痛利小便

益氣力強志羊脂 性炒

淫羊藿氣寒稟天冬令之水氣入足少陰腎經味

辛無毒得地潤澤之金味入手太陰肺經氣味降

多於升陰也陰者宗筋也水不制火火熱則筋失

其剛性而痿矣淫羊藿入腎而氣寒寒足以制火

而痿自愈也絕傷者陰絕而精傷也氣寒益水味

辛能潤潤則陰精充也莖玉莖也痛者火鬱于中

也熱者清之以寒鬱者散之以辛所以主莖中痛

本草經解卷六

淫羊藿巴戟天

山

也小便氣化力由辛寒之氣清而利小便

肺主氣腎統氣寒益腎辛潤肺故益氣力也氣力

既益內養則太所以強志養腎藏志也

制方

淫羊藿酒治偏風不遂木酒膝痛 同五味覆

盆丸治三焦熱 專為末泡湯漱治牙疼

巴戟天氣微溫味辛甘無毒主大風邪氣陰痿不

強筋骨安五臟補中增志益氣酒拌

巴戟天氣微溫。稟天春升之木氣。人足厥陰肝經。味辛甘無毒。得地金土二味。人足陽明燥金胃經。氣味俱升陽也。風氣通肝。巴戟入肝。辛甘發散。主大風邪氣散而寫之也。陰者宗筋也。宗筋屬肝。痿而不起。則肝已全無鼓動之陽矣。巴戟氣溫益陽。所以主之。蓋巴戟治陽虛之痿。滋羊養治陰虛之痿也。肝主筋。腎主骨。辛溫益肝腎。故能強筋骨也。胃者五藏之原。十二經之長。辛甘入胃。溫助胃陽。

本草經解要卷一 巴戟天 未

則五藏皆安也。胃為中央土。土溫則中自補矣。腎統氣而藏志。巴戟氣溫益肝腎者。散也。肝氣不假。則不耗腎而志氣增益也。

制方

巴戟天同五味菴菴山萸鹿茸栢仁杞子補骨脂
治陰痿 同鹿角栢仁天冬遠志蓮鬚覆盆黃栢
治夜夢鬼交洩精 同熟大黃治飲酒人脚爽
肉菴菴氣微溫味甘無毒主五勞七傷補中除莖中

寒熱痛養五藏強陰益精氣多子。婦人厥陰入服。輕身。洗去。甲用。

肉菴菴氣微溫。稟天春升之木氣。人足厥陰肝經。味甘無毒。得地中正之土味。入足太陰脾經。色黑而潤。製過味鹹。兼入足少陰腎經。氣味俱濁。降多於升。陰也。填精益髓。又名黑司命。五勞者。勞傷五藏之真氣也。勞者溫之。菴菴氣溫。所以治勞也。七傷者。食傷憂傷飲傷房室傷。使傷勞傷。經絡營衛。

本草經解要卷一 肉菴菴 未

氣傷之七傷也。七者皆傷。真陰肉菴菴。甘溫滑利。能除元陰之不足。所以主之也。中者陰之守也。甘溫益陰。所以補中。菴菴也。寒熱痛者。陰虛火動。或寒或熱而結痛也。菴菴滑利。所以去者。所以主之。五藏強陰者。也。甘溫潤陰。故菴菴五藏陰者。宗筋也。宗筋屬肝。肝得血則強。菴菴甘溫益肝血。所以強陰。色黑入腎。補益精髓。精足則氣充。故益精氣。精氣足則頻御女。所以多子也。婦人厥陰皆由血。

成發蓉溫滑而鹹以與堅滑以去者溫以收結所以主之也久服肝脾腎精氣充足所以身輕也

制方

肉從蓉同白膠杜仲地黃當歸麥冬治婦人不孕

同人參鹿茸杜狗莖白膠杜仲補骨脂治陽痿

及老人陽衰一切腎虛腰痛兼令人有子 同黃

耆治腎氣虛 同北味丸治水之成痰 同鹿茸

山藥白朮丸治腎虛白濁 同沉香脂麻丸治汗

本草經解要卷一

肉從蓉

其

多便閉 同山萸北味丸治消中易饑 專用二

三兩白酒煎服治老人便閉 同山藥杞子山萸

北味黃耆歸身治腎燥洩瀉 同白芍甘草黃芩

紅麴治痢

地黃氣寒味甘無毒主傷中逐血癆填骨髓長肌肉

作湯除寒熱積聚除癰瘰折跌絕筋久服輕身不老

主者丸良

地黃氣寒主天冬寒之水氣入足少陰腎經味甘

無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味重濁

陰也陰者中之守也傷中者守中真陰傷也地黃

甘寒所以主之癯者血虛不運而風寒濕湊之所

以麻木也地黃味甘益脾脾血潤則運動不滯氣

寒益腎腎氣充則開合如式血和邪解而癯瘵矣

腎主骨氣寒益腎則水足而骨髓充脾主肌肉味

甘潤脾則土滋而肌肉豐也作湯除寒熱積聚者

湯者盪也或寒或熱之積聚湯能盪之也蓋味甘

本草經解要卷一

地黃

九

可以緩急性滑可以去着也其除癯者血和則結

者故陰潤則閉者通皆補脾之功也其癰折跌絕

筋者筋雖屬肝而養筋者脾血也味甘益脾脾血

充足則筋得養而自續也久服氣寒益腎腎氣充

所以身輕味甘益脾脾血旺則華面所以不老且

先後二天交接元氣與穀氣俱納也

制方

地黃同大薊小薊各半持取自然汁和童便服滑

血熱吐衄症 同麥冬治產後煩悶 同沙蒺藜

從蓉鹿茸山萸北味治男子精寒 同白茯苓皮

澤瀉山藥山萸各六味湯丸治一切陰虛症 同

人參遠志麥冬棗仁柏仁茯神甘草治心虛怔忡

悸忘 同黃耆川連黃柏棗仁五味麥冬圓肉牡

蠣治盜汗不止 同麥冬五味牛膝杞子車前阿

膠天冬治尿血 同麥冬五味牛膝治下部無力

同砂仁治胎動下血腰痛 同生薑治產後中

本草經解要卷一

池黃

二十

風 同醋炒黃耆治腸風不止 同肉桂山藥山

萸丹皮澤瀉白茯苓七味湯丸治命門火衰 同

人參附子山萸白茯苓皮澤瀉山藥丸名腎氣丸

治命門虛寒

天門冬氣平味苦無毒主諸暴風濕偏痺強骨髓殺

三蟲去伏尸久服輕身益氣延年不饑去

天門冬氣平稟天秋平之金氣入手太陰肺經味

苦無毒得地寒涼之火味入手少陰心經氣味俱

降陰也其主暴風濕偏痺者燥者濡之熱者清之

者者潤之也蓋風本陽邪風濕偏痺發之以暴

病皆屬於火也骨屬腎腎屬水天冬氣平益肺肺

金生水故骨髓強也去伏尸皆濕熱所化味苦

可以祛濕氣平可以清熱濕熱下逐三蟲伏尸皆

去也久服益肺肺清則氣充故益氣氣足則身輕

氣治則延年氣滿則不饑也

制方

本草經解要卷一

天冬麥冬

三十一

天冬同麥冬五味煎膏治消渴 同生地人參滋

養陰血 同生地麥冬丸煎逍遙散下治婦人骨

蒸 同生地麥冬白芍鱉甲牛膝杜仲續斷童便

治吐血

麥門冬氣平味甘無毒主心腹結氣傷中傷飽胃絡

脈絕羸瘦短氣久服輕身不老不饑去

麥冬氣平稟天秋平之金氣入手太陰肺經味苦

無毒得地中和之土味入手太陰脾經氣降味和

陰也。心腹者肺脾之分。結氣者邪熱之氣結也。其主之者麥冬甘平。平能清熱。甘緩散結也。中首陰也。傷中者陰傷也。甘平益陰。故主傷中。脾為胃行津液者也。脾血不潤則不能為胃行津液而傷飽之症生矣。味甘而潤滋養脾血。故主傷飽。脈者血之府。胃與脾合胃絡脈絕者脾血不統。脈絡不與胃相接也。甘潤養陰。所以續脈。脾主肌肉。而稟氣於胃。脾陰不潤則肌肉不長。而胃氣上逆。肺亦能

本草經解卷一

天冬麥冬

圭

制方

麥冬同川連治消渴飲水 同甘草粳米大棗竹葉治勞氣欲絕 同烏梅治下利口渴 同人參北味杞子治虛熱病暑 同沙參北味治心肺虛熱

萎蕤氣平味甘無毒。主心腹結氣虛熱濕毒腰痛。莖中寒及目痛背爛淚出。

萎蕤氣平。稟天秋降之金氣。入手太陰肺經。味甘無毒。得地中和濕土之味。入足太陰脾經。氣降味和。陰也。甘平之品。則能清能潤。故亦主心腹結氣也。其主虛熱者。甘能補虛。平可清熱也。濕毒腰痛。及莖中寒。目痛背爛。淚出。皆太陽膀胱之病也。膀胱之經起於目內眥。其直者下項。挾脊抵腰中。入

本草經解卷一

萎蕤

圭

循脊絡腎屬膀胱。膀胱本寒水之經。膀胱有濕毒。則濕氣走腰中而痛。走膀胱而莖中寒矣。於是膀胱民火上炎於經。終目痛。內眥爛而淚自出也。其主之者。膀胱之開合。皆由氣化。萎蕤氣平。益肺脾氣降。則小便通。濕行火降。而諸症平矣。蓋膀胱津液之府。肺乃津液之原。潤其原則膀胱之濕亦行也。所謂治病必求其本者如此。

制方

萎蕤同黃耆治老人大便閉 同漆葉治陰虛兼
令人有子

牛膝氣平味苦酸無毒主寒濕痿痹四肢拘攣膝痛
不可屈伸逐血氣傷熱火爛墮胎久服輕身耐老

牛膝氣平稟天秋降之金氣入手太陰肺經味苦
酸無毒得地木火之味入足厥陰肝經手厥陰心
包絡氣味俱降陰也肺熱葉焦發為痿痹牛膝苦
平清肺肺氣清則通調水道寒濕下逐營衛行而

本草經解要卷一

牛膝

苦

痿痹愈矣濕熱不攘則大筋短而四肢拘攣膝
痛不可屈伸矣牛膝苦酸酸則舒筋苦除濕熱所
以主之也逐血氣者苦平下洩能逐氣滯血凝也
傷熱火爛者熱湯傷火傷瘡也苦平清熱酸能收
斂則痛止而瘡愈也苦味伐生生之氣酸滑傷厥
陰之血所以墮胎久服則血脈流通無滯所以輕
身而耐老也

制方

牛膝同生地治下元虛 專用五兩酒煎治女人
除痛 同當歸生地治死胎 用三兩同鱉甲三

錢治瘥在陰分久不愈胃虛加人參一兩陳皮去
白五錢 同青蒿生地麥冬杞子治血虛發熱

續斷氣微溫味苦無毒主傷中補不足金瘡癰瘍折
跌續筋骨婦人乳難久服益氣力 酒炒

續斷氣微溫稟天春升之木氣入足厥陰肝經味
苦無毒得地南方之火味入手少陰心經氣升味

本草經解要卷一

續斷

苦

降陽也肝藏血心主血血者營也中之守也血虛
則中傷續斷氣微溫入肝肝者陽中之少陽以生
氣血者也所以主傷中補不足者補肝經之不足
也金瘡癰瘍皆傷血之症氣溫益血味苦清心所
以主之折跌續筋骨者氣微溫能活血血活則斷
者續也若人血不足則乳難氣溫行血血充乳自
多也肝者龍極之本以生氣血之藏也氣微溫達
少陽之氣所以益氣力也

制方

續斷一味治產後諸症。同杜仲棗肉丸治胎不安。同北味木瓜炮薑牛膝丹皮生地治產後火升。

五味子氣溫味酸無毒主益氣欬逆上氣勞傷羸瘦補不足強陰益男子精。

五味子氣溫稟天春升之木氣入足少陽膽經味酸無毒得地東方之木味入足厥陰肝經氣升味

本草經解要卷一

五味子

五

降陰也。膽者擔也。生氣之原也。肝者敢也。以生氣血之藏也。五味氣溫益膽味酸益肝所以益氣肝血虛則木枯火炎乘所不勝病欬逆上氣矣。五味酸以收之。溫以行之。味過於酸則肝氣以津而火不炎矣。肝氣不足則不勝作勞。勞則傷其真氣。而肝病乘脾。脾主肌肉。故肌肉瘦削。五味酸以滋肝氣。溫治勞所以主勞傷羸瘦也。肝膽者東方生生之藏。府萬物榮發之經也。肝膽生發則餘藏從之。

宣化五味益膽氣而滋肝血所以補不足也。陰者宗筋也。肝主筋味酸益肝肝旺故陰強也。酸溫之品收斂元陽欬則陰生精者陰氣之英華也。所以益男子精也。

制方

五味同黃耆麥冬黃柏治夏月困乏無力。同炮薑灰欬浮遊之火歸于下焦。同乾葛扁豆治酒疸。同苦茶甘草治久欬。同白礬末猪肺藥服。

本草經解要卷一

五味子沙參

五

治痰嗽並喘。專為末治肝虛洩精及陽事不起。同生地丹皮山萸山藥澤瀉茯苓各都氣湯治水虛火炎。同滋羊藿丸治陰虛陽痿。房不舉。易洩易爽。

沙參氣微寒味苦無毒主血結驚氣除寒熱補中益肺氣。

沙參氣微寒稟天初冬之水氣入足少陰腎經味苦無毒得地南方之火味入手少陰心經氣味俱

降陰也。心主血而藏神，神不寧則血結而易驚矣。結者散之，驚者平之。沙參味苦，能散氣寒，能平也。心火稟炎上之性，火鬱則寒，火發則熱，苦寒之味能清心火，故除寒熱。陰者所以守中者也，氣寒益陰，所以補中。肺為金藏，其性畏火，沙參入心苦寒清火，所以益肺氣也。

制方

沙參一味治肺熱咳嗽，為末酒服方寸七，治卒

本草經解要卷七

沙參為藥

矣

疝少腹及陰中相引絞痛，自汗出欲死者，用米飲下二錢治白帶。

芍藥氣平，味苦，無毒。主邪氣腹痛，除血痹，破堅積，寒熱疝瘕，止痛，利小便，益氣。赤者破血

芍藥氣平，稟天秋收之金氣，入手太陰肺經，味苦無毒，得地南方之火味，入手少陰心經，氣味俱降陰也。腹者是太陰經行之地，邪氣者肝木之邪氣，乘脾土作痛也。芍藥入肺氣平，伐肝所以主之血。

痺者血澁不行而麻木也。芍藥入心苦以散結，故主之也。堅積堅硬之積也。疝者小腹下痛，疝病也。瘕者假物而成之積也。寒熱疝瘕者，其原或因寒或因熱也。芍藥能破之者，味苦散結，氣平伐肝也。諸痛皆屬心火，味苦清心，所以止痛。膀胱津液之出皆由肺氣，苦平清肺，肺氣下行，故利小便。肺主氣壯火則食氣，芍藥氣平益肺，肺清故益氣也。赤者入心與小腸，心主血，小腸主變化，所以行而不

本草經解要卷十

芍藥

矣

留主破血也。

制方

芍藥醋炒則入肝，同白朮補脾，同川芎瀉肝，同人參補氣，同歸身補血，同甘草止痛，同黃連止瀉，同薑棗溫經散濕，同甘草夏加黃芩冬加桂枝治腹中虛痛，同甘草治消渴引飲，同犀角治衄血咯血，同香附熱艾治經水不止，同香附末鹽湯調服治血崩帶下，同川連滑石甘草升

麻人參蓮心扁豆紅蓮乾葛治痢 同荆芥防風
生地黃耆甘草治腸風 同歸身生地牛膝炮薑
續斷麥冬五味治產後虛熱 同黃耆防風治表
虛自汗 同陳皮藿香木瓜甘草治中惡腹痛
同白朮白茯苓芥陳皮治脾濕腹痛

當歸氣溫味苦無毒主欬逆上氣溫瘧寒熱洗洗在
皮膚中婦人漏下絕子諸惡瘡瘍金瘡煮汁飲之

當歸氣溫稟天春升之木氣入足厥陰肝經味苦

本草經解要卷一 當歸 辛

無毒得地南方之火味入手少陰心經氣升味厚
陽也其主欬逆上氣者心主血肝藏血血枯則肝
木挾心火上刑肺金而欬逆上氣也當歸入肝養
血入心清火所以主之也肝為風心為火風火為
陽但熱不寒者為溫瘧風火乘肺肺主皮毛寒熱
洗洗在皮毛中肺受風火之邪不能固皮毛也當
歸入心入肝肝血足則風定心血足則火息而皮
毛中寒熱自愈也婦人以血為主漏下絕子血枯

故也當歸補血所以主之諸惡瘡瘍皆屬心火心
血足則心火息金瘡失血之症味苦清心氣溫養
血所以皆主之用煮汁飲者取湯液之功近而速
也

制方

當歸同黃耆名補血湯治血虛發熱象白虎症
同川芎名佛手散治失血眩暈 本味酒煮治血
虛頭痛 同知母治衄血不止 同牛膝甘草梢

本草經解要卷一 當歸 辛

治小便血 為末酒服治心下刺痛 酒浸治臂
痛 用一兩水煎露服治溫瘧 用二兩吳萸一
兩同炒去萸為末蜜丸治久痢 同白芷治大便
不通 同生地治婦人血虛 同川芎砂仁治胎
動及胎死腹中 同炮薑治產後血脹 同白蜜
治產後腹痛 同黃耆白芍治產後自汗 同白
朮治面黃色枯 同白芍川芎等分香附加三倍
丸名調經丸治經水不調 同麥冬甘草治熱病

郭語神昏 同菴谷山藥卜麥治腎燥洩瀉 同

桂枝白朮甘菊牛膝治癩 同牛膝鱉甲陳皮生

薑治瘡在陰分久不止 同棗仁遠志茯神人參

治心虛不眠 同人參川芎治難產倒生 同白

膠地黃白芍續斷杜仲治女人血閉無子 同地

榆金銀花紅麴滑石治利下純血

紫苑氣溫味苦無毒主欬逆上氣胸中寒熱結氣去

蠱毒痿躄安五藏

本草經解要卷一

紫苑

至

紫苑氣溫稟天春升之木氣入手厥陰心包絡經

味苦無毒得地南方之火味入手少陰心經氣升

味降陰也心為君火火刑肺金則欬逆上氣矣紫

苑入心味苦清火所以主之也心包絡手厥陰脈

起於胸中手厥陰之筋其支者入腋散胸中厥陰

主散寒熱結氣者厥陰有或寒或熱之氣結也結

而不散厥陰病矣紫苑氣溫可以散寒味苦可以

散熱也蠱毒者濕熱之毒化蟲成蠱也味苦無毒

洩而殺蟲所以主之也痿躄者肺受濕熱薰蒸不

能行清肅之令心氣熱下脈厥而上上實下虛樞

折擊脛縱不任地而生痿躄也味苦入心清熱降

氣故主痿躄也心為君主十二官之宰五藏之主

也味苦益心心安五藏皆安也

制方

紫苑五錢煎治肺傷欬嗽 紫苑款冬各一兩百

部五錢末薑烏梅煎湯調服三錢治久欬嗽 同

本草經解要卷一

紫苑知母

至

杏仁等分蜜丸五味湯化服治小兒欬嗽 同五

味丸含化治吐血痰欬 為末水服三撮治女人

卒不小便及小便血

知母氣寒味苦無毒主消渴熱中除邪氣肢體浮腫

下水補不足益氣

去毛鹽水炒

知母氣寒稟天冬寒水之氣入足少陰腎經味苦

無毒得地南方之火味入手少陰心經氣味俱降

陰也腎屬水心屬火水不制火火燥津液則病消

渴火薰五內則病熱中其主之者苦清心火寒熱
腎水也除邪氣者苦寒之味能除燥火之邪氣也
熱勝則浮火勝則腫苦能清火寒能退熱故主肢
體浮腫也腎者水藏其性惡燥燥則開合不利而
水反蓄矣知母寒滑滑利關門而水自下也補不
足者苦寒補寒水之不足也益氣者苦寒益五藏
之陰氣也

制方

本草經解要卷十

知母秦艽

三四

知母同麥冬石膏貝母陳皮鱉甲青蒿干膝治久
瘧煩渴 同桂枝白芍甘草飴糖治脾虛胃熱多
食而煩 同牛膝生地白芍甘草桂枝桑枝治手
足牽引夜臥不安 同白芍花粉甘草桂枝治榮
瘧驚呼不安臥 同黃柏車前木通天冬甘草治
強陽不痿

秦艽氣平味苦無毒主寒熱邪氣寒濕風痺肢節痛
下水利小便

秦艽氣平稟天秋降之金氣入手太陰肺經味苦
無毒得地南方之火味入手少陰心經氣味俱降
除也皮毛屬肺外感之邪氣從皮毛而入者或寒
或熱或則肺先受邪秦艽入肺味苦能洩所以主
之風寒濕三者合而成痺痺則血澁不行矣味苦
入心心生血苦能散結血行痺自愈也肢節痛濕
流關節而痛也秦艽氣平降肺肺氣行則水道通
水道通則濕下凝矣其下水利小便者皆通水道

本草經解要卷十

秦艽石解

三四

制方

秦艽酒煎治黃疸 秦艽一兩治小便難腹滿 同
茯苓甘草治骨節煩熱 同乾葛茵陳五味川連
梔豆木通治仁治酒毒 同玄仁木瓜五加皮黃
柏黃連非膝治下部濕熱作痛及濕瘡
石解氣平味甘無毒主傷中除痺下氣補五藏虛勞
羸瘦除益精久服厚腸胃

酒浸

石斛氣平稟天秋降之金氣入手太陰肺經味甘
無毒得地中正之土味入足太陰脾經甘平為金
土之氣味入足陽明胃手陽明大腸經氣降味和
陰也陰者中之守也陰虛則傷中甘平益陰故主
傷中痺者閉也血枯而澀則麻木而痺甘平益血
故又除痺肺主氣肺熱則氣上氣平清肺所以下
氣五藏藏陰者也陰虛則五藏俱虛而不勝作勞
勞則愈傷其真氣矣五藏之陰脾為之原脾主肌

本草經解要卷一

石斛延胡

辛

肉故五藏虛勞則肌肉消瘦也甘平益陰所以主
虛勞而生肌肉也陰者宗筋也太陰陽明之所合
也石斛味甘益脾胃所以強陰精者陰氣之精華
也甘平滋陰所以益精腸者手陽明大腸也胃者
足陽明胃也手足陽明屬燥金燥則腸胃薄矣久
服甘平清潤則陽明不燥而腸胃厚矣

制方

石斛同麥冬五味人參白芍甘草杞子牛膝杜仲

理傷中補虛勞強陰益精 同麥冬白茯苓皮甘
草治胃熱四肢爽弱 專一味夏月代茶健足力
延胡索氣溫味辛無毒主破血婦人月經不調腹中
結塊崩中淋露產後諸血症血暈暴血衝上因損下
血煮酒或酒磨服

延胡索氣溫稟天春升之木氣入足厥陰肝經味
辛無毒得地西方之金味入手太陰肺經氣味俱
升陽也辛能散結溫能行逆肝藏血故入肝而破

本草經解要卷一

延胡索

辛

血肝屬木木性條達則肝血不凝月經不調矣
辛溫暢肝所以調經腹為陰腹中結塊血結成塊
延胡索散結溫能行血所以至之崩中肝血不凝
而下崩也淋露下之淋瀝不止也辛溫氣味上升
條達肝氣暢而肝血凝崩淋自止也產後諸血症
指惡露未盡之病而言也辛溫破血所以至之血
暈血閉而暈也其辛之者藉其辛散之功也暴血
衝上血挾邪氣而上衝也其至之者辛溫破血之

力然必佐他藥以成功也。因損下血血傷而下也。辛溫活血故佐酒助血歸經也。

制方

延胡索為末酒服治胃脘痛及下利腹痛。同歸身生地牛膝益母花重便治產後血暈。同芎歸芍地白膠牛膝香附治女人經阻少腹痛。同朴硝治畜血。專為末猪胰煎服治氣塊痛。同當歸陳皮丸治經水不調腹痛。同歸身桂心末治

本草綱目卷一

細辛

辛

冷氣腹痛

細辛氣溫味辛無毒。主欬逆上氣頭痛腦動百節拘攣風濕痺痛死肌久服明目利九竅輕身長年。

細辛氣溫東天春升之木氣人足厥陰肝經味辛無毒得地西方之金味人手太陰肺經氣味俱升陽也肺屬金而主皮毛形寒飲冷則傷肺肺傷則氣不降而欬逆上氣之症生矣細辛辛入肺溫能散寒所以主之風為陽邪而傷於上風氣入腦則

頭痛腦動風性動也其主之者風氣通肝入肝辛散也地之濕氣感則害人皮肉筋骨白節拘攣濕傷筋骨也風濕痺痛濕傷肉也死肌濕傷皮也細辛辛溫散濕活血則皮肉筋骨之邪散而愈也久服辛溫暢肝肝開發於目五藏精液上奉故目明辛溫開發故利九竅肝木條暢以生氣血所以輕身長年也。

制方

本草綱目卷一

細辛小茴香

辛

細辛同石膏治陽明火熱頭痛。同芎歸芍地

藥本甘草白薇治女子子宮冷不孕。同甘草治傷寒少陰咽痛。同五味白芍甘草肉桂炮薑黃青蘇椶治欬逆上氣及筋骨疼痛。同白芍甘草桂枝木通歸身治風濕痛。專為末吹鼻治卒倒不省人事。

小茴香氣溫味辛無毒主小兒氣脹霍亂嘔逆腹冷不下食兩肋痞滿

小茴氣溫稟天春升之木氣入足厥陰肝經味辛無毒得地西方之金味入手太陰肺經氣味俱升陽也小兒皆肝氣有餘肝滯則氣脹小茴辛溫益肝兼通三焦之真氣所以主脹也肺為百脈之宗司清濁之運化肺寒則清濁亂於胸中揮霍變亂而嘔逆矣小茴辛入肺溫散寒故主霍亂嘔逆也腹屬太陰脾經冷則火不生土不能化腐水穀而食不下矣小茴辛溫益肺肺亦太陰芳香溫煖而

本草經解要卷一

小茴香

單

脾亦煖食自下也助屬厥陰肝經痞滿者肝寒而氣滯也小茴辛可散痞溫可祛寒所以主兩肋痞滿也

制方

小茴同生地北味白芍甘草歸身山藥治漏症
同山藥白芍甘草白茯苓米治食不下 同磁石
白芍木瓜治氣脹 同荔枝核治疝

遠志氣溫味苦無毒主欬逆傷中補不足除邪氣利

九竅益智慧耳目聰明不忘強志倍力久服輕身

七去心甘草湯
浸晒乾用

遠志氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味苦無毒得地南方之火味入手少陰心經氣溫味苦入手厥陰心包絡氣升味降陽也中者脾胃也傷中脾胃陽氣傷也遠志味苦下氣氣溫益陽氣下則欬逆除陽益則傷中愈也補不足者溫苦之品能補心肝二經之陽不足也除邪氣者溫苦之氣

本草經解要卷一

遠志

單

味能除心肝包絡三經鬱結之邪氣也氣溫益陽陽主開發故利九竅九竅者耳目鼻舌口大小便各一也味苦清心心氣光明故益智慧心為君主神明出焉天君朗朗則五官皆慧故耳目聰明不忘也心之所之謂之志心靈所以志強則者收也遠志暢肝肝強故力倍久服輕身不老者心安則坎離交濟十二官皆安陽平陰秘血旺氣充也

制方

遠志同茯神人參生地棗仁丹砂鎮心定驚 同
木香歸身棗仁人參白朮茯神甘草圓肉名歸脾
湯治脾虛健忘 同人參棗仁栢仁麥冬五味歸
身茯神茯苓益智生地甘草沉香治心虛神不守
舍 專酒煎治鬱症癱疽

菖蒲氣溫味辛無毒主風寒濕痺欬逆上氣開心孔
補五臟通九竅明耳目出音聲主耳聾癱瘓溫腸胃
止小便利久服輕身不忘不迷延年益智高志

本草經解卷一 菖蒲 聖
不老

菖蒲氣溫味辛無毒主風寒濕痺欬逆上氣開心孔
無毒得地西方之金味入手太陰肺經氣味俱升
陽也風寒濕三者合而成痺痺則氣血俱閉菖蒲
入肝肝氣入肺肺主氣氣溫能行味辛能潤所
以辛之也辛潤肺肺潤則氣降而欬逆上氣自平
辛溫為陽陽主開發故開心竅辛潤肺肺主氣溫
和肝肝藏血血氣和調五臟俱補矣通九竅者

溫開發也辛溫為陽陽氣出上竅故明耳目肺主
音聲味辛潤肺故出音聲主耳聾即明耳目之功
也治癱瘓者辛能散結也腸胃屬手足陽明經辛
溫為陽陽充則腸胃溫也勝光寒則小便不禁菖
蒲辛溫溫肺肺乃勝光之上源故止小便利也久
服輕身肝條暢也不忘不迷或陽氣充而神明也
延年陽盛則多壽也益智高志辛溫為陽陽主
高明也不老溫能活血血充面華也

本草經解卷一 菖蒲 聖
制方

菖蒲同熟地黃栢九治腎虛耳聾 同白朮蒼朮
木瓜苡仁石斛草薢黃栢治濕痿及濕瘡 同人
參麥冬棗仁茯神遠志生地治心虛氣鬱 專為
水淋濕瘡
肉豆蔻氣溫味辛無毒主溫中消食止洩治積冷心
腹脹痛霍亂中惡鬼氣冷瘧嘔沫冷氣小兒乳疝

也附子熱可軟堅辛可散結溫可行滯也金瘡寒則不合附子溫肺肺主皮毛皮毛煖則瘡口合也

制方

附子佐人參肉桂五味補腎真陽 佐白朮除寒濕 同人參白芍甘草砂仁陳皮治慢驚 同白朮肉桂牛膝木瓜青皮治寒疝 同人參陳皮治久疾嘔噦 同人參白芍甘草桂枝北味治傷寒誤汗下真陽虛脫症

本草綱目卷一

附子補骨脂

聖

補骨脂氣大溫味辛無毒主五勞七傷風虛冷骨髓

傷敗腎冷精流及婦人血氣墮胎鹽水炒

補骨脂氣大溫稟天陽明之火氣入足陽明胃經

味辛無毒得地西方之金味入手太陰肺經色黑

而形如腎人足少陰腎經氣味俱升陽也其主五

勞七傷者五藏之勞食憂飲房室饑勞經絡營衛

七者之傷莫不傷損先天後天真氣而成也補骨

入腎補真陽以生土先天與後天相接腐水穀而

化精微則勞者可溫而傷者可益矣風虛冷者邪風乘虛而入以致患冷也其主之首辛溫可以散風祛冷也腎主骨髓傷敗腎虛寒也腎既虛寒則氣不足攝精精自流矣補骨溫益陽氣辛能潤髓所以主之婦人血氣婦人血冷氣寒也補骨溫肺肺主氣而為津液之化源所以治血冷氣寒也胎者大氣舉之也補骨辛溫溫能活血辛能散氣氣血活散所以墮胎也

本草綱目卷一

補骨脂

聖

制方

補骨脂四兩菟絲子四兩核桃肉一兩沉香乳香沒藥各二錢半丸治下元虛敗 同黑脂麻丸治五勞七傷 同杜仲核桃肉名青娥丸治腰痛 同白茯苓沒藥酒丸名返精丸治心腎不交 同青鹽末治精氣不固 同小茴香酒丸治小便無度 同韭子末治玉莖不痿 同肉蓯蓉丸名二神丸治虛洩 同栗壳治久痢不止

益智子氣溫味辛無毒主遺精虛漏小便餘瀝益氣
安神補不足利三焦調諸氣夜多小便者取二十四
枚破入鹽同煎服有奇驗鹽水炒

益智氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味辛
無毒得地西方之金味入手太陰肺經氣味俱升
陽也其主遺精虛漏者氣溫益肝肝氣固則不遺
洩也其主小便餘瀝者味辛益肺肺主氣氣能收
攝精氣氣化而下行所以膀胱亦固也辛益肺肺
本經經藥也

益智所以益氣者則以補氣為要又安神補不足者
清心也心者肝之相火也木氣入心也相火者相火之
府也清心者清其相火也清其相火則心神安也所以謂
益智小使氣化而下行所以膀胱亦固也辛益肺肺
本經經藥也

制方
益智同白朮同煎服有奇驗
白茯苓白朮赤白濁 同遠志茯神甘草九治

赤濁 同人參白茯苓半夏陳皮車前治溫痰上泛
同藜香蘇子陳皮木瓜枇杷葉治氣上逆 同
五味山萸人參治淋瀝 同人參炮薑陳皮藜香

治胃寒嘔吐
木香氣溫味辛無毒主邪氣辟毒疫溫鬼強志主淋
露久服不夢寐驚寐
木香氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味辛
無毒而香燥得地燥金之正味入足陽明胃經氣
本經經藥也

味俱升陽也辛溫益胃胃陽所至除邪惡毒鬼氣
皆消所以主邪氣毒疫溫鬼也辛溫之品能益陽
明陽明之氣能強志氣淋露者小便淋瀝不止勝
光氣化津液乃出淋漓不止陽氣虛下陷也陽者
胃腕之陽也辛溫益胃胃陽充而淋漓止也久服
則陽勝陽不歸於陰故不夢寐陽氣清明陰氣伏
藏故不驚寐也
制方

木香同延胡索治女人血氣刺心痛不可忍 同
牽牛雷丸檳榔治蟲積 佐川連白芍治利 同
陳皮砂仁白蔻蘇葉治氣不通順

半夏氣平味辛有毒主傷寒寒熱心下堅胸脹欬逆
頭眩咽喉腫痛腸鳴下氣止汗 湯浸去涎淨
薑汁拌焙

半夏氣平稟天秋燥之金氣入手太陰肺經味辛
有毒得地西方酷烈之金味入足陽明胃經手陽
明大腸經氣平味升陽也主傷寒寒熱心下堅者

本草經解要卷一

半夏

辛

心下脾肺之區太陰經行之地也病傷寒寒熱而
心下堅硬濕痰在太陰也半夏辛平消痰去濕所
以主之胸者肺之部也脹者氣逆也半夏辛平辛
則能開平則能降所以主之也欬逆頭眩者痰在
肺則氣不下降氣逆而頭暈眩也東垣曰太陰頭
痛必有痰也半夏辛平消痰所以主之咽喉太陰
經行之地火結則腫痛其主之者辛能散結平可
下氣氣下則火降也腸鳴者大腸受濕則腸中切

痛而鳴濯濯也辛平燥濕故主腸鳴下氣者半夏
入肺肺平則氣下也陽明之氣本下行上逆則汗
自出矣平能降氣所以止汗也

制方

半夏同黃連括蕪實各小陷胸湯治心下堅 同
甘草防風生薑治痰厥中風 同神麴南星白朮
枳實薑汁治風痰濕痰 同甘草治風痰喘急
同黃芩薑汁治上焦熱痰 同白芍甘草黃芩治

本草經解要卷一

半夏

辛

身熱吐瀉 同瓜仁治肺熱欬 同陳皮治痰飲
同白茯苓水飲 同人參治反胃 同白茯苓
草丸名消暑丸治伏暑 同人參白朮白茯苓
陳皮名六君子湯治脾濕生痰不思飲食

本草經解要卷一

本草經解要卷二

古吳葉桂天士集註

河東楊緝祖遠齋問定

同里門人王從

草部下

白豆蔻氣大溫味辛無毒主積令氣止吐逆反胃心出穀下氣

白蔻氣大溫東天木火之氣入足厥陰肝經手少

本草經解要卷二

白蔻

陽相火三焦經味辛無毒得地西方燥金之味入
手太陰肺經足陽明胃經氣味俱升陽也肺主氣
積冷氣肺寒也氣溫溫肺味辛散積所以主之食
入反出胃無火也辛溫煖胃故止吐逆反胃胃中
寒則不能化水穀肺寒則不能行金下降之令白
蔻辛溫所以胃煖則消穀肺煖而下氣也

制方

白蔻同丁香砂仁陳米黃土薑汁丸香太倉丸治

本草經解要 卷二

反胃 同人參生薑陳皮藿香治胃寒嘔吐 同

半夏陳皮生薑白朮白茯苓治寒痰作吐 同藿香

陳皮木香治上焦滯氣 同人參白朮陳皮生薑

治秋瘧胃虛不食 同扁豆五味橘紅木瓜治中

酒嘔吐

白蒺藜氣溫味苦無毒主惡血破癥結積聚喉痺乳
難久服長肌肉明目輕身炒去刺

白蒺藜氣溫東天春和之木氣入足厥陰肝經味

本草經解要卷二

白蒺藜

七

苦無毒得地南方之火味入手少陰心經氣升味
降秉火氣而生陽也主惡血者心主血肝藏血溫
能行苦能洩也癥者有形可徵也有形之積聚皆
成於血白蒺藜能破之者以入心肝而有苦溫氣
味也癥者閉也喉痺火結於喉而閉塞不通也溫
能散火苦可去結故主喉痺乳難乳汁不通也乳
房屬肝氣溫達肝其乳自通白蒺藜一名旱草秉
火氣而生形如火而有刺久服心火獨明火能生

五三五

土則飲食倍而肌肉長肝木條暢肝開竅于目故
目明木火通明元陽舒暢所以身輕也

制方

白朮蒸同歸身治月經不通 同杞子菟絲子治
肝虛 同五味淫羊藿杞子海螵蛸治肝虛陽痿
專為未服治一切鬱症明二三十年之日疾

縮砂仁氣溫味辛澁無毒主虛勞冷渴宿食不消赤
白洩痢腹中虛痛下氣

本草經解要卷十一 縮砂仁 三

砂仁氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味辛
澁無毒得地西方燥金之味入于太陰肺經足陽
明胃經手陽明大腸經氣味俱升陽也主虛勞冷
渴者陽虛而作勞則真氣愈耗所以土冷而洩瀉
也砂仁氣溫益氣味澁可以止洩也辛溫溫胃胃
緩則宿食自消赤白瀉利腸寒積滯也辛溫散寒
味澁止洩也腹中虛痛腹中陽氣虛而寒痛也溫
以益陽辛以散寒所以止之肺主氣下氣者辛能

益肺肺平氣自下也

制方

砂仁同人參陳皮藿香白茯苓炙草治吐瀉不
食 同藿香橘紅木瓜治霍亂轉筋 同川附炮
薑厚朴陳皮飯丸治冷利 連殼炒黑末熱酒下
二錢安胎止痛 用兩許炒為末入鹽三錢湯泡
冷服治乾霍亂

薑黃氣大寒味辛苦無毒主心腹結積疰忤下氣破

本草經解要卷十一 薑黃 四

血除風熱消癰腫功力烈於鬱金
薑黃氣大寒稟天冬寒之水氣入足少陰腎經足
太陽寒水膀胱經味辛苦無毒得地金火之二味
入手太陰肺經手少陰心經氣味俱降陰也心腹
心肺之分也心主血肺主氣結積者氣血凝結之
積也其主之者辛能散氣苦能破血也疰忤者濕
熱內淫性與物忤也其主之者苦寒清濕熱也下
氣者苦寒降氣也破血者辛苦行血也除風熱者

風熱爲陽邪外感太陽經氣寒清熱味辛散風也
苦寒而辛散故又主癰腫功力烈於鬱金者氣較
鬱金更寒也

制方

薑黃同肉桂枳殼治左脇痛 同當歸生地牛膝
延胡索肉桂治積血痛 同肉桂末治中寒心痛
鬱金氣寒味辛苦無毒主血積下氣生肌止血破惡
血血淋尿血金瘡

本草經解要卷一

鬱金

五

鬱金氣寒稟木水合之水氣入足少陰腎經手太
陽寒水小腸經味辛苦無毒得地金火之二味入
手太陰肺經手少陰心經氣味降多於升陰也心
主血肺主氣味苦破血氣寒降氣所以主血積下
氣也瘡口熱則腐爛血流苦寒之品爲末治外能
生肌止血也破惡血者卽味苦破血積之功其主
血淋尿血者則入小腸苦寒清血之力也以其生
肌止血所以又主金瘡

制方

鬱金同韭菜降香歸身生地童便治吐血衄血
同牛黃治陽毒失血

款冬花氣溫味辛無毒主欬逆上氣善喘喉痹諸驚
癇寒熱邪氣

款冬氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味辛
無毒得地西方澤潤之金味入手太陰肺經氣味
俱升陽也肺金主氣氣逆則火乘金而欬逆上氣

本草經解要卷一

款冬花

六

氣喘矣其主之者味辛潤肺氣溫宣通則肺金下
降之令行而諸症平也喉痹者火結於喉而閉塞
也喉亦屬肺款冬辛溫通肺故并主喉痹也諸驚
癇寒熱邪氣者驚有虛實之別癇有五藏之分其
類不一所以邪氣亦有寒熱之殊也其主之者以
其邪雖有寒熱之殊然皆厥陰肝木氣逆火炎之
症款冬辛溫溫能達肝辛能降氣氣降火平邪氣
退矣

制方

款冬同麻黃杏仁桑皮甘草治寒嗽之氣喘 同百
合煎膏各百花膏治痰欬有血

旋覆花氣溫味鹹有小毒主結氣脇下滿驚悸除水
去五藏間寒熱補中下氣

旋覆氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味鹹
有小毒得地北方陰慘之水味入足少陰腎經氣
味降多于升陰也溫能散結鹹能堅故主結氣

本草經解要卷二

旋覆花

七

脇下滿也水氣乘心則驚悸鹹溫下水所以甚主
驚悸也去五藏間寒熱者五藏藏陰者也痰蓄五
藏則陰不藏而寒熱矣鹹溫可以消痰所以去寒
熱也補中者中為脾胃水行痰消則中宮脾胃受
補也下氣者鹹性潤下也因有小毒所以服之必
煩也

制方

旋覆同人參半夏代赭石甘草生薑大棗治傷寒

汗下後心下痞堅噫氣不除

藿香氣微溫味辛甘無毒主風水毒腫去惡氣止霍
亂心腹痛

藿香氣微溫稟天初春之木氣入足少陽膽經足
厥陰肝經味辛甘無毒得地金土之二味入手太
陰肺經足太陰脾經氣味俱升陽也風水毒腫者
感風邪濕毒而腫也其主之者風氣通肝溫可散
風濕毒歸脾甘可解毒也惡氣邪惡之氣也肺主

本草經解要卷二

藿香

八

氣辛可散邪所以主之霍亂脾氣不治揮霍擾亂
也芳香而甘能理脾氣故主之也心腹亦脾肺之
分氣亂於中則痛辛甘而溫則通調脾肺所以主
之也

制方

藿香同香附木升麻諸氣 同陳皮治霍亂 同
滑石丁香治夏月吐瀉 同香附甘草治胎氣不
安 同白茯苓半夏治風水毒腫

前胡氣微寒，味苦，無毒。主痰滿胸脇中痞，心腹結氣，風頭痛，去痰，下氣，治傷寒寒熱，推陳致新，明目益精。前胡氣微寒，稟天初冬寒水之氣，入足太陽膀胱經，味苦無毒，得地南方之火味，入手少陰心經，氣味俱降陰也。胸者肺之部也，心火刑肺，則肺之津液不下行，鬱於胸中而成痰矣。前胡味苦清心火，所以主痰滿胸也。人身之氣，左升右降，心火乘肺，肺不能降，則升亦不升而脇中痞矣。前胡味苦，氣本草經解要卷二 前胡 九

寒清心降氣，肺氣降則升者亦升而痞愈矣。心腹結氣邪熱之氣結於心腹也，寒能下氣，苦能散結，所以主之。風頭痛傷風而頭痛也，風為陽邪，苦寒抑陽，故止頭痛，去痰下氣，清心寧肺之功也。傷寒寒熱，乃陽盛陰虛之風熱症也，苦寒清熱，所以治之。苦寒之味，行秋冬肅殺之令，所以推陳致新，蓋陳者去而新者方來也。味苦清火，所以明目，氣寒助陰，所以益精也。

制方
前胡同杏仁甘草桑皮桔梗治熱喘下氣。同花粉歸身甘草黃芩治傷寒寒熱。同甘菊丹皮治風熱目疼。

羌活氣平，味苦甘，無毒。主風寒所擊，金瘡止痛，奔豚，癰疽，女子疝瘕。入服輕身耐老。一名獨活。羌活氣平，稟天秋燥之金氣，入手太陰肺經，味苦甘無毒，得地南方中央火土之味，入手少陰心經。本草經解要卷二 羌活 十

足太陽脾經氣味降多於升陰也，其主風寒所擊，金瘡止痛者，金瘡為風寒所擊，則血氣壅而不行，其痛更甚矣。羌活苦能洩，甘能和，入肺解風寒，所以風血行而痛止也。奔豚者，腎水之邪如豚奔矣，而犯心也。苦可燥濕，甘可伐腎，所以主之。癰者，風症也，經者，濕流關節之症也。羌活氣平，可以治風，味苦可以燥濕，故止癰瘕也。女子疝瘕，多經行後血假風濕而成。羌活平風燥濕，兼之氣雄，可以散

血也久服則脾濕散所以輕身心血和所以耐老皆味甘苦之功也。

制方

羌活同麥冬前胡黃芩甘草治太陽疫症 同白

朮蒼朮秦艽生地苡仁木瓜石斛黃柏治下部濕

熱 同生地赤芍甘草丹皮石膏治風熱牙疼

升麻氣平微寒味苦甘無毒主解百毒殺百精老物

殃鬼辟瘟疫瘴氣邪氣蠱毒入口皆吐出中惡腹痛

本草經解卷十一

升麻

十一

時氣毒癘頭痛寒熱風腫諸毒喉痛口瘡久服不天

輕身長年

升麻氣平微寒。夏天秋平冬寒金水之氣入手太

陰肺經足太陽膀胱經手太陽小腸經味苦甘無

毒得地南方中央火土之味入手少陰心經味苦

則燥入足陽明胃經氣味輕清陽也其解百毒者

氣平而寒味甘而苦能消能和所以解毒也其殺

百精老物殃鬼者升麻藥平寒之氣則得清陽通

達之性能破幽暗制精鬼也。瘟疫瘴氣邪氣皆天

地鬱塞薰蒸之氣也。平寒能清苦能洩甘能和所

以能辟之也。蠱毒陰惡敗壞之毒甘苦之味能和

乳解故藥入口蠱即吐出也。其主中惡腹痛者甘

能解毒苦能洩邪也。其主時氣毒癘頭痛者甘平

和毒苦寒清熱平苦又燥濕也。其主寒熱風腫諸

毒者平甘以和之寒苦以清之入膀胱能散寒熱

風腫也。喉痛口瘡火鬱於上也。其主之者苦寒之

本草經解卷十一

升麻

十一

味火鬱發之也。久服不天輕身長年者升麻為陰

甲之陽能升陽氣於至陰之下。陰精所奉其人壽

也。蓋必佐補藥方可久服耳。

制方

升麻同葱白散陽明風邪 同石膏止陽明齒痛

同葛根白芍甘草名升麻葛根湯治陽明之熱

邪及癰疹 同人參蓮子治噤口痢 同石膏知

母麥冬竹葉治陽明經風熱 同川連紅麴滑石

白芍甘草治痢。

川芎氣溫味辛無毒。主中風入腦頭痛寒痺筋攣緩急金瘡婦人血閉無子。

川芎氣溫。稟天春和之木氣。入足厥陰肝經。味辛無毒。得地西方之金味。入手太陰肺經。氣味俱升陽也。風為陽邪而傷於上。風氣通肝。肝經與督脈會於巔頂。所以中風風邪入腦頭痛也。其主之者辛溫能散也。寒傷血。血凝則麻木而痺。血不養筋。

本草經解要卷十一

川芎

十三

筋急而痺。肝藏血而主筋。川芎入肝而辛溫則血活而筋舒。肝者春而榮者春也。緩急金瘡金瘡失血則筋時緩時急也。川芎味辛則潤滑可治急氣。溫則緩緩可治緩也。婦人稟地道而生以血為主。血閉不通則不生育。川芎入肝肝乃藏血之藏。生發之經。氣溫血活自然生生不已也。

制方

川芎同白芍歸身生地各四物湯治血虛 同甘

菊歸身生地白芍甘草治血虛頭痛 同歸身桂心牛膝治子死腹中 同續斷生地白膠杜仲山萸北味人參黃耆棗仁治血崩不止。

防風氣溫味甘無毒。主大風頭眩痛惡風風邪目盲無所見。風行周身骨節疼痛久服輕身。

防風氣溫。稟天春和風木之氣。入足厥陰肝經。味甘無毒。得地中正之土味。入足太陰脾經。氣味俱升陽也。肝為風木。其經與督脈會於巔頂。大風之

本草經解要卷十一

防風

十四

邪入肝則行於陽位。故頭眩痛。其主之者溫以散之也。傷風則惡風。惡風風邪在表之風也。肝開竅於目。目盲無所見。在肝經之風也。風行周身在經絡之風也。骨節疼痛。風在關節而兼濕也。蓋有濕則陽氣滯而痛也。皆主之者。風氣通肝。防風入肝。甘溫散也。脾主肌肉。濕則身重矣。久服輕身者。風劑散濕且引清陽上達也。

制方

防風同白芍黃耆治表虛自汗 同荆芥白芷生
地地榆黃耆治被傷風

葛根氣平味甘辛無毒主消渴身大熱嘔吐諸痺起
陰氣解諸毒 葛穀氣平味甘無毒主下痢十歲以

葛根氣平稟天秋平之金氣入于太陰肺經味甘
辛無毒得地金土之味入足陽明燥金胃氣味輕
清陽也其主消渴者葛根辛甘升騰胃氣氣上則

本草經解要卷二 葛根 五

津液生也其主身大熱者葛根氣平平為秋氣秋
氣能解大熱也脾有濕熱則嘔吐葛根辛甘
升發胃陽胃陽鼓動則濕熱下行而嘔吐止矣諸
痺皆起於氣血不流通葛根辛甘和散氣血活諸
痺自愈也陰者從陽者也人身陰氣脾為之原脾
與胃合辛甘入胃鼓動胃陽陽健則脾陰亦起也
甘者土之冲味甘平者金之和氣所以解諸毒也
葛穀氣平味甘入足陽明胃手陽明大腸陰中陽

也陰中之陽為少陽清輕上達能引胃氣上升所
以至下痢十歲以上陽陷之症也

制方

葛根同香薷生地煎服可以預防熱病 同白芍
甘草山藥白茯苓米治痢血不止 葛根一味治
中毒

麻黃氣溫味苦無毒主中風傷寒頭痛溫瘧發表出
汗去邪熱氣逆上氣除寒熱破癥堅積聚 去節
水煮

本草經解要卷二 麻黃 五

麻黃氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味苦
無毒得地南方之火味入手少陰心經氣味輕升
陽也心主汗肝主疎洩入肝入心故為發汗之上
藥也傷寒有五中風傷寒者風傷衛寒傷營營衛
俱傷之傷寒也麻黃溫以散之當汗出而解也溫
病但熱不寒之瘧也溫瘧而頭痛則陽邪在上必
發表出汗乃可去溫瘧邪熱之氣所以亦可主以

麻黃也。肺主皮毛。皮毛受寒。則肺傷而欬逆。上氣之症生矣。麻黃溫以散皮毛之寒。則欬逆上氣自平。寒邪鬱於身表。身表者太陽經行之地。則太陽亦病而發熱惡寒矣。麻黃溫以散寒。寒去而寒熱除矣。癢堅積聚者。寒氣凝血而成之積也。寒為陰。陰性堅。麻黃苦入心。心主血。溫散寒。寒散血活。積聚自破矣。
根節氣平。味甘無毒。入足太陰脾經。手太陰肺經。所以止汗也。

本草經解要卷一 麻黃白芷

制方

麻黃同桂心治風痹冷痛。同桂枝甘草杏仁生薑大棗治寒傷營症。同白芍甘草炮薑細辛蘇梗北味治肺寒而喘。麻黃根同黃耆牡蠣末小麥湯下治自汗。

白芷氣溫。味辛。無毒。主女人漏下赤白。血閉。陰腫。寒熱。頭風。侵目。泪出。長肌肉。潤澤顏色。可作面脂。
白芷氣溫。稟天春和之木氣。入足厥陰肝經。味辛。

無毒而芳香。得地西方。燥金之味。入足陽明胃經。手陽明大腸經。氣味俱升陽也。其主女人漏下赤白者。蓋肝主風。脾主濕。風濕下陷。則為赤白帶下。白芷入肝散風。芳香燥濕。故主之也。肝藏血。血寒則閉。氣溫散寒。故治血閉。陰者男子玉莖。女人牝戶也。屬厥陰肝。腫而寒熱。肝經風濕也。濕勝故腫也。白芷入肝。辛可散風。溫可行濕。所以主之也。肝經會督脈於巔頂。風氣通肝。肝開竅於目。頭風侵

本草經解要卷一 白芷

目。候出肝有風而疎洩也。其主之者以辛溫可散風也。胃主肌膚。而經行於面。辛溫益胃。故長肌膚。芳香辛潮。故澤顏色也。可作面脂。乃潤澤顏色之餘事也。

制方

白芷同黃耆甘草生地麥冬五味能長肉。同辛夷細辛治鼻症。同甘草生薑豆豉大棗名神白散治一切傷寒。同貝母酒煎治乳癰初起。同。

白芍甘草白茯苓米治胃虛洩瀉

藥本氣溫味辛無毒主婦人痼瘕陰中寒腫痛腹中急除頭風痛長肌膚悅顏色

藥本氣溫稟天春升之木氣入足厥陰肝經味辛無毒得地西方之金味入手太陰肺經氣味俱升陽也婦人以血為主血藏於肝肝血少則肝氣滯而疝瘕之疝生矣藥本溫辛溫行辛潤氣不滯而血不少疝瘕自平也厥陰之脈絡陰器厥陰之筋

本草經解卷一

藥本

九

結陰器其主陰中寒腫痛者入肝而辛溫散寒也厥陰之脈抵小腹肝性急腹中急肝血不潤也味辛潤血所以主之風氣通肝肝經與督脈會於顛頂風邪行上所以頭痛其主之者辛以散之也肺主皮毛長肌膚味辛益肺之力悅顏色辛能潤血之功也

制方

藥本同 小香治霧露清邪中於上焦 同羌活細

辛川芎葱白治寒鬱太陽頭痛 同白芷可作而

脂

柴胡氣平味苦無毒主心腹腸胃中結氣飲食積聚寒熱邪氣推陳致新久服輕身明目益精

柴胡氣平稟天中正之氣味苦無毒得地炎上之火味膽者中正之官相火之府所以獨入足少陽膽經氣味輕升陰中之陽乃少陽也其主心腹腸胃中結氣者心腹腸胃五臟六府也藏府共十二

本草經解卷一

柴胡

三

經凡十一藏皆取決於膽柴胡輕清升達膽氣膽氣條達則十一藏從之宣化故心腹腸胃中凡有結氣皆能散之也其主飲食積聚者蓋飲食入胃散精於肝肝之疎散又藉少陽膽為生發之主也柴胡升達膽氣則肝能散精而飲食積聚自下矣少陽經行半表半裏少陽受邪邪併於陰則寒邪併於陽則熱柴胡和解少陽故主寒熱之邪氣也春氣一至萬物俱新柴胡得天地春升之性入少

陽以生氣血故主推陳致新也久服清氣上行則陽氣日強所以身輕五藏六府之精華上奉所以明目清氣上行則陰氣下降所以益精精者陰氣之英華也

制方

柴胡同人參半夏黃芩甘草大棗生薑名小柴胡湯治少陽寒熱同白芍甘草枳實名四逆散治胸脇痛四肢厥冷同人參升麻黃耆甘草歸身

本草經解要卷二

柴胡桔梗

三

白朮廣皮生薑大棗名補中益氣湯治勞傷倦怠同人參黃耆白朮甘草升麻白茯苓澤瀉葛根神麴治暑傷元氣同升麻葛根等能升陽散火同白芍丹皮山梔甘草白茯苓白朮廣皮歸身名逍遙散治肝膽鬱火

桔梗氣微溫味辛有小毒主胸脇痛如刀刺腹滿腸鳴幽鬱恐悸氣

桔梗氣微溫藥天初春稚陽之木氣入足少陽膽

經味辛有小毒得地西方陰慘之金味入手太陰肺經氣味俱升陽也胸者肺之分也脇者膽之分也膽氣不升肺氣不降則滯於胸脇痛如刀刺矣其主之者辛以散之溫以達之也足之三陰從足走腹太陰行氣于三陰者也肺亦太陰通調上下相傳之職太陰不能通調則腹飽滿矣其主之者辛以調氣溫以行氣也大腸者燥金之府也大腸濕熱則鳴而肺與大腸為表裏桔梗辛以益肺

本草經解要卷二

桔梗

三

肺通調水道則濕熱行而肺鳴自止膽為中正之官膽者擔也膽氣傷則不能擔當而驚恐悸矣桔梗辛溫則扶蘇條達遂其生發之性復其果敢之職而驚恐悸自平也

制方

桔梗同貝母巴霜名結胸湯治痰在中焦同人參北味麥冬治小便不通同枳殼治胸滿不痛同甘草名甘桔湯治肺癰同生薑治妊娠中

惡心腹痛。

茵陳氣平微寒味苦無毒。主風濕寒熱邪氣熱結黃疸。久服輕身益氣耐老面白悅長年。

茵陳氣平微寒。稟天秋平冬寒。金水之氣入手太陰肺經。足太陽寒水膀胱經。味苦無毒。得地南方之火味。入手少陰心經。氣味俱降。陰也。風為陽邪。濕為陰邪。風濕在太陽陽邪發熱。陰邪發寒也。其主之者。氣寒清熱。味苦燥濕也。心為君火。火鬱太

本草經解要卷二

茵陳

三

陰則肺不能通調水道。下輸膀胱。而熱與濕結矣。太陰乃濕土之經。所以蒸土色於皮毛。而成黃疸也。其主之者。苦平可以清心肺微寒。可以解濕熱也。久服則燥勝。所以身輕平寒。清肺肝主氣。所以益氣。心主血。味苦清心。心清則血充華面。所以耐老。而面白可悅也。心為十二官之主。心安十二官皆安。所以長年也。

制方

茵陳同川連乾葛黃柏苡仁北味治酒疸。同二荒茯苓澤瀉車前木通陳皮神麴紅麴治穀疸。同生地石斛木瓜牛膝黃柏治女勞疸。

虞柏草氣寒味苦辛無毒。主寒熱瘰癧鼠瘻頭瘡。癰散痲結氣脚腫濕痺。輕身。

夏枯草氣寒。稟天冬寒之水氣。入足太陽膀胱寒水經。味苦辛無毒。得地火金之味。入手少陰心經。手太陰肺經。遇火令而枯。稟金水之氣。獨全水制。

本草經解要卷上

夏枯草

五

火金平木。故專手陽相火風木膽經之症。氣味輕清。少陽也。太陽主表。表邪入則太陽有病。而惡寒發熱矣。其主之者。味辛可以散表寒。味苦可以清熱也。瘰癧鼠瘻皆少陽膽經風熱之毒。夏枯草稟金水之氣。味所以專入少陽解風熱之毒也。頭乃太陽行經之地。膀胱濕熱則生頭瘡。其主之者。氣寒清熱。味苦燥濕也。積聚而有形。可微謂之瘕。乃濕熱結氣也。味辛可以散結。味苦可以燥濕熱。

所以主之也。癭亦少陽之症。其主之者以夏枯草
耑治少陽之症。而辛散之功也。濕邪傷下。脚腫濕
痺。無非濕也。苦能燥濕。所以主之。且入肺與膀胱
而有祛濕之力。濕勝則身重。既有祛濕之功。所以
又能輕身也。

制方

夏枯草末。治血崩不止。及赤白帶下。夏枯草可代
柴胡升發。可代甘菊清肝。同白朮。白朮黃柏治

本草經解要卷二

夏枯草丹參

五

濕熱。同連翹。金銀花。貝母。元參。薄荷。花粉。紫背
天葵。甘草。治癰癤。有功効。用數兩煎湯。煮甘菊
紫花。地丁。金銀花。連翹。白朮。白薇。甘草。生地。白芷
半枝蓮。消一切腫毒。甚神。

丹參氣微寒。味苦。無毒。主心腹邪氣。腸鳴。幽幽如走
水。寒熱積聚。破癥除瘕。止煩滿。益氣。

丹參氣微寒。稟天初冬寒水之氣。入手太陽寒水
小腸經。味苦無毒。得地南方之火。味入手少陰心

經氣味俱降陰也。心腹者。心與小腸之區也。邪氣
者。濕熱之邪氣也。氣寒則清熱。味苦則燥濕。所以
主之。腸小腸也。小腸為寒水之府。水不下行。聚於
腸中。則幽幽如水。走聲响矣。苦寒清洩。能瀉小腸
之水。所以主之。小腸為受盛之官。本熱標寒。所以
或寒或熱之物。皆能積聚腸中也。其主之者。味苦
能下洩也。積聚而至有形。可徵謂之癥。假物成形
謂之瘕。其能破除之者。味苦下洩之力也。心與小

本草經解要卷二

丹參

五

腸為寒。小腸者。心火之去路也。小腸傳化失職
則心火不能下行。鬱于心而煩滿矣。其主之者。苦
寒清洩之功也。肺屬金。而主氣。丹參清心瀉火。火
不刑金。所以益氣也。

制方

丹參同牛膝。生地黃。黃柏。則健走飛步。同麥
冬。沙參。五味。甘草。青蒿。花粉。治煩滿。同牛膝。木
瓜。草薢。稀莖。杜仲。續斷。治脊強脚痺。粵一味治

濕熱疝氣自汗出欲死者 為末水丸治與脚氣

益母花子氣微溫味辛甘無毒主明目益精除水氣

久服輕身

益母氣微溫稟天初春之木氣入足厥陰肝經味

辛甘無毒得地金土之味入手太陰肺經足太陰

脾經氣味俱升陽也肝為藏血之藏脾為統血之

藏辛甘益血目得血則能視所以明目脾者陰氣

之原也肺者津液之原也甘辛能潤所以益精脾

本草經解要卷二

益母

辛

者為胃行津液者也肺者相傳之官通調水道者

也辛甘益脾肺則津液行而水道通所以除水氣

久服益肝脾肺主周身之氣脾主周身之血肝

為生生之臟以生氣血氣血生長旺自然身輕

矣(壅)主癰瘡瘻所以可浴兒也

制方

益母子童便煎服能下死胎 同川芎歸身白芍

生地杜仲阿膠續斷丸安胎止痛 同生地白芍

麥冬青蒿五味阿膠治胎漏下血

紅花氣溫味辛無毒主產後血暈口噤腹內惡血不

盡絞痛胎死腹中並酒煮服亦主蠱毒

紅花氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味辛

無毒得地西方之金味入手太陰肺經氣味俱升

陽也肝為藏血之臟生生之經產後血暈口噤者

產後則肝血不藏肝枯則風熾所以血暈而口噤

也治風先治血血行風自滅紅花辛溫潤血所以

本草經解要卷二

紅花

辛

主之腹內惡血不盡絞痛胎死腹中皆血寒不行

不能養肝之故紅花辛溫活血暢肝所以主之也

並酒煎服者藉酒活血潤血之力也亦主蠱毒者

辛溫則散而毒可解也

制方

紅花煎汁和童便服治胞衣不下產後血暈 同

當歸生地牛膝白芍益母川芎延胡索治產後惡

血不盡

附氣微寒味甘無毒除胸中熱充皮毛久服令人益氣長鬚眉醋炒

香附氣微寒稟天深秋之金氣入手太陰肺經味甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣降味和陰也胸中者肺之分也皮毛者肺之合也肺主氣氣滯則熱而皮毛焦香附甘寒清肺所以除胸中熱而充皮毛也久服令人益氣者微寒清肺肺清則氣益也鬚眉者血之餘脾統血味甘益脾脾

本草經解要卷二

香附

无

血盛所以鬚眉長也

制方

香附生則上行胸膈外達皮毛熟則下走肝腎外徹腰足炒黑則止血童便炒則入血分補虛鹽水炒則入血分潤燥青鹽炒則益腎酒炒則行經絡醋炒則入肝薑汁炒則化痰飲同參朮則補氣同歸地則補血同木香則去滯同薏仁則理氣同沉香則降氣同川芎蒼朮則解鬱同梔子川連則降

火同茯神則交心腎乃十二經氣分之要藥也

童便炒為末醋湯服治血崩 同茯神甘草治氣

逆 同沉香砂仁甘草治痞脹噎酸 同砂仁甘

草治一切氣滯症 同烏藥甘草治一切心腹刺

痛 同茯神甘草橘紅治婦人血滯氣虛之症

貝母氣平味辛無毒主傷寒煩熱淋瀝邪氣疝瘕喉

痺乳難全瘰風瘰去心糯米炒

貝母氣平稟天秋平之金氣入手太陰肺經味辛

本草經解要卷二

貝母

三十

無毒得地西方之金味入手陽明燥金大腸經氣味降多於升陰也其主傷寒煩熱者傷寒有五風寒濕熱溫而風與熱乃陽盛之症陽盛所以煩熱也貝母氣平則清味辛潤散故主之也淋瀝者膀胱有熱也邪氣者熱邪之氣也膀胱以氣化為主貝母味辛潤肺肺乃主氣之藏肺潤則氣化及於州都小便通而不淋瀝矣其主疝瘕者肺氣不治則不能通調水道下輸膀胱一而濕熱之邪聚結

成疝成癧。貝母氣平可以通調水道。味辛可以散熱結也。大腸之脈其正者上循咽喉。火發於標。乃患喉痹。痹者閉也。其主之者味辛氣平。能解大腸之熱結也。肺乃津液之府。主乳難者。味辛能潤。則乳自通也。肺主皮毛。味辛氣平。則肺潤而皮毛理可愈。金瘡也。風痠者。風濕流於關節。致血不能養筋而筋急也。貝母味辛。辛則散風濕而潤血。且貝母入肺。肺潤則水道通而津液足。所以風濕逐而筋脈舒也。

本草經解要卷二 貝母

三

制方

貝母薑汁丸治憂鬱不伸。同厚朴丸化痰降氣。同知母牡蠣末豬蹄湯調服治乳汁不下。專木治吐血衄血。吹鼻中治吹乳作痛。同知母前胡麥冬葛根甘草治傷寒煩熱。同陳皮前胡石膏知母麥冬竹瀝治痰癧。同白芷白蒺藜治鬱症乳癰。

葶藶子氣寒味辛無毒。主癧癧積聚結氣。飲食寒熱破堅逐邪。通利水道。炒用

葶藶子氣寒。稟天冬寒之水氣。入足太陽寒水膀胱經。手太陽寒水小腸經。味辛無毒。得地西方之金味。入手太陰肺經。氣味降多於升。陰也。其主癧癧積聚結氣者。氣結聚而成積。有形可徵者。謂之癧。假物成形者。謂之癧。葶藶入肺。肺主氣。而味辛可以散結也。小腸為受盛之官。飲食入腸。寒熱之物皆從此運轉。如調攝失宜。則寒熱之物積矣。葶藶氣寒。可以去熱。味辛可以散寒。下洩可以去積也。破堅者。辛散之功。逐邪者。下洩之力。十劑云。洩可去閉。葶藶是也。肺者通調水道。下輸膀胱。葶藶入肺。入膀胱。辛寒下洩。所以通利也。

本草經解要卷二 葶藶子

三

制方

葶藶炒成末。蜜丸。大棗同煎。治肺壅喘急及支飲不得息。同棗肉丸治通身浮腫。專酒浸治腹

嚴積聚

元參氣微寒味苦無毒主腹中寒熱積聚女子產乳

餘疾補腎氣令人明目

蒸晒

元參氣微寒稟天冬寒之水氣入足少陰腎經味苦無毒得地南方之火味入手少陰心經手厥陰心包絡經氣味俱降陰也腹中者心腎相交之區也心為君火心不下交於腎則火積於上而熱聚腎為寒水腎不上交於心則水積於下而寒聚矣

本草經解要卷二

元參

三

元參氣寒益腎味苦清心心火下而腎水上升者一升而降者降寒熱積聚自散矣女子以血為主產乳餘疾產後諸症以產血傷也心主血味苦清心所以主之補腎氣者氣寒壯水之功也令人明目者益水可以滋肝清心有以瀉火火平水旺目自明也

制方

元參同生地甘菊蒺藜杞子柴胡能明目 同貝

母連翹甘草花粉薄荷夏枯草治瘰癧 同升麻

甘草治發癍咽痛 同知母麥冬竹葉治熱病燥

熱煩亂

天花粉氣寒味苦無毒主消渴身熱煩滿大熱補虛

安中續絕傷

天花粉氣寒稟天冬寒之水氣入足少陰腎經足太陽寒水膀胱經味苦無毒得地南方之火味入手少陰心經氣味俱降陰也膀胱者津液之府也

本草經解要卷二

天花粉

三

心火內燠則津液枯而病消渴膀胱主表火盛則表亦熱而身熱也其主之者苦寒可以清火也心為君火火盛則煩滿大熱其主之者寒以清之苦以洩之也火盛則陰虛補虛者清潤能補陰虛也陰者中之守安中者苦寒益陰陰充中有守也其主續絕傷者血為陰陰虛則傷陰枯則絕花粉清潤則虛者滋枯者潤也實名栝樓甘寒之性能解陽邪所以主傷寒陽邪結胸也

制方

花粉同川連治心火赤金消渴 同人參麥冬治

肺津枯消渴 同麥冬竹葉治心火煩渴 實同

川連枳實各小陷胸湯治傷寒結胸

牛蒡子氣平味辛無毒王明目補中除風傷一名惡實酒蒸

焙

牛蒡子氣平稟天秋子之金氣味甘無毒得地西

方之金味入手太陰肺經氣味降多於升陰也牛

本草經解要卷二 牛蒡子

三

蒡氣平清熱味辛散鬱熱清則目得血而能視

矣所以明目中者陰之守也人身陰陽求之升降

牛蒡辛平清肺肺氣下降則陰生所以補中也風

傷於衛衛附皮毛皮毛者肺之合也辛平疎肺則

皮毛解散所以除風傷也

制方

牛蒡同紫草犀角生地治痘血熱不出 同桔梗

甘草治風熱咽痛

甘菊花氣平味苦無毒王諸風頭眩腫痛目欲脫淚

出皮膚死肌惡風濕痺久服利血氣輕身耐老延年

甘菊氣平稟天秋平之金氣入手太陰肺經味苦

無毒得地南方之火味入手少陰心經氣味俱降

陰也味苦清火火抑金勝發花於秋其稟秋金之

氣獨全故為制風木之上藥也諸風皆屬於肝肝

脈連目系上出額臨督脈會於巔肝風熾則火炎

上攻頭腦而眩火盛則腫而痛其主之者味苦可

本草經解要卷二 甘菊花

三

以清火氣平可以制木也肝開竅於目風熾火炎

則目脹欲脫其主之者制肝清火也手少陰之正

脈上走喉嚨出於面合目內背心為火火盛則心

系急而淚出其主之者苦平可以降火也皮膚乃

肺之合肌肉乃脾之合木火刑肺金脾土則皮膚

肌肉皆死甘菊稟金氣具火味故平木清火而手

皮膚死肌也其主惡風濕痺者風濕成痺風統於

肝甘菊氣平有平肝之功味苦有燥濕之力也久

服利血氣者肺主氣氣平益肺所以有利於氣心
主血味苦清心所以有利於血利於氣氣充身自
輕利於血血旺自耐老氣血皆利其延年也必矣

制方

甘菊搗汁治疔瘡 重九採花末服治酒醉不醒
同杞子丸服終身無目疾瘡疽 同穀精草菘
荳皮等分末治目昏

丹皮氣寒味辛無毒主寒熱中風瘧癘驚癇邪氣除

本草經解要卷二 丹皮 三

癥堅瘀血留舍腸胃安五藏療癰瘡

丹皮氣寒稟天冬寒之水氣入手太陽寒水小腸
經味辛無毒得地西方之金味入手太陽肺經氣
味降多於升陰也寒水太陽經行身之表而為外
藩者也太陽陰虛則皮毛不密而外藩不固表邪
外入而寒熱矣其主之者氣寒可以清熱味辛可
以散寒解表也肝者風木之藏也肺經不能制肝
肝風扶濁火上逆中風瘧癘驚癇之症生焉丹皮

辛寒益肺平肝肝不升而肺氣降諸症平矣小腸

者受盛之官與心為表裏心主血血熱下注留舍
小腸瘀積成瘕形堅可徵丹皮寒可清熱辛可散
結所以入小腸而除瘕也五藏藏陰者也辛寒清
血血清陰足而藏安也榮血逆於肉裏乃生癰瘡
丹皮辛寒可以散血熱所以和榮而療癰瘡也

制方

丹皮同防風末酒服治癩疔 同麥冬五味白茯苓

本草經解要卷二 丹皮黃連 三

甘草木通生地治心包絡之火

黃連氣寒味苦無毒主熱氣目痛背傷淚出明目腸
澀腹痛下痢婦人陰中腫痛久服令人不忘 酒炒吳
黃同炒 妙

黃連氣寒稟天冬寒之水氣入足少陰腎經味苦
無毒得地南方之火味入手少陰心經氣味俱降
陰也其主熱氣自痛者心主火火氣熱心病會肝
肝開竅於目也黃連苦寒所以清火也手少陰之

正出於面合目內背手少陰為心火火盛則心系急而淚出皆傷淚出皆心火也黃連清心所以主之實則瀉其子心者肝木之子也清心則肝邪瀉所以明目也大腸為庚金之府心火乘之則津液化成膿血痛而下痢矣其主之者寒以清火苦以洩熱也北方黑色入通於腎開竅於二陰婦人陰中乃腎竅也熱勝則腫腫痛者火盛也黃連入腎寒苦清火所以主之其久服令人不忘者入心清

本草經解要卷二

黃連

无

火火清則心明能記憶也

制方

黃連同西河柳黃芩黃栢石膏知母甘草治痧疹已透煩躁不止 同當歸棗仁圓肉生地黃芩黃栢黃耆治火症盜汗 同槐花枳殼乳香沒藥治痢純血腹痛 同五味麥冬乾葛治酒病 同麥冬五味治卒消渴小便多 同人參蓮子治虛痢專為末丸名瀉心丸治心實心痛 同吳萸神

麴丸治肝火作痛 同白朮陳皮神麴丸名四神丸治胸中嘈雜作痛 同白朮治思想所致白淫 同木香丸名香連丸治痢 同炮薑末治氣痢後重

黃芩氣平味苦無毒主諸熱黃疸腸澼洩痢逐水下血閉惡瘡疽蝕火瘍

酒炒

黃芩氣平稟天秋涼之金氣入手太陰肺經味苦無毒得地南方之火味入手少陰心經氣味俱降

本草經解要卷二

黃芩

守

陰也心者火藏也十二官之君諸熱之主也若平清心故主諸熱黃疸者濕熱乘脾之症也脾為大陰濕土土濕熱則本色現而發黃疸黃芩苦平清肺脾亦太陰太陰濕熱退而脾疸亦平也肺與大腸為表裏大腸濕熱則腸澼洩痢黃芩清肺肺清則通調水道而濕熱下逐腸肺復其燥金之性而洩痢愈矣肺司水道熱則肺失清肅之令而水道不通水因而蓄焉黃芩清肺則氣化下及膀胱而

水下逐矣。血閉者實熱在血分而經閉不通也。心主血味苦清心則能下洩所以主之。惡瘡疽蝕者瘡疽敗壞潰腐而不收口也。火瘍者火傷瘡也。皆心火有餘而腐壞肺之皮毛也。苦平清心肺所以主諸痛痒瘡瘍也。

制方

黃芩同白芍甘草名黃芩湯治濕熱腹痛及瀉痢。

同白芍甘草半夏治吐瀉。同白芍麥冬白朮

本草經解要卷上

黃芩連翹

聖

治胎不安內熱。

連翹氣平味苦無毒。主寒熱鼠瘻癰癧癰腫惡瘡癩

瘡結熱蠱毒。去心用

連翹氣平稟天秋平之金氣入手太陰肺經味苦

無毒得地南方之火味入手少陰心經手厥陰心

包絡經氣味俱降陰也。心包絡者臣使之官喜樂

出焉其經別屬三焦出循喉嚨出耳後合少陽鬱

則包絡之火上炎經絡而成寒熱鼠瘻癰癧矣。連

翹輕清平苦輕而揚之因而越之。結者散而寒熱愈也。癰腫惡瘡皆生於心火。連翹味苦清心所以主之。癰瘤結熱亦心包絡之鬱結火也。其主之者輕揚有散結之功也。蠱毒因辛熱而成辛熱則生蟲也。連翹平能清而苦能洩熱解蟲化而蠱自消也。

制方

連翹同脂麻治癰癧。同貝母白芷甘草金銀花

本草經解要卷上

連翹天麻

聖

元參薄荷夏枯草白芩治同上。

天麻氣平味辛無毒。主諸風濕痺四肢拘攣小兒風

癰驚氣利腰膝強筋力久服益氣輕身長年。

天麻氣平稟天秋平之金氣味辛無毒得地西方

之金味入手太陰肺經得天地之金氣獨全故為

制風木之上藥氣降味升陽也。肝為風木諸風皆

屬於肝肝主血血澁不通則濕感成痺也。其主之

者天麻氣平味辛入肺而通水道能活血而散風

也四肢脾主之。因於濕則大筋乘短而成拘攣也。肺亦太陰。水道通調則太陰濕行而脾濕解拘攣愈矣。小兒風癇驚氣皆肝經血虛氣亢以致氣逆而驚癇也。天麻味辛辛則潤血氣平平則鎮驚也。辛平之品潤肝血而平肝氣肝主筋而位居下故能利腰膝而強筋力也。久服辛平益肺脾主氣所以益氣氣充身自輕而年自長也。

制方

本草經解要卷二 天麻木通

鑿

天麻同半夏黃芩前胡陳皮白茯苓治痰厥頭痛。

同白朮陳皮白茯苓車前治飲在心下。同南星前

胡陳皮白茯苓一切風痰。

木通氣平味辛無毒主除脾胃寒熱通利九竅血脈

關節令人不忘去惡蟲。

木通氣平。稟天秋平之金氣味辛無毒得地西方

之金味專入手太陰肺經氣降味苦陰也其除脾

胃寒熱者蓋飲入於胃遊溢精氣上輸於脾脾氣

散精上歸於肺肺氣通調水道乃下輸膀胱如水道不通則飲留於脾胃而發寒熱矣木通入肺以通水道故除脾胃寒熱也。九竅者耳目鼻各二口大小便各一也木通氣平則利味辛則通所以通利九竅血脈關節也。其令人不忘者心藏神而屬火水道通則心火有制神清多記憶也。濕熱不除則化生惡蟲水道通則濕熱有去路故惡蟲不生也。

本草經解要卷二

木通車前子

鑿

制方

木通同生地炙草竹葉治心熱便赤。同白茯苓

瀉車前豬苓燈心治癰閉。同牛膝生地天冬冬

冬五味黃柏甘草治尿血。同生地甘草赤茯苓

葉名導赤散瀉小腸之火。

車前子氣寒味甘無毒主氣癰止痛利水道通小便

除濕療久服輕身耐老。

車前氣寒稟天冬寒之水氣入足太陽寒水膀胱

經味甘無毒得地中正之土味八足太陰濕土脾經氣降味和陰也膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣出氣不化閉塞下竅而為癃閉其主之者寒能化熱甘能化氣也小便者心火之去路也火結於膀胱則小便痛矣其止痛者氣寒能清火也飲入於胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺肺乃下輸膀胱車前味甘甘能益脾脾氣散精則肺氣通行故水道通小便利也益脾利水

本草綱目卷之四 藥性論 車前子

則濕下逐故又除濕癉也久服輕身耐老者指有病者而言也人身有濕則身重濕逐則身輕濕逐脾健脾主血血充故耐老也不然滑泄之品豈堪久服者哉

制方

車前同木通沉香陳皮升麻治氣癰 同二尤木
瓜石斛草薺白茯苓五加皮治濕癉 同白芍白朮
菟絲甘草治水洩 同生地牛膝天冬麥冬黃柏

五味杞子人參白膠治尿血及女子血淋 專末服治暴洩

澤瀉氣寒味甘無毒主風寒濕痺乳難養五藏益氣力肥健消水久服耳目聰明不饑延年輕身面生光能行水上

澤瀉氣寒稟天冬寒之水氣入足太陽寒水膀胱經味甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣降味和陰也其主風寒濕痺者風寒濕三者合而

本草經解要卷之四 澤瀉

藥

成癉辨則血閉而肌肉麻木也澤瀉味甘益脾脾濕去則血行而肌肉活癉症瘳矣其主乳難者脾統血血不化乳所以難也味甘益脾脾濕行則血運而乳通也其主養五藏益氣力肥健者蓋五藏藏陰者也而脾為之原脾主肌肉而性惡濕澤瀉濕去則脾健脾乃後天之本所以肌肉長而氣力益陰氣充而五藏得所養也其消水者入膀胱氣寒下洩也久服耳目聰明不饑延年輕身者

腎與膀胱為表裏膀胱水道通心腎之精道固精足則氣充腎開竅於耳所以耳聰水之精為目瞳子所以明目腎者胃之關關門固所以不餓腎氣納所以延年輕身也其言面生光能行水上者脾為濕土濕則重燥則輕輕則能行水上脾統血血充則面有光彩也蓋表其利水有固腎之功燥濕有健脾之効也

制方

本草經解要卷二

澤瀉葶藶

罌

澤瀉同白茯苓肉桂各五苓散治濕熱

同山藥山黃白茯苓丹皮生地北味名都氣湯補腎

真陰及小兒行語遲同白茯苓建蘭葉豬苓治飲

痰欬嗽

葶藶氣平味苦無毒主腰脊痛強骨節風寒濕周痺

惡瘡不瘳熱氣

葶藶氣平稟天秋降之金氣入手太陰肺經味苦

無毒得地南方之火味入手少陰心經氣味俱降

陰也太陽寒水經挾脊抵腰中太陽有濕則陽氣不布腰脊強而痛矣太陽經行身表附皮毛而為外衛者也皮毛者肺之合葶藶氣平入肺味苦燥濕肺之皮毛理而太陽之濕亦逐所以主腰脊強痛也骨節者節捷之處也亦屬太陽經濕流孔竅故風寒濕合而成痺則周身麻木而骨節更甚也其主之者葶藶入肺肺通調水道下輸膀胱可以去太陽之濕而理痺也惡瘡熱氣皆屬心火葶藶

本草經解要卷二

葶藶防已

罌

味苦清心心火退則瘍瘡愈而熱氣解矣

制方

葶藶同蓮子白茯苓前木通澤瀉牛膝甘草黃柏

可分清治濕同杜仲治腰脚痺爽同菖蒲益

智烏藥治白濁佐杜仲肉蓯蓉菟絲子北味丸

名金剛丸治筋痿足不能行

防已氣平味辛無毒主風寒溫瘧熱氣諸癩除邪利

大小便

一第... 6 反E...

防已氣平。稟天秋降之金氣。味辛無毒。得地西方。燥金之味。入手太陰肺經。氣味降多於升。陰也。風寒溫瘧者。感風寒而患。但熱不寒之瘧也。熱氣諸癩者。心有熱而患。一切風癩也。溫熱皆為陽邪。癩瘡皆屬風木。防已氣平。可以清陽邪。味辛。可以平風木。而消風痰也。除邪者。辛平之品。可除濕熱之邪也。小便出於膀胱。膀胱津液。肺氣化。乃出。防已氣平。可以化氣。故利小便。大便出於大腸。肺與大

本草經解要卷二

防已大黃

芩

腸為表裏。味辛。可以潤腸。故利大便也。但臭惡傷胃。宜慎用之。

制方

防已同黃耆。桂枝白茯苓甘草。治皮水。同黃耆白朮。甘草生薑大棗。治風水。惡風汗出。身重脈浮。

大黃氣寒。味苦。無毒。主下瘀血。血閉寒熱。破癥瘕積聚。留飲宿食。瀉滯腸胃。推陳致新。通利水穀。調中化食。安和五藏。

大黃氣寒。稟天冬寒之水氣。入手太陽寒水小腸

經。味苦無毒。得地南方之火味。入手少陰心經。手

少陽相火三焦經。氣味俱降。陰也。濁陰歸六府。味

厚。則洩兼入足陽明胃經。手陽明大腸經。為瀉滯

之品也。味厚為陰。則入陰分。血者陰也。心王者也。

血凝則瘀。大黃入心。味苦下洩。故下瘀血。血結則

閉。陰不和陽。故寒熱生焉。大黃味苦下洩。則閉者

通。陰和於陽。而寒熱止矣。癥瘕積聚。皆有形之實

本草經解要卷二

大黃

芩

邪。大黃所至。蕩平。故能破之。小腸為受盛之官。無物不受。傳化失職。則飲留食積矣。大黃入小腸。而下洩。所以主留飲宿食也。味厚則洩。濁陰歸府。大黃味厚為陰。故入胃與大腸。而有瀉滯之功也。消積下血。則陳者去。而新者進。所以又有推陳致新之功焉。其推陳致新者。以滑潤而能通利水穀。不使阻礙腸胃中也。腸胃無礙。則陽明胃與太陰脾調和。而食消化矣。飲食消化。則陰之所生。本自五

味五藏主藏陰陰生而藏安和矣

制方

大黃同黃芩沉香礞石丸名淡痰丸治痰症同
常歸檳榔治痢初起同甘草治胃火食入即吐

燈草氣寒味甘無毒主五淋生煮服之

燈草氣寒稟天冬寒之水氣入手太陽寒水小腸
經足太陽寒水膀胱經味甘無毒得地中正之土
味入足太陰脾經氣味降多於升陰也心與小腸

本草經解要卷二 燈草 三

為表裏小便者心火之去路也心火結於小腸腸

膀胱則小便淋瀝矣燈心生煮服之氣寒清熱味甘

化氣結者解而火下洩矣

制方

燈心焙同炒鹽共末吹喉痹煎湯調燈花末塗

乳小兒吮之止夜啼

使君子氣溫味甘無毒主小兒五疳小便白濁殺蟲

療瀉痢

使君子氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味
甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味俱
升陽也小兒疳症名雖有五原皆由脾虛脾虛則
不健運於是積聚生疳也其主之者味甘可以益
脾氣溫可以健運也中氣不足則溲溺為之變所
以小便白而混濁也其主之者甘溫益氣氣足則
清肅而便清也甘溫之品則具條達之性能瀉脾
經之濕熱濕熱清則瀉痢自止而蟲不生所以殺

本草經解要卷二 使君子 三

蟲療瀉痢也

制方

使君子同蘆薈蕪荑滑石麥芽厚朴陳皮殺疳蟲

消疳積專為末治小兒蛔痛及虛腫煎湯漱蟲

牙疼痛

本草經解要卷二

本草經解要卷三

古吳葉桂天士集註

河東楊維祖遠齋閣定

同里門人王從龍校刊

木部

枸杞子氣寒味苦無毒主五內邪氣熱中消渴周痹風濕久服堅筋骨輕身不老耐寒暑

枸杞子氣寒稟天冬寒之水氣入足少陰腎經味

本草經解要卷三

枸杞

子

苦無毒得地南方之火味入手少陰心經氣味俱降陰也五內者五藏之內也邪氣者熱邪之氣也蓋五內為藏陰之地陰虛所以有熱邪也其主之者苦寒清熱也心為君火腎為寒水水不制火火燥津液則病熱中消渴其主之者味苦可以清熱氣寒可以益水也水益火清消渴自止其主周痹風濕者痹為閉症血枯不運而風濕乘之也治風先治血血行風濕滅也杞子苦寒益血所以治痹



久服苦益心寒益腎心腎交則水火擊而筋骨堅筋骨健則身自輕血足則色華所以不老耐寒暑者氣寒益腎腎水足可以耐暑味苦益心心火寧可以耐寒也

制方

杞子同五味治疰夏 同熟地白朮白茯苓治腎虛

目睛

金櫻子氣平味酸澁無毒主脾洩下痢止小便利澁

本草經解要卷三

金櫻子

子

精氣久服令人耐寒輕身

金櫻子氣平稟天秋成之金氣入手太陰肺經味酸澁無毒得地東生西收金木之味入足厥陰肝經入手陽明燥金大腸經氣味俱降陰也十劑云澁可去脫脾洩下利大腸不禁也金櫻子味酸澁所以因脫也小便氣化乃出金櫻子氣平益肺肺氣足以收攝則小便利自止五藏六府之精皆藏于腎所以疏洩肝散之也金櫻子味酸斂肝肝不

疎洩精氣自澁矣久服酸平益肺肺主皮毛皮毛
同所以耐寒肺主氣氣充所以輕身也

制方

金櫻子同艾質丸名水陸丹益氣補真 煎膏丸
杜仲末治腎洩

杜仲氣平味辛無毒主腰膝痛補中益精氣堅筋骨
強志除陰下癢濕小便餘瀝久服輕身耐老鹽水炒

杜仲氣平稟天秋降之金氣味辛無毒得地潤澤

本草經解要卷三

杜仲

三

之金味端入手太陰肺經氣味升多於降陽也腰
者腎之府膝者腎所主也杜仲辛平益肺肺金生
腎水所以腰膝痛自止也中者陰之守也辛平益
肺肺乃津液之化源所以陰足而補中也初生之
水謂之精天一之水也杜仲入肺肺主氣而生水
所以益精氣精氣益則肝有血以養筋腎有髓以
填骨所以筋骨堅也肺主氣辛平益肺則氣剛太
所以志強陰下者即纂問任脈別絡也癢濕者濕

也杜仲辛平潤肺則水道通而濕行也小便氣化
乃出有餘瀝氣不收攝也杜仲益肺氣氣固則能
攝精也久服辛平益氣氣充則身輕辛潤滋血血
旺則耐老也鹽水炒則入腎醋炒則入肝以類從
也

制方

杜仲同續斷砂仁治胎前雜症 同續斷山藥糊
丸治類墮胎 專一味酒炒丸治腰背痛

本草經解要卷三

茯苓

四

茯苓氣平味甘無毒主胸脇逆氣憂悲驚邪恐悸心
下結痛寒熱煩滿欬逆口焦舌乾利小便久服安魂
養神不饑延年

茯苓氣平稟天秋降之金氣入手太陰肺經味甘
無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣平味和
降中有升陰也胸者肺之分也脇者肝之分也肝
主升而肺主降肺金不足則氣不降肝木有餘則
氣上逆逆于肝肺之分故在胸脇間也茯苓入肺

氣平則降味甘可以緩肝所以主之脾為土肺為
金脾肺上下相交則五藏皆利位一身之天地矣
若脾肺失中和之德則憂恚驚邪恐悸七情乖戾
於胸發不中節而為病茯苓味甘和脾氣平和肺
脾肺和平七情調矣心平脾之分也濕熱在脾則
結痛濕熱不除則流入太陽而發寒熱鬱於太陰
而煩滿濕乘肺金而欬逆茯苓甘平淡滲所以能
燥脾伐水清金治以上諸症也人身水道不通則

本草經解要卷五

茯苓

五

火無制而口焦舌乾矣茯苓入肺以通水道下輸
膀胱則火有去路故止口舌乾焦水道通所以又
利小便也肝者魂之居也而隨魂往來者神也久
服茯苓則肺清肅故肝木和平而魂神安養也不
饑延年者脾為後天之本肺為元氣之府脾健則
不饑氣足則延年也

制方

白茯苓人參白朮甘草陳皮山藥扁豆白芍治脾

虛一人參白朮甘草陳皮半夏名六君子湯治
欬而吐 同二朮澤瀉車前白芍陳皮木瓜豬苓
治水腫 同陳皮半夏甘草人參枳殼川芎白芍
歸身生地前胡葛根枳殼蘇葉生薑大棗名茯苓
補心湯治火鬱心包痛而吐血欬逆

茯苓氣平味甘無毒主辟不祥療鼠眩風虛五勞口
乾止驚悸多恚怒善忘開心益智安魂魄養精神

茯苓神氣平稟天秋平之金氣入手太陰肺經味甘

本草經解要卷五

茯苓

六

無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣平味和
降中有升陰也茯苓味甘氣平得中正之氣味和
脾肺位一身之天地所以能辟不祥也諸風皆屬
肝木木虛則風動而眩其主之者味甘性緩可以
益肝傷氣平清金可以定風木也五勞五藏勞傷
其神也五勞神傷則陰火動而口乾矣茯苓甘平
安神故止口乾驚悸多恚怒善忘皆心腎不交而
肝木不寧之症茯苓氣平益肺脾氣下降則心亦

下交味甘益脾脾氣上升則腎亦上交蓋天地位則水火燾土金實則風木定五行相制之道也其謂心益者者皆氣平益肺之功肺益則水道通而心火有制所以心神開明而光明肺益則金生腎水所以伎巧出而智益也肝者魂之居肺者魄之處茯神氣平益肺脾寧肝和故安魂魄精者陰之華神者陽之靈夜神味甘益脾脾和則飲食納而精神得所養也

本草經解要卷三

茯神松花

制方

茯神同沉香丸名朱雀丸治心神恍惚 專為木艾湯服治心孔有汗及心虛夢洩白濁

松花氣溫味甘無毒主潤心肺益氣除風止血亦可

酸酒

松花氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味俱升陽也其主潤心肺者飲食入胃脾氣散精輸于心

肺松花味甘益脾氣溫能行脾為胃行其津液輸于心肺所以潤心肺也益氣者氣溫益肝之陽氣味甘益脾之陰氣也風氣通肝氣溫故肝所以除風脾統血味甘和脾所以止血也可釀酒者清香芳烈宜於酒也

制方

松花同山藥白芍甘草茯苓治洩瀉 同紅糖山藥北味肉桂白芍杜仲治腎洩 專浸酒治頭

本草經解要卷三

山藥肉

旋腦腹

山藥氣平味酸無毒主心下邪氣寒熱溫中逐寒濕痹去三蟲久服輕身核去

山藥氣平稟天秋成之金氣入手太陰肺經味酸無毒得地東方之木味入足厥陰肝經氣味俱降陰也心下脾之分也脾之邪肝木之邪也肝木血少氣亢則尅脾土并於陽則熱并於陰則寒矣山藥味酸入肝益肝血而斂肝氣則心下之寒熱自

除也。山萸味酸收斂，斂火歸于下焦。火在下，謂之少火。少火生氣，所以溫中。山萸氣平，益肺。肺主皮毛，而司水道。水道通調，則皮毛疏理而寒濕之癩瘳矣。三蟲者，濕熱所化也。濕熱從水道下行，則蟲亦去也。久服，味過于酸，肝氣以津，肝者散也，生氣生血之藏也，所以身輕也。

制方

山萸同人參、五味、杜仲、菴耆，治老人小便淋瀝及

本草經解要卷三

栢仁

九

遺尿。同葛、黃、甘、菊、生地、黃、相、五、味、治、腎、虛、耳、聾。

同杜仲、牛膝、生、地、白、膠、山、藥、治、腎、虛、腰、痛。同

生、地、山、藥、丹、皮、白、茯苓、漏、蘆、柴、胡、白、芍、歸、身、五、味、名

滋、腎、清、肝、飲、治、水、枯、木、亢、之、症。同杜仲、治、肝、腎

俱虛。

栢子仁，氣平，味甘，無毒。主驚悸，益氣，除風，燥安。五藏

久服，令人潤澤，美色，耳目聰明，不饑，不老，輕身，延年。

栢仁，氣平，味酸，無毒。主心腹寒熱，邪結氣聚，四肢

無毒，得地中正之土味，入足太陰脾經，以其仁也。

兼入手少陰心經，氣升味和，陽也。心者神之舍也。

心神不寧，則病驚悸。栢仁入心，驚者平之，氣平平

驚悸也。益氣者，氣平益肺，氣味甘益脾，氣滋潤益

心氣也。治風先治血，血行風自滅。栢仁味甘益脾

血，血行風息而脾健，運濕亦下，速矣。蓋太陰乃濕

土之經也。五藏藏陰者也。脾為陰氣之原，心為生

血之藏，肺為津液之府。栢仁平甘益陰，陰足則五

本草經解要卷三

栢仁

十

藏皆安矣。久服，甘平益血，令面光澤，心為君主，主

明則十二官皆安。耳目聰明矣。味甘益脾，不饑不

老，氣平益肺，輕身延年也。

制方

栢仁同松仁、麻仁，治老人虛閉。同白朮、生地、黃

肉丸，治心脾虛。

酸棗仁，氣平，味酸，無毒。主心腹寒熱，邪結氣聚，四肢

酸痛，濕痹。久服，安五藏，輕身延年。炒。

棗仁氣平稟天秋斂之金氣入手太陰肺經味酸無毒得地東方之木味入足厥陰肝經手厥陰風木心包絡經氣味俱降陰也心者胸臆之分手厥陰心包絡脈起之處腹者中脘之分足厥陰肝經行之地心包絡主熱肝主寒厥陰主散不能散則寒熱邪結氣聚矣棗仁味酸入厥陰厥陰和則結者散也四肢者手足也兩厥陰經行之地也酸痛濕痹風濕在厥陰絡也棗仁味酸益血血行風息

本草經解要卷五

酸棗仁

十一

氣平益肺肺理濕行所以主之也心包絡者心之臣使也代君行事之經也肝者生生之藏發榮之主也久服棗仁則厥陰陰足所以五藏皆安氣平益肺所以輕身延年也

制方

棗仁同茯神遠志麥冬石斛五味圓肉人參治驚悸 同生地白芍麥冬五味圓肉竹葉治自汗 同茯神人參治盜汗 同人參茯神白朮甘草治

振持不眠 同知母茯神甘草名酸棗仁湯治虛煩不眠

女貞子氣平味苦無毒主補中安五藏養精神除百疾入服肥健輕身不老

女貞子氣平稟天秋收之金氣入手太陰肺經味苦無毒得地南方之火味入手少陰心經氣味俱降陰也中者陰之守也五藏者藏陰者也女貞氣平益肺肺為津液之化源所以補中而藏安也心

本草經解要卷三

女貞子

十二

者神之居肺者水之母入心肺而益陰陰足氣充氣充神旺精生所以主養精神也氣失其平則為病女貞氣平益肺肺主氣氣得其平百病皆除矣人身有形之皮肉筋骨皆屬陰者也女貞平苦益陰則肌肉自豐筋骨自健也心者生之本其華在面肺者氣之源氣足則身輕血華故不老也

制方

女貞同甘菊生地杞子蒺藜治目昏暗 搗汁熬

骨埋地中七日點風熱赤眼

肉桂氣大熱味甘辛有小毒利肝肺氣心腹寒熱冷疾霍亂轉筋頭痛腰痛出汗止煩止嘔欬嗽鼻鼾墮胎漏中堅筋骨通血脈理疏不是宜導百藥無所畏久服神仙不老

肉桂氣大熱稟天真陽之火氣入足少陰腎經補益真陽味甘辛得地中西土金之味入足太陰脾經手太陰肺經有小毒則有燥烈之性入足陽明

本草經解要卷三

肉桂

十三

燥金胃手陽明燥金大腸氣味俱升陽也肉桂味辛得金味金則能制肝木氣大熱稟火氣火能制肺金制則生化故利肝肺氣心腹太陰經行之地寒熱冷疾者有心腹冷疾而發寒熱也氣熱能消太陰之冷所以愈寒熱也霍亂轉筋太陰脾經寒濕症也熱可祛寒辛可散濕所以主之經云頭痛巔疾過在足少陰腎經腰者腎之府腎虛則火升於頭故頭痛腰痛也肉桂入腎能導火歸原所以

本草經解要 卷三

主之辛熱則發散故能汗出虛火上炎則煩肉桂導火所以主止煩也腎主五液寒則上泛肉桂溫腎所以止嘔辛甘發散疏理肺氣故主欬嗽鼻鼾血熱則行所以墮胎肉桂助火火能生土所以溫中中者脾胃也筋者肝之合也骨者腎之合也甘辛之味補益脾肺制則生化所以充肝腎而堅筋骨也其通血脈理疏不足者熱則陽氣流行所以血脈通而理疏密也宜導百藥無所畏者藉其通

本草經解要卷三

肉桂桂枝

十四

行流走之性也久服神仙不老者辛熱助陽陽明故神純陽則仙而不老也

制方

肉桂同人參炮薑附子治中寒腹痛 同薑黃枳壳甘草生薑大棗治左脇痛脹 同當歸牛膝治冬月產難產門不開 同黃柏知母丸各滋腎丸治小便不通

桂枝氣溫味甘辛無毒主上氣欬逆結氣喉痹吐吸利

五六七

則節補中益氣久服通神輕身不老

桂枝氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味辛無毒得地西方潤澤之金味入手太陰肺經氣味俱升陽也肺為金藏形寒飲冷則傷肺肺傷則氣不下降而病上氣欬逆矣桂枝性溫溫肺肺溫則氣下降而欬逆止矣結氣喉痹吐吸者痹者閉也氣結於喉閉而不通但吐而不能吸也桂枝辛溫散結行氣則結者散而閉者通不吐而能吸也辛

本草經解要卷三

桂枝

五

制方

桂枝同白芍甘草生薑大棗名桂枝湯治中風
同白芍甘草飴糖生薑大棗黃耆名黃耆建中湯

治陰血不足

吳茱萸氣溫味辛有小毒主溫中下氣止痛除濕血痺逐風邪開腠理欬逆寒熱泡焙用

吳茱萸氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肺經味辛有小毒得地西方燥烈之金味入手太陰肺經氣味俱升陽也中者脾也太陰經也肺主氣亦太陰也氣溫則肺令下行而太陰亦煖所以溫中下氣也寒邪客于胸腹則真氣不通而痛矣辛溫則流

本草經解要卷三

吳茱萸

十六

行和散所以止痛也辛溫煖肺肺氣通行則水道通調故又除濕血泣則成痺肝藏血血溫則活故主血痺辛溫為陽則能發散故逐風邪肺主皮毛而司腠理辛溫疎散腠理自開形寒飲冷則傷肺肺傷則氣不下降而火反上逆欬逆寒熱之症生焉吳茱萸辛溫煖肺肺氣下降而寒熱欬逆之症自平也

制方

吳更同人參生薑大棗名吳更湯治嘔涎頭痛

同陳皮附子治腎氣上噦 同川連白芍丸治痢

同炮薑末湯服一錢治食已吞酸 同肉桂

薑丸名和中丸治寒腹脹

丁香氣溫味辛無毒主溫脾胃止霍亂壅脹風毒諸

腫齒疔醫能發諸香

丁香氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味辛

無毒得地西方之金味入手太陰肺經氣味俱升

本草經解要卷三

丁香

陽也丁香味辛入肺芳香而溫肺太陰也脾主太

陰肺煖則太陰煖而脾亦溫肺與大腸為表裡大

腸屬胃所以主溫脾胃也霍亂太陰寒濕症也氣

壅而脹肝邪乘土也丁香辛溫能散太陰寒濕平

厥陰脹氣所以主之也風氣通肝風毒諸腫風兼

濕濕勝而腫也丁香氣溫可以散肝風味辛可以

消濕腫也齒疔醫陽明濕熱生蟲也太陰與陽明

為一合丁香辛溫太陰則太陰為陽明行濕熱而

齒疔醫愈也能發諸香者丁香氣味辛溫而有起發之力也

制方

丁香同白菴藿香陳皮厚朴砂仁治寒霍亂 同

陳皮薑汁糊丸治小兒虛寒吐瀉 同半夏薑汁

丸治小兒寒濕吐瀉不止

蜀椒氣溫味辛有毒主邪氣欬逆溫中逐骨節皮膚

死肌寒濕痹痛下氣久服頭不白輕身增年

本草經解要卷三

蜀椒

六

蜀椒氣溫稟天春煖之木氣入足厥陰肝經味辛

一有毒得地西方酷烈之金味入手太陰肺經氣味

俱升陽也其主邪氣欬逆者氣溫入肝可以散邪

味辛入肺降氣可以止欬逆也中者太陰脾也蜀

椒入肺肺亦太陰肺溫脾亦溫也骨節皮膚肝肺

之令也蜀椒氣溫可以散寒味辛可以祛濕所以

主死肌痹痛也肺主氣肺溫則下降之令行所以

下氣久服辛溫活血髮者血之餘所以頭不白也

辛溫益陽陽氣充盛所以身輕增年也

制方

蜀椒炒去汗搗取紅末一斤生地取自然汁煎至一升和椒末丸名椒紅丸治元藏傷憊同蒼朮醋糊丸治餐洩不化椒目同巴豆菖蒲松脂黃

蠟為挺納耳中一日一易治耳聾神效

沉香氣微溫味辛無毒療風水毒腫去惡氣

沉香氣微溫稟天初春之木氣入足少陽膽經足

本草經解要卷三

沉香

九

厥陰肝經味辛無毒得地西方之金味入手太陰肺經氣味俱升陽也沉香辛溫而香燥入肝散風入肺行水所以療風水毒腫也風水毒腫即風毒水腫也肺主氣味辛入肺而氣溫芳香所以去惡氣也

制方

沉香同人參菖蒲遠志茯苓神棗仁生地麥冬治思慮傷心同木香藿香砂仁治中惡腹痛辟惡氣

逆

同蘇子橘紅枇杷葉白菴人參麥冬治胸中氣逆烏藥氣溫味辛無毒主中惡心腹痛蠱毒疰忤鬼氣宿食不消天行疫瘴膀胱腎間冷氣攻衝背脊婦人血氣小兒腹中諸蟲

烏藥氣溫稟天春暖之木氣入足厥陰肝經味辛無毒得地西方之金味入手太陰肺經氣味俱升陽也肺者手太陰經主氣合皮毛而為外固者也

本草經解要卷三

烏藥

三

肺氣不虛則外邪無從而入正氣不傷則外邪不能為害心腹太陰經行之地中惡而心腹痛太陰正氣不能祛邪也烏藥味辛而溫溫能行辛能散所以主之辛溫為陽陽能破陰故主蠱毒疰忤鬼氣也飲食入胃散精于肝肝之能散全賴辛溫之陽以行之也烏藥辛溫助肝所以消食疫瘴之邪皆因濕熱釀成辛溫係達可消濕熱抑寒之氣所以主之膀胱腎間冷氣寒水之氣也攻衝背脊從

陰位來而犯陽也。烏藥辛溫助陽陽之所至陰寒自退且背脊太陰肺所主也。氣溫入肝肝藏血味辛入肺肺主氣辛溫走洩所以主婦人血氣凝滯也。小兒腹中諸蟲皆濕熱所化辛溫則具上達下洩之性所以能去諸蟲也。

制方

烏藥同人參沉香檳榔各磨汁各四磨湯治七情鬱結上氣喘急 同沉香人參甘草末名烏沉散

本草經解要卷三

降真香

三

治一切氣一切冷一切痛及中惡吐瀉轉筋症忤鬼氣疫癘。

降真香氣溫味辛無毒燒之辟天行時氣宅舍怪異小兒帶之辟邪惡氣。

降香氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味辛無毒得地西方之金味入手太陰肺經氣味俱升陽也燒之能降天真氣所以辟天行時氣宅舍怪異也小兒帶之能辟惡氣者氣溫味辛辛溫為陽

陽能辟惡也色紅味甜者佳

制方

降香同白芍甘草北味丹皮白茯苓生地治怒氣傷肝吐血 多燒能祛狐媚 為末治刀傷血出不止。

蘇方木氣平味甘鹹無毒主破血產後血脹悶欲死者水煮五兩取濃汁服

蘇木氣平稟天秋降之金氣入手太陰肺經味甘

本草經解要卷三

蘇方木

三

鹹無毒得地中北土水之味入足太陰脾經足少陰腎經氣味降多於升陰也味甘入脾脾統血味鹹走血所以破血也產後血脹悶煮汁五兩服破血之功也。

制方

蘇木同澤蘭生地人參小便益母牛膝黑豆治產後血暈 同人參名參蘇飲治產後氣喘面黑欲

蔓荆子氣微寒味苦無毒主筋骨間寒熱濕痺拘攣明目堅齒利九竅去白蟲久服輕身耐老

蔓荆子氣微寒稟天冬寒之水氣入足少陰腎經足太陽寒水膀胱經味苦無毒得地南方之火味入手少陰心經氣味俱降陰也太陽寒水主筋所生之病而骨者腎之合也蔓荆寒可清熱苦可燥濕濕熱攘則寒熱退而拘攣愈矣氣寒壯水味苦清火火清則目明水壯則齒堅齒乃腎之餘也九

本草經解要卷三

蔓荆子

五

制方

蔓荆子同甘菊荆芥黃芩烏梅芽茶白茯苓川芎黑豆土茯苓治偏正頭風目將損者

桑皮氣寒味甘無毒主傷中五勞六極羸瘦崩中絕

脈補虛益氣

桑皮氣寒稟天冬寒之水氣入足少陰腎經味甘無毒得地中正之土味入足太陽脾經氣降味和陰也中者中州脾也脾為陰氣之原熱則中傷桑皮甘寒故主傷中五勞者五藏勞傷真氣也六極者六府之氣虛極也藏府俱虛所以肌肉削而羸瘦也其主之者桑皮甘以固脾氣而補不足寒以清內熱而退火邪邪氣退而脾陰充脾主肌肉自

本草經解要卷三

桑皮

五

制方

桑皮同白芍苳仁木瓜白茯苓陳皮赤小豆治水腫如神 同白芍沙參杞子黃耆甘草北味治虛勞

同糯米末米飲下治陸血欬嗽 桑皮一味治皮水

桑葉氣寒味苦甘有小毒主除寒熱出汗

桑葉氣寒稟天冬寒之水氣入足太陽寒水膀胱經味苦甘有小毒得地中南火土之味而有燥濕之性入手少陰心經足太陰脾經氣味降多于升陰也太陽者行身之表而為一身之外藩者也太陽陽本寒標熱所以太陽病則發寒熱桑葉入太陽本草經解要卷三 桑葉 苦能清甘能和故除寒熱汗者心之液得膀胱氣化而出者也桑葉入膀胱而有燥濕之性所以出汗也

制方

桑葉同黃耆歸身治血虛身熱無汗 同附子黃耆治裏氣虛寒表邪未盡 同麻丸名桑麻丸治血癩

槐花氣平味甘無毒主五痔心痛眼赤殺腹藏蟲及

皮膚風熱腸風渴血赤白痢並炒研服

槐花氣平稟天秋涼之金氣入手太陰肺經味苦無毒得地南方之火味入手少陰心經氣味俱降陰也肺與大腸為表裏五痔大腸之火症也槐花味苦清心所以主之火鬱于心則痛氣平能清味苦能瀉所以主之地眼赤肝有實火也實則瀉其子味苦清心乃肝之子也腹太陰經行之地藏即大腸肺之合也味苦可以殺蟲所以主之也皮本草經解要卷三 槐花 膚肺之合也平能清風苦能瀉熱所以主之腸風下血大腸火也赤白痢大腸濕熱也味苦者能清所以並炒研服也

制方

槐花同荆芥治下血 同牡蠣末治白帶 黃柏氣寒味苦無毒主五藏腸胃中結熱黃疸腸痔止洩利女子漏下赤白陰傷蝕瘡 鹽水 黃柏氣寒稟天冬寒之水氣入足少陰腎經味苦

無毒得地南方之火味入手少陰心經氣味俱降陰也五藏六府心為君主心屬火結熱火氣結也味苦洩熱所以主之黃疸胃經濕熱之症腸痔大腸火結之病洩利大腸濕熱之症其主之者黃柏入腎腎者胃之關大腸腎所主也氣寒能清味苦能燥故治以上諸症也漏下赤白胎漏下血及赤白帶也一因血熱妄行一因濕熱下注黃柏入腎寒能清熱苦可燥濕所以主之陰傷蝕瘡陰戶傷

本草經解要卷三

黃柏

三

蝕成瘡也諸瘡皆屬心火其主之者苦寒瀉火也

制方

黃柏同知母滋陰降火 同茅朮除濕清熱治痿

要藥 同細辛瀉膀胱火 用蜜炙成末煨大蒜

丸治妊娠下痢白色 同木瓜白茯苓二朮石斛生

地治痿 同白芍甘草治火熱腹痛

山梔仁氣寒味苦無毒主五內邪氣胃中熱氣面赤

酒炮鼓鼻白癩赤癩瘡瘍

炒黑

山梔氣寒稟天冬寒之水氣入足太陽寒水膀胱經味苦無毒得地南方之火味入手少陰心經氣味俱降陰也五內者五藏之內也五藏為陰其邪氣乃陽邪也山梔苦寒清陽所以主之胃為陽明胃中熱氣燥熱之氣也氣寒稟冬寒之水氣所以除燥熱也心主血其華在面而赤色心火盛也苦味清心所以主之鼻屬肺肺為金金色白心火乘肺火色赤故鼻紅成酒炮鼓鼻其主之者入心清

本草經解要卷三

山梔仁

三

火也癩者麻皮風也膀胱主表心火鬱于膀胱寒

水經則濕熱成癩也白者濕也赤者火也山梔入

心與膀胱苦寒可以燥濕熱所以主之也瘡瘍皆

屬心火苦寒清心故主瘡瘍也

制方

梔子同桑皮黃芩甘草桔梗五味乾葛治酒鼓鼻

同連翹麥冬竹葉燈心川連甘草瀉心經有餘

之火

琥珀氣平味甘無毒。主安五藏定魂魄殺精魅邪氣消瘀血通五淋。

琥珀氣平。稟天秋平之金氣入手太陰肺經味甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味降多于升陰也。色赤專入血分五藏藏陰者也。血有所凝則五藏為之不安。琥珀甘平和血故安五藏也。隨神往來者謂之魂。並精出入者謂之魄。魄陰而魂陽也。琥珀氣平入肺脾主氣味甘入脾脾統血

本草經解要卷三 琥珀 无

質堅有鎮定之功所以入肺脾而定魂魄也。魂魄定則神氣內守而精魅邪鬼不得犯之。所以云能殺鬼魅也。氣平則通利味甘則緩中所以能消瘀血也。氣平入肺脾通水道所以治五淋也。

制方

琥珀同乳香沒藥延胡索乾漆鱉甲為末治產後血暈。同丹砂滑石竹葉木通麥冬治心火小便閉。

豬苓氣平味甘無毒。主痰瘧解毒蠱症不祥利水道久服輕身耐老。

豬苓氣平。稟天秋涼之金氣入手太陰肺經味甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味降多于升陰也。其主痰瘧者蓋主太陰嘔吐之濕瘧也。豬苓入脾肺以化氣則濕行而瘧止也。蠱症不祥皆濕熱之毒。甘平滲利所以主之。肺主氣氣平益肺脾氣化及州都則水道利所以利水久服則味

本草經解要卷三 豬苓枳實 三

甘益脾脾統血血脈故射老氣平益肺脾主氣氣和故身輕也。

制方

豬苓同白茯苓澤瀉滑石阿膠名豬苓湯治傷寒日渴及嘔而思水。枳實氣寒味苦無毒。主大風在皮膚中如麻豆若痒除寒熱結止痢長肌肉利五藏益氣輕身。枳實氣寒。稟天冬寒之水氣入手太陽寒水膀胱

經手太陽寒水小腸經味苦無毒得地南方之火
味入手少陽相火三焦氣味俱降陰也太陽主表
經行身表為外藩者也。大風在皮膚中如麻豆苦
痒者皮毛患太麻風也。其主之者枳實入太陽苦
寒清濕熱也。小腸為寒水之經丙火之府寒熱結
者寒熱之邪結于小腸也。其主之者苦以洩結也。
小腸為受盛之府化物出焉受物不化則滯而成
痢。枳實苦寒下洩所以止痢。太陰脾主肌肉乃濕

本草經解要卷三

枳實

三

土之藏也。土濕則脾困而肌肉不生。枳實入小腸
膀胱苦寒清濕熱所以脾土燥而肌肉長也。三焦
人身一大腔子也。苦寒清三焦之相火。火息則陰
足而五藏皆安也。益氣者枳實洩滯氣而正氣受
益也。輕身者邪去積消則正氣流通而身輕也。

制方

枳實同白朮名枳朮湯治心下堅水飲痞滿。同
白朮治產後腹大滿痛。同川芎甘草治左脅痛。

脹

枳殼氣微寒味苦酸無毒。主風痒麻痺通利關節勞
氣欬嗽背膊悶倦。故留結胸膈痰滯逐水消脹滿大
腸風安胃止風痛。炒

枳殼氣微寒稟天初冬寒水之氣入足太陽寒水
膀胱經手太陽寒水小腸經味苦酸無毒得地東
南木火之味入足少陽相火膽經手厥陰風木心
包絡經氣味俱降陰也。太陽經行身表附皮毛而

本草經解要卷三

枳殼

三

為衛者也。太陽為寒水風入寒水則風濕相搏風
痒麻痺矣。其主之者酸可治風苦可燥濕也。關節
皆筋束之。太陽主筋所生病。苦寒清濕熱故利關
節也。勞則傷少陽之氣。于是相火刑金而欬嗽矣。
枳殼味酸可以平少陽味苦可以瀉相火。火息木
平而欬止矣。背膊太陽經行之地。火熱鬱於太陽
則背膊悶倦。苦寒下洩可以瀉火熱也。手厥陰經
起于胸中厥陰為相火。火炎胸中則痰涎滯結。枳

一書七〇二 冊 頁 八 五

殼寒可清火苦可以洩胸膈之痰也。人小腸膀胱而性寒苦故可以逐水消脹滿風為陽邪入大腸陽經兩陽相燦則血熱下行而為腸風心包乃風木之經代君行事而主血枳殼清心包之火可以平風木而治腸風胃為燥金味苦能燥所以安胃經云味過於苦胃氣乃厚蓋以苦能洩也。風入太陽氣壅而痛枳殼味苦能洩所以止痛也。

制方

本草經解要卷三

枳殼檳榔

三五

枳殼同人參麥冬治氣虛大便不快。同川芎歸身生地白芍秦艸治腸風下血。

檳榔氣溫味苦辛澁無毒。主消穀逐水除痰癥殺三蟲伏尸療寸白。

檳榔氣溫稟天春升之木氣入足厥陰肝經味苦辛澁無毒得地南火西金之燥味入手少陰心經足陽明燥金胃經手陽明燥金大腸經氣味降多於升陰也足陽明為木穀之海氣溫則行味辛則

散故主消穀逐水手陽明為傳導之官消化不盡則水穀留滯變成痰癥檳榔溫辛具消穀之才苦洩有下降之德所以主之也。三蟲伏尸寸白皆濕熱所化之蟲也辛則散澁則燥苦則殺蟲故主以上諸蟲也。

制方

本草經解要卷三

檳榔厚朴

三五

檳榔同川連扁豆蓮肉橘紅紅麴白芍烏梅葛根枳殼治痢下後重。同雷丸使君子白蘘蕪蘆薈肉蔻胡黃連治小兒疳蚘。同棟根鶴虱錫灰苡仁根貫仲烏梅治一切寸白蟲。同茅朮草果青皮甘草治瘴瘧。

厚朴氣溫味苦無毒。主中風傷寒頭痛寒熱驚悸氣血痺死肌去三蟲。薑汁炒。

厚朴氣溫稟天春升之木氣入足厥陰肝經味苦無毒得地南方之火味入手少陰心經氣味升多於降陽也。難經云傷寒有五中風傷寒濕溫熱病

溫病是也中風傷寒者中風症也風氣通肝肝脈與督脈會於巔風為陽邪而傷上所以頭痛其主之者厚朴入肝溫散也寒熱驚悸者病寒熱而驚悸也心虛則悸肝虛則驚厚朴氣溫可以達肝味苦可以清心也肝藏血心主血血凝泣則成癢苦可以洩溫可以行故主血癢死肌者亦血泣而皮毛不仁麻木也苦洩溫行故亦主之三蟲濕所化也味苦燥濕可以殺蟲所以去蟲也

本草經解要卷三

厚朴

五

制方

厚朴同檳榔木香川連滑石陳皮甘草治痢初起
同白朮人參白茯苓治腹脹 同生薑陳皮
藿香砂仁半夏治胃寒嘔逆

竹部

竹葉氣大寒味甘平無毒主胸中痰熱欬逆上氣
淡竹葉氣大寒稟天冬寒之水氣入足少陰腎經
味甘平無毒得地中央燥土之味入足陽明燥金

胃土氣味俱降陰也足少陰之脈其支者注胸少陰腎主五液水泛成痰痰滯胸中則熱其主之者寒可清也陽明胃氣本下行氣逆而上則薰肺而欬竹葉寒可清胃甘平可以下氣也

制方

竹葉同陳皮治上氣發熱 同石膏知母甘草麥冬名竹葉石膏湯治壯熱口渴

竹茹氣微寒味甘無毒主嘔哕溫氣寒熱吐血崩中

本草經解要卷三

竹茹

五

竹茹氣微寒稟天初冬寒水之氣入足太陽寒水膀胱經味甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味降多于升陰也太陽者寒水經也冬日燥熱則太陽陰精不藏感天燥熱之氣主春木令則為病溫火性炎上故多嘔哕病在太陽故發寒熱竹茹氣寒可以祛溫火味甘可以緩火炎所以主之也脾統血血熱妄行非吐即崩其主之者甘寒可以清熱也

制方

竹茹同麥冬半夏甘草生薑治嘔噦 同木瓜陳

皮麥冬枇杷葉人參蘆根汁石斛治胃熱嘔呃

同花粉治病後大熱指

竹瀝氣大寒味甘無毒療暴中風風癱胸中大熱止煩悶消渴勞復

竹瀝氣大寒稟天冬寒之水氣入足少陰腎經味

甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味降

本草經解要卷三

竹瀝

三

多于升陰也暴病皆屬于火火熾風生以致僵仆

或偏痺不仁竹瀝甘寒可以清熱緩急所以主之

胸中者太陰脾經行之地脾陰虛則胸中大熱矣

甘寒清熱所以主之腎者水也心者火也水不制

火則心中煩悶而消渴矣其主之者甘寒可以壯

水而清火也勞復者傷寒熱病愈後勞瘵而復熱

也其主之者亦以甘寒能更清耳

制方

竹瀝同薑汁治中風及小兒狂語 同生地麥冬

花粉石斛蘇梗北味治暴中風 同桔梗甘草麥

冬治肺痿咳嗽

果部

蓮子氣平澁味甘無毒主補中養神益氣力除百疾久服輕身耐老不饑延年去心炒

蓮子氣平澁稟天秋收之金氣入手太陰肺經味

甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經以其仁

本草經解要卷三

蓮子

三

也兼入手少陰心經氣味升多于降陽也脾者五

藏之中也甘平益脾所以補中心者神之居也芳

香清心所以養神脾為萬物之母後天之本肺主

周身之氣先天之源甘平益脾肺所以益氣力心

為十二官之主王安則十二官俱安而百病皆除

也久服輕身耐老者益氣和血之功不饑延年者

補脾養神之力也

制方

石蓮子蒸熟蜜丸不饑清心寧神 同白茯苓治遺

精 同川連木香陳米治噤口痢 同川連白芍

扁豆葛根升麻紅麴甘草滑石烏梅丸治痢如神

同馬豆末治脾虛不食

陳皮氣溫味苦辛無毒主胸中痰熱逆氣利水穀久服去臭下氣通神

陳皮氣溫稟天春升之木氣入足厥陰肝經味苦辛無毒得地南西火金之味入手少陰心經手太

本草經解要卷三

陳皮

羌

陰肺經氣味升多于降陽也胸中者肺之分也肺

主氣氣常則順氣變則滯滯則一切有形血食痰

涎皆假滯氣而成痰痰成則肺氣不降而熱生焉

陳皮辛能散苦能洩可以破痰清熱也苦辛降氣

又主逆氣飲食入胃散精于肝溫辛疏散肝能散

精水穀自下也肺主降苦辛下洩則肺金行下降

之令而下焦臭濁之氣無由上升所以去臭而下

氣也心為君主神明出焉味苦清心味辛能通所

以通神也

制方

陳皮留白和中去白消痰理氣同朮補脾同甘草補脾同補氣藥補氣同破氣藥破氣同消痰藥去痰同消食藥化食各從其類以為用也 同人參

首烏桂枝歸身薑皮治三日瘧寒多 同白菝生

薑藿香半夏治寒痰 同白茯苓甘草半夏名二陳

湯治痰症 同生薑治噎 同藿香治霍亂吐瀉

本草經解要卷三

陳皮青皮

學

用薑汁焙末同棗煎治脾瘕 去白為末藿香

調酒下治乳癰初發 鹽湯泡刮去白同甘草丸

治痰涎上泛 同白朮丸名寬中丸治脾虛脹滿

不思飲食

青皮氣溫味辛苦無毒主氣滯下食破積結及膈氣

苦無毒得地西南金火之味入手太陰肺經手少

陰心經氣味升多于降陽也其主氣滯者味辛入

陰心經氣味升多于降陽也其主氣滯者味辛入

肺肺主氣而辛溫能通也下食者飲食入胃散精于肝氣溫入肝肝能散精食自下也辛能散濕能行積者破而結者解矣肝主升肺主降升而不降氣膈于右降而不升氣膈于左溫可達肝辛苦洩肺則升降如而膈氣平矣

制方

青皮同人參鼈甲治瘧母 同枳殼肉桂川芎治左脇脹滿痛

本草經解要卷三

大棗

望

大棗氣平味甘無毒主心腹邪氣安中養脾氣平胃氣通九竅助十二經補少氣少津液身中不足大驚四肢重和百藥久服輕身延年

大棗氣平稟天秋收之金氣入手太陰肺經味甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味升多于降陽也心腹者太陰經行之地也邪之所湊其氣必虛陰陽形氣不足者宜調以甘藥大棗味甘可以調不足故主心腹邪氣外為陽內為陰陰和

則中安甘平益陰所以安中脾者陰氣之原也胃者陽氣之原也甘平益陰故養脾氣陰和則陽平故平胃氣中氣不足則九竅不通甘能滿中中氣足九竅通也十二經者三陰三陽也脾胃者陰陽之原也大棗養脾氣平胃氣則十二經無不助矣肺主氣而生津液氣平益肺所以主少氣少津液也肺主一身之氣脾統一身之血甘平益脾肺身中氣血和自無不足之症矣血氣足則神安所以

本草經解要卷三

大棗芡實

望

制方

大棗同小麥甘草名甘草小麥湯治婦人藏燥無故悲啼

芡實氣平澁味甘無毒主濕痹腰脊膝痛補中除暴疾益精氣強志令耳目聰明久服輕身不饑耐老神

仙方

芡實氣平澁稟天秋收之金氣入手太陰肺經味甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味降多于升陰也脾為濕土而統血濕邪傷于下則走廢脊膝致血泣而成癰芡實甘平則益脾肺肺通水道則濕行脾和則血活而癰者瘳矣中者脾也味甘益脾故能補中暴疾多屬于火得水之精者多能抑火芡實味甘屬土而生于水所以制火而

本草經解要卷三

芡實

望

主暴疾腎藏精肺為金而腎為水氣平益肺肺氣旺則生精金生水也味甘益脾脾氣升氣平益肺肺氣降升降如則天清地寧養之以剛大而志強矣味甘益脾脾統血自得血則明耳得血則聰故令耳目聰明也久服氣平益肺肺氣充則身輕味甘益脾脾血旺耐老不饑也肺脾氣血充足神仙有自來矣

制方

芡實同金櫻子丸補下元虛 同白茯苓石蓮肉 棗肉丸治便數遺精

木瓜氣溫味酸無毒主濕痺脚氣霍亂大吐下轉筋不止

木瓜氣溫稟天春和之木氣味酸無毒得地東方之木味氣溫升達味酸收斂一直一曲曲直為木入足厥陰肝經氣味降多于升陰也肝主筋濕傷筋筋掣則癢木瓜溫能散濕酸能舒筋故主濕癩

本草經解要卷三

木瓜

望

脚氣者濕侵肝絡也酸能滋肝溫能散濕故亦主之霍亂大吐下轉筋不止者肝屬木木邪乘土上吐下洩肝主筋筋熱短縮而為之轉也木瓜入土以瀉木木平筋自舒所以主之也

制方

木瓜同桑皮大棗治霍亂轉筋 同歸身牛膝石斛續斷白芍陳皮治血虛轉筋 同苡仁白茯苓尤五加皮石斛草薺黃柏治脚氣 專為末治楊

梅結毒

烏梅氣平味酸無毒。主下氣除熱煩滿。安心止肢體痛。偏枯不仁死肌。去青黑痣。蝕惡肉。

烏梅氣平。稟天秋收之金氣。入手太陰肺經。味酸無毒。得地東方之木味。入足厥陰肝經。氣味俱降。陰也。肺主氣。氣平則降。所以下氣。肝屬木。木枯火炎。逆於胸中。則熱而煩滿。烏梅味酸。能收浮熱。收氣下行。所以止煩滿也。心者火也。木之子也。味酸

本草經解要卷三

烏梅

單

氣平能平肝木。木和心自安也。肢體屬脾。脾為土。肝木尅土。則痛。味酸則斂。所以止痛。肝藏血。血枯則偏枯不仁。死肌矣。味酸益肝血。血和則潤。不仁死肌愈也。去青黑痣及蝕惡肉。酸收之味。外治能消痣與肉也。

制方

烏梅作湯治火炎頭痛。同豆豉甘草生薑童便治勞瘵。同川連九治赤痢。專燒灰敷治齧肉。

枇杷葉氣平味苦無毒。主卒嘔不止。下氣。大炎制

枇杷葉氣平。稟天秋收之金氣。入手太陰肺經。味苦無毒。得地南方之火味。入手少陰心經。氣味俱降。陰也。暴病屬火。火炎上逆。嘔而不止。噎者。歲也。味苦清心火。所以主之。肺主氣。氣熱則上逆。氣平降肺氣。所以下氣也。

制方

枇杷葉同麥冬五味白芍甘草治卒嘔不止。同

本草經解要卷三

枇杷葉龍眼

單

蘇梗前胡丹皮花粉五味木瓜治氣逆不下。

龍眼肉氣平味甘無毒。主五藏邪氣。安志厭食。除蟲毒。去三蟲。久服強魂聰明。輕身不老。通神明。

同肉氣平。稟天秋平之金氣。入手太陰肺經。氣味甘。無毒。得地中正之土味。入足太陰脾經。氣味降中。有升陰也。脾者五藏之原也。邪之所湊。其氣必虛。圓肉味甘。益脾脾健。運則五藏皆充。而邪氣不能容矣。腎藏志。腎者水藏也。同肉氣平。益肺肺。金生

腎水水滋而志安味甘益脾補腸以自進甘能解毒故除蠱三蟲濕熱所化也氣平益肺肺金藏也肺益則清肅之令行水道通濕熱下逐而蟲去矣久服氣平益脾味甘益脾脾主一身之血肺主一身之氣氣足生精則陰氣獨強心肝腎俱滋矣肝藏魂肝滋血藏故魂強而目明腎滋水旺則身輕而耳聰心滋血潤血色華面所以不老心靈通達所以神明也

本草經解要卷三

龍眼山棗子

四

制方

圓肉同生地天冬麥冬丹參栢仁遠志蓮肉五味
茯神人參補心安神

山棗子氣冷味酸無毒煮汁服止水痢沐頭洗身治瘡癢

山棗氣冷稟天秋涼之金氣入手太陰肺經味酸無毒得地東方之木味入足厥陰肝經氣味俱降陰也飲食入胃散精于肝肝不散精則滯而成癩

山棗味酸益肝肝能散精則滯下行氣冷益肺肺氣通調則水穀分而痢止矣沐頭者山棗消滯能去垢也皮毛者肺之令也瘡痒肺熱也氣冷清肺所以洗之也

制方

山棗同礬紅川連紅麴梢肉積 同紅麴麥芽陳皮白朮肉果厚朴砂仁消食積 同小茵九治疝氣

本草經解要卷三

杏仁

吳

杏仁氣溫味甘有小毒主欬逆上氣雷鳴喉痹下氣產乳金瘡寒心奔豚湯泡去皮尖雙仁者大毒勿用

杏仁氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味甘得地中正之土味入足太陰脾經杏果本苦且屬核仁而有小毒則稟火性入手少陰心經氣味俱升陽也肺為金藏氣上逆乘肺則欬肺苦氣逆急食苦以洩之杏仁苦而下洩所以止欬也火結于喉閉而不通則為喉痹雷鳴者火結痰雍聲如吼

也杏仁溫能散結苦能下洩甘可緩急所以王之也杏仁味苦制肺制則生化則肺金下行所以下氣肝藏血血溫則流行故主產乳血既流行瘡口亦合故又主金瘡也心陽虛則寒水之邪自下如豚上奔衝犯心君矣故為寒水奔豚其主之者杏仁稟火土之氣味能益心陽而伐水邪也杏本有小毒若雙仁則失其常所以能殺人也

制方

本草經解要卷三 杏仁桃仁

五

杏仁同白芍甘草北味蘇梗百合款冬治火逆氣喘專一味消狗肉積

桃仁氣平味苦甘無毒主瘀血血閉癥瘕邪氣殺小

蟲雙仁者大毒

桃仁氣平稟天秋收之金氣入手太陰肺經味苦甘無毒得地中南火土之味入手少陰心經是太陰脾經氣味降多于升陰也心主血脾統血血者陰也有形者也周流乎一身灌溉乎五藏者也

有疑滯非瘀即閉矣至有形可徵即成癥假物成形則成癥蓋皆心脾不運故也桃仁甘以和血苦以散結則瘀者化閉者通而積者消矣桃為五木之精能鎮辟不祥所以主邪氣稟火之苦味所以殺小蟲也

制方

本草經解要卷三 桃仁

五

桃仁同大黃朴硝甘草桂枝名桃仁承氣湯治蓄血

本草經解要卷四

古吳葉桂天士集註

河東楊緝祖遠齋閱定

同里門人王從龍按刊

金石部

鐵衣氣平味辛甘無毒主風熱惡瘡瘍疽瘡疥疥氣在皮膚中研醋炒

鐵衣氣平稟天秋降之金氣入手太陰肺經味辛

本草經解要卷四

鐵衣

甘無毒得地金土之味入足陽明燥金胃土氣味降多于升性重色黑陰也肝為風木風熱瘡疽疥疥肝火症也氣平可以平肝味甘可以緩熱所以主之也皮膚者肺之合也氣在皮中氣不斂也其主之者氣平可以斂氣也素問用鐵落治狂狂者肝木之症故取金氣以制之也

制方

鐵衣同白芍甘草丹皮杞子牛蒡茯神木瓜遠志

治狂症 同白芍北味炮薑杞子肉桂甘草治小兒驚風

硃砂氣微寒味甘無毒主身體丑癩百病養精神安魂魄益氣明目殺精魅邪惡鬼久服通神明不老丹砂氣微寒稟天初冬寒水之氣入足少陰腎經味甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經色赤而生水銀入手少陰心經蓋心乃火藏而藏陰者也氣味降多于升質重味薄陰也心腎者人身之

本草經解要卷四

硃砂

水火也天地之用在於水火水火安則人身天地位矣丹砂色赤質重可以鎮心火氣寒可以益腎水水升火降心腎相交身體五臟之病皆愈也心者生之本神之居也腎者氣之源精之處也心腎交則精神交相養矣隨神往來者謂之魂並精出入者謂之魄精神交養則魂魄自安味甘益脾胃為後天氣者得于天充于穀後天納穀所以益氣心病多舍于肝心火不炎則肝血上奉故又明目

也。色赤具南方陽明之色。陽明能辟陰幽。所以殺精魅邪惡鬼也。久服通神明不老。心之所藏者神明。久服丹砂則心火清。火清則血充。故虛靈不昧。光彩華面也。

制方

丹砂一兩。同人參。茯神。甘草各二錢。山藥。馬豆各四錢。青黛。僵蠶各一錢。水片一分。丸名安神丸。治小兒驚症。同生地。當歸。白茯苓。甘草。川連。名硃砂

本草經解要卷四

硃砂芒消

三

安神丸安神清熱

芒消氣寒。味苦。無毒。主五藏積熱。胃脹閉。滌去蓄結飲食。推陳致新。除邪氣。鍊之如膏。久服輕身。

芒消氣寒。稟天冬寒之水氣。入手太陽寒水小腸經。味苦無毒。得地南方之火味。入手少陽相火之焦經。氣味俱降。陰也。其主五藏積熱。胃脹閉者。五藏本為藏陰之經。陰枯則燥。而火就之。則熱積于藏。而陽偏盛矣。陽者胃脘之陽。陽偏盛故胃脹而

閉塞也。其主之者。芒消入三焦。苦寒下洩。水穀之道路通而脹者平矣。小腸為受盛之官。化物出焉之府。小腸燥熱。則物受而不化。飲食蓄結于腸矣。芒消入太陽。苦寒下洩。鹹以稟堅。則陳者下而新者可進也。除邪氣者。苦寒治燥熱之邪氣也。鍊之如膏。久服輕身者。指三焦小腸有實積者言也。蓋積去身自輕也。

制方

本草經解要卷四

芒消

四

芒消同大黃。枳實。厚朴。名承氣湯。治胃實積聚。

滑石氣寒。味甘。無毒。主身熱洩瀉。女子乳難。癆閉。利小便。蕩胃中積聚寒熱。益精氣。久服輕身。耐饑。長年

水研飛

滑石氣寒。稟天冬寒之水氣。入手太陽寒水膀胱經。手太陽寒水小腸經。味甘無毒。得地中正之土味。入手太陽脾經。氣味降多于升。陰也。其主身熱。腸澀者。蓋太陽行身之表。為諸經主氣者也。暑傷

太陽則氣化失職。水穀不分。身熱洩利。腸辟矣。滑石甘以益氣。寒以清暑。所以主之也。其主女子乳難者。乳汁不通也。甘寒有益脾土。脾濕行則脾血化乳也。膀胱熱則癃閉。甘寒滑滲。故主癃閉而利小便也。脾者為胃行津液者也。脾濕則困。不行胃中津液。渣穢則積聚于胃。而寒熱生焉。滑石入膀胱利小便。則濕去。脾健而胃中積聚皆行矣。益精氣者。滑石入小腸。則心火有去路。火不刑金。肺金

本草經解要卷四

滑石

五

旺生水也。久服濕行脾健。所以輕身耐饑。脾為後天。脾旺穀充。自然長年也。

制方

滑石同甘草末。治暑邪小便閉。水飛。治濕熱惡瘡。同石膏末。大麥汁服。治女勞瘕。同藿香丁香末。治霍亂。

石膏氣微寒。味辛。無毒。主中風寒熱。心下逆氣。驚喘。口乾舌焦。不能息。腹中堅痛。除邪鬼。產乳。金瘡。

石膏氣微寒。稟天初冬寒水之氣。入足太陽寒水膀胱經。味辛無毒。得地西方燥金之味。入手太陽肺經。足陽明燥金。皆手陽明燥金。大腸經。氣味降多于升。陰也。中風者。傷寒五種之一也。風為陽邪。中風病寒熱。而心下逆氣。驚喘。則已傳陽明矣。陽明胃在心之下。胃氣本下行。風邪挾之上。逆乘肺。則喘。胸木聲。則驚。陽明火燥。津液致。口乾舌焦。不能呼吸。故用石膏辛寒之味。以瀉陽明實火也。履

本草經解要卷四

石膏

六

中大腸經行之地。大腸為燥金。燥則堅痛矣。其主之者。辛寒可以清大腸之燥火也。陽明邪實。則妄言妄見。如有神靈者。邪鬼附之。石膏辛寒。清胃胃火退。而邪妄除。故云除邪鬼也。產乳者。產後乳不通也。陽明之脈。從缺盆下乳。辛寒能潤陽明。潤則乳通也。金瘡熱則皮腐。石膏氣寒。故外糝合金瘡也。

制方

石膏同川連甘草煎發狂 同知母甘草粳米者

白虎湯治陽明中風熱病 同知母麥冬甘草竹

葉名竹葉石膏湯治陽明邪熱 同防風荆芥細

辛白芷末擦胃火牙疼 同銀硃末治金瘡不合

慈石氣寒味辛無毒主周痹風濕肢節中痛不可持

物洗洗酸消除大熱煩滿及耳聾醋煨

慈石氣寒稟天冬寒之水氣入足少陰腎經味辛

無毒得地西方之金味入手太陰肺經氣味降多

本草經解要卷四 慈石 七

于升陰也其主周痹風濕肢節中痛不可持物洗

洗酸者蓋濕流關節痛而不可持物濕勝筋爽也

濕而兼風風屬木木曰曲直曲直作酸洗洗酸痛

所以為風濕周痹也慈石味辛入肺金能平木可

以治風肺司水道可以行濕也腎水藏也水不制

火濁氣上逆則大熱煩滿慈石入腎氣寒壯水質

重降濁所以主之腎開竅于耳腎火上升則聾慈

石氣寒可以鎮火所以主耳聾也

制方

慈石同生地白芍五味小茴歸身山藥治脇症

同生地肉桂炮薑五味治龍雷火逆 同麥冬五

味牛膝白芍知母歸身蘇梗治大熱煩滿及耳聾

代赭石氣寒味苦無毒主鬼疰賊風蠱毒殺精物惡

鬼腸中毒邪氣女子赤沃漏下火煨醋拌

代赭石氣寒稟天冬寒之水氣入足少陰腎經味

苦無毒得地南方之火味入手少陰心經氣味俱

本草經解要卷四 代赭石 八

降陰也天地者陰陽之體水火者陰陽之用也腎

為坎水代赭氣寒益腎則腎水中一陽上升心為

離火代赭味苦益心則心火中一陰下降水升火

降陰陽互藏其宅而天地位矣故鬼疰邪氣精魅

惡鬼賊風毒邪不能相干即或有邪亦必祛逐也

寒可清熱苦可伐邪所以又主蠱毒及腹中邪毒

也腎主二便心主血血熱則赤沃漏下苦寒清心

心腎相交所以主女子赤沃漏下也

制方

代赭石同旋覆花人參半夏生薑大棗甘草石旋覆代赭湯治傷寒汗吐下後心下痞鞭噫氣不除

細研真金湯下治小兒驚症

紫石英氣溫味甘無毒主心腹欬逆邪氣補不足女

子風寒在子宮絕孕十年無子久服溫中輕身延年

火穀醋淨

紫石英氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味

本草經解要卷四

紫石英

九

甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味俱

升陽也心腹者是太陰經行之地脾虛不能生肺

肺失下降之令則邪氣上逆而欬矣紫石英味甘

質重益脾土而降氣逆所以主欬也補不足者氣

溫補肝氣之不足味甘補脾陰之不足也厥陰之

脈結于陰器則子宮亦屬肝經肝為兩陰交盡之

經風木之府風寒在子宮則肝血不凝脾血亦不

統不能生育而孕矣脾土之成數十所以十年無

子也紫石英氣溫可以散子宮之風寒味甘可以

益肝脾之血也中者中州脾土也久服甘溫益脾

所以溫中肝木條達脾土健運所以身輕延年也

制方

紫石英同白薇艾葉白膠歸身山萸川芎香附治

女子絕孕無子同龍齒牡蠣甘草北味炮薑治

小兒驚症

赤石脂氣大溫味甘酸辛無毒主養心氣明目益精

本草經解要卷四

赤石脂

十

療腹痛腸澼下痢赤白小便利及癰疽瘡痔女人崩

中漏下產難胞衣不出久服補髓好顏色益智不饑

輕身延年火穀

赤石脂氣大溫稟天春夏木火之氣入足厥陰肝

經手厥陰心包絡經味甘酸辛無毒得地中東西

上木金之味入足陽明燥金胃土手陽明燥金大

腸氣味升多于降陽也心包絡者臣使之官喜乘

出焉故心君行事之府也石脂氣味酸溫則條暢

心包絡而心君之氣得所養矣。肝開竅于目辛溫
疎達則肝和而目明。精者五臟陰氣之華也。甘酸
之味可以益陰。所以益精而補髓也。腹者太陰經
行之地。太陰為濕土。土濕而寒則痛。右脂氣溫溫
能行寒去濕。所以主之也。胃與大腸為陽明燥金。
陽虛不燥則腸澼下利。右脂溫辛收澁。故主下利
及小便利。蓋澁可以固脫也。諸痛痒瘡瘍皆屬心
火。火有虛實。實火可瀉。虛火可補。心包絡代君行

本草經解要卷四 赤石脂 十一

事其氣味酸溫可補心包絡之次也。肝藏血肝血
不藏則崩中漏下產難胞衣不出矣。味甘酸可以
藏肝血氣溫可以達肝氣所以主之也。久服補益
陽明陽明經行于面所以好顏色。腎為慳藏而藏
智。酸收益陰所以益智。陽明胃氣充益所以不饑
而延年也。

制方

赤石脂同炮薑粳米名桃花湯治痢下膿血專

為末酒服治痰飲。同炮薑蒸餅丸名桃花丸治
痢下白凍。

穀菜部

粳米氣平味甘苦無毒。主益氣止煩止洩。

粳米氣平稟天秋成之金氣入手太陰脾經味甘
苦無毒得地中南火土之味入足太陰脾經手少
陰心經氣味降多于升陰也。脾主氣氣平益肺所
以益氣。脾為陰氣之原。脾陰充足則五臟血脈精

本草經解要卷四 粳米小麥 十二

髓周身皮肉筋骨皆因之強健。自無心煩下洩之
事矣。所以止煩止洩也。

制方

白米五合雞屎一升同炒焦為末水一升頓服治
食生米成瘕。炒焦入藥開胃下氣。

小麥氣微寒味甘無毒。主除客熱止煩渴咽燥利小
便養肝氣止漏血唾血令女人易孕。

小麥氣微寒。主入冬寒之水氣入足少陰腎經味

甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味降
多于升陰也客熱外熱也小麥味甘而潤潤則陰
生成除客熱少陰之絡絡咽水不制火則煩渴咽

乾小麥氣寒則壯水清火故止煩燥腎與膀胱為

表裏氣寒益腎則膀胱熱退而小便利矣腎水足

則生肝木木滋則氣平所以養肝氣也脾統血血

熱則妄行下漏上吐矣味甘益脾氣寒清熱所以

止嘔漏也甘潤益血女人以血為主血足所以易

本草經解要卷四

小麥馬料豆

十三

孕也

制方

小麥同通草治五淋腹滿 同甘草大棗治女人

藏燥悲啼

馬料豆氣平味甘無毒生研塗癰腫煮汁殺鬼毒止

痛久服令人身重

馬豆氣平稟天秋成潤澤之金氣入于太陰脾經

味甘無毒得地中正之上味入足太陰脾經氣味

降多于升陰也甘平潤燥清熱故生塗癰腫煮汁
殺鬼毒止痛也久服則脾土滋潤故令人身重也
蓋上濕則重也

制方

馬豆同甘草解百毒 同首烏蒸服黑髮烏鬚

同歸身蒸服治血枯 同赤豆菘豆名三豆湯治

痘血熱症

綠豆氣寒味甘無毒主丹毒煩熱風疹藥石發動熱

本草經解要卷四

綠豆

十四

氣奔豚生研絞汁服亦煮食消腫下氣壓熱解石用
之勿去皮令人小瘰

綠豆氣寒稟天冬寒之水氣入足少陰腎經味甘

無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味降多

于升陰也丹毒煩熱風疹皆屬心火綠豆入腎氣

寒足以清心火味甘可以解熱毒所以主之也丹

石之藥性熱多服則熱毒發動其主之者甘寒能

解熱毒也奔豚者心病也心受火邪而藏之于肝

肝受之而藏之腎腎氣上竅如脈奔衝也其主之者寒可清火甘可緩竅也熱勝則腫氣寒清熱所以消腫火性炎上氣熱則炎上氣寒清熱所以下氣氣寒所以壓熱味甘所以解石毒也皮性寒故用之不可去皮去皮令人小壅者甘故也

制方

綠豆同赤豆黑豆醋調敷痘癰 同大黃薄荷塗丹毒

本草經解要卷四

菡苳

五

菡苳氣微溫味甘無毒主和中下氣

菡苳氣微溫稟天春初少陽之氣入足少陽膽經手少陽三焦經味甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味俱升陽也中者脾胃也菡苳氣溫入膽膽氣生發則脾胃之氣宣通所以曰和中也味甘入脾脾健則氣下行所以下氣也

制方

菡苳同人參白朮白茯苓甘草山藥苳仁蓮肉桔梗

砂仁末各參苓白朮散治脾濕洩瀉及小兒脾虛症 同麥冬五味川連乾葛解酒毒

脂麻仁氣平味甘無毒主傷中虛羸補五內益氣力長肌肉填髓腦久服輕身不老色黑者良酒蒸晒

脂麻氣平稟天秋涼之金氣入手太陰肺經味甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經入穀之仁兼入手少陰心經氣味升多于降陽也陰者中之守也傷中者陰血傷也肺為津液化源脾統血心

本草經解要卷四

脂麻

六

主血脂麻入脾肺心甘平益血所以主傷中也脾主肌肉脾燥則虛瘦味甘潤脾故主虛羸內為陰外為陽五內五藏之內藏陰之所也脂麻滋潤故補五內陰虛則餒五藏既補氣力自充脾主肌肉味甘潤脾肌肉自長髓與腦皆陰氣所化也甘平益陰陰長髓腦自填久服味甘益脾脾血潤故不老氣平益肺脾氣充故身輕也

制方

麻仁同甘菊天冬黃栢生地首烏栢仁桑皮牛膝
杞子麥冬九治半身不遂 同芽尤九治脾濕

穀芽氣溫味苦無毒主寒中下氣除熱

穀芽氣溫稟天春生之木氣入足厥陰肝經味苦
無毒得地南方之火味入手少陰心經氣味升多
于降陽也中者脾胃也穀食入土溫能散寒故主
寒中味苦下洩所以下氣除熱也

制方

本草經解要卷四

穀芽豆豉

七

穀芽同炙草砂仁白朮九名穀神丸啓脾進食

同山藥白朮白芍白朮陳皮治脾虛不食

豆豉氣寒味苦無毒主傷寒頭痛寒熱瘴氣惡毒煩
躁滿悶虛勞喘吸兩脚疼冷

豆豉氣寒稟天冬寒之水氣入足太陽寒水膀胱
經手太陽寒水小腸經味苦無毒得地南方之火
味入手少陰心經手少陽相火三焦經氣味俱降
陰也傷寒有五風寒濕熱溫當其初傷太陽也太

陽經行于頭而本寒標熱故必頭痛寒熱豆豉氣
寒能清味苦能洩所以主之也瘴氣惡毒致煩躁
滿悶熱毒鬱于胸中非宜劑無以除之故用豆豉
苦寒所以湧之也虛勞喘吸火乘肺也兩脚疼冷
火上而不降也豆豉苦寒足以清火清上則火自
降所以皆主之也

制方

豆豉同葱白治傷寒初起 同薤白治血利

本草經解要卷四

豆豉紅麴

六

紅麴氣溫味甘無毒主消食活血健脾燥胃治赤白

痢下水穀

紅麴氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味甘
無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味俱升
陽也主消食者飲食入胃散精于肝肝散之然後
脾消之紅麴入脾肝氣溫達肝肝疎暢則脾亦健
運也肝藏血脾統血血溫則活也人之水穀入胃
中焦濕熱蒸蒸游溢精氣日化為經是為營血紅

麴以白飯蒸成紅色與營血有同氣相求之理能生血而健脾胃健則為胃行其津液而胃燥矣治赤白痢者以有活血消食之功也下水穀者氣溫達肝味甘益脾之力也

制方

紅麴同白朮甘草治吐逆 同滑石甘草末治暑痢

神麴氣溫味辛甘無毒主化水穀宿食癥結積聚健

本草經解要卷四

神麴

十九

脾煖胃炒黃

神麴氣溫稟天春升之木氣入足厥陰肝經味辛甘無毒得地中西土金之味入足陽明燥金胃土氣味俱升陽也飲食入胃散精于肝肝不散精則水穀宿積矣積之既久則有形可徵者結于內神曲氣溫散肝肝氣疎散則宿者銷而積者化也肝氣既疎腸則脾土自健陽者胃腕之陽辛溫益陽所以又煖胃也

制方

神麴同茅朮丸健脾燥濕 專炒研末酒服二錢能回乳

醋氣溫味酸無毒主消癰腫散水氣殺邪毒

醋氣溫稟天春和之木氣入足少陽膽經味酸無毒得地東方之木味入足厥陰肝經氣味降多于升陰也肝藏血少陽為相火火逆血壅則生癰腫味酸收斂氣溫行血故外敷消癰腫也水畏土剋

本草經解要卷四

醋酒

二十

味酸斂木木斂土伸所以散水氣也邪毒多屬發物味酸收斂所以殺邪毒也

制方

醋同半夏雞蛋白黃治少陰病咽中生瘡 同黃耆白芍桂枝治黃汗 火炭沃醋治產婦昏暈

酒氣大熱味苦辛甘有毒主行藥勢殺百邪惡毒氣酒氣大熱稟天純陽之氣入手少陽相火三焦經味苦辛甘有毒得地火金土之味燥烈之性入足

陽明燥金胃土手陽明燥金大腸經氣味升多于降陽也純陽之性走而不守故行藥勢氣熱助陽味辛甘則發散所以殺百邪惡毒氣也

制方

酒浸瀉羊藿治腹痛 浸牡荊子治耳聾

飴糖氣大溫味甘無毒主補虛乏止渴去血

飴糖氣大溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味俱

本草經解要卷四 飴糖

升陽也肝者生生之藏生氣生血之經也脾者後天之本萬物之母也飴糖氣溫達肝肝氣升則陽氣充味甘益脾脾血潤則陰氣盛所以主虛乏也

味甘益脾脾陰足則渴止氣溫溫肝肝藏血血溫則瘀者行所以去血也

制方

飴同白芍甘草桂枝生薑大棗名建中湯治肝脾血不足 同川椒炮薑人參名大建中湯治腹痛

不可解

乾薑氣溫味辛無毒主胸滿欬逆上氣溫中止血出汗逐風濕痹腸澼下痢生者尤良 炮

乾薑氣溫稟天春升之木氣入足厥陰肝經味辛無毒得地西方之金味入手太陰肺經炮灰色黑入足少陰腎經氣味俱升陽也胸中者肺之分也肺寒則金失下降之性氣壅於胸而滿也滿則氣上所以欬逆上氣之症生焉其主之者辛散溫行

本草經解要卷四 乾薑

也中者脾胃胃也脾胃為土土賴火生炮薑入腎助火火在下謂之少火少火生氣氣充則中自溫也血隨氣行氣逆火動則血上溢炮薑人腎腎溫則浮逆之火氣皆下火平氣降其血自止矣出汗者辛溫能發散也逐風濕痹者辛溫能散風濕而通血閉也腸澼下痢大腸之症蓋大腸寒則下痢腫穢肺與大腸為表裏辛溫溫肺故大腸亦溫而

下痢止也生者其性尤烈所以尤良

制方

炮薑同北味斂火下行。同人參溫中益氣。同生地白芍牛膝歸身治產後發熱。同人參陳皮治胃虛嘔逆。同陳皮白朮貝母白茯苓治痰瘕。同人參白朮桂枝陳皮治寒瘧。同人參白朮甘草各理中湯治虛寒洩瀉。

生薑氣微溫味辛無毒久服去臭氣通神明。

生薑氣微溫稟天初春之木氣入足少陽膽經足

本草經解要卷四

生薑

主

厥陰肝經味辛無毒得地西方之金味入手太陰肺經氣味俱升陽也臭氣陰濁之氣也久服辛溫益陽陽能去陰所以去臭氣也神者陽之靈也明者陽之光也辛溫為陽久服陽勝所以通神明也

制方

生薑取自然汁晒粉同甘草半夏陳皮白茯苓為末

治中焦濕鬱之痰

荊芥氣溫味辛無毒主寒熱鼠瘻癰癧生瘡破積聚

氣下瘀血除濕疸

荊芥氣溫稟天春升之木氣入足少陽膽經足厥陰肝經味辛無毒得地西方之金味入手太陰肺經氣味俱升陽也少陽膽經行半表半裏邪客之則往來寒熱荊芥辛溫和解少陽所以主之鼠瘻癰癧生瘡皆少陽火鬱之症荊芥辛以達風木之氣溫以發相火之鬱鬱火散而風寧諸症平矣飲食入胃散精於肝肝不散精氣聚而積聚成矣荊芥入肝溫能行氣所以主之肝藏血血隨氣行肝氣滯則血亦滯而瘀焉溫可行氣辛可破血故下瘀血也肺者通調水道之官也水道不通則濕熱成疸荊芥辛能潤肺肺治則水道通所以除濕疸也

本草經解要卷四

荊芥

主

制方

荊芥同童便治產後衄血。同槐花治大便下血

同生地治疥瘡。荊芥穗末酒服二錢治中風

口噤兼治產後風噤迷悶

薄荷氣溫味辛無毒主賊風傷寒發汗惡氣心腹脹滿霍亂宿食不消下氣煑汁服亦堪生食

薄荷氣溫稟天春升之木氣入足厥陰肝經味辛無毒得地西方之金味入手太陰肺經氣味俱升陽也傷寒有五中風傷寒濕溫熱病溫病是也賊風傷寒者中風也風傷於衛所以宜辛溫之味以發汗也惡氣心腹脹滿蓋脹之惡氣必從肝而來

本草經解要卷四

薄荷

辛

薄荷入肝溫能行辛能散則惡氣消而脹滿平也太陰不治則揮霍擾亂薄荷辛潤肺肺氣調而霍亂愈矣飲食入胃散精於肝肝不散精則食不消薄荷入肝辛散宿食自消也肺主氣薄荷味辛潤肺肺潤則行下降之令所以又能下氣也以氣味芳香故堪生食也

制方

薄荷同漆葉苦參何首烏麻仁荊芥生地茯苓

尤苜蒲治大麻風 專為末蜜丸治風熱上壅

香薷氣微溫味辛無毒主霍亂腹痛吐下散水腫香薷氣微溫稟天初春之木氣入足少陽膽經味辛無毒得地西方燥金之味入手太陰肺經手陽明大腸經氣味俱升陽也夏月濕熱之氣鬱於太陰陽明則揮霍擾亂而腹痛吐瀉矣其主之者溫能行氣辛可解濕熱也肺者相傳之官主通調水道下輸膀胱香薷味辛潤肺所以主散水腫也

本草經解要卷四

香薷紫蘇

辛

制方

香薷同人參白朮木瓜白茯苓陳皮車前治水腫 同白朮丸治水腫以小便利為效

紫蘇氣溫味辛無毒主下氣除寒中其子尤良

紫蘇氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味辛無毒得地西方之金味入手太陰肺經氣味俱升陽也肺主氣而屬金金寒則不能行下降之令紫蘇辛溫溫肺肺溫則下降所以下氣脾為中州太

陰經也。肺亦太陰。肺溫則脾寒亦除。故除寒中也。其子尤良。下降之性辛溫。氣味尤甚也。其梗本乎地者。親下下氣尤速。

制方

紫蘇同陳皮治感寒上氣。同人參治虛欬上氣。蘇子同良薑廣皮丸治風濕脚氣。同梗米治上氣欬逆。

葱白氣平味辛無毒作湯治傷寒寒熱中風面目浮腫能出汗。

本草經解要卷四

葱白

辛

葱白氣平稟天秋涼之金氣入手太陰肺經味辛無毒得地西方燥金之味入足陽明燥金胃經氣味升多于降陽也太陽寒水經為人身外藩者也。寒水虛則外邪傷病名傷寒傷寒有五風寒濕熱溫也當初傷太陽太陽為病必發寒熱故可從表散之葱白入肺肺合皮毛味辛可散所以主傷寒寒熱表邪也風為陽邪陽邪傷上風勝則浮腫辛

平可以散風所以主之氣平入肺肺合皮毛味辛發散則胃氣充而穀精化汗故能出汗也。

制方

葱白同生薑治傷寒頭痛。同人參治脫陽危症。炒熨小腹治小便閉脹。搗敷金瘡出血。

薤白氣溫味辛苦滑無毒主金瘡瘡敗輕身不饑耐老。

薤白氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味辛

本草經解要卷四

薤白

辛

苦滑無毒得地西南金火之味而有潤澤之性入手太陰肺經手少陰心經氣味升多于降陽也。金瘡氣虛則瘡口不合氣溫可以益氣所以主瘡敗也。氣溫達肝肝氣條暢則氣血日生所以輕身溫煖脾土土健所以不饑味辛潤血血華所以耐老也。

制方

薤白同瓜蒌白酒治胸痹心背痛。同瓜蒌白酒

半夏治胸痹不臥心痛徹背 同枳實桂枝厚朴
瓜蒌治胸痹胸滿脇下逆搶心

白芥子氣溫味辛無毒發汗主胸膈痰冷上氣面目
黃赤醋研敷射工毒

芥子氣溫稟天春升之木氣入足厥陰肝經味辛
無毒得地西方之金味入手太陰肺經氣味俱升
陽也味辛入肺肺合皮毛辛溫發散所以發汗胸
者肺之分也膈者肝之分也白芥子辛溫疎散所

本草經解卷四 白芥子 无

以入肝肺之分而消痰冷也肺主氣氣溫則下行
所以至上氣也面目黃赤肝乘脾也氣溫達肝肝
不乘脾黃赤自退也醋研主射工毒亦辛溫條達
之功效也

制方

白芥子同白朮棗肉丸治胸膈痰飲 同甘遂大
戟蝎尾巴霜辰砂丸各控涎丹治痰迷心竅

禽獸部

五靈脂氣溫味甘無毒主療心腹冷氣小兒五疳辟
疫治腸風通利氣脈女子月閉研酒

五靈脂氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味
甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味俱
升陽也心腹者太陰厥陰經行之地也寒則冷氣
凝矣其主之者氣溫可以祛寒也氣溫可以暢肝
味甘可以益脾小兒疳雖有五皆由肝氣滯脾氣
虛而成所以概主五疳也味甘能和所以辟疫久

本草經解卷四 五靈脂 无

風人中乃為腸風氣溫達肝肝主風而藏血故治
腸風溫則通行故利氣脈脾統血肝藏血血溫則
行故主月閉也

制方

五靈脂同澤蘭牛膝益母延胡丹皮紅花赤芍山
查生地治惡露未盡 同降香紅麴通草紅花延
胡非萊菔便治胃脘瘀血痛 同木香烏藥治血
氣刺痛 專用生熟各半為木治革不知人事

龍骨氣平味甘無毒主心腹鬼疰精物老魅欬逆洩痢膿血女子漏下癥瘕堅結小兒熱氣驚癇

龍骨氣平稟天秋收之金氣入手太陰肺經味甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經龍為東方之神鱗蟲之長神靈之骨入足厥陰肝經氣味降多于升陰也心腹太陰經行之地也太陰脾氣上升則肺氣下降位一身之天地而一切鬼疰精魅不能犯之矣龍骨氣平益肺肺平則下降味甘益

本草經解要卷四

龍骨

主

脾胃和則上升升降如而天地位焉所以祛鬼疰精物老魅也欬逆者肝火炎上而乘肺也洩痢膿血清氣下陷也女子漏下肝血不藏也龍骨味甘可以緩肝火氣溫可以達清氣甘平可以藏肝血也脾統血癥瘕堅結脾血不運而凝結也氣溫能行可以散結也小兒熱氣驚癇心火盛舍肝而驚癇也驚者平之龍骨氣平所以可平驚也

制方

龍骨同牡蠣白芍甘草桂枝生薑大棗治夢遺

同遠志硃砂丸治勞心夢遺 同韭子治洩精

同白石脂治洩瀉 同牛黃犀角鈎藤丹砂生地

茯神琥珀金箔天竹黃竹瀝治大人癲症小兒驚

癇

鹿茸氣溫味甘無毒主漏下惡血寒熱驚癇益氣強志生齒不老

鹿茸氣溫稟天春升之木氣入足厥陰肝經味甘

本草經解要卷四

鹿茸

主

無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味俱升陽也肝藏血脾統血肝血不藏則脾血不統漏下惡血矣鹿茸氣溫可以達肝味甘可以扶脾所以主之也寒熱驚癇者驚癇而發寒熱也蓋肝為將軍之官肝血虛則肝氣亢挾濁火上逆或驚或癇矣鹿茸味甘可以養血氣溫可以導火所以止驚癇之寒熱也益氣者氣溫則益陽氣味甘則益陰氣也甘溫有益陰陽之氣氣得剛大而志強矣鹿

其骨屬也。齒者骨之餘也。甘溫之味主生長所以生齒。真氣充足氣血滋盛所以不老也。

制方

鹿茸同牛膝杜仲地黃山萸補骨巴戟山藥菴蓉兔絲治腰痛陰痿。同白膠陽起石菴蓉棗仁栢仁黃耆熟地丹砂丸名斑龍丸治諸虛。專用浸酒治陽事虛痿。同兔絲小茴羊腎丸治腰痛不能轉側。

本草經解要卷四

白膠

三

白膠氣平味甘無毒。主傷中勞絕腰痛羸瘦補中益氣。婦人血閉無子。止痛安胎。久服輕身延年。

白膠氣平。稟天秋收之金氣。入手太陰肺經。味甘無毒。得地中正之土味。入足太陰脾經。氣味降多。于升實滋味厚陰也。中者脾土也。傷中勞絕者脾虛之人而作勞以傷真氣。脾為陰氣之源。源枯而陰絕也。其主之者味甘益脾陰也。腰痛羸瘦者脾為陰氣之源。而針合人身之肌肉脾陰虛則腎陰

亦虛。故腰痛而肌肉瘦削也。其主之者味甘可以補脾氣。平可以益肺滋腎也。補中者補脾中氣也。益氣者肺主氣。氣平可益肺也。脾統血。女人血閉無子。脾血不統也。味甘益脾陰。所以主之。脾血少則燥而痛矣。味甘養血。所以止痛。血足則胎安。故又安胎也。久服輕身延年者。白膠氣平益肺。肺主氣。氣足則身輕。味甘益脾。脾統血。血足則穀納而延年也。

本草經解要卷四

白膠阿膠

三

制方

白膠同牛膝丹皮麥冬生地白芍歸身鬱金續斷小便治勞傷吐血。同山萸杞子鹿茸生地麥冬杜仲補骨山藥車前五味巴戟蓮鬚歸身紫石英。治女人血閉無子。

阿膠氣平味甘無毒。主心腹內崩勞極酒洒如瘧狀。腰腹痛四肢酸疼。女子下血安胎。久服輕身益氣。阿膠氣平。稟天秋收之金氣。入手太陰肺經。味甘

無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味降多
于升色黑質潤陰也心腹者太陰經行之地也內
崩勞極者脾血不統內崩而勞極也陰者中之守
陰虛則內氣餒而洒洒惡寒如瘧狀也其主之者
味甘可以益脾陰也腰腹皆藏陰之處陰虛則空
痛阿膠色黑益陰所以止痛四肢脾主之酸疼者
血不養筋也味甘益脾脾血統四肢之疼自止女
子下血脾血不統也味甘以統脾血血自止也安

本草經解要卷四

阿膠

苦

胎者亦養血之功也久服輕身益氣者氣平益肺
肺主氣氣充則身輕也

制方

阿膠同杜仲杞子白芍山藥生地人參黃耆續斷
治崩中漏下 同白芍炙草麥冬生地白膠歸身
杞子杜仲續斷治婦人胎漏下血 同川連黃芩
白芍雞子黃名黃連阿膠湯治少陰病心煩不臥
同蒲黃生地治吐血衄血 同黃連白茯苓治

下痢毒法

麋羊角氣寒味鹹無毒主明目益氣起陰去惡血注
下辟蠱毒惡鬼不祥常不魘寐

麋羊角氣寒稟大冬寒之水氣入足少陰腎經味
鹹無毒得地北方之水味入足太陽寒水膀胱經
氣味俱降陰也膀胱經起于目內眥氣寒可以清
火火清則水足而目明矣益氣者鹹寒益腎氣之
不足也起陰者鹹寒益腎腎足則宗筋強也味鹹

本草經解要卷四

麋羊角

苦

則破血氣寒則清熱故主惡血注下也蠱毒濕熱
之毒也鹹寒可清濕熱所以主之麋羊性靈通神
故辟惡鬼不祥鹹寒益腎腎水足則精明所以常
不魘寐也

制方

麋羊角同犀角丹砂牛黃琥珀天竺黃金箔茯神
遠志竹瀝鈎藤治癲狂 同杞子甘菊穀精生地
五味女貞子黃柏治肝熱目昏

犀角氣寒味苦酸鹹無毒主百毒蟲疰邪鬼癩氣殺
鉤吻鴆羽蛇毒除邪不迷或歷寐久服輕身

犀角氣寒累天冬寒之水氣入足少陰腎經味苦
酸鹹無毒得地東南北木火水之味入手少陰心
經手厥陰風木心包絡經手太陽寒水小腸經氣
味俱降陰也百毒之性皆熱蟲疰亦濕熱而成其
主之者苦寒可以清熱散毒也氣寒壯腎水味苦
清心火火降水升心腎相交一身之天地位矣所

本草經解要卷四

犀角

三七

以能除邪殺鬼不迷或歷寐也氣寒味苦行天地
肅殺之令所以辟瘴解鉤吻鴆羽蛇毒也久服輕
身者心腎交則陰陽和心神清則百脈理所以身
輕也

制方

犀角同丹砂琥珀金箔天竺黃牛黃鈎藤麝犀角
珠屑治風熱驚癇 同生地紅花麥冬紫草白芍
牛蒡治血熱痘病 同鬱金小便生地麥冬甘草

白芍治吐血衄血

虎骨氣微熱味辛無毒主邪惡氣殺鬼疰毒止驚悸
治惡槍鼠瘻頭骨尤良煎

虎骨氣微熱累天初夏之火氣入足少陽相火膽
手少陽相火三焦經西方之神味辛無毒得地面
方之全味入手太陽肺經氣味俱升陽也其除
惡氣者味辛入肺肺主氣氣肅則一切邪惡皆除
也鬼疰之毒陰惡之毒也虎骨氣味辛熱入三焦

本草經解要卷四

虎骨

三六

而通達所以殺鬼疰也膽虛則驚悸辛熱溫膽故
止驚悸惡槍鼠瘻之毒虎為西方金獸虎嘯風生
金能制木也其毒屬木所以主之鼠瘻少陽膽與
三焦之毒所以主之者亦以味辛制風木之毒也
頭骨氣厚所以尤良也

制方

虎骨同牛膝木瓜生地山藥山萸黃柏杞子麥冬
五味治痿痺不能步履 同草薢獨活防己茅朮

牛膝何首烏苒仁木瓜治偏痹不仁 同歸身白

芍藥草續斷牛膝白膠生地麥冬治白虎痛風

同龍骨遠志未名預知散治驚悸久服令人聰慧

同鹿手角白芍浸酒治臂痛

蠱魚部

石蜜氣平味甘無毒主心腹邪氣諸驚癇瘵安五藏

諸不足益氣補中止痛解毒除眾病和百藥久服強

志輕身不饑不老延年神仙火煉

本草經解要卷四

石蜜

堯

石蜜氣平稟天秋收之金氣入手太陰肺經味甘

無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味升多

于降陽也心腹太陰經行之地也氣味甘平故主

邪氣諸驚癇瘵肝熱而氣逆也驚者平之癇瘵者

緩之甘平之味平之緩之也甘為土化土乃萬物

之母五藏諸不足補之以甘也真氣者得于天充

手穀甘味益脾脾和則穀納所以益氣補中也蜜

乃採百花釀成而得至甘之正味所以止痛解毒

除眾病和百藥也久服氣平益肺脾主氣味甘益
脾脾統血血氣和調所養剛大所以強志輕身不
饑不老延年神仙也

制方

蜜同蘆根汁梨汁人乳牛乳童便竹瀝治癩瘡

煉熟和諸丸藥膏子塗火灼瘡 煉鞭加皂角末

作擬納便道中治大便硬結

烏賊魚骨氣微溫味鹹無毒主女子赤白漏下經汁

本草經解要卷四

烏賊魚骨

罕

血閉陰蝕腫痛寒熱癥瘕無子煨

烏賊魚骨氣微溫稟天春和之木氣入足厥陰肝

經味鹹無毒得地北方之水味入足少陰腎經氣

味升多于降陽也女子以血為主肝為藏血之藏

肝血不藏則赤白漏下其主之者氣溫以達之也

肝藏血血枯則血閉其主之者味鹹以通之也腎

為藏精之藏主陰戶隱曲之地肝為厥陰其經絡

陰器其筋結陰器二經濕濁下注則陰蝕腫痛其

于之者氣溫可以燥濕味鹹可以消腫也寒熱瘰
瘰者癥瘕而發寒熱也烏賊骨鹹可更堅溫可散
寒熱也男子腎虛則精竭無子女子肝傷則血枯
無子鹹溫入肝腎通血益精令人有子也

制方

烏賊魚骨同蘆薈雀卵丸治肝傷血枯 同橘紅
末寒食麩丸治骨節 同蒲黃末治舌腫出血不

止 同北味杞子淫羊藿歸身丸久服令人多子

本草經解要卷四

烏賊龜甲

望

龜甲氣平味鹹無毒主心腹癥瘕堅積寒熱去痞疾
息肉陰蝕痔核惡肉醋炙

龜甲氣平稟天秋收之金氣入手太陰肺經味鹹
無毒得地北方之水味入足少陰腎經氣味俱降
陰也心腹者厥陰肝經經行之地也積而有形可
徵謂之癥假物而成者謂之瘕堅硬之積致發寒
熱厥陰肝氣凝聚十分亢矣龜甲氣平入肺肺平
可以制肝味鹹可以更堅所以主之也痞者肝氣

滯也鹹平能制肝而更堅故亦主之息肉陰蝕痔
惡肉一生于鼻鼻者肺之竅也一生于二便二便
腎之竅也入肺腎而更堅所以消一切惡肉也

制方

龜甲同牛膝當歸陳皮首烏知母麥冬治久瘧
同知母石膏麥冬貝母竹葉治溫瘧 同青蒿麥
冬五味生地杞子牛膝治骨蒸勞

龜甲氣平味甘有毒主漏下赤白破癥瘕痔瘡五痔

本草經解要卷四

龜甲

望

陰蝕濕癬四肢重弱小兒顛不合久服輕身不饑

龜甲氣平稟天秋收之金氣入手太陰肺味甘得
地中正之土味入足太陰脾北方之神介蟲之長
性復有毒稟陰寒之性入足少陰腎經氣味降多
于升陰也脾統血脾血不統則漏下赤白其主之
者味甘益脾也瘧而至于有癥瘕濕熱之邪已癩
結陰分矣龜甲陰寒可以清熱氣平可以利濕所
以至之也火結大腸則生五痔濕濁下注則患陰

蝕肺合大腸腎主陰正性寒可去熱氣平可消滯
所以主之也脾主四肢濕勝則重弱龜甲味甘參
脾氣平去濕濕行四肢健也腎主骨小兒腎虛則
顛骨不合其主之者補腎陰也久服益腎腎者胃
之關關門利能去脾濕所以身輕不饑也

制方

龜甲同熟地黃藥知母豬脊髓丸各補陰丸治陰
虛相火熾 同髮川芎歸身治難產及短小女子

本草經解要卷四

龜甲牡蠣

聖

交骨不開

牡蠣氣平微寒味鹹無毒主傷寒寒熱溫瘧酒酒驚

恚怒氣除拘緩鼠瘦女子帶下赤白久服強骨節殺

邪鬼延年盛泥
固椒

牡蠣氣平微寒稟天秋冬金水之氣入手太陰肺

經足太陽寒水膀胱經味鹹無毒得地北方之水

味入足少陰腎經氣味俱降陰也冬不藏精水枯

火旺至春木火交熾發為傷寒熱病病在太陽寒

小所以寒熱其主之者鹹寒之味入太陽壯水清
火也夏傷於暑但熱不寒名為溫瘧溫瘧陰虛陰
者中之守守虛所以酒酒然也其主之者鹹寒可

以清暑熱氣平入肺肺平足以制瘧邪也肝虛則

驚肝實則恚怒驚者平之恚怒降之氣平則降蓋

金能制木也味鹹足以栗堅平寒可除拘緩故主

鼠瘦濕熱下注于腎女子則病帶下氣平而寒可

清濕熱所以主之久服強骨節鹹平益肺腎之功

本草經解要卷四

牡蠣人乳

聖

也殺邪鬼氣寒清肅熱邪之力也能延年者固澀

補氣之全功也

制方

牡蠣同龍骨桂枝白芍甘草薑棗治夢洩 同黃

耆麻黃根治盜汗 同元參甘草丸治瘰癧 煨

研米醋炒成團再煨研以米醋調艾末熬膏丸醋

湯下治月水不止

人部

人乳氣平味甘鹹無毒主補五藏令人肥白悅澤
人乳氣平稟天秋金之平氣入手太陰肺經味甘
鹹無毒得地中北土水之味入足太陰脾經足少
陰腎經氣味降多于升陰也肺主一身之氣脾統
一身之血腎藏一身之精人乳本血所化入脾肺
腎三經補益精氣血所以五藏皆益而令人肥白
悅澤也

制方

本草經解要卷四

人乳

聖

人乳同梨汁名接命丹治氣血衰弱 同牛膝杜
仲補骨脂白茯苓牛乳當歸丸名太乙神應丸治虛
損
小便氣寒味鹹無毒療寒熱頭痛溫氣童男者尤良
小便氣寒稟天冬寒之水氣入足太陽寒水膀胱
經味鹹無毒得地北方之水味入足少陰腎經氣
味俱降陰也太陽膀胱經起于目內眥上額交巖
行身之表而為外藩者也感天燥火之溫氣入寒

水之經則寒熱頭痛矣小便鹹寒下降所以可灌
燥火之邪也童男者穢氣少故尤良也

制方

小便同白芍甘草丹皮白茯苓山萸北味治吐血不
止 同人參附子肉桂治陰盛格陽 同豆豉治
頭痛至極

紫河車氣溫味甘鹹無毒主血氣羸瘦婦人勞損面
黧皮黑腹內諸病漸瘦瘁者以五味和之如髓餌法

本草經解要卷四

紫河車

聖

與食之勿令知

紫河車氣溫稟天春生之木氣入足厥陰肝經味
甘鹹無毒得地中北土水之味入足太陰脾經足
少陰腎經氣味升多于降陽也脾者統血之藏腎
者藏氣之經肝者生生之藏以生氣血之經甘鹹
益脾腎氣溫暢肝氣所以主血氣羸瘦也婦人以
血為主勞傷五藏則損其真陰陰虛血枯血不華
面面黧皮黑河車味厚益陰所以主之也腹者陰

也腹內諸病陰分虧也除主質所以形漸瘦也陰
虛補之以味所以用五味和之也勿令病人知者
恐知之而惡其藥也

制方

河車同人參黃耆鹿茸白膠當歸補骨五味巴戟
天治真陽虛損 同敗龜板黃柏杜仲牛膝生地
砂仁白茯苓天冬麥冬人參五味丸名大造丸治男
女虛勞骨蒸

本草經解要卷四

紫河車

聖



銅人腧穴鍼灸圖經卷上


經脈

黃帝內經云凡人兩手足各有三陰脈三陽脈以合為十二經脈也手之三陰從臑走至手手之三陽從臑走至頭足之三陽從頭下走至足足之三陰從足上走入腹絡脈傳注周流不息故經脈者行血氣通陰陽以榮於身者也其始從中焦注手太陰陽明陽明注足陽明太陰注手少陰太陽太陽注足太陽少陰少陰注手心主少陽少陽注足少陽厥陰厥陰復還注手太陰其氣常以平且為紀以漏水下百刻晝夜行流與天同度終而復始也

銅人腧穴

經脈

上缺





十二經脈氣穴經絡圖

黃帝問曰余聞氣穴三百六十五以應一歲未知其所願卒聞之岐伯稽首再拜對曰審乎哉問也其非聖帝孰能窮其道焉因請溢意盡言其要雷公問曰禁服之言凡刺之理經脈為始願聞經脈之始生帝答曰經脈者所以決死生處百病調虛實不可不通矣手太陰之脈起於中焦下絡大腸還循胃口上膈屬肺從肺系橫出腋下下循臑內行少陰心主之前下肘中循臂內上骨下廉入寸口上魚循魚際出大指之端其支者從腕後直出次指內廉出其端是動則病肺脹滿膨而喘欬缺盆中痛甚則交兩手而脅是為臂厥主肺所生病者欬嗽上氣喘喝煩心胃滿臑臂內前廉痛掌中熱氣盛有餘則肩背痛風汗出中風小便數而欠氣虛則肩背痛寒少氣不足以息溺色變凡十二經之病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷則灸之不盛不虛以經取之其十二經皆倣此也

手太陰肺經左右凡二十二穴

少商二穴 在手大指端內側去爪甲角如韭葉

魚際二穴 在手大指本節後內側散脈中

太淵二穴 在掌後

經渠二穴 在寸口

列缺二穴 在腕後

孔最二穴 在腕上

尺澤二穴 在肘約

俠白二穴 在肘上

天府二穴 在腋內

雲門二穴 在巨骨下

中府二穴 在雲門下

手陽明之脉起於大指次指之端循指上廉出合谷

兩骨之間上入兩筋之中循臂上廉入肘外廉循臑

外前廉上有出髃骨之前廉上出桡骨之會上下入

缺盆絡肺下膈屬大腸其支別者從缺盆上頸貫頰

下入齒縫中還出俠口交人中左之右右之左上俠

鼻孔是動則病齒痛頰腫主津所生病者目黃口乾

軌衄喉痺肩前膈痛大指次指痛不用也

手陽明大腸經左右凡四十六穴

商陽二穴 一名絕陽在手大指次指

二間二穴 一名二間在手大指次指

三間二穴 一名三間在手大指次指

合谷二穴 大指虎口在

陽谿二穴 在腕中

偏歷二穴 在腕中

溫留二穴 在腕上

下廉二穴 在肘上

上廉二穴 在肘上

三里二穴 在曲池

曲池二穴 在肘外

肘髁二穴 在肘上

五里二穴 在肘上

臂臑二穴 在肘上

肩髃二穴 在肩端

巨骨二穴 在肩端

天鼎二穴 在頸後

扶突二穴 在頸後

禾髃二穴 在頸後

迎香二穴 在鼻旁

手少陰之脉起於心中出屬心系下膈絡小腸其支

者從心系上俠咽系目其直者復從心系却上肺出

腋下循臑內後廉行太陰心主之後下肘內廉循

肩內後廉至掌後兌骨之端入掌內廉循小指之內出其端是動則病監乾心痛渴而飲是謂臂瘵是主心所生病者目黃脇痛臑臂內後廉痛瘵掌中熱也

手少陰心經左右凡一十八穴

少衝二穴 在掌中少指內

少府二穴 在掌中直勞宮

神門二穴 在掌後兌骨端

陰郄二穴 在掌後脈中

通里二穴 在腕後

靈道二穴 在掌後一寸五分

少海二穴 在肘內廉節後陷中

青靈二穴 在肘上

極泉二穴 在腋內腋筋下

手太陽之脈起於小指之端循手外側上腕出踝中直上循臂骨下廉出肘內側兩骨之間上循臑外後廉出肩解繞肩胛交肩入缺盆向腋絡心循咽下膈拉胃屬小腸其支別者從缺盆循頸上頰至目銳眦却入耳中其支者別頰上頰拉鼻至目內眦斜絡於頰是動則病監痛頰腫不可回顧肩似拔臑似抽

主液所生病者耳聾目黃頰頰腫肩臑肘臂外後廉痛也

手太陽小腸經左右凡三十八穴

少澤二穴 在掌小指末

前谷二穴 在掌前陷中

後谷二穴 在掌後陷中

腕骨二穴 在腕後陷中

陽谷二穴 在腕後陷中

養老二穴 在後一寸陷中

支正二穴 在腕後五寸

小海二穴 在肘內廉節後陷中

肩貞二穴 在肩後陷中

臑腧二穴 在臑後大骨

天宗二穴 在臑後大

秉風二穴 在臑後外肩小

曲垣二穴 在肩中

肩外腧二穴 在肩外廉

肩中腧二穴 在肩中

天窗二穴 在頰後動脈前

天容二穴 在頰後

顛髻二穴在面頰下

聽官二穴在耳中珠子大如小豆是

手厥陰之脉起於臂中出屈心包下膈歷絡三焦其支者循臂出腋腋下三寸上抵腋腋下循膈內行太陰少陰之間入肘中下臂行兩筋之間入掌中循中指出其端其支別者從掌中循小指次指出其端是動則病手心熱臂肘癢急腋腫甚則臂骨支滿心中澹澹大動面赤善笑不休目黃是主心包脉所生病者煩心心痛掌中熱也

手厥陰心包經左右凡一十八穴

針灸卷六

中衝二穴在手小指之端

勞宮二穴在掌中央屈無名指取之

太陵二穴在掌後兩筋間陷中

內關二穴在掌後二寸

間使二穴在掌後三寸兩筋間陷中

郄門二穴在掌後五寸

曲澤二穴在肘內廉筋中屈肘得之

天泉二穴在臂二寸天溫在曲腋之下

天池二穴在腋下一寸一名天會

手少陽之脉起於小指次指之端上出次指之間循

手表腕出臂外兩骨之間上貫肘循膈外上肩交出

是少陽之後入缺盆交膈中散絡心包下膈徧屬三焦其支者從膈中上出缺盆上項俠耳後直上出耳上角以屈下頰至頰其支者從耳後入耳中走出耳前過客主人前交頰却出至目銳皆是動則病耳聾耳鳴聾聵噎腫喉痺是主氣所生病者汗出目銳皆痛耳後肩膈肘臂外皆痛小指次指不用也

關衝二穴在手小指次指之端去爪甲如韭葉

液門二穴在手小指次指陷中

中渚二穴在手小指次指本節後陷中

陽池二穴在腕上陷中

外關二穴在腕後二寸

支溝二穴在腕後三寸

會宗二穴在腕後三寸

三陽絡二穴在臂上大一寸

四瀆二穴在肘前五寸

天井二穴在肘上一寸

清冷淵二穴在肘上

消灤二穴在肘下

針灸卷七

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <p>臑會二穴 <small>在肩前廉去</small></p> | <p>肩髃二穴 <small>在肩端廉上</small></p> | <p>天髃二穴 <small>在肩缺盆中上</small></p> | <p>天牖二穴 <small>在頰大筋外缺盆上</small></p> | <p>翳風二穴 <small>在耳後尖</small></p> | <p>瘰癧二穴 <small>在耳本雞</small></p> | <p>顛息二穴 <small>在耳後</small></p> | <p>角孫二穴 <small>在耳部中</small></p> | <p>絲竹空二穴 <small>一名目髃左</small></p> | <p>和髃二穴 <small>在耳前</small></p> | <p>耳門二穴 <small>在耳前起肉</small></p> |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|

足太陰之脉起於大指之端循指內側白肉際過蠡骨後上內踝前廉上腠內循胛骨後交出厥陰之前上循膝股內前廉入腹屬脾絡胃上膈俠咽連舌本散舌下其支別者復從胃別上膈注心中是動則病舌本強食則吐胃脘痛腹脹善噫得後出餘氣則快然而衰身體皆重是主脾所生病者舌本痛體不能動搖食不下煩心心下急痛寒瘡瘡瘻洩水下黃疸不能卧強及股膝內腫痲大指不用也

足太陰脾之經左右凡四十二穴

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <p>隱白二穴 <small>在足大指內側端</small></p> | <p>大都二穴 <small>在足大指本</small></p> | <p>太白二穴 <small>在足內側核</small></p> | <p>公孫二穴 <small>在足大指本</small></p> | <p>商丘二穴 <small>在足內踝下</small></p> | <p>三陰交二穴 <small>在內踝上</small></p> | <p>漏谷二穴 <small>在內踝上</small></p> | <p>地機二穴 <small>在內踝上</small></p> | <p>陰陵泉二穴 <small>在膝下</small></p> | <p>血海二穴 <small>在膝上</small></p> | <p>箕門二穴 <small>在膝上</small></p> | <p>衝門二穴 <small>在膝上</small></p> | <p>府舍二穴 <small>在腹結</small></p> | <p>腹結二穴 <small>在腹結</small></p> | <p>大橫二穴 <small>在腹結</small></p> | <p>腹哀二穴 <small>在腹結</small></p> | <p>食竇二穴 <small>在腹結</small></p> | <p>天谿二穴 <small>在胸中</small></p> | <p>胃卿二穴 <small>在胸中</small></p> | <p>周榮二穴 <small>在胸中</small></p> |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|

大包二穴 推開下三

足陽明之脉起於鼻交頰，循鼻外入上齒，出俠口環唇，下交承漿，却循頰後下廉，出大迎，循頰車上耳前，過客主人，循髮際至額，顛其文別者，從大迎前下人迎，循喉嚨入缺盆，下膈，屬胃絡脾，其直行者從缺盆下乳內廉，下俠臍，入氣衝中，其支者起胃下口，循腹裏下至氣衝中，而合以下髀關，拉伏兔，下入膝臑中，下循胛外廉，下足跗，入中指內間，其支者下膝三寸而別，以下入中指外間，其支者別跗上入大指間，出其端是動則病悽悽然振寒，善伸數欠，顏

針灸卷十

黑病主惡人，與火聞木音則惕然而驚，心欲動獨閉戶，憊而處甚則欲上高而歌，弃衣而走，責嚮腹脹是為肝厥，是主血所生病者，狂瘡溫淫汗出，軌衄口喎，脣赤頸腫，喉痺腹水腫，膝臑腫痛，循膺乳衝，股伏兔，胛外廉是跗上皆痛，中指不用，氣盛則身以前皆熱，其有餘於胃則消穀善飢，溺色黃，氣不足則身以前皆寒，慄胃中寒則脹滿盛也。

足陽明胃經左右凡九十六穴

厲兌二穴 在足大指次指端

內庭二穴 在足大指次指中

陷谷二穴 在足大指次指本節

衝陽二穴 在足背第一跖骨

解谿二穴 在足背第一跖骨

豐隆二穴 在足背第一跖骨

下巨虛二穴 在足背第一跖骨

條口二穴 在足背第一跖骨

上巨虛二穴 在足背第一跖骨

三里二穴 在足背第一跖骨

犢鼻二穴 在足背第一跖骨

梁丘二穴 在足背第一跖骨

陰市二穴 在足背第一跖骨

伏兔二穴 在足背第一跖骨

髀關二穴 在足背第一跖骨

氣衝二穴 在足背第一跖骨

歸來二穴 在足背第一跖骨

水道二穴 在足背第一跖骨

大巨二穴 在足背第一跖骨

外陵二穴 在足背第一跖骨

天樞二穴 在足背第一跖骨

滑肉門二穴 在足背第一跖骨

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 承泣二穴 | 四白二穴 | 巨髎二穴 | 地倉二穴 | 大迎二穴 | 人迎二穴 | 水突二穴 | 氣舍二穴 | 缺盆二穴 | 氣戶二穴 | 庫房二穴 | 屋翳二穴 | 膺窓二穴 | 乳中二穴 | 不容二穴 | 承滿二穴 | 梁門二穴 | 關明二穴 | 太一 | |
| 在日瞳子七分 | 在日瞳子一寸 | 在巨髎下八分 | 在口吻交會 | 在頰前一分 | 在頰前一分 | 在頰前一分 | 在頰前一分 | 在頰前一分 | 在頰前一分 | 在頰前一分 | 在頰前一分 | 在頰前一分 | 在頰前一分 | 在頰前一分 | 在頰前一分 | 在頰前一分 | 在頰前一分 | 在頰前一分 | 在頰前一分 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|------------|--------|--------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 曲泉二穴 | 膝關二穴 | 中都二穴 | 蠡溝二穴 | 中封二穴 | 太衝二穴 | 行間二穴 | 大敦二穴 | 足厥陰肝經左右凡二十六穴 | 嘔逆洞洩孤疝遺溺瘰癧 | 婦人少腹腫甚 | 別貫膈上注肺 | 於頰其支者 | 肋循喉嚨 | 陰毛中環陰器 | 踝一寸上踝八寸 | 足厥陰之脉 | 頭維二穴 | 下關二穴 | 頰車二穴 | |
| 在膝上筋下 | 在膝上筋下 | 在膝上筋下 | 在膝上筋下 | 在膝上筋下 | 在膝上筋下 | 在膝上筋下 | 在膝上筋下 | 在膝上筋下 | 在膝上筋下 | 在膝上筋下 | 在膝上筋下 | 在膝上筋下 | 在膝上筋下 | 在膝上筋下 | 在膝上筋下 | 在膝上筋下 | 在膝上筋下 | 在膝上筋下 | 在膝上筋下 | 在膝上筋下 |

| | |
|------|---------|
| 陰包二穴 | 在膝上四寸 |
| 五里二穴 | 在膝中筋下三寸 |
| 陰廉二穴 | 在膝下二寸 |
| 章門二穴 | 在腋下一寸 |
| 期門二穴 | 在乳下二寸 |

足少陽之脈起於目銳眦上極角下耳後循頰行手少陽之脈前至肩上却交出少陽之後入缺盆其支別者從耳中出走耳前至目銳眦後其支別者目銳眦下大迎合手少陽於頰下加頰車下頰合缺盆下臂中貫膈絡肝屬膽循胃裏出氣衝繞毛際橫入髀厭中其直者從缺盆下腋循胃過季脅下合髀厭中以下循解太陽出膝外廉下外輔骨之前直下極絕骨之端下出外踝之前循足跗上入小指次指之間其支別者從跗上入大指循歧骨內出其端還貫入爪甲出三毛是動則病口苦善太息心脅痛不能轉側甚則面微塵體無膏澤足外及熱是為陽瘕是主所生病者頭痛目銳眦痛缺盆中腫痛腋下腫馬刀俠瘰汗出振寒瘧瘡脊中脅肋脾膝外至斷絕骨外踝前及諸節皆痛小指次指不用也

足少陽膽經左右凡八十六穴

| | |
|-------|--------|
| 竅陰二穴 | 在足小指次指 |
| 俠谿二穴 | 在足小指次指 |
| 地五會二穴 | 在足小指次指 |
| 臨泣二穴 | 在足小指次指 |
| 丘墟二穴 | 在足小指次指 |
| 懸鐘二穴 | 在足小指次指 |
| 陽輔二穴 | 在足小指次指 |
| 光明二穴 | 在足小指次指 |
| 外丘二穴 | 在足小指次指 |
| 陽交二穴 | 在足小指次指 |
| 陽陵泉二穴 | 在足小指次指 |
| 陽關二穴 | 在足小指次指 |
| 中瀆二穴 | 在足小指次指 |
| 環跳二穴 | 在足小指次指 |
| 居髎二穴 | 在足小指次指 |
| 維道二穴 | 在足小指次指 |
| 五樞二穴 | 在足小指次指 |
| 帶脈二穴 | 在足小指次指 |
| 京門二穴 | 在足小指次指 |
| 日月二穴 | 在足小指次指 |

| | | |
|------|--------|--------|
| 輒筋二穴 | 在前行一十寸 | 若骨 |
| 淵腋二穴 | 在腋中 | |
| 肩井二穴 | 在肩上 | 解中缺盆上大 |
| 風池二穴 | 在頸後 | |
| 腦空二穴 | 在頭中 | |
| 承靈二穴 | 在正管後 | |
| 正營二穴 | 在日窓 | |
| 目窓二穴 | 在日窓 | |
| 臨泣二穴 | 在目上五分 | |
| 陽白二穴 | 在眉上一寸 | |
| 本神二穴 | 在曲差後一寸 | |
| 完骨二穴 | 在耳後 | |
| 竅陰二穴 | 在完骨上 | |
| 浮白二穴 | 在耳後 | |
| 大衝二穴 | 在耳後 | |
| 率谷二穴 | 在頭上 | |
| 曲鬢二穴 | 在頭中 | |
| 懸釐二穴 | 在頭上 | |
| 懸顛二穴 | 在頭上 | |
| 額厭二穴 | 在額上 | |

| | | |
|--------|----------|----------------|
| 容其入二穴 | 在耳前 | 有空 |
| 聽會二穴 | 在耳前 | 有空 |
| 瞳子髎二穴 | 在目外 | |
| 足少陰之脉 | 起於小指之下 | 斜趣是心出然谷之下 |
| 循內踝之後 | 別入跟中 | 上膈內廉上股內後 |
| 廉貫脊 | 屬腎絡膀胱 | 其直者從腎上貫肝膈入肺中 |
| 循喉嚨 | 俠舌本 | 其支者從肺出絡心注膏中是動則 |
| 病 | 飢不欲食面黑如漆 | 欬唾則有血喝喝而喘坐 |
| 而欲起 | 目眩眩如無所見 | 心如懸若飢氣不足則善 |
| 惡心惕悸 | 如人將捕 | 是為骨厥是主腎所生病者口 |
| 熱舌乾咽腫 | 上氣喘乾及痛煩 | 心痛黃疸腸澀 |
| 臂股內後 | 廉痛痠厥嗜卧 | 是下熱而痛也 |
| 足少陰腎之經 | 左右凡三十四穴 | |
| 涌泉二穴 | 在足心 | |
| 然谷二穴 | 在足內 | |
| 太谿二穴 | 在足內 | |
| 大鍾二穴 | 在足內 | |
| 照海二穴 | 在足內 | |
| 水泉二穴 | 在足內 | |
| 復溜二穴 | 在足內 | |

| | |
|------|---------|
| 交信二穴 | 少陰前上二寸後 |
| 築賓二穴 | 中陰維上端分 |
| 陰谷二穴 | 大筋下小筋上 |
| 橫骨二穴 | 正大一寸 |
| 大赫二穴 | 正大一寸陰維一 |
| 氣穴二穴 | 正大一寸 |
| 四滿二穴 | 正大一寸 |
| 中注二穴 | 正大一寸 |
| 育脰二穴 | 正大一寸 |
| 商曲二穴 | 正大一寸 |
| 石關二穴 | 正大一寸 |
| 都二穴 | 正大一寸 |
| 道谷二穴 | 正大一寸 |
| 幽門二穴 | 正大一寸 |
| 步郎二穴 | 正大一寸 |
| 神封二穴 | 正大一寸 |
| 靈墟二穴 | 正大一寸 |
| 神藏二穴 | 正大一寸 |
| 或中二穴 | 正大一寸 |
| 喻府二穴 | 正大一寸 |

銅人腧穴鍼灸圖經 卷上

足太陽之脉起於目內眦上額交巔上其支別者從巔至耳上角其直行者從巔入絡腦還出別下項循肩髀內俠脊拄腰中入循脊絡腎屬膀胱其支別者從腰中下貫臀入膕中其支別者從膕內左右別下貫腓俠脊內過髀樞循髀外後廉下合膕中下貫脛內出外踝之後循京骨至小指外側端是動則病頭痛似脫項似拔脊痛腰似折髀不可回轉膕如結膕如裂是為蹠癢是主筋所生病者痔瘡癩疾頭項痛目黃淚出軌衄項背腰尻膕膕脚皆痛小指不用也足太陽膀胱經左右凡一百二十六穴

| | |
|------|------|
| 至陰二穴 | 正大一寸 |
| 通谷二穴 | 正大一寸 |
| 束骨二穴 | 正大一寸 |
| 京骨二穴 | 正大一寸 |
| 金門二穴 | 正大一寸 |
| 申脈二穴 | 正大一寸 |
| 僕參二穴 | 正大一寸 |
| 崑崙二穴 | 正大一寸 |
| 付陽二穴 | 正大一寸 |
| 飛陽二穴 | 正大一寸 |

| | |
|-------|-----------------|
| 承山二穴 | 一名在魚腹一名在腓腸下分肉間 |
| 承筋二穴 | 一名在腓腸中一名在腓腸下 |
| 合陽二穴 | 在膝下二寸 |
| 委中二穴 | 在膝中約紋中 |
| 委陽二穴 | 在承扶下六寸 |
| 浮郄二穴 | 在委陽上一寸 |
| 殷門二穴 | 在肉上六寸 |
| 承扶二穴 | 一名在尻臂下一名在陰下衝文中央 |
| 秩邊二穴 | 在第二十一節下 |
| 胞育二穴 | 在第十九節下 |
| 志室二穴 | 在第十四節下 |
| 育門二穴 | 在第十三節下 |
| 胃倉二穴 | 在第十一節下 |
| 意舍二穴 | 在第十節下 |
| 陽經二穴 | 在第九節下 |
| 魂門二穴 | 在第七節下 |
| 膈關二穴 | 在第七節下 |
| 譙譙二穴 | 在第六節下 |
| 神堂二穴 | 在第五節下 |
| 膏肓腧二穴 | 在第四節下 |

| | |
|--------|---------|
| 魄戶二穴 | 在第三椎下 |
| 附分二穴 | 在第二椎下 |
| 會陽二穴 | 在尾骨兩傍 |
| 下髀二穴 | 在第四空 |
| 中髀二穴 | 在第三空 |
| 次髀二穴 | 在第二空 |
| 上髀二穴 | 在第一空 |
| 白環腧二穴 | 在第二十一節下 |
| 中背內腧二穴 | 在第二十節下 |
| 膀胱腧二穴 | 在第十九節下 |
| 小腸腧二穴 | 在第十八節下 |
| 大腸腧二穴 | 在第十六節下 |
| 腎腧二穴 | 在第十四節下 |
| 三焦腧二穴 | 在第十三節下 |
| 胃腧二穴 | 在第十一節下 |
| 脾腧二穴 | 在第十節下 |
| 膽腧二穴 | 在第九節下 |
| 肝腧二穴 | 在第七節下 |
| 膈腧二穴 | 在第五節下 |
| 心腧二穴 | 在第一節下 |

厥陰腧二穴寸五分出山附經

肺腧二穴寸五分各俠

風門二穴寸五分各俠

大杼二穴寸五分各俠

天柱二穴寸五分各俠

玉枕二穴寸五分各俠

絡却二穴寸五分各俠

通天二穴寸五分各俠

承光二穴寸五分各俠

五處二穴寸五分各俠

曲差二穴寸五分各俠

攢竹二穴寸五分各俠

晴明二穴寸五分各俠

督脈者起於下極之腧並於脊裏上至風府入腦上

巔循額至鼻柱屬陽脈之海也中行凡二十七穴

鼻柱下

素髻一穴在鼻柱上

水溝一穴在鼻柱下人中

兌端一穴在唇上

斷交一穴在唇內

額上行

神庭一穴在神庭後入

上星一穴在神庭後入

額會一穴在神庭後入

前項一穴在額會後

百會一穴在額會後

後項一穴在百會後

強間一穴在後項後

腦戶一穴在強間後

風府一穴在腦戶後

瘖門一穴在風府後

大傾一穴在瘖門後

陶道一穴在大傾後

身柱一穴在陶道後

神道一穴在身柱後

靈臺一穴在神道後

至陽一穴在靈臺後

筋縮一穴在至陽後

脊中一穴 取之第十一節不可灸令人經脈

懸樞一穴 在第十四節取之

命門一穴 在第十四節取之

陽關一穴 在第十六節取之

腰陽一穴 在第二十一節

長強一穴 在第二十一節

任脈者起於中極之下以上毛際循腹裏上關元至咽嗑屬陰脈之海也中行凡二十四穴

頤前

承漿一穴 在頤前

頤下

廉泉一穴 在頤下

膺膺

天突一穴 在喉下

璇璣一穴 在天突下

華蓋一穴 在璇璣下

紫宮一穴 在華蓋下

玉堂一穴 在紫宮下

膻中一穴 在玉堂下

中庭一穴 在膻中下

腹中行

鳩尾一穴 在腹中行

巨關一穴 在鳩尾下

上腕一穴 在巨關下

中腕一穴 在上腕下

建里一穴 在中腕下

下腕一穴 在建里下

水分一穴 在下腕下

神關一穴 在水分下

陰交一穴 在神關下

氣海一穴 在陰交下

右門一穴 在氣海下

關元一穴 在右門下

中極一穴 在關元下

曲骨一穴 在中極下

會陰一穴 在曲骨下

銅人腧穴鍼灸圖經卷上


銅人腧穴鍼灸圖經卷中

黃帝曰余聞九鍼於夫子衆多不可勝數余推而論之以為一紀余試誦之子聽其理非則語余請受其道令可久傳後世無患得其人乃傳非其人勿言歧伯稽首再拜曰請聽聖王之道帝曰用鍼之理必知形氣之所在左右上下陰陽表裏血氣多少行之逆順出入之會誅伐有過雪汗解結知補虛寫實上下之氣門通於四海審其所在寒熱淋露榮輸異處審於調氣明於經隧左右支絡盡知其會寒與熱爭能合而調之虛與實隣決而通之左右不調犯而行之

針灸卷中六

明於逆順乃可治之陰陽不奇故知起時審於本末察其寒熱知邪所在萬刺不殆知官九鍼刺道畢矣凡鍼灸避忌之法謹案黃帝內經靈樞經甲乙經云子午為經卯酉為緯二十八宿為制度太陰虧盈為法則并太一血忌禁察成一圖有所治療悉皆避之若遇暴卒之疾仍須急速救療洞達名工亦不拘於此法即如禁穴諸醫未愈明堂中亦許灸一壯至三壯

鍼灸避忌之圖



偃伏頭部中行凡一十六

神庭 上星 額會 前頂 百會 後頂

強間 腦戶 風府 瘧門

偃伏第二行左右凡一十四穴

曲差 五處 承光 通天 絡却 玉枕

天柱

偃伏第三行左右凡一十二穴

臨泣 目窓 正營 承靈 腦空 風池

側頭部左右凡二十六穴

額厭 懸顛 懸釐 天衝 率谷 曲鬲

角孫 竅陰 浮白 顛息 瘰脈 完骨

醫風

正面部中行凡六穴

素髻 水溝 兌端 斷交 承漿 廉泉

面第二行左右凡一十穴

攢竹 睛明 巨髻 迎香 禾髻

面第三行左右凡一十穴

陽白 承泣 四白 地倉 大迎

面第四行左右凡八穴

本神 絲竹空 瞳子髻 顴髻

側面部左右凡一十六穴

頭維 客主人 下關 和髻 聽會

耳門 聽宮 頰車

偃伏頭部中行

神庭一穴在鼻直入髮際五分督脈足太陽陽明三

脈之會治癩疾風癩戴目上不識人頭風目眩鼻

出清涕不止目淚出驚悸不得安寢可灸二七壯

至七七壯止歧伯曰凡欲療風勿令灸多緣風性

輕多即傷惟宜灸七壯至三七壯止禁不可鍼鍼

即發狂忌生冷雞猪酒麪動風物等

上星一穴在鼻直上入髮際一寸陷中督脈氣所發

治頭風面虛腫鼻塞不聞香臭目眩痰涎振寒熱

病汗不出目睛痛不能遠視以細三稜鍼刺之即

宣洩諸陽熱氣無令上衝頭目可灸七壯不宜多

灸若頻灸即拔氣上令人目不明忌如前法

額會一穴在上星後一寸陷中可容豆督脈氣所發

治目眩面腫鼻塞不聞香臭驚癩戴目上不識人

可灸二七壯至七七壯初灸即不痛病去即痛痛

即罷灸若是鼻寒灸至四日漸退七日頓愈鍼入

二分留三呼得氣即寫頭風生白屑多臍鍼之效

佳鍼訖以末鹽生麻油相和指髮根下頭風即永
除若八歲已下即不得鍼蓋緣顛門未合刺之不
幸令人天忌熱麪猪魚物等

前頂一穴在顛會後一寸五分骨陷中督脈所發據
甄權鍼經云是一寸今即依素問一寸五分為定
療頭風目眩面赤腫小兒驚癇風癇瘰癧發即無
時鼻多清涕頂腫痛鍼入一分可灸三壯至七七
壯即止忌如前法

百會一穴一名三陽五會在前頂後一寸五分頂中
央旋毛中可容豆督脈足太陽交會於顛上治小
兒脫肛久不差風癇中風角弓反張或多哭言語
不擇發即無時盛即吐沫心煩驚悸健忘痰瘧耳
鳴耳聾鼻塞不聞香臭可鍼入二分得氣即止可
灸七壯至七七壯即止唐秦鳴鶴刺微出血頭痛
立愈凡灸頭項不得過七七壯綠頭項皮膚淺薄
灸不宜多

後頂一穴一名交衝在百會後一寸五分枕骨上督
脈氣所發治目眩頭項惡風寒目眩頭偏痛可
灸五壯鍼入二分
強間一穴一名大羽在後頂後一寸五分督脈氣所

發治腦旋目運頭痛不可忍煩心嘔吐涎沫發即
無時頭項強左右不得回顧可灸七壯鍼入二分
腦戶一穴一名合顛在枕骨上強間後一寸五分督
脈足太陽之會禁不可鍼鍼之令人瘖不能言治
目睛痛人能遠視面赤目黃頭腫可灸七壯亦不
可妄灸令人失瘖

風府一穴一名舌本在項髮際上一寸大筋內宛
中疾言其肉立起言休立下督脈陽維之會禁不
可灸不幸使人失瘖治頭痛項急不得回顧目
眩鼻衄喉咽痛狂走目妄視鍼入三分

瘖門一穴一作瘖一名舌橫一名舌厭在項中央入
髮際五分宛宛中督脈陽維之會入繫舌本仰頭
取之禁不可灸灸之令人瘖治項強舌緩不能
言諸陽熱氣盛鼻衄血不止頭痛風汗不出寒熱
風瘖脊強反折瘖瘖癩疾頭重鍼入二分

偃伏第二行
曲老二穴在神庭傍一寸五分入髮際足太陽脈氣
所發治心中煩滿汗不出頭項痛身體煩熱目視
不明鍼入二分可灸三壯
五處二穴在上星傍一寸五分足太陽脈氣所發治

目不明頭風目眩癩瘕目戴上不識人鍼入三分留七呼可灸三壯

承光二穴在五處後一寸五分足太陽脉氣所發治鼻塞不聞香臭口喎鼻多清涕風眩頭痛嘔吐心

煩目生白膜鍼入三分禁不可灸忌如前法

通天二穴在承光後一寸五分足太陽脉氣所發治

頰項轉側難鼻塞悶偏風口喎鼻多清涕衄血頭重鍼入三分留七呼可灸三壯

絡却二穴一名強陽又名腦蓋在通天後一寸五分足太陽脉氣所發治青風內部目無所見頭旋耳

鳴可灸三壯

玉枕二穴在絡却後一寸五分俠腦戶傍一寸三分

起肉枕骨入髮際上三寸足太陽脉氣所發治其痛不能視腦風疼痛不可忍可灸三壯

天柱二穴俠項後髮際大筋外廉陷中足太陽脉氣

所發治足不任身體有背痛欲折目瞑視今附治項項筋急不得回顧頭旋腦痛鍼入五分得氣即

寫立愈

偃伏第三行

臨泣二穴在自上直入髮際五分陷中足太陽少陽

之會治卒中風不識人目眩鼻塞目生白膜多淚

鍼入三分留七呼得氣即寫忌如前法

目窓二穴在臨泣後一寸足少陽陽維之會治頭面

浮腫痛引目外皆赤痛忽頭旋日眩視遠視不明

鍼入三分可灸五壯今附三度刺目大明

正營二穴在目窓後一寸足少陽陽維之會治牙齒痛脣吻急強齒齲痛頭項偏痛鍼入三分可灸五壯

承靈二穴在正營後一寸五分足少陽陽維之會治腦風頭痛惡風寒靴衄鼻塞息不利可灸三壯

腦空二穴一名顛顛在承靈後一寸五分俠玉枕骨

下陷中足少陽陽維之會治腦風頭痛不可忍目

瞑心悸發即為顛風引目眇勞疾羸瘦體熱頭項

強不得回顧鍼入五分得氣即寫可灸三壯魏公

苦患頭風發即心悶亂目眩華陀當鍼而立愈忌

如前法

風池二穴在顛顛後髮際陷中足少陽陽維之會治

洒泝寒熱温病汗不出日眩苦頭痛瘖瘡項項痛

不得回顧目淚出欠氣多卑靴衄目內眦赤痛氣

發耳塞目不明腰偏僂引項筋無力不收鍼入七

分留七呼可灸七壯

側頭部

額厭二穴在曲周下顛額上廉手足少陽陽明之交
會治頭風眩目無所見偏頭痛引目外眦急耳鳴
多嚏頰項痛鍼入七分留七呼可灸三壯忌如前
法

懸顛二穴在曲周上顛額中足少陽脉氣所發治熱
病煩滿汗不出頭偏痛引目外眦赤身熱齒痛面
膚赤痛鍼入三分留三呼可灸三壯忌如前

懸釐二穴在曲周上顛額下廉手足少陽陽明之交

會治熱病汗不出頭偏痛煩心不欲食目兌眦赤
痛鍼入三分可灸三壯

天衝二穴在耳後入髮際二寸治頭痛癩疾風痊牙
斷腫善驚恐可灸七壯鍼入三分

率谷二穴在耳上入髮際一寸五分足大陽少陽之
會治腦胃寒痰傷酒風發腦兩角弦痛不能飲食
煩滿嘔吐不止可灸三壯鍼入三分

曲鬢二穴在耳上髮際曲隅陷中鼓頰有空足太陽
少陽之會治頰腫引牙車不得開急痛口禁不
能言灸亦良可灸七壯鍼入三分

角孫二穴在耳郭中間開口有空手足少陽之會

治目生膚翳高斷腫可灸三壯明堂別無癆病法
竅陰二穴在枕骨下指動有空足太陽少陽之會治

管疽發厲項痛引頭目痛鍼入三分可灸七壯

浮白二穴在耳後入髮際一寸足太陽少陽之會治
發寒熱喉痺欬逆痰沫骨中滿不得喘息耳鳴聾

嘈無所聞頸項癰腫及癭氣有背不舉悉能治之
鍼入五分可灸七壯

顛息二穴在耳後間青絡脉足少陽脉氣所發治身
熱頭重脅痛不得轉側風痊耳聾小兒發癇癩瘰

嘔吐涎沫驚恐失精瞻視不明不宜鍼即可灸七
壯

瘰癧二穴一名資脉在耳本後難足青絡脉刺出血
如豆汁不宜出血多治頭風耳鳴小兒驚癇癩瘰

嘔吐洩痢無時驚恐眇瞽目睛不明可灸三壯鍼
入一分

完骨二穴在耳後入髮際四分治頭痛煩心癩疾頭
面虛腫齒齲偏風口眼喎斜頰項痛不得回顧小

便赤黃喉痺頰腫鍼入五分可灸七壯

翳風二穴在耳後陷中按之引耳中手足少陽之會

治耳聾口眼喎斜失欠脫頷口噤不開吃不能言
頰腫牙車急痛鍼入七分可灸七壯

正面部中行

素髻一穴一名面正在鼻柱之端督脉所發此穴諸
方關治療法外臺云不宜灸千金治鼻齶肉不
消多涕生瘡鍼入一分

水溝一穴在鼻柱下一名人中督脉手陽明之會治
消渴飲水無度水氣遍身腫失笑無時癩癩語不
識尊卑乍喜乍哭牙關不開面腫腎動狀如蟻行
卒中惡鍼入四分留五呼得氣即寫灸亦得然不

針灸卷十五

及鍼者灸可小雀糞大為艾炷日可灸三壯至七
壯即罷風水面腫鍼此一穴出水盡即頓愈忌如

前法

兌端一穴在脣上端治癩疾吐沫小便黃舌乾消渴
衄血不止脣吻強齒斷痛鍼入二分可灸三壯炷
如大麥出千金外臺甲乙經

斷交一穴在脣內齒上斷維筋中治面赤心煩痛頰
項急不得回顧新附治小兒面瘡癩久不除點烙
亦佳鼻塞不利目淚眵汁內皆赤癢痛生白膚翳
鼻中瘻肉蝕瘡鍼入三分可灸三壯

承漿一穴一名懸漿在頤前脣下宛宛中足陽明任

脈之會療偏風口喎而腫消渴口齒疳蝕生瘡灸

亦佳日可灸七壯至七七壯止灸即血脉通宣其

風應時立愈其艾炷不用大一依小竹筋頭作炷

脉鹿細狀如細線艾炷破肉但令當脉灸亦能愈

疾凡灸臍下久冷疝瘕痰癖氣塊伏梁積氣宜艾

炷大故小品諸方云腹背宜灸五百壯四肢則但

去風邪不宜多灸七壯至七七壯止不得過隨年

數如巨關鳩尾雖是膏肓之穴灸不過七七壯艾

炷不須大以竹筋頭作炷正當脉上灸之若灸膏

針灸卷十六

腹艾炷大灸多令人永無心力如頭頂穴若灸多

令人失精神臂脚穴灸多令人血脉枯竭四肢細

瘦無力既復失精神又加於細瘦即脫人真氣鍼

入三分得氣即寫忌如前法

廉泉一穴一名舌本在頷下結喉上陰維任脉之會

治舌下腫難言舌縱涎出欬嗽上氣喘息嘔沫口

噤舌根急縮下食難可灸三壯鍼入三分得氣即

寫

面第二行

攢竹二穴一名始光一名光明一名鼻柱在兩眉頭

陷中足太陽脈氣所發治目眇眇視物不明眼中赤痛及眼瞶動鍼入一分留三呼呼吸三吸徐徐而出鍼不宜灸宜以細三稜鍼刺之宜洩熱氣三度刺目大明忌如前法

睛明二穴一名淚孔在目內眥手足太陽少陽陽明五脈之會治攀睛翳膜覆瞳子惡風淚出目內眥癢痛小兒雀目疳眼大人氣眼冷淚隨目視物不明大眥努肉侵睛鍼入一寸五分留三呼禁不可灸雀目者宜可久留鍼然後速出鍼忌如前法

巨膠二穴俠鼻孔傍一作旁八分直目瞳子躄脈足陽明之會治青盲目無所見遠視眇眇白翳覆瞳子面風寒鼻頰上腫壅痛癢瘻口喎鍼入三分得氣即寫灸亦良可灸七壯

迎香二穴在禾髻上一寸鼻孔傍五分手足陽明之會治鼻有瘰肉不開香臭衄血偏風口喎面癢浮腫風動葉葉狀如蟲行或唇腫痛鍼入三分留三呼不宜灸忌如常法

禾髻二穴在鼻孔下俠水溝傍五分手陽明脈氣所發治鼻衄血不止鼻清涕生瘡口禁不開鍼入二分

面第三行

陽白二穴在眉上一寸直目瞳子足少陽陽維之會治頭目痛目眇背脊寒慄重衣不得溫可灸三壯鍼入二分

承泣二穴在目下七分直目瞳子陷中躄脈任脈足陽明之會治口眼喎斜目瞶面紫葉動羞口眼目視眇眇冷淚眼背赤痛禁不宜鍼鍼之令人目烏色可灸三壯炷如大麥忌如常法

四白二穴在目下一寸足陽明脈氣所發治頭痛目眩眼生白翳微風目瞶動不息可灸七壯鍼入三分凡用鍼穩審方得下鍼也若鍼深即令人目烏色

地倉二穴俠口吻傍四分外如近下有脈微微動躄脈手陽明之交會若久患風其脈亦有不動者治偏風口喎目不得閉失瘖不語飲食不收水漿滿落眼瞶動不止病左治右病右治左鍼入三分留五呼得氣即寫灸亦得日可灸之二七壯重者七壯其艾作炷大小狀如鹿釵脚大灸炷若大口轉喎却灸承漿七七壯即愈慎猪魚熱麪房勞等大迎一穴在曲頰前一寸二分骨陷中動脈又以口

下當兩肩足陽明脈氣所發治寒熱頭痛瘧疾
啞齒齧痛數欠氣風痙口噤牙疼頰腫惡寒士
強不能言鍼入三分留七呼可灸三壯今附風墜
面浮腫目不得閉唇吻動不止當鍼之頓愈
而第四行

本神二穴在曲差傍一寸五分一日直耳上入髮際
四分足少陽陽維之會治目眩頸項強急痛骨節
相引不得轉側癩疾嘔吐涎沫鍼入三分可灸七
壯

絲竹空二穴一名目髻在眉後陷中足少陽脈氣所

發禁不可灸不素使人目小又令人目無所見治

目眩頭痛目赤視物眈眈風癩目戴上不識人眼
睫毛倒發狂吐涎沫發即無時鍼入三分留三呼
宜寫不宜補

瞳子髻二穴在目外皆五分手太陽手足少陽之會
治青盲目無所見遠視眈眈目中層翳白膜頭痛
目外皆赤痛可灸三壯鍼入三分

額髻二穴在面頰骨下廉兌骨端陷中手少陽太陽
之會治口喎面赤目黃眼瞶動不止頰腫齒痛鍼
入二分

側面部

頭維二穴在頰角入髮際本神傍一寸五分足少陽
陽明脈之交會治頭偏痛目視物不明今附治微
風眼瞶動不止風淚出鍼入三分禁不可灸

客主人二穴一名上關在耳前起骨上廉開口有空
動脈宛宛中足陽明少陽之會治唇吻強耳聾瘖
瘖口沫出目眩牙車不開口噤齧食鳥偏風口眼
喎斜耳中狀如蟬聲可灸七壯艾炷不用大筋頭
作炷若鍼必須側卧張口取之乃得禁不可鍼深
問曰何以不得鍼深岐伯曰上關若刺深令人欠

而不得於下關不得久留鍼即故而不得久牙關
急是故上關不得刺深下關不得久留鍼也

下關二穴在客主人下耳前動脈下廉合口有空開
口即閉足陽明少陽之會療聾耳有膿汁出偏風
口目喎牙車脫臼其穴側卧開口取之鍼入四分
得氣即寫禁不可灸牙斷腫虛張口以三稜鍼出
膿血多含鹽湯即不畏風慎如前法

和髻二穴在耳前兌髮下橫動脈手少陽脈氣所發
治牙車引急頭重痛耳中嘈嘈頰腫鍼入七分
可灸三壯

聽會二穴在耳前陷中上關下一寸動脈死中張
口得之手少陽脈氣所發治耳聾耳中狀如蟬聲
通耳食牙車脫臼相離一二寸其穴側卧張口取
之鍼入七分留三呼得氣即寫不須補灸亦良日
可灸五壯至二十七壯止十日後依前報灸之即愈
忌食動風生冷猪魚物等

耳門二穴在耳前起肉當耳缺者治耳有膿汗出生
瘡腫耳鳴耳耳鳴如蟬聲重聽無所聞齒齲鍼入
三分留三呼可灸三壯

聽官二穴在耳中珠子大如赤小豆手足少陽太陽
三脈之會治耳聾如物填塞無所聞耳中嘈嘈心
腹滿臂痛失聲鍼入三分可灸三壯

類車二穴在耳下曲頰端陷中足陽明脈氣所發治
牙關不開口噤不語失瘡牙車疼痛頰頰腫頸強
不得回顧其穴側卧開口取之鍼入四分得氣即
寫灸亦良日可灸七壯至七七壯止炷如大麥慎
如常法

肩髃部左右凡二十六穴
肩井 天髎 巨骨 臑會 肩髃 肩髃
肩貞 天宗 秉風 臑腧 曲垣 肩外腧

背腧部中行凡一十三穴
大傾 陶道 身柱 神道 靈臺 至陽
筋縮 脊中 懸樞 命門 陽關 臑腧
長強

背腧第二行左右凡四十四穴
大杼 風門 肺腧 厥陰腧 心腧
膈腧 肝腧 膽腧 脾腧 胃腧 三焦腧
腎腧 大腸腧 小腸腧 膀胱腧
中膂內腧 白環腧 上髂 次髂 中髂

下髂 會陽
背腧第三行左右凡二十八穴
附分 魄戶 膏肓腧 神堂 謄謄
膈關 臈門 陽經 意舍 胃倉 育門
志室 胞育 秩邊

肩髃部
肩井二穴在肩上陷缺盆上大骨前一寸半以三指
按取之當中指下陷中者是一名髃井手足少陽
陽維之會治五勞七傷項項不得回顧背髃兩
手不得向頭或因撲傷腰髃疼脚氣上攻甲已經

云只可鍼入五分此針井足陽明之會乃連入五
感氣若刺深則令人悶倒不識人即速須三里下
氣先補不寫須更平復如故凡鍼肩井皆以三里
下其氣若婦人墮胎後手足厥逆鍼肩井立愈若
灸更勝鍼可灸七壯

天髀二穴在肩缺盆中上慈骨之際陷中央手少陽
陽維之會治肩肘痛引頸項急寒熱缺盆中痛汗
不出脊中煩滿鍼入八分可灸三壯

巨骨二穴在肩端上行兩叉骨間陷中手陽明
之會治背膊痛脊中有瘀血肩臂不得屈伸而痛

灸五壯鍼入一寸五分

臑會二穴一名臑髀在肩前廉去肩頭三寸手陽明
之絡治項癭氣瘤臂痛不能舉氣腫痲痛鍼入七
分留十呼得氣即寫可灸七壯

肩髃二穴在肩端兩骨間陷者宛宛中舉臂取之手
陽明蹻脉之會療偏風半身不遂熱風癱瘓手臂
癱急捉物不得挽弓不開臂細無力筋骨痠疼可
灸七壯至二七壯以差為度若灸偏風不遂可七
七壯止不宜多灸恐手臂細若風病筋骨無力久
不差當灸不畏細也刺即淺肩臂熱氣唐虞欽

若患風痺手臂不得伸引諸醫莫能愈難轉肩
髃一穴今將弓箭向梁射之如故

肩髃二穴在肩端臑上陷中舉臂取之治肩重不可
舉臂肘可灸三壯鍼入七分

肩貞二穴在肩曲胛下兩骨解間肩髃後陷中治風
痺手臂不舉肩中熱痛鍼入五分

臑腧二穴在肩髃後大骨下胛上廉陷中手足太陽
陽維蹻脉之會治寒熱肩腫引胛中痛臂痠無力
鍼入八分可灸三壯

天宗二穴在秉風後大骨下陷中手太陽脉氣所發
治肩胛痛臂肘外後廉痛頰頰腫可灸三壯鍼入
五分留六呼

秉風二穴在肩小臑後舉臂有空手太陽陽明手
足少陽之會治肩痛不能舉可灸五壯鍼入五分

曲垣二穴在肩中央曲胛陷中按之應手痛治肩痛
周痺氣注肩髃病急疼刺可灸三壯鍼入五分

肩外髃二穴在肩胛上廉去脊三寸陷中治肩胛痛
熱而寒至肘可灸三壯鍼入六分

肩中髃二穴在肩胛內廉去脊二寸陷中治寒熱目
視不明效嗽上氣唾血鍼入三分留七呼可灸十

壯

壯

背膂部中行

大傾一穴一本作椎今從頁作傾餘皆倣此在第一

傾上陷中手足三陽督脉之會療五勞七傷濕瘧

痰瘧氣疰背臂周急頸項強不得回顧風勞食氣

鍼入五分留三呼寫五吸若灸以年為壯甲乙經

云大傾下至尾骶骨二十一傾長三尺折量取膂

穴凡度周身孔穴遠近分寸以男左女右取中指

內文為一寸素問云同身寸是也又多用繩度量

孔穴繩多出縮取穴不准今以薄竹片點量分寸

針灸卷之五

療病准的

陶道一穴在大傾節下間俛而取之督脉足太陽之

會治頭重目眩洒泝寒熱脊強汗不出可灸五壯

鍼入五分

身柱一穴在第三傾節下間督脉氣所發治癩疾瘰

癧怒欲煞人身熱狂走謔言見鬼鍼入五分灸七

七壯

神道一穴在第五傾節下間俛而取之督脉氣所發

治寒熱頭痛進退往來痰瘧恍惚悲愁健忘驚悸

可灸七七壯至百壯止小兒風潤瘰癧可灸七壯

靈臺一穴在第六椎節下間俛而取之督脉氣所發

經關療病法出素問

至陽一穴在第七椎節下間俛而取之督脉氣所發

治寒熱解散淫瀼胫痠四肢重痛少氣難言可灸

三壯鍼入五分

筋縮一穴在第九傾節下間俛而取之督脉氣所發

治驚癇狂走顛疾脊急強目轉上垂可灸三壯鍼

入五分

脊中一穴一名神宗在第十一傾節下間俛而取之

督脉氣所發治風癇癩邪温病積聚下利禁不可

針灸卷之五

灸灸則令人腰背偃僕鍼入五分得氣即寫

懸樞一穴在第十三傾節下間伏而取之督脉氣所

發治積氣上下行水穀不化下利腰脊強不得屈

伸腹中留積鍼入三分可灸三壯

命門一穴一名屬累在第十四傾節下間伏而取之

督脉氣所發治頭痛不可忍身熱如火汗不出瘰

癧裏急腰腹相引痛鍼入五分可灸三壯

陽關一穴在第十六傾節下間伏而取之鍼入五分

可灸三壯關療病法出素問

腰膂一穴一名背解一名腰柱一名腰尹在第二十

一傾節下間宛宛中以挺腹地舒身兩手相重支
頷縱四體然後乃取得其穴腎脈氣所發治腰腹
疼腰脊強不得回轉溫瘧瘧瘧鍼入八分留三呼
寫五吸可灸七壯至七七壯慎房勞舉重強力甲
乙經云鍼入二寸留七呼可灸七七壯

長強一穴一名氣之陰部督脈絡別甲乙經云在脊
骶端之少陰少陽所結會治腸風下血五種痔瘡
蝕下部墜鍼入三分抽鍼以大痛為度其穴跌地
取之乃得灸亦得然不及鍼日灸三十壯至二百
壯止此痔根本是冷慎冷食房勞甲乙經云鍼入

二寸留七呼

針灸卷四

背膈第二行

大杼二穴在項後第一傾下兩傍相去各一寸五分
啣中甲乙經云是太陽少陽之會瘰癧頸項強不
可說仰頭痛振寒瘰癧氣骨節滿傷寒汗不出脊
強瘰癧煩滿風勞氣欬嗽骨中鬱熱身熱目眩鍼
入五分可灸七壯

風門二穴一名熱府在第二傾下兩傍相去各一寸
五分督脈是太陽之會治傷寒頸項強目瞑多噦
鼻軌出清涕風勞嘔逆上氣骨背痛喘氣卧不安

鍼入五分留七呼今附若類洩諸陽熱氣背水
不發瘰癧可灸五壯

肺膈二穴在第三傾下兩傍相去各一寸五分足太
陽脈氣所發治上氣嘔吐支滿不嗜食汗不出腰
背強痛寒熱喘滿虛煩口乾傳尸骨蒸勞肺痿欬
嗽鍼入三分留七呼得氣即寫出甲乙甄權鍼經
云在第三傾下兩傍以搭手左取右右取左當中
指末是穴治骨中氣滿背候如龜腰強頭目眩令
人失顏色鍼入五分留七呼可灸百壯

針灸卷四

厥陰膈二穴在第四傾下兩傍相去各一寸五分治
逆氣嘔吐心痛留結骨中煩悶鍼入三分可灸七
七壯出山眺經

心膈二穴在第五傾下兩傍相去各一寸五分治心
中風狂走發潮語悲泣心骨悶亂煩滿汗不出結
積寒熱嘔吐不下食欬唾血鍼入三分留七呼得
氣即寫不可灸

膈膈二穴在第七傾下兩傍相去各一寸五分治欬
而逆逆膈胃寒痰食飲不下胃滿支腫兩脅痛腹
脹胃脘暴痛熱病汗不出喉痺腹中積滯默然嗜
卧四肢怠墮不欲動身常濕不能食食則心痛周

痺身且痛鍼入三分留七呼可灸三壯

肝膈二穴在第九頰下兩傍相去各一寸五分治欬

引兩脅急痛不得息轉側難撥脅下與脊相引而

反折目上視目眩循眉頭痛驚狂駭起則目眩

眩目生白翳欬引胃中痛痞疝少腹痛唾血短氣

鍼入三分留六呼可灸三壯

膽膈二穴在第十頰下兩傍相去各一寸五分治心

腹脹滿嘔則食無所出口舌乾咽中痛食不下

目黃胃脅不能轉側頭痛振寒汗不出腋下腫鍼

入五分可灸三壯

脾膈二穴在第十一頰下兩傍相去各一寸五分治

腹脹引背背痛飲食倍多身漸羸瘦黃疸善欠脅

下游洩利體重四肢不收治癰積聚腹痛不嗜食

痰瘧寒熱鍼入三分留七呼可灸三壯

胃膈二穴在第十二頰下兩傍相去各一寸五分治

胃中寒腹脹不嗜食羸瘦腸鳴腹痛胃脅支滿脊

痛筋癱鍼入三分留七呼可灸隨年為壯

三焦膈二穴在第十三頰下兩傍相去各一寸五分

治腸鳴腹脹水穀不化腹中痛欲洩注目眩頭痛

吐逆飲食不下肩背痠急腰脊強不得俛仰鍼入

五分留七呼可灸三壯

腎膈二穴在第十四頰下兩傍相去各一寸五分與

膈平治虛勞羸瘦耳聾腎虛水藏久冷心腹脹

兩脅滿引少腹急痛目視眩眩少氣溺血小便濁

出精陰中疼五勞七傷虛憊脚膝痠急是寒如水

頭重身熱振慄腰中四肢淫瀦洞洩食不化身腫

如水鍼入三分留七呼可灸以年為壯慎如前法

大腸膈二穴在第十六頰下兩傍相去各一寸五分

治腰痛腸鳴腹脹繞臍切痛大小便不利洞洩食

不化脊強不得俛仰鍼入三分留六呼可灸三壯

慎猪魚酒麪生冷物等

小腸膈二穴在第十八頰下兩傍相去各一寸五分

治小便赤澀淋瀝少腹疔痛脚腫短氣不嗜食大

便膿血出五痔疼痛婦人帶下鍼入三分留六呼

可灸三壯

膀胱膈二穴在第十九頰下兩傍相去各一寸五分

足太陽脈氣所發治風勞腰脊痛洩利腹痛小便

赤澀遺溺陰生瘡少氣足前寒病急不得屈伸女

子癥聚脚膝無力鍼入三分留六呼可灸三壯

中膈內膈二穴一名脊內膈在第二十頰下兩傍相

去各一可五分俠脊起肉治腸冷赤白痢腎虛消渴汗不出腰脊不得俛仰腹脹脅痛鍼入三分留十呼可灸三壯

白環臑二穴在第二十一椎下兩傍相去各一寸五分足太陽脈氣所發治腰脊癱急痛大小便不利甲乙經云鍼如腰戶法同挺腹地端身兩手相重支額縱息令皮膚俱緩乃取其穴鍼入八分得氣即先寫訖多補之治腰髓疼脚膝不遂溫瘧腰脊冷疼不得安卧勞損風虛不宜灸慎房勞不得舉重物

上髻二穴在第一空腰髻下俠脊陷中足太陽少陽絡治腰膝冷痛嘔逆鼻衄寒熱癰婦人絕嗣陰挺出不禁鍼入三分可灸七壯

次髻二穴在第二空俠脊陷中治疝氣下墜腰脊痛不得轉搖急引陰器痛不可忍腰已下至足不仁背膝寒小便赤淋心下堅脹可灸七壯鍼入三分中髻二穴在第三空俠脊陷中厥陰少陽所結治丈夫五勞七傷六極腰痛大便難腹脹下利小便淋澀食洩婦人絕子帶下月事不調鍼入二分留十呼可灸三壯

下髻二穴在第四空俠脊陷中足太陽厥陰所結治腰痛不得轉側女子下蒼汁不禁中痛引少腹急疼大便下血寒濕內傷鍼入二分留十呼可灸三壯

會陽二穴一名利機在陰尾骨兩傍督脈氣所發治腹中冷氣洩利不止久痔陽氣虛乏陰汗濕鍼入八分可灸五壯

背臑第三行附分二穴在第二頷下附項內廉兩傍相去各三寸手足太陽之會正坐取之治肩背痠急風冷客於

腠項強痛不得回顧風勞臂肘不仁可灸五壯鍼入三分

魄戶二穴在第三頷下兩傍相去各三寸正坐取之足太陽脈氣所發治背骨痛欬逆上氣嘔吐煩滿虛勞肺痿五尸走症項強不得回顧鍼入五分得氣即寫又宜久留鍼灸亦得日可灸七壯至百壯止忌猪魚酒麪生冷物等

膏肓臑二穴在第四頷下兩傍相去各三寸主無所不療羸瘦虛損夢中失精上氣欬逆發狂健忘又取穴之法令人正坐曲脊伸兩手以臂著膝前令

15001 丹 2 1

正直手大指與膝頭齊以物支肘勿令臂得動搖也從胛骨上角摸擦至骨下頭其間當有四肋三間灸中間從胛骨之裏去胛容側指許摩脂去表肋間空處按之自覺牽引於肩中灸兩胛中一處至百壯多至三百壯當覺下體似流水之狀亦當有所下出若得痰疾則無所不下也如病人已困不能正坐當令側卧俛上臂令前取穴灸之又以右手從左肩上住指頭所不及者是穴也左取亦然乃以前法灸之若不能入坐當伸兩臂令人挽兩胛骨使相離不尔即胛骨覆其穴灸之無驗

針灸卷五十一

此灸訖後令人陽康盛當消息以自補養論曰昔在和緩不救晉侯之疾其在膏之上育之下鍼藥不能及即此穴是也人不能求得此穴所以宿病難遣若能用心此方便求得灸之無疾不愈出千金外臺

神堂二穴在第五頤下兩傍相去各三寸正坐取之足太陽脉氣所發治有痛背腹滿洒泝寒熱背脊強急可灸五壯鍼入三分

譚譜二穴在肩膊內廉俠第六頤下兩傍相去各三寸正坐取之足太陽脉氣所發以手痛按之病者

言譚譜鍼入六分留三呼寫五吸治腋疔癰暴脈急引脅痛熱病汗不出溫瘧肩背痛目眩鼻衄喘逆腹脹有體內廉痛不得俛仰可灸二七壯至百壯止忌菹菜白酒物等

膈關二穴在第七頤下兩傍相去各三寸陷中正坐取之足太陽脉氣所發治背痛惡寒脊強俛仰難食飲不下嘔噦多涎唾胃中噎悶可灸五壯鍼入五分

魂門二穴在第九頤下兩傍相去各三寸陷中正坐取之足太陽脉氣所發治食飲不下腹中雷鳴大便不節小便赤黃可灸三壯鍼入五分

陽經二穴在第十頤下兩傍相去各二寸陷中正坐取之足太陽脉氣所發治腹滿腹脹大便洩利小便赤澀身熱目黃可灸三壯鍼入五分

意舍二穴在第十一頤下兩傍相去各三寸陷中正坐取之足太陽脉氣所發治腹滿虛脹大便滑洩背痛惡風寒食飲不下嘔噦不止消渴目黃可灸五十壯至百壯鍼入五分

胃倉二穴在第十二頤下兩傍相去各三寸足太陽脉氣所發治腹內虛脹水腫食飲不下惡寒背脊

不得俛仰可灸五十壯鍼入五分

盲門二穴在第十三傾下兩傍相去各三寸又肋間

異經云與鳩尾相直治心下日大堅婦人乳有餘

疾可灸三十壯鍼入五分

志室二穴在第十四傾下兩傍相去各三寸陷中足

太陽脈氣所發治腰脊強痛食飲不消腹中堅急

陰痛下腫失精小便淋瀝鍼入五分可灸三壯

胞育二穴在第十九傾下兩傍相去各三寸陷中伏

而取之足太陽脈氣所發治腰痛惡寒少腹堅急

瘞閉重不得小便澀痛腰背卒痛可灸五七壯鍼

入五分

秩邊二穴在第二十傾兩傍相去各三寸陷中伏而

取之足太陽脈氣所發治腰痛不能俛仰小便赤

澀腰尻重不能舉五痔發腫鍼入五分可灸三壯

慎如前法

側頸項部左右凡一十八穴

天容 天牖 天窓 天鼎 扶突 缺盆

人迎 水突 氣舍

膺胸中行凡七穴

天突 璇璣 華蓋 紫宮 玉堂 膻中

中庭

膺胸第二行左右凡一十二穴

膺府 或中 神藏 靈墟 神封 步郎

膺胸第三行左右凡一十二穴

氣戶 庫房 屋翳 膺窓 乳中 乳根

膺胸第四行左右凡一十二穴

雲門 中府 周榮 胃卿 天谿 食竇

側腋左右凡八穴

淵液 臑筋 天池 大包

側頸項部

天容二穴在耳下曲頰後手太陽脈氣所發治喉痺

寒熱咽中如鯁鍼入一寸可灸三壯

天牖二穴在頸筋缺盆上天合後天柱前完骨下髮

際上手少陽脈氣所發治頭風面腫項強不得回

顧鍼入一寸留七呼不宜補之亦不宜灸若灸之

面腫眼合先取諛諱後鍼天牖風池其病即差若

不先鍼諛諱即難瘳其疾也

天窓二穴一名窓籠在頸大筋前曲頰下扶突後動

脈應手陷中手太陽脈氣所發治耳鳴耳無所聞

頰腫喉中痛暴痞不能言肩痛引項不得回顧可

灸三壯鍼入三分

天鼎二穴在頸缺盆直扶突後一寸手陽明脈氣所發治暴瘖氣哽喉痺咽腫不得息飲食不下喉中鳴可灸三壯鍼入三分慎如常法

扶突二穴一名水穴在人迎後一寸五分手陽明脈氣所發治欬多唾上氣咽引喘息喉中如水雞鳴可灸三壯鍼入三分

缺盆二穴一名天盖在肩下橫骨陷中治寒熱瘰癧缺盆中腫外潰則生骨中熱滿腹大水氣缺盆中痛汗出喉痺欬嗽可灸三壯鍼入三分不宜刺太

深使人逆息也

人迎二穴一名五會在頸大脈動脈應手俠結喉傍仰而取之以候五藏氣足陽明之氣所發禁不可灸灸之不幸傷人治吐逆霍亂胃滿喘呼不得息項氣悶腫食不下鍼入四分

水突二穴在頸大筋前直人迎下氣舍上一名水門足陽明脈氣所發治欬逆上氣咽喉癰腫呼吸短氣喘息不得鍼入三分可灸三壯

氣舍二穴在頸直人迎俠天突陷中足陽明脈氣所發治欬逆上氣瘤癭喉痺咽腫項強不得回顧

鍼入三分可灸三壯

膺膺部中行

天突一穴在結喉下四寸宛宛中陰維任脈之會鍼入五分留三呼得氣即寫治欬嗽上氣胃中氣噎喉中狀如水雞聲肺壅咯唾膿血氣咽乾舌下急喉中生瘡不得下食灸亦得即不及鍼其下鍼直橫下不得低手即五藏之氣傷人慎如藥法及辛酸物等

璇璣一穴在天突下一寸陷中仰頭取之任脈氣所發治胃皮滿痛喉痺咽腫水漿不下可灸五壯鍼入三分

華蓋一穴在璇璣下一寸陷中仰頭取之任脈氣所發治胃脅支滿痛引胃中欬逆上氣喘不能言可灸五壯鍼入三分

紫宮一穴在華蓋下一寸六分陷中仰頭取之任脈氣所發治胃脅支滿膺骨疼飲食不下嘔逆上氣煩心可灸五壯鍼入三分

玉堂一穴在紫宮下一寸六分陷中一名玉英任脈氣所發治胃滿不得喘息膺骨疼嘔吐寒痰上氣煩心可灸五壯鍼入三分

膻中一穴一作竄一名元兒在玉堂下一寸六分直
兩乳間陷中仰卧取之任脈氣所發治肺氣欬嗽
上喘噦膿不得下食胃中如塞可灸二七壯今附
療膈氣嘔吐涎沫婦人乳汁少其穴禁不可鍼不
幸令人夭折慎猪魚酒麪物等

中庭一穴在膻中下一寸六分陷中任脈氣所發治
胃脅支滿噎塞食飲不下嘔吐食還出可灸五壯
鍼入三分

膺膈第二行
膺膈二穴在巨骨下璇璣傍各二寸陷中仰而取之

針灸卷三十九

足少陰脈氣所發治欬逆上喘嘔吐胃滿不得飲
食可灸五壯鍼入三分

或中二穴在膺膈下一寸六分陷中仰而取之足少
陰脈氣所發治胃脅支滿欬逆喘不能食飲鍼入
四分可灸五壯

神藏二穴在或中下一寸六分陷中仰而取之足少
陰脈氣所發治胃脅支滿欬逆喘不得息嘔吐胃
滿不嗜食可灸五壯鍼入三分

靈墟二穴在神藏下一寸六分陷中仰而取之足少
陰脈氣所發治胃脅支滿痛引背不得息欬逆嘔

吐胃滿不嗜食鍼入三分可灸五壯
神封二穴在靈墟下一寸六分仰而取之足少陰脈
氣所發治胃滿不得息欬逆乳癰洒泝惡寒可灸
五壯鍼入三分

步郎二穴在神封下一寸六分陷中仰而取之足少
陰脈氣所發治胃脅支滿鼻塞不通呼吸少氣喘
息不得舉臂鍼入三分灸五壯

膺膈第三行

氣戶二穴在巨骨下膺膈兩傍各二寸陷中仰而取
之足陽明脈氣所發治胃脅支滿喘逆上氣胃背

針灸卷六

急不得息不知食味鍼入三分可灸五壯

庫房二穴在氣戶下一寸六分陷中仰而取之足陽
明脈氣所發治胃脅支滿欬逆上氣多唾濁沫膿

血可灸五壯鍼入三分

屋翳二穴在庫房下一寸六分陷中仰而取之足陽
明脈氣所發治欬逆上氣呼吸多唾濁沫膿血身

體腫皮膚痛不可近衣淫灑癩瘰不仁可灸五壯
鍼入三分

膺窓二穴在屋翳下一寸六分足陽明脈氣所發治
胃滿短氣脣腫乳癰寒熱卧不安可灸五壯鍼入

四分

乳中二穴當乳是足陽明脈氣所發禁不可灸灸不幸生蝕瘡瘡中有清汁膿血可治瘡中有瘰肉若蝕瘡者死微刺一二分

乳根二穴在乳下一寸六分陷中仰而取之足陽明脈氣所發治胃下滿痛臂腫乳癰痿寒痛不可按抑可灸五壯鍼入三分

膺胸第四行

雲門二穴在巨骨下俠氣戶傍各二寸陷中動脈應手太陰脈氣所發治喉痺胃中煩滿氣上衝心欬

喘不得息胃脅短氣有痛不得舉臂甲乙經云可灸五壯鍼入三分刺深使人氣逆故不宜深刺

中府二穴肺之募一名膺中膺在雲門下一寸乳上

三肋間動脈應手足太陰之會治肺系急胃中痛懔懔臍熱嘔逆上氣欬唾濁涕有背痛風汗出腹脹食不下喉痺有息膚骨痛寒熱鍼入三分留五呼可灸五壯

周榮二穴在中府下一寸六分陷者中仰而取之足太陰脈氣所發治胃脅支滿不得俛仰飲食不下欬逆胸脹鍼入四分

胃鄉二穴在周榮下一寸六分陷中仰而取之足太陰脈氣所發治胃脅支滿引背痛卧不得轉側鍼入四分可灸五壯

天谿二穴在胃鄉下一寸六分陷中仰而取之足太陰脈氣所發治胃中滿痛乳腫青膺欬逆上氣喉中作聲鍼入四分可灸五壯

食竇二穴在天谿下一寸六分舉臂取之足太陰脈氣所發治胃脅不滿膈間雷鳴瀉瀉瀉常有小聲鍼入四分可灸五壯

側腋

淵腋二穴在腋下一寸宛宛中舉臂得之治胃滿無力臂不舉禁不宜灸灸之不幸令人生腫蝕馬瘍內潰者死寒熱生馬瘍可治鍼入三分

軛筋二穴在腋下一寸腹前一寸者脊是少陽脈氣所發治胃中暴滿不得卧喘息也可灸三壯鍼入六分

大包二穴在淵腋下三寸脾之大絡布胃脅中出九助間治腹有大氣氣不得息胃脅中痛內實則其身盡寒虛則百節皆縱可灸三壯鍼入三分

天池二穴在乳後一寸腋下一寸者脊直腋掖助間

一名天會手心主足少陽脉之會治寒熱心膈煩
滿頭痛四肢不舉腋下腫上氣胃中有聲喉中鳴
可灸三壯鍼入三分

腹部中行凡一十五穴

鳩尾 巨關 上腕 中腕 建里 下腕

水分 神闕 陰交 氣海 石門 關元

中極 曲骨 會陰

腹第二行左右凡二十二穴

幽門 通谷 陰都 石關 商曲 盲腸

中注 四滿 氣穴 大赫 橫骨

腹第三行左右凡二十四穴

不容 承滿 梁門 關門 太一

滑肉門 天樞 外陵 大巨 水道

歸來 氣衝

腹第四行左右凡一十四穴

期門 日月 腹哀 大橫 腹結 府舍

衝門

側脅左右凡一十二穴

章門 京門 帶脉 五樞 維道 居膠

腹部中行

鳩尾一穴一名尾翳一名解肝在臆前脊骨下五分

治心風驚悸發癲不語人語心腹脹胃中滿欬

逆數噫喘息喉痺咽壅水漿不下不可灸灸即令

人畢世少心力此穴人難鍼大好手方可此穴下

鍼不然取氣多不幸令人夭鍼入三分留三呼寫

五吸肥人可倍之忌如前法

巨關一穴心之募也在鳩尾下一寸鳩尾拒者少令

強一寸中人有鳩尾拒之任脉氣所發治心中煩

滿熱病胃中痰飲腹脹暴痛恍惚不知人息貴時

唾血蛇虫心痛蠱毒霍亂發狂不識人驚悸少氣

鍼入六分留七呼得氣即寫灸亦良可灸七壯至

七七壯止忌猪魚生冷酒熱麪物等

上腕一穴在巨關下一寸當一寸五分去脊骨三寸

任脉足陽明手太陽之會治心中熱煩黃脉氣脹

不能食霍亂吐利身熱汗不出三焦多涎心風驚

悸心痛不可忍伏梁氣狀如復杯鍼入八分先補

後寫之神驗如風癰熱病宜先寫後補其疾立愈

灸亦良日可灸二七壯至一百壯未愈更倍之忌

如常法

中腕一穴一名太倉胃之募也在上腕下一寸手太

陽少陽足陽明所生任脉之會上紀者中脘也滂
心下脹滿傷飽食不化霍亂出洩不自知心痛温
瘧傷寒飲水過多腹脹氣喘因讀書得背脊氣上
攻伏梁心下狀如覆杯寒癖結氣鍼入八分留七
寸寫五吸疾出鍼灸亦良可灸二十七壯至百壯止
忌猪魚生冷酒麪物等

建里一穴在中脘下一寸治心下痛不欲食嘔逆上
氣腹脹身腫鍼入五分留十呼可灸五壯

下脘一穴在建里下一寸足太陰任脉之會治腹痛
六腑之氣寒穀不轉不嗜食小便赤腹堅硬癍塊

臍上瘕氣動日漸羸瘦鍼入八分留三呼寫五吸
灸亦良可灸二十七壯至二百壯止

水分一穴在下脘下一寸臍上一寸任脉氣之所發
治腹堅如鼓水腫腸鳴胃虛脹不嗜食繞臍痛衝

肖不得息鍼入八分留三呼寫五吸若水病灸之
大良可灸七壯至百壯止禁不可鍼鍼水盡即斃

神闕一穴一名氣合當臍中是也治洩利不止小兒
疝利不絕腹大繞臍痛水腫鼓脹腸中鳴狀如流

水聲久冷傷備可灸百壯禁不可鍼慎如常法
陰交一穴一名橫戶素問云在臍下一寸任脉氣所

發治臍下疝痛寒疝引少腹痛腰膝痠癢腹瀉女
子月事不絕滯下產後惡露不止繞臍冷痛鍼入
八分得氣即寫可灸百壯止

氣海一穴一名膻腧一名下育在臍下一寸五分任
脉氣所發治臍下冷氣上衝心下氣結成塊狀如

覆杯小便赤澀婦人月事不調滯下崩中因產惡
露不止繞臍疝痛鍼入八分得氣即寫寫後宜補

之可灸百壯今附氣海者是男子生氣之海也治
歲氣虛僿真氣不足一切氣疾久不瘳悉皆灸之
慎如常法

石門一穴一名利機一名精露在臍下二寸三釐之
募任脉氣所發治腹脹堅硬水腫支滿婦人因產

惡露不止遂結成塊崩中漏下灸亦良可灸二十七
壯至一百壯止婦人不可鍼鍼之終身絕子

關元一穴在臍下三寸小腸之募足太陰少陰厥陰
三陰任脉之會下紀者關元也治臍下疝痛小便

赤澀不覺遺瀝小便澀痛狀如散火溺血暴疝痛
臍下結血狀如覆杯轉胞不得尿婦人帶下癢聚

因產惡露不止月脉斷絕下經冷鍼入八分留三
呼寫五及灸亦良可灸百壯至三百壯止慎如常

法

中極一穴一名玉泉一名氣原在關元下一寸膀胱之募是三陰任脉之會治五淋小便赤澀失精臍下結如覆杯陽氣虛憊疝瘕水腫黃豚搶心甚則不得息恍惚尸屢婦人斷緒四度鍼鍼即有子故却時任鍼也因產惡露不止月事不調血結成塊鍼入八分留十呼得氣即寫可灸百壯至三百壯止

曲骨一穴在橫骨之上毛際陷中動應手任脉是厥陰之會治少腹脹滿小便淋瀝不通瘡疔少腹痛

婦人赤白帶下惡合可灸七壯至七七壯鍼入二寸

會陰一穴一名屏翳在兩陰間任脉別絡俠督脉衝脉之會治小便難竅中熱皮痛穀道搔痒久痔相通者死陰中諸病前後相引痛不得大小便女子經不通男子陰端寒衝心恨恨可灸三壯

腹第二行

幽門二穴俠巨關兩傍各五分衝脉是少陰之會治胸中引痛心下煩悶逆氣衰急支滿不嗜食數效健忘洩利膿血少腹脹滿嘔沫吐涎噁女子心

痛逆氣善吐食不下可灸五壯鍼入五分

通谷二穴在幽門下一寸衝脉是少陰之會治失欠

口喎食飲善噎暴瘕不能言鍼入五分可灸五壯

陰都二穴一名食官在通谷下一寸衝脉是少陰之

會治身寒熱瘧病心下煩滿氣逆可灸三壯鍼入

三分

石關二穴在陰都下一寸衝脉是少陰之會療脊強

不開多唾大便秘澀婦人無子歲有惡血上衝腹

中疝痛不可忍可灸三壯鍼入一寸

商曲二穴在石關下一寸衝脉是少陰之會治腹中

積聚腸中切痛不嗜食可灸五壯鍼入一寸

育脬二穴在商曲下一寸臍傍各五分衝脉是少陰

之會治大腹寒疝大便乾燥腹中切痛可灸五壯

鍼入一寸

中注二穴在育脬下一寸衝脉是少陰之會治小腹

有熱大便堅燥不利可灸五壯鍼入一寸

四滿二穴一名髓府在中注下一寸衝脉是少陰之

會治臍下積聚疝瘕腸澀切痛振寒大腹石水婦

人惡血疝痛鍼入三分可灸三壯

氣穴二穴在四滿下一寸一名胞門一名子戶衝脉

足少陰之會治月事不調洩利不止黃氣上下引

腰痛可灸五壯鍼入三分

大赫二穴一名陰維一名陰關在氣穴下一寸衝脉

足少陰之會治男子陰器結縮女子赤帶可灸五

壯鍼入三分

橫骨二穴在大赫下一寸此穴諸經關療病法外臺

云治腹脹小便難陰器縱伸痛可灸三壯

腹第三行

不容二穴在幽門兩傍各一寸五分去任脉二寸直

四肋端足陽明脉氣所發治腹滿痞癖不嗜食腹

針灸卷六九

虛鳴嘔吐胃背相引痛喘欬口乾痰癖脅下痛重

肋疝瘕鍼入五分可灸五壯

承滿二穴在不容下一寸足陽明脉氣所發治腸鳴

腹脹上喘氣逆食飲不下有息唾血可灸五壯鍼

入三分

梁門二穴在承滿下一寸足陽明脉氣所發治脅下

積氣食飲不思大腸滑洩穀不化可灸五壯鍼入

三分

關門二穴在梁門下一寸足陽明脉氣所發治遺溺

善滿積氣腸鳴卒痛洩利不欲食腹中氣游走俠

臍急痰瘕振寒鍼入八分可灸五壯

太一二穴在關門下一寸足陽明脉氣所發治癩疾

狂走心煩吐舌可灸五壯鍼入八分

滑肉門二穴在太一下一寸足陽明脉氣所發治癩

疾嘔逆吐舌可灸五壯鍼入八分

天樞二穴大腸之募一名長谿一名穀門去盲膪一

寸五分夾臍傍二寸足陽明脉氣所發療夾臍切

痛時上衝心煩滿嘔吐霍亂寒瘧洩利食不化女

子月事不時血結成塊腸鳴腹痛不嗜食可灸百

壯鍼入五分留十呼

針灸卷七十

外陵二穴在天樞下一寸足陽明脉氣所發治腹中

痛心如懸下引臍腹痛可灸五壯鍼入三分

大巨二穴在長谿下二寸足陽明脉氣所發治少腹

脹滿煩渴瘕疝偏枯四肢不舉可灸五壯鍼入五

分

水道二穴在大巨下三寸足陽明脉氣所發治少腹

滿引陰中痛腰背強急膀胱有寒三焦結熱小便

不利可灸五壯鍼入二寸五分

歸來二穴在水道下二寸治少腹赤豚卵縮莖中痛

婦人血歲積冷可灸五壯鍼入八分

氣衝二穴一名氣衝在婦來下鼠臑上一寸動脈應
 手宛宛中足陽明脈氣所發治腸中大熱不得安
 卧腹有逆氣上攻心腹脹滿淫滯月水不利身熱
 腹中痛瘕疝陰腫難乳子上搶心痛不得息氣衝
 腰痛不得俯仰陰痿疝疝痛兩丸塞痛不可忍可
 灸七壯立愈炷狀如大麥禁不可鍼

腹第四行

期門二穴肝之募在不容傍一寸五分直兩乳第二
 肋端是太陰厥陰陰維之會治胃中煩熱賁豚上
 下目青而嘔霍亂洩利腹堅硬大喘不得安卧脅

針灸卷十五

下積氣女子產餘瘀食飲不下胃管支滿心中切
 痛善噫若傷寒過經不解當鍼期門使經不傳鍼
 入四分可灸三壯

日月二穴膽之募在期門下五分足太陰少陽陽維
 之會治大息善悲小腹熱欲走多噤言語不正四
 肢不收可灸五壯鍼入七分

腹哀二穴在日月下一寸五分是太陰陰維之會治
 大便膿血寒中食不化腹中痛鍼入三分

大橫二穴在腹哀下三寸五分直臍傍是太陰陰維
 之會療大風逆氣多寒善悲可灸五壯鍼入七分

腹結二穴在大橫下三分一名腸瀦治繞臍痛上衝
 搶心腹寒洩利欬逆鍼入七分可灸五壯

府舍二穴在腹結下三寸是太陰厥陰陰維之交會
 此三脈上下三入腹絡肝脾結心肺從脅上至肩
 此太陰和三陰陽明支別治疝瘕脾中急痛循脅
 上下搶心腹滿積聚瘕氣霍亂鍼入七分可灸五
 壯

衝門二穴一名慈宮上去大橫五寸府舍下橫骨兩
 端約中動脈是太陰厥陰之會治腹寒氣滿積聚
 疼淫

針灸卷十五

乳子上衝心不得息鍼入七分可
 灸五壯

側脅

章門二穴脾之募一名長平一名脅髀在大橫外直

臍季肋端側卧屈上足伸下足舉臂取之足厥陰
 少陽之會治腸鳴盈盈然食不化脅痛不得卧煩

熱口乾不嗜食胃管支滿喘息心痛腰痛不得轉
 側傷飽身黃羸瘦胃脘腹腫脊強四肢懈惰善恐

少氣癈逆肩臂不舉可灸百壯鍼入六分忌如前
 京門二穴腎之募一名氣膺一名氣府在監骨腰中

季脅本俠脊治腰痛不得俯仰寒熱腹脹引背不

得息水道不利溺黃少腹急腫腸鳴洞洩脾樞引

痛可灸三壯鍼入三分留七呼

帶脈二穴在季脅下一寸八分治婦人少腹堅痛月

脉不調帶下赤白裏急瘦癯可灸五壯鍼入六分

五樞二穴在帶脉下三寸一云在水道傍一寸五分

治男子寒疝陰卵上入小腹痛鍼入一寸可灸五

壯

維道二穴在章門下五寸三分足少陽帶脉之會治

嘔逆不止三焦不調水腫不嗜食鍼入八分可灸

三壯

針灸卷七十三

居髀二穴在章門下八寸三分監骨上陷中陽蹻足

少陽之會治腰引少腹痛有引脊臂癱急手臂不

得舉而至肩灸三壯鍼入八分

銅人腧穴鍼灸圖經卷下

黃帝問曰十二經中氣血多少皆可徵驗其岐伯對曰

其可度量者乎度也以經水應十二經脉也谿谷遠

近淺深氣血多少各不同其治以鍼灸各調其氣血

合而刺之補虛寫實皆所盡知其部分也肝是厥陰

經少氣多血心手少陰經少血多氣脾是太陰經少

血多氣肺手太陰經少血多氣腎是少陰經少血多

氣膽是少陽經多氣少血小腸手太陽經多血少氣

胃足陽明經多血多氣大腸手陽明經多血多氣膀

胱是太陽經多血少氣心包絡手厥陰經多血少氣

三焦手少陽經多氣少血視其部中浮絡其色多青

則痛多黑則風痺黃赤則熱多白則寒五色皆見寒

熱也感虛乃留於筋骨之間寒多則筋癱骨痛熱多

則骨消筋緩也

傍通十二經絡流注孔穴圖

肺 心 肝 脾 腎 心包絡

春刺井 少商 少衝 大敦 隱白 涌泉 中衝

夏刺榮 魚際 少府 行間 大都 然谷 勞宮

秋刺經 太淵 神門 太衝 太白 太谿 太隄

冬刺合 經渠 靈道 中封 商丘 復溜 間使

冬刺合水尺澤 少海 曲泉 陰溪泉 陰谷 曲澤

大腸 小腸 膽 胃 膀胱 三焦

所出為井 金商陽 少澤 竅陰 厲兌 至陰 開衝

所注為榮 水二間 前谷 俠谿 內庭 通谷 液門

所過為原 合谷 腕骨 丘墟 衝陽 京骨 陽池

所行為經 火陽谿 陽谷 陽輔 解谿 崑崙 支溝

所入為合 上曲池 小海 陽溪泉 三里 禾中 天井

手太陰肺經左右凡一十八穴

少商 魚際 太淵 經渠 列缺 孔最

尺澤 俠白 天府

少商二穴木也在手大指端內側去爪甲角如韭葉

手太陰之脈所出也為井治煩心善噦心下滿汗

出而寒欬逆痰癢振寒腹滿唾沫脣乾引飲不下

膨膨手癢指痛寒慄鼓頷喉中鳴以三稜鍼刺之

微出血洩諸歲熱溼唐刺史成君綽忽顯頷腫大

如升喉中閉塞水粒不下三日甄權鍼之立愈不

宜灸

魚際二穴火也在手大指本節後內側散脈中手太

陰脈之所流也為榮治洒泝惡風寒虛熱舌上黃

身熱頭痛欬嗽汗不出痺走骨背痛不得息目眩

煩心少氣腹痛不下食肘懸支滿喉中乾燥寒慄

鼓頷欬引尻痛溺出嘔血心痺悲恐鍼入二分留

三呼

太淵二穴在手掌後陷中手太陰脈之所注也為腧

治胃痺逆氣寒厥善噦嘔飲水欬嗽煩怒不得卧

肺脹滿膨膨臂內廉痛目生白翳眼皆赤筋缺盆

中引痛掌中熱欬欠喘不得息噫氣上逆心痛唾

血振寒咽乾狂言口辟可灸三壯鍼入二分

經渠二穴金也在寸口陷中手太陰脈之所行也為

經治瘧寒熱骨背痠急骨滿膨膨喉痺掌中熱欬

嗽上氣數欠熱病汗不出暴痺喘足心痛嘔吐鍼

入二分留三呼禁不可灸灸即傷人神

列缺二穴去腕則上一寸五分以手交叉頭指末筋

骨罇中手太陰絡別走陽明瘰癧風口喎手腕無

力半身不隨欬嗽掌中熱口噤不開寒瘧嘔沫善

笑縱脣口健忘鍼入二分留三呼寫五吸即可灸

七壯慎酒麪生冷物等

孔最二穴在腕上七寸手太陰經治熱病汗不出此

穴可灸三壯即汗出欬逆臂痠痛鍼入三分可灸

五壯

尺澤二穴水也在肘中約上動脈中手太陰脈之所入也為合治風痺肘癱手臂不得舉喉痺上氣舌乾欬嗽唾濁四肢暴腫臂寒短氣鍼入三分可灸五壯

俠白二穴在天府下去肘五寸動脈中治心痛乾嘔煩滿鍼入三分可灸五壯

天府二穴在腋下三寸動脈中以鼻取之治逆氣喘不得息目眩遠視眩暈卒中惡鬼疰不得安卧禁不可灸使人逆氣今附刺鼻衄血不止鍼入四分

留三呼

手陽明大腸經左右凡二十八穴

商陽 二間 三間 合谷 陽谿 偏歷

溫留 下廉 上廉 三里 曲池 肘髻

五里 臂臑

商陽二穴金也一名絕陽在手大指次指內側去爪甲角如韭葉手陽明脈之所出也為井治胃中氣滿喘欬支腫熱病汗不出耳鳴耳聾寒熱瘧瘡口乾頤頰腫齒痛惡寒肩背急相引缺盆痛目青盲可灸三壯右取左左取右如瀕食立已鍼入一分

留一呼

二間二穴水也一名門谷在手大指次指本節前內側陷中手陽明脈之所流也為榮治喉痺頰腫肩背痛振寒鼻衄衄血多驚口喎鍼入三分灸三壯

三間二穴木也一名少谷在手大指次指本節之後內側陷中手陽明脈之所注也為輸治喉痺咽中如鯁齒齲痛嗜卧胃滿腸鳴洩寒瘡唇焦口乾氣喘目昏急痛鍼入三分留三呼可灸三壯

合谷二穴一名虎口在手大指次指歧骨間陷中手陽明脈之所過也為原療寒熱瘡鼻衄衄熱病汗

不出目視不明頭痛齒齲喉痺痿臂面腫唇吻不收瘖不能言口禁不開鍼入三分留六呼可灸三壯今附若婦人妊娠不可刺之損胎氣

陽谿二穴火也一名中魁在腕中上側兩筋陷中手陽明脈之所行也為經治狂言喜笑見鬼熱病煩心目風赤爛有翳癢逆頭痛胃滿不得息寒熱瘧疾喉痺耳鳴齒痛驚掣肘臂不舉痲疥鍼入三分留七呼可灸三壯慎如前法

偏歷三穴手陽明絡在腕後三寸別走太陰治寒熱瘧風汗不出目視眩暈瘖多言耳鳴口喎齒齲

喉痺乾鼻衄血鍼入三分留七呼可灸三壯
 溫留二穴一名遂注一名地頭在腕後大七五寸小
 士六寸手陽明經治口喎腸鳴腹痛傷寒身熱頭
 痛噦逆肩不得舉癩疾吐涎狂言見鬼喉痺面虛
 腫鍼入三分可灸三壯
 下廉二穴在輔骨下去上廉一寸輔骨肉其分外斜
 治頭風臂肘痛瀉黃鍼入五分留五呼可灸三壯
 上廉二穴在三里下一寸其分獨極陽明之會外斜
 治腦風頭痛小便難黃赤腸鳴氣走疰痛鍼入五
 分可灸五壯
 三里二穴在曲池下二寸按之肉起兌肉之端治手
 臂不仁肘癰不伸齒痛頰頰腫癰癰可灸三壯鍼
 入三分
 曲池二穴土也在肘外輔骨屈肘曲骨之中以手拱
 背取之手陽明脈之所入也為合治肘中痛偏風
 半身不遂刺風癰脈喉痺不能言臂中煩滿筋緩
 提物不得挽弓不開屈伸難風臂肘細而無力傷
 寒餘熱不盡皮膚乾燥鍼入七分得氣先寫後補
 之灸亦大良可灸三壯
 肘髁二穴在肘大骨外廉陷中治肘節風痺臂痛不

可舉屈伸癰急灸三壯鍼入三分
 五里二穴在肘上三寸行向裏大脉中央治風勞筋
 恐吐血肘臂痛臂肘四肢不得動搖寒熱癰欬
 嗽目視眩暈痰瘧心下脹滿可灸十壯禁不可鍼
 臂臑二穴在肘上七寸脰肉端手陽明絡治寒熱頸
 項疴急癰癰肩臂痛不得舉可灸三壯鍼入三分
 手少陰心經左右凡一十八穴
 少衝 少府 神門 陰郤 通里 靈道
 少海 青靈 極泉
 少衝二穴本也一名經始在手小指內廉之端去爪
 甲角如韭葉手少陰脈之所出也為井治熱病煩
 滿上氣心痛痰冷少氣悲恐善驚掌中熱背脊中痛
 口中熱咽中酸乍寒乍熱手癰不伸引肘腋痛鍼
 入一分可灸三壯
 少府二穴火也在小指本節後陷中直勞宮手少陰
 脈之所流也為榮治煩滿少氣悲恐畏人掌中熱
 肘腋癰急背脊中痛手卷不伸鍼入二分可灸七壯
 神門二穴土也一名兌衝在掌後兌骨之端陷中手
 少陰脈之所注也為腧治瘧心煩甚欲得飲冷惡
 寒則欲處溫中咽乾不嗜食心痛數噦恐悸少氣

不足手臂寒喘逆身熱狂悲哭嘔血上氣遺溺大小人五癩可灸七壯炷如小麥大鍼入三分留七乎

陰郄二穴在掌後脈中去腕五分治失瘖不能言洒泝振寒痲逆心痛霍亂胃中滿衄血驚恐鍼入三分可灸七壯

通里二穴在腕後一寸熱病卒心中懊懣數欠頻伸悲恐目眩頭痛面赤而熱心悸肘臂痛實則支腫虛則不能言苦嘔喉痺少氣遺溺鍼入三分可灸三壯

靈道二穴金也去掌後一寸五分或一寸手少陰脈之所行也為經治心痛悲恐相引痲痺肘癱暴瘖不能言可灸三壯鍼入三分

少海二穴水也一名曲節在肘內廉節後又云肘內大骨外去肘端五分手少陰脈之所入也為合治寒熱齒齲痛目眩發狂嘔吐涎沫項不得回顧肘癱腋脅下痛四肢不得舉鍼入三分可灸三壯甄權云屈手向頭取之治齒寒腦風頭痛不宜灸鍼入五分

青靈二穴在肘上三寸舉臂取之治肩臂不舉不能

帶衣頭痛振寒目黃脊痛可灸七壯

極泉二穴在腋下筋間動脈入臂治心痛乾嘔四肢不收咽乾煩渴臂肘痲寒目黃脊下滿痛可灸七壯鍼入三分

手太陽小腸經左右凡一十六穴

少澤 前谷 後谿 腕骨 陽谷 養老

支正 小海

少澤二穴金也一名小吉在手小指之端去爪甲下一分陷中手太陽脈之所出也為井治瘡寒熱汗不出喉痺舌強口乾心煩臂痛癱瘓欬嗽頸項急

不可顧目生膚翳後瞳子可灸一壯鍼入一分

前谷二穴水也在手小指外側本節之前陷中手太陽脈之所流也為榮治熱病汗不出瘡癩癩疾耳鳴頰腫喉痺欬衄血頸項痛鼻塞不利目中白翳臂不得舉可灸一壯鍼入一分

後谿二穴木也在手小指外側本節後陷中手太陽脈之所注也為腧治瘧寒熱目赤生翳聾耳聾胃滿頸項強不得回顧癱疾臂肘癱急可灸一壯鍼入一分

腕骨二穴在手外側腕前起骨下陷中手太陽脈之

所過也為原治熱病汗不出脅下痛不得息項領腫寒熱耳鳴目冷淚生臂狂惕偏枯臂肘不得屈伸痲瘡頭痛煩悶驚風癱瘓五指掣可灸三壯鍼入二分留三呼

陽谷二穴火也在手外側腕中兌骨之下陷中手太陽脈之所行也為經注癩疾狂走熱病汗不出脅痛項領腫寒熱耳聾耳鳴齒齲痛臂腕外側痛不舉妄言左右顛癡癡目眩可灸三壯鍼入二分留二呼

養老二穴在手踝骨上一空一寸陷中手太陽經治

肩欲折臂如援手臂疼不能自上下目視不明可灸三壯鍼入三分

支正二穴

在腕後五寸別走少陽治寒熱頰腫肘癰頭痛目眩風虛驚恐狂惕生眵目可灸三壯鍼入三分

小海二穴

土也在肘內大骨外去肘端五分陷中甄權云以屈手向頭取之手太陽脈之所入也為合

治寒熱齒斷腫風眩項痛癆腫振寒肘腋腫少腹痛四肢不舉可灸三壯鍼入二分

手厥陰心主脈左右凡一十六穴

中衝 勞宮 太陵 內關 間使 一竹 郄門 曲澤 天泉

中衝二穴木也在手中指端去爪甲如韭葉陷中手厥陰心主脈之所出也為井治熱病煩悶汗不出掌中熱身如火心痛煩滿舌乾鍼入一分

勞宮二穴火也在掌中央動脈中以屈無名指取之手厥陰脈之所流也為榮治心風善怒悲笑不休手痺熱病三日汗不出休惕胃脅痛不可轉側大小便血衄血不止氣逆嘔噦煩渴食飲不下大小人口中腥臭胃脅支滿黃疸自黃可灸三壯

太陵二穴土也在掌後兩筋間陷中手厥陰脈之所注也為輸治熱病汗不出臂癱腋腫善笑不休心懸若飢悲泣驚恐目赤小便如血嘔逆狂言不樂喉痺口乾身熱頭痛短氣胃脅痛鍼入五分可灸三壯

內關二穴在掌後去腕二寸別走少陽治目赤支滿中風心癱實則心暴痛虛則心煩惕鍼入五分可灸三壯

間使二穴金也在掌後三寸兩筋間陷中手厥陰脈之所行也為經治心懸如飢卒狂胃中澹澹惡風

之

寒嘔吐怵惕寒中少氣掌中熱腋腫肘癢卒心痛
多驚瘖不得語咽中如鯁可灸五壯鍼入三分岐
伯云可灸鬼邪

郄門二穴去腕五寸手厥陰郄治心痛衄血嘔噦驚
恐畏人神氣不足鍼入三分可灸五壯

曲澤二穴水也在肘內廉陷中屈肘取之手厥陰脉
之所入也為合治心痛善驚身熱煩渴口乾逆氣
嘔血風脉臂肘手腕善動搖可灸三壯鍼入三分
留七呼

天泉二穴一名天濕在曲腋下二寸舉臂取之治心
病臂背支滿欬逆膺背胛間臂內廉痛鍼入六分
可灸三壯

手少陽三焦經左右凡二十四穴

關衝 液門 中渚 陽池 外關 支溝

會宗 三陽絡 四瀆 天井 清冷淵 消灤

關衝二穴金也在手小指次指之端去爪甲角如韭
葉手少陽脉之所出也為井治喉痺舌卷口乾頭
痛霍亂昏中氣噎不嗜食臂肘痛不可舉目生翳
膜視物不明鍼入一分可灸一壯慎猪魚酒麪生
冷物等

液門二穴水也在手小指次指間陷中手少陽脉之
所流也為榮治驚悸忘言咽外腫寒厥手臂痛不
能自上下痰瘧寒熱目眩頭痛暴得耳聾目赤齒
齒齲痛鍼入二分可灸三壯

中渚二穴木也在手小指次指本節後間陷中手少
陽脉之所注也為腧治熱病汗不出目眩頭痛耳
聾目生翳腹灸瘧咽腫肘臂痛手五指不得屈伸
鍼入二分可灸三壯

陽池二穴一名別陽在手老腕上陷中手少陽脉之
所過也為原治寒熱瘧或因折傷手腕捉物不得
肩臂痛不得舉鍼入二分留三呼不可灸慎生冷
物等

外關二穴手少陽絡在腕後二寸陷中治肘臂不得
屈伸手五指盡痛不能握物耳聾無所聞可灸三
壯鍼入三分留七呼

支溝二穴火也在腕後二寸兩骨之間陷中手少陽
脉之所行也為經治熱病汗不出肩臂痠重為腋
痛四肢不舉霍亂嘔吐口禁不開暴瘧不能言可
灸二七壯鍼入二分慎酒麪生冷猪魚物等
會宗二穴在腕後三寸空中一寸治肌膚痛耳聾風

癰鍼入三分可灸三壯

三陽絡二穴在臂上大交脉支耳上一寸治嗜卧身體不欲動耳卒聾齒齲暴瘕不能言可灸七壯禁不可鍼

四瀆二穴在肘前五寸外廉陷中治暴氣耳聾齒齲痛可灸三壯鍼入六分留七呼

天井二穴土也在肘外大骨後肘後上一寸兩筋間陷中屈肘得之手少陽脉之所入也為合甄權云曲肘後一寸又手按膝頭取之兩筋骨罅治心昏痛欬嗽上氣喘噎不嗜食驚悸瘕瘕風痺臂肘痛

捉物不得可灸三壯鍼入三分慎如常法

清冷淵二穴在肘上二寸伸肘舉臂取之治孺從肩臂不舉不得帶衣可灸三壯鍼入三分

消灤二穴在肩下臂外腋斜肘分下行治寒熱風痺

項痛肩背急鍼入六分可灸三壯

足厥陰肝經左右凡二十二穴

大敦 行間 太衝 中封 蠡溝 中都 膝關 曲泉 陰包 五里 陰廉 大敦二穴木也在足大指端去爪甲如韭葉及三毛中足厥陰脉之所出也為井治卒疝小便數遺溺

陰頭中痛心痛汗出陰上入腹陰偏大腹臍中痛悒悒不樂病左取右右取左腹脹腫滿少腹滿中熱喜寐戶覺狀如死婦人血崩不止可灸三壯鍼入三分留六呼

行間二穴火也在足大指間動脈應手陷中足厥陰脉之所流也為榮治溺難又白濁寒疝少腹腫欬逆嘔血腰痛不可俛仰腹中脹心痛色蒼蒼如死狀終日不得息口喘四肢逆冷喘乾煩渴噤不欲視目中淚出太息癩疾短氣可灸三壯鍼入六分留十呼

大衝二穴土也在足大指本節後二寸或一寸半陷中今附凡詠太衝脉可訣男子病死生足厥陰脉之所注也為輸治腰引少腹痛小便不利狀如淋瘕疝少腹腫漉遺溺陰痛面目蒼色胃脅支滿足寒大便難嘔血女子漏血不止小兒卒疝嘔逆發寒噎乾肘腫內踝前痛滯澀筋痠腋下腫馬刀瘍癰瘰腫鍼入三分留十呼可灸三壯

中封二穴金也在足內踝前一寸仰足取之陷中伸足乃得之是厥陰脉之所行也為經治瘡瘻色蒼蒼振寒少腹腫食快繞臍痛足逆冷不嗜食身

體不仁寒疝引腰中痛或身微熱鍼入四分留七呼可灸三壯

蠡溝二穴在足內踝上五寸別走少陽是厥陰絡治卒疝少腹腫時少腹暴痛小便不利如瘞閉數噫恐悸少氣不足腹中痛悒悒不樂胸中悶如有瘕肉狀背痠急不可仰鍼入二分留三呼可灸三壯

中都二穴一名中都內踝上七寸斷骨中與少陰相直治腸澼瘡疝少腹痛婦人崩中因產惡露不絕鍼入三分可灸五壯

膝關二穴在臍下二寸陷中治風痺膝內痛引臍不可屈伸喉咽中痛鍼入四分可灸五壯

曲泉二穴水也在膝內輔骨下大筋上小筋下陷中屈膝取之足厥陰脈之所入也為合治女子血瘕按之如湯沃服內少腹腫陰挺出丈夫瘰癧陰服痛小便難腹脅支滿瘞閉少氣洩利四肢不舉實即身熱目眩痛汗不出目眦眦痛筋癢不可屈伸癸狂衄血喘呼少腹痛引喉咽鍼入六分灸三壯又云正膝屈內外兩筋間宛宛中又在膝曲橫文頭治風勞失身極痛洩水利膿血陰腫

筋痛可灸三壯鍼入六分留十呼

陰包二穴在膝上四寸股內廉兩筋間是厥陰別走治腰尻引少腹痛遺溺不禁鍼入六分可灸三壯五里二穴在氣衝下三寸陰股中動脈治腸中滿熱閉不得溺可灸五壯鍼入六分

陰廉二穴在羊矢下去氣衝二寸動脈中治婦人絕產若未經生產者可灸三壯即有子鍼入八分留七呼

足少陽膽經左右凡二十八穴

竅陰 俠谿 地五會 臨泣 丘墟

懸鍾 陽輔 光明 外丘 陰交

陽陵泉 陽關 中瀆 環跳

竅陰二穴金也在足小指次指之端去爪甲如韭葉足少陽脈之所出也為井治脅痛欬逆不得息手足煩熱汗不出轉筋癱瘓頭痛心煩喉痺舌強口乾肘不可舉聾聵不聞人語可灸三壯鍼入一分俠谿二穴水也在足小指次指歧骨間本節前陷中是少陽脈之所流也為榮治胃脅支滿寒熱汗不出目外皆赤目眩頰腫耳聾骨中痛不可轉側痛無常處可灸三壯鍼入三分

地五會二穴在足小指次指本節後陷中去俠谿一
寸治內傷唾血足外皮膚不澤乳腫鍼入二分不
可灸灸則使羸瘦不出三年卒

臨泣二穴在足小指次指本節後間陷中去俠
谿一寸五分足少陽脈之所注也為腧治胃中滿
缺盆中及腋下腫馬刀瘍癰善齧頰天牖中腫淫
樂衝痠自眩枕骨令顛痛洒泝振寒婦人月事不
利季脅支滿乳癰心痛周痺痛無常處癰逆氣喘
不能行疹癘目發可灸三壯鍼入二分

丘墟二穴在足外踝下如前陷中去臨泣三寸足少

陽脈之所過也為原治骨節滿痛不得息久瘧振
寒腋下腫痿癢坐不能起髀樞中痛目生翳膜腿
筋痠轉筋卒疝少腹堅寒熱頸腫可灸三壯鍼入
五分留七呼

懸鐘二穴在足外踝上三寸動脈中是三陽之大絡
按之陽明脈絕乃取之治心腹脹滿胃中熱不嗜
食膝筋痛筋急是收履坐不能起可灸五壯鍼
入六分留七呼

陽輔二穴火也在足外踝上四寸輔骨前絕骨端如
前三分去丘墟七寸是少陽脈之所行也為經治

腰溶溶如坐水中膝下膚腫筋癢諸節盡痛亡無
常處腋下腫漢馬刀喉痺膝筋痠風痺不仁可灸
三壯鍼入五分留七呼

光明二穴在足外踝上五寸別走厥陰足少陽絡治
身解寒淫樂衝痠不能久立與陽輔療病法同熱
病汗不出卒狂虛則痿痺坐不能起實則足筋熱
膝痛身體不仁善齧頰可灸五壯鍼入六分留七
呼

外丘二穴在足外踝上七寸少陽所生治膚痛痿痺
胃脘脹滿頸項痛惡風寒癩疾鍼入三分可灸三

壯今附狗犬所傷毒不出發寒熱速以三姓人可
灸所齧之處立愈

陽交二穴一名別陽七維都在足外踝上七寸斜屬
三陽分肉之間治寒癢驚狂喉痺胃滿面腫寒痺
膝筋不收灸三壯鍼入六分留七呼

陽陵泉二穴土也在膝下一寸外廉陷中足少陽脈
之所入也為合鍼入六分得氣即寫又宜久留鍼
為要也治膝伸不得屈冷痺脚不仁偏風半身不
遂脚冷無血色又以蹲坐取之灸亦良日可灸七
壯至七七壯即止

陽關二穴在陽陵泉上三寸犢鼻外陷中治膝外痛不可屈伸風痺不仁鍼入五分不可灸

中瀆二穴在髌骨外膝上五寸分肉間陷中足少陽絡治寒氣客於分肉之間痛攻上下筋痺不仁可灸五壯鍼入五分經七呼

環跳二穴在髀樞中側卧伸下足屈上足取之治冷風濕痺風脉偏風半身不遂腰髀痛不得轉側可灸五十壯鍼入一寸留十呼忌熱麪猪魚生冷物等

足太陰脾經左右凡二十二穴

隱白 大都 太白 公孫

商丘 三陰交 漏谷 地機

陰陵泉 血海 箕門

隱白二穴木也在足大指端內側去爪甲角如韭葉

足太陰脉之所出也為井治腹脹喘滿不得安卧

嘔吐食不下暴洩衄血卒尸蹙不識人是寒不能

温鍼入三分今附婦人月事過時不止刺之立愈

大都二穴火也在足大指本節後陷中足太陰脉之

所流也為榮治熱病汗不出手足逆冷腹滿善嘔煩熱悶亂吐逆目眩可灸三壯鍼入三分

太白二穴土也在足內側核骨下陷中足太陰脉之所注也為腧治身熱煩滿腹脹食不化嘔吐洩膿血腰痛大便難氣逆霍亂腹中切痛可灸三壯鍼入三分

公孫二穴在足大指本節後一寸別走陽明太陰絡治寒瘧不嗜食卒面腫煩心狂言腹虛脹如鼓可灸三壯鍼入四分

商丘二穴金也在足內踝下微前陷中足太陰脉之所行也為經治腹脹腸中鳴不便脚虛令人不樂身寒善大息心悲氣逆痔疾骨疽蝕絕子厭夢可

灸三壯鍼入三分

三陰交二穴在內踝上三寸骨下陷中足太陰厥陰

少陰之交會治痰癖腹中寒膝股內痛氣逆小便

不利脾病身重四肢不舉腹脹腸鳴漉洩食不化

女子漏下不止可灸三壯鍼入三分昔有宋太子

性善醫術出苑逢一懷娠婦人太子諫曰是一女

也今徐文伯亦諫之此一男一女也太子性急欲

剖視之臣謂鍼之為是三陰交前手陽明合谷應

鍼而落果如文伯之言故始娠不可刺

漏谷二穴亦名太陰絡在內踝上六寸骨下陷中治

痿痺冷氣心腹脹滿食飲不為肌肉消渴痺不能久立鍼入三分

地機二穴亦名脾舍是太陰經別走上一寸空在膝下五寸治女子血癥按之如湯沃心內至膝丈夫滯洩腹脅氣脹水腫腹堅不嗜食小便不利可灸三壯鍼入三分

陰陵泉二穴水也在膝下內側輔骨下陷中伸足取之是太陰脈之所入也為合又曲膝取之治腹中寒不嗜食膈下滿水脹腹堅而逆不得卧腰痛不得俛仰霍亂石瘕小便不利氣淋寒熱不節鍼入

五分

血海二穴在膝膕上內廉白肉際二寸中治女子漏

下惡血月事不調逆氣腹脹可灸三壯鍼入五分

箕門二穴在魚腹上越筋間動脈應手在陰股內一云股上起筋間治淋遺溺鼠鼯腫痛小便不通可灸三壯

足陽明胃之經左右凡三十六穴

厲兌 內庭 陷谷 衝陽 解谿 豐隆

下廉 條口 上廉 三里 犢鼻 梁丘

陰市 伏兔 髀關

厲兌二穴金也在足大指次指之端去爪甲如韭葉足陽明脈之所出也為井治尸厥口噤氣絕狀如中惡心腹脹滿熱病汗不出寒熱瘧不嗜食面腫足脣寒喉痺齒齲惡風鼻不利多驚好卧鍼入一分可灸一壯

內庭二穴水也在足大指次指外間陷中足陽明脈之所流也為榮治四肢厥逆腹脹數欠惡聞人聲振寒咽中引痛口喎齒齲痛瘰不嗜食可灸三壯鍼入三分

陷谷二穴木也在足大指次指之間本節後陷中去

內庭二寸是陽明脈之所注也為腧治面目浮腫及水病善噦腸鳴腹痛熱病汗不出振寒瘧疾鍼入三分留七呼可灸三壯

衝陽二穴在足跗上去陷谷三寸是陽明脈之所過也為原治偏風口眼喎斜肘腫齒齲痛發寒熱腹堅大不嗜食振寒久狂登高而歌弃衣而走是緩後不收鍼入五分可灸三壯

解谿二穴火也在衝陽後一寸五分腕上陷中足陽明脈之所行也為經治風面浮腫顏黑熱氣上衝腹脹大便下重瘰癧膝股筋轉筋目眩頭痛癰

疾煩心悲泣霍亂頭風面目赤鍼入五分可灸三壯

豐隆二穴在外踝上八寸下廉筋外廉陷中別走太

陰治癰逆胃痛如刺腹中切痛大小便難澀癰頭

痛面浮腫風逆四肢腫身濕喉痺不能言鍼入三分可灸三壯

下廉二穴一名下巨虛在上廉下三寸當舉足取穴

治少腹痛飧洩次指間痛脣乾涎出不覺不得汗

出毛髮焦脫肉少氣胃中熱不嗜食洩膿血胃脅

少腹痛暴驚狂言非常女子乳癰喉痺筋腫足跗

不收鍼入八分可灸三壯

條口二穴在下廉上一寸舉足取之治膝筋寒痠痛

足緩履不收濕痺足下熱鍼入五分

上廉二穴一名上巨虛在三里下三寸當舉足取之

治飧洩腹脅支滿狂走俠臍腹痛食不化喘息不

能行可灸三壯鍼入三分甄權云治臧氣不足偏

風脹腿手足不仁可灸以年為壯

三里二穴土也在膝下三寸筋外廉兩筋間當舉足

取之是陽明脈之所入也為合治胃中寒心腹脹

滿胃氣不足聞食臭腸鳴腹痛食不化秦丞祖云

諸病皆治食氣水氣蠱毒痲痺四肢腫滿膝筋痠

痛目不明華陀云療五勞羸瘦七傷虛乏胃中癢

血乳癰外臺明堂云人年三十已上若不灸三里

令氣上衝目可灸三壯鍼入五分

犢鼻二穴在膝膕下胛俠解大筋中治膝中痛不仁

難跪起膝膕癰腫潰者不可治不潰者可療若犢

鼻堅硬勿使攻先以洗熨即微刺之愈

梁丘二穴在膝上二寸兩筋間治大驚乳痛寒痺膝

不能屈伸可灸三壯鍼入三分

陰市二穴一名陰疝在膝上三寸伏兔下若拜而取

之治寒疝少腹痛脹滿腰已下伏兔上寒如注水

鍼入三分不可灸

伏兔二穴在膝上六寸起肉一本云膝蓋上七寸治

風勞氣逆膝冷不得溫鍼入五分不可灸

髀關二穴在膝上伏兔後友分中治膝寒不仁痲癢

股內筋絡急鍼入六分

足少陰腎經左右凡二十穴

涌泉 然谷 太谿 大鍾 水泉 照海 復溜 交信 築賓 陰谷

宛中足少陰脈之所出也為并治腰痛大便難心中結熱風脉風癩心痛不嗜食婦人無子欬嗽身熱喉痺胃管滿目眩男子如蠱女子如姪娠五指端盡痛足不得踐地可灸三壯鍼入五分無令出血淳于意云漢北齊王阿毋患足下熱喘滿謂曰熱癩也當刺之足心立愈

然谷二穴火也一名龍淵在足內踝前起大骨下陷中是少陰脈之所流也為榮治咽內腫心恐懼如人將捕涎出喘呼少氣足跗腫不得履地寒疝少腹脹上搶胃管欬唾血喉痺淋瀝女子不孕男子

針灸九

精溢前瘦不能久立足一寒一熱舌縱煩滿消渴初生小兒臍風口禁痿癩洞洩可灸三壯鍼入三分不宜見血

太谿二穴土也在內踝後跟骨上動脈陷中是少陰脈之所注也為輸治久瘧欬逆心痛如錐刺其心手足寒至節喘息者死嘔吐口中如膠善噫寒疝熱病汗不出默默嗜卧溺黃消瘰大便難咽腫唾血今附瘰癧寒熱欬嗽不嗜食腹脅痛瘦瘠手足厥冷可灸三壯鍼入三分

大鍾二穴在足跟後衝中走太陽足少陰絡治實則

小便淋閉洒洒腰脊強痛大便秘澀嗜卧口中熱虛則嘔逆多寒欲閉戶而處少氣不足胃脹喘息舌乾咽中食噎不得下善驚恐不樂喉中鳴欬唾血可灸三壯鍼入二分留七呼

水泉二穴少陰郄去大谿下一寸在內踝下治月事不來未即多心下悶痛目眩脈不能遠視陰挺出小便淋瀝腹中痛可灸五壯鍼入四分

照海二穴陰蹻脈所生在足內踝下治噎乾四肢懈墮善悲不樂久瘧卒疝少腹痛嘔吐嗜卧大風偏枯半身不遂女子淋瀝陰挺出鍼入三分可灸七

壯

針灸五

復溜二穴金也一名昌陽一名伏白在足內踝上二寸陷中是少陰脈之所行也為經治腰脊內引痛不得俛仰起坐目眩脈善怒多言善乾涎自出足痿不收履筋寒不自溫腹中雷鳴腹脹如鼓四肢腫十水病溺青赤黃白黑青取井赤取榮黃取腧白取經黑取合血痔洩後腫五淋小便如散火骨寒熱汗注不止可灸五壯鍼入三分留三呼交信二穴在內踝上二寸少陰前太陰後廉前筋骨間腓是陰蹻之郄治氣淋瘕疝陰急腰引腦內廉

骨痛又洩利赤白女子漏血不止可灸三壯鍼入四分留五呼

築賓二穴在內踝上腓分中治小兒胎疝痛不得乳

癩疾狂言嘔吐沫足膈痛可灸五壯鍼入三分

陰谷二穴水也在膝內輔骨後大筋下小筋上按之

應手屈膝乃取之足少陰脈之所入也為合治膝

痛如離不得屈伸舌縱涎下煩逆溺難少腹急引

陰痛股內應痛婦人漏血不止腹脹滿不得息小

便黃男子如蠶女子如妊娠可灸三壯鍼入四分

留七呼

足太陽膀胱經左右凡三十六穴

至陰 通谷 束骨 京骨 申脈 金門

僕參 崑崙 付陽 飛陽 承山 承筋

合陽 委中 委陽 浮郄 殷門 扶承

至陰二穴金也在足小指外側去爪甲角如韭葉是

太陽脈之所出也為井治目生翳鼻塞頭重風寒

從足小指起脈痺上下帶骨痛無常轉筋寒瘡

汗不出煩心之下熱小便利失精鍼入二分可

灸三壯

通谷二穴水也在足小指外本節前陷中足太陽脈

之所流也為榮治頭重目眩善驚引軌顛項痛目眩眩甄權云結積留飲胃滿食不化可灸三壯鍼入二分

束骨二穴木也在足小指本節後陷中是太陽脈之

所注也為膈治腰如折膈如結耳聾惡風寒目眩

項不可回顧目內眦赤爛可灸三壯鍼入三分

京骨二穴在足外側大骨下赤白肉際陷中足太陽

脈之所過也為原治腰痛不得屈伸目內眦赤爛

發瘧寒熱善驚不欲食筋癆是筋痠痺樞痛頸

項強腰背不可俯仰軌血不止目眩鍼入三分

可灸七壯

申脈二穴陽蹻脈所出在外踝下陷中容爪甲白肉

際治腰痛不能舉體是筋寒不能久立坐若下舟

車中癩疾鍼入三分

金門二穴一名關梁在足外踝下是太陽和陽維所

別屬也治霍亂轉筋膝筋痠身戰不能久立癩癧

尸蹙暴疝小兒發癩張口搖頭身及折可灸三壯

炷如小麥大鍼入一分

僕參二穴一名安邪在跟骨下陷中拱足得之治是

跟痛不得履地也痿轉筋尸蹙如中惡狀霍亂吐

逆癲癩狂言見鬼鍼入三分可灸七壯

崑崙二穴火也在足外踝後跟骨上陷中足太陽脈

之所行也為經治腰尻痛足踣腫不得履地就

脚如結踝如裂頭痛首昏病急效喘暴滿陰腫痛

小兒發癩癩癩注如小麥大可灸三壯鍼入三分

付陽二穴在足外踝上三寸陽蹻都太陽前少陽後

筋骨間陽蹻之邪治痿癱風痺頭重顛痛髀樞股

筋痛癭瘰風痺不仁時有寒熱四肢不舉可灸三

壯鍼入五分留七呼

飛陽一穴一名厥陰足太陽絡別走少陰在外踝上

七寸治野雞痔瘡節風足指不得屈伸頭目眩逆

氣執細癩疾寒瘡可灸三壯鍼入三分

承山二穴一名魚腹一名肉柱在兌膈腸下分肉之

間陷中治腰背痛脚膈重戰慄不能立脚氣膝下

腫雀亂轉筋大便難久痔腫痛可灸五壯鍼入七

分

承筋二穴一名膈腸一名直腸在膈腸中央陷中治

寒痺轉筋支腫大便難脚膈痠重引少腹痛鼻斂

衄腰背病急霍亂可灸三壯禁鍼

合陽二穴在膝約中央下二寸治腰脊強引腹痛陰

股熱膝筋痠重履步難寒疝陰偏痛女子崩中鍼入六分可灸五壯

委中二穴土也在膈中央約文中動脈是太陽脈之

所入也為合治腰俠脊沉沉然遺溺腰重不能舉

體風痺髀樞痛可出血痼疾皆愈今附委中者血

邪也熱病汗不出是熱瘵逆滿膝不得屈伸取其

經血立愈

委陽三穴三焦下輔膈也在足太陽之後出於膈中

外廉兩筋間屈伸取之承扶下六寸足太陽脈之

中治腋腫痛骨滿膨筋急身熱飛尸通注痿

瘕不仁小便淋瀝可灸三壯鍼入七分

浮郄二穴在委陽上一寸展膝得之治小腸熱大腸

結股外經筋急髀樞不仁可灸三壯鍼入五分

掖門二穴在肉郄下六寸治腰脊不可俛仰舉重惡

血注之股外腫鍼入七分

承扶二穴一名肉郄一名陰關一名皮部在尻髻下

股陰衝上文中治腰脊相引如解久痔尻腫腫大

便難陰胞有寒小便不利鍼入七分

銅人腧穴鍼灸圖經卷下

穴膺都數

仰人頭面部

神庭一穴直鼻柱在額上入髮際五分

上星一穴在額上直鼻入髮際一寸陷中容

豆

顴會一穴在上星後一寸陷中

前頂一穴在顴會後一寸五分骨陷中

百會一穴在前頂後一寸五分頂中央旋毛

陷中容指

曲老二穴俠神庭傍一寸五分在髮際也

五處二穴俠上星傍一寸五分

承光二穴在五處後二寸

通天二穴在承光後一寸五分

本神二穴曲差傍一寸五分入髮際四分

臨泣二穴當目上眇直目上入髮際五分陷

中

目窓二穴在臨泣後一寸

正營二穴在目窓後一寸

素髎一穴在鼻柱端也

水溝一穴在鼻柱下人中是也

斷交一穴在唇內齒上縫是也

承漿一穴在頤前脣下陷中也

攢竹二穴在眉頭陷中

睛明二穴在目內眇是也

巨髎二穴俠鼻傍八分直目瞳子是也

迎香二穴在禾髎上鼻孔旁五分

禾髎二穴直鼻孔俠水溝傍五分

地倉二穴俠口吻四分是也

陽白二穴在眉上一寸直目瞳子是也

承泣二穴在目下七分直目瞳子是也

四白二穴在目下一寸直目瞳子是也

大迎二穴在曲頰前一寸三分骨陷中動脈

應手是也

頭維二穴在額角髮際本神傍一寸五分

絲竹空二穴在眉後陷中

瞳子髎二穴在目外眇五分是也

顴髎二穴在面顴骨下廉陷中也

側部

上關二穴在耳前上廉起骨開口有空是也

下關二穴在耳前下廉合口有空張口而合

也

和髻二穴在耳前兌髮下按則動脉應手也

耳門二穴在耳前起空當耳中缺者是也

聽宮二穴在耳中珠子大如小豆是也

頰車二穴在耳下曲頰端陷中也

頰厭二穴在耳前曲角顛顛上廉是也

懸顛二穴在曲角上顛顛中是也

懸壺二穴在曲角顛顛下廉是也

天衝二穴在耳後入髮際二寸

率谷二穴在耳上入髮際一寸五分

曲鬢二穴在耳上髮際曲隅陷中鼓頰有空

是也

角孫二穴在耳郭中間上開只有空是也

伏人頭部

後頂一穴在百會後一寸五分枕骨上也

強間一穴在後頂後一寸五分

腦戶一穴在枕骨上強間後一寸五分

風府一穴在腦戶後一寸五分入髮際一寸

大筋內宛之中

瘖門一穴在項髮際宛中入系舌本也

絡郄二穴在通天後一寸五分

玉枕二穴在絡郄後一寸五分俠腦戶傍一

寸三分起空枕骨上入髮際三寸

天柱二穴在大筋外廉俠項髮陷中也

承靈二穴在正營後一寸五分

腦空二穴在承靈後一寸五分俠玉枕傍骨

下陷中也

風池二穴在顛顛後髮際陷中

竅陰二穴在完骨上枕骨下搖動應手也

浮白二穴在耳後入髮際一寸

完骨二穴在耳後入髮際四分

顛息二穴在耳後青脈是也

瘖脈二穴在耳本雜足青脈是也

腎風二穴在耳後尖角陷中按之引耳中痛

是也

頸項部

廉泉一穴在頷下結喉上一名舌本也

人迎二穴在頷大脈動應手俠結喉傍以候

五藏氣也

水突二穴在頷大筋前直人迎下氣舍上是

也

氣舍二穴在頸直人迎俠天突陷中也

扶突二穴在氣舍後一寸五分仰天昂而取

之

天窓二穴在頸大筋前曲頰下扶突後動應

手陷中

天鼎二穴在頸缺盆直扶突後

天容二穴在耳下曲頰後是也

天牖二穴在頸筋缺盆上天容後天柱前完

骨下髮際上是也

伏人背部

大椎一穴在第一椎上陷中

陶道一穴在大椎節下間陷中俛而取之

身柱一穴在第三椎節下間

神道二穴在第五椎節下間仰而取之

靈臺一穴在第四椎節下間仰而取之

至陽一穴在第七椎節下間俛而取之

筋縮一穴在第九椎節下間俛而取之

脊中一穴在第十一椎節下間俛而取之

懸樞一穴在第十三椎節下間伏而取之

命門一穴在第十四椎節下間伏而取之

腰脞一穴在第十一椎節下間

長強一穴在脊骶端也

大杼二穴在第一椎下兩傍各一寸五分陷

中是也

風門二穴在第二椎下兩傍各一寸五分

肺脞二穴在第三椎下兩傍各俠脊相去一

寸五分

厥陰脞二穴在第四椎下兩傍一寸五分

心脞二穴在第五椎下兩傍各一寸五分

膈脞二穴在第七椎下兩傍各一寸五分

肝脞二穴在第九椎下兩傍各一寸五分

膽脞二穴在第十椎下兩傍各一寸五分正

坐心之

脾脞二穴在第十一椎下兩傍各一寸五分

胃脞二穴在第十二椎下兩傍各一寸五分

三焦脞二穴在第十三椎下兩傍各一寸五

分

腎脞二穴在第十四椎下兩傍各一寸五分

大腸脞二穴在十五椎下兩傍各一寸五分

小腸腧二穴在第十七椎下兩傍各一寸五分

分

膀胱腧二穴在第十九椎下兩傍各一寸五分

分

中膂內腧二穴在第二十椎下兩傍各一寸

五分俠脊腫果起處是也

白環腧二穴在第二十一椎下兩傍各一寸

五分伏而取之

上髀二穴在第一空腰果下一寸俠脊陷中

次髀二穴在第二空俠脊陷中

中髀二穴在第三空俠脊陷中

下髀二穴在第四空俠脊陷中

會陽二穴在尾骨兩傍是也

附分二穴在第二椎下兩傍附項內廉兩傍

各三寸正坐取之

魄戶二穴在第三椎下兩傍各三寸

膏肓腧二穴在第四椎下近第五椎兩傍各

三寸

神堂二穴在第五椎下兩傍各三寸

譙諸二穴在肩甲內廉俠第六椎下兩傍各

三寸

膈關二穴在第七椎下兩傍各三寸陷中正

坐關肩取之

臑門二穴在第九椎下兩傍各三寸正坐取

之

陽經二穴在第十椎下兩傍各三寸正坐取

之

意舍二穴在第十一椎下兩傍各三寸陷中

正坐取之

胃倉二穴在第十二椎下兩傍各三寸

肓門二穴在第十三椎下兩傍各三寸

志室二穴在第十四椎下兩傍各三寸陷中

正坐取之

胞肓二穴在第十九椎下兩傍各三寸伏而

取之

秩邊二穴在第二十一椎下兩傍各三寸陷

中伏而取之

側肩膊部

肩井二穴在缺盆上有大骨前是也

天髀二穴在肩缺盆中上髂骨之隔陷中也

缺盆二穴在肩下橫骨陷中是也

巨骨二穴在肩端上行兩叉骨間陷中

肩髃二穴在肩端臑上聊舉臂取之

天宗二穴在秉風後大骨下陷中

秉風二穴在肩上下小髃後舉臂有空

肩外腧二穴在肩上廉去脊三寸陷中

肩中腧二穴在肩胛內廉去脊二寸陷中

曲垣二穴在肩中央曲甲陷中

胃部

天突一穴在頸中結喉下四寸中央宛宛中

針灸百三
是也

璇璣一穴在天突下一寸中央陷中仰頭取之

華蓋一穴在璇璣下一寸陷中仰而取之

紫宮一穴在華蓋下一寸六分陷中仰而取之

玉堂一穴在紫宮下一寸六分陷中

膺中一穴在玉堂下一寸六分直兩乳間陷中仰而取之

中仰而取之

中庭一穴在膺中下一寸六分

膺府二穴在巨骨下璇璣傍二寸陷中仰而取之

或中二穴在膺府下一寸六分陷中仰而取之

神歲二穴在或中下一寸六分仰而取之

靈墟二穴在神歲下一寸六分陷中仰而取之

神封二穴在靈墟下一寸六分

步郎二穴在神封下一寸六分陷中

氣戶二穴在巨骨下膺兩傍各二寸陷中仰而取之

針灸百四
而取之

庫房二穴在氣戶下一寸六分陷中仰而取之

屋翳二穴在庫房下一寸六分陷中仰而取之

膺窓二穴在屋翳下一寸六分

乳中二穴當乳是也

乳根二穴在乳中下一寸四分陷中仰而取之

雲門二穴在巨骨下俠氣戶傍各二寸陷中

按之動脈應手舉臂取之

中府二穴在雲門下一寸乳上三肋間動脈

應手陷中

周榮二穴在中府下一寸六分陷中仰而取之
骨鄉二穴在周榮下一寸六分陷中仰而取之
天谿二穴在骨鄉下一寸六分陷中仰而取之
食竇二穴在天谿下一寸六分陷中也

腋脅部

淵腋二穴在腋下三寸宛宛中舉臂取之
大包二穴在淵腋下三寸脾之大絡布脅脇
輒筋二穴在腋下三寸腹前行一寸著脇陷
中

天池二穴在乳後一寸腋下捷脇直腋擗肋
間也

腹部

鳩尾一穴在臆前蔽骨下五分
巨關一穴在鳩尾下一寸令強一寸中心
有鳩尾椎之
上皖一穴在巨關下一寸五分去蔽骨三寸
中皖一穴在上皖下一寸太倉居其中
建里一穴在中皖下一寸也
下皖一穴在建里下一寸也

水分一穴在下皖下一寸也

神關一穴在臍中是也

陰交一穴在臍下一寸也

氣海一穴在臍下一寸五分

石門一穴在臍下二寸

關元一穴在臍下三寸

中極一穴在臍下四寸

曲骨一穴在橫骨之上毛際陷中

會陰一穴在大便前小便後兩陰間是也

幽門二穴在巨關傍五分

通谷二穴在幽門下一寸陷中

陰都二穴在通谷下一寸

石關二穴在陰都下一寸

高曲二穴在石關下一寸

育脬二穴在高曲下一寸去臍傍五分

中渚二穴在育脬下五分

四滿二穴在中渚下一寸氣海傍一寸

氣穴二穴在四滿下一寸

大赫二穴在氣穴下一寸

橫骨二穴在大赫下一寸

不容二穴在幽門傍一寸五分

承滿二穴在不容下一寸

梁門二穴在承滿下一寸

關明二穴在梁門下一寸

太一穴在關明下一寸

滑肉門二穴在太一下一寸

天樞二穴在滑肉門下一寸傍去脊脛一寸五分

五分

外陵二穴在天樞下一寸

大巨二穴在外陵下一寸

水道二穴在大巨下三寸

歸來二穴在水道下二寸

氣衝二穴在歸來下鼠臑上一寸也

期門二穴在不容傍一寸五分上直乳第二肋端

肋端

日月二穴在期門下五分

腹哀二穴在日月下一寸五分

大橫二穴在腹哀下三寸五分傍直臍

腹結二穴在大橫下三分

府舍二穴在腹結下三寸

衝門二穴去大橫五寸府舍下橫骨端也

腹脇部

章門二穴在大橫外直臍端

京門二穴在監骨腰中季肋本俠脊也

帶脈二穴在季肋下一寸八分

五樞二穴在帶脈下三寸一曰在水道傍一寸半

寸半

維道二穴在章門下五寸三分

居髀二穴在章門下八寸三分

十二經穴

手太陰肺經

少商二穴在手大指端內側去爪甲角如韭葉

魚際二穴在手大指本節後內側

太淵二穴在掌後陷中

經渠二穴在寸口陷中

列缺二穴在腕後一寸五分

孔最二穴去腕上七寸

尺澤二穴在肘約中上

俠白二穴在天府下去肘五寸

天府二穴在腋下三寸臂內廉

手陽明大腸經

商陽二穴在手大指次指內側去爪甲角如

韭葉

二間二穴在手大指次指本節內側陷中

三間二穴在手大指次指本節內廉側陷中

合谷二穴在大指歧骨間

陽谿二穴在腕中上側兩筋陷中

偏歷二穴在腕中後三寸

溫留二穴在腕後大士五寸小士六寸

大針灸百九

下廉二穴在輔骨下去上廉一寸

上廉二穴在三里下一寸

三里二穴在曲池下二寸

曲池二穴在肘外輔骨屈肘曲骨之中

肘髻二穴在肘大骨外廉陷中

五里二穴在肘上行馬裏大脉中

臂臑二穴在肘上七寸

肩髃二穴在肩端兩骨間

臑會二穴在俠肩髻後大骨下甲上廉陷中

手少陰心經

少衝二穴在手小指內廉之端去爪甲角如

韭葉

少府二穴在手小指本節後陷中

神門二穴在掌後兌骨之端

陰郄二穴在掌後脈中去腕五分

通里二穴在腕後一寸

靈道二穴在掌後一寸五分或曰一寸

少海二穴在肘內廉節後陷中

青靈二穴在肘上三寸舉臂取之

極泉二穴在腋下筋間

大針灸百三

手太陽小腸經

少澤二穴在小指次指之端去爪甲角下一

分陷中

前谷二穴在手小指外側本節前陷中

後谿二穴在手小指外側本節後陷中

腕骨二穴在手外側腕前起骨下陷中

陽谷二穴在手外側腕中兌骨之下陷中

養老二穴在踝骨上一空在後一寸陷者中

支正二穴在腕後五寸

小海二穴在肘內大骨外去肘端五分陷中

肩正二穴在肩曲脾下兩骨解間有腧後陷

中

手厥陰包絡脈經

中衝二穴在手中指之端去爪甲角如韭葉

勞宮二穴在掌中央

太陵二穴在掌後兩筋間陷中

內關二穴在掌後去腕二寸

間使二穴在掌後三寸兩筋間陷中

郄門二穴在掌後去腕五寸

曲澤二穴在肘內廉橫多末屈肘得之

天泉二穴在曲腋下去肩二寸

手少陽三焦經

關衝二穴在手小指次指之端去爪甲角如

韭葉

液門二穴在手小指次指陷間

中渚二穴在手小指次指本節後間

陽池二穴在手表腕上陷中

外關二穴在腕後二寸陷中

支溝二穴在腕後三寸兩骨之間

會宗二穴在腕後三寸

三陽絡二穴在臂上大父脈支溝上一寸

四瀆二穴在肘前五寸外廉陷中

天井二穴在肘外大骨之後肘後上一寸

清冷淵二穴在肘上二寸伸肘舉臂取之

消灤二穴在肩下臂外間

臑腧二穴在俠肩髀後大骨下甲上廉陷中

足太陰脾經

隱白二穴在足大指內側端去爪甲角如韭

葉

大都二穴在足大指本節後陷中

太白二穴在足內側核骨下陷中

公孫二穴在足大指本節之後一寸

商丘二穴在足內踝下微前陷中

漏谷二穴在內踝上六寸骨下陷中

三陰交二穴在內踝上三寸骨下陷中

地機二穴在別走上一寸空膝下五寸

陰陵泉二穴在膝下內側輔骨下陷中

血海二穴在膝膕上內廉

箕門二穴在魚腹上越筋間

足陽明胃經

厲兌二穴在足大指次指之端去爪甲角如

韭葉

內庭二穴在足大指次指外間陷中

陷谷二穴在足大指次指之間本節後陷中

衝陽二穴在足跗上五寸骨間

解谿二穴在衝陽後一寸半腕上陷者中

豐隆二穴在外踝上八寸

下巨虛二穴在上廉下三寸

條口二穴在下巨虛上一寸

上巨虛二穴在三里下三寸

三里二穴在膝眼下三寸

犢鼻二穴在膝臑下脣上俠解人筋中

梁丘二穴在膝上二寸兩筋間

陰市二穴在膝上三寸伏兔下

伏兔二穴在膝上六寸起肉

解關二穴在膝上伏兔後交分中

足少陰腎經

涌泉二穴在足心陷中屈足卷指宛宛中

然谷二穴在足內踝前大骨下陷中

太谿二穴在足內踝後跟骨上

水泉二穴在太谿下一寸在內踝下

大鍾二穴在足跟後衝中

照海二穴在足內踝下

復溜二穴在足內踝上二寸陷中

交信二穴在內踝上二寸

築賓二穴在內踝上臑分中

陰谷二穴在膝內輔骨後大筋下小筋上

足太陽膀胱經

至陰二穴在足小指外側去爪甲角如韭葉

通谷二穴在足小指外側本節前陷中

束骨二穴在足小指側外本節後陷中

京骨二穴在外側大骨下赤白肉際陷中

金門二穴在足外踝下

中脈二穴在外踝下陷者中

僕參二穴在跟骨下陷者中

崑崙二穴在足外踝後跟骨上陷者中

付陽二穴在外踝上三寸

飛陽二穴在外踝上七寸

承山二穴在足跟下分肉間陷者中

承筋二穴在踰腸中央陷者中

合陽二穴在膝約中央下二寸

委中二穴在腘中約文中

委陽二穴在足太陽之前少陽之後

浮郄二穴在委陽上一寸

殷門二穴在內郄下六寸

承扶二穴在尻臀下股陰下衝文中

足厥陰肝經

大敦二穴在足大指端去爪甲角如韭葉

行間二穴在足大指間動處二指中

太衝二穴在足大指本節後二寸或一寸半

陷中

中封二穴在足內踝前一寸

蠡溝二穴在內踝上五寸

中都二穴在內踝上七寸

臑關二穴在臑臑下二寸陷中

曲泉二穴在膝內輔骨下大筋上小筋下陷

中

陰包二穴在膝上四寸股內廉兩筋間

五里二穴在下去氣衝三寸

陰廉二穴在羊矢下去氣衝二寸

足少陽膽經

竅陰二穴在足小指次指之端去爪甲角如

韭葉

俠谿二穴在足小指次指骨間本節前陷中

地五會二穴在足小指次指本節後陷者中

臨泣二穴在足小指次指本節後間陷者中

丘墟二穴在足外廉踝下如前陷者中

懸鐘二穴在外踝上三寸

陽輔二穴在足踝上輔骨前絕骨端如韭葉

光明二穴在外踝上五寸

外丘二穴在外踝上七寸

陽交二穴在外踝上七寸

陽陵泉二穴在膝下一寸外廉陷者中

中瀆二穴在髌骨外膝上五寸

環跳二穴在髀樞中

周身孔穴俱在卷中

脩明堂訣式

正面長七尺五寸

頂去額長四寸

額下去顛長一尺

結喉下至缺盆中長四寸

缺盆中下至髑髀骨長九寸心臆骨是也

髑髀骨下至臍長八寸

天樞下至橫骨長六寸五分臍傍二寸是也

穴名天樞

橫骨下至內輔長六寸五分

內輔下至上廉長一尺八寸

上廉下去下廉長三寸

下廉去內踝長三寸

內踝至地長三寸

伏人長七尺五寸

項去項髮際長七寸五分項後入髮際

項髮下至大椎長三寸五分大椎上三節

大椎下至尾骶骨長三尺分作二十一椎

髀樞下至臍中長一尺四寸

臍中下至跗骨長一尺六寸

跗骨至地長四寸

側人長七尺五寸

頂去腦角長四寸

腦角下至柱骨長一尺

柱骨下行腋中不見長四寸

深腋下至季脇長一尺七寸

季脇下至髀樞長六寸

髀樞下至膝中長一尺四寸

膝中下至外踝長一尺六寸

外踝去京骨長三寸

京骨至地長一尺

橫廣闊狹相去遠近

頭圍二尺八寸

骨圍四尺五寸

腰圍四尺二寸

兩髀樞之間廣六寸五分

耳後完骨廣九寸

耳前當耳門廣二寸

兩額之間廣九寸五分

兩乳之間廣九寸五分

兩肩相去二尺一寸

肩下至肘長一尺七寸

肘去腕長一尺二寸五分

腕去中指本節長四寸

本節去指末長四寸五分

足長一尺二寸

橫廣四寸五分

骨格三折各長七尺五寸

五臟六腑大小形狀

五臟大小形狀法

肺六葉兩耳四垂如蓋附第三頤

心狀如蓮花未開二臟俱在膈上附第五椎

肝七葉左三葉右四葉膽在短葉間第九椎

脾廣三寸長五寸掩太倉附第十一椎

腎狀如石卵色黑紫附十四頤

經云凡人有七衝門所入紆曲屈伸長六丈四寸四分至所出

唇門唇動也至齒九分

齒門齒動也後去會厭深三寸五分

會厭為之門也下至胃口上上院穴也長

一尺六寸胃紆曲屈伸長三尺六寸

小腸係胃下口胃下口為之門也長三尺二寸

尺左迴葉積十六曲

大腸係小腸長二丈一尺右迴十六曲腸會

廣腸係大腸長二尺八寸至出穀也至所出

門之鬼也

臍下一寸是上口滌水入膀胱所出溺也

避鍼灸訣

人神

人神之法將何起

一日先從足大指

二日外踝三股內

四在腰間五口裏

六手七日内踝看

八腕九尻須在記

十日鬢背一單柱

二來髮際三牙齒

十四胃管五適身

六胃七日氣衝起

八股九足二十踝

二十一朝來小指

二月外踝及骨三在肝及

四手陽明也須好記

五足陽明六在骨

七膝八陰知住止

九米豚脰十足跌

念取人神精妙理

避太一法

太一從來八節遊

立春左足戊寅收

己丑過後春分氣

左畔骨堂已卯留

立夏左手戊辰日

己巳相隨夏至頭

頭首忌來當兩午

立秋右手戊申遊

己未纜過秋分至

右畔骨堂辛酉求

立冬便求居右足

戊戌己亥自然周

冬至腰尻壬子是

四季在腹戊巳備

切忌用鍼并灸

若能迴避福優悠

血忌

血忌正牛二月羊

三寅狹四要商量

若逢五卯六月雞

辰七狗八避最強

馳九猪十曆所推

十一即是鼠伏歲

凡當馬位十二月

調攝之道順陰陽

十四經發揮序

人具九臟之形而氣血之運必有以疏載之其流注則曰歷曰循曰經曰至曰其交際則曰會曰過曰行曰達者蓋有所謂十二經焉十二經者左右手足各備陰陽者三陰右而陽左也陽順布而陰逆施也以三陽言之則太陽少陽陽明陽既有太少矣而又有陽明者何

取兩陽合明之義也以三陰言之則太陽少陰厥陰陰既有太少矣而又有厥陰者何取兩陰交盡之義也非徒經之有十二也而又有所謂經絡者焉經絡之數三百六十有五所以附經而行周流而不息也至若陰陽維蹻衝帶六脉固皆有所繫屬而唯有督任二經則苞乎腹背而有專以諸經滿而溢者此則

受之初不可謂非常經而忽畧焉法宜與諸經並論通考其隧穴六百五十有七者而施治功則醫之神秘盡矣蓋古之聖人契乎至靈洞視無隱故能審經脉之真源虛實之變建名立號使人識而治之雖後世屢至抉膜導脈驗幽索隱卒不能越其範圍聖功之不再壹至是乎由此而觀學醫道不可不明乎經

絡經絡不明而欲治夫疾猶習射而不操弓矢其不能也決矣廉之友滑君深有所見於此以內經骨空諸論及靈樞本輸篇所述經脉辭旨簡嚴讀者夫易即解於是訓其字義釋其名物疏其本旨正其句讀釐為三卷名曰十四經發揮復慮隧穴之名難於記憶聯成韻語附於各經之後其有功於斯世也不

亦遠哉世之著醫書者日新月盛非不繁且多也漢之時僅七家耳唐則增為六十四至宋遂至一百七十又九其發明方藥豈無其人純以內經為本而弗之雜者抑何其鮮也若今之張元素劉完素張從正李杲四家其立言垂範殆或庶幾者乎今吾滑君起而繼之凡四家微辭秘旨靡不貫通發揮之作必將

與其書並傳無疑也嗚呼橐籥一身之氣機以補以瀉以成十全之功者其唯針砭之法乎若不明於諸經而誤施之則不假鋒刃而成賊人矣可不懼哉縱諉曰九針之法傳之者蓋鮮苟以湯液言之亦必明於何經中邪然後注何劑而治之柰何粗工絕弗之謂也滑君此書豈非醫塗之輿梁也與濂故特為序

之以傳非深知滑君者未必不以其言為通情也滑君名壽字伯仁許昌人自號為櫻寧生博通經史諸家言為文辭溫雅有法而尤深於醫江南諸醫未能或之先也所著又有素問欬難經本義行於世唯經本義雲林危先生素嘗為之序云
翰林學士亞中大夫知

制語兼脩

國史金華宋濂謹序

十四經發揮序

觀文於天者非宿度無以稽七政之行
察理於地者非經水無以別九圍之城
矧夫人身而不明經脈又焉知榮衛之
所統哉此內經靈樞之所由作也竊嘗
攷之人為天地之心三才蓋一氣也經
脈十二以應經水經絡三百六十有五
以應周天之度氣穴深淺以應周期之

日宜乎榮氣之榮於人身晝夜環周軼
大旋之度四十有九或謂衛氣不循其
經始以晝行諸陽夜行諸陰之異未始
相從而亦未嘗相離也夫日星雖殊所
以麗乎天者皆陽輝之昭著也河海雖
殊所以行乎地中者實一水之流行也
經絡雖交相貫屬所以周於人身者一
榮氣也噫七政失度則災眚見焉經水

十四經發揮 序

失道則涿潦作為經脈失常則所生是
動之疾繇是而成焉以故用鍼石者必
明俞穴審圖鑑因以虛實以補瀉之此
經脈本輸之旨尤當究心靈樞世無註
本學者病焉許昌滑君伯仁父嘗著十
四經發揮專疏手足三陰三陽及任督
也現其圖章訓釋綱舉目張足以為學
者出入嚮方寔醫門之司南也既成將

鈔梓以傳徵余叙其所作之意余不敏
輒書三才一氣之說以歸之若別經絡
筋骨之屬則此不暇備論也時
至正甲辰中秋日白明呂後養生主書
于驃騎山之樵舍

自序

人為血氣之屬飲食起居節宣微爽不能無疾之感人或內或外或小或大為是動為所以生病成不出五藏六府手足陰陽聖智者興思有以治之於是而入者於是而出之也上古治病湯液醪醴為症少其有疾率取夫空穴經隧之所統繫視夫邪之所中為陰為陽而灸刺之以驅去其

所苦觀內經所載服餌之法總一二為灸者四三其它則明鍼刺無慮十八九鍼之功其大矣厥後方藥之說肆行鍼道遂寢不講灸法亦僅而獲存鍼道微而經絡為之不明經絡不明則不知邪之所在求法之動中機會必捷如響以難矣茲昔軒轅氏岐伯氏介：問答明經絡之始末相孔穴之分寸探幽摘遠布在方冊亦欲使天

下之為治者視天下之疾有以究其七情六淫之所自依則以察夫某為某經之偏下也某為某經之虛若實可補寫也某為某經之表裏可汗可下也鍼之灸之藥之餌之無施不可俾免交頰蹙呻吟抑已備矣遠古之書淵乎深哉於初學或未易也乃以靈樞經本輸篇素問骨空等論衷而集之得經十二任督脈云行腹背者二其

隧穴之周於身者六百五十有七故其陰陽之所以往來推其骨空之所以駐會圖章訓釋綴以韻語釐為三卷目之曰十四經發揮庶幾乎發前人之萬一且以示初學者於是而出入之嚮方也烏乎故圖以窮其源因文以求其義尚不戾前人之心後之君子察其勒而止其不逮是所望也至正初元閏月六日許昌滑壽自序

十四經發揮

凡例

一十二經所列次第並已流注之序為之先後附以任督二奇者以其有專說也據之為十四經云

一註者所以釋經也其訓釋之義凡有三焉訓字一義也釋身體府藏名物一義也解經一義也其載定法分寸則圖以別之

一各經既於本經詳註及所其有他經交會處但云見某經不必復贅

一經脈流注本經曰應曰循曰至曰抵其交會者曰會曰過曰行其或經行之處既非本經人非交會則不以統之

奇經八脈雖不若十二經之有常道亦非若諸絡脈之微細

也任督二脈之直行者既已列之十四經其陰陽維絡帶六脈則別具編末以備參考

目錄

上卷

手足陰陽流注篇

中卷

十四經脈氣所發篇

下卷

奇經八脈篇 附仰伏人尺寸圖

十四經發揮卷上

手足陰陽流注篇

許昌滑壽著

凡人兩手足各有三陰脈三陽脈以合為十二經也

三陰謂太陰少陰厥陰三陽謂陽明太陽少陽也人兩手足各有三陰脈三陽脈相合為十二經也手三陰謂太陰肺經

少陰心經厥陰心包經手三陽謂陽明大腸經太陽小腸經少陽三焦經是三陰謂太陰脾經少陰腎經厥陰肝經是三

陽謂陽明胃經太陽膀胱經少陽膽經謂之經者以血氣流行經常不息者而言謂之脈者以血理分派行體者而言也

手之三陰從臑走至手手之三陽從手走至頭足之三陽從頭下走至足足之三陰從足上走入腹

手三陰從臑走至手謂手太陰起中焦至出大指之端手少

陰起心中至出小指之端手厥陰起胸中至出中指之端手

三陽從手走至頭謂手陽明起大指次指之端至上挾鼻孔

手太陽起小指之端至目內眦手少陽起小指次指之端至

目銳眦是三陽從頭走至足謂足陽明起於鼻至入中指內

間是太陽起目內眦至小指外側端是少陽起目銳眦至小

指次指間是三陰從足走入腹謂足太陰起大指之端至

屬脾絡胃是少陰起足心至屬腎絡膀胱是厥陰起大指聚

毛至屬肝絡膽是三陰雖曰從足入腹然太陰乃復上膈挾

咽散舌下少陰乃復從腎上挾舌本厥陰乃復上出額與督

脈會于巔屬手太陰從肺系橫出腋下手少陰從心系上肺

出腋下手厥陰循胸出脇上抵腋下此又秦越人所謂諸陰

脈皆至頭胸而還者也而厥陰則又上出於巔蓋厥陰之

畫也。所以然者，示陰無可畫之理，亦猶鳥之碩果不食，示陽無可畫之義也。然易之陰陽以氣言，人身之陰陽以感象言，氣則無形，而藏象有質，氣陽而質陰也。然則無形者貴乎陽，有質者貴乎陰歟。

絡脈傳注周流不息

絡脈者本經之旁支，而別出以聯絡於十二經者也。本經之脈由絡脈而交他經，他經之交亦由是為傳注周流，無有停息也。夫十二經之有絡脈，猶江漢之有沱潛也。絡脈之傳注於他經，猶沱潛之旁導於他水也。是以手太陰之支者，從腕後出，次指端，而交於手陽明。手陽明之支者，從缺盆上扶口鼻，而交於足陽明。足陽明之支者，別附上中，大指端，而交於足太陰。足太陰之支者，從胃別上膈，注心中，而交於手少陰。手少陰則直自本經少衝穴，而交於手太陰。不做

支授，蓋君者出令者也。手太陰之支者，別頰上至目而皆而入於足太陰。是太陽之交者，從膊內左右別下合膈中，下至小指外側端，而交於足少陰。是少陰之支者，從肺出，注胸中，而交於手厥陰。手厥陰之支者，從掌中循小指次指出其端，而交於手少陽。手少陽之支者，從耳後出，至目眦骨，而交於足少陽。是少陽之支者，從肘上入大指爪甲，出三毛，而交於足厥陰。是厥陰之支者，從肝別貫膈上注肺，而交於手太陰也。故經脈者，行血氣，通陰陽，以榮於身者也。

通結上文，以起下文之義。經脈之流行不息者，所以運行血氣，流通陰陽，以榮養於人身者也。不言絡脈者，卒經以該之。其始從中焦，注手太陰，陽明，陽明注足陽明，太陰注手少陰，太陽注足太陽，少陰注手少陰，少陽注足少

陽厥陰厥陰復還注手太陰

始於中焦，注手太陰，終於注足厥陰，是經脈之行一周身也。其氣常以平旦為純，句以漏水下百刻，是夜流行與天同度，終而復始也。

氣營氣純統紀也。承上文言經脈之行，其始則自起中焦，其氣則常以平旦為紀也。營氣常以平旦之寅時為紀，由中焦而始注手太陰，以次流行也。不言血者，氣行則血行可知。漏水下百刻，晝夜流行與天同度者，言一晝夜漏下百刻之內，人身之經脈流行無有窮止，與天同一運行也。蓋天以三百六十五度四分度之一為一周天，而終一晝夜人之營衛則以五十度周於身，氣行一萬三千五百息，脈行八百一十丈，而終一晝夜適當明日之寅時，而復會于手太陰，是與天同

度終而復始也。或云晝夜漏刻有長短，其營氣盈縮當何如，然漏刻雖有短長之殊，而五十度周身者均在其中，不同漏刻而有盈縮也。

右本篇正文與金蘭循經同

十四經發揮卷上

十四經發揮卷中 十四經脈氣所發篇
手太陰肺經之圖



手太陰肺經穴歌
手太陰經十一穴中府雲門天府列缺白
尺澤孔最存列缺經渠太淵滿魚際少商如韭菜

手太陰肺之經 此十一穴五共二十

肺之為藏六葉兩耳四垂如蓋附着於脊之第三椎中有二十四空行列分布諸藏清濁之氣為五藏華蓋云

手太陰之脈起于中焦下絡大腸還循胃口上膈屬肺

起發也絡統也還復也循巡也又依也沿也屬會也中焦者在胃中脘當臍上四寸之分大腸註見本經胃口胃上下口也胃上口在臍上五寸上腕穴下口在臍上二寸下腕穴分也膈者隔也凡人心下有膈膜與脊脇周四相着所以遠隔濁氣不使上薰於心肺也手太陰起于中焦受足厥陰之交也由是循任脈之外是少陰經脈之裏以次下行當臍上一寸水分穴之分統絡大腸手太陰陽明相為表裏也乃復行本經之外上循胃口逆還上膈而屬會于肺榮氣有所歸

於本藏也

從肺系橫出腋下循膈內行少陰心主之前下肘中

肺系謂喉龍也喉以候氣下接於膈肩下肋上際曰腋膈下對腋處為膈肩肘之間也膈盡處為肘臂節也自肺藏循肺系出而橫循膈胸部第四行之中府雲門以出腋下循膈內歷天府俠白行手少陰手心主之前下入肘中抵尺澤穴也蓋手少陰循膈臂出小指之端手心主循膈臂出中指之端手太陰則行乎二經之前也。中府穴在雲門下一寸乳上三肋間動脈應手循中雲門在巨骨下俠氣戶旁二寸陷中動脈應手舉臂取之天府在腋下三寸以取之膈內肅動脈中俠白在天府下去肘五寸動脈中尺澤在肘中約文上動脈兩筋中

循臂內上骨下廉入寸口上魚口循魚際出大指之端

肘以下為臂魚滿也也也手掌後高骨停動脈為關前動脈為寸口曰魚口魚際云者謂掌骨之前大指本節之後其肥肉隆起處統謂之魚際則其間之穴名也既下肘中乃循臂內上骨之下廉歷孔最列缺入寸口之經渠大淵以上魚循魚際出大指之端至少商穴而終也端杪也。孔最穴去腕上七寸列缺去腕側上一寸五分以手交叉頭指端指筋骨中絡穴也經渠在寸口陷中大淵在掌後指中魚際在大指本節後內側散脈中少商在大指端內側去爪甲如韭葉白肉內宛之中

其支者從腕後直出次指內廉出其端

指之端矣此則從腕後列缺穴達次指內廉出其端而交於手陽明也

是動則病肺脹滿膨而喘咳缺盆中痛甚則交兩手而瞽此為臂痛是主肺所生病者咳嗽上氣喘渴煩心胸滿臑臂內前廉痛掌中熱氣盛有餘則肩背疼風寒寒字汗出中風小便數而欠虛則肩背疼寒少氣不足以息溺色變卒遺失無度盛者寸大三倍於人虛者寸口反小於人迎也

手陽明大腸經之圖



手陽明大腸經穴歌

手陽明穴起商陽二間三間合谷藏陽谿偏歷歷溫溫下廉上廉三里長曲池肘髎迎五里臂臑肩髃巨骨當天髀扶突木膠接終以迎香二十六

手陽明大腸之經凡二十穴左右共四

大腸長二丈一尺廣四寸當臍右回十六曲

手陽明之脈起於大指次指之端循指上廉出合谷兩骨之間上入兩筋之中

大指次指大指之次指謂食指也手陽明大腸經也凡經脈之通除脈行手足之裏陽脈行手足之表此經起於大指次指之端循指上廉受手太陰之交行乎陽之分也由是循指之上廉歷二間三間以出合谷兩骨之間復上入陽谿兩筋之中○商陽在手大指次指內側去爪甲角如韭葉二間在手大指次指本節前內側陷中三間左手大指次指本節後內側陷中合谷在手大指次指歧骨間陷中陽谿在腕中上側兩筋陷中

循臂上廉入肘外廉循臑外前廉上肩

自陽谿而上循臂上廉之偏歷溫溜下廉上廉三里入肘外廉之曲池循臑外前廉歷肘髁五里臂臑絡臑會上肩至肩髃穴也。偏歷在腕中後三寸溫溜在腕後小士六寸大士五寸下廉在輔骨下未上廉一丈一士廉在三里十寸三寸在曲池下二寸按之內起曲池在肘外輔骨屈肘曲骨之中以手拱胸之時膠在肘大骨外廉陷中五里在肘上三寸行向裏大脈中臂臑在肘上七寸臑會見手少陽經手陽明之絡也肩髃在肩端兩骨間陷者宛中牽臂力空出臑骨之前廉上出柱骨之會上
肩端兩骨之間為臑骨肩臑上際會處為天柱骨出臑骨前廉循巨骨穴上出柱骨之會上會於大柱。巨骨穴在肩端上

行兩叉骨間陷中大椎見督脈手足三陽督脈之會


下入缺盆絡肺下膈屬大腸

自大椎而下入缺盆循足陽明經脈外絡繞肺臑復下膈當天樞之分會屬於大腸也。缺盆天樞見足陽明經

其支別者從缺盆上頸貫頰入下齒縫中
頰莖為頰耳以下曲處為頰口前小者為齒其支別者自缺盆上行為頰循天樞扶突上貫於頰入下齒縫中。天樞在頸缺盆上扶突後一寸扶突在乳會後一寸五分仰而取之又云在人迎後一寸五分
還出挾口交人中左之右右之左。上挾鼻孔
口唇上鼻柱下為人中既入齒縫復出夾兩口吻相交於人中之中左脈之右右脈之左。上挾鼻孔循禾膠迎香而終以

交於足陽明也。人中穴見督脈為手陽明督脈之會禾膠左鼻孔下挾水溝旁五分迎香在禾膠上一寸鼻孔旁五分是動則病齒痛頸腫是主津液所生病者自黃口乾熱咽喉痺肩前臑痛大指次指痛不用氣盛有餘則當脈所過者熱腫虛則寒深不復盛者人迎大三倍於寸口虛者人迎小於寸口也

足陽明胃經之圖



足陽明胃經穴歌

四十五穴足陽明承泣 四白巨膠結地倉大迎頰車時下閉
 頰維人迎對水突氣合連缺盆氣戶庫房屋翳頰車巨髎
 延乳根不容承滿梁門僞閉門大乙滑肉門 天樞水陵太
 巨存水道滯來氣冲次解閉伏兔走陰市梁丘犢鼻足三里
 上巨虛連條口是下巨虛及至豐隆解谿沖陽陷谷中庭
 厲兌經穴終

足陽明胃之經 凡四十五穴。是經氣血俱多。

胃大一尺五寸。行屈曲伸長二尺六寸。

足陽明之脈。起於鼻交頰中旁約大腸之脈。下循鼻外入上齒中。還出頰口環唇下交承漿。

頰鼻上蓋也。鼻山根為頰。足陽明起於鼻兩旁迎香穴。由是而上左右相交於頰中。過睛明之分。下循鼻外。歷承漿。甲由巨髎入上齒中。復出循地倉。扶兩口。吻環繞唇下。左右相交於承漿之分也。

迎香手陽明經穴。睛明足太陽經穴。手足太陽少陽足陽明五脈之會。承泣在目下七分。直瞳子。四白在目下一寸。真瞳子。巨膠在鼻孔旁八分。直瞳子。地倉扶口吻旁四分。承漿見任脈。足陽明任脈之會。

却循頰後下廉出大迎。循頰車上耳前。過客主人。循髮際至額。

頰 腮下為頰。中為頰。頰前為髮際。髮際前為額。頰自承漿循循頰後下廉出大迎。循頰車上耳前。歷下關。過客主人。循髮際。行懸鐘。頰後之分。經頭維會於額。額之神庭。大迎在曲頰前一寸三分。骨陷中動脈。頰車在耳下曲頰端陷中。下關在客主人下耳前動脈下。廉合口有空。開口則闕。客主人懸鐘。額角髮際三穴。並是少陽經。皆手足少陽陽明之交會。額維在額角髮際。本神旁一寸五分。神庭旁四寸五分。神庭穴。見督脈。是太陽陽明督脈之會。

其支別者。從大迎前下人迎。循喉嚨入缺盆。下膈。屬胃絡脾。胸兩旁高處為膈。上橫骨為巨骨。巨骨上陷中為缺盆。其支別者。從大迎前下人迎。循喉嚨。歷水突。承漿。入缺盆。行足

其支別者。從大迎前下人迎。循喉嚨入缺盆。下膈屬胃絡脾。胸兩旁高處為膈。上橫骨為巨骨。巨骨上陷中為缺盆。其支別者。從大迎前下人迎。循喉嚨。歷水突。承漿。入缺盆。行足

其支別者。從大迎前下人迎。循喉嚨入缺盆。下膈屬胃絡脾。胸兩旁高處為膈。上橫骨為巨骨。巨骨上陷中為缺盆。其支別者。從大迎前下人迎。循喉嚨。歷水突。承漿。入缺盆。行足

其支別者。從大迎前下人迎。循喉嚨入缺盆。下膈屬胃絡脾。胸兩旁高處為膈。上橫骨為巨骨。巨骨上陷中為缺盆。其支別者。從大迎前下人迎。循喉嚨。歷水突。承漿。入缺盆。行足

其支別者。從大迎前下人迎。循喉嚨入缺盆。下膈屬胃絡脾。胸兩旁高處為膈。上橫骨為巨骨。巨骨上陷中為缺盆。其支別者。從大迎前下人迎。循喉嚨。歷水突。承漿。入缺盆。行足

其支別者。從大迎前下人迎。循喉嚨入缺盆。下膈屬胃絡脾。胸兩旁高處為膈。上橫骨為巨骨。巨骨上陷中為缺盆。其支別者。從大迎前下人迎。循喉嚨。歷水突。承漿。入缺盆。行足

其支別者。從大迎前下人迎。循喉嚨入缺盆。下膈屬胃絡脾。胸兩旁高處為膈。上橫骨為巨骨。巨骨上陷中為缺盆。其支別者。從大迎前下人迎。循喉嚨。歷水突。承漿。入缺盆。行足

其支別者。從大迎前下人迎。循喉嚨入缺盆。下膈屬胃絡脾。胸兩旁高處為膈。上橫骨為巨骨。巨骨上陷中為缺盆。其支別者。從大迎前下人迎。循喉嚨。歷水突。承漿。入缺盆。行足

其支別者。從大迎前下人迎。循喉嚨入缺盆。下膈屬胃絡脾。胸兩旁高處為膈。上橫骨為巨骨。巨骨上陷中為缺盆。其支別者。從大迎前下人迎。循喉嚨。歷水突。承漿。入缺盆。行足

少陰俞府之外下膈當上腕中腕之屬胃絡脾。今迎在
頸大脉動應手扶結喉旁一寸五分水突在頸大筋前直人
迎下氣舍上氣舍在頸直人迎下挾天突膈中缺盆在肩下
橫骨膈中俞府見足少陰經上腕見任脉足陽明手太陽在
脉之會中腕見任脉手太陽少陽足陽明所生任脉之會
其直行者逆缺盆下乳內廉下挾臑入氣冲中

直行者逆缺盆而下乳內廉循氣冲庫房屋脊膈處乳中
乳根亦容承滿梁門閉門太乙滑肉門下挾臑歷天樞外陵
大巨水道滂來諸穴而入氣冲中也。氣冲在巨骨下俞府
旁二寸膈中庫房在氣冲下十六分膈中仰而取之屋脊在
庫房下一寸六分膈中仰而取之膈處在膈下一寸六分
膈中乳中穴當乳是乳根穴在乳下一寸六分膈中仰而取

之不容在幽門旁相去各一寸五分承滿在不容下一寸梁
門在承滿下一寸關門在梁門下一寸太乙在關門下一寸
滑肉門在太乙下一寸下挾臑天樞在挾臑二寸外陵在天
樞下一寸大巨在外陵下一寸水道在大巨下三寸滂來在
水道下二寸氣冲一名氣街在滂來下鼠鼯上一寸動脉應
手宛中自氣冲至乳根計中折自不容至滑肉門計中折
自天樞至滂來計中折
其支者起胃下口循腹裏下至氣衝中而合
胃下口下腕之分准經云大會下口為幽門者是也自屬胃
處起胃下口循腹裏下至少陰俞府之外本經之裏下至氣
衝中與前之入氣衝者合
以下詳見於伏兔下入膝膈中下指肘外廉下足跗中指外

間抵至少腹外為胃三前膝上把胃是為伏兔伏兔之
解開挾膝筋中為臑膈骨為臑離也既相合氣衝中乃
下解開抵伏兔歷陰市梁丘下入膝膈中經膈鼻下循前外
廉之三三里巨虛上廉條口巨虛下廉豐隆解開下足跗之衝
陽膈谷入中指外間之內廉至屬完而終也。解開在膝上
伏兔後交文中交一作伏兔在膝上六寸起肉正跪坐而取之
一云膝蓋上七寸陰市在膝上三寸伏兔下膈中非而取之
梁丘在膝上二寸兩筋間膈鼻在膝膈下膈骨上骨解大筋
中三里在膝眼下三寸膈骨外大筋內宛然中舉足取之
極重按之則跗上動脉止矣巨虛上廉在三里下三寸舉足取
之條口在下廉上一寸舉足取之巨虛下廉在上廉下三寸
舉足取之豐隆在外踝上八寸下膈外廉膈中別走少陰

解開在衝陽後一寸五分腕上膈中衝陽在足跗上五寸骨
間動脉去膈各三寸膈谷在足大指次指間本節後膈中內
廉在足大指次指外間膈中屬完在足大指次指去爪甲如
韭葉

其支者下膝三寸而別以下入中指外間
此支自膝下三寸循三里穴之外
其支者別跗上入大指間出其端
此支自跗上衝陽穴別行入大指間斜出足厥陰行間次之
外循大指下出其端以交於足太陰
是動則病洒然振寒善伸數欠顏黑病至則惡人與火聞
木音則惕然而驚心欲動獨閉戶牖而處其則欲上高而歌
聲衣而走負羆腹脹是為肝厥是血所生病者狂言善忘

汗出欬喘口喝唇腫喉痺大腹水腫臌脹腫痛待腐乳
 氣衝股伏芻箭外應足跗上皆痛中指不用氣盛則身以前
 皆熱其有餘於胃則消穀善飢滿已黃氣不足則身以前皆
 寒懷胃中寒則脹滿盛者人迎大三倍于寸口虛者人迎反
 小寸可足也
 諸虛本經穴 胃虛胃寒等症 乳 乳中乳根 氣衝 諸氣衝 腹中諸氣
 不用 不能常用

足太陰脾經之圖



足太陰脾經穴歌
 二十一穴太陰脾隱白太都太白隱公孫高丘三陰交漏谷
 地机陰陵泉血海箕門冲門開府倉腹結大橫排腹食倉
 連太極胸鄉周榮大包隨

足太陰脾之經 二十一穴左右共四十二穴
 脾廣三寸長五寸捺于太倉附脊第十一椎
 是太陰之脉起於大指之端循指內側白肉際過掌骨後上內
 踝前廉

取骨一作核骨俗云孤拐骨是也足跟後兩骨起骨為踝骨
 足太陰起大指之端隱白穴受足陽明之交也由是循大指
 內側白肉際太都穴過核骨後歷太白公孫高丘上內踝前
 廉之三陰交也。隱白在足大指內側端去爪甲角如韭葉
 大都足大指本節後一寸別走陽明高丘在足內踝下微前
 中三陰交在內踝上三寸骨下陷中
 上端內循指骨後交出散陰之節

脾陽也。由三陰交上膈內衝背後之漏谷止。寸二寸交
出是厥陰經之前至也。執陰陵泉。漏谷在內踝上六寸骨
下陷中地。執在膝下五寸。陰陵泉在膝下內側輔骨下陷中
仰足取之。

上膈。膈內前入膈。屬脾絡胃。
脾內為膈。膈上下為膈。自陰陵泉上循膝股內前廉之血海
箕門。逆還入膈。經衝門。府舍會中。極關。石復循腹結。太極會
下。腕。歷腹。過日月。期門。之。循本經之。裏下。至中。腕。下。腕
之際。以。膈。脾。絡。胃。也。血海在膝膕上內廉白內際二寸中
箕門在魚腹上越筋間。陰股內動脈中。衝門上。去大橫五寸
在府舍下。橫骨端約中。動脈。府舍在腹結下三寸中。極關元
並見任脈。皆足三陰任脈之會。腹結在大橫下一寸三分大

橫在腹哀下三寸五分。直臍旁下。腕見任脈。是太陰任脈之
會。腹哀在日月下一寸五分。日月見足少陽經。是太陰少陽
維之會。期門見足厥陰經。是太陰厥陰經之會也。沖門府
舍。腹結。大橫。腹哀。去腹中行各四寸半。

上膈。扶咽連舌。本散舌下。
咽所以嚥物者。居喉之前。至胃長一寸六分。為胃系也。舌本
舌根也。由腹哀上膈。循食竇。天竅。胸。背。周榮。由周榮外。曲折
向下。至大包。人自大包外。曲折向上。會中府。上行。行人迎之
裏。扶咽連舌。本散舌下。而終焉。食竇在天竅下一寸六分。
舉臂取之。天竅在胸鄉下一寸六分。仰而取之。胸鄉在周榮
次下一寸六分。俯而取之。周榮在中府下一寸六分。俯
中。仰而取之。大包在淵腋下三寸。揣腋是也。少陽經也。手

太陰經是太陰之會也。人迎見足陽明經。
其支別者。復從胃別上膈。注心中。

此支由腹哀別。行。升。從。胃。部。中。腕。穴。之。上。膈。注。於。脾。中。之。裏。心
之。分。以。交。於。手。少。陽。中。腕。膈。中。並。任。脈。穴。
是。動。則。病。古。本。強。食。則。噦。胃。腕。膈。脹。善。噦。得。後。與。氣。則。快。然。
如。柔。身。體。皆。重。是。主。脾。所。生。病。者。古。本。痛。脾。不。能。動。搖。食。不。下。
煩。心。下。急。痛。寒。瘧。澹。澹。泄。水。閉。黃。疸。不。能。臥。膝。內。腫。脹。心
大。指。不。用。為。此。諸。病。盛。則。寫。之。虛。則。補。之。熱。則。疾。之。寒。則。溫。
之。陷。下。則。灸。之。不。盛。不。虛。以。經。取。之。盛。者。寸。口。大。三。倍。寸。口
迎。虛。者。寸。口。反。小。于。人。迎。也。
得。後。即。去。後。與。氣。即。止。

手少陰心經之圖



手少陰心經穴歌

九穴元依手少陰極泉青灵少海深灵道通里陰郄透神門
中府少冲尋

手少陰心之經凡九穴左右共十八

心形如未放蓮花居肺下膈上附著於脊之第五椎

手少陰之脈起於心中出屬心系下膈絡小腸

心系有二一則上與肺相通而入肺兩大葉間一則由肺葉

而下曲折向後並脊骨細絡相連貫脊髓與腎相通正當七節

之間蓋五藏系皆通於心而心通五藏系也手少陰經起於

心循任脈之外屬心系下膈當臍上二寸之分絡小腸

其支者從心系上挾咽繫目也

支者從心系出任脈之外上行而挾咽繫目也

其直者復從心系却上肺出腋下

直者復從心系直上至肺藏之分出循腋下極泉也穴在

臂內腋下的筋間動脈入胸

下循膈內後廉行太陰心主之後下肘內廉

自極泉下循膈內後廉行太陰心主之後歷青灵穴下肘內廉抵

少海。青灵在肘上三寸舉臂取之少海在肘內廉端外去

循臂內後廉抵掌後兌骨之端入掌內廉循小指之內出其端

腕下踝為兌骨自少海而下循臂內後廉歷灵道通里系掌

後兌骨之端經神門入掌內廉之少冲而終端於手

太陽也心為君主之官示君於它藏故其交經授受不假於

支別云。灵道在掌後一寸五分通里在腕後一寸陷中陰

郄在掌後脈中去腕五分神門在掌後兌骨之端陷者中少

府在手小指本節後陷中五分少冲在手小指內廉端去爪甲如韭葉

是動則病噎乾心痛而欲飲是為臂厥是主心所生病者

目黃脇疼膈臂內後廉痛厥掌中熱痛盛者寸口大再倍

於人迎虛者寸口反小於人迎也

手太陽小腸經之圖



手太陽小腸經穴歌

手太陽穴一十九少澤前谷後谿腕骨陽谷養老連支正
少海肩貞走臑俞天宗與秉風曲肘肩外復有中天窅天容
上顛髎却月中清刺臑宮

手太陽小腸之經凡十九穴左右共三十八穴

小腸長三丈二尺左回疊積十六曲胃之下口小腸上口

也在臍上二寸水穀於是入而後下一寸為水分穴則小

腸下口也至是而泌別清濁水液入膀胱滓穢入大腸云

手太陽之脉起於小指之端循手外側上腕出踝中

臂骨盡處為腕下兌骨為踝本經起小指端少澤穴由是

循手外側之前谷後谿上腕出踝中歷腕骨陽谷養老穴也

少澤在手小指外側端去爪甲角一分陷中前谷在手小

指外側本節前陷中後谿在手小指外側本節後陷中腕骨

在手外側腕前起骨下陷中陽谷在手外側腕中兌骨下陷

中養老在手直上循臂骨下廉

脊兩旁為髎：上兩角為肩髎肩髎下成肩骨為肩髎

自養老穴直上循臂骨下廉支正穴出肘內側兩骨之間屈

少海穴上循臑外後為行手陽明少陽之外上有循肩貞臑

俞秉風秉風曲肘肩外俞有中俞諸穴乃上會大椎因左右

相交於兩肩之上。支正在腕後五寸少海在肘內大骨外

去肘端五分陷中肩貞在肩曲肘下兩骨解間有髎後陷中

臑俞在挾肩髎對心後大骨下肘上廉陷中天宗在支後後

大骨下陷中秉風在天宗外有上小髎後秉風有空曲肘在

有中夾四指陷中按之應手有外俞在肩肘上廉去三

寸陷中肩中俞在肩肘內廉去脊二寸陷中大髎在背脊三

足三陽督脉之會

入缺盆絡心循咽下膈抵胃脘小腸

自交肩上一入缺盆循肩向腋下行當臍中之分絡心循胃系

下膈過上腕中腕抵胃下行任脉之外當臍上二寸之分屬

小腸臆中上腕中腕並見任脉會穴也

其支者別從缺盆循頰上頰至目眦皆却入耳中

目外角為眦皆支者別從缺盆循頰之天窅天容上頰抵顛

髎上至目眦皆逆頰于髎却入耳中循聽宮而終也。天容

在頰大筋前曲頰下扶突後動脈應手陷中天容在耳曲頰

後顛髎在面頰骨不意兌骨端陷中腫于髎足少陽經穴聽

宮在其中珠子大如赤小豆

其支者別頰上頰抵鼻至目內眦斜絡于頰


目下為頰白大角為內眦其支者別循頰上頰抵鼻至目內

眦皆明穴以交於足太陽也睛明是太陽經穴

是動則病嗔目腫赤目痛

是動則病嗔目腫赤目痛

去八甲角如韭菜
 是動則病衝頭痛目似脫項似振脊痛腰似折解不可以
 曲脚如結胸如裂衣是為蹇蹇是主筋所生病者痔瘡疝氣
 疾頭顛項疼目黃淚出執紼項背腰尻脚指皆痛小指
 不用盛者人迎大升倍於寸口虛者人迎反小於寸口也



足少陰腎經穴歌

足少陰穴二十七涌泉然谷太谿通水鍾照海通水泉後溜交
 信築賓通陰谷橫骨大赫氣穴四滿中注三育瑜商曲石
 關膠陰都通谷出門辟步廊神封靈墟位神藏或中踰府既

足少陰腎之經二十七穴左右共五十四

腎有兩枚狀如石外色黑紫當骨下兩旁入脊腎附脊之
 第十四椎前後夾脊平直

足少陰之脉起於小指之下斜趣是心

趣向也足少陰起小指之下斜向是心之湧泉穴在是心陷
 中是是捲指交中

出然谷之下循是內踝之後別入跟中上膈內出腠內廉

跟足跟也由湧泉轉出是內踝然谷穴下循內踝後太谿穴
 別入跟中之骨踵照海水泉乃折自太谿之外上循內踝行
 厥陰太陰之後徑復溜交信過三陰交上膈內循榮實出胸
 內肓抵陰谷也然谷在足內踝前大骨下陷中大谿在足
 內踝後跟骨上動脈陷中大鍾在足跟後動中照海在足內

踝下水泉在大筋下一寸內踝下後端在足內踝上二寸動
 脈陷中交信在足內踝上二寸少陰前太陰後三陰交見
 足太陰是三陰之交會也集賢在足內踝上陷中陰分在
 膝內輔骨後大筋下上筋上按之應手屈膝可得之
 上股內後廉貫脊屬腎絡膀胱

由陰谷上股內後廉貫脊會於脊之長強穴還出於前循橫
 骨大赫氣穴四滿中注育俞當育俞之所膈之左右屬腎下
 膈下通關元中極向絡膀胱也。長強見腎脈之少陰少陽
 所結會腎脈別絡也橫骨在大赫下一寸育俞下五寸十金
 陰中注是也。大赫在氣穴下一寸氣穴在四滿下一寸
 如中注是也。大赫在氣穴下一寸氣穴在四滿下一寸
 四滿在中注下一寸氣海旁一寸中注在育俞下一寸育俞
 在商曲下一寸去膈骨五分指骨至育俞致之資生經云

去中行各一寸半關元中極並任脈穴之三陰任脈之會日
 其直者從腎上腎肝膈入肺中循喉嚨扶舌本

貫肝上循幽門上膈歷臍入肺中循神封臍虛神臍中
 俞府而上循喉嚨並人迎扶舌本而終也。商曲在右關下
 一寸石關在陰都下一寸陰都在通谷下一寸通谷在幽門
 下一寸幽門扶巨關旁各五寸商曲至通谷去腹中行各五
 分步廊在神封下一寸六分陷中神封在臍虛下一寸六分
 陷中臍虛在神臍下一寸六分陷中神臍在臍中下一寸六
 分陷中或中在俞府下一寸六分陷中俞府在巨骨下廉乳
 旁二寸陷中自步廊至臍中各二寸五仰而取之
 人迎穴見足陽明經

十四經發揮 卷中

其支者從肺出終心注胸中
 兩乳間為胸中支者自神臍別出遠心注胸之膈中以交於
 手厥陰也

是動則病飢不欲食面黑如地色欬唾則有血喘而喘
 坐而欲起目眩如無所見心如懸若飢狀氣不足則善
 恐心惕如人持捕之是謂胃脹是主胃所生病者口熱
 舌乾咽腫上氣噎乾及痛煩心痛黃疸腸痔脊骨改內
 後廉痛瘕瘕瘕目是下熱而痛為此諸病盛則寫之虛則
 補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取
 之灸則強實生肉緩帶被髮大杖重履而步盛者寸
 口大再倍于人迎虛者寸口反小于人迎也

手厥陰心包經之圖



手厥陰心包絡經歌
九穴心包手厥陰天池天泉曲澤深邪間使內關對大陵
勞宮中沖倚


手厥陰心包之經 此九穴左右共十八
心包一名手心主以藏象按之在心下橫膜之上豎膜之
下與橫膜相親而黃脂漫裹者心也其漫脂之外在細筋
膜如絲與心肺相連者心包也或問手厥陰經曰心主火
曰心包絡何也曰君火以衣相火以佐手厥陰代君火行
氣以肘而言故曰手心主以經而言則曰心包絡一經而
二名實相火也
手厥陰之脈起於胸中出屬心包下膈歷絡三焦

手厥陰受足少陰之交起於胸中出屬心包由是下膈歷絡
於三焦之上腕中腕及肘下一寸下焦之分也
其支者循胸出脇下腋三寸上抵腋下下循脇內行大陰少陰
之間入肘中
脇上際為腋自屬心包上循胸出脇下腋三寸天池穴上行
抵腋下循脇內之大泉穴以介手太陰少陰兩經之間
入肘中之曲澤也天池在腋下三寸乳後一寸着脇直腋
腋肋間天泉在曲腋下臂二寸率臂取之曲澤在肘內廉
下陷中屈肘得之
下臂行兩筋之間入掌中循中指指出其端
由肘中下臂行兩筋之間循行間使內關太陵入掌中
勞宮穴循中指指出其端之指端也

間使在掌後三寸兩筋間陷中內關在掌後六腕二寸大陵
在掌後兩筋間陷中勞宮在掌中六寸無名指取之實生
經云屈中指以今規之其若屈中指無骨兩兩者之間取之
為九中衝在手中指端去爪中如韭葉陷中
其支別者從掌中循小指次指出其端

小指次指無名指也自小指逆數之則為次指示支別者自
掌中勞宮穴別行循小指次指出其端而交於手少陽也
是動則病手心熱臂肘掌急腋腫甚則胸脇支滿心中澹
澹大動面赤目黃喜暈不休是主脈所生病者煩心痛
掌中熱盛者寸口大一倍於人迎虛者寸口反小於人迎
也

手少陽三焦經之圖



手少陽三焦經

二十三穴手少陽開河液門中渚外關支溝會宗
手陽四瀆配天井合連清冷淵消滲臑會肩髃偏天臑
臂風臑脈顯息角孫通耳門禾膠絲竹空

手少陽三焦之經凡二十三穴左右共四十二穴。是經多氣少血。

三焦者水穀之道路氣之所終始也上焦在心下下膈在胃上口其治在膻中直兩乳間陷者中中焦在胃中脘當臍上四寸不上不下其治在臍旁下焦當臍臍上口其治在臍下一寸

手少陽之脈起於小指次指之端上出次指之間循手表腕出臂外兩骨之間上臂肘

臂骨盡處為腕臑盡處為肘手少陽起小指次指端開衝穴上出次指之間歷液門中渚循手表腕之陽池出臂外兩骨之間循外關支溝會宗三陽絡四瀆乃上貫肘抵天井穴也。開衝在小指次指之端去爪甲如韭葉液門在小指次指間陷中渚在小指次指本節後陷中陽池在手表腕上陷中外關在腕後二寸陷中別走手少陽支溝在腕後三寸兩骨間陷中會宗在腕後三寸空中一寸三陽絡在臂上大交脈支溝上一寸四瀆在肘前五寸外廉陷中天井在肘外大骨後上一寸兩筋間陷中屈肘得之甄權云四肘後一寸又手按臑頭取之兩筋骨解

循臑外上肩交出足少陽之後入缺盆布臑中散終心包下

肩肘之間臂下對液處為臑從天井上行循臂臑之外歷清

冷淵消寒行手太陽之裏陽明之外上有循臑會肩髃天臑交出足少陽之後過系風肩井下入缺盆復由足陽明之外而交會於臑中散布絡結於心包乃下膈當胃上口以屬上焦於中腕以屬中焦於陰交以屬下焦也。清冷淵在肘上二寸神肘舉臂取之消滲在肩下臂外間腋斜肘分下行臑會。在肩前廉去肩頭三寸肩髃在肩端臑上舉臂取之天臑在肩缺盆中上比骨之隙陷中乘風見于太陽經手足少陽手太陽：明之會肩井見足少陽經手足少陽：維之會缺盆足陽明經穴胆中見任脈心包相火用事之分也中腕陰交見任脈三焦之募任脈氣所發也

類至項

腦戶後為項目下為頰其支者從胆中而上出缺盆之外上項過大椎循天臑上挾耳後經翳風臑脈顯息直上出耳上角至角孫過懸鐘頰脈又過陽曲晴明屈曲下類至頰會會顯之會也。大椎見督脈手足三陽督脈之會天臑在頰大筋外缺盆上天臑後天臑後資生天柱前完骨而髮際上懸鐘頰脈見足少陽經手足陽明少陽之交會也翳風在耳後中央角陷中按之引耳中痛瘰癧在耳本後難足青脈中顯息在耳後青脈中角孫在耳廓中間上開口有室陽白見足少陽經手足陽明少陽之會晴明見足太陽經額脈見于太陽經手少陽太陽之會也

其支者從耳後入耳中出是耳前過客主人前交類至日乾也

此支從耳後循頰入耳中過聽宮歷耳門和齶却出至目
 銳眇會瞳子膠筋絲竹空而交於足少陽也
 聽宮見手太陽經手足少陽手太陽三脈之會耳門在耳前
 起由當耳缺中而膠筋在耳前兌髮下橫動脈瞳子膠筋見足少
 陽經手太陽手足少陽之會絲竹空在肩後陷中
 足動則病耳聾渾、瘡。眩暈喉痛是去氣所生病者汗
 必日銳眇皆痛痲疼耳後有瞽時肩外皆痛小指次指不用也
 者人迎大一倍於寸口虛者人迎反小於寸口也

足少陽胆經之圖



足少陽胆經穴歌

少陽之經瞳子膠四十三穴行過之
 聽宮耳門和齶却出至目
 懸壺曲鬲翹率谷天冲浮白次寒陰完骨本神企陽白臨泣
 開目窻正帶承靈及腦風池看井淵脈長軒筋助日月京門
 當帶脈五樞維道續居膠環跳下中巖陽關陽陵後陽交外
 但光明陽輔高懸鍾丘墟足臨泣池上俠谿寒陰里

此維頭部自瞳子膠至風池凡三寸穴作三折向外而行
 始瞳子膠至完骨是一折入自完骨外折上至陽白會晴
 明是一折入自晴明上行循臨泣風池是一折緣其穴曲
 折外後唯為斜率故此作一至二十次第以該之一種子
 膠二听會三完骨四領厭五懸壺六懸鍾七回鑿八率谷
 九天冲十浮白十一巖陰十二完骨十三本神十四陽白

十五臨泣十六目窻十七正營十八承靈十九腦空二十

風池

足少陽胆之經 凡四十三穴左右共八十

胆在肝之短葉間重三兩三銖包精汁三合

足少陽之脈起於目銳眇上抵頭角下耳後

足少陽經起目銳眇之瞳子膠於是循聽會客主人上抵頭
 角循額厭下懸壺懸壺由懸壺屬外循耳上髮際至曲鬲率谷
 由率谷外折下且後循天衝浮白竅陰完骨大目完骨外折
 上逆角孫循本神過申差下至陽白會精明復從晴明上行
 循臨泣目窻正帶承靈腦空風池也。瞳子膠在日外皆五
 分听會。在耳前陷中上開下一寸動脈完。張口得之客主
 人在耳前起骨上懸壺口有空連脈完。中頭厭在曲鬲下

陰少陽所結之會也長強見腎脈足少陰少陽所結之會中
瀆在解骨外膝上五寸分由間陷中陽關在陽陵泉上三寸
續鼻外陷中陽陵泉在膝下一寸外廉陷中

下外輔骨之前直下抵絕骨之端下出外踝之前循足附上入
小指次指之間

筋外為輔帶外踝以上為絕骨足面為跗自陽陵泉下外輔
骨前歷陽穴外無光明直下抵絕骨之端循陽輔懸鐘而下
出外踝之前至五墟循足面之臨泣地五會伏竅乃上入小
指次指之間至竅陰而終也○陽交在足外踝上七寸斜屬
二陽分肉之間外丘在足外踝上七寸光明在足外踝上五
寸陽輔在足外踝上四寸輔骨前絕骨端如前三分去五墟
七寸懸鐘在足外踝上三寸動脈中五墟在足外踝下如前

去臨泣三寸臨泣在足小指次指本節後間陷中去挾竅一
寸半地五會在足小指次指本節後陷中俠竅在足小指次
指岐骨間本節前陷中竅陰在足小指次指端去爪甲如

其支者別附上入大指循岐骨內出其端還貫爪甲出三毛
足大指本節後為岐帶大指爪甲後為三毛其支者自足附
上臨泣穴別行入大指循岐骨內出大指端還貫爪甲

是動則病口苦善太息心脇痛不能轉側甚則面微塵體
無膏澤足外反熱是為陽筋是主骨所生病者胸膈痛頰疼
目眩背痛缺盆中腫痛腋腫下腫馬刀挾癰汗出振寒瘧疾
脇肋解膝外至脛絕骨外踝前及膝節白痛小指次指不
用盛者人迎大一倍於寸口虛者人迎反小於寸口也

宛廣韻由切深空之貌即穴際之謂也江西席後家錢氏書
宛中皆謂字音作宛堂醫經宛音相近而然今悉依改定雖然所

足厥陰肝經之圖



足厥陰肝經穴歌

一十三穴足厥陰大敦行間太衝後中封蠡溝中都近膝間
曲泉除包臨耳重相近陰廉與章門常對期門深

足厥陰肝之經凡一十三穴左右共二十
肝之為藏左三葉右四葉凡七葉其治在左其藏在右腸
右腎之前並胃着脊之中第九椎

足厥陰之脈起於大指聚毛之上循足附上廉去內踝一寸
足大指爪甲後為三毛後橫又為聚毛去相去也足厥
陰起於大指聚毛之大敦穴循足附上廉行間太衝抵內
踝一寸之中封也大敦在足大指端去爪甲如韭葉及三
毛中行間在足大指間動脈處季太冲在足大指本節後三

足厥陰之脈起於大指聚毛之上循足附上廉去內踝一寸
足大指爪甲後為三毛後橫又為聚毛去相去也足厥
陰起於大指聚毛之大敦穴循足附上廉行間太衝抵內
踝一寸之中封也大敦在足大指端去爪甲如韭葉及三
毛中行間在足大指間動脈處季太冲在足大指本節後三

寸或去一寸半動脈陷中中封在足內踝前一寸陷中仰而取之

上踝八寸交出太陰之後上腠內為

自中封上踝過三陰交歷毒溝中都復上一寸交出太陰之後上腠內為至膝間曲泉。三陰交見足太陰經足少陰太陰厥陰之交會也。毒溝在內踝上五寸中都。在內踝上七寸。胛骨也。膝間在積鼻下二寸陷中曲泉。在膝內輔骨下大筋上小筋下陷中屈膝得之在膝橫文。

循股入陰中環陰器抵小腹挾腎屬肝絡膽

解內為膝下為小腹由曲泉上行循股內之陰包五里陰廉。逢衝府舍之分入陰毛中左右相交環陰器抵小腹而上會曲骨中極關元復循章門至期門之所挾胃屬肝

下日月之分終於膝也。陰包在膝上四寸股內為內筋間五里在氣衝下三寸除股中動脈陰廉在羊矢下去氣衝二寸動脈中衝門府舍見足太陰曲骨見任脈足厥陰任脈之會中極關元見任脈足三陰任脈之會也。章門在大橫外直膝季肋端側臥屈上足伸下足舉臂取之。期門直兩乳第二助端肝之募也。日月見足少陽經。上貫脇布脇肋循喉嚨之後上入頰頰連目系上出額與督脈會於顛。

目內連深處為目系頰頰頰頰也。自期門上貫脇行食室之外大包之束散者為脇肋上雲門淵腋之間入迎之外循喉嚨之後上入頰頰行大迎地倉白陽白之外連目系上出額行頰頰之束與督脈相會於顛頰之百會也。合者為大包足

太陰經穴雲門手太陰經穴淵腋足少陽經穴人迎大迎地倉白陽白見足陽明陽白臨泣見足少陽百會見督脈

其支者從目系下頰頰環唇內

前以連目系上出額其支從目系下行任脈之承。李經之重下頰裏交環於口唇之內

其支者復從肝別貫膈上注肺

此交經之友從期門屬肝者別貫膈行食室之外本經之重上注肺中下行至中焦挾中腕之分以交於手太陰也

是動則痛腰痛不可以伸仰丈夫癩病婦人小腹腫甚則

嗝乾而塵脫色是主肝所生病者胸滿噎逆同喉狹疝道

濕癢閉盛者寸口大一倍於人迎虛者寸口反小於人迎也

凡此十二經之病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之治不則灸之不盛不虛以經取之

督脈之圖

凡此脊脊骨高處則動脈如魚脊高如乃其此龍乃居之靈



督脈經穴歌

督脈部中行二十七穴始長強腰俞伏閉命門當懸指脊中
走筋絡至陽天靈神道長身柱陶道大椎命門風府連腦
內強間後項百會前頂顛會上星圓神庭素髀水溝重天
端巖交斯已矣

督脈 凡二十七穴

督之為言都也行督部之中行為以脈之都綱奇經八脈之一也

督脈者起於下極之胸


下極之胸兩陰之間屏翳處心屏翳兩肋間為脊內深處為下極督脈之所始也

並如脊裏上至風府入腦上巔循額至鼻柱屬陽脈之海也

脊之為骨凡二十一椎通項骨三椎共二十四椎自屏翳兩
起歷長強穴並脊裏而上行循腦膂陽關命門懸樞脊中筋
縮至陽天靈神道身柱通風門循陶道大椎至風府入
腦循腦戶強間後項上巔至百會前項顛會上星神庭循額
至鼻柱經素髀水溝先端至斷交而終焉云以脈之海者以
人之脈絡周流於諸穴之盛譬猶水也而督脈則為之都綱
故曰以脈之海。屏翳見任脈任脈別絡挾督脈衝脈之會
長強在脊最處腰俞在第二十一椎節下間陽關在第十六
椎節下間命門在第十四椎節下間懸樞在第十三椎節下
間脊中在第十一椎節下間筋縮在第九椎節下間至陽在
第七椎節下間天靈在第六椎節下間神道在第五椎節下
間身柱在第三椎節下間風以見足太陽乃督脈足太陽之

會陶道在大椎節下間陷中自陽關至此諸穴並悅而取之
大椎在第一椎上陷中庭門在風府後入髮際五分風府在
項入髮際二寸腦戶在枕骨上強間後一寸五分強間在後
項後一寸五分後項在百會後一寸五分百會一名三在兩
項後一寸五分項中旋毛中直兩耳尖中容丘前項在顛會
後一寸五分陷中顛會在上星後一寸陷中上星在神庭後
入髮際一寸陷中容丘神庭在鼻上入髮際五分素髀在鼻
柱上端水溝在鼻柱下人中先端在唇上端斷交在唇內齒
上斷絕也

任脈之圖



任脈經穴歌

任脈分三八起於會陰上曲骨中極關元到石門氣海陰交神闕五水分下脘循建里中脘上脘巨闕起鳩尾中庭膻中

任脈凡二十四穴

任之為言妊也行腹中任為夫人生養之本奇經之一脈也

任脈者起於中極之下以上毛際循腹裏上關元至喉龍馬陰脈之海也

任與腎同源而二岐皆則由會陰而行皆任則由會陰而行膈夫人身之有任督猶天地之有子午也人身之任督以腹背言天地之子午以南北言可以分可以合者也分之以於以

見陰陽之不雜合之于以見渾淪之無間一而二二而一也也任脈起於中極之下會陰之分也由是循曲骨上毛際至中極行腹裏上脘關元中脘巨闕鳩尾中庭膻中上脘巨闕起鳩尾中庭膻中泉上脘循承漿環唇上至斷交分行繫兩目下之中夾會承泣而終也云陰脈之海者亦以人之脈絡周流於諸陰之分譬猶水也而任脈則為之總任焉故曰陰脈之海也會陰一名屏翳在兩陰間曲骨在橫骨上毛際陷中動脈應手寸極在關元下一寸關元在臍下三寸石門在臍下二寸氣海在臍下一寸五分陰交在臍下一寸神闕當臍中水分在下臍下一寸上臍一寸下臍在連里下一寸建里在中脘下一寸中脘在上臍下一寸靈樞結云腧腧即岐以下至天樞天樞

明經穴換肺二寸長八寸而中脘居中是也然人四目有大小亦不可拘以自身也但自腧筋至臍中以八寸為度各依部分取之上脘在巨闕下一寸當一寸五分去散骨三寸巨闕在鳩尾下一寸鳩尾在散骨之端言其骨垂下如鳩形故以為名臍前散骨下五分也人無散骨者從岐骨際下行一寸中庭在膻中下一寸六分胆中在玉堂下一寸六分兩乳間玉堂在紫宮下一寸六分紫宮在華蓋下一寸六分華蓋在璇玑下一寸六分璇玑在天突下一寸陷中天突在頸結喉下一寸宛中在膻中任脈是也明之會斷交見督脈任督二脈之會承泣見足陽明蹻脈在臍是也明之會也按任督二脈之直行者為腹背中行諸穴之系今特舉一

以附十二經之後如骨空論云者茲不與為其餘衝帶維蹻所經之穴是則寄會於諸經之間矣誠難與任督二脈之灼就行腹背者皆故此得以畧之雖就因畧以致詳亦不害於兼取也故其八脈全篇仍別出于左方云
右十四經正文並與金蘭循經同

十四經發揮中卷終

十四經發揮卷下

奇經八脈篇

脈有奇常十二經者常脈也奇經八脈則不拘如常故謂之奇經蓋以人之氣血常行於十二經脈其諸經滿溢則流入奇經焉奇經有八脈督脈起於後任脈任於前衝脈為諸脈之海陽維則維絡諸脉陰維則維絡諸脉陰陽自相維持則諸維常調維脉之外有帶脉者束之猶帶也至於兩足陽脉有陰有陽以得諸太陰之別以得諸少陰之別以得諸厥陰人圖設溝渠以格水潦斯無漫溢之患人有奇經亦若是也今摭集奇經八脉所發者氣穴處所共成一篇付之於後以備通攷云

督脉

督脉者起于小腹以下骨中央女子入繫度孔之端其絡循陰器合篡間繞後列統督至少陰與巨陽中絡者合少陰上股內後為貫脊屬腎與太陽起目內眦止額交巔上入絡腦還出別下項循脊背內挾脊抵腰中入循脊絡腎其男子循莖下至篡與女子室其少腹直上者貫臍中夾上貫心入喉上順環唇上系目之中此生病從少腹上衝心而痛不得前後為衝病其女子不產瘕瘕道瀉嘔乾治在督脉。督脉之别名曰長強伏脊上項散上項下當肩脾左右別走太陽入貫脊實則脊強虛則頭重取之所別故難經曰督脉者起於下極之胎並於脊重上至風府入屬於腦上頭循額至鼻柱屬太陽脉之海也此為病令人脊強及新。督脉後頭循脊脊長四尺五寸五分二

十七穴穴見前

按內經督脉所發者二十八穴據法十椎下一穴名中極脉尾骨兩旁二穴長強共有二十九穴今多斷交二穴少中極一穴會陽二穴則係督脉別絡與少阴會故止載二十九穴穴見前

任脉

任脉者與衝脉皆起於胞中循脊裏為經絡之海其浮而外者循腹上行會於咽喉別而絡唇口血氣盛則肌肉熱血獨盛則滲灌皮膚生毫毛婦人有餘於氣不足於血以其月事數下任衝並傷故也任脉之交脉不營其口唇故鬚鬚不生是以任脉為癰男子因結七疝女子帶下瘕聚故難經曰任脉起於中極之下以上毛際循腹裡上關二

至咽喉上順循面入目屬陰脉之海凡此任脉之行從胞中上注目長四尺五寸五分按二十四穴穴見前

按內經云任脉所發者二十八穴經閉一穴實有二十七穴內斷交一穴屬督脉承泣二穴屬定陽明陽脉故止載二十四穴穴見前

陽蹻脉

陽蹻脉者起於跟中循外踝上行入風池其為病也令人陰緩而陽急兩足蹻脉本太陽之別合於太陽其氣上行氣并相逐則為滿目氣不營則目不合男子數其阳女子數其陰當數者為經不當數者為絡也蹻脉長八尺所發之穴生於申脉外踝下屬以輔阳為却以謀本於僕骨下與足少陰會於居髀下又與手阳明會於肩髃及巨

骨在... 又與手足太陽... 陽明會于地... 任脉足陽明會于承泣... 已上為陽蹻脉之所榮凡二十穴... 陰蹻脉者亦起於跟中循內踝上行至咽喉交貫衝脉... 為病者令人陽緩而陰急故曰蹻脉者少陰之別別於然... 谷之後上內踝之上直上循股入膈上循胸重交缺盆... 上出人迎之所入鼻為目內眦合於太陽女子以之為經... 男子以之為絡而足蹻脉長八尺而陰蹻之知在交信... 此二脉蹻脉病者取此

衝脉者與任脉皆起於胞中上循脊裡為經絡之海其浮... 於外者循腹上行會於咽喉別而終唇口故曰衝脉者起... 於氣冲並足少阴之經俠脐上行至胸中而散其為病令... 人逆氣重急難經則曰並足少阴之經以穴致之足少阴... 俠脐左右各二寸而上行足少阴俠脐左右各五分而上... 行鍼經所載衝脉與督脉同起於會阴在其腹也行于幽... 門通谷陰都石關商曲育中注四滿氣穴大赫橫骨凡... 二十二穴皆足少阴之分也然則衝脉並足少阴之經明... 矣


陽維脉... 陰維維於陽其脉起於諸陰之會與陰維皆維終于身... 陽不能維于陽則容不能自收其脉氣所發別于全

門在足外... 陽交為初... 會于膈... 井涌其在頭也... 泣上至正營循于腦空下風池其與督脉會則在風府及... 症門難經云陽維為病苦寒熱

此陰維脉氣所榮凡二十四穴... 陰維維于陰其脉起於諸陰之交若陰不能維于陰則長... 然失志其脉氣所發者陰維之知名曰築賓規足太... 阴會于腹哀大橫又與足太陽厥陰會于府舍期門與任... 脉會于天突廉泉維經云此維為病苦心痛... 此陰維脉氣所榮凡二十四穴

帶脉... 帶脉者起于季脇回身一周其為病也腰腹縱容如囊... 之狀其脉氣所榮在季脇下一寸八分止名帶脉以其回... 身一周如帶也又與足少阴會于維道... 此帶脉所榮凡四穴... 以上雜取素問難經甲乙經聖濟總錄中余合為篇

十四經發揮卷下終



ZW 21101000784197

S


7121.5

15b(99)

仰人尺寸之圖



伏人尺寸之圖



共五十九叶週身穴俱前