

創刊於民國廿七年九月一日 工部局登記證C273號

新中醫刊

第二卷

第十期

本期要目

現階段中醫應有之責任.....	朱小南
魚翅海參效用與牛蹄筋相同.....	衛聚賢
疔部文字注释史.....	衛聚賢
金匱新義.....	祝味菊
藥物研究龍骨龍齒石鐘乳何首烏.....	章次公
非暑論.....	陳公明
麻疹新論.....	周毅
論雁來風.....	金少陵
金匱痰飲咳嗽病方論.....	錢公玄
錯綜龐雜.....	彤影
醫學挫談.....	黃勝白

中華民國廿九年五月一日出版 定價每冊二角

上海

泰

昌

參

號

(參燕業大同行)

●專售各種補品●

電話購貨請打

九一六七八
八六九七四

地址

北京南路

南法大馬路

科學儀器館

本館創辦於民國前十年

營業要目

分館

漢口後花樓

重慶米花街

昆明金碧路同仁街

中西文具

中西樂器

博物標本

美術用品

理化器械

運動器械

化學藥品

自來水筆

生理模型

科學圖書

測量儀器

繪圖用具

總館地址

上海福州路四〇六號

電話 九一一七七

九一一七六

〔藥〕——號藥國堂餘慶——〔道〕

電話九三七二一號

花	杜	丸	補	參	道
露	煎	散	劑	燕	地
痧	諸	膏	飲	銀	藥
藥	膠	丹	片	耳	材
<hr/>					
與	種	校	配	功	出
衆	種	對	方	效	品
不	特	認	準	靈	精
同	點	真	足	速	良

丸散膏丹香餅等貨售出概不退換

煎代 送接
藥客 藥方

服	清	手	取	藥	照	不	當	同	前	立	電
務	潔	續	費	力	方	取	即	店	來	刻	話
週	可	完	極	準	監	力	送	配	接	派	通
到	靠	備	廉	確	煎	錢	上	就	方	人	信

〔材〕——口路沙長路義文愛海上——〔地〕

新中醫刊第二卷第十期

目 錄

論 著

現階段中醫應有之努力.....朱小南..... 3

魚翅海參效用與牛蹄筋相同.....衛聚賢..... 4

特 稿

广部文字注释史.....衛聚賢..... 6

專 著

金匱新義(續).....祝味菊.....10

疾病研究

麻疹新論.....周 毅.....13

非暑論.....陳公明.....25

論雁來風.....金少陵.....27

藥物研究

龍骨龍齒石鐘乳何首烏.....章次公.....29

方 劑

金匱痰飲咳嗽病方論.....錢公玄.....38

綜 說

錯綜龐雜.....彤 影.....41

消 息

新中國醫學院近况.....記 者.....28

科學提煉國藥已獲成功.....記 者.....36

補 白

醫藥控談.....黃壽白.....46

新中醫刊社

社 長 朱 小 南
名譽編輯 包 天 白

編輯主任

朱 中 德 余 蔚 南

編 輯

王 宏 綬 茅 志 祥

孟 克 明 顧 小 秋

總 務

榮 質 文 羅 耀 祥

夏 名 揚 周 惠

出 版

傅旭初 沈鳳鳴

廣 告

沈仲如 徐傳剛

會 計

茅 濟 棠 金 明

編 輯 處

上海愛文義路四七五號轉

出 版 處

上海法租界李梅路七六號

代 售 處

本 埠

五洲書報社 中國圖書公司

中醫書局 文德書局

外 埠

香 港 世 界 書 局

價 目		
零 售	每 冊	國幣貳角
定 閱	全年十二期(連郵)	國幣貳元
廣 告		
全 頁	每 期	三十元
半 頁	每 期	十六元
彩色封底另加		

論 著

現階段中醫應有之努力

朱 小 南

自八一三事變發生以還。全國各界。一致奮起。在中央領導之下。致力於各種工作。其意志之堅定。情緒之熱烈。實為過去所未有。良以此次事變。為中華民族生死存亡所繫。凡屬黃帝神明之後裔。俱應各盡所長。為國効力。以救危亡。吾中醫同仁。雖不能執戈以從。但亦當堅守崗位。致其最大努力。以盡國民之天責。筆者管見。以為丁茲國難嚴重之秋。中醫界應有之努力。固不一其道。然可得而言者。約有兩端。第一、抗戰三載。戰區日廣。衝國健兒。死傷於鋒鏑者。為數固鉅。而被難之民衆。流亡載道。疾病交加者。亦不知凡幾。吾人既抱救世濟人之宏願。復多回生起死之良方。在可能範圍內。亟應各竭其能。隨時隨地。為傷兵及難民。盡醫治之義務。俾受創之鬥士。患病之難胞。得以減少死亡。早日恢復康健。以從事各項工作。此於抗建期間之人力上。實大有裨益也。第二、事變迄今。海口大都淪陷。軍民所必需之西藥。輸入困難。價格奇昂。國家經濟。損失不貲。補救之道。厥惟利用國產藥材。加以科學提煉。代替西藥之用。藉以杜塞漏卮。考吾國西南各省。產藥甚豐。其中當有不少藥品。可資代用。吾道中人。不乏藥化專家。誠能以科學方法。各就所知。悉心研究。定有若干光輝之成就。照目前情況。對於治創傷瘧疾霍亂等藥品。需要最殷。尤當加意研究。儘先製煉。俾能自足自給。不致仰求外貨。此於民族經濟上。為利亦非淺鮮也。吾中醫同志。素具愛國熱忱。對於上述二端。想早已共喻。甚望能齊一步調。努力邁進。則國家之人力財力。咸蒙其利。良相良醫。將於此見之矣。

魚翅海參效用與牛蹄筋相同

衛 泉 賢

魚翅海參在現在宴會席中，視為必需的珍品。但此二物，俱係海產。當此外匯大漲之際，席中設魚翅海參，不啻是多消耗外匯。此在國家經濟立場上言，應廢除魚翅海參的。再就滋養品而言，魚翅海參中無非是含些膠質，如果人身體上需要膠質的話，不妨吃些牛蹄筋及豬蹄子等，以作代替。猶如中藥中有珍珠一門，大的珍珠，價值甚貴，如易以蚌殼雞蛋皮，則不值一文。因珍珠與蚌殼同係石灰質，何必含賤而用貴。這與宴席中含牛蹄筋而用魚翅海參同為太不經濟的事。

茲將本草綱目中關於魚翅海參條抄錄於左：

沙魚翅：

沙即鮫魚，種類甚多，皆可食。綱目鮫魚條集解下，瀕湖注云：「沙魚腹下有翅，味並肥美，南人珍之。主治下特載其肉皮膚之功用，翅獨略焉。今人習為常嗜之品，凡宴會肴饌，必設此物為珍享。其翅乾者成片，有大小，率以三為對，蓋脊翅一，划水翅二也。煮之折去硬骨，檢取軟翅色如金者，淪以雞湯，佐饌味最美。漳泉有煮好剔取純軟刺，作成團，如脂肪餅狀，金色可愛，名沙刺片，更佳。」

味甘性平，補五臟，消魚積，解蠱毒。（食物宜忌）益氣開膈，托毒，長腸力。（閩部食蔬）清痰，開胃進食。（藥性考）

以上見本草綱目拾遺卷十鱗部。

海參：

閩小記云：「閩中海參色獨白，類撐以竹箴，大如掌，與膠州遼海所

出異，味亦淡劣。入藥以產遼海者良，紅旗街出者更勝於綠旗街。有刺者名刺參，無刺者名光參，入藥用大而有刺者佳。一名海男子，有硬櫛二種，而黑膩者尤佳。人以腎爲海。此種生北海鹹水中，色又黑，以滋腎水，求其類也」。百草鏡云：「南海泥塗亦產海參，色黃而大，無刺，肉亦硬，不中食品，土人名曰海瓜皮，言其如瓜皮之粗韌也。以其充庖炮豬肉食，可健脾，入滋補陰分藥，必須用遼東產者，亦可熬膏作膠用」。

五雜俎：「海參遼東海濱有之，一名海男子，其狀如男子勢然，淡菜之對也。其性溫補，足敵人參，故名海參……」。

以上見本草綱目拾遺蟲部。

據上所載沙魚以「肉皮膽」有「主治」「功用」而「翅獨略焉」，後人以「金色可愛」，乃「習爲嘗嗜之品」。是魚翅作補品本無其事。海參以「其狀如男子勢然」。故「以滋腎水，求其類也」。作爲補品，更屬荒唐。不過牠是「亦可熬膏作膠用」，其中有點膠質。而牛蹄筋爲熬膏作膠的很好原料，宴席中以牛蹄筋代替魚翅海參，既省外匯，亦不減滋補。因讀本草有感而錄之，願衛生家大事提倡！

介紹國醫刊物

國醫導報 朱仁康主編

全年六冊定閱連郵一元

地址 馬斯南路20號

特 稿

疒 部 文 字 注 釋 史

衛 聚 賢

- 痲** 廣韻：(集韻)同疔。
康熙字典：(集韻)同疔。
- 痲** 廣韻：(集韻)里孕切，音令，風病也。
康熙字典：(集韻)里孕切，音令，風病也。
- 瘵** 說文：積血也，从疒，於聲。依倨切。
玉篇：於豫切，積血也。
廣韻：去聲，御韻，依倨切，血瘵。
康熙字典：(廣韻)依倨切，(集韻)(韻會)(正韻)依據切，并音餒(說文)積血也。(楚辭九辯)形銷鑠而瘵傷。(註)銷鑠瘵傷，身體焦枯被病久也。又(揚子太玄經)八爲疾瘵。(註)瘵疾也。又(集韻)衣虛切，音於，義同。
醫學大辭典，瘵血之停滯者，如瘵血，即蓄血也。
- 瘵** 康熙字典：(字彙)杜回切，音頽，陰病。
- 瘵** 玉篇：於歇切，中熱，亦作喝渴，又音渴。
廣韻：入聲，曷韻，苦曷切，內熱病也。
康熙字典：(廣韻)苦曷切(集韻)丘葛切，并音渴，內熱病也。(正字通)本作喝(方書)受暑中喝受涼中暑。又(集韻)於歇切，音謁，義同。又虛艾切，音餒，病也。
- 瘵** 廣韻：(集韻)吐猥切，音醜，瘵瘵病。(五音集韻)他內切，音退，與椽同。

康熙字典：（集韻）吐猥切，音骸，瘵瘵病。（五音集韻）他內切，音退，與梭同。

瘵 玉篇：寒病也。

廣韻：上聲，寢韻，瘵，寒病，疎錦切，瘵，上同。

康熙字典：（集韻）楚錦切，音疹，駭恐貌。又（廣韻）疎錦切，（集韻）所錦切，并參，上聲，義同。又（玉篇）寒病也。又（集韻）所禁切，音疹，義同。

瘧 廣韻：（集韻）丑厄切，音精，瘧瘧寒病。

康熙字典：（集）丑厄切音精，瘧瘧寒病。

癘 玉篇：徒回切，下腫也。

廣韻：上平聲，灰韻，杜回切，陰病。

康熙字典：（廣韻）杜回切，（集韻）徒回切，并音頤。（倉頡篇）陰病。

又（集韻）徒對切，音隊下潰。（集韻）或作癘、癘、癘。

醫學大辭典癘杜回切，與隕，頤，癘均通。（集韻）引（倉頡篇），癘，陰病。（釋名）陰腫曰癘。

瘧 康熙字典：（正字通）俗瘵字。

瘧 玉篇：式與切，瘧，熱疾也。

廣韻：式與切，瘧，熱疾也。

康熙字典：（集韻）賞呂切音暑，中暑之病。

瘧 玉篇：思醉切，風瘧也。

廣韻：思醉切，風瘧也。

康熙字典：（集韻）雖遂切，音崇，風瘧病。

癩 廣韻：薄茲切。

康熙字典：（廣韻）薄茲切，（集韻）婢典切，并音辦，骨風疾也。又

（集韻）妣面切，音便，義同。

三 病 勢

疲 說文：病劣也，从疒，及聲，呼合切。

玉篇：呼合，荆立二切，病劣也。

廣韻：入聲，緝韻，居立切，病也。合韻，呼合切，病劣兒。盍韻，呼盍切，肥疲。

康熙字典：(唐韻)(集韻)并呼合切，音歛(說文)病劣也。又(廣韻)居立切，(集韻)訖立切，并音急。義同。又(廣韻)呼盍切，音歛胞。

疥 康熙字典：(字彙)丑鳩切，音抽，病差愈。

疥 廣韻：入聲，業韻，去劫切，病劣。

康熙字典：(廣韻)去劫切，(集韻)乞業切，并音怯，病劣，與怯通。又(集韻)口舉切，音去，病也。

痊 玉篇：七緣切，病瘳也。

廣韻：下平聲，仙韻，此緣切，病瘳。

康熙字典：(廣韻)此緣切，(集韻)(韻會)遂緣切，(正韻)且緣切，并音詮，(玉篇)病瘳也，(集韻)病除也，(抱朴子用刑卷)是以灸刺慘痛而不可止者，以痊病也。

醫學大辭典：(痊驥集)二卷，療馬劑。

痼 康熙字典：(集韻)乙洽切，音押，江淮之間，謂病劣曰痼，(正字通)或曰禿瘡，下窪貌。

瘡 康熙字典：(篇海類編)音旨，小疾。

瘡 廣韻：(集韻)(類篇)并兩舉切，音呂，瘡病，又久病。

疾 說文：病息也，从疒，夾聲。苦叶切。

玉篇：丘協切，病息也。

瘖 廣韻：入聲，怙韻，苦協切，(說文)曰病息也。

康熙字典：(唐韻)苦叶切，(廣韻)苦協切，(集韻)詰叶切，并音愜，(說文)病息也，(集韻)或作瘖。

瘖 廣韻：(集韻)蒲故切，音步，復病也。

康熙字典：(集韻)蒲故切，音步，復病也。

瘖 玉篇：力代切，惡病也。

廣韻：上平聲，哈韻，洛哀切，惡病，去聲，代韻，都代切，惡病。

康熙字典：(廣韻)(集韻)并洛代切，音賚，惡病。(博雅)瘖癘也，文(唐韻)落哀切，(集韻)郎才切，并音來，義同，又(類篇)久疾也。俗作癘。

瘖 說文：久也。(逸文)

玉篇：古護切，久病也。瘖，同上，又小兒口瘖。

廣韻：去聲，暮韻，古暮切，久病。

康熙字典：(集韻)(韻會)(正韻)并古暮切，音顧，(說文)本作瘖，久病也，(正韻)久固之疾，(後漢光武紀)京師醴泉湧出，飲之者瘖疾皆愈，(抱朴子微旨卷)抱瘖疾而言精和鵠之伎，又(韻會)通作固，(禮月令)國多固疾，亦通作鋼，(前漢賢誼傳)必為鋼疾。

醫學大辭典：瘖，病之積久不愈者。瘖疾，瘖病，久病也。

瘖 說文：病瘖也，从疒，俞聲。以主切。

玉篇：弋乳切，小輕也，又音俞，病也。

廣韻：上平聲，虞韻，羊朱切，病也。上聲，虞韻，以主切，病也，(說文)曰病瘖也。

康熙字典：(唐韻)以主切，(集韻)(韻會)勇主切，并音庚，(說文)病瘖也，(徐曰)今別作愈，非是，(玉篇)小輕也，(前漢高帝紀)漢王疾瘖，(釋文)瘖，病差也，又(廣韻)病也，(詩小雅)父母生我，胡俾我瘖，(傳)瘖，病也，(又)不令兄弟交相為瘖，又(廣韻)羊朱切，(集韻)(韻會)容朱切，(正韻)雲俱切，并音俞，又(韻會)愈戍切，(正韻)羊茹切，并音裕，義并同，又賢也，(晉語)東方之士，孰為瘖，(註)瘖賢也，(釋文)，瘖，羊茹反，(前漢藝文志)不猶瘖於野乎。

專 著
金 匱 新 義
祝 味 菊

六師曰。吸而微數。其病在中焦。實也。當下之即愈。虛者不治。在上焦者。其吸促。在下焦者。其吸遠。此皆難治。呼吸動搖振振者。不治。

【註】此承上文。就氣息以決人之生死。並示肺與別臟相關之診斷法也。吸氣微而數急。因消化器官能障礙者。乃係實證也。下之則愈。然體虛者不可下。則為不治。因心臟衰弱而影響於肺者。其吸促。因肝腎衰弱而影響於肺者。其吸遠。皆為難治。呼吸時全身筋脈振振然動搖者。虛脫之兆。故亦不治。

七師曰。寸口脈動者。因其王時而動。假令肝王色青。四時各隨其色。肝色青而反色白。非其時色脈。皆當病。

【註】此宗內經而示色脈合參之診法也。夫脈證相合者為順。脈證相反者為逆。此不易之大法。至以四時氣候之變遷。謂人體五臟脈色亦當隨之而有所應者。其說詳於內經。此則但引肝之脈色為例耳。理涉玄奧。故不贅釋。

八問曰。有未至而至。有至而不至。有至而不去。有至而太過。何謂也。師曰。冬至之後。甲子夜半。少陽起。少陽之時。陽始生。天得溫和。以未得甲子。天因溫和。此為未至而至也。以得甲子。而天未溫和。為至而不至也。以得甲子。而天大寒不解。此為至而不去也。以得甲子。而天溫如盛夏五六月時此為至而太過也。

【註】氣候冷熱變遷。關係人之生理狀態者至切。氣候變遷失常。則

人將感而成病。故設爲問答之辭以明之。古時中國幅圓窄狹其說當係以我國中原各省爲準。現在世界交通。各人種之身溫組織既有差別。而各地帶之寒熱變化亦迥異。則甲子陽生之說。視爲例言可耳。

九師曰。病人脈浮者在前。其病在表。浮者在後。其病在裏。腰背強不能行。必短氣而極也。

【註】此示脈同病異之辨證法也。初病之人。其脈浮者。爲病在表。病久脈浮。兼有腰痛。背強。不能行。短氣而極等證。此精血虛而陽氣浮。病在裏矣。

一〇問曰。經云。厥陽獨行。何謂也。師曰。此爲有陽無陰。故稱厥陽。

【註】此設爲問答。以釋厥陽之義也。

【解】〔厥陽〕謂虛性興奮之現象也。

十一問曰。寸脈沉大而滑。沉則爲實。滑則爲氣。實氣相搏。血氣入臟卽死。入腑卽愈。此爲卒厥。何謂也。師曰。唇口青身冷。爲入臟。卽死。如身和汗自出。爲入腑。卽愈。

【註】此示診斷卒厥生死之法也。凡卒然厥倒之病。以其脈沉大而滑爲預兆。俗呼中風體質。正實邪實。血氣相搏。發爲衝血。固矣。然有入臟卽死。入腑卽愈之分。其故何也。曰。凡唇口青身冷者。爲入臟。經云。厥不回者死也。身體暖而汗自出者。爲入腑。經云。厥回者生也。

【解】〔脈沉大而滑〕謂血管擴張。血壓過高也。（參看拙著診斷提綱脈理）

〔唇口青身冷〕謂唇口靜脈鬱血。而全身毛細管貧血也。

〔入臟〕謂腦出血也。

〔身和汗自出〕謂膚表機能回復也。

〔入腑〕謂腦初充血。血液隨即環流入臟腑也。

【卒厥】 謂卒然暴死也。其原為腦出血。腦充血。呼吸器或循環器之官能障礙。見此證之病甚多。如痰厥、氣厥、中風、中暈、霍亂、痧、疫、癘、癩等皆是。

十二問曰。脈脫入腑即愈。何謂也。師曰。非一病也。百病皆然。譬如浸淫瘡。從口起流向四肢者。可治。從四肢流來入口者。不可治。病在外者可治。入裏即死。

【註】 此承上文示卒厥時之脈象。及診斷病之淺深趨勢。而決生死之法也。

【解】 【蠟脫】 謂蠟絕也。絕而復者生。不復者死。

【浸淫瘡】 即皮膚傳染病之注稱。外臺所謂轉廣有汗。流繞周身者也。

錢 種 德 國 藥 號

實 驗 萬 靈 戒 煙 膏

漲價聲明
本號發行此膏救濟同胞十餘年來戒除斷癮者不計其數一向售價從廉今因藥料成本一再狂漲不得已於本年四月一日起改訂售價每瓶二元四角（可服七至九日）以保成本如遇國曆一日十五日及農曆朔望均照例九折平時實售無扣尚祈鑒諒是幸

千難萬難
吸煙人神經被煙毒麻醉。則百脈憤張。精神與奮。面色蒼白血虧也。喘咳時作氣衰也。事不戒煙最難。勞神慮也。三者俱備。百病叢生。至此視雅片一服此膏。為第二生命。苟欲戒除。其苦難堪。此膏以滋補強壯為君。以殺蟲消毒為佐。補戒兼施。雙管齊下。一經試服。精神無不振奮。以加強生活能力。使不感疲倦。同時能深入臟腑。逐漸清除煙積而不傷元氣。故此膏戒煙者。精神壯滿。夜眼聰暢。大便通順。食慾增加。而無遺精失眠。腰痠背痛。頭昏腦脹。呵欠頻作。四肢困倦。愈諸苦狀。且因病上癮者。如胃痛咳嗽等症。皆可連帶無治其夙疾。處方神妙。服過來莫不譽為絕無流弊之戒煙聖劑。多年老癮。六七瓶即可戒清。新癮祇須一二瓶便可斷根。源斷絕後。續服數瓶。培養體元。必能倍見康健。當此春氣溫和之際。正是戒煙良辰。有志者宜堅決求戒。保證毫必痛苦。早登康健之域。

絕不覺難
補強壯為君。以殺蟲消毒為佐。補戒兼施。雙管齊下。一經試服。精神無不振奮。以加強生活能力。使不感疲倦。同時能深入臟腑。逐漸清除煙積而不傷元氣。故此膏戒煙者。精神壯滿。夜眼聰暢。大便通順。食慾增加。而無遺精失眠。腰痠背痛。頭昏腦脹。呵欠頻作。四肢困倦。愈諸苦狀。且因病上癮者。如胃痛咳嗽等症。皆可連帶無治其夙疾。處方神妙。服過來莫不譽為絕無流弊之戒煙聖劑。多年老癮。六七瓶即可戒清。新癮祇須一二瓶便可斷根。源斷絕後。續服數瓶。培養體元。必能倍見康健。當此春氣溫和之際。正是戒煙良辰。有志者宜堅決求戒。保證毫必痛苦。早登康健之域。

管齊下。一經試服。精神無不振奮。以加強生活能力。使不感疲倦。同時能深入臟腑。逐漸清除煙積而不傷元氣。故此膏戒煙者。精神壯滿。夜眼聰暢。大便通順。食慾增加。而無遺精失眠。腰痠背痛。頭昏腦脹。呵欠頻作。四肢困倦。愈諸苦狀。且因病上癮者。如胃痛咳嗽等症。皆可連帶無治其夙疾。處方神妙。服過來莫不譽為絕無流弊之戒煙聖劑。多年老癮。六七瓶即可戒清。新癮祇須一二瓶便可斷根。源斷絕後。續服數瓶。培養體元。必能倍見康健。當此春氣溫和之際。正是戒煙良辰。有志者宜堅決求戒。保證毫必痛苦。早登康健之域。

感疲倦。同時能深入臟腑。逐漸清除煙積而不傷元氣。故此膏戒煙者。精神壯滿。夜眼聰暢。大便通順。食慾增加。而無遺精失眠。腰痠背痛。頭昏腦脹。呵欠頻作。四肢困倦。愈諸苦狀。且因病上癮者。如胃痛咳嗽等症。皆可連帶無治其夙疾。處方神妙。服過來莫不譽為絕無流弊之戒煙聖劑。多年老癮。六七瓶即可戒清。新癮祇須一二瓶便可斷根。源斷絕後。續服數瓶。培養體元。必能倍見康健。當此春氣溫和之際。正是戒煙良辰。有志者宜堅決求戒。保證毫必痛苦。早登康健之域。

而無遺精失眠。腰痠背痛。頭昏腦脹。呵欠頻作。四肢困倦。愈諸苦狀。且因病上癮者。如胃痛咳嗽等症。皆可連帶無治其夙疾。處方神妙。服過來莫不譽為絕無流弊之戒煙聖劑。多年老癮。六七瓶即可戒清。新癮祇須一二瓶便可斷根。源斷絕後。續服數瓶。培養體元。必能倍見康健。當此春氣溫和之際。正是戒煙良辰。有志者宜堅決求戒。保證毫必痛苦。早登康健之域。

其夙疾。處方神妙。服過來莫不譽為絕無流弊之戒煙聖劑。多年老癮。六七瓶即可戒清。新癮祇須一二瓶便可斷根。源斷絕後。續服數瓶。培養體元。必能倍見康健。當此春氣溫和之際。正是戒煙良辰。有志者宜堅決求戒。保證毫必痛苦。早登康健之域。

源斷絕後。續服數瓶。培養體元。必能倍見康健。當此春氣溫和之際。正是戒煙良辰。有志者宜堅決求戒。保證毫必痛苦。早登康健之域。

溫和之際。正是戒煙良辰。有志者宜堅決求戒。保證毫必痛苦。早登康健之域。

苦。早登康健之域。

保證戒絕
新癮十天
老癮一月
永不復癮

地址 六馬路新橋電車站西首 電話 九〇七〇一

疾 病 研 究

麻 疹 新 論

周 毅

一 定義

二 病原

三 病理

四 症狀

五 診斷及鑑別診斷

(一) 白喉 (二) 天花 (三) 猩紅熱 (四) 風疹 (五)

斑疹傷寒

六 治療

(一) 內治 (二) 外治 (三) 調護

七 併發症

八 豫後

九 豫防

(一) 中法 (二) 西法

周 毅編著

二十九年三月一日

一 麻 疹 之 定 義

麻疹俗名「痧子」，疹浮小而有頭粒，隨出隨收，不積膿疱，北人謂之「糠瘡」，南人謂之「麸瘡」，越人稱「痞子」，閩粵之間稱「麻子」

；其稱謂不同，病則一也。小兒幾無能免此疾患，其傳染之迅速，流行範圍之廣大，他病無其匹者。然人羣中約有百分之三具天然免疫力；而一次患過，終身可得免疫，第二次患麻疹者，則所罕觀。

二 麻疹之病原

麻疹病原，中西解釋，各不趨洽。因我國以六淫氣化為說。麻疹病原，論其表，屬六淫之風熱；論其本，為先天之胎毒。雖吾國各家學說，亦紛紜各異，然以胎毒為焦點者，則主張僉同。如歸納各家所論，約為四端：一、胎毒，二、六府積熱，三、天行時氣，四、感寒傷食恐懼。前二項為麻疹之病原，後二項為麻疹之誘因。

歐西醫學對於麻疹之病原至今尚未確悉。然現今學者，多謂係一種濾過毒，為今日之顯微鏡尚不能窺見者；另一說，或係特種之鏈球菌所起。然麻疹為一強力之傳染病，則無二意，今可作一簡單之試驗如下：即將麻疹病兒於卡他期中之口鼻排泄物接種於健兒，健兒如尚未患過麻疹，立即傳及而發麻疹。因病兒卡他期中口鼻排泄物中含有麻疹之病毒也。

麻疹與年齡之關係，六月以下之嬰兒，不易感傳，一月以內，尤其罕見。因嬰兒之血液中含有母親賜予抗麻疹之免疫力也。一歲至六歲傳染最多，約占百分之七十五，七歲以上則逐漸減少。

三 麻疹之病理

麻疹之病變最特殊者，乃在皮膚及粘膜。皮膚則於患處發炎，因血清、噬細胞、赤血球等滲出，刺激周圍之血管，皮膚則起浮腫，繼則表皮脫落，滲出物之殘質吸收而歸消滅。粘膜之卡他炎亦與皮膚之病變相同，而來鼻塞流涕，目紅含潤咽腫咳嗽，氣管枝發炎等病變。

四 麻疹之症狀

麻疹大概流行於春冬兩季，小兒罹此患者，每以感冒爲之誘因，其病前證狀，與流行感冒傷風，幾完全相同，故病家每以重傷風而不注意，任令吹風，不知忌避，茲述其病狀如左：

(一) 潛伏期 大多爲七至十二日，先來食慾不振，間有咳嗽，倦怠嗜睡，下午微熱，於最後數日，每日體重減輕，是謂「慕尼爾」氏 (Meunier) 徵。若小兒在感傳中又受風寒者，則潛伏期中，亦即發熱。

(二) 前驅期 此期鼻塞增加，噴嚏流涕，目紅含潤，咳嗽增多，熱度高昇，或嘔吐泄瀉，甚則腹痛，咽喉乾痛，口內紅腫，硬顎上恆見小紅點，最特殊者爲上臼齒相對之頰內粘膜上見白色或青白色點，周圍有紅圈，此即科潑力克氏 (Koplik) 斑點，此係一種早顯而恆有之特徵，患麻疹者百分之八十至九十均見此點，在診斷上甚爲重要。然在健碩之嬰兒，偶有不見斑點者。

(三) 發疹期

疹點發現 自前驅症候發生以後第三四日，熱度升高，疹點遂現。最先見於顏面，口眼四周，頭部及耳壳前後，次及頸部軀幹，延至四肢，以顏面軀幹特爲顯明。通常從疹點初發，越一二日，蔓延遍及全身各部，此乃發疹極盛時期。疹點初現之時，圓形大如粟粒，逐漸加多，變爲橢圓形，各點四周，屈曲如鋸齒狀。其後陸續發生，新舊各症，互相併合，變紅塊狀，稍爲隆起。雖併合如塊狀，然細細辨認，各個疹點可辨，其間有空隙之康健皮膚。疹點之顏色，初期鮮紅，逐漸疹點增多，顏色漸濃，呈暗赤色。

燥熱證狀 發疹極盛，面作浮腫狀，結膜炎增重，眼瞼腫脹，怕光流淚，如濃之眼滓結成痂皮，上下眼瞼，緊緊膠着，較前驅期更甚。鼻粘膜分泌增多，色黃粘稠。聲音嘶啞，咳聲粗厲。舌苔乾燥，膩白或灰褐色。胃呆不欲食，口渴索飲甚煩。凡此症狀，國人混稱「火

甚燥熱」，西人則謂各種粘膜炎症增重也。

(四) 恢復期 疹點逐漸消失，色彩亦逐日褪除。其消褪之定序，先發部位先退，間有參差者。疹褪留有棕色斑點，旋即落屑如糠秕，三至七日，全部落屑告終。眼瞼及鼻腔粘膜之充血及腫炎亦消褪。前帶厚苔之舌，復形潔淨光紅。然呼吸器各部，支氣管及喉頭氣管炎症，雖較輕快，尚多存在。幼兒及衰弱者，屢自支氣管炎轉為肺炎。痧疹初退，晚上遍體多汗熱勢低降，一二日，即恢復常溫。漸有食慾，睡眠安靜，元氣逐漸恢復。病兒失音，雙目怕光，實為麻疹之特象，倘於此時熱度仍不減退，則有併發病矣。

五 麻疹之診斷及鑑別診斷

麻疹之要點，為口、眼、鼻之卡他症狀，口內有科潑力克氏斑點，發熱，斑丘性皮診及血液及尿之特象。因其變化尚少，故診斷不難。

其他諸症當無鑑別者，為白喉、天花、猩紅熱、風疹、斑疹、傷寒、並其他斑丘性皮疹。茲逐項詳述於后：

(一) 白喉 麻疹與喉部白喉症之鑑別，最為重要。其鑑別診斷上之要點，為無科潑力克氏斑點，咽喉分泌物塗抹中，顯微鏡下能見白喉桿菌，有時全片純為白喉菌。其細菌培養之檢查，則更精確。

(二) 天花 天花易與麻疹混合者有二：一為發生麻疹狀之先驅疹者，極少見於兒童，且口內無科潑力克氏斑點，眼鼻部不見卡他症狀。一為融合天花，面部腫脹，痘瘡於丘疹期內，顆粒不分，眼眼水紅，此時難與麻疹鑑別。然融合天花，口內無科潑力克氏斑點，祇在顎及咽門，有粘膜疹而已。天花疹發則熱退，麻疹則不然。

(三) 猩紅熱 猩紅熱為點狀瀰漫性紅疹，面部較少，其中央無疹；限於眉間，顴頰及前額諸部。兩頰深紅，口鼻環周之皮膚缺乏血液，特別

蒼白，而呈所謂環口蒼白圈(Circumoral Pallor)。梅樣舌，此為猩紅熱之特症。口內無科潑力克氏斑點。狄克氏(Dicks)試驗為正反應。

(四) 風疹 風疹之潛伏期較長，侵襲症狀極輕，口內無科潑力克氏斑點。皮疹發現迅速。頸後淋巴腺腫脹(此為特徵)。病程較短，祇有一至三日耳。尿內二氫反應為負性，而麻疹則為正性。皮疹將發之頃，淋巴球比較的增多，而麻疹則反減少。

(五) 斑疹傷寒 斑疹傷寒尚見於大江之北，可與麻疹混同。惟斑疹傷寒在面部斑疹極少，且非首先發現之區，口內無科潑力克氏斑點。血液檢驗外，斐二氏(Weil-Felix)試驗為正反應。

六 麻 疹 之 治 療

(一) 內治 麻疹之治療，須明主要原理，其病毒由皮膚外達，主要之治療，因勢利導，儘使麻疹透達，此言其常也。若大便瀉瀉，邪機不達表，面色皸白，疹點不透，氣急鼻扇，邪熱閉於肺，急當救逆，此言其變也。至若兼治併發症，則五花百門頭緒多端。國醫擅長此病，救逆亦所專長。古人傳遺若干方劑，用之得當，效若桴鼓，如響斯應也。

如麻疹初起，頭痛發熱，咳嗽，顏面已有疹點而未暢發者，則可用荊芥湯，因荊芥為發汗解熱之藥，有透達麻疹之功。

麻疹熱甚面紅、目赤、咽痛、疹點稠密，色帶紫暗，鼻衄，煩躁口渴，脈洪大快速，舌尖紅者，可用敗毒湯。

麻疹兇毒，毒重表閉無汗，疹點不能透達，胸悶煩躁欲死者，可用麻黃梔子湯。

麻疹發熱，胸悶，疹點不透，皮乾無汗，毒悶心胸，煩躁欲死者，可用芫荽酒。

麻疹熱高煩渴，咽喉炎腫，咳嗽喉痛，湯飲難以下嚥，呼吸困難者，

可用甘桔萎湯。

惡性麻疹，疹出渾身如錦紋，色赤中略帶紫黑，熱高，氣急，咽喉疼痛，目赤，鼻衄，便閉溲赤等，則用大青湯。

麻疹發出後，高熱不退，繼發肺炎，喘息咳嗽，鼻翼扇張，煩渴，咽痛，痰粘不鬆者，可用加味麻杏石甘湯。

茲再以其藥効分類言之：

透發藥：麻黃 葛根 荊芥 防風 西河柳

上列諸藥，皆透發痧子主要之品。惟麻黃必須無汗氣喘，然後可用。葛根荊芥辛涼解肌，一直可用至熱退為止。荊芥防風，則限於痧子未透暢時可用，痧子已密佈，便不須此。柴胡性升，痧子不透，下而便瀉者宜之。西河柳亦限於麻疹不暢時可用。

寒涼藥：石膏 黃連 黃芩 竹葉 梔子 蟬蛻 元參

麻疹大法當以寒涼清透。熱不甚，證勢平善者黃芩以下五味，用於葛根荊芥透發藥中為副藥，極穩妥。石膏必須壯熱煩躁大渴可用。黃連苦寒，可以消炎，中等熱以上（攝氏表三十八度半至三十九度間）宜之。

宣肺藥：川貝 象貝 桑葉 橘紅 桔梗 前胡 蘇子

麻疹必見咳嗽，以咳劇暢爽為佳。暢爽則肺中風邪有宣達之路，故麻疹之咳嗽，只須上列各味，用於透發劑中為重要之副藥。咳聲不暢而短，桔梗尤良。前胡用於鼻流清涕時良。若涕濃化黃色，便不宜用。蘇子宜於咳而氣粗微急，若氣急甚鼻扇，則麻黃所主，非蘇子能濟矣。

化痰藥：括蕁 橘紅 半夏 地枯蘿 萊菔子 冬瓜子

麻疹必咳嗽，咳嗽痰必多，此是副症，於主藥方中，酌加右藥一二味已足。

消導藥：枳實 查炭 腹皮 穀芽

麻疹病機着重在呼吸系統，然消化機能亦受影響。若前驅期多食停積，或病起引起消化機能衰減者亦停積。此當用消導法如上列諸藥。
。不可貿然攻下。

分利藥：赤苓 豬苓 通草 車前 澤瀉

小便短赤者，用此一二味為副藥。

止瀉藥：無價散 炮薑 扁衣 建麩

麻疹大便泄瀉，為邪機下陷，疹點不得透達，則前途必有病變。無價散止瀉透發有特效，其分量以一分為率，最重二分。炮薑止瀉，必須泄瀉之屬寒者，如所瀉色白，質稀薄而無臭，或所下完穀有不消化之物，方可用之。扁衣建麩為止瀉副藥。

清咽藥：牛蒡 元參 馬勃 錫類散 珠黃散

麻疹咽喉紅腫作痛，乃風熱之邪蘊於肺胃，西醫所謂喉頭粘膜炎。上列諸藥隨可加用於主要藥方中。喉痛甚，用錫類散或珠黃散吹口。

涼血藥：犀角 丹皮 生地

麻疹壯熱噴燥無汗，舌質乾絳，邪毒熾盛。犀角為主藥，生地丹皮為副藥，有特效。

鎮驚藥：鈎鈎 僵蠶 大地龍

麻疹大熱，手足瑟瑟動，如作驚之狀，此非驚風，乃大熱神經受炙引起之神經症狀。無汗當汗，大熱當清，酌加以上諸藥為副。

右列各藥，雖分列各系，其交互配合，則不能呆板。如麻黃石膏恆同時並用。當麻疹壯熱無汗煩躁口渴之時，僅用麻黃，不用石膏，竟不得汗；僅用石膏，不用麻黃，亦不中肯。宣肺化痰藥，隨方應用為副助。輕劑透發，隨在可以為佐使。又消導，利溲，止瀉，鎮驚諸藥，見症運用可

也。

(二) 外治 麻疹治療，應用藥物，既如上述。惟此病必須助以外治，使疹點易於透發。吾人大可利用西醫之噴霧吸入器，以國產透發性藥物，溶化爲液體，配合西醫芳香藥劑，如此處置，中西療法，一爐共治，其效更爲美善。撮舉其功效如下：

- 一、催疹透發 國產藥物，有透發性，幫助疹子之透發，有扶正托邪之功能。
- 二、助肺呼吸 西國藥劑，具揮發性，幫助肺臟之呼吸，有吸養排炭之作用。
- 三、濕潤空氣 麻疹惡乾燥之空氣，用此法，則霧氣瀰漫，空氣含潤，合於麻疹之病理。
- 四、溫暖氣候 麻疹喜溫暖之空氣，用此法，則水蒸氣瀰漫床帳氣候和煦，合於麻疹之病理。
- 五、闕除穢濁 麻疹忌穢濁之空氣，用此法，則芳香之藥性瀰漫，辟除穢濁之氣也。
- 六、弭除病變 麻疹出不出，或出不透，則生命危險。所以出不出者，或因邪機下陷而大便瀉；或因正氣虛弱，而面色白，或因氣候寒冷，而汗腺閉。於是後步之變化，氣急鼻扇。再進而發支氣管炎及肺炎等症矣。以此法用之，能扶助正氣，升提邪毒，溫和空氣。疹子一出，病變即可轉好矣。

(三) 調護 麻疹調護方法，至關重要。醫家治療雖中肯綮，而病家如調護不宜，病亦不得愈。故小兒出麻疹，醫家之治療，病家之調護，兩俱中較，乃獲安全。西醫治此病，無主症療法，所謂治法，全是調護方面事，可知麻疹之調護，十分重要也。病家所應注意者，述之如下：

- 一、病室溫度 病室之溫度，須不暖不冷，而保持其平均，大抵以稍

高爲佳。

二、病室空氣 以新鮮清淨爲佳。病孩雖不能吹風，但空氣則必須流通。

三、病室氣候 以濕潤爲佳。常用蒸氣噴霧器，在病房中噴霧。同時使病孩吸入蒸氣。此在治療中最爲重要。

四、病室光線 不宜過於光明。

五、衣着覆被 麻疹最宜溫暖之氣候。衣被亦須帶暖，不可吹風。然以適可爲當。

六、飲食菜蔬 以流動易於消化者爲佳。病癒之後，亦須注意。

七 麻疹之併發症

麻疹最普通之併發症，莫如枝氣管肺炎；其次則爲中耳炎，痢疾，及假膜性咽喉炎；白喉，猩紅熱亦可併發。然於五歲以上之兒童，併發症即少見。

最重要之併發症爲肺部諸病，其中最多者，爲枝氣管肺炎，於冬春兩季尤爲多見。自麻疹之侵入期起，無論何時皆可發見，但於疹點發足之時，最易發生。麻疹中併發肺炎者，每因患害未癒盡，以致日後發生枝氣管擴張症，或肺組織起纖維變化，終身受累。枝氣管肺炎於三歲以下幼兒最多。統計疫病流行之際，平均患此併發症者，自百分之十六至四十四之衆；因此殞亡者，多至百分之十至五十！有者兼患胸膜炎，且因此又併發膿胸者。

咽喉部於麻疹，自始原已發炎，惟又可併發假膜性炎。有者於疹點方盛之時，併發膜性炎，此種大抵由鏈球菌所致；有者併發較遲，則多係白喉菌侵襲而起。咽喉兩處未必同時發病，咽部此種併發症，有時可多至百分之二或三云。

口腔亦可併發炎症，如瘍性口炎，走馬疳等。後者幸不多見，患者多不救。

腸內併發症亦極普通。輕者，僅如消化不良之腹瀉；重者兼發痢疾，熱天更為多見。痢疾在三歲以下者併發較多。著者亦遇傷寒症發於麻疹之發疹期中，腹瀉，發熱，然經過極為良好。

中耳炎亦為常見之併發症，約占百分之十二。

眼部病患麻疹亦甚多見。慢性眼結合膜炎，即於病後仍可續患。角膜可發潰瘍，重者全眼發炎，因此失明者有之。眼部沉重之併發症，約有百分之四。

頸部淋巴腺於病中腫脹，但鮮膿潰者。此種腺腫於病後消退極慢，可延數月之久。胸中膈之淋巴腺亦然。有時腺腫係結核性者。

神經系者，抽搐鮮見於麻疹之初，見於疾病進行之際，且見於嬰兒。有時因中耳炎，或得枝氣管性肺炎而起。腦炎，腦膜炎，脊髓炎或神經炎等，亦有偶患者；腦膜炎且有屬結核性者。

其他諸部如皮膚及腎部之併發症，在麻疹概屬少見。

麻疹以後，或於病中暴發，殊難救治者，是結核症也。原患結核症者，在麻疹中對於結核菌素之反應概變負性，約於病後二星期中，始仍復原為正性。然每乘患麻疹之機會，肺部結核病可從此散佈，或歷若干時後，多於數月以後，發生骨癆，最常見者為髖關節之骨癆。

八 麻疹之豫後

麻疹死亡率頗不一致，大抵為百分之四至六；惡疫流行之際於育嬰堂，孤兒院中等，死率可超過百分之三十。

死亡者，大多數均在三歲以下，死於二歲以下者，比死於五至十歲之間者，超過十至二十倍。

病前之體質，衛生及環境狀況，並病中之調治，均於豫後有密切關係。

死亡最大之原因，為枝氣管肺炎，皮疹消退，而熱度仍高，即為枝氣管肺炎最著之表徵。

起病時熱度即高，或則熱度持續不退，直至疹點發出，均非佳兆。皮疹已發足，熱度反升高，或皮疹消退而熱仍不退，均非好象。皮疹發現過遲或發而隱約不顯，為數頗少，或係出血性皮疹，或出而忽隱，此皆因血運不良，心力衰退，均非佳兆。疹色鮮紅，滿佈全身，但不盡併，粒粒分明，緩緩分佈者，前途樂觀。抽搐，腹瀉，嘔吐，均惡，如於嬰兒尤為凶險。麻疹將愈，現沉劇之喉炎者，亦不佳。

九 麻 疹 之 豫 防

(一) 中法

麻疹流行時，用紫草根作煎劑內服，連服四五劑，可免疫，即使傳染，亦可無生命之危。

查紫草根含有 Lithospermumtoh($C^{30}H^{30}O^{15}$)及 Shikonin($C^6H^{10}O^6$)之成分。為清血解毒變質藥，兼有利尿緩下作用；賞用於斑疹、痘毒、毒瘡、頑癬、小兒瘡毒等症。有涼血活血，及增進免疫力之功效也。

(二) 西法

麻疹傳染頗速，公共豫防極其緊要。三歲以下，及脆弱嬰兒，或已患結核幼兒皆須慎避。麻疹流行之際，小學校內如發現斯疹，則凡未患過麻疹之幼兒立令暫時輟學。待二星期後，倘歸家不發麻疹者，可令續學。如家內有一兒患麻疹，該家其餘學童凡未患過麻疹者，皆須同時離校，否則恐將散佈此病於校內。

隔離之時期，麻疹經過良好者，自發疹後三星期，即可歸校。倘得肺

炎者，則須五六星期之休養。

病室於病兒告痊後，即宜洞開門窗，使通風二日，室內器物皆須洗淨。床褥枕被，一概更洗。

豫防注射自民國七年（一九一八），尼可里（Nicolle）氏及康西耳（Conseil）氏提創用該症告痊人之血清注射，迄今傳用甚廣。病後恢復期內之第八或第九日，抗毒素之含量最高，此時抽血，以供注射，效用最著。此種血清，如於接觸病人後五日內射之，則可完全不發麻疹；但四五星期後，其免疫力即漸減退。倘於第六至第九日內射之，雖有仍發麻疹者，然可使病情大形減輕。血清劑量，三歲以下者，三至五毫；三歲以上，其劑量為其年齡之二倍。注射全部血液亦可，但劑量較血清須加一倍。無論血清血液，一概肌肉注射。諸恢復者之新血清可併合一管，貯於冰箱內，至一年之久，猶著功效。

此種由豫防注射後所發之麻疹，可稱薄弱性麻疹（Attenuation Measle）。其潛伏期亦較長，約十四至十七日。發熱甚微。卡他症狀極輕，易於失察。科潑力克氏斑點有無不定。周身症狀均已輕善。然其症雖輕，患過以後，亦得終身免疫。換言之，欲得永久的免疫能，則血清注射不可過早，其量亦不可過大，必使小兒發現麻疹之數種症狀也。

周 毅 二十九年三月一日

非 暑 論

陳 公 明

古人以外感病原因，分作六氣；曰風寒、暑、濕、燥、火也。然暑、與火，到底有何分別耶？暑本乃夏令之氣，其時見空氣溫度升高，是顯見其熱之理明甚。其所謂火者，亦不過是熱之意義；考古人治火之藥，用三黃石膏之類，是可見其所謂火者，即熱也。從物理之研究，火為熱之體，熱為火之用，火乃積熱生光而又能燃燒者；故現在暑與火當合併為熱之必要。

但古人把暑與熱分開，潔古曰：「中暑為陰症為不足；中熱為陽症為有餘」。李士材曰：「香薷飲為夏月發汗之藥其性溫熱，只宜於中暑，若中熱服之反成要害」。此可見潔古與李士材對於暑與熱分而不同。然考暑為夏令之氣，其時見空氣之溫度升高，是顯見其熱之性也。故暑與熱其性同。古人將暑與熱分而別之此實是大錯！考香薷飲內用香薷厚朴是為發汗除濕之用。乃是為夏月治傷濕之藥。蓋夏月長日炎蒸，濕土司令醫書均謂每年冬至後秋分前皆是濕氣，而夏月為濕氣最重之時；其時見空氣中水蒸氣常飽和之狀態，是可見其證也。空氣之水分太多，不能容納人身汗液之蒸發，因此人體之水分不得適量排泄，則濕病成矣。健康人之排泄汗量，通常一晝夜有二磅之多，勞作之人及夏日猶不止此。濕氣濃重之時，則人身汗液之已出汗腺者不得蒸發，未出汗腺者阻於腺口，未蒸發之汗，不得復出。其勢必轉內蒸，神經失其清靈，致人神昏頭裹目蒙，因濕氣之阻於腺口刺激皮膚之毛囊肌收縮而呈身惡寒之狀態或全身痠麻，繼之體溫鬱聚於皮膚而致膚表發熱。由於濕熱之故致肌肉寬緩皮下血管擴張而波及心

力則致人發生身重難於轉側，骨節痠痛，皮膚浮腫觀乎穿樹膠鞋者，足腫襪濕，乃因空氣不能由樹膠透過出入，而足之汗液於是亦不得蒸散之故；由此可明濕病之理矣。是以用香薷飲發汗除濕，其理明矣。古人因不明濕氣傷人之病理故曰：「中暑」現在急須更正之必要。

內經云：「脈虛身熱得之傷暑」這正明示暑乃熱之理也。蓋人身因熱汗出，而陽散；陽散其氣必虛，此即由於熱極，心臟因拍動然甚，而呈疲乏之狀態，故其脈虛，甚則脈伏。脈論所謂「熱至其極也，脈反伏。」即此之理。當用生脈散。以五味之酸收散氣，以麥冬清涼生津，以人參補氣。金匱治中暑有用白虎加人參湯，張仲景製竹葉石膏湯以治暑煩熱渴脈虛者；此亦示明暑乃熱之理也。豈可用香薷飲辛熱耗洩之藥，以更虛其氣加其熱而送其命乎？此皆因潔古與李士材誤認「濕」病為「暑」病致「暑」與「濕」混而不明。現在吾人應用近代理化科學的知識將「暑」與「火」之性拼合為「熱」。更正香薷飲治病所能發生效用者，乃是傷濕之病也。

整理於一九三九年九月三日

科學提煉國藥已獲成功

抗戰軍興以來。內地交通阻隔。外匯高漲。軍民所必需之西藥。用量驟增。價格奇昂。國藥專家王藥雨。化學專伉鐵備等。殫心研究。利用川省土產藥材。加以科學提煉。已獲成功。計有硫酸鈉、硫酸銅、硫酸鐵、硫酸銀、生理食鹽、純淨硫磺、植物凡士林七種。又特效成藥三種。為健胃靈。（主治腸胃疾病）標準藥膏。（主治皮膚疾病）標準消腫膏（主治各種發炎腫脹）三種。經各方採用。均認為與舶來品無異。而售價則僅什一。如大量製造推銷。可望杜塞漏卮不少。

論 雁 來 風

金 少 陵

夫六淫之邪。風居其一。內經有云。風爲百病之長。又曰。風者善行而數變。稽諸素問有風論一篇。詳言其因風傷人之爲病。病各異而名不同。略如以春夏秋冬及季夏之傷於風邪也。分爲肝心肺腎脾五臟之風。其有症見鼻柱壞皮膚瘍潰者。名爲癘風。若見食飲不下。隔塞不通之證者。名爲胃風。此外爲證因證狀之各殊。有偏風、腦風、漏風、內風、首風、腸風、泄風之名。幾難攬指數。並無以雁來風爲病名焉。嘗讀沈氏尊生。載有雁來風一證。症狀皮頑肌燥。至秋癢發。治用羌活白芷散。或加味逍遙散等方。惟言甚簡略。惜於斯病之起原。未能闡發其理。按此症本不見於有明以前之醫書。無從考證。其以雁來風名病者。緣其人平素一身不癢。每逢季秋燕去雁來之際。方纔癢發。逾時不藥亦愈。察其治法。所以用羌活白芷散者。爲祛新舊之風也。或用加味逍遙。養血以驅風。試徵諸古人治風先治血。血行風自滅之訓。亦可謂精切矣。

以愚意度之。大抵雁來風之爲病。其人先感炎夏暑氣。皮毛已傷。新秋復受燥氣。伏藏於皮膚之間。傷及營血。至新秋辛金極旺之時。風高氣燥。草木皆肅。正詩豳風所謂。九月肅霜是也。人受此嚴肅之風氣。皮頑肌燥。自然癢發。况營分受傷。血不能潤澤皮膚也。內經曰。諸癢痛癢。皆屬於心。又曰。諸血者。皆屬於心。是症若無燥氣伏藏於皮膚之間。先傷營血。祇季秋之風氣乘之。斷無應時癢發之理。所以春夏冬三時不癢者。以皮膚既無伏藏之燥氣。營血未受戕傷故也。至主治以羌活白芷。爲祛

風之要藥。是未能體風之用，恐服之有火隨風起。風借火威。其勢將蔓延而不已。

愚意以爲內經所謂風淫於內。治以辛涼。佐以苦甘。及燥者濡之諸法。可宗也。惟自愧管窺之見。所論又爲皮膚之疾。誠莊子所謂小知間間。小言詹詹是也。旅京時曾與韓君論及。知不值博雅之一啞耳。

消 息

新 中 國 醫 學 院 近 況

上海王家沙花園路。新中國醫學院。辦理完善爲東南有數之國醫學府。近有香港華南國醫學院爲推進院務起見。特派院董黃花節氏到滬。於四月四日下午。往該院參觀。以資借鏡。當由該院院長朱小南及祕書。盛毓駿教務長包天白事務主任黃寶忠等招待。導往各部分參觀。旋款以茶點。並贈院刊及各屆畢業紀念冊。以聯情誼。據黃氏表示。該院課程完善。設備充實。足資効法。茲將華南國醫學院院長黃焯南致該院函。附錄於下。

逕啓者：焯南前承政府之督促。暨各界名流之贊助。不付綿薄。曾在廣州設立華南國醫學院。以期培育健全國醫人材。而保固有國粹。迨廣州市淪陷後。即在港復課。迄今已兩年於茲矣。第以發揚國醫。作育青年。責任至爲重大。非力圖振奮。共同策進不爲功。素仰

貴院爲醫校柱石。維新前鋒。冀挹

北斗之清芬。用作南針之借助。茲特由敝院院董黃花節先生蒞滬。專誠候教。敬請將校務之設施。暨各科教材大綱。及講義編纂進度之標準。各項中心計劃。詳爲面釋。充分予以利便。俾資借鏡。而便改進。實深緬感。

又聞該院本學期男女生共二百三十餘人。內四年級四十餘名。定於四月二十八日舉行畢業試驗。屆期將由各國醫公團派員監試。以昭鄭重云。

藥 物 研 究

龍 骨 龍 齒

章次公編著

名 稱	別 名	龍骨別名陸虎遺生。又名開伽骨。
品考及產地	蘇頌曰。李肇國史補云。春水至時。魚登龍門。蛻骨甚多。人採爲藥。豈龍骨卽此魚之骨乎。寇宗奭曰。諸說不一。終是臆度。曾有崖中崩出一副皮骨。頭角皆備。不知蛻耶斃耶。按蘇寇之說。較爲切實。然亦是臆想。據和漢藥物學。謂在最古代。有如象樣獸 (Mastodon)。埋沒土中。其骨骼化石。往往從地下掘出。卽今之龍骨也。龍齒與龍骨。同生於一體。周伯度曰。龍骨以白者爲上。齒以蒼者爲優。生則微黑。煨之則如翡翠色可愛。較白者功用更捷。——本草思辨錄。產於河北四川山西等處——藥物道地錄。	
形 態	龍骨作巨大之塊狀。其色白者多。龍齒爲齒狀物。其完整者。各枚行列整齊。外表光澤如瓷。而內細鬆如龍骨。	
修 治	酒浸 火煨 打研生用	
性 味	味甘淡	
成 分	主成分爲磷酸及碳酸加爾叟謨鹽類等。——臺灣皇漢醫界第三十一號。	
用 量	龍骨三錢至兩許。龍齒三錢至六錢。大量兩許。	
效 能	(1) 龍骨之主治 本經心腹鬼疰。欬逆洩痢膿血。女子漏	

下。癥瘕堅結。成小兒熱氣驚癇。別錄心腹煩滿恚怒。氣伏在心下。不得喘息。腸癰內疽陰蝕。四肢痿枯。夜臥自驚汗出。止汗縮小便。溺血。定魂魄。甄權逐邪氣。安心神。止夜夢鬼交。虛而多夢紛紜。止冷痢。下膿血。女子崩中帶下。時珍益腎鎮驚。止虛癆。收濕氣脫肛。生肌斂瘡。龍齒之主治。本經大人驚癇。諸癲癩疾狂走。心下結氣。不能喘息。小兒五驚十二癇。別錄小兒耳熱不可近。大人骨間寒熱。殺蟲毒。甄權鎮心安魂魄。日華治煩悶熱狂鬼魅。(2) 倪朱謨曰。龍骨安心神。定魂魄。斂虛汗。收脫泄之藥也。周士和曰。其體堅重。其質粘着其性收斂。故本草主小兒驚癇。大人癲狂。神志浮越不寧之證。以此寧之。如日華言能斂虛汗。止泄瀉。滲水氣者。總因收攝斂瀉。瀉以固脫之義。如別錄又治遺精淋濁崩漏帶下骨脫諸病者。亦斂閉精氣。收攝神藏之功也。以上諸病。倘因血熱積滯為患者。法當通利疏泄。不可使用此止瀉之劑。恐積滯瘀血未清。反能為害也。——本草彙言。周伯度曰許叔微云游魂不定者。治之以龍齒。古方如遠志丸龍齒清魂散平補鎮心丸。皆收攝之劑也。——本草思辨錄(3) 藥徵曰。(龍骨)主治臍下動也。旁治煩驚失精。和漢藥物學曰。龍骨鎮靜精神激動之心悸。止發覺之惡夢。並治健忘虛汗。下痢遺精。子宮出血帶下等。且能制食際分泌之汗。

編者按 古代視龍為神祕之動物。飛騰變化。莫可端倪。故謂其遺骨有潛陽育陰之妙。凡人身氣血滑脫。心神耗散。腸胃洞泄。皆能愈之實則本品之用。重可鎮怯。瀉以固脫。八字盡之矣。龍齒與龍骨。雖同生於一體。然龍齒之用。偏於鎮怯。龍骨牡蠣。近世每并用。論潛鎮之功。則牡蠣優於龍骨。收斂之功。則龍骨優於牡蠣。龍骨既以收斂見長。以入丸散。較有用處。入湯藥實煎不出何等氣味。古人以溫粉止汗。具見龍骨收斂之效。在外治矣。

石 鍾 乳

章次公編著

- 名 稱** 學名 Stalcte ○別名 留公乳 虛中 蘆石 鵝管石 夏石 黃沙石 ○釋名 時珍曰。石之津氣。鍾聚成乳。滴溜成石。故名石鍾乳。蘆與鵝管。象其空中之狀也。
- 原 礦 物** 酸素鹽類中之碳酸鹽類礦物。
- 品考及產地** 吳儀洛曰。出洞穴中。石液凝成。垂如冰柱。如鵝翎管。碎之如瓜甲光明者真。——本草從新。古方藥品考曰。其形如指。色白或褐。又如翅管。中空透明輕虛者。名鵝管石。俱爲上品。形長大質粗中充實者。爲下品。時珍曰。按范成大桂海志所說。甚詳明。云桂林宜融山洞穴中。鍾乳甚多。仰視石脈涌起處。卽有乳牀白如雪。石液融結成者。乳牀下垂。如倒數峯小山。峯端漸銳且長。如冰柱。柱端輕薄。中空如鵝翎。乳水滴瀝不已。且滴且凝。此乳之最精者。以竹管仰承取之。鍊治家又以鵝管之端。尤輕明如爪甲者爲勝。小泉榮次郎曰。凡含有碳酸之水。透過石灰質之地層。溶解爲碳酸石灰。此水自洞穴之上。滴瀝下降之際。接觸空氣。放散溶存之碳酸瓦斯。而析出結晶性之中性碳酸石灰。漸次下垂。凝結而爲冰柱狀。是爲石鍾乳。又其滴瀝而下。再由下盤旋凝結而上。則爲石筍。亦稱石牀。鍾乳因其生成之狀態。自昔卽有種種名稱。別之如下。孔公石一名孔公石。次於鍾乳。狀如牛羊角。中有孔附附垂於石。如木之有萌擊。殷

孽一名薑石生於石上。如木之孽。亦盤結如薑。此即孔公孽之根也。但以附石生而粗者爲殷孽。接殷孽而生。由漸空通者爲孔公孽。接孔公孽而生者。爲鍾乳。蓋殷孽如人之乳根。孔公孽如乳房。鍾乳如乳頭也。石牀一乳牀。或稱逆石。亦作石筍。鍾乳水滴下凝結而生。儼如竹筍。久則漸與上乳相接爲柱。石花一名乳花。水乳凝石上。散如霜雪。日久積成如花者也。土殷孽一名土乳。即鍾乳石之生山崖土中者。人亦掘爲石山。以供玩賞。不知其爲土鍾乳也。——和漢藥考。

- 形 態** 爲白色或灰白色之冰柱狀鑲石。長短不一。其橫斷破碎面。有自中心向外作放線狀之條理。透明。質重。
- 修 治** 研煨。
- 性 味** 味淡。
- 成 分** 含有碳酸鈣 CaCO_3 。
- 用 量** 一錢至八錢。
- 效 能** (1) 本經欬逆上氣。明目益精。下乳汁。別錄。益氣補虛損。療脚弱疹冷。甄權主泄精寒嗽。壯元氣。大明補五勞七傷。(2) 張石頑曰。肺氣虛寒。咳逆上氣。哮喘痰清。下虛脚弱。大腸滑泄不禁等疾。功效無出其右。本經主欬上氣。取其性溫而鎮墜。則氣得歸元。而病自愈。——本經逢源。黃宮繡曰。虛滑遺精者。服此立能有效——本草求真(3) 林天定曰。內服其粉末。可治喘息腸炎。及乳閉等病。——台灣藥物學。用作眼科藥。——和漢藥考。
- 編 者 按** 本品在古代僅供方士及士大夫等服食之用。入藥甚鮮。近世亦祇於感寒欬逆方中。用爲副藥。其實本品可用於肺癆。吾

家太炎先生。謂久服則有促進病竈石灰化之作用。并謂六朝人常服鍊製之鍾乳。故多病癰疽發背。而肺病則絕少。近人不服石鍾乳。少疽發於背之變。而肺癆則比比皆是矣。太炎先生論肺癆消長之故。雖不得為定論。然以石鍾乳治肺。則絕合學理。石鍾乳一經鍊製。其性極熱。是以易發癰疽。若生用或略煨。則其性微溫。雜滋陰藥中同用。決無流弊。讀者毋疑慮為也。

本品又為鑛物性吸着劑。亦不易溶於水。解以吞為佳。

上海		張延德國藥號	
<p>不驚白女寒...一治 神風帶人水胸氣霍切二 效。下子殺痞厥亂虛十 。一。宮不。吐勞種 切臍虛化脊骨瀉。陰疽 疑腹寒。痛蒸。潮日腫。 難作。日。久膨熱中。三 大病。無勝膈。內脾十 。小。子。脫反心障泄種 治兒息疝胃腹。風疾 之急。氣。疹尸消疾 無慢赤。胃痛厥渴。</p>	<p>金液丹</p> <p>津而補雋此 止不而品參 渴寒不。稟 之滯。味峨 力。則。甘眉 。有。其性之 兼異功平靈 寬於超。益。秀 胸元諸益。為 利參諸氣。天 膈。黨化。痰生 之具。痰生 用生清。之</p>	<p>等腸糜。房。崙 症風立本而或治 。下見堂成。因內 血奏此。七情外 脫效散。若不鬱疾 肝。無。早疑。感 痛一論。早治。受 。痔外。食積風 腸漏久痛積酒溼 癰腫近瘁酒溼 臟。難飽燥 毒。開忍入熱</p>	<p>至寶痔瘡丹</p>
<p>藥瘡痔効神 散棗猴方祕 散氣胃應萬 水藥痧救急</p>	<p>虔製</p>	<p>文分取不 藥送方接 確準力藥 藥煎客代</p>	<p>特設</p>
三六五二九：話電		口路合勞路京南：址地	

何 首 烏

章 次 公

名 稱 釋名 大明本草曰。其藥本草無名。因何首烏見藤夜交。何卽采食有功。因以宋人爲名。唐李文公集何首烏錄云。僧文象好養生術。元和七年。朝茅山。遇老人于華陽洞口。告僧曰。汝有仙相。吾授汝祕方。有何首烏者。順州南河縣人。祖能嗣。本名田兒。天生閻。嗜酒。年五十八。因醉夜歸。臥野中。見藤相交。久乃解。解合三四。心異之。掘根晒而乾之。有鄉人袁良。戲使之餌。經七宿。忽思人道。娶寡婦曾。遂生男。鄉人異之。十年生數男。俱號爲藥。年百六十歲乃卒。男女一十九人。子庭服亦百六十歲。男女三十人。子首烏服之。年百三十歲。男女二十一人。有李安期者。與首烏鄉里親善。遂敘其事傳之云。審是。則唐以前本草。并無是名。其藥本爲交藤。因何首烏服食。年百餘歲而髮猶黑。遂以名之爾。——節鄭文焯醫故○別名 地精 陳知白 馬肝石 桃柳藤 九真藤 赤葛 紅內消

科 屬 蓼科。

產 地 自生於各地之山野。

形 態 爲蔓草類植物。春月從宿根抽莖。纏繞他物。長及丈餘。莖蔓呈紫色。葉似薯蕷而無光。作心臟形。前端尖皆互生。秋季於蔓梢葉腋。綴穗狀細小白花。花後結實。類蓼實根蔓延甚長

。似括囊根。數塊相連。小者如蕃藷。大者如甜瓜。質堅硬。表面多凹凸赤褐色者。謂之赤何首烏。白色者謂之白何首烏。

藥用之部 根藤。

修 治 竹刀刮去皮。切片。入柳甌砂鍋上。九蒸九晒。

性 味 味甘微溫。

成 分 含有克利瑣反酸 Chrysphansaure

用 量 小量三錢。中量五錢。大量兩許。

效 能 (1) 開寶瘰癧。消癰腫療頭面風瘡。治五痔止心痛。益血氣。黑髮髮。悅顏色。亦治婦人產後。及帶下諸疾。大明久服令人有子。治腹臟一切宿疾腸風。好古瀉肝風。時珍莖葉主治風瘡疥癬作癢。煎湯洗浴甚效。(按首烏之藤。名夜交藤。時醫用治失眠) (2) 汪穎曰。能止諸瘡。大約瘡邪入陰分。久而不解者。必須此。毒痢下純血。諸藥不效者。亦用之有神。黃宮繡曰。何首烏諸書皆言滋水補腎。黑髮輕身。備極贊賞。與地黃功力相似。獨馮兆張辨論甚析。其言首烏苦澀微溫。陰不甚滯。陽不甚燥。得天地中和之氣。熟地首烏。雖俱補陰。然地黃則專入腎而滋天一之真水。首烏專入肝經。以爲益血祛風之用。一爲峻補先天真陰之藥。故其功可立救孤陽亢烈之危。一係調補後天營血之需。以爲常服長養精神。却病調元之餌。先天後天之陰不同。奏功之緩急輕重。亦有大異也。况名夜合。又名能嗣。則補血之中。尚有化陽之力。豈若地黃功專滋水。氣薄味厚。而爲濁中濁者。堅強骨髓之用乎。——本草求真 (3) 用爲強壯藥。以治消削病。久服易得孕。又用於間歇熱。——和漢藥物學 朝夕飲何首烏葡萄酒。有強壯之功效。——房雄 (4) 曹拙巢先生曰。何首烏有滋養之力。而性滑利。能

使人洞泄。嘗有江陰人盛姓醫製服之。其人素肥胖。服後大泄。連服則連泄。懼而止。袁淑範曰。克利瑣反酸 Cerysphanisäure 爲安忒拉慶 Aathrachinan 之誘導體。非何首烏特有之成分。例如大黃旃那等。卽其例也。是等物質。在臨床上皆用爲下劑。依此等之例。與化學及藥物學上的實驗推論時。何首烏似非如世人所信爲天下成仙之妙藥也。惜余未能見經過百年或二百年之何首烏。及繼續持長一年或數個月用同一動物試驗之。如能連日持長服用。或能有如古人所云之齒落重生。返老還童。其效力能在近來流行之愛恩斯坦博士返老還童法以上。然以現今所知範圍以內。何首烏亦不過一緩下劑耳。卽有如大黃等能惹起腸管刺激作用也。然近來聞信用何首烏之效力。持長連用人之言曰。何首烏非常用無效。如連用三四個月時。確能整理腸胃云云。誠如其言。胃腸消化不良。食物停滯于腸管。因而便秘之人。又不良毒物停滯于腸管內。因而下利之人。由此而食慾不振。榮養不良。連用適量之何首烏時。因能與腸管以輕度之刺激。其結果能掃淨腸管內容。充進腸管壁之緊張性。因之腸管之運動消化及吸收亦強盛。食慾亦因之而振。榮養亦因之而恢復。氣力增加。至令體弱無子之人。亦因之而得子。此亦非不可能之事也。又云。能治婦人產後及帶下諸疾者。蓋連用何首烏時。如上述能恢復一般榮養狀態。同時又能刺激腸管。故骨盤腔內諸臟器之血行。亦因之而變化。因之病得全愈。此亦在吾人理想所能推及之理也。如上服用何首烏。有時或亦有效。徵之于動物實驗。何首烏雖無毒性。然腸管銳敏之人。服何首烏起峻瀉。衰弱之人欲強壯。服何首烏。反更衰弱等之例。雖稀亦有見聞。願諸君當斟酌用之。由以上所述。

可得到下面之結果。何首烏依動物試驗成績推斷時。對於因消化器之障害。所發生衰弱證。雖有幾分之效力。然絕非如古書記載。藥商廣告。為天下之妙藥也。——節錄民國醫學雜誌一卷六號 顧惕生先生曰。日本人咸稱何首烏治癆。鄙人亦嘗試服。首烏與六味丸之主藥地黃。皆含鐵之有機物。服首烏之法。每首烏一升。加茯苓半斤。咳者加五味子半斤。欲求子者。加枸杞半化。中藥不但令人愈病。且能令人有子。斯為奇也。——節錄醫光一卷二期肺癆病食養療法。

編者按 何首烏據古籍記載。民間傳說。滋腎益腎上力甚強。今袁淑範君論其功用。僅為一緩下劑。拙巢先生又言其性甚滑利。則古今傳說。似已不可盡信。袁君解釋其奏效之由。亦委曲入理。但據予個人用首烏延壽丹之經驗。則未見有泄瀉之弊。此殆多方製煉。藥性減殺。配藥又多。首烏力分而薄。故遂無泄瀉之弊歟。首烏近世均作補腎益陰之用。其所以有通便之功。亦以為陰分充盈。而腸自不乾涸。說理雖誤。但吾人處方却便利不少。例如病人不敢服大黃者。以首烏代之。溫病之恢復期。大便秘者可用之。吳氏增液湯其選也。景岳何人飲。以首烏治虛癆久瘧。吾人用此方亦有效有不效。意者首烏並不能直接治瘧。何人飲時亦奏效。純因當歸黨參維持營養之力。功與首烏無關也。總之。首烏。為一植物性下劑。其補益之力。無非製調胃腸。使人胃健腸通而已。或者謂近世首烏并非真者贗鼎耳。果真是首烏。確有補益之功。誌之以存一說。

方 劑

金匱痰飲咳嗽病方論

錢 公 玄

- (一)苓桂朮甘湯 茯苓四兩 桂枝三兩 白朮三兩 甘草二兩
- (二)腎氣丸 見前虛癆篇
- (三)甘遂半夏湯 甘遂大者三枚 半夏十二枚以水一升
煮取半升去滓
芍藥五枚 甘草如指大一枚炙
- (四)十棗湯 甘遂 大戟 芫花熬等分
- (五)大青龍湯 麻黃六兩去節 桂枝二兩 甘草二兩炙
杏仁四十個 生姜三兩 大棗十二枚 石羔如雞子大碎
- (六)小青龍湯 麻黃三兩去節 芍藥三兩 五味子半升
乾姜三兩 甘草三兩炙 細辛三兩 桂枝三兩 半夏半升
- (七)木防己湯 木防己三兩 石膏十二枚雞子大 桂枝二兩
人參四兩
- (八)木防己加茯苓芒硝湯 即前方去石膏加芒硝三合
茯苓四兩 減防己一兩
- (九)澤瀉湯 澤瀉五兩 白朮二兩
- (十)厚朴大黃湯 厚朴一尺 大黃六兩 枳實四枚
- (十一)葶藶大棗瀉肺湯 見前肺癰篇
- (十二)小半夏湯 半夏一升 生姜半斤
- (十三)己椒藶黃丸 防己 椒目 葶藶 大黃各一兩
- (十四)小半夏加茯苓湯 半夏一升 生姜半斤 茯苓四兩

- (十五)五苓散 澤瀉一兩一分 豬苓三分 茯苓三分
白朮三分 桂枝二分
- (十六)苓桂味草湯 茯苓四兩 桂枝四兩 甘草三兩炙
五味子半升
- (十七)苓甘五味姜辛湯 茯苓四兩 甘草 乾姜
細辛各三兩 五味子半升
- (十八)苓甘五味姜辛半夏湯 茯苓四兩 甘草 乾姜
細辛各二兩 五味子半升 半夏半升
- (十九)苓甘五味加姜辛半夏杏仁湯 茯苓四兩
甘草三兩 五味子半升 乾姜 細辛各三兩
半夏半升 杏仁半升
- (二十)苓甘五味加姜辛半夏杏仁大黃湯 茯苓四兩 甘草三兩
五味子半升 乾姜三兩 細辛三兩 半夏半升
杏仁半升 大黃三兩

金匱論飲有四。卽痰飲懸飲溢飲支飲是也。與近世所稱痰飲不同。近世所謂痰飲。係指劇欬吐涎之症。而金匱則包括之範圍較廣。蓋其所論者。乃多種水濕停聚之病變也。惟肺主通調水道。若水氣停聚。則肺臟之氣化窒礙。多見欬逆氣促者。此所以金匱以痰飲與欬嗽同論也。此篇之欬。因飲而發。與前肺痿肺癰欬嗽篇所論者不同。故前篇諸方。秦半以逐水爲主。治欬之藥至少。茲分別釋之如後。

金匱云。「病痰飲者。當以溫藥和之」。該條文之後。次第出三方。卽苓桂朮甘腎氣丸及甘遂半夏湯。以意測之。該三方乃爲治痰飲設也。夫水飲由於水濕凝聚所致。濕勝則陽微。故宜與溫藥以化之。統觀金匱治飲諸方。以溫藥爲多。良不誣也。夫金匱所論痰飲症狀。謂「其人素盛今瘦。水走腸間。漉漉有聲」。則明係脾陽式微。水谷不能化生精微。而飲停中州之症。方用苓桂朮甘。溫中化水極爲合度。桂甘辛甘可以化陽。苓朮

健脾而兼利水也。至腎氣丸治痰飲。與苓桂朮甘同爲虛方。蓋亦可以溫陽而利小便也。夫脾陽衰者。溫脾不效。則惟有峻下。古人所謂「益火生土」之法是也。故用腎氣丸治飲。爲苓桂朮甘之進一步辦法。方中有附桂之溫陽。地黃之補腎。苓瀉之利水。補而不滯。利而不伐。洵善方也。以上二方。皆治虛症。而用溫藥和之之方也。甘遂半夏湯則爲峻下劑。宜於形氣俱實之人。以猛藥一次而去之法也。方用甘遂半夏。蠱滌痰飲。芍藥甘草以維護氣陰。按「下則傷陰。汗則傷陽」。痰飲雖多陽虛。但實症峻下之後。耗液極易。故以芍藥輔之。惟方中甘草。不作緩和之用。蓋甘草與甘遂反。本草著有明文。仲景同用於一方。取其相反以建功。益增其瀉下之力也。

十棗湯主治懸飲。亦一峻下劑也。懸飲症見水流脇下。欬吐引痛。是飲停脇下之症。十棗湯中甘遂大戟芫花皆瀉水之峻品。通行十二經絡。無所不達。水飲停留脇間僻處所在。非此不能搜逐淨盡者也。然實症則可用。虛症當施溫化。仲景雖未出方。然有前治痰飲之例爲證也。

治溢飲凡二方。大小青龍是也。按溢飲乃飲水流溢。歸於四肢之病。是必有腫滿之形可見。肢腫而見欬唾者。謂之溢飲。若但腫者則爲水氣而非痰飲病矣。仲景言大小青龍均主之。金鑑註云。「溢飲病屬經表。雖當發汗。然不無寒熱之別。熱者以辛涼發其汗。大青龍湯。寒者以辛溫發其汗。小青龍湯」。按大青龍湯有石膏而小青龍中有姜辛。故有寒熱之別也。顧大青龍藥力過劇。如審症不當。誤用當有亡陽之險。且此方除發汗之力特峻外。鎮欬祛痰之藥甚尠。故近代醫家治痰飲。用大青龍者絕少。至小青龍湯一方。則不限於溢飲用之。凡寒飲停於胸膈。劇欬氣喘吐涎沫者。用之其效頗神。小青龍之可治喘欬。傷寒已早有明文。方中麻細爲宣肺定喘之上將。姜夏爲溫中化痰之要藥。桂芍可以和榮衛。芍味可以鎮欬逆。且細辛乾姜五味。有開闔相濟之妙。爲經方治欬必用之藥也。又按病欬喘而兼肢腫者。十九爲虛症。蓋由小循環障礙而起。病至危急。挽回頹勢。頗非易事。大小青龍攻尠之藥。絕不可浪投。故溢飲一症。虛多實少。實者可用金匱法。虛者則不可用。不可不慎也。

綜 說
錯 綜 龐 雜
形 影

本刊出刊在即而編輯先生又索稿甚急新稿不及撰姑以日前之舊部潦草塞責。

溼 溫 概 要

——緒言——

素問曰。「熱病者。皆傷寒之類也」。難經曰。「傷寒有五。曰中風。曰傷寒。曰濕溫。曰熱病。曰溫病」。是以可知濕溫亦即傷寒之一類。凡病發熱惡寒無汗者。無論春夏秋冬。均為傷寒。發熱不惡寒。或惡寒時間甚短有汗者為溫病。在春曰春溫。在夏曰暑溫。在長夏曰濕溫。此所謂溫病。因傷於寒而得之病。仍得稱為傷寒也。

——病理——

夏日外界空氣。熱高於人體。肌膚毛竅。非但無須抵抗。並且有待於疏泄。以調節體溫。是以夏日邊防空虛之時。傷於寒發熱汗出。表層無抵抗。一覺惡寒即發熱。若在長夏時令。氣候兼濕化。發時即為濕溫。

——症狀——

初起熱度弛張。頭痛惡寒。身重疼痛。舌白不渴。脈弦細而濡。面色淡黃。胸悶不肌。午後身熱。狀若陰虛。若一候未清。裏虛而邪內陷。則

變症多端。如神識昏蒙而譫妄。舌滑脈緩。下利洞泄。咽喉阻痛。或大便不下。或氣逆嘔逆不飢不食。機竅不靈。嘔而不渴。若熱度過高。必發斑疹與白瘡。此斑疹與白瘡。亦即邪欲外越之意也。

——治法——

先宜化其濕邪。濕邪化後。然後可以清熱。無汗不可發汗。以濕為粘膩之邪。汗傷心陽。使濕隨辛發表之藥。蒸騰上升。心包被蒙。則成神昏譫語。清竅被蒙。則成耳聾目眩。若見其中滿不飢。以為停滯而投下劑。則傷陰而抑脾陽之升。邪乘勢內陷。而為洞泄。更有以其午後身熱。而以陰虛目之。投以養陰柔藥。蓋濕為陰邪。再用陰藥。二陰相得。同氣相求。遂有錮結不可解之勢。法當先以三仁湯開泄上焦肺氣。兼化濕濁者主之。濕化則可以再商他圖。如舌白膩以寒未罷。桂枝辛通溫散之品。亦在必用之例也。

當歸與芍藥

當歸自古來。即有身尾之分。并云。歸身養血。而歸尾破血。實則祇能窺其一角耳。當歸以產地之不同。而大小亦殊。陝產者。為最大。身大而尾小。川、甘、滇產者。甚小。身小而多鬚。因其身大質多為能養血。是也。以其身小質微。為行血。亦是也。總之當歸為女科血症之主藥。甚是。本草從新云。當歸血滯能通。血虛能補。血枯能潤。血亂能撫。以上四症。究亦女子為多。男子甚少。於此可想見其為女科血症主藥。無疑矣。至於身尾破血養血。之說。吾人儘可置而不論。但若欲行血破血時。須以酒炒用之即是矣。近人云。當歸能增強血液養化機能。促進新陳代謝。補而不膩補血而兼能行血。此數語極為妥善。誠為不二法門也。

以古人之經驗。近人之考察。晚近更用當歸提精。而舉世皆認當歸為女科血症聖藥。無疑義矣。

芍藥有赤白二種。以產浙江杭州者爲良。其性味因產地之各異。因而亦莫衷一是。總以綱目之苦平爲最當。東人認本品爲鎮痙鎮痛藥。因其內含鞣酸也。若云其爲血症主藥。則未當也。赤芍破血固良。究不若斑蝥之類爲勝。如云白芍養血。亦去地歸甚遠。此則欲舉爲血症之主藥者不亦誣乎。

討論大建中湯

金匱要略曰。心胸中大寒痛嘔不能飲食。腹中寒上冲。皮起出見有頭足上下痛而不可觸近者。大建中湯主之。此條所謂上冲皮起出見有頭足上下痛而不可觸近者。乃腸蠕動過劇之症也。即急性之腹膜炎是也。此必胃腸素虛。寒猝得外寒而發此症。胃腸不安故嘔不能食。腸蠕動劇烈。致寒氣上冲而作心胸痛。又因其痛近於外。故不可觸。近有之方書。竟指此條爲寒疝。真荒謬極矣。此條主旨。完全是胃腸虛寒。因虛寒而不安。不安則蠕動加劇而作痛矣。並非因疝上冲而作痛也。此固狐虺之弄巧。後學者可不慎哉。

大建中湯所以主此症者。因姜椒可以溫腸胃。人參以補虛。更用膠飴亦即建中主旨也。

本方用作殺虫劇據說甚效。但未經親試。不敢妄從。以意演之如下：蜀椒。本草綱目曰辛溫有毒。治鬼疰蠱毒殺虫魚毒。（別錄）殺虻虫。（時珍）通經安虻殺鬼疰魚虫毒。（備要）由上觀之。則本品爲溫性之殺虫殺菌藥。

乾姜之舊說。雖無殺虫字面。而其鎮痛作用甚佳。凡腹中有虫者。發作時必作劇痛。用此鎮痛良效。

人參療腸胃中冷。心腹鼓痛。胸脅逆滿。霍亂吐逆。調中止消渴。通血脈。（別錄）此雖舊說。但本品用小量能健胃。對於胃弛緩之消化不良

有效。仲景於本方人參用小量。亦無非使其奏健胃之功。但對於虫積。若用人參。恐反有助紂爲虐之弊。闕以存疑。

飴糖普通用。本品無非取其容易消化。或作爲矯味之用。若殺虫時用本品。亦卽金匱甘草粉蜜湯之意也。不外引而導之。誘而殺之之義。凡虫見甜則喜盡食。食後待飴盡則蜀椒等之藥力發作。於是虫得有消除之機會矣。

膀胱蓄血與蓄水

膀胱蓄血者。熱也。仲景所謂：「熱結膀胱」者是也。然究其所以熱結於膀胱者。其因或爲熱病不解。解熱蘊而下趨。或謂熱濁下注。其因雖不一。但終不離乎熱。其證必少腹拒按。小便必短少或黃濇。尺脈弦數。其於舌診。則無特殊可見。固下焦之病不主舌也。餘如女子之月經不通而致蓄血者。或產後惡露不盡而致蓄血者。亦在在所常見耳。治法當以桃仁承氣湯桂枝茯苓丸大承氣湯爲主。至於加減進退。固不能膠柱鼓瑟。終在乎醫者見證以定權衡耳。

膀胱之蓄水。大都爲寒聚所致。因膀胱爲水府。一旦爲寒所聚。於是淤而不通。而成蓄水矣。其證必見少腹腫脹。小便不利而脈濡瀯。或大便溇瀉。然其間亦有虛實之分。雖不現之於證。也當明察也。虛者宜猪苓湯實者宜五苓散。但其證變萬端。加減亦在醫者之變通耳。

苓桂朮甘與真武湯

苓桂朮甘者治痰飲。及吐下後逆滿與邪解飲發之症。經曰：「傷寒若吐若下後心下逆滿氣上冲胸。起則頭眩脈沉緊。發汗則動經。身爲振振搖者。茯苓桂枝白朮甘草湯主之」。又曰。「心下有痰飲胸脇支滿、目眩、苓桂朮甘湯主之」。上一條是吐下後所變諸症。此或素有飲邪之人。因傷

寒吐下之後。飲邪乘虛而作。否則決無外邪吐下而不愈。此必飲家無疑也。下一條云。治痰飲是彰而不待言矣。方中桂枝溫之。茯苓利之。白朮補之培之。甘草和之緩之。飲邪得此。無有不治。

真武者北方水神也。顧名思義蓋為逐咳鎮水而設。經曰。「太陽病發汗汗出不解。其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗地者。真武湯主之」此非發汗不解。乃不該發汗也。其人體本虛。因發汗重劫其液。則變為心下悸。頭眩身瞤動振振欲擗地諸壞症矣。是以用姜附以回其機能。白朮以補中。芍藥以鎮心筋之痙攣。茯苓以淡滲分利之。則體虛者之太陽病必瘳矣。又曰。「少陰病二三日不已。至四五日腹痛。小便不利。四肢沉重疼痛。自下利者。此為有水氣。其人或咳或小便利。或下利或嘔者。真武湯主之」。此處用真武者。全是鎮水以止咳之意。

苓桂朮甘為痰飲。及素有飲邪。而感外邪吐下後飲乘虛入裏之方。真武湯乃治體虛不能發汗及少陰病因水氣而咳之方。總之二方之意。均是逐水祛寒培中之方。實乃虎賁中郎之相類似耳。

脈盛身寒之傷寒與脈虛身熱傷暑之病理

盛者。實緊之象也。傷寒論曰太陽病……必惡寒脈陰陽俱緊者。名曰傷寒。由是知惡寒固為傷寒。而脈緊亦是傷寒之特徵。人身之於受寒時。體工起一種抵抗作用而制之。斯時則血循環加速血壓亢盛。而脈搏是以亦因此而加緊。此則為傷於寒無疑。宜以辛溫發散之藥表之。發其汗而寒自去。

傷暑者身熱脈虛。因傷暑者乃所謂中熱也。傷暑必炎夏之時。炎夏時外界空氣稀薄。呼吸時感困難。且中熱祇身熱而不汗出是腠理壅滯也。心臟雖竭力鼓動。而以呼入養氣甚少。兼以排泄汗液不能充分暢達。斯時宜以白虎湯涼心存津。則身熱自去。血行復原。而得痊矣。

醫 藥 控 譚

黃 勝 白

黃 蘗

按西國古藥有治後重坐藥。蓋利病家裏急後重不已。後陰作楚。不復可忍者。緩之以黃蘗坐藥法以黃蘗根或葉。末爲散。和以酪。或稍加嗎啡丸爲挺納穀道中。亦有已痔痛。蓋黃蘗之精。爲阿特騰萍。有麻醉末端神經之作用。其法行之久矣。今按此法。吾國唐以前卽有之。必效法療冷利方曰。取黃蘗子。熬令黃色搗爲末。和臘月豬脂更搗。令熟。爲丸綿裹如棗許大。以納下部。因利出。卽更納新者。不過三度卽差。又療小兒赤白痢脹不出方。用黃蘗及薄切羊肉綿裹納下部中。不過再差他類此者頗多。其意豈非大略相同耶。獨惜中土。自唐至今。竟復無人能辨其所以得效。實由直接麻醉穀道神經所致。徒拘拘於黃蘗性寒性熱之兩途。聚訟不休。怨夫。又黃蘗子所以能麻醉之效。實由其中含有阿特騰萍Atropinen H23 No3 然其所含不如葉之多。故西人昔用子者。後改用葉。及今由 E. Schmidt 攷見黃蘗中實含有精英最多。蓋子中百分僅含〇・〇〇一。葉中可含〇・二三。根中乃至〇・六也。故近日又羣舍葉而用根矣。嗚呼。卽此一端。西國醫學所以日進之故。可知矣可不於此再三致意乎。

上海

參燕業大同行

元豐參行

▲專售各種補品▼

電話購貨請打八六七〇五號

地址

公館馬路十四號

