


圖
註
本草綱目求真

出版

上海錦章書局



入胃
下熱
攻滯

大黃

二更一

症。暫用以為開泄。導氣自上達下。而使二便頓開。以快一時。時珍曰。一宗室大人。年幾六十。平生苦病。結病旬日。一行甚于三十餘年矣。時珍診其人體肥膏梁而多憂鬱。日吐酸鹹。益盆脣乃寬。又多大病。此乃三焦之氣壅滯。有升無降。津液胃化為痰飲。不能下。滋膩肺非血燥也。潤劑留滯。硝黃徒入血分。不能通氣。俱為痰阻。故無效也。乃用牽牛末。皇英膏丸。與服一服。而減三服而平。取子淘去浮者。春去皮。得木香乾薑良。

大黃。肺胃大苦大寒。性沉不降。用走不守。耑入陽明胃府。大瀉陽邪。內結宿食不消。三承氣湯。皆有大黃內入仲景治則。用調胃承氣取其內。有甘草之緩。不令有傷胃府之意也。治邪由少陽之經而入陽明之府者。則用小承氣取其中。有枳實之急。得以破氣氣之壅也。治邪由少陽之經而入陽明之府者。則用小承氣取其中。無亡硝之鹹。致令泄下。以傷其胃也。故凡傷寒邪入胃府。而見日晡潮熱。於申酉譖語班狂。便祕硬痛。手不可近。拒按屬寒。乃溫熱瘡瘍。下利赤白。腹痛裡急。黃疽水腫。積聚留飲宿食。心腹痞滿。二便不通。與癥結血分。一切癰瘕血燥血秘。寃熱等症。用此皆能推陳致新。定亂致治。故昔人云。有將軍之號。成無己曰。熱法所勝。以苦泄之。大黃。強然苦則傷氣。寒則傷胃。下則亡陰。故必邪熱。宣結宿食不平。用之得宜。高不可輕用。帝勿從。幾至委頓。梁武帝常有心腹疾。諸醫咸謂宜用平藥。欲服大黃。姚僧坦曰。大黃乃是劫藥。至尊年大黃無度。理亦從之。遂遞。今醫用一毒药而攻眾病。偶中便謂之神。不中不語。用药之失呵。不戒哉。若使病在上脘。雖或宿食不消。及見發熱。只須督養。而不尚苦熱。復自道若誤用大黃。推直不下。反致熱結不消。為害不淺。時珍曰。大黃病在五經。血分者宜用之。若在氣分用之。是謂躁伐。無過脾胃。胃之邪火有餘也。雖曰禹心寃。萬四經血中之伏火也。又仲景治心下痞滿。接之較者。用大黃。黃連。大黃連。禹心湯主之。此亦脾胃之濕熱。非禹心也。疫發于陰。而反下之。則作痞滿。乃寒傷營血。邪氣乘虛。結于上焦。胃之上。沈在于心。故曰消心寃。禹心。問云。太陽所致。為痞滿。火曰濁氣。在上則生。填脾。火曰陽。而在下。則生。填膀胱。火曰陽。而在右。則生。填胸。火曰分野。仲景大陷胸丸。皆用大黃。亦寓脾胃血分之邪。而降其湿。肺也。若結胸在氣分。則降其火。而反溼。心寃。亨曰。心陰不足。肺與肝俱各受火。而病作。故黃芩救肺。黃連救肝肺。者陰之主。肝者心之母。血之合也。肺火之大既退。則陰復。其舊矣。仲景傷寒論云。太陽病外症未解。不可下。脉浮大不可下。少陰病陽虛。尺脉弱者。不可下。脉數不可下。惡水者。不可下。頭痛目黃者。不可下。虛家不可下。陽微不可下。諸四逆。沈先輩立藥治病。原有成則。如大黃芒硝。則瀉腸胃之燥熱。穿牛甘遂。則瀉腸胃之濕熱。巴豆硫黃。則瀉胃之寒結也。雖其所通则一。而性寃有不同。當為分視。至于老人虛秘。腹脹少食。婦人血枯。陰虛寒熱。脾氣虛積。腎虛動氣。及陰疽色白不起等症。不可妄用。以取虛虛之禍。用產錦紋者。良生用峻熱用純。忌進食。能通利。不得殺食。不黃芩為使。

解心
經熱
邪

降肝
胆外
感風
邪疾
大寢
結

鴉肺
燥熱

散肝
脾濕
熱內
結

赤鍼

連翹心

入味

苦微寒

質輕而湯

書雖載鴉六經皆火

其經清取涼

是爲鴉心要劑

心但開有辦

心爲人主

心清則諸臟

之皆清矣

然濕熱不除

病症百出

是以離毒

五淋寒熱

風瘡惡瘡

熱結鹽毒等

並能少治

者爲實邪腫而不

腫而

不結者爲留氣瘡飯

且經有三

諸瘡瘍

皆屬火

連翹實為瘡家聖藥也

然多用胃虛食少脾

胃不足者慎之

况清

而無補癰瘡後勿服火熟由於虛者可後

前胡
山草
言三

前胡高八分味苦微寒功善下氣凡因風入肝膽火盛痰結營氣寒喘噦氣有餘咳嗽嘔逆宿膈霍亂小兒疳氣等症升藥便是火氣所生使氣有餘故此當用此苦泄俾邪去正復不似柴胡性主上升引邪外出而無害寒風熱固結于其中也按二胡均是風藥一升一降用各不同若使車前有外感風邪虛火實結而用柴胡上升不亦如火益熱乎故必用此下降但症外感絕少本屬陰虛火動並氣不歸元胸膈逆滿者切忌泄故走皮白肉黑味甘氣香者良半夏為復全宜矣忘火今有削片以溫當歸片料可恨

白微
音西
山草

白微肺入味苦而鹹性寒無毒凡人陰虛火動則內熱生風火氣焚灼身體壯熱支滿痰渴澀忍不知人與夫汗出血厥酸痛淋閉其在婦人則或妊娠勞傷妊娠也神無所依而見淋露不淨並血枯熱勝而見虛煩上嘔非不用此苦泄誠降利水使陰氣自上而下則熱何由泄乎是以金匱安中益氣竹皮丸用此以治婦人產中虛煩嘔逆經流云古方謂經種子往往其源起于真陰不足陽勝而內熱故營血日枯也蓋陰清無則自生旺而有子矣須佐以歸地芍藥桂枝從容等藥才金姜桂湯用此以治風濕身熱汗出身重又有白微芍藥等氣外越者禁用似牛膝而短小柔軟去頭酒洗用恐大苦火戰山茱蠯丸

白微
音西
蔓草

白微肝脾入散腫瘡痛清敷解毒散結止痛久為外科所用要藥然目亦鴉瘡溫瘡陰腫帶下淋屬失精金瘡生血凡因風熱濕毒而成者何不可以為內科之用如金匱薯蕷丸用此以解風氣百疾溫張瑞曰其湯全以桂枝葛根和營散熱合理又乎補益腎肝又書載同地膚子則可以治淋濁失精同白芨則可以散金瘡失血最日血飲同甘草則可以解狼毒之毒豈盡癰腫解毒而已哉但此味辛肺主散味苦主陰味甘主緩故止可以散結解熱若胃氣虛弱癰瘡已消者均非所宜蔓草亦有妄根如卵長有三五枚同葉皮黑肉白代赭石為使及烏頭色亦為斂功用皆同

鴻肺
魚腥

玄菟

胃中熱
寒熱
發熱
辟時
不行不

寫肝
寫風

紫苑
言草

紫苑肺辛苦而溫。色赤雖入至高之臟。仍兼下降。故善載入肺金血分。辛入肺能治虛勞咳嗽驚悸吐衄諸血。又能通調水道。下降可以治渴澇便血。用此上下宣宜。且此辛而不燥。潤而不滯。非多用獨用不能達於肺實。為有益。然躁泄性多。殆養力少。與桑白皮杏仁同為一類。但桑白皮杏仁則潤肺經氣分。此則專潤血經氣分也。故肺虛乾咳禁用。乾咳類多血虛者。色潤軟者良。人多以車前投覆花亂之。其藥雖分上中與下。然下疎泄尤甚。蜜炒用欵冬為使。白者名玄菟。氣分大。世肺采時後方引此三分鉛丹一分並酸漿服一刀圭。日進三服。至二十日能令面黑轉白。過服不宜。去頭髮蜜水炒用。欵冬為健忘。天雄瞿麥。華本遠志。畏茵陳。

蘆根
言草

蘆根苦入肺胃。治無他奇。惟清肺降火是其所能。凡人胸中有熱。則火升。上嘔逆氣不下。脾肺熱起。則消渴便數。甚至不能少忍。全匱王氏治心膈氣滯煩悶不下。故必得此苦寒以治。則諸症悉除。工昂曰。肺為水之上源。脾氣最升。上歸于肺。始能熱則小便舉。甚至不能少忍。人性急速故也。蘆中空故入。且解蝦魚中毒酒毒。然此其宜寘熱不宜虛寒。若誤用之。必致見害。取逆水上內甘美者。致若露出水面者。損人舌蘆節。

貫眾
言草

貫眾肝胃即俗稱為管作者是也。味苦微寒無毒。世遇天時行不正之氣。人多用此置之水缸。使人食之不染。且不獨力能解毒。凡遇崩漏帶下並癰瘕疽瘍。虫蟲骨硬皆可用之。蓋以苦能殺蟲。寒能收熱故也。人著庄旨。昔王珣百一選方言。食鯉魚羹為骨所硬。百藥不效。或令以貫眾煎濃汁。連進一咯而出。可見軟堅之功。其殆若是之神矣。形似狗脊而大。汁能制三黃化五金。伏鐘乳結沙制水解毒軟堅。

青葙子
言草

青葙子苦寒。入即雞花草者是也。備要文言即草决明。味苦微寒無毒。入足厥陰肝。凡人一身風癧蟲疥。得飲晨色青青盲翳。多緣熱盛風熾所致。亦有不盡風熱者。盡言服此目疾自愈。昏青即散。三蟲皆殺。風癧即絕。無非因其血熱除勝熱。脉和而病自可愈耳。無他義也。但瞳子大者切忌。助太陽而轉者大忌。拙用。

竹茹
言草

清肺
解煩
降溫

涼胃
心止
渴除

清肺
胃涼
心止
渴除

熱心
除肝
熱渴
腎氣

解毒
熱狂
燒病
毒

竹茹尚八味甘而淡。氣寒而滑。凡因邪熱客肺。肺金失養。而致煩渴不寐。脣噏嘔逆。惡阻。嘔吐吐血。衄血等症者。當服。
諸症皆就。肺胃熱論。蓋味甘則中可安。而煩不生。味寒則熱得解。而氣寒。蓋又反入肺上焦。所以金匱之治。產後虛煩嘔逆。則有竹皮大丸。金之治。產後內虛。煩熱短氣。則有甘竹湯。竹茹一升。甘草。茯苓各二兩。水煎服。產後虛煩頭痛。短氣。時亂不解。則有淡竹湯。皆薑茶各二兩。水煎服。產後虛煩頭痛。短氣。時亂不解。則有淡竹湯。皆

有至理。內存不可不知。取竹刮去外膜。取二層如麻縷者良。

淡竹葉音八
竹葉尚八味甘而淡。氣寒而滑。凡因邪熱客肺。肺金失養。而致煩渴不寐。脣噏嘔逆。惡阻。嘔吐吐血。衄血等症者。當服。

竹葉心體輕氣薄。味甘而淡。氣寒微毒。據晉書載。京心緩脾。清痰止渴。為治上焦風邪煩熱。咳逆喘促。嘔噏吐血。一切中風。驚癇。癲等症。累日陰新。久風邪。之煩無非因其輕能解。十年能散。雖甘能緩。脾涼能入。寒能清。熱能解。故耳。然大要總屬清利之品。合以石膏同治。則能解除胃熱。而不致煩渴不止矣。竹葉石膏湯。方假其辛寒以散陽明之熱邪也。竹生一年嫩而有力者。及秋猶

天竹黃音三
天竹黃。入條天竺國之竹。精氣結成其粉。形如竹節。味甘氣寒。色青性濃。功用略同。皆能逐瘀利濕。但此良心去風除熱。為小兒驚癲。風熱痰渴。聲音蚊之竹瀝。其性和緩。而無寒滑之患也。故緩。今市肆多骨灰。萬粉雜入。不可不辨。

秦皮音三
秦皮。高入肝膽肺。味苦氣寒。色青性濃。功入肝。以除熱。入肺。以清熱。是以因風而見濕。脾。腎。目障之症者。則當用此苦燥苦降之味。以除因熱而見崩帶。腸澼。下利之症者。則當用此取清寒氣以固。如仲景白頭翁之用秦皮苦瀝。之類。白頭翁苦瀝老子云。天道貴清。惟瀝故補。服此不惟泄熱止脫。而且益肺有子矣。至治赤眼腫痛。則合黃芩分頻點。並秦皮一味煎湯。以洗其效。或加滑石。黃連等。但此氣寒傷胃。總不宜于胃虛少食之人。耳。出酉上皮。有白點。漬水碧色。畫紙不脫者。其人戰為使。恐吳茱萸。

川練子音八
川練子。小腸膀胱即苦練子。因出于川。故以川名。又名金鈴子。練是者。是也。味苦氣寒。微毒。凡人冬時感冒寒邪。至春而發。則為溫以致。症見狂躁並癲。熱被寒承。症見囊腫並強制引作痛。與夫寒熱相乘。指由五臟所生。云蟲肉蝕者。俱宜用此調治。有蟲耗其津液而渴。須以苦荳滑熱之功。寒有勝熱。義故能使熱悉除。而毒蟲腹病亦得。因其自心下降。由于小

便而乃泄矣。但人止知此為陰疝之味。瘡白狐白癩曰瘻曰瘕。而不知有逐數解症之加。以至廢而不治。即其治疝亦不分其是寒是熱。是偏是平。與夫偏有錯雜多寡之異。其痛亦不分其所痛之處。是否自下而上。從上而下。在辨症惟計古方除熱疝如其疝並非熱。其痛自上而下。痛飲入腹。且有厥逆吐涎。非用辛溫不能見效。若以川練同入。則於理不免歧而二矣。寒疝不然。古人立方治疝。偏以川練同投。其意奚似。蓋緣初有錯雜。則治不得不爾。若以錯雜之邪而概用以辛燥。不更使病相左乎。繡嘗諸同人。凡人用藥治病。須當明其偏乎。偏症偏治。平症平治。錯雜多寡不一之症。則即當以錯雜不一以治。括盡治法。昔繡治一族。故字次周。陰疝其寢是偏不平。毫無一症混雜。乃有附城一醫。必執古方。用以川練。繡謂病症不雜何須用。是終謂其古方所用川練。稽書何無一語。活動間有指屬及佐。亦無一語申明。以致蒙混不解。蓋言繡只據理授服。隨手輒應。而不為方所執。及閱張璐本經。逢原其辨川練功用。分為陰陽二症。及有錯雜之邪。必用川練之說。始嘵理道本同。而古人則先于我而獲。繡益信已所治族叔之病。而不敢用川練者。未始不有理存而竟所捨而如一也。不驗於否。則幾為古方所誤矣。故凡疝因熱邪。及因蟲蟲肉。食宜乎川練。若使脾胃虛寒。疝屬陰疝。則川練其切忌焉。練以川產為正。去皮取肉。去核用根。有雌雄二種。雄根色赤。無子。大毒忘火。雌根白色。多微毒。可採青留白。單味酒煎。投服殺蟲治瘧。煎湯洗之。可治中蠱。即時吐出。茴香為使。

蒙花

灌木

密蒙花。蕊入肝。因冬不凋。花開蒙密。故蒙名。甘而微寒。功為入肝經。除熱養營。益肝開竅。目目得血而能視。虛則青。虛則黑。則赤腫。眵淚。目中赤脉。及小兒痘瘡。餘毒。疳氣。攻眼。得此甘能補。益寒能除熱。肝血足。而諸症無不愈矣。然味薄。力氣施耳。竹如蘆根。則柿霜。而清肺胃之熱。能治咽喉口舌瘡。痛。腸風痔漏。然必元氣未離。始可投服。若虛煩喘嗽。切忌柿乾。同

柿蒂

山茱萸

柿蒂。常入脾胃。味苦。氣平。時珍謂其雖與丁香同為止呃之味。然一辛熱。而一苦平。合用深得寒熱。兼濟之妙。醫通本草。謂濟生蒂。之半。以散外附之寒。如係有寒無熱。則丁香在所必用。不得固執於治疝當佐以柿蒂。有熱無寒。則柿蒂在所必需。不得泥以兼濟之。必難以丁香。是以古人用藥。有合數味而見效者。有單用一味而見效者。要使藥與病對。不致浮躁而枉施耳。竹如蘆根。則柿霜。而清肺胃之熱。能治咽喉口舌瘡。痛。腸風痔漏。然必元氣未離。始可投服。若虛煩喘嗽。切忌柿乾。同

於柿霜但力少緩俱忌蟹

梨音黎

山藥

梨肺胃成于秋花皆白得西方金氣之最味苦微酸氣寒無毒功爲入肺與胃。凡胸中熱結軟嗽咳便祕狂煩咽乾喉痛中風因渴反胃不食。反胃有因熱成有因寒成不可不辨並湯火傷瘡癰疽目障丹石熱氣一切属于熱成者惟食梨數枚即能轉重爲輕消弭於無事。總錄久胃轉食藥物不下用大雪棗一個以丁香十五粒刺入梨內紙裹煨熟聖惠方治小兒風熱皆消燥悶不渴症已極氣血消竭此去三年當以瘡死王人不樂而去來茅山道士謂曰按類編云一土人狀若病厭厭無聊往謂揚吉老詩云日居新水之復道士留置弟子中久之以寃白道士診之笑曰汝便下山但日日吃好梨一夥如生梨已盡則取乾者泡湯食津飲汁疾自當平士人如其戒經一歲復見吉老見顏貌腴澤脉息和平驚曰君必遇異人不然豈有虛理士人備告吉老吉老具衣冠望茅山設拜自咎其學之未至此與道言之謾傍佛祖失二條則梨之功豈小補哉然准孔梨鷺梨消梨可食餘根則亦然必元氣素實大便堅方可與食酌之淮麻酒燭曷人食之甚佳終不能却疾若使元氣虛弱慢咳多致寒中益梨是大利之物服之中益寒冷金瘡乳婦亦忌投服恐血得寒益發宣可概謂能食而不審而別之乎搗汁熬膏良薑蜜製清痰止嗽用來服與梨相間收穢則不爛。

西瓜音瓜

肺

西瓜膾胃內櫟。今人遇值三伏天燥不論男婦大小朝夕粢食誠以燥渴之極得此味甘色亦能引心胞之熱下入小腸膀胱而止。令其心胸頓涼煩渴口渴故書載治太陽膀胱陽明胃中暑及熱病大渴等病宜投。如青溫夏熱等症並有天生白虎湯之典。惟是稟氣素厚遇熱消渴及伏氣發瘧得此如湯潑雪若以脾胃素虛恣服轉渴朝夕必待隔滯上澆或澆或腫或脹元陽已前方為覺誤悔莫及矣衛生歌云瓜桃未及少食免至秋來成瘧痢又小本寒暎之寒氣益聚而寒矣猶之油性本熱經久煎則其性稍革而不熱矣因述此以為好食瓜者一歲。

銅青音金

金

銅青肝膽即俗所云銅綠者是也。與青所產不同銅青氣稟地陰英華外見藉醣結成故味苦酸澆氣寒能入肝膽二經按酸入肝而斂所以能合金瘡止血古寒能除風熱所以能去膚亦及眞瘡肉苦能泄結所以醣除喉中則吐風痰而使血氣心痛皆止為散能療喉痺牙疳醣調揩腋下治胡瘡薰汗調點擦沿風眼綿裏用真川連三錢杏仁八粒去皮生用生甘草六分胆蕕一分青銅三分大元參一枝水煎乘熱擦眼去疳蟲所治皆厥陰之病強弱而察其麻乃可投之

海石音石

石

鴉肝
膽指
熱除
目翳

散上
焦積
熱軟

海石肺腎即書所云浮石者是也其石係水沫結成浮于水上故以浮名色白體輕味鹹氣寒(或肺之氣也)時令曰其質若蓋既有升上之能復有達下之力其曰能治上焦痰熱目翳痘癰者以其氣浮上達之謂也能治諸淋積塊癰瘤者以其鹹潤軟堅之意也余政席上病談云肝屬木當浮而石入水則沉而南海有浮水之石木入水則浮而南海有沉水之石木入水則沉而南也肝實而肺虛也故有尅制之氣也味鹹者良煅過水飛用

空青百九一石

滯脾
積熱
除內
外目
翳

空青為人感銅精氣而結故為入肝明目蓋人得水氣之清者為肝血其精英則為胆汁開竅于目血者五臟之英注之為神胆汁充則目明減則目昏銅亦清陽之氣所生其氣之清者為綠猶肝血也其精英為空青之漿猶胆汁也其為治目神藥蓋亦以類相感耳時珍况人多怒則火起于肝水虛則火起于腎故生內外翳障得此甘酸大寒以除積熱又火兼之以酸則火自斂兼得金以平木故治赤眼青盲其空青所含之漿可取點眼效亦磨翳要約善云不怕人間多瞎眼只愁世上無空青但空青中水久則乾必須驗其中空內有青綠如硃者即是如無綠青亦可不必拘泥聖濟錄治黑翳覆腫用空青攀石燒谷一兩貝子四枚研細日服

石膏言二石

石膏為入胃肺甘辛而淡體重而降其性大寒功耑分胃清熱解肌發汗消癧緣傷寒邪入陽明胃府內隸不解則必日熱口乾舌焦唇燥堅痛不解仲音諳語氣逆驚喘弱陽易飲鹽中暑自汗胃熱發班牙痛等症皆當用此調治火無已日寒陰邪也風喜傷陽寒喜傷陰營衛陰陽為風寒所傷則非輕劑所能獨散必須輕重之劑同散之以辛能發汗解熱甘能緩脾益氣生津止渴寒能清熱降火故也按石膏是足陽明胃之藥在胃肺受火制故必用此辛寒以清肺氣所有白虎之名肺主西方故也景曰石膏足陽明故也故仲景治傷寒陽明症身熱目痛口乾不眠以身熱也前胃之經也胸前肺之室也邪在陽明肺受火制所以有白虎之名但西有肅殺而無生長如不得已而用須中病即止切勿過食以損生原也若衰暮及氣虛血虛胃弱者恐非所宜况有貌屬熱症裡屬陰寒而見班黃狂燥日晡潮熱便閉等症服之更須斟酌惟細就食辨詳求其真可汪昂曰按陰盛格陽陽盛格陰二症至為難極而格陰于外冷而內熱經所謂重陰必陽重陽必陰重寒則熱重熱則寒也甚宜白虎湯亦有臉黑屬寒者古無芒刺輕班疹亦有陰陽偏盛宜石膏又有內傷陰症見斑疹者微紅而稀少此胃氣極虛遍其無限之火運行于外當補益氣血使中和玉則氣不外游血不外散若作熟治生死反掌醫者宜審取掌白者良亦名寒小石非鹽精入研細或甘草水飛或火煅各隨本方用雞子為

使忌豆鐵

除
血分
寃熱

青鹽音石

青鹽音石入縣中名戎鹽。氣至陰之氣凝結而成。不經煎煉。生于涯溪之陰。其味鹹。氣寒無毒。能入少陰腎臟。以治血分寃熱。故凡病因腎起而見小便不通。胃中疼亦色昏。及吐血。溺血。齒舌出血。牙齦熱痛。暨蟲毒邪氣固結不解者。宜以此味投治。普濟方。古風服。鹽爐丸。大小一錢半。水煎服。或鹽化水點之。并景金匱方。治小便不通。用戎鹽。鹽爐丸。大小一枚半。水煎服。之俾腎補而熱除。鹹入而堅軟。經曰熟澆于內。治以鹹寒。正此謂耳。山西羌不假。育鍛。方枝目潤色青者良。

食鹽音石

三百九四

鹽心腎之品類甚多。有生海江淮。南北生池山。西生井。四川生土。鹽生階。光明生石。鹽生樹。鹽生草。鹽之各異。然寒氣味則一。鹽味鹹氣寒。加以梔角末同煎。則味又兼微辛。五味惟鹹潤下。故凡大小便閉者。得此則通。五味惟鹹走血。故凡血熱血痛者。得此則入。五味惟鹽入骨。故補腎藥必當鹽湯送下。而諸骨筋痛。藉此則堅。案時珍曰。腎主骨。骨肉筋脉皆因溫熱所致。經曰熟澆于內治以骨鹽入骨也。五味惟鹹潤燥而平。又能泄肺。故凡痰飲喘逆。得此則降。案時珍曰。吐藥用之者。鹹引水也。能取豆腐與此同義。五味惟鹹軟堅。故凡結核積聚。得此則消。五味惟鹹補心。故凡病因心起而見喜笑不休。則當用此沸飲遏止。案金方用鹽摩產婦腹井。以其力有上舒之意也。水蛭蚯蚓及鹽。如何得此。即化服。亦水制火之意也。案真人治喉中生肉。用鹽裹頭。塗鹽擦之。日五六度。聖惠方治帝鐘喉風垂長年。丁脣食鹽頻點之。即消。

朴硝音石

三百九五

朴硝兼入腎。即皮硝。生乎函谷地。刮取。初次煎成爲朴。由朴再煎爲盐。其性最陰。善於消物。故以硝名。其味苦而且辛。凡五金八石用此。俱能消除。况人臟腑積聚乎。然公教邪深。固閉結不解。用以苦鹹。以爲削伐。則药興病得。自不見碍。時珍曰。硝精水之子也。氣寒味寒。走血而潤下。易除三焦腸胃。宣養陽強之病。乃折治大邪藥也。好古曰。硝利小便而陷胎。然傷寒杜絕可下者。用此。兼大黃引之直入。大腸潤燥。軟堅瀉熱。而母子俱安。經云。有故無殼亦無質也。此之謂鹹。以在下言之。則便溺俱陰。以前後言之。則前承後血。以腎言之。總主大小便。難治。渴閉結。俱爲水少火盛。成無巳曰。穀滿于胃。以水濟之。則消。于體上。僧用此方。而妄加畏鹽也。以其寓有以水濟火之意也。孫真人治喉中生肉。用鹽裹頭塗鹽擦之。日五六度。于苦故用。坐硝大黃相須爲用也。王昂曰。坐城尉家有猫子死。腹中啼叫。欲燒醫以硝。蓋之死子即下。後有一牛。亦用此法。

消職
肺結
邪固

芒硝

得如仲景大陷胸湯。太承氣湯。調胃承氣湯之類。雖其用有大黃可以除熱。然亦不得不假軟堅之藥耳。若使病非實熱。及或軟結不堅。妄用承氣朴硝等。以為消解。其不傷人。性命幾希。唐時腊曰。腊辟臣禁雪。红雪碧雪。皆用此研練。但朴硝初煎性急。芒硝久煎。差緩耳。大黃為使。

玄明粉石

瀉火
胃寒
胃定

玄明粉。治胃係芒硝再煎而成。其色莹白。甘而冷。功用等於芒硝。皆有軟堅推陳致新之力。陳不除。則瀉痢不止。用宜同用之意。若熱閉不通。則當用此下。金然煅過多遍。其性稍緩。不似芒硝。其力迅銳。服之恐有傷血之虞耳。王好古曰。玄明粉治陰毒一切。非伏解。亦當用此。下金然煅過多遍。其性稍緩。不似芒硝。其力迅銳。服之恐有傷血之虞耳。王好古曰。玄明粉治陰毒一切。非伏解。亦當用此。下金然煅過多遍。其性稍緩。不似芒硝。其力迅銳。服之恐有傷血之虞耳。陽在內不可用。若用。則為玄明粉煅煉多偏。佐以甘草去其苦。若佐甘草同投。則膈上痰液。胃中寢疾。腸中宿熱。又克見其治矣。並洗眼目。消腫。補錄兄式和用玄明粉搽服初覺一二次甚允。越後孩兒屢除屢忘苦參。

寒水石石

清土
解熱
消燥

寒水石。胃附又名凝水石。又名白水石。生於國地。因鹽精滲入土中。年久結聚。清瑩有核而成也。味辛而鹹。氣寒無毒。性竅能治時行大熱。口渴水腫。蓋以性稟純陰故也。經曰。熱淫于內。治以鹹寒。又曰。小熱之氣。涼以和之。大熱之氣。寒以收之。服此治熱利水。適相宜耳。永類方。男女輕躁不得小便。寒水石二兩。滑石一兩。葵子一合。水煎即利。易簡方。陽火傷。然此止可暫治。有餘之邪。及敷湯火水傷。若虛人熱深。其切忌焉。瑩白含之即化者真。否即是偽。但真者絕少。

雪水天水

清土
解熱
消燥
解利
水道

雪水。入氣稟太陰。水極似土。雖于冬時置而不問。然值傷寒陽毒。濕疫時毒。母毒內熾。並盛夏暑熱內蒸。而見燥熱殆甚者。並可用此調治。宋興日腊雪水。大寒之水也。取治以上諸病。具能以解燒酒諸毒。是以善載。凡治熱症。可用塊置于兩乳之間。且云宋徽宗因食水過甚致病。醫士楊介仍以水煎諸藥以治。其源深得用承義耳。因知病因水起。還以水解之也。

孩兒茶音先

孩兒茶。心肺。味苦微澀。性涼無毒。功耑清土。膈熱化瘀。生津收濕。涼血生肌。凡一切口瘡喉痺。時行瘧疾。並盛夏暑熱內蒸。而見燥熱殆甚。吐血。衄血。便血。尿血。血崩。及婦人崩淋經血不止。陰疳痔瘡者。服之立能見效。出南曹。是細茶末入竹筒埋土中。日久取出。搗汁成塊。小潤澤者。上大而枯者次之。真偽莫辨。氣質草用。宜慎之。

熊膽入脾大腸，味苦性寒無毒。功屬涼心平肝。惟其涼心所以能治心體症。惟其平肝所以能治目赤翳障。惡瘡瘍等症。且能入脾而治黃疽。入大腸而治久痢。除膚濕熱。并治小兒風痰壅塞發作。要除敷涼血而病自愈耳。熊膽春近首夏在腹秋在左足冬在右足能罷壯毅之物屬陽故當以喻不二心之臣而詩以為男子之祥也凡此只可作丸勿煎湯。通明者佳。但以木粒之多點水性善出運轉如飛者良

辟塵撲塵水上投胆少許則塵豁然而開。又取少許研酒水中掛如線直至水底不散者真。

鱈魚膽

三百一

鱈魚膽入心肝脾即屬鳥鱈。又名七星魚者是也。其物伏土勝水。味甘性寒無毒。凡人患十種水氣垂死。可用肉桂、瓜慈白以治。且者湯浴兒可以稀。正^陽扶醫方摘要曰：「除夕黃晝時用大烏魚一尾。小者二三尾者湯浴兒遍身七竅俱到。不可燒可輯。」胆味苦雖載甘。白華曰：「諸魚胆苦惟此胆然。」當之終苦。凡喉痺將死者點入即愈。病深者水調灌之亦可。首有七星夜謂之水厭。鷹為天厭。鹿為地厭。衛生歌。天鷹行有序。鹿有義黑魚拱北知臣禮人無禮義反食之。天地鬼神皆不享。

石决明

三百二

石決明入肝一名千里光。得水中陰氣以生。其形如蚌而扁。味鹹氣寒無毒。入足厥陰肝經。除熱為磨翳消障之品。緣熟鹹則風必生。風生則血被風阻而障以起。久而固結不解。非不用此鹹寒軟堅逐瘀清熱祛風則熱何能祛乎。故本事珍珠母丸與龍齒同用。皆取疏散肝經積熱也。但此須與養血藥同入方能取效。且此氣味鹹平。入服消伐過當。不無寒中之弊耳。亦治骨蒸勞熱五麻。汪昂曰：龍清研細水飛點目。能消外瘡。痘後眼翳可同穀精草等分細研。猪肝蘸食即退。七孔丸者良鹽水者。鉢裹煨熟為末。水飛惡旋覆。

珍珠

三百三

珍珠入心肺。即蚌所生之珠也。珠稟太陰精氣而成。故中秋無月。則蚌即無珠也。此藥馮楚暗辨論最詳。謂其用功多入陰經。其色光明。其體堅硬。大小無定。要以新完未經鑽綴者為尚。味甘微鹹。氣寒無毒。今手少陰心經足厥陰肝經。蓋心虛有熱。則神亂浮游。肝虛有熱。則目生翳障。目為除二經之熱。故能鎮心明目也。耳聾本屬腎虛。有^{耳為}熱。質^質甘寒。所以主之。逆蘆者。蘆張也。胸腹氣逆。脹滿。以及手足皮膚皆腫也。經曰：「諸濕腫滿皆屬脾土。」諸滿脹大。皆屬於熱。此脾虛有熱。並有積滯所致。珍珠味甘。既能益脾。寒能除熱。體堅復能磨積消滯。故亦主之。珠藏于澤。則川有媚。况塗于面。竊不令人潤澤顏色。

入解
胃肺
毒

參至于疗毒癰腫。長肉生肌尤臻奇效。但體最堅硬。研如飛麵方堪服食。否則傷人臟腑。外挫肌肉作瘀。蚌蛤無陰陽壯
須雀化成。故珠耑一於陰精也。

金汁三百五

金汁而入係取糞入鑪。理于土內。三年取出。莹清如水者是耳。味苦氣寒。置于土中。時久得其土氣最厚。故能入胃。大解熱
毒。凡濕熱時行。毒勢衝迫。勢危莫制者。用此灌之下咽。稍減。以其氣味相投。故能直入其巢。而破其毒耳。的初生小兒周
時內。毒氣方張。用此服一二分。既能化毒。且能免後痘疹。此最靈驗。但累體氣寒。體瘦色白者。不可誤用。恐其反奪天真耳。
不可不審。灌花用此最良。

秋石三百五

秋石。禹人本于人溺。因秋露水攬澄晒乾。刮取而成。故名秋石。味鹹氣溫。據書載能滋陰潤臟。退蒸軟堅。治癆止嗽。通利
便濇。精固氣且云經火煅煉去其鹹寒。轉為溫補。溫而不燥。潤而不滯。清不損元。降不敗胃。為滋陰降火之聖藥。為精火兩
然。鋪霜謂補處少而清處多。溫處少而寒處多。溫止由於太陽而非弱中。虛勞火重。服此似不甚碍。以其具有情間有微力。
亦非補中正劑。惟地黃乃補中正劑耳。法於秋時。取童便每缸用石膏七錢。桑擗澄傾去清液。如此二三次。乃入秋露水攬澄。如此數次。穢淨鹹減。以重紙
鋪上。晒乾刮去。在下重濁。取輕清為秋石。再研入灌。鍊盃盛定。鹽泥固澣。升打升起蓋上者。名秋水。味淡而香。乃秋石之精
英也。

瀉胃
熱
秋水
瀉脾
胃火
瀉心
火盛
瀉肝
大
瀉腎
大
瀉肺
火
瀉心
火
瀉肝
大
瀉腎
大

膀胱

清上
中二
焦大
熱與
濕

其用必矣。此非同為溼肝之用乎，而胆火之必用以胆氣大者何也？在腎心注見骨蒸熱，不得不用黃芩。在心大腸，見心火，不得不用黃芩。在肝膽，見頭目不清，痰涎不消，不得不用茶荈。在肺，見火留骨節，不得不用青蒿草。在脾，見無干膏熱，不得不用桔梗。此非同為潤腎藥乎？而膀胱火起之必用以人中白，童便及三焦火起之必用以青蒿草。桔子者又自可驗。諸火之害當分臟腑。如此但用而不病，其病症之符，肺氣之合，則其為禦最速，可不深思而長。

愚處

黃芩

音大

黃芩 味入心肺。大寒，入肝大腸肺脾，書載味苦。入心，又載入肺。鴻火入脾除濕。入大腸以治腸澼腹痛。痢為腸癖，凡痢有寒，有熱，有病屬於熱，畏熱，喜冷，不畏衣被。渴則涼，好治水，食少，心急快，隨消小便，熱亦渴，不甚下痢。純紅，則腰硬，按井或頭疼，身熱筋脈痠痛，此其症之實者也。病屬於寒，則其形體黃弱，顏色青白，脉雖隱數，而無力，無神。麻則真經，而中虛似寔，血則微紅，不能飲食，或胃脘作嘔，而多吞酸，或數至圓，故出不出或口雖渴而不欲飲，或冷飲而不欲咽。此其症之虛者也。入小腸膀胱以治淋門，且治中焦寒火及邪在少陽膽經，得此以為清理三葉而上下表裡皆治。其功力之泛涉，殆有難言。主者耳，不知內火衝激，外邪傳入，皆能發害。上如胸膈咽喉，下如肚腹二便。中如表裡之所陰陽之界，無不病癓，形以故腹痛腸澼，病寒熱往來。瘡黃疽，林閉，胸高氣喘，癰瘍瘡瘍，瘍火嗽喉腥，經閉胎漏，口渴津枯，一皆濕之所淫，熱之所浸，火之所勝。出諸病之要，黃芩味苦性寒，枯而大者輕飄上升，以清肺肺，清則痰自理矣。注綱曰：疾因火寔，而細者沉重，下降以利便，便利則腸澼自去。酒炒則膈熱可除，而肝胆火熄生用則寔熱堪投，而腹痛斯愈。時珍曰仲景治少陽症，小柴胡湯本屬少陽，合鴻火，並用之。蓋黃芩味苦，氣寒，色黃，而綠爲心火，而除脾濕，俾金不受火上刑，故能殺肺少陽之症。雖用黃芩以治手足少陽相火，黃芩亦少陽本經藥也。楊士瀛真指方云：柴胡退熱不及黃芩，蓋亦不如柴胡之退熱乃寒，能勝熱折火之本者也。且得白朮砂仁以安胎，得厚朴黃連以除腹痛。得桂藥以治痢，得柴胡以治寒熱，此雖合上與下表裡皆治而完止為上中二焦，鴻火除熱與濕之味矣。如火燎煩燥引飲而盡盛者，宜一味黃芩湯以瀉。但肺虛腹痛屬寒者，切忌。寒傷脾胃，損其生化也。黃明者良药，虛者為枯，芩即片芩，內寔者，條芩即子芩。上行酒炒瀉肝胆火，豬胆汁山藥龍骨煮使，畏丹皮丹砂。

黃連

三百九

黃連 味苦，大寒。據書所載，治功備極美者，且以別錄中有厚腸胃一語，互為傳播，以至于今。謬尤莫聞，貽害無窮。詎知黃連止屬瀉心之品？除濕之味，好古曰：黃連苦燥，苦人心火，就燥瀉火，則無病矣。但其寔瀉脾也，寔則瀉其子也。即云腸澼能止，口乾能除，宿溼腹痛能消，癰瘍瘍瘍瘍能愈，胆虛能鎮，與夫婦人陰蝕，小兒疳積，並火眼赤痛，吐血，血衄，諸瘻等症，無不由此調治，亦何莫不因熟熱火退而言。豈於濕除大退之外，尚有治效之著哉？元素曰：黃連之用有六：鴻火心肺火一也；去中焦濕熱二也；諸瘻必用三也；去風濕四也；止中部見血六也。朱震亨曰：下痢胃口熱，噤口者，用黃連人參煎。

治肺
入伏熟
化清

大禹
膽脾
骨髓
海大
熱邪

知母
音九
山草

湯終日服之如吐再強飲但得一呷下咽便好劉完素曰古方以黃連為治病之最善治病惟宜平苦寒藥半能發散開通
鬱結苦能燥濕寒能勝熱使氣宜平而已苦寒藥多泄惟黃連黃藥性冷而燥能降火去濕而能瀉病故治病以之為君
果曰凡癰癥發赤肚痛不可忍者宜黃連當歸以酒浸煎之宿食不消心下痞滿者須用黃連枳實况此性稟純陰在人腸胃素厚挾有燥熱火熱服之過多尚有偏性為害
而致胃陽頓絕生風斯成宗英曰今人多用黃連治利益執以苦燥之義下裡但見腸虛寒泄微似有血便即用之又不顧
可久服使肅殺之令常行而復其生發中和之氣乎秦樹與喬希聖論黃連書云聞公以眼疾銷黃連至十數兩猶不已
殆不可也醫經有久服黃連告來反熱之說此雖大寒其味至苦入胃則先歸于心火而不已心火偏勝則熱乃其理也
矧有脾陽素弱因此一言流播而可恃為常服者乎今人一見火熾不論是寒是熱是虛是實輒以取捨以致偏勝招患暗
受夭折殊堪嘆息時珍曰黃連治目反病為要藥古方治病香連丸用黃連生薑石菖蒲酒蒸黃連炒用黃連生薑
治口瘡用黃連細辛皆是一冷一熱一陰一陽寒熱互用之意而無偏勝之害王昂曰黃連爲心火大蔭少火龍胆草肝膽大
膽大黃連佐大黃三焦大黃芩佐之橘皮按桂附胡椒火止就山四川瘦小狀類鳳爪連珠者良薑半炒用胆大猪胆汁
炮上焦火酒炒中焦大黃半炒下焦大鹽水炒武重便妙食積大黃土炒熟熱在氣分吳茱萸湯炒在血分乾姜冰糖眼赤乳頭黃芩龍骨為使惡菊花玄參桑白皮畏款冬花牛膝恐猪
肉亦有不忘者如臘連丸黃連猪肚丸之類

胡黃連
山草

肉丸黃連
猪肚丸之類

胡黃連入肺而入臟出于波斯國近時秦海南北亦有氣味功用亦同黃連因以連名但此性耑達下大伐臟腑骨髓澑火軟邪
凡骨髓勞軟五心煩熱三消五痔溫瘡濕痢惡毒等症皆得以治經曰心移熱于肺為膈消是渴而多飲上消肺熱症也又
數有膏肓為下消腎熱症也又按經言痔因飽食經脉橫解腸澼為痔又言督脈生病痔漏人按香連有治痔漏之功
言痔有肛痔壯痔脉痔腸痔血痔之分皆濕熱下流傷于血分無所施洩則逼肛門而為痔腫故同猪胰以療楊梅痔瘡
且同乾薑以治小兒裏積同雞肝以治小兒疳眼同烏梅以治小兒血痢同甘草猪胰以治微瘡又治婦人胎熱較之黃連
治功同而稍異耳但小兒腎臟不足脾胃虛寒者其切忌焉心黑外黃折之塵出如烟者真畏惡同黃連

知母
魚入肺辛苦微滑能佐黃藥以治膀胱熱邪緣入水腫癃閉本有屬血屬氣之分肺伏熱邪不能生水膀胱絕其化源
便秘而渴此當清肺以利水者也熱結膀胱真陰乾涸陽無以化便秘不渴此當清膀胱以導濕者也黃柏氣味純寒雖能
下行以除膀胱濕熱但肺金不肅則化源無滋又安能上達于肺而得氣分俱肅乎知母味辛而苦沉中有浮降中有升既
能下條黃柏以泄腎水復能上行以潤心肺王昂曰黃柏入二經血分故二藥必相須而行俾氣清肺肅而濕熱得解是以昔人有云黃柏與知母之類清肺車前子之
義不可或離之義震亨曰小便不通有熱有濕有氣結于下宜清宜燥宜升又

類燥脾
术之類

故書宣用此在上則能消肺止渴却頭痛。潤心肺解虛煩喘。吐血衄血去喉中腥臭。在中則能退胃火。平消

瘧在下則能利小水。潤大腸去膀胱腎肝濕熱。腰脚腫痛。并治癰瘍內敷。除火熱。林崩漏等症。若謂力能補陰。則大謬矣。補惟地黃。景岳謂此性最沉寒。本無生氣。用以清火。則可。用以補陰。則何補之有。第其陰柔善順。似乎有德。猶之小人在朝國家元氣受其制削。而有陰移而莫之覺者。是不可不見之真。而辨之早也。諸此可為妄用。知母黃柏一歲得酒良。行酒浸下行鹽水。拂忌鍼。

青黛基草

人鴻
肝經
大
肝膽
火
寃除
腎經
大
青
藍子

青黛。入係。鹽散。浮末。攢。搔。掠。出。取。訖。而成。味鹹。性寒。色青。人鴻。肝經。寃火。及散。肝經。人體。行義曰。一婦患。脣腹二陰過生。用。鹽松。精。身。目。之。類。生。之。熱。痛。食。甚。其。歸。暗。而。食。魚。蝦。發。風。之。物。乃。用。馬。齒。莧。四。兩。研。細。入。青。黛。兩。和。金。故。小。兒。熱。痛。舌。仍。服。八。正。散。而。愈。此。中。下。直。蓄。瘡。風。熱。毒。若。不。由。當。作。腸。風。內。痔。瘻。不。能。禁。百。物。則。仍。發。痔。者。也。故。凡。小。兒。風。熱。驚。癇。瘡。毒。母。敷。瘡。瘻。蛇。大。毒。全。瘡。血。出。膾。膈。鱗。食。止。天。行。頭。痛。瘟。疫。毒。發。斑。吐。血。咯。血。痢。血。等。症。或。應。作。丸。為。衣。云。功。與。藍。等。而。止。血。拔。毒。之。功。與。治。膈。化。鹽。之。力。似。較。藍。而。更。勝。也。和。弱。白。堊。水。井。吹。口。疳。最。妙。取。嬌。碧。者。水。飛。爭。石。灰。用。藍。散。黃。有。石。灰。敷。瘡。殺。蟲。最。奇。敷。屬。下。膈。非。此。不。除。藍。葉。銀。蓮。即。名。大。青。大。鴻。肝。膽。寃。火。以。祛。心。胃。熱。毒。故。于。時。疾。陽。毒。發。斑。喚。瘻。等。症。最。利。斑。由。東。寒。表。虛。而。得。故。斑。得。以。透。肌。斑。如。疹。子。者。其。熱。輕。斑。如。錦。紋。者。其。熱。重。班。上。紫。黑。者。其。熱。重。而。胃。爛。也。古。治。赤。斑。煩。夜。有。屏。角。太。青。湯。藍。字。止。能。解。毒。除。疳。故。于。兒。痘。蠱。敗。退。必。矣。甘。草。水。浸。暴。用。小。豆。青。粟。為。使。恐。地。黃。

龍胆草山草

人鴻
肝經
大
肝膽
火
寃除
腎經
大
青
藍子

龍胆草。入。肝。膽。火。大。苦。之。寒。性。稟。純。陰。大。鴻。肝。膽。大。邪。時。珍。日。相。人。奇。在。肝。膽。有。鴻。無。補。故。龍。胆。之。兼。入。膀。胱。時。除。下。焦。熱。與。己。功。用。相。同。故。書。載。治。骨。間。寒。熱。聲。痛。鹽。膈。火。行。廬。疫。敷。利。疽。黃。寒。累。腳。氣。而。痛。者。為。足。脚。氣。宜。清。熱。利。濕。按。風。尚。津。枯。細。而。不。腹。者。其。熱。輕。斑。如。錦。紋。者。其。熱。重。班。上。紫。黑。者。其。熱。重。而。胃。爛。也。古。治。赤。斑。煩。夜。有。屏。角。太。青。湯。藍。字。止。能。解。毒。除。疳。故。于。兒。痘。蠱。敗。退。必。矣。甘。草。水。浸。暴。用。小。豆。青。粟。為。使。恐。地。黃。

玄參山草

人鴻
肝經
大
肝膽
火
寃除
腎經
大
青
藍子

玄參。苦。鹹。微。寒。入。肺。書。雖。載。能。壯。水。以。制。浮。遊。無。根。之。火。攻。於。咽喉。臂。脉。背。肝。膈。入。肺。中。備。喉。嚨。余。舌。本。凡。腎。水。浮。游。制。臂。脉。背。肝。膈。入。肺。中。備。喉。嚨。余。舌。本。凡。腎。水。

之大
次於
咽喉

瀉火
消肺
清熱
解毒
散血
消癰

牡丹皮 入心、肝、脾、肺、大、小、腎、膀胱、血分 治無

牡丹皮 入心、肝、脾、肺、大、小、腎、膀胱、血分 治無
辛苦微寒能入手少陰心、足少陰腎。足厥陰肝以治三經血中伏火。時珍曰：伏火即陰火也。陰火即相火也。相火熾則血必枯，必燥必滯。與火上浮而見為吐為衄。火所逼故越出土氣。大則燒傷皮肉，小則發斑，有陰有陽此陰火也。

射干

三百三十三

毒草

射干 端入心形如鳥羽鳥扇。又以鳥羽鳥扇為名。辛苦微寒。善載火解毒散血消癰。究毒之所胎。血之所聚。灰之所積。又皆因火結聚而成。虛為真火。射干苦能降大寒。能勝熱。或因味辛上散。俾火降熱除。而血與痰與毒。無不因之而平矣。是以喉瘡咽痛。結核癰癥。便瘧瘧母等症。因於老血。結于心脾。痰涎積于太陰厥陰者。肺脾無不可以調治。如金匱之治熱氣之用。射干麻黃治瘧母。當用前丸。用烏扇燒過。千金之治喉瘡。用烏扇膏。擣千附子和擦之。治便毒之用。射干同生蠶煎服。皆取性主善降功多于上服。則治之高妙。若脾胃虛寒切忌。甘淡者熟炒用。

天冬

百合科

草藥

天門冬 入心、肝、肺、大、小、腎、膀胱、血分 治無
甘苦大寒。據書載瀉肺火。大寒補腎。然究止屬苦寒。安能滋腎而補水乎？解所云能補水者。以肺本清虛。涼則氣塞而不擾。熱則亂行而不生。且肺為腎母。肺金失養。則腎亦燥而不濡。腎氣上攻。則肺益燥而受寇。而凡咳嗽吐血。痰結燥渴。肺癰。肺痿等。無不因之。畢呈。肺蘿水于五臟。蕭火及肺。積熱上蒸。與外感風寒。內傷熱血。熱結而成瘻。則本于津液枯竭。不能上潤于肺。及風熱傷衛。而致氣竭力衰。故肺則為陽寘。而腎則為陰寘。則為虛。虛則口不渴。而虛則宜養。宜下。而虛則宜溫。宜潤。治法因于內者。從內的治。因于外者。從外得此清肅之品。以為化源之治。則腎未必即補。而補腎之基。未必不於所清。而先具也。是以又云補腎。但其性滑利。脾胃虛寒。及無熱而泄者。最忌。苦泄寒勝。若無取肥大明亮者。良去心皮酒蒸用。地黃貝母為使。惡鯉魚。二冬熟膏良。

射干

三百三十三

毒草

等謂其腎水受傷。真陰失守。孤陽無根。發為火病。得此色黑性閑。微寒以為卽制。則陽得陰歸。而咽喉不致腫痛。而莫已也。然此只可暫治。以熄其火。非若地黃性柔純陰。力能溫腎壯水。以制陽光。即書有言。服此玄參。可以益精明目。消瘡除敗。及治一切骨蒸傳辰發斑。斑有陰有陽。此陰火也。射干性微寒。殺止可。若使病非火起。則服此炎滑之味。更使病轉劇乎？是以書載脾虛泄濁。服此黑參。為大忘耳。熟過焙用。勿犯鍼灸。惡薑者。生薑輩來及藜蘆。

汗骨

薰

赤丹皮
白丹皮

大瀉
及除膀胱湿邪

瘻所主潤則平，然昏仆身軟吐病時發時止，五勞一曰志勞，二曰心勞，三曰思勞，四曰憂勞，五曰疫勞，瘻結而見瘡，瘻毒產生難並無汗骨瘻。陰虛又見邪熱，故見無汗骨瘻。用此不特味辛而散血中之寢熱，具有涼相火之神功。世人專以黃柏治相火，而不知丹皮之功更勝。蓋黃蘖強寒而燥，初則傷胃，久則敗陽。苦燥之性持久而補陰之功絕少。丹皮亦色更離，能蕩陰中之火，使火退而陰生。所以入足少陰而佐滋補之用，較之黃蘖不啻霄壤矣。張元素曰：丹皮治無汗之骨瘻，地骨皮治有汗之骨蒸，神不足者手少陰心志不足者足少陰腎。仲腎氣丸用丹皮治神志不足也。志火之精為神故心藏神但補性少而泄性多，凡虛寒無明經行過期不盡者，為並其鳥，亦者利血白者，事補氣酒拌蒸用，忌蒜胡荽伏硫。

黃蘖奇本

言文

黃蘖，禹入腎，角。昔人同知母用於六味丸中，名為知蘖八丸味。又同知蘖各一兩，酒洗焙研入桂，名為滋腎丸。時今日知佐黃柏治陰降藥能制命門膀胱陰中之火，知母能清肺金溢腎水之化源謂其可滋真陰。此說一出而天下翕然宗之，以至于人罕不可破詎知黃蘖性稟至陰味苦性寒，行隆冬肅殺之令，故獨入少陰瀉火，入膀胱瀉熱。好古曰：黃芩、梔子入肺，黃連入心，黃柏入腎，燥濕所歸，各從其類也。震亨曰：火有二层，火者天火也，心火也可以溫伏，可以水減，可以直折，黃連之屬可以利之，相火人也，可以水濕折之，當從其性而伏之，惟黃蘖之屬可以降之。凡人病因火尤而見骨蒸等熱者，須察脉症或因中氣不足，虛火上炎，宜用參木甘草，草薢附子之類，或用黃柏、梔子等分，為末捲，或用黃柏、梔子、甘草、附子之類，或嘴宮桂引火歸元，服其丸，果洪大，按之有力，可炒黑暫用，使其濕熱順流而下。陰火因而替大，則陰不受煎熬，而陰乃得長矣。非謂真陰虛損，服此即有該潤之力也。發明時珍曰：東垣丹溪皆以黃柏爲陰火，因則無任蕩之患失，按腎本屬水，虛則熱，心本屬火，虛則寒。動火之病須之，然必少壯氣盛，能食者用之，相火用補，須藥住住，以此二味為君，日服一錢，脾胃受傷，真陽暗損，精氣不勝，致生他疾，故巢氏醫學宗旨有四物加知母，黃柏久服，傷胃不能生陰之戒。王昂曰：按火濕大，相火隸人之異虛火，宜補實人，宜瀉火，宜清潤，人宜升發溫火，由濕熱為數多病，肺腎經所謂諸腹股大，皆屬於熱，諸病胎脛皆属于火，是也。宜利濕清熱而兼補脾相火，寄於肝腎，乃龍雷之火，非苦寒所能勝，宜滋腎養血壯水之主，肝火旺，又按諸病之中火症為多，有本經自病者，如肺火咳嗽久則移熱于大腸，而泄瀉心火煩急，久則移熱于小腸，而為淋閉之類是也。有臟腑相移者，如肺火咳，久則移熱于心，火旺肺金

是也。又有別經相移者，有數經合病者，當從其重而治之也。奈今天下人不問虛實，竟有為去熱治勞之妙藥，而不知陰寒之性能損人氣，減人食慾門真元之火，一見而消亡脾胃運行之職，一見而阻喪元氣既虛，又用苦寒逼絕生機，莫此為甚。川產肉厚色深者，良生用降寢火，審火則不傷胃。炒黑能止崩帶酒製治，本靈製治中醫製治下。

桑白皮

灌木

桑白皮，入辛甘性寒，善入肺中氣分，瀉大利水，除痰泄氣，緣氣與水興發，止屬病標。其氣逆不利，與水飲膠結，未有不因火結而成火，雖謠甫曰：是瀉肺中火邪，萬肺氣也。久而不治，則瘀結便祕，喘嗽胸滿，唾血口渴，水腫腹脹，腹脹不色而見桑白皮，甘而寒，能於肺中治大利水，俾火去而水自消，水去而火即滅，而氣因而和。時珍曰：桑白皮長于利小水，乃宣則餘者宜之。十劑云：燥可去濕，桑白皮赤小豆之屬是也。宋醫錢乙治肺氣熱盛咳嗽，而後喘而腫身熱，萬曰：欲用桑白皮炒一兩，地骨皮培一兩，草炒炒半兩，每母服一二錢，入粳米百粒，水煎食後溫服。桑白皮地骨皮皆能瀉火，從小便去甘草瀉火而緩乃瀉肺諸方之準繩也。至晝有六能補元氣之不足，不過云其氣得自安。若以甘寒之味可以補氣，則當置甘溫於何地乎？況本草十劑篇云：燥可去濕，桑白皮赤小豆之屬是也。故濕則為重，宜燥而以除之。燥字從濕去重徐之後，但此性寒而裂，其裂亦作寒裂，雖有甘味，不能以制，故古人有戒勿多用之條。及肺虛火衰，水涸風寒作噦者，為切忌焉。馬鍾曰：練金瘡刮去皮，取白或恐瀉氣，審火用續斷桂心為使。忌鍼，桑乃其木之精，其木能開闊利水，九把燃火，則能去風除溼，故取桑枝，膏宜用。時日煎藥用桑者，取其能利關節，除風寒濕，車諸痛，山觀靈樞經云：治寒瘻內熱，用桂酒法。以桑炭炙布巾熨焯處，口僻用馬膏法，以桑鈎鉤其口，及坐桑灰土皆取此意也。又癰疽發背不起，或瘀肉不腐，潰及陰瘻，惡流注膿胞，須瘡久不愈者，用桑木炭成細片，紫作小把燃火，吹息之，患處每咬一片，時以瘀肉腐動為度。內亦要服補氣藥，誠良方也。乾桑木炭，甘涼色黑，治能除熱，養陰止渴，烏頭黑髮，月令云：四月宜飲桑椹酒，能理百種風火。桑耳散，血除瘀，破瘀攻癰，桑葉清肺，瀉胃涼血，燥濕去風明目，聖濟錄治吐血不止，晚桑葉焙研末，水服三錢，內一服止，後用補肝肺藥半金方，治頭髮不長，用桑葉麻黃，預脚目用黑芝蔴同桑葉等分，為丸，日服，治寒熱虛實，但見病血，即作熱治，妄用柏連芩柏殊為可惜，且能治心煩懊，五黃五淋，亡血津枯，口噤目赤，風瘡等症。此數亨曰：經霜桑葉研末，水飲服止盜汗。

桑葉

桑木

治心肺熱，邪曲屈下行

治心肺熱，邪曲屈下行，皆瀉肺，而三焦之鬱火以解，熱厥心痛以平。心痛因熱治，當用此，但丹溪謂心痛久則鬱而成熟，此止就其大勢論耳。若使所見之兼症，兼脉以分病之是，寒是熱藥之意，其法以丹溪之治虛火之急，得之矣，不可病以痛久成熱為凡，吐衄血淋，血刺之病，以息。桑子止治熱鬱之血脈，若經寒而血不歸，不可妄用。本草淮曰：治寢火之血順氣為先，氣行則血自歸經，宜溫大之，涼得之矣。氣壯則能自攝，血歸竅見今醫士不論寒熱虛實，但見病血，即作熱治，妄用柏連芩柏殊為可惜，且能治心煩懊，五黃五淋，亡血津枯，口噤目赤，風瘡等症。此數論。

鴻肺
降氣

入肺
降火
入腎
京血
涼骨

語業已道其大要矣。然更就其輕清推之，則浮而上者，其治亦上。故能治心肺之火，而凡在上，而見消渴煩躁，悶懶不眠，頭痛目赤，腫痛等症，得此以除。散屬氣燥，屬血，仲景施子政湯用桔子以治肺，順用香豉以治腎，燥火用桔子作吐藥，以就其味苦而論，則苦而下者，其治亦下。故能治肝腎膀胱之火，而凡在下，而見淋閉，便結，痘黃，癰，疽，血，疔，瘡，癰，癧等症，得此以世易簡方，治血不止，用山藥子燒灰吹之，屢效。普濟方治小便不通，用桔子仁十四個，獨蒜頭一箇，蜜鹽少許，搗貼於小腹，一錢，起癥，按此惟其氣浮，故仲景用此以吐，食之疾癥，惟其味苦，能降。故丹溪用此以降內鬱之邪耳。但治上宜生，治下宜炒，宜黑，雖其上下皆入而究則由自肺達下，故能旁及而皆治者也。此惟寔邪實熱，則宜，若復並非實熱，概為通用，恐不免有損食泄瀉之虞矣。生用鴻火炒黑止血，薰汁炒止煩嘔，內熱用仁表熱用皮。

地骨皮

灌木

地骨皮，肺腎即枸杞根也，味甘氣寒，雖與丹皮同治骨蒸之劑，但丹皮味辛，能治無汗骨蒸，此屬味甘，能治有汗骨蒸，且丹皮屬入血，散瘀之品，汗者血也，無汗而見血瘀，則於辛於寒最宜。若有汗骨蒸，而更用以丹皮辛散，不竟使奪汗無血乎？經曰：熱淫於內，以甘寒地骨皮是也。按地骨皮入肺降火，入腎涼血涼骨，凡五內熱淫，而見肌肉潮熱，二便癃閉，胸脅痛楚，與火於頭，而見風痛不休，外感之風宜散，邪內生之於表，而見潮熱無定，是內薰蒸而達于表，朱二允曰：能足內潮人所作潮往來，非柴葛所能治，用地骨皮走表，又走裡之藥，消其浮遊之邪，服之未有不愈者，特表而出之。於肺而見消渴咳嗽，不虛，上無虛，不用此解，除令人但知芩連，人治上焦之火，知榮以治下焦之火，而不知地骨皮之甘淡微寒，深得補陰退熱之義矣。時珍常嘗言：高佐此退熱，屢有殊功。李東垣曰：地骨皮為裡，皮為表，此既治內熱，不生而於表裡浮遊之邪，無有不愈。此為表裡上下皆治之藥，而於下為尤切焉。但脾胃虛寒者禁服。江昂曰：腸滑者忌枸杞子，中寒者忌地骨皮。生用甘草水浸用。

杜杞葉

山果

杜杞葉，肺入味苦氣平，諸書皆言為肺治喉，緣嗽多由胃氣不和，肺氣不順，以致火氣痰塞，因而咳嗽不已。丹溪云：氣有餘便是火，火起則痰生，服此味苦而平，則肺金清肅而氣不得上逆而順矣。氣順則痰與火皆順。同為一類而逆者不逆，嘔者不嘔，咳者不咳，渴者不渴，是皆人用此合以欬，久花紫苑杏仁桑皮木通等分，大黃減半，蜜丸以治肺熱，大嗽身如火炎，令其食後夜卧含化一丸，剗未終而病即愈，則知此為清肺治火止嗽之要劑也。取葉乾重三錢者，為氣足，拭淨毛以免射肺，作嗽或霍火，或齎火，各依方用。

清胃
降火

茶茗三百廿一

茶茗歸入胃腎大者為茗小者為茶天地至清之氣得春露以培生意充足鐵木淳穢不受味甘氣寒故能入肺清痰利水入心清熱解毒是以珀頤能除火瘡能解凡一切食積不化屬滯頭目不清著寒痰不消二便不利消渴不止一切便血吐血衄血血痢火傷目瘡等症服之皆能有效湯液云茶苦寒下行如何是清頭但熱服則宜冷服聚疾多服少睡神久服人精至於空心飲茶既真入腎削火復于脾胃生寒陰陽服之無碍萬不宜服分之度處甚多有以陽表名者謂之真嚴鑄名者生於浙紹耑于清火有以建茶名者生於閩地耑於辟瘡者以苦丁名者產于六合耑於止利有以普耳名者生子滇南耑於消食辟瘡止利至蒙山世所罕有其有許多偽充真偽真殊然大要總屬道地宣滯之品茶散能治赤白痢蓋用使其寒熱平調雖一日之利暫快而終身之累斯大損多益少服宜慎矣

犀角三百廿一

犀角歸入胃

青胃
大熱
兼涼
心血

苦鹹大寒功耑入胃清熱及入心清熱而入以至及于陽明胃腑時珍曰五臟六腑必先于之必先入胃犀角為神靈之獸食百草之毒及眾木之棘角尖精力盡聚用此苦寒之性使之耑入陽明以清諸熱犀角也熱邪既去心經自明所以狂言妄語熱毒耀腫齶煩目赤吐衄血血蓄血時渡斑黃痘瘡重陷等症無不由子入胃入心散邪清熱涼血解毒之功也然痘瘡心火初用不無水伏之虞後用不無引毒入心之患故必慎用始無碍耳至于蟲毒之鄉遇有食以犀角助搗之有毒則生白沫無毒則無若云可以發表取汗則必毒熱閉表合以升發等味同投則見魄汗淋漓若微毒單用則不及矣鏤成以熱掌搗之香者真尤須鴻不香者假成器多被患者無力入湯劑磨汁八九劑剉細納懷中待熱搗之立碎升麻為使忌鹽

羚羊角三百三

羚羊角歸入心肺

青胃
大熱
兼涼
心血

苦鹹大寒功耑入肝爲火畜也而羚羊則屬木故其角入厥陰肝經甚捷同氣相求也肝生木開竅于目其發病也目暗障翳而羚羊角能平之肝主風在合爲筋其發病也小兒驚癇婦人子癧大人中氣弱筋脉變急歷急掣痛而羚羊角能舒之魂者肝之神也發病則嘔嘔不寧狂越僻誤驚癇卒死而羚羊角能安之血者肝之臟也發病則瘀滯上注疝痛毒痢瘡瘍瘕產後血氣而羚羊角能

火
膀胱
大
清降

散之。相火寄於肝膽。在氣為怒。病則煩懣。氣逆嘔塞不通。寒熱及傷寒伏熱而羚羊角能降之。羚之性靈而筋骨之精在用。故又能辟惡而解諸毒。碎佛牙而燒煙走蛇虺也。本經別錄甚著其功。而近俗罕能發揚。惜哉。時珍之論如此。但此雖能清肝及肺。若使過用久用。則更有伐生之氣耳。多雨角。一角者勝山驢。山羊非羚羊也。剉研極細。毫磨用。

人中白三百四十一人

人中白入肝即溺白瑩之物。故以白名。味鹹氣平。能瀉肝經。膀胱火邪。使之盡從小便而出。蓋膀胱係溺口之故道。用此正以其故。道耳。今人病口舌諸瘡。用之有效。降火之驗也。張景岳說云。李上常苦鼻衄。僅存喘息。張思順用人中白散。即之用人中白藥治之。即止。並不再作。此皆散血之驗也。瓦上根。刮取白新

重便二百五

童便高入膀胱。兼入肺胃肝心。係孩童津液。濁氣滲入膀胱而味鹹。氣寒無毒。為除瘧熱骨蒸。咳嗽吐血。婦人產後血衄。暈悶。絕之聖藥。諸書云。降火甚速。降氣甚神。飲溲溺百不一死。非真不如其言。功力之優也。又言人病有寒則咳嗽。殺人疾不停物。經云。飲入于胃。游溢精氣。上輸于脾。脾氣散精上歸于肺。通調水道。下輸膀胱。故人服小便入胃。亦隨脾之氣上歸于肺。下通水道。而入膀胱。乃尋其舊路也。故能治肺病。引火下行。凡人精氣清者為氣。濁者為血。濁之清者為津液。濁之濁者為小便。與血同類也。故味鹹而走血。鹹寒能化虛熱。使火不上炎。血不妄溢。是以能療諸血證也。凡人久嗽失音勞過煩躁吐衄。損傷皮膚。皴裂入咬火燒絞腸。殘痛難忍。包衣不下。法當乘熱飲之。薛已云。子在居庸見覆車被傷七人。仆地吟呻。俱令供宜服。此苦勝服。或作痛。或發熱煩躁。口渴。惟服此一昧勝似他藥。他的肺散恐有瘀血。反致誤人。童便不動臟腑。不傷氣血。萬無一失。軍中多用此。亦屢試有效。益熱則尚存真氣。其行自速。冷則性有鹹味。寒性矣。若救陰却勞。必以童便為優。蓋取混元之氣。清純而不淆雜耳。但胃寒食少者。切忌。人類用秋石。雖亦能入腎除熱。但經水澄火煉。真元之氣全失。其功不及童便多矣。况多服久服。則鹹能走血。令血凝氣滯。為病初有陽氣素虛。食少腸滑者。其可用之為治乎。取童子十歲以下。相火未動。不食葷腥酸鹹者佳。去頭尾。取中間一節。清徹如水者。用痰用蜜。汁濃用蜜。水月用湯溫之。

本草求真卷七

下氣氣者人身之寶。周流一身。須刻無間。稍有乖離。即為病矣。治之者。惟有保之養之。順之和之。使之氣常自若。豈有降伐其氣而使不克自由耶。然河間謂人五志過極。皆謂火。丹溪謂人氣有餘便是火。則是氣過之極。亦為人身大患也。是

以氣之虛者宜補氣之降者宜升氣之間者宜通氣之鬱者宜宣氣之散者宜散氣之脫者宜固氣之實而堅者則又宜破宜降宜下而已蓋氣之原發于腎統于脾而氣之出由于肺則降之故每出于肺居多而腎與脾與肝止偶見其氣乎而已如馬兜鈴非因入肺散寒而熱而降其氣半蘇子非因入肺寬胸消痰止咳定喘而下其氣半杏仁非因入肺開散風寒而下其氣半桔梗非因入肺清熱而降其氣半黃芩非因入肺消痰火而下其氣半橘梗隨子非因入肺宣肺而瀉火枳殼非因入肺宣火而降其氣半葛根非因入肺消之下三稜破氣則在肺經血分之中諸石則入心肝二經涼血解熱而氣得石以平郁李則行水破瘀山甲則破癰毒結取之氣而血亦消喬木則消肺中積滯之氣妙熟藥服子則下肺喘而消脾帶主于沉香補腎脂是引腎真火收納歸宅黑鉛是引腎真水收納歸宅皆能下氣定喘丸此皆屬降劑一有錯誤生死反掌治之者可不熟思而詳辨

半

荆三稜

音云芳草

草三
根破血
經之氣
分之氣
消痰
下肺

枝梗破
肝經之氣
分之氣
消痰
下肺

最肺
風寒
氣分
氣消痰
下肺

旋覆花

溫草
三百克

三稜味苦氣平皮黑白肉白大破肝經血分之氣故凡一切血瘀氣結瘡硬食停老塊堅積靡不藉此味苦入以血分行其氣滞俾血自氣而下但此若以血藥同煎則於血可通以氣藥同入則於氣可治仍須和以補氣健脾之味方良汪昂曰患癲癥死遺言聞腹取之得病塊如石大理五色削成刀柄因刈三稜謂日五氣所病以為噎又日寒氣客于胃破逆從下上散復出于胃故為噫嘔氣多屬胃氣虛弱三稜火附消氣也但云削成刀柄不無詭誤若使專用劫伐則胃氣愈虛氣不行而積增大矣

出荆地色黃體革若鯤魚而小者是今世所用皆草三稜醋浸炒或麩裹煨

旋覆花入肺即本經所名金沸草者是也其性雖蕙辛溫凡陰虛勞嗽風熱燥咳不可誤用用之其嗽必甚究之味苦而鹹性王下降凡心脾伏飲膈下脹滿胸上痰如唾如膠漆風寒濕痰及聞死肉腥之即能有效更能續筋敗傷而止汗消渴之陽病旋覆花藤細如筋可炙破能續筋敗傷是以仲景之治傷寒汗下後心下痞堅噫氣不除有旋覆花諸石湯即增氣也經日五氣所病以為噎又日寒氣客于胃破逆從下上散復出于胃故為噫嘔氣多屬胃氣虛弱三稜火附消氣也然亦有疫有大有食仲景立此方以治傷寒汗下後胃虛內用人参甘草以扶正董襄以和中旋覆花於轉陰虛而陽升而上遠諸石使總陽留滯之陰降而下行然並金匱半夏湯下有旋覆花湯胡洽治痰飲在兩脅脹滿有宿痰花湯皆取苦能下氣故耳惟其性專主下故書皆載病衰弱大腸虛寒暑切忌以其不禁再下故也五月五日採花晒乾去皮蒂蕊殼用

杏仁

五百克

李仁肺既存發散風寒之能復有下氣降喘之力緣辛則散邪苦則下氣潤則通秘溫則宣濡行痰杏仁氣味俱備故凡

肺經感受風寒而見喘嗽欬逆胸滿便祕煩熱頭痛則未盡毒瘡瘍狗毒面毒錫毒金瘡無不可以調治按醫餘云索麵宜杏仁能消其積也狗咬傷瘡瘍此方用蠟燭杏仁以塗即愈是否仁能解狗毒也諸瘡腫痛用杏仁去皮研搗取膏入輕粉麻油謁搽神效是杏仁能治瘡瘍毒也目中翳遮但瞳子不破聖濟錄用杏仁三升去皮搗火燒熟去麪研搗

降氣
寬胸
消積除胸
膈以

除喘

積去油每門一錢入銅線一錢研。東垣論杏仁與紫菀均屬宣肺除溼開濁而一主於肺經之血瘀。一主于肺經之氣陷。杏仁與桃仁俱治便祕而一治其脈浮氣喘便秘子晝而見。俗一治其脈沉狂熱便閉于夜而見。桃仁楚曉論杏仁括莫均厲陰火而從腠理中發散以祛故表虛者最忌。杏仁一從腸胃中清利以除故裏虛者切忌。括諸藥貌雖相同而究實有分辦。魄門即肚門主政納為氣之通道故並用陳皮佐之至晝所言久服令人鬚眉髮落亦是耗氣之故今人以此混治陰虛喘嗽及於亡血家妄投其亦未明耗氣損血之義也。予去皮尖炒研。薑根連皮尖研雙仁者殺人得火良惡黃耆黃芩葛根。

枳殼三百三十

枳殼熟入肺胃苦酸微寒功善下氣開胸利肺開胃凡人或因風寒食滯熱積濕停風熱而見咳嗽胸滿便閉痰癰癥結嘔逆水腫脹痛潔利痔腫腸風濕癰等症治皆能除。至晝有云枳殼益氣明目似屬誕但人臍附本貴清利清利則氣自益而目自明。枳殼體大氣散解軟之枳實功雖稍遜而利氣寬胸謂之益氣非其宜乎。王好古曰枳實佐以參术乾薑則益氣益氣而復多用則能以損胸中至高之氣雖束胎瘦胎亦有進用枳殼之味。昔湖陽公主難產方士進瘦胎飲用枳殼四言消痞止但多用則能以損胸中至高之氣雖束胎瘦胎亦有進用枳殼之味。兩甘草二兩五月後日服一錢。聚古改以枳木名來然必氣實可投若使氣虛而用則不免有虛虛之禍矣。寇宗奭謂瘦胎束胎二藥子甚不然蓋孕婦全賴血氣以養胎丸若概施則誤矣。時珍曰八九月胎氣盛壅滯用枳殼蘇梗以順其氣胎前無帶則虛後無虛也氣弱者大非所宜矣。陳者良。

枳實三百三十

枳實熟入肺胃味甘性寒治能降氣寬腸消積去穢凡白帶白澀泄痢瘧瘧潰爛湯火灼傷氣盛濕熱等症是其所宜且炒焦熟利肺開胸寬腸之味耳是以氣在胸中則用枳殼氣在胸下則用枳實氣滯則用枳實雖古有云枳殼治氣枳實治血然氣行則血自通究皆利氣之品而非通血之劑耳故同白朮則可調脾同大黃則可推蕩。時珍曰蓋自飛附至去也俗云一年沉積在若使脾胃虛弱不堪服食食則令人頭眩作麵和猪羊內食食則令人鬚眉脫落又不可食黃魚以氣而已若氣虛宿滿而用枳實枳殼則與抢救救火者無異矣。

薑參音王

水術膾胃味甘性寒治能降氣寬腸消積去穢凡白帶白澀泄痢瘧瘧潰爛湯火灼傷氣盛濕熱等症是其所宜且炒焦熟水術以治絞腸疝腹痛醋調塗之以治小兒丹毒赤腫亦妙蓋以味甘入腸性寒濕熱氣動而降能使五臟溼滯皆歸而去也俗云一年沉積在若使脾胃虛弱不堪服食食則令人頭眩作麵和猪羊內食食則令人鬚眉脫落又不可食黃魚以氣而已若氣虛宿滿而用枳實枳殼則與抢救救火者無異矣。

以食皆是其性動降之故。時珍曰：薑參最降氣，竈能鍊腸胃津滯而治渴。

燒反淋水即鹹。用化石灰能去麝肉。

渴帶澀，利腹痛，上氣之疾氣盛有濕熱者宜之。

平瀉平瀉者從輕酌瀉之意也。凡人臟氣不固或犯實邪不瀉則養虎賂患遇瀉則真元有損故僅酌其微苦微寒至平至以固中而已。瀉不必過用硝黃但取石斛輕支以瀉脾茅根以瀉胃柿蒂以斂胃溫熱邪粳米甘未甘原下氣金銀花清肺解毒而已。瀉不必追用黃芩不知母但用沙參清肺火熟百部除肺寒桂百合清肺理氣桔杷葉清肺焦陰火伏留骨節白芍入肝斂氣的膝入肝清熱除風而已。瀉心不必黃血積熱消勞除蒸旱蓮草入肝涼血青蒿草清三子葉清心以瀉煩當草清心以醒憂利水鬱金入心以散瘀丹參入心以破血而已。瀉腎不必追用黃柏重便知母但用丹皮以除無汗骨蒸地骨皮以除有汗骨蒸而已。至於調刺陰陽則或用以陰陽水止瀉消渴解毒則或用以補黃沒藥苦酒開鬱則或用以木宅紫花穀精草而已。凡此雖屬平瀉但用之得宜自有起死回生之力未可忽為淺常也。

沙參言三山草

沙參肺甘苦而淡性寒體輕故能入肺以泄熱及瀉肺火。凡久嗽肺萎全受火耗者服此最宜。蓋以熱氣重熱非用甘苦輕淡不能以制焚燎之勢故嗽必藉此止若寒客肺中作嗽切勿妄用以嗽既屬寒成復兼寒藥為治不更使寒益甚乎。至晝夜補肺養肝及益脾腎皆是從肺子母受累推究而出服此肺不受刑子母皆安即肝亦不受累諸臟並見安和耳。非直能以補陰也。然在於肺宜用肺熱清而陰不受累故書白實者良生沙地長大生黃土者瘦小惡陽已反藜蘆。

薑沙仁言三根

薑沙仁禹入肺書載于清肺熱下理脾濕以其色白入肺性寒瀉熱味甘入脾味淡濕故也然此升少降多凡虛火上乘而見肺萎肺癰因熱生渴而見水腫濕熱脚氣心火世列熱淋並風熱筋急拘攣等症皆能利水而使筋不縱筋為厥陰指于陽明胃土以為長養益陽明胃土內無濕熱以溫則肺上不薰蒸其葉而宗筋亦潤宗筋則筋骨柔而筋固肺熱焦葉機闊不利而治姜則獨取於陽明故意涼清熱除濕實為始瘡要藥震亨曰寒則筋急熱則筋縮急因于堅強縮因於短促若受寒則弛弛則引長然寒與濕未嘗不挾熱三者皆因于濕然外濕非內濕故之不能成病故濕之為病因酒而魚肉繼之甘滑陳久燥火并辛香皆致蒸之因也筋急寒熱皆有因熱筋急當用薑沙仁清熱除濕因寒筋急當散寒濕似不宜用薑蒸熟之非若白朮氣味苦溫寒性不見號為補脾要藥矣此皆清熱利水之味用於湯劑江昂不然衍義之說亦非確論和緩須倍他藥若津枯便秘陰寒轉筋及有孕婦女不宜妄用以性為下泄也殺疣取根同糯米炒熟或鹽湯煮過用。

麥冬言二三百

肺火根普淡

清心

清肺
熱除
腳濕

肺火

麥冬心肺有類天冬然麥冬甘味甚多寒性差少天冬所主則更在肺而在心是以書載功能消痰止嗽治嗽須分外感內傷如外感則聲盛而渴未緩後急日夜無度痰涎稠枯而喘急內傷則聲怯而稿先急後緩或早甚或暮甚清痰小氣而喘之外感則其發必暴或為寒熱或為氣逆或為鼻塞脣重頭痛輕者脈亦相緩重者脈見弦洪內傷其發

有物或素質弱精虛，固日漸以甚其症或為寒熱，朝熱或為形容瘦減或兩鬚常赤或氣短喉乾，其脈亦微數，重必細數，弦緊，而熱除煩。去疫除溫，則生為足弱不能行之症，腰脊不舉，骨枯肌減，發為骨痿之症，獨肺熱而葉焦，高源化絕，而諸臟不得仰肺灌潤，故疫獨推于肺而治痿又責重于陽。

明而又載同人參，則能復脈生津，脈散非舍心肺而皆治乎。蓋肺朝於百脈，脈屬心，心燥則肺失養，而脈絕，心清則氣即充，而脈復，冬氣宜清補，聚於心中，除煩，而心不煩，譬如人當盛暑，則燔灼不寧，若值秋風一至，則炎熱頓解，而無燥鬱不堪之候矣。東垣曰：人參甘寒，寓火熱而益元氣，來冬苦寒，滋脾金，益五臟之氣也。至于乳汁不開，用此則能通活，血妄行，用此則能即止。他如膈上之稠痰，得此則消，心下之支滿得此，則除。脾胃有積熱，則化胃有火，嘔則止，色因血枯，即閏嗽久不止，即愈，成保肺之津液。清心之指南也。但氣寒而虛人禁用，肥大者良去心用，人滋補藥酒浸地黃車前為使藥，久再苦參青葙木耳，而脈復。

百部

音三五

寒泄，肺熱，殺蟲，止嗽。

百合

音二六

百合，入肺，甘苦微溫，功善殺蟲，能除一切蟲毒。及傳屍骨熱，樹木蛀蟲，疳積，疥癬，即死，然亦能治寒嗽及泄肺熱，以其氣味甘溫故也。李時珍曰：二冬亦屬治嗽，但二冬性寒，治嗽此則氣溫治寒耳。百部雖云微溫，而苦過于甘，於氣熱屬有礙，似於虛人不宜。浩傷不可不知，根名成自，故以百名。取肥實者，竹刀劈去心皮，酒浸焙用。

石斛

音三六

石斛，入肺，生於石上，體瘦不肥，色黃如金，枝如鉗，甘淡微苦鹹平，故能入肺而除虛熱，入腎而清元氣，又能堅筋骨，強腰膝。凡骨蒸潮熱，養濕精，小小便餘瀉者，最宜以其本生于石，體堅質硬，故能補虛弱，強筋助骨也。但形瘦無汗，味淡難出，非經久熟，氣味莫泄，故止可入平劑，或熬膏用以治虛熱，補性雖有，亦惟在人，認病輕重，於用可耳。取光潤如金鉗，股短中實者，艮長而虛者，名水斛，不堪入藥。去頭根，酒浸用，惡巴豆，畏蠶蠶。

鈎藤

音三七

入肺，除虛熱，入腎，清心，肺餘，熱，寒泄，腸熱，殺蟲，止嗽。

水斛

音三八

治心
熱祛
用風

清胃
火消
瘀血
利水
道
茅針
茅上
敗
清肝
腎三
焦陰
火伏
留骨
節
青蒿
子
青高
根
利水
除煩
清心

釣藤味甘微苦。氣平微寒。為手少陰心厥陰肝經要藥。緣肝主風。心主火。風火相煽則風因火而愈熾。火亦因風而益盛。其在小兒則病必在驚癇。瘛瘲。眼翻抽掣。急而縮為掣。緩不已為瘛。伸縮不已為瘲。飛治謂之搐搦是也。大人則病必見頭旋目眩。婦人則病必見赤白帶下。故必用此輕平宣泄以為下降。則風靜火熄。而驚風軟自爾。其究除矣。瘲煩惡動。故由掣病此。惟小兒風熱初熱病未見其者。用之得宜。若使風火至極。勢難驅退。則此輕平疏泄。效難克奏。又當細審所因。用以重劑。以為投服。則瘲始病當而無添重藥輕之劑矣。取藤細多鈎者良。有加但久煎則無力。

白茅根音言草

清胃
火消
瘀血
利水
道
茅針
茅上
敗

茅根入肺胃。味甘性寒。清熱瀉火。消瘀利水。凡苦寒之藥。未有不傷氣敗胃。此藥味甘性純專理血病。凡一切吐血衄血。血瘀血淋。血崩血閉。並咳嗽喘急。煩渴。黃疸。水腫等症。因熱因火而成者。服之熱除而血即理。火退而氣與水即消矣。吐血由於逼而上行。與衄血由於肺火所致。皆當用此水煎溫服。或為末水泔水調服。且能解酒毒。恐爛五臟。用根汁一升飲。根汁一升飲。潰癰疽及癰毒諸瘡。或用根搗敷。或用此煮汁調敷毒等藥。或以酒者。亦無不可。此藥甘不泥膈。寒不傷中。為治虛羸客犯中州之劑。時珍曰。良藥也。世人以微而忽之。惟事苦寒之劑。傷中和之氣。烏足如此哉。至云能以補中益氣。雖出本經。然亦不過因其胃熱既除。而中氣自復。豈真補益之謂哉。經解之說。似未可信。第以白者為良。初生茅針。可以生噉。甚益小兒。功用亦同。屋上敗茅。止衄敷瘡最妙。

青蒿音言草

青蒿入肝腎三焦。性寒苦。味甘微辛。氣寒無毒。陰中有陽。降中有升。能入肝腎三焦血分。以療陰火。伏留骨節。故凡骨蒸勞熱。及風毒熱黃。久瘧久痢。瘡瘍惡瘻。鬼氣屍疰等症。最服此。時珍曰。月令通。集言伏內。庚日采蒿懸門庭。可辟邪。冬至以其苦有泄熱殺蟲之能。陰有退熱除蒸之用。辛有升發舒脾之功。而又於胃中氣不犯。以其得春升之令最早也。其形有類山茵陳。又能清上虛熱。以治目疾。且燒灰淋汁。點治惡瘻。瘧內癰癥。生搗可敷金瘡。止血止痛。但性偏寒不溫。雖曰於胃不犯。亦止就其血虛有熱。服之得宜而言。若使脾胃素虛。及見泄瀉。則于此終屬有忌。妄服便滯葉用。耗膏良。使子勿使母。使根勿使莖。止。薑草心脾何以當。以其草屬肝膽。值可以解憂。蓋草之背。苗如愁葉。食可以適口。即度味甘而氣微涼。能以去濕利水。除熱通淋。止渴消煩。開胸寬膈。令人心平氣和。無有憂鬱。是以命名。時珍曰。薑草即今東人採其花。耐甘而貨之。名為黃花菜。又曰。薑草屬水性。下走陰分。一名宜男。蓋無微意。

薑草音言草

薑草心脾何以當。以其草屬肝膽。值可以解憂。蓋草之背。苗如愁葉。食可以適口。即度味甘而氣微涼。能以去濕利水。除熱通淋。止渴消煩。開胸寬膈。令人心平氣和。無有憂鬱。是以命名。時珍曰。薑草即今東人採其花。耐甘而貨之。名為黃花菜。又曰。薑草屬水性。下走陰分。一名宜男。蓋無微意。

游但氣味清淡服之功未卽臻不似氣味猛烈藥一入口而卽見其有效也。

山楂

山楂一
山楂

消食
磨肉
伐胃
肢脾

山楂脾胃甘酸鹹平。何書旣言健脾。又曰能伐脾胃生化之氣得非自矛盾乎。使明其理以推。則知所謂健脾者。因其脾胃有食積。用此酸鹹之味。以為消磨。俾食行而痰消。氣破而血化。謂之為健。止屬消道之健矣。如係胃脾之氣。便以補益為名。以為用藥進步。詎知實而用此輕平消導。得此則健虛而用此保無害。云伐生之說乎。按楂味酸與鹹。最能消化肉食。並多殺食者絕。凡耆老雞硬肉。但投楂肉數枚。則易爛。其消肉積。且人多食則嘈煩易飢。服久太過。但用山楂即解。豈非戕脾伐不相同。時珍曰。凡三牌內食物不化。胸腹酸利。脹悶者。于每食後嚼二枚。絕佳。但不可多用。恐反耗伐也。至於兒枕痛。獨于惡露積于太陰化之速。最令砂糖調服。以行其寒。有大小二種。小者入藥去皮核。化食磨積。搗作餅子日乾用。易飢。損齒齦。人尤不宜也。出北地大者良。

梗米

梗米一
梗米

固中
清熱
除煩

梗米。尚入脾胃。卽人常食之米也。稟天地中和之氣。味甘性平。時珍曰。北梗涼。南梗溫。亦梗熱。白梗涼。晚白梗寒。新梗人非此物不能養生。故性尚主脾胃。而兼及他臟。凡五臟血脉。靡不因此而灌潤。五臟積液。靡不因此而充溢。他如周身筋骨肌肉皮膚。靡不因此而強健。故凡白虎桃花竹葉石膏等湯。靡不因此。為固中清熱。然米既有早晚之不同。復有地土出處之各異。頃日新米。仁食動風。早米受氣既早。性雖溫而質多粘。食之反能戀膈。脾有濕滯。則米潤而性陰。然總于中是固。諸方用此佐助。蓋恐藥性甚寒。得此甘緩同入。俾胃氣不致頓損。而熱與煩亦得與之俱安矣。此雖常食之物。服之不甚有益。而一參以藥投。則其力甚巨。未可等為泛常而忽視也。

米醋

米醋一
米醋

散淤
解毒
下氣
消食

米醋。入本濕熱之氣而成味。則酸苦氣溫。酸主斂。故善多載散瘀解毒。下氣消食。且同木香磨服。則治心腹血氣諸痛。以火淬醋入鼻。則治產後血暈。且合外科鈎散。則治癰結瘻癰。痘黃癰腫。暨口喫以治舌瘻。麵塗以散損傷精血。及殺魚肉菜蕈諸毒。義而又有散瘀解毒之功。至醋既酸。又云能散癰腫。以消則內散。潰則外散。故耳。解且多食傷筋軟齒。收縮太過。則筋人傷。時珍曰。酸屬木。傷筋者最忌。脾病多食酸。傷脾肉韌。而信陽以酸入筋。過斂則於筋有傷。過酸則木強水弱。而於齒多軟。宗奭曰。食酸齒堅。猶造靴皮者須得醋而致軟。

故知其性收斂
不負酸收之意
米造陳久者良
鏡源曰米醋煮製四黃
丹砂胆礬常山諸藥

調陰陽
不和

瀉肝
分積熱
除勞嗽
骨熱

陰陽水
地水

陰陽水入即湯沸半杯合井冷水半杯而並用之也。緣人陰陽不和則吐瀉並作而霍亂不寧斯時病屬食氣寒熱難分。陰陽莫測若使技以偏制之類以熱則不克有誤治之失矣。惟急用此投治則陰陽克協故借有形調和之質以平無形不和之氣也。若使心腹絞痛。若有吐瀉之寢者是為乾霍亂即為絞腸少心腹绞痛不得吐瀉者名乾霍亂吐在下則瀉邪在中則吐瀉並作則又另有法在如古方用鹽款熟童便調飲極為得治而非此水所能治矣。

蟹甲

通蟹

濕血入味鹹氣平色青晝雖載屬補肝。肝與腎載屬補腎。黑入各別然究皆屬除熱削肝之品。介蟲皆屬陰非真滋肝藥也。凡厥陰血分積熱而見勞嗽骨蒸寒熱往來溫瘧瘧母及腰腹脇堅血瘕痔核經阻產難癰癰瘡瘍等症服此鹹平能以消除。諸症皆就陰虛邪入而論之。若肝虛無熱切忌蟹以七肋九肋者佳以其得陽之數耳。其用必取少肋以助屬肝故耳。但食品中惟蟹巨測如三足兩頭並項強股赤筭大毒能以殺人不可不慎。

血劑

溫血涼血下血

濕血身氣以衛外血以營內有氣以統血則血始能灌溉一身而凡目得藉血以視耳得藉血以聽手得藉血以觸掌得腐謀虛能斷二便能送藥事能應者靡不本其氣之所運有血以附氣則氣能升降出入而凡伎巧能強治節佳山水穀能潤注而不流故必有用溫燥之藥以行之氣勝于血則血燥而不通故有少陰清涼之藥次之行之若使氣血並勝則有積熱而致瘀塊不消根深蒂固經年累月不愈者則又不得不輕破氣捐血之藥以下俾血氣血乘而氣更虛則氣更虛於氣則氣失其所司而血愈寒愈帶故凡用藥治血必得其氣稍厚以為之主而凡瘦厚氣薄之品自不得相兼如血有疑於肝症見惡寒戰栗其可不用肉桂以治乎風溼血閉其可不用川芎以治乎肌膚灼熱吐衄則風其可不用芍藥乎經閉不通其可不用蒼耳子以治乎陰腫崩漏其可不用海螵蛸以治乎目翳不散其可不用海螵蛸以治乎乳阻其可不用王不留行以治乎惡露不淨其可不用大小茴以治乎血暈血滯其可不用沙糖以治乎此肝經血氣之當溫也若使肝經血滯而更見有脾氣不運則伏龍肝似不能離肌肉不生則白疕似不能捨水腫腹痛則澤蘭似不能却蟲不能除肌肉不生目翳不開則爐甘石似不能少血脫不固遺瘻內消則荊芥似不能除血脈不通則桑葉似不能除心腹卒痛則延胡索不得不用神氣不定則安息香不得不用骨碎血瘀則骨碎補不得不進此症有兼心肺者又如此見有鼻衄血滯之不得不用丹皮以止筋骨血瘀之不得不用烏墨以治乎血瘀之不得不用斷續以通肺痿血瘀之不得不用雞蘇以散腎寒血瘀之不得不用陽起石以宣得不中赤精遺之不得不用白蒺藜以解督脈不通之不得不用鹿茸以溫筋骨堅硬症瘕痃癖之不得不用海狗肉以散是症有兼腎經者又如此矣至于心經血滯而症見有痞冷痛在上者有桂心可用見有癰瘍痛迫在下者只有乳香可除凡此止就溫血大慨畧為分晰而究其要則又在隔症審脉分別無差庶于用藥治血之理自不致有天淵之隔矣。

雞蘇尚入即龍腦薄荷也。又名水蘇。生於係野生之物。味辛微溫。功有類于蘇薄。但蘇薄其性稍涼。水蘇其性稍溫。蘇薄其性主升。水蘇其性主降。蘇薄多於氣分。疏散水蘇多於血分。溫利。故凡肺氣上逆而見頭風目眩。與血瘀血熱而見肺痿血痢。吐衄崩漏。喉腥口臭。邪熱等病者。皆當用此宣泄。人平和劑局方。俾熱除血止。而病自可以愈矣。但表疏汗出。其切忌焉。

澤蘭三百四
芳草

澤蘭尚入苦甘而辛。即今婦人採置髮中除垢者是也。玩書所論澤蘭與本經蘭草同為一體。其生澤旁。葉莖素枝。亦節綠葉皆香。置于髮中能以辟邪。首頭故雖呼為香草。俗則呼為孩兒草。與於山間。其花雖香。而葉絕無風者。迥不相同。時珍曰。蘭草澤蘭一類二種。雖生水旁下濕處。但以莖圓節長。葉光有毛。有此者為蘭草。並微方。即無。而葉有毛者。為澤蘭。木公離騷序。云必采蘋。俱香燥潔不變。方可刈佩。今之蘭蕙花雖香。而葉無氣質。弱易萎。不可刈佩。汪昂曰。本經既言澤蘭。則非山蘭明矣。是離騷之秋蘭。當屬本經之澤蘭無疑也。吳草盧曰。蘭為醫經上品之藥。有枝有莖。今之所謂蘭。是無枝無莖。因黃山各稱之。遂誤指為離騷之蘭耳。蘭草。澤蘭。莖圓葉光。其性專主入心。雖書載有人服益氣輕身。不老膚。語然究止。屬利水除痰。殺蟲辟惡。而為消渴良藥。即內經所謂數食肥甘。傳為消渴。治之以蘭。以除陳氣。是也。東垣治止渴生津飲。用蘭葉蓋于此。又此草浸油。塗髮髮澤。蘭草方葉毛。雖書載有和血舒脾。長養肌肉之妙。然究皆屬入脾行水。入肝治血之味。是以九竅能通。臟節能利。宿食能破。月經能調。癥瘕能消。水腫能散。產後血淋腰痛能止。吐血衄血。目痛風癱。癰毒撲損。能治脾氣虛。則三焦通利。而正氣和。肝舒散。則營衛流行。而病邪解。蘭草走氣道。澤蘭走血分。正補鴻皆不同也。赤白茯苓。亦澤蘭。觀此。則書所云。舒脾和血。不過因其水消血除之意。豈宜舒脾和血之味也乎。入補氣補血之味。同投則消中有補。不致損真。誠佳品也。防已為使。根名

大小劍音兒
溫草

大小劍尚入雖書載屬甘溫。可以養精保血。雖然究精之養血之保。則又賴于血榮一身。周流無滯。若使血瘀不消。而致見有吐衄。唾咯。崩漏之症。與血積不行。而致見有癰疽。腫痛之病。則精血先已不治。安有保養之說乎。用此氣味溫和。溫不致燥。行不致散。瘀滯得溫。則消瘀塊得行。斯活。惡露既淨。自有生新之氣。癰腫消。具有固益之妙。保養之說。義由此起。豈真恭曰。大劍葉瘦腫脹而小能理血疾。不治外科。若脾胃虛寒。飲食不思。泄瀉不止者。切勿妄服。兩劍相似。花如薯。大劍莖粗。

通帶

沙糖
音辛

而葉細少刺莖低葉不纖皆用莖。

白糖
溫補

脾肺

入肝
叢結
通血

和胃

入肝
行血
不留

沙糖本于甘蔗所成。甘蔗氣稟中和。味甘氣寒。已為除熱潤燥之味。其治則能利腸解煩。消痰止渴。至于沙糖。經大煅煉。性轉為溫。色變為赤。與蔗又似有別。時珍曰。沙糖本草言其性寒。故能行血化瘀。是以產婦血量多者。有用此與酒沖服。取其得以入血消瘀也。小兒丸散用此調服。取其溫以通滯也。烟草用以解毒。亦取其有開導之力也。然性溫則消。則下。故虛熱過服。則有損齒消肌之病。味甘主緩。壅。故痰濕過服。則有戀膈脹滿之弊。此又不可不深思而熟察耳。時珍曰。沙糖性不宜多食。與魚肉之類同食。皆不益人。今人每用為水印。徒取其通口而不言陰受其害也。白糖因晒浮結而成。種類造體。鮮味甘色白。主治亦頗相似。然紫入血而白入氣。久食反有壅壅上膈之處。晝夜能以清熱。似非正說。時珍曰。石蜜糖比之紫沙糖性稍平。功用相同。人患試以口燥之。會食此其燥益甚。口冷之實。食之其冷即除。且致轉為燥渴生痰。於此可覘大槩矣。又奚必過為辨論哉。

穀精草

黑草

穀精草。入肝。本穀餘氣而成。得天地中和之氣。味辛微苦。氣溫。故能入足厥陰肝及足陽明胃。按此辛能散結。溫能通達。凡一切風火齒痛。喉痺血熱。瘡瘍痛癰。肝虛目翳。濕汎雀盲。至晚不見。並疳病傷目。痘後星障。服之立能有效。且遠清明目功力。駕子白蘿而去星明目。尤為專長。時珍曰。穀精體輕性涼。能上行陽明。分野凡治目中。試看望月沙。係危所食此草而成。望月沙亦能治眼。則知此更為眼家要藥矣。取嫩秧花如白星者良。

王不留行

黑草

王不留行。在古已命其名。謂此雖有王命。其性走而不守。不能以留其行也。又按古書有云。穿山甲。王不留。婦人服之乳當流。亦云行血之力也。觀此數語。已得氣味主治大要矣。又著其味曰。辛。曰甘。曰平。其氣曰溫。其功則能入足厥陰肝經。血分去風。去壅。通經利便。下乳催生。散癰腫。拔竹刺。與瞿麥同功。則知氣味疏泄潤至極。人安能有血而克止乎。何書人言止血定痛。能治金瘡。似與行血之意大屬相悖。頃日張仲景治金瘡。有王不留行。真元廣詎。知血瘀不行。得此則行血出。不止。得此則止。非故止也。得其氣味以為通達。則血不於瘡口長流。而血自散各經。以致其血自止。其痛即定。豈必以止為止哉。蓋義但古人表著治功。多有如此立說。以留後人思議。不可不細審焉。花如鈴鐺實如燈籠子。穀五穀。取苗一茎。浸用。

逐血
破瘀

溫血
分寒
除冷
止痛

入心
行氣
活血
止痛

天仙藤三百五十一

蔓草

天仙藤萬人青木香。馬兜鈴藤也。味苦氣溫。觀書所論。主治婦娠子腫。胎自兩足漸至喘悶似於他症。則未及焉。即其所治之理亦不過因此主子疎泄。性溫得以通活。故能活血通道。而使水無不利。風無不除。血無不活。痛與腫均無不治故也。昔有天仙藤散。天仙藤香附子陳皮甘草烏藥等。以治子腫。其亦可以知其槩矣。葉似葛圓而小。有白毛根有鬚。四時不凋者是。

骨碎補音普

骨碎補萬人入肾味苦而溫功而入腎補骨。且能入心破血。是以腎歸耳。鳴腎久瀉。腎司開闔之權。水足趾出水謂之子氣。及腹痛風瘡等症。而出無不用此調治。泄瀉研末入猪腎服食。牙痛炒黑。傳其財補骨。跌仆損傷骨痛牙痛血凝日熱日僵日盪。疰症皆明除乘于少陰之絡而成補骨故耳。雖與補骨脂相似。然總不如補骨脂性平固腎通心而無逐瘀破血之治也。去毛蜜拌蒸用。

桂心三百五十二

桂心萬人入心兼後人又祖其義而亦別之。有九日飲。日食日煎。日血。日腹內冷痛。瘡癰等症。皆能奏效。以其所治在心。故治亦在于裏。而不在于軀殼之外耳。非若肉桂。末去外層皮肉。其治在于通經達絡。以除風寒濕痺。而不耑入心腹之內也。

乳香音吾

乳香萬人入脾胃。即書所云薰陸香者是也。查鼠性溫不潤。諸書多以血有補。誰知血因氣逆。則血凝而不通。以至心腹絞痛。瘡因氣滯。則血聚而不散。以致痛楚異常。乳香查鼠入心。既能使血宣通。而筋不伸。楊瘦清云。凡人筋不伸者。數復能入。臂溫補。使氣與血互相通活。俾氣不令血阻。血亦不被氣碍。故云功能生血。究皆行氣活血之品耳。非如沒藥氣味苦辛。功竝破血散瘀。皆有推陳之力。而無致新之妙。是以書載乳香功能活血調氣。托裏護心。外用入瘡。凡能使毒氣。腹諸痛。口噤耳聾。口噤燒腫折傷癰癰。治癰狂。用靈仙辰砂乳香末仁酒下。恣但遇癰疽已潰及膿血過多者。不可妄投。恐其復閉走洩之路。其意也。可見矣。是若當歸辛潤。而為補血第一要藥也。出諸商如乳頭明透者。良惟難研。水飛過用。鉢坐熱水研之。或用燈心同研。則易細。市人多以楓香偽售。勿用。

酒音吾

造釀

酒當入脾

熱惟冠

星物

入胃則氣逆上壅

滿胸則肝浮膽橫

等於勇士不可遏矣

若引經用為嚮導則其勢最速

辛則通身達表

引入至高

巔頂之分

炎者忌甘則緩

寒者忌苦則降

水良血淡則通利

小便而速下也

枯者忌淡則利

火便而速下也

水良血熱酒傷中

溫飲和胃怡神壯色

於上渴滿于下恣飲寒涼其熱內鬱肺氣大傷其焰也病渴或嘔吐或自汗或瘡疥或鼻衄或泄利或心脾痛尚可散而去之其久也病深或消渴或內疽或肺癰或鼓脹或失明或毒瘻或瘍瘍或痔漏為難明之病非具眼未易處也至

於夜飲更屬不宜

益及氣王收斂氣密則固若用酒宣發醉飲就枕熟睡三僵傷心損目亂其清明勞其脾胃停風動火

致病甚多至入藥共釀合蠶則療麻逆客忤色紫則理癰瘕偏風急政則鮮煖熱而散風寒參橘則益五臟以明耳目狗肉

汁則大補元陽葡萄肉則甚消痰癖牛膝乾地則滋陰枸杞仙靈皮則扶陽痿等杜酒指納裏兜口中可令速語噴瘞及壁

則逐蚊蠅燒酒則散寒結然燥金涸敗胃傷膽水酒藉火醞釀其性則熟酒藉水底其質則寒少飲未至有損多飲自必

見害如陰虛酷好其臟本熱加以酒熱內助其熱益增不致逼血妄出不止陽虛酷好其臟本寒加以酒寒內入其害無量

不致飽脹吞酸吐瀉不止岳子損傷篇內極說糟眉跌傷行瘀止痛亦驅蛇毒及盦凍瘡醇而無灰陳久者良畏枳椇葛花

赤豆花綠豆粉鹹肉得鹽則解以水制火意

韭菜

二月八

年

性種類甚多能總由水穀之精熟穀之液醞釀而成故其味有甘有辛有苦有淡而性皆至熱惟冠其有寒凝海氣土火以致心痛者宜用韭汁和五苓散為丸空心茴香湯下益韭性急能散胃口氣血滯也又反胃宜用韭汁二杯入蜜汁半乳各一杯細溫服蓋韭汁者消食和胃半乳能解食和胃半乳當作熱治脈小便不利嘔吐酸臭當作熱治脈無力嘔吐清水當作寒醫色之黃白而澤者為實熱能令如大蛇傷用此搗爛如泥加鹽少許作厚籠頻換則安被刑杖及打血凝消運動即散久病下利不止同鰣魚煮食即止但火甚陰虛用之為最忌烏龜養牛肉汪昂人多以韭炒牛肉其味甚佳亦未見其作害又按經曰毒藥攻邪五穀為養五畜為益五果為助氣味韭子功治合而朋之以補精益氣五蘋菜蘿蔔蔓葵藿五萬桃李杏杏葉是也使韭累忘牛肉則經何以又不言其有忌乎素問曰足厥陰病則遺尿思想無窮入房太甚發為筋痿及為白泄男陽洩而下女子崩涕而下畧同但治遺精白濁更勝韭子之治遺精漏泄小便頻數女人帶下者能入厥陰補下焦肝及命門之不足命門者藏精之

血
寫

墨
言九

府故自蒸暴炒研用。救急易方用瓦片煅紅安。椎子數粒青油數點待烟起以筒。治云吸引至痛處良久以溫水漱吐有小蟲出為效未盡再薰。

墨黑入島能以止血。以其色黑味辛氣溫而止之也。益黑能勝紅。紅見黑而即止。以火不勝水者故耳。辛能散血。血散則血歸經而不外溢。是以遇辛而即止也。溫能行血。血行則血周流經絡而血不聚于所傷之處。是以得溫而即止也。止血義蘊故凡血熱過下。如溫瘡鼻衄產後血暈崩漏等症。並絲纏眼中皆可以治。如止血則涼苦血迷並汁投消腫。則以猪膽汁釀醋調並眼有絲纏則以黑磨雞血速點客忤中腹則磨地漿汁吞各隨病症所用而治之耳。但瘟疫熱病初起。遂用此以止血。則非所宜。

百草霜
言十

治血
止血
正氣
除熱
解毒
清目
翳

百草霜。黑入肝。兼入腎。即遇火上烟煤及斧頭鍋煤也。因燒雜草故名。味辛氣溫。觀其所主與伏龍肝相似。凡血見黑即止。蟲毒惡氣得辛溫則散。故本經黑主蟲毒中惡吐血暈以酒或水。或醋細研溫服亦塗金瘡止血生肌。至于傷寒發斑。及有陰毒疽膈瘡崩咽喉口舌曰癰諸瘡亦須用此以取火化從治之義。

兔屎
言十一

兔屎。黑入肝。即名望月沙者是也。充黑太陰之精。復餌製精草明日之藥。是以能明目以除目中浮翳。且療瘻瘍。并治瘧疾。食痘瘡等症。服之皆治亦由熟結毒積而成。得此寒以解熱。辛以散結。圓以收目。故能服之有功。時珍曰。兔屎能解毒殺蟲。在往用之諸家本草並不言及。亦缺漏也。按沈存中良方云。江陰萬融病瘡四體如焚。寒熱煩躁一夜瘡若一人。腹痛一月光明。使人心骨皆寒及瘡而係元規。使人遺糞服之。遂平。扣之則明月丹也。乃瘡而夢。若陰氣上乘目障不清。未可用也。史記方詳。

海螵蛸
言十二

海螵蛸。黑入腎。即烏賊魚骨。禀水中之陽氣。味鹹氣溫。腹中有墨書字。逾年乃滅。常吐黑水。自置其身人即于黑水處取之。凡諸血病。因于寒溫而見陰戶腫痛。大陰腫下刺。疳疾。暨瘕瘕。血崩。血閉。腹痛。環脣。目翳。淚出。膀胱出膿等症。服此鹹能走血。最能除寒。逐濕則血脉通。而無諸血障。吾之弊矣。故宜入厥陰肝經。血分活血。時珍曰。接素問云。有病胸背支脢者。妨于食。病至則先聞脣聲。見所清脫。血或解入房中。氣竭肝傷。故月事衰少。不來治之。以四烏頭骨一薑。始為末。丸如雀大。如小豆。每服五丸。飲以鯉魚汁。所以利腸中及傷肝也。御此則其厥陰血分無疑矣。又云。經閉有有餘不足二病。有餘者血滯不足者肝傷。血閉不足之病。兼入少陰腎經以治。濕瘻。癰癧。諸瘡。裁用。螵蛸同麝為末。以治耳底出膿。同牽牛以治赤白目翳。同乾

涼血
解熱

涼血
通瘀

胭脂
紅花

人心

包肝
涼血
鮮毒

生地黃
蕷草

生地黃入心肝腎，性味甘寒，故書嘗載其性鮮補。但入手少陰心，足少陰肝，足厥陰肝，並足太陰脾。手太陰小腸力專清熱濁火，涼血消瘀。錢仲陽直赤誠生地與木通同用能瀉內火之火，別錄治婦人崩漏，心胎動血不止及產後血上涌，心胎動血由血鼻衄，吐血皆搗汁飲之。故凡吐血咯血，衄血，畜血，溺血崩中帶下，審其症果因于熱成者，無不用此。調治血出于鼻，是由于清道血出于口，是由于扁道，血出于嗓子，是由于肺血見于咯，是由于心血見于吐，是由于肝血見于嘔，是由于脾血見于便，是由于胃血由庚溪而帶出，是由于肌膚而出，其名曰血溢，血由口鼻俱出，其名曰大衄，皆當詳其虛實以治。並戒房事，陽強症毒盛，血燥頭折跌傷精，而見血瘀血癥之症者，無不採其同入以為活血生新之用。第書有言服此長肉生肌，甚是熱除血活以後長養之語。久服輕身不老，甚是病去身安力健之詞。未可因此認為辟穀成仙屬實。若使血因寒滯，而猶用以生地，不更使寒益甚。而血愈出不返乎。掘生肥大者，洗淨搗汁以飲，或用酒製，以免傷胃之鐵。

紅花
蕷草

紅花入心，辛苦而溫，色紅入血，為通瘀活血要劑。血之下而青者，營虛有熱血之下而黑者，熱與寒共血色，黑而屬血屬極，血與泄物並下者，屬有積或因脈絡受傷，血從尿出者，屬陰盛火動，或因房勞過度，營血妄行，血色黑點面色白，脈沉遲者，屬下元虛寒，陽盛陰是陽吐而見血色紫黑，其血出于大腸，血在漢後者為通血，其血出自于肺胃，由氣虛腸盈，盈血生于心包，藏于胸屬于衝任。一有外邪內侵，則血滯不行，紅花汁與血類，故凡血燥而見喉痙不消，痘瘡不起，肌膚腫痛，作脛作痛，經閉便難，經閉本有血滯血枯之血暈，口噤，卒死腹中，治當用此通活。時珍曰：紅花汁與之同類，故能行男子血脉，女子經水多則行血少，則養血接養，有名醫陸氏曰：血閉也得紅花數十帖，方可活通。

購得以大鍋煮湯盛二桶于窗格之下使婦但用不宜過多少用則合當歸能生多用則血能行過用則能使血不行不止屐其上薰之甚亦再加少頃指動半日乃蘇

而斂肉脂係入花染出可治小兒疎耳。紅藍花三錢半枯蓼五錢為末以帛袋纏淨吹之無花則用枝葉一方去穀并解痘瘡毒腫挑破以油胭脂敷之良。

入肝
醫涼
血
鴻
熱
焦
血
崩

紫草
山草

甘鹹氣寒色紫質滑而入厥陰血分涼血血涼則九竅通二便利故凡血熱毒閉而見心腹急痛水腫不消五痛癰癧惡瘡及痘瘡血熱毒盛二便閉滯者治當用此俾血得寒而涼得鹹而降得滑而通得紫而入血涼毒清而二便因以解矣活幼書云紫草性寒小兒脾虛者及能作泄奈世誤以為宣發之藥不論毒閉與否輒用殊失用藥意義矣鴻者忌服草得陽氣之早用宜取草為正酒洗用紫草去頭鬚本經云

旱蓮草
蕪草

旱蓮草入即書所云醴腸草金陵草者是也味甘而酸性平色黑功為入肝入腎為止血涼血要劑是以血熱則膏用之其血即止顏白汁塗變白為異火瘡發紅其紅即退齒牙動搖擦之即固合冬青子名二至丸以補肝腎但性陰寒雖善涼血不益脾胃躁若不同以薑汁椒紅相兼修服者必腹痛作鴻苗如旋覆實似蓮房斷之有汁須臾而黑熟膏良

赤芍
芳草

赤芍味入肝苦酸微寒性沉而澑諸書皆言因其苦寒則能入于下焦血分除熱傳熱悉從下解又言性沉而澑凡人症患吐衄崩中腸風血痢等症為腸風下血者而色鮮四射如箭乃風性使然素問所謂久風入中則得此則能澑血不解按此不無兩歧詎知其熱不除則血不其熱既解則血自安且其性主收斂既能清降又能收澑則清不慮其遇澑亦不慮其或濡嘗為解熱止血藥也但血熱者當用癰癥者不宜用久病者宜用初起者不宜用作膏可貼金瘡搗汁可塗虎犬蛇蟲為是症虛實惡瘡硝石斛畏驚甲小虧反藜蘆

地榆
山草

地榆味入肝腸胃苦酸微寒性沉而澑諸書皆言因其苦寒則能入于下焦血分除熱傳熱悉從下解又言性沉而澑凡人症患吐衄崩中腸風血痢等症為腸風下血者而色鮮四射如箭乃風性使然素問所謂久風入中則得此則能澑血不解按此不無兩歧詎知其熱不除則血不其熱既解則血自安且其性主收斂既能清降又能收澑則清不慮其遇澑亦不慮其或濡嘗為解熱止血藥也但血熱者當用癰癥者不宜用久病者宜用初起者不宜用作膏可貼金瘡搗汁可塗虎犬蛇蟲

傷毒飲之亦可。似柳根外黑裏細取一截炒熟用。稍反行血得髮良惡寒。

卷柏

苦

入胃涼血

卷柏入原屬草部。並非側柏。生子石上。形如拳卷。故以卷名。即俗所謂萬年松者是也。氣堅質厚。味甘性溫。入足厥陰肝經。血分其治有分生熟。生則微寒。熟則破血通經。故治癰瘕淋結等症。火則辛溫。能以止血。故治腸紅脫肛等症。性與側柏葉懸殊。治亦稍異。側柏葉仗金氣以制木。階妙黑以止血。不可不辨。鹽水煮半日。井水煮半日。焙用。

銀柴胡

苦平

消胃熱涼血

銀柴胡入胃肝經。兼入肝經。味甘微寒無毒。功用等於石斛。皆能入胃而除虛熱。但石斛則兼入腎。潛氣固筋骨。此則入腎涼血為耳。故和潤同治。升清發表必有此。則氣味下達。入腎與彼迥不相得。若用北胡以治虛癆。則咳嗽發熱愈無益。日陰火愈起。可不辨而混用乎。出銀州者良。故以銀胡號之。

蒲公英

苦滑

消胃熱

蒲公英。帶入肺肝。即黃花地下草也。味甘性平。能入陽明胃。厥除肝涼血解熱。故乳癰乳巘為首重焉。且能通淋。用此可以通解。擦牙齒。塗頭成疾。名瘡瘍。諸蟲游諸物上。必遺精汁。乾久則有毒。人手觸及。解食毒。疔毒。緣乳頭屬肺。乳房屬胃。乳癰乳巘多因熱盛血滯。用此直入二經。外敷散腫臻效。同夏枯草。連翹白芷。紫藥同治。况此屬土花黃。故于食滯可解毒。氣可散。又能入腎涼血。故于鬚髮可染。獨莖一花者。是有子者非。

凌霄花

苦寒

消胃熱涼血。即紫葳花。肝經血分藥也。味甘而酸。氣寒無毒。凡人火伏血中。而見腸結血閉。風瘡崩漏。腹痛一切。由於血瘀血熱而成者。所當用此調治。蓋此專主瀉熱。熱去而血自活也。是以肺癰之藥多有用此為君。支青為本。和密附。消腫散結。清火散結。此克安者。以其內有瘀積。瘀去而胎即安之意也。所至婦忌服者。恐其瘀血既無。要用恐生他故也。此為女科血熱必用之藥。但當相症施治耳。藤生花開五瓣。黃赤有點。不可近鼻。聞傷腦。

槐角

苦寒

槐花

槐角入胃。入肝即槐實。味苦酸鹹。氣寒無毒。入手足陽明大腸胃。及入足厥陰肝。凡因肝經熱鬱。而致風眩煩悶。痔血腸風。並

清心
神安
驚安

鮮熱
活血

涼血
活血

無名異

音矣

側柏葉音西入人即書所云丹砂朱砂者是也。因砂出于辰州故以辰名。體陽性陰。外顯丹色。內含真赤。不熟而寒。雖中有火也。不苦而甘。人中有土也。娶死嫁女。交會于中。故能入心解熱。而神安魄定。是日丹砂統陰。納浮游之火。而是以同滑石。甘草。則清暑同達。龍骨則養心氣。同丹參。則養心血。同地黃。枸杞。則養腎。同厚朴川椒。則養脾。同南星川烏之類。則祛風。且以參茯神。濃煎調入丹砂。則治離病。夏子益奇病方云。凡人自覺本形作雨人並行並臥。不得真假者。離魂病也。類編云。錢王少卿夜多惡夢。通宵不寐。自慮非吉。遇鄧州推官胡用之曰。昔常如此。有道士教戰因解醫中一絲。覺遺之。即夕無夢。神魂安靜。此有道士教戰經火。及一切烹鍊。則毒等於砒礦。況此純陰重滯。即未烹鍊。人服殊間。以其產靈之氣。被其鎮降也。辰砂明鑿。則其氣良惡。磁石畏鹽。水忌一切血。頃曰。鄭康成注周禮以丹砂石胆雄黃。赭石磁石為五毒。古人惟以攻瘡瘍而本經以丹砂為無毒。故多鍊治服食。鮮有不為藥患者。豈五毒之說勝乎。當以為成。

側柏葉音西入人即書所云丹砂朱砂者是也。因砂出于辰州故以辰名。體陽性陰。外顯丹色。內含真赤。不熟而寒。雖中有火也。不苦而甘。人中有土也。娶死嫁女。交會于中。故能入心解熱。而神安魄定。是日丹砂統陰。納浮游之火。而是以同滑石。甘草。則清暑同達。龍骨则養心氣。同丹參。則養心血。同地黃。枸杞。則養腎。同厚朴川椒。則養脾。同南星川烏之類。則祛風。且以參茯神。濃煎調入丹砂。則治離病。夏子益奇病方云。凡人自覺本形作雨人並行並臥。不得真假者。離魂病也。類編云。錢王少卿夜多惡夢。通宵不寐。自慮非吉。遇鄧州推官胡用之曰。昔常如此。有道士教戰因解醫中一絲。覺遺之。即夕無夢。神魂安靜。此有道士教戰經火。及一切烹鍊。則毒等於砒礦。况此純陰重滯。即未烹鍊。人服殊間。以其產靈之氣。被其鎮降也。辰砂明鑿。則其氣良惡。磁石畏鹽。水忌一切血。頃曰。鄭康成注周禮以丹砂石胆雄黃。赭石磁石為五毒。古人惟以攻瘡瘍而本經以丹砂為無毒。故多鍊治服食。鮮有不為藥患者。豈五毒之說勝乎。當以為成。

陰瘡濕瘻。自汎不止者。服此治無不效。肛邊發露。內珠狀如露乳。時出膿血。白杜痔。肛邊腫痛。生瘻突起。腫至五六日。自潰痛而有血。寒症。紅米。登州。脫肛者。日痔瘻。肛邊生瘻。頭額發搘。而後痛更甚。衣出清血者。曰脈痔。膀胱內結核。名舉痔。頭上有孔。名痔漏。瘻口有蟲。名蟲痔。大法用槐角地榆。生地。京血苓。蓮根。柏子仁。防風。秦艽。桂。風。等。人參。和如生。同不宜專用。涼煩當熟。補臍收功。以其氣皆純陰。為涼血要藥。故能除一切熱散。一切結。清一切火也。至書所云能流肝膽。風熱者非是。具考表性得此。則疎實因熱除而風自息之意。凡書所著治功。多有如此。立說不可不細體會而詳究耳。去單子及五子者。銅杞根碎半乳拌蒸。十月上已採。漬牛胆中。乾百日。食後吞一枚。但塗湯大傷損生肌殺蟲。炎罨凍瘡。洗鬚髮。最佳。酒浸或炒或生用。桂牡蠣為使。慈菊花宜酒。元旦飲椒柏酒。以辟邪。

辰砂

音鑿

無名異音矣入人即俗所名乾子者是也。味甘而鹹。性寒無毒。諸書皆言。能治癰腫。損傷。接骨。金瘡合口。其義何居。以其鹹有入血之能。甘有補血之力。寒能勝熱。義者故耳。是以人於受杖時。母服三五錢。於傷處不甘覺痛。用醋磨塗。腫處即消。要。

皆外治之品而非內服之味也。生川廣小東石子也。一包數百枚。

猪尾血

凉血
音爻

猪尾血，入肝，兼即猪尾尖之處，刮而出者也。凡人血燥不活，用以辛溫以爲搜剔，則血益燥而不活矣。按猪本屬陰物，血亦更屬陰味，以至陰之物而治至陰之血，則其自得陰化而熱以解，然必得一活動以爲疏暢，則血不為熱凝。惟猪通身皆寒，食飽即卧，其活止在一尾。而尾尖則又活中之至活者也。故吳費建中偏墳言治痘，凡逢毒盛而見乾紅晦滯，乾燥之象輕則用以桃仁地丁紅花赤芍，重則用以猪尾尖血取一盞二盞，入藥同炒，佐水片開搘，理通達內外，誠發千古未發之奇秘也。費建中治痘，血瘀氣滯，用大黃一兩，青皮一錢半，桃仁四錢，紅花錢半，赤芍錢半，木通八分，荆芥錢半，葛根一兩，牛蒡子一錢，白頭項地龍二十一條，紫花地丁一兩五錢，蠅蟲六分，山楂一兩五錢，蘆根以根，各必勝湯。此是勢急之際，用以大劑，若毒勢未急，或分作三劑，煎服。若毒勢未急，或分作三劑，煎服。

雨各必勝湯。此是勢急之際，用以大劑，若毒勢未急，或分作三劑，煎服。若毒勢未急，或分作三劑，煎服。

以拔若血瘀之極，必加猪尾血，大黃不已，加石膏。但須在細症酌治。月經廢血一活，則一身之血與之俱活。治痘而見乾紅晦滯，內症具備，其可不藉此血以爲通活之具乎？但血因虛而燥，因寒而凝，而不用以辛溫辛熱以爲通活，則無愈見其有礙者矣。取雄猪尾血者佳。

兔肉

獸

兔肉，入大腸，人言可治虛勞。人多食而不忌，不知兔肉性寒，久食絕人血脈。損元氣，陽事令人痿弱，故時珍董之以爲涼血解熱利腸之藥。據元醫陽事，今人瘦黃，八月至十月可食，餘月傷人，神弱免死。而眼合者，損人。況虛勞一症，脾胃兩虛，節在醫者用藥挽救，亦難兩全無弊。若復加兔肉甘寒，又安能力補脾胃而爲虛房要藥乎？人不察，動用兔肉治療，以致陽氣日虛，而陰氣日竭。余因先君曾患虛勞，股無將愈，後食兔肉，而病復發，故特拈出，以爲妄食兔肉者戒。

青魚膽

音爻

魚膽，入肝，本屬苦寒，可以戰目去障，以膽入胆故也。至于青魚之膽氣味亦同，且色青，入肝，開竅于目，又膽有點目，治鯉之功，目睛生津，注眼能黑，夜視物以其好噉螺蠅，蠅能明目也。又味苦氣寒，能涼血熱，故又主塗痔瘡，擦少瘡，咬喉脾功與熊胆相同。臘月收陰乾。

夜明沙

音爻

夜明沙，入肝，即名天鼠屎也。其屎因食蚊蟲而化，蚊蟲善食人血，是即蚊蟲之眼，故能入肝經，血分活血，爲治冒障翳之聖藥。肝之載目，凡人目生障翳，多緣肝有血積，以致上攻于目。其或見爲驚癲瘡，胞血氣腹痛，得此以散瘀寒，以勝熱，則血自

入肝
活血
明目

涼肝
血開
目翳

鮮毒


涼血
逐瘀

血餘
人言

活而病無不可食。本草稱以其蚊善食。吳鶴皋曰：古人每用蟲蟲水蛭治血病以其善吃人血故耳。故即可以食血者，食其血耳。如石决明、猪肝、眼明、夜靈散治雞盲。

下丹胎同瘀甲癩是卽以蚊治蚊之意。淘淨焙用，恐白微白歟。

血餘當入肝心，味苦微溫。據書載能補腎壯氣，然總不如地茱米者為補精補氣之最耳。素問曰：腎之華在髮。王冰註云：腎主髓，髓之海，髮者，腦之華。腦精之榮以養氣之榮，以眉血之榮以養之。故腎華在髮。髮者，血之餘血者，水之類也。今方家以髮為血餘，益本此也。葉世隱草木子云：子腎氣外行而有蹻，女子官人則無蹻而眉髮不異也。又載功能療癥瘕、癆理咳嗽，固崩帶，止血暯，獨血淋，舌血，鼻血，暨轉胞不通及產瘡。膏敷毒治皆有效。陳藏器曰：生人髮掛蘿樹上，鳥不敢來食其實。又人逃走，取其髮于轎車上，却轉之，則迷亂不知所適。此不白此正神也。然總皆屬通關開竅，涼血散瘀，生新之品。治小兒兩角生瘡，用髮灰三錢，飲汁服。若胃虛用之，多有吐瀉之弊。皇女洗髮用。



本草求真卷八

江西撫州府宜黃縣監生

臣黃宮誠較訂
臣男黃學義校字

下血為人之寶。安可言下。然有血瘀之極。積而為塊。溫之徒以增熱涼之。或以增滯。惟取疏動走泄。苦鹹烈毒之品。以治血瘀。內滯則得。以散瘀逐。則血自爾。不凝。按書所載。瘧血下血藥類甚眾。要之在審症。明確則於治方不謬。如症兼寒。兼熱。內燔不解。則宜用苦寒。歸人安詳。而奴等。借其陰氣。水蛭桃仁。毋草。以爲之破。取其辛以散熱。苦以降結之意也。瘀氣結甚。則宜用以班發乾漆。以爲之降。取其氣降。則以爲之疏。行經閉用。不水味。但蟲蠶寄奴。自無能除。而解而用。瓦楞子。則於蓄血元有味。化則宜用。以散瘀。而用苦。尤爲諸劑中下血。敗氣。而用錢三七。血竭。可借其隨瀉。而用蟻附。則於改善。而用丹參。以善其氣降。當審用血。用金藥蟲蠶。而用苦。以解瘀。則有皂礬。五靈脂。可入。惟有苦溫而降。則其氣降。不可稍有忽畧。以致損人。元氣於不測中也。

三七山草

三七。而入肝胃。兼入心大腸。又名山漆。時珍曰。或云能合金瘡。始添枯物也。甘苦微寒而溫。世人僅知功能止血住痛。殊不知痛因血瘀。則痛作。血因數散。則血止。三七氣味苦溫。能於血分化其血瘀。試以諸血之中。入以三七。則血旋化爲水矣。此非紅花紫草類也。故凡金刃刀剪所傷。及跌仆杖瘡。血出而止。燭蠶塗之。或爲末。滲其血即止。時珍曰。受杖時先服一二錢。不衝後尤宜服之。且以吐血衄血。下血。痢崩漏。經水不上產。後惡露不下。俱宜自嚼。或爲末。米飲送下。即愈。并虎咬蛇傷。血出可治。喝血。此爲陽明厥陰血分之藥。故能治一切血病。一種庭砌栽植者。以苗搗敷。腫毒即消。亦取散血之意。一時春生苗。夏高三四尺。葉似蘭草。而勁厚有棱。莖有赤梗。根大如牛蒡。根與南中來者。不類。恐是劉寄奴之屬。甚易繁衍。廣產形如人參者。是時珍曰。比薦近時出自南人軍有節。非研用良。

茜草

三百八三

行血肝心

茜草。味酸鹹。寒色赤。功用畧有似於紫草。但紫草則止入肝涼血。使血自爲通活。此則能入肝與心胞。使血必爲走泄也。故凡經閉風癥。黃疸。疽有黃疸。瘡疽酒痘。黃汗疽。女勞病。音有寒濕溫濕之別。此則專就蓄血以論。大因於瘀血。內阻者。服之固能使瘀下行。如值吐崩尿血。因於血滯而見艱澁不快者。服之更能逐瘀去血之品。與於紫草血

熱則涼之意貌同實異不可混也。但血虛發熱者忌用。根可染綠忘鐵。

紫參三百八十五

山草

紫參常入肝兼入胃勝胱又名北參味苦而辛氣寒無毒功常入肝遂於破血兼入胃肺膀胱使血自為通利故凡寒熱血痢癰腫積塊心腹積聚因於血瘀阻滯而成者無不可以調治以其味苦則泄味辛入肝寒則勝熱而使血從二便出矣仲景治下痢腹痛而用紫參湯以除亦取散其積血之意聖惠方治吐血不止用紫參人參阿膠炒等分爲末烏梅湯服一錢二分去人參加甘草以橘末湯服普濟用五參丸治面上酒利用紫參丹參人參苦參沙參各一兩但市人罕識其真用以紫參爲代雖其寒熱不同而其疎利則一反藜蘆古方治婦人腸覃爲味丸所用北參即此物也

鬱金三百八十五

芳草

鬱金常入心辛苦而平諸盡論斷不一有言此屬純陰其論所治皆屬破氣下血之說有言性溫不寒其論所治則有燒寒除冷之謂究之體輕氣重其氣先上行而微下達凡有宿血凝積及有惡血不堪之物先於上處而行其氣若使其邪其氣其痰其血在於膈上而難消者須審宜溫宜涼同於他味兼為調治之震亨曰鬱金屬火與土其性輕揚上行治吐血砌血唾服其血自消疾中帶血者加竹沥又如敗血衝心加以薑汁童便去心癰癩明礬爲丸砂爲衣與受盡毒加以升麻之類鼻血上行者鬱金並加四物服之經驗方治失心癰狂用真鬱七兩明礬二兩爲末薄荷丸白湯下又婦人癲狂十年至人授此初服心胸間有物脫去神氣酒熟再服服而甦此驚憂痰血絡聚心竅所致鬱金入心去惡血明辨去煩躁故也又范石湖文集云嶺南有桃生之害於飲食中行厥脛法魚肉能反生於人腹中而人以死剴陰投其家初得覺腹痛次日剴人十日則生在腹中也凡胸膈痛即用升麻或胆礬吐之若膈下痛則即以米湯調鬱金末二錢服即瀉出惡物或合升麻鬱金服之不吐則下若使惡瘧寒症於惡瘧惡瘧在於下部而難消者俟其辛氣既散苦氣下行即為疎泄而無鬱滯難留之弊矣此藥本屬入心散瘀傷寒論云斑痘始有白邊忽捲入腹紫黑無膿用鬱金一兩甘草二錢半水半杯煎去甘草切片焙研末入冰片五分每用一錢以生猪血五七滴新汲水下因瘀去而金得泄故命其名曰鬱金書云此藥純陰而寒者因性主下而言也有云是藥性溫而言者因氣味辛香主上而言也各有論說不同以致理難盡一耳因為辨論正之出川廣圓如蟬肚外黃內赤色鮮微香帶甘者真市人多以薑黃偽充

莪朶常入肝

草

莪朶氣味苦平既於肝經血分逐氣莪朶氣味辛溫復於氣分逐血故凡氣因血室而見積痛不解吐酸奔豚痞瘕癥瘕等症者須當用此調治按之應手為脈是因傷食所得假物成形為瘕是因傷血所得見於肌膚可見為瘕是因傷氣所得結伏起於臍上大如手臂上至心下脾積曰痞氣在胃脘腹大如盤肺積曰癥氣在右脇下腹如大杼腎積曰奔豚發於小腹土至心下如豚奔走之象或上或下亦無定時經曰大積大聚宜可犯也良其大半而此過者少故去積須以甘溫調養

又曰：壯者氣行則已怯者則養而成病。潔古云：壯人無積，惟虛人則有之。故養正則邪自除。俾氣自血而順而不致閉結不解矣。但蓬木雖屬磨積之味，血積宜用桃仁。麻蟲達木瓦墜丁，痰積宜用半夏、南星、白术、枳實、礞石硝石風化硝白芥子、海石蛤粉水精宜用大戟、甘遂、芫花、芫花酒精宜用乾薑、神曲砂仁豆蔻、黃連乾薑甘遂牽牛茶精宜用薑黃、茱萸、使君子、鵝頭、虎杖、黃錫宜用桃仁、榧仁、鼈甲、草果。若虛人服之，最屬可危。須得參木補助為妙。大者為廣木，堅硬難搗，灰火煨透乘熟搗之，或醋磨酒磨，或煮熟用。

薑黃三百八十七

芳草

破脾中氣，下血行

片子薑黃廣薑黃

生用宣於通瀉炒用止血

心安神志

四物湯亦有產前症

破心胞血安神志

丹參三百八十九

山草

丹參商入心包，味苦色赤性平而降。

時珍曰：五參五色配五臟，故人參入脾曰黃參，沙參入肺曰白參，玄參入肝曰黑參，牡

丹參入心包，味苦色赤性平而降。

此書載能入心包絡破瘀一語，已盡丹參功效矣。

然有論其可以生新安胎調經除煩，養神定志及一切風寒崩帶，癥瘕

目赤疝病，瘡疥腫痛等症。

時珍曰：接婦人明理論云：四物湯治婦人病不問產前產後，經水多少皆可通用。惟一味丹參散

黃芩、芍藥、當歸也。

總皆由其瘀去以見病，無不除非真能以生新安胎養神定志也。

凡妊娠無故大便不實者，切忌畏鹽水、忌醋反

藜蘆

蒲黃商入肝，味甘氣平，功用無他，但以生用熟用炒黑分其治法耳。以生而論，則凡瘀血停滯、腫毒積塊、跌仆傷損、風腫癰瘍、

溺閉不解服之，立能宣洩解除。

時珍曰：一婦舌脹滿口，以蒲黃煑搗，比曉乃愈。宋度宗舌腫滿口，御醫用蒲黃乾薑末等分

也，未效，散用此同。

五靈脂治血氣滯痛，以熟焦黑，則凡吐血、下血、腸風血尿、血痢服之，立能止血。然此止屬外因，可建奇功。內傷若不足之吐

血，則非此所能治者矣。

丹參三百八十九

丹參商入心包，味苦色赤性平而降。

此書載能入心包絡破瘀一語，已盡丹參功效矣。

然有論其可以生新安胎調經除煩，養神定志及一切風寒崩帶，癥瘕

目赤疝病，瘡疥腫痛等症。

時珍曰：接婦人明理論云：四物湯治婦人病不問產前產後，經水多少皆可通用。惟一味丹參散

黃芩、芍藥、當歸也。

總皆由其瘀去以見病，無不除非真能以生新安胎養神定志也。

凡妊娠無故大便不實者，切忌畏鹽水、忌醋反

藜蘆

益母草

(三百九十一)

益母草

胞肝

一名茺蔚。辛微苦寒。功能入肝心胞絡。消水行血。去瘀生新。調經解毒。為胎前胎後要劑。是以無胎而見血

淋血。閉血崩帶血下痛。

帶下者因病生於帶脈之意也。帶脈橫於腰間。凡病人下白則為白帶。既胎而見胎漏臨產而見難

產已產而見血量斤腫乳癰等症。服此皆能去瘀生新。

時珍曰。益母草根莖花葉專於行血。而子則行中有補也。蓋味辛則於風可散。血可活。味苦則於熱可消。結可除。加以氣寒則於熱可療。並可臨症酌施。則於

母自有益耳。外此番沙腹痛嘔之用此濃煎恣飲亦取能散惡血。

若其病非寒。則非所宜。然氣味辛散。瞳子散大者。其切忌之。益母子

主治暑同。但行中有補。非若益母草徒以消水行血為事也。

小暑端午及或六月六日採取良。滿陰返魂丹六月六日採花葉。實為未密。凡治胎產百病。

近效方。搗葉子微炒妙。

汁敷膏良。忌鐵子微炒妙。

劉寄奴

(三百九十二)

活血通瘀益母子

一名寄奴。辛微寒。功能入肝心胞絡。消水行血。去瘀生新。調經解毒。為胎前胎後要劑。是以無胎而見血

淋血。閉血崩帶血下痛。

帶下者因病生於帶脈之意也。帶脈橫於腰間。凡病人下白則為白帶。既胎而見胎漏臨產而見難

產已產而見血量斤腫乳癰等症。服此皆能去瘀生新。

時珍曰。益母草根莖花葉專於行血。而子則行中有補也。蓋味辛則於風可散。血可活。味苦則於熱可消。結可除。加以氣寒則於熱可療。並可臨症酌施。則於

母自有益耳。外此番沙腹痛嘔之用此濃煎恣飲亦取能散惡血。

若其病非寒。則非所宜。然氣味辛散。瞳子散大者。其切忌之。益母子

主治暑同。但行中有補。非若益母草徒以消水行血為事也。

小暑端午及或六月六日採取良。滿陰返魂丹六月六日採花葉。實為未密。凡治胎產百病。

近效方。搗葉子微炒妙。

汁敷膏良。忌鐵子微炒妙。

蘇木

(三百九十三)

一名入心。甘鹹辛涼。功用有類紅花。少用則能和血。多用則能破血。但紅花性微溫和。此則性微寒涼也。故凡病因表裏風

走而致血滯不行。既產後血量脹滿以死。及血痛。血瘕。經閉。氣壅。癰腫。跌撲損傷等症。皆宜相症合以他藥調治。如疎風則

與防風同用。行血則與乳香同用。海藻。但性本疎泄。產後惡露已盡。大便不實者。均應禁用。出蘇方爻愛。愛州志。鐵

沒藥

(三百九十四)

一名入心。甘鹹辛涼。功用有類紅花。少用則能和血。多用則能破血。但紅花性微溫和。此則性微寒涼也。故凡病因表裏風

走而致血滯不行。既產後血量脹滿以死。及血痛。血瘕。經閉。氣壅。癰腫。跌撲損傷等症。皆宜相症合以他藥調治。如疎風則

與防風同用。行血則與乳香同用。海藻。但性本疎泄。產後惡露已盡。大便不實者。均應禁用。出蘇方爻愛。愛州志。鐵

珀者良治同乳愈

郁李仁三百九十四

入脾下氣行水破血

鏈除老血久積伏瘀

入肝血分破瘀

入心胞肝破血破瘀

郁李喘入脾兼入大腸世人多合胡麻同用。以為潤燥通便之需。然胡麻功止潤燥緩中活血。非若郁仁性潤其味辛甘與苦而能入脾下氣行水破血之劑也。故凡水腫癃急便閉。關格不通。得此體潤則滑。味辛則散。味苦則降。與胡麻實異。而又可以相需為用者也。按宋史錢乙傳云。一乳婢因停而病。既已目張不得瞑。乙曰。煮郁李酒飲之。使醉即愈。所以然者。目係然此止屬治標之劑。多服恐滲液而益燥結不解耳。去皮共蜜浸研。

乾漆喬木

三百九十五

乾漆肺脾味辛氣溫有毒。弘景曰。生漆毒烈。人以雞子有降無升。耑破日久凝結之血。及削年深堅結之積。令人感受風寒暑濕鬱而為病。則中外不舒。胃中有物留滯不消。久而生蟲。血積不化。結而為癰。由是陽氣竭澤。津液枯槁。癰瘍風瘻。因之不免用此。辛溫毒烈之性。鏈除瘀中氣得復。絕陽皆續而緩急和矣。按血見漆化水。故能化瘀破血。千金三盡方皆賴以之為君。震亨曰。漆性急而飛用之中節。猶自嗤腸胃也。去後補性內行人不知也。本經言能輕身者。以其盡去而身自輕之謂也。所謂中氣可復。絕傷可續者。亦因於去而中自復。與傷自續之謂也。但無積血者切忌。以其傷營血。損胃氣耳。炒令烟盡為度。試漆訣云。微扇光如懸鏡。綠急似鈞城成琥珀色。打着有浮嘔。若患漆瘡。以生蟹汁紫蘇解之。相感志云。漆得蟹而咸水益物性相制。凡人畏漆者。嚼蜀椒塗口鼻則可免。

血竭香木

三百九十六

血竭耑入心係南番樹木之液。猶人之膏脂者。是味甘而鹹。性平。色赤。按五味惟甘主補鹹主消。血竭味甘。雖能和血收口。止痛止肌。然味鹹則消。却能引膿。性耑入肝。經血分破瘀。故凡跌撲損傷。氣血攬刺。內傷血聚。並宜同酒調服。通氣乳香沒藥。雖主血病。而亦兼入血分。此則耑入血分而不兼及氣分者也。但性最急切。引膿甚利。不可多服。解凡血病無積瘀者不必用之。以染透指甲燒灰。不變色者佳。藥肆偽造甚多。或有以海母亂真者。絕少。同眾藥搗用。飛塵得竈陀僧良。

桃仁三百九十七

五果

桃仁耑入心辛苦甘溫。為厥陰心胞肝血分主藥。夫血者陰也。有形者也。周流乎一身。一有凝滯。則為瘀。瘀血血閉。或婦人月水不通。或跌撲損傷。積血及心下宿血。堅痛皆從足厥陰受病。以其為藏血之臟也。若能泄滯。半能散積。甘溫通行而緩肝。故並主之。所以為蓄血必須之藥。成無己曰。肝者血之源。血聚則肝氣燥。肝苦急。急食甘以緩之。桃仁之甘以緩肝。以散血。故張仲景散當湯用之。以治傷寒八九日內。有蓄血發熱。如狂小腹滿痛。小便自利。

者又有當汗失汗，熱毒深入，吐血及血結胸煩躁，譖語者亦以此湯主之。與麻蟲水蛭大黃同用。

能去滯，甘能生新，但苦重，微氣薄，味厚沈而下降。故瀉多補少，散而不收。用之不當，及過用，多用使血下不止，損傷真陰。不可不慎。張路曰：大抵氣血喜溫，而惡寒寒則溫不能流，溫則消而去之。此軒岐密旨。但世之名於醫者一見血症，每以寒涼清陰為勝，殊不知寒有陰不濟陽，而上溢者尚為可戰。有陽不統陰而下脫者尤為砒鴉。蓋因陽藥性暴，稍有不慎，立見其害。不若陰柔之性，至死不知其誤而免旁人之譖謗也。噫！醫之弊僅可為知己道，難為俗人言耳。行血連皮。

火生用潤燥去皮尖炒用，俱研碎或燒存性，用雙仁者有毒，不可食。香附為使。說曰：能發丹石毒生者尤損人。瑞曰：桃與蠶同食，心腹痛服木人忌之。

蓮鴟水

三百九十八集

蓮鴟滿入

心脾

出淤泥而不染，真根通達諸竅，聯綿諸絡。允為交構黃宮，通調津液之上品味。甘性寒，入心脾血分。冷而不泄澁，而滯故凡產後血積煩悶，酒後煩渴，渴十盞，盛怒血淋，以灰髮二錢，痛脹霍亂，虛渴失血，血痢並金瘡折傷，酒毒驟毒，搗熱酒，一切屬熱，屬於服之立為解除。若非熱非癆，調服之，增病。其有破血止熱之力也。者熟甘溫益胃，補心實腸久服，令人心懽并搗塗，拆裂凍瘡，患處熱揭塗。孟說曰：產後忌生冷，獨鴟不忌，謂其能散瘀血也。不作表散言。春禁口，噤口利服，能使結糞自下。胃氣自開者，亦以熱除血解而言。冷利噤口，熟服止瀉，實腸者以其有溫補之力也。益脾補心者，以其味甘入胃，多孔象心之謂也。時珍曰：自然銅生於卑溝，而潔白自若，質柔而穿堅，居下而有節，孔微玲瓏，緣內隱生於軟弱而發為空葉花實，又復生芽，以續生人，削鴟皮，誤落心中，其血渙散，不復相應，故醫家用以破血多效，殆者血凝也。但世搗澄鴟粉多以豆麥羹粉偽充真者，絕少。鴟節味濃，同生地汁童便善止一切吐衄血症，忌鐵同油煤麯米菜食，則無渣煮忌鐵器。

入心脾血分，消瘀血，散瘀接骨止痛。

鴟粉

鴟節

散血瘀接骨止痛

散滯

開結破瘀

古文錢

四百

自然銅

金

自然銅，入因何用？能接骨。蓋骨被折傷，則血瘀而作痛，得辛以散瘀，破氣則痛自止，而傷自和也。而骨安有不接乎？且性東堅剛，於骨頸類，故能入骨而接。是以有合乳香沒藥，麝蟲五鉢古錢，麻皮灰血竭，胎骨作丸，煎當歸地黃續斷牛膝丹皮紅花濃湯送下，以治跌撲損傷最效。但中病即已，不可過服，以致真氣走泄耳。東平曰：自然銅世以為接骨之藥，然此等方，迎合病人之意，而銅非假不可用。若產後血虛者，忌服產銅坑中火煅醋淬七次，細研，新出火者，其大毒金毒相隔，挾香藥，熱工惟在速效，非假不可用。

古文錢，篇入氣味辛涼，雖曰屬銅有毒，然歷久氣化，其毒無多。時珍曰：古文錢，但得五考其主治，有曰能治目赤翳障，婦人血症，橫痃者，是能開其氣血壅塞之路也。宗奭曰：予少時嘗患目赤腫痛，數日不能開，客有教以生薑一塊，洗淨去皮，以古青銅錢刮汁，點之初甚苦，熱淚滾滾，而然終無涓滴，後有患者，教之往往疑惑，信士點。

止血破瘀入肝行血破瘀止痛

收瘻除毒殺蟲破血分精

通瘀止血

之無不一
再但作瘡者不可用也。有曰能治心腹痛者是能散其血氣凝結之意也。有曰能治月經不來者是能解其胞脈也。有曰能治五淋者是能通其衝任熱壅也。有曰能治跌撲損傷者。火煅醋淬是能入其受傷凝滯之所而消其血瘀也。故治目亦腎障則須用以生薑汁塗刮青點目治內障生花不用治婦人逆產五淋則須煎汁以服治便毒初起則與胡桃肉同嚼食二三枚即消以金伐木者故耳或煮湯或刮膏或醋服各依本方製用。

花蕊石四百一石

花蕊石端入石雖產硫黃山中號為性溫然究味酸而滑其氣亦平故有化血之功耳是以損傷諸血胎產惡血血運並子死腹中胞衣不下服之體即疏通飛血化為黃水全瘡血流敷即合口誠奇方也。頃曰近世以合硫黃同研末敷金瘡其效之亦甚但此原屬劫藥時珍曰花蕊石嘗試其味酸澀其功專於止血能使血化為水酸以收之蓋赤石脂亦能下胞胎與此義同。下後止後須以獨參湯救補則得之矣若使過服則於肌血有損不可不謹以罐固臍頂火燬過出火毒研細水飛晒乾用。

皂礬四百二石

皂礬端入脾兼入肝即保慈等於白礬味亦酸鹹而尚有收瘻除濕去蟲殺蟲之功但力差於白礬而稍緩且此色綠味酸燒之則赤以破血分之清垢其效甚速如金匱之治女勞黑輝硝石礬石丸專取以皂礬以破積於之血且治喉痺用此以取酸涌化涎之力同米仁研食延暉脣介瓣用以收燥濕解毒之功腸風瀉並用此以收消散濕熱之後人有收澑之功也然而諸治之外又善消積帶凡腹中堅積諸藥不能化者以紅礬同健脾消食藥為丸投之輒消按張三丰仙傳云治脾土衰弱肝木土色宜伐木丸用倉木二兩米泔水浸同黃酒麴四兩炒赤色皂礬一兩醋拌晒乾大煅但胃弱人不宜多用服此者為末醋糊丸每服一四十丸好酒末湯下日三服時珍常以此加平胃散治賁膜中腹滿果驗但胃弱人不宜多用服此者飲身已食喬麥犯之立覺青瑩淨者良亦用畏醋。

五靈脂四百三石

五靈脂原禽而入即比地寒號蟲鳥矢也。時珍曰周口乃候時之鳥也。五臺諸山甚多其狀如小雞四足有兩翅夏月毛采五色勝惡粒大如豆核之有如糊者有枯塊如糖者人以其受五行之靈其矢狀如凝脂故有五靈脂之號其氣腥臭難聞其味苦酸而辛惟其腥臭難聞故能入血凝臭穢之處而療其病惟其味苦酸而辛故能入心與肝而泄其滯是以心中血氣刺痛婦人產後少腹兒枕塊痛及瘻挾血成窠養血凝作痛月經往來不定等症皆為血分行氣必需之藥宋史曰有人病目乃血所病也肝受血則能視目病不治血為肯理也田五靈脂之藥而愈又有人被蛇毒所傷良久昏憊僧以酒調藥二錢灌之逐吐仍以草敷咬處少頃復准二錢其苦皆去問之乃五靈脂一兩雄黃半兩后為末耳。又李仲南云五靈脂治崩中

非止治血之藥乃去風之副風動物也衛在經虛治風傷營血以致崩中暴下與荆芥等風治崩漏同方悟古人識見深遠如此亦一說但未及肝血虛漏此亦自生風之意按衛為血海任為胞胎任脉通衛脈或則月事以時下無崩漏之患且易生子若女中血崩經水過多赤帶不止宜半生半炒酒調服之亦治飛逆癲癇及解惡毒藥毒但此氣味俱厚辛羶不堪觸目指為甘溫張氏謂非正論改為性寒不為無見故僅可治有餘之滯若使氣血不足服之大損真氣腥更使人動吐所當避也酒飛去砂石晒乾入藥行血宜生止血宜炒惡人參

瓦楞子

附蛤粉
四百四

瀉肝分精塊血

瓦楞子肝即今所謂蚶子殼者是也味鹹而甘性平故多主消血化痰除血為婦人血塊散凝治男子痰癖積聚要藥者陰氣也五臟所生其始發有常處其痛不離其部上下有所終始左右有所窮處謂之積聚者陽氣也六腑所成其始發無根本上下無所留止其痛無常處謂之聚積聚之症止上根於腸而食積不化之可用以化氣消導之則緩輕有言卒然飽食多飲則腸滿起居不能用力過度則咯脹傷傷於陽絡則血外溢血外溢則血傷於陰絡則血內溢血內溢則後血傷於腸胃之絡則血溢於腸外腸外有寢汗未與血相搏則并合凝聚不得散而積成矣且以胃之大名曰虛里胃肺絡肺出於左乳之下其動應衣是即明宗氣所出之道凡人飲食不節漸以留滯而致痞積成於左脅膈膜之外者即此候也是以昔人有云此與鼈甲蟲蟲同為一類皆能消癰除積但蟲蟲其性最近此與鼈甲其性稍緩耳煅紅醋淬三次用

班蝥

附百生
四百五

瀉肝分精塊血

班蝥下部最屬惡物聞人捕捉即於屁尾射出惡氣令人臭不可聞近人肌肉則潰入胎則墮其毒概可知矣神農本草經爲羌青夏食薑花爲辛長秋食豆花爲班蝥冬入地中爲地胆按羌青青綠花尤毒事長黑身赤頭班蝥色地胆黑頭赤足其味辛其氣寒其性下走而不上專走下竅直至精溝之故書言外用止可以触死肌敷疥癬惡瘡內治止可以破石淋拔瘰疬疔腫下大傷惡毒而已取其以毒攻毒也然惟實者可用其拔瘰疬毒則以班蝥法製使令毒根從便出如粉片血塊爛肉之形楊澄甫曰瘰疬之毒莫不有根人抵治以班蝥地塊爛肉次以木通滑石燈心草輩導之但下大毒之初先於患人頭上拔去血髮二三莖以班蝥七枚去翅足尖黃用蟾蜍搗汁服之瘡口於無風處糊去血惡小便洗淨裹敷之服後小便當有瘀毒泄去三四日當有狗肉三四十枚為盡如數少再服七枚若愈後忌聞鐘聲復發則不可治矣去頭足糯米炒熟生用則吐瀉人亦有用米取氣不取質者畏巴豆丹參惡

甘草芫花

瀉肝分精塊血

水蛭附百生
四百六即馬黃蜞生於陰濕之處善食人血味鹹與苦氣平有毒與蟲蟲功用相似通利水道破血墮胎故月閉血瘕積聚無子並腫毒惡瘡折傷皆能有效然服之存性見水復能化生噬人臟腑破瘀之藥甚多何須用此如犯之者止用黃泥

作丸吞之必入泥而出以土制水故也。時珍曰昔有逢行飲水及食水菜誤吞水蛭入腹生子為患。吸噉血腸痛黃凡用須預先熬黑七日置水中不活者方用畏石灰食鹽。

瘦者惟以田泥或搗黃土飲數升則必盡下出也。蓋蛭在人腹得土氣而下耳。凡用血蟲蟲飛物猛於食血。

蟲蟲四百七

破血
墮胎

涼血
軟骨

破血
接骨

除血
滯化
熱血
水

蟲蟲微苦微鹹氣寒有毒善噏牛馬豬血因其性以為用故以之治一切血結諸病。故凡病血蓄而見身黃脈結腹痛如狂小便利並堅瘕積塊瘡母。九竅閉塞脢服之自克有效以苦泄結鹹走血故也。且色青入肝服之宜入肝臟血分而散之矣。河間云蟲食血而治其性而為用也。仲景合水蛭用此以治太陽蓄血如狂亦是此意。但性屬惡毒以治此病由是刑罰之治盜賊非得已也。去翅足炒用惡麻黃。

蟲蟲四百八

蟲蟲即屬地蠶又名土蠶者是也味鹹性寒其物生於土中伏而不出喜攻隙穴以刀斷之中有汁如漿聞接即連復能行走故畫載跌撲損傷續筋接骨義由此耳真奇物也。且人陰血貫於周身雖賴陽和亦忌燥烈若熱氣內鬱則陰陽阻隔而經絡不通因而寒熱頓生得此鹹寒入血軟堅則凡血聚積塊癥瘕靡不因是而除而血脉調和榮衛暢達月事時至又安有血枯血閉而不見其生育者乎故又能治諸般血症而使挾孕而有子也是以古人用此以治跌撲損傷則多合自然銅龍骨血竭乳香沒藥五銖錢黃荆子麻皮灰狗頭骨以治下腹痛血痛血閉則合桃仁大黃以治頌曰張仲景治雜病黃蠶蟲丸又有大蠶甲丸及婦人瘀血並用之以其有堅破下血之功各隨病症所因而用之耳。陰乾臨時研入畏兒莢菖蒲屋避。

螃蟹四百九

螃蟹最屬陰寒故畫所述利弊大令人駭如蟹與柿同食則令人泄瀉及發瘕瘕與孕婦食則能使胎即下食之令子生而爪尤甚以蟹燒烟則能集鼠於庭。江景曰以黑犬血灌蟹三日燒之諸鼠畢至。

同銀硃燒烟則能使臭蟲即斃蟹近於漆則化漆而為水筋

骨損斷用蟹搗爛微炒納入瘡中則能使筋即連他如胸中熱積喝辟面腫及蓄血發黃婦人乳癰硬腫小兒顧解凡因熱結熱滯而成者無不用之立效其化血為水逐熱消瘀未有若是其神者矣沈括筆辟云闕中無蟹土人收乾者懸總緣性上談痕不但人不識即鬼亦不識也。其迅利耳若血因寒滯及腹中疼痛喜熱而惡寒者其切忌馬醯蟹宜入蒜投則不沙散中解毒者宜搗搗節熬酒調服宋興曰此物極動風火。

雜劑

殺蟲

發毒
解毒
毒物

本草綱目卷一百一

卷一百一

蟲蟲

螃蟹

殺蟲

發毒

解毒

毒物

之

陰
蟲

入脾
胃消
瘧除
殺蟲

性熱
殺蟲

潤肺
殺蟲
化水

蘆薈常入肝東入脾心大苦大寒功專殺蟲除疳安心得目最為小兒驚癇疳積上品。蘆薈使君子等且能吹鼻殺腦瘻及除鼻瘻即波斯國木脂。於楚州青藥人教用以蘆薈一兩尖甘草末半兩研末先以溫漿水洗辦亦淨傳之立乾便瘥真奇方也。然苦雖能殺蟲寒能發熱而氣甚穢惡氣血得所順得所當慎投僅可施之恭養若胃虛少食人得之入口便大吐逆逐致食滯泄因而羸瘦怯弱者多矣。如黑錫苦色綠者真。

阿魏
香木
四百十三

阿魏常入脾胃出西波斯番國中阿虞木枝梗汁味辛氣平而溫且極臭烈故書載能殺蟲辟惡又其味既兼辛與溫則氣更活不滯故書載治瘧辟穀是以溫瘡鬼魅蟲毒傳屍惡氣痘瘡等症服之最為得宜。王璆一百一選方治久瘧用真阿魏丹砂酒丸八分湯下但人血氣閒舊則順遇臭則逆故胃虛氣弱之人雖有瘧積但當溫胃和氣偶瘧自消切勿用此臭烈以傷胃氣至辨真偽則但取少許安置銅器一宿沾處白如銀色者真以真最屬難得古人已有黃芩無假阿魏無真之說矣用鉢研細熬酒器上燶過入藥

大楓子
香木
四百十四

大楓子常入肝脾本屬毒藥耳按據諸書皆載味辛性熱其味止可取油以殺瘧疥若用此以治大風病則先傷血而失明矣。故子名風故凡血燥之病宜用苦寒以勝縱有瘧疥宜辛宜熱而血有受損不更使病益劇乎即或致以驟成功以劫致然列毒之性不可多服惟用外敷不入內治其功或不沒也凡入丸藥湯藥俱宜除油為妙。

榧實
香木
四百十五

榧實常入肺甘澑微苦體潤而滑性平無毒按據諸書有言氣味辛寒能瀉濕熱為肺家之果又云性溫散氣能去腹中邪氣及殺諸蟲皆無定論余按榧實甘潤是其本質凡肺不潤而燥者得此則宜故有解燥除熱之功非書所云能除濕熱之意乎又其燥熱內擾則蟲自爾見蝕而五痔腹脹等症自爾悉除服此燥氣走腸胃煩清其氣自爾不結非書所謂溫能散氣之意乎又書有載有毒無毒在人食既無病又能以此療病毒何由見非書所云無毒之說乎又其苦澑兼備既能清燥潤肺復於蟲蝕性味不合令其即水化水非書所云有毒之說乎究之止屬潤肺解熱殺蟲之品其言有毒止是蟲之毒而非毒人之毒也其言無毒因非毒人之毒而為毒蟲之毒也故凡一切肺燥而見咳嗽不寧腹中不和五痔惡毒並小兒黃瘦便閉不解等症服之無不奏效好食茶葉面黃每日食榧子七枚以愈為度治白蟲日食榧子七枚滿七日蟲皆化為水昔東坡詩云驅除三彭蟲愈我心腹疾

義。正是矣。但多食則有滑腸之虞。炒食味即香酥甘美。更有引火入肺。大腸受傷之慮。不可不細察耳。忌鵝肉及菉豆。能殺人。物類相感。志云。榧煮素羹。味更甜美。猪脂炒榧黑皮自脫。榧子同甘蔗食。其渣自乾。

水銀

石
四百六十六殺諸蟲
痘瘡

水銀走而從石中迸出者為石汞。從丹砂中出者為硫黃汞。究皆丹砂液也。性稟至陰。辛寒有毒。質重者而流利。得鹽礬為輕粉。加硫黃為銀硃。燒成罐同硫黃打大昇鍊則為靈砂。同皂礬則為升降靈丹。藥之飛騰靈變。無有過是。故以之殺諸蟲疥瘡也。然至陰之性近於男子陰器。則必消癆無氣。入耳能蝕人腦。至盡。頭瘡切人肉。令百節繩縮外敷。尚防其毒之害。內服為害不待言。而可知矣。今人有水銀燒成丹砂。醫無不知。本經言其久服成仙。甄權言其運丹元母抱子以為長生。六朝以下。貪生者服食至成廢篤。而喪厥軀。不知若何人矣。方士固不足道。本草言其可妄言哉。水銀但不可服食耳。而其治病之功。不可掩也。同黑鹽結砂。則頭瘡又鉛同硫黃結砂。則頭瘡又鉛同硫黃在用者能得首癒。而執其樞要耳。得紫河車。則伏得川椒。則收花椒茶末。收之。

銀硃

石
四百六十七

銀硃。外係水銀同煅煉成硃。性燥味辛。方書用以殺蟲治瘡。亦是以毒解毒而已。用以食服。古人切戒。謂其性悍烈。良非空宜。時珍曰。功過且同。與輕粉同。

輕粉

石
四百六十八

輕粉。需入係水銀加鹽礬昇煉而成。水銀一兩。白礬二兩。食鹽一兩。入鐵器內盒覆封固。升煉。又法水銀一兩。皂礬七錢。白礬五錢。同上昇法。一兩汞可昇粉八錢。接水銀金之應。醜鹽錫之精。華二氣同根。是則成粉也。雖是化純陰而為辛燥。然陰毒之性猶存。故能殺蟲治瘡。劫痰消積。烈毒之性。定而不守。今人用治楊梅瘡。色不白也。雖能劫風邪濕熱。從牙齦而出。暫得寬解。劉完素曰。銀粉能傷牙齒。蓋上下齒離屬手足陽明之經。毒氣盛於陽胃。然毒氣竄入筋骨。血液耗散。久發為結毒。遂成廢人。仍須用水銀昇鍊入三白丹引拔毒之藥。同氣搜逐。瑞風辟仙丹。通天再造散。用以搜剔毒邪。仍從齒縫而出。再以錢氏利驚丸。白餅子並用。取痰積從大便而出矣。時珍曰。黃連土茯苓。畏磁石而黃。忌一切血。本出於丹砂。故也。閭閻事宜。宜作女人面脂。用輕粉滑石。去皮。共分蒸過。入膠脣為末。以雞子清調勻。名太真紅玉膏。洗面畢。傅之。旬日色如紅玉。

殺蟲

石
四百六十九

殺蟲。味苦性寒。出於糞中。故仍取其入腹消積。俾其不傷正氣也。其法漂淨。失黃為末。調服。又用蠅礬數十隻。打死置於罐內。取殺蟲入內食盡。然後淘除穢惡。取殺蟲焙乾。凡小兒疳積。腹大脚弱。翳膜遮睛。及大人熱結謹語。毒利作嘔。並宜。

消食

積

散熱涼血解毒
清肺有攻拔惡
利通竅之毒開

服之無不立效是以鼻瘻瘡取此有尾者燒灰一錢巨褐衣灰和勻頻吹最效與利骨取牙用白馬臍上肉一二觔待生蛆與烏骨白雞一隻食之取糞陰乾每一錢入硇砂一錢研勻用少許擦瘻處片時即落蓋取鐵以入鐵遇骨與肉鑄入之意無他義也

人經曰營氣不從逆於肉裏乃生癰疽又白諸痛瘡瘻皆屬心火又觀丹溪有言癰疽皆因陰陽相滯而生則是癰疽發毒之發固合內外皆致而不僅於肉裏所見已也但其毒氣未深等於傷寒邪初在表其藥止宜升散而不遽用苦寒俾防白芷荆芥薄荷桔梗等藥何一不為發毒散毒之最山甲皂角等藥何一不為驅毒追毒之方至於蜈蚣則能驅風通瘀散結蛇退則能驅風辟惡野菊花則能散大毒出入牙力能入腎推毒梧桐液力能透散風邪火毒攻牙能拔毒外行若在芙蓉花則藥雖屬清涼而仍兼有表性是以用此以為數毒霜力能透散之方除則治毒之劑審其性有苦寒之味者應另列於解毒之中不可入於發毒劑例俾人皆知毒從外發不得竟用內藥內陷

范麻子 毒草 四百二十

范麻子高人經甘辛有熱性味頗類巴豆既有收引拔毒之能復有開竅通利之力觀書所言搗膏以貼手臂腫痛一夜即

效用此同羊脂膏香鯉甲等藥煎作摩膏日摩數次止可針刺好肉用仁搗敷患處即拔瘰疬惡瘡用仁外敷立愈時珍曰鯉脂油能拔病氣外用凡此皆屬外用以奏奇功但不
宜於服耳昔人有以汁點畜舌根下即不能食點畜肛門內即下血死并云服范麻者一生不得服豆犯即脹死其毒可知輕小平剷所能治矣此又不可不知也

芙蓉花 濑木 四百廿一

芙蓉花常入肺為外科癰疽藥也凡清涼膏清露散鐵罐散即是此物蓋此味辛氣平質滑功善清肺涼血散熱止痛消腫排膿凡一切癰疽腫毒無論花葉及根皆可搗研為末調蜜塗四圍留中患處乾則頻換初起者即覺清涼痛止腫消已成者即膿出已潰者即易斂或加赤小豆蒼耳子同入為末功效殊見然必毒輕不重用此方可若大毒陰毒其勢莫遏則非

楓香 楠木 四百二十二

楓香係楓膏脂所成結而為香故曰楓香又曰白膠香按楓性最疎通故木易蛀外科用以透毒金瘻未敷即效筋斷

即續齒頰腫痛燒灰揩牙甚工咳唾膿血同藥服之即止皆取透發病氣之意時珍曰楓香松脂皆可亂乳香其功雖次於乳香而亦琴絲不遠故能見其

象牙

四百二十三

皆治也以蠶水煮二十沸入冷水中採扯數十次晒乾用

拔毒
外脫

象皮

蟾蜍
拔風
大熱
毒之
邪

蟾蜍
散熱
內攻
拔熱

象牙肉味甘性寒按象性主剛猛而牙則善脫故凡皮肉間有形滯物及邪魅驚悸風癇並惡瘡內有毒未拔者服之立能有效以其具有脫性故能以脫引脫耳時珍曰時人知燃犀可見水是以外瘡不解用牙磨水服之并挫末蜜調塗之即效諸鐵竹木刺入肉刮削煎湯溫服即愈諸骨鰻入於喉刮下薄片頻服即吐不吐再服以吐出為度象皮味鹹氣溫專治金瘡不合用皮煅灰存性敷之亦可熬膏入散

蟾酥

四百二十四

蟾酥常入生肌即蟾蜍俗名蠍眉間內有白汁者是也味辛氣溫有毒能拔一切風火熱毒之邪使之外出邪氣蓋着人肌肉鬱而不解則或見爲疔瘡發背陰瘡陰蝕疽癰惡瘡故必用此辛溫以治蓋辛主散溫主行使邪盡從汗出不留內入而熱自可以除矣但性有毒止可外治取效如發背未成者用活蟾蜍繫瘡上半日蟾必昏惰置水中救其命再易一個三日則毒散矣勢重者割蟾合瘡上不久必良不可謂再易二三次即愈慎勿以微物見輕也即或用丸劑亦止二三四釐多已多則能侵毒入其用作丸投服亦宜雜他藥內入如牛黃明礬乳香沒藥之類毋單服也故書載拔諸毒只宜用酥一錢白麵二錢硃砂少許作錠諒病輕重酌與不可盡服又治背發興名等毒取酥三五分磨膠水化米醋入銚火化乘熱手刷不已以散為度刻玉塗之等於刻蠍房術用之更善總皆外科奪命之功一句輕則爛人肌肉至若蟾蜍氣味辛寒凡癥瘕積塊風犬咬傷小兒疳積瘧疾發班瘡痘發背用之與酥畧同以其辛有發散之能寒有逐熱之功外敷固見神功內服除去頭足腸腹垢亦能去積除熱如風狗咬傷用蟾蜍後足搗汁生食先於患人頂心拔去血髮三四莖於小便內見沫其毒即解發背初腫用活蟾數個更易繫於腫上法詳則其毒亦散矣時珍曰蟾蜍土之精也上蟲入伏山精制蛇蛇故能入陽明經退虛熱而性靈異穴土食熱行濕氣而為麻病癰疽諸瘡要藥也總皆具有外拔內攻之力勿輕用也蟾酥以油單紙裹屑裂之酥出紙上陰乾用蟾蜍焙乾去皮爪酒浸去肉用

人牙

四百二十五

人牙
入腎

人牙常入味鹹性溫功善治痘倒鷙綠痘或出不快及見黑陷多因毒氣深入故須用此內發時珍曰齒者腎之標骨之餘也痘瘡則毒自腎出方長之餘外為風寒穢氣所冒腠理閉塞血溢不行毒不能出或變黑倒鷙宜用此物以酒燙過之竄瀉熱外拔熱入腎內攻

入腎經發出毒氣便熱令復行而瘡自紅活蓋劫劑也。若伏毒在心，盲不省人事，及服虛色白瘡，不能作膿熱，肺紫泡之症。止宜解毒補虛，苟誤用此，則鬱悶聲啞反成不救可不慎哉。高武疽斧管月云：左仲叔言：治瘡者宜啜退火毒，用之解毒草為解毒之品。凡屬毒創無不概獲，詎知毒因心熱而成者，自有黃連連翹可解。因於肺火而成者，則有黃芩連翹可解。因於腎火而成者，則有黃柏知母可解。且毒見於腸胃，痘孔閉，宜用漏蘆以通之。症見消渴不止，宜用葛根。痘瘻已全，用白頭翁解之。症見風行惡瘡，宜用射干以開之。心腎火熱，宜用山豆根以熄之。鬼疰癰瘍，宜用漏蘆以消之。肝腎毒發，宜用鴟牛以療之。乳癰乳石，多屬肝腎，起宜用蒲公英以療之。惡瘡不散，多屬中心火，宜用甘草節以投之。皆有深瘻內存，不可稍忽。若在班蝥、鳳仙子、惡毒之品，要當審症酌治，不可一毫稍忽於其中也。

牛蒡子

濕草

草

牛蒡子，肺、入。又名惡實，又名泥粘子。辛苦冷滑，令人止言。解毒凡遇瘡瘍，並腫瘍等症，無不用此投治。然猶未繹其義。凡人毒氣之結，多緣外感風寒，營氣不從，速於肉裏，故生癰毒。牛蒡味辛且苦，既能降氣下行，復能散風除熱，深得表裏之義。是以但性冷滑利，多服則中氣有損，更且令表益虛矣。至於脾虛泄瀉為尤忌焉。實如葡萄而褐色，酒拌煮，待有霜拭去用。

金銀花

四百二十七

金銀花，肺、入。經冬不凋，故又名忍冬。味甘性寒，無毒。諸書皆言補虛養血，又言入肺散熱，能治惡瘡、腸癖、疽痔、瘍瘍，為外科治毒通行要劑。按此似屬兩岐，殊不知書言能補虛者，因其芳香，味甘性雖入內，逐熱而氣不甚，退利傷損之意也。書言能養血者，因其毒結血凝，服此毒氣頓解，而血自潤，克養之謂也。究之止屬清熱解毒之品耳。確是以一切癰疽等病無不藉此內入，取其氣寒解熱力。王通利至云：能治五種屍症，事亦不虛。飛屍、遊屍、伏屍、沈屍、疽症，五疽病固不一，但此專主風溫藥材，難得須用。忍冬勝生，取一把，以葉入砂盆研爛，入生餅子酒，少許稀調，得所，塗於四圍中，留一口洩氣，其藤止用五兩木桶，搗搗不可犯。大甘草節生用一兩，同入沙瓶內，以水二盞，武火慢煎至一盞八分，無灰好酒一大盞，再煎十數沸，去渣分為三服。一日二劑服。至大小腸通利，則藥力到。如謂久服輕身延年，益壽不無過謬。凡古人表著藥功類，多如是。是但在用藥煮，辨認明確，不盡為藥治效所惑也。花與葉同功，其花尤妙。江浙以

山荳根

蔓草

草

山荳根

蔓草

草

大苦大寒，功屬瀉心保肺及降陰經火逆，解咽喉腫痛。第一要藥，緣少陰之脉上循咽喉，咽喉雖處肺上，而肺

降火
利咽

逼近於心故凡咽喉腫痛多因心火挾其相火交熾以致逼迫不寧耳治常用此以降上逆之邪俾火自上達下而心氣因滌以除且能以法大腸風熱肺與大腸相表裏肺氣清則大腸風熱亦解及解藥毒殺小蟲并腹脹喘滿熱厥心痛心腹皆安火不上逆則並療人馬急黃熱去磨汁以飲互痔諸瘡服之悉平總賴苦以泄熱寒以勝熱耳但脾胃虛寒作瀉者禁用

和中
止嗽
消渴
解毒

解胃
瀉胃
瀉腸
利尿
通乳
汗毒並止

薺尼山草四百二十九

薺尼肺脾兩入即甜桔梗似人參而體虛無心似桔梗而味甘不苦按據諸書有因味甘載能和中止嗽消渴然力專主解毒以毒性急迫甘以和之故也觀葛洪肘後方云一藥而解眾毒者惟薺尼汁濃飲一升或煮嚼之亦可作散服此藥在諸藥中毒皆自解也又張鷺朝野僉載云名醫言虎中藥箭食清況而解野猪中藥箭施薺尼而食食物猶知解毒何況於人乎觀此洵為解毒之最且更能治強中精出消渴之後發為癰疽之症千金有薺尼丸治諸腫毒虎中藥箭亦以取其清熱解毒之功無他義耳薺尼丸大豆茯神磁石桔梗根熟地黃地骨皮玄參石斛鹿茸各一兩人參沈香各半兩未以倫牡洗淨煮爛并和為丸空心鹽湯下猪腎薺尼湯用猪腎一具薺尼石膏各三兩人參茯苓磁石知母葛根黃芩桔梗根甘草各二兩黑大豆一升水一斗煮三升分三服後人名為石子薺尼湯但市肆多取此苗以亂人參又有取此作為蜜參者其性即屬薺尼不可不察

白頭翁山草四百三十

白頭翁肺脾兩入味苦性寒何書用此以治利便膿血經云腎欲堅者食苦以堅之利則下焦虛損故以純苦之劑以堅如仲景之治挾熱下利之用白頭翁湯之屬是也湯用白頭翁黃連黃柏秦皮若使熱結不除則腎愈虛愈解而痢莫愈又書何以用此以治瘧瘧寒熱齒痛骨痛算効尤瘡瘍瘕等症亦因邪結陽明服此熟解毒清則腎不燥擾而骨固盛屬胃不受邪而齒安陽明毒不上浸而効止熱不內結而瘡與瘕皆却此用此風無熱熾而小兒頭秃得除矣總皆清解熱毒之力也近根有白首俱酒良

漏蘆水入

漏蘆味苦而鹹氣寒有毒凡苦則下泄鹹則軟堅寒則勝熱漏蘆氣味俱備其性耑入陽明胃經故凡癰疽背發乳汁不通及預解時行痘毒者咸須仗此以解毒邪俾邪盡從便出而解矣諸症非盡熱毒而起不得妄用然書又云遺精尿血能止亦因毒解熱除自止之意非因漏蘆寓有收瀉之功也但氣虛瘡瘍不起及孕婦有病者切忌出閨中莖如油蔴枯黑如漆者真甘草拌連翹為使

山慈姑山草四百三二

山慈姑味苦微辛寒微毒功竊瀉熱消結解毒故凡症瘕癰疽無名井腫癰瘡瘍瘻瘍瘻結核等症用此

瀉熱
利尿

治療
症等處

外敷
醋磨

固可解散內服亦可調治。為結毒散結之方。普濟方治粉滓面點用山慈姑夜盞旦洗但性寒冷不可過服。根與蘿蔔小蒜相類去

毛殼用

菜豆四百三

豆

清腸
胃熱
毒
菜豆
粉
姜
皮

解伏
熱除
熱症

宿風
邪經
絡腸
胃熱

人中黃四百三

人中黃端入

味甘性寒。據書備極稱善。有言能厚腸胃潤皮膚和五臟及資脾胃。按此雖用外者歸丸不是過也。第書所言能厚能潤能和能資者。緣因毒邪內熾。凡臟腑經絡皮膚脾胃無一不受毒擾。服此性善解毒。故凡一切癰腫等症無不用此奏效。并解一切草木煮汁。則止消渴。磨粉合以乳香丹砂。則能護心使毒不入。護心膏。築枕夜卧。則能明目疏風杖瘡疼痛。則用雞子白調敷。即愈。皮猶涼於菜豆退翳明日如神。粉撲痘瘻尤妙。市民誦韻音經甚誠出行折一足哀苦叫苦蓬夢木扎定其效如神。一方菜豆粉新鈍炒柴胡井水調厚敷紙貼。

蚯蚓端入牌經絡最屬寒味。顧書所載甚明。其言味鹹性寒無毒。其論所治則云能主伏屍鬼疰陽寒伏熱。狂證熱病發狂血熱痘瘡。班多紫黑。癥瘕黃疽。損傷垂危。瘧癰潰爛。流串臂風腳氣。備極毒熱形症。皆能調治。宋興曰。腎臟風下症病不可觸也。有毒。有人用脚病藥中用此果得奇效。病愈服之不輟。至二十餘日。則其風味之寒不待言矣。究其所以致治則因。此物伏感。宜處水鑽土飲泉。是其本性。故能除其鬼疰。解其伏熱。且味鹹主下。屬濕而以入濕為功。故於濕熱之病。濕熱之物。遇之即化停穢。畜水觸着。即消而使盡。從小便而出。時行曰。其性寒而下行。故能解諸熱疾。且利小便治足疾而通經絡也。蚓蚓本有鑽土之能。化血之力。而凡跌仆受傷。血瘀經絡。又安有任其停蓄而不為之消化乎。但審認不確。妄為投用。良非所宜。取老蚯蚓白頭者。良搗汁井水調下。入藥或晒乾為末。昇云。中其毒者。鹽水解之。張將軍敗衄咬毒。或微火或燒灰各隨本方用。

蠅牛端入經絡

溫生

即帶殼大蟬蛹是也。生下濕地陰雨即出。稟性至陰味鹹小毒。故古方用此以治真陰虧損。腠理不密。致風中於經絡。而見口眼喎斜。筋脉攣拘。及風熱脫肛痔瘡。腫痛癰疽。發背疔瘡等症。皆能見效。須曰。入嬰孩藥最勝。總以取其鹹寒解其諸熱之性耳。并解蜈蚣毒。取形狀小綠桑木者佳。或微火或燒灰各隨本方用。

蠅蜘蛛

四百三

五

人中黃端入是用甘草末入於竹筒塞孔。冬月置於糞缸之內。經春取出懸掛。風處陰乾。取用。味甘性寒。書載功而入胃解

漏陽
胃實

熱

攻堅
破硬

拔毒

祛臟
腑洗
寒通
大便
寒結

毒以其味甘故也。中其解五臟實熱以其氣寒故也。宜勝又治瘟疫諸毒斑狂及發瘡痘黑陷不起以其臭與不正相類故能以毒攻毒也。然遇多難得可取坑垢以代。

熱

又治瘟疫諸毒斑狂及發瘡痘黑陷不起以其臭與不正相類

鳳仙子
毒草

四百三十七

毒物凡藥沖淡和平不寒不熱則非毒矣。即或秉陽之氣為熱秉陰之氣為寒而性不甚過烈亦非毒矣。至於陰寒之極燥陰無陽強為制伏不敢重投者則其為毒最大而不可以妄用矣。如砒霜硝砂巴豆鳳仙子草烏射罔鉤吻是熱毒之殺人者也。水銀鉛粉木鼈尚苟是寒毒之殺人者也。草麻商陸狼毒是不寒不熱性非冲和寓有辛毒之氣而亦能以殺人者也。然鋪蠶謂醫之治病凡屬毒物固勿妄投即其性非毒烈而毒症不真辨脈不審辨其為毒最大而不可以執矣。況人之藥人所共知人尚知禁若屬非毒視為有益每不及防故余竊見人病常有朝服無毒之藥而夕見其即斃者職是故也。因用藥劑一戒。

巴豆
商木

四百三十八

鳳仙子肾入又名急性和俗所謂金鳳花子是也。其性急猛異常味苦氣溫小毒。凡病人患頑疾積塊噎膈骨哽服之立刻見效以其氣味急道能於骨穴堅硬處所極力搜治是以勝金丹用之以治狂癇取其急領破毒吐泄同研以點牙疼即落同獨蒜搗汁以塗居塊即消噎食不下用鳳仙花子酒浸三宿晒乾為末酒丸溫酒下不可多用即急性和子也。加麝香阿魏尤捷投予以煮硬肉即爛但此生不蟲蠶蜂蝶不近且多食則戰人喉似非無毒用之當細審量可耳。

巴豆商入辛熟大毒據書所載生猛熟緩可升可降能行能止開竅宣滯去臟腑沈寒為斬關奪命之將。夫既能宣滯通敷則藥能降能行何書又言能升能止耶。此數字不無令人少疑究之書之所言降者固有沈寒痼冷積敗於臟深入不毛故欲去不能不去不得不非用辛熟迅利斬關直入掃除陰霾推陳致新亦安能湯滌而如斯哉。是即書之所謂能降能行者耳。升是即所謂能升能止者是也。時珍曰一婦年六十餘瘡泄五載犯生冷油膩肉食即作痛服升瀉藥瀉反甚脈沈滑此乃用治泄痢食人耳。夫醫理玄遠變化靡盡在人引伸觸類毋為書執則用藥不岐即如大黃亦屬開閉通便之品然惟腑病多熱者最宜若以臟病多寒而用大黃通利不亦自相悖謬乎。故仲景治傷寒傳裏多寒者多用大黃東垣治倒壁之瘻善用有勘亂調中之妙。元素曰世以治久病膈氣而以巴豆辛熟通開腸胃營熱之氣。巴豆稟大第鬱結難通。血液隨亡其陰虧損傷寒結胸膈小兒疳積用之不死亦危奈何庸人畏大黃而不畏巴豆以其性熱惲小耳。試以少許輕擦皮膚須臾發泡况下腸胃能無潰灼薰爛之患乎。即有急症不得已而用之。汪昂曰經喉急癥緩治則死用解毒丸。雄黃一兩研末用津咽下。金一錢巴豆十四粒去皮油為丸每用五分津咽下。

救慈人
兼吐瘧疾

消肉不化

救食
救人

砒石

石

雄黃破精氣傷金破惡氣巴豆下調涎然係厲劑不可輕用或用紙搘蘸頭尖者是雄雄者更搘巴豆綿裹隨左右納鼻中吐出惡涎紫血即寃有功效不丟膜則胃傷不去心則作嘔或用殺用仁用油生用炒用醋煮燒存性用研去油名巴霜羌花為使畏大黃連涼水或黑豆菜豆汁亦佳得火良

硇砂

石

雄黃破精氣傷金破惡氣巴豆下調涎然係厲劑不可輕用或用紙搘蘸頭尖者是雄雄者更搘巴豆綿裹隨左右納鼻中吐出惡涎紫血即寃有功效不丟膜則胃傷不去心則作嘔或用殺用仁用油生用炒用醋煮燒存性用研去油名巴霜羌花為使畏大黃連涼水或黑豆菜豆汁亦佳得火良

時珍曰：巴豆緊小頭尖者是雄雄者更搘巴豆綿裹隨左右納鼻中吐出惡涎紫血即寃有功效不丟膜則胃傷不去心則作嘔或用殺用仁用油生用炒用醋煮燒存性用研去油名巴霜羌花為使畏大黃連涼水或黑豆菜豆汁亦佳得火良

壓去其油取霜少許入藥可也者為唯有核及兩瓣紙上貼之真效如神

末枯痔外敷畏醋菜豆冷水羊血

本草求真卷九

增補

硇砂
易入腸胃而傷人之急，故名信石。即錫之苗，故錫亦云有毒。色白有黃，量有名金腳。硇煉過者曰硇霜，色紅最劣。性味辛苦而難化，入砂即爛，故治噎膈、癥瘕。其性猛烈，不堪言。況人胞胎、脾胃，其堪用此？消導乎？第或藥與病對，有非峻迫投治不能奏效。時珍曰：硇砂大熱有毒之物，噎膈反胃，積塊內癥之病，用之則有神功。蓋此疾皆起於七情飲食所致，痰氣鬱結，遂成有形妨礙道路，吐食痛脹，非此物化消，豈能去之？如穀食不消，則必用以橘葉紫蘇、生薑、菜果，不消則必用以丁香桂心水飲。不消則必用以牽牛芫花。至於肉食不消，又安能舍此阿魏、硇砂而不用乎？第當詳其虛實，審其輕重緩急，以求藥與病當耳。潔古云：實中有積攻之，而不可過；虛中有積攻之，但謂壯實之火，在初時果有大積攻之，自便。若屬虛人，縱有大積，或應攻補兼施，可耳。如其審証不明，妄為投治，禍猶指掌不可不慎。出西戎如牙硝、光澤者，良用水瓶過醋煮乾，如霜刮下用之。忌羊血。

蘆稷

益氣

和中

黍稷

清熱

涼血

解者

生則
熟則
疏泄
則

入腎
祛風
散熱
利水
下氣
活血
解毒

養腎
氣消
胃氣

稷端入有蘆稷黍稷之分。蘆稷者其形高如蘆荀，既香且性，復中和所以為五穀之長而先王以之名官也。味甘無聲，故食可以益氣和中，宣脾利胃。煎湯以治霍亂吐瀉如神。用此燒酒可治腹中沈疴。啾唧若黍稷之稷，形狀似粟，但粟稊則叢聚，攢簇。黍稷之粒則疎散成枝。黍與黍稷分別則粘者為黍而不粘者則為黍稷。昔人於此紛紛置辨而不盡。一是亦未分二稷之說矣。黍稷味甘性寒，作飯疎爽香美可愛。服之可以清熱涼血，解暑止渴。故書載治癰疽於背，瘡疽之症，但多食則有冷氣內發，飲黍稷則必死。忌同附子服。

粟米四百四四

稊粟四五

粟米端入腎兼脾胃味鹹氣寒，時珍曰：粟即梁也，穗大而毛長，粒粗者為粱，穗細者為粟，苗俱似茅種類甚多。栗米粉丸內但此生者硬而難化，得蒙水熱者滯而難消。故書言此惟食則有足重難消之虞。與杏仁同食則有吐瀉之慮，不可不熟悉而明辨也。陳者良。

黑大豆四百四五

菽豆

黑大豆端入腎兼脾胃味甘性平，色黑體潤。按豆形象似腎，本為腎穀而黑豆則尤連腎加以鹽引，則豆即能直入於腎也。時珍曰：豆有五色，惟黑豆屬水性寒，腎為寒水之經，故能治水消脹，下氣制風熱而活血解毒。所謂同氣相求也。故書有言：服此令人澤肌補腎，止渴生津，非其補腎之力歟？身面浮腫，水刑不止，痘瘡濕爛，得此則消；非其入腎去水之力歟？頭項強痛，卒中失音，得此則除；非其制風之力歟？此虛風也，若純外風，則不須此。脚氣攻心胸，脇卒痛，單服此味，則效；非其下氣之力歟？熱毒攻眼，乳巣發熱，得此則愈；非其解熱之力歟？便血，赤刑折傷，陰陽得此則良；非其活血之力歟？風癱瘓，丹毒蛇蠍，得此則化；非其解毒之力歟？然體潤性壅，多服令人身重。藏器曰：大豆生本炒食，極熱；食進寒，作頭暈，四肢冷，造醫及加甘草，則解百藥毒。

黃大豆四百四六

菽豆

黃大豆端入腎兼脾胃按書既言味甘，服多壅氣生痰動嗽，又曰：寬中下氣利大腸，消水脹腫毒。其理似屬兩岐，詎知書言甘壅而滯是即炒熟而氣不洩之意也？書言寬中下氣利腸，是即生冷未炒之意也。凡物生則疎泄，熟則壅滯。大豆其味雖甘，其性雖溫，然生則水氣未泄，服之多有疎泄之害。故豆須分生熟而治，則有補瀉之為別。藏器曰：大豆生是以書載誤，食毒物須生搗研水吐之，諸菌毒不得吐者，濃煎汁飲試內癰及食毒腹痛並與生黃豆嚼甜而不惡心者，是即上部結有癰脹及中

具毒發癥之真候。惟有痘後餘毒發癰，炒黑研末以黃豆燒黑研末，或煎湯洗痘後生瘡，未香油調塗，腫瘍背瘡等症。生浸細磨
數則或煎湯炒黑為末，以治用補則須假以炒熟，然必少食則宜。若使多服不節，則必見有生痰壅氣動噉之弊矣。豆油半甘而熱，與豆氣味稍別，能養瘡疥解髮疽，萬燒灰點惡瘻去惡肉，豆忌豬肉。

蠶豆四百四十七

菽豆

蠶豆，味甘性溫，據書載此服多滯氣。又曰：誤吞鐵針用此即下。蓋緣人受穀食必仗中氣以為運行，若使中氣稍振，雖服有形之物礙於腸胃，用此合以溫藥同投，即能以解。精善堂方一女子誤吞針入腹，諸醫不能治。有人教令煮蠶豆同薑，如其中氣既緩，稍服瀉滯，即能作脹，況多食乎？此蠶豆之所以有通有不通之說也。但此既能通針，其性疏利，已見一斑。與於陰潤之物遇人，則滯絕不相同。惟在臨症，相人體氣及多食少食，以別耳。

白豆四百四十八

菽豆

白豆，味甘平，性平無毒，故書載入脾胃利濕除熱。凡人病因濕熱而見脹滿消渴，閉寒熱，中吐逆瀉泄者，服此最宜。與病因濕熱而見痘疔紫黑，而大或黑壞而臭，或中有紫線，用此治無不效。牛御史四聖丹用白豆四十五粒研為末，以油胭脂同杵成膏，先以簪挑，並或氣虛病脹，用此同羊肉煮食，亦能奏功。蓋緣此豆屬土，故治亦在脾胃之病，但須假以佐使，如治痘疔入肌活血，必兼勝脂同投入脾與胃，補氣必兼羊肉同入，各有至理。非僅豌豆一味所能施也。出胡地，大如杏仁者是。

豌豆四百四十九

菽豆

豌豆，味甘氣平，無毒，故書載入脾胃利濕除熱。凡人病因濕熱而見脹滿消渴，閉寒熱，中吐逆瀉泄者，服此最宜。與病因濕熱而見痘疔紫黑，而大或黑壞而臭，或中有紫線，用此治無不效。牛御史四聖丹用白豆四十五粒研為末，以油胭脂同杵成膏，先以簪挑，並或氣虛病脹，用此同羊肉煮食，亦能奏功。蓋緣此豆屬土，故治亦在脾胃之病，但須假以佐使，如治痘疔入肌活血，必兼勝脂同投入脾與胃，補氣必兼羊肉同入，各有至理。非僅豌豆一味所能施也。出胡地，大如杏仁者是。

豇豆四百五十

菽豆

豇豆，味甘而鹹，性平無毒。考之時珍云：豇豆可菜可菓，備用最多，乃豆中之上品。又曰：豇豆開花結莢，必兩兩並垂，有習坎之義。豆象微曲，有似人腎，所謂豆為腎穀者，宜此當之。是以腎氣虛損，必賴此為主治。用豇豆入鹽少，且此味許食之甚妙。

甘而平入腎而更入胃故凡胃津不生渴不止吐逆泄痢小便頻數草莽毒中皆得甘以調劑而使諸症其悉平也袖珍方云
中鼠莽毒者以豇豆煮汁飲即解欲試書載諸疾無禁惟水腫忌補腎氣不宜多食耳

豆腐追蹤
四百五
一

漏胃太過
服生動氣
豆皮豆芽

解臂
熱邪
及諸
食物

辛多於苦
則能以治
寒濕苦多
於辛

芹菜
辛多於苦
則能以治
寒濕苦多
於辛

豆腐而入脾經豆磨爛加以石膏及或鹹汁內入而成其性非溫故書皆載味甘而鹹氣寒微毒且謂寒能動氣凡服豆腐過甚而致腎中寒氣發動並生瘡疥頭風等症者須用茱萸湯及杏仁以解之家言茱萸入湯中則腐不成以茱萸湯下藥而愈頃曰發腎氣可解惟有胃火衝擊內熱鬱蒸症見消渴脹滿並休息久痢用白豆腐煎食赤眼腫痛用消風散藥水服收瘡疥頭風杏仁貼之頻易又或燒酒煮腐以貼色紅即易燒酒醉死者心頭熱者用熟豆腐切片以貼冷即煑換則當用此以投至云能和脾胃止是火去熱除以後安和之語並非裏虛無熱無火溫補之謂也豆皮性同豆腐能除班痘翳能除翳豆芽充疏須防發疥動氣芽有生

豆醬
造釀

四百五
二

豆醬歸入本豆與麩蒸罨加鹽與水曬成雖曰經火經日煎熬然味鹹性冷火不勝水仍為解熱解毒瀉火之劑耳是以書載一切魚肉蔬菜葷毒皆當用此以調蛇蟲蜂蠍犬咬湯火砒霜蠍毒皆當用此以解與夫手指掣痛用醬清和蜜漬浸之敷用醬清和石硫黃大便不通入乳中飛蟲入耳用醬潤灌浸淫瘡痏用醬解和輕粉毒中化水以擦身上乾燥用豆藥以壯娠下血尿血等症用豆醬煎乾生地二兩為末每服一錢米湯以下用豆醬一二升去汁取豆炒研服方才起尿血無不當用以以治但此氣鹹性冷小兒過服則恐生痰動氣妊娠合雀肉以食則恐令兒面黑所當避也取豆醬陳久者佳力不如豆醬

芹菜
軍卒

芹菜歸入肺地出有水有旱其味有苦有辛有酸之類考之張璐有言旱芹得青陽之氣而生氣味辛實能理胃中濕濁水芹得濕淫之氣而生氣味半濁考之綱目有言旱芹氣味甘寒能除心下煩熱水芹氣味甘平能治女子赤沃兩說絕不相類詎知旱芹種類或有得於陽氣之厚故味多辛而燥得於陽氣之微故味苦而多濕水芹種類得於陽氣之最則氣雖濁而仍清得於陰氣之勝則味既苦而且濁不得謂水芹盡屬陰類旱芹盡屬陽類也惟察辛多於苦則芹多燥而不涼苦勝於辛則芹多寒而不溫辛勝於苦則治當如本經所云能治女子赤沃俾濁濕去胃氣清而精血有賴令人肥健嗜食苦勝於辛及質粘滑則治當如唐木所云能治癰腫馬毒人安能入脾以助食入陰以助精入肝以保血乎但芹在水須防有蟲在於葉間春夏之交多有蚯蚓蛇蛇在於此處遺精視之不見令人為患而青手青腹滿如狂痛不可忍作蛟龍痛須服鞭錫二三丸吐出

便瘥其根白盈尺者曰馬斯食之令人發瘡疥以其濕熱之氣最盛也和醋食之損齒有齶痕人不可食。

胡蘿蔔四百五
草辛

胡蘿蔔入肺始於元時胡地而至形似蘿蔔故以是名按書所列主治止是寬中下氣及散腸胃邪氣數種他則無有論及蓋因味辛則散味甘則和質重則降蘿蔔甘辛微溫其實又重故能寬中下氣而使腸胃之邪與之俱去也但書有言補中健食非是中虛得此則補中虛不食得此則健實因邪去而中受其補益之謂耳萬不可食子可以作食料

芥菜四百五
草辛

芥菜入肺胃一食品耳何書載能通肺開胃利氣豁痰又載久食則人真氣有虧眼目昏暗並或發入瘡痔是明指其於目有害而書又有言能明目其故何居蓋緣芥性辛熱凡因陰濕內壅而見痰氣閉塞者服此痰無不除氣無不通故能使耳益聰而目益明也若便臘素不寒止因一時偶受寒濕而氣不得宣通初服得此稍快久則積溫成熟其目漸聰不明而諸痔瘡瘍靡不因是而至矣素問云辛走氣病無多食辛食則肉膩而脣塞此之謂歟如其平素熱盛竟無濕閉寒閉等症其菜不必多服但此一入口而凡燥熱等症無不因是即形又嘗止便血發痔害目而已哉說曰煮食動氣與風生食痔疾便血者忌之孫思邈曰同魚食發水腫至於食芥而淚即隨是亦淚為肝液木受辛耗而液不克勝耳陸佃云望梅生津食芥墮淚之自內生也夜無他義也用此當細審辨可耳故蓋以多食為戒詳溫散部內所當合參

同蒿草四百五
辛

同蒿入心脾一名蓬蒿其味辛而且甘其性溫其氣濁凡相火內熾症見諸般燥候者服之令人氣滿頭昏目眩心煩舌強是即氣溫助火之一驗也若使素稟大良則食又能消痰利水安脾和胃養心是即千金所言能安心氣之說也總之凡物辛溫施於陰臟無火則宜施於陽臟有火為大忌耳

薤菜四百五
辛

薤菜入脾胃按書別無所論惟言氣味甘平幹柔如蔓中空如葱以之橫地節節生根號為南方奇蔬又言專解野葛毒生搗服之尤良取汁滴野葛苗當時即死搗汁和酒服能治難產則其性氣通清可知是以脾胃虛寒大便滑脫服最深忌但此其氣稍平較之波棱覓菜養菜為更勝耳凡平臘服之最宜

油菜四百五
辛

門
血
葛
菜

菜

油

利
腸
胃
解
煩

通
腸
利
便

莧
菜

子

本草圖說

卷

四

百五十九

油菜人肝脾二名羹臺據書皆載氣味辛溫而大明獨指其性曰涼其義何居緣五味五氣於人氣血不甚傷損則或投以辛散而真氣不失自不得以涼名如其用辛破血審於真氣有礙則辛氣既投涼氣自至又曷能使辛為溫而其氣不得以涼名乎油菜氣味雖辛為五葷之一其用長於行血破氣如座後一切氣痛血痛並諸遊風丹毒熱腫瘡痔等症其威用之與經水行後加入四物湯服之云能斷產並治小兒驚風貼其頂頸引氣上出婦人難產亦同歌云黃金花結果米實細粉如神難產而究氣行而氣無復血破而血莫生謂之為涼誰曰不宜是以書載下座須以藏久者為佳否則又有泄瀉之虞又曰舊患脚氣者不宜食孤臭人不宜食食之加劇及或動疾發瘡使果是溫非涼亦曷為服之而有若是之症乎子打油善治癰疽及塗痔漏中蟲薰肉生蟲以此油塗節減

白松菜

四百五十九

白松菜入腸胃因何命名以其經冬不凋故以松稱因色青白故以白號但松有三一曰牛肚菘其葉最大而味甘一曰紫菘即蘆菔一曰白菘根堅小而不可食三種南北通有時珍曰蘇恭言南北變種者蓋指蔓青紫菘而言紫菘根似蔓青而葉又不同耳而氣則一本草言其性溫大明言其性涼蓋涼則是而溫則非也時珍曰氣虛胃冷人多食則恶心吐沫氣壯人則相宜說曰發風冷內虛人不可食有熱人食不發病則其冷性又屬可知瑞曰夏至前食發氣動疾有是疾者忌之即據別錄載能通利腸胃除胸中煩解渴蕭炳載能消食下氣治癰疽止熱氣嗽冬汁尤佳甯源載能和中利大小便並列丹方載治小兒亦遊赤遊於上下至心竈經入目白菜揉爛怕色滿目出漆毒生瘡用白菘菜搗敷即退亦何莫不是氣涼之故而能使其諸病悉除也後人不解其意反以味平曰溫生則辛冷熟則甘寒嗟嗟性既溫矣安有止煩除渴消食下氣解熱之功乎於此可徵其概矣

莧菜

柔滑

四百六十

莧菜入腸胃味甘氣寒質滑按據諸書無不皆言其性冷利能治熱結血痢疎毒之症恭曰亦莧辛寒宏景曰大莧細莧並冷利療亦下而不堪食震亨曰紅莧入血分善走故與馬芻同能下即人服之者亦無不謂其通腸利便是亦菜中最冷最滑之味也且又戒其多食則令人動氣煩悶又曰不可與鯪同食生鯪殺試取鯪肉切如豆大以莧菜裹置土坑內用土掩蓋一宿盡變成鯪按此事即未有而其氣味之寒氣味之冷與於鮑鯪同為一類也故有如此箴規之詞矣豈止尋常冷利之味哉然累臟陽不陰及於暑時挾有真正熟候亦又何忌惟在食之者之能審其所用可耳子治肝經風熱上攻眼目赤痛生翳遮障不明青盲赤眼並宜服之為末每服方寸匙

菠蘿屬滑

通利腸胃。蓋因滑則通，故名滑。

宜咸用之。人言能解熱毒酒毒，蓋因寒則療，熱則發。並因酒濕成毒者，須宜用此以服。且毒與熱未有不先由胃而始及腸。故藥多從甘入。菠蘿既滑且冷，而味又甘，故能入胃清解，而使其熱與毒盡從腸胃而出矣。然此服之過多，為害不淺。張璐云：凡蔬菜皆能疏利腸胃，而菠蘿冷滑尤甚。又曰：多食令人腳弱，發腰痛，動冷氣，與鮑魚同食，發霍亂，則知此即可以供蔬而用。又當斟酌於其中也。北人多食肉類，食此則冷。

苦菜四百六二

苦菜屬滑。入心，竊氣至陰，故味苦寒而不溫，而經所列病症，有言能治五臟邪氣者，邪熱客於心也。胃脾渴熱中疾者，熱在胃也。腸澼者，熱在大腸也。惡瘡者，熱瘀傷血肉也。苦寒總除諸熱，故主之也。熱去則神自清，故久服安心益氣，聰明少卧也。耐饑而寒，輕身不老者，總言其熱去陰生心，安氣益之神功也。此與苦苣同為一物，而形色稍異。治法與苦苣相同。宗奭曰：苦苣殊妙，青苗陰乾，以備冬月為求水調散之。雜記云：凡病痔者，宜用苦苣菜或蘿蔔，或蘿蔔出時不可取，令蠅子青蟲齧婦亦忌食之。

白苣四百六三

白苣屬滑。有似高良，葉有白汁，味苦，氣寒無毒，故治亦載開胸利膈、通腸滑胃。然冷氣入食之，其氣益冷。座後食之，寒入小腸而痛甚，追與醋酥同食，則能生蟲之為害耳。

高良四百六四

高良屬滑。由於白高良來，故以高名。味苦氣冷微毒。高良蟲不敢近，蛇虺觸之則目瞑不見物，人中其毒，以薑汁解之。治專通經絡，利水通道，解毒殺蟲。凡人病因熱濕而見胸膈填脹，眼目昏暗，乳汁不通，小便閉塞等症，用此治無不效。如乳汁不通，則用高良菜搗汁以服。小便不解，及或尿血，則用高良菜搗敷臍上。沙蟲水毒，則用高良菜搗汁以塗。蛇蟲與蟲入耳，則用高良菜搗汁以滴。及或和雄黃等分，為丸，釀油入耳，以引之類。凡此因其味苦，苦則能以降氣，因其氣寒，寒則能以解熱故耳。至晝既言治能明目，而又言其多食，則使人目昏，無非因其熱極傷目，則目得此以明。過服生寒，而目不明，則目又得因此而暗，無他義也。子能下乳利水，並治陰毒痔漏，下血傷損作痛，功與高良菜同。

開胸利膈、通腸滑胃。然冷氣入食之，其氣益冷。座後食之，寒入小腸而痛甚，追與醋酥同食，則能生蟲之為害耳。

高良屬滑。由於白高良來，故以高名。味苦氣冷微毒。高良蟲不敢近，蛇虺觸之則目瞑不見物，人中其毒，以薑汁解之。治專通經絡，利水通道，解毒殺蟲。凡人病因熱濕而見胸膈填脹，眼目昏暗，乳汁不通，小便閉塞等症，用此治無不效。如乳汁不通，則用高良菜搗汁以服。小便不解，及或尿血，則用高良菜搗敷臍上。沙蟲水毒，則用高良菜搗汁以塗。蛇蟲與蟲入耳，則用高良菜搗汁以滴。及或和雄黃等分，為丸，釀油入耳，以引之類。凡此因其味苦，苦則能以降氣，因其氣寒，寒則能以解熱故耳。至晝既言治能明目，而又言其多食，則使人目昏，無非因其熱極傷目，則目得此以明。過服生寒，而目不明，則目又得因此而暗，無他義也。子能下乳利水，並治陰毒痔漏，下血傷損作痛，功與高良菜同。

解時
行諸
毒

芥菜

莖

散血
寬腸
利水
通淋
消痘
解心
肺熱
邪氣
臺蘆
殺蟲
葉
臺蘆
燒灰
浴

助濕
脹脾

解熱
散血
寬腸

芥菜
芥
滑子

匏瓠
四百六十六

夏月以菜作粥。及或搗汁。亦能解熱。治毒止痢。止血。生肌。搗葉以敷禽獸諸傷。災瘡。此皆以寒療熱之法耳。若使脾虛人服之。則有腹痛之患。氣虛人服之。則有動氣之憂。與腸滑人服之。則有泄瀉之虞。至云治能補中理脾。皆是書中語。欠分闢。徒以啟人妄用之階。非實義也。莖燒灰淋汁。洗衣潔白如玉。

匏瓠水菜入心胃大種類。其形有大有小。有長有短。其味有甜有苦。錦囊曰。長大如東瓜者名瓠。殊似西瓜者名匏。腰細頭銳者名胡蘆。柄直底圓者名瓠子。為菜瓠有苦甜二種。甘者大苦者小。又曰或以難其性。有平有寒。甘多平。其用有利有害。利則不但可作器用。器大者可為蓋。蓋小者可為瓢。為腰。為頭。可以浮水。為盤。可以盛食。為舟。可以浮舟。為器。可以為舟。可以養參。犀角。可以清暑。其利溥矣。且能下水降氣。利水通道。以治淋閉。黃面目浮腫之症。腹脹。腰脛用亞腰。腰用亞腰。頭用頭。以心與肺。以除煩熱。消渴之症。人最宜燒灰存性研末。以擦腋下癰瘤之症。虛最宜搗葉為丸。孫思邈稱其甘平。可以耐饑。花鬚陰乾。李時珍指其煎湯。可以解毒。稀痘。陰乾於徐夜煎湯浴。小兒可以免痘。每服一個。食前溫酒下。入腎。以治諸般瘡病。及或目翳。鼻塞。鍼前水含漱。日三四次。鼻塞。血竭。努肉。用子煎汁以治。此皆有利之處。蓋天生此一物。以為暑時必用之需也。其言有害之處。亦復不少。扁鵲云。患虛脹者。不得食之。食則患水不瘥。苦者尤傷胃氣。不可輕試。凡苦寒藥皆能伐胃。不獨此也。本經治大小浮腫。又云下水令人吐。大傷中氣。今人治黃疽水氣。大小便不通。或浸火酒飯上蒸。或寶糖霜煅存性。必暴病實病。庶可劫之。若久病脾胃誤服。必致吐利不止。往往致斃。可不慎歟。

南瓜
水菜

茄子
水菜

性稟地陰。外假陽火。皮赤肉白。陽包乎陰。花實香紫。故書載此品類之賤。食物之所不屑。凡人素患脚氣。於此最屬不宜。服則濕生氣。壅腫。虛寒。用此與羊肉同食。則病尤見劇迫。惟有太陰濕土。口渴舌乾。服差。見其有益耳。至經有言。補中益氣。或以津枯燥涸。得此津回氣復。以為補益之自平。否則於理其有不合矣。

茄子
水菜

膾滑而利。服則多有動氣。生瘡損目。腹痛泄瀉之虞。孕婦食之。尤見有害。此瓜菜中無益之物也。

李延飛曰。秋後食此損目。生生編云。女人服此能傷。

利氣
花
茄蒂
桔梗

消暑
水道
胡瓜
葉

生用
苦寒
解心
肺煩
熱
解毒
利便
通腸
助冷

解暑
熱內
伏作
疴

綠瓜
瓜
葉

此動氣發瘡及瘍。帝治陽風下血及擦瘍。時珍曰：治瘍風用茄蒂燒灰，花治金瘡牙痛，燒灰塗根及枯根葉皆治凍瘡破裂者，湯清之。

胡瓜
瓜
葉

四百六九

胡瓜，入脾。大腸氣味甘寒，服此止能清熱利水，別無裨益。故北人坐炕用此以為席珍。南人值暑用此以為供蔬，并或咽喉腫痛用此入藥，以為吹消。用老黃瓜去子，以芒硝填滿，枝瘡火眼用此納硝刮粉，以為點搽。湯火傷灼用此搗碎入瓶，取水以為刮敷。水病肚脹用此連子醋煮空心以為投服。小兒熱痢用此同蜜以為投治。皆以取其甘寒解毒之意，然使臟寒氣陰復則能以動氣發熱作瘡，且發脚氣生瘡。小兒過服尤易作瀉。生瘡不可不慎。葉則苦平，小毒，能治小兒閃癖。一歲用一葉去根攢汁服。

苦瓜
瓜
葉

四百七十

苦瓜，端入心，即錦荔枝其種，有長有短。何書載言用長宜取青皮去子，煮肉充蔬，蓋謂生則性寒，熟則性溫，用此生青性寒，以為除熱解煩，清心明目之品。何書又言用短宜待熟，亦取子為食，蓋謂其子苦甘，內藏真火，用此性熱，以為壯陽益氣之功。共此一味而生熟不同，寒熱迥別，故其所用，其亦各有別如此。

越瓜
瓜
葉

四百七十一

越瓜，端入心，即稍瓜。以瓜本生於越，故以越名。今湖州等處亦有服之。於人無益，但取味甘性寒，能解酒毒，利小便，燒灰傅吻瘡，及陰莖熱瘡而已。若多食之，則令人心痛腹痛，泄瀉微結，脚弱不能以行，並天行病後食之，能以發病，與於胡瓜之性，恍惚相似，皆為通腸助冷之品也。小兒尤不可食。

甜瓜
瓜
葉

四百七十二

甜瓜，端入心，胃暑月解止渴之品也。味甘性寒，有毒。凡人因於暑熱內伏，症見膿血，惡利痛不可忍，須以水浸甜瓜數枚，食之即愈。若瓜經日曝，其寒尤甚。故書有言：瓜寒於曝，油冷於煎，即是此意。但此陽氣素盛，亦宜少食。若使脾胃素冷服之，則有瘡疽，動氣反胃，陰下生瘡，發熱作脹之變。須用鹽花少許，麝香與酒則解。脚氣癰癧，食之患永不除。瓜蒂專主涌吐，已詳吐散部內。但有兩鼻兩蒂者，殺人。皮可取收作羹，或蜜收晒為巢。

解風
寒濕
熱盛
毒留
滯經
絡爪

葉

利水
消腫
解熱
冬瓜

解暑
利水
消腫
解熱
冬瓜

潤腸
胃膚
澤肌
膚

芋葉
芋莖
潤腸
胃膚
澤肌
膚

絲瓜 岂入經絡。貫串房隔連屬。凡人風寒濕熱。蠱毒血積。留滯經絡。發為癰疽瘡瘍。崩漏陽水腫等症者。服之立能有效。以其通經達絡。無處不到。小兒痘出不快。用此近帶三十寸。連皮燒灰。存性為末。沙糖水調服。並可以敷脚腫。鼻漏。時流瀉水。用此瓜藤近根三寸。燒灰存性為末。酒服方寸匙亦效。小兒預防出痘。於立冬後用小絲瓜殼。入硃砂服之亦應。皆以借其寒滑通達之性耳。但過服亦能滑腸作泄。故書有言。此屬菜中不足食之。當視臟氣以為可否也。葉搗汁生服。可解一切蛇傷之毒。滓盒患處亦佳。

冬瓜四百七十四

冬瓜 嵌入味雖甘淡。性甚冷利。故書所述治效多是消腫定喘。楊氏家藏方治十種水氣浮腫。用大冬瓜一枚切片。去瓢。以水在內煨至火盡。取出切片。同赤小豆焙乾。為末糊。每服半錢。水煎服。七十日。或久。瓜子湯下。日三服。小便利為度。止渴及治癰腫熱毒。切片敷上。壓丹石毒。然惟臟腑有病者最宜。若虛寒腎冷。反病滑泄及水寒氣弱。體瘦服之則水氣益世。而有厥逆滑脫。渴之虞矣。王昂既言性能止渴消腫。而又謂性不走服。甚宜人。是何自相矛盾耶。子能補肝明目。凡藥中所用瓜皮。可作面脂。以色子者即是此物。瓜皮可作面脂。以色白故。

一百七十五

鹽

醬瓜本寒物。即冬瓜別種。其形如枕。生時剖開。味酸。藏經醬醃。味甚美。入腸胃氣不甚溫。按書有言。味鹹而甘。性寒有益。治利腸胃。止消渴。不可多食。其說非謬。蓋以醬經蒸發。熟內積毒自免。有瓜性甘寒。加以醬入。則寒反得下達。是以渴熱之症。得此則消。腸胃之燥得此則潤。且其長於利口。而致日服不厭。則濕又得內積而成。而寒又得因是而生。故又戒其宜節。不可以多食。以致病生於不測中也。

芋子四百七十六

芋子 腸胃種類甚多。芋有六種。青芋。紫芋。真芋。白芋。連草芋。野芋。名老芋。形葉相似。如一根有大毒。並殺人不可食。一開花。或七八月有開者。抽莖生花。黃色。旁有一長導管之細半莖。蓮花之狀也。據書述其功能。有言生用。則可以治腹中癖氣。生用芋子一兩。壓破酒五分。清頭上軟癩。用大芋搗熟。用則充飢。墨膚。十月後晒乾收之。冬月食不發病。但有小解毒稀痘。小兒食冷吐。則能止渴生津。養熱除煩。通腸開結。和血食。則能下氣寬中。煮汁。壅食。則能破血通瘀。及浴身上。遊風燒灰。則能以治瘡。胃風邪。腫痛。用芋燒研。搭懷。微曰沈括筆談云。處士劉陽隱居王能除煩止渴。療妊娠心煩迷悶。胎動不安。并敷此蟲。雄腫毒瘡。瘡瘍成瘻。用並燒灰。敷瘡。瘡無癰肉。芋苗。肺乾燒存性。此生則發。熟則滑。性滑則可。以下石毒。故書載此多食。則不免有動風發冷泄瀉。及難冠化之弊矣。若任芋葉與莖。味辛冷滑。功

筍竹
淡竹
筍
刺竹
筍
酸筍
蘆筍
諸筍
筍
新竹
筍
苦竹
筍
冬筍
筍
節間
瘀骨
瘡熱
不治

生山尾一蜘蛛為蜂所螫墜地腹鼓欲裂徐即入草嚼破芋梗野芋形葉與芋相似芋種三年不採成招亦能殺人食之宜用土漿盦汁大豆汁以飲

諸筍
系滑

諸筍味甘微寒無毒。接筍雖載品類甚多如筍竹筍。即中苞性能治消渴風熱等症。淡竹筍亂味甘寒能陰火熱。狂燥頭風。賴竹紫條等症。桃竹筍有小毒。出廣中皮滑而黃半絞瘦能治六畜瘡中蛆等症。在刺竹筍時珍曰生交廣中叢生大者圍二
竹爲弓根大如氣味甘苦微有小毒食之令人落髮。酸筍出粵南筍大如臂指至用帛裹已去苦水投令井水中浸二日取止癉如綠絳暗者可食。治事者提入中州成罕物云氣味苦涼無毒食之令人止渴解醒利膈蘆筍氣味甘溫能治噎膈煩悶不食等症。然細多食助冷動氣以甘則氣壅而寒則發人冷慾。惟素患有疾瘡在於皮裏膜外者得此則愈如竹泄同薑可以治人瘧疾之意。他筍其味皆甘惟苦竹筍則苦食之可以治人氣逆而不作壅。以苦主於下氣故也。况筍初食難化而脾虛尤甚。一小兒食乾筍三寸許噎於喉中壯或喘粗如驚服驚藥不效後吐出筍諸症乃定真難如此也。久食則腸受刮。利大腸。如益於脾俗謂之刮腸丸。惟用生薑麻油始可以解。新州等處竹筍氣味苦寒食尤不美。如萬服驚藥不效後吐出筍諸症乃定真難如此也。久食則腸受刮。利大腸。如益於脾俗謂之刮腸丸。惟用生薑麻油始可以解。新州等處竹筍氣味苦寒食尤不美。新州叢竹。匡廬扁竹。瀘州方竹。筠南蘆竹。筍竹。月竹之類。但世猥用竹筍以發豆瘡。其害非輕。筍味多苦。最載人喉服須先以灰湯煮過再煮乃良。或以薄荷數片同煮亦去筍味惟有冬筍生冬而土不出陽氣未泄故食則能通脈利氣。凡吐血衄血滯不通之症皆可授服。痘瘡不出取糞同米者粥食之良。泄瀉者忌筍筍性味亦然。乾筍淡片利水豁痰消腫。

李
五百七八集

李尚人肺以李名多子故也。時珍曰。李木其子大者如杯如斗小者如彈如櫻。其味有甘酸苦澀數種。其色有青綠紫朱黃赤縹紫灰胭脂青皮之殊。其形有中心馬肝柰李杏李水李離核合核無核匾縫之異。其產有武陵房陵諸李。早則四月熟遲則十月十一月熟。故味甘而酸。或苦而澀。而性微溫。苦澀者不可食。不素問言李味屬肝。故治多在於肝。正思邈所謂肝病宜食李之意也。中有痼熱不調。骨節間有勞熱不治。得此酸苦性入則熱得酸則歛得苦則降而能使熱悉去也。且書既言除熱而書又言多食命人臚張及發虛熱。蓋因凡物生則難化熟則易消。李屬生硬之物。多食則物在胃不消。故又轉為臚張發熱之病矣。推之盡吾夏食李則能以發瘡瘍合雀肉與蜜食則能以損五臟合漿水以食則能以化霍亂並服人不可與食。無非李屬熱物少食則其多食則瘡與熱俱聚。單食而不雜以濕熱之物尤可多食。而更合以濕熱之物則食烏見其有可乎。故但指其勿食。正以使人自思可耳。

生熟
發毒

溫腎
國胃
寬腸
栗楔
栗穗
栗花

改欲
心中
虛熱

開胃
通膽
生津
止渴

青桃五百七十九

青桃萬人肺家巢耳。然却列此為下。以桃味甘而酸。性熱微毒。故書皆載食則使人發熱生雞作瀉膨脹成淋。及發丹石之毒與蟹同食。則使人心痛不休。與服白术人則忌。究其主台止有作脯可益顏色一語。化無有及。則知桃性固熱。生食而桃不化其熱。益甚安得有利無害。而不見有滿脹發熱發毒生瘡之病乎。又桃差勝可解煥熱。

青梅四百八十一

青梅萬人肝膽胃。花開於冬而熟於夏。張璐謂此得木金氣。故其味最酸而入膽耳。人之舌下有四竅。兩竅可通膽液。食則通膽。使液外出。類相感也。酸主收。故治皆主酸收之病。如本經所言下氣除熱煥滿安心止肢體痛。是已然。惟漸久則佳。若青梅則凝滯滯氣。非偏枯不仁等症所宜用也。梅之種類甚多。惟榔梅最勝。相傳真武折梅枝插榔樹株而誓曰吾道若成。花開果實。其種從均州太和山來。即榆樹中之一種。其梅如杏。而鬆脆異常。故近世謂之消梅。食之開胃生津清神安睡。乃榔樹之本性也。然多食亦能凝血滯氣。當細審食可耳。

楊梅四百八十二

楊梅萬人心兼入肝脾心胞。心體亦入心。味酸入肝。及甘入脾。故書載為心家血分之藥。兼入肝脾心胞。又載性溫而熱。張璐曰。溫能治心煩口渴。消熱解毒。且於歸藏。則能止嘔除吐。燒灰則能斷瘍。若或多食。則有損傷動血致効之虞。緣人陰虛熱浮。氣血不歸。清之固屬不能表之。更屬不得。惟借此為酸收。則於浮熱可除。煩渴可解。并或因其過食。而致見有損傷動血之變矣。設使熱從實致。則食此味必不能效。然果因於清涼可解。則食此味必不見燥。又曷為而有燥熱損傷之戒乎。性熱之說。於此可徵。根皮煎湯能解砒毒。燒灰油調塗湯火傷核仁療脚氣。然須多食。以補漆拌核爆即自裂也。

栗五百八十二

栗萬人入腎兼入陽胃。

腎之果也。味鹹性溫。體重而實。故能入腎而補氣。凡人胃氣虧損。而見腰腳軟弱。並胃氣不充。而見腸鳴泄瀉。服此治無不效。宏景曰。相傳有人患腰脚弱。在栗樹下食數升。便能起行。此是補腎之義。然須風乾。連夜吞咽為佳。時珍曰。風乾之栗。勝於日曬而大煨油炒。勝於蒸熟。若使栗不風乾。或生水氣未除。食則助濕。發氣生蟲。蒸煮炒熟食。則雅氣帶膈。於風水之人尤忌。小兒多食。令齒不生。栗楔係栗中辦。能療筋骨風痛。令積瘀癥。生噬可罨惡刺。出箭頭。敷瘰疬腫毒。痛。栗核即肉上薄皮燒灰存性。能治骨鰓。在喉吹入。即下栗殼者汁。能治反胃消渴。栗穗即外刺煮汁。洗大丹毒腫。栗花能治瘰疬。栗樹皮煮汁。可洗沙蟲溪毒。并丹毒瘡毒。栗

根酒煎能治偏墮脅氣皆以其下氣解毒之功耳。

橄欖

四百八一

栗根入肺胃生津止渴酒魚諸毒

栗根入肺胃生津止渴酒魚諸毒
橄欖嫩葉入魚肝及子。迷悶至死取此煮汁即解。故書又載能解諸魚之毒。木作機其魚撥着即皆浮出。及治魚骨之哽。橄欖燒灰存性研末急流水於痘瘡不起。並痘抓碎成瘡。磨汁塗成瘡解。魚食枯瘡解毒。腸風下血。橄欖燒灰存性研末。每服二錢水調以鹽。初生胎毒調下亦效。大兒落地時用橄欖一個燒研。砂五分和噙生脂麻一口。吐唾和藥。謂之安兒口。中待腫一個時辰方可與乳。外擦取下陽。胃毒令兒少疾。及出痘稀少也。核核方。安兒口中待腫一個時辰方可與乳。外擦取下陽。胃毒令兒少疾。及出痘稀少也。脰有蟲用橄欖研末。入麝香少許貼之。下部疳瘡。用橄欖燒存性研末。由核核山查核等分。陰腎癰腫等症。研末每服二錢。空心齒湯送下。無不效。以其具有溫行酸飲之性耳。但此性專搜胎毒。過服則有嘔吐泄瀉之虞。性重聚火滯熱。喉用之得宜。熟噉則不免有熱氣上蒸之弊也。

桔梗

四百八四

桔梗肺胃潤肺下氣和脾

桔梗味甘而辛。體潤氣香。性平無毒。按書言此香可舒脾。辛可潤肺。葉中佳品。誠佳品也。然云炒食無害。論亦未周。蓋此氣味雖純。既不等於胡桃肉之熟。復不類烏半菱角之涼。食則清香可愛。適口助茗。最為得宜。第此體潤質滑。施於體燥堅實則可。施於體寒濕滯。中氣不運。恣啖不休。保無害脾滑腸之弊乎。仍當從其體氣以為辨别。則得之矣。

花生

四百八五

花生味甘而辛。體潤氣香。性平無毒。按書言此香可舒脾。辛可潤肺。葉中佳品。誠佳品也。然云炒食無害。論亦未周。蓋此氣味雖純。既不等於胡桃肉之熟。復不類烏半菱角之涼。食則清香可愛。適口助茗。最為得宜。第此體潤質滑。施於體燥堅實則可。施於體寒濕滯。中氣不運。恣啖不休。保無害脾滑腸之弊乎。仍當從其體氣以為辨别。則得之矣。

鈎藤

潤肺

烏芋

四百八五

破肝

腎精

皮

栗根

入肺胃生津止渴酒魚諸毒

烏芋味甘而辛。體潤氣香。性平無毒。按書言此香可舒脾。辛可潤肺。葉中佳品。誠佳品也。然云炒食無害。論亦未周。蓋此氣味雖純。既不等於胡桃肉之熟。復不類烏半菱角之涼。食則清香可愛。適口助茗。最為得宜。第此體潤質滑。施於體燥堅實則可。施於體寒濕滯。中氣不運。恣啖不休。保無害脾滑腸之弊乎。仍當從其體氣以為辨别。則得之矣。

鈎藤

潤肺

下氣

和脾

烏芋味甘而辛。體潤氣香。性平無毒。按書言此香可舒脾。辛可潤肺。葉中佳品。誠佳品也。然云炒食無害。論亦未周。蓋此氣味雖純。既不等於胡桃肉之熟。復不類烏半菱角之涼。食則清香可愛。適口助茗。最為得宜。第此體潤質滑。施於體燥堅實則可。施於體寒濕滯。中氣不運。恣啖不休。保無害脾滑腸之弊乎。仍當從其體氣以為辨别。則得之矣。

生
助氣
解熱益胃
進食生止
胃渴
熱滯
腸胃解腸
胃熱
毒成
病

不能起發同地龍搗爛清聲醒酒。其效若是之多。蓋以味甘性寒則於在胸實熱可除而諸實脹滿可消體黑則以力善下行而諸血痢毒可祛是以冷氣勿食食則令人每患脚氣熱嗽勿用用則於人有集火氣之為害耳。

橘櫟四百八十七

橘櫟肺胃與皮共屬一物而性懸殊橘皮味辛而苦而橘櫟則變味甘而酸也皮有散痰開瘻理氣之功而櫟則更助痰作飲及有滯氣之害也進賢縣胥簡章之女秀英忽氣喘促至極眼翻手搖已有莫主之勢繡貯其肺右觸浮滑而弦至書有言能治消渴開胃並除胸中膈氣此為內熱亢極胃氣不寒者而言若使水虧脾弱發為咳嗽而日用此恐喫保無生痰助氣之弊乎今之虛勞好食此物類多受害人特習而不察耳但用蜜煎作羹佳

菱角四百八十八

菱角入肺胃種類雖多角四角者為菱兩角者為蘋花隨月而轉氣滯則一即書有言安中消水止渴解酒療瘧治痢又有紅瀉白補生降熟升之說然亦止供食品而於治療則無且於過食則有腹滿填脹損陽痿莖之處必取麝香生薑吳茱萸作湯及或沉香磨汁以導是亦味甘性寒助濕增滯之一証也乎性平之說似不足信

香草四百八十九

香草當入食中佳品凡蓏粟土熟毒惟香草味甘性平大能益胃助食及理小便不禁蓋此本於桑楮諸木所出得受桑楮餘澤而成也有種出於深山湖楓木上小然此性極滯濡中虛服之有益中寒與滯食之不無滋害取冬產肉厚細如錢大者良

木耳四百九十一

木耳當入大生非一木良枯莫辨權曰草耳古槐桑樹上者良枯木者次之其餘樹木多動風氣發痼疾令人肚下急損經有光欲爛不生蟲者並有據書所載能治痔瘡掀腫崩中漏下用此炒黑為末酒調服眼流冷淚用木耳燒存性不勝一兩為末酒調服一切牙痛等症用荆芥等分然性稟陰濕生於枯木徒有良精冷腎之害而無溫脾益胃之功也本經言其益氣不饑輕身強志恐讐詞耳豈真謂哉

磨菰四百九十二

磨菰當入腸本於桑楮諸木埋於土中澆以米泔而生味甘氣寒正要曰有毒半時珍曰無毒半色白柔軟中空狀如未開玉簪花品又有

治蟻
瘻下
瘻共
終有
毒害
人

通氣
利

鵝膏
鵝脂
鵝脣
鵝脣
鵝脣
鵝脣

膿滯
壅發
之品

形如羊肚。蜂窠眼。故又有別其名曰羊肚菜。味甘如雞。故又有別其名曰雞腿。旅皆與香蕈諸菰同為一類。但香蕈色白而平。磨荪則色白而寒也。香蕈能益胃氣不饑。及治小便不禁。磨荪則能理氣化痰。而於腸胃亦有功也。然皆體潤性滯。多食均於內氣有阻。而病多發。不獨磨荪然也。

雉原禽

雉屬入心兼入肺。由異氣所感。靈蛇所變。卑雅云。蛇交雉則生蜃蜃為雉。入大水則化。水經云。蛇為岐其卯遇雷則入地。不遇雷則仍為雉。不得山川之氣。逐其飛騰。則得滄溟之氣。恣其吞吐。是與蛇蛻出沒無異。時珍云。雉屬離。離屬吳。故凡雞煮則冠變。雉者則冠紅。飛必先鳴。食多蟲蟻。此雖食品之貴。食可補中益土。胃土及治蟻瘻下痢。然終性熱有毒。故書言其八九兩月可食。春夏不可食者。以其雉食蟲蟻。又與蛇交變化有毒也。發痔發瘡發瘍。與家雞子同食。令人發症。周身疼痛者。謂其雉食蟲蟻有毒。秉性暴烈有火也。但書既言發瘍發痔。而書又曰。可治蟻瘻與瘍。亦以雉素好食蟻。故可以制蟻瘻而治其毒耳。

雁四百九三

雁水禽
雁屬入肝腎。狀考之時珍謂有蒼白二種。今人以白而小者為雁。大者為鶩。蒼者為野鶩。亦可飼。鳥。爾雅謂之鷗鷗也。雁有四德。寒則自北而南。止於衡陽。熱則自南而北。歸於雁門。其信也。飛則有序。而前鳴後和。其禮也。失偶不再配。其節也。夜則星宿而一奴巡更。晝則啞盧以避矰繳。其智也。而捕者奉之為媒。以誘其類。是則一愚矣。故雁謂之信鳥。人不宜食。道家謂之天厭。味甘氣平。其性通利血氣。故能補虧瘦。逐風癆。取肉炙。多服長毛髮生鬚。久服壯筋骨。助氣。昔黃帝製指南於雁脰骨空中。中製針。取其能定南北。但覓之不易。後人於鯉魚脰中製之。以其性東伏土。定南北不移。可定水土之方向也。今又傳稻花水煮。子時荷花水煮。以足南北。取雁南來時瘦不可食。北嚮時乃肥可取之。

鵝四百九四

鵝水禽
鵝屬入肝脾。肉。按書有言。味甘性平。有言。味辛性涼。有言。氣味俱厚而毒。有言。服則解熱解毒。有言。服則發風發瘡發毒。持論不同。意見各一。究之味甘不補。味辛不敢體潤而滯。性平而涼。人服之而可以解五臟之熱。及其服丹之人最宜者。因其病屬體實氣燥。得其甘平以解之也。煮汁能止渴者。以其肉多肥膩。而壅不渴之意也。發風發瘡發毒。因其病多濕熱。得此濕勝氣壅外發。熱出者意也是以鵝體之潤在膏與腺。腺即鵝尾之肉。可以潤皮膚而合面脂。灌孔耳而治卒聾。塗破裂而消癰毒。在涎可以入喉而治穀。一皆體潤和燥之力。即卵氣味甘溫。可以補中益氣。而猶有多食發疾之戒。非性屬膿滯。曷為耳。

鵝毛

鵝掌

鵝脣

鵝脰

補中

利水

息血

解溫

塵毒

解毒

殺蟲

解毒

利水

解溫

解毒

溫補

有是半血兼熟飲可治血膈吐逆不食病根非是以血引血之意乎。血與毛可治射工之毒。毛為文波聚系暖而性冷。嬰兒尤宜之能。非鵝能食此蠱以物制物之意乎。宏景曰東川多漢濱養鵝以辟之又曰鵝未必食射工也。屎可以治小兒驚口瘡。自生出可治。自外生入不可治。治用食草白萬下清真源汁入沙糖研勻磁器密封勿令洩氣則手指塗之立效。非其屬性不溫而膽亦能潤燥之意乎。凡此所見治畧皆有義存不可僅執是溫是冷之說以致忘其主體也。藏器曰蒼鵝食蟲主射工毒。

鳬四百九十五

鳬

水

金

鳬肉入脾胃即野鴨又類鴻雁夏藏冬飛羣飛散日味甘氣平無毒其肉肥而不脂善而易化凡滯下泄瀉喘嗽者須防咽喉頭腦腫痛犯此宜用生薑甘草解之。新說云楊玄之通則廣州歸楚州因多食鵝遂病咽喉間生癰潰而壞乃可投藥初食覺甘香至半動覺精竅盡一動覺辛辣粥入人口無滯膾尤好半夏毒於口故以甘草湯而愈。其功用又言服此能解嶺南野葛子並溫瘧久病欲死。蠱氣欲死或是無毒得此則犯有毒得此則解之意也。至書有言服此能利五臟益心力令人聰明猶是冗統之辭未有確指無足信也。脂膏塗凍瘡固不龜裂自外者勿食同竹筍食則小腹脹。

鵝四百九十六

鵝

水

金

鵝肉入脾胃雖屬野味然味甘性平治能補腎明目補肺益氣治功恍惚相似是以范記治目則有班鳩丸總

班鳩四百九十八

班鳩

水

金

班鳩肉入肺雖屬野味然味甘性平治能補腎明目補肺益氣治功恍惚相似是以范記治目則有班鳩丸總

本草綱目卷真

卷八 食物鳩

鵝鵝

竹雞

鷄鶏

鰐魚

鯉魚

上

益人
溫胃

長濕熱變生渴熱瘡瘍之病也。魚有皂白二種。皂者頭大白者腹腴皆與鯉魚之性相似而非食品之所共貴者矣。

鯉魚

五百二

魚

鱸魚。入形狀似鰱而究竟不相同。蓋鱸首細而白而鱈則首大而黑也。鱸則水動而躍而鱈則水即動而不躍也。且鱸之美在腹而鱈之美在頭。鱸之性動而燥而鱈之性則稍亞於鱸也。時珍曰：鱸為魚之下品，故有膚常之號。究其所論主治在鱸謂能補中益氣。上出故於承分則補而鱈謂能溫胃益人。并其所論多食之戒則亦有動風發瘡於熟之虞。宜鱸鱈二物同為一類之性乎。否則何其適相合矣。

蔬器曰：止可供
食品別無功用

鯩魚

五百三

魚

鯩魚。入食品味長。江湖與池皆有以草為飼常與青鱗混雜故名曰鯩。又名曰鯢。時珍曰：鯢因其第在池中，則味甘溫無毒。時珍言其燉中和胃即是此物。若在江湖所蓄則飼非盡青草常有穢惡混食故書又言食能發瘡但魚性多溫無論在池在湖施於陽臟之人則自發熱動燥施於陰臟之人不惟其燥全無且更鮮有溫和之力矣。食物之宜當先視人臟氣以為轉移。非獨鯩魚然也。膽味苦寒能治一切竹木刺在喉中以酒化二三枚溫服取吐即出。

鯔魚

五百四

魚

鯔魚。入湯江湖小魚耳。時珍曰長僅數寸形狹如扁狀似柳葉鱗細而整潔白可愛性愛羣游洵小魚中之最善者也。味甘性溫無毒據書言其主治有曰暖胃止瀉是其性溫之力又曰煮食已憂得非性愛羣游而能使人之憂自己乎。於此可見食物之助矣。

鯔魚

五百五

魚

鯔魚。脾臍即俗所云桂魚者是也。味甘性平小毒按書言此性最疏利凡腹內聚有惡血水蟲服此最屬有效故於癆癧最宜。昔有邵氏年十八病癆累年不愈偶服鯔魚而痊非其性最疏利能治惡血蟲蠱之意乎。但此有督刺十二以應十二月之數若人誤受鯔害則惟取櫑核磨水以解以魚最畏櫑故也。尾貼小兒軟癆佳膽治骨鯔竹木刺入咽喉不拘大人小孩或入腹刺痛服之皆出腹月余大鯔魚膽懸北壁下陰乾遇鯔者用皂子大酒淬溫服如無鯔魚膽鯪魚膽鯔魚膽亦用。

白魚

五百六

利肺
水開
胃氣

利水
除脚氣目昏
青魚
眼睛

宣中健胃
益氣

白魚常入肺胃味甘氣平形窄腹扁鱗細頭向上肉有細刺武王白魚同滑石以投名滑石白魚散取其長以治水兼助亂髮以破血氣通調而淋濇止矣但此性亦滑利故同聚食脾腎受泄必致腰有痛楚脾胃過食不溫必致飽脹不快惟有火食差可乃或醃或糟以為食耳至晝有言補肝明目調五臟理十二經絡者時珍亦謂此屬溫美之辭未足深信當以開寶之註為正

青魚五百七

青魚常入肺味甘性平色青謂曰狀似蝶而背青故書載能入肝通氣入脾利水凡人因於濕熱下注而見脚氣疼腫濕熱上蒸而見眼目不明皆當用此調治以此好啖螺則能利水故此亦能利水以除腳氣目昏之病也服人然治腳氣服此必須兼以薤白同投則內始有溫和之力矣所當合參味與服石人相反不可合生胡荽生葵頭中枕骨狀如琥珀磨水可治心腹卒痛亦可作筭作飲器解蠱眼睛汁治汪目能夜視瞻另詳於涼血部內所當合參

鱉魚五百八

鱉魚常入脾胃即南方溪澗中之小魚非海中鱉魚也海中鱉魚本名鮫魚溪澗鱉魚因居沙溝吹沙而遊咂沙而食故以鱉名味甘氣平無毒究其主治止曰燉中益氣因其味甘性平而然服之可使中氣溫和無有虧損非云中氣虛極必得此魚以作治療也

銀魚五百九

銀魚常入脾胃胃即書所云鱠殘魚者是也吳王食魚鱠氣味甘平不入治療據書止言出於松江浙江大者不過三四十身圓無鱗潔白如銀小者尤勝鮮食最美曝乾亦佳作羹食之可以寬中健胃而無油膩傷中之患

石班魚五百一十

石班魚常入人屬毒物凡服之者無不謂患頭痛作泄蓋此生於南方溪澗水石之處長數寸白鱗黑班浮遊水面聞人聲則割然深入其魚有雌無雄二三月與蜥蜴合於水上其胎毒人又與蛇交南方有土蜂土人殺此魚標於樹上引鳥食而土蜂盡退是以服之而致見有諸病之作耳但肉食之差可而子及腸尤甚今時捕魚多雜此魚賣與人食須宜慎之

鯛魚五百十一

鯛魚常入經絡兼入肝腎稟土陽氣以生性善穿穴力堅而銳無足能竄與蛇同性時珍曰南嶺鯛肆中以扛時水畜數百頭復以檻

之。或以蒜搗，投以缸中，則
鱗脫，而不以市物性相制也。故書皆載通經達絡，能治十二經風邪。並耳目諸敷之病。如風中血脉，口眼喎斜，用尾血同麝少許，右喝塗左，左喝塗右，止即洗去。十全云：龍血雞冠血，和伏龍肝並治。口喝耳痛，鼻効痘後目翳。用血滴點即愈。用血滴點即愈。從其類也。陳瘡，蛇蠍打死，香油抹腹。抹於繫於瘡上，候痛取下。看鱗有蟲上人，即去。未盡更作後人。酒蒸同藥為丸，陽道不長，不能續嗣。用此血同蛤蚧等藥以入丸，方見蛤蚧內。皆以借其性力相助。但此味甘性熱，其力能補，若病屬虛熱，及時行病後，陰虛火熾，食則必有氣弱動風與氣之變，不可不慎。

鮫魚

五百十二

無鱗魚即海中之漁魚者是也。生於南海。背皮粗錯，可飾刀把。其肉作鱠，鮮活切片，以生食為勝。能補五臟。功亞於鯽。蓋鯽補脾利水，想此亦屬利水之品。故有功亞於鯽之說也。皮治痔瘡，鹽燒，解鱗魚毒。

烏賊魚

五百十三

無鱗魚即泥鰌，伏於泥中。得土陰氣以養性，動而侵，故能入土以補脾。書言燉中益氣者，義根是也。得水則浮而出，涸則入泥而不見，故能下入而治病。書言同米粉，有羹，下入而收痔者，義由斯也。他魚水涸即死，惟鰐常自滲涎以自養，伏泥而不涸。故人服之而津生。書言醒酒消渴者，義亦由此起也。消渴用泥鰌十頭，陰乾去頭尾，燒灰，乾荷葉等分，烏鬚揩擦。泥鰌狼把草各一兩，雄燕子一個，酸石榴皮半兩，搗成團，入瓦鍋內，陽事不起，食之。如何用之立應？以其筋強力鉗，故能入骨，以烏鬚入腎，與肝以起陽也。泥鰌形似牛狗，燉瘦用燉，一兩，二枚，從口鼻送入，立肥。

鮆魚

五百十四

即泥鰌，伏於泥中。得土陰氣以養性，動而侵，故能入土以補脾。書言燉中益氣者，義根是也。得水則浮而出，涸則入泥而不見，故能下入而治病。書言同米粉，有羹，下入而收痔者，義由斯也。他魚水涸即死，惟鰐常自滲涎以自養，伏泥而不涸。故人服之而津生。書言醒酒消渴者，義亦由此起也。消渴用泥鰌十頭，陰乾去頭尾，燒灰，乾荷葉等分，烏鬚揩擦。泥鰌狼把草各一兩，雄燕子一個，酸石榴皮半兩，搗成團，入瓦鍋內，陽事不起，食之。如何用之立應？以其筋強力鉗，故能入骨，以烏鬚入腎，與肝以起陽也。泥鰌形似牛狗，燉瘦用燉，一兩，二枚，從口鼻送入，立肥。

若在喉中骨哽。用此入喉。牽拽而出。先入喉中。牽拽出之。此則人之所易知者矣。但不可合白犬血食。

鮑魚

五百十五

兼入陽考之長洲。張璐有言。其魚腥穢止可決驗。而不可加鹽。乾則形如塊肉。性溫無毒。而取腥穢以滌一切瘀積。同氣相感也。入肝散血。煮汁治四烏鰯一簾茹丸。治女子血枯經閉。內經以療傷肝利腸。而不傷伐元氣。惜乎世罕用之。今危人用以煮肉。則脂沫盡解。滌除垢膿之驗也。昔秦皇死沙壠。令暑屍腐。令輜重載鮑魚。以亂其臭。始皇本呂不韋的導。漏側宮幃。非取其滌除遺臭之義歟。

鱣鱣魚

五百十六

無鱗魚

清肝
腎血熱
毒

祛肝
風寒
六風
熱殺
蟲
蠅
骨

通肝
膽
濕
瘧
癥

海蛇

無鱗魚

鰐鱣魚。兼入肝腎類。有分間嘴者為鰐。尖嘴者為鱣。皆棲土中陰氣以生。味甘氣寒。其形類蛇。常與水蛇同穴。故其性有小毒。力善走竄鑽穴。故書謂能祛風殺蟲。接蟲由於風。生如骨蒸。廢瘡。五痔。瘡瘍。陰戶。蝕瘻。漏溼。風癩。虛損等症。人常食之。為有益也。虛損廢瘡多有蟲蝕。有病療者。相染已死數人。乃取病者。銜之棺中。棄於流水。永絕傳染。漁人異之。開視。見張鼎云。此以骨燒烟。則可以辟蚊蠅。薰屋竹木。則可以斷蚊。置骨於衣箱中。則可以斷蠅。惟脾胃虛泄。並孕婦食之。則大忌耳。性滑。凡昂頭行水。及重三四肋者。腹下有黑斑。背上有點者。皆為有毒。切不可食。

蛇

五百十八

俗曰海蛇。即廣所云水母者是也。按書言。此生於東海。狀如血鷹。大者如牀。小者如斗。無眼目。腹胃以蝦為目。蝦動蛇流。故曰水母目。又曰水母形。渾然凝結。其色紅紫。無口眼。腹下有物如懸。絮羣蝦附之。噚其涎沫。浮沈如飛。為潮所帶。則蝦去而蛇不得歸。人因割取。浸以灰礬。去其血汁。而色遂白。厚為蛇頭。其味更勝。究其主治。大約多能下血消癰。清熱解毒。而氣亦不甚溫。蓋緣此屬血類。血味多鹹。鹹則能以入腎。血藏於肝。海蛇形如血鷹。則蛇多入於肝。蛇產於水。腎屬水。則蛇又多入腎。故是以勞損積血。得此則消。小兒丹疾大傷。得此則療。但忌白糖同淹。則蛇隨即消化。而不能以久藏。以土包水者故耳。無他義也。

解胸
中煩

解

鷺兼入肝。乃海中小蚌耳。與江湖蚌蛤相類。閩人以田種之。候潮泥壅沃。謂之鷺田。其肉可為羹。以充海錯。鷺生海泥中。二頭味甘性平。煮食可治胸中邪熱煩悶。飯後食之。與服丹石人適合。並治婦人產後虛熱。可知性體屬陰。故能解熱除煩。然

惟水裏火盛者別宜。若使脾胃素冷服之必有動氣泄瀉之虞矣。書言可治冷刑似屬巧詭未可深信。

蛙
五百十九

清熱
利水
開氣

蛙膾耑入膀胱與螺蚌皆產於水其味雖甘而性則寒故能清熱利水解毒如水盤腹大用乾青蛙二枚以酥炒乾螺蚌七枚炒苦葫蘆半兩為末空心酒服三錢即愈通身水腫以青蛙一二枚去皮炙熟食之即治毒刑噤口以水蛙一個并肚腸搗碎瓦焙入麝香五分作餅貼脣上即通時行面赤項腫瘻毒用金線搗汁水調空腹頓服即效然肉雖寒而骨善跳則熱性雖動而氣善蓄則閉食之令人作淋及或多食令人尿閉脣下酸痛治須擣以車前梢水或燒酒行氣之類以解臘熱者須用酒以通車前膾實者亦可用

至於孕婦食尤有忌壽天不可不知

鱉肉

五百二十

鱉肉耑入肝止有雌無雄與蛇與龜為匹形多變幼故書有言鱉有三足。一足者不宜食。獨目者不宜食。頭足不縮者不宜食。目凹陷者不宜食。腹丁有王字士字文蛇丈文者不宜食。生於山者名旱鱉不宜食。腹亦如血者名硃鱉不宜食。此有毒殺人不宜食鱉之說也。又言鱉合雞子竟食則令人生鱉同猪兔鴨食則能損人同芥子食則生惡瘡與妊婦食則生子項短同薄荷食則能殺人此合他味同食之有見害於人也。至於冷癆食之則能發冷水病須合葱與椒薑同煮並剉鱉甲少許以入可知鱉性冷故須假以薑椒以為之佐耳鱉項下有軟骨如匙形者食之令人患水病須去之然惟婦人素挾血熱症見血瘕血漏並瘧痢諸症服之得宜若使中氣有虧謂可補中益氣縱出別錄亦屬膚語不足信也

涼肝