

0
1cm
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29



浙江圖書館

丹溪心法附錄卷之十一



浙江圖書館

丹溪心法

附錄

卷之十一

丹溪心法附錄卷之十一

火門

火

四十三

附風寒

丹溪心法

○火陰虛火動難治

火鬱當發者何經

輕者可降

重者則從其

性而升之

實火可瀉黃連解毒湯之類

虛火可補

小便降六最

速

凡氣有餘便是火不足者是氣虛

火急甚重者必緩之以生耳



草煎瀉瀉緩參不亦可

八壯氣實火盛

顛狂者可用正治或硝黃水

大証

五圖書館



竹集

墨齋

寧東山古庵方

廣濟堂

水之類 人虛火盛狂者以生薑湯與之 若投冰水正治立死 有補

陰即火自降炒黃柏生地黃之類 凡火盛者不可驟用涼藥必兼溫

散 有可發者二風寒外來者可發鬱火 可發 氣從左邊起者乃肝

火也 氣從臍下起者乃陰火也 氣從 腳下起入腹如火者乃虛之

極也蓋火起於九泉之下多死一法用附子末津調塞湧泉穴以四物

湯加降火藥服之妙 陰虛証本難治用 四物湯加炒黃柏降火補陰

龜板補陰乃陰中之至陰也 四物加 曰馬脛骨降陰中火可代黃

連黃芩 黃連黃芩梔子太黃黃柏降火 升陰中之火不可用 生其

草緩火邪木通下行瀉小腸火 人中白 兩服火須風露中二三年者

人中黃大涼治疫疾須多年者佳中氣 不足者味用其寒 山梔子

仁大能降火從小便泄去其性能屈曲下 肝人所不知亦能治若疑中

火邪

人方

左金丸 治肝火 一各回令灰

黃連 大兩 吳茱萸 一兩或半

右為末水丸或蒸餅丸白湯下五十九

附諸賢論

書

劉宗厚曰火之為病其害甚大其變甚速其勢甚彰其死甚暴何者蓋能燔灼焚燬飛走狂越消鑠於物莫能禦之遊行乎三焦虛實之兩途曰君火也猶人火也曰相火也猶龍火也火性不妄動能不違於道常以稟位聽命運行造化生存之機矣夫人在氣交之中多動少靜欲不妄動其可得乎故凡動者皆屬火化火一妄行元氣受傷勢不兩立偏勝則病移害他經事非細故動之極也病則死矣經所謂一水不勝二火之火出於天造君相之外又有厥陽臟腑之火根於

五志之內六欲七情激之其火隨起。蓋大怒則火起於肝，醉飽則火起於胃，勞勞則火起於腎，悲哀動中則火起於肺，心為君主，自焚則死矣。毋湊又啓火出五臟主病曰諸風掉眩屬肝，火動之類。經所謂一水不勝五大之火，出有人為又考內經病機一十九條內本屬火者五，諸熱皆瘵皆屬於火之類。而河間又廣其說，火之致病者甚多。添契內經之旨曰：諸病喘嘔吐酸暴注下迫轉筋小便渾濁腹脹大鼓之有聲如鼓，癰疽瘍疹癩氣結，吐下霍亂，發熱腫脹，鼻塞，衄血，溢血，泄瀉，閉身熱惡寒，戰慄驚惑，悲笑譫妄，衄蟻血，汚此皆少陰若火之熱，乃真心小腸之氣所為也。若瘵瘵暴瘖瘖，目眩，探探狂越，罵詈驚駭，肘腫疼酸，氣逆衝上，禁慄如喪神，守噤嘔瘡，癩癩耳鳴，及驚嘔涌溢，食不下，目昧不明，暴注，暈瘦，暴病暴死，此皆少陽相火之熱，乃心包絡三焦之氣所為也。是皆火之變見為諸病也。為肺虛則

熱乃心包絡三焦之氣所為也且足皆火之變見為諸病也為脈虛則

浮大實則洪數藥之所主各因其屬君火者心火也可以濕伏可以
水滅可以直折惟黃連之屬可以制之相火者龍火也不可以水濕
折之從其性而伏之惟黃柏之屬可以降之噫瀉火之法豈止如此
虛實多端不可不察以臟氣司之黃連瀉心火黃芩瀉肺火芍藥瀉
脾火柴胡瀉肝火知母瀉腎火此皆苦寒之味能瀉有餘之火耳若
飲食勞倦內傷元氣火不兩立而陽虛之病以其溫之剷除之如黃
芪人參甘草之屬若陰微陽強相火熾盛以乘陰位曰漸煎熱為血
虛之病以其寒之剷降之如當歸地黃之屬若心火亢極鬱熱內實
為陽強之病以鹹冷之剷折之如大黃朴硝之屬若腎水受傷真陰
失守無根之火為陰虛之病以壯水之剷制之如生地黃玄參之屬
若右腎命門火衰為陽脫之病以溫熱之剷濟之如附子乾姜之屬
若胃虛過食冷物抑遏陽氣於脾土為火鬱之病以升散之剷發之

如升麻葛根之傷不明請此之觀而求大之為病施治何所從哉
於諸經集畧其說備處方之用庶免實實虛虛之禍也

附脉理

脉理提綱曰大脉洪數虛則

附諸方

九味羌活湯 治春夏秋非時感冒風寒發熱惡寒頭疼項強或無汗

或有汗以代桂枝麻黃青龍各半湯治太陽經表熱之神藥也此湯

非獨治四時風寒春可治溫夏可治熱秋可治濕治雜証亦有神也

六神速解散 治時行三月後謂之晚發頭痛身熱惡寒脉洪數先用

九味羌活湯不愈後服此湯

並見肩寒

○已上二方發散風寒

不熱之劑

東垣瀉陰火升陽湯 治肌熱煩

然而赤食少喘咳痰

東垣濕陰人升陽湯 治肌熱煩 煎面赤食火喘咳

羌活

甘草

黃芪

蒼朮

升麻

柴胡 一兩半 人參

黃芩 各七錢

黃連 酒炒

石膏 半兩 柴胡

右咬咀每服一兩或半兩水煎

此藥發脾胃火邪又心膽肝肺膀胱藥也 傷陰火升發阻氣榮養氣血者也

升陽散火湯

治男子婦人四肢發熱肌熱筋痺熱骨髓中熱發困

熱如燎捫之烙手此病多因血虛而得之或胃虛過食冷物抑遏陽氣於脾土火鬱則發之

升麻

葛根

獨活

羌活

防風 二錢

柴胡 八錢

甘草 炙三錢

人參

白芍 各半兩

甘草 生二錢

右咬咀每服半兩或一兩水煎稍熱服

地骨皮散

治渾身壯熱脉長而滑陽毒火熾發渴

地骨皮

茯苓 各半兩

柴胡

黃芩

生茶 一錢

知母各一兩 石膏二兩 羌活 麻黃各七錢半有汗並去

右咬咀每服一兩入姜煎

○已上三方升散鬱火表熱之劑

小柴胡湯 見傷寒

柴胡飲子 治解一切肌骨蒸積熱作發寒熱往來表熱裏和則發寒裏熱表和則發熱

邪熱半在表半在裏出入進退無特即寒熱往來陰陽相勝也蓄熱寒戰表之陽和正氣與邪熱并

脈絕寒戰而久煩渴也及傷寒發汗不解或中外諸邪熱口乾煩渴或下後熱

未愈汗後勞復或骨蒸肺痿喘嗽婦人餘疾產後經病

柴胡 人參 黃芩 甘草 大黃

當歸 芍藥 各半兩

右為末每服抄三錢水一盞生姜三片煎至七分溫服日三服病熱

甚者加服之

甚者加服之

防風當歸散子

宜明方

治脾腎真陰損虛

邪心風熱鬱甚陽勝陰衰邪

氣上逆三實下虛怯弱不耐或表熱而

胃熱惡寒或裏熱而躁熱煩

渴或邪熱半在表半在裏速退出入不

已而為寒熱往來或表多則

惡寒或裏多則發熱或表之陽分陽和

止氣與邪相助并甚於裏為

熱極深而外無陽氣裏熱極甚陽極似

裏而寒戰腹滿煩渴者或裏

之陰分正氣反助邪熱并甚於表則雖

裏煩渴而汗出也或邪熱壅

塞者或煩熱而痛者或熱結極甚陽氣

不通而反覺冷痛或中外熱

鬱煩躁甚喜涼畏熱者或熱極閉塞不

可宜通陽極似陰中外喜熱

而反畏寒者或躁熱煩渴者或渴熱極

甚而腹滿不渴者或一切風

熱壅滯頭目昏眩暗風眼黑偏正頭痛

口乾鼻塞耳鳴及聾咽嗌不

利或目赤腫痛口瘡舌痺或上氣痰飲

心膈鬱痞腸胃燥澀小便頻

澀澀或是皮膚癢痒手足麻痺又或動

脈拘急支絳倦怠或溼身

肉跳動心忪驚悸或口眼喎斜語言蹇澀或狂妄昏惑健忘失志及
或腸胃燥熱渴飲而飢不欲食或濕熱以餘而消殺善飢然能食而
反瘦弱或誤服燥熱毒藥及妄食熱物上逆多而耗損脾胃則風熱毒
甚而多有如此不必全見也無問有病無病中燥熱毒藥所使者宜
宜通氣血調順飲食又服之舊病除去心病不生設虛人常服猶益
功驗自可知矣

防風

黃歸

白芍

柴胡

黃芩

人參

甘草

大黃

滑石

六兩

右研每服三錢至五錢水一大盞生薑

一片同煎至七分去渣溫服

○廣按此方用大黃瀉陽明之濕熱

八便出用滑石降三焦之毒

火從小便出用黃芩以涼腸蒸胡以

防風防風以清頭目用人參

甘草以裨氣當歸芍藥以補血

之陽補脾胃之陰而無半

小正十香燥熱之銀藥其治風熱燥熱濕熱

味辛香燥熱之謬藥真治風熱燥熱濕熱 伏虛之良劑非聖於嗜
者其能如是也耶 溫熱病汗下後餘熱未退用此尤妙

○已上三方和解半表半裏熱之劑

大柴胡湯

方見傷寒

防風通聖散

方見中風

○已上三方發攻表裏熱之劑

調胃承氣湯

小承氣湯

大承氣湯

玉見傷寒

三一承氣湯

見溫病

○已上四方攻下裏熱之劑

清心湯

即涼膈散料內加黃連五錢用蜜與竹葉同煎

連翹

山茱萸

大黃

薄荷葉

黃芩

各五錢

甘草 一兩半

朴硝 二錢五分

加黃連 半兩

右為細末每服五錢水一盞蜜少許打葉十片同煎七分溫服

洗心散 和劑古 治風塵痰滯心經積熱口苦唇燥眼溢多淚大便秘結

小便赤澀

白朮 一兩半

麻黃 和煎

當歸 去土洗

荆芥穗

芍藥

甘草

大黃

去根去

各八錢

右為末每服二錢水一盞生姜薄切各少許同煎溫服

人參瀉肺湯 秘方 治肺經積熱上喘咳嗽胸脇脹滿痰多大便澀滯

黃芩

枳殼

枳殼

甘草

薄荷

連翹

杏仁

炒去皮

桑白皮

炒

大黃

桔梗

炒各等

右吹咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓食後通口服

三... 和劑... 口清... 結... 肺... 大... 秘... 結... 心... 膈... 煩... 燥...

右吹咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓食後通口服

三黃湯 和劑 治積熱結滯臟腑大便秘結心膈煩燥

黃連 去芫須 黃芩 去腐 大黃 煨各等分

右吹咀每服四錢水一盞煎至七合空心服

三黃丸 和劑方 治男子婦人三焦積熱咽喉腫閉心膈煩燥小便赤澀

大便秘結並宜服之

黃連 去芫須 黃芩 去土 大黃 煨各半兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服四十九丸熱水吞下

一方用腦射為衣丸如大豆大夜間嚙化一二丸亦好

合化三黃丸 治症同前 見喉痺

大金花丸 聖明方 治中外諸熱癰汗咬牙時語驚悸溺血淋閉咳血

瘦弱頭痛并骨蒸肺痿喘急等症更加梔子名曰梔子金花丸又曰

既濟解毒丸

黃連

黃栢

黃芩

大黃

各等分

自利去大黃加梔子

右為末滴水丸如小豆大每服二

二十九新汲水下

四生丸

宣明方

治一切熱瘧

服開肌膺諸熱証皆可服

大黃

牽牛

皂角

各二兩

朴硝半兩

右為末滴水丸如梧子大每服三

丸食後白湯下

黃連解毒湯

宣明方

治傷寒雜病熱

毒煩燥乾嘔口渴喘滿陽厥極深

畜熱內甚

方見溫熱

黃連湯

聖惠方

治一切積熱血熱腹

熱酒熱並用

黃連淨不拘多少井水浸之良久

既盛於鍋內煮取清汁服之

○廣按書云寒因熱用熱因寒用

同也蓋積熱用寒藥以治之痼冷

用熱藥以治之恐相違逆如黃

廷用姜汁制酒制如附子用蜜制

黃連湯 聖惠方 治一切積熱血熱腹熱酒熱並用 既盛於鍋內煮取清汁服之 同也蓋積熱用寒藥以治之痼冷 用熱藥以治之恐相違逆如黃廷用姜汁制酒制如附子用蜜制

用熱藥以治之恐相違逆如黃連
定用姜汁制酒制如附子用蜜制

重復制是也此方既用一味黃連又用井水浸之不無太過乎以

酒代之慶子妙矣

神芎九宣明方治三焦積熱風痰壅滯頭目赤腫或生瘡腐咽膈不利

或腸胃結燥小便赤澀大便閉塞一切熱証並宜服之

大黃生

黃芩各二

牽牛生

滑石各四

黃連

薄荷

川芎各半

右為末滴水丸如梧桐子大每服五十九丸溫水食後下

解毒丸通玄方治中外諸邪熱毒癰腫瘡疽勦味拘攣咬牙驚悸二

切熱毒並宜治之

大黃

黃連

黃芩

山梔子

牽牛

滑石各半

右為末滴水丸如梧桐子大每服三四十九丸溫水送下

大註

此即黃連解毒湯神芎丸合方也

全真丹

聖惠方

治臟腑積熱洗滌腸垢潤利燥滋解風毒攻疰手足浮

腫或頑痺不仁痰涎不利涕唾稠粘胸膈痞塞膈脹滿飲食咸退

少困倦無力

川大黃

三兩用米泔水浸過三日每日

黑牽牛

八兩子慢火炒四兩生

右以皂角一兩輕炒去皮子水一大碗浸一宿入蘿蔔一兩切作片

子同皂角一處熬至半碗去滓再熬至二鍾攪和上件藥末乾濕調

勻丸如梧子大每服二二十九至五六十丸諸飲下隨証加減以利

為度

平胃散

三兩方

治四時纏身熱口乾舌燥大小便秘澀及熱病後餘熱不

除善於胃中四肢發熱口渴無汗

厚朴 去皮姜

射干 未沸浸

升麻

煨姜 各一兩

芍藥 二兩

枳殼 去穢

大黃 蒸

甘草 炙

右吹咀每服四錢水一盞煎至七分去滓空心熱服

八正散

治大人小兒心經蘊熱咽乾口燥目赤睛痛臃腫秘結小便赤澀 方見前

赤澀

方見前

○已上諸方治三焦蘊火實熱之劑

黃芩湯

治心肺蘊熱口瘡咽痛腸悶小便淋濁不利

澤瀉

梔子仁

黃芩

麥門冬 去心 木通

生地黃

黃連

甘草 各等分

右吹咀每服一兩水二盞生薑五片煎至一盞食前溫服

清心丸

治經絡中大邪蘊滯心忪恍惚口瘡咽燥

黃柏 生 二兩

龍腦 二錢

火記

右為末蜜丸梧子大每服十九粒以前後門冬湯下

碧石 和方 治一切積熱口舌生瘡心煩喉閉

芒硝 青黛 石膏 多研末 寒水石

滑石 甘草 湯二 馬牙硝 各等分

右將芒硝湯入諸藥末再煎用柳木篦不住手攪令消容入青黛和

勻傾沙盆內候冷凝結成霜研為末每用少許含化津嚥如喉閉不

能嚥用竹筒吹藥入喉中

玄明粉 御藥方 此藥大治邪熱所于膈上氣滯臍胸秘澁並宜服之

以朴硝前出以春瀝五七遍至夜於星月下晝至天明自然結作青白

塊子用磁罐子裝實於炭火內從慢至緊自然成汁煎為直候不響

再加頂火一煖便取出於淨地上倒下用盆合蓋了以去大毒然後

研為細末每二斤入甘草生熟二兩為末一奩攪勻能醫對量用之

或一錢二錢以桃花煎湯或葱白湯下

或一錢二錢以桃花煎湯或葱白湯下

白虎湯 治氣熱 見溫熱

四順清涼飲 治血熱 見風熱

薄荷煎 御藥院方 治口舌生瘡 喉腫痛

薄荷 一兩取頭 茶三兩中

川芎 內取腦子 半錢

砂仁 半兩取 末二錢

右為末入腦子和勻煉蜜成丸任意嚼和劑方無腦子有括梗

天竺散 經驗方 治臍臍積熱煩渴多渴口舌生瘡咽喉腫痛

山梔子 去核 連翹 三

甘丁草 二兩

雞冠雄黃 半錢

瓜蒌 一兩 大破

鬱金 用皂角

片焙乾切

右為末每服一錢食後臨睡新汲水調下

清氣散 本草方 治氣壅痰涎上膈煩熱

枳殼

川芎

赤胡

前胡

茯苓

甘草

獨活

心活

青皮

白木

人參 各等分

右為末每服二錢水一鍾煎至一德煎七分服

龍腦飲

和劑方

治毒積邪熱咽乾喉痛心煩鼻衄及痰熱咳嗽中風

躁傷寒餘毒發熱並宜用之

縮砂仁

瓜蒌根

各三

石高

兩

藿香葉

二兩

甘草

六兩

拖子仁 十二兩

右為末每服二錢用新汲水八蜜調下

傷寒餘毒潮熱虛汗除蜜入竹青煎服

龍腦雞蘇丸

和劑方

有煩渴涼

一屬解酒毒除邪熱并治咳嗽吐血

血諸淋下血胃熱口臭肺熱

喉腫脾熱口甜嗜熱口苦並宜服之

黃耆

去芦

麥門冬

去心

阿膠

炒

蒲黃

炒

人參

去芦

生乾地黃

六兩

生草

二兩

木通

二兩

煎

生乾地黄

六兩另研如末

山丹草

各一斤

木通

二兩用柴胡浸

柴胡

銀州者二兩和木通以湯半外浸一二宿取汁後和膏

雞蘇淨葉

一斤身

右除別研藥外並搗為末將好蜜三斤先煉一二沸然後下生乾地

黃末不住手攪令勻取木通柴胡汁慢火熬成膏勿令焦然後將其

餘藥末同和為丸如黃豆大每服三十丸嚼破熱水下虛煩消渴驚

悸人參湯下咳嗽唾血鼻衄吐血麥門冬煎湯下惟淋用草前子煎

湯下

耳露飲

和劑方

治胃中客熱牙

重腫咽隔乾燥吐氣腥臭或胃經受

濕伏熱在裏身黃如疸亦能治之

枳殼

去心

石斛

去芽

枇杷葉

淨洗

甘草

炙

乾熱地黄

黃芩

天門冬

去心

麥門冬

去心

山薤陳

生乾地黄

右吹咀每服三錢水一鐘煎至七分食後溫服

滋腎丸 投料方 治不渴小便閉邪熱在血分也

知母 二兩酒浸 肉桂 一錢

共藥 一兩加麩

右知母黃柏氣味俱陰以同煎氣故能補而瀉下焦大也桂與火邪同解故曰寒因熱用凡諸病在下焦皆不渴也熱水為丸百沸湯下

○已上諸方治三焦虛火虛熱之劑

○風熱 初起

圖

附諸方

定風餅子 簡易方 治風客陽經邪傷腠理骨脊濕直言語蹇澁轉筋

寒痰厥頭痛肉瞤筋惕手顫舌昇淵及飲酒過多嘔吐涎沫頭目眩暈

常服消風去邪 凡傷風

追風散 和劑方 治諸風上攻頭暈今日眩鼻塞聲重皮膚瘙癢骨節掣引

婦人血風一切頭風並治之

婦人血風一切頭風並治之

白殭蚕去絲 荆芥二兩 石膏四兩 川烏炮去皮 防風去蘆

全蝎炒一兩 射香一兩 甘草炙

右為末每服半錢 飯後臨臥茶調下

荆芥丸 楊氏方治一切風邪上攻頭目咽膈不利或傷風發熱頭疼鼻

塞舌重並治之

養氣丹 和劑方治諸虛百損真陽不固上實下虛氣不升降或咳嗽或

喘促一切肺虛氣喘之人婦人血海冷憊諸證並宜服之

禹餘糧火煨醋汁 紫石英火煨 磁石火煨

赤石脂如前 代赭石火煨醋汁

已上五石各以水再研挹其清者置之紙上用竹節盛之滴盡水候

乾各用瓦瓶盛貯以鹽水紙筋和泥固濟陰乾以硬炭五十斤分作

五處煨此五藥以紙灰蓋之火盡再煨如此三次埋地穴內兩日出

火毒再研細入後藥

肉蓯蓉

酒洗浸一宿
焙乾一兩

破故紙

附子

茴香

丁香

木香

肉桂

山藥

巴戟

肉豆蔻

麩暴

鍾乳粉

別研

鹿茸

酒炙

當歸

酒浸一宿
焙乾

沉香

白茯苓

去皮

遠志

去心

沒藥

去砂

陽起石

煨別

五靈脂

乳香

別研

朱砂

別研各

圖

石入前藥同研極勻用糯米糊為丸每兩作五十九陰乾入布袋內

擦令光瑩每服二十九空心溫酒姜鹽湯任下婦人用艾醋湯下

養正丹

和劑方

治上感下虛氣不外降元陽虧損氣短身羸及中風涎

潮不省人事傷寒陰虛自汗唇青婦人血海久冷並治之

水銀

黑錫

去毒淨與水
一結砂

硫黃

朱砂

研細各

右用黑盞一隻火上燒黑鑿成汁次下水銀以柳條攪次下朱砂攪

合不見星子放下少時方入硫黃末急攪成砂和勻如有酸以醋酒

右用黑鹽一袋大上水... 煎成汁次下水銀以柳條燒次下朱砂燒

令不見星子放下少時方入硫黃不急攪成砂和勻如有酸以醋酒

之候冷取出研極細者糯米糊為丸如棗大每服三十粒溫湯送

湯任下

○廣昔年初見養氣丹養正丹出證曰治諸虛百損真陽不足上實

下虛氣不升降一切體弱氣虛之人並宜服之云者予以為補虛

益損之劑無出於此後觀本草藥要白熟中消中不得服芳草石

藥夫芳草之味義石藥之氣悍予則於此二冊所用石藥不

能不致疑焉及觀七方十劑之目石藥云為重劑重可以去怯其

疑方總釋也何以言之夫體弱氣虛之人稠痰鬱大膠固於胃

之間非石藥之氣悍而能開散之乎蓋石藥所以去病邪病邪退

而正氣自復正猶石灰所以救積著根死而禾苗自茂也石藥

非補人之藥亦猶石灰非肥田之物養氣丹內有茯苓鹿茸當歸

等藥庶乎有補而養正丹全是金石之益奈何補之有哉觀者謹焉

○已上諸方辛溫發散之劑

清風散 和劑方 治諸風上攻頭目昏眩項背拘急鼻嚏舌重耳作聲鳴

及皮膚頑麻癢疹癩人血氣風頭皮腫痒並治之 見傷風

和劑方 治風氣上攻頭目昏眩肢體拘急皮膚胃癢痒癩疹成瘡

及治寒熱不調鼻塞舌重



藿香 和劑方

白芷

前胡 去芦各一斤

黃耆 去芦

甘草 焙

人參 去芦各二斤

羌活 去芦

防風 去芦各三斤

右為末每服二錢水一盞入薄荷少許煎湯調下食後服茶清亦可

清神散 和劑方 治風化痰治頭目眩暈耳聾鼻塞咽噎不利

檀香 和劑方

人參 去芦

羌活 去芦

石膏 碎五斤

薄荷 去土二斤

荆芥 二十斤

甘草 炙二斤

防風 去芦十斤

細辛 去苗洗一斤

右為細末每服二錢食後湯煎服或入茶末九炒

右為細末每服二錢食後沸湯點服或入茶末尤妙

四生散 和劑方 治男子婦人肝腎風毒上攻赤眼痒痛羞明多淚及下

注脚膝生瘡遍身風癬兩耳內痒服之尤妙

黃耆

川獨活

蒸梨 沙苑

白附子

右等分為細末每服三錢薄荷酒調下如腎臟風下疰生瘡以猪腰

子批開入藥末二錢在內合定裹煨熟空心細嚼用塩酒下

川芎茶調散 和劑方 治諸風上攻頭目昏眩偏正頭疼腦疼鼻塞舌重

見傷風

大辰砂丸 御藥院方 清頭目化痰涎及感冒風末鼻塞舌重頭目昏眩

項背拘急皮膚瘙癢並皆治之 見傷風

防風散 楊氏方 治頭目不清去風明目

一防風

川芎

白芷

其菊花 甘草

大

右等分為末每服三錢食後荆芥湯調下

追風散 瑞竹堂方 治白癩風

何首烏 荆芥 穗

若參

蒼水

米泔水浸一宿焙乾各等分

右件為細末好肥皂

角三斤去皮弦入磁器內熬為膏和為丸如梧

桐子大每服三五十

九空心酒茶性下忌一切動風之物

胡麻散

和劑方

治脾肺

風毒攻衝遍身皮肉瘙癢或生瘡疥或生癰疹

用手搔時浸淫成瘡

久而不差愈而復作面上遊風或如虫行紫白

癩頑麻或腎臟風攻

生瘡並宜服之

見癩毒

四神丸

經驗方

治手足

頑麻痰涎壅盛頭目昏眩肩背拘急

見癩毒

芎朮湯

御藥院方

清祖

葵志祛風消腫治頭目昏痛鼻塞舌重

川芎 二兩

白朮

二兩七錢五分

右以咀每服八錢水一盞半姜五片煎至八分去滓溫服食後或前

右吹咀每服八錢水 一盞半姜五片煎至八分去滓溫服食後或為

細末白湯點服亦得

天麻散

宣明方

治頭項

偏頭面腫拘急風傷側發躁熱

川芎

苦參

地骨皮

細辛

威靈仙

何首烏

薄荷葉

蔓荊子

菖蒲

杜蒺藜

牛蒡子

蛇蛻草

荆芥穗

防風

已上各半兩

天麻 一兩

甘草 炙二兩

右為末每服三錢用

蜜水調下茶酒任下不拘時

防風天麻散

宣明方

治

風麻痺走注肢節疼痛中風偏枯或暴昏不語

內外風熱壅滯并鮮

昏眩

見中風

消毒犀角飲

治大人

小兒內蘊邪熱痰涎壅滯或腮項結核遍身瘡

節並宜用之

見斑疹

一方 治風熱結滯或生瘡痂及金石發熱小腸等熱

用桑椹不拘多少微研以布絞去粗以瓦器熬稀膏量多少入蜜再

熬成稀膏盛于磁器中每服一二匙食後臨臥以沸湯點服

○已上諸方辛平發散之劑

上清散

治上焦熱耳鼻壅塞頭目不清

川芎

荆芥穗

薄荷葉

朴硝

石膏

桔梗

各一兩

右為細末每服一字口含小鼻內搐之加龍腦三分妙

上清丸 治口舌生瘡咽喉腫痛咳嗽煩熱能清聲潤肺寬膈化痰爽

氣寧神

百藥煎

薄荷

各一兩

縮砂

一兩

片腦

一錢

玄明粉

甘松

桔梗

何子

砂

各五

寒水石

一兩

古為細末其甘松煎膏為丸如梧桐子大每服一丸化或嚼三五丸

右為細末其草熬膏為此如梧桐子大每服一九噙化或嚼三五九茶湯下

龍腦丸 宜明方 治大人小兒一切蘊熱毒氣不散口舌生瘡咽喉腫痛

及夫音癰疹

龍腦 朱砂 麝香 牛黃 各等分

右為不銕黃蠟為丸如米粒大每服三五丸浸甘草入參湯送下

龍腦川芎丸 御藥方 消風化滯除熱消痰通利七竅爽氣清神

桔梗 一兩 片腦 六錢 縮砂仁 二錢 白豆蔻 五錢 薄荷 去土五

川芎 防風 去芦 甘草 各一

右為末煉蜜為丸每兩作二十九每服二九細嚼茶清送下

當歸龍膽丸 宜明方 治腎水陰虛風熱蘊積時發驚悸筋惕搖擗神志

不寧榮衛壅滯頭目昏眩肌肉爛癢背膈痞塞咽嗌不利腸胃燥逆

小便溺閉筋脉拘急肢體痿弱膈風痲疾小兒急慢驚風常服宣通
血氣調順陰陽病無再作

當歸

草龍膽

山桅子

黃連

黃芩

黃芩

天黃

蒼蒼

青黛

木香

麝香

另研

本為末煉蜜和丸如小豆大

小兒如麻子大

每服二十丸生薑湯送下忌發

熱諸物

兼服防風

治風氣不調頭目昏

治痰涎壅滯

遍身拘急及風邪塞

鑿頭痛項強鼻塞舌重肢節煩疼六陰風兩頭覺不安

見傷風

卷活丸

治症同前

見傷風

旋覆花湯

街藥院方

治風熱則面生赤以梔子腦昏目疼鼻塞舌重面上

起風狀如虫行忌猪肉雞

旋覆花湯 街藥院方 治風熱則面生赤以梔子腦昏目疼鼻塞舌重面上 起風狀如虫行忌猪肉雞

遊風狀如虫行忌猪肉類

旋覆花 去土 八參 去芦 紫明 去芦 赤茯苓 去皮 赤芍藥 去皮

黃芩 去皮 枳實 麩炒 甘草干 炙二

右吹咀每服一兩水一盞半生薑五片煎至八分去滓食後溫服

通關散 御藥院方 治風熱上攻頭目筋脈拘急痰涎壅盛肢節煩疼

羌活 去芦 獨活 去芦 防風 去芦 天麻 去芦 山梔子

大黃 兩各一 滑石 二兩 甘草 二

石吹咀每服八錢水一盞半生薑五片煎至八分食後溫服

仙木芍散 宜明方 治風熱壅塞頭目昏眩及明耳目消痰飲清神

川芎 連翹 黃芩 山梔子 菊花

防風 大黃 當歸 芍藥 桔梗

蒼香葉 各五 蒼朮 石膏 各二 甘草 滑石 各三

荆芥穗 薄荷葉 硝砂仁 各二

大風

右吹咀每服三錢水一盞煎至七分食後通口服

川芎石膏湯 治風熱上攻頭目眩痛咽乾煩渴

防風通聖散 治風熱證總劑

五月九日

○廣按此方治熱風燥三者之總劑也凡熱風燥之為病必於此而取則焉何以言之風本於熱熱極則風生燥生於風風動則燥至是熱風燥三者其實一源流也故此一方而能兼治之觀其用防風麻黃薄荷荆芥使熱邪從玄府出也用梔子滑石使熱邪從小便出也用大黃朴硝使熱邪從大便出也其餘黃芩散肺大連翹散心火石膏散胃大芍藥散脾火川芎當歸和血潤燥白木甘草補脾和中桔梗開膈其間並無一味辛香燥熱之藥可謂善於處方矣故於熱風燥三者之証一日發百中無施而不可非聖於醫者其能是歟

其能是歟

愈風丹 蘇竹壺方 治諸般風證偏正頭痛

功風通聖散 四物湯 黃連解毒湯 三下料 加羌活

何首烏 細辛 菊花 天麻 獨活

薄荷 各一兩

右為末煉蜜為丸如彈子大每服 九細嚼 食清下不拘時

荆黃湯 和利方 治風熱結滯或主痰喘

荆芥 四兩 大黃 二兩

右吹咀每服五錢水一鐘煎至六分空心服

涼膈散 和劑方 治大人小兒臟腑積熱口舌生瘡石痰實不利煩燥多渴

賜胃秘遊便溺不利 見濕熱

連翹 四分 甘草 一分 川大黃 一分 朴 一分 薄荷

黃芩 一分 山梔子 一分

大

四時竹葉湯之上

七

右水二鍾竹葉七片蜜少許同煎一鍾食後服

既濟解毒湯 治上熱頭目赤腫而痛胸膈煩悶不得安臥大便微秘

大黃 酒煨 黃連 酒炒 黃芩 酒炒 甘草 炙

桔梗 各二錢

柴胡 升麻 連翹 各一錢

右每服水二鍾煎一鍾食後溫服

洗心散 治風壅痰滯心經積熱口舌唇燥眼目多淚大便秘結小便

赤澁 見大類

犀角地黃湯 治風熱大甚眼赤目痛喉閉口是 見時症

四順清涼飲 治一切積熱丹毒并喉龍熱痛

當歸 去芦 甘草 炙 赤芍藥 各等分

右每水一鍾煎食後溫服每服五錢

牛黃清心丸 方 治諸風緩縱不隨語言蹇澀心忪健忘恍惚來

頭目眩暈昏中煩驚痰逆塞精神昏墜又治心熱不足神志不定
驚恐怕怖悲憂慘戚虛煩少睡喜怒無時或發於在顛神思昏亂

凡中風

○已上諸方主涼外散內清之劑

○廣按宣明論云夫熱風之體也動搖風之用也風生於熱以
熱為本而風為標是言風者即熱病也又按錢氏小兒論云肝
有風目連筋不搐得心熱則搐固論之凡病掉眩強直之謂風
風則不離乎熱也觀大陵之上經則識風之象矣 又按古方不
分風之從外入由內起一緊曰風今予分之外入則曰中風傷風
冒風內起則曰風熱外入治以辛溫外散內起則治之以辛涼內
消度得其病機治法也

大

心法

十一

吐血 四十四

四物湯

○吐血陽盛陰虛故血不得下行因火炎上之

大者發熱乳者血滯與失血也 大法補陰抑

五錢為末冷水調服 山梔子最清胃熱之血

吐紫血者挑仁承氣湯下之 先吐紅後見痰

下降四物湯為主加痰藥火藥 先痰嗽後見

為急 痰嗽涎帶血出此是胃口清血熱蒸帶

或暴吐紫血一碗者無事吐血為好此熱傷

毒湯之類 吐血挾痰積吐一二碗者亦只補

陰降火四物湯加大劑

毒湯之類 吐血挾痰積吐一二碗者亦只補陰降火四物湯加大劑

之類 挾痰若用血藥則沉而不行只治火則止吐血火病也 六吐

紅不止以乾姜炮末童便調從治 喉既痰血荆芥散妙 舌上血故

出血如線不止以槐花炒末乾摻之 若吐血一方童便一分酒半分

播柏葉温飲非酒不行 嘔吐血出於胃也實者犀角地黃湯主之虛

者小建中湯加黃連主之

入方

二黃補血湯 治初見血及血多宜服

熟苾 一錢 生苾 半錢 當歸 七分 柴胡 五分 升麻

芍藥 二錢 牡丹皮 五分 川芎 七分 黃芪 五分

右以水煎服 血不止可加桃仁半錢酒大黃對酌虛實用之丙部

去柴胡升麻

又方 治見血後脾胃弱精神少血不止者

DAIKI HOKOKAI

二二

人參一錢 黃耆二錢 五味子三 芍藥 甘草五分

當歸五分 麥門冬五分

右咬咀水煎服 加礬金研入亦可

又方

人參 白朮 茯苓 陳皮各一 甘草

半夏 川芎各五 青皮 神麩各三

右咬咀水煎服 如胃不和加藿香 如渴者加葛根半錢 若痰

結塊者加貝母一錢 黃芩半錢 去白陳皮半錢 若小便赤色加炒

黃柏五分 若大便結燥加當歸七分 心煩加黃連酒拌曬乾五

分 若小便滑加煨牡蠣 若目元血多去半夏恐燥加生茶一錢 牡

冊五分 桃仁三分 若胃中不化飲食少進加炒山萸仁八分 若

血溢入濁道留聚腸間清則吐白痰蘇子降氣湯加入參阿膠各五分

上隔癰熱吐血者以四物湯加荆芥木何膠各五分更不止於本方

血溢入濁道以回聚歸則吐... 上膈壅熱吐血者以四物湯加荆芥何膠各五分更不止於本方
中加大黃滑石各五分 胃傷吐血宜理中湯加川芎乾薑各五分
此是飲酒傷胃也吐血不止用生薑根為末二錢水煎故冷食後服
良 白芨末調服治吐血

已上諸方雖非丹溪所出以其藥同故錄於前

附諸說具論

劉宗厚曰經云榮者水穀之精也和調五臟流於六腑乃能入於脉
也源源而來生化於肝流於心藏於肺布於肺施泄於腎灌
既一身日得之而能視耳得之而能聽手得之而能攝掌得之而能
握足得之而能步臟得之而能液腑得之而能氣是以出入升降濡
潤宣通者由此使然也注之於脉少則瀉充則實常以飲食日滋故
能陽生陰長取汁變化而赤為血也生化既則諸經恃此而長養衰

耗竭則自脉由此而空虛可不知謹養我故曰血者神氣也持之則
存失之則亡是知血盛則形強血弱則形衰神靜則陰生形役則陽
亢陽盛則陰必衰又何言陽盛而生陰血也蓋謂血氣之常陰從乎
陽隨氣運行於內苟無陰以養其則氣何以樹立故其致病也易調
治也難以其比陽常虧而又損之則陽者九陰易之之論可以見矣
諸經有云陽道實陰道虛陰道虛是陽氣有餘陰常不足以人之生
也年至十四而經行至四十九而經斷可見陰血之難成易虧如此
陰氣一傷所變之證妄行於上則吐衄衰涸於外則虛勞忘反於下
則便紅稍熱勝脫則癰閉弱血矣是陽間則為腸風陰虛陽搏則為
崩中濕蒸熱痰則為滯下熱極后皮則為膿血火極似水血色紫黑
熱勝於陰發為瘡瘍濕滯於血則為潰癰瘰癧皮膚則為冷痺蓄之
在上則人喜忘蓄之於下則人喜狂嗜惡味小則痰涎內凝大則

位身半已上同六之陽身半已下同地之陰此特舉其所顯之證者
治血必血屬之然欲求血藥其四物之謂乎河間謂隨證輔佐之
六合湯者詳言已矣余故陳其氣味專司之要不可不察夫川芎血
中氣藥也通肝經性味辛散能行血滯於氣也地黃血中藥也通
腎經性味甘寒能生真陰之虛也當歸分三治血中主藥也通肝經
性味辛溫全用能活血各歸其經也芍藥陰分藥也通脾經性味酸
寒能涼血治血虛腰痛也若求陰藥之屬必於此而取則馬脾胃論
有云若善治者隨經損益補其二味之所宜為主治可也此特論
血病而求血藥之屬者也若氣虛血弱又當從長沙血虛以人參補
之陽旺則生陰血也若四物者獨能主血分受傷為氣不虛也輔佐
之屬若桃仁紅花蘇木血竭牡丹皮者無補所宜蒲黃阿膠地榆白
芷霜栝樹皮者血閉所宜乳香沒藥五靈脂凌霄花者血痛所宜

參攷陽年腰枸杞子益母草夏枯草敗龜板者血虛所具乳酪血液之物血燥所宜乾姜桂者血寒所宜生地黃苦參血熱所宜特取其正治入各耳若能觸類而長可謂應無窮之變矣

附財理

醫家要曰諸證失血皆見乳脈隨其下以驗所出大凡失血脈廣而細設見浮大後必難治

附諸方

犀角地黃湯 治傷寒汗下不解熱于經絡隨氣湧泄為衄血或清道閉塞流人胃腹吐出血如鼻衄吐血不盡餘血停留致面色痿黃大便黑者更宜服之

犀角

生芩

白芍

牡丹皮

右以咀每服五錢水煎溫服實者可服

桃仁承氣湯

芒硝

桂枝各三

甘草

二錢五分

大黃一兩

桃仁五錢去

右咬咀每服一兩入姜同煎

館

黃連解毒湯

見濕熱

三黃丸

治積熱吐血咽隔不利

見大類

犀角地黄湯

按林方主脈浮客脈芤浮芤相合血積胃中熱之甚也

在上焦此藥主之

生地黄

二兩黃芩

黃連

各一兩

大黃

半兩

右咬咀每服一兩水二鍾煎至一鍾食後通口服

四生丸

良方

治吐血衄血陽盛於陰血熱妄行

生荷葉

生艾葉

生栝葉

生地黄

各等分

右研爛丸如雞子大每服一九水三鍾煎至一鍾瀉過溫服

藕汁散 濟生方 治吐衄不止

主藕汁 生地黄汁 大菊汁 生薑 半匙

右件藥汁調和令勻每服一小鐘不拘時服

雙荷散 聖惠方 治卒暴吐血

藕節 七箇 荷葉頂 七箇

右同蜜搗細水二鐘煎八分去滓溫服或研末蜜調下

批託葉散 治暑毒攻心嘔吐鮮血 方見中暑

○已上數方治內實吐血之劑

小建中湯

桂枝 甘草 芍藥 白芍 六錢 生薑 一錢

阿膠 炒

右咬咀水煎

荆芥散

荆芥穗

甘草

桔梗

右咬咀姜煎食後服

大阿膠丸

和劑方

治肺虛客熱咳

嗽不咽乾多唾涎沫或有鮮血勞傷肺

胃吐血嘔血並皆治之

麥門冬

去心扶神

栢子仁

百部根

杜仲炒

丹參

貝母炒

防風

遠志

人參各二錢五分

茯苓

乾山藥

熟地黃

阿膠

五味子各一兩

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸水煎六分和水吞服

必勝散

和劑方

治男子婦人血妄流溢或吐或咳衄血

小薊

并根

人參

蒲黃

當歸

熟地黃

川芎

烏梅

去核各一兩

吐血

卷十

二二日

右咬咀每服四錢水一鍾煎七分溫服不拘時

龍腦鷄蘇丸

治腸熱咳嗽或吐血衄血

見火類

伏苓補心湯

治心虛為邪氣所傷吐血

見咳血

是齋白朮散

簡易方治積熱吐血咳血若因飲食過度更重有傷脾胃

而吐血者最宜服之惟忌食熱麵煎炒一切發風之物

白朮 二兩

人參 去芦

白茯苓 去皮

黃芪 蜜浸各一兩

山藥

百合 去心各七錢半

甘草 炙半兩

柴胡

前胡 各二錢半

右咬咀每服三錢水一鍾姜三片棗一枚煎六分溫服

歸脾湯

治思慮傷脾不能統攝心血以致反行或吐血下血

凡健忘

大門冬湯

濟生方治思慮傷心吐血衄血

遠志 去心半兩

白芍藥

天門冬 去心

麥門冬 去心

黃芪 去芦

同膠砂粉 沒藥 生地黃 各一

藕節

阿膠 蛤粉炒

沒藥

當歸

生地黃 各一兩

人參

地黃 炙各五錢

右吹阻每服四錢水一鐘姜五片煎六分不拘時溫服

加味理中湯

乾姜 炮

人參

白朮 各二錢

甘草

芎藭根 各半兩

右吹阻每服三錢水一鐘前七分溫服不拘時

麥門冬飲子 蘇林方 治脾胃虛弱氣促氣弱精神短少吐血

人參

五味 各五錢

紫苑 一錢

黃芪

芍藥

甘草 各一錢

當歸身

麥門冬 各五錢

右吹阻作一服水煎食後服之

團參丸 治吐血咳嗽服原藥未得者

人參

黃耆

飛羅廼 各一兩

百合 三錢

生血

...

...

...

右為米酒水為丸如梧子大每服三十丸藥酒湯下

辰膠散 經驗方 治大人小兒吐血

同膠散

給粉散

辰砂少許

右為末藕節搗汁和蜜調下食後服

側柏散 治內損吐血下血因酒太過勞傷於內血氣妄行其出如湧

泉口鼻皆流頂更不救服此即安又治男子婦人九竅出血

側柏葉 一兩五

人參 去芦

荆芥穗 一兩

右為末每服三錢入磁羅麵三錢拌和汲水調粘相似啜服

一方 治吐血

用生地黃五斤搗汁生蜜二斤半以尾錫器盛貯於鍋內重湯蒸架

火煮三日二夜取出入人參末四兩快茶末六兩冷勻不拘時候以

熱湯點服 一名瓊玉膏

一方

用栢葉一握乾姜三片阿膠二挺炙水二鍾煎至二鍾去粗須服

芍藥湯濟生方治一切失血過多眩暈不甦

芍藥

當歸

去芦酒浸

食

右咬阻每服四錢水二鍾半煎至七分溫服不拘時

四物湯見補損治失血過多加栢葉煎服

理中湯

見中寒

圖

蘇子降氣湯

見痰類

○已上諸方治內虛吐血之劑

一方 治酒色傷心肺口鼻俱出血

用荆芥燒灰置地上出火毒為末每服三錢陳米湯下

一方 治大人吐血及傷酒食醉飽低頭掬重損傷吐血至多汗血交

吐血

二六

二六

行口鼻血出但声未失者格之無不效

百草霜 即鍋底上黑灰外人家者妙

官

右為末每服三錢米飲調下或并花水調下三服即愈若鼻血用一捻吹入鼻中立效

○皮肉破處及炙瘡出血百般用藥不止摻羊錢或一字立止

一方 治吐血

用上好墨為末每服一錢以白湯化阿膠清調服

一方

用血餘燒灰為末每服二錢冷水調下

○每鼻以竹管吹入鼻中即止

一方 治吐血咯血

用藕節搗汁飲之

一方

用栝葉瓦上焙乾為末 每服三錢食後米飲調下

一方

用大黃末每服一錢以牛地黃汁一合水半鍾立煎四五沸溫服即愈

一方

治飲酒過多蘊熱胸膈以致吐血衄血

葛花二兩

黃連四兩

若為末以大黃末熬盡早九如梧桐大每服一百丸溫湯下或煎服

亦可 吐衄証若脈滑者難治

○已上諸方止血涼血之劑

○廣按氣為陽血為陰若血屬陰者已若夫動靜有常則氣盈

謂均陰陽和順何病之有或入也六淫侵于外七情成于中動過

於靜陽勝于陰則氣有餘而血不足也丹溪曰氣有餘便是火火

三十一

性急暴燥灼經絡則血沸騰而錯經妄行為咳血嘔血咯血衄血
弱血下血之所由也况血為氣之依附若是血敗散枯涸則氣失
依附而發越矣不死何待可不畏哉治瘵大法以苦辛寒藥散火
涼血為君以辛味藥開鬱利氣為臣以升提藥復其位為佐使
或以酸澀藥止塞其源或以甘溫藥滋補其後如此病之不愈者
未之有也 又按丹溪正法吐血條已兼咳嘔咯衄四者附方嘔
血衄血通用

咳血 四十五

浙江

丹溪心法

○咳血 火升 痰盛 身熱多是血虛四物湯加減用

其類云咳血者嗽出痰內有血者是嘔血者嘔全血者是咯血者每咳

咳嗽血 火升 痰厥 身熱多日 痰血虛四物湯加補用

戴云欬血者嗽出痰內有血者是嘔血者嘔全血者是咯血者每欬
出皆是血 痰瘕衄血者鼻中出血也 崩血者小便出血也 下血者大
便出血也 雖有各色分六俱是熱証 但有虛實新舊之不同 或妄言
為寒者誤也

入方

青黛

瓜蒌仁

訶子

海粉

山施

右為末以蜜同姜汁丸如芡粒欬甚者加杏仁去皮尖後以八物湯加

病調理

附諸方

黃芩散 治欬成勞

甘草 四錢

黃芩

麥門冬

熟艾

桔梗

白芍 各五錢

沙血

...

...

右次咀每服五錢水煎

後參補心湯 三 治心氣虛熱不能藏血以致面色黃瘁五心煩熱

咳嗽唾血 及婦人懷妊惡阻嘔吐亦宜治之

半夏 湯炮七次

前胡

白茯苓

人參 各七錢五分

紫蘇

枳殼 麩炒

桔梗

甘草

乾葛

陳皮 各五錢

當歸 二兩

熟地黃 五錢

白芍藥 二兩

川芎 七錢五分

右次咀每服四錢水一鍾姜三片棗一枚煎七分食後溫服

雞蘇丸 棗梓七 治虛熱昏冒倦怠下屋上壅嗽血衄血

雞蘇葉 八兩 兩金

黃耆

防風

菊花

荆芥 各二兩

桔梗

川芎

甘草

菊花

生芩 各半兩

片腦 五分

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸用麥門冬去心煎湯送下 又

右為末煉 蜜丸如彈子大每服一九用麥門冬去心煎湯送下 又

治肺損吐血日漸乏力 痰喘行步不得健 飲食不美或發寒 熱小便赤澀加車前子三錢用急火炒香煎湯對下

經效何塞丸 濟生方治嗽血唾血

當歸地黃湯 宣明方治嗽血吐血大小便血或婦人經候不調月水過

多喘欬 並見勞瘵

人參芍藥湯 直指方治虛弱少血津液內耗心火炎燥熱乘肺金咳

咯血及血不榮肌肉動搖寒咳

當歸

川芎

白芍藥

各五錢

人參

辛夏制

橘紅

赤茯苓

阿膠

細辛

羌活

甘草

右吹咀每服八錢水二鍾姜三片煎一鍾食後溫服

一方 治咳嗽

痰血

...

...

用新綿燒灰半錢食後好酒調服

一方

用栢葉瓦上焙乾為末每服三錢食後米飲調下

嘔血 四十六

圖

丹溪心法

○嘔血火載血上錯經主行

厥大發熱喉中痛者是氣逆用參芪

多貴相劑各宜歸在地黃用之

嘔血用韭汁童便姜汁煎蘇合同飲

之其血自清

火載血上錯經

主行用四物湯加炒山梔童便姜汁服

又方以蘇合薑汁酒服

蘇合金天冷吐血入姜汁童便良

又一方用韭汁童便二物合

蘇合金細研和服

又方治吐血或衄血

行用蘇合金如無用山茶花心姜汁煎童便和好酒調服即止後以犀角地

行用鬱金如無用山茶花代姜汁薑便和好酒調服即止後以犀角地黃湯加鬱金 怒氣甚則嘔血暴癆內逆肝肺相搏血溢鼻口但怒氣致血証者則暴甚以經曰抑怒以全陰者是也否則五志之火動甚火載血上錯經妄行也用柴胡黃連黃芪地骨生熟地芍藥以水煎服虛者以保命生地黃散丹加大門冬枸杞草等分水煎服

附諸方

一方 治嘔血

圖

黃栢露炙

右搗為末煎麥門冬湯調一錢七立瘥

聖真方 治嘔血

側柏葉或乾或除

右為末不計時以米飲調下錢匕

浙

保命生地黄散 治諸見血無寒吐血衄血下血弱血

生地黄 熟地黄 枸杞子 地骨皮 天門冬去心

黃耆 白芍藥 甘草炙 黃芩各等分

右以咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去滓食前通口服脉微身凉加

減每兩加官桂半錢

大薊散濟生方 治飲啖辛熱傷於肺鍾嘔血衄血名曰肺疽

大薊根洗 犀角鎊 升麻 桑白皮炙 蒲黃炒

杏仁去皮尖 甘草炙 桔梗炒

右以咀每服四錢水一鍾姜五片煎至八分温服不拘時

咯血 四十七 附痰涎血

舟溪心法

○咯血痰帶血絲者用姜汁青黛蜜復行瀝火血藥中用如四物湯
加地黃膏牛膝膏之類 咯唾血出於腎以天門冬麥門冬貝母知母
桔梗百部黃柏遠志熟米牡蠣姜桂之類 痰涎血出於脾以葛根黃
芪黃連芍藥當歸甘草沉香之類主之

入方 治痰中見血

白朮

一錢五分

當歸

一錢

芍藥

一錢

牡丹皮

一錢五分

桃仁

一錢

山梔

炒黑八分

桔梗

七分

貝母

一錢

黃芩

五分

甘草

三分

青皮

五分

右以水煎服

又方 治痰中血

白朮

一錢五分

牡丹皮

五分

貝母

一錢

芍藥

一錢

桑白皮

一錢

各四

舟溪心法

卷四

山施炒黑一分桃仁研錢 葶藶三分

右以水煎服

又方 治痰中血

橘紅二錢 半夏一錢 茯苓一錢 甘草三分 白朮一錢

枳殼一錢 人參五分 五味針五 桑白皮一錢 黃芩一錢

右以水一鍾姜三片煎服 或加青黛半錢

又方

橘紅一分 半夏 茯苓 牡丹皮 貝母

桃仁各一 黃連七分 甘草 大青各五

右以水煎生薑三片

附諸方

治咯血

小荷... 不拘...

荷葉不向多
少燻乾

右為末米湯調二錢匕

又方 治咯血及衄血

白芍藥一兩

犀角末二錢

右為末新汲水服一錢匕血止為限

又方 治咯血

桑白皮一錢五分 半夏一錢

知母圖

貝母

茯苓各一錢

阿膠炒五分 桔梗七分

陳皮一錢

甘草

杏仁炒各五分

生棗一錢 山柰七分

柳桂二分即桂之嫩小枝條也宜入治上

右以水煎生姜三升

天門冬九本方 治吐血咯血大能潤肺止咳

天門冬一兩 甘草

白茯苓

阿膠

杏仁炒

各血

...

...

...

貝母路五

心法附錄卷三十一

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服一丸熱津含化日夜可十九

雞蘇散治勞傷肺經喘丙有血咽喉不利

雞蘇葉

黃耆

生地黃

洗淨

阿膠

貝母去心

白朮根

各一兩

麥門冬去心

桔梗去芦

甘草

各五錢

右取咀每服四錢水一鍾姜三片蔥七分溫服

槐花散

朱氏集驗方

治咯血失血

用槐花炒為末每服二錢糯米飲下仰臥

黃連阿膠丸

濟生方

治勞嗽并嗽血唾血

一見前論

恩抱散

治咯血吐血唾血及煩躁咳嗽

生蒲黃

乾荷葉

茅根各等分

右為末每服三錢濃煎桑白皮湯食後溫服

衄血 四十八

丹溪心法

○衄血涼血行血為主大抵與吐血同 用山茶花為末童便姜汁酒

調下 犀角生地黃湯入鬱金同用如黃芩升麻犀角能解毒 又以

鬱金末童便姜汁并酒調服 經血逆行或血暈或吐血或唾血用韭

汁服之立效 治血汗血 衄以人中白新瓦上火逼乾入麝香少許研

細酒調下經驗入中白即濁益白並秋石也 衄血出於肺以犀角升

麻梔子黃芩芍藥生地黃紫苑丹參阿膠之類主之 原病或曰衄者

陽熱拂鬱于於足陽明而上熱則血妄行故鼻衄也

附諸方

衄血 八 衄血 衄血

三十三

河間生地黄散 治鬱熱衄血或咯吐血皆治之

枸杞

柴胡

黃連

地骨

天門冬

白芍

甘草

黃芩

黃芪

生芩

熟藥各等分

右咬咀水煎服 若下血加地榆

又方 治衄血

伏龍肝半升即銅心龜肉上

右以新汲水一大碗淘取汁和蜜服

茜根散 治鼻衄不止

茜根

阿膠蛤心

黃芩各一兩

側柏葉

生芩各一兩

甘草各半兩

右以水煎服加姜三片

圖

書

黃芩為極湯 治鼻衄不止

黃芩 芍藥 甘草

右以水煎服 或犀角也 煎湯如煎犀角以桑寄生之

○鼻通於腦血上溢於腦 所以從鼻而出凡鼻衄並以桑花調立

散時進折二泔仍令以麝油滴於鼻或以蘇蜀芥滴入亦可又桑花

白芍藥對等尤好 外迎法以井花水濕紙頂上貼之 左鼻衄以

線扎左手中指右出孔右手中指指出兩手俱扎 或炒黑蒲黃吹

鼻中或龍骨末亦可

止衄散

黃芪 赤茯苓 白芍藥 當歸 生藥

阿膠 各三錢

右為末每服二錢食後黃芩湯調下

四血

三一四

香附散

川芎二兩 香附四兩

石為末每服二錢茶湯調下

館

○廣按血證須要涼血散火此藥既非涼血又非散火何也蓋血病用血藥而不效者以其血之所藏無以養也夫心主血肝藏血此方用川芎所以和血通肝而使血歸於肝臟也用香附所以開鬱行氣而使之散經絡也血歸火散則病是不止哉

黃芩芍藥湯 按按方治虛家不能飲食吐血衄血

黃芩

芍藥

甘草 各等分

一法如生薑黃芩

右水煎服 此藥治傷寒吐血衄血

治海乞 本草方治吐血無時

苗草根

艾葉各一兩

烏梅肉炒

半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九丸烏梅湯下

生地黃湯直指方治上熱衄血

生地黃一兩

阿膠炒

川芎三錢

桔梗

蒲黃

并草生各五錢

右吹咀每服八錢水一鍾半入生姜汁二匙煎至六分去滓溫服

麥門冬飲直指方治鼻衄

白芍藥

蒲黃炒

生薑二錢

生地黃三錢麥門冬三錢

右吹咀蜜一合水一鍾半煎至六分分作二服

川芎三黃散直指方治骨蒸衄血

天黃炒

川芎

黃連

黃芩各等分

右為末每服二錢并水調下食後

血

血

三

血

生地黄湯 經方 治榮中有熱發肺痿鼻衄等症一切丹毒等疾

生地黄

赤芍藥

當歸

川芎 各等分

右吹咀水二鍾煎至一鍾去滓食後溫服 若鼻衄加蒲黃生薑

黃芩丹毒加防風

清肺飲 經方 治衄血吐血久不愈者

五味子 十箇

麥門冬

當歸身 人參

生地黄 各五

音老旦 二錢

右吹咀作一服水二鍾煎至一鍾去滓食後溫服

用三稜針氣街

出血立愈

地黄飲 經方 治衄血往來久不愈甚效

生地黄

熟地黄

枸杞子

地骨皮

各等分

右為末每服二錢蜜湯調下日三服

麥門冬散子 治衄血不止

麥門冬

生地黃 各等分

右剉每服一兩水煎

黃連散 經驗方 治大人小兒感熱寒熱血血隨熱氣散溢於鼻者謂之

鼻衄凡血得寒則凝凝結聚行熱則流散妄行

黃連

黃芩

一相葉

甘草 各等分

豆豉 三十

右吹阻每服一兩水二錢煎至一鐘去滓食後過口服

生地黄湯 治鼻衄或迷不省

用生地黄三五斤取汁服之以相葉鼻中須臾即止

白炭散 治鼻衄不止

一用白炭不以多少為末冷水調貼鼻竅下

寸金散 治鼻衄不止

衄血

衄血

三十一

二

玉馬鬃

井草

黃藥

右為一每服二錢新汲水調下不倍再服

射香

治鼻

射香五分

白礬

白龍骨

射香五分

右三味拌和勻每用一字先將水為多鼻內無涕然後吹藥於鼻

中或以濕紙擦無藥事內尤妙

龍骨散 三百方 治鼻

用白龍骨不拘多少研為末用少許吹入鼻中凡鼻塞為血骨

此藥吹之

山梔散

朱氏集驗方 治鼻

用山梔子不以多少燒為末少許吹入鼻中

犀角散

浙

用白龍骨不拘多少研為末用少許吹入鼻中

用白草霜為末用少許吹入鼻中立刻效

一方 治鼻血不止

用頭髮燒灰以竹管吹入鼻中即止或以酒調亦可

一方

用新採栢葉搗水服之即止

一方 治鼻衄及酒疸黃沙淋

用萱草根搗汁一鍾生姜汁半鍾相和時時細呷

一方

用生姜汁磨好墨滴鼻中

一方

用菊花塞鼻中外用菊花濃煎湯服

方血 治鼻血不止 治鼻衄及酒疸黃沙淋 治鼻衄及酒疸黃沙淋 治鼻衄及酒疸黃沙淋

弱血 四十九

館

丹溪心法

書

○弱血屬熱 用炒山梔子水煎服 或用小蓴琥珀 有血虛四物加
牛膝膏 實者用當歸承氣湯下之後以四物加山梔

入方

小蓴飲子 治下焦結熱血淋

注

生芩

小蓴

滑石

通草

淡竹葉

蒲黃炒

藕節

當歸酒浸

梔子炒

甘草炙各半兩

右用水煎空心服

附諸方

冷公方 治尿血

生地黄汁 一合

生姜汁 一合

右以二物相合頓服瘥

當歸承氣湯

當歸

厚朴

枳實

大黃

芒硝

右剉水煎

當歸散

大 全 良 方 治 婦 人 小 便 出 血 或 時 尿 血

當歸

羚羊角屑

赤芍藥

生地黄

刺薊葉

右 咬 咀 每 服 八 錢 水 一 鍾 半 煎 至 八 分 去 滓 通 口 服 食 前

一方 治小便出血

用當歸四兩酒三升煮一升頓服漸

一方

弱血

心去附錄卷之七

三十八

用琥珀為末每服二錢灯心薄荷湯調下

鹿角膠治生方 治房室勞傷小便赤血

鹿角膠 五錢 沒藥 另研 油頭髮灰 各三

右為末用茅根汁打糊丸如梧子大每服五十丸鹽湯送下

六味地黃丸 治老人尿血 見補損

瑞竹堂蒲黃散

故紙炒 蒲黃炒 千年石石八炒

右等分為細末每服三錢空心熱酒調下 此劫劑也

下血 五中

浙

丹溪心法

○下血其法不可純用寒涼藥必以寒涼藥中如羊脂為佐久不愈者
後用溫劑必兼升舉藥中加酒浸炒涼藥如酒煮黃芩充之類寒因熱
用故也 有熱四物加炒山梔子赤茯苓丸回膠珠去大腸濕熱屬
虛者當溫散四物加炮乾姜赤麻 凡用血藥不可單行單止也

入方

白芷

五倍子

右為末粥丸如梧子大每服五十丸米湯下

附脈理

脈訣舉要白便血則乳熱則赤壘胃燥腫閉熱在膀胱

附諸方

黃連香薷飲 治伏暑絕下鮮血 渴中者

敗毒散 治風熱流入大腸經下血不止 見傷風

下血

三十一

胃風湯 治風濕乘虛入於腸胃或下瘀血 鬼疔類

槐花散 治腸胃有濕脹滿下血 官

蒼朮

厚朴

陳皮

當歸

枳殼

各一

槐花 二刀

甘草

烏梅 各半

右以水煎空心服

當歸和血散 治腸癖下血濕毒下血

槐花

青皮 各六

當歸身

升麻 各二

刺芥穗

熟地黄

白朮 各六

別號 四分

右為末每服二三錢清米飲調下食前

林慶去濕和血散 治腸癖下血作淚其血 咽出有力而遠射四

散如能毒二月中下一行腹中大作痛乃陽明氣衝熱毒所作也當

去濕毒和血而愈

生地黃

牡丹皮

生甘草各五錢

熟甘草

黃芩各一錢

當歸身

熟地黃

蒼朮

秦艽

肉桂各三分

橘皮

升麻各一錢

白芍藥各一錢五分

右咬咀作一服水四鐘煎至一鐘稍熱空心服

黃連湯後詳方治大便秘下血腹中不痛者請之濕毒下血

黃連

當歸各五錢

甘草各一錢五分

右咬咀每服一兩水二鐘煎至一鐘食前通口服

○已上諸方治濕毒下血之劑

香連丸 冷熱不調下血如痢

見痢類

聚金丸 楊氏方 治腸胃積熱或酒毒大便下血腹中熱痛煩渴脉弦數

黃連四兩酒炒一兩姜汁炒一兩

枳實一兩

黃芩

防風各一兩

右為末煮麩糊丸如梧子大每服五十九米泔浸枳殼水下不拘時

芍藥黃連湯 保命集 治大便後下血腹中痛謂之熱毒下血

芍藥 黃連 當歸各五 淡桂五分 甘草錢

大黃

右每服一兩水二鍾煎至一鍾服如痛甚調木香檳榔末一錢服

阿膠湯 扶粹方 治傷寒熱毒胃下利膿血

黃連丸 治飲酒過多下血不止 圖

黃連二兩 赤茯苓 阿膠炒各

右用黃連茯苓為末調阿膠膠手丸每三十九丸食後水飲下

芍藥湯 扶粹方 行血調氣澁而便膿血知氣行而血止行血則便自愈

調氣則後重除 見痢類

涼血地黃湯 扶粹方 如飲食不節起居不時者陰受之陰受之則入五

臟入五臟則積滯閉塞為食泄又為腸痔者水穀與血另作一法

咳出也時今值夏濕熱大盛正當寒氣勝而素氣弱也故腸胃之証甚以此藥主之

熟地黃

當歸

黃皮

槐花炒各五分

知母炒

黃柏去灰炒各一錢

館

右咬咀作一服水一鍾煎至七分溫服如小復瀉臍下悶或大便後

重調木香枳榔各五分和熱空心服或食前服如裏急後重又不

去者當下之如有傳變隨証加減

○已上諸方治熱毒下血之劑

伏龍肝散三四方治先糞後血崩之遠血兼生虫

伏龍肝淨斤 且草炙

白朮

阿膠

黃芩

乾地黃各三兩千金石作乾姜

浙

右咬咀每服四錢水一鍾煎空心服虛者加附子

下血

...

...

...

竹茹湯 大生良方 治婦人汗血吐血尿血下血

竹茹

寒地黃 陸 人參 官

白芍藥

桔梗

川芎

當歸

真草

桂心

右咬咀每服一兩水二鐘煎至一鐘食後通口服

煎紅丸 齊生方 治臟腑虛寒下血不止面色痿黃自是羸瘦

側柏葉 炒黃

鹿茸 人土色

附子 炮

川續斷 酒浸

黃芩

阿膠 蛤粉

白礬 研

當歸 去芦同炙

右為末醋煮米糊丸如梧子大每服七十丸空心米飲下

○廣按本方出證云治臟腑虛寒下血不止主八血證乃火使之然言

虛則可言寒則不可也丹溪云下血久不愈者後用溫劑此方正

合其義東垣云勞者溫之損而溫之損而不溫何能愈哉此方乃

溫補之義非溫寒之謂也

○已上諸方治久虛下血之劑

酸酈固榮散 治吐血便血

白芷 半兩 真蒲黃 一錢 其草 一錢 地榆 一兩

右取咀每服一錢溫酒調服如氣弱人加石膏一兩

一方

槐花

荆芥 等分

右為末酒調下一錢匕仍空心食積血加

一方 治卒下血

用赤小豆一升搗碎水二升絞汁飲之

烏梅丸 治便血下血

烏梅 三兩燒灰存性

浙

右為末醋糊丸梧子大每服七十九空心米湯下

下血

四一二

一方 治中毒下血

用蟬皮燒灰存性研細每服二錢調下日進三服

一方 治下血劫劑

百藥煎一兩甲一

右為末糊丸如梧子大服六平丸空心米湯下

一方

血餘灰 鞋底灰 猪牙皂角灰各等分

右為末清調三錢匕

一方 治下鮮血

山茱子仁燒灰

右為末水和一錢匕服

一方 治身熱有血面色黃

浙 江 圖 書

石榴皮

右為末煎茄子湯調一錢已

方 治糞後下血不止

艾葉

不以多少

右以生姜汁三合和服

一方 治臟毒下血

苦棟

炒令黃

右為末蜜丸米飲下二十九粒妙

一方

百草霜

研細

右用酒調下

○已上諸方涼血止血之前

下血

本草綱目卷之二十一

四十三

浙江圖書館

酒煮黃連丸

見泄瀉

四物湯

見補損

腸風臟毒

丹溪心法

○腸風獨在胃與大腸出若兼風者蒼朮秦朮芍藥香附

入方

黃芩

秦朮

槐朮

升麻

青黛

右以水煎服

治腸風下血

滑石

黃芩

秦朮

升麻

或以水煎服或以酒煎服或以水煎服或以酒煎服

圖書館

蒼木各等

右以水煎服 或以蒼木生葉木化鉄器為末丸服

又方

加藤燒存

槐子焙

右為末蒸飯丸如梧子大每服一百丸空心米湯下

又方 便血久遠傷血致虛并麻風癰瘡見而者

龜板二兩

升麻

香附各五

芍藥一兩

側柏葉一兩

椿根皮七錢

右為末粥丸以四物湯加白木黃連其草陳皮作末湯下丸藥

又方 脉緩大口渴月經紫色苦傷挾濕

白朮羊兩

黃柏炒

生草湯

白芍各三

地榆二錢

黃芩下

香附各二

揚風

右為末蒸餅充服

又方 治積熱便血

蒼朮

陳皮一兩

黃連

黃柏

條芩各七錢

連翹半兩

右為末生苦膏六兩丸如梧子大每服五七十九白湯下

又方

腸風脫露以車荷鳴五七箇焙乾燒灰醋調搽仍忌濕麵酒辛熱物

附諸方

腸風黑散和劑方治腸風下血或在囊前後並皆治之

荆芥二兩

亂髮

槐花

槐角各一兩

甘草炙

蝟皮炒各兩半

枳殼去心炒一兩

右將所燒藥同入瓦瓶內空泥固濟燒存三分性出火毒同甘草炒

救搗羅為末每服三錢水一鍾煎七分空心服

香梅丸 濟生方治腸風臟毒下血

烏梅 同核燒存性 香白芷 不見百藥煎燒存性各半分

右為末米糊丸如梧子大每服七十九空心米飲下

黑玉丹 和濟方治腸風積熱下血不止

刺蝟皮 制一兩 猪懸蹄 筒一百枚 敗絲 兩 苦練根 五兩 雷丸 四兩

牛角觥 制十兩 槐角 六兩 艾麻 四兩 乱髮 皂角水洗

右剉碎用瓦罐內燒存性研為細末入乳香二兩射香八錢研和令

勻用酒打麵糊為丸如梧子大每服二十九先細嚼胡桃一枚空心

以温酒吞下多進得效

槐角丸 和濟方治五種腸風下血痔瘻脫紅下血並服

槐角 炒 地榆 黃芩 防風 去芦

湯風

...

...

當歸酒浸一宿
焙乾去莖

枳殼去白
炒
各八兩

右為末酒糊丸如梧子大每服三十丸空心米飲下

槐花散本事方治腸風
臍毒下血

槐花炒

柏葉炒
爛

槐花

枳殼炒

右為末每服二錢空心米飲調下

香附散本事方治腸風

香附炒一兩

枳殼炒

當歸炒

川芎五錢

槐花炒

共草各五分

右為末每服三錢水一鍾姜三片棗二枚煎七分溫服

蒜連丸齊生方治臍毒下血

鷹角黃連去莖
一兩

右為末用獨頭蒜一箇滾香熟研和入一口杵極爛丸如梧子大每服

四十耗空心陳米

加減四物湯 治腸風下血不止

側柏葉

生地黃

當歸 酒浸 去劣

川芎 各一兩

枳殼 炒 去白

荆芥穗

槐花 炒

甘草 各半兩

右改咀每服四錢一鍾姜三片烏梅少許同煎空心溫服

黃連散 治腸風下血疼痛不止

黃連

雞冠花

貫衆

川大黃

烏梅 各一兩

并草 各五錢

右為末每服二錢用溫米飲調下日三服不拘時

黃連貫衆散 治腸風下血

黃連

雞冠花

貫衆

大黃

烏梅肉 各一兩

并草 各七錢

枳殼

荆芥 各一兩

腸風

心云附錄卷三十一

五

△

右為米每服二錢溫米飲下食前

結陰丹 按神方 治腸風下血臟毒下血諸大便血疾

枳殼去穢 歲時仙 黃芪 陳皮去白 椿根白皮

何首烏 刺茶各半

右為米酒糊丸如梧子大每服五七十丸陳米飲入醋少許煎過要

煎溫水送下

地骨皮散 經方 治腸風痔瘻下血不止

地骨皮 鳳眼根皮 並用鹽水中煮好去土不煎

右二味各等分同炒微黃色搗為細末每服三錢空心溫酒調服忌

食油膩等物

止血散 仙藥院方 治腸風下血或在發箭或在便後在便前其血近

腎肝血也在便後者其血速心肺血也此藥並主之

皂角刺去灰 二兩 胡桃仁去皮 二兩 槐花二兩

右為末每服二錢米飲調酒亦可

一方 治腸風臟毒

用茄蒂燒灰存性為末米飲調下二錢小兒服半錢

一方 治腸風下血

乾檮根白皮

人參去方

右件等分為末每服二錢空心用酒或米飲調下

一方

槐花

枳殼江

右等分炒存性為末新井水為丸米飲下

一方 治臟毒下血

用黃連四兩酒浸春秋五日夏三日冬七日晒乾為末以烏梅肉六

腸風

...

...

右為米每服二錢溫米飲下食前

結陰丹 按辨方 治腸風下血臟毒下血諸大便血疾

枳殼去穢 歲時仙 黃芪 陳皮去白 椿根白皮

何首烏 荆芥穗各半

右為米酒糊丸如梧子大每服五七十九陳米飲入醋少許煎過要

熬溫水送下

地骨皮散 經方 治腸風痔瘻下血不止

地骨皮 鳳眼根皮 並用鹽水中煮好去土不煎

右二味各等分同炒微黃色搗為細末每服三錢空心溫酒調服忌

食油膩等物

止血散 自藥院方 治腸風下血或在發前或在便後在便前其血近

腎肝血也在便後者其血遠心肺血也此藥並主之

皂角刺去灰二兩 胡桃仁去皮 熟地炒 槐花三兩

右為末每服二錢米飲調酒亦可

一方 治腸風臟毒

用茄蒂燒灰存性為末米飲調下二錢小兒服半錢

一方 治腸風下血

乾栲根白皮

人參去方

右件等分為末每服二錢空心用酒或米飲調下

一方

槐花

枳殼江

右等分炒存性為末煎井水為丸米飲下

一方 治臟毒下血

用黃連四兩酒浸春秋五日夏三日冬七日晒乾為末以烏梅肉六

腸風

治腸風下血

二

兩同搗為膏丸如梧子大每服二三十丸空心白湯下

方 治腸風下血

官

用椿根白皮此羽者去粗皮酒浸晒乾為末研膠棗肉丸如梧子大每服三五十九酒送下

書

○廣按腸風者邪氣外入隨感隨見所以其色清也臟毒者蘊積毒久而始見所以其色濁也治腸風以散風行濕藥治臟毒以清熱涼血藥又要看其虛實新久之不同新者實者宜降之瀉之虛者久者宜升之補之故治法有所異也

痔瘡 卷二

浙

丹溪心法

○痔瘡專以涼血為主

○痔瘡專以涼血為主

入方

人參

昔莖

生芩

涼血

川芎

當歸

和血

升麻

條芩

治大

枳殼

寬腸

槐角

涼血

黃連

等分

一方無黃連

右以水煎服

或丸服亦可

重洗

五倍子

朴硝

桑寄生

蓮房

加荆芥

煎湯先重後洗又冬瓜藤亦好又大腸熱腫者用木鱉子五倍子

研細末調傅

痔頭向上是大腸熱甚收縮而上用四物湯解毒湯

加枳殼白木槐角秦艽

淋

附諸方

圖書

清心丸 素問云諸痛痒瘡瘍皆屬心火此藥主之

黃連 兩

煨神

微赤茯苓 各半

右為末煉蜜為丸如梧子大每服二百丸食前米湯下

清涼飲 治諸疰熱并大便秘結書

當歸

赤芍藥

甘草炙

大黃 飲上蒸

右等分為末每服二錢新水調下圖

黃芩葛花丸 宣明方治腸中久積熱毒痔瘻下血疼痛

黃芩

葛花

生地黃 焙

黃赤小豆花 各一兩

大黃

赤芍藥

黃芩

當歸 各三錢

絹皮 一錢

檳榔

白蘇 炒

皂角子 仁 炒各五錢

右為末煉蜜丸如梧子大每服二十九至三十九丸前桑白皮湯及面

香薷子煎湯下亦可

撰角丸 治痔瘻有效

槐角 當歸

地骨皮

蝟皮 各等分

右為末滴水丸如梧子每服五十丸空心服

蝟皮丸 治諸痔瘡出血裏急疼痛

槐花 炒

艾葉 炒

秋散

地榆

當歸

川芎

黃芪

白芍

白茯苓 枳

貫衆

蝟皮 各一兩

頭髮 燒三錢

猪後蹄重甲 十枚

皂角 一錢炙黃去皮

右為末煉蜜丸如梧子大每五十丸食前米湯下

猪甲散 治諸痔

猪懸蹄甲 不以多少

右為末陳米湯調二錢空心服

芎歸丸 治痔下血不止

痔瘡

法外餘卷之十一

四九

川芎

當歸

黃芪

神麩炒

地榆

槐花

炒各半兩

阿膠炒

頭髮燒灰

荊芥

木賊

各一分

右為末煉蜜丸如梧子大每五十丸食前米湯服

乾葛湯

治每遇飲酒發動痔瘡腫痛而流血

乾葛

枳殼炒

半夏

茯苓

生薑

杏仁

各半兩

黃芩

甘草

各二錢半

右劉每服三錢黑豆一百粒姜三片白梅一箇水煎服

橘皮丸

治因憂思怒適臨于前痔瘡發作腫痛大便難強努則肛

出亦皆治之

橘皮

枳殼炒

川芎

槐花

炒各半兩

檳榔

木香

桃仁炒去

紫蘇葉

香附

甘草

各二錢半

右劉每服三錢姜煎東煎服

一方 治腸痔每大便常有血

蒲黃末方寸匕未飲調下日三頓癰

地黃丸 治五痔滋陰必用之

地黃 酒蒸熟 兩六錢

槐花 炒

黃柏 炒

杜仲 炒

白芷 各 兩

山藥

山茱萸 各兩

獨活 各八錢

澤瀉

牡丹皮

茯苓 各六錢

黃芪 半兩

白附子 二錢

右為末煉蜜丸如梧大每五十丸空心米湯服下

一方

大黃 三

牡蠣 煅

右為末作十服空心服

五灰散 三方 治五種痔瘡不問內外並宜服之

鱉甲 治痔

蝟皮 治痔

蜂房 治痔

蛇蛻 治氣痔

痔瘡

五

一

猪左足懸蹄甲 治腸瘡

右燒存性隨証倍用一分為末并花水調二錢空心臨臥時服

香散丸 宣明方治濕熱內甚因而飽食腸痔發為諸痔久而成瘻

木香 黃蘗條三 枳殼炒 厚朴各半 黃連一兩

蝟皮 一箇 燒灰 當歸 荆芥穗三錢

右為末麵糊丸如梧子大每服一圓十九溫水下食前日三服

一方 治諸痔瘡

槐花 一兩 魚魚 刺長碎胡椒七粒 川椒 一兩

右用猪肚一箇公乘在內扎定和煮熟去藥及空心食肚子

○已上諸方內治之劑

薰洗方

菊花 荆芥 枳殼 厚朴

右以水煎入白礬石先薰後洗

右以水煎入白礬先薰後洗

又方

用五倍子如燒香法置桶中薰妙

又方

木鱉子

七箇取
仁研

土礬末

二錢

右以水煎薰洗二三次

如肛門腫熱以朴硝末水調淋之良

又方

搗桃葉一斛熬之內小口器中以下部搗上坐虫自出

又方

用無花菓葉煮水薰少時再洗

又方

用好醋沃燒新磚如法坐薰良

又方 翻花痔

用荆芥防風朴硝煎湯洗之次用木鱉字對金研末入龍腦些少水調傅之或用熊膽片腦和勻貼之尤妙

又方

用全蝎不以多少或二三箇初發痔痒用此燒薰

又方

用韭菜不以多少燒熟湯以盆盛湯在內盆上用罌蓋之留一竅却以韭菜於湯內泡之以穀道坐其上令氣蒸薰候溫用韭菜湯輕輕洗瘡數次自然脫體

又秘方

先用乾馬齒莖煎湯洗或用累師活搗敷瘡紙封口空心食前搽湯

一調下秋薇末一二錢

又方

用枳殼不拘多少每用末二錢

一大碗沙瓶內煎百沸先薰蒸

後洗之

外敷蝸牛膏

館

用蝸牛一枚射香少許用小砂合子盛蝸牛以射香糝之次早取汁塗痔瘡有效

槐白皮膏

和清方

治內外諸痔年久不愈者

槐白皮

枳實

各五錢

赤小豆

三合

桃仁

六十枚

當歸

各三兩

甘草

白芷

各二兩

右咬咀以煎成猪膏一升微火煎至其色紫可成膏以貼瘡

五灰膏在方治臟腑一切蘊毒瘰癧為痔瘡不問遠年近日形似雞冠

蓮花核桃牛乳或肉或外並皆治之此方親傳之瘡科劉叔茂累試

痔瘡

五十二

五十二

△

一皆駭不敢自秘

蕎麥

天半

荆柴

老杉

薊柴

山白竹

取以上四般柴竹截作二尺許長以斧劈破成片各取一束曬乾

大瓦燒過置坛內為灰防為風所化煨盡燒却以水於鍋內煮角是

汗又用酒滴以布帛實其合罈置蕎麥於酒漏內以所煮四般炭汁

熬之然後取汁於鍋內慢火熬汁約取一小碗候冷入石灰同昇調

和成膏以瓦瓶貯之止用石灰傳之面上不令走氣臨用特却去石

灰以冷水調開於病者以水洗洗淨痔瘡仰臥搭起一足先以濕紙

於瘡四圍貼護却用竹篋挑藥塗於上痛更痛息用紙措去藥再塗

如此三四遍要痔瘡如黑樣黑方效水洗淨每日常置冷水一盆

以葱湯和之日洗三五通六七日後膿穢出盡其瘡自消

寬腸丸

醫方大成

五灰塗痔瘡之後

膿穢

秘結

不通者用此藥寬腸

黃連

枳殼

右為末麴糊丸如梧子大每服五十九空心米湯下

一方 治久痔

用能煎塗至神效

一方 治痔瘡有頭

用芫花入土根洗淨木臼搗以少水絞汁於銀銅器內慢火煎成膏

將絲線於膏內度過繫痔瘡頭繫時微痛候心躁痔落時以紙蘸蘸

膏於竅內永除其根

一方

治用藥枯痔後大便堅硬難下以大黄濕紙裹煨枳殼去穢當熟湯

洗各等分為末煉蜜丸如梧子大每服三十九白湯下

灸法

痔瘡

外科全書卷之十一

五十三

用大絲一斤頭垢搗成餅子先安頭垢餅於痔上外安蒜艾灸之

○已上數方外治之法

四物湯

解毒湯

漏瘡

五十三

丹溪心法

江

○漏瘡先須服補藥生氣血用參朮芪芍歸為主大劑服之外以附子末津唾和作餅子如錢厚以艾灸之漏大疔一大漏小疔小但灸令微熱不可使痛乾則易之則再研如末作餅再灸如困則止來日又灸直至肉平為效亦有用附片灸仍用前補劑作膏貼之尤妙 痔漏涼大腸

寬大腸 用枳殼去穢入巴豆炒微焦去巴豆炒微焦用枳殼末貼之尤妙

寬天腸 用枳殼去穰入巴豆鉄線經裏透去巴豆藥用是藥別煉
搗用前藥乾用寬腸 泄竅用赤石脂白石脂枯礬煑黃丹腦子 漏竅
外塞用童便煨鹽其石牡蠣粉

久方

館

黃連散 元有痔漏又於肛門邊生一塊皮厚腫痛作膿就在痔孔出

作食積注下治

黃連

阿魏

神麩

山查

桃仁

連翹

槐角

犀角 等分

右為末以少許置掌心時時舐之津液嚥下如消三分之二止後服

附諸方

莽味槐角九 治痔漏通用及治腸風下血

槐角 二兩

生芩 二兩

當歸身

黃芪 各一兩

川芎

漏瘡

...

...

...

阿膠各半 黃連 條苓 栝櫞 茶丸

防風 連翹 地榆 升麻各一 白芷各一

右為末煉蜜丸或酒糊為丸如梧子大每服五十九漸加至七八十

丸有丸空心溫酒或米湯送下書

法日以槐角生葉生血涼血為君當歸川芎黃芪阿膠補虛為臣必

諸藥為佐使蓋黃連瀉心火條苓瀉天陽枳殼寬大腸藜蘆去天陽

風防風為血證上使連翹為血證中使地榆為血證下使而連翹又

能散經絡中火邪地榆又能涼血枳殼散火邪又與白芷引諸藥

入大腸經絡失痺瀉經絡之病也

楳藤子丸 御藥院方 治腸癖下血痔漏結核疼痛

楳藤子一箇重七錢者 皂角刺燒存性 茴香炒 枯白藜

枳殼去白 檳榔炒 白附子丸 蠟炒 乳香炒

右為末醋麵糊丸如梧子每服三十九空心溫酒下如痔瘡痛醋所

右為末醋麵糊丸如梧子每服三十九空心溫酒下如痔瘡痛醋研
五七丸塗患處

錫皮丸 清生方 治五種痔漏

猪左懸蹄甲

黃牛角腮

馬皮

一箇同上二藥燒灰存性

防風 去芦

貫衆

槐角子 炒

鱉甲

醋炙

枳殼 去白

雞冠花

槐花

黃耆

去芦

雷丸

黃連 去瀝

當歸

香白芷

油髮灰

玄參

各半

鹿射香 方

五分

右為末米糊丸如梧子大每服一百丸空心米飲送下生高并虛弱
者不宜服也

枳殼散

御藥院方

治腸風痔漏便血無數疼痛不可忍

枳殼

去穢

槐子

微炒

荆芥穗

各半

同

右為末每服三錢薄粟米粥調下如人行一二里地再以粥壓下日

漏瘡

五疔余卷之十一

五

五

五

五

進二三服

一方 治痔漏下血疼痛

官

用槐花炒枳殼去穢各一兩為末醋糊丸如梧子大每服二十九空心食前米飲湯下十服見效

一方

用枳殼水浸去穢每二片用巴豆一粒在內線縛於銀石器內以醋浸一指高煑乾去豆為末醋糊為丸如梧子大每服十五丸空心茶清送下

猪腎丸 通行漏瘡中惡水自大腸中出

用黑牽牛碾細末二錢半入猪腎中以線扎青竹葉包慢火煨熟空

心溫酒下

○已上諸方治初發痔漏涼解之劑

乳香丸 治冷漏

乳香 二錢

牡蠣粉 一錢三分

杏為末雪糝糊丸麻子大每服三十丸姜湯空心下

銅腸丸 和清方 治久漏虛漏肛門腫 或生瘡時有膿血及腸風下血

虛寒又不愈者

指葉 二枚燒存性 蝟皮 二筒燒存性 雞冠花 四錢 白礬 二兩

胡桃仁 取仁十五兩不去油醋內燒存性 白附子 天南星 生用 枳殼 去穢炒

半夏 訶子 二兩 附子 去一兩

右為末醋糊丸如梧子大每服三十丸空心臨臥溫酒送下

黑丸子 危氏方 專治年久痔漏下血用之累驗

乾姜 百草霜 一兩 木饅頭 二兩 烏梅 敗棕

預葉 油髮 各半 已上七味各燒灰存性却入後藥

通書

...

...

...

桂心 三錢

白芷 五錢伏不見火

右九味為末醋糊丸如梧子大空心服飲下三十丸

烏玉丸 秘方 治男子婦人下血腸風痔瘡初者痲痺不可忍服此三四次

是效初得此病或痒或疼或發道周迴多生硬核是痔破者是漏下血是風皆因酒色過度即成此疾人多以外醫敷洗不知病在腸中有

蟲若不去根其病難除

圖

槐角 六兩

雷丸 四兩

敗棕 八兩

苦練根 五兩

芝蔴 四兩

牛蒡根 十一兩

亂髮 皂角水

右件剉碎用磁器內燒存性碾末入乳香二兩射香八錢研勻酒糊

丸如梧子大每服五十九細嚼胡桃一箇酒送下空心臨晚二服

甚者三服忌別藥房空醋魚雞諸般發風動氣毒物并忌食此

○已上請方治年久痔漏溫澁之類

黑黑乃婦翻花漏瘡

薰男婦翻花漏瘡

草芥子

去殼

防風

天南星

炒子

右件為粗末盆內燒烟上用器具蓋之留一孔坐孔上薰之

又方 薰漏瘡

艾葉

五倍子

白膠香

苦練根

各等

右剉碎如燒香法置長桶內坐薰瘡處

薰洗痔瘻疼痛

枳殼

半兩

朴硝

二錢

薄荷

半兩

荆芥

乾蓮蓬

各一

右件為粗末用水三碗煎至二碗半乘熱薰洗

洗漏瘡方 治漏瘡孔中多有惡穢常須避風洗淨

漏蜂房白芷煎湯洗

或大腹皮苦參煎湯洗

右洗畢拭乾先用東面石搗皮晒為末乾搽以殺淫虫少頃傳藥

又方

用冬瓜湯洗即愈

又方

用蒜硝并水調洗

或用鹽蒜硝調搽

又方 治痔漏

用河邊水漂出柳根赤髻煎湯洗極效

傳文漏方

用九孔蜂房及黃以臘月猪脂研傳候收汁以龍骨降香製末入

乳香硬瘡

又方 傳痔漏

用田螺一箇挑開壓入片腦一分過一宿取螺內水搽瘡先用冬瓜

蒜煎湯洗淨搽

蒲黃散 治下部痔漏

蒲黃 一兩

益母草 兩

一在為末每用少許貼患處

又方

用蠶螂不以多少焙乾為末先用礬水洗淨貼之

辰砂提子 秘方 治痔漏等瘡

人言 一錢

白礬 二錢

蜜陀僧

辰砂 各五

左件先研人言細鋪鍋底次用礬人言上粘烟盡為度次將陀僧

辰砂研細白糕和作尖提子如小麥大每用一粒頑漏納瘡口上去

敗肉盡後貼生肌散

生肌散 秘方

寒水石 煨

龍骨 煨

乾胭脂 三錢

輕粉 一錢

漏瘡

治下部痔漏

治下部痔漏

治下部痔漏

右件研末乾貼瘡嫩寒水石乾胭脂加龍腦瘡老毒方

辰砂膏秘方

瓜蒂李三

蜜陀僧研二錢

硃砂半錢

片腦半錢

右件為末知瘡乾津調貼瘡濕乾貼

至紅散秘方

硃砂二兩

先燒研砂在鍋內火煎
白礬末放土枯烟不為度

礬二兩

硃砂四錢

右件為末敷痔乾用津唾調貼

代針膏秘方

巴豆五錢

去皮

枳殼大者

去核

右件將豆裝在枳殼內綿縛罐內盛醋浸乾

曬濕展藥敷痔根去痔不用止用生肌散如

調代針膏敷瘡頭小敷肉自去

互晒乾研細用絲綿
頃漏日久不可用津

四效散 聖惠方 治鼠如痔漏

蜜陀僧 二錢 射香 片腦 二半 銅綠 一字

右件為末先用溫水洗拭乾散

生地黄膏 治漏瘡通用 **館**

露蜂房 炙 五倍子 木香 三錢 乳香 一錢 輕粉 一字

右為末用生地黄一握搗細和為膏攤生絹貼之

蛇蛻散 治漏瘡血水不止

蛇皮 焙 五倍子 龍骨 各二錢 續斷 五錢

右為末入射香少許津唾調傅

○已上諸方外治之法

○廣按痔漏之原由乎酒色過度濕而生熱克于臟腑溢于經絡墜平殺道之左右衝突為痔久而成漏者也痔輕而漏重瘻實而漏

虛治痔之法不過涼血清熱而已至於治漏初則宜涼血清熱燥
濕久則宜滋竅殺虫而兼手溫散也或曰痔漏大是根源何故而
用溫滋殊不知痔止出血始終是熱漏流膿水始是濕熱終是濕
寒不用溫藥何以去濕而散寒乎非止痔漏百病中多有始熱而
終寒者如瀉痢如嘔吐初作則腸胃氣實為熱久作則腸胃氣虛
而為寒矣丹溪下血條云下血久不愈者後用溫劑正此義也

脫肛 五十四

丹溪心法

○脫肛屬氣熱 氣虛 血虛 血熱 氣虛者補氣 參芪芍歸升麻

血虛四物湯 血熱者涼血四物湯加炒柏 氣熱者條芩六兩升

一兩麵糊丸 外用五倍子為末托而上之一次米泔至五七次

麝一兩麵糊丸 外用五倍子為末托而上之一次未收至五七次待
收乃止 又東北方壁土泡湯先薰後洗

附諸方

香荆散 三月方 治肛門脫出大人小兒香自治之

香附子

荆芥穗 各半 一方加砂仁

右為末每服三匙水一大碗煎至十數沸熱淋洗

一方

用五倍子為末每用三匙入白礬一塊水二碗煎洗

一方

用木賊燒灰存性為末擦肛門上按入即愈

一方

用浮萍為末乾貼患處

又方 治氣虛而淋者

八物湯加黃芪虎杖甘草煎湯服諸藥中可加牛膝

附諸方

五苓散 治伏暑小便赤澀如淋

一方 治諸淋

四苓散 二錢 益元散 一錢 燈草 四錢 山梔子 一錢

右水煎空心服 或益元散加車前末一錢 或益元散加阿膠末

一錢

正散 和劑方 治大人小兒心經蘊熱小便閉結小便赤澀癃閉不通

熱淋血淋膏淋沙淋石淋並皆治之

車前子

瞿麥

蒲葦

滑石

甘草

山梔

大黃 延壽

木通 通

右以明每服三錢水一鐘入心十粒煎至六分食前溫服

右吹咀每服三錢水一鍾入灯心七莖煎至六分食前温服

五淋散 和劑方 治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不出或如膏如

沙如石或如豆汁並皆治之

赤茯苓 六兩 赤芍藥 六兩 山梔子 仁各十兩 當歸 去酒

甘草 生用各五兩 條芩 三兩

右吹咀每服四錢水一鍾煎八分空心服

石膏散 和劑方 治膀胱有熱淋瀝不去脘腹急痛蓄尿有時夢後即發

或尿如豆汁或出沙石並皆治之

芍藥 白朮 滑石 葵子

瞿麥 石膏 去毛各二兩 當歸 甘草 生用各三兩 留行

右為末每服二錢空心小麥湯調下

通草湯 消生方 治諸淋

淋疾 六 祛村餘卷之二 六五二

王不留行 葵子

通草

菟根

蒲黃

唐經法

桃膠

瞿麥

滑石

荊芥穗

右文四每服四錢水一鍾姜五片煎服

地膚子湯 治諸病後體虛觸熱熱結不化遂成瘡毒亦便赤注

數起少出莖痛如刺或尿出血

地膚子

楮冬

知母

黃茶

海藻

通草

瞿麥

枳實

升麻

葵子

右吹咀每服四錢水一鍾姜五片煎六分溫服

車前子散 治諸淋小便痛不可忍

車前子

淡竹葉

赤茯苓

灯草

荊芥穗

右作二服水煎

立效散 治下焦結熱小便淋閉作痛有時尿血

立效散 補方 治下焦結熱小便淋閉作痛有痔尿血

并草 炙三

瞿麥穗 一兩 山梔子 去皮炒

右吹咀每服五錢水一鍾姜三片葱白三箇灯心三十莖煎至六分

去滓食後温服

○已上八方清熱之劑

導赤散 和劑方 治心虛蘊小便赤澁或成淋痛

生乾地黄 甘草 木通

右吹咀每服三錢水一鍾竹葉十片煎六分温服

火府丹 本草方 治心經蘊熱小便赤少及五淋澁痛

木通 黃芩 各一兩 生熟地黄 二兩

右為末煉蜜研為丸如梧子大每服五十九木通湯送下

○已上三方方寧心之劑

六味地黄丸 治血虛腎虛消渴淋濁 見補損

壽表

治下焦結熱小便淋閉作痛有痔尿血

六十二

鹿角霜丸

三周方

治膏淋多因憂思失志濁氣干清小便淋閉黯如膏

脂疲劇筋力或傷寒濕多有此証

鹿角霜

秋石

白茯苓 各等分

右為末麵糊丸如梧子大每服五十丸空心米湯下

○已上二方滋腎之劑

一方 治氣虛脾虛消渴淋濁

圖

人參

滑石 各一

白朮 一錢

赤茯苓

澤瀉 各七分

麥門冬

甘草 各五分

竹葉 三十

右剉作一服水一鍾灯心二十莖煎六分溫服食前

滑心蓮子飲

和劑方

治上盛下虛心火炎上口苦咽乾煩渴微熱小便

赤澁或欲成淋在比皆治之

黃芪 密炙

石蓮肉 去心

赤茯苓

人參 各七

車前子

麥門冬 去心 甘藷 炙 地骨皮 黃芩 各半

右吹咀每服五錢水一鍾煎六分溫服發熱加柴胡薄荷

○已上二方祛脾之劑

髮灰散 治血淋 若年小便出血為莖血皆主之

亂髮不拘多少燒灰入射香少許每服用米醋泡湯調下 治淋

以葵子末等分米飲空心調下最治婦人胞轉不尿

葉氏治血淋方 簡易方

阿膠 熬別 木槿花 赤茯苓 滑石 澤瀉 各一

車前子 半兩

右吹咀每服三錢水一鍾煎六分五更時服

一方 治小腸有熱血淋急痛

車前草連根帶穗洗淨白內搗并花水調濃清汁空心涼服一碟

淋瀝

...

...

...

若是淋沙石則以煖寒末石為末調服

一方 治血淋熱淋

官

赤小豆 不以多少

一右為末每服二錢煖酒一椀溫酒調服

通秘散 治血淋痛不可忍

陳皮

香附

赤茯苓 各等分

右剉每服二錢水煎空服

白薇散 治熱淋血淋

白薇

赤芍藥 各等分

一右為末每服二錢溫酒調下立效或加茯苓

一方 治熱淋血淋

茯苓 十箇

本以水四碗煎至一碗空心服甚效

右以水四碗煎至一碗空心服甚效
一方治淋諸熱淋

山茵陳 淡竹葉 木通 山梔子 滑石

甘草 猪苓 瞿麥

右剉每服五錢水一鍾半灯心少許煎至八分空心温服如大便秘
澁加大黃同煎

○已上八方理血之劑

沉香散治氣淋 此多因五内鬱結氣不舒行陰滯於陽而致壅滯
小腹脹滿便瀉不通

沉香 石膏 滑石 王不留行 當歸

葵子 芍藥 甘草 陳皮 木香

青皮 各二分 五分

附錄

卷之六

六

右為末每服三錢煎大麥湯下

傳濟方治五淋

官

赤芍藥一兩

栝榔

右為末每服二錢水煎空心服

書

一方治赤淋急痛

蓋元散

苗香

一錢散

木香

栝榔

右為末水調服

①已上三方理氣之劑

江

一方治小便淋痛赤澀下沙石

萱草根一握搗取汁服 或嫩苗煮食之亦可

一方治沙石淋

琥珀二錢研為末去心葱白湯調下

琥珀散

宜明方

治五淋

沙石淋

滑石

琥珀

一

木通

當歸

木香

鬱金

藜竹

各半

右為末每服五錢以蘆葦葉煎空心調服如無蘆葦葉以竹

葉煎湯送下

○已上三方治鬱金劑書

二神散

治諸淋急痛

海金沙

七升

滑石

兩

右為末每服二錢煎末通麥門冬車前草湯入蜜少許送下

一方

石燕子

七箇搗如黍米大

新桑白皮

三兩到同拌勻

右將二物分作七帖用水一鍾煎七分去粗空心午煎至夜各一服

淋疾

心法附錄卷之十一

六十一

琥珀散

聖惠方

治五淋澀痛小便有膿出血

琥珀

海金砂

沒藥

蒲黃

各一兩

右為末每服三錢濃煎通草湯送下日二服

方

用螻蛄七枚鹽二兩同與新瓦上焙乾研細溫酒調服一錢即愈

方

用苧根二莖剉碎水一碗煎至半碗頓服即通

方

用車前子一兩以絹囊盛水二鍾煎溫服立瘥

方

用地膚子或葶葉一兩水一鍾煎溫服

即此方掃心苗上子是心

○已上數方專攻之劑

方
治淋症中痛此是月經不調流注於熱

黃柏

聖惠方

一方 治淋莖中痛此是肝經氣滿有熱

甘草梢子 半兩

青皮

黃栢

澤瀉 各二

右作一服水二鍾煎至一鍾空心温服

一方 治苦病淋而莖中痛不可忍

六君子湯加黃栢知母滑石石常琥珀煎服

見調胃類

麥冬琥珀湯 治淋莖中痛不可忍相引脇下痛

人參 五分

茯苓 四分

川練子 炒一分

琥珀 三分

生甘草 二

玄胡索 七分 澤瀉

柴胡

當歸梢

加青皮

黃栢 各三分

右作一服水一鍾半煎至七分空心温服

○已上諸方治莖中痛之劑

治婦人諸淋方

淋疾

用苦楛根俗名杜牛膝洗淨槌碎一握水五碗煎至一碗去渣
射香乳香末各少許調服小便肉當下沙石剝剝有聲是其效也
石膏散 治婦人小便卒淋澀

石膏

黃芩

木通

榆栢皮

葵子

瞿麥穗

茸草

各等分

右以咀每服八杯水一鍾半姜三片煎至八分去渣食前溫服

○已上治婦人淋証之劑

八味丸

八物湯

並見補換

○廣按淋証其感不一或因勞心或因忿怒或因醇酒或因厚味

致夫勞勞者陰虛火動也忿心者氣動生火也醇酒厚味者

濕熱也清熱既久熱結下焦所以小便淋瀝欲去不去不去又

而痛不可忍也若淋証久結下焦所以小便淋瀝欲去不去不去又

而痛不可忍者初則熱淋血淋久生煎熬本
 石也諸方中類多散熱利小便而於開鬱行
 若夫散熱利小便只能治熱淋血淋而已其
 必須開鬱行氣破血滋陰方可也古方用鬱
 青皮木香行氣藥也用蒲黃牛膝破血藥也用
 藥也東垣用藥凡例小腹疼痛用青皮黃柏去
 蓋小腹小便乃肝腎之部位也學者不可不知

小便不通 五十六

丹溪心法

○小便不通有氣虛 血虛 有痰 風閉 實 氣虛用參芪赤

深開

六十八

六十八

六十八

麻等先服後吐或參芪藥中探吐之 血虛四物連芩服後吐或芍歸

湯中探吐亦可 痰多二陳湯先服後吐已上皆探吐 若痰氣閉

塞二陳湯加木通一作香附探吐之以提其氣氣下則水自降下蓋氣

承載其水也 有實熱者當利之砂糖湯調產生不三三或山施之

類 有熱有濕有氣結於下宜清宜燥宜升 有石之婦多患小便不

通胞被胎壓下故也轉胞論用四物湯加參木平石 五陳皮并草姜煎

湯空心服 一婦人脾疼後患大小便不通此是痰隔中焦氣滯於下

焦以二陳湯加木通初與後煎渣吐之

附脉理

脉訣舉要曰鼻頭色黃小便必難脉浮弦滑為不小便

附諸方

清黃湯聖惠方治心腎有熱小便不通

木通 香附 砂糖 參 芪 芍 歸 芩 木 平 石 五 陳 皮 草 姜 煎

赤茯苓 木通 薤白皮 荆芥

灯草 赤芍藥 甘草 補黃 滑石

右各等分為末每服二錢葱白煎蘇煎湯調下食前服

葵子散 宣明方 治小便不通

葵子

葵子 性寒 味甘 治小便不通

右咬咀每服四錢水二鍾煎至一鍾去滓食前服

葵子湯 濟生方 治膀胱實熱難留小便不通

赤茯苓 木猪苓 葵子 枳實 瞿麥

滑石 木通 者黎 車前子 甘草

右咬咀每服四錢水一鍾半煎至五分煎八分去渣溫服

海金沙散 梅祥方 治小便淋瀝及下焦濕熱氣不施化或五種濁赤

閉不通

海金沙散 梅祥方 治小便淋瀝及下焦濕熱氣不施化或五種濁赤

海金沙 木通

瞿麥

滑石

通草

杏仁去皮尖炒

官

右咬咀每服一兩灯心二十葉水三鐘煎至一鐘溫服

醫金書蓮丸方治心火炎上腎水不升致使水失不得相濟膀胱水

腸積熱或癃閉不通或遺溺尿赤或白濁如淋或膏淋如膿或如痰

子水或如少石米粒或如粉糊相似者俱熱証也此藥悉皆治之

鬱金

黃連各一兩

黃芩

琥珀研

大黃酒浸各二兩

滑石四兩

黑牽牛六兩

白茯苓四兩

右為末水丸如梧子大每服五十九沸湯下空心服如用消導飲食

降心火可加沉香五錢

氣散濟生方治小便不通腹膈急痛

甘草

木通各三

瞿麥

葵子

滑石各一

右為末每服半錢灯心湯下食前

木通散 濟生方 治小便不通小腹痛不可忍

木通

滑石 各一兩

黑牽牛 頭末半兩

右咬咀每服一錢水半鍾灯心十葉葱白一莖煎三分食前服

八珍散 聖惠方 治大人小兒小便不利或不通

大黃

木通 去皮

滑石

粉草

瞿麥

山梔子

黃芩

荆芥 各等分

右為末每服一錢薄荷湯調下小兒減服食前

草蜜湯 治心腎有熱小便不通

生車前草搗取自然汁半鍾合蜜二匙調下

一方 治膀胱不利為癃瘕者小便閉而不通

八正散加木香

方見淋類

一方 治小便不通 臍下滿悶

海金沙 一兩

臘茶 半兩

右為末 每服三錢 生姜甘草湯調下

一方 治膀胱有熱 小便不通

書

用朴硝不拘多少 研為末 每服三錢 空心以茴香湯調下 妙

琥珀散 治老人虛人小便不通

圖

用琥珀為末 每服一錢 以人參茯苓煎湯調空心服 或煨蜜丸 如梧

子大 每服十九 赤茯苓湯下

一方 治小便不通

雞子中黃 一枚 服之 不過三

一方

用炒鹽熱封小腹 冷復易之

或以食鹽炒熱 放溫填濟中

自取公甲壳 燒灰 米飲服之

一方 治忍小便久致胞轉

自取瓜甲燒灰米飲服之

一方

取陳艾筆頭一枚燒為灰和水服之

一方

用酸漿草搗汁入蜜同服

一方

用竹雞草一兩洗淨車前草一兩同於砂盆搗爛加蜜少許無蜜加
鹽少許取汁空心服小便自通竹雞草其葉如竹葉花翠藍色

四物湯

見補損

二陳湯

見痰類

圖

本草綱目卷二十一

二十一

△

用炒鹽... 或以食鹽炒... 煎以黃粟土... 煎以黃粟土... 煎以黃粟土...

小便不禁 五十七

丹溪心法

書

○小便不禁者屬熱屬虛 熱者五苓散加解毒虛者五苓加四物
戴云小便不禁出而不覺赤者有熱白者氣虛也

附諸賢論

王節齋曰小便不禁或頻數古方多以為寒而用溫澁之藥殊不知屬
熱者多蓋膀胱火邪妄動水不得寧以不能禁而頻數來也故年老
人多頻數是膀胱血少陽火偏旺也治法當補膀胱陰血瀉火邪為
主而佐以收澁之劑如牡蠣山茱萸五味子之類不可用溫藥也病
本屬熱故宜瀉火因水不足故火動而致小便多小便既多水益虛

吳萸 補血補氣瀉火治其本也收之滋之治其標也

附諸方

茯苓丸

一因方 治心腎俱虛神志不守小便淋瀝不禁

赤茯苓

白茯苓

右為末以新汲水按先澄去新沫控乾如取地黃牙皂好酒同於銀

石器內熬成膏搜和丸如彈子大空心酒下丸

桑螵蛸散

治男子小便頻數如稠如澀色此由勞心焦思得之

有服此藥不終劑而愈

方見赤白濁

治小便

退失

阿膠

炒成

牡蠣

鹿茸

桑螵蛸

右為末糯米糊丸如梧子大每五十九空心鹽酒下

六味地黃丸

治內虛熱者小便頻數不禁

方

方

方

本方加牡蠣五味子

見補損

家韭子三因方治大人小兒下元虛寒小便不禁或成白濁

麋茸酒炙 牛膝酒浸 熟地黃

當歸各二兩 杜仲去皮 石斛去芦 乾姜炮 桂心各一兩

兔耳子酒浸 巴戟去心各一兩半

右為不酒糊丸如梧子大每服一百丸空心塩湯温酒任下小兒涼

作小丸服之

見中暑

五苓散

見温熱

解毒散

見補損

四物湯

浙江

丹溪心法

○專主平熱帶下與脫精同治法青黛海石黃柏內傷氣血虛不

能固守常服八物湯加減吞櫻樹根丸 思想成病其病在心安神丸

帶補藥 熱則流通知母黃柏蛤粉青黛為丸 精滑專主平瀉補黃

相知母降火牡蠣粉蛤粉燥濕

戴云因夢交而出精者謂之夢遺不因夢而自泄精者謂之精滑皆

相火所動久則有虛而無寒也

入方

良姜三下

黃柏二下

芍藥二下

櫻樹根皮一兩

右為末麵糊丸梧子大每服三十丸空心茶湯下

附諸賢論

齊憲

...

七十三

三鄭齋曰：虛遺精滑，人多作腎虛治，而用補腎滋精之藥，不效。殊不知此證多屬脾胃飲酒厚味，痰火濕熱之人，多有之。蓋腎藏精，精之所生，由脾胃飲食化生而輸歸於腎。今脾胃傷於濃厚濕熱，內撥其氣濁而不清，則其所化生之精亦得濁氣。腎主秘藏，陰靜則寧，今所輸之精既有濁氣，則邪火動于腎中，而水不得寧靜，故遺而滑也。此證與白濁同，丹溪論白濁為胃中濁氣下沉滲入膀胱，而云無人知此也。其有色心太重，妄想過用，而致遺滑者，自宜腎治，但兼脾胃者，多要當審察。

附脉理

脉訣舉要白遺精白濁當驗於尺結，孔動脈二證之的。

附諸方

固精丸 治心神不安腎虛白遺精

知丹... 補腎... 固精丸... 治心神不安腎虛白遺精... 方古... 補腎... 固精丸... 治心神不安腎虛白遺精...

知母炒

黃精酒炒各一兩

牡蠣三錢

龍骨一兩

芡實

蓮蓬

茯苓

遠志去心各一兩

方石

山茱萸肉三錢

右為末煮山藥糊為梧子大珠砂為衣服五丸

小兒絲子丸李濟方

治腎氣虛損耳鳴四肢倦怠夜夢遺精

石蓮肉二兩

兔絲子酒焙五兩

白茯苓焙一兩

山藥二兩

兩內粉淨切糖

右為末用山藥糊搜和丸如梧子大每服五十九

空心溫酒送下

下如脚膝無力木爪湯下



感喜丸和濟方

治丈夫元陽虛備精氣不固小便白濁餘淋常流夢寐

多驚頻頻遺泄婦人白濁白帶並皆治之

黃蠟四兩

白茯苓去皮切塊用猪苓一分

二十餘沸取出日晒不固猪苓四兩

同煮

右以茯苓末鑿黃蠟丸如彈子大每丸空心細嚼

連液蒸下以小

便清為度忌米醋只喫糠醋

夢遺

夢遺

山藥

七十四

金鎖正元丹 和濟方 治真氣不足呼吸短氣四肢倦怠脚膝酸疼目暗

耳鳴遺精盜汗一切虛損之証並皆服之

五倍子 八錢 紫巴戟 一兩 補骨脂 酒浸 砂 一錢 龍骨 二錢

肉蓯蓉 洗焙 菟絲子 炒 熟地黃 酒蒸 萆薢 去皮

右為末入研藥勻酒糊丸如梧子每服二十九空心溫酒送下湯任下

玉鎖丹 御藥院方 治精氣虛滑遺泄不禁

龍骨 蓮花蕊 雞頭實 烏梅 等

右為末用熟山藥去皮為膏和丸小豆大服三十九空心米飲下

芡實丸 濟生方 治思慮傷心疲勞傷腎心腎不交經元不固面少顏色

驚悸健忘小便赤澀遺精白濁足脛酸疼耳龍耳目暗

芡實 蒸去 蓮花蕊 二 茯神 去木 山茱萸肉 龍骨 生用

五味子 肉桂子 熟地黃 萆薢 肉蓯蓉 酒浸

牛膠酒浸紫石與各一兩

右為末酒煮山藥糊丸如梧子大每服七十九空心塩湯下

固精丸經騶方治思慮色慾過度損傷心氣遺精盜汗小便頻數

白茯苓去皮秋石各四兩石蓮肉去殼皮炒

水雞頭粉紅花在上結子墜下各二兩

右為末以蒸棗肉杵和丸如梧子大塩湯下三十九温温酒下亦可

小中金丸宣明方治元臟氣虛不足夢寐陰人走失精各一

陽起石研木香研乳香研青鹽各一錢五分骨碎補炒

白龍骨一兩緊者搗碎絹袋盛大豆蒸熟取出焙乾研爛黃狗腎一雙酒一升煮熟切作片子焙

杜仲各半兩去皮生薑炒絲尽茴香炒白茯苓二兩與狗腎同為末

右為末酒麵糊丸如皂角子大每服二九空心温酒下忌房室

葉氏定心湯簡易方理心氣不足榮血衰少精神恍惚夢中失精

卷之十一 七十五

人參 去芦 三兩

白茯苓 去皮 蜜炙

茯神 去木 三兩

厚朴 姜制

川芎

赤石脂 研

白朮 各二兩

紫苑草

防風

甘草 炙 兩

麥門冬 去心 兩半

官桂 半兩

右咬咀每服三錢六一鍾赤小豆七十粒煎六分食後服

金櫻丸 治精滑遺洩及小便後遺瀝

金櫻子

雞頭實 各一兩

白蓮花蕊

龍骨 煨 各半兩

右為末糊丸如梧子大每服七八十九空心塩酒下

白羊肝丸 治遺精

用大半夏八兩剉斤猪苓四兩為末拌炒黃色去猪苓却將半夏為

末用白羊腎兩對云筋膜無灰好酒煮爛搗為泥和半夏末為丸如

梧子大晒乾將楮令末炒熟拌和藥丸安於磁器內密封養藥每服

三十九猪苓煎湯送下

龍骨 治精不禁危急者

龍骨

海裏燒乾為末

靈砂

水磨各一兩

仁

訶子

小者熟灰煨取肉半兩

右為末糯米糊丸如菜豆大每服十五丸加至三十九空心温酒下

臨臥熱水下亦可

館

方

靈砂 二兩

陽起石

火通紅砂仁

訶子肉

各一兩

白茯苓

牡蠣

雌雄各半兩火煨飛

麥門冬

去心二錢半

右為末糯米飯丸空心酒下一十九要通飲葱茶半鍾即行如無陽

起石以龍骨代之亦妙

鹽散

治漏精白濁

鹽

不以多少入磁石器內放黃泥封固煨一日取出鋪陰地一宿

白茯苓

山藥

沙石

右為末入鹽一兩研勻棗肉和蜜丸如梧子大每服三十九空心東

鹽

五十四

湯送下

桑螵蛸散

治小便白濁遺失精

見赤白濁

八物湯

見補損

樗樹根丸

即固腸丸

見婦人

○廣按精猶水也靜則安位動則妄行何以言之左腎所藏者精

真水也右腎所藏者氣也相火也夫夢遺精滑之症蓋由人之思

想過度以動心火心火君火也君火動則相火翕然而動所以激

搏真水而踈泄也其為熱証明矣古方往往以為寒而用熱燥之

藥精薪救火難矣我今但錄其稍可者以為收澁滑脫之用亦所

謂初劑也中病則已不可過服况龍骨最能潤津液若過服之既

年發燥熱之所由也慎之慎之或曰精泄已久則為寒矣古方用

熟原宜以是乎乎曰不然夫精為陰也火為陽也陰精虛而陽火

愈增矣經云陰虛生內熱未云陰虛生內寒也

浙江圖書館

浙
江
圖
書
館
藏
書
目
錄

浙江圖書館



丹溪心法卷之十三

丹溪心法卷之十三

丹溪心法卷之十三

休寧東山古唐方 廣袖之類集

風熱門

斑疹

五十九

圖書館

丹溪心法

○斑屬風熱挾痰而作自裏而發於外通聖散中消息裏微汗散之
 切不可下 內傷斑者胃氣極虛一身火遊行於外所致宜補以降於
 陰証暑例中求之 發症似傷寒者痰熱之病發於外微汗以散之若
 下之非理 疹屬熱與痰在肺清肺六降痰或解散出汗亦有可下者

丹溪

卷之十二

一

一

疹即瘡疹汗之即愈通聖散中消息之 癩疹多屬脾隱隱然在皮

層之間故言癩疹也發則多癩或不仁者是蒸風蒸濕之殊色紅者蒸

火化也 黃瓜水調伏龍肝去紅點斑

戴云斑有色點而無頭粒者是也疹浮小有頭粒者隨出即收收則

又出是也非若斑之無頭粒者當明辨之

附諸方



玄參升麻湯 三白方 治傷寒失下熱毒在胃發疹或汗下吐後餘毒不

散表虛裏實發於外甚則煩躁譫妄

玄參 升麻 甘草 各一分

右以咀每服四錢水一鍾煎七分溫服溫毒發斑亦宜服之

陽毒升麻湯 活人方 治陽毒赤斑狂言咽喉痛出膿血

升麻三分 黃芩 人參

甘草 二分

右吹咀水二鍾煎至一鍾去滓溫服不拘時

梔子仁湯 治人方 治火發斑 煩燥面赤咽痛潮熱

梔子仁 赤芍藥 大青 知母 各一兩 升麻

黃芩 石膏 二兩 甘草 各半兩 杏仁 去皮尖 柴胡 一兩

右吹咀每服四錢姜二片豉百粒水煎溫服

化斑湯 治傷寒汗吐下後斑發麻症

人參 石膏 知母 甘草 守 梔子白朮

一方加玄參

右吹咀時時煎服

黃連橘皮湯 治溫毒發斑

黃連 去毛 陳橘皮 杏仁 去皮尖 枳實 麻黃 去節

黃連 四兩 陳橘皮 四兩 杏仁 四兩 枳實 四兩 麻黃 四兩

葛根 各二兩

厚朴

去麩

甘草

炙各一兩

右咬咀水煎服

調中湯

治內傷外感而發陰症

館

蒼朮

一錢半 陳皮一錢

砂仁

書

藿香

芍藥

甘草

桔梗

半夏

白芷

卷心

枳殼

各一錢 川芎五分

麻黃

桂枝

各五分

右咬咀姜三片水煎服

消毒犀角飲子

牛旁子

六錢

荆芥

防風

各三錢

甘草

一錢

右咬咀水煎服

通聖散

出丹溪經方

川芎

當歸

麻黃

薄荷

薄荷

白芍 石膏 桔梗 附石

荆芥 梔子 白朮 甘草

右對水煎服 如身痠加蒼朮羌活 痰飲加半夏

每服細末三錢生薑三片搗細服之

頭眩 六十一 書

丹溪心法

○頭眩 痰挾氣虛併火 治痰為主 補氣藥及降火藥 無痰不

作眩 痰因火動又有濕痰者有火痰者 濕痰者多宜三陳湯火者

加酒茶挾氣虛者相火也治痰為先 痰氣藥降火藥如東垣半夏白朮

天麻湯之類 眩暈不可當者以大黃酒炒為末茶湯調下 火動其

頭眩 公法精餘卷之十二 三

痰用二陳加黃芩蒼朮羌活散風行濕 左手脈數熱多脈澀有死血

右手脈實有痰積脈大是久病久一 久病之人氣血俱虛而脈大

痰濁不降也 昔有一老婦患赤白帶一年半頭眩坐立不得睡之則

安專治赤白帶帶愈其眩亦安

附脈理

脈訣舉要曰風寒暑濕氣鬱生涎下虛上實皆昏暈而眩風浮寒

濕細暑虛涎弦而滑虛脈則無治眩暈法尤當審諦先理痰

氣次隨證治

附諸方

獨活散 楊氏家方消風化痰治頭目眩暈

細辛去藥 石膏研 甘草炙各 防風去芦 藥本去土

旋覆花 蔓荊子 川芎 獨活去芦各

右為赤每服二錢水一鍾姜二片煎至六分食後服

川芎散 本草方 治風眩頭暈

山藥 甘菊花 入參 茯神

山菜莖肉 館 小川芎

右為末每服二錢酒調不拘時日三服不可候用野菊花

芎朮湯 衛生方 治胃弱中濕眩暈吐逆頭重不食

川芎 半夏 白朮 甘草

右取咀每服四錢水一鍾姜七片煎七分溫服不拘時

芎朮除眩湯 衛生方 治感寒濕頭目眩暈

甘草 川芎 附子 白朮 官桂

右取咀每服三錢姜七片水煎溫服食前

荊黃湯 張子和方 治頭眩

荊黃湯

大黃

荊芥穗

防風

各等分

右為粗末大作劑料水煎去滓服以利為度

芍藥湯 治風寒在腦或感邪濕頭重痛眩暈或倒置不安

並皆治之

川芎

細辛

白朮

甘草

各等分

右以咀每服一兩姜五片茶芽少許水一鐘半煎八分臨臥服

或食後服亦可

頭運方 利頭清氣降火

注

南星

集五分

半夏

一分

桔梗

七分

枳殼

一分

陳皮

一分

厚朴

甘草

三分

茯苓

一分

黃芩

一分

右作一服姜七片水煎服食後

香橘飲 治氣下虛眩暈

木香

白朮

半夏麩

橘皮

蘇枳殼

砂仁 各半兩

丁香

骨草 各二錢五分

右剉散水二鐘姜五片煎服

加當歸川芎官桂治血虛眩暈

白附子丸

治風痰上厥眩暈頭昏

全蝎 炒半兩

白附子 炮

南星 炮

半夏

蘇枳殼

甘菊

天麻

川芎

橘紅

殭蚕 炒

乾姜 炮

右為末生薑半斤取汁和糊丸梧子大煎荊芥湯下五十九

人參前胡湯

治風痰頭暈目眩

半夏麩

木香

枳殼 炒

紫蘇

赤茯苓

南星 炮

甘草 炙各五錢

人參 三錢

前胡

橘紅 各五錢

右剉散每服五錢姜五片煎服

頭眩

...

...

川芎茶調散 治風眩頭痛

見傷風

半夏白朮天麻湯 治頭痛

鳴起散 天全良方 治婦人血風攻腦頭旋悶倒不知人事喝定草即愈

耳草也

右取嫩心不以多少陰乾為末每服一錢酒調下

黑錫丹 治早起眩暈酒食自定以為常此因老痰鬱痰所作必須

此藥劫之

見痰類

○廣按頭眩之症多主於痰無痰則不作眩有因寒痰濕痰者有因

熱痰風痰者有因氣虛痰者有因血虛痰者其証不一也夫

寒痰濕痰作眩或因外感寒濕或因內傷生冷熱痰風痰作眩或

因外感風暑或因內動七情氣虛眩暈或因脾虛不進飲食或胃

胃弱也世為虛症故單用補藥每因血下血女人每因崩中在

後而作也已上數方雖各有所主未能盡其變在智者擴克之也
又嘗論之大咳嗽頭痛頭眩三者乃病之標必治其病之本而病
方已如產後眩暈只補其血如脾虛眩暈只補其氣是治其病之
本也

頭痛

六十一

附眉頭痛

圖

○頭痛多生於痰痛甚者火多有可吐者可下者 清空膏治諸頭痛
除血虛頭痛不可治 出東垣試效方 血虛頭痛自魚尾上攻頭痛用
歸湯古方有追涎藥

附諸論

頭痛

王節齋曰久頭痛病暑感風寒便發寒月須重綿厚帕包裹者此屬暑
熱本熱而標寒世人不識率用辛溫解散之藥暫時得效誤認為暑
殊不知因其本有鬱熱毛竅常疎故風寒易入外寒束其內熱閉逆
而為痛辛熱之藥雖能開通閉逆散其標之寒邪然以熱濟熱病本
益深惡寒愈甚矣唯當瀉火涼血為主而佐以辛溫散表之劑以從
治法治之則病可愈而根可除也圖

辨症

脈訣專要曰頭痛陽弦浮風緊寒風熱洪數濕細而堅氣虛頭有雜症
必清痰厥則滑腎厥堅實

頭痛治例

浙

心法附錄曰頭痛須用川芎知不愈者加引經藥
太陽川芎

少陽柴胡 太陰蒼朮 少陰細辛 厥陰吳茱萸

如病人頭痛是濕痰所致宜用一頁各藥水

如肥人頭痛是濕痰宜丁夏蒼朮

如瘦人頭痛是熱宜酒製黃芩防風

如感冒頭痛宜防風羌活蒼朮白芷

如風熱在上頭痛宜天麻薄荷石膏酒製黃芩

如白人頭痛是氣虛宜黃芪酒洗生地黃南星秘藏製神湯

如形瘦蒼黑之人頭痛乃是血虛宜當歸川芎酒黃芩之類

如苦頭痛用細辛

如頂顛痛宜導本防風柴胡東垣云頂顛痛須用導本去川芎

且如太陽頭痛惡風脈浮際川芎羌活獨活麻黃之類為主

少陽頭痛脈弦細往來寒熱柴胡為主

陽明頭痛自汗發熱惡寒脈浮緩長實升麻葛根石膏白芷為主

太陰頭痛必有痰體重或腹痛脈沉緩以蒼朮半夏南星為主

頭痛

頭痛

二

△

少陰頭痛是寒氣逆為寒厥其脈沉細麻黃附子細辛為主

厥陰頭痛或吐痰沫厥冷其脈浮緩以吳茱萸湯主之

血虛頭痛當歸川芎為主

氣虛頭痛人參黃芪為主

氣血俱虛頭痛調中益氣湯內加川芎三分蔓荊子三分細辛二分

其效如神

又有痰厥頭痛所感不一一天知方者體也法者用也徒知體而不

用者弊體用不失可謂上工矣

加減三五七散和劑方治八風

五痺肢體不仁大治風寒入肌陽虛

痛畏聞人聲目旋運轉耳內

蟬鳴應有濕痺脚氣緩弱並皆治之

山茱萸

去核

細辛

兩

乾姜

三

防風

五

茯苓

三

右為綱家要法溫酒食送服

附子 三箇 法皮脐

右為細末每服温酒食前調服

川芎茶調散 治諸風上攻頭自偏正頭痛 見傷風

都梁丸 和劑方 治風吹項背頭自昏眩以及腦痛婦人產前產後傷風

頭痛

香白芷 揀大者沸湯洗五次則乾

右為末煉蜜為丸如彈子大每服可丸細嚼用荆芥湯下

小芎辛湯 清生方 治風寒在腦頭痛眩暈嘔吐不已

川芎 一兩 細辛 洗去上 白木 洗去 甘草 炙各半兩

右以咀每服四錢水一盞姜五片茶芽少許煎服

一萬 治傷風感風一切頭痛

甘菊 一兩 細辛 半兩 甘草 七片 白芷 半兩 香附子

頭痛

治頭痛

八

羌活

薄荷

荆芥

茵陳

蒼朮

川芎

右為末每服二錢茶清調下婦人產後當歸石膏末調下

定風餅子秘方治偏正頭痛

草烏頭

半兩

香白芷

一兩

川芎

二兩

防風

一兩

天麻

甘草

各一兩

細辛

半兩

圖

右為末姜汁丸如龍眼大捏作餅子每服一餅食後茶湯下

川芎丸

聖惠方

消風

化痰

証

利咽

膈清

頭目

旋暈

心忪

煩熱

急肩背拘蹇肢體煩疼皮膚

瘙癢

腦昏目

疾鼻

塞聲

重面上

遊風

川芎

薄荷

各七兩

甘草

各一兩

細辛

一兩

防風

各二兩

五兩

桔梗

十兩

右為末煉蜜丸每兩半作一丸下丸每服一丸細嚼茶清食後臨卧時

三芎餅子 濟生方

川芎

撫芎

乾姜

甘草

葉本

天南星 炮去皮

防風 去蘆

白朮 各等分

一方有蒼耳無白朮

右為末姜汁蒸餅為劑如鷄頭天捏作餅每服五錢餅細嚼茶清下
微清膏

蔓荆子

細辛 各一分

薄荷葉

川芎

生甘草

炙甘草 各五分

葉本 一錢

右為末茶清調下二錢

神靈散 治偏正頭疼眼疼不止及破傷風等疾

煇硝 一兩

黃丹

雄黃 各三錢

沒藥

乳香 各二錢

右為細末令患人口噙溫水用竹筒吹藥入鼻中少許

更痛

心去付餘卷五十二

一方 治偏頭疼以雄黃細辛等分研末每服一字左邊疼吹右鼻內
右邊疼吹左鼻內

○已上諸方辛温外散風寒之劑

天麻散

治頭項痛頭面腫拘急風傷衛發躁熱方見風熱

生朱丹

治諸風痰盛頭目眩氣鬱積滯胸膈不利

朱砂

二兩二錢半

龍腦一錢

白附子

炮去皮

石膏

燒通紅令

石為末燒粟米飯為丸如小豆大硃砂為衣每服二十九食後茶下

任下

天川芎丸

治首風暈眩外合陽氣風寒相搏胃膈痰飲偏正頭疼

芎藭

天麻

治諸風痰盛頭目眩氣鬱積滯胸膈不利

清散... 治因風頭痛... 胃眼俱痛不可忍者

川芎

鬱金

芍藥

荆芥穗

薄荷

芒硝 各二錢半

乳香

沒藥 各半錢

腦子 二分

右為末每服一字鼻內吹之

館

菊花散

和劑方

治風熱上攻

頭痛不止

石膏

甘菊花

防風

旋覆花

蔓荆子

甘草

羌活

右用水二盞生薑五葉... 大祖溫服

芎芷散 直搗方

治風寒頭

王

川芎

白芷

荆芥穗

欒石膏

右為末每服一錢食後沸湯調服

川芎散 直搗方 治偏頭高

頭痛

...

...

...

甘菊花 石膏

川芎

右為細末每服一錢茶清調下一方有白姜茶六錢生用

石膏散按辨方治頭痛不可忍

麻黃去根 石膏

白首烏字前乾姜

右為細末每服三錢茶清服

煎頭散惠方治偏正頭痛



川芎生二

香附子去心

右為末每服一錢好茶調下常服除根

方 治頭痛去風痰

南星一箇大 皂角生七錢

白梅一箇

姜三片

牙茶一撮

葱頭一箇

右將前藥與三石炭為末每服一錢茶清服不可忍

牙茶一撮
葱頭一兩

一方 治頭痛連眼痛 此風痰上攻須用白芷關之

兩前茶

川芎

白芷

防風

藁本

細辛

當歸

館

右用水煎服

川芎散 聖惠方治頭風偏正頭痛

書

羌活

細辛

川芎

香附子

槐花

甘草 炙

石膏

荆芥穗

薄荷

菊花

茵陳

防風 各一兩

右為末每服二錢茶清調食後服忌動風物

○巴上諸方辛平外散風寒內消風熱之劑

清空膏 治偏正頭痛年深不愈者又治風濕熱頭上壅及腦痛除血

頭痛

治頭痛年深不愈者

壅

及

虛頭痛不治餘皆治之

川芎 五錢

柴胡 七錢

黃連 酒炒

防風

羌活 各一兩

炙甘草

一兩

細挺子黃芩

三兩

酒製

半斤

炒

右為末每服二錢熱酒內入茶少許湯調如膏抹在口內少用白湯

送下臨臥如苦頭痛每服加細辛二分痰厥頭痛脈緩或羌活

防風川芎甘草加半夏一兩五錢面如偏正頭痛服之不愈或羌活

防風川芎一半加柴胡一倍如發熱惡熱而渴此陽明頭痛只與

白虎湯加吳白芷 白虎湯方見溫熱類

靈砂丹

御藥院方

治風熱鬱結氣血滯頭目昏眩鼻塞聲重鼻流清

涕口苦舌乾咽嗑不利胸膈痞悶咳嗽痰實腸胃燥澀小便赤黃或

腎水陰虛心火熾甚及偏正頭疼髮落牙痛遍身麻木疥癬瘡瘍一

切風熱並皆治之

天麻

獨活

地龍

細辛

石膏

防風

連翹

薄荷

川芎

磁子

芍藥

荆芥穗

當歸

黃芩

大黃

全蝎

菊花

人參

白木

硃砂

寒水石

桔梗

宿砂

生甘草

滑石

右為末煉蜜丸每兩作十五丸硃砂為衣每服一丸細嚼茶清送下

真珠散 聖惠方 治偏正頭瘧頭風

盆硝

白滑石

乳香

片腦

右研細用一字口噲水噲鼻內

豆粉丸 聖惠方 治風熱頭疼

川芎

細辛

甘草

白芷

薄荷

石膏

朴硝

頭痛

法附命卷之十二

十二

一

豆粉

各二錢半

各半

二錢

各半

各半

各半

右為細末煉蜜和丸如彈子大石膏末為衣每服一丸細嚼茶清下
川芎散 聖惠方治風盛腦 鑿鼻寒清涕熱氣攻眼淚多眇齒間緊急
作偏頭痛

川芎

柴胡

半夏麩

甘草 多

甘菊花

細辛

人參

前胡

防風 各半

右咬咀每服八錢水一盞半生薑四片薄荷少許煎至八分溫服

安神湯 聖惠方治頭痛 眩暈眼黑

羌活

黃蘗

防風 各一兩

柴胡

升麻

知母

酒浸

生地黃

各半兩

黃耆

三兩

生甘草

二兩

加蔓荊子

半錢

川芎

三分

炙甘草

三錢

右咬咀每服八錢水一盞半煎至八分去渣溫服食後

治頭痛

右吹咀每服八錢水一盞半煎至八分去茶溫服食後

治頭痛如破

酒炒大黃半兩一半茶煎

○已上諸方辛涼內消風熱之劑

定風餅子

治風寒客於陽經邪傷腠理背脊強直言語蹇澁熱惡

寒痰厥頭痛肉瞤筋惕手顫鼻淵

方見傷風

如聖餅子和劑

治風寒伏留陽經氣厥痰飲一切頭痛

防風

天麻各半兩

南星洗

乾姜

川芎

甘草

川烏各一兩

半夏生半兩

右為末水丸作餅子每五餅同煎茶酒下澹寮方加細辛

三生丸

濟生方

治痰厥頭痛

頭痛

法附錄卷之三

十一

半夏

口附子

天南星

各等分

右為末生薑自然汁浸蒸餅為丸如菉豆大每服四十九食前姜湯

米飲任下

天香散 簡陽方 治年久頭風頭痛不得愈者

天南星

上夏

湯洗去滑

川烏

去

白芷

各等分

右咬咀每服四錢水一盞煎一半入姜汁半盞煎六分温服

九龍丸 重德方 治如女人般頭風一切頭痛

川芎

石膏

白芷

川烏頭

半夏

南星

各等分

加細辛

金錫

各二錢半

右為末薑汁為丸如梧桐子大每服五十九茶清送下

不卧散 治頭痛不可忍者

玄明膏

七枚

白芷

二錢

猪牙皂角

肥實者刮去

二兩

用竹管送入男左女右鼻中... 酸令病者坐却令...

右為末用水調丸成小餅子如杏仁大用時令病者仰臥以水化服
用竹管送入男左女右鼻中藥味至喉少酸令病者坐却令咬
銅錢一箇於當門齒上當見涎出成盆即愈

玉真丸 濟生方 治腎厥頭痛不可忍其脈舉之則弦按之則堅

生硫黃 二兩 石膏 硬者不燥

半夏 湯洗七次

硝石 別研各一兩

右為末研勻用生姜汁煮糊丸如梧子大每服四十九食前姜湯
飲任下虛寒甚者去石膏用鍾乳粉一兩

芎藭散 治氣厥頭痛因氣所觸心腹脹滿嘔吐酸水頭目昏眩

川芎

天台烏藥 各等分

右為細末每服二錢臘茶清調服

芎藭湯 三因方 治着濕頭痛身重眩暈痛極

附子 生去皮臍半兩

白朮

川芎

桂心 各二錢半

甘草 半斤

頭痛

治着濕頭痛

附子

石吹咀每服四錢水一盞姜七片棗子一箇煎食前服

○已上諸方治痰厥腎厥着濕之劑

順氣和中湯 治氣虛頭痛紫蘇升陽補氣頭痛自愈

黃芪半錢 人參一錢 甘草炙七 白朮 陳皮

當歸各五 升麻各三 柴胡各三 細辛

蔓荊子 川芎各二 圖

右作一服水煎食後服 亦治氣血俱虛頭痛

半夏白朮天麻湯 治脾胃証已經服疎風丸下二三次元証不瘳增

以吐逆痰唾稠粘眼黑頭旋目不敢開頭苦痛如裂四肢厥冷不得

安卧此氣虛頭痛也

黃柏二分 乾姜三分 澤瀉 白茯苓 天麻

黃芪 人參 蒼朮各三 炒神麩 白朮各

麥芽

半夏

陳

戰

右每服五錢水煎熱服

芎歸湯 治血虛頭痛

川芎

當歸

右每服五錢水煎服

四神散 大全良方 治婦人血風眩暈頭痛

菊花

當歸

旋覆花

荆芥穗

右等分為細末每服二錢葱白三寸茶末二錢水一盞半煎至八分

去滓食後溫服

調中益氣湯 治氣血俱虛頭痛

內加川芎三分蔓荊子三分無名異二分 方見脾胃

○已上諸方治氣虛血虛之劑

頭痛

丹溪心法

○肩痛屬風熱與痰 作風痰治 痛風

入方

黃芩酒浸

白芷

右為末茶清調二錢

又方

川烏

草烏二味為君童便浸炒去毒

細辛

羌活

黃芩

甘草護粉

右為細末茶清調服 一本加南星

選奇方

治肩骨痛不可忍大有效

方風

各一

甘草

夏月

浙江圖書館

酒黃芩

一錢冬月不用有熱者用

右每服三錢水煎食後溫服水二鍾煎七分

上清散 治因風頭痛眉骨眼疔真痛不可忍

一方 治頭痛連眼痛 俱現頭痛

頭風

書

圖

丹溪心法

○屬痰者多 有熱有風有血虛 在左屬風薄荷荆芥屬血虛川芎

當歸 在右屬痰蒼朮半夏屬熱酒芍為主又屬濕痰川芎南星蒼朮

偏頭風在左而屬風者用荆芥薄荷此二味即是治之生藥有君臣

佐使之分凡主病者為君而多臣次之佐又次之須要察其兼見何症而

佐使之如有痰即以二陳湯治痰而佐之他症皆倣此又須察絀病情全在治法出入加減不可執方

入方

酒片苓 三 水 蒼朮 二 水 半 羌活 三 水 防風 各五 水 細辛 二 水

蒼耳 三 水

右為末每服三錢生薑一大片同搗勻茶湯盪起服之

入方

酒片苓 三 水 蒼朮 二 水 半 羌活 三 水 蒼耳 三 水 川芎 三 水

生甘草 二 水 酒黃連 各一 水 半 半夏 三 水 二

右為末服法同前

瘦人搗藥

欬石膏 升麻 各五 水 鱉甲 煎茶 檀香皮

薄苛 白芷

右為末搗鼻內

頭痒風屑髮黃

用大黃酒浸炒為末茶調服

一粒金搗鼻方 治偏頭風

藥本

玄胡索

皂莢

川芎

青黛 各一兩

草撥

不以多炒研如月夜

方為末入製草撥末一兩半用無根水丸每服一粒長流水化開

鼻以銅錢二三文口咬是出涎

治頭風

烏頭尖 七箇 刺芥

防風 酒

甘草

蔓刺子

合芎

桔梗

麻黃

右為末茶調

一人頭風鼻塞

南星

茶末

酒茶

辛夷

川芎

右為末茶調

附諸方

川芎散 治偏頭痛頭風神效

甘菊花

石膏

川芎

右為末每服一錢茶清調下一方有台參六錢生用

消風散 和劑方 治諸風上攻頭目昏眩偏正頭風及婦人頭皮腫痒並

皆治之

川芎茶調散 治諸風上攻頭目昏眩偏正頭風及婦人頭皮腫痒並

治諸風頭目昏眩偏正頭風及婦人頭皮腫痒並

菊花

川芎

茶末

酒茶

辛夷

白芷

羌活

獨活

秦艽

防風

菊花

川芎

荊芥穗

羌活

甘草

白芷

各二兩

細辛

一兩

防風

去芦

蟬蛻

僵蚕

薄荷

各五錢

右為末每服二錢食後用茶清調下

芎辛湯 治膈痰風厥頭目昏疼鼻塞聲重肩背拘急

川芎

五錢

細辛

三錢

甘草

炙一兩

右用水煎食後服

一方 治一切頭風

用猪牙皂角炮玄胡索各一錢青黛半錢為末滴水為丸如梧子大

攪作餅子晒乾每用一餅新水化開男左女右仰面以蘆筒鼻內灌

之口咬銅錢一十五文其涎便出更不再發亦治痰疾妙

一方

頭風

本草綱目卷之十二

大

二

天麻

防風

川芎等分

右為末每服二錢溫酒食後調下以豆豉湯洗頭避風即愈

一方 治偏頭風

用華撥為末令患者口中人口不知左邊痛左鼻吸一字右邊痛右鼻

吸一字甚效

金花一聖散 治頭風

川芎

川芎

白芷 各等分

右為末每服二錢生葱三六薄餅藥三四皮同煎食後服

灸法

宜灸顙會百會前頂上等穴

眼目

丹溪心法

○眼黑睛有翳皆用知母黃柏 眼睛疼知母黃柏瀉腎火當歸養陰

水 眼中風淚出食後吞龍膏九數粒日三次 冬月眼暴發翳亦當

解散不宜用涼藥

入方

神效七寶膏 治暴發眼熱壅有翳膜者

麩仁去油 白鵬砂 片腦 硃砂

右用蜜調成膏點眼

爛眶眼

薄荷 荆芥 細辛 浙

右為粗末如燒香狀燒之以青碗塗去蜜少許於內覆香烟上取烟盡

眼目 卷之十二 十九

之後以小青罐收烟藏之凡眼有風熱多淚者皆可點此是陽明經有風熱所致

生熟地黃丸 活血虛眼 見後

龍會丸 見勝痛

一人病眼至春夏便當依醫治

黃芩 酒浸

南星 姜製

香附 童便浸

蒼朮 童便浸 各二兩

道莒 酒浸 一兩半

山梔 炒一兩

龍膽草 酒浸

陳皮

連翹

蘿蔔子 蒸

青黛 各半兩

柴胡 三升

左為末 神麩糊丸

附諸賢論

浙江圖書館

王龍齋曰眼赤腫痛宜方用藥內外不同在內湯散用苦寒辛涼之藥以散其邪故點藥莫要於必為其火在外點洗則用辛熱辛涼之藥以散其邪故點藥莫要於

冰片而冰片大辛熱以其辛性甚故借以拔火邪而散其熱氣
方用燒酒洗眼或用乾姜末生薑汁點眼者皆此意也蓋赤眼是火
邪內炎上攻於目故內治用苦寒之藥是治其本如鍋底之去薪也
然火邪既客於目從內出外若外用寒涼以阻逆之則鬱火內攻不
得散矣故點藥用平熱而洗眼用熱湯是火鬱則發因而散之從治
法也世人不知冰片為劫藥而誤認為藥常用點眼遂致積熱入目
而昏暗瘴翳故云眼不點不瞎者此也又不知外治忌寒涼而要將
冷水冷物冷藥搥洗當致目瞎者有之

附諸方

明目流氣飲和劑方治肝經不足內生風熱上攻眼目視物不明官見
黑花當風多淚癢澁難開或生障翳婦人血風時行暴赤一切眼疾
並皆治之

大黃

牛蒡子

川芎

菊花

白芷

細辛

防風

玄參

山梔子

黃芩

甘草

蔓荊子

荆芥

木賊

草決明

蒼朮

右為末

每服二錢臨臥用冷酒調下

洗心散

和劑方

治風痰壅滿心經積熱邪氣上衝眼眩睛痛或腫或赤

迎風多淚怕日羞明並皆治之

和劑方

治風毒攻上暴赤赤腫癢癢濕多淚

方見大類

洗肝散

和劑方

治風毒攻上暴赤赤腫癢癢濕多淚

薄荷

當歸

羌活

防風

川芎

甘草

大黃

赤芍

右為末每服三錢食後以熱水調下

蜜蒙花散

和劑方

治風氣攻注兩眼赤腫多淚羞明并暴赤

五决月用... 蜜蒙花散... 治風氣攻注兩眼赤腫多淚羞明并暴赤

蜜蒙花

桂枝

羌活

木賊

菊花

菊花

石决明

用塩同煮 研粉等分

右為末每服一匙 鹽茶清食後調下

撥垂散

和神方

治男子婦人風熱攻眼目昏暗翳膜遮睛怕日羞

明一切風毒眼疾並皆治之

羌活

防風

柴胡

甘草

右為末每服二錢水一鍾煎服食後薄荷湯調茶并菊花苗煎湯

皆可服忌諸毒物

蠲花散

和神方

治肝經蘊熱毒氣上攻眼目赤腫多淚蓋明一切風

毒并宜服之

穀精草

去土

菊花

去梗

蟬脫

去土

羌活

甘草

白蒺藜

炒去刺

草决明

防風

去土

山梔子

去殼

川芎

不見火

本草綱目

卷之二十一

二十一

蜜蒙花去核 荆芥穗去梗 黃芩去土 蔓刺子法反 木賊法等各

右為末每服二錢食後用茶清調服或荆芥湯調亦可

菊花散和劑方 治肝生風毒眼目赤腫昏暗羞明多淚流痛

菊花去梗 羌活去土 白蒺藜炒去 木賊去角各 蔓刺子法反

右為末每服二錢食後茶清調下

四生散 治肝腎風毒上攻眼赤痒痛不時羞明一方見風

弓窮丸御藥院方 治遠視不明常見黑花久服明目

芎藭 菊花 荆芥 薄荷 甘草各一兩

蒼朮二兩米

右為末煉蜜丸如梧子大每服五十九食後茶清下

荆芥散三因方 治肝經蘊熱眼目赤腫

荆芥穗 當歸 赤芍藥 黃連一兩

右改單每服三錢水一鍾煎三沸濾去滓溫服或洗

子全神麴丸 三日方明眼目 一日歲可讀細書常服有效

神麴 四兩 光明硃砂 二兩 醋重

右為末煉蜜丸如梧子大每服九食後茶飲下

黃連丸 本傳方 治肝經風熱上攻眼目 澀痛不可用藥捕者

乾熟地黄 黃連 决明子 沒藥 光明硃砂

甘菊花 防風 羌活 桂心 各半兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服三十九食後熟水下

决明子散 治風毒上攻眼目腫痛或卒生翳膜或赤澀腐肉或

痒或痛羞明多淚

黃芩 甘菊花 决明子 石膏

赤芍藥 川芎 川羌活 甘草 蔓荊子

石决明

右為末每服三錢水一鍾姜

草龍膽散聖德方治風毒熱氣

迎風有淚翳膜攀睛胬肉癢

龍膽草洗去菊花去核

香附子炒去川芎不見火

一右為末每服三錢用麥門冬汁

亦得

又方和劑方治眼目暴赤腫痛

瘀肉侵睛時多熱淚及因忿怒

澀痛致成內外障翳等疾

平煎至六分食後服

攻衝眼目暴赤發澀羞明及腫痛多眵

痛

草决明微炒甘草炙

勿入沙糖少許調服食後或茶清調下

風毒熱氣上衝睛赤連眶臉昏赤爛

逆損肝氣久勞瞻視風沙塵土入眼

今

菊花去核赤芍藥八兩

龍膽草炒去麥門冬炒去

眵音脂

防風

甘草

羌活

各三四

右用為末温酒調二錢食後服

散熱飲子

按辨方

治眼暴赤暴腫

防風

羌活

黃芩

黃連

右等分水一鍾半煎八分去滓温服食後如大便秘加六黃一兩痛

甚加當歸地黃各一兩如煩燥不眠加梔子一兩

○已上諸方散風熱之劑

石膏羌活散

宣明方

治久患雙目不視光明遠年近日內外氣障風翳

暗拳毛倒睫一切眼疾

羌活

治翳熱

蜜蒙花

治羞明怕日

木賊

退翳障

香白芷

清熱明目

乾菜子

細辛

二味起

蘇子

起拳毛

川芎

治頭風

蒼朮

行氣

甘菊花

明目

荆芥穗

治目中

石膏

黃芩

二味洗

葉本

治偏正

甘草

藥

眼目

本草綱目卷之二十一

二十一

右為末每服一錢至二錢食後臨卧用蜜水一盞調下或茶清亦可
日進三服至十日漸明至二十日大驗此方醫數十餘人矣 後人
加當歸枸杞子梔子仁連翹胡薄荷葉防風天麻桔梗各等分
花無名散手到方治大人小兒風癩傷肝或為氣攻一切眼目昏
漸生翳膜及久患頭風牽搐兩眼漸漸細小連眶赤爛小兒瘡疥久
眼白膜遮睛赤溢癢痛並治

圖

茯苓

甘草

防風

川芎

羌活

當歸

洗炮各三兩

赤芍藥

十五兩

羌活

天一兩

薄荷

去其皮

連翹

去頭風二兩

石决明

原置水裏研如高粉

蒼朮

去皮炒

右為末每服三錢食後米酒調服茶清亦可忌毒食

明眼地黃丸

手到方

治男子婦人肝虛熱積上攻眼目昏膜遮睛羞淚

多淚此藥多治肝腎兩經俱虛風邪所乘并治暴赤熱眼

石斛 生地黄 熟地黄 防风

杏仁 去皮尖炒 枳殼 去白剋炒

右為末煉蜜丸如梧子大每服三十丸食前盪湯溫酒任下

羊肝丸 清生方 治肝經有熱目赤睛疼視物昏澁

羊肝 一具 生用 黃連 去頭另 研為末

右先將羊肝去筋膜於沙盆內搗爛入黃連末杵和丸如梧子大每

服五十九丸熟水送下利濟方用白羊子肝

上清丸 秘方 治風熱上壅眼目昏花迎風冷淚羞明赤爛

羚羊角 犀角 黃連 厚朴 各一兩 半黃

黃芩 川芎 羌活 蟬退 白芷

菊花 大黃 防風 草決明 地膚子

滑石 各五錢 生地黄 熟地黄 各七錢 牽牛 八錢半

明目 卷之十一 二十四

右為末煉蜜丸如梧子大每服三五十九茶清下食後

杞苓丸 曾氏家傳 專治男子腎臟虛耗水不上奔眼目昏暗遠視不

明漸成內障

白茯苓 去皮 真枸杞 酒浸 當歸 酒洗 青益 研 兔絲子 酒洗

右為末煉蜜丸如梧子大每服七十丸食前熟湯下

導赤散 曾氏家傳 治心臟積熱上攻眼目兩背浮腫血復白睛羞明洒

淚一切治之

牛蒡子 炒 榆子 槐子 炒 生乾地黄 黃芩 各等分

右為末每服二錢食後麥門冬湯調下

早前散 曾氏家傳 肝經積熱上攻眼目逆順生翳血灌瞳人羞明多淚

蜜蒙花 去炒 甘菊花 去炒 白蒺藜 炒 羌活 粉草

草决明 早前子 各炒 黃芩 龍膽草 炒

右為末每服二錢食後飯湯調下

右為末每服二錢食後飯湯調下

五味子丸 曾氏家傳 治心肝二經蘊結以風邪并腎臟虛耗眼目昏暗或

生醫膜

何膠 蛤粉炒

熟地黃 各一兩 白茯苓

麥門冬 各一兩 藥

五味子

杜仲 去皮姜汁炒 斷絲各二兩

貝母 炒

栝子仁

茯苓 去木

遠志 去心 人參

百部

防風 去蘆各

右為末煉蜜丸如彈子食前姜湯調下一丸

蔓荊湯 聖惠方 治勞役飲食不節內障眼疾此方立效

黃耆

人參 各一兩

蔓荊子 二錢

甘草 炙

白芍藥 二兩

黃柏 三錢酒浸

右以咀每服五錢水二盞食後臨臥溫服

助陽和血補氣陽衛生寶鑑 治眼發後上熱白睛紅多淚淚無寒癢而

眼目

三才參卷之十二

二十五

癰澁難開此服苦寒藥太過而真氣不能通九竅故眼昏花不明宜助陽和血補氣

防風 七分 黃耆 二錢 甘草 炙 一錢 蔓荊子 一錢 當歸 身 一錢

白芷 五分 升麻 一錢 柴胡 各五分

右吹咀作一服水一鍾半煎一鍾臨臥通口服忌風寒及食冷物

地黃湯 按科方治眼久病昏澁因發而久不愈者

防風 羌活 黃芩 黃連 地黃

當歸 人參 茯苓

右等分爲粗末水一鍾半煎八分食後臨臥通口服

白物龍膽湯 按科方治目赤昏翳發作雲翳將疼痛不可忍者

當歸 川芎 芍藥 地黃 各伍錢 羌活 三錢

車龍膽 二錢 防風 三錢 防已 二錢

右吹咀每服八錢水一鍾半煎八分食後通口服

右以咀每服八錢水一鍾半煎八分食後通口服

○已上諸方散風熱兼補虛之劑

菊精丸 和劑方 治肝腎不足眼目昏暗常見黑花多有冷淚

枸杞子 三兩 菘蓉 酒浸炒 甘菊花 四兩 巴戟天 去心

楊氏家藏方加五味子 三兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服五十九丸食後溫酒鹽湯下

加減駐景丸 簡易方 治肝腎氣虛兩眼昏暗視物不見

車前子 炒一兩 熟地黄 洗 當歸身 各伍錢 五味子 枸杞子 各一兩

兔絲子 酒製 楮實子 無膠膜 川椒 炒出火毒

右為末蜜糊丸如梧子大每三十九丸溫酒鹽湯下食前

養肝丸 濟生方 治肝氣不足眼目昏花或生眵淚

當歸 酒浸 車前子 酒蒸 防風 去芦 白芍藥 薤仁 另研

熟地黄 酒蒸 川芎

楮實 各等分

右為末煉蜜丸如梧子大每服七十九熟水下不拘時

生熟地黃丸 治血虛陰虛眼目昏花

生糸 熟糸 玄參 金釵石斛 各四兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服五十九空心服

東垣熟乾地黃丸 治血少神勞氣弱虛眼目昏黑

熟地黄 一兩 生地黃 一兩 禁胡 八錢 天門冬 甘草 炙

枳殼 地骨皮 黃連 五味子 各三錢 人參 二錢

當歸身 酒浸 黃芩 各五錢

右為末煉蜜丸如棗豆大每服五十九熟水下

○已上諸方補虛之劑

去翳膜明眼目

用生絹五兩取直白如雪者置銅金銀鍋子內以新水浸及

用芒硝五兩取真白如雪者置銷金銀鍋子內以新布蓋及用
火用一小磚火內放先燒磚熱然後下藥在鍋磚上四面有火慢慢
熬溶良久鍋內有聲先去頂上火并瓦鍋中覘未沸顯清明汁以鉄
鉗鉗出鍋傾藥汁在別器中凝滲如五色者方好研如極細入龍腦
各等分用點退下翳或吹入鼻中並有神效

黃連膏

宣明方

治一切眼目瘵肉攀睛風痒淚落不止

黃連

半斤

白丁香

五升水

一煎淘

攪細用

朴硝

一斗以水半煎

右取水入硝香釜內熬至七分淘出令經宿水面浮牙者取出控乾
以紙袋子盛風中懸至風化將黃連細末熬清汁懸乾硝用猪羊膽
和加蜜點之效矣

撥雲散

秘方

點眼中有翳雲膜遮障近日癢痛眼不可點

硃砂

去換石

鵬砂

水飛

黃丹

水飛

青鹽

盆硝

盆硝

盆硝

硃砂

鵬砂

黃丹

青鹽

盆硝

盆硝

盆硝

盆硝

盆硝

盆硝

盆硝

盆硝

靈石 一斤煨七次入童子小便
輕粉 一斤

麝仁 六十箇去皮用白
黃色者不用

右為極細末研無聲為度忌鷄魚一切辛熱之物

碧霞丹 宣明方 點一切惡眼風赤者

龍腦 麝香 硃砂各二錢 沒藥 血竭

乳香 銅青各一錢 鴨砂二錢

右為末滴水和丸如梧子大每服一九新汲水化開點之立效

撥雲膏 秘方

礞石 黃丹 一兩 川烏 七錢半 犀角 乳香

沒藥 硃砂 輕粉 各一錢 青鹽 血竭

片腦 麝香 麝仁 各七錢 當歸 二錢半 黃連 一錢

蜜一斤 銅絲 麝香

右件諸藥各如法研細用白沙蜜十五兩溫火初沸下黃丹二沸下

右件脩合各如法研細用白沙蜜十五兩温火初沸下黃丹二沸下

爐甘石二沸下諸藥不粘手為度用磁盞內熱水泡開熟點不拘時

捲簾散 楊氏家藏方 治火新痛眼昏澀難開翳膜遮睛或成胬肉或

暴發赤腫疼痛並皆治之

爐甘石 四兩 黃連 六錢 抄碎用水一鉢 朴硝 五錢

已上先將爐甘石末入井鍋內開口煨令外有霞色為度次將入黃

連朴硝水中浸飛過候乾又入黃連半盞不飛過再候乾次入

白礬 二錢 賦粉 一錢 黃連末 半兩 青鹽

膽礬 各七錢 丁香 另研 乳香 另研 鉛白霜 各一 銅錢 七枚

硃砂 另研

右為末同前件藥和合令勻每用少許點眼

○已上諸方點攀睛赤肉之劑

醫目 卷之二十一

黃連散 楊大參方 治肝受風熱眼眩赤爛

乳香 一錢半 黃連 去須 荆芥 六分 燈心 一百莖

右艾咀每用二錢水二鍾煎一鍾濾去粗煎洗

光明湯 治一切暴眼

白礬 一字 銅綠 一錢 杏仁 各一分 守草 各一分 乾姜 三分

右件用生絹袋盛貯頓放於磁器內以沸湯浸用紙封蓋定待冷臨

臥洗之

既眼湯 治暴赤眼

黃連 各一錢 上亦為藥 防風 各半錢 杏仁 四箇 去

右用水半鍾將小孩乳汁少許蒸盡之澄清點洗不拘時

消毒散 治眼赤腫夜痛不定兼治瘡腫不消

大黃 生 五錢 黃芩 今 黃柏 一兩

右為末每用生蜜水調敷如糊攤在緋絹視子生隨即赤左右貼於

右為末每用生蜜水調塗如糊難在緋絹花子上隨目赤左右貼於
太陽穴如乾用溫水頻潤

五黃膏 御藥院方 治目赤

黃栢 一兩
黃連
黃芩
黃丹
大黃 各半

右為細末每一錢蜜水調成膏攤緋絹上隨左右眼赤貼於太陽穴

赤眼方 秘方

鷄爪黃連 銅綠 半餅 大艾葉

右將黃連銅綠研末用淨水調膏攤於磁器內却將艾揉軟為丸

燒艾炮黑盞內藥丸用沸湯泡淨以銀簪蘸藥點之

爐甘石散 海上方 治一切目疾不問得病之因悉治之

爐甘石 真者半斤用黃連四兩對如豆大於銀石器中
用水二碗煮二次再揀去黃連取出并石細研

片腦 研

右二味同研勻每用半字白湯泡時時洗之點亦可

又方

爐甘石

半兩飛三次去砂石另研細

硃砂

白礬

腦子

各半

麝香

少許

右為極細末用沸湯泡點洗俱可

乳香散 治眼赤腫疼痛不可忍

麝香

二錢半

益硝

黃連

各二錢

雄黃

乳香

沒藥

片腦

各半

右為末鼻內搽少許點亦可

復明膏 點遠年近日雜患眼目金花

黃連

一斤洗淨

當歸

一斤洗淨

柯子

三兩

黃柏

三兩去粗皮

右四味用酒浸水天桶磁器內浸十五日入銅鍋內熬至乾半湯濾去

右四味用膠水一六桶磁器內浸十五日入銅鍋內熬至乾半湯濾去
 滓爐甘石半斤桑柴火煨七次用前藥四味汁煎七次如鷄子黃色
 為用研極細末水飛過鵝梨子五箇搗爛用生絹袋濾去滓黃丹
 半斤水飛過去為用蜜一斤半水二升半葱一把熬水盡去滓猪胰
 子十五箇擇淨脂油用擇草擗一大把同搗爛泥生絹袋濾去滓再
 過一次同前藥汁下入銅鍋內煎熬成稀膏下後六味

青鹽
 盆硝各一兩
 銅絲
 硃砂
 鵬砂

熊膽各五錢

右為極細末入鍋再熬一時欲成稠膏子下後四味

麝香三錢水研細
 龍腦
 輕粉
 粉霜各三錢

再熬從緊至慢漸漸微火熬成膏出鍋入磁器內盛放空中埋一箇月
 去火毒可用已後看時却用乳汁化開點每日可點二五十筋若

腫時歌一二日再點以效為度三月九月脩合為妙

珊瑚膏 方 治遠年近日不視光明一切雜患病眼五輪不損者並皆

治之新患眼翳日見效每用皂角子一大塊冷水半鍾鷄子殼少許

於小盞內浸化研開點眼或洗眼亦得臨臥點用奇效不可具陳除

內障氣眼不治

紫金膏 方 同珊瑚膏治一切眼疾用藥如皂豆許點眼大角內

一點五七遍者病大小用此膏與珊瑚膏 方 詳見片圖

龍膽膏 方 治暴赤眼腫痛癢流淚開怕日羞明逆風淚出視物昏化

每用豆許點眼大角內少時連點數筋大有功效今具藥品于后

玄精石 一斤 桂府消石 一斤 黃連 秦皮 切細

龍膽草 苦棟根 五味子 各用十兩 當歸 赤芍藥

大梔子 麩仁 各五兩 杏仁 各五兩 槐枝 二斤切 柳枝 二斤切

玄精石至五味子七味用入鍋盛水二大桶煎至一半去滓將細生

玄精石至五味子七味用入鍋盛水二大桶煎至一半去滓將細生

絹濾過磁器盛放又當歸至柳枝口味亦用水二桶煎至一半去滓

再將細生絹濾過亦用磁器盛放白沙蜜五斤先用少油搽鍋內慢

火煉蜜紫色為度將前二次煎成水同煎數沸再用生絹濾過再

熬至一半入銅鍋內下鴨砂五兩摻膽大者五箇慢火煎用鉄鏟不

住手攪熱成稀膏除一斤於磁器內盛放一宿將上等片腦六錢研

細入藥內攪勻用油紙封固一宿名為片腦膏○下爐甘石六兩黃

丹六兩用水飛過研砂九錢攪鹽九錢益硝九錢銅綠九錢輕粉三

錢粉霜二錢俱研細用水二碗用細生絹濾過盡入煎熱成三斤藥

內將鉄鏟不住手攪慢火再熬成稀膏又除二斤半用磁器內盛放

經一宿再用上等片腦一錢麝香二錢研細入藥內攪勻將油紙封

固一宿名為紫金膏○又以珊瑚半兩為粗末用水一大碗煎數沸

白

去毒除朱

三十一

去滓不用入煎熬成稀膏一斤於內又下爐甘石二兩黃丹二兩用水

飛過將鉄鏟不住手攪幾稠膏再下上等片膠一錢研細入藥內

攪勻於磁器內盛放名爲珊瑚膏

脩煉爐甘石黃丹之法

爐甘石不拘多少砂器盛

淘澄爲泥用之

黃丹不拘多少以鉄鉢

光明拚雲錠子治遠年治

爐甘石一斤燈過用黃

片膠一錢海蝶蛸二

乳香沒藥各一

右研極細以後黃連膏子和劑攪成錠子淨水磨化點

頑木炭火煉通赤用黃連水蘸灰水飛



砂候紫色用水飛過淘澄爲塵用之

自一切眼疾

連半斤水二碗煎

麝香一分珍珠一分血竭三分

水

珊瑚砂一分

劑藥黃連膏子

黃連

龍膽草

芍藥

大黃

黃柏

黃芩

生地黃

白芷

防風

木賊

薄荷葉

羌活

紅花

菊花 各等分

右用水七八碗浸藥三日煎成膏子和劑前藥成錠子

開光錠子

爐甘石

煨黃連水拌
沖末二兩

礞石 五分

珍珠

片腦 各三分

牛黃

雄黃 各一分

右為細末熬黃連膏為錠子麻煎

春雪膏

於春天雪冷凍之時取明淨冰硝三四斤為末或不拘多少用黃

藥

心法丹餘卷之十二

三十二

圖

遠防風赤芍藥當歸尾各五錢牙皂三箇各剉片與硝拌入雪
與硝一般多同拌勻為水過一宿濾去黃連等藥却將硝雪水
用瓦盆或銅盆盛之於露天中處受霜露之氣其盆弦上自然結
成砂却用烏盆一箇以紙劔墊盆底內用厚牛皮紙盛砂於盆內紙
筋上使砂中水氣盡流於紙內候砂乾莫以磁器收貯可回交用
每硝砂一錢加鴨砂半錢凡勝二分研細點眼

○已上諸方點洗之劑

○看接眼疾所因不過虛實二者而已虛者眼目昏花腎經真水之
微也實者眼目腫痛肝經風熱之甚也苟實為則散其風熱為虛
為則滋其真陰為虛實相和則散風熱滋真陰兼之夫何眼疾之不
瘳哉此內治之法也至於久病失調熱壅血凝而為拳睛肉翳膜
赤爛之類不假點洗外治之法則何由而全愈乎蓋病情有標

有內外散也又當見輪之氣有餘便是火而散火在於破氣

血不足則陰虛而滋陰
有內外故也又當見論之氣有餘便是火而散火在於破氣
眼疾故為而作也歟

耳聾

六十一

書 館

丹溪心法

○耳聾皆為於熱少陽厥陰
之類 大病後耳聾須用四物湯降火 陰虛火動耳聾者亦用四物
湯 因鬱而聾者通聖散為大黃酒煨再用酒炒三次後入諸藥通
酒炒 耳鳴因酒過者大劑通聖散加枳殼柴胡大黃甘草南星信
青皮荆芥不愈用四物湯炒 耳鳴必用龍會丸食後服 氣實公

耳聾

三古村餘卷之三

三十一

柳九或神考九下之 擊病必用龍會九四物湯養陰 濕痰者神

考九換柳九 耳濕腫痛涼膈散加酒炒大黃善令酒浸防風荆芥

羌活服腦多射少濕加枯礬吹 耳內團團熱亦是陰虛

戴云亦有氣閉者蓋亦是熱氣閉者耳不鳴也

入方

草麻子

四十粒

棗肉

十箇

一右入人乳汁搗成膏石上曝乾便充如指大綿裹塞於耳中

又方

鼠膽汁滴入耳中尤妙

又方

將龜放在漆棹上尿山角綿漬之搗入青葱管中滴入耳中

附諸賢論

王倫醫家曰耳鳴或鳴甚如蟬或左或右或時聞塞世人多作腎虛治

王節齋曰耳鳴證或鳴甚如蟬或左或右或時閉塞世人多作腎虛治一不效殊不知此是痰火上升繼發於耳中而為鳴鬱甚則壅閉矣遇此疾但審其平昔飲酒厚味上積素有痰火只作清痰降火治之大抵此症多因先有痰火在上又感惱怒而得怒則氣上少陽之火客於耳也若是腎虛而鳴者亦是睡多慾當見勞怯之證

附諸方

犀角飲子 濟生方 治風熱上壅兩耳聾閉內外腫痛膿水流出

犀角 鎊 菖蒲 木通 玄參 赤芍藥

赤小豆 炒 甘菊花 去梗梗 各一兩 甘草 炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片煎七分溫服

清神散 治風氣壅上頭目不清耳常重聽

耳聾 治法 餘卷之三 三十四 乙

殭蚕炒去絲質

乾菊花各一兩 荆芥穗

羌活

木通

川芎

防風各五錢 木香一錢

石菖蒲

甘草各三錢

右為末每服三錢食後臨臥茶清調下

復聰湯魏方伯魯 治痰火上攻耳聾耳鳴

半夏制

陳皮去白

白茯苓去皮

甘草炙

瞿麥

藜蘆

木通

菖蒲去粗皮炒褐

右用水二茶鍾生姜三片葱三茶鍾空碗臨臥各一服

涼膈散

治風熱上攻耳聾

見溫熱

通聖散

治風熱上攻耳聾

見斑疹

滾痰丸

治熱痰濕痰耳聾

見痰類

神芎散

治濕熱濕痰耳聾

見火類

換柳丸

治濕熱濕痰耳聾

見病類

治肝火上升耳聾

見病類

換柳丸 治濕熱濕痰耳聾 見病類

龍會丸 治肝火上升耳聾

見腦痛

和劑流氣飲 治氣閉耳聾

見赤帶

內加菖蒲生薑葱白同煎服 凡治龍耳須開鬱行氣

六味地黃丸 治陰虛火動耳聾

見補損

內加知母黃柏菖蒲遠志

書

地黃丸 治勞損耳聾

熟地黃

當歸

川芎

辣桂

兔絲子

川椒炒

故紙炒

白蒺藜炒

胡芦巴炒

杜仲炒

白芷

石菖蒲各二錢

磁石火燒醋淬七次研

水飛一錢二分

右為末煉蜜丸如梧子大每五十丸葱白溫酒下

磁石羊腎丸

治諸般耳聾

補虛開鬱行氣散風去濕

磁石

三兩火煨醋淨七次用葱子一合木通三及用

磁石水同煎一晝夜者葱子木通不用取藥二及

川芎

耳聾

心濟世醫方卷十二

三十五

白朮

川椒去油

肉棗去核

防風

茯苓

北細辛

山藥

遠志去心

大川烏炮

木香

當歸

鹿茸酒浸

兔絲子酒浸

黃芪各一及

肉桂六分半

熟地黃二兩

石菖蒲一兩

兩

右為末用羊腎兩對去皮

廣以酒煮爛研細好酒糊丸如梧子大每

一五十九空心溫酒下益湯

亦可



一〇廣按丹溪云耳聾皆

傷於熱而已上三方又用辛熱之藥不無便

入疑議殊不知耳聾

多屬痰火鬱結非磁石之鎮墜川烏之流

通與夫川椒細辛肉桂

菖蒲之辛散則老痰驚火何由而開耳聾何

由而愈哉雖然耳聾

而愈亦為劫劑後當以通聖散和之可也

〇已上諸方均

定劑

一方 治耳聾久不聞者

聚不磁石一塊

川山甲

取耳方 治風熱搏之津液結靨成核塞耳

生猪脂

地龍

全下墨博分

右件細研以葱汁和攪如黍核薄綿裹入耳令潤即挑出

紅綿散 治疔耳有膿及黃水

海鯨鮫

枯礬

鐵屑各一字

乾胭脂五分

右為末用管吹入耳中

圖

方

一周五倍子焙乾一兩全蝎三錢燒存性為細末吹入耳中

方

用枯白礬一錢胭脂一字麝香各許研細以綿絛子先輕去耳中膿

水即用別經絛子送藥入耳中 一云加龍骨亦佳

方 治耳內膿出或黃汁

石膏

明礬

黃丹

真蛤粉

龍骨

石膏

新天
上煨

明礬

結

黃丹

煨

真蛤粉

龍骨

各等分

麝香

少許

右為末綿纏竹筒拭耳換綿蘸藥入耳

一方 治耳作膿者

用甘遂一塊如棗核大以綿裹塞耳中以甘草口中徐徐嚙下
耳爛 用貝母研末乾摻

治百虫入耳

圖

一方用香油灌入耳即出

一方用鷄冠血滴入耳即出

一方用牛乳最良灌入耳即出

治一切虫物入耳

用竹管入耳門以口氣盡方吸出最妙

耳聾

治法附錄卷之十二

三十七

一方 治凍耳

用椒攪核燒灰清油調敷雀腦亦可

○已上諸方外治之法

○唐按丹溪云耳聾皆屬於熱誠哉斯言然有左耳聾者有右耳聾

者有左右耳俱聾者不可不分經而治也夫左耳聾者少陽火也

龍會九主之右耳聾者太陽之火也六味地黃丸主之左右耳俱

聾者陽明之火也通聖散滾痰丸主之何以言之有所忿怒過度

則動少陽膽火從左起故使左耳聾也有所色慾過度則動太陽

膀胱相火從右起故使右耳聾也有所醇酒厚味過度則動陽明

胃火從中起故使左右耳俱聾也蓋左耳聾者婦人多有之以其

多忿怒故也右耳聾者男子多有之以其多色慾故也左右耳俱聾

者膏粱之家多有之以其多肥甘故也總三者而論之忿怒致耳

聾耳者必因多丹溪云厥陰少陽以多當用開痰散因熱致之謂耳

者膏肓之象多有之以其多肥甘故也總三者而論之必怒致耳

聾者為多丹溪云厥陰少陽火多當用開痰散風熱耳之謂乎

鼻病

六十五

館

丹溪心法

○酒渣鼻是血熱入肺

治法用四物湯加陳皮

又云

紅花酒炒黃芩

煎入好酒數滴就調炒五靈脂末同服格致論中於上藥有蒼苓生薑
氣弱者加黃芪

入方

注

用桐油入黃連末以天吊藤燒灰熟得之 一云用桐油入天吊藤

燒油熟調黃連末拌得之

又方

鼻病

三行詩餘卷之十五

三十八

一用山花末蜜臘九彈子大空心嚼一九白湯下

治鼻辛癭肉 胃中有食積熱痰流注治本當消食積

蝴蝶卷二錢

細辛一錢

白芷半錢

右為末四鼻中

治鼻淵

南星

半夏

蒼朮

白芷

神麩

酒芥

辛夷

荊芥

各等分

右末水調食後服

附諸賢論

三節齋曰鼻塞不聞香臭或但遇寒自多塞或暑感風寒便塞不特塞

發者世俗皆以為肺寒而用解表通利辛溫之藥不效殊不知此是

肺經素有火邪火鬱壅則喜眉目熱而惡見寒故遇寒便塞遇感便發

治法清肺降火為主而佐以通氣之劑者知常鼻塞不聞香臭者

肺經主皮毛火邪火鬱發於鼻則鼻塞但如熱而惡寒見寒故退寒不復見寒過之惡便發

也治法清肺降火為主而佐以通氣之劑若如常鼻塞不聞香臭者
尋審其平素只作肺熱治之清金瀉火消痰或丸藥喻化或末藥輕
調緩服久服無不效矣此予所親見而治驗者其平素原無鼻塞舊
證一時偶感風寒而致室塞聲重或流清涕者自作風寒治

附諸方

菖蒲散 御藥院方 治鼻內室塞不通一不得喘息

菖蒲

皂角

圖

右為末每用一錢綿裹塞鼻中仰臥片時
增損防風通聖散 治鼻內塞不利肺氣不清

鼠粘子

桔梗

桑白皮

紫苑

荆芥穗

甘草

生二兩

右吹咀每服八錢水一鍾半姜五片煎八分食後溫服

御藥院

卷之十二

三十九

菴活散

治腦有鬱熱遇寒鼻塞

凡傷風

仙米芎散

治腦有鬱熱遇寒鼻塞

凡傷風

川芎石膏湯

治腦有鬱熱遇寒鼻塞下流中風

○已上數方治鼻塞之劑

蒼耳散

三日方治鼻流濁涕不止名曰鼻淵

辛夷仁

半兩

蒼耳子

二香白芷

兩

薄荷葉

右為末每服二錢

葱茶送下食後調下

辛夷散

治肺虛為四氣所干

鼻肉壅塞涕出不已或氣息不通

或聞香臭

川芎

木通

防風

甘草

辛夷仁

細辛

洗去土

藜蘆

升麻

香白芷

右為末每服二錢茶清調下

風湯

治鼻淵腦熱涕下濁

涕不止久而不已必切血

防風湯 治鼻淵腦熱滲下濁

防風 二兩 黃芩

麥門冬 一兩 杏仁

右為末每服二錢沸湯調服 復服

○已上數方治鼻淵

鉛紅散 治風熱上攻面鼻生

舶艚硫黃 白礬 各半兩

右為末黃丹少許染與病人

兼服升麻湯下瀉膏丸以除病根也

局方升麻湯

熟半夏 茯苓

乾葛 桔梗

天參 甘草 炙 川芎

官

復服

芝劑

紫赤刺癰疹俗乎肺風

圖

面色同每上半錢津液塗之臨臥再塗

新

白芷 當歸 各二錢 蒼朮

升麻 各一兩 熟枳殼 乾姜 各半兩

鼻病

大黃各半

芍藥七錢

陳皮

甘草各一兩半

右咬咀每服五錢生姜煨心

水煎食前服

瀉青丸一見中風

白龍丸 治酒瘡鼻并滿面惡赤酒刺

川芎

藁本

細辛

白芷

甘草等分

右為末每四兩入煨石膏末一升水逐日用此丸末洗面如燥在法更覺少時方用湯洗去

又方

用黃柏苦參檉柳等分為末傳以豬脂調尤妙

又方

用青黛槐花杏仁研傳之

又方

用杏仁研乳汁傳之

犀角仁研乳汁傳之

○已上數方治酒瘰鼻之類

白黃散 簡易方 治鼻齕肉鼻痔等症

一雄黃 白礬 細辛 瓜子 各等分

右為末搗入鼻中

辛荑膏 每藥院方 治鼻生瘰肉鼻塞不通有時疼痛

辛荑葉 二兩 細辛 木香 木通 白芷

杏仁 湯炮去殼共研令五錢用

右用羊髓猪脂二兩和藥於石器中慢火熬成膏取赤黃色故入

龍腦麝香一錢為丸綿裹塞鼻中數日肉脫即愈

驚金散 治鼻中生瘰肉

用驚金猪牙皂角各一兩二味水浸一宿火煮透搗金為度去皂

鼻痔

三才集卷之七

四十一

一劑不用以舊金焙乾再用此細辛半兩麝香研砂各一錢同為末燒

藥丸如茶子大每服一丸食後醫藥湯下

聖黃散 治耳中瘰肉

唯黃半兩

麝香

少許

輕粉

杏仁

湯地者凡一

右於乳鉢內先研杏仁如泥餘藥同研細勻磁盒蓋定每有患

同深淺夜臥用筋頭點藥末皮脫盡中隔夜一次半月效

又方

用狗骨燒灰加研砂少許每用棉裹中瘰肉自化

又方

以鹽菜揉爛塞鼻中一夕自然落

又方

用白藥燒為末面脂和綿裹塞耳中數日瘰肉自落

又方

用雄黃一塊如棗塞鼻中過十餘日瘰肉自落

○已上數方治瘰肉之劑

口舌口 六十一

書

丹溪心法

圖

○口瘡服涼藥不愈者因中焦虛且不能食相火衝上無制用理中湯人參白朮甘草補之虛乾姜散火之標其則加附子或啗官桂亦妙 一方生白礬為末貼之極效或啗良久以水漱之再啗 一方治口瘡甚者用西瓜漿水徐徐飲之 冬月無此用西瓜皮燒灰得之 又方黃連好酒煮啣下立愈 又方遠志醋研鴨毛掃患處出涎

口舌

口舌

口舌

入方

細辛

黃柏炒等分

一云黃連

右為末貼之或搽舌上吐涎水如再傳須旋合之若合下既火無效

治滿口白爛

葶藶為末

厚黃柏一兩

右用柏火炙為末醋煎數沸後調上藥漱涎再用白湯漱口則愈

附諸方

立效散

治唇緊

治唇緊瘡疼之

五

訶子肉

五倍子

右為末乾貼唇上立效

赴廷散

治赤白口瘡

治赤白口瘡

黃柏

黃連

蜜陀僧

右為末乾貼瘡

右為末乾貼瘡

換柳散 應驗方 治口瘡疼痛大有神效

五倍子 三錢

寒水石 半兩

蒲黃

黃丹 二錢半

右為末每服少許乾貼瘡上

龍石散 和制方

治大人小兒上腦腫毒口舌生瘡咽噎腫塞痰病婦悶

每用少許摻貼患處無津小兒瘡疹毒氣攻口齒先用五福化毒丹

掃後仍再用此藥摻貼立效



硃砂 一錢半

研用

寒水石 通赤三錢二分半

生腦子 二錢半

生腦子 二錢半

研

右為末每日三五次用夜臥摻貼妙

清金散 方

治大人小兒白口瘡急惡快似水耳

五倍子 去土四錢

青黛 四錢

右為末好油調貼瘡上咽喉中瘡爛用竹管吹入喉中有津吐出

兼金散 三四方 治熱毒生瘡於舌

細辛

黃連 各半分

右為末先以布帛蘸水搽淨患處搽藥於上涎出即愈

起瘡散 治口瘡疼痛

五味子

一兩

滑石

半兩

黃柏

各半分

右為末每服半錢乾搽瘡上良久便可飲食

治口瘡 張子和方

白礬

一兩

黃丹

一兩

紅散下
瓜馬友

右為末搽於瘡上即愈

一方 治蠱蚤

用黃柏一兩去粗皮以五倍子二錢蜜陀僧甘草各少許三味為末

水調敷在黃柏上灸三五次藥末盡為度後將黃柏切作片曬

以時貼於患處天明則愈

水調敷在黃柏上炙三五次藥末盡為度後將黃柏切作片之

以時貼於患處天明則愈

一方 治爛疔瘡

用橄欖燒灰存性為末先用米泔水洗淨後摻上藥

一方 治舌腫

用栢草霜為末以好醋調敷立效

柳花散 治口舌生瘡

玄胡索一兩 黃柏 黃連各半兩 蜜陀僧三錢 青黛二錢

右為末傳貼口內有津即吐

○已上諸方治標之劑

升麻散 濟生方 治上膈壅毒口舌生瘡咽喉腫痛

升麻 赤芍藥 人參 桔梗 甘草 乾葛 各一兩

右咬咀每服四錢水一鍾半姜五片煎八分溫服

口舌 治心法齋余卷之七 四十四

瀉黃飲子 洛生方 治風熱纏於脾經唇燥折裂口舌生瘡

白芷

升麻

枳殼 去白炒

黃芩

防風 去芦

半夏

湯洗

石斛 各一兩

甘草 炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎七分溫服

黑參丸

治口舌生瘡久不愈

黑參

天門冬

麥門冬

去心各炒一兩

右為末煉蜜丸如彈子太母用一九綿裹噙化嚥津

增損如聖散

治上焦熱壅口舌生瘡

桔梗 二兩

甘草 炙一兩半

防風 半兩

枳殼 製二錢半

黃芩 一兩

右為末每服三錢水煎食後服

浙

○已上諸方治本之劑

○廣按口舌証中治標之劑已靜而治本之劑稍畧宜於火類風熱

類之中選而用之

類之中選而用之

牙齒 六十七

館

丹溪心法

書

○牙痛梧桐淚為末少加麝香擦之 牙大痛必用胡椒草撥能散其
甲浮熱間以升麻寒水石佐以辛涼劑亦薄荷細辛之類 又方用清
涼藥使使痛不開必須從治畢換川芎薄荷荆芥細辛樟腦青蘊
治牙痛甚者

防風

羌活

青蘊

細辛

草撥

川椒

白為末擦之

牙齒

心法

丹溪

又方

南星為末，霜梅三箇取其引，延胡索，薄荷，散風，熱，望，是，入，膏，入，骨，擦，齦。

又方

蒲公英燒灰香附末

白芷

青鹽

右為末擦齦

治陰虛牙山齦血氣虧

用四物湯加牛膝香附生甘草剉拍

送下

蒼朮白膠香塞孔中

陽明熱而牙痛

大黃香附燒灰存性為末入土青鹽少許不特擦牙

圖

館

固齒

用羊脛骨燒存性二錢當歸
自是猪牙皂角青礬各一錢為末格

牙上

刷牙藥

燒白羊骨灰一兩升麻一兩
蓮半錢擦用

附諸賢論

王節齋曰牙床腫痛齒動搖
爛脫落世人皆作腎虛治殊不知此屬陽明濕熱蓋齒雖屬腎而生於牙床上下床屬陽明大腸與

胃猶木生於土也腸胃傷於美酒厚味膏粱甘滑之物以致濕熱上攻

則牙床不清而為腫為痛或出血或生蟲由是齒不得安而動搖黑

爛脫落也治宜瀉陽明之濕熱則牙床清寧而齒自然安固矣

附諸方

牙齦

牙齦

牙齦

牙齦

血竭散 應驗 牢牙定痛治齒根注復連膈骨疼痛久而不愈者

血竭

石膽

乳香

五靈脂

蜜陀僧 各等分

右研令勻每用一字以指蘸貼於病處候少時荆芥湯漱

立效散 御藥 治牙疼不可忍

百草霜 細研

滄鹽 研各錢

麝香 研

乳香 研和各半錢

右件一處再研勻每用少許口含溫水隨牙疼一邊鼻內搗之用無

時尤妙

一方

用蒼耳草細辛羌花小麥川椒各等分剉碎水煎時時含漱吐去

藥不可煎下 又細辛羌花二味同搗熟尤妙

青龍散 御藥院方

治陽經風熱齒齲腫痛

香豆豉

川芎

益母

細辛 各半兩

青黛 三錢

薄荷葉二錢

右為末以指蘸藥擦牙腫處吐津誤燕不妨

宣牙膏

御藥院方

治齒牙動搖不牢牙冷痛不止齦肉出血

麝香一分

龍骨

定粉

另研各二錢半

右二味為細末後入麝香勻用黃臘一兩磁盞內鑄開入藥於內攪勻放冷取出將火斗燒鋪紙內藥攤之勻薄每用剪作紙條兒臨臥於齒患處齒斷間封貼一宿至次日早晨取出藥每夜用之此半月消牙齒腫忽生斷肉治疳蝕去風邪牢牙齒大有神效

梧桐淚散

御藥院方

治牙齒斷腫悶宣露血出

梧桐淚

川芎

細辛

白芷各半錢 生地黃

青鹽一分

寒水石

煨熟二錢

右件同為細末每用茶點患處吐涎候藥不妨無時日五七次

牙齒

御藥院方

卷之十三

九十七

路蜂房散 御藥院方 治牙齒疼痛經驗神效

靈蜂房 炒黃 細辛 各二錢 大戟 七錢 防風 一錢

右以咀每五錢水一鍾煎七分去滓熱飲令出無時

消毒散 御藥院方 治齒斷并口唇生瘡腫痛

晚蚕蛾 五倍子 蜜陀僧

右為細末每用少許乾傳冷下有津吐出

兩關散 應驗方 治牙關緊急不開因風熱攻注牙齒

川芎 薄荷 益硝石 白芷 全蝎 各一錢

僵蚕 天麻 各半錢 細辛 一錢

右為末每用少許以指蘸藥滿口搽牙斷上為半時用溫水漱口

太和散 御藥 治牙齒動搖斷肉浮腫虫蟬發痛

梧桐淚 白茯苓 生地黃 各半錢 川芎 香白芷

升麻 各三分 華陰細辛 三分 鹿角骨 半斤 上青鹽 一分 牙皂 一分

升麻 各三分 華陰細辛 三分 麝香 半分 上青鹽 一分 牙皂 煨存性

右為末青齒麝香另研拌勻每用藥少許指蘸藥擦牙病處常用

去疳牢牙定疼止痛

消風定痛散 應驗 治牙疔疔疔痛風熱攻注斷肉腫悶

荆芥 四錢 白芷 防風 細辛 全蝎

升麻 川芎 各二錢 膽礬 二分 朴硝 青黛 各八分

右為末每用一指蘸藥擦於牙上為末時有津吐出

赴廷散 和劑方 治風牙疔牙攻疼疼痛不可認者

良姜 去芦 草烏 去皮 細辛 去葉 荆芥 去梗各等分

右為末每用少許於痛處擦之有涎吐出不得吞嚥良人用鹽湯灌

漱其痛即止用腐炭末一半根常使擦牙

細辛散 和劑方 治風虫牙疼或牙齦宣爛腮頰浮腫皆治

山甲 卷之二

荊芥

去梗 一兩

縮砂

半兩

細辛

一兩

川椒

去目炒

白芷

二兩

白芷

二兩

白芷

二兩

右為末每用少許於痛處頻頻擦之有涎吐出仍用漱鹽湯

丁香散

神藥

治牙齦疼痛

丁香

萹撥

蝎稍

大椒

各等分

擦法同前

定痛散

御藥院方

治牙風疼痛

細辛

生半兩

草烏

生一兩

全蝎

半兩

乳香

二錢

右為末每用少許擦牙痛處引涎吐之須臾以鹽湯灌漱即止

雄黃定痛膏

楊氏家秘方

治牙齦疼痛

盆硝

二錢

雄黃

一錢

細辛

二錢

大蒜

二枚

牙皂

四錢

重

右為末同大蒜一處搗為丸如梧子每用一丸將綿子裹藥左邊

牙痛效在左耳右邊牙疼效在右耳內良久痛止取出藥丸可治數

人亦皆治之

方 治一切牙痛

川升麻

當歸

川椒

細辛

華撥

白芷

荊芥

各等分

右為末用瓦合子貯之緊閉合口勿令泄氣每用少許搽在牙痛處以溫荊芥湯灌漱立效

一方 治牙疼

鶴虱

細辛

白芷

甘松 各五分

右為末拭牙上或煎湯噙漱立效

一方 治風牙疼

防風

麻黃

生地黄

各一兩

芫花

蜂窩

各五錢

花椒 三錢

浮麥 一兩

牙齒

公法行餘卷之十一

四十九

右為粗末入葱白三根同水煎熱漱不可嚥下

一方 治虫牙疼不可認者

用漢椒為末以巴豆一粒研成膏飯丸如蛀孔大綿裹安於蛀孔內

立效

草撥散 治風虫牙疼

書

草撥 二錢

蝎稍

良姜 各一錢

草烏 五分 去皮尖

右為末以指蘸藥擦於患處

一方 取痰牙落不犯手

王

草烏

草撥 各半兩 川椒

細辛 各一錢

右為末每用少許擦於患牙處其牙自落

○已上諸方外散治標之知

初起散 和藥 清頭目發散風熱治陽明經不利邪毒攻注牙齒動

宣靈根下動搖發痛又治偏頭痛

內虛浮宣露褪下動搖發痛又治偏頭痛新久注目或發夜痛
視物不明其藥功效不可且惡也

川芎

獨活

羌活

防風

細辛

薄荷

生地黄

荆芥

甘草

存粗末作一服水二鍾煎一鍾去滓溫服食後日進三四服愈

清防風散

柳葉片方

治上

風

熱

攻

衝

氣

鬱

滯

斷肉虛腫身寒聲重頭目眩暈皆治之

防風

細辛

羌活

川芎

獨活

荆芥穗

天麻

甘草

白檀

白芷

序腦

右同為細末入腦子再研勻每服一錢淡茶清調勻稍熱飲吐

不拘時如覺頭昏目痛牙齦腫悶用熱茶清調三錢食後服

甘露飲子 治男子婦人胃中客熱口氣齒斷腫悶宣密心中
多煩飢不欲食嗜以及咽喉中有瘡並皆治之

黃芩 天門冬 枇杷葉 甘草 枳殼

麥門冬 生乾地黄 山茵陳 石斛

右為粗末每服五錢水一大鍾煎至七分去滓溫服食後

一服腫閉煎藥熱漱之極驗

敗毒散 治風熱攻注牙齦疼痛久而不愈

細辛 薄荷葉 地骨皮 荊芥穗

右為粗末每服七錢水二鍾煎至一鍾去滓溫漱冷吐煎服尤妙

地骨皮散 治牙齒虛熱 薑攻衝齒肉腫痛口舌生瘡此藥如神

朱胡 地骨皮 薄荷

右為粗末每服一鍾水煎至一鍾去滓熱漱冷吐煎服愈好

升麻散 御藥院方 治牙齦疼痛生斷肉去熱毒解外風寒

防風 去苗 當歸 升麻 各二錢 藁本 去苗土 甘草 炙

白芷 細辛 芍藥 各一錢 木香 半分

右件搗羅為散於乳鉢中研細塗貼齒斷粗者以水二鍾藥五錢煎

至七沸去滓熱漱冷吐秋冬牙痛用此煎服解散最妙

地黃散 御藥院方 治風熱攻注陽明牙痛斷腫或血出宣露

生地黃 一錢 防風 細辛 薄荷葉 地骨皮

藁本 各一錢 首草葉 荆芥穗 當歸 各半錢

右同為粗末作一服水一鍾半煎至一鍾去滓微熱漱口冷吐之前

服尤妙

玉池散 御藥院方 治牙痛或動搖不牢

地骨皮 白芷 升麻 防風 細辛

牙痛

川芎

槐花

當歸

藜蘆

甘草

生俱各

右為粗末作一服水一鍾半煎至一鍾去滓溫熱漱口冷則吐之煎

服尤妙張龍圖去地骨皮加細活治牙流膿血變骨槽風者及膏

已出者俱效

○已上諸方內消治本之劑

宜於火類風熱類選用

血竭散

應驗

治牙疳弄惡瘡不差之神

寒水石

燒熟四兩細研

龍骨

二兩

蒲黃

二兩

血竭

五兩

粘白礬

一兩

右為末每用少許貼在瘡口上紙封貼

續連散

應驗

治牙疳疔蝕口生瘡立效

寒水石

燒熟四兩細研

蒲黃

二兩

黃丹

五兩

右為末每用少許乾貼瘡上膏少時吐水

治走馬牙疳

一考 浴走馬牙疳

黃柏

藜蘆

石膏

銅青

麝香

麝香

龍骨

官

右以火焙存性為末每用五分擦於患處

一方 治牙疳

青黛

銅綠

晉礬

黃柏

麝香

枯白礬

人言

黃連

芒硝

麝香

輕粉

黃連

右為末後入輕粉麝香研勻少許擦患處

一方

五倍子

銅青

明礬

麝香

右研末先以益醋湯洗患處拭乾搽藥於上

牙疳

公醫科余卷之十二

五十二

○已上諸方治疳之劑

國醫氏令散 應效 牢牙齒固不生疳疾

龍骨

寒水石 燒熟

升麻

香白芷

麝香 一兩

細辛

青鹽 各三錢

石膏 四兩

麝香 四錢

石燕子 六者 羊對六

燒研 伴之 天

書

右為末每日早晨以脂蘸藥擦牙後用溫水漱口吐出

白牙藥 每藥 院方 治牙疳黃黑不瑩淨

零陵香

白芷

青鹽

升麻 各二錢

石膏 一兩

細辛 一錢

麝香 干錢

研

砂鍋 細末

一兩

右除砂鍋膏香三味外五味同搗細末加上前三味共八味調勻

研每自早晨以指蘸藥水擦牙後用溫水漱口吐出

牙痛散 治牙疳疔毒痛腫動搖常用擦漱固齒

土法燕燕不以多生用

土茯苓 去腐生肌 不以多少

右為粗末每服五錢淡漿水 下 碗煎至七八沸去滓入鹽末一匙帶

熱時時漱之別無所忌然雖 未 不殺蓋單方之藥取效急速兼神

仙秘旨云若人服茯苓一年 後 冬不寒夏不熱服之二年老耆復

少髮白復黑齒落重生服之二年輕身長生今雖不作湯散服餅久

而漱之其驗亦尚

沉香白牙散 御藥院方 檳榔 齒 淨 今 白 及 治 口 臭

沉香 麝香 各五分 升麻 藿香 本

藿香葉 甘松 星 各一分 二分半 石膏 二兩 寒水石 一刃

右為末每日早晚搽牙

齒藥方 三日 西嶽蓮花峯神傳

猪牙皂角及生姜 四國升麻 熟地黃

木律星透槐角子

細辛荷帶要相當

青益等分同燒毀

研細將來使最良

措齒牢牙鬣髮黑

誰知世上有仙方

右用新瓦鑊盛藥合口以酥

縛定鹽泥固濟日乾穿一地穴先放新

磚後放藥以罐口向下用炭

火燒令青煙出稍存性去火經宿取為

末每用擦牙溫水漱去

一方早蓮作黃連

一方 固齒烏髭髮

母丁香

沉香

各半兩

石燕子

一雙火煨
醋淬七次

龍骨

一兩

海馬

一兩

茴香

一兩

生地黄

二兩

麝香

二兩

青鹽

半兩

右為末每用一撮空心擦至

縫驗片時溫水漱去

羌活散

應驗

嗽牙藥去風止痛

薄荷

羌活

二兩

天黃

一兩

右用水二鍾煎至一鍾去滓溫漱或吹之熱亦無妨

右用水二鍾煎至一鍾去滓溫漱冷吐之熱亦無妨

○已上諸方固齒之劑

○廣按牙痛之証其入腸胃者痛熱上出於牙齦之間適被風寒或冷飲所鬱則濕熱不得外達發作痛也其病情有標本之分所用藥有溫涼之異何則牙痛之証寒是標故外擦漱之藥宜辛溫以散寒開鬱熱是本熱內服之藥宜辛涼以散熱清中如此則內外交攻標本兩治其病豈有不愈者乎

浙江

浙江圖書館藏書

浙江圖書館

浙江圖書館藏書

善本
11
日




浙江圖書館

浙江圖書館善本

甲 登記號：010941

一九 年 月 日



浙江圖書館












colorchecker CLASSIC



xrite



colorchecker CLASSIC



x-rite

100mm