

萬有文庫

第一集一千種

王雲五主編

本草綱目

(七十)

張紹棠重訂

商務印書館發行

本草綱目

(七十)

張紹棠重訂

書學基本國

# 本草綱目

## 卷二十五

### 穀之四

### 造釀類二十九種

大豆豉	別錄	豆黃	食療	豆腐	日用	陳廩米	別錄	飯	拾遺	青精乾石	飴飯	經	粥	拾遺
附	麴拾遺	米糕	綱目	糲	綱目	寒具	綱目	蒸餅	綱目	女麴	拾遺	黃蒸	拾遺	麴嘉祐
藥性	紅麴	丹溪補遺		蘖米芽	別錄	即麥		餠餌	別錄	醬	別錄	榆仁醬	食療	蕪荑醬
療	醋	別錄	酒	別錄	諸	燒酒	綱目	葡萄酒	綱目	糟	綱目	米粄	食物	春杵頭細糠
錄														別

### 右附方舊八十新一百

### 穀之四 造釀類二十九種

### 大豆豉

別錄  
中品

【釋名】「時珍曰」按劉熙釋名云：「政嗜也。謂和五味可甘嗜也。許慎說文謂豉爲配鹽幽菽者，乃鹹豉也。

【集解】「弘景曰」豉出襄陽錢塘者香美而濃，入藥取中心者佳。藏器曰：蒲州豉味鹹，作法與諸豉不同。其味烈。陝州有豉汁，經十年不敗。入藥並不如今之豉心爲其無鹽故也。既曰一

陝府豉汁甚勝常豉其法以大豆爲黃蒸每一斗加鹽四升春三日夏二日即成半熟加生薑五兩既潔淨且精也。『時珍曰』豉諸大豆皆可爲之以黑豆者入藥有滻。豉鹹。政治病多用滻。豉汁及鹹者當隨方法其豉心乃合。豉時取其中心者非剥皮取心也。此說見外臺祕要造淡豉法用黑豆及二三斗六月內淘淨水浸一宿瀝乾蒸熟取出攤席上候微溫蒿覆每三日一看候黃衣上遍不可過取曬簸淨以水拌乾溼得所以汁出指閒爲準安甕中築實桑葉蓋厚三寸密封泥於日中曬七日取出曝一時又以水拌入甕如此七次再蒸過攤去火氣收築封即成矣造鹹豉法用大豆一斗水浸三日淘蒸攤罷候上黃取出簸淨水淘灑乾每四斤入鹽一斤薑絲半斤椒橘蘇茴杏仁拌勻入甕上面水浸過一寸以箬蓋封口曬一月乃成也造豉汁法十月至正月用好豉三斗清麻油熬令煙斷以一升拌豉蒸過攤冷曬乾拌再蒸凡二遍以白鹽一斗入淨釜下椒薑絲同煎三分減一貯於不津器中香美絕勝也有鰥豉瓜豉醬豉諸品皆可爲之但充食品不入藥也。

淡豉【氣味】苦寒無毒。〔思邈曰〕苦甘寒濤得鹽良。〔果曰〕陰中之陰也。

【主治】傷寒頭痛寒熱癆氣惡毒煩躁滿悶虛勞喘吸兩脚疼冷殺六番胎子諸毒別錄治時疾熱病發汗熬末能止盜汗除煩生搗爲丸服治寒熱風胸中生瘡煮服治血痢腹痛研塗陰莖生瘡性治瘡疾骨蒸中毒藥蠱氣大咬大明下氣調中治傷寒溫毒發癩嘔逆時珍○千金治溫毒黑膏用之。

蒲州豉【氣味】鹹寒無毒。

【主治】解煩熱熱毒寒熱虛勞調中發汗通關節殺腥氣傷寒鼻塞陝州豉汁亦除煩熱器  
【發明】〔弘景曰〕豉食中常用春夏之氣不和炒以酒漬服之至佳依康伯法先以醋酒澆蒸藥治時疾熱病發汗熬末能止盜汗除煩生搗爲丸服治寒熱風胸中生瘡煮服治血痢腹痛研塗陰莖生瘡性治瘡疾骨蒸中毒藥蠱氣大咬大明下氣調中治傷寒溫毒發癩嘔逆時珍○千金治溫毒黑膏用之。

傳脚皆瘡頃曰古今方書用豉治病最多江南人善作豉凡得時氣卽先用葱豉湯服之取汗往往便瘳也時珍曰陶說康伯豉法見博物志云原出外國中國謂之康伯乃傳此法之姓名耳其

鼓調中下氣最妙。黑豆性平，作豉則溫，既經蒸署，故能升能散。得葱則發汗，得鹽則能吐，得酒則治風，得薤則治痢，得蒜則止血，炒熟則又能止汗。亦麻黃根節之義也。

瘡不語。煮豉汁一升服。覆取汗。仍著桂末于舌下嚥之。千金方。咽生瘍肉。鹽豉和搗塗之。先刺破出

惠方。舌上血出。如蟻孔者。豉三升。水三升。煮沸。一升日三服。葛氏方。墮胎血下。煩滿用豉一升。水三升。煮沸。三沸。同華陀方也。婦人難產。乃兒枕破與敗血裹其子也。以勝金散逐其敗血。卽順矣。用鹽豉一兩。以舊青布

小兒胎毒。淡豉煎濃汁。與三五口。其毒自下。又能助脾氣消乳食。聖惠。小兒覘乳。用鹹豉七箇去皮。膩粉一錢。同研丸。添米。小兒丹。

毒。作瘡出水。豉炒煙盡爲末。小兒頭瘡。以黃泥裹煨熱。取研以發背癰腫。已潰未潰。用香豉三升。入少

厚三分。瘡有孔。勿覆孔上。鋪豉餅。以艾列於上。炎之。但使溫溫。勿令破肉。如楊氏。陰莖生瘡。痛爛者。以豉一分。蚯蚓溼泥二分。水研和塗。千金方。一切惡瘡。不過三四次出

熱痛。卽急易之。患當減快。一日二次。灸之如先有孔。以汁出爲妙。千金方。一切惡瘡。熬豉爲末。傳之

楊氏。陰莖生瘡。上乾卽易之。禁熱食酒蒜芥菜。藥性論。中乳。半盈浸濃汁。頓飲之。中酒成病。豉漬白各半升。水二升。千金方。牛馬毒。豉汁。和人乳類服。千解蜀椒毒。豉汁飲之。千金方。中牛馬毒之效。衛生易簡。小蝦蟆毒。閼痛有至死者。以生豉一合。投新汲水洗三枚。浸水。豉塗之。小兒病。淋。方見蒸餅。總錄方。刺在肉中。嚼豉塗之。千金方。小兒病。淋。方見蒸餅。

半盈浸濃汁。頓飲之。中酒成病。豉漬白各半升。水二升。千金方。服藥過劑。閼亂者。豉汁。千金雜物昧目。不出用。七枚。浸水。豉汁飲之。以津

豆黃瘡。豆黃食。校正。原附大豆。下今分出。

【集解】  
蓄之如盒。醫法待上。黃取出。曬乾。搗末。收用。

【氣味】甘。溫。無毒。忌豬肉。

一說曰

時珍曰。造法用黑豆一斗。蒸熟。鋪席上。以

【主治】溼痹膝痛。五臟不足。脾胃氣結積。壯氣力潤肌膚。益顏色。填骨髓。補虛損。能食肥健人。以鍊豬

脂和丸。每服百丸。神驗祕方也。肥人勿服。訖○出延年祕錄方。生嚼塗陰癢汗出時。

【附方】新二脾弱不食。末每服一合。飲下日四五服。任意。千金方打擊青腫。大豆黃爲末。水和。

豆腐用。

【集解】時珍曰豆腐之法。始於漢淮南王劉安。凡黑豆黃豆及白豆泥豆碗豆綠豆之類皆可爲  
膏。未收者大抵得鹹苦酸辛之物皆可收斂爾。其面上凝結者揭取曬乾。名豆腐皮。入饌甚佳也。

【氣味】甘鹹。寒有小毒。原曰性平。按延壽書云。有人好食豆腐中毒。醫不能治。作腐家言。菜菔入湯中則腐不成。遂以菜菔湯下藥而愈。大抵暑月恐有人汗尤宜慎之。

【主治】寬中益氣。和脾胃消脹滿。下大腸濁氣。原清熱散血。時

【附方】新一休息久痢。白豆腐醋煎食之。赤眼腫痛。有數種皆肝熱血凝也。用消風熱藥服之。夜用鹽收豆腐貼之。酸漿者勿用。證治要訣。杖瘡青腫。豆腐切片貼之。頻易一法。以燒酒煮。心頭熱者用熱豆腐細切片遍。

陳廩米別錄

【釋名】陳倉米。古名老米。俗名火米。老亦陳也。火米有三。有火蒸治成者。有火燒治成者。又有畬田火米與。

此不  
同。

**【集解】**弘景曰：陳廩米卽粳米久入倉陳赤者以廩軍人故曰廩爾方中多用之人以作醋勝於粟當居前。藏器曰：廩米吳人以粟爲良漢地以粳爲善亦猶吳貯鄭稿貴近賤遠之意確人論其功粟自利與經說稍戾。宗奭曰：諸家註說不言是梗是粟然二米陳者性皆冷煎煮亦無膏膩粉食令時珍曰：廩米北人多用粟南人多用粳及稻並水浸蒸曬爲之亦有火燒過色變故人謂之紅粟紅腐陳久皆氣過也。古治成者入倉陳久相因也。

**【氣味】**鹹酸溫無毒。一藏器曰：「麋米熱食卽冷食卽冷，其性多涼，但炒食則溫。」爾豈有熟食卽熟者乎？」

**【主治】**下氣除煩渴調胃止洩別錄補五臟潤腸胃華暖脾去憊氣宜作湯食良土炊飯食止痢補中益氣堅筋骨通血脉起陽道以飯和酢搗封毒腫惡瘡立瘥北人以飯置甕中水浸令酸食之暖五臟六腑

之氣研末服去卒心痛孟晉寬中消食多食易饑原調腸胃利小便止渴除熱時珍

**【發明】**時珍曰：陳倉米煮汁不渾，初是氣味俱盡，故沖淡可以養胃。古人多以煮汁煎藥，亦取其潤腸胃。寇氏謂其冷利，皆非中論。

**【附方】**新霍亂大渴。煮汁澄清飲良。以黃倉米三升水一斗。反胃膈氣時。以水微拌溼。自想日氣如在米中。次日米炊飯焙研。每五兩入沉香末半兩。和勻。每米飲服二三錢。普濟方諸般積聚不時生病。及諸般積聚。太倉丸治脾胃饑飽豆不用入去白櫟皮四兩爲末。糊丸梧子大粒。去皮同炒至米香。豆黑勿令米焦擇去。暑月吐瀉。陳倉米末水丸梧子大。每服百丸。白湯送下。

飯遺推

**【集解】**時珍曰 飯食諸穀皆可爲之。各隨米性詳見本條。然有入藥諸飯不可類從者應當別出。大抵皆取粳和粟米者爾。

**新炊飯** 主治 人尿牀以熱飯一盞傾尿牀處拌與食之勿令病者知。又乘熱傅腫毒良。時珍  
**寒食飯** 飯 主治 減瘢痕及雜瘡研末傅之。藏燒灰酒服治食本米飲成積黃瘦腹痛者甚效。孫思邈

**傷寒食復用此飯燒研米飲服二三錢效。**時珍

**祀竈飯** 主治 卒噎取一粒食之卽下燒研擦鼻中瘡。時珍

**益邊零飯** 主治 鼻中生瘡燒研傅之。時珍

**齒中殘飯** 主治 蠕咬毒痛傅之卽止。時珍

**殮飯** 殮音孫卽 主治 熱食解渴除煩。時珍

**荷葉燒飯** 主治 厚脾胃通三焦資助生發之氣。時珍

**【發明】** 李杲曰 易水張潔古枳朮丸用荷葉裹燒飯爲丸。蓋荷之爲物色青中空象乎震卦風木更以燒飯和藥與白朮協力滋養穀氣令胃厚不致再傷其利廣矣。大矣。時珍曰。按韓悉醫通云東南人不識北方炊飯無甑類乎爲燒如燒菜之意遂訛以荷葉包飯入灰火燒熑雖丹溪亦未之辯但以新荷葉煮湯入粳米造飯用荷葉湯者寬中芥葉湯者豁痰紫蘇湯者行氣解肌薄荷湯者去熱淡竹葉湯者辟暑皆可類推也。

**青精乾石餽飯** 宋圖經

**【釋名】** **烏飯** 頌曰 按陶隱居登真隱訣載太極真人青精乾石餽飯法。餽音信。餽之爲言。飧也。謂以酒蜜藥草輩溲而曝之也。亦作礪。凡內外諸書並無此字。惟施於此飯之名耳。陳藏器

烏飯  
本草名

【集解】治漸取一斛二斗用南燭木葉五斤燥者三斤亦可雜莖皮煮取汁極令清冷以洩米米食墳胃補髓消滅三蟲上元寶經云子服草木之王氣與神通子食青燭之津命不復殞此之謂烏飯法取南燭莖葉搗碎清汁浸今血皆一莖炊春之從四月至八月未用新生葉色皆深九月至三月用宿葉色皆淺可隨時進退其斤兩又采軟二宿不必用湯瀉而炊之初米正作綠色蒸過便如紺色若色不好亦可淘去更以新汁漬之灑漬枝梗米九浸九蒸九曝米粒緊小黑如鑒珠袋盛可以適遠方也時珍曰此飯乃仙家服食之塊法而乃服食家所忌也

【氣味】甘平無毒

【主治】日進一合不饑益顏色堅筋骨能行藏器益腸胃補髓滅三蟲久服變白卻老極眞人法

粥拾

【釋名】糜爲粥使糜爛也粥濁於糜育育然也厚曰餽薄曰酏米

【主治】止消渴煩熱時珍

小麥粥【主治】止消渴煩熱時

糯米○秫米○黍米粥【氣味】甘溫無毒

器

用杏仁和諸花作之

【主治】咳嗽下血氣調中藏

時珍

一

【主治】益氣治脾胃虛寒。洩痢吐逆。小兒痘瘡白色。珍時

粳米○稻米○粟米○梁米粥【氣味】甘溫平無毒。

【主治】利小便止煩渴養腸胃。時珍

【發明】孟醫通云一人病淋素不服藥予令專啖粟米粥絕去他味旬餘減月餘痊此五穀治病之食之妙訣齊和尙說山中僧每將旦一粥甚繫利害如不食則終日覺臟腑燥潤蓋粥能暢胃氣生液也大抵養生求安樂亦無深遠難知之事不過寢食之間爾故作此勘人每日食粥勿大笑也此皆著蘇津飲

綠豆粥解熱毒止煩渴。

御米粥治反胃利大腸。

薏苡仁粥除溼熱利腸胃。

蓮子粉粥健脾胃止洩痢。

芡實粉粥固精氣明耳目。

菱實粉粥益腸胃解內熱。

栗子粥補腎氣益腰脚。

薯蕷粥補腎精固腸胃。

芋粥寬腸胃令人不饑。

百合粉粥潤肺調中。

蘿蔔粥消食利膈。

胡蘿蔔粥寬中下氣。

馬齒莧粥治癰消腫。

油菜粥調中下氣。

莙�蓬菜粥健胃益脾。

菠蘿菜粥和中潤燥。

薺菜粥明目利肝。

芹菜粥去伏熱利大小腸。

芥菜粥豁痰辟惡。

葵菜粥潤燥寬腸。

韭菜粥。溫中暖下。

葱豉粥。發汗解肌。

茯苓粉粥。清上實下。

松子仁粥。潤心肺。調大腸。

酸棗仁粥。治煩熱。益膽氣。

枸杞子粥。補精血。益腎氣。

薤白粥。治老人冷利。

生薑粥。溫中辟惡。

花椒粥。辟瘴禦寒。

茴香粥。和胃治疝。

胡椒粥。茱萸粥。辣米粥。並治心腹疼痛。

麻子粥。胡麻粥。郁李仁粥。並潤腸治療。

蘇子粥。下氣利膈。

竹葉湯粥。止渴清心。

豬腎粥。羊腎粥。鹿腎粥。並補腎虛諸疾。

羊肝粥。雞肝粥。並補肝虛明目。

羊汁粥。雞汁粥。並治勞損。

鴨汁粥。鯉魚汁粥。並消水腫。

牛乳粥。補虛羸。

酥蜜粥。養心肺。

鹿角膠入粥食。助元陽。治諸虛。

炒麵入粥食。止白痢。○燒鹽入粥食。止血痢。

麩尺沼切。○拾遺

【校正】原附粟下。今分出。

【釋名】糗去九切。一時珍曰。一炒者也。劉熙釋名云。糗。穀也。飯而磨之使穀碎也。

【集解】恭曰。一麩。蒸米麥熟過磨作之。一藏器曰。河東人以麥爲之。北人以粟爲之。東人以梗米爲之。炒乾飯磨成也。粗者爲乾糗糧。

米麥麩氣味。甘苦微寒。無毒。一酸寒。一藏器曰。

【主治】寒中除熱。消渴下氣。蘇和水服。解煩熱。止洩。實大腸。器炒米湯。止煩渴。

餌綱

**【釋名】**粢。時珍曰：「一餅以粢糲合梗米粉蒸成，狀如凝膏也。」單糯粉作者曰粢。米粉合豆末糖蜜者曰餌。釋名云：粢，慧軟也。餅而也相黏而也。揚雄方晉云：餌謂之餌。或謂之粢。或謂之粢。音令或謂之餌。音渴然亦微有分別不可不知之也。

**【氣味】**甘溫無毒。時珍曰：「梗米糕易消化，難剋化。損脾或積小兒尤宜禁之。」

**【主治】**粳糕養脾胃，厚腸益氣和中。○粢糕益氣暖中，縮小便，堅大便效。

時珍

**【發明】**時珍曰：「晚梗米糕可代蒸餅丸脾胃藥，取其易化也。糯米粢可代糰糊丸丹藥，取其相黏食飯二百粒，或一百粒，獨蒜一枚，恒山一兩，以水二盞浸一夜，五更煎至一盞，頓服，當下利為度。」

**【附方】**新一老人泄瀉，乾餅一兩，薑湯泡化代飯，簡便方。

糰糊  
目

**【釋名】**角黍。時珍曰：「糰俗作粽。古人以菰蘆葉裹黍米煮成，尖角如糰欄葉心之形，故曰糰。曰角龍也。」

**【氣味】**甘溫無毒。

**【主治】**五月五日取糰尖，和截瘡藥良。

寒具綱  
目

**【釋名】**捻頭。錢環餅術饑也。環餅，象環劍形也。饑易消散也。服虔通俗名謂之餳。張揖廣雅謂之釋。綱目

楚辭謂之粗枝雜字解詁謂之青環。

【集解】一時珍曰一錢乙方中有捻頭散葛洪肘後有捻頭湯醫書不載按鄭玄註周禮云寒具米食也以糯粉和麪麻油煎成以餉食之可留月餘宜禁烟用觀此則寒具卽今微子也以糯粉和麪入少鹽牽索紐捻成環鉤之形油煎食之劉禹錫寒具詩云纖手搓成玉數尋碧油煎出嫩黃深夜來春睡佳人纏臂金。

【氣味】甘鹹溫無毒。

【主治】利大小便潤腸溫中益氣時珍。

【附方】新二錢氏捻頭散治小兒小便不通用延胡索苦棟子等分爲末每服半錢或一錢血痢不止地曬研爲末每服二錢摻在羊血上炙熟食之以捻頭煎湯送下或以地榆煮汁熬如飴狀一服三合捻頭湯化下。

蒸餅綱目

【釋名】一時珍曰按劉熙釋名云餅者并也溲麪使合并也有蒸餅湯胡餅索餅酥餅之屬皆隨形命名也。

【集解】一時珍曰小麦麪脩治食品甚多惟蒸餅其來最古是酵糟發成單麪所造丸藥所須且能爛濾過和脾胃及三焦藥甚易消化且麪已過性不助溼熱其以果菜油膩諸物爲餡者不堪入藥性。

【氣味】甘平無毒。

【主治】消食養脾胃溫中化滯益氣和血止汗利三焦通水道時珍。

**【發明】**時珍曰：按愛竹談藏云：宋寧宗爲郡王時，病淋，日夜凡三百起。國醫問措，或舉孫琳治之。淋只是水道不利，三物皆能通利，故爾。若琳者，其可與語醫矣。

**【附方】**六積年下血寒食蒸餅烏龍尾各一兩，阜角七挺去皮酥。下痢赤白。治營衛氣虛風邪襲入腸胃之間，便痢赤白，膀胱虧冷。

痛裏急後重煩渴脹滿不進飲食，用乾蒸餅蜜炒二兩，御米殼蜜炒四錢，煎化熱服。傳信適用妙方。

崩中下血陳年蒸餅燒存性，米飲服二錢。盜汗自汗，每夜臥時帶饑，喫蒸餅一枚。一切折傷。

寒食蒸餅爲末，每服二錢酒下，甚驗。

肘後方：湯火傷灼，餽頭餅燒存性研末，研末。

### 女麴拾

**【校正】**原附小麥

**【釋名】**麴子音桓黃子完麥，罷成黃子，故有諸名。

**【集解】**恭曰：女麴完小麥爲飯，和成麴之，待上黃衣取曬。

**【氣味】**甘溫無毒。

**【主治】**消食下氣止洩痢，下胎破冷血。

蘇

### 黃蒸拾

**【校正】**原附小麥

**【釋名】**黃衣蘇恭麥黃時珍曰：此乃以米麥粉和

蒸成黃故有諸名。

**【集解】**恭曰：黃蒸磨小麥粉拌水和成餅，麻葉裹待上黃衣取曬。藏器曰：黃蒸與麴子不疎，人以小麥，南人以梗米，六七月作之，生綠塵者佳。時珍曰：女麴蒸麥飯，罷成黃蒸，磨米

有參粉罨成，稍  
不同也。

【氣味】主治並同女麴。蘇恭溫補能消諸生物藏器溫中下氣消食除煩華治食黃黃汗時

【附方】新一癰黃疽疾或黃汗染衣涕唾皆黃用好黃蒸二升每夜以水二升浸微暖於銅器中平旦絞汁服半升極效必效方

麴祐宋嘉

【釋名】酒母

時珍曰麴以米麥包罨而成故字從麥從米從包省文會意也酒非麴不生故曰酒母書云若作酒醴爾惟麴蘖是矣劉熙釋名云麴朽也變使生衣敗朽也

【集解】藏器曰一麴六月作者良入藥須陳久者炒香用

時珍曰麴有麥麴米造者不一皆酒磨碎以淘麥水和作塊楮葉包罨懸風處七十日可用矣造麴法三伏時用白麴五斤綠豆五斤以

蓼汁煮爛辣蓼末五兩杏仁泥十兩和踏成餅楮葉裹懸風處候生黃收之造白麴法用麴五斤糯米粉一斗水拌濕篩過踏餅楮葉包掛風處五十日成矣又米麴法用糯米粉一斗自然蓼汁和作酒圓丸楮葉包掛風處七日曬收此數種麴皆可入藥其各地有入諸藥草及毒藥者皆有毒惟可造酒不可入藥也

小麥麴【氣味】甘溫無毒

震亨曰一麸皮涼入大腸經

【主治】消穀止痢

別錄

平胃氣消食痔治小兒食癟

蘇恭調中下氣開胃療臟腑中風寒

器主霍亂心膈氣

瘍逆除煩破癥結

孟诜

補虛去冷氣除腸胃中塞不下食令人有顏色

吳瑞落胎并下鬼胎

日止河魚之疾

大麥麴【氣味】

前同

勸醫文

【主治】消食和中下生胎破血取五升以水一斗煮三沸分五服其子如糜令母肥盛時珍○

麴米麴氣味同前

【主治】消食積酒積糯米積研末酒服立愈餘功同小麥麴時珍○

出千金

【附方】舊五新四米穀食積炒麴末白湯調服二錢日三服三焦滯氣陳麴炒萊菔子炒等分每用三化用麴未湯服方寸匕日三千金水痢百起六月六日麴炒黃馬蘭子等分爲末米飲服赤白痢下水穀不消以麴熬日四五服肘後方酒毒下血空心米飲服二錢神效傷寒食復之良餅煮汁飲或上搶心下血者生服三升肘後狐刺尿瘡瘍孔中蟲出愈古今錄驗

神麴藥性論

【釋名】集解時珍曰昔人用麴多是造酒之麴後醫乃造神麴專以供藥力更勝之蓋取諸神聚會之日造之故得神名賈思勰齊民要術雖有造神麴古法繁瑣不便近時造法更簡易也葉氏水靈錄云五月五日或六月六日或三伏日用白麴百斤青蒿自然汁各三升以配白虎青龍朱雀玄武勾陳蟠蛇六神用汁和麴末杏仁作餅麻葉或楮葉包裹如造醬黃法待生黃衣曬收之

【氣味】甘辛溫無毒元素曰一陽中之陽也入足陽明經凡用須火炒黃以助土氣久者良

【主治】化水穀宿食癥結積滯健脾暖胃性養胃氣治赤白痢元素消食下氣除痰逆霍亂泄痢脹滿諸疾其功與麴同。閃挫腰痛者煅過淬酒溫服有效婦人產後欲回乳者炒研酒服二錢日二卽止甚驗

時珍

【發明】「時珍曰」按倪維德啓微集云：神麴治目病，生用能發其生氣，然用能斂其暴氣也。

【附方】舊一新六 胃虛不尅。蜜丸彈子大。每食後嚼化一丸。普濟方。壯脾進食。神麴炒蒼朮泔制炒等用。者分爲末。糊丸梧子大。每米飲服五十丸。冷健胃思食。養食丸。治脾胃俱虛不能消化水穀胸膈痞悶。腹蕪炒三兩乾薑炮四兩烏梅肉焙四兩爲末。蜜丸梧子大。每米飲服五十丸。日三服。和劑局方。虛寒反胃。方同。暴泄不止。神麴炒二兩茱萸湯泡兩兩爲末。醋糊丸梧子大炒。每服五十丸。米飲。產後通絕。神麴炒爲末。水服。食積心痛。陳神麴一塊燒紅淬酒。千金方。大盤服之。摘玄方。

紅麴丹溪遺

【集解】「時珍曰」紅麴本草不載法出近世亦奇術也。其法用梗米一石五斗水淘浸一宿作飯。分十五處入麴母三斤。搓揉令勻。併作一處以帛密覆熱即去帛攤開覺溫急堆起又密覆次日日中又作三堆過一時分作五堆再一時合作一堆又過一時分作十五堆稍溫又作一堆如此數次第三日用大桶盛新汲水以竹籬盛麴作五六分。灑溼完又作一堆如前法作一次第四日如前又灑若麴半沉半浮再依前法作一次又灑若盡浮則成矣。取出日乾收之其米過心者謂之生黃。入酒及鮭醢中鮮紅可愛未過心者不甚佳。入藥以陳久者良。

【氣味】甘溫無毒。腸風痔瘻脚氣哮喘淡嗽諸疾。

瑞曰：釀酒則辛熱有小毒發

【主治】消食活血健脾燥胃治赤白痢下水穀亨釀酒破血行藥勢殺山嵐瘴氣治打撲傷損。吳治女人血氣痛及產後惡血不盡擂酒飲之良。

【發明】「時珍曰」人之水穀入於胃受中焦溼熱蒸熟游溢精氣變化爲紅散布臟腑經絡是爲營此造化自然之微妙也。造紅麴者以白米飯受溼熱鬱蒸變而爲紅卽成真色久亦不渝此

乃人穀造化之巧者也。故紅麴有治脾胃營血之功。得同氣相求之理。

**附方** [新] 溼熱泄痢。丹溪青六丸用六一散加炒紅麴五錢爲末。蒸餅和丸梧子大每服五七十九丸。白湯下日三服。○丹溪心法。小兒吐逆。頻頻不進乳食。手足心熱。用紅麴年久者三錢。牛白朮炒一錢半。甘草炙一錢。爲末。每服半錢。煎棗子米湯下。經濟小兒頭瘡。因傷溼入水成毒。濃汁不止。用赤麴一錢。爲末。每服半錢。煎棗子米湯下。○附方。心腹作痛。香附乳香等分。爲末。酒服。摘玄方。

### 粟米別錄

中品

**【釋名】** [弘景曰] 此是以米作粟。非別米名也。 [恭曰] 穀猶孽也。生不以理之名也。皆當以可生之物生之。取其粟中之米入藥。按食經用稻。稭稻卽穢穀之總名。陶謂以米作粟。非矣。米豈能更生乎。

**【集解】** [宗奭曰] 穀米。粟蘖也。 [時珍曰] 別錄止云。穀米。不云粟作也。蘇恭言。凡穀皆可生者。是矣。有粟黍。穀麥豆諸蘖。皆水浸脹候。生芽曝乾去蘖。取其中米炒研。麪用其功。皆主消導。今併集於左。方日華子謂穀米爲作醋黃子者。亦誤矣。

**粟蘖** 一名粟芽。 [氣味] 苦溫。無毒。 [宗奭曰] 今穀神散中用之。性溫。於麥蘖。

**【主治】** 寒中下氣除熱。別錄除煩。消宿食。開胃。爲末和脂傅面。令皮膚悅澤。陶弘景

稻蘖。一名穀芽。 [氣味] 甘溫。無毒。

**【主治】** 快脾開胃。下氣和中。消食化積。時珍。

**【附方】** [新] 啓脾進食。穀神丸用穀蘖四兩爲末。入薑汁鹽少許。和作餅焙乾。入炙甘草砂仁白朮炒各一兩爲末。白湯點服之。或丸服。澄療方。

穠麥蘖。一名麥芽。氣味鹹溫無毒。

【主治】消食和中。別錄。破冷氣。去心腹脹滿。性開胃。止霍亂。除煩悶。消痰飲。破癥結。能催生落胎。日補脾胃虛。寬腸下氣。腹鳴者用之。元素。消化一切米麪諸果食積。時珍。

【發明】好古曰。一麥芽神麴二藥。胃氣虛人宜服之。以代戊己腐熟水穀豆蔻縮砂烏梅木瓜芍藥食畢輒甚。用大麥蘖一升。椒一兩。並炒乾薑粟蘖皆能消導米麪諸果食積。觀造餳者用之。可以類推矣。但有積者能消化。無積而久服。則消人元氣也。不知若久服者。須同白朮諸藥兼用。則無害也矣。

【附方】舊三快膈進食。麥蘖四兩。神麴二兩。白朮橘皮各一兩。爲末。蒸餅丸梧子大。每人參湯下三五十丸。效。穀勞嗜臥。人四肢煩重。喫嘿欲臥。食畢輒不消。羸瘦弱乏。因生百疾。大麥蘖五升。三兩搗末。每服方寸匕。白湯下。日三。肘後腹中虛冷。食輒不消。大麥蘖半斤。豉五合。杏仁二升。皆熬黃香搗篩糊丸。彈子大。每服一丸。白湯下。肘後方。產後腹腫不通。轉氣急坐臥不安。以麥蘖一合。爲末。和酒服。良久通轉。神產後青腫。乃血水積也。乾漆大麥蘖等分。爲末。新瓦中鋪漆一層。蘖一層。重重令產後諸疾並宜。婦人經驗方。產後祕塞。妄服藥丸。宜用大麥芽炒黃。爲末。每服三錢。沸湯調下。與粥同服。婦人良方。妊娠去胎。小品用大麥芽。一升水。三升煮。二升分三服。神效。○產後回乳。產婦無子。食乳。乳不消。令人發熱惡寒。用大麥蘖二兩。炒爲末。每服五錢。白湯下。甚良。丹溪纂要方。

飴餉別錄

【釋名】鈎。音徐盈切。一時珍曰。按劉熙釋名云。餉之清者曰餉。形怡怡然也。稠者曰鈎。強硬如錫也。紫類琥珀方中謂之鈎。如鈎而濁者。曰餉。方言謂之餕。餕音長皇。楚辭云。粃粃蠻餕。用餕餕是也。嘉謨曰。一因色。乾枯者名鈎。

**【集解】**〔弘景曰〕方家用餉乃云膠餉是溼餉如厚齧者其凝結及牽白者餉餉不入藥用。韓保造惟以糯米作者入藥粟米次之餘但可食耳。時珍曰：餉餉用麥蘖或穀芽同諸米熬煎而成。古人寒食多食餉故醫方亦收用之。

**【氣味】**甘大溫無毒。入太陰經。〔宗奭曰〕多食動脾氣。〔震亨曰〕餉屬土而成為火。大發溼中病者切宜忌之。生瘍動火最甚。甘屬土腎病多食甘。傷腎骨痛而齒落皆指此類也。

**【主治】**補虛乏止渴去血。錄補虛冷益氣力止腸鳴咽痛治唾血消痰潤肺止嗽。

珍

健脾胃補中治吐。

血打損瘀血者熬焦酒服能下惡血。又傷寒大毒嗽於蔓菁薤汁中煮一沸頓服之良。〔孟暉〕脾弱不思食人少用能和胃氣亦用和藥。寇宗解附子草烏頭毒時。

**【發明】**〔弘景曰〕古方建中湯多用之。餉與酒皆用米蘖而餉居上品酒居中品是餉以和潤為優。酒以醺亂為劣也。〔成無己曰〕脾欲緩急食甘以緩之。膠餉之甘以緩中也。〔好古曰〕餉乃脾經氣分藥也。甘能補脾之不足。〔時珍曰〕集異記云：刑曹進河朔健將也。為飛矢中目拔矢而斂留于中。鉗之不動痛困俟死。忽夢胡僧令以米汁注之必愈。廣詢于人無悟者。一日一僧丐食宵所夢者叩之僧云：但以寒食餉點之。如法用之清涼頓減酸楚至夜瘡癰用力一鉗而出旬日而瘳。

**【附方】**舊二老人煩渴寒食大麥一升水七升煎五升入蛟龍癥病。凡人正二月食芹菜誤食蛟龍精每服寒食餉二合渴即飲之。奉親書簡便方魚骨哽咽不能出用餉餉丸。雞子黃兩頭可驗。吐蛇者勿用金匱要略。魚臍疔瘡者燒灰。千金方療疽毒瘡數日則愈。千金方誤服藥過劑悶亂者餉餉。草烏頭毒及天雄附子毒並食手足癰瘡炒臍月餉傅火燒成瘡粉白餉燒灰。

**醫  
下別小易  
品錄品選  
方**

**【釋名】**〔時能珍食物曰〕按劉熙釋名云：醬者，將

**氣味**鹹冷利無毒。兒無牽生瘡，動氣妊娠，合雀肉食之，令兒面白黑。**一頤曰**：「麥醬和鯉魚食，生口瘡。」**主治**除熱止煩滿，殺百藥及熱湯火毒。**別錄**：殺一切魚肉菜蔬蕈毒，并治蛇蟲蜂蠍等毒。**日華**：醬汁灌入下部，治大便不通。灌耳中，治飛蛾蟲蟻入耳。塗獵犬咬及湯火傷灼未成瘡者，有效。又中砒毒，調水服。

**【發明】**「弘景曰：」醬多以豆作。純麥者少。入藥當以豆醬陳久者彌好也。又有魚醬肉醬皆呼爲鹽。夷曰：」聖人不得醬不食。意欲五味和五臟。悅而受之。此亦安樂之一端也。」時珍曰：」不得醬不食。亦無取其殺飲食百藥之毒也。」

**【附方】**六手指掣痛。醫清和蜜。溫熱浸之。千金瘧瘧風駁。日揩之。外臺祕要。妊娠下血。豆醬二升去汁。取古今錄驗。妊娠尿血。豆醬一大盞。熬乾生地黃二兩爲普濟方。浸淫瘡癬。醬瓣和人尿塗解輕粉毒。服輕粉口之。陳醫化水頻漱。瀕湖集簡方。

**榆仁醬食**

**【校正】**原附醬下。

今分出

**【集解】**〔時珍曰〕造法。取榆仁水浸一伏時。袋盛。擣洗去涎。以蓼汁拌曬。如此七次。同發過麪。

**【氣味】**辛美。溫無毒。

**【主治】**利大小便。心腹惡氣。殺諸蟲。不宜多食。孟曉。

**蕷荑醬食**

**【校正】**原附醬下。

今分出

**【集解】**〔時珍曰〕造法與榆仁醬同。

**【氣味】**辛美。微臭。溫無毒。多食落髮。

**【主治】**殺三蟲。功力強於榆仁醬。孟曉。

**醋別錄**

**【釋名】**酢。音醯。苦酒。弘景曰。醋酒爲用無所不入。愈久愈良。亦謂之醯。以有苦味。俗呼苦酒。丹

**【發明】**〔張從正曰〕北人亦多食乳酪酥脯甘美之物。皆生蟲也。萌也。而不生蟲者。蓋食中多胡荽蕷荑鹵汁。殺九蟲之物也。

古方多用  
酢字也。

**【集解】**「恭曰」醋有數種。有米醋、麥醋、麴醋、糟醋、釀醋、桃醋、蒲萄大棗蔓蕡等諸雜果醋。會多爲米醋。小麥醋不及糟醋。爲多妨忌也。大麥醋良。藏器曰：蘇言蒲萄大棗諸果堪作醋。緣渠是荆楚人土地儉，倚果敗，則以釀酒也。糟醋猶不入藥，況於果乎。時珍曰：米醋三伏時用倉米一斗淘淨蒸飯，攤冷，盦黃曬，簸水淋淨，別以倉米二斗蒸飯，和勻入甕，以水淹過，密封暖處，三七日成矣。糯米醋秋社日用糯米一斗淘蒸，用六月六日造成，小麥大麴和勻用水二斗入甕，封釀三七日成矣。粟米醋用陳粟米一斗淘浸七日，再蒸淘熟，入甕密封，日夕攪之，七日成矣。小麥醋用小麥水浸蒸飯，盦黃曬乾，水淋過，再以麥飯二斗和勻，入水封閉，三七日成矣。鶴醋用錫一斤水三升煎化，入白麴末，二兩瓶封，曬成。其餘糟糠等醋，皆不入藥，不能盡紀也。

**米醋**〔氣味〕酸苦溫無毒。〔洗〕曰：「大麥醋微寒，餘醋並同。」弘景曰：「多食損人肌臟。」藏器曰：「酸屬木，脾病毋多食。酸傷脾肉，腸而唇揭。○服茯苓丹參。」人不可食。醋鑑源曰：米醋煮制四黃丹砂膽礬常山諸藥也。

**【主治】**消癰腫，散水氣，殺邪毒，錄理諸藥，消毒，鵝治產後血運，除癥塊，堅積消食，殺惡毒，破結氣，心中

酸水痰飲，器下氣除煩，治婦人心痛，血氣并產後及傷損金瘡出血，昏運殺一切魚肉菜毒，華醋磨青

木香止卒心痛，血氣痛，浸黃蘖含之，治口瘡，調大黃末塗腫毒，煎生大黃服，治痃癖甚良。孟

黃疸黃汗。〔好古曰〕張仲景治黃汗有黃芪芍藥桂枝苦酒湯治黃疸有麻黃醇酒湯苦酒清酒方見金匱要略。

**【發明】**「宗奭曰」米醋比諸醋最驟，入藥多用之。穀氣全也。故勝糟醋。產婦房中常以火炭沃醋，氣弱，水氣強，故如是。造靴皮者須得醋而紋，故知其性收斂，不負酸收之意。時珍曰：按孫光憲

北夢瑣言云：一婢抱兒落炭火上燒灼，以醋泥傅之，旋愈無痕。又一少年眼中常見一鏡，趙卿謂之曰：

來晨以魚鱠奉候及期延至從容久之少年饑甚見臺上一甄芥醋旋旋啜之遂覺胸中豁然眼花不見廁云君吃魚鱠太多魚畏芥醋故權証而愈其疾也觀此二事可證別錄治癰腫殺邪毒之驗也大抵醋治諸瘡腫積塊心腹疼痛淡水血病殺魚肉菜及諸蟲毒氣無非取其酸收之義而又散瘀解毒之功李廷飛云醋能少飲辟寒勝酒王翫自幼不食醋年踰八十猶能傳神也

**【附方】**新十三身體卒腫，醋和蚯蚓屎，白虎風毒濾出，以布染乘熱裹之，煎五升，沸切葱白三根，外升煎一沸，霍亂祕要，霍亂。

**吐利良** 鹽醋煎服甚  
**如宜方** 霍亂煩脹，未得吐下，以好苦酒一升飲之。**千金方** 足上轉筋，以故綿浸醋中，微蒸熱裹之。外整出汗不滴，瘦。

腰脚并耳聾者米醋浸荆三稜夏四日冬六腋下胡臭三年釀酢和石蠶瘍風病之酢和硫黃末傅確有經驗後方

不潰苦酒和雀屎如小豆大。傳舌之上下。木舌種強。餌醋時時含牙蘞。

瘡。米醋煮枸杞白皮一升，取鼻中出血。醋和胡粉半匙，許服。○又法用醋塞耳治聾，以醇酢微火炙。

治癰生疔瘻卽瘻。疔後方生口口和土塗隆潤乾卽易之。千金方塞耳治更附子削尖塞之。千面曾瘡卽苦酒漬布常常中此石毒飲釀醋得吐卽愈。服硫發難。醉和豉研膏傅之。食雖不詳飲

金方曰點石取拭之。勝後方中研不事不可飲水。廣記用研發癰燥則易。千金方竹簽子毒醋少許卽消。軍才強呂方見石鋒易者。清醋急軟一二盞。令毒氣欲到。酢甕附子甘草吳公交趾。

廣記方 潤身蟲出部鹽石毒蛇傷螫不散然後用藥濟急方 蠍刺蟹人之口醫學心鏡 蝦咬毒凡百節抽延義人耳以苦酒生

**傷**塗目以甚妙亦無瘢痕也。狼煙入口以醣少許飲足上凍瘡以醣洗足胎死不下煮醋服三升立

潰之冷則更燒石投之千金。疗腫初起用蠶圍住以一鍼亂刺瘡上。三度銅器根煎醋沸過三次卽愈。

**中別品錄**

酒

中別  
品錄

校  
正

酒指今這併稱爲筭一酒社

**【釋名】**『時珍曰』按許氏說文云酒就也所以就人之善惡也。一說酒字篆文象水在齒中之狀飲曰醞白曰醕。

**【集解】**『穣』不異惟米酒入藥用藏器曰凡好酒欲熟時皆能候風潮而轉此是合陰陽也。『洗』曰酒有紫酒蠶酒桑椹酒葱豉酒蒲萄酒蜜酒及地黃牛膝虎骨牛蒡大豆枸杞通草仙靈脾狗肉等皆可和釀作酒俱各有方。『宗奭』曰戰國策云帝女儀狄造酒進之於禹說文云少康造酒即杜康糟下酒糗酒秫黍酒蒲萄酒地黃酒蜜酒有灰酒新熟無灰酒社壇餘胙酒今人所用有糯米酒煮酒美酒豆麴酒香葉麴酒鹿頭酒羔兒等酒江浙湖南又以糯粉入衆藥和爲麴曰餅子酒至於官務中亦見不作疾者蓋此物損益兼行可不慎歟。漢賜丞相上尊酒爲上稷爲中粟爲下今人又以蘖造者蓋止是醴非酒也書云若作酒醴爾惟麴蘖酒則用麴體則用蘖氣味甚相遠治療豈不殊也。『穎』曰入藥用東陽酒最佳其酒自古擅名事林廣記所載釀法其蘖亦用藥今則絕無惟用麴麴汁拌造。『時珍』曰金盆露水和蠶造麴以浮飯造釀醇不作瀉其水秤之重於他邑所造俱不然皆水土之美也處州金盆露黃飲之至醉不頭痛不口乾美可尙而色香劣於東水多陽能聚淡山東秋露白色純烈蘇州小瓶酒麴有羣藥金陵瓶酒麴米無蠶而水有鹹且用灰味太甘簡吸飲穀麥黍豆即此常飲入藥俱良山西襄陵酒。

**【米酒】**苦甘辛大熱有毒。『洗』曰久飲傷神損壽軟筋骨動氣病。『士良』曰凡服丹砂北庭石乳飲令入四肢滯血化爲癰疽。『藏器』曰凡酒忌諸甜物脂鍾乳諸石生蠶並不可長用酒下不能引酒合乳飲令人氣結用牛肉食令人生蟲酒後臥黍穉食豬瘦照人無影不可飲祭酒自耗不可飲。

肉患大風。時珍曰：酒後食芥及辣物，緩人筋骨。酒後飲茶傷腎藏，腰脚重墜。膀胱冷痛，兼患澀飲水腫，消渴，掣痛之疾。一切毒藥因酒得者，雖治又酒得鹹而解者，水制火也。酒性上而鹹潤下也。又畏枳根葛花，赤豆花綠豆粉者，寒勝熱也。

【主治】行藥勢，殺百邪，惡毒氣。鋒通血脈，厚腸胃，潤皮膚，散濕氣，消憂發怒，宣言暢意。器養脾氣，扶肝，除風下氣。孟解馬肉桐油毒丹石發動諸病，熱飲之甚良。時

糟底酒。三年臘糟

下取之。開胃下食，暖水臟，溫腸胃，消宿食，禦風寒，殺一切蔬菜毒。日止嘔噦，摩風癩，腰膝疼

老酒。經數十年不壞，可和血養氣，暖胃辟寒，發痰動火。時

春酒。清明釀造者，亦可經久。常服令人肥白。孟解蠻蝮尿瘡，飲之至醉，須臾蟲出如米也。

李絳兵手集

社壇餘胙酒。拾遺治小兒語遲，納口中佳。又以噴屋四角，辟蚊子。器飲之治聾。時珍曰：按海錄碎事有社翁今日沒，心情爲寄治聾酒一瓶之句。

糟筍節中酒。氣味鹹平，無毒。

【主治】飲之，主嘔氣嘔逆，或加小兒乳及牛乳同服，又摩癰瘍風器。

東陽酒。氣味甘辛，無毒。

【主治】用制諸藥良。

**發明**一弘景曰一大寒凝海惟酒不冰明其性熱獨冠羣物藥家多用以行其勢人飲多則體弊腹者死飽食者病飲酒者健此酒勢辟惡勝於他食之效也一好古曰一酒能引諸經不止與附子相同味之辛者能散苦者能下甘者能居中而緩用爲導引可以通行一身之表至極高分味淡者則利小便而速下也古人惟以麥造麴釀黍已爲辛熱有毒今之醸者加以烏頭巴豆砒霜薑桂石灰竈灰之類大毒大熱之藥以增其氣味豈不傷沖和損精神涸榮衛竭天癸而天夫人壽耶一震亨曰一本草止言酒熱而有毒不言其溼中發熱近於相火醉後振寒戰慄可見矣又性喜升氣必隨之痰鬱于上潤濕于下恣飲寒涼其熱內鬱肺氣大傷其始也病淺或嘔吐或自汗或瘡疥或鼻皺或泄別或心漏爲難名之病非具眼未易處也夫醉酒性大熱飲者適口不自覺也理宜冷飲有三益焉過于肺入脾於胃然後微溫肺得溫中之意可以補氣次得寒中之溫可以養胃冷酒行遲傳化以漸人不得恣飲更甚既醉既飽睡而就枕熱擁傷也今則不然圖取快喉舌焉爾一穎曰一人知戒早飲而不知夜飲更甚既醉既飽睡而就枕熱擁傷也心傷自夜氣收斂酒以發之亂其清明勞其脾胃停溼生瘡動火助慾因而致病者多矣朱子云以醉爲節可也一機曰一按扁鵲云過飲腐腸爛胃潰髓蒸筋傷神損壽昔有客訪周顗出美酒二石顗飲酒天之美祿也一石二斗客飲八斗次明顥無所害客已脇穿而死矣豈非犯扁鵲之戒乎一時珍曰一酒天之美祿也一驚怖卒死之卽醒鬼擊諸病血卒然着人如刀刺狀胸膈腹內切痛不可抑按或後馬氣敗云美酒甚則喪邦醉後此得飲酒之妙所謂醉中趣壺中天者也若夫沈湎無度醉以爲常者輕則致疾行甚則飲教微亡家而隕軀命其害可勝言哉此大禹所以疏儀狄周公所以著酒誥爲世範戒也一驚怖卒死溫酒灌鼻血下血一名鬼排以醇酒吹兩鼻不可抑按或

**入瘡**或馬汗馬毛入瘡皆致腫痛煩熱入腹則殺人多飲醇酒至醉卽愈妙。肘後方。

**虎傷人瘡**但飲酒常令大醉。蛇咬成瘡，燒酒淋洗瘡上。  
**一合酥**一匕乾薑末二匕。三十年耳聾子一升七日去。

澤任性飲之。天行餘毒。手足腫痛。欲斷作坑深千金方。履居坑上。以衣壅之。勿作坑深。外塗方。產後血悶。清酒一升。和生地黃汁煎服。梅師身面疣過三度良。產後血悶。清酒一升。和生地黃汁煎服。梅師身面疣

三尺燒熱灌酒着下部痔瘡。掘地作小坑燒赤以酒沃之。納吳茱萸在內坐之。不令泄氣。類要方。下部痔瘡。掘地作小坑燒赤以酒沃之。納吳茱萸在內坐之。不令泄氣。

飲酒七升碌砂半兩瓶浸緊封安豬圈內任豬搖動七日取出頓丈夫腳冷不隨不能行者用津酒三  
飲飲○又方正月一日酒五升淋碓頭杵下取飲之千金方令冷三日止千金方勿

之漬脚至膝常着灰火勿海水傷裂凡人爲海水鹹物所傷及風吹裂痛不可忍用蜜半斤水酒三  
斤防風當歸羌活荆芥各二兩爲末煎湯浴之一夕即愈使琉十

錄

【附諸酒方】今輯其簡要者以備參考藥品多者不能盡錄

愈瘡酒治諸瘡疾頻頻溫飲之四月八日米一石麴一斤爲末俱酸水中待酢煎之一石取七

屠蘇酒陳延之小品方云此華陀方也

元旦飲之辟疫癘一切不正之氣造法用赤木桂心七錢五分

屠蘇酒防風一兩菝葜五錢蜀椒桔梗大黃五錢七分烏頭二錢五分赤小豆十四枚以三角絳糞盛

之中歲飲此水一世無病○時珍曰一蘇魏鬼名此藥屠割鬼爽故名或云草菴名也

逡巡酒補虛益氣去一切風痹溼氣久服益壽耐老好顏色造法三月三日收桃花三兩三錢五月五

六月六日收脂麻花六兩六錢九月九日收黃甘菊花九兩九錢陰乾

十二月八日取臘水三斗待春分取桃仁四十九枚好者去皮尖白麪十斤正同前花和作

麴紙包四十九日用糯米飯一瓶白水一塊封地榆諸藥和麴

五加皮酒去一切風溼癆壯筋骨填酒精髓飲用或加當歸牛膝去骨煎地榆諸藥

白楊皮酒以白楊皮切片浸酒煮飲之石

白楊皮酒治風毒脚氣腹中瘻癬如

女貞皮酒治風寒腰膝女貞

仙靈脾酒浸無灰酒二斗密封三日飲之

薏苡仁酒去風同麴紙包四十九日用米釀成飲之

薏苡仁酒治偏風不遂強筋堅骨

仁粉切片浸酒煮飲之

薏苡仁酒治風寒腰膝女貞

一斤蜜方

**天蠶冬酒**潤五臟和血脈久服除五勞七傷癩癧惡疾常令酒氣相接勿令大醉忌生冷十日當出風疹毒氣三十日乃已五十五日不知風吹也冬月用天蠶冬去心煮汁同麴米釀成初熟微酸

**百靈藤酒** 治諸風。百靈藤十斤水一石煎汁三斗入糯米三斗神麯九斤如常釀成三五日更炊糯飯投之卽熟澄清日飲以汗出爲效。聖惠方。

**地黃酒** 補虛弱壯筋骨通血脉治腹痛變白髮用生肥地黃加牛膝汁同熬米封密亦有加葦藥者。日中五七次。

**牛膝酒**壯筋骨治癰瘍補虛損除久瘧用牛膝煎汁和麴米釀酒或切碎袋盛浸酒煮飲之

當歸酒  
當和  
歸血煎  
脈  
汁  
或筋  
癩骨  
或止  
浸諸  
並痛  
如調  
上經  
法水

**菖蒲酒**治耳聰明。一十二病通血脉。治骨癆。久服益人。

**枸杞酒**補虛羸。益精氣。去冷風。壯陽道。止目暎。健腰脚。用地黃發酵。用甘州枸  
杞。煮熟。飲。

**人參酒**補中益氣通治諸虛用**人參末**同**熟米酒**或**發盛浸酒**煮飲

薯蕷酒。治諸風眩。同米茶益精髓。壯脾胃。用薯蕷粉。酒同煮熟。次日服。

**茯苓酒** 治頭風虛寒眩暎腰膝主五勞七伤之

菊花酒治頭風明耳目去癰瘍消百病用甘菊花煎汁同麴米釀酒或加地黃當歸枸杞子諸藥亦佳

**黃精酒**壯筋骨益精髓變白髮治百病用黃精蒼朮各四斤枸杞根柏葉天靈冬三斤煮汁一石同麴十斤糯米一石如常釀酒飲



仙茆酒	治虛之病	用仙茆九蒸九曬浸酒飲
通草酒	續五臟氣	通十二經脈利三焦煎汁同麴米釀酒飲
南藤酒	治風虛	逐冷氣除痹痛強腰脚
松液酒	取其津液	於大松下掘坑置之
松節酒	治冷風虛	弱筋骨堅痛脚氣亦可
柏葉酒	治風瘧	歷節作痛東向飲
枳茹酒	柏葉煮汁	同麴米釀酒飲
椒柏酒	元旦飲之	辟一切疫癘不正之氣除夕以
竹葉酒	治諸風熱病	七枝浸酒一瓶飲
槐枝酒	竹葉煎汁	如常釀心暢意淡
牛勞酒	治中風	刮茹浸酒飲急
枳茹酒	用枳殼刮茹	浸酒飲急
巨勝酒	治風虛	半斤袋盛浸酒飲
麻仁酒	治骨髓風毒	生地黃半斤袋盛浸酒飲
麻子仁	炒香袋盛	不能動者取大
炒香袋盛	治風虛	地黃半斤袋盛浸酒飲
炒香袋盛	治腰脚	牛勞酒治之

紅麴酒治腹中及產後瘀  
血紅麴浸酒煮飲神麴燒赤淬酒飲之

柘根酒治耳聾下方

磁石酒治腎虛耳聾用磁石木通菖蒲等分袋盛酒浸日飲

蠶沙酒治痛用原蠶沙炒黃袋盛缸底糯飯緩擊急疼痛惡瘡疥瘻用白花蛇肉一條袋盛同

烏蛇酒治癰瘍置於風頭頸項瘡亦可浸酒詳見本條○一類曰一廣西蛇酒罐上安蛇數寸其頭則采山中糯飯

花蛇酒治諸風痛殺蟲辟瘡治癰瘍每服數盃當身體習習而愈也

蚺蛇酒治之釀成酒飲亦可浸酒詳見本條○一類曰一廣西蛇酒罐上安蛇數寸其頭則采山中糯飯

藥不能無毒也

蝮蛇酒治惡瘡諸瘻惡風頑癱疾取活蝮蛇一條同醇酒一斗封埋馬溺處周年取出蛇已消化每服數盃當身體習習而愈也

紫酒治中風口偏不語及角弓反張煩亂欲死及鼓脹不能

消以雞屎白一升炒焦投酒中待紫色去津頻飲之

豆淋酒治人產後一切中風諸病用黑豆炒焦以酒淋之溫飲之

霹靂酒治不產氣偏墜婦人崩中下血胎

詳見龜條

龜肉酒治十年咳嗽

釀

**虎骨酒** 黃櫟碎同麴米如常釀酒飲亦可浸酒詳見虎條

**鹿頭酒** 治虛勞不足消渴夜夢鬼物補益精氣鹿頭

**鹿茸酒** 骨煮汁同麴米如常釀酒飲之

**鹿茸酒** 治虛寒弱久服令人肥白癡

**鹿茸酒** 用鹿茸山藥浸酒服詳見鹿茸下

**戊戌酒** 「詵曰」大補元陽「穎曰」其性大熱陰虛無冷病人

**羊羔酒** 大補元氣健脾胃益腰宣和化成殿真方糯米一石如常浸蒸肥羊內七斤麴十四兩杏

**羊羔酒** 仁一斤同煮爛連汁拌飯入木香一兩同釀勿犯水十日熟極甘滑○一法羊肉五斤蒸爛酒飲

浸一宿入滑梨七箇同搗

取汁和麴米釀酒飲之

### 燒酒綱目

**【釋名】火酒** 綱目阿刺吉酒正要

**【集解】**

時珍曰「燒酒非古法也。自元時始創其法。用濃酒和糟入甑蒸令氣上。用器承取滴露。凡取其清如水味極濃烈。蓋酒露也。」穎曰「遲遲酒以燒酒復燒二次入珍寶異香。其蟲每個以檀香十數斤燒煙薰令如漆。然後入酒蠟封埋土中三年絕去燒氣取出用之。曾有人攜至舶能飲三四益卽醉。價值數倍也。有積病飲一二盃卽愈且殺蟲云。予親見二人飲此打下活蟲長二寸許謂之魚蠱。云。」

**【氣味】**辛甘大熱。有大毒。而死。或薑蒜同食。令人生瘡。○鹽冷水綠豆粉解其毒。

**【主治】**消冷積寒氣，燥濕痰。開鬱結，止水泄。治霍亂瘧疾，膈心腹冷痛。陰毒欲死，殺蟲辟癥利小便，堅大使。洗赤目，腫痛有效。

珍時

**【發明】**時珍曰：燒酒純陽毒物也。面有細花者爲真，與火同性，得火即燃。同乎焰，消北人四時飲而散疾。飲治泄瘧而止冷痛也。辛先入肺，和水飲之，則抑使下行，通調水道，而小便長白，熱能燥金耗血。大腸受刑，故令大便燥結，與薑蒜同飲，卽生痔也。若夫暑月飲之，汗出而膈快，身涼，赤目洗之，淚出而腫消，亦散此。乃從治之方焉。過飲不節，殺人頃刻。近之市沽，又加以砒石、草烏、辣灰、香藥助而引之，是假盜以方矣。善攝生者宜戒之。按劉克用病機賦云：有人病赤目，以燒酒入鹽飲之，而痛止，腫消，蓋燒酒性走引鹽通行經絡，使鬱結開而邪熱散。此亦反治劫劑也。

**【附方】**七冷氣心痛，燒酒入飛以頭燒酒，卽止。耳中有核，如棗核大，痛不可動，者以火酒滴入。油茶末各四兩，同浸酒內煮成一處，每日挑食，以茶下之，取效。

### 蒲萄酒綱

**【集解】**新洗曰：「蒲萄可釀酒，藤汁亦佳。」時珍曰：「蒲萄酒有二樣：釀成者味佳，有如燒酒法者，有米醉而易醒者也；燒者，取蒲萄數十斤，同大麴釀醋，取入甑蒸之，以器承其滙露，紅色可愛。古者西番者，次之。平陽太原者，又次之。或云蒲萄久貯，亦自成酒，芳甘酷烈，此真蒲萄酒也。」

**釀酒**〔氣味〕甘辛熱微毒。〔時珍曰〕有熱疾齒

燒酒<sub>〔氣味〕</sub>辛甘大熱有大毒。

〔時珍曰〕

人習而不覺。南人切不可輕生飲之。

〔主治〕暖腰腎。駐顏色。耐寒。正要消痰破癆。

汪

糟綱  
目

〔釋名〕粕綱

〔集解〕〔時珍曰〕櫟穠黍麥皆可蒸釀酒醋熬煎餡飴化成糟粕酒糟須用臘月及清明重

曆者瀝乾入少鹽收之。藏物不敗。錄物能軟。若榨乾者無味矣。醋糟用三伏造者良。

酒糟<sub>〔氣味〕</sub>甘辛無毒。

〔主治〕溫中消食。除冷氣殺腥。去草菜毒。潤皮膚。調臟腑。恭醫撲損瘀血。浸水洗凍瘡。搗傅蛇咬蜂叮。毒。

日華

〔發明〕〔時珍曰〕酒糟有麴蘖之性能活血行經止痛。故治傷損有功。按許叔微本事方云。治腕折曾有人傷折。筋骨痛不可忍者。用生地黃一斤。藏瓜。蘆糟一斤。生薑四兩。都炒熟布裹罨傷處。冷即易之。蘆糟一物入赤小豆末和勻罨於斷傷處。以杉片或白桐片夾之。云不過三日即痊可也。

〔附方〕〔新〕手足破裂。紅糟臘豬脂。薑汁鹽等分研爛炒熟擦之。裂鶴膝風病。酒醋糟四兩。肥阜一箇。去砂糖一兩。薑汁半甌研匀。日塗之。加入燒酒尤妙也。暴發紅腫之。不可忍者。臘糟糟。參方。鶴膝風病。酒醋糟四兩。肥阜一箇。去日塗之。良久痛處如蟻。

行熱簡便良方

大麥醋糟【氣味】酸微寒無毒。

【主治】氣滯風壅手背腳膝痛炒熟布裹熨之三兩換當愈時珍。

乾鶴糟【氣味】甘溫無毒。

【主治】反胃吐食暖脾胃化飲食益氣緩中時珍。

【發明】時珍曰一鶴以糞成暖而消導故其糟能化帶緩中養脾胃止吐也按龜洪濟察方云甘露湯或嚦入炎甘草末二兩鹽少許點湯服之常熟一富人病反胃往京口甘露寺設水陸泊舟岸下夢予在臨汀療一小吏旋愈切勿忽之

【附方】新脾胃虛弱平胃散等分末一斤入乾糖糟炒二斤半生薑一斤半

米粄食  
物。

【釋名】米皮糠亦紙薄之義也

【集解】穎曰一米粄卽精米上細糠也昔陳平食糠穀而肥也時珍曰一糠諸粟谷之殼也其近米之細者爲米粄味極甜鹹年人多以豆屑或草木花實可食者和爛蒸煮以救饑云其

【氣味】甘平無毒。

【主治】通腸開胃下氣磨積塊作糗食不饑光滑膚體可以頤養。穎

春杵頭細糠中品 別錄

【校正】禹錫曰自草部移入此

【集解】時珍曰凡穀皆有糠。此當用穎稻粟秫之糠也。北方多用杵。南方多用碓。入藥並同。丹家言糠火鍊物力倍於常也。

【氣味】辛甘熱。金糠之性則熱也。

【主治】卒噎。刮取含之。煎湯呷之。亦可燒研水服方寸匕。令婦人易產。時珍母祕錄。

【發明】弘景曰治噎用此亦是春搗義。附天下事理多相影響如此。

【附方】舊新一、膈氣噎塞。飲食不下。用碓搗上細糠蜜丸。石蓮肉炒一錢。水煎服。日三次。

聖濟總錄

## 卷二十六

菜部

李時珍曰：凡草木之可茹者謂之菜。韭薤葵葱薑五菜也。素問云：五穀爲養。五菜爲充。所以輔佐穀氣。疏通壅滯也。古者三農生九穀。場圃蔬草木以備饑饉。菜固不止於五而已。我國初周憲王圖草木之可濟生者四百餘種。爲救荒本草。厥有旨哉。夫陰之所生。本在五味。陰之五宮。傷在五味。謹和五味。臟腑以通。氣血以流。骨正筋柔。腠理以密。可以長久。是以內則有訓。食醫有方。菜之於人。補非小也。但五氣之良毒。

各不同。五味之所入有偏勝。民生日用而不知。乃搜可茹之草。凡一百五種爲菜部。分爲五類。曰葷辛。曰

柔滑。曰蓏。曰水。曰芝。桶。舊本菜部三品。共六十五種。今併入五種。移十三種入草部。六種入果部。自草部移入及併二十三種。自穀部移入一種。果部移入一種。外類有名未用。移入三種。

神農本草經一十三種。梁陶弘景註。

本草拾遺一十三種。唐陳氏編。明徽明陳嘉謨蒙簽。

日華本草二種。宋人朱震。元人朱震。補遺。

草一種。宋唐懷微。

本草綱目一十七種。明李時珍。

【附註】魏李當之藥錄。吳普本草。宋雷敷炮炙。宋寇宗奭衍義。金張元素珍珠賦。李杲法象。

會編元朱震。宋大衛。明汪機。

## 菜之一 葸辛類三十二種

韭別錄  
山韭千金文韭附  
葱別錄  
薑別錄  
五辛菜拾遺

葫別錄  
即大蒜  
生薑別錄  
乾薑本經  
馬蘚唐本

薑舊本  
萊菔即蘿蔔  
水蘄即蘿蔔  
莧唐本  
紫莧圖經

芥別錄  
薤唐本  
蒜別錄  
薤唐本  
白芥別錄  
蕪菁別錄  
白芥開寶  
蕪菁別錄  
胡荽嘉祐  
胡荽嘉祐  
胡蘿蔔嘉祐  
胡蘿蔔即胡蘿蔔  
數低蜀胡蘿蔔  
池得蜀胡蘿蔔

王漁思  
本草拾遺  
日華本草二種。宋大明

開寶本草六種。宋志

嘉祐本草十種。禹錫宋掌

食物本草二種。明汪願

食鑑本草一種。明周原

蜀本草二種。蜀韓昇

千金食治二種。孫唐

唐本草七種。唐蘇恭

名醫別錄一十七種。梁陶弘景註。

食療本草三種。唐張鼎

食性本草一種。南唐陳士良

蜀本草二種。蜀韓昇

圖經本草四種。宋蘇頌

證類本草一種。明寧周原

救荒本草一種。周明

蕭炳四聲唐

王好古湯液廣

蕭炳四聲蜀

勒馬思 羅勒 嘉祐  
吉附 卽蘭香

白花菜 食物

蔊菜 綱目

草豉 拾遺

韭別錄

左附方舊一百五十新二百九十二

菜之一 菜類三十二種

【釋名】草鍾乳。拾起陽草。侯氏藥譜○「頌曰」案許慎說文。韭象葉出地上形一種而久生。故謂曰。俗謂韭是草鍾乳。言其溫補也。時珍曰。韭之莖名韭白。根名韭黃。花名韭黃。乃未出土者。

【集解】蔚忌曰。韭叢生豐本長葉青翠。可以根分。可以子種。其性內生。不得外長。葉高三寸。便蔚而復生。久而不乏也。九月收子。其子黑色而扁。須風處陰乾勿令浥鬱。北人至冬移根于土窖中。培以馬屎。暖則卽長。高可尺許。不見風日。其葉黃嫩。謂之韭黃。豪貴皆珍之。韭之爲菜可生可熟。可菹可久。乃菜中最有益者也。羅願爾雅翼云。物久必變。故老韭爲覓。頌曰。鄭玄言。政道得利。陰物變爲陽。故葱變爲韭。可驗。葱冷而韭溫。

【氣味】辛微酸。溫濶無毒。時珍曰。生辛濶。熟甘酸。大明曰。熱。宗奭曰。春食則香。夏食則多。食乏氣力。冬月多食。動宿飲。吐水不可與蜜及牛肉同食。

【主治】歸心安五臟。除胃中熱。利病人可久食。別錄。時珍曰。一案千金。葉煮鯽魚鮮食。斷卒下痢。根入生髮膏用。根葉煮食。溫中氣下。補虛益陽。調和臟腑。令人能食。止洩血膿。腹中冷痛。生擣汁服。主胸痹骨痛。不可觸者。又解藥毒。療狂狗咬人數發者。亦塗諸蛇虺蠍蟲惡蟲毒。藏。煮食充肺氣。除心腹。

痼冷痃癖。擣汁服治肥白人中風失音。華。煮食歸腎壯陽。止洩精。暖腰膝。原。燂熟以鹽醋空心喫十頓。治胸膈噎氣。擣汁服治胸痺刺痛如錐。卽吐出胸中惡血甚。驗又灌初生小兒。吐去惡水惡血。永無諸病。既主吐血。唾血。衄血。尿血。婦人經脈逆行。打撲傷損及膈噎病。擣汁澄清和童尿飲之。能消散胃脘瘀血。甚效。震亨飲生汁。主上氣喘息欲絕。解肉脯毒。煮汁飲止消渴。盜汗。煎產婦血運。洗腸痔脫肛。時珍曰。【發明】弘景曰。此菜殊辛臭。雖煮食之。便出猶熏灼。不如葱薤熱卽無氣。最是養生所忌。頌曰。韭黃未出糞土。最不益人。食之滯氣。蓋含抑制未申之氣故也。孔子曰。不時不食。正謂此類。花食之亦動風。思邈曰。韭味酸。肝病宜食之。大益人心。時珍曰。韭葉熱根溫。功用相同。生則辛而散血。熱則甘而補中。入足厥陰經。乃肝之菜也。素問言。心病宜食韭葉。食鑑本草言歸腎文。雖異而理則相貫。蓋心乃肝之子。腎乃肝之母。母能令子實虛。則補其母也。道家目爲五葷之一。謂其能昏人神而動虛陽也。有一貧叟。病噎膈。食入卽吐。胸中刺痛。或令取韭汁入鹽梅鹵汁少許。細呷得入。漸加忽吐稠涎數升而愈。此亦仲景治胸痹用薤白。皆取其辛溫能散胃脘疾。飲惡血之義也。震亨曰。心痛有食熱物及怒鬱致死血。留于胃口作痛者。宜用韭汁桔梗加入藥中。開提氣血。有腎氣上攻以致心痛者。宜用韭汁和五苓散爲丸。空心茴香湯下。蓋韭性急能散胃口血滯也。又反胃宜用韭汁二盃。細溫服。蓋韭汁消血。薑汁下氣消痰。和胃。牛乳能解熱。同燂熟以鹽補虛也。一人臘月。瘡瘍塞食道也。遂以韭汁半斤而愈。

**【附方】**二十一、**胸痺急痛**。一、**說曰**：「胸痺痛如錐刺，不得俛仰，自汗出，或微背上不  
水二錢煮七分，去滓再煎，二沸溫服，得汗愈。未汗再服。」**南陽活人書**：**傷寒勞復**，**方同上**。  
**臘中便通**。○**臥忽不寤**，勿以火照之。但痛處，拇指甲際而唾其面，則活。其後方：**風忤邪惡**，**簡晏茱萸炒半升水**，**食醫心鏡**。

一斗煮之仍以病人櫛內入煮三沸櫛浮者喘息欲絕。韭汁飲生沉者死。煮至三升分三服。金匱要略。一千金方。消渴引飲。韭苗日用三五兩或炒或作羹勿入鹽入醬無妨喫至十斤卽住。極效。遇清明勿喫。有人病此引飲无度得此方而愈。秦憲副方。喉腫難風冷卽易。一千金方。水穀痢疾食之良。韭菜作羹粥炒任脫肛不收。生韭一斤切以酥拌炒熟。絳裹作食。醫心鏡任脫肛不收。二包更互熨之以入爲度。聖惠。痔瘡作痛。蓋之留一孔用洗器淨韭菜一把泡湯中乘熱坐孔上先袖珍方。小兒胎毒初生時以韭汁少許灌之卽吐出。四聲本草。小兒腹脹和豬肋煎汁服一合。間日一小兒患黃。韭根搗汁日滴鼻中。服取愈。祕錄。小兒患黃。取黃水取效。同上。痘瘡不發。韭根煎湯服。產後嘔水。產後因怒哭傷肝嘔。海上方。青綠水用韭葉一斤。取汁入薑汁少許。和產後血運。韭菜切安瓶中沃以熱醋令飲遂愈。摘玄方。刺傷中水腫痛。煮韭熱。瀝湖集簡方。刺傷中水腫痛。煮韭熱。瘡瘍作癢。韭葉杵傅。衄不止。韭根同搗棗大塞入鼻中。五般瘡癬。和塗之數度愈。經驗方。金瘡出血。韭汁和風化石末傳之效。未傳之效。千金方。易兩三度卽止。千金方。全否則十有九死。徐本齋云。此法出肘後方。有風大一日咬三人止。一人用此得活。親見有效。方得保。仲備。食物中毒。生韭汁服。急方。食良。一千金。大明曰。入藥揀淨。伏石鍾乳香也。

韭子【脩治】

熟暴乾

去黑皮

炒黃用蒸

【氣味】辛甘溫無毒

伏石鍾乳香也。

【主治】夢中洩精。溺血。別錄。暖腰膝。治鬼交。甚效。華補肝及命門。治小便頻數。遺尿。女人白淫白帶。珍時。

【發明】刺諸丸主漏精。時珍曰：棘刺丸方見外臺祕要。治諸勞洩。小便數。藥多不錄。案梅師方治遺精。用韭子五合。白龍骨一兩爲末。空心酒服方寸匕。千金方治夢遺。小便數。川韭子二兩。桑螵蛸一兩。微炒研末。每旦酒服二錢。三因方治下元虛冷。小便不禁。或成白濁。有家韭子丸。蓋韭乃肝之菜。入足厥陰經。腎主閉藏。肝主疏泄。素問曰：足厥陰病則遺尿。思想無窮。入房太甚。發爲筋痿。及爲白淫。男隨洩而下。女子綿綿而下。韭子之治。遺精漏泄。小便頻數。女人帶下者。能入厥陰補下。焦肝及命門之府。故同治云。

【附方】舊三新四夢遺溺白勞傷腎。夢中洩精。用韭子二兩。微炒爲末。食前溫酒服二錢七分。虛勞。溺精。用韭子二升。十月霜後采之。好酒八合。漬一宿。以晴明日童子糲米一升。稻米二斗。水一斗。向南擗。一萬杵。平旦溫酒服方寸匕。日再服之。外臺祕要：夢洩遺尿。升煮粥。取汁六升。分三服。金玉莖強中也。用韭子破故紙各一兩爲末。每服三錢水。一盡煎服。日三卽住。經驗方：腰脚無力。韭一方。升。揀淨蒸兩炊久。暴乾。簸去黑皮。炒黃。擣粉安息香。二大兩水煮一二百沸。慢火炒赤色。和女人帶下。及男子腎虛冷。夢遺。用韭子七升。醋煮千沸。焙研末。金方：煙薰蟲牙。用瓦片。煅紅安。韭子數粒。清油數點。水漱吐。未盡再薰。小蟲出爲效。敷急易方。

山韭子

【釋名】董音鐵。音織並。

【集解】韓詩云：六月食韭也。山中往往有之。而人多不識。形性亦與家韭相類。但根白葉如燈心苗耳。

後北征錄云：北邊雲霧戎地多野韭。沙葱人皆采而食之。卽此也。蘇氏以詩之讐卽此未知是否。又呂忱字林云：簽童嚴水韭也。野生天涯葉如韭而細長可食。觀此則知野韭又有山水二種氣味或不相遠也。

【氣味】鹹寒澀無毒。

【主治】宜腎主大小便數去煩熱治毛髮千

【發明】時珍曰：薺，腎之菜也。腎病宜食之。諸家本草不載，而孫思邈千金方收之。他書僅字多訛。薺菜四兩，鯽魚肉五兩，煮羹下五味，并少麪食，每三五日一作之。云極補益。

【附錄】孝文韭，拾遺。藏器曰：辛溫無毒。主腹內冷，脹滿，洩痢，腸澼，溫中補虛，令人能食。王塞北山之時珍曰：此亦山韭也。但因人命名耳。

葱  
中品  
別錄

【釋名】孔目，菜伯，同和事草，同鹿胎。

時珍曰：葱從忽，外直中空，有忽通之象也。孔者草中有孔也。

白葉中湖曰：葱，蕘，諸物皆宜。故云菜伯和事物。

【集解】恭曰：葱有數種。山葱曰薺。葱療病以胡葱，其人間食葱有二種：一種凍葱，經冬不死。分莖若金燈，著葱生于山谷，不入藥用。頌曰：入藥用山葱，胡葱食品用冬葱。漢葱又有一種樓葱，亦冬葱類。江南人呼爲龍角葱。莖上生根，移下蒔之。時珍曰：其皮赤，每莖上出歧如八角，故云瑞。曰：龍角卽龍爪葱。

太官上供宜之。故有數名。漢葱一名木葱。其莖粗硬。故有木名。冬葱無子。漢葱春末開花成叢。青白色。其子味辛。色黑。有皺文。作三瓣狀。收取陰乾。勿令浥鬱。可種可栽。

**葱莖白**【氣味】辛平。葉溫。根鬚汁並無毒。【弘景曰】葱有寒熱。白冷青熱。傷寒湯中不得用青也。一可過多。損髮髮。發人虛氣。上沖五臟。閉絕爲其開骨節出汗之故也。一思邈曰。正月食生葱。令人面黃。常山人忌食葱。一服地黃。常山人忌食葱。

**主治**作湯治傷寒寒熱。中風面目浮腫。能出汗。經傷寒骨肉碎痛。喉痺不通。安胎歸目。益目睛。除肝中邪氣。安中利五臟。殺百藥毒。根治傷寒頭痛。別錄主天行時疾。頭痛熱狂。霍亂轉筋。及奔豚氣。腳氣。心腹痛。目眩。止心迷悶。大通關節。止衄血。利大小便。孟試治陽明下痢。下血。李果達表和裏。止血。寧原除風濕。身痛。麻痺。蟲積心痛。止大人陽脫。陰毒腹痛。小兒盤腸內釣。婦人妊娠溺血。通乳汁。散乳癰。利耳鳴。塗瘡犬傷。制蚯蚓毒。時珍殺一切魚肉毒良。

**【發明】**一元素曰。一葱莖白味辛而甘平。氣厚味薄。升也。陽也。入手太陰足陽明經。專主發散。以通上熱。厥逆脈微者。白通湯主之。張仲景治少陰病。下利清穀。裏寒外熱。惡燥急食。辛以潤之。葱白辛溫。以通陽氣也。一時珍曰。一葱乃釋家五葷之一。一生辛散。熱甘溫。外實中空。肺之菜也。肺病宜食之。肺主氣。外應皮毛。其合陽明。故所治之症。多屬太陰陽明。皆取其發散。通氣之功。通氣故能解毒。及理血病。氣者血之帥也。氣通則血活矣。金瘡磕損折傷。出血疼痛不止者。王華百一方。用葱白砂糖等分研封之。云痛立止。更無痕瘢也。葱葉亦可用。又葱管吹鹽入玉莖內。治小便不通。及轉脬危急者。極有捷效。余常用治數人。得驗。

**【附方】**舊十二。新三十二。感冒風寒。初起。卽用葱白一握。淡豆豉半合。傷寒頭痛。二兩水煮溫服。活人書。瀕湖集簡方。



坐之取氣水自下。聖濟錄陰囊腫痛。又方用煨葱入鹽杵如泥塗之。小便溺血。葱白一握。鬱金一兩。一日三次。普濟方腸痔有血。葱白三斤。煮湯熏蒸。赤白下痢。葱白一握。細切和米煮粥。便毒初起。葱白炒熱布包。傳以紙密護之外。服通氣藥卽愈。癰疽腫硬。同炒黑研末。醋調貼一伏時。又換以消爲度。外科精義。傳以紙密護之外。服通氣藥卽愈。癰疽腫硬。同炒黑研末。醋調貼一伏時。又換以消爲度。外科精義。

一切腫毒。葱汁漬之。日四五度。乳癰初起。卽散。並于金疔瘡惡腫出。以醋湯洗之。神效。聖濟錄。小兒禿瘡。泄冷盡再服。血壅怪病。人偏身忽然肉出如錐。既癢且痛。不能飲食。名血壅。不速治必潰。夏子益怪病奇方。解金銀毒。葱白九升煮一升半。頓服當吐出膿血而愈。水華主水病足腫。蘇利五臟益目精發。

葉主治。煨研傅金瘡水入皺腫。鹽研傅蛇蟲傷及中射工溪毒。華主水病足腫。蘇利五臟益目精發。

### 黃疽

思邈

【發明】  
頌曰。一、煨葱治打撲損。見劉禹錫傳信方。云得于崔給事。取葱新折者。燒火煨熟。剝皮。其間有軍吏言。此方遂用之。三易面色卻赤。斯須云已不痛。凡十數度。用熱葱并涕纏裹。其指遂畢席笑語。城尉戴堯臣試馬。損大指。血出淋漓。余用此方再易而痛止。翌日洗面。不見痕跡。宋推官鮑縣尹皆得此方。每有殺傷氣未絕者。亟令用此。活人甚衆。又凡人頭目重悶。疼痛。時珍每用葱莖葉插入鼻內二三寸。并耳內氣通。卽便清爽也。

【附方】  
新二、水病足腫。葱莖葉煮湯漬之。日三小便不通。腎上即通。葉搗爛入蜜合外瘡。傷風水腫毒取。舊二、水病足腫。五次妙。韋宙獨行方。小便不通。腎上即通。葉搗爛入蜜合外瘡。傷風水腫毒取。

和乾蘆黃藥等分煮湯浸洗立愈。食療蜘蛛咬瘡待化成水取點咬處即愈。李絳兵部手集代指毒痛。取萎黃蘆葉千金方。

汁【氣味】辛溫滑無毒。

【主治】溺血飲之解藜蘆及桂毒。別散瘀血止衄止痛治頭痛耳聾消痔漏解衆藥毒時能消玉爲水化五石仙方所用。弘景。

【發明】時珍曰一葱汁卽葱涕功同葱白古方多用葱涎丸藥亦取其通散上焦風氣也。勝金方取之亦佳云。隣婦用此甚效。老僕試之亦驗。二物同食害人何以能治此疾恐人脾胃不同非甚急不可輕試也。一懷微曰三洞要錄云葱者菜之伯也能消金錫玉石神仙消金玉漿法于冬至日以鹽蘆銀青石各三分自消矣。暴如飴食之可休糧亦曰金漿也。

【附方】舊四衄血不止方見金瘡出血塗之卽止。梅師方火焰丹毒從頭起者生瘡瘻作痛。葱涎白之先以木簞子煎湯薰洗其冷如冰卽效。解鉤吻毒面青口噤欲死以葱人苦此早間用之午刻即安也。唐仲舉方解鉤吻毒涕喫之卽解千金。

鬚【主治】通氣。既療飽食房勞血滲入大腸便血腸澼成痔口乾研末每服二錢溫酒下時。

【附方】舊一喉中腫塞氣不通者。葱鬚陰乾爲末每用二錢入蒲州膽礬末一錢和勻每用一字吹之杜王方。

花【主治】心脾痛如錐刀刺腹脹用一升同吳茱萸一升水八合煎七合去滓分三服立效。頌○出崔實氣味】辛大溫無毒。

【主治】明目補中氣不足。經溫中益精華。宜肺歸頭。邈。

【附方】舊一·眼暗補中。葱子半斤爲末。每取一匙煎湯一升半。去滓入米。煮粥食之。亦可。

荳葱音格。○

【釋名】山葱。

【集解】保昇曰 葳蔥生山谷不入藥用。《頌曰》爾雅云：蒼山葱也。說文云：蒼葱生山中。細莖大葉食之香美於常葱。宜入藥用。《時珍曰》蒼蔥野葱也。山原平地皆有之。生沙地者名沙蔥。蔥生水澤者名水蔥。野人皆食之。開白花結子如小蔥頭。世俗不察。胡蔥卽蒜蔥。誤指此爲胡蔥。詳見胡蔥下。保昇言不入藥用。蘇頌言入藥宜用山蔥。胡蔥今致思邈千金食性自有蒼蔥功用而諸本失收。今採補之。

【氣味】辛微溫無毒。時珍曰 佛家以蒼蔥爲五葷之一。見蒜下。

【主治】除瘴氣惡毒。久食強志益膽氣。思邈主諸惡載。狐尿刺毒。山溪中沙蟲射工等毒。煮汁浸或擣傅。大效。亦兼小蒜茱萸輩。不獨用也。蘇子

【氣味】同蔥。

【主治】洩精。邈。

胡葱宋開寶

【釋名】蒜蔥。綱回回葱。時珍曰 按孫真人食忌作葫蔥。因其根似葫蒜故也。俗稱蒜蔥。正合此義。元人飲膳正要作回回蔥似言其來自胡地。故曰胡蔥耳。

**【集解】**「洗曰」胡葱生蜀郡山谷狀似大蒜而小形圓皮赤稍長而銳五月六月採。保昇曰「葱而根莖皆細白或云根莖微短如金燈或云似大蒜而小皮赤而銳」時珍曰「胡葱卽蒜葱也孟洗韓保昇所說是矣非野葱也野葱名蒼葱似葱而小胡葱乃人種蒼八月下種五月收取葉似葱而根似蒜其味如薤不甚臭江西有水晶葱蒜根葱蓋其類也李廷飛延壽書言胡葱卽蘿子蓋因相似而誤爾今俗皆以野葱爲胡葱因不識蒜葱故指蒼葱爲之謬矣

**【脩治】**「斂曰」凡採得依紋擘碎用綠梅子相對拌

**【氣味】**辛溫無毒「時珍曰」生則辛平熟則甘溫「洗曰」亦是薰物久食傷神損性令人多忘損絕血脈發癟疾患胡臭齦齒人食之轉甚「思邈曰」四月勿食葫蘆令人氣

驚多

**【主治】**溫中下氣消穀能食殺蟲利五臟不足氣。孟洗療腫毒保昇

**【發明】**弘景言葱能化五石消桂爲水則是諸葱皆能軟石故今人採葫蘆煮石謂之胡蘆也陶

**【附方】**新一身面浮腫小便不利喘急用胡葱十莖赤小豆三合消石一兩以水五升煮葱豆至熟同搗成膏每空心溫酒服半匙

聖惠方

**子【主治】**中諸肉毒吐血不止萎黃悴者以一升水煮冷服半升日一夜一血定乃止孟洗

薤  
錄中品○別

**【釋名】**藠子音叫或作  
薤者非  
藠子音釣火葱綱目菜芝錄鴻薺音會時珍曰「薤本文作蕘韭類也故字從韭

人訛爲藠子其葉類葱而根如蒜收種宜火薰故俗人稱爲火葱羅願云物莫美于芝故薤爲菜芝蕘頌復附劄子於蒜條誤矣

**【集解】**別錄曰「薤生晉山平澤」恭曰「薤是韭類葉似韭而闊多白而無實有赤白二種白者補而美赤者苦而無味」頌曰「薤處處有之春秋分時至冬葉枯爾雅云野山薤也生山中

莖葉與家薑相類而根莖長葉大僅若鹿葱體性亦與家薑同今人少用。宗奭曰「薑葉如金燈葉差狹而更光故古人言薑露者以其光滑雖珍之義」時珍曰「薑八月栽根正月分苗宜肥壤數枝一本則茂而根大葉狀似韭韭葉中空似細葱葉而有棱氣亦如葱二月開花紫色根如小蒜一本數顆相依而生五月葉青則掘之否則肉不滿也其根煮食芼酒糟藏醃浸皆宜故內則云切葱薑實諸臍以柔之白肉亦如葱葉而有棱氣亦如葱二月開晶葱葱葉蒜根與薑相似不臭亦其類也按王禎農書云野薑俗名天薑生麥原中葉似薑而小味益辛亦可供食但不多有卽爾雅山薑是也。

薑白氣味辛苦溫滑無毒。好古曰「入手陽明經」頌曰「薑宜去青留白白冷而青熱也」既發熱病不宜多食三四月勿食生者「大明曰」生食引涕唾不可令入作癥癰。

【主治】金瘡瘍敗輕身不饑耐老歸骨除寒熱去水氣溫中散結氣作羹食利病人諸瘡中風寒水氣腫痛擣塗之別煮食耐寒調中補不足止久痢冷瀉肥健人日華治洩痢下重能泄下焦陽明氣滯李好古曰「下重者氣滯」逆散加此以泄氣滯治少陰病厥逆洩痢及胸痺刺痛下氣散血安胎時心病宜食之利產婦思治女人帶下赤白作羹食之骨哽在咽不去者食之卽下既補虛解毒頌白者補益赤者療金瘡及風生臘肉蘇與蜜同擣塗湯火傷甚速。宗溫補助陽理時珍。

【發明】弘景曰「薑性溫補仙方及服食家皆須之偏入諸膏用不可生噴薑辛爲忌」既曰「薑白色者最好雖有辛不葷五臟學道人長服之可通神安魂魄益氣續筋力」頌曰「白薑之性冷而補又曰薑子煮與夢婦飲易產亦主脚氣」時珍曰「薑味辛氣溫諸家言其溫補而蘇頌圖經獨謂其冷補按杜甫薑詩云東比青芻色圓齊玉筋頭衰年關膈冷味暖併無憂亦言其溫補與經文相合則冷補之說蓋不然也又按王禎云薑生則氣辛熱則甘美種之不葷食之有益故學道人貴之老人宜之然道家以薑爲五葷之一而諸氏嘗其不葷何耶薛用弱齊諧志云安陸郭坦兄得天

行病後遂能大餐。每日食至一附。五年家貧行乞。一日大饑。至一園。食薤一畦。大蒜一畦。便悶極臥地。吐一物如龍。漸漸縮小。有人撮飯於上。卽消成水。而病尋瘳也。按此亦薤散結蒜消癥之驗也。一宗奭曰。薤葉光滑。亦難焯。千金治肺氣喘急。方中用之。亦取其滑泄之義。

**附方**舊十五  
新八 胸痹刺痛。張仲景栝樓薤白湯治胸痹痛徹心背，喘息欬唾短氣。喉中燥癢，寸脈沉遲。  
千金治胸痹半夏薤白湯用薤白四兩半夏一合根實半兩生薑一兩栝樓實半枚咬咀以白醋漿三升煮一升溫服日三○肘後治胸痛瘥而復發薤根五升搗汁飲之立瘥○敲音在酢漿也。卒中惡死卒死或先病或平居寢臥奄忽而死皆霍亂乾嘔不止者以薤一虎口以水三升煮取一升。冷卻灌入鼻中便省。肘後兩服不遇三作卽已。韋苗獨行方奔豚氣痛。薤白搗汁飲之。肘後方赤痢不止。薤同黃蘖煮汁赤白痢下薤白一握同米煮粥。小兒疳瘍。薤白生搗如泥以米粉和蜜作餅。內冷痛。薤白一升當歸四兩水燉肉。同炒食之。范汪方妊娠胎動腹內冷痛。薤白二升分二服。楊氏產乳。煮熟食之。葛洪方瘡犯惡露。甚者殺人。薤白搗爛以帛裹煨然去帛傅之。冷卽易換亦手指赤色。隨兩服。葛洪方妊娠胎動腹內冷痛。薤白生搗如泥以米粉和蜜作餅。內冷痛。薤白一升當歸四兩水燉肉。同炒食之。范汪方妊娠胎動腹內冷痛。薤白二升分二服。古今錄驗。梅師方。瘡瘍塗之愈乃止。肘後方疥瘡痛癩塗之。同上。灸瘡腫痛。微火煎三上三下去滓塗之。梅師方。瘡瘍塗之愈乃止。手足癰瘡。生薤一把以熱醋投人。薤白搗汁飲之并塗之。日諸魚骨哽。千金毒蛇螫傷。徐玉方虎犬咬傷。三服瘥乃止。葛洪方。咽喉腫痛。薤根醋搗傅腫處。卽易之。聖惠。咽喉腫痛。薤白嚼斷安膜上令咽處引之卽出。同上。誤吞釵鑽。取薤白曝萎煮熟切食一。葛洪方目中風翳。遍痛作痛取薤白截斷安膜上令

**【附錄】**藜蕎拾遺  
胸膈刺痛者服之。生平澤其苗如葱亂韭。時珍曰：此亦山薤之類。方名不同耳。

蘇下別品錄

**【釋名】**小蒜，別  
蒜，音  
莖，漢人得葫蒜於西域，遂呼此爲小蒜，以別之。故伏侯古今注云：蒜，葫蒜也。  
俗謂之小蒜。胡國有蒜十子一株，名曰胡蒜。俗謂之大蒜，是矣。蒜乃五葷之一，故許氏說文謂之葷。葷爲五葷，佛家以大蒜、小蒜與渠慈葱爲五葷道家以韭蘿蒜芸薹胡荽爲五葷，道家以韭蘿蒜芸薹胡荽爲五葷。

雖各不同，然皆辛熏之物，生食增恚，熟食發姪，有損性靈，故絕之也。

**【集解】**

別錄曰：「蒜，小蒜也。五月五日採之。」宏景曰：「小蒜生葉時可煮和食。至五月葉枯取根。」

苗葉根子皆似葫而細數倍也。爾雅云：「山蒜也。」說文云：「蒜，音亂，一名薺。」音力，蓋一頌曰：「本草謂大蒜爲葫。小蒜爲蒜。」而說文所謂葷菜者乃大蒜也。葫，卽小蒜也。書傳載物之別名，不同如此。用藥不可不審。」宗奭曰：「小蒜卽葫也。苗如葱，根白大者如烏芋子，兼根煮食，謂之

宅蒜。」時珍曰：「家蒜有二種，根莖俱小而瓣少，辣甚者蒜也。小蒜也，根莖俱大而瓣多，辛而帶甘者，葫也。大蒜也。按孫炎爾雅正義云：帝登嵩山遭葫芋毒，將死，得蒜齧食乃解。遂收植之，能殺腥蟲魚之毒。又孫愬唐韻云：張騫使西域，始得大蒜種歸據此。則小蒜之種自萬移栽，從古已有。故爾雅以萬

爲山蒜，所以別一家蒜也。大蒜之種自胡地移來，至漢始有。故別錄以葫爲大蒜，所以見中國之蒜小也。又王禎農書云：一種澤蒜，最易滋蔓，隨處隨合，熟時探子漫散種之。吳人調鼎多用此根作菹，更勝葱韭也。按此正別錄所謂小蒜是也。其始自野澤移來，故有澤名。而寇氏誤作宅字矣。諸家以告野生山

蒜澤蒜解家蒔之小蒜，皆失於詳。攷小蒜雖出於晉，既經人栽培，則性氣不能不移，故不得不辨。弘景曰：「味辛性熱，損人不可長食。」陰核疼曰：「無毒。三月勿久食。傷

蒜根也。」**【氣味】**辛溫，有小毒。人志性黃帝書云：同性熱，損人不可長食。核疼曰：「無毒。三月勿久食。傷時病後，忌食之。」

**【主治】**歸脾胃，主霍亂腹中不安，消穀理胃溫中，除邪痺毒氣。別錄：主溪毒。弘景：下氣治蠱毒，傅蛇蟲沙虱。

**瘡瘍**，日華：「恭曰：此蒜與胡葱相得，主惡瘍毒。大效。山人經療時用之。塗疔腫甚良。孟

**葉**，主治心煩痛解諸毒，小兒丹疹，思

時病後

**【發明】**華陀用蒜靈卽此蒜也。一時珍曰：按李延壽南史云：李道念病已五年，丞相褚澄診之曰：非冷更吐之，凡十二枚而愈。或以蒜字作蘇字者誤矣。范曄後漢書云：華陀見一人病嘔食不得下，令取餅曰：未盡要藥而後人鮮有知者。

**【附方】**舊七時氣溫病初得頭痛壯熱，脈太，卽以小蒜一升杵，搗汁三合，頓服，不過再作，便癒。肘後方：霍亂脹滿，不得吐下，名乾霍亂。小蒜水三升煮一升，頓服。方：霍亂轉筋，入腹殺人，以小蒜鹽各一兩搗，立止。聖濟錄：積年心痛，不忍不拘，五年者隨手見效。濃汁煮手水毒中人，一名中溪，一名中溼，一名水病似射工而無物，初得惡寒，頭目微疼，旦醒暮劇，手足逆集，水毒中人，三日則生蟲，食下不癢，不痛，過六七日，蟲食五臟，注下不禁，以小蒜三升，煮微熱，大熱即冷，勿以他病治之也。肘後方：射工中人，瘡上灸七壯，千金止截瘡疾，少許丸如芡子大，每服一丸。面東新汲水下，唐慎微陰腫如刺，汗出者，小蒜一升，韭根一升，楊柳根二惡核腫結，小蒜吳茱萸等分，研泥入黃丹，搗散，敷之。永類方：蛇蠍螫人，津傳之，搗汁服，以小蒜洗淨，搗汁滴之，良。至妙無常及發足踝者，杵小兒白禿，頭上圓白，色以蒜切，葛氏厚傳，頻易。葛氏：小兒白禿，日揩之。子母祕錄：蛇蠍螫人，津傳之，搗汁服，以小蒜洗淨，搗汁滴之，未出。

山蒜拾

後方

蜘蛛入耳，小蒜洗淨，搗汁滴之，未出。

李絳兵部手集

【釋名】蒿歷澤蒜。

**【集解】**蒜與蒜無異。一時珍曰：山蒜似大蒜而臭。藏器曰：澤蒜根如小蒜，葉如韭，又生石間者，名小石蒜。

蟲始自三種移成故猶有澤蒜之稱爾雅云薑山蒜也今京口有蒜山產蒜是也處處有之不獨江南又呂忱字林云水中蒜也則蒜不但產于山而又產于水也別有山慈姑水仙花老鴉蒜石蒜之類其花亦異並見草部下

葫  
別錄

【主治】山蒜治積塊及婦人血癥用苦醋磨傅多效。頌澤蒜石蒜並溫補下氣滑水藏器。

葫  
下品

【氣味】辛溫無毒

【釋名】大蒜弘景葷菜。弘景曰一今人謂葫爲大蒜蒜爲小蒜以其氣類相似也。按孫愐名二蒜皆屬五葷故通可稱葷詳見蒜下

【集解】美少辛涇陽者皮亦甚辣。頌曰一今處處園圃種之每顆六七瓣初種一瓣當年便成獨子葫至明年則復其本矣其花中有實亦作葫瓣狀而極小亦可種之。時珍曰一大二蒜皆八月種春食苗夏初食薹五月食根秋月收種北人不可一日無者也。

【氣味】辛溫有毒久食損人目。弘景曰一性最熏臭不可食俗人作蠶以啖肉損性伐命莫此之中煮當是未經試耳。藏器曰一初食不利目多食卻明久食令人血清使毛髮白。時珍曰一久食傷肝損眼故嵇康養生論云葷辛害目此爲甚耳今北人嗜蒜宿炕故盲醫最多陳氏乃云多食明目與別錄相左何耶。震亨曰一大蒜屬火性熱喜散快膈善化肉暑月人多食之傷氣之禍積久自見養生者忌之化肉之功不足論也。頌曰一多食傷肺傷脾傷肝膽生瘻助火昏神。思邈曰一四月八月食人腹內生瘻腸中腫又成瘻發黃疾合蜜食殺人凡服一切補藥不可食之。

【主治】歸五臟散癰腫瘡除風邪殺毒氣別下氣消穀化肉蘇去水惡瘻氣除風濕破冷氣爛痃癖。

伏邪惡。宣通溫補。療瘡癬。殺鬼去痛器。健脾胃。治腎氣。止霍亂。轉筋腹痛。除邪祟。解溫疫。療勞瘧。冷風傳風。損冷痛。惡瘡蛇蟲蠱毒。溪毒沙蟲。並擣貼之。熟醋浸經年者良。日溫水擣爛服。治中暑不醒。擣貼足心。止鼻衄不止。和豆豉丸服。治暴下血。通水道。宗爽擣汁飲。治吐血。心痛。煮汁飲。治角弓反張。同鯽魚丸。治膈氣。同蛤粉丸。治水腫。同黃丹丸。治痢瘡。孕痢。同乳香丸。治腹痛。擣膏敷臍。能達下焦。消水利大小便。貼足心。能引熱下行。治泄瀉。暴痢。及乾濕霍亂。止衄血。納肛中。能通幽門。治關格不通。珍。

【發明】宋黃曰。一葫氣極韋。置臭肉中。反能掩臭。凡中暑毒人。爛嚼三兩瓣溫水送之。下咽即知。但禁飲冷水。又鼻衄不止者。擣貼足心。衄止。卽拭去。一時珍曰。一葫蒜入太陰陽明。其氣薰烈。能通五臟。達諸竅。去寒溼。辟邪惡。消癰腫。化癥積。肉食此其功也。故王禎稱之云。味久不變。可以養生。可致遠化。臭腐爲神奇。調鼎俎。代醯醬。攜之旅塗。則炎風瘴雨。不能加。食鴻臚。毒不能害。夏月食之。解暑氣。北方食肉。麵尤不可無。乃食經之上品。日用之多助者也。蓋不知其辛能散氣。熱能助火。傷肺損目。昏神伐性之害。佳。再受之而不悟也。嘗有一婦。衄血一晝夜不止。諸治不效。時珍令以蒜傅足心。卽時止。真奇方也。又葉石林避暑錄云。一僕暑月馳馬忽仆地。欲絕。同舍王相教用大蒜及道上熱時。各握研爛。以新汲水一瓊和取汁。抉齒灌之。少頃卽甦。相傳徐州市門忽有版書此方。咸以爲神仙土。教救人云。一藏器曰。昔有患痃癖者。夢人教每日食大蒜三顆。初服遂至暝眩吐逆。下部如火。後有人大蒜數片。合皮搗卻。兩頭吞之。名曰內灸。果獲大效也。一頌曰。一經言。葫散癰腫。按李絳兵部手集方人云。云不毒瘤腫毒號叫臥無不神效。盧坦侍郎肩上瘡作連心痛悶。用此便瘥。又李僕射患腦癱。久不遂。虛與此方亦效。惟不應。若覺痛。卽掀起蒜。蒜焦更換新者勿令損皮肉。洪嘗苦小腹下患。大腫。灸之亦瘥。每用灸爲善。又葛洪人。惟人不能以意。不詳審。必不得。毒氣發洩耳。然後解散。凡一初發。李按之類。灸之亦愈。急。便成痴。核初起。有異皆可灸。如神乃灸之。不計錢勝。厚子無壯人。勿令洪人。點用空數。

藥言者。惟人不能以意。不詳審。必不得。毒氣發洩耳。然後解散。凡一初發。李按之類。灸之亦愈。急。便成痴。核初起。有異皆可灸。如神乃灸之。不計錢勝。厚子無壯人。勿令洪人。點用空數。

頭及項以上一切不可用此恐引氣上更生大禍也。又史源記蒜灸之功云：母氏背脾作癰有赤暈半寸，二日橫斜約六七寸，痛楚不勝或言一尼病此得灸而愈。予齊間之尼云：劇時昏不知人，但聞范奉議坐守灸八百餘壯，方甦。約艾一篩，予亟歸以炷如銀杏大灸十數株，不覺乃灸四旁，亦處皆痛。每一壯則赤隨縮入三十餘壯，亦暈收退，蓋灸遲則初發處肉已壞故不痛。直待灸到好肉方痛也。至夜則火焮滿背癰高阜而熱，夜得安寢矣。至曉如覆一甌，高三四寸，上有百數小竅，色正黑，皮肉壞也。非艾火出其毒於壞肉之裏，則內逼五臟而危，蓋高阜者，毒外出也。小竅多毒不聚也。

散庸醫傳貼涼冷消

之說何可信哉？

**附方** 舊十六新  
**背瘡灸法** 凡覺背上腫硬疼痛用溼紙貼尋瘡頭用大蒜十顆，淡豉半合，乳香一錢，細研隨瘡頭大小用竹片作圈圍定，填藥于內二分厚，着艾灸之，痛灸至癰癰，灸至痛以百壯爲率，與蒜錢灸法同功。外科精要：疔腫惡毒，用門臼白灰一撮，羅細以獨蒜頭或新蒜染火擦瘡口，候瘡頭即愈，象山民人患水腫一卜者傳此用之有效。仇遠碑史：山嵐瘴氣生熟大蒜各七粒，水氣腫滿即愈。端午日取獨頭蒜煨熟入簪，外臺祕要：乾濕霍亂，塗足心立愈。

**丹毒** 無常色及發足踝者，搗蒜厚，傅乾即易之。肘後方：關格脹滿，裏納下部氣立通也。外臺祕要：乾濕霍亂，塗足心立愈。

**永類水氣腫滿** 大蒜田螺車前子等分，熬膏，攤貼臍中，水從便瀉而下，數日即愈。

**鈴方** 等分，分搗丸，芡子大，每白湯嚼下一丸。端午日以獨頭蒜十箇，黃丹二錢搗丸，梧泄氣方，每服九丸，長流水下甚妙。普濟方：泄瀉暴痢。

**立癰** 下足心兩根，去皮研膏，入豆豉搗丸，梧子大，每米飲鼻血不止，服藥不應，用蒜一枚去皮研膏，中千金方，並同上。腸毒下血，爲丸，日日米湯服之。濟生方：暴下血病，用葫蘆無不愈者，寇宗奭本草衍義：鼻血不止，厚一豆許，左鼻血出，貼左足心右鼻血出，貼右足心。

**簡要濟衆方** 立癰，血逆心痛，升卽愈。肘後鬼疰腹痛，搗和薑汁一合，頓服。永類鈴方：心腹

**冷痛。**法醃浸至二三年。蒜食至數顆。其夜啼腹痛。面青冷證也。用大蒜一枚。煑研日乾。乳香五分。寒濕氣痛。端午日取獨蒜同辰粉搗塗之。唐瑤經驗方。鬼毒風氣。獨頭杵一枚。和雄黃杏仁研爲丸。空腹飲下三粒。危氏得效方。寒濕須臾欲絕。用獨頭蒜二枚。削去兩頭。塞鼻中。左候口。中膿血出。立效。聖惠喉痹腫痛。大蒜塞耳鼻中。日久。耳鼻中日漬。大蒜切片貼足心。頭風苦痛。易簡方。用大蒜研汁。噙鼻中。○聖濟錄。用大蒜七瓣去皮先燒紅。地以取效止。摘玄方。頭風苦痛。蒜逐箇于地上磨成膏子。卻以殼蠶一兩去頭足。安蒜上碗覆一夜。勿令透氣。只取蠶研末。噙入鼻中。口中含水甚效。小兒驚風。總錄方。小兒臍風。獨頭蒜切片。安臍上。以艾灸之。口小兒臍風。獨頭蒜切片。安臍上。以艾灸之。口小兒臍風。獨頭蒜切片。安臍上。以艾灸之。口小兒氣淋。宋寧郡王時病淋。日夜凡三百起。國醫罔措。或舉孫琳治之。琳用大蒜淡豆豉蒸餅三物搗丸。令以溫水下。三十丸。曰今日進三服。病當減三分之一。明日亦然。三日病除已而果然。賜以千緡。或問其說。琳曰。小兒皆能通利故也。愛竹翁談。蔽產後中風。角弓反張。不語。用大蒜三十瓣。以水三升灌之。卽甦。張傑子母祕錄。金瘡中風。取蒜一反。去心無灰酒四升。煮極爛并滓。服婦人陰腫。作癰。蒜湯洗之。效。永類鈐方。陰汗作癰。大蒜淡豉搗丸。梧子大硃砂一升。研生方。食

**蟹中毒。**乾蒜煮汁。飲方。蛇痕面光。吐出熱如火。炙人飲。蒜汁。危氏一方。盤

**小便淋瀝。**或有或無。用大蒜一箇。紙包煨熟。露夜空心。新水送下。朱氏集驗方。小兒白疕。日揩之。祕錄。閉口椒毒。蒜食之。煮熟。即安。仍食。

**景射工溪毒。**獨頭蒜切三分厚。貼上突之。蜈蠍蟹傷。獨頭蒜摩之。蛇虺蟹傷。孟旣曰。卽時嚼蒜封之。六升。煮三四沸。浸損處。○梅師用獨頭蒜。酸草搗絞。傅咬處。脚肚轉筋。以冷水食一瓣。擣生方。食。

**方乳。**二升煮熟。空心頓服。明日又進。外以去皮。蒜一升搗細。小便。

**方升。**煮三四沸。浸損處。○梅師用獨頭蒜。酸草搗絞。傅咬處。

**方蟹中毒。**乾之。

【集解】食之取迎新之義謂之五辛盤杜甫詩所謂春日春盤細生菜是矣

【氣味】辛溫無毒。『時珍曰』熟病後食多損目。

【主治】歲朝食之助發五臟氣常食溫中去惡氣消食下氣器

雲薹唐本

【釋名】寒菜。胡居士方。胡菜同。薹菜。埤雅。薹芥。沛綱目○『時珍曰』此菜易起薹須採其薹食則分枝

榨油也。羌隴氐胡其地苦寒冬月多種此菜能歷霜雪種自胡來故服虔通俗文謂之胡菜而胡治居士百病方謂之寒菜皆取此義也或云塞外有地名雲薹戊始種此菜故名亦通

【集解】恭曰別錄云薹乃人間所斂菜也。宗奭曰薹不甚香經冬根不死辟蟲於諸菜中亦不甚佳。『時珍曰』薹方藥多用諸家註亦不明令人不識爲何菜珍訪考之乃今油

菜也。九月十月下種生菜形色微似白菜冬春採薹心爲茹三月則老不可食。開小黃花四瓣如芥花結莢收子亦如芥子灰赤色炒過榨油黃色燃燈甚明食之不及麻油近人因有油利種者亦廣云

薹葉【氣味】辛溫無毒可多食食之加劘又損陽氣發瘡及口齒病胡臭人不可食又能生腹中諸蟲

道家特忌以爲五葷之一。

【主治】風遊丹腫乳癰。唐本破癥痕結血。開竇治產後血風及瘀血。日煮食治腰脚癆。搗葉傅女人吹嫋。

藏器治癰疽豌豆瘡散血消腫伏蓬砂。時

【發明】藏器曰『薹破血故產婦宜食之。』馬志曰『今俗方言病人得吃薹是宜血病也。』丸腫痛至午通腫目不能開經日幾斃予思本草薹治風遊丹腫遂取葉搗傅隨手卽消其驗如神也亦可搗汁服之。

**【附方】**新八  
赤火丹毒 方見 天火熱瘡 初起似癰漸如水泡似火燒瘡赤色急速能殺人  
薑葉根蔓菁根各三兩爲末以雞子清和貼之近效方 風熱腫毒  
消無蔓菁卽以商陸根代之甚效也 近效力 手足癰疽出用薑葉煮汁服一升并食乾熟菜數  
頓少與鹽醬冬月用子研水服 千金方 異疽似癰而小有異膿如小豆汁今日去明日滿用薑葉搗熱布袋盛  
薰葉煎湯洗之外薰祕要 血痢腹痛合入蠻一合溫服 葵搗汁二  
子【氣味】辛溫無毒

**【主治】**夢中洩精與鬼交思 取油傅頭令髮長黑藏器行滯血破冷氣消腫散結治產難產後心腹諸疾  
赤丹熱腫金瘡血痔時

**【發明】**時珍曰一 薑葉子葉同功其味辛氣溫能溫能散其用長於行血滯破結氣故古方消腫  
散結治產後一切心腹氣血痛諸遊風丹毒熱腫瘍毒諸藥咸用之經水行後加入四物湯服  
之云能斷產又治小兒驚風貼其項頸則引氣上出也婦人方治產難歟云  
黃金花結粟米實細研酒下十五粒靈丹功效妙如神難產之時能救急

**【附方】**新十  
一 薑葉散 治產後惡露不下血結衝心刺痛將來纔遇冒寒踏冷其血必往來心腹間刺痛  
二 薑葉散 不可忍謂之血母并治產後心腹諸疾產後三日不可無此用薑葉子炒當歸桂  
心赤芍藥等分每酒服二產後血運半盞童便半盞煎七分溫服卽甦溫隱居海上方補血破氣追  
錢趕下惡物 楊氏產乳產後血運半盞童便半盞煎七分溫服卽甦溫隱居海上方補血破氣追  
丸治婦人血刺小腹痛不可忍亦可常服補血虛破氣塊甚效用薑葉子微炒桂心各一兩高良薑牛兩爲末醋糊丸梧子大每淡醋湯下五丸沈存中靈苑方腸風臟毒子生用甘  
草炭爲末每服二錢頭風作痛三分爲末噙鼻黃風熱牙痛 薑葉子一分大黃風熱水煎服之  
水煎服之每服二錢頭風作痛三分爲末噙鼻左嘴右嘴左聖惠小兒天鈞  
一錢水調塗項上名塗項散水生烏頭去皮尖各二錢爲末每用陳菜子油同穿山甲末熬成  
一錢水調塗項上名塗項散水生衆妙方熱癤腫毒頭骨等分

爲末。醋和傅。傷損接骨。蓼子一兩。小黃米炒二合。龍骨少許。爲湯火傷灼之。楊起簡便單方。蜈蚣  
之。千金方。傷損接骨。未醋調成膏。攤紙上貼之。乾坤祕鑑。湯火傷灼之。楊起簡便單方。蜈蚣  
熬。傷。菜子油。傾地上。擦地上油。掺之即好。

菘別錄

上品

【釋名】白菜。時珍曰。按陸佃埤雅云。菘性凌冬晚凋。四時常

見有松之操。故曰菘。今俗謂之白菜。其色青白也。

【集解】弘景曰。菘有數種。猶是一類。止論其美與不美。菜中最爲常食。宗奭曰。菘葉如蕪菁。葉者疑卽牛肚菘也。時珍曰。菘卽今人呼爲白菜者。有二種。一種莖圓厚微青。一種莖扁薄而白。其葉皆淡青白色。燕趙遼陽揚州所種者最肥大而厚。一本有重十餘斤者。南方之菘。畦內過冬。北方者多入窖內。燕京圃人。又以馬糞入窖壅培。不見風日。長出苗葉皆嫩黃色。肥美無滓。謂之黃芽菜。豪貴以爲嘉品。蓋亦倣韭黃之法也。菘子如蕓薹子而色灰黑。八月以後種之。二月開黃花。如芥花。四瓣三  
月結角。亦如芥。其菜作  
積食尤宜。不宜蒸曬。

【正誤】恭曰。菘有三種。牛肚菘葉最大。厚味甘。紫菘葉薄細。味少苦。白菘似蔓菁也。菘菜不生北如此。頌曰。菘南北皆有之。與蔓菁相類。梗長葉不光者爲蕪菁。梗短葉闊厚而肥腴者爲菘。舊說北土無菘。今京洛種菘。都類南種。但肥厚差不及爾。機曰。蔓菁菘菜恐是一種。但在南土葉高而大者爲菘。秋冬有之。在北土葉短而小者爲蔓菁。春夏有之。○時珍曰。白菘卽白菜也。牛肚菘卽最肥大者。紫菘卽蘆菔也。開紫花故曰紫菘。蘇恭謂白菘似蔓菁者誤矣。根葉俱不同。而白菘根堅白。不可食。又言南北變種者。蓋指蔓菁而言。紫菘根似蔓菁而葉不同種類亦別。又言北土無菘者。自唐以前或然。近則白菘紫菘南北通有。惟南土不種蔓菁。種之亦易生也。蘇頌漫爲兩可之言。汪機妄起臆斷之辨。俱屬謬誤。今悉正之。

莖葉【氣味】甘溫無毒。大明曰。涼微毒。多食發皮膚風癩瘻。洗曰。發風冷。內虛人不可食。有

食似小冷。張仲景言藥中有甘草食菘，卽令病不除也。『頌曰』有小毒，不可食多。多則以生薑解之。『瑞曰』夏至前食發氣動疾，有足疾者忌之。『時珍曰』氣虛胃冷人多食，恶心吐沫，氣壯人則相宜。

【主治】通利腸胃，除胸中煩解酒渴。別行於上下至心卽死。菘菜搗白菘菜搗，塗毒生瘡，爛塗之飛絲入目。白菜搗爛帕包滴，三二點入目，卽止。

【附方】  
一、小兒赤遊傳之卽止。張傑子母祕錄。塗毒生瘡，爛塗之飛絲入目。白菜搗爛帕包滴，三二點入目，卽止。

子【氣味】甘平，無毒。

【主治】通利腸胃，除胸中煩解酒渴。音秀○

【附方】  
一、酒醉不醒。菘菜子二合，細研，井華水

芥  
上品

【病名】農書云：其氣味辛烈，菜中之分然者，食之有割介之意，故字從介。

【集解】弘景曰：芥似菘而有毛味，辣可生食，及作菹。其子可以藏冬瓜。又有蕷音郎，作菹，甚辣。

子粗大白色，如白染米甚辛美，從西戎來。頌曰：芥處處有之，有青芥似菘，有毛味極純紫可愛，作菹最美。有白芥見本條，其餘南芥、旋芥、花芥、石芥之類皆菜茹之美者，不能悉錄。芥莖葉

土多芥，相傳嶺南無蕷，有人大攜種至彼種之，皆變作芥。地氣使然耳。時珍曰：芥有數種，青芥又

名刺芥，似白菘，有柔毛，有大芥，亦名皺葉芥，大葉皺紋，色尤深綠，味更辛辣。二芥宜入藥用，有馬芥葉，又如青芥，有花芥葉，多缺刻，如蘿蔔英，有紫芥莖，俗呼春菜，四月食者謂之，夏芥，心嫩薹謂之，芥藍，淪食肥美，其花三月開黃色。

俗呼臘菜，春月食者，謂之。

可出結英一二寸子大如蘇子而色紫味辛研末泡過爲芥醬以侑肉食辛香

莖葉【氣味】辛溫無毒〔洗曰〕一煮食動氣與風生食發丹石不可多食大葉者良細葉有毛者害人

魚食發水腫

【主治】歸鼻除腎經邪氣利九竅明耳目安中久食溫中止欬嗽上氣除冷氣主欬逆下氣去頭

面風〔孟子〕通肺豁痰利膈開胃時

珍

【發明】〔時珍曰〕一芥性辛熱而散故能通肺開胃利氣豁痰久食則積溫成熱辛散大盛耗人真元

〔蘇文〕肝木受病昏人眼目發人瘡痔而別錄謂其能明耳目者蓋知暫時之快而不知積久之害也

〔素問〕云辛走氣氣病無多食辛多則肉脰而唇揭此類是矣〔陸佃〕云望梅

生津食芥墮淚五液之自外至也暮而涎垂媿而汗出五液之自內生也

【附方】〔新〕四牙齦腫爛出臭水者芥菜搣燒存

〔舊〕研末頻服之卽愈

飛絲入目神芥菜汁點之如

漆瘡搔癢之

千金方

痔瘡腫

〔芥菜搣餅頻坐之談塗塗翁經效方〕

【子氣味】辛熱無毒〔時珍曰〕一多食昏

目動火泄氣傷精

【主治】歸鼻去一切邪惡症氣喉痹弘

日

症氣發無常處及射工毒丸服之或搗末醋和塗之隨手有驗

〔蘇〕治風毒腫及麻痺醋研傅之撲損瘀血腰痛腎冷和生薑研塗貼之又治心痛酒調服之

〔華〕研末作

醬食香美通利五臟〔孟子〕研末水調塗頂頸止衄血吳瑞溫中散寒豁痰利竅治胃寒吐食肺寒欬嗽風冷

氣痛口噤唇緊消散癰腫瘀血時

**【發明】** 〔寺珍曰〕芥子功與菜同。其味辛。其氣散。故能利九竅。通經絡。治口噤耳聾鼻衄之證。消癰治病尤良。見後本條。

**【附方】** 舊新 感寒無汗。熨之取汗出妙。○楊起簡便單方。身體麻木。芥菜子末。醋調塗。中風口噤。本縮者用芥菜子一升研入醋二升。小兒唇緊。頻塗之。崔氏纂要方。身熱頭頸頰下效。聖惠方。耳聾。馬芥子搗汁曝濃揩破。喉痹腫痛。乾卽易之。○又用辣芥子研末。醋調取汁點入喉內。待喉內鳴。耳卒聾閉。芥子末入乳汁和以綿裹塞之外。臺祕要。并聖惠方。耳聾。鼻塞。雀目不見。真紫芥菜子炒卻用陳麻骨燒煙吸入立愈。並聖惠方。耳聾。鼻塞。雀目不見。黑爲末。川羊肝炒一具。分作八服。每用芥末三錢。捻肝上。筒中。翳膜。芥子一粒。輕手挿入眼中。少頃。眉毛不生。芥菜子擣裹定煮熟冷食。以汁送下。聖濟總錄。目中翳膜。以井華水。雞子清洗之。總錄。半夏等數次卽生。薑自然汁。調搽。孫氏集效方。鬼疰勞氣。芥子三升研末。絹袋盛入三斗酒。熱痰煩運。白芥霍亂吐瀉。搗細水和傅。清上。反胃吐食。芥子末。酒服方寸匕。上氣嘔吐。芥子末。蜜丸梧子大。井華水。寅臍下絞痛。方同聖濟總錄。腰脊脹痛立效。芥子末。調酒貼之。走注風毒。作痛用小芥子末。和玄方。摘之。走注風毒。雞子白塗之。聖惠。一切癰腫。豬膽汁和芥子末。貼之。日。癰腫射工中人。有瘡。用芥子末。和酒厚塗。婦人經閉。不行。至一年者。臍腹痛。腰腿沉重。寒熱往來。用芥子二兩爲末。每服二錢。熱酒食前服。仁存方。陰證傷寒。腹痛。貼臍上。芥菜子研末。生生編。

白芥宋開寶附。

**【釋名】** 胡芥草。蜀本胡戎而盛於蜀。故名。自

**【集解】**荅曰：白芥子粗大白色，如白粱米，甚辛美。從西戎來。藏器曰：白芥生太原河東，葉如三尺，其葉花而有丫，如花芥葉青白色，莖易起而中空，性脆，最畏狂風大雪，須謹護之，乃至折損。三月實者尤高，其子亦大，此菜雖是芥類，迥然別種也。中華本草曰：芥子白且粗，入藥及啖最佳，而人間開黃花，香郁，結角如芥角，其子大如粱米，黃白色，又有一種莖大而中空，性脆，最畏狂風大雪，須謹護之，乃至折損。三月

**莖葉** **【氣味】** 辛溫無毒。人不可食。胡芥爲其性暖熱也。

**【主治】** 冷氣器安五臟功與芥同。

華

**子** **【氣味】** 辛溫無毒。

**【主治】** 發汗，主胸膈痰冷上氣，面目黃亦。又醋研傅射工毒，錄禦惡氣，遁尸飛尸，及暴風毒腫，流四肢疼痛，弘景燒烟及服辟邪魅。日華藏器曰：款嗽胸脇支滿，上氣多唾者，每用溫酒吞下七粒。思邈利氣豁痰，除寒暖中，散腫止痛，治喘嗽，反胃，痹木脚氣，筋骨腰節諸痛。

時珍

**【發明】** 震亨曰：痰在脇下及皮裏膜外，非白芥子莫能達。古方控涎丹用白芥子，正此義也。時珍曰：白芥子辛能入肺，溫能發散，故有利氣豁痰溫中，開胃散痛，消腫辟惡之功。按韓懋醫通云：凡老人苦於痰氣，喘嗽，胸滿，懶食，不可妄投燥利之藥，反耗真氣，懲因人求治，其親靜中處，三子養親湯治之，隨試隨效。蓋白芥子白色主淡，下氣寬中，紫蘇子紫色主氣，定喘止嗽，蘿蔔子白種者，主食，開痞降氣，各微炒研破看所主爲君，每劑不過三四錢，用生絹袋盛入，煮湯飲之，勿煎。太過則味苦辣，若大便素實者，入蜜一匙，冬月加薑一片，尤良。南陵末齋子有辭贊之。

**【附方】** 舊一，新八。反胃上氣，白芥子未酒服一熱痰煩運，白芥子黑芥子大戟甘遂芒消砂等分，爲末糊丸，梧子大每服二十丸，薑湯下，名黑芥丸。普濟方：腹冷氣起餅，白丸，小豆大每薑湯，分爲末糊丸，湯吞十丸，浸蒸甚。

妙○續傳信方。脚氣作痛。方見白芷。小兒乳癬。白芥子研末水調攤膏貼。防痘入目。白芥子末水調塗足心引毒歸腫毒。初起白芥子末醋調塗。胸脇痰飲。白芥子五錢。白朮一兩爲末。棗肉和搗瀝湖集簡方。胸脇痰飲丸。梧子大每白湯服五十丸。摘玄方。

蕪菁上品

【釋名】**蔓菁**。唐九英菘。本療諸葛菜。猶是蕪菁器曰。一蕪菁北人名蔓菁。今井汾河朔間燒食其根呼爲蕪根。曰九英菘。根葉長大而味不美。人以爲軍糧。禹錫曰。爾雅云。須蕪。詩谷風云。采葑采菲。毛蒼註云。葑須也。孫炎云。葑一名葑。禮坊記云。葑蔓菁也。陳宋之間謂之葑。陸機云。葑蕪菁也。幽州人謂之芥。郭璞云。蕪似羊蹄葉細味酢可食。揚雄方言云。蔓蕪蔓菁也。陳楚謂之蔓齊魯謂之蕪。關西謂之蕪。趙魏謂之大芥。然則葑也。須也。蕪菁也。蔓菁也。蘆也。芥也。七者一物也。時珍曰。按孫愐云。蔓菁苗也。其說甚通。掌禹錫以蕪蕪釋蔓菁。陳藏器謂蕪是酸模。當以陳說爲優。詳見草部酸模下。劉禹錫嘉話錄云。諸葛亮所止令兵士獨種蔓菁者。取其纔出甲可生啖一也。葉舒可煮食二也。久居則隨以滋長三也。棄不令惜四也。回則易尋而採五也。冬有根可食六也。比諸蔬其利甚博至今蜀人呼爲諸葛菜。江陵亦然。又朱輔山溪蠻譜云。猫獺猶羌地。方產馬王菜。味澀多刺。卽諸葛菜。食心正。在春時。諸菜之中。最有益者。惟此爾。其子夏秋熟時採之。宗奭曰。蔓菁子黑色。蔓菁子紫色。蘆菔子黃赤色。而大數倍且不圓也。大明曰。蔓菁比蘆菔根短而細葉大連地上。生厚潤短肥而潤其色紅。頌曰。蕪菁南北皆有。北土尤多。四時常有。春食苗。夏食心。亦謂之薹子。恐秋月食莖。冬食根。河朔多種以備饑歲。菜中之最有益者。惟此爾。其子夏秋熟時採之。宗奭曰。蔓菁食心。正在春時。諸菜之中。有益無損於世。有功采擷二日之餘。河東太原所出。其根極大。他處不及也。又出西番吐谷渾地。謂之機。機二曰。蔓菁

【集解】弘景曰。別錄蕪菁蘆菔同條。蘆菔是今溫菘。其根可食。葉不中斂。蕪菁根細於溫菘。而葉不用也。俗人蒸其根及作菹食。但小薰臭爾。恭曰。蕪菁北人名蔓菁。根葉及子皆是菘類。與蘆菔全別體用亦殊。陶言蕪菁似蘆菔。蘆菔葉不堪食。是江表不產二物理。要其眞也。菘子黑色。蔓菁子黃赤色。大根相似。蘆菔子黃赤色而大數倍且不圓也。大明曰。蔓菁比蘆菔根短而細葉大連地上。生厚潤短肥而潤其色紅。頌曰。蕪菁南北皆有。北土尤多。四時常有。春食苗。夏食心。亦謂之薹子。恐秋月食莖。冬食根。河朔多種以備饑歲。菜中之最有益者。惟此爾。其子夏秋熟時採之。宗奭曰。蔓菁食心。正在春時。諸菜之中。有益無損於世。有功采擷二日之餘。河東太原所出。其根極大。他處不及也。又出西番吐谷渾地。謂之機。機二曰。蔓菁

全別。或謂在南爲菜菔，在北爲蔓菁。殊無定見。今按二物根葉花子都別，非一類也。蔓菁是芥屬，根長紫赤色，蘆菔是菘屬，根圓亦有長者，有紅白二色。其味辛甘而永，葉不甚大，而糙，亦有花葉者。夏初起薹，開淡紫花，結角如蟲狀。腹大尾尖，似胡蘆巴，不均不圓。黃赤色，如此分之，自明白矣。其蔓菁六月種者，根大而葉盛。八月種者，葉美而根小。惟七月初種者，根葉俱良。擬賣者純種九莢九英，根大而味短，削淨爲菹，甚佳。今燕京人以瓶醃藏，謂之閉甕菜。

**根葉〔氣味〕**苦溫無毒。宗奭曰時珍曰多食動氣。

**【主治】**利五臟，輕身益氣，可長食之。別錄常食通中，令人肥健。蘇頌消食下氣，治嗽，止渴，去心腹冷痛，及

**熱毒風腫，乳癰，妬乳寒熱。**既

**【發明】**「既曰：」九英菘出河西，葉大，根亦粗長，和羊肉食甚美。常食都不見發病。

**【附方】**舊八預禳時疾。立春後遇庚子日，溫蔓菁汁合家大小並服。

堪。連日病困者，蔓菁菜入少米煮，飲酒辟氣。乾蔓菁根二七枚，蒸三遍，研末酒後水服二錢，卽無酒氣也。

千金一切腫毒，生蔓菁根一

許同搗封之。日三易之。○肘後方用蔓

菁葉不中水者，燒灰和臘豬脂封之。○鼻中衄血，飲十便良方。

大醉不能治者，集療方。豌豆斑瘡，根搗

須臾根出，立瘥。忌油膩，生蔓菁根井葉去土，不用水洗，以鹽和搗塗之，熱卽換，不過三五次。

冷五辛黏滑，陳臭，肘後乳癰寒熱，卽瘥。冬月只用此方，已救十數人。須避風。李絳兵部手集

女子妬乳，度良，又方和雞子白封之，亦妙。食療，陰腫如斗，生蔓菁根搗封之，治人。

豌豆斑瘡，蔓菁汁挑瘡研，塗之，三食頓根出矣。

肘後方，大咬傷瘡，重發者，用蔓菁根搗

汁，挑瘡研，塗之，三食即出也。

普濟方

子【氣味】苦辛平無毒。

【主治】明目別錄療黃疽利小便水煮汁服主癥瘕積聚少少飲汁治霍亂心腹脹末服之主目暗爲油

入面膏去黑點皺文

蘇恭

和油傅蜘蛛咬器壓油塗頭能變蒜髮

孟诜

入丸藥服令人肥健尤宜婦人

蕭炳

【發明】藏器曰

仙經言蔓菁子九蒸九曝搗末長服可斷穀長生蜘蛛咬者恐毒入內搗末酒服亦以油和傅之蔓菁箇中無蜘蛛是其相畏也

陳氏

時珍曰蔓菁子可升可降能汗能吐能下

能利小便又能明目解毒其功甚偉而世罕知用之何哉夏初采子炒過榨油同蘇油練熟一

色無異西人多食之點燈甚明但烟亦損目北魏祖珽因地窖中因蔓菁子油燈傷明卽此也

【附方】舊四新

明日益氣服方寸匕日三升亦可研水和米煮粥食外臺祕要常服明日勝用蕪菁子

三升以苦酒三升煮熟日乾研篩末以井華水服

方寸匕日三升以苦酒三升煮熟日乾研篩末以井華水服但瞳子不壞者十得九愈用蔓

三無所忌抱朴子云服盡一斗能夜視有所見物

千金方青盲眼障蔓菁子六升蒸之氣遍合瓶取下

以釜中熱湯淋之乃曝乾還淋如是三遍卽收

未食上清酒服方寸匕日三升亦可研水和米煮粥食外臺祕要常服明日勝用蕪菁子

蒸九曬爲末每空心米飲服二錢日再服

○又方蔓菁子二升決明子一升和勻以酒五升煮乾曝爲末每服二錢溫水調下日二並聖惠風邪攻目視物不明肝氣虛

末食半錢食後酒下日三服

聖濟總錄服食辟穀蕪菁子熟時采之水煮三過令苦味盡噪搗

末每服半錢食後酒下日三服

○又方蔓菁子四兩入藥瓶中燒黑無聲取出入蛇蛻二兩又燒成灰爲服食辟穀蕪菁子熟時采之水煮三過令苦味盡噪搗

末每服半錢食後酒下日三服

○又方蔓菁子四兩入藥瓶中燒黑無聲取出入蛇蛻二兩又燒成灰爲服食辟穀蕪菁子熟時采之水煮三過令苦味盡噪搗

末每服半錢食後酒下日三服

○又方蔓菁子四兩入藥瓶中燒黑無聲取出入蛇蛻二兩又燒成灰爲服食辟穀蕪菁子熟時采之水煮三過令苦味盡噪搗

末每服半錢食後酒下日三服

○又方蔓菁子四兩入藥瓶中燒黑無聲取出入蛇蛻二兩又燒成灰爲服食辟穀蕪菁子熟時采之水煮三過令苦味盡噪搗

金睛黃小便赤用生蔓菁子末熱水急黃黃疸及內黃腹結不通用蔓菁子搗末水

外臺祕要霍亂脹痛之蕪菁子搗末水煎服當得嚏鼻

草拾遺熱黃便結切惡物沙石草髮並出孟诜食療本草

一升研外濾汁一盞當瀉一便關格服之卽通後汗出勿怪空腹

藏器本草大利或自淨或得汗一升研外濾汁一盞當瀉一便關格服之卽通後汗出勿怪空腹

○又方蔓菁子搗末水煎服當得嚏鼻

心腹作脹蔓菁子一

自利或利或得汗一升研外濾汁一盞當瀉一便關格服之卽通後汗出勿怪空腹

方惠

心腹作脹蔓菁子一升研外濾汁一盞當瀉一便關格服之卽通後汗出勿怪空腹

草拾遺熱黃便結切惡物沙石草髮並出孟诜食療本草

一升研外濾汁一盞當瀉一便關格服之卽通後汗出勿怪空腹

藏器本草

大利或自淨或得汗一升研外濾汁一盞當瀉一便關格服之卽通後汗出勿怪空腹

方惠

心腹作脹蔓菁子一升研外濾汁一盞當瀉一便關格服之卽通後汗出勿怪空腹

草拾遺熱黃便結切惡物沙石草髮並出孟诜食療本草

一升研外濾汁一盞當瀉一便關格服之卽通後汗出勿怪空腹

藏器本草

大利或自淨或得汗一升研外濾汁一盞當瀉一便關格服之卽通後汗出勿怪空腹

**蕷子**末水服方寸匕。風疹入腹爲未。每溫酒服一錢。聖惠方。瘰疽發熱。起色白。刮之汁出。復發熱其上。日夜勿止。肘後方。背疽不愈。愈而復發。骨從孔中出者。蕷子熟搗。帛裹。展轉。日一夜。勿止。傳之用帛裹定。日一易之。千金方。小兒頭癩。一日三上。和酢傳。蔓菁子四兩炒研。蔓菁子研末。入面脂中。夜塗之。亦去面皺。聖惠方。

**花氣味** 辛平無毒

**【主治】**虛勞眼暗。久服長生。可夜讀書。三月三日采花陰乾爲末。每服二錢。空心井華水下。  
微慎

萊菔唐本草

**釋名**蘆菔郭璞云蘆音羅蒲北切同菔蘿菔音羅  
呼楚菘廣南人呼秦菘時珍曰按孫愐廣韻言晉人名菘音拉荅秦人名蘿菔王禎農書言北人蘿菔一種春曰破地錐夏曰夏生秋曰蘿蔔冬曰土酥謂其潔白如酥也珍按菘乃菜名因其耐冬如松柏也葉菘乃根名上古謂之蘆菔中古轉爲萊菔後世訛爲蘿蔔南人呼爲蘿聘與霍同見晉灼漢書註中陸佃乃言萊菔能制麁毒是來麁之所服以菔音服蓋亦就文起義耳王氏溥濟方稱乾蘿蔔爲仙人骨亦方土謬名也

**集解** 弘景曰 蘆菔是今溫菘其根可食俗人蒸其根及作菹食但小瀟臭爾葉不中啖又理喪其真也江北河北秦晉最多登萊亦好頌曰 莱菔南北通有北土尤多有大小二種大者肉堅宜蒸食小者白而脆宜生啖河朔極有大者而江南安州洪州信陽者甚大重至五六斤或近一杯亦一時種蒔之力也瑞曰 夏月復種者名夏蘿蔔形小而長者名蔓菁蘿蔔時珍曰 莱菔今天下通有之昔人以蕪菁萊菔二物混註已見蔓菁條下圃人種萊菔六月下種春秋采苗冬掘根春末抽高薹開小花紫碧色夏初結角其子大如大蔴子圓長不等黃赤色五月亦可再種其葉有大者如蕪菁細者如花芥皆有細柔毛其根有紅白二色其狀有長圓二類大抵生沙壤者脆而甘生瘠地者

堅而辣根葉皆可生可熟可糖可醬可豉可醋可糖可腊可飯乃蔬中之最有利者而古人不深詳之豈因其賤而忽之耶抑未諳其利耶

【氣味】根辛甘葉辛苦溫無毒〔洗曰〕性冷

〔思邈曰〕平不可與地黃同食令人髮白爲其澀營衛也

〔時珍曰〕多食萊菔動氣惟生薑能制其毒又伏硇砂

【主治】散服及炮煮服食大下氣消穀和中去痰癖肥健人生搗汁服止消渴試大有驗〔唐本〕利關節理顏色練五臟惡氣制麪毒行風氣去邪熱氣煥利五臟輕身令人白淨肌細〔孟诜〕消痰止欬治肺癆吐血

溫中補不足同羊肉銀魚煮食治勞瘦欬嗽〔日華〕同豬肉食益人生搗服治禁口痢穎搗汁服治吐血衄

血瑞寬胸膈利大小便生食止渴寬中煮食化痰消導〔寧海〕殺魚鯉氣治豆腐積汪主吞酸化積滯解酒

毒散瘀血甚效末服治五淋丸服治白濁煎湯洗脚氣飲汁治下痢及失音并烟熏欲死生搗塗打撲

湯火傷時珍

【發明】

〔頌曰〕萊菔功同蕪菁然力猛更出其右斷下方亦用其根燒熱入藥尤能制麪毒昔有婆羅門僧東來見食麥麪者驚云此大熱何以食之又見食中有蘿菔乃云賴有此以解其性自

此相傳食麪必啖蘿菔

〔炳曰〕搗爛制麪作餽飪食之最佳飽食亦不發熱酥煎食之下氣凡人飲食過度生嘴嚙之便消

〔慎微曰〕按楊億談苑云江東居民言種芋三十畝計益米三十斛則知蘿蔔果能消食也

〔宗奭曰〕服地黃何首烏人食萊菔則令人鬚髮白

三十畝計益米三十斛則知蘿蔔果能消食也

世皆以爲此物味辛下氣速也然生蘿蔔子更辛何止能散而已蓋萊菔辛而又甘故能散緩而又下氣速也所以散氣用生蘿蔔下氣用萊菔

〔震亨曰〕萊菔屬土有金與水寇氏言其下氣速人往往煮食過多停滯成溢飲豈非甘多而辛少乎

〔時珍曰〕萊菔根葉同功生食升氣熟食降氣蘇寇二氏言其下氣速人往往煮食過多停滯成溢飲豈非甘多而辛少乎

〔止齋曰〕不知其生則噫氣熟則洩氣升降之不同也大抵入太陰陽

少陽氣分故所主皆肺脾腸胃三焦之病

李九華云萊菔多食滲入血則其白人髭髮蓋亦由此非獨因其下氣澀營衛也按洞微天府由來是此中惆悵悶狂云夢中見紅裳女子引入宮殿中小姑令歌每大日

遼歌云五靈樓閣曉玲瓈

按洞微天府由來是此中惆悵悶狂云夢中見紅裳女子引入宮殿中小姑令歌每大日

遼歌云五靈樓閣曉玲瓈

按洞微天府由來是此中惆悵悶狂云夢中見紅裳女子引入宮殿中小姑令歌每大日

麥毒也。少女心神小姑脾神醫經言蘿蔔制麯毒故曰火晉宮火者毀也。遂以藥井蘿蔔治之。果愈。又妄行蘿蔔下氣而酒導之故也。又云有人好食豆腐中毒。醫治不效。忽見賣豆腐人言其妻誤以蘿蔔湯入鍋中。遂致不成其人心悟。乃以蘿蔔湯飲之而瘳。物理之妙如此。又延壽書載李師逃難入石窟。東嚼汁嚥下。此法備急不可不知。

### 【附方】

舊二新

二十一、食物作酸者。蘿蔔生嚼數片或生菜嚼之亦佳。絕妙乾者熟瀕湖集簡方。反胃噎疾。蘿蔔蜜煎浸細。

消渴飲水。獨勝散用出丫子蘿蔔三枚淨洗切片日乾爲末。每服二錢。煎豬肉湯澄清肺痿欬血。蘿

頻食肉或鯽魚煮熟鼻衄不止。蘿蔔搗汁半盞入酒少許熱服。并以汁注鼻中。皆同煎。早一服。午一服。日晡米飲吞阿膠丸百粒。如無蘿蔔以子搗汁亦可。一方加枯礬七分同煎。

方只用蘿蔔菜煎湯日飲之。○普濟方用蘿蔔片不拘新舊染蜜噙之。嚥汁味淡再換覺思食以肉一

煮粥與食不可過多。痢後腸痛。同大腸便血。大蘿蔔皮燒存性荷葉燒存性蒲黃生。普濟腸風下血。蜜炙蘿蔔任意。人食之昔一婦人

服此有效。此有服方。酒疾下血。連旬不止。用大蘿蔔二十枚留青葉寸餘。以井水入大腸脫肛。生藥根搗實臍

一百一選方。罐中煮十分爛。入淡醋空心任食。壽親養老方。普濟遍體浮腫。出丫子蘿蔔浮麥等分。

用蘿蔔切片蜜浸少時。炙乾數次。不可過。遍體浮腫。浸湯飲之。聖濟總錄脚氣走痛。蘿蔔煎湯洗

爲末。鋪護內偏正頭痛。生蘿蔔汁一蚬殼仰臥隨左右。以此治人。傳此方移時。遂愈也。以此治人。不勝數。如宜方失音不語。蘿蔔生

蠶汁同服。聖濟總錄內偏正頭痛。有道人傳此方。移時。遂愈也。以此治人。不勝數。如宜方失音不語。蘿蔔生

普濟方。喉痺腫痛。蘿蔔汁和臙漿。滿口爛瘡。妙自然汁。瀕湖集簡方。烟熏欲死。明下。湯火傷灼。

可打撲血聚。皮不破者。用蘿蔔搗封之。

邵氏方或

子【氣味】辛甘平無毒。

【主治】研汁服。吐風痰同醋研。消腫毒華。下氣定喘。治痰消食除脹。利大小便止氣痛。下痢後重發瘡疹時。

【發明】降升則吐。風痰散風寒發瘡疹降則定疾。喘嗽調下痢後重止內痛皆是利氣之效。予曾用殊果有。

【附方】  
售二新上氣痰嗽。喘促睡臘血以茱蘂子一合研細煎湯食上服之。○食醫心鏡肺痰欬嗽以糖和丸芡子大綿裹含之。薑汁末甚妙。  
○勦喘痰促過厚味卽發者。蘿蔔子淘淨蒸熟曬研。薑汁浸蒸餅丸綠豆大。燒存性等分爲末。薑汁和煉蜜丸梧子大。每服五七十丸。白湯下。簡便單方久嗽痰喘。蘿蔔子炒杏仁去皮尖炒等分。蒸餅丸麻子半斤搗細以水一盞瀝取汁入香油及蜜些須溫服。後以桐油浸過曬乾。鵝翎探吐。中風口禁。蘿蔔子牙阜莢各二錢以小兒風寒研末。一錢丹溪方。小兒風寒研末。一錢  
溫葱酒服之。取微汗。○衛生易簡方。風祕氣祕。蘿蔔子炒一合搗水和阜莢末二錢服立通。壽域神方。氣脹氣蠱。茱蘂子研以水濾汁浸縮砂一  
大效。衛生易簡方。風祕氣祕。蘿蔔子炒一合搗水和阜莢末二錢服立通。壽域神方。氣脹氣蠱。茱蘂子研以水濾汁浸縮砂一  
如神。末每米飲服一錢。楊仁齋直指方。小兒盤腸氣痛用蘿蔔子炒黃研末。香年久頭風。茱蘂子生薑等分搗取汁入鼻中。立止。朱氏集驗方。牙齒疼痛之左疼點右鼻右疼點左鼻。濟普濟。蘿蔔子十四粒。生研以人乳和。瘡瘍不出。蘿蔔子生研末。米飲服良。衛生易簡方。

生薑別錄  
中品

校正

原附乾薑下今分出  
自草部移入此

【釋名】時珍曰按許慎說文薑作𦵹云藥溼之菜也。王安石字說云薑能驅藥。

【集解】別錄曰者爲良苗高二三尺葉似箭竹葉而長兩兩相對苗青根黃無花實秋時采根時珍曰以漢溫池州宜原隰沙地四月取母薑種之五月生苗如初生嫩薑而葉稍闊似竹葉對生葉亦辛香春秋社前後新芽頓長如列指狀采食無筋謂之子薑秋分後者次之霜後則老矣性惡溼洳而畏日故秋熱則無薑呂氏春秋云和之美者有楊柳之薑楊柳地名在西蜀春秋運斗樞云璇星散而爲薑

【氣味】辛微溫無毒浮而升陽也○之才曰秦椒爲之使殺牛夏南星薑若毒惡黃芩黃連天鼠蕷弘景曰久服少志少智傷心氣今人敵辛辣物惟此最常故論語云每食不撤薑言可常食但不可多爾有病者是所宜矣○恭曰一本經言薑久服通神明生痰氣即可常敵陶氏謬爲此說檢無據思邈曰八九月多食薑至春多患眼損壽減筋力孕婦食之令兒盈指果曰古人言秋不食薑令人瀉氣蓋夏月火旺宜汗散之故食薑不禁辛走氣瀉肺故秋月則禁之晦菴語錄亦有秋薑天人天年之語○時珍曰食薑久積熱患目疹屢試有準凡病痔人多食假酒立發甚速癰瘍人多食則生懸肉此皆昔人所未言者也相感志云糟薑瓶內入蟬蛻雖老薑無筋亦物性有所伏耶

【主治】久服去臭氣通神明歸五臟除風邪寒熱傷寒頭痛鼻塞欬逆上氣止嘔吐去痰下氣別錄曰去水氣溼療欬嗽時疾和半夏主心下急痛和杏仁作煎下急痛氣實心胸擁隔冷熱氣神效搗汁和蜜服治中熱嘔逆不能下食飄散煩悶開胃氣汁作煎服下一切結實衝胸膈惡氣神驗孟珙破血調中去冷氣汁解藥毒藏器除壯熱治痰喘脹滿冷痢腹痛轉筋心滿去胸中臭氣狐臭殺腹內長蟲張益脾胃散風寒元解菌蕈諸物毒吳生用發散熟用和中解食野禽中毒成喉痹浸汁點赤眼搗汁和黃明膠

熬貼風濕痛甚妙。

珍時

乾生薑主治治嗽溫中治脹滿霍亂不止腹痛冷痢血閉病人虛而冷宜加之

薑屑和酒服治偏

風孟曉肺經氣分之藥能益肺好。

【發明】成無己曰一薑棗味辛甘專行脾之津液而和營衛藥中用之不獨專於發散也一杲曰

三也與芍藥同用溫經散寒四也孫真人云薑爲嘔家聖藥蓋辛以散之嘔乃氣逆不散此藥行陽而散氣也或問生薑辛溫入肺何以云入胃口曰俗以心下爲胃口者非矣咽門之下受有形之物及胃

之系便是胃口與肺系同行故能入肺而開胃口也曰人云夜間勿食生薑令人閉氣何也曰生薑辛

溫主開發夜則氣本收斂反開發之則違天道矣若有病人則不然也生薑屑比之乾薑則不熱比之

生薑則不溫以乾生薑代乾薑者以其不僭故也俗言上牀蘿蔔下牀薑薑能開胃蘿蔔消食也

珍曰一薑辛而不葷去邪辟惡生啖熟食醋漿糟鹽蜜煎調和無不宜之可蔬可和可果可藥其利博

矣凡早行山行宜含一塊不犯霧露清溼之氣及山嵐不正之邪案方廣心法附餘云凡中風中暑中

氣中毒中惡乾霍亂一切卒暴之病用薑汁與童尿服立可解散薑能開痰下氣童尿降火也

一頌皮大妙

楊士瀛

曰

一薑能助陽茶能助陰二物皆消散惡氣調和陰陽且解溼熱及酒留食薑

皮冷痢去皮大妙

崔元亮集驗方載

敷賜

曰一薑治痢方以生薑切細和好茶一兩益任意呷之便瘥若是熱痢若

暑氣之毒不問亦白通效

蘇東坡治文潞公有效

金方千子暴逆氣上喉

薑兩三片

寇氏衍義

乾嘔厥逆

頻嚼生薑

嘔吐不止連津呷之又殺腹內長蟲

食醫心合

附方

舊

三十一

痰澼卒風

生薑二兩附子一兩水五升煮取

食療瘧疾寒熱

脾胃聚滯發爲寒熱

生薑四兩搗自然汁一酒盃

露

易簡寒熱痰嗽

咽之

本草衍義

初起者燒薑一塊含

嗽不止

生薑五兩

鶴牛升火煎

熱食盡病段

久患欬噫

生薑汁半合蜜一匙煎

小兒欬嗽

生薑四兩

效方初虞世必

飲

外臺祕要方

煎湯浴之

又殺腹內長蟲

煎取四合

**鏡心痞嘔噦**。心下痞堅。生薑八兩水三升煮一升半。夏五升煮一升取汁同煮。一升半分再服。五合洗。千金反胃羸弱。作粥食。○專信適用方。用母薑二斤搗汁。用生

臺祕要。外霍亂腹脹升煮二升分三服。肘後方。腹中脹滿。冷即易之。梅師胸脇滿痛。有邪氣結實。硬痛脹滿者。生薑一斤搗渣留汁慢炒。待潤以絹包子患處。款款熨之。冷再以汁炒再熨。良久豁然寬快也。陶華傷寒。雖法大便不通。生薑削長二寸塗鹽止。生薑煨研爲末。共乾薑末等分。以醋和麪作餳鈍。先以水煮。又以清飲煮過停冷。吞二七枚。以粥送下。日一度食療。下惠濕熱發黃。生薑時時周身擦之。其黃自退也。一方加茵陳蒿尤妙。傷寒搥法。暴赤眼腫點之。淚出今日點明日愈。勿疑。○一治暴風客熱。目赤睛痛腫者。臘月取生薑搗絞汁。陰乾取粉入銅青末等分。每以少許沸湯泡澄清溫洗。淚出妙舌上生胎。薑片時時擦之。自去。陶華方。滿口爛瘡。生薑自然汁。頻頻漱吐。牙齒疼痛。老人薑瓦焙入枯礬末同擦之。有喉痹毒氣。生薑二斤搗汁。蜜合日亦可爲末。擦之甚效。普濟方。氣五合煎匀。每服一匙。並見禽合。食鳩中毒。食竹雞毒。食鷗鵝毒。方並見禽部本條。中萬荳毒。中諸藥毒。獨犬傷人。並飲生薑汁。小品五服。

**虎傷人瘡** 內服生薑汁外以汁洗之  
**用白礬末傅上**  
**蛇蠍人瘡** 未傳之乾薑末傅上  
**即易千金**  
**蜘蛛咬人之良藥** 切片貼  
**千金刀斧金瘡** 生薑傳勿動嚼  
**次日卽生肉甚**  
**明効手足**  
**生薑葱白搗爛**  
**失禁瘡** 薑汁和酒調  
**百蟲入耳** 薑汁少夜下孤臭  
**薑汁頻**

**妙扶壽方** 用挑三火和麪洗熱瘡之頭挑後生  
蠶貼之。百步不工許滴之則一宿吳華絕極。  
**赤白癩風良** 生薑頻擦之。兩耳凍瘡生薑自然汁熬  
並易簡。兩耳凍瘡膏塗。暇日記發背初起。生薑一塊炭火炙一層刮一層。海上方。疔瘡腫毒。

五  
產後肉線一婦產後肉線後用力  
以熱絹五尺折作方結令人輕輕盛起肉線使之屈曲作三團納入產戶乃以絹袋盛薑就近熏之冷

則更換繫一日夜縮入大半二日盡入也。此乃魏夫人祕傳怪病方也。但不可使線斷斷則不可治之矣。脈溢怪症須臾目鼻口被氣脹合此名脈溢。生薑自然汁和水各半盡服卽安。○並夏子益奇疾方。

**薑皮**〔氣味〕辛液無毒。

〔主治〕消浮腫腹脹痞滿和脾胃去醫時。

珍

〔附方〕一拔白換黑。刮老生薑皮一大升于久用油腥鍋內不須洗刷固濟勿令通氣令精細人守之。孔中或先點鬚下然後拔之以指擦入三日後當生黑者神效。李卿用之有驗。蘇頌圖經本草當

**葉**〔氣味〕辛溫無毒。

〔主治〕食餉成癥搗汁飲卽消張機。

〔附方〕新打傷瘀血服薑葉一方寸匕日三。范汪東陽方。

乾薑本品

〔校正〕自草部移至此。

〔釋名〕白薑。見下。

〔集解〕弘景曰：「乾薑今惟出臨海章安數村作之。蜀漢薑舊美。荊州有好薑而不能作乾者。凡作乾薑法。水淹三日去皮置流水巾六日更刮去皮然後曬乾置瓷缸中釀三日乃成。」頌曰：「造法采根于長流水洗過日曬爲乾薑。以漢溫池州者爲良。故人呼陶說乃漢州乾薑法也。」時珍曰：「用乾薑以母薑造之。今江西壅均皆造以白淨結實者爲良。故人呼白薑。又曰均薑。凡入藥並宜炮用。」大清外術言曰：「大苦辛。好古曰：『大清外術言孕婦不可食乾薑。』令胎內消蓋其性熱而辛散生薑也。」時珍曰：「豬大清外術言孕婦不可食乾薑。」保昇曰：「久服令目暗。餘人目暗而辛散生薑也。」

**【主治】**胸滿欬逆上氣溫中止血出汗逐風濕痹腸澼下痢生者尤良。本經寒冷腹痛中惡霍亂脹滿風邪諸毒皮膚間結氣止唾血別錄治腰腎間疼冷冷氣破血去風通四肢關節開五臟六腑宣諸絡脈去風毒冷痹夜多小便甄權消痰下氣治轉筋吐瀉腹臟反胃乾嘔瘀血撲損止鼻紅解冷熱毒開胃消宿

**食明**•主心下寒痞目睛久赤好古

**附方** 舊十六 脾胃虛冷，不下食，傾久羸弱成瘵者，用溫州白乾薑漿水煮透，取出焙乾搗末，陳脾胃藥過入鐵銚溶化和丸梧子大每空心米飲下三十丸。十便方頭運吐逆，胃冷生痰也。用川乾一錢二分水一鍾半煎減半，暖胃消痰。二薑丸用乾薑高良薑等分炮研末糊丸，和劑局方。心氣卒痛，乾眼累用有效。

末外臺祕要。陰陽易病。丈夫名陰易婦人名陽易速宜汗之。卽愈滿四日不可治也。用乾薑四兩爲汗末。每用半兩白湯調服。覆衣被出。汗後手足伸卽愈。傷寒類要方。中寒水瀉。乾薑炮研末。粥飲服後效。肘血痢不止。乾薑燒黑存性放冷爲末。每服後方一錢米飲下。神妙。○姚氏集驗。脾寒瘈疾。水一盞煎至七分服。○又乾薑炒黑爲末。每服酒服三錢。七冷氣欬嗽結脹者。乾薑未熟酒調服。牛欬嗽上氣。用合州乾薑炮皐英炮去皮子及蛀者和搗三千杵丸梧子大。每飲服三丸。欬發卽服。日三五服。禁食葱薑油腥。其效如神。禹錫在淮南與李亞同幕府。李每治人而不出方。或謂其客李曰。凡人患嗽多進冷藥。若見此方用藥熟燥必不肯服。故信但出藥卽多效也。試之虛勞不眠。乾薑爲末。湯服三錢。千金方吐血不止。乾薑爲末。童子小鼻衄不止。乾薑削鼻中。龜鼻不通。乾薑末蜜調塞。卽止。廣利方。冷淚目昏。乾薑粉一字炮湯。赤眼澀痛。白薑末水調貼足。目忽不見人。聖濟錄。中風。內有汁。牙痛不止。川薑炮川椒等分爲末。捲之。御藥院方。班豆厥逆。次以明爲度。聖濟方。目中卒痛。出拭之未盡更易。甘草炙一錢。牛水二鍾煎一鍾服。麗安常傷寒論。癰疽初起。自愈此乃東昌申一齋奇方也。諸症辨。瘰疬不斂。乾薑爲末。薑汁打糊和作劑。以黃丹爲衣。每日隨瘡大小入藥在內。追腫消散。膿盡生肉口合爲度。如不合以葱白汁調大黃末擦之。卽愈。救方。虎狼傷人。乾薑末。水服三匕。生薑汁。蛇蠍螫人。遇螫卽以傅之。便定。廣利方。

附錄】天竺乾薑。拾遺藏器。惡血積聚。生變羅門。一名胡乾薑。狀似薑。小黃色也。

商蒿宋嘉

【釋名】蓬蒿。一時珍曰。一形氣。同乎蓬蒿故名。

**【集解】**〔機曰〕本草不著形狀。後人莫識。〔時珍曰〕蕓蒿八九月下種。冬春采食。肥莖花葉微似地菘。及苦蕷子最易繁茂。此菜自古已有。孫思邈載在千金方。菜類至宋嘉祐中始補入本草。今人常食者而汪機乃不能識。輒致擅自脩纂。誠可笑慨。

**【氣味】**甘辛平無毒。〔禹錫曰〕多食動風氣。薰人心令人氣滿。

**邪蒿**宋嘉祐

宋嘉祐

**【釋名】**〔時珍曰〕此蒿葉紋皆邪故名。

**【集解】**〔藏器曰〕邪蒿根莖似青蒿而細軟。〔時珍曰〕三四月生苗葉似青蒿色淺不臭。根葉皆可茹。

**【氣味】**辛溫平無毒。〔詵曰〕生食微動風作羹食良不與胡荽同食。令人汗臭氣。

**【主治】**胸膈中臭爛惡邪氣利腸胃通血脈續不足氣。〔孟詵曰〕煮熟和醬醋食治五臟惡邪氣厭穀者治脾

胃腸澼氣渴熱中暑疾惡瘡食醫心鏡

**胡荽**宋嘉祐

**【釋名】**香荽。拾遺胡菜。薹蘆荽。〔時珍曰〕荽許氏說文作葰。云薑屬可以香口也。其莖柔葉細而根多

布散之貌俗作芫花之光非矣〔藏器曰〕石勒諱胡故并汾人呼胡荽爲香荽。

**【集解】**〔時珍曰〕胡荽處處種之。八月下種。晦日尤良。初生柔莖圓葉葉有花歧根軟而白。冬春采

大麻子亦辛香。按賈思勰齊民要術云：六月布種者可竟冬食。春月按子沃水生芽種者小小供食而已。王禎農書云：胡荽於蔬菜中子葉皆可用。生熟俱可食，甚有益於世者，宜肥地種之。

【正誤】李廷飛曰：胡荽，蕎子也。吳瑞曰：胡荽俗呼蕎子，乃薤也。李吳二氏云並作胡荽誤矣。

根葉【氣味】辛溫，微毒。洗曰：平微寒，無毒，可和生菜食。此是葷菜，損人精神。華陀云：胡臭口臭，屬不可同邪。薦食令人汗臭難產。時珍曰：凡服一切補藥及藥中有白朮、牡丹者，不可食。此伏石鍾乳。

【主治】消穀治五臟，補不足，利大小腸，通小腹氣，拔四肢熱，止頭痛，療沙癩，豌豆瘡不出，作酒飲之，立出通心竅，嘉補筋脈，令人能食，治腸風，用熱餅裹食甚良。孟合諸菜食氣香，令人口爽，辟飛尸鬼疰蟲。

吳辟魚肉毒。寧瑞。

【發明】時珍曰：一胡荽辛溫，香竄內通心脾，外達四肢，能辟一切不正之氣，故痘瘡出不爽快者，能直指方云：痘疹不快，宜用胡荽酒飲之，以辟惡氣。牀帳上下左右皆宜掛之，以禦汗氣。胡臭天癸淫佚之氣，一應驅除，所不可無。若兒虛弱及天時陰寒，用此妙如兒壯實，及春夏晴暖，陽氣發越之時，加以酒麴助虛，以火益火，胃中熱熾，毒血聚滯，則變成黑陷矣，不可不慎。

【附方】舊五癰痘不快，用胡荽二兩切，以酒二大盞煎沸，沃之，以物蓋定，勿令洩氣候。熟氣結滯，數發者，胡荽半斤，五月五日采陰乾水，七升煮取一升，半去孩子赤丹。胡荽汁塗之，面上黑子日洗之。小津分服，未瘥更服。春夏秋冬根莖並可用。必效方：譚氏方。小便不通，滑石末一兩，分三四服。聖濟總錄：肛門脫出，胡荽切一升，入子解中蠭毒。胡荽根搗汁半升，和酒立下，神驗。必效方：蛇虺螫傷。胡荽苗合口千金方。

母祕錄：解中蠭毒。胡荽根搗汁半升，和酒立下。

**子**【氣味】辛酸平無毒用炒

**【主治】**消穀能食。思蠱毒五痔及食肉中毒。吐下血。煮汁冷服。又以油煎塗小兒禿瘡。器發痘癰。殺魚腥時。

**【附方】**舊三四食諸肉毒汁冷服半升。日夜各一服卽止。食療本草。腸風下血。胡荽子和生菜以熱餅裹食之。普濟方。新四食。炒搗末。每服二錢。赤痢砂糖水。五痔作痛。胡荽子炒爲末。每服二錢。空心痔漏下白痢。薑湯下。瀉血白湯下。日二普濟方。升乳香少許。普濟方。升粟糠一升。白湯下。數服見效。海上仙方。脫肛。以小口瓶燒烟熏之。儒門事親。腸頭挺出。秋冬。秋。冬。搗胡荽子醋煮熨之。甚效。孟旣食療本草。牙齒疼痛。胡菜子卽胡荽子五升。以水五升。煮取一升。含外臺祕要。

### 胡蘿蔔綱目

**【釋名】**地來氣味微似蘿蔔故名。

**【集解】**時珍曰。胡蘿蔔今北土山東多蒔之。淮楚亦有種者。八月下種。生苗如邪蒿。肥莖有白毛者。盈握。狀似鮮嫩地黃及羊蹄根。三四月莖高二三尺。開碎白花。攢簇如傘狀。似蛇牀花。子亦可調和食料。按周憲王救荒本草云。野胡蘿蔔苗葉花實皆如蛇牀花。亦如家牀胡蘿蔔。但根細小。味甘。生食蒸食皆宜。花子皆大於蛇牀。又金幼孜北征錄云。交河有沙蘿蔔。根長二尺許。大者徑寸。下支生小者如筋。其色黃白。氣味辛而微苦。亦似蘿蔔氣。此皆胡蘿蔔之類也。根【氣味】甘辛。微溫。無毒。

**【主治】**下氣補中。利胸膈腸胃。安五臟。令人健食。有益無損。時

子〔主治〕久痢時珍

水蘄音芹○本經下品

【釋名】芹菜錄水英本經楚葵弘景曰「蘄字俗作芹字。論其主治合在上品未解何意乃在下品」二新譜夢聲也後省作芹从斤亦譜聲也。其性冷滑如葵故爾雅謂之楚葵呂氏春秋菜之美者有雲夢之芹雲夢楚地也楚有蘄州蘄縣俱音淇羅頤爾雅翼云地多產芹故字从芹蘄亦音芹徐鍇注說文蘄字从少蘄諸書無蘄字惟說文別出狩字音銀疑相承誤出也據此則蘄字亦當从蘄作薪字也

【集解】並堪作蘄及生菜保昇曰「水蘄生南海池澤」恭曰「水蘄卽芹菜也。有兩種。荻芹白色取根赤芹取莖葉。芹生黑滑地食之不如高田者宜人置酒醬中香美。高田者名白芹。餘田者皆有蟲子在葉間視之不見食之令人爲患。弘景曰「又有渣芹可爲生菜亦可生啖。」時珍曰「芹有水芹旱芹水芹主江湖陂澤之涯旱芹生平地有赤白二種。二月生苗其葉對節而生似芍藥其莖有節棱而中空其氣芬芳五月開細白花如蛇牀花。楚人采以濟饑其利不小詩云虧櫻泉言采其芹杜甫詩云飯煮青泥坊底芹又云香芹碧澗羹皆美芹之功而列子晉鄉豪嘗芹口慘腹蓋未得食芹之法耳。」

莖〔氣味〕甘平無毒思邈曰「苦酸冷澀無毒。」洗曰「和醋食。」齒齦不可食李廷飛曰「赤芹害人不可食。」

【主治】女子赤沃止血養精保血脉益氣令人肥健嗜食本經去伏熱殺石藥毒搗汁服孟飲汁去小兒

暴熱大人酒後熱鼻塞身熱去頭中風熱利口齒利大小腸器治煩渴崩中帶下五種黃病大

【發明】〔張仲景曰「春秋二時龍帶精入芹菜中人誤食之爲病面青手青腹滿如妊娠痛不可忍作蛇龍病俱服硬錫三升日三度吐出蜥蜴便瘥。」時珍曰「芹菜生水涯蛟龍雖云變化莫測其精那得入此大抵是蜥蜴蛇之類春夏之交遠精於此故爾且蛇喜嗜芹尤爲可證別有馬芹見後

**附方** 新舊 **一、小兒吐瀉** 芹菜切細煮汁飲之。不拘多少。**子母祕錄** 小便淋痛。水芹菜白根者去葉搗井水和服。聖惠方。小便出血。水芹搗汁日服六七劑。

**花氣味苦寒無毒**

董唐音本勤草

**釋名**苦堇爾董

爾雅。董葵，唐綱目。禹錫曰：「爾雅云：薑苦。董也。郭璞云：卽董葵本草。言味甘而此云苦。古人語倒。猶甘草謂之大苦也。」時珍曰：「其性滑如葵，故得葵名。」說文云：董根如薺，葉如細柳子。

**【釋名】**苦堇爾雅。堇葵本草。唐旱芹綱目。禹錫曰。爾雅云。薔苦堇也。郭璞云。卽堇葵本草。言味甘而此云苦。古人語倒。猶甘草謂之大苦也。時珍曰。其性滑如葵。故得葵名。**【集解】**恭曰。堇菜野生。非人所種。葉似蕷菜花紫。禹錫曰。說文云。堇根如薺。葉如細柳子。時珍曰。此旱芹也。其性滑利。故洪舞愈賦云。烈有椒桂。滑有堇榆。一種黃花者有毒殺人。卽毛芹也。見草部毛莧。又烏苗亦名堇。有毒。各見本條下。

**菜**〔氣味〕甘寒無毒

**【主治】**搗汁洗馬毒瘡并服之。又塗蛇蠍毒及癰腫本。久食除心下煩熱。主寒熱鼠瘻。瘰癧生瘡。結核聚氣。下瘀血。止霍亂。及生搗汁半升服能殺鬼毒。卽吐出。孟詵

**【發明】**香菸曰功，薑葉止霍亂，與

**【附方】**舊一。結核氣。薑菜日乾爲末。油煎成膏摩之。日乾爲末。糊丸梧子大。每服四十粒。空心溫酒下。大殺百蟲毒。壽域神方。

紫堇音芹○  
宋圖經

【釋名】赤芹目

蜀芹經

楚葵同

苔菜同

水

葛菜別

四字

時珍曰

一董蘚

一義也詳下

【集解】頌曰一紫堇生江南吳興郡淮南名楚葵宜春郡名蜀芹豫章郡名苔菜晉陵郡名水葛菜  
時珍曰蘇頌之說出於唐玄宗天寶單方中不具紫堇形狀今按軒轅述寶藏論云赤  
荳即紫荳也生水濱葉形如赤芍藥青色長三寸許葉上黃斑味苦澀其汁可以煮雌制汞伏硫砂燒  
黃號爲起貧草又土宿真君本草云赤荳生陰厓陂澤近水石間狀類赤芍藥其葉深綠而背甚赤  
莖葉似蕎麥花紅可愛結實亦如蕎麥其根似蜘蛛嚼之極酸苦

灝江淮人三四月采苗當蔬食之南方頗少太行王屋諸山最多也

苗氣味酸平微毒

花氣味酸微溫無毒

【主治】大人小兒脫肛頌

【附方】舊一脫肛凡大人小兒脫肛每天冷及喫冷食卽暴癆不止肛則下脫久療不瘥者春間收紫堇

入腸中每日一塗藥嚥面不過六七度若五歲以下小兒卽瘥矣又以熱酒半升和散一方寸匕空腹服之日再服漸加至二方寸匕以瘥爲度

天寶單方

馬蘄音芹○  
唐本草

【釋名】牛蘄附胡芹通野茴香

茴香以其氣味子形微似也光明經三十二品香藥謂之葉婆你

【集解】恭曰一馬蘄生水澤旁苗似鬼鍼芥菜等嫩時可食花青白色子黃黑色似防風子調食味用之香似橘皮而無苦味一保昇曰一花若芹花子如防風子而扁大爾雅云茭牛蘄也孫炎味釋云似芹而葉細銳可食菜也一名茭一名馬蘄子入藥用一時珍曰一馬蘄與芹同類而異種也

卑溼地有之三四月生苗一本叢生如蒿白毛蒙茸嫩時可茹葉似水芹而微小似芎藭葉而色深處處

六月開碎花，攢簇如蛇林及薜蘿花，青白色，結實亦似薜蘿子，但色黑而重爾。其根白色，長者尺許，氣亦香而堅硬，不可食。蘇恭所謂鬼鍼，卽鬼針草也。方莖燈葉子似枚脚，着人衣如鍼，與此稍異。

**苗** **[氣味]** 甘辛溫無毒。

**[主治]** 益脾胃，利胸膈，去冷氣，作茹食。珍時。

**子** **[氣味]** 甘辛溫無毒。

**[主治]** 心腹脹滿，開胃下氣，消食，調味用之。唐炒研醋服，治卒心痛，令人得睡。孟晚溫中暖脾，治反胃。

**[附方]** 新慢脾驚風，馬芹子丁香白僵蠶等分爲末，每服一

**懷香草**

**[校正]**

自草部移入此

**[釋名]** 茴香，八角珠。頌曰：「蘆香北人呼爲茴香，聲相近也。」弘景曰：「煮臭肉下少許，卽無臭氣。」臭醬入末亦香，故曰回香。時珍曰：「俚俗多餳之，矜枉咀嚼，恐懷香之名，或以此也。」

**[集解]** 頌曰：「今交廣諸番及近郡皆有之。入藥多用番舶者，或云不及近處者有力。三月生葉，似老人呼爲土茴香。八九月采實陰乾。今近道人家園圃種之甚多。川人多煮食其莖葉。」宗奭曰：「云似老胡荽者誤矣。胡荽葉如蛇牀，雖有葉之名，但散如絲髮，特異諸草也。」時珍曰：「茴香宿根深，冬生葉似苗，作叢肥莖，絲葉五六月開花，如蛇牀花而色黃，結子大如麥粒，輕而有細棱，俗呼爲大茴香。今惟以寧夏出者第一，在他處小者謂之小茴香。自番舶來者實大如柏實，裂成八瓣，一瓣一核，大如豆黃，獨有色，有仁味，更甜。俗呼舶茴香，又曰八角茴香。廣西左右江峒中亦有之。形色與中國茴香迥別。」氣味同爾。北人得之，咀嚼薦酒。

**子** **[氣味]** 辛平無毒。用思邈曰：「好古曰：「苦辛微寒，浮也。」入手足少陰太陽經，良炒黃。用思邈曰：「苦辛微寒，浮也。入手足少陰太陽經。」

【主治】諸瘻霍亂及蛇傷。本膀胱胃閒冷氣及育腸氣調中止痛。嘔吐。忘治乾濕脚氣。腎勞癩疝陰疼。

開胃下氣。大補命門不足。李暖丹田。吳緩。

【發明】丙故曰小腸也能潤丙燥以其先戊故從丙至壬又手足少陰二藥以開上下經之通道所以壬與丙交也。時珍曰小茴香性平理氣開胃夏月祛蠅辟臭食料宜之。大茴香性熱多食傷目發瘡。食料不宜過用古方有去鈴丸用茴香二兩連皮生薑四兩同入坩器內淹一伏時慢火炒之入鹽一兩爲末糊丸梧子大每服三五十丸空心鹽酒下此方本治脾胃虛弱病。茴香得鹽則引入腎經發出邪氣。腎不受邪病自不生也亦治小腸疝氣有效。茴

【附方】

舊四新

十六 開胃進食火炒黃焦爲末酒糊丸梧子大每服十九丸至二十五丸溫酒下。經驗方。療瘡

瘡發熱連背項者。茴香子搗

大小便閉。敷服氣促八角茴香七個大麻仁半兩爲末生葱白

末服之日一服普濟。小便頻數。

茴香不拘多少淘淨入鹽少許

炒研爲末炙糯米糕蘸食之

孫真人方。大便不通用茴香末以生薑自然汁調傅腹

炒油用茴香炒苦棟子炒等分爲末每食前酒服二錢

保命集。腎邪冷氣力弱者用大茴香六兩分作三分

第一度用附子一分茴香一分同炒黃出火毒一夜去

附子研茴香爲末空心鹽酒下一錢第二度用二味各一

牛同茴香爲末如前服第三度各一分同炒存性出火毒全研爲末如前服之

朱氏集驗方。腎虛

腰痛。茴香炒研以猪腰子批開摻末入內溼紙裏

腰痛如刺簡便方用八角茴香炒研每服二錢食前

痛處○活人心統思仙散用八角茴香各

炒研三錢木香一錢水一鐘酒半鐘煎服仲

腰重刺脹酒服二錢直指方

小腸氣墜直指用八角茴香小茴香各

三錢乳香少許水服取汗

○孫氏集效方。治小腸疝氣痛

便方小腸氣墜不可忍用大茴香荔枝核炒黑各等分研末

每服一錢溫酒調下○瀕湖集簡方

治疝氣膀胱各一兩。葱白焙乾五錢

膀胱疝痛桃事下方用舶茴香杏仁各

小腸痛用茴香各等分研末每服一錢

溫酒送下戴原禮要訣

炒研每酒服一錢花椒五錢

膀胱疝痛本事方用舶茴香杏仁各

小腸痛用茴香各等分研末每服一錢

炒研每酒服一錢花椒五錢

膀胱疝痛炒研每酒服一錢花椒五錢

膀胱疝痛炒研每酒服一錢花椒五錢

未燒蠶丸彈子大每服一丸溫酒嚼下。疝氣偏墜定罐內以酒煮爛連胞搗丸如梧子大每服五十丸白湯下仙方也。鄧才筆脅下刺痛小茴香一兩炒枳殼五錢鈍炒爲末。辟除口臭得。若殷食醫心鏡蛇咬久潰小茴香搗末傅之。千金。

莖葉【氣味】與子同

【主治】煮食治卒惡心腹中不安。權治小腸氣。卒腎氣衝脅如刀刺痛喘息不得。生搗汁一合投熱酒一合和服。孟

【發明】頌曰范汪方療惡毒癰腫或連陰明脾間疼痛急劇入小腹不可忍一宿卽殺人者用茵香苗葉搗汁一升服之日三四服其津以貼腫上冬月用根此是外國神方永嘉以來用之起死回生神驗。

蒔蘿宋開

【校正】自草部移入此

【釋名】慈謀勒寶。小茴香。時珍曰。蒔蘿。

【集解】藏器曰蒔蘿生佛晝國實如馬芹子辛香。珣曰。按廣州記云。生波斯國馬芹子色黑而重蒔蘿子色褐而輕以此爲別。善滋食味多食無損卽不可與阿魏同食奪其味也。頌曰。今嶺南及近道皆有之。三月四月生苗花實大類蛇牀而葉生辛香六七月采實今人多用和五味不聞入藥用。時珍曰。其子簇生狀如蛇牀子而短微黑氣辛臭不及茴香。嘉謨曰。俗呼蒔蘿。內有黑子但皮薄色褐不紅耳。但皮

苗【氣味】辛溫無毒。

【主治】下氣利膈時珍

子【氣味】辛溫無毒

【主治】小兒氣脹霍亂嘔逆腹冷不下食兩肋痞滿器健脾開胃氣溫腸殺魚肉毒補水臟治腎氣壯筋骨。主膈氣消食滋美味。李珣

【附方】新二閃挫腰痛薜蘿作末酒服二錢七分水類鈴方中含水隨左右噙鼻神效聖惠方

【附錄】蜀葫爛除婦人血氣下拘殺牙齒蟲生安南似蘆香子可和食數低甘溫無毒主冷風冷氣下宿食又消服滿生西番北土池得勒拾遺藏器曰根辛溫無毒破冷氣消食生西國草根也胡人食之馬思荅含苦溫無毒去邪惡氣溫中利膈順氣止痛生津解渴令人口香元時飲膳用之云極香料也不知何狀故附之

羅勒宋嘉祐附

【釋名】蘭香祐香菜目醫子草云石虎諱言勒改羅勒爲香菜今俗人呼爲醫子草以其子治醫也

【集解】禹錫曰羅勒處處有之有三種一種似紫蘇葉一種葉大二十步內卽聞香一種堪作

時種之乃生否則不生常以魚腥水米泔水泥溝水澆之則香而茂不宜糞水臘仙神隱書言園邊燒俗呼爲西王母菜食之益人

【氣味】辛溫微毒禹錫曰不可多食壅關節澀營衛令人血脈不行又動風發腳氣

**【主治】**調中消食去惡氣。消水氣宜生食。療齒根爛瘡爲灰用之甚良。患曉嘔者取汁服半合。冬月用乾者煮汁其根燒灰傅小兒黃爛瘡。禹錫主辟飛尸鬼疰蠱毒吳瑞

**【發明】**時珍曰按羅天益云蘭香味辛氣溫能和血潤燥而掌禹錫言多食澀營衛血脈不行何耶又東垣李氏治牙疼口臭神功丸中用蘭香云無則以薑香代之此但取其去惡氣而已故飲膳止要云與諸菜同食味辛香能辟腥氣皆此意也。

**【附方】**新二鼻疳赤爛。蘭香葉燒灰二錢銅青五分輕粉二錢乙小兒方反胃欬噫。生薑四兩搗爛入蘭香葉一兩鹽和麪四兩裹作燒餅煨熟空心喫不過兩三度效反。普濟方

**子**【主治】目翳及塵物入目以三五顆安目中少頃當濕脹與物俱出又主風赤眵淚。祐嘉

**【發明】**時珍曰按普濟方云昔廬州知錄彭大辨在臨安暴得赤眼後生醫一僧用蘭香子洗灌子得溼即脹故染惹眵淚浮膜爾然目中不可着一塵而此子可納三五顆亦不妨礙蓋一異也。

**【附方】**新二目昏浮翳。蘭香子每用七個睡時水煎服走馬牙疳。小兒食肥甘腎受虛熱口作臭息次第淬研末牛兩和勻每以少許傅齒及齦上立效內服甘露飲活幼口議。一錢蜜陀僧醋

### 白花菜食

**【釋名】**羊角菜。

**【集解】**時珍曰白花菜三月種之柔莖延蔓一枝五葉葉大如拇指間開小白花長蕊結小角長二三寸其子黑色而細狀如初眠蠶沙不光澤菜氣穠臭惟宜鹽菹食之穎曰一種黃

花者名黃花菜形  
狀相同但花黃也。

【氣味】苦辛微毒。一類曰「多食動風氣滯  
臟腑令人胃中悶滿傷脾。」

【主治】下氣。汪江煎水洗痔搗爛敷風濕癆痛擂酒飲止瘡。時珍

蔊菜音罕。  
綱目

【校正】拾遺蔊菜。  
併入草部

【釋名】蔊菜。音覃。辣米菜。一時珍曰「蔊味辛辣如火焯人故名亦作蔊陳藏器本草有蔊菜云辛菜也則蔊乃蔊字之訛爾。」

【集解】「時珍曰」蔊菜生南地田園間小草也冬月布地叢生長一二分角內有細子野人連根葉拔而食之味極辛辣呼爲辣米菜沙地生者尤伶仃故洪舞齋老圃賦云蔊有拂士之風林洪山家清供云朱文公飲後輒以蔊莖供蔬品蓋盱江建陽嚴陵人皆喜食之也。

【氣味】辛溫無毒。一李廷飛曰「蔊菜細切以生蜜洗或略汋食之爽口消食多食發痼疾生熱。」

【主治】去冷氣腹內久寒飲食不消令人能食。藏器利胸膈豁冷痰心腹痛。時珍

草豉拾遺。

【校正】移入此。

自草部

【集解】「藏器曰」生巴蜀諸國草  
似韭狀豉出花中彼人食之。

【氣味】辛平無毒。

【主治】惡氣調中益五臟開胃令人能食。藏器



時尼波羅國獻波穢菜類紅藍實如葵葉火熟之能益食味卽此也方士隱名爲波斯草。

【集解】時珍曰「波穢八月九月種者可備冬食。美四月起薹尺許有雄雌就莖開碎紅花叢簇不顯雌者結實有刺狀如葵菜子。」程時須研開易浸脹必過月朔乃生亦然通利。

菜及根【氣味】甘冷滑無毒必破腹不與鮋魚同食發霍亂取汁煉霜制砒汞伏雌黃硫黃。

【主治】利五臟通腸胃熱解酒毒服丹石人食之佳。

孟通血脈開胸膈下氣調中止渴潤燥根尤良時

【發明】〔說曰〕北人食肉麪食之即平南人食魚鱉水米食之卽冷故多食冷大小腸也。〔時珍曰〕

按張從正儒門事親云凡人久病大便澀滯不通及痔漏之人宜常食波穢葵菜之類滑以

【附方】一、消渴引飲。日至一石者波穢根雞內金等分。

○蘿宋嘉祐

【釋名】「時珍曰」蘿與壅同此。菜惟以壅成故謂之壅。

【集解】宜溼地畏霜雪九月藏入土窖中三四月取出壅以糞土卽節生芽一本可成一畦也。幹柔

如蔓而中空葉似波穢及鱉頭形味短須同豬肉煮令肉色紫乃佳段公路北戶錄言其葉如柳者誤矣按稽含草木狀云蘿菜葉如落葵而小南人編葦爲筏作小孔浴水上種子於水中則如萍根浮水面及長成莖葉皆出於葦筏孔中隨水生之也。南方之奇蔬也則此菜水陸皆可生之也。

【氣味】甘平無毒。

【主治】解胡蔓草毒。卽野葛毒。煮食之。亦生擣服。藏。擣汁和酒服。治產難。時珍曰○出唐瑞方

【發明】一藏器曰「南人先食蕹菜。後食野葛。二物相伏。自然無苦。取汁滴野葛。當死相殺如此。」張華博物志云。魏武帝噉野葛至一尺。應是先食此菜也。

蕹菜音甜。別錄中品。○

【校正】併入嘉祐

薯蕷菜

【釋名】薯蕷菜時珍曰。通因其味也。也。恭與薯蕷之義未詳。

【集解】弘景曰「蕹菜卽今以作鮓蒸者。」恭曰「蕹菜葉似升麻苗。南人蒸魚食之。大香美。」保昇曰「苗高三四尺。莖若葫蘆。有細棱。夏盛冬枯。其莖燒灰淋汁洗衣。白如玉色。」士良曰「葉似紫菊而大。花白。」時珍曰「蕹菜正二月下種。宿根亦自生。其葉青白色似白菘。菜葉而短。莖亦相類。但差小耳。生熟皆可食。微作土氣。四月開細白花。結實狀如茱萸核而輕虛。土黃色。內有細子。根亦白。色。

【氣味】甘苦。大寒滑。無毒。禹錫曰。平微毒。冷氣人不可多食。動氣先患腹冷人食之必破腹。

【主治】時行壯熱。解風熱毒。擣汁飲之便瘥。蘇恭曰。夏月以菜作粥食。解熱止熱毒痢。擣爛傅灸瘡。止痛易氣。理脾氣去頭風。利五臟。祐。

根【氣味】甘平。無毒。

【主治】通經脈。下氣。開胸膈。正要。

子【主治】煮半生。擣汁服。治小兒熱。孟醋浸揩面去粉滓。潤澤有光。藏器

**【附方】**新痔瘻下血。去鱗腸裝藥在內，繫合入銀石器內，上下用火燒熱，放冷爲末，每服二錢，米飲下。

日二服。

**東風菜** 宋開寶

**【釋名】**冬風。志曰：此菜先春而生，故有東風之號。一作冬風。言得冬氣也。

**【集解】**志曰：東風菜生嶺南平澤，莖高二三尺，葉似杏葉而長，極厚軟，上有細毛。煮食甚美。時裴淵廣州記云：東風菜花葉似落姪，莖紫宜肥肉，作羹食，香氣似馬蘭，味如酪。

**【氣味】**甘寒無毒。

**【主治】**風毒壅熱，頭痛目眩，肝熱眼赤，堪入羹臠食。

開寶

**薺** 上品別錄

**【釋名】**護生草。時珍曰：護生草，可辟蚊蟻，謂之薺。釋家取其莖，作

**【集解】**普曰：薺生野中。弘景曰：薺類甚多，此是今人所食者，葉作菘，亦佳。詩云：誰謂荼苦，科葉皆大，而味不及其莖，硬有毛者，名芥蕡，味不甚佳，並以冬至後生苗，二三月起莖，五六寸，開花，整整如一結莢，如小萍，而有三角莢，內細子如葶苈子，其子名韭子，音嵯，四月收之。師曠云：歲欲甘，草先生薺，是也。芥蕡，莖皆是薺類，莖莧，見草部溼草類。

**【氣味】**甘溫，無毒。

**【主治】**利肝和中。別利五臟，根治目痛。明目益胃。根葉燒灰，治赤白痢，極效。

**【附方】**新二一、暴赤眼。痛脹矯澀。薺菜根。薺菜和根莖。洗淨搗乾爲細末。每夜臥時先洗眼。杵汁滴之。

聖濟總錄。腫滿腹大。四肢枯瘦。尿澀。用甜荳。壓炒。薺菜根等分爲末。煉蜜丸。彈子大。日收之良。

周王曰。三月三日采陰乾。士良曰。亦名菥蓂子。四月八日采子。水調成塊。煮粥作餅。甚黏滑。

**【氣味】**甘平無毒。一櫟曰。患氣人食之。動冷疾。一洗曰。不與麵同食。令人胸悶。服丹石人不可食。

**【主治】**明目目痛。別青盲。不見物。補五臟不足。治腹脹。去風毒邪氣。治壅去腎。解熱毒。久服視物鮮明。良。

**花**【主治】布席下辟蟲。又辟蚊蛾。良。陰乾研末。棗湯日服二錢。治久痢。大。

**菥蓂**

音析  
莧  
本經上品

**【校正】**自草部移入此。

**【釋名】**大薺。別大蕺。本經馬辛。又云一名榮。目一名馬駒。

**【集解】**一別錄曰。菥蓂生咸陽山澤及道旁。四月五月采。暴乾。弘景曰。今處處有之。是大薺。俗呼爲老薺。然其味甘而不辛也。一藏器曰。一本經菥蓂。一名大薺。蘇氏引爾雅爲註案。大薺即薺。非菥蓂也。菥蓂大而扁。莖細而圓。二物殊別也。一頃曰。爾雅。菥蓂謂之蕷。音典子。葉皆似薺。即薺。一名狗薺。菥蓂即大薺。大抵二物皆薺類。故人多不能細分。乃爾致疑也。古今眼目方多用之。一時珍良曰。菥蓂。菥蓂有毛。故其子功用相同。而陳士良曰。本草亦謂薺實。一名菥蓂。苦花黃。爲異耳。或言菥蓂即甜荳。薺實。但菥蓂味甘。花白。薺實苦。花黃。

**苗**【氣味】甘平無毒。

【主治】和中益氣利肝明目時珍。

菥蓂子【氣味】辛微溫無毒。【恭曰】甘而不辛。【普曰】神農雷公辛李當之小溫。○  
荳荆實細辛良惡乾薑苦參一云苦參爲之使。○

【主治】明日目痛淚出除癆補五臟益精光久服輕身不老。本經療心腹腰痛。別錄治肝家積聚眼目赤腫。

權甄

【附方】

新舊一、眼目熱痛淚出不止。菥蓂子搗篩爲末。臥時銅簪少許入目。當有熱淚及惡物出。甚佳。眼中弩肉。方同上。夜夜點之。

繁縷別錄

能待來滋滋乃草名卽此也。

【釋名】蕪縷。爾雅釋名。繁縷。郭璞。滋草。千鵝腸菜。時珍曰。此草莖蔓甚繁。中有一縷。故名。俗呼鵝兒腸。象形也。易於滋長。故曰滋草。古樂府云。爲樂當及時。何

【集解】通謂雞腸。雅士總名繁縷。〔既曰〕繁縷卽藤也。又恐白軟草是之。保昇曰。葉青花白。采苗入藥。頌曰。卽雞腸也。南中多有之。生於田野間。近澤下溼地亦或有之。葉似荇菜而小。夏秋間爲一物。謹按郭璞註。爾雅云。蕪縷一名雞腸草。實一物也。今南北所生。或肥瘠不同。故人疑爲二物。而葛洪肘後方治卒淋云。用雞腸及繁縷如此。又似是二物。其用大概主血。故人宜食之。時珍曰。繁縷卽鵝腸。非雞腸也。下溼地極多。正月生苗。葉大如指頭。細莖引蔓。斷之中空。有一縷如絲作蔬。甘脆三月以後漸老。開細瓣。白花結小實。大如稗粒。中有細子。如葵。墮子吳瑞本草謂黃花者爲繁縷。白花者爲雞腸。味微苦。亦不然。二物蓋中相似。但鵝腸味甘。莖空有縷。花白色。以爲別。黃帝云。合鮑食。發消渴。令人忘多忘。權曰。黃苦。時珍曰。甘微鹹。既說曰。甘苦。人多忘。

【主治】積年惡瘡痔不愈。別錄：破血下乳汁。產婦宜食之。產後腹有塊痛。以酒炒絞汁溫服。又暴乾爲末。醋糊和丸。空腹服五十九丸。取下惡血。藏器

【發明】弘景曰：此菜五月五日采暴乾燒作屑。療雜瘡有效。亦雜百草服之。不止此一種也。耽曰：能去惡血。不可久食。恐血盡。

【附方】舊新一食治烏髭。繫縷爲繩。久久食之。小便卒淋。繫縷草滿兩手。水煮常飲之。聖惠方能烏髭髮。聖惠方。產婦有塊。作痛。繫縷丈夫陰瘡。二分入少水和研作餅貼之。乾卽易。禁酒麪五辛及熱食等物。甚效。范汪東陽方見上。新出蚯蚓屎

雞腸草別錄

【校正】本原在草部。唐

移入此

部

【主治】毒腫止小便利。別錄療蠅蠅溺瘡。弘景主遺溺。洗手足傷水爛。甄權五月五日作灰和鹽療一切瘡。及

風丹遍身癢痛。亦可搗封。日五六易之作菜食。益人去脂膏毒氣。又燒傅疳疕。取汁和蜜服。療小兒赤白痢。甚良。孟耽研末或燒灰揩齒去宣露。蘇頌

【氣味】微辛苦。平無毒。之才曰：一苦寒。

【主治】毒腫止小便利。別錄療蠅蠅溺瘡。弘景主遺溺。洗手足傷水爛。甄權五月五日作灰和鹽療一切瘡。及

**【附方】**新舊二止小便利。雞腸草一斤於豆豉汁中煮和米小兒下痢。赤白雞腸草搗汁一合和氣淋服。痛。雞腸草三兩石韋去毛一兩每用三錢水一盞煎服。鹽濟總錄。風熱牙痛。辛等分爲末每日擦三次名祛痛散。元臟氣虛小兒疳。鴉腸草旱蓮草細發背欲死之。射干中人成瘡者以雞腸草搗塗之。肘後方。反花惡瘡。雞腸草研汁拂之或爲末。續醫林正宗一切頭瘡。雞腸草燒灰和鹽普濟方。發背。塗之。射干中人之經日卽愈。盧氏方。

首蓿別品

**【釋名】**木粟。光風草。時珍曰。首蓿郭璞作牧宿。謂其宿根自生可飼牛馬也。又羅願爾雅翼然日照其花有光采故名懷風。又名光風茂。陵人謂之連枝草。金光明經謂之塞鼻力迦。

**【集解】**弘景曰。長安中乃有首蓿。閩北人甚重之。江南不甚食之。以無味故也。外國復有首蓿草以療目。非此類也。詵曰。彼處人采其根作土黃芪也。宗奭曰。陝西甚多用飼牛馬嫩時人兼食之。有宿根。刈訖復生。時珍曰。雜記言首蓿原出大宛。漢使張騫帶歸中國。然今處處田野有之。陝隴人亦有種者。年年自生。刈苗作蔬。一年可三刈。二月生苗。一科數十莖。莖頗似灰蘿。三葉葉似決明葉而小如指頂。綠色碧點入夏及秋開細黃花。結小莢圓扁。旋轉有刺。數莖累果老則黑色。內有米如黍米可爲飯。亦可釀酒。羅願以此爲鵝頂草誤矣。鵝頂乃紅心灰蘿也。

**【氣味】**苦平。澀無毒。宗奭曰。微甘淡。詵曰。涼少食好。多食令冷。

入筋中卽瘦人。李廷飛曰。同蜜食。令人下利。

**【主治】**安中利人。可久食。利五臟。輕身健人。洗去脾胃閒邪熱氣通小腸諸惡熱毒。煮和醬食亦可作羹。孟诜利大小腸。宗乾食益人。蘇作羹。孟诜利大小腸。宗乾食益人。

**主治**熱病煩滿，目黃赤，小便黃，酒疸。擣服一升，令人吐利即愈。蘇恭擣汁煎飲，治沙石淋痛時珍。

**【釋名】**〔時珍曰〕按陸佃埤雅云：蒐之莖葉皆高大而易見，故其字從見，指事也。

**菜**〔氣味〕甘冷利無毒。《恭曰》赤莧辛寒。《鼎曰》莧動氣令入煩悶，冷中損腹，不可與繁同食。生  
「機曰」此說屢試不驗。

**【主治】**白莧補氣除熱通九竅。既赤莧主赤痢射工沙虱。恭紫莧殺蟲毒治氣痢。藏器六莧並利大小腸。

**【發明】**曰：弘景曰：「人覓細覓並冷利。赤覓微寒，故主血痢。紫覓不寒，比諸覓無毒，故主氣痢。」既曰：「五月五日收覓菜，和馬糞草，方中時用之。」頌

說「機試曰不驗此

本草綱目 十七 卷二十七 菜部

九十九

齒爲細末等分與妊娠人常服令易產也。震亨曰：「紅朮入血分善走故與馬朮同服能下胎或煮食之令人易產。」

十一

**附方** 新四產後下痢赤白者用菜莧菜一握切薑汁入粳米煮粥食之立瘥也。齋親養老書小兒緊唇之良聖惠漆瘡搔癩煎湯洗之。野翁方卽蜂蠭螫傷擦野莧搾諸蛇螫人津塗之。集驗方射工中人寒熱發瘡葉搗汁飲一升日再服瘥。集驗方偏在一處有異於常者取赤莧合莖葉搗汁飲一升日再服瘥。

**覓實**〔氣味〕甘寒無毒

**【主治】**青盲明目除邪利大小便去寒熱久服益氣力不饑輕身本經治白翳殺蟻蟲別錄益精明大肝風客

【發明】異種時珍其治目覓實功亦彷彿子同類

**【附方】**新利大小便。竟實爲末半兩。分二服。新汲水下。聖惠。

**根**【主治】陰下冷痛，入腹則腫滿殺人。擣爛傅之，時

**【附方】**新一牙痛。莧根曬乾燒存性爲末。揩之再以紅

馬齒莧草

**釋名**馬齒別錄五行草圖經五方草綱目長命菜同上九頭獅子草似莧故名俗呼大葉者爲獅耳草小葉者其葉比並如馬齒而性滑利爲鼠齒莧又名九頭獅子草其性耐久難燥故有長命之稱寶藏論及八草靈變篇並名馬齒龍芽又名五方草亦五行之義頌曰馬齒莧雖名莧類而苗葉與莧都不相似一名五行草以其葉青梗

赤花黃根白子黑也。『藏器曰』別錄  
以馬齒與莧同類二物既殊今從別品

【集解】『弘景曰』馬齒與莧別是一種布地生實至微細俗呼馬齒莧亦可食小酸。『保昇曰』此木搥碎向日東作架曬之三兩日卽乾如隔年矣入藥須去莖其莖無效。『數曰』凡使勿用大葉者不是馬齒莧亦無水銀。『時珍曰』馬齒莧處處野生之柔莖布地細細對生六七月開細花結小黃實實中細子如葷莧子狀人多采苗煮鹽爲蔬方士采取伏砒縮汞煮丹砂伏硫。

尖實別有法度一種水馬齒生水中形狀相類亦可汋食見王四樓菜譜

恭曰辛溫。『宗奭曰』人多食之然性寒滑。

【主治】諸腫瘍疣目癩揩之破痃癖止消渴器能肥腸令人不思食治女人赤白下蘇飲汁治反胃諸淋金瘡流血破血癖癥瘕小兒尤良用汁治緊唇面皰解馬汗射工毒塗之瘻。『蘇恭』治自尸脚陰腫。保膏塗濕癬白禿杖瘡又主三十六種風煮粥止痢及疳痢治腸痛。『孟珙』服之長年不白治癰瘡殺諸蟲生搗汁服當利下惡物去白蟲和梳垢封丁腫又燒灰和陳醋滓先灸後封之卽根出。『開寶』散血消腫利腸滑胎解毒通淋治產後虛汗。『時珍』

【發明】『時珍曰』馬齒莧所主諸病皆只取其散血消腫之功也。『頌曰』多年惡瘡百方不瘥或不可堪百醫無效及到京有廳吏上此方用之便瘥也。李絳記其事於兵部手集。

【附方】舊十五新三十六風結瘡馬齒莧一碩水一碩煮取汁入諸氣不調之。『馬齒莧煮粥食』醫心鏡。禳解疫氣。六月六日采馬齒莧曬乾元旦煮熟同醋食之可解疫癘氣。唐瑤經驗方筋骨疼痛不拘風溼氣楊梅瘡及女人月家病先用此藥止疼。



**子**主治明目仙經用之。寶延年益壽。既青盲白翳除邪氣利大小腸去寒熱以一升擣末每以一匙用葱豉煮粥食或著米穀五味作羹食心。

**【附方】**新目中出淚或出膿用馬齒莧子人莧子各半兩爲末綿裹銅器中蒸熟。

大骨頭膿水出處每熨以五十度爲率久久自絕聖惠。

**苦菜本經** **校正**併入嘉祐

苦苣苦蕷

**【釋名】**茶音途苦苣祐苦蕷納本經游冬別編苦苣用老鶴菜教天香菜時珍曰苦茶以味名也經歷供饌名苦苣而又重出苦苣及苦蕷條今並併之。

**【集解】**別錄曰苦菜生益州川谷山陵道旁凌冬不死三月三日采陰乾桐君藥錄曰苦菜黃似菊所在有之其說庶桐君略同苦蘿俗亦名苦菜非此茶也保昇曰春花夏實至秋復生花而不實經冬不凋宗奭曰此月令四月小滿節後苦菜秀者也四方皆有在北道者則冬方凋生南方者冬夏常青葉如苦苣而狹綠色差淡折之白乳汁出味苦花似野菊春秋皆旋開時珍曰苦菜卽苦蕷也家栽者呼爲苦苣實一物也春初生苗有赤莖白莖二種其莖中空而肥折之有白汁出葉似花蘿白菜而色綠帶碧上葉抱莖稍葉似鷄嘴每葉分叉攢挺如穿葉狀開黃花如初綻野菊一花結子一叢如苘蒿子及鵝虱子花罷則收數子上有白毛茸茸陳風飄揚落處卽生士良曰靈蛾出時不可折取令蛾子青爛蠶婦亦忌食之然野苣若五六回拗後味反甘滑勝於家苦蕷良得比例陶說誤矣。

**【正誤】**弘景曰苦菜疑卽茗也茗一名茶凌冬不凋作飲能令人不眠。恭曰詩云誰謂荼苦卽苦菜異名也陶氏謂荼爲茗者乃木類按爾雅釋草云荼苦菜也音途釋木云槚苦菜也音遲切二物全別不得比例陶說誤矣。

**菜(氣味)**苦寒無毒。一張機曰：「野苣不可共蠶食，令人作肉疔。」時珍曰：「脾胃虛寒人不可食。」

**【主治】**五臟邪氣厭伏也。延叶反。穀胃痹久服安心益氣，聰察少臥，輕身耐老。本經腸澼渴熱中疾惡瘡久服耐饑寒，豪氣不老。別錄調十二經脈，霍亂後胃氣煩逆，久服強力，雖冷甚益人。嘉祐搗汁飲食，面目及舌下

黃，其白汁塗丁腫，拔根滴癰上立潰，器點瘊子自落。衛義傳蛇咬，明目，主諸瘡。汪機血淋痔瘻。時珍坐之先熏後洗，冷即止。日洗數次，屢用有效。

**【附方】**新六、**血淋尿血**。苦蕷菜一把，酒水各半煎服。資生經言：血脈不調，苦蕷菜曬乾爲末，每服二錢，溫酒下。衛生易簡方：喉痹腫痛，半盞燈心以湯浸搗汁半盞，和對口惡瘡。野苦蕷搗汁一鍾，入薑汁一匙，和酒服。中沙虱毒，沙虱在水中，人澡浴則匀服。普濟方：皮上正赤，如小豆，取粟摩之，痛如刺，三日後寒熱發瘡，毒若入骨，殺人嶺南多此，卽以茅葉刮去，以苦菜汁塗之佳。肘後方：壺蜂叮螫良。摘玄方：根

**花子(氣味)**甘平無毒。

**【主治】**去中熱，安心神。宗奭：黃疸疾，連花子研細二錢，水煎服，日二次。良。汪

**白苣**宋嘉祐

**【釋名】**石苣。生菜。時珍曰：「白苣苦苣，蒿苣俱不可煮烹，皆宜生，擣去汁鹽醋拌食，通可曰生菜。而白苣稍美，故獨得專稱也。王氏農書謂之石苣。陸機詩疏云：青州謂之苣，可生。」

蒸茹亦可

**【集解】**藏器曰：「白苔似高薑葉有白毛。」時珍曰：「處處有之。似高薑而葉色白，折之有白汁。正云：苔有數種，色白者爲白苔，色紫者爲紫苔。味苦者爲苦苔。」

**菜（氣味）**苦寒，無毒。一炳曰：平。患冷氣人食之，卽腹冷，亦不至苦損人。產後不可食，令人寒中小腸痛。一思邈曰：不可共酪食，生蟲蠶。

**【主治】**補筋骨，利五臟，開胸膈壅氣，通經脈，止脾氣，令人齒白，聰明少睡。可常食之。孟诜曰：解熱毒酒毒，止消渴利大小腸。

**消渴利大小腸**。

**【附方】**一、魚臍瘡。舊其頭白似腫痛不可忍，先以鍼刺破頭及四畔，以白苔滴孔中良。○外臺祕要。

### 高薑

**【釋名】**高菜，千金菜。時珍曰：按彭乘墨客揮犀云：萬菜自周國來故名。

**【集解】**藏器曰：「高薑有白者，紫者入燒藥用。」

時珍曰：高薑正二月下種，最宜肥地。葉似白苔而尖，色稍青，折之有白汁，黏手。四月抽薹，高三四尺，剝皮生食，味如胡瓜，糟食亦良。江東人鹽曬壓實，以備方物，謂之高筍也。花子並與白苔同。

**菜（氣味）**苦冷，微毒。李廷飛曰：久食昏人目。患冷人不宜食。時珍曰：按彭乘云：高薑有毒，百蟲不敢近。蛇虺觸之，則目瞑不見物。人中其毒，以薑汁解之。

藏器曰：紫高薑，砂子制硃砂，又曰：紫色高薑和土作器，火煅如銅也。

**【主治】**利五臟，通經脈，開胸膈，功同白苔。藏器曰：利氣，堅筋骨，去口氣，白齒牙，明眼目。原通乳汁，利小便，殺

蟲蛇毒時珍

七

**【附方】**舊一。乳汁不通。高苜菜煎酒服。海上方。小便不通。高苜菜搗傅臍上，即通。衛生易簡方。卽小便尿血。同上方甚效。同陽氏方。沙蟲水毒。

**附方**舊一  
**五乳汁不通**新五乳汁不通。高薑搗汁，煎酒服。海上方。小便不通。通○衛生易簡方。即小便尿血。同上方。甚效。**沙蟲水毒**楊氏方。沙蟲水毒。萬薑搗傅臍上。卽萬薑葉乾者一分，雄黃一分，爲末糊丸。百蟲入耳。萬薑搗汁滴入耳中。引出也。聖惠方。百蟲入耳。萬薑搗汁滴入耳中。引出也。聖濟總錄。

**高** **首** **菜** **搗** **汁** **塗** **之** **良** **方** **耳** **高** **首** **菜** **乾** **者** **一** **分** **雄** **黃** **一** **分** **爲** **末** **糊** **丸** **百** **蟲** **入** **耳** **高** **首** **搗** **汁** **滴** **入** **自** **出** **也** **聖** **濟** **總** **錄**

**【附方】**舊一  
**乳汁不行**生甘草三錢，橘梗米各半合，煮粥頻食之。一舍。  
**小便不通**即通。海仙方。

**腎黃如金** 煎高  
**蒿子一合細研水一盞** 外塗祕要  
**陰囊癩腫一盞** 煎高  
**蒿子一合擣末水** 閃損腰痛三兩白粟米炒一撮乳  
**香沒藥烏梅肉各半兩爲末** 煉蜜丸彈瘻瘍上不生  
**鬚髮不生** 高蒿子拗猢猻薑末頻擦之  
**摘玄方**

**水苦賣經圖**

【釋名】謝婆菜。圖經。半邊山。

**[集解]** **厚光**曰：一水苦蕡生宜州溪澗側葉似苦蕡而以自號而次之。八九月采其根食之。

**根**〔氣味〕微苦辛寒無毒

**【主治】**風熱上壅。咽喉腫痛。及項上風癰。以酒磨服。蘇頌

翻白草救荒

**釋名** 雞腿根。荒。天藕。野菜譜。時珍曰。翻白以葉之形。名也。楚人謂之湖雞腿。淮人謂之雞腿天藕。

**【集解】**〔周憲王曰〕翻白草高七八寸葉硬而厚有鋸齒背白似地榆而細長開黃花根如指大長  
弱莖一莖三葉尖長而厚有皺紋鋸齒而青背白四月開小黃花結子如胡荽子中有細子其  
根狀如小白朮頭剝去赤皮其內白色如雞肉食之有粉小兒生食之荒年人掘以和飯食

**根氣味**甘微苦平無毒

**【主治】吐血下血崩中瘡疾癰瘍**

珍時

**【附方】**新

七崩

中下血

用湖雞腿根

一兩搗碎酒

二錢煎

一錢服

瀨

湖集簡方

吐血不止

翻白草

水

二鍾煎

一鍾空心服

瘡疾寒熱

翻白

草根

五七個煎

水服之

無名腫毒

方同

疔毒初起

不拘已成未成

用翻白草

酒煎服

出汗即愈

渾身疥癩

端午日午時采翻白草

洗收每用一握

搗煎

瘻瘍

湯盆盛

圍住熏洗效

劉松石保壽堂方

**仙人杖草**

遺拾

**【校正】**自草部

移入此

**【集解】**藏器曰

「仙人杖

生劍南平澤

葉似苦苣叢

生陳子昂觀

玉篇序云予從補闕喬公北征夏

喬公言其功甘心食之人或謂喬公曰此白棘也

公乃訊予因作觀玉篇焉頃曰

「仙人杖

有三物同名

一種是菜類

一種是枯死竹筍之色黑者

者枸杞一名仙人杖

是此仙人杖乃作菜茹者

白棘木

甘類何因相似

或曰喬公所謂白棘乃枸杞

是枸杞之有棘者

木經枸棘無白棘之名

又其味苦

此有仙味

甘乃知草木之類多而難識

使人惑疑似之言以真爲僞

宜乎子昂論著之詳也

時珍曰

別有菜味

人草生階除間高二三寸又有仙人掌草生於石壁上皆與此名同物異不可不審並見石草類

**【氣味】**甘小溫無毒

**【王治】**作茹食去瘀癥除風冷大久服長生堅筋骨令人不老

藏器

蒲公英唐本草

【校正】自草部移入此。

【釋名】構瓣草。音構。

金簪草。綱

黃花地丁。

時珍曰：名義未詳。孫思邈千金方作鳧公英。蘇頌圖經作僕公馨。庚辛玉冊作鵝鴨英。俗呼蒲公丁。又呼黃花地丁。

淮人謂之白鼓釘。蜀人謂之耳癥草。關中謂之狗乳草。案土宿本草云：金簪草一名地丁花如金簪頭，獨脚如丁，故以名之。

【集解】五月采之。

保昇曰：蒲公英草生平澤田園中。莖葉似苦苣，有細刺，中心抽一莖，端出一花，色黃如金錢，俗訛爲僕公馨是也。

宗奭曰：即今地丁也。四時常有花，花罷飛絮，絮中有子，落處即生。所以庭院間皆有者。因風而來。

時珍曰：地丁江之南北頗多。他處亦有之。嶺南絕無。小科布地，四散而生。莖葉花絮並似苦苣，但小耳。嫩苗可食。庚辛玉冊云：地丁葉似小萐，花似大旋葍。一莖莖上三四寸，斷之有白汁。二月采花，三月采根，可制禾伏三黃。有紫花者，名大丁草。出太行王屋諸山，陳州亦有。

苗。氣味甘平無毒。

【主治】婦人乳癰水腫，煮汁食及封之。立消。

恭

解食毒，散滯氣，化熱毒，消惡腫結核。丁腫。

靈

塗牙，烏鬚。

牙，烏鬚。

髮，壯筋骨。

時珍曰：

白汁塗惡刺，狐尿刺，瘡，卽愈。

頌

【發明】杲曰：蒲公英苦寒，足少陰腎經君藥也。本經必用之。

震亨曰：此草屬土，用黃花味甘。

服瀉欲睡，是其功也。

睡覺微汗，病卽安矣。

年七月十五日夜，以左手中指背觸著庭木，至曉遂患痛不可忍。

經十日，痛日深，瘡日高大，色如熟小豆，色常青長者論有此方，遂用治之。

手方下，則愈。

痛亦除，瘡亦卽瘥。

未十日而平復如故。

楊炎南行，方亦著。

其效云：「時珍曰：薩謙齋、瑞竹堂方，有擦牙，烏鬚髮還少丹，甚言此草之功，蓋取其能通腎也。故用東垣李氏言：其爲少陰藥，而著本草者，不知本草者，不知此經必

**【附方】**新五還少丹昔日越王曾遇異人得此方極能固齒牙壯筋骨生腎水凡年未及八十者服之  
蒲公英一斤髮返黑齒落更生年少服之至老不衰得遇此者宿有仙緣當珍重之不可輕泄用  
洗淨勿令見天日眼乾入斗子解鹽一兩香附子五錢二味爲細末入蒲公草內淹一宿分爲二十團  
用皮紙三四層裹繫定用六一泥卽蚯蚓糞如法固濟入竈內焙乾乃以武火煅瑞竹堂方乳癰紅腫蒲公英一  
通紅爲度冷定取出去泥爲末早晚擦牙漱之吐嚥任便久久方效冬藤一  
二兩搗爛水二鍾煎一鍾食前唐氏方別多年惡瘡貼○救急方  
服睡覺病卽去矣蒲公英搗爛覆之卽黃花地丁也  
積德堂方疔瘡疔毒蒲公英搗爛和酒煎服取汗  
疔瘡疔毒蒲公英搗爛覆之卽黃花地丁也別多年惡瘡貼○救急方

蛇蠍腫痛

方同

### 黃瓜菜食

**【釋名】**黃花菜。時珍曰其花黃其氣如瓜故名

**【集解】**穎曰「黃瓜菜野生田澤形似油菜但味少苦取爲羹茹甚香美。」時珍曰「此菜二月假地丁之花成絮也野人茹之亦采以飼鷄兒。」

**【氣味】**甘微苦微寒無毒。

**【主治】**通結氣利腸胃。

### 生瓜菜宋經圖

**【釋名】**一頌曰「生瓜菜生資州平田陰畦間春生苗長三四寸作叢生葉青而圓似白莧菜夏開紫白花結細實黑色其味作生瓜氣故以爲名。」

**【氣味】**甘微寒無毒。

【主治】走注攻頭面四肢及陽毒傷寒壯熱頭痛心神煩躁利胸膈擣汁飲之又生搣貽腫。蘇落葵別錄下品

【釋名】落葵。雅。藤葵。鑑。藤菜。目。天葵。錄。蘩露。同。御菜。俗。燕脂菜。脂。時珍曰。落葵一名藤葵。俗呼爲胡蕷。葵名釋家呼爲御菜。亦曰藤兒菜。爾雅云。葵。蘩露也。一名承露。其葉最能承露。其子垂垂亦如繖。故得露名。而落二字相似。疑落字乃夥字之訛也。案考工記云。大圭終葵首也。註云。齊人謂椎曰落葵。圭首六寸爲椎。然則此菜亦以其葉似椎頭而名之乎。

【集解】弘景曰。落葵又名承露。人家多種之。葉惟可飪鮓食。冷滑。其子色紫。女人以漬粉傅面爲一落葵。三月種之。嫩苗可食。五月蔓延。其葉似杏葉而肥厚。軟滑。作蔬和肉皆宜。八九月開細紫花。累積結實。大如五味子。熟則紫黑色。採取汁紅如燕脂。女人飾面點唇及染布物。謂之胡燕脂。亦曰染絳。子但久則色易變耳。

葉【氣味】酸。寒。滑。無毒。時珍曰。甘微酸。冷滑。脾冷人不可食。

【主治】滑中散熱。別錄利大小腸。時珍

子【主治】悅澤人面。別錄可作面脂。蘇頌曰。取子蒸過。烈日中暴乾。擦去皮。取仁細研。和白蜜塗面。鮮華立見。

蕷音戢。○別錄下品

【釋名】蕷菜。秦。魚鰐草。時珍曰。蕷字段公路北戶錄作蕊。音戢。秦人謂之蕷子。蕷音相近也。其葉鰐氣。故俗呼爲魚鰐草。【集解】恭曰。蕷菜生溼地山谷陰處。亦能蔓生。葉似蕎麥而肥。莖紫赤色。山南江左人好生食之。案趙叔文醫方云。魚鰐草即

**紫蕨**葉似荷其狀三角一邊紅一邊青可以養豬又  
有五葉卽五毒草花葉相似但根似狗脊見草部

**葉氣味**辛微溫有小毒別錄曰多食令人氣喘弘景曰俗傳食蕨不利人腳恐由閉氣故  
氣消精髓思邈曰素有脚氣人食之一世不愈

**主治**蠻螋尿瘡別錄淡竹筒內煅熟搗傅惡瘡白禿明散熱毒癰腫瘡痔脫肛斷痔疾解礎毒時珍

**附方**舊一背瘡熱腫熱毒冷卽易之新六背瘡熱腫熱毒冷卽易之經驗方痔瘡腫痛魚腥草一握煎湯熏洗留孔以洩急疔瘡作痛二日卽愈徵人所傳方也○陸氏積德堂方○小兒脫肛過用芭蕉葉托住藥坐之自入方水洗也○永蟲牙作痛魚腥草花椒菜子油等分搗勻入泥少許和作小丸如豆大隨牙左右塞耳內兩邊輪換不可一齊用恐閉耳氣塞一日夜取看有細蟲爲效簡便方斷截瘡汗卽愈臨發前一時作之救急方惡蛇蟲傷魚腥草燬面草槐樹葉草決明同上

### 蕨拾

**釋名**蕨人足之蕨故謂之蕨周秦曰蕨齊魯曰鼈初生亦類鼈脚故也其苗謂之蕨莖又如

**集解**「藏器曰」蕨生山間根如紫草人采茹食之「時珍曰」蕨處處山中又有之二月生芽拳曲狀如小兒拳長則展開如鳳尾高三四尺其莖嫩時采取以灰湯煮去涎滑曬乾作蔬味甘美滑亦可醋食其根紫色皮內有白粉搗爛再三洗澄取粉作粃粃皮作線食之色淡紫而甚滑美也壅人饑年掘取治造不精聊以救荒味卽不佳耳詩云陟彼南山曾采其蕨陸機謂其可以供祭故采之然則蕨之爲用不獨救荒而已一種紫蕨似蕨有花而味苦謂之迷蕨初生亦可食爾雅謂之月爾三蒼謂之紫蕨郭璞云花繁月爾紫蕨拳曲繁盛故有月爾之名其及根氣味甘寒滑無毒「時珍曰」久食令人目暗鼻塞落又冷氣人食多

【主治】去暴熱利水道令人睡。藏器補五臟不足氣壅經絡筋骨閒毒氣。孟根燒灰油調傅蛇蠍傷○蠍蟲名。

【發明】藏器曰「多食消陽氣故令人睡弱人脚四皓食芝而壽夷齊食蕨而夭固非良物。千寶搜神記云鄱鑑鎮丹徒二月出獵有甲士折蕨一枝食之覺心中淡淡成疾後吐一小蛇縣屋前漸乾成蕨。遂明此物不可生食也。」時珍曰：「蕨之無益爲其性冷而滑能利水道洩陽氣降而不升耗人真元也。四皓采芝而心逸夷齊采蕨而心憂其壽夭於蕨何與焉。陳公之言可謂迂哉。然饑人瀕死賴蕨延活又不無濟世之功。」

【附方】新一腸風熱毒二錢米飲下。聖惠。

水蕨  
綱目

【集解】時珍曰「水蕨似蕨生水中。呂氏春秋云：菜之美者有雲夢之蕷卽此菜色蕷音豈。」

【氣味】甘苦寒無毒。

【主治】腹中痞積淡煮食一二日卽下惡物忌雜食一月餘乃佳。時珍○衛生方。

薇  
拾遺  
校正  
自草部  
移入此

【釋名】垂水雅野豌豆綱目大巢菜。時珍曰「案許慎說文云：薇似蘆乃菜之微者也。王安石字說云：旁面枝葉垂於水故名。垂水也。巢菜見翹搖下。」

【集解】藏器曰「薇生水旁葉似萍蒸食利人。三秦記云：夷齊食之三年顏多不異。武王誠之不食而死。李珣曰：「薇生海池澤中水菜也。」時珍曰：「薇生麥田中原澤亦有。故詩云：山有蕨。」

薇非水草也。卽今野豌豆。蜀人謂之巢菜。蔓生莖葉氣味皆似豌豆。其叢作蔬入藥皆宜。詩云采薇采薇亦柔止。禮記云。菴豕以薇。皆此物也。詩疏以爲迷蕨。鄭氏通志以爲金櫻芽。皆謬矣。項氏云巢菜。有大小二種。大者卽薇。乃野豌豆之不實者。小者卽蘇東坡所謂元修菜也。此說得之。

【氣味】甘寒無毒。

【主治】久食不飢。調中利大小腸。藏器利水道。下浮腫。潤大腸。珣

翹搖拾遺。

【釋名】搖車。爾雅野蠶豆。綱目小巢菜。藏器曰一翹搖生平澤。蔓生如荳豆。紫花。時珍曰。處處皆有。蜀人秋種春采。老時耕轉搖之狀。故名。蘇東坡云。菜之美者。蜀鄉之巢。故人巢元修嗜之。因謂之元修菜。陸放翁詩序云蜀蔬有兩巢。大巢卽豌豆之不實者。小巢生稻田中。吳地亦多。一名漂搖草。一名野蠶豆。以油燂之。綴以米糁。名草花。食之佳。作羹尤美。

【集解】壅田故薛田詩云。荳種豌巢沃晚田。蔓似荳豆而細葉似初生槐芽及葵葉而色青黃。欲花未  
萼之際。采而蒸食。點酒下鹽。芼羹作餡。味如小豆。至三月開小花。紫白色。結角子似豌豆而小。

【氣味】辛平無毒。诜曰一煮食佳。

诜曰一煮食佳。

【主治】破血止血。生肌擣汁服之。療五種黃病。以瘥爲度。器利五臟。明耳目。去熱風。令人輕健。長食不厭。甚益人。孟诜止熱瘡。活血平胃。時珍

【附方】二活血明目。漂搖豆爲末。甘草湯服二錢。日二服。衛生易簡方。熱瘡不止。翹搖杵汁服。

鹿藿本經下品

校正

自草部移入此

【釋名】鹿豆。郭璞音勞。亦  
璞。勞。音勞。亦

野綠豆。時珍曰。豆葉曰蕷。鹿喜食之。故名俗呼蕷豆。蕷音勞。亦

【集解】別錄曰。鹿藿生汝山山谷。弘景曰。方藥不用人亦無識者。但葛苗一名鹿藿。王磐野菜譜作野綠豆。爾雅云。菌音卷。鹿藿也。其實蕷音紐即此。

一鹿豆可生熟。五月六月采苗日乾之。郭璞註。爾雅云。鹿豆葉似大豆。蔓延生根黃而香是矣。時珍曰。鹿豆即野綠豆。又名蕷豆。多生麥地田野中。苗葉似綠豆而小。引蔓生生熟皆可食。三月開淡粉花。結小莢。其子大如椒子。黑色可煮食。或磨粉作餅蒸食。

【氣味】苦平無毒。

【主治】蠱毒。女子腰腹痛。不樂。腸癰瘍。癰瘍氣。本經止頭痛。梁簡文

灰蘆音狄○

【校正】原自草部移入穀部。今復移入此。

【釋名】灰蘆菜。目金鎖天。

時珍曰。此菜莖葉上有細灰如沙。而枝葉翹趨故名。梁簡文

【集解】藏器曰。灰蘆生於熟地。葉心有白粉似藜。但藜心赤莖

葉心嫩葉背面皆有白灰。爲蔬亦佳。五月漸老。高者數尺。七八月開細白花。結實簇簇如穗。中有細

莖。心嫩葉背面皆有白灰。爲蔬亦佳。五月漸老。高者數

尺。七八月開細白花。結實簇簇如穗。中有細

【修治】金鎖天莖高二尺五六寸爲妙。若長若短皆

不中使。凡用勿令犯水。去根日乾。以布拭去肉。若毛使

令盡。細剉焙用之。時珍曰。灰蘆卽金鎖天葉撲蔓翠往有金星堪用。若白青色者是妓女莖。不可用。

亦可爲蔬。許見本地條下。

莖葉【氣味】甘平無毒。

**【主治】**惡瘡蟲蠶蜘蛛等咬，擣爛和油傅之，亦可煮食作湯浴疥癬風瘻，燒灰納齒孔中殺蟲蠶，含漱去甘瘡，以灰淋汁蝕瘻肉，除白癩風黑子面黓，著肉作瘻器。

**【附方】**新一 疗瘡惡腫。野灰蘿蔴葉燒灰，攪破瘻皮，唾調少許點之，血出爲度。 普濟

**子仁** **【氣味】** 甘平無毒。

**【主治】** 炊飯磨麵食殺三蟲器。

藜綱  
目

**【釋名】** 萊。詩疏。紅心灰蘿。玉鵝頂草。土宿。臘脂菜。詳下文。

**【集解】** 時珍曰 藜處處有之，卽灰蘿之紅心者。莖葉稍大，河朔人名落藜。南人名臘脂菜，亦曰鵝

北山有萊。陸機註云：萊卽藜也。初生可食。謙沛人以雞麻爲萊。三蒼以茱萸爲萊。皆名同物異也。韻府謂藜爲落蒂，亦誤矣。寶藏論云：鵝頂龍芽，其頂如鵝。八九月和子收之，入外丹用。

**葉** **【氣味】** 甘平微毒。時珍曰 按庚辛玉冊云：鵝頂陰草也。擣汁煮粉霜燒伏汞及雌黃砒石。

**【主治】** 殺蟲器。煎湯洗蟲瘻，漱齒齦，擣爛塗諸蟲傷去癬風。

時珍

**【附方】**新一 白癩風。青別以好乳香半兩，鉛霜一分，搗成牛脂二兩，和勻，每日塗三次。 圣惠

**莖** **【主治】** 燒灰和荻灰蒿灰等分水和蒸取汁，煎膏點疣贅黑子，蝕惡肉。

時珍

藜  
藜草  
唐本附

**【釋名】**以爲祖此卽秦荻藜也蓋亦藜類其名亦由此得之可。  
**【集解】**所載者一洗曰一秦荻藜生下溼地所在有之人美。

【氣味】辛溫無毒

**主治**心腹冷脹下氣消食和醬醋食之。唐本破氣甚良。又末之和酒服療心痛悒悒塞滿氣。孟诜

醸  
醡  
菜  
類

**【集解】**出香甜入項。唐慎微證類本草收此。而形狀莫考。惟雷敦炮炙論云。形似牛皮蔓。搗之有乳汁。然亦不云治何病也。

**【主治】**月水不利，擣葉絞汁和酒煎服一盞。

**【附方】**一、**傷中崩赤心服**，**醋醃杵汁**，**拌干金方酒**，**煎沸空**

**附錄**茅膏菜拾遺「藏器曰」味甘平無毒。煮服主赤白久痢。雞侯菜「又曰」味辛溫無毒。久食  
嶺南似艾。二月生苗。孟娘菜「又曰」味苦小溫無毒。主婦人腹中血結羸瘦。男子陰囊溼癰。強陽道  
宜雞羹食之。故名。令人健行不睡。補虛去痔瘻瘰癧。搜瘤生四明諸山。冬夏常有葉似升麻。  
方莖山人「又曰」味辛溫無毒。溫中去惡氣。消食。生安南人種爲茹。采茹之。優殿。南方草木狀云。合浦有優殿人種之。以豆醬食之。芳香好味。

**芋中別品錄**

**【釋名】**土芝。別錄蹲鴟。時珍曰。按徐鉉註說文云。芋猶吁也。大葉實根駭呼人也。吁音芋。疑怪貌又坐故也。芋魁東漢書渠渠義同。

作芋渠渠義同。

書

**【集解】**弘景曰。芋錢塘最多生。則有毒味。蓋不可食。種芋三年不采。則成枯芋。又別有野芋。名老更多。苗並相似。莖高尺餘。葉大如扇似荷葉而長。根類薯蕷。而毒少。正可煮啖之。兼肉作羹甚佳。蹲鴟之餽。蓋謂此也。芋大毒不可啖。之關陝諸芋遍有山。南江左惟有青白紫三芋而已。頌曰。今處處有之。閩蜀淮楚尤多。植之種類雖多。大抵性效相近。蜀川出者形圓而大。狀若蹲鴟。謂之芋魁。彼人種以當糧食。而毒多。初煮頭灰度饑年。江西閩中出者形長而大。其細者如卵。生於魁旁。食之尤美。凡食芋並須栽蕷。者其野芋有大毒。不可食。家癥曰。江浙二川者最大而長。京洛者差圓小。然味佳。他處不及也。當心出苗者爲芋。大頭四邊附之而生者爲芋子。八九月已後掘食之。時珍曰。芋屬雖多。有水旱二種。旱芋山地可種。水芋水田蒔之。葉皆相似。但水芋味勝。莖亦可食。芋不開花時。或七八月間有開者。抽莖生花。黃色。旁連芋。有一長莖護之。如半邊蓮花之狀也。按郭義恭廣志云。芋凡十四種。君子芋。魁大如斗。赤鶴芋。長丈餘。味美。莖亦可食。雞子芋。色黃。九月熟。蔓芋緣枝生大者如二三升也。

**【主治】**寬腸胃。充肌膚。滑中。別錄。冷啖煩熱。止渴。蘇令人肥白。開胃通腸。閉產婦食之。破血飲汁。止血渴。藏器破宿血去死肌。和魚煮食甚下氣。調中補虛。大

**【發明】**弘景曰。芋白色者無味。紫色者破氣。煮汁啖之止渴。十月後曬乾收之。冬月食不發病。他時芋以鹽同煮過。換水再煮。方可食之。

**【附方】**舊二新二腹中癥氣。生芋子一斤。壓破酒五斤。漬二七日。用白芋燒灰。傳之。乾卽易千金方頭上軟癩。卽乾簡便方。

**葉莖** **氣味** 辛。冷滑無毒。

**【主治】**除煩止瀉。療妊娠心煩迷悶。胎動不安。又鹽研傅蛇蟲咬。并癰腫毒痛。及署毒箭。大梗擦蜂蠍尤良。宗爽汁塗蜘蛛傷時。參。

**【發明】**慎微曰沈括筆談云。處士劉易隱居王屋山見一蜘蛛爲蜂所螫。墜地。腹鼓欲裂。徐行入草。嚼破芋梗以瘡就齧。處磨之。良久腹消如故。自後用治蜂蠍有驗。由此。

**【附方】**新一黃水瘡。芋苗曬乾燒存性研擦。

邵真人經驗方。

**【附錄】野芋** 弘景曰野芋形葉與芋相似。李種三年不采成枯。李晉呂並能殺人。誤食之煩悶垂死。惟以土漿及糞汁大豆汁飲之。則活矣。藏器曰野芋生溪澗側。非人所種者。根葉相似。又有天荷亦相似而大。時珍曰小者爲野芋。大者爲天荷。俗名海芋。詳見草部毒草類。野芋根辛冷。有大毒。醋摩傅蟲瘡惡癬。其葉搗塗毒腫初起無名者。卽消亦治蜂蠍塗之良。

**土芋** 拾遺

**【校正】**自草部移入此。

**【釋名】**土卵。遺黃獨。綢土豆。

**【集解】**藏器曰土芋蔓生。葉如豆。其根圓如卵。鵝食後彌吐。人不可食。又云土卵蔓生。如芋人以灰汁煮食之。恭曰土卵似小芋。肉白皮黃。梁漢人名爲黃獨。可蒸食之。

**根氣味** 甘辛。寒。有小毒。

**【主治】**解諸藥毒。生研水服。當吐出惡物便止。煮熟食之。甘美不饑。厚人腸胃。去熱嗽。藏器

**釋名** 諸<sub>音</sub> 葛<sub>音</sub> 須<sub>音</sub> 土<sub>除</sub> 諸<sub>音</sub> 山<sub>山</sub> 諸<sub>音</sub> 圖<sub>圖</sub> 經<sub>經</sub> 山芋<sub>芋</sub> 吳<sub>吳</sub> 山藥<sub>藥</sub> 曾<sub>曾</sub> 衍<sub>衍</sub>

**王延**「吳普曰」薯蕷一名譜薯。一名兒草。一名修胞。齊魯名山芋。鄭越名土蕷。秦楚名玉延。頌海經云。景山北望少澤。其草多諸蕷。音同薯蕷。則是傳之訛耳。宗奭曰。薯蕷因唐代宗名預避諱。改

爲薯藥。又因宋英宗諱署，改爲山藥。盡失當日本名。恐歲久以山藥爲別物，故詳著之。

卷之三

**集解** 五月別錄曰：一薯蕷生嵩高山谷，二月八月開白花，七月結實青黃，八月熟落其

根采  
內根  
白暴  
外乾  
黃類  
芋曰  
弘亦  
景生  
曰臨  
一胸  
近鐘  
道山  
處始  
處生  
有赤  
之華  
山細  
東蔓

搗江粉南食皆大多美掘且取愈食疾之而以補充一者青黑間味最殊大不而美蜀臘

道食者亦尤用良之頌惑日曰處此處有兩以種北一都者四百明而者且爲佳佳田春乾

如生  
三鈴苗  
今憂  
人延  
冬離  
春授  
采莖  
根紫  
刮葉  
之青  
白有  
色三  
者尖  
爲似  
上白  
青春  
黑牛  
者葉  
不更

堪  
近  
泮  
洛  
澤  
人  
更  
種  
開  
之  
極  
白  
有  
息  
大  
春  
類  
取  
棗  
宿  
花  
根  
生  
頭  
以  
實  
黃  
於  
沙  
菜  
和  
間  
牛  
狀

真作極聚實刮磨入湯煮之作塊不散味更真美云食月頻更美

之漑尤之益當人年過於家園圃種美者南又中江一湖種閩生中山一中種桃根紅如如意指

北學之之產類或而有皮不紫同極故有形大類者差一別枝也。重甄數權斤臼削一去按皮

劉肅敬煮叔食  
異俱死苑美云但  
薯性預冷野於人北謂地之者土革諸彼根士既入呼藥爲譙又復南

月可  
生食  
人苗  
延植  
蔓之  
紫者  
莖隨  
緣所  
葉種  
葉之  
皆有物  
三而  
尖像  
似之  
代自也  
奉時  
牛珍  
葉珍  
而曰

更光薔澗五入藥野月開花者成穗淡著紅供顏色結英其家種者爲族英凡良三四

山居合錄云：堅曾無仁，得山芋，其子如荆棘於手，食狀似雷火，於是以水浸之，參

白根小卽不  
末此一也皮  
霜色也後土  
收黃水而中子  
留內而經種白  
爭或春食之去  
月采根其根與  
采根與其截用  
同種樹皆生王  
欒生王欒

脩治日手用入竹藥貴生白乾枯之舌故去  
市裏刀刮去皮支筋故去黃古盛方皮置皆以  
以市裏刀刮去皮支筋故去黃古盛方皮置皆以  
日手用入竹藥貴生白乾枯之舌故去黃古盛方皮置皆以  
市裏刀刮去皮支筋故去黃古盛方皮置皆以

得蓋白生蠻則未一性空。日夕滑語。不可水可入中藥。全然熟。則消滯。或氣去只消。置爐。啖草耳。其法宗火。冬火。

凡使勿用平田生二三紀者

須要山中生經千紀者皮赤四面有鬚者妙采得以

去  
涎  
蒸  
過  
暴  
乾  
用

**根氣味**甘溫平無毒。〔普曰〕神農甘小溫。桐君雷公甘涼。無毒。〔之才曰〕紫芝爲之使。惡甘遂。

**主治**傷中補虛羸除寒熱邪氣。補中益氣力長肌肉強陰。久服耳目聰明輕身不饑延年。經主頭面遊風頭風眼眩下氣止腰痛治虛勞羸瘦充五臟除煩熱。別補五勞七傷去冷風鎮心神安魂魄補心氣不足開達心孔多記事。甄權強筋骨主泄精健忘。大明益腎氣健脾胃止洩痢化痰涎潤皮毛。時珍生擣貼。

腫硬毒能消散。亨

**【發明】**〔權曰〕凡患人體虛羸者宜加而用之。〔詵曰〕利丈夫助陰力熟煮和蜜或爲湯煎或爲粉並佳乾之入藥更妙惟和麪作餌則動氣爲不能制麴毒也。〔李杲曰〕山藥入手太陰手足太陰二經補其不足清其虛熱又按王履濟洞集云山藥雖入手太陰然肺爲腎之上源源既有益無害此八味丸所以用其強陰也。又按曹毗杜蘭香傳云食薯蕷可以辟霧露。

**【附方】**舊新十一補益虛損益顏色補下焦虛冷小便頻數瘦損無力用薯蕷於沙盆中研細入銚中心腹虛脹手足厥逆或飲苦寒之劑多未食先嘔不思飲食山藥半生半炒小便數多茯苓等分爲末每水飲服二錢○下痢禁口山藥半生半炒爲末每服二錢生山藥擣爛半碗入甘蔗汁半椀脾胃虛弱不思飲食山芋白朮一兩參七錢牛爲末水濕熱虛泄山藥蒼朮等分飯丸米飲服大腫毒初起帶泥山藥蕷麻子糯米等分水膀眼鼻瘡山藥沙糖同搗塗上卽消。先以普濟方敷塗四圍乃上此。簡便單方項後結核或赤腫硬痛以皮膚研傅之卽散也。普濟方研泥子二個同研貼。手足凍瘡山藥一錢。生山藥一挺去之皮膚神麻急易方如之皮膚研傅之卽散也。普濟方研泥子二個同研貼。

零餘子拾

校正

自草部  
移入此

零餘子

【集解】藏器曰「零餘子大者如雞子小者如彈丸在葉下生曬乾功用強於薯蕷薯蕷有數種此美於芋子霜後收子墜落在地者亦易生根

【氣味】甘溫無毒

【主治】補虛損強腰脚益腎食之不飢

甘藷綱

【集解】巨魁大者如鵝卵小者如雞鴨卵剥去紫皮肌肉正白如肪南人用當米穀果食蒸炙皆香美初時甚甜經久尋風消淡也又按稽含草木狀云甘藷薯蕷之類或云芋類也根葉亦如芋根大如拳頭蒸煮食之味同薯蕷性不甚冷殊差之不業耕者惟種此蒸切曬收以充糧糗名蕭糧海中之人多食亦由不食五穀而食甘藷故也

【氣味】甘平無毒

【主治】補虛乏益氣力健脾胃強腎陰功同薯蕷珍時

百合本經

校正

自草部  
移入此

【釋名】璠音強瞿別蒜腦諸名中庭弘景曰百合俗人呼爲強仇仇卽瞿也聲之訛耳時珍曰一百合之根以衆瓣合成也或云專治百合病故名亦通其根如大蒜其味如山諸故俗稱蒜腦諸瓞野王玉篇亦云璠乃百合蒜也此物花葉根皆四向故曰強瞿凡物旁生謂之瞿義出韓詩外傳

**【集解】**別錄曰：百合生荊州山谷，二月八月采根，陰乾。弘景曰：近道處處有之。根如葫蘆，數大莖長，根粗花白者宜蒸煮食之。乃云是蚯蚓相纏結變作之，亦堪服食。恭曰：此有二種，一種葉葉如雞距，又似柳葉，青色，近莖處微紫，莖端碧白。四五月開紅白花，如石榴嘴而大，根如葫蘆，重疊生宜雞糞，或云百合是蚯蚓化成而反好雞糞理不可知也。時珍曰：百合三月生苗，高二三尺，莖粗如箭，四面有短竹葉，不似柳葉。五六月莖端開大白花，長五寸六出，紅蕊四垂向下，色亦不紅，者葉似柳，乃山丹也。百合結實，略似馬兜鈴，其內子亦似之。其瓣種之，如種蒜法。山中者宿根年年自生，未必盡是蚯蚓化成也。蚯蚓多處，不聞盡有百合，其說恐亦浪傳耳。

**【正誤】**宗奭曰：百合莖高三尺許，葉如大柳葉，四向攢枝而上。其顛即開淡黃白花，四垂向下，一異也。根卽百合白色，其形如松子，四向攢生，中間出苗。時珍曰：寇氏所說乃卷丹，非百合也。蘇頌所傳不堪入藥者，今正其誤。葉短而闊，微似竹葉，白花四垂者，百合也。葉長而狹，尖如柳葉，紅花不蘇四垂者，山丹也。莖葉似山丹而高，紅花帶黃而四垂上，有黑斑點。其子先結在枝葉間者，卷丹也。吳瑞本草言白花者名丹，以四月結子，秋時開花，根小少瓣，蓋一類三種也。吳瑞本草言白花者名丹，百合一仇不知何所據也。

**根〔氣味〕**甘平，無毒。一權曰：

有小毒。

**【主治】**邪氣腹脹心痛，利大小便，補中益氣。本經除浮腫，臍脹，痞滿寒熱，通身疼痛，及乳難喉痹，止涕淚。別百邪鬼魅，涕泣不止。除心下急滿痛，治腳氣熱歟。權：安心定膽，益志養五臟，治顛邪，狂叫，驚悸，產後血狂，運殺蟲毒氣，脅癰，乳癰，發背諸瘡腫，明心急黃，宜蜜蒸食之。孟宗：溫肺止嗽。元

**【發明】**方病名百合，而用百合治之，不識其義。張仲景治百合病，有百合知母湯。百合滑石代赭湯，百合新者可蒸可煮，和肉更佳。乾者作粉食。

最益人。時珍曰：按王維詩云：冥搜到百合，真使當重肉果堪止淚無欲縱望江目蓋取本草百合止涕淚之說。

**附方**舊三新百合病七枚以泉水浸一宿後百合病行住坐取一升卻以知母三兩用泉水二升煮合明旦更以泉水二升煮取一升半分服○百合雞子黃一個分再服○百合代赭湯治百合病已經下後者用百合代赭石一兩滑石三兩水二升煮取一升卻以代赭石一兩滑石三兩水二升煮取一升同煎取一升牛分再服○並仲景金匱要略方百合變渴病已經月變成消渴者百合一升水一斗陳子和白湯餅畢食之小百合變熱者用百合一兩滑石三兩爲末飲百合腹滿作痛者用百合炒爲末每小品方寸匕微利乃良小品方寸匕二日新百合四兩蜜和蒸孫真人食忌肺臟壅熱煩悶欬嗽者新百合含一片吞津聖惠方肺病吐血新百合搗汁和水飲之亦可羹食○衛生易簡耳聾耳痛乾百合爲末溫水服二拔白換黑七月七日取百合熟搗用新盜瓶盛之密封挂門上陰痛錢日二服千金方百合每拔去白者搗之卽生黑者也便民圖纂野百合同鹽搗泥天泡濕瘡生百合搗汁和水飲之耳聾耳以楮葉搗勸用鹽泥二兩百合半兩黃丹瘡腫不穿傳之良應驗方鹽搗泥天泡濕瘡卽安瀕湖集簡方魚骨哽咽百合五兩研末蜜水調園頸項魚骨哽咽包住不過三五次卽下聖濟

**花**主治小兒天泡濕瘡暴乾研末菜子油塗良時  
**子**主治酒炒微赤研末湯服治腸風下血思

山丹華

**【釋名】**紅百合日連珠同川強瞿通志紅花菜。

**〔集解〕**「曉曰」百合紅花者名山丹。其根食之不甚良。不及白花者。而瓣少。莖亦短小。其葉狹長而尖。頗似柳葉。與百合迥別。四月開紅花。六瓣不四重。亦結小包子。於山丹。四月結子在枝葉間。入秋開花在顛頂。誠一異也。其根有瓣似百合。不堪食。別一種也。

**根**【氣味】甘涼無毒。正要云：平。

**【主治】**瘡腫驚邪，明大時，女人崩中，珍。

花氣味根同

【主治】活血去瘀，傳疔瘡惡腫。

**草石蠶遺拾**

**【釋名】**地蠶用土蛹餘甘露子食

草長謂大者之都地，救荒種瓜兒本。

**【集解】**如蠶葉器曰一陽氏註蠶部石蠶云曰今俗用草根之似蠶者按亦草名石蠶生高山出福州信州如山石上有毛節

蠶常生下溼地及沙磧間。秋時耕犁偏地皆是。收取以醋淹作菹食。冬月亦掘取之。一穎曰：「一草石蠶，即今甘露子也。荆湘江淮以南野中有之。人亦栽蒔。二月生苗長者近尺。方莖對節。換葉有齒。並如雞蘇。但葉皺有毛耳。四月開小花成穗。一如紫蘇花穗。結子如荆芥子。亦可醬漬。蜜藏既可爲菜。狀又可老蠶。五月掘根蒸煮食。但葉之味似柏者。若與此不同也。」陳藏器言石蠶者若與此不同也。

**根**【氣味】甘平無毒。『時珍曰』不宜生食及多食。

寸白蟲與諸魚同食令人吐。

【主治】浸酒除風破血煮食治溪毒。葛器焙乾主走注風散血止痛其節亦可搗末酒服。

頌和五臟下氣。

**清神要**

**竹筍**蜀本草

【校正】併入木部

遺桃竹筍拾

【釋名】竹萌爾雅竹芽簡竹胎說文竹子神異經竹故字從匁今謂竹爲虧母草謂筍生匁有六日而齊母也僧贊

名苗一名初篁皆會意也俗作筍者非

【集解】弘景曰竹類甚多筍以實中竹筍竹者爲佳於藥無用頌曰竹筍諸家惟以苦竹筍厚而葉長闊筍味微苦俗呼甜苦筍食品所宜亦不聞入藥用也時珍曰晉武昌戴凱之宋僧贊寧皆著竹譜凡六十餘種其所產之地發筍之時各各不同詳見木部竹下其筍亦有可食不可食者大抵北土鮮竹惟秦蜀吳楚以南則多有之竹有雌雄但看根上第一枝雙生者必雌也乃有筍土人於竹根行鞭時掘取嫩者謂之鞭筍江南湖南人冬月掘大竹根下未出土者爲冬筍東觀漢記謂之筍苞筍並可鮮食爲珍品其他則南人淡乾者爲玉版筍明筍火筍鞭筍者爲鹽筍並可爲蔬食也按贊云凡食筍者譬如治藥得法則益人反是則有損采之宜避風日見風則本堅入水則肉硬脫殼煮之失味着刃則失柔煮過再煮過久必損人苦筍宜久煮乾筍宜取汁爲羹茹蒸之最美燶之亦佳

者載人咽先以灰湯煮

過再煮乃良或以薄荷數片同煮亦去羃味詩云其蔌伊何惟筍及蒲禮

加豆之實筍殖魚醃則筍之爲蔬尚之久矣

諸竹筍【氣味】甘微寒無毒

『藏器曰』諸筍皆發冷血及氣

瑞曰筍同羊肝食令人目盲

【主治】消渴利水道益氣可久食

利膈下氣化熱消痰爽胃

原

**苦竹筍**【氣味】苦甘寒

**【主治】**不睡去面目并舌上熱黃消渴明目解酒毒除熱氣健人器理心煩悶益氣力利水道下氣化痰理風熱脚氣并蒸煮食之心鏡治出汗中風失音。汪顯乾者燒研入鹽擦牙疳。時珍曰

**簾竹筍**【主治】消渴風熱，益氣力，消腹脹。蒸、煮、炒食皆宜。原

**淡竹筍**〔氣味〕甘寒

**【主治】**消痰除熱。狂壯熱頭痛頭風，并妊娠頭旋顛仆驚悸溫疫迷悶。小兒驚癇天弔。汪穎

**【主治】**小兒痘疹不出，煮粥食之，解毒有發生之義。汪穎

**【主治】**小兒痘疹不出。煮粥食之解毒。有發生之義類。汪曰：「**發明**」一洗曰：「淡竹筍卽中母筍，雖美，然發背悶脚氣，箭竹筍斬者可食。陳者不宜。諸竹筍多食皆不益人。脾病不宜食之。一小兒食乾筍三寸許，嘔於喉中，壯熱喘粗如驚服，驚藥不效，後吐出筍譜。謂之刮腸寬。惟生蠻及麻油能殺其毒。人以麻滓沃竹，則次年漏疎可驗矣。其蘄州蕭竹毛斑竹，宜臘竹，澧州方竹，叢南蕙竹，勞竹，月竹，諸筍皆苦，勒不堪食也。時珍常見俗醫治痘，往往勸飲筍湯云：能發痘，蓋不知痘瘡不宜大腸滑利而筍有刮腸之名，則暗受其害者不知若干人也。戒之哉，戒之哉！」

**桃竹筍**拾遺。【藏器曰】南人謂之黃筍。灰汁煮之可食。不爾。載人喉。其竹叢生。醜類非一。【時珍曰】桃枝竹出川廣中。皮滑而廣。犀紋瘦骨。四寸有節。可以爲席。

**【氣味】**苦。有小毒。

**【主治】**六畜瘡中。蛆擣碎納之。蛆盡出。藏器

**刺竹筍**。【時珍曰】生交廣中。叢生大者圍二尺。枝節皆有刺。夷人種以爲城。伐竹爲弓。根大如車轎。一名芭竹。

**【氣味】**甘苦。有小毒。食之落人髮。竹譜

**酸筍綱目**

**【集解】**一時珍曰。一臘筍出粵南。顧玠海槎錄云。筍大如臂。摘至用沸湯泡去苦水。投冷井水中浸二三日。取出。纏如絲繩。醋賓可食。好事者攜入中州。成罕物。云

**【氣味】**酸涼無毒。

**【主治】**作湯食。止渴解醒。利膈。時

