

世醫得效方卷第十二

小方科

癰毒

平血感治風熱積毒聚成發於頭面足熱者如胭脂色
其熱如火輕輕著手痛不可忍加紫草煎與犀角消毒飲
相間服赤瘰火瘰紫瘰瘰並治壯熱煩渴甚加黃芩麥門
冬去心朴消各半錢大見後膏腫
科路瘰癧

內托散

紅內消

當歸

芍片

甘草節

羌活

黃芩

麝香

半錢

右為末每服一錢荊蒨煎湯調成或生地黃亦可

敗毒散 治癰毒初發如白梅樣遊走遍身燥悶腹脹焦渴

每服真錢水壹盞生薑亂片紫草少許煎溫服方見大方

偏治平血散 與敗毒散合和生薑薄荷蠶退去足翼防

去蘆 細切煎湯加天花粉少許

又方 角癰遊走不定掀然赤腫疼痛用藥角歸手足上為妙後取碎

寒水石 石膏 黃連 黃柏各壹兩

右為末水調劑

又方 青黛土朱寫末井水調入蜜數角亦可

又方 黃丹不拘多少磨刀水調劑

又方 癰毒腫痛如火用大黃利消為末調塗腫處立效水

蒼生地黃松葉淨淨搥子比哥研爛水調傳

洗方 用防風酸棗車草赤芍龍心土煎水洗

又方 洗角後用小鷲圓嚴聖邪大鷲圓鎮發方見前

針法 取碎用水蟬數條以青苔蓋覆或濕紙亦可去血

即消未消再用癰毒滿身徧黑入腹入陰難治

諸疔

大安神圓 治心疔面黃臉赤煩滿壯熱心燥口瘡虛驚

益黃散治脾疔體黃肚大愛喫泥土脹滿氣麤下酸臭

方見後

生熟地黃湯 治肝疔痿頭孫目白腹脹睛流汗合面而

肉色青黃筋骨熱羸瘦

生乾地黄

洗熱地黃各半兩

川芎

半赤茯苓

枳殼去穢

杏仁去皮尖

川黃連去頭

半夏

天麻

地骨皮

甘草

當歸各半

右劉散每服貳錢生薑二片黑豆十五粒水煎臨卧

清肺湯治肺癆咳嗽氣逆多喘操鼻咬甲寒熱

桑白皮

炒兩紫蘇

北前胡

黃芩

當歸去尾

天門冬去心

連翹

防風

赤茯苓

北梗

生乾地黄

甘草各壹分

右劉散每服二錢水一盞煎溫服不拘候

水 治腎疝極瘦身有瘡疥寒熱作時頭暈脚冷如

生乾地黄

乾山藥

山藥

澤瀉

牡丹皮

白茯苓

右為末煉蜜圓梧子大每用一二圓化開服

胡黃連 治熱疝潮熱如火大便澀

胡黃連

川黃連 朱砂壹錢半

右黃連為末和木砂入猪膽內繫定盛懸於錢而莖一

炊入取出研蘆薈青黛各二錢半去足蝦蟇灰二錢

麝少許粳米飯圓麻子大每服十圓食後米飲下

五福丹 治熱疝肌肉黃瘦晝夜不見物陳粟米飲

化下方見則

圓治冷瘧時時油瀉虛汗不止

丁香

丁皮各壹錢 木香

紫厚朴劉寄

史君子肉倍橘紅

肉豆蔻風濕聖藥 各主錢

右為末神麩糊圓麻子大每七圓食前米飲下

圓走馬疳口內生瘡牙齦潰爛齒黑欲脫或出血

真氣丈夫婦人同

川白芷生

馬牙硝壹錢 銅青壹錢

麝香壹字

右為末乾傳口角及擦齒上妙仍服雄酥圓效方見後

圓活蛔疳圓食肉太早或腸胃停蓄肥膩為蛔其發

多啼嘔吐清沫腹痛脹滿唇口紫黑腸頭及齒痒

新白菩提根皮同浸焙

綠色貫衆 木香

桃仁浸去

蕪荑炒

雞心檳榔或鶴虱炒

輕粉半錢

乾蝦蚶各三錢 史君子各半錢

右為末飛羅麩糊圓麻子大每二十圓天明清肉汁下

內加當歸川黃連各二錢半治脊疳兼疳勞可擇用

大圓治脊疳虫蝕脊督身熱羸黃煩熱下痢脊骨知

錐齒指背瘡頻啗指甲

蘆薈

無美

木香

青黛乾

檳榔

川黃連神各壹錢

蠅退神各壹錢

麝香壹字

胡黃連半兩

右為末猪脂二箇取汁浸糕圓麻子大每服二十圓米

飲下

龍膽丸 治腦疳頭皮光急滿頭餅瘰腦熱髮結身汗顯顯高

龍膽草

川升麻

苦棟根皮焙 防風

赤茯苓

蘆薈

油髮灰

青黛乾

黃連淨

各三錢

右為末猪膽汁浸糕糊圓麻子大每二十圓薄青紫蘇泡過下食後仍以蘆薈末入鼻

兒童圓 治乾疳瘦悴少血舌乾目睛不轉乾啼身熱手足

青皮皮燥 大便乾結搭口癡眼乾渴

黃連去鬚

白礬頭

草龍膽去青

青橘皮去核

五倍子

蟾頭

夜明砂炒

苦棟根

雄黃

麝香

青黛

天漿子炒

能瞻

蘆薈

胡黃連

已上各壹分

石為末研令勻糯米糊和圓麻子大一歲兒每服一圓不計時候米飲下日進三服尤佳一方有乾蝸牛微炒壹分

白不散 又名**疳積散** 治疳渴煩燥引水乳食不進夜則渴

甚加烏梅陳米疳瀉停積宿滯水穀不聚頻泄不效加肉

豆蔻呵子方見前

木香圓 治疳痢冷熱不調五色雜下裏急外重

黃連淨

木香

紫厚朴去蘆皮

縮砂仁

夜明砂隔紙

訶子肉炒

右為末粳米飯團麻子大每服十五圓乾艾葉生薑煎湯食前溫下

福圖

治疔腫脹因虛中有積腹肚緊脹頭面盛浮

羅蔔子炒 陳皮

青皮

好檳榔

黑牽牛取仁半炒

北五靈脂

赤茯苓

蓬義木煨

木香去穢半

右為末飛羅麩糊圓黍豆大每服十五圓紫蘇桑白皮煎湯下

黃膏湯

治疔癆喘喘不定虛汗骨蒸渴而復瀉乳食遲滯

黃耆蜜炙 當歸

川芎

白芍藥

生乾地黄

蝦蟇去足

鱉甲脂炙焦

人參

白茯苓

橘皮

半夏麩

北柴胡

史君子苦澀

甘草炙

右對散每服貳錢水一盞薑二片棗一枚煎食前服

啟聖圖

治疔癆

人參半兩

川芎

蘇美

北柴胡各半

史君子苦澀 胡黃連

川黃連各半兩

右用鱉血一盞吳茱萸一兩拌和二連淹一宿次早炒乾透出茱萸并血只用二連夾餘藥杵末粟米粉糊圓

麻子大每服二十圓食前熱水下

治疔癆

治疔癆後項邊有核如癰癧狀按之轉動軟而不疼

名無辜疔毒兼治諸疔一服虛熱退二服渴止三服瀉痢

注

○蟾蜍壹枚夏月晴燥中取體大不跳不鳴者其身顯露名

右取糞虫壹杓置桶中以尿浸之桶上要乾不與虫走

却將蟾蜍殺之頓在虫中任與虫食一日夜次以新布

袋盡旬繫定置之急浸一宿取出瓦上焙為末入麝一

字糶飯揉圓麻子大每服二三十圓米飲下

一方白蕪美黃連胡黃連青黛各半兩蚘蚋一箇只用

酒浸灸去骨為末麪糊圓粟米大每服三十圓食後臨

卧米飲下日三服立效

又方治無辜疳

右以夜明砂炒為末入諸飲食中與之

通泄太過成疳

蟾酥酒去骨

龍膽草

史君子去殼

茴香壹兩炒

胡黃連

川練子去核木香

蕪荑各壹兩

巴豆貳枚 宣連去麩

右為末猪膽汁圓或糊圓青黛為衣常服蘇湯下

肥兒圓治諸疳多因闕乳喫食太早或因父患臟腑胃虛

虫動日漸羸瘦腹大不能行髮敗發熱無精神

黃連

檳榔二枚

史君子肉

肉豆蔻

木香二錢

右為末麩糊圓羅葷子大每服三四十圓量兒歲數加

煨熟水吞下

六神圓 捉疳止瀉

丁香

木香

肉豆蔻

去殼各半兩三味用麩果同入慢火炒

火煨令乾

訶子

史君子

蘆薈各壹兩細研入

右為末棗肉圓麻子大每服五圓至七圓溫米飲下乳

食前服

五神圓 治疳傷肚大

青皮

不去白炒焦黃存性

北五靈脂

蓬莪朮各壹兩

右為末搜和秤藥末一兩用肥巴豆肉去油秤一錢研

細拌和粳米飯圓麻子大每三五圓米湯不飢飽時下

小兒疳積諸疳作熱瀉瀉每服二十圓米飲下
天方科咳散類

疳疔不發散方

右以肥兒圓每服十五圓用蘇合香圓一粒入朱砂五

靈脂末各少許石薑煎湯調開下
方見前 蘇合香圓大 方科中 氣散

疳疔黃連圓治疳疔瘡自孩提至弱冠潮熱發瘡乃疳疔使

然疔虫食其肌膚空虛疳熱流注遍身熱瘡疥疥欲無已

蟾酥圓 相間服尤效

雄獨肚 查具 鷹爪黃連 去鹽 淨洗 七兩

右剉作小截少水和納猪肚中用線縫密頃在五升粳

米上蒸十分爛取放白中入此蒸飯搗子餘并粘突得

所舉手捏圓如小菘豆大每服二十圓米飲下童子倍
之冠者又倍之仍以川芎生地黃茯苓神與之調血
清心熱多者間服生犀散方見前二十歲以上潮熱
瘡是為虛勞皆一種病也用藥同前凡兒童諸病不
於疳則出於熱熱則生痰常須識此矣

方 右用大腹皮苦參川白芷為劉散煎湯淋洗妙
又甘草黃柏馬鞭草帶霜煎芥煎水洗後却用阿膠
連肉煨燒灰入麝香輕粉少許和勻傅瘡上效

右以韭菜地九糞煨為末出火毒清油調傅

法 治無辜疳腦後項邊有核如彈按之轉動軟而

其間有虫如米速飲之則虫隨熱氣流散
肺以致肢體作癱瘓便利膿血壯熱羸瘦頭露骨高
因氣血虛所致用針刺破以膏藥貼則愈或因墮墜
兒衣露於簷下為雀鳥落羽所汚兒著此衣虫又皮毛
亦致斯疾凡曬兒衣須微火烘之

丁突噴露

十全 治小兒手足極細頂小骨高尻削體瘦腹大胛突
號哭胸陷或生穀癩是名丁突虛執往來頭骨分開翻食
吐蟲煩渴嘔噦是為噴露二者皆因脾胃久虛不能消化
水穀以榮血氣致肌肉銷蝕腎氣不足復為風冷所傷榮
骨枯露亦有胎中受毒臟腑少血致之此皆無辜種類之

疾並難治兒服

青皮去穢

陳皮去白

蓬朮炮

川芎

比五靈脂

白豆蔻仁

雞心檳榔

蘆薈各半斤

木香

史君子肉焙

蝦蟇灰各一錢

右為末猪膽汁浸糕糊圓麻子大每服二十圓米飲下

有熱薄寄湯下

戕病

龍膽湯

治孕婦被惡虫齧

其腹中令兒病也其證下利寒

熱去來毫毛鬢髮不悅澤

及治婦人有兒未能行時復有

孕使兒飲此乳亦作此病

龍膽草

北柴胡

苦參黃芩

杜楨

金月皮

芍藥

甘草炙

茯苓

蟻蟻去沙

大黃壹兩 梔子壹兩

右剉散以水壹升煮取五合為一劑十歲已下小兒皆

可服若兒生一日至七日分一合為三服八日至十五

日分一合半為三服生十六日至二十日分二合為三

服二十日至三十日四十日盡以五合為三服皆以得

下即止此劑為出腹嬰兒所作若日月長大者以次依

此為例必知客忤及有鬼氣可加人參當歸各二錢半

一百日兒加一錢一字二百日兒加二錢半一歲兒加

半兩餘准此

積滯

積滯 戕病

葱湯圓治積神效

巴豆三十五粒用水浸壹宿五更初去 輕粉半錢

滑石五錢 鷹糞五錢

右為末研飯為圓如粟米大周歲以下每用三圓以上
四圓末效再加圓數膈上有涎或吐亦無妨如有虫用
苦楝皮少許甘草二寸煎湯五更初先將化虫藥服了
後用此取下春李燈心湯下夏李蘇鹽湯下秋李蘇湯
冬李葱白湯下初生兒以一粒放口中乳汁下

有積圓治乳積吐乳瀉乳其氣酸臭此由啼哭未已以風
與兒停滯不化得之

丁香

烏梅五錢

巴豆十四粒圓縮砂仁各五錢

右為末穿棉圓每服七圓米飲下

過飽飽後即腫得之
冊治食積肚硬帶熱瀉瀉或嘔皆因飲食無度多食
過飽飽後即腫得之

烏梅取肉

巴豆十六粒

青皮五分

陳皮五分

去白

右為末米糊圓粟米大每服七圓米飲下化鉄亦消

蠶矢感積圓

治食積

舌目腫黃肚熱脹痛覆

多困酷啼不食或大腸乾澀小便如澀或便利無禁糞白
酸臭服之天效方見大方科諸

蘇合香丸

治氣積腹痛啼叫如蟬湧皆因觸性其氣禁備

不和淹涎目及得之蘇合香丸感應圓等分和圓如粟

米大紫蘇湯下三十圓立效方見大方科

異香散 取積後調理

石蓮肉 壹兩 蓬萊木

益智仁

京三稜

甘草 各六箇 青皮 去穢

陳皮 去白 厚朴 壹斤炒

右剉散每服二錢水一盞生薑二片棗一枚鹽少許煎
通口服鹽湯點鹽酒調亦可不拘時服

炒香 胃散 和滋氣 胃消積 每服一錢蘇鹽

下多服尤妙 見大方

殺虫

因寒食 養肥甘生熱 肌瘦 肚虛 口吐清涎 唇間
腹中絞痛 口鼻中出黑色虫 不洽

史君子 四十箇 去殼

雷九 半兩

定粉 一分

輕粉 半錢 青箱子

鸞虱 壹分

為末用雞鴨卵和蒸為餅 先將此藥隔日咬五更服
將葱湯圓取下 方見前

子湯 每服二錢 苦煉根少許煎湯調服 近病亦效 煎

聖藥

鶴虱 去土 胡粉

檳榔

白礬 半斤

苦煉根皮 各半兩

蘇美

黃連

酸石榴皮 各壹分

右為末以糊圓如麻子大一歲兒三圓 將水入香油三
五滴下其虫小者化為水大者自下加雷九或用猪瘦

肉湯下

碧金散 治蛔虫寸白蟲

苦煉根 壹兩 鶴虱

猪牙皂角 二錢

好青黛 半兩 麝香 壹分

右同研勻每服壹字用淡猪肉湯食前調

安毒散 治因藥物籠肌膚消瘦虫生腹中極痛不可忍者

真胡粉 炒 檳榔

白礬 二錢 半生用

右為末米飲調痛時服空心未洗面前服或圓如麻子

大小兒多有諸虫臟腑虛弱食肥甘則動腹痛叫哭團

身撲手嘔清水涎沫面色青黃飲食不進不生肌膚

檳榔 各半兩

史君子仁 半兩 各末

川練子 炒去核 鶴虱 各二兩

其虫小者化為水大者自下
人一歲兒五圓溫漿水入清油一二點打勻溫米飲

嘔吐

驚吐 治因殺為吐妳面色青霍香煎湯化開服

硫黃散 治吐并發為吐

硫黃 半兩 水銀 壹分

右同研無星黑色量大小一字至一錢已水小點以指

緩緩磨濕添湯調方可服吐立止兼治大人反胃妙

冷吐 益黃散 治脾胃傷冷作吐每服二錢水一盞生薑紅

棗煎溫服 方見后 白不散 亦效 方見前

熱吐治 治壅熱又傷臟腑作嘔吐每服一錢

丁香香葉煎溫服方見前

涎吐治 治胸膈停痰作吐見大方并 方單用半

夏泡七次為末薑湯下效亦能止瀉有熱者灸 即

柴胡湯方見大方 治脾胃停食不化所吐酸臭善薑黃梅煎

積吐治 治脾胃停食不化所吐酸臭善薑黃梅煎

風吐治 治胃脘生風頻吐用黃荆兼一皮煎湯化

兼服治 治風熱吐朴消白滑石為末每服

半錢漿水半盞清油半兩調勻服必完

吐乳

治吐乳兼下痢不止雪糕圓粟米大米飲下二寸

圓粉方見大方 治吐乳兼下痢不止雪糕圓粟米大米飲下二寸

掌中圓治 治藥物與乳便吐下水乳不得飲食不下者

白豆蔻十四箇 甘草半兩 縮砂拾肆箇

右為末逐旋安掌中与他乾噉牙兒乾搽口中

丁香散治 治吐乳傷食

丁香 石蓮肉 枇杷葉生薑自然汁

右為末每服一錢米飲調下

霍亂正氣散治 治外感風寒濕作嘔每服二錢水一盞生薑

二片木瓜一片煎服效方見大方

濕熱不時暴嘔治 治霍亂吐瀉二片薑香小許煎方見大方

吐乳

香蘇散治生時洗上牽延或嘔加半夏湯洗葱白生薑各

少許煎亦見大方
針灸家類

交精吐妳四君子湯加藿香木瓜煎湯服又治經年吐妳

不停或成片段眼慢養多穢氣有筋膜通父母交感時喫

乳所致益黃散方見台
保童圓方見前 兼用

吐乳不止恐成脾風方

右以靈砂一粒青州白圓乎三粒同研末米飲調下量

大小与之吐久虛甚者對用靈砂親試有效靈砂大方
見風科通治類

青州白圓乎方

又方蓮心二十一箇香附子三箇豆菜黃七箇丁香七箇

一匙新瓦上炒黃研為末以乳汁調付乳頭上令兒喫

霍亂有驗

霍亂

總說吐瀉起於脾胃不調陰陽不順清濁相干或感風寒

之氣傷於脾胃胃氣不調故嘔不食脾胃虛弱臍不

調故泄瀉有脾虛傷感風冷故先吐而後瀉有胃

熱嘔吐登瀉夏月嘔吐登瀉為霍亂因胃熱引飲停留

胃氣吐瀉登瀉用香藿散大凡吐瀉不可使下止吐瀉

藥先調脾胃秋冬之間多是傷食生冷過度外感風寒

多瀉登瀉當用醒脾散但吐不瀉因傷粘物滯脾有胃

熱嘔吐渴水不休有胃冷嘔吐面青白四肢逆冷大凡

吐瀉先調脾胃氣此大法也

白朮散治胃氣不和脾氣虛弱發為吐下每服一水水盡

冬生薑二片烏梅半斤紅棗一枚蘇梗三寸煎溫服方見

五苓散治陰陽不調或感風邪暑毒霍亂嘔瀉不止每服

二水蘇葉木瓜食監湯調服未效如生薑自然汁少許

又方用生薑自然汁為圓麻子大量兒大小米飲下效

六和湯治夏秋暑冷相搏嘔泄不止每服二水水一盞

生薑二片木瓜一片煎溫服方對傷暑類

惡心口苦舌乾肢躄困倦不思飲食或發霍亂吐利轉筋

宜服方見大方辨傷暑類

治陰陽不和脾胃虛損吐下不止凡吐瀉五月內

九分下一分補八月內九分補而一分下有熱者先用

脾後退熱研藥石膏湯王之次用水銀硫黃末王之生薑

水調下但霍亂一證吐利交作蓋由飲食生冷或胃熱之

氣中腕節閉揮霍交亂用此能通暢三焦分理陰陽兼治

及胃嘔吐中暑昏亂最為切當方見大方辨傷暑類

若因虛癸熱必作慢脾風用米飲調下特效須多服若胃

氣已生則旋減金液却以四君子湯加陳皮名異功散徐

徐調理方見大方辨傷暑類

胃方治霍亂 右以牛涎一合灌下立效陳大黃煎煎湯洗手足上并

服濃汁一二合自愈

灸法 男左女右第二脚指上如菴豆大艾炷灸三壯即愈

泄瀉

驚瀉 **安神圓** **小麥圓** **白木散** 治瀉下青色 方並見前

疝瀉 **白朮散** **蟾蜍圓** **史奇餅** 治所瀉爛如泥肚緊 方並見前

精瀉 **養精圓** 治瀉下極臭 腹痛方見 服後次用 **益黃散**

方見後 **平用散** **補脾散** 補脾即安 方並見前 **益黃散** 方並見前

熱瀉 **五苓散** 方見大方 **痢心散** 方見 治瀉利大便熱每服

二水並用燈心拾半車前草二根煎服

白朮散 治臟腑極冷瀉出如破水 **白朮散** 欲交猴用

白朮散 治腸胃虛冬瓜子仁湯下或脾氣虛 **益黃散** **五苓散**

白朮散 治腸胃虛冬瓜子仁湯下或脾氣虛 **益黃散** **五苓散**

白朮散 治腸胃虛冬瓜子仁湯下或脾氣虛 **益黃散** **五苓散**

白朮散 治腸胃虛冬瓜子仁湯下或脾氣虛 **益黃散** **五苓散**

白朮散 治腸胃虛冬瓜子仁湯下或脾氣虛 **益黃散** **五苓散**

五苓散 治腹痛瀉為腸胃虛冷

肉豆蔻 煮散 治腹痛瀉為腸胃虛冷

右為末每服一錢米飲調下

冷熱不調瀉 **和安散**

木香 **當歸** **川芎**

柴胡 **青皮** **北梗** **甘草**

赤茯苓 各等分

右剉散每服一錢水一盞生薑二片棗一枚煎空心服

化華散 方見大方

香連圓 方並見大方

腎淺震靈丹治百種寒濕瀉脫骨力弱小腹痛泄多白

右用三圓為末火鐘乳粉半錢以炒破故紙一錢半

肉且龜一錢大棗二枚煎取清汁乘熱調空心灌下

大方科瀉冷類

梅月天時行瀉香梘湯每服生薑二片豆豉伍粒水壹

煎 方見大方科傷寒類

下痢

地榆散治赤痢因大腸停積熱毒得之或點滴鮮紅

地榆 呵子

甘草 各等分

右藥才安肚一錢益米湯調六腹服

八分

地榆壹錢 甘草貳錢 芍藥壹錢 當歸貳錢

右幽散每服壹錢水壹盞煎溫服

小黃連阿膠圓治腸胃有執大便秘澀疼痛喘吐下痢赤

黃類燥多渴腹痛小便不利乃積熱蘊毒為之圓如粟米

大方見大方科寒熱類

四生散

嬰粟散 去粟赤類

黑豆壹合生甘草半錢

生薑半錢

右幽散每服貳錢煎溫服如嘔食不入加入參少許

天宗胡湯 治下痢古黃口燥胸滿作渴身熱腹脹譫語此
必有燥屎服此下之唐與止藥科處方

六省散 治白痢因腸胃虛弱受於寒氣所下不止腹痛不
食立效

木香 炮壹分 厚朴 薑汁炒 半兩 白朮 壹分 龍骨
當歸 洗淨炒 各半兩 乾薑 炮 阿子肉 各壹分

右剉散每服貳錢水壹盞生薑二片棗一枚煎溫服量
大小加減

厚朴 治滑冷下痢不禁

厚朴 附子 乾薑 陳皮 各壹兩

右為末糊圓粟米大每服三十圓米飲下日三服

赤不自或赤白相雜裏急后重圓如粟米大方見大方科泄瀉類

小駐車圓 治冷熱不調或乳哺失節泄瀉不止或下痢鮮

紅或赤多白少腹痛后重腸胃虛滑便數減食困倦一切
瀉痢並宜服之方見大方科下痢類

栗飲 治赤白痢

木香 五分 黃連 去鬚 粟殼 去蒂 兩 赤

僵蚕 炒去絲 五分 甘草 乙兩

右用生薑二兩切同炒為末每服壹錢米飲下 赤痢
生地黃七寸白痢烏梅一錢並煎湯調下如有熱小柴

胡湯解之方見大方科傷寒類

公謹散 治禁口痢因服澁住藥太過傷損胃氣聞食口閉
四服逆冷若穀道不閉黃汁長流不治

蓮肉法散

右為末每服壹錢空腹米飲調服

真料參苓白朮散 治禁口痢和胃進食或單用山藥細炒
半生半熟為末米飲調服立效方見大方科脾胃類

等住圓 治澹瀉奔一切瀉痢立效

當歸 硫黃 牡蠣各二分 木香半兩

右為末麩糊圓粟米大每服二七圓糯米飲入薑汁一
二滴送下

止瀉 治休息痢因腸胃虛弱紅白相雜西二點

發不止方見大方科下痢類

炒子 治休息痢及疳瀉日久不能安者

右用雞子一枚打破用黃蠟一塊如指大銚內鑊以雞
子拌和炒熟空心食之

成應圓 治釀疔痢肚大喫食不成肌膚其下如濃粥汁青

白黑為冷黃赤為熱皆積聚所致方見大方科秘隘類

砂圓 即爛圓 治積痢

乳湯 治氣痢下如魚眼方科下痢類

脾胃

白朮散 文多方見大方科下痢類 溫脾養胃止氣理泄瀉胃熱煩渴不

問陰陽虛實並宜服之或乳食不進羸困少力因而失治
變成風癩方見為散紫蘇梗煎正脾生薑棗子虛實熱服

涼糞後不能食先用此生胃中津液後服生脾散退熱方
見前早涼夜熱不可下只用煎三升許頓服稍愈後再服

三升候不渴無涎又投生脾散二服即安白水煎亦可如
渴飲水多者多服無時盜汗虛汗亦用此藥止瀉治痰退

熱清神渴倍加白水渴甚者任意多飲

散 阿膠壹兩半麩炒鼠粘子壹分炒香馬兜鈴半

兩甘草一分杏仁柒箇去皮尖糯米壹兩為散每服二

錢用水煎服

史君子圓 正脾助胃

厚朴薑汁炒 陳皮

甘草

史君子法製

右為末煉蜜圓黍豆大每服三七圓 疳瀉積瀉水

下 熱瀉加青黛米飲 冷瀉薑 中暑瀉香薷 時

行瀉桑葉 赤菊藍姑草 白荆烏梅 蠶瀉益姑草

已上並用水飲下 益姑草竹葉菜是也

六神散 理脾胃虛止吐瀉進飲食養氣

嫩黃耆 白扁豆 人參 白朮

白茯苓 粉草各等分 或加麝香亦可

右為末每服貳錢麻鹽湯正氣生薑棗子湯調下

黃散 治脾胃虛弱吐瀉及治脾疳腹大身瘦此藥補脾

調氣冷腹痛久冷無效

陳皮

青皮

呵子肉

甘草

丁香伍錢

右對故每服水壹中益生薑貳片煎如腹脹

脾胃

人參

白朮

豆蔻

甘草

乾薑

薑香各等分

右為末每服一錢或半錢薑湯下如醒脾胃冬瓜子入

米飲下

氣散

桔梗

甘草

乾薑

縮砂

益智子

茴香

蘇葉

右為末每服半錢水瀉婆蘇水瓜煎湯下調脾胃生薑

素子煎湯調服

音散

治脾胃不和方見前

腹痛

四順清涼散

治熱作痛面赤壯熱四肢煩手足俱熱加

青皮枳殼去穢切片入

方見大方科補熱類

氣散治挾冷作痛面色白或青四肢冷甚

青皮

陳皮

桔梗

蓬莪朮

辣桂

藿香

益智仁

香附子

甘草

加半夏

小

腹
痛
十二卷

右劉散每服三錢水一盞姜三片棗一枚煎不拘時候

蘇合香圓

蘇合香圓與... 煎服治證同上

方見人方 料冲氣類

積散

積散... 治邪正交爭冷熱不調... 為腹瀉嘔吐

枳殼去穢

檳榔去毒

青皮去穢

陳皮去白

木香去穢

當歸

粉草各伍錢

右劉散每服二錢水一盞生薑二片煎溫服

赤氣

赤氣... 治氣作痛時先曲腰啼哭眼中無淚脚冷唇乾

額上麥汗或外腎約上陰囊偏大

金鈴子

去穢

縮砂去穢

木香各伍錢

右為末每服壹錢大者貳錢鹽湯或好酒調服

治同上... 凡六每服二七粒全愈

湯下方見大加 料冲氣類

瀉瀉圓

瀉瀉氣小腹痛引腰脊彎曲身不能直

芫花醋浸少

不香

三稜各半兩

茯苓

青皮去白

全蝎

肉桂

附子炮

硃砂各壹分

右為末將硃砂浸洗去土頓在湯瓶上候成膏子和糖醋打麩糊圓如棗豆大每服三十圓空心溫酒送下未效再服

效再服

又方金鈴子圓

治赤氣小腹痛引腰脊彎曲身不能直

木香

檳榔

三稜

蓬朮炮

青皮 去白

陳皮

川練肉

羌花

各半兩

辣桂

牽牛

生煎

川巴

且肉

不去油

右為末麩糊圓磨子大每三圓空心午前各一服薑湯下

五六散治陰核氣結腫大鈞痛多因啼怒不止傷動陰氣

結聚不散得之或胎婦啼泣過傷令兒生下小腸氣閉如

以風冷血水相聚水氣上乘於肺故先喘而後疝痛外腎

木硬臍下痛楚不可忍惟利二便則安以木通葱白茴香

食鹽煎湯調下得小便利為效

方服大分

雷歸散治疝氣大疝秘小腹陰囊牽引撮聚痛甚

辣桂

牽牛

炒即

當歸

北大黃

杏仁浸去皮炒

全蝎

壹錢半

皮狹苓木香縮砂其草為散生薑煎和胃唇青不洽

治盤腸內鈞腹中極痛乾啼

明乳香

沒藥

別研

木香

薑黃

各半

水散

去皮研細

木香

水散

去皮研細

右以木驚子搜和四味末為圓櫻桃大煎鈞藤湯化下

一歲可服半圓次魏香散

魏香散用蓬莪木半兩真阿魏一錢先以溫水化開阿魏

浸莪木一日夜焙乾為末每服一字或半錢煎蘇葉

飲空心調下

蒲黃散治吐血咯血

生蒲黃

油髮灰等分

右研細每服一錢煖生地黃汁調下米飲亦可

生地黄汁治吐血衄血

生地黄汁取一合髮灰半錢調分作兩服食后少頃

鼻吻方

生薑薑汁仰頭滴下鼻仍飲其汁

腫滿

五苓散治伏暑感濕腫滿用生薑皮木瓜車

草山茵陳煎方見大方利濕聖劑

分氣飲治腫脹作喘氣短而急

北棗

赤茯苓

陳皮

桑白皮

大腹皮

枳殼

半夏麴

真蘇子炒

此蘇蘇

甘草各貳錢草果仁壹錢

右剉散每服一錢半水一盞生薑二片棗子一枚煎服

若膈心凸起掌心平缺盆平背心平不治大喘氣龐不

食乃賢水盈溢上行傍浸於肺亦不治

五皮散

神助散

相兼服方見大方利腫滿類

治熱毒遊腫破草鞋人亂髮燒灰醋調傳熱毒

黃散貼腫毒

右用大黃、柏黃連各等分為末攢猪膽汁調塗頭

及脚心又方硝石白麩等分研勻井水調睡時塗脚心效

單方 治脚氣腫痛及蠱腫

右商陸不以多少切碎酒煮熟候酒溫連商陸飲喫腫肚蠱腫同米煮粥喫大人亦可服

盜汗

白朮散

安神圓

小驚圓

治蠱麻黃根煎湯下

方並

又方 治心腋汗大人小兒皆有之大人乃心血溢盛而常突赤者是也小兒因驚得之有人常有盜汗不止氣弱體虛醫不可乃心血溢盛為汗非虛也宜用藥收斂心血

川當歸

人參各半兩

右數散用猪心二箇可切三片藥亦分三服每服水一椀猪心一片煎服

白朮散 治盜汗入米糖煎服效

牡蠣散 治血虛自汗或病後暴虛津液不固自汗夜臥甚又不止則粘瘦短氣煩倦方見大方利自汗類

膏方 治脚汗白礬乾葛為散煎水洗效

又方 治睡中汗出酸棗仁人參茯苓為細末米飲下半錢

項軟

大桂圓 治風氣頸起軟頭不得正成去煎或去后

蛇含石

大塊塊煨末次用酢泔米次

川礬金末

少許

右碾細又入鉢內研極細和前藥米入少麝香和勻用雪白大米飯圓龍眼大每服一圓荆芥湯化下或又入生薑汁一二滴或用金銀薄荷湯早晨不拘時下風熱

項軟合用涼肝圓方見前

五加皮散 治頸軟

右用五加皮為末酒調塗瘻頸骨上

健骨散 治父患疝疾體虛不食及諸病後天柱骨圍醫

不識謂之五軟

曰僵蚕為末三歲兒半錢薄荷酒調下後用生筋散貼

生筋散 治空則

木鱉字一陸箇黃麻子陸拾箇

右研細先起顛摩項上令熱津唾調貼之効又方用

附子生用去皮臍天南星切各等分生姜自然汁調

項軟服

語遲

葛蒲圓 浴受胎其母卒有驚怖和氣乘心舌本不通四五歲長猶不能言

人參 石菖蒲 麥門冬 去心

川芎 當歸 各二錢 滴乳香 朱砂 各別研

右為末煉蜜圓麻子大每服十圓粳米米飲下

聾耳

耳聾散 治腎經有熱上衝於耳遂使津液壅滯為稠膿為

清汁耳內痛亦有沐浴水入耳中濕氣停滯為膿但不疼

二證久不瘥變成聾耳

明礬煨

龍骨 研 各三錢 黃丹 煨 二錢 胭脂 一錢

語遲 聾耳 十二卷

麝少許

右為末先以綿被取去水次以鵝毛管吹藥入耳本方加海螵蛸末亦好

月蝕耳方

胡粉和東方壁土為末傳

又方

蝦蟆燒灰存性搗為末和猪膏傳

重舌

傳

治重舌乃心脾俱有熱也心候於舌所主者血脾之

脉絡出於舌下若心脾有熱則血氣俱盛附舌根而重生一物形如舌而短小是也有著頰裏及上脘者曰重脘有著齒齦者曰重齦皆當刺去其血也用真蒲黃傳之或灰傳之或馬牙明傳之或竹瀝浸黃柏點之隨消亦好

並見大方科百病類

木舌

治

木舌舌迺心之候脾之脉絡於舌臍脾壅滯心脾

積熱氣土衝故令舌腫漸脹大塞滿口中是為木舌若不急療必至害人每用一字研細竹瀝調下辨局方

又方

黃蜀葵花研細黃丹半之同研點七次

又方

川朴消二分紫雪一分白鹽半分同研每半錢竹瀝

井水調傳

帶頤

冷證

帶頤治帶頤涎流出而漬於頤間也認者脾之液

脾胃虛冷故涎液自流不能收約法當溫脾

重舌
木舌
帶頤
子卷

半夏

木香

丁香

各半及

川白姜

主

白木

青皮

陳皮

各二升半

右為末，熬糊，圓麻子大一歲十圓，二歲二十圓，米湯下。

熱證通心飲

方見前

只用瘡爛方

髮灰為細末，猪脂和傳，燕窠泥亦好。

咽疾

射干湯治風熱腫痛

射干

川升麻

各一兩

馬牙消

馬勃

各半及

右為末，每服一錢，水一盞，煎食后溫服。

喉痺腫痛方

已退燒存母
為去

右每服用半錢乳汁調下，或用螻房燒存性為末。

半錢乳汁調服

夜啼

治赤散 治心燥啼面赤小便赤赤口中熱腹上赤熱或有

汗仰身而啼至曉方息，加黃芩煎未效，**白心散** 加麥門冬

軍前子燈心薄荷煎，或用燈心燒灰塗乳上，与兒飲亦效。

方並見前

六神散 治腹痛啼哭面青口中冷氣四肢亦冷，曲腰而啼。

或大便泄瀉，青白糞，及不吮乳。

人參

山藥炒

白木各半兩，甘草真錢

白茯苓

白扁豆

各壹兩

右為未每服一錢薑三片棗一枚煎一方用當歸白芍藥人參各二錢半甘草桔梗陳皮各一錢為散每服二錢水煎時上與服

手合

蒜圓

治冷證腹痛夜啼面青手冷

大蒜

壹枚慢火煨香熟取出細切
湘研曰中或火上煨半乾研

乳香

半錢別研

右研勻圓如芥子大每服七粒乳空時服

安神圓

治外客忤犯夜啼金銀湯化開服方見前

黃土散 治小兒卒客忤

竈中黃土

蚯蚓屎

各等分

右研勻和水塗兒頭上及五心良

觸犯禁忌夜啼方服蘇合香圓以醋吹入重及用方

口到乳上便啼身額必微熱急看口內或瘡或雲，前口瘡重舌類治之其啼自止

顛陷

單方 治因臟腑有熱瀉引水漿致成泄利久則血氣虛弱不能上交腦髓故顛陷如坑不得滿平宜用黃狗頭骨炙黃為末雞子清調之傳

顛填

集說顛陷者顛門腫起也脾主肌肉乳食不常飢飽無度或寒或熱乘於脾家致使臟腑不調其氣上衝為之瘻脹顛突而高如物堆塚毛髮短黃自汗是爾若云氣上衝則牽輓熱氣上衝則柔軟寒者溫之熱者涼之劑量

顛陷
顛填
上卷

輕重兼以調氣小兒肝盛風熱交攻亦然未易退差

解顛

地黃圓 治年六八兒頭縫開解不合腎主髓腦為髓海腎氣有虧腦髓不足所以腦顛開而不能合兒腦髓欠少如木無根不過千日終成廢人

大熟地黃

洗用

山茱萸

乾山藥

澤瀉

壹錢

牡丹皮

白茯苓

各壹錢半

右為末煉蜜圓梧桐子大每用一二圓溫水空心送下仍用大南星微炮為末米醋調傅於絳帛上烘熱貼之

三辛散

治頭骨縫合不合頭骨開解名曰解顛

細辛

桂心各半兩 乾薑洗下錢半

右為末以乳汁和傅顛上乾復傅之兒面亦即愈

又方 蛇蛻炒焦為末用猪頰車中髓調傅頂上日三四度

有人作頭巾裹遮護之久而自合亦良法也

又方 驢頭骨不以多少燒灰研細以清油調敷頭縫中

手拳不展

意以圓 治所受肝氣弱致兩膝攣縮兩手伸展無力

當歸

洗乾

秦朮

薏苡仁

防風

羌活各壹兩

右為末煉蜜圓雞頭大每一粒至二粒麝香京芥湯洗

脚拳不展

海狗皮散 治腎氣不足血氣未榮脚指拳縮無力不

解顛
手拳不展
脚拳不展
十二卷

能伸展

海桐皮 牡丹皮

當歸 熟地黄

牛膝各壹斤 山茱萸

補骨脂各半兩

右為末每服一錢葱白二寸煎食前服

行遲

地黃圓 治氣血不充骨髓不滿軟弱不能行或肝腎俱虛
肝主筋筋弱不能束所致一方加川牛膝五加皮酒炙鹿
茸妙方見前

又方 虎骨圓

虎股骨酒炙 生乾地黄 酸棗仁酒燉 防風 當歸

白茯苓 辣桂

川芎

牛膝羊分右五末續當尤蘇子大每五圓酒吞下或木瓜湯

五加皮散 治三歲不能行者

真五加皮 苧牛膝 酸木瓜乾各半分

右為末每服一錢半粥飲調次入好酒兩點再調食前服日二劑

鶴節

地黃圓 治重受不足血氣不充故肌肉瘦薄骨節呈露如
鶴之膝乃骨虛得之腎虛則精髓內耗膚革不榮易為邪
氣所襲日就枯瘠其始鶴節之節乎木方加鹿茸酥炙川
牛膝各一錢修合服餌並同三歲以下與十圓三歲以上
與十五圓方見前

龜胸

百合湯 胸高脹滿其狀如龜此肺經受熱所致也乳母酒麪無度或夏川熱煩熱乳與兒得之或乳母多食五辛而亦成此疾

川大黃三分 天門冬去心 杏仁去皮炒 百合

木通

桑白皮炒

甜葶藶炒上爛 石膏各半

右為末煉蜜圓黍豆大每服五圓食后臨卧熟水化下

龜背

松葉湯 治嬰兒生下不能護背客風吹脊入於骨髓致之或坐太早亦致偃僂背高如龜多成癩疾

松花

枳殼

防風

獨活各一兩

麻黃

川大黃

前胡

桂心各半兩

右為末蜜圓黍米大每服十粒粥飲下量兒加減

灸法 肺腧穴第三椎骨下兩傍各一寸半臍俞穴第七椎

骨下兩傍各一寸半以小兒手中指中節為一寸灸炷

如小麥大但三五壯而止

髮不生

髮不生 治血氣不足不能榮於髮

當歸去尾

生乾地黄

何首烏酒洗

揚芍藥各一兩

胡粉五

右為末煉蜜圓如黍米大每服十粒煎黑豆湯下兼磨

化塗抹頭上

魚骨
髮不生
十三卷

齒不生

黃散治齒不生齒者由骨之所終髓之所養稟氣不足則髓不能充於骨故齒久不生

川芎

乾地黄

當歸

芍藥

白芍藥

路一沉香

粉草

右為末溫益湯調服半錢用少許揩齒脚亦佳

雄鼠糞二七粒兩頭尖者是每日用一粒揩齒根上

至二十一日當生

瘡毒

和散治諸般瘡毒生姜薄荷生乾地黄麥

天心煎服方見瘡腫科諸瘡類及人方科瘡類

角無辜瘡毒治同前方見前

五石散治同上

方見瘡腫科諸瘡類

角無辜瘡毒

右用黃連大拍為末色蕉汁調敷角留口搽瘡加輕

粉有汁加黃丹服麝香各少許和勻乾瘡

諸般惡瘡

上藜蘆取皮焙乾為末別研入

不夾石雄黃

輕粉

水粉

蚌粉

右和勻先用鮑魚一箇入真清油內煎候熟去魚以曲

攤冷調藥傳瘡三日以后以葱湯遍身洗浴所穿衣服並

脫去洗淨乳母仍忌油膩肥汁紅酒煎炙及熱物等立

子三卷

效癬瘡用真米醋調傳立效

鯽魚方治小兒白禿瘡

鯽魚一尾重三四兩者去腸肚次

雄黃

右為末生清油調傳先以薑水洗拭后用藥

如聖黑膏治頭瘡久不瘥及白禿

巨豉半升 龍膽草 蕪荑各壹分

右一處用溫帝暴益泥固濟火服存性碾為末以生清

油半斤熬取四兩下藥急搗勻得所釐合收傳神效

丸人耳輪瘡極痒臨睡時傳一遍治白禿剝頭石一

瘰癧方治卒得瘰癧

右用赤爛牛糞燒交研細傳

魚腦瘡方瘡頭里深破之黃水出四畔浮漿

右用蛇退皮燒存性細研雞子清調傳

雙瘡方燕窠土研細猪脂傳

解方水銀一分胡粉二分水研入雞冠血傳

鼠鱗瘡方

右用蛇床子為末先以韭菜根煎湯洗次用臈月猪脂

調藥傳之

灸甲散治眉叢中生瘡名曰鍊銀鱗

右用穿山甲前膊鱗炙焦為末清油輕粉調傳

白散散治凍耳成瘡或痒或痛

黃蘗

白飯各半兩

右爲末先以湯洗瘡後用生清油調塗

白粉

治髮邊

生較癩名發鬚有數年不愈者此極妙

猪頭上毛

搗頭上毛殼乙攪

鼠屎乙粒

右爲末清油調傳或加輕粉尤妙

生附子 治凍爛脚成瘡

生附子半個去皮臍

右爲末麩水調貼之即愈

陰囊

治陰股間汁出先痒后痛愈後復發及陰囊生瘡

以火炙瘡抓去茄令乾以蜜傅却搜麩作燒餅炙熟以

錫上乘執射之冷則再炙再射之度爲妙

胎毒瘡方 治一歲二歲內滿頭延及遍身生瘡皆因在胎

中父母恣情交合所致名曰胎蛆經父不差先用化毒

丹消毒飲服却用父小便以鵝翎刷洗瘡上青黛爲細

末乾搽效

即效方 治頭上生瘡及肥疳瘡猪筒骨中髓調輕粉早傅

晚愈又用樹上乾桃燒灰清心調傳效暑毒軟節皆可

疔自瘡方 治遍身如魚目無膿又名狂虜瘡川升麻剉散

煎百一弗入蜜一二匙以磁器盛鵝翎拭瘡上

諸惡瘡生頭百南星貝母等分用湯泡七次研爲細末入

土朱少許乾則清油調祿濕則乾搽

口瘡

厚湯 治血盛將養過溫心有客熱熏發於上焦遂成瘡

右用黃連一兩去鬚或加腦子麝香鵬沙為末每服一字溫水臨臥服

連翹飲 治心肺有熱瘡發班駁如丹身腫有熱或熟煮大粟與食亦佳 方見疹瘡類

洗心散 治心熱煩渴作成口瘡每用一字乾糝兒口中嚥

奕亦無妨乳母同服尤妙 方見大力科類

傅乘 治滿口瘡爛

黃丹一兩好蜜一兩瓦盞盛翫上蒸一炊久取出以鵝

翎刷瘡上效

貼藥 是藥末醋調貼兩脚心後夜即愈藥性雖熱能引

熱就下至良

又方 天南星家陀僧為末 治口瘡不能吮乳醋調貼兩有

又方 生硫黃為末新汲水調貼手心脚心效即洗去

軟瘡

指頭散 治軟瘡愈而再作用野蜂房一二箇燒灰存性以

巴豆三七粒去殼煎清油三二沸去巴豆以油調藥敷

立效白礬粘為末清油調傳亦效 此藥有驗人以指頭為

又方 大枳殼一枚去穰令空地上磨令口平以稠麪糊按

四唇露在瘡上自破膿溜出盡更無癩痕

又方 治軟瘡屢安再作者

右用桑螵消燒灰存性以清油調傳

又方 鷄抱如殼燒灰存性為末入輕粉少許清油調傅此物難得只以鷄子抱退殼如上法用亦可

散卷百方

白及

赤石脂

各壹分 當歸參錢 去鹽

龍骨

少許

右為細末乾糝

脫肛

釣腸圓 治大腸虛寒或因服涼藥過度或久痢後臟寒所致圓如粟米大大者細嚼胡桃溫酒送下小者水香湯下方見大方科諸痔類

瓜菜圓 治初病脫肛鼻梁青脉唇白齒根焦黃久病兩頰光眉赤唇焦多啼哭

黃瓜羹

乙管白礬半兩

右將白礬入瓜羹內圍濟火煨為末末糊圓每服三十圓米湯送下

兩頰脫肛黑色生瘡方

右用巴豆殼燒灰色蕉自然汁煮入朴消少許洗乾用真清油點三滴放三角白礬煨過研煨真龍骨少許同研糝肛頭用芭蕉葉搗上勿令便去出入令大兒抱定

龍骨散 治大腸虛肛門出

龍骨

訶子肉 炒各二分半

沒石子

大許二枚

嬰粟殼

去類醋炙 赤石脂 各二分

右為末每服一錢米飲調下

香附子荆芥皂角煎水洗

以葱湯洗令軟用芭蕉葉托上

五倍子搗大腹皮煎水洗以赤石脂末摻在芭蕉

葉上托入

章麻子四十九粒研爛水調作餅子貼臍頂上收上

方有效

治脫肛不收

右用浮萍草不以多少杵為細末乾貼患處

治臟熱肛門脫出

右用紫背蕞一六種又為魚腥草搗爛如泥先用朴硝

水洗參肛門用芭蕉托入却用藥於肛下貼坐自然收

用新礬一片燒紅以醋澆之氣上即用脚布疊數重

壓定使熱氣上透不可過熱令病者以醫坐於布上如

覺布溫遂旋減之以常得溫熱為度

灸法頂上旋毛中三壯即入又灸尾脊骨三壯又灸臍中

隨年壯

遺尿

鷓鴣散治腎與膀胱俱虛冷氣乘之不能約制故遺尿不

禁或睡重衣自出

辣桂

龍骨各半

鷓鴣燒

牡礪灰

白茯苓

真桑螵蛸

各半兩

右劉散每服一錢水一盞薑二片棗一枚煎服

又方

鷄臍脰

壹斤

鷄腸燒

猪胞

炙焦

右為末每辰一錢酒調下男用雌鷄女用雄鷄者

尿白痰多散治乳疝失節有傷於脾致使清濁色白也久而成疝亦心膈伏熱兼而得之

京三稜

蓬莪不潰

縮砂仁

赤茯苓

各半

青皮

陳皮

滑石

甘草

各半

右為末每服一錢麥門冬燈心煎湯調下

又方

大甘草頭煎湯服

淋閉

葵子散

治諸淋兼小便不通

葵子

車前子

木通

瞿麥

桑白皮

赤茯苓

山梔子仁

甘草

各等分

右剉散每服一錢井水一小盞葱白二寸煎食前服

道生散

治血淋仍以米飲調油髮灰少許空心灌下方見

尿血方

生蒲黃

生地黃

赤茯苓

付草

各等分

右剉散每服一錢水一小盞煎調油髮灰少許食前服

順細散

治十餘歲因驚之候心氣不行小便淋瀝日久三

四十次漸覺黃瘦宜服

韭子

琥珀

益智

金毛狗脊

去毛

白茯苓

去皮

豆豉

火煨醋泔研

石常

去毛

石常

去毛

右為末每服一錢米湯調日二服

大便秘

白散 治風與滯血留蓄上焦胸膈高起大便不通

沒藥

大黃

枳殼炒

北梗各五分

木香

甘草炙

右劉散每服一錢姜二片水一盞煎服

陰腫

三白散 治膀胱蘊熱風濕相乘陰囊腫脹大小便不利

白牽牛式兩

桑白皮

白朮

木通去節

陳皮去白

右為末每服二錢姜湯調空心服

圓 治啼叫怒氣閉擊於下結聚不散水實不行發為
此疾

桃仁浸去皮尖

辣桂

牽牛炒碎

白芍煮

牡丹皮

北木各五分

右為末煉蜜圓如麻子六每服五圓或七圓青皮木通

煎白塩少許煎湯灌下或煎大流氣飲研青木香圓下

蟬退散 治陰囊怒腫多坐地為風或虫蟻咬著

右用蟬退半兩水一椀煎湯洗腫處其痛立止腫亦消

再溫再洗洗后仍與五苓散加燈心煎服又方用葱園

內蚯蚓糞甘草汁調塗

傅藥 **地龍膏** 治外腎腫硬或疝或風熱暴腫及陰瘡

大便秘
陰腫
主卷

乾地黃不以多少為未先以葱椒湯於避風處洗次用
津唾調傳其上下腎熱者雞子清調傳或加牡礪少許

又方 地龍養群生蘆葯汁調傳

牡礪散 治外腎腫太至物通明

牡礪粉研極細先以津唾塗腫處次用糝傳

又方 卵腫研桃仁唾調傳

馬山方 治風熱外腎焮赤腫痛日夜啼叫不數日退皮如
鷄卵殼愈而復作用老杉木燒灰入膩粉清油調傳效

卒暴

捷方 治卒然腹皮青黑而死灸臍上下左右去臍各半寸
并鳩尾骨下一寸凡五處各灸三壯仍用酒和胡粉盒

其腹

又暴腹滿欲死半夏不多多少微火炮為末酒和為圓如

粟米大二五粒淡薑湯或蜜湯下

又中惡暴死葱白納下部及鼻中立活或用菖蒲末著舌

底吹入兩鼻兩耳中效

又中惡欲死甘草濃煎湯服立驗

斷乳

畫眉膏

梔子各一分 存性

雌黃

朱砂各少許

右為末入生清油輕粉少許調勻候兒睡着濃抹於兩

眉醒來自不喫乳未效再用即驗

卒暴
此乳
三卷終

氏小兒方卷第十二

