

大德重校聖濟總錄卷第二十八

傷寒門

傷寒發黃

傷寒發豌豆齋

傷寒發狂

傷寒剛瘧

傷寒柔瘧



傷寒發黃

論曰傷寒發黃之狀身體盡變或如熏黃或如橘色是也凡陽明中風太陽中濕皆令人發黃蓋由得病無汗小便不利寒濕不散則熱結脾胃腠理閉塞瘀熱之氣與宿穀相薄而鬱蒸不能消散故大小便結澀不通令人身體面目皆變黃色其病腹滿一身盡疼發熱若其人小腹滿急眼睛澀疼鼻骨痛兩膊及項強腰背急者是也但得小便快利即漸愈仍不用大便秘多即令人心腹又有急黃者身體黃甚卒然而發心滿氣喘命在須臾故名急黃有初得病便黃者或初不知是黃死後

方變黃者此病亦因脾胃發熱本天行時氣所作也宜
細辯之但發熱心戰者乃是急黃之候

治陽明病發熱汗出此為越熱不得發黃也但頭汗出
小便不利渴引水漿者此為瘀熱在裏身必發黃下之
宜茵陳蒿湯又傷寒七八日身黃如橘皮小便不利腹
微滿者宜茵陳蒿湯方

茵陳蒿

陸

梔子

拾肆

大黃

兩

右三味咬咀如麻豆大每服五錢匕水二盞煎取一
盞去滓溫服三服後小便當利如皂莢汁者其黃乃

愈

治傷寒瘀熱在裏身必發黃麻黃連翹湯方

麻黃

去根節湯煎
去沫貳兩

連翹

貳兩

杏仁

去皮尖雙
揀揅拾枚

生梓白皮

升切壹

生薑

兩

甘草

兩

右七味咬咀如麻豆大每服五錢匕用潦水三盞煎
取一盞去滓溫服不拘時

治傷寒身黃發熱梔子蘗皮湯方

梔子

拾伍

黃蘗

去蘗皮
貳兩

甘草

兩

梔子
拾伍

右三味咬咀如麻豆大每服三錢匕水一盞半煎取
一盞去滓溫服

治太陽病身黃脉沉結小腹鞭小便利者為無血也小便自利其人如狂者血證諦也宜服抵當湯方半煎取

水蛭 參拾枚妙

蝨蟲 參拾枚妙

桃人 去皮尖雙人妙壹拾枚

大黃 參拾枚妙

右四味咬咀如麻豆大每服三錢匕水一盞半煎至

七分去滓溫服 大豆入豉煎正豉小豆豉木二指煎

治傷寒瘀熱在內濕氣鬱而不散裏發肌肉小便不利

身體發黃利水道消濕散方

主熱白濁

牽牛子 妙半斤只取味貳兩

赤茯苓 去黑皮

米香 煮 陳橘皮 湯浸去白

右四味為散每服二錢匕煎葱白湯調下不計時候

治傷寒心胸堅鞭脚手心熱即變為黃秦芫湯方

秦芫 去苗上

紫草 去苗上

白鮮皮

黃芩 去黑心

梔子人

大黃 剉妙各壹兩

右六味蠶搗篩每服五錢匕用水一盞半煎至一盞

去滓溫服日三夜一

治傷寒發黃服藥差後未全除餘熱發動三黃散方

大黃 剉

黃芩 去黑心

黃連 去須

梔子人 煎 苦參 各壹兩 刺水不麻

右五味搗羅為細散每服用米飲調下二錢匕日三

服

治傷寒發黃煩熱皮肉皆黃小便赤不利龍膽湯方

龍膽

枳殼去黑

苳胡去苗

梔子人

知母切焙

地骨皮黃芩

木通剉

芍藥

甘草炙

羚羊角鎊

麥門冬去心

升麻各半

右一十二味廬搗篩每服五錢匕用水一盞半煎至

一盞去滓不拘時溫服

治傷寒發黃或先服利藥未差者宜以內消湯以折熱

氣黃芩湯方

黃芩去黑

茵陳蒿

升麻各壹

梔子人

苳胡去苗

龍膽各半

犀角鎊

右七味廬搗羅每服五錢匕用水一盞半煎至一盞

去滓入生地黃汁一合攪令勻不拘時溫服

治傷寒發黃面目悉黃小便赤宜服茵陳蒿太黃湯方

茵陳蒿

梔子人

苳胡去苗

藥皮蜜炙各

黃芩去黑

升麻去苗

大黃剉炒各

龍膽半

右八味廬搗篩每服五錢七用水一盞半煎至一盞

去滓早晚食後溫服

治傷寒發黃通身如金色者茅根湯方

茅根洗

梔子人

茵陳蒿

地骨皮

甘草炙各半兩

右五味麤搗篩每服五錢匕用水一盞半生薑三片

豉三七粒同煎至一盞去滓早晚食後溫服

治傷寒發黃壯熱骨節煩疼兩胸下氣脹急鞭痛不能

食宜服此胡枳殼湯方

芫胡苗

枳殼去麩

黃芩去黑心

梔子人

茵陳蒿

龍膽各一兩

大黃剉

甘草炙各半兩

右六味麤搗篩每服五錢匕用水一盞半煎至一盞

去滓早晚食後溫服

治傷寒熱毒熾盛熏炙三焦攻擊皮膚通身發黃茵陳

蒿黃芩湯方

茵陳蒿

黃芩去黑心

梔子人

升麻

秦艽去苗

牡丹皮

荆芥穗

麻黃節

細辛去苗

石膏

知母各半兩

黃連去

大黃剉

知母各半兩

黃連去

右一十三味搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分

去滓食後臨臥溫服

黃蘗 法

治傷寒時氣發黃葶蘆丸方

甜葶蘆

隔紙炒 壹分

大黃

剉炒 兩

人參

兩

右三味搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每服溫水

下二十九以利益為度

治傷寒熱毒所加卒然心中滿氣喘急發熱心戰意黃

九

大黃

半兩 生剉

朴消

壹分 別研

一盞半煎至一盞

右二味用水二大盞漬大黃一宿次旦煎至一盞去

滓下朴消攪令勻不計時候溫分三服快利即差

治傷寒急黃梔子人湯方

梔子人

芫胡

苗 壹分

朴消

別研

茵陳蒿

各半 兩

右四味除朴消外各細剉用水三大盞煎二大盞去

滓下朴消攪令勻不拘時候分溫三服取利為度

治時氣急黃疼痛茵陳蒿散方

茵陳蒿

黃芩

去黑 心

梔子人

大青

各壹 兩

大黃

剉

朴消

各伍 兩

白鮮皮

葛根

剉

升麻

各壹 兩半

石九味搗羅爲散每服二錢匕新汲水調下得利卽

差

治時氣面黃腹堅氣急言語錯亂茵陳黃芩湯方

茵陳蒿

大黃蒸過

生麥門冬去心

梔子人各肆兩

青黛

升麻各參分

黃芩去黑心

右七味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓下芒消末半錢匕更煎一二沸溫服

傷寒發豌豆瘡

論曰凡傷寒熱毒內盛多發胞瘡者以病人裏實表虛故也裏實則毒氣不能內消表虛故乘虛發於肌肉而成瘡也其瘡大小形如豌豆其色或白或赤若頭作癩漿戴白膿者其毒則輕若紫黑色作根隱隱在肌肉裏者其毒則重甚者周而徧身五內七竅皆有也

治傷寒天行壯熱頭痛發瘡如豌豆石膏湯方

石膏碎貳兩

芫胡去苗

虎杖各壹兩

知母兩半

芍藥兩壹

山梔子人參分

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服

治傷寒熱病生豌豆瘡并胞瘡煩悶昏迷參麻湯方

玄參

兩

升麻

參分

犀角

鎊半

乾藍葉

兩

甘草

參分

右五味搗篩每服五錢匕水一盞半入葱白三寸

豉一百粒同煎至一盞去滓溫服日二

治傷寒天行熱病毒氣稍盛生豌豆并胞瘡煩躁迷悶

二黃湯方

大黃

剉炒

黃芩

去黑心

麥門冬

法心

芍藥

各壹兩

甘草

炙剉

大青

半斤

入豉肉裏

右六味搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服

治傷寒發豌豆瘡四邊赤腫方

胡荽

壹兩

生地黄

壹兩

水一盞人短一百餘煎

右二味細切搗絞取汁空心頓服一盞許

治傷寒熱盛發豌豆瘡升麻湯方

升麻

兩

大黃

剉炒

黃連

須去

甘草

參分

山梔子

人兩

一盞半煎至八分去

右五味搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服日二

兩

和黃

太厚

黃連

去心

治傷寒熱病發豌豆瘡未成膿者方

黃連

兩

去須壹盞煎至一盞食後服

右一味細剉水一盞煎至七分去滓食後溫服

治傷寒熱毒氣盛發瘡如豌豆犀角湯方

犀角兩 磅貳

麻黃去根

黃連去須各壹兩半

木香兩

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服

治傷寒天行壯熱頭痛發瘡如豌豆偏身大青湯方

大青兩

山梔子人

犀角各兩

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞入豉一百粒煎

至七分去滓溫服

治傷寒熱毒發瘡如豌豆牡丹湯方

牡丹皮兩

山梔子人

黃芩去黑心

前胡大黃 主頭昏赤香粉以麻黃麻黃去根

右六味等分到如麻豆大每服三錢匕水一盞煎至

七分去滓溫服

治傷寒發斑豆瘡欲出化毒湯方

甘草壹兩

黃連去須各壹分

右二味剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八

分去滓溫服不計時發

治傷寒時行熱毒發瘡頭面及身須臾周匝狀如火瘡

皆帶燥聚隨沒隨生去隨面火食聚與固而燥成火發

冬葵菜腫脹不情蒜薑多少不以

右二味拌勻初患急食之不早治殺人既差後瘡癩

色黑彌熾疔滅此是惡毒時氣也

治傷寒熱病欲奎豌豆瘡者未宜令不成內消散方

小墨爐半盞

治在味用酒三合磨奪虛頓飲之調水一盞煎至

治傷寒熱病生庖瘡煩躁迷悶紫草飲方去毒

紫草并根細切 山慈竹人 實本去毒 百粒煎

治右一味藥持備每服豆錢七水一盞煎至七分去滓

散不計時候濕服紫草湯

治傷寒時氣發瘡如豌豆煩悶竹葉湯方不詳制

苦竹葉切 小麥各貳兩 石膏碎參兩

又右三味麤搗篩每服五錢七水一盞牛煎至一盞去

滓溫服不計時候

治傷寒時疾發豌豆瘡及赤瘡子未透心煩狂躁氣喘

妄語或見神鬼龍腦丸方五錢

龍腦壹錢

治右一味細研旋滴豬心血和丸如雞頭實大每服一

丸紫草湯化下煎豆膏三五箇煎畢此方不出黑

治傷寒熱病初出豌豆瘡三五箇便服此令瘡不出黑
散子方

臘月豬糞

右一味以新砂瓶子盛瓦蓋口炭火燒令通赤取出

安地上出火毒入乳鉢研細每服空心新汲水調下

三錢七

又方

青黛鹽分

右一味研細每服新汲水調下一錢七不拘時候

治傷寒發斑疹豆瘡紫草湯方

紫草

荆芥穗

惡實鐔六代去

右三味麤搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓

溫服

傷寒發狂

論曰重陽者狂謂陽氣獨盛也傷寒熱毒既盛內外皆
熱則陽氣憤嗔而發爲狂越其病使人狂走妄言或罵
詈不避親疎或妄見妄聞甚則至於棄衣而走登高而
歌或數日不食踰垣上屋者蓋四肢諸陽之本也熱盛
而四肢實是爲重陽故所上之處皆非素所能而病乃
能也若乃因火爲邪而發爲驚狂及內有瘀血而外證

如狂其為病雖不同然其為陽氣有餘則一也
治傷寒欲發狂解毒止躁苦參飲方

苦參

黃芩

去黑心
貳兩

甘草

炙半兩

右三味搗為麤末每服三錢匕水一盞煮煎至七分去滓入生地黃汁約半合攪勻去滓溫服不計時候

治傷寒熱結在內心神恍惚狂妄夫黃湯方益內快背

大黃

芒消

桂

大腹皮

甘草

木通

桃人

右七味麤搗篩每服四錢匕水一盞煎至六分去滓

溫服不計時候以通利為度

治傷寒九日至十日頭眩掉大涎出恍惚狂走眼見神
鬼犀角湯方

犀角

茵陳

茯苓

芍藥

麥門冬

生乾地黃

梔子

木通

蘆根

右七味麤搗篩每服五錢匕用水一盞半入竹葉三七片同煎至八分去滓食後溫服

治傷寒心熱狂妄精神不安龍齒散方

龍齒

丹砂

牛黃

馬牙消

地龍炒各兩

麝香研壹錢

右六味搗研為散每服一錢匕以生薑蜜水調下不

計時疾

治陽毒發狂及癩邪狂走千金丸方

一錢半入酒漿二

豬血壹盞生用

不灰木為末

藍根連葉為末各壹兩

水銀壹錢以錫沙子結沙子

雞子參枚只用清

膩粉錢半黃粉兩半

右六味除豬血雞子清外細研入豬血雞清拌和令

勻入瓷罐子內封閉臘日合之掘地坑一尺培候端

午日取出旋丸如雞頭大每服一丸生薑泔及紙漿

水化破服

治傷寒脉浮醫以火劫之亡陽必驚狂救逆湯方

桂去毒皮

蜀漆各壹兩半

甘草炙壹兩

牡蠣熬貳兩半

龍骨貳兩

右五味剉如麻豆大每服五錢匕以水一盞半入生

薑半分切大棗二枚擘破同煎取七分去滓溫服

治傷寒後狂言欲走口乾或時吐逆人參湯方

人參

羚羊角屑

葛根剉

竹筴

前胡去蘆頭

麥門冬去心焙各半兩

甘草炙分

半夏湯洗去滑炒乾半兩

右八味麤搗篩每服五錢匕用水一盞半入生薑一

分拍碎棗三枚擘破同煎至八分去滓食後溫服

治傷寒過經不解熱結在裏狂言不定煩躁欲走柴胡湯方

柴胡去苗

大黃剉

枳實

枳殼去瓢

枳實剉

甘草炙

兩

右五味麤搗篩每服三錢匕以水一盞煎取六分去滓溫服未利再服

治傷寒發汗後熱毒未盡因有所驚狂言欲走羚羊角湯方

羚羊角屑

犀角屑

防風去

茯神去

黃芩去

玄參

升麻各半

龍齒兩

甘草兩

前胡兩

竹筴各半

地骨皮洗

人參各半

右六味剉味麤搗篩每服五錢匕用水一盞半煎至八分去滓溫服

治傷寒心狂欲走緣風熱毒氣內乘于心所致香豉湯方

香豉一升

芒消一升

白礬一升

其

右三味每取豉半兩先以水一盞煎取七分去滓下

芒消末三錢匕再煎三兩沸空腹分溫五服如人行

三里更二服日夜可四服但初看是風狂者宜暫縛
兩手足三服之後解之即無不愈者原方去藥不
治傷寒太陽病六七日表證仍在脉微沈反不結胸其
人發狂者以熱在下焦少腹當鞭滿小便自利者下血
乃愈所以然者以太陽隨經盡瘀熱在裏故也抵當湯
方八

水蛭拾枚

蠱蟲拾枚

大黃酒洗

兩

炒

桃人尖雙

去皮

人參

各

右四味剉如麻豆每服五錢匕以水一盞半煎取八
分去滓溫服醉時嘗下血不再服之

治傷寒發狂欲走是毒氣壅於上焦毒熱不散狂盛者
俱縛手脚恐自刑害及走趁入其脉左寸洪數時時狀
地朴消湯方

朴消燒令白

於濕地紙

二錢

散

香

山梔子

人

分壹

右三味麤搗篩每服三錢匕以水一盞煎至半盞去
滓空腹溫服如人行十里再一服如利即止

治傷寒狂言欲走大小便不通腹痛脹滿大黃湯方

大黃細剉

木通剉

木香

白芷

各

升麻

羚羊角屑

白茅根

剉

黃芩 去黑心
各半兩

右七味麤搗篩每服五錢匕用水一盞半入葱白五寸同煎至八分去滓溫服

治傷寒陽盛發狂大便不通腹脹滿欲走鬱金散方

鬱金

細切

大黃 細切

桂 去麤皮
半兩

甘草 炙
一分

右五味搗羅爲細散每服二錢匕食後煎蔥豉湯調下

治傷寒得汗熱毒不解心煩躁悶言語不定小便赤澀大便不通狂悶欲走方

大黃 細切

朴消 研各
貳兩

黃芩 去黑心

山梔子 人

沃青 各壹
兩半

龍膽 去土

苦參 各壹
兩

右七味搗羅爲細末鍊蜜和成劑更搗三五百杵丸如梧桐子大每服二十九食後煎麥門冬湯下量病勢更加丸數

勢更加丸數

治傷寒時行發狂妄見神鬼金薄九方

金薄

銀薄 各壹
拾片

鐵落 用水淘去沙
泥取鐵粉肆

兩

青黛 兩

砒霜 兩

麝香 半

末人研米研細水調服

右六味研爲細末入糯米粥爲丸如皂莢子大新水磨下一丸如人行五里吐出涎立効

治傷寒熱實發狂煩躁悶亂不灰木散方

不灰木貳兩

滑石

寒水石

藍根

甘草生各壹兩

右五味搗研爲散每服二錢匕研生粟米泔入乳糖

一塊如棗大同化調服不拘時候

治傷寒發狂眼通赤大小便血出身如金色兼治六七

日狂躁發熱絳雪丸方

消石壹兩

丹砂

壹兩

黃芩

右二味同研如粉燒粟米飯和丸如彈子大每服一

丸沙糖冷水化下服藥後便睡移時汗出爲効

傷寒剛瘧

論曰太陽病發汗過多因致瘧其狀令人搖頭發熱頸項強急腰身反張或瘵瘵口噤但謂之剛瘧者特以其無汗而反惡寒故也

治太陽病無汗而小便反少氣上衝胸口噤不得語欲

作剛瘧葛根湯方

葛根剉肆兩

麻黃

去根節剉芍藥各參

桂皮去麩

甘草

炙各貳兩

右五味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半生薑五片棗二枚擘破同煎至七分去滓溫服取微汗

治剛痊胸滿口噤卧不著席兩脚掣急斷齒大承氣湯

方

大黃剉肆兩

厚朴去麤皮生薑汁炙半斤

枳實去蘂炒壹兩

右三味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至

七分去滓入芒消末半錢匕再煎一兩沸溫服

治傷寒剛痊身熱仰目頸痛項強石膏湯方

石膏碎

前胡去蘆頭各壹兩

犀角鎔

防風去

芍藥各半兩

龍齒研分

牛黃研壹錢

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入豉一百粒

蔥白五寸煎至八分去滓不以時溫服

治傷寒剛痊渾身壯熱頭疼口噤筋脉拘急心神躁悶

羚羊角湯方

羚羊角鎔

百合

芎藭

木通剉

葛根剉

升麻

去黃芩去黑心各半兩

石膏碎壹兩

龍齒

防風去各半兩

各半兩

右一十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞

去滓不拘時溫服日再

附註

治傷寒剛瘕仰目壯熱筋脉不舒牙關緊噤不欲見食

羚羊角升麻湯方

附註

羚羊角銹

升麻

白鮮皮

龍齒各半

木通到

百合各心

附註

防風去效各

石膏兩

附註

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半或一百粒葱

白五寸煎至一盞去滓不拘時溫服

治傷寒剛瘕身熱不渴煩悶頭疼龍齒湯方

龍齒搗

前胡去蘆頭各半兩

犀角銹

木通到

黃芩去黑心各壹分

牛黃研半錢

右六味除牛黃外各細剉分作二服每服用水一盞

半煎至八分去滓入牛黃一字攪勻不拘時溫服

治傷寒剛瘕閉目合面肢節急強身熱頭疼羌活湯方

羌活去蘆頭

王不留行

桂去皮

黃松節炒各壹兩

當歸切

茯神去木各壹兩

防風去

荆芥穗各半兩

麻黃去節

石膏各壹兩半

右一十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分

去滓不拘時溫服良久以葱豉粥投出汗未汗再服
以差為度

治傷寒剛痊通身壯熱龍齒犀角湯方

龍齒

犀角 鎊

前胡 去蘆頭
各壹兩

牛黃 壹錢
半

右四味將三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至

八分去滓入牛黃少許不拘時溫服

治傷寒剛痊壯熱頭痛筋脉不能舒展犀角大黃散方

犀角 鎊

大黃 剉妙各
壹兩

芎藭 半兩

石膏 貳兩

牛黃 分半

右五味搗羅四味為散入牛黃同研令勻每服一錢

匕不拘時煎淡竹葉湯調下

治傷寒剛痊無汗惡寒口噤背強小續命湯方

麻黃 去根節煎桂
去蘆

甘草 炙各
半兩

防風 去叉壹
分半

白朮

人參

芎藭

附子 生去
皮臍

防已

黃芩 去黑心
各壹分

右一十一味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至

一盞去滓入生薑汁少許再煎一二沸溫服日三夜

二若柔痙自汗者去麻黃夏病及病覺熱甚者減桂

枝一半冬及初春病去黃芩

傷寒柔痊

論曰柔痊之狀掣頭發熱頭項強急腰身反張或癱瘓口噤與剛痊同然謂之柔痊者特以其自汗不惡寒故也痊又謂之痊者蓋痊痊一類古人特以強直名之

治傷寒柔痊項背強八八反汗出惡風桂枝加葛根湯

方

葛根兩

麻黃

去節 煎掠

芍藥各 兩

甘草

炙

桂

去 皮

石五味搗麴篩每服五錢匕水二盞入生薑五片大

棗兩枚擘破煎至一盞去滓溫服良久再服以衣被

覆微汗出差不須啜粥

治傷寒柔痊手足厥冷筋急汗不止桂朮湯方

桂

去 皮

白朮

人參

附子炮裂去 臍 防風去

乾薑炮

甘草

炙 各 半 兩

右七味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至八分

去滓溫服日二服

治傷寒柔痊手足逆冷筋脉拘急汗出不止頸項強直

掣頭口噤附子白朮湯方

附子炮裂去皮臍 白朮各壹兩 芎藭參

獨活去蘆 桂去粗皮 各半兩

右五味剉如麻豆每服三錢匕水一盞入生薑半分

拍碎棗二枚擘破同煎至七分去滓溫服不計時候

治傷寒柔痙汗出身體強直手足多寒五味子湯方

五味子炒壹兩 附子炮裂去皮臍 木香

檳榔各參分 白朮 桂去粗皮

乾薑炮 甘草各半兩

右八味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至八分

去滓食後溫服晚再服

治傷寒柔痙身體強直汗出不止腹內急痛附子散方

附子炮裂去皮臍 乾薑炮 甘草剉

桂去粗皮 人參各半兩

右五味搗羅爲散每服二錢匕以薑粥飲調至不拍

時

治時行及傷寒後虛憊發即閉眼合面者柔痙之候也

手足厥冷筋脉急強汗出不止薑木湯方

乾薑炮 白朮 桂去粗皮 各壹兩

附子炮裂去皮臍 甘草各壹兩 防風去粗皮

石六味剉如麻豆每服五錢匕用水一盞半煎至八

分去滓溫服

治傷寒柔痙四肢逆冷汗不止腹中痛筋脉急此胡飲

方

此胡苗去

赤茯苓去黑皮各參分 檳榔剉

五味子炒各半兩

桂去皮 高良薑剉

羌活去蘆頭各壹分

右七味麤搗篩每服五錢七用水一盞余煎至八分

去滓溫服

治傷寒柔痙病經三日不差恐陰氣攻五藏致損茯苓

湯方

大蘇赤茯苓去黑皮

五味子炒

麥門冬去心焙各貳兩

此胡苗去兩半

桂去皮壹兩

檳榔剉

細辛去苗葉各半兩

右七味麤搗篩每服四錢七水一大盞煎至六分去

滓溫服

傷寒論卷之六

大德重校聖濟總錄卷第二十八

傷寒論卷之六

大德重校聖濟總錄卷第二十九

傷寒門

傷寒壞病

傷寒狐惑

傷寒百合

傷寒陰陽易

傷寒鼻衄

傷寒壞病

論曰傷寒大陽病三日已發汗若吐若下若溫針仍不解者多變爲壞病又太陽病轉入少陽已吐下發汗少陽證罷此爲壞病知犯何逆以法治之此皆由傷寒病在諸經絡發汗吐下而病證不除又感異氣氣有寒暑燥濕風不同病亦隨變故謂之壞病又有傷寒過經再受熱邪留蓄藏府病候多變者及傷寒解後虛羸少氣餘證未除者皆謂之壞病也

治傷寒壞病差後或十數日或半月二十日終不惺惺精神昏語言錯又無寒熱醫或作鬼崇或作風疾多端

治癩弗效或朝夕潮熱頰赤或似瘡皆由發汗不盡餘毒在心包絡間所致知母麻黃湯方

知母

焙壹兩半

麻黃

去根節煎掠去沫

甘草

炙

芍藥

黃芩

去黑心各半兩

桂

去皮半兩盛暑中可減半

右六味剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服半日內可相次三服溫覆取汗未汗再服若心煩不眠欲飲水者當稍稍與之令胃中和即愈

治傷寒壞病經數日未差諸藥不能除升麻湯方

升麻

龍甲

醋炙去裙襴

枳殼

去瓤炒

犀角

葛根

黃芩

去黑心各參分

甘草

前胡

去蘆頭

烏頭

炮裂去皮臍各半兩

右九味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓下地黃汁二合攪勻食後溫服

治傷寒壞證經半月不解龍甲湯方

龍甲

醋炙去裙襴

芫胡

去苗

升麻

枳實

細剉去瓤炒

犀角

鎊

黃芩

去黑心各壹兩

甘草

烏梅

肉各半兩

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓下地黃汁二合攪勻食後溫服

治傷寒壞病醫所不能治熱在胸中不能言語麥奴丸方

麥奴

釜底墨

竈突墨

梁土塵

大黃炒

黃芩去黑心

朴消研各半兩

麻黃去根節壹兩

右八味搗研為末鍊蜜和搗三五百杵丸如彈丸大每服一九新汲水研下如渴當極飲水不欲水亦強

飲之須臾必寒寒已汗出差

治傷寒壞病冷熱相搏心下結胸滿氣急大便秘不利體變黃青黑如桃枝色四肢逆冷熱結在內者不可服湯

飲宜麝香丸方

麝香研

豬苓去黑皮

朴消研

薤花炒

芫花醋炒各壹分

大黃炒

商陸

甘遂炮各半兩

木香

右八味搗研為末鍊蜜和搗三五百杵丸如菘菹大每服十九食前溫湯下良久必利未利再服

治傷寒壞病頭與骨肉俱痛狂言妄語醫所不療者黑

奴丸方

麻黃去根節兩半

黃芩去黑心

甘草炙

竈突墨

芒消各壹兩

三豎豎壹拾

豎壹拾

右六味搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸如彈子大
每服一九新汲水研下不拘時候甘草

治傷寒壞病大効丸方

烏頭

附子

各壹兩貳味去皮礱為末用
醃壹升煎盡為度又入好酒

壹升再煎成
膏後入諸藥

烏蛇皮浸去
皮骨炙

細辛去
葉

厚朴去
薑汁炙

人參

赤茯苓去
皮 澤豆大

桂皮去
蠹

乾蠍炒
去

木香

乳香研

葶豆蔻去
皮

硫砂研

胡桐淚

檳榔剉

膩粉

不灰木各壹
分

右一十七味將一十五味搗研為末入五味薑子內
和搗丸如梧桐子大每服十九丸如陽盛研牛黃膩粉
煎水下如陰盛發厥心胸結痞煎柳枝湯下治傷寒
治傷寒壞病經久不差潮熱不退身體沉重昏憤煩悶

麥門冬湯方

麥門冬

去
心

赤茯苓

去
皮

鼈甲

去
殼

甘草

剉

三錢

木

一

大

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞烏梅一箇小麥

五十粒同煎至七分去滓溫服不拘時候

治傷寒壞病潮熱頰赤口乾煩躁神思昏塞經久不差

前胡湯方

前胡

去薑頭
或兩

此胡

去
常山

人參

葛根

剉各
一分
甘草
參分

右六味搗篩每服三錢匕水一大盞烏梅一箇椎

碎生薑三片煎至七分去滓溫服不拘時候

傷寒狐惑

論曰狐惑之病或初得狀似傷寒或因傷寒而變然皆
蟲證也蟲食其喉為惑使人聲啞蟲食其下部為狐使
人咽乾其候皆默默欲眠不得卧起居不安惡飲食而
日乍赤乍白乍黑是也此由傷寒病腹內熱飲食少腸
胃空虛而蟲為之不安故隨所食上下部而病名狐惑

也

治傷寒變成狐惑其脉數無熱微煩默默但欲卧汗出
得之三四日眼赤得之七八日目四眦黑能食者膿已
成也宜赤小豆當歸散方

赤小豆

壹升水浸令
芽生焙乾

當歸

切焙

右二味搗羅為細散每服二錢匕漿水一盞煎五七

沸和滓溫服不拘時

治傷寒不發汗十日以上成狐惑病腹脹面赤惡聞食

臭羚羊角湯方

羚羊角 鎊

大腹 井皮子

茈胡 去苗

朴消 各半

葵藜 分參

石膏 碎

桑根白皮 剉各壹兩

右七味廔搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服不拘時

滓溫服不拘時

治傷寒不發汗後變成狐惑脉數無熱微煩目赤但欲

眠睡咽乾不能食黃芩湯方 用四背果湯食後服日

黃芩 去黑心

射干 各壹兩

黃連 去須炒

甘草 炙

前胡 去蘆頭

青竹筴

知母 焙各半兩

右七味廔搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後溫服

滓食後溫服

治傷寒發汗後變成狐惑毒氣發盛惡聞飲食咽中乾

痛胸脇滿悶犀角湯方 用犀角一兩半煎米一盞煎

犀角 鎊分參

黃連 去須炒

芍藥

木通 剉

木香 剉

枳實 去穢炒

射干 剉

人參 日乾

半夏 湯洗半兩

右九味廔搗篩每服五錢匕水一盞半生薑一聚大

拍碎煎至八分去滓食前溫服

治傷寒狐惑羸病挑人湯方

桃人去皮尖 槐子

艾各壹兩

右三味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半棗三

枚擘破煎至八分去滓溫服一盞半主盛一棗大

治傷寒狐惑咽喉澀痛唇口破唾膿血知母湯方

知母焙壹兩

石膏貳兩

黃芩去黑心

甘草炙到各參分

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半糯米一匙煎

至八分去滓食前溫服每服後宜溫酒煖食即中

治傷寒病後有滄出下部黃連犀角湯方

黃連去須半兩

犀角剉壹兩如無

以北麻代之無半煎至八分去

烏梅柒枚

木香壹兩

饑羊食代

右四味咬咀如麻豆大每服三錢匕水一盞煎至六

分去滓溫服

治傷寒陰陽不和變成狐惑目如鳩赤面色斑紋如錦

木通湯方

木通到壹兩

吳茱萸湯洗參桂去麤皮

細辛去苗葉各半兩

甘草參分

水一盞半煎一棗大

右五味搗篩每服五錢匕水一盞半棗二枚擘破

蔥白五寸煎至八分去滓食前溫服

治傷寒不發汗成狐惑六七日不解寒熱來去胸脇滿

痛默默睡臥不欲食心煩善嘔腹痛前胡湯方

前胡去蘆頭

半夏壹兩半湯洗

黃芩去黑心

甘草炙各一分

人參壹兩一分

石五味麤擣篩每服五錢匕水一盞半生薑一棗大

拍碎棗三枚擘破煎至八分去滓空心溫服

治傷寒發汗不解變成狐惑寒熱無常心中躁悶不欲

飲食半夏湯方

半夏湯洗洗去

木通剉

桃人湯浸去皮

附子炮裂去

桂皮去

葛根一客煎至六

枳殼去瓢炒

黃芩去黑心

羚羊角銚壹分

大升麻壹分

麻黃去根節

白芍藥壹分

右一味一味剉如麻豆每服五錢匕水六盞半生薑

一棗大拍碎煎至八分去滓溫服

治傷寒不發汗變成狐惑病在陽曰惑在陰曰狐其狀

默默眠睡起則不安喉中乾燥惡聞食臭其面或赤或

白語聲微弱先宜服此薰草湯方

零陵香

黃連去須炒

只用薰草湯方

右二味剉如麻豆大平分三服每服用漿水三盞浸

藥一宿煎至一盞去滓食前溫服日再

治傷寒狐惑下部蠱瘡雄黃導氣散方

雄黃 研

青箱子

苦參

黃連 各半 兩

桃人 去皮尖雙入再炒研壹分

右五味搗研為散以生艾搗汁和如棗子大綿裹導下部篇蓄汁和更佳冬月無艾只用散綿裹亦得

治傷寒發汗下利不解心中躁悶復熱發壯熱大腸不通咽中乾痛變成狐惑皂莢丸方 開食具此曲丸成也

皂莢 貳挺去皮子 火炙

大黃 半兩 用心其根

檳榔 剉

木香 各壹分

右四味搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服二十九生薑茶清下不拘時日再

治傷寒狐惑微煩默默欲臥毒氣上攻咽乾聲啞下蝕濕蘊或便膿血雄黃丸方

雄黃 研

當歸 剉炒各壹分

盧會 研

麝香 研各壹分

檳榔 剉半

右五味搗研為末煮麩糊和丸如梧桐子大每服十五丸至二十九食前溫粥飲下日三

治傷寒狐惑神思昏悶大便難肌膚熱此胡散方

此胡 剉

大黃 剉

赤芍藥

檳榔 剉

枳實 剉炒去麩 各壹兩 半夏 半兩 薑汁浸令透焙

右六味搗羅為散每服二錢匕濃煎苦楝根湯調下

米飲亦得

治傷寒狐惑蝕上部則聲啞甘草瀉心湯方

甘草炙肆兩

黃芩去黑心

人參

乾薑炮各參兩

黃連去須

半夏湯洗去滑染宿暴乾貳兩

右六味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半牛薑

二棗大拍碎煎取八分去滓溫服日再

治傷寒不發汗變成狐惑毒氣上攻喉咽疼痛下痢不

止地榆湯方

地榆

黃連去須

木香各半兩

白朮壹分半

甘草剉

阿膠炙燥各壹分

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑一棗大

拍碎煎至八分去滓食前溫服

治傷寒狐惑病在上焦撩膈湯方

苦參壹兩

甘草生用

右二味細剉用漿水一盞半煎至八分去滓五更初

服良久卽吐

治傷寒狐惑毒攻下部肛內生瘡熏洗四皮湯方

槐白皮

柳白皮

桑白皮

右四味等分各細剉每用四兩以漿水一斗煎至七

右四味等分各細剉每用四兩以漿水一斗煎至七

治百合傷寒已經下後百合滑石代赭湯方

多入百合味破以百滑石破兩其代赭如彈丸大

右三味先以水洗百合漬一宿白沫出去其水更以新汲水二盞煎取一盞去滓別用新汲水二盞煮滑石代赭取一盞去滓後合和重煎取一盞半分溫再服

治百合傷寒病吐之後者百合雞子湯方其味

百合味破 雞子黃一枚

右二味先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以新汲水二盞煎取一盞去滓內雞子黃攪勻分溫

再服合煎

治百合傷寒已經汗後百合知母湯方合半夏湯方

半百合味破 知母兩

右二味先將百合擘碎用新汲水二盞浸一宿當有白沫出去却沫水了却用新汲水五盞煮百合取汁一盞去滓盛於淨器中又將知母亦用新汲水二盞煮取一盞去滓後將百合知母汁相和同煎取一盞半分不計時候分溫作二服

治百合傷寒病變發熱百合滑石散方

滑石兩 石膏兩 甘草兩 白朮兩 芍藥兩 茯苓兩 黃芩兩 滑石兩 石膏兩 甘草兩 白朮兩 芍藥兩 茯苓兩 黃芩兩

右二味精羅為散更入乳鉢研如粉每服空心米飲調下二錢九日二服當微利即住服

治百合傷寒病已經吐下發汗病形如初者百合地黃湯方

百合漿散

生地黃汁證

右二味先以水洗百合漬一宿白沫出去其水更以

新汲水二盞煮取一盞去滓內地黃汁再煎取一盞

半分溫再服中病勿更服大便當如溲

治百合傷寒病不差不思食欲成勞百合半夏湯方

百合兩

半夏

湯洗漿偏乾令乾入參

赤菴苓皮黑

黃連去須剉

知母各壹兩

生乾地黃兩半

右七味蟲檮節每服五錢匕用水一盞半入生薑一

分拍碎同煎至八分去滓食後溫服日二

治百合傷寒病久不差不思食欲成勞百合此胡湯方

百合兩

此胡去

知母焙

黃連去須剉

秦艽去苗

栝樓根各壹兩

甘草半兩炙赤

右七味蠶檮節每服五錢匕水一盞半生薑半分拍

碎煎至七分去滓食前溫服日三

治百合傷寒病似勞形狀如瘡百合紫苑湯方

百合

紫苑去苗

此胡去苗

杏人

湯浸去皮尖
雙入炒令黃

白茯苓

去黑皮

甘草

多令
微赤

右六味等分廩搗篩每服五錢匕水一盞半生薑半
分拍碎煎至七分去滓空心溫服日晚再服

治百合傷寒病補陰養陽厚朴散方

厚朴

去麩皮薑汁
炙令紫黑色

桃人

去皮尖雙入
研黃別研

杏人

去皮尖雙入炒令
黃別研各壹兩

紫石英

別研

白鮮皮

五加皮剉

桑根白皮

剉

右七味搗研爲散更入乳鉢一處研如粉每服食前
用葱白糯米煎湯調下二錢匕日二舉白米四瓠餅

治傷寒差後已經二七日潮熱不解將變成百合病身
體沉重無力昏如醉狀百合前胡湯方非太早不卦合

生百合

參枚
洗

前胡去蘆

麻黃

去節各
壹兩半

葛根

剉

生麥門冬

去心

石膏

參兩

右六味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎取

七分去滓溫服後如食頃再服

治百合傷寒兼下痢不止心中幅幅堅而煩嘔半夏湯

方

半夏參兩湯洗米偏焙今乾

黃芩去黑心

百合各壹兩半

乾薑炮裂

黃連去須剉微炒

人參各壹兩

甘草炙令赤到半兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑半分拍

碎棗三枚擘破煎至七分去滓食前溫服日二

傷寒陰陽湯

麻黃壹兩半

論曰凡傷寒大病之後氣血未復若房事太早不特令病人勞復因爾染易男病傳女女病傳男猶轉易然故名曰陰陽易其狀身熱衝胸頭重不能舉目眩四肢拘急苦小腹急痛力弱著床不能轉側舉動憑人若不即

治則死或經歲月漸至羸困亦死

麻黃壹兩半

治傷寒大病差後復勞陰陽湯枳實湯方

枳實去穢炒

梔子人各壹分

豉貳合兩

雄鼠糞壹柒枚微炒

梔子人各壹分

右四味麤搗篩用淘米泔二盞先煎取一盞半後下

藥再煎取八分去滓食前分溫作二服未效再服

治傷寒陰陽易驚氣欲絕荆芥湯方

荆芥穗兩

雞臍脰兩

桑螵蛸剉炒

鼠壹枚和皮骨燒灰別研

右四味以三味麤搗篩每服五錢匕用水二盞入葱

白薤白各二莖切煎至一盞去滓下鼠屎末一錢匕攪令勻空心溫服日晚再服

治傷寒後未平復強谷陰陽毒氣感動身體熱氣衝胸頭重不能舉四肢拘急小腹痛或即筋脉舒緩氣力疲乏眠卧著牀不能搖動甚者手足拳即死末香丸方

木香禮禮論田犀角屠二醫求生乾地黄對可

萎蕤各參列杜仲去蘊史炙沉香到不特令

白朮各參若青研各壹當歸切焙各壹

茵陳酒浸去知母各壹枳實去枳殼去

肉蓯蓉酒浸去枳實去枳殼去橫榔到人若不即

覆香子炒人參到白茯苓去黑皮

附子炮裂去皮

右一十八味擣羅為細末鍊蜜和九梧桐子大每服三十九空心溫酒下

治傷寒陰陽易一身疼重少氣小腹急或引陰中拘攣熱上衝胸頭重不欲舉眼中生花或膝脛拘急燒禪散方

婦人中禪燒作灰婦人病取男者

右一味細研水服方寸匕日三小便利陰頭腫為愈治傷寒後陰陽易身體重小腹裏急陰頭微腫立効湯

方

韭韋握
細切

雄鼠糞貳枚
炒

右二味都用水三盞煎至二盞去滓不計時候一日
令盡汗出即愈

治傷寒後陰陽易頭痛壯熱石膏湯方

石膏貳兩
研

荆芥穗壹兩

青竹筴半兩

右二味搗麤篩每服三錢七用水一盞煎至七分去
滓食後溫服

治傷寒後陰陽易小腹拘急陰腫身體熱毒氣衝心胸
頭重不能舉萎蕤湯方

萎蕤壹兩

桂去粗皮
半兩

木一木香
參生一盞去

雄鼠糞貳枚
炒

荆芥穗半兩

右五味搗篩每服五錢七用水一盞半煎至一盞
去滓食前溫服日再服以差為度

治傷寒後陰陽易頭重百節解吸少氣者牀不能操
動甚者手足拳陰腫豐本湯方

韭根洗切
焙

栝樓根各貳兩

青竹筴半兩

乾薑等各
半兩

雄鼠糞炒
壹兩

右五味搗搗篩每服五錢七用水一盞半煎至一盞
去滓食前溫服

治傷寒陰陽易工灰散方

手足指甲貳拾片男病用女中衣襠壹疋男病

病用男者

右二味並燒作灰研令細分三服不計時候溫酒調

湯方

治傷寒未平復陰陽交易壯熱頭痛或鼻中出血犀角

湯方

犀角鈔屑壹兩石膏研碎參兩竹茹切頭至一盞

葛根切頭至一盞丹參各壹兩

右五味搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

面澤食後溫服

治傷寒後未平復合陰陽相易力劣汗出及鼻衄頭疼

杜仲散方

杜仲去麩皮炙牡蠣熬木一盞煎至一盞

右五味搗羅爲細散每服二錢匕食後濃煎麻黃根

湯調下日三服

傷寒鼻衄

論曰傷寒鼻衄者由熱氣蘊盛血液妄行蓋心主血肝則藏之肺主氣鼻則通之心肝爲熱邪所傷則血隨氣行所以從鼻出也昔人謂陽盛則衄者蓋陽盛則熱盛

熱盛則宜衄故傷寒太陽證衄血乃解謂是故也至於陰病則不宜衄蓋陰證自無熱安得而衄故少陰病但厥無汗強發之必動血從口鼻耳目出者是謂下厥上竭為難治也

治傷寒鼻衄脉微者黃芩芍藥湯方

黃芩

銹

心

芍藥

二錢

甘草

炙

黃芩

右三味礪搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

淋瀝服

治傷寒及溫病應發汗而不發汗內有瘀血鼻衄吐血面黃大便黑犀角地黃湯方

犀角屑

如卒無以升麻代之

牡丹皮

各壹兩

生地黃

斤

芍藥

分

一

一

一

一

右四味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓溫服有熱如狂者加黃芩去黑心二兩其人脉大來遲腹不滿自言滿者為無熱不用黃芩

治傷寒衄血不止茅花湯方

茅花

壹把

右一味剉碎以水三盞煎濃汁一盞分二服無花以

根代之

治傷寒熱病鼻衄不止或兼唾血黃連散方

黃連須去

伏龍肝

淡竹筍各參

黃芩去黑心

梔子人

甘草炙各

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑一棗大拍碎煎至八分去滓入生地黃汁半合亂髮灰半錢匕攪勻更煎一沸食後溫服

治傷寒鼻衄不止竹筍湯方

青竹筍

黃芩去黑心

蒲黃

伏龍肝各半

右四味麤搗篩每五錢匕水一盞半煎至八分去滓

下藕汁一合攪勻食後溫服

治傷寒鼻衄不止頭面俱熱犀角湯方

犀角燒

大青

甘草炙各

升麻燒 蘇葉各壹 小薊各壹

黃芩去黑心 芍藥各壹 生乾地黄壹

朴消各貳

右一十味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎

至八分去滓溫服

治傷寒鼻衄不止此是陽毒攻肺阿膠湯方

阿膠炙 黃芩去黑心 葱白連須

小鼓壹 艾葉炒 水一盞半煎至八分

右五味細剉分作二服每服用水一盞半煎至七分

去滓下生地黃汁一合攪勻食後溫服服法

治傷寒鼻衄及吐血心中堅鞭偏身疼痛四肢煩悶刺

薊湯方去滓煎服

六刺薊和知地咬生麥門冬心正生乾地黃焙各

雞蘇兩赤茯苓去黑皮青竹茹各半兩

右六味咬咀如麻豆大每服三錢匕水一盞生薑一

棗大拍碎煎至七分去滓食後溫服服法

治傷寒鼻衄不止黃芩湯方

治傷寒鼻衄不止黃芩湯方甘草黃芩各梔子人黃芩大

蒲黃人 荆芥穗各半兩 黃芩

右五味剉如麻豆大每服三錢匕水一盞半煎至八

分去滓溫服不拘時候羊角散

治傷寒鼻衄不止金黃散方人金黃散錢黃藥子

鬱金各甘草各半兩 黃藥子

黃藥子去毒皮炙 各壹分

右四味搗羅為細散每服三錢匕冷水調下不拘時

以此為度

治傷寒頭痛壯熱鼻衄不止釣藤湯方

釣藤人 桑根白皮剉 馬牙消各壹兩

梔子人

甘草炙各分

大黃炒各分

黃芩去黑心各

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞竹葉三七片煎

至六分去滓下生地黃汁一合攪勻食後溫服

治傷寒鼻衄不止竹筴湯方

青竹筴雞子大生地黃半兩

黃芩半兩

右二味以水一盞半煎至八分去滓食後溫服

治傷寒肺熱衄血不止羚羊角湯方

羚羊角鎊

犀角鎊

麥門冬去心

梔子人

紫苑去苗土各五分

牛黃研

指雲參各壹錢

人參

黃耆

甘草炙各半兩

赤茯苓去黑皮

白朮煎至八分

右十一味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八

分去滓食後溫服日二次

治傷寒內熱鼻衄痰壅吐逆前胡湯方

前胡去蘆 蘆薈各五分 甘草炙 白朮煎至八分

陳橘皮湯浸去白焙 大腹皮各五分 赤茯苓去黑皮

旋復花 桔梗炒各半兩 半夏湯洗各

石光味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑一棗大

拍碎煎至八分去滓食後溫服

治傷寒鼻衄去五藏熱毒黃土湯方

黃土當歸切 甘草炙 葶藶一棗入

芍藥

黃芩去黑心

芎藭各參

桂去粗皮 生乾地黃半 青竹筴兩

右九味麻葛篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓食後溫服

治傷寒鼻衄不止髮灰散方

髮亂髮 壹圓 如梳 麝香研 小水一盞 煎至八

右二味同研極細每服一錢匕新汲水調下又取少

許吹鼻中立差

治傷寒衄血心胸煩滿四生飲方

生地黃汁合

生藕汁合

生刺薊汁壹

生薑汁合

白藥子壹分

右五味和勻於銀石器中微溫過食後分二服

治傷寒鼻衄不止頭痛壯熱升麻湯方

升麻

雞蘇莖葉

芍藥各壹

青蒿

犀角銹各

芒消參

右六味屬搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

下地黃汁一合食後溫服

治傷寒鼻衄及一二斗不止苦藥散方

苦藥兩壹

右一味搗羅為細散每服一錢匕食後新汲水調下

治傷寒鼻衄地黃飲方

生地黃汁貳合 蜜貳合

右二味攪勻頓服

治時疾壯熱頭痛鼻衄不止生地黃飲方

生地黃汁 生藕汁 生薑汁

生蜜各貳合

右四味和勻分作三服每服微煎過食後臨臥服

大德重校聖濟總錄卷第二十九