

麻科活人

周
徽

贈

麻科活人全書卷之三

安成

璞齋謝玉瓊纂輯
阜山劉齊珍訂刊

咳嗽第五十

石陽周茂五書亭重刊

發熱蒸蒸咳嗽頻涕流鼻孔淚滿睛面浮眼腫雙腮赤
此是天行麻毒侵

發熱蒸蒸咳聲頻目腫面浮氣上行坐臥不安痰嚙少
肺葉焦舉熱邪蒸

麻症百聲咳不歇初熱未出正相宜不咳少咳皆不順
破咳須要用陳皮

正収収盡宜無咳此時有咳須早醫清金瀉火為急務
及待危時悔是遲

痲毒連綿上氣咳發作百聲終不歇胸高肩聳呷長流
擺手搖頭泉下客

天行痲疹與傷寒相似惟痲則噴嚏鼻涕跟胞
腫目淚汪汪之爲異耳但見此等症候真是痲症夫

痲原發於心心火內亢則肺金受剋以致肺葉焦舉

故有咳嗽法當清金瀉火以加味人參白虎湯見上

條去人參甘草粳米加牛蒡子連翹主之有用白虎

湯見上六條去甘草粳米加牛蒡子薄荷葉治之者或

以三味消毒散合瀉白散二方俱去甘草治之方中

桑白皮取採鮮者多用爲妙熱甚煩渴者加知母天

花粉石膏黃芩之類如咳甚者以二母散或麥門冬

湯除去升麻赤芍甘草或清肺湯去吉梗甘草加蘇
子或秘本清肺湯去吉梗甘草或薛氏清肺飲去柴
胡陳皮吉梗甘草等方隨見而用之然確宜清熱透
毒不可止咳故古人多用清揚飲子去甘草加連翹
主之慎勿用五味子及收斂等藥秘塞肺竅令咳嗽
終身不已只宜清餘熱消痰壅而咳自止貝母麥冬
飲除甘草吉梗加連翹牛勞子黃芩黃連之類前後
咳嗽俱可施用夫痲有咳則肺氣疏通毛竅開豁而
痲則易於出透所以痲症初熱未出之先最喜咳嗽
多咳則爲順候俚言所謂撲痲是也痲疹出透則心
經火息肺無尅伐而咳自止正出之際若無逆聲咳

嗽及少咳與不咳者則腠理閉密痲難透表急於升
發藥中多加留白陳皮以破其咳使毛竅開洩腠理
舒暢而痲自易出透矣已出之後及將收收後則又
以無咳爲佳如痲已出而咳不止身熱作渴煩燥不
食脉洪者以古方黃連解毒湯見三十一條加生地黃鮮
骨皮治之肺熱如咳喘者用生地黃散去陳皮加黃
芩葶藶桑白皮治之喘甚者加括蕁霜北芥子蘘子
萊菔子治之出盡及收後微微咳嗽者此餘邪未盡
肺氣未平也不須服藥若欲治之則以瀉白散合三
味消毒散俱去甘草與服如肺燥寒不利而咳者以
利金湯去陳皮吉梗甘草生薑加麥冬牛蒡子黃芩

桑白皮治之痲盡透而壯熱咳嗽大便閉者以除熱
清肺湯去赤芍甘草加黃連黃芩地骨皮火藤仁只
壳以清利之或加大黃下之如出盡及收後咳嗽甚
而仍不止者是屬於熱治宜清熱降火佐以消痰之
品以清咽滋肺湯去玉竹吉梗甘草加黃連枯黃芩
或聶氏清肺飲去陳皮柴胡吉梗甘艸加貝母黃連
至之出盡收後咳嗽不止而多痰者以清咽滋肺湯
去玉竹浙麥冬吉梗甘艸加只壳茯苓陳皮治之或
聶氏清肺飲去北柴胡吉梗麥冬加只壳治之若痲
至五六月而仍咳嗽氣粗外熱不退乃尙有餘毒留
於肺胃宜用孟介石清肺飲除僵垂柴胡陳皮吉梗

甘艸加地骨皮桑白皮葶藶治之或以靜遠主人清
肺飲去吉梗甘艸加石膏黃芩治之如痲後咳嗽聲
音不清不思飲食眼目不清昏口乾燥者以清肺消
毒化痰湯去吉梗甘艸治之若痲後氣喘咳嗽連聲
不任者此乃毒流於肺經肺中伏火金虛藥焦故咳
嗽連聲不任也以秘本門冬清肺湯或用骨皮清膈
散俱去吉梗甘艸糯米治之如體熱者亦以秘本門
冬清肺湯去甘艸吉梗糯米加黃連黃芩牛蒡子治
之咳嗽甚而氣喘連聲不任甚至飲食噎水者此熱
毒乘肺而然也亦以秘本門冬清肺湯去甘艸吉梗
糯米加蜜炙枇杷葉治之見血者再加茅根阿膠治

之如咳嗽有吐血者以麥冬清肺湯去查肉吉梗加
生地黄王之兼有噎水者亦以此方除查肉吉梗治
之如麻後咳嗽氣急者以只壳前胡湯除甘艸吉梗
以換了易換梗加芥子萊菔子葶藶括蕩霜以治之
然亦有加沉香者在麻後似亦無害如麻後但氣粗
者以聶氏清肺飲仍除柴胡吉梗甘艸加芥子蘘子
萊菔子葶藶治之如麻後咳嗽不止內熱不清心神
不寧夜卧不安以天真膏除黃芪白朮薏苡仁加酒
炒黃連酒炒黃芩辰砂王之如麻後咳嗽失聲發熱
者以葶藶丸加地骨皮天花粉酒炒黃連黃芩水煎
與服麻後咳嗽腹脹喘急煩燥泄瀉聲啞唇青口青

者以賈蘭峰傳方除麻黃陳皮吉梗甘艸白芍加麥冬骨皮芥子治之或不除白芍更加柴胡亦可此在麻後活法變通在乎其人然切不宜遽用白朮等味如麻後久咳不止以生地黃當歸身白茯苓川貝母

桑白皮杏仁栴霜等味以養血涼血清金而咳自止

然竟有以四物湯

見二十五條

合只吉二陳湯加括萋霜

杏仁治之者雖曰無碍反不若以前之七味治藥簡

而功捷也如兼渴者加麥冬只壳兼喘者加蘇子芥

子治之或更加葶藶菴葶子亦可其有感觸風寒咳

嗽煩悶嘔逆清水眼赤咽痛口舌生瘡者以防風敗

湯散

見第五條

加生黃芩治之如咳嗽氣喘唇焦熱結在

內煩燥不寧或口鼻出血不拘前後並宜以犀角解
毒化痰湯去赤芍甘艸加麥冬杏仁芩薤治之或用
聶氏清肺飲去陳皮柴胡淡竹葉甘艸吉梗加黃連
當歸尾治之收後如見此候以加味人參白虎湯見
十九條去人參甘艸糯米加生地黃地骨皮黃芩以
潤之倘或久咳不止面浮目腫胸高如龜肩聳氣喘
搖手擺頭口鼻出血面色或青或赤或白而枯鼻燥
昏悶者皆不治之症也

三味消毒散 治咽喉疼痛及痘疹已出未出與未出

勻又治一切瘡毒並能涼膈消痰

牛蒡子炒研荆芥穗二分甘艸五分

研末每用三錢水煎服

瀉白散 治喘嗽並脾經肺有熱目黃口不吮乳

桑白皮

炙

地骨皮

各一

炙甘艸

五分

糯米一百粒引水煎食後服

加人參白茯苓知母黃芩各加減瀉白散治肺炎喘嗽

二母散 治麻後咳嗽甚及肺熱咳嗽

知母

貝母

去心重

生薑一片引水煎服

或為末白水下一錢

麥門冬湯

即二十八條肉葛根麥門冬散去人參淡竹葉

麥冬

去

葛根

熟石膏

各二

茯苓

赤芍藥

酒炒各六分

升麻

炙甘艸

各四分

水煎服

清肺湯 治麻後咳甚

枯黃芩 貝母 知母 苦梗各七分 防風 炙甘草

各四分 水煎服

秘本清肺湯 治不時咳嗽寒熱唾紅

黃芩 當歸 麥冬 防風 赤茯苓 生地黄

連翹 蘇葉 前胡 吉梗 甘草各五分 桑白皮

一 水煎服

聶氏清肺飲 治麻後氣粗咳嗽

桑白皮炒蜜 地骨皮去骨各五分 麥冬去心一分 天花

粉元參各八分 柴胡六分 吉梗 黃芩炒酒 川木

通去皮七分 熟石膏 生地黃各一分 陳皮 生甘

艸去皮各
三分

淡竹葉燈心引水煎加羚羊角磨汁對服

清揚飲子 痘疹王方

西河柳各一分 麥冬 元參各二分 牛蒡子炒 葛根

知母炒蜜 蟬蛻肚洗去 薄荷葉 荆芥

穗各一分 甘艸各一分 淡竹葉片三十 水煎服

貝母麥冬飲

貝母 麥冬 薄荷葉 元參 括蕓仁 吉梗

甘艸 水煎服

生地黄散 治麻肺熱喘咳斑疹身熱口乾心煩

生地黄各一分 麥冬五分 杏仁 款冬花 陳皮各八分

水煎服準繩有甘艸一書並有吉梗

利金湯 治肺燥塞不利而咳

貝母 茯苓 貝壳 陳皮 吉梗 甘艸 生姜

白蜜引

除熱清肺湯 治痲盡透而壯熱咳嗽大便閉結

石膏錢三 麥冬去心一分 元參 生地黃 貝母

括藁根 赤芍藥錢各一分 甘艸五分 水煎溫服

清咽滋肺湯 治痲後除熱咳嗽痞

元參 牛蒡子 荆芥 貝母 麥冬 括藁根

馬兜鈴 明玉竹 吉梗各八分 甘艸四分 水煎服

前方繆仲淳有薄荷無馬兜鈴

孟介石精肺飲

熟石膏

生地黄

各一錢五分

麥冬

淡竹葉

七分

陳皮

元參

柴胡

當歸尾

黃芩

知

母炒

吉梗

僵蚕

甘艸

夫皮

蕊心

五寸引

靜遠主人清肺飲

治麻後傳肺胃二經咳嗽喘急

麥冬

牛蒡子

防風

茯苓

桑白皮

地骨皮

知母

吉梗

甘艸

水煎服

清肺消毒化痰湯

牛蒡子

荆芥穗

防風貝母

各五分

連翹

黃芩

前胡

茯苓

各七分

貝殼

吉梗

各一分

甘艸

三分

水煎飲十餘次徐徐服

秘本門冬清膈湯

天冬 麥冬 知母 貝母 杏仁 石膏
去皮尖 炒研

骨皮 牛蒡子 凝冬花 桑白皮 馬兜鈴

吉梗 甘艸 糯米引水煎服六

骨皮清膈散

黃芩 二分 石膏 七分 滑石 七分 地骨皮 當歸

桑白皮 紫苑茸 炒蜜 白茯苓 吉梗 甘艸 各五分

姜三片引水煎服

前方加入參柴胡白芍白朮黃芪 各五分 各人參情

膈散治肺熱鼻乾涕唾稠粘

麥冬清肺湯

麥冬 知母 貝母 黃芩 杏仁 天花粉

只壳 陳皮 丹皮 查肉 吉梗 水煎服

只壳前胡湯

只壳 前胡 防風 赤茯苓 蘇梗 吉梗

甘艸 水煎服 氣急者以沉香磨水對服

天真膏 治麻後咳嗽不止肉熱不清心神不寧夜臥

不安或生瘡疥

生地黃 麥冬 元參 白茯苓 紫苑茸 知母

陳皮 桑白皮 沙參 生黃芪 薏苡仁 棗仁

丹皮 扶神 當歸身 白朮 沙參

右以生地麥冬元參沙參黃芪苡仁炒白朮爲君白
茯苓炒棗仁茯神當歸母皮陳皮紫苑茸爲臣炒知
母桑白皮爲佐入砂鍋內以長流水浸用桑柴文武
火煮兩時辰久水乾再添水於內取出去滓將藥水
澄清復入砂鍋再熬加蜜和成膏以磁罐收貯每用
三匙滾水調服

葶藶丸 治麻出氣喘將成龜胸

葶藶子

隔布炒

漢防已

牽牛子

炒

杏仁

去皮尖油

萊菔子

水煎服

大便溏滑者除牽牛

賈蘭峰傳方

黃連

黃芩

連翹

元參

知母

杏仁

乾葛

麻黃 牛蒡子 陳皮 厚樸 白芍 吉梗

甘州 水煎服

只吉二陳湯

半夏 姜汁蒸 二小 陳皮 去 白茯苓 錢一 甘州 分五

只壳 吉梗 各八分 姜引水煎服

犀角解毒化痰湯 治麻後咳嗽氣喘唇焦結熱解煩

燥不安或口鼻出血

犀角 汁 丹皮 連翹 貝母 天花粉 薄荷

紫艸茸 甘艸 稍 當歸 八分 牛蒡子 九分

赤芍 分六 生地黃 分二 黃連 分五 淡竹葉 分三十

水煎服

氣促發喘鼻翳胸高第五十一

氣促原以肺未清開口出納喘候真鼻扇痰鳴喘將絕
胸高必定歸幽冥

氣促之症多緣肺熱不清所致治法當分時候若見

於未出及正出之時藥宜疎托以清熱透肌湯日二

條去甘艸主之如見於正收及收後藥宜降火及瀉

肺氣以清咽滋肺湯見五去玉竹青梗甘艸加茯苓

陳皮以消痰若開口而作出納胸高疊起止不常

不定是為喘症乃屬痰火之候熱邪壅遏肺竅氣道

阻塞而然也然喘症有虛實之分實者易治虛者難

為欲察其虛實之確在於大便之溏泄小便之清利

大便之堅結小便之赤澀上別之若大便澹泄小便
清利唇白而身無大熱皆爲虛症縱以半夏蘇子芥
子葶藶杏仁甘艸萊菔子陳皮南星茯苓之類以清
痰潤肺多難獲効實則大便堅燥小便赤澀唇紅而
身發壯熱用甘艸杏仁陳皮只壳蘇子括藜仁杏仁
桑白皮黃芩黃連天冬麥冬等味多易於取効果係
實者以竹葉石膏湯見二半條去人參半夏炙甘艸梗
米加括藜仁貝母北芥子治之冬日更加蜜酒炒麻
黃少許可以隨手而應大抵未出時而喘者易治收
後而喘者難治如發熱時多喘邪熱壅於肺故也慎
勿用定喘之劑惟宜以大劑石膏知母竹葉湯或櫛

訶葛根湯去甘艸王之初發熱而喘者以麻黃湯去
 甘艸加連翹牛蒡子只壳或以清金散火湯去吉梗
 甘艸加酒炒黃芩杏仁連翹只壳治之初發熱未出
 之時而喘者以三拗湯去甘艸加荆芥石膏芽茶治
 之如肺炎喘嗽以加味瀉白散去人參甘艸王之發
 喘而鼻黑乾燥者以白虎解毒湯是二六條王之如痰
 實壯熱胸中壅悶則喘急以前胡只壳散除甘艸
 加貝母黃連黃芩括蕞霜治之如麻已出而喘者用
 加味清肺降火湯王之如麻出三日後而作喘者急
 以靜遠王入清肺飲見五十一條去知母吉梗甘艸加杏仁
 括蕞霜芥子治之或以生地黃散見五十一條治之如麻後

發喘以清咽滋肺湯

見五條

去玉竹、吉梗、甘艸、白虎

湯

見二十條

去甘艸、粳米，以滋潤肺胃。若痲後而喘，日

久胃虛不可用白虎湯

見二十條

只宜以靜遠主人

肺飲

見五條

主之痲後，如有日久發喘不歇者，以小柴

胡湯

見二十條

以貝母、易半夏、沙參、易人參加五味子

從權治之。若喘而無涕，兼之鼻扇者，則難治矣。蓋鼻

扇症，肺氣將絕。若鼻扇而兼喘滿痰鳴者，此必不治

如鼻扇而咽喉清利，無喘滿而精神似故，不減者，十

救二三宜滋培肺氣，藥以潤肺清痰為主，以補肺阿

膠散治之。收後而鼻扇者不治。若痲喘而胸高者，乃

肺經熱甚而脹起者也。其症多見於正收及收後，凡

痲見胸高之症為肺壞乃不治之候有用葶藶桑白皮散治之者亦僅十全一二而已若發其施無不愈未之有也

石膏知母竹葉湯

石膏

五斤至

知母

一斤至

淡竹葉

三十斤至

麥冬

三斤至

薄荷

二斤

西河柳

許

水煎服

理前葛根湯

西河柳

前胡

葛根

荆芥穗

貝母

元參

知母

麥冬

甘艸

水煎服

麻黃湯

麻黃

泡去綠汁

杏仁

去皮尖油

甘艸

冬五

石膏

臘茶葉

各一

一方去石膏加桑白皮

水煎服

清金散火湯

麻黃

炮去

蘇葉

牛蒡子

吉梗

甘草

水煎服

三拗湯

麻黃

不去節

杏仁

不去油皮

生甘草

水煎服

加吉梗荆芥名加味三拗湯

加味瀉白散

桑白皮

地骨皮

白茯苓

知母

黃芩

人參

甘草

糯米一百粒引水煎食後服

前胡只壳散

前胡

只壳

赤茯苓

炙甘草

甘草

大黃

煎兒

石收咀每黑三錢水一盞煎六分旋服

加味清肺降火湯 治麻出喘急

陳皮 枯黃芩 麥冬 桑白皮 生地黃 貝母

枝仁 括萎仁 天花粉 石膏 葶藶子 地骨

皮 蘇干炒 燈心二十根引水煎服

補肺阿膠散 治肺虛有火嗽無津液而氣破鼻翳

阿井膠蛤粉炒一兩 五錢能補血液精肺滋腎益而

馬兜鈴一兩象肺故人 牛蒡子炒香一兩 刺楸一兩 肺毒能

治火 杏仁去皮尖七不瀉燥 粳米一兩 即粉

炙甘草一兩 益 水煎服

李時珍曰補肺阿膠散用馬兜鈴非取補肺取其清

熱降氣而肺自安也中間之阿膠粳米乃補肺之正藥安知精熱降氣瀉之即所以補之也若崙於一味用補反能助肺火而增咳嗽

葶藶桑白皮散 治胸高氣喘

葶藶子 隔紙炒 漢防已 杏仁 貝母 蘿菔子

姜汁炒研 家蘇子 姜汁炒研 桑白皮 蜜炒 只壳 黃芩

北芥子 姜汁炒研 三劑水煎服 胸高而喘者加蜜炒

麻黃茸

衄血第五十二

喉中衄血痰涎七毒火不得發越者未出正出十全一
正収収後難爲也

麻屬肺胃如喉中有痰衄血而鳴者其症屬痰火之
候此因毒火內結之極邪熱阻逆不得發越所致也
若見於木出正出之間治當清肺降火消痰爲主十
中可救一二以除熱清肺湯見五去赤爲甘艸王之
若見於止収及収後者必邪熱未透毒火傳裏或露
風早収餘熱內攻而肺氣受傷也實爲難治此症宜
防之未導之先

五
 中
 有
 一
 二
 三
 四
 五
 六
 七
 八
 九
 十
 十一
 十二
 十三
 十四
 十五
 十六
 十七
 十八
 十九
 二十
 二十一
 二十二
 二十三
 二十四
 二十五
 二十六
 二十七
 二十八
 二十九
 三十
 三十一
 三十二
 三十三
 三十四
 三十五
 三十六
 三十七
 三十八
 三十九
 四十
 四十一
 四十二
 四十三
 四十四
 四十五
 四十六
 四十七
 四十八
 四十九
 五十
 五十一
 五十二
 五十三
 五十四
 五十五
 五十六
 五十七
 五十八
 五十九
 六十
 六十一
 六十二
 六十三
 六十四
 六十五
 六十六
 六十七
 六十八
 六十九
 七十
 七十一
 七十二
 七十三
 七十四
 七十五
 七十六
 七十七
 七十八
 七十九
 八十
 八十一
 八十二
 八十三
 八十四
 八十五
 八十六
 八十七
 八十八
 八十九
 九十
 九十一
 九十二
 九十三
 九十四
 九十五
 九十六
 九十七
 九十八
 九十九
 一百

喉啞聲音不清第五十三

咳嗽咽傷聲啞非與痘瘡同例也此乃麻疹之常候
認作危症是愚者

瘰本屬火瘡啞乃瘰之常候多吉無凶不可以痘瘡

瘡啞比例蓋因肺胃熱邪為風寒所襲不能盡達於

表咳甚咽傷故瘡啞也治宜清肺降火消痰為主以

清咽滋肺湯見五條除去玉竹吉梗甘艸加黃芩木通

至之若肺熱咳嗽聲啞者以萬氏清肺飲去蒼朮訶

子仁吉梗加黃芩貝母至之若聲瘡而咽痛者以射

干消毒飲去甘艸加黃芩山豆根至之如瘰後聲音

不清咳嗽不思飲食眼目不清唇日乾燥者以清肺

消毒化痰湯見五去吉 梗甘艸加麥冬黃連天花粉

主之無心虛聲音不揚者以導赤通氣湯除去甘艸

人參加沙參主之加係肺熱聲音不清響者以甘艸

清金散主之兼有咳者以清金降火湯主之或以驢

方治之

射干消毒飲

射干 元參 連翹 荆芥 牛蒡子 甘艸

水煎溫服

葛氏清肺飲

麥冬 荆芥穗 天花粉 知母 吉梗各二

訶子仁各八 水煎

五疇氣湯

生地黄 麥冬 當歸身 石菖蒲 人參

甘肅 燈心引

甘桔清金散 痲後肺熱 聲音不清有用之而瘖甚者

宜刪

吉縷一兩 甘艸 連翹 訶子皮各五分 牛蒡子七

為末每用一錢加薄荷葉少許水煎服

清金降火湯 治痲肺熱 聲啞咳嗽

當歸 白芍藥酒炒 生地黄酒洗 括蘆仁 白茯苓

陳皮 貝母去心 桑白皮蜜炒 麥冬 黃芩酒炒

杏仁去皮尖 黃連酒炒 枝仁炒 元參 蘇梗

石膏 天冬 甘艸 姜三片引水煎服

治麻後咳嗽失聲驗方

牛蒡子 黃芩 天花粉 薄荷葉 桔梗 甘艸

水煎服

嘔逆第五十四

嘔逆雖曰有虛實痰症實多虛無一只因逆氣上冲喉
胃火炎炎作嘔逆

嘔逆之症乃氣逆上冲而作聲也其症雖有虛實之
分而麻厲火候而發嘔逆乃胃火上冲所致實者八
九而虛者未常見一二也治法宜以清火安胃爲主
如實熱痰火發嘔逆者以竹茹栝蒂湯去牛夏甘艸
加貝母石膏主之如嘔逆不止者以安胃散去查肉
治之若嘔逆一連二三十聲不歇者以紙條宣鼻孔
中得嚏卽已或以生姜汁同蜜汁煎熱頓服之亦可

竹茹栝蒂湯

竹茹 柿蒂 陳皮 半夏 甘艸

因惱怒發呃者加柴胡青皮黃芩

安胃散

陳皮 麥芽 木通 澤瀉 黃芩 石斛 杏肉

水煎食遠服 胃火甚者加石膏

噴嚏第五十五

噴嚏能令肺氣清始終有嚏痲必輕若還鼻塞而無嚏風邪留滯毒來侵

痲症初起而多嚏者乃內火因風邪搏激而然故有噴嚏者則肺毒得解而肺氣全通矣初熱未出之時若有噴嚏者必是先因外感而後得通也其毒縱因可救正出之時有噴嚏者其痲必輕收後而尚有噴嚏者方爲盡退乃毒得盡解可無餘患矣若嚏而多涕濁壅得泄肺氣自清最爲吉兆若無嚏而鼻塞不通者必有風邪留滯如清肺湯見五條除去吉梗甘艸加荆芥薄荷葉連翹牛蒡子只壳赤茯苓或利金湯

見五
十條 去吉 椴甘 艸生 姜加 赤茯苓 薄荷 葉連 翹牛 勞

子 或全書 除熱 清肺 湯等 方俱 可施 用但 凡遇 有鼻

塞 不通 之症 總宜 用辛 涼之 劑以 透達 之如 荆芥 乾

葛 牛勞 子薄 荷葉 麻黃 辛散 之品 元參 石膏 淡竹 葉

括 蕒根 清涼 之味 在所 當施

全書 除熱 清肺 湯重出 瀉心 火清 肺金 主方

麥冬 黃芩酒炒 石膏 元參 生地黃 貝母

赤茯苓 水煎服 壯熱 加地 骨皮 壯熱 大甚 更

加黃連

氣粗 加葶 藶子 括蕒 霜 氣喘 加蘇 子芥 子

便閉 加火 蘇仁 只壳 便閉 甚加 大黃

鼻通多涕鼻乾無涕第五十六

始終多涕本爲吉鼻乾無涕肺府熱其間形症有數般
可辨良工細認識

鼻通多涕肺氣順也所謂多涕者鼻常有涕非鼻涕
暫見比也痲症得肺府平和鼻無阻塞此爲順候初
熱至出時多涕者皆爲吉兆收後亦以多涕爲易治
至於鼻乾無涕必須鼻孔之內絕無物塞而鼻乾燥
方是真候此乃肺府熱極閉塞而不通也初熱未出
之間見之其症必重以清肺飲去陳皮五味子吉梗
甘艸合清揚飲子見五條除甘艸淡竹葉加石膏黃芩
更量加蜜酒炒蘇黃以解表而疎通肺氣或以聶氏

第二清肺飲去柴胡陳皮姜蚕吉梗歸尾淡竹葉合

蘇葛湯見第去柴胡赤芍甘艸加只壳治之若已出

大熱致鼻乾無涕者此症亦重宜以全書除熱清肺

湯見五十加黃連地骨皮連翹牛蒡子只壳治之或

暫有而暫無涕者雖重亦可救以杏仁清肺湯去吉

梗甘艸加黃芩治之又有先無涕其後熱退鼻通有

涕者又有因熱甚鼻外被塞乾結似於無涕者以利

金湯見五十去吉梗甘艸生姜陳皮加牛蒡子黃芩赤

茯苓連翹治之或更加桑白皮杏仁治之以上數症

總皆要肺氣通暢雖凶可救醫家須宜詳察施治

杏仁 貝母 茯苓 陳皮 吉楓 五味子

甘艸 名玉 水煎服

蕭氏第二清肺飲 治麻出四五日回時有餘毒留於

肺胃多咳嗽氣粗外熱不退

熟石膏 生地黃 各一分 元參 柴胡 一分

麥冬 二分 陳皮 六分 桔黃芩 酒炒 當歸尾 知母 炒

淡竹葉 吉楓 各七分 殭蚕 炒五分 生甘艸 去皮三分

燈心引水煎服

杏仁清肺湯

杏仁 麥冬 貝母 欬冬花 午莠子 甘艸

枯梗 水煎服

公... 之... 及... 之... 平... 七... 世...

... 之... 及... 之... 平... 七... 世... 公... 之... 及... 之... 平... 七... 世...

微汗自汗大汗無汗第五十七

微汗當出熟不留。初出未收。總沐麻升發之味。須禁用。用之大洩。反爲洗。

自汗之症。屬陽虛。麻後見之。更可危。勿令見風。成瘧病。治陰抑陽。症自除。

發熱。渾身汗最宜。元府開豁。麻出時。衛中表邪從此散。汗多亡陽。又忌之。

壯熱無汗。大非吉。不因風寒。因火鬱。自始至末。總無汗。縱麻已收。症百出。

麻有自汗。微汗。大汗。無汗等症。而均有宜有忌。麻初出。至未收之時。皆宜微汗。有微汗。則皮膚通暢。腠理

開豁而麻易透發熱之際有自汗者則有發散之義
乃為常候蓋麻遇自汗則毒從汗解元府開而麻毒
透衛中之表邪則從之而散矣不可遽止亦不可復
用升發之劑若自汗而更升發恐汗大洩致有亡陽
之患夫自汗之症原屬陽虛初時無妨若麻後自汗
多成痲病切勿見風法當治陰抑陽使腹內虛熱清
退而汗自止以四物湯見二十仍去白芍川芎加元
參牡蠣粉之如麻後自汗兼不食吐衄者真是虛
症最為難治亦宜以四物湯見三十加牡蠣粉香銀
石斛用舊蒲扇或舊蒲扇燒灰研細末入藥中調服
若誤投藥餌傳變多端難收功矣切勿拘治麻初起

常法而用辛溫解散之劑。如果係脾熱，可用瀉黃散去甘州，因症加減而治。則又可拘麻初之治法。若自汗而煩渴，氣壅脈數者，則以靜遠主人化斑湯。如括萋霜至之。至於大汗過多之症，則有二因。一因或被蓋厚而致大汗過多者，一因用升發之劑過甚而發汗過多者。二者皆不宜也。蓋恐大汗過多，致有亡陽之變。輕則症難脫體，重則多有不救。倘遇麻有隱暗不透之壞症，從權施治而用升發之劑，取其大汗使毒從汗解。此特語其變而非正治也。然亦多因。經曰：汗多亡陽，急須止之。以秘本黃連湯，或當歸六黃湯。外用溫粉撲法治之。

有以人參白虎湯合古方黃連解毒湯現經十治之者似

乎未當方仍
列後備用

若婦人麻後汗多心慌神昏者亦有因

而致不可不察有因麻症初起適遇經行麻乃火候

心火旺盛榮血多虧今又月期適至血又下洩虧耗

大過至麻收之後氣血兩虛未有不感汗多怔忡神

昏等候急宜以玉屏散加牡礪粉與服以止其汗免

至凶陽旋用人參養榮湯去桂心五味子多加牡礪

粉龍骨數大劑與服須宜急治遲則不救若麻症初

起壯熱而無汗者多因外感風寒大重以致皮膚乾

燥毛竅不開麻疹壅滯而汗亦難出多成內攻之症

或肚腹脹痛或發喘促夏秋之間宜微升散以葛根

解肌湯

見第
五條

去赤芍甘艸加木通只壳治之春冬寒

月重爲發散如加味三拗湯、吉椶、甘艸或葛根、

邪湯見三十條加炒麻黃治之、但不可過劑、使渾身常

得微汗爲妙、有微汗則腠理潤澤、則麻易出、又有一

等因熱極火鬱而無汗、亦致皮膚乾燥而不活澤、

亦難出、此症外必見唇舌破裂、二便結滯、昏沉壯熱、

或身痛、肚腹脹疼、多發喘促、胸膈痰鳴、不拘何時、無

分遲早、急用寒涼降火清肺之劑、佐以升發之藥、以

白虎解毒湯見二十條加地骨皮、貝母、元參、牛蒡子、前

胡、乾葛治之、遲則恐成壞症、大抵麻症常以微汗爲

順、自始至末、必以得汗爲妙、經曰微汗常出、熱熱越

而不留、此之謂也、若始終無汗、麻難收、收後必有餘

症宜用寒涼升發解毒為當

瀉黃散

防風

四

枝仁

炒黑

藿香葉

七

石膏

五

甘艸

二錢

為末白湯下或用蜜同酒拌炒仍用白湯下

加味三拗湯

麻黃

不去節

杏仁

不去皮

生甘艸

荆芥穗

吉梗

水煎服

靜遠主人化斑湯

石膏

知母

元參

麥冬

牛蒡子

連翹

黃芩

地骨皮

淡竹葉

水煎服

秘本黃連湯

黃連 黃栢 黃芩 麥 生地黄 當歸

生黃芪 水煎加入燒蒲 灰調服

當歸六黃湯 治自汗盜汗

當歸 生地黄 熟地黄 黃芪 蜜炒各一 黃芩

黃連 黃栢 各五分 水煎服

溫粉撲法

黃連 牡礪粉 貝母 各五錢 粳米粉 一升

為末撲身上

玉屏風散

黃芪 炙炒一兩 大當歸 六錢 陳粳米 黃色合炒 水煎服

玉屏散 治自汗不止氣虛表弱

黃芪蜜炒 防風各一兩 白木土炒五錢

生姜紅棗引水煎服

人參養營湯 治脾肺氣虛營血不足驚悸健忘寢汗

發熱食少無味身倦肌瘦

人參 白朮土炒 黃芪蜜炒 炙甘艸 陳皮全當歸

桂心各一錢 熟地黃 五味子蜜炒 白茯苓各七分

白芍藥酒炒八分 遠志肉去骨甘艸水煮五分

生姜紅棗引水煎服

人參白朮湯 見六十四條

黃連解毒湯 見三十五條

衄血諸失血第五十八

毒邪併迫血離經衄流於鼻不須驚當知熱毒從茲解
血去榮中毒少輕

吐血便血與溺血當分熱甚和血甚熱入血室勞動火
總而名爲失血症

鼻之衄血因內熱熾甚邪火沸騰血隨火載自肺胃
上行而溢於鼻也麻疹本乎肺胃故初起及未出之
先而衄血者是爲順候亦發散之義也蓋麻毒從衄
而解而榮中之毒則輕少矣不必遽止熱得開洩不
藥而衄自己非錯經妄行之比但不宜久耳如衄血
過多此爲火迫經曰奪血者亡急須止之其衄之不

已或有尖血者俱宜清肺瀉火佐以涼血之藥治之
以犀角地黄湯去白芍加荆芥穗枯黃芩主之凡初
熱見形衄血者乃心火上沖煩悶其症不妨用生地
黃芩子湯加枯黃芩以散心火之鬱熱而清肺已出
而衄血者以加減犀角地黄芩花湯去甘艸治之已
出大便下血或小便溺血者或吐血衄血或一便閉
瀕熱渴赤痛以犀角解毒湯去赤芍治之如衄血不
已急須止之以茅根湯加黃連或元參地黃湯去升
麻白芍甘艸加茅根黃連或茅花湯去甘艸加黃連
等方主之已收之後或出鼻血或失血者俱宜以加
減犀角地黄芩花湯去甘艸治之有用四物湯加凡
茅根治之者

痲症血熱及勞動火熱入血室吐血衄血發狂發黃者俱宜用犀角地黄湯去白芍加桃仁治之若正收及收後仍衄不止者以四物湯見二十五條加茅根麥冬以澁潤之然痲症衄血或便血溺血俱為失血之候須當分熱甚血甚施治熱甚者以黃連解毒湯見十五條主之血甚者以犀角地黄湯去白芍主之

犀角地黄湯 治傷溫病一應發汗而不得汗內畜血

及鼻衄吐血不盡肉餘瘀血大便出血面黃或中脘

作痛 犀角 生地黃酒浸另搗 牡丹皮 白芍

各等分水煎服 喜妄如狂加大黃黃芩 吐血衄

血者加扁栢藕汁童便 脉大來遲腹不滿而自言

瀕者加當歸肉桂

生地枝子湯 治心火上冲衄血

生地黄 枝仁 葛根 薄荷葉 燈心引

加減犀角地黃茅花湯

犀角汁磨 生地黄 茅花 丹皮 只壳 黃芩

枝仁 連翹 黃連 麥冬 當歸尾 甘艸

燈心三十根引

犀角解毒湯

犀角 黃連 黃柏 黃芩 枝仁 生地黄

牡丹皮 赤芍 水煎服

茅根湯

茅根 當歸 生地黄 山枝仁 枯黄芩

水煎加百艸霜入藥中服

元參地黄湯 止痘疹

元參 生地黄 丹皮 枳仁 升麻 申甘艸各

錢五分 白芍 水煎服

按此方宜均勿用升麻以塞上衝之源勿謂但屬陽

明胃經即可用升麻也

茅花湯 治衄血

靜茅花 當歸頭 牡丹皮 生地黄 甘艸

水煎服

附方

茅花湯

鬱金 生地黃 黃芩 水煎入百州霜調服

元參解毒湯 治衄血失血

元參 黃芩 枝仁炒 生地黃 粉葛 荆芥穗

吉糧 甘艸 水煎加茅根汁京墨汁對服

犀角地黃湯 治失血衄血便血尿血

犀角 升麻 生地黃 木通大吉糧 京芍

甘艸

水煎服

嘔吐第五十九

毒火鬱遏胃氣傷。初熱嘔吐原無妨。欲吐不吐乾霍亂。二者一見最獨當。

痲症初起嘔吐亦屬常候而吐瀉交作者順乾霍亂

者逆欲吐不吐者危夫痲症之有嘔吐者皆因胃間

火毒不能發洩而鬱於內致傷胃氣而作也初熱而

得嘔吐之症此毒未發出藥宜疏托以葛根解肌湯

見第五條去赤芍甘艸或葛根疎邪湯見三十一條至之正出

及正收時而見嘔吐之症者是毒未盡藥宜清涼解

毒少加疏散可也以消毒飲見二十二條去甘艸加只亮

黃連治之多痰者加括蓼霜貝母治之收後而仍有

嘔吐者，乃是餘毒留於胃脘所致，脾胃虛而熱滯也。宜用清涼脾胃之藥，佐以分利之劑，用石斛清胃散去赤芍、甘艸主之。取此方中之陳皮、扁豆、藿香以止嘔吐，若嘔一止，而陳皮、藿香、葉扁豆又宜除之，不可過用，恐致燥害。此症若不聞以金石之品，全用輕淨之藥，其嘔難定。如嘔吐不止者，以竹茹湯主之。如熱甚嘔吐者，以解毒湯見二十六條去古梗，加竹茹、枇杷葉主之。

石斛清胃散 治痲後嘔吐胃虛不食熱滯

石斛 茯苓 貝壳 丹皮 扁豆 藿香 陳皮

赤芍 錢各一 甘艸 分五 生姜 引

竹茹湯

竹茹 陳皮 柿蒂 查肉 水煎服

吐痰淋後有痰胸口痰甚第六十

吐痰之症有多般都緣肺胃火邪干俱宜清肺消痰火
治者須作一例看

吐痰之症有二有吐出而白者有吐出而成塊者皆

肺胃之火欠清而作也俱宜清肺消痰降火為急以

杏仁清肺湯見五十六條去甘艸吉梗加黃芩或以清肺

飲見五十六條去五味子白吉梗甘艸加麥冬黃芩知母

石膏治之但清痰切勿用半夏南星等燥藥惟宜用

天花粉貝母陳皮之類清肺降火宜用玉門冬麥冬

杏仁桑白皮黃芩黃連之類切勿用吉梗中州之品
如麻後有痰而不吐痰者宜用加味二陳湯去半夏
川艸加貝母括蕁霜至之如麻後胸口痰甚者用經
驗方或敷或楷治之

加味二陳湯

陳皮 半夏 白茯苓 防風 天麻 連翹

甘草 水煎服

經驗方 治胸口痰甚

吳茱萸 葱白 十餘

右為細末以生姜自然汁和葱白搗和作餅蒸溫敷

胸上立效

吐虵蟲第六十一

吐虵之疴是何因胃虛無穀更上行急宜施治免胃爛。

調養脾胃疴自平。

痲前吐虵乃胃熱不進穀食所致治法宜清肺解散。

以秘本門冬清肺湯見五條去甘艸吉梗主之若將出

正出之際而吐虵者是因胃間有熱膈上有痰虫不

能安故也患者能食則已不必用藥若欲用藥則以

殺虫丹與之在初熱未見痲時而吐虵者與吐虵過

多而不能食者皆為胃氣虛敗必不能治然吐虵之

疴多見於正收及收後之時亦因胃火熾甚多致少

食虫無所養故望上而出或三四條或五六條或十

卷三十一條三十一

餘條而止不宜過多，多則有害。治當安胃為急，久則胃爛難救矣。以七味白朮散加烏梅再斟酌加減而治之。虫得酸則安矣。如麻後熱退能食而吐，虵者宜調養脾胃，庶無他變。以安虵散除胡粉白礬七味白朮散加烏梅等方治之。若麻後吐虵不食而兼白汗者，真是胃虛，最為難治。以七味白朮散加烏梅牡蠣粉釵石斛治之。如係脾熱，則以瀉黃散見五十條加烏梅牡蠣粉釵石斛治之。

殺虫丹

生葱

把

炒吃虫即化為水

七味白朮散

治胃虛津氣不行而渴

人參 白朮炒 白茯苓 炙甘草 藿香葉

乾葛根煨 木香 水煎服

安虵散 治吐虵色赤成團而活屬熱者

烏梅肉三錢 黃連 蜀椒 藿香 檳榔各一 切粉

白礬各五分 為末每用三錢水煎如糊空心服

吐沫音末口中汁也 口中流涎不止第六十二

清涕之中見白沫實為胃火旺所致治宜清胃并降火

莫以白沫作寒治

吐出涕中有白沫流涎不止均非虛都因胃中邪火旺

急宜清胃免傾危

吐沫者吐出清涕之中而有白珠是也乃是胃火旺

甚所致治宜清胃降火為急宜以加味清胃散加連翹牛蒡子主之其不去升麻者蓋欲用之以開提胃熱故也然亦須斟酌而用如麻後有口中流涎不止者亦是胃火旺甚所致也宜以河澗涼膈散見二十六條治之但方中有大黃芒硝須要察人之虛實強弱大小及大便之堅瀘而施不可槩用以誅伐無過

加味清胃散 治胃中蘊熱中腕作痛痛後火氣發泄

必作寒熱乃止及齒齲腫痛出血疹引頭腦

生地黄四錢 川升麻一錢五分 牡丹皮五錢 當歸尾酒洗

三錢 川黃連酒煮 防風 荆芥 石羔 水煎服

泄瀉第六十三

痲初泄瀉最爲宜。瀉而日久須治之。熱寒食冷便膿血。數般當分新與遲。

痲症泄瀉，慎勿遽止。蓋痲有瀉，而胃與大腸之邪熱

得解，是亦表裏分消之義也。初熱作瀉者，用猪苓湯

去阿膠、甘艸、加葛根、連翹、牛蒡子。主之。有用香薷散者，然終不若

分利之爲當也。香薷散方仍列。若痲見二三日泄瀉者，以透班和中

湯去升麻、川芎、柴胡、吉梗、半夏、陳皮、甘艸、生姜，加連

翹、牛蒡子、地骨皮。主之。若身熱煩渴泄瀉者，用三苓

散。見三十一條。加地骨皮、黃連、黃芩、麥冬。主之。夏月用辰

砂、益元散去甘艸治之。如痲後泄瀉者，以薏苡仁散

去香附、甘艸、主之。痲後泄瀉及便膿血者，皆由熱邪內陷故也。夫忌止泄，惟宜用升散之藥，以黃連、葛根湯加扁豆、滑石、白芍藥數劑，與服而自愈。然痲症泄瀉，須分新久寒熱傷食傷冷六般。若初熱瀉者，用三苓散加木通，以重瀉心經之熱。寒瀉則十中無一，或有傷食傷冷而作寒瀉，四肢冰冷，肚腹不熱，口不作渴，小便不赤者，不得已而用理中湯一劑，止之久瀉不止，以六君子湯加肉豆蔻，或香薷丸止之。如再不止，用醒脾散與服，或以五倍子、鴛栗壳燒灰，用米飲而下瀉之。凡後數方，蓋亦萬不得已，從權而用，切勿可目為定規而濫用也。

猪苓散

猪苓

澤瀉

赤苓

滑石

阿膠

甘艸

水煎服

香蘇散

蘇葉

陳皮

白芷

川芎

香附米

甘艸

生姜葱白引

透斑和中湯

葛根

猪苓

澤瀉

茯苓

川芎

升麻

各七分

前胡

吉梗

各一錢

柴胡

五分

陳皮

半夏

各七分

甘艸三分

生薑三片引水煎分作數次服

辰砂益元散

治暑月小便利

辰砂一錢

桂府滑石

水飛過六兩

甘艸四錢

炙甘艸

六錢

右爲細末清水調下二三錢老人虛人及病後傷津

而小便不利者不宜用

又治暑月發驚多汗小便瀦痛兼瀉心火

前方加薄荷葉少許以清肺熱名雞蘇散

加青黛少許以散肝火名碧玉散

加石膏少許以除胃熱名白玉散 治同本方

加紅麴五錢以治赤痢名清六九

加吳茱萸 一兩以治濕熱吞酸 一書治白痢名茱萸六九散

加乾薑五錢以治白痢 一書消飲食名溫六九

加生栢葉生車前生藕節以治血淋名三 生益元散

加牛黃治虛煩不得眠名至寶益元散

加葱白五根香豉四合名葱豉益元散以水煎服

則兼散表邪

薏苡仁散

薏苡仁

淮山藥

白茯苓

穀麥芽

白扁豆

香附米

山查肉

甘州

水煎服

黃連葛根湯

黃連酒炒

葛根

升麻

甘州

水煎服

理中湯

人參

白朮

乾薑

甘州

水煎服

一書加肉豆蔻

一書加肉豆蔻去人參

六君子湯

人參 白木 白茯苓 炙甘草 陳皮 半夏

紅棗 薑引

香薷丸

黃連 炒 肉豆蔻 麩包 訶子肉 麩包 煨 木香

砂仁 白茯苓 爲末 飯丸 蘇子 大米 飲下 十五丸

醒脾散

北全蝎 五隻 粒 白附子 烏豆水 浸蒸 人參 木香

白茯苓 天麻 姜汁 拌蒸 石菖蒲 去尾 姜汁 蒸 炙甘草

爲細末 水調服

糞滄水瀉第六十四

毒源之症不須除，麻得斯候毒得舒，始終糞如黃褐色，雖有變症保無虞。

糞出有沫名水泄，初潮正出見爲吉，久瀉氣陷恐成痢，溺赤燥渴脾胃熱。

麻症滄糞理勢必然，此肺胃之火所作而致，不必施治，何則火勢極則大便閉結，麻本火候，倘再使閉，則火毒內作極矣，麻出必險，是以糞滄爲正候，初出與出時見此症，其麻縱險可救，正取與收後而糞滄色如黃褐者，雖有變症可保無虞，若水瀉之症，糞色必黃而有沫，小便赤口乾唇燥，皆由脾胃有熱所致，然

痲症泄瀉熱邪得以開洩是為順候初熱未出之間

水瀉者以三苓散見三十條加葛根連翹木通滑石主

之正出之時水瀉者亦以三苓散見三十條加連翹麥

冬潮熱甚者更加黃連黃芩主之古人有用大麥白

冬治之者實為夫痲泄瀉毒火因瀉而解雖曰美候

不妥方仍收列然不可令其久瀉倘或久瀉不止則正氣必衰脾氣

下陷凡有未發熱之前水瀉至正出之際而不止其

為日已久則痲毒難以發越後則留毒為害不小宜

以加味三苓散主之倘執泥毒邪得瀉而解之說縱

其久瀉而不為之早治恐至痲收磨之後變成痢症

或下紫紅血等症治療維艱正收及收後而水瀉者

毒邪雖得瀉而盡然止宜瀉三五次不可過多若自
首至尾水瀉不止者宜用清涼利水之藥而佐以升
提古有用三苓散見三十條加香白芷浙麥冬治之者
須當審理察宜隨機加減而施正收及收後水瀉過
甚者須以理脾胃為主宜以只實理中湯隨意消息
加減而治若不急治多成腫脹便血痢疾等候至若
瀉後瀉利不止口渴目閉四肢不溫與嘔吐不食洞
泄不知者皆為不治之症

加味三苓散 治痘淋瀉甚小便紅黃

猪苓 木通 赤苓 車前子 澤瀉 八分

炒各七分

黃芩 牛蒡子 黃連

酒炒

各五分

酒炒二分

卷三 六十四條 三六

燈芯五十寸引水煎食前服

人參白虎湯 治熱病舌乾大渴發熱背寒

人參 炙甘草 生石膏 知母

粳米 水煎分作三次溫服一日飲盡

枳實理中湯 治胃按食及結胸本虛不能受攻者

乾薑 人參 白朮

枳實 茯苓 炙甘草

水煎服

瀉法第六十五

痲症泄瀉本常候當分屬熱與屬寒瀉下清稀白沫者莫作熱候一般看

痲症泄瀉本屬常候屬熱者多屬寒者少然亦有瀉下清稀白沫者其症喜溫腹疼喜按此屬寒瀉宜以胃苓湯去蒼朮少用白朮肉桂加煨薑治之不可一例而治也

胃苓湯 治飲食停積浮腫泄瀉脉症俱實者

蒼朮 米泔水浸去皮以芝 川厚朴 去皮姜 廣陳

皮 去 炙甘草 各三 生白朮 白茯苓 堅猪苓

各二 澤瀉 錢三 肉桂 錢一 水煎服

平胃本平胃氣之墩。若因脾土之虛不能消運。又須稍藉參苓如養胃湯之類。然復有土衰不能分利而成腫脹。且氣藥不勝參朮。難合理中者。乃合五苓以健運水土。與正氣之假蘇藿以散邪。而不移易之定例也。

瀉而腹痛脹滿第六十六

瀉下腹疼與脹滿噯氣澁息如敗卵飲食不節腹中停
寬腸化食自安妥。

瀉而窘迫腹痛脹滿或有噯氣如敗卵者此乃飲食
不節停滯腹中宜用枳亮湯見四十一條去甘州加山楂
肉麥芽木通以治之

咳嗽鼻衄嘔吐泄瀉首尾治法總論第六十七

咳衄吐瀉痲之宜熱毒由斯消滅時治法解毒同一例
用方首尾不共施

痲疹初出必要咳嗽使癩理疏通鼻衄則熱毒得以

隨衄而解泄瀉則上下熱毒得出嘔吐均屬美候亦

脾胃二經熱毒所致且痲出自脾胃其理只以解熱

毒為主六一散至寶丹或四物湯見二十條加黃連黃

芩仍憑擇用若痲出之後而見咳嗽鼻衄吐瀉等候

則又不宜用上三方俱宜以三味消毒飲見三十三主之可也

六一散治表裏三焦之熱解肌清燥

滑石六 甘草一 為細末燈芯湯或薑湯下

前方滑石等分四兩甘草等分一兩名曰天水散治
瘧乾燥而痛用蜜水調塗并白湯調服

至寶丹又名祛風至寶丹

防風 荆芥 連翹 麻黃 薄荷葉 枝仁炒黑

川芎 當歸 白芍炒 大黃酒蒸 芒硝各五 桔

黃芩 石膏 吉梗各一錢 甘州兩 滑石兩 川

黃栢 人參 熟地 黃連 羌活 獨活 天麻

細辛 全蝎 白木錢五

右為細末蜜丸彈子大不拘茶酒任下一丸

前方即防風通聖散此處加人參補氣熟地益血黃

栢黃連除熱羌活獨活天麻細辛全蝎祛風

自利去硝黃 白汗去麻黃加桂枝

涎嗽加姜製半夏

麻科

四

六

八

十

十二

十四

十六

十八

二十

二十二

二十四

大便秘第六十八

火壅血燥津液竭大便因之而閉滯無分先後急通潤
稽延日久變紫黑

大便秘結者乃火壅血燥而耗精液故也癉之爲候
大便宜滑如黃褐色乃爲正候若大便秘閉而不通大
非所宜無論前後日期但大便秘者急當用滑潤清
涼之劑初時大便難通而堅結難出者宜微潤之不
可通利以通幽湯去升麻甘草熟地黃加火麻仁枳
實黃連治之如麻未出之初有面色或青或紅或唇
紫或煩悶而大便秘而不通者宜以大承氣湯去厚
杜加連翹牛蒡子防風葛根荆芥穗下之使毒從大

湯經而出然後再用宜毒發表湯見第五條去升麻桔梗

甘艸以發出麻疹其症自痊若正收及收後大便不

通者則宜用大通潤之劑以四順清涼飲治之甚則

用河間涼膈散見二十六條以通利之若大便閉結發熱

身痛者以大柴胡湯主之腹痛氣喘者以前胡枳壳

湯見五十一條去炙甘艸加薑汁炒芥子治之凡麻見便

閉之症急宜早治慎勿遲延日久則麻變焦紫枯黑

而難救矣。

通幽湯 升清陽降濁陰治噎塞便閉

油當歸二錢五分 升麻醋浸三分 桃仁研如泥一錢 生甘艸

炙甘艸各五分 紅花五分 熟地黃 生地黃各一錢五分

水煎以藥汁磨檳榔五分對藥稍熱服加火蘇仁大黃名當歸潤腸湯

大承氣湯

大黃酒洗四錢 芒硝三錢 厚朴 枳實各八分 水煎服

四順清涼飲 一名四順飲


當歸 赤芍 大黃酒蒸 甘艸各等分

水煎入生白蜜一二匙對藥熱服

大柴胡湯 治表症未除裏症又急汗下兼行用之

柴胡錢一 黃芩 芍藥各三分 枳實三分 半夏五分

大黃二分 黃蘗引



小便赤澇第六十九

膀胱餘熱小便澇火毒如何消散得無分初潮與收後

三苓導赤為定格

小便赤澇此裏熱甚之症也在初熱正出之時見之

乃熱邪瀉滲是為在候痲出現時小便赤澇或淋者

以三苓散見三十條加燈芯石膏葶藶射干治之若熱

甚小便赤澇譫語驚恐者以導赤散見三十條去甘艸

合三苓散見三十條加辰砂至之夏月以辰砂益元散

見三十條去甘艸加石膏至之若小便不利而嘔吐者

以三苓散見三十條加藿香竹茹枇杷葉治之一二日

不通者以加味導赤散見四十條至之若於正收及收

後而見小便不通者是內有熱毒不得消散而餘熱

下區膀胱用導赤散見六條加麥冬或用加味導赤

散見四條以滋氣化導利而小便仍不通者必因六

便秘鬱之故速宜通利大便以通幽滯見六條夫升

麻熟地甘肅加枳壳丑牛合導赤散見六條治之六

便一通而小便自利矣

大小便不通第七十

痲疹二便閉不通邪火熾甚在裏中通閉涼膈利臟腑
管取一服見奇功

痲疹自出至收總宜大小便滑利二便俱不宜閉

即急宜通利若痲症有大小便俱不通者是火邪內

熾之極宜以何間涼膈散見二十條去甘艸加牛蒡車

前木通治之甚則以通閉散去甘艸人參八正散去

甘艸治之

通關散 通心經利小便良方

枝仁炒 大黃酒蒸各 木通 赤茯苓 瞿麥

扁蓄炒 車前子炒 滑石 人參 甘草各三五分

卷三 七十一條 四三

燈心十根引

八正散 治濕熱下注口渴咽乾淋痛尿血小腹急滿

木通 瞿麥 車前子 枝仁 大黃 滑石

扁蓄 甘艸 燈心引

木通瞿麥燈心入小腸而降心火車前入膀胱而瀉
肝火山枝仁瀉三焦之鬱火大黃滑石乃瀉火利水
之捷藥扁蓄利水止痛甘艸稍入莖止痛雖治下焦
而不專治下焦必三焦通利水方能下行也

一書加木香

吐利並作下滯裏急後重脫肛第七十一

發熱之時吐利并任他吐利不須驚胞胎蓄毒從斯解
腸胃停汚自此清

發熱蒸蒸吐利併或時滯下作腸鳴火邪內迫宜清解
法向時行痲症尋

自利甚時冬變更裏急後重症隨生須爲通利洩其毒
若犯瀉劑病更增

痲症脫肛何所因火邪內迫後重成升提清熱是神手
若作氣虛定傷人

久瀉脫肛氣血虛治法不可一例拘養血升提成妙用
破滯用下更增危

痲本胎毒發熱之時吐利並作毒火因之而解此為
 美候如吐利并作或時下瀉或作腸鳴亦是火邪內
 迫而然純是熱候不可作寒而治治法總宜清解依
 痲科惡症施治庶保無虞如上焦火甚者則吐下焦
 火甚者則瀉中焦火甚者則吐瀉并作自利甚者則
 必見裏急後重而為瀉下矣如見裏急後重之症則
 病者不耐猛方下氣併便而脫肛之症又勢所必致
 也如痲發熱之時吐多者以竹茹石膏湯去半夏加
 補芎王之白利甚者以秘本豬苓湯去升麻甘艸分
 利之發熱時吐利并作者以三苓散見三十
七條加竹茹
 積滯滑石王之下瀉以加味黃芩湯去白芍藥甘艸

加枳實連翹牛蒡子青皮以治之痲收後熱毒未曾
解盡有下積滯者當以蓮石菜黃芩去升麻乾葛甘
艸白芍藥加枳壳山查肉麥芽青皮治之但方中菜
萸若非陰寒膈寒而挾有熱者亦須除去愚按下積
滯之症非僅痲收後有之即將出正出之時亦常有
見者愚謂不拘先後但痲見有下積者則當以清熱
導滯湯見七十一條去白芍藥厚朴甘艸當歸淡竹葉加
山查肉麥芽治之更爲妥當自利甚而變爲裏急後
重者以黃連解毒湯見三十五條加連翹牛蒡子青皮治
之若小便短少者更加木通滑石治之如裏急甚者
則當加半生半炒黑白丑牛以利之或以銅壁山人

黃芩湯去人參赤芍甘艸加連翹牛蒡子丑牛以利
之或以加味黃芩湯去白芍甘艸加枳實木通連翹
牛蒡子丑牛以利之若夫脫肛之症多見於將收已
收之後而治法有不可一例者若因毒火內迫大腸
枯瀉肺金受傷不能傳送致成囊急後重之症而病
者難忍無奈下力送氣催便以糞稍鬆致肛脫出不
可認作氣虛施治治法總宜清熱解毒導利行滯瀉
火清金兼用升提之品以加味導赤散去薄荷淡竹
葉加當歸尾潤腸得破惡血而養心血牛蒡子以消
毒枯黃芩瀉肺火以涼肺血視亮以破氣滯滑石各
八分通利六腑九竅以蕩熱散濕丑牛四五分以除

壅滯丹皮四五分以開陷伏之邪使之外散升麻五

六分以升散大腸胃胆三焦之火熱如兼有潮熱者

加鮮地骨皮二三錢治之若因久瀉而脫肛者亦以

加味藟赤散去薄荷竹葉加當歸身錢許川芎錢許

升麻六分以養血理氣升散大腸胃胆三焦之火熱

竹茹石膏湯竹茹 石膏 陳皮 半夏 黃芩 水煎服

秘本猪苓湯治瀉猪苓 澤瀉 滑石 赤茯苓 黃連 升麻

甘艸 燈心引水煎服 并治病人用力催便脫肛

加味黃芩湯各一分黃連 黃芩 滑石 白芍各

甘艸七分水煎服 血痢加地榆皮二錢

連石菜萸丸

黃連酒炒

滑石

至過各一兩

黃芩

乾葛

白芍各八分

萊萸一兩

升麻七分

甘艸四分

為末以山藥研粉作糊合丸梧子大食遠用白湯送

下三五錢

銅壁山人黃芩湯 治裏急後重

黃芩 黃連

生地黃

木通

只亮

當歸斤

赤芍藥

人參

甘艸

三劑水煎服

初劑加大黃微利之

加味導赤散

生地黃

酒洗一分五分

川木通

川元參

各五分

連翹六分

川黃連八分

薄荷葉四分

淡竹葉七分

燈心引水煎服

痢症第七二

邪內陷因成痢，患症施劑莫雷同。用心調理起沉痾，輕刮瀉圖霸功。

痢之成痢，乃熱邪內陷所致。多見於正收及收後間。有見於初熱未出及正出之時者，亦有自首至尾而作痢不輟者。又有因久瀉而成痢者。當分別治療，不可混施。若於初熱未出與正出之時而作痢者，藥宜以疎托爲君，行滯氣爲臣，爲佐解毒爲使。以葛根解肌湯見第五條少用葛根，去赤芍，蟬蛻，木通，甘艸，罌加青皮，檳榔，再加防風，主之。若痢已出，透身熱未全退，毒氣注流而成痢者，以清熱導滯湯去白芍，查肉，甘艸。

厚朴加生地黃地骨皮木通主之若痲毒未清變成
赤白痢者以加減黃芩湯去白芍查肉甘艸加地榆
皮連翹牛蒡子主之如痲後成痢赤白腹痛者以古
方黃芩湯加只壳治之亦有久瀉而成痢者原因氣
血已虛不得已用人參黃連枯黃芩乾薑煎湯從權
治之如正收及收後而下痢白色者藥宜用解毒涼
血行滯氣之品以靜遠主人黃芩湯除去人參木香
甘艸加生地黃牛蒡子連翹防風主之痢下膿血者
以白頭翁湯去黃柏加防風主之或因食積下滯者
以消食化滯為主川枳壳湯見四十條去甘艸加山查
麥芽木通青皮主之若腹中作脹時痛時止者以鹿

模湯去乾姜甘草加檳榔山楂主之夫麻後成痢乃

積熱移於大腸以治麻後痢統方加減主之有以二

三條加木通枯七條治之者痢後下痢而身熱腹痛者以古方黃

連解毒湯見三十條治壯盛之人內有挾食積滯

能食者以三黃九見四十條利之若麻後赤痢以四物

湯見二十條合古方黃連解毒湯見三十條去枝仁用當

歸尾加只壳治之稍輕者以四物湯見二十條加姜汁

炒黃連榆皮治之如麻後白痢以四物湯見二十條加

陳皮白苓木香更有加生白木者須宜酌用麻後作

痢如兼小便赤澀者以四物湯見二十條加中前子木

通治之麻後痢症或赤或白者以四物湯見二十條倍

白芍藥當歸加大黃少許以利瀉數次痢後泄瀉成

痢者以四物湯見二十五條加地骨皮酒炒黃芩王之若

痢前曾經泄瀉日久未曾清解至於痢後變為休息

痢不問赤白但見裏急後重晝夜不停者此餘毒在

大腸乃積熱移於大腸也急宜行氣養血切不可妄

施瀉劑以圖霸功河間曰養血而痢自止行氣則後

重自除誠格言也宜以河間治久痢方去人參白芍

藥王之有用古方黃芩湯合入水與香薷丸三條十

九體虛者香薷丸內更加人參腸滑者香薷丸內加

榆根白皮治之者宮木皆河間治久痢方之為當也

如自首至尾下痢不輟者必有風毒留滯於內宜解

毒行滯而兼疎風實脾之劑庶幾立應以清熱導滯

清熱導滯湯 十六條用

湯去當歸淡竹葉加防風荆芥治之行用四君子湯
治之者猛而有知山藥吳茱萸
理方并列後 若痢而兼嘔吐噤口不食更腸滑不
止或下鮮血或下紫黯色或下如瘕膿或下如屋漏
水或下如雞肝色如黑菴汁之類兼之氣喘煩渴熱
甚發呃淋色紫晦者皆不治之症

黃連炒酒 檳榔 黃芩炒酒 生白芍 川厚樸薑汁

枳壳炒麩 陳皮各七分 青皮 甘艸各三分 連翹

牛蒡子炒研各八分 楂肉 當歸 淡竹葉各一錢

燈心五十寸引水煎加犀角末三分溫服

紅多者加紅花分 地榆皮 桃仁酒炒各八分

秘瀉甚者與裏急後重之極者加酒炒大黃八分

加減黃芩湯 黃芩 黃連 當歸 枳壳 檳榔

青皮 澤瀉 山楂 槐花 白芍 甘艸 引燈心

古方黃芩湯 治伏氣發溫小腸膀胱三焦 自痢 胆腑合病

黃芩 一分 白芍 六分 炙甘草 一分 大棗二枚引

加半夏 二錢 名黃芩加半夏湯 生姜引

人參黃芩黃連乾薑湯 治胃虛客熱痞滿

人參 黃芩 黃連 炮乾薑 各二錢 水煎溫服

靜遠主人黃芩湯 黃芩 黃連 貝壳 檳榔

青皮 川芎 木香 人參 甘艸 水煎調六一散服

瀉痢湯 治熱痢下重

白頭翁

黃連

黃柏皮

各等分水煎溫服不愈再服

厚樸湯

治脾胃虛作脹腹中時痛時止

厚樸

姜汁炒

陳皮

去白

茯苓

乾薑

炙艸

水煎服

治麻後痢統方

黃連

酒炒

黃芩

酒炒

麥冬

防風

天花粉

元參

枳殼

牛蒡子

木通

枝仁

滑石

枳實

京芍

勾藤勾

甘州

二劑水煎服不愈加猪苓青皮

河間治久痢方

當歸

白茯苓

黃芩

車前子

陳皮

人參

甘州

白芍藥

炮乾姜少許為引煎服

四君子湯

人參

白朮

土炒

白茯苓

甘州

紅棗姜引

附 治麻後痢丹方 西河柳 爲末以沙糖水調服

附 萬氏治麻後痢下鮮血驗方

當歸尾

生地黃

條子苓

黃連

酒炒

枳壳

炒

烏梅肉

生甘草

人參

白芍

水煎服

下虵虫第七十三

上膈胃火盛少食虵虫不安行下行此候不須用方藥
調其餘食症自平

下虵之症多見於麻收之後乃上膈及胃火壯盛少
食虫不能上安而下行虫行下行亦順症也與過
食傷中虫不能容或不同但調其飲食自愈非若
口中吐虫之比耳不須施治