

喉痧輯要

喉痧輯要

洞庭鳳在元賓夫甫誤



爛喉痧至危之症也。蓋寒煖非時，鬱成厲毒。一鄉傳染相同，即是天行之瘟疫。與尋常咽喉通行痧疹俱迥然不同。考其來由，自雍正癸丑年間，曾有是症。發於冬春之際，不分老幼，遍相傳染。發則壯熱燔渴，痧密肌紅，宛如錦紋咽喉。

疼痛腫爛一團火熱內熾醫家見其火熱甚也
投以犀羚芩連梔膏之類輒至隱伏昏閉或喉
爛廢食延挨不治或便泄內陷轉眼凶危醫者
束手病家委之於命孰知初起之時頻進解肌
散表溫毒內達於外豈有不生活者內徑所謂
微者逆之甚者從之火熱之甚寒涼強遏多致
不救良可慨也後嘉慶丙子之春及道光己酉

正月吳下又盛行醫家不能深察禱用寒涼目
擊死亡者夥矣良由冬不藏陽亡冰少雪溫邪
為寒所束若乘勢表散邪從暢汗者得生否則
若有不殞命者予是時甫業醫於胥江浞張爰
廬夫子予親友患是症俱延吾師診治及隨吾
師之臨診立意解表為主荆防柴葛之中或加
麻黃或用萍艸絕不換入一味清涼散劑之後

皆得暢汗滴淋痲痧或見或吞喉痛悉平俱獲
全生茲予避難耒崇舌耕餬口餒課攸閑非知
已不出診迎聞喉痧頗多死亡不少每與松陵
夏君閑設是症志同道合因攷古證今備採要
法著為此編非逞臆說也竇以閱歷有年知此
症之重在發表不在治喉其喉科自有全書毋
庸夾襍若乃此症四時皆有是在隨時活變摠

之暢汗為第一義也。夏君號子垣。今二尹汪公
之表兄。與予為真知己。大方之外。幼科痧症亦
專長。醇然謹厚。去時醫習氣。亦方技中之不概
見者。

同治五年歲在丙寅。葭月鳳賓夫自序於瀛洲
行餘書屋

百集古志

何處正氣死於此山其真如實其日其月其

東漢

東漢

東漢

東漢

喉痧論症

一凡形寒壯熱咽喉腫痛頭痛體痛咳嗽胸悶
鼻塞嘔噁兩目汪々手足指冷脉未濡者或
現浮數此即厲邪痧症需用滾方荆防葛根
湯兩三劑俟其暢汗痧透點至足心舌有楊
梅刺方進辛涼清解之味摠之痧慎於始若
有一毫胸臆未清便是痧疹未透不可早進

寒涼遏伏以致不治

一凡痧疹欲出未出之時宜早為發散以解其毒則無餘患若不預解使之盡出或早投寒涼遏伏多致毒蓄於中或為壯熱日久枯痺或成驚癇或為瀉痢或為咽喉腐爛咳血喘促或作浮腫疔蝕而死此雖一時戾氣之染

然未有不由於人事之未盡也。

一凡痧疹逡巡不出者乃風寒外束皮膚閉密

也。亦宜荆防葛根湯主之。外用芫荽酒以亭

蘇蘸酒浸之。

恐露體冒風
即不用亦可

咽喉如有腫痛腐

爛者宜合玉鑰匙散頻吹之。

方見後

一凡形寒發熱面若裝殊痧不出肌即現上吐
下瀉腹痛如絞甚至發厥口噤目閉神昏此
乃內挾溫滯痧穢外感戾毒暴寒折伏表裏
為病陰陽不通最屬危候每至朝發夕死不
能過兩三日者若投寒涼清解有如操刃急
進藿香正氣散加煨葛根牛蒡子蟬衣焦麩
等味一兩劑得暢汗吐瀉厥止痛停痧得熅

一赤扶過三日。庶無妨礙。但此症吐瀉之後。津液大傷。必然發渴。思飲冷湯。切勿與吞。即甘蔗水。梨。橘子。一切生冷寒涼之物。亦忌。

一凡熱邪壅於肺。逆傳心胞。絡痧疹不得出。或已出而復沒者。乃風寒所遏而然。若不早治。盡必內攻。以致喘急音啞而死。急用升麻葛

根湯加荆芥牛蒡子桔梗蟬退櫻桃核浮萍
枳杷杷葉等煎服外用芫荽酒以苧麻蘸酒
憂之痧症復出喘止乃可無虞倘俸質單弱
者不能透達需用遠邪煎或柴歸飲發之如
進二湯仍不燉赤者急進托裏舉班湯

一凡痧疹只怕不能出若出得暢盡其毒便解

故治痧疹者貴慎於始發熱之時當察時令
寒暄酌而治之倘時令嚴寒即桂枝葛根湯
或麻黃湯俱可用勿拘辛溫遲疑二湯內俱
加入牛蒡子蟬衣桔梗散之如時令大熱以
升麻葛根湯加牛蒡子辰砂蟬衣益元散散
之如果熱火克熾稍加生石膏斟酌用之倘
時令平和以荊防葛根湯加浮萍竹葉之類

使發得透暢莫使其絲毫逗通致生受幻纏
錦痧後切忌大葷魚肉海鮮酸醃瀟辣之物
以杜後患切囑切囑

此入平氣七輕不許肺香或此部合天慈功
應和黃新野世因口部來氣或或二或內則
東靈由由出子尚類合類更時部部富部高
廷部族有部音射部部游無子部部部部部合

論症續要

一凡服表散之劑必得汗至足心痺痧透咽痛
止胸悶舒方去餘邪若有痧汗少或痧現即
隱症勢最險或痧後重感風邪或食鮮葷之
物必有餘毒為患俗稱痧怪痧尾是也痧腹
痧癩痧癆內外諸症百出慎之

一凡服事之人最為要紧必須老成可靠者終

日終夜不得倦怠病人不可脫裏衣以被緊

蓋出汗後不可使露致汗不暢若任性貪涼

雖方藥中病亦難奏效蓋痧邪當發出之時

病人每悶不可耐稍一反側於被內使露以

為適意痧点即隱毒從內陷適意即連死之

道也

一凡痧多屬於肺陽氣從上頭面愈多者為佳。若餘處見而面部不見者名曰白面痧白鼻痧其症最重必多用升發之劑至於痲多屬於脾隱在皮膚之間或成塊如雲頭而突多起於手足身背之上發則多癢或麻木是兼濕疫之故藥宜佐以滲濕祛疫有先見痲沒

見痧亦有痲而不痧。而不痲者亦有喉腐
不見痲痧者表汗則一也。

一凡喉痧由未已久。綱目云天行喉痺一鄉相
似。屬運氣之邪火。或寒藥下之。酸藥点之。鬱
其邪於內。不得出也。正傳云。火性急速。發必
暴悍。必以從治之法。甘桔荆防。加以溫藥為

導徐、頻與不可頓服。切不可驟用寒涼之藥。仲鹵云：痧疹不宜依症施治，惟當治肺，使痧疹發出，則了無餘蘊矣。

一凡神昏識語，惟當透肺邪，不宜用寒涼。即使痧回脫皮，舌紅唇燥，餘火熾盛，只須輕清洩肺為主。是集後方藥中所不載者，明眼人當

深知其意

一凡咽喉閉塞。毒氣歸心。胸前腫滿。氣煩促。下部洞泄不止者死。若初起咽腐。嘔吐清水。神昏。讖語。目光上竄。脈濡而伏。疫声如鋸者不治。又三四日內。津涸舌光。唇齒焦黑。鼻扇口張。目無神者。亦不救。

採集要方

諸方藥品分量可加減用

荆防葛根湯

荆芥 炒 錢半

牛蒡子 三錢

生枙 五分

防風 錢半

白杏仁 三錢

桔梗 一錢

葛根 錢半

招壳 一錢

玉貝 去心研 三錢

加浮萍叶 三錢

升麻葛根湯

痧点隱々不透者用之

升麻 五分

赤芍 錢半

生朴 四分

葛根 錢半

牛蒡 錢

桔梗 錢半

荆芥 錢半

蝉衣 錢

浮萍 錢

加櫻桃核 錢

托裏舉班湯

見点後不用升麻瀉者不用歸身

升麻 一钱

歸身 五分

炙甘草 水炙 五分

柴胡 五分

赤芍 酒炒 一钱

浮萍 三钱

原方有白芷 一钱 當酌用之

製山甲 一钱 當酌用之

蝉衣 牛蒡 荆芥 象貝

隨症可加

透邪煎

柴歸飲与此相同加柴胡

防風

錢半

赤芍

錢半

歸身

錢

荆芥

錢半

牛蒡

三錢

蟬衣

錢

升麻

錢

炙甘草

錢

藿香正氣散

較暑症者藥味不同

蘇葉

錢

藿梗

錢半

桔梗

錢

製川朴 二錢

焦神曲 二錢

茯苓 二錢

製茅朮 一錢

炒半曲 一錢

牛蒡 三錢

煨葛根 錢半

陳皮 七分

生竹 五分

加蟬衣 錢

清火之劑 痧後服

黑豆

赤豆

綠豆

各五錢

生竹 一錢

玉鑰匙

即喉症子字吹藥治一切喉症腫痛腐爛長肉生肌始終用之

製元明粉

五錢

礪砂

五錢

硃砂

五分

梅花冰片

五分

製蚕

五分

右藥用新傾銀罐先裝礪砂後裝元明粉

層之間鍊如昇枯磬之狀鬆脆為貴研極

細末置冷地出火氣後加冰片

金不換方

即前方加人中白三錢

青黛三錢

其元明粉入西瓜皮內冬天懸掛當風瓜上

糊孔中鑽出之硝名曰瓜硝

又方加西牛黃三分

灑珠細末三分

杜牛膝

汁末皆可然此方有餘之家用之亦可不必

搃以子字吹藥為準

申字吹喉散

元明粉 七兩

雄黃 三錢

右研細末用二三錢调入蘿蔔汁內燉溫
一大碗以羊毛筆蘸汁洗掃喉間或漱喉
吐去老痰如有牡牛膝打汁調和更妙但
不可多噉防作瀉

辰字探吐方

治牙關緊閉吐藥之最靈者

真胆礬

三錢

即石胆也

冬月用青魚胆汁拌陰乾研極細末水調送下此藥入口若有不嘔者一切喉腫乳蛾吐出頑痰五鬆如無青魚胆製者亦可用宜預製為愈

附錄 急救中鴉片烟毒方

用胆礬

三錢

甘竹末

一錢

白蜜

四兩

以開水燉化服下。用手於胸間抹捺使其

嘔吐盡淨即活。若鴉片同酒服者不救。

無價散

徐洞溪先生方

治闷痧不出。治闷症。

雄猪糞

臘月用火燉至烟盡為度。水內漂白研細淨三錢。

大冰片

一分

二味絹包

投入煎劑內立驗

異功膏藥

切不可悞入口中

姪婦不可用此

班蝥

四錢

糯米炒黃去翅足去米

此米須

與磚石同包沉於深河之底誠恐

鷄犬悞食傷命至喙至喙

血竭

一分

乳香

一分

沒藥

一分

金竭

一分

元參

一分

麝香

三分

冰片

三分

以上共為細末，研瓶固封。如遇一切喉症及牙痛，用尋常膏藥一張，取此散一指，甲摻在膏藥上，貼於痛處。外皮左痛貼左右，痛貼右貼左。三時皮上即起泡，以銀針挑破，泄氣即愈。凡險症起泡更速。此乾隆丁未年河南卮方傳，全活無數。

備急方

用巴豆肉以紙壓取油捲作紙捻將火点着
即刻吹滅以其烟熏鼻中一時口鼻流涎牙

関自閉

或用草麻子油亦可

又方用巴豆肉研爛綿裹隨左右塞鼻中左

右俱患者左右俱塞

一字散

猪牙皂角

七钱

雄黄

二钱

明礬

一钱

藜蘆

一钱

蝎梢

七枚

以上研为细末吹少许入鼻即吐痰或用

皂角一味捣烂醋调滴入喉间四五匙亦

即吐痰而鬆

喉閉刺少商穴法

少商穴在大指內側之端去爪甲角分许左
右手同以針刺出血未即鬆

喉閉刺委中穴法

穴在膝蓋對後灣內大小腿交界縫中亦用

針刺之

喉痛初起治法

凡喉症初起一日内頭頂髮內有紅點一粒
急將銀針挑破擠出毒血用生姜蘸桐油擦
之若過一週時此点即隱矣

荆防敗毒散

此方專治一切時行疫氣
在人審症加減用之可也

荆芥

防風

柴胡

前胡

羌活

獨活

甘草 桔梗 枳壳 川芎 牛蒡 薄荷

茯苓

● 痲痧採用諸藥

咽喉專治之藥 枳梗 生甘草

喉痧輯要

九

發散之劑

荆芥

防風

牛蒡

葛根

前胡

紫蘇

蟬衣

浮萍

沒攷

麻黃

冬寒必用輕則三分重則五六七八分

透邪之劑

升麻

柴胡

葛根

西河柳

雄猪糞

煨灰漂白用

解毒之劑

射干

姜蚕

山豆根

人中黃

青棉線

祛痰之劑

蘇子

土貝

象貝

白杏仁

姜霜

射干

新鮮石菖蒲汁

杜牛膝汁

竹茹

消腫之劑

馬勃

赤芍

蟬衣

理氣之劑

陳皮

枳殼

蘇梗

鬱金

木香

香附

烏藥

沉香

砂仁

消導之劑

查炭

枳實

厚朴

檳榔

神曲
麦芽
小青皮
萊菔子

清熱之劑
連翹
黑梔
桑葉
桑白皮

丹皮
知母
花粉
地骨皮

石羔
枇杷葉

養陰之劑
鮮生地
細生地
北沙參

疾少詳要

麦门冬 霍石斛

必用肺热已清者方可用

以上诸药原为不能延醫者居家倉卒
随症採取药味加入煎方大略而已坐
高明勿哂其陋然亦不外乎此也

喉癰吊疫神藥

天名精。子曰鶴虱。根名杜牛膝。俗呼為臭花。
狼牀。四五月間最繁。交之有之。採取極易。用
井水洗去泥。連根葉搗取濃汁。放磁盆內。晒
微乾。可丸。每丸重五分。晒極乾。磁瓶收貯。勿
洩氣。否則即化為水矣。如遇疫。聲瀉。喉間
脹塞。及乳蛾等症。用兩三丸。醋研如漿。以羊

毛筆蘸之在喉間連探兩三次痰即吐出不
脹塞矣其物如神若牙關閉者灌汁鼻中亦
可倘遇氣欲絕者將濕棉花捲結抵住糞門
為要恐其氣走下也再急服煎劑

又方用天名精汁丸將陳年福珍酒燉微溫化
服一丸蓋煖避風取出暢汗即愈如症重者

加至三四丸。連服之。如症犯於四五月間。取
連根常葉斤許。搗汁一碗。以陳福珍酒沖和。
燉溫。隨量服之。或得汗。或大吐而愈。

地。其。所。重。非。子。後。昔。子。有。至。如。而。食。

其。所。重。非。子。後。昔。子。有。至。如。而。食。

地。其。所。重。非。子。後。昔。子。有。至。如。而。食。

方法調治必能獲效。此雖好善者固多。然殺生以資口腹者。亦無日不多。予因亦戒殺。有年。為力薄。不能放生耳。每逢患難。輒有神祐。而今而後。更勉為之。既欲保全自己之性命。應當愛惜物類之性命。且不費服藥之資。並不致身體痛苦。以此放生。亦甚便宜。呂祖所謂汝欲延生。須放生者。已先我言之矣。寔夫甫奉勸。