圖像本草蒙筌

享

386

国立国会図書館　タイトル『圖像本草蒙筌12卷首1卷總論1卷』　請求記号　特1-386

ガラス使用

本草蒙筌

亨

特1
386

27.4.4

国立国会図書館　タイトル『圖像本草蒙筌12卷首1卷總論1卷』　請求記号 特1-386

ガラス使用

圖像本草蒙筌卷之二

新安陳嘉謨廷采纂輯　門生　欽邑葉非　鮑倚　婿胡一貫　姪晨　校刊

潭陽後學劉孔敦　若樸　增補

草部中

芎藭　味辛。氣溫。升也。陽也。無毒。生川蜀。名雀腦芎者。圓實而重。狀如雀腦。此上品也。用治凡病證俱優。產歷陽。屬廬州府。名馬銜芎者。根節大莖細狀如馬銜。合止齒根血獨妙。京芎關中所種。關中古西京多種蒔因而得名。功專療偏頭疼。台芎出台州。屬浙江。只散風去濕。撫芎出撫郡。屬江西。惟開鬱寬胸。餘產入藥不堪。煮湯浴身則可。一名香果。嘗載圖經。秋採曝乾拯疳。形擇重實潔白。油者勿用。惡黃耆山茱狠毒。畏硝石滑石黃連。反藜蘆使白芷。乃手少陽本經之藥。又入手足厥陰二經。堪佐升麻。升提氣血

特1
386

止本經頭痛。血虛頭痛之不可遺。（餘經頭痛亦宜用俱各加引經藥）散肝經諸風頭面遊風之不可缺。上行頭目。下行血海。通肝經血中之氣藥也。治一切血。破癥結宿血。而養新血。及鼻洪吐血溺血。婦人血閉無娠。治一切氣。毆心腹結氣。諸般積氣。併脇痛瘀氣疝氣。中惡卒痛氣塊。排膿消瘀。長肉。兼理外科。溫中燥濕散寒。專除外感。得牡蠣療頭風旋暈吐逆。得細辛。治金瘡作痛呻吟。同生地黃煎。禁崩漏不止。用陳艾湯調末。試胎孕有無。（婦人經斷三四月用此藥服之腹內覺動是孕否則病也）所忌須知。單服久服。犯則走散眞氣。令人暴亡。務加他藥佐之。中病便已。○蘼無係苦苗葉。地產又尚雍州。（屬陝西）卻風眩止泄瀉。除蠱毒鬼疰。主蚘逆驚癎

謨按苦蕷不宜單服久服。犯則走散眞氣。令人暴亡。無乃因其氣味辛溫。辛甘發散之過。丹溪嘗此示人也。又古一婦人感患頭風服苦半年。一旦暴死。亦載經註。垂戒叮嚀。迹此觀之。苦蕷之禍。信弗輕矣。故今明醫。每用四物湯。治虛怯勞傷。減去其苦。亦鑒此轍。奈何鄉落愚民。罔明藥性。時採土苦煎茶。謂啜香美體氣稍實。俛俾無虞。儻涉虛贏。鮮不蒙其禍者。惟歸天命。果眞天作孽耶。抑自作孽耶。

鳳翔府苦蕷

永康軍苦蕷

芳藥　味苦酸。氣平微寒。氣薄味厚。可升可降。陰中之陽。有小毒。近道俱生。淮南獨勝。開花雖顏色五品。入藥惟赤白二根。山谷花葉

單根重實有力。家園花葉盛。根輕虛無能。反藜蘆。惡硝斛。（苦硝斛石）畏硝石鼈甲小薊。使烏藥沒藥雷丸。入手太陰肺經。及足太陰脾臟。赤白因異。製治亦殊。赤芍藥色應南方。能瀉能散。生用正宜。白芍藥色應西方。能補能收。酒炒纔妙。（若補陰酒浸勿見火）赤利小便去熱。消癰腫破積堅。主火盛眼疼。要藥。白和血脉緩中。固腠理止瀉痢。爲發之性故也。儻不得已要用。桂酒（肉桂煎酒）漬炒少加。血虛寒人。亦禁莫服。經云。冬月減芍藥。以避中寒。則可徵矣。

（謨按芍藥。何入手足太陰也。益酸澁者爲上。爲收斂停濕之劑。故爾。雖主手足太陰。終不離於收降之體。又至血海。而入九地之下。直抵於足厥陰焉。氣味酸收。又何利小便也。益腎主大小二便。用此益陰滋濕。故小便得通。仲景治傷寒。每多月者。抑非以其主寒熱利小便乎。一說芍藥本非通利之藥。因其能停諸濕。而益津液。故小便自利。於義亦通。又何謂緩中也。益損其肝者。緩其中。卽調血止痛之謂。丹溪云。芍藥惟止血虛腹痛。然諸痛並宜辛散。此僅酸收。故致血調則痛自止。豈非謂緩中也。

澤州芍藥

黃芩　味苦。氣平大寒。味薄氣厚。可升可降。陰也。陰中微陽。無毒。所產尚彭城（屬山東）凡用擇深色。剔去內朽。刮淨外衣。薄片咀成。生炒

如式。單惡葱實。勿令同煎。畏丹砂牡丹蔾蘆。用山茱龍骨引使。枯飄者。名〔宿荃〕入手太陰。上膈酒炒爲宜。堅實者。名〔子荃〕入手陽明。下焦生用最妙。宿荃瀉肺火消痰利氣更除濕熱。不留積於肌表。間。子荃瀉大腸火。養陰退陽。又滋化源。常克溢於膀胱內。一赤痢頻併可止。一赤眼脹痛能消。得五味蒙蠟。五味子牡蠟蒙牡。育妊娠。得白朮砂仁安胎孕。療鼠瘻。同耆歛赤豆。黃耆白歛赤小豆。治腹疼。同厚朴黃連又煎小清空膏。載丹溪方單味而。清頭腦總除諸熱。收盡全功。〔子〕研細煎湯治腸澼膿血

條州黃芩

〔黃連〕味苦。氣寒。味厚氣薄。可升可降。沉也。陰也。陰中微陽。無毒。宣〔連〕出宣城。屬南直隸。肥龍苗少。去苗收者。〔川連〕生川省。瘦小苗多。帶苗收者。並取類鷹爪連珠不必分地土優劣。日曝待甚乾燥。布裹捋音落淨鬚苗。治諸火邪。依各製炒。火在上。炒以醇酒。火在下。炒以童便。實火朴硝。虛火醯醋。痰火薑汁。伏火火伏下焦者。鹽湯。氣滯火。同吳茱萸。血瘕火。拌乾漆末。食積瀉亦可服。陳壁土向東者妙。研炒之。硝茱漆土俱研細。調水和炒肝膽火盛欲嘔。必求豬膽汁炒。又治赤眼。人乳浸蒸。或點或吞。立能劫痛。勝烏附。烏頭附子畏款冬。惡芫菊花芫花菊花玄參。忌猪肉冷水。爲使黃芩龍骨。入手少陰心經。巴豆遇之其毒即解。可熬膏煎液。任合散爲丸。香連丸。廣木香和搗。爲腹痛下痢要藥。茱連丸。吳茱萸佐助。乃吞吐酸。水神方。如止消渴便多。單研蜜爲丸亦効。同枳殼治血痔。同當歸。治眼瘡。佐桂蜜煎服空心。黃連爲君。佐官桂少許煎百沸。入蜜空心服之。使

心腎交於項刻鎮肝涼血。凡治血防風爲上使黃連爲中使地榆爲下使調胃厚腸。益膽止驚癎。瀉心除痞滿。去婦人陰戶作腫。愈小兒食土成疳。消惡瘡惡癰。卻濕熱鬱熱。○又種生羌胡國土。因以胡黃連爲名。乾如楊柳枯枝。折斷一線煙出。氣平寒。味尤苦甚。心內黑。皮略淡黃。惡玄參菊花。亦解巴毒。忌豬肉悞食。令人洩精。療癆熱骨蒸。治傷寒欬嗽溫瘧多熱即解。又痢成疳竟除。補肝膽劫目痛尤靈。理腰腎欽陰汗最捷。小兒盜汗潮熱。婦人胎蒸虛驚。並宜用之。不可缺也。

謨按苦先入心。火必就燥。黃連苦燥乃入心經。雖云瀉心實瀉脾臟。爲子能令母實。實則瀉其子也。但久服之。反從火化。愈覺發熱。不知有寒。故其功効。惟初病氣實熱盛者。服之最良。而久病氣虛發熱。服之。又反助其火也

雅州黃連

宣州黃連

廣州胡黃連

桔梗　味辛苦。氣微溫。味厚氣輕。陽中陰也。有小毒。嵩山註前雖盛。近道亦多。交秋分後採根。噬味苦者入藥。蘆苗去淨。泔漬洗宋泔漬一宿焙乾。入手足肺膽二經。畏白芨龍眼龍膽。開胸膈除上氣壅。清頭目。

国立国会図書館　タイトル『圖像本草蒙筌12巻首1巻總論1卷』　請求記号　特1-386　ガラス使用

潤州荊芥

蜀州莽草

散表寒邪。歐胸下刺疼。通鼻中窒塞。咽喉腫痛急覓。中惡蠱毒當求。逐肺熱。住欬下痰。治肺癰排膿養血。仍消恚怒。尤御怔忡。又與國老甘草並行。同爲舟楫之劑。載諸藥不致下墜。引將軍大黃可使升。解利小兒驚癎。開提男子血氣。〇莽草別種。味甘氣寒。在處山谷生。苗與桔梗似。根甚甘美。可亂人參。土人取蒸扎匾以充人參賣者。卽此是也。善解諸毒。別無所能。蛇蟲毒搗敷。藥石毒生服。以毒藥與之。共處其毒氣自旋消無。野猪被毒箭中傷。亦每食此物得出。

和州桔梗

桔樓實　味苦甘。氣寒。味厚。氣薄。屬土有水。陰也。無毒。春生山野僻處。苗係藤蔓引長。葉作叉有毛。似瓜葉。似甜花。葉花淺黃六瓣。似萌蘆花。實結拳大。青漸赤黃。皮黃蒂小正圓者名桔。皮赤蒂麤銳長者名樓。名傳雖異。證治相同。霜降採收。囫圇搗爛。或煆蛤蜊粉和。擇紫口者煆研。桔樓一斤。明礬四兩。各以新瓦貯盛。置於風日處所。待甚乾燥。復研細霜。明礬者號如聖丹。用薑汁打糊丸就。生薑湯吞下。出何良碧方。蛤蜊者。勝真海粉。可多備聽用。一年。出諸證辯疑方。並主痰喘欬嗽。服下神效立獲。取子剝殼。用仁滲油。重紙包裹。磚壓滲之。只一度。免人惡心。每多次。失藥潤性。畏牛膝乾漆。及附子烏頭。惡乾薑。使枸杞。味甘補法

捷性潤下氣佳令垢滌鬱開。故傷寒結胸必用俾火彌痰降。凡虛怯癆嗽當求。解消渴生津。悅皮膚去皺。下乳汁。炒香酒調末服（取仁炒香熟爲末酒調一七覆面臥少時）止諸血並炒入藥煎湯。（一切血症並治）蔓葉搗汁濃煎中暍（音謁）傷暑服效。○又天花粉即栝樓根。挖深土者曝乾。刮麤皮淨咀片。善潤心中枯渴大降膈上熱痰腫毒排膿。潰瘍長肉。消撲損瘀血。除時疾熱狂酖酒疸去身面黃。通月水止小便利。仍治偏疝。酒浸微煎。如法服之。佳痛如刺（先以五錢以醇酒一碗早晨漬至下午微煎滾於天空下露過一宿次早低凳坐定雙手按膝飲下即愈如未效再服一劑）造粉調粥日食。亦潤枯燥補虛。

栝樓根名天花粉
內有花紋天然而成故名之

衢州栝樓

均州栝樓

貝母　味辛苦氣平微寒。無毒。荊襄多生苗莖青色。葉如大麥葉。花類鼓子花。近冬採根曝乾聽用。有瓣如聚貝子。故人以貝母名。黃白輕鬆者爲良。油里堇硬者勿用。去心咀片。入肺行經。消膈上稠痰。久欬嗽者立効。散心中逆氣。多愁鬱者殊功。仲景治寒實結胸製小陷胸湯。以栝樓子黃連輔斯作主。（因味辛散苦瀉故能下氣今方改用半夏候也）海藏療產後無乳。立三母散。用牡鱉知母尊此爲君。煮豬蹄湯調服。足生人面惡瘡。燒灰油敷收口。產難胞衣不出。研末酒服。離懷時疾黃疸

能歐赤眼膚瞖堪點。除疝瘕咳痺。止消渴熱煩。○又丹龍睛係獨顆瓣無分拆儻悞煎服。令遍身筋不收持。蓋汁黃精。合飲卽解

謨按世俗多以半夏有毒。棄而不用每取貝母代之。殊不知貝母乃太陰肺經之藥。半夏乃太陰脾陽明胃經之藥。何得而相代耶。且夫欬嗽吐痰。虛勞吐血咯血痰中見血。咽痛喉閉。肺癰肺瘻。婦人乳難癰疽。及諸鬱證此皆貝母爲向導也。半夏乃爲禁用。若涎者。脾之液也。美味膏粱多煿大料。皆生脾胃濕熱。故涎化稠粘爲痰。又則生火。痰火上攻故令昏憒不省人事口噤偏廢僵仆瘈瘲不語。生死旦夕。自非半夏南星扁可治乎若以貝母代之。則束手待斃矣

貝母實　○○○○　丹龍睛圓無瓣者勿用　○○

貝母

欵冬蔬　味辛甘。氣溫陽也。無毒。生常山縣名屬浙江山谷。及上黨郡名屬山西。二月採花。三月採葉。大成叢似葵花出根下。如菊。百草中惟此不顧氷雪。最先春者也。原呼鑽凍。今名欵冬。撰末舒嫩蓋採收。去向外裹花零殼。甘草湯浸一宿。待乾。搽碎纔煎。惡硝石皂莢玄參畏麻黃辛夷貝母。仍畏四味苓連者莆黃芩黃連黃者青莆使杏仁。宜紫菀。治肺癰膿血腥臭止肺欵痰嗽稠粘。潤肺瀉火邪。下氣定喘促。卻心虛驚悸。去邪熱驚癎。補劣除煩。洗肝明目。又歐久嗽燒煙吸之。

資州款冬花

紫菀　味苦辛。氣溫無毒。近道多生。真定郡名屬北直隸。獨勝。根甚柔細。春初採收。水洗淨去頭。蜜浸宿焙用。忌雷丸遠志惡瞿麥天雄。畏茵陳蒿。使款冬。蘆主款逆痰喘。肺痿吐膿。治小兒驚癇。寒熱結氣。虛勞不足。能補。蠱毒痿蹙。堪啖。仍佐百部款冬。研末。薑梅湯下。共治久嗽。立建神功。款冬。蘆各一兩。百部五錢為末。每服三錢。生薑烏梅湯送下。食後及臨臥。特各一服。○〔女菀〕氣味同。漢中郡名屬陝西　川谷產。一名白菀。惟畏鹵鹹。紫菀缺時用此可代。亦主驚癇。寒熱氣喘。又止霍亂。瀉痢腸鳴。除肺傷款勤。去膀胱支滿。

解州紫菀

信州馬兜鈴

滁州馬兜鈴

馬兜鈴　味苦。氣寒。陰中之陽。無毒。山谷俱有。野坂尤多。藤蔓繞樹而生。結實如鈴。五瓣去葦膜取向裏匾子。入藥劑微炒燥為良。燒煙熏痔瘻癧瘡。煎湯劫痰結喘促。去肺熱止款。清肺氣補虛。○根名青木香。亦為散氣藥。

木香　味甘苦。氣溫。味厚於氣。降也。陰中陽也。無毒。出自外番。來從閩廣。形如枯骨。苦口粘牙。凡欲用之。勿見火。日。合丸散。日。際熏乾煎。熟湯。臨服投末。氣劣氣不足能補。氣脹氣塞能通。和胃氣神。行肝氣最捷。散滯氣於肺上。膈破結氣於中下焦。敺九種心疼。逐積年冷氣藥之佐使。亦各不同。破氣使檳榔。和胃佐薑橘。止霍亂吐瀉。嘔逆翻胃。除痞癖癥堅。膵腹脹疼。安胎健脾。誅癬散毒。和黃連。治暴痢。用火煨。實大腸辟瘟疫邪。御霧露瘴。勿老云總調諸氣之劑。不宜久久服之。

謨按王海藏謂本經云。主氣劣氣不足。藥性論謂安胎健脾。是皆補也。衍義謂瀉胸腹窒塞積年冷氣。日華子謂除痞癖癥堅。是皆破也。勿老總謂調氣之劑。不言補。不言破。諸說不同何也。恐與補藥爲佐則補。與瀉藥爲佐則瀉。故云然也。

廣州木香

滁州青木香

大茴香（即懷香子）味辛。氣平無毒。鄉落多生。秋月方採。殼有八角。子赤藏中嚼甚香甜。鹽酒炒用。入心腎二臟及小腸膀胱。主腎勞疝氣小腸氣攣疼。理乾熟。腳氣膀胱氣腫痛。開胃止嘔。下食。調饌止臭。生香。爲諸痿霍亂捷方。補命門不足要藥。療惡腫癰毒。搗根葉汁吞。○又小茴香。家園栽種類蛇床子。色褐輕虛。亦治疝散疼。每同煎取効。飲饌大料。增入尤奇。○別種蒔蘿。出自閩廣。顆粒似蔓椒開口。（俗呼蒔蘿椒。內有黑子但皮薄色褐不紅耳）氣味比茴香更辛。散氣除脇肋膨

大茴香　小茴香

廣州蒔蘿



蘼香子

香附子　即莎草根　味苦甘。氣微寒。氣厚於味。陽中陰也。無毒。近道郊野俱生。高州屬廣東出者獨勝。狀如棗核。周匝有毛。秋取曝乾。忌犯鐵器。

預舂熟。童便浸透。復搗碎。砂鍋炒成。若理氣疼。醋炒尤妙。乃血中氣藥。凡諸血氣方中。所必用者也。快氣開鬱。逐瘀調經。除皮膚瘡瘍外邪。止霍亂吐逆內證。炒黑色。禁崩漏下血。調醋末。敷乳腫成癰。宿食可消。泄瀉能固。感熱長毛髮。益氣克皮毛。久服利人。（疎利之劑亦當解悟。又引血藥至氣分而生血。故因而稱曰婦人要藥也

謨按本經諸方用逐瘀血調經。是下氣而推陳也。用治崩漏不止。是益氣而止血也。又云。引血藥至氣分而生血。是又能補。何如言相背戾。用相矛盾耶。雖然。是亦陰生陽長之義爾。但本經未嘗言補。惟下老湯用之。言于老人有益。意有存焉。蓋于行中兼有補。補中兼有行。正如天之所以爲天者。健而有常也。健運不息。所以生生無窮。卽此理也

澧州莎草

益智　味辛。氣溫。無毒。嶺南州郡。歲歲有生。去殼取仁。研碎入藥。生君相二火。入脾肺腎經。在四君子則入脾。在集香丸則入肺。在鳳髓膏則入腎。三經而互用者。蓋有子母相關意焉。和中氣。及脾胃寒邪。禁遺精。併小便遺瀺。止嘔噦而攝涎唾。調諸氣以安三焦。更治夜多小便。入鹽煎服立効

雷州益智子

縮砂蜜　味辛苦。氣溫。無毒。舟產波斯國中。及嶺南山澤。苗高三四尺許。類高良薑苗莖。葉有八九寸長。闊半寸許。開花近根。嬌嬈結實成穗。連綴皮緊厚多皺。色微赤黃。子八漏一團。粒如黍米。故名縮砂蜜也。秋採陰乾。精製如式。先和皮慢火炒熟。纔去殼取仁。研煎與益智子人參爲使。入肺。與白檀香荳蔻爲使。入膀胱腎。赤白石脂爲使。入大小腸。除霍亂。止惡心。卻腹痛安胎。溫脾胃下氣。治虛勞冷瀉。併宿食不消。止赤白泄痢。及休息痢證。總因通行結滯。服之悉應如神。起酒味甚香。調食饌亦妙

新州縮砂蜜

国立国会図書館　タイトル『圖像本草蒙筌12巻首1巻總論1巻』　請求記号　特1-386　　ガラス使用

草菓

草菓　味辛。氣溫。升也。陽也。無毒。惟生閩廣。入月採收。肉子大粒成團。外殼緊厚黑皺。尼資入劑。取子剉成。氣每熏人。因最辛烈。夏月造生魚鱠。亦多用此釀成。故食饌大料方中。必伏以爲君也。消宿食立除脹滿。去邪氣且郤冷疼。同縮砂温中。焦佐常山截疫瘧。辟山嵐瘴氣。止霍亂惡心

謨按草菓本經原未載名。今考方書。補其遺缺。但性辛烈過甚。凡合諸藥同煎。氣獨熏鼻。則可知矣。雖專消導。大耗元陽。老弱虛羸。切宜戒之

廣州肉豆蔻

肉豆蔻　味苦辛。氣温。無毒。胡國多生嶺南亦産。一名肉菓。形類彊九。油色肥實。佳。麵包煨熟用。所入經絡。推手陽明。療心腹脹疼。卒成霍亂者。可止。理脾胃虛冷。不消宿食者。能温。男婦傷暑。血痢有功。小兒傷乳。吐瀉立効。痢疾助之。白粥飲。吐瀉佐以生薑湯

白豆蔻　味辛。氣大温。味薄氣厚。陽也。無毒。原出外番。今生兩廣。苗類芭蕉。最長葉如杜若。不凋。開花淺黄。結子作朶。生青熟白。七月採收。入手太陰肺經。別有清高之氣。散胸中冷滯。益膈上元陽。温脾土。郤疼。退目雲去障。止翻胃嘔。消積食脹

廣州白豆蔻

草豆蔻　味辛。氣温。陽也。無毒。交趾國名多生。嶺南亦有。苗類杜若。梗根似高良薑。花作穗。嫩葉卷之而生。葉漸舒。花漸出。如芙蓉淡紅。實結苞。至秋成殼而熟。秋方黃。似龍眼微鋭。外皮有稜（如菱子稜無鱗甲中子連綴亦似白豆蔻多粒）甚辛香。應時採收。曝乾收貯。入劑剝殼取子。行經惟胃與脾。去腸下寒。止霍亂吐逆。醫膝上痛。逐客忤邪傷。酒毒尤消。口臭即解

（漠按草豆蔻。用治中脘冷疼。鮮有得其眞者。市家多以草仁假代。安穫奇功。考究圖經著明形色。俾後醫士過目即知。即但可取效病人。抑亦不受欺於賣者也）

草豆蔻

霍香　味辛甘。氣微温。味薄氣厚。可升可降。陽也。無毒。嶺南郡州。人多種蒔七月收採。氣甚芬香。市家多攙棉花葉茄葉假充。不可不細擇。剪揀去枝梗入劑。專治脾肺二經。加烏藥順氣散中。奏功子肺。加黃耆四君子湯內。取效在脾。入傷寒方。名正氣散。理霍亂仰嘔吐止。開胃口。令飲食增。禁口臭難聞。消風水延腫

蒙州藿香

儋州高良薑

雷州高良薑

高良薑　味辛苦。氣大温。純陽無毒。高良係廣屬郡。今誌改名高州薑。乃地土所生。形多細小而緊健。脾消食。下氣温中。除胃間冷逆衝心。邵霍亂轉筋瀉痢。翻胃嘔食可止。腹痛積冷堪歐。○結實秋收。名紅豆蔻。善解酒毒。餘治同前

胡椒　味辛。氣大温。屬火有金。無毒來從南廣。出自西戎。蔓生苗莖軟柔。長僅寸半。延發枝條細嫩。與葉相齊。子結條中。兩兩相對。其葉晨開暮合。合則將子裹藏。陰氣不泄。故甚辛熱。狀如鼠李。六月採收。番人呼為昧履支。中國稱曰胡椒。子殺一切魚肉菰蕈之毒。調諸殽食饌湯飲之需。下氣去風痰。温中止霍亂腸胃冷痢可卻。心腹冷痛堪除。療產後血氣刺疼。治跌撲血滯腿痛。食勿過劑損肺傷脾。○又草澄茄。柄麄帶圓。係嫩胡椒青時摘取。一云向陽生者為胡椒。向陰生者為澄茄。化穀食理。逆氣多効。消痰辟止嘔噦。殊功染鬚髮香身。逐鬼氣除脹傷寒。欬噫亦每用之。○山胡椒所在俱生顆粒略大。止痛破滯。俗用亦靈

胡椒

防風　味甘辛。氣温升也。陽也。無毒種生沙苑屬。河南根類蜀葵。秋後

採收曝乾入藥。殺爲頭大毒惡黎蘆 黎蘆白斂芫菪 芫菪乾 撐堅實脂潤。爲良去蘆頭釵股不用係太陽本經之藥又通行脾胃二經職居卒伍卑賤之流聽命即行隨引竟至盡治一身之痛而爲風藥中之潤劑也治風通用散濕亦宜身去身半已上風邪。稍去身半已下風疾收滯氣面頰尤瀉肺實有餘歐眩暈頭顱更開目盲無見故云除上焦風邪要藥儻或誤服反瀉人上焦元氣爲害豈淺淺哉花止痛骨節間亦治風効子消穀胃脘內又調食香。葉收採煎湯。主風熱汗出

防風

味辛苦。氣平寒。陰也。無毒。多生漢中府。屬陝西 通行十二經。畏。

防已

草薢。敗雄黃毒惡。細辛。宜使殷藥狀與木通近似。氣味大異。無益有傷。凡覓賣家因難得眞多採似者假代殊不知氣味大異。無益有傷。凡覓拯疥。甚宜細審種因根苗各治名分漢木兩呼。漢防已是根破之紋作車輻解。苦實馨香。木防已是苗皮皺上有丁足子。青白虛軟。宗此辯認庶不差訛。並刮淨麁皮縷咀成薄片。漢者主水氣名載君行 音抗 木者理風邪職僉使列故云腰已下至兄濕熱腫痛腳氣及利大小二便退胸胠積熱消癰散腫非用漢者不能成功若療肺氣喘欬膈間支滿併除中風攣急風寒濕痺熱邪。此又全仗木者以取効也。

謨按東垣云防已性苦寒純陰能瀉血中濕熱通血中滯塞補陰泄陽助秋冬瀉春夏之藥也譬諸於人則險而健者類之夫

險健者每每幸災樂禍。遇有風塵之警。必竟借爲亂階。然而見善亦喜見惡亦怒如善用之可使禦敵兇暴之人衝突險固之地亦不爲無益者也故凡瞑眩之藥聖人安得因之而便廢耶亦必存之以待善用。今夫防已聞其臭則可惡下咽則令身心煩亂飲食減少。藥之瞑眩誠爲拗拙至於通行十二經以去瀦熟壅塞腫疼反治下注脚氣除胸脇積熱而庶其基則非此不可誠爲行經之倦藥也然雖藥力之能亦在人善用而不錯爾復有不可用者數端今悉舉陳使知警省如飲食勞倦陰虛內熱元氣穀氣已虧之病而以防已瀉去大便則重亡其血此不可用一也如大渴引飲是熱在下焦氣分宜滲瀉之其防已乃下焦血藥此不可用二也如外感風寒邪傳肺經氣分濕熱而小便黃赤甚至不通此上焦氣病禁用血藥此不可用三也若人久病津液不行。上焦虛渴宜補以人參葛根之甘溫儻用苦寒之劑則促危亡。此不可用四也仍不止如此。但上焦濕熱者。皆不可用。若係下焦濕熱流入十二經以至二陰不通。必須審用可也。學者宜併覽之。

典化軍防已

黔州防已

紫蘇　味辛。氣微溫。無毒。各園圃俱栽。莖葉背面並紫。氣味香竄者甚美。五月。端午日採。乾。發表解肌。療傷風寒。甚捷。開胃。下食。治作脹滿。羌脚氣兼除口臭。亦碎梗下諸氣。略緩體稍虛者用。宜子研

紫蘇

簡州蘇

荊芥　味辛苦。氣溫。氣味俱薄。浮而升陽。也無毒。山谷生。在處有。作蘇香氣又名假蘇。夏末採收。陰乾待用。須取花實成穗。能清頭目上行。發表能解利諸邪。通血脉。傳送五臟下瘀血。除濕痺。破結聚散瘡瘍。和醋。熬。風腫疔瘡。研調酒理。中風强直。仍治產後血暈。炸末搽入重便

成州假蘇即今荊芥是也

白芷　味辛氣溫。氣味俱輕。升也。陽也。無毒。所在俱生。吳地尤勝。氣甚香窜。又名芳香。根收處暑。灶無是日收則不蛀。色選黃澤。效速。惡旋覆使。當歸通行手足陽明二經。又為手太陰經之引使也。乃本經頭痛中風寒熱。解利之要藥。亦女人漏下赤白。血閉陰腫之佳丹。炒宜黑用。作面脂。去面皰。散目瘡。止目淚。去肺經風寒。治風通用。療心腹血痛。止痛多宜。外散乳癰背疽。內托腸風痔瘻。排膿消毒。長肉生肌。一切瘡瘍並用。調治與細辛辛夷作料。治久患鼻塞如神。○葉

澤州白芷

名高麻道家常採煎湯浴體能殺尸蟲

細辛　味大辛氣溫氣厚於味升也陽也無毒山澤多產華陰（屬陝西）獨良葉類馬蹄莖如麥蘖其根甚細其味甚辛藥中惟採根煎故因名曰細辛也賣者多以杜蘅假代殊不知氣雖小異入口吐人不可不細擇耳反黎蘆忌生菜畏滑石硝石惡狼毒（狼毒山茱萸）黃者雖手少陰引經乃足少陰本藥或用獨滑爲使或佐曾青聚根止本經頭痛如神治諸風濕痺立効安五臟尤益肝膽溫陰經旋去內寒利竅通精氣下氣得歸芍牡本芎芷甘草（當歸芎藭芍藥牡丹皮蓼本川芎白芷甘草）療婦人血閉神方得朱明魚膽羊肝（石決明青魚膽青羊肝）止風淚目疼劫劑寒邪發在裏之表合麻附三味煎湯（麻黃附子細辛湯載仲景方）口臭及置齒腫疼煮濃汁熱含冷吐過半錢單服令氣塞命傾

信州細辛

麻黃　味甘辛氣溫氣味俱薄輕清而浮升也陽也無毒青州彭城（並屬山東）俱生榮陽中牟（並屬河南）獨勝惡細辛石葦宜陳久年深凡欲用之須依法製去根節單煮數沸傾上沫用火焙乾任合丸散煎湯

方不令人煩悶以厚朴爲使入手足四經手太陰經本經之藥陽明經榮衛之藥而又入足太陽經手少陰經也發汗解表治冬月正傷寒如神驅風散邪理春初眞溫疫果勝泄衛實消黑斑赤疹去榮寒除身熱頭疼春末溫瘧勿加夏秋寒疫切禁因時已變溫熱難抵劑之輕揚仍破積緊癥堅更劫欬逆痿痺山嵐瘴氣亦可禦之若蜜炒煎湯主小兒瘡疱患者多服恐致亡陽止汗固虛根節是妙

謨按東垣云麻黃治衛實桂枝治衛虛雖俱治太陽之經其實榮衛藥也肺主衛心主榮麻黃爲手太陰之劑桂枝爲手少陰之劑故冬月傷寒傷風欬欬者用麻黃桂枝即湯液之源也然麻黃又爲在地之陰陰當下行何謂發汗而升上經云味之薄者陰中之陽麻黃屬陰氣味俱薄則陰中有陽可知矣安得不爲輕揚之劑升土而發汗乎但入手太陰經終亦不能離乎陰之本體也

茂州麻黃



同州麻黃

葛根　味甘氣平寒氣味俱薄體輕上行浮而微降陽中陰也無毒各山谷俱生成藤蔓旋長春初發葉秋後採根入土深者力洪去皮用之効速殺野葛巴豆百毒入胃足陽明行經療傷寒發表解肌治肺燥生津止渴解酒毒卒中邵溫瘧往來散外瘡瘍止瘀提中胃氣除熱花消酒不醉殼治痢實腸生根汁乃大寒專理天行

威州葛根

藟靈僊 味苦氣溫可升可降陰中陽也無毒隨處平澤俱有不聞水聲者良先於衆草而生莖方數葉相對花開淺碧根甚密稠冬月採根陰乾日選丙丁戊巳去蘆酒洗忌茗麵湯消腸中久積痰涎除腹內疫癖氣塊散水甲皮虛風中痺痛利腰膝跗踝濕滲冷痛要藥也仍歐癥瘕尤

海州葛根

時病止熱毒吐衄去熱燥消渴婦人熱悶能甦小兒熱痞堪卻葛粉甘冷醉後宜食除煩熱利大小便壓丹石解鴆鳥毒葉敷金瘡搗爛蔓祛咳痺燒灰

石州威靈僊

寧化軍威靈僊

瘀蓋性好走能通行十二經爲諸風濕冷痛要藥也仍歐癥瘕尤療折傷虛者切禁用之多服疏人眞氣

秦艽 味苦辛氣平微溫可升可降陰中陽也無毒出甘松龍洞及河陝諸州長大黃白色爲優新好羅紋者尤妙用菖蒲爲使入太陽手經養血榮筋除風疸肢節俱痛通便利水散黃疸遍体如金除頭風解酒毒止腸風下血去骨蒸傳尸

石州秦艽

蒙本　味辛苦。氣溫。氣厚味薄。升也陽也。無毒。多産河東。亦生杭郡春採根曝三十日成。因其根上苗下。狀與禾蒿相同。故以蒿本爲名。爾惡蘭茹。畏青箱。氣力壯雄。風濕通用。止頭痛巔頂上。散寒邪巨陽經。得白芷作面脂。同木香辟霧露。○實以鬼卿爲君。主風流入四肢

寧化軍秦艽

寧化蒙本

荆州蒿本

蘇荷　味辛苦。氣溫。氣味俱薄。浮而升。陽也。無毒。又名鷄蘇。各處俱種。姑蘇龍腦者第一。龍腦地名。在蘇州府。儒孝前。此處種者。氣甚香。竟因而得名。古方有龍腦鷄蘇丸。即此是也。五月端午日採乾。與薤作葅。相宜。和蜜炒。餞益妙。入手厥陰包絡及手太陰肺經。下氣令脹滿消。散發汗俾閉節通利。清六陽會首。敺諸熱生風。退骨蒸。解勞乏。善引藥入榮衛。乃因性喜上升。小兒風涎。尤爲要藥。新病瘧者忌服。恐致虛汗亡陽。猫犾食之。即時昏醉。蓋亦物相感爾。

蘇州薄荷

香薷

菱薤女菱　味甘。氣平。無毒。泰山谷多生。滁州舒州俱有。葉長有

香薷音柔味辛氣微溫。無毒。三伏堪爲菜蔬。兩京亦每栽種。入藥拯病。隨處可收。大葉者種優。陳年者効捷。主霍亂中脘絞痛。治傷暑小便澁難。散水腫有徹上徹下之功。肺得之清化行熱自下也去口臭有撥濁回清之妙。脾得之鬱火降氣不上焉。解熱除煩。調中温胃〇又有一種名石香薷。延生臨水附崖。葉細辛香弥甚。今多採此。拯治亦佳。

狹表白裏青莖榦黄精相同。強直似竹有節。故一名玉竹。又名地節。咸取象也。根大如指。一二尺長。色黄多鬚。甘美可啖。開青花春末結圓實夏初。八劑採根竹方刮淨。蜜水浸宿。文火烘乾。勿誤取鉤吻黄精。二物俱似菱薤。但菱薤節上有毛。葦斑葉尖處有小黄點爲異。須仔細辯認。眞假考古方多用。畏鹵鹹。勿加。益氣補中潤肺。除熱主心腹結氣。虚熱濕毒。治腰脚冷痛。天行熱狂。止皆爛瞤。逐風搖四末。澤容顏。去面黑黯。調氣血。令體康强〇又種女菱。辛溫氣味。與菱薤全別。似白斂蔓生。開白花。結細子。在荆襄每名曰蔓地楚。今人常謬以爲白頭翁。採得陰乾。去頭上白蓋。剉成細片。拌豆淋酒蒸。從巳至申。方取曝用。主霍亂腸鳴洩痢。灑淅風寒。理遊氣上下無常。癮瘨寒熱。消食。敗積。出汗散邪。

讀按菱薤本經與女菱同條。考其諸註有指一物二名。有謂自

是二物。又後女萎與前女萎同名。亦云功用並同。信非二物。疑乃剩出一條也。但考陳氏所註謂古方用者。又似差殊。胡洽治時氣洞洩墨下。有女萎丸。治傷寒冷下。結腸丸。亦有女萎。治虛勞小黃耆酒。云下痢者。加女萎。詳此數方所用。乃後加圈女萎緣其性溫。主霍亂洩痢故也。又茵芋酒用女萎。主賊風手足枯痺。四肢拘攣。女萎膏治身體瘡斑剝乃似前與萎蕤同條女萎緣其主風搖四末。及去黑黯澤容顏。故陳藏器亦謂更非二物。是不然。況此女萎性平味甘。後條女萎性溫味辛。性味既殊功用又別。安得爲一物乎。又續命鬱甲湯。治傷寒七八日不解。鬱甲湯。治脚弱並用萎蕤。又萎蕤飲主風熱項急痛。四肢骨肉煩熱。萎蕤丸主風虛熱發即頭痛。乃似前與女萎同條。萎蕤緣其主虛熱濕毒故也。三者主治既殊。則非一物明矣。又云萎蕤一名地節。極似偏精。疑即青黏即華佗所服漆葉青黏散是此也。然世無復能辯者。未敢爲信。姑著之以俟明達折衷爾。

滁州萎蕤

舒州女萎

某耳實

味苦甘。氣溫。葉苦辛微寒。有小毒。本生蜀川。今發各處。一名蒼耳實。小刺多。羊過即粘綴毛中。故又名之曰羊負來也。秋採微炒入藥。最忌猪肉米泔。散疥癬。徧身瘙癢。者立効。祛風濕周痺。四肢攣急者殊功。止頭痛。善通頂門。追風毒。任在骨髓。殺痡蟲。濕蟲。主惡肉死肌。益氣開聰明。强志煖腰膝。亦堪久服。明目輕

身。根葉逢端午收藏。辟惡入病家無畏。汁攪小便同飲。去疔腫如神。接安舌下流涎。治目黃好睡。若被犬咬急服。彌佳。痔發肛門煎湯熏妙

滁州菜耳

天名精　味甘辛。氣寒無毒。各處江湖俱生。平原川澤尤盛。與蒌蒿同狀。逢夏秋抽條。花開紫白相兼。葉似菘菜而小。本經別款地菘即此是也。五月採曝。一種數名。辛味似薑有麥句薑之號。香氣如蘭。有蜻蜻蘭之稱。仍謂蝦蟇蓝。因藍狀頗類。又呼天蔓菁。爲蔓菁略同。別說載名天門精。爾雅載名菥蓂。稅系首。昔劉熾曾援塞剖麝而蹶起。晉劉熾射一麝。剖除臟臨援此草塞腹內。後世復相傳云

活鹿草。亦曰劉熾草。名之疊出如許之多。苟弗考詳。寧無疑惑。單用垣衣爲使。專療折傷金瘡。拔腫毒惡疔。下瘀血血瘕。利小便以逐積水。除結熱而止渴煩。追小蟲。去濕痺。亦堪久服。耐老輕身。

謨按一種數名者甚多。名各有因者誠少。此名疊出咸載所因但既稱活麝之功。當亦著濟人之效。歷考古傳方劑。並無用之。各省明醫絕無識者。有用之藥。不得濟用當時。徒列多名。正所謂雖多亦奚以爲也。

防葵　味甘辛。苦氣寒無毒。一云有小毒。不生他郡。惟產襄陽。屬荊廣

明州天名精

一本三莖。一莖三葉。中抽大榦。花開榦端。色白如榦開花慈葉類葵葉色青。根若防風香竄故因名防葵也。三月三日。採根曝乾最易蛀損須時曝之依時入水能浮。切勿悞用狠毒二根形頗相類但防葵根浮水狼毒每根沉水略少異耳善惡大差用宜謹藥劑修合。製法須知。甘草湯浸成塊一宵。黃精汁拌咀片炒燥。主膀胱熱結尿溺不通。治鬼疰癲癇驚邪狂走。疝瘕腸洩堪理小腹支滿能敺。强志除腎邪。益氣堅筋骨。血氣瘤大如椀摩醋塗上即消。中火者。不可服之。令恍惚如見鬼狀。

蛇床子

味苦辛甘。氣平無毒。在處田野俱產。揚州襄州獨勝。春生苗葉成叢。青碎彷彿蒿狀。開白花細緻百餘一窠。四五月開結黃子輕虛。粒如黍米。近秋收採。背日陰乾。所惡之藥有三。牡丹巴豆貝母。入藥取仁炒用。浴湯帶殼生煎。治婦人陰戶腫痠。溫煖子臟。療男子陰囊濕癢。堅舉尿莖。斂陰汗。卻癜瘋。掃瘡瘍。利關節。主腰胯腫痛。祛手足痺頑。大風身癢難當。作湯洗愈。產後陰脫不起。絹袋盛收。婦人無娠。最宜久服。

草龍膽　味苦濇。氣大寒。氣味俱輕陰也。無毒。山野俱有。苗高尺餘。葉類龍葵略尖。根同牛膝甚苦。故因名草龍膽也。須近冬月方採其根。并草湯浸一宵。漉出曝乾待用。伐胃中伏熱。及時行溫熱能滌痢去腸中小蟲。卻驚癎。益肝膽二氣。治癰腫口瘡。敵驚癎除下焦濕腫。併酒疸黃腫堪退。療客忤痞氣。治癰腫口瘡。敵驚癎殺蠱毒。酒浸爲柴胡輔佐。上行治眼目赤疼。努肉必加。翳障通用。空腹勿服。令人溺遺。

信陽軍草龍膽

襄州草龍膽

澤瀉　味甘酸氣寒。氣味俱厚。沉而降陰也。陰中微陽無毒。淮北雖生不可入藥。漢中所出方可拯疴。蓋因形大而長。尾有兩岐爲異耳。但易蛀朽。須密收藏。製宗雷公酒浸曝用。長海蛤文蛤二藥入太陽少陽足經。君五苓散中。因其功長於行濕。佐八味丸內引桂附等歸腎經去陰汗。大利小便瀉伏水。微養新水。故經云除濕止渴聖藥。遍淋利水仙丹。久服輕身。多服昏目。葉壯水臟。通血脈行乳汁。催生實主風痺。除濕邪。强陰氣。益腎服久無子。惟面生光。

謨按澤瀉多服雖則昏目。暴服亦能明目。其義何也。蓋味鹹能瀉伏水。則胞中留久陳積之物。由之而去也。瀉伏水。去留垢故明目。小便利。腎氣虛故昏目。二者不可不知。

邢州澤瀉

絳州瞿麥

瞿麥　味苦辛。氣寒降也。陽中微陰無毒。生泰山川谷。今處處有之。結實與麥同形。故因名曰瞿麥。立秋收採。風際陰乾。惡蟛蜞。使。薯蕷。牡蠣。草附。利小便。君主可用。決癰腫。佐使堪爲。去目腎逐胎。下閉血出刺。

通草　味甘淡。氣平味薄。降也。陽也。陽中陰也。無毒。産江淮山谷。如指大。藤莖。正月採。收陰乾入藥。因孔節相貫。吹口氣即通。故此得名。去皮咀片。瀉小腸火鬱不散。非他藥可倫。利膀胱水閉不行。與琥珀相等。消癰疽作腫。療脾疸嗜眠。解煩熾開耳聾。出音聲通鼻塞。行經下乳。催産墮胎。實結如小木瓜。名曰鴛腹。白黑核。亦能治翻胃證。除熱三焦。根治項下癭瘤。多取絞汁頓服。○又種心空有瓠與燈草同。乃通脫木。立名。憑操碎用。潔白輕虛可愛。女工每剪飾花利水使陰竅通和。退腫令癰閉舒泰。更治産後下乳如神。

謨按通草通脫木經云。行水專利小腸。且多他證之治。既爲良藥。當勿傳訛。奈何時醫每以通草認作別條。木通以通脫木反呼名曰通草。致使市家真僞混賣。候人甚多。殊不知本草立名。各有意寓。通脫木因瓠中藏。脫木得之名。竟直述。通草藤莖不

甚長大故以草稱木通係俗指葡萄藤莖且大且長特加木字總曰通者孔竅悉同行水利腸固並建效其治他證雖百木通不能及一通草矣齊驅並駕安得謂乎況木通栽多家園皮薄堅確實名葡萄通草產自山谷皮厚軟柔實名鷰腹通脫木輕虛潔白皮木脫除三者內似外殊極易分別名正言順何得悖違只緣堅信耳聞不復詳考經意錯亂顛倒莫覺其非醫悞猶閑病悞深可憫也

興元府通草

玄參

味苦鹹氣微寒無毒春生深谷莖方葉似芝蘇又如槐柳細長秋取根初白乾旋紫黑鼻聞微臭咀片忌銅誤犯餌之噎喉喪目古人深戒吳載醫通那韓氏醫通惡者棗薑葉黃者大棗生薑山葉反藜蘆五味可爲君藥惟走腎經強陰益精補腎明目治傷寒身熱支滿忽忽如不知人療溫瘧寒熱往來灑灑時常發顫除女人產乳餘疾歐男子骨蒸傳尸逐腸內血瘕堅癥散頸下痰核癰腫蠱此乃樞機之劑管領諸氣上下肅清而不致濁治空中氤氳之氣散無根浮游之火惟此爲最也

江州玄參

沙參

味苦甘氣微寒無毒江淮俱多宛句註前尤妙叢生崖壁上苗高二尺餘葉類枸杞有叉柄根若葵根而筋大近夏花開白色瓣瓣有白粘膠圖經嘗云此爲小異秋後採根曝用中正白實者佳

反藜蘆惡防已乃足厥陰本經藥也治諸毒排膿消腫安五臟益肺補肝止痓氣絞痧散浮風瘡瘍除邪熱去驚煩易老用代人參形實不同蓋取味之苦甘瀉中兼補略相類爾

淄州沙參

丹參　味苦氣微寒無毒山谷有在處多莖方稜長尺餘青色葉相對似婆荷有毛花紅紫夏開根麤長冬採畏寒水石反藜蘆專調經脉勻善理骨節痛生新血去惡血落死胎安生胎破積聚癥堅止血崩帶下腳痺軟能健眼赤腫可消散癰贅惡瘡排膿生肉碎精魅鬼祟養正殿邪更治腸鳴幽幽瀉下如走水狀

隨州丹參

青葙子　味苦氣平微寒無毒園圃俱有江淮獨多莖直似高青紅葉大如柳柔軟花上紅下白形類鷄冠即野鷄冠花純白者勝子黑扁而光粒同莧實六月收取多治眼科去肝臟熱毒上衝青盲翳障昏花堅筋骨鎮肝益腦髓聰耳莖葉亦妙春採陰乾治風熱瘙癢於皮膚療疥痔蟲蟨於下部止金瘡去血塞鼻

衄來紅。

謨按本經款內載曰子名草決明意謂功專治眼特假別名以

美之非眞爲決明子也若以爲然則原揭諸簡端何不直書而但曰青葙子乎正猶沙參一名知母龍眼一名益智名同而實異也且別條所載決明子藥粒狀稍大主治尤優世醫弗明或偏執一不免得此失彼大辜藥味之能矣幸而此曰草決明彼曰決明子兩名雖一上下字差略此分別不同讀者不可不識也

滁州青葙子

木賊　味甘微苦無毒苗長尺餘寸寸有節產自秦隴諸郡色青麥冬不凋夏將莖收手摺節淨憑煎湯液任合散丸益肝膽退目瞖

秦生消積塊止月經久滴極易發汗大能疎邪得麝香牛角鰓治休息痢證得芎歸餘糧石治赤白崩中得桑耳槐鵝療腸風下血得槐子枳殼療痔瘻來紅

秦州木賊

惡實　即牛旁子　味辛苦氣平無毒原產鄧州屬河南今生各處葉如茵芋葉長大實似葡萄核褐黃殼類粟稗小而多刺鼠過之則綴惹不落故又名曰鼠粘子也秋後採取製宜酒蒸止牙齒蝕疼散面目浮腫退風熱咽喉不利及腰膝風凝風濕癮瘕癰盈肌徃蕩湯毒盛生吞一粒即出瘡頭明目補中潤肺散氣

蜀州惡實

敗醬　味苦鹹氣平微寒無毒俗呼苦薦菜多生深谷中入劑用之夏初收採因似敗豆醬氣故以敗醬爲名入足少陰腎經及手厥陰包絡除腫癰排膿散血破癥結催產落胎去疽痔疥瘙郁毒風痙痺鼻洪吐血能止腹痛凝血可推

江寧府敗醬

白薇　味苦鹹氣平大寒無毒近道處處俱生根類牛膝短小三月三日收採陰乾惡黃者大黃乾薑及乾漆山茱大棗圭中風身熱支滿忽忽人事不知療溫瘧寒熱痰痎洗洗有時發作狂惑鬼邪堪卻傷中淋露可除利氣益精下水瘀瀝

滁州白薇

白蘞　味甘辛氣微溫無毒出江浙蜀川生洲渚砂磧葉如柳樹葉苗似芫花苗根麤長與牛膝頗同但堅脆（音翠）而柔軟鮮有凡資入藥秋後採根甘草湯浸一宵折去蘆鬚焙用欬嗽上氣能降胸脇

逆氣堪感。氣塞腦倒睡不得者殊功。氣衝喉呼吸欲絕者立効。仍治氣塞咽嗌時作水鷄聲鳴。故古人氣嗽方中。每每用之不遺。亦以其善主一切氣也。又能保定肺氣溫藥佐使尤奇。

謨按白薇白前近道俱有。苗莖根葉形色頗同。儻誤採收。殺人家大閑鍵匪特一藥爲然。凡相類者。俱不可不細察爾。

成州白前

舒州白前

白鮮

味苦鹹氣寒無毒。山谷處有。苗莖只餘（嫩可作茹）葉稍白。似槐葉尤繁。花淡紫（四月開）如蜀葵略小。根與蔓菁彷彿。心實皮色白黃。二月採根取皮。差晚則虛惡也。因鼠作羊羶氣息。故俗加羊字呼名。（俗呼爲白羊鮮）惡桔梗螵蛸。及茯苓革解。療遍身黃。疸濕痺。手足不能屈伸。治一切癩毒風瘡。眉髮因而脫落。消女人陰腫。或產後餘疼。止小兒驚癇。併淋瀝欬逆時熱發狂。飲水多多。煎服尤宜。葛洪治鼠瘻有膿。熬白鮮皮膏。吐出立愈。李兵部理肺嗽不已。製白鮮皮湯飲下即差。

滁州白鮮

薇銜

味苦氣平微寒無毒素問名曰麋銜南人謂之吳風草也根莖赤黑花開淺黃葉叢生似芫蔚有毛種兩般分大小各喚大者名大吳風草小者名小吳風草麋鹿有疾銜此草差素問之名又因此出產漢中川谷及兗句耶鄆屬陝西秋採莖葉陰乾須得秦皮爲使主風搖濕痺致歷節痠疼療吐瀉驚癎及鼠瘻癰腫卻熱除痰癇逐水消暴癥婦人服之絕產無子。

謨按神農經中藥之靈者不計千百何獨麋銜矣醴並著素問擅名滑氏讀缺亦嘗論及乃曰矣醴麋銜治人疾也豈誠二藥果有過乎諸藥之能以致喋喋贅美之如是邪蓋緣上古之人俗尚質朴人所病者多中實耶二藥專攻正與相對用每輒效故錄其名中古以來咸溺酒色病之着體虛損居多藥宜補調難行攻擊由是鴆矢淬酒無復下咽麋銜之名絕不聞耳正孟子所謂彼一時此一時故也不然利前之藥豈有不利於後乎。

薇銜

卷耳子　味苦氣微寒微溫無毒苗如蒿艾處處叢生十月採實陰乾荊實薏苡爲使江南人家亦多種此以辟蛇也消食明目益氣輕身主女人經澁不通扶男子陽痿不舉消水氣作脹散瘀血成癰打撲折傷風寒濕痺腰膝重痛骨節痠疼多服獲効全安久服延年不老

寧州菴蕳子

狗脊　味苦甘。氣平微溫無毒。生深谷多生。在處俱有。根採類金毛狗脊。故假爲名。酒蒸須從巳至申。纔咀入劑。惡敗醬。使革蘚。治腰背強疼。閃機緩急。理脚膝軟弱。筋骨損傷。女子傷中欠調。老人失溺不節。周痺寒濕。並可醫疼。

温州狗脊

茵陳蒿　味苦辛。氣平微寒。陰中微陽。無毒。隨處俱產。泰山者良。葉細青蒿。雖同。葉背白色。却異。秋後葉落。莖梗不凋。至春復發舊枝。故因名茵陳蒿也。所行經絡。惟足太陽。專治疸症發黃。入劑俠爲君主。佐梔子附子。分陽熱陰寒。陽黃熱多。有濕有燥。濕黃加梔子大黃湯服。燥黃加梔子橘皮湯煎。茵蔯苗撈則濕黃。苗旱則燥黃。濕則瀉之。燥則潤之。意也。陰黃寒多。只有一證。須加附子。共劑成功。解傷寒大熱。仍除退瘴瘧風熱。乘悉逐。行滯止痛。寬腦化痰。久服輕身。益氣耐老。

江寧府茵陳

絳州茵陳蒿

草蒿（即青蒿）味苦氣寒無毒。山谷川澤隨處有生。葉實根莖並堪入藥。春夏採用。莖葉爲宜。入童便熬膏。退骨蒸勞熱。生搗爛絞汁。卻心痛熱黃。瘧肉腫癰。燒灰淋濃湯點。洩痢鬼氣。研末調米飲吞。秋冬用之。取根與實。實須炒過。根乃咀成。愈風瘙疥癢。止虛煩盜汗。開胃明目。辟邪殺蟲。○白蒿即蓬蒿。別名。似青蒿而葉麤上有白毛錯雜。補中氣。治濕黃。長毛髮殊功。○邪蒿似青蒿細軟利。腸胃通血脈續不足有功。○牡蒿葉長齊頭。一名齊頭蒿。克皮膚血脈滿盛。○角蒿花罷作角。主口齒疳蟲惡瘡。○蘆蒿比小薊略殊。下氣破血。○茼蒿與黃菊近似。安心養脾。○又馬先蒿類芫蔚葉。俗呼虎麻。芫蔚亦理風濕癩瘍。

漢按諺云。三月茵陳四月蒿。人每誦之。只疑兩藥一種因分老嫩而異名也。殊不知葉雖近似。種却不同。草蒿葉皆面俱青且結花實。茵陳葉面青背白。花實全無。況過寒冬。尤大差異。茵陳不凋。至春復舊。餘上發葉。固餘陳老。故名茵陳。草蒿莖餘俱凋。至春再從根下起苗。如草重出。乃名草蒿。發舊餘者。三月可採。產新苗者。四月纔成。是指採從先後爲云。非以苗分老嫩爲說也

瀘州茅根

鼎州茅根

茅根　味甘氣寒無毒曠野平原無處不產本爲蓋屋草俗呼過山龍牧採洗去衣皮搥斷忌犯鐵器甘美可啖斷殼甚長下淋利小便通閉逐瘀血除客熱在腸胃止吐衄因勞傷解渴堅筋補中益氣茜破血且下水腫花止血仍置金瘡又有茅針一名茅笋禁崩漏寒鼻洪腫毒未潰服之一針便潰一孔屋芝陳久酒浸煎濃吐衄血來服亦即止爛茅老屋上及益墻者得醬汁和研斑瘡蠶咬瘡可敷屋四角茅收治鼻洪尤驗取茅屋滴溜水飲殺雲母石毒須知○

又種萱音蕙花甘溫無毒亦止吐衄可貼多瘡

戎州仙茅

江寧府他茅



僊茅　味辛氣溫有毒西域多有蜀浙亦生葉青似茅故此爲名其根獨莖而直旁附細根內肉黃白多涎外皮麤褐二月八月採根曝乾梵語呼阿輪乾陁南人呼婆羅門蜜咀禁鐵器製浸米泔去赤汁毒出無防忌兩般牛肉牛乳主心腹冷氣不能食療腰足攣痺不能行丈夫虛損勞傷老人失溺無子益肌膚明耳目助陽道長精神久久服之通神强記傳云十斤乳石不及一斤僊茅亦表其功力爾誤服中毒舌脹者急飲大黃朴硝數杯仍以末摻舌間遂旋愈也

甘蕉根　味甘。氣大寒無毒。種類不一。地產亦殊。川蜀者。作花大夢堪觀。卷葉中抽莖作花。初生大蕾。如倒垂蒜苞。閩廣者結實極美可啖。他處雖有花實俱無。近歲都下。往往種之。並係芭蕉類。頗同。實非共一種也。此指有子者爲是。須待立秋後採根絞汁服。主天行狂熱悶煩。誤服金石燥渴。產後脹悶。奇効悉臻。搗爛敷去小兒赤遊丹毒。大人發背癰疽。風瘧頭瘡。神功立應。蕉油在於皮內。竹筒挿入吸來。（如取漆法）煩渴飲差。鬚髮塗黑。暗風癇悶。暈欲倒。急飲下一二盞。便甦。子生青熟黃。可曝乾寄遠北地以爲珍果。食每蒸熟。取仁。潤心肺。生津通血脈。填髓。○芭蕉根　性雖相類。醫方內不載。拯疔但吸其油亦能黑髮。

芭蕉花

甘蕉根

景天　味苦酸。氣平。無毒。一云有小毒。人家園亭多以盆植。莖葉堅厚。隨插隨生。俗名掛壁青。謂無土養不瘁。又名慎火草。因治火瘡立差。煎湯浴小兒熱刺痧瘡。搗爛敷小兒赤遊丹毒。金瘡蠱毒兼療風驚。熱燥總醫。花　香細淺紅帶赤白。能止。

景天

徐長卿

徐長卿　味辛氣溫無毒。淄齊淮間俱有。卑濕川澤皆生。春煖茂榮冬寒枯槁。葉如柳葉兩兩相當根類細辛。區區短小。氣臭亦似。三月採收。麪拌以少蜜拌勻。磁甑蒸三伏曝用。去蠱毒疫疾。殺鬼物精邪。溫瘧祛惡氣。逐久服強身。輕身延年。

黃藥根　味苦氣平無毒。藤生三四尺高。莖根與小桑類。萬州屬廣東人者緊重。他處者輕虛。十月採根。外科多用。主咽喉痺塞及諸惡腫毒瘡疽。治蛇犬咬傷。併馬走心肺積熱。生搗取汁。亦合塗。子肉味酸消癭甚捷。收須浸酒日飲數杯。見效即停。不爾項縮。

黃藥

黃藥根

石龍蒭

石龍蒭　味苦氣寒。微溫無毒。生長山谷濕地。九節多味者良。又名龍鬚。織席堪用。五月採莖。日曝。九月採根陰乾。通小便不利熱淋除內傷不足虛疳。殺鬼疰惡毒。去尿管澁疼。潤皮毛。槁枯卻心腹邪氣。久服延壽。明目輕身。○敗蘆煎湯。治淋亦効。

石龍芮　味苦氣平。無毒。雖生川澤。惟出益州（州蜀四）一叢數莖。一莖三葉。葉芮芮短小多缺。子綴綴色黃味辛。（如葶藶）又云。有兩種類水。生者。葉光澤子圓陸生者。葉有毛子銳。入藥劑內。水生者佳。二月八月採皮。五月五日收子。以大戟爲使。畏蛇蜕吳茱。平胃氣欠和。胃熱作痛。補陰氣不足莖冷失精。風寒濕痺。齊齗心腹邪氣竟解。通利関節。悅澤皮膚。久服明目輕身。令人結孕育子。其陸生者。天炙另名取少葉。搽繫臂上一宵。作大泡。狀如火燎。燉赤善惡懸隔。不可不知。

絡石　味苦氣溫微寒無毒。陰山峻壁隨處有之。多包絡石上。或延木上。莖節着處。即生根鬚。葉圓凌冬常青。花白結子。累黑與薜荔木連地錦。石血等。同一類焉。入家亭圃石山亦每種植。既飾採莖葉入藥。擇附石爲良。畏貝母菖蒲。使牡丹杜仲。疾閉不通欲絕水煎湯下立甦。皆癰煩腫延開。蜜和汁服即効。堅筋骨。强健腰足利関節。潤澤容顏。去風熱死肌解口舌乾燥。蛇毒心悶堪散刀瘡瘡口可封。久服輕身。通神明目。延年耐老。○薜荔。雖同絡石。莖葉麁大如藤。治背癰。將葉採收。煎酒飲下利即愈。○〔木連〕味苦。附木而生。苗藤似寄生。緣直上。枝葉如石韋。豐厚且圓。任採煎湯。或收浸酒。初服壯陽。卻病。久服耐老。延年。藤汁取之。堪敷風毒。掃白癜風。瘡除疥癬癩瘍。子生大類蓮房。一年一熟。房內多白汁。久漸黑。凝破血甚良。依時收採。子亦入藥。並載圖經。○〔地錦〕味甘葉

如鴨掌。藤蔓著地隨節有根亦緣木石沿長。每耐寒凍不瘁。煎湯浸酒。破血止疼。祛產後血凝逐腹中血瘕○又種石血亦以血攻狀與絡石相同。但葉尖而半赤。石崖多產。收取無時。煎酒建功。墮胎亦速。

絡石

新安陳嘉謨延采纂輯　門生　歙邑葉棻　鮑倚
婿胡一貫　姪晨　校刊
潭陽後學劉孔敦　若樸　增補

草部下

附子　味辛甘。氣溫大熱。浮也陽中之陽也。有大毒。係烏頭傍出故附子僉名。皮黑體圓底平。山芋狀相彷彿。畏人參黃耆甘草。併黑豆烏韭防風惡蜈蚣。使地膽。種蒔川嵩蜀人春每種蒔冬月收採者汁全。頂擇正圓一兩一枚者力大。製宗陶氏槌法。以刀去淨皮臍。先將薑汁鹽水各半煎入。砂鍋緊煮七沸。次用甘草黃連各半兩加童便緩煮一時。撈貯罐中。埋伏地內。晝夜週畢。囫音忽圇音輪曝乾。藏須密封。用旋薄剉。仍文火復炒。庶劣性盡除。氣因浮中有沉。功專走

而不守。凡和群藥可使通行諸經以爲引導佐使之劑也。除四肢厥逆。去五臟沉寒。噤閉牙關。末納鵝管吹入。紅突丁毒。末調醯醋塗消。口瘡久不差。醋麪和末貼脚底。脚氣暴發腫酷汁攪末敷患間。漏瘡。剉片如錢。封口加艾可炙。矮脚膝健步。堅筋骨。強陰佐八味丸中。壯元陽益腎。非附子不能補下焦陽虛故入味丸去桂附益補腎經陰乃補腎經之陽六味丸也丹溪謂加爲少陰向導恐非是君木附湯內。散寒濕溫脾。陰經在中。眞寒。薑附湯煎可禦。此須生用不在製拘。助甘緩參芪成功。健潤滯地黃建效。內傷熱甚。速入勿疑。此藥治外感語非偏身表涼四肢厥者不身表熱甚而氣虛脈細者正宜速入經云溫能除大熱是也俗醫不知。誤爲補劑。日相晝用。寧不殺人。孕婦忌煎。墮胎甚速。○立春生者。乃謂爲頭。因有腦類烏頭。麪。竟假名爲醫家呼喚。氣味製度。俱與附同。本經云。春採爲烏頭。冬採爲附子。又云附子頂圓正。烏頭頂歪斜。宗此別之庶弗差謬。忌豉汁。惡蔾蘆。反半夏括蔞。貝母茛菪。白斂。遠志爲使。謂經通行。理風痺。祛風痰。散寒邪。除寒痛。破滯氣。積聚。去心下痞堅。亦能墮胎。孕婦切忌。煎膏名射罔。須識數箭射禽獸。創必。倘誤中人。甘草急噉。藍青。萍草。亦可解之。○烏喙音啄諱兩歧。頭上兩岐相合狀如牛角。喙者乃烏之口。因類亦假爲名。一應俱同烏頭惟使別用。莽草。主風濕陰囊瘙癢。止寒熱歷節掣疼。亦墮妊娠。更消癰腫。○天雄亦係一種。其體略細而長。氣味相同。製度弗異。惡腐婢。使亦遠志。忌豉汁。制須乾薑專補上焦陽虛善治一切風氣。酸寒濕痺。緩急拘攣。卻頭面風。往來疼痛。助武勇。力作不倦。消結積。身輕健行。調血脈益精。墮胎孕通竅。○側子狀如棗核。又從附子旁生。畏惡無著。但宜生用。理脚氣驗。散風癆惡瘡。掃鼠瘻惡瘡。劫冷氣濕痺。如前墮孕。女科當知。○吔穗亦一名。木鼈子者是。令人喪目。藥中忌之。

謨按附子烏頭烏喙天雄側子射罔木鼈子七名。實出一種但
治各有不同。今尊會編附其總論。天雄長而尖者。其氣親上。故
曰非天雄不能補上焦陽虛。附子圓而矮者。其氣親下。故曰非
附子不能補下焦陽虛。烏頭原生苗腦。形如烏鳥之頭得母之
氣守而不移。居乎中者也。側子散生傍側。體無定在。其氣輕揚。
宜其發四肢克皮毛。爲治風瘧之神劾也。烏喙兩岐相合。形如
烏嘴其氣鋒鋩。宜其通經絡。利關節尋隙達徑。而直抵病所也
煎爲射罔。禽獸中之即死。非氣之鋒鋩健利者。能如是乎。又有
所謂木鼈子。乃雄喙烏附側中有此穗者。其形摧殘其氣消索
譬如疲癃殘疾之人。百無一能。徒爲世累。且又令人喪目。宜其
不入藥用也

四卷木部中有此同名專入外科之用

附子

大附子　八角附子　烏頭形　烏喙形



成州烏頭

天雄

天南星

味苦辛氣平可升可降陰中陽也有毒下澤極多在處俱有苗類荷梗直起高僅尺餘葉如翦葉杪生兩岐相抱花若蛇頭黃色子結作總鮮紅根比芋猶圓肌細膩且白本經載虎掌草即此後人以天南星改稱亦與鬼蕅蒟蒻相侔每逢冬月間候採殊不知蕅蒟莖斑花紫根極大肌麤南星莖青花苞根略小肌細炮之易裂得此纔眞製須多泡生薑湯七八次或研塡入牯牛膽臘月黑牯牛膽一箇用南星研末取汁拌勻塡入內風乾過年成塊對碎復炒極疳方書謂之牛膽南星即此是也倉卒不能得此依前薑湯泡或火炮並殺毒堪用但性慓烈也乃上行治肺經本藥欲下行資黃蘗引之畏生乾薑及黑附子散跌撲卽疑瘀血墜中風不語稠痰利胸膈下氣墮胎破堅積誅癰消腫水摩簇蛇蟲咬毒醋調貼破腦傷風瘤突額顱麝加數麥先用小針十數枚作一把痛上微刺通竅

用新南星醋摩加麝少許日用一次雖如椀大半月全消

江寧府天南星

滁州天南星

半夏　一名守田　味辛微苦。氣平。生寒熟温。沉而降。陰中陽也。有毒。山谷川澤。處處有之。苗起一莖。莖端三葉。根名半夏。八月採收。反烏頭惡皂莢。畏雄黃。生薑乾薑秦皮龜甲。忌羊肉羊血海藻飴糖。使宜射干柴胡。經入足膽脾胃。久藏入藥同橘皮謂二陳。生嚼戟喉（生用良人喉龍）宜沸湯製七次。仍加薑制。總可投瓶。若研末。揀少枯礬（明泡過半夏四兩入礬一兩共研）拌薑汁捏作小餅。諸藥包裹風際陰乾。此又名半夏麴也。片則力峻。麴則力柔。總主諸痰。驗證佐助。火痰黑老痰膠加

苓連秫樓海粉寒痰清濕痰白。入薑附蒼术陳皮風痰卒中昏迷皂角天南星和。痰核延生腫突。竹瀝白芥子攪劫痰厥頭疼。止痰飲膀痛。散逆氣除嘔惡。開結氣發音聲。脾瀉兼畝。心汗且歛益脾惡濕半夏專能燥濕。勝水故爾孕婦忌用。恐墮胎元。如不得已用之復加薑汁炒過。消渴并諸血證尤禁。莫加因燥反助火邪。眞陰愈被熬害。津枯血耗。危殆日侵。不得不預防也。生半夏消癰腫。成顆者。摩水敷蠍子螫人。塗上即愈。婦人產後暈絕。爲丸塞兩鼻中。能填刻回甦。此扁鵲捷法

讀按內經云。腎主五液。化爲五濕。自入爲唾。入肝爲淚。入心爲汗。入脾爲痰。入肺爲涕。丹溪又云。有痰曰嗽。無痰曰欬。因嗽而動脾之濕也。半夏惟入脾以瀉痰之標。不能入腎以瀉痰之本。然欬無形。嗽有形。無形則潤。有形則燥。所以爲流濕潤燥之劑

也。又小柴胡湯中。加之以治傷寒。寒熱。半助柴胡以主惡寒。半助黃芩而能去熱。及往來寒熱。皆用之有各半之意。故因而名曰半夏云。本經別以守田目之者。蓋緣夏半前後。人多耘蒔在田。斯又指名而生意也

第二卷貝母款後　諺按宜參看

濟州半夏

京三稜　味苦辛。氣平。陰中之陽。無毒。生荊襄陂澤。近霜降採根。狀若鯽魚黃白。體重者美。麪包火炮。加醋復炒過。靈色白屬在氣。違。

淄州京三稜



那州京三稜

專破血中之氣。故消癥瘕血塊。證兼毆積聚氣滯疼。虛者忌煎。恐損眞氣。○仍有三種。亦附其名。黑三稜。色若烏梅。輕鬆。去皮則白。○草三稜。形如鷄爪。屈曲根上生根。○石三稜。色黃。體重堅硬如石。總消積氣。主治相同。

蓬莪茂

味苦辛。氣溫。無毒。多產廣南諸州。或生江浙田野。子如乾椹。葉似蘘荷。莖錢大。略高。根類薑成塊。茂生根底相對。似卵大小不常。九月採收。依前炮製。色黑。屬在血分。氣中之血。專毆。破痃癖

端州蓬莪茂

骨碎補　味苦。氣溫。無毒。陰濕山谷。生長最多。根着樹石上有毛。葉附兩小葉相對。每一大葉邊附小葉槎牙兩兩相對。不結花實。至久乾黃。入藥採根刮去毛用。補骨節傷碎。療風血積疼。破血有功。止血亦効。本名曰胡荽。唐明皇以其主折傷甚驗。故易名骨碎補也。

溫州蓬莪茂

止心疼。通月經。消瘀血。治霍亂積聚。理惡疰邪傷入氣藥。仍發諸香。在女科。真爲要劑。凡求速効摩酒單嘗

海州骨碎補

舒州骨碎補

牡丹　味辛苦。氣寒。陰中微陽。無毒。多生漢中巴郡。花開品色異常。富貴表先賢賛揚。賞玩爲當世貴重。凡資治療。惟採根皮。家園花瓣層。根氣發奪無力。山谷花單瓣。根性完具有神。赤專利多。白兼補最。入劑之際。不可不知。今世多取梗皮代充。或採五加皮雜賣。乖謬殊甚。選擇宜精。經入足腎少陰。及手厥陰包絡。忌葫蒜。畏莧。絲涼骨蒸不遺。止吐衄必用。除癥堅瘀血。留舍於腸胃中。散冷熱血氣攻作於生產後。仍主神志不足。更調經水欠勻。治風癎。定

滁州牡丹

牡丹　味甘苦。氣溫。一云氣涼。無毒。雖係兩種。氣味不殊。隨處田野俱生。北平（今改順天）出者力勝。蓋薊門以薊取名。則可徵矣。凡資治療用。須採根大薊高三四尺餘。葉多青刺而皺。花開如髻。赤若紅藍。北人因之。呼爲千針草也。破血捷。消腫奇。吐衄唾咯立除。沃血崩帶即止。去蜘蛛蠍子咬毒。平燬突痛甚癰疽。並搗爛絞濃汁半甌。攙童便或醇酒飲下。小薊苗高尺許。花亦如前。但葉略差有刺不皺。僅理血疾。不治外科。

大薊　小薊

劉寄奴草　味苦。氣温。無毒。山側道傍。春煖即産。凡用入藥。隨時採收。下氣止心腹急疼。下血瘀産後餘疾。消癥腫癰毒。滅湯火熱瘡。

[子]研泡熱水下咽。腸瀉無度者即已。原因劉裕小名寄奴。用此以治金瘡獲効。竟指名曰劉寄奴草也。

滁州劉寄奴

紅藍花　味辛甘苦。氣温。陰中之陽。無毒。各鄉俱蒔。五月旋收。因葉似藍。故此爲譽。堪染顏色。可作燕脂。欲留日曝乾。入藥手揉碎。惟入血分。專治女科。下胎死腹中。爲末生聖藥。療口噤血暈誠已産瘡壅塞不通。搗取生汁旋嚥。天行瘡難出。研細子末酒吞。或搗

紅藍花

延胡索　即玄胡索　味辛苦。氣温無毒。來自安東。將名屬南直隸。生從奚國。因避宋諱。改玄爲延。形類半夏色黄。用須炒過咀片。專入太陰脾肺二云。又走肝經。調月水氣滯血凝。止産後血衝血暈。跌撲下血淋露崩中。心腹卒疼小腹脹痛。並治之而即効也。



茅山玄
胡索



西玄
胡索

鬱金　味苦。氣寒。純陰。屬土。與金有水。無毒。色赤兼黃。生蜀地者勝。體圓有節。類蟬肚者眞。倘或入藥難求。採山茶花可代（燒灰存性研細調服）涼心經下氣。消陽毒生肌。禁尿血。除血淋。兼鼓血氣作痛。破惡血止吐血。仍散積血歸經。因性輕揚上行。又治鬱遏殊効。名由此得。

曾載本經

鬱金



薑黃　味辛。氣溫。無毒。圖經云。是經種三年已上老薑也。多生江廣（江西廣東）亦產蜀川。色比鬱金稍大。論主治功力。又烈過鬱金。破血立通下氣最捷。主心腹結氣。併疰忤積氣作膨。治產血攻心。及撲損瘀血爲痛。更消癰腫。仍通月經

薑黃味辛溫色黃。似薑瓜圓大。鬱金最少。薑黃常多。今市家惟取多者欺人。謂原本一物。指大者爲薑黃。小者爲鬱金。則世間之物。俱各大小不齊。何嘗因其異形。而便異其名也。此但可與不智者道爾。若果爲是。則鬱金亦易得者。又何必以山茶花代耶。

宜州薑黃

浸州薑黃

艾葉　味苦。氣生寒。熟溫。陰中之陽。無毒。各處田野有。以複道者爲佳。初春布地生。與草蒿狀頗類。但葉背白。風動微香。每端午朝。天

明多採或懸戶資禳疫癘或藏家防治病邪煎服宜新鮮氣則上達炙火宜陳久氣乃下行搗碎入四物湯安胎漏腹痛搗汁攪四生飲止吐衄咯紅艾附丸（同香附水酯糊丸）開鬱結調月經溫煖子宮使孕早結薑艾丸（同乾薑）治陰冷氣去惡氣免證久纏和研細雄黃熏下部瘡瘻癬及疥癬神效和蠟片訶子熏痢疾瀝痔及疥癬神效（實）取入藥令人有殊功作炷炙諸經穴不差鑒竅拔風濕毒尤驗

嫉助水藏壯陽煖腰膝明目○又九牛草產均州山（屬湖廣）葉圓長背白有芒莖獨植高二尺許氣香似艾採亦端陽治諸般風勞止遍身疼痛

謨按艾葉本經及諸註釋悉云生于田野類蒿複道者為佳未嘗以州土拘也世俗反指此為野艾至賤視之端午節臨庵採懸戶辟疫而已其治病症遍求蘄州所產獨莖圓葉背白有芒者稱為艾之精英倘有收藏不吝價買彼處仕宦亦每採此兩京送人重紙包封以示珍貴名益傳遠四方盡聞今以形狀考之九牛草者即此人多不識並以艾呼經註明云氣雖艾香實非艾種醫用作炷以炙風濕痺疼痛勞熱積聚嘗獲效者亦因辛嵐可以通利關竅而已謂之全勝真艾未必能然大抵人之常情貴遠賤近泥于習俗膠固不移縱有本經之文諸家之註何嘗着一目視以為真偽之別耶噫可勝嘆哉可勝嘆哉

蘄州艾葉



地檢　味苦甘酸氣微寒氣味俱薄陰中陽也無毒山谷俱有生長

江寧府地榆

紫草　味苦。氣寒。無毒。入家園圃。多有種栽。三月採根。可煎染紫。凡資入藥。去根取茸。益氣補中。通竅利水。治目黃。成疽。療腹滿作疼。

衢州地榆

入月採根曝乾。惡麥門冬。宜人頭髮。雖理血病。惟治下焦。止婦人帶下崩中。及月經不斷。卻小兒疳熱瀉痢。殿積瘀時行止痔瘻來。紅。禁腸風下血。散乳痙。急金瘡。因性沉寒。故諸血熱者可用。倘若虛寒水瀉冷痢。切宜忌之。

第一卷五加皮款後讀按宜參看

單州紫草

合膏敷瘡癬瘡瘍。單煮托蹤痘瘡癤。

茜草　味苦。氣寒。陰中微陽。無毒。多產郊原。一名地血。苗牽長蔓延草上。根紫色。收採春初煎汁。可染絳紅。入藥勿犯銅鐵。療中多蠱毒。吐下血如爛肝。治跌久損傷。凝積血成瘀。虛熱崩漏不止。勞傷吐衄時來。女子經滯不行。婦人產後血暈。凡諸血證並建奇功除乳結爲癰。理體黃成疸。

茜草　茜根

馬鞭草

味甘苦。氣微寒。有小毒。江淮州郡多。村墟陌路有。苗葉類菊。又若狠牙。高二三尺。莖圓。抽四五穗花。紫春開細碎。紫色秋復再花。穗較鞭鞘不異。故以馬鞭爲名。主下部蝕瘡。併金瘡積血作疼。研末敷妙魯治楊梅瘡用此煎湯先熏後洗漫纔到便覺爽快候温洗之痛腫隨減氣通女人月水。及血氣成癥結瘕生搗煎良。醉酒煎服去小腹卒痛難當。禁久瘧發熱不斷。絞腸沙即効。纏喉痺極靈殺諸般疰蟲。消五種痞塊

馬鞭草

夏枯草

味苦辛。氣寒。無毒。曠野乎原隨處俱有。葉類旋覆花似丹參。冬至後發生。夏至時枯瘁。故謂夏枯草也。四月收採。洗淨陰乾凡用拯疳王瓜爲使。破癥堅癰瘤結氣。散瘰癧鼠瘻頭瘡。寒熱堪歐。濕痺兼卻。

誤讀

按夏枯草。禀純陽之氣。得陰氣即枯。故逢夏至梗枯也。丹溪有言。善補養厥陰血脈之功。能治肝虛目疼。冷淚不止。羞明怕日。久視昏花。用夏枯草五錢。香附子一兩。研細爲散。茶調下咽。服之誠有神功。惜乎本經未之及也。

滁州夏枯草

百部　味甘苦氣微温。又云微寒。無毒。一云有小毒。隨處生長。用惟取根。勞開去心。酒浸火炙。主肺熱上氣。止年久欬嗽急求。治傳尸骨蒸殺寸白蚘蟲須用。又專治蟯蟲。亦可去疳。燒湯洗牛馬身蝨不生。燒煙薰樹木。蛀蟲即死。人家燒燼盡逐蠓蠅。

峽州百部

滁州百合

成州百合

百合　味甘。氣平。無毒。洲渚山野俱生。花開紅白二種。根刻葫蒜。小瓣多層。人因美之稱名百合。百合花者。養臟益志。定膽安心。逐驚悸狂叫之邪。消浮腫痞滿之氣。止遍身痛。利大小便。碎鬼氣。除時疫欬逆。殺蟲毒。治外科癰疽。乳腫喉痺殊功。發背搭肩立効。又張仲景治傷寒壞後。已成百合病證。用此治之。固此名同。然未識有何義也。蒸食。能補中益氣。作麵可代糧過荒。花者。僅治外科。不理他病。凡採待用。務必分留。

壽州前胡

旋覆花　味鹹甘。氣溫無毒。一云冷利。有小毒。叢生深谷之中。名金沸草。顏色深黃如菊。人又呼金錢花。七月採收曝乾入藥。治頭風明目逐水濕通便去心滿噫氣痞堅消胸結痰唾膠漆驚悸亦止寒熱兼除。倘病者稍涉虛羸。防損氣不宜多服。要理金瘡止血。

前胡　味苦。氣微寒。無毒。山谷多產。秋月採根。色白兼黃。氣香甚烈。凡用入藥。須日曝乾。畏藜蘆惡皂莢。以半夏爲使。去痰實如神。胸脇中痞滿立除。心腹內結氣即逐。治傷寒傷熱。又推陳致新。消風止頭疼。保嬰利疳氣。

隨州旋復花

大黃　味苦。氣大寒。味極厚。陰中之陰。降也。無毒。形同牛舌。產自蜀川。必得重實錦紋。勿用輕鬆朽黑。使苗芩一味。入陽明二經。欲使上行。須資酒製。酒浸達巔頂。上酒洗至胃脘中。並載舟楫梢。少停仍緩國老。草不墜有斯佐助。總去病邪。如欲下行。務分緩速。欲速生使投滾湯一泡便吞。欲緩熟宜同諸藥久煎方服。入劑多寡看人實虛蓋性。催沉不浮。故用直走莫守。調中化食。要時水穀利通

推陳致新。頃刻腸胃蕩滌奪土鬱無壅滯。定禍亂建太平。因有峻烈威風特加將軍名號仍導瘀血更滾頑痰破癥堅積聚止疼敗癰疽熱毒消腫勿服太過下多亾陰。若研末鷄清調稠可敷上火瘡取効

誤按大黃極寒硫黃極熱。二黃氣味懸隔。何號將軍相同蓋硫黃係至陽之精。大黃乃至陰之類。一能破邪歸正。挺出陽精一能推陳致新甚定禍亂並有過乎諸藥之能宜其同得居上之號也。

蜀州大黃



連翹　味苦氣平微寒氣味俱薄輕清而浮升也陽也無毒葉短微赤葉狹常青。花細瓣深黃實作房黃黑因中片片相比。狀如翹應故名。凡用採收須擇地土生川蜀者實類椿實殼小堅似椿實外未開者外完而無附蔕剖則中解氣甚芬香纔乾便脫蔕。不擊自然落下。生江南者實若菡萏殼粟軟外有附蔕抱之解脉絕無香氣自少。乾久尚着莖上任擊亦不脫離。以此爲殊惟蜀最勝。去梗旋研入劑方靈餘剩密藏氣味免失經入少陰心臟。手足少陽陽明。瀉心經客熱殊功降脾胃濕熱神効殿惡癰毒蠱毒去寸白蟲蚘蟲瘡科嘗號聖丹血證每為中使通月水下五淋義蓋取其結者散之故此能散諸經血凝氣聚必用而不可缺也實人宜用。虛者勿投。

○連翹係根之名。仲景方云去熱。本經未載此亦附之。

兗州連翹

射音夜王　味苦。氣平微温屬金有木與水火陰中陽也無毒。川澤郊原隨處生長葉如翹羽扇。俗呼烏鬚根。一説葉類萱草堅强根多短鬚黄黑。花開四種紫白紅黄。丹溪取紫爲眞。只因試過有驗三月三日。採根曝乾。凡藥劑投煎務米泔浸宿。散結氣旋平癰毒逐瘀血竟通月經。止唉痺刺疼。殿口熱穢臭去因勞而發之濕熱潰硬腫殊功。行太陰厥陰之積瘀消突核甚捷。仍治胸滿氣脹更療欬急延多。

滁州射干

薁州葍蔔

葍蔔　味苦氣平無毒春月布地生在處沿路有苗類瞿麥。根若蓬蒿葉細竹葉相同莖赤鈒股近似節間花綻色微青黄。五月採收陰乾入藥主浸淫疥瘙疽痔。治丹石發衝眼疼。去小兒蛕蟲療女子陰蝕

国立国会図書館　タイトル『圖像本草蒙筌12卷首1卷總論1卷』　請求記号　特1-386　ガラス使用

苦參

味苦氣寒沉也純陰無毒田野山谷。隨處有生採根曝乾嚼之極苦。反藜蘆莫入惡貝母菟絲使宜玄參。惟作丸服。不入湯散治腸風下血及熱痢刮痛難當療溫病狂言致心燥結胸垂死赤癩眉脫者。敺風有功。黃疸潰溺者逐水立効掃遍身瘡瘕。止卒暴心疼。除癰腫殺疥蟲破癥瘕散結氣養肝氣明目止淚。益腎精解渴生津利九竅通便。妥五臟定志。子生作茨十月堪收亦明山輕身。惟又服有驗

秦州苦參

成德軍苦參

牽牛子

味苦氣寒有毒不拘州土處處有之種春時。旋生苗作蔓繞墻垣籬墜待秋月。方開花如鼓子花碧色日出開日西闔結實白皮裹外成毬。葉發枝間有三尖角。子藏毬內。亦三廉稜。九月採收曝乾。多有黑白兩種黑者屬水力速。百者屬金效遲。炒研煎湯。並取頭末。除壅滯氣急。及疫癀蠱毒殊功。利大小便難併腳滿水腫極驗。

漢按東垣云牽牛非神農經藥出名醫續註。云味苦寒能除濕利小便。治下疰脚氣據所說氣味主治俱誤。凡藥中用牽牛者。少則動大便多則瀉下如水。乃道氣之藥試取嘗之味則辛辣又嚼雄壯漸漸不絕。非辛而何。續註謂味苦寒。果安在哉牽牛但能瀉氣中濕熱不能瀉血中濕熱。況濕從下受。下焦主血是血中之濕。宜用苦寒之味也。張仲景治七種濕證小便不利無一藥犯牽牛者。非不知牽牛能瀉濕利小便也為濕病之根在

下焦。是血分中氣病而不可用辛辣氣藥及瀉上焦太陰之氣
故也仲景尚不敢輕用。夫何世醫。不分血氣而一槩用之乎。夫
濕者水之別稱有形者也若肺先受濕則宜用之。今則不問有
濕無濕。但傷食或欲動大便或有熱證或作常服尅化之藥罔
不用之豈不誤哉殊不知牽牛比諸辛藥瀉氣尤甚。張文懿公。
如悔悟也治當益脾健胃。使元氣生發自然腐熟水穀此治無
以加矣經云。辛瀉氣肺氣病者無多食辛。況飲食勞倦。所傷在
胃。胃氣不行。心火乘之胃受火邪。名曰熱中。脉經云。脾胃主血
其所生病。當于血中瀉之。久潤燥。破惡血瀉胃之濕熱也胃熱上
炎肺受火邪。當用黃芩之苦寒以瀉火。當歸之辛温以瀉血經
桃仁之辛甘油膩以破惡血。兼除燥潤大便。然猶不可專用。須
于黃耆人參甘草諸甘温甘寒。補元氣瀉陰火。正藥內兼而用
之。何則上焦元氣已自虛弱。津液不足。口燥舌乾。若反用牽牛
氣味俱陽。大辛之藥。重瀉其已虛之元氣。復耗其津液利其小
便。以致陰火愈甚。故重則死輕則天誠可憫也。牽牛感南方熱
火之化所生者也。血熱而瀉氣。差悞甚矣。若病濕勝。氣不得施
化。致大小便不通。則宜用之耳。濕去則氣得周流。所謂五臟有
邪更相平也。經云。一臟不平以所勝平之。火能平金而瀉肺者。
即此也。近世錢氏瀉黃散中。獨用防風過于他藥一二倍者。以
防風辛温能于土中瀉金之子。不使助母也。經云。從前來者爲
實邪。謂子能令母實。故以所勝平之也。晦菴語錄中。有秋食薑。

則天人天年經止言辛瀉氣而痲菴云然戒之深也何則秋分食薑令人瀉氣故禁之夏月食薑不禁者熱氣生旺之時宜以汗散薑能發汗以越其熱也薑尚如此況牽牛乎可見味辛之物皆有宜禁之時亦猶牽牛不可一槩用之也

越州牽牛子

味辛苦氣大寒沉也陰中之陰無毒一云小毒用之當熬陝西河北俱多曹州屬山東出者獨勝延生田野收採夏間粒如黍匾小微黃製腳紙文火略炒惡癩蠱石龍芮使偷皮得酒良種因甜苦兩般證量輕重各用苦葶藶行水走泄迅速形壯證重者堪求一卧葶藶行水走泄緩進形瘦證輕者宜服苟或鹵莽勿致殺人逐膀胱伏留熱氣殊功消面目浮腫水氣立效肺癰喘不得臥非此難痊葶藶大棗瀉肺湯主之出仲景方痰飲欬不能休用之勿愈主癥瘕積聚結氣理風熱瘙癢痺瘡又服虛人須記勿犯

曹州葶藶



丹州葶藶

澤蘭　味苦甘一云苦辛氣微温無毒水澤多生家園亦種苗高二三尺許紫節方莖有四棱葉尖對生有毛但不光潤八月花開白色

狀與薄荷花同。初採微辛。此爲異耳。採收入藥。防已使。良理胎產百病。淹纏女科須覓。消身面四肢浮腫。濕中宜求。破宿血。去癥瘕殊功。行瘀血。療撲損勿効。散頭風目痛。追癰腫瘡膿。長肉生肌。利門通竅。○根色紫黑。地笋爲名。與菜根相仵。凡血證俱治。女人產後堪作菜蔬。○又種益妳草。收彷彿澤蘭葉類。莖色略異。細認纔知。果益妳。續斷乳如神。仍去痔。收脫肛最捷。多令香燥。漬酒飲之。

徐州澤蘭

梧州澤蘭

葫蘆巴

味苦。氣溫。純陽無毒。本經云。乃番國蘿蔔子也。原本產諸胡地。今亦時于嶺南春月生苗。夏間結子。子作細莢。至秋採收得。銳仁大茴香。治膀胱疝氣効。三味炒各等分。研末半以酒糊丸。半爲散。每用五七十丸。鹽酒下。散以熟米飲調下。與丸子相間。空心服。日各一二服。即効。得硫黃黑附子。療腎臟虛冷。佳。鼓脹滿腹脇中。退青黃面頰上。

廣州葫蘆巴

革薢

味苦甘。氣平無毒。盛出河陝荊蜀。蔓生葉作三叉。秋月採根。狀類山芋。一種莖有刺者根白實。一種莖無刺者根軟虛。種雖兩般。白者爲勝。又與萹蓄小異。凡收切勿混真。蓋萹蓄根作塊赤黃。革薢根細長淺白。博物誌亦曰萹蓄與革薢相亂。時人每呼白萹

葵者即革薢也。利刀切片。酒浸烘乾。凡用拯疴。忌食牛肉。長葵根
牡犢。及柴胡大黃。爲使宜薏苡仁。治痺盡風寒濕。腰背冷痛止。筋
骨掣痛除。補水臟益精。縮小便明目。逐關節久結老血。掃肌膚延
生惡瘡。仍主恚怒傷中。尤療老人五緩。〇拔葵別種。亦係蔓生俗
呼金剛根。又呼鬱根。延發山野地採根秋月。切片曝乾。浸赤汁煮米
粉嘗辟時疫瘟瘴極驗。搗碎末。釀醇酒飲。去風毒。脚痺殊佳。止小
便益血氣。腰背疼甚。煎服亦靈。

謨按近道所產。呼爲冷飯團。即革薢也。俗之活夫。活婦。多病楊
梅瘡。劑用輕粉。愈而復發。久則肢體拘攣變爲癰漏。剉革薢三
兩。或加皂角刺。牽牛各一錢。水六碗煎耗一半。溫三服。不數劑
多差。原因水衰。用披相火凌土。土屬濕生肌肉。濕熱鬱于肌腠。
故爲癰腫。經曰。濕氣害人皮肉筋脉是也。革薢味甘淡。去脾濕
濕去則榮衛從。筋脉柔。肌肉長。而拘攣癰漏立愈。此亦理也。新
病服之不效者。火盛而濕未鬱。革薢長于去濕。而劣于去熱。病
久則火衰而氣已耗。氣耗則濕鬱。用之去熱故効也。

興元府革薢

荊門軍革薢

預知子　味苦氣寒無毒。出淮南及漢黔諸州。係藤蔓附大木。直上
葉三角綠色。背淺面深。實五月作房。生青熟赤。子藏房內。六七多
枚。如皂角子褐斑。似飛蛾蟲光潤。欲求極貴。因得甚難。取二枚綴
衣服領中。遇毒物則有聲側側。能先知覺。故有此名。服須去皮。研

細湯下。殺蟲誅蠱諸毒並壞根搗水煎。穫効尤速。

預知子

蒴蕎　味苦。氣寒有小毒。一云去執無毒。沃壤多生。平澤亦有。氣作猪臭故名蒴蕎。此草多生江東其處語言呼猪為蒴呼臭為蕎因其氣類故此名之。五六七月採收五月五日六月六日七月七日並宜收採。枝葉花實俱用。惟去執密。酒層層和灑。九蒸九曝完全細末研成蜜丸。豆大。蚕起空腹吞服。酒下多寡隨宜。療暴中風邪。口眼喎斜者立効。治久漸濕痺。腰脚疼痛者殊功。搗生汁服之。主熱毒煩滿。服多則吐。惟少為宜。

海州蒴蕎

謨按此草。處處俱生。視之多有異狀。金稜銀線。素根紫莖。對節生枝。方梗圓葉。如式修製服誠益人。百服則耳目聰明。千服則鬚髮烏黑。追風逐濕猶作泛閑。古方每竭贊揚。深功難盡著述可見至賤之類。却有殊常之能。賢者不可因賤而不收。病家亦勿謂賤而不製服也。

鶴蝨

味苦氣平。有小毒。平原曠野俱有。莖圓二尺高。葉皺大。彷彿紫蘇花白黃儼若甘菊。八月結子。粒細而尖。任收散文為丸大

国立国会図書館　タイトル『圖像本草蒙筌12巻首1巻總論1巻』　請求記号　特1-386　ガラス使用

除州鶴虱

能殺蟲追毒。蚘蟲咬心腹卒痛者。肥肉汁調下即安。砒霜毒吞腸胃未裂者。濃蘆汁送下立吐。

成州鶴虱

酸醬實　味酸氣平寒。無毒。園圃田坂處處有生。春開白花旋結青殼子藏殼內。大若櫻珠。臨熟盡變深紅。五月堪取啖食。孕婦吞下立分娩無憂。小兒食之。能除熱有益。根搗汁極苦。治黃疸易消。葉採陰乾亦利水道。定志益氣。解煩除煩。

酸漿

石韋　味苦甘。氣平微寒。無毒。叢生山谷石上者真。不聞人聲水聲者效。葉長似柳。背有黃毛。不拭射人肺中。即成欬欬難治。務先去淨。灸拌羊脂炒變焦黃。方入藥劑。得菖蒲妙。使杏仁良。治遺瀝成淋。通膀胱利水。療癰疽發背。去惡風止煩。益精氣補五勞。除邪熱安五臟。○生瓦上者瓦韋。爲名。治淋亦佳。本經曾載。

海州石韋

黔州海金沙

海金沙　本經不言氣味只云出產黔州屬雲南一二尺高株材葉小七月收取扱起全科晴日襯紙地間將此曝於紙上以杖敲擊自落細沙且曝且敲沙盡爲度用爲丸散專利小腸得梔子牙硝蓬砂可共療傷寒狂熱本註又云小便不通臍下滿悶者用此一兩臘茶五錢絕細研成煎生薑甘草梢調下三錢不通又再服之旋可以取効也。

海藻　味苦鹹氣寒無毒一云有小毒東海所生葉類萍藻根着水底石上莖如亂髮而烏七夕收採性反甘草治項間瘰癧消頸下瘿瘤聚利水道通癃閉成淋瀉水氣除脹滿作腫碎百邪鬼魅此偏墜疝疼〇又種麤長乃名海藻療風搖兼下水濕〇昆布亦係海菜治與海藻同功散結潰堅並著奇効

讀按榮氣不從外爲癰腫堅硬不潰伏此可消益三藥味俱鹹經云鹹能軟堅隨各引經藥治之則堅無不潰肺無不消也



海帶

昆布

海藻

常山　味苦辛。氣寒無毒。川蜀多生湖浙亦有。擇如鷄骨。入藥方靈。
忌菘菜鷄肉葱。畏玉扎勿令犯。截溫瘧吐痰沫殊功。解傷寒。感寒
熱立効。水脹堪逐。鬼蠱能消。勿滾熱下咽。必露冷過宿。（此服此須
露天空下一宿次早饑服）年老久病人全忌。形瘦稍虛者少煎。蓋性悍兇猛逐
甚捷。功不掩過者也。○苗名蜀漆。味苦純陽。五月收採陰乾使宜
稻蓼桔梗散火邪錯逆。破癥瘕堅。除痞結積凝。碎蠱毒鬼疰。久
瘧兼治。欬逆且調。切勿多服。亦防惡吐。

常山

蜀漆

甘遂　味苦甘氣大寒。有毒。多產京西川谷。二月採根陰乾。狀若連
珠。使宜瓜蒂反甘草。惡遠志。破癥堅積聚如神。退面目浮腫立効。
食停胃內有之即嘔。水結胸中。非此不解。蓋氣直透所結之處。專
于行水攻決。利從穀道出也。凡用斟酌切勿妄投。



甘遂

白斂

白斂　味苦甘。氣平。微寒。無毒。一云有毒。隨處。蔓生深林猶盛。根如鷄鴨卵。三五同窠。採待中秋時。黑皮洗淨。破片以竹穿。日曝入藥與白芨並行。反烏頭。使代赭。退赤眼除熱。散結氣止疼。理小兒溫瘧驚癎。療女子陰戶腫疼。殺火毒。爲火煨湯泡。聖藥治外科。敷背癰疔腫神丹。

白芨　味苦辛。氣平。微寒。陽中之陰。無毒。多出石山。苗高尺許。葉青兩指大。莖端生一苔。花開紫紅。實熟黃黑。根如菱米。節間有毛。二

白芨

八月採。乾紫石英爲使。惡理石。畏杏仁。名擅外科。功專收斂。不煎湯服。惟熬膏敷。除賊風鬼擊。痱緩不收。去潰瘍敗疽。死肌腐肉。敷山根。額之下鼻之上。止衄。塗齆癬殺蟲。作糊甚粘。裱畫多用。

白附子　味甘辛。氣溫。純陽。無毒。一云有小毒。巴郡涼州俱多。砂磧畏濕。纔有。獨莖發葉甚細。周匝生于穗間。形類天雄。入藥炮用。治面上百病。可作面脂。主血痺冷痰。且行藥勢。感諸風冷氣。解中風失音。摩醋擦身。背汗斑。尤去疥癬。用前帝裏邊然藥擦三日。愈忌澡洗。研末收陰囊濕癢。併滅瘢痕。

白附子

白頭翁　味苦氣溫可升可降陰中陽也無毒一云味甘苦有小毒山谷田野在處有之苗作叢葉細稍長葉生枝有毛不澤毛細白色風來反靜風去則搖與獨滑赤箭苗莖三者無差異也近根底處白茸寸餘狀類老翁名由此得交秋收採向日曝乾一云陰乾入藥拯疴蠱實爲使主溫瘧陽狂寒熱治癥瘕積聚腹疼逐血愈金瘡瘕風煖腰膝消瘰癧散癭瘤小兒頭禿瘡腥及兩鼻血衄神効男子陰疝偏腫併百節骨痛殊功牙齒痛亦除赤毒痢必用經云腎欲堅急食苦以堅之劑則下焦虛故必用此苦之劑以堅之

白頭翁

商陸　味辛甘酸氣溫有毒一名樟柳多産郊原葉如牛舌舒長純青色莖高三尺柔脆青赤色秋開花作穗色赤白兩般花赤者根赤相同花白者根白無異白根入藥劑專利水對證可煎赤根見鬼神甚有毒貼腫堪用儻齒莽誤服必刺血喪身釋文云如人形者有神其根有似人形雙手雙足者能通神今術家每云樟柳神之藥花名葛花尤良若陰乾搗末水吞能治人健忘善悟服後臥思所事開心復記詳明並墮妊娠孕婦切忌

謨按白根治水方載多般或取根雜鯉魚蒸湯或咀粒搗粟米

并州商陸

王不留行　即剪金花　味苦甘。氣平。陽中之陰。無毒。江浙近道俱有。莖青。七八寸長。葉尖如小匙頭。花開係黃紫色。子如黍穀黑微圓。三月採根莖。五月取花子。先灑酒蒸一次。復浸發水一宵。微火焙乾。收

鳳翔府商陸

揩擦取軟成膿。如或揩爛加鹽總敷無名腫毒。古讀云。其味酸辛其形類人。療水貼腫其效如神。斯言盡之矣

為丸空心服之。並可獲効。赤根貼腫方亦不同。喉痺窒塞不通。醋熬敷外腫處。石癰堅如石者。

成德軍王不留行

江寧府王不留行

留待用。主金瘡止血。逐痛。治女科催產調經。除風痺風痙內寒。消乳癰。皆癰外腫出刺。下乳止衄。歐煩

蒲公草　即黃花地丁草　味苦。氣平。無毒。一云耩耨草。俗呼孛孛丁。田側道傍

逢春滿地。葉如苦苣有細刺。花類金錢。開莖端。斷其莖。莖中空如蔥狀白汁竟流。開罷花飛絮隨起。絮中有子。落地則生。庭院有之。因風吹至。採宜四月五月。經入陽明太陰。煎汁同忍冬。臨服加醇酒。潰癰腫。消結核。屢著奇功。解食毒。散滯氣。併療神効

蒲公草

穀精草　味辛。氣溫無毒。生長穀田中。採收三月後花白葉細。圓小似星。故又名戴星草也。理咽喉痺塞。止牙齒風疼。口舌諸瘡。眼目腎膜。並堪煎服。取効霎時。又餵馬驢騾。能殺蟲穎內。益力健步。長

秦州穀精草

毛生騾

江寧府穀精草

旱蓮艸

金星草　味苦氣寒。無毒。多生陰濕石上。葉長凌冬不凋。背有黃點兩行。狀若金星相對。故因得此名也。五月採收。風乾入藥。解毒消腫。專理外科。凡百初起惡瘡。但諸未潰陽毒。沿頸瘰癧發背癰疽。或刺碎煮酒類吞。或研末調水旋服。或煎汁淋洗。或搗爛敷塗。并可建功。立能獲効。諸丹石毒悉解。硫黃毒亦能感。根搗浸直麻油

旱蓮艸　一名鱧腸　味甘酸氣平無毒。濕地多生。苗若旋覆花。細而白色實圓而作房。摘斷枝莖汁出。漸黑。或煎酒服。或熬膏敷。染白髮回烏。止赤痢。變黃髮眉稀少。可望速生而繁。火瘡發紅。能使流血立已

搽頭。大生毛髮

施州金星草

佛耳草

佛耳草　味酸氣熱。無毒。郊原野坂處處有之。春生苗尺餘。夏開花黃色。葉與馬齒莧類。細小微有白毛。俗呼黃蒿。人每收採。搗爛和米粉作粿。柔韌音軟而香美可嘗。藥劑凡資。曝乾纔用。以歉冬爲使治寒嗽及痰。尤去肺寒。大升肺氣切勿過服。損目失明

佛耳州

燈籠草　味苦氣大寒無毒。在處俱有。八月採收。花實根莖並堪入藥。苗高三四尺許。花紅而類燈籠。故此爲名。專主熱嗽。蓋因苦而除燥熱。輕能治上焦故也。丹溪嘗云。燈籠草。治熱痰嗽。佛耳草。治寒痰嗽。

燈籠州

三白草　味甘辛。氣寒。有小毒。出自襄州屬　生臨池澤。每交初夏之月。葉端半白如霜。農人候以蒔田。三葉白草便秀。故此爲譽。用惟取根。利大小便。逐脚膝氣。除疝瘕滿去瘧。砂堅癖。歐痰。疔腫仍消。積聚尤劇。

三白艸

燈心草　味甘氣寒。屬金與火無毒。江南澤地叢生。苗莖圓細長直多採蒸熟。向日曝乾。拆取中心白穰用之。燃燈照夜。此謂熟草。不入醫方。務求生剉者爲良。搓碎煎湯。液纔效。通陰竅利小便。除癉閉成淋。消水濕作腫。鉢搗乳香少入。油潤全無。罐藏冰片多加。分兩不耗。根採煎服。功力尤優。○燈花止小兒夜啼。亦能治大人喉痺。金瘡敷上。血禁肌生。

灯心少

蛇舍草　味苦。氣微寒無毒。一云有毒。石上並生。遠近處咸有。一莖五葉七葉。兩種略殊。當用細葉黃花。此品纔妙。昔田父見蛇舍。着別傷蛇即活。嘗採此治癰腫。去內惡毒立痊。由此得名。郊科多用。主驚癎寒熱。邪氣心腹邪氣。除瀝痺疽痔惡瘡。鼠瘻惡瘡。諸丹石燥毒殊功。但蛇蠍蜂傷。悉效。人家多種。亦令無蛇。又用搗爛成膏。堪續已斷手指。○其根收取。乃名女青。搗細末帶之。則疫癘不犯。主蠱毒而逐邪惡。殺鬼魅。以傍不祥。

蛇舍少

水荭少

水荭草（即天蓼）味鹹氣微寒無毒。一云味辛有毒。雖生各處。多在水傍。苗莖高尺餘。葉大色赤白。五月採實。用者最稀。去痺氣。除惡瘡。下水氣。解消渴。去煩明目。奇効咸臻。〇馬蓼葉大同前。畏濕之地亦產。夏收採曝乾入劑。主腸中蟲蛭。輕身。〇水蓼生淺水中。大葉有黑點。根莖並採。可用煎湯。拌脚止霍亂轉筋。消脚氣腫滿。吞服止蛇毒攻內。去疮癖脹疼。水蠱黃腫腹膨。用蒸汗出立愈。二月勿食傷腎弱陽。若合魚鮓食之。令陰冷痛欲絕。〇毛蓼冬根不死。葉上有毛。亦主瘰癧癰疽。引膿長肉。〇白蓼紅蓼造酒並佳

山茨菇根

味辛苦。有小毒。俗呼金燈籠。多生沙濕地。初春萌孽葉如韭葉。長青二月開花。狀若燈籠色白。瓣有黑點子結三稜生夏纔交其苗即稿。依時掘地可得。遲久腐爛難尋。與老鴉蒜略同。在包裹上分別。蒜却無毛光禿。茨菇包裹有毛。得之去皮。生焙任用生搗爲拔毒敷藥。頻換則靈。焙研合玉樞神丹必資作主。消癰疽無名疔腫。散癮疹。有毒惡瘡蛇虺嚙傷。並服神効

山茨菇

山豆根

味苦氣寒。無毒。各處山谷俱有。廣西出者獨佳。俗呼金鎖匙。苗長一尺許。葉兩傍而有曲鈕。子成簇而色鮮紅。粒似豆圓。名

山豆根

因此得。凡資療病。惟取其根口嚼汁吞。止咽喉腫痛要藥。水調末服除人馬急黃捷方。敷蛇蟲咬傷。去血氣腹痛。

萱草

萱草根　俗名鹿葱　味甘氣寒。無毒。園圃多種。五月開花。療酒疸遍身通黃。絞生根汁嚥下。治沙淋小便澁痛。煮熟嫩苗食之。咀和酒煎為破腦傷風要藥。搗攬蕫汁。係大熱衄血仙方。安五臟輕身。利胸膈明目。久久服餌。歡樂無憂稽康云。合歡觸怒。萱草忘憂是也○宜男係花之字。孕婦佩則生男。丹溪曰性下行走陰分名宜男者尊無幾意存焉

萱草

蘆根　味甘氣寒無毒。洲渚多生。秋冬纔取。掘土擇甘美者有効。露出及浮水者損人。解酒毒退熱除煩止嘔噦開胃下食。食魚蟹中毒即刼懷胎孕發熱即甦○花白名曰蓬茸主卒癰亂尼急煮汁頓飲。霎時可安。

蘆根

菰根

菰根　味甘。氣大寒。無毒。多生江湖陂澤。葉如蒲薹尖長。抹馬甚肥作薦誠軟。江南呼爲茭草。卽此是焉。四時取根搗爛絞汁。止小便利解渴。主腸胃熱除煩。久浮水面者燒灰研朱。火灼瘡敷愈。用鷄清調鱠。菰菜卽春生茭筍。煮食治心腹卒疼。楳鯽魚爲羹。解酒毒開胃丹。不熟發頓食卽差。須防滑中。不宜多食。菰首當作菰手。係歲久中生白臺與小兒臂同。故取爲名喚。食少追風去熱。止上膈渴消食多發氣弱陽。令下焦冷滑。食同白蜜癒疾復生。臺中有黑者茭鬱名。用之治小兒赤痢効。葉利五臟亦驗。食巴豆人忌之。子細若青麻黃名彫胡米。俗每合黍粟煮過凶荒年。大抵菰之種類皆極冷利。不可過食。惟服金石人相宜爾

菰首

茭鬱

芦根　味甘。氣寒。無毒。卽落地多種養。宿根春自發生。葉取飼池魚。面青背白。皮剝績著布。一年三收。根輕虛白黃。採無時入藥。搗敷小兒赤遊丹毒。及諸癰疽發背乳房。煎療女人胎動不安。併產前後發熱煩悶。塞胎漏下血。腎俞毒蛇傷。時疫大渴狂呼。非此莫能。金石服多。燥熱飲下立除。芦皮藏留。產婦堪用作枕。眠止血暈。安胎上去腹疼。漬芦汁管大解消渴。蠏蛟中毒。一飲卽瘥。故近蠏室種之則蠏竟不產也

苧根

苧根　味甘。氣寒。屬水無毒。葉如萵苣。多產近傍。根取醋摩。善走血分。主小兒頭禿疥癩。除熱治女子陰觸浸淫。殺蟲去痔疽。除風癬。或採多熬膏加蜜。用防風研末和丸。秬樓甘草酒吞。治前諸證。亦妙。日服二次。每次服三十丸。葉作菜茹。小兒疳蟲立追。食多滑腸作瀉。實苦澁平。赤白雜痢能止

羊蹄根

羊蹄根　味苦。氣溫。有小毒。川谷甚多。遠近俱有。莖紫花白。一二尺長。密開花。盈舊枝莖。如紫稍作穗。木山葉。採嫩苞。蓝向晴日曝乾。花落葉生。不堪用也。得之煮醋數沸。漉出漬水一宵。復曝乾收。纔免毒害。反甘草。使決明。散皮膚水腫。發浮消胸膈痰沫。善嘔。欬逆上氣。能止咽腫短氣可安。瘙疥癘瘡。除蟲毒鬼疰。令人虛損。久服不宜。汁漬線縲。繫痔易落。○根採尤毒。乃名蜀桑。搗爛堪毒魚。研末能敷疥。

綿州芫花

莞花

莞花　味苦辛氣寒有毒生咸陽川谷及河南中牟苗似胡葵刺無誤按芫花瀉濕利水爲要夫水者脾胃腎三經所主有五臟六腑十二經之部分上而頭目中而四肢下而腰膝外而皮毛中而肌肉內而筋骨脉有寸関尺之殊診有浮中沉之異必當審其病在何經何臟乃可用之倘若悞投爲害非淺

花類芫花色白狀極細四五月採力甚猛熬令赤收入藥劑中急欲行水有是證者斟酌投煎破積聚大堅瘕癥療痰癖欬逆上氣咽喉內腫痃氣可散膀胱下痰癖氣塊能消

淄州貫衆

貫衆　味苦氣微寒有毒在處山谷有背日陰濕生莖有三稜皮係赤色葉青綠如小鷄翅根紫黑似老鴉頭故本經欵中亦載曰此謂草鴉頭也一說根形如大瓜下有黑鬚毛二八月採根陰乾赤小豆藿菌爲使殺諸毒理金瘡惡毒殺三蟲去寸白蚘蟲仍除頭風更破癥瘕

鳧茨　味甘氣平微寒無毒苗似龍鬚葉如芋狀根黑指大皮厚有毛又一種皮薄無毛者亦同今人謂之荸薺本經載曰烏芋烏喜食又得此名水田蒔之在處有者三月三日採根曝乾生產後血悶攻心理產難子胞不下壓丹石除胸膈痞氣下石淋退面目疸黃風腫能

消痺熱堪御。開胃進食。益氣溫中。性善斂銅。着之即碎。故爲消堅
創積要劑也。多食則生他症。卒食則嘔水來。孕婦食動胎。小兒食
臍瘡藥採搗爛。蜥咬可敷。

鳧茨



水萍　味辛酸。氣寒。無毒。俗係柳絮隨風飛起。入池沼得水生成。小者
藻背面俱青。大者萍面青背紫。下無根帶。水面漂浮。入藥拯疥。惟
萍可用。七月半採。依法曝之。竹篩攤開。水盆架住。曝向烈日。纔得
燥乾。盆無水則不燥。研末細羅。蜜丸彈大。豆淋酒化。空心頓吞。發汗驟來
鼓風速退。仍治時行熱病。堪浴遍身瘡瘡。生採煎湯消水腫。利小便。去
暴燥。止消渴。夏夜蚊多。燒煙可除。

謨按普濟大風丹云。東京開河。掘得石碑。梵書天篆。無有曉者。
林靈素逐字釋解。乃是治中風方。歌曰。天生靈草無根幹。不在
山間不在岸。始因飛絮逐東風。泛梗青青飄水上。神仙一味去
沉痾。採時須是七月半。怕甚攤風與中風。酒下三丸都汗散

大戟　味辛甘。氣大寒。陰中微陽。有小毒。種甚猥賤。處處有生。春發
紅芽。日漸叢長。凡資入藥。惟採正根。傍附誤煎。洶瀉難禁。惡薯蕷。
使赤豆。反甘草海藻芫花。畏菖蒲蘆根鼠屎。每與甘遂同利小便。
消水腫腹滿急疼。除中風皮膚煩燥痛。毆蠱毒。破癥堅。通月信墮胎。
散頸癧逐瘀。○苗名澤漆。味苦兼辛。退邪熱皮膚。卻浮腫面目。大

河中府大戟

蚤休 一名紫河車 味苦氣微寒有毒。川谷俱有。江淮獨多。不生傍枝。一莖挺立莖中生葉。葉心抽莖。年久發三四層。上有金線垂下。故又名金線重樓。俗呼七葉一枝花也。圖經云。葉如鬼臼。根若肥薑。凡入藥中。惟採根用。主驚癎搐頭弄舌。除濕熱發腫作瘡。下三蟲。解百毒。或摩酒飲。或摩醋敷

滁州蚤休

淄州商陸

商陸 味辛酸。氣寒有小毒。近產河陽原出。高脚苗。逢春煖方起葉。類大戟。常青花色黃。結子絕無根皮赤似羅蔔根。斷則流汁黑凝如漆。故云漆頭。五月採根陰乾。惟取頭黑者勝。使甘草節惡麥門冬。畏素問中云去惡血。古姚僧坦用治癰疽。作散煩敷。肉消便止。破癥瘕。殺疥蟲。逐敗胎死肌。除大風熱氣。善忘不樂。亦著本經。○又草商陸。其根色白。囚醫取黑頭入劑。採多燒熱熾焙之。作假代真。主治不異。敷潰瘍作散。載古方亦多。

衛矛　一名鬼箭羽

味苦。氣寒。無毒。深山谷多產。平陸地絕無。莖類栢皮。葉似山茶青綠。幹有三羽。狀似箭翎。創取皮羽陰乾拭淨赤毛。酥炙。一說只使箭頭每兩用酥一分緩炒酥盡為度。任煎湯液。專治女科。能墮妊娠善療血氣遺邪。祟殺蟲毒。破癥結。通月經。腹滿汗出。立瘳。崩中下漏。即止。治皮膚風腫。去腹臟白蟲。產後血絞肚痛。殊功。惡症卒暴心痛

捷効　衛矛

狠毒　味辛。氣平。不大毒。出陝西郡州。似商陸苗葉。採根八月。肉白皮黃。重實者良。入水浮虛者劣。偽黑大豆惡麥。勾薑破積聚痰癖。去惡瘡鼠瘻。疽癰。逐欵逆上氣。殺蠱毒。赤鬼精。走獸飛禽亦嚇殺害。

右州狠毒

羯羊虛　即仙靈脾　味辛。氣寒。無毒。莖細而堅。葉圓而薄。所在俱有。麥冬不凋。俗呼為三枝九葉草也。但生處不聞水聲者為美。凡採製須先酒浸過曝乾。剉碎對拌羊脂。每一斤用羊脂四兩。火炒脂盡為度。羊食合。故此著名。治男子絕陽不興。治女人絕陰不產。卻老。益壽。增力。強志。久服有損。明載本經。

永康軍淫羊藿

羊躑躅

味辛。氣溫。有大毒。向陽山谷。逢春則生。起苗一尺餘高。結藍二月半後。葉如桃葉深綠。花似瓜花正黃。羊誤食之。躑躅而死。故本經竟名羊躑躅。今南人反呼黃杜鵑。依時採花。陰乾入藥主風溫。藏肌肉裏。洒洒痺麻。治賊風在皮膚中。淫淫掣痛。鬼疰蠱毒並治瘟瘧惡毒瘴瘕

羊躑躅

沂州淫羊藿



蘆

味辛苦。氣寒。有毒。近道俱有。深谷多生。反芍藥細辛。及五參人參沙參玄參丹參苦參。勿用。惡大黃。使黃連。三月採根陰乾。去蘆微炒入藥專能發吐。不用煎湯。惟作散用主頭禿疥瘡。療腸癖瀉痢殺諸蟲除蠱毒。去死肌。愈惡瘡。治喉痺不通。理風痰上壅。亦能醫馬塗癬併敷馬刀爛瘡。

解州蘇蘆

解州蘇蘆

莨菪音浪湯子　即天仙子　未苦甘。氣寒。有毒。山谷各處生。苗高四天許。葉濶三指。夏開白花。實同罌粟作房。子如黍米成粒。五月收採。向日曝

乾。主風癇癲狂。療濕痺拘急。助足健行見鬼。理齒蛀蝕出蟲。久服輕身。走及奔馬。炒熟方益生則瀉人。別說云。煮一二日。尚入土萌芽。用者尤宜審也

秦州萇菪

續隨子 一名千金子 味辛氣溫有毒。酷如大戟葉巾抽莖。開花黃小多層結實青而有殼。人家亭圃。每種觀瞻。又因秋種冬生春秀夏實。故又名曰拒冬實也。用須取仁紙裹壓以重石去油。復研成霜方可入藥。宜一切宿滯積聚。敷諸般疥癬惡瘡逐水利大小二腸。散氣除心腹脹痛。殴蠱毒鬼疰。消痃癖瘕瘕。通月經下痰飲。不可過服

廣州續隨子



防毒損人甚烈。中白汁旋收。敷白癜面皯即去

蓖麻子 味甘辛。氣平。有小毒。園圃中俱種。胡地者益良。子如牛蜱色斑。葉類火麻厚大。得名由此。其性善收。剝殼取仁。修製忌鐵鹽湯入砂鍋煮透。牛口為度。撈起以石臼搗糜。用敷無名毒疽。吸出有形滯物。剔骨立起膿血。盡追塗足心。下胎孕子胞。始神。塗顛頂。收生腸脫肛甚捷。塗口眼喎僻。即牽正復元。左患塗右右患塗左 見效急除。久則反損。因性峻急故也。亦堪服餌。方法須依。殴卒仆風癇。取仁一兩黃連切成豆粒一兩。水一碗。又砂鍋中文火炒為度。撈起去黃連只用仁。風乾不得見日。每日一粒。竹刀切四段。每

明州芭麻

儋州芭麻

漠按病分血气藥別陰陽丹溪云芭麻子屬陰主吸出有形質之滯物故取胎產胞衣剩骨膿血者用之葯枝肉屬陽主散無形質之滯氣故消瘤癰赤腫者用之苟不明此理而錯用治則不應也

華撥　味辛氣大溫無毒出崔國中產竹林內苗作叢高二尺許葉圓綠潤二寸餘五月開花白色在表七月結子小指般長秋末收子陰乾辛烈過於蒟醬嶺南海舶貿易常多老黑者不堪紫褐者爲上消宿食下氣除胃冷溫中痃癖陰疝痛並驅霍亂冷氣疼立卻禁水洩虛痢止嘔逆醋心得訶子人參桂心乾薑爲丸治臟腑虛冷腸鳴洩痢神效仍殺腥穢食味堪調久服走泄真陽令人腸虛下重根名華撥沒黑硬近似柴胡能治諸勞傷陰汗寒疝核腫

華撥

舒州鬼臼

齊州鬼臼

鬼臼　味辛。氣微溫有毒。齊杭襄峽最多。深山陰地纔有。獨莖起土內。一葉竪莖端。狀如傘蓋。一云葉六旦東向。暮西傾。隨日出沒。枯一莖爲一臼。逐歲增添。每年長一莖。莖枯爲一臼。要求真採之。勿貿假誤也。垣衣所畏。制伏可資。辟瘟疫惡氣不祥。殺蠱毒鬼疰精物去目赤膚瞤。療喉結風邪。不入湯煎。惟作散用。

乾苣　味鹹氣寒。一云溫。無毒。即地面青苔是也。滲濕有背陰生。療心腹悶煩。研調水飲。治霍亂嘔吐。採煎汁嘗。發諸般瘡疥。殺蟲下一切丹石去毒。但服不可過劑。令人少血痿黃。〇生老屋上者名屋遊。利膀胱氣及浮熱在皮膚間。〇生古墻側者。名垣衣。主黃疸心煩。致暴熱攻腸胃內。〇陸鼈。生水石面止洩痢。強胃氣消穀溫中。〇土馬騣。生土墻頭涼骨蒸止鼻衄。敗毒殿熱。〇井苔。從井底見。療水腫漆瘡熱瘡。〇船苔。向船底求。治五淋鼻洪吐血。〇瓦松。生瓦溝。通女人經絡閉澁。邪生山石。去小兒時熱驚癇。〇瓦松因所附不同。以致主療各異。瓦松

讀按至賤之物。如許之名。蓋因所附不同。以致主療各異。瓦松雖則別種。亦由滲濕而生。故併錄之。以便查考。

鬼督郵　味辛苦氣平。無毒。所在山谷有必叢生。苗惟一莖。類小箭幹。葉出莖端。如纖根橫而不發鬚。花開葉心。其色黃白。二月八月。用惟採根。甘草水煮一伏時。漉曝乾。任九煎服。主鬼疰卒忤中惡及百精毒。去濕瘧時行疫癘。併心腹邪。强脚脇。益膂力。腰腿諸疾並可敺除。今醫不審其真。每每以徐長卿充乖。殊甚。夫長鬱

赤箭鬼箭雖皆有鬼督郵別名而治大相異也。務辯的實切勿混淆。

鬼督郵

蜀葵花

味甘。氣寒陰中之陽無毒。即家園紅白葵花惟川蜀產者最勝。色因有二。治亦不同。紅葵花治赤帶赤痢如神。血燥兼治白葵花。赤白帶白痢速効。氣燥亦效。子能催生墮胎。更療淋澁水腫一切瘡疥癰毒。研末俱可敷之。葉搗爛貼金瘡火瘡又煮食除熱痢丹痢。整理惡瘡散血。根主客熱通便。根莖共煮汁吞。即解丹石熱結。○蜀葵花各種葉俠多缺而尖。催生產尤靈。數金瘡更驗。

蜀葵花

子炒研調酒亦催產捷方。

紅葵花



黃蜀葵

大青

大青　味苦。氣大寒無毒。多生鄜蜀濠淄。亦產江東州郡。葉綠似石竹莖紫。花紅如馬蓼根黃。入藥用葉兼莖。春末夏初收採。仲景書内每每擅名。傷寒熱毒發斑。有大青四物湯飲效。傷寒身強脊痛。有大青葛根湯服靈。又單味大青煎湯。治傷寒黃汗黃疸天行時疫。尤多用之。仍醫腫癰。且解煩渴。○〔小青〕異種惟產福州屬福建土人用治癰瘡。取葉生搗敷上。

土瓜

土瓜　味苦。氣寒無毒。一云有小毒。生平澤山野。及籬壁垣墻。一名土瓜。處處俱有。月令四月王瓜生。卽此是也。作藤蔓發葉多刺。敗圓。逢夏至開花深黃。單辦。實結七八月間外殼紅黃如秬樓狀。中子紫赤。似螳螂頭。採入醫方。〔根子〕兩用。治小便疫遺不禁。潤心肺。解蠱毒。卻黃病黃疸。用子宜生。療下痢赤白雜來。敗腸風除肺痿。止血溢血泄。用子須炒。根搗汁。去小兒閃癖痞滿及天行熱疾發狂。痰癊暴生。並可服也。但少爲奇。多服則吐下。根煎湯。破婦人血瘕堅癥。併撲損瘀血作痛。乳汁不下。但當飲之。過多不妙。仍逐骨節中伏水。更消損頸上瘻瘡。去濕痺痠疼。散癰疽瘀腫。通經墮孕。益氣愈聾。

均州王瓜



特1
386

国立国会図書館　タイトル『圖像本草蒙筌12卷首1卷總論1卷』 請求記号 特1-386
ガラス使用

特1
386

国立国会図書館　タイトル『圖像本草蒙筌12卷首1卷總論1卷』 請求記号 特1-386

ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『圖像本草蒙筌12卷首1卷總論1卷』　請求記号 特1-386

ガラス使用