

外科經驗方

癰疽驗方

外科經驗方

神祕驗方  
薛氏醫按

餘杭陶華編  
柴胡薛  
已校

新黃  
英玄有閱

癰疽十段關

癰疽  
遍身拘急疼痛寒熱宜宣通經絡宜用人參散

毒散

人參敗毒散

人參

獨活

柴胡

桔梗炒

羌活

枳殼炒

茯苓

川芎

前胡

甘草 各一錢

作一劑水一鍾薑三片煎一鍾服後服內托復散

散入參

內托復煎散

地骨皮

防已 酒洗

官桂

白芍藥 炒

甘草 炙

當歸 酒洗

茯苓 十兩關

白朮 炒

人參

黃芩 炒

黃芪 鹽水拌炒 各一錢

防風 二錢

咬咀先以蒼朮一斤水五升煎去朮入藥再煎至

二升終日飲之相再煎服

愚按機要云治瘡之法當分三因用前一劑者蓋  
爲外因之治也邪在表者用人參敗毒散散之後  
服內托復煎散托之使邪不得內侵固爲善也亦  
有內因邪在臟致大便不通宜用內疎黃連湯又  
有不內外因者便利調勻飲食如故邪在經絡宜  
用托裏榮衛湯不可一槩用前一藥也

內疎黃連湯

黃連炒

芍藥炒

當歸酒拌

檳榔

木香

黃芩炒

山梔炒

薄荷

桔梗炒

甘草 各十分

連翹 錢

大黃 錢

作一劑水二鍾煎八分食前服

托裏榮衛湯

黃芪 炒

紅花

桂枝

蒼朮 米泔浸炒

柴胡

連翹 各一錢

羌活

防風

當歸身 酒拌

甘草 炙

黃芩 各十分

人參 五錢

作一劑水二鍾煎八分食遠服

癰疽大渴發熱或瀉或小便如淋宜用竹葉黃芪湯

竹葉黃芪湯

生地黃

黃芪

各二錢

當歸

酒洗

淡竹葉

川芎

甘草

炙

黃芩

炒

白芍藥

炒

人參

半夏

石膏

煨各一錢

作一劑水二鍾薑三片煎八分食遠服

愚按前證七惡中之一惡也此方治之其功甚捷

亦有左手脉浮大而熱或渴者宜發散表邪右手

脉沉實而熱或渴者宜疎去內邪若瀆後作渴或

小便如淋或脉大而無力者屬氣血虛也宜大補

氣血亦有瀆後熱不止或作渴遂以為敗證不治

若素有胃火或胃經熱毒未盡胃脈尚數者仍宜  
服前湯服而脈反大熱愈甚渴愈作斯爲敗證蓋  
因真氣虛而邪氣實也今之潰瘍畏石膏黃芩二  
藥性冷多不肯服若胃脈未靜非此藥莫能治也  
若因循日久煎熬氣血膿血愈多氣血愈虛反成  
敗證矣治者當舍證從脈可也大抵瘡瘍之證十  
惡內見一二惡甚可畏虛中見惡證者不治實證  
無惡候者自愈

天方托裏黃芪湯

黃芪

炒六錢

甘草

灸

瓜蒌根

各錢

作一劑水二鍾煎八分頓服之加人參一錢亦可  
愚用此方治氣虛作渴甚效若氣血俱虛或膿血  
大泄作渴或兼發熱者宜用托裏養榮湯  
托裏養榮湯

人參

黃芪

當歸

酒拌

芍藥

川芎

白朮

各一錢

五味子

研炒

麥門冬

去心

甘草

各五分

熟地黄

用生者酒拌銅鍋內蒸半日

作一劑用水二鍾薑三片棗二枚煎八分食遠服

癰疽膿血大泄敗臭痛甚宜用黃耆人參湯



五黃耆人參湯

人參

蒼朮

米泔浸炒

白朮

炒

陳皮

麥門冬

去心

當歸

酒洗

神麴

甘草

炙

五味子

杵炒各錢

黃耆

炙二錢

黃柏

炒

升麻

各四分

作一劑水二鍾薑三片棗二枚煎八分食遠服

愚按前證七惡中之二惡也宜此方治之亦有淺

後虛而發熱或作痛少寐尤效若痛少止大便不

實黃柏麥門冬可不用蓋恐寒中也凡瘡膿潰之

後若脈洪大則難治自利者不治

癰疽喘急恍惚嗜卧此心火刑肺金宜用人參平肺散

### 人參平肺散

桑白皮炒

知母七分炒

杏仁去皮炒

地骨皮

紫蘇

橘紅

半夏薑製

茯苓

青皮

人參各一錢

五味子廿粒炒

甘草炙五分

作一劑水二鍾薑三片煎八分食遠服

愚按此方理氣清肺化痰之劑若肺脉洪數無力

者宜用若兼發熱作渴脉洪數有力者宜用如金

解毒散此證火尅金爲惡候面赤者亦不治

如金解毒散 方見後

癰疽日斜視上黑睛緊小白睛青赤肝挾火邪宜用

瀉青丸

瀉青丸

當歸 酒拌

川芎

山梔仁 炒

羌活

草龍膽 酒拌炒

防風

大黃 酒拌炒 各等分

爲細末煉蜜丸雞頭實大每服一九煎淡竹葉湯

化下日進二三服如瀉去大黃加荊芥或用黃連

瀉心湯一二劑亦可

愚按前證七惡中之三惡也若肝脈弦緊洪數者

最當亦有目視不正睛不瞭脈微或浮者乃真

氣虛也宜用大補之劑夫瀉青者瀉肝經之火邪

也肝屬木其色青故耳

癰疽四肢沉重宜用胃苓湯

胃苓湯

蒼朮 二錢米泔浸炒

厚朴 薑製

陳皮 原鹽炒

甘草 炙

白朮 炒各一錢

茯苓 一錢七分

澤瀉

木香

白芍藥 炒各一錢

官桂 五分

淡竹葉 二十片

作一劑水二鍾薑三片棗二枚煎八分食前服

愚按前證七惡中之五惡也服而若脾氣醒濕氣

除宜用參苓白朮散之類多服恐導損津液

參苓白朮散重宜用買參苓

人參 木其色青茯苓

白朮 炒

蓮肉 去心

大蘇

砂仁 炒

黃芩

薏苡仁 炒

甘草 炙

山藥 各二兩

桔梗 炒

甘草

薏苡仁 炒

白朮

茯苓

白扁豆 薑汁浸炒去皮

白朮 炒

茯苓

薏苡仁 炒

甘草 炙

為細末每服二錢用石菖蒲煎湯調下

癰疽嘔吐不下食不知味宜用橘半胃苓湯

橘半胃苓湯

橘紅

半夏

善製各錢

蒼朮

米泔浸炒

白朮

炒

厚朴

薑製

甘草

炙

茯苓

人參

澤瀉

茅根

各二錢

薑汁

數匙

作一劑水二鍾煎一鍾入薑汁煎一二沸作十餘

次飲之

愚按前證七惡中之六惡也用此方後胃氣將醒

宜用六君子湯兼服之亦有煩躁飲冷不食驟沉

實而嘔者恐不可用此宜用內疎黃連湯

內疎黃連湯 方見前

癰疽聲嘶色敗唇鼻青赤面目浮腫宜用調胃白朮

散

調胃白朮散

白朮 炒

茯苓 各二錢

陳皮

白芍藥 炒

檳榔

澤瀉 各一錢

木香 五分

作一劑水二鍾薑三片煎八分食後服如腫不退

知

白朮炒

枳實炒

錢各一

愚按前證乃七惡也用此方若濕除氣少退用六君子湯參苓白朮散之類大便不實尤效再用檀榔木香恐傷真氣也亦有真氣虛而致前證者尤不宜用二藥

六君子湯

人參

白朮炒

茯苓

半夏

薑製本

陳皮

各一錢

甘草

炙五分

作一劑水二鍾薑三片棗二枚煎六分食遠服

參苓白朮散

方見前



癰疽胸滿腹痛泄瀉咳逆昏憤宜用托裏溫中湯

羌活

乾薑

炮各一錢

附子

炮馬錢

益智仁

搗碎

丁香

沉香

木香

茴香

各一錢

甘草

炙二錢

陳皮

一錢

作一劑水二鍾薑三片煎八分食前服

愚按此寒氣內陷之方也羅謙甫捨時從證曰內

經云寒溼於內治以辛熱佐以苦溫故以乾薑附

子大辛熱溫中外發陽氣白裏之表故為君羌活

味苦辛温透關節炙甘草甘温補脾胃行經絡通  
血脉胃寒則嘔吐吃逆不下食益智仁丁香沉香  
大辛熱以散寒為佐瘡氣內攻氣聚而為滿木香  
茴香陳皮苦辛温治痞散滿為使也用治前證誠  
為良方非精於醫者不能立也若寒氣散中氣温  
宜用托裏健脾之劑

癰疽大痛不止宜用加味解毒湯

加味解毒湯

黃耆 鹽水拌炒

黃連 炒

黃芩 炒

黃柏 炒

連翹

當歸 酒洗

甘草 灸

白芍藥

梔子仁

炒各一錢

作一劑水二鍾煎八分服之藥下痛即止

愚按此方若脉洪大按之有力者用此解之其功

甚大亦有便秘脉實而痛者宜用内疎黃連湯下

之若瀆而反痛者宜用内補黃芪湯補之穢氣所

觸而痛者和解之風冷所逼而痛者溫養之丹溪

云凡瘡不可不痛不可大痛煩悶者不治即痛

内疎黃連湯 方見前

内補黃芪湯

黃芪 鹽水炒

熟地黃 酒拌

人參

茯苓

甘草

炙各五分

芍藥

炒

川芎

官桂

遠志

去心炒

當歸

酒拌各八分

麥門冬

去心五分

作一劑水

一鍾半薑三片棗二枚煎六分食遠服

癰疽勢惡平陷一應無名疔毒活人無數宜用真人

活命散

真人活命散

一名仙方活命散

滴乳

研

防風

白芷

貝母

赤芍藥

當歸尾

明沒藥

研

皂角刺

炒

天花粉

甘草節

川山甲

炮各一錢

陳皮

金銀花

各三錢

在背俞皂角刺爲君

在腹募白芷爲君

在胸次加瓜蒌仁

二錢

在四肢金銀花爲君

如疔瘡加紫河車草根

三錢如無亦可

右爲粗末瘡大四兩瘡小二兩作一劑無灰酒十

茶鍾瘡小五茶鍾入有嘴瓶內以厚帛封口勿令

泄氣煎至三大鍾去粗作三次服接連不段隨瘡

上下服能飲酒者服藥後再飲三五杯此藥並無

酒氣不動臟腑不傷氣血忌酸薄酒鎮器服後側

睡覺痛定回生神功浩大不可憶度

真人活法世間稀 大惡癰疽總可醫

消毒只如湯潑雪 化膿漸使肉生肌

獨陰功何止萬人活 神效何須刻卅期

云 留下仙方誠信授 存仁脩製上天知

愚常用此方不問陰陽虛實善惡腫潰大痛或不

痛先用此劑大勢已退然後隨餘證調治其功甚

捷誠仙方也

二黃膏 治一切腫毒

黃柏

大黃 各等分

爲末用醋調搽如乾用水潤之

又方揭毒散

大黃 兩半

白芨 一兩

朴硝 一兩

爲末井水調搽如乾再搽

愚按此二方乃寒涼之藥若瘡瘍焮腫作痛屬陽之證宜用之或微腫痛而不焮赤者恐不宜用蓋氣血喜溫而惡寒若冷氣入裏反爲難治之證矣

又方 治一切癰疽腫毒

草烏

貝母

天花粉

南星

芙蓉葉 各等分

爲細末用醋調搽四圍中留頭出毒如乾仍用  
潤之

愚按此方藥性溫和常用不問陰陽腫潰並效

○宣毒散 治一切毒瘡其功不可盡述

大黃 煨五錢 白芷 五錢

作一劑水二鍾煎一鍾食前服

愚按此方乃宣通攻毒之劑若脉沉實便秘者乃  
毒在臟也宜服之以絕病源其功甚大或臟腑調  
和而脉不實恐不可用醫林集要方大黃一斤白  
芷六兩爲末每服三錢熱酒調下更用茶清調搽



患處命名萬金散蓋因其功而珍之也當以水送  
爲丸令可服吳江申僉憲兄昔患疽木悶堅硬脈  
沉實乃毒在內用一服大小便下污物再服而消  
恐患者忽此二藥故以所嘗治驗者告之

集香散 洗癰疽潰爛

白芷

藿香

茅香

香附

防風

木香

甘草

各二錢

各二錢

作一劑用水三碗煎數沸去粗淋洗患處

愚按此方乃馨香之劑也經云血氣聞香則行得

臭則逆即此意也若瘡毒將盡宜用之若毒未盡  
或有瘀肉宜先用雄黃解毒散解之後宜用此方  
須用膏藥護貼使風邪弗入肌肉易生大凡一有  
瘡口卽用膏藥貼之至收口爲度最忌生肌之劑  
雄黃解毒散 治一切癰疽潰爛解毒凡下部濕毒  
作痒未膿者連用數次自消

雄黃 一兩

白礬 四兩

寒水石 一兩

爲末用滾水二三碗乘熱入煎藥一兩薰洗患處  
神僊太乙膏 治癰疽及一切瘡毒不問年月深淺  
已未成膿者並治之如發背先以溫水洗淨軟帛

拭乾用緝帛攤貼之更用冷水送下血氣不通溫  
酒下赤白帶下當歸酒下咳嗽及喉閉纏喉風並  
用新綿裹置口中噙化下一切風赤眼捏作小餅  
貼太陽穴更以山梔子湯下打撲傷損外貼內服  
橘皮湯下腰膝痛者患處貼之鹽湯下唾血者桑  
白皮湯下以蛤粉爲衣其膏可收十餘年不壞愈  
久愈烈又治瘰癧癩瘡並用鹽湯洗貼酒下一丸  
婦人經脈不通甘草湯下一切疥別煉油少許和  
膏塗之虎犬蛇蝎湯火刀斧傷者皆可內服外貼

玄參

白芷

當歸

肉桂

大黃

赤芍藥

生地黃

各一兩

為咀用麻油二斤入銅鍋內煎至黑濾去粗入黃丹十二兩再煎滴水中心捻軟硬得中即成膏矣予常用但治瘡毒并肉癰有奇效忽一婦月經不行腹結塊作痛貼之經行痛止後隨前云治證用之無有不效愈知此方之妙也

生肌散

治瘡口不合

木香

一錢

黃丹

枯礬

各五錢

輕粉

一錢

右件各另爲細末用猪膽汁拌勻晒乾再研細粉  
患處

愚按此方乃解毒去腐搜膿之劑非竟自生肌藥  
也蓋毒盡則肉自生常見患者往往用龍骨血竭  
之類以求生肌殊不知餘毒未盡肌肉何以得生  
反增潰爛耳若此方誠有見也亦有氣血俱虛不  
能生者當用托裏之劑又有風寒襲於瘡所不能  
生者宜用豆豉餅灸之若流注頑瘡內有膿管或  
癰肉或癰核須用針頭散腐之錠子尤妙如背瘡  
杖瘡湯火瘡大潰當用神效當歸膏則能去腐生

新止痛大有神效

豆豉餅 治瘡瘍腫硬不潰及潰而不斂并一切頑  
瘡惡瘡用江西豆豉爲末唾津和作餅子如錢大  
厚如三文置患處以艾壯於餅上灸之餅乾再用  
唾津和作如背瘡腫大用漱口水調作餅覆患處  
以艾鋪於餅上燒之如未成者用之卽消已成者  
縱不能全消其毒頓減前人俱稱有奇功不可忽  
之

神效當歸膏 治癰疽瘡毒及湯火杖瘡潰爛最能

止痛推陳致新

當歸 二兩

蘇油 四兩

白蠟

五錢如用黃蠟一兩尤效

先用當歸入油煎至焦黑色去粗入蠟溶化即成膏矣此方用蠟為君前人每云蠟為外科之要藥生肌定痛續筋補虛其功不可盡述常見善訟者杖後隨食蠟兩許飲酒一二碗一睡之後血散痛止輕者即消重者雖腐潰亦易愈可見蠟之功為大用者不可忽之

癰疽勢退調治隄防作渴宜用加減八味丸

加減八味丸 補腎止口渴虛煩

五味子

乾山藥

各四兩

官桂

白茯苓

牡丹皮

白者佳

澤瀉

各三兩

山茱萸肉

四兩酒拌搗膏

熟地黃

用生者二兩酒拌罈器蒸半日即為熟地砂器亦可搗膏

為細末入二膏加煉蜜或酒糊丸梧子大每服七

八十丸空心温酒下塩湯亦可

愚按此方乃陰虛火動之劑也瘡疽痊後及將痊

口渴甚者舌黃堅硬及未患先渴或心煩躁渴小

便頻數或白濁陰痿飲食少思肌膚消瘦及腮腫

脚先瘦及口齒生瘡不絕此乃腎水枯涸不能上



潤心火炎上水不能既濟服此藥以生腎水降心  
火諸證悉退誠良方也○一男子作渴日飲水數  
碗冬月亦然彼用前方去肉桂服之不應○一男  
子患此欲治以前丸彼謂肉桂性熱乃服知母黃  
柏等藥渴不止背發疽而歿○一男子亦患此證  
漸消瘦與前丸數服渴減半一劑而瘥再劑形體  
復壯夫肉桂腎經藥也前證乃腎經虛火炎上無  
制爲患用肉桂導引諸藥以補之及引虛火歸原  
故效○一男子口舌糜爛津液短少眼目赤小便  
數痰涎壅盛腳膝無力或冷或午後腳熱勞而愈

盛數年不愈服之即愈此皆治驗也

### 地黃大補丸

治癰疽愈後作渴

龜板 酒炙 兩半

黃柏 酒炒 五錢

知母 去皮 五

人參 一兩

熟地黃 用生者兩半 酒拌 銅器蒸半日 搗膏

為細末入二膏如前方丸服

### 大補腎氣丸

治證同前

五味子 炒

黃柏 酒炒 各一兩

知母 去皮 一兩 酒拌 搗膏

龜板 童便炙 二兩

熟地黃 用生者二兩 酒拌 銅鍋內蒸半日

為細末入二膏加酒糊和丸梧子大每服四五十

丸五更酒送下鹽湯亦可

愚按二方常治陰虛相火之證有奇效亦有中虛  
虛而作渴須用六一湯補中益氣湯之類

補中益氣湯

黃耆 灸錢半

甘草 灸

人參

當歸 酒拌

白朮 灸各錢

升麻

柴胡 各三分

陳皮 五分

作一劑水二鍾薑三片棗二枚煎一鍾空心服

六一湯 方見前

黃礬丸 定痛生肌

黃蠟 真者二兩

明礬 二兩

五

先將黃蠟熔開離火待少溫入礬末和勻衆手爲丸如梧子大每服二三十丸食前溫酒下每日二服

愚按此方不惟定痛生肌而已護膜止瀉消毒化膿及內癰排膿托裏之功甚大或金石補藥發疽非此莫能治更用白礬一兩每服一錢溫酒調下尤效有遍身生瘡狀如蛇頭名曰蛇頭瘡尤宜服之每日百丸方有功效若蛇蝎并一切毒蟲所傷融化熱塗患處內更服之其毒卽解爲外科之要藥也服至三四兩之上愈見其功矣

秘方托裏散 治一應瘡毒始終常服不致內陷

瓜蒌

大者一箇 榨

當歸

酒拌

黃芪

鹽水 拌炒

甘草

白芍藥

各兩 半

皂角刺

炒 兩

金銀花

一兩

天花粉

一兩

熟地黃

用生 兩 兩

拌銅器

蒸半日

用無灰酒五茶鍾和藥五兩入磁器內厚紙封

再用油紙重封置湯鍋內用蓋覆之煮至藥

取出分服直至瘡愈

愚按此方藥品平易消毒之功甚大且不動臟

不傷氣血不問陰陽腫潰屢用屢效誠仙方也

治發背腦疽勢盛者更隔蒜灸若脉沉實大小便  
秘者先用疎通而後用此其功甚捷若大毒已退  
不作膿或不潰者用托裏潰而不斂及膿清用峻

補

散  
一據本草卷之六  
卷之十三

三合湯

治癰疽不肯作膿

新江子肉  
砒

斑猫  
各等分

為細末經瘡內惡肉自化

愚按此方藥性大毒果惡毒之證宜用腐之更取  
以毒攻毒亦有陽氣虛不能腐化成膿者宜用大  
補之劑及桑木灸之以補接陽氣丹溪云氣血壯

實膿自湧出大抵瘡之潰歛遲速乃血氣盛衰使然也

梧桐淚方

癰疽勢腫惡不潰堅硬以快利刀將患處劃成十字路用麵水調稠厚週圍瘡口外高起五分許如塘池樣將淚填半滿用好米醋滴淚上須臾自沸勿令滾出麵外次日用金銀花煎湯洗淨再如前用一次只用醋洗不痛爛肉自去

愚按此方果惡瘡惡肉不腐宜用之亦有陽氣虛不能腐化者宜用大補之

李願顏先生口授治疔瘡

回生丹 非泛常之藥萬寶之秘專治一切疔毒並

有神效

金脚信

明礪砂

明乳

半夏

上緋丹

江子肉

不去

明雄黃

大南星

南礪砂

錢

大斑猫

十五箇去頭足翅

為細末旋取蟾酥和光麻子大硃砂為衣每服十

五丸好酒下看瘡生上下食前後服能飲者至醉

如腫毒失治毒氣入腹用此藥能起死迴生良久



吐瀉俱作乃甦

飛龍奪命丹 治一切疔瘡毒瘡神效

乾蟾酥

二錢 乳化

血竭

一錢 餅者真

沒藥

寒水石

煨

硼砂

雄黃

各三錢

乳香

硃砂

明礬

各一錢

輕粉

冰片

各五分

蝸牛

四十九箇 研為膏如無亦效

蜈蚣

一條 去頭酒浸焙乾

右各味俱另為細末取蝸牛蟾酥研勻入前末熟

拚丸菘豆大硃砂為衣每服四五丸嚼葱白一口

吐在手將藥包葱內用溫酒吞下須臾汗出或少

吐泄毒卽解

愚按前方乃慄悍攻毒之劑也。蓋無經不至熱。熱不  
動者。後方尚緩。若食一切禽畜毒物。所至及癘  
脈。次緊細數。毒畜在內。并惡毒證。欲汗吐者。宜用  
前方有神效。老弱之人。或瘡毒稍輕者。宜用後丹。  
還更以隔蒜灸之。爲良常治此疾。先以隔蒜灸之。  
痛者灸至不痛。不痛者灸至痛。若灸之而不痛者。  
明灸之。及針疔。及四畔去惡血。以後丹一粒入瘡  
頭。針孔內以膏藥貼之。若針之不痛。或無血者。以  
針燒赤。頻烙患處。以痛爲度。更宜服之。眼黑見火。

光者此毒氣入臟腑也不治若患在手足紅絲攻  
心腹者就於紅絲盡處刺去惡血更服敗毒藥若  
紅絲近心腹者更挑破瘡頭去惡水以膏藥貼之  
如麻木者服後丹更以隔蒜灸明灸亦善凡人暑  
死多是疔毒用燈照看遍身若有小瘡卽是宜急  
灸之候醒更服敗毒散或前丹養生方云人汗入  
肉食之則生疔瘡不可不慎予常用後方無礪砂  
血竭蜈蚣冰片名奪命丹甚效

緋丹卽黃丹也

治冷癰青硬無頭陰毒

生鏤鏤 二錢

白松香 兩半

輕粉 二錢

麝香 少許

先將鏤鏤松香為細末入銚內加麻油一兩慢火煎數沸離火待熱少退入輕粉麝香末攪勻即為膏矣收貯量瘡大小攤貼患處

愚按此方常治瘡疥毒瘡皆效冷癰之證未試

御史散 治疥瘡

生鏤鏤 三錢

為末木香磨酒調下分病上下食前食後服之得微汗而愈

愚按此方乃秘法也未嘗試用常治疥瘡有  
攻心腹者用鍊銹三錢牡礪二錢青鹽一錢  
挑破瘡頭以燈盞內油調搽其絲自回名喚回  
但不用服之本草云鍊銹生鍊上衣也治惡瘡  
疥癬蜘蛛等咬蒜磨敷之亦未云服家藏方用猫  
兒眼草一擔細切以水擔餘浸二日煮百餘沸去  
粗取汁煎至三四碗用生鍊銹細研末三兩徐徐  
入汁內以鍊杖不住手攪再煎至二碗許成膏子  
治一切癰疽瘡毒其效癩癧潰後塗瘡內尤效

四聖散

治熱毒及疥瘡

槐花

炒

龜甲

童便炙 各四兩

鍊銹

三錢

大黃

如瀉 不用

川山甲

炮一兩

五靈脂

炒各二兩

為末酒下三錢如疔瘡加紫河車根三錢

愚按此方清涼降火攻毒之劑非積熱陽證膿未成者恐不宜用

黑末子 治癰毒

用羊角連內骨燒存性為末酒調三錢分上下服之瘡可散

愚按此方未嘗用服蓋秘方也常治面上或身卒得赤斑或痒或癩毒不治殺人以殺羊角燒存性

研令極細末以雞子清調塗之甚效本草亦云然

蟻蝦膏 治疔毒

蟻蝦

三箇肚白者佳

黃麻蟲

十箇

右二味搗勻撥破患處貼之如患在手足間有紅絲上臂絲盡處將針挑斷出血仍用前藥

愚按此方常用有效如無麻蟲亦效毒盛者更服敗毒藥蟻蝦卽屎蚋蝦也

拔毒散 治一切癰疽腫毒其功不可盡述

乳香

沒藥

川山甲

炮

當歸

木鱉子

各一錢

瓜蒌仁

各一分

甘草 炙五分

忍冬藤 二錢

牙皂角 七分

大黃 生熟各錢半

連翹 一錢

貝母 十分

作一劑用酒水各一鍾煎一鍾食前服

愚按此方攻毒止痛化膿之良劑也屢用屢驗若有膿或已潰者大黃可不用恐泄其真氣則膿者難潰潰者難斂也亦有膿雖潰脉仍洪數或沉實喜冷者火邪尚在又所宜用

牡礪散 治血疔即便毒

當歸 酒拌錢半

甘草節 錢半

滑石 煨錢半

牡礪 煨錢半

大黃 三錢

木鱉子 五箇



作一劑用水二鍾煎一鍾露一宿五更頓服冬月  
火溫服已未潰膿血從大便出

愚按此方乃醎寒導滯之劑若久曠房室大小便  
秘發熱焮痛或交感強固精氣致精血交錯腫結  
疼痛便秘者宜用若勞倦之人不甚焮痛大小便  
如常或小便赤色發熱不作膿及潰而不斂宜用  
十全大補湯蓋此證多起於勞役不足或房勞過  
度精氣俱虛之人俗云一斤米瘡此言百日後可  
愈也若大補氣血不旬日而愈何用百日蓋瘡之  
收斂在乎血氣之盛也嘗治舉人凌待之虛而服

剋伐藥幾致危殆予用托裏健脾藥而消秀才王  
文遠勞苦患之服小柴胡湯而表證散後用托裏  
藥膿成針之而旬日愈胡判官膿清脉弱以大補  
之藥而已愈因新婚復發自用連翹消毒散致瀉  
痢不止竟致不救可見此證屬不足多矣非補不  
可大抵便毒屬肝經初起堅硬肝主筋故也五七  
日後當赤軟膿成故也若尚堅硬乃元氣不能腐  
化往往人見堅硬只欲內消反服攻散藥多致虛  
虛之禍前所治者卽其驗也

全大補湯

人參 二錢

肉桂 五分

地黃 酒拌蒸焙

川芎

茯苓

白芍藥 炒

白朮 炒

黃芪 鹽水拌炒

當歸 酒拌各一錢

甘草 炙五分

作一劑用水二鍾薑三片棗二枚煎八分食前服

若滑而毒未盡者加金銀花連翹白芷各五分

葳靈仙散 治便毒

葳靈仙

貝母

知母 各一兩

為末每服三錢空心酒調下如不散再服

是接此方通經去膿消毒補虛益氣蓋此證多

於陰虛之人此方乃是一見也亦有厥痛小便  
者宜先用加減龍膽瀉肝湯大小便秘厥腫作痛  
宜入正散增寒發熱剋防敗毒散然後用此方若  
不作膿或膿不潰宜用大補之劑潰而不斂者更  
用豆豉餅灸之

加減龍膽瀉肝湯

龍膽草

酒拌炒

澤瀉

車前子

炒

木通

生地黃

當歸尾

酒拌

山梔

炒

黃芩

各一錢

甘草

生五分

作一劑用水二鍾煎八分食前服如濕盛加黃連

大便秘加大黃

八正散

大黃 酒拌炒

車前子 炒

瞿麥

篇蓄

山梔仁 炒

木通

甘草 各一錢

滑石 煨二錢

作一劑水二鍾煎八分食前服

荆防敗毒散 方見前

豆豉餅 方見前

防風通聖散 治瘡瘍使毒若瀉去芒硝大黃能解

暑月熱毒或遍身頭面患瘡

芍藥煨

芒硝

滑石煨

川芎

大黃煨

桔梗

石膏煨

荆芥

麻黃各厚一分

山梔

白朮

連翹

當歸

薄荷

甘草

防風

黃芩焙各八分

作一劑水二鍾煎八分服

愚按此方非表裏俱實大小便秘者恐不可用宜

審之

郭氏神效烏金散 治一切瘡毒

蒼耳頭

小草烏頭

火蘇頭

木賊 去節

蝦蟆頭

樺皮節

麻黃 去根節

右各等分晒乾入磁器內鹽泥封固炭火煨旱至  
申時如黑煤為度研為細末每服二錢病重者三  
錢熱酒調下未得汗再服如汗乾再服解毒鍊藥  
之藥天晴淨室脩合

愚按此方乃攻毒表散之劑外因用之為宜前云  
再服解毒鍊藥之藥則又為內因也果內外因者  
宜乎如此否則大犯禁庭矣常治外因者汗劫不

下肉因者下而不汗玉機微義云此方治疔腫癰疽時毒附骨疽諸惡瘡等證若瘡黑陷如石堅硬四肢逆冷脉細或時昏冒譫語循衣煩渴危篤者服此汗之瘡卽起此可見治外因之專藥也常用有效蝦蟆頭卽車前草

郭氏青金錠子

治發背癰疽開瘡口去腐肉好肉

自生

峻劑生砒開瘡

緩劑煨去死肉用

慢劑去砒枯礬生好肉用

愚按此以毒攻毒之意也嘗一縣尹背瘡竟背腐



潰色黯重若負石甚危喜飲食頗進用桃紅散色  
漸赤負漸輕再用而肌生更服托裏藥而愈蓋此  
亦大毒證非此峻藥莫能治此亦用砒故用攻毒  
有效然有氣血虛不能腐潰宜補養血氣常治發  
背初起未成膿先用烏金膏或援生膏點患處數  
點以殺其大勢更服仙方活命飲如飲食少思或  
不甘美用六君子湯加藿香連進三五劑如外皮  
腐動用雄黃解毒散洗之每日用烏金膏塗腐處  
候有瘡口卽用紙作撚蘸烏金膏絛入瘡內若有  
脹爲筋膜間膿不出致作脹痛用針引之腐肉著

塞者去之若瘀肉腐動用猪蹄湯洗如膿稠焮痛  
飲食如常瘀肉自腐用消毒藥與托裏相兼服之  
仍用烏金膏塗搽若瘀肉已離好肉卽去之如膿  
不稠不稀微作痛飲食不甘瘀肉腐遲用桑柴灸  
患處更用托裏藥主治之瘀肉不腐或膿清稀不  
焮痛者服大補之劑仍用桑木灸之以補接陽氣  
解散鬱毒其肉自腐

援生膏 治一切惡瘡及癰癤初起點破雖未全消  
亦得已殺其毒

血竭 一錢

蟾酥 三錢

麝香 五分

雄黃 五錢

輕粉 二錢

乳香 一錢

沒藥 一錢

用蕎麥稽灰或真炭灰一斗三升淋灰湯八九碗  
將栗柴或桑柴文武火煎作三碗存一碗以備日  
久藥乾添用取二碗盛於磁器內將前藥研爲極  
細末入灰湯內用鑊幹或柳枝順攪再入好細石  
灰一升再攪勻過一宿却分於小磁罐收貯凡遇  
諸惡瘡點當頭一二點一日換二次次日又一次  
以出血水爲度如藥乾却加所存灰湯少許調之  
烏金膏 解一切瘡毒及腐化瘀肉此藥最能推陳

致新

用巴豆一味去殼炒焦研如膏點腫處則蝕毒塗  
瘡肉則自腐化加乳香沒藥少許亦可如絛瘡內  
入香油少許稠稀可用但人謂巴豆有毒炒焦用  
之其毒已去不過能去舊生新耳何毒之有

桑木灸法 治發背癰疽瘡肉不腐潰或不起發陰  
瘡癰癰流注賺瘡頑瘡惡瘡久不愈者須多多灸爲  
佳此法未潰則拔毒止痛已潰則補接陽氣誠良  
方也用桑木燃着吹熄焰用火灸患處每次灸片  
時以瘡肉腐動爲度丹溪云火以暢達拔引鬱毒

此從治之意也

猪蹄湯 治一切癰疽消腫毒去惡肉潤瘡口止疼

痛

白芷

黃芩

赤芍藥

當歸

羌活

甘草

露蜂房

蜂兒多者  
佳各五錢

先以猪蹄一隻用水四五碗煮熟取清湯入煎藥

煎二十餘滾去藥温洗患處隨用膏藥護貼

内疎黃連湯

方見前

治焮腫發熱

愚按此方乃疎通攻毒之劑也毒在臟致便秘

脉沉實嘔哕心煩發熱者服之輒效

破棺丹 治熱毒癰疽

大黃

二兩半 生半熟半

芒硝

甘草

各二兩

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸用童便加酒

半盞滾白湯和酒化服

愚按此方乃鹹寒解毒之劑若脉沉實發熱多汗

大渴煩躁便秘或譫語結陽之證用之即效如無

前證恐不宜用

如金解毒散 治肺癰

桔梗 一錢

甘草 錢半

黃連 炒

黃芩炒

黃柏炒

山梔炒各七分

作一劑水二鍾煎八分作十餘次呷之不可急服

愚按此方乃降火解毒之劑也發熱煩渴脈洪大

者用之俱效若脈數咳痰腥臭或唾膿瘀宜用桔

梗湯大抵肺癰之證肺脈洪大或吐膿不止者難

治膿自止脈短濇者自愈白赤火剋金也不治

桔梗湯 治欬而胸膈隱痛兩肘腫滿咽乾口燥煩

悶多渴時出濁唾腥臭小便赤色大便多澁

桔梗炒

貝母去心

當歸酒浸

瓜蒌仁并

枳殼炒

薏苡仁炒

桑皮

甘草節

防已

去皮各一錢

百合

五味子

地骨皮

甜葶藶

杏仁

知母

炒各五分

黃芪

鹽水拌炒錢半

作一劑水一盞半薑三片煎至七分不拘時溫服

咳加百藥煎熱加黃芩大便不利加煨大黃少許

小便澁甚加木通車前子煩燥加白茅根咳而痛

甚加人參白芷

瀉白散 治肺癰

桑白皮

炒二錢

地骨皮

甘草

炙



貝母 去心

紫苑

桔梗 炒

當歸 酒拌各一錢

瓜蒌仁 錢半

作一劑水一鍾薑三片煎八分食遠服

愚按此方乃瀉肺邪消毒之劑也若喘欬唾痰沫肺脉浮數者用之有效如脉大發熱作渴宜用解毒散解之而後用此劑其或唾膿之際宜排膿如唾膿後及脉將安宜補肺初起胸膈脹滿喘急咳嗽宜發散表邪

排膿散 治肺癰吐膿後宜服此排膿補肺

黃芩 鹽水拌炒

白芷

五味子 炒杵

人參

各等分

爲細末每服三錢食後茶湯調下

寧肺湯

治咳嗽吐膿自汗土氣喘急用此補肺及

治榮衛俱虛發熱自汗

人參

當歸

酒拌

白朮

熟地黃

川芎

白芍藥

甘草

炙

五味子

搗炒

麥門冬

去心

桑白皮

炙

阿膠

蛤粉炒各一錢

白茯苓

一錢

作一劑水二鍾薑三片煎八分食後服

青龍湯

治肺經受寒咳嗽喘急服此發散表邪

半夏 湯炮七次 乾薑 炮

細辛

麻黃 去節

肉桂

芍藥

甘草 炙各

五味子 二兩

每服五錢水一鍾薑三片煎七分食後服

附子散 治陽痿

薏苡仁 二兩

附子 炮五錢

敗醬草 一兩

每服四錢水煎空心温服

愚按此方乃辛熱之劑也若積久陰冷所致宜用

丹溪云身甲錯腹皮急按之濡如腫狀腹無積聚

身無熱脉數此腸内有癰積久陰冷所致故金匱

有用附子温之即此方也

茯苓湯 專治腸癰

赤茯苓

桃仁

去皮尖 各一錢

甜瓜子

研

芒硝

大黃

炒各二錢

牡丹皮

二錢半

作一劑水二鍾煎一鍾食前服

牡丹皮湯 專治腸癰

牡丹皮

大黃

炒

桃仁

去皮尖

芒硝

各二錢

瓜蒌仁

研一錢

作一劑水二鍾煎一鍾食前服

愚按此二方乃行血破血之劑也如發熱自汗惡

寒小腹作痛小便如淋脉遲者有效丹溪云小腹  
腫痞按之痛小便如淋或自調發熱身無汗復惡  
寒其脉遲緊者膿未成宜下之當有血此內結熱  
所成也故金匱有用大黃利之卽此方也若無前  
證恐不宜用亦有腹內脹痛脉滑數或膿已下或  
後重時時而下宜用排膿散太乙膏蠟礬丸及托  
裏藥

排膿散治腸癰小腹脹痛脉滑數或裏急後重或

時時下血

黃芪鹽水拌炒

當歸酒拌

金銀花

外科經驗方

薛氏醫按

吳郡薛 已著

新都吳玄有校

腫瘍

人參敗毒散加荆芥防風名荆防敗毒散

治癰疽疔腫發背乳癰等證增寒壯熱甚至頭痛

拘急狀似傷寒者宜服一二劑以衰其毒輕則內

自消若至六七日不消可服托裏消毒散

人參

前胡

柴胡

羌活

獨活

川芎

桔梗

枳殼 麩炒

茯苓

甘草 各一錢

作一劑用水二鍾煎至八分食遠服

如熱甚或痛甚者加黃芩黃連

大便不通量加大黃 煨 朴硝

托裏消毒散 治一切瘡疽服前藥不消者宜服此

藥未成即消已成即潰腐肉易去新肉易生如有

瘡口宜貼膏藥歛即不用切忌早傳生肌之藥

人參

黃耆 監水拌炒

當歸 酒拌

川芎

芍藥 炒

白朮 炒

茯苓

各一錢

白芷

金銀花

各半錢

甘草

五分

作一劑用水二鍾煎至八分澆在上食後服澆在

下食前服

仙方活命飲

治一切癰疽疔腫不問腫潰

川山甲

同蛤粉炒黃色

甘草節

防風

沒藥

赤芍藥

白芷

各六分

當歸尾

乳香

各一錢

天花粉

貝母

皂角刺

各八分

金銀花

陳皮

各三錢



作一劑用酒一大碗同入瓶內紙糊瓶口慢火煎  
數沸去粗病在上食後服病在下食前服能飲酒  
者服藥後再飲三兩杯尤好

金銀花湯

治一切癰疽發背疔瘡及喉閉乳蛾等

證用金銀花藤葉搗爛取汁半鍾和熱酒半鍾溫  
服甚者不過三五服可保無虞

忍冬藤酒一名金銀花酒

治食膏粱灸燂過多及

服金石補藥日久發疔預服免患

忍冬藤

鮮者五兩  
乾者一兩

大甘草節

一兩

作一劑用水三鍾煎至二鍾入無灰好酒一鍾

煎十餘沸去粗分三次服能飲酒者一次服另取  
藤搗爛酒調敷患處中留頭出毒乾再搽

槐花酒 治發背及一切瘡毒不問已成未成但焮  
痛者並治之

用槐花四五兩微炒黃乘熱入酒二鍾煎十餘沸  
去粗熱服未成者二三服已成者一二服

治癰疽發背疔腫惡瘡一二日至五六日不問痛否  
取大蒜切片如三錢厚置瘡頭上用艾壯於蒜上  
灸之三壯換蒜痛者灸至不痛不痛者灸至痛盡  
氣自然隨火而散丹溪云火以暢達拔引鬱毒此

從治之意若瘡頭多即用大蒜搗爛鋪患處攤其  
於蒜上燒之更服槐花酒一二劑若至數日不甚  
腫痛及不腐潰者此屬血氣不足尤當多灸及服  
溫補藥切忌寒涼之劑

神功散 治發背癰疽及諸瘡不問腫潰並治之

黃栢炒為末 草烏炒為末

用漱口水調入香油少許搽患處如乾仍用前水

潤之

潰瘍

瘡者人參湯治諸瘡潰後食少倦怠口舌乾燥或

不燥

寒蕪往來驚悸少睡並治之

黃耆

鹽水拌炒三錢

人參

白朮

炒

陳皮

一錢

蒼朮

米泔水浸炒一錢

麥門冬

五分去心胃寒

不用

當歸

酒拌

炙甘草

一錢

神麴

五分炒

升麻

一分

五味子

搗碎五分

黃栢

三分酒炒腹不實者去之

作一劑用水二鍾生薑三片煎至一鍾食遠服如

少睡加酸棗仁

炒一錢

肌肉遲生加白斂

去皮一錢

乳香止痛散 治諸瘡潰爛疼痛不忍

乳香

沒藥

各二錢

寒水石

煨

滑石

名四錢

水片

半斤

為細末搽患處

雄黃解毒散

治一切癰腫潰爛毒勢甚者先用此

藥二三次以後用猪蹄湯

雄黃 一兩

白礬 四兩

寒水石

一兩

用滾水二三碗乘熱入前藥一兩洗患處以太

膏或神異膏貼之

猪蹄湯

治一切癰疽消腫去惡肉潤瘡口止癢

白芷

黃芩

當歸

羌活

赤芍藥

露蜂房

蜂兒多者佳

生甘草 各五錢

用猪蹄一隻水四五碗煮熟去油粗入前藥煎數沸去粗溫洗隨用前膏藥貼之

神仙蠟礬丸 治癰疽及腸癰托裏消毒固臟腑止

疼痛

黃蠟 七錢

白礬 一兩 細研

熔蠟候溫入礬末和勻丸梧子大每服三五丸食遠滾湯送下

治諸瘡久不合口用炮附子去皮尖為細末唾津和隨瘡大小作餅置患處用艾壯於餅上灸之更服

大補氣血藥用江西豆豉為餅多灸之亦效

加減八味丸 治疽痊後及將痊口乾渴舌或堅黃

及未病先渴益腎水制心火

肉桂 一兩

山茱萸

用肉酒拌搗膏

山藥

各四兩

澤瀉 蒸三兩

五味子

微炒四兩

牡丹皮

白者

白茯苓 各二兩

熟地黄

八兩酒浸搗膏

為末入二膏加密丸梧子大每服七八十九空心

鹽湯送下

天乙靈應膏

治一切瘡疽及跌打損傷寒濕疾痛

玄參

大黃

肉桂

白芷

生地黄

芍藥

當歸

各一兩

為咀用香油二斤浸五七日煎至黑色去粗徐徐

下黃丹一斤再煎二十餘滾滴水成珠即為膏矣

加沒藥乳香各一兩亦可

疥瘡

奪命丹

治諸般腫毒疥瘡

蟾酥

輕粉

各五分

硃砂

三錢

白礬

枯

寒水石

煨

銅綠

各一錢

蝸牛

二十箇別研如泥一方無亦可

乳香



沒藥

麝香

各一錢

為末將蝸牛泥為丸如丸不就加酒糊少許燒如  
菜豆大每服一二丸用生葱頭三莖嚼爛同藥以  
酒熱酒送下出汗為度無汗再進一服

疥瘡之證初生其狀甚微多在四肢頭面骨節之處  
痒痛難忍增寒壯熱可服劑防敗毒散一二劑或  
奪命丹一服若有紅絲自瘡向腹走者宜撥破瘡  
頭去惡血以膏藥封貼如針之痛可用奪命丹  
一粒入瘡內毒即消如生唇面口內有紫筋者宜  
挑斷吐去毒血噙奪命丹一二粒毒入喉入腹俱

不治

槐花酒 治一切疔瘡腫毒

方見前

忍冬藤酒 治一切疔毒及發背癰疽並治之

方見前

乳癰

神效瓜蒌散 治乳癰乳勞

瓜蒌

大者一箇搗

甘草 半兩

當歸 半兩

沒藥

另研

乳香

各一錢 另研

作一劑用酒三碗煎至二碗分三次食後飲煎熟

菴患處陳良甫云如有乳勞便服此散可杜絕病

根如毒已成能化膿為水毒未成者則從大小便

散之

消毒散 治吹乳乳癰并便毒如增寒壯熱或頭痛

者宜先服人參敗毒散一二服方可服此藥如無

前證即服此藥三二劑或腫不消宜服托裏藥

青皮 法白

金銀花

天花粉

柴胡

殭蚕 炒

貝母

當歸 酒拌

白芷 各二錢

用水二鍾煎至一鍾食遠服如便毒加大黃 煨一錢

空心服

又方治吹乳乳癰不問已成未成用蒲公英一握 春

花黃搗爛入酒半鍾取酒溫服袒貼患處甚者不

過三五服即愈

癩癧

癩癧者結核是也或在耳前連及頤頷下至缺盆在

子骨

皆謂癩癧手少陽三焦經主之或在胸及胸

之側皆謂馬刀瘡手少陽膽經主之太抵二經多

氣少血初生如豆粒漸如梅李核或一粒或三五

粒按之則動而微痛不甚熱惟午後微熱或夜間

口乾飲食少思四肢倦怠或堅而不潰潰而不合

皆由血氣不足故往往變為勞瘵况其症原不係

膏梁丹毒之變因虛勞氣鬱所致宜以益氣養榮  
之藥治之其瘡自消若不詳脉證經絡受證之異  
及虛實之殊槩用追蝕毒藥及牽牛斑貓流氣飲  
十宣散敗毒散治之則先犯病禁經禁以致血氣  
愈損反爲敗證矣可不慎哉丹溪亦云或有風毒  
熱毒氣毒之異更宜斟酌而治之

益氣養榮湯治抑鬱及勞傷氣血頸項或四肢腫  
硬或軟而不赤不痛日晡微熱或潰而不斂並治

之

人參

白朮

炒二錢

茯苓

陳皮

貝母

香附子

當歸 酒拌

川芎

黃耆 鹽水拌炒

熟地黄 酒拌

芍藥 炒

桔梗

甘草 炒各一錢

作一劑姜三片用水二鍾煎至八分食遠服

胸痞人參熟地黄 各減三分 口乾加五味子麥門冬往

來寒熱加軟柴胡地骨皮膿清加人參黃芪膿多

加川芎當歸膿不止加人參黃芪當歸肌肉連生

加白斂宮桂

夏枯草湯 治瘰癧馬刀不問已潰未潰或日久成

漏用夏枯草六兩水二鍾煎至七分去粗食遠服  
此生血治瘰癧之聖藥虛甚當煎濃膏服并塗患  
處多服益善煎十全大補湯加香附子貝母遠志  
尤善

治瘰癧已成未成已潰未潰以手仰置肩上微舉起  
則肘骨尖自見是灸處如患在左灸左肘患在右  
灸右肘若左右俱患兩肘皆灸灸以三四十壯爲  
度更服補劑灸三次瘡自除如患三四年不愈者  
辰時灸至申時三灸即愈更服益氣養榮湯  
又方灸瘰癧未成膿者用大蒜切片如三錢厚安患

處用艾壯於蒜上灸之至三五壯換蒜每日灸十  
數蒜片以拔鬱毒如破久不合內有核或瘀肉此  
因血氣不足不能腐爛以銅錢挺輕輕連衣膜取  
去縱取重亦不痛不必畏懼更用江西豆豉爲末  
唾津和爲餅如前灸之以助陽氣內服補藥外貼  
琥珀膏或太乙膏瘡口自合

又方治瘰癧已破核不腐致瘡口不斂或貼琥珀膏  
不應用時效針頭散傳之以去腐肉以如神散傳  
之更服益氣養榮湯若氣血虛者先服益氣養榮  
湯待氣血稍充方用針頭散仍服前湯



如神散 治瘰癧已破瘡口未合

松香末 兩 白礬 三錢

為細末 油調 擦乾 糝亦可

散腫潰堅丸 治瘰癧馬刀瘡 服益氣養榮湯不能

消散者宜服此丸 五日又服益氣湯 五日如此相

兼服之 不應以針頭散傅之

知母 酒拌 炒 黃柏 酒拌 炒 瓜蒌根 酒拌

昆布 酒拌 炒 桔梗 黃芪 酒拌 炒

連翹 黃連 炒 京三稜 酒拌 炒

葛根 白芍藥 各三錢 升麻

當歸稍

酒拌

柴胡

甘草

各

草龍膽

四兩酒炒

黃芩

一錢五分一半生用酒炒

為細末煉蜜丸如棗豆大每服一百丸或一百五

十丸滾湯送下

加味敗毒散

即荆防敗毒散加牛蒡子玄參

治風熱上壅頤痛或因

怒氣增寒壯熱如四五劑不退宜服益氣養榮湯

方見前

神秘散 治瘰癧服散堅丸及養血氣藥不應者宜

進此藥更以養血氣藥服之

斑猫

二十一個去頭足翅同糯米炒去米不用為末

荆芥穗末

一錢

黑牽牛末

錢炒

直殭蚕末

錢炒

和勻每服一錢五更溫酒調下日午惡物從小便

中下如小便澁或痛宜以葱茶湯或木通湯即下

更吃米粥補人不下次日五更再服必以下為度

若脉牢瀼或洪大無力者不可服

時效針頭散

追蝕惡瘡瘻肉

赤石

半兩

乳香

白丁香

各一錢

砒

生用

黃丹

各一錢

輕粉

麝香

蜈蚣

一條

為細末糝於瘡肉上或瘡口小就搽瘡口上肉自

去更以膏藥貼之肉亦去嘗用砒末二錢以白  
末二錢和勻同飛過用禁一錢合藥亦效但不及  
生砒之功速耳

琥珀膏

治瘰癧腫硬或穿破膿水不絕經久不瘥

或成癭疾及癰疽並貼之更服益氣養榮等湯

琥珀

丁香

木香

各二錢

桂心

半兩

硃砂

細研

白芷

當歸

防風

去蘆

木鱉子

法殼

木通

各半兩

黃丹

七兩

柳枝

三兩

松脂

二兩

麻油

一斤

內除琥珀丁香桂心硃砂木香為細末餘藥剉咀  
以油浸五日入鑊中以慢火熬候白芷焦色瀝去  
下松脂末及黃丹以柳枝不住手攪滴水中試軟  
硬如軟再煎得中方入琥珀等末攪勻磁器盛貯  
用旋攤

咽喉口齒

清胃散 治胃經有熱牙齒或牙齦腫痛或牽引頭  
腦或面上發熱並治之

末當歸身

酒拌

黃連

生地黃

俱酒製

去牡丹皮

一錢五分

升麻

二錢

作一劑用水二鍾煎至七分食遠服

玄參升麻湯 治心脾壅熱舌上生瘡或木舌重舌

或連頰兩邊痛腫並治之

玄參

赤芍藥

升麻

犀角

鎊末

桔梗

炒

管仲

黃芩

各錢

甘草

半錢

作一劑水二鍾煎八分入犀角合後服

柳花散 治口舌生瘡

玄胡索 一兩

黃栢 半兩

蜜陀僧

青黛

各二錢

爲末每用少許付之有涎吐出再搽

碧雲 治一切積熱口舌生瘡心煩喉閉及牙齒齒

齧作痛

芒硝

青黛

寒水石

煨

石膏

煨各一斤  
未飛

朴硝

馬牙硝

甘草

滑石

各二兩

將甘草煎湯二升入諸藥再煎用柳枝不住手攪

令消溶入青黛和勻傾砂盆內候冷結凝成霜取

霜研爲末每用少許含化嚥津如喉閉不能嚥下

用竹管吹藥入喉中

金鑰匙 治一切風及痰涎壅塞水漿不下不識

人事者宜刺患處去血即消或刺少商穴在左手大指內

側去爪甲 急者二處並刺後繪圖

焰硝 一兩 五錢 白殭蚕 一錢 礪砂 五錢

片腦 二分 雄黃 二錢

研末和勻以竹管吹入喉中有涎吐出內服荆防

敗毒散如大便秘加大黃朴硝

破關丹 治乳蛾喉閉纏喉風等證

蓬砂末 五錢 霜梅肉 一兩 燻爛

丸芡實大每服一丸噙化嚥下內服荆防敗毒散



又方治虛火炎上用炮附子去皮尖切片噙之或研  
為末用唾津調塗脚心亦可

又方用肉桂為末哈之

治諸骨鯁

用象牙末吹患處

又方用五倍子茶葉為末吹患處

囊癰

加味瀉肝湯 治肝經濕熱不利陰囊腫痛或潰爛

皮脫羣丸懸掛或便毒及下疳腫痛或潰爛並治

之

龍膽草

酒拌炒

當歸稍

車前子炒

澤瀉

生地黄

芍藥炒

黃連炒

黃栢

酒拌炒

知母

酒拌炒

防風

各一錢

甘草稍

五分

作一劑水二鍾煎八分食前服外敷烏金散

烏金散

麩炭

紫蘇葉

為末各等分香油調搽

加味小柴胡湯

治囊癰腐爛或飲食少思日晡發

熱

柴胡

人參

黃芩

炒

川芎

白朮

炒

黃耆

鹽水浸炒

當歸

酒洗

甘草

黃栢

酒拌炒

知母

酒拌炒 各一錢

半夏

五分

作一劑水二鍾煎八分食前服

痛甚加黃連 小便不利加木通

下疳

勝金散 治下疳潰爛或疼痛 治

黃連

黃栢

輕粉

硃

孩兒茶

各五分

米片

為細末香油調搽內服加味瀉肝湯

加味瀉肝湯

治下疳腫痛或潰爛不愈

方見前

加味小柴胡湯

治下疳潰爛發熱少食

方見前

痔瘡

附便血

槐角丸

治痔漏腫痛或便血

槐角

一兩

防風

地榆

枳殼

麩炒

當歸

酒

各一兩

為末煉蜜丸梧桐子大每服五十九丸空心滾湯下

腫痛或便秘飲槐花酒膿多或倦宜服黃耆人參

湯潰而作痛宜服乳香止痛散

雙解散 治男子交感強固精氣以致精血交錯肛

門連 拗腫痛大小便澁滯

棘桂

大黃

炒

白芍藥

澤瀉

牽牛

炒搗

桃仁

去皮尖各二錢半

甘草

五分

乾薑

一錢

作二劑水二鍾煎七分空心并食前服

秦艽白木湯

治痔瘡作痛大便乾燥或下血

秦艽

桃仁

去皮尖研膏

皂角仁

煨

枳殼

麩炒

當歸尾

酒拌

澤瀉

白朮

各一錢二分

地榆

一錢血不止倍之

作一劑用水二鍾煎八分食前服

祛風潤燥湯 治痔瘡焮腫作痛大便秘澀

防風

荆芥

羌活

黃連

黃芩

秦艽

枳殼

各一錢半

當歸

酒拌

皂角仁

去皮麩存性

桃仁

去皮尖研

澤瀉

紅花

各一錢

大黃

煨二錢

作一劑用水二鍾煎八分食前服

治痔瘡下疳瘡

臘月取羊膽一枚入片腦末一分置風處用時以

凉水化開頻敷患處內服槐子酒或加味瀉肝  
熊膽更佳如眼痛者點之尤効

又方治痔瘡痛不可忍

槐樹根 七兩不犯 鉄搗碎

片腦末

指甲草 七顆蜀人呼為苦草採喂 猪饑民亦食之高二三寸

作一劑用水二鍾煎一小盞入米片末候溫頻敷

患處內服槐子酒無指甲草亦可

治便紅

用黃連吳茱萸等分熱湯拌濕罨一二日同炒各

另為末各糊為丸如梧子大每服二三錢糞前紅

服茱萸丸糞後紅服黃連丸俱酒下如四五服不應者乃氣虛不能攝血以六君子湯加黃耆地松治之再不應以補中益氣湯倍加柴胡升麻升舉之切忌寒涼之劑

便癰

雙解散

治男子交感強固精氣致患便癰腫痛或

發熱宜用此藥一二服如不消更服補中益氣湯

荆防敗毒散

治便癰發寒熱或拘急頭痛

方見前

加味瀉肝湯

治便癰腫硬不消或小便澀滯

方見前

仙方活命飲

治便癰不潰痛甚

方見前



托裏消毒散

治便癰不作膿或不潰

方見前

加味十全大補湯

治便癰膿清或不斂

方見後

神効瓜蒌散

治婦女患便癰不潰或痛甚及乳癰

一切癰疽等毒並治之

方見前

補中益氣湯

治勞役患便癰不消

人參

黃耆

鹽水拌炒

白朮

炒各五分

當歸

酒拌

陳皮

各一錢

柴胡

升麻

各五分

作一劑姜三片棗二枚水二鍾煎八分食前服

補骨脂散

治不慎房勞患便癰或勞役患此腫痛

並治之

補骨脂 研炒 一兩

牛蒡子 研炒

牽牛 研炒

大黃 酒拌炒 各五錢

為末每服五錢痛甚者一兩空心熱酒調下

製甘草 治便癰腫痛或歎連莖根 方見後

懸癰

治懸癰以大甘草

水一鍾浸透

以慢火灸

水乾為度如

未成膿者四五劑已成膿者一二劑酒煎空心服

如小便赤更服清心蓮子飲三四劑及托裏滋陰

藥若潰而不斂宜服大補氣血藥不謹守者必成漏證

加味小柴胡湯 治懸癱攣攣痛發熱小便赤澀或增

寒發熱 方見前

清心蓮子飲 治懸癱勢退惟小便赤澀

黃芩 五錢

黃耆 錢半

石蓮肉 去心

人參

赤茯苓 各十錢半

車前子 炒

麥門冬 去心

甘草 炙

地骨皮

製甘草 法見前

每服一兩用水二鍾煎八分食前服

如發熱加柴胡薄荷

加味托裏散

治懸癰不消不潰

人參

黃耆

鹽水拌炒

當歸

酒拌

川芎

麥門冬

去心

知母

酒拌炒

黃栢

酒拌炒

芍藥

炒

金銀花

柴胡

製甘草

法見前各一錢

作一劑用水二鍾煎八分食前服

加味十全大補湯

治懸癰潰而不斂或發熱飲食

少思

人參

黃耆

鹽水拌炒

白朮

炒

茯苓

熟地黄

酒拌中滿  
減五分

當歸

酒拌

川芎

芍藥

炒各  
一錢

肉桂

麥門冬

去心

五味子

搗炒

甘草

炒各  
五分

作一劑用水二鍾煎一鍾食前服

莖腫加青皮

熱加黃芩柴胡

日晡熱加柴胡地骨皮

小便赤加酒製知母

黃

小便澀加車前子山梔子

俱炒

和膿瘡

治腫瘡濕毒瘡傷手瘡或遍身熱瘡並治之

黃栢末酒炒

輕粉三錢

用猪膽汁調搽乾搽亦可內服人參敗毒散云

槓加蒼木黃栢

隔紙膏 治臙瘡濕毒瘡

石膏煨研

白礬研

各等分桐油調成膏作隔紙膏貼之更服荆防敗

毒散如數劑不應宜服人參黃耆湯方見前

湯火瘡

治湯澆火燒瘡止痛生肌

大黃末一兩

當歸末一兩

用燭油調搽或芝麻油調搽乾搽亦可

栝葉散 治湯火傷或痛甚

栝葉 炒

梔子仁 各三兩

鉛粉 半兩

為細末以羊骨髓五兩熔化和藥以木椎研良久

日塗三五次用燭油調亦可

治凍破成瘡或手足皸裂

歷青末 一兩

黃蠟 一兩

香油 二兩

三味熔化搽患處

破傷風

益真散 治跌打損傷或風入瘡口項強牙關緊急

或腰背反張並治之

防風

天南星

等分

為末每服三錢小兒一錢用重便一鍾煎至七分  
熱服

艾方

治打撲傷損或蟲獸傷破皮膚風邪入肉牙

關緊急腰背反張或遍麻木甚者不知人專用蒸

搗爛塗傷處將艾壯於蒜上灸之多灸為善仍用

膏藥護貼內服玉真散如毒蛇風犬咬傷先刺患

處去毒血亦如前法治之

小兒丹毒



治小兒丹毒多生頭面四肢色赤遊走不定用細磁  
器擊碎取有鋒芒者一塊以筋一根劈開頭尖夾  
之用線縛定兩指輕撮筋稍令磁芒正對患處懸  
寸許再用筋一根頰擊筋頭令毒血遇刺皆出更  
以神功散敷之內服荆防敗毒散或五福化毒丹  
入腹者不治

五福化毒丹 治小兒蘊積毒熱驚惕煩躁頰赤口  
乾口舌生瘡夜卧不寧謔語咬牙或頭面遍身  
生瘡癩

玄參

桔梗

各一

茯苓

二兩

人參

青黛

牙硝

甘草

七錢五分

麝香

一字

金銀箔

十片

為末煉蜜丸芡實大一歲者每服一丸薄苛湯化

下及治痘疹後餘

涎血臭氣必生也

黃汁化下更用雞翎掃藥口內

治小兒白屑滿口因各曰驚口瘡不能吮乳用髮纏

指上蘸井水拭舌如屑不脫膿煮栗木汁以綿纏

筋頭拭洗却用飛過黃丹搽上

神仙解毒萬病丹

一名太乙丹紫金丹一名神仙太乙丹一名玉握丹

治一切

毒及菰子鼠莽菌蕈金石或喫疫死牛馬河豚

等毒或時行瘟疫山嵐瘴瘴急喉閉纏喉風脾病  
黃腫赤眼及衝胃寒暑熱毒上攻或自縊或溺水  
或打撲傷損癰疽發背瘡腫湯火或蛇蟲犬鼠所  
傷或中邪狂走鬼胎鬼氣並宜服之居家出入不  
可無此藥真濟世衛身之寶毒藥如嶺南兩廣最  
多若徒宜於此纔覺意思不快服之即安彼潤有  
草曰胡蔓草又名斷腸草陰置水中飲之即死又  
有取毒蛇殺之以草覆上以水洒之數日菌生其  
上取爲末酒調以毒人始亦無患再飲酒即發立  
死其或淫婦多與北人配合北人回密以藥置食

中乃戒之曰子某年來若從其言婦乃以藥解之  
過期則必死矣名曰定年藥凡北人至彼方亦宜  
知之若覺中毒四大不調即便服此况彼下藥時  
必於雞豚等肉投之後再食前物必發其毒急服  
此一錠或吐或利隨手便瘥昔有一女子久患勞  
瘵為屍蟲所噬磨一錠服之一時吐下小蟲十餘  
條後只服蘇合香丸半月遂如常如牛馬六畜中  
毒亦以此藥救之無不效者

文蛤

三兩淡紅黃色者  
碎洗淨又名五倍子

山茨菇

二兩

續隨子

去殼研細以紙包  
壓去油再研一兩

紅芽大戟

洗淨  
一兩

五錢

麝香三錢研

右各另爲細末和勻以糯米粥和勻於木臼中舂  
千餘下每料分作四十錠於端午重陽七夕合如  
欲急用辰日亦得勿令婦人孝服不具足人及雖  
犬之類見之合宜珍重否則無効○如癰疽發背  
未破用冷水磨塗痛處并服良久覺毒立消○陰  
陽二毒傷寒心悶語狂胸膈壅滯邪毒未發及瘟  
疫山嵐瘴氣纏喉風冷水入薄荷一葉同研下○  
急中顛邪喝叫亂走鬼胎鬼氣並用煖無灰酒下  
○自縊或落水死心頭煖者及驚死鬼迷死未隔

宿者並冷水磨灌下○蛇犬蜈蚣傷並用  
塗傷處如腹脹或迷悶者更宜服之諸般癩  
問新久臨發時煎桃柳枝湯下○小兒急慢  
五疳入痢蜜水薄苛一葉同磨下○牙關緊  
一錠外塗內服量大小用之牙痛酒磨塗及合  
許吞下○湯火傷東流水磨塗傷處○打撲傷  
炒松節酒下○年深日久頭痛太陽疼用酒入  
苛磨紙花貼太陽穴上并服之○諸般癩疾口  
歪邪眼目掣取夜多睡涎言語塞澀卒中風口  
牙關緊急筋脉攣縮骨節風腫手脚疼痛行步

難一應風氣疼痛並用酒磨下有孕婦人不可服  
○余治一婦人腹內結塊久而不清○一婦人月  
經過期不至腹內作痛服破血行氣之劑不効服  
之並痊○一婦人苦頭風作暈數年亦服之吐痰  
碗許遂不再發○一男子喉閉水漿難下○一男  
子纏喉風痰涎壅盛○一婦人中風牙關緊急痰  
涎溢出隨服並愈○一男子便毒堅硬○一男子  
患痔未成膿苦痛大便俱難各進一錠後去二次  
痛即止不用而消○一男子患發背瘡頭如粟重  
如負石內服外塗後去三四次每去紅肉如炙即

臣而疹○一男子利自死牛即口遍身是紫泡不  
計其數已而俱憤各灌一錠吐瀉而甦一藥不下  
者而死○一小兒昏憤六日不省一小兒驚風發  
搦諸藥不効空口灌之並蘇○一男子中風牙關  
緊急口出涎水亦灌之尋愈○一女子爲邪所交  
腹作痞服之隨下惡物其邪仍至又服半錠每夜  
更灸二三錠使烟氣盈屋遂不再至○一家患傳  
屍勞兄弟五人已死者三人有方士令服此藥遂  
各進一錠一下惡物如膿狀一下死蟲如蛾形俱  
獲生其人遂以此藥廣濟屍證無不驗者余常用



治一切雜病及瘡疽等毒未成膿者甚効其已成  
膿者亦能殺大勢考其藥品雖不言補今羸瘦之  
人服之並効誠神劑也然以價計之用銀三錢  
有七十錠可救七十人有力之家當合之以濟  
近人製此往往加以硃砂雄黃考之諸方並無  
殊余故不用恐亂其真也識者當自知之

卷而張之方小良醫贈六日不發一小良醫贈  
情其遠乎而斯劑分贈一錠也感而撰一藥不  
月而張之方小良醫贈六日不發一小良醫贈