

陳脩園先生醫書七十二種

上海錦章書局
出版



本草之始昉於神農樂止三百六十品此乃開天之聖人與天地為一體實能探造化之精窮萬物之理字字精確非若後人推測而知之者故對症施治其應如響仲景諸方之藥悉本此書藥品不多而神明遠以試而有效醫家皆取而用之代有成書至李時珍而為七百二十品後世日增一日凡華夷之奇草偽原其生處諸家之說而本草更大備此藥味由少增益唐慎微證類本草為綱目考核其同辨其真其所治之病益廣然皆不若神農本草之純正真確故宋人有云用神農之品無不效而宏景所增已不甚效若後世所增之藥則尤有不足憑者至其註釋大半皆視古方用此藥醫某病則增注之古方治某病其藥不止一品而誤以方中此藥為專治此病者有之更有以己意推測而知者又或偶愈一病實非此藥之功而強著其效者種種難信至張潔古李東垣輩以其藥專派入某經則更穿鑿矣其詳在治病不必分經絡藏府篇故論本草必以神農為本而他說則必審擇而從之更必驗之于病而後信又必考古人方中所曾用者乃可採取餘則止可於單方外治之用法用之又後世所增之奇藥或出於深山窮谷或出於殊方異域前世所未曾有者後人用之往往有奇效此乃偏方異氣之所鍾造物之機久而愈洩能治古方所不能治之奇病博物君子亦宜識之以廣見聞此又在本草之外者矣

治病不必分經絡藏府篇出徐氏六種

徐靈胎先生傳

袁枚

乾隆二十五年文華殿大學士蔣文恪公患病 天子訪海內名醫大司寇秦公首薦吳江徐靈胎 天子召入都

命視將公疾先生奏病不可治 上嘉其朴誠欲留在京師効力先生乞歸田里 上許之 十年 上以中貴

人有病再 召入都先生已九十九歲自知衰矣未必生還乃率其子蟻載褊枻以行果至都三日而卒 天子悅惜之賜帑金 命熾扶觀以歸嗚呼先生以吳下一諸生兩家 聖子變化已無病不治矣迨其後藥味日多至陶

宏景倍之而為七百二十品後世日增一日凡華夷之奇草子蒲輪之徵迺撫司道到門遠駕聞者皆驚且羨以為

希世之榮余舊史官也與先生有撫塵之好急思采其奇方異術奮筆書之以垂醫鑑而活蒼生倉卒不可得今秋訪熾於吳江得其自述紀略又訪諸吳人之能道先生者為之立傳傳曰先生名大椿字靈胎晚自號涖溪老人家

本望族

康熙十八年鴻詞科翰林纂修明史先生者有異稟聰強過人凡星經地志九宮音律以至舞刀奪槊

勾卒贏越之法靡不宣究而尤長于醫母視人疾穿穴膏肓能呼肺腑與之作語其用藥也神施鬼識斬關奪隘如

周亞夫之軍從天而下諸岐黃家目愷心駭帖帖警服而卒莫測其所以然蘆墟近耕石卧病六日不食不言目炯

炯直視先生曰此陰陽相搏證也先投一副須臾目瞑能言再飲以湯竟躍然起曰余病危時有紅黑二人纏繞作

祟忽見黑人為雷震死頃之紅人又為白虎銜去是何祥也先生笑曰雷震者余所投附子霹靂散也白虎者余所

投人參白虎湯也共驚以神張兩村兒生無皮見者欲嘔將棄之先生命以糯米粉糝其體裹以絹置之土中出其

頭飲以乳兩晝夜而皮生任氏婦患風痺兩股如針刺先生命作厚褥連強有力老姬抱持之戒曰任其顛撲叫

號不許放鬆以汗出為度如其言勿藥而愈商人汪令聞十年不御內忽氣喘頭汗徹夜不眠先生曰此亢陽也服

使過多之故命與婦人一交而愈有奉師某與人角仗富胸受傷氣絕口閉先生命覆卧之奮拳擊其尻三下逆吐

黑血數升而愈其他如沈文愨公未遇時診脉而知其必貴熊季輝強壯時握臂而知其必亡皆所謂視於無形聽

於無聲者其機警靈速皆此類也先生長身廣額音聲如鐘白鬚偉然一望而知為奇男子少時留心經濟之學於

東南水利尤所洞悉雍正二年當事大開塘河估深六尺傍塘岸起土先生爭之曰誤矣開太深則費重淤泥易積

傍岸泥崩則塘易倒大府是之改縮淺短離塘岸一丈八尺起土工省費而塘以保全乾隆二十七年江浙大水蘇

府莊公欲開震澤七十二港以洩太湖下流先生又爭之曰誤矣震澤七十二港非太湖之下流也惟近城十餘港

乃入江故道此真下流之當開濬者其餘五十餘港長二百餘里兩岫室盧墳墓以萬計如欲人開費既重而傷民

實多且恐湖泥倒灌旋開塞此乃民間自濬之河非當官應辦之河也莊公以其言入奏天子是之遂賦工屬役

民不擾而工已竣先生隱於洄溪矮屋百椽有畫眉泉小橋流水松竹鋪紛登樓則太湖奇峰鱗羅布列如兒孫拱

侍之狀先生嘯傲其間人望之疑真人之在天際也所著有難經釋醫學源流等書凡六種其中錄別利弊剖析

經絡將古今醫書明其是非指其非久行於世于熾字榆村儻蕩有父風能活人濟物以世其家孫坦乙卯舉人以詩

受業隨園門下贊曰記稱德成而先藝成而後似乎德重而藝輕不知藝也者德之精華也德之不存藝於何有人

但見生先藝精後絕而不知其平素之事觀存與人忠英枯槁之造修與梁見義必為是據於德而后游於藝者也

宜其得心應手驅遣鬼神嗚呼豈偶然哉猶記丙戌秋余左臂忽短縮不能伸諸醫莫效乃挖舟直詣涇陽無介紹惘惘然疑先生之未必我見也不料名紙一投家門延請握手如舊相識且難奉為僕清故竟日贈丹藥一丸而別故人手尊漢迎而笑曰有是哉子之幸也使他人求此一見費黃金十笏矣其為世所欽重如此先生好古不喜時文與余平素意合故未其嘲學究俳歌一曲載詩話中以警世云

凡例

一錄此百種原以辨明藥性開發義蘊使讀者深識其所以然因此悟彼方藥不致悟用非備品以便查閱也覽者勿以不載常用之藥為疑

一諸藥有獨具之性者則用詳解其兼長可互見者俱不重出推類自明

一此解亦間有與前人相同者但彼祇釋其當然而未推測其所以然知所當然則用古人之方能不失古人之意知所以然則方可自製亦可能合古人製方之意也故此解皆著其所以然之故而淺近易曉者則略焉

一所解諸藥乃就市中所有審形辨味以合經義至古今土產各殊或有尚非正義與尚有遺義者則俟知者正之

一諸藥有所出地名雜以後漢時郡縣陶隱居疑為仲景元化等所記是本經所載已不皆神農以來所產之地矣今之所產又大半非漢時所產之地欲盡考其實固無從也故不復列而解之

一本經所載一名甚多因無可解故亦不列

一品第及字樣俱依明重刻宋太觀刊唐慎微本所載白字本經考陶隱居本草有朱書墨書之別朱書為神農本經墨書為名醫別錄開寶間重定印本於本經易朱書為白字大觀本連之雖未必無傳訛而取其近古猶勝於近刻也

一詳解止此百種餘亦頗有略為解者以資人者淺一概不存

神農本草經百種錄目次

上品

丹砂 雲母 石鍾乳 礬石 朴消 滑石

禹餘糧 紫石英 五石脂 扁青 菖蒲 菊花

人參 甘草 乾地黄 朮 菟絲子 牛膝

此胡 麥門冬 車前子 木香 薏苡仁 澤瀉

遠志 龍膽 細辛 石斛 著實 黃連

黃耆 肉蓯蓉 防風 續斷 決明子 丹參

五味子 蛇床子 沙參 菌桂 松脂 槐實

柏實 茯苓 藥木 乾漆 辛夷 桑上寄生

髮髮 龍骨 麝香 牛黃 白膠 阿膠

石蜜 桑螵蛸 藕實莖 橘柚 大棗 葡萄

石硫黃 水銀 磁石 陽起石 乾薑 苦參

芍藥 玄參 百合 白芷 黃芩 狗脊

澤蘭 牡丹 吳茱萸 梔子 鹿茸 犀角

白堊蠶 白芷 伏翼 蚌蟬

下品 附子 半夏 大黃 芋蓆 白及 貫眾

連翹 夏枯草 水蛭 桃核仁 旋復花 菴蘆

水蛭 桃核仁 旋復花 菴蘆 白及 貫眾

水蛭 桃核仁 旋復花 菴蘆 白及 貫眾

水蛭 桃核仁 旋復花 菴蘆 白及 貫眾

閩吳航陳念祖修園鑒定

吳江徐靈胎洄漢著

上品

丹砂味甘微寒則知其性若色與氣則在下文主治之中可推而知之也

之病也如和子養精神凡精氣所結之物皆足以養精神安魂魄未入心益氣明目

能藥皆如此全氣所成也又五臟之精皆上注殺精魁邪惡鬼色故足以辟陰邪

子目大小皆屬心丹砂益目中心藏之精殺精魁邪惡鬼色故足以辟陰邪

石屬金亦金之精也凡上品之藥皆得天地五行之精以成其質人身不外五行求其精氣以補真

元則神靈通而形質同矣但物性皆偏大過不及反足為害苟非通乎造化之數者未有試而不驗者也

總解此因其色與質以知其效者丹砂正赤為純陽之色心屬火色赤故能入心而統治心經之證其質重故

又有鎮墜血氣之能也凡藥之用或取其氣或取其味或取其色或取其形或取其質或取其性情或取其所

生之時或取其所成之地各以其所偏勝而即資之療疾故能補偏救弊調和藏府深求其理可自得之

雲母味甘平主身皮皴肌雲母色白屬金故為肺經之藥又肺中風寒熱如在車船上

藏之功益子精明目肺為腎源日為肺此久服輕身延年肺壯則氣旺

總解雲母雖有五色而白其正色也白屬金生水故雲母之上常生雲氣雲者地氣上升欲為雨而未成雨

者也肺屬金而在上為人身之水源與雲母相類故為肺經之藥

石鍾乳味甘温主欬逆上氣鍾乳石體屬金又其象下明目益精精能引肺氣入腎安五臟通百節利九竅

則藏安中下乳汁鍾乳即石汁如乳者所滯而度則竅通成與乳為類故能下乳汁也

總解此以形為治石為土中之金鍾乳石液所凝乃金之液也故其功專于補肺以其下垂故能下氣以其中

空故能通竅又肺朝百脉肺氣利則無所不利矣自唐以前多以鍾乳為服食之藥以其能直達腎經驟長陽

氣合諸補腎之品用于房中之物最效但此乃深巖幽谷之中水溜凝結而成所謂金中之水其體至陰而石

藥多悍性反屬陽故能補人身陰中之火陰火一發莫可制伏故久服毒發至不可救惟昇煉得宜因證施治

以交肺腎子母之藏實有殊能也

上海錦章書局石印

礬石味酸寒礬石味酸而與酸者蓋五味中無酸即酸之變味主寒熱寒熱為肝經之疾洩瀉白沃亦收瀉之功

○陰蝕惡瘡味則性寒故能殺毒○目痛堅骨莖制火清金○鍊餌服之輕身不老增年能收斂肝氣

總解此以味為治礬石之味最烈而獨成一味故其功皆在于味

朴消味苦寒朴消味鹹而云苦者或古時所產之地與○主百病除寒熱邪氣即氣凝結則生寒熱消味○逐六府積聚結固留癖尚能滲出故過積聚等即無不清解也○能化七十二種石此較聖○鍊餌服之輕身神仙積聚結固留癖尚能滲出故過積聚等即無不清解也

之淨穢以存其精華故有此效

總解消者消也朴消乃至陰之精而乘陽以出其本水也其標火也遇濕則化為水遇火則升為大體最清而

用最變故丹家重之石屬金消過火則亦變火蓋無火之性而得火之精氣者也火鑠金故能變化石

滑石味甘寒主身熱洩瀉寒能除熱滑石能有利大小腸○女子乳難乳亦水類滑石利水且○瘕閉利小便滑石味甘寒主身熱洩瀉寒能除熱滑石能有利大小腸

中積聚寒熱滑石味甘寒主身熱洩瀉寒能除熱滑石能有利大小腸○益精氣久服輕身耐飢長年益胃氣胃氣利則其效如此

總解此以質為治凡石性多燥而滑石體最滑潤得石中陰和之性以成故通利腸胃去積除水解散熱降氣石

藥中之最和平者也

禹餘糧味甘寒主欬逆補中降氣○寒熱煩滿除脾胃虛虛及有濕滯○下赤白質燥性寒故能○血閉癥瘕清瀉

○大熱熱在陽明者必○鍊餌服之不饑其質類粉而補脾土所○輕身延年補春後

總解禹餘糧色黃質膩味甘乃得土氣之精以生者也故補益脾胃除熱燥濕之功為多凡一病各有所因治

病者必審其因而治之所謂求其本也如同一寒熱也有外感之寒熱有內傷之寒熱有雜病之寒熱若禹餘

糧之所治乃脾胃濕滯之寒熱也後人見本草有治寒熱之語遂以治凡病之寒熱則非惟不效而且有害自

宋以來往往蹈此病皆本草不講之故耳

紫石英味甘溫主心腹欬逆甘能和中○邪氣補不足散風寒補心○女子風寒在子宮絕孕十年無子子宮屬衝

下連故能入于衝脈之底風寒結孕溫散收斂風也

○久服溫中輕身延年補血

總解此以色為治色紫則入心心主血故能補血其降氣而能入下焦則質重之效也

青石亦石黃石白石黑石脂等味甘平主黃疸洩痢腸游膿血蝕濕皆濕氣在太陰也○下血赤白邪氣
除○癰腫疔瘡惡瘡頭瘍疥癬此皆濕鬱所生之毒○久服補髓益氣肥健不饑輕身延年致精氣而燥脾○五色
脂各隨五色補五藏性治異同而所補之藏各異

總解石脂得金土雜氣以成故濕土之質而有燥金之用脾惡濕燥能補之寒其質屬土不至過燥又得秋金
斂藏之性乃治濕之聖藥也

扁青味甘平主目痛明目養肝之功○折跌癰腫金瘡不瘳收澀斂之功○破積聚消肝○解毒氣利精神久服輕身不老氣

所結之物故能除毒益精增年也

總解內經云五藏六府之精皆上注于目故目雖屬肝之竅而白乃肺之精也五行之中火能舒光照物而不
能鑿物惟金之明乃能鑿物石屬金體故在藥皆能明目而扁青生于山之有金處蓋金氣精華之所結也又
色青屬肝子目疾尤宜凡草木中得秋金之氣者亦然凡物精華所結者皆得天地清粹之氣以成而穢濁不
正之氣不得干之故皆有解毒之功其非精華所積而亦能解毒者則必物性之相制或以毒攻毒也

菖蒲味辛溫主風寒濕痹辛能散風濕能除寒芳燥能除濕○欬逆上氣開心孔補五藏開竅下通者入心氣○通九竅明目出

音聲芳香清烈故走通諸竅也○久服輕身不忘不送惑延年氣不阻滯則身體通利氣通則津液得和通之耳目惟靈皆資也

總解菖蒲能于水中橫行四達辛烈芳香則其氣之盛可知故入于人身亦能不為濕滯痰涎所阻凡物之
生于天地間氣性何如則入于人身其奏效亦如之蓋人者得天地之和氣以生其氣血之性肖乎天地故以
物性之偏者投之而亦無不應也餘可類推

菊花味甘平主風頭眩腫痛目欲脫淚出芳香上達又得秋金之氣○皮膚死肌惡風濕痺清脾降風驅風散濕○久服利血

氣輕身耐老延年菊花晚開晚落花中之最久者也故其益人如此

總解凡芳香之物皆治頭目肌表之疾但香則無不辛燥者惟菊花得天地秋金清肅之氣而不甚燥烈故于

頭目風火之疾尤宜焉

人參味甘微寒主補五藏安神定魂魄止驚悸有形無形無一之不補也○除邪氣明目正氣充則邪氣自除五藏六府之精皆上注于目此所云明乃補其精之

效非若他藥專
有明目之功也○開心益智人參氣賦而不帶補而兼通
故能入心孔而益神明也○久服輕身延年補氣之功

總解人參得天地精英純粹之氣以生與人之氣體相似故于人身無所不補非若他藥有偏長而治病各有

其能也凡補氣之藥皆屬陽惟人參能補氣而體質屬陰故無剛燥之病而又能入于陰分最為可貴其力大

而峻用之失宜其害亦甚于他藥也今醫家之用參救人者少殺人者多蓋人之死于虛者十之一二死于病

者十之八九人參長于補虛而短于攻疾醫家不論病之已去未去於病久或體弱或富貴之人皆必用參一

則過為謹慎一則借以塞責而病家亦以用參為盡慈孝之道不知病未去而用參者不少如小柴胡新加湯之

逆固諸藥罔效終無愈期故曰殺人者多也或曰仲景傷寒方中病未去而用參者不少如小柴胡新加湯之

類何也曰此則以補為瀉之法也古人曲審病情至精至密知病有分有合者邪正並居當專于攻散分者

邪正相雜有虛有實實處宜瀉虛處宜補一方之中兼用無礙且能相濟則用人參以建中生津托出邪氣更

為有力若邪氣尚盛而未分必從專治無用參之法也况用之亦皆入疎散藥中從無與熟地芫肉等藥同入

感證方中者明乎此而後能不以生人者殺人矣○人參亦草根耳與人殊體何以能驟益人之精血蓋人參

乃升提元氣之藥元氣下降不能與精血流貫人參能提之使起如火藥藏于砲內不能升發則以火發之若

砲中本無火藥雖以砲投火中不能發也此補之義也○堅筋骨長肌肉倍力形不足者補之以味
甘草之甘為土之正

甘草味甘平主五藏六府寒熱邪氣甘能補中氣中氣旺則臟腑之精
甘能四布而驅其不正之氣也○久服輕身延年補後天

總解此以味為治也味之甘至甘草而極甘屬土故其效皆在于脾脾為後天之主五藏六府皆受氣焉脾氣

或則五藏皆循環受益也

乾地黃味甘寒主折跌絕筋傷中逆血痺行血之功○填骨髓長肌肉血足能化精而色黑髮潤也
脾經血血克則肌肉亦滿矣○作湯除寒熱積聚

除痺血充足則邪氣散血流通則
凝滯消血氣利則經脈暢○生者尤良血貴流行不貴滯積故中
古以前用熟地者甚少○久服輕身不老補血之功

總解地黃色與腎相類血故入人身則易于補血血補則陰氣得和而無枯燥拘牽之疾矣古方只有乾地黃

生地黃從無用熟地黃者熟地黃乃唐以後製法以之加入溫補腎經藥中頗為得宜若於湯劑及養血涼血

等方甚屬不合蓋地黃取其性涼而滑利流通熱則脈滯不涼全失其本性矣又仲景傷寒一百十三方惟復
脈用地黃蓋傷寒之病邪從外入最忌滋滯即使用補必兼疎拓之性者方可入劑否則邪氣向裏必有遺害
今人一見所現之證稍涉虛象便以六味湯為常用之品殺人如麻可勝長嘆

木味苦溫主風寒濕痺死肌五厚而兼辛散故能除

作煎餌久服輕身延年不饑脾胃充則體強

總解不者土之精也色黃氣香味苦而帶甘性溫皆屬于土故能補益脾土蓋其氣甚烈而芳香四達故又能

達于筋脉肌膚而不專于建中宮也

菟絲子味辛平主續絕傷子中有絲不斷

明目輕身延年生精則日明

總解子中之最有脂膏者莫如菟絲且炒熟則芳香又潤而不滑故能補益肝脾也凡藥性有專長此在可解

不可解之間雖聖人亦必試驗而後知之如菟絲之去面野亦其一端也以其辛散則辛散之藥甚多以其

滑澤則則滑澤之物亦甚多何以他藥皆不能去而獨菟絲能之蓋物之生各得天地一偏之氣故其性自有

相制之理但顯于形質氣味者可以推測而知其深藏于性中者不可以常理求也故古人有單方及秘方往

往以一二種藥治一病而得奇中及視其方皆不若經方之必有經絡奇偶配合之道而效反神速者皆得其

藥之高能也藥中如此者極多可以類推

牛膝味苦酸此止言味而不言性故謂

火爛墮胎此性也後凡不言性者做此

總解此乃以其形而知其性也凡物之根皆橫生而牛膝獨直下其長細而韌酷似人筋所以能舒筋通脉下

血降氣為詣下達藥之先導也筋屬肝肝藏血凡能舒筋之藥俱能治血故又為通利血脉之品

此胡味苦平主心腹去腸胃中結氣輕揚之體能除

則正○久服輕身明目益精諸邪不能害則正

飲食積聚寒熱邪氣疏腸胃之滯邪○推陳致新總上三者

總解此胡腸胃之藥也觀經中之言治效皆主腸胃以其氣味輕清能于頑土中疎理滯氣故其功如此天下惟木能疎土前人皆指為少陽之藥是知其末而未知其本也張仲景小訖胡湯專治少陽以此為主藥何也按傷寒傳經次第先太陽次陽明次少陽然則少陽雖在太陽陽明之間而傳經乃居陽明之後過陽明而後入少陽則少陽反在陽明之內也蓋以所居之位言則少陽在太陽陽明之間以從入之道言則少陽在太陽陽明之內故治少陽與太陽絕不相干而與陽明為近如小訖胡湯之半夏甘草皆陽明之藥也惟其然故氣味須輕清疎達而後邪能透土以出知此則仲景用訖胡之義明而訖胡為腸胃之藥亦明矣

麥門冬味甘平主心腹結氣傷中傷飽胃絕脉絕解枯燥之結氣補精胃中之陰氣○羸瘦短氣補胃則生肌清大則益氣○久服輕身不老不後天足則體健而能耐飢也

總解麥門冬甘平滋潤為純補胃陰之藥後人以為肺藥者蓋土能生金肺氣全恃胃陰以生胃氣潤肺自資其益也

車前子味甘寒主氣癰止痛利水道小便專利下焦分○除濕痺濕必由膀胱出下焦利則濕氣除○久服輕身耐老氣順濕除則身體康強也

總解凡多子之藥皆屬腎故古方用入補腎藥中蓋腎者人之子宮也車前多子亦腎經之藥然以其質滑而氣薄不能全補則為腎府膀胱之藥膀胱乃腎氣輸洩之道路也

木香味辛主邪氣辟毒疫溫鬼氣極芳烈能除邪穢不祥也○強志主淋露者氣通于心心與小腸為表裏○久服不夢寤驚寐

心氣通則神魂安

總解木香以氣勝故其功皆在乎氣內經云心主臭凡氣烈之藥皆入心木香香而不散則氣能下達故又能通其氣于小腸也

薏苡仁味甘微寒主筋急拘攣不可屈伸風濕痺專祛陽明之濕熱○下氣久服輕身益氣直達下焦陽明立利則體強而氣充也○其根下

三蟲除陽明濕熱所生之蟲

總解薏苡仁甘淡冲和質類米穀又體重力厚故能補益胃氣舒筋除濕中虛故又能通降濕熱使下行蓋凡筋急痺痛等疾皆痿證之類內經治痿獨取陽明意以為陽明之藥故能已諸疾也

澤瀉味甘寒主風寒濕痺凡被水氣之○乳難消水乳亦水類故能通乳也○養五藏益氣力肥健水氣陰則成脾惡滿脾氣燥則○久服耳目聰明不饑延年輕身面生光澤之功○能行水上脾為濕土濕則重脾

總解澤瀉乃通利脾胃之藥以其淡滲能利土中之水水去則土燥而氣充脾惡濕故也但濕氣必自膀胱而出澤瀉能下達膀胱故又為膀胱之藥

遠志味苦溫主欬逆傷中補不足氣喘則欬心主營營○除邪氣利九竅辛香疏達則能○益智慧耳目聰明不志強志倍力心氣通則精足神全心氣

總解遠志氣味苦辛而芳香清烈無微不達故為心家氣分之藥心火能生脾土心氣盛則脾氣亦和故又能益中焦之氣也

龍膽味苦澀主骨間寒熱治肝氣犯○驚癇邪氣肝火犯○續絕傷氣創筋骨○定五藏殺蟲毒殺藏中之氣○久服益智不忘收斂心中之神氣○輕身耐老氣熱即去而正氣歸有此效

總解藥之味澀者絕少龍膽之功皆在于澀此以味為主也澀者酸辛之變味兼金木之性者也故能清斂肝家之邪火人身惟肝火最橫能下挾腎中之遊火上引包絡之相火相持為害肝火清則諸火漸息而百體清

細辛味辛溫主欬逆散肺經○頭痛腦動散頭○百節拘攣風濕痺痛死肌散筋骨肌○久服明目利九竅輕身長年除則身健而壽矣散諸竅之風風氣

總解此以氣為治也凡藥香者皆能疎散風邪細辛氣盛而味烈其疎散之力更大且風必挾寒以來而又本熱而標寒細辛性溫又能驅逐寒氣故其疎散上下之風邪能無微不至也

石斛石斛其說不一出廬江六安者色有長二三寸如紋股世謂之全紋石斛折之有肉而實咀之有膿涎○味甘黏魚味甘淡此為最佳如市中長而黃色及枯槁無味者皆木斛也因近日無不誤用故附記于此○味甘平主傷中培脾○除脾下氣治肉痺使中○補五藏虛勞羸瘦強陰補也長肌肉補脾陰○久服厚腸胃腸胃為中

輕身延年補益後天

總解凡五味各有所屬甘味屬土然土質無味也故洪範論五行之味潤下作鹹炎上作苦曲直作酸從革作

辛皆即其物言之惟于土則曰稼穡作甘不指土而指土之所生者可知土本無味也無味即為淡淡者五味之所從出即土之正味也故味之淡者皆屬土石斛味甘而實淡得土味之全故其功專補脾胃而又和平不偏也

著實味甘平主益氣充肌膚得天地之和氣以生故著○明目聰慧先古聖人以生故有能益人之神明也○久服不饑不老輕身益足神全故有此效

總解此因其物之所能以益人之能也昔聖人幽贊于神明而生著此草中之神物也服之則補人之神自能聰慧前知矣食肉者鄙不益信矣

黃連味苦寒主熱氣除熱在○目痛皆傷淚出明目除濕熱在上之病○腸澼腹痛下痢除濕熱在中之病○婦人陰中腫痛除濕熱在下之病○久服令人不忘補心也

總解苦味屬火其性皆熱此固常理黃連至苦而反至寒則得火之味與水之性者也故能除水火相亂之病水火相亂者濕熱是也凡藥能去濕者必增熱能除熱者必不能去濕惟黃連能以苦燥濕以寒除熱一舉兩得莫神于此心屬火寒勝火則黃連宜為瀉心之藥而反能補心何也蓋苦為火之正味乃以味補之也若心家有火邪則此亦能瀉之而真火反得寧是瀉之即所以補之也苦之極者其性反寒即內經亢害承制之義所謂火盛之極反兼水化也

黃耆味甘微溫主癰疽久敗瘡排膿止痛大風癩疾五痔鼠瘻補虛除肌肉中之熱毒去肌肉中之濕毒補脾胃之虛○小兒百病小兒當補後天復天復天者肌肉之本也

總解黃耆甘淡而溫得土之正味正性故其功專補脾胃味又微辛故能驅脾胃中諸邪其皮最厚故亦能補皮肉為外科生肌長肉之聖藥也

肉苁蓉陶隱居云是馬精落地所生○味甘微溫主五勞七傷補中補諸精○除莖中寒熱痛莖中者精之道路也復有此種則莖而長者也○養五藏強陰益精氣多子五藏各有精精足則陰足而精者○婦人癥瘕精充則癥瘕自去○久服輕身則其病自已矣

總解此以形質為治也從容象人之陰而滋潤黏膩故能治前陰諸疾而補精氣如地黃色質象血則補血也

防風味甘溫主大風頭眩痛惡風邪風病也○目盲無所見風在上○風行周身風在筋○骨節疼痛風在筋

煩滿風在上○久服輕身風氣作則

總解凡藥之質輕而氣感者皆屬風藥以風即天地之氣也但風之中人各有經絡而藥之受氣于天地亦各有專能故所治各不同于形質氣味細察而詳分之必有一定之理也防風治周身之風藥之統領也

續斷味苦微溫主傷寒補不足苦溫能散寒補○金瘡癰傷折跌續筋骨肌肉筋骨有傷皆能治之○婦人乳難通滿之功○久服益

氣力強筋

總解此以形為治續斷有肉有筋如人筋在肉中之象而色帶紫黑為肝腎之色故能補續筋骨又其性直下

故亦能降氣以達下焦也

决明子味鹹平主青盲日淫膚赤白膜眼赤痛淚出凡日病內外等證無所不治○久服益精光不但能治目邪而且能補目之精也皆鹹降清火之功

輕身大清則體健也

總解决明生于秋得金氣之正色極黃得金之色其功專于明目詳上扁青條內夫金之正色白而非黃但白為受色之地乃無色之色耳故凡物之屬金者往往借土之色以為色即五金亦以黃金為貴子肖其母也草

木至秋感金氣則黃落故諸花實之中凡色黃而耐久者皆得金氣為多者也

丹參味苦微寒主心腹邪氣赤心故能逐心腹之邪○腸鳴幽幽如走水心與脾不和則為○寒熱積聚破癥除瘕走赤血且止痛凝結者無不治之

止煩滿益氣心氣舒則煩滿止

總解此以色為治也赤走心心主血故丹參能走心以治血分之病又辛散而潤澤故能通利而滌邪也

五味子味酸溫主益氣欬逆上氣氣欬則益肺主氣肺氣欬則欬逆除而氣亦降也○勞傷羸瘦補不足氣欬則病不侵而身強盛矣○強陰益男子精

氣欬則歸陰腎主收斂而精者腎之所藏也故欬之功無不益腎五味形又似腎故為補腎之要藥

總解此以味為治也凡酸味皆斂而五味酸之極則斂之極極則不止于斂而且能藏矣藏者冬之令屬腎故

五味能補腎也

蛇床子味苦平主婦人陰中腫痛男子陰痿濕癢皆下體濕○除痺氣利關節陰陰現在筋骨之證○癩癩陰濕痰在○惡瘡

本草經百重錄

上海錦章書局石印

苦濕毒
所生
○久服輕身濕去則

總解蛇床生陰濕卑下之地而芬芳燥烈不受陰濕之氣故入于人身亦能于下焦濕氣所歸之處逐其邪而補其正也

沙參味甘微寒主血積肺氣上逆之血○驚氣心火○除寒熱補中肺家失調之寒熱肺主氣肺和則氣克而三具實也○益肺氣色白體輕故入肺也○又服利人肺氣清和之效

總解肺主氣故肺家之藥氣勝者為多但氣勝之品必偏于燥而能滋肺者又膩滯而不清虛惟沙參為肺家氣分中理血之藥色白體輕疎通而不燥潤澤而不滯血阻于肺者非此不能清也

茵桂味辛溫主百病言百病用之得宜皆有益也○養精神和顏色通過臟腑益在內也調暢血脈益在外也○為諸藥先聘通使平者四逆引藥以通經絡○久服輕身不老血脈通利之效○面生光華媚好常如童子血和則潤澤也

總解寒氣之鬱結不舒者惟辛溫可以散之桂性溫補陽而香氣最烈則不專于補而又能驅逐陰邪凡陰氣所結能與藥相非非此不能入也人身有氣中之陽有血中之陽有氣中之陽走而不守血中之陽守而不走凡藥之氣勝者往往補氣中之陽實勝者往往補血中之陽如附子煖血肉桂煖氣一定之理也蒸氣之陽勝則能動血血之陽勝則能益氣又相因之理也桂氣分藥也而其驗則見于血其義不曉然乎

松脂味甘溫主疽惡瘡頭瘍白充疥癩除濕火所化之病○風氣香散○安五藏除熱補腦液性耐寒暑○久服輕身不老延年松脂而奇

總解松之精氣則皮故其脂皆生于皮其質粘膩似濕而性極燥故凡濕熱之在皮膚者皆能治之凡癰疽瘡疥之疾皆皮膚濕火所鬱必腐肉傷皮流膿結痂而後愈松之皮日易月新脂從皮出全無傷損感其氣者即成膿脫痂而愈義取其象之肖也

槐實味苦寒主五內邪氣熱清身避不歸根之火○止涎唾清肺燥○補絕傷陽明主機關此能滋養陽明也○五痔火瘡婦人乳癢皆陽明疾

子藏急痛亦陽明經疾

總解槐當秋而實得金之令色黃得金之色故其性體清肅乃手太陰手陽明之要藥也全衰則為火所侮凡

有餘之火不歸藏其宅必犯肺與大腸得此清肅之氣以助之則火不能傷而自歸其宅不治火而火自退此
從本之治醫之良法也

柏實味甘平王驚悸清心益氣壯大食而人除風濕痺得扶金之令能久服令人潤澤美

色耳目聰明滋潤皮膚不饑不老輕身延年柏之性不乾

總解柏得天地堅剛之性以生不與物變遷經冬彌翠故能寧心神欽心氣而不為邪風遊大所侵尅也人

之生理謂之仁仁藏于心物之生機在于實故實亦謂之仁凡草木之仁皆能養心氣以類相應也

茯苓古注茯苓皆云松脂入地所結無苗葉花實味甘平主胸脅逆氣憂志驚邪恐悸心下結痛寒熱煩滿欬逆

皆脾虛不能化水痰飲留結諸症之疾口焦舌乾胸有飲則水不升利小便通利久服安魂養神不饑延年通心脾和

總解茯苓生山谷之中得松柏之餘氣其味極淡故為調補脾陰之藥義見石斛條下 凡人邪氣鬱結津液

不行則為痰為飲痰稠為火之所結飲清稀為水之所停故治痰則鹹以降之治飲則淡以利之若投以重

劑反拒而不相入惟茯苓極輕淡屬土土勝水能疎之滌之令從膀胱以出病漸去而不覺也觀仲景猪苓湯

五苓散等方教自見矣

藥木味苦寒主五藏腸胃中結熱黃疸腸痔止洩痢女子漏下赤白陰陽蝕瘡皆陽明表裏上下

總解黃藥極黃得全之色故能清熱其味極苦苦屬火則又能燥濕凡燥者未有不熱而寒者未有不濕惟黃

柏于清熱之中而兼燥濕之效蓋黃色屬金陽明為燥金故其治皆除陽明濕熱之疾氣類相感也

乾漆味辛溫主絕傷補中續筋骨填髓腦補精補骨安五藏實藏中五緩六急補和風寒濕痺漆得寒反堅

能除寒生漆者入肌膚即生漆去長蟲當爛故亦能腐蟲久服輕身耐老漆入地不朽其質

總解此以質為治漆樹脂也凡草木之脂最韌而不朽者莫如漆人身中非氣非血而能充養筋骨者皆脂膏

也氣血皆有補法則以樹之脂膏力最厚者補之而脂膏獨無補法而脂膏之中凡風寒濕熱之邪留而不去

者得其氣以相助之並能驅而滌之也

辛夷味辛溫主五藏身體寒熱清氣下風頭腦痛升散面黧去皮毛久服下氣輕身明目增年耐老清氣上

本草經百種錄 上海錦章書局石印

欲下得而百體
清寧可永年矣

總解 辛夷與朮木同植必高于朮木而後已其性專于向上故能升達清氣又得春氣之最先故能疎達肝氣
又芳香清烈能驅逐邪風頭目之病藥不能盡達者此為之引也

桑上寄生味苦平主腰痛得春之氣亦能助筋骨也○小兒背強驅骨○癰腫安胎和血脈胎毒寄母腹者也○充肌膚堅髮蓋長頰眉養皮之
○其實主明目系性去風肝木風藏而開○輕身通神寄生乃感風露之益以生

總解 寄生乃桑之精氣所結復生小樹于枝間有子之象焉故能安胎其性與桑相近故亦能驅風養血其生
不著土資天氣而不資地氣故能滋養血脈于空虛之地而取效更神也

杜仲味辛平主腰脊痛補中益精氣堅筋骨強志其實堅韌者其精氣不足故也○除陰下瘰癧補皮利濕○小便餘滲
之氣堅管○久服輕身耐老強壯

總解 杜仲木之皮木皮之韌且厚者此為最故能補人之皮又其中有絲連屬不斷有筋之象焉故又能續筋
骨因形以求理則其效可知矣

髮髮味苦溫主五癰鬪格不通利小便水通滑潤○療小兒癩大人瘡仍自還神化滋養
總解 髮為血之餘而經中所治之疾皆主通經利使之功也蓋心與小腸為表裏心主血髮為血之餘則不
能入心而能入小腸以小腸為心之出路也且髮亦毛類肺主皮毛而為水源故能利水非一定之理乎其治

癩瘡則瀉心家之痰飲及滋潤血脈之功也○金匱要畧方治小便閉淋用滑石亂髮知用藥悉遵本經者為
仲景一人而已

龍骨味甘平主心腹鬼瘡精物老魅絕陽能制陰邪○效逆效血○洩痢膿血女子漏下收澀○癭瘕堅結龍性善入能
小兒熱氣驚癇致火○慈主小兒大人驚癇癩疾狂走與骨同義性溫則屬腎屬骨皆主○心下結氣不能喘息收

上見進行諸瘕心性○殺精物殺亦與○久服輕身通神明延年龍能飛騰變化且
之逆氣逆氣

總解 龍得天地純陽之氣以生藏時多見時少其性至動而能靜故其骨最粘澀能攻正氣凡心神耗散腸
胃滑脫之疾皆能已之○陽之純者乃天地之正氣故在人身亦但欲正氣而不欲邪氣所以仲景于傷寒之

邪氣未盡者亦用之復之醫者于斯義最爲之審也○人身之神屬陽然神非若氣血之有形質可補也依
治神爲最難龍者乘天地之元陽出入而變化不測乃天地之神也以神治神則氣類相感更佐以寒熱溫涼
補瀉之法雖無形之病不難治矣○天地之陽氣有二一爲元陽之陽一爲陰陽之陽陰陽之陽分于太極既
判之時以日月爲升降而水火則其用也與陰爲對待而不並於陰此天地並立之義也元陽之陽存于太極
未判之時以寒暑爲起伏而雷雨則其用也與陰爲附麗而不雜于陰此天地包地之義也龍者正天地元陽之
氣所生藏于水而不離乎水者也故春分陽氣上升泉冷龍用事而能飛秋分陽氣下降泉溫龍退蟄而能潛
人身五臟屬陰而腎尤爲陰中之至陰凡周身之水皆歸之故人之元陽藏焉是腎爲藏水之藏而亦爲藏火
之藏也所以陰分之火動而不藏也亦用龍骨蓋借其氣以藏之必能自反其宅也非格物窮理之極者其孰
能與于斯

麝香味辛溫主辟惡氣香氣感則殺鬼精物溫瘧蠱毒痢瘕香能勝邪香能散風香能散毒香通經絡去三蟲蟲皆濕穢之所生故亦能除之○久

服除邪不夢寤寤寐由心氣悅塞而臥牛黃味甘平主驚癇通心氣悅塞而臥寒熱熱感狂瘧清心家除邪逐鬼心氣壯則邪氣自不能容也

總解此以氣爲治麝香食香草其香氣之精結于腦內爲諸香之冠香者氣之正正氣感則自能除邪辟穢也

牛黃味甘平主驚癇通心氣悅塞而臥寒熱熱感狂瘧清心家除邪逐鬼心氣壯則邪氣自不能容也

總解牛之精氣不能運于周身則成黃牛屬土故其色黃也凡治痰涎皆以補脾爲主牛肉本能健脾化痰而

黃之功尤速又黃必結于心下故又能入于少陰厥陰之分以驅邪滌飲而益其精氣也

白膠味甘平主傷中勞絕腰痛羸瘦皆腎虛○補中益氣補血則中氣自足也婦人血閉無子止痛安胎補血胎之功○久

服輕身延年精足血滿故有此效總解鹿之精氣全在于角角本下連督脉鹿之角于諸獸爲最大則鹿之督脉最盛可知故能補人身之督脉

督脉爲周身骨節之主腎主骨故又能補腎角之中皆貫以血衝爲血海故又能補衝脉衝督感而腎氣強則

諸效自臻矣

阿膠味甘平主心腹內崩血脫勞極酒酒如瘧狀皆傷則脾傷而血虧此○腰腹痛四肢酸疼血枯女子下血

七 上海錦章書局石印

安胎養血則血自止而胎安 ○久服輕身益氣補血則氣亦充

總解阿井為濟水之伏流濟之源為流水自流水以至於阿井伏見不常若夏書所謂溢為滎出于陶邱北者皆伏流從下泛上者也阿井在陶邱北三百里泉雖流而不上泛尤為伏脉中之靜而沈者過此則其水皆上

泛成川且與他泉水亂而不純矣故阿井之水較其旁諸水重十之一二不等人之血脉宜伏而不宜見宜沈而不宜浮以成之膠真止血調經之上藥也其必以驢皮煎者驢肉能動風肝為風藏而藏血乃借風藥以引

入肝經也又凡皮皆能補脾脾為後天主血之本而通血故又為補血藥中之聖品

丹雄雞味甘微溫主女人崩中漏下赤白沃補虛溫中止血補肺 ○頭主殺鬼難得清肅之氣而頭為之會故能除鬼邪 ○東門上者尤

良東門上者東門上所傳難項取陽方之生氣也 ○肌胫裏黃皮微寒主洩利難食砂石亦能消化故治食積不化之洩痢 ○尿白主消渴難善食而不善飲其腸胃不能容水故主渴

傷寒寒熱治傷寒有食邪之寒熱

總解凡血肉之物鮮屬金者惟雞于十二支屬酉而身輕能飛其聲嘹喞于五音屬商乃得金氣之清肅者也

五藏之氣木能疎土金能疎木雞屬金故能疎連肝氣本血肉之物故又能不尅伐而調養肝血也

石蜜石蜜野蜂于崖間石隙中采花所作也疏古時未有養蜂之法則以道 ○味甘平主心腹邪氣養胃和中 ○諸驚癇

疰疰心 ○安五藏諸不足益氣補中 ○止痛解毒甘能緩痛者能除諸病性俱金 ○和百藥諸性俱化

久服強志輕身不饑不老精神充足故也

總解蜜者采百花之精華而成者也天地春和之氣皆發于草木草木之和氣皆發于花花之精英釀而成蜜

和合眾性則不偏委去糟粕則不滯甘以養中香以理氣真養生之上品也但其性極和平于治疾則無速效

耳○凡天地之生氣皆正氣也天地之死氣皆邪氣也正則和平邪則有毒毒者敗正傷生之謂蜜本百花之

蕊乃生氣之所聚生氣旺則死氣不能犯此解毒之義也

桑螵蛸味鹹平主傷中疝瘕瘕血結中氣 陰痿益精生子補益腎氣 ○女子血閉和通血脈 ○腰痛強腎之經 ○通五淋利小便水道

通明

總解桑螵蛸桑上螳螂所生之子也螳螂于諸蟲中最有力而其子最繁則其腎之強可知人之有子皆本于

腎以子補腎氣相得也。桑性最能補傷和血。螺蛸在桑者亦得桑之性。故有養血逐瘀之功也。

藕實莖一氣相通莖與實異非○味甘平主補中味甘淡得○養神氣虛而○益氣力脾腎壯則○除百疾性
與偏推若他藥之根實各元也○味甘平主補中味甘淡得○養神氣虛而○益氣力脾腎壯則○除百疾性
之害也○久服輕身耐老不飢延年和子

滋其血脉濃而不滯香而不燥果中之聖品也

橘柚味辛溫主胸中痰熱逆氣關連上○利水殺通利中○久服去臭下氣通神芳者年以自能辟
穢邪而通正氣也

總鮮橘柚通體皆香而皮辛肉酸乃肝脾通氣之藥也故凡肝氣不舒尅賊脾土之疾皆能已之 凡辛香之藥皆上升橘柚實酸酸主斂故又能降氣不專于散氣也

大棗味甘平主心腹邪氣安中養脾建立中氣則○助十二經平胃氣十二經皆受津液于脾胃○通九竅補而

補少氣少津液身中不足周身氣血○大驚四肢重甘能緩急脾虛○和百藥百藥氣味不齊○久服輕身長年補

益後天
之功

總鮮棗味甘而肉厚色赤得火之色土之味故能建立中焦溫養脾胃為厚天之本萬物生于土土生統盈諸

經自皆受益矣

葡萄味甘平主筋骨濕脾益氣倍力強筋○強志肝虛○令人肥健耐饑忍風寒久服輕身不老延年皆培補肝

可作酒此以形為治葡萄屈曲蔓延冬春舒與筋相似故能補益筋骨其實甘

雞頭實味甘平主濕脾腰脊膝痛下氣濕○補中除羸疾羸疾皆生于中氣不足○益精氣強志肝腎足則心○令

耳目聰明諸疾○久服輕身不飢耐老神仙脾腎兼壯則

總鮮雞頭生于水中而其實甘淡得土之正味乃脾腎之藥也脾惡濕而腎惡燥雞頭雖生水中而淡滲甘則
不傷于濕質黏味澀而又滑澤肥潤則不傷于燥凡脾腎之藥位住相反而此則相成故尤足貴也

中品

石硫黃味酸溫主婦人陰蝕陰濕所生之疾推○疽痔惡血亦下血陰分○堅筋骨壯筋骨○除頭禿髮根濕

蟲 ○能化金銀銅鐵奇物欒

總解 硫黃乃石中得火之精者也石屬陰而火屬陽寓至陽于至陰故能治陰分中寒濕之疾其氣旺而性暴故又能殺蟲而化諸金也

水銀味辛寒主疥癩痂瘍白禿殺皮膚中蟲解皮毛中濕熱之毒 ○墮胎至重能墮胎又胎氣始生肝氣 ○除熱殺

金銀銅錫毒得五金之精氣故能化五金之毒 鎔化還復為丹丹亦銀出于丹砂中者為多故亦可鍊成 ○久服神仙不死以其不朽而能變化也

總解 水銀五金之精也得五金之精氣而未成質鍊之亦能為金銀等物其所治皆皮膚熱毒之疾蓋肺屬金而主皮毛亦以氣相感也 ○丹家爐鼎之術以水銀與針為龍虎合鍊成丹服之則能長生久食飛昇羽化自

參同契以後其說紛紛高明之士為所誤者不一而足夫水銀乃五金之精而未成全體者也凡金無不畏火

惟水銀則百鍊如故以其未成金質中含水精故火不得而傷之其能點化為黃白者亦因藥物所鍊變其外

貌非真能作金銀也合乃以其質之不朽欲借其氣以固形體真屬支離蓋人與萬物本為異體借物之氣以

攻六邪理之所有借物之質以永性命理之所無術士好作聰明談天談易似屬可聽是則伏羲畫卦列聖繫

辭何嘗有長生二字此乃假託大言以惑小智其人已死說云尚在試其術者破家喪身未死則不悟既死則

又不知歷世以來昧者接踵總由畏死貪生之念迫于中而反以自速其死耳悲夫

磁石味辛寒主周痺風濕肢節中痛不可持物洗洗酸痛味辛則散風石性燥則除濕其治酸痛等疾者以其能堅筋骨中之正氣則邪氣自不能侵也 ○除大熱

煩滿寒陰熱 ○及耳聾增入火上則耳聾

總解 凡五行之中各有五行所謂物物一元極也如金一行也銀色白屬肺金色赤屬心銅色黃屬脾鉛色青

屬肝鉄色黑屬腎石也者金土之雜氣而得金之體為多何以驗之天文家言星者全之散氣而星隕即化為

石則石之屬金無疑而石之中亦分五精焉磁石乃石中鉄之精也故與鉄同氣而能相吸鉄屬腎故磁石亦

補腎腎主骨故磁石堅筋壯骨腎屬冬令主收藏故磁石能收斂正氣以拒邪氣知此理則凡藥皆可類推矣

陽起石味鹹微温主崩中漏下寒滑 ○破子藏中血癥瘕結氣寒熱腹痛無子凡寒凝血滯之病皆能除之 ○陰痿不起補不足

總解陽起石得火不燥得日而飛硫黃得日無煇得火而發皆為火之精而各不同蓋陽起石稟日之陽氣以成天上陽火之精也硫黃稟石之陽氣以成地上陰火之精也所以硫黃能益人身陰火之陽陽起石能益人身陽火之陽也五行各有陰陽亦可類推

乾薑味辛溫主胸滿寒_{者則散之}之在胃○欬逆上氣_{平能潤}○溫中止血_{而歸經}○出汗_{平能散逆寒}○逐風濕痺_{治寒}
在筋者○腸辟下痢_{治寒邪者}○生者尤良_{平散之品尤取其氣性之清烈也}○久服去臭氣通神明_{平甚氣烈故能辟穢通陽}

總解凡味厚之藥主守氣厚之藥主散薑氣味俱厚故散而能守夫散不全散守不全守則旋轉于經絡藏府之間驅寒除濕和血通氣所必兼矣故性雖猛峻而不妨服食也

苦參味苦寒主心腹結氣_{苦入心以散}○癰疽積聚_{苦極則}○黃疸_{寒能除}○溺有餘瀝_{心通于小腸心火降則}
小腸通○除癰腫_{諸瘡皆結之心火心火}○補中_{苦以燥之即此義也}○明目止淚_{寒清肝火}

總解此以味為治也苦入心寒除火故苦參高治心經之火與黃連功用相近但黃連似去心藏之火為多苦參似去心府小腸之火為多則其黃連之氣味清而苦參之氣味濁也

當歸味甘溫主欬逆上氣_{潤肺}溫瘧寒熱洗洗在皮膚中_{皆風寒在}○婦人漏下絕子_{苦血不}○諸惡瘡瘍金瘡
營血大醫及○煮飲之_{煮飲則能四達以行諸經按血在經絡之中流行不息故凡用行血補血之藥受傷之病}

總解當歸辛香而潤香則走脾潤則補血故能透入中焦營氣之分而為補營之聖藥當歸為血家必用之藥而本經無一字及于補血養血者何也蓋氣無形可驟生血有形難連長凡通閉順氣和陰清火降逆生津

去風利竅一切滋潤通利之品皆能令陰氣流通不使亢陽致害即所以生血也當歸辛芳溫潤兼此數長實為養血之要品惟苦其血充之效則血之得所養不待言而可知此等當參全經而悟其理

麻黃味苦溫主中風傷寒頭痛溫瘧發表出汗去邪熱氣_{以能驅其邪使皆從汗出也}○止欬逆上氣_{散肺邪}○除寒熱_{散營衛}○破癥堅積聚_{散藏府}

總解麻黃輕揚上達無氣無味乃氣味之最清者故能透出皮膚毛孔之外又能深入積痰凝血之中凡藥力所不到之處此能無微不至較之氣雄力厚者其力更大蓋出入于空虛之地則有形之氣血不得而禦之也

芍藥味甘主邪氣腹痛肝氣則痛除血痺肝都破痲痲堅結寒熱肝都止痛利小便血和則痛止

養肝之聖藥也
總解芍藥花大而榮得春氣為盛而居百花之殿故能收拾肝氣使歸根反本不至以有餘肆暴犯肺傷脾乃

玄參味甘微寒主腹中寒熱積聚皆大氣凝女子產乳餘疾虛後血虧補腎氣令人明目陰

總解玄參色黑味苦而性寒故能除腎家遊浮上升之火但腎火上升者全陽火發于氣分大盛則傷氣內經所謂壯火食氣是也陰火發于血分大盛則傷血內經所謂齋寒之而熱者取之陰是也產後血脫則陰衰而

大無所制又不可以寒熱折之氣血未寧又不能納峻補之劑惟玄參制火而帶微補用之最為的當也

百合味甘平主補肺腹脹心痛肺氣不舒之疾利大小便肺為水源補中益氣甘能補脾肺主氣

總解此以形為治也百合色白而多瓣其形似肺始秋而花又得全氣之全者故為清補肺金之藥

白芷味辛溫主女人漏下赤白血閉陰腫風在下氣而寒熱風在風頭侵目淚出風在上長肌膚潤澤可作面

脂風氣乾燥風去則總解凡驅風之藥未有不枯耗清液者白芷極香能驅風燥濕其質又極滑潤能和利血脉而不枯耗用之則

有利無害者也蓋古人用藥既知藥性之所長又度藥性之所短而後相人之氣血病之標本參合研求以定取舍故能有顯效而無隱害此學者之所殫心也

黃芩味苦平主諸熱黃疸大腸熱中腸澼洩痢大腸府中逆水水在腸下血閉血之在腸明者惡瘡疽蝕

相參益顯也

狗脊味苦平主腰背強闊機視急周脾寒濕膝痛凡骨節之在骨節○顏利老人老人精血虧則齒牙空虛中元不能好養故于此藥為尤宜也

總解此以形為治狗脊偏體生毛而多脊頗似狗之脊諸獸之中惟狗狡捷而此藥似之故能入筋骨機關之際去其凝滯寒濕之氣而使之強健利捷也形同而性亦近物理蓋可推矣

紫草味苦寒主心腹邪氣去心腹熱邪○五疔濕熱在血中○補中益氣營家之熱清則中實和利○利九竅諸竅不為邪熱所閉○通水道心氣通

水萍味辛寒主暴熱得水之氣故能降熱○身癢濕熱在皮膚之間○下水氣萍入水不濡故能下水氣○勝酒水氣勝則酒氣散矣○長鬚髮益皮毛之血氣○主消渴得水氣之助○久服輕身亦如萍之性也

總解水萍生于水中而能出水上且其葉入水不濡是其性能敵水者也故凡水濕之病皆能治之其根不着土而上浮水面故又能益皮毛之疾

澤蘭味苦微溫主乳婦內血清陽明經絡濕熱之邪○中風餘疾氣溫體性故能散餘風○大腹水腫身面四肢浮腫骨節中水視始內病○金瘡癰腫瘡膿亦皆濕毒之疾

總解澤蘭生于水中而芳香透達即實虛能于人體絡受濕之處分疎通利無所隔礙蓋其質陰而氣陽故能行乎人身之陰而發之于陽也

牡丹味辛寒主寒熱中風痙癎驚癇痼邪氣皆肝氣所發之疾○除穢堅瘀血留舍腸胃已未去血氣者能消散也○安五藏五藏皆血氣不和則○療癰瘡清血家毒火

總解牡丹為花中之王乃木氣之最榮澤者故能疎養肝氣和通經脈與芍藥功頗近但芍藥微主斂而牡丹微主散則以芍藥味勝牡丹氣勝味屬陰而氣屬陽也

吳茱萸味辛溫主溫中下氣風寒上逆○止痛散寒濕之痛○欬逆寒熱寒邪入肺○除濕血痺辛能燥濕溫能行血也○逐風邪開腠理香散風

總解吳茱萸味極辛辛平屬金平木故為驅逐肝風之要藥但肝風有二一為扶寒之風一為扶火之風吳茱萸性溫於扶寒之風為宜此又不可不審也

梔子味苦寒主五內邪氣熱邪○胃中熱氣黃色入腸明○面赤酒皰鼓鼻白癩瘡瘍此皆肌肉之病

總解梔子正黃亦得金色故為陽明之藥但其氣體輕虛走上而不走下故不入大腸而入胃胃在上焦故也

胃家之熱熱惟此為能除之又胃主肌肉肌肉有筋筋骨者有皮皮者梔子形開似肺肺主皮毛故專治肌

肉熱毒之見于皮毛者也

鹿茸味甘溫主漏下惡血血中之陽○寒熱驚癇陽虛心火○益氣強志補血之功○生薑不老補腎之功○角主惡瘡癰腫

拓血中○逆邪惡氣拓陰邪○留血在陰中陰絡之旋導得

總解鹿茸之中惟一點胚血不數日而即成角此血中有真陽一點通督脈貫睛水乃至靈至旺之物也故入

于人身為峻補陽血之要藥又其物流動生發故又能逐瘀通血也餘義見白勝條下○鹿茸氣體全而未發

洩故補陽益血之功多鹿角則透發已盡故拓毒消散之功勝先後遲速之間功效輒異非明乎造化之機者

不能測也

犀角犀有山犀水犀二種而水犀為妙○味苦涼主百毒蠱症殺邪氣○邪鬼靈氣○瘴氣瘴熱之毒○殺鈎吻鴆羽蛇毒除邪一切毒除之○不達惑魔解心祛熱

總解牛屬土而犀則居水水無獸惟犀能伏其中則其得水之精可知凡物之毒者投水土則毒自化犀得

水土之精故化毒之功為多而其角中虛有通靈之家故又能養心除邪也

伏翼味鹹平主目瞑明目夜視有精光存養肝經○久服令喜樂嬉好無憂則樂

總解凡有翼能飛之牧夜則目盲伏翼又名天鼠即鼠類也故日出則目瞑而藏日入則目明而出乃得陰氣

之精者也肝屬厥陰而開竅于目故資其氣以養肝血而濟目力感應之理也物有殊能必有殊氣皆可類推

炸蟬古人用蟬今人用蛻氣性亦相近○味鹹寒主小兒驚癇夜啼癩病寒熱皆小兒風熱之疾

總解炸蟬感涼風清靈之氣以生身體體而聲嘹亮得金氣之發揚者也又脫落皮股亦屬人身肺經之位故

其性能清火驅風而散肺經之鬱氣若其質輕虛尤與小兒柔弱之體為宜也○炸蟬日出有聲日入無聲止夜啼取其意也

白堊蠶味鹹主小兒驚癇夜啼之風鹹○去三蟲風生之蟲○滅黑點令人面色好風壯或癯○男子陰陽病風濕

總解蠶食桑之蟲也桑能治風養血故其性亦相近蠶蠶感風而腫凡風氣之疾皆能治之蓋借其氣以相感

也○蠶蠶困風以腫而反能治風者何也蓋邪之中人也有氣而無形穿經絡愈久而愈深以氣類相反之藥

投之則拒而不入必得與之同類者和入諸藥使為鄉道則藥力至于病所而邪與藥相從藥性漸發邪或從

毛孔出或從二便出不能復留矣此即從治之法也風寒者濕莫不皆然此神而明之道不專恃正治奏功

也

下品

附子味辛溫主風寒欬逆邪氣寒邪逆在上焦○溫中除中焦之寒○金瘡血肉得燒而合○破癥堅積聚血瘕寒氣凝積血滯于中得熱乃行也○寒

濕踣雙拘攣膝痛不能行步此寒邪之在下俱筋骨間者

總解凡有毒之藥性寒者少性熱者多寒性和緩熱性峻速入于血氣之中則暴取烈性發不支藏府嬌柔之

物豈能無害故須審慎用之怛熱之有毒者速而易見而寒之有毒者緩而難察尤所當慎也

半夏味辛平主傷寒寒熱寒熱之在脾胃間者○心下墜下氣辛能開肺降逆○咽喉腫痛頭眩開降之火○胸脹欬逆腸鳴氣降則通和故能愈

諸病○止汗辛中帶濕之功也

總解半夏色白而味辛故能為肺經燥濕之藥○肺屬金喜斂而不喜散蓋斂則肺葉垂而氣順散則肺葉張

而氣逆半夏之辛與薑桂之辛迥別入喉則閉不能言望金瘡則血不復出辛中帶濕故能疎而又能斂也又

辛之斂與酸之斂不同酸則一主于斂辛則斂之中有發散之意尤與肺相投合也

大黃味苦寒主下瘀血閉結血中熱○寒熱血中積○破癥瘕積聚凡腹中邪氣之積無不除之○留飲宿食滯滯腸胃推陳

致新凡腹中飲食之積無不除之○通利水殺調中化食助腸胃逆○安和五藏邪積既去則正氣自和

總解大黃色正黃而氣香得土之正氣正色故專主脾胃之疾○凡香者無不燥而上升大黃極滋潤達下故

能入腸胃之中致滌其凝結之邪而使之下降乃驅逐停滯之良藥也

葶藶味辛寒主癥瘕積聚結氣水飲所結之疾○飲食寒熱破堅逐邪亦皆水氣之疾○通利水道肺氣降則水道自通

葶藶味辛寒主癥瘕積聚結氣水飲所結之疾○飲食寒熱破堅逐邪亦皆水氣之疾○通利水道肺氣降則水道自通

葶藶味辛寒主癥瘕積聚結氣水飲所結之疾○飲食寒熱破堅逐邪亦皆水氣之疾○通利水道肺氣降則水道自通

葶藶味辛寒主癥瘕積聚結氣水飲所結之疾○飲食寒熱破堅逐邪亦皆水氣之疾○通利水道肺氣降則水道自通

〔總解〕葶藶滑潤而香專瀉肺氣肺為水源故能瀉肺即能瀉水凡積聚寒熱從水氣來者此藥主之○大黃之瀉從中焦始葶藶之瀉從上焦始故傷寒論中承氣湯用大黃而陷胸湯用葶藶也

旋覆花味鹹溫主結氣胸下滿驚悸結中上二焦○除水鹹能下○去五藏間寒熱五藏留結不流所生之寒熱○補中下氣能下通

〔總解〕此以味為治凡草木之味鹹者絕少鹹皆治下鹹而能治上焦者尤少惟此味鹹而治上為中上二焦之藥鹹能軟堅故凡上中二焦凝滯堅結之疾皆能除之○凡體輕氣芳之藥往往能消寒熱益寒熱之疾無不因鬱逼而成內經云大鬱則發之輕芬之體能發散故寒除也

葶藶味辛寒主蠶毒味酸殺蟲○效逆洩痢腸游除濕熱○頭痛疥癬惡瘡殺諸蟲毒去死肌皆殺蟲之功

〔總解〕凡有毒之藥皆得五行剛暴偏雜之性以成人身氣血乃天地中和之氣所結故服毒藥者往往受傷疥疥等疾久而生蟲亦與人身氣血為類故人服之而有傷氣血者必能殺蟲惟用之得其法乃有利而無弊否則必至于兩傷不可不慎也○又毒之解毒各有所宜如燥毒之藥能去濕邪寒毒之藥能去火邪辨證施治神而明之非僅以毒攻毒四字可了其義也

白及味苦平主癰腫惡瘡敗疽傷陰死肌解毒生肌○胃中邪氣養胃驅邪○賊風鬼擊痲緩不收相隨逐風

〔總解〕此以質為治白及氣味沖淡和平而體質滑潤又極黏膩入于筋骨之中能和柔滋養與正氣相調則微邪自退也

貫眾味苦微寒主腹中邪熱氣寒能除熱○諸毒邪熱殺三蟲濕熱所生之蟲也

〔總解〕貫眾生于山澗之中得天地清陰之氣故能除蘊熱濕穢之疾其體中虛而清芳故能解中焦之毒人身之蟲皆濕熱所生濕熱除則諸蟲自消也

連翹味苦平主寒熱大氣所鬱之寒熱○鼠瘻癰癧痲腫惡瘡癰結熱皆肝旺熱結之證○蠱毒濕熱之蟲

〔總解〕凡藥之寒熱溫涼有歸氣分者有歸血分者大抵氣勝者治氣味勝者治血連翹之氣芳烈而性清涼故凡在氣分之鬱熱者皆能已之又味兼苦辛應秋金之令故又能除肝家留滯之邪毒也

夏枯草味甘辛寒主寒熱瘰癧氣瘰癧頭瘡○破癰散癰結氣所結○脚腫濕痺○在下者○輕身○強壯也

總解此以物稟之氣候為治又一義也凡物皆生于春長于夏惟此草至夏而枯蓋其性稟純陰得少陽之氣

勃然興發一文感陽陰氣將盡即成熟枯槁故凡感陽留結之病用此為治亦即枯滅此天地感應之妙理也

凡藥之以時候榮枯為治者俱可類推

水蛭味鹹平主逐惡血瘀血月閉破血癥積聚諸敗血結滯之○無子惡血留于子○利水道水蛭生于水中故也

總解凡人身瘀血方阻尚有生氣者易治阻之久則無生氣而難治蓋血既離經與正氣全不相屬投之輕藥

則拒而不納藥過峻又反能傷未敗之血故治之極難水蛭最喜食人之血而性又遲緩善入遲緩則生血不

傷善入則堅積易破借其力以攻積久之滯自有利而無害也

桃核仁味甘平主瘀血閉癥邪氣凡血滯之疾皆除之○殺小蟲此血所生之蟲

總解桃得三月春和之氣以生而花色最鮮明似血故凡血滯血結之疾不能調和暢達者此能入于其中而

和之散之然其生血之功少而去瘀之與多者何也蓋桃仁本非血類故不能有所補益若瘀癥皆已敗之血

非生氣不能流通桃之生氣皆在于仁而味苦又能開洩故能逐舊而不傷新也

增補食物秘書

粳米 味甘性溫香胃和脾除濕止渴地衣史良

稷米 味甘性寒和胃

赤黍 味甘性溫多食難化

高粱 即王蜀黍甘平潤

青粱米 甘微寒補中益氣治胃脾熱中清渴止渴

菰米 味甘性白而滑膩香

糯米 甘溫暖脾胃止虛寒渴病飲自汗煩小便發熱多食壅滯

秫米 甘微寒利大腸治漆瘡患脚氣寒

大麥 鹹涼潤中益氣寬胸膈止渴利不動風

粳 甘溫入脾東入肝補虛養氣澤肌膚厚腸胃亦能壅氣

蕎麥 甘寒得氣寬腸去滓薄糜白濁忌石帶疔治氣腫

蕎麥 甘寒得氣寬腸去滓薄糜白濁忌石帶疔治氣腫

蕎麥 甘寒得氣寬腸去滓薄糜白濁忌石帶疔治氣腫

蕎麥 甘寒得氣寬腸去滓薄糜白濁忌石帶疔治氣腫

蕎麥 甘寒得氣寬腸去滓薄糜白濁忌石帶疔治氣腫

蕎麥 甘寒得氣寬腸去滓薄糜白濁忌石帶疔治氣腫

蕎麥 甘寒得氣寬腸去滓薄糜白濁忌石帶疔治氣腫

蕎麥 甘寒得氣寬腸去滓薄糜白濁忌石帶疔治氣腫

蕎麥 甘寒得氣寬腸去滓薄糜白濁忌石帶疔治氣腫

蕎麥 甘寒得氣寬腸去滓薄糜白濁忌石帶疔治氣腫

蕎麥 甘寒得氣寬腸去滓薄糜白濁忌石帶疔治氣腫

蕎麥 甘寒得氣寬腸去滓薄糜白濁忌石帶疔治氣腫

蕎麥 甘寒得氣寬腸去滓薄糜白濁忌石帶疔治氣腫

私米 即占木粒小

黍米 甘溫補中益氣

黃粱米 味甘性平和中止嘔亂渴

白粱米 甘微寒和中益氣止煩渴去脾

稗米 甘微寒宜脾益氣亦堪作飯

粟米 味甘性微寒入腎解小多毒益丹田腸胃利水

陳倉米 甘微寒涼潤胃止渴下氣解煩渴

篩草子米 甘平補虛之溫腸胃

小麥 甘涼心之穀亦養肝氣飲汗止血除煩渴

薏苡仁 甘寒健脾養氣補脾清熱去風濕消水

胡麻 味甘性寒補中益氣養五臟去風濕和腸胃久食

白芝麻 味甘性寒多食滑腸抽人肌膚潤通乳汁多食損

大麻仁 味甘性平潤五臟和腸去熱淋通乳汁多食損

大杏仁 味甘性平潤五臟和腸去熱淋通乳汁多食損

大杏仁 味甘性平潤五臟和腸去熱淋通乳汁多食損

大杏仁 味甘性平潤五臟和腸去熱淋通乳汁多食損

大杏仁 味甘性平潤五臟和腸去熱淋通乳汁多食損

大杏仁 味甘性平潤五臟和腸去熱淋通乳汁多食損

大杏仁 味甘性平潤五臟和腸去熱淋通乳汁多食損

大杏仁 味甘性平潤五臟和腸去熱淋通乳汁多食損

大杏仁 味甘性平潤五臟和腸去熱淋通乳汁多食損

大杏仁 味甘性平潤五臟和腸去熱淋通乳汁多食損

大杏仁 味甘性平潤五臟和腸去熱淋通乳汁多食損

菜豆 甘寒清腸胃熱毒治一切痲腫等症止渴

菜豆 甘寒清腸胃熱毒治一切痲腫等症止渴

菜豆 甘寒清腸胃熱毒治一切痲腫等症止渴

菜豆 甘寒清腸胃熱毒治一切痲腫等症止渴

菜豆 甘寒清腸胃熱毒治一切痲腫等症止渴

菜豆 甘寒清腸胃熱毒治一切痲腫等症止渴

菜豆 甘寒清腸胃熱毒治一切痲腫等症止渴

菜豆 甘寒清腸胃熱毒治一切痲腫等症止渴

菜豆 甘寒清腸胃熱毒治一切痲腫等症止渴

菜豆 甘寒清腸胃熱毒治一切痲腫等症止渴

菜豆 甘寒清腸胃熱毒治一切痲腫等症止渴

菜豆 甘寒清腸胃熱毒治一切痲腫等症止渴

菜豆 甘寒清腸胃熱毒治一切痲腫等症止渴

菜豆 甘寒清腸胃熱毒治一切痲腫等症止渴

菜豆 甘寒清腸胃熱毒治一切痲腫等症止渴

菜豆 甘寒清腸胃熱毒治一切痲腫等症止渴

菜豆 甘寒清腸胃熱毒治一切痲腫等症止渴

菜豆 甘寒清腸胃熱毒治一切痲腫等症止渴

菜豆 甘寒清腸胃熱毒治一切痲腫等症止渴

菜豆 甘寒清腸胃熱毒治一切痲腫等症止渴

菜豆 甘寒清腸胃熱毒治一切痲腫等症止渴

菜豆 甘寒清腸胃熱毒治一切痲腫等症止渴

菜豆 甘寒清腸胃熱毒治一切痲腫等症止渴

以清皆以... 凡... 治... 效... 功... 效... 功... 效... 功...

芎藭

治肝風熱上攻眼目赤痛時行熱毒五六月... 效... 功... 效... 功... 效... 功...

芥蘭

甘辛性冷寬胸解酒多食... 效... 功... 效... 功... 效... 功...

枸杞苗

甘苦性寒解熱毒除風明目... 效... 功... 效... 功... 效... 功...

萹蒿

甘辛平解河豚毒解胃利腸去風熱... 效... 功... 效... 功... 效... 功...

萹菜

甘溫滑解百藥毒解渴止嘔下氣... 效... 功... 效... 功... 效... 功...

焯菜

出廣西洋州大婁山亦有之平濕去冷血... 效... 功... 效... 功... 效... 功...

百合

甘淡性微寒消肺熱飲氣安神... 效... 功... 效... 功... 效... 功...

香椿苗

甘辛和胃消風多食昏神... 效... 功... 效... 功... 效... 功...

鹿葱

苦五臟根治沙淋凡水黃疸... 效... 功... 效... 功... 效... 功...

龍鬚菜

根結氣以醋拌食和肉菜食亦佳... 效... 功... 效... 功... 效... 功...

海帶

性同海藻昆布并詳藥部瀉水... 效... 功... 效... 功... 效... 功...

馬蘭菜

甘平有小毒壓丹石利五臟宣腸胃... 效... 功... 效... 功... 效... 功...

木耳

甘寒明目益氣... 效... 功... 效... 功... 效... 功...

地耳

味甘有小毒治婦人瘦瘵陰痛... 效... 功... 效... 功... 效... 功...

桑耳

味甘有小毒治婦人瘦瘵陰痛... 效... 功... 效... 功... 效... 功...

椶耳

味甘有小毒治婦人瘦瘵陰痛... 效... 功... 效... 功... 效... 功...

松茸

味甘有小毒治婦人瘦瘵陰痛... 效... 功... 效... 功... 效... 功...

竹筴

味甘有小毒治婦人瘦瘵陰痛... 效... 功... 效... 功... 效... 功...

甘菊苗

甘苦性寒生熱守可食明目... 效... 功... 效... 功... 效... 功...

首菊

味甘安中健人去積胃開熱... 效... 功... 效... 功... 效... 功...

苦艾

苦寒取汁解熱治漆瘡及丹毒... 效... 功... 效... 功... 效... 功...

紫苑

辛苦性溫潤肺化痰治虛喘咳嗽... 效... 功... 效... 功... 效... 功...

蒲公英

味甘微苦性寒通結利腸... 效... 功... 效... 功... 效... 功...

紫菜

味甘性寒去積積痰有冷積腹痛者食之令人吐涎... 效... 功... 效... 功... 效... 功...

草決明

甘寒清心明目治頭風眩暈... 效... 功... 效... 功... 效... 功...

薇

甘寒調中... 效... 功... 效... 功... 效... 功...

五加菜

甘平去皮膚風濕強筋... 效... 功... 效... 功... 效... 功...

石耳

甘平益精明目久食令不亂... 效... 功... 效... 功... 效... 功...

槐耳

苦辛陰寒破血治五痔下... 效... 功... 效... 功... 效... 功...

榆耳

八月採... 效... 功... 效... 功... 效... 功...

香菘

甘平和胃益... 效... 功... 效... 功... 效... 功...

杉草

辛溫治脾... 效... 功... 效... 功... 效... 功...

苦竹筴

有大毒... 效... 功... 效... 功... 效... 功...

磨孫 甘草味甘性平

天花 瓜味甘性平白味甘性寒

凡苗 久春無毒夏秋有毒

龍眼 味甘性平

諸葛 味甘性平入肺胃

味苦平 難食

傷用 香油生黃治之

蘆筍 治嘔風及煩渴不食

東風 菜性平溫高

麥 菜性平溫除大小

翹搖 即野薑也名大

山藥 味甘性平補

諸病 聖藥也凡能

無毒 取大者十月後

芋 芋有大毒解法

黃瓜 味甘性寒有小

絲瓜 味甘性平初

燒瓜 菜酒搗汁生

越瓜 瓜心腹瀉泄瀉

南瓜 瓜心腹瀉泄瀉

各菌 凡有毒瘡牙痛

草蓼 甜州等處有之

雞 雲南多有之

芙蓉 令下魚冷同生

羊蹄 菜即先菜一

萬花 菜皆清瘦神

甘薯 粵中一種大如

芋 芋甘性平補

野芋 自以地漿或

芋苗 同蒸搗敷蛇

冬瓜 味甘性寒入

苦瓜 清心明目

甜瓜 入心胃甘寒

胡瓜 甘寒清暑

冬瓜 味甘性寒入

苦瓜 清心明目

甜瓜 入心胃甘寒

胡瓜 甘寒清暑

冬瓜 味甘性寒入

苦瓜 清心明目

宿病存性用惟患虛弱禁食○若者尤傷胃氣

花治全瘡牙痛燒灰末煮成散

西瓜 內積味甘性寒解此即解若脾胃虛弱則百病叢生○瓜子仁甘寒清肺潤腸和中止渴炒則性熱

補中宜見藥不可

梨 甘酸解暑開肺涼心消痰止咳除客熱心煩通胃中痞塞

李 入肝入腎有甘酸苦澀四種酸者

青梅 味酸飲汁開胃通氣生津止渴或久

仁 療肺氣痰多食以橘湯并梅詳藥部

根 皮煎湯能解此毒燒灰油潤空湯大傷

魚 不生者水氣水降功逆發氣生虫炒熟食便氣滯腸小兒多食令

橄欖 先酸後甘氣溫入肺胃生津止渴酒毒風毒而骨痛喉用之亦宜熱嗽勿用過服有嘔吐泄瀉之患

枇杷 氣甜下氣潤肺利脾飲肝生肉有寒中脹滿之虞熱者可解酒熱中寒

杏子 性溫下氣潤肺止咳助陽熱發毒○杏仁散肺

柿 甘酸下氣潤肺止咳助陽熱發毒○杏仁散肺

櫻桃 性熱和脾潤腸止渴潤水較病多食作嘔發

橙 性寒助濕熱有寒熱咳嗽者忌之小兒尤忌

蘋果 產順天府甘平

柚 甘酸寒解酒毒去腸胃中惡氣蒸生痰難化小兒忌食

金橘 甘酸性溫下氣快膈止渴解酒辟

石榴子 性酸溫性溫堅丹石毒殺虫治瘡多食傷肺損

松子 甘溫補氣虛散風寒

茄子 性寒解熱散血寬腸利氣多食助氣生痰損目

醬瓜 鹹甘性寒散毒利腸胃止消渴

沙棠果 甘平不似棠黃花赤實味

青桃 性熱微毒發熱生癆作渴膨脹或淋惟作腫

楊梅 性溫熱收斂心虛熱治心煩口渴渴消熱解毒

菜 甘鹹溫開胃溫腎寬腸治疔毒疔毒疔毒疔毒

橘 皮則開痰理氣詳藥部○破則生痰助氣惟肉熱

甜 甘寒去腸胃熱毒止暴渴利小便多食脾寒成痲

柑 痛潤利以相皮蒸薄解之皮解酒調中下氣多食脾燥

棠 性寒也酸甘澀寒

棠 性寒也酸甘澀寒

棠 性寒也酸甘澀寒

棠 性寒也酸甘澀寒

棠 性寒也酸甘澀寒

棠 性寒也酸甘澀寒

棠 性寒也酸甘澀寒

棠 性寒也酸甘澀寒

棠 性寒也酸甘澀寒

棠 性寒也酸甘澀寒

棠 性寒也酸甘澀寒

梧桐子 性寒無益英熟煎開胃

福 甘寒生食消痰清熱涼血○蒸者熱補心實

花生 甘平體潤舒脾潤肺○惟體寒至滯中氣不運者勿多食

烏芋 甘平解毒破肝腎堅積止血治痢腫痛○擦磨解毒發痘清聲曬酒

菱角 生止胃渴解酒熱渴胃胃多食則腹滿填脈

艾實 甘微溫補脾開胃

大棗 甘溫補脾中氣血多食損虛○餘詳藥部溫中

蓮子 補脾通氣兼入心腎大便秘者勿服

荔枝 甘寒下氣和平利大小腸止渴解酒治嘔吐反胃

荔枝 甘微酸入脾助氣入肝補血大寒者忌之○核入肝中

龍眼 甘溫補心脾氣血治健忘怔忡驚悸益神智又中

龍眼 甘溫補心脾氣血治健忘怔忡驚悸益神智又中

檉柳子 白粉作餅食能補虛虛最揭之醃柳樹中

燒蔗 甘溫能解暑

波羅蜜 甘香止渴解煩醒酒益氣○核中仁煮沙食之

檉柳子 白粉作餅食能補虛虛最揭之醃柳樹中

無花果 五痔腫痛腐爛流膿洗之○葉治

山慈姑 涼解毒

林檎子 酸寒解諸酸敗之毒用鹽醋蒸熟

楊桃 酸甘性平治風熱生津止渴或蜜漬或醃

人面子 酸寒和養解酒醒脾生津食

蕉子 甘寒生食止渴開胃

葫蘆子 甘平煮食益心脾生

黃皮果 酸甘性寒多食動肺火生瘡癩者宜晚晒乾

葫蘆子 甘平煮食益心脾生

胡桃 氣惟肺有熱痰及命門火熾者忌用詳藥部

葡萄 甘微酸○買買葡萄甘

白果 酸甘性溫有小毒生食引而不食多食同種飲食身散并詳藥部

木瓜 酸溫入肝利筋骨及血痰脾腿無力去濕多食

枳椇子 一名雞距子甘平治頭風小腹痛

山查子 甘酸平消積治虫治風不

葛 甘涼生津止渴除痰止嘔吐治熱毒血痢解酒毒

林檎子 酸甘溫酒痰下氣治霍亂腹痛下痢清小兒

山查子 甘酸平消積治虫治風不

將葛 甘涼生津止渴除痰止嘔吐治熱毒血痢解酒毒

葛 甘涼生津止渴除痰止嘔吐治熱毒血痢解酒毒

將葛 甘涼生津止渴除痰止嘔吐治熱毒血痢解酒毒

葛 甘涼生津止渴除痰止嘔吐治熱毒血痢解酒毒

將葛 甘涼生津止渴除痰止嘔吐治熱毒血痢解酒毒

象肉味甘性平補虛去風除濕治風濕痺痛

熊肉味甘性平補虛去風除濕治風濕痺痛

熊肉味甘性平補虛去風除濕治風濕痺痛

熊肉味甘性平補虛去風除濕治風濕痺痛

熊肉味甘性平補虛去風除濕治風濕痺痛

熊肉味甘性平補虛去風除濕治風濕痺痛

熊肉味甘性平補虛去風除濕治風濕痺痛

熊肉味甘性平補虛去風除濕治風濕痺痛

熊肉味甘性平補虛去風除濕治風濕痺痛

熊肉味甘性平補虛去風除濕治風濕痺痛

熊肉味甘性平補虛去風除濕治風濕痺痛

熊肉味甘性平補虛去風除濕治風濕痺痛

熊肉味甘性平補虛去風除濕治風濕痺痛

熊肉味甘性平補虛去風除濕治風濕痺痛

熊肉味甘性平補虛去風除濕治風濕痺痛

熊肉味甘性平補虛去風除濕治風濕痺痛

熊肉味甘性平補虛去風除濕治風濕痺痛

熊肉味甘性平補虛去風除濕治風濕痺痛

熊肉味甘性平補虛去風除濕治風濕痺痛

熊肉味甘性平補虛去風除濕治風濕痺痛

熊肉味甘性平補虛去風除濕治風濕痺痛

熊肉味甘性平補虛去風除濕治風濕痺痛

熊肉味甘性平補虛去風除濕治風濕痺痛

熊肉味甘性平補虛去風除濕治風濕痺痛

熊肉味甘性平補虛去風除濕治風濕痺痛

熊肉味甘性平補虛去風除濕治風濕痺痛

熊肉味甘性平補虛去風除濕治風濕痺痛

上海錦章書局石印

二月復初食多初風濕痺痛
蘇子如桂平清毒食美之令入細肌肩美色粉丹石毒
蠟肉甘微寒清火調中之令入細肌肩美色粉丹石毒
蚌肉治為虛度寒忌之熱食動酒毒去眼赤
忌之性味氣形小
蛤蚧之氣如風痛多又各名聖氣子殼燒過醋泮為食消血塊化反持止心氣痛及冷
蝟甘溫壓丹石毒解酒去狗中熱
田螺甘大寒解酒毒冷積熱治目赤熱黃
沙白形似蠟亦似蠟而大壳光滑黃白色甘溫清熱補虛除煩解渴令
淡菜結冷濕益熱中帶下五臟虛弱久病宜以五食之去毛良不宜多食久食
海粉結冷濕益熱中帶下五臟虛弱久病宜以五食之去毛良不宜多食久食
燕窩甘平補氣味恒遇火熱急迫者無濟也并見無部
海參甘鹹性微寒潤五臟補食
江鯧柱小使消殺中宿物令人易就食得生薑醬同食良止
角帶子甘平清殺中宿物令人易就食得生薑醬同食良止
車破甘鹹性微寒潤五臟補食
蜂蜜味甜
魚鱈甘鹹平清殺中宿物令人易就食得生薑醬同食良止
魚膠甘鹹平清殺中宿物令人易就食得生薑醬同食良止
魚鱈甘鹹平清殺中宿物令人易就食得生薑醬同食良止

魚鱈甘鹹平清殺中宿物令人易就食得生薑醬同食良止
魚膠甘鹹平清殺中宿物令人易就食得生薑醬同食良止
魚鱈甘鹹平清殺中宿物令人易就食得生薑醬同食良止

魚鱈甘鹹平清殺中宿物令人易就食得生薑醬同食良止
魚膠甘鹹平清殺中宿物令人易就食得生薑醬同食良止
魚鱈甘鹹平清殺中宿物令人易就食得生薑醬同食良止

魚鱈甘鹹平清殺中宿物令人易就食得生薑醬同食良止
魚膠甘鹹平清殺中宿物令人易就食得生薑醬同食良止
魚鱈甘鹹平清殺中宿物令人易就食得生薑醬同食良止

魚鱈甘鹹平清殺中宿物令人易就食得生薑醬同食良止
魚膠甘鹹平清殺中宿物令人易就食得生薑醬同食良止
魚鱈甘鹹平清殺中宿物令人易就食得生薑醬同食良止

魚鱈甘鹹平清殺中宿物令人易就食得生薑醬同食良止
魚膠甘鹹平清殺中宿物令人易就食得生薑醬同食良止
魚鱈甘鹹平清殺中宿物令人易就食得生薑醬同食良止

魚鱈甘鹹平清殺中宿物令人易就食得生薑醬同食良止
魚膠甘鹹平清殺中宿物令人易就食得生薑醬同食良止
魚鱈甘鹹平清殺中宿物令人易就食得生薑醬同食良止

魚鱈甘鹹平清殺中宿物令人易就食得生薑醬同食良止
魚膠甘鹹平清殺中宿物令人易就食得生薑醬同食良止
魚鱈甘鹹平清殺中宿物令人易就食得生薑醬同食良止

魚鱈甘鹹平清殺中宿物令人易就食得生薑醬同食良止
魚膠甘鹹平清殺中宿物令人易就食得生薑醬同食良止
魚鱈甘鹹平清殺中宿物令人易就食得生薑醬同食良止

魚鱈甘鹹平清殺中宿物令人易就食得生薑醬同食良止
魚膠甘鹹平清殺中宿物令人易就食得生薑醬同食良止
魚鱈甘鹹平清殺中宿物令人易就食得生薑醬同食良止

魚鱈甘鹹平清殺中宿物令人易就食得生薑醬同食良止
魚膠甘鹹平清殺中宿物令人易就食得生薑醬同食良止
魚鱈甘鹹平清殺中宿物令人易就食得生薑醬同食良止

魚鱈甘鹹平清殺中宿物令人易就食得生薑醬同食良止
魚膠甘鹹平清殺中宿物令人易就食得生薑醬同食良止
魚鱈甘鹹平清殺中宿物令人易就食得生薑醬同食良止

魚鱈甘鹹平清殺中宿物令人易就食得生薑醬同食良止
魚膠甘鹹平清殺中宿物令人易就食得生薑醬同食良止
魚鱈甘鹹平清殺中宿物令人易就食得生薑醬同食良止

魚鱈甘鹹平清殺中宿物令人易就食得生薑醬同食良止
魚膠甘鹹平清殺中宿物令人易就食得生薑醬同食良止
魚鱈甘鹹平清殺中宿物令人易就食得生薑醬同食良止

魚鱈甘鹹平清殺中宿物令人易就食得生薑醬同食良止
魚膠甘鹹平清殺中宿物令人易就食得生薑醬同食良止
魚鱈甘鹹平清殺中宿物令人易就食得生薑醬同食良止

米飲

魚膽

魚鮓

平辨脉法歌括

魚膽即魚生油魚所作之精其色隨乎魚性○甘溫去胃熱止吞酸利大小腸補
魚鮓以莖修補而成甘性平不益脾胃發瘡疥生食損
平辨脉法歌括

鮑魚肝通入腸泄垢而不傷元氣煎汁
鮑魚通入腸泄垢而不傷元氣煎汁

南雅堂醫書外集

壁山黃 任寶臣編 男道階 道真 校字

平脈法

脉有三部陰陽流通呼吸出入上下於中秋浮冬沉春弦夏洪察色觀脈大小不同三部之分尺寸及關營衛流行不失衡診腎沉心洪肺浮肝弦此自經常不作病占倘有參差虛實見焉變化相乘陰陽相干風則浮虛寒則牢堅沉潛水瀆支飲急弦動則為痛數則熱煩設有不應知變所緣三部不同病各異端太過可怪不及亦然審察表裏三焦別馬來疾去遲內虛外實米潮去大病裏可必米大去小在表無疑上潮小者其汗自越下潮小者厥病關格頭無汗生有汗則劇衛感名高營盛名章高章相搏其名曰綱衛弱曰慄營弱曰卑慄卑相搏名損無遺衛和曰緩營和曰遲緩則陽長遲則陰滋遲緩相搏則未相宜是名曰弦色光肉肥人責浮瘦人責沉有若是者其病以成心肺俱浮肝腎俱沉脾主肌肉中候可明假令下利三部脉伏尺中小見腎氣可續若見損脉必至危焉浮表沉裏數府遲藏浮大濡等和緩有象厥陰肝木其脉微弦濡弱而長縱病亦安純弦者死肝藏傷殘倘得毛浮至秋難痊少陰心火洪大而長夏月得此雖病無傷太陰肺金其脉毛浮得數則劇遲緩可瘳數受火剋癰腫堪憂少陰腎水沉滑如經翁奄與沉滑脉以名翁為正陽沉為純陰陰陽和合關尺自平陽明微沉僅能飲食少陰微沉股汗陰濕脉有相乘有縱有橫水火金木乘以縱名火水木金厥名曰橫火行乘木水行乘金是名曰逆倒施而行金水木火順名相生縱橫最重順逆猶輕乘藏乘府陰陽攸分浮數乘府遲濇藏陰寸口脉微曰陽不足陰往來之惡寒可卜陰不足者遲脉見弱陽往來之發熱時作陽結浮數陰結沉遲是皆實證有傷津液陽結之證身輕能食大便不通期十七日陰不能食大便反鞭十四日劇早圍宜慎陽浮陰弱筋急血虛其脉沉者營氣裏微衛衰脉浮汗出如珠陽結之脉獨如車蓋如循長子陰結之概如晏上能陽氣裏微如渴漆絕必亡其血細如蛛絲陽氣必微下不至關

陽絕之源上不至關陰絕之愆此皆不治死於剋焉陽氣前絕陰氣後竭其人已死身必青色陰前陽後色赤心熱
脈病人安是曰行尸生卒眩仆短命有期人病脈好名曰內虛以無穀神雖困可醫肺絕之證汗出不流毛髮自潤
氣喘不休脈浮而洪身汗如油液亡氣脫喘而不休水漿不下胃氣先壞身體不仁營衛已敗乍靜乍亂精神亦散
此皆命絕由斯可斷心絕之證陰盡陽留體如烟重直視搖頭肝絕之證唇吻反青四肢紫習見於脾經脾絕之證
栗汗發黃環唇黑真主已傷腎絕之證狂言失志漫便遺失目反直視病家來請告以病情人若發熱身體痛疼
師到診之病人安卧其脈沉遲絕不浮大知其已差先藥可賀假云腹痛病人自坐師到診之脈浮而大沉細不形
定愈無錯未請人云發熱煩極明日師到靜卧向壁脈復自和其愈可必又有詐病醫者識破師到不驚向壁安卧
三言三止脈之噦唾假令脈和詐言沉疴當須吐下鍼灸宜多數千百處其病乃瘥詐病詐治妙法無過持脈之時
可望而知火和呻病風則言遲搖頭寒痛表強行遲坐伏短氣腰痛坐依心痛護腹如懷印遺懼如循線面白脫色
數日不飲口乾脈澹羞愧脈浮色乍赤白假令人病脈證相應作湯與飯食頃變更吐利腹痛大異前證是名災怪
失於先問吐利之作非闕此藥舊時所服今乃發作故曰災怪以警先覺四診之法望聞問切上中下工於此分別
自古及今語多妄說長沙心法具於平脈撮成短句以承先哲

辨脈法

陽脈浮大滑動與數陰脈沉澹弦微並弱陰見陽生陽見陰惡緩止曰結數止曰促結則陰盛促則陽物動而中止
不能自還其名曰代病必難痊動脈之源陰陽搏擊陽動汗出陰動發熱形冷惡寒三焦傷賊動脈之狀頗似數脈
見於關上頭尾俱減形如豆大動搖厥脈浮而緊狀如弓弦按之不移是名曰弦弦而大者減與乳脈弦減為寒
乳則虛厄寒虛相搏此名為革婦人得此半產漏下男于此得精亡血脈有弦緊浮滑沉澹此六脈者名曰殘賊陰陽
俱繫中邪可怕清邪中上濁邪中下陽中於邪頭強頸學發熱頭痛腰痠陰中於邪必主內慄表氣微虛裏氣
微急便溺妄出足膝冷逆三焦相瀆內外不通上焦拂鬱口爛斷蟲中焦不治胃氣上衝脾氣不轉營衛不通衛氣
前通小便黃赤熱氣所過癰膿可必營氣通者噎嗝咽塞寒為熱擁自下凝血陰陽俱厥脾氣孤弱五液注下下焦
不瀉清便下重便難且數臍築狀痛命難全活清濁混淆慎勿妄治七日微熱邪退可俟大發熱者邪氣猶至惡寒

欲嘔腹痛欲利至於吐利緊去人安若脈動遲能食自痊脈浮而大浮虛大實存寸為格關候在尺關則不通格則吐逆脈浮而滑浮陽滑實陽實相搏其脈數疾衛氣失度發熱汗出此為不治證屬不足脈浮而數風熱相搏瀧浙惡寒表邪始作若不發熱有隱痛處蓄積有膿飲食如故脈浮而大風虛氣強風氣相搏隱疹身痒久為痲癩泄風名彰諸微亡陽諸濡亡血諸緊為寒諸弱發熱是諸脈見乘寒則厥鬱冒不仁胃虛脾瀋口急不言外戰內慄緊為寒實亦主虛冷亡汗若吐欬者飲冷胃虛下利皆令脈緊寸微尺緊多汗虛損陰盛陽亡從茲以診病人之脈微弱而瀋醫誤吐下其人亡血陽微惡寒陰微發熱夏欲複衣裸欲冬月脈微而緩表虛裏實微則衛疎緩則胃實穀入於胃脈道乃行水入於經其血乃成血多氣少失其常經三焦絕道名曰血崩脈微而瀋營衛不行三焦無仰體碎斲氣不足口喙身疼衛氣既虛惡寒欠呻上焦不歸噫而酢在中焦不歸穀食內停下焦不歸遺洩失精衛衰色黃營衰色青根葉枯槁寒慄唾腥欬逆吐沫上焦以明脈弱而遲血寒氣微血寒發熱氣微內饑餓不能食中滿而虛脈弱而緩中焦已虛脾氣不足胃氣有餘食卒不下吞酸而噫氣填隔上內傷飲食跌陽之脈獨取斗遲兼和緩象胃氣常治浮則傷胃數則動脾此非本病誤下所為營衛內陷其數先微因是而知脾氣不治脈反更浮邪氣獨留潮熱發渴穀食難投便鞭氣噫遲緩乃瘕數脈不退惡瘡可憂跌陽浮瀋少陰如經其病在脾下利當行少陰沉滑斯為如經滑而數者屎膿已成跌陽伏瀋三焦氣塞吐逆使閉名曰闕格跌陽滑緊胃實脾強持實擊強痛達自傷如手把刃坐自作瘡跌陽沉數實熱消穀此為易治緊則病篤大而緊者當即下利脈實病虛其證難治脈微而緊虛寒相應微緊相搏短氣之證跌陽不出身冷膚鞭脾不上下營衛俱病跌陽浮花衛衰營傷肌肉甲錯體瘦羸危浮乳相搏宗氣衰歇皮肉脂髓四屬斷絕脈緊而浮寒與氣共浮為腹瀉緊為絞痛浮緊相搏寒氣內關腸鳴而轉轉即氣動膈氣乃下趨泄如洞少陰脈伏除腫而痛跌陽脈和少陰脈負土能制水大順以固少陰之脈弱而兼瀋弱者微煩瀋者逆厥少陰脈伏睛少精血陽氣迫促上入胸膈宗氣及聚心下血結陽氣退下陰股間熱令身不仁此為尸厥當刺期門並刺巨關辨脈之法具於此中熟讀玩味其用無窮平辨脈上下二篇始自仲景叔和所傳所畧述要領撮成四言神而明之是在後賢

本經使讀序

醫者治病貴善用藥藥之氣味具有五行五行者天地生成之數陰陽消長之理不明乎此而能用藥以治病者鮮矣顧藥之通于用者固在氣味而當混沌初開之時其氣之寒熱溫平涼味之甘苦酸辛鹹果何由而辨別不爽自非開天明道之聖人首出庶物烏能審氣察味定為不易之經哉史稱炎帝神農時民有疾病未知藥石帝始味草木之滋嘗一日而遇七十毒神而化之遂作方書以療民疾所謂方書雖未指名世所傳神農本草經意其遺也厥後如伊聖湯液仲景傷寒金匱諸方咸遵而用之固有或越易所謂明于天之道而察于民之故是與神物以前民用者其此之謂歟唐宋而後危言日出經旨反晦醫道之環寶由于期浸淫至今真學爭鳴各逞臆見比之洪水猛獸抑又甚焉夫士子讀書必宗孔子非是者即為離經畔道業醫而不宗本經獨非離經畔道者乎雖仲景後宗本經者間亦有人然不無異同之見惟 國朝徐靈胎張隱菴葉天士陳修園輩註解本經開發精蘊不啻破牖振聾厥功偉矣而修園本草經讀一書尤多期望後學之意但經文詞旨簡奧語句參差讀者每以難于記誦為恨余不揣固陋取本經而編輯之補短截長叶以韻語名曰本經使讀極知僭妄無所逃罪然在初學之艱于記誦者未必無小補也至若明于天地生成之數陰陽消長之理兼善其君臣佐使之宜以適于用而幾十全者則有望于學識兼優之士神明變化焉 鄙人謝不敏矣

時

同治八年歲在己巳春王正月上元後一日黃 狂自序于芸經堂

本經使讀凡例

一藥性始于神農所傳本草經闡陰陽之秘洩天地之藏誠千古所不易者也自梁陶弘景而後諸家之說或行其與經旨相謬戾者多矣茲編一以本經為準所謂摩言清亂衷于聖也

一本經藥味分上中下三品茲編仍之其前後次序不盡拘也

一本經藥有三百六十五品茲則照常用者錄之其有後人所不識及識而不常用者闕焉至如大戟芫花甘遂水蛭虻蟲蟻蠱雲母鼠婦蛻螂白魚等雖非常用而仲景傷寒金匱方中用之不妨編入以見古人用藥志遠

本經使讀序

上海錦章書局石印

本經之意

一藥有經方而用之及時方所常用而本經所無者因採別錄諸本附于後

一本經藥品經方尚用之不盡而必附別錄以下藥味且錄之多有以時方所常用不欲拂時好也其藥之氣味主治俱見本草綱目然綱目雜收眾說反令人無所適從茲編惟取最先者存之餘皆從略

一本經有橘皮無青皮圖經始分之有枳實無枳殼開寶始分之後人既已分用不妨附入至若羌活一名獨活是一物而二名也然考今時所用實是二種因取唐甄權藥附馬惟天麻乃赤箭之根氣味甘平地骨皮乃枸杞之根主治不同不必分載

一藥之為用在于氣味如芍藥本經苦平別錄酸寒今人只知其為酸寒不復知其為苦平矣是皆從經之過也若赤芍之誤陳修園已闢之茲不贅

一藥之氣味功能茲編已悉其矣讀者于讀熟後更取諸家註解而參閱之自有得心之候

一時醫不能用經方者以經方所用之藥與時下本草氣味功能不合故也讀此編後取經方查對有一味不合否

一昔人云取法乎上僅得乎中蓋醫而不宗本經是不能取法乎上也竊怪世之為醫者於諸家雜說深信不疑而于本經則疑而棄之不一寓目豈後人之智能反出開天明道之聖人上哉何不思之甚也

一其編原為初學而設只取稍叶韻語便于誦讀其中不無倒亂割裂之處然引人入勝實不得已也讀者原之一讀是編者必須屏去一切雜說專力于斯自然深造有得不然是先入之言為主雖讀猶弗讀也

神農本草經上品

壁山黃 狂實巨編 男道階 道叔 校字

南雅堂醫書外集

人參甘寒開心益智補五臟而安神定魄而止驚悸久服則輕身延年兼明目而除邪氣
黃耆甘溫敗瘡癰疽既可排膿而止痛並五痔鼠瘻而能醫又主大風與癩疾小兒百病兼補虛
白朮氣味甘溫入脾風寒濕痺痲痺死肌止汗除熱煎餌消食久服輕身延年不飢

甘草甘平功擅解毒主治五臟與六腑倍氣力而堅筋骨除寒熱之邪氣解瘡癧而長肌肉

薯蕷甘平入肺歸脾除寒熱邪氣主傷中虛羸補中益力強陰長肌久服則耳目聰明輕身延年而不飢
肉蓯蓉甘微溫無毒勞傷補中益中痛除養五臟而強陰益精氣以多育兼主婦人之癥瘕若按身頸久服滋壯甲類

地黃甘寒絕筋折跌填髓長肌傷中逐血生者作湯而除痺兼除積聚之寒熱不老輕身久服始得

天冬氣味苦平主治諸暴風濕癱偏痺而強骨髓殺三蟲而去伏尸久服輕身益氣故延年而不飢

麥門甘平心腹氣結傷中傷飽胃絡脈絕又主羸瘦短氣久服輕身可得延益

細辛辛溫欬逆上氣頭痛腦動風濕痛痺百節拘攣死肌可治久服則明目輕身九竅亦利

蔡胡苦平臟腑結氣推陳致新飲食積聚久服明目益精兼主寒熱邪氣

黃連苦寒主治熱氣目痛背傷而淚出腸澼腹痛而下痢婦人陰中腫痛久服不忘善記

防風甘溫大風頭眩惡風風邪目盲無見骨節痛疼久服身健

續斷氣苦溫無毒金瘡癰瘍折跌筋骨通婦人之乳難主傷寒而補不足欲益氣力須當久服

牛膝苦酸氣平無毒痿痺肢攣不可伸屈傷熱火爛血氣能逐又主墮胎孕婦忌服

巴戟甘溫補中益氣安五臟而強筋骨起陰痿而增腎志專主大風能除邪氣

石斛甘平傷中除痺虛勞羸瘦補臟下氣強陰益精兼厚腸胃

澤瀉甘寒風寒濕痺養五臟而益氣力肥健人而消水氣兼主婦人之乳難久服則耳目聰慧

五味無毒氣味酸溫主治欬逆益氣強陰勞傷羸瘦益男子精
以仁甘寒久風濕痺筋急拘攣身益氣

菟絲辛平主補不足益氣使人飽傷可續汁去面黧久服明目

葳蕤甘平中風暴熱不能動搖筋跌肉結是諸不足久服潤澤

沙參苦寒主除寒熱補中益肺驚氣血結

遠志苦溫傷中欬逆聰耳明目強志倍力除邪氣而補不足利九竅而主慧五

菖蒲辛溫風寒濕痺開心通竅欬逆上氣明目出聾耳聾使利兼主癰瘡亦溫腸胃久服不忘補腦益智

赤箭辛溫殺鬼精物長陰肥健惡風蠱毒善益氣力須當久服

車前甘寒通便利水濕痺能除氣癢痛止

羌活氣味苦甘而平風寒所擊全瘡止疼女子疝瘕痲痺奔豚倘能久服奈老身輕

升麻甘平苦寒無毒頭痛寒熱時氣癘疫喉氣口瘡風腫諸毒中惡腹痛蠱毒吐辟瘟瘴之邪氣殺鬼精與老物

輕身延年是在久服

茵陳氣味苦平微寒熱結黃疸濕熱風寒久服益氣耐老白兔食之亦仙

甘菊氣味苦平無毒諸風頭眩目痛淚出去死肌而除濕痺利血氣而宜久服耐老輕身延年可卜

龍膽氣味苦瀟大寒定五臟而殺蠱毒主寒熱之在骨間筋骨之絕傷可續驚癇之邪氣能安

紫蘇辛溫下氣殺殺除飲食而辟口臭辟惡氣而去邪毒輕身通神貴在久服挾寬服而止心痛枝通經而通脈絡

若用其子下氣尤速

逆搖實益氣味甘平益氣除疾補中養神久服不飢耐老身輕

芡實甘平強志益精王治濕痺腰脊膝疼補中除暴耳目聰明久服不飢耐老身輕

脂麻甘平傷中虛羸補五內而益氣填骨髓而長肌輕身不老久服致奇能黑髮

益母花子辛甘微溫主除水氣明目益精葉作浴湯能治癰形

茵草苦寒風寒濕痺黃疸補中血枯短閉

茯苓甘平胸膈逆氣心下結痛則寒熱煩滿而欲逆肝氣上逆則憂志驚邪而以浮因之口焦舌乾惟明小便
若欲安魂養神是非久服不至

猪苓甘平通利水道蠱疰不祥痰癰亦效

牡桂辛溫上氣欬逆結氣喉痺兼治吐吸利關節而補中益氣通神明而久服始益

茵桂辛溫主治百病養精神而和顏色為諸藥通使之先聘不老輕身久服乃應

橘皮氣味苦辛而溫癢熱逆氣水穀通行久服去其下氣通神

枸杞苦寒五內邪氣熱中消渴風熱周痺久服則堅筋骨而耐寒暑洵為服食之上劑

木香辛溫主辟邪氣疫濕鬼淋露強志久服則陰陽氣和不致夢寐而寤寐

杜仲氣味辛平補中而益精氣主腰膝之痛疼堅筋骨而強志陰下之濕痿可除小使之餘濕亦治

桑根白皮甘寒氣味主治傷中羸瘦五勞六極可治又主崩中絕脈兼能補虛益氣

桑上寄生氣味苦平長鬚眉而堅髮齒充肌膚而主腰疼兼治小兒之背強癰腫女子之胎長安寤

槐實苦寒五內邪熱治五痔而療火瘡止涎澀而補傷絕兼主婦人乳難子脹痛劇

柏實甘平主治驚悸除風濕之痺痛安五臟而益氣久服則耳目聰明潤澤美麗

大棗甘平心腹邪氣補氣則通竅助安中則養脾胃胃滋津液而補不足和百藥而四肢亦利

朴硝苦寒百病可治去固結留痰除寒熱邪氣能化七十二種石善逐臟腑之積聚

丹砂味甘微寒無毒主身體五臟之百病殺精魅邪惡之鬼物安魂魄而養精神益中氣明雙目不老通神
足在久服

滑石甘寒寒熱積聚身熱洩瀉小便癢閉女子乳難兼益精氣

紫石英甘氣溫無毒主腹欬逆之邪補肝脾二經之不足女子風寒在子宮絕孕十年而不育服溫中
年可卜

石脂甘平黃疸洩痢腸海脹血赤白下利惡瘡頭癩腫疽痔陰蝕疥癬補髓益氣肥健不飢服之到石
色隨石氣

餘糧甘寒欬逆寒熱大熱煩滿下利赤白血閉癰疽能消濕熱鍊餌服之不憂糧絕

髮髮苦溫主治五癰利小便水閉格不通又能療小兒驚大人瘧而有自違神化之功

龍骨甘平鬼精物絕又主欬逆洩痢膿瀝女子漏下癥瘕堅結小兒驚癇由氣之熱治瘧如神水歸其宅

阿膠甘平心腹內崩勞極如癰四肢酸痛腰腹空疼女子血崩安胎有效久服身輕

白膠甘平補中益氣腰痛羸瘦勞傷可治止痛安胎無子血閉

牛黃苦平驚癇寒熱或狂症逐鬼除邪

麝香辛溫主辟惡氣殺鬼精物三蟲可去溫瘧驚癇除邪屢寐兼療蠱毒孕婦當忌

石蜜甘平補中益氣止痛解毒諸驚癇瘧安五臟之不足主心腹之邪氣和百藥而除眾病久服則輕身強志

龜板之氣味甘平破癥瘕而攻痰瘕療五痔與陰蝕去濕痺而健肢弱又主漏下赤白小兒顯骨不合

牡蠣鹹平傷寒熱驚志怒氣帶下赤白祛濕瘧而除拘攣鼠瘻殺邪鬼而能堅強骨節

桑螵蛸平利水通淋傷中疝瘕陰痿遺精女子血閉兼治腰疼

空青甘酸寒而無毒主治青盲聰耳明目利九竅而通血脈養精神而益肝木輕身延年是在久服

礬石氣味酸無毒寒熱洩痢惡瘡痛目白沃陰蝕堅強齒骨輕身增年須鍊餌服

膽礬酸辛氣寒有毒主諸癰疽金瘡翳目女子陰蝕崩中血出石淋寒熱諸邪氣毒

蛇牀之氣味苦平除痺氣而利關節男子陰痿濕癢婦人陰腫痛劇又主癰癩與惡瘡久服輕身好顏色

疾黎之氣味苦溫主治惡血而破瘕瘵喉痺與乳難並積聚而能平久服則長肌肉明目而輕身

芡實氣味甘寒無毒主治青盲除邪明目利大小便寒熱可除欲毒氣力端在久服

麻仁甘平補中益氣久服肥健神仙可至

瓜蒂氣味苦寒有毒主身面四肢之浮腫下水氣而殺蠱毒又主欬逆上氣及諸病之在胸腹功兼吐下

松脂氣溫味甘而甘難疽瘡瘡可治白禿頭瘍能痊又主疥癬之風氣熱除而五臟亦安久服輕身不老延年

辛夷無毒氣味辛溫主五臟身體之寒熱去面野而風動腦痛久服則明目增年耐老輕身

東仁酸平邪結氣聚心腹寒熱酸痛濕痺久服則五臟亦安延年延身利

從仁甘溫主治明目背爛腫痛赤傷淚出又主邪熱氣結胸腹並氣輕身尤在久服
女貞氣味苦平安五臟而養精神補中虛而除百病久服則肥健輕身

五加辛溫益氣癆變心腹疝痛疽瘡陰蝕

蔓荊氣味苦而微寒主筋骨間之寒熱祛濕痺而治拘攣去白蟲而輕身耐老利九竅而目明齒堅

地膚苦寒補中益筋治膀胱熱利小便淋久服耐老耳目聰明

龍齒溫涼主殺精物瘕疰癩狂驚癲可除心下結氣喘息能續

瓜子御子甘平令人悅澤益氣不飢並好顏色

雲母甘平身皮死肌中風寒熱如在船車益子精而輕身明目安五臟而邪氣可除

萍蕪無毒氣味酸平主安五臟益精長陰強志倍力久服身輕時珍曰蕪二種

蒼朮苦溫風寒濕痺瘕疰可除死肌能治若欲輕身延年而不肌是在久服作煎餌時珍曰與白朮功同但

白英甘寒補中益氣寒氣入疰消渴亦治輕身延年久服之利

冬葵子甘寒滑無毒主臟腑寒熱之蘞瘦利小便而五癰可除久服輕身延年堅骨而長肌肉

草決鹹平主治青盲赤白翳膜目中膚溢眼赤淚出久服益精

蒲黃之氣味甘平主心腹膀胱之寒熱兼利小便消痰止血

乾漆氣味辛溫無毒主治絕傷能續筋骨填髓腦而安五臟並風寒濕痺以消除生者功能去長蟲耐老輕身

天蛤無毒氣味寒平主治惡瘡兼蝕之痔

鯉魚膽苦氣寒無毒目熱赤痛青盲明目益氣強悍是在久服

雄雞肉甘氣溫無毒主辟不祥通神殺毒女人崩漏下赤白沃

蜜蠟甘溫下痢膿血主治金瘡補中續絕並氣不飢耐老可得

夜明砂辛寒水氣治面癰腫主除驚悸皮膚時痛腹中血氣兼破積聚寒熱後人用治目翳

涵盧鹹寒皮膚熱毒惡瘡疔漏痺乳出並氣輕身聰耳明目不老延年是在久服

神農本草經中品

乾薑辛溫欬逆上氣止血出汗逆風濕痺兼治胸滿腸澼下利生者尤良溫中之劑
生薑氣味辛而微溫久服去其氣可以通神明

蔥白氣味辛平無毒治傷寒之發熱惡寒中風之浮腫面目並能出汗可作湯服

當歸苦溫上氣欬苦又主但熱不寒之溫瘧及寒熱洗洗之在膚皮婦人漏中絕子瘡瘍金瘡能治如蝕蠟汁

芎藭味辛重春溫氣主中風入腦之頭痛拘攣緩急而寒痺又主金瘡婦人血閉

淫羊藿辛重寒水氣主陰痿與絕傷益氣力而強志草中痛除小便能利

荊芥辛溫氣勝於味主陰熱寒破積聚氣亂瘰癧並生瘡除濕疸而下血瘀

麻黃苦溫發汗之劑風寒頭痛欬逆上氣去邪熱而已溫瘧破癰堅而消積聚

葛根氣平具甘辛味主消渴而解大熱止嘔吐而愈諸痺兼解諸毒亦起陰氣注諸葛酸收氣味甘平

黃芩苦寒腸澼洩痢主諸熱與黃疸逐水而下血閉惡瘡疽蝕火瘍亦治

玄參氣寒具有苦味女子產乳餘疾腹中寒熱積聚令人目明能補腎氣

丹參苦寒心腹邪氣腸鳴幽幽寒熱積聚破癰堅而除痰止煩滿而益氣

丹皮辛寒主治寒熱中風則惡癢及驚癇邪氣留腸胃為舍宅癩癰瘡而安五臟除癰堅而消瘀血

防己辛平熱氣諸癰風寒濕瘧除邪利便

狗脊苦平頗利老人主腰背強而關機緩急治周痺痛而寒濕膝疼

秦艽苦平寒熱邪氣肢節痛痠寒濕風痺又主下水小便能利

紫苑苦溫上氣欬逆又主胸中寒熱氣結安臟去蠱兼療痿躄

知母氣味苦寒無毒主治消渴熱中下水而補不足兼治肢體浮腫益氣而邪可除

貝母氣平具有辛味傷寒煩熱淋瀝邪氣乳難金瘡疔痛喉痺性主陽明風痲亦治

花粉苦寒消渴暑熱補虛安中煩滿大熱陰路有傷能續其絕兼仁用治胸痺結胸以其能開胸前之結

苦參平腹痛邪氣破堅積疝瘕除寒熱血痺並氣止痛小便能利
木通氣味辛平主除脾胃寒熱通利九竅血脈關節令人不忘惡蠱可滅

白芷辛溫漏下赤白血閉陰腫頭風寒熱止目淚而長肌膚作面脂而能潤澤

苦參苦寒心腹結氣苦痘癩疽瘰癧積聚逐水補中明目止淚

水萍氣寒味具辛辣下水氣而勝酒除身癢而女黃髮又主暴熱與消渴久服得輕身大法

款冬氣溫中含辛味主治欬逆善喘喉痺癆諸驚癩寒熱邪氣

厚朴苦溫木氣火味風寒頭痛寒熱驚悸行氣血而治痺痛死肌散寒濕而三蠱可去能得言外之氣

芫子苦寒立內邪熱酒飽鼓鼻癩疾赤白又主瘡瘍面赤胃熱

枳實之氣味苦寒主大風之在皮膚如麻豆兮苦痒寒熱結令可除蠱惡而利五臟止痢而長肌肉

黃蘗苦寒腸胃結熱痔瘡黃疸與腸痔主五臟而止痢洩兼治女子陰傷蝕瘡漏下赤白

山茱萸酸氣平無毒主治心下邪氣寒濕之痺可逐祛寒熱而去三蠱溫中輕身宜久服祛

吳茱萸辛氣溫小毒溫中下氣而止痛並血痺濕氣而能除兼主欬逆寒熱開腠理而風邪可逐

杏仁之性質冷利有小毒其氣味則甘苦而帶溫主欬逆上氣喉痺而雷鳴通產乳令而功專下氣療金瘡令並寒

心奔脈湯炮去核映用

烏梅酸澀氣稟溫平下氣除熱煩滿安心止肢體痛偏枯不仁能蝕惡肉去痣黑青

犀角苦酸鹹寒無毒主蠱疰邪鬼瘴氣解鈎吻鴆羽蛇毒除邪則不迷惑魔寐輕身則貴在於久服

羚羊甘溫漏下惡血並氣強志驚癩寒熱生齒不老大補腎脈

鼈甲鹹平能去瘡疾心腹寒熱癩瘕堅積痔核惡肉蝕肉陰蝕

鱉鱗氣味鹹辛而平主治小兒夜啼癩萬滅黑黠而令人面色光好去三蠱而療男子之瘡在陰陳修園曰凡藥金

鹽鱗氣味鹹辛而平主治小兒夜啼癩萬滅黑黠而令人面色光好去三蠱而療男子之瘡在陰陳修園曰凡藥金

鹽

大 臣 更 貴

四 上海錦章書局石印

本經 卷之... 蛤蟬鹹寒得全氣全王小兒驚癇夜啼寒熱病癲古人用蟬令人用氣性亦相近

石膏氣寒辛味白質中風寒熱心下氣逆兼主口乾舌焦驚喘而不能息除邪鬼而療腹中堅痛主陽明而益乳金瘡有蓋

寒水石辛氣寒無毒主邪氣身熱之中皮膚除煩瑣積聚之在胸腹

食鹽甘鹹氣寒無毒腸胃結熱喘逆可服病在胸中令人吐出

陽起石鹹微溫無毒主治崩漏子臟血鬱破癥瘕而療腹痛起陰養而補不足

水銀氣味辛寒有毒主治疥癩痂瘍白禿殺皮膚虱及五金毒除熱墮胎未可輕服

雄黃味苦平寒有毒主治寒熱殺鬼精物蠱毒惡瘡疽痔瘻毒兼療死肌輕身鍊服

硫黃氣味酸溫有毒主治婦人陰蝕疽痔能化金銀銅鐵奇物兼除白禿頭瘡去惡血而堅筋骨

蔥石無毒氣寒味辛風濕周痺肢節痛疼消除煩滿大熱以及耳聾無聞

紫參苦寒心腹積聚邪氣寒熱通氣使利

地榆氣味苦寒無毒主婦人乳產疼痛並七傷五漏而兼除治帶下而止汗痛療金瘡而除惡肉

紫葢氣寒具有苦味治五疳而心腹邪除利九竅而補中益氣

白鮮苦寒欬逆淋漓頭風黃疸濕痺死肌兼主女子之陰中腫痛並治不可屈伸之在四肢

澤蘭苦溫品列于中主治金瘡癰腫瘡膿

木耳小毒氣味甘平益氣不飢強志輕身

茅根甘寒補中益氣勞傷虛癢瘀血閉兼除寒熱小便可利

白薇氣味苦鹹而平主暴中風而身熱肢滿心忽忽而不知人並治狂惑邪氣寒熱酸疼溫瘧洗洗有時而興

葶本辛溫頭風痛除陰寒腫痛腹中急促兼主婦人之疝瘕悅顏色而長肌肉

海藻氣味苦鹹而寒主治癭瘤結氣散項下硬核痛墜下水腫而消癥瘕癰腫腹中上下雷鳴而亦安

收醬苦平疥癬瘡痔兼主暴熱火瘡赤氣

瞿麥苦寒主治開格明目去翳使閉癥結出刺決癰墮胎下血

蘇齊辛溫中明目耐風寒而下水氣消浮腫而解癰毒

紫葳即沒食氣味酸寒主血崩中癰疽血閉寒熱補羸瘦而養胎祛產乳之餘疾

黑大豆甘氣平無毒生研則塗癰腫而止痛煮汁則殺鬼精而解毒卷主濕痺膝痛寧縮

赤小豆平味甘而酸主下水腫癰脹排馬

百合甘平主治邪氣腹脹心痛大小使利

土瓜根苦寒水氣寒故酸疼血瘀月閉並氣愈能消渴肉痺

石韋苦平易熱邪氣癰閉不通水道可利

蜀椒有毒氣味辛溫主邪氣欬逆溫中而下氣逐齊節皮膚寒濕之痺疾久服則頭不白增年而輕身

秦椒有毒氣味辛溫除風邪氣去寒痺疼堅齒明目久服身輕

秦皮苦寒風寒濕痺除身中之洗洗寒熱祛目中之白膜去翳

皂角辛鹹溫有小毒主治風痺風頭淚出利九竅而去死肌逐邪氣而殺精物

竹葉苦平上氣欬逆主殺小蟲惡瘍筋急根竹湯服渴止氣逆又能補虛下氣可必

露蜂房毒甘平氣味驚癩癰寒熱邪氣癩疾鬼精蠱毒腸痔火熱之良用克有濟

履蟲有毒鹹寒氣味主心腹洗洗寒熱破癰疽而下血閉

蝨蟲苦寒而有毒破堅積而逐瘀血通血脈而利九竅消癰疽而除寒熱

蟻蝻味鹹有毒稟春溫之木氣主腸下堅滿血痛破血痺而通月閉又主目中青翳白膜消惡血而逐血瘀

氣味濕鹹厥有烏賊主治血閉濁下赤白陰蝕腫痛癢寒熱

蟹鹹小毒寒主熱疾邪氣結痛面腫喘僻燒之致鼠大能收漆

石灰氣味辛溫有毒主治疔瘍疥癩瘡毒死肌隨胎熱氣可逆殺五種痔蟲去黑子息肉

蕪菁甘平風寒濕痺皮膚寒熱胃中熱氣久服身輕筋骨堅緻花實蕪菁白蕪可去

鐵落平得金氣強主治風熱諸惡瘡癰氣在皮膚善起發狂

蕪莢辛平化食去蟲兼治五內邪氣濕毒在皮骨中

刺楸苦平陰腫陰蝕痛引腰背下血白赤又主五痔五色血汁煮酒服之諸症以息

神農本草經下品

葶藶辛寒主治結氣飲食寒熱癥瘕積聚破堅逐邪水道通利

連翹苦平主治寒熱鼠瘻癰腫癰疽疔毒瘰癧瘰癧毒熱結

夏枯草寒味苦而辛寒熱瘰癧破癥散癰瘰癧瘰癧頭瘡與結氣治腳腫濕痺而輕身

代赭石苦寒氣無毒主鬼疰賊風殺惡鬼精物女子赤沃漏下腹中邪氣蠱毒

戎鹽鹹寒主治明目可去毒蠱能堅肌骨

鉛丹辛寒反胃吐逆除熱下氣驚癩癩疾

胡粉辛寒主治伏尸能殺三蟲兼治毒螫

芫青味苦微寒有毒主腹中邪熱之氣殺三蟲而解諸毒

白頭翁苦溫溫瘧可折癥瘕積聚狂陽寒熱止腹痛而療金瘡敗癰氣而逐瘀血

白及氣平味苦有餘主治癰腫惡瘡敗疽胃中邪氣傷陰死肌並賊風鬼擊而可治疔緩不收亦能醫

青柏葉苦寒無毒主治邪氣風瘙癢除皮膚中熱殺三蟲毒于瘰癧各口之青後人用以明目

澤漆味苦微寒無毒主皮膚熱水氣大腹四肢面目浮腫丈夫陰氣不足

商陸氣味辛平有毒主治水腫疔瘕癰疽除癰腫殺鬼精物

蘆薈氣味辛寒有毒主治毒蠱欬逆洩痢腸辟可除瘡頭癩疥癩之惡瘡去死肌而殺諸蟲之毒

天雄大毒氣味辛溫主治大風寒濕痺癱瘓節痛而拘攣緩急強筋骨而輕身健行破積聚邪氣金瘡得煖而生

烏頭氣味辛溫大毒中風惡風洗洗汗出主寒熱與欬逆上氣破積聚而寒濕痺除

狼牙苦寒而有毒主治邪氣與熱氣兼主疥癬及惡瘍去白蟲而療瘡痔

大戟氣味苦寒小毒主治蠱毒十二水積聚急痛滿在腹中風皮膚之痛癢嘔吐氣逆皆可除

甘逆氣味苦寒有毒大腫疔瘕浮腫面目破癩惡積聚而消脹滿去留飲宿食而利水散
常山氣味苦寒有毒傷寒寒熱溫瘧鬼毒疾結胸中吐逆可服

蜀漆有毒辛平氣味治瘧寒熱逆上氣腹中癭瘕堅痞積聚兼治蠱毒鬼疰邪氣
南星大毒氣味苦溫寒熱結氣伏梁傷筋癱拘攣而利水道去積聚而治心疼眩暈

射干苦平有平主治上氣欬逆喉痺咽痛不得消食散飲食之大熱腹中氣結邪逆

芫花小毒氣味辛溫主治欬逆咽腫喉鳴殺蟲魚而癩腫可去祛鬼瘧而疔瘕亦平

棟實小毒氣味苦寒主治溫疾大熱狂煩殺三蟲而療癰疔利小便而治傷寒

巴豆辛溫有毒主治溫瘧寒熱去留飲痰海破癭瘕堅結去惡肉而除邪殺蟲利水散而開通閉塞

梓白皮苦氣寒無毒能治三蟲主治熱毒

斑蝥辛寒有毒主治鼠瘻瘡瘻去寒熱而除蠱疰破(疔)瘕而蝕死肌

水蛭氣平鹹苦有毒主利水道惡瘕能逐善破血瘕月閉可服

蜈蚣鹹寒主治瘧難除惡瘡而潰癰腫出肉刺而噉啞以安

蜈蚣酸溫氣癘月閉利水墮胎血癩癩瘕

蜈蚣寒鹹而有毒主治寒熱之腹脹^{制平}小兒驚癇惡癩大人癩疾狂陽

白魚無毒溫氣鹹味厚小兒中風背起項強治婦人疝瘕小便不利

白欬苦平主散氣結目赤癩疽止痛除熱小兒驚癇濕瘧女子陰蝕赤白

雷丸苦寒殺蟲無比逐毒氣而除胃熱利丈夫不利女子

羊蹄苦寒主除熱疾頑疔疥瘻女子陰蝕

苦瓠有毒氣寒味苦主治水腫能令人吐

蔓椒苦溫風寒濕痺屈節膝痛四肢厥氣煎作浴湯取汗大利

白堊味苦臭春溫氣寒熱癩瘕月閉積聚

石南氣味辛苦而平主養勝氣內傷衰陰癆風痺積聚利皮毛骨筋

蛇蛻鹹甘氣平味劣主治小兒驚癇寒熱癩疾惡癢搔頭弄腸腸痔瘡每取效甚捷火煎

茶葉氣味甘微寒上高少睡利便去疾神農

名醫別錄 梁陶弘景

首香氣味甘而溫去惡氣而主風水毒腫上霍亂而治心腹痛疼○前胡苦寒推陳致新胸中痞滿氣結腹心傷寒寒熱風頭痛痰去痰下氣明目益精○香附微寒具有甘味充皮毛而除胸中熱長鬚眉而令人益氣○茯苓甘平益智開心療虛勞風眩止志怒悸驚辟不祥而善記憶安魂魄而養精神○竹茹甘寒主治吐衄嘔吐濕氣崩中寒熱○竹瀝味甘大寒無毒療中風風痺胸熱止煩悶消渴勞復○木瓜酸溫主治濕痺吐下轉筋霍亂脚氣○枇杷葉苦氣平無毒辛暖不止下氣最速 龍眼甘平久服強魂安去飲食不老輕身去三蟲而除蠱毒安五臟而通神明○小麥甘寒主除客熱利小便而止咽燥煩渴養肝氣而止渴與吐血○菟豆氣味甘溫無毒主治和中下氣可卜○穀芽苦溫消穀下氣又主寒中除熱導滯治胃○豆豉苦寒頭痛寒熱煩燥滿悶瘴氣毒烈而脚疼冷虛勞喘吸○飴糖甘溫止渴去血主補虛之建中可得○香薷辛溫主治霍亂腹痛吐下水腫能散○白芥子辛氣溫無毒胸膈痰冷黃赤面目發汗下氣散射工毒○虎骨辛熱主邪惡氣瘰癧瘰而治惡瘡殺鬼疰而止驚悸○檳榔苦辛氣溫而溫消殺逐水除痰癖結主殺三蟲兼療寸白○牽牛子苦寒而有毒主下氣而癩水脹利小便而除風毒○忍冬無毒氣味甘溫主治寒熱身腫久服長年輕身 鈎藤無毒氣味微寒主治小兒寒熱驚癇○人乳甘鹹氣平補臟令人肥白悅澤有象○小使氣寒具有鹹味主療寒熱頭痛濕氣○草蘇苦平主治氣熱風寒濕痺及惡瘡不疼腰脊痛疼而堅強骨節又主傷中志怒陰痿失溺老人五緩關節老血白前甘溫主治胸膈欬逆上氣呼吸欲絕 側柏苦溫治吐衄血蒸氣輕身崩中赤白去濕痺而耐暑寒生肌肉而止痢血 艾葉苦溫吐血下利辟風長肌下部瘡蟲婦人漏血陰氣不利作炷灸疾百病可治○牛蒡子辛氣平無毒主除風傷補中明目 王不留行氣味苦平全瘡止血出刺逐疹止心煩鼻衄除風痺瘡侵兼主婦人產難久服耐老輕身 胡蘆無毒氣味苦寒主骨間痺四肢拘攣陰痿短氣酸脹寒○陳倉米溫味酸而酸調胃止洩下氣除煩 秫米甘寒主利大腸兼治寒熱可療漆瘡 米醋氣溫酸苦無毒主散水氣消癰殺毒○米酒有

每主行藥勢氣味苦甘而辛熱殺百邪與惡毒氣 韭味辛酸氣柔溫歸心安臟除胃中熱大利病人久食可
得○韭子氣味辛甘而溫主治夢中溺血遺精 菹白辛苦而溫滑主歸骨而除寒熱瘡諸瘡風寒水腫去水氣
而溫中散結兼利病人可作美食 大蒜有毒辛溫氣味主歸五臟散癰腫蟲兼除風邪亦殺毒氣○甘蔗平清
寔有甘味下氣而利大腸和而助脾氣 乳香無毒氣味辛溫主風水腫去惡氣隱疹○李根白皮氣味大
寒奔豚消渴氣逆心煩 楮實甘寒益氣充肌陰痿水腫明目不飢○良薑無毒氣味辛溫胃中冷逆霍亂腹疼
○草果味辛性溫氣溫止嘔吐而去口臭主溫中而治腹痛 蟬蛻甘鹹氣寒無毒小兒驚癇婦人難育又治久
痢燒灰水服 穿山甲鹹微寒有毒主治五邪驚喘悲哭用方寸匕燒灰水服療蠅瘰癧及諸疔毒○石決
鹹平主治青盲目障翳痛久服益精 雞子黃甘柔春溫氣醋煮治小兒發熱產後虛利前食則煩熱可除鍊過
則嘔逆亦治○味甘氣寒惟雞子白主目熱赤痛除心下伏熱止煩滿欬逆治小兒小泄生吞治產難胞衣不出
翻漫腫黃疸○雞矢白寒主破石淋傷寒寒熱消渴轉筋利便止遺兼滅癩瘰 亂髮氣味苦而微溫止血鼻衄
咳嗽五淋二便不通小兒癇驚○羊肉大熱味苦而甘主煖中及子宮餘疾頭風汗而虛勞冷寒補中益氣驚止
心安 白馬通溫止渴無毒主治吐血下血鼻衄婦人崩中全瘡血出 獺肝氣味甘溫有毒主除魚鯁鬼疰蠱
毒兼止久嗽燒灰酒服 龜心土辛微溫無毒吐血崩中欬逆血出癰腫毒氣用醋調塗○蜘蛛微寒而有小毒
治大人小兒瘡疔音疔亦作及小兒丁癩大腹美亦作瘰癧有系 三年而不能行吸蜈蚣蜂蟻毒○粳米氣平
味苦而甘益氣止澁止渴止煩 苦精甘平主除風濕五臟可安中補氣益血延年輕身貴在久食○大藟甘溫
安胎止血又主女子帶下赤白小麴性同養精保血 苧根甘寒主貼熱丹行滯破痰胎氣可安瀝麻之汁可消
渴煩○萹荷氣味辛溫小毒中益及瘡搗汁與服 蔓青根葉氣味苦溫主利五臟益氣輕身子苦辛平常服目
明 沉香辛溫主去惡氣風水毒腫並皆能治 覆盆無毒氣味甘平令髮不白益氣輕身○銀屑辛平安臟定
神除邪止悸久服輕身

唐本草 唐蘇恭

鬱金香溫止血生肌下氣破血金瘡可醫 山楂酸冷主止水痢沫頭洗身瘡痔能治○薄荷辛溫陽寒發汗

惡氣賊風脹滿宜乳下氣消食生熱便○蒲公英甘氣平無毒乳癰水腫外封內服○椒目無毒苦味寒氣除
腹脹滿治水便利○胡椒味辛大溫無毒下氣溫中而去痰臟膽風冷皆可除○片腦辛苦微寒氣主心腹邪
風濕積聚耳聾明目去目赤翳○河包勒苦無毒而溫主下食而治冷氣並脹滿之在腹心○蘇木甘寒氣平無
毒產後血脹取濃汁服○胡黃連苦氣平無毒治骨蒸勞熱補肝胆明目療洩痢與五痔並五心煩熱而可除○
院僧辛平主治久痢面上癩野金瘡五痔○薑黃辛苦下氣破血治心腹結積疔消癰腫而除風熱○菟葵氣
味甘寒下諸石淋蛇虎諸瘡解毒止痛○三白草寒味辛而甘利大小便破癰消痰積聚水腫脚氣亦安○酢漿
酸寒主解熱渴殺諸小蟲癩瘰癧○苦葶辛溫主治乳癰風遊耳腫持敷效隆○血竭氣平甘鹹無毒心腹卒
痛金瘡血出破積去邪止痛上肉

本草拾遺 唐陳藏器

烏藥氣味辛溫無毒中惡腹痛鬼氣毒毒宿食不消天行瘧疫膀胱腎間冷氣衝突兼治婦人血氣小兒諸蟲在腹
小苗辛溫消脹下食氣結而兩肋痞滿腹冷而霍亂嘔逆○益智辛溫益氣安神小便餘滲虛漏遺精利三焦而補
不足調諸氣而固腎根○馬齒莧酸氣寒無毒止消渴而行疔癰主腫癰而治疣目○猪膽苦寒傷寒熱中數小兒
頭瘡治大便不通○山慈姑甘微辛小毒癰腫瘡癩磨醋可塗兼治癰癧面野能除○輕粉辛溫有毒主殺瘡疥癩
癰瘰癧疔瘰大腸可通○華芡辛溫下氣消食溫中補腎療陰疝瘕

藥性本草 唐甄權

神麴味辛甘溫無毒主消宿食善化水穀痰結積聚能除腹胃健脾可服○獨活苦辛諸中風濕勞損風毒奔喘
氣逆皮膚苦痒手足攣急

蜀本草 蜀韓保昇

五櫻酸溫主濕精氣止小便多脾洩下痢耐寒輕身久服有濟

開寶本草 宋馬志

何首烏苦氣溫無毒主治癰癧消癰腫毒兼療五痔風瘡帶下諸疾可除止心痛而黑髮益精髓而長筋骨久瘧

久痢是惟可服○延胡辛溫主治破血崩中淋露月閉塊積產後血症因損下血和酒煮服酒磨亦得○肉苁辛溫止洩滑脫心腹脹痛霍亂中惡鬼氣冷瘧精冷吐沫溫中消食小兒乳霍○故紙辛溫勞傷可瘳骨髓傷敗腎冷精流婦人墮胎服之無憂○白菟辛溫消殺下氣又主積冷吐逆反胃○砂仁辛溫勞虛冷痢腹中虛痛消食下氣○紅花氣溫而味辛主產後血暈口噤腹中絞痛惡血不盡能下死胎療蠱毒瘡○丁香辛溫主溫脾胃止霍亂聖胎風毒治諸種齒牙疳蟲○練豆甘寒主治丹毒煩熱風疹奔豚氣突下氣壓熱消腫解毒○五靈脂甘溫主心腹冷氣小兒五疳女子月閉治腸風而辟疫並血脉而通利○馬兜鈴苦氣寒無毒肺熱咳嗽痰結喘促兼療血痔瘰癧凡屬虛嗽勿服○沒藥苦平止痛破血金瘡杖瘡痔漏瘡癰目翳掌痛卒暴下血○使君甘溫殺蟲之劑小兒五疳白濁瀉痢○五倍酸平主肺風氣風濕癬疥齒宣疳蟲小兒面鼻疳瘡大人下血五痔○胡桃味甘兼平溫氣潤肌黑髮強健肥膩燒研可和松脂而傅瘰癧多食則利小便而去五痔○燈心甘寒主治五淋生煮服之數席尤珍○木鼈甘溫主治折傷除粉刺黥黥消結種惡瘡婦人乳癰紅腫生肌止痛尤良○元精石鹹寒春溫氣主除風冷邪氣濕痺婦人漏下心腹結聚頭痛解肌兼益精氣○仙茅有毒氣味辛溫主治腰脚風冷痺痺而不能行瘳虛勞而益陽道助筋骨而長精神○釜臍墨辛氣溫無毒吐血血暈酒水溫服主中惡蠱金瘡可塗○甘松甘溫主治惡氣心腹卒痛泄瀉下氣○三枝苦平瘳癩積聚通經墮胎止痛利氣○莢蓬氣味苦辛而溫中惡鬼症心腹痛瘳宜亂冷氣消食通經婦人血氣丈夫奔豚○青黛鹹寒主治諸熱天行頭痛熱腫節小兒驚癇金瘡下血○葶靈仙苦溫主諸風痲痺氣塊膀胱宿膿腰膝冷痛五臟宣通兼療折傷祛疫瘳功○枳椇會氣味苦寒無毒清熱殺蟲鎮心明目○蜜蒙花寒甘平無毒主治青盲赤腫淚出小兒豉豆疳氣攻目○枳椇殼苦酸重寒水氣勞氣咳嗽胸膈痰氣逆水消脹散結安胃諸風痲痺痛關節通利○然銅辛平主治傷折能破積聚止痛散血○砒石大毒氣味辛酸主治瘧疾瘳諸風瘳○骨碎補根氣味溫苦破血止血傷折能補

圖經本草 宋蘇頌

青皮氣溫苦平無毒破積下食氣滯可除○佛指甲甘氣寒微毒湯火灼傷細研可塗

花蕊石平味酸而清婦人血運金瘡出血○胡蘆巴苦無毒大溫元微虛冷勝腫飛飛腫脹面色黑青○木賊
甘苦主治目疾益肝胆而退翳膜癢腸風而消塊積又主血痢崩中白赤○銅青氣味酸平無毒能合金瘡止血明
目婦人血氣心痛狂風潮眼淚出兼治惡瘡疔瘡亦去未瘡惡肉

日華本草 宋大明

硃砂苦辛兼稟暖氣消痰止咳癢結喉痺○古錢氣味辛平有毒療風赤目翳障明目滋潤橫痃五淋燒以醋淬

本草補遺 元朱震亨

山茶花紅氣味全缺主治吐衄腸風下血

本草綱目 明李時珍

土茯苓甘溫平無毒調中止洩進食消殺兼療瘡腫拘攣筋骨○三七味甘苦溫無毒調中止洩進食消殺兼療
瘡腫拘攣筋骨○雞冠甘涼痔漏下血帶下崩痢用分赤白○山柰辛溫辟瘴暖中寒濕霍亂牙痛風蝨心腹冷
痛惡氣能攻○殺精草辛氣溫無毒主頭風痛目昏翳膜○刀豆甘平溫中下氣能止欬逆兼利腸胃○蘿蔔子
平味辛而甘下氣定喘消食治痰下痢後重瘡疹發馬○芙蓉辛平清肺涼血排膿止痛解毒散熱癰腫惡瘡大
小一切主治有效不分花葉○樟腦辛熱通關利滯霍亂心痰寒濕腳氣蝨齒疥癩殺蟲最利○孩兒茶平味苦
而澆化痰生津清上膈熱生肌定痛收濕止血用治金瘡諸瘡一切○壚甘石甘氣溫無毒止血消腫生肌明目
收濕除爛能去翳膜○豬膏甘寒主破冷結利腸胃而通小便除五疔而散宿血

和劑局方之為書也可以據證檢方即用藥不必求醫不必脩制尋賾見成丸散病痛便可安在仁民之意可謂至矣自宋迄今官府守之以為法醫門傳之以為業病者恃之以立命世人習之以成俗然予獨有疑焉何者古人以神聖工巧言醫又曰醫者意也以其傳授難的造詣雖深臨機應變如對敵之將操舟之工自非盡君子隨時反中之妙靈無愧于醫乎今乃集前人已成之方應今人無限之病何異刻舟求劍按圖索驥其偶然中難矣

或曰仲景治傷寒者三百一十三方治雜病者金匱要略曰二十有三門歷代名方汗牛充棟流傳至今明效大驗顯然耳目今吾子致疑於局方無乃失之深矣乎

予曰醫之視病問證已得病之情矣然病者一身血氣有淺深體段有上下臟腑有內外時月有久近形志有苦樂肌膚有厚薄能毒有可否標本有先後年有老弱治有五方令有四時某藥治某病某經用某藥孰為正治反治孰為君臣佐使合是數者計較分毫誤方治療貴乎適中今觀局方別無病源議論止于各方條述證候繼以藥石之分兩條製藥餌之法度而又勉其多服常服久服殊不知一方通治諸病似乎立法簡便廣給原野冀獲一二靈免許學士之謂乎仲景諸方實為世醫門之規矩準繩也後之欲為方圓平直者必于是而取則焉然猶設為問難藥作何應處以何法許學士亦曰我善讀仲景書而知其意然未嘗全用其方局方制作將擬仲景耶故不揣荒陋敢陳管見倘蒙改而正諸實為醫道之幸今世所謂風病大半與諸症證源同論治良由局方多以治風之藥通治諸症也古聖論風論症各有篇目源流不同治法亦異不得不辨接風論風者百病之長至其變化乃為他病又曰善行數變曰因于露風曰先受邪曰在腠理曰客曰入曰傷曰中歷陳五臟與胃之傷皆多汗而惡風其發明風邪係外感之病有臟腑內外虛實寒熱之不同若是之明且盡也別無癰瘰癧弱卒中不省僅仆鳴針掣縮眩暈語澀不語之文新舊所錄治風之方凡十道且即至寶丹靈寶丹論之曰治中風不語治中風語澀夫不語與語澀其可一例看乎有失音不語有舌強不語有神昏不語有口禁不語有舌縱語澀有舌麻治澀治大腸風秘秘有風熱有風虛曾謂一方可通治乎又曰治口鼻血出夫口鼻出血皆是陽盛陰虛有升無降血隨氣上越出上竅法當補陰抑

陽氣降則血歸經豈可以輕揚飛竄之腦府佐之以燥悍之金石乎又曰治皮膚燥癢經曰諸癢為虛血不榮肌膚所以癢也當與滋補藥以養陰血和肌潤癢自不作豈可以一十七兩重之金石佐以五兩重之腦府香桂而欲以一兩重之當歸和血一升之重使活血一升之生地黃汁生血夫枯槁之血果能和而生乎果能潤澤肌肉之乾瘦乎又曰治難產死胎血脈不行此血氣滯病也又曰治神昏恍惚久在床枕此血氣虛弱也夫活血以血藥治虛以補藥被燥悍香竄之劑固可以刮滯氣果可以活血而補虛乎潤澤丸等三十餘方皆曰治諸風治一切風治一應風治男子三十六種風其為主治甚為浩博且寒熱虛實判然迥別一方通治果合經意乎果能去病乎龍虎丹排風湯俱係治五臟風而排風又曰風發又似有內出之意夫病既在五臟道達而所感深一則用麻黃三兩以發其表一則用腦麝六兩以瀉其衛而謂可以治臟病乎借曰在龍虎則有寒冰石一斤以為鎮墜在排風則有白朮當歸以為補養此殆與古人輔佐因用之意合乎臟病屬裏而用發表瀉衛之藥甯不犯誅伐無過之戒乎甯不助病邪而伐根本乎骨碎補丸治肝腎風虛乳香當歸丸治體虛換腿丸治足三陰經虛或因感風而虛或因虛而感風既曰體虛肝腎虛足三陰經虛病非輕小理宜補養而自然銅半夏葶藶靈仙荊芥地龍川練馬藥防風牽牛蜜脂草烏羌活石南天麻南星續柳等疏通燥疾之藥居補劑之大半果可以補虛乎七聖散之治風濕流注活血應痛丸之治風濕客腎經汗以散風等水以行濕仲景法也觀其用藥何者為散風何者為行濕吾不得而知也三生飲之治外感風寒內傷喜怒或六脈沈伏或指下浮盛及痰厥氣虛大有神效治外感以發散仲景法也治內傷以補養東垣法也誰能易之脈之沈伏浮盛其寒熱表裏虛實之相連若水火然似難同藥痰厥因于寒或能成功血氣虛者何以救救已上諸疑特舉其顯者耳若毫分鏗析更僕未可盡也姑用真之妄言

或曰吾子謂內經風論主于外感其用麻黃桂枝馬附單將以解風寒也其用腦麝葶藶靈仙黑牽牛草將以行痰滯也子之言過矣

予應之曰風病外感善行數變其病多實少虛發表行滯有何不可治風之外何為又歷述神魂恍惚起使須人手足不隨神志昏憤癱瘓痺痺手足筋衰眩暈倒仆半身不遂腳膝緩弱四肢無力顛掉拘攣不語語澀諸痿等證悉皆治之效皆從論師批案集五臟因而受之發為痿痺心氣熱生脈虛故阻礙不任也肝氣熱生筋痿故宗筋弛縱

脾氣熱生肉痿故痺而不仁腎氣熱生骨痿故足不任身又曰諸痿皆屬于上謂之上者指病之本在肺也又曰昏惑曰癡癡曰瞽瞖曰瞽昧曰暴病曰勞胃曰眩暈曰暴瘡曰瞽瘡皆屬于火又曰四肢不舉曰古本強曰足痿不收曰疾涎有聲皆屬于土又禮記註曰魚肉天產也以養陽作陽德以為倦怠者是濕熱內傷之病當作諸痿治之何局方治風之方兼治痿者十居其九不思諸痿皆起于肺熱傳入五臟散為諸証大抵只宜補養若以外感風邪治之甯免實實虛虛之禍乎

或曰經曰諸風掉眩皆屬于肝諸暴強直皆屬于風至于掉振不能久立善暴憊仆皆以為木病肝屬木風者木之氣曰掉曰掉振非顛掉乎曰眩非眩運乎曰不能久立非筋衰乎非緩弱無力乎曰諸暴強直非不隨乎曰善暴憊仆非倒仆乎又曰瞽瞖曰瞽昧曰暴病曰勞胃眩暈暴瘡曰瞽瘡與上文所謂屬肝屬風屬木之病相似何為皆屬于火曰古本強曰疾涎有聲何為皆屬于土痿論俱未嘗言及而吾子合火土二家之病而又與倦怠並言總作諸痿治之其將有說以通之乎

予應之曰按原病式曰風病多因熱甚俗云風者言末而忘其本也所以中風而有癱痿諸證者非謂肝木之風實甚而卒中之也亦非外于中風良由將息失宜腎水虛甚則心火暴盛水不制火也火熱之氣熖鬱神明昏弱骨不用而卒倒無所知也亦有因喜怒思悲恐五志過及而卒中者五志過熱甚故也又原病曰脾之脈連舌本散舌下今脾臟受邪故舌強又河間曰謂腦熱甚火氣炎上傳化失常故津液涌而為痰涎潮上因其稠黏難出故作聲也一以屬脾一以為胃熱謂之厲火與土不亦宜乎雖然歧伯仲景孫思邈之言風大意似指外邪之感則河間之言風明指內傷熱證實與痿論所言諸痿生于熱相合外感之邪有寒熱虛實而挾寒者多內傷之熱皆是虛證無寒可散無實可瀉局方本為外感立方而以內傷熱證同出治其為害也似非細故

或曰風分內外痿病因熱既得聞命矣手陽明大腸經肺之腑也足陽明胃經脾之腑也治痿之法取陽明一經此引而未發之言願明以告我

予曰諸痿生于肺熱只此一旬便見治法大意經曰東方實西方虛瀉南方補北方此固是就生剋言瀉瀉而大經大法不外于此東方木肝也西方金肺也南方火心也北方水腎也五行之中惟火有二腎雖有二水居其一陽常

有餘陰常不足故經曰一水不勝二火理之必然肺全體燥而居上主氣畏火者也脾土性濕而居中主四肢畏木者也火性炎上若嗜欲無節則水失所養火寡于畏而侮所勝肺得火邪而熱矣木性剛急肺受熱則金失所養木寡于畏而侮所勝脾得木邪而傷矣肺熱則不能管攝一身脾傷則四肢不能為用而諸痿之病作焉南方則肺金清而東方不實何脾傷之有補北方則心火降而西方不虛何肺熱之有故陽明實則宗筋潤能束骨而利機關矣治痿之法無出于此駱隆吉亦曰風火既熾當滋腎水東垣先生取黃蘗為君黃芩等補藥之輔佐以治諸痿而無一定之方有兼痰積者有濕多者有熱多者有濕熱相半者有扶氣者臨病製方其善于治痿者乎雖然藥中肯綮矣若將理夫宜聖醫不治也天產作陽厚味發熱先哲格言但是患痿之人若不淡薄食味吾知其必不能安全也或曰小續命湯與要略相表裏非外感之藥乎地仙丹治勞傷腎虛非內傷之藥乎其將何以議之

予曰小續命湯比要略少當歸石膏多附子防風防已果與仲景意合否也仲景謂汗出則止藥局方則曰久服差又曰久病風陰晦時更宜與又曰治諸風似皆非仲景意然麻黃防已可久服乎諸風可通治乎地仙丹既曰補腎而滋補之藥與僭燥走竄之藥相半用之賢愚燥而謂可以補腎乎僭曰足少陰經非附子輩不能自達八味丸仲景腎經藥也八兩地黃以一兩附子佐之觀此則是非可得而定矣非吾之過論也

又觀治氣一門有曰治一切氣冷氣滯氣逆氣上氣用安息香丸丁沈丸大沉香丸蘇子丸勻氣散如神丸集香丸白沉香丸煨姜丸鹽煎散七氣湯丸痛溫白丸生薑湯其治嘔吐膈噎也用五膈丸五膈寬中散膈氣散酒癩丸草豆蔻丸檀氣丸人參丁香散其治吞酸也用丁沉煎丸小理中丸其治痰飲也用倍木丸消飲丸溫中化痰丸五苓丸且于各方條下或曰口苦失味曰噎酸曰古澀曰吐清水曰痞滿曰氣急曰胸下急痛曰五心中熱口爛生瘡皆是明著熱證何為卒用熱藥夫周流于人之身以為生者氣也陽往則陰來陰往則陽來一升一降無有窮已苟內不傷于七情外不感于六淫其為氣也何病之有今曰冷氣滯氣逆氣上氣皆是肺受火邪氣得炎上之化有升無降薰蒸清道甚而至于上焦不納中焦不化下焦不濡轉傳變為嘔為吐為膈為噎為痰為飲為翻胃為吞酸夫治寒以熱治熱以寒此正治之法也治熱用熱治寒用寒此反佐之法也許味前方既非正治又非反佐此愚之所以不能無疑也謹按原病式曰諸嘔吐酸昏屬于執諸積飲痞膈中滿皆屬于濕諸氣逆衝上嘔涌溢食不下皆

屬于火諸堅痞脹滿急痛吐腥穢皆屬于寒深吳仲景之意金匱要略曰胸痹病胸背痛括薑蘆白湯主之胸痹心痛微背括薑蘆白半夏湯主之心下痞氣氣結在胸膈下上逆搶心者枳實括薑蘆白桂枝湯主之嘔而心下痞者半夏瀉心湯主之乾嘔而利者黃芩加半夏生姜湯主之諸嘔吐數不得入者小半夏湯主之嘔吐病在膈上者豬苓湯主之胃反嘔吐者半夏參蜜湯主之食已即吐者大黃甘草湯主之胃反吐而渴者茯苓澤瀉湯主之吐後欲飲者文蛤湯主之病似嘔不嘔似噦不噦心中無奈者姜汁半夏湯主之乾嘔手足冷者陳皮湯主之噦逆者陳皮竹如湯主之乾嘔下痢者黃芩湯主之氣衝上者皂莢丸主之上氣脈浮者厚朴麻黃湯主之上氣脈沉者澤漆湯主之大逆上氣者麥門冬湯主之心下有痰飲胸膈支滿目眩茯苓桂枝湯主之短氣有微飲當從小便出之宜茯苓桂朮甘草湯腎氣丸亦主之病者脈伏其人欲自利者反快雖利心下續堅滿者此為流飲欲去故立甘遂半夏湯主之病懸飲者十棗湯主之病溢飲者當發其汗宜小青龍湯又宜用小青龍湯心下有支飲其人若胃脘漉瀉湯主之支飲胸滿者厚朴大黃湯主之支飲不得息者厚大棗瀉肺湯主之嘔家本渴今反不渴心下有支飲故也小半夏湯主之卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸者小半夏加茯苓湯主之假令瘦人臍下有悸者吐涎沫而頭眩水也五苓散主之心胸有停痰宿水自吐水後心胸間虛氣滿不能食消痰氣令能食茯苓飲主之先渴後嘔為水停心下此屬飲家半夏加茯苓湯主之觀其微意可表者汗之可下者利之滯者導之鬱者揚之熱者清之寒者溫之偏寒偏熱者反佐而行之扶濕者淡以滲之扶虛者補而養之何嘗例用辛香燥熱之劑以火濟之火實實虛虛咎將誰執

或曰脈訣謂熱則生風冷生氣寒主收引今冷氣上衝矣氣逆矣氣滯矣非冷而何吾子引仲景之言而斥其非然則諸氣諸飲嘔吐反胃吞酸等病將無寒證耶

予曰五臟各有火五志激之其火隨起若諸寒為病必須身犯寒氣口得寒物乃為病寒非若諸火病自內作所以氣之病寒者十無一二

或曰其餘痰氣嘔吐吞酸噎膈反胃作熱作火論治於理可通若病人自言冷氣從下而上者非冷而何

予曰上升之氣自肝而肺中扶相火自下而出其熱為甚自覺其冷非真冷也火極似水積熱之甚陽亢陰微故見

此證冷生氣者出高陽生之謬言也若病果因感寒當以去寒之劑治之何至例用辛香燥熱為方不知權變蓋不
悞人

或曰氣上升者皆用黑錫丹查正丹養氣丹等藥以為鎮降然服之者隨手得效吾子以為熱甚之病亦將有悞
耶

予曰相火之外又有臟腑厥陽之火五志之動各有火起相火者此經所謂一水不勝二火之火出于天道厥陽者
此經所謂一水不勝五火之火出于人欲氣之升也隨火炎上升而不降孰能禦之今人欲借丹劑之重降而降之
氣鬱為濕痰丹性熱燥濕痰被劫亦為暫開所以清快丹藥之法偏助狂火陰血愈耗其升愈甚俗人喜溫迷而不
返被此禍者滔滔皆是

或曰丹藥之降欲降而升然則如之何則可

予曰投以辛涼行以辛溫制伏肝邪治以鹹寒佐以甘溫收以苦甘和以甘淡補養陰血陽自相附陰陽比和何升
之有先哲格言其則不遠吾不贅及

或曰吐酸素問以為熱東垣又言為寒何也

予曰吐酸與吞酸不同吐酸是吐出酸水如醋平時津液隨上升之氣鬱積而成鬱積之久濕中生熱故從火化逆
作酸味非熱而何其有積之于久不能自涌而出伏于肺胃之間略不得上熱不得下肌表得風寒則內熱愈鬱而
酸味刺心肌表溫暖腠理開發或得香熱湯丸津液得行亦得暫解非寒而何素問言熱者言其本也東垣言寒者
言其末也但東垣不言外得風寒而作收氣立說欲瀉肺金之實又謂寒藥不可治酸而用安胃湯加減二陳湯俱
犯丁香且無治熱濕鬱積之法為未合經意予嘗治吞酸用黃連菜羹各製炒隨時令送為佐使蒼朮茯苓為主病
湯浸炒餅為小丸吞之仍教以粗食蔬菜自養則病易安

或曰蘇合香丸雖是類聚香藥其治骨蒸瘰癧月閉狐狸等病吾子以為然乎

予曰古人製方用藥羣隊者必是攻補兼施彼此相制氣味相次孰為主病孰為引經或用正治或用反佐各有意
義今方中用藥一十五味除白朮砂訶子共六兩其餘一十三味共二十一兩皆是性急輕靈之劑往往用之于

氣病與暑併昏昧之人其衝突經絡滲湯氣血枯槁枯拉朽然不特此也至如單豆蔻散教人于夏月涼煎以代熱水夫草豆蔻性大熱去寒邪夏月有何寒氣而欲多服縮脾飲用單果亦是此意且夏食寒所以養陽也單豆蔻草果其食寒之意乎不特此也抑又有甚者焉接氣丹曰陽氣暴絕當是陰先虧陰先虧則陽氣無所依附遂致飛越而暴絕也上文乃曰陰氣獨盛陰氣若盛陽氣為有暴絕之理假令陽氣暴絕宜以滋補之劑保養而鎮靜之庶乎其有合夏食寒以為養陽之本何至又服辛香燥熱之劑乎且此丹下咽暴絕之陽果能接乎孰為是若君其質之或曰局方言陰勝陰邪盛也陰邪既盛陽有暴絕之理予之所言與陽氣相對待之陰也果有陰虧而陽勝者吾子其能救之乎

予曰陰陽二字固以對待而言所指無定在或言寒熱或言血氣或言臟腑或言表裏或言動靜或言虛實或言清濁或言奇偶或言上下或言正邪或言生殺或言左右求其立言之意當是陰鬼之邪耳陰鬼為邪自當作邪鬼治之若陰先虧而陽暴絕者當治一人矣浦江鄭兄年近六十奉養受用之人也仲夏久患滯下而又犯房姦忽一晚正走廁間兩手舒撒兩眼開而無光尿自出汗如雨喉如拽鋸呼吸甚微其脈大而無倫火無部位可畏之甚余適在彼急令煎人參膏且與艾氣海穴艾炷如小指大至十八壯右手能動又三壯脅微動參膏亦成遂與一盞至半夜後盡三盞眼能動盡二斤方能言而索粥盡五斤而利止十斤而安

乎

或曰諸氣諸飲與嘔吐吞酸膈噎及胃等證局方未中肯綮我知之矣然則要略之方果足用乎抑猶有未發者乎

予曰天地氣化無窮人身之病亦變化無窮仲景之書載道者也醫之良者引例推類可謂無窮之應用借令略有加減脩合終難踰越矩度夫氣之初病也其端甚微或因些少飲食不詳或外冒風雨或內感七情或食味過厚偏助湯氣積成膈熱或資稟充實表密無汗或性急易怒火炎上以致津液不行清濁相干氣為之病或痞或痛不思食或噎腐氣或吞酸或嘈雜或膨滿不求原本便認為寒速以辛香燥熱之劑投之數帖時暫得快以為神方厚味仍前不節七情反復相仍舊病被劫暫開濁液易于攢聚或半月或一月前益復作如此延蔓自氣成積自積成痰此為痰為飲為吞酸之由也良工未遇終藥又行又扶痰涎遂成痰囊此為痞為痛嘔吐為噎膈反胃之次第也飲

食湯液滯流不行滲道寒澀大便或秘或澹下失傳化中焦愈停鬱者不察猶執為冷翻思前無隨手得快至此實
主皆根藥欠燥熱顯伺久服可以溫脾壯胃消積行氣以薑一且竅然之效不思胃為水穀之海多血多氣清和則
能受脾為消化之氣清和則能運今反得香熱之偏助氣血沸騰其始也胃液凝聚無所容受其久也脾氣耗散傳
化漸逆其有胃熱易饑急于得食脾傷不磨鬱積成痛醫者猶曰虛而積寒非尋常草木可療徑以烏附助佐丹劑
專意服餌積而久也血液俱耗胃脘乾槁其槁在上近咽之下水飲可行食物難入間或可入亦不多名之曰噎其
槁在下與胃為近食雖可入難盡入胃良久復出名之曰膈亦曰反胃大便秘少若羊矢然名雖不同病出一體要
略論飲有六曰痰飲懸飲溢飲支飲留飲伏飲分別五臟請證治法至矣盡矣第恨醫者不善處治病者不守禁忌
遂使藥助病邪展轉深痼去生漸遠深可痛哉

或曰千金諸方治噎膈反胃未為廢姜桂等劑何吾子之多言也

予曰氣之鬱滯久留清道非借香熱不足以行然患有大黃石膏竹茹芒硝澤瀉前胡朴硝茯苓菴菴根括蕪等
藥為之佐使其始則同其終則異病邪易伏其病自安

或曰胃脘乾槁者古方果可治乎將他有要捷之法者或可補前人之未發者乎

予曰古方用人參以補肺御米以解毒竹瀝以消痰乾姜以養血粟米以實胃蠶水以潤燥姜以去穢正是此意旋
雖岑亦曰噎當是神思間病惟內觀自養可以治之此言深中病情而施治之法亦為近理夫噎病生于血乾夫血
陰氣也陰主靜內外兩靜則臟腑之火不起而金水二氣有養陰血自生腸胃津潤傳化合且何噎之有因屬類而
長曾製一方治中年婦人以四物湯加和白陳皮留尖桃仁生甘草酒紅花濃煎入驢尿飲以治其或生蟲也與數
十貼而安又台州治一匠者年近三十勤于工作而有父妻且喜酒其面白其脈澁重則大而無力令其辭去工作
卧于牛家取新溫牛乳細飲之每頓進一杯一晝夜可飲五七次盡卻食物以漸而至八九次半月大腸潤月餘而
安然或口乾蓋酒毒未解間飲甘蔗汁少許

或者又曰古方之治噎膈反胃未有不宣寒者予何不思之甚

予曰古人著方必為當時抱病者設也其人實困于寒故用之而得效後人遂錄以為今式不比局方泛編成書使

天下後世之人凡有此證者幸遵守以為之定法而專以香熱為用也雖然按寒者亦或有之但今人之染此病幸
因痰氣久停醫藥停變而成其為無寒也明矣

或曰治脾腎以溫補藥豈非局方之良法耶吾子其將何以議之

予曰選言消亂必折諸聖稿恐脾腎有病未必皆寒觀其養脾丸治脾胃虛冷體倦不食嘉禾散治脾胃不和不能
多食消食丸治脾胃俱虛飲食不下小獨聖丸治脾胃不和不思飲食大七香丸治脾胃虛不思飲食連翹丸治
脾胃不和飲食不下分氣紫蘇飲治脾胃不和本香餅子治脾胃虛寒溫中良姜丸曰溫脾胃奪命抽刀散曰脾胃
冷燒脾散曰脾胃虛連食散曰脾胃虛冷不思飲食丁香煮散曰脾胃寒二姜丸曰養脾胃姜合丸曰脾胃久
虛蓮煎丸曰脾胃虛弱守金丸曰脾胃虛冷集香丸曰脾胃不和蟠葱散曰脾胃虛冷壯脾丸曰脾胃虛弱人參丁
香散曰脾胃虛弱人參者散曰脾胃不和丁香透膈湯曰脾胃不和丁香五香丸曰脾胃虛弱膈膈膈丸之壯氣暖
腎兜然子丸之治腎虛金釵石斛丸之治氣不足茵香丸之治臟虛冷玉霜丸之治氣虛安腎丸之治腎精寒麝香
鹿茸丸之益氣養正丹之治諸虛朴附丸之治脾胃虛弱接氣丹之治真氣虛四神丹之治五臟沉香鹿茸丸之治
氣不足椒附丸之溫五臟從蓉大補丸之治五臟元氣虛鍾乳白澤丸之治諸虛三建湯之治氣不足甚者類聚丹
劑悉曰補脾胃溫脾胃補腎補五臟補真氣而各方條下曰古苦曰面黃曰古苦無味曰中酒吐酒曰酒積曰酒癖
曰飲酒多曰酒過傷曰氣促喘急曰口淡曰古濕曰噎醋曰舌乾曰溺數曰水道澀痛曰小便出血曰口苦曰咽乾
曰氣促曰盜汗曰失精曰津液內燥曰氣上衝曰外腎痿曰枯槁失血曰口骨乾燥曰喘滿曰肢體煩疼曰衄血曰
小便淋瀝者是明其熱證如何類聚燥熱而謂可以健脾溫胃而滋腎補氣乎經曰熱傷脾常服燥熱而不傷脾乎
又曰腎惡燥多服燥熱而不傷腎乎又曰熱傷氣久服燥熱而不傷氣乎又曰用熱速熱又曰有熱者寒而行之
此教人用熱藥之法蓋以熱藥治寒病句無寒藥為之嚮導佐使則病拒藥而扞格不入謂之速熱者行之有寒也
兩句同一意思後人不識此理故重言以明之今局方辛香燥熱以類而聚未嘗見其所謂速熱也用熱而不速熱
非惟不能中病抑且正氣先傷醫云乎哉夫良醫之治病必先求其得病之因其虛邪也當治其母實邪也當治其
子微邪也當治其所勝賊邪也當治其所不勝正邪也當治其本經索邪又謂雜合受邪病者所受非止一端又須

察其有無雜合之邪輕重較量視標本之緩急以為施治之先後今乃一切認為寒冷吾不知脾胃與腎一向口是寒冷為病耶論方至此雖至愚昧不能不致疑也吾又改之要略矣諸嘔吐不得入者小半夏湯主之痙病寒熱不食食則頭眩心中不安者茵陳湯主之身腫而冷胸室不能食病在骨節發汗則安心胸停痰吐水虛滿不能食者茯苓湯主之中風手足拘急惡寒不欲飲食者三黃湯主之下利不欲飲食者大承氣湯主之五勞虛極羸瘦不能食者大黃廬蝨丸主之虛勞不足汗出而悶脈結心悸者炙甘草湯主之虛勞腰痛小腹拘急者八味丸主之虛勞不足者大薯蕷丸主之虛勞虛煩不得眠者酸棗仁湯主之夫嘔者胸滿者吐水者下利者惡寒者腫而冷者不能飲食者虛勞羸瘦者虛勞汗而悸者虛勞而腰痛者虛勞不足者虛勞煩而不眠者自局方之法觀之蓋不認為寒冷而以熱藥行之乎仲景施治則不然也痰者導之熱者清之積者化之濕者溼之中氣清和自然安裕虛者補之血凝者散之躁者益之熱者和之陰氣清溫何虛勞之有也

或曰傷寒一門雖取雜方仲景之法亦摘取之矣吾子其忘言乎

予曰傷寒之法仲景而下發明殆盡局方是否愚不必贅雖然仲景論傷寒矣而未及乎中寒先哲治胃大寒而昏中者用附子理中湯而安其議無則得之矣曰傷曰中未聞有議其意同之者予使而思之傷寒有即病有不即病必大發熱病邪循經而入以漸而深中寒則倉卒感受其病即發而暴傷寒之人因其舊有鬱熱風寒外邪肌腠自密鬱發為熱其初也用麻黃桂枝葶藶微表而安以病體不甚虛也中寒之人乘其腠理疎豁一身受邪難分經絡無熱可發溫補自解此謂氣之大虛也傷寒熱雖甚不死中寒若不急治去生甚速其虛實蓋可見矣

或曰脾胃一門子以局方用藥太熱未合經意若平胃散之溫和可以補養胃氣吾子以為何如

予曰蒼朮性燥氣烈行溫解表甚為有力厚朴性溫散氣非脹滿實急者不用承氣用之可見矣雖有陳皮甘草之甘緩甘辛亦是決烈耗散之劑實無補土之和經謂土氣太過曰敗草亦能為病况胃為水穀之海多氣多血故因其病也用以瀉有餘之氣使之平爾又雖察其扶寒得寒物者投之胃氣和平使瀆卻無謂之平者非補之之謂其可常服乎

或曰調胃承氣亦治胃病謂之調者以與平胃散之平意義相近何用藥之相遠也

予曰調味承氣治熱中下二焦藥也經曰熱淫于內治以酸寒佐以苦甘功在乎導利而行之以緩平胃散止治濕上焦之藥也經曰濕上甚而熱治以苦溫佐以甘辛以汗為效而止

或曰治濕不利小便非治也非仲景法耶何子言之悖也

予曰淡滲治濕以其濕在中下二焦今濕在上宜以微汗而解不欲汗多故不用麻黃乾葛草

或曰局方用藥多是溫補或以為未合中道積熱癘冷二門其制作其取用吾子其無以議之矣

予曰張仲景言一百八病五勞七傷與婦人共三十六病孫真人言四百四病凡遇一病須分寒熱果寒耶則熱之果熱耶則寒之寒甚甚耶則反佐而制之今列病之目僅十有餘而分積熱癘冷兩門何不思之甚也要略中風脈緊為寒浮為虛肺痿吐涎不能飲不渴必遺溺此為肺中冷甘草乾姜湯溢之腹滿痛時減如故此為寒宜溫之下利欲噎不能此腹中寒也腸下偏痛脈弦緊此寒也宜大黃附子細辛湯溢之痰飲脈弦者寒也黃疸發熱煩喘胸滿口燥又被大劫其汗病從濕得身盡熱而黃此熱在內宜下之下利脈數而渴設不差則清膿血以其有熱也婦人能食病七八日而更發熱者此為胃實氣熱宜大承氣下之產後七八日若太陽證小便堅滿此惡露不盡不大便四五日發熱晡時煩燥食則妄言此熱在表結在膀胱宜大承氣利之安婦人或中風或傷寒經水適來適斷有寒熱皆為熱入血室今局方不曾言病而所謂寒與熱者其因何在甚病何名果寒雜合所受邪果無時令資稟之當擇耶據外證之寒熱而遂用之果無認假為其耶果以是為非也

或曰以寒熱為篇目固未合經意若其諸方果有合乎

予曰有積熱為篇目固可有議若諸方之制作取用儘有妙理吾其為子發明前人之意恐可為用者涓埃之助夫紫雪者心脾肝胃經之藥也通中散洗心散表裏血氣之藥也涼膈散心脾脾胃之藥也龍腦散子勝冰丹珍珠散靈液丹上中二焦之藥也碧雲雞蘇丸三黃丸八正散三焦藥也甘露丸心脾肺之藥也涼膈丸心脾胃之藥也抱龍丸麥門冬散心脾肝之藥也妙香丸疏快腸胃制伏木火藥也甘露飲心脾胃藥也五淋散血而裏藥也消毒飲氣而表藥也麻仁丸氣而裏藥也導赤丸氣與血而裏藥也導赤散心小腸藥也有升有降有散有補有滲導有驅逐有因用有引經或緩之以甘或收之以酸或行之以香或因之以蠟或燥之以苦觀其立方各有所主用方之

人宜求其意若夫痼冷門尤有可議者冷即寒也內經以寒為殺厲之氣今加痼于冷之上豈非指身惡寒而且喜熱之病耶若以此外証使認為痼冷宜乎身英公之常餅烏附常御綿帳不知濕痰積中抑遏陽氣不得外泄身必惡寒經曰元則害承乃制又劉河間曰火極似水故見此証當治以鹹寒佐以甘溫視標之先後正邪之虛實孰緩孰急為之正法何至類用烏附丹劑借燥之藥抱薪救火屠劍何異古人治戰慄有以大承氣湯下之而愈者惡寒戰慄明是熱證亦是因久服熱藥而得之者但有虛實之分耳進士周本道年近四十得惡寒証服附子數日而病甚求余治診其脈弦而似緩遂以江茶入姜汁香油些少吐痰一升許減綿大半又與道聖散去麻黃大黃芒硝加當歸地黃百餘貼而安又一色目婦人年近六十六月內常覺惡寒戰慄喜吹熱御綿多汗如雨其形肥臃厚已得附子二十餘但渾身癢甚兩手脈沉瀉重取稍大知其熱甚而血虛也以四物湯去川芎倍地黃加白朮黃芪炒藥生甘草人參每貼二兩重方與一貼腹大泄目無視口無言予知其病熱深而藥無反佐之過也仍取前藥煎炒與之蓋借火力為嚮導一貼止四貼精神回十貼病全安又蔣氏婦年五十餘形瘦面黑六月喜熱惡寒兩手脈沉而瀉重取似數以三黃丸下以姜汁每三十粒三十貼微汗而安彼以積熱痼冷為叙方之篇目其得失可知矣

泄痢一門其用鍾乳健脾丸朝真丸駐車丸呵梨勒丸大濕脾丸黃連阿膠丸胡粉丸桃花丸呵梨勒散木香散七葉湯赤石脂散養臟湯御米湯金粟湯狗頭骨丸豆蔻丸肉豆蔻散三神丸丁香豆蔻散止瀉丸皆用熱藥為主治以溫藥為佐使當為腸虛感寒而成瀉痢者設也彼瀉痢者將無熱証耶村無積滯耶內經曰春傷于風下為膿血多屬滯下夫瀉痢証其類尤多先賢曰濕多成瀉此確論也曰風曰濕固不可得而通治矣况風與濕之外人有雖合受邪似難例用溫熱之劑今方中書証有兼治暑急者有兼治後重者有兼治暑急後重者此豈非滯下之病乎今瀉利與滯下滾同論治寧覺虛虛之患將不俟終日矣

或曰然則瀉利與滯下為病不同治法亦別吾子其能通之乎

予曰經曰暴注下迫皆屬于熱又曰暴注屬于火又下痢清白屬于寒熱若火之氣熱相火之氣寒寒水之氣傷火熱者二屬水寒者一瀉痢一証似乎屬熱者多屬寒者少詳玩局方專以熱濕為用若用之于水痢清白而屬于寒者斯可矣經所謂下迫者即暑急後重之謂也其病屬火相火所為其毒甚于熱也設以濕熱非殺之而何謹按仲

之法謂下痢脈滑而數者有宿食當下之下痢脈遲而滑者實也痢為未成急下之下痢脈反滑當有所去下之
安下痢不欲食有宿食者當下之痢腹滿痛為寒為實當下之下痢腹堅實當下之下痢語有燥矢當下之下痢
二部皆平按之心下緊急下之下痢已差至其時後發者此為下未盡更下之安下痢脈大浮弦下之當自愈感寒
下者不可下下後心下堅痛脈遲此為寒宜濕之脈浮大此為虛強下之故也設脈浮革者因而腸鳴當溫之下痢
脈遲緊痛未欲止當濕之下痢心痛急當散重可與理中四逆附子輩下痢大孔痛宜濕之劑仲景可下有十法可
溫者五法謂之下者平用承氣加減何嘗以砒丹巴硃決裂燥熱重毒之劑謂之溫者率用姜附為主何嘗用鍾乳
龍骨石脂粟殼緊溫燥毒之劑

或曰可下者豈非腸胃有積滯乎不用砒丹巴硃惡積滯未易行也吾子以為未然幸發明承氣之意可乎

予曰大黃之寒其性善走位以厚朴之溫善行滯氣緩以甘草之甘飲以湯液灌滌腸胃液潤輕快無所留滯積行
即止砒丹巴硃毒熱劑成丸藥其氣凶暴其體重滯積垢雖行毒氣未過譬如強暴貪賊手持兵刃其可使之
徘徊瞻顧於堂冥間乎借使有愈病之功其腸胃清淳之氣能免旁損暗傷之患乎仲景治痢可溫者溫可下者下
或解表或利小便或待其自己區別易治難治不治之證至為詳密然猶與滯下深同立方命論其後劉河間分別
在表在裏扶風挾濕挾熱挾寒挾虛明著經絡誤防傳變大概發明滯下證治尤為切要和血則便濃自愈調氣則
後重自除此實盲者之日月聾者之雷霆也

或曰局方治法將終不能彷彿仲景之方耶

予曰圓機活法內經且舉與經意合者仲景之書也仲景因病以製方局方製方以俟病若之何其能彷彿也宋命
近臣學校方書彼近臣者術業素甚居養不同焉知為醫之事哉雖然知尊仲景矣亦未嘗不欲效之也徒以捧心
效西施爾觀桃花丸一方可見矣即要略桃花湯也仲景以治使膿血用赤石脂完者乾姜枳米同煮作湯一飲病
安使止後藥意謂病屬下焦血虛且寒非乾姜之溫石脂之澀且重不能止血枳米味甘引入腸胃不使重澀之體
少有凝滯故煮成湯液藥行易散餘毒亦無局方不知深意不造妙理但取易于應用喜其性味溫補借為止瀉良
方改為丸藥劑以麪糊日與三服其果能與仲景之意合也

或曰河間之言滯下似無扶虛扶寒者然乎否乎幸明以告我

予曰泄痢之病水穀或化或不化並無勞瘁惟覺困倦若滯下則不然或膿或血或膿血相雜或腸垢或無糟粕或糟粕相混雖有痛不痛大病之異然皆裏急後重逼惱人攻之于經察之于證似乎皆熱證實證也余近年涉滯亦有大虛大寒者不可不知敢率其略以備采覽余從叔年踰五十夏間患滯下病腹微痛所下褐色後重頻併飲食大減時有微熱察其脈皆弦而濡似數而稍長却喜不甚浮大兩手相等視其神氣大減余曰此非滯下憂慮所致心血虧脾氣弱耳遂與參朮為君當歸身陳皮為臣川芎炒白芍藥茯苓為佐使時暄熱甚加少黃連與兩日而安梅長官年三十餘奉養厚者夏秋間患滯下腹大病有人教服單煮乾姜與一貼痛定少頃又作又與又定由是服乾姜至三斤八日後予視之左脈弦而稍大似數右脈弦而稍大減亦似數重取之似緊余曰此必醉飽後吃寒冷太過當作虛寒治之因其多服乾姜遂教四物湯去地黃加人參白朮陳皮酒紅花茯苓桃仁煎入生薑汁飲之至一月而安金氏婦年近四十秋初尚熱患滯下腹但隱痛夜重于晝全不得睡食亦稍減口乾不飲已得治痢靈砂二貼矣余視之兩手脈皆濡且不勻神思倦甚飲食全減因與四物湯倍加白朮為君以陳皮佐之與十數貼而安此三病者若因其逼迫而用峻劑豈不悞人

或曰局方諸湯可以清痰可以消積可以快氣可以化食口鼻既宜胸膈亦舒平居無事思慮預防非方之良者乎

予曰清香美味誠足快意揆之造化恐未必然經曰陰平陽秘精神乃治氣為陽宜降血為陰宜升一升一降無有偏勝是謂平人今觀諸湯非豆蔻縮砂乾姜良姜之辛宜于口非丁香沈檀蘇桂之香宜于鼻和以酸鹹甘淡其將何以悅人奉養之家閑佚之際主者以此為禮賓朋以此取快不思香辛升氣漸至于散積濕成熱漸至鬱火甘味戀腸漸成中滿脾主中州本經自病傳化失職清濁不分陽亢于上陰微于下謂之陰平可乎謂之陽秘可乎將求無病適足生病將求取藥反成受苦經曰久而增氣物化之常氣增而久天之由也其病可勝言哉

或曰舍利非諸湯之類乎其香辛甘酸治有甚焉何言論弗之及也

予曰謂之舍利則者皆取時果之液煎然如飴而飲之甚香調以沸湯南人因名之曰煎味雖甘美性非中和

且如金櫻煎之類小使杏煎楊梅煎蒲桃煎櫻桃煎之發胃火積而久濕熱之禍有不可勝言者僅有金櫻煎之類
毒可以解渴其餘味之美者並是嬉笑作罪然乎否乎

或曰婦人一門無非經候胎產帶下用藥溫煖于理頗通吾子其無志此乎

予曰婦人以血為主血屬陰易于虧欠非善調攝者不能保全也餘方是否姑用置之若神仙聚寶丹則有不能忘
言者其方治血海虛寒虛熱盜汗理宜補養琥珀之燥麝香之散可以用乎而色瘰黃肢體浮腫理宜導濕乳香沒
藥固可治血可以用乎胎前產後虛實不同逐敗養新攻諸難並積塊堅癥赤白崩漏宜于彼者必防于此而欲以
一方通治乎世人以其貴細溫平又喜其常服可以安神去邪令人有子殊不知積溫成熱香散氣服者無不被
禍自非五臟能言醫者終不知覺及至變生他病何曾歸咎此丹余姪女形色俱實以得子之速服此藥背上發癩
蓋候甚危余診其脈散大而濇急以加減四物湯百餘貼補其陰血幸其質厚易于收效實之薄者悔將何及若五
積散之治產後餘血作痛則又有不能忘言者以蒼朮為君麻黃為臣厚朴枳殼為佐雖有芍藥當歸之補血僅及
蒼朮三分之一且其方中言婦人血氣不調心腹搗痛閉而不行並宜服之何不思產後之婦有何寒邪血氣未充
實難發汗借曰推陳致新藥性溫和宜可借用麻黃之散附以蒼朮枳朴虛而又虛禍不設踵率爾用藥不思之甚
或曰初產之婦好血已虧瘀血尚留黑神散非藥散

予曰至哉坤元萬物資生理之常也初產之婦好血未必虧汚血未必積臟腑未必寒何以藥為飲食起居加調
其何痛之有誠有汚血體怯而寒與之數貼亦自爾使或有他病當求病起何因病在何經氣病治氣血病治血寒
者溫之熱者清之熱者行之虛者補之血多者止之何用海製此方不恤無病生病彼黑神散者用乾姜當歸之溫
熱黑豆之甘熱地黃之微寒以補血之虛佐以炒蒲黃之甘以防出血之多芍藥之酸寒有收有散以為回藥之助
官桂之大辛熱以行滯氣推瘀血和以甘草之緩其為取用似乎精密然驅逐與補血似難同方施治設有性急者
形瘦者本有怒火者夏月坐草者時有火今姜桂皆為禁藥論語未達之戒不知承執其咎至于將提之法尤為悖
理肉汁發陰經之火易成內傷之病先哲具有訓戒胡為以羊羶濃汁作糜而又常服當歸丸當歸建中湯四順理
中丸雖是滋補志犯桂附乾姜倍熱之劑臟腑無寒何處消受若夫兒之初生母腹頃寬使啖單子且吃火鹽不思

離子難化火鹽發熱屢轉為病醫者不識每指他證率備用藥寧不快人余每見產婦之無疾者必教以却去黑神散與夫離子火鹽諸般肉食且以白粥將理間以些少石首蒸煮令甘淡食之至半月以後方與少肉若離子亦須豁開淡煮大能養胃却疾彼富貴之家驕妾之婦卒有白帶頭風氣痛膈滿痰逆口乾經水不調髮脫體熱皆是陽勝陰虛之病天生血氣本自和平曰勝曰盛又焉知非此等謬妄有以啟之耶

金匱醫著建中湯

大補十全散勞

芎藭湯

治勞復參門冬湯

生地黃黃連湯

萬病紫苑丸

八物定志丸

海藏大五補丸

調胃白朮澤瀉散水

苦楝丸

三焦熱 三焦寒

活人敗毒散溫

掌中金散

地骨皮枳殼散煎

千金種子法

大建中湯

易簡胃風湯煎

蜜酒

海藏五飲湯

增損理中丸結

理中湯加減例

潔古天麻丸中風

清心丸熱

四物六合諸方

喉閉不救方

發斑諸藥附

三陽頭痛

龍腦蘇丸上焦

易簡芎歸湯血

搐鼻香子宮冷

易簡杏子湯水

千里散

易老門冬飲子

海藏大已寒丸

易簡參蘇飲煎

平胃散加減例

大效牡丹皮散血

火府丹下

海藏當歸丸三陰

極濟換骨丹

蒸病五蒸湯

發黃茵陳蒿加減例

黃耆膏子同

三奇六神補法

傷寒不可汗不可下不可吐諸證

大發春宜吐夏宜汗秋宜下凡用藥汗及吐下湯劑皆中病即止

若少陽病脈微不可發汗亡陽故也宜附子湯 若陽已虛尺中弱瀉者復不可下之宜小柴胡湯 若動氣在左在右在上在下並不可發汗宜柴胡桂枝湯 若少陰病脈細沉數病在裏不可發汗宜當歸四逆湯 若少

陽病不可發汗宜小柴胡湯 若咽中閉塞咽乾燥亡血衄家淋家瘡家不可發汗以上六證並宜小柴胡湯

若下痢清穀不可發汗宜理中湯四逆湯之類 若四逆厥及虛家皆不可吐厥者宜當歸四逆湯 虛宜附子湯 有熱人宜黃耆人參建中湯 若少陰膈上寒乾嘔不可吐宜小半夏加橘皮湯湯中凡 若咽中有動

氣不可下咽中閉塞不可下宜烏扇湯 若外實者不可下諸四逆厥者不可下虛家亦然厥宜當歸四逆湯 虛者宜附子湯 有熱宜黃耆人參建中湯 本虛攻其熱必噉宜小柴胡湯 若脈浮而緊瀉則衛氣弱緊則寒中寒陽微

汗解假令尺中遲者不可發汗榮氣不足血少故也宜小柴胡湯 若脈濡而緊瀉則衛氣弱緊則寒中寒陽微 衛中風發熱而惡寒榮緊衛風冷微嘔心內煩此不可汗宜小柴胡湯 若濡而弱不可發汗宜小柴胡湯 若

浮而大浮為氣實大而血虛小使當赤而難胞中當虛今反小便利而大汗出法應衄衄家微可與小建中湯若 反更實津液四射榮竭血盡乾煩而不得眠此不可下宜與小柴胡湯 若脈浮大應發汗宜柴胡桂枝湯 若

脈浮而緊者不可下而反下之為大逆宜桂枝麻黃各半湯 若脈數不可下宜柴胡桂枝湯 若下之必煩利 不止宜葛根黃連黃芩湯 若脈瀉弱浮數不可下宜小柴胡湯 若瀉弱微瀉則陽氣不足中風汗出而反

燥煩瀉則無血厥而且寒不可下宜桂枝甘草牡蠣龍骨湯 若結胸脈浮大不可下下之即死宜小陷胸湯 若陽病多者熱下之則硬宜小柴胡湯 若太陽發汗不微轉屬陽明微汗出不惡寒若太陽證不罷不可下之

下之為逆宜桂枝麻黃湯 若太陽病有外證未解不可下下之為逆宜桂枝麻黃湯 若病發于陽而反下之 熱入因作結胸病發于陰而反下之因作痞 結胸則有陷胸湯凡三 痞則有瀉心湯五 若太陽與陽明合

病病而胸滿不可下宜麻黃杏仁甘草石膏湯 若太陽與少陽合病心下硬頭項強而眩者不可下宜小柴胡

湯 若病欲吐者不可下宜小半夏加橘皮湯 太陰脫痢吐食自利腹痛下之必胸下結硬 厥陰病嘔氣上衝心中熱饑不欲食食則吐或下之則利不止 若少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐腹痛能吐始得之手足寒脈弦遲者此胸中實寒不可下也宜溫中湯生姜汁半夏湯 若無陽陰強大使硬者下之必清殺腹滿宜用蜜煎導法 若傷寒五六月不結胸腹滿脈虛腹者不可下此亡血也宜當歸四逆湯下之則死宜四逆加人參湯 若蘇結無陽證不往來寒熱其人反靜舌上胎滑者不可攻也謂下也宜用小柴胡湯若傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之宜小柴胡湯 若陽明病身面色赤攻之必發熱宜調胃承氣湯 若色黃者小便不利也宜五苓散 若陽明病心下硬滿者不可攻之宜生薑瀉心湯 半夏瀉心湯 攻之利不止者死宜四逆湯不可汗下吐三法利害非輕前人多列經後大抵醫之失只在先藥藥之錯則變生若汗下不差則永無亡陽生黃畜血結胸痞氣及下痢洞泄腸熱痢瘕急勞等證生矣其如此故錄大禁忌於前使醫者當疾之初不犯也

太陽證 桂枝二十四方麻黃五方在後保命集內

傷寒六經所感形證合用汗下吐和解毒湯九仲景活人雲岐子保命集載之詳者此不復重錄數書中所無者并諸方對證加減合載于後

金匱黃耆建中湯 治虛勞裏急諸不足宜此方主之

黃耆 桂枝 生薑切各 芍藥各 炙甘草二兩 膠飴斤 大棗十二 右七味咬咀以水

七升先煮六味取三升去滓內膠飴令消溫服一升日三若嘔者加桂薑 若腹滿者去棗加茯苓四兩 若肺虛損不足瘡氣加半夏五兩

易簡建中加減法

若婦人血疼男子心腹疼痛并四肢拘急疼痛甚者加連志半兩 若或吐或瀉狀如霍亂及胃涉濕寒賊風入腹

拘急切痛加附子七錢半 若疝氣發作當於附子建中湯煎時加蜜一匙頭許 若男子婦人諸虛不足小腹

急痛脇肋膜脹 下虛滿胸中煩悸面色痿黃唇口乾燥少力身重短氣腰背強痛骨肉酸疼行動喘乏不能飲

食或因勞傷過度或因病後不復加黃耆一兩半 若婦人一切血氣虛損及產後勞傷虛羸不足腹中病痛嘔

吸少氣小腹拘急痛引腰背時自汗出不思飲食加當歸一兩名當歸建中湯產後半月每日三服令人精壯
大建中湯 治內虛裏急少氣手足厥逆少腹攣急或腹滿弦急不能食起即微汗出陰縮或腹中寒痛不堪苦若
脣口舌乾精自出或手足作寒作熱而煩苦酸病不能當立此補中益氣

桂心三錢 芍藥 黃耆各三錢 甘草炙 當歸 人參各一兩 生姜切 附子五錢

半夏二錢 東瓜 右以咀水五盞煮至三盞去滓分三服

易簡杏子湯 治咳嗽不問外感風寒內傷生冷及虛勞咯血痰飲停積志皆治療

人參 半夏 茯苓 細辛切 甘草炙 官桂切 乾姜切 芍藥 五味子

右以咀每服四錢水一盞半杏仁去皮尖剉五枚姜五片煮至六分去滓服 若感冒得之加麻黃等分 若

脾胃素實者用當裏殼去筋膜碎剉以醋淹炒等分加之每服加烏梅一枚煮服其效尤驗 嘔逆惡心者不可用

此若久年嗽氣虛喘急去杏仁人參倍加麻黃添芍藥如麻黃之數乾姜五味子各增一半名小青龍湯

大補十全散

參者木茯苓 芍地桂歸川 三五錢秤用 生薑棗水煎 婦人虛弱用 名美號十全 治男子婦人諸虛

不足五勞七傷不迎飲食久病虛損時發潮熱氣攻骨痛拘急疼痛夜夢遺精面色痿黃脚膝無力喘咳中滿脾

腎氣弱五心煩悶並皆治之

肉桂 芍藥 甘草 黃耆 當歸 川芍 人參 白朮 茯苓

熟地黃各等 右為麤末每服二大錢水一盞生薑三片棗二枚煎至七分不拘時候溫服桂芍藥甘草小建中

湯也苦者與此三物即苦者建中湯也人參茯苓白朮甘草四君子湯也川芍芍藥當歸四物湯也以其氣血俱

衰陰陽並弱天地得之成數故名曰十全散

易簡胃風湯 治大人小兒風冷虛入客腸胃水穀不化泄瀉注下及腸胃濕毒下如薑汁或下瘀血日夜無度

人參 茯苓 川芍 官桂 當歸 芍藥 白朮各等 右以咀每服二錢水

一大盞粟米百餘粒同煎七分去滓稍熱服空心小兒量力減之 若加熟地黃黃耆甘草等分足為十味名十

補湯 若虛勞嗽加五味子 若有痰加半夏 若發熱加柴胡 若有汗加牡蠣 若虛寒加附子 若寒甚
加乾姜皆依本方等分 若骨蒸發熱飲食自若者加十補湯加柴胡二兩服之 若氣短加人參 若小便不
利加茯苓 若脈弦澀加川芎 若惡寒加官桂 若脈澀加當歸 若腹痛加白芍藥 若胃熱濕或加白朮
若血痰色紫者陳血也加熟地黃 若血鮮色紅者新血也加生地黃 若寒熱者加柴胡 若肌熱者加地
骨皮 若脈洪實痛甚者加酒浸大黃 潔古云防風為上使 黃連為中使 地榆為下使
千里殼一名水胡蘆

木瓜

紫蘇葉

官桂 兩半

烏梅肉

赤茯苓 兩一

右為細末煉蜜為丸如彈子大噙化一丸嚥

津

又方

百藥煎

烏梅肉

紫蘇葉

人參

甘草

麥門冬

右各等分為細末煉蜜丸噙化

烏梅湯

烏梅肉

甘草 兩三

百藥煎 兩一

白芷 兩一

白檀 兩三

右為細末湯煎

蜜酒

好蜜 斤一

水 一碗

細麴 斤一

好乾酵母 兩三

右先煎蜜水去花沫令絕冷下麴酵每日三攪三日熟

陽明證

葛根湯三方升麻湯三方青龍湯三方

易老門冬飲子

治老弱虛人大喝

人參

枸杞

白茯苓

甘草 兩二

五味子

麥門冬

去心各半兩

右為麩末生薑水煎

麥門冬飲

治勞復欲死人氣欲絕者用之有效

麥門冬

甘草 兩二

梗米 兩一

右門冬去心為細末水二盞煎梗米令熟去米約湯一小盞半入藥五錢匕

棗二枚去核新竹葉十五片同煎至一大盞去滓火溫服不能服者綿滴口中 後人治小兒不能注者宜用

此綿滴法此方不用石膏以其三焦無大熱也兼自欲死之人陽氣欲絕者故不用石膏若加人參大妙

上海

上海錦章書局石印

海藏五飲湯 一留飲心下二滯飲腸下三痰飲胃中四溢飲膈上五流飲腸間凡此五飲酒後傷寒飲冷過多故有此疾

旋覆花 人參 陳皮 枳實 白朮 茯苓 厚朴 半夏 澤瀉

猪苓 前胡 桂心 芍藥 甘草 右等分剉每兩分四服水二盞生姜十片同煎至七

分取清溫飲無時忌食肉生冷滋味等物因酒有飲加葛根花縮砂仁

海藏已寒丸此丸不併上陽生於下 治陰證服四逆輩胸中發燥而渴者或數日大便秘小便澀赤服此丸上不便大小便自利

肉桂 茯苓略半 良薑 烏頭炮各 附子炮 乾姜炮 芍藥 茴香炒 右等分

為細末糊為丸桐子大溫酒下空腹食前五七十九丸亦得酒醋為糊俱可

婦人血風證因大脫血崩漏或前後血因而枯燥其熱不除循衣撮空撲牀閉目不省擲手揚規搖動不寧錯語失

神脈弦浮而虛內燥熱之極也亂麓鼻乾而不潤上下通燥此為難治宜

生地黃黃連湯王之

川芎 生地黃 當歸略七 赤芍藥 梔子 黃連 黃芩略三 防風炮 右為麩

末每服三錢水二盞煎至七分取清飲無時徐飲與之 若脈實者加大黃下之 大承氣湯氣藥也自外而之

內者用之 生地黃黃連湯血藥也自內而之外者用之氣血合病循衣撮空證同 自亂而之血血而復之氣

大承氣湯下之自血而之氣氣而復之血地黃黃連湯王之也二者俱

增損理中丸 王朝奉云大小陷胸湯丸不愈者宜與之

人參 白朮 桔葉 牡蠣各二 甘草炒三 乾姜炮一 枳實炮四 黃芩去枯 右為細

末煉蜜為丸如彈子大湯蓋煎服不歇復與之不過五六胸中豁然矣用藥神速未嘗見也 渴者加桔葉根

汗者加牡蠣

少陽發大小柴胡湯如成在前則子

少陽發大小柴胡湯如成在前則子

易簡參蘇飲 治感冒發熱頭痛與痰飲凝積發而為熱並宜服之若感冒發熱亦如服春胃湯法連進數服微汗即愈大治中脫痞悶嘔逆惡心開胃進食小兒室女尤宜服之

前胡 人參 紫蘇 乾島 半夏 茯苓 枳殼 陳皮 甘草

桔梗 木香 右咳咀每服四錢水一盞半生薑七片棗一枚煎至六分去滓不以時候素有痰飲者

俟退熱以二陳湯或六君子湯調服若男子婦人虛勞發熱或吐衄下血過多致虛熱者用此藥三兩加四物湯二兩合和名茯苓補心湯

活人治婦人傷寒妊娠服藥例

若發熱惡寒者不離桂枝芍藥 若往來寒熱者不離柴胡前胡 若大渴者不離知母石膏五味子麥門冬

若大便泄者不離桂附白朮乾姜 若大便燥結者不離大黃黃芩 若經水通來適去斷者不離小柴胡 若

安胎者不離人參附膠白朮黃芩 若發汗者不離葱豉生薑麻黃旋覆 若頭痛者不離前胡石膏梔子 若

傷暑頭痛者不離紫胡石膏甘草 若渴者不離枳實陳皮 若腦氣不安者不離黃芩麥門冬人參 若涎

發黑者不離黃芩梔子升麻

萬病紫苑丸 療膈腹久患症癖如碗大及諸黃病每地氣起時上氣衝心連膈絞痛一切蟲咬十種水病十種盡

病反胃吐食嘔逆惡心飲食不消天行時病婦人多年月露不通或腹如懷孕多血天陰即發又治十二種風濕

痺不知年歲晝夜不安夢與鬼交頭白多屑或哭或笑如鬼魅所著腹中生瘡腹痛服之皆效

紫苑去苗 吳茱萸湯洗七次焙乾 葛蒲 柴胡去 厚朴薑製 桔梗去 茯苓去 皂莢去

子等 桂枝 乾姜炮 黃連去 蜀椒去 巴豆去 川烏去

三錢 加羌活 獨活 防風各半 右為細末入巴豆勻煉蜜丸如桐子大每服三丸漸加至五七

丸生薑湯送下食後臨睡初有孕者不宜服其引子後

痔漏腸風酒下 赤白痢瀉子湯下 膿血痢米飲湯下 墮傷血悶四肢不收酒下 蛔蟲咬心檳榔湯下

氣噎憂噎荷葉湯下 打撲傷損酒下 中毒惡皮甘草湯下 一切風升麻湯下 寸白蟲檳榔湯下 霍亂

乾姜湯下 咳嗽杏仁湯下 腰腎痛益淋湯下 陰毒傷寒溫酒下 吐逆生薑湯下 食飲氣塊麩湯下
時氣井花水下 脾風陳皮湯下 頭痛水下 心痛溫酒下 大小便不通燈草湯下 因物所傷以本物湯
下 吐水梨湯下 氣病乾姜湯下 小兒天風吊搐防風湯下防已亦可 小兒疳疔葱白湯下 小兒乳食
傷白湯下 月信不通煎紅花酒下 婦人腹痛川芎湯下 懷孕半年後胎漏艾湯下 有子氣衝心酒下
產暈痛溫酒下 血氣痛當歸酒下 產後心腹脹滿益淋湯下 難產孟志湯下 產後血痢當歸湯下 赤
白帶下酒煎艾湯下 解內外傷寒粥飲下 室女血氣不通酒下 子死菜子湯下 又治小兒驚癇大人癩
狂一切風及無辜婦人身上頑麻狀如蟲行四肢具陣呻吟等疾

太陰證 編綱三方辨心五後保命集四

理中湯加減例

若為寒氣濕氣所中者加附子一兩名附子理中湯 若霍亂吐瀉者加橘紅青橘各一兩名治中湯 若乾霍
亂心腹作痛先以鹽湯少許頓服候吐出令透即進此藥 若嘔吐者于治中湯內加丁香半夏一兩每服生薑
十片同煎 若泄瀉者加橘紅茯苓各一兩名補中湯 若溲泄不已者于補中湯內加附子一兩不喜飲水穀
不化者再加縮砂仁一兩共成八味 若霍亂吐下心腹作痛手足逆冷于本方中去白木加熟附名四順湯
若傷寒結胸先以桔梗枳殼等分煎服不愈者及諸吐利後胸痞欲絕心高起急痛手不可近者加枳實茯苓
各一兩名枳實理中湯 若瀉者再於枳實理中湯內加括葉根一兩 若霍亂後轉筋者理中湯內加大煨石
膏一兩 若臍上築者腎氣動也去木加官桂一兩半腎虛燥故去木恐作奔豚故加官桂 若悸多者加茯苓
一兩 若渴欲飲水者添加木半兩 若苦寒者添加乾姜半兩 若腹滿者去白木加附子一兩 若飲酒過
多及喫炙博熱食發為鼻衄加川芎一兩 若傷胃吐血以此藥能理中脫分利陰陽安定血脈只用本方 若
中附子毒者亦用本方或止用甘草乾姜等分煎服仍以烏蘆煎湯解之

平胃散加減例

若瀉脾濕加茯苓丁香白朮為調胃散一法加藿香半夏 若加乾姜為厚朴湯 若虛癆時氣一二傷寒頭痛

壯熱加逆類急白五十粒散三十粒煎三二服微汗出愈 若五勞七傷脚手心熱煩燥不安百節酸疼加柴胡

若疾嗽瘧疾加薑製半夏 若本藏氣痛加茴香 若火氣衝滿加桑白皮 若婦人赤白帶下加黃耆 若

酒傷加丁香 若飲冷傷食加高良薑 若滑脫泄瀉加肉苳蔻 若風痲四肢沈困加荆芥 若腿膝冷痛加

牛膝 若澤身虛墮拘急加地骨皮 若腿膝濕痺加兔絲子 若白痢加吳茱萸 若赤痢加黃連 若頭風

加藜本 若轉筋宜亂加楠木皮 若七邪六極耳鳴夢洩盜汗四肢沈重腿膝酸疼婦人宮藏久冷月脈不調

者加肉桂 若胃寒嘔吐多加生薑 一法加茯苓丁香各三兩共成六味 若氣不舒快中脫痞塞加縮砂仁

香附子各三兩生薑煎服 若與五苓散相半為對金飲子 若與六一散相合為黃白散 若與錢氏異功散

相合為調胃散 若欲進食加神麩麥芽吳茱萸蜀椒乾薑桂為吳茱萸湯 若加藜本桔梗為和解散治傷寒

吐利 若加藜香半夏為不換金止氣散 若瘧疾寒熱者加柴胡 若小腸氣痛者加苦棟茴香

少陰證真武四逆等法在活人並附方七頭在保命集內

八物定志丸補益心神安定魂魄治痰去胸中邪熱理脾胃

人參半兩 葛蒲 遠志法 茯神法 茯苓去破各 硃砂此 白木 麥門冬法各

牛黃細研 右為細末煉蜜丸桐子大米飲湯下三十丸無時 若髓竭不足加 生地黃 當歸 若脾氣

不足加 天門冬 麥門冬 五味子 若心氣不足加 上黨參 茯神 葛蒲 若脾氣不足加 白木

白芍藥 益志 若肝氣不足加 天麻 川芎 若腎氣不足加 熟地黃 遠志 牡丹皮 若膽氣不足

加細辛 酸棗仁 地榆 若神昏不足加 硃砂 預知子 茯神

仲景八味丸

熟地黃補腎水真血 肉桂補腎水真火 牡丹皮補神志不足 附子能行諸經而不止煎益火 白茯苓能

伐腎邪濕滯 澤瀉去胞中留垢及遺溺 山茱萸治精滑不集 乾山藥能治毛中燥酸濕 右八味皆君主

之藥 若不依易老加減服之終不得效若加五味子為腎氣丸述類象形之劑也益火之源以消陰翳壯水之

主以制陽光錢氏地黃丸減桂附

潔古老人天麻丸 治證見活法機要

天麻六兩酒浸三日 除風痺 牛膝六兩酒浸三日 強筋 玄參六兩 樞機管領 羊解六兩另 壯骨 杜仲七兩剉使

筋骨相著 當歸十兩全用 和養血 羌活十五兩或 去骨節間風 生地黄斤 益真血 附子一兩 行諸經不止 獨

活去 腎間風邪 右為細末煉蜜為丸如桐子大每服五七十丸病大至百丸空心食前溫酒白湯下服藥忌

壅塞宜于通利故服半月稍覺壅塞微以七宣丸輕疏之使藥再為用也

大效牡丹皮散 治血藏虛風及頭目不利不思飲食手足煩熱肢節拘急疼痛胸膈不利大腸不調陰陽相干心

驚忪悸或時旋暈

牡丹皮 川芎 枳殼炒 陳皮炙 玄胡 甘草 羌活 半夏湯 三棱炮

乾薑炮 肉桂各半 木香 訶子肉 白朮炒 芍藥三 當歸一兩 右為細末每服二錢

水一盞半煎五七沸食前溫服益血海退血風勞攻注消寒痰膏脾胃理血氣攻刺及氣虛惡寒潮熱證至妙

海藏大五補丸同三十九例

天門冬 麥門冬 葛蒲 茯神 人參 益智 枸杞 地骨皮 遠志

熟地黃 右為末煉蜜為丸如桐子大空心酒下三十九丸 本方數服以七宣丸泄之

清心丸治熱

黃柏生 天門冬 黃連研 龍腦一 麥門冬法 右為細末煉蜜丸桐子大每服十丸臨臥門

冬酒下薄荷湯亦得

大府丹兩丁俱瀉

黃芩 黃連 生地黃 木通 三 右為細末煉蜜丸桐子大每服二三十九丸臨臥溫水下

海藏調胃白朮澤瀉散 治痰病化為水氣傳變水鼓不能食

白朮 澤瀉 芍藥 陳皮 茯苓 生姜 木香 檳榔 右為末一法

加白朮木藥各半治腹臍上腫如神若心下痞者加枳實 若下臍者加牽牛

厥陰證效驗如神

四物湯 益榮衛滋氣血 水不調 膈脹 疔痛 等證 並見局方

熟地黃 補血如補下痛非此不能 川芎 治風濕解木地如血虛頭痛非芎藥不能 白芍 和血理脾如腹中虛痛非此當歸如

如血則痛非此不能 熟地 右為鹿末水煎 加減于後 若加地骨皮牡丹皮治婦人骨蒸 若妊娠胎動不

安下血不止者加艾十葉阿膠一片又加葱白黃耆 若血藏虛冷崩中去血過多亦加膠艾 若婦人嘗服春

倍川芎 脈弦頭痛 夏倍芍藥 脈洪飧泄 秋倍地黃 脈沈瀆血虛 冬倍當歸 脈沈寒而不食 若

春則防風四物加防風倍川芎 若夏則黃芩四物加黃芩倍芍藥 若秋則門冬四物加天門冬倍地黃 若

冬則桂枝四物加桂枝倍當歸 若血虛而腹痛微汗而惡風四物湯加茂桂謂之腹痛六合 若風眩暈加秦

芫羌活謂之風六合 若氣虛弱起則無力眩然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加

黃連梔子謂之熱六合 若虛寒脈微自汗氣難布息清使自調加乾姜附子謂之寒六合 若中濕身沈重無

力身微涼汗加白朮茯苓謂之濕六合 若虛後虛勞日久而脈浮疾宜 柴胡四物湯 川芎 熟地黃 當

歸 芍藥 各半 加柴胡 人參 黃芩 甘草 半夏 細辛 水煎服 若婦人筋骨肢節痛及頭痛脈弦增寒

如瘧宜治風六合 四物湯加防風 羌活 各一 若血氣上衝心腹肋下滿悶宜治氣六合 四物湯加香木

檳榔 各一 若膈下虛冷腹痛及腰脊間悶痛宜玄胡六合 刺棘 各一 四物湯加玄胡 若練 各一 若氣充

經脈故月事頻併臍下多痛宜芍藥六合 四物湯加芍藥 各一 若經事欲行膈腹絞痛臨經痛者血澀也宜入

物湯 四物湯加玄胡 苦練 各一 檳榔 木香 各一 若經水過多別無餘證宜黃芩六合 四物湯加黃芩

白朮 各一 若經水澀少宜四物內加葵花煎 各一 若虛勞氣弱咳嗽喘滿宜厚朴六合 四物湯加厚

朴 各一 枳實 棗 各一 若經水暴下加黃芩一兩 若腹痛者加黃連如夏月不去黃芩 若經水如黑豆汁者加

黃芩黃連各一兩 若經水少而色和者四物湯加熟地黃當歸各一兩 若經水通來通斷或有往來寒熱者

先服小柴胡湯以去其寒熱後以四物湯和之 若婦人血積者四物湯內加 廣棧 京三稜 桂枝 乾漆

略一 若婦人傷寒汗下後飲食減少血虛者宜 八物湯 四物湯加黃耆 甘草 茯苓 白朮 各一 若

妊娠傷寒中風表虛自汗頭痛項強身熱惡寒脈浮而弱太陽經病宜表虛六合湯 四物湯和桂枝 地骨皮

路七 若妊娠傷寒頭痛身熱無汗脈浮緊太陽經病宜表實六合湯 四物湯和麻黃 細辛各半 若妊娠

傷寒中風濕之氣肢節煩疼脈浮而熱頭痛宜風濕六合湯太陽標病也 四物湯和防風 蒼木七兩若妊娠

傷寒下後過經不愈濕毒發痼如錦紋宜升麻六合湯 四物湯和升麻 連翹路七 若妊娠傷寒胸脇滿痛

而脈弦少陽也宜柴胡六合湯 四物湯和柴胡 黃芩路七 若妊娠傷寒大便硬小便赤氣滿而脈沉數陽

明太陽本病也急下之宜大黃六合湯 四物湯和大黃 桃仁十兩去皮 若妊娠傷寒汗下後咳嗽不止

者宜人參六合湯 四物湯和人參 五味子路五 若婦人妊娠傷寒汗下後虛痞脹滿者陽明本虛也宜厚

朴六合湯 四物湯和厚朴 枳實路七 若妊娠傷寒汗下後不得眠者宜梔子六合湯 四物湯和梔子

黃芩路半 若妊娠傷寒身熱大渴蒸蒸而煩脈長而大者宜石膏六合湯 四物湯和石膏 知母路半

若妊娠傷寒小使不利太陽本病宜茯苓六合湯 四物湯和茯苓 澤瀉路半 若妊娠傷寒太陽本病小使

赤如血狀者宜琥珀六合湯 四物湯和琥珀 茯苓路半 若妊娠傷寒汗下後血漏不止胎氣損者宜膠艾六

合湯 四物湯和阿膠 艾各半再一方加甘草半兩上 若妊娠傷寒四肢拘急身涼微汗腹中痛脈沉而遲少陰

病也宜附子六合湯 四物湯和附子炮炙肉桂路半 若赤白帶下宜香桂六合湯 四物湯和肉桂 香附

子路半 若妊娠傷寒著血證不宜墮胎藥下之宜四物大黃湯下 四物湯 生地黃 酒浸大黃 若虛熱

病四物與參蘇飲相合名補心湯主之 若四肢腫痛不能舉動四物蒼木各半湯主之 若治燥結四物與調

胃承氣湯各半為玉燭散 若流淚淵燥宜四物理中各半湯 若保胎氣令人有子四物與煇砂四君子湯各

半名八珍湯 若熱與血相搏口舌乾渴飲水加 結萋 麥門冬 若腹中刺痛惡物不下加 當歸 芍藥

若血崩者加 生地黃 蒲黃 黃芩 若頭昏項強者加 柴胡 黃芩 若因熱生風者加 川芎 桑

胡 防風 若藏秘澀者加 大黃 桃仁 若滑瀉者加 官桂 附子 若嘔者加 白木 人參 生薑 若大渴者加 知母 石膏 若發寒熱者加 乾生薑 牡丹皮 芍藥 柴胡 若水停心下微吐逆者

景樂各半服之其效如神 若婦人或因傷酒或因產亡血或虛勞五心煩熱者宜四物二連湯 四物湯妙地

黃連 胡黃連 溫飲清汁 四物與桂枝麻黃白虎漿胡理中四逆米芩承氣涼膈等皆可作各半湯此易

老用藥大略也 若虛煩不得睡加 竹葉 人參 若婦人血虛心腹疼痛不可忍者去地黃加乾薑名四神

湯 若諸痛有濕者四物與白朮相半加 天麻 茯苓 川山甲 酒煎 若目赤暴發作雲翳疼痛不可忍

宜四物龍膽湯 四物略半羌活 防風略三龍膽草 防已略二水煎

海藏云婦人妊娠黃血

婦人妊娠或蓄血 抵當桃仁勿忘施 要教子母俱無損 大黃四物對服之

海藏當歸丸治三陰受邪心膈少三腹疼痛氣風等證

四物湯略半 防風 獨活 金竭略半 茴香炒 續斷略半 苦練 玄胡略七 木香

丁香略二 右為細末酒糊丸桐子大空心溫酒下三五十丸大效

苦練丸治奔豚小腹痛神效

川苦練 茴香 附子去皮炮 右三味酒二升煮盡為度焙乾細末之每秤藥末一兩入玄胡半兩全

蝎十八個炒丁香十八個別為末和勻酒糊丸桐子大溫酒下五十九空心痛甚加當歸煎酒下

治喉閉速迎不救方

皂莢去皮子生半兩為細末筋頭煎少許在痛處更以醋糊調藥末厚塗項上須臾使破血出立差

極濟換骨丹 海云自汗者不宜服 歌曰

槐皮芎朮並 仙人防首蔓 十味各停勻 苦味香減半 龍麝即少許 朱砂作衣壁 麻黃膏煎丸大小

如指彈 右治半身不遂口眼喎斜手足不仁言語蹇澀或痛入骨髓或厚裂皮膚或中急風涎潮不言精神昏

塞行步艱難筋脈拘急左癱右瘓一切風疾並皆治之

槐莢子生 人參 桑白皮 蒼朮 川芎 何首烏 蔓荊子 蕤靈仙 防風各

兩 五味子 香附子 苦參略一 香白芷二 麝香二研 右一十四味為細末入香令勻又

用麻黃十斤去節根用大河水三石三斗熬至六斗濾過去滓再熬至二升半入銀石器內熬成膏入前藥末和勻杵三五千下每一兩作十九丸朱砂為衣每服一丸先搗碎酒一盞自晨浸至晚食後臨卧攪勻服之神清無睡是藥之驗須更隔五日服之如中風無汗宜服若體虛自汗服之是重云津液也若風感人于密室溫臥取汗

三焦熱用藥大例方在元成

上焦

清神散

連翹防風湯

涼膈散

龍腦飲子

犀角地黃湯

中焦

小承氣湯

調胃承氣湯

洗心散

四順清涼飲

桃仁承氣湯

下焦

大承氣湯

五苓散

八正散

石菴散

抵當湯丸

氣分熱

柴胡飲子

白虎湯

血分熱

清涼飲子

桃仁承氣湯

通治大熱

三黃丸

黃連解毒湯

三焦寒用藥大例方在衛生

上焦

桂附丸

鐵刷湯

胡椒理中丸

中焦

二氣丸

附子理中丸一大建中

下焦

還少丹

八味丸

大真丹

氣分寒

桂枝加附子湯

桂枝加芍藥

人參新加湯

血分寒

巴戟丸

神珠丹

通治大寒

大已寒丸

四逆湯

以上內有寒熱之大略也若外有寒熱者當求別法

發痲諸藥

葛根橘皮湯痲在肌

治傷寒暴發肌中痲爛欬而心悶但嘔清汁宜此

葛根

橘皮

杏仁

知母

黃芩

麻黃

甘草

分剉每用五錢水煎

陽毒升麻湯痲在面

治傷寒一二日或吐下後變成陽毒腰背痛煩悶不安面赤狂言見鬼下痢脈浮大數咽喉

痛下膿血五日可治七日難愈

升麻

犀角

射干

黃芩

人參

甘草

升麻

右咬咀水三升煎取半飲一盞

許再服溫覆手足汗出解否則重在

陽毒玄參升麻湯痲在身 治汗下吐後毒不散者虛寒者熱於外是則州據道語兼治痲痺腫痛

玄參 升麻 甘草各半 右細剉水煎

陽毒梔子湯少陽陽明合病 治陽毒傷寒壯熱百節疼痛

升麻 梔子仁 黃芩 芍藥 石膏 知母 甘草 杏仁 柴胡

右籠末五錢生薑五片豉百粒水煎

消毒犀角欬子治痲

牛蒡子六兩 荆芥三兩 防風三兩 甘草一斤 水煎服

陰毒升麻鷲甲湯陰痲 大建中湯尤妙

升麻三兩 當歸 甘草各二兩 蜀椒一斤 鷲甲一斤 雄黃半兩 右為末每服半兩水煎

蒸病 治者宜隨各經虛實內外淺深用藥加減可也

古今錄驗五蒸湯

甘草一斤 茯苓三兩 人參二兩 竹葉二兩 乾地黄 葛根各三兩 知母 黃芩各二兩 石膏五兩

粳米一石 右十味咳咀以水九升煮取二升半分為三服亦可以先煎小麥水乃煮藥 忌海藻菘菜蕪菜大醋

寶熱 黃芩 黃連 黃蘗 大黃 虛熱 氣也 烏梅 秦艽 柴胡

血也 青蒿 鷲甲 蛤蚧 小麥 牡丹皮

肺乾 烏梅 天門冬 麥門冬 紫苑 皮啞血 石膏 桑白皮

膚嗜睡 牡丹皮 氣喘促身熱 人參 黃芩 梔子

大腸乾 右孔 大黃 芒硝 脈溢白沫語不絕 生地黃 當歸

心乾 黃連 生地黃 血熱 地黃 當歸 桂心 童子小便

小腸下 赤茯苓 木通 生地黃

脾熱 芍藥 木瓜 苦參 肉食無味而嘔 芎藭

胃古下 石膏 粳米 大黃 芒硝 葛根

肝脾白 川芎 當歸 前胡

膽脾白 柴胡 桔梗

腎耳 生地黄 石膏 知母 寒水石

髓骨 天門冬 當歸 地黃

生地黄

胞赤 澤瀉 茯苓 生地黄 沉香 滑石

膀胱左耳 澤瀉 茯苓 滑石 凡此諸藥皆熱病後食肉油膩房酒犯之而成久蒸不除變成瘡病即死矣

萬根散 治陽毒身熱如火頭痛躁渴咽乾乾痛

萬根散料 黃芩 大黃 甘草

活 敗毒散 太陽證 治傷風濕疫風溫風眩風痰痺溫

羌活 獨活 前胡 柴胡 枳殼 人參 茯苓 桔梗 甘草

川芎吟 右細末生薑水煎或沸湯點亦可大人小兒皆宜瘡烟之地濕疫時行或人多風瘴或久處卑濕

脚氣此藥不可缺一方少加薄荷同煎

三陽頭痛

羌活 防風 荆芥 升麻 葛根

細辛 葱白連鬚 若陰證頭痛只用溫中藥足矣乃理中並附之類也

發黃兼諸雜證治法在前辨如內附 柴胡 黃芩

小便不利煩燥而渴 加茯苓猪苓滑石當歸官桂 煩躁喘嘔不渴 加黃皮白朮半夏生薑茯苓 四肢滿

身冷者加 附子甘草

茵陳黃湯加減

筋熱 川芎 當歸

三焦作熱 石膏 竹葉

腦熱 地黃 防風 羌活

骨熱 地黃 防風 羌活 蠶甲 地骨皮 牡丹皮 當歸

肉熱 石膏 黃蘗

山梔子仁 朴硝略半 右為末水煎

山梔子仁 朴硝略半 右為末水煎

山梔子仁 朴硝略半 右為末水煎

山梔子仁 朴硝略半 右為末水煎

山梔子仁 朴硝略半 右為末水煎

山梔子仁 朴硝略半 右為末水煎

山梔子仁 朴硝略半 右為末水煎

山梔子仁 朴硝略半 右為末水煎

山梔子仁 朴硝略半 右為末水煎

山梔子仁 朴硝略半 右為末水煎

山梔子仁 朴硝略半 右為末水煎

山梔子仁 朴硝略半 右為末水煎

山梔子仁 朴硝略半 右為末水煎

山梔子仁 朴硝略半 右為末水煎

山梔子仁 朴硝略半 右為末水煎

肢體逆冷腰上自汗 加附子乾薑甘草 身冷不止者 加附子乾薑 前集未已脈尚伏 加吳茱萸附子 乾薑木通當歸

韓氏立名為茵陳茯苓湯 茵陳槭皮湯 小茵陳湯 茵陳四逆湯 茵陳附子湯 茵陳茱萸湯 大抵只是仲景陰證藥內加茵陳也用者要當識之

掌中金丸 治婦人乾血氣

川山甲地 甘草 苦丁香 川椒 苦苾菴 白附子 草烏頭 猪牙皂角各二色

龍腦雞蘇丸 上焦熱 除煩解勞去肺熱欬衄心熱驚悸脾胃熱口甘吐血肝膽熱泣出口苦肝熱神志不定

上而酒毒高熱消渴下而血滯五淋血崩等疾

薄荷斤 麥門冬去心 甘草半兩 生乾地黃六兩各 黃耆 新蒲黃 阿膠炒 黃連

人參 木通略一 柴胡二兩到向木通湯半 右為細末好蜜二斤先煉一二沸然後下生地黃末不

住手攪時加木通柴胡汁浸熬成膏勿令火緊急了然後將前藥末和丸如豌豆大每服二十九白湯下 虛勞

煩熱梔子湯下 肺熱黃芩湯下 心熱悸動恍惚人參湯下 唾咯吐衄四血去心麥門冬湯下 脾胃熱赤

芍藥生甘草湯下 肝熱防風湯下 腎熱黃柏湯下 治五淋及婦人漏下車前子湯下 痰嗽者生薑湯下

芫中痛者蒲黃滑石末一錢調下 氣逆者槭皮湯下 室女虛勞寒熱潮作煎柴胡人參湯下 已上並食

後臨臥服

黃耆膏子煎丸 治證同前

人參 白木略半 柴胡 黃芩略一 白芷 知母 甘草略半 蟹甲一兩半手 右

為細末黃耆膏子丸桐子大每服三五丸百沸湯下空心右用黃耆半斤煎末水二斗煎一斗去滓再煎令不

住攪成膏至半斤入白蜜一兩飴一兩再煎令蜜錫熟得膏十兩放令丸藥

地骨皮枳殼散 治骨蒸壯熱肌肉消瘦少力多困夜多盜汗

上海錦章書局石印

地骨皮 秦光 柴胡 枳殼 知母 當歸 蠶甲燻火 右等分為末水一盞

桃柳枝頭各七個薑三片烏梅一個母服去滓臨臥服

易蘭芎歸湯 治一切去血過多眩暈悶絕傷胎去血產後去血崩中去血拔牙去血金瘡去血不止者舉頭欲倒

卷能治之

芎藭 當歸各等 右吹咀水煎服 若產後眩暈加芎藥 產後腹疼不可忍加官桂酒量使合煎

妊娘子死或不死胎動酒水合煎即下未死者即安 若虛損腹痛少氣頭眩自汗每服加羊肉一兩生姜十片

水煎 若臨月服之則縮胎易產 若室女婦人心腹疼痛經脈不調水煎服 若妊娠胎氣不安產後諸疾酒

煎服 若難生倒橫子死腹中先用黑豆一大合炒熱水與小便合煎服 若難產用百草霜香白芷等分重子

小便好醋各一合沸湯浸服甚者再服已分娩矣 若腸風藏毒每服加槐花末半錢三日取下血塊即愈 若

吐血亦宜服此 若血氣上喘下腫空心煎艾湯調下 若產後惡血注心迷悶喘急腹痛依前用黑豆加生薑

自然汁煎服 若產後頭痛加荆芥 若崩中漏下失血不止加香附子炒每兩入甘草一錢沸湯煎服 若有

白帶者加芎藥半兩乾姜等分米飲調下

三奇六神細法
白虎白蠟一百斤 青龍青蒿自然汁三升 勾陳蒼耳汁二升 騰蛇野梨子汁四升

室武杏仁四升去皮尖者炒 朱雀赤小豆三升洗去 右一處拌勻稍乾為妙用大盆罇一宿子伏內

至寅日踏極實為度甲寅庚寅戊寅乃三奇也取鋪如細法

千金種子法道火之時當至陰節間而止不爾則過一宮矣子問故師曰深則少陰之分漸殺之方何以生化淺則

厥陰之分融和之方故能發生所以受胎之處在淺而不在深也非月經後皆不可用事惟經後一日男二日女

三日男此之外皆不成胎大風大雨大寒大暑陰晦日月蝕皆不可交接所生男女痴聾瘡癩四體不完矣

搗鼻香 治子宮久冷赤白帶下 牡蠣版 紫葳花 韶腦 母丁香 黃狗頭骨 蛇牀子

破故紙 桂心 絡等 右為細末陳蜜丸如雞頭大臨服用一粒

孔門一貫呼參二南詔鯉師以授之弟父以授之子皆本心法以為心傳驚道何獨不然三衢雷君少逸醫名噪于一時余守衡六年相交最久相知益深嘗序其時病詢醫家四要論書行世溯其淵源得力于庭訓居多其尊人逸仙先生則受學于程芝田先生也一日少逸出芝田先生醫法心傳一書問序于余且言曰程先生為新安人博學能文有聲庠序字法米南宮又善指墨畫其家世業岐黃于醫理尤精嘉道間懸壺全衛着手奏效衛人有贈杏林春色圖贈之者吾先君從游多年得其真傳曾著有醫博四十卷醫約四卷咸豐辛酉濶于兵燹惟方業遺稿僅存厥後託友求覓文書而不可得乃得程先生醫法心傳一卷喜不自勝先生為吾父之師得先生之書猶得吾父之書如此而不刊刻以傳心焉乎安少逸之言如此噫少逸喜承父志能不忘本可謂不負所傳矣爰取斯篇而讀之着實說理闡發詳明知其根底內經尊崇仲景後博覽乎唐宋以來諸名大家書融會貫通心悟乎古人之言能暢達古人言中之意心契乎古人之心能曲繪古人意中之言辨其是非判其偏正莫不以仲聖為折衷殆所謂神明于規矩之中變化于規矩之外者歟此書一出世之習醫者家置一編心領神會得所宗主不為異說所誑予以活人濟世則不獨先生之心得以傳即少逸與其尊人親友私淑之心亦藉之以傳夫何異儒術之得有傳人哉

光緒十一年歲在乙酉仲冬之月儘先補用道特授衢州府知府楚北劉國光寶臣氏撰

目錄

醫法長沙

讀書先要根柢說

顛倒五行解疑

傷寒六經晰義

仲景傷寒論概治男婦大小雜病說

溫疫原考

痢疾要旨

痘科救偏

痘症原委

老幼治法

損傷論治

臨症扼要

新安程芝田先生遺著

門下晚學生雷豐少逸甫校刊

醫法長沙

仲景先師為醫中之聖其者傷寒雜病論堪為千載之準繩是矣但經叔和編次久失真傳自柯韻伯先生著有傷寒論註論翼附翼書出發仲景之精微破諸家之僻見千載達達一朝指破寔為仲景之功良醫學之金針也然大匠誨人能與人規矩不能使人巧仲景之方法猶規矩也有方外之方法外之法其中奧旨可以意會難以言傳若能越于規矩之外不離規矩之中方為神妙所謂執中有權始為時中中無定體隨時而在譬之四時冬無忌陽夏無伏陰春無凄風秋無苦雨此其有定者也仲景即因其有定者而治之如病別五臟治分六經以寒治熱以熱治寒以補治虛以瀉治實是也至春行夏令夏行秋令秋行冬令冬行春令此其無定者也仲景即因其無定者而治之如五臟有變連六經有轉屬寒因寒用熱因熱用寒因塞用通因通用是也其先補後攻先攻後補寒熱並用攻補兼施此又變中之變也故一方可兼治數病諸方可移治雜病神而明之存乎其人余謂仲景之六經治法猶孔明之八陣圖法苟能熟讀精思則臨症之時隨機應變自可出入神化矣

憲章昭著闡發精詳至言仲景六經治法猶孔明八陣圖法比喻更為確切仲編弟劉東璧拜識

仲景書原是活潑潑地觀此篇全論大法已探抉其要旨應是從長沙室裏得來 晚生 王玉塘拜識

讀書先要根柢說

昔賢云書宜多讀謂博覽群書可以長識意見也第要有根柢根柢者何即靈樞素問神農本草難經全讀仲景傷寒論是也宜先熟讀如儒家之五經四書王道德經湯無偏無黨必以聖言為折衷則心始有定見再閱諸子百家或正或偏孰非孰是方不為邪說所惑醫書汗牛充棟不可勝舉即以四大家而論如張子和主治吐衄讀子和書而不讀河間書則治火不明讀河間書而不讀東垣書則內傷不明讀東垣書而不讀丹溪書則陰虛不明不獨此也讀四子書而不讀立齋書則不明真陰真陽之理不讀鼓峰書則不知攻伐太過之陰虛陽虛不讀又可書則不識

溫疫傷寒之異治不讀嘉言書則不識秋傷于濕之誤小兒驚風之非然要知諸子各有所偏總不若仲景之可溫則溫可涼則涼可補則補可瀉則瀉為時中也至于讀叔和傷寒編次而不讀韻伯傷寒論註論翼又不曉傳經直中之說傳陰轉陽之妙至言仲景傷寒方論本可統治雖病能獨開生面實為仲景之功臣千載之準繩也故曰讀書先要根柢再閱諸子百家由博返約不致歧途流為偏僻雖不堪升堂入室亦不致為門外漢耳

諸子百家皆有所偏惟仲景為時中堪為千載準繩寔古今不易之論名言至論小可喻大豈獨醫學為然哉仲

論識

讀書不得法便入牛鬼蛇神之域此篇從內經諸子揭其要旨而明白說來先生殆循循然善誘人乎玉培讀

顛倒五行解

萬物不外五行治病不離五臟五行分金木火水土五臟配肺脾肝心脾五行有相生相剋如金生水水生木木生火火生土土生金金剋木木剋土土剋水水剋火火剋金此為順五行人所易解無庸細述惟顛倒五行生剋之理人所難明然治病之要全在乎此如金能生水水亦能生金金燥肺痿須滋腎以救肺是也水能生木木亦能生水腎水枯槁須清肝以滋腎是也木能生火火亦能生木肝寒木腐宜益火以煖肝是也火能生土土亦能生火心虛火衰宜補脾以養心是也土能生金金亦能生土脾氣衰敗須益氣以撫土是也如金可剋木木亦可剋金肝木過旺則刑肺金也木可剋土土亦可剋木脾土健旺則肝木自平也土可剋水水亦可剋土腎水泛濫則脾土腫滿也水可剋火火亦可剋水相火煎熱則腎水消燼也火可剋金金亦可剋火肺氣充溢則心火下降也至于肺來剋木須補心以制金肝來侮脾宜補金以制木脾燥消腎當養木以抑土腎水凌心當扶土以制水心火刑金須壯水以制火此借強制敵圍衛救趙之義也若水泛補金木腐補水火或補木土旺補火金燥補土不獨不能相生而反相剋矣且金能生水又能剋水氣滯則血凝也水能生木又能剋木水多則木腐也木能生火又能剋火木鬱則火遏也火能生土又能剋土火燥則土燥也土能生金又能剋金土裂則金銷也雖金可剋木亦可生水以養木木可剋土亦可生火以培土土可剋水亦可生金以資水水可剋火亦可生木以壯火火可剋金亦可生土以化金至肺寔瀉腎腎寔瀉肝肝寔瀉心心寔瀉脾脾寔瀉肺肺寔補其母寔則瀉其子也但子來扶母則吉母來抑子則凶我剋

者為妻若妻來夫病亦難愈所謂肝得脾而莫瘳腎見心而莫治脾遇腎而難痊肺達肝而難愈心得肺而無醫蓋土乘木衰又能生金尅木火乘水衰又能生土尅水水乘土淤又能生木尅土木乘金傷又能生火尅金肺乘火銷又能生水尅火此生尅循環原同太極即河圖洛書之理如能參透雖病有千變萬化亦無遺情矣

五行餘義

凡五行相生者吉相尅者凶固矣但生我者父我生者子父慈子孝自然相生者古若父不慈子不孝倫常乖舛則不相生而反相尅者矣尅我者夫我尅者妻惟夫妻反目則夫有出妻之事或牝雞司晨則妻來乘夫之逆若夫唱婦隨夫以妻為室妻以夫為家飲食男女本不相離相尅而遂以相生相制而遂以相濟矣雖火以水為賊水以土為賊土以木為賊木以金為賊金以火為賊各性其性各賊其賊若和合其性則互為相生五行俱不可相離惟克則害承乃制也然要之土為五行之本土無定位分配四季寄體中宮火藉之而不熄水藉之而不泛金藉之而不生木藉之而不凋故脾神為黃婆心神為嬰兒腎神為姤女修煉家升坎填離欲男女交垢須賴黃婆牽合以脾胃為後天之根本也然非專以補脾胃而言也仲景因胃實致心腎不交用承氣湯下之用和因脾虛心腎不交制脾脾湯補之皆是黃婆牽合之義變理陰陽調和鼎煎良醫良相功本相伴其道非易其任不暴重哉

從河圖洛書九疇之理疏解出來將顛倒五行生尅病症指點分明非同穿鑿之論

仲編識

五行論解前賢雖有無此透徹且引病指證更屬明顯顛倒之例之俱有至理用意如張炬而游洞天愈深愈明

玉蟾請

傷寒六經斷義

嘗讀仲景傷寒論列六經以治百病而手三陽三陰皆具焉諸家傷寒傳足不傳手于理究未合且仲景原文關於心肺者居多手三陽三陰皆牽連及之余諦思其義蓋十二經俱包括無遺也何言之以心主營統理六經之血肺主衛總輸六經之氣經曰肺者大氣之主心者五臟六腑之君也營不離衛衛不離營各經受病而氣血俱應之以心肺為一身之主宰六經之綱領也六經近譬之猶六部達譬之猶六國心肺猶君主夫肺氣為陽心血為陰而以心為君者以血有形而氣無形也如太虛冥廓其氣充周磅礴足包舉地之精形而四虛無着故氣以血為依附

大氣聚于胸中而血以氣為依歸氣不離血血不離氣經曰兩背之上中有人母非指心肺而何至于三焦三焦包絡主血大腸與肺相表裏小腸與心相表裏俱可與心肺統之足證十二經包括無遺也不有確據哉故風寒之傷營衛猶賊寇之犯宮城最為緊要須用大兵直搗其堅不使磐固其勢如麻鞋青龍等方是也治得其法一掃淨盡不得其當延及他經雖六經各有治法總以氣血為主持氣血若足即邪犯六經亦無所害氣血不足則君憂臣辱君辱臣危矣故初病之時氣血未傷猶兵多糧足國固用軍之得其宜則賊自散若因循苟且坐失機宜則姑息養奸賊氣日盛正氣日衰再思背城一戰縱得賊去而國未有不俱敗者也所以過經壞病或補正逐邪或養陰退熱其法不可不知也然則心肺豈不為一身之主宰六經之經領哉此余一得之見書之以質高明

傷寒傳足不傳手之說自叔和論後千百年來誰能出其裏面得此名論仲景原文關於手經者方有著落所謂得其頭領全身俱動從知有慧眼并有神怡者始能讀傷寒論仲編識

以心肺為君主統括十二經則風寒傷營衛始有頭緒六經方有線索千古以來獨出手眼且疏解虛俱從內經勅出傷寒論得此闡發其義始當雪亮明白定可為仲景之功臣亦可為後學之準繩矣玉堦詩

仲景傷寒論可統治男婦小兒雜病說

竊觀內經得窺軒岐之旨不外三才五行生剋之理人身列為六經六經分三陰三陽太陽為開陽明為闔少陽為樞此為三陽也太陰為開少陰為樞厥陰為闔此為三陰也三陽為表三陰為裏萬病出入不外六經六經者統手足而言也此元氣營衛所體要寒熱虛實所考徵仲景先師傳述闡發悉本內經著傷寒雜病論特括六經以審萬病六經各標提經令人知有所向若指南針也亦並無手足字冠頂自叔和刪輯以六經獨為傷寒而說謂傷寒論獨治傷寒一病叔和亂之于前諸家仍之于後千百年來莫能出其裏面甚至仲景之方世不敢用以為宜古而不宜今各承家技自立新方雖有仲景之名而無仲景之實將其方書湮沒于世久矣幸柯韻伯先生出著有傷寒論註論翼附翼等書辨其舛訛透其元旨可欽句句內經字字仲景也于是仲景之書乃顯內經之旨益彰如五經四書註解經朱子手筆始有定評朱子可為孔子之功臣而韻伯堪稱仲景之功臣不亦宜乎余竊推而廣之仲景傷寒論無拘男女小兒雜證俱可統治即以婦人雜病所異男子者惟月經胎前產後夫月經有血

痰經阻者輕則桃仁承氣重則抵當湯丸可用也有血虛經閉者或因陰血盛則當歸建中諸苓湯復脉湯可用也或因陽氣虧則理中黃耆建中吳茱諸四逆附子等湯可用也其胎前產後亦不外寒者溫之熱者清之虛者補之寔者瀉之之法經云婦人有故無煩亦無煩也六經諸方俱可通用因症加減不必拘方所謂遵仲景之意不必執仲景之方是矣至小兒驚風之妄喻嘉言已闢之即為傷寒剛柔痙是小兒傷寒即遵太陽經治法可矣又吳又可論小兒因溫疫發搐寔非驚風是小兒溫疫即遵陽明經溫病治法可矣推之乍寒乍熱致搐莫非少陽之條上吐下瀉致搐不外太陰之例如戴眼昏睡厥逆吐利即少陰經之陽虛症也四肢牽引直視及張即少陰之陰虛症也其中更有陰極似陽陽邪入陰下虛格陽陰極煩燥陰陽駁雜之症俱關少陰之變候不可不細辨也其寒熱消渴或不欲食而吐蛔或吐酸水無非厥陰之症至于古燥昏乾煩渴不寐大便不通小便便短赤係各經轉入陽明膈胃寔之熱症也若初生門病只要辨胎火胎寒不外火則清之寒則溫之之法小兒五疳即大人五癆雖分五臟宜重脾腎二經腎虛而脾未虛者補腎為先腎虛而脾亦虛者補脾為急滋腎之品且不可用清涼之味斷不可投以脾胃二經乃一身根本也今兒科五疳丸肥兒丸內俱有胡連蘆薈三稜莪朮初病壯寔者尚可暫用若脾虛者堪受削伐乎至小兒麻豆更可從傷寒比例治之嘉言云能治傷寒始能治麻痘誠哉是言也然則婦人小兒可通治男子雜病更無疑矣故惟仲景之方方外有方法外有法合是症使用是方方各有經而用可不拘只有表裏寒熱虛寔之不同並無傷寒男婦大小之各異此余一偏之見有知契者諒不唾為阿其所好云

韻伯者傷寒論翼等書辨訛存真可謂仲景功臣先生又闡述韻伯真旨亦可為韻伯之功臣至言可統治男婦小兒此又古今以來堪稱獨識者矣仲物識

自叔和出而仲景之道晦自韻伯出而仲景之道彰先生處處推服韻伯寔意仲景至婦人小兒亦咸歸六經之節制即謂仲景復生韻伯不死也可玉腕讀

溫疫原考

嘗考仲景先師著傷寒雜病論十六卷自西漢至晉曾患兩朝數經兵燹相傳卒病論六卷久不可復觀矣即傷寒論亦遺亡過半迨王叔和搜羅斷簡殘編不全遺編編為序例以三百九十七法一百一十三方流播人間傳之奕

慎不為無功惜其難以已意以溫病為伏寒暴寒妄立四變攪入傷寒論中以致後學不能出其果白莫不以溫病為傷寒莫不以得寒之方法治溫病混淆不清貽害非淺自吳又可參悟仲景之旨者痘疫論然後知與傷寒治法有霄壤之殊又攻疫症多端有葡萄痘捻頭痘蝦蟇瘟大頭瘟瓜瓢瘟楊梅瘟疔瘡痘軟脚痘絞腸瘟龍虱痘龍指痘癩爪痘版腸瘟結肋瘟蟹刺瘟地葡萄瘟扣頭瘟啞瘡瘡手足麻瘟等名共二十種而又可所論瘟疫特其一耳至霍亂瀉痢喉痺丹毒眼疾咳嗽風溫暑溫濕溫秋溫冬溫俱能傳染故謂之雜疫此感時行不正之氣而成者或寒或熱或寒熱錯雜是當參酌寒溫消息治之若溫疫之症係天地間病尸穢惡疠毒之雜氣無形無母氣交流行人相傳染由口鼻而入先入膜原膜原在半表半裏陰陽交界之區邪伏其中鬱久蒸熱突然而發並無感冒之因人自不覺耳至分佈三焦則三焦如焚火症迭出故溫疫之病從血分傳出氣分陽症居多而無陰症必內潰然後從裏達表戰汗而愈非同傷寒從氣分傳入血分有寒有熱也治溫疫之法雖非一端其要旨在存津液如初起忘表汗恐傷津液也繼則清解毒早下之以存津液也至補陰諸方法何莫非養其津液哉蓋疫癘煎蒸最傷津液惟恐津液澆枯邪毒不能傳化而出至成下閉上脫之危候則不可救治矣余故云治溫疫得其數較治傷寒頗易若不得其數較治傷寒更難傳云苟得其要一言而終不得其要流散無窮其斯之謂與

治溫疫以存津液為主本又可論中秘而不宣之旨此能獨扶其數所以讀書貴在心靈性慧悟其要旨非徒以咕嗶為功也

仲綱識

痢疾要旨

痢疾一症或言熱或言寒聚訟紛紜不能合一偏寒者視桂附姜芩如砒鴆偏熱者視苓連梔柏如蛇虎各執一偏俱非確論夫痢古名滯下又名腸澼俗名為積故痢未有不因停積而成者但積有熱有寒熱者因受濕熱而成寒者由食生冷而得故痢初起不論寒熱赤白俱有腹痛病一陣痢一次有痢無糞必須下其糞身重則痛止而痢亦減要知熱痢當用大黃下之寒痢宜用巴霜下之至辨寒熱之法熱者渴欲飲冷水小便黃赤或瀉痛短少發熱後重臍下必熱且拒揉按脈必滑實有力寒者口不渴即作渴亦喜熱飲小便色白或淡黃臍下必寒且喜揉按脈必沉遲無力白主氣分赤主血分俱有寒有熱若痢而有真者堅硬者為熱稀澇者為寒遠須辨其色若焦黃或如敗醬

色者仍是熱症腹痛或不痛既有糞下則不須用下法矣只須調氣養血如熱者苦苓芍藥湯之類兼血虛者合四物六味以養陰如寒者抑扶佐關煎之類兼氣虛者合溫胃胃關以扶陽再要辨陰陽臟腑為分治素係陽臟者受濕熱諸多即食生冷亦不致成痢蓋陽臟者陰必虛陰虛者多火故也素係陰臟者因食生冷諸多即受濕熱亦不能成痢蓋陰臟者陽必虛陽虛者多寒故也內經云陽虛者陰必湊之陰虛者陽必湊之即易經所謂火就燥水流濕之義也古人治痢以脾胃為主俱用溫補不無偏僻余謂脾胃二經一陰一陽腎命二臟一水一火若脾命虛者是當補陽胃腎虛者是當養陰也故診病必先審陰陽臟腑再以外症辨之是寒是熱或實或虛是無過情矣至于久痢寒熱錯雜者多故古方俱寒熱並用如烏梅丸溫脾湯之類是也大約病雖同而人之體氣不同則病亦因人而異所謂用古人之法不可執古人之方寒熱虛實因人而施方為善治 按痢亦係疫病之一吳又可言疫病無陰症乃千古獨出手眼又言四損者言治損不可獨治疫更為精細余謂今人先天不足者多後天知培養者亦少如勞心過度者則傷神色慾過度者則傷精故陽臟者照吳氏治法無不適妥若陰臟者脾土既虛腎火亦衰寒涼之劑究宜慎用步步俱當照顧脾命不獨四損者宜然也常人體氣薄弱者亦當謹慎調治方保萬善故并及之此篇之法不獨痢症為然凡病俱當照此辨之 仲編識

痘科救偏

嘗聞痘科諸書各偏一見或專溫熱或專清涼或尚疎肌或尚通裏甚有獨特蜈蚣金蝎桑蠶之品一味攻毒者紛紛不一皆非善治要知五者治法雖不可廢當因人而施如皮膚嬌嫩氣虛多痘者宜用溫燥色蒼體燥血虛多火者是宜清涼皮厚肉堅則表必定解肌應施胃強脾健則內多堅通裏當用素生瘡痂胎毒必甚攻毒須投此皆因人治症之良法不獨痘科為然但子不離母乳子之寒熱虛實又當視其母之體為轉移故治痘之要始終以氣血為主氣血若足則起發滋養結痂皆易奏功且痘後無一切雜毒氣血不足則連延時日每少收成痘後且多變症古人治痘忌散忌下成法可遵因散則消血下則耗氣也夫痘之發熱係內毒薰蒸非外邪侵燻果風寒外感者用散藥以解其表或食邪內結者用下藥以攻其裏此係兼治不得已用之非正治法也所以順症不必用藥若外無風邪宜堪誤散內無實熱實可妄下耶其溫燥傷血攻毒耗氣更無論矣况過來壯實者寡怯弱者多惟宜照顧氣

血調和營衛血熱者宜加滋陰氣寒者當投溫補散毒外出效足毒遠始克成功要知散毒血化或所請有一分漿則出一分毒氣血若少誰能託毒外出哉攻毒而不知補氣血何異掘苗助長欲希其不槁未之有也即如起手方製一升麻葛根湯內用升麻提毒外出葛根透肌疎表鼓舞胃氣生津止渴又恐過開腠理用白芍理和陰血用甘草解毒和中只此四味氣血並治表裏兼調神妙無比且云見熱後忌用升葛恐重傷其表也古人用藥慎重如此是痘不宜過散言在章中不可妄攻言在意外矣今痘科一見發熱不論有外感無外感輒用劫散之藥消耗津液津液有傷則色轉深紅一見深紅便為火盛而投寒劑以致氣血冰凝不能起發或津液外傷而點見乾枯或津液內傷而腸胃燥閉或頂陷色嬌本氣虛也而認為火發或平塌黑陷屬血虧也乃誤作熱邪攻散雜投輕症轉重順症變逆害非淺鮮總未解陰氣外溢則熱退陰血內潤則使通之義耳蓋言有云能善治傷寒始能治痘蓋傷寒以存津液為主而痘症尤宜以存津液為主也作此以救痘科之偏以匡時師之弊

治痘以氣血為主使得頂門一針至辨脈時醫通藥更為真切堪擊暗聾

仲煥識

始終以氣血為主此見道之言足補前賢所未備至以存津液為主自從仲景傷寒論悟來知之深故言之詳故有關係之作玉蟠請

痘症原委

按痘毒藏于腎經痘稟于陰而成于陽故痘全賴腎中水火鼓舞送毒外出如發熱三日始能見點發熱三日始能發脹發熱三日始能灌漿發熱三日始能結痂始終莫不以腎中真火為主至陽過盛則腎陰虛宜補陰配陽譬如鍋中水少則飯易焦釜底少火則飯難熟治痘之法豈不賴培補氣血哉要知兩腎為氣血之本腎火為氣之原腎水為血之海火足始能生土生金水足始能生木生火也書言腎經之痘為難治者是因根本先傷陽氣虛不能起服陰血虛不能灌漿然則治痘之法斷不可消導與寒涼也明矣蓋消導則氣破血傷寒涼則血凝氣滯所以倒靨陷伏之禍皆由于此業是醫者不可不知所本哉推而論之不獨痘科為然即百病莫不如是凡人具一太極若陰陽和平則無病如腎中陰虛則肝心之病起腎中陽虛則脾肺之症生至于陽盛陰洩陰敗陽衰之症皆道極中極之候也一宜救陰以抑陽一宜扶陽以制陰若平治之法滋陰可以降火補火即可生氣悟得此中理方是醫中傑

此之謂也

痘症全賴時中水火託毒外出此說未經人道可謂推本窮源之論

濟華譜

又有三四月瘟疫流行之年感受疫氣而出痘有宜用石膏大黃并寒涼之劑者要知係治痘毒非治痘毒也痘毒可以內攻痘毒必須外出痘毒清痘始能出但其症必大熱如烙口渴喜冷小便短赤大便閉結或下利臭水或色如敗醬故當攻下痘毒清則痘始能起服滋養不獨不可溫補即溫散亦非所宜惟養陰之法最善蓋滋陰可以降火也然滋養時亦須補氣參者又所必需薑桂因症酌用又不可執痘毒溫補為法也

痘症用清涼攻下惟痘毒宜寒蓋痘毒可以內攻痘毒必須外托專是科者熱能悟到此理

濟華譜

老幼治法

書言老人多氣少血小兒純陽無陰蓋緣天癸之水男子二八始至八八乃絕女人二七始至七七乃絕也竊謂老人陰既絕陽亦衰安得多氣當言老人少氣少血為是故老人多脾虛之症實由命門陽衰如八味右歸等丸老人服之每多效驗因脾虛釜底添薪之法也亦為陰中補陽所以老人宜陰陽並補明矣至小兒為嫩陽本是無陰賴此一點絳陽以生陰血寒涼之品最伐其陽陽若一虛即成陽絕慢脾之症每多無救或因外邪入裏則變為熱或瘦邪內鬱火燥薰蒸涼解可愈然因病致熱非謂小兒純陽素應寒涼也至于過汗傷陰血燥生風四肢搖擗再用寒涼下咽即始或作慢驚投以溫補服之亦覺要知過汗傷陰血燥生風須用滋補快涼亡陽胃寒脾敗宜投溫補經言快汗亡陽必先亡離家之陰再亡坎中之陽陰虛陽無所附也快下亡陰必先亡胃家之陽再亡脾中之陰陽亡陰不獨存也二語從來快解因并及之所以小兒宜補陰不宜伐陽至驚風之妄喻嘉言已闢之無庸多贅老人小兒諸病原可統治所異者如是宜加意焉

解得老人為衰陽幼為嫩陽使得其數可稱千古夏眼快汗亡陽二語解法亦獨出手眼

仲翰識

嫩陽衰陽之說從來未經人道小兒宜補陰不宜伐陽更為獨開生面此篇乃大開法門

玉壘讀

損傷論治

嘗致損傷治法代少真傳非口授單藥即秘傳抄本不外破瘀行氣之品為非錯治至破傷風之症一味驅風攻毒

恐非盡善有因外感風邪致角弓反張四肢抽搐自應驅風攻毒若因遺精及犯房室而致者大非所宜也當分內傷外感為是蓋內傷所致有血不榮筋有氣不統血者或能補氣養血尚可死裏求生若因擊風攻毒不幾雪上加霜乎所以內傷所致十犯九死職此之故竊思外感者應無汗而瘡痂多燥內傷者應有汗而瘡痂多濕再內傷必脈虛形弱外感必脈實形強再加細問雖不中不遠矣此余一得之見業是科者勿以此言為無稽之談幸甚

以此論推之可見內外科終歸一理玉琥請

臨症扼要

凡治人病若無表邪妄行發散輕則心陰受傷重則腎陽飛越若無寒熱誤為攻下先則胃陽耗喪繼則脾陰消亡無火而用清涼則血凝氣滯無寒而投溫熱則血燥火生若陰虛補陽陰破陽消非枯則槁陽虧液陰陽為陰通不走即飛陰陽兩虧偏補一邊亦非善治難治病之法不外表裏寒熱虛實之辨然在表宜散須審其不宜散在裏宜攻須審其不宜攻虛寒者當溫須審其不當溫熱者當清須審其不當清虛虛者當補須審其不可補寒者可瀉須審其不可瀉處所謂獨處藏好最宜仔細者也或寒熱並用或攻補兼施隨症處方變化無定膠柱鼓瑟固執不通婦人小兒總歸一理傷寒雜病詎有殊途死裏求生不外此法神而明之存乎其人

用意精深鞭達近裡非同面上一爬可謂心細如髮矣臨症能照此法決少錯誤一貫心得其在斯乎仲翰識

獨處藏好另開法眼能死裏求方不愧司命之權功俾良相宜虛譽哉玉琥請

張劉李朱四子論

仲景以後推四大家者張劉李朱是也人謂四子之書可補仲景之未備余謂四子祇得仲景之一隅如張子和主治吐即仲景梔豉湯瓜蒂散之意也劉河間主治火即仲景白虎湯瀉心火之意也李東垣重脾胃非即仲景之中理中湯之義乎朱丹溪專滋陰非即仲景之豬苓復脈湯之義乎四子各守一偏豈若仲景之時中其攻補溫涼無可無不可哉至云仲景傷寒論獨為傷寒而非治雜症試觀其中表裏寒熱虛實陰陽諸法全備雜症俱可仿之為則雖代有名賢雜症諸書不過引而伸之觸而長之預能出其範圍後學果能執讀揣摩則治雜症思過半矣推而廣之并可統治男婦小兒一切雜症所謂遵仲景之法不必執仲景之方是在乎神而明之耳醫中之聖生民以來未有如仲景者也後來諸賢孰不當在弟子之列

四子只得仲景之一隅惟仲景獨得其全體如孔子之時中無可無不可比喻確當至引方據論更為明顯

醫宜通變論

凡醫書中有正言反言常言變言者讀書者須從其正面悟出反面從反面悟出其正面也知其常當通其變知其變當通其常切不宜膠柱鼓瑟也審矣如脈訣云人迎緊甚傷于風氣口緊甚傷于食設人迎緊甚而其人並無發熱惡風表症當知其為血虛陰虛也設氣口緊甚而其人並無胸滿噎塞症當知其為氣虛陽虛也丹溪云氣有餘便是火嘉言云氣不足便是寒兩言似屬相背要知氣有餘邪氣也邪氣有餘便生火氣不足正氣也正氣不足便生寒即一正面一反面也仲景治少陰症因胃寔致心腎不交用大承氣湯下之嚴用和治脾虛心腎不交割歸脾湯主之即從仲景反面悟出也男女不交用黃連牽引之義所云肥人氣虛多瘦瘦人血虛多火男人多氣少血女人多血少氣南方多柔弱北方多強壯此言其常也亦有反是者總當因通不可執一故凡診病不必論其肥瘦男女南方北地只須問其平素或係陽臟或係陰臟為準則如陽臟者平素必不喜熱物倘受寒邪熱藥不宜過劑養陰為宜或受熱邪則寒藥當重也陰臟者素常不欲冷物即受熱邪寒藥不可過劑補氣為先或受寒邪則熱藥弗輕也至于小兒純陽無陰老人多氣少血更當活看蓋小兒為嫩陽老人為衰陽嫩陽衰陽非強壯比故小兒宜

補陰不宜伐陽老人宜補陰兼補陽陽生陰長理所必然凡治小兒以六味治老人以八味往往見效職是故耳
治病以陰臟陽臟為準則讀書以正面反面為變通已得金針矣仲綱識

從正悟反從反悟正靈機滿紙先為醫學指南至云小兒宜補陰不宜伐陽乃千古獨見玉蟾請

古今治法無異同論

余初習醫所讀者惟宋元明諸家之書其所論俱為今人體氣薄弱謂仲景之方宜于古而不宜于今只取平和之劑畧峻險者俱不收用各承家技自製新方將仲景之方書置之高閣久矣其偏于溫補者每遵陽能生陰之說不獨岑連知柏畏其寒凝即丹芍地冬亦所忌用其偏于滋補者又守陰常不足之論不但桂附薑芫視若砒鴆即香砂丁蔻亦不輕投至攻散之劑更無論矣以為寔而誤補不過增病病增者可解虛而誤攻必先脫元元脫者無救請之似屬近理故每以補字橫于胸中作為枕中之秘不曰陰虛陽虛即曰先天後天然效者半不效者亦半又以為王道無近功日後一日聽之氣數束手待斃今之良醫大抵如斯也竊思仲景為醫中之聖其著書立說當為久遠計非為一時計也豈有宜古不宜今之理如三代之禮至今不易所損所益百世可知况藥以攻病有是病則病受之若是無病不獨峻劑能傷正氣即和平之品亦堪殺人有是病而不用是藥則姑息養奸輕症轉重重症轉危矣夫攻病如攻敵用藥如用兵兵在精而不在多藥貴當而不在忌峻如仲景之方只用數味寒熱攻補各盡其妙且攻賊即是安民驅邪即以養正六淫之邪猶賊亂也七情之傷猶民變也賊亂可攻民變宜安固不可認賊為民又不可將民作賊如大寇已去只須安民而餘黨自散即養正可以逐邪之義若首惡未除賊還復聚又當安內以攘外矣能于仲景諸方細加揣摩則臨症有握要之機用藥無畏縮之弊古今豈有同異哉倘認症不確又不若和平之劑為穩所謂臨事而懼好謀而成治病者亦作如是觀

無偏無黨道合時中至攻病如攻敵一段有經有緯治國之道臨陣之法俱不外是仲綱識

攻劑宜輕補藥當重論

仲景之方攻補並重左右咸宜余曾有古今無異同論益又以攻劑宜輕補藥當重之論冀不自相矛盾有背聖法乎蓋另有一說姑申論之因邇來補藥價昂攻藥價賤凡物之珍貴者必有破缺雜玉魚目混珠之弊人心不古弊

張為幻不獨人參鹿茸多假少真即者木桂苓亦難道地至攻散之味則有其無假矣故用攻劑每易奏功一投補方即難見效况古方中溫涼攻補之劑俱用人參駕馭其間則溫不燥血涼不敗胃攻不傷氣補則功捷今既無參一味攻散則人既困于病復困于藥邪難倖去而正氣不傷者寡矣此猶用藥合法若孟浪攻擊者害尤非淺今人病後往往難得復原職此之故學之無紀之兵民解不受其害初累于賊繼累于兵民未有不憔悴者也所云攻劑宜輕補劑當重者此也其中權宜是當通變言雖無稽理或有合爰作是論請質高明

洞明世務練達人情酌古宜今利弊通微 仲煥識

因時制宜醫林妙手累賦累兵比喻確當可為資治要言不獨醫學宜理法則 玉蟾識

按張景岳所著理陰煎六味回陽飲胃關煎之類俱用熱地加入桂附薑艾即為扶陽之劑想亦因人參價貴難以合用不得不別開一徑以為扶陽之助亦見其一片苦心後人應聞之言陽已虛更用熱地滯膩之品豈能回陽等論未免太過不觀八味湯丸陽虛之症古人皆宗之太僕所云益火之原以消陰翳是也景岳未嘗不倣此意蓋熱地得桂附補命火以生脾土土旺自能生金是補氣之源也愚謂陰虛陽衰之症以救陽為急如四逆薑附等湯所宜如脾胃虛寒者則理中溫胃為宜若陰陽兩虛者景岳請方何妨選用寒重者桂附薑艾是宜重加往往得效據云有雲騰致雨之妙豈虛譽哉 自識

方不在多貴加減得法論

近世醫家不推病由務求名目一症數方以多為貴久矣竊謂治病學治罪立方同制律加減猶比例也罪條不等總不外斬絞流徒杖責之律病症無窮亦不外清溫補瀉攻散之方從寬從嚴比例擬處或輕或重加減權宜蓋律是死法而比例是活法也方是從經而加減從權也如仲景之方猶之古律諸家之方皆比例而出也藥方雖多總不出古方之範圍故方不在多而貴加減之得法即仲景立方精而不雜以六方為主諸方從而加減焉凡汗劑皆本桂枝吐劑皆本旋乾攻劑皆本承氣和劑皆本柴胡寒劑皆本瀉心溫劑皆本四逆瀉而數之共成一百十三方皆從加減而出也推而廣之補氣不外四君補血不外四物化痰不離二陳解鬱不離越鞠如薛氏醫案方不滿百其因症用方左右咸宜出神入化何莫非加減之妙哉能得其理一言而終不悟其理流弊無窮其斯之謂歟

立方向制律加減猶比例配法活法從經從權議論的確堪稱老吏斷獄仲論哉
用古入化貴在加減寔不易之論熟搗經方自有左右逢源之妙 玉塘論

陰陽不可偏補論

諸書所言補陽能生陰之說余竊有疑焉夫陽生陰長蓋謂孤陽不生孤陰不長陰陽不可偏廢也如人既陰虛火燥矣再去補陽則陽益旺而陰益竭况陽附于陰陰虛則陽無所附又烏能生陰耶譬之于苗賴水以養若水已乾再加烈日則苗槁矣必沛然下雨始能勃然而興此顯而易見也惟補氣可以生血即金能生水之義非陽能生陰之謂也夫補氣補陽原有分別內經曰勞者溫之係溫存之溫非溫熱之溫也一字誤解天懸地隔矣余謂陰陽不可偏補陰不離陽陽不離陰陰陽相配天地以位萬物以育如古方中六味丸復脈湯補陰藥也內配萆薢桂枝之陽味是矣其中湯附子湯補陽藥也內皆佐芍藥之陰品是矣諸如此類不可枚舉至四逆吳萸芩湯乃治有陰無陽之症係救陽非又補陽也又如白虎黃連等湯乃治陽盛陰消之病係救陰非補陰也所謂陽為陰運不走即飛陰被陽銷非枯即槁專於補陰固非盡善專於補陽亦非盡善也

補陽生陰之誤苗槁一喻駁得痛快宜陰陽並補之理亦說得暢透 仲論識

陰陽不可偏補自根據內經而非舛說至引方指症更有神悟是非襲說者 玉塘請

稿謂夏至一陰生冬至一陽生二語註解有言夏至陰長陽衰宜扶陽抑陰冬至陽生陰弱當理陰平陽有云一陰初生止陽盛陰衰之候一陽初長止陰旺陽衰之候一宜補陰一宜補陽兩相刺謬二說俱非無理然藥以治病非以治時有是病即用是藥原非可以時拘也如冬寒熱寒亦當施夏日病寒熱亦可用陰陽藥病又當兼補陽以引陰陰以引陽不可執一責在圓通吾人讀書不能細心體悟另出手眼鮮不為偏見所誤者也因並識之

凡治病不外先天後天固以脾胃為主矣然後天脾胃一陰一陽宜分先天腎命一水一火宜別蓋腎水虧則生火而脾胃亦必枯槁腎水虧則生寒而脾胃亦必濕潤非謂補後天即宜溫燥補先天即宜滋潤也 自識

診病須察陰臟陽臟平臟論

凡人陰臟陽臟平臟本性使然如素係陰臟者一切飲食必喜熱物偶食生冷腹中即覺凝滯不安大便一日一度

決不堅燥甚則補湯食不消化若係陽臟者一切飲食必喜寒涼偶食辛熱之物口中便覺乾燥甚則口瘡咽痛大便數日一次必堅硬甚則燥結腸疰當先詢問再辨其病之陰陽陽臟所感之病陽者居多陰臟所感之病陰者居多不獨雜病傷寒亦然如醫宗金鑑治傷寒法以寒化熱化分理以陽臟者多熱化陰臟者多寒化也故陽臟患傷寒溫表之劑不可過用涼攻之劑不妨重用也陰臟患傷寒溫表之藥不妨重投涼攻之方不宜過劑也難經曰陽虛者汗之則愈下之則死陰虛者下之則愈汗之則死蓋表不達熱下不達寒陽臟者陰必虛陰虛者多火陰臟者陽必虛陽虛者多寒故也內經云陽虛者陰必湊之陰虛者陽必湊之此之謂也至于平常之人或寒飲或熱食俱不妨事即大便一日一度不堅不溏若患病者係熱者不宜過涼係寒者不宜過熱至用補劑亦當陰陽平補若過熱則傷陰過寒則傷陽最宜細心斟酌此診病用藥第一緊要關頭臨症時能如此體會雖不中不遠矣

仲翰識

將陰臟陽臟平臟三種之體用藥之法曲折描寫原原本本俱從內經悟出非同尋常枉撰者比定為後學津梁

疫症關係全在虛寒二字論

又可先師著溫疫論一書洵可謂獨闢鴻蒙堪謂之寶筏第其書專于攻邪善于補正雖有四損不可正治之條惜未將四損之義逐細詳明列于各條之下似乎虛症原屬罕有然今之世虛損之人十常八九寒熱之輩十無二三故凡病疫者氣血多虛經云邪之所湊其氣必虛間有體實之人而感者邪受不深不藥亦可自愈以正氣素是邪毒易于傳化精血素風津液不至燥乾故不藥自可得汗而解毋見定症之始被庸醫誤投麻桂亦不至于死者有之若體虛者感之邪受必深斷不可誤聽勿藥自愈之說不過較之誤服溫散為緩耳蓋疫毒伏于膜原薰蒸腸腑些微之氣血逆蒸而敗敗極則陰陽脫于外邪毒伏于中未有不終于內閉外脫者也余見此等損症有被俗醫誤服硝黃其有不至于危者鮮矣噫定症候服麻桂得經妙手尚可挽回損症候服硝黃雖有明醫不可救藥治虛損之症可不慎歟故孔以立云人參雖能固邪然氣虛不能傳化者非人參何以砥柱中流地黃雖膩隔然陰虛不能作汗者非地黃何以澤枯潤燥倘執祛邪存正之說擅用攻瀉不知正氣衰微必不能敷布津液坐令虛人多致暴脫即不暴脫亦必委邪沈墜終至不救余治實熱之症議加逐邪存正之法虛損之症議用補正祛邪之治其氣虛

古今醫論
者于祛邪解毒中倍加人參以補氣托邪貧者以黨參沙參代之其血虛者于祛邪解毒中倍用地黃以養血作汗但臨症之中惟陰血虛者諸多因瘦症多屬熱病熱邪最傷陰血故余治陰虛熱甚者惟玉女煎諸養榮湯之輩陽盛而熱甚者惟三黃解毒犀角地黃之類間有陽虛者亦惟參麥四君輩桂附究不輕投即有過服寒涼者暫與一劑陰氣潛消即止後服仍以養陰為主固不可以寒症而投虛損之方更不可以虛症而用寒熱之法虛寒一差毫釐千里未有不夭枉民命者也故臨症時務宜于虛寒上細心求之設辨之不明識之不廣膠滯一說必致一悞再悞或始悞而終悞也虛寒二字可辨之不早辨哉

今之醫生其未讀溫疫論者固無足論矣即有讀過溫疫論者膠柱鼓瑟物而不化執一達原三消與承氣攻瀉之方至養陰之法全不講究又何知詳辨四損之症誰知顧今人體弱之多耶得此暢論則又可四損不可正治之旨益彰明顯著矣

陳濟華讀

序

治疔之法向無專書南渡時有救急仙方皆載瘡醫之術所論疔瘡甚詳惜原本與作者姓名並佚

天祿秘鈔不可得而窺也無專書遂無專家鄉曲逆旅之人倉卒肉墳未及延醫誤犯口戒每不治即有能治之者未得數要雖有明堂秘傳安能扶危于頃刻間哉吳門張君營亭游于浙得鈔本于慈谿應氏繼于他處得刻本二種參攷異同原其本皆按經循絡逐刪疑就簡合為一書前舉要言各穴繪以總圖治法編成歌訣附以膏方名曰治疔捷法王君誠三惠指疔膏亭為之治病若失索其書亦不秘王君以之療人輒效繼增以考正穴法願付手民以廣其傳而求序于余余向不精岐黃之術嘗讀古問諸書間有疑義輒為通其說願以舊史退居田里生道

聖世無補

堯舜施濟之功往往滋愧此書一出使黃童白叟悉免顛連救之救急仙方斯真無媿非特余所深幸古人亦無湮沒之憾矣是為序

光緒丙子春仲德清俞樾撰

序

瘍醫諸證惟疔為不易治亦惟疔為最易治得其法應手而愈不得其法有朝發夕死者良可憫也乙亥夏余患指疔已潰勢甚劇外舅小林先生謂答亭張君善治疔即往造其門求為一刺不日而消是秋復患唇疔刺之立愈奇其術觀其書則按經循絡探本尋源信為可傳蓋梓諸先生再三謝謂治疔雖有見效尚未逐疔經驗未敢問世也豈得書後見有患是證者輒遵法治之皆效里中有患疔死者既死始聞之向使蚤治或可救蓋深自咎傳布之遲矣然必待先生逐款經驗而後梓非惟是書弗彰而如里中人者庸豈少哉亟付梨棗以廣其傳竊以取穴之法未必盡知毫釐之差千里之謬謹按針灸大成逐穴註明俾暗是書瞭如指掌家置一編不致臨時倉皇矣語曰能近取譬可謂仁之方也已質諸先生當以為然

光緒二年丙子仲春長洲王翬書于小輞川

同治癸酉秋 宗兄答亭自浙慈歸過余齋徽談別緒出示治疔拔法一書曰得之于應氏藏本頗有效驗夫治疔之法莫詳于醫宗金鑑及癩科大全皆以排膿提毒為治而循經刺穴却未曾有乙亥夏王增緘三患指疔求治于余余曰何不于答亭一刺乎即隨試之經刺果不日而消不藥而愈蓋信是書之不虛為拔法也遂囑緘三付之手民以廣其傳俾窮鄉僻壤皆有是書按穴施治可無舛枉矣是為序

光緒二年八月平江小林張振家書于三影園

浙慈應侶篁先生精于治疔之法昔年過蘇適有患疔者見其按穴刺之不日而消庚申夏余避難遑旋因訪友航海至慈而侶篁先生已歸道山哲嗣答躬余通家誼也出示書曰此先人手澤治疔法也遂錄其原稿歸于他處購得刻本兩種校對畧有異同參其異旨皆按經循絡而治其本泄其毒也惟間有裨出難效者不揣鄙拙畧為刪繁就要詳明經絡各穴繪以總圖治法編成歌訣以便臨症之易于檢攷也王君緘三謂是書之有益于世足以輔外科之要旨出資雕板以廣其傳爰述是書之緣起云爾

光緒二年仲春吳縣張鏡書

刺疔拔法



南雅堂醫書外集

吳縣張鏡書答亭甫著

長洲王鑒緘三甫校刊

治疔要言

凡疔症發于頭面手臂者多發于腹背下部者少初起時一小瘰或癩或癢而不痛漸即腫大急須戒口一切魚肉葷腥煎炒發食務要忌淨治法先看疔之發于何處翻閱歌訣用小鎌刀或三棱針按穴輕刺畧為出血隨以麻油和食鹽熏穴上以透泄其毒切勿將疔頭刺破為要即以疔膏藥隔水溫軟捏扁貼于患處初起二三日立見消化無須服藥矣如疔頭掀腫者膏藥外用鮮菊葉搗爛塗之即能消腫再用菊葉搗汁服之神效菊葉種類甚多惟深秋開花者方可入藥若遲誤至六七日未食發物尚可見效若疔頭破爛或食發物者須防毒陷難治更或寒熱交加務須延醫審脈定方外內兼治矣毒甚者先服蠟礬丸以護心包庶免內陷之虞大凡疔症用藥以清涼解毒為主勿用散藥及羚羊角之屬舊本類有成方未免難出劑之不錄





治疥效

鶴頂疔生督脉經宜刺百勞與天庭印堂人中與尾氈委中兩穴保安寧

天庭疔從尾氈刺肩井面巖百勞治挿花類車與地合中衝一穴須刺至

天門疔刺尾氈穴肩井地倉又龍古地合面巖與挿花百勞一二至三節

太陽生疔關衝刺百勞七節須挑至地合肩井與印堂大敦竅陰穴當誌

前髮際疔尾關決球跳竅陰是要穴地合百勞與曲池熱刺兩穴又龍古

挿花疔屬肝胆經髮際印堂刺甚靈百勞七節與地合竅陰大敦保安寧

大頭疔發頭腫大急刺尾氈可安泰天庭地合與百勞中衝一決可無害此疔起于印堂上寸許毒重則頭腫大

印堂疔刺尾氈穴關衝百勞人中決更刺兩顙井面巖心肺火毒可瘡滅

山根疔刺尾氈穴百勞挑至第四節人中地合與印堂兩顙骨上亦須決

眉中生疔肝脾熱須刺隱白大敦穴地合兩旁食指尖脚穴百勞七節與龍古

眉燕眉稍兩處疔才咬龍古曲池經百勞大敦與隱白肩井一決保安寧

上下眼胞若生疔隱白厲兌與天庭更尋曲池并龍古中衝穴與委中靈樞摩逆患處

鼻節疔向印堂決百勞關衝尾閭穴天庭地合與承漿兩口角旁是要訣

鼻環疔向尾氈決百勞一節至四節地合印堂兩顙車關衝穴與外龍古

穿鼻疔須刺關衝地合天庭地倉通面巖印堂與厲兌尾閭一決即能鬆

迎香疔刺商陽穴合谷曲池尾氈決地合百勞與天庭陽明熱毒即除滅

散笑穴疔刺尾氈唇內齒根印堂症可除百勞關衝與地合天庭印堂刺即舒

鼻尖疔向人中決地合印堂兩龍古

顙骨疔刺厲兌穴小指外側少澤決內外龍古與大敦髮際左右看分別生左決右

面巖疔刺厲兌穴天庭百勞兩龍古大敦地合與印堂髮際關衝類車決

頤疔宜從肩井刺高陽合谷曲池至

顛膠疔又名對齒小指外側少澤使合谷一穴左右分姓祛祛中街一穴刺乃至

牙咬疔刺合谷穴手三里與曲池決疔旁上下左右刺地合中街兩頤泄

頰車疔刺合谷穴地倉少商肩井決

上反唇疔中街決委中面巖是要穴唇內齒根各斷交印堂關衝與龍舌

下反唇疔加地合其餘俱照上反唇^{照上}之^{照上}取州地合

人中疔刺尾闕穴斷交委中是要訣天庭地合與印堂百勞刺至第三節

吊角疔刺承漿穴十指尖與地倉決委中隱白與耳湧肩井巨骨是要訣^{此疔又}

鎖口疔刺地合穴天庭印堂與龍舌耳湧耳垂與委中面巖中街是宜泄

地合疔向髑骨決承漿兩額天庭穴中指尖根各一鍼男左女右有分別^{中指尖即中街穴指腹}

耳下項疔合谷治插花肩井面巖使再兼環跳與巖陰百勞印堂俱宜刺

耳門疔屬三焦火肩井合谷刺甚安腕後外關與關衝中街穴內刺亦可

耳湧疔刺合谷穴更兼肩井又龍舌中指尖根各一鍼百勞七節亦須決

耳後生疔屬膀胱肩井至陰而巖當中指尖根各一刺百勞委中與印堂

後髮際疔刺至陰尾骶骨上二節尋肩井百勞委中決數處排泄患無侵

正對口疔屬腎脈頰刺尾骶是上策天庭地合與印堂百勞委中可解危

偏對口疔刺至陰印堂尾闕委中鍼地合百勞二節刺膀胱毒解患無侵^{用九兩筋花根射于二林}

舌尖生疔心火熾中指尖頭^{脚中}須一刺百勞承漿與印堂少衝少府為之使^{川連五分連心五}

喉內患症鎖喉危兩少商穴刺即鬆^{用刺土半味一兩鮮馬刺根一兩同拔再用金果前中末一錢毛炭}

喉旁生疔發痘後可刺少商合谷口

肩井生疔刺龍舌後谷穴陰是裏穴地合訣並與曲池髮際印堂尾闕決

取下生疔名扶爐肩井巨骨與少衝

卧胸疔又名井疽中脫關元氣海居百勞三節又七節起初即刺可消除

手掌疔生勞宮穴腕骨內關中衝決臑骨曲澤與印堂六處刺之毒自泄

紅絲疔從脉門起先斷絲頭刺可止寸寸挑至近疔頭中衝穴與龍舌使紅絲疔有從合谷發者挑法俱先從紅絲起處

當頭先刺寸寸挑至近根始有白泡須挑破之

手槽疔生感靈穴可刺肩井與龍舌更加肘骨與曲池四處記取是要訣

螺紋疔生大指頭雲門尺澤有米由 食指生疔刺合谷曲池龍舌不須憂 中指生疔刺曲澤內關龍舌細推求

無名指疔關衝刺肩髃外關可參謀 小指生疔刺腕骨後谿前谷穴須搜 初起俱將豬胆奎指根一决症

可療

又手指生疔不論何指初起速將豬苦胆塗于指上即能消腫或用黃連蜈蚣研末雜于清油敷患處 指根者即患疔之指根第三節近掌處如患大指即刺大指根如患食指即刺食指根餘依此

手背疔屬手少陰腕骨外關龍舌鉞四圍微細針刺雄黃數解患無侵

背脊疔屬督脈經尾氾委中百勞靈

臑骨生疔刺屬兌膝眼委中刺無害

湧泉穴疔百勞刺陰谷太谿為之使脚虎口中須一針前後隱珠俱可治

肉龜疔生脚背上其形似龜病難量急用銀針刺四圍艾火疔頭可無恙

神效膏方

松香 二十兩用桑柴灰煎汗澄清入松香煮爛取出納冷水

百草霜 五兩如煤可下篩淨細無聲為度掛茶烟煤無用

去油乳香 三兩細研 白蠟 二兩切為末

黃蠟 十兩制水 麻油 六兩 去油沒藥 三兩細研 銅綠 五兩研細過篩再

選吉日淨室焚香齋戒修合忌婦女雞犬及孝服人見用桑柴火先將麻油入鍋煎滾後次下松香候稍滾再下

白蠟候稍滾再下黃蠟候稍滾再下乳香候稍滾再下沒藥候稍滾再下銅綠候稍滾再下百草霜煙滾過數次

于鍋內冷透搓成條子丸如柱圓核大收載瓷器內臨用取一丸呵軟捏扁切勿令見火貼于患處頃刻止痛火

日腫消即愈已破爛者貼之亦可實然神效之速百發百中疔瘡藥之至寶也此方活人甚多而需費無幾務望

諸善士或合藥或刻方廣為施送費甚小而功甚大也 忌食葷腥煎炒辛辣沸湯大熱生冷麪食豆腐茄子王

瓜酒肉等物

考正穴法

長洲王鑿絨三甫輯校

頭部

鵝頂當頭頂從鼻直上入髮際三寸半 天庭當頭從鼻直上入髮際五分

插花兩旁一寸半髮際 太陽眉頭臨中髮際上是穴忌刺

印堂兩眉間 眉燕眉頭 前髮際太陽穴

鼻環鼻兩側 額骨額骨 穿鼻兩旁

耳湧耳尖上捲耳 耳垂耳垂 耳門耳前也肉當耳

迎香鼻下九分 散笑迎香穴 額髁額骨

牙咬頰下 頰髁頰骨 地倉口吻旁四分

天門兩額角

面巖兩旁

耳門耳前也肉當耳

額髁額骨

耳門耳前也肉當耳

額髁額骨

地倉口吻旁四分

類車耳下入分曲取之

吊角兩角

承漿開口取之

地合正銅

人中柱下近孔

衝交正中齒門

後髮際兩骨下

正對口口頭骨上

偏對口位兩旁

耳後旁光骨處

脛腹部

肩井骨上臨中

巨骨骨上尖端

肩髃骨上臨中

缺盆骨下

中脫骨上

雲門骨下

魯中骨下

氣海寸五分

闕元三寸

背部

百勞骨上

燕利骨上

尾翫骨上

環跳骨上

燕利骨上

尾翫骨上

手足部

龍舌尺澤

外龍舌尺澤

十指尖十指尖

肘骨尺澤

威靈骨上

臑骨骨上

膝眼骨上

少海骨上

尺澤骨上

少衝骨上

少府骨上

少海骨上

中衝骨上

勞宮骨上

內關骨上

曲澤骨上

少澤骨上

前谷骨上

後谿骨上

腕骨骨上

合谷骨上

外關骨上

高陽骨上

關衝骨上

手三里骨上

曲池骨上

隱白骨上

手三里骨上

曲池骨上

隱白骨上

陰谷 脇內腋後大筋下小筋上結之應子屈膝乃得之

太谿 足內踝後五分跟骨上動脈陷中

湧泉 足心陷中屈足撻指宛宛中白肉無筋取之

前後隱球 形象穴前後

大敦 足大指端去爪甲

委中 腓中央約紋動脈陷中令人屈伏地取之

至陰 足小指外側去爪甲

竅陰 足小指次指外側去爪甲

厲兌 足大指次指之端去爪甲

考穴取寸法

頭部

直寸用前髮際至後髮際折作十二節為一尺二寸前髮際不明者取眉心直上行三寸後髮際不明者取大椎上行三寸前後俱不明者折作一尺八寸並依此法取之 橫寸用眼內眥角至外眥角為一寸並依此法取之

膺腹部

直寸取中行心蔽骨下至臍共折八寸人無蔽骨者取歧骨下至臍心共折九寸依此取之 橫寸用兩乳間橫折作八寸悉依此取之

背部

大椎穴至尾骶骨穴共計廿一椎通計三尺 上七椎每椎一寸四分一釐共九寸八分七釐 中七椎每椎一寸六分一厘共一尺一寸二分七釐 下七椎每椎一寸二分六釐共八寸八分二釐直寸悉依此取之 取橫寸法與手足部同

手足部

取寸用男左女右赤中指第二節內廷兩橫紋頭相去為一寸取福秤心量或用薄篋量皆易折而不伸縮為準如用繩量則伸縮不準此謂同身取寸法圖詳于後

附治取折鍼簡易法

摩指甲角塗鍼口鍼頭即出如神

以藥物治肺癆症乃彌縫之策耳若言根治療法斷不可僅持之以奏效吾國患肺癆者多半持服藥主義是與此症大反對者也余幼時學醫同班中有患肺癆者服藥殆遍病不少動卒以出學力求衛生始復輕減畢業後從事于各醫院前後診察肺癆患者逾千數就經驗觀之此病之醫愈於藥劑者百無一二其能確實治愈者皆善用天然療養法者也醫藥一項僅為之補助耳茲將此法之內容謹為病家陳之

大凡人體對於外物本有天然之抵抗力不幸而為外物所侵仍足以相持至勞窮力盡而後已故此抵抗力者誠為吾人活命之機關而於肺癆病患者尤為生死之所係也肺癆之起乃一種結核菌侵害肺臟所致肺愈弱者侵害愈速肺強者則反是故病之輕重遲速不能以日月計當以個人之抵抗力大小計之其抵抗力之最大者雖有結核症而終身無患焉然則醫治此病無非一抵抗之力問題欲增添此抵抗力使結核菌無隙可攻以致消滅即謂之天然療養法也此法包括六種(一)為空氣日光療發(二)為飲食滋養療法(三)為休息療法(四)為運動療法(五)為衣被之調攝及皮膚之衛生療法(六)為補劑療法

(一)空氣日光療法 此乃諸法中之最要者能實行之他法皆易事耳患者如無重大變症晝夜二十四時宜呼吸戶外之新空氣無論身熱與否氣候變換與否有無肺膜氣管等疾患與否皆可行之即陰雨天氣亦不可稍加限制若至重霧時窗戶仍須洞開惟張以紗網使排障空氣中之不潔物質最妙之法在使患者終日卧坐於戶外若四肢寒冷可衣着溫暖家有花園者可於園中搭一玻璃涼棚棚頂須前面斜向上方後面斜向下方自前至後長約四尺六寸頂之中另設通氣法頂之四緣亦皆以玻璃此頂或須能旋轉者或須固定者皆可隨意建造棚之四面皆空如有風雨可用屏風遮蔽夏令不宜用戶外空氣療法餘時皆宜用之天時愈寒空氣愈佳惟須多穿絨毛之衣衫而已

夜間安卧能於戶外最佳在肺癆病院之患者多半卧於棚下如患者確有不能卧於室外之狀況則室中窗戶亦須洞開卧牀宜近窗口室內陳設一律除去如有塵土烟霧窗上可張以輕紗

日光空氣療法簡而易行惟體弱患者必不樂從殊不知此乃最穩妥最省費最效驗之治法各國著名病院醫愈肺癆患者歲以千萬數端藉於此即病之最危險者亦治愈焉誠不可輕視也

(二)飲食滋養療法 此法無非在飲食上注意視食量之增減而定飲食之時間種類及多少然與第一法須合併行之患者既獲空氣日光其食量必大增能隨意飲食毫無勉強惟欲預防傷食其每餐距離之時間必以四時至五時餘為度早餐約在九時午餐一時半晚餐七時三餐之外禁食他物食品須精美適味烹調既佳安用藥劑之調理哉茲將各種食品臚列於左患者可選擇更換食之

早餐之食品 牛乳烤焦之面包牛油蛋鮮魚生肉片茶加菲查可辣脫稀粥

午餐之食品 美味之湯羹生牛肉須搗碎魚嫩牛肉排烤牛肉嫩雞野味各種鮮嫩茶蔬鮮菓乳油牛油牛乳軟熟之米飯烤焦之麵包

晚餐之食品 與午餐同但宜輕減

如上開食品仍不能消化當易以最簡單之食品專用肉食療法或將生牛肉羊肉亦可搗碎略加食鹽食之每日食一磅至一磅半分二次食之或製牛肉汁飲之製牛肉汁法以牛肉半磅和以冷水半大碗食鹽半茶匙按華氏一百度之熱度蒸一時半二時許然後納於布袋內擠出之如有壓力之器可選壓出肉汁不必和水或作牛肉羹服之牛肉羹製法以肉半磅搗割極細和以熟牛乳少許使成面漿狀然後加入華氏一百五十度之熱牛乳半大碗乘熱飲之惟肉須新鮮牛肉汁亦須製成即飲如隔片時肉質敗壞食之即難消化而起腸胃病或問食生牛肉腥味難堪實與中國人之口味大不宜有無變通辦法乎余曰廣東人吃宵夜將生牛羊肉切成薄片在熱鍋中略盪即食之與此法相仿如嫌上法煩瑣不使者可照此變通亦可但煮熟之牛羊肉食之有損無益西人曾以肺癆菌種入犬身犬得肺癆後如飼以生牛肉體重頓增肺患輕減後餵以熟肉犬即消瘦馴致虛脫故生牛肉之與肺癆實有補益之功此其明証也與生牛肉有相類之功效者為生雞蛋但須新產者每次食前食生蛋二三枚僅和食鹽少許切不可與牛乳及他飲料相和如嫌太冷可溫暖食之如牛肉與蛋二者均不適於消化可飲牛乳以代之消化愈少愈增其牛乳之飲量而減少他食品若僅持牛乳為滋養料者雖日

飲三四瓶亦不為多至牛乳之飲法或以苡米湯沖淡飲之或加蘇打水或和咖啡古古等香料或加消化藥或和以紅茶雞蛋等均無一定總以調和患者之腸胃適於消化為宜至於牛乳與生牛肉可時常更換食之但每日之食量宜隨消化之強弱而定

(三)休息療法 休息之長短視患者脈搏之緩速及體溫之升降而定如體溫升降無定脈速而軟弱宜全休息若脈搏每分鐘九十至體溫升至華氏一百度半者宜完全休息除脈搏體溫之關係如有吐血咳嗽者亦宜完全休息惟體溫與脈搏日現穩健之象休息時間可以減少每一二小時可緩步十分至十五分而以餘時休息始體質稍強運動漸可加增每日上午步行三刻或一小時下午亦如之餘時仍安靜食前食後均休息三刻時問若按此繼續行之不生險象殆體力大增可坐汽車馬車出外遊散

(四)運動療法 運動之增減須視乎脈搏與體溫之情形而定之如兩者均持穩健之態度則運動可漸加增矣但運動之中以步行為最適當但須輕緩從容約每小時行二三英里許不得稍及急迫亦不可談話先在平地履行及體力漸佳可步行山陂之地最後可每日上山行走至運動已無危險可漸及遊戲如游獵印度棒鉞之操演(但須輕小者騎馬踏自行車皆可試行惟打球等戲終嫌太急尚不相宜此外復有練習深呼吸之一法或在曠野或在窗口練習極深極緩之呼吸並非閉口行之也居常所坐之椅須令背部挺直切勿欹斜間時將臂上下前後運動亦有裨益在英國愛丁堡城之肺癆病院內凡患肺癆者其運動共分三期第一期完全休息自數日(至數禮拜不定)第二期遊戲運動步行(先在平地後在陂地自四分至一英里至五英里)深呼吸等是也第三期為工作運動隨患者之所好任擇何種之工作此等工作又分甲乙丙丁四級甲級最輕者如檢紫草等乙級次輕者如提籃灌花等事丙級稍輕者如栽花種草耘土等事丁級重者如掘溝鋤木推小車等事

(五)衣被之調攝及皮膚之衛生療法 皮膚有蒸發排洩之功用如御厚衣衾則皮膚不獲宣洩自由與衛生大有妨碍所著之衣料宜用羊毛絨屬臥室卧牀切勿懸挂帳簾既碍呼吸又妨皮膚之蒸發衣宜寬鬆通體便於運動能保護體肉之熱度為限凡胸部腰部圍纏厚物者悉宜摒除每日可用溫水或冷水搭拭皮膚隨即抹乾使其活動則血脉暢旺感冒不易矣

用藥法
(六)補劑療法 補劑對於肺癆無非欲滋養患者以增加其抵抗力而已魚肝油者乃通常之補劑然須視消化之如何而量為開服牛油乳油及他種動物油皆可代之無論何種油質須投患者之所好勉強令食殊覺無益麥精一物頗具滋養性可與魚油合併食之此外有數種補劑如次亞磷加里次亞磷鈉次亞磷加爾知亞謨同有補益之效英本草內有復方次亞磷糖漿即含此等藥劑在內可以服用又砒石水(一名弗列爾水)及蘇打加苦凸來脫兩種藥劑如久服之能補血強身但每服多日須間歇十餘日不可連服

更換氣候療法亦為治肺癆之一種惟按最近之調查確知其肺病於無甚重大之關係世界上無論何地何種氣候皆有肺癆發現惟在空氣較佳日光較好氣候較和之處患者較易調處而已更換氣候常有種種不便無論旅館病院每不若家中之安適既需巨費又勞跋涉如貧而無力更難措手故不可輕於嘗試也凡病根已深或身熱不退尤忌連動如照上述六種療法在家切實行之殊勝於他往茲將各種氣候分別論之

一海濱及海洋之氣候 海濱空氣既清日光又佳寒暖平均是真利於肺病惟風浪時作沙土橫飛潮濕尤甚每令人厭惡故此種氣候仍不足以治病不過有肺患者可藉資保護而已若航海一次與居於海濱同惟舟中艙位多無通氣法海面之空氣因此無效

二沙漠之氣候 沙漠之空氣最爽而清潔日光又佳惟大風沙作不堪其苦故利害與海濱同祇宜於慢性之肺癆而已

三森林高地之氣候 此種氣候可隨處覓得森林既多空氣清芳風日和平凡肺病之益慢性者均可就此調養如居住日久必獲大愈

四高山之氣候 高山空氣清潔涼爽日光明媚煦和且極幽靜山居者血脉暢旺呼吸氣壯食欲大增消化必良皮膚活潑無論新舊慢性之肺癆皆可藉此全愈惟在極高之山則恐體弱不能支持耳

附丁福保先生所述肺癆病之原因及治法

肺癆病之原因及其病狀

肺病之原因或因受暑或因酒色或因外感其原因不一窮其究竟必歸諸肺肺病即癆之原也肺病之生因肺生

堅粒如沙其數至煩久之漸成爲一大粒潰爛成穴狀與潰瘡相似其所以生堅粒之故蓋孱弱之軀及患瘰癧之人身內常生一如乳餅色之質先成小圓粒令患處癢而發炎有數處同病則聚合成一大粒此質若生於肺內遲早必潰腐成穴若生於小兒之腦胞膜內則成腦胞膜水漲之疾如在小兒大小腸皮膜食多不飽是曰疳積故此種堅粒不獨在肺也

肺癆第一層之情形身弱而消瘦面白而皮亮胸膈變窄時有乾咳初則早起咳嗽後則日夜不止行路則氣促用力則面紅上山登樓氣難呼吸吐稠痰亦有咳血者脈數每一分約百至斯時左右肺葉其上半已有多粒成塊此為肺癆第一層情形第一情形已見之後或數十日或數月數年咳嗽漸增時有鬚痰吐出脈較前尤數呼吸亦愈促日晡發熱兩頰鮮紅晨起多冷汗則熱漸退語言有沙聲或聲暗俗謂失音咽喉生瘡胸膈常痛有時忽發者因肺胞膜畧有生炎處也大便秘澀泄有時痢瀉此由腸中有堅粒成瘡故也舌苔紅色或能多食或不能多食身愈瘦弱此為第二層情形久之則精方耗散而死矣

肺癆病之治法

肺癆一症防之易而治之難故防之之法不可不講求也凡虛弱人宜習體操等保衛身體之法以杜肺病之萌芽設疑第一層之情形將見并宜常服魚肝油至一二年或能復原此油甚和平有益無損惟須於飯後服之蓋飯前之胃內皮為油膩阻隔則不能接受食物也庸醫每禁服此油而令病人食洋參南北沙參冬冬等藥致肺發毒熱而現第二層病狀至第二層情形已現雖有妙手亦末如之何僅能用法緩其死期而已日本大正帝曾肺癆醫生用法割去其壞肺其病即愈可見治此症者日人已着先鞭矣

治癆病之法莫妙於多吸空氣人之身體無論如何行動必費若干微質其餘之廢料即從迴血管運至肺內使吸入之養氣燒化則血復變為紅色倘潔淨空氣欠缺身內廢料不能化盡必擁塞於肺膈經絡之內即為微生物之巢穴此微生物滋生極速故內傷者每次所吐之痰其毒微生物有多至三百萬者一日夜所吐之痰其微生物有多至數千兆所吐之痰既乾微生物即飛入空際吾人每不經意吸之而入是即內傷之根若吸入之清氣豐足身內廢料燒化淨盡無容身之地則在內不克滋生矣故病弱人宜常在空曠處行走而兼習體操

者即為多吸鮮空氣之地步也

痧病死後之預防

痧病死後俗以絲棉網其面目防痧蟲飛去殊不知痧蟲極細斷非絲棉所能障礙矧其蟲出自病者痰內必病者死後其蟲始出也如欲防其傳染宜令病人吐痰於盂盪出即傾於火上點火燒之病人死後其室宜用殺蟲藥水揩洗否則亦須用濃石灰水多抹幾次其根或可斷絕也

論喉痧概要

喉痧一名爛喉痧又名白喉日本名實扶的里亞為急性傳染病之一種其傷人最速亦最慘中國歷年因此病而損生生命者不知幾何考此病初起時惡寒發熱頭痛身體倦怠口腔內之扁桃腺及咽喉頭等處紅赤腫起痛楚不舒妨礙咽物此初起之大畧情形也過此不治則腫痛益甚扁桃腺及咽喉頭間現白色或黃色之斑點旋即潰爛腐敗音啞痰哮鼻腔紅腫時流稠涕頸線粗腫體溫亢進譫語不寐脈搏疾數此則病毒猖熾最為吃緊之時苟醫而不得法則瞬息間現痲搖煩燥目直視口噤咬牙窒息而死矣大人如此小兒尤甚危乎險哉喉痧病毒之害人如其酷也故東西醫士以此病與鼠疫霍亂腸室扶斯等病視為一體而統稱之曰急性傳染病蓋喻其死人急速為傳染病之最劇者也推其原因固由於實扶的里桿菌之毒傳染而生而不講衛生實為此病之主要原因蓋人身血液腦筋暨各器官本有抵抗力以自衛其生命惟夫不能講衛生之人平日已將其抗毒之質消失殆盡一旦傳染病發生之時則無有抵抗之能力往往為健康之人而暮已卧病垂危者職是故也近來每醫生每年所遇喉痧病以最少數計之尚有二十三人其中雖不盡屬喉痧要皆能傳染能傷人之喉疫慨吾國公眾衛生尚未實行而喉痧病毒之將大猖獗於今日也因畧述喉痧預防法警告當世賢愛生命之君子倘亦有取於是乎

一食物之注意宜多食植物品如蔬菜蘿蔔水果米飯飽包之類少食動物品如豬羊牛肉雞鴨魚蝦之類

以動物之肉多含毒質食之既久則人身中血液濃濁毒質蘊隆易罹喉痧而植物則反是且戒飲酒酒能燥血液傷口腔內及喉頭咽喉之組織或成吸紙烟鴉片烟旱烟水烟紙烟含有尼可青暨炭酸等毒質鴉

片中含嗎啡水烟早烟亦含炭酸等毒能壞血液壞口腔內及咽喉頭之組織專釀喉痧

(二) 飲料之注意子宜用河水江水濾過煮沸飲之煨粥煮飯亦須用此惟不流通之河其水污穢變色者不可飲城市井水多近陰溝便所尤不可飲且隔宿之茶與不潔之茶葉及隔宿之肉湯變色變味者有毒不可飲

(三) 居室之注意子居室中無論堂前臥室廚房天井大門外後門外皆須洒掃潔淨不可容留污穢雜物且凡

几案窗扇椅子桌檯每日須洗抹一二次更陰溝宜常時洗刷疏通日宜洒以石炭酸水倘以中國藥肆無售則以石灰浸水代之天井厨竈臥室堂前亦宜常以此水洒之卯窗牖宜常開以通日光空氣裏痰

罐宜每日換水兩次
(四) 衣服之注意子衣服被褥均不可過暖暖則體中生熱易於出汗亦致生喉病之一原因也且衣服宜稍寬鬆不可過緊緊則血液循環受其壓迫易於出汗則血中易致不潔之弊更衣服被褥均宜時常洗換

(五) 起居之注意子戒憂鬱怒惱念煩且每日宜練深呼吸一次更宜常時沐浴及以潔水煮沸漱喉每日須漱二次卯操勞不可太過每日須有一二時休息之餘暇更不可作無益之遊嬉如操麻雀牌等以妄役精神

(六) 有喉痧病之人不可與之接觸談話呼不得已亦須稍為遠避午喉痧病人之糞溺疫痰吐不可近來喉痧病人所用之茶盃碗筋手巾等不可用

以上所述皆預防喉痧之要法為世界醫學大家所倡導而極有功效者也竊願各界諸君留心來納朋友親戚之間各相勸勉則喉痧之病毒庶幾可以絕跡矣

療治法

病症之種類甚夥然大抵受其害者只在一身惟遺傳及傳染二種則波及他人為害較烈二者之中若遺傳病之受其害者只其後嗣耳傳染病而不加意防滅則蔓延各地靡有止期其為害尤烈傳染病種類繁多其為害最烈者除痘症肺勞病外以咽喉病為最危險為人人所知茲為條舉於後

(一) 內纏喉風

內纏喉風者其症內外無形惟覺有物阻塞喉內飲食難以下咽惡寒發熱甚則喉內纏以紅絲或紅點如絲未入闕下者可治絲已入闕下則難治矣如見紅絲即宜為之刺斷

(二) 外纏喉風

外纏喉風者喉外面腫沿頸項頗痛身發寒熱頸項外有紅絲如蛇纏繞狀甚則目睛突氣息粗鼻塌長急宜以去風疾之藥治之或可望生

(三) 噎食喉風

噎食喉風者即飛絲毒也其起時斗然發熱忽起一紫泡即宜將其泡用針點破吹以極效之喉藥內服清熱解毒之劑噎止乃無妨也

(四) 啞瘵喉風

啞瘵喉風者乃風痰犯咽膈也口不能言而牙關緊閉面紫唇青冷涕頻流而喉間作痛急宜以開關之藥服之冀其風消痰降則無礙矣

(五) 弄舌喉風

弄舌喉風者其起時身發熱口內腫微作瘡舌拖出喜以兩手頻頻弄之故名弄舌喉風急宜針其患處出血者可治無血者則難治矣或針兩手大拇指側離甲根一分之少商穴中去其惡血內服消毒解熱疎風之劑方有生理

(六) 連珠喉風

連珠喉風者兩拘深處患珠粒狀之曰點初生時祇二三點或三四點日久蔓延漸見增多若吹以應驗之喉藥內服清熱解毒之劑可愈

(七) 鎖喉風

鎖喉風者又名咬牙風也其毒聚於牙床胃火上攻口畧能言語而音不甚清失治恐成牙漏之症其治法須先以藥使其開關再服清熱解毒之劑然此症與啞瘵喉風相似牙關皆閉其所異者鎖喉風之腫痛在於牙床關

雖閉塞其口尚畧可言語惟音不甚清啞瘴喉風乃竟不能言耳此其異點也須詳辨之

(八) 喉癰

喉癰者因七情抑鬱而成者居多生於喉嚨花後如李形五六日後方可用以針法若針過早恐其復發而其症狀與喉閉相似但喉閉之色紫喉癰之色乃微帶黃也

九 喉痧

喉痧者亦凶惡之咽喉病也最易傳染且滬上頗多蓋滬地為人烟稠密之區煤毒最重苟偶食燥烈之食品則更張煤之勢刺戟肺臟侵犯血液故一感風溫其症乃作矣夫肺為嬌藏最易受傷喉為氣管則肺管也肺受烈毒之刺戟肺亦必因之而受傷故喉間始則痛繼則爛也且肺主皮毛血液既為烈毒所侵故遍身發痧幸而其痧發透則其毒已外達固無大碍然愈後而遍身之皮毛亦必脫落諺云不死亦要脫皮則是症也苟痧未發透或胃風或治不如法其痧不能外達則其毒伏於內而無可解必致肺爛喉腐而亡也其症之狀態頻頻發熱喉間作痛唇若塗脂口燥舌乾身發痧子或骨間脹痛苟罹是症則須早延良醫治之否則其毒內陷諸藥難救預防之法不可不慎也

(十) 喉懸

喉懸者其形亦與喉癰喉閉相似生於喉嚨花正中但喉癰形如李狀色微黃喉閉形如櫻桃喉懸形如珠而色黑繫腦門生一紅絲如髮懸一黑泡大如櫻桃掛至咽門倘誤用刀針則死苟遇此病須早延良醫為要

(十一) 單蛾

單蛾者生於喉間或左雲門或右雲門如桃李而微帶長形此症將起時早醫之可望速退如其形若豎者則凶惡矣雙蛾則雲門皆腫如小紅李之狀亦忌豎形其症不論已成未成皆可針之吹以喉藥內服清解風痰之劑輕者幾劑可愈

(十二) 喉痺

喉痺者形小而圓狀如棋子或生於雲門左或生於雲門右若其色紫紅而平塌且光如鏡者係平日之酒毒所

致宜內消不可刺喉內服清熱解毒之藥品若其色紅而不光其形凸起腫及頰腮者乃風熱所致先以喉藥吹之如不消再用針法內服清劑

十三 喉閉

喉閉者內生一血泡腫塞喉間如櫻桃狀甚則茶水難以入喉故名喉閉其狀畧與喉痺相似但喉痺乃從內裏發出其形實象菓子狀喉閉乃從膜內發出係一紫泡可用針法內服清解之劑

十四 楊梅喉癰

楊梅喉癰者因交於不潔之婦而染其花柳之毒竄入腎臟腎腎脈循喉嚨系舌本其毒上升故喉間白色一片穢氣難聞其治之法須以頂上之喉藥吹之內服解毒之劑苟由白而轉黃則無礙矣陰虛喉癰者因患癆症虛火上炎故喉間生癰若蝦皮狀時時發熱頻頻咳嗽面赤聲嘶甚則飲茶飲水均從口鼻噓出則難治矣俗名倒魚鱗者是也苟誤以實症治之則貽害匪淺須以六味地黃湯加元參川貝母銀花連翹等類服之是其正治喉症之名目繁多種種不同其害頗烈且速能致人性命於旦夕之間者苟因循致誤頗難挽回殊堪恐怖故特舉其重要者數端簡畧述之俾我國民瞭然而慎之也

霍亂說略一

霍亂症名急痧又名時疫 俗名吊痧羅痧日本名虎列刺多發現於勞働者而上等社會中人恒不多觀蓋此輩勞苦殊甚炎天口渴必飲多量之冷水必食零星之瓜果困倦之時則卧地休息又以彼等羣族而居故互相傳染速於置郵若輩目不識丁不知衛生為何物動遭疾苦良可憫也查霍亂之病原係一種菌桿桿即桿狀之微生物入腸發生毒質侵入血內遂現各種病狀此種菌桿形略彎曲時作螺旋狀時蜷伏如西字母之變司形由細菌學家谷克氏在患霍亂者之腸內大便內所驗出者也當霍亂流行之際凡食用之水中常含此桿菌如水未煮沸而飲之則桿菌入腸為患矣瓜果之屬都含生水故食之即有危險患者之嘔瀉物內有霍亂菌甚多若任意傾棄矣遂之蠅蚋咕其毒菌復飛於食物上食之者即有傳染之虞又傳病之人手觸患者之嘔瀉物及其污穢之衣被而不以消毒水洗手隨便飲食往往將霍亂菌引入口中而下咽之遂達腸胃而生霍亂焉此傳染之大概也至霍亂之發作常在半夜時嘔瀉大作腸內絞痛初瀉稀薄而帶便色既而愈瀉愈厲所瀉出者淡白如米湯嘔吐者初則為胃內之不消化物後為漿水兩腿轉筋痛不可忍全身熱度漸低口渴煩悶目眶深陷手足指皺裂谷貌瘦削皮膚寬鬆語言半啞脉微而伏冷汗遍體斯時也患者奄奄一息矣如能及時醫治或有轉機否則虛脫而死此病狀之大概也蓋霍亂為至危險之症斷送人命在頃刻間而預防之法則甚簡單茲特條列於左

個人預防法

一戒勞力過多二戒思想過度及愁慮憂鬱等事三戒吞食生腐菜葉魚肉凡食鮮菜須去皮食之其已去皮而浸於生水者切不可食四戒飲食無度六戒飲未煮之水水沸二十分鐘方可取飲凡惡劣之檸檬水皆不可飲七戒多用鹽類瀉劑九戒房勞十戒與患霍亂者接近十一戒往霍亂盛行之地十二戒動霍亂人嘔瀉之物十三一切食物須蓋於紗罩內以防蠅蚋飛集

公眾預防法

公眾預防法無非隔離消毒清潔檢疫四端此與中國現況尚難實行姑略之

霍亂急救法

夏令之家用良藥最要者為樟腦勃蘭地酒法以最陳之物蘭地酒一瓶和以淨白樟腦四錢遇有患急痧者可投以此酒一小杯用開水少許送下然後送往醫院醫治則無貽誤矣尚有俗呼十滴藥水者西名哥羅顛(Corona)亦為治疫之妙品凡患腸絞痛而兼吐瀉者可服此十滴至二十滴用開水少許送下效驗頗良凡患霍亂者切忌挑痧一則針上有毒二則針刺要害有性命之虞三則血管被其蹂躪致有瘀血凝結於中以致血脉不通往往患者有受挑痧之害以致注射鹽水時常被血管中之凝血阻塞不能醫治者頗多也

赤痢說卷二

赤痢俗名痢疾又名紅白痢又有噤口痢五色痢等名稱乃指病狀而言發現於暑令而感於夏秋之交凡素患瘧疾腳氣腎臟炎等者其體虛弱得之甚易餘如好食生冷嗜酒無度或腹部受寒或常用瀉劑或素有便秘腹瀉等症者皆足為致病之原因而其主要的病原實為兩種赤痢菌一名亞米拜古立一名赤痢症(由日本醫士布喀氏驗出)由飲水食物之媒介而侵入腸內其發現之病狀約可分為急性亞急性慢性三種急性者驟然惡寒戰慄時欲大便初帶黃色既下血膿粘液體熱高至一百零三四度每便覺裏急後重此種痢最屬危險往往於四十八時至七十二時內患者即呈衰脫之象而難醫治至亞急性者較急性為多初患腹瀉既而便兼血沫時思大便然每便止下血於粘沫並覺裏急後重困苦萬分患者口渴舌胎白厚體熱高至一百零一度症之輕者能於一星期後漸愈或變為慢性痢其重者諸症增劇便愈臭惡兼下腸內之綠色爛皮漸著腸穿出血之象中醫所謂五色痢者殆指此而言慢性者大半由亞急性所變先患腹瀉既而使帶血膿日下七八次然每便輒痛腹內不舒舌胎污穢口渴胃呆此症能經年累月不愈漸致消瘦虛弱成不治之症者有之此各種痢疾之大概也患痢後能生各種變症一肝內生膿瘡二腸內變窄三各種關節炎此皆難於醫治者也吸鴉片者患痢疾常變烟痢能經久不愈以致衰脫如預防痢疾之法可按上詳得病之原因而預防之即禁止食生冷嗜酒腹即受寒多用瀉劑等是也至素患瘧疾脚氣便秘腹瀉者除調理本疾外尤當注意於上列之禁止事項此外

尚有緊要預防法兩則一痢者之糞使須履行消毒掩土深埋之切不可任意傾棄因蠅蚋棲止無定能將其毒菌播散也二各種食物須納於紗罩內以防蠅蚋之飛集

赤痢急治法

治痢之第一要義在去腸內之積滯無論何種痢疾初起時可投以蓖麻油少許並暫禁絕飲食然後請醫診治則較易著手矣

瘧疾說畧三

發瘧于日本名麻拉利亞俗名打擺子其種類蓋甚多有日作瘧間作瘧三日瘧四日瘧有每三日之中發作於第一二日而間歇於第三日者有日日發作而似無間歇之時者遍地所常見者以三日瘧與日作而似無間歇之惡瘧為最多其致病之原因良由於地形卑溼溝渠不洩池窪繁多發生毒蚊（蚊之名阿諾非利司者實為傳染瘧疾之媒介）每值夏秋蟄人肌膚遂將瘧虫種入人身而致瘧疾蓋瘧疾之發作乃由於一種瘧虫（西名麻拉利亞潑勒司母丁）侵入紅血球之故蚊既吮患者之血復以其半盾之嘴螫於健者之身患者紅血球內之瘧虫乃藉以送入健者之血內一轉移間復蚊之力能造成無數患瘧者故地愈卑濕毒蚊愈多而患瘧者愈盛其理甚明中醫所謂風暑合邪始成瘧病乃臆度之談耳據日醫之報告台灣最稱卑濕瘧病盛行日兵駐於此者自一八九七至一九〇一年緣營房內未設防蚊之具每歲死於瘧疾者居各病百分之十七至二十自一九〇一年起雖設而未完全死數即減至百分之十一至十九至一九〇三年一律用防蚊之具死於瘧者驟減至千分之七可見防蚊即所以防瘧毫無疑義茲將防蚊法略述之

一除蚊法

除蚊之法首在止其發育凡溝渠之不洩者須疎通之池沼潭窪之蓄水者可傾火油於水面則蚊之浮卵體被蓋於油之下不得空氣漸至滅亡住屋之四圍一切積水宜除去之則蚊無所棲依矣此皆除蚊之法也然此難施於鄉間因稻田之灌溉端賴乎各水源也

二驅蚊法

驅蚊之法在使住屋內無隻蚊飛進其法用一種銅絲網張於房屋之外面加陽台走廊等處而以電鍍之鐵紗網張於房屋之門窗戶隔等處此網宜取每英寸有十二眼者為佳倘房屋本無圍廊者每處窗戶當各張以紗網如外為百葉窗內為玻璃窗而紗網適張於其間並將每處之紗網分為上下兩截上截不能移動指於架之外緣下截能上下移動而按於架之內緣如欲啟窗可將下截之紗網向上推送直至高處因窗架之中間左右均有彈簧支撐故此紗網即不下墜如欲其下墜可將兩拇指壓迫彈簧即落至原處矣出入之門戶須隔以兩重紗網每門宜附釘鐵絲彈簧俾得隨手關閉臥室即寫字房內宜以紗網另夾一小間為辦事安臥之用防蚊為防瘧之上策但有居於窮鄉僻壤不得施行者則惟有預服金雞納霜而已或每晨服五釐或每十日服十五釐均足以避瘧疾之病狀即大寒大熱大汗孀孺多知之故不另贅

鼠疫說略四

鼠疫之發現於滬地者已兩次矣去年七八月間開北之川虹路一帶疫斃者二十餘人工部局曾於該處圍白鉛之牆至今未撤前滬道所設之防疫所迄今未裁此皆彰彰在人耳目近來香港鼠疫常見他處亦宜留意萬一此疫發現不特居民慘遭疫禍而於防疫上又將不勝其煩擾矣注意衛生者請先為防範之也可

查鼠疫之種類有核子瘟(日文名腺百司)為肺瘟又名肺百司為血素中毒瘟次之肺瘟又次之核子瘟之病狀病起時甚急初則惡寒戰慄繼發重熱若於小兒必先驚風其煩燥之狀態頭部之烈劇眼球之赤紅均為本症特異之病狀核子之隆起者或於腿窩或於頸部腋窩肘側等處觸之痛甚時則嘔瀉交作狂妄譫語其病劇者三四日後即致死亡血素中毒瘟之病狀多不及醫治暴病而死其血內含有百司為菌甚多肺瘟之病狀即血略高熱昏迷呼吸短促連則數時緩則一二日即病亡

欲防鼠疫之發生首在滅鼠因鼠身跳虱甚多鼠死之後其尸體潰爛跳虱無所得食遂離鼠身而播遷於人體此虱含有疫氣當其吮人肌膚即將疫菌(疫菌即百司為菌)送入血內而疫以起焉凡足部原腿部有破碎處者更易傳染滅鼠之法有數端(一)畜貓(二)設鼠器即捕鼠器(三)投毒餌(四)房屋不用隔棚之天花板(五)地板下用西門德土及白油石子墊實(六)一切食物藏於有蓋之鐵器內則鼠既無所食又無所居又失自由自能消滅矣

地板上宜常用消毒藥水指洗則一切跳蚤臭虫等不易藏匿凡居室內發現死鼠者須將屋內什物器具全行搬出用消毒藥水指洗並用石灰水洗滌牆壁所有牆壁地板之鼠穴悉以西門德士補實之

消毒藥水有二種一名吉氏藥水 *Carbolol* 每兩和水四加倫即可用一名錫林 *Spore* 每百分水和此藥二分即可用

預防鼠疫如種疫苗或可得免疫性然亦不可恃為萬全去歲東省之肺百司篤呼吸間均能傳染故從事於防疫者均用假面具以防疫氣之侵及其效甚著



救急方法

普通疾症

傷風 傷風三月不愈便成肺癆病其為危險故患者急宜早治初病時宜節飲食或多飲滾湯或服發散藥使
之發汗如喉間燥癢作咳宜用棉花浸冷水纏頭以三角巾裹之腹痛貼 末泥於心窩裏暖腹部安卧先服鎮
和丸一粒而後延醫療治

眼疾 用布片浸冷水掩於目下或用溫水亦可惟不可拭目中誤入塵芥可用涼水徐徐注眼中沖去之若石
灰入眼滴油為善或用軟筆毛蘸水或油黏去之又眼疾多具傳染宜與人異居盥漱之具不宜公用也

疔毒 初發時見紅色中有一小泡急宜滴入銀水少許或用小錢器燒火烙上然後用棉布浸二十倍石酸水

蓋之延醫診治

吐血 若血色鮮紅中雜泡沫者為肺血色暗紅或黑或凝塊者為胃血宜令病者仰卧於床上身稍高用手巾

浸冷水貼之肺血則貼於胸前胃血則貼於心窩四肢用熱水洗擦延醫療治

齒痛 概因齒缺而生當貼芥末泥於兩頰以溫水漱口如有小孔則用棉花小團浸四十倍石炭酸水填塞若

其齒朽腐不堪可以拔去

外傷

創傷及挫傷 已出血者用沸過冷水洗淨傷口候血止用棉花或布片浸於二十倍石炭酸水貼患處外加油

紙以卷軸帶纏之

出血 靜脈出血其色暗紅者先用沸過之冷水洗灌傷口次以消毒棉紗置創面上以淡石炭酸水洗淨指頭

力按傷口務令血止依上法治之動脈出血鮮紅色血液射出如線者先高持其部位同消毒棉紗置創面依上

法按之若血仍不止可力壓其創處上部之動脈

陳傷 若皮膚時紅色漲癢疼痛或麻用冷水徐徐擦之稍覺發熱時以布片浸四十倍石炭酸水貼之如傷處

上海錦章書局石印

起泡或皮膚發紫黑色治法與火傷同

火傷 先注冷水於傷處次用棉花塗油蓋之外加綳帶如有水泡用針刺小孔冷水流出水泡之皮不可揭去再以棉花浸四十倍石炭酸水貼之外加綳帶如皮膚已發黑色或灰白色則塗以撒里失酸軟膏或以二十倍石炭酸水浸棉花貼之外加油紙施綳帶

骨傷 受傷後勿動搖傷處徐解其衣按摩整筋令斷骨條順然後取木片厚墊棉花置傷處之三面以卷軸帶三角巾等固縛之再以布片浸冷水而後延醫如皮膚業已破裂則以五十倍石炭酸水洗盡候血流止以消毒棉紗蓋其上而後正傷肢之形狀如前法

蛇犬咬傷 立以口吮出其毒血再以帶縛創處上部以防毒之蔓延全身以布片或綿浸以四十倍石炭酸水貼傷口施綳帶多飲熱湯促其出汗從速招醫診治為宜

急症

觸電 手臂觸電若不能活動可將黃土泥用水泡濕將手臂伸入土內便可解去電氣或用潮潤沙土亦妙雖已昏迷氣閉祇須潮潤沙土鋪地令卧於上再將潮濕沙土滿鋪於身但留口鼻使其呼吸即醒

悶絕 為煤氣及炭氣所悶而氣絕宜移至清涼空氣中澆冷水於面以洗之用人工呼吸法其法令患者仰卧椅高其頭及胸部開口出舌以細布纏舌防其舌之縮入口之閉合救治者跪於其頭之兩旁以兩手握患者之二肘上提過頭使空氣入肺約二秒後放下其臂緊壓於胸腋亦約二秒反覆行之至患者自能呼吸而止又依法提患者手臂過頭或反屈其臂置背下開口出舌如前法救治者跨患者之腹部而跪以兩手掌平置胸前再以兩手指壓在心窩使肺中空氣流出二秒後放手則胸部開張空氣流出亦二秒再壓之至患者自能呼吸此喉梗 食物或異物梗塞喉間致氣息不通目突面紅者先開其口探二指於口內扳出梗物倘出不得手則推患者俯伏墊硬物於心窩以手掌按其背後每見良效

溺水 脫去溺者衣服以布纏指拭去口內泥土救者平坐俯置溺者之腹於膝上用手工支溺者之額頭稍反側使吐出水用羽毛等攪塞咽喉鼻孔促其呼吸倘不見效施人工呼吸法如前

縊首 先抱持其身緩緩斷其索卸下緩撫其胸背及縊痕再行人工呼吸法

中毒 誤飲食毒物為時未久可用指頭或羽毛等搔抓咽喉以催吐又可飲多量之微溫水內加芥末或食鹽稍許可催吐且稀毒質

卒暈 因墜地或頭部被擊而暈者解開衣褲之紐使之安卧頭及上半身畧高用浸冷水之布冷其頭面輕叩心臟部且以毛刷摩擦脚及胸部及醒覺可使飲冷水若不醒可施工呼吸法

日射病 因日光久晒而起眼皮色紅者為腦充血白者為貧血充血者移至涼處解去衣服上身墊高安卧以浸冷水之手巾蓋其頭及胸前如不愈用冷水澆頭又浴以水即愈呼吸已停者用人工呼吸法

凍僵 移於冷室或無風之樹陰除去衣服用冰雪摩擦周身或浴於冷水摩擦之至四肢柔軟摩擦更不宜間斷後行人工呼吸法迫患者自能呼吸先被以薄衾繼用稍厚之被漸入暖室初時不可移至暖處為要

傳染病

傷寒 病初安卧室中通暢空氣遍洒消毒水吐遺之物盛盆中消毒深埋於野頭額上以冷手巾覆之或用溫涼水洗擦周身速延醫治療他人不得妄至室內

赤痢 病者當安卧多加衣服使腹部溫暖如腹部甚絞痛用麩半斤加芥末一二錢開水沖和以大手巾包之置腹上稍冷即換食物不宜多須暖補易化者延醫治療使遺須消毒深埋衣褲被褥須開水洗酒溺器亦須消毒

霍亂 用芥末暖膏貼腹上用熱湯壺包布以溫四肢又用絨布浸火酒及樟腦精摩擦拘攣之處飲以白開地酒連延醫治室中須通空氣遍體消毒水吐湯之物以盆承接消毒深埋所用器物皆須消毒除看護者以外不許他人入室又此病流行時食物必燒至熟透勿食瓜果及難消化物飲水必沸過用白絨布裹腹宜使足部

白喉 病室宜通暢空氣食物須稀薄而滋補者常用溫水漱口涎沫及嗽口水傳染極烈消毒深埋延醫治療

痘症 日用溫水洗抹兩次飲食多用滋補之稀湯室中空氣流通身上務須清潔未種痘之人不許入室

治療方法

痘症 室中須清潔謹防涼風如畏光窗須遮暗延醫診治如癩點收退當以溫水浴之

外傷

瘋狗咬傷 咬後速洗創面以自己尿液洗之亦可後用水銀軟膏塗擦患處或用薄荷精二錢酒精二錢連於毒蛇咬傷 速以口吸出毒血（但口內有傷者不可吸）緊束創面上部用亞摩尼水洗滌傷處以腐蝕之或用強醋酸塗傷處昆蟲刺傷芳香硼砂精或二十倍單純硼砂精塗傷部又用亞摩亞水一分胡麻油四分混和成白色之稠液震盪之塗擦傷處

火傷 用薄荷腦五錢胡麻油五錢石灰水五錢混和塗傷處或用石灰酸一錢華攝林（礦物油）一兩混和塗傷處或用亞鉛華一錢葛粉二錢撒布患處

創傷 用鹽基沒食子酸鈣 *Calcium salicylate* 一錢華攝林一兩製為軟膏塗傷處或用薄荷油十滴刺納林

二名絨脂五錢華攝林一兩塗之或用石灰酸一錢亞麻仁油四錢以沈降炭酸石灰適宜拌和挾於布片之間貼布創上或於傷處洗滌後用沃度爾撒布洗滌刺用石灰酸八分甘油一錢以水二兩四錢溶和煎細帶用嗎紗劑用酒精二十四兩哥羅仿謨四兩八錢蓖麻子油五錢石灰酸一兩二錢半混合溶液浸漬脫脂綿紗一斤乾燥之名為石灰酸綿紗於創口洗淨後以石灰酸綿紗貼創口細帶外纏化膿後用硼酸二錢黃蠟四錢阿列布油六錢熔和攤布片貼之或用亞鉛華一錢單軟膏一錢混和攤布片貼之疼痛甚者用石灰酸一錢刺納林二兩四錢混和攤布貼之止血劑用枯礬一錢水一勻溶解醃脫棉花壓創面或用單甯酸撒布血面

挫傷 打撲感迫受傷腫痛皮下有暗藍色經久化膿用沃度丁幾五錢酒精一兩塗傷處或用硼酸一錢水四合溶解醃白布纏傷處

凍瘡 用稀鹽酸四錢水四錢混和塗患處或用巴刺賓軟膏五分樟腦五分混和塗擦患處潰瘍未陷者用沃度丁機一錢酒精二錢塗之或用石油一兩樟腦一錢塗之已陷者用亞鉛華五分用單軟膏五分塗之

雜症

胃弱 用芳香丁幾五分苦味幾丁五分酒精二錢混和之每食後服三十滴或用橙皮末一錢二分大黃末一錢重碳酸甯道一錢二分分十包一日三包或用括矢亞越幾斯一錢硫酸鉄五分為四十九一日三次每服一

丸或用百布聖二錢半白糖一兩桂枝末一錢以達拉佩寫護護為飲作五十粒每食後用一二粒或用水飴二錢牛膽越幾斯一分混和之一日三次分服

傷食 用芳香丁幾一錢薄和油一滴一日三回分服或用稀鹽酸三十滴苦味丁幾一錢半每食後服十五滴或用大黃末二分重炭酸曹達五分當樂二分薄荷油二滴一日三回分服但稀鹽酸與重炭酸曹達禁合用
胃氣痛 用薄荷油一錢二釐依的兒性綱草丁幾五錢以二十滴混和於糖水中服之或用次硝酸蒼鉛五分重炭酸曹達一錢分五包食後半時服一包痛甚時令患者伏卧自背後壓迫膈腹或以懷爐熱其患處或以芥子泥攤布貼之

肺炎 惡寒發熱胸部覺痛咳嗽頻發痰黃赤色用安息香酸二分五釐白糖一錢二分十分包用蠟紙包之每二時服一包或用的列並底油二錢半醋酸五分當樂水二錢枸橛油一分二釐半以卵黃一枚取其四分之一與藥酸和塗擦胸部或用吐根酒十滴和水四錢每二三時服一次

癩頭瘡 用百露枝爾撒謨五錢塗之或用撒爾失爾酸一分阿列布油一錢塗之或用安息香丁幾七分半硫黃花一分半猪油一錢二分半刺納林六錢二分半煉合為軟膏塗之

傷風 鼻乾燥閉塞頻噴嚏有時惡寒微熱頭痛有鼻涕用加蜜列花四錢洋產按骨木花二錢煎湯分二日來溫服或用薄荷腦一錢小粉五分混和嗅入少許

喉痛 喉頭覺痒或痛咳嗽吐白痰或失聲用明礬一兩薄荷腦五釐分作二十分每分以水二合至三合溶解數百回含嗽或用單寧酸一錢落水四五合含嗽

氣管支炎 乾嗽僅略出粘膠無色之痰胸部中央微痛用加蜜列花二錢礪砂五分接骨木花二錢為煎劑作二日服日服三次或用撒爾失爾酸曹達一錢小粉一錢分六包日服三包

流行性感胃 頭痛咳嗽全身諸筋覺痛一時流行反覆傳染用撒爾失爾酸曹達五分作二次服又用安知必林二分小粉二分作二次服又用安質歐兒林一分乳糖五分龍腦五釐分四包一日三次服用

嗽咳 用龍腦二分半夏二分杏仁末五分干姜末二錢攝涅瓦根末二錢青豆粉三錢以水飴及蜜煉之分六

次作二日服或用薄荷腦五分茴香油五分白糖十分作錠三十粒每次服二粒日服三次或用半夏末五分搗
涅瓦根一分龍腦一分干姜末五分分六包一日三包或用吐根五分龍腦五分半夏末二錢為丸作一百八十
粒日服三粒至十五粒或安息香醋一分桔梗末五分龍腦五釐分三包一日三次服

疥癬 劇痒生粟大水泡有小孔內有極小之蟲為蜘蛛族之疥蟲類用百露拔爾撒漢五錢薄荷油十滴塗之
或用流動蘇合香二分阿列布油二錢溶和塗之又用硫黃華一錢半單軟膏一兩半於夜間塗

乾癬 又名鱗屑癬用撒爾沙根一兩茴香五分薄荷葉一分湯煎作三日服必須一二月又用石炭粉一錢
石油二錢溶解塗患處

眼綠炎 又名爛弦風用硼酸一分華攝林一錢塗眼綠

眼膜炎 目痛而淚少者用皓礬一釐六毫薑椒水五錢蒸溜水十錢半點眼一日一回至二回淚多者用皓礬
一釐茴香水五分蒸溜水七錢半朝夕點眼又用硼酸一分華攝林二錢半於夜間以少許塗眼緣則睫毛不致
膠封膜上生半透明灰白色之顆粒者為急性症用皓礬二釐蒸溜水八錢點眼每日一次若由急性症轉化為
慢性症者用硫酸銅一分甘油五分蒸溜水五錢溶解點眼每日一次

星翳 眼膜上有白色之翳用沃度仿護一分華攝林一錢為軟膏一日點眼一次又用沃度加個謨二釐炭酸
曹達五釐水四錢溶解為點眼藥以促其吸收

條蟲 用綿馬越幾斯一錢蓖麻油子二錢以蜜作丸分一百八十粒隔半時服三十粒又用苦蘇花五錢蜂蜜
一兩煉和作二次服又用加麻刺二錢三分三次服之

頭痛 用硫酸規尼涅一分五釐茶五分薄荷腦一釐作二十四丸一日三次分服或用鱘草酸規尼涅三分加
啡末二分作百丸每服十粒又用薄荷油五分酒精五分溶和擦患處或用薄荷鏡摩擦患部或以魚膠一錢加

水溫溶冷後加薄荷油滴二滴攤布上貼之

腦充血 舊名逆上實性者面潮紅虛性者面蒼白用臭素加里一錢硫酸加里一錢旋那葉末四錢大黃末五
分為丸三日分服或用芒硝三錢溶水一日三次分服又或用臭素加里一錢分三色一日一包溶水中作分服

分服

脛貧血 舊名卒倒面色蒼白四肢厥冷背滿汗冷失神用薄荷腦少許入口內失神時以亞摩尼亞水嗅之又

用薄荷腦五釐膚香一釐龍腦一分丁香一分肉豆蔻一分以蜂蜜混和蒸潤使含口內以水嗽下

齒痛 用丁香油一分龍腦一分芒硝二分硝石一分煉和填齒窩或以龍腦一錢的列並底油十二滴加耶布

底油十滴浸棉球填齒窩又以芒硝末二錢落水四合含嗽

乾霍亂 腹痛下痢瀉瀉白色或綠色之液吐瀉甚劇口渴四肢厥冷眼窩眼落壯年者一二日全愈用芳香硝

砂精一兩薄荷油十滴炭酸麻倔涅失亞五分振蕩之每二十分時服十五滴又用薄荷油十滴龍腦五分阿仙

藥二錢作六粒二日分服

蛔蟲 用珊瑚膏五釐白糖一錢作十二粒一日三回每回一粒

龜裂 寒冷時皮膚生線狀或溝狀之裂用甘油一錢苛性加里二分酒精二分水四錢混和塗之

麻症 急性之傳染病初皮膚生赤色之斑點又發小節結但每人只傳染一次不再傳染用加密列花二錢接

骨木花一錢杏仁二分分二包入麻袋煎之一日一包三次服患者口渴時用橙汁一兩單舍利別二兩四錢取

二錢溶解於水中飲之又用安貿歐貌林一分五釐服之

下痢 用蕃椒丁幾一錢大黃丁幾二錢芫花散撒下幾(十倍者)三兩薄荷油二分混和一日三回一

回十五滴或用大黃丁幾一錢五倍子丁幾二分混和一日三回一回十五滴或用撒爾失酸蒼鉛五分重炭酸

曹達二分分三包一日三回或用單寧酸蒼鉛五分重炭酸曹達二分分三包一日三回或用胡椒木一錢硫黃

華二錢以葛粉為丸作一百八十九丸每回服三十九丸一日三回

眩暈 用繖草丁幾二錢薄荷油一滴混和每服十五滴一日三次

不眠症 用失華那爾德名 *Sulphonal* 一錢分四包臨臥時服一包或用臭素加里三分以水或荷蘭水溶之

臨臥時頓服

口瘡 口內熱痛過飲食物之鹹味及熱起刺激者用硝石一錢鹽加里五分混和塗口中或用硼砂一錢甘酒

一錢溶水二合含嗽或用明礬一錢溶水二合含嗽

癩風 發於頭上反被衣服處之皮膚呈微黃色有光色之面皮屑脫落狀是延微痒難愈無他害又皮膚呈白色斑點者曰白癩風用加里石鹼塗患處或用水楊酸二分甘油五分酒精三分混和塗之

天泡瘡 用硫黃華一錢炭酸加里五分安息香脂五錢刺納林三錢渣和為軟膏塗之或用滑石末一錢亞鉛華一錢研和撒布於水泡破潰面

癩周 用臭素加里一錢溶水二合一日二回至四回分服或用臭素曹達一錢鱘草丁幾一錢水二兩一日三回服時再加水或茶和之或用臭素加里一錢大黃末二分桂皮末五分和作丸一日分三次服

癩疾 用鹽酸規尼涅一錢為丸作一百八十粒每服十粒至十五粒於發作前六時或八時服或用單寫酸規尼涅二分五釐白糖一錢包三包一日三回服

頑癬 皮膚少隆起呈紅色有鱗屑痂皮小泡中央發疹增大醫治此症之法甚多法之靈效而易施者有二馬一用加里石鹼二錢刺納林二錢那布答林二錢混和舉軟膏塗之或石炭酸五錢阿列布油一兩薄荷油一滴混和分離毛布貼患處

癩尿病 用安質歐貌林一分半桂皮末一錢分三包一日三回服或用安知必林二分半甘草末一錢分三包一日三回服或用撒里矢爾曹達五錢桂皮丁幾二錢橙皮丁幾二錢薄荷油十滴酒精一兩每回四十滴和水服之患者不宜食有糖分及小粉之食料以內卵牛乳等為宜

聾耳 以食鹽二錢或撒里矢爾酸一錢或酸礬一錢溶水十兩洗耳又用沃度仿謨末一錢硼酸一錢於洗後撒布或用明礬末吹入耳內硼酸末亦佳

耳神經痛 用鹽酸規尼涅一分服之又用撒里矢爾酸二分半乳糖二分半分二包朝夕二回服

痔 用重酒石酸加里二錢硫黃華二錢分三包溶糖水服之又用五倍子一錢安息香脂七錢阿列布二錢為軟膏於痛時塗布

版臭 用撒里矢爾酸三分澱粉三分研和撒敷窩或用燒明礬五分滑石五分撒布或以歐貌拉氏軟膏

百日咳 用重炭酸曹達五分水一合溶解一日三回服又用硼酸末五釐吸入鼻孔

貧血病 用芳香鐵丁幾一錢龍膽丁幾五錢每服二十滴一日三次又用鹽酸規尼涅一錢焦性酸鐵一錢為九分一百二十九每服一丸作三次服

哮喘 用炭酸亞摩尼亞一錢水一兩每回服三十滴以水和服日服數次或以臭素加里一錢白糖一錢一次服之日服三次

頭痛 用蓖麻子油四錢一次服下以瀉之或用芳香礪砂精一錢大黃丁幾二錢芳香丁幾一錢混和服十五滴日服三次或用薄荷油二分半酒精二錢每次十滴和糖水服之

赤痢 用撒里矢爾撒蒼鉛五分重碳酸曹達三分四分四包日服三包或用蓖麻油四錢頓服下之

暈船 用薄荷腦一分龍腦一分乳糖五分分三包一回一包或用安知必林二分澱粉三分混和服之

蝦蟇瘡 此症兩頰腫起顏貌奇變用沃度丁幾一錢酒精三錢塗之

汗瘡 盛夏汗液刺戟皮膚而發用亞鉛華葛粉等分研和盛紗囊撒布患處

腦漏 鼻內漏臭惡之膿汁用百倍石炭酸甘油塗鼻孔或用薄荷油塗口鼻臭吸又以硼酸一錢溶水二合洗滌鼻孔或用硼酸一錢薄荷油少許撒棉球中置鼻孔內

吃逆 用臭素加里二錢茯苓末一錢分十包日服三包或用依的兒性繡草丁幾一兩薄荷油十分混和一回服二十滴又於心窩部塗樟腦精或酒精

神經痛 初覺如蟻走狀次微痛漸劇微摩則痛增壓迫則減退用安知必林一分半以水和服或加甘草五分作九分二次服又以薄荷油一分胡麻油一分刺納林一錢為軟膏塗患處

嬰兒之哺育

欲得健兒必求其母之健壯與其哺育之適當當未產以前生母之攝養宜慎及既產以後而嬰兒之哺育尤難故述產前攝養法與嬰兒哺育法于左

(一) 妊婦衛生妊婦衣服宜溫暖寬潔食物宜滋養調和動靜宜舒暢適宜此其要義也

(二) 選用乳母若生母有故不能哺乳時不得不用乳母以哺養之則選用之道宜加慎矣必體壯性柔無遺傳病而年在二十至三十五歲者其年齡及分娩期能與生母相等尤佳其乳汁宜豐滿充足其衣服飲食宜適於衛生又須使之變其積習與吾家俗相化此其要義二也

(三) 人工哺育人工哺育以獸乳及乳粉等而牛乳為最宜取乳之牛須擇其壯而無疾常食豆蔬與小量之食鹽者且牛乳朝榨者淡夕榨者濃嬰兒初生淡者為宜每十五分鐘略一哺之生後三月以前則用乳一水三六月以前用乳一水二九月以前則水乳參半而後漸次減水終用純乳又或和以乳糖及最上白糖煮沸後俟溫度適宜再行哺之哺之之器務期潔淨或以水煮之飲餘之乳切勿再用暑時尤宜速棄夏日牛乳易於腐敗貯藏之法須開瓶煮沸置冷水中此其要義三也

(四) 哺乳時期嬰兒食量以年齡為準每日約每一小時四十五分或二時哺乳一次稍長則漸減之夜中則就寢午夜及晝爽共二次再長則改為就寢及早晨二次其斷乳期約在二年之後此其要義四也

嬰兒之起居

嬰兒長成端賴培植綿育既難而起居尤慎

(一) 衣服嬰兒衣服宜輕暖而疎吾國絨布最為適當外貨如法蘭絨等亦宜夏則細麻亦可尤貴清潔須用白色絨羅網縵既難洗滌且易養成統縉之習西人嬰兒衣服之製造素有研究故其後身宜廣袖筒宜潤帶不直緊四肢須外露冬衣則裝棉宜薄夏日則可着兜肚或半臂之類而吾國積習襪不連縫非所宜也

(二) 飲食哺乳之法前已述之若小兒既生一年之後食量較增可哺以粥湯或米飯肉食蔬菜果實等類須溫

冷道中不可過度且慎食調理尤貴者親使易消化甘鹹不宜過度尤忌辛香比及年齒稍大又喜終日運動故飲食易消食量較多往往往食食易罹疾病則分量宜酌中也且吾國惡習往往嬰兒就食母氏婢媪恒喜咀嚼授之此傳染病之基也當切戒之

(三) 居處宜通光射多開窗戶使空氣流通尤貴清潔室內器具不可亂雜且匍匐步行危險極多故所居不可鄰於斷崖池沼之處寢室可與母共唯不宜同舍

(四) 疾病小兒生後七閱月即生下顎門齒二枚孳生上顎此後漸生小白齒大齒大白齒等三年後二十枚乃全長成此生齒期尤宜慎重虛弱之兒眼臉及頰邊現赤色或寐則驚啼或發熱下痢或發湯疹有此病徵速宜診治若因齒痛而啼則以淨布浸溫湯屢屢拭之有此徵疾或以樹膠板等柔軟之物任其齧之亦可且常常發熱苦悶務須攝心保養食物不宜過分如肉類及菜蔬等尤宜少食又種痘不宜過時約生在後七十日至六閱月為宜未種之先宜延醫診視無病方可就種種後六月再接種一次若痘症流行之時尤貴多種數次凡種痘於左右二腕上者須左右各種三顆刺痕少腫而顯紅色四五日後少墳起而生膿紅色至七八日而中心釀膿十日後腕部暑痛身體稍覺發熱心神不快十二日而生痂越七八日而痂落矣小兒常患熱症宜用手中浸水稍許纏於身體以毛巾覆之其他如呼吸器病腦神經病眼耳病咳嗽水痘夜啼赤痢耳下腺痰感冒假痘傷風霍亂傷寒及身體偏斜手足麻木等均為小兒常患之病宜速延醫診治居常宜察其身體及呼吸若小兒呼吸急迫或微緩寐中驚啼鼻中多涕夜間盜汗小便不暢或小便白濁等皆為病徵宜速為診治

(五) 動靜嬰兒生後六七月間除食乳撒便外大抵酣卧卧時被服宜輕暖遙體不可覆其頭面以阻塞空氣母氏不宜以腕枕之夜間小兒體溫過度易於思食以二次為度吾國南方積習喜用坐車每致釀成曲背等症宜切戒之西人搖車最宜小兒生後於春秋兩季每二週間暗和之日抱持之運動戶外歷半小時許寒嚴暑酷之間則每七八週間可施行一次且常引其嬉笑以便周流血脈且不可使其污穢致損皮膚每日須洗浴一次其溫度以攝氏三十五度至三十七度華氏九十五度以上百二度以下為宜寒冷之日日中

最佳臨盥宜先用毛絨巾輕輕摩擦全體及頭部洗顏面時須別換溫水另用毛巾徐徐拭之其身居水中僅能五十分之久一方豫浸毛巾於溫水中徐徐拭全身拭畢安臥床上勿觸冷氣食後宜以潔淨之毛巾浸溫水中少絞之徐徐拭其口中及口傍便溺之後亦須洗滌其下部嬰兒初生不宜剃髮候週歲後始可剪之

(六) 遊戲玩具務擇樹膠所製者忌用玻璃等製及有毒顏料施采色之物擇其可以養成知識或輔助體育者與之如西人常以木製之小房屋等授與小兒使其佈列足以養成兒童之建築知識也又近日西人有以木製飛機授諸兒童而教以飛行之淺理者其諄諄善識之意盡美盡善吾國則反乎是其授諸兒童者非泥製之鬼神即木雕之妖魔何知識之淺鄙耶吾國小兒手足稍能自動即喜毀壞玩物宜令其善為收藏且須污者洗之破者整之秩序井然毋使拋雜蓋可以養成兒童之德性也

經驗要方二十種

頭風疼痛。用鮮鵝兒草塞鼻甚妙。又方。川芎。白芷。石膏。麝研末。茶送下。頭痛不止。用鮮蕪葉。放銅鍋炒熟。加入上好米醋。元梁。烹之。用布包之。紫頭。稍冷。再換。屢試屢驗。

新增雷頭風痛。頭面疔瘡。腫痛。增熱。壯熱。狀如傷寒。用清震湯治之。荷葉一枚。升麻。蒼朮。各五錢。煎服。

最近試驗。男女面上雀斑。其色或黃。或黑。碎點無數。由火鬱血分。風邪外搏。而成。用時珍玉容散。猪牙皂角。

紫背浮萍。青梅。櫻桃。各一兩。鷹屎。白三錢。或鴉屎。亦可。共研細末。每早晚用少許。在手心內。水調濃擦面上。良

久。以溫水洗面。至七八日後。其斑皆去。神效。又用好玉器。時時擦之。久則自退。面上黑氣。半夏焙研末。

米醋調敷。不可見風。自早至晚。不計次數。三日後。用皂角煎湯洗下。即白。

雙目不明。

睛光。睛眼。皆治。黑豆。黃菊花。五條皮。硝。六錢。水一鐘。煎七分。帶熱重洗。五日換藥。再洗。一年後。

可以復明。平日忌茶。並戒惱怒。

飛絲入目。金墨磨濃。新筆蘸墨。塗眼用。閉目片時。其絲成塊。用手輕摸。即出。如未盡。再點必出。又方。明

礬五錢。食鹽三錢。用開水泡化。將舌共浸入碗內。良久。絲出。屢試神效。

耳濕流膿。牛艮。四分。胭脂米。一錢。水片。一分。共為末。吹入耳。數次。自愈。耳通法。巴豆斑蝥。麝香。共研末。慈

蜜為丸。棉花包之。入耳內。三日。出黃水。四日。即愈。百蟲入耳。雄黃。用草紙捲燒。煨重之。又不可驚動。如在

左耳。以手緊閉右耳。并兩鼻孔。努氣。左耳蟲必出也。如在右耳亦然。或用好醋。麻油。韭汁。姜汁。忽汁。此數種

因便而用。灌入耳內。其蟲即出。

鼻流血不止。竹青三錢。細茶三錢。共煎水。飲即止。鼻流血。黑棗。甘草。二味研末。吹入鼻孔。即止。耳鼻流

血不止。不效。即死生地。一兩。麥冬。一兩。淨水煎服。愈。又鼻內生蟲。韭菜子。燒烟。向鼻重之。引蟲出。淨自愈。又

方。明雄研末。向鼻中時時嗅之。極效。

唇中腫大。生蒲黃。二錢。頂上梅花冰片。川連。各一錢。共研細末。麻油調敷。唇中及唇邊。口角。生紅白顆粒。

此即疔瘡。有頭痛寒熱等症。亦有麻木。不知痛癢者。須查疔瘡門治之。

口生肉疔 有根如絲吐出乃能飲食檢之其痛入心此名血餘症用真麝香一錢研末作兩次服自愈
或用人髮燒灰服亦可 口內齒肉出血痛爛用大黑棗剖開去核真明雄黃包棗內菜油燈上燒存性研
細末時時擦之即愈 口舌生瘡吳茱萸研末好醋調敷兩足心過夜便愈性能引熱下行故也 口臭
雞聞每夜臨睡時含荔枝肉二枚次早吐出半月見效

古頭潰爛 凡古爛痛極飲食難進宜用吳茱萸三四錢研末好熱醋調敷兩足心用布捆好對時一換其效

如神 古上生菌此惡症也初起如豆漸大如菌皮痛紅爛無皮朝輕暮重由心脾熱毒所致用礞砂人中

白各五瓦上青苔瓦松澹雞糞各一用傾銀子罐子一個將藥裝入封固外用鹽泥封好以炭火煨紅待三

炷香為度候冷開罐取出入頂上梅花水片麝香各一共研細末臨用時先以磁針刺破血菌用藥少許點

之再用蒲黃蓋之內服二陳湯用內外門小舌落下用鹽椒攪連核燒灰存性研末吹之即上 或用食

鹽炒熟點之均效

陰虛牙痛 枸杞一兩蒸瘦猪肉食一二次神效之至 又牛膝去心鹽水炒五錢猪腰一對要一精才上者

粥食立效 又用陳鹽梅子含口內吐出涎水數次即愈

咽喉辨治 咽喉之患最為險惡然頃刻而痛難及係屬寒症若悠緩而痛乃為熱症內經云驟起非火緩

起非寒虛寒寔熱是在聰明者知所區別乃所投而無誤耳凡喉症須於喉症門詳細參看斟酌用之為妙

單雙喉蛾又名喉痺生于咽喉關上者輕關下者重此症喉閉片時即不可救若男子從鼻梁中心尋至頭

頂婦女則從後腦尋至頂上小兒則看兩手虎口如有水泡紅子即用銀針挑穿喉蛾即破忌見燈火切切

一面用老大蒜頭搗和如蠶豆大敷經渠穴穴在大腸下手腕男左女右用蠅壳蓋上紫佳用亦可用片時

即起一水泡銀針挑破將水搽淨以去毒氣立刻安痊再服甘桔湯用內外備風火上鬱頸腫喉痛薄荷

一錢連翹射干牛蒡馬勃各二錢生菜豆皮三錢水煎服 又最近喉症吹藥良方 犀牛角三分上梅片

三分血珀末三分月石五錢鳳凰衣一錢燈草灰三分川貝母一錢人指甲五分飛青黛五分壁喜窠十四

薄荷五分蒲黃五分上川連五分廉珠粉三分以上共研極細末磁瓶收貯能吹一切喉症 又妙方能治

七十二種喉症頂上水片二錢真礪砂一錢元明粉一錢硃砂二錢共研極細末用磁瓶收藏不可洩氣能吹各種喉症

吐血治方 吐血之症不一而患自肺熱者居多若不早治必至漸入癆瘵良可慮也方以白茅根去心四兩馬蘭頭連根四兩湘連子四兩紅棗四兩先將白茅根馬蘭頭兩味洗淨同入鍋內濃煎二三次濾去渣再入湘蓮子紅棗入罐丈火燉令患者隨時取食以食完為度所患病者自然斷根不復發矣屢試神效治一切紅症 仙鶴草二錢紅棗七枚同者去草連湯服之無不立效兼能治腸紅便血虛勞等症 又吐血

立止薑便藕汁韭菜汁陳京墨汁各一錢扁柏一錢酒汁以上五杯奏一大盞隔水燉溫和熱服 治吐血不止當歸二錢炒黑花蕊四分版杏仁一錢去皮尖淮七三錢茵草一錢丹皮一錢生地汁即芋薺五錢共煎湯和童便服立止 又用桑樹根皮去粗皮脚燉精猪肉淡食數次奇效

雜治門 聞死人臭 棺中人朽屍臭發出聞之不快心中作嘔欲吐鼻中死臭難去可以旱煙管中裝入布屑而吸之臭氣自去而心自安 治痔良方瓦松三錢甘草節三錢防風三錢透骨草即白鳳仙花根二錢蟬衣三錢荆芥三錢劉寄奴三錢癩蝦蟆草三錢 濃煎至沸入醋半杯鹽一撮將葯水傾於洗淨之痰盂內身坐其上熏之俟葯水稍溫即用水洗之不過二三次脫根永不發矣 安眠法夜間不能安眠每夜食稀白粥一碗忘小菜 又方用燈草煎湯代茶飲後不可飲茶 誤吞針用上方治之奇驗或用蠶豆煮

韭菜同食韭菜不可切斷針與韭菜從大便出 又妙方挖取活癩蝦蟆眼珠一對帶血用冷水團圓吞下其針兩端穿珠立刻吐出或從大便出奇效 忘水遠食蝦蟆 誤吞金銀銅鐵錫 羊脛骨脚詳前燒枯為末米湯調服二三錢一日必出 或用橄欖核燒枯研末開水調服亦出 或食糯米糖亦效 誤吞頭

髮頭髮吞入腹中足以牽繫臍脈若在喉間尤為危險可用日常梳髮之舊木梳須油透者一個燒枯研為細末用黃酒沖服極效

火藥及湯火炮傷 生豬膏生扁柏葉同搗極爛敷傷處即止痛生肌 又用狗油塗之其痛如失湯潑火燎身直即時可救如起泡則狗油無用矣須用水檮樹達汁塗之其泡自然平下如泡爛用竹蟲屎加水片

上海醫學書局印

少許調油塗之有水則乾摻自愈此方經驗 湯火膏油等傷急用生石羔搗爛以桐油調塗患處三四次
一兩日即愈 治滾水油湯火傷 田七一錢 生甘草二錢 黃連一錢 共為末麻油塗留口出毒勿令攻心

如太重加蕉根蚯蚓七條用新瓦焙乾放地上令去火氣研末調油敷之 湯泡火傷 川山甲 版 枯礬山漆

水片各等分為細末茶油調敷 湯火燒傷 梔子為末和鷄卵白掃之立效 湯火傷仙方 水調服合生

芋頭去皮磨爛敷傷處立愈如傷重再敷二三次無有不效經驗多人 手足被竹木鐵釘磁器玻璃等物

刺入肉內不出用牛膝放入口內嚼爛取出敷患處二三次此物必出 竹木刺入肉用土狗挫爛帖之即

出 毒蛇咬方 烏柏葉半邊蓮小毛射雄黃精槐花木通滑石各藥輕重隨用共為末蜜為丸每丸一錢五

分 蛇咬急救方 用火燎蛇咬處其毒隨火而出或用新火熏之即愈途中無藥便用生鹽一撮口嚼爛敷

咬處即無生鹽熟鹽亦可 百足咬經驗仙方 此蟲咬人其傷口必閉先用大玉香點火照之其口即開開

時其口即有黑氣隨火而出次用蜘蛛數箇新瓦焙存性點傷口即復合後用生葫蘆煎水飲即愈 又用

鳳仙花擦之不論紅白或用八角擦之亦可 又蜈蚣百足咬用雄鷄或塗傷口立即止痛或用公鷄喉內

涎塗之或用舊油紙傘燒烟熏傷并擦之均能止痛或取大蜘蛛在傷口令吸去毒用鷄血塗隨放蜘蛛於

水令吐出毒以全其生 毒狗咬傷方 一人被狗咬甚至聲將狗狗此毒入心也用斑毛二十四隻同米一

撮炒黃去斑毛將米為末再用杏仁三錢 川連三分 甘草三分 茯神一錢 煎開水米末吞下即愈 又方用

麻油和雄黃末服或用水仙花根搗取汁酒水和飲少頃上吐下瀉而愈 又癩狗咬傷杏仁三錢 舊酸梅

一錢 黃糖一撮 狗肝菜一撮 同搗爛敷患處數日即愈 又瘋犬咬人此症最怕七日一發發時天本無風

病人但覺風大入帳蒙頭躲避此非吉兆過三七之日無此最風情形方為可治被咬時先者頭頂如有紅

髮二三根趕緊拔去最為要緊隨於無風處以冷茶洗淨汚血用杏仁搗融敷之內服韭菜汁一碗隔七日

再服一碗四十九日共服七碗傷口上再用煮熟鷄蛋白蓋上用艾絨在上燒數十次百日內忌鹽醋一年

內忌猪肉魚腥酒色終身忌食狗肉蠶蛹紅飯豆方得保全否則十有九死此係萬仙妙方有瘋犬一日咬
三人用此方得活親見有效切不可誤吃斑蝥毒約以致小便秘痛難忍欲解斑蝥之毒查解救諸毒門

頭面諸疔 救急湯 紫花地丁 金銀花 白菓仁 桔梗 生甘草 知母 三水煎服至重三劑必愈

此方治頭面口角疔瘡俱效吞斤更妙 又方 一人唇口生疔七个頭腫如斗心悶神昏百藥不效後有人云

此名七星摺月用蜘蛛搗爛數之頃刻瘡口出黃水腫消神清次日全愈如無蜘蛛以五穀蟲一錢瓦上焙乾研

末白礬三分蟬酥三分以燒酒溶化調勻敷疔上少刻疔亦破流毒水而愈矣 又方 凡口瘡生疔者大靨

中如有紫筋用銀針刺之出血即愈者人不知疔在何處但唇內癢極須臾半面腫硬痛甚見腿後起有紫筋刺

之立效 又方 雄雞冠血點上其效如神 又方 大蝦蟆一個取肝貼之立消兼治面上生疔對口疔等症

又方 生規去壳搗碎敷之即效 又方 烏色草魚去鱗取皮切片貼之隨貼隨乾乾則另換至數十次即

破口而愈矣

黃水瘡 初如粟米瘡而兼痛破流黃水浸淫成片流處即生由脾胃溼熱外受風邪相搏而成發於心下者若不

早治則難救宜用青蛤散 蛤粉兩 真青黛錢 熟石膏兩 輕粉 黃柏各五 共研細末先用香油調成塊次用

涼水調稀塗之神效並治鼻中生蟲 又方 蠶豆殼瓶 砒末 加黃丹少許以真菜油調敷麻油亦可乾則再敷

三日即愈屢試如神 又方 紅棗燒炭錢 飛黃丹 松香 枯礬各四 共研為末麻油搽立效 又方 輕粉

樟腦錢 二大楓子去壳 川椒各四 杏仁錢 共為細末和柏油搗勻敷之功效如神柏油又名捲油又名白

油即為桐子油也或用癩毒門松脫散蘆薈散燕泥散雞腰膏均極神效

瘡中生蛆以海桐油洗淨 諸瘡因蒼蠅飛聚而生蛆者用 寒水石細末 搽之如香反細不如無蒼蠅而

生蛆者係陰溼所化也用海參燒枯研末搽之或用皂莢飛過為末搽之其蛆即化為水

附骨疽 生大腿外側又名貼骨疽又名縮脚疽初起不熱不紅甚則錐痛難以屈伸轉動不便久則寒鬱為熱熱

甚作膿而無頭皮色不變漸透紅亮一點則為內膿已成潰則收功甚難用 白芥子研末燒酒調敷或以大戟

甘遂二末白蜜調敷內服陽和湯每日一劑四五服可消清則再服子龍丸或小金丹以杜患根大忌開刀開則

定成縮脚損疾此林屋山人秘方也

霍亂痧 痛而不吐瀉者名乾霍亂毒入血分宜放痧新食宜吐久食宜消食消下結宜攻痛而吐瀉者毒入氣分

宜...

...

宜刮痧有痧筋則放宜調其陰陽之氣須知腸胃食積宜驅不宜止止則益痛若吐瀉而後痛者此因瀉糞穢觸
宜用養香正氣須防食積血滯或消或攻或活血彼山藥茯苓及燥濕之劑溫暖之藥皆不可亂投乾霍亂盤腸
大痛先放痧用石二方與潤下丸炒

一人晚覺腹痛吐瀉數十次痛益甚宿食雖吐瀉盡乃毒入血分血瘀作痛也用絲六絲七方少平次日再服愈
下頰脫落 此症起於腎肺虛損元神不足或談笑高興忘倦一時元氣不能接續所致須平生正坐令人以兩手

脫住下頰向腦後送上關竅隨用布條兜住務須避風若受風邪則痰涎上擁口眼歪斜邪則難治矣外用天南
星研末姜汁調敷兩腮頰一日即上次日再用 高麗參 白朮 茯苓 製半夏各五錢 當歸錢二 僵蠶錢二 天麻

陳皮各一錢 川芎各一錢 甘草三錢 製附子六錢 燈心十四 生姜三片 水煎服 又方 真烏梅搗勻為餅塞滿牙盞頭處張口
流涎隨手撮上 又方 白朮兩 防風五錢 水煎服半刻即上其效甚速

大腸脫肛不收 蝸牛身有螺蚶壳頭有雙鬚者 猪油調敷立效桑樹蝸牛更好 又方 腳魚頭焙枯研末麻油
調敷或以紙托患處神效 又方 大螺蚶個 入頂上梅花水片分 即時水出敷之甚效 又方 蟬退研末香

油調搽奇效無比 又方 大蜘蛛個 去頭足瓦上焙枯研末燈油調敷半刻即收神效 又方 生鐵心水煮
濃汁日洗數次雖脫肛多年亦效 又方 草蓆子七 去壳搗爛數顆門上少刻即收收後務即將藥洗去有人

脫肛三月一敷即愈 又方 糶上灰塵或則吊 同鼠糞燒烟於桶內坐上薰之數次即止 又方 後小兒脫
肛辣椒方百藥不效服之即愈

腿足不能起立能食易飢 凡人腿足無力不能起立而口又健飯如少忍飢餓即時頭面皆熱有咳嗽不已者此
痿症也乃陽明胃火上衝於肺金而肺金為火所逼不能傳清肅之氣於下焦而腎水燥乾骨中髓少故不能起

立而胃火又焚燒故能食善飢久則水盡髓乾而難治矣可不急瀉其胃中之火哉然而瀉火不補水則胃火無
以制未易息也方用起痿至神湯 熟地 山藥 元參 甘菊花各一 白芥子三 當歸 白芍 台黨各五 神

曲二 水煎服一劑火減二劑火退十劑而痿有起色三十劑可全愈也此方奇在菊花為君瀉陽明之火而又不
損胃氣其餘不過補腎水生肝血健脾氣消痰涎而已蓋治痿以陽明為主瀉陽明而佐諸藥自易成功耳 終