

0 1 2 3 4 5 6 7 8

JAPAN


Tama

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

贊  
聲  
鈔

四十九

二十一



二十一

武門  
號  
卷

34

續

目錄卷第四十九 諸藥祕傳依本草

性全集

同上案入二藥有君臣佐使以相宣擇又合和十卦八宜角一君二臣五佐又可一君三臣九佐也

神農本草三卷

云上藥一百七種為君主養命以應天無毒多服久服不傷人欲輕身益氣不老延年者本上經中藥一百七十五種為臣主養性以應人無毒有斟酌其宜欲過病補虛羸者本中七日經下藥一百七十五種為佐使主療病以應地多毒不可久服欲除寒熱邪風破積愈病者本平經

三品金三百六十種法三百六十五度合之應一日以成一歲  
倍其數合生七百九名本說如此今案上品藥性示皆  
能遺病但其勢用和厚不為倉卒之効然而歲月  
將服必獲大益病既愈矣命示兼申天道人育  
故云應天百七種者云當謂寅卯辰巳之月法方  
物生榮時也

中品藥性癆病之辨漸

深輕身之貌稍薄猶服之祛患當速而延齡為  
緩人懷性情故云應人百七種者當謂午未申酉  
之月法万物成就時也

下品藥專主攻

擊毒烈々氣傾損中和不可恒服疾愈上地貯收殺  
故云應地獨用百七五種者當謂戌亥子丑之月兼  
以閏之盈數加之法万物枯藏時也今合之貯不  
心偏用自隨人患若參而共行之但君臣配隸應  
依後所說若單服之者所不論耳

藥有陰陽配合子母兄弟根葉花實中石骨肉今  
安如立人制多君少臣多臣少佐則氣力不周故也而  
檢仙俗諸方亦不必皆爾養命之藥則ヨク君養性  
之藥財ヨク臣療病ヲ之藥則多佐猶依本性所主

而第饑斟酌用此者益當為善又恐上品君中饑各有貴賤譬如此列國諸侯雖並得利制而猶叛宗周臣佐之中亦當如此所以門冬遠志別有君目臣鑿

耳草國充大黃將軍明其優劣不皆同帙自沈農岐之後孰正應領畧輕重為其分割也仙方之草十九有防己細辛俗方石散有桔梗乾薑畧舉大者如此其餘有致十條別注有後半夏有毒用之必須生薑此是取其所畏以相制耳其相須相使者不必同類如和羹調食魚肉葱段各有所宜共相宣荔

也藥有酸鹹耳苦辛五味人有寒熱溫涼四氣及有毒無毒傷乳曝乳株造時月生熟土地所出無不傷陳新並各有法本說如是又有分劑秤兩輕重多少皆須甄別若用得其宜与病相會入口必愈身安壽延若令熟卒裡二瓶假牀類分兩邊升湯丸六度當反羌剗以至殆命醫者意也右三所謂良醫蓋之善以意量得其節也說言俗無良醫狂死者半拙醫療病不若不喻如宰夫以鮫鱉為葷羹食之更足成病豈充飢乏可望哉故仲景公云如此醫敘之也

療寒以熨薑瘡熨以寒薑飲食不消以吐下藥  
鬼注盜毒以毒薑瘡腫瘍瘻瘡以瘡薑風濕薑各隨  
其所宣本說如此今安有薑性一物蓋至十全病者取其  
偏長為本補瀆療寡婦尼僧異妻妾此是達其性懷  
之所致也病在胸膈以上者先食後服藥病在心腹以下  
者先服藥後食病在四肢血脉者宜空腹而在旦病在  
骨髓者宜飽滿而在夜其狀但薑性之多方節適之  
早晚復須條理今方家所云先食後食蓋此義也  
又有湏酒服飲煖服湯有疎有致者湯有生有熟皆

各有法用時無應詳宣之 以本性為根宗配合諸證  
不可一概言所以醫方千卷猶未理盡春秋以前及  
和緩之書箇數道經畧載扁鵲教法其用薑猶是  
本草家意至漢淳于意及華中等方今時有存者  
皆脩薑性張仲景一部竊為衆方之祖宗又悉依本  
中但其善訣服明氣候以意消息耳至於剗腸割膽  
刮骨續筋之法乃別術所得狀神農家夏行教種薑  
便致大益其深練歲積即本中久服之不如俗人微覺  
便止故能臻其所極以致遐齡豈但充牴愈疾而

已今瘡醫處瘻皆耻者本中或倚約旧方或用人傳說攬筆疏之倣然載面此以表奇其畏懼相反自冥昧而薦類續僻分兩參差不以為疑偏尔伍羌則自信方驗若旬月未瘳言病滯深倍不反永諸已思得失虛構多納金帛狀唯在頭宜責固將居禹貽謹譴矣其經四部軍國礼眼若詳用永哉正於芟述狀直至於湯藥一物有謬便性命及之乎棄之君百金之長何可不深思戒慎耶許太子侍薦不洗藥不先掌招殺賊之辱李孫饋薦仲尼未達知薦之

不可輕信晉時有一才情人欲刊正周易及諸薦方先与祖紂共論祖方辨擇經典縱有異同不足以偈凡效方藥々々不連便毒夭所由則後人受弊不少何可輕以裁斷祖云此言可謂仁識足為水鏡論語云人而無恒不可以作巫醫明此二法不得以權飾ヲ忘造所以醫不二代不眠其薦九折臂乃成良醫蓋謂學功湏深故也衆醫都不知薦性唯聽市人々々又不先穴皆株送之家株送之家傳習造掘與僞好惡莫測所收鐘乳酢煎火令白細辛水漬今血黃膏竈

薑為辦當飯酒酒取潤螺蛸膠着采枝吳公朱足  
令赤丸有此等皆狀更實俗用既久轉以成法收復可  
改未知之何又依法分薑不量副除如遠志牡丹裁不  
取半地黃門冬三分耗一九去皮除心之屬分兩皆不  
侵相忘病家唯依此用不知更秤 又王公貴勝合  
薑之日薑付群下其下好薑貴石無不竊盜紫石  
丹砂吞出洗更一行經十數過賣諸有此等例偽巧  
百端雖鑒檢初不能覺以此療病確即効斯藥家  
之盈虛醫人之淺拙也可耻々可恐々

本中時月皆是庚寅歲首則從漢大初後所說也其  
根物多以二月八日者謂春初津潤始萌未衝拔葉  
勢力淳濃故也至秋枝葉就枯又飯流於下令即  
更拔之春寧宜旱秋寧宜脫其華實莖葉乃  
右隨其成變矣歲月亦有旱晏不必都依本  
文矣經說蕷乳之依遁甲法甲子旬蕷中在癸  
酉以薑着酉地余不必然正是不露日曝於陰影  
處乾之耳所以有云曝干故也若辛可兩用益當  
為善案謹本草採薑蕷干者多至如鹿茸經称

隂干皆悉礮壞今今火干易得旦辰中木根苗隂  
干皆惡九月已前採者悉宜日干十月已後採者隂  
中乃好矣

古秤唯百銖兩而無分名今則以十黍為一銖六  
銖為一分四分成一兩十六兩為一斤但古秤複今  
南一秤是也晉秤始後漢末已來分一斤為二斤  
一兩為二兩耳金銀絲錦並与藥同無輕重矣  
古方唯有中景而已涉今秤若用古秤作湯則  
水多殊少故知浙複秤善用今者耳方言分等

者派分兩之分謂諸藥斤兩多少皆同耳視病之  
大小輕重所用乃以意裁丸此皆是丸散之量更  
依劑度用之湯酒中無分亦也

一散藥百克力主十分方寸匕之一準十如梧子大  
也方寸匕者作匕正方一寸抄散取不落為度錢  
五匕者今五錢錢邊立字者以抄之亦今不落為  
度一撮者四刀圭也十撮為一夕十夕為一合以栗  
升分之者謂藥有虛實輕重不得用斤兩則以  
升平之藥升方作上侄一寸下侄六分深八分內散勿

案柳正介徵勤令平調耳一藥有云如細麻者即胡  
麻也不必扁々但令較畧大小相秤耳如黍粟  
亦然以十六黍為一大豆下也如大麻者即大  
麻子唯十三細麻也如胡豆者今青班豆也以  
二大麻準之如小豆者今赤小豆也粒有大小以三  
大麻準之如大豆以二小豆準之如梧子者以二大  
豆準之

一方寸匕散蜜和得如梧子十九為度如彈丸及  
雞子黃者以十梧準之安一方寸匕散為丸如梧子

得十六丸如彈丸一板不梧若雞子黃者準丸以  
彈丸同雞子黃此其不等也

一湯酒膏藥旧方皆云咬咀者謂秤畢擣之如大豆  
又使咬去細末此於夏殊不悅藥有易碎唯碎多  
末末秤兩則不復均令皆細切之較畧今如咬咀  
者羌得無末而粒片調於藥力同出無生熟也  
散藥亦先細切曝燼之謹案咬咀正謂商量斟  
酌之耳耳余解皆理外生精也有各擣者有合  
擣者隨方所言其潤濕藥如丹丸乾地黃藥皆先

切乾曝燥獨擣令偏碎更出細礱曝干逢陰雨亦  
以微火烘之燥少停令乃擣之丸濕藥燄皆大耗  
當先增分兩湏得屑乃秤為正其湯酒中不湏  
如此一簇丸薑用蜜蜜絇令細於蜜丸易變若簇  
散巾薑用輕疎絇於酒服則不染其石藥亦用細  
絇如凡者

一簇丸散藥半皆更合於中以杵研治之數百迴  
視色理和同為佳

一湯酒膏中用諸石藥皆細擣之如粟末而可

以葛布簇令調並新綿以制之裹內中其唯黃朱  
沙細末如粉

一煎湯欲熟微火少以手合少沸其水數依方多少  
大畧止兩薑用水一斗煮取四升以此為率然則  
利湯欲生少水而多取補湯欲熟多水而少取好  
詳視所得寧令水少者用新布兩人以尺木絞澄去  
泥土濁覆紙令寧勿令鎗器中百有水氣於熨  
湯上煮令煖人好服湯寧令少熱易下冷則嘔  
涌云分四服三服者要令刀熱乃足相及先視人

之強羸病之輕重以爲進退增減之必焉依方一說也

一漬藥酒隨寒暑日數視其濃烈便可瀝出不必待至酒尺也淳可曝燂微擣更漬飲之可作散服凡建中腎瀝諸補湯淳合兩劑加水煮竭飲之又敵一剎新藥貪人可當依此用皆應先曝今燂丸合膏初以若酒漬取令淹浸不用多汁密覆勿洩云醉時者固時者也從今日至明日亦有止宿者三上三下以洩其焦勢令藥味得出

上之使迺々沸仍下下之取沸靜良久乃上寢欲少生者其中又有薤白者以子兩頭微焦黃為候有白芷附子者亦令少黃色也猪肪皆勿令往水鴈月弥佳絞膏亦以新布若是可服之膏々淳亦湛酒莫稍飲之可摩之膏々淳則宜少以薄病上此蓋貧鄙人欲兼盡其力也

一膏中百雄黃朱沙草皆別擣細研如麵湏絞膏竟乃投中以物疾攬至于凝強勿使沉聚在下不調也有水銀者於凝膏中研令消散胡粉亦然凡湯酒中用

大黃不湏細剗作湯者先瀆水令淹浸蜜覆一宿  
明日更湯乃以臨熟內中又更兩三沸便敍出  
則刀勢盤易得快利丸散中用大黃回方皆熟令  
不宜尔可

一湯中用麻黃皆先別煮兩三沸斬去其沫更益  
水如本數乃內全藥不尅令人煩麻黃皆折去節  
令理通寸斬之小草瞿麥立分斬之細辛白前三  
分斬之丸散膏中則皆細剗

一湯中用完物皆碎破乳棗核子枯棗子之類是也

用細核物亦打碎山茱萸五味子仁人核決明子之  
類是也細花子物正尅完用之旋伏花菊花地膚  
子葵子之類是也米麥豆三草完用之諸虫先微炙  
亦完用之唯蠟蟻當中破之生姜夜干皆薄切  
巴消祐穰阿膠皆須絞湯竟肉汗中更上火內  
三沸滓洋尽時乃服之

一用參門全皆微湯潤抽去心杏人桃人湯柔去  
皮巴豆打破剥皮刮去心不尅令人心悶石葦辛夷  
刮去毛兔箭削取羽及皮梨芦剔取根微炙

實去其核正用皮又灸之杵雲實於鎗器中微  
熬令汗出則有弊礮石於公瓦上若鈎物熬令  
沸汁尽二礮石皆黃土泥芒令燔燒乏半日令  
斃而解散犀角零羊角皆刮截作屑諸齒骨  
並炙擣碎之皂莢去皮子灸之

一湯丸散用天雄附子烏啄側子皆燒灰炮令研  
削去黑皮乃秤之剝去更傷易湯令滑盡不  
介丸人咽曰方七許廻今六七過便足亦可血更  
之一沸易水如此三過仍控洗便畢急時訖隨大小

破為細片乃秤以入湯若膏酒丸散皆須曬燥  
乃秤之

一丸散用膠皆先炙使通肺沸起燄乃擣不交  
處更炙之

一丸中用鵝脂洋投少蜜中搅調以广和藥用熟艾  
細碎刀令諸藥擣令散不可獲別擣內散中

一用蜜皆先火煎斷沫令色微黃則丸經久不壞多  
少隨蜜精龐

瓦散用巴豆杏仁桃仁亭歷胡諸有膏脂藥皆熬令

黃黑別擣令如膏以指撲視汎尔乃以向成散稍  
下臼中合研擣令消散乃復以輕疎絳箋畢湏足  
又肉臼中依法擣數百杵也湯膏中用亦有熬  
之者雖生並擣破

一肉桂心厚朴杜仲秦皮木蘭革皆削去上虛類甲鼈  
皮取裡有味者秤之茯苓楮芩削除黑皮牡丹巴戟  
天遠志野葛芩皆搘破去心紫苑洗去土皆乃  
秤之薑白芍白除青令居莽中石南斗苜芋澤  
蘭歇取葉及軟莖鬼臼黃連皆除根毛刈  
瓣

去閉口者及目熾之

一狼毒枳實橘皮半夏麻黃吳茱萸皆欲得陳久  
其余唯須精漸

一方云巴豆如干枚者有大小當先去心皮早以秤之  
以一分準十六枚附子烏頭如干枚者去皮畢以半兩  
準一枚枳實如干枚者去核半以一分準二枚橘皮  
一分準三枚棗有大小以三枚準一两云乳薑一累者  
以一兩為正

一方云半夏者洗畢秤五兩為謹案半夏一升者以

八兩為正稱一升者三兩為正吳茱萸一升者以五兩為正  
也云其子一升其子各有虛實輕重不可通以秤唯  
皆取半升為壳子一升者有蕷葛子一升者四兩  
茱子一升者三兩半地膚子一升者四兩是其皆不  
同也

一方云

唯薑附子湯及膏酒中生用亦剗去皮乃秤之並  
理破作七八片隨其大小並割除水黑處  
湯酒膏丸散用半隻皆旦晚以熱湯洗去上滑  
手按之釋時隨柱心一尺者削去皮畢量半兩為正  
其半一尺者量二兩為正

一方云蜜一斤者有七合猪膏一斤者有一升二合  
茱分劑料理法大畧如此

玉石部上品

丹砂君萬

辰列

宣列在之

味甘微寒也無毒主身体五藏百病養精神安魂魄益氣明目通血脉止消渴澤人面殺邪惡鬼除中惡腰痛毒氣癆諸瘡久服通神明不尤輕身作末各與朱光也如雲母西磁石鹹木與朱者令朱砂俗醫皆別取唐本註云

丹砂大畧二種有土砂石其土砂色黑療赤但不入心眩石砂便有十數種竅上者光明砂大如

卵小如棗栗形如雲母光明一名無量砂如石榴顆狀術義曰丹砂令人謂之朱砂辰朱砂也外臺祕要云傷寒時氣溫疫頭痛一二日血砂一兩以水一斗煮取一杯頓服

雲母君萬

元列

江列在之

味甘無毒主身皮死肌中風寒熱除氣安五藏子精明目下氣堅肌瘠五勞七傷虛損輕身延年一名雲珠一名雲花一名雲英一名雲液一名雲砂為之使畏鮑用及流水隱居云按仙經雲母乃

有八種向日視之色黃多赤名雲珠如水露乍黃乍白名雲砂英為苦以下畧之其色黯之黑有文斑々如鋸者名膽是等不可服大害人令虛勞家丸散用之白色者上有毒主下痢腸癖補腎冷陽損之云青赤白黃紫者並堪眼黑者不可服害人衍義曰雲母古補有練法令人服者至少令合雲母膏治一切癰毒瘡等惠氏局方別有法服雲母之法或以桂蕊水化之或以露於鐵器中焚之或

以消石合於筒中埋之為水或以蜜為酪或以秋露清之百日為粉服之一年百病除三年老反成童子入火不燒入水不濡躁而不傷厲与仙人相見埋之昂焦而猛火中經時

不焦埋之令人長生也眼經十年血氣常霍其上眼共母以至其子具理自然也神仙傳云宮嵩眼雲母數百歲有童子顏色至惠方云治火瘡瘍治用雲母粉同生羊髓和如泥塗之千金方云治風癆遍身治不差者眼雲母粉以

清水調眼之者人之大小以意酌量与之多少眼干  
金翼方云治雙風汙出凹水和雲母服之不適  
耳眼立差又方治帶下溫水和服之方十克見  
神効差又方治赤白痢積年不差鰥調眼方  
寸兩見立神効治百病食醫心鏡云治赤  
兒赤白痢及水痢雲母粉半大兩研作粉復  
白粥調空腹服之

王泉君夢

味耳平無毒主五藏百病和筋強骨安魂魄

長肌肉益氣利血脉療婦人帶下十二病明耳目  
久眼耐寒暑不老神仙輕身長年人臨死服五  
斤三年色不變一名玉礼畏數冬花禹錫ち  
治血塊

和石鐘乳君夢道別ニアリ

石鐘乳味甘溫無毒生氣明目益精安五藏通百  
節益氣補虛瘦瘠腳弱疼強隱久服延年益壽  
顏色不老令人有子一名公乳一名芦石畏紫石  
英禹錫石鐘乳一名虛中神農辛チ相君黃帝醫

和耳十云無毒扁鵲耳十方引成如乳汁黃白色

室中相通二月三月取陰乳又日華子云補益勞

七傷因經云石鐘乳生竹室山谷及泰山

礬石君夢

晉列有之

味暖寒無毒主寒熱堅骨云鼻中鳥肉輕身  
不危增年久服傷人骨耳草為之使惡牡廯  
聖惠方云治少兒肺中汁出不止并而膻用礬  
矣細研傳之

千金方云治少兒口瘡飲乳不得以白礬如雞

子大置暗中墮兒足底二十昂愈

又方治鼻中息肉燒礬末面脂和綿裹寒鼻

中敷日息肉隨落消落

津液血出不止以礬石一兩燒水三斤煎取一斤  
乃含之時後方云瘻耳內腫痛出膿水不止方

礬燒末又以筆管吹耳內日三四度或以綿裹

塞耳中立差

又方瘻人瘍生瘡暖出作臼取高昌白礬麻仁  
等分研煉猪脂相和成膏糊白皮作湯洗瘡合

乾昂金膏然后以树叶貼其上不逾三度差

簡要濟衆方治牙齒腫痛白礬一兩燒灰露蟬房一兩微火為散每用二錢水一中盃煎十全沸  
搗爛牙冷吐之

消石君夢

味苦辛寒大無毒主五藏積熱冒賾閉除邪氣  
療五藏十二經脉中百二十疾暴傷寒暖中大  
熱止煩渴消湯利小便及瘻瘍瘡練之如膏灸  
眼輕身天地至神之物一名芒消為之便應若

參苦菜今艺消乃是煉朴消作之一名消石石朴神  
農若下扁鵲耳下昂成硝石畏杏人竹葉食之  
治

喉瘡

巫山方治眼赤痛用消石

吳茱萸方云治立種淋疾勞淋血淋氣淋熱淋石淋  
小便不通消石一兩研為細末每服二錢諸淋各依  
湯虛煩小便小出小腹急痛葵子末煎湯下補  
虛丸散熱淋小便熱赤色淋虛不快滑下急痛  
並用冷水調下石淋茎內痛尿不能出卒患諸淋

並只以冷水服之

芒消君藥

味辛苦大寒主五藏積聚久熱冒閉陽邪氣破留  
血暖中痰實結通經脈利大小便及月水破五淋於  
朴消石石韋為之使惡晉宋古方多用消石少用  
芒消近代諸醫但芒消近代諸醫但芒消斯言消  
石豈古人昧於芒消也消石一名芒消理既明白不  
合拿出之屬性論亦芒消使味鹹有小毒能通女

子月水閒

瘡癰黃疸病主墮胎患雪公方入乳鉢研如粉用

芒消足曰芒消

朴消君藥

味苦辛寒大寒無毒主百病除寒熱邪氣遂六  
府積聚輕身神仙自下如銀入地千歲不變色白  
者佳黃者傷人亦殺人一名消石朴畏鹽胃中鹽  
至惠方云治頭氣頭痛不止用朴消二兩鳩羅為  
散用生油調塗湏上外臺祕要云治喉痺一兩細  
含之立差

簡要清衆云治小便不通陶脫墮一百花散研為末  
每服二錢簡香酒調下生津止渴之水鄭真人曰  
滑石君薦一道列在之

味耳寒大寒無毒主身墮閉利小便蕩胃中積  
聚寒墮益精氣通六府一名脫石一名番石名番石  
章為之思

聖惠方云治乳石發動墮煩

湯不止滑石半兩研如粉以水一中盃頓服之未再  
服

又方云治婦人小便不得滑石葱湯調二錢入黃連  
外臺祕云妊娠不得小便滑石末水和泥淬下二寸  
廣利方云不通小便淋結膀胱妨悶兼痛以滑石  
八分如麵水五大合和頓服正裏之藥

楊氏產乳云治小便不通滑石末以車前汁和塗  
睛四畔方四寸墮即易之水和亦得以入小便  
石膽君薦信列在之鄭真人曰治小便不通者  
味暖辛寒有毒王明目久痛金瘡女陰鯁痛石

淋寒墮崩中下血諸邪毒氣上氣及瘻瘍瘡練餅

服之三名甚石為之  
薰花 辛夷 石膽 神農  
暖少寒 李氏 太寒 桐君 辛有  
偏鵲 苦無毒 藥性論云石膽君有大毒外臺  
祕要云泡齒痛及落喉細研石膽以人乳汁和如  
膏付痛齒 梅師方云治甲疽以石膽一兩火燒  
令煙尽研末傳瘡上不逾四五度立差

赤石脂君藥

味甘酸辛大溫無毒能心氣明目益精癆腹痛下  
瘀赤白小便利及癰疽瘡痔女子崩中惡大黃畏

芫花 千金翼論方云治癰飲吐水無時篤者其源  
以冷飲過度遂令脾胃氣不能消於飲食入胃皆  
變成冷水吐不停皆赤石脂散主之赤石脂一斤礣  
篩服方寸酒飲到至三七服尽一斤終身不吐補  
五藏令人肥脈諸藥不効用此方愈張仲景方治  
傷寒下痢不止便膿血者桃花湯主之其方用赤  
石脂一斤一半全用一半用乾姜一兩粳半斤以水七  
升煮之去滓七合內赤石脂末二方寸匕服三

白石脂君藥

味甘微平無毒主竅肺氣厚腸補骨髓療立藏驚  
嘔不足心下煩止腸痛下水小腸熱便腰血女子崩  
中漏下赤伏排癰疽瘍瘻久服安心輕身為之畏  
黃芩唐韋富獨行方云治小兒肺下汁出不止  
兼赤少腫以白石脂細末火熬溫摸肺中日三良斗  
門方云治溼痢用白石脂干姜二物擣以百沸湯  
和麵為丸如梧子暴乾三十丸服之霍亂煎將  
水為使

黑石脂君藥

味鹹平無毒主養腎氣強陽主陰虛瘡上腸洩  
痢瘍口瘡咽瘍久服益氣不飢延年一云石  
涅二云名石黑

玉石部中品

雄黃臣萬階弱在之

味苦甘平寒大溫有毒主寒熱瘧惡瘍瘻目痛  
鼻中息肉及絕筋破骨百筋中大風積聚中惡  
肢痛邪氣百毒食之輕身神仙一名黃合唐本  
註云出石門名石黃者亦是雄黃其色無光者不任

其色如雞冠者為真有青黑色而堅者黑黃有形  
色似真

外臺祕要云治滑氣極熱以一兩和小便一杯研如  
粉乃取黃理石一枚方圓可一尺以灰火燒之三食  
頓極熱搗黃汁於石上恐大熱不可近官者一斤  
薄置上坐石上冷以衣被圍繞三五度差千金  
方云治耳聾耳以雄黃硫黃等分為末綿裹塞  
耳中博濟方云治偏頭瘻至久散雄黃細辛等  
分研盡細每用一字已下厄邊疼喫入右鼻尤

### 邊疼喫入左鼻立止アリ

集驗方云治卒醫癰搗黃搗為末細篩以管吹入  
鼻孔中傷寒類要云治小腸痛滿不得小便及  
瘡天行病雄黃細研蜜丸如棗核內弱孔中  
又方殺萬虫以末如棗塞鼻孔

### 石流黃臣藥

廣列榮列二在之

味鹹溫大熱有毒主婦人陰飼疽瘻惡血堅筋  
骨除心腹積聚邪氣冷癖上氣脚冷鼻衄惡  
瘡下部瘡

聖惠方云治諸瘡奴肉如蛇出

數十用硫黃一兩細研於肉上薄塗之而時消  
外臺祕要云治小兒聰耳硫黃末粉耳中內一夜羌  
止太清服鍊瓦砂法石硫本出波斯國角列之  
境藥品之中号為將軍功能破邪反正

磁石

臣藥

慈列在之

味辛鹹寒無毒治風股節中痛陰大熱煩滿  
及耳聰聰腎腎施骨氣益精除消癰腫瘻  
令人有子一名處石殺蟄蟲毒惡牡丹畏黃石脂  
外臺祕要云治下聰取磁石搗為醋和封之根而

立出卷

陽起石

齊列有

味鹹微溫無毒主崩中漏下破子藏中血結氣寒  
熱腸痛無子易子癰瘻不發補不足瘡易子莖  
乳寒陰下溫痒去臭汗消水暉久肌令人有子一  
名白石一名石生為之使惡澤渾菌桂雷丸蛇脫  
皮畏兔絲子經云

陽起石坐脊山谷理陽起山其常有溫暖氣雄  
成冬大雪偏消猶此山無積山一穴宦常禁閉出

月久積其穴益深得之甚以色白肌理莹明若狼牙者為上雖多種而精好者难得

術義曰陽起石如狼牙者佳不白如姜石其塊者亦內自治男子婦人下部虛冷腎氣乏施子藏久寒湏水飛研用丸石藥冷熱者皆有毒宜斟酌

玉石部下品

石灰 伍俠

益肝氣破積聚冷暖痛去龜中息肉久眠令人筋牽、燥火百日眠一刀主不諫服則救人反百獸一名青

分石治大露丸云主寒冷百病方礬石燥乳薑桂心皂莢倍梗各三枚 附子二枚 右六物擣筋蜜丸並主積聚及飲食不下心腹堅實皆用礬石近世乃少用者味辛溫主疽瘍瘻癰氣惡瘡癩疾死肌墮眉黑子息肉瘡瘻骨疽一名惡灰一名希灰術義曰石灰一合以醋炒調如泥於惡偏風口喝耶人口唇上不患處一盞塗之

立使牽正

礬石 仇栗

階弱潞別在之

扁經云礬石有大熱性置水中令水不冰又堅而拒火  
燒之一日久但解散而不奪其堅市人參取潔白  
石當之燒即為也此藥積聚痼冷為良用之湧者  
乃佳陶隱居云礬石亦大熱令以黃土泥苞炭火燒  
之一日一夕則解研可用療令結為良丹方

砒霜 佐藥 信効二在

味苦酸有毒主諸瘡風疾在胸膈可作吐藥可久  
眠能傷人飛鉗砒霜黃而成造作別有法

扁錫云砒霜有毒治瘡疾腎氣帶入藥以酢者殺

毒乃成

又方取牛水浸從甲至子拭乾却入瓶盛於火中燬別研  
三万下用別說云信効正山有砒井宮中其石色  
亦甚如雄黃以冷水磨解熱毒治瘻瘍甚  
効近大郎殺人古方並不入藥唯是燒鍊丹石家  
用近今多以治瘻然大意本以生者能解熱毒令俗  
醫乃不究其理即以所燒霜用服之其玩常有湯  
綠水先收水尽然后下取生砒謂之砒雄色如牛肉  
或有淡白者謂石砒石謂土派土磨研心吐下因此有

安者，遂爲定法。燒霜時人在上風，余丈外立下風所近中木皆死。飲毒鼠藥，大亦死，可不察也。

巫患方云治卒中風，昏憊，君醉發，涎壅土盛四肢。方用砒霜如羔豆大研以新汲水調下少許，用麯水投大吐即愈。若吐再服。

石燕 永列在之

以水煮汁飲之，主淑有効。婦人產後，各把一枚立驗。出零陵青琅玕。

味辛平，毒主身痒，火瘡，癰傷，白禿，疥癬，死肌，瘡

鍊之三八名石珠，一六名青珠。

禹錫云：主身熱目赤，以水浸令冷之。瑠璃本是石，以自然灰理之，可為器。車渠馬腦並玉石類足，西國重瑠佛經云：七寶者謂金銀琉璃車渠馬腦玻璃真珠是也。或云珊瑚琥珀，令馬腦碗上刻鏤為奇工者，皆以自然灰，又混吾刀治之，自然灰令時以牛皮膠作假者沉也。

草部上品之上

黃精君萬 競列 解列 商列 供列 在

味耳平無毒補中益氣除風溫安五藏久腫身延  
年一十六名仙人余娘一十六名馬箭

菖蒲君藥 戒列 衡列三百

味辛溫無毒主風寒溫痺補五藏通九竅明耳  
目出音声主可聾癰疽一名昌陽為之惡地瞻  
麻黃 漢武帝內傳云武帝上嵩山見長仙  
二丈問云吾凡嶽山人也聞內傳云中嶽有石上菖蒲  
一寸九節食之長生故來之忽然不見

千金方云日月來足厥產者鴉菖蒲根汁一二升灌

喉中

又方治產 崩中下血不甚菖蒲一兩半剉酒  
二盃煎取去滓三服食前溫服

又方云治好忌久服聰明益智七月七日取菖蒲  
酒服三方也

飲酒時後方云扁鵲云中惡與卒死鬼擊類為  
治皆已死鴉 菖蒲生根絞之灌之立差

又方云耳聾菖蒲根一下巴豆一粒去心二物合  
搗分作七丸綿裹塞耳目着一丸効アリ

又方云卒胎動不安或腰痛胎轉下血不止菖蒲汁三升服之

人參君蔥 滷列 威列 威勝筆 競列 淵忌在之  
味耳微寒 激溫無毒補五藏安精神定魄止  
驚悸除邪氣明目開心益智療腸胃中冷止腸  
皺痛霍亂吐逆調中止消渴通血脉破堅積一  
名人術一六名神山一六名血參如人形者有神生二  
月四月八月上旬采根竹刀刮暴乾無令見風灰  
苓為之使惡梨芦又鹹膩經云二人同走一与人參

之一不与人參俱走三五里許其不含遲

經驗後方云治大人小兒不進乳食和氣去痰人參  
四兩半夏一兩生姜汁熬一宿曝乾為末麵粉丸  
如棗豆大每服十九食后生姜湯吞

又方治狗咬破傷風吹人參不許多少茱萸火  
燒令烟絕用益子令研為末在瘡上立處効アリ  
勝金方云治吐血以人參一味

天門冬君蔥 建列 在之

味苦辛平大寒無毒主諸暴風溫偏癱強骨髓

去寒熱養肌膚益氣力利小便冷而能補久服  
輕身益氣陽煥之云服天門冬食鰐羹中毒浮  
萍解之

耳草 君藥

府列 沁列 在之

味甘無毒主五藏六府寒熱邪氣解百藥毒丸  
土猪安和七十種石一千二百種草一名蜜耳三名  
蜜草一名落草乾漆苦矣為之使惡遠志  
反大戟芫花耳遂海藻四物經經驗方治赤  
白痢方甘中一尺灸碎破以漿水煎二三度又以

燬火灸之後用生姜去皮半兩二味以漿水一升半煎  
取八合服之立効孫真人云主一切傷寒耳中如指長  
灸細剗童子小便一升煎取六合空心服日再服之  
御藥院方云二三日咽痛可與耳草湯去滓日三服  
姍和衆方云治小兒尿血耳中五分以水六合煎取二  
合去滓一歲兒一日服令尽

軋地黃 君藥

異列 沈列 在

味甘苦寒無毒主骨髓長肌肉作湯寒熱積聚除  
生地黃大寒主婦人崩中血不止及產後血上時後

方云治耳中常鳴生地黃塞之

木君萬 草列 石列ニアリ

味苦耳無毒主風寒溫痺死肌瘻疽止汗除熱消食主大風頭痛目淚出消疾皮間風水結腫除心下急滿及霍亂吐下不止利腰膝間血益液暖胃消穀嗜食作煎久服輕身延年三名山薑一名山連生二月三月八月九月抱朴子云木名山精故神農經曰必欲長生常服山薑治一切風疾且勞七傷冷氣腰脹補腰膝消痰治水氣利

小便止反胃嘔逆山嵐瘴氣陰煩長肌肉

聖惠方云治雀目不許時月蒼朮一兩搗羅為散每服一錢不許時候筋子

菟絲子君萬

草列在

味辛甘平無毒益氣力去面節養肌強陰堅筋主莖中寒精一名玉女一名菟朮一名菟蠽藥性論云治男女虛冷時後方云治卒腫滿身面皆洪大菟絲子升酒丸升清二三宿每服一升日三服又方治面上粉刺搗菟絲子絞取汁塗之羌產

書云治橫生菟絲子為末酒調下一錢匕水飲  
調下亦得

草部上品之上

牛膝君萬

草列

懷列在

味苦酸平無毒主寒溫痺四肢膝痛不可屈伸  
血氣傷熱火癩墮胎及腰脊痛婦人月水不通  
血結益精利陽氣止髮白久服輕身一名百倍二  
月八月十月采根蕷丸畏自前時后方云口舌

生瘡牛膝酒漬含之

又方治小便不剃莖中痛欲死並治婦人血結  
堅痛牛膝一大把并華酒煮飲之立愈

注驗方云治消渴牛膝五兩細剉為末生地黃汁  
五升浸盡暴夜浸汁尽為度蜜丸如桐子大空  
心溫酒中三十九久服壯筋骨

孫真人食忌云治牙齒疼々痛燒牛膝根灰致牛  
糞間

又方云卒得瘡瘍人不知以牛膝

根搗傅之

柴胡君萬

草列

江寧府アリ

味苦平微寒無毒主心腹及冒中結氣飲食積聚  
寒熱邪氣除傷寒心下煩熱諸熱痰結實結  
冒中邪逆五藏間遊氣一名地薰一名芸蒿辛杏  
孫尚藥方云治黃疸柴胡一兩去苗耳草一分  
石細剗作一劑以水一椀白茅根一握同至七分  
去滓任意時服一日足

麦门冬君薦

味甘平微寒無毒主心腹結氣腸中傷短氣  
身重目黃心下滿虛勞寒熱口乾嘔吐強陽

益精保定肺氣安五藏令人肥一名禹余粮  
独活君薦

文列云独活云寧化軍云羌活云鳳翔府云鶴活云  
味苦甘平微溫無毒主風寒瘲上痛女癟瘕結  
諸賊風痛一名羌活一名羌青一名諸一名胡一名  
陶德居云羌活形細而多節西列為獨活也微  
白為風搖故名獨活

唐本註云瘡風宜用獨活兼水宜用羌活  
本經云二物同一類令人以紫色而審者為羌活黃

色而作塊者為獨活

千金方云治中風通身冷口噤不知人獨活四兩好酒一升煎取半升分溫再服

小兒方云治產後風虛獨活湯主之治產後腹中痛羌活二兩酒二升煎取一升

麻

君萬

沃列在

味甘苦平微寒無毒解百毒殺百精溫疫瘴風氣邪氣出毒入口皆吐出中惡腹痛時氣頭痛寒熱風腫諸毒喉痛口瘡久眼輕身長年一名周麻

生益列山谷二月八月采根日乾

藥性論云蜀升麻主治少兒風驚癇時氣熱疾能治口瘻風腫疼并根浮日卒子云安枕定魄時後方云喉痺麻剉合之喉塞亦然

千金翼方云治產血不足成經月半歲升广三兩清酒五升煎取二升半分溫再治

梅師方云治時行病發瘡升麻五兩以水蜜二味同煎三沸半服傳瘡

車前子君萬

味甘鹹寒無毒主氣利水道小便陰溫痔男子  
傷中女子淋瀝不飲食養肺強陰益精令人子在  
明目療赤痛一名牛遺一名道

百一方云小便不通車前子一斤三升煎取一升半  
分三服

又方治石淋車前子二升以緋裹盛水八升煮取三  
升不食之服之須臾石下子母祕錄云治積生不  
得出車前子末酒服二錢治淫方云歐陽文忠云  
公常暴下國醫不能愈夫人云南人有此藥三文

一胎甚効夫人置之以國醫藥雜進之一服而愈  
後名賣藥者問其方但用車前子一味為末末  
飲下二錢已去利水道

木香

君薑

廣列

海列

青木香

味辛溫無毒主邪氣辟毒疫溫鬼強志主淋癆  
氣劣肌中偏寒主氣不足消毒殺鬼精輕身至神  
仙一名蜜香藥性論云女人血氣刺心二痛不可忍  
末酒服之治九種心痛積年冷氣痃癖癥塊脹痛  
霍亂吐泻心腹傷寒類要天行熱行病若發亦

黑班如痴責木杳二兩水二升煎取一升頓眼之効

澤淳君夢

脊列在

味甘鹹寒無毒主風寒溫痺乳雖消水養五藏氣力補虛損五勞除五藏痞滿消渴淋瀆腎氣強陰補不足除邪溫久服面

中部上品之上

遠志君夢

商列威勝軍

脊列有

味苦溫無毒主症傷中補不足除邪氣利九竅益智惠耳目聰明強志信力定心氣止驚悸益精

去心下膈氣皮膚中熱面目黃久服輕身不危好顏色延年一名小中一名棘莧畏真珠

荊辛溫無毒主顏逆以痛惱勤百節破瘀利水道味辛溫無毒主顏逆以痛惱勤百節破瘀利水道用胃除痺安五藏通精氣

石斛君夢 温列 春列三在

味甘平無毒主傷中隱下氣補五藏虛勞強陰益精補肉一名生一名壯

巴戟天君夢

歸列在

味辛甘微溫無毒大風邪氣癰癧不發起  
強筋骨安五藏補中增志益氣頭面遊  
風小腹及痛下氣補五勞益精利男子為  
之恩丸丹參

赤箭君藥充別有

味辛溫主殺鬼精消雍腫益元力長陽  
增年一名離母術義曰赤箭天麻苗也然天  
麻治瘡不同故後人分之為二經中言八采  
根暴乾故知同

又有鬼箭莖有羽其瘡並相似而人來異恐非  
此赤箭

草部上品之下

芎藭臣藥永康軍

味辛溫無毒主中風入腦頭痛寒婦人血崩  
無子諸寒冷心腹堅痛中惡卒急暎痛肉寒  
一名胡窮一名香黑黃連藥性論云芎藭臣  
能治腰脚弱半身不遂肉冷痛斗門方云治偏  
頭痛用京芎細剉酒浸服之羌

黃連

臣藥

宣列有

味苦寒無毒主熱氣目痛皆傷泣出明目暖痛  
下痢婦人傷中腫痛五藏冷熱之下洩口瘡  
為之惡菊花芫花玄參畏欵冬巴豆

扁經云高一尺已來葉似耳挖朴子方乳汁煎之  
治目

外臺祕要云治卒心痛黃連八兩

又方卒消

蜜和服三十九治湯延年

莊驗方云

不可忍黃芩黃連各一錢以水

二升煎取一升分三服熱啜冷飲矣

斗門方云痔疾有頭如雞冠者用黃連末傳之  
即羌文和赤小豆末尤良治小兒吐血

廣利方云治骨節熱積漸黃黃連四分研  
切以童子小便用大合浸經宿微煎三四沸滓  
食上分兩服如人行四五里再服

蒺藜子君夢

秦列 同列有

味苦辛溫微寒無毒主惡血破積聚喉痺乳唯  
身體風止痒頭痛少兒頭瘡瘍腫一名人一名正行

一名郎莉

千金方云治遍身風痒生瘡疥心疾藜子貝母各四枚為末下去曰五里不再服

黃耆

君夢

憲列二百

味甘微溫無毒主癰疽大風癩疾五風瘻補虛少兒百病婦人癰風邪五癥間惡血丈夫虛損洩痢益氣利癰腫疽瘡一名羅脂一名百本生泻

味甘鹹微溫無毒主五勞七傷補中除虛中寒熱

癩養五藏強陰益精氣多孕婦人癰除膀瘦脫邪氣腰痛止刺久服輕身

唐本註云令人所用中蓖菪刮舌花用代肉本經有肉蓯蓉功力殊比來醫人時有用者術義云肉蓯蓉功屬經以謂皮如松子有鱗子字以酒淨洗去黑汁

防風

臣夢

河中府

布列

同列二在

味甘辛溫無毒主大風煩脳痛惡風少邪目盲無所見止風熱汁出一名百枝一名屏風

蒲黃 產藥

味甘平無毒主心眼膀胱寒熱利小便止血消癩血久服輕身益氣力

千金方云古上生瘡以蒲黃傳之羌時後方云治腸痔大便常血水服蒲黃方寸匕日三服允梅師方云產后血不下蒲黃水三升煎取

一升頓服

續類

晋列

越列二在

味辛微溫無毒主傷寒金瘡癰筋骨一名

南中

外臺要方云治淋取生續絞取汁

馬根

味苦溫微寒無毒主風熱死肌癰傷口乳舌集癰腫不消喉舌腫不通大驚入腹陰邪氣食腎主腰痛輕身明目一名畧石一名明石一名一名懸石畏貝母菖蒲陶隱居云不識此萬仙浴方法都無用者或云是石類或生人石猶如石唐本註云此初生治溫乾處冬夏實黑而因莖葉

在石間者葉細厚而

味鹹苦平微寒毒主青盲赤白膜眼赤痛淚出益光輕身生

味苦微寒無毒主心眼止煩渴益氣

養血心腹痼疾結氣腰脊強肺痺除風邪一名赤參一名木羊畏鹹水反薑芦

芍藥臣藥澤乃在

味苦酸平微寒有小毒主邪氣腹痛破堅積寒熱疝瘕瘦止痛利小便益通順血脉消癰腫時

行寒熱中惡腹痛腰一名白木別本註云有兩種赤者利小便下炁白者上痛散血其花亦有紅白二色神農苦相居耳無毒岐伯鹹李氏小寒雷公酸古今註芍藥有二種有中芍藥木芍藥木者花大而色深俗呼為牡丹狀也

秦艽 石州寧化郡

味苦辛平微溫無毒主寒熱邪氣日華子云味甘令主傳屍骨蒸治及痔時氣生羌鳥山谷

貝母

越州

味辛苦平微寒無毒主傷寒煩熱淋瀝邪氣  
癥瘕喉痺乳難一名空草一名茱一名苦花

澤蘭 使萬 徐列

味苦甘微溫無毒主乳婦大腹水腫身面四肢浮  
腫骨節出雍腫產后金瘡肉寒一名虎蘭一名伟  
蒲洛陽人家種之而葉少異今山中又有一種甚  
相似葉少強山中者為狀而葉家則采之今蘭葉  
如麦門冬而長及一尺無枝故謂之澤蘭

欵冬花君萬 秦列 雜列

味辛甘溫無毒主上氣喉痺驚癇寒熱邪氣  
消渴喘息一名虛髮一名氏冬十一月采花陰乾  
杏人為之惡畏貝母辛夷麻黃黃耆黃芩當歸云  
欵冬花出常山山谷根紫色莖青紫葉似竹葉經云  
月閏黃花紫葉去土二寸初出如菊花葉也

薑黃 宣列 濟川

味辛苦大寒無毒主心腹結積症瘕下氣壅腫烈  
於鬱金葉都似鬱金花青生於根出蔓無子根有  
黃青白三色其色作之方治鬱金同生吳耳

唐本附品經云薑黃舊不載所出乃郡

廣蜀列多有之葉青長一尺許

薑金

潮列二有

味辛苦寒無毒主血積下氣生血破惡氣淋尿

血金瘡

本註云紫苗似姜黃花白秋

出莖心無实根黃赤馬醫多用之

肉豆蔻

君要

廣列二有

味辛溫無毒主鬼氣溫中治積冷心腹脹痛霍亂

中惡術義云肉中蔻對中豆蔻言之去穀只用肉二油

色者佳

聖惠方云治冷痢腹不能食肉豆蔻一兩去皮以醋  
麵裹煨令麪熟為度搗為散次時粥飯一錢

零陵香

蒙列

味甘平無毒主惡氣氣心腸痛下氣生零陵心

其松香

文列

味甘溫無毒之惡氣卒心腹痛用合諸香散

草部下品之上

附子使藥

味辛耳溫大熱有大毒主風寒邪氣積聚血瘦心腹  
冷痛霍亂轉筋肌骨強陰為百藥長生山谷及廣漠  
冬月采為附子春采為烏頭地曠為之忌蝶蛇畏  
防風黑豆草黃芩人參

陶隱居云附子以八月上旬取八角者良皆無灰  
微炮令折勿過焦推姜附傷生用之俗方每用附  
子皆湏耳中人參生姜相配者正以制其毒故也  
陳藏器云附子酢浸削如指內可中去薑去皮  
炮合折以蜜塗上灸之令蜜入內食之勿咽耳計

主喉痺雷公云凡先湏細認勿誤用烏頭烏啄  
天雄側子木薑子烏頭少有莖苗長身烏黑  
耳

巫惠方云治丁瘡腫用附子末酢和塗之乳而再  
塗肉於酒中徑一十日隔日飲之服一小合羌

千金翼方云治大風冷瘻腫滿諸痺亦病用大  
附子一枚童羊兩二枚亦得炮之酒漬春夏五日  
夏秋三日服一合以羌為度日再服無訛不治經驗  
方云嘔逆鼈甲散大附子一箇生姜一片細剉煮研如

麵糊米飲下之

經驗后方云治熱病吐下水及下痢身冷脉發躁  
不止附子一枚去皮臍分作八片入鹽一錢水二升煎一  
升溫服立効

簡要濟衆方云治脚氣連腫滿久不差方黑附  
子一兩去皮臍生用鴉為散生姜汁調如膏塗  
付腫上藥乾再調塗之俟腫消為度

孫用和方云治大浮霍亂不止附子秤重七錢  
炮去皮臍為末每服四錢水二盃鹽半錢煎取一

盃溫服立効

孫地口訣云治亂痛附子炮石膏少分為末入腦麝  
香少許酒下半錢

歲次癸卯年十一月

終

