

證治準繩

九十九

拾函

五科^女產後門

脚氣	不語	驚悸	黃疸	蓐勞
遍身疼痛	狂言謔語	恍惚	發熱	虛羸
中風	顛狂	虛煩	往來寒熱	痞悶
瘵癥	乍見鬼神	渴	瘧	腹脹
拘攣		自汗		

內閣文庫	
番號	漢 12971
冊數	100 (99)
早 號	301 60



脚氣

天陰產後熱悶氣上轉為脚氣者何答曰產則血虛

水無復因春夏取涼過多地之蒸濕因足履之所以

着為脚氣其水熱悶擊癢驚悸心煩嘔吐氣上皆其

候也可服小續命湯方見雜病中風兩三劑必愈若醫者誤

以逐敗血藥攻之則血去而疾益增矣 陳熙揮評

曰脚氣固是常病未聞產後能轉為者往往讀千金

見產婦多有此疾之語便出是證文辭害意蓋可見

矣設是熱悶氣上如何便服續命湯此藥本主少陽

經中風非均治諸經脚氣要須依脚氣方論陰陽經

終謂之此涉專門未易輕論既非產後要病更不繁
引陳無擇雖有此論然小續命湯加減與之用無
不效故百問云寒中二陽所患必冷小續命湯主之
如生薑暑中二陰所患必熱小續命湯去附子減大
煩躁者紫雪最良予取百問中加減法如無紫雪用
無使後人均得治瘧
真薄荷煎冷水嚙下物湯各半服之
補氣血為主佐以小續命湯寄生湯如不應用大防
風湯一產婦患前證或用獨活寄生湯而痊後復
作服前湯其汗如水更加口噤吐痰余用十全大補
湯培養血氣漸愈後飲食日少肌體日瘦吐痰如湧

此命門火衰脾土虛寒用八味丸加味歸脾湯諸

證漸退肌肉漸生

獨活寄生湯

治肝腎虛弱或久履濕冷之地或洗

足當風濕毒內攻兩脛緩縱攣痛痺弱或皮肉紫

破足膝攣重又專治產後脚氣

用獨活蒸

桑寄生如無以杜仲炒

牛膝去毒

細辛官桂不見

白茯苓

防風

川芎

當歸

人參

熟地黃酒洗

芍藥

秦艽各二兩

甘草炙壹兩

白濁水每服肆錢薑五片水煎服

白濁水

白濁水

白濁水

白濁水

白濁水

白濁水

白濁水

白濁水

白濁水

煎服

煎服

煎服

煎服

煎服

煎服

煎服

煎服

煎服

煎服

遍身疼痛

大產後遍身疼痛者何答曰產後百節開張血脉流
散遇氣弱則經絡肉分之間血多流滯累日不散則
骨節不利筋脉急引故腰背不得轉側手足不能動
搖身熱頭痛也若醫以為傷寒治之則汗出而筋脉
動惕手足厥冷變生他病但服趁痛散除之薛前
證若以手按而痛甚是血滯也用四物炮薑紅花桃
仁澤蘭補而散之若按而痛稍緩此是血虛也用四
物炮薑人參白朮補而養之一產婦身腹作痛發
熱不食煩躁不寐盜汗脇痛服解散祛血之藥不時

產後遍身疼痛

女科

昏憤六脉洪大如無用補中益氣加炮薑半夏一劑
頓退二三又劑寢食甘美但背強而痛用八珍散大
補湯調理而安 一產婦遍身頭項作痛惡寒拘急
脉浮緊此風寒之證也用五積散一劑汗出而愈但
倦怠發熱此邪氣去而真氣虛也用八珍湯調補而
痊 一婦六月產後多汗人倦不敢袒被故汗出被
裡冷則浸漬得風濕疼痛遂以羌活續斷湯數服而
愈
越痛散岐雲 治產後氣弱血滯遍身疼痛及身熱頭
疼

半膝

當歸

桂心

白朮

黃芪

獨活

生薑

甘草

薤白

右吹咀每服半兩水三盞煎至壹盞半去查食前
服 陳無擇評曰越痛散不特治產後氣弱血滯
兼能治太陽經感風頭疼腰痛自汗發熱若其
感寒傷食憂恐驚怒皆致身疼發熱頭痛况有暴
勞諸證尤甚越痛散皆不能療不若五積散入醋
煮用却不妨
五積散加酒煎治感寒頭痛身疼方見傷寒門恐與

四物各半服之穩當加桃仁煎治腰痛逐敗血去

風濕

大治產後遍身青腫疼痛及眾疾

牛膝

大麥蘗冬等

右為細末以新瓦罐子中填一重麥蘗一重牛膝
如此填滿用鹽泥固濟火煨過赤放冷研為散但
是產後諸疾熱酒調貳錢下

活血丹

蒼朮四物各半湯

並見雜
病身痛

烏金散治產後骨節四肢疼痛

見後在
言諸語

中風

天夫產後中風者由產時傷動血氣勞損藏府未曾
平復起早勞動致使氣虛而風邪乘虛入之故中風
風邪之氣客於皮膚經絡但疼痺羸乏不任少氣大
凡筋脉挾寒則攣急啞僻挾溫則縱緩虛弱若入諸
藏恍惚驚悸隨其所傷府藏經絡而生病焉 郭稽
中論曰產後中風者何答曰產後五七日內強力下
床或一日之內傷於房室或懷憂怒擾盪冲和或因
食生硬傷動藏府得病之初眼澁口噤肌肉攣搖漸
至腰脊筋急強直者不可治此乃人作非偶爾中風

所得也。前證果外邪所屬形氣不足病氣有餘。當補元氣為主稍佐以治病之藥若強力不休月內入房屬形氣俱不足當純補元氣多有復甦者若誤投風藥乃促其危也。

丹產後中風口眼喎斜必用大補氣血然後治痰當以左右手脉分其氣血多少以治切不可作中風治用小續命湯及發表治風之藥。

防風湯 治產後中風背項強急胸滿短氣

防風

獨活 各去

葛根 各伍兩

當歸

人參 各去

白芍藥

甘草 炙各二兩

若為吹咀每服捌錢水壹盞半棗子貳枚擘破同煎至壹盞去滓温服不拘時

川芎散 治產後中風身背拘急有如繩束

川芎

羌活 去蘆

酸棗仁

羚羊角屑

芍藥 各肆兩

桑白皮 壹兩半

防風 去蘆壹兩貳錢

一為吹咀每服壹兩水貳大盞煎至壹盞半去滓不拘時服日進三服

經効茯苓湯 治產後風虛頭痛語言蹇澁

經効中風

茯苓 去皮

防風 去蘆

乾葛 各一兩

麥門冬 去心

芍藥

黃芩 各陸錢

犀角屑 四錢

甘草 炙二兩

右咬咀每服壹兩水壹大盞半煎至壹盞去滓溫服不拘時

鹿肉湯 治產後中風頭痛壯熱言語蹇澀

鹿肉 叁斤

阿膠 炒脹

黃芩

茯神 去木

黃芪 蜜炙

甘草 炙

白芍藥

人參

獨活 各去蘆

桂心

乾地黄

川芎 各貳兩

半夏 湯洗壹兩

若為咬咀每服伍錢水肆盞鹿肉伍錢薑伍片同煎至貳盞去鹿肉再煎至壹盞半入阿膠消化去粗溫服不拘時日進貳服

聖岐治產後中風半身手足不遂言語蹇澀恍惚多忘精神不定

獨活

當歸

芍藥

防風

川芎

玄參

天麻 各伍錢

桂心 叁錢

右咬咀以水捌升煮取貳升半分為叁服覺効更

作一劑又作丸每服貳拾丸如有熱加葛根五錢
有冷加白朮五錢 若有氣證加生薑壹兩半若
手足不遂加牛膝壹錢半車釐參錢黃芪肆錢
若腹痛加當歸芍藥各柒錢半 若不食加人參
伍錢玄參壹兩 若寒中三陰所患必冷小續命
湯加生薑煎 若暑中三陽所患必熱小續命湯
去附子減桂心一半加薄荷煎
保命血氣湯 治產後諸風痿痺無力

秦艽 羌活 防風
白芷 川芎 芍藥

當歸 白朮 茯苓

熟地黄 各等分

右為末一半蜜丸一半散酒調下伍柒拾丸妙

治產後風虛五緩六急手足頑痺氣血不調大豆壹
升炒令熟熟投參升酒中密封飲之

小品治產後中風語澁四肢拘急羌活參兩為末每
服伍錢水酒各半蒸煎去滓溫服

華陀愈風散 治婦人產後中風口噤手足痲痺如
角弓或產後血暈不省人事四肢強直或心眼倒

築吐瀉欲死 用荆芥穗微焙每服參錢豆淋酒

產後中風

調服或童子小便服之口噤則挑齒灌之斷噤則
灌入鼻中其効如神大抵產後大眩則汗出而腠
理疎則易於中風也時珍曰此方諸書盛稱其
妙姚僧坦集驗方以酒服名如聖散云藥下可立
待應効陳氏方名舉卿古拜散蓋存敬方用古老
錢煎湯服名一捻金王貺指迷方加當歸等分水
煎服許叔微本事方云此藥委有奇効神聖之功
一婦人產後睡久及醒則昏昏如醉不省人事醫
用此藥及交加散云服後當醒必以左手搔頭用
之果然答成產寶方云此病多因怒氣傷肝或憂

氣內鬱或坐草受風而成急宜服此藥也戴氏證
治要訣名獨行散賈似道悅生隨抄呼為再生丹
右產後中風用續命湯及羌活等發散之藥必
詳氣血以四物四君子相與各半停對分兩服
之可也

大產後下血過多虛極生風者何荅曰婦
人以榮血為主因產血下太多氣無所主唇青肉冷
汗出目眩神昏命在須臾者此但虛極生風也如此
則急服濟危上丹若以風藥治之則誤矣
薛前證
若心脾血氣俱虛用十全大補湯如不應加附子鈞

藤鈞若肝經血虛用道遙散加鈞藤鈞經云脾之榮
在唇心之液為汗若心脾二藏虛極急用參附湯救
之 一婦人患前證或用諸補劑四肢逆冷自汗泄
瀉腸鳴腹痛余以陽氣虛寒用六君子薑附各加至
五錢不應以參附各壹兩始應良久不服仍腸鳴腹
痛復灸關元穴百餘壯及服十全大補湯方効
濟危上丹

乳香

五靈脂

硫黃

玄精石

同研極細

阿膠

炒服

卷柏

生用

桑寄生

陳皮

去白各等分

右將上四味同研停於銀石器內微少炒勿焦了
再研極細復入餘藥為末拌勻生地黄汁和丸如
梧子大每服貳拾丸温酒或當歸酒送下食前

當歸建中湯

見產後腹痛

口噤 天夫產後中風口噤者是血氣虛而風入於頷
頰夾口之筋也手三陽之筋結入於頷產則勞損腑
臟傷於筋脉風若乘之其三陽之筋脉則偏持之筋
得風冷則急故令口噤也

葛根湯

治產後中風口噤什地頭目眩暈痰盛氣

急及治產後諸疾

葛根

生薑各陸兩

獨活肆兩

當歸參兩各去蘆

甘草炙

桂心

白茯苓去皮

石膏

人參去蘆

白朮

防風各去蘆

川芎各貳兩

右為吹咀每服伍錢水貳盞煎至壹盞半去滓溫

服無時日進二服

乾葛湯深療產後中風口噤不能言

獨活去蘆貳兩

乾葛壹兩半

甘草半兩炙

生薑壹兩貳錢半

右為吹咀每服壹兩水貳大盞煎至壹大盞去滓

治無時

天麻散 治產後中風口噤

天麻柒錢半

白附子炮

天南星炮

半夏湯洗柒遍去滑薑製乾蠟半兩

右為細末每服壹錢生薑薄荷酒調下幹開口灌

之不拘時

當歸散 治婦人產後中風牙關緊急不省人事口

吐涎沫手足痲癱

當歸去蘆

荆芥穗各等分

右為細末每服貳錢水壹盞酒半盞煎至壹盞灌

之如牙關緊急，斡開微微灌之，但下咽即生，屢用救入，大有神效。

伏龍肝散 治產後中風口噤不能語言，腰背疼痛。

伏龍肝 壹兩 半兩 乾薑 半兩

為細末，每服貳錢，溫酒調下，不拘時，日進二服。

交加散 治產前後百病，兼治婦人榮衛不通，經脈

不調，腹中撮痛，氣多血少，結聚為瘕，產後中風，並

宜服之。

生地黄 壹升 研取 自然汁

生薑 拾貳兩 研 取自然汁

右先將地黃汁炒生薑，萍生薑汁炒地黃，萍各稍

乾焙為細末，每服參錢，溫酒調下，尋常腹痛亦宜

服，產後尤不可離。

大張 大夫產後角弓反張者，是體虛受風，風入

諸陽之經也。人陰陽經絡周環於身，風邪乘虛入於

諸陽之經，則腰背反折，攣急如角弓之狀也。薛前

證因氣血耗損，腠理不密，汗出過多而患之者，乃虛

象也。宜固氣血為主，佐以本方。丹溪云：產後當大補

氣血為先，雖有他證，以未治之。如惡寒發熱等證，乃

氣血虛甚之極也。宜大劑參芪歸朮肉桂以培養之。

如不應急，用炮附子，再不應用人參壹兩，炮附子貳

參錢名參附湯借猶未應乃藥力未能及也宜多用

之

愈風散

當歸湯

羌活酒並見前

羚羊角散 治產後中風身體反張

羚羊角屑

當歸各半

獨活

防風各去蘆

麻黃去節各壹兩

人參去蘆

赤芍藥

細辛去苗

桂心各半兩

右為咬咀每服捌錢茶壹大盞半生薑伍片煎至

壹大盞去滓溫服不拘時

小品療產後中風虛人不可服他藥者一物獨活湯

芝及一物白鮮湯主之亦可與獨活合煮之

川獨活參兩細切

右水參升煮取壹升分服柰酒者亦可酒水煮

一物白鮮湯 用白鮮皮亦依獨活法

產後中風瘖口噤面青手足急強者

以竹瀝貳升分為五服溫溫頻服大効

治產後中風角弓反張口噤不語方

川烏伍兩坐如豆大

右取黑豆半升同炒半黑以酒參升傾於鐺內急

攪以絹濾取酒微溫服壹小盞取汗若口不開者

汗後 汗出多而變 大產後血虛腠理不密故多汗因遇
風邪搏之則變痙瘓者口噤不開背強而直如發痲
狀搖頭馬鳴身反折須臾拾發氣息如絕宜速斡口
灌小續命湯稍緩卽汗止如兩手摸控者不可治也
薛產後發痙因去血過多元氣虧極或外邪相搏
以致牙關緊急四肢痙強或腰背反張肢體抽搐若
有汗而不惡寒者曰柔痙若無汗而惡寒曰剛痙然
產後患之實由亡血過多筋無所養而致故傷寒汗
下過多潰瘍膿血大泄多患之乃敗證也若大補血
氣多保無虞若攻風邪死無疑矣 一產婦牙關緊

之 以 瘥 爲 度
千金雞矢醃 瘥產後中風及男子諸風并產後百
疾神效方又治產後中風口噤拘困篤腰背強直
時時反折

烏雞屎 參升 大豆 貳升

右先炒豆令聲絕次炒雞屎令黃以酒壹升先淋
雞屎取汁淋大豆每服壹升重者凡四五服極妙
張文仲瘥產後中風風痙徧身冷直口噤不識人方
白朮 肆兩 以酒叁升煮取壹升頓服效

產後中風 文斗五 七十一

急腰背及張四肢抽搐兩目連劄余以為去血過多
元氣虧損陰火熾盛用十全大補加炮薑一劑而甦
又數劑而安余在吳江史萬湖第入更時聞喧襲
云某家人婦忽仆牙關緊急已死矣詢云是新產婦
出直厨余意其勞傷血氣而發瘳也急用十全大補
加附子煎滾令人推正其身一人以手夾正其面却
空開其口將藥灌之不甦藥已冷令側其面出之仍
正其面復灌以熱藥又冷又灌如此五次方嚥下隨
灌以熟藥遂甦夷堅志云杜壬治郝質子婦產四
日瘳瘳戴眼弓背及張壬以為瘳病與大豆紫湯獨

活湯而愈政和間余妻方分娩猶在壽中忽作此證
頭足反接相去幾二尺家人驚駭以數婢強拗之不
直適記所云而藥草有獨活乃急煎之乃醫未全連
進三劑遂能且醫至即愈矣更不須用大豆紫湯古
人處方神驗屢矣

小續命湯 治產後中風及剛瘳柔瘳

陳臨川云雖然陳無擇評曰產後汗出多變瘳亦
令服續命湯此又難信既汗多如何更服麻黃官
桂防已黃芩葦不若大豆紫湯為佳局方大聖散
亦良藥也愚既朱奉議云凡剛柔二瘳小續命湯

並可加減與之若柔瘳自汗者去麻黃加葛根之
說朱奉議必有所據雖大豆紫湯大聖散良亦不
可偏見曲說有妨古人之意

大豆紫湯 治中風頭眩惡風自汗吐冷水及產後
百病或中風癱瘓背強口噤直視煩熱脉緊大者
不治 小品方主產後中風困篤背強口噤或但
煩躁或頭身皆重或身重癱瘓發嘔吐直視並宜服

川獨活去蘆黃 大豆半升 酒叁升

右先用酒浸獨活煎一兩沸別炒大豆極焦烟出

急投酒中密封候冷去豆每服壹貳合許得少汗
則愈日進十服此藥能去風消血結如妊娠折傷
胎死腹中服此得瘥

陳臨川云凡產後口噤腰背強直角弓反張皆名
曰瘳又名曰瘳古人察有汗無汗以分剛柔陰陽
而治今產寶諸書有中風口噤一門又有角弓反
張一門其實一也如增寒發熱有類傷寒皆不論
及豈可只以一二藥治之

大豆湯 治產後中風發則仆地不省人事及妊娠
挾風兼治蓐草之間諸般病證

產後 女科 五

大豆 伍升 炒黃

獨活 去蘆

葛根 各搗 兩

防已 去皮 陸兩

右咬咀每服伍錢酒貳盞煎至壹盞半去粗溫服不拘時日三服

麝羊角飲子 治產後氣實腹中堅硬兩脇脹滿心中煩熱渴欲飲水欲成剛瘕中風之疾

麝羊角 半兩 鎊

防風

羌活

桔梗 並去蘆

敗醬 各搗錢

桂心

柴胡 去蘆

大黃 浸過煨 各壹兩貳錢

為改咀每服五錢水壹大盞半同煎至壹盞去粗

溫服不拘時候更服地黃酒用地黃切壹升炒令

黑甕瓶中下熱酒叁升密封口煮令減半任意服

之

防風當歸散

防風

當歸

川芎

地黃 各壹兩

右剉每服壹兩水叁盞煎至貳盞溫服

髮氏云續命湯大豆紫湯舉鄉古拜散太陽厥陰藥也邪實脉浮弦有力者固宜但產後血氣太虛之人不宜輕投其表但用防風當歸散治之為妙

產後中風

女科五

七十四

妻入云蘇合散八分以酒煎服之
古方用大黃四兩以酒煎服之
六博玉列當散以酒煎服之
益氣散

黃芩 各壹兩

芫花 當歸

川芎

瓜蒂散

黑養麻中平燕窩寒北密桂口蘇合蘇半竹黃
益氣散以酒煎服之
黃芩四兩以酒煎服之
益氣散

瘰癧

瘰癧者筋脉拘急也 瘰者筋脉張縱也 經云肝主筋
而藏血 蓋肝氣為隕 為火 肝血為陰 為水 前證因產
後陰血去多 陽火熾盛 筋無所養 而然耳 故癰疽膿
水過多 金瘡出血 溫甚 則陽隨陰散 亦多 致此 治法
當用八珍 加丹皮 鈞藤 以生陰血 則陽火自退 諸證
自愈 如不應當用四君 考歸丹皮 鈞藤 以補脾土 蓋
血生於至陰 至陰者 脾土也 故小兒吐瀉之後 脾胃
虧損 亦多 患之 乃虛象也 無風可逐 無痰可消 若屬
陽氣脫陷者 用補中益氣 加薑桂 陽氣虛敗者 用十
產後 瘰癧 女科五 七十五

全大補加桂附亦有復生者此等證候若肢體惡寒
脉微細者此為真狀若脉浮大發熱煩渴此為假象
惟當固本為善若無方抽搐戴眼反折汗出如珠流
者皆不治 一產婦因勞兩臂不能屈服蘇合香丸
肢體痿軟汗出如木余謂前藥辛香耗散真氣調理
虛而津液安泄也先用十全大補湯加五味子補實
勝聖收斂真氣汗頓止又佐以四君子調補元氣漸
愈用逍遙散大補湯調理而痊 一產婦先胸脇乳
內脹痛後因怒口禁吐痰臂不能伸小便自遺左三
部脉弦余謂此肝經血虛而風火所致不能養筋先

惡字本悉作

用加味道逍遙散治之臂能屈伸又以補肝散六味丸
諸證悉愈 一婦人發瘵遺尿自汗面赤或時面青
飲食如故肝脉弦緊余曰此肝經血燥風熱名瘵也
肝主小便其色青入心則赤法當滋陰血清肝火遂
用加味道逍遙散不數劑諸證悉退而安 一婦人產
後血風患此以小續命湯數服而安

表產後因虛傷風瘵同傷寒表證未傳入裏宜服防
風湯

防風湯 治風虛發熱項背拘急肢節不隨恍惚狂
言來去無時不自覺悟亦治脚氣緩弱甚効此藥
產後瘵瘵 女科五

温和不虛入

秦朮 去苗土

半夏 湯洗柒次切片

防已

芍藥 白者

當歸 去蘆

獨活 去蘆

防風 去蘆各

白朮

黃芩

遠志 去骨

麻黃 去節

升麻

石膏 煨

甘草

人參 去蘆各

右為菴末入半夏片令勻每服肆錢水貳中盪生薑米捌片煎至壹盞去滓取清汁陸分入麝香末少許食後臨卧帶熱服

海藏愈風湯 即華佗愈風散

交加散 即當歸散並見產後中風

增損柴胡湯 治產後感異證手足牽搐涎潮昏悶

柴胡 叁錢

黃芩 壹錢

人參

甘草 炙

半夏 各壹錢半

知母 壹錢

石膏 貳錢

黃芪 貳錢

右咬咀分二服水貳盞薑叁片棗貳枚煎捌分不

秦朮湯 前證已去次服此藥去其風邪

秦朮

芍藥

柴胡 各壹錢

甘艸 炙壹錢

黃芩

防風 各壹錢

人參

半夏 各壹錢

產後 痲癩

女科五

七十七

右為咬咀分二貼每貼水貳盞薑參片煎搗分食
遠服

石膏 煑

黃芩 煑

甘草 炙

半夏 煑

柴胡 煑

黃芩 煑

映母 煑

人參

此藥治產後風痲癩等症

拘攣

大產後中風筋脈四肢攣急者是氣血不足臟腑俱
虛月內未滿起早勞役動傷臟腑虛損未復為風所
乘風邪冷氣初客於皮膚經絡則令人頑痺不仁羸
乏少氣風氣入於筋脈挾寒則攣急也 薛肝屬木
而主筋前證若肝經風熱血燥用加味道遙散如不
應當用六味地黃丸以補腎水經云風客淫氣精乃
亡邪傷肝也仍參前雜證諸風血方論治之 一產
婦筋攣臂軟肌肉掣動此氣血俱虛而自熱也用十
全大補湯而安 一產婦手麻服愈風丹遍身皆麻

產後 拘攣

女科五

七十八

神思倦怠余謂氣血虛弱用十全大補加炮薑數劑
漸愈去薑又數劑及逍遙散而痊

芎藭散 治產後中風四肢筋脉攣急疼痛背項強
急

芎藭

羌活

當歸 各去蘆

酸棗仁 炒

羚羊角屑 錢各柒 去蘆

牛蒡子 各壹 兩炒

桂心

赤芍藥 各半 兩

右為收咀每服捌錢水壹大盞半煎至壹大盞去
粗溫服不拘時

薛前方如未應當用八珍湯更不應十全大補

湯

防己膏 治產後中風四肢筋脉攣急身體麻痺並

宜用之

漢防己 去皮 半斤

茵芋 伍兩

右為收咀用酒五升浸藥壹宿取豬肪壹斤文
武火熬三上三下成膏攤在紙花上貼病人患處
以執手不住塵膏上

以藥手不...
 五火然...
 六...
 七...
 八...
 九...
 十...
 十一...
 十二...
 十三...
 十四...
 十五...
 十六...
 十七...
 十八...
 十九...
 二十...

不語

因人心有七孔三毛產後虛弱多致停積敗血閉於
 心竅神志不能明了又心氣通於舌心氣閉塞則舌
 亦強矣故令不語但服七珍散薛經云大腸之脉
 散舌下又云脾之脉是動則病舌本強不能言又云
 腎之別脉上入于心繫舌本虛則不能言竊謂前證
 若心腎氣虛用七珍散腎虛風熱地黃飲大腸風熱
 加味道遙散加防風白芷脾經風熱秦艽升麻湯肝
 經風熱柴胡清肝散加防風白芷脾氣鬱結加味歸
 脾湯加升麻肝木太過小柴胡加釣藤鈎脾受土侮

不語
 女科五

六君加升麻白芷鈞藤鈞肝脾血虛用佛手散脾氣
虛用四君子氣血俱虛八珍湯如不應用獨參湯更
不應急加附子補其氣而生其血若竟用血藥則誤
矣一產婦不語用七珍散而愈後復不語內熱喘
熱肢體倦怠飲食不進用加味歸脾湯為主佐以七
珍散而愈後因怒不語口噤腰背反張手足發搐或
小便見血面赤或青或黃或時兼赤余曰面青肝之
本色也黃者脾氣虛也赤者心血虛也用八珍湯加
鈞藤鈞茯苓遠志漸愈又用加味歸脾湯而痊
七珍散

人參

石菖蒲

生地黄

川芎 各壹兩

細辛 壹錢

防風

辰砂 別研各半兩

右為極細末每服壹錢薄荷湯調下無時

胡氏孤鳳散

治產後閉目不語用生白礬末每服

壹錢熱水調下

治產後不語

人參

石蓮肉 不去心

石菖蒲 各等分

右每服伍錢水煎

逐血補心湯

治產後失音不語

產後不語

女科五

十一

紅花 赤芍藥 生地黄

桔梗 蘇葉 前胡

茯苓 防風 牛膽南星

黃連 粉葛 當歸 各壹錢

薄荷 人參 升麻 各壹錢

半夏 貳錢伍分 甘草 壹錢

右剉為散分作二服每服水壹鍾半薑叁片煎至
柒分空心服滓再煎服

人參 百首藤 坐地黃

狂言謔語

一 大夫產後語言顛倒或狂言謔語如見鬼神者其源
不一須子細辨證用藥治療產後驚風言語亂道如
見鬼神精神不定者研好朱砂酒調下龍虎丹方見
三凡作一服燕琥珀地黄丸服之 一則因產後心
虛敗血停積上干於心而狂言獨語者當在乍見鬼
神條求之 二則產後臟虛心神驚悸志意不安言
語錯亂不自覺知神思不安者當在驚悸條求之
三則宿有風毒因產心虛氣弱腰背強直或歌哭嗔
笑言語亂道當作風痙治療當在心驚中風條求之

產後 狂言謔語 女科十五

四則產後心虛中風心神恍惚言語錯亂當在中
風恍惚條求之 五則產後多因敗血迷亂心經而
顛狂言語錯亂無常或暈悶者當於本卷血暈類中
求之 六則因產後感冒風寒惡露斬然不行增寒
發熱如瘧晝日明了暮則譫語如見鬼狀當作熱入
血室治之宜琥珀地黄丸及四物湯只用生乾地黄
加北柴胡等分煎服如不退者以小柴胡湯加生乾
地黄如黃芩分兩煎服愈雖然已上諸證大抵胎前
產後自有專門一定之法毫髮不同如產後首當逐
散生新然後子細詳辨疾證不可妄立名色自生新

意加減方藥大宜對證依古法施治未有不安者也
薛前證當固胃氣為主而佐以見證之藥若一於
攻痰則誤矣 一產婦形體甚倦時發譫語用相子
散稍愈又用加味歸脾湯而愈又因怒仍狂言脇痛
小便下血用加味道遙散以清肝火養肝血頓瘥又
佐以加味歸脾湯而安

雲岐奪命散 血暈

治產後敗血衝心發熱狂言奔走脉虛大者

乾荷葉 生乾地黄 牡丹皮 等分

右三味濃煎湯調生蒲黃末貳錢匕二服即定

產後在言諸證

局方妙香散治產後心神顛倒語言錯亂如見鬼麻
用生乾地黄當歸二味煎湯調服立効
烏金散 治產後三五日或半月之間忽狂言亂語
日見神鬼等證

當歸 遠志肉 川芎

酸棗仁 白朮 赤芍藥

香附子 辰砂另研入 熟地黄

羌活 防風各貳錢 茯神貳錢

半夏叁錢 全蠍 麥門冬

人參 牛膝 天麻各壹錢

甘草玖分 陳皮 白芷各壹錢 伍分

右劉散作二服冰壹鍾半薑叁片葱三枝入金銀
同煎壹碗不拘時溫服

四物補心湯 治產後言語恍惚顛倒錯亂

當歸伍錢 川芎 生地黄

白芍藥 茯苓 半夏

桔梗 白朮各肆錢 陳皮叁錢

甘草壹錢

右劉為散分作六服每服用水壹鍾薑叁片煎至
柒分空心溫服半再煎服 有熱加酒炒黃連貳

產後 狂言謔語 女科五

錢無熱不用

甘草

白朮

刺史

白芍藥

芎藭

半夏

當歸

川芎

生肌黃

同煎...

六陳...

甘草

刺史

白芷

癲狂

天癸產後因驚敗血衝心昏悶發狂如有鬼祟宜用

局方大聖澤蘭散宜日合者加好辰砂研令極細每

服加壹字許煎酸棗仁湯調下一服可安薛前證

乃血虛神不守舍非補養元氣不可仍參後各門互

用一產婦患前證或用大澤蘭湯而愈後又怔忡

妄言其痰甚多用茯苓散補其心虛頓愈又用八珍

散加遠志茯神養其氣血而瘥一產婦亦患此證

用化痰安神等藥病益甚神思消燼余以為心脾血

氣不足用大劑參朮芎歸茯神酸棗仁四斤餘而安

產後 癲狂 女科五

八十二

乃以歸脾湯五十餘劑而愈
 大聖澤蘭散 治婦人血海虛冷久無子息及產後
 敗血衝心中風口噤子死腹中擘開口灌藥須臾
 生下便得無恙治墮胎腹中攻刺疼痛橫生逆產
 胎衣不下血運血癖血滯血崩血入四肢應血藏
 有患及諸種風氣或傷寒吐逆咳嗽寒熱往來遍
 身生瘡頭痛惡心經脈不調赤白帶下乳生惡氣
 胎藏虛冷數曾墮胎崩中不定因此成疾室女經
 脈不通並宜服之常服暖子宮和血氣悅顏色退
 風冷消除萬病兼療丈夫五勞七傷虛損等病

澤蘭葉	石膏	石膏	卷柏
白茯苓	防風	厚朴	桔梗
細辛	栝子仁	五味子	乾薑
吳茱萸	藁本	白朮	丹參
人參	川烏頭	川芎	白薇
川椒	甘艸	當歸	肉桂
黃芪	燕羨	阿膠	牛乾地黃

澤蘭葉 研各 貳兩
 石膏 研各 貳兩
 石膏 研各 貳兩
 卷柏 去根
 白茯苓 去皮
 防風 去蘆
 厚朴 去麩皮 薑汁炙
 細辛 去苗
 栝子仁 微炒
 桔梗
 五味子 揀淨
 乾薑 炮
 吳茱萸 湯洗米次焙 炒各壹兩
 藁本 去苗
 白朮
 丹參 各柒錢半
 川烏頭 炮去 皮臍
 川芎
 當歸 各壹兩 柒錢半
 肉桂 壹兩 貳錢半
 阿膠 各半兩
 牛乾地黃 壹兩 半
 燕羨 微炒赤
 甘艸 炙
 白薇
 阿膠 各半兩
 肉桂 壹兩 貳錢半
 牛乾地黃 壹兩 半

右為細末每服貳錢空心臨卧熱酒調下若急疾不拘時日三服

何氏方治產後因敗血及邪氣入心如見祟物顛狂大辰砂壹貳錢重研令極細人乳三四茶脚許調仍搗紫項活地龍一條入藥候地龍滾三滾取出地龍不用不令帶藥出但欲得地龍身上涎耳却入無灰酒與前乳汁相和七八分盞重湯温遇疾作分三二服

乍見鬼神

大心主身之血脉因產傷耗血脉心氣虛則敗血停積上干於心心不受觸遂致心中煩躁卧起不安乍見鬼神言語顛錯醫人不識呼為風邪如此治必不得愈但服調經散每服加龍腦壹捻得睡即安薛前證若敗血停滯用調經散若血虛發熱用八珍加炮薑若心血虛損用柏子仁散大抵此證皆心脾血少所致但調補胃氣則痰清而神自安矣若果係鬼祟所附即灸鬼穴可愈其或不起者多因豁痰降火攻伐之過也一產婦患前證或用調經散愈而

產後乍見鬼神 女科五

八十七

復作仍服前藥益甚痰涎上湧朝寒暮熱余朝用八
珍散夕用加味歸脾湯各五十餘劑而愈
雲岐治產後發熱狂言奔走脉虛大者四物湯加柴
胡如不愈加甘草柴胡生地黃等分煎服亦可
廣濟治產後血暈心悶不識人神言鬼語氣急欲絕
暈見血

養調經散

沒藥 硃珀並細研 桂心各壹錢
芍藥 當歸各貳錢半 麝香研
細辛 各半錢

右為末每服半錢生薑汁温酒各少許調服

茯神散 治產後血邪心神恍惚言語失度睡卧不
安

茯神壹兩去皮木 人參 龍齒研
琥珀研 赤芍藥 黃芪
牛膝各柒錢半 生地黃壹兩半 桂心半兩
右為末每服叁錢水壹盞煎至柒分不拘時去滓
温服

治方產後一日言語顛倒用蘇合香丸壹錢以童便調
服即甦

產後乍見鬼神 女斗五

症

栝子仁散

治產後狂言亂語皆因內虛敗血挾邪

氣攻心

栝子仁

遠志去心

人參

桑寄生

防風

琥珀別研

當歸焙

生地黄焙

甘草各等分

右為粗末先用白羊心壹箇切片以水壹大盞半

先煮至玖分去羊心入藥末伍錢煎至陸分去滓

無時服

與前顛狂譫語門參看

驚悸

大產後臟虛心神驚悸者由體虛心氣不足心之經

為風邪所乘也或恐懼憂迫令心氣受於風邪邪搏

於心則驚不自安若驚不已則悸動不定其狀目睛

不轉而不能動診其脉動而弱者驚悸也動則為驚

弱則為悸矣薛按人之所主者心心之所主者血

心血一虛神氣不守此驚悸所由作也當補氣血為

主一產婦患前證二度服琥珀地黄丸局方妙香

散隨効再患服之其症益甚而脉浮大按之如無發

熱惡寒此血氣俱虛用十全大補加味歸脾二湯各

產後驚悸

八十五

八十九

百餘劑而愈後遇驚恐勞怒復作仍服前藥而安
大產後心悶氣絕眼張口噤遍身強直腰背反偃狀
如癰疾心忪驚悸言語錯亂皆是宿有風毒因產心
氣虛弱發成風癱 薛按仲景先生云有汗為柔癱
用桂枝湯無汗為剛癱用麻黃湯然產後得此血氣
俱乏之敗證也不可與傷寒例看丹溪先生云產後
當大補氣血為主可用十全大補湯以補元氣如不
應急加附子更不應是藥力弗逮也仍用參附湯多
服余常治大虛之證參芪數斤附子數枚方愈一
產婦患此不省人事言語妄甚惡風寒喜熱飲形氣

倦怠脉虛浮無力余謂血氣虛寒用十全大補湯二
十餘劑不應又二十餘劑稍緩乃漸加附子至一錢
服數劑諸證減一二又二十餘劑退三四乃去附
子五分數劑諸證頓退而安又發仍服前藥加附子
三五分而愈

白茯苓散 治產後心神驚悸言語失常心神昏憤

白茯苓 去皮 熟地黃 人參 去蘆各 壹兩半

遠志 去心 白芍藥 黃芪 去蘆

桂心 當歸 炒去蘆 甘草 炙

麥門冬 各壹兩 石菖蒲 桑寄生 各柒錢半

右為咬咀每服捌錢水壹大盞半生薑伍片棗叁枚竹葉參柒片煎至壹大盞去滓溫服無時

熟乾地黄散 治產後心虛驚悸神思不安

熟乾地黄 貳兩 黃芪 去蘆

白薇

龍齒 另研 各壹兩 人參 去蘆

茯神 去木

羌活 遠志肉 各柒錢半

桂心

防風 去蘆 甘草 炙各半兩

右為咬咀每服五錢水壹大盞半生薑五片棗叁枚煎至壹大盞去滓溫服不拘時一方無黃者有荆芥

產乳七寶散 初產後服之調和血氣補虛安心神

鎮驚悸

朱砂 水飛

桂心

當歸 去蘆

川芎 人參 去蘆

白茯苓 去皮

羚羊角 燒存性 各貳錢 乾薑 壹錢

為細末每服壹錢用羌活豆淋酒調下將護產婦用之不飲酒用清米飲調下 如覺心煩熱悶以麥門冬

去心煎湯調下若心下煩悶而痛用童便調下若

覺心胸煩熱即減薑桂覺寒却加之腹痛加當歸

心悶加羚羊角心虛氣怯加桂心不思飲食或惡

心加入參虛煩加茯苓以意斟酌日二夜一服之

產後驚悸

女科

卷

海藏大効牡丹散 治血臟虛風及頭目不利不思飲食手足煩熱肢節拘急疼痛胸膈不利大腸不調陰陽相干心驚怯悸或時旋暈

牡丹皮

川芎

枳殼

陳皮

玄胡索

甘草

羌活

半夏

木香

訶子肉

芍藥

三稜

乾薑

桂心

當歸

白朮

白朮

右爲細末每服貳錢水壹盞半煎五七沸食前溫

服益血海退血風勞攻注消寒痰實脾胃理血氣
攻刺及氣虛惡寒潮熱證至妙
遠志丸 治產後臟虛不足心神驚悸志意不安腹
中急痛或時怕怖夜卧不安

遠志

麥門冬

黃芪

當歸

人參

白朮

獨活

白茯苓

桂心

栝子仁

石菖蒲

熟乾地黃

山茱萸

鍾乳粉

阿膠

右爲細末煉蜜和搗五七百下丸如梧桐子大每

服參拾丸温酒送下不拘時候日進二服

白茯苓丸 治產後心虛驚悸神志不安

白茯苓 去皮 熟乾地黄 各壹兩 人參 去蘆

桂心 遠志 去心 石菖蒲

栝子仁 琥珀 各半兩 另研細

右為細末煉蜜和搗三二百下丸如梧子大每服參拾丸不拘時粥飲送下

右方俱用桂中無熱而脈遲且微者宜之

人參散 治產後臟腑虛心怔驚悸言語錯亂

人參 去蘆 麥門冬 去心 各一兩 牛黃 研

白薇 各貳錢 茯神 去木 獨活

防風 各壹錢 遠志 去心 生地黄

朱砂 水飛 天竺黃 另研 甘草 炙

龍齒 研各肆錢 龍腦 另研 麝香 各壹錢 細研

右為細末每服貳錢薄荷酒調下不拘時

琥珀地黃散 治血虛多驚及產後敗血諸疾

辰砂 琥珀 沒藥 並細研

當歸 各等分

右為細末每服貳錢空心白湯調下日三服

茯苓散 療產後狂語志意不定精神昏亂心氣虛

九十三

風邪所致

茯苓 一方用

生地黄 各二兩

遠志

白薇

龍齒 各二兩

防風

人參

獨活 各二兩

右以銀壹大斤水壹斗五升煮取柒升下諸藥煮

取叁升温分三服忌菘菜猪肉生冷一方治產後

神恍惚志意不定加荆芥

療產後多虛羸弱若大汗利皆至於死此重虛故也

若中風語謬昏悶不知人者宜服此

人參

茯苓

羌活

大棗

遠志 各二兩

竹瀝 壹升

右用水陸升煮取叁升下竹瀝更煎取貳升半分

三服

抱膽丸 治產後血虛驚氣入心及顛瀾風狂或室

女經脉通行驚邪蘊結

水銀 貳兩

黑鉛 壹兩半

朱砂 壹兩另

乳香 壹兩另

右將黑鉛入銚子內鎔化下水銀結成砂子次下

朱砂滴乳末乘熱用柳木搥研勻丸如芡實大每

服壹丸空心金銀薄荷湯化下得睡切莫驚動覺

來即安 妙香散亦善

才少商... 古熟黑餘人... 內發少... 水... 蘇... 煇... 于... 文...

木... 壹... 兩... 錢...

水... 壹... 兩... 錢... 朱... 壹... 兩... 錢...

艾... 蘇... 蘇... 蘇...

蘇... 蘇... 蘇... 蘇... 蘇... 蘇... 蘇... 蘇...

三... 兩...

式用木... 式用木... 式用木... 式用木... 式用木...

大... 壹... 兩... 錢... 蘇... 壹... 兩... 錢...

恍惚

大產後中風恍惚者由心主血血氣通於榮衛臟腑

通循經絡產則血氣俱傷五臟皆虛榮衛不足即為

風邪所乘則令心神恍惚不定也 薛前證當大補

血氣為主而佐以後方為善蓋風為虛極之假象也

固其本源諸病自退若專治風則速其危矣 一產

婦患前證盜汗自汗發熱肺熱面色黃白四肢畏冷

此氣血俱虛用八珍湯不應更用十全大補加味歸

脾二湯始應後因勞怒發厥昏憤左目牽緊兩唇抽

動小便自遺余謂肝火熾盛用十全大補加釣藤山

葉... 葉... 葉... 葉... 葉...

提而安再用十全大補湯辰砂遠志丸而愈
千金療產後暴苦心悸不定言語錯亂恍惚皆因心
虛所致

茯苓 參兩

芍藥 貳兩

甘草

桂心

當歸 各壹兩

生薑 貳兩

麥門冬 壹升

大棗 參拾枚

右為散水送下煎取壹升去滓分作兩服

經効療產後心虛忪悸志意不定煩躁恍惚

茯神

當歸

黃芩

麥門冬 去心

甘草

人參

芍藥

酸棗仁

白鮮皮 各貳兩

大棗 柒枚

右為粗末水貳升煮取柒合去滓溫服

琥珀散 治產後中風恍惚語澁心神煩悶四肢不

隨

琥珀 另研

茯神 去木各壹兩

遠志 去心

石菖蒲

黃芪

防風

獨活

人參 各去蘆

麥門冬 去心

芎藭

桑寄生

赤芍藥

羚羊角屑 各半兩

甘草 貳錢

右為吹咀每服五錢水壹中盞半煎至壹大盞去滓溫服不拘時

遠志散 治產後中風心神恍惚言語錯亂煩悶睡卧不安

遠志 去心 防風 去蘆各壹兩 麥門冬 去心

酸棗仁 炒 桑寄生 獨活 去蘆 茯神 去木

桂心 當歸 去蘆炒

羚羊角屑 各半錢半 甘草 炙半兩

右為吹咀每服伍錢煎服法同前

天麻丸 療產後中風恍惚語澁四肢不隨

天麻 硃砂 水 防風 去蘆

羌活 去蘆各壹兩 僵蠶 炒半錢 乾蝎 炒

白附子 炮 五靈脂 炒各半兩 雄雀糞 炒

牛黃 另研各貳錢半

右為細末糯米飯為丸如梧子大每服貳叁拾丸薄荷酒送下日進二服

辰砂遠志丸 主產後中風消風化痰安神鎮心

石菖蒲 遠志肉 甘草煮 人參

茯神 去木 辰砂 各伍錢 川芎

山藥 鐵粉 麥門冬 去心

產後恍惚 天麻丸

細辛

天麻

半夏湯泡

南星

白附子各三兩

右為末薑汁煮糊丸如菉豆大別以朱砂為衣每服參拾九夜卧生薑湯吞下

古為膠末糯米瀉為次收酥干大將銀有參餅

半黃真途半

白樹子

正靈謀半兩

蘇蚩糞

美蓄各壹兩

蘇蚩糞半兩

蘇蚩糞

天麻

天麻

去殼

虛煩

并餘血

薛論見發熱條四物湯加茯神遠志治產後虛煩

十全大補湯尤効

大餘血奔心蓋是分無了不便與童子小便并擗心

下及卧太速無食不相宜之物所致但能依方療之

無不痊可

療產後餘血不盡本衝心煩悶腹痛

川芎

生乾地黄

枳殼

芍藥各等分

右酒服方寸匕日二服

集驗療生後血氣煩方

千金方

生地黄汁

清酒 各壹升

右相和煎壹沸分為兩服

廣濟療血氣煩悶方 生藕汁飲貳升効竹瀝亦得

療產後七日內宿血不散時時衝心迷悶

荷葉

壹兩 米錢半

延胡索

貳兩

地黄汁

貳合

右水貳升煮一味取捌合下延胡索分三服空心

忌肉食一日

療產後餘血攻心或下血不止心悶面青冷氣欲絕

羊血壹盞頓服若不定更服立効

經効療產後氣虛冷搏於血血氣結滯上衝心腹脹

清

當歸

桂心

川芎

吳茱萸

橘皮

生薑

各壹兩 芍藥 貳兩

右以咀以水參升煮取壹升去滓空心服

治產後餘血奔心

用陳白梅搥碎湯煎湯飲

金黃散 治產後惡血衝心時發煩躁

玄胡索

蒲黃

各半兩

桂心 貳錢半

右為細末烏梅煎湯冷調下貳錢

沒藥花 治產後心胸煩躁惡血不快

產後產類

女科

九十九

沒藥研

蠻薑

延胡索

乾漆炒

當歸

桂心

牛膝

牡蛎皮

乾薑各等分

右為細末醋煮麩糊丸如梧桐子大煎麩湯下拾

丸至拾伍丸

補遺治產後餘血衝心煩悶腹痛用蒲黃不以隔

紙炒每壹錢東流水煎湯調下又失笑散亦佳

短氣治產後短氣欲絕心中煩悶竹葉湯

竹葉切細

麥門冬

小麥各壹斤

甘草壹兩

生薑貳兩

大棗拾貳枚

右切以水壹斗煮竹葉小麥至捌升去滓納餘藥者取參升去滓溫服虛悸加入參貳兩少氣力加糯米伍合

糯米伍合

甘竹茹湯治產後內虛煩熱短氣方

甘竹茹壹升

人參

茯苓

甘草各壹兩

黃芩叁兩

右以水陸升煮取貳升去滓分三服日三

人參當歸湯治產後去血過多血虛則陰虛陰虛

生內熱令人心煩短氣自汗頭痛

熟地黄

人參去蘆

當歸身去蘆

產後虛損

文斗五

二

肉桂 去粗皮 麥門冬 去心各 白芍藥 錢半

血熱甚者加生地黃貳錢

水貳鍾粳米壹合竹葉拾片煎至壹鍾食遠服

氣薤白湯 治產後胸中煩熱逆氣方

薤白 半夏 甘草

人參 各壹兩 栝藹根 貳兩 麥門冬 半升

右以咀以水壹斗參升煮取肆升去滓分伍服日

三夜二執甚加知母壹兩

不得眠 雲岐治產後虛煩不得眠芍藥梔鼓湯

芍藥 當歸 梔子 各伍錢 香鼓 半合

右如梔子鼓湯修服產後傷寒便同下後變證 此方

雖雲岐法不若仲景酸棗湯穩當

仲景二物黃芩湯 婦人在草褥自發露得風四肢

苦煩執頭痛者與小柴胡湯頭不痛但煩者此湯

主之傷寒少陽病見

黃芩 壹兩 苦參 貳兩 乾地黃 肆兩

右三味以水捌升煮取貳升溫服壹升多吐下虫

婦人產中虛煩亂嘔逆安中益氣竹皮大丸主之

生竹茹 石膏 各貳分 桂枝

白薇 各三分 甘草 柒分

煩熱四肢

右五味末之聚肉和丸彈子大每以飲服壹九日
三夜二服有熱者倍白薇煩喘者加栝實壹分
陳尋常治諸虛煩熱者以竹葉石膏湯溫膽湯殊不
知產後與尋常不同如石膏等藥不宜輕用用之必
死

經驗方 治產後煩躁禹餘糧壹枚狀如酸飴者入
地埋一半四面築緊用炭壹秤發頂火壹斤煨去
火三分耗二為度用濕沙土罈一宿方取出打去
外面一層只用裏內細研水淘澄五七度將紙襯
乾再研數千遍用甘草煎湯調試錢匕一服立効

渴

熊產後心煩發渴宜清心蓮子飲雜病白濁 醒前證若
出血過多虛火上炎用童子小便或四物白木麥門
丹皮若胃氣虛而有熱用竹葉歸芪湯若血虛發熱
用八珍加麥門五味若血脫發熱煩躁用當歸補血
湯若胃氣虛弱用補中益氣湯或七味白朮散
產婦患前證朝寒暮熱肚腹作痛以手按之不痛余
以為血氣俱虛用八珍之類治之彼反行逐血更加
發熱煩躁余用當歸補血湯熱躁漸止用八珍麥門
五味氣血漸復

百二

熟地黄湯 治產後虛渴不止少氣脚弱眼眩飲食

無味

熟地黄 酒洗淨蒸 人參 去蘆

麥門冬 去心各 瓜蒌根 貳錢 甘草 炙半

右作一服水貳鍾糯米壹撮生薑參片紅棗參枚

同煎至壹鍾不拘時服

產寶療產後大渴不止

蘆根 切壹升 瓜蒌 女 人參

甘草 各叁 大棗 貳拾枚

麥門冬 生

右以水玖升煮取三升分三服頓服四劑即差忌

菘菜

黃芩散 治產後血渴飲水不止

黃芩 麥門冬 各等

咬咀每服參錢水盞半煎至捌分去滓溫服無時

括婁根湯 療產後血渴

括婁根 兩 麥門冬 去心 人參 各壹兩

生乾地黄 甘草 各壹兩 土瓜根 伍兩

大棗 貳拾枚 產寶無地黃麥門冬有杜蠟粉等分

咬咀以水捌升煮取貳升分三服

產後湯 大棗 二兩

千金竹葉湯 療產後虛渴少氣力

竹葉 各壹升 甘草 伍分 人參

茯苓 各壹兩 小麥 伍合 生薑

半夏 各壹兩 麥門冬 伍兩 大棗 拾伍枚

右以水九升先煮竹葉小麥薑棗取柒升去滓

內藥再煎取貳升去滓一服五合日三夜

七味白朮散 治中氣虛弱津液短少口乾作渴或因吐瀉所致者

白朮 伍兩 白木 伍兩 米香

人參 甘草 炒 藿香

白茯苓 白木 炒 米香

乾葛 各壹錢 右水煎服

竹葉歸芪湯 治胃氣虛弱口乾作渴惡冷飲食者

竹葉 壹錢 黃芪 貳錢 白朮

人參 當歸 各壹錢 麥門冬 柒分

甘草 炒伍分 右水煎服

玄胡索散 治產後失血渴不止

鬱金 乾葛 桂心

青皮 枳殼 玄胡索

右各等分以好醋浸一宿焙乾末之每服貳錢陳

皮湯調下日三夜

桃花散 治產後不煩而渴

新石灰

壹兩

黃丹

伍錢

右為細末渴時井水調下壹錢

本治產後出血太多虛煩發渴用真正蒲黃末貳錢

白湯調下如渴燥甚井花水下

治產後中風煩渴用紅花子伍合微炒研碎以水煎

濃徐徐呷之

療血渴及產後渴疾用蓮子心生取為細末米飲調

下貳錢効

自汗

大夫虛汗不止者由陰氣虛而陽氣加之裏虛表實

陽氣獨發於外故汗出也血為陰產則傷血是為陰

氣虛也氣為陽其氣實者陽加於陰故令汗出而陰

氣虛弱不復者則汗出不止也凡產後血氣皆虛故

多汗因之遇風則變成瘧縱不成瘧亦虛乏短氣身

體柴瘦唇口乾燥又則經水斷絕由津液竭故也

薛按前證屬血氣俱虛急用十全大補湯如不應用

參附芪附等湯若汗多亡陽發瘧尤當用前藥王海

藏先生云頭汗出至額而還額上偏多蓋額為六陽

之所會也。由虛熱熏蒸而出，竊謂前證當以部位分
 之。額左屬肝，額右屬肺，鼻屬脾，頤屬腎，額屬心。治者
 審之。一產婦略聞音響，其汗如水，而昏憤。諸藥到
 口，即嘔。余以為脾氣虛敗，用參附末為細丸，時含三
 五粒，隨液嚥下，乃漸加之。至錢許，却服參附湯，而痊。
 一產婦盜汗不止，遂致廢寐，神思疲甚，口乾引飲。
 余謂血虛有熱，用當歸補血湯，以代茶。又以當歸六
 苗湯，內黃芩、連翹、炒黑倍，加人參、五味子二劑而愈。
 大凡產後忽冒汗出不識人，治用雞子及竹瀝
 二法見前血暈
 產前澄屬太虛，宜固元氣為主。其汗不止，必變柔痙。

東垣先生云：婦人分娩及半產，漏下昏冒，目瞋，蓋因
 血暴亡而火上熾，但補其血，則神自昌。若常時血下
 虧，補而升舉其氣，陽得血而神安，則目明矣。今立一
 方以補手足厥陰之血，兼益陽氣，名曰全生活血湯。
 全生活血湯 治發熱自汗盜汗目暈四肢無力
 口乾頭暈行步欹側

- | | | |
|----|------------------------------|----------------------------|
| 升麻 | 芍藥 <small>炒各
參錢</small> | 柴胡 |
| 當歸 | 防風 | 羌活 |
| 獨活 | 葛根 | 甘草 <small>炒各
錢</small> |
| 川芎 | 藁本 <small>各壹錢
伍分</small> | 生地黃 |

產後自汗 文十五 百六

熟地黄 各壹錢 細辛

蔓荆子 各伍分

紅花 叁分

右每服伍錢水煎熱服

麻黃根散 治產後虛汗不止

當歸

黃芪

麻黃根

牡蠣 煨為粉

人參

粉草 各等分

右吹咀每服肆錢水壹盞煎至柒分去滓溫服

又方

當歸

黃芪 各壹兩

麻黃根 貳兩

右吹咀每服叁錢水壹盞煎柒分去滓服

千金療產後風虛汗出不止小便難四肢拘急難以屈伸

屈伸

甘草 炙壹兩

附子 半箇炮去尖

桂心

芍藥 各壹兩半

右吹咀每服叁錢水壹盞生薑肆

片棗壹枚煎柒分去滓空心溫服忌豬肉冷水生葱等物

經効療產後汗出不止

黃芪 拾貳分

白朮

牡蠣 煨

茯苓

防風

麥門冬 去心

生地黄 各捌分

大棗 柒枚

右吹咀水貳升煮取柒合去滓空心分溫兩服

產後自汗

文十五

行二

瘡產後血氣暴虛汗出淡竹葉煎湯參合微溫服

之須臾再服

又方馬齒莧研取汁參大合煮一沸投蜜匙許冷

停頓服無新者用乾者

止汗散治產後盜汗不止一應汗多者皆可服

牡蠣煨研

小麥麩炒令黃色

右等分和勻煮生豬肉汁調下貳錢無時

人參湯治產後諸虛不足發熱盜汗

人參

當歸各等分

右為末以豬腰子一隻去脂膜切小片子以水三

升糯米半合葱白兩條煮米熟取清汁膏盞入藥

貳錢煎至捌分溫服不拘時

當歸六黃湯治氣血虛熱盜汗不止不應加入參

白朮心血不足加酸棗仁炒

當歸

熟地黃自製

黃芪炒各

生地黃

黃蘗炒黑

黃芩炒黑

黃連炒黑各

右水煎服

參附湯治陽氣虛寒自汗惡寒或手足逆冷大便

自利或臍腹疼痛吃逆不食或汗多發瘧等證

人參青兩

附子炮伍

治

女科

百八

右作一服薑棗水煎徐徐服去人參加黃芪名芪

附湯

黃附湯

治陽氣虛脫惡寒自汗或口噤痰涌四肢

逆冷或吐瀉腹痛飲食不入及一切虛寒等證

黃芪 壹兩

附子 炮伍錢

右作一劑薑棗水煎服如不應倍加附子方得全

濟

當歸補血湯 見前

十全大補湯 見下

黃疸

治一婦人四月內產發黃四肢倦怠食少經年不

來時發熱脉弦

白朮 壹兩

人參

秦朮

牡丹皮

生地黃

木通

柴胡

芍藥 各半兩

川芎

黃芩

乾葛 各壹錢

甘草 伍分

右分十二貼水煎食前熱服

白朮	黃芩	芍藥	甘草	柴胡	枳實	木香	丁香	入參	然水
...

...

不應面色黧黑兩尺浮大按之微細此以命門火虛不能生脾土脾土不能生諸臟而為患也用八味丸補土之母而痊 一婦產後三日起早死氣血未定遂感身熱目暗如風狀卽以清魂散二服得微汗而愈 滑伯仁治一產婦惡露不行臍腹痛頭疼寒熱衆皆以為感寒溫以薑附益大熱手足搖擗語譫目撮診其脉弦而洪數面赤目閉語喃喃不可辨舌黑如焙燥無津潤胸腹按之不勝手蓋燥劑搏其血內熱而風生血蓄而為痛也曰此產後熱入血室因而生風卽先為清熱降火治風涼血兩服頗爽繼以琥

珀牛黃等稍解人事後以張從政三和散行血破瘀
三四服惡露大下如初時產已十日矣于是諸證悉
平一婦盛暑月中產三日發熱其脉虛疾而大惡
露不行敗血攻心狂言叫呼奔走擊捉不住以乾荷
葉生地黃牡丹皮濃煎湯調下生蒲黃二錢一服即
定惡露旋下而安一婦產後時發昏瞽身熱汗多
眩暈口渴或時頭痛惡心醫用四物赤血之劑病不
減又用小柴胡病益甚石山至診得浮洪搏指注曰
產後而得是脉又且汗多而脉不為汗衰法在不治
所幸者不喘不泄耳其脉如是蓋涼藥所激也用大

發熱

薛產後虛煩發熱乃陽隨陰散氣血俱虛若惡寒發
熱煩躁作渴急用十全大補湯若熱愈甚急加桂附
若作渴面赤宜用當歸補血湯若誤認為火證投以
涼劑禍在反掌王太僕先生云如大寒而是熱之不
熱是無火也熱未復去晝見夜伏夜發晝止不時而
熱是無火也當治其心如大熱而是寒之不寒是無
水也熱動復止倏忽往來時動時止是無水也當助
其腎故心盛則生熱腎盛則生寒腎虛則寒動於中
心虛則熱收於內又熱不勝寒是無火也寒不勝熱

產後發熱

女科

百十

是無水也治法前證無水者六味丸無火者八味丸
氣血俱虛者八珍湯與十全大補湯 大尹俞君之
內產後發熱晡熱吐血便血兼盜汗小便頻數胸脇
脹痛肚腹痞悶余曰此諸臟虛損也治當固本為善
自恃知醫用降火之劑更加瀉利腸鳴嘔吐不食腹
痛足冷始信余言診其脉或浮洪或沉細或如魚其
面或青黃或赤白此虛寒假熱之狀時雖仲夏當捨
時從證先用六君子湯加炮薑肉桂數劑胃氣漸復
諸證漸退更佐以十全大補湯半載全愈 儒者楊
敬之內人所患同前但唾痰涎或用溫補化痰之劑

不應面色黧黑兩尺浮大按之微細此因命門火虛
不能生脾土脾土不能生諸臟而為患也用八味丸
補土之母而痊 一婦產後三日起早死氣血未定
遂感身熱目暗如風狀即以清魂散二服得微汗而
愈 滑伯仁治一產婦惡露不行臍腹痛頭疼寒熱
衆皆以為感寒溫以薑附益大熱手足搖擻語謔目
撮診其脉弦而洪數面赤目閉語喃喃不可辨舌黑
如焙燥無津潤胸腹按之不勝手蓋燥劑搏其血內
熱而風生血蓄而為痛也曰此產後熱入血室因而
生風即先為清熱降火治風涼血兩服頗爽繼以琥

珀牛黃等稍解人事後以張從政三和散行血破瘀三四服惡露大下如初時產已十日矣于是諸證悉平一婦盛暑月中產三日發熱其脉虛疾而大惡露不行敗血攻心狂言叫呼奔走拏捉不住以乾荷葉生地黃牡丹皮濃煎湯調下生蒲黃二錢一服卽定惡露旋下而安一婦產後時發昏瞽身熱汗多眩暈口渴或時頭痛惡心曾用四物涼血之劑病不減又用小柴胡病益甚石山至診得浮洪搏指注目產後而得是脉又且汗多而脉不爲汗衰法在不治所幸者不喘不泄耳其脉如是盖涼藥所激也用人

參參錢黃芪或錢甘草當歸各柒分白朮門冬各一錢乾薑陳皮黃芩各五分煎服五劑脉歛而病漸安王愈憲宜人產後因沐浴發熱嘔惡渴欲引冷水瓜果謔語若狂飲食不進體素豐厚不受補醫用清涼熱增劇診得六脉浮大洪數江曰產後暴損氣血孤陽外浮內真寒而外假熱宜大補氣血與人珍湯加炮薑八分熱減大半病人自以素不宜參芪不肯再服過一日復大熱如火復與前劑著加參芪炮薑連進二三服熱退身涼而愈

汗血

當歸養血丸

產後腹痛

當歸黃芪湯

腰痛

產後發熱

文斗十五

行三

虛 當歸補血湯

當歸散 並見胎自墮半產條

虛 大全人參湯 見上自汗

羅氏犀角飲子 治產後亡津液虛損時自汗出發熱困倦唇口乾燥

犀角

麥門冬 白木各半兩 柴胡 壹兩

枳殼 麩炒 地骨皮 生地黃 甘艸 炒

當歸 人參 茯苓 黃芩

黃芪 各柒錢

右咬咀每服肆錢薑叁片浮麥柒拾粒水煎服

三之一湯 治產後虛勞發熱日久不安

柴胡 黃芩 人參 半夏

川芎 當歸 芍藥 熟地黃

甘草 各壹錢半

作一服水貳鍾薑叁片紅棗壹枚煎一鍾無時服

三分散 治產後日久虛勞發熱

川芎 當歸 芍藥 熟地黃

白朮 白茯苓 黃芪 各壹錢 柴胡

人參 各壹錢半 黃芩 半夏 甘草 各半錢

右作一服水貳鍾生薑叁片紅棗壹枚煎至壹鍾

食前服

加味道遙散 治產後發熱口乾作渴唇裂生瘡

當歸 白芍藥 乾葛各錢 生地黃

川芎 黃芩各錢 人參錢半 麥門冬錢分

柴胡壹錢 烏梅貳箇 甘草陸分

右剉散分作二服用水壹鍾煎至柒分空心服

虛寒 婁產後發熱多屬虛寒惟乾薑加入補藥中神効此

丹溪法也

人參當歸湯 治產後去血過多血虛則陰虛陰虛

則生內執心胸煩滿呼吸短氣頭痛悶亂晡時轉

甚與大病後虛煩相類方見前

往來寒熱

郭產後乍寒乍熱者何答曰陰陽不和敗血不散能

令乍寒乍熱產後血氣虛損陰陽不和陰勝則乍寒

陽勝則乍熱陰陽相乘則或寒或熱若因產勞傷臟

腑血虧不得宣越故令敗血不散入於肺則熱入於

脾則寒醫人若誤作瘧疾治之則謬矣陰陽不和宜

增損四物湯敗血不散宜奪命丹又問二者何以別

之時有刺痛者敗血也但寒熱無他證者陰陽不和

也增損四物湯不一皆隨病加減薛產後寒熱因

氣血虛弱或脾胃虧損乃不足之證經云陰虛則發

產後往來寒熱

百一

熱陽虛則惡寒若兼大便不通尤屬氣血虛弱切不可用發表降火若寸口脈微名陽氣不足陰氣上入於陽中則惡寒用補中益氣湯尺部脈弱名陰氣不足陽氣下陷於陰中則發熱用六味地黃丸大抵陰不足陽往從之則陽內陷而發熱陽不足陰往從之則陰上入而惡寒此陰陽不歸其分以致寒熱交爭故惡寒而發熱也當用八珍湯若病後四肢發熱或形氣倦怠此元氣未復濕熱乘之故耳宜補中益氣湯若肌熱大渴引飲目赤面紅此血虛發熱用當歸補血湯若認爲寒則誤矣 一產婦惡寒發熱用十

全大補加炮薑治之而愈但飲食不甘肢體倦怠用補中益氣而安又飲食後犯怒惡寒發熱抽搐咬牙難候其脈視其面色青中隱黃欲按其腹以手護之此肝木侮脾土飲食停滯而作用六君加木香一劑而安 一產婦惡寒發熱余欲用八珍加炮薑治之其家知醫以爲風寒用小柴胡湯余曰寒熱不時乃氣血虛也不信仍服一劑汗出不止譫語不絕煩熱作渴肢體抽搐余用十全大補湯一劑益甚脈洪大重按如無仍以前湯加附子四劑稍緩數劑而安 吳茱山治一婦人產後去血過多食後著惱頭疼身

往來寒熱

百七

痛寒熱如瘧左手弦大微有寒邪右手弦滑不勻食
飲痰火也二者因虛而得宜養正祛邪遂以茯苓補
心湯去地黃加羌活青皮葱棗三服汗出身涼其患
漸差然後以八物湯調理半月後全愈一婦產後
惡露未盡瘀血入絡又感寒邪身熱如瘧即以生料
五積散五貼惡露自下而寒熱除又一婦產後惡
露未盡因起抹身寒氣客於經絡乍寒乍熱脉緊而
弦以葱白散二貼安一少婦初產四日冷物傷脾
胃但覺身分不快嘔逆飲食少字缺心腹滿悶時或腹
脇刺痛晨惡寒晚潮熱夜則恍惚譫語則抽搦

類風狀變異多端諸醫莫測或作虛風或云血凝實
執用甘溫而行血以寒涼退實熱如此半月不效汪
至見醫滿座亦踴縮診其脉弦而緊遂令按之小腹
急痛知瘀血未盡也思患者大勢惡露已下未必還
有餘血偶因寒涼所傷瘀血停滯下焦日久客于經
絡所以變生諸證須得大調經散倍入琥珀化諸惡
血成水其患方愈遂合前藥服之五日後行惡水斗
許臭不可近患人覺倦病勢漸減然後以人參養榮
湯數劑貼月餘如初
雲產後往來寒熱四物內加小柴胡湯

產後往來寒熱四物內加小柴胡湯

保治日久虛勞微有寒熱脈沉而數宜柴胡四物湯

川芎 當歸 芍藥

熟地黄 各壹錢半 柴胡 捌錢 大參

黃芩 甘草 半夏 各叁錢

右為末水煎服

雲產後往來寒熱懸弦者少陽也小柴胡加生地黄

湯

柴胡 貳兩 黃芩 伍錢 人參 叁錢

半夏 壹兩半 大棗 叁枚 生地黄

梔子 枳殼 各伍錢

右如前煎服

增損柴胡湯 治產後虛發寒熱飲食少腹脹

柴胡 人參 甘草

半夏 陳皮 川芎

白芍藥 各等分

右每服叁錢薑伍片棗貳枚水同煎食後日二服

虞增損四物湯 方見本 評曰乍寒乍熱榮衛不和難

以輕議若其敗血不散豈止入脾肺二臟邪大抵

一陰閉一陽即作寒熱陰勝故寒陽勝故熱只可

云敗血循經流入閉諸陰則寒閉諸陽則熱血氣

產後往來寒熱 女科 百七

與衛氣解則休遇再會而復作大調經散五積散
入醋煎佳

雲岐熟地黃散 治產後蓐勞皆由體虛氣力未壯

勞復所起四肢煩疼時發寒熱不思飲食

熟地黃 人參 白芍藥

白茯苓 白朮 續斷各壹兩

黃芪 桂心 五味子

當歸 川芎各柒錢半 大全方有麥門冬柒錢半

右艾咀每服錢壹二片棗壹枚水煎服一方

無桂心五味續斷有柴胡黃芩半夏各柒錢半作散

黃芪丸 治產後蓐勞寒熱更甚頭目眩痛骨節痠

痰氣力羸乏

黃芪 鼈甲 當歸炒各壹兩

桂心 白芍藥 續斷

川芎 牛膝 菴蓉

沉香 栝子仁 枳殼各七錢半

五味子 熟地黃各半兩共為細末

右煉蜜丸九梧子大每服肆伍拾丸食後粥飲下

大調經散 治產後血虛惡露未消氣為敗濁凝滯

榮衛不調陰陽相乘增寒發熱或自汗或腫滿

治後 治後 治後

氣血未平之所為也

大豆二兩半 炒去皮

茯神壹兩

真琥珀壹錢

右為細末濃煎烏豆紫蘇湯調下

加減烏金散 治產後寒熱似瘧

厚朴

柴胡

黃芩

麻黃各二錢

陳皮

常歸

川芎

桔梗

茯苓各壹分

桂枝

蒼朮

白芷

枳殼

羌活

草果

半夏各二錢

甘州玖分

白芍藥

熟地黄各壹錢 五分

右劉為散分作兩服每服用水壹鍾半薑叁片葱

參壹煎至壹鍾不拘時服 有汗多當歸川芎白

芍藥熟地黄 有脹多厚朴陳皮 有熱多柴胡

黃芩 有寒多蒼朮草果桂枝 有痰多半夏桔

梗茯苓 有頭痛多川芎白芷羌活 有瀉去枳

殼甘草不用如方用有餘血塊在腹作潮熱疼 癩加三稜義木多用玄胡索八角

產寶療產後惡寒壯熱一夜三五度發惡語口中生

瘡時時乾嘔困乏悶絕

產後往來寒熱

百十九

人參 獨活 白鮮皮 葛根

防風 青竹茹 遠志 各壹兩半 茯神 貳兩

白斂 貳兩半 玄參 叁兩 竹瀝 貳升

右取銀壹斤水壹斗伍升煮取柒升下諸藥重煮

取叁升分温叁服忌魚酒濕麵等

知母湯 治產後乍寒乍熱通身温壯胸心煩悶

知母 叁兩 芍藥 黃芩 各貳兩 桂心

甘草 各壹兩以

右米五升者取貳升半分三服一方不用桂心

用生地黄

瘧

產後瘧疾多由汚血挾寒熱而作大法宜柴胡四

物湯調之熱多者草果飲子寒多者生熟飲子

產後瘧疾因脾胃虛弱飲食停滯或因外邪所感或

鬱怒傷脾或暑邪所伏審係飲食用六君加桔梗蒼

朮藿香如外邪多而飲食少用藿香正氣散如外邪

少而飲食多用入參養胃湯飲食勞役用補中益氣

湯氣血虛弱用十全大補加炮薑虛寒用六君加薑

桂元氣脫陷急加附子太凡久瘧多屬元氣虛寒蓋

氣虛則寒血虛則熱胃虛則惡寒陰火下流則寒熱

交作或吐瀉不食腹痛煩渴發熱譫語或手足逆冷
寒戰如慄雖見百證當峻溫補其病自退若誤用清
脾截瘧之類多致不起一產婦患瘧發熱作渴胸
膈脹滿遍身作痛三日不食嘔酸變氣此是飲食所
傷脾胃不能消化用六君加神麴山查四劑而不作
酸乃去神麴山查又數劑而飲食進其大便不通至
三十五日計進飲食七十餘椀腹始悶令用豬膽汁
導而通之其糞且不甚燥一產婦患瘧久不愈百
病蜂起其脈或洪大或微細或弦緊或沉伏難以名
狀用六君加炮薑二十餘劑脈證稍得又用參朮煎

膏佐以歸脾湯百餘劑而瘥一產婦朝寒暮熱或
不時寒熱久不愈用六君子補中益氣兼服百餘劑
而尋愈

草果飲子 治婦人產後瘧疾寒熱相半者或多或少熱
者宜此

半夏 湯泡 赤茯苓 甘草 炙 草果 炮去

川芎 陳皮 白芷 各貳錢 青皮 去白

良薑 各貳錢 乾薑 肆錢

右以咀每服參錢水壹大盞薑參片棗貳个同煎
至柒分去滓當發日侵早連進三服無有不安

產後 生熟飲子 治產後瘧疾多寒者

肉豆蔻 草果仁 厚朴生去粗皮 半夏

陳皮 甘草 大棗去核 生薑

右八味等分細剉和勻一半生一半用濕綿紙裹煨令香熟去紙與一半生者和勻每服秤伍錢重水貳錢煎至柒分食前一服食後一服

補遺產後瘧疾熱多寒少者清脾湯 寒多熱少者養胃湯 久而不已者七寶飲截之方並見雜病瘧

瘧勞

夫產後瘧勞者此由生產日淺血氣虛弱飲食未平復不滿日月氣血虛羸將養失所而風冷密之風冷搏于氣血則不能温于肌膚使人虛乏勞倦乍卧乍起顏容憔悴食飲不消風冷邪氣而感于肺肺受微寒故咳嗽口乾遂覺頭昏百節疼痛榮衛受于風邪流注臟腑須臾熾發時有盜汗寒熱如瘧背膈煩悶四肢不舉沉重着床此則瘧勞之候也 又曰婦人因產理不順疲極筋力憂勞心慮致令虛羸喘乏寒熱如瘧頭痛自汗肢體倦怠咳嗽痰逆腹中絞刺名

產後瘧勞 婦人 百三

曰羸勞薛按前證當扶養正氣為主用六君子湯
加當歸若脾肺氣虛而咳嗽口乾用補中益氣加麥
門五味若因中氣虛而口乾頭暈用補中益氣加蔓
荊子若肝經血虛而肢體作痛用四物參朮若因肝
腎虛弱而自汗盜汗寒熱往來者用六味丸加五味
子若因脾虛血弱肚腹作痛月經不調用八珍湯倍
加白朮若因脾虛血燥皮膚瘙癢用加味道遙散大
抵此證多因脾胃虛弱飲食減少以致諸經疲憊而
作當補脾胃飲食一進精氣生化諸臟有所倚賴其
病自愈矣仍參虛煩發熱方論主治汪一婦產未

精月因怒氣血流如水三日方止隨又勞苦四肢無
力睡而汗出日晡潮熱口乾五心如炙諸醫皆用柴
芩薄荷之類其熱愈熾診其脉弦大無力此羸勞也
以四物湯壹兩入胡黃連秦艽青蒿各半錢數服熱
退身涼後以黃連八珍丸一料而安

羸

石子湯 療產後虛羸喘乏乍寒乍熱如瘧四肢

痛面色痿黃名曰羸勞

豬石子

壹雙去脂 膜四破

香豉

一方無此 有知母

葱白

切

粳米

當歸

芍藥

各兩

右吹咀分兩劑每劑用水參升煮取壹小碗去滓

產後羸勞

女科五

百三十一

分三服 廣濟無芍藥有人參

增損柴胡湯 見前注 來寒熱

豬腰子粥 治羸勞發熱 用豬腰子壹枚去白膜

切作柳葉片以鹽酒拌先用粳米壹合入葱椒煮

粥鹽醋和將腰子鋪盆底以熱粥蓋之如作蠶生

狀空心服

虛人參鼈甲散 治羸勞皆由在產內未滿百日體中

虛損血氣尚弱失於將理或勞動作傷致成羸勞

其狀虛羸乍起乍卧飲食不消時有咳嗽頭目昏

痛發歇無常夜有盜汗寒熱如瘧背膊拘急沉困

在床服此大效

人參 桂心 當歸 桑寄生

白茯苓 白芍藥 桃仁 麥門冬 去心

熟地黄 甘草 各半 續斷 貳錢 牛膝 柒錢

鼈甲 黃芪 各壹兩

右為細末每服先以豬腎壹對去筋膜以水兩大

盞生薑半分棗叁枚煎至壹盞去豬腎薑棗然後

入藥末貳錢蔥白叁寸烏梅壹箇荆芥伍穗煎至

柒分去滓空心晚食前溫服此藥神妙

許仁則療產後日淺久坐視聽言語多或運用氣力

產後羸勞 百三十四

遂覺項膊肢節皮肉痛乍寒乍熱此為勞

豬腎壹雙去脂 當歸 芍藥

生薑各貳兩 葱白切 桂心各壹兩

右水捌升煮腎取陸升下藥煮取貳升分溫二服

熟地黄散見前

白茯苓散治勞緣生虛日淺久坐多語運動用

白茯苓壹兩 當歸 川芎 桂心

白芍藥 黃芪 人參各半 熟乾地黄壹兩

吹咀先以水貳盞入豬腎壹雙去脂薑片參棗參煎壹

盞去三物入藥半兩煎柒分去滓食前分溫三服

黃芪丸往來寒熱

胡氏牡丹散治產後虛羸發熱自汗欲變勞或血氣所搏經候不調或寒熱羸皮

白芍藥 當歸 五加皮 地骨皮

人參各半 沒藥 桂心各貳錢 牡丹皮參錢

右為細末每服貳錢水酒各半盞如不飲酒只用

水壹盞開元錢壹枚麻油蘸之同煎柒分去滓通

口服煎不得攪喫不得吹

黃耆煮散治產後羸勞肌膚黃瘦面無顏色或憎寒壯熱四肢痠疼心煩頭痛

鼈甲醋炙 黃芪各壹兩 桂心 當歸炒

桑寄生 白茯苓 白芍藥 人參

產後 羸勞 女科 三

熟地黄 麥門冬去心 甘草炙各半兩 牛膝半兩

右為細末每服用豬石子壹對去脂膜切破先以

水膏盪入薑半分棗叁枚煎至柒分去石子薑棗

却下藥伍錢更煎至肆分去滓空心晚食前溫服

二滓併煎

黃芪建中湯 治產後諸虛不足發熱或惡寒腹痛

黃芪炒 肉桂各壹兩 白芍藥炒貳兩 甘草炒柒錢

每服伍錢薑棗水煎服日二三服虛甚者加附子

紫河車丸治產後虛弱大效猶大產兒即食

其胞衣故無產疾方見虛勞

虛羸

產寶云產後虛羸者皆由產後虧損血氣所致須當

慎起居節飲食六淫七情調養百日庶保無疾若中

年及難產者毋論日期必須調養平復方可涉喧否

則氣血復傷虛羸之證作矣 薛前證產傷氣血者

用八珍湯飲食傷胃者用四君子湯停食傷脾者用

六君子湯勞傷元氣者用補中益氣湯若愛氣覺有

藥味者此藥復傷胃也但用四君子湯徐徐少飲以

調脾胃若胃氣一健血氣自生諸證自愈矣

丹產後補虛

人參

白朮 各壹錢

黃芩

歸身尾 各伍分

川芎 半兩

陳皮 叁分

右水煎服如有寒加乾薑叁分茯苓壹錢

保命三元湯治產日久虛勞而脉浮大者即小柴胡

合四物也

治產後日久虛勞發熱不效者三合散物此四君手四

方合和是也

白朮

川當歸

芍藥

黃芪

茯苓

熟地黄 各壹兩

柴胡

人參 各壹兩半

黃芩

半夏

甘草 各陸錢

川芎 壹兩

右為粗末每服壹兩水壹鍾半煎服日三

當歸羊肉湯 治產後雖無疾者但覺虛弱兼心腹

痛

肥羊肉 壹斤去脂水壹斗煮取捌升去肉

當歸 伍兩

黃芪 肆兩 生薑 陸兩

右以肉汁煮三味取貳升伍合分為四服若覺惡

露不盡加桂叁兩惡露下多加芩叁兩有寒加茱

萸壹兩有氣加細辛貳兩有熱加生地黃汁貳合

保命治產婦虛勞不能食十全散 即十全大補湯

產後虛勞

女科

百二十七

十全大補湯

治諸臟虧損氣血俱虛惡寒發熱或自汗盜汗便血吐血或大便不實飲食少思或胸腹作痛口舌生瘡或耳目不明牙齒不固

人參

白朮

白茯苓

黃芪

當歸

熟地黃酒洗蒸焙

白芍藥炒

川芎各壹錢

肉桂

甘草各伍分

右薑棗水煎服

當歸建中湯見前腹痛

雲岐治產後虛損飲食不下四物加建中參白朮

茯苓主之

療產後大虛心腹急痛血氣上搶心氣息乏補益方

黃芪

白朮

當歸

人參

甘草各貳兩

生薑肆兩

先以白羊肉叁斤去膜水

壹斗玖升煮肉取汁伍升下諸藥煮叁升分三服

勞勞大夫產則血氣勞傷臟腑虛弱而風冷客之冷

搏於血氣血氣不能溫於肌膚使人虛乏疲頓致羸

損不平復若久不平復風冷入於子臟則胞臟冷使

久無子

薛前證若血氣虛弱用八珍湯血氣虛寒

用十全大補湯胃氣虛弱用補中益氣湯脾氣虛弱

用六君子湯命門火衰用八味丸肝脾血虛用加味

產後虛羸

女科

百三十八

逍遙散肝脾鬱怒用加味歸脾湯

產寶療產後風虛羸瘦勞弱不生肌肉

黃耆 當歸 芍藥 人參各一分 桂心

甘草 川芎 生薑各肆分 大棗拾貳枚

右九味水柒升煮參升分溫參服

療產後虛勞骨節疼痛頭汗不出

當歸 人參 生薑各貳分 黃芪叁兩

淡鼓叁合 豬腎貳枚 梗米叁合 薤白叁合

右水壹斗伍升先煮豬腎取陸升下諸藥煮取壹升

又方 豬腎壹隻煮入葱豉作臠如常食之

痞悶

郭問產後口乾痞悶者何答產後榮衛大虛血氣未

定食麵太早胃不能消化麵毒結聚於胃腕上熏胸

中是以口乾燥渴心下痞悶醫者不識認為胸膈壅

滯以藥下之萬不得已但服見現丸則愈 陳無擇

評曰產後口乾痞悶未必只因食麵或產母內積憂

煩外傷燥熱飲食甘肥使口乾痞悶當隨其所因調

之可也心煩宜四物湯去地黃加入參烏梅煎若外

傷燥熱看屬何經當隨經為治難以備舉飲食所傷

見現丸却能作効 薛前證若宿食停滯用六君枳

產後痞悶

女科

百二十七

實神麴若因肉食所致更加山查若因魚鱠之類再
加陳皮其物既消而仍痞或反作痛作嘔此脾胃受
傷用六君子湯或燕酸變腐加炮薑作瀉更加升麻
如不應佐以四神丸或間用補中益氣湯 一婦人
食角黍煩渴痞悶腹痛大便欲去不去服消導之藥
不應飲食日減肌體日瘦半年矣余謂此食積為患
用大酒麴炒為末溫酒調服貳錢俄而腹鳴良久仍
下糞而愈 一婦人食魚鮓腹痛患痢諸藥不應
用陳皮白朮等分為末以陳皮湯送下數劑而愈
見現丸

薑黃炒

三稜醋炒

萹澄茄

陳皮去白

良薑

人參

蓬莪茂酒炒各

右為細末用蘿蔔搗爛絞取汁煮麴糊丸如梧子
大每服參拾丸蘿蔔湯下白湯亦可

大抵此病不外乎氣滯血凝
或木山藥清溫脾氣以
兼其效

刺文去白

真薑

人參

薑黃炒

三蘇醋炒

淮參

腹脹

郭產後腹脹滿悶嘔吐不定者何答曰敗血散於脾
胃脾受之則不能運化精微而成腹脹胃受之則不
能受納水穀而生吐逆醫者不識若以尋常治脹止
吐藥治之病與藥不相干轉更傷動正氣疾愈難治
但服抵聖湯則愈
薛前證若敗血傷於脾胃宜用
前方若飲食停於脾宜用六君厚朴若飲食傷於胃
宜用六君子湯大凡損其脾者當節其飲食為善
一產婦患前證或用抵當湯敗血已下前證益甚小
腹重墜似欲去後余謂此脾氣虛而下陷用補中益

產後腹脹

女科

百三十一

氣湯加炮薑溫補脾氣重墜如失又用六君子湯而

安
抵聖湯入生薑半兩焙乾水煎方見胎前腹脹○薛氏云此方最宜用之
局方平胃散加人參亦可

且樂不昧于轉思

婦科

漢書門		
一〇九	二二	二九七
冊	架	函
冊	架	函
冊	架	函

內閣文庫		
三〇	二〇〇	二九七
函	冊	冊
函	冊	冊
函	冊	冊