

ノナリ
 發生部ハ專ラ顔面ニシテ殊ニ上眼窩縁、前額、鼻、口唇等ナリ、若シ顔面ニ甚キ結節ヲ生スルキハ顔貌大ニ變化シ恰モ獅子ノ顔貞ノ如シ故ニ之ヲ獅子顔ト云フ、若シ結節部ノ毛髮脱落スルキハ之ヲ天刑病性脱毛症ト云フ
 第三期即軟化期 堅牢ナル脂化スルカ爲メニ漸々軟化シテ赤色減退シ蒼白色或ハ帶黃灰白色トナリ此レヨリ漸ク吸收セラレテ治癒ニ赴キ或ハ潰瘍ヲ生シテ后茶褐色ノ痂皮ヲ結フ此結節ハ畜ニ顔面ノミナラス四肢ノ伸側、手掌及ヒ足蹠ニモ發スル者ナリ
 第四期即粘膜炎期 病ノ終リニ至レハ粘膜炎ニ變化シ及ホス乃チ顔面ニ生シタル者ハ口腔、鼻腔ヨリ遂ニ喉頭氣管粘膜炎ニ波及シ以テ氣管支加多流等ヲ繼發ス又眼球ニ波及シ結膜、虹彩等ニ

小結節作ルヲアリ此際大抵腸、腸間膜腺、肺、腹膜等ニ結節ヲ作り甚ク衰脱シテ遂ニ斃ル、者ナリ
 (坤)知覺脱失性天刑病 又神經性天刑病 本症ニ於テモ亦初メ赤斑ヲ生シ之ト同時或ハ稍後レテ神經性障害ヲ來ス者ナリ而シテ大抵初メハ肘關節ヨリ末梢部及ヒ坐骨神經走路ニ沿テ知覺過敏トナリ稀ニハ三叉神經等モ過敏トナルヲアリ之ヨリ漸ク知覺脱失ヲ發シ又其部ニ神經痛ヲ發スルヲアリ之ヲ疼痛性知覺脱失ト云フ又運動系障害ヲ發シ諸部ノ筋肉ニ運動麻痺ヲ呈スルニ至ル如此運動麻痺及ヒ知覺脱失セル部ハ種々ノ變化即チ色素欠亡、膚毛脱落、壞疽性水泡、壞疽性潰瘍等ヲ發ス此潰瘍甚ク著キトハ深部ニ達シ漸ク骨關節等ヲ侵蝕シ四肢ノ一部脱落スルヲアリ
 本病ニ罹リタル者ハ凡テ營養不良ナルニ由リ僅微ノ創傷ヲ受

クルモ容易ニ治癒スルコトナシ又麻痺ノ爲ニハ數高度ノ火傷等
 チ致スコトアリ
 以上二種ノ天刑病ハ各自特別ニ發スルハ希ニシテ大抵毎ニ合
 發スル者ナリ
 (預后) 不長ニシテ全治スルハ極テ稀ナリ
 (經間) 甚ク慢性ニシテ六年乃至二十餘年間持續ス
 (治療) 未タ本病ヲ全治セシム可キ藥劑ヲ發見セズ古來砒石劑
 沃土劑、溴素劑、水銀、金銀、肝油、クラーレン及種々ノ酸類ヲ用ルモ皆
 其効ヲ見ス又一時、グルシヨノ油ヲ内外用ニ供スルコトヲ賞用セ
 リ其内服量ハ十乃至三十滴チ一日二三回ニ與フ本邦ニテハ大
 楓子油、七葉樹油等ヲ賞用スルモ亦卓効ナシ其他石炭酸ノ内服
 チ用ルコトアリ必魯加爾、溼、ハ奏効スルカ如シト云フト雖モ未
 ダ十分ナル經驗アラズ

附錄紅斑性狼瘡

ループス、エリテマトイドス

狼瘡ノ一種ニシテ皮膚ニ帽針頭大乃至豌豆大ノ限局性赤斑ヲ
 生シ僅ニ隆起シ其中央部ハ毛髮ノ開口部ニ對シ常ニ密着セル
 上皮ノ鱗癬ヲ生シ中央部ハ赤色ヲ呈スルモ周圍ニ至ルニ從ヒ
 暗赤色トナル者ナリ此斑ハ漸次増大シテ近傍ノ者ト相融合シ
 甚ク大ナル赤斑トナリ而テ強甚ノ癢痒ヲ發スレバ決シテ潰瘍
 チ生スルコトナシ此部ニ存スル皮脂腺ハ凝固セル皮脂ヲ以テ閉
 塞セラレ后期ニ至レバ該腺ハ漸ク萎縮シ眞皮モ亦癩痕狀ニ収
 縮シ上皮剝脫スル者ナリ本症ハ大抵鼻ト頬トニ發スル者ニシ
 常ニ廿歲以后ノ婦人ニ來リ其斑狀鼻梁チ起テ兩頬ニ蔓延シ恰
 モ蝴蝶ノ兩翼チ張ルカ如キ形狀ヲ呈ス又希ニハ頭部、耳部或ハ
 四肢ニ發スルコトアリ此疹ハ多クハ皮脂腺ヨリ發スル者ニシテ
 之ヲ顯微鏡下ニ驗スルニ肥太セル皮脂腺ノ周圍ニ肉芽細胞チ

發生シコノ新生細胞ハ專ラ皮下結組織中ニ位ス本症ハ時トシテ尋常狼瘡鱗狀濕疹圓形禿瘡ニ類似スルヲアリ

(治療) 加里石鹼二分酒精一分ヲ混和シ「フランドル」ヲ以テ之ヲ患部ニ塗擦シ然ル后十%ノ白降汞軟膏ヲ貼スヘシ又苛性加里或ハ石炭酸ト酒精ノ混液(等分)格魯兒亞鉛ト酒精ノ混液(等分)等ヲ以テ之ヲ腐蝕シ或ハ患部ヲ亂刺スヘシ内服ニハ肝油砒石劑及ヒ鐵劑ヲ投スヘシ

皮膚腺病

此病ハ皮膚深層ニ肉芽織ヲ生シ其部ノ皮膚ハ暗赤色ニシテ扁平隆起ヲナシ一定時ヲ經過シテ破潰シ潰瘍トナリ希膿ヲ排泄ス其邊緣ハ剝離シ底面ニハ暗紫色ニシテ不長ナル肉芽ヲ發生ス

(療法) 強壯療法ヲ行ヒ不長肉芽ヲ抓去シ邊緣ヲ切除スヘシ

皮膚結核

本病ハ極テ罕レニシテ皮膚ニ淺小ナル潰瘍ヲ作り底面ハ灰白黃色邊縁ハ不正ニシテ緩慢ニ周囲ニ蔓延ス此症ハ通例内臟結核ノ爲メ死ニ瀕スル際ニ續發スルモノナレハ治療モ亦別ニ施スヲ要セズ

第十章 神經官能的皮膚病

癢症 プルリーツス

諸般ノ皮膚病ハ時トシテ劇甚ノ癢ヲ發スルヲアリ例之ハ濕疹ノ治癒期疥癬痒疹等ノ如シ之ニ反シテ茲ニ論述スル所ノ痒症ハ毫モ發疹ナクシテ癢痒ヲ發スル者ナリ而シテ之ヲ發スル原因ハ未ダ明ナラサレヒ數武雷篤病、糖尿病、胃肝ノ疾患、卵巢或子宮諸病等ヨリ發スルヲアリ其何等ノ關係アリテ發スルヤ尙不明ナリ

(甲) 局處性癢痒症 ハ癢痒一部ニ局發スル者ナリ例之ハ肛門、足
 蹠、大陰唇、陰囊、尿道外口、包皮等ニ發スルカ如シ婦人ニアリテ
 ハ之カ爲ニ精神幽鬱不安コシテ或ハ手淫ニ耽リ或ハ狂情ヲ發
 スル者ナリ其癢痒ニ堪エスミテ之ヲ搔破スルルハ其部ニ濕疹
 或ハ出血、上皮剝脫等ヲ來スアリ

(乙) 汎發性癢痒症 皮膚ノ大部殊ニ四肢ノ伸側ニ癢痒ヲ發スル
 者ナリ

(治療) 著明ノ原因アルルハ之ヲ除キ人工カ、ス鹽ヲ内用セ
 シメ皮膚ニハ麻醉性軟膏ヲ貼ス可シ「ヘブラ」氏ハ全身癢痒ヲ制
 センカ爲メニゴム製ノ衣服ヲ着セシメタリ其他ハ皆姑息法ニ
 シテ冷水澀注法、冷水浴、或ハ曹達浴(一浴中五〇〇乃至一〇〇〇
 ノ曹達ヲ加フ)昇汞浴(一浴中昇汞一〇〇ヲ加フ)ヲ施シ腫ニ局發
 スル者ニハ石炭酸ヲ塗擦シ或ハ左ノ坐藥ヲ挿入セシム

鹽酸莫爾比涅

〇〇一

加加阿酪

二五

右坐藥一個ヲ作り腔内ニ挿入ス

第十一章 寄生物性皮膚病

〇動物寄生性皮膚病

疥癬 スカビエス 又疥癩 俗ニヒゼント云フ

疥癬ハ一種ノ寄生蟲即チ疥癬蟲 アカルス、スカビチーノ刺戟ニ
 由テ發スル一種ノ「エクサエム」ナリ往時醫學ノ未タ開ケサル時
 ニ於テハ本症ヲ分テ眞性仮性ノ二種トシ甲ハ初ヨリ傳染毒ヲ
 有スル者ヲ云ヒ乙ハ他病ノ傍症ト爲テ發シ其終ニ至テ傳染毒ヲ
 ナ醸成シ爰ニ始テ傳染病トナルト云ヒ梅毒疥癬毒疥等種々ノ
 名稱ヲ下スニ至レリ而シテ彼ノ瘡中ニ見ル所ノ細虫ノ如キハ
 傳染毒ノ爲メニ生シタル者ニシテ決シ之カ原因タラスト云ヘ

リ醫學開進ノ今日チ以テ之ヲ見レハ實ニ痴人ノ夢ヲ説クニ異ナラス

疥癬蟲ハ蜘蛛屬ニシテ通常目撃スル所ノモノハ雌蟲ナリ此雌蟲ハ雄蟲ニ比スレハ甚ク大ニシテ長徑三分一密迷幅徑四分一密迷ヲ有ス故ニ肉眼能ク之ヲ視ルヲ得可シ顯微鏡下ニ於テ之ヲ熟視スレハ其形狀恰モ龜兒ニ類シ背ノ周縁ハ波狀ヲナシ背面ニハ不正ノ隆起ヲ呈ハス其全ク發育セル者ハ四對ノ脚アリ雌雄共ニ前ノ二對ハ尖端ニ吸盤ヲ有シ尙第四對ニ吸盤アル者ハ雄蟲ナリ而シテ吸盤ヲ有セサル所ノ脚ニハ必ス長毛ヲ具ヘリ雄蟲ノ大サハ雌蟲ノ半ニシテ通常目撃スル者ニ非ス雌蟲ハ胎内ニ五十個ノ卵ヲ有シ一日毎ニ一個ヲ産ス其卵子ハ八日ニシテ孵化シ子蟲トナリ走行スルニ至ル此子蟲ハ初メハ六脚ナレト第一蛻皮後ニ於テハ二脚ヲ増生シテ八脚トナル此子蟲

ハ疥癬道ノ被蓋ニ存スル小孔ヲ超テ一旦外部ニ出テ爰ニ於テ又速ニ表皮内ニ穿入シ六七週後ニハ生熟シテ生殖機能ヲナスニ至ル

(經過) 今試ニ一個ノ疥癬蟲ヲ取テ皮面ニ放ツトハ暫時所々ニ逍遙シ遂ニ一定部ニ占位シ頭部ヲ下垂シテ皮膚ニ密接シ後脚ヲ直立シテ後体ヲ舉揚シ鉛直ノ方向ヲ以テ直ニ角層ヲ穿テ以テ其中ニ侵入シ凡ソ十五分乃至三十分間ニシテ全体全ク其中ニ潜伏ス其己ニ表皮下ニ至ルヤ速ニ路ヲ斜向スル者ナリ此蟲ハ常ニ粘液層中ニ棲息シテ真皮ノ中ニ入ルヲナシ故ニ其体内毫モ赤血球ヲ有セス然レト衰弱患者ニシテ表皮ノ榮養不全ナル時ハ往々真皮内ニ侵入シ体内ニ赤血球ヲ攝取スルヲアリ故ニ赤血球ノ有無ニ由テ患者ノ健否ヲ卜知シ得ヘシ

疥癬蟲ノ最モ能ク運動スル者ハ子蟲ニシテ次ハ雄蟲次ハ雌蟲

トス

(傳染作用) 疥癬ハ疥癬蟲ノ生育スル爲ニ發スル疾病ナルカ故ニ其傳染スルヤ膿疱及ヒ水泡ニ由ラスシテ必ス虫体ヲ以テス面シテ子虫ハ運動ノ活潑ナルヲ以テ大抵之ヲ以テ傳染ス卵ヲ産スヘキ雌虫ハ常ニ卵道ノ深部ニ潜居スルカ故ニ之ニ由テ傳染スルヲナシ數十年前以前ハ之ヲ觸接性傳染病ニ算入シ以テ其摸範トナセリ此虫ノ運動ハ温度ニ逢テ活潑トナルカ故ニ温所ニ於テ患部ニ觸接スルキハ容易シ傳染スル者ナリ例之ハ同衾或ハ握手ノ際ニ於ルカ如シ

(疥癬虫ノ所在) 此虫ハ身体ノ一定部位ニ棲息ス例之ハ手ニ於テハ指間、腕關節ノ掌面、手掌ノ尺骨側ノ如シ其他婦人ハ乳房生殖器等小兒ハ臀部甚タ希ニハ極温ヲ受サル顔面部等ニ發スルアリ凡テ皮膚ノ軟部ハ傳染シ易キ者ナリ

(徵候) (第一) 患部ニ煩癢ヲ發シ表皮中ニハ炎性滲分泌物ヲ生シテ皮表ニ小蕾疹或ハ水泡ヲ形成シ水泡ハ數日ヲ經レハ乾燥シ上皮剝脱スル者ナリ (第二) 疥癬蟲ハ常ニ皮膚ニ小管ヲ造リ其中ニ潜居ス之ヲ疥癬道ト云フ其長徑ハ種々ニシテ卵道最モ長ク生卵セサル所ノ雌蟲道之ニ次キ子蟲道又之ニ次キ最モ短キハ雄蟲道トス此管狀道ハ直線狀ナルアリ波濤狀ナルアリ角度狀ナルアリ其末端ハ盲端ニ終リ或ハ他部ニ開口ス生卵スル雌蟲ハ且ツ生シ且ツ行テ管道ノ盲端部ニ至レハ遂ニ外出スル能ハスシテ此ニ休止ス卵道ヲ檢スレハ剝脱セル上皮蟲ノ糞屎及ヒ蛻皮横列セル卵等アリ卵道ノ部位ハ疥癬蟲ノ棲息部ニ在テ白色ナルアリ不潔物ノ爲メ暗色トナルアリ或ハ斑点狀ノ線ヲ爲スアリ (第三) 皮膚ノ過敏ナル者ハ蟲ノ刺戟ノ爲ニ透明ノ水泡變シテ膿疱トナリ甚キハ大ナル潰瘍ヲ形成シ膿汁ヨリ成ル所ノ痂皮

チ以テ被ハル〔第四〕煩癢ノ爲ニ強ク癢爬シテ蓄疹ノ尖端ヨリ出血シ之カ爲ニ慢性トナル者ハ非常ノ癢痕ヲ結ヒ或ハ并行セル爪痕ニ色素沈着ヲ殘スヲアリ搔痒ノ原理ハ未ダ明説ナシト雖モ恐クハ疥癬蟲ノ刺戟性液ヲ分泌スルニ由ル者ナラシ一説ニ由レハ虫体異物トナリ皮膚ヲ刺戟スルニ由ルト云フ然レモ試ミニ微細ノ銀朱末ヲ取テ皮膚ニ強擦シ或ハ之ヲ皮下ニ入ルモ疥癬ノ如キ癢疹ヲ發セサルヲ以テ之ヲ推セハ此説ノ不當ナルヲ看破スルニ足ル又疥癬蟲ノ死セル者ヲ破潰シ其液ヲ皮下ニ注入スルモ尙能ク癢疹ヲ發スルヲ以テ考フレハ刺戟液ヲ分泌スルニ原スルカ如シ

〔診斷〕 疥癬ハ以下五種ノ診法ヲ以テ緊要トスア〔甚キ癢疹ヲ發ス特ニ夜間癢温ニ遇フキニ甚シイ〕部位ハ大抵一定シテ特異ナリウ疥癬道ノ存在ニ傳染ノ模様及已往症オ疥癬蟲ノ存在

疥蟲ヲ穿鑿セソニハ卵道ニ就テス可シ即チ其末端ヲ針ニ由テ開鑿スルキハ微細ナル灰白色ノ斑点トナリテ現ハル、者ナリ玆ニ得タル者ハ凡テ雌虫ナリ雄虫ヲ見ント欲セハ蓄疹若クハ近部ニ存スル隆起ヲ取テ檢ス可シ

〔治療〕 此症ノ治法ハ近時ハ殆ト一ニ歸セリ其往時賞用セシモノハ左ノ如シ

〔第一〕器械的療法 「コルザカ」島ニ於テハ針ヲ以テ虫体ヲ刺殺シ支那ニ於テモ同法ヲ賞用シタリ其他俗間ニ行ハル、砂粒或ハ食鹽ノ摩擦ノ如キモ亦器械的ノ殺除法ナリコレ皆患者ニ不快ヲ與ヘ且不確實ナルヲ以テ良法ニ非ス

〔第二〕藥劑的療法 古ハ種々ノ硫黃含有物ヲ賞用セリ例之ハ硫黃軟膏或ハ石灰炭酸加里等ニ硫黃ヲ混セル者ノ如シ然レ其効確實ナラサルノミナラス却テ之カ爲ニ炎ヲ惹起スノ恐レアリ

其處方左ノ如シ

硫黃二分 石灰一分 常水十分

右煎沸シテ濾過シ一日二回患部ニ貼ス皮膚ニ炎
徴アレハ之レヲ忌ム

皮膚ノ過敏ナル者ニハ硫黃軟膏ヲ用フ其他ウイルクソン氏
軟膏ヲ用ヒ又種々ノ揮發油例之ハ帝列并油、過泥子油、榜丁等ヲ
用ヒタルニ皮膚ノ刺戟甚ク且容易ク揮發スルカ故ニ其効力從
テ僅少ナリ

本症ニ於テ奏効確實ナル藥劑ハ無刺戟ニシテ且速ニ疥癬虫ヲ
殺滅シ容易ク揮發セサル者トナス此目的ニ適合スル者ハ蘇合
香及ヒ百露拔爾撒母ナリ就中百露拔爾撒母ハ悉ク上記ノ三性
ヲ具ヘリ而シテ此藥劑ハ蕾疹及水疱疹ニ功ナキモ其原因タ
疥虫ヲ鑿殺スルヲ以テ間接ニ偉功ヲ奏スル者ナリ其用法ハ臨

臥ノ前ニ入浴シ(表被ヲ柔軟ニスルノ効アリ)或ハ浴セシテ其
十五瓦ヲ十分患部ニ塗擦ス可シ(頸部以下全身ニ塗擦スルヲ可
トス)若シ其液濃厚ニ過ルキハ酒精ヲ以テ稀釋ス可シ塗擦ハ十
分ニ行フキハ一回ニシテ治ス可キモ若シ一部ヲ殘スヲアレハ
再ヒ之ヨリ蔓延スルヲ以テ尙一回行フヲ可トス茲ニ注意ス可
キハ前衣ヲ脱シテ他衣ト交換セシムルニ在リ蓋シ衣服ハ其傳
染ヲ媒介スレハナリ

衣服ノ消毒ハ攝氏八十乃至九十度ノ熱ヲ施スカ或ハ冷所ニ放
置スルヲ二日間ナレハ疥蟲ハ大抵死亡スル者ナリ蘇合香ハ百
露拔爾撒母ヨリ濃厚ナルカ故ニ酒精或ハ脂油ヲ以テ稀釋ス可
シ

〇處方

蘇合香八分 精製酒精二分 阿列布油一分

蘇合香ハ常ニ百露拔爾撒母ヨリ多量ヲ要ス之レ蘇合香ハ其主
効成分タル「スナロール」一%及「スナチン」(桂酸スナロール)ヲ有
シ且沸騰点ハ百四十八度ニシテ百露拔爾撒母ハ其成分彼ヨリ
多ク「スナロール」ノ他「シンナモン」(桂酸ベンツォル依的兒)ヲ含ミ
且沸騰点ハ三百度ナリ

現今我邦ニ於テハ東雲草ノ浴湯ヲ施シテ効アリト云フ者アリ
(附録)動物疥癬 動物ニモ人類ニ於ケルカ如ク一種ノ疥癬アリ
即多ク牛、羊、象、馬、犬、猫等ニ見ル者ニシテ其皮膚變化及疥癬虫モ
人体ニ來ル者ト同一ナリ此虫ヲ人体ニ附接スルキハ一時皮膚
ニ炎及ビ甚キ刺戟ヲ起ス者ナリ然レ蕃殖スルノ性ナシ

イキシードス

此虫ハ和名ヲ詳ニセサレモ恐クハ犬ニ於ケル犬虱、牛ニ於ケル
牛虱ト同種類ノ者ナラン其大サ二乃至三密迷ニシテ四對ノ脚

ヲ具ヘ常ニ樹上ニ栖息スル者ニシテ樹下ヲ通過スル動物アレ
ハ忽チ其皮膚ニ附着シテ以テ血液ヲ吸收シ増大シテ豌豆大ニ
至ル

「イキシードス、リチーヌス」ハ「イキシードス」ノ一種ニシテ常ニ犬
或ハ牛ニ寄生シ又人体ニ來ルコトアリ其來ルヤ堅ク皮膚ニ附着
シテ脱落シ難シ故ニ之ヲ除去セント欲セハ格魯々保兒母、亞兒
箇保兒或ハ帝列並油ヲ塗擦ス可シ世俗ニ所謂(ダニ)ナル者ハ蓋
シ之レナラン

デルマニス、アヴィウム

多ク雞類殊ニ鴿ノ巢内ニ住シ夜ニ至レハ鳥皮ニ附着シ其血液
ヲ吸收スル者ナリ又人体ニ附着スルキハ癢痒ヲ發スル所ノ疹
ヲ生ス

アルガスマルシクス

波斯ニ多ク住セル扁平梨子状ナル帶赤茶褐色ノ虫コシテ背面ニ白色ナル數多ノ圓形凹窩ヲ有シ視器ヲ具ヘス其体ハ四乃至六密迷ノ長サアリ常ニ家壁ノ間隙ニ占居シ時々出テ、人体ヲ襲フ埃及國ニ亦此虫アリト云フ

波斯人ノ説ク所ニ由レハ此蟲ハ性光明ヲ嫌忌シ晝ハ潜伏シテ家壁ノ間隙ニ在リ夜ハ出テ、臥褥ニ來リ以テ人体ヲ襲フ其甚シク蕃殖スル時ハ全家悉ク之カ巢窟トナリ住居スル能ハサルニ至ル其驅蟲法ニ至テハ甚ク困難ニシテ家屋ト共ニ之ヲ燒キ盡スニ非レハ其蹤ヲ絶ツ能ハス然レ其性光明ヲ嫌フヲ以テ燭然タル燭火ヲ点シテ姑息ニ其害ヲ避ルヲ得ルト云フ

アルガス、レフレッキスザス

此虫ハ鳩体ニ寄生シ之ヨリ人体ニ來ルコトアリ

トロンビギユーム、アウツムナール

關節虫ニ寄生セル黄色或ハ赤色ノ蟲ニシテ三對ノ脚ヲ有シ殆ト楕圓形ヲナス其人体ニ來ルヤ甚キ皮膚發疹ヲ生ス歐洲ニ於テハ六月乃至八月ノ候專ラ多ク人体ニ來ルト云フ

面皰蟲 アカルス、フォリクロズム

此蟲ハ皮脂腺ノ内部即チ面皰中ニ栖息スル者ニシテ歐洲ニハ甚ク多キモ本邦ニハ甚ク少ナキ者ナリ而シテ毫モ人体ニ障害ヲ爲サス皮脂ヲ面皰中ヨリ嘔出シテ顯微鏡下ニ檢スルキハ容易ク見得ル者ナリ

蟲 ペダクルス

(一) 頭虱 九日ニシテ孵化シ十八日ニシテ成育シ以テ生殖作用ヲ營ムニ至ル其一回頭髮ニ付着スルキハ數多ノ卵ヲ產生シ甚シク蕃殖シ不快ノ感ヲ與フル者ナリ

(療法) 日々髮ヲ梳リ以テ其虱ヲ去ルキハ七日間余ニシテ除却

シ得可シ又蘇合香、百露、拔爾撒母、及ニ揮發油ヲ用ヒテ功アリ、水銀軟膏モ亦功アリト雖モ動モスレハ濕疹ヲ起スノ恐レアリ故ニ可及的用途ナルヲ可トス

(二) 耻虱 一乃至一、二密迷ノ長サヲ有スル扁平ノ虫ニシテ三對ノ脚ヲ有シ脚端ニ銳爪アリ之ヲ以テ強ク皮膚ニ付着ス專ラ陰部ノ毛髮部ニ來リ又眉毛ニ生ス之ヲ生スレハ甚タ不快ノ癢痒ヲ發シ搔抓スレハ濕疹ヲ生ス

(療法) 一%ノ酒精石炭酸溶液ヲ塗敷スルヲ最モ佳トス又水銀軟膏、百露、拔爾撒母、石炭油ヲ用ルモ可ナリ

(三) 衣虱 虱族中最大ナル者ニシテ三乃至五密迷ノ長ヲ有シ三對ノ脚ヲ具フ名ノ如ク衣服ノ襤褸間ニ棲息シ時々皮膚ニ至リテ血液ヲ吸收シ以テ痒感ヲ發セシメ屢々甚シキ皮膚炎ヲ起ス

(療法) 衣服ヲ清潔ニスルヲ最良トス而シテ衣服襤褸間ニ卵子ヲ附着スルヲ以テ五六十度ノ熱湯中ニ其衣ヲ浸シ以テ全族ヲ盡滅ス可シ

砂蚤 プロツキス、ペチトランス又サ
ルコプロシルラ、ペチトランス

亞米利加洲熱帶地方ノ砂中ニ住シ人体就中婦人ノ足趾ニ能ク來リ皮膚ニ侵入シ甚キ潰瘍ヲ形成ス其虫ノ大サ一乃至一、二五密迷ナリ

蚤 プロツキス、イリダンス

通常見ル所ノ蚤ナリ故ニ別ニ記載スルヲ要セス
チメツキス、レクツラリウイス、又ワシ
チエ

古來本邦ニハ全ク存在セサル者トセシモ近時東京鎮臺ノ兵卒中ニ之レヲ見タリ

蚊 クレンツキス、ビビエンス

尋常目撃スル蚊ナリ

フイテリア、メヂノイジス

下肢ノ皮膚陰囊及ヒ眼瞼結膜ニ來リ炎ヲ起スナリ

○植物寄生性皮膚病

癩風 ピツチリアジス、ヴェルシコロル
又クロアスマ、バラシナクム

本症ハ一種ノ寄生物即チ癩風黴ニ由テ發スル者ニシテ彼ノ單ニ「シロアスマ」ト稱スル子宮病或ハ妊娠等ニ由テ皮膚ニ色素沈着スル者トハ大ニ異レリ

癩風ハ一ニ之ヲ汗斑ト云ヒ俗ニ呼ンテ癩ナマヅト稱スル者ニシテ皮膚ニ帶黃色或ハ茶褐色ノ斑ヲ生シ漸次周方ニ蔓及シテ大斑トナルカ若クハ其近部ニ生セル所ノ同斑ト混同シテ其領地ヲ擴大ス而シテ斑部ノ表被ハ粉屑狀ニ剝脱シ癢痒ヲ發スルノ外体軀ニ障害ヲ爲スナシ

(占位) 專ラ胸腹希ニハ四肢ニ發ス然レ露出セル顔面等ニ來ル

「ナシ」此症ハ常ニ黴菌ノ傳染ニ由テ發スル者ナリ皮膚ニ發汗シ易キ者ハ凡テ此寄生植物發生シ易シ故ニ軟肺癆家ニ發ス

往昔此症ハ肝ノ諸病或ハ月經不調等ニ由テ來ルト稱セリ是レ癩風ト通常ノ「シロアスマ」ト混同セルニ由ルナリ

癩風ハ下等ノ黴菌ニ由テ發スル者ニシテ其「ピルツ」チ癩風黴ニクロスポロン、フルフル(千八百四十五年發見)ト云フ此「ピルツ」ハ甚細小ニシテ彎曲スル所ノ菌根ヲ具フ菌絲ハ凡テ連節ヲ有セス又多クハ分岐セス只大ナル者ノミ菲薄ノ中隔ヲ有セリ故ニ尤發育ノ下等ナル者トス

(一) 說ニ由レハ皮膚病ノ黴菌ハ總テ同一ナル者ニシテ只其發育ノ度異ルノミナリト云ヒ又一說ニ由レハ全ク異種ノ者ナリト云フ此問題ヲ判決ス可キ尤モ單簡ナル試驗ハ癩風黴ヲ取テ南

瓜、桃、梨實等ニ種植シ發育セシムルハ須臾ニシテ數多ノ黴菌發育セルヲ見ル之ヲ以テ考レハ皮膚病ノ「ピルツ」ハ皆同一ナルカ如シ然レハ大氣中ニハ諸種ノ「スポーレン」ヲ有シ癩風黴ノ發育スル際ニハ之ト同ク發育ヲ遂クルヲ以テ未タ判然此問題ヲ解釋スルヲ能ハス此書ニ於テハ各個異種ノ「ピルツ」トシテ之ヲ論述ス可シ

此「ピルツ」ハ菌絲ノ外小ニシテ圓形ナル種子ヲ具フ此種子ハ大凡ソ五乃至七ミクロミリメートルノ直徑ヲ有シ通常一部ニ簇集セリ或説ニハ集合セル種子ハ特別ナル膜ヲ以テ被ハルト云フモ未タ詳カトラス

「ピルツ」ヲ試験セシムルハ患部ノ表皮ヲ刀刃ニテ剝離シ載物硝子板上ニ安シ加里滷汁ヲ滴下シテ顯微鏡下ニ驗シ或ハ豫メ患部ニ發泡ヲ貼シ其水胞ノ衣膜ヲ取テ顯微鏡下ニ檢スルハ明ニ

其「ピルツ」ノ侵入セルヲ見ルヘシ

此「ピルツ」ハ表皮ノ尤上層ニ占位シ往々汗腺排泄管開口部ノ周圍ニ集リ決テ之ヨリ内部ニ侵入スルヲナシ其種子ハ好テ毛嚢ニ入り尙毛幹ニ侵入セルヲアリ此症ノ黃色ヲ呈スルハ上皮細胞間ニ集合セル「ピルツ」ニ由ル者ニシテ別ニ色素ヲ沈着セルニ非ス

(治療) 先上皮ヲ柔軟ニシ然後「ピルツ」ヲ殺ス可シ上皮ヲ柔軟ナラシムルニハ強ク加里石鹼ヲ塗擦シ或ハ加里石鹼精ヲ用フヘシ「ピルツ」ヲ殺スニハ十%ノ白降汞軟膏〇.二%昇汞液或ハ軟石炭酸精ヲ塗擦スヘシ殊ニ功アルハ「グリツファン酸軟膏」一分ト四分ノ脂肪ヨリナリ又「吳亞末」ヲ用ルモ可ナリ乃チ「吳亞末」ヲ醋ニ和シテ糜粥樣泥ヲ作り患部ニ貼スヘシ是レ「吳亞末」中ニハ「クリサルビン」ト稱スル効分ヲ有スルニ由ル其他撒酸甘油軟

膏ヲ用フルコアリ

白禿風

チチア、ファゾ、オザ

本症ニハ種々ノ名稱ヲ下ス者ニシテ例之ハ「ポルリス、ファゾ、オザ」或ハ「ポルリス、デカルヴァンス」等ノ如シ

白禿風ハ蒼白若クハ硫黄色ノ痂皮ヲ作り其中ニ「ピルツ」ヲ有ス此痂皮ハ圓形ニシテ乾燥シ表面ハ凹陷シ内面ハ隆起シ周圍ハ皮膚面ヨリ稍隆起ス此痂皮ハ數密迷ヨリ一仙迷ノ直径ヲ具ヘ鼠矢様ノ臭氣ヲ有ス痂皮下ニハ僅ノ上皮ニテ被ハレ容易ニ出血スル所ノ凹陷部アリ或ハ潰瘍トナリクル眞皮ヲ露出スルコアリ或ハ痂皮數多相混同スルコアリ注意シテ痂皮ヲ檢スレハ上面及ヒ下面共ニ上皮ヨリ被ハレ上皮細胞、不潔ナル異物、及ヒ無數ノピルツ等ヨリナレリ
此「ピルツ」ハ千八百三十九年「シヨントライニ」氏ノ發見ニ係ル故

ニ之ヲ「アヒヨリオン、シヨントライニ」或ハ「オイザウム、シヨントライニ」ト云フ是レ即チ白禿風徴ナリ其菌絲ハ分歧シテ非薄ナル中隔ヲ有スルモ連節ナシ故ニ前者ヨリ少ク發育セル者ナリ本症ハ癢痒ヲ發スルヲ以テ周圍ニ水泡或ハ膿疱等ヲ生スル者ナリ

(占位) 多クハ頭毛部ニ占居ス此「ピルツ」ハ毛囊内ニ達シ皮脂腺ノ開口部ニ至リ之ヨリ進行スルコトナシ而シテ其部ノ毛髮ハ乾燥シ甚ク脆弱トナリ毛囊内ニハ菌種及ヒ菌絲ヲ含ム殊ニ十%ノ腐蝕加里ヲ注シキハ容易ニ認メ得可シ之ヲ發スル部ノ毛髮ハ營養ヲ失ヒ中部ニ於テ折斷スル者ナリ若シ毛囊全ク萎縮スルキハ治ス可ラサル禿頭トナル時トシテハ爪甲ニ發スコレ爪甲ヲ以テ頭部ノ痂皮ヲ抓破シ此時ニ乘シテ其「ピルツ」ノ傳染スルニ由ルナリ其他顔面、肩胛、背部、臍部、生殖器等ニ發生スルコトアリ

此症ハ甚ク蔓延シ易シ何者乾燥セル痂皮容易ニ飛散スルヲ以テナリ又人工的ニ種接スルモ發生セシムルヲ得ヘシ人体ノミナラス鼠兔雞等ニモ發スルヲアリ

(診斷) 甚ク容易ナレ他ノ痂皮ヲ形成スル者ト區別ス可シ乃チ小膿疱疹濕疹等ナリ其辨別ハ臭氣ノ異ルト顯微鏡下ニ「ピルツ」ヲ發見スルトニ由ル

(治療) 持長シテ治療スルヲ要ス(第一)脂油ヲ以テ痂皮ヲ軟化シテ除去シ然後毛髮ヲ可及的短ク剪斷シ石鹼ヲ以テ清淨シ(第二)錫子ヲ以テ患部ノ毛髮ヲ除去シ甚ク蔓延シタル者ハ「ペヒカツペ」ヲ用ヒ一時ニ數多ノ毛髮ヲ除去シ然後遺殘セル毛髮ヲ「チリエン」錫子ヲ以テ除去ス可シ(第三)〇・二%昇汞ノ亞爾個保兒溶液ヲ塗擦シ或ハ久ク白降汞軟膏ヲ塗擦シ若クハ左ノ藥劑ヲ貼ス

〇處方

石炭酸 二〇 甘油 酒精 各一〇〇

右塗擦藥トス

又三四%ノ石炭酸油ヲ塗擦スルモ可ナリ毛髮ヲ除去スルニハ十四日ヲ隔テ三四回行フ可シ

毛髮ヲ除去ス可キ所ノ化學的物質乃チ脫毛藥ハ必要ノ者ニ非ス只膚面ニ於テ毛髮ヲ荒蕪スルノミニシテ尤緊要ナル「ピルツ」ノ存在スル毛髮ヲ荒蕪スルコトナケレバナリ又瓜ニ生ゼシモノニハ昇汞コロシウムヲ塗布スルニ

寄生性匭行疹 ヘルペス、バラシナシス

匭行疹トハ一部ニ生セル發疹漸々近傍ニ匭匭蔓延スル者ヲ謂フ故ニ此名ハ發疹ノ本体如何ニ關セス只其性質ニ由テ下セル者ナリ然レモ現今ハ種々ノ水泡疹ニ此名ヲ附セリ例之ハ角膜

匍行疹、口唇匍行疹等ノ如シ寄生性匍行疹ハ一種ノ植物寄生性皮膚病ニシテ其寄生物ヲトリヒヨフイットン、トゾーラソツト云フ

(徴候) 皮膚ニ赤色ノ圓斑ヲ生シ歷然トシテ健全部ト界シ漸々以テ近圍ニ向テ蔓延シ中心部ニ於テハ徐々ニ褪色シ周圍ニ於テ紅輪ヲ殘ス此輪ハ稍皮膚ニ隆起シ赤色ヲ呈シ時トシテハ數個同時ニ發生シ互ニ混同スルコトアリ輪ノ内部ハ單ニ上皮剝脱ニ止リ蕾疹或ハ水胞若シハ膿疱ヲ生スルコトナリ故ニ種々ノ名稱アリ乃チ水疱ヲ有スルキハ之ヲ水胞性植物寄生性匍行疹ト云フカ如シ

此疹ハ縱令水胞或ハ膿疱ヲ生スルモ決シテ破潰スルコトナク内容乾燥シテ治スル者ナリ其頭部ニ生スルキハ之ヲ刺頭性匍行疹ヘルペス、トゾーラソツト云ヒ又圓形ヲ呈スルヲ以テ之ヲ

圓形禿頭ト云フ之ヲ生スルキハ毛髮ハ圓形ニ脱落シ初メハ毛根部ニ於テ破折スルモ後ニハ其全部脱落スル者ナリ此疹ハ無毛部或ハ爪甲ニモ生スルコトナリ

(甲) 圓形禿頭 一ニ頭部匍行疹ト云フ然レ顔面匍行疹ト對稱スルノ誤ヲ生スルヲ以テ之ヲ頭部寄生性匍行疹ト稱スルヲ可トス此疹ハ頭毛部ニ圓形赤色斑ヲ生シ鱗癬蕾疹或ハ水疱ヲ以テ之ヲ被包シ毛髮ハ其部ニ於テ乾燥シ皮膚ヲ隔ル一二密迷ノ部ニ於テ破折シ後ニハ全部脱落シ之カ爲ニ禿頭ヲ生ス此疹ハ他部ノ毛髮部ニモ亦發スル者ナリ

(區別診斷) 「アンアチエル」ト區別ス可シ此疹ニ於テハ皮膚ハ赤色ニシテ毫モ變化ナク只毛髮ノ脱落セルノミ

(乙) 鼠蹊匍行疹 頑癬又ハ輪癬ト稱シ世俗ニ之ヲ(インキン)ト謂フ此疹ハ赤色ニシテ鱗癬若シハ水疱或ハ蕾疹ヲ以テ被包セル

圓斑又ハ圓輪ニシテ陰囊ニ初發シ以テ漸々大腿或ハ鼠蹊部ニ蔓延ス或人ハ之ヲ有邊性濕疹ト名ケタリ

古ハ此疹ハ内陷シテ貴重ノ内臟ニ轉移スル性アリト云ヘリ

(丙)爪甲匄行疹 ハ頭部ノ匄行疹ヲ抓把スルニヨリ生スル者ニシテ爪甲ハ縦線ヲ生シ破裂シ易ク終ニ組織分離シ爪甲組織間ニ白色粉末狀ノ「ピルツ」ヲ見ル(トリヒヨフィットン、トゾーラノス)此疹ハ爪甲ニ局限シ他部ニ蔓延スルコトナシ

「トリヒヨフィットン」トゾーラノス「ハマルムステン」氏ノ發見スル所ニシテ前種ノ者ヨリ能ク發育シテ節ヲ有シ枝別シタル菌糸ト菌種トヲ有シ菌子ハ血球ノ三分一大ニシテ各所ニ散在ス此寄生物ハ毛囊開口部ニ存在シ漸々毛囊ト毛根間ニ入り遂ニ毛根中ニ達シ毛發之カ爲ニ破潰シ其纖維分離スルニ至ル毛髮脱落シ其部ノ毛球荒蕪スルキハ毛髮ハ再發スルコトナシ

此疹ハ數々犬猫牛馬等ニ生シ是ヨリ人体ニ達スルコトアリ而シテ皮膚ノ濕潤部ニ發スル者ナリ

(治療) 毛髮ナキ部ニハ白降汞軟膏或ハ〇、二乃至〇、五%ノ昇汞液或ハ二乃至四%ノ石炭酸溶液ヲ用ヒ軟膏ノ効アル者ハ「グリソフアン酸、吳亞末等(醋ト等分ニ混シテ泥トス)」リ水楊酸甘油軟膏モ亦効アリトス

毛髮部ニ於テハ先ツ毛髮ヲ剃去シ(拔去スルヲ最可トス)昇汞石炭酸或ハ稀硫酸ヲ塗布シ爪甲匄行疹ニ於テハ爪甲ノ尖端ヲ切除シアルコール或ハ〇、二%ノ昇汞水或ハ二%ノ亞爾個保兒性石炭酸中ニ浸スモ可ナリ

皮膚病各論 尾

附 録

ヘブラ氏軟膏

單鉛硬膏

オレフ油

各等分

右混和シテ塗擦ニ供ス

ウイルクキンソン氏軟膏

テール

硫黃華

各二十瓦

加里石鹼

各四十瓦

家猪脂

右混和

タニンエルクソチン軟膏

タニンエルクソチン

二瓦

ヘブラ氏軟膏

二十瓦

右混和

硝酸銀軟膏

硝酸銀

〇六

單軟膏

三〇〇 (二%ノモノ)

右混和

硫灰水

硫黃

一分

石灰

二分

水

二十分

右混合

亞砒酸丸

亞砒酸

〇三

甘草末

各適宜

甘草熬

右六十九トナシ一日三回一粒ヅ

サルサ根煎

サルサ根

一〇〇〇

旃那葉

一〇〇〇

右煎出シテ一八〇〇ノ液ヲ取り一日ニ用ニ

脱毛藥

第一硫化加爾叟母液或軟膏(十%)

第二ルスマー一分 石灰四分

右炭酸加里飽和液二分ヲ以テ煮沸シ之ヲ毛髮部

ニ貼ス久時之ヲ貼用スルハ皮膚ヲ刺戟ス故ニ

暫時ニシテ除去スベシ「ルスマー」ハ印度地方ニ使用

スル色素ニシテ主ニ硫化砒素ヨリナルモノナリ

第三ルスマー一分 石灰九分

卵黄ニテ泥ヲ作り木篋ヲ以テ毛髮部ニ貼シ五

分時後ニ除去スベシ

昇汞コロジウム

昇汞

一分

コロジウム

二十分

右混和

石炭酸ワゼリン

石炭酸

二分

ワゼリン

三十分

右混和シ癢痒ニ用ユ

昇汞浴

曹達浴

一浴中ニ五乃至十瓦ノ昇汞ヲ含ム

一浴中三百乃至五百瓦ノ曹達ヲ含ム

撒酸甘油軟膏

澱粉

二分

溜水

一分

右攪和シ甘油十分ヲ加ヘ重湯鍋中ニ煮テ製ス

黄バスター

沉澱硫黃

里斯林

精製酒精

炭酸加里

硫酸依的兒

百露拔爾撒母
右等分ヲ混攪シ撒糸ニ浸シテ貼付ス

ヘブラ氏亞爾加里石鹼精
綠色石鹼 一〇〇〇
精製酒精 五〇〇
右混和シ二十四時間放置シ之ニラバンドラ丁幾
五〇ヲ加フ

亞鉛華軟膏
亞鉛花 一分
玫瑰軟膏 又ハ單膏 九分
右混和シ製ス

亞砒酸軟膏
亞砒酸 三〇

鉛糖軟膏

- 甘草 七、五
- ケレオソルト 〇、五
- 草膏 二五、〇
- 右狼瘡ヲ腐蝕スルニ用フ
- 鉛糖 七、五
- 龍腦 〇、五
- 苦扁桃油 五〇、〇
- 黃蠟 二五、〇
- 右混和ニ濕疹ニ貼用ス
- 硫黃軟膏
- 硫黃花 三分
- テイヤ 三分

硼酸軟膏

- 白堊 二分
- 綠色石鹼 六分
- 家猪脂 六分
- 右混和ニ四十八時間ニ四回塗布ス
- 硼酸 五〇乃至二〇、〇
- 家猪脂 一〇〇、〇
- 右混和
- 白降瀝軟膏
- 白降汞 一分
- 家猪脂 九分
- 右混和
- 石炭酸白降汞軟膏

石炭酸 〇三

白降汞 〇二

玫瑰軟膏 三〇〇

石混和エクサチエーマニ用フ

石炭酸酒精液

石炭酸 一五

稀酒精 三〇〇〇

甘油 五〇

右洗薬トシ痒疹ニ用フ

麻醉性塗擦薬

格魯々保兒母


龍腦

阿片丁幾 各一〇〇

亞爾個保兒 七〇〇

右疼痛或ハ痒痒アル發疹ニ塗敷ス

附錄尾



明治廿年一月十九日出版御届
同年三月三十日刻成出版



編輯人 鳥取縣平民 遠藤大太郎

京都府下下京區第廿五組
天神町第拾番戶



出版人 京都府平民 若林茂一郎

京都府下上京區第卅組
晴明町第拾番戶



發兌書肆

東京

東京日本橋區馬喰町貳丁目 島村利助

東京本郷春木町三丁目 同支店

東京神田區西福田町壹番地 伊藤誠之堂

東京日本橋通三丁目 丸家善七

大坂南區心齋橋筋南一丁目 松村九兵衛

大坂心齋橋南久太郎町四丁目 森本專助

大坂

若林春和堂發兌大略目

- 胥乙邊氏常用方鑑 江阪秀三郎譯 定價金八拾五錢 全一冊
- 胥乙邊氏脚氣病論 神戶文哉校 定價金八拾五錢 全一冊
- 精神病約說 神戶文哉譯 定價金六拾五錢 同三冊
- 袖醫療必携 新宮涼園譯 定價金三拾錢 同三冊
- 袖配劑方例 竹岡友仙編輯 定價金壹圓廿五錢 同三冊
- 藥物極量表 江阪秀三郎譯 定價金拾錢 同三冊
- 女子解體ノ圖 土山武邦著 定價金拾貳錢五厘 同三冊
- 病尿辨 河內周平著 定價金卅錢 同三冊
- 局部打診圖說 秋吉耕齋譯 定價金八拾錢 同三冊
- 工藝雜誌 毛利文啓譯 定價金五錢 同三冊
- 京都醫事雜誌 每月一冊發兌 定價金五錢 同三冊

○ 防 雷 鐵 記	明石博高口述	定價金 五 錢	全一冊
○ 皮 膚 病 纂 論	遠藤大太郎編輯	同 金	全一冊
○ 獨 乙 語 階 梯	原口隆造編輯	同 金 廿 八 錢	同一冊
○ 獨 乙 文 典 畧	同	同 金 四 拾 五 錢	同一冊
○ 獨 乙 小 文 典	同	同 金 五 拾 錢	同一冊
○ 袖 醫 學 字 彙	新宮涼園譯	豫約價 金貳圓廿五錢	同一冊
○ 珍 畫 袖 珍 獨 和 辭 書	小野操先生纂著	價 金 卅 六 錢	同一冊
○ 插 入 袖 珍 獨 和 辭 書	橋本龜太郎編輯	價 金 卅 六 錢	同一冊
○ 和 文 獨 逸 作 文 獨 案 內	川上正光校閱	必 讀 獨 乙 會 話 案 內	同一冊
○ 通 譯 獨 乙 會 話 案 內	百溪 隣纂譯	定價金 八 拾 錢 郵 稅 共	同一冊
○ カ ド リ 一 氏 文 典 原 書	同	同 金 六 拾 錢	一 冊
○ シ ャ ッ プ 獨 逸 文 典 獨 案 內 馬 島	珪插譯	同 金 八 拾 五 錢	一 冊
○ エ ル 氏 獨 逸 文 典 直 譯	同	同 金 四 拾 錢	一 冊
○ ヲ エ ル 氏 萬 國 史 直 譯	同		

○ ヘ ス テ 第 貳 讀 本 獨 案 內	馬島珪插譯	同 金 八 拾 錢	一 冊
○ 同 第 四 讀 本 直 譯	大賀宗順共譯	同 金 七 拾 錢	一 冊
○ 獨 和 字 書	紙數七百餘ヘーン語數六萬言		全一冊
○ 獨 逸 語 書 取 早 學	馬島珪之助編纂	定價金 五 拾 錢	全一冊
○ 英 語 解 話 案 內	ルードルスレマン校閱	定價金 廿 八 錢	全一冊
○ 通 辨 解 話 案 內	大瀬房太郎著	定價金 廿 八 錢	全一冊
○ 英 語 解 話 案 內	英ハナムン氏閱	定價金 五 圓	全貳冊
○ 產 科 學	吉田顯三講述	價 金 廿 三 錢	全一冊
○ 日 本 藥 局 方	今村 編 纂	豫約價 八 拾 五 錢	全一冊
○ 歐 米 各 附 分 量 表	賀部幹 合 纂	價 金 貳 圓 八 拾 錢	全貳冊
○ 國 對 照 日 本 藥 局 方	賀陽今村 合 纂	定價金 卅 錢	全一冊
○ 和 漢 洋 藥 品 異 名 全 集	渡邊 遂 編 纂	定價金 廿 八 錢	全一冊
○ 製 法 新 書	蘆田東雄編輯	正價金 廿 八 錢	全一冊
○ 製 法 秘 訣	法學士渡邊安積編輯	定價金 壹 圓	全一冊
○ 羅 馬 法	鈴木敬信抄譯	同 金 壹 圓 五 拾 錢	全一冊
○ 代 數 教 授 書	同		

- 物理學 飯盛挺造譯 同 金三圓九拾五錢 全三冊
- 有機無機化學 丹波敬三譯 同 金五圓 全四冊
- 醫科全書解剖論 大學醫學部 同 金五圓六拾五錢 全廿七冊
- 永松氏生理學 永松東海纂述 同 金三圓拾錢 全二冊
- 病理各論 三宅秀著 同 金六圓 全十二冊
- 外科各論 佐藤進講義 同 金八圓八拾錢 全十八冊
- 新纂藥物學 樞村清德編輯 同 金貳圓 全七冊
- 昆氏產科學 長谷川纂合譯 同 金貳圓廿錢 全一冊
- 歌氏眼科學 石川清忠 同 金貳圓廿錢 全一冊
- 衛生概論 甲野柴譯 同 金貳圓廿錢 全一冊
- 衛生概論 柴田承挂譯 同 金貳圓卅五錢 全三冊
- 短顯微鏡 百二十倍懷中物 價五拾錢 一個
- 京都衛生地誌摘要 藤井良吉著 不日出版


京都上京區第三十組晴明町

春和堂

若林茂一郎

三十一	二十九	二十七	全	二十六	全	二十四	全	全	二十	十八	十四	十二	十一	十	九	頁	
四	三	二	七	四	十三	三	十三	十二	十	十三	一	全	十二	七	三	四	行
此毛	清檢	テ色	錘扁	維ノ長	睫毛	容置セシム	撒布	不同ニシテ	内ニ現	爪	端ハ	口膜	頭ト比	復乳	下部	体肢	誤
此者	精檢	テ其色	錘狀扁	維ノ長	睫毛	客置ス	散在	不同ナリ	内ニハ現	爪	端ハ	口膜	頭ト比	復乳	下行	体軀	正
八十八	八十三	全	七十六	全	六十二	六十一	全	五十五	四十一	三十九	三十八	全	三十六	三十四	三十三	三十二	頁
二	三	七	六	一	一	五	十三	十三	十三	三	八	十	二	八	四	八	行
及脂	妨ケル	最先	力	種説	微疹	胃傷	故此	母毒	乳頭爪	撒布	ル而	開口セス	脈管ト	無織	變化有スル	表皮ハ	誤
皮脂	妨ケル	最先	刀	種設	蓄微疹	胃腸	故此	丹毒	乳頭爪	散在	ル者アリ	開口ハ	脈管ハ	無織	變化セル	表皮ノ	正

九十	九十三	九十六	九十八	九十九	百四	百七	全	百十一	百十四	百二十	百廿一	百三十五	百四十七	百五十三	百五十六	百五十八	百五十九
五	十一	六	二	十一	三	五	六	二	三	三	九	八	三	五	八	四	十
阿利	涅硬	鹹味	局發ノ	密尿	エリテス	圓毒	コッパイム	元進	澤度	馨香	ニケ四ケ	阿鉛	二同	大部ヲ	沃劑	摩温	爾涅
阿列	腺硬	鹹味	局發性ノ	密尿	エリテマ	丹毒	コッパイバ	亢進	沃度	馨香	二個四個	亞鉛	二〇	大部	沃土劑	摩温	爾必涅
百六十七	百六十八	百七十三	百七十九	百八十一	百八十三	百八十四	百八十六	全	百九十	百九十一	全	全	百九十二	二百十六	二百十八	二百廿四	二百廿六
七	一	二	八	十	十	十	六	十二	二	七	八	九	十	二	十二	八	三
中背	希ニナリ	局外	軟骨	治癒	全	素原	ナル脂化	氣營	鱗鮮	癩症	癩痒	全	ハ皆	トンヅランツ	毛發	黃バスター	草膏
中指	希レナリ	局處	軟骨	治療	全	素因	ナル結節脂化	氣營	鱗鮮	癩癩症	ノ癩痒	全	モ亦	トンヅランソ	毛髮	硫黃バスター	單膏



24

13

(M)

059765-000-1

24-13

皮膚病纂論

遠藤 大太郎 / 編

M20

CBH-0448

