


N 3349




眼科耳鼻喉科
覽 便


漢口同仁醫院編纂

眼病圖譜


砂眼



砂眼性角膜炎




實質性角膜炎



(由梅毒性而傳) 或由梅毒性而傳

腺淚眼



(由梅毒性而傳) 或由梅毒性而傳

漢口同仁醫院考案

眼科耳鼻咽喉科便覽序言


醫學之目的 治療疾病 不待言矣 然有時爲醫師者 雖割股治療 適切注意 而病者及看護人 常有不能嚴守醫師之指示 致綿延占 藥之時間 或竟趨于意外不幸之轉歸 斯誠一大遺憾也 吾甚願病者及看護人 明瞭疾病之常識 瞻念自身之利害 尊重醫師之注意 服從醫師之指示 專心靜養 努力加療 圖身體之健全 冀病魔之早除 同登壽域 其樂又當何如哉

敝人有鑒於此 感於斯 故囑本院各科醫師 就其日常最多見之疾病 擇其繁而要者 按科彙編 刊印成冊 提述疾病之原因及症狀 並豫後之良慮 而於注意事項 尤爲重要 本書編纂之旨 乃煩惱疾病之痛苦 祈病者及看護人諸君 讀斯書後 對己身之所患 有所深悉 於醫師之指導教示 能柔順服從 一心加 療則醫治之目的可達 其效果之確信 亦定可斷言也矣

中華民國十九年十月十日雙十節日

漢口同仁醫院

院長 藤田敏郎 識



眼科耳鼻咽喉科便覽目錄

眼科之一班

1	結膜炎	一
2	淋毒性結膜炎	二
3	沙眼	三
4	淚通狹窄	三
5	角膜バンヌス	四
6	結膜フリクテン	四
7	角膜實質炎	四
8	白内障	五
咽喉科之一班		
9	扁桃腺炎	五
10	白喉	六

耳鼻科之一班

11	外聽道炎	七
12	歐氏管狹窄	八
13	慢性肥厚性鼻炎	八
14	上顎囊蓄膿症	九

眼科耳鼻喉科便覽

漢口同仁醫院編纂



眼科之一斑

1 結 膜 炎

原因
症狀

腺病 及外來刺激 或由細菌傳染 或由流行性而發生

本症有水疱性結膜炎 加答兒性結膜炎 格魯布性結膜炎三種 水疱性結膜

炎 眼珠結膜發生局限性小水疱 其種類有三 概在角膜之近旁 (一) 孤

立性者 其數一或二三個 羞光流淚 經一二月變為潰瘍 新生上皮而愈

(二) 多發性者 專於角膜緣 形小如砂粒 結膜及角膜周圍充血著明 刺

激症亦甚 羞光流淚 眼險痠痛 (三) 惡性濾胞疹 形大而潰瘍 刺激

性強劇 有時以混濁之血管向角膜中心進行 呈芒把形 所謂芒把狀角膜炎

即是也 又有角膜穿孔 紅彩脫出者 加答兒性結膜炎 急性者 眼險赤

腫熱痛臉緣糜爛 血膜充血 重症者 眼險結膜亦充血浮腫 有時溢血 眼

脂溢出 晨起時 睫毛膠着 自覺症灼熱 疼痛羞光 異物感 壓重感 往

々續發角膜表層炎 或潰瘍 慢性者 諸症較輕 結膜弛緩 呈暗赤色 分泌亦少 格魯布性結膜炎 概侵犯小兒 與化膿性 結膜炎相似 結膜全面生灰白色或黃白色義膜 拭之容易除去 然易再生 經過八至十四日

注意

- 〔一〕 除其原因 安靜禁勞動
- 〔二〕 每日清洗患部 及點適應對症之眼藥
- 〔三〕 如係由腺病而來 並宜內服鐵劑
- 〔四〕 患部行冷罨法 或溫罨法

2 淋毒性結膜炎 [膿漏眼又名風眼]

原因

淋疾 或白帶下之傳染

症狀

第一期 結膜浸潤肥厚 硬固而不易反轉 乳頭發赤腫脹 眼球結膜亦潮紅浮腫 角膜周圍呈堤狀隆起 分泌黃色液體 羞明 灼熱 覺有異物 甚即疼痛 第二期 乳頭贅殖 呈天鵝絨狀 分泌多量之膿液 每波及角膜 而生潰瘍 或穿孔 故此期大須注意 第三期 潮紅腫脹漸消 分泌物亦漸減變為液性 全經過須四至六星期

注意

- 〔一〕 絕對安靜 攝生 整理便通 病室稍暗
- 〔二〕 每半時以硼酸水洗眼一次 並嚴行消毒法 以防傳染

〔三〕 如由有淋菌傳染而來 須行淋菌凡克辛注射

〔四〕 視其症狀之重輕 點以對病眼藥

〔五〕 內服消炎解毒藥

3 砂

眼 [顆粒性結膜炎]

原因

有傳染性 兵營 學舍 監獄中最多 病原尚未定 一九〇七年 撥羅乏采克

氏由急性砂眼之結膜上皮中 發見小體 認爲本病病原體

病狀

急性者 眼瞼結膜 著明紅腫 反轉視之 其贅殖之乳頭間 有帶黃灰白色

之顆粒 常顆粒未發生時 與急性單純性結膜炎難區別 眼球結膜亦潮紅腫

脹 有羞光 流淚 灼熱及異物感 慢性者 第一期 上眼瞼結膜發生散在

性灰白色顆粒 軟骨上緣 著明隆起 下眼瞼結膜顆粒少 而視力漸次障害

第二期 乳頭增大 顆粒消散 或變爲潰瘍 而生肉芽 膿漏 及刺激症者

最多 第三期 肉芽變爲癢痕 分泌減退 刺激消除 此外有名乳頭性砂眼

者 結膜面之乳頭贅殖 呈天鵝絨或覆盆子狀

注意

〔一〕 急性者 病室稍暗 行冷罨法或溫罨法

〔二〕 慢性者 用藥劑療法 兼以手術療法 安靜

4 淚 通 狹 窄

[淚囊炎]

原因	急性者 多由慢性續發 慢性者 因結膜炎 鼻粘膜疾患 淚囊周圍骨膜炎 等鼻淚管閉塞而來
症狀	急性者 淚囊部劇痛 皮膚發赤 呈波動 結膜浮腫 經二三日破壞 排膿而成瘻孔 慢性者 淚囊部稍隆起 流淚 壓之排出膿性 粘液性 或透明之液 每續發結膜炎 及眼臉溼疹
注意	(一) 急性者 初時用冷捲法 或溫捲法 早行切開手術 (二) 慢性者 每日行洗滌 及擴張法 無效時 即行手術爲要
原因	5 角膜パンヌス [血管發生性角膜炎] 多半續發於砂眼 其他腺病性結合膜炎 乳疳充血性粘膜炎等 亦爲本病之原因
症狀	始於角膜上緣 漸次蔓延溷濁 或爲潰瘍 或滲出顆粒
注意	原因療法外 施以人工膿漏術 或角膜周擁切除術 6 結膜フリクテン [名水胞性結膜炎]
本症	原因症狀及注意於前結膜炎篇中詳細載及不贅
原因	7 角膜實質炎 梅毒〔尤係先天性梅毒之一特徵〕

症狀

角膜實質生浸潤 周圍充血 表面無光彩 呈汎發性溼濁 其溼濁多始自邊緣或中心 漸次波及全面 分有血管 及無血管性角膜實質炎 有血管性者羞明 流淚 發赤 有時疼痛 如炎症狀焉

注意

原因療法 原因不明時 先試以驅梅毒療法 或行梅毒反應試驗

8 白 內 障

原因

先天性〔有遺傳者〕外傷 年老〔四十五歲以上〕全身病〔糖尿病蛋白尿〕等 其他因虹彩 毛樣體 脈絡膜 硝子體等疾患續發

症狀

自覺症 有飛蚊 多視 夜盲 晝盲 弱視等症 他覺症 以斜照法檢查時 若全白內障 則孔瞳內 一般呈灰色或白色 限局性者 則呈線狀 點狀 雪片狀之灰白色 或白色溼濁

注意

待適當之時機 行手術療法 其間羞光時 可用有色眼鏡 或近業之凸面鏡子

耳鼻咽喉科之一班

9 扁桃腺炎

原因

感冒 刺激 及猩紅熱 癩疹 丹毒 梅毒 間歇熱等

症狀 急性粘膜炎性者紅腫 濕胞性者 扁桃腺濕胞化膿 現黃白色之斑點 疼痛

嚙下困難 不能開口 流涎突然發熱等 為其共通症狀 腺窩性者 於腺窩

部形成黃白色之栓塞 有時互相癒合 成灰白色之偽膜 須與咽部白喉症區

別

注意 (一) 輕症 用冷卷法 並含嗽劑

(二) 重症含冰塊 局部塗擦 再用卷法 及含嗽劑

(三) 扁桃腺腫大 已成慢性 屢々再發者 須行切除手術

10 白喉

原因 為一八八四年 樂福拉氏所發見之白喉菌 而專侵犯未滿十歲之小兒 大人

亦有傳染者

症狀 局部症狀 扁桃腺及咽頭黏膜 腫脹 發赤 微疹 及發生白色 或帶黃白

色偽膜 下頷角後方之下頷淋巴腺 亦腫脹 有壓痛 全身症狀 其初身体

違和 頭痛發熱 嚙下困難 其次呼吸亦困難 併發症為支氣管肺炎 心臟

衰弱 急性腎臟炎 皮膚荀行疹 紅斑 出血 中耳炎 多發性關節炎 後

發症 為心臟內膜炎 白喉後末梢麻痺 腎臟炎 若不將咽頭之炎症 取出

鏡檢難下確診

注意

(一) 將患者隔離 注射白喉血清 用冷罨法 及含嗽劑

(二) 內服強心劑 流通室內空氣 高熱即用水囊

(三) 若將窒息 即速行氣管切開術

11 外 聽 道 炎

化膿菌侵襲

原 因

有限局性 或瀰蔓性 聽道癰腫 限局性者 皮膚潮紅腫脹疼痛 其項現黃

症 狀

色膿點 次則破潰排膿 瀰蔓性者 耳鳴 疼痛 熱灼 搏動 緊張感等通

常諸症 經過三四日輕快 分泌物初為漿液性 漸次變為膿性

注 意

安靜 限局性時 速即切開 瀰蔓性者 行冷罨法 及吹入防腐收水藥

12 中 耳 炎

原 因

多併發於鼻 咽喉 急性粘膜炎 急性發疹傳染病 如麻疹 痘瘡 猩紅熱

傷寒 白喉等 亦為本病原因

症 狀

粘膜炎性者 有耳痛 耳鳴 充塞之感 聽力障害等 經一日至數日後 鼓

膜穿孔 排出分泌物 同時各症亦皆輕快 化膿性耳痛 頭痛 耳鳴 難聽

小兒患者 發熱 譫語 經過數日至一二週後 鼓膜穿孔排膿 諸症亦皆輕

快

注意

凡精神感動 身體運動等 足以增進疼痛者 皆宜避 發熱者 命安臥 微腫而鼓膜潮紅者 行溫卷法 痛不止者 須行鼓膜穿刺術 有乳突合併症者 行外科手術

13 歐氏管狹窄

原因

鼻加答兒 腺樣增殖症 口蓋扁桃腺之炎性諸病而來 又有以歐氏管 開口部腫瘍或癭痕 而起片側性閉塞症者

症狀

難聽 耳鳴 耳部充塞感 自聲強聽 頭部昏懵等 惟在欠伸 擤鼻等時 則聽力改善 斯本病特有之徵也

注意

原因療法外 行歐氏管通氣之局所療法 頑固性者 須用擴張器插入 以圖擴張

14 慢性肥厚性鼻炎

原因

急性鼻炎 反復襲來而起 或塵埃煤烟中之勞働者 化學刺激物之取扱者 喫煙 嗜酒家 心臟瓣膜病 腎臟病患者等循環障礙 腺病質 貧血 鼻中

隔棘 槓之彎曲等症而來 又有慢性萎縮巧鼻炎 因治療不適當 切除甲介

後而發 或由副鼻腔蓄膿症續發

症狀

鼻閉塞 鼻汁過多 閉鼻聲 嗅覺減退 咽頭乾燥不快 頭痛 頭重 眩暈

精神沈鬱 記憶力減退 注意集中困難 其他續發 外鼻鬱血 結膜炎 淚
漏症 中耳加答兒咽頭 喉頭及氣管枝等慢性炎 又反射的喘息 癩痢等症
除去原因 行局所療法 或行外科切除術

15 上顎竇蓄膿症

原因 由齒根骨性炎 感冒 麻疹 猩紅熱 白喉 丹毒後而發 有急性慢性二種
症狀 急性者 有中等度發熱 顏面神經痛 上顎骨部緊張 乃至疼痛 其疼痛於
咳嗽 噴嚏及前屈時增劇 有多量之膿漏 他覺性 頰部腫脹發赤及壓痛

慢性者至化膿時 鼻閉塞 惡臭性膿性鼻汁夥多 頭重頭痛 上及下眼窩神
經痛 精神沈鬱 記憶力思考力減退 眩暈 睡眠不良 前屈時覺有惡臭氣
其他屢屢有粘液鼻汁 及粘膜肥厚
急性症 頰部行溫罨法 內服發汗劑 慢性化膿症須行手術療法爲要

關於閣下的疾病如左

- | | |
|--------------|---------------|
| 一 病名 | 須用愛克司光透視 |
| 二 要入院治療 | 透視費 每回 元 |
| 入院豫定日數約 日 | 六 須用愛克司光照相 |
| 三 須每日來院受治 | 照相費 一張 元 |
| 每日來院受治療日數約 日 | 七 要用人工太陽燈放射治療 |
| 四 要行手術 | 放射回數約 回 每回 元 |
| 手術費 大洋 元 | 八 其他注意事項 |
| 五 須用愛克司光線放射 | |
| 放射回數約 回 每回 元 | |

補病靈

補病靈

營養不良 貧血 神經衰弱 不眠症 憂鬱症

食慾消失 消耗性疾患 虛脫狀態等服之頗奏效 尤其於肺

結核及類似結核性之慢性病患者 補養身體之唯一滋養品

體素

體素

是造血及休質之主要素 並對澱粉蛋白質等有

強度之消化力 因由酵母精製 故同他之吸收力 有頗遠之

特徵肺勞 貧血 食慾不振 營養不良 產後病後 三人

用之增血 食慾得以充進 休質得以強健 試無二三補血強

壯劑也

思明堂大藥房

漢口第三特別區太平街


電話

四八七

二五八

六九一

號



3

漢口同仁醫院 自前清光緒二十八年創立
迄今已將三十年矣 爲漢上最首之醫院
其間診療之經過 亦爲各界人士所共悉
早已口碑載道 名傳中外 不待贅言 今
更力求進步 對於一切設備 無不希求完
善 如價值一萬六千餘金之愛克司光 及
於皮膚病 有特效之人工太陽燈 並電療
器 一切理學療法的器械等 無不應有盡
有 故於治療上可稱順心應手也 再本院
地近江岸 靜肅非常 房間廣潔 空氣清
新 住院治療 更爲相宜

地址 漢口第一特別區一碼頭 電話

一九〇
一〇二一