

醫方類聚卷之一百三十九

諸癩門

三因方

滯下三因證治

病者滯下人皆知赤為熱白為寒而獨不知

純下清血為風下如豆羹汁為濕夫六氣之

傷人初無輕重以暑熱壹氣燥濕同源收而

為四則寒熱風濕不可偏廢古方去風停於

膚腠殺乘虛入客腸胃或下瘀血或下鮮血

此方治諸癩門
滯下三因證治
病者滯下人皆知赤為熱白為寒而獨不知
純下清血為風下如豆羹汁為濕夫六氣之
傷人初無輕重以暑熱壹氣燥濕同源收而
為四則寒熱風濕不可偏廢古方去風停於
膚腠殺乘虛入客腸胃或下瘀血或下鮮血



注下無度濕毒下如豆羹汁皆外所因之明文也古方有五洩因臟氣鬱結隨其所發使利膿血作青黃赤白黑之不同者即內所因也用飲服冷熱酒醴醢醢縱情恣慾房室勞逸致損精血腸胃枯溢久積冷熱遂成毒痢皆不內外因治之先推其歲運以平其外察其鬱結以調其內審其所傷以治不內外使條然明白不至妄投也

胃風湯治風冷乘虛入客腸胃水谷不化洩

瀉注下腹脇虛滿腸鳴疝痛及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血日夜無度並宜服之血病見

露宿湯治風痢純下清血

杏仁

七粒大皮尖

若木瘡

壹掌大

烏梅

兩個○得効方壹介

草菓

壹介

酸石榴皮

半介

青皮

兩介

甘草

二寸

右爲剉散作壹劑水二椀生姜三片煎七分椀露星一宿次早空心服

苦散治脾受濕氣泄利不止米谷不化

黃連去須剉 吳茱萸 白芍藥剉如豆各二兩同炒

令赤

右為末得效方 每服二錢水壹盞煎至七

分得效方 溫服

固腸湯治腸虛下痢醫方大成腸上有赤白

頻併日久無度老幼產婦俱可服之

罌粟殼三兩醋浸 枳殼麩炒 白芍藥各二

橘紅炙稍黃 當歸 甘草炙各一兩 訶子煨 木香

煨人參 白姜煨各半兩

右為剉散每服四錢水壹盞半大成煎七

分去滓食前服大成溫服醫方集成抽珍方系類鈴方與大成同

三聖丸治下痢赤白日夜無度及泄瀉注下

藜皮大厚者去 大蒜細切 罌粟殼去辦細切各等

右三物一處罈篩過麤者更搗同淹一宿

次日慢火炒香熟亦旋篩取細者餘更炒

不介則細者焦礪為末粟米飲糊丸如梧

子大每服五十九米湯下

斷下湯治下痢赤白無問久近長幼皆可服

鶯粟殼炙十四個去辨○直指方大鶯粟殼去筋萼剪碎醋淹炒燥 草

菓青介不白朮錢壹半甘草錢壹半茯苓青錢○

加木香半錢

右為剉散作一劑水壹大椀姜七片棗七

個煎至一大盞分二服空腹或下純赤加

黑豆二十七粒白則加炮乾姜壹錢○直

指方右為麤末分作兩服每服薑五片大

棗三箇大烏梅三箇食前煎服固腸散見方

泄瀉通用 煎服二錢煎米飲下食前

厚腸湯治下痢赤白

鶯粟殼八兩剉炒地榆六兩白朮 紫蘇葉 木

瓜乾各二兩

右為剉散每服四錢水盞半姜七片棗二

個煎七分去滓空腹服

水煮木香丸治腸胃虛弱風濕進襲洩瀉水

谷滯下膿血痢刺疼痛裏急後重日夜無度

當歸洗芍藥 甘草炙阿膠去核各厚朴

去麤皮 青皮 陳皮 各壹兩 縮砂仁 木香

切各製 鶯粟殼 切爛淹 炒五分

右為末蜜丸壹兩作五丸每服一丸水壹
匙煎七分食前溫服別

衛生十全方 或加四錢水薑半姜汁水煎二

瓜治泄痢

治暴水瀉不止 白朮 紫菀 桑白木

麻葉 膏劑焙乾今之作 乾薑 半兩

右為細末每服二錢陳米飲調下食前

治白痢水瀉

訶子 三箇煨 去核 肉豆蔻 壹箇麩 裏煨

右為細末作壹服陳米飲調下食前

治諸般瀉痢

罌粟殼 去頂帶蜜 炙二兩 青皮 陳皮 各去白 二兩 當

歸 去蘆膏 兩切 乾葛 壹兩 甘草 壹兩

右為細末每服二錢水壹盞煎七分如患
赤白痢用酸石榴皮壹片同煎食前服

治諸般泄痢

罌粟殼二兩人參一兩白扁豆一兩薑汁煮去皮橘皮

去白烏梅肉兩半枳殼半兩甘草兩

右為麤末每服三大錢水壹盞半薑五片

棗子兩箇煎七分入蜜半匙頭去滓溫服

治赤白痢

罌粟殼七箇去頂帶蜜炙蠟茶壹塊如指大砂糖壹

塊如指大酸石榴皮壹片如指大生薑壹塊如指大

大指

右以水壹大椀同煎至七分食前服

治禁口痢

罌粟殼十箇去頂帶蜜炙人參壹錢切一兩

右以水壹椀煎至壹小盞服日三四服即

愈

治寒痢不止

罌粟殼壹兩蜜炙去頂肉豆蔻壹錢烏梅壹兩乾

薑等分

右為細末每服二錢以水壹盞生薑三片

煎至七分溫服

治積痢

硃砂壹分 朱砂壹分

右並研極細用巴豆二十一粒去殼皮膜於銀石器內重湯煮一伏時巴豆紫色為度去十四粒止將七粒與前二味同研極勻溶黃蠟半兩置藥每旋元如菜豆大每服三元至五元水瀉生薑湯下赤白痢烏梅湯下須令腹極空時服服了一時方可喫淡粥臨卧服尤佳

治臟腑滑泄每到天明必須溘瀉

五味子炒二兩 吳茱萸細粒綠色者炒半兩

右為細末每服二錢陳米飲下食前溫服

治脾胃虛冷大腸滑泄不禁

大川烏炮去皮臍尖 胡椒 赤石脂各半兩 乾薑

炮一兩

右為細末薄糊為元如梧桐子大每服二十元陳米飲下此藥雖七八十老人大腸虛滑服之亦効食前

又方厚朴去麤皮以薑汁塗炙七次二兩訶子皮炮草豆蔻

去肉豆蔻煨陳皮去青皮白乾薑炮木香

已上各等分甘草炙壹分

右為細末每服二錢水壹錢生薑三片棗

壹箇同煎食前服

神巧萬全方

諸痢

治大熱毒純血痢治不可差者方

右川大黃三兩持羅為末每服四錢水壹

中盞煎至七分露星月下空心服之利三

五行以粥止不差加黃連一兩以疝痢法

治之

治白痢心腹脹滿不能飲食硫黃散方

硫黃研細訶梨勒皮各壹兩半肉豆蔻去殼乾薑炮

陳橘皮去穢附子炮厚朴三兩薑汁塗炙甘草

中兩炙

右件搗羅為末每服二錢以粥飲調下

唐太宗療氣痢據實錄正觀中上以氣痢久

而末痊下詔旁求有術士進乳煎葦撥方
 用之有效後累試虛冷人服之尤妙其藥
 分兩以意量之多少臨時大約葦撥壹服
 三錢匕其乳煎了得半升已來○是齊醫
 方治氣痢直指方得効方名牛乳湯治氣痢泄如蠡渤聖濟總錄治氣痢久不差及諸痢困弱者名葦撥煎備預百要方氣痢日夜數行太平廣記
 唐太宗得効方乳煎葦撥沉存中良方云
 每用牛乳半升葦撥末二錢匕總錄抽珍方百要方
 三錢同煎減半總錄於銀石器中慢火煎令減半空心服仍

其載本末瓊碎錄氣痢取黃牛乳壹小盞
 煎葦茱末壹錢不計時候稍熱服

治一切痢聖濟總錄名黃連

黃連二兩黃蘗各一兩羚羊角各一兩白茯苓半

○總錄赤茯苓各一兩木香各一兩黃芩各一兩甘草各一兩肉桂各一兩

右四味為末煉蜜和丸如梧桐子大每服

二枚丸空心薑蜜湯下唐張回使君將貶

又南仲云得此方長慶中韋給事洪景使安

劉夢得授之此方暑月涉洵得痢疾用之

立効

又方青木香 黃連

甘草

炙

肉苳蔻

各等分

右焙為末以沙糖和之漉丸空心以水飲

下十九以意斟酌加減之○聖濟總錄治

熱痢香連丸方木香黃連

去須炒

甘草

炙肉

荳蔻去殼右四味等分擣羅為末沙糖和丸

如梧桐子大每服十五丸空心米飲下更

以意加減

治赤白痢

甘草

半兩擘破炙以淡漿水蘸三度又炙

生薑

和皮用半兩

右二味以淡漿水壹升半煎八合服立效

治泄瀉無度漸成休息痢藏腑久冷宜服草

還丹

乾薑

一斤

甘草

四兩

草豆蔻

連皮大腹

各五分

右用小于鑊內慢火煮一伏時水盡添水

煮切開看薑內無白心即住候煮乾白薑

薄切焙乾次入大附子

二兩炮

白檳榔

二兩

用酒酵子壹升焙乾為末和勻以稠粟米

粥為丸梧桐子大每服二十九米飲下一日三服

治諸痢脫肛方

龍骨 艾葉微炒 黃連各一兩 驚頭骨二介 阿膠三分 麩焦

右件杵為末食前以粥飲調下二錢

治水瀉腹痛不納飲食龍骨散

龍骨白色者 木香炮 當歸炒 肉苳蔻麩裏炮
各一兩 厚朴二兩去皮 薑汁炙

右件為末每服粥飲調下二錢日三四服

治冷氣水瀉日夜二三十行腹中痠痛四肢

不和縮紗丸方

縮紗去皮 黃連炒 附子炮 吳茱萸湯洗七遍

兩木香二乾薑 半兩

右為末用嚼軟飯和丸梧桐子大每服三

又十粒以粥飲下

治水瀉不止腹藏久冷不思飲食硫黃丸方

硫黃一兩 白礬三兩 煨三兩 火

右件都細研爲末以粳米飯和勻如菘豆
大每服十九以粥飲下不計時候

又方訶梨勒三顆麩裏煨令麩赤黃色去麩
取訶梨勒皮杵羅爲末飯和丸梧桐子大
米飲下二十九

助道方

治多時腹痛久寒泄痢

多時瀉痢腹中寒晝夜應須數十番似把縮
砂并粟米煎湯送下駐車元二錢日三四

連月腹痛瀉痢類併不能安跡或病後肚
疼泄痢不止可用局方駐車元壹貼分作
二服煎縮砂二十粒搥碎粟米約二白粒
陳皮壹片生薑十片北棗二箇水三盞同
煎取清盞半分作二服送下駐車元五
粒如病久頗深連服數服其効必愈不可
具述
不治久痢腹中疼得此藥如神
久痢腹疼最是乖陳米陳皮煮縮砂石脂調

取湯壹服補助腸間立便差

下痢之病皆因腸胃虛弱或時腹痛川局
方赤石脂湯二貼分作三服煎縮砂二十
粒搥碎陳皮壹大片陳米百餘粒生姜十
片大棗二个水二大盞煎取壹盞半去滓
分作三次調赤石脂湯立効

是齋醫方

痢疾

六妙湯治下血或痢不止詹判院武子方

烏梅

十箇搥碎

甘草

二寸生用

鶯粟殼

十箇去穢損槌碎

丁香

五箇全用

桂心

二寸去粗皮

縮砂仁

四錢半搥破

右六味同拌勻作壹服水一盞半於銀器

內煎至七分忌銅鐵器去滓温服滓用水

二盞再煎小半盞服

治痢獨神元沉太虛侍郎方沉仁父傳鶯粟

殼去穢帶不以多少用米醋壹盃蘸炙以

醋多為妙候焦黃為細末煉蜜為元小彈

子大每服壹元水壹盞生薑三片煎至七

分服○得效方治痢神效罌粟殼

十兩重分作三

分去穰及蒂萼一分醋炒一分生用一分蜜炙右為末川蜜圓如

小指頭大紅痢生地黃春茶煎湯嚼下白

痢烏梅甘草節但為末二錢陳米塩梅湯

亦效

治禁口痢正順伯運使傳鯽魚一枚不去鱗

腮下作一竅去腸肚入白礬壹粟子大紙

裏煨令香熟令病人取意用塩醋食之季

毅方燒存性灰米飲調下曾用之有效○

得效方煨鯽魚方治禁口痢鯽魚撚去膽

與腸肚入白礬壹大豆許同煨熟入塩醋

喫不過兩枚與痢俱效未氏集壽域神方

禁口痢用鯽魚壹尾不去鱗腮下作壹竅

去腸入白礬壹塊如粟子大燒灰存性研

為細末每服三錢食前米飲調下又治腸

風血痢衛生易簡方治腸風血痢用鯽魚

一箇釀白礬燒灰存性為末米飲調服

治痢方鴈茶和末不以多少白梅肉和為元

赤痢甘草湯下白痢烏梅湯下泄瀉不止
 陳米飲下每服二十元團茶尤佳白梅貴
 陳○經驗良方右用臈茶不拘多少新舊
 細研如赤痢用蜜同水煎如白痢用連皮
 生姜研自然汁同水煎每水壹盞煎至半
 盞空心服二服即愈永類編
 治禁口痢孟公實郎中傳云甚妙者連服以
 多少不炒剝去殼將肉非心碾為細末每
 服二錢陳米飲玉機微義調下衛生易便
陳皮飲

覺思食此疾蓋是毒氣上衝華蓋心氣不
 通所以不入食服此藥之後心氣通痢當
 頓下而愈醫方大成集成南北未愈自服
 痢藥○得效方治禁口痢食飲不下用石
 蓮肉留心為末陳米飲下直指方禁口痢
 方石蓮肉乾右為末每服二錢陳米飲調
 下便覺思食仍以日照東方壁土炒真橘
 皮為末薑棗略煎佐之聖濟總錄
 祭酒林謙之說韶州醫人劉從周治病有功

議論殊不凡且有驗云大凡痢疾不問赤白而後為冷熱之證若手足和煖則為陽只須先服五苓散用粟米飲調下次服感應元二十粒即愈若覺手足厥冷則為陰當服煖藥如已寒元附子之類如此治痢無不効此方親曾用有効有人夏月患痢一日六七十行用五苓散者兩服立止

治赤白痢并臟腑等疾臧將仕之女服之有驗

鶯粟殼

去穰帶令淨炙黃

鶯粟子

少令微黑

右同為細末煉蜜為元如小雞頭大每服十元十五元赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下瀉米飲下小兒元如粟米大量大小加減服之

治赤白痢

澹寮方名變通圓

吳茱萸

棟淨

黃連

去鬚并蘆剉散子大

右等分一處以好酒浸透取出各自揀焙或噉乾為細末糊元如梧桐子大赤痢用

黃連元三十粒甘草湯下白痢用茱萸元三十粒乾薑湯下赤白痢各用十五粒相合併以甘草乾薑湯下醫方大成集或補珍方衛生易簡方

洞此方浙西何山純老以傳蘇翰光云數十年救人無數人多求方不敢輕授恐以其藥品之微而忽之翰光每以救人甚効

洪氏方亦有修製湯使少異○直指方茱萸連揀淨黃連去鬚牛寸一截同右各碾未醋麪糊圓桐子大赤痢專服黃連白

痢專服茱萸赤白併服或多或少以意增減每服七十圓陳米飲下以愈為度朱氏集驗方戊巳丸真吳茱萸川中者湯洗三兩次黃連去鬚好右等分米糊為丸空心下三十九酒浸

赤痢當歸黃連甘草湯下白痢茱萸生薑湯下

治血痢熱躁水研粳米半升取汁令盡以汁置有油薏瓶膈紙封口沈井底平且服之吳內翰家乳媪病服之而愈

泊宅編云蜀人山叟治痢藥用鶯粟殼并去核鼠查子各數枚焙乾末之飲下尤治禁口痢鼠查子即糖毬

治禁口痢陳慶長知縣名祖永云頃守官南康其子年十許歲患禁口痢水漿不入者數日惟能進藥同官家有方書載壹治法試用之壹服而痢稍疎三服遂索粥飲頓食半盞許自是痢止而安其法用乾山藥經驗良方一兩壹半炒黃色半生用研為細末米

飲調下得效方治心腹虛膨手足厥冷或飲過苦澁涼劑晨朝未食先嘔或聞食即吐不思飲食此乃脾胃虛弱山藥壹味剉如小豆大壹半銀石器內炒熟壹半生用為末水飲調下醫方大成集成南北經方力補珍方永類鈐方衛生易簡方同白獲其功

如聖湯治下痢赤白甚重者二方焦濟卿

人參三寸當歸三寸洗三寸滴乳壹塊黑甘草二寸烏梅七箇罌粟殼一箇去穢大北棗七箇縮砂仁

冷服白痢熱服赤白痢溫服年高孀婦小兒皆可服忌生冷肥膩物
必効飲子治久新赤白痢浙東帥趙侍郎子和壬子年施此藥

白朮 甘草 蜜 養粟 澁 蜜 炙 已 上 等 分 用 煎 文

平右爲籠米每服三大錢水煎蓋半生薑三片棗壹箇煎至七分去滓溫服白痢加白朮赤痢加甘草不拘時候服忌油膩之物
治痢泊宅編云姚祐自殿監遷八座母夫人

病痢諸藥不効令李昂筮軌革有真人指靈草之語一日登對上訝其色悴具以實奏詔賜一散子數服而愈仍喻只炒椿子熟末之飲下余檢本草椿筴主大便下血今處處有之夏中生筴檇之有花者無筴有筴者無花常生臭檇上未見椿上有筴者然世俗不辨椿檇之異故俗中名此爲椿筴其實檇筴耳注云檇皮主疳痢日華子云檇皮溫無毒止瀉及腸風入藥時用

右各研為細末用黃臈溶成膏元如小棗
豆大每服五粒白痢乾薑湯下赤痢甘草
湯下如要定轉用棗湯下七粒

治赤白痢及水瀉最効廬州合肥唐主薄錡

方

破故紙一兩炒罌粟殼四兩去穢頂帶人

右二味為細末煉蜜為元如彈子大每服

膏元水豈盞化開薑二片棗壹箇煎取七

分如小兒分作四服

治痢無問赤白張王仲參議說官局二薑元

不用糊却以獾猪膽為元依常法服以米

飲湯下空心食前服

百中散治一切痢不問赤白或一日之間一

二百行只壹服便疎再二三服即愈魏不伐

方

罌粟殼三斤去土下帶頂屑剉成厚朴三

去粗皮淨秤用牛薑汁一宿炙令薑汁盡為度

右為細末每服二三錢米飲調下忌生冷

油膩魚鮓毒物得効方同三日湯壽資通判所

傳與此同云極有功效

夷堅甲志云虞丞相自渠州被召途中冒暑

得疾泄痢連月夢壁間有韻語藥方一紙

讀之數過其詞曰暑毒在脾濕氣連脚不

泄則痢不痢則瘡獨煉雄黃蒸麩和藥甘

草作湯服之安樂別作治療醫家大錯如

方服之遂愈永類鈴方同○得効方治暑毒濕

氣下痢雄黃壹味籠蒸研為末甘草湯調

服即效

瑣碎錄

治諸痢方

治諸痢以艾葉陳皮煎濃湯服

又方用閩中水梅水臙茶飲之則愈

治冷痢附子炮去皮臙烏梅燒灰等分薑棗

煎服

治痢久不差椿子炒熟為末調之

治臟毒木鱉子以針筍於麻油燈上燒成灰

類聚百方
研細濃煎陳米飲調二錢服

或水瀉不止用薑壹塊去皮破作兩片刮去
薑心內白礬塞滿乾紙包火中煨令薑熟
取出以薑覆地下令去火氣却以半滾湯
半冷木相和壹小盞謂之陰陽水尽服之
立效

又方以大蒜搗爛貼臍下并脚心立止○壽

域神方暴痢用蒜搗爛兩足下貼之衛生易簡

同方

又方殺羊角壹枚用白礬末填滿燒為灰都

研為細散食前汲新水調下三錢

又方鶯粟花未開時外角兩片青葉包之花

開卽落地收取陰乾患赤白痢垂死者碾

為細末米飲調下立有神効

噤口血痢方鱖魚不去鱗腸臘日懸於簷下

常風處冷自乾至立春後取下用尾火焙

碎碾為細末臨用時米湯調下

湯簡方命不麻赤白痢問人欲與此方料息

斷下湯治下痢赤白無問久近長幼及休息痢疾

草菓連皮白朮各一錢茯苓各一錢甘草半錢火酒

熟右咬咀川大鶯粟殼十四枚去筋膜并萼

蒂剪碎以醋淹炒燥為麤末同前作壹劑

水二大盞簡易方大碗姜七片棗烏梅各七個

煎至壹大盞分二服服之赤痢加烏梅豆

七粒簡易方加黑豆二七粒白者加乾薑半錢重凡

鶯粟殼治痢服之其効如神但性緊澁多

令人嘔既用醋製加以烏梅不致為患簡易

方此下云况斷下湯一方有四君子素嘔料用之不致閉胃妨食而獲奇効也

吐則不可服人率痢疾古方謂之滯下多

因腸胃素有積滯而成此疾始得之未可

遽止先以加巴豆咸應元十餘粒用白梅

煎茶或姜湯嚥下令大便微利仍以前藥

服之無不應手作效若脾胃素弱用罌粟

殼二兩製如前法橘紅兩半肉豆蔻半兩

為末用烏梅肉二兩蒸過爛研別以醋煮

米糊一處搜和爲圓如梧桐子大每服五十圓米飲嚥下米飲姜湯任意嚥下兼治泄瀉不止壹服卽愈更令藥力相接自然平治瀉痢之川鶯粟殼人多不敢服今製度得宜服之不妨但用之令有搏節自獲奇切非比麻黃之發散寒邪大黃之蕩滌蘊熱必欲其脉病相參決是何證方可服之故難輕用但服鶯粟殼之後如覺惡心頭眩却以理中湯四君子湯加豆蔻木香

輩調其胃氣仍以二陳湯水煮半夏元定其嘔逆各見本方痢疾乃腹心之患若畏首畏尾用平和之劑決難作效必致危篤雖欲服此則已晚矣如秦皮地榆黃蘗若木瘡輩其性苦寒却難輕服治血痢當服胃風湯膠艾湯震靈丹白者宜服附子湯震靈丹白丹之屬更宜審而用之更宜以鶯粟殼藥服之相參若五色雜下泄瀉無時當用熟烏頭一兩厚朴甘草乾姜

米糊一處搜和爲圓如梧桐子大每服五十圓米飲嚥下米飲姜湯任意嚥下兼治泄瀉不止壹服卽愈更令藥力相接自然平治瀉痢之川鶯粟殼人多不敢服今製度得宜服之不妨但用之令有搏節自獲奇切非比麻黃之發散寒邪大黃之蕩滌蘊熱必欲其脉病相參決是何證方可服之故難輕用但服鶯粟殼之後如覺惡心頭眩却以理中湯四君子湯加豆蔻木香

輩調其胃氣仍以二陳湯水煮半夏元定其嘔逆各見本方痢疾乃腹心之患若畏首畏尾用平和之劑決難作效必致危篤雖欲服曲則已晚矣如秦皮地榆黃蘗若木瘡輩其性苦寒却難輕服治血痢當服辟風湯膠艾湯震靈丹白者宜服附子湯震靈丹白丹之屬更宜審而用之更宜以鶯粟殼藥服之相參若五色雜下泄瀉無時當用熟烏頭一兩厚朴甘草乾姜

各一分生姜煎服諸證並宜佐以鶯粟殼
之藥今人治痢多用駐車圓黃連阿膠圓
等其中止有黃連肥腸其性本冷若所感
稍輕及餘痢休息不已則服之有效若病
稍重非此可療徒謂其穩當而服之悠悠
度時乃自取困頓耳 俗謂禁口痢者多
因病人服痢藥太過傷損胃氣若全不進
食或添嘔吐鮮有不致斃者宜以四桂散
理中湯參苓散四君子湯之類加肉豆蔻

木香輩姜棗烏梅煎服仍噉震靈丹等藥
若穀氣旋生所思之物則隨意與之不必
甚忌但欲軟煮熟食勿多與耳惟雞鵝并
豬羊腸肚所煮雜汁并鮮魚不可食或服
此等藥後下痢遍數及疼痛倍於服痢藥
之時背不妨俟飲食稍進却於前調脾胃
藥中加罌粟殼旋治之自獲安全

大抵寒元治久寒積冷臟腑虛弱心腹疝痛
脇肋滿甚泄瀉腸鳴自利自汗米穀不化陽

氣暴衰陰氣獨勝手足厥冷傷寒陰盛神昏
脉短四肢怠惰並宜服

乾姜

高良姜

各六兩

官桂

藜蘆

各四兩

右爲細末水煮麵糊爲圓如梧桐子大每
服二十粒米飲下食前此藥燥甚能治臟
腑虛寒滑而下利及泄瀉腸鳴水穀不化
自非看得清切灼然藏寒泄瀉不可輕服
多有泄瀉溇瀉之患用溫熱藥不止者宜
用緊澁之劑可於斷下湯方中求之

王氏
易簡

方 王氏易簡方又云施氏說大已寒固

乃二薑圓加官桂藜蘆撥局方云治臟腑虛
弱心腹疼痛泄瀉腸鳴傷寒陰證四肢怠
惰王氏取之既言治滑而下利又言治泄
瀉腸鳴既言治泄瀉腸鳴乃復言治大便
溇泄時復下利言之數四不憚其煩而不
知其大能治心脾疼霍亂等疾如以之攻
治冷瀉則此藥大燥曾不若附子理中圓
用藥之妙也附子理中圓治脾胃虛弱寒

濕乘之腹痛腸鳴泄瀉不止或胃膈逆滿
 噎塞不通嘔吐冷痰飲食不下並宜服之
 附子生去乾薑炮人參白朮各一兩甘草
 多半
 右為末煉蜜為圓每兩作十圓每服壹圓
 食前沸湯化下嚼破服亦得或凡如梧桐
 子大服前得

簡易方

痢證

...

蘇沉良方四神散一名勝金散

黃連聖濟總錄去須炒當歸總錄切焙黃柏總錄去麩皮切炒

乾薑各等分總錄炮

右細末每二大錢烏梅三個煎湯調下空

心服末水瀉等分木赤痢加黃柏白痢

加乾姜後重加黃連腹痛加當歸

予家常合此藥夏月最獲用大凡泄痢宜

食酸苦惡甘鹹蓋酸收苦堅甘緩鹹濡不

可不知也

蔡醫博秘方九寶飲子分水穀止瀉

鶯粟殼蜜炙 青皮 陳皮 木通 各一兩 赤

茯苓皮 車前子 炒 黃耆 微厚 朴製 粉草 各

右粗末每服三錢水壹大盞煎至七分去

滓服

本事方木香散治隔年痢不止

木香 黃連 與木香同炒 鶯粟殼 生

姜 切片同粟殼 炒燥各半兩 甘草 炙

右細末 神方生薑 入麝少許研勻 陳米飲

下二服 醫方大成 神 治血痢尤奇 醫方集

經驗方 抽珍方 承類 鈐方 衛生易簡方 與大成同

直指方

瀉痢證治

敗毒散治風邪寒邪壯熱下痢 方見諸 陳米

飲調五苓散佐之 方見水

不換金正氣散治風邪寒邪冷證下痢 方見

門

治要除濕湯

方見霍亂門

加官桂木香治風寒令

證下痢加乾薑伏苓治傷濕下痢仍以五

苓散利其小便

方見水

理中湯

方見泄瀉門

加厚朴木香伏苓治濕冷下

痢

艾薑圓治濕冷下痢膿血腹痛婦人下血

乾艾葉

四兩炒

川白薑

一兩炮

右為末醋煮麵糊圓桐子大每七十圓得

方三食前温米飲下○嚴氏濟生續方治

白痢艾葉

陳者四兩

乾薑

炮去灰

右二味各碾

為末用醋調陳倉米粉打糊為圓如小梧

桐子大每服七十圓空心食前米飲送下

永類鈔方同

此方乃男婦得之於買平章魏國

公屢嘗以此方取奇效實不敢私秘附刊

于此

大參豆蔻散冷證瀉痢通用

木香厚朴

製

蒼朮

米泔浸曬

乾薑

炮

肉豆蔻

生各二兩

半夏麩

陳皮

阿膠

炒

鶯粟殼

去筋

萼醋淹炒 縮砂 甘草 炒各二

右判每三錢薑棗煎食前服

香薷剉散五物香薷湯六和湯 方見諸暑門 治傷

暑下痢五苓散佐之

升麻湯

升麻 白芍藥 甘草 炙各七兩 白乾葛 十五兩

右蠶末每三錢薑三片同煎吞感應圓治

復暑下痢纏痛

苗連阿膠圓 方見咳嗽門 麩皮湯 方見泄瀉門 治熱證

發熱下痢亦治暑痢

真人養臟湯治冷熱不調下痢 方見泄瀉門 依前

法用之

三稜散治食積下痢腹痛 方見泄瀉門 依前法用

之

感應圓 方見諸氣門 解毒雄黃圓 方見積滯門 治諸積

下痢用五苓散送下 方見諸氣門

和劑流氣飲大異香散五膈寬中散 方見諸氣門

治諸氣痢 方見諸氣門

肉菟散治冷證久痢不止方見泄瀉門

附子理中湯薑附湯方見諸寒門木附湯方見諸濕門

治虛損久痢四肢厥冷以意擇用

玉華白丹治臟腑久虛止瀉止痢

陽起石入甘鍋煨通紅酒淬白石脂煨左

三顧牡礪取白者各半兩鍾乳粉一兩

右研極細如粉和粳米糊圓空心米飲

下渴者入參湯下亦治腸風下血又震靈

丹方見泄瀉門通用

赤石脂禹餘糧湯治瀉痢諸藥不效以此固

其下焦一錢五分或豆大空心

赤石脂剉小塊禹餘糧煨淨以中

右等分夾和每服四錢空心煎服煎

瀉痢須要衣服周密恐傷風冷凡蘊熱血痢

裏急而痛甚雖已踈通蕩滌然其痛不減

至者非熱亦非積也榮血虧少陽剛勝陰故

爾用藥當以川芎為佐榮血一調其痛立

止

朱氏集驗方

瀉痢

至聖保命丹治赤白痢晝夜無度

真麻油

三巴豆

四黃丹

二黃蠟

四不炒

右件先將麻油同巴豆用銀鍋慢火熬成

色如埤炭黑色去巴豆不用次黃丹煎數

沸再入黃蠟熬令色黑滴入水中成膏為

其度每服一銖重半錢旋丸如菜豆大空心

赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下赤白痢乾

姜甘草煎湯下

蘇感丸治積痢不進飲神効

蘇合香丸 感應丸

右二味和合丸如菜豆大每服二三丸

薑湯吞下○醫方大成二藥和勻元如粟

米大每服五十元

玉機

淡姜湯空心下

醫方集成南北經驗方

一聖散治下痢赤白或小便不利淋瀝痛

鷺粟殼

去穢蓋洗

車前子

炒

右等分爲細末每服二錢米飲下

乳香散治一切赤白痢或雜色等痢及水瀉

乳香二錢甘草四錢草果子炮罌粟殼三十箇去

穰蓋筋膜令淨密炙

右爲中細末將乳香入乳鉢內勻三味每服二錢水一盞入茶四五粒煎至六分

無時服立有神效

御米丸治一切瀉痢

肉豆蔻 呵子 白茯苓 白朮各壹兩石

蓮肉 當歸各半兩罌粟殼壹兩半乳香三錢

右爲末水糊爲丸每服三五十丸米飲下

如血痢減豆蔻白朮加當歸罌粟殼

又方治老人下痢赤白雜色服胃風湯取効

百靈散治赤白痢

罌粟殼去穰帶用陳皮去穰木通 烏梅

車前子 甘草 黃連

右等分破咀每服三大錢水壹盞八分生薑三片棗壹枚煎八分不拘時服如腹痛

加芍藥忌酒麪雞魚一切毒物

治痢諸方赤熱白寒因暑而得先進五苓散

一服澤蘭散

澤蘭葉微炒川中米囊皮姜汁或蜜炙去膜蒿枝

以五月五日造青蒿真艾葉甘草炮

右壹服水盞半煎再鍊赤加黃連白加乾

薑

黃連丸治伏熱瀉痢不止田監薄方酒蒸黃連丸

用香薷湯下即愈

瓜藹散治五色痢疾久不愈者大研蠶三十

瓜藹一箇黃色者以炭火煨存性用

右研為細末作壹服用溫酒調服 胡大

卿有一僕患痢半年至杭州遇一道人傳

此方而愈

肉果散治赤白痢

米囊皮炙肉果一木香陳皮甘草各

錢

右細末分八服白者米湯赤者白湯

木香散 木香八兩白朮米泔水浸去白粉

南木香 用黃連水煮至乾去黃連取木香薄切焙

右為末作三服一次甘草湯下二陳皮湯

肉下五米飲下

黃連散治血痢 以上數方順慶朱承黃連一

味剉碎用無灰酒煎至七分溫服 散人掛

葛茶方止休息痢大効 此藥神效

乾薑 炮建茶各一

瓜右以烏梅取肉丸如梧桐子大每服三十

丸食前米飲下 等效

地榆散治諸般痢 地榆專治血痢

地榆 訶子甘草

石細末搗米飲調下

治諸色瀉痢方 蜀椒夏月臘氣不粘而渴宜

以香薷湯調胃 若有裏急後重宜

黑進胃風湯加枳殼 仍以麩炒去穰不若有

積滯宜進蘇感丸 若水瀉宜進酒蒸黃

連丸

嚴氏濟生方

痢疾

黑圓子治脾胃怯弱飲食過傷留滯不化遂成痢下宜速進此藥推導更須斟酌受病深淺增損圓數還當逐盡積滯方佳却徐徐補養之方見宿食門

恐此藥倉卒不能辨止用局方感應回加少巴豆為圓服之亦佳

四味阿膠圓治脇熱下痢其色黃煩躁多渴

澹寮方黃臍腹疼痛小便不利

黃連去鬚茯苓去皮二兩○澹赤芍藥三兩

阿膠蛤粉炒壹兩

右為細末用醋糊為圓如梧桐子大每服

五十圓空心食前用米飲送下

烏梅圓治熱留腸胃下痢純血臍腹疔痛或

先經下痢未斷服熱藥蘊毒伏熱滲成血痢

皆治之

烏梅肉二兩黃連三兩當歸去蘆枳殼去穢

兩

右為細末醋糊為圓如梧桐子大每服七

十圓空心食前米飲送下醫方大成集

珍方永類鈔方

當歸圓治冷留腸胃下痢純白腹痛不止得

方治冷痢清腸鳴所下純白

常歸去蘆酒洗芍藥得效方附子炮去

白朮炮厚朴薑制阿膠蛤粉炒烏

梅肉二

右為細末醋糊為圓如梧桐子大每服五

十圓空心川米飲送下醫方大成集

永類鈔方玉機微義同得効方此下云腹

苦根圓治一切毒痢及蠱注痢下如雞肝

心煩腹痛得効方此下云又脈或大或小浮

因版五石湯圓遍損陰氣甚則其血自

茜根洗川升麻得効方犀角鏡地榆洗當

歸去蘆黃連去枳殼去穢白芍藥洗

不等分為細末醋煮米糊得効方為圓如

梧桐子大每服七十圓得效方五十圓空心食米

飲送下醫方大成集或補珍方玉機微義同

嚴氏濟生續方

瀉痢

乳豆圓治大腸虛寒滑泄不止

鍾乳粉壹肉豆蔻半兩裏煨香去麩不用

右為細末煮棗肉柿和為圓如梧桐子大

每服七十圓空心食前用米飲送下

固腸圓治大腸久冷滑泄不禁

附子壹隻炮去皮臍肉豆蔻壹兩製裏煨香去麩不用

右為細末醋糊為圓如梧桐子大每服七

十圓食前用陳米飲送下

香連圓治陰陽相搏冷熱不調或瀉或痢

木香二寸分作二段一段用糯黃連半兩

一半用吳茱萸炒去菜萸不用一半生用

右為細末米糊為圓如梧桐子大每服七

十圓赤白痢用甘草乾薑湯下赤痢用甘草

湯下赤白痢用甘草乾薑湯下血痢

用醋湯下並食前服○瑞竹堂方治赤白

痢木香宜兩壹半生用壹半糯米黃連壹

壹半生用壹半用菜右為細末米粉或粟

米飯為丸如梧桐子大每服三十丸空心

米飲湯送下方同

秘傳香連圓治赤痢方同

木香切片黃連去鬚生薑切片四兩○承

右三味先鋪生薑在鍋底次鋪黃連於薑

上次又鋪木香於黃連上用新汲井水三

碗煎乾不要攪動候煎乾取出三味焙乾

碾為細末以醋調陳倉米粉打糊為圓如

小鈴方無梧桐子大每服七十圓空心食

前米飲湯送下

靈砂丹治積痢不問久新及治積瘧食瘧得效

方蠟圓又名靈砂圓治痢止

礪砂方一兩別研○得效朱砂一分

右用黃蠟半兩巴豆三七粒去殼同於銀

石器內重湯煮膏伏時候巴豆紫色為度

夫二七粒止將壹七粒與前二味同研極
 均再鎔前蠟搜和成劑每旋圓如菘豆大
 每服五圓至七圓得效方大成每水瀉用
 生薑湯下白痢用艾湯下赤痢用烏梅湯
 下服時須極空腹得効方五更服畢一時
 不可喫食臨卧服之尤佳澹寮方與可食
 淡粥一日瘧疾用乳香湯面東服於不發
 日晚間服醫方集成南止經驗方袖珍方
方與大○微義又云川溪曰仲景治痢之
成同

法下者率用承氣加減何嘗以砒巴豆丹
 礪決烈燥毒之劑蓋大黃之寒其性善走
 佐以厚朴之溫善行滯氣緩以甘草之甘
 飲以湯液灌滌腸胃滋潤輕快無所留滯
 積行即止此砒丹巴礪熱毒類聚成丸其
 氣凶暴其體重燥積垢雖行毒氣未歇備
 使有愈疾之功其腸胃清淳之氣能免旁
 損措傷之患乎

棗肉圓治脾腎虛寒或腸鳴泄瀉腹脇虛脹

或胃膈不快飲食不化

破故紙四兩

木香不見火

肉豆蔻二兩麩裏煨香

去麩不用

右為細末燈心煮棗肉為圓如梧桐子每

服七十圓用薑塩湯送下空心食前

修月魯般經後錄

蜜香飲治赤白痢神効

檳榔

粟殼

去穰蜜炒

枳實

泔浸蜜炒

青皮

去穰蜜炒

地榆蜜炒甘草

玄參

陳皮

去穰

茯苓

厚

朴蜜炒

右以吐赤者用烏梅二箇白梅壹介白者

不用烏梅每服用水二錢煎至八分去滓

不拘時候禁口痢入生姜煎服忌魚鯉生

冷鷄麵粘膩之物

宣明論

痢門類

益元散治身熱吐痢泄瀉腸癖下痢赤白瘰

閉淋痛利小便偏主石淋

乃服金石熱藥而結為砂石從小便

淋出蕩胃中積聚寒熱益精氣通九竅六府
 者也 生津液去留結消畜水止渴痢中除煩熱心
 躁腹脹痛悶補益五臟大養脾腎之氣此腎水之
藏非為主 理內傷陰痿安魂定魂補五勞七
之府也 傷一切虛損主癰瘡驚悸其季切 健忘止煩
 滿短氣藏傷咳嗽飲食不下肌肉疼痛并口
 瘡牙齒疳蝕明耳目壯筋骨通經脉和血氣
 消水穀保元真解百藥酒食邪毒耐勞役飢
 渴寒熱辟中外諸邪所傷久服強志輕身注

顏延壽及解中暑傷寒疫癘飢飽勞損憂愁
 思慮恚怒驚恐傳染并汗後遺熱勞復諸疾
 并解兩感傷寒能令遍身結滯宣通氣和而
 愈及婦人下乳催生產後損益血衰陰虛熱
 甚一切熱證兼吹妳乳癰及神驗之仙藥也
 惟孕婦不宜服滑胎也

桂府膩白滑石六兩 甘草壹兩
 右為末每服三錢蜜少 溫水調下無蜜日
 三服欲冷飲者新汲水調下解利傷寒發

汗煎

葱白豆豉

湯調下肆錢

每服水壹盞葱白五十豆豉五十粒

煮取汁壹盞調下

併三服效為度此藥是寒涼解

散鬱熱設病甚不解多服此藥無害但有

益而無損俗惡性寒兼易得之賤物而不

明素問造化之理故不取本草神驗之言

而多不用焉若以隨證驗之乃凡人之仙

藥也不可闕之

傷寒當汗而不可下當下藥則汗出自愈裏熱便得宜通而愈或半

在裏半在表可和解而不可發汗吐下者

若服上藥多愈亦獲小效是涼膈散和

解散沸鬱邪熱甚者小加減涼膈散在佳

或必不當江

蒼朮末

三分同葱豉煎湯調

服滑石麻黃桂枝

當即

甘草

防蒼朮

兩

同為末每服四錢

葱白

五豆豉

煎至七分

去洋溫服併三

遍毒散

非孕婦

太白散

加

麻黃

二兩去節如神白散

或遍毒散與加

麻黃蒼朮

各等分

濟眾云青竜散

或青龍散

滑石與

蒼朮

二最為發汗之妙藥也

唯正可汗者

則轉加熬

大逼毒散

或解利

涼膈散

感

也名曰

四錢或下乳用猪肉麩羹或酒

下益元散之類調下四錢不計時候日三

服宜食肉 催產 用溫油漿調下三錢併二
 麵羹粥 三豈承氣湯 三服以產為度或死胎不
 煎下者 三豈承氣湯 類用溫油漿調服前後
 俱下胎可活產母也凡難產或死胎不下
 皆由風熱燥澁緊斂結滯不能舒緩一故
 產戶不得自然開也其藥力至則熱結頓
 開而產矣慎不可溫補而反生燥熱也俗
 未知產後亡夜損血疼痛憊懼以致神在
 氣亂則陰氣損虛邪熱大甚而為諸證由
 不明素問造化故不識證候陰陽反以妄
 謂產後諸虛百損便為虛冷而無熱也誤以
 熱藥溫補或見渴煩者不令飲水本為善
 心為害多矣豈知治病之道俱以臨時審
 其藏府六氣虛實明其標本如法治之而
 已矣此藥之常用雖為効至太俗以病
 異藥同將為妄 今以加黃丹 是以桃和色紅
 行灰不侮慢

玉散 若青黛 合輕粉 碧玉散 若薄荷葉 末

分同 雞蘇散 主療並同但以迴避 愚俗之妄侮慢耳

玄青丸治下痢勢惡頻并窘痛或久不愈諸

藥不能止須可下之以開除濕熱痞閉積滯

而使氣液宣行者宜以逐之兼宜利積熱酒

食積黃瘦中滿水腫腹脹兼療小兒驚疳積

熱乳癖諸證 唯洩瀉 者勿服

黃連 黃蘗 大黃 人林遂 抽珍 芫花 醋

炒大戟 各半 牽牛 四兩取末二兩 輕粉 二錢

○袖珍青黛方一錢

右為末勻水丸小豆大初服十九每服加

十九空腹日午臨卧三服以快利為度機

後常服十五二十九數日後得食力

病末痊除者再加取利後却常服以意

消息病去為度後隨證止之小兒丸如黍

米大或麻子大退驚疳熱積不須下者常

服十九衛生寶鑑同

阿膠梅連丸治下痢無問久新赤白青黑疼

痛諸證

金井阿膠淨草灰炒透明白別烏梅肉

炒黃蘗剉黃連當歸焙赤芍方

藥醫林方乾薑炮赤茯苓寶鑑去皮醫林

小茯苓方白

右為末入阿膠研勻水丸桐子大溫水飲

下十九食前兼夜五六服小兒丸如菜豆

忌油膩脂肥諸物也醫方大成○醫林方

右為細末滴水為丸如桐子大小兒丸如

米大每服五十九白湯送下日夜併五七服

牛黃神金丸治大人小兒嘔吐瀉利無問久新赤白諸色或渴或不渴小便澀或不澀并小兒驚疳積熱痘癍堅積腹滿硬痛作發往來亦能寬膈消食

輕粉 粉霜 硃砂 已上雄黃研朱砂

信砒 芭豆 去皮各壹錢 黃丹 膈 三錢

右先研粉霜次旋入硃砂研細下雄黃朱

砂信砒再研下丹粉研勻別研芭豆爛為油與前藥研勻近火上炙控熱別研膈軟入藥勻搓作劑旋丸小豆大新水下壹丸小兒黍米麻子大或止吐瀉利疾調甘露散是桂苓甘露或益元散亦得

芍藥藥皮丸治一切濕熱惡痢類并窘痛無問膿血並宜服之

芍藥 黃蘗 各一兩 當歸 黃連 各半兩

右為末水丸小豆大 玉機微義同 温水下三四

十九無時兼夜五六服忌油膩脂肥發熱

諸物等也南北經驗方袖珍方同得○蘭

室秘藏右為末飯為丸如雞頭大每服五

七十九食前米飲湯下忌油膩酒濕麪等

物此林本廿續效益天增心機

貳勝丸治泄痢虛損不問久新者

搯鼓紫蒜去皮各小豆大像水

右同杵為膏丸如桐子大每服三九至五

升米飲湯下青城神方米上如未愈及赤

白痢腹滿脇痛更與杏仁丸○神効名方

香鼓丸治痢蒜為鼓為右二味相和作丸

如桐子大米飲湯送下五七十九食前

杏仁丸治一切赤白瀉痢腹痛裏急後重者

杏仁四十九箇芭荳四十九箇去皮壹大盞入此

右以藥同燒存性研細如溼用臈積定旋

丸如桐子大每服一二九煎大黃湯下問

日壹服

白木聖散子治一切瀉痢久不差并婦人產

後痢亦治

御米殼二兩蜜炒當歸 肉豆蔻 縮紗仁

石榴皮干阿子 乾薑炮 陳皮去白 白木

甘草各等分芍藥各等分

右為細末每服二錢水壹大盞入乳香少

許同煎和滓服

勝金膏治一切泄瀉痢不已謂脉浮洪者反

多日不已微小者立止

芭荳皮同燒存性楮實葉同燒存性

右為末鎔臍丸如菘豆大每服五丸煎汁

草湯下

大聖全真散治一切寒熱赤白溏泄等痢疾

御米殼半斤炒甘草壹兩炙乾薑半兩炮醋石榴

皮壹兩炒陳皮去白茯苓去皮當歸已上各兩

右為末每服二錢水壹盞小兒半盞乳香

同煎至七分食前忌油膩生硬冷物等

車前子散一名斷痢散治一切痢不止

車前子不已多炒香

右為末每服二錢米飲調下食前空心○

王氏集驗方治熱痢并小便不通車前散

車前草為末水調服無葉子亦可

象骨散治脾胃虛弱心腹脹滿水穀不消噫

氣吞酸食輒嘔吐霍亂泄瀉濃血四肢沉重

臍腹疼痛裏急夜起頻併不思飲食皆可治

之

象骨四兩呵子取肉二兩肉豆蔻壹兩枳殼壹兩

草二兩乾薑兩半

右為末每服三錢水壹盞半煎至八分

滓熱服食前日三服

海蛤玉粉散治血痢解藏中積毒熱

海蛤不已多少

右為末每服二錢入蜜少許冷水調下不

藥計時候

東垣試效方

瀉痢腸澼

癸卯歲冬十月小雪薄冰天令應時白樞判

家一老僕面塵脫色神氣特弱病脫肛日久
藥未驗近日復下赤白膿痢作裏急後重
白多赤少不在其苦先師料曰此非肉食膏
梁必多蔬食或飲食不節天氣應時衣蓋猶
薄寒侵形體乃寒滑氣泄不固故形質下脫
也蘭室秘藏天氣雖寒衣蓋猶薄不禁而腸
頭脫下者寒也真氣不禁形質不收乃血
滑脫也此乃寒滑氣泄當以澁去其脫而除
不固故形質下脫也其滑微酸之氣固氣上收去其下脫以大熱
之劑除寒補陽以補氣之藥升陽益氣是的

對其證

訶子皮散治腸胃虛寒泄瀉米穀不化腸鳴
腹痛脫肛或作膿血日夜無度

粟米

去蒂蓋蜜炒半錢

訶子

去核七分煨

乾薑

炮六分

皮

半錢

本草十劑云澁可去脫以粟穀之酸微澁
上收固氣去脫主用爲君也以訶子皮之
微酸上收固血治其形脫橘皮微苦溫益
真氣升陽爲之使以乾薑太辛熱之劑除

寒為臣

右件為細末分作二服

蘭空秘藏每服三

錢水煎至壹錢和滓熱服空心再服全愈

除濕熱和血湯

蘭室秘藏名升治腸澼下血

別作壹派其血啣出有力而遠射四散如篩

仲春中旬下二行腹中大作痛乃陽明氣衝

熱毒所作當升陽去濕熱和血脈是其治也

生地黄

半錢牡丹皮 半錢白芍藥 壹錢生甘草

半錢熟甘草

錢一黃芪 一錢升麻 七分當歸身 三分蒼

木秦苑

橘皮 二分肉桂 此熟地黃 各

右件咬咀都作壹服水四錢煎至一錢去

滓空心宿食消盡服之稍熱立效

升麻補胃湯治宿有陽明血證五月間大熱

因吃杏腸澼下血啣遠去四下散漫如篩腰

沉沉然腹中不痛血色紫黑病名曰濕毒腸

澼是陽明少陽經血證也

升麻 羌活

各壹錢獨活 防風 各半錢柴胡

半葛根三分肉桂少牡丹皮熟地黃生

地黃各半白芍藥壹錢當歸身三分黃芪壹錢

黃芪壹錢炙甘草半

同存件咬咀如麻豆大分作二服每服水二

大錢煎至壹盞去滓稍熱服食前藏同

柳華散衛牛寶鑑袖珍治腸澼血濕并

下血神效

根花六分青皮六分○袖珍壹錢當歸身壹錢荆芥

種六分○寶鑑四錢升麻壹錢熟地黃六分○

六川芎四分白朮六分○袖珍六錢

右件為細末每服二錢或三錢米飲清調

下食前忌酒濕麵生冷物藏同

益智和中湯治腸癖下紅血或色深者紫黑

腹中痛腹皮惡寒右三部脉中指下得俱弦

按之無力關脉弦甚緊肌表陽明分涼腹皮

熱而喜熱物熨之內寒明矣

升麻壹錢葛根半白芍藥壹錢炙甘草壹錢桂

枝四分益智仁半當歸身壹錢黃耆壹錢牡丹皮

半柴胡半錢半夏半錢乾薑少許肉桂壹分

右件為麤末都作一服小三大錢煎至一

錢去滓溫服一服食前藏室秘藏食後

和中益胃湯治太陰陽明腹痛大便常泄若

不泄却秘而難見在後傳作濕熱毒下鮮紅

血腹中微痛脇下急縮脉緩而洪弦中之乍

得按之空虛

熟地黄三分當歸身酒製四分升麻半錢蘇木壹分藁

本二分炙甘草三分柴胡半錢益智二分

右件都作壹服水三錢藏室秘藏煎至壹錢

去滓空心溫服一服而愈

茯苓湯治因傷冷飯水泄一夜約走十行變

作白痢次日其痢赤白腹中疴痛減食熱躁

四肢困倦無力以動

茯苓六分澤瀉壹錢當歸身四分蒼朮二分藁

下錢生薑二錢肉桂五分猪苓六分炙甘草半錢升麻

黃芩壹錢芍藥半錢柴胡二分藏二錢

右件收明分作二服每服水二大盞煎至

壹盞去滓稍熱服食前

黃芪補胃湯治一日大便三四次溏而不多

有時作泄腹中鳴小便黃

黃芪三分炙甘草二錢升麻六分橘皮三分當歸身

三分益智仁三分柴胡三分紅花少許

右件咬咀分作二服蘭室秘藏水二大盞

煎至壹盞去滓稍熱服食前除大十餘變

升陽除濕湯自下而止者別而去之

升麻半錢柴胡半錢羌活半錢蒼朮壹錢炙甘草三分

神麴半錢猪苓半錢陳皮三分大麥蘖三分防風

半錢澤瀉半錢

如胃寒腸鳴加益智仁半錢半夏半錢生薑棗

蘭室秘藏姜三片棗壹枚同煎非腸鳴不得用

右件都作壹服水二盞煎至壹盞去滓早

飯後秘藏稍熱服

人參益胃湯治頭悶勞動則微痛不喜飲食

四肢怠墮躁熱短氣口不知味腸鳴大便微

溏黃色身體昏悶覺渴不喜冷物

黃芪分二甘草分二黃芩分三陳皮錢半柴胡分三紅

花許少當歸尾分二升麻錢半白朮分三半夏分三人

參分三益智分二蒼朮錢半右都作壹服水二盞煎至壹盞去滓稍熱

服食前服藏同秘

升麻補胃湯治因內傷服牽牛大黃食藥致

瀉痢五七行腹中大痛

升麻錢半柴胡錢半當歸身分二半夏分三乾薑分二

甘草分七黃芪錢半草薺錢半紅花許少

右件都作壹服水二盞煎至壹盞去滓早

飯後藏室秘稍熱服

扶脾圓治脾胃虛寒腹中痛溇瀉無度飲食

不化

白朮錢二茯苓錢二橘皮錢二大麥蘖四錢炙甘

草錢二肉桂錢半半夏錢二乾生薑錢半呵子皮錢二

紅豆錢壹乾薑錢壹炒麴錢四藿香錢壹烏梅錢二

右件為細末荷葉燒飯為圓如桐子大每

服五十圓食前溫水送下

類聚重刊

五十七

烏梅肉圓治腸風下血別無餘證但登廁便見亦非內痔服之立效

真疆蠶烏梅肉焙乾

右為末薄糊團如雞頭肉大每服百圓食

前多用白湯送下日三服

御藥院方

治泄痢

豆蔻固腸丸

禾類鈴方治脾胃虛弱藏府頻

滑醫方大成集成南比經驗方可思飲食腸

鳴腹痛並皆治之

木香 赤石脂 乾姜 縮砂 厚朴 姜

真制肉豆蔻 面裏煨去

右為細末麴糊鈴方和丸如梧桐子大每

服六十九丸食前米飲下

縮砂丸治大便泄瀉米穀不化臍中疼痛可

思飲食

縮沙人末黃連去須附子炮去吳茱萸湯

乾薑七次焙訶子皮 肉豆蔻各壹乾薑炮木

香各半

右為細末水煮麩糊和丸如梧桐子大每服五七十九食前米飲送下

真方聖散子治男子婦人脾胃受濕中脘停寒喫物頻傷心胃滿悶脇肋膨脹腸鳴虛痞小腹豎痛臍下強急或大便不調米穀遲化裏急後重下痢膿血或下五色或便如魚腦或如豆汁或有鮮血或如爛肉相似日夜無度久而不愈嗜卧怠墜虛羸肢體沉困寒熱

作時此藥能固養脾胃溫中止腹痛服之甚有所益

御米殼五兩擣碎肉豆蔻麵裏煨赤石脂

烏魚骨去皮甘草炙揀丁香訶子皮乾

姜炮製已上

右件為細末每服先用水壹盞入乳香少許煎五七沸調藥末二錢和滓食前熱服

堅中丸治脾胃受濕滑瀉注下

黃連去須黃蘗去陳皮兩赤伏苓去皮白

木澤瀉各壹兩肉豆蔻白芍藥人參

桂半兩夏麩各半兩

右為細末水浸餛餅和丸如梧桐子大每

服五七十九食前溫米湯送下

炙肝散治脾胃虛弱五勞七傷肌體羸瘦全

不思食久患泄瀉腸滑不止心胃滿悶臍腹

疼痛或使膿血困倦無力四肢沉重及心勞

口瘡並皆治之

木香白木生犀末山茵陳去核紅

豆蔻縮沙人桂皮去蘊人參去蘊黑附

干炮裂去石斛剉炒狗參去皮川芎良姜

柴胡去苗訶子炮去核草豆蔻去皮各陳皮

白芍藥白蕪荑炒去乾姜炮桔梗

吳茱萸洗焙防風紫苑去土紫參去皮各

右二十五味各修製畢搗羅為細末每服

二錢羊肝二兩去筋膜薄批摻藥入葱白

生姜絲塩各少許拌勻用紙裹水濕文武

火煨熟却用生姜粥送下食前日進二服

水煮木香膏治脾胃受濕臟腑滑瀉腹中疼痛日夜無度腸鳴水聲不思飲食每欲利時裏急後重或下赤黃或便膿血並宜服之

木香 丁香 訶子皮 當歸 藿香葉

黃連去須白芍藥 青皮去白陳皮去白甘草炙

厚朴牛各枳實製兩乾姜炮各乳香肉

豆蔻 縮沙人各壹兩半御米殼蜜水拌炒深

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服壹丸

冰壹大盞衛生寶鑑有棗壹枚摩破煎至七分和滓

稍熱服食前

潤腸橘杏丸此二味降氣潤腸服之快腸自

無澁橘杏丸方

橘皮 杏仁去皮尖雙人麩炒黃色各等分白木

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五

丸腹空溫水下久服不損胃氣

潤腸丸治津液耗少大便秘澁下焦氣滯常

服消食下氣祛風潤燥

威靈仙茸壹兩郁李人去皮半兩木香二錢枳實

二錢 麻人半 七錢 檳榔 三人 參 二錢

右件為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服

三十九至五十九生薑湯下食後臨臥服

換腸丸治泄瀉不止及諸下痢之疾

御米殼 二兩去屑 木香 碎微炒淨秤 呵子皮 白

芍藥 甘草 炒 當歸 去蘆人 參 各一兩 白朮

白茯苓 去皮各壹兩半

右件為細末煉蜜和丸如彈子大每服壹

丸水壹盞煎化稍熟食前服

二聖散治泄痢不問新久並皆治之

乾黑木耳 炒一兩 鹿角膠 壹分炒

水右為細末每服三四錢溫酒調下不拘時

候 候

加減神功丸治三焦氣澁心腹痛悶六腑風

熱大便不通腰腿疼痛肩背重悶頭昏面熱

口苦咽乾心胃煩燥睡臥不安及治脚氣并

素有風人大便結燥

訶梨勒 四人 參 二兩去 牽牛 四兩炒 大麻人

別壽如膏四兩

右為細末入麻人搗研勻煉蜜為丸如梧
桐子大每服四十九丸溫水下溫酒米飲皆
可服食後臨臥如大便不通可倍丸數以
利為度

丙豆蔻丸治腸虛胃弱停積風冷大便泄瀉
水谷不化腹脇脹痛下痢膿血遍數頻併裏
急後重嘔逆惡心肢體困倦飲食減少並宜
服

丙豆蔻炮去麩黑附子炮去皮川姜炮去麩

硫黃研白朮炒當歸去蘆訶子皮各壹兩川

大烏頭炮去皮紅豆蔻各半兩

右為細末醋麵糊為丸如梧桐子大每服

大三丸米飲送下空心食前服

厚朴丸和脾暖胃補虛益氣治心腹疼痛胃

膈虛痞腹脹腸鳴口苦吞酸肢體倦怠飲食

減少痰逆惡心吐發嘔吐便利不調或即泄

瀉並宜服之

厚朴去皮生薑汁製四兩乾姜炮桂皮川椒及目微

炒各二兩右為細末水煮麩糊為丸如梧桐子大每

服三十九至五十九溫米飲下食亦服

大已寒凡治中焦氣弱脾胃受寒飲食不美

氣不調和退陰助陽除藏府積冷心腹疼痛

大便滑泄腹中雷鳴霍亂吐瀉手足厥逆便

利無度及療傷寒陰濕形氣沈困自汗

附子炮去皮臍川烏頭炮裂去皮臍剉作小塊

如豆大再沙令黃色

川乾姜炮裂高良姜剉桂皮去吳茱萸炒各膏兩

右為細末醋煮麩糊為丸如桐梧子大每

服五七十九丸熱米湯下空心食前日進二

服無所忌

吳茱萸洗七次焙治一切積冷脾胃不和心腹疼痛

嘔吐泄瀉腹內絞痛

吳茱萸洗七次焙良姜剉碎乾薑炮五

入石竹三味各修製畢搗羅為細末醋打麩

糊為丸如梧桐子大每服五十九空心食

前清粥飲送下

大道固腸丸治腸虛滑泄水谷直下完谷不

化久寒積冷心腹脹滿可思飲食怠墮嗜卧

困倦少力又治白帶脉候沉微

吳陽起石煆膏硫黃飛火赤石脂煆通白礬治

肉豆蔻醋裏燒熟白龍骨二兩川烏頭

炮去皮臍乾薑兩炮木香各縮沙入各半

右件研羅為細末醋麵糊為丸如梧桐子

大每服五七十丸空心粥飲下

椒艾丸治久虛寒醫方大成治下泄痢不止

烏梅去核二兩半川椒炒去目柔成無滓

艾膏兩乾姜炮赤石脂小黑附子炮裂去

右件除烏梅外同為細末將蒸烏梅肉研

勻更入熟棗肉蜜少許和丸如梧桐子大

每服二十九丸米飲湯下食前醫方集成南

珍方永類鈔方與大成同

附子畢撥丸治經虛月候不時腸滑下痢頻

併常服助氣安血大補衝任

黑附子炮裂去皮三兩 官桂去皮 良姜細

炒陽起石火燒一日 川姜炮裂厚朴製 白木剉

白茯苓夫皮 赤石脂火燒通紅 肉豆蔻醋和

燒壹兩半 右件各修製畢搗羅為末酒煮麵糊為丸

如梧桐子大每服四十九空心食前服

大聖散治脾胃積寒心腹疼悶藏府泄瀉腸

鳴絞痛

益智二兩連皮炒 川烏炮裂 陳皮湯浸去

兩乾姜炮裂半兩 茴香七錢 甘草二錢

果右為末紗羅子羅每服二錢水壹盞入搵

一捻同煎至七分去滓食前熱服

得効方五

百下痢

風證神木散治胃經傷風自汗小便難下痢

嗽方見咳

露宿湯方見三

因方

頭

方

方

方

胃風湯治法藥件并見泄瀉門

寒證人參敗毒散治寒邪壯熱下痢及所下

似痢非痢似血非血色如濁酒者加陳米

百粒煎方見傷寒門

不換金正氣散治臟腑受寒下痢赤白加烏

梅陳米煎方見傷寒門

暑證六和湯治胃暑伏熱致成痢疾煩渴小

便赤澁方見諸暑門

五苓散治同上能分陰陽利水道方見諸暑門

藥皮湯治暑痢方見泄瀉門

酒蒸黃連圓治伏熱瀉痢不止用香薷散燈

心二十莖車前草二根煎吞服立效方見後

濕證加味除濕湯治一身盡痛重著浮黃下

痢如豆羹汁方見後

牛夏麩去麩皮厚朴薑汁炒蒼朮炒藿香葉

陳皮炒茯苓各五錢粉草五錢官桂 木香各三錢

右剉散每服四錢水一盞半生薑三片紅

棗二枚煎服空心仍以五苓散兼服利其

小便

艾薑圓

方見直苦散因方見三

熱證小承氣湯治下痢赤黃但煩飲冷小便

不利得熱則極心煩燥喜渴先服壹二服

蕩之須審是實熱方可次用五苓散加車

前子以利小便黃連阿膠圓佐治之即效

方見諸暑及咳嗽門

小柴胡湯治下痢赤白心中煩燥潮熱加赤

芍藥地榆麥門冬淡竹葉煎效

方見傷寒門

敗毒散治同上加陳米煎

方見傷寒門

烏梅圓治下痢純血臍腹絞痛脉急大數由

腸胃久虛或先經下血痢未止服熱藥蘊毒

伏熱滲成血痢

烏梅

二兩

黃連

三

茶萸

當歸

皮

各乙

不為末醋糊圓如梧子大每服三十圓米

飲湯下更以意加減服

飲湯下更以意加減服

地榆散治熱留腸胃下痢鮮血亦名瀉火散

方見諸暑門水瀉時因成淋下大便如三十圓米

藥皮湯治熱證發熱下痢方見泄瀉門

芍藥藥皮方見宜論三葉黃

三黃熟艾湯治傷寒四五日大下熱痢諸藥

不止宜服此除熱止痢亦作圓子熟水吞下

四十圓治時行毒痢良驗

黃芩黃連黃蘗各二錢熟艾半個雞子大

右剉散每服三錢水清盞煎去七分去滓

水瀉加不拘時服下白痢或瀉或痢

酒蒸黃連圓治身熱下痢鮮血煩躁多渴或

傷熱物過度本經蒸黃蘗化驗藥散

黃連音斤好酒二勝

法右用酒浸瓦器盛置籠上蒸至爛取出曬

乾研為末用麵糊為圓如梧子大每服三

十圓熟水吞下又療傷酒過多臟毒下血

大便泄瀉用溫米飲下食前一日兩服

白頭翁湯方見金匱

冷證當歸圓 方見嚴氏濟生方

大凡痢疾雖體寒手足逆冷汗自出六脉沉伏不宜輕用附子多因伏暑而得此疾亦有冷汗自出四肢逆冷六脉虛弱但背寒而垢或面如塗油齒乾煩冤燥渴引飲此伏暑證也
小柴胡湯五苓散酒蒸黃連圓必能奏效學者宜審思耳 方見傷寒門諸書
水煮木香圓治純下白痢及淡紅黑痢

汗罌粟殼 二兩去 訶子肉 六錢 乾薑 四兩 木香

青皮 三錢 陳皮 三錢 甘草 三錢 歸身 四兩 白芍藥

右為末煉蜜圓如彈子大每服壹圓熟水

空心服 ○ 滄察方治一切赤白痢膿血相

雜裏急後重或臟腑滑泄日夜無度或積寒久冷臍腹疼痛可思飲食罌粟殼 半斤

蓋訶子 二兩 訶子 二兩 乾薑 二兩 木香 二兩 陳皮 二兩 青皮 二兩 甘草 二兩 川當歸 二兩 白芍藥 二兩

補... 川當歸... 白芍藥...

和為細末煉蜜為圓每樽兩作六圓每服

壹圓水膏盡煮至七分冷心服粟殼...

豆蔻散治脾虛腸鳴久痢不止齊煎...

大肉豆蔻一枚刺小孔子入乳香五小糖

右為末每服等錢米飲調平地黃圓燕水

附子理中湯正理中湯加炮附子每料壹兩

木附湯薑附湯治同上方並見霍亂散

玉華白丹治臟腑久虛下痢空心米飲下湯

者人參湯下亦治腸風下血

震靈丹橘皮煎圓治同上方並見痢冷

鍾乳建脾圓方見千金方木香散方見和劑局方

五積散治內傷生冷下痢加縮砂木香製粟

殼炒阿膠大效方見傷寒門

椒艾圓治虛寒下痢不止方見泄瀉門

四桂散治下痢又復洩瀉耳鳴手冷腹痛加

木香生薑棗子粟米煎就調後藥方見泄瀉門

赤石脂散治腸胃虛弱水穀不化洩瀉注下

腹中雷鳴及冷熱不調下痢赤白腸滑腹痛

遍數頻多脇肋虛滿胸膈痞悶肢體困倦飲

食減少

赤石脂炙各乙兩甘草二錢半肉豆蔻麩裏煨

兩縮砂仁五兩

為末二錢粟米飲調

冷熱不調下痢真人養臟湯

香連圓治全方並見

駉車圓治全方見後已上三方

氣痢牛乳湯方見神巧

木香流氣飲治同上方見諸

五膈寬中散治同上方見隔

異香散治憂鬱氣滯不散腹中膨滿刺痛下

痢不止

蓬莪茂煨益智仁炙甘草炙京三稜煨

青皮去白陳皮大白各石蓮肉乙兩厚朴薑汁

二兩

右剉散每服二錢水膏瑗薑三片棗壹枚

搥膏捻前七分通口服不計時或搥湯搥酒亦可

木香勻氣散治氣痢腹痛經驗方見諸

積痢治食積下痢腹內緊痛不進飲食搥梅

冰湯或米飲多服盧氏感應圓或用蘇合香

異圓和圓仍用黍胃液五零散二末藥搥湯

空心服調理立安方見積聚諸氣及脾胃諸暑門

蠟置圓又名靈砂圓治痢止水瀉方見姜氏濟生續方

禁口痢敗毒散治心煩手足熱頭痛此乃毒

氣上衝心肺所以嘔而不食每服四錢水

煮盡半陳倉米百粒姜三片棗壹枚煎溫

服方見傷寒門

真科參苓白朮散治禁口痢食飲不下棗湯

調效方見脾胃

煨鯽魚方方見是齋醫方

休息痢加味養臟湯加炮附子青皮烏藥炭

苓各五錢治傷酒肉炙燂後發為痢疾休

作無時名曰休息生姜三片紅棗二枚煎

方見泄瀉門

神效散治休息痢氣痢膿血不流疼痛困弱

常歸煨烏梅肉黃連 白芍 白朮 白茯苓

右等分爲末研大蒜成膏爲圓如梧子大

每服二三十圓厚朴湯下一方加阿膠

炒五積散治同出生薑 三片 紅棗 二枚 搯梅

膏筒木香半錢方見傷寒門

駐車圓方見 金方 升 米 百 味 三 引 出 黃 連 頭 煎

秘方養臟湯治同上方見 後 視 不 食 或 泄 瀉 四 錢 木

大已寒圓虛冷者效方見泄瀉門 薑茶圓方見朱氏集驗

方 濟 生 方 氏 集 驗

毒痢茜根圓方見嚴氏

魚鮓湯治痢下五色膿血或如爛魚腸並無

大便腸中攪痛不可忍呻吟叫呼聲聞于外

粉霜研 輕粉 朱砂研 礪砂研 白石 丁香

各一錢 乳香錢 巴豆二七 个 去 殼 不 去 油

右爲末蒸棗肉爲圓嬰孩三圓如粟米大

二三歲四五歲如麻粒人每用三四圓並

旋圓煎鮮湯吞下仍間服調胃藥此證緣

久積而成故小兒多有之澹寮方同

蟲疰痢羚羊角圓治下血黑如鷄肝色相似

時發渴者神傳米炒陳好下衣

大羚羊角壹兩宣黃連二兩白茯苓一兩黃柏去

皮乙兩半右為末煉蜜圓如梧子大每服五六十圓

蠟茶送下病危者復生若血鮮滑洩不固

欲作厥狀此藥不可服當灸臍下氣海關

大

元二穴更服玉華白丹方見痢

參附湯

人參絲附炮去皮勝

肉豆蔻微火煨裂

右判散每服二錢水盞半生薑七片棗二

枚煎食前服

腹痛不止薑茶方治痢下腹痛肚皮熱手不

可近右用生薑切碎如粟米大草茶相等

煎服效又方煮茶白痢用蜜赤痢用薑末

効用真人養脯湯再加楊芍藥當歸立止

方見泄瀉門

香連圓治冷熱下痢腹痛甚肛門所泄皆熱

方見泄瀉門

木香勻氣散治宿冷不消氣滯腹痛用紫蘇

湯調下末效用乳香沒藥湯調服方見諸痢門

瘧痢六和湯治夏月冒暑瘧痢俱作瘧則間

日而寒戰掉煩燥難禁當發瘧之時痢或

暫止痢則腹痛晝夜頻數又胸滿乾嘔食

藥莫下以此藥治之用生薑三片烏梅一

个紅棗二枚麥門冬二十粒去心煎仍間

服香連圓米飲下未效用五苓散消暑圓

仍多服加減清脾湯更用勝金圓斷之方

諸暑泄瀉及諸瘧門

痢風加味敗毒散治痢手足拘攣疼痛加檳

榔木瓜虛人五積散合和生薑紅棗煎方

傷寒門

天防風湯祛風順氣活血脉壯筋骨逐寒濕

逐冷氣又治患痢後脚痛痿弱不能行履名曰痢風或兩膝腫大痛髀脛枯腊但存皮骨拘攣踈卧不能屈伸名曰鶴膝風服之氣血流暢肌肉漸生自然行履如故

熟乾地黃洗白朮各二兩羌活去蘆人參去蘆

兩川芎洗附子炮去皮臍防風去蘆牛膝去蘆

去蘆酒浸切川當歸洗去蘆酒浸黃耆去蘆

微炒乙兩杜仲去蘆白芍藥各二兩甘草炙

右到散每服五錢水壹錢半生薑七片大

棗壹枚煎八分空腹温服

郁李圓治痢後風手足不能屈伸或麻豆證傳變手足筋脉急亦能治之

郁李仁 枳殼 川獨活 鱉甲醋炙

右等分爲末木瓜湯調下酒亦可

又方治脚手皆腫不能行步

川烏 赤芍藥 蒼朮酒浸土朱

右爲末糊圓如梧子大引子同上

通治木香散住腹痛痢

南木香錢五 地榆兩壹 黃連錢七 青皮錢五 赤芍藥

枳殼錢六 乳香錢五 甘草錢五

右為末每服二錢熱湯調服

黑豆散

小黑豆炒 川練子 烏梅 甘草 乾薑

罌粟殼二个去 帶蔓穰

右到散煎至七分將紗濾過捩自然汁空

腹服

當歸散住瀉痢

地榆 陳皮 罌粟殼去帶穰 當歸尾 赤芍

藥 甘草 肉豆蔻煨 加黃連

右等分為末每服壹錢冷水調服

獨神圓方見是 齋醫方

神應散治痢緊嚴絕妙

余罌草梗 肉豆蔻 訶子 罌粟殼去帶

又地榆 甘草 當歸尾 茯苓 白朮 枳

殼夫 烏梅各乙 丁皮 木香住痛 陳皮

若紅痢勿用 煎藥茶煎以煎藥不

右為圓或末五花痢用春茶陳皮煎湯下
 如是末用蜜壹匙春茶烏梅煎湯調服又
 又方金嬰華葉及子煎粟殼去穰及蒂水
 右為末用蜜圓如手指大湯引同送大毒
 秘方養臟湯治五色痢經驗

陳皮去穰枳殼去穰黃連去穰南木香 烏梅去核
各五錢 蒼粟殼去穰厚朴去穰杏仁炒
錢重 甘草各五錢 豆豉炒 瓜蒌炒
去皮 右判散五色黑豆棗子煎紅痢生地黃春

茶汁草節煎服五色久不效加龍骨赤石
 脂人參楊芍藥各一兩為末蜜圓烏梅甘
 草湯下粟米飲亦可立效

大阿膠圓治發熱下痢腹痛甚肛門痛欲
 絕者
 常歸 阿膠炒 豆蔻煨 竜骨 赤石脂

大艾 黃連各半兩 木香 乳香別研 白礬五錢
分 右為末拉梅肉圓每服三十圓如梧子大

陳米飲下

四物湯治血痢方見婦人推車圓治同上方見

前九聖圓治上痢赤白日夜無度裏急外重

緊痛服之特效

鶯粟殼去帶殼米醋炒壹兩重川烏炮去皮黃連去南

木香北赤石脂麻枯礬肉豆蔻煨乾

薑白茯苓去皮各五錢中

右為末醋煮陳米粉糊為圓梧桐子大每服五十圓空心米飲下腹痛不止當歸乳

香湯下又名緊皮圓

立效散方見和劑大斷下圓治久痢不止方見泄瀉

門沒石子圓治臟氣虛弱大腸滑洩次數頻

併日漸羸瘠不進飲食或久患赤白痢脾瀉

等疾並皆治之

白米各三錢白茯苓切作片訶子此

炮取赤石脂別下香不見火肉豆蔻炒

沒石各二錢

右和勻用湯泡蒸餅為圓小梧桐子大每

服三四十圓米飲吞下粥食前一日三四服棗肉圓亦可

荆芥湯治自痢血痢或婦人血崩

荆芥 楮樹皮 白

等分剉散治血崩每服二錢水壹盞煎

至七分去滓放溫服如血痢則為味冷醋

調徐徐呷服白痢熱醋調下神效不可具

述 大調十圓亦入酸不五

香茸圓 方見聖惠方

平胃散治血痢 高誠

右秤壹兩入川續斷麤末二錢半拌勻每

服二錢水一盞煎七分服 方見脾胃

樗白皮散 方見是齋醫方

百中散治一切痢不問赤白或一日之間一

二百行只一服便疎再二三服即愈 方見是齋

醫方

酸石榴皮散治同上

石榴皮 陳皮 甘草 川當歸 鶯菜

穀去帶芎種各半兩

右剉散用水十盞煎取三盞次用下藥

茯苓七錢粉草七錢北五味子七介

右為末將前藥汁入此三味再煎五七沸

去滓空心溫服甚者不過兩劑輕者一劑

立效

乳香散方見是齋醫方

加減木香煮散治一切痢神妙

木香 甘草 當歸 肉荳蔻 人參

官桂 楊芍藥 訶子 烏梅去核 阿膠粉

炒白茯苓各五錢 鶯粟殼官兩半去帶

右剉散每服四錢水一錢半生薑三片紅

棗二枚同煎去滓空腹服

加味四君子湯治久患痢疾服藥已多而疾不愈且治痢多是攻擊臟腑之藥轉覺難安宜用輕清和氣之藥即愈

人參 白朮 白茯苓 川芎 黃耆

甘草 鶯粟殼製同上

右各等分判散每服三錢水壹瓊半生薑
三片棗子二枚烏梅壹个煎溫服黃香

澹軒方

夏秋瀉利

暑毒侵脾濕侵脚不瀉即痢否則瘧雄黃蒸

餅合和藥甘草作湯服安藥

痢

醫言無積不成痢本法元投感應元蕩積須

添巴豆子却隨赤白自尋方

痢無赤白總堪憂一種玄胡索易求瓦上炒

乾為細末米湯壹服頓能瘳

建茶一捻細羅研練白塩梅搗作元白痢烏

梅赤甘草各湯吞下便安然

久痢

久痢纏綿命不延生薑搗汁浸黃連炒焦為

末蜜元服送以臘茶酒食前

痛痢

痢時疼痛有良方端的無如四物湯加著阿

膠并熟艾濃煎熱服自安康

時行赤痢

時行赤痢不難醫甘草橘紅榴樹皮蜜炙去
年鶯粟殼烏梅煎服自能醫

赤痢

熱成赤痢有方治雞爪黃連細末之雞子清
調作圓子薑湯吞下効無疑

白痢

灼如冷證痢成白須服官方大已寒附子理

中湯未効更投米飲震靈丹

血痢

血物須還四物湯更兼痢藥服之良駐車圓
子吞成百三服之間便復常

壹兩現成平胃散更加壹分用續斷水煎連
併服三錢血痢即時疎更罕

噤口痢

痢逢噤口三方傅剝取烏蓮心肉研山藥半
生仍半炒米湯調服各三錢

輕粉同研大蒜元貼於臍下便思餐不然火
煨白梅末湯下二錢腸亦寬肉厚山藥半

痢後痛風

痢後偏生痛脚風豈般五積自能攻於中去
却麻黃味酒煮多多服見功

澹寮方

痢疾

嘗有夏月胃暑伏熱瘧痢俱作瘧則間日而
寒熱戰掉煩燥難禁當發瘧之時痢或暫

止痢則腹痛晝夜頻數又胃膈緊隔乾嘔

食藥莫下先用六和湯

方見諸暑門

次下茯苓

半夏湯及生半夏圓

方見咳嗽門

胃膈稍開却

用常山為圓斷瘧次用臟腑痢疾藥也其

功多在六和湯

治痢因腸胃間有酒食生冷積滯而成即古

方所謂滯下者用加巴感應圓十餘粒白

梅煎茶或薑湯嚥下如小便少五心煩熱

煎生料五苓散吞下先令大便利去積滯

却服斷下湯之類當應手而愈

治下痢赤白心中煩燥潮熱小柴胡湯加赤

芍藥地榆煎服

治下痢發熱或口噤敗毒散用生姜棗子陳

米煎服痢後手足疼痛敗毒散加檳榔木

瓜煎服此即所謂痢後風也

治痢以鶯粟古方未聞今人所用雖其法小

異而皆有奇功或用數顆慢火炙黃為末

米飲下或去粟用殼如上法或以殼五七

枚甘草壹寸半生半煖大碗水煎取半碗

麻溫溫呷服蜀人山叟曰川殼并去核鼠查

子各數枚焙乾末之飲下尤治噤口痢

編 飲末至煎二三次服之煎在汁食

唐憲宗賜馬捻治瀉痢腹痛方以生薑和皮

切碎如粟米大用草索相縛煎服之元祐

二年文潞公得此疾百藥不効而傳此方

遂愈良方

痢疾噤口數日不食食必吐瀉瘡殆盡用烏

骨鷄修事如常白煮清汁與服服之其自
胃氣頓開痢止人活此異人方也增品方

固腸散主瀉痢日久來正癘不能食此方

肉豆蔻用生木香不規訶子地乾薑地阿

膠炒陳皮白罌米殼等分醋炙

右為末生薑二片紅棗壹枚煎至七分臨

臥服此散

痢疾不納飲食俗謂之禁世醫者但知其危

篤而畏縮更不究其所致危篤之由故多

不救良可愍哉易簡方謂宜用四桂散理

中湯參苓散加肉豆蔻木香輩或噤震靈

丹等藥何乃王德膚知其一而未知其二

耶蓋古方有用清心壓毒藥者有用生胃

進食藥者豈可執以一律齊之如診而知

其脾胃脉不弱問而知其頭疼心煩手足

濕熱未嘗多服涼藥此乃毒氣上衝心肺

所以嘔而不食宜用敗毒散每服四錢重

陳倉米壹百粒薑三片棗壹枚木壹蒸半

煎至八分去滓溫服又方用石蓮子搥碎
去殼留心并肉碾爲細末亦川陳米飲調
下若其脉微弱或心腹虛膨或手足厥冷
初病則不嘔嘗服鶯粟烏梅及苦澁涼劑
或飲葷藥已多早晨未食先嘔或纔聞穢
氣卽嘔不思飲食此乃脾胃虛弱却不可
信易簡方之言然別有一方尤爲易簡也
一味山藥剉如小豆大壹半銀瓦銚肉炒
熟壹半生用同爲菜飯飲調下自有奇功

又嘗觀前輩癰疽方治嘔而不食亦有一
說毒氣攻心者却以乳香菘豆粉作內托
裏散治之如脾胃虛弱者用嘉禾散山藥
圓治之若胃中更有活法哉其方爲禁口
痢用又何患不收功於危篤邪嶺南衛生集
凡人患痢不問赤白脉小身涼者易安脉大
身熱者難差患痢未有不腹痛者皆緣有
積故也暑積及熱積多患赤痢冷積多患
白痢亦有腸胃有風而患赤痢者有冷熱

不調而患赤白痢者暑積痢可用黃連阿膠圓絲煎散加滑石白痢可用駐車圓感應圓冷熱不調戊己圓巴豆圓子之類醫有人久患赤白痢服藥已多而疾不愈且治痢多是虛藥攻擊臟氣不和轉覺難安史載之用輕清和氣藥與之遂愈其方用

罌粟殼炙 人參 白朮 白茯苓去 川芎 甘草炙 黃芪

右等分細末每二錢水壹盞生薑棗子烏

梅半箇不必多 煎八分溫服醫說

獨異志唐貞觀中有僧指張寶藏云六十日丙官登三品言訖不見寶藏還京師太宗苦氣痢進乳煎葦撥方上服之立差宣下宰臣與五品官宰臣魏證難之逾月不進擬疾復發久命進之一啜又平因思曰嘗令與進方人五品官不見除授何也證懼日奉詔之際未知文武上怒曰治得宰臣愈可與五品官我天子也不妨與三品文

官時恰六十日矣其方每服川牛乳半斤
革撥三錢匕同煎減半空腹頓服方良

衛生寶鑑

泄痢

芍藥黃芩湯

玉機微義名黃芩芍藥湯

治泄痢腹痛後重

身熱久不愈脉洪疾者及下痢膿血稠粘

黃芩

芍藥

各一

甘草

半

右咬阻每服半兩

壹兩

水壹錢半

方二

煎至壹錢去粗温服不拘時

披粹方同

口服食前

大黃湯治瀉痢久不愈膿血稠粘裏急後重

日夜無度

醫林方治便血身熱脉勝

不用大黃壹兩剉

碎好酒二大錢同浸半日許再同煎至壹

錢半

去粗

將酒分作二服頓服之

痢止勿服如未止再服取利為度後服芍

藥湯和之痢止再服白朮黃芩湯

拔粹方玉機微

義服芍藥黃芩湯

蓋徹其毒也

芍藥湯行血調氣經日溲而使膿血知氣行

而血止行血則便自愈調氣則後重除屎行

芍藥一兩當歸一兩黃連各半黃芩各半

黃三錢桂二錢淡一錢白草一錢檳榔二錢

錢三木香一錢方玉機一錢微義一錢如使一錢

汗後臟毒加黃藥半兩公二兩助二兩

右九味咬咀每服五錢水二錢煎至一錢

去相溫服食後溫服之如痢不減漸加吐

大黃食後不愈血脈真忘外重

白朮黃芩湯服前藥痢疾雖除更宜調和

白朮一兩黃芩七錢甘草三錢

右三味咬咀作三服水壹錢半煎壹錢溫

服清拔粹方玉○袖珍方右咬咀每服壹

兩水二盞煎至壹盞去滓通口服食前煎

漿水散治暴泄如水醫林方治下有周身汗

自出背身盡冷脉微而弱氣少不能語甚者

加吐此為急病

半夏二兩附子炮桂乾薑甘草炙各

良薑二錢

右六味為末每服三五錢漿水二錢煎至

半錢和粗熟服拔粹方同甚者三四服微者一

二服醫材方右為細末每服三五錢漿水一大盞同煎熟服并進二三服太

陽經傷動傳太陰下痢為鶩溏大腸不能

禁固卒然而下下成小油光色其中或有

硬物欲起而又下欲了而不了小便多清

此寒也宜溫之春夏宜桂枝湯秋冬宜白

朮湯利則於三週水立減半煎少類品

桂枝湯方

桂枝 白朮 芍藥 各五錢 甘草 二錢

右四味咬咀每服五錢水壹觥煎七分去

粗溫服其脈弱胃弱或白熱諸病皆

白朮湯方

白朮 芍藥 各三錢 乾薑 五錢 甘草 二錢

右四味為籠散如前煎甚者去乾薑加附

子三錢謂辛能發散也

內經曰膿血稠粘皆屬於火夫太陰主瀉少

陰主痢是先泄而亡津液火就燥堅惡燥居

下焦血分其受邪者故便膿血也然青白爲寒赤黃爲熱宜須兩審治熱以堅中丸荳蔻香連丸治寒以白膠香散或多熱少寒水煮木香膏虛滑頻數宜止澁宜養臟湯病氣大退正氣未復常補且如瀉痢止脾胃虛難任飲食不可一槩用尅伐之劑若補養其脾胃氣足自然能飲食山錢氏方中異功散設或喜嗜飲食太過有傷脾胃而心腹痞滿嘔逆惡心則不拘此例

當權用橘皮枳朮各壹服得快勿再服若飲食調節無傷則胃氣和平矣

堅中丸治脾胃受濕滑泄注下

黃連去須黃蘗

赤茯苓

去皮澤瀉

白朮

陳皮

肉荳蔻

人參

白芍藥

官桂

半夏麴

各半

右十壹味爲末湯浸蒸餅丸如桐子大每服五七十九溫米飲送下食前

丁巳年八月從軍過鄧時值霜雨民多痢疾

遂得白朮安胃散聖餅子於高仲寬處傳之
 用之多效故錄于此
 白朮安胃散治一切瀉痢無問膿血相雜裏
 急後重窘痛日夜無度及治小腸氣痛婦人
 臍下虛冷并產後而枕塊痛亦治產後虛弱
 寒熱不止者

米穀 三兩去頂 茯苓 去車前子 白朮 各一
帶蜜拌炒
 烏梅肉 各半 五味子 各半
 右六味為粗末每服五錢 神功水二錢

煎至壹錢去粗空心溫服之

聖餅子治瀉痢赤白臍腹撮痛久不愈者

定粉 蜜陀僧 玉機微 舶上硫黃 各三錢

黃丹 二錢 輕粉 少許

右五味為末入白麵四錢匕滴水丸如指
 頭大捻成餅廕乾食前溫漿水磨下大便
 黑色為效

南白膠香散治脾胃虛寒滑腸久瀉臍腹疼
 痛無休止

米殼

四兩

龍骨

南白膠

各三錢

香甘草

七錢

炙乾薑

半兩

右五味為粗末每服五錢水壹觥半煎至

壹觥去粗溫服食前忌冷物傷胃下大

芫蕤燥腸九治沉寒痼冷泄痢腹痛後重

附子

炮去皮

赤石脂

各一兩

舶上硫黃

良薑

切

芫蕤

乾薑

各半兩

右六味為末醋糊丸如桐子大每服三十

丸米湯下

施圓端

食前忌牛冷硬物及油

膩物

玉粉散治冷極泄瀉久作滑腸不禁不思飲

食宜服神效

紅豆

揀淨

大附子

炮去皮

乾薑

炮各半兩

舶上硫黃

別研二錢半

右四味為末入研藥勻每服二錢空心半

稀半稠粟米飲下至晚又壹服重者十服

心效輕者三五服安

玉粉丹逐化虛中積止膿血痢撮痛裏急後

重並皆治之

定粉半兩粉霜三錢延胡三錢膩粉壹錢石燕子壹筒

半兩陳粟米為下煎熟又壹匙煎

右先杵石燕延胡為末入乳鉢內共粉霜

等一處研如粉雞清丸如豌豆人每服三

丸至五丸溫米飲下食前臨卧不論老弱

妊婦產人皆可服之粥飲下五丸或另丸

一等麻子大量小兒大小夜臥溫米飲下

五七丸漸服十九丸忌油膩粘滑冷硬等物

四時用藥例

洩而使膿者小腸泄也脉以五至以七洪大

者宜以七宣丸脉平和者立秋至春分宜香

連丸春分至立秋宜芍藥藥皮丸四時皆宜

加減平胃散如有七宣丸證候者亦宜服此

藥去其餘邪兼平胃氣

芍藥藥皮丸方按粹方抽珍方治便膿血

芍藥 黃蘗各等分

右為末醋糊丸如相子大每服五七十九

溫米飲送下食前

玉機微義右為未水丸

加減平胃散經云四時皆以胃氣為本久下血則脾胃虛損而血不流於四肢却入於胃中而為血痢宜服此滋養脾胃

木香

檳榔

各三錢○拔粹方各壹兩半

白朮 厚朴

製陳皮

各壹錢

甘草

七人參

黃連 白茯苓

芩 阿膠

炒

桃仁

各半兩

右十壹味為末每服五錢水三錢生薑三片棗子壹箇煎至壹觥去粗溫服無時拔粹

方右為細末同平胃散煎服

加減法

血多加桃仁

氣不下後重加

檳榔木香

拔粹方無水香

膿多加阿膠 腹痛加

官桂

拔粹方無官桂

芍藥 甘草

濕

拔粹方作乾

多加

白朮

脈洪大如

拔粹方作加

大黃 熱泄加

黃連

小便澀

拔粹方作泄

加茯苓澤瀉

拔粹方無

澤瀉

阿黎勒丸治休息痢日夜無度腥臭不可近臍腹撮痛諸藥不效者

呵子主核母丁香三十箇椿根白皮一兩玉機微

雨義此藥以厚朴煎取汁與藥同煎

右為末醋糊丸如桐子大每服五十九陳

米飲送下空心食前

鞠窮丸治中風或中風濕臟腑滑瀉

附子 芎藭 白朮 神麴各等分

右四味為末麴糊丸如桐子大每服三五

十九溫米飲送下此藥亦治飧泄甚妙素

問云春傷於風夏必飧泄米谷不化蓋春

木旺肝生風邪淫於脾經夏飲冷當風故多飧泄也

陳麴丸磨積止瀉痢治腹中冷疼

陳麴一兩官桂 人參 乾薑 白朮

當歸 甘草炙厚朴各半兩

右八味為末煉蜜丸如桐子大每服三五

十九溫酒或淡醋湯任下食前日二服

醫方類聚卷之一百三十九