

醫方類聚卷之五十七

傷寒門三十一

澹軒方

感冒

觸著風寒意不佳生薑搗汁莫留滓一盃熱

酒和調服五積香蘇未足誇

乍覺風寒感冒初橘皮蒼朮及薑蘇四般合

和砂鍋煮連沃三盃病已除

入疫家



雄黃細末水調濃蘸筆深塗鼻竅中或撚指
來時搐鼻自然清淨上元官

傷寒指掌圖

酌準料例

傷寒方內所載衡量皆依漢制與今之輕重
淺深不同者蓋隨時更變也若古方大陷胃
湯大黃六兩芒硝一升甘遂二錢水六升煮
取二升分二服以今用之無乃太甚乎若以
漢之五銖錢秤較加以二倍頗與今數合後

世以古之三兩爲今之一兩則彷彿也若桂
枝湯用桂枝芍藥生薑各三兩卽今之一兩
甘草二兩卽今之六錢二字半水七升卽今
之二升三合半度可滴中如大陷胃湯雖三
之取一亦似不倫蓋歷年寢遠傳寫乘訛或
分兩少而水數多或水數多而分兩少輕重
不等器量頗殊却當視病淺深察藥柔峻以
意斟量不可偏執若此甚衆不能枚舉然秤
有銖秤有字秤銖秤以六銖爲一分四分爲

一兩字秤以四字爲一錢十錢爲一兩若升合者古方謂一升準今之一大白盞也一合二合微此酌量之後之雜方謂水一盞者準今一中盞是乃酌古準今以便修製云

增補藥品

南陽書謂仲景證多而藥少使皆如仲景調理既正變異不生則麻黃桂枝青龍用之而有餘以後世望聖人難矣此譏甚至因採外臺千金聖惠等方補而完之今除仲景正方

外并於南陽等書擇可用者兼而充之但雜方內藥性峻烈及不循法度者亦不敢取然南陽所載湯劑每服並抄五錢匕恐劑小病大者不能的中今以劑之小大稍加增損餘如群隊和平所投切當以効爲期不能較於毫忽也

製藥例

麻黃 去節湯泡 甘草 炙 杏仁 去皮尖 麥門冬 去心
茯苓 去皮 乾薑 炮 附子 或生或炮並去皮臍 半夏 湯泡七次 栝

婁去皮 栝婁根去麤皮 細辛去土 柴胡去蘆 牡蠣 煨枳
 殼去麤皮 枳實去殼 旋覆花去支梗 黃蘗去麤皮 梔子去擘
 厚朴去白皮 烏梅去核 防風 羌活 桔梗
 獨活 前胡並去蘆 地黃洗去土 鱉甲醋水蛭去
 炒 蟲蟲去翅足 茵陳 蘧麥 白薇 茅花
 紫蘇 牛膝並去梗 黃耆炙 天南星炮 商陸
 去 陳皮去麤膜 青皮去穢 紫苑去土 延胡索去浮皮 巴
 豆去殼并心 百合水洗漬 茱萸湯泡 皂角去皮

子酥 瓜蒂炒 蜀椒去目并合 秦皮去麤皮 海藻
 洗去 甘遂濕紙煨 芫花醋拌 大黃濕紙裏煨 脾
 焙 蜀漆洗去腥 滑石 赤石脂 禹餘糧
 作湯並 石膏 代赭石 寒水石作湯並 煎
 沉香 丁香 木香 肉桂並不見火 苦酒即米醋
 豉即淡豆豉 人溺即童便 猴鼠糞即雄鼠屎 猪膚諸
 所載不一考之韻膚皮也及禮運疏曰膚革
 外薄皮革膚內厚皮此正燂猪時皮上黑膚
 乃膚淺白粉即米粉 潦水漢書謂潦亦作滂又
 之義也 亦雨甘爛水取水六七升置大盆內以杓揚
 澤水取水六七十升置大盆內以杓揚

之連即連翹根如牛旁可食者即牛旁根萎蕤似

精而小異所大青用葉或

一桂枝湯加黃芩名陽旦湯太陽中風發熱

汗出鼻鳴乾嘔

桂枝 芍藥各一兩 甘草六錢二 生薑兩一 大

棗十二枚

水二升三合半煎取一升去滓分三服啜

稀粥取微汗

二桂枝甘草湯發汗過多叉手自冒心心下

悸欲得按

桂枝一兩 參六錢二 甘草六錢二

水一升煮取三合半去滓頓服

三桂枝葛根湯傷風項背強有汗不惡風柔

瘕桂枝湯內加葛根一兩三錢一字半

四桂枝石膏湯熱病夏至後同桂枝用桂枝

湯內加石膏一兩三錢一字半

五桂枝新加湯又名桂枝芍藥半夏生薑湯

汗後身痛脉沉桂枝湯內加人參一兩芍

藥生薑各三錢一字半加水作四升

六桂枝附子湯風濕身疼脉浮虛瀼漏風桂

枝湯加附子一枚

七桂枝大黃湯關脉沉實按之痛大便秘桂

枝湯內加大黃壹兩三錢一字半芍藥壹

兩減甘草壹半

八桂枝人參湯

方見傷寒論注解

九桂枝栝樓乾葛湯柔痊

桂枝

芍藥

各二錢

栝婁根

甘草

各二錢

水二盞生薑七片棗壹枚煎至八分去滓

服

十桂枝芍藥湯即小建中湯脉浮腹痛枝枝

湯加芍藥壹兩

十一桂枝二越婢一湯太陽發熱惡寒脉微

弱

桂枝

芍藥

麻黃

甘草

各叁分

石膏

叁錢

一字生薑

四錢半

大棗

四枚

水一升七合煮麻黃一二沸去上沫內諸

藥煮取壹升去滓温分二服

十二桂枝二麻黃一湯服桂枝後形似瘧日

再發得汗必解

桂枝 芍藥 四錢 麻黃 二錢 甘草 叁錢

杏仁 十六箇 生薑 四錢 大棗 五枝

水一升二合半先煮麻黃一二沸去上沫

內諸藥煮取六合半去滓分二服

十三桂枝麻黃各半湯太陽脉浮緩如瘧無

汗身痒

桂枝 五錢 芍藥 甘草 麻黃 各叁錢

杏仁 二十箇 生薑 叁錢 大棗 四枚

水一升六合半先煮麻黃一二沸去上沫

內諸藥煮至六合去滓分三服

十四桂枝加桂湯奔豚衝心桂枝湯內加桂

六錢二字半

十五桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

十六桂枝甘草龍骨牡蠣湯 方並見傷寒論注

十七桂枝加知母石膏升麻湯熱病夏至後

用之桂枝湯內加知母石膏各四錢半升
麻三錢

十八桂枝加厚朴杏子湯太陽下之微喘者
表未解也桂枝湯內加杏仁二十一箇厚
朴半兩

十九桂枝去桂加茯苓白朮湯服桂枝以下
後不解胃滿小便不利

芍藥 茯苓 白朮各二錢 甘草一錢
水一盞半生薑三片棗一枚煎至八分去

滓服

二十麻黃湯方見三因方

二十一麻黃葛根湯太陽發熱無汗惡寒剛
瘧

麻黃 赤芍藥各三錢 乾葛一錢半 豉半合

水二盞葱白壹莖煎至八分去滓服

二十二麻黃升麻湯大下後脉沉遲尺脉不
至咽喉不利唾膿血厥逆泄利不止者為

難治

麻黃

八錢 一字升

當歸

各四錢 半字

知母

黃

芩

萎蕤 各二字 半

石膏

白朮

芍藥

天

門冬

桂枝

茯苓

甘草

乾薑

各三字 半

水三升三合先煮麻黃一二沸去上沫內

諸藥煮取壹升半去滓分三服次第令盡

汗出愈

二十三麻黃杏子甘草石膏湯太陽汗後喘

麻黃

一兩 參錢 一字半

杏仁

五十箇

甘草

六錢 二字 半

膏

二兩 六錢 一字半

水二升三合半先煮麻黃減六合去上沫
內諸藥煮取八合去滓分二服

二十四麻黃知母石膏湯太陽無汗夏至後

服麻黃湯內加母半兩石膏一兩

二十五麻黃連軹赤小豆湯 二十六麻黃

附子細辛湯

方並見傷寒論注解

二十七麻黃杏仁薏苡甘草湯風濕相搏一

身盡痛

麻黃

薏苡仁

各半兩

甘草

二錢 半

杏仁

十箇

水三盞煎至壹盞半去滓分二服

二十八越婢湯風痺脚弱

石膏兩一白木兩半附子箇半甘草二錢半麻黃七錢

半分三服每用水壹盞半生薑三片棗壹

枚煎至八分去滓服

二十九茯苓白木湯濕溫

茯苓 乾薑 甘草 白木 桂各一錢半

水二盞煎至八分去滓服

三十葛根湯太陽無汗惡風剛瘧太陽陽明

合病

葛根一兩參錢一桂 芍藥 甘草各六錢

麻黃 生薑各一兩大棗十二枚

水三升三合半先煮麻黃葛根減七合去

上沫內諸藥煮取一升四合分三服取微

似汗

三十一葛根解肌湯疫癘春感青發熱而渴

不惡寒

葛根兩半黃芩 芍藥各二錢半麻黃參錢半甘草

桂各一錢半

水三盞半棗二枚煎至二盞分二服

三十二葛根葱白湯已汗未汗頭痛

葛根 芍藥 知母各參錢 芎 生薑各六錢

葱白一把

水三盞煎至一觥半分二服

三十三葛根橘皮湯溫毒發斑心煩嘔逆

葛根 橘皮 杏仁 知母 黃芩 麻

黃 甘草各一錢

水壹盞半煎至八分去滓服

三十四葛根黃芩黃連湯太陽中風候下之

協熱利不止

葛根一兩 黃芩 甘草各二錢 黃連參錢

水三盞煎至壹盞半去滓分二服

三十五葛根半夏湯太陽陽明合病不利

但嘔者

葛根二錢 半夏 麻黃各一錢半 甘草 桂枝

芍藥各一錢

水二盞生薑五片棗子一枚煎至八分去滓服取微似汗

三十六大青龍湯傷寒見風傷風見寒太陽無汗脉浮緊發熱惡寒煩躁可服之脉弱惡風汗出不可服

麻黃二兩桂枝二兩甘草六兩杏仁四十生

薑一兩棗十二枚石膏一雞子大

水三升煮麻黃減七合去上沫內諸藥煎至一升去滓分三服取微似汗汗出多者

溫粉撲之一服得汗止後服

三十七大青龍加黃芩湯太陽無汗惡風煩躁夏至後用本方內加黃芩六錢二字半

三十八小青龍湯方見三因方

三十九小青龍去麻黃加杏子湯太陽汗後飲水多咳而喘本方內去麻黃加杏子仁

一兩

四十小青龍去麻黃加茯苓湯太陽咳嗽表不解心下有水小便不利本方內去麻黃

加茯苓一兩

四十一小青龍去麻黃加附子湯水寒相搏
咳逆本方內去麻黃加附子半兩

四十二大柴胡湯內實大便難身熱不惡寒
反惡熱

柴胡二兩六錢 黃芩 芍藥各一兩 半夏八錢

一字 大黃六錢 枳實四枚即大者八片 生薑六錢

二字 大棗十二枚

水四升煎至二升去滓再煎三五沸分三

服一方加大黃一倍

四十三小柴胡湯傷寒四五日往來寒熱胃

滿心煩喜嘔少陽發熱風濕身熱

柴胡二兩六錢 黃芩 人參 甘草各一

半夏八錢 生薑一大棗

水四升煎至二升去滓再煎至壹升分三

服

四十四小柴胡加茯苓湯小便難潮熱腹滿

本方內加茯苓壹兩

四十五小柴胡去黃芩加芍藥湯下後陰弱
生熱脈微惡寒本方去黃芩加芍藥壹兩
四十六小柴胡去黃芩加茯苓湯嘔而發熱
胃脇滿小便不利本方去黃芩加茯苓一
兩三錢一字半

四十七小柴胡去棗加牡蠣湯水結胃本方
內去棗加牡蠣一兩三錢一字半

四十八小柴胡參棗生薑加五味子乾薑湯
少陽寒熱胃滿或泄而嗽本方內去參棗

生薑加五味子八錢一字乾薑六錢二字
半

四十九小柴胡去半夏加人參栝萸湯發熱
而渴本方內去半夏加人參半兩栝萸實
壹枚

五十小柴胡加桂湯身熱欲近衣身熱不渴
本方內去人參加桂一兩

五十一小柴胡加五味子湯溫病發熱而渴
不惡寒嗽者本方內加五味子半兩

五十二小柴胡加乾薑牡礪湯痞而胃脇滿
脹本方內加乾薑半兩牡礪六錢

五十三柴胡桂枝湯風温汗後身熱痞而心
下妨悶動氣

柴胡一兩參錢 桂枝 黃芩 人參 芍

藥各半 甘草 半夏各參錢 生薑半兩

水六盞棗六枚煎至三盞去滓分三服

五十四柴胡桂薑湯往來寒熱胃脇滿小便
不利嘔而不渴

柴胡二兩六錢 桂枝二兩 黃芩各一兩 乾薑 甘

草 牡礪各六錢 枳實根一兩參錢

水四升煮取二升去滓再煎取一升半分

正三服

五十五柴胡龍骨牡礪湯傷寒八九日下之

胃滿煩驚小便不利譫語一身盡痛火邪

驚狂亡陽煩躁卧起不安

柴胡一兩參錢 龍骨 桂枝 鉛丹 人參

黃芩 茯苓 牡礪各半兩 半夏四錢 大黃

六錢二字半生薑兩大棗六枚

水二升六合半煎至一升三合半內大黃更煮一二沸去滓溫分三服

五十六敗毒散疫癘四時通用傷風有汗夏至後用風濕身腫體痛惡風局方有之

五十七黃耆建中湯傷寒身痛尺脉遲汗後身痛脉弱

黃耆各一錢半桂芍藥各一錢甘草一錢

水二盞薑五片棗二枚煎至八分去滓入

稠飭一大匙再煎盡溫服舊有微瀉或嘔者不用飭

五十八小建中湯即桂枝芍藥湯少陰惡寒手足踈而溫傷寒貳三日心中悸而煩

桂枝各一兩甘草各一兩芍藥二兩生薑六錢大

棗十二枚飭半合

水二升三合半煮取一升去滓內飭微火令烱分三服嘔者勿用

五十九小續命湯二症通用局方有之

類聚五十七
十一

六十小續命加薑汁湯脚氣寒中三陽煎湯

成去滓入生薑自然汁壹匙再煎壹沸服

六十一小續命去附子減桂壹半湯本方去

附子減桂壹半脚氣暑中三陽所患必熱

六十二升麻葛根湯無汗惡寒疫癘通用發

斑小兒瘡疹

升麻 葛根 芍藥 甘草 各等分

每服六錢水壹盞半煎至八分去滓服

六十三升麻六物湯口瘡赤爛

升麻 梔子仁 各一錢半 大青 杏仁 黃芩

各一錢

水一盞半葱白三莖煎至八分去滓溫服

六十四陽毒升麻湯 方見三因方

六十五玄參升麻湯發斑咽痛

升麻 玄參 甘草 各半兩

水三盞煎至一盞半去滓服

六十六大承氣湯胃實譫語五六日不大便

腹痛煩渴少陰口燥咽乾日晡發熱脉實

類聚五十七
十一

大黃 兩三錢 一字 厚朴 二兩六錢 二字 枳實 即枳殼 十半筒 芒

硝 合一

水四升先煮二物取一升七合去滓內大黃煮取一升去滓內芒硝更一二沸分二服得利止後服

六十七小承氣湯六七日不大便腹脹滿陽

明無表證汗後不惡寒潮熱狂言而喘

大黃 一兩三錢 一字 厚朴 六錢 二字 枳實 九者六半筒

水一升三合半煮取六合去滓分二服得

利止後服

六十八調胃承氣湯太陽陽明不惡寒反惡

熱大便秘譫語嘔噦

大黃 六錢 二字 半筒洗 甘草 一錢 一字 芒硝 合一

水一升煮取三合半去滓內芒硝微煎溫

服

六十九桃仁承氣湯外已解小腹急大便黑

小便不利血證也黃瘰

桃仁 五十箇 桂枝 芒硝 甘草 各六錢 二字半 大

黃 一兩參錢
一字半

水二升三合半煮取一升二合去滓內苦
硝微煎分五服

七十白虎湯汗後脉洪大而渴虛煩中暍

知母 二錢六錢二
字半 石膏 五兩參錢
一字 粳米 二合

水三升三合半煮米熟去滓分三服

七十一白虎加人參湯又名化斑湯赤斑口

燥煩渴中暍白虎湯內加人參六錢二字

半

七十二白虎加蒼朮湯濕溫疫癘秋感熱白

虎湯內加蒼朮二兩增水作四服

七十三黃芩湯腸垢協熱利太陽少陽合病

下利

黃芩 一兩
字半 芍藥 甘草 六錢二
字半 大棗 十二
枚

水三升三合半煮取一升去滓分三服嘔

者加半夏八錢壹字生薑壹兩增水作四

服

七十四黃芩芍藥湯衄後脉微黃芩湯內不

用大棗

七十五黃芩半夏生薑湯乾嘔而利黃芩湯
內加半夏八錢壹字生薑半兩

七十六黃連湯腹滿痛大便秘胃中有熱腹
痛欲嘔

黃連 甘草 乾薑 桂枝 各一人參六錢

二字半夏八錢 大棗 十二半

水三升三合半煮取二升去滓分五服日
三服夜二服

七十七黃連阿膠湯温毒下利膿血

黃連 一兩三錢 黃芩 叁錢二 芍藥 六錢二

雞子黃 二兩 阿膠 一兩

水壹升七合先煮三物取七合去滓內膠
烱盡小冷內雞子黃攪勻分三服

七十八黃連雞子湯少陰煩躁不得卧與黃
連阿膠湯同

七十九黃連橘皮湯温毒發斑下部生瘡

黃連 二錢 陳橘皮 杏仁 枳實 各一錢 麻黃

葛根各一錢 厚朴 甘草各一錢

水三盞煎至壹盞半去滓分二服

八十黃連龍骨湯少陰脉沉腹痛咽痛苦煩體猶有熱

黃連一兩 芎藭各一分 龍骨半兩

分三服每服水壹盞半煎至八分去滓服

八十一黃連犀角湯方見三因方

八十二黃連解毒湯大熱乾嘔錯語呻吟不得眠

黃連一分 黃芩 黃蘗各半兩 梔子四箇

水二盞半煎至壹盞半去滓分二服

八十三酒煮黃連丸暑毒發熱而渴不惡寒嗽者

黃連四兩 以無灰好酒浸面上過一寸重湯煮乾焙

為細末麵糊丸如梧桐子大每服五十九熟水下

八十四蜜漬黃蘗汁方見得效方

八十五竹葉湯陽明汗多而渴衄而渴欲飲

水水入卽吐差後渴

石膏二錢 麥門冬一兩 人參 甘草各

錢一 半夏 竹葉二

水二升半煮取壹升半內粳米壹合再煮米熟湯成去滓分貳服

八十六竹葉石膏湯與竹葉湯方證同

八十七梔子仁湯方見三 八十八梔子豉湯

方昇傷寒活人書

八十九梔子蘖皮湯濕家發黃傷寒發黃

梔子四錢 黃蘖皮四錢 甘草二錢

水一盞半煎至七分去滓服

九十一梔子厚朴湯太陽下後腹脹附起不安

梔子十四枚 厚朴一兩 枳實四枚

水壹升煮取半升去滓分二服得吐止後服

九十一梔子升麻湯虛煩不止三月至夏至

前謂之晚發可服

生地黃汁一兩 梔子六錢 升麻三錢 柴胡兩 石

膏半兩

水四盞煎至二盞半去滓分三服

九十二梔子乾薑湯醫以丸藥下之身熱不
去

梔子十四枚 乾薑六錢二分

水一升二合煮取六合去滓分二服

九十三梔子烏梅湯傷寒差後不得眠

梔子 黃芩 甘草各一錢 柴胡二錢 烏梅肉

二筒

水壹盞半生薑三片竹葉二七片豉五十

粒煎至八分去滓服

九十四枳殼梔子湯勞復發熱

枳殼一枚 肥梔子一枚

清漿水二盞半空煮退八分內二藥煎取

九分下豉煎五六沸去滓服覆令汗出

九十五枳殼梔子大黃湯食復發熱於前方

內加大黃如博碁子大五六枚同煎服

九十六茵陳湯黃瘧頭汗出欲發黃

茵陳蒿兩半大黃錢叁肥梔子叁枚

水三升三合半先煮茵陳減壹半內二味煮取壹升去滓分三服小便利出如皂角汁一宿腹減黃從小便出也

九十七茵陳五苓散疫癘秋感熱發黃渾頭汗出欲發黃

茵陳蒿末兩一五苓散兩半

和勻每服二錢食前米飲湯調服或濃煎茵陳湯調五苓散亦得

九十八茵陳梔子黃連三物湯大便自利而

黃

茵陳蒿錢叁梔子黃連各二錢

水二盞煎至八分去滓服

九十九知母麻黃湯差後昏沉

知母錢叁麻黃甘草芍藥黃芩各一錢

桂枝錢半

水二盞煎至八分去滓服取微汗

一百知母葛根湯風温身灼熱

知母半一錢 乾葛四錢 石膏錢 甘草錢 木香

升麻 黃芩 南星 人參 防風 杏

仁 芎 羌活各一錢 萎蕤二錢 麻黃二錢

每服七錢水二盞煎至八分去滓服

一百一大陷胃湯大結胃

大黃兩一 芒硝一字 甘遂末一字

水二升先煮大黃至七合去滓內芒硝煮

一二沸內甘遂末分二服得利止後服

一百二小陷胃湯小結胃

黃連錢 半夏一字 栝婁實大者一箇

水二升先煮栝婁取一升去滓內諸藥煮

取七合去滓分三服

一百三大陷胃丸結胃項強如柔瘰狀下之

則和

大黃二兩六錢 葶藶 芒硝 杏仁各三

字

上二味為細末內杏仁芒硝合研如脂丸

如彈大一枚別搗甘遂末一字白蜜半合

水七合煮取三合半温頓服之一宿乃下
如不下更服取下為效

一百四抵當湯 一百五抵當丸 方並見傷寒論注

一百六陽旦湯即桂枝湯加黃芩一兩春末

夏至前可服

一百七陰旦湯身大熱欲近衣此內寒外熱

芍藥 甘草 各二錢 乾薑 黃芩 各二錢 桂枝

錢四大棗 二枚

水三盞煎至壹盞半去滓分二服

一百八四逆湯太陰自利不渴陰證脉沉身

痛

附子 一枚生去皮作八片 甘草 六錢二分 乾薑 半兩

水壹升煮取四合去滓分二服強人可大

附子壹枚加乾薑半兩

一百九四逆散加五味子乾薑湯少陰四肢

厥逆或泄利而嗽

甘草 枳殼 柴胡 芍藥 各一兩 五味子

乾薑 各半兩

爲細末每服二錢米飲調下

一百廿茯苓四逆湯汗下後煩躁不得眠

茯苓二人參參錢附子一枚生去皮作八片甘草六錢

二字乾薑兩半

水壹升七合煮取壹升去滓分三服

百十一當歸四逆加茱萸生薑湯下之厥逆

當歸 桂枝 芍藥 細辛各一兩 通草

甘草各六錢 茱萸參錢 生薑六錢

水六盞煎取三盞分三服

百十二四逆散少陰四逆或咳或悸或小便

不利或腹痛虺厥

甘草 枳殼 柴胡 芍藥各半兩

爲細末每服二錢米飲調下

百十三四逆加茯苓散少陰小便不利四逆

散加茯苓半兩

百十四甘草乾薑湯少陰小便色白病形悉

具而渴吐逆動氣下之反劇身雖有熱反

欲蹶

甘草一兩乾薑半兩

水二盞煎取一盞分二服

百十五甘草附子湯風濕小便不利大便反

快

甘草 白朮各三錢附子一枚桂枝六錢

水二升煮取一升去滓分三服得微汗則

解

百十六炙甘草湯一名復脈湯脈結代心動

悸

甘草一此二字人參六錢生地黃一兩桂枝

麻子仁 麥門冬各一兩阿膠六錢

水酒合五升生薑壹兩大棗十二枚清酒

二升三合水二升七分煮取二升去滓內

膠烱盡分三服

同上芍藥甘草湯自汗出小便數

芍藥 甘草各三錢

水二盞煎至八分去滓服

百十七芍藥附子甘草湯汗下後惡寒

芍藥 附子 甘草 各三錢

水二盞煎至八分去滓服

百十八陰毒甘草湯陰毒

甘草 升麻 當歸 桂枝 各一錢 雄黃

蜀椒 各一錢半 鼈甲 三錢

水二盞煎至八分去滓服如人行五里更

進一服溫覆取汗毒當從汗出未汗再服

百十九茯苓甘草湯自汗不渴水氣承心振

寒而慄

茯苓 桂枝 各二錢 甘草 一錢 生薑 三錢

水一盞半煎至八分去滓服

百廿小半夏茯苓湯水結胸三

半夏 四錢 赤茯苓 三錢

水二盞煎至八分去滓入生薑自然汁半

盞再煎一二沸溫服

百廿一茯苓桂枝大棗湯汗後臍下悸欲作

奔豚

茯苓 二兩六錢 甘草 六錢二 桂枝 一兩三字半

芍藥 附子 甘草 各三錢

水二盞煎至八分去滓服

百十八陰毒甘草湯陰毒

甘草 升麻 當歸 桂枝 各一錢 雄黃

蜀椒 各一錢半 鼈甲 三錢

水二盞煎至八分去滓服如人行五里更

進一服溫覆取汗毒當從汗出未汗再服

百十九茯苓甘草湯自汗不渴水氣承心振

寒而慄

茯苓 桂枝 各二錢 甘草 一錢 生薑 三錢

水一盞半煎至八分去滓服

百廿小半夏茯苓湯水結胃

半夏 四錢 赤茯苓 三錢

水二盞煎至八分去滓入生薑自然汁半

盞再煎一二沸溫服

百廿一茯苓桂枝甘草大棗湯汗後臍下悸欲作

奔豚

茯苓 二兩六錢 甘草 六錢 桂枝 一兩三錢

二字半 六錢二字 一兩三字

半大棗 十五个

甘爛水 說見製藥例 三升三合先煮茯苓減六

合內諸藥煮取一升去滓服三合

百廿二茯苓桂甘白朮湯

茯苓 一兩三錢一字半 桂枝 兩 白朮 甘草 各六錢二

半字

水二升煮取一升去滓分三服

百二十三赤茯苓湯厥陰消渴氣上衝吐下後身振搖筋肉惕

赤茯苓 陳皮 人參 各二錢 白朮 芎藭

半夏 各一錢

水二盞煎至八分去滓服

百廿四猪苓湯 方見傷寒論注

百廿五大半夏湯傷寒痰證

半夏 白茯苓 生薑 各一分

水二盞煎至一盞去滓臨卧時服

百廿六半夏生薑湯即小半夏湯咳逆穀不下而嘔吐

半夏一分生薑二兩

水三盞煎至壹盞去滓分二服

百廿七半夏桂甘湯疫癘夏感寒非時暴寒

伏於少陰脉微弱咽痛次必下利名腎傷

寒

半夏 桂枝 甘草各一分

水二盞生薑五片煎至八分去滓旋旋呷

之

百廿八生薑汁半夏湯方見傷寒論注解

百廿九厚朴半夏甘草人參湯

厚朴四錢半夏一分甘草一分人參半錢

水二盞生薑五片煎至八分去滓服

百三十甘草瀉心湯即半夏瀉心湯此內減

甘草三錢下之心下痞

甘草兩一分半夏八錢黃芩 乾姜 人參各一分

黃連三錢大棗十二枚

水三升三合煮取二升去滓再煮取壹升

分三服

百三十一附子瀉心湯 方見傷寒論注解

百三十二生薑瀉心湯下利心下痞腹中雷

鳴於甘草瀉心湯內減甘草作三錢一字

半加生薑壹兩三錢一字半

百三十三三黃瀉心湯心下痞按之濡其脉

關上浮者可服惡寒不可服於附子瀉心

湯內去附子

百三十四霹靂散 方見無求子活人書

百三十五桔梗半夏湯腹脹

桔梗 半夏 陳皮 各二錢

水壹盞半生薑五片煎至八分去滓熱服

百三十六附子湯 方見傷寒論注解

百三十七木附湯風濕小便自利濕溫

白木 六錢二 半夏 三錢一 附子 六錢一 生薑 各半

水二升棗二枚煮取壹升去滓分二服

百三十八羌活附子湯咳逆 長沙山陰

羌活 附子 茴香 各半 木香 一錢 乾薑 一

生

爲細末每二錢水壹盞搥一捻煎十數沸
熱服

百三十九真武湯陰證脉沉身痛發汗過多
筋惕肉瞤少陰腹痛小便不利

茯苓 芍藥 生薑 各一兩 白朮 六錢二附

子 一枚

水二升六合煮取一升三合去滓分三服
欬者加五味子細辛乾薑小便利者去茯苓
苓下利者去芍藥加乾姜嘔者去附子加

生姜

百四十白通湯少陰下利

葱白 四莖 乾薑 三錢一 附子 一枚

水一升二合煮取六合去滓分二服

百四一白通加猪膽汁湯下利厥逆脉不至

附子 一枚 乾薑 三錢一 葱白 四莖 人尿 一合猪

膽汁 合

水一升煮取半升去滓內人尿膽汁相和
分二服無膽汁亦可

百四二 乾薑附子湯下後復發汗晝不得眠
無表證脉微者

乾薑 三錢 附子 一枚
字半 生

水壹升煮取三合半去滓頓服

百四三 乾薑黃芩黃連人參湯傷寒悞吐下
寒氣內格食入即吐

乾薑 黃連 黃芩 人參 各叁錢

水壹盞半煎至八分去滓服

百四四 正陽散 方見無求子活人書

百四五 理中湯太陰自利不渴寒多而嘔腹
痛鴨溘虵厥霍亂

人參 甘草 乾薑 白朮 各二錢

水二盞煎至八分去滓服

百四六 理中加茵陳湯傷冷中寒脉弱 虛
變為陰黃本方內加茵陳蒿二錢

百四七 理中加石膏湯霍亂轉筋本方內加

石膏 兩半

百四八 理中丸痞而胃寒霍亂寒多不渴厥

陰飢不能食食即吐虵未成結胃者與理中湯同但為細末煉蜜丸如彈大沸湯半蒸化壹丸

百四九增損理中丸太陰下之胃滿硬諸結胃宜服此

人參 白朮 各二兩 甘草 乾薑 各一兩半 黃芩

中枳殼片十二兩

為細末煉蜜丸如彈大沸湯化壹丸

百五十枳實理中丸 方見三因方

百五一四順丸少陰十餘日下利不止手足微冷理中丸內加甘草一倍

百五二脾約丸老人津少大便澁脚氣大便燥

大黃 二兩 枳殼 厚朴 白芍藥 各半兩 麻子

仁 一分 杏仁 一分

為細末煉蜜丸如桐梧子大每服三十九溫水下未知再加服

百五三柴胡半夏湯痰熱頭疼手足煩熱

柴胡二兩半夏 白朮各半兩甘草 人參

黃芩 麥門冬各參分

每服七錢水壹盞半生薑五片棗子壹枚煎至八分去滓服

百五四治中湯食積心腹滿痛即理中湯加

青陳皮各二錢

百五五百合知母湯 百五六百合地黄湯

百五七百合洗方方並見金匱方

百五八犀角地黄湯血證大便黑衄後脉微

發狂發黃漱水不欲嚥當汗不汗內有瘀血

芍藥二錢生地黄一兩牡丹皮二錢犀角屑

二錢半如無以升麻代之

分三服每服水壹盞半煎至七分去滓服

百五九犀角大青湯斑瘡出煩疼

大青參分梔子十枚犀角屑二錢鼓一撮

分二服每服水壹盞半煎至八分去滓服

百六十大青四物湯發赤斑

大青一阿膠 甘草各二錢半豉二合

分三服每服水壹盞半煎至壹盞去滓入膠候烱温服

百六一青黛一物湯發赤斑青黛如棗大水研服

百六二黑奴丸方見三因方

百六三黑膏温毒發斑嘔逆

生地黄二兩六錢好豉一兩六錢

以猪膏十兩合露之煎令三分減一絞去

滓雄黃麝香如豆大內中攪和分三服毒從皮中出則愈忌蕪荑

百六四紫雪發斑脚氣暑中三陽所患必熱煩躁者局方有之

百六五吳茱萸湯方見傷寒論注解

百六六旋覆代赭湯汗吐下後心下痞旋覆花兩人參六錢代赭石一兩甘草

一兩錢半夏八錢大棗十二枚

水三升三合煮取二升去滓再煎至壹升

半分三服

百六八大橘皮湯嘔噦胃滿虛煩不安

陳皮 甘草 各半兩 人參 一兩

分二服每服水二盞生薑十五片煎至八

分去滓服

百六九小橘皮湯又名生薑橘皮湯嘔噦手

足逆冷

陳皮 一兩 生薑 二兩

水三盞煎至一盞半去滓分二服

百七十橘皮湯傷寒痰逆惡寒

甘草 一錢 人參 二錢 陳皮 半兩

用青葙竹刮上青茹壹團薑四片棗壹枚

水壹盞半煎至八分去滓熱服

百七一橘皮乾薑湯即橘皮半夏生薑湯咳

逆噦惡

陳皮 通草 人乾薑 人參

分二服每服水二盞煎至八分去滓服

百七十二桔梗湯 方見傷寒論注解

百七三桔梗枳殼湯痞證胃滿不痛

桔梗 枳殼

水二盞煎至八分去滓服

百七四桔梗半夏湯腹脹

桔梗 半夏 陳皮 各三錢

水二盞薑五片煎至八分去滓服

百七五漢防已湯風濕脉浮身重汗出

甘草 黃芪 各三錢 漢防已 六錢 白朮 兩半

水三盞生薑十片棗二枚煎至八分去滓

服

百七六防已黃芪湯與防已湯同但分兩異

亦治證亦同

防已 黃芪 各三錢 白朮 二錢 甘草 一錢

水二盞薑五片棗壹枚煎至八分去滓服

百七七防風白朮牡礪湯

白朮 牡礪粉 防風 各等分

為細末每服二錢酒調下米飲亦得日二

三服汗止服小建中湯食爾小建中湯

百七十五積散感寒脚氣食積心腹滿痛局
方有之

百七九五苓散小便不利而渴中暍煩躁霍
亂局方有之

百廿五味子湯喘促脉伏而厥
五味子分人參 麥門冬 杏仁 陳皮

各半兩

水三盞生薑十片棗子二枚煎至一盞半
分二服

百八一十棗湯心下痞硬脇痛乾嘔短氣汗
出不惡寒

芫花 甘遂 大戟 各等分

水一盞半先煮大肥棗十枚取八分內藥
末強人一錢弱人半錢平旦溫服若下少
病不除明日更服加半錢後快利後糜粥
自養

百八二白散寒實結胃

貝母 桔梗 各一分 巴豆 一分

二味爲散內巴豆研和以白飲和服強人
半錢弱人減之病在膈上必吐在膈下必
利不利進熱粥一盃利過進冷粥一盃汗
出已腹中痛與芍藥一兩如上法
百八三桃花湯 方見傷寒論注解
百八四杏仁湯風濕身痛惡風微腫

桂 半 天門冬 麻黃 芍藥 各二錢半 杏仁 七枚
水三盞生薑十片煎至壹盞半去滓分二
服

百八五木瓜散脚腫

大腹皮 紫蘇 乾木瓜 甘草 木香
羌活 各一分
爲麤散分三服每服水一盞半煎至八分
去滓服

百八六烏梅丸 方見傷寒論注解

百八七牛旁根散汗不流是汗出時蓋覆不
周故腰背手足搖擗也

牛旁 十條 麻黃 牛膝 天南星 各六錢

右細剉於砂盆內研細用好酒一升同研以新布揆取汁後用炭火半秤燒一地坑子內通赤去火掃淨投藥汁坑內再燒令黑色取出於乳鉢內細研每服半錢酒調下日三

百八入酸棗湯吐下後晝夜不得眠

酸棗仁升一甘草二錢半知母半麥門冬二合半

茯苓 芎 乾薑各叁分

爲麤散每服四錢水一盞煎至六分去滓

溫服

百八九地掬散傷寒熱毒不解晚卽壯熱腹

痛便膿血

地榆 犀角屑 黃連 茜根 黃芩各半

兩 梔子仁二錢半

爲麤末每服五錢水一盞入薤白五寸煎

至六分去滓服

百九十葱豉湯傷寒一二日頭項痛惡寒脉

緊無汗

葱白十五 豉二大 乾葛八錢 麻黃四錢

水二升先煮麻黃六七沸去白沫內乾葛煎十餘沸下豉煎取八合去滓分二服如人行五六里再服訖良久煮葱豉粥熟喫以衣覆出汗

百九一連須葱白湯已汗未汗頭痛如破

生薑二兩 連須葱白升切半

水三盞煎至壹盞半去滓分二服

百九二茅花湯方見無求子活人書

百九三藥皮湯熱毒深入吐血

藥皮參錢 黃芩 黃連各二錢

水二盞煎至壹盞去滓入阿膠壹錢半煎烊溫服

百九四麥門冬湯勞復發熱

麥門冬 甘草各二錢

粳米湯壹盞半棗二枚竹葉十五片煎至八分去滓服

百九五檳榔散方見無求子活人書

百九六萎蕤湯冬温風濕春月中風傷寒

萎蕤一分石膏半麻黃 白薇 羌活

杏仁 甘草 芎 青木香各一錢葛根半兩

分三服每服水二盞煎至八分去滓服

百九七葶藶苦酒湯發狂煩躁面赤咽痛大

下傷血發熱脉澹

苦酒半升葶藶一分生艾汁無生艾以熟艾煮汁半升

煎取七合作三服

百九八栝婁根湯風濕大渴

石膏二兩栝婁根一分人參 防風 甘草各半

兩葛錢

每服七錢水壹盞水煎至八分去滓服

百九九延胡索散方見傷寒論注解

二百射干湯夏月暴寒熱伏於內咳嗽嘔啞

射干 當歸 麻黃 肉桂 枳實 紫

苑 獨活 橘皮 甘草各一兩生薑二兩

夏二兩杏仁半

每服七錢水壹盞半煎至八分去滓服

二百一金沸草散頭痛壯熱胃膈有痰

前胡 旋覆花各一兩 半夏 細辛 甘草

各二 荆芥穗一兩 赤茯苓六錢

為麤末每服四錢水壹盞半生薑五片棗

壹枚照至七分去滓服

二百二關 二百三文蛤散 二百四牡礪澤

瀉散方並見傷寒論注 二百五猪膽雞子湯方見千金方

二百六猪膚湯方見傷寒論注 二百七鱉甲散方見

無求子方見傷寒論注 二百八地血散方見傷寒論注 二百九赤

石脂丸方見無求子活人書

二百十赤石脂禹餘糧湯痞而利不止當治

下焦

赤石脂 禹餘糧各一

分三服每服水一盞半煎至八分去滓服

一百十一白頭翁湯腸垢脇熱而利渴而下

利

白頭翁 黃蘗 秦皮 黃連各一

水一盞半煎至八分去滓服

二百十二烏扇湯 方見傷寒活人書

二百十三消暑元局方有之 二百十四香

薷湯局方有之 二百十五香薷散局方有

之

二百十六治蜜桃仁湯 二百十七雄黃銳

散 方並見三方

二百十八萬全木通散 方見傷寒活人書

二百十九鼠矢豉湯勞復發熱

梔子 十四枚 雄鼠矢 二十七枚 枳實 三枚

為麤末每服四錢水壹盞半葱白二寸香

豉三十粒煎一盞去滓分二服

二百二十猓鼠矢湯 方見三方 二百二十一燒

裨散 方見傷寒論注解

二百二十二竹皮湯病後交接勞復外腎腫

腹中絞痛

刮青竹皮 一大盞

水二盞煎至八分去滓服

二百二十三當歸四逆湯 方見傷寒論注解

二百二十四通脉四逆湯厥逆下利脉不至

甘草六錢二附子大者一枚乾薑一斤

面赤者加葱九莖嘔加生薑咽痛加桔梗利止脉不出加人參水三大盞煎取一盞半去滓分二服

同上通服四逆加猪膽汁湯吐利止汗出而

厥四肢拘急脉微欲絕本方內加猪膽汁

半合

同上通脉四逆加芍藥湯少陰腹痛或泄利

下重本方內加芍藥六錢二字半

二百二十五瓜蒂散吐法脉大胃滿多痰涎

病頭疼

瓜蒂炒赤小豆各等分

二味別擣篩為散中半合和令以水二盞煮香豉一合作稀粥去滓取三分之一和散一錢匕頓服之不吐少少加得快吐乃止諸亡血虛家不可服

二百二十六瓜蒂搐鼻法濕家鼻塞頭疼瓜

齋不以多少爲末口噙水搖一字入鼻中
出黃水愈

二百二十七蜜導煎法 二百二十八猪膽

汁法

方並見傷寒論注解

二百二十九陰毒薰法陰毒逆冷囊縮者大豆二升炒令極熱先以淨盆桶內置熱醋三升旋扶病人坐桶上薰少時却以熱豆傾桶中薰之有傾囊下却以陰證藥服之

二百三十葱熨法

方見三因方

二百三十一陰毒

著艾法

見針灸門

二百三十二水漬法陽毒漸深脉洪大內外結熱舌卷焦黑鼻如烟煤宜服此疊布數重新水漬之稍拭去水搭於患人背上須臾蒸熱又以別浸冷布易之頻換新水熱稍退可進陽毒藥

二百三十三硫黃煎法咳逆服藥無效者以硫黃乳香等分爲末以酒煎急令患人鼻之

又方雄黃二錢酒一盞煎七分急令患人喫其熱氣卽止

二百三十四灸少陰方見針灸門二百三十五温

粉方見三因方二百三十六蒸法方見聖惠方

二百三十七灸關元二百三十八灸期門

二百三十九刺大椎肺俞方並見針灸門二百四十

結胃灸法方見得效方

肘後方

治傷寒時氣温病方

治傷寒及時氣温病及頭痛壯熱脉大始得

一日方取旨兌根葉合搗三升許和之真

丹一兩水壹升合煮絞取汁頓服之得吐

便差若重壹升盡服厚覆取汗差

又方小蒜一升擣取汁三合頓服之不過再

作便差壽域神方同

又方烏梅二十七枚搯五合以水三升煮取壹

升去滓頓服之

又方取生杵木削去黑皮細切裏白者一升

以水二升五合煎去滓一服八合三服差
又方取朮九子二七枚以水五升按之令熟
去滓盡服汁當吐下愈

又方雞子壹枚著冷水半升攪與和乃復煮
三升水極令沸以向所和水投湯中急攪
令相得適寒溫頓服取汗

又方以真丹塗身令遍面向火坐令汗出差
又方取生蘘荷根葉合搗絞取汁服三四升
又方取乾艾三斤以水一斗煮取壹升去滓

頓服取汗

又方鹽一升食之以湯送之腹中常絞吐便
覆取汗便差

又方取比輪錢一百五十七枚以水一斗煮
取七升服汁盡之須臾復以五升水更煮
令得一升以水二升投中合令得三升出

錢飲汁當吐毒出也

又方取猪膏如彈丸者溫服之日三服三日
九服

又方烏梅三十枚去核以豉一升苦酒三升
煮取一升半去滓頓服

又傷寒有數種人不能別令一藥盡治之者
若初覺頭痛肉熱脈洪起一二日便作葱
豉湯用葱白一虎口豉一升以水三升煮
取一升頓服取汗不汗復更作加葛根二
兩升麻三兩五升水煎取二升分再服必
得汗若不汗更作加麻黃二兩又葱湯例
米三合水壹升煮之少時下鹽豉後內葱

白四物令火煎取三升分服取汁也

又方豉一升小男溺三升煎取壹升分爲再
服取汗

又方葛根四兩水壹斗煎取三升乃內豉壹
升煎取升半一服搗生葛汁服一二升亦
爲佳也

若汗出不歇已三四日胃中惡欲令吐者豉
三升水七升煮取二升半去滓內蜜壹兩
又煮三沸頓服安卧當得吐不差更服取

差祕法傳於子孫也 壽域神方同

又方生地黃三斤細切水壹斗煮取三升分三服亦可服藜蘆吐散乃苦參龍膽散若以五六日以上者可多作青竹瀝少煎令減為數數飲之厚覆取汗

又方大黃黃連黃蘗梔子各半兩水八升煮六七沸內豉壹升葱白七莖煮取三升分服宜老少

又方苦參二兩黃芩二兩生地黃半斤水八

升煮取壹升分再服或吐下毒則愈

若已六七日熱極心下煩悶狂言見鬼欲起

走用乾茱萸三升 壽域神方二升 水二升 神方三升 煮

取一升後去滓寒溫服之得汗便愈此方恐不失必可用也祕之

又方大蠅一升破去以人溺煮令熟去滓服之直生絞汁及水煎之並善又絞糞汁飲數合至一二升謂之黃龍湯陳久者佳

又方取白犬從背破取血破之多多為佳當

及熱以薄帛上冷乃去之此治垂死者活
無白犬諸純色者亦可用之

又方取桐皮削去上黑者細擘之長斷令四
寸壹束以酒五合以水壹升煮取壹升去
滓頓服之當吐下青黃汁數升卽差

又方雞子三枚芒消方寸匕酒三合合攪散
消盡服之

又方黃連三兩黃蘗黃芩各二兩梔子十四
枚水六升煎取貳升分再服治煩嘔不得

眠

治時氣行垂死破棺千金煮湯苦參一兩咬
咀以酒二升半舊方用苦參酒煮令得壹
升半去滓適寒溫盡服之當聞苦寒吐毒
如浴膠便愈

又方大錢百文水壹斗煮取八升內麝香當
門子李子次末稍稍與飲至盡或汗或吐
之

治溫毒發斑大疫難救用生蝦蟇正介破腹

去腸乃擣吞食之得五月五日乾者燒末
益佳矣

黑奴丸胡洽小品同一名水解丸又一方加
小麥黑敦壹兩名爲麥奴丸支同此注麻
黃二兩大黃二兩黃芩壹兩芒消壹兩釜
底墨壹兩竈突墨二兩梁上塵二兩搗蜜
丸如彈丸新汲水五合末壹丸頓服之若
渴但與水須臾寒寒了汗出便解日移五
赤不覺更服一丸此治五六日胃中大熱

口噤名爲壞病不可醫治用此黑奴丸

又方大青四兩甘草膠各二兩豉八合以水
一斗煮二物取三升半去滓內豉煮三沸
去滓乃內膠分作四服盡又合此治得至
七八日發汗不解及吐下大熱甚佳

又方大黃三兩甘草二兩麻黃二兩杏仁三
十枚芒消五合黃芩一兩巴豆二十粒熬
搗蜜丸和如大豆服三丸當利毒利不止
米飲止之家人視病者亦可先服取利則

不相染易也此丸亦可預合置

麻黃解肌一二日便服之麻黃甘草升麻芍藥石膏各壹兩杏仁三十枚貝齒三枚末之以水三升煮取壹升頓服覆取汗出即愈便食豉粥補虛卽宜也

又方麻黃二兩黃芩桂各壹兩生薑三兩以水六升煮取二升分爲四服

亦可服葛根解肌湯葛根四兩芍藥二兩麻黃大青甘草黃芩石膏桂各壹兩大棗四

枚以水五升煮取二升半去滓分爲三服微取汗

三日已上至七八日不解者可服小柴胡湯柴胡八兩人參甘草黃芩各三兩生薑八兩無者乾薑三兩半夏五兩湯洗之大棗十二枚水九升煮取二升半分爲三服微覆取汗半日須臾使差若不好更作一劑若有熱實得汗不解腹滿痛煩躁欲謬語者可服大柴胡湯方柴胡半斤大黃二兩黃

芩三兩芍藥二兩枳實十枚半夏五兩洗
之生薑五兩大棗十二枚水一斗煮取四
升當分爲四服當微利也

此四方最第一急須者若幸可得藥便可不
營之保無死憂諸小治爲防以窮極耳若
病失治及治不差十日已上皆名壞病唯
應服大小驚甲湯此方藥分兩乃少而種
數多非備急家所辦故不載凡傷寒發汗
皆不可使流離過多一服得微汗汗絮便

止未止粉之勿當風初得傷寒便身重腰
背痛煩悶不已脈浮面赤斑斑如錦文喉
咽痛或下痢或狂言走欲此名中陽毒五
日可治過此死宜用此方雄黃甘草升麻
當歸椒桂各一分水五升煮取二升半分
三服溫覆取汗服後不汗更作一劑
若身重背強蟄蟄如被打腹中痛心下強短
氣嘔逆脣青面黑四肢冷脈沉細而緊數
此名中陰毒五日可治過此死用此方甘

草升麻各二分當歸椒各壹分鱉甲壹兩以水五升煮取二升半分三服溫覆取汗汗不出湯煮更作也

陰毒傷口鼻冷者乾薑桂各壹分末溫酒三合服之當大熱差凡陰陽二毒不但初得便尔或一二日變作者皆以今藥治之得此病多死治熱病不解而下痢困篤欲死者服此大青湯方大青四兩甘草三兩膠二兩鼓八合赤石脂三兩以水壹斗煮取

三升分三服盡更作日夜兩劑愈

又方但以水五升豉壹升梔子十四枚韭白壹把煮取三升半分爲三服

又方龍骨半斤擣碎以水壹斗煮取五升使極冷稍稍飲其間或得汗卽愈矣

又方黃連當歸各二兩乾薑壹兩赤石脂二兩蜜丸如梧子服二十九日三夜再

又方黃連二兩熟艾如鴨卵大以水二斗煮取壹升頓服立止

天行諸痢悉主之黃連三兩黃蘗當歸龍骨
各二兩以水六升煮取二升去滓入蜜七
合又火煮取壹升半分爲三服効
天行毒病挾熱腹痛下痢升麻甘草黃連當
歸芍藥桂心黃蘗各半兩以水三升煮取
一升服之當良

天行四五日大下熱痢黃連黃蘗各三兩龍
骨三兩艾如雞子大以水六升煮取二升
分爲二服忌食猪肉冷水

若下膿血不止者赤石脂一斤乾薑一兩粳
米一升水七升煮米熟去滓服七合日三
又方赤石脂一斤乾薑二兩水五升煮取三
升分二服若絞臍痛加當歸一兩芍藥二
兩加水壹升也

若十餘日不大便者服承氣丸大黃杏人各
二兩枳實一兩芒消一合搗蜜和丸如彈
丸和湯六七合服之未通更服

若下痢不能食者黃連一升烏梅二十枚炙

燥並得擣末蝎如棊子大蜜一升合於微
火上令可丸丸如梧子大一服二九日三
若小腹滿不得小便方細末雌黃蜜和丸取
如棊核大內溺孔中令半寸亦以竹管注
陰令痛朔之通

又方末滑石三兩葶藶子一合水二升煮取
七合服

又方擣生葱薄小腹上參易之
治胃脇痞滿心塞氣急喘急方人參朮各一

兩枳實二兩乾薑一兩擣蜜和丸一服一
枚若嗽加括蕞二兩吐加牡蠣二兩日夜
服五六丸不愈更服

毒病攻喉咽腫痛方取真藺茹爪甲大內口
中以牙小嚼汁以漬喉當微覺異爲佳也
毒病後攻目方煮蜂窠以洗之日六七度佳
又方冷水漬青布以掩之末以青布吹之
若生翳者燒豉二七粒末內管鼻中以吹之
治傷寒嘔不止方甘草壹兩升麻半兩生薑

三兩橘皮二兩水三升煮取二升頓服之
愈

又方乾薑六分附子四分末以苦酒丸如梧
子大一服三九日三服

治傷寒腕不正方甘草三兩橘皮一升水五
升煮取三升分服日三取差

又方熟洗斗夏末服之一錢一服

又方赤蘇一把水三升煮取二升稍稍飲

又方乾薑六分附子四分末苦酒丸如梧子

大服叁九日三服

比歲有病時行仍發瘡頭面及身須臾周匝
狀如火瘡皆戴白漿隨決隨生不卽治劇
者多死治得差後瘡癥紫黑彌歲方滅此
惡毒之氣

方見干金方

又方以水濃煮升麻絲沾洗之苦酒漬彌好
但痛難忍其餘治猶依傷寒法但每多作
毒意防之地黃黑膏亦好
治時行病發黃方茵陳六兩大黃二兩梔子

十二枚以水一斗先煮茵陳取五升去滓
內二物又煮取三升分四服亦可兼取黃
疸中雜治法差

比歲又有虜黃病初唯覺四體沉沉不快須
臾見眼中黃漸至面黃及舉身皆黃急令
溺白紙紙卽如藥染者此熱毒已入內急
治之若初覺便作芡帶赤豆散吹鼻中鼻
中黃汁出數升者多差若已深應看其舌
下兩邊有白脉彌彌處蘆刀割破之紫血

出數升亦歇然此須慣解剖者不解割忽
傷亂舌下青脉血出不止便煞人方可燒
紡軫鐵以灼此脉令焦兼芡帶雜巴豆搗
爲丸服之大小便亦去黃汁破灼已後禁
諸雜食又云有依黃坐黃復須分別之方
切竹煮飲之如飲

又方擣生芡根絞取汁飲一升至二三升

又方醋酒浸雞子一宿吞其白數枚

又方竹葉切五升小麥七升石膏三兩末懸

裹之以水一斗五升煮取七升一服一升
盡喫即差也

又方生葛根汁二升好豉一升梔子三七枚
茵陳切一升水五升煮取三升去滓內葛
汁分爲五服

又方金色脚雞雌雞血在治如食法熟食寅
飲汁令盡不過再作亦可下少鹽豉佳
治毒攻手足腫疼痛欲斷方搃豉及羊尿壹
升搗令熟以漬之

又方細剉黃蘗五斤以水三斗煮漬之亦治
攻陰腫痛

又方煮羊桃汁漬之雜少搃豉尤好

又方猪蹄一具合葱煮去滓內少鹽以漬之
毒病下部生瘡者燒塩以深導之不過三壽域

神方

又方生漆塗之懸導之

又方大炆艾灸下部此謂窮無藥

又方取蜋三升以水五升得二升半盡服之

又方煮桃皮煎如糝以絲合導之

又方水中苧菜擣絲裏導之日五易差

又方櫟皮檲皮合煮汁如糝糖以導之又濃煮桃皮飲之最良

又方擣蛇莓汁服三合日三水漬烏梅令濃并內崖蜜數數飲

若病人齒無色舌上白或喜睡眠憤憤不知痛痒處或下痢急治下部不曉此者但攻其上不以下爲意下部生虫虫食其肛肛

爛見五藏便死治之方取雞子白內漆合攪還內殼中仰頭吞之當吐虫則愈

又方燒馬蹄作灰細末猪脂和塗懸以導下部日數度差

又方桃人十五枚苦酒二升塩一合煮取六合服之

又方燒艾於管中薰之令煙入下部中少雄黃雜妙此方是溪温故尔兼取彼治法

又有病蠶下不止者烏頭二兩女萎雲實各

一兩桂二分蜜丸如桐子水服五九一日
三服

治下部卒痛如鳥啄之方赤小豆大豆各一
升合搗兩囊貯蒸之令熟更互坐卽愈
此本在雜治中亦是傷寒毒氣所攻故凡治
傷寒方甚多其有諸麻黃葛根桂枝柴胡青
龍白虎四順四逆二十餘方並是至要者而
藥難盡備且診候須明悉別所在撰大方中
今唯載前四方尤是急須者耳其黃膏赤散

在辟病條中預合初覺患便服之傷寒時行
溫疫三名同壹種耳而源本小異其冬月傷
於寒或疾行力作汗出得風冷至夏發名爲
傷寒其冬月不甚寒多暖氣及西風使人骨
節緩墮受病至春發名爲時行其年歲中有
癘氣兼挾鬼毒相注名爲溫病如此診候並
相似又貴勝雅言惣名傷寒世俗因號爲時
行道術符刻言五溫亦復殊大歸終止是共
途也然自有陽明少陰陰毒陽毒爲異耳少

陰病例不發熱而腹滿下痢最難治也

附方

必效方治天行一二日者麻黃一大兩去節以水四升煮去沫取二升去滓著米一匙及豉爲稀粥取強一升先作熟湯浴淋頭百餘梳然後服粥厚覆取汗於夜最佳梅師方治傷寒汗出不解已三四日胷中悶吐豉一升鹽豈合水四升煎取一升半分服當吐

聖惠方治傷寒四日已嘔吐更宜吐

方見本方

又方治時氣頭痛不止用朴消三兩擣羅爲散生油調塗頂上

勝金方治時疾熱病狂言心躁苦參不限多少炒黃色爲末每服二錢水壹盞煎至八分溫服連前三服有汗無汗皆差

博濟方治陰陽二毒傷寒黑龍丹舶上硫黃一兩以柳木槌研三兩日巴豆一兩和殼記箇數用二升鐺子一口先安硫黃鋪鐺

底次安巴豆又以硫黃蓋之醞醋半升已來澆之蓋子蓋合令緊密更以濕紙周迴固濟縫勿令透氣縫紙乾更以醋濕之文武火熬常著人守之候裏面巴豆作聲數已半爲度急將錫子離火便入臼中急擣令細再以少米醋并蒸餅少許再搗令冷可丸如雞頭大若是陰毒用椒四十九粒葱白二莖水壹盞煎至六分服一九陽毒用豆豉四十九粒葱白二莖水一盞同煎

吞一九不得嚼破

孫用和方治陽毒入胃下血頻疼痛不可忍鬱金五箇大者牛黃一皂莢子別細研二味同爲散每服用醋漿水一盞同煎三沸溫服

孫兆口訣治陰毒傷寒手足逆冷脉息沉細頭疼腰重兼治陰毒欬逆等疾方川烏頭乾薑等分爲籠散炒令轉色放冷再搗爲細散每一錢水一盞鹽一撮煎取半盞溫

服

又方治陰勝隔陽傷寒其人必躁熱而不欲
 飲水者是也宜服霹靂散附子一枚燒為
 灰存性為末蜜水調下為一服而愈此逼
 散寒氣然後熱氣上行而汗出乃愈
王氏集驗

同方

唐崔元亮療時疾發黃心狂煩熱悶不認人
 者取大栝樓一枚黃者以新汲水九合浸
 淘取汁下蜜半大合朴消八分合攪令消

盡分再服便差
壽域神方同

外臺祕要救急治天行後嘔逆不下食食入
 即出取羊肝如食法作生淡食不過三度
 即止

又方以雞卵一枚煮三五沸出以水浸之外
 熟內熱則吞之良

簡要濟眾治傷寒咳噫不止及噦逆不定丁
 香壹兩乾柿蒂壹兩焙乾搗末人參煎湯
 下壹錢無時服
王氏集驗方同

外臺祕要治天行毒病衄鼻是熱毒血下數升者好墨末之雞子白凡如梧子用生地黃汁下一二十九如人行五里再服

又療傷寒已八九日至十餘日人煩渴熱勝而三焦有瘡蟹者多下或張口吐舌呵呬目爛口鼻生瘡吟語不識人除熱毒止痢方龍骨半斤碎以水壹斗煮取四升沉之井底令冷服五合漸漸進之恣意飲尤宜老少

梅師方治熱病後下痢膿血不止不能食白龍骨末米飲調方寸匕服

食療治傷寒熱毒下血羚羊角末服之卽差又療疝氣

外臺祕要云崔氏療傷寒手足疼欲脫取羊屎煮汁以灌之差止亦療時疾陰囊及莖熱腫亦可煮黃蘗等洗之

經驗後方治時疾發豌豆瘡及赤瘡子未透心煩狂躁氣喘忘語或見鬼神龍腦壹錢

細研旋滴猪心血和丸如雞頭肉大每服壹丸紫草湯下少時心神便定得睡瘡復發透依常將息取安

藥性論云虎杖治大熱煩躁止渴利小便壓一切熱毒暑月和甘草煎色如琥珀可愛堪看嘗之甘美瓶置井中令冷徹如水白瓷器及銀器中貯似茶啜之時人呼爲冷飲子又且尊於茗能破女子經候不通擣以酒浸常服有孕人勿服破血

治時氣病起諸復勞方

凡得毒病愈後百日之內禁食猪犬羊肉并傷血及肥魚久膩乾魚則必大下痢下則不可復救又禁食麩食胡蒜韭薤生菜蝦鮓輩食此多致復發則難治又令到他年數發也

治篤病新起早勞及食飲多致復欲死方以水服胡粉少許又方粉三升以煖水知服之厚覆取汗

又方乾蘇一把水五升煮取二升盡服之無
乾者生亦可用加生薑四兩豉一升

又方取伏雞子殼碎之熬令黃黑細末熱湯
服一合溫覆取汗

又方大黃麻黃各二兩梔子八十四枚豉一
升水五升煮取二升分再服當小汗及下

痢

又方濃煮甘皮服之蘆根亦佳

覺多而發復方燒飯篩末服方寸匕良

治交接勞復陰卵腫或縮入腹腹中絞痛或

便絕方燒婦人月經衣服方寸匕

又方取狨子一枚撞之三十六放於戶中逐
使喘極乃刺脇下取血一升酒一升合和

飲之若卒無者但服血慎勿便冷應用狨

狨

又方取狨狨脛及血和酒飲之差

又方刮青竹筍二升以水三升煮令五六沸

絞去滓服之此亦通治勞復壽域神方同

又方取女陰上毛燒飲之洗陰汁飲三升愈

又方礬石一分消三分末以大麥粥清可方

寸匕三服熱毒隨大小便出壽域神方同

又方取蓼子一大把水按取汁飲一升乾者

濃取汁服之葱頭搗以苦酒和服亦佳壽域

神方同

又方蚯蚓數升衛生易簡方數條絞取汁服之良

若差後病男接女病女接男安者陽易病者

發復後者亦必死

卒陰易病男女溫病差後雖數十口血脉未

和尙有熱毒與之交接者即得病曰陰易殺

人甚於時行宜急治之令人身體重小腹急

熱上衝胃頭重不能舉眼中生眵膝脛拘急

欲死方方見傷寒論注解

又方鼠矢兩頭尖者二七枚藍一把水五升

煮取二升盡服之溫覆取汗王氏集驗方壽域神方同

○衛生易簡方治傷寒差後婦人病與男

子交接名陰易用其裨褱燒灰研細冷水

調服以小便利爲愈若男子病後與婦人
交接名陽易用韭根去青一握約徑寸半
豶鼠糞十四粒兩頭尖者水壹盞煎六分
頓服之以汗出之爲愈

又方蚯蚓二十四枚水一斗煮取三升一服
仍取汗並良

又方末乾薑四兩湯和頓服溫覆取汗得解
止

又方男初覺便灸陰三七壯若已盡甚至百

壯卽愈眼無妨陰道瘡復常

大病差後小勞便鼻衄方左顧牡蠣十分石
膏五分擣末酒服方寸匕日三四亦可蜜
丸服如梧子大服之

大病差後多虛汗及眼中流汗方杜仲牡蠣
分等暮卧水服五匕則停不止更作

又方甘草二兩石膏二兩搗末以漿服方寸
匕日二服差

又方龍骨牡蠣麻黃根末雜粉以粉身良

又差復虛煩不得眠眼中瘡疼懊懣鼓七合
烏梅十四枚水四升先煮梅取二升半內
鼓取一升半分再服無烏梅用梔子十四
枚亦得

又方黃連四兩芍藥二兩黃芩一兩膠三小
挺水六升煮取三升分三服亦可內乳子
黃二枚

又方千里流水一石揚之萬度二斗半半夏
二兩洗之秫米壹斗茯苓四兩合煮得五

升分五服

梅師方治傷寒差後交接發動困欲死眼不
開不能語方梔子三十枚水三升煎取壹

升壽域神方水叁服衛生易

蓋煎取一盞方同
治瘴氣疫癘溫毒諸方

辟溫疫藥干散大麻人栢子人乾薑細辛各
壹兩附子半兩炮搗篩正旦以井華水舉
家各服方寸匕疫極則三服日一服
赤散方牡丹五分皂莢五分炙之細辛乾薑

附子各三分肉桂二分真珠四分躑躅四分
分搗篩爲散初覺頭強邑邑便以少許內
鼻中吸之取吐溫酒服方寸匕覆眠得汗
卽差晨夜行及視病亦宜少許以內粉粉
身佳牛馬疫以壹匕著舌下溺灌日三四
度甚妙也

度嶂散辟山瘴惡氣若有黑霧鬱敷及西南
溫風皆爲疫癘之候方麻黃椒各五分烏
頭三分剉辛朮防風桔梗桂乾薑各一分

搗篩平旦酒服壹錢匕辟毒諸惡氣冒霧
行尤宜服之

辟天行疫癘雄黃丹砂巴豆礬石附子乾薑
分等搗蜜丸平旦向日吞之壹丸如胡麻
大九日止令無病

常用辟溫病散方真珠肉桂各壹分貝母三
分熬之雞子白熬令黃黑三分搗篩歲旦
服方寸匕若歲中多病可月月朔望服之
有病則愈病人服者當可大效

趙泉黃膏方人黃附子細辛乾薑椒桂各壹兩巴豆八十枚去心皮搗細苦酒漬之宿臈月豬膏二斤煎三上三下絞去滓蜜器貯之初覺敷色便熱如梧子大壹九不差又服亦可火炙以摩身體數百遍佳并治賊風走遊皮膚並良可預合之便服卽愈也

單行方術西南社中栢東南枝取暴乾末服方寸匕立差

又方正月上寅日擣女青屑三角絳囊貯繫戶上帳前大吉

又方馬蹄木擣屑二兩絳囊帶之男左女右又方正月朔旦及七月吞麻子小豆各二七枚又各二七枚投井中又以附子二枚小豆七枚令女子投井中

又方冬至日取雄赤雞作腊至立春煮食盡勿分他人二月一日取東行桑根大如指懸門戶上又人人帶之

又方埋鵲於圓前

斷溫病令不相染著斷髮仍使長七寸盜著

病人卧席下

壽域神方同

又万蜜以艾灸病人床四角各壹壯不得令

知之佳也

壽域神方同

又方鮑魚頭燒三指撮小豆七枚合末服之

女用豆二七枚

又方熬豉雜术酒潰常將服之

又方以鯽魚蜜致卧下勿令知之

壽域神方同

又方栝子人細辛糝米乾薑三分附子一分

末酒服方寸七日服三服十日

又方用麥蘖服糝米乾薑又云麻子人可作

三種服之

丹參膏療傷寒時行賊風惡氣在外卽支節

麻痛喉咽痺寒入腹則心急脹滿胷脇痞

塞內則服之外則摩之并癱緩不隨風濕

痺不仁偏枯拘屈口喎耳聾齒痛頭風痺

腫腦中風動且痛若癰結核漏瘰癧堅腫

未潰傳之取消及丹癰諸腫無頭欲狀骨
 疽者摩之令消惡結核走身中者風水
 遊腫亦摩之其服者如棗核大小兒以意
 減之日五服數用之悉効丹參蒟藳各三
 兩莽草葉躑躅花各一兩菊花一兩秦膠
 獨活烏頭川椒連翹桑白皮牛膝各二兩
 十二物以苦酒五升油麻七升煎令苦酒
 盡去滓用如前法亦用猪脂同煎之若是
 風寒冷毒可用酒服若毒熱病但單服牙

齒痛單服之仍用絲裏嚼之比常用猪脂
 煎藥有小兒耳後瘰子其堅如骨已經數
 月不盡以帛塗膏帖之二十日消盡神効
 無比此方出小品

云常用辟病散真珠桂肉各一分貝母三分
 杏仁二分熬雞子白熬令黃黑三分五物
 搗篩歲旦服方寸匕若歲中多病可月月
 朔望服

單行方南向社中栢東向枝取曝乾末服方

寸姚云疾疫流行預備之名爲栢枝散服
神良刪煩方云旦南行見社中栢卽便收
取之

姚大夫辟温病粉身方芎藭白芷藁本三物
等分下篩內粉中以塗粉於身大良
衛生寶鑑一

陰毒傷寒

玉褌肚

川烏 細辛 良薑 乾薑 天仙子

牡蠣粉 肉桂 胡椒 各等分

右爲末醋糊調塗臍下絛衣覆之又名温
內玉抱肚

廻陽丹治陰毒傷寒手足厥冷

川烏 炮 牡蠣 燒 不灰木 燒 良薑 炒 白芍藥
各二錢 麝香 少許

右爲末每用壹錢男病女津唾調塗外腎
上女病男津唾調塗乳上

手陽丹治陰毒傷寒手足逆冷指甲青色體

冷脉沉細而微神效方右用葱五枝陳
 蜂窩肆五箇燒存性為末用葱搗如泥
 和丸如彈子大手心內握定用手帕緊扎
 定須臾汗出以絲被覆蓋如手心熱甚休
 解開如服藥時先服升麻湯五錢出子葱
 連須叁枝生薑五片水貳大盞煎至壹盞
 去粗温服以被覆之汗出而愈
 王海藏已寒丸治沉寒痼冷臍腹冷疼迴陽
 返陰

附子炮 乾薑泡 茴香炒 良薑七錢 茯苓五錢
 桂叁錢
 右為末醋糊丸如桐子大每服三五拾丸
 温酒送下食前

傷寒

羅謙甫先生衛生寶鑑一書分門別類纖
 悉具備惟治傷寒之法雖紀述一二而不
 全錄盖以其一門理趣幽深未易殫舉况
 其玄機妙旨已備於仲景以下歷代名醫

書中先生之意欲使可醫者究心尋繹庶得其奧今猶恐遐方僻壤臨病倉卒醫者欲求全書檢閱豈可得乎故祖述仲景諸公治內傷外感經驗方并中暑方附刊卷末名曰補遺庶免鹵莽滅裂之輩妄投七劑誤傷於人耳若欲究其極致則仲景治外感三百九十七法一百一十三方東垣治內傷初中末三法及歷代名醫方論具有全書誠刻能意推求以施治療而全人

生亦仁者之用心也茲不能盡述云
外感傷寒等證

表證

頭疼發熱或鼻塞聲重四時俱用芎朮香蘇

散治之

即局方香蘇散加芎朮

川芎

香附

紫蘇

各四兩

甘草

一兩

蒼朮

陳皮

各二兩

右剉每服三五錢水煎去粗熱服不拘時候日三服

傷風傷冷鼻塞聲重頭痛目眩四肢尙倦咳嗽多痰胃滿氣短證重者三拗湯治之輕者金沸草散治之

局方三拗湯方

麻黃不去根節杏仁不去皮尖甘草不去分

右剉每服五錢生薑五片水煎通口服被覆取汗

局方金沸草散又治時行寒疫壯熱惡風

旋覆花去梗麻黃去節前胡各兩荊芥穗四兩甘

草炒半夏湯泡薑汁浸赤芍藥各一兩

右七味每服五錢水一盞半生薑三片棗一枚煎八分去粗溫服不拘時候

頭疼項強發熱惡寒肢體拘急骨節煩疼腰脊強痛胃膈煩滿四時用消風百解散治之春初秋末用葛根解肌湯治之局方消風百解散方

荆芥 白芷 陳皮去白蒼朮 麻黃去節各四兩 甘草二兩炙

右六味每服五錢水壹盞半生薑三片烏梅一枚連須葱白三寸煎至八分去粗溫服不拘時候

局方葛根解肌湯方

葛根四兩去根節芍藥 甘草炙黃芩

各二兩冬寒可去之如病肉桂一兩天氣人有鬱蒸熱可斟酌用之酌用之

右六味每服五錢水壹盞半棗壹枚擘破煎八分去粗稍熱服不以時候汗出爲度

頭痛項強壯熱惡寒身體煩疼目睛痛多寒壅欬嗽鼻塞聲重春夏秋俱用敗毒散治之冬用十神湯治之春秋若寒亦用局方敗毒散

人參 茯苓 甘草炙 前胡 川芎 羌

活 獨活 桔梗 柴胡 枳殼

右十味各等分每服五錢水壹盞半生薑薄苛各少許煎至八分去粗溫服不拘時候

局方十神湯方

陳皮去白麻黃去節川芎甘草炙香附

紫蘇去梗白芷升麻芍藥各四兩乾葛

十四兩

右十味每服五錢水一盞半生薑五片煎至八分去滓熱服不拘時候如發熱頭痛加連須葱白三莖如中滿氣實加枳殼數片同煎服

傷寒發熱頭痛四時用十味芎蘇散治之

川芎七錢紫蘇乾葛各二錢半澹寮方

味各半兩柴胡各半兩茯苓甘草各半錢半夏六錢枳

殼炒參錢半陳皮參錢半桔梗生二錢半

右剉每貼五錢水二盞薑三片葱白二根

煎一盞去粗不拘時服澹寮方醫方大成集成南北經驗方

袖珍方吹咀每服參錢生薑棗子煎服

黃連解毒湯方見無求子活人書潔古涼膈散方見宣

宣明雙解散方

防風川芎當歸芍藥大黃薄荷

苛 麻黃節不去 連翹 芒硝各半兩 石膏

昔岑 桔梗各一兩 滑石 甘草各參兩 荆芥

梔子 白朮各一錢 生薑參片已上卸 滑石

六廿草一兩已上 即益原散

右二拾味每服五錢葱白五寸生薑三片

水煎服

傷寒七八日邪毒不解表裏俱熱心胃大煩頭痛自汗大渴飲水燥乾脉滑數而實或長而實用啓源白虎湯治之夏熱時用如上證

脉洪大可加人參 如鼻中氣短促上喘脉

洪大而虛無力或微遲則內傷治

知母一兩 甘草一兩 粳米合一兩 石膏四兩亂

末為

右肆味每服五錢水煎溫服如或煩渴口

乾脉洪大加人參半兩名人參白虎湯此

藥立夏後立秋前天氣熱時可服立夏前

立秋後天氣不熱時不可服內傷氣虛血

虛脉虛之人並不可服此方與仲景方分

兩不同

裏證

傷寒四五日或十餘日邪結在裏大便秘澀
腹滿或脹痛或繞臍刺痛或譫語或心下痞
硬脉長脉沉實或下利心下堅硬或已經下
其脉浮沉尚有力用仲景大柴胡湯治之

柴胡八兩 黃芩 赤芍藥各叁兩 大黃二兩 半夏

二兩 枳實半兩

燒炒

右六味每服五錢水一盞半生薑五片棗

子壹枚煎至八分去粗不拘時服

惡熱不惡寒手心腋下澀澀汗出胃中乾涸
燥糞結聚潮熱大便秘小便如常或腹滿而
喘或譫語脉沉而滑用仲景調胃承氣湯治
之

芒硝半斤 甘草炙二兩 大黃四兩

皮酒洗

去

右剉每服臨期斟酌多少先煮貳味熟去

粗下硝上火煮貳叁沸頓服之

始初發熱惡寒今汗後不惡寒但大熱發而

躁始初脉浮大今脉洪實或沉細數始初惺
 惺今狂語用調胃承氣湯治之方見前
 心胃連臍腹大悶腹中疼坐卧不安冒悶喘
 急或腹中微滿不大便用仲景小承氣湯治
 之

大黃四兩厚朴二兩枳實大者叁枚炒

右剉碎二味大黃切如棋子大臨證斟酌
 多少用之

育腹脹滿按之痛日久不大便小便赤澀表

裏俱熱或煩渴譫妄或狂妄不識人或潮熱
 懊懣又如瘧狀或大渴反不能飲或喘急冒
 悶或微喘直視脉實數而沉用大承氣湯或
 三一承氣湯治之

仲景大承氣湯方

大黃四兩如棋子大酒洗厚朴八兩薑炒枳實大者五枚炒芒硝二合

右四味每服看證斟酌多少用水三盞先
 煮二物取壹盞半去粗內大黃煮取八分

去粗內芒硝微煎一兩沸溫服得下餘勿服

啓源三一承氣湯

大黃酒洗芒硝 厚朴薑炒枳實炒各半兩甘草炙一兩

右五味每服斟酌多少用承一盞半生薑三片煎八分熱服得利則止未利再服傷寒手足溫自利不渴腹滿時痛咽乾脉沉細用三因治中湯治之

人參 乾薑炮 白朮 甘草炙 陳皮白青

皮炒各等分

右六味剉每服五錢水壹盞半煎七分去粗食前服

半表半裏證

往來寒熱或胃滿脇痛或心煩或嘔或欬或口苦舌乾或渴或小便不利或心悸脉弦或弦緊用小柴胡湯治之方見前寒熱往來大便秘澁腹滿脹痛或時發煩躁

或已經汗後如瘧日晩發熱用大柴胡湯治
之方見前

外感有內傷證

人參養胃湯方見和劑局方

外感發熱頭疼內因痰飲凝節為熱或中脘
痞滿嘔逆惡心川參蘇飲或藿香正氣散治
之

局方參蘇飲方

陳皮去白枳殼炒桔梗 甘草炙木香各半兩

半夏 乾葛 紫蘇葉 前胡 人參

茯苓各七錢半

右拾壹味剉每服五錢水五盞半生薑七

片棗壹枚煎七分去粗微熱服用一方不用木香

局方藿香正氣散方

茯苓 白芷 大腹皮 紫蘇各一兩 陳皮

桔梗 白朮 厚朴 半夏 甘草各二兩

藿香去土

右十壹味剉每服五錢水壹盞半生薑三

片棗一枚煎至七分去粗熱服如欲出汗
被蓋再煎服

如以上證候未見愈用小柴胡湯治之方見前

如以上證候又未見愈腹或滿數日不大便

用活人書小柴胡加芒硝湯

柴胡二兩 黃芩七錢 人參 甘草炙各半 夏

錢八芒硝兩

右六味剉每服五錢水壹盞半生薑五片

棗壹枚煎八分去粗下硝再煎壹兩沸稍

熱服

外感傷寒極證

陽證

身動而輕言語有聲目睛了了鼻中呼吸出

入能往來口中鼻中俱氣熱出此事難知 用調胃

承氣湯治之方見前

陰證

身靜而重語言無聲氣少難以布息目睛不

了了鼻中呼吸不能出入往來口中鼻中氣

俱冷水漿不入大小便不禁面土惡寒有如

刃刮出此事難知用四逆湯及葱熨法治之

仲景四逆湯方

甘草炙二兩乾薑炮一兩半附子一枚生用去皮破八片今宜炮

用

右三味每服斟酌多少水二盞煮取八分

去粗溫服

活人書葱熨法葱一束以繩纏如餅大切去

根葉惟存葱白長二寸先以火煨一面令

熱勿至灼火乃以熱處著病人臍連臍下

其上以熨斗盛火熨之令葱餅熱氣透入

腹中更作三肆餅如壞不可熨即易一餅

俱病人漸醒手足溫有汗乃差更作四逆

湯以溫內

陽證似陰

手足逆冷大便秘結小便赤色或大便黑硬

脈沉而滑出清人書按此手足逆冷名熱厥與陰

厥不同詳見後篇厥證條下證輕者用白虎

湯

脈沉而滑出清人書按此手足逆冷名熱厥與陰

厥不同詳見後篇厥證條下證輕者用白虎

湯重者小承氣湯治之白虎湯方小承氣

湯方並見前

陰證似陽

身微熱煩躁面赤脉沉而微出活人書按身微熱

是裏寒煩躁是陰盛發躁面赤是下元虛陽

泛上猶日落而霞光上天也與陽證面赤不

同仲景少陰證面赤用四逆湯加葱白治之

四逆湯方見前加更葱白前服

身冷脉細沉數煩躁不飲水出活人書此名陰盛

格陽川仲景乾薑附子湯加人參治之

乾薑一枚炮去附子一枚炮去加人參半兩

右三味每服酌量多少水壹盞半煎至八

分去粗或溫或涼服水一盞

傷寒目赤而煩渴脉七八至東垣曰此陰盛

格陽於外非熱也診脉以數為熱遲為寒今

脉七八至是熱極也然按之至骨則無脉是

無根蒂之脉雖七八至其下無根蒂故知非

熱也出試治法用乾薑附子湯加人參八又

川白通加猪膽汁湯 乾薑附子湯加人參

前方見

仲景白通加猪膽汁湯方

葱白四莖 乾薑二兩 附子一枚炮去皮破八片 人尿五合猪

膽汁二合

右剉每服酌量多少水一盞煮至五分去

粗內尿膽汁和勻或溫或涼服無膽亦可

表裏雜證

煩躁

煩為煩擾躁為躁憤皆為熱證然煩有虛煩躁有陰躁古人所謂陰極發躁

陽證

五六日不大便或心下硬而煩躁者治用大

柴胡湯或調胃承氣湯方並見前

大熱乾嘔呻吟錯語不得眠治用黃連解毒

湯方見前

煩躁發熱胃中煩悶或已經汗解內耗胃中

煩滿其證不虛不實治用三黃瀉心湯或用

竹葉石膏湯治之

活人書三黃瀉心湯

大黃 黃連 各二兩 黃芩 一兩

右剉每服壹兩百沸湯二大盞熱瀆之停

一時久絞去粗煖動分貳服

仲景竹葉石膏湯

石膏 一斤 半夏 二兩 甘草 二兩 人參 二兩 麥門

冬 半兩

右剉每服五錢水二盞入淡竹葉生薑各

五片煎至一盞半去粗入粳米百餘粒再煎候米熟去米溫服不計時

陰證 此是陰極發熱

手足冷或身微熱脉皆沉細微弱而煩躁者

治用四逆湯加葱白方見前或白通加猪膽汁

湯方見前或用人參三白湯加竹茹或無憂散

右四方選而用之

人參三白湯

白朮 白芍藥 白茯苓 各一兩 人參 二兩 加

竹茹一

糲

白芍藥

一人參二

人右剉每服五錢水二盞生薑三片煎八分

去粗溫服

三因無憂散以天南星為末入臘月黃牛膽

中縛令緊懸於當風避日處候乾為末用

人參半兩煎湯七分盞調末二錢乘熱服

之遲少時更以熱人參湯投之或入辰砂

細末亦可

舌胎

陽證

寒邪在半表半裏舌胎白滑或黃胎治用小

柴胡湯

方見前

熱結在裏表裏俱熱舌上或白或黑不滑而

澁治用白虎湯

加人參

方見前

經曰藏結舌上白胎滑者難治又曰藏結無

陽證不往來寒熱其人反靜舌上胎滑者不

可攻也

陰證

手足冷舌胎黑治用四逆湯方見前

譫語此是語言謔妄錯亂也

陽證

胃實不大便譫語治用大柴胡湯或調胃承

氣湯方並見前

婦人傷寒經水適斷發熱惡寒至夜譫言此

為熱入血室血室者素問所謂女子胞即產

腸也治用小柴胡湯方見前

陰證

手足冷脉細微而譫語治用四逆湯方見前

鄭聲此是語言鄭重如說此一語又復再說聲氣無力句不連續也

陽證

身微熱脉微弱而鄭聲者治用人參三白湯

方見前

陰證

身涼手足或冷而鄭聲者治用四逆湯方見前

吃逆仲景所謂噦蓋臍下氣逆衝上出口作聲素問所謂諸逆衝上皆屬於火

陽證

不虛不實而吃逆者治用小柴胡湯方見前或

用橘皮竹茹湯或用丁香柿蒂湯加人參

活人書橘皮竹茹湯

橘皮斤一青竹茹半一升甘草炙二兩人參半兩

右剉每服五錢水二盞生薑五片棗二枚

煎八分去粗溫服

丁香柿蒂湯加人參

丁香 柿蒂 青皮 陳皮 加人參各分

右剉每服三錢水一盞半煎七分去粗溫服

身熱脉雖數而虛而吃逆者治用人參三白

湯加竹茹方見前或用八物湯加竹或用丁香

柿蒂湯加人參方見前

八物湯加竹茹方

人參 白朮 白茯苓 甘草 當歸

熟地黃 川芎 竹茹 白芍藥各等分

右剉每服五錢水壹盞生薑三片煎八分

去相溫服

陰證

身冷手足或冷而吃逆者治用四逆湯加人參方見前如病後無他證獨見吃逆者治用人參三白湯加常歸

人參 白朮 茯苓 芍藥 當歸各等分

右剉每服五錢水二盞生薑三片煎八分不拘時服

發黃

陽證

茵陳蒿湯方見傷寒論注解

身熱大便如常小便不利而發黃者治用茵

陳五苓散

澤瀉 白朮 猪苓 赤茯苓各一兩半 官桂

茵陳一兩三兩

右剉水煎溫服

身熱大小便如常而發黃者治用仲景梔子檨皮湯加茵陳

梔子十五枚 甘草一兩 檗皮二兩 茵陳六兩

右剉水煎温服

陰證

皮膚涼又煩熱欲卧水中喘嘔脉沉細遲無力而發黃者治用茵陳四逆湯

乾薑一兩 甘草二兩 附子炮一枚去皮破八片 茵陳六兩

右剉

每服酌量多少水煎涼服

皮膚冷心下硬按之痛身體重背惡寒目不

欲開懶言語自汗小便利大便秘了而不了脉

緊細而發黃者治用茵陳四逆湯方見前

遍身冷面如桃柳枝色腹滿小便澁關尺脉

沉遲細而發黃者治法先用茵陳茯苓湯以

利其小便次用茵陳四逆湯加當歸木通入

茵陳茯苓湯方

茯苓 官桂各一兩 猪苓七錢 滑石一兩 茵陳半兩

陳半兩 加當歸一兩

右剉每服五錢水煎温服

茵陳四逆湯方見前更加當歸木通

發斑

斑斑如錦紋或面部或背脊或四肢紅赤者胃熱也紫黑者胃爛也赤者五死一生黑者十死一生治用玄參升麻湯重者白虎加人參湯

三因玄參升麻湯方

玄參炒升麻 甘草炙各半兩
右剉每服五錢水壹盞半煎七分溫服

白虎加人參湯方見前

陰證

斑如蚊蚤咬痕稀少而微紅此下元陰火失守聚在胃中上熏於肺肺主皮毛故背脊皮膚發此斑也治用大建中湯

桂心 芍藥 黃芪各二錢 人參 當歸

甘草炙各一錢 附子炮半兩 乾薑五錢 半夏二錢

右九味剉每服酌量多少水二盞棗二枚煎入分去粗溫服

發狂

陽證

發狂煩躁面赤脉實治用調胃承氣湯方見前

陰證

發狂而肌表雖或熱以手按之則冷透手或肩背胛膈有斑十數點脉極沉細治用乾薑

附子湯加人參方見前

厥逆

陽證

厥者逆也陰陽不相順接故手足逆冷冷至臂腿名曰四肢厥逆

手足雖冷有時或溫手足心必暖脉雖沉伏

按之則滑其證或畏熱或渴欲飲水或揚手

擲手煩躁不得眠大便秘小便赤此名熱厥

古人所謂陽極發厥也治用白虎湯大承氣

湯雙解散涼膈散以上四方詳證輕重選而

用之方並見前

陰證

四肢冷身不熱惡心蹇足卧或引衣被自覆不渴或下利或大便如常脉沉微不數或雖

沉實按之則遲弱此名冷厥治用通脈四逆湯或當歸四逆湯或白通加豬膽汁湯並方前若病人寒熱而厥面色不澤冒昧兩手忽無脉或一手無脉此是將有好汗宜用麻黃附子甘草湯以助其汗汗出則愈不用藥助亦好汗必自出治用麻黃附子甘草湯

麻黃 二兩 去節 甘草 二兩 炙 附子 一箇 炮

右剉每服五錢水二盞煎至八分不拘時溫服

多汗

陽證

身微熱表虛汗出不已或因醫者發汗以致表虛脉不實治用王海藏黃芪湯

黃芪 人參 白茯苓 白朮 白芍藥

各一兩 甘草半錢 陳皮五錢

右剉每服酌量多少用水二盞生薑三片煎八分溫服

陰證

身涼額上手背有冷汗治用四逆湯加人參
前方見

結胃 邪氣乘虛結於心中硬滿而痛手不可按其痛連臍腹堅硬名曰大結胃

若按之心中痛此名小結胃

心胃高起大痛手不可按治用輕者枳實理中丸重者大陷胃治丸之活人書枳實理中

丸

茯苓 人參 各二兩 枳實 炒十枚 白朮 乾

薑炮甘草 各二兩

右為末煉蜜和勻每一兩作四丸熱湯化下壹丸

仲景大陷胃丸

大黃 參 葶藶 炒 杏仁 炒去尖 芒硝 各七錢半

右以前二味為末研杏仁芒硝如泥和藥

末丸如彈子大每服一丸別杵甘遂末一

錢匕白蜜一大匙水二盞煎至七分頓服

之一宿乃下如不下更服以下為度但甘

遂性猛宜詳虛實斟酌用之

按之心中痛脉浮滑者治用仲景小陷胃湯治之

黃連二錢半 半夏六錢 栝蒌實大者一枚用四分之一

右以水三盞先煎栝蒌實至一盞半去粗入前藥二味煎至一盞分作二服利下黃涎未即安

心下痞邪氣乘虛帶於心下滿而不痛日痞

心下滿而不痛者治用半夏瀉心湯或生薑瀉心湯或枳實理中丸治之

仲景半夏瀉心湯方

半夏二兩半 黃芩 人參 甘草 乾薑各二兩

黃連一兩 棗子十二枚擘破

右剉用水一斗煮取六升去粗再煎取三升溫服一升日三服

仲景生薑瀉心湯方

生薑四兩 甘草炙 人參 黃芩各二兩 乾薑

黃連各一兩 半夏半升 棗子十二枚

右八味以水壹斗煮取六升去粗再煎取

三升温服一升日三服

枳實理中丸前方見

心下痞滿心煩腹鳴下利治用生薑瀉心湯

前方見

嘔有物有聲名曰嘔乾嘔則無物

陽證

嘔而發熱或寒熱或潮熱者治用小柴胡湯

前方見

陰證

嘔而身微熱或厥或煩小便利脉弱者治用

四逆湯出此事難知方見前

吐有物無聲名曰吐

陽證

吐而身熱或不熱者治用小半夏加茯苓湯
或小半夏加橘皮湯或乾薑黃芩黃連人參湯治之

活人書小半夏加茯苓湯方

半夏五兩生薑八兩茯苓兩更加白朮陳皮廿

草各二兩

右剉水煎服

活人書小半夏加橘皮湯方

半夏兩一陳皮兩半更加白朮茯苓甘草各半兩

右剉每服五錢水二盞生薑十片煎至八

分去粗溫服

仲景乾薑黃芩黃連人參湯方

乾薑 黃芩 黃連 人參各參兩

右剉每服五錢水二盞煎八分去粗溫服

陰證

吐而手足寒或煩躁治用四逆湯方見前

醫方類聚卷之五十七