

義集

婦人科

調經

血崩

虛勞

妊娠

小產

乳病

久病

經閉

帶下

赤痢

產前

產後

乳岩

久病

婦人科

特別  
19  
613  
6



門 9  
號 613  
卷 6

新刊增補萬病回春義集卷之六

太醫院醫官金谿雲林龔廷賢子才編輯

門人 醫官同邑胡廷訓

慈谿羅國望

弟 醫官廷器姪懋官

書林 後學 余一貫增補

書林 萃慶堂 余泗泉刊行

# 婦人科

脉經曰寸關調如故而尺脉絕不至者月水不利當患小腹引腰痛氣滯上攻胃臆也○寸口脉浮而弱浮則為虛弱則無血○尺脉來而斷絕者月水不利○尺脉滑血氣實婦人



經脈不利

肝脈沉主月水不利腰腹痛

少陰脈弱而微微則血少

脈來至狀如琴弦若少腹痛主月水不利孔竅生瘡

胃脈滿少陰脈微而遲微則無精遲則陰中寒滿則血不來

此為居經三月一來

脈經卷九云少陰脈弱而微之則少血弱則

少陰脈滑而數者陰中生瘡

生風微弱相搏陰中惡寒胃氣下泄吹

少陰脈數則氣淋陰中生瘡

而正喧師曰吹而正喧此穀氣實也

少陰脈弦者白腸必挺核

。豎陽脈微而滿微則胃氣虛之則短氣咽燥而

少陰脈浮而動則為虛動則為痛婦人則漏下

口苦胃熱滿則

婦人生死脈訣

矢液少陰脈微

脈經曰婦

漏血下赤白日下血數升脈急數者死遲者生

婦人漏下赤白不休脈小虛滑者生大緊實數者死

婦人新生乳子脈沉小滑者生實大弦急者死

婦人疝瘕積聚脈必急者生虛弱者死

婦人生產因中風伊寒熱病喘鳴而有息脈實而浮緩者生

小急者死

婦人生產之後寸口脈焱疾不調者死沉細附骨不絕者生

金瘡在陰處出血不絕陰脈不能至陽者死接陽而復出者

生

懷孕六七月脈實大牢強弦急者生若沉而細者死

丹溪曰產前脈細小產後脈洪數皆死又曰產後當洪數既產

而洪數如故豈得不死此亦大槩言之亦有洪數而生者

調理

婦人諸病者多是氣盛而血虛也。

○調氣養血湯專治婦人室女血氣不和胎前產後諸病蓋婦人以血為主殊不知因氣先不調然後血脈不順即生諸病

奪命還真香附米 錢炒二 烏藥一錢 砂仁一錢 當歸 川芎 白芍酒炒

地黃 各一錢 甘草炙三分

右剉一劑姜棗煎服或丸或散皆可○氣痛加吳茱萸○痰盛加二陳湯

婦人經水或前或後或多或少或踰不來或一月兩來者俱是不調之故也

○千金調經湯治婦女經水不調或前或後或帶下或崩漏或經行腹痛或經閉不通或經行不調或經行不調或經行不調

不調時上泄血經候不調久不懷孕

當歸 川芎 白芍 酒炒各人參 阿膠炒

牡丹皮 肉桂各一 吳茱萸炒 麥門冬去心

半夏姜製各一 甘草五分

右剉一劑生姜煎服

經水先期而來者血虛有熱也治當補血清熱經自調也

當歸半 川芎五分 白芍酒炒 生地黄一 阿膠炒 五分

艾葉三分 條芩一 黃連姜炒 黃栢五分 知母五分

香附一 甘草三分

右剉一劑水煎空心溫服

經水過期不來作痛者血虛有寒也治當溫經養血痛自止也

當歸半 川芎五分 白芍酒炒 熟地黄一

桃仁皮尖研 紅花三分 香附一分 肉桂五分

蓬木一分 蘇木一分 木通八分 甘草五分

右剉一劑水煎空心溫服

經水將來作痛者血實氣滯也腹中陳上作痛乍作乍止氣血俱實治當行經順氣痛自止也

當歸 川芎 白芍 生地黃 黃連

香附 桃仁去皮 紅花減半 玄胡索 牡丹皮

莪木各等分

右剉一劑水煎空心溫服發熱加柴胡黃芩

經行着氣作心服腰脇疼痛者乃瘀血也治當順氣消瘀痛自已也

當歸 川芎 白芍 生地黃 桃仁去皮尖

紅花 玄胡索 莪木 青皮

右剉一劑水煎溫服

經水過期而來紫黑成塊者氣鬱血熱也治當調經順氣經自調也

當歸 川芎 白芍 生地黃 桃仁去皮尖

紅花 牡丹皮 青皮 香附 玄胡索

甘草

右剉一劑水煎服

經水過期而來色淡者痰多也治當活血化痰經自調也

當歸 川芎 白芍 生地黃 陳皮 半夏姜

白茯苓去皮 甘草各等分 右剉一劑生姜三片水煎服

經水過期而來作痛者血虛有熱也治當生血清熱痛自止也

當歸 川芎 白芍酒炒 生地黃 牡丹皮

桃仁去皮 紅花 木香 香附 玄胡索

甘草

右判水煎温服

經水過多久不止者成血崩也治當涼血補血經自止也

當歸 川芎 白芍酒炒 生地黃 白木 條芩

阿膠炒 白茯苓去皮 山梔炒 地榆 荆芥 香附

甘草

右判水煎空心服久不止者加搗茅根汁磨墨同服

經水行後作痛者氣血虛也治當調養氣血痛自止也

當歸 川芎 白芍酒炒 熟地黃 人參 白木去

白茯苓 乾姜炒 甘草

右判一劑姜棗煎服

經水去多久不止發腫滿者是脾經血虛也治當補血健脾利

當歸 川芎 白芍酒炒 熟地黃 茯苓 白木

砂仁 大腹皮 木香 陳皮 厚朴姜汁炒

蘇子 猪苓 木通 香附 玄胡索

牛膝去芦 甘草

右判一劑水煎温服

經水月久不行發腫者是瘀血滲入脾經也治當活血健脾行

當歸 川芎 白芍 桃仁去皮 紅花 牡丹皮

乾姜 肉桂 厚朴 枳殼炒 木香 香附

牛膝去芦 玄胡索

右判水煎服

經水月久不行腰脅有塊作疼者是血結癥瘕也治當調經止

當歸 川芎 砂仁 木香 小茴 乳香

枳實炒 厚朴姜炒 桃仁 紅花 牡丹皮

肉桂

香附

玄胡索

牛膝

去芦

右剉劑水煎溫服

錯經妄行於口鼻者是火載血上氣之亂也治當滋陰降火順氣調經自佳也

當歸

川芎

白芍

生地黄

黃芩

山梔

牡丹皮

犀角

阿膠炒

白茯苓去皮

門冬去心

陳皮

右剉劑水煎溫服

經行身痛麻痺寒熱頭疼者乃觸經感冒也

○加減五積散治婦人遇經行時沿身疼痛手足麻痺或生寒

依本方去乾姜加羌活獨活牛膝姜葱煎服方見中寒

經水不調或腹痛白帶或淋瀝不止或肌瘦者此血氣俱虛也

○大補經湯治婦人氣血虛弱血海寒冷經水不調或時心腹

月淋瀝不止面色痿黃四肢無力頭目眩暈肌體羸瘦

當歸酒洗

白芍酒炒

香附各六分

川芎

熟地黃各五分

白朮去芦

白茯苓去皮

黃芪

陳皮

玄胡索各四分

人參

砂仁

阿膠炒

沉香另研

小茴酒炒

吳茱萸炒

肉桂

粉草各三分

右剉一劑姜棗煎服

○經驗調經湯治婦女經水或前或後或多或少

當歸

熟地黃

香附各一分

白芍酒炒

吳茱萸炒

大腹皮

紫荊皮

肉荜蓉各一分

川芎

條芩各七分

粉草五分

右剉一劑生姜三片棗一枚水煎待經至之日服起一日一

劑服至四劑而止經即對

○艾附暖宮丸

治婦女經水不調小腹時痛赤白帶下子宮虛

南香附米一斤

四兩醋浸四兩湯浸各浸一宿焙乾

北艾葉

焙乾搗爛去灰醋當歸川芎白芍酒炒

熟地黃

姜汁炒各玄胡索子炒二兩耳草生用八分

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服七八十九空心米湯

送下或酒亦可

○調經八物丸

養血調經如期除赤白帶久服立孕

當歸

酒洗南芎鹽湯浸切白芍酒炒一熟地黃酒浸二兩

白茯苓

去皮一兩白木焙二兩橘皮鹽湯洗曬

條芩

酒炒一兩牡丹皮一兩玄胡索酒炒一兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服七八十九空心淡鹽湯

晡

下寒月酒下

一婦人熱執肢體瘦倦食少無味月經不行或鼻衄或血崩半載矣或用順氣清熱等劑不應更加寒熱且時欲作嘔余以為鬱怒虧損脾胃虛火錯經妄行而然耳遂朝用補中益氣湯夕用六味丸各數劑半載而痊方見補益

一婦人經行遇怒其經即止甚則口噤筋攣鼻衄頭痛痰氣搐搦瞳子上視此肝火熾甚以小柴胡湯加熟地黃山梔釣藤鈎而愈方見傷寒

一婦人多怒經行旬餘方止後淋瀝無期肌體倦瘦口乾內熱盜汗如洗日晡熱甚皆由肝脾虧損無以生發元氣用補中益氣湯加茯神遠志酸棗仁麥門冬五味子牡丹皮龍眼肉治之獲痊方見補益



一婦人經行感冒風邪晝則安靜夜則譫語此熱入血室也用  
小柴胡方見傷寒加生地治之頓安但內執頭暈用補中益  
氣方見補益加蔓荊子而愈後因怒惱寒熱譫語胸脇脹痛  
小便頻數月經先期此肝火血熱妄行用加味道遙散加生  
地而愈方見婦人虛勞

### 經閉

婦人壯盛經閉者此血實氣滯宜專攻也

○通經丸 治經閉並乾血氣

斑猫二枚 苧蒿糯 大黃五錢 桃仁四十九個

右為末酒糊為丸如梧桐子大空心酒下五七丸甚者十五  
凡如血枯經閉者用四物湯送下

五積

○通徑耳露丸 治婦人經行不通前漏腸風赤白帶下血風五  
夫婦陰血陽精不交諸疾神効

大黃四兩 用頭紅花四兩 入水取汁浸一日不用經乾  
皮三兩 用好酒浸一日乾切 如杏核大晒乾不用童便  
皮二兩 用五粒炒黃色 去豆不用四兩 用當歸四兩 入淡醋  
浸一日晒乾不用當歸

右四分共合一處入南木香一兩百草霜五錢共為細末以  
當歸醋紅花水煮米糊為丸如梧桐子大每服三四十九空  
心溫酒下

○取經丸 治婦人經閉不通不論新久

乳香 沒藥 孩兒茶 巴豆去殼葱白 各五分  
班猫五箇

右為末共搗為丸綿裹三層繫放筒上將綿繫住送入陰戶

內三四寸許俟一炷香時經水即下

○一粒仙丹 治婦人乾血勞并赤白帶下種子如神

巴豆 一百二十箇去殼用新磚一箇將豆帶包放磚上

班猫 六十箇去翅 穿山甲 五錢油煎 皂角 一兩刮粗皮

苦苧 末一兩 大黃 末一兩

右合一處以棗煮去皮核丸藥如彈子大用綿繭張開裹藥  
在內穿入三寸竹筒上頭後仍留係二三寸餘攪一轉不令  
藥氣出外用時先以溫水洗陰內令潔淨拭乾却以葱汁浸  
溫藥頭送入子宮極深處整一日一夜取出藥不用此藥用  
後少間耳冷氣下行發寒發熱如傷寒之狀不怕飲食任意  
食用無妨半日即通或鮮血或死血一切惡物悉下忌生冷  
發物自此子宮和暖而交媾則有孕矣

婦人虛弱經閉者此血蚶枯竭宜補經自通也

○通經調氣湯 治婦女經閉虛弱者

當歸 酒洗 川芎 白芍 酒炒 生地黄 酒浸 香附 童便炒

牡丹皮 錢八 柴胡 六錢 黃柏 酒炒 知母 酒童便炒 黃芩 酒炒

牛膝 去土 酒洗 桃仁 紅花 二味

右剉作十劑水煎空心一服臨臥一服

○牡丹皮湯 治室女經閉咳嗽發熱

當歸 半錢 川芎 八分 白芍 生地黄 陳皮 白朮

香附 錢一 牡丹皮 一錢半 柴胡 黃芩 各七 甘草 四

右剉一劑水煎服

○養真湯 治婦人經閉不通臍下一塊已經三載顏色如故百

當歸 酒洗 川芎 白芍 酒炒 熟地 姜汁 山茱萸 去核

室女月 閉咳

白茯苓皮去梔子炒 小茴酒炒益母草 香附酒醋米泔

陳皮各等 右劉六劑水煎服經盡通後此作丸服

六味地黃丸治婦女經閉或熱或咳嗽等症方見補益依本

婦人半虛半實經閉者宜攻補兼施也

通經湯治婦女經閉者

當歸 川芎 白芍 生地 大黃 官桂

石厚朴 枳實 黃芩 蘇木 紅花

烏梅前服

右劉六劑水煎服

調經養血丸治婦女經閉或熱或咳嗽等症方見補益依本

香附酒炒白芍酒炒各

川芎一兩生地黃酒洗二兩茯苓去皮白芷一兩

牡丹皮酒洗二兩乾姜炒一兩肉桂一兩紅花一兩

桃仁兩玄胡六錢沒藥一兩半夏香油炒

阿膠炒一兩小茴錢二莪木五錢

甘草炙五錢

右為未醋糊丸每服八十九空心白湯黃酒任下

婦女經閉有積塊者宜養血破積也

四物調經湯治婦女或十五六歲經脈不行日夜生寒抽手

塊冲動痛者此恨食生冷傷感而致也

當歸酒洗川芎 白芍酒洗柴胡 黃芩

枳殼去穢熟地酒浸陳皮 莪木醋炒

三稜醋炒白木去芦白芷 小茴鹽水玄胡各五分

香附童便炒一分 青皮麩炒 砂仁 紅花  
甘草各四分

右劉一劑生薑三片葱白三根水煎溫服○苦有塊不通瀉  
與調經丸間服○遍身疼痛加羌活獨活○咳嗽加杏仁五  
味子各五分○肚痛加炒乾漆七分○瘧疾加草果常山○泄  
瀉去枳殼加肉蔻

○調經丸

當歸酒洗 川芎 熟苧姜汁 青皮麩 陳皮 枳殼去穢

白木去芦 厚朴姜汁 小茴香炒 艾葉去筋各 香附醋炒

三稜煨醋 莪木煨醋 砂仁 白芷 牛膝去芦

玄胡略一粉草 琥珀各五錢 右為末醋打糊為丸梧桐子大每服八九十丸米湯下酒亦

可若肚痛以蒼朮去白木

婦人經通之後宜調理之劑也

○加減四物湯加香附陳皮之類方見補益

○滋陰百補丸治女人勞傷氣血不足陰陽不和乍寒乍熱心

香附童便一斤炒去毛分四製酒醋鹽湯 益母草半斤搗

當歸酒浸 川芎 熟苧酒洗 白木去芦各 人參去芦

茯苓去皮 玄胡索各二兩 白芍三兩 甘草一兩

右為末煉蜜丸梧桐子大每服六十九丸空心宿砂湯下或酒

醋白滾水任下

婦人胃氣素弱為哭母吐血咳嗽發熱盜汗經水三月不行

余以為悲則傷肺思則傷脾遂朝服補中益氣方見補益加

桔梗貝母知母夕用歸脾湯方見健忘送六味丸而愈方見

之虛勞在

一婦人久患瘧瘵作則經不行形虛脉大頭痛懶食大便泄瀉  
小便淋瀝口乾唇裂內熱腹脹蓋由久瘵正氣已虛陰火獨  
旺用補中益氣治之尋愈惟不時頭痛乃加蔓荊子而痛止  
又兼用六味丸而經行方見補益

魏憲副寵夫人患逆經吐血不止予診六脉微澹有力此血虛  
火盛也以四物去熟地黃用生地黃共一兩加酒蒸大黃一  
兩同煎入童便服之服後血止經通矣

徐憲副寵夫人患經閉人皆擬有孕至七八箇月漸覺黃瘦腹  
中左右有塊如鼓發熱面赤不思飲食余診六脉微澹此血  
枯氣鬱也以四物湯加香附牡丹皮白朮之類十數服又加  
桃仁紅花又數服方與四妙枳殼丸不三四服打下血塊若  
許始愈

增補調理門方旨

增補固經丸

酒黃芩 龜板 白芍藥 各一黃栢 妙褐色三錢  
檮根白皮 七錢半 香附 童便浸一宿焙乾三錢

月來過多不止者此方主之○月來過多不止是陰血不足  
以鎮守胞絡之火故血走失而越常度也是方也黃芩黃栢  
芍藥龜板皆滋陰制火之品故謂壯水之主以鎮陽光也檮  
皮之澁所以固脫香附之辛所以開其鬱熱爾

血崩

崩漏者有新久虛實之不同也  
帶下崩中脉多浮動虛遲者生實數者重

初起屬實熱者宜解毒也

黃連 黃芩 黃柏 生地黄 蒲黃

右剉水煎空心服

○治婦人血崩年四十以上甚哀太甚則心悶急肺葉卒焦而不可服燥熱之藥蓋血熱則流行先以

黃連解毒湯後以涼隔散合四物湯調治效

稍久屬虛熱者宜養血而清火也

○溫清飲治婦人經脈不注或如豆汁五色相雜面色痿黃吐

當歸 白芍 熟地 川芎 黃連

黃芩 黃柏 梔子 各一錢半

右剉一劑水煎空心服

日久屬虛寒者宜溫補也

○益母湯治婦人血崩

當歸 川芎 白芍 酒炒 熟地 黃芩 條芩

陳皮 香附 醋炒 阿膠 蛤粉 炒 各一錢 益母草

白木 錢半 各一 玄參 蒲黃 炒 各八 甘草 四分

右剉一劑水煎空心服

○五灰散治血不止成血崩

蓮蓬殼 黃柏 血餘 百草霜 棕皮

右各燒灰加山梔炒黑蒲黃炒黑墨血竭共為細末調入前

藥服之或煉蜜為丸每服五十九清米湯送下

○秘傳經驗治血崩雜方

○一方用乾黑野薑為粗末入壺內燒烟令崩婦坐其上烟重

久久自愈

○一方用真京墨燒烟盡為末服二錢黃酒調下

○一方用管仲燒存性為末黃酒調下

○一方用刺刺芽汁加童便和酒服

○一方用乾漆燒灰三錢五靈芝一豆大為末同黃酒下

○一方用柿餅燒灰三錢白熟水下

○一方用棉花子仁炒黃色甘草黃芩等分為末每服二錢

空心黃酒下

○一方用香附炒四錢五靈芝炒二兩歸尾一兩二錢共為末

每服二錢空心黃酒下或米糊為丸梧桐子大每服五十九

空心醋湯下

○一方治漏不止

用槐子燒存性為末空心溫熱水送下三錢立止

○一方治崩漏如神

童子髮焙乾小桃紅子不拘多少共為細末黃酒送下

○一方治紅脉不止

狗頭骨燒灰為末羅網用好徽州瓶酒一鍾用灰一分二鍾

用二分三鍾用三分如不止者照常加至七鍾用七分神效

一婦人崩漏面黃或赤時覺腰間臍下痛四肢困倦煩熱不安

其經行先發寒熱而脇如束此脾胃虧損元氣下陷與相火

濕熱下迫所致用補中益氣湯加防風芍藥炒黑黃柏煎服

歸脾湯而愈補中益氣湯方見內傷歸脾湯方見健忘

一女子漏下惡血月經不調或暴崩不止多下水漿之物或白

帶脫漏不止皆因飲食不節勞倦所傷或素有心氣不足致

令心火乘脾必怠情嗜臥困倦乏力氣短氣急脾主滋榮調

身者也脾胃虛而心胞乘之故漏下月水不調也况脾胃為血氣陰陽之根蒂也當除濕去熱抑風氣上伸以勝其濕又云火鬱則發之用補中益氣湯去陳皮人參白朮加蒼朮藜本防風羌活獨活蔓荊子

補遺方

○樗白湯治崩漏不止

- 樗白皮 即臭椿根皮 二錢 滋血
- 枯苓 一錢半 補血
- 熟地黃 一錢 補血
- 當歸頭 一錢半 血
- 地榆 一錢 血
- 川芎 一錢
- 生地黄 七錢
- 伏龍肝 一錢
- 艾葉 炒六分
- 白芍 酒炒八分

右剉一劑水二鍾醋一匙煎八分空心服三五劑即止

帶下

婦人赤白帶下者皆因月經不調房色過度或產後血虛胃中濕疾流下滲入膀胱而帶也腰酸頭暈眼花小腹脹痛四肢無力困倦而虛用八物湯加減吞下止帶丸肥人多痰有帶症瘦人多火亦有之帶與麥遺同法

帶下屬氣血虛者

○加減八物湯治婦人赤白帶下

- 當歸
- 川芎
- 芍藥
- 生地黃
- 人參 去芦
- 白朮 去芦 茯苓 去皮 山藥
- 杜仲 酒炒
- 香附 炒各等
- 甘草 炙半
- 烏梅 一個

右剉一劑姜棗煎食前溫服○肥人加半夏○瘦人加黃柏

凡  
仙傳藥酒方  
補遺方  
內  
心運



○飽悶去人參加砂仁○腹痛加小茴玄胡去人參○冬加煨乾姜少許

○止帶丸

當歸 酒洗 川芎

白朮 去芦 人參 去芦 山藥

杜仲 姜汁酒炒

香附 醋炒 青黛

牡蠣 火煨

破故紙 酒炒

續斷

椿根皮

此藥大治白帶酒炒各等分

右為細末煉蜜為丸梧桐子大每服三十九空心糯米湯吞下○腹痛加玄胡索茴香去人參○飽悶加砂仁去人參○夏月加黃柏○冬月加煨乾姜少許○肥人加姜製半夏○瘦人加酒炒黃柏

帶下屬虛寒者

○五積散

治婦人赤白帶下方見中寒

本方加香附子小茴香吳茱萸

○四仙散

治婦人白帶

蒼朮 一兩酒浸去黑皮

白芷

川芎

大附子 各五錢炮去皮臍

右為末每服五分空心好酒調下

○香朮丸

治婦人白帶臍脹腹痛

香附 醋浸 蒼朮 米泔浸

陳皮

當歸 酒洗 川芎

白芍 酒炒

熟地黃

各二兩姜汁酒浸焙

右為末酒糊為丸如梧桐子大每服三十九空心溫酒送下

帶下屬濕痰者

○加味二陳湯

帶下屬濕熱者

○固經丸

黃柏酒浸 香附炒各一兩 山桅炒 敗龜酒炙各二兩 白木去  
白芍酒炒各七錢 山茱萸酒蒸 椿根皮酒炒各五錢 貝母去心  
乾姜炒各二錢 苦參五錢

右為末酒糊為丸梧桐子大每服八十九空心滾熱水下  
○加減六合湯治婦人上有痰火下有白帶腹痛

當歸酒洗一錢 白芍酒炒八分 川芎鹽水浸七分 熟地黃酒洗焙一錢  
橘紅鹽水洗去白 茯苓去皮七分 甘草炙四分  
半夏姜製七分 貝母去心七分 糯米拌 白木去 升一錢

右剉一劑生薑三片水煎空心熱服若上痰火盛加枳殼七分  
分臨臥服

○收帶六合丸

一名益氣固腸丹治赤白帶下肚腹疼痛細  
白木米泔浸焙 蒼朮米泔浸焙 白茯苓去皮 陳皮鹽水洗 當歸酒洗  
白芍酒炒各二錢 熟地酒洗 半夏姜製

椿根白皮洗焙各一兩 牡丹皮 黃柏酒炒各一兩  
甘草炙一兩 防風九錢 升麻八錢

右為末酒糊丸如梧子大每服百丸空心米湯下鹽湯亦可  
一方加香附枳殼

○滋榮收帶丸治崩後氣下陷成白帶小腹脹滿痛甚等症

當歸酒洗 白芍酒炒 蒼朮米泔 白茯苓去皮 黃柏酒炒  
椿根皮焙各一兩 白木二兩 半夏姜製 川芎鹽湯

香附米鹽水浸炒 防風 升麻 青皮醋炒  
木香 大甘草炮各四錢

右為細末酒打糊為丸如梧桐子大每服一百二十九空心  
益湯米湯白湯任下

○雙白丸 治白帶如神

石灰一兩白茯苓二兩為末水丸每服三十九空心白水下  
○專治赤白帶下

蕎麥麵不拘多少用鷄子清為丸每服三五十九白湯送下  
即愈

一婦人頭暈吐痰胃滿氣喘得食稍緩苦於白帶二十餘年諸  
藥不應此氣虛而痰飲也痰飲愈而帶自愈遂朝用六君子  
湯夕用六味丸不月而驗 方見補益

一婦人帶下四肢無力余曰四肢者土也此脾胃虛弱溫疾下  
注以補中益氣歸脾二藥治之而愈

二婦人年踰六十內熱口乾勞則頭暈吐痰帶下或用化痰行  
氣前症益甚飲食愈少肢體或麻或恪服祛風化痰肢體常麻  
手足或冷或熱日漸消瘦余曰症屬脾氣虛弱而不能生肺  
祛風之劑復損諸經也當滋化源遂用補中益氣加茯苓半  
夏炮姜二十餘劑脾氣漸復飲食漸加諸症頓愈 方見補益

增補帶下門方旨

增補白芷黃芩實瓦壅子治白帶下

白帶者胃中濕熱下注而成猶之溺注于器而坐溺底至耳  
生  
前古名醫有單用焦白芷而主者有單用焦芩實而主者有  
單用瓦壅粉而主者蓋以白芷之性香而升舉芩實之性辛  
而利氣瓦壅之性燥而勝溫炒而焦之則火可以生土土可  
以防火煉而粉之則燥可以勝溫勝溫則無以下注而白帶

白帶止矣此用三物之意也

增補白葵花紅葵花治赤白帶下方

凡人腰脰之間有帶脉奇經入脉之一也迴身一週如束帶焉下焦虛損督任有虧則中焦氣血乘虛而襲之陷于帶脉之下氣病為白血病為赤名曰赤帶下也東垣曰白葵花治白帶紅葵花治赤帶赤治血燥白治氣燥此何言哉岷謂葵花者朝陽之華也稟草木之陰涵天地之陽故能潤燥而升陽使營衛上行不復陷于帶脉之下而為帶下也或問帶下一疾耳此言氣血陷于帶脉之下為帶下前言胃中濕熱下注為帶下何相悖也余曰婦人無病容單下白者責之濕熱下注婦人久病赤白並下責之氣血下陷多成瘵也又曰有言白者屬寒赤者屬熱其說何如余曰曾見寒者固有赤

帶熱者益多白帶此白帶赤熱之言不足徵矣必若所言則赤白並下者是寒熱並下見道之言不如此

增補千金白馬毛散

白馬毛二兩椒和圭甲十八 蘇醋炙

牡蠣一兩十八龜甲四兩

共為末每服酒下方寸七日止

治赤白帶下此方良○氣陷于下焦則白帶血陷于下焦則赤帶以澀藥止之則未盡之帶留而不出以利藥下之則既損其中又傷其下皆非治也白馬得乾之剛毛得血之餘血餘可以固血乾剛可以利氣固血則赤止利氣則白愈此用馬毛之意也龜鱉牡蠣外剛而內柔離之象也去其柔而用其剛固可以化癥可以固氣化癥則赤白之成帶者無復中

留固氣則營衛之行不復陷下榮不陷則無赤衛不陷則無白矣

### 虛勞

脈來數大或虛細弦急

虛勞者多因氣結憂思恐驚或情慾動心或經水不調變生諸病上盛下虛脚手心熱或皮焦骨熱或午後發熱夜間發熱或日夜不退盜汗減食憎雜怔忡嘔噦煩燥胃腹作痛飽悶作瀉痞塊虛驚面白唇紅頭目眩暈腰背酸痛四肢困倦無力小水赤色重則虛火上攻兩頰頰赤骨蒸勞熱陰虛火動也治之宜養血健脾以治其本降火清鬱以治其標以逍遙散養心湯之類選而用之

### 虛勞吐血者

○清肺飲子 治婦女虛勞發熱咳嗽吐血先服此清熱止血後服逍遙散加減調理

當歸 酒洗 川芎 黃芩 貝母 去心 知母 蜜水炒

阿膠珠 蒲黃 炒 陳皮 各八分 白芍 酒炒 生地黃

天門冬 去心 麥門冬 去心 前胡 各一錢 薄荷 六分 枳殼 麩炒 五分 藕節 十片 甘草 炙 三分

右剉一劑水一鍾半煎至一鍾食後徐徐溫服

### 虛勞熱嗽有汗者

○逍遙散 治肝脾血虛發熱或潮熱或自汗盜汗或頭痛目赤或心腹重墜水道澀痛或腫痛出膿內熱作渴

當歸 酒洗 白芍 酒炒 白朮 土炒 白茯苓 柴胡 酒炒 各

其草 炙 五分

右剉一劑煨姜一片薄荷少許水煎服○加牡丹皮梔子炒  
各加味逍遙散

○滋陰至宝湯治婦人諸虛百損五勞七傷經脈不調肢體羸  
瘦此藥專調經水滋養血脈補虛勞祛元氣健脾胃  
胃養心脾開胃收盜汗止泄瀉開胃氣利胃膈療腹痛解煩渴  
散寒熱祛痰大有奇效不能盡述

當歸 酒洗 白朮 去芦 白芍 酒炒 白茯苓 去皮 陳皮

知母 生用最能驅 虛中之火 貝母 去心 香附 童便炒 地骨皮 去骨

麥門冬 去心各 薄荷 柴胡 酒炒 甘草 各三分

右剉一劑用煨生姜三片水煎溫服

虛勞熱嗽無汗者

○茯苓補心湯治婦人以血旺氣衰為本心生血肝藏血今血  
平肺金使肺氣得以乘平肝木肝之虧損不能生血又肝氣  
潤不榮經絡故月信不調矣此藥專補心元之虛抑其肝氣

之盛調和榮衛滋養血脈其疾自愈無治去血過多虛勞發  
熱及吐血衄血咳嗽痰喘上壅腎膈不利

當歸 川芎 白芍 酒炒 熟芩 陳皮 半夏 炒

白茯苓 皮 桔梗 去芦 枳殼 麩炒 前胡 去芦 各一 乾葛

紫蘇 各七分 人參 木香 各五分 甘草 三分

右剉一劑姜棗煎服

○滋陰地黃丸治婦人經水不調或不通虛勞吐血衄血咳血  
便血癸熱咳嗽盜汗痰喘心喘一切虛損瘦怯  
之病

熟地黃 姜汁浸 山藥 二兩 山茱萸 酒蒸去 白茯苓 去皮

牡丹皮 去骨 澤瀉 去毛 各一兩半 天門冬 去心

生地黃 酒洗 麥門冬 去心 知母 炒去毛 酒 貝母 去心

當歸 酒洗 香附米 童便浸炒 各二兩

右為細末煉蜜丸梧桐子大每服百丸空心鹽湯下痰唾淡

喘  
也

則

姜湯下

○烏骨鷄丸

治婦人虛弱咳嗽吐痰或骨蒸勞熱或赤帶下或經水不調形體瘦倦無九或口乾舌燥

人參

去芦錢當歸酒洗

熟苧

浸姜汁

白芍

酒炒

白茯苓

去皮各

一兩

香附

兩便浸炒

川芎

陳皮

秦艽

玄胡索

貝母

去心

牡丹皮

七錢

甘草

五錢俱剉

成飲片聽用

用黃芪為末拌飯喂烏鷄喂至肌肥眼生睽縊死燥去毛破開取出腸胃好酒洗淨入前藥飲片在鷄肚內線縫住用酒醋等分煮鷄爛如泥撈起焙乾或晒乾為細末將鷄汁打麵糊為丸梧桐子大每服五十九空心清米湯吞服

經閣左

送下六味丸而愈

一女子懷抱素鬱胸滿食少吐血面赤用六味丸及歸脾加山

梔貝母芍藥而愈

一婦人素勤苦冬初咳嗽發熱吐血盜汗遍身作痛或寒熱往來用化痰降火之藥口噤筋挛此血本虛而藥復損之且余用八味丸為主佐以補中益氣麥門冬五味山藥年餘而痊一婦人患勞嗽不時發熱或時寒熱或用清熱之劑其熱益甚盜汗口乾兩足如炙遍身皆熱昏憤如醉良久熱止方甦或晡熱至旦方止此陰血虛而陽氣弱也余朝六味丸料夕用十全大補湯月餘諸症稍愈更蒸以補中益氣湯兩月餘而愈

已上方俱見補益

求嗣

求嗣之脉專責於尺右尺偏旺火動好色左尺偏旺陰虛非福惟沉滑勻易為生息微瀆精清煎遲冷極若見微濡入房無力女不好生亦尺脉瀯

一氣既分而儀肇判萬物之中而惟人最靈通天地之幽微達聖賢之蘊奧審神仙之法術窮造化之根源無所不知矣自盤古及今逮羲農之為帝分陰陽運會之源流有夫婦人倫之道理故普天率土之姓貴賤窮達之人無不覆宗絕嗣者寧不測然而痛哉則夫男女之生本陰陽自然之奧理若非智術勉強之為也但世情早立嗣者以為常未立嗣者以為變誦瀆鬼神齋僧佈施以求獲嗣其愚甚矣其實萬戶之產

無能以繼百畝之田無後孰能任是誠可悲也無嗣有不勤心而求者寡矣故孟子曰不孝有三無後為大誠哉是言也求嗣若不若求之於已其理甚明人所易曉愚竊聞黃帝之論驗百家之仙方秘訣乃不經之言是或一種之道惟取其生育立胎之理胎月各配之妙虛陰老陽之說其道專生乎男其訣不生乎瘡疹其子且壽而弗夭胎連生女而轉男多嗣者效之每每經驗百無一謬好事者潛心於此不惟得嗣子允與陽採戰固精取藥養身之術無不在其中矣豈指事論事而已哉人間大道乃我衆仙師之秘訣誠不可輕泄而易露也珍之重之軒轅曰婦人有徵老不生男女者何也多因房事損動臟腑或天癸不通子宮披寒或男子事狂陽訪精少清寒不能射又不既濟而相勝此所以不生長故



也或有正生產常年便斷六七年數歲不生何也亦由女人  
上有數疾勞損身體以致經脈不調雖有亦微弱亦難以容  
納陽精如主請客而無備客未多而不管待此實主不能相  
歡客何以久留此又難以生長也須要陽事舉經脈以子宮  
煖精純熱且壯射而相濟然後可成故足月生者中道不足  
月生者貧薄過月生者其子貴重矣

交合月日時刻佳期論

女人生長十三歲為始至二十九歲為終五十歲生者四十  
九歲受胎來也每年十二  
有生男生女之月不同按婦歲  
數有三十七圖交合可揀生男之月以待婦人經水來時有  
兩日半淨者三日淨者亦有女人血衰氣盛六七日淨者不  
可拘定但觀寶田看經水之顏色何如耳乃以紫白之物或

而

絲或帛夾之于戶口取而目之金色者乃佳期也鮮紅者未  
半不及也淺淡者太過也惟以敗血去淨新血生如金者為  
佳期此時交合無不成矣若先期交者縱使施精則金水木  
盛子宮淤塞且無受精之處胎亦難成後期而交者則子宮  
已閉施精亦無門而入胎豈有成也哉所謂敗血已淨子宮  
空虛新血復生正等陽時乃是乾道之日此時施精如燻煉  
金如漿點膏立胎箇七成矣又云經水淨後單日下種則成  
男雙日下種則成女四日以後不成矣施精亦要在子時後  
方可也蓋子時後夜氣清明一陽發生古語云一陽動處外  
興工是也以時施精順則成人也此時修煉逆則成丹也此  
時再遇天晴月朗風日清和又是成定吉日又逢天月二德  
合日行房不惟成子而子且貴神氣清秀聰明必過人矣或

揀生女月交合却生男揀生男月交合却生女何也蓋陰陽  
運會之差以致胎氣之錯如女胎當以男名喚男胎當以女  
名呼易名呼與可保長生矣

結胎交合妙訣

美子要摘金丹先要點穴動情結胎若果都成演明交合之道  
要與陽要動情要奈戰要採藥要頓挫要斟酌要謹慎要用  
功然後其胎可成未交之先要種子先將紅印紙剪下燒灰  
無根水調女人面東服之然後交接使夫婦各飲微醺乃有  
興極或以言語引戲手足撫摩挑挽皮面相猥女人面赤用  
手抱樓可見慈動矣如男子陽事未舉却取月華秀氣以意  
運下與陽再戰蟠桃猥炒鑄劍走馬撫琴以招感至然後交  
合均為而進

正臥甚勿偏斜如泄精却用五字之訣

爾以使神於利害怒惡之地進退交合以待女人藥生果  
見目瞑身顫兩頰赤熱鼻口涼氣兩手若緊抱美子亦開  
鼻口接吸女人真氣却用神交着力深入直撞鳳凰靈臺女  
人肢体不衣滑精流溢此則女人快美之極子宮正開之際  
男子亦泄精陽先至暴陰定生女陰先降包陽定成男此所  
謂陰陽固濟相盛一種一子百種百男胎皆成也但記泄精  
之時猛咬女人上唇令其自驚仍用男呼女吸如忍大小便之  
狀則精始混融而成胎矣殊不知子宮有二穴男在左穴女  
在右穴入於左施精亦在於左交既畢令女人穩睡勿  
動屈左足而左側臥者男胎多成若屈右足而右側臥者女  
胎多成頓飯時節不可動身始交之時令器皿先去不便交

後不可小解此胎定成無錯矣且若不用壯陽敗陰之手段  
假若陰盛之婦而遇衰老之夫將何以使陰精之先至而必  
于生男哉

胎成禁忌秘訣

胎既成矣則陰陽之精且純渾融一氣已無雜氣脉精血盡嫩  
而未老動之易尅而易化第恐風邪感入損傷胎氣切記後  
後連交挾持重物過險超壑深怒大笑大驚高語是何也蓋  
以胎嬰之結一月如白露二月如桃花三月之後男女分可  
當靜以守之逸以待之故曰靜而有常故也且如連交一次  
則胎息反被動搖感受風邪入于子宮壁如果木開花若遇  
風寒霧露花定不能結果縱有結成必定生虫風落結胎後  
若更連交亦不能以成子耳縱有一成亦不能結實完真非

小產則胎風非生虫落而何將產若連交則胎受毒穢產後  
滿頭生瘡之必然也慎之忌之

未及三月轉女成男妙訣

東南挑作新斧柄親夫張日自作成孕婦床下刀向上無人見  
之男孕成若置抱鷄巢下安蒲巢盡是鷄之雄雄黃一塊墮  
騎當真陽朝上產仙即直男壹草髮左簪此花飛帶產兒童  
弓弦繫腰百日間轉女成男有萬千夫髮手足指甲剪身鋪  
席下男即轉雄鷄長尾枝二莖插安床下男即定軒轅野雲  
傳至今此訣種種皆曾應入倫大道是真訣不遇明傳莫與

命

未網諸錄  
器條時珍  
日更轉女  
為男  
法懷玉  
產三日名曰  
始胎血脈  
未流象  
形而愛  
是時宜  
服藥用奇  
置狀在  
緊且向  
知恐不傳  
難誰之則

書八卦筭生男女歌 返而來之即種子訣  
父母之年上下舉 坐胎之月為中主之乾坎艮震定是男

則一稟皆雄也蓋胎化之法亦理之自然故食壯雞取湯

異離坤兌决是女 筭男却生女 三六九歲死 笑女却生男 終久鬼來纏 若是正胎者

精之全於天產者惟雄黃取湯精之全於地

婦人之道始於求子求子之法莫先調經每見婦人之無子者其經必或前或後或多或少或將行作痛或行後作痛或紫或黑或淡或凝而不調不調則血氣乖爭不能成孕矣

瘵者極弓矢藉斧斤取則物見於人

婦人無子多因血氣俱虛不能攝養精氣故也 肥人痰多軀脂滿溢閉塞子宮治酒消痰養血順氣 四物湯加白朮茯苓陳皮枳實半耳砂仁香附甘草竹瀝

瘦人火多子宮乾燥無血治宜清熱補血

四物湯加人參茯苓黃芩山梔香附生地陳皮甘草 調經種子百發百中

常燥 酒洗川芎 熟地黃 六錢 香附 炒六白芍 酒炒三

白茯苓 錢 陳皮 三錢 吳茱萸 炒四錢

牡丹皮 玄胡索 各三錢 若過期而經水色淡者乃血虛有寒也加官桂炒乾姜熟艾

各二錢 若先期三五日色紫者加條芩三錢

右制作四劑每一劑用生薑三片水一碗半煎至一碗空心

溫服渣再煎臨臥服待經至之日服起一日一服藥盡經止

則當交媾即成孕矣縱未成孕經當對期俟經來再服四劑

必孕無疑矣 種子濟陰丹 香附米 四兩 童便 各三錢 醋 一兩 酒 一兩 米泔 益母草 二兩

凡傳藥酒方必孕無疑矣 補延齡固本 氣養血調經胎益子宮療腰痛除帶下

異物多生惡怪 印其微矣象斤 犀牛角 逐生山羊 雞冠花 人髮 雞 助告 龜 而抱 龜 以甚 龜 以甚 龜 以甚 感况於外

高麗白朮

當歸酒洗 川芎一兩 白芍鹽酒炒 一兩 二錢

熟地黃酒洗 陳皮去白 半夏姜汁浸 炒

白茯苓去皮 白朮去皮 阿膠蛤粉炒 成珠二兩

艾葉醋煮 一條 艾酒炒 麥門冬去心 一兩 牡丹皮酒洗

川續斷酒洗 小茴鹽酒炒 五錢 玄胡索四錢

沒藥五錢 吳茱萸泡炒 五錢 炙甘草三錢

右為細末酒糊為丸梧桐子六每服百丸空心米湯下

○蠱斯勝寶丸治婦人經水不調 肝腹冷痛赤白帶下一切虛

黃芪蜜炙 人參去芦 白朮去芦 白茯苓去皮 常歸酒洗

川芎 白芍酒炒 肉桂 大附子炮裂 煨去皮

乾姜炒 胡椒 小茴香鹽酒炒 破故紙酒炒

艾葉醋炒 烏藥炒 以上各二 吳茱萸三兩 鹽水炒

香附米炒 兩醋 蒼朮酒洗 兩米泔浸 炒 甘草炙 一兩

右剉作片用白毛烏骨雞一隻重一斤半或二斤者吊死水

泡去毛腸屎并頭脚翼尖不用將雞放砂鍋裏將前藥片蓋

上入好酒煮爛為度取去骨同藥在鍋焙乾為末將煮雞酒

汁打稀米糊為丸如梧桐子大每服五十九空心好酒吞下

○女金丹

當歸酒洗 川芎 白芍酒炒 人參去芦 白朮去芦

白茯苓去皮 桂心 薑本 白薇

白芷 牡丹皮 赤石脂另研 玄胡索

沒藥另研 甘草各等分

右各等分除石脂沒藥另研其餘皆以醇酒浸三日烘乾晒

亦可為末足秤十五兩外用香附米去皮毛以水醋浸三日

容炒為末足秤十五兩右共十二味和合重羅敷過煉蜜為  
丸彈子大磁器收封每取七丸空心雞未鳴時服一丸先以  
薄荷湯或茶灌漱咽喉後細嚼以溫酒或白湯送下鹹物乾  
果壓之服至四十九丸為一劑以癸水調平受孕為度孕中  
三日一丸產後後二日一丸百日上盡人事而不育焉天矣  
一方去沒藥加沉香治婦人久虛無子及胎前產後一切病  
患男子積年血氣手脚麻痺半身不遂血崩帶下產後腹中  
結痛吐逆心痛并婦人諸虛不足心腹疼痛並治一方去桂  
用熟地黃丸如梧桐子丸每服五十九丸空心溫酒或白湯送  
下以乾物壓之

○百子建中丸

女服此藥調經養血安胎順氣不問胎前產後月事參差有

餘不足諸症悉皆治之

真阿膠

二兩蛤粉炒

斷艾葉

二兩去梗醋煮汁

香附米

十二兩杵去皮毛醋

當歸

洗酒二兩

南川芎

二兩

白芍藥

酒炒二兩

熟地黃

姜汁浸焙二兩

右為細末煉蜜為丸梧桐子大每服八十九丸空心白沸湯點

醋少許下內寒者溫酒下

○六味地黃丸

方見補益治婦人久無孕育者加香附二兩童

男子無嗣必用之藥

○固本健陽丹

凡人無子多是精血清冷或稟賦薄弱有壯

子宮故令無子豈可盡燻各於母血之不足與虛寒耳

龜鱉子

酒煮一兩

白茯苓

去皮

山藥

酒蒸

牛膝

去芦酒洗

杜仲

酒洗去皮

當歸身

酒洗

肉蓯蓉

酒洗

五味子

酒洗去梗

益智仁 鹽水炒 嫩鹿茸 酥炙以上 熟苧 酒蒸

山茱萸 酒蒸去核各三兩 川巴戟 酒浸去心一兩

續斷 酒浸 遠志 紫 蛇床子 炒去壳各一兩半加

人參 二兩 枸杞子 三兩 殊効

右為細末 煉蜜為丸 如梧桐子大 每服五七十九 空心鹽湯

送下 酒亦可 臨臥再進一服 若婦人月候已盡 此是種子期

也 一日可服三次 無妨 如精不固 加龍骨牡蛎 火煨 鹽酒淬

三五次 各一兩三錢 更加鹿茸五錢

劉小亭公年四十無子 患陽事痿弱 精如冰冷 求治於予 曰君

留神調理 倘生子 願當重報 因脰兩寸 脉洪兩尺 脉沉微 無

力 此真元衰 德心乃斲 喪過度所致也 以固本健陽丹 加人參

附子 枸杞子 覆盆子 各二兩 製一料 服盡 見下元溫暖 如前

又製一料 服至半料 而乃正果 孕生一子 渠甚悅 遂成莫逆

焉 後傳之於劉栢亭 劉敏庵 俱服之 皆生子

增補求嗣門方壹

增補長春廣嗣丹

人參 去芦 天門冬 去心 當歸 酒洗 澤瀉 去尾 山茱萸 去核

石菖蒲 炒 赤石脂 五味子 去梗 覆盆子 去萼

白茯苓 車前子 廣木香 栢子仁 各一兩

山藥 煨 汁 川巴戟 去心 川椒 去目 與殼 及閉 川牛膝 酒洗

生地黃 熟地黃 地骨皮 去木 與土 杜仲 各二兩

遠志 泡去心 肉蓯蓉 酒洗 去心 枸杞子 各三兩

兔系子 酒洗 夫上仍用 酒蒸 搗 曬 乾 四兩

上藥二十五味 煉蜜作丸 梧桐大 每服三十九日三

者

則

經

男婦親嗣此方主之。二五之精妙合而凝，然後成胎。形孕育，故求嗣者宜實其精。世人益精專于補腎，此求其末也。經云：腎者主水，受五臟六腑之精而藏之，故五臟盛乃能瀉，如斯焉。言之則腎主臟精耳，而生精之原固本于五臟六腑也。是方也，人參、天門冬、五味子，用之補肺；石菖蒲、栝子仁、當歸、遠志，用之養心；白茯苓、懷山藥，用之養脾；山茱萸、熟地黃、覆盆子、仲牛膝、巴戟、菴蓉、枸杞、兔絲子，用之補肝腎。所以然者，肝腎同一治也，乃車前澤瀉利其灼陰之邪，生地骨皮平其五藏之火，石脂之澀所以固精，木香之竄所以利六腑。川椒之辛所以散濕，脾痺也。此則兼五臟六腑而調之，五臟之精實六腑之氣和，夫然後可以續精而宜于矣。非得內治之旨者，不增補延精育子方。

天門冬 去心 麥門冬 去心 川巴戟 去心 人參 白朮

白茯苓 去心 川牛膝 生地黃 熟地黃

肉蓯蓉 去心 枸杞子 兔系子 去心 蓮鬚

白茯苓 山藥 姜汁炒 山茱萸 去核 沙苑疾藜 炒

栝子仁 鹿角膠 鹿角霜 各五分 酸棗仁

遠志 五味子 石斛 各二兩

上藥共為末，蜜丸，梧桐子大，早晨鹽湯送下百丸，此亦廣

嗣之方也。

女媧者必  
補肺  
夜神  
補心  
生地  
補心

男為措精，乃能有孕。然輕者五臟之所生，而藏之賢者也。故欲藏精于腎者，宜調五臟五臟盛而精生矣。是方也，人參、五味、天、麥、門、冬、石、斛、補、脾、胃、也、鹿、角、膠、巴、戟、牛、膝、茱、萸、菴、蓉、沙、苑、疾、藜、補、肝、腎、也、鹿、角、膠、血、氣、之、屬、用、之、所、以、生、精、用、霜、薄。



藥也  
茯苓山

乃能交搆而宜子矣  
醫收澁之品用之所以固脫如是則五臟皆有養而精日生

增補韭子苗香蛇床子川椒天雄附子總方

此六物者濕熱之品也取之者何凡人艱嗣者多有下虛而胃中之濕蘖之內生胞痺腎脾白帶之疾故令精寒而不嗣也乃能蒸此數物酌而用之則痺去而宜子矣

增補黃芩黃連黃柏梔子方

世人謂精寒者不生嗣率以溫煖之劑主之此不可執也蓋天地冲和而萬物發育朔方寒勝固令不毛滿服蒸炎亦令焦土明于精寒不嗣昧于血燥不胎非良手也故述芩連梔栢以為廣嗣者告能令氣血冲和則生生之道矣

龜增補人胞鹿茸鹿膠蛤蚧圭板猪脊髓總方

九年高精弱难于生育草木無情不能補之故宜上件酌而入之蓋取其為血氣之屬補之易也耳

### 妊娠

脉妊孕初時寸微五至三部平勻久按不替妊孕三月陰搏於

二 渴

陽氣衰血旺脉正相當肝橫肺弱心滑而洪尺滑帶散久按溢強或關滑大代止尤忙洪且脉遲其胎必傷四月辨質右女左男或浮或沉疾大實兼左右俱盛胎有三三更審經脉陰陽可參但疾不散五月懷胎大急大緩腫漏為殃六七月來脉喜實長沉遲而瀦墮胎當防脉弦寒熱當煖子房八月弦實沉細非良少陰微緊兩胎一傷勞力驚仆胎血難藏冲心悶痛色青必亡足月脉亂反是吉祥

暑增  
六和少

經脉不行已經三月者尺脉不止則是胎也

○驗胎散

川芎為末每服一錢空心艾葉煎湯調下覺腹內微動則有胎也若服後一日不動非胎必是經閉

○艾醋湯 如過月並明有無如月數未足難明

用好醋炆艾服半盞後腹中番大痛是有孕不為痛定無

安胎者養血健脾清熱也

○素有執者宜

當歸二錢 川芎半 生地黃一錢 益母草一錢 白朮二錢

條苓一錢 砂仁八分 香附米半 便炒一錢 蘇梗一系

黃連炒八甘草三分

右剉一劑生薑三片水煎溫服

○安胎丸 妊娠常宜服之

當歸 川芎 白芍 條苓各一兩 白朮去 五

右為末酒糊丸梧桐子大每服五十九茶湯任下空心服日進三服此方養血清熱之藥也瘦人血少有熱胎動不安素懶半產者皆宜服之以清其源而後無患也

素虛弱者宜

○芎歸補中湯 治婦人懷孕血氣虛弱不能榮養以致數月而墮各半產

黃芪蜜炙 人參 白朮 當歸 川芎

白芍酒炒 乾姜煨炒 阿膠炒 五味子 杜仲酒炒

木香 甘草

右剉劑水煎服

○千金保胎丸 凡女人受胎經三月而胎墮者雖氣血不足乃中衝脉有傷中衝脉即陽明胃脉供應胎孕至

此時必須節飲食絕慾戒怒瘦免小產之患服此可以保全

當歸 酒洗 川芎 一兩 熟苧 姜汁炒 阿膠 蛤粉炒二兩

艾葉 醋煮 砂仁 炒 條芩 炒 益母草 二兩

杜仲 酒去粗皮 白朮 土炒 陳皮 一兩 續斷 酒洗

香附米 浸三日炒 鹽水童便各

右為細末煮棗肉為丸梧桐子大每服百丸空心米湯下

惡阻者惡心阻其飲食也

當歸 白芍 煨 陳皮 香附 炒 白朮 去苦

半夏 姜湯泡七次炒過不 白茯苓 去皮 藿香

神麴 炒 砂仁 各等分 甘草 減牛

右剉劑生薑三片棗一枚水煎溫服

子煩者心神悶亂也

白茯苓 去皮 防風 一錢 麥門冬 去心 黃芩 各一錢

右剉一劑竹葉五片水煎服

子癇者目吊口噤也

當歸 川芎 防風 獨活 茯苓

五加皮 薏苡仁 杏仁 酸棗仁 木香

羚羊角 甘草

右剉劑生薑五片水煎服

子懸者心胃脹痛也胎前諸病總宜此方加減

當歸 川芎 白芍 酒洗 人參 紫蘇

陳皮 大腹皮 甘草

右剉劑生薑五片葱白七寸同煎服○腹痛加香附木香○

咳嗽加枳殼桑白皮○熱加條芩○嘔加砂仁○瀉加白朮

茯苓

子腫者面目虛浮也

當歸

川芎

白芍

熟地黄

茯苓

澤瀉

白朮

條芩

梔子

麥門冬

厚朴

甘草

右剉劑水煎溫服

子氣者兩足浮腫也

天仙藤

洗青木香藤

紫蘇

陳皮

香附

烏藥

木香

甘草

右剉生薑煎服加磨木尤良

子淋者小便澁少也

麥門冬

赤茯苓

木通

淡竹葉

右剉水煎空心服

轉胞者平不得小便也

冬葵子 五錢 山梔子 五錢 木通 三錢 滑石 五錢

右剉一劑水煎溫服外以冬葵子山梔子滑石為末田螺肉搗

膏或生葱汁調膏貼臍中立通

崩漏者屬虛血漏下也

○芎歸湯治胎漏下血不止或心腹脹一服立効

當歸尾

川芎各五錢

右剉一劑酒煎入童便一盞同服

○膠艾四物湯一名安胎飲治胎漏下血腹痛

當歸

川芎

白芍酒炒熟

阿膠炒

條芩

白朮

去芦砂仁

香附炒

艾葉少許

前病回春 卷之六

右劉劑糯米一撮水煎空心服

胎動者因有所傷也

○佛手散治妊娘五七個月因事驚嚇着胎或子死腹中惡露  
并俱安若胎損即便逐下

當歸 六錢 川芎 四錢 益母草 五錢

右劉一劑水煎入酒一盞再煎一沸溫服如人約行五里再

進一服

胎逆喘急者火動也

條芩 香附

右各等分為末每服二錢白湯調下

妊娘傷寒護胎法

井底泥 青黛 伏龍肝

右為末攪勻塗於孕婦臍中二寸許如乾再塗上以保胎孕也

一妊婦下血服涼血之藥下血益甚食少體倦此脾氣虛而不能攝血余用補中益氣湯而愈後因怒而寒熱其血仍下此

肝火旺而血沸騰用加味逍遙散血止用補中益氣湯而安

一妊婦下血發熱作渴食少體倦屬脾氣虛而肝火所侮用四君加柴胡山梔血止因怒復作用六君加柴胡山梔升麻而安

一妊婦胎六月體倦懶食面黃晡熱而胎不長因勞欲墜此脾氣不足也用八珍湯倍加參朮茯苓三十餘劑脾胃漸健胎安而長矣

一妊婦墮胎昏憤不時吐痰自用養血化痰之劑昏憤不省自

萬病回春

長集卷之六

三

汗發搐痰涎壅出被以為中風欲用祛風化痰予曰此屬脾  
氣虛寒所致遂用十全大補湯加炮姜二十餘劑尋愈  
一妊婦因怒吐血兩脇脹痛小便淋瀝此怒而血蓄於上隨火  
出也用小柴合四物四劑血止用六君子安胎飲調理而安  
一婦人經閉八月肚腹漸大面色或青或黃用胎症之藥不應  
余診視之日面青脉瀯寒熱往來肝經血病也此鬱怒傷脾  
肝之症非胎也不信仍用治胎散不驗余用加味歸脾逍遙  
二藥各二十餘劑諸症稍愈彼欲速效別服通經丸一服下  
血昏憤自汗惡寒手足俱冷嘔吐不食余用人參炮姜二劑  
漸愈又用十全大補湯五十餘劑而安已上俱見補益  
脈滑文尚書寵夫人有孕患惡阻嘔吐不止飲食不下心中煩燥頭  
目眩暈諸醫以和脾胃之藥一陳湯藿香正氣散保生湯之  
醫鑑卷六  
候生湯  
治婦人經  
候不調  
無病  
脈滑文  
大孕  
候生湯

也精  
如故  
食一物  
大吐  
此者  
血如  
作寒  
之人  
二小  
白不  
香附  
其車  
右刺  
皮  
覺惡  
加了香  
類遍投罔效予診左脉微數氣口數此血虛氣盛有火也若  
一不養血則火不降火不降則嘔不止以茯苓補心湯加姜汁  
炒黃連竹茹二服全愈  
一婦人每懷孕至三箇月必墮不肯服藥予以四五年老母鷄  
煮湯入紅穀小黃米煮粥食之不數劑胎固至月滿而生男  
增補妊娘門方音  
增補半夏茯苓湯  
增補  
白芍藥  
人參  
芎藭  
細辛  
旋覆花  
白芍藥  
人參  
芎藭  
細辛  
生薑各三錢  
乾地黄  
茯苓各三十錢  
桔梗各十二錢

下部氣血不足復盜脾胃之氣以固養胎元故令脾胃自弱  
乃嫌惡阻者此方主之○惡阻者惡心而防阻飲食也此是

不勝穀氣一聞穀氣便惡心而防阻也是方也半夏生姜能開胃而醒脾。地黃芍藥等窮能養陰而益血。人參茯苓甘草能和中而益氣。乃橘皮桔梗旋覆花細辛皆辛甘調氣之品。可以用平惡逆之氣而進飲食者也。或問半夏為妊娠所忌。柰何用之。余曰昔人恐久用而燥陰液。故云忌爾。若有惡阻之症。則在所必用也。故孫真人方之聖者也。其養胎之劑。用半夏者。蓋五方也。

增補補皮湯

橘皮

竹茹

人參

白朮

各十八銖

生姜一兩

厚朴

十二銖

妊娠嘔吐不下食者。此方主之。○惡阻以聞食而惡。責之脾虛。嘔吐以食入復吐。責之有火。所謂諸逆衝上。皆屬火也。此

是厥陰之血。既蒸其胎。少陰之火。虛而上逆。竹茹能平少火。厚朴能下逆氣。橘皮生姜所以開胃。人參白朮所以益脾。開胃益脾。欬其安胎。云爾。

增補白朮條芩方

先醫曾云。白朮條芩安胎之聖藥。此何云也。蓋以白朮益脾。能培萬物之母。條芩瀉火。能滋子戶之陰。與其利而去其害。故曰安胎聖藥。

增補膠艾湯

熟地黃

艾葉

當歸

川芎

炙甘草

真阿膠炒成珠各半。黃耆二分半。

孕婦漏胎不安者。此方主之。○漏胎者。懷胎而點滴下血也。此是陰虛不足以濟火。氣虛不足以固血。故有此症。是方也。

阿膠熟地黃當歸川芎益血藥也黃耆甘草艾葉固氣藥也  
血以養之氣以固之止漏安胎之道畢矣

增補砂仁葱白湯

砂仁一小搥碎葱白十枚煎湯吞下

妊娠腹痛者此方主之○痛者氣血滯澁不通使然故用砂  
仁順氣于下葱白順氣於中氣行血利而痛自止有故而痛  
者各隨証以治之

增補犀角散

生犀角 地骨皮 麥門冬 赤茯苓

條芩 生甘草

子煩者此方主之○子煩者懷子而煩悶也煩悶則心膈有  
熱故用犀角涼心骨皮退熱條芩瀉火麥冬清金赤苓道赤

甘草和中

增補四物湯加參連姜夏方

當歸 川芎 芍藥 熟地黃 黃芩

黃連 半夏 生姜

子癩者此方主之○子癩者懷子而癩仆也此陰血養其胎  
陰虛火亢痰氣厥逆故令癩仆是方也四物可以養血參連  
可以降火姜夏可以破逆

增補紫蘇飲

紫蘇葉 人參 陳皮 白大腹皮 黑豆汁洗過

當歸 川芎 粉草 白芍藥 酒炒

子懸者此方主之○胎氣不和凌上心腹上滿悶悶謂之子  
懸乃下焦氣實火氣壅胎而上也故用紫蘇蘇皮陳皮川芎



流其氣當歸芍藥利其血氣流血利而胎自下矣然必用夫  
人參耳草者邪之所湊其氣必虛也流氣之藥推其陳補氣  
之藥致其新爾

增補地膚草湯

地膚草四兩水四升煎取二升分三服取自然汁服亦可  
子淋者此方主之○懷子而小便淋澀謂之子淋子淋之原  
本于濕熱地膚草能利膀胱能疏風熱以之而治子淋亦單  
劑之良也

增補冬葵子湯

冬葵子 粳米 柴胡 桑白皮 赤茯苓  
赤芍藥 當歸 各半分  
此亦子淋之方也○滑可以去者故用冬葵子清升則濁自

降故用柴胡氣化則能出故用桑皮辛利而能潤竅故用當  
歸而赤茯苓者取其入血而利丙丁也

增補木通丸

木通 紫蘇葉 香薷 桑白皮 各一錢

桔殼 枳殼 條芩 各五分 訶子皮 木香 各三分

妊娠身體浮腫四肢脹急小便不利者此方主之○妊娠氣  
血朝胎營衛之行澀故令身體浮腫四肢脹急而小便不利  
也是方也紫蘇流氣于表桑皮枳殼木通木香枳殼流氣于  
裏香薷流氣中濕條芩流氣中之熱訶子流氣中之液服藥  
之後營衛流行氣血健運則浮腫諸疾可得而皆愈矣或問  
何以不利小便余曰內經有言氣化則能出矣故知本之醫  
只調其氣無用淡滲為也

增補三合湯探吐法

人參

白朮

茯苓

甘草

當歸

川芎

芍藥

地黃

半夏

陳皮

妊娠轉胞不得小便者此湯服之探吐數日愈○胞非轉也  
由孕婦中氣怯弱不能舉胎上壓其胞胞繫于臍而小便不  
通耳故用二陳四物四君三合煎湯而探吐之所以升提其  
氣上竅通而下竅自利也

增補束胎丸

白朮二兩

茯苓七錢

陳皮三兩

不見火

黃芩夏一兩春秋七錢冬五錢

妊娠七八月間服此胎氣斂束令人易產○產難者多  
由內熱灼其胞液以致胎產之際乾澀而或脾氣怯弱不

令

取

能運化精微而致胞液不足亦產難之道○用白朮茯苓  
益其脾土而培萬物之母用黃芩清其胎熱瀉火而存胞液  
乃陳皮者求其辛利能流動中氣化其肥甘使胞氣不滯見胎  
身勿肥耳此束胎之義也

增補達生散

大腹皮

三斤黑豆汁洗晒乾入劑

人參

陳皮

紫蘇

當歸

白芍藥

白朮絡

炙甘草

妊娠臨月此方服之令人易產○詩云誕彌厥月先生如達  
朱子曰先生首生也達小羊也羊子易生而無留難故者醫者  
以此方名之然產難之故多是氣血虛弱營衛澀滯使然  
是方也人參白朮甘草益其氣當歸芍藥益其血紫蘇腹皮陳  
皮流其滯氣血不虛不滯則其產也猶云達矣

增補車前子

詩曰采芣苢言采之其首車前也朱子曰之未詳何用其子治產難媿得其說凡遇妊娘臨月於宜用湯液內加之每良

增補催生諸藥方

生不必催也催之則宋人之擾苗耳非為無益而又害之矣古方有用兔腦者有用猪脂者有用油蜜葱白者有用葵子者有用牛乳榆皮滑石者有用金鳳子者有用柞枝者取其滑澤之義耳猶近理也又有用象牙灰者有用蛇退灰者有用筆頭灰者有用百草霜者有用伏龍肝者有用鑿頭灰者有用蓖麻子貼手足心者有用握石燕者雖曰各下深意但燒灰而服者必燥其津液手握足貼者用之弗耳噫平時失

於

于將理至于臨產艱難頻以雜藥催之皆或

增補十全大補湯

人參

黃耆

白朮

白芍藥

茯苓

當歸

川芎

甘草

熟地黃

肉桂少許

正產之後氣血虛耗者此方主之小產者亦此方主之○氣虛宜補氣故用人參黃耆白朮茯苓甘草血虛宜補血故用當歸川芎芍藥地黃肉桂丹溪曰產後宜大補氣血此之謂也

增補桃仁紅花蘇木玄胡索肉桂山查蒲黃方

產後有瘀血留于子戶作痛者宜四物湯加上件

增補黑神散

熟地黃

蒲黃炒

黑乾姜炒

當歸

白芍藥

桂心 各二

炙甘草 三錢 黑豆 炒去皮 二合半

上件共為末每服二錢童便和酒調下

胎死腹中者此方主之胎死者產難經日而胎死也法以妊  
娠舌頭青黑為驗是方也蒲黃能逐敗血熱地芍藥當歸能  
養新血乾姜肉桂能養新血而逐敗血甘草黑豆能調正氣  
而逐敗氣師云此方更治胞衣不下產難血暈餘血奔心兒  
枕疼痛乍見鬼神等証蓋諸證皆是瘀血為患故並治之  
增補千金神造湯

蟹瓜 一升 阿膠 三兩 甘草 二兩

婦人脈陰陽俱盛名曰雙軀若少陰微者產血即凝濁經養  
不周胎即偏夭其一獨死其一獨生不去其死則母失胎宜  
此方主之○蟹瓜能破胞而墮胎以其稟性之質故耳非

此

雙娘所宜也是方也蓋用蟹瓜攻其死阿膠安其生甘草平  
其毒也或問蟹瓜之毒寧保其不傷彼生者乎余曰無死者  
則傷生有死者則毒以類從惟攻其死不犯其生者大易方  
以類聚物以群分水流濕火就燥之義也

增補獨參湯

人參 二兩 水 一升 煎半升 溫服

產後血暈不省人事者此方主之○血暈者下血過多而眩  
暈也不省人事者氣血大脫而神不用也故用人參其溫益  
元之品以主之此藥可以固氣可以生血可以益元身熱氣  
急者加童便一爵身寒氣弱者加附子三錢

增補醋炭薰莫法

凡血暈不省人事者急治炭火以醋醋沃之使醋氣薰蒸入

鼻則能收斂神氣自然精爽

增補紅花酒

紅花一兩炒清酒五爵沃之温服

胞衣不下者此方主之○胞衣不下者氣弱而瘀血盈於胞也故用清酒吐其氣紅花敗其血

增補猪腎湯

猪腎一具白糯米三合葱白一升人參淡豉五合

當歸各二兩

產后尊勞者此方主之○尊產中之名也產中虛羸喘乏乍寒乍熱病如瘧狀名曰尊勞此是虛乏氣血不相順接虛故乍寒墜故乍熱寒熱無時休息証狀似瘧實非瘧也治宜大補氣血糯米七升葱豉醒脾而猪腎者取其以類相從者補

系胞之區也

增補升陰舉經湯

羌活 藁本去土防風各二錢肉桂去皮夏勿用

白朮 當歸 柴胡各三錢黃耆三錢熟地黄

人參各錢 細辛六分川芎各一錢獨活 炙甘草

附子炮去皮臍各一錢五分 菝葜仁十枚去尖 白芍藥 紅花各五分

陽勝

婦人經血崩下者此方主之○血氣人身之陰陽也陽主升陰主降陽根乎陰七根乎陽一動一靜互為其根則一升一降循經而行無崩陷也若陽有餘則升者勝血從上竅而出陰不足則降者盛血從下竅而出是方也附子肉桂人參黃耆白朮甘草壯陽益氣之品也羌活獨活柴胡藁本防風細辛川芎升陽舉經之品也芍藥地黃紅花當歸菝葜仁滋陰入

愈矣皆用  
當歸補血

使其氣血

千

血之品也壯陰則氣不虛舉經則血不陷滋陰則血不燥誠如是則血為氣之守氣為血之衛血營肝中氣衛于外升降上下一循其經矣胡然而崩也

增補獨活湯

獨活

生姜名五防風

秦艽 桂心

白木

甘草

當歸

附子略二

葛根三兩防已一兩

時人分作十服

產后中風口噤背反者此方主之○產後血氣俱虛易受風寒風傷乎筋則痠寒傷乎筋則痠故令口噤背反是方也獨活防風秦艽葛根防已疏風藥也桂心附子驅寒藥也風去則筋不痠寒去則筋不痠乃當歸者所以養血于驅風之后生姜白木甘草者所以調氣于散寒之餘必欲養血調氣者

產後不忘其虛也

# 產育

脉臨產六至脉號離經或沉細滑若無即生浮大難產寒執又頻此時凶候急於色微面頰唇舌忌黑與青面赤毋活子命必傾若胎在腹子毋歸冥

足 總 產

夫產育之難者此由產婦不曾預聞講說生育道理臨事惶惶用力失宜遂有難產之患是故有逆理者則先露足有橫產者則手先露坐產者則先露其臂此皆用力太早之過夫當臍腹疼痛之初見身宛轉而未順用力一逼遂致橫逆若手足先露者用細針刺見手足心一二分深三四刺之以益塗其上輕七送入見得痛驚轉一縮即順生矣或兜先下者謂

踏蓮花生急以鹽塗兒脚底又可急搔之併以鹽摩母腹上則正生矣

上  
凡胞衣不下乃母生兒訖流血入衣中衣為血所脹故不得下治之稍緩脹滿腹中以次出坤心胃疲痛喘急必致危篤若偶此症急繫臍帶急斷之以物墜住使其子血脉不潮入胞中則胞衣自當痿縮而下縱淹延數日亦不害人只要產母心懷安泰不可輕信坐婆妄用手法多因此而損者良可嘆哉又胞衣不下因產母元氣衰薄者用芎歸倍桂以溫之凡妊娠欲產痛陣尚疎經三兩日不生或產母氣乏羨頓產道乾澁致令難產總覺腹痛但破水後便可服以五積散加杏仁七粒木香磨順流水姜棗煎調百草霜末一錢服之未經破水者勿服

凡生產先知此十証庶免子母之命折於無辜也世之收生健者少有精良妙手多致傾命予因傷痛而備言之

一日正產

正產者言懷胎十月陰陽氣足忽然作陣疼痛胎至谷道疑破血下兒即正產

二日傷產

傷產者言懷胎未足月有所傷動以致忽然臍腹疼痛或服催藥過早或產母努力太早逼兒錯路不能正生凡分娩須待兒身轉順頭對產門努力一送兒即正生

三日催生

催生者言欲產時兒頭至產門方服藥催之或經日久產母困倦難生宜服藥以助其血氣令兒速生

四曰凍產

凍產者言天氣寒冷產母血氣遲滯兒不能速生故衣裳宜厚產室宜煖背心亦宜溫和庶兒易生

五曰執產

執產者言盛暑之月產婦當溫涼得宜執甚產母則頭眩面赤昏暈若產室人眾執氣蒸逼亦致前患名曰血暈若夏月風涼陰雨亦當謹避

六曰橫產

橫產者言兒方轉身產母用力逼之故也凡產母當令安臥仰臥穩婆先推兒身順直頭對產門以中指探其肩不令臍帶羈板方用藥催之繼以產母努力兒即生

七曰倒產

倒產者言兒未能轉身產母努力故也當令產母仰臥穩婆推入候兒自順若良久不生令穩婆手入產戶一邊撥兒轉順近產門却服催藥并努力即下

八曰偏產

偏產者言兒回身未順生路產母努力逼兒頭偏一邊產雖露頂非也乃額角耳當令產母仰臥穩婆輕手正其頭向產門却令產母努力子即下若兒頂後骨偏住穀道露額令穩婆以綿衣炙煖裹手於穀道外傍輕手推正令產母努力兒即生下

九曰礙產

礙產者言兒身已順門路已正兒頭已露因兒轉身臍帶絆其肩以至不能生令產母仰臥穩婆輕推兒向上以中指按兒



肩脫臍帶仍令兒身正順產母努力兒即生

十日坐產

坐產者言兒之欲生當從高處牢繫手巾一條令產母以手攀之輕上屈坐令兒生下不可坐低兒生路

十一日盤腸產

趙都運蒸人每臨產則子腸先出然後產子其腸不收名曰盤腸穩婆以醋水各半盞默然喚產婦面背方收不可不知

子死腹中

夫子死腹中者多因驚動太早或觸犯禁或抱腰太重或頻探試水胞衣先破血水先盡而胎乾涸故耳其候產母唇舌青黑者子母俱死若舌黑或脹悶甚者然其子已死矣先以平胃取一兩酒水各半煎却校朴硝半兩即熟皮硝服或用硝

一兩以童便調下亦效

○平胃散

蒼朮

米泔浸

陳皮

厚朴

姜汁炒

甘草

右剉一劑酒水煎加朴硝再煎一二沸溫服

如因難產或大寒時急以大油紙摺徐上斷其臍帶雖兒已死令暖氣入腹多得復生切不可用刀斷之

產生難者燥澁緊斂也催生只用芎歸湯最穩當又效捷

○催生飲

當歸

川芎

大腹皮

洗根殼炒白芷各等分

右剉一劑水煎溫服此五味下胎催生立應

○柞木飲

催生亦治橫生逆產死胎爛脹不下者服之立下如

柞木生枝如小指大者一握淨洗剉碎一葉一刺處處有之

甘草五寸

右對一大劑水一碗半，砂鍋內紙二重密封，慢火煎至一匙，候產母腹痛甚時，溫飲一盃，不過一二服，覺下重即生。

○催生湯 候產母腹痛，見臍聚水下方服。

桃仁 煨去赤皮

牡丹皮 淨官桂

白茯苓 去皮

右對一劑水煎服。

○如神散 催生累效靈妙，於理因難通於事實殊效。

臨產時令人路邊尋草鞋一隻，取耳燒灰，溫酒調下三錢，如得左足者生男，右足者生女，覆者且死，側者有驚，此藥委是神奇。

○催生散 治難產并胞衣不下。

白芷

伏龍肝

百草霜

滑石 各等分 甘草 減半

右為細末，用芎歸湯入酒，童便少許調煎，不服之，二次佐助立。

○脫衣散 治胞衣不下。

川牛膝 三錢 歸尾 二錢 木通 三錢 滑石 四錢 冬葵子 半錢 加枳殼 二錢

右剉劑水煎服。

有胞衣不下，因產母元氣虛薄者，

用芎歸倍桂以溫之，自下。

補遺方

○治婦人難產 用蛇退一錢，焙存性，為末，黃酒調下，即生。

○治橫生逆產

服諸符藥不下者，灸右足小指尖頭三炷，艾炷如小麥大。

○治死胎不出

尖

射香五分另研官桂末三錢作一服黃酒調下須臾如手推

下效

○治胎死腹中疼痛不已

鹿角燒灰存性為末每服三錢溫黃酒送下

一孕歸交骨不開產門不開皆由是氣虛弱胎前失於調攝以

致血氣不能運達而然也交骨不開陰氣虛也用加味芎歸

揚補中益氣湯產門不開氣血虛也用十全大補湯加味芎歸

孕婦各一兩加自死胎一枚一個斷灸婦人頭髮子握燒存性即

# 小產

當過十

小產重者大產將息過當十倍大產乃粟熟自脫小產如採生

粟破其皮殼斷其根蒂非自然者蓋胎前損傷胞脈腐爛然

後胎墮豈不過於大產但多以小產為輕以致殞命大抵小

產宜補虛生肌肉養臟氣生新血去瘀血

○補氣養血湯 治小產氣虛下血不止

人參 黃芪 當歸 白朮 白芍藥

艾葉 炙甘草 阿膠 川芎 青皮

香附 砂仁

右剉一劑水二盞煎至一盞去渣溫服

○補血定痛湯 治小產瘀血心腹疼痛或發熱惡寒

當歸 川芎 熟艾 白芍 玄胡索

桃仁 紅花 香附 青皮 澤蘭

牡丹皮 各五分

長集卷之六

愈

右剉一劑用水一盞半入童使酒各一半煮煎至一盞溫服  
若以手按腹痛此是瘀血為患宜用此藥  
若按之反不痛此是血虛宜用四物湯參苓白朮  
若痛而作瀉此是脾虛宜六君子加破故紙炒肉豆寇煨姜  
棗煎服

# 產後

脈產後後滑沉細亦宜實大弦牢瀦疾皆危  
婦人產畢飲熱酒童便共一鍾閉具少坐上床倚高立膝仰臥  
不時喚醒及以醋塗鼻或用醋燒炭及燒漆器更以手從心  
捍至臍下使惡露不滯如此三日以防血暈血逆酒雖行血  
亦不可多恐引血入四肢且能昏暈宜類食白粥少許一月

百

之後宜食羊肉猪蹄少許仍慎言語七情寒暑梳頭洗足以  
而日為度若氣血素弱者不計日月否則患手足腰腿痠疼  
芽疰名曰蓐勞最難治療初產時不可問是男女恐因言語  
而泄氣或以愛憎而動氣皆能致病不可獨宿恐致虛驚不  
可刮舌恐傷心氣不可刷齒恐致血逆須血氣平復方可治  
事犯時微若秋毫成病重如山嶽可不戒哉

產後諸疾以末治之大補氣血為主也

○芎歸調血飲治產後一切諸病氣血虛損脾胃怯弱或惡露  
致於熱惡寒自汗或去血過多或飲食失節或怒氣相沖以  
眼花耳鳴口禁不語昏憤等症

- 當歸
- 川芎
- 白朮去芦
- 白茯苓去皮
- 熟地黃
- 陳皮
- 烏藥
- 香附童便炒
- 乾姜炒黑
- 益母草
- 牡丹皮
- 甘草

愈風

右判一劑、生姜一片、棗一枚、水煎溫服、看病加減于後  
一產後惡寒發熱、頭疼體痛、脈大無力者、是氣血俱虛也  
依本方加人參黃芪、去用芎、牡丹皮、益母草  
一產後惡露不盡、胃腹飽悶、疼痛、或腹中有塊、惡寒發熱、有惡血也

依本方加桃仁、紅花、肉桂、牛膝、枳殼、木香、玄胡、索童、便姜汁、少許、去熟地黃

一惡血去後、腹不滿、不硬、不痛、但虛熱不退  
依本方加人參、去牡丹皮、益母草

一產後早起、勞動發熱、惡寒  
依本方加人參、黃芪

一產後惡露不盡、瘀血上冲、昏迷不醒、腹滿硬痛者、當去惡血

依本方加桃仁、紅花、肉桂、玄胡、索童、牛膝、童便、姜汁、少許  
一產後腹軟滿、不硬、痛者、不是瘀血、乃是脾虛故也

依本方加人參、砂仁、厚朴、去益母、牡丹皮  
一產後惡露不盡、敗血流入肝胃、二經、或腹脅刺痛、或發腫滿

依本方加遠志、紅花、厚朴、玄胡、肉桂、青皮、木香、去熟地黃、久不愈成血鼓

一產後血去不止、是血虛血熱  
依本方加人參、黃芪、生地黃、炒梔子、荆芥、阿膠、烏梅、去益母

草、牡丹皮、烏藥、血甚不止、加地榆、入茅根汁、磨墨調服  
血久不止、成血崩、服五灰散、方見血崩

一產後去血過多、大腸乾燥、無血、大便閉結、不通  
依本方加麻仁、生地、桃仁、杏仁、黃芩、枳殼、厚朴、紅花、去川芎

白木茯苓烏藥乾姜益母草陳皮

一產後氣大脫血虛極昏暈不醒者切不可驚哭叫動則驚散其氣乘昏暈死可用熟米湯布按元氣復甦

依本方加人參黃芪去牡丹益母烏藥先將熟醋薑臬即醒

一產後泄瀉脾虛發腫  
依本方加人參蒼朮砂仁厚朴猪苓木通大腹白芍炒去熟地川芎烏藥益母草牡丹皮瀉甚不止加肉蔻柯子烏梅去厚朴父不愈成產後脾瀉中滿

一產後食傷脾胃飽悶泄瀉後復痢者難治

依本方加砂仁木香山藥蒼朮厚朴白芍炒去熟地川芎益母草牡丹皮烏藥瀉甚不止加肉蔻柯子煨烏梅去厚朴木香

香

一產後惡心嘔噦不止若去血過多乃是脾胃虛寒血少之故

依本方加人參半夏烏梅去益母草牡丹皮香附烏藥

一產後惡露去少嘔噦惡心胃脹或胃膈疼痛是惡血冲胃

依本方加肉桂砂仁厚朴紅花去熟地白木茯苓

腸痛

一產後因惡傷肝胃脇刺痛飽脹不進飲食發熱

依本方加砂仁木香厚朴青皮玄胡索茴香去熟地黃白木茯苓益母草牡丹皮

錯語

一產後血虛發煩燥虛驚睡臥不安錯語失神

依本方加人參酸棗仁竹茹炒山梔麥門冬辰砂去烏藥牡丹皮益母草乾姜

一產後口眼喎斜手足牽引或筋傷肉腫或驚悸戰掉不止或作寒熱脉或大無力或虛細皆氣血俱虛不能榮養筋脉

中凡  
青龍散  
谷香

依本方加人參黃芪辰砂去烏藥乾姜益母草牡丹皮若脈  
來浮緊有力恐血虛中風本方去黃芪辰砂加防風荆芥羌  
活不可全作風治以風散氣候矣有痰加竹瀝姜汁少許半  
夏姜炒去黃芪二三服藥除防風荆芥羌活依本方加減條  
理

一產後心血空虛神無所依或因悲思鬱結怒氣憂鬱亡則神  
舍空舍空則生痰是神不守舍使人驚狂煩亂呼罵欲走悲  
歌妄笑頭搖手戰

依本方加人參竹茹酸棗仁夜門冬山梔貝母枳實辰砂竹  
瀝姜汁去川芎烏藥乾姜益母草牡丹皮

一產後血少脾虛生痰上迷心竅使人昏迷不能言語

依本方加瓜蒌貝母枳實人參石菖蒲桔梗竹瀝姜汁少許

去香附烏藥乾姜益母草牡丹皮

一產後心血空虛心無血養口不能言精神短少

依本方加人參酸棗石菖蒲遠志茯神生地桔梗夜門冬竹  
瀝姜汁少許去牡丹益母烏藥乾姜香附

一產後去血過多血虛發腫者

依本方加砂仁大腹皮厚朴猪苓木通去牡丹皮益母草烏

藥乾姜

一產後惡血去不止流入脾經發腫滿者

依本方加紅花大腹皮厚朴砂仁木香猪苓木通去益母草  
烏藥白木茯苓

一產後脾虛飽悶不進飲食

依本方加砂仁白豆蔻厚朴益智木香去川芎益母草牡丹

皮烏藥乾姜

一產後血虛，煩渴不止，津液枯竭。

依本方，加人參、麥門冬、五味子、天花粉、葛根、蓮肉、烏梅、白芍、去川芎、乾姜、牡丹皮、益母草、烏藥、香附。

一產後脾虛，發痰喘氣急。

依本方，加沉香、木香、蘇子、厚朴、白芍、砂仁、枳實、貝母、竹瀝、姜汁、少許，去益母草、牡丹皮、乾姜、白朮、香附、烏藥。

一產後因去血過多，遍身骨節痛難轉側，是血虛不能榮養筋

骨。  
依本方，加生地、白芍、紅花、人參、牛膝、乳香、薄荷、桂少許，去益母草、牡丹皮、姜汁、烏草、牡丹、烏藥、乾姜。

一產後因去血過多，血虛發痙者。

依本方，加人參、黃芪、生地、白芍、去益母草、牡丹皮、姜汁、烏草、熟地、柴胡、黃芩、少許，有痰加瓜蒌、貝母、枳實、竹瀝、姜汁、少許，去熟地、黃。

一產後形體壯盛，手足痙瘓，遍身疼痛，難以動縮者，是血虛有風痰也。

依本方，加貝母、枳實、薄荷、桂、牛膝、炒黃芩、羌活、蒼朮、白芍、竹瀝、姜汁、少許，去益母草、牡丹皮、乾姜、烏藥、白朮。

一產後初起，腹中有塊，升舉作痛，無寒熱者，俗云鬼枕，七日痛自己，或腹滿硬痛，作寒熱者，痛不移處，是死血痛，當去惡血。

痛自止矣。

一產後初起，蒸乳發寒熱者。

依本方，加青皮、枳殼、通草。



○益母丸 治婦人胎前產後或難產胎胞不下血暈不醒或惡露不盡俱可服之

五月五日午時取益母草陰乾搗為細末煉蜜為丸如圓眼大每服一丸童便好酒各半研化服之不飲酒姜湯化下

○回生丹 長葛孫奎亭經驗

大黃 一斤為細末 蘇木 三兩剉用河水五碗煎汁三碗

紅花 三兩炒黃色入好酒一大壺同煮三五滾去紅花不用存汁用

黑豆 三升煮熟取汁三碗去豆不用止用豆皮

先將大黃末以好米醋三四碗攪勻以文武火熬成膏如此二遍次下紅花酒蘇木湯黑豆汁攪開大黃膏入內又熬成膏取出如有鍋把再焙乾入後藥

當歸 川芎 熟地黃 白茯苓 去皮 蒼木米汁浸 香附米 烏藥 玄胡索 桃仁另研 蒲黃

牛膝 去節 白芍 酒炒 甘草 陳皮 木香

三稜 五靈脂 羌活 地榆 山萸 酒蒸去核

人參 白木 去芦 青皮 去穢 木瓜 各三錢 良姜 四錢

乳香 沒藥 各一錢

右為細末用大黃膏為丸如彈子六每服一九酒頓化通口服

若產後頭疼身熱有汗謂之傷風加桂枝末三分姜葱煎湯頓化服之

若產後頭疼身熱無汗謂之傷寒加麻黃末三分姜葱煎湯頓化服之

若產後無乳加天花粉三分當歸尾三分穿山甲炙三分黃連三分為末同入酒內頓開不拘時服令乳母將乳頭搽干

餘轉其乳如湧泉自出

保生論回生丹功效

露

養胎益血和子治妊婦失宜勞後胎動或胎漏惡露時下臍急  
寒久不成胎痿燥不長過期不產日月雖滿動作無力或致  
損墜產時未至惡露先下胞絡枯燥致令難產或逆癩悶亂  
連日不產子死腹中腹上冰冷口唇青黑出冷沫惡露上攻  
昏悶不省喘促汗出及血未盡臍腹冷痛寒熱往來或因產  
勞虛損身羸面黃體瘦心怯盜汗飲食不進漸成勞瘵八月  
常服壯氣養胎順產滋陰養血調和陰陽密膝理實臟腑治  
風虛實癰冷閉門寶鑑經驗醫方治妊婦胎前產後崩漏帶  
下室女經閉月水不調

第一子死腹中如何

答曰妊母因染熱病六七日經傳臟腑熱極以致子死腹中  
墜胎下不分離命在須臾急服回生丹三九便生

第二難產如何

答曰緣胎氣已成子食母血臨月足餘經血成塊俗呼為兒  
枕臨產時兒枕先破及將生時枕破血裹其子故難產但服  
此藥逐去敗血須臾自生橫生逆產同治

第三產後胎衣不下如何

答曰母子分解既訖母受其寒產血入于衣中被血所脹此  
胎衣不下令人脹悶飲食不進逐去衣中敗血自然下矣

第四產後血暈起止不得眼見黑花如何

答曰產後三日血氣未定還走五臟奔克於肝醫人不識呼  
為暗風差矣宜此丹治之即愈

第五產後口乾心悶如何

答曰產後七日以來血氣未定因三日食麵與血結積聚在心是以煩渴醫人不識呼為胃膈壅悶但服此藥萬無一失

第六產後寒熱似瘧如何

答曰產後虛羸血入于心肺熱入于脾胃則寒熱極反渴啟人不識呼為瘧疾悞傷產婦不可勝記若服此救之百發百中

第七產後四肢浮腫如何

答曰敗血走注五臟轉滿四肢停留回轉不得乃化為浮腫遂致四肢俱腫醫人不識遂為水腫與血腫不問水腫氣閉而小便澁血腫氣渴而四肢寒先服此丹去敗血後用利水

氣藥

第八產後血邪如見神癡狂言語無度如何

答曰產後敗血熱極中心所以煩燥言語顛狂醫人不識呼為風邪若以風治之是庸醫悞人若急服此丹萬無一失

第九產後失音不語如何

答曰心有七孔三毛敗血充心流入孔中被血所閉言語不得醫人不識呼為脫陽脫陽失音甚是為難無方下藥除不審視產婦敗血行與不行順與不順令血氣妄行流入心孔却反為難語若服此丹萬無一失

後第十產難泄痢腹痛如何

答曰妊婦未滿月悞食酸冷堅硬之物與血相搏流入大腸不得剋化或泄膿血或作汚刺不得安穩但服此即愈

第十一產後百節酸疼如何

答曰生產姪婦百骨脂中開張產後餘血流入經絡停留日久結聚不散壅滯虛脹是以百節酸疼醫不識此呼為濕症用藥損者多矣但服此丹二三服去其滯血即痊

第十二產後小腸尿血如鷄肝如何

答曰產婦月中將理失宜飲食不得應時兼以氣怒以致餘血流入小腸閉却水道是以小便澁結血似鷄肝流入大腸閉却肛門逆致大便澁難醫人不識呼為五臟淋澁傷損心肝以致瘀血成塊形如鷄肝殊不知敗血流入大腸閉塞水穀以致如此但服此藥立痊

第十三產後下血似崩中如何

答曰產後敗血惡露盡止之間亦當服藥以調五臟或食酸

鹹之物寒熱不一因此榮衛不得調和以致腹中便作崩漏形如肝色渾身潮熱背膊拘急心中煩悶醫人不察云為崩下但婦人癸水將至暴下不止愆期過度故曰崩下產婦血氣正行失于保養以成此疾但服此丹其病即痊

第十四產後胃膈氣滿嘔逆不定如何

答曰產後血停于脾胃食充氣充心氣不安胃膈脹滿嘔吐偏多醫人不識呼為翻胃口不容受飲食故曰翻胃口妊婦血停於脾心氣相冲而為嘔逆如何謂之番胃但服此丹二三丸百不一失

第十五產後咳嗽寒熱往來如何

答曰產後不能忌口食麵結痰為塊上喘咳嗽四肢寒熱心悶口乾渾身煩燥睡夢多驚體虛無力經水不來名曰血閉

腸痛面赤因此難治變作骨蒸治須仔細若服此丹不應雖  
盧醫不起

喉

第十六產後胃中似蟬聲如何

答曰敗血衝逼於心轉入肺氣與血並結成塊入喉中作聲  
似蟬鳴人以為怪產得此病者十不救一

第十七產後面黃舌乾鼻中流血遍身色黧生斑如何

答曰產後敗血入五臟六腑皆病流入肌膚敗血出入流走  
四肢熱結留注轉還不得故有此疾可畏可慎產後有此十  
無一活但此疾百中無一二如遇此丹可保無虞

第十八產後眼溢腰痛似角弓如何

答曰產婦百日之後方得脫體今在月中七日以來食麥麥  
口之物以致煩熱不得安寧因循不肖服藥調理兼百日之

內過傷房事或久病或坐卧當風取其一時快樂殊不知產

後血氣虧損倘一犯之則不能免此患也

第十九產後小便澀大便不通如何

血入腸中誰得知小便淋瀝大便遲乍寒乍熱常多汗如醉  
如痴似鬼迷花發目前如碎錦病纏身內總成虛只消一粒

回生藥產婦從今免困危

產後諸疾補遺

產婦略聞音響其汗如水而昏憤諸藥到口即嘔余以為脾

氣虛敗用參附末為細丸時含三五粒隨液嚥下乃漸加之

至錢許却服參附湯而痊

產後生腸不收皆由氣虛血弱所以縣下但養氣和血其物

自收用補中益氣湯去柴胡陳皮加川芎升提之用執手心

常慰腰肚但腰肚氣暖其物自收

一產婦陰脫腫痛脉滑數欲作膿也用十全大補湯而膿成又數劑而潰但小使頻數患處重墜此元氣虛而下陷也用補中益氣湯而尋愈

一產婦玉門不閉發熱惡寒用十全大補加五味數劑而熱退

用補中益氣加五味數劑玉門閉

一產婦血崩因怒其血如湧仆地口禁目斜手足搐搦此肝經

血耗生風余用六味丸料一劑諸症悉退但食少晡熱佐以

四君子柴胡牡丹皮而愈

一產婦泄瀉四肢面目浮腫喘促惡寒用六君加姜桂而泄瀉

愈又補中益氣而脾胃健

一產婦泄瀉腹痛日久形體骨立內熱晡熱自汗盜汗口舌聚

爛吐痰脉洪大重按全無此命門火衰脾土虛寒而不能攝

痰歸元用八味丸補火以生土用補中益氣湯兼補肺金而

痊

一產婦牙關緊急腰背反張四肢抽搐兩目連劄此去血過多

元氣虧損陰火熾盛用十全大補加炮姜一劑而甦數劑而

安

一產婦筋牽臂軟肌肉抽掣皆屬氣血虛用十全大補湯而痊

已上諸方俱見補益

# 乳病

乳汁不通結核成餅不散寒熱作痛者宜速揉散乳汁一通餅

核自消如不消結成乳癰急用連鬚葱煎成餅搭乳上用灰

大一罐蓋葱上須更汗出立消

乳汁不通者有盛有虛也

○盛宜

桂枝二錢 瞿麥

柴胡

天花粉

絡一通草七分

青皮 白芷

木通

赤芍

連翹

甘草各五分

右剉一劑水煎頻服更摩乳房

○虛宜

王不留行

木通

天花粉

當歸

川芎

白芍酒炒

生芩各半分

右剉一劑用獾猪蹄傍肉四兩煎湯二鍾又藥同服先將葱

湯頻洗乳房

○湧泉散

治乳汁不通不問虛盛先用木梳頻刮乳房後服藥

穿山甲炒

白姜蚕炒

肉豆蔻各一分

皂角五錢

胡桃仁去皮四兩

芝蔴炒半升

右為細末每服不拘多少溫酒調下任意食之

○治乳汁不通

王不留行

天花粉

甘草各三兩

當歸

穿山甲酥炙各五錢

右為細末每服三錢猪蹄湯或熱酒調下其乳即通

乳癰發痛者血脈凝注不散也

天花粉

金銀花

皂角刺

穿山甲土炒

當歸尾

白芷稍

瓜蒌仁

貝母

甘草節

右剉酒煎服此方治吹乳癰痛腫不可忍者

○瓜蒌散

治婦人乳疽乳癰如勞

九冬

黃瓜女子多者不去 當歸 五錢 乳香 研針 沒藥 一錢 研針  
生甘草 五錢

右合一劑好酒三碗於銀石器中慢火熬至碗半分為三次  
食後服如有乳勞便服此藥杜絕病根如毒氣已成能化膿  
為黃水毒未成即內消疾甚者再合一服以愈為度

○治婦人吹乳

用黍子一合黃酒下即散

○治婦人吹乳硬腫身發熱增寒疼痛難忍不進飲食者服之  
良驗

鹿角一兩炭火煨存性研細分作二服先將末藥五錢入鍋  
次下無灰酒一碗滾數沸倒在碗內乘熱盡飲臨臥服汗出  
即安

○治吹乳仙方

用葱一大把搗成餅一指厚攤乳上用灰火一罐覆葱上須  
更汗出腫痛立消

一產婦勞役忽乳汁如湧昏昧吐痰此陽氣虛而厥也灌以獨  
參湯而甦更以十全大補湯數劑而安方見補益

一婦人氣血方盛乳房作脹或無兒飲脹痛增寒發熱用麥芽  
二三兩炒熟水煎服立消其耗散如此何脾胃虛弱飲食不消方中多用之

### 乳岩

婦人乳岩始有核腫如蟹棋子大不痛不痒五七年方成瘡初  
便宜多服疎氣行血之藥須情思如意則可愈如成之後則  
如岩穴之凹或如人口有唇赤汁膿水浸流胃腹氣攻疼痛

氣



用五灰膏去蠹肉生新肉漸漸收斂此疾生於憂鬱積忿  
中年婦人未石者尚可治成瘡者終不可治宜服十六味流氣飲

○十六味流氣飲 治乳岩  
當歸 川芎 白芍 黃耆 人參 官桂 厚朴 桔梗  
枳壳 烏藥 木香 檳榔 白芷 防風 紫蘇 甘草  
乳癭加青皮 亦治痘疹餘毒作癭瘤

增補三方

右剉一劑水煎食遠臨臥頻服

### 婦人諸病

婦人與鬼交通者由臟腑虛神不守故鬼氣得為病也

其狀不欲見人如有對晤時獨言笑或特悲泣是也脉息羸  
伏或為鳥啄皆鬼邪為病也又脉來綿綿不知度數而顏色

不變此亦是斯候也

宜灸鬼哭穴以患人兩手拇指相並用線繫扎當合縫處半肉半甲間灼艾後

七壯若果是邪祟病者即乞求免灸云然自去矣

○茯神散

治婦人風虛與鬼交通妄有見聞言語雜亂

白茯神 一錢半

白茯苓 去皮 人參

石菖蒲 各一錢

赤小豆 五分

右剉一劑水煎服外用辟邪丹祛之方見瘰癧

婦人傷寒發熱經水適來晝則明了暮則譫語如見鬼狀此為  
熱入血室也

○小柴胡湯方見傷寒

依本方加生地黃

○一方用四物湯去熟地黃用生地黃加柴胡各等分煎服亦  
治此症

婦人陰腫者是胞絡虛為風邪所客也

○黑白散治陰戶腫痛

小麥 朴硝 白礬 五倍子 葱白

右件煎湯頻洗○一方用馬鞭草搗爛塗之

婦人陰痒者是虫蝕陰戶也

○治陰痒用蛇床子白礬煎水淋洗即止

○一方用牛肝或猪肝三寸納入陰中其虫盡入肝內取出立

効

婦人陰中生瘡者是濕熱也

○療女人陰中生瘡

杏仁 雄黃 礬石各二分麝香二分半

右研細傳入陰中○一方單用硫黃研細付之亦効

主

一婦人素鬱悶陰戶痛痒不時出水飲食少思肢体倦怠用婦

脾湯加丹皮山梔芍藥柴胡生草服之而安

一婦人病愈後小便出尿此陰陽失於傳送名大小勝交也先

用五苓散二劑而愈又用補中益氣湯而安

一婦人陰中寒冷小便澄清腹中亦冷飲食少思大便不實下

元虛寒治以八味丸月餘飲食漸加大便漸實又月餘諸症

悉愈

一婦人每交接出血作痛此肝火動脾而不能攝血用補中益

氣濟生湯脾二湯而愈若出血過多而見他症但用前藥調

補肝脾

一婦人陰中挺出一條五寸許悶痛重墜水出淋漓小便澀滯

夕與葱膽瀉肝湯分利溫熱朝與補中益氣湯升補脾氣諸

症漸愈再與婦脾加山施疾冬川芎黃柏問服調理而愈後因勞役或怒下下部温痒小水不利仍用前藥即愈亦有及許者亦有生諸虫物者皆用此治

一婦人小便自遺或時不利日瞶益甚此肝熱陰挺不能約制用六味丸料加白木酒炒里黃柏七分知母五分數劑諸症悉愈若誤用分利之劑愈損真陰必致不起

一婦人有孕小便不利小腹腫脹幾至於殆用八味丸一服小便淋漓再以前丸之料加車前子一劑即利肚腹頓寬而安一姪婦無故自悲用大棗十枚甘草小麥各三兩分三劑水煎服而愈後復患又用前湯佐以四君子加山施而安

一婦人身顫振口妄言諸藥不効余以為鬱怒所致詢其故蓋為素熯其夫而含怒久矣投以小柴胡湯稍可又用加味歸

脾湯而愈

一婦人驚悸怔忡無寐自汗盜汗飲食不甘思情嗜臥用歸脾湯而愈至年餘懷抱鬱結患前症蕪衄血便血仍用前湯而愈

一婦人忽昏憤發謔語自云為前某賴某人銀兩其被責我將你起解往城惶理問兩脚腓膝臂處皆青腫痛不可忍口稱苦楚次日方甦痛尚不止用金銀藤兩許水煎服而愈

一女子年二十歲未婚患每見男子即咬住不放後暈倒陰戶流出冷精頃間即醒其厥陰肝脉弦出寸口乃陰盛思男子不可得也予令其父母用棍痛責使之思痛而失懲也後服抑陰丸而愈

重刊增補萬病回春卷之六終



