病曰精義

特別
ヤ9
1188
8

WQ
1188
8

病因精義目次

卷之八 四篇下

惡心嘔吐第三十九
嘔血第四十
呃逆第四十一
胃痛第四十二 胃脘腫
腹痛第四十三 腸脘腫
霍亂第四十四

99-1329

桃塢小森先生講述　男　桃郭義真筆記

惡心嘔吐第三十九

惡心嘔吐者。輕重之別也。其近因。出乎自然良能欲除胃中之害物。其遠因。大率係乎食物不良。若食滯鬱積。若食毒物。此為真證。其原以由食在胃也。更有胃中自然生害物。或自他部浸淫来者。所謂酸敗液。黏濁液。蛔蟲。結石。腐敗膽液。及諸惡液混於津唾而入胃者。或自白脈等末梢滲漏而溜瀦者。或其所滲漏良液亦曰其溜瀦以致腐敗

者等是也。此亦真證之屬。以為病毒泄除之證者也。

凡食道ノ運行ハ上ノ胃管ヨリ。中ノ胃腸ヲ經。下ノ肛門ニ至ルマデ。蠕蠕トシテ動キ。以テ順下傳送スルヲ常トス。然ニ今卒爾トシテコレニ反シ。上ニ逆ヲテ嘔泄スルハ何ゾヤ。他ナシ胃中ニ害物アリテ。以テ所在ヲ攪亂スレバ。則胃ノ白脈コレニ觸感シ。立地ニ其常機ヲ變シ。便ニ就テコレヲ驅泄セント欲スルノ致ス所ナリ。凡病毒胃ニアレバ嘔吐シ。腸ニアレバ下利シ。胸肺ニアレバ欬出シ。皮表ニアレバ汗出シ。若ハ瘡疥トナシテ在ル所ニ隨ヒ。コレヲ外出スルニ便ナル道ヲ求テ。コレヲ逐フ者。所謂ル人身内ニ具スル所ノ天受自然ノ良能ノ為ル所ナリ。默シテ其妙機ヲ見ルベシ。

此說已ニ初篇ニ具スト雖モ。世醫多ク此理ヲ知ラズ。故ニコレヲ鎮セン事ヲ欲テ。コレヲ左右スルヿヲ為ズ。乃自然良能ニ逆テ以テ其病ヲ助益スルヿ火カラズ。故ニ再說丁寧ヲ致スノミ。學者試ルヿ勿レ。下利モ亦コレニ準ズ。蓋其將ニ嘔セントスルヤ。其胃ニ在ル所ノ不良ナル物質ノ物ガ。胃ノ裏面ノ膜ニ抵觸シ。所在ノ白脈コレニ勝ヘザレバ。則一齊ニ牽攣シテ。上方ヘ急縮シ。胃ノ全體ガ窄少ニナリ。下口ハ自ラ緊閉シテ。其内ニ在ル所ノ物ヲ上口ヘ溢出シ来レバ。則上ノ胃管ノ白脈ニ抵觸シテ。茲ニ惡心ヲ催スナリ。故ニ曰フ。惡心嘔吐ハ輕重ノ別ナリト。凡不良ノ食物ノ養榮ニ害アル者。及諸般ノ毒物ヲ食ヒ。

若ハ吐劑ヲ服シ。或ハ劇下ノ劑ヲ用テ反テ嘔スル者。其機皆一般ナリ。（又其食服スル所。敢テ害アル品ニ非スト雖モ。或ハ香臭甚ク。或ハ氣味屬キ者ヲ用レバ。其白脈質脆弱ノ人ハ。其感觸ニ勝ヘズシテ。亦能惡心嘔吐ヲ發ス。其機同ジト雖モ。其因同カラズ。詳ニ下文ニ論說ス。）又其食物不良ナルニ非レドモ。若其用度。胃ノ分量ニ過越スルトキハ。則鬱滯腐敗シテ害物トナリ。前ニ同シク惡心嘔吐ヲ發シ來ルコトアリ。又其食度過分ナルニハ非レドモ。胃弱ノ人ハ。時ニコレヲ化スルコト能ズシテ鬱滯腐敗シ。遂ニ數〻嘔吐ヲ發スル者アリ。此等ノ證ハ。其原近ク飲食ニ起テ。專ラ胃ノ所業ニ出ヅ。故ニ此ヲ真證ト謂フ。又胃中自然ニ害物ヲ生ズト云ハ。所謂酸敗液酒家及留飲家ノ嘔吐。若〻ハ小兒ノ吐乳等。諸〻酸臭物ヲ吐出スル者是ナリ。粘濁液。痰飲家。又喎噎家。及他粘稠物ヲ吐スル者是ナリ。及蛔蟲。結石等ナリ。此等ナホ其遠因ヲ推セバ。亦皆攝養不度。若〻ハ胃ノ薄弱ナルヨリ來ル。腐敗膿汁ヨリ來ルハ。所謂ル雘亂ノ類。及苦味汚臭ノ物ヲ吐スルハ皆是ナリ。他部ヨリ浸淫シ來ル者ハ。熱病毒。瘡瘡毒。丹毒。傷冷毒。痛風毒等ノ胃ニ入ル者是ナリ。此ガ熱毒。瘡毒等ハ。多〻ハ津唾ニ混シテ來リ。傷冷毒。痛風毒等ハ。大率諸脈ノ末梢ヨリ淋滴シ來ルナリ。又其良液ナルモ。濁濘スルニヨリテ腐

敗スルハ。下篇ニ所謂嘔血ノ如キ是ナリ。以上諸證ハ。其曰大ニ逕庭アリト雖モ。其胃ニ在ルノ害物タルヤ同ジテ。而シテ其發嘔スル所以ノ機ハ一ナリ。故ニコレヲ真證ノ屬トシ。又病妻泄除ノ證ト謂フ。

又有胃及其所交通之諸部有他病以連累逼迫而惡心發嘔者此謂兼發之證又有自意識感動身體妄動及外部創傷等来者此謂雜證別有稱乾嘔者是曰唯有嘔狀而無物多於兼發雜證等發之然胃口緊閉有物不得吐者亦有之尤為重證凡惡心嘔吐及乾嘔共有宜鎮者亦有宜促者不能詳其曰焉得施至當之治哉

兼發ノ證ハ。第一胃ノ瘍腫。次ニ膈膜。腸及腹部諸藏ノ瘍腫。膿瘍。諸疼痛。損傷。或ハ癩疝。大便閉。子宮病。又白脈病。頭痛。咳嗽等ニ於テ發嘔スル者是ナリ。此等ハ皆其疼痛ニ因テ。白脈牽攣スルノ運動ヲ轉移連累シテ。胃ヲ攪亂スルノ致ス所ニシテ。本来其吐スル所ノ物ニ因テ發スル嘔ニ非ルガ故ニ。既ニ胃ニ在ルホドノ物ヲ吐シ盡セドモ。其勢ナホ止マズ。數乾嘔ヲ致スモノナリ。（但其膿ヲナシテコレヲ胃ニ齎シ来ル者ハ。此例ニ非ズ）又其甚者ニ至テハ。則腸部ニ在ル所ノ乳糜。（小腸）糞失。（大腸）及溲道ノ劑（直腸ヲデモコレヲ吐出スルコトアリ。

唯癲疝ト。大便閉トヨリ来ルハ。其順下傳送ノ機ヲ失スルノ致ス所ナルノミ。又泄瀉早ク止ミ。或ハ居恒通泄セシ所ノ者。閉塞スル（痔血閉。經血閉ノ類）モ亦ヨク嘔吐ノ因ヲナスナリ。〇譫證ノ意識ノ感動ニ因ルト云ハ。汚物ヲ見。若クハ臭氣ニ觸レ。或ハ嫌（ヒ）惡ム所ノ食。若クハ曽テコレガ為ニ敗嘔セシコトアル所ノ物品ヲ見テ。忽ニ惡心ヲ催シ来リ。或ハ怒氣ニ因テ發嘔スル者等皆是ナリ。又藥品ノ氣味ニ由テ。コレヲ嫌惡ムヨリ發嘔スルモ亦此類ナリ。身體ノ妄動ニ因ルト云ハ。乘舩。騎馬。疾走等ニ由テ来ル者ヲ謂ナリ。

外傷ニ兼發スルハ。特ニ頭部ノ創傷ニ於テコレヲ誘發スルモノナリ。コレヲ要スルニ此三因ハ皆是其曰ノ為ニ。神府（頭腦）ヲ攪亂シ。昏冒眩暈スル等ニ因テ。白脈寧急シ上方エ畏縮スルガ為ニ。劍狀柔骨ヲ内方エ撓屈シテ。胃ノ下口ヲ靡閉シ。且胃ヲ攪亂シテ。其中ニ在ル所ノ物ヲ上口エ絞出スルノ致ス所ナリ。（胃ト腦ト感通敏速ナル理。頭痛篇ニ説ケリ）〇乾嘔ノ吐物ナキハ。前文ニ所謂ル病勢ニ逼迫セラレテ。止ムコトヲ得ズ嘔機ヲ作ス者是ナリ。物有テ吐スルコト能ザルハ。所謂ル乾霍亂ノ類是ナリ。蓋嘔ハ本来逆機ナル

ガ故ニ。或ハ白脈質強實ニ過ギ。其鬱急スルコト甚シケレバ。則胷ニ其下口ヲ閉ルノミナラズ。上口モ亦閉塞シテ。反テ嘔スルコト能ザル者アリ。或ハ白脈質虚弱ナルニ。其嘔セントス欲スル所ノ物。涸泥質ニシテ重滞シ。滑脱スベキ水樣液ニ乏シケレバ。則コレヲ逆出スルコト能ザルヨリ来ル者アリ。乾嘔ノ曰ハ。大率此三等ニ過ルコトナキナリ。

○凡惡心噦吐。胃中ニ害物アルノ候ハ。必ス心下痞悶シ。甚キ者ハ苦煩疼痛シ。或ハ噯氣嘈雜。口苦腐臭等ノ證ヲ兼ヌ。膽汁酷厲ヨリ来ルハ。胸膈焼ガ如ク。煩悶懊

惱シ發熱ス。腹部諸藏ノ瘀腫ハ。必其部ニ於テ移動セザルノ疼痛アリ。且多クハ呃逆ヲ兼ヌ。胃ノ裏膜剝脱蝕爛（此證ハ諸般ノ毒物ヲ食ヒ。若クハ酷厲腐敗ス侵蝕スベキ惡液ヲ内蓄スルヨリ来ル）等ヨリ来ルモ。亦呃逆ヲ兼ヌ。又頭ノ創傷ニ嘔アルハ。死徴ナリ。真吐後。食欲ナク。唯熱飲ヲ欲スルハ。胃ノ積壞樣ノ膜衰弱ノ徴ナリ。肩胛痛ニ嘔アルハ。良徴ナリ。病毒泄除ノ證ハ。都テ此ヨリ快路ニ趣ク者多シ。又總テ純一無襍ノ物。及純清鉛色惡臭ノ物ヲ吐スルハ。惡徴ナリ。凡病ノ初ニ黒膽液ヲ吐スルハ。良兆ナリ。耳聾ニ黒膽液ヲ吐スルハ。死兆ナリ。吐糞

病ノ初ニ。膽液ニ粘液ヲ混シ吐スルハ。死兆ナリ。」凡赤色物ヲ吐シ。劇痛ヲ兼ルハ。死兆ナリ。」吐後眼華ヲ現ジテ。音聲變ズル者ハ。腦熾腫ノ前兆ナリ。

○治法。胃中害物アルノ證ハ。總テコレヲ促ス。ニ宜シ。吐根散コレヲ主ル。更ニ微温湯。或ハ鹽湯。或ハ野菊浸等ヲ多ク飲シメ。以テ快吐ヲ得セシムベシ。但胃衰弱ノ者ニハ。芳香健胃ノ劑。香橙。桂。肉豆蔻。益智。木香等ヲ調シ與ベシ。已ニ快吐ヲ得テ後ハ。各其病因ニ隨テ。適宜ノ治法ヲ施スベシ。例スルニ食用不良。若ハ非度。若ハ胃弱等ヨリ来ルハ。殊ニ攝養ヲ愼ミ。適宜ノ健胃劑ヲ撰用スルニ在リ。痘毒。丹毒。

痛風毒。傷冷毒等ノ内陷シ。或ハ通血閉止等ヨリ来ルハ。復タビ發泄スルニ宜シ。刺絡。下劑。脚湯。呼膿法。敷疱膏等ヲ撰用スベシ。熱毒ヨリ来ルハ。其本病ニ隨フベシ。

○無發ノ證ハ。大率コレヲ鎮スルニ宜シ。蓋各其本病ノ治ニ從フニ在リ。但熱ニ屬スル者ハ。清涼劑ニ宜シ。白脈孿急スル者ハ。香竄ノ藥（麝香。肉桂。藿香。丁子）品ニ宜シ。外用ハ。燒酒温蒸法ヲ施スベシ。○感動ニ因テ發スル者ハ。先ツ其因ヲ去テ而シテコレヲ安靜ニシ。冷水ニ阿片醇一二滴ヲ加ヘ與レバ則愈ユ。○乾嘔ノ病勢ニ因テ止ガタキ者ハ。香橼飲ニ宜シ。丸嘔吐當ニ鎮

スベキ者皆コレヲ主ル。方。蘭方椒機嘔吐セント欲シテ吐セズ。急迫スル者ハ。一等烈劑ヲ用テ。速ニコレヲ湧越セシムベシ。諸藥劑泰西方鑑ニ出ス

嘔血第四十

嘔血。謂自胃出血也。其近因。動脈。靜脈。或門脈等ノ末梢破裂而滲漏溜瀦焉也。其遠因。大率喜飲烈酒熱酒。若用辛辣苛腐之飲食藥劑。若服峻劇吐下之藥品者。或壞血病。癰瘡。諸腐敗病。及經閉。痔血閉。肝。脾閉塞病等兼發者。若曰打撲撞衝来者也

胃血ノ候ハ。爾前多ノ人心下急結シ。季肋下牽張シテ（此ハ大概諸閉塞ヨリ来ルノ候ナリ）而シテ其發スルヤ。必惡心。煩悶。眩暈。胃痛等ノ證アリテ傍来リ。且其吐スル所ノ血大率凝塊黯赭色ニシテ。而シテ肺血ノ鮮紅ナルニ同カラズ。又多少食物。若ハ粘液。酸液。膽液等ノ胃中ニ在ル所ノ者ヲ雜出シテ。而シテ氣泡アルコトナシ。此等ノ證ヲ以テ其肺血ト異ナル所ヲ辨ズベシ。其遠因烈酒以下吐下後等ニ於テ来ル者ハ。此皆コレガ為ニ胃ニ循行スル動靜脈ノ末梢ヲ破裂セシメテ血滴淋漓シ。漸ク溜瀦セシヲ嘔シ来ルナリ。壞血病。癰瘡。

腐敗熱病等ヨリ来ル者ハ。其腐壊酷厲ノ氣質ヲ以テ。内ヨリ脈管ヲ侵刺腐蝕シテ。而シテ透漏スルナリ。此ヲ最惡證トス。」經閉。痔血閉。肝。脾ノ閉塞等ヨリ来ル者ハ。是其血胃ニ蔓延スル所ノ門脈ノ枝別ヨリシテ瀉出スルナリ。門脈ハ他部ノ靜脈ノ如ク。腹部諸藏ニ循ル動脈ノ末梢ヲ受テ血ヲ湊會シ。以テ肝ニ輸送スル者ナリ。經閉スレバ則腹部ノ血ガ一同ニ盈滿テ此脈ニ溢レ。又痔血ハ此脈ノ枝別ノ肛内兩側ニ在モノヨリ瀉出スルナリ。故ニ痔血アリシ者ガ閉塞スレバ。則此脈溢滿シ。肝。脾閉塞スレバ。此脈ノ血稠結スル等ヨリ来ナリ。或ハ肝脈直ニ破裂シ總管ヨリ傳テ溢来者アリト雖モ。此證ハ必下血ヲ兼發スルヲ以テ徵スベシ。蓋門脈ヨリ来ル血ハ。其色殊ニ黯赭ニシテ。其質ハ反テ濃稠ナラズ。又胃痛スルコトナシ。若夫レ外傷ヨリ来ハ知リ易シ。論說スルヲ須ズ。

○治法。脈實緊ナル者。及胃部脹熱跳動スル者ハ。先ッ刺絡術ヲ施スベシ。若痔脈腫脹スル者ハ。蟻鍼法ヲ行フベシ。且先ッ其身體ヲ安靜ニシテ。謾ニ震動セシムベカラズ。而シテ軟化凝導方ヲ施シ。二根湯。梅麥二石飲等ノ清酸藥ニテ。徐徐ニ下導スベシ。決シテ麻瀉劑ヲ與フベカラズ。然ドモ血ノ出ルコト甚多ク。衰弱ヲ致

ス者ニハ。三味磬精煉。四味石脂煉等ヲ與ヘ。醋水綿ヲ胃部ニ貼シ。胃ト季肋トノ際ニ乾角子ヲ施スベシ。然ドモ胃中ニ溜血アル限リハ。尚前藥ヲ兼テ浄除シ盡スベシ。前次ノ血既ニ盡テ復吐セントスル者。或ハ煩燥シテ睡コト能ザル者ハ。三味磬精煉。清和飲。扁桃乳合罌粟煉糖等ヲ與フベシ。嘔血後衰弱。面青浮腫。心惕苦悶スル者ハ。滋養ノ食品ヲ與ヘ。毎一時ニ幾那糖桂飲ニ乳汁少ヲ和シ服セシムベシ。尚復シ難キモノハ。鐵幾沒蘇煉コレヲ主ル。凡嘔血止ザルノ時ハ。但汁液ヲ食ハシメテ。決シテ固食ヲ與ベカラズ。止後ト雖モ。尚柔軟ノ品ヲ撰ミ用フベシ。外傷ヨリ来ル嘔血ハ殊ニ難治ナリ。諸腐壊ヨリ来ル。此證ニハ。石梅接骨甚危證

飴。或ハ消接罌亞煉飲等ヲ與フベシ。愈後日ヲ經テ強壯ナラシムル藥浴ヲナサシムベシ。諸藥劑總テ泰西方鑑ニ集載スル撰用スベシ

咽逆第四十一

咽逆之近因。胃。胃管。横膈白脈。有テ所支障ル而拘急シ牽連シテ咳頭ヲ害スル呼吸ヲ也。其遠因。食物硬泥。風氣急張。或釀腐敗乳糜。或生蛔蟲。或服食有毒諸品。或冷物所傷。或寒氣所侵。或酷厲毒留著于胃若胃管。或刺戟物刮削胃及胃管

之滑液若剝脫裏膜或熱毒侵入或胃及諸藏煩腫或諸般脫泄及失血或寒熱壞沮殊發下部者或内部創傷及截切石淋若腸破傷者兼發等也

呃逆ハ胃及胃管横膈等ノ白脈運行支障スル所アリテ一種ノ痙攣様ノ運動ヲ作シ喉頭ニ連及シテ共ニ牽引スルナリ是ヲ以テ頻リニ異常ノ音ヲ發ス

大率老人及虚弱家食後胃中飽滿シ食物固泥シテ白脈ノ運行ヲ支障スル者ニ發スルコト多シ又壯實ノ人ト雖モ貪飡暴食シ或ハ硬堅難化ノ物ヲ食テ或ハ腐敗乳糜ヲ生シ或ハ風氣ヲ生シ或ハ蛔蟲ヲ生スル

者モ亦能此病ヲ發スルコトアリ又毒物ヲ食ヒ或ハ夾毒ノ藥（譬ハ如ク鴆毒ノ如キ物）ヲ服食シ或ハ冷物ヲ食ヒ或ハ寒氣ニ中レルヨリモ亦コレヲ發スルコトアリ蓋毒物ハ直ニ以テ白脈ヲ刺傷シテ拘攣セシメ或ハ麻痺セシメテ而シテ靈液ノ運行ヲ妨害スルヨリ来リ甚キトキハ則胃ノ裏膜ヲ剥脫スルニ至ル若毒物ナラザルモ酷厲刺戟質ノ物ハ亦ヨク胃及胃管ノ裏膜ニ布ク所ノ天賦ノ滑液ヲ奪去シ其感觸ニ耐ヘザルヨリ白脈攣急ノ運動ヲ發シ来ルナリ冷物ヲ食ヒ寒氣ニ中ル者ハ以テ靈液

ヲ凝泣シ。白脈ヲ畏縮セシムルヨリ来ルナリ。又内ニ酷厲ナル膿液様ノ毒。或ハ傷冷毒。壊液毒。腐敗毒。膿様液ノ如キ悪物ヲ生ジ。ソレガ胃及胃管ニ来テ留著シ。以テ所在ノ白脈ヲ衝動スルヨリ来ル者アリ。熱病。殊ニ瘧熱正ニ發動スルニ當テ其勢ニ乗ジ觸動セラレテ發スル者多シ及胃。腸瘍腫。或ハ膈膜。或ハ肝藏。及諸藏瘍腫。硬結腫。癌瘡等ニ於テ發スルハ。猶諸毒物ノ如シ。白脈ヲ刺戟拘攣セシムルノ致ス所ナリ。然ドモ加ルニ靈液虚耗コレニ抵當スルコト能ハザルノ因ヲ併テ。而シテコレヲ發シ来ルナリ。嘔吐。下利赤利。乳糜利。殘泄。失血等甚シク。或ハ吐下劑ヲ過用シテ頻ニ滋養液ヲ已奪シテ靈液ヲ損乏シ。因テ白脈拘急スルヨリ發シ来ルアリ。壊疽。及内部創傷。中ニ就テ短肋或ハ劍状柔骨ノ損傷。及頭蓋骨ノ打撲創傷ニ於テコレヲ發スル若クハ截切法ヲ施スニ由テ来ルモ。亦是靈液虚憊。白脈畏縮スルノ致ス所。皆死徴ナリ。

○治法。食物硬泥。風氣急張。或ハ冷物ヲ食ヒ。寒氣ニ中ルヨリ發スル者ハ。醇酒。或ハ燒酒。或ハ丁香油。一滴二滴或ハ茴香。藿香。香橙。薄荷等ノ露水ヲ與フベシ。若シ寧急甚者ハ忽チ弗蒲鎮痛液十滴ヨリ近ヲ砂糖湯ニ和シ與フベシ。但寒氣ニ中ル者ハ。外ヲ温熨強壮ノ香油ヲ胃部ニ塗リ。或ハ膏藥ヲ貼スルモ亦良。蛔蟲。或ハ便祕ヨリ發スル者

ハ適宜ノ下劑ニ宜シ。中毒ニ因ル者ハ。油及乳汁ヲ與テコレヲ和シ。且吐スルニ宜シ。藥毒ニ中リ。或ハ粘液。膽液及諸惡液留滯ノ候アル者モ。亦コレヲ吐スベシ。（吐根散宜シ）胃ノ粘滑液ヲ奪去セラルヽ者ハ。粘滑滋潤ノ劑ヲ與フベシ。裏膜ヲ剝脫セラルヽ者ハ。粘滑愈創ノ劑ニ宜シ。〇熱病及諸癰腫等ニ蕃發スル者ハ。龍消散ヲ蕃用スベシ。或ハ甘消石精二三滴麥酒一盃ニ和シ與フルモ亦良。癰腫ハ更ニ乳汁蒸湯法ヲ各其部ニ施スベシ。〇諸般ノ脫泄ヨリ來ル者ハ。健補滋養劑ニ宜シ。寒熱壞疽ニ蕃發スルハ。幾那加防腐劑ニ宜

ン。内部創傷。及截切法ヲ施スニ因ル者。及諸呃逆止ミガタキ者ハ。麝香煉コレヲ主ル。（諸藥劑總テ泰西方鑑ニ集載ス採用スベシ）

胃痛第四十二　并胃癰腫

胃痛之近因。胃中有害物攪亂所在使白脈拘急也。或上迫于胃口甚則牽引乎胃管而連及乎心部也。其遠因大率同乎嘈雜及嘔吐而一等劇烈者蓋亦攝生不良而食物鬱滯若生酸液黏液腐敗液蛔蟲風氣等或膽液變壞或諸病毒浸淫或胃熱病或經閉痔血閉或子宮病脾病肝病石淋兼發者等也若夫胃癰腫者疼痛尤甚且有盛

熱傍來也。或成潰瘍。或變硬腫者。皆其痛劇且連綿不休。最為難證也。

胃痛ハ心下刺痛。心腹痛。胃脘痛ナド稱スル者皆是ニシテ。其證胸下ヨリ心部ニ連テ疼痛シ。甚キ者ハ上突急迫シテ呼吸短促シ。四肢厥冷シ。冷汗絞出スル ニ至ル。蓋胃痛ノ心心部ニ連及スルコトアル者ハ。胃ノ白脈ハ胃管ヨリ連屬シテ。共ニ循胸白脈ノ管領スル所ナルガ故ナリ。又其痛輕微ナルハ。唯胃膜ノ細支白脈ノミ攣急シテ。胃ノ全質ガ繆綣スルガ如ク。覺ヘ痛ム處低キ者ナリ。俗言ノウチウ子痛ト云ヲ是ナリ。其レガ漸ク強ナレバ。則其本ニ。逼テ胃ノ上面ヨリ胃口及胃管ニ至ルナリ。胃ノ白脈叢ハ。上面ニ在テ而シテ胃口ノ周圍ニ白脈ヲ布クコト最多シ。故ニ痛必コヽニ徹スルコトヲ覺ルコヽニ至レバ胃ノ全體ヲ引絞リテ狹窄ナラシメ。且上方ニ引擧テ。其半ハ胸骨内ニ迫入シ。胸下ハ石ノ如ク堅硬ナルモノナリ。然ドモ其毒甚多カラズ。胃機ナホ其常ヲ失フニ至ラズシテ。コレヲ順下シテ泄瀉セントシ。欲ル者ハ。先ウチウ子ト痛テ。而シテ下ロニ促リ。胃ノ右方ヨリ漸ク腸部ニ往キ雷鳴シ下ルヲ覺フルモノナリ　其遠因ハ本文ニ謂ヘル所ノ如ク。大率嘈雜。噯氣。呑酸。惡心。嘔吐等ヲ發スルニ同レキガ故ニ。東賊胃弱ニシテ日常右等ノ證ヲ患ル人ハ。亦必毎時胃痛ヲ兼發シ來ルモノナリ。又其毒ノ區別ヲ知ルニ。

食滞ハ必其以前食ノ所ノ多キカ。若クハ化シ難キ物カト言フヲ聞テコレヲ察シ。酸液ヲ生ズルハ。面色滲淡灰白。或ハ呑酸スルヲ以テ知リ。粘液ヲ生ズルハ。其以前必心下鬱閉冷重スルヲ以テ推シ。風氣ヲ生ズルハ。其噯氣放屁ヲ發シテ微快ヲ覺ルヲ以テ別ツ。腐敗液蛔蟲。膳液變壞。各其徴アリ。前後諸篇ヲ通考シテコレヲ詳ニスベシ。若夫中毒ノ胃痛ハ尤劇烈ニシテ堪ヘ難ク。甚キ者ハ胃ノ裏膜剝脱赤爛スルニ到ル。諸病毒浸淫ヨリ来ル者ハ。第一寒氣迫入スル者ハ毎時卒然トシテ發ス。邦俗所謂ヒヘハラ是ナリ。痛風四肢ノ痛ミ俄ニ止ミ胃ニ内陷シテ劇痛ヲ發スルコトアリ。壞血様ノ病毒アル人。胃部ノ脈絡ニ鬱滞シテ胃痛ヲ發スルコトアリ。動スレバ癇癪様ノ病ヲ患ル人。其病毒ガ胃ノ白脈ニ侵入シテ斃スル者アリ。此等ハ皆其毒胃中ニ在ルニ非ズ。而シテ胃ノ體質ニ在ルナリ。故ニ其拘攣スルコト尤甚シク。自ラ前證ト區別スル所アリ。邦俗所謂サシコミナル者是ナリ。又熱毒胃ニ入テ疼痛スルアリ。胃中鬱毒アリテ斃熱スル者アリ。此ヲ胃熱病ト謂フ。此亦時時胃熱ヲ兼發スルモノナリ。此二證ハ熱病篇ト參考スベシ。又諸通血閉留シ。門

脈及腹部ノ諸脈ニ鬱滞シ。胃ニ迫テ癰痛スルアリ。子宮病（此證ニハ其部痙攣衝逆スルヨリ脾病等ニ其災ヲ胃ニ轉移シ来ルモノアリ）脾病等ニ無發スルモ。亦皆搆血留滞スルヨリ来ル。俗ノ所謂血積是ナリ。又肝。脾。或ハ腸間膜ニ硬結腫様ノ者ヲ生ジ。白脈及血脈ノ運行留滞スルヨリ。胃ニ連及シテ癰痛スルアリ。従来所謂五積六聚七癥八瘕ナド。皆此類ヲ誤リ認メ種種ノ名ヲ命ズル者ノミ。又石淋腎痛ニ於テ無發スルアリ。此亦白脈ノ連交スルヨリ来ルナリ。凡諸病毒浸淫。及無菌ノ諸證ハ。宜ク各病門ヲ參考シテ詳ニ其因證ヲ察シ知ルベキナリ。（凡寒氣迫入以下ノ因アル者。）

無菌ニ上文ノ諸因ヲ以スレバ。尤劇烈ナル痛ヲ發シ。且惡心嘔吐等ノ證ヲ兼ヲ見ハスコトアリ。然ドモ其因唯胃中ノ鬱滞毒ニヨルノミニ非ルトキハ。既ニ吐シ或ハ下シテ胃中潔浄スト雖モ。其痛ナホ休スルコトナク。且必其本病ノ證アリテ傍ヒ来ル者ナリ。宜ク意ヲ用テコレヲ察シ。誤治妄投ヲ致スコト勿ルベシ

○胃癰腫ノ候ハ。胃部硬滿シテ熱痛シ。其痛ミ處ヲ定テ動カズ。（猶外部腫物ヲ生ズルガ如ト一般ナルガ故ナリ）食スルゴトニ心痛ミヲ益シ。且多クハ嘔逆シテ容受セズ。煩悶大渇。呼吸不利。脈緊數ニシテ沉伏シ。病漸ク進ムトキハ乾嘔。呃逆。煩躁。不寐。顏色青白。四肢厥逆。或ハ冷汗出テ。或ハ昏暈シ。或ハ拘急搐搦シ。脈結代。或ハ築動不齊。診シ得ガタシ。若シ潰瘍ニ變ズル者ハ。痛ミ止テ快ヲ覺フレドモ。元氣頓ニ脫シテ不日

ニ死ヲ致ス。若硬結腫ニ變ズル者ハ。熱漸ク減ズレドモ痛ニ持久シテ止ズ。終ニ死ニ陷スルナリ。

○凡胃痛ニ劇キ吐下。失氣昏冒等ヲ數〻發シ。厥逆搐搦ヲ兼ルハ大危證ナリ。又胃痛ニ熱ヲ兼ルハ。往往惡徵ナルヲ見ル。又數〻胃痛及腸痛ヲ發シ。腸鳴噯氣ヲ兼ル者ハ。動スレバ輒チ皷脹ヲ發スルコトアリ。胃及近傍諸藏ニ硬塊ヲ生ジテ胃痛シ。コレガ消散セザル者ハ。遂ニ不治ノ水腫ニ陷スルコトアリ。解剖家ノ說ニ。劇キ胃痛ニテ死セル者ヲ解觀セシニ。胃口ニ腫瘍潰瘍ヲ生ジ。或ハ胃内ニ黃或ハ綠色ノ膿液。或ハ黑膿液アリ。

或ハ結石。或ハ膜樣ノ瘤アリ。或ハ叢胞。或ハ腸間膜。或ハ肝藏等ニ硬結腫アリト謂ヘリ。

○治法。停食。或ハ腐敗液等ノ胃中ニ在ルアリテ。腐臭ヲ噯シ。惡心ヲ催シテ。而シテ胃痛スル者ハ。コレヲ吐セシムベシ。吐根散コレヲ主ル。或ハ吐酒石ヲ與ルモ亦可ナリ。既ニ吐シテ尚愈ザル者ハ。大黃。或ハ酒石皮等ヲ用テ和ニコシヲ下セシ。腐敗酷厲ノ膿液アルヨリ来ル者ハ。石梅接骨飴コレヲ主ル。悍烈鹽液アルヨリ来ル者ハ。甘消石精ヲ與フベシ。或ハ酪清大麥煎等ニ多ノ酸味果汁ヲ加ヘ與ルモ亦可ナリ。酸敗液アル前方ヲ與ルモ亦可ナリ。

ルヨリ来ル者ハ。牡蠣散。蝋蛄散。麻倻涅シ失亞等ニ大黄ヲ加（與ヘベシ。邦俗所謂ル留飲痛ト云ル者多クハ是ナリ）粘液アルヨリ来ル者ハ。将王散コレヲ主ル。終リニ野菊煎。橙皮末等ヲ用テ收功スベシ」風氣痞滞ヨリ来ル者ハ。茴香酒。桂露。緑礬湛等ニ宜シ」凡大便祕閉スル者ハ。澁導方。或ハ緩下劑ヲ用テコレヲ通ズベシ」胃弱ニシテ數。胃痛ヲ發スル者ハ。發作時應用藥劑ヲ投シテコレヲ治シ。閒時ハ前ノ諸篇ヲ通考シテ。隨證健胃劑ヲ與テ全功ヲ收ムベキナリ。○中毒ノ治ハ。嘔吐篇ニ出ヅ。蛔蟲ノ治ハ。本條ニ由ルベシ。○中寒胃痛。惡心嘔氣アル者ハ。停食ヲ

蒸ル十リ。宜ク先コレヲ吐セシムベシ。吐根散。或ハ苦味健胃浸ニ宜シ。吐盡テ後芳香温煖ノ健胃劑コレヲ主ル。（藿香。肉桂。薄荷。木香。肉豆蔻。茴香。香橙。宿砂。山奈。良薑等）○壞血様ノ病毒ヨリ来ル者ハ。酸蘆醇コレヲ主ル。○痛風毒内陷ヨリ来ル者ハ。醇酒。燒酎等ニ宜シ。麝香少ヲ加テ益佳ナリ。若嘔氣アル者ハ。宜ク先コレヲ促スベシ。○屢ク搐搦痙攣ヲ患ル人。及軟弱ノ婦人。數。胃痛ヲ發スル者ハ。忽チ滿。鎮痛液ニ宜シ。○諸通血閉止ヨリ来ル者ハ。刺絡術ニ宜シ。次ニ和性下劑ヲ用テコレヲ下セ。婦人經止テ後數。胃痛スル者ハ。肘脚等ニ呼膿法ヲ施スベシ。○胃及近傍

諸藏ノ硬結ヨリ来ル者中ニハ甚小ニシテ深ク沈ミ知レ難キアリ。ヨク按撫シテコレヲ認メ得ベシ。休作時ナク持續シテ愈ガタシ。先牛香湯或ハ芩苣開壅湯ヲ與ヘ。石鹼丸。覇王鹽等ヲ兼用シ。更ニ軟和蒸湯法。或ハ塗藥等ヲ施シ。且時時按腹摩擦シ。又騎馬乘車。或ハ緩歩逍遥シテ血液ノ運行ヲ調和スベシ。則愈ニ。○凡胃痛。胃腸ニ留滯物ナクシテ。頑固愈ヘ難キ者ハ。阿片醇コレヲ主ル。桂露。或ハ他ノ芳香藥湯ヲ用テ和シ服スベシ。又他病ニ兼発スル者ハ。各本病ト互考シテコレヲ治スベシ。○胃癰腫ハ。速ニ刺絡シテ其人微暈ヲ鼓スルニ至ルベシ。外軟化藥湯ヲ用テ胃部ヲ蒸シ。或ハ鼓疱膏ヲ貼シ。又時時脚湯ヲ施シ。蹠ニ温性糊劑ヲ貼シ。亞麻油。阿利ブ機油等ヲ大麥水ニ和シテ導尿道方トシ。數。コンヲ施シ。次ニ大麥煎ニ潔淨消石三五釐ヲ和シテ時ニコレヲ與ヘ。間ニ亦乳酪清。甘草。蜀葵。粘魚須等ノ湯劑ヲ作リ與フベシ。若吐止ザル者ニハ。時ニ清和飲。或ハ緩瀉和調劑ヲ一七ヅヽ用フベシ。但此證ハ内服劑ヲ用ルニ微微順調シテコレヲ服セシメ。以テ嘔吐ヲ促サヾルヲ要ス。他ノ治法ハ肝癰腫門ト通用スベシ。諸藥劑總テ泰西方鎚ニ集載ス撰用スベシ

腹痛第四十三　并腸癰腫

腹痛之近因。厚腸薄腸腸間膜等。白脈攣急也。其遠因。自攝生不良。食物不好。以生酸液。黏液。蛔蟲。風氣等。來亦猶胃痛一般。或酷厲膽液。或痙攣拘急。或冒寒傷冷。熱毒浸淫。或稠血聚滯。脾病。子宮病。腎痛。兼發等。亦復然。但異乎其毒之所著已。特白脈衰弱。或大便祕結。或感金石毒。或泄瀉痢疾後。疼痛者。則胃痛之所無也。又腸癰腫疼痛者。所謂腸癰之初證。而人略知其趣者。不須敢辨之。然亦有其所裘不一。或終不能下膿者。則復不無所以生惑也。學者詳焉。

腹痛ノ起原ハ厚大薄小二腸ニ亙リテ所在ヲ定ムベカラズト雖モ。攝生不良以下。酷厲膽液以上ノ因ヨリ来ル者ハ。大抵薄腸ニ在リ。大小二腸ハ一連四襲ノ長膜管ニシテ。上ハ胃ノ下口ニ接シ。下ハ肛門ニ至ル。然ドモ其部位ニ由テ差形状主用ヲ殊ニスルヲ以テ。コレヲ別テ六部トス。第一部ヲ十二指腸ト謂フ。胃ノ糜爛スル所ノ食ヲ承テ以テ乳糜ヲ釀熟スルコトヲ主ル。膽液。叢胞液共ニ茲ニ入ル。第二部ヲ空腸ト謂フ。精粹ノ液ハコレヲ下部ニ送リ。粗滓ハコレヲ輸シ。空虚ノ時多キヲ以テ名ル。第三部ヲ回腸ト謂フ。此部最長ク轉回重疊スルガ故ニ名ク。釀化ノ功茲ニ終成シテ。滓屎全成テ下ニ傳フ。以上三部ヲ小腸トシ。又薄腸トス。其膜薄ク其管狭キヲ以ナリ。第四部ヲ首腸ト謂ヒ。第五部ヲ縮腸ト謂フ。其終末ハ即肛門ナリ。此三部ヲ大腸トシ。又厚腸トス。其膜厚ク其管太キヲ以テナリ。皆コレ滓屎ヲ傳送スルヲ以テ用トス。其長ヲ度ルニ小腸ハ其七

ニ居リ。大腸ハ其三ニ居ル。其位ス ル呼小腸ハ大半前ノ下部ニ在リ。大腸ハ後底ノ上部ニ在ルコト多シ。

其大體ヲ領知シテ。而シテ後然ドモ亦細ニ其情狀診腹ノ術ニ從事スベキノミ

ヲ區別スルニ。食傷ニ因ル者。胃ニ在テハ其コレヲ糜爛スルコト能ハズシテ。停滯スル者ナルガ故ニ。未タ其形狀ヲ失ハザル者多シ。既ニ腸ニ至テハ則大抵糜爛シテ。而シテ腐敗（所謂腐敗乳糜スル者ナリ。而シテ其痛ミヲ發スル處ハ。則薄腸ノ初次ニ在リ。酸敗液モ亦同シ。又其痛ミヲ裝スルノ狀ハ。其腐壞。若ハ酸敗セル酷厲ノ氣ヲ以テ。腸白脈。及腸間膜ノ白脈ヲ刺戟攣急シテ絞ルガ如クニシテ。而シテ冷痛スルナリ」。粘液ハ薄腸ノ

裏面。吸收管ノ口。（乳糜脈ノ若クハ乳糜脈。腸間膜ノ沙胞ニ瘵滯シ。以テ諸液ノ流行ヲ妨ゲ。痞滿膨脹シテ冷痛スルナリ」。蛔蟲ハ其居ル處ニ隨テ咬傷シ。呀在ヲ定ムベカラザルナリ。然ドモ諸腸殊ニ拘攣スル者ハ。組縢蟲ヨリ來ル者多シ。尚本篇ト參考スベシ」。風氣ハ諸腸痛コレヲ兼ル者多シ。其故何ゾヤ。蓋シ腸ハ飲食ヲ烹熟シテ乳糜ヲ釀成スルノ官舍ニシテ。而シテ物ノ烹釀スルヤ。必箇ノ風氣ヲ生セザルハナキガ故ニ。其拘攣掣急スルニ當テ。腸ノ膵理ヲ緊急閉合シテ以テコレヲ漏泄セザレバ。則已ムコトヲ得ズコレ

ニ鬱滞ノ患ヲ将出シ来ルアリ。又物ノ腐壊スルモ。亦同ク風氣ヲ生ジ。（酸敗液。腐敗脂膏等ヲ因トスル者皆コヽニ屬ス）又空嚢状ノ物（腸形ヲ屬ス）ヲ牽攣縮張スレバ。則嚢篇ノ機ヲ作シテ自然ニ風氣ヲ生ズル者（諸腸痛皆此機アリ。中ニ就ク）瘤様ノ病。及子宮衝逆病。脾病ナルガ故ナリ。然ドモ此等ハ皆其因彼ニ在テ此ニ在ラズ。風氣ヲ以テ主トシ論ズベカラズ。但夫ノ乾食ヲ食テ多ク津唾ヲ費シ。急ニ烹醸沸泡シテ夥ク風氣ヲ生ズル食品（餅并ニ諸粘膠ノ品麺ナリ）及珠ニ風氣ヲ生ズル食品（饂飩并ニ諸薯蕷汁。納豆汁。及諸豆。芋。ヲ用ノ如キ）ヨリ来ル者ハ。則コレ風氣吹張シテ以テ攣痛ヲ作サシムルナリ。宜ノコレヲ以テ治術ノ標的トスベシ。蓋風氣ノ生ズル壊液様ノ腐壊毒ノ脈絡ニ鬱滞シテ発スル者。及瘤癭拘急ノ為ニ発スルガ如キ。其始甚精微ノ風氣ニシテ其痛ヲ発スルコト峻烈ナルガ。時ヲ歴ルニ従テ腸間ニ在ル所ノ飲食ノ穢氣。及温煖氣カ穢氣ニ比スルニ。初生ノ風氣ハ。猶高山峻嶺ノ氣ノ如ク。則萬物ノ氣穢合シテ漸ノ粗大ニ為リテ。而シテ痛モ亦漸ノ緩解シ。遂ニ噯屁ノ天地間ノ氣ヲ発セザレバ則止ムザル者ハ。其痛倏忽トシテ来去シ。遷移シテ処ヲ定メズ。常テ癇疾アル人。及脾病。子宮病等アル者ニ於テ「瘤様ノ運動ヲ腸ニ鼓ヲ発セザレバ則止ムザルナリ」

コレヲ得ルナリ」冬時ノ寒氣ヲ冒シ。或ハ夏日冷水ヲ過飲スルヨリ来ルモ。亦其痛速ニ来リ速ニ去リ。且コレヲ按シテ痛ヲ増ス。又其部位ハ大抵臍傍ニ在リ。熱毒浸淫。稠血聚滞。或ハ壊血毒。或ハ腎痛ニ兼發スル者等ハ。胃痛。及各病本篇ヲ照シテコレヲ知ルベシ。煩クコヽニ贅セズ。蓋世間疝痛ト稱スル者。多ハ是稠血留滞ノ腸痛ナリ。然ドモ壮年ノ人ハ多血ニ屬シ。衰老ノ人ハ涸血ニ屬ス。知ラズンバアルベカラズ。（又粘液痛。痙攣痛。疽腫痛。或ハ大便祕痛モ亦皆混シテ疝痛トスル者アリ。因テ以テ大抵類似ノ方ヲ以テコレヲ治ントス。宜ナリ其功ヲ得難キコト大便祕結ヨリ来ルハ。縮腸ノ部位ニ當テ

痛ミ。且其人多日快通ヲ得ザルト。其累累然トシテ重積スルトヲ以テ知ルベシ。金石毒ニ感ズトハ。鉛粉。水銀。信石等ヲ扱フコトヲ業トスル人ニ於テ。頑固ノ腸痛ヲ得ル者是ナリ。然ドモ時ニハ藥食ノ中ヨリコレヲ得ルモ亦コレアリ。其證先ヅ胃傍。或ハ臍部ニ起リ。其初ハ勢鈍クシテ。久クモ續カズ。漸ノ劇ナリ且久續シ。其人食氣ヲ失ヒ。且噯氣ヲ發シ。又嘔シ。大便通ジガタク。腹絞急シテ背ニ着クガ如ク。後ニハ臍及肛モ内ニ引入レ。羸瘦漸ノ甚ク。終ニハ四肢殊ニ上肢麻痺スルナリ。（此證或ハ半熟ノ葡萄酒ノ如キ泡沸スル飲食。或ハ生果ヲ食フヨリモホコヽヲ發スト謂ヘリ○又按ルニ癇痙様ノ病ヨ

リ發スル腸痛。及稠血聚滯ヨリ来ル腸痛。共ニ動モスレバ輒チ四肢不遂運動シ難キ證ニ轉ズルアリ。又痛風流注痛ノ如キ四肢ニ在リシ酷毒ガ轉ジテ。腸痛トナルモ亦多シ。是他ナシ腹部ヲ循ル白脈ニハ。循表白脈ノ枝ヲ夥ク別チ與ヘテ。相交通スルノ甚親キヲ以ナリ。

其前病ノ腸内ニ在リシ毒物ヲ絞出セシ機勢ガ留殘スル者ニシテ。必裏急後重ノ状ヲ兼ルモノナリ。復コレヲ雜ズルコトヲ須ズ。○腸癰腫ノ候ハ。他諸癰腫ト同ク。盛熱劇痛シテ而シテ動セス。些モコレヲ按スベカラズ。舌乾胎白。大渴。便祕。尿赤短少。脈緊ニシテ數ナリ。若愈ザレバ則潰瘍トナル。所謂腸癰ナリ。

其發スル處。腸ノ内面ニ於スル者ハ。則終ニ膿汁ヲ下スニ至ルト雖モ。若外面ニ向テ潰破シ。膿汁腹腔ノ間ニ出レバ。則コレヲ泄除スルノ道ナク。遂ニ勞瘵ニ陷入スルナリ。故ニ内部諸癰腫ハ。其初ニ於テ熟察シ。速ニコレヲ消散セシムルヲ要トス。

○凡腸痛一時頓發スル者ハ治シ易シ。經久ナルハ復シ難シ。又此病數發シテ而シテ風氣ヲ兼ル者ハ。動スレバ輒チ鼓脹ニ變ズ。凡寒痛ハ治シ易ク。熱痛ハ治シ難シ。殊ニ癰腫ハ若愈ザレハ則元氣遂ニ裏ヘ不寐。譫妄。呃逆。冷汗等ヲ發シ。終ニ昏睡シテ死ス。

○治法。酸液。粘液。風氣。腐敗乳糜。泡沸スル飲。化シ難キ

食苓ヨリ来ル者。若惡心嘔氣アラバ。先多ク微温湯ヲ與ヘテコレヲ吐セシメ。而シテ後麻倔涅刺亞。覇王鹽蝋蛄大黄散。將王散。若クハ瀉導劑等ヲ撰用シテ。和カニコレヲ下シ。滯物既ニ除テ痛尚休マザル者ハ。緩睡和調劑コレヲ主ル。定痛和調劑モ亦佳ナリ。若其滯積物甚多ラズ。風氣多クシテ雷鳴走痛スルハ。先ッ燒酒。或ハ杜松酒。茴香酒。橙皮精。野菊煎等ヲ與ヘテ其痛ヲ和シ。次ニ定痛利毒飲ヲ與ヘテコレヲ下セ。又凡テ寒痛ハ温湯。或ハ温石ヲ用テ腰腹ヲ蒸シ煖メテ良。脚湯モ亦佳ナリ。○腐敗膿液。腐敗脂膏等ヨリ来ル熱痛ハ。石梅接骨

飴酒石皮散等。或ハ阿片醇ヲ加フ。ヲ與ヘテコレヲ下シ。若嘔吐止ミガタキハ。鎮嘔飲。或ハ定吐飲ヲ兼用シ。或ハ適宜ノ瀉導劑ニ阿片醇ヲ加テコレヲ施シ。或ハ腹部ヲ温蒸シテ可ナリ。腸胃淨除シテ痛止マザル者ハ。安睡止痛ノ諸劑ヲ撰用ベシ。○攣急牽引ヨリ来ル者。及中寒傷冷胃濕等ヨリ来ル者ハ。阿片醇十二三滴ヲ桂露一盃ニ和シ服シテ良。或ハ接花錦葵浸。或ハ野菊煎等ヲ與ヘテ兼テ野菊煎亞麻油ヲ合匀シテ瀉導方トシ。或ハ定痛利毒飲ヲ與ヘテコレヲ下シ。外ガ苗香ヲ以テ薫シタル毛布ヲ用テ。腹部ヲ温包スベシ。若痛尚休マズンバ。二水雙

精飲。或ハ前ノ定痛緩睡ノ和調劑ヲ與フベシ。脾病。子宮病等ニ無發シテ。若シ嘔吐止マザル者ハ。大麥湯ヲ多ク與ヘテ快吐ヲ得セシメ。而シテ後一二說ノ所ノ方法ヲ施シ。痛稍和スル者ハ。阿魏丸。或ハ麝香醇ヲ取リ薄荷露ヲ用テ服セシムベシ。又足部寒濕ニ傷ルヽヨリ来ル者ハ。故ニ脚湯法ヲ無施スベシ。○熱毒浸淫。壞液病毒腎痛等ニ無發スル者ハ。治本病上ニ在リ。稠血聚滯ヨリ来ル者。酒客。及火壯多血家ナラバ。先刺絡シ。尋デ芒消各末抹シ度刺蜜湯ヲ與フベシ。老人凋血家ハ。寛痛滋養飲コレヲ主ル。頑固愈ガタキハ。忽弗滿鎭痛液コレヲ主ル。此藥ハ諸症頑固ノ疼痛皆ヨクコレヲ治ス。但腸胃欝滯物アラハコレヲ淨除シテ。而シテ後與フベシ。然ドモ諸熱アル者ニハ用フベカラス　又外ヨリ温湯。或ハ藥湯ヲ用テ腰腹ヲ温蒸スベシ甚良ナリ。又山蓄菜精モ亦ヨク粘血寒疝ヲ治ス。○白朮裹弱腸痛ヲ發スル者ハ。龍腦散ヲ白湯ニテ送下シ。或ハ幾那散五分ヲ酒ニテ服シ。或ハ朝夕ニ橙葉散五分ヲ用ルモ亦良效アリ。○大便硬結ヨリ来ル者ハ。軟化滌導方ヲ施シ。牛黄湯。或ハ蜀葵加蜜鹽湯ヲ與ヘ。和ニ按腹シテコレヲ下導スベシ。若尚快通ヲ得ザル者ハ。蜜石納那浸。或ハ將王散ヲ與フベシ。愈後再硬ヲ豫防シテ是可ナリ。○金石毒腸痛ハ。先

蜀葵加蜜鹽湯。或ハ蝌蚪大黄散。茉莉酒石散。蜜石旃那浸。四味覇王飲等ヲ與ヘ。緩和滌導方ヲ薦施スベシ。若效ナキ者ハ。麝香ヲ服セシメ。或ハ滌導方ニ加ヘ施スベシ。良驗アリ。鹼鹽滌導方。煙旃滌導方。薰煙法等ヲ施スモ亦良ナリ。此等ノ方法ニテ便通軟可ナルトキハ。則復前ニ擧ル緩和ナル劑ニ易ヘテ久用スベシ。若劇痛止ガタキ者ハ。緩睡和調劑。芙蓉扁桃油等ヲ與ノベシ。若痼證ヲ兼見ハサバ。直ニ鹿角精。硇砂精等ヲ脊椎上ニ塗擦スベシ。都テ一切堅硬。粘稠。膨脹。難化ノ食ヲ禁ズ。諸證畧退テ治ヲ希望スベキハ。纈草飲加橙皮嫁

糖。或ハ蔘甘湯ヲ久服セシムベシ。諸證痊テ唯痼證ヲ餘ス者ハ。硫黄湯ニ浴セシムベシ。或ハ越列吉的兒ヲ施スモ亦良ナリ。若不熟ノ生果ヲ食フヨリ来ル者ハ。先前ノ方法ヲ與ヘ。終ニ久クシテ三味蘡精煉ニ鼠婦帝列面丸ヲ兼用シテ收功スベシ。愈後常ニ大便ヲ順調シ。家業休シ難キ者ハ。毎早業ヲ執ル前ニ。牛酪。或ハ油類一二兩ヲ用ヒ。或ハ肥脂類ノ羹汁。喬麥。赤小豆等ヲ食ヒ。酸味ノ果。辛濃ノ飲ヲ禁ジテ豫防スベシ。

腸癰腫ハ。先ヅ刺絡術ヲ施シ。腹部ニ糊劑ヲ貼シ。或ハ發疱膏ヲ痛處ニ施シ。或ハ温蒸シ。或ハ脚湯法ヲ施シ。内服

劑ハ。大麥煎ニ消石及蜜醋練ヲ加ヘテ頻頻コレヲ與ヘ。毎一二時清凉泄導方ヲ施シ。或ハ薫烟法ヲ施シ。或ハ迄消飲ニ阿片醇ヲ加ヘテコレヲ與フ。若胃中ニ留滞物アルハ。掃腸丸ニ宜シ。若コレヲ施シテ通利ヲ得ズンハ。屢温湯ニ浴セレメテ佳ナリ。尚諸燃腫門ヲ通考スベシ。諸藥劑總テ泰西方鑑ニ集載スル所ニ採用スベシ

霍亂第四十四

霍亂之近因。腸胃有テ腐敗酷厲毒ヲ以攪亂所在。白脈不勝ヘ其虐害而劇寧急ニシテ自然良能ヲ以驅泄スル諸上下ニ也。其遠因ハ腐敗膽液。腐壞脂膏。或腐敗停食。或腐壞酷厲侵蝕毒物等也。若夫中暑中寒。情意急動。及肝脾叢胞腸間膜等ノ造成不完者亦為誘發其毒ヲ之因也。別有稱乾霍亂者。腸胃急痛。四肢厥冷等。同乎本病。而無吐下物。但泄風氣於上下已。其因諸生風氣之事件。是可參考前諸篇ヲ矣。

腸胃諸病因。大抵同軌一轍ニシテ。但其毒ノ多少。其性ノ寛猛。其純雑ノ差異。加ルニ各人稟賦ノ同カラザルヲ以テシテ。而シテ後發シテ輕重諸證ヲ見ハス。未。此病ノ如ク急迫猛烈十ル者ハアラス。以テ其毒ノ猛烈

過多ナルヲ知ルベシ。蓋此病其腸胃劇痛シテ而シテ吐下交ヲ以テ徴候トス。然ドモ其因同カラザルコトアルガ故ニ。其證モ差等ナキコト能ハズ。仍テコレヲ別テ三證トス。曰ク真。曰ク類。曰ク雑是ナリ。真證ノ因ハ即チ腐敗膿液ナリ。膿液ノ物タル。烈苦熱性。以テ飲食ヲ尅化スルノ資トナルモノニ非ズ。故ニ此液ヲ有スルノ過多重厚ナル者ナリ。故ニ此液ヲ有スル者ハ、必強壮勇猛ニシテ。而シテ動モスレハ輒チ熾盛熱ニ罹ルモノナリ。夫レ然ルガ故ニ此液若腐壊スルトキハ。必猛烈強暴ノ病ヲ發ス。此ニ至テハ則其多火稍拘ラズニ蓋其腐壊セル所ノ膿液ガ靜脈ヨリ傳ヘテ血中ニ入レバ。則惡性腐敗熱ヲ發シ。若膽管ヨリ總管ニ傳テ腸胃ニ入レバ。則此病ヲ發スルナリ。蓋此兩道共ニ肝膽ニ交通スル者故ニ。何レヘ傳ルニモセヨ。其一方ヘモ亦多少浸潤セザルコトヲ得ズ故ニ惡性熱ニハ必惡心ヲ兼ネ。此病ニハ必發熱身痛ヲ兼ヌ　此證ハ大率六七月ノ交。炎熱蒸暑ノ時ニ當テ。血門脈中ニ鬱滯腐敗スルコトアレバ。則腐敗セル膿液ヲ醸シ。以テ此病ノ原ヲナスナリ。若コレヲ救フノ速ナラザレバ。則必日ヲ出ズシテ死スルニ至ル。諸證ノ中。唯此證ヲ危險トス。類證ノ因ハ。即腐敗脂膏ナリ。是其膏粱美味ヲ貪リ。重滞腐敗スルニ係ル。其他生冷粘滑難化ノ食品ヲ食フテ。重滞

腐敗スル者モ。亦同證ヲ發スルコトアリ。此二因ノ者ハ。其鬱滯スル所ノ者ヲ吐下シ盡セバ則愈。以テ眞證ニ別ツ所ナリ。第其中腐敗脂膏ニ因ル者ハ。則其證劇烈。殆ト真證ニ同シト雖モ。他ノ食滯ニ因ル者ハ。則稍輕シ。是亦類證中ノ區別ナリ。棄證ハ。右ノ諸因無クシテ。而シテ腹痛吐下スル者ヲ謂フ。其因ハ他ノ諸ノ腐敗液。或ハ酷厲膿液。此唯其性ノ過烈ナルノミニシテ。其實イヤダ腐敗セザル者ヲ指ス。此樣ノ人ハ屢劇カラザル腹痛吐下ヲ發スル者ナリ。或ハ悍烈鹽液。或有毒ノ品ヲ食フ者。或ハ他病アリテ其毒ガ腸胃ニ浸淫シ。或ハ近傍ノ諸藏造成惡キ等ヨリ。腹痛吐下ヲ將出シ來モノ是ナリ。蓋真類二證ハ。其痛ヲ發スルコト。大率臍圍ニ起ル。祿證ハ必シモ然ラズ。而シテ其證モ亦自ラ輕重差等アリ。又誘發ノ因。中暑ハ多ク真證ヲ將出シ。中寒ハ多ク類證ヲ將出シ。情意ノ急動ハ。大抵祿證ノ酷厲膿液ノ證ヲ將出シ。肝脾等ノ造成惡キ者ハ。時ニ隨テ何レノ證ヲモ將出シ來モノナリ。若夫乾霍亂ノ因ハ。則諸ノ風氣ヲ生スル食物。烹釀沸溢スル飲液ヲ用ル等ヨリ來。前ノ諸篇ヲ通考シテコレヲ知ルベシ。又吐セント欲シテ吐スルコトヲ得ズ。乾霍亂ニ似タル者アリ。誤認ベカラズ。說嘔吐篇ニ由リ參考スベシ解剖家ノ說ニ。數

回真證ニテ死シタル者ヲ解觀セシニ。肝。脾。腎。腸間膜ノ造成惡ク。又結石。硬結。及潰瘍等アル者アリ。又總テ膽管甚廣闊弛引シ。胃腸ニ夥ノ膽液アリ。糞證ニハ胃及腸ニ酷厲惡臭ノ液アリテ。磨鐵ニ觸レバ忽黒色ヲナシ。且腸中ニ風氣充滿セル者アリト云

○治法。真證ハ。先ツ輕吐劑ヲ與ヘ。更ニ酪清大麥水雌雞羹（或ハ雛羹）ノ如キ稀液（或ハ蔴薏等ノ藥品ヲ加ルモ亦良）ヲ用テ吐シ易カラシメ。且清緩瀉導方（或ハ前ニ云飴液類ヲ用フ）ヲ施シ。尋テ雙龍鹿黄和調劑。或ハ苓虎接骨湯ヲ投シ。適宜ニ導泄スベシ。姿ニ強キ吐下劑ヲ與ヘテ元氣ヲ伐ナ。或ハ熱藥ヲ投シテ其毒ヲ資ベカラズ。其吐下スル所ヲ察テ腐敗物既ク盡キタルヲ知ラバ。則藿桂醫煉和調劑ヲ與ヘ。或ハ石鹽清凉飲。酸瑰清凉飲等ニ阿片醉十滴許ヲ加ヘ。コレヲ與ヘテ以テ鎮靜スベシ。（或ハ麥餅煎。蝋蛤石。白堊。赤石脂等モ亦良）○類證。腐敗脂膏ヨリ發スル者ハ。初メ真證ト同ク救療スベシ。他ノ食滯ヨリ来ル者ハ。稍強キ吐下劑ヲ與フベシ。若其吐下物ニ酸氣アルハ。吐王散。吐下散ノ類ニ宜シ。又二證トモ緩和瀉導方ヲ兼用シ。腹部ヲ温蒸シテ良ナリ。吐下已テ後。適宜ノ健胃劑ニ阿片醉ヲ加ヘテコレヲ與フ。○真類トモニ脈緩弱虚候アル者ハ。

桂露ニ阿片酊十滴ヨリ二十滴ニ至ヲ加テコレヲ與フベシ。好酒ノモト佳

四肢微冷スル者ハ。温湯ヲ用テコレヲ温ムベシ。

愈後久ク食養ヲ愼ムベシ。阿片酊少ヅヽヲ用ヒ。又幾那酊ヲ飲ムベシ。レノテ良ナリ。○雜證ハ。各其毒性ヲ診別シ。随宜救療スベシ。乾霍亂ハ。破氣驅風劑合鎮痙劑ニ宜シ。

共ニ前後諸篇ヲ通考セバ。則其從フ所ヲ知ラン。諸藥劑ハ總テ泰西方鑑ニ集載スル所ニ採用スベシ

病因精義卷之八 終