





L. Steiner 1878



Слово о Праведном
Бояне Касьяне

Литургия

Слово о Праведном

Бояне Касьяне

Слово о Праведном Бояне Касьяне

Литургия

Слово о Праведном Бояне Касьяне

ZOOLOGISCHE
BEYTRÄGE
ZUR
XIIIL AUSGABE
DES LINNEISCHEN
NATURSYSTEMS
VON
JOHANN AUGUST DONNDORFF.

ZWEYTN BANDES ZWEYTER THEIL
HÜHNER- UND SPERLINGSARTIGE VÖGEL.

L e i p z i g,
in der Weidmannischen Buchhandlung.

1795.

ORNITHOLOGISCHE
BEYTRÄGE
ZUR
XIII. AUSGABE
DES LINNEISCHEN
NATURSYSTEMS

VON
JOHANN AUGUST DONNDORFF.

B. II. ff



ZWEYTER BAND

HÜHNER- UND SPERLINGSARTIGE VÖGEL.

KGL.CHR.ACAD.

Leipzig,

in der Weidmannischen Buchhandlung.

1795.

LIBRARIES

САДУ

СИДЕЛИ

БЫЛО ВРЕМЯ

QL
352
D66
1792
Bd.2, T.3
SCNHRB



F Ü N F T E O R D N U N G

GALLINAE. (*Hühnerartige Vögel.*)

95. GESCHLECHT. OTIS. *Der Trappe.*

Müller, Natursyst. II. p. 441. Gen. XCV.

Leske, Naturgesch. p. 218. Gen. II.

Borowsky, Thierreich III. p. 114. Gen. LIX.

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 207. Gen. XLVIII.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 453. Gen. LIV.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 277. Gen. XXXIII.

Halle, Vögel, p. 94. Gen. III.

Neuer Schaupl. d. Nat. IX. p. 107.

Onomat. hist. nat. V. p. 815.

Klein, av. p. 17. Gen. III.

Briffon, ornith. II. p. 216. Gen. LXVI.

Batsch, Thiere, I. p. 402. Gen. CIV.

Latham, Syst. ornith. II. p. 658. Gen. LIX.

Hermann, tab. affin. anim. p. 138.

Donndorff, Handb. d. Thiergeesch. p. 313. Gen. LXI.

I. T A R D A. *Der gemeine Trappe.* (1)

Müller, Natursyst. II. p. 441. n. i. *der Trappe.*

Leske, Naturgesch. II. p. 218. n. i. *der gemeine Trappe.*

Borowsky,

(1) Flügelweite 6. Fuß. - Gewicht an 30 Pfund. Ein scheuer, furchtsamer und vorsichtiger Vogel. Außer einem dumpfen Knurren und Brummen im Zorn, und zur Falzzeit, hört man

Borowsky, Thierreich, III. p. 115. n. 1. *der Trappe.*

Tab. 59.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 208. n. 1. Otis (Tarda) maris capite iuguloque utrinque crista-to; *der Trappe.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 454. n. 1. *der große Trappe.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 278. n. 1. *der große Trappe*, p. 288. *gemeiner Trappe*; *Trappgans*; *Ackertrappe*.

Funke, Naturgesch. I. p. 284. *der Trappe.*

Ebert, Naturl. II. p. 104. *der gemeine Trappe.*

Halle, Vögel, p. 94. n. 4. *die gemeine Trappe.*
Fig. 3.

Meyer, Thiere, I. p. 19. Tab. 18. 19.

Beckmann, Naturhist. p. 48. n. 5. *der Trappe.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 299. ad n. 102. *der große Trappe.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 181. n. 170. *die Trappe.*

Neuer Schaupl. d. Nat. IX. p. 107. *Trappe.*

Onomat. hist. nat. V. p. 819. *die gemeine Trappe.*

Handb. der Naturgesch. II. p. 43. *die Trappe.*

Handb. d. deutsch. Thiergeisch. p. 113. *der Trappe.*

Klein, av. p. 18. n. 1. Tarda simpliciter.

Klein, Vorbereit. p. 33. n. 1. *Ackertrappe oder Trappgans.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 18. n. 1. *Ackertrappe.*

Klein,

keine Stimme von ihm. Lebt bis zur Falzzeit, die gegen das Ende des März fällt, in Gesellschaft, dann aber beißen die Männchen einander ab, und jeder sucht sich zum Besitzer von 2. bis zu 6. Hennen zu machen. In Deutschland sind die Trappen nicht Zug-, sondern höchstens Strichvögel, denn man findet sie zu allen Jahreszeiten. Das Weibchen brütet 30 Tage, verlässt aber die Eyer, so bald sie ein Mensch beiüft hat. Die Hähne bekommen erst nach dem ersten Mausern die Bartfedern.



- Klein*, stemmat. av. p. 3 tab. 2. fig. 1—3.
Klein, Vögeleyer, p. 16. tab. 3, fig. 1.
Brisson, ornith. II. p. 216. n. 1. Outarde.
Büffon, Vögel, III. p. 5. der Trappe, m. e. Fig.
Gesner, Vögelb. p. 221. Trappe. fig. p. 222.
Batsch, Thiere, I. p. 403. der gemeine Trappe.
Latham, Syst. ornith. II. p. 658. n. 1. Otis (Tarda) nigro rufoque undulato-maculata. subtus albida, capite (maris) iuguloque utrinque crista.
Seligmann, Vögel, III. Tab. 41. der Trapphahn.
Seligmann, Vögel, III. Tab. 43. die Trappheune.
Frisch, Vögel, Suppl. p. 106. der Trapphahn.
 Tab. 106 ist ein altes Weibchen.
Siemßen, meklenb. Vögel, p. 51 n. 1. der gemeine Trappe.
Bock, N. G. von Preuß. IV. p. 367. der Trappe.
Fischer, Livil. p. 88. n. 117. Ackertrappe.
Taube, Slavon. p. 22. Trappen.
Leem, Finn. p. 130 ** Trappen.
Pallas, Reis. III. p. 220. Trappe.
Rytschkow, orenb. Topogr. p. 243. Drachwa,
 Dudak, Tudak.
Lepethin, Tageb. d. russ. Reis. I. p. 309. Trappen.
Pallas, nord. Beytr. III. p. 16. die Trappen.
Pennant, britt. Zool. (von Murr) p. 91. tab. 43.
Günther, Nest. u. Ey. tab. 43.
Perrault, Charras u. Dodart, Abh. a. d. N. G.
 II. p. 45. anatomische Beschreib. von 6. Trappen. tab. 52. der Trappe. tab. 53. die Zergliederung.
Naturforsch. XIII. p. 221. n. 137. der Trappe.
Grillo: *Naturforsch.* XXII. p. 130. Trappe.
Götz, Naturgesch. einig. Vögel, p. 25. der Trappe.
Döbel, Jägerprakt. I. p. 46. Trappe.
Naumann, Vogelsteller, p. 174. Trappe.

- Anweis. Vögel zu fang. p. 561. *der Trappe.*
 Oekonom. Zool. p. 79. n. 21. *der gemeine Trappe.*
 Beckmann, Beschr. d. Kurmark, I. p. 809.
Eberhard, Thiergesch. p. 109. *der Trappe.*
Göze, Nat. Menschenl. u. Vorseh. V. p. 531. *der Trappe.*
 Hist. phys. u. geogr. Mancherley, II. p. 156.
Bechstein, Mußt. schädl. Thiere, p. 132. n. 1. *der Trappe.*
Husly v. Rassyna: ungarisch. Magaz. I. p. 466. m. e. ill. Fig.
Jablonsky, allgem. Lex. p. 1226. *Trappe.*
Beckmann, phys. oekonom. Bibl. VI. p. 379. *der Trappe.*
Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 127. n. 159. *der Ackertrappe.*
Loniceri, Kräuterb. p. 659. *Trapp.*
Lemmery, Materiallex. p. 804.
Zückert, Speif. a. d. Thierreich, p. 97.
Geoffroy, mater. med. VII. p. 565. *der Trappe.*
 Onomatol. forestal. III. p. 702.
 Gothaisch. Hofkalender, 1780. p. 60.
Frisch, seltsam. Geschicht. II. p. 727.
Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 55. Tarda.
Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 27. n. 1. Tarda.
Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 154. n. 1. Otis (Tarda) iugulo utrinque cristato.
Schwenkfeld, av. Siles. p. 355. Tarda Recent. *Trappe.*
Charleton, onom. zoic. p. 73. n. 8. Otis, Tarda et Bistarda.
Charleton, exercitat. p. 82. n. 8.
Moehring, av. gen. p. 58. n. 58. Otis.
Rzaczynsk, hist. nat. Polon. p. 289. Otis seu Tarda Isidori et Aldrovandi, Bistarda Alberti magui.

Rzacz.

Rzacz. auch. histor. nat. Polon. p. 401. *Anser Trappa.*

Sibbald, Scot. illustr. P. II. L. 3. c. 16. *Otis, Tarda.*

Barrere, ornith. Cl. III. gen. 9. sp. 1. *Tarda pyrenaica fulva, maxillis nigris antibus, marginibus pennarum roseis.*

Belon, hist. des ois. p. 236. portr. des ois. p. 56.

Fonston, av. p. 63. *Otis sive Tarda.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 138. *Otis Tarda.*

Raji, catal. plantar. Cantabrig. p. 34.

Aristot. histor. anim. II. c. 16. *ωτις.*

Athen. Deipnosoph. L. IX. c. 10. p. 330.

Aelian. de nat. anim. L. V. c. 24. *ωτις.*

Plin. hist. nat. L. 10. c. 22. *Aves tardae; Otides.*

Schaefer, element. ornithol. tab. 51.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 314. n. 1. *der gemeine Trappe.*

β. *Otis tectricibus alarum albis.* *

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. 288.

3. ARABS. *Der arabische Trappe.*

Müller, Natursyst. II. p. 444. n. 2. *die arabische Trappe.*

Leske, Naturgesch. p. 219. n. 2. *der arabische Trappe.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 120. *der Arabische Trappe; der Lohong.*

Ebert, Naturl. II. p. 105. *der arabische Trappe.*

Halle, Vögel, p. 98. n. 6. *die Arabische Trappe.*

Neuer Schaupl. d. Nat. IX. p. 119. n. 2. *arabische Trappe.*

Onomat. hist. nat. V. p. 818. *die Arabische Trappe.*

Klein, av. p. 18. n. 3. *Tarda Mechaensis, Arabica.*

Klein, Vorbereit. p. 34. n. 3. *der Araber.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 18. n. 3. *Arabische Trappe.*

- Brisson*, ornith. II. p. 219. n. 3. Outarde d'Arabie.
Batsch, Thiere, I. p. 404. der Lohong.
Büffon, Vögel, IV. p. 63. der Afrikanische ge-
 - schopfte Trappe. m. e. Fig.
Latham, Syst. ornith. II. p. 659. n. 4. Otis (Arabs)
 rufescens, nigricante striata, subtus alba, auri-
 bus erecto-cristatis.
Latham, syn. suppl. p. 226. Arabian Bustard.
Seligmann, Vögel, I. Tab. 23. der arabische
 Trappe.
Lepechin, Tageb. d. russ. Reis. I. p. 309. arabische
 Trappen; russ. Strepel.
Linne, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 154. n. 2. Otis (Arabs)
 auribus erecto-cristatis.

3. TETRAX. Der Trappenzwerg.

- Müller*, Natursyst. II. p. 444. n. 3. die kleine Trappe.
Leske, Naturgesch. p. 219. n. 3. der Zwerptrappe.
Borowsky, Thierreich, III. p. 118. n. 2 der Trap-
 penzwerg.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 455. n. 2. der kleine
 Trappe.
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 288. n. 2.
 der kleine Trappe, p. 292. Zwerptrappe; Trap-
 penzwerg; Trieltrappe; Grieltrappe.
Ebert, Naturl. II. p. 105. der kleine Trappe; Feld-
 ente.
Halle, Vögel, p. 97. n. 5. der Trappenzwerg.
Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 185. n.
 171. der Trappenzwerg.
Pennant, arct. Zool. II. p. 299. A. der kleinere
 Trappe.
 Neuer Schaupl. der Nat. IX. p. 119. n. 3. kleine
 Trappe.
Onomat. hist. nat. V. p. 823. die kleine Trappe.
Klein, av. p. 18. n. 2. Tarda nana.

Klein,

Klein, Vorbereit. p. 34. n. 2. *Trieltrappe*; *Griel- oder kleine Trappe*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 18. n. 2. *Trieltrappe*.

Briffon, ornith. II. p. 218. n. 2. petite Outarde, appellée vulgairement Canne-petiere.

Büffon, Vögel, IV. p. 48. *der Trappenzwerg*, in e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 404. *der Trappenzwerg*.

Latham, Syn. Suppl. p. 226. Little Bustard.

Latham, Syst. ornith. II. p. 659. n. 3. *Otis* (*Tetrax*) nigro rufo alboque variegata, subtus alba, capite iuguloque laevi.

Beseke, Vögel Kurl. p. 68. n. 143. *die kleine Trappe*.

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 53. n. 2. *der Zwerg-trappe*.

Seligmann, Vögel, VII. tab. 41. *der kleine Trappe*.

Bock, N. G. v. Preuss. IV. p. 371. *der kleine Trappe*.

Cetti, Sardin. II. p. 119. *der Trappenzwerg*.

Pallas, Reis. Ausz. III. p. 474. *kleine Trappen*.

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 10. *das Steppenhuhn*.

Pontoppidan, Dänem. p. 171. n. 1. *Trappegaas*.

Pontoppidan, Norweg. II. p. 139. *Trappagiäs*.

Adanson, Senegal. p. 63. *Gros-Yeux?*

Leem, Finnm. p. 130. ** *Orides Tetraces*.

Linné, Abhandl. II. p. 295. n. 89. *der Trappenzwerg*.

Naturforsch. XIII. p. 223. n. 138. *die kleine Trappe*.

Bechstein, Must. schädl. Th. p. 132. n. 2. *kleine Trappe*.

Beckmann, Bibl. VI. p. 384. *der kleine Trapp*.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. 154. n. 3. *Otis* (*Tetrax*) capite iuguloque laevi.

Müller, zool. dan. prodr. p. 27. n. 200. *Otis* (*Tetrax*) capite iuguloque laevi.

Charleton, exerc. p. 83. n. 9. *Anas campestris*.

Charleton, onom. zoic. p. 74. n. 9. *Anas campestris*; Canne-petiere.

Jonston, av. p. 64. *Anas campestris Bellonii*.

Hermann, tab. affin. anim. p. 138. *Otis Tetrax*.

Salerne, ornithol. p. 155.

Dict. des anim. I. p. 390. *Canard de Pré de France*.

Anas pratensis Galliae, p. 403. Canne-petiere.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 314. n. 2. der *Trappenzwerg*.

4. AFRICA. *Der afrikanische Trappe.*

Müller, Natursyst. II. p. 445. n. 4. *die aethiopische Trappe*. Tab. 18. Fig. 1.

Borovesky, Thierreich, III. p. 120. n. 4. *der aethiopische Trappe*.

Neuer Schapl. d. Nat. IX. p. 119. n. 4. *Aethiopische Trappe*.

Onomat. histor. nat. V. p. 817. *die Aethiopische Trappe*.

Büffon, Vögel. IV. p. 66. *der Aethiopische oder Afrikanische Trappe*.

Batsch, Thiere, I. p. 404. *der aethiopische Trappe*.

Latham, Syn. Suppl. p. 227. White-eared Bustard.

Latham, Syst. ornith. II. p. 659. n. 5. *Otis (Afra) nigra*, dorso cinereo-undulato, auribus albis.

Sparrmann, Reis. p. 148. *Korrhahn*, oder *Knorrhahn*.

Adanson, Seneg. p. 244. *fliegende Strauß?*

Voy. de le Moine aux Isles Canaries, Cap verd, Senegall etc, à Par. 1695. p. 106. Autruche volante?

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 315. n. 3. *der afrikanische Trappe*.

5. BENGALENSIS. *Der Churge.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 162. *Indianische Trappe*.

Brissot,

Brisson, ornith. II. p. 231. n. 13. grand Pluvier de Bengale.

Büffon, Vögel, IV. p. 69. der Indianische mittlere Trappe. Der Churge, m. e. Fig.

Latham, Syn. Suppl. p. 228. Indian Bustard.

Latham, Syst. ornith. II. p. 660. n. 6. Otis (Bengalensis) nigra, subtus fulvo-fusca, dorso maculis, cauda fasciis nigris, tectricibus alarum albis.

Seligmann, Vögel. VII. Tab. 40. der indianische Trappe.

Adanson, Seneg. p. 63. Gros-yeux, Grossaugen?

Hermann, tab. affin. anim. p. 130. Otis indica.

6. HOU B A R A. Der Hubara.

Büffon, Vögel, IV. p. 73. der kleine Afrikanische gehäubte Trappe mit der Halskrause, oder Hubara.

Borowsky, Thierreich, III. p. 121. n. 5. der Trappe mit der Halskrause.

Latham, Syst. ornith. II. p. 660. n. 8. Otis (Hubara) flavescens, fusco-maculata, collo pennis elongatis, albidis, rachibus nigris, remigibus nigris, medio macula alba.

Shaw, Reise, p. 162. der Houbaara, oder Houbaary, Tab. II.

Gentl. Magaz. XIX. tab. p. 499.

Voy. en Barbarie, I. p. 267.

Donndorff, Handb. d. Thiergeesch. p. 315. n. 4. der Hubara.

7. R H A A D. Der Rhaad.

Büffon, Vögel, IV. p. 76. der kleine gehaubte Afrikanische Trappe, ohne Halskrause.

Latham, Syst. ornith. II. p. 660. n. 9. Otis (Rhaad) cristata flavescens, fusco maculata, subtus alba, capite nigro, cauda fusca, fasciis nigris.

Shaw, Reis. p. 163. der Rhaad oder Saf-saf,
tab. II.

Voy. en Barbar. p. 267.

8. INDICA. Der indianische Trappe.

Latham, Syst. ornith. II. p. 661. n. 10. *Otis* (*India*) *fusca*, *nigro-undulata*, *subtus fusco-albida*, *gula alba*, *vertice nigro*, *lateribus capitis fascia nigra*.

9. CHILENSIS. Der chinesische Trappe.

Latham, Syst. ornith. II. p. 658. n. 2. *Otis* (*Chilensis*) *capite iuguloque laevi*, *corpore albo*, *vertice rectricibusque cinereis*, *remigibus primoribus nigris*.

Vidaura, Chile, p. 71. der Pinquen.

A. Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Das Geschlecht ist mit fünf Gattungen vermehrt.
In der XII. Edition war dies Geschlecht unter den *Grallis*.

B. Neuere Gattungen.

1. Der indianische geührte Trappe.

Latham, Syn. Suppl. p. 228. *Passarage Bustard*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 660. n. 7. *Otis* (*Aurita*) *nigra*, *corpore supra fusco-reticulato*, *occipite pennis utrinque 4. capillaribus apice rhombatis*, *macula alarum auriumque alba*.

96. GESCHLECHT. STRUTHIO. Der Strauß.

Müller, Natursyst. II. p. 446. Gen. XCVI.

Leske, Naturgesch. p. 217. Gen. I.

Borowsky, Thierreich, III. p. 121. Gen. LX.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 208. Gen. XLIX.

Bechstein,

- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 448. Gen. LIII.
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 186. Gen. LXIV.
Onomat. hist. nat. VII. p. 354.
Brisson, ornith. II. p. 209. Gen. LXII. p. 211.
 Gen. LXIII. p. 212. Gen. LXIV.
Batsch, Thiere, I. p. 402. Gen. CV.
Latham, Syst. ornith. II. p. 663. Gen. LXI. p. 664. Gen. LXII. p. 665. Gen. LXIII.
Hermann, tab. affin. anim. p. 131. 136.
Donndorff, Handb. der Thiergeesch. p. 315. Gen. LXII.

I. CAMELUS. *Der gemeine Strauß.* (2)

- Müller*, Natursyst. II. p. 446. n. 1. *der Kameelstrauß.*
Leske, Naturgesch. p. 217. n. 1. *der gemeine Strauß.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 122. n. 1. *der Kammeelstrauß*, tab. 60.
Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 208. Struthio (Camelus) pedibus didactylis, digito exteriore parvo mutico, spinis alarum binis; *der Strauß.*
Bechstein, Naturgesch. I. p. 448. n. 1. *der gemeine Strauß.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 186. *der gemeine Strauß.*
Funke, Naturgesch. I. p. 307. *der Strauß.*
Ebert, Naturl. II. p. 106. *der eigentlich so genannte Strauß*, tab. 27.
Halle, Vögel, p. 85. n. 1. *der Strauß; Kameelvogel.*
Meyer, Thiere, I. Tab. 60. *der Strauß*, Tab. 61. *das Gerippe.*

Gatterer,

(2) *Latham* hat mit *Brisson* aus dieser, und den beyden folgenden Gattungen, drey besondere Geschlechter gemacht.

- Gatterer*, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 227.
 n. 225. *der Strauß*, *Straußvogel*; *Kameelstrauß*; *Kameelvogel*; *Strauß*; *Struz*.
Neuer Schaupl. d. Nat. VIII. p. 660. *Strauß*.
Onomat. hist. nat. VII. p. 354. *der Strauß*, *Camelstrauß*.
Handb. d. N. G. II. p. 153. *der Strauß*.
Klein, Av. p. 16. *Struthio*. *Struthio-Camelus autorum*.
Klein, Vorbereit. p. 30. *der Strauß oder Strutz*.
Klein, verb. Vögelh. p. 16. *Strauß*.
Klein, Stemmat. av. p. 1. tab. 1. fig. 1. 2.
Klein, Vögeleyer, p. 15. tab. 1.
Gesner, Vögelb. p. 496. *Strauß*, fig. p. 497. mittelm.
Brisson, ornith. II. p. 209. n. 1. *Autruche*.
Büffon, Vögel, III. p. 124. *der Strauß*, tab. 77.
Batsch, Thiere, I. p. 405. *der gemeine Strauß*.
Bickmann, Naturhist. p. 48. *der Strauß*.
Latham, Syst. ornith. II. p. 663. *Struthio Camelus*.
Fermin, Surin. II. p. 123. *der Strauß*.
Niebuhr, Beschr. von Arabien, p. 168. *Strauß*.
Shaw, Reise, p. 386. *der Strauß*. (Naamah.)
Le Vaillant, Reis. n. Afr. II. p. 209. 334. *Strauß*.
Sparrmann, Reis. p. 126. 429. *Strauß*.
Byron, Reis. um d. Welt, p. 182. *die Straffen*.
Ludolf, Aethiop. I. c. 12. n. 1. II. p. 161. n. 89.
Struthio.
Kolbe, Vorgeb. der guten H. edit. in 4. p. 389. *Strauß*.
Pokock, Beschr. des Morgenl. I. p. 311.
Allgem. Reis. II. p. 289. 493. III. p. 96. V. p. 79. 202. XI. p. 201.
Adanson, Senegall. p. 70. *Straußvögel*.
Leon. Afr. descrip. Afr. p. 765. *Struthiocamelus*.

Perrault,

- Perrault, Charras n. Dodart*, Abh. a. der N. G. II.
p. 61. anatom. Beschr. von 8 Straussen Tab. 54.
bis 57.
- Guyons Reis. n. Ostind.* p. 192.
- De la Porte*, Reis. I. p. 165.
- Valentin*, mus. museor. I. p. 460. Struthio, m.
e. fig.
- Hamb. Magaz. X. p. 442. XX. p. 140. XII. p. 66.
147.
- Goeze*, nützl. All. I. p. 148. *der Strauß*.
- Mannigfalt. II. p. 620. — Neue Mannigfalt. I.
p. 362.
- Hamb. Journ. II. p. 734.
- Dresd. Magaz. II. p. 778.
- Beckmann*, Bibl. IV. p. 433. VI. p. 59. XVI. p.
87. 415.
- Scopoli*, Bem. a. d. N. G. I. p. 128. n. 160. *gemeiner afrik. Strauß*.
- Willich*, obs. de Struthio-Camelo, Fref. 1587. 8.
Oekonomisch. Zool. p. 80. n. 1. *der afrikanische
Strauß*.
- Ludovici*, Kaufmannslex. II. p. 1503. IV. p. 2233.
- Eberhard*, Thiergesch. p. 110. *der Strauß*.
- Zorn*, Petinotheol. II. p. 490. 706.
- Jablonsky*, allgem. Lex. p. 1150. *Strauß*.
- Loniceri*, Kräuterb. p. 660. *Strauß*.
- Merklein*, Thierreich, p. 381. *Strauß*.
- Bern. Gallegaris Lo Struccero*, Venez. 1646. 8.
- Scaliger*, de Struthiocamelo; exercit. 230. p. 723.
- Erreurs populaires, I. L. 3. c. 22. p. 356. Autruche.
- Acta erud. suppl. I. p. 250. — *Manget bjbl. I. P.*
I. p. 479.
- Phil. transact. XXXIII. p. 223. XXXIV. p. 113.
XXXV. p. 275.
- Vallisnieri*, notom. dello Struzzo; in Oper. T.
I. p. 239. c. f.
- Velschius*,

Velschius, de pulvere metallico nigro ex ventri-
culo Struthionis. — Eph. nat. cur. Dec. I. an.
3. obs. 37. p. 52.

Amman, dissert. Σιδηνοπεψιας Struthionis, Lips.
1657. 4.

Cardau. de subtil. L. 10. p. 335. Struthiocam-
elus.

Mem. de l'acad. d. Sc. 1735. p. 146.

Thivenot, voyages, I. p. 313. Ed. germ. Fcf.
a. M. 1693. p. 223.

Derham, Phyllicotheol. p. 578.

Marmol, deser. de l'Afrique, I. p. 64.

Voy. du Fr. *Philippe*, Carme-dechaussé; p. 379.

Chefeld. Anatomi. c. 5 (Scelet.)

Geoffroy, mater. méd. VII. p. 673. der-Strauß.

Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 55. Struthio - Ca-
melus.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 27. n. 1. *Struthio-*
Camelus

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 155. n. 1. *Struthio*
(*Camelus*) pedibus didactylis.

Kramer, Austr. p. 354. n. 1. *Struthio-Camelus*,
Strauß.

Charleton, onom. zoic. p. 71. n. 10. *Struthio*;
Struthio-camelus.

Schwenkfeld, av. Silef. p. 350. *Struthiocamelus*,
Straußvogel.

Moehring, av. gen. p. 56. n. 54. *Struthio*.

Knorr, délic. natur. II. Tab. I. 1. p. 81.

Barrere, orn. Cl. III. gen. 40. *Struthio*.

Hermann, tab. affin. anim. p. 131. 136. *Struthio-*
Camelus.

Gerin. ornithol. II. p. 29. tab. 137. 138. 139.

Plin. hist. nat. L. 10. c. 3. L. 11. c. 37. L. 29. c. 5.
Struthiocamelus.

Aelian, de nat. anim. L. 2. c. 27. Στρουθος.

Aristot.

Aristot. hist. anim. L. 4. c. 14. L. 9. c. 32. Στρουθος ὁ λιβυκος.

Jes. XIII. v. 21. — *Jerem.* Klagl. IV. v. 3. — *Mich.* I. v. 8. — *3. Mos.* XI. v. 16. — *5. Mos.* XIV. v. 15. — *Hiob.* XXXIX. v. 18. 19.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 315. n. 1. der gemeine Strauß.

2. CASUARIUS. Der Casuar. (3)

Müller, Natursyst. II. p. 450. n. 2. der Casuar.

Leske, Naturgesch. p. 217. n. 2. der Kasuar.

Borowsky, Thierteich, III. p. 128. n. 3. der Kasuar.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 209. n. 2. Struthio (Casuarius) pedibus tridactylis, galea palmaribusque nudis, remigibus spinosis; der Casuar, Emeu.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 451. n. 2. der Kasuar.

Funke, Naturgesch. I. p. 311. der Kasuar.

Ebert, Naturl. II. p. 107. der Casuar.

Halle, Vögel, p. 91. n. 3. der Kasuar.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 236. n. 237. der Kasuar.

Neuer Schaupl. d. Nat. II. p. 59. Casuar.

Onomat. hist. nat. II. p. 660. Casuar.

Beckmann, Naturhist. p. 48. n. 6. b. der Casuar.

Handb. d. N. G. II. p. 156. der Casuar.

Klein, av. p. 17. Casuarius, Casuaris, Emeu, Eme.

Klein, Vorbereit. p. 32. Casuar.

Klein, verb. Vögelh. p. 17. Casuar.

Klein, Stemmat. av. p. 2. c. fig.

Klein, Vögeleyer, tab. 2.

Briffon, ornith. II. p. 212. n. 1. Casuar.

Büffon, Vögel, III. p. 209. der Kasuar. tab. 76.

Batsch, Thiere, I. p. 407. der Kasuar, Eme.

Latham,

(3) Ist vor dem Jahre 1597. nicht in Europa gesehen.

- Latham*, Syst. ornithol. II. p. 664. n. 1. *Casuarius* (Emeu) niger, vertice galeato, corpore setoso, capite colloque supremo nudis.
- Sparrmann*, Reis. p. 434. *der Kasuar*.
- Guyon*, Ostind. p. 202.
- Keyßler*, Reis. p. 23. Tab. 13. fig. 2.
- Allgem. Reis. VIII. p. 52. *Eme*.
- Franzisci* ost.-u. westind. Lustgarten, p. 315.
- Verricht. d. niederl. ostind. Gesellsch. 2te Gesand. sch. p. 48. fig. p. 49.
- Valentin*, mus. museor. I. p. 460. *Casuarius*, c. f. Mus. Wormian. p. 292. *Emeu*.
- Perroult*, *Charras*, u. *Dodart*, Abh. a. d. N. G. II. p. III. anatomische Beschr. von 4. *Casuar*en, tab. 57. *der Casuel*, tab. 58. die Zerglie. derung.
- Mannigfalt. III. p. 145. *der Kasuar*, fig. p. 176.
- Eberhard*, Thiergefch. p. 108. *Emeu*.
- Jablonsky*, allgem. Lex. p. 212. *Casuar*.
- Beckmann*, Bibl. VI. p. 60. *der Casuar*.
- Mem. pour serv. à l'hist. des anim. II. p. 157.
- Linné*, Syst. Nat. Ed. II. p. 55. *Emeu*.
- Linné*, Syst. Nat. Ed. VI. p. 27. n. 1. *Emeu*.
- Linné*, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 155. n. 2. *Struthio* (*Casuarius*) pedibus tridactylis, vertice paleari. busque nudis.
- Kramer*, Aust. p. 354. n. 1. *Casuarius*.
- Charleton*, onom. zoic. p. 71. n. 1 *Emeu*.
- Moehring*, av. gen. p. 57. n. 56. *Cela*.
- Barreire*, ornith. gen. 38. *Emeu* pennis setosis, ni. gricantibus, crassa cervice.
- Ludolf*, Aethiop. L. 10. c. 12. n. 2. II. p. 162. n. 89. *Casuarius*.
- Hermann*, tab. affin. anim. p. 131. 132. Str. *Casua. rius*.
- Gerin*, ornithol. II. p. 28. tab. 136.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 316. n. 2.
der Kasuar.

3. RHEA. Der amerikanische Strauß.

Müller, Natursyst. II. p. 452. n. 3. der amerikanische Strauß.

Borowsky, Thierreich, III. p. 127. der amerikanische Strauß.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 209. *Suri*, *Tuju*.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 453. n. 3. der Straußkasuar.

Ebert, Naturl. II. p. 108. der Straußbastard.

Halle, Vögel, p. 89. n. 2. *Strauskasuar*; ungeschwänzter Strauß.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 235. n. 226. der Straußkasuar.

Neuer Schaupl. d. Nat. VIII. p. 668. *Straußbastard*; grauer Casuar mit Straußenschnabel; Ohnschwanz.

Onomat. hist. nat. VI. p. 823. der amerikanische Strauß.

Klein, av. p. 17. *Struthio nothus*.

Klein, Vorbereit. p. 31. *Straußbastard*.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 17. *Straußbastard*, *Ohnschwanz*.

Brisson, ornith. II. p. 211, n. 1. *Thouyou*.

Büffon, ornith. I. p. 452. *Touyou*.

Büffon, Vögel, III. p. 195. der Südamerikanische, Okzidentalische, Magellanische oder Guianische Strauß.

Batsch, Thiere, I. p. 407. der amerikanische Strauß.

Latham, Syn. III. 1. p. 23. *.

Latham, Syst. ornith. II. p. 665. n. 1. *Rhea Americana*.

Vidaure, Chile, p. 71. *Straußvogel*.

- Molina*, l. c. der *Cheuque oder amerikanische Strauß*.
- Eberhard*, Thiergesch. p. 108. der *amerikanische Strauß*.
- Beckmann*, Bibl. VI. p. 60. der *Tonyou*.
- Goeze*, Allerl. III. p. 124. n. 8. der *Strauß*.
- Goeze*, Natur, Menschenl. u. Vorf. V. p. 345. der *Touioniou?*
- Samml. zur Phys. u. N. G. II.* p. 613. der *Touioniou?*
- Allgem. Reis. XVI. p. 296. *Salian*.
- La Maine*, navigations austr. p. 129.
- Hist. des Incas. Tom. II. p. 274.
- Linné*, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 155. n. 3. *Struthio (Americanus) digitio postico rotundato mutico*.
- Moehring*, av. Gen. p. 57. n. 55. *Rhea*.
- De Laet nov. orb.* p. 616. *Yandou*.
- Barrere*, Franc. equinox. p. 133. *Grus cinerea ferrivora*.
- Fonston*, av. p. 186. *Nhanduguacu*.
- Charleton*, onom. zoic. p. 115. n. 20. *Jandou*.
- Donndorff*, Handb. der Thiergesch. p. 317. n. 3. der *amerikanische Strauß*.

A. Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

In der XII. Edition stand dies Geschlecht unter den *Grallis*.

B. Neuere Gattungen.

1. Der neuholländische Kasuar.

Phillips Reis. n. Botany-Bay, p. 170. tab. 7.

White, Reis. n. Neu Süd Wallis; in dem Magaz. merkw. Reisebeschr. V. p. 124. m. e. Fig.

Latham,

Latham, Syst. ornith. II. p. 665. n. 2. *Casuarius* (N. Hollandiae) nigricans, vertice piano, corpore setoso, capite colloque pennaceis, tibiis postice ferratis.

97. GESCHLECHT. DIDUS. *Der Straußkafuer.*

Müller, Natursyst. II. p. 455. Gen. XCVII.

Leske, Naturgesch. p. 219. Gen. III.

Borowsky, Thierreich, II. p. 160. Gen. XXV.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 209. Gen. L.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 456. Gen. LV.

Briffon, ornith. II. p. 214. Gen. LXV. *Raphus*.

Batsch, Thiere, I. p. 402. Gen. CVI.

Latham, Syst. ornith. II. p. 662. Gen. LX.

Hermann, tab. affin. anim. p. 132; 163.

Donndorff, Handb. d. Thiergeesch. p. 317. Gen. LXIII.

I. INEPTUS. *Der Dronte.* (4)

Müller, Natursyst. II. p. 455. *der Tölpel*.

Leske, Naturgesch. p. 219. *der Dronte*.

Borowsky, Thierreich, II. p. 161. *der Dronte*.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 209. n. 1. *Didus* (*Ineptus*) pedibus ambulatoriis, cauda brevissima, pennis incurvis; *der Dudu*, *Dronte*, *Walghvogel*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 456. *der Tölpel*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 186. *der Töpel*.

Funke, Naturgesch. I. p. 326. *der Dronte*.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 236. n. 228. *der Dronte*, *Ebelvogel*, *Mönchschwan*.

Onomat. hist. nat. III. p. 663. *Dronte*.

(4) Soll, nach dem Bericht neuerer Reisenden, jetzt gar nicht mehr existiren, cf. *Blumenb.* l. c.

- Handb. d. Naturgesch. II. p. 158. *der Dronte*.
Briffon, ornith. II. p. 214. n. 1. *Dronte*.
Büffon, Vögel, III. p. 230. *der Dronte*. tab. 77.
Batsch, Thiere, I. p. 409. *der Dronte*.
Latham, Syst. ornith. II. p. 662. n. 1. *Didus* (*In-*
eptus) *griseus*, *reinigibus rectricibusque flavo-*
cinereis, *capite cucullato*.
Seligmann, Vögel, VIII. Tab. 84. *der Dodo*.
Beckmann, Bibl. VI. p. 60. *der Dronte*.
Neue Mannigfalt. III. p. 1. fig. p. 16.
Charleton, onom. zoic. p. 113. n. 15. *Dodo Lusi-*
tanorum; *Cygnus cucullatus*.
Moehring, av. Gen. p. 58. n. 57. *Raphus*.
Bont. Ind. orient. p. 30. tab. 70. *Dronte*.
Fonston, av. p. 176. *Cygnus cucullatus*, s. *gallus*
gallinaceus peregrinus Clusii.
Voy. des Holland. aux Ind. orient. II. p. 214.
Hermann, tab. affin. anim. p. 132. 163. *Didus in-*
eptus.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 317. *der*
Dronte.

2. SOLITARIUS. *Der Einsiedler.* (5)

- Borowsky*, Thierreich, II. p. 162. *der Einsied-*
ler.
Batsch, Thiere, I. p. 408. *der Einsiedler*.
Büffon, Vögel, III. p. 238. *der Einsiedler*.
Latham, Syst. ornith. II. p. 662. n. 2. *Didus* (*So-*
litarius) *griseo fuscoque varius*, *alis abbreviatis*,
alulis gibbosis.
Beckmann, Bibl. VI. p. 61. *der Einsiedler*.
Allgem. Reis. X. p. 3. der Einsiedler.

3. NAZA-

(5) Soll, nach *Büffon*, 45 Pfund schwer seyn, und das Eine Ey,
 welches das Weibchen legt, 7 Wochen bebrütet werden; auch
 das Fleisch der Jungen schmackhaft seyn.

3. NAZARENUS. *Der Vogel von Nazareth.* (6)

Borowsky, Thierreich, II. p. 162. *der Nazar-*
vogel.

Batsch, Thiere, I. p. 409. *der Nazarvogel.*

Büffon, Vögel, III. p. 247. *der Vogel von Na-*
zareth.

Latham, Syst. ornith. II. p. 663. n. 3. *Didus (Na-*
zarenus) toto corpore tomentoso nigro.

Beckmann, Bibl. VI. p. 61. *der Vogel von Na-*
zare.

Veränderungen gegen die XII. Edition, und Ver-
mehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Das Geschlecht ist mit zwey Gattungen vermehrt.

98. GESCHLECHT. PAVO. *Der Pfau.*

Müller, Natursyst. II. p. 457. Gen. XCIV.

Leske, Naturgesch. p. 221. Gen. IV.

Borowsky, Thierreich, II. p. 163. Gen. XXVI.

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 207. Gen.
XLVII.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 457. Gen. LVI.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 293. Gen.
XXXVII.

Onomat. hist. nat. VI. p. 216.

Batsch, Thiere, I. p. 411. Gen. CXII.

Latham, Syst. ornith. II. p. 616. Gen. XLIX.

Hermann, tab. affin. anim. p. 168.

Donndorff, Handb. d. Thiergeesch. p. 318. Gen.
LXIV.

(6) Beckmann vermutet, daß so wohl diese, als die vorher-
gehende Gattung mit dem Dronte wohl einerley seyn mö-
gen.

I. CRISTATUS. *Der gemeine Pfau.* (7)

Müller, Natursyst. II. p. 457. n. 1. *der gemeine Pfau.*

Leske, Naturgesch. p. 221. n. 1. *der gemeine Pfau.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 164. n. 2. *der gemeine Pfau.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 207. n. 1. *Pavo (Cristatus) capite crista compressa, calcaribus solitariis. Der Pfau, Pageluhn.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 457. n. 1. *der gemeine Pfau.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 293. n. 1. *der gemeine Pfau. p. 304. Phau; Paw; Pagelun, Pawlun, Funovogel, Pau.*

Funke, Naturgesch. I. p. 218. *der Pfau.*

Ebert, Naturl. II. p. 112. *der Pfau.*

Halle, Vögel, p. 429. n. 449. *der Pfau.*

Meyer, Thiere, II. p. 1. tab. 1. *der Pfau.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 237. n. 229. *der Pfau.*

Beckmann, Naturhist. p. 49. n. 1. *der Pfau.*

Neuer Schapl. d. Nat. VI. p. 445. *Pfau.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 217. *der gemeine Pfau.*

Handb. d. N. G. II. p. 50. *der Pfau.*

Handb. d. deutsch. Thiergeesch. p. 113. *der Pfau; Pacheluhn.*

Klein, av. p. 112. B. *Pavo.*

Klein, Vorbereit. p. 208. B. *Pfau, Paw.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 115. *Pfau.*

Klein, Vögeleyer, p. 32. tab. 14. fig. 1. 2.

Gesner, Vögelb. p. 396. *Pfaw. M. e. ziempl. gu-
ten Fig.*

Siemßen,

(7) Ist erst zu Alexanders des Grossen Zeiten in Europa bekannt geworden. Das Männchen wird wohl 25. Jahr alt. Soll sich mit Truthühnern begatten.

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 238. n. 1. *der gemeine Pfau.*

Brisson, ornith. p. I. p. 79. n. 7. *Paon.*

Büffon, Vögel, V. p. 144. *der Pfau.* M. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 424. *der gemeine Pfau.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 616. n. 1. *Pavo (Cristatus) capite crista compressa, calcaribus solitariis.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 372. *der Pfau.*

Wolf, Ceyl. II. p. 135. *der Pfau.*

Kolbe, Vorgeb. der guten H. Ed. in 4. p. 388. *Pfauen.*

Knox, Ceyl. p. 57. *die Pfauen.*

Valentin. mus. museor. I. p. 462. *Pavo.* M. e. Fig.

Allgem. Reis. IV. p. 528. V. p. 79. *Pfauen.*

Pontoppidan, Norweg. II. p. 149. *Pfau.*

Beckmann, Bibl. VI. p. 396. *der Pfau.*

Eberhard, Thiergesch. p. 65. *der Pfau.*

Meidinger, Vorles. I. p. 139. n. 1. *der gemeine Pfau.*

Oekonom. Zool. p. 82. n. 23. *der gemeine Pfau.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 17. 18. 506. 605.

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 130. n. 162. *der gemeine Pfau.*

Anweis. Vögel zu fang. etc. p. 423. *der Pfau.*

Jablonsky, allgem. Lex. p. 799. *Pfau.*

Geoffroy, mat. med. VII. p. 609. *der Pfau.*

Allgem. Magaz. VII. p. 352. *Pfau.*

Naturforsch. XVII. p. 66. n. 139. *der gemeine Pfau.*

Neue Mannigfaltigk. III. p. 290.

Mannigfaltigk. IV. p. 529.

Merklein, Thierreich, p. 324. *Pfau.*

Zückert, Speis. a. d. Thierreich, p. 42.

Ludovici, Kaufmannslex. p. 626 ff.

Gothaisch. Hofkalend. 1776. N. G. des Pfaues.

- Lemmery*, Materiallex. p. 846.
Hannöv. Magaz. 1769. p. 704.
Büchoz, Abhandl. vom Federvieh, p. 18.
Loniceri, Kräuterb. p. 661. *Pfau*.
Allgem. Haushalt. und Landwissensch. I. p. 861.
Pfau.
Borkhausen, Magaz. I. p. 212. n. 89.
Sperling, diss. de Pavone, Witteb. 1643. 4.
Friederici, diss. de avium pulcherrima, Pavone, Lips. 1676. 4.
Bartholin. obs. ex anatome pavonis, Act. Haffn. I. obs. 114. p. 285.
Scaliger, exercitat. 238. p. 735.
Paullini, zeitverkürz. erbaul. Lust, III. n. 64. p. 421.
Aldrovand. pavonis elogium; in Dornav. Amphith. I. p. 436.
Libavii pavonis elogium; in Oper. Tom. II. p. 713.
Mandeslo, voy. aux Indes, Tom. II. Liv. I. p. 147.
Thevenot, voy. au Levant, III. p. 18.
Tavernier, voy. Tom. III. L. I. p. 57.
Pyrard, voyag. Tom. I. p. 426.
Lintscot, navigatio in Orientem, p. 39.
 Second. voyag. de Siam. p. 75.
Gemelli Careri, voy. autour du monde, V. p. 270.
 Hist. des Indes, Tom. II. p. 329.
Charlevoix, hist. de St. Domingue, I. p. 28—32.
Bruyer, de re cibaria, L. 15. c. 28.
Augustin. de civitat. Dei, L. 21. c. 4.
 Mem. de l'Acad. des Inscript. XX. p. 636.
Menestrier, traité des Tournois, p. 40.
Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 55. *Pavo*.
Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 27. n. 1. *Pavo cauda longa*.

Linné,

- Linné*, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 156. n. 1. *Pavo* (*Cristatus*) capite crista erecta.
- Schwenkfeld*, av. Siles. p. 325. *Pavo*. *Pfau*; *Paw*.
- Charleton*, onom. zoic. p. 72. n. 1. *Pavo*.
- Belon*, hist. des oiseaux, p. 233. *Paon*.
- Mus. Wormian.* p. 297. *Pavo*.
- Moehring*, av. gen. p. 50. n. 45. *Pavo*.
- Rzaczynsk.* hist. nat. Polon. p. 243. *Pavo* s. *Parvus*; *Avis medica Varroni*, *Iunonia avis Ovidio*.
- Dict. des animaux, III. p. 324. *Paon*.
- Bomare*, dict. Tom. VII. p. 487. VIII. p. 205. *Paon*, oiseau de Junon, ou de Medie ou de Perse.
- Encycl. oeconom. XI. p. 401. *Paon*.
- Cours d'hist. nat. III. p. 80. *Paon*.
- Zinnian*. Uov. p. 25. tab. 1. *Pavone*.
- Gerin*. ornithol. II. p. 73. tab. 217.
- Hermann*, tab. affin. anim. p. 168. *Pavo cristatus*.
- Aristot.* hist. animal. L. 6. c. 2. n. 28. *Tæws*.
- Aelian*. de nat. anim. L. 5. c. 32. L. 11. c. 33. L. 13. c. 18. L. 16. c. 2. *Tæws*.
- Plin*. hist. nat. L. 10. c. 20. L. 11. c. 37. L. 29. c. 6. *Pavo*.
- Sueton*. Vitell. c. 13. *Pavo*.
- Palladius*, de re rust. L. 1. c. 28. *Pavones*.
- Varro*, de re rust. L. 3. c. 6. *Pavo*.
- Gellii noct.* attic. L. 7. c. 16. *Pavones*.
- Columella*, de re rust. L. 8. c. 11. *Pavones*.
- Athenaei Deipnosoph.* L. 23. c. 13.
- Donndorff*, Handb. d. Thiergesch. p. 318. n. 1. der gemeine *Pfau*.

B. PAVO VARIUS. *Der bunte Pfau.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 116. a. *der bunte Pfau*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 305. n. 2.
der bunte Pfau.

Briffon, ornith. I. p. 81. A. Paon panaché.

Büffon, Vögel, V. p. 200. der bunte Pfau, m.
e. Fig.

Latham, Syn. II. 1. p. 671.

Latham, Syst. ornith. II. p. 816. β. Pavo varius.

Merklein, Thierreich, p. 326.

γ. **PAVO ALBUS.** Der weiße Pfau.

Borowsky, Thierreich, II. p. 167. b. der weiße
Pfau.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 304. n. 1.
der weiße Pfau.

Briffon, ornith. I. p. 81. B. Paon blanc.

Büffon, Vögel, V. p. 195. der weiße Pfau, m.
e. Fig.

Merklein, Thierreich, p. 325. schneeweisse Pfauen.

Büchoz, Abhandl. vom Federvieh, p. 16.

Geoffroy, mater. med. VII. p. 618.

Klein, Vögeleyer, p. 32. weißer Pfau.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 327. Pavo candidus.

Charleton, onom. zoic. p. 72. n. 1. Pavo albus.

Aldrovand. ornithol. p. 32. Pavo albus.

Linné, fn. Suec. II. p. 71. n. 197. β. Pavo colore
albo.

Latham, Syn. II. 1. p. 672.

Latham, Syst. ornith. II. p. 617. β Pavo albus.

Gerin. ornithol. II. p. 74. tab. 218.

Zinnan. Uov. p. 26. tab. 1. fig. 1. Pavone bianco.

Diction. des animaux, III. p. 327.

Jonston, av. p. 58. Pavo albus.

δ. **BICALCARATUS.** Der doppelt gespornte Pfau.

Müller, Natursyst. II. p. 459. n. 2. der chinesische
Doppelsporn.

Leske,

Leske, Naturgesch. p. 221. n. 2. *der Pfau mit doppeltten Sporen.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 163. n. 1. *der doppelt gespornte Pfau*, tab. 26.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 458. n. 2. *der Pfaufasan.*

Ebert, Naturl. II. p. 113. *ein Pfau in China, der zwey Sporen über einander hat.*

Pennant, archt. Zool. II. p. 277. *der Pfaufasan.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 218. *der Chinesische Pfaufasan.*

Klein, av. p. 114. n. 5. *Phasianus pavonius.*

Klein, Vorbereit. p. 212. n. 5. *Pfaufasan.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 118. *Fasan mit blauen Flecken, Pfaufasan.*

Klein, av. p. 114. n. 6. *Phasianus fuscus.*

Klein, Vorbereit. p. 212. n. 6. *der braune Fasan.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 118. n. 6. *schwarzbrauner Fasan.*

Briffon, ornithol. I. p. 82. n. 9. *Paon de la Chine.*

Büffon, Vögel, V. p. 275. *der chinesische Pfauenfasan; Spornvogel*, m. 2. figg.

Batsch, Thiere, I. p. 424. *Pfauenfasan.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 617. n. 3. *Pavo (Bicalcaratus) capite subcristato, calcaribus binis.*

Seligmann, Vögel, III. tab. 29. *der chinesische Phasanenpfau.*

Seligmann, Vögel, III. tab. 33. *die Henne des Phasanenpfauen aus China.*

Sonnerat, Reis. n. Ostind. II. p. 135. tab. 99. *der kleine Pfau aus Malacca.*

Linneé, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 156. n. 2. *Pavo (Bicalcaratus) capite laevi, calcaribus duobus.*

Bomare, Dictionn. IV. p. 349.

Dictionn. des animaux, II. p. 151.

Hermann, tab. affin. anim. p. 168. *Pavo bicalcaratus*.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 319. n. 2. der doppelt gespornte Pfau.

4. TIBETANUS. Der tibetische Pfau.

Müller, Natursyst. II. p. 459. ad n. 2. *Chin-Tchien-Khi*, tab. 19. fig. 1.

Müller, Natursyst. Suppl. p. 121. n. 4. der Chinquis.

Onomat. hist. nat. VI. p. 219. *Chin-Tchien-Khi*.

Briffon, ornith. I. p. 83. n. 10. *Paon de Tibet*.

Büffon, Vögel, V. p. 269. der Chinquis oder Tibetische Pfau.

Latham, Syst. ornith. II. p. 617. n. 4. *Pavo (Tibetanus) dorso superiore tectricibusque caudae maculis splendide caeruleis, calcaribus binis*.

Linné, Syst. Nat. Ed. XII. I. p. 268. n. 2. β *Pavo tibetanus*.

3. MUTICUS. Der Pfau ohne Sporen.

Müller, Natursyst. II. p. 460. n. 3. der japanische Pfau, tab. 24. fig. 2.

Leske, Naturgesch. p. 221. n. 3. der Pfau ohne Sporen.

Borowesky, Thierreich, p. 167. n. 3. der Japanische Pfau.

Ebert, Naturl. II. p. 113. der japanische Pfau.

Halle, Vögel, p. 430. n. 450. der geschuppte Pfau, mit Livreistreifen.

Onomat. hist. nat. VI. p. 219. der Japanische Pfau.

Briffon, ornith. I. p. 81. n. 8. *Paon du Japon*.

Büffon, Vögel V. p. 272. der Japanische geschopfte Pfau; der Aehrenträger.

Batsch, Thiere, I. p. 424. der japanische Pfau.

Latham,

Latham, Syst. ornithol. II. p. 617. n. 2. *Pavo* (*Muticus*) capite crista subulata, calcaribus nullis.

Charleton, onom. zoic. p. 72. n. 2. *Pavo Japonensis*.

Diction. des animaux, III. p. 328.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 319. n. 3.
der Pfau ohne Sporen.

Veränderungen gegen die XII. Edition, und Ver-
mehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Edit. XII.

Edit. XIII.

p. 268. n. 2. β *Pavo tibetanus*. p. 731. n. 4. *Pavo tibetanus*.

Das Geschlecht ist also mit einer Gattung ver-
mehrt, welche vorher als Spielart von der zweyten an-
genommen wurde.

99. GESCHLECHT. MELEAGRIS. Das
Truthuhn.

Müller, Natursyst. II. p. 461. Gen. XCIX.

Leske, Naturgesch. p. 222. Gen. V.

Borowsky, Thierreich, II. p. 167. Gen. XXVII.

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 206. Gen.
XLVI.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 459. Gen. LVII.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 306. Gen.
XXXVIII.

Briffon, ornith. I. p. 41. Gen. II. Gallo-pavo.

Batsch, Thiere, I. p. 410. Gen. CVIII.

Latham, Syst. ornith. II. p. 618. Gen. L.

Hermann, tab. affin. anim. p. 168.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 319. Gen.
LXV.

I. GALLOPAVO. Der Puter. (8)

Müller, Natursyst. II. p. 463. der wilde Truthahn aus Neuengland.

Leske, Naturgesch. p. 222. n. 1. das Puterhuhn.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 207. n. 1. *Meleagris (Gallopavo) maris pectore barbato*; der Kalekuter; Truthahn; Puder.

Borowsky, Thierreich, II. p. 169. die wilden Puter.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 330. n. 1. das wilde Truthuhn.

Pennant, arct. Zool. II. p. 273. n. 94. das wilde Puterhuhn.

Ebert, Naturl. II. p. 113. die Truthühner.

Halle, Vögel, p. 433. n. 451. das Indianische Huhn.

Meyer, Thiere, II. p. 1. tab. 3.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 242. n. 230. der Kalekuter.

Neuer Schaupl. der Nat. IV. p. 351. Kalekutischer Hahn.

Onomat. hist. nat. V. p. 135. der welsche Hahn.

Klein, av. p. 112. n. 1. *Meleagris vulgaris*.

Klein, Vorbereit. p. 208. n. 1. gemeiner Kalekut.

Klein, verb. Vögelh. p. 116. n. 1. gemeiner Kalekuter.

Klein,

(8) Ist 1530. zuerst nach Deutschland gebracht. — Die erste genaue Beschreibung von diesem Vogel hat Oviedo ums Jahr 1525. gegeben — Im wilden Zustande, wo sie in Herden von 500. angetroffen werden, steigen sie bis auf den Gipfel der höchsten Bäume, und werden von dem Genuss der kleinen rothen Eicheln so fett, dass sie nur noch eine kurze Strecke fliegen können, und bald von einem Reuter überjagt werden. Sie sollen alsdenn oft an 40. Pfund schwer werden. Das Weibchen brütet 26—27. Tage. — In den bewohnten Gegenden von Amerika sind die wilden Puter außerordentlich selten geworden, und finden sich nur haufenweise an den entferntesten und unbesuchtesten Oertern.

- Klein, Vögeleyer, p. 32. tab. 13. fig. 4.
Briss., ornith. I. p. 43. B. Dindon sauvage.
Buffon, Vögel, IV. p. 224. die wilden Puter.
Batsch, Thiere, I. p. 418. gemeine Puter.
Latham, Syst. ornith. II. p. 618. n. 1. Meleagris
(Gallopavo) capite caruncula frontali gularique,
maris pectore barbato.
Linne', Syst. Nat. Ed. II. p. 56. Gallopavo.
Linne', Syst. Nat. Ed. VI. p. 27. n. 1. Gallopavo.
Linne', Syst. Nat. Ed. X. I. p. 156. n. 1. Meleagris
(Gallopavo) capite caruncula frontali, cri-
staque gulari, maris pectore barbato.
Charleton, onom. zoic. p. 72. n. 2. Gallopavo;
Gallus Indicus, Meleagris.
Moehring, av. gen. p. 51. n. 47. Cenchramus.
Schaefer, element. ornithol. tab. 37.
Zinnian. Uov. p. 27. Gallina indiana.
Hermann, tab. affin. anim. p. 168. Meleagris Gal-
lopavo.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 319. der
Puter.

β. Der zahme Puter.

- Müller, Natursyst. II. p. 461. n. 1. der kalekutsche
Hahn. tab. 24. fig. 3.
Borowsky, Thierreich, II. p. 168. n. 2. der kale-
kutsche Hahn.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 459. das Truthuhn.
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 306. n. 1.
das gemeine Truthuhn. p. 330. Puterhuhn; Ka-
lekuter; kalekutischer Hahn; gemeiner Kalkut;
Truthahn; Puter; Puder; wälscher Hahn;
türkischer Hahn; Kuhnhahn; indianischer
Hahn; Puthe; Kalkun; Knurre; Putchen;
Pipe.
Funke, Naturgesch. I. p. 203. das Truthuhn.
Briss.,

Brisson, ornith. I. p. 1. n. 1. Dindon.

Büffon, Vögel, IV. p. 190. der kalekutische Hahn,
oder Puter. Tab. 95. 96.

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 240. n. 1. der gemeine Kuhnhahn.

Eberhard, Thiergesch. p. 63. der welsche Hahn.

Meidinger, Vorles. I. p. 140. n. 1. das Puterhuhn.
Handb. d. N. G. II. p. 38. der Kalekuter.

Handb. d. deutsch. Thiergesch. p. 114. Puterhahn.

Beckmann, Naturhist. p. 49. n. 2. der Kalekutische Hahn.

Gesner, Vögelb. p. 218. Indianisch Hun. fig. p. 219.
zieml. gut.

Bock, N. G. von Preuß. IV. p. 373. der Kalkau; Truthahn.

Cetti, Sardin. II. p. 109. das Puterhuhn.

Molina, Chil. p. 210. Puter.

Wolf, Zeil. p. 160. der kalekutische Hahn.

Taube, Slavon. u. Syrm. I. p. 4. wälsche Hühner.

Georgi, Russl. p. 442. welsche Hühner.

Fermin, Surin. II. p. 143. der Puter.

Kolbe, Vorgeb. d. g. H. ed. in 4. p. 388. Indianische Hühner.

Knox, Ceyl. p. 57. calecutische Hähne.

Adanson, Senegall. p. 250. kalekutische Hähne.

Pontoppidan, Dänem. p. 172. Kalkon; Truthahn.

Naturforsch. XVII. p. 66. n. 140. der kalekutische Hahn.

Neue schwed. Abhandl. X. p. 221. 224.

Lichtenberg, Magaz. für das Neueste, etc. II. 1.
p. 234. das kalekutische Huhn.

Lichtenb. u. Voigt, Magaz. VII. 2. p. 154. calecutischer Hahn.

Andre u. Bechstein, Spazierg. III. p. 268. 273.
Puter.

Olla potrida. 1786. 2. St. p. 87.

Beckmann,

Beckmann, Bibl. V. p. 505. VI. p. 391. *der kalekutische Hahn.*

Oekonom. Zool. p. 83. *der kalekutsche Hahn.*

Jablonsky, allgem. Lex. p. 1332. *Truthahn.*

Loniceri, Kräuterb. p. 643. *Indianischer Hahn.*

Dan. Beckherr, preuß. *Messerschlucker*, 1636.
p. 22. f.

Beckmann, Beytr. zur Gesch. d. Erfind. III. p. 244.
Kalekuter.

Kramer, Austr. p. 355. n. 1. *Meleagris*; *Indiansch Piphun.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 279. *Gallopavus*; *Calecutisch Hun.*

Du Tertre, hist. des Antill. II. p. 265. *l'oule d'Inde.*

Salerne, ornithol. p. 132.

De Lery, voyag. au Brésil. p. 171.

Lawson, hist. Carol. p. 27. und 149.

Du Pratz, Louisiana. II. p. 85.

Russel, Alepp. p. 63.

Tavernier, voyag. p. 146.

Purchas, Pilgr. III. p. 995.

Dampier, voyag. Vol. III. P. II. p. 65. 85. 114.

De Laet, descr. Ind. p. 74. 83. 91. 491.

Lopez de Gomara, Hist. de Mexico. p. 343. *Gal-lipavos.*

Anderson, Gesch. des Handels, III. p. 518. IV.
p. 131. 189.

Borkhausen, Magazin, I. p. 213. n. 90.

Bonare, Diction. III. p. 313. *Coq d'Inde.*

Encycl. Oeconom. VI. p. 329. *Coq et Poule d'Inde;* *Paon d'Inde.*

Cours d'hist. nat. III. p. 58. *Coq d'Inde.*

Diction. des animaux I. p. 699.

Chardin, voyag. III. c. 9. p. 38.

Gerin. ornithol. II. p. 75. tab. 222 — 226.



Hannöv. Magaz. 1777. p. 1246. hartes Leben eines Truthhahns.

Petit, descript. anatomique de l’Oeil du Coq d’Inde. Mem. de l’Acad. de Par. 1735. p. 163. Mit Abbild.

Gahr liep, de ovo Gallo-pavi, ut raro sic monstroso. — Eph. nat. cur. Dec. III. an. 5. et 6. obs. 164. p. 374.

Zink: Leipzig. Samml. VIII. p. 959. von welschen Hühnern.

Hannöv. Magaz. 1776. p. 767. u. 1470. vom Brüten des Puterhahns.

Nachr. d. Schles. patriot. Gesellsch. I. p. 306. III. p. 4. von Erziehung der Puter.

Journ. Encycl. 1768. V. 2. p. 129. — Berlin. Samml. IV. p. 574. Schwedische Art, die jungen Puter zu erziehen.

Stutg. ökonom. phys. Ausz. II. p. 529. vom Mästen der welschen Hühner.

Physik. ökonom. Patriot. III. p. 314.

Allgem. Haushalt. u. Landwissensch. I. p. 837. ff.

Zückert, Speis. a. d. Thierreich, p. 91.

Allgem. Harzmagaz. I. p. 33. ff. 103. ff.

Preuss. Sammler, I. p. 152.

γ. Der gehäubte Puter.

Müller, Natursyst. II. p. 464. b. der Haubentruthahn.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 332. n. 5. das Puterhuhn mit dem Federbusche.

Halle, Vögel, p. 433. n. 452. das Indianische Huhn, mit weißem frisierten Federbusche auf dem Kopfe.

Klein, av. p. 113. n. 2. *Meleagris*, Gallo-pavo cri-

status.

Klein,

Klein, Vorbereit. p. 210. n. 10. *Kurre mit Straußfedern.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 117. n. 2. *Kurre mit Straußfedern.*

Brisson, ornith. I. p. 43. A. Dindon hupé.

Büffon, Vögel, IV. p. 225. *der gehäubte Puter.*

Wöchentl. Danzig. Erfahrungen, 1746.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 157. γ. *Gallopavo cristatus.*

δ. *Der kupferfarbene Puter.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 331. n. 4. *das kupferfarbene Truthuhn.*

ε. *Der weiße Puter.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 331. n. 3. *das weiße Truthuhn mit rothem Kopfe und schwarzem Haarbüschel auf der Brust.*

ζ. *Das Bastardtruthuhn.* *

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 332. n. 6.

η. *Eine eigene Spielart von zahmen schwarzen, verwilderten Truthühnern.* *

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 331. n. 2.

Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Edit. XII.

Edit. XIII.

p. 269. n. 2. *Meleagris Cristata* p. 733. n. 2. *Penelope Cristata.*

p. 269. n. 3. *Meleagris Satyra.* p. 733. n. 1. *Penelope Satyra.*

In der XII. Edit. bestand dies Geschlecht aus drey Gattungen; da aber die beyden letztern in der XIII. zum folgenden Geschlechte gezählt worden sind, so hat erstes nun um so viel weniger. Bey der ersten Gattung sind die Varietäten δ und ε hinzugekommen.

* EINGESCHOBENES GESCHLECHT.
PENELOPE. *Die Penelope.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 461. Gen. LVIII.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 187. Gen. LXVIII.

Latham, Syst. ornith. II. p. 619. Gen. LI.

Donnitorff, Handb. der Thiergeesch. p. 320. Gen. LXVIII.

I. SATYRA. *Der Napaul.*

Müller, Natursyst. II. p. 464. n. 3. *der bengalische Truthahn.*

Leske, Naturgesch. p. 222. n. 3. *der gehörnte Truthahn; der Napol.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 168. n. 2. *das gehörnte Truthuhn*, Tab. 27.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 461. *Napol.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 187. *der Napol.*

Ebert, Naturl. II. p. 112. *der gehörnte indianische Fasan.*

Neuer Schaupl. d. Nat. II. p. 769. n. 7. *gehörnter Fasan.*

Onomat. hist. nat. V. p. 139. *der gehörnte Fasan.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 118. n. 7. *gehörnter Fasan.*

Brisson, ornith. I. p. 86. n. 17. *Faisan cornu de Bengale.*

Büffon, Vögel, V. p. 259. *der gehörnte Fasan oder Napaul*, m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 418. *das gehörnte Truthuhn.*

Latham, Syn. Suppl. p. 203. *Horned Turkey.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 619. n. 2. *Meleagris (Satyra) capite cornibus geminis, corpore rubro, punctis ocellatis.*

Seligmann, Vögel, V. tab. 2. der gehörnte indische Fasan.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 157. n. 3. Meleagris (Satyra) capite cornibus duobus, corpore rubro, punctis nigris, albo foetis.

Hermann, tab. affin. anim. p. 169. Meleagris Satyra.

Donndorff, Handb. d. Thiergefch. p. 320. n. 1. der gehörnte Fasan.

2. CRISTATA. Der Quan. (9)

Müller, Natursyst. II. p. 464. n. 2. der brasiliische Truthahn.

Müller, Natursyst. Suppl. p. 122. n. 2.

Leske, Naturgesch. p. 222. n. 2. das brasiliische Truthuhn.

Borowsky, Thierreich, II. p. 170. n. 3. das Brasiliische Truthuhn.

Halle, Vögel, p. 435. n. 454. der dunkelbraune Fasan; Jacupema.

Onomat. hist. nat. IV. p. 96. Guan; der dunkelbraune Fasan.

Klein, av. p. 112. n. 4. Alector Brasiliensis, Quan s. Guan Indis.

Klein, Vorbereit. p. 207. n. 4. brasiliischer Hahn.

Klein, verb. Vögelhist. p. 115. n. 4. Brasiliener.

Klein, av. p. 114. n. 2. Phasianus fuscus brasiliensis.

Klein, Vorbereit. p. 211. n. 2. der braune Brasiliische.

Klein, verb. Vögelh. p. 118. n. 2. brauner Brasiliener.

Briffon, ornith. I. p. 43. n. 2. Dindon du Brésil.

Büffon, Vögel, V. p. 302. 304. der Guan oder Quan.

Batsch, Thiere, I. p. 418. das brasiliische Truthuhn.

Latham, Syst. ornith. II. p. 619. n. 1. *Penelope (Cristata) capite pennis erectis cristato, temporibus violaceis.*

Seligmann, Vögel, I. tab. 25. der in Westindien so genannte Quan, oder Guan; der brasiliische Fasan.

Schlözer, Erdbesch. von Amer. p. 685. der Quan.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 157. n. 2. *Meleagris (Cristata) capite pennis erectis cristato, temporibus violaceis.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 168. *Meleagris Cristata.*

Fonston, av. p. 194. *Jacupeima.*

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 321. n. 2. der brasiliische Fasan.

3. CUMANENSIS. Der Jaku.

Büffon, Vögel, V. p. 300. der Jaku, m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 620. n. 3. *Penelope (Cumanensis) uigricans, capite cristato, temporibus gulaque caeruleo nigricantibus.*

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 603. *Yaku, Cujovit.*

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 321. n. 3. der weißgehaubte Fasan.

4. PIPILE. Die schwarzbauchige Penelope.

Latham, Syn. Suppl. p. 205. *Piping Curassow.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 620. n. 2. *Penelope (Pipile) caruncula gulari caerulea, ventre atro, dorso fusco atro maculato.*

5. MARAIL. Der Maraye. (10)

Müller, Natursyst. Suppl. p. 125. n. 10. *Marail.*

Büffon,

(10) *Büffon* vermutet, er sey das Weibchen oder eine Abänderung vom Jaku. (Cr. Cumanensis.)

Büffon, Vögel, V. p. 306. *der Marail, oder grünliche Kayennische Fasan*, m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 620. n. 4. *Penelope (Marail) capite subcristato, temporibus gulaque incarnatis carunculatis*.

Sammel. zur Phys. u. N. G. II. p. 602. *der Maraye*.

Fermin, Surin. p. 129. *Maray*.

Barrere, Fr. equinox. p. 139. *Phasianus niger, aburus, viridi rostro*.

Donndorff, Handb. d. Thiergeesch. p. 321. n. 4. *der grünliche cayennische Fasan*.

6. VOCIFERUS. *Der Schreyvogel*.

Büffon, Vögel, V. p. 312. *der Schakamel oder Chakamel*.

Onomat. histor. nat. II. p. 802. *Chachalacametl, p. 802. Schreyvogel*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 625. n. 5. *Crax (Vociferans) fusca, rostro pedibusque cyaneis, abdomine albido*.

Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Das ganze Geschlecht ist hier neu. Die *erste* und *zweyte* Gattung sind aus dem vorhergehenden Geschlechte hieher versetzt; die übrigen *vier* sind neu hinzu gekommen.

100. GESCHLECHT. CRAX. *Der Hoko. (Buschhuhn.)*

Müller, Natursyst. II. p. 465. Gen. C.

Leske, Naturgesch. p. 223. Gen. VI.

Borowsky, Thierreich, II. p. 170. Gen. XXVIII.

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 206. Gen. XLV.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 461. Gen. LIX.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 187. Gen. LXIX.

Onomat. hist. nat. III. p. 458.

Latham, Syst. ornith. II. p. 622. Gen. LIII.

Batsch, Thiere, I. p. 411. Gen. CXI.

Hermann, tab. affin. anim. p. 168. 169.

Donndorff, Handb. d. Thiergeesch. p. 322. Gen. LXVII.

I. ALECTOR. *Der Curasso.*

Müller, Natursyst. II. p. 464. n. 1. *der guajanische Pauweis.*

Leske, Naturgesch. p. 223. n. 1. *der Hoko von Guiana.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 170. n. 1. *der guianische Hokko*, tab. 28.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 206. n. 1. Crax (Alector) cera flava, corpore nigro, ventre albo; *der Curasso.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 462. *der guianische Hocco.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. I. p. 187. *der guianische Hocco.*

Onomat. hist. nat. III. p. 460. Crax Gujanensis.

Halle, Vögel, p. 424. n. 445. *das schwarze dünnleibige Huhn aus Indien.*

Klein, av. p. III. n. 3. Alector Curassaus? Mitu-porangá.

Klein, Vorbereit. p. 206. n. 3. *Indianischer Hahn.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 115. n. 3. *Kurassauer.*

Briffon, ornithol. I. p. 84. n. 12. Hocco de la Guiane.

Büffon, Vögel, V. p. 281. der eigentlich so genannte Hokko. M. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 423. *der guianische Hokko.*

Latham,

- Latham*, Syst. ornith. II. p. 622. Crax (*Alector*)
cera flava, corpore nigro, ventre albo. (*mas*).
Bankroft, N. G. von Guian. p. 104. der Pfauen-
fasan von Guiana.
Schlözer, Erdbeschr. von Amer. p. 228. Curaſoe.
Schneider, zool. Abh. p. 139. indianische Hahn.
Perrault, Charsas u. Dodart, Abhandl. a. d. N.
G. I. p. 259. anatomische Beschr. dreyer india-
nischer Hähne, tab. 34. der indianische Hahn;
tab. 35. die Zergliederung.
Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 131. n. 163. der
schwarze indianische Hahn.
Neue Mannigfalt. III. p. 608. Kuraffovogel, Ku-
raffavische Pfauenfasan, Kuskovogel, fig. p.
624.
Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 55. Crax.
Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 27. n. 1. Crax niger,
corolla albo nigroque varia.
Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 157. n. 1. Crax (Ni-
gra) nigra.
Moehring, av. gen. p. 51. n. 46. Crax.
Jonſton, av. p. 191. Mituporanga.
Donndorff, Handb. d. Thiergeſch. p. 322. n. 1.
Der Curaffo.

β. MITU. Der brasiliatische Hoko.

- Müller*, Natursyst. II. p. 466. n. 3, der brasiliati-
ſche Pauwis.
Onomat. hist. nat. III. p. 458. der brasiliatische
Nachtwächter.
Klein, av. p. 112. Alestor Mitu vel Mutu.
Klein, Vorbereit. p. 207. Mitu oder Mutu.
Klein, verb. Vögelhist. p. 115. Mitu.
Brisson, ornith. I. p. 83. n. 11. Hocco du Brésil.
Büffon, Vögel, V. p. 285. brasiliischer Hokko,
p. 286. Mitu.

Latham, Syst. ornith. II. p. 623. β . Cr. cera rubra, corpore nigro, abdomine fusco.

Latham, Syn. II. 2. p. 691. Var. A.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 27. n. 3. Crax niger corolla atra, rostro rubro.

Barrere, ornithol. p. 83. Crax niger, crista tota atra, rostro cinnabrinus.

Jonston, av. p. 180. Mutu.

γ . *Der Curasso mit weißer Schwanzspitze.*

Latham, Syn. II. 2. p. 692. Var. B.

Latham, Syst. ornith. II. p. 623. γ .

δ . *Der Curasso mit weißem, schwarz gespitztem Federbusch.*

Latham, Syn. II. 2. p. 692. Var. C.

Latham, Syst. ornith. II. p. 623. δ . Cr. cera flava, corpore nigro, crista alba, apice nigra, collo albo nigroque fasciato.

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 131. α .

b. RUBRA. *Der (so genannte) peruvianische Hoko.*

Müller, Naturfyst. II. p. 466. n. 2. *der Peruvianische Pauw*.

Halle, Vögel, p. 426. n. 446. *das rothe Huhn aus Indien.*

Klein, av. p. 112. ad. n. 4. *Albini Gallina.*

Briffon, ornith. I. p. 86. n. 16. *Hocco du Perou.*

Büffon, Vögel, V. p. 283. *peruanische Hokko.*

Latham, Syn. II. 2. p. 693.

Latham, Syst. ornith. II. p. 623. n. 1. Crax (Alecto) rubra, capite caerulecente, crista alba, apice nigra. (*femina*.)

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 157. n. 2. Crax (Rubra) rubro capite caerulecente.

Gerini, ornithol. II. p. 77. tab. 227. *Gallopavo brasiliensis.*

ϵ . *Latham*,

$\varepsilon.$ *Latham*, Syn. II. 2. p. 693. Var. A.

Latham, Syst. ornith. II. p. 624. $\beta.$ Cr. corpore rubro, collo albo nigroque annulato, abdomine albo, cauda fusca.

$\zeta.$ *Latham*, Syn. II. 2. p. 693. Var. B.

Latham, Syst. ornith. II. p. 624. $\gamma.$ Cr. corpore toto fusco-rubro, lutescenteque fasciato.

$\eta.$ *Latham*, Syn. II. 2. p. 693. Var. C.

Latham, Syst. ornith. II. p. 624. $\delta.$ Cr. corpore fusco-rubro, collo albo nigroque annulato, cauda fasciis novem luteis nigro marginatis.

4. GLOBICERA. *Der schwarzbäuliche Curasso, mit kirschförmiger Kugel auf dem Stirnbein.* (¹)

Müller, Natursyst. II. p. 467. n. 4. der *Curassauische Pauw*.

Borowsky, Thierreich, II. p. 171. n. 2. der *Curassaoische Hokko*.

Onomat. hist. nat. III. p. 459. *Crax curassavicus*.

Klein, av. p. III. ad n. 3. *Gallus alias indicus*. p. 112. *Gallina indica*.

Klein, Vorbereit. p. 207. *die indianische Henne*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 115. ad n. 3. *Gallus indicus*. *Gallina indica*.

Brisson, ornith. I. p. 85. n. 13. *Hocco de Curassow*.

Büffon, Vögel, V. p. 282. 286. 291.

Batsch,

(1) Mit diesem Vogel scheint es noch nicht so ganz aufs Reine zu seyn, ob er wirklich eine eigene Gattung ausmache oder nicht. *Brisson* und *Büffon*, u. a. m. halten ihn dhr. Bedenken mit dem *Alector* für einerley; und *Edwards* sagt selbst, dass sein *Curassow Bird* der *Mituporanga* des *Marcgr.* sey. Auch finde ich bey *Seligmann*, *Dodart* mem. III. p. 223. als Synonym citirt. Hiezu kommt, dass, wie Edw. sagt, der Knöpf auf dem Schnabel erst nach dem ersten Jahre erscheint, und *Fernandez* an seinem *Tepetototl* ebenfalls einen Höker auf dem Schnabel wahrgenommen, der vielleicht eben diesen in der ersten Bildung begriffnen Knöpf vorstelle.

Batsch, Thiere, I. p. 423. der Kurassaosche Hokko.
Latham, Syst. ornith. II. p. 624. n. 2. Crax (Globicera) flava, narium gibbere globoſo, corpore nigro-caeruleſcente, abdomeni mo albo.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 85. der Curassovogel.
Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 132. b. das indianische Huhn.

Fonſton, av. p. 84. Gallus indicus alter.
Gerin. ornithol. II. p. 79. tab. 229.

5. PAUXI. Der Pauxi.

Müller, Natursyst. II. p. 468. n. 5. der mexicanische Pauwis.

Leske, Naturgesch. p. 223. n. 2. der Pauxi, Kusko.

Borowky, Thierreich, II. p. 172. n. 3. der Mexikanische Hokko.

Onomat. hist. nat. III. p. 460. der Hocco-Vogel von Mexico.

Klein, av. p. 112. Pauxi Nierembergii.

Klein, Vorbereit. p. 207. der Pauxi.

Klein, verb. Vögelhist. p. 115. ad n. 3. Pauxi.

Briffon, ornith. I. p. 85. n. 14. Hocco du Mexique.

Büffon, Vögel, V. p. 293. der Pauxi, Kusko, Steinvogel von Kayenne. M. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 423. Kusko.

Latham, Syst. ornith. II. p. 624. n. 3. Crax (Pauxi) cera caerulea, narium gibbere cristato, corpore nigricante, abdomine apiceque caudae albis.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 85. der Cusco.

Murr, Reis. d. Missionar. p. 230. der Pauxi.

Neue Mannigfalt. II. p. 601. der Kuskusvogel, oder mexikanische Pfauenfasan. M. e. Fig.

Fonſton, av. p. 84. Gallina indica altera.

Donn-

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 322, n. 2.
der Pauxi.

A. Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Edit. XII.

Edit. XIII.

p. 270. n. 2. *Crax rubra*. p. 736. b. *Cr. Alector. Femina*.

p. 270. n. 3. *Crax Mitu*. p. 736. β. *Cr. Alector. Var.*

Auf diese Art hat das Geschlecht jetzt drey Gattungen weniger, als vorhin. Bey der ersten sind die Var. β. bis η. hinzugekommen.

B. Neuere Gattungen.

I. Der Hoko mit hornartigem Gewächs auf dem Scheitel.

Briffon, ornith. I. p. 87. n. 18. *Crax vertice cono corneo onusto, Hocco à tête calleuse.*

Latham, Syn. Suppl. p. 206. *Galeated Curassow.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 624. n. 4. *Crax (Galeata) vertice corneo, corpore nigro, crisso albo.*

101. GESCHLECHT. PHASIANUS. Der Fasan.

Müller, Naturfyst. II. p. 469. Gen. CI.

Leske, Naturgesch. p. 223. Gen. VII.

Borowsky, Thierreich, II. p. 173. Gen. XXIX.

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 204. Gen. XLIV.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 463. Gen. LXI.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 333. Gen. XXXIX.

Onomat. hist. nat. VI. p. 431.

Briffon, ornith. I. p. 44. Gen III.

Batſch,

Batsch, Thiere, I. p. 410. Gen. CX.

Latham, Syst. ornith. II. p. 625. Gen. LIV.

Hermann, tab. affin. anim. p. 168.

Donndorff, Handb. d. Thiergeesch. p. 322. Gen. LXVIII.

I. GALLUS. Der Hahn.

Latham, Syst. ornith. II. p. 625. n. 1. *Phasianus* (*Gallus*) *caruncula compressa* *verticis geminaque* *gulæ*, *auribus nudis*, *cauda compressa adscendente*, *pennis colli linearibus elongatis*, *apice membranaceis*.

Sonnerat, Reis. nach Ostind. u. China. II. p. 116.

der wilde Hahn und die wilde Henne. tab. 94. 95.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 395. *der wilde Hahn*.

β. DOMESTICUS. Der gemeine Haushahn; gemeinsame Huhn.

Müller, Natursyst. II. p. 469. n. 1. *der Haushahn*.

Leske, Naturgesch. p. 224. n. 1. *das gemeinsame Huhn*.

Borowsky, Thierreich, II. p. 177. n. 5. *der Haushahn*.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 204. n. 1. *Phasianus* (*Gallus*) *caruncula compressa* *verticis geminaque* *gulæ*, *auribus nudis*, *cauda compressa adscendente*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 463. n. 1. *das gemeinsame Huhn*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 334. n. 1. *das gemeinsame Haushuhn*.

Funke, Naturgesch. I. p. 194. *das Huhn*.

Halle, Vögel, p. 418. n. 437. *das Haushuhn*.

Meyer, Thiere, I. Tab. 75. *das Huhn*, — tab. 76. *das Gerippe von Färberröthe roth*, — tab. 77. *Gerippe weiss von einem vierfüssigen Huhn*, — tab. 78. *dreyfüssige Hahn mit dem Gerippe*.

Gatterer,

- Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 244. n. 233. *der Haushahn.*
Neuer Schaupl. d. Nat. III. p. 622. *Hahn.*
Onomat. hist. nat. VI. p. 437. *der Haushahn.*
Beckmann, Naturhist. p. 49. n. 3. a. *der gemeine Haushahn.*
Handb. d. Naturgesch. II. p. 27. *der Hahn.*
Handb. d. deutsch. Thiergesch. p. 114. *der Haushahn; Gockel, Geker.*
Sander, oekon. Naturgesch. II. p. 14. *der Haushahn.*
Walther, oekon. N. G. Deutschl. p. 135. *Haushahn.*
Klein, av. p. III. A. 1. *Alestor.*
Klein, Vorbereit. p. 205. n. 1. *Nachtwächter.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 114. n. 1. *Haushahn; Kräher.*
Klein, Vögeleyer, p. 31. tab. 13. fig. 1.
Gesner, Vögelb. p. 160. *Han*, fig. p. 161. gut. p. 177. *Capaun, oder Caphan.* M. e. gut. Fig. p. 180 *Henne.* M. e. gut. Abbild.
Brisson, ornith. I. p. 45. n. 1. *Le coq et la Poule.*
Buffon, Vögel, IV. p. 78. *der Haushahn und die Henne.* M. 2. Figg.
Batsch, Thiere, I. p. 420. *der gemeine Hahn.*
Latham, Syn. II. 2. p. 700. *Domestic Cock,*
Latham, Synt. ornith. II. p. 626. n. 1. β . *Gallus domesticus*, caruncula compressa verticis geminaque gulæ, auribus nudis, cauda compressa adscendente, pennis colli linearibus elongatis.
Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 379. *das zahme Huhn.*
Cetti, Sardin. II. p. 101. *das Huhn.*
Molina, Chili, p. 209. *die Haushühner.*
Niebuhr, Beschr. von Arab. p. 168. *Hüner.*
Wolf,

- Wolf*, Ceyl. p. 137. *der Hahn.*
Olaffen, Isl. I. p. 118. *Hüner.*
Kolbe, Vorgeb. d. g. Hoffn. Ed. in 4. p. 388.
Hahnen und Hühner.
Pontoppidan, Dännem. p. 172. n. 1. *Hane.*
Pontoppidan, Norweg. II. p. 148. *Höns.*
Fermin, Surin. II. p. 138. *Haushuhn.*
Taube, Slavon. I. p. 40. *Hennen.*
Adanson, Senegall. p. 250. *Hühner.*
Allgem. Reis. IV. p. 265. 388.
Bosmann, Reis. n. Guinea, p. 240.
Borkhausen, Magaz. I. p. 213. n. 91.
Siemßen, meklenb. Vögel, p. 240. n. 1. *der Haushahn.*
Eberhard, Thiergesch. p. 63. n. 1. *der Haushahn.*
Merklein, Thierreich, p. 283. *Hänne.*
Meidinger, Vorles. p. 141. n. 1. *das gemeine Huhn.*
Naturforsch. XVII. p. 68. *der Haushahn.*
Krüntz, ökonom. Encycl. XXVI. p. 1. *Huhn.*
Oekonom. Zool. p. 84. n. 25. *der Haushahn.*
Jablonsky, allgem. Lex. p. 424. *Hahn.*
Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 133. n. 164. *der Haushahn.*
Beckmann, Bibl. VI. p. 385. *der Haus-Hahn.*
Allgem. Haushalt. u. Landwissensch. I. p. 824.
Beckmann, deutsche Landwirthsch. p. 471.
Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 56. *Gallina.*
Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 28. n. 1. *Gallus gallinaceus.*
Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 158. n. 1. *Phasianus (Gallus) cauda compressa ascendentē.*
Kramer, Austr. p. 355. n. 1. *Gallus cauda compressa ascendentē. Han.*
Charleton, onom. zoic. p. 75. n. 17. *Gallus Gallinaceus.*

Charle-

Charleton, exercit. p. 84. *Gallus Gallinaceus*.

Belon, hist. nat. des Ois. p. 242. *Coc, Coq, Gau, Geau, Gal, Gog.*

Schwenfeld, av. Siles. p. 264. *Gallus domesticus.*

Han. p. 266. *Gallina villatica; Hennie, Hun.*

Moehring, av. gen. p. 52. n. 49. *Gallus.*

Rzaczynsk. hist. nat. Polon. p. 432. *Gallus gallinaceus.*

Jonston, av. p. 72. *Gallus gallinaceus.*

Schäfer, element. ornithol. tab. 38.

Gerini, ornithol. II. tab. 207: 208.

Aristot. hist. anim. L. 6. c. 1. n. 58. c. 2. n. 1. 28. c. 3. n. 39. 45. c. 4. n. 49. Αλεκτορίδες.

Aelian. de nat. anim. L. 4. c. 29. Ἀλεκτρυών. L. 3. c. 38. L. 4. c. 16. Αλεκτορίδες.

Plin. hist. nat. L. 10. c. 21. c. 50. c. 56. *Gallus; Gallina.*

Varro, de re rust. L. 3. c. 9. *Gallinae villaticae.*

Columella, de re rust. L. 8. c. 2. *Gallina rustica.*

Palladius, de re rust. L. 1. c. 27. *Gallina.*

Donndorff, Handb. der Thiergeesch. p. 323. n. 1. der *Haushahn.*

γ. CRISTATUS. Das Haubenhuhn.

Müller, Natursyst. II. p. 470. a. *Haubenhuhn.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 178. a. *der Haubenhahn; geschoßte Hahn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 398. n. 2: *das Haubenhuhn.*

Brisson, ornith. I. p. 45. A. *Coq hupé.*

Büffon, Vögel, IV. p. 154. *der Haubenhahn, oder die gehäubte Henne.* tab. 86.

Latham, Syn. II. 2. p. 703. *Crested Cock.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 626. n. 1. γ. *Gallus domest. cristatus*, crista in vertice plumosa densissima.

Krünnitz, Encykl. XXVI. p. II. n. 2. *Haubenhahn,*
Buschhahn.

Siemßen, meklenb. Vögel. p. 243. a. der *Hautenhahn.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 440. n. 1. die *gehaubte Henne.*

Pontoppidan, Dännem. p. 172. *Tophöns.*

Borkhausen, Magaz. I. p. 214. β.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 158. β. *Gallus cristatus*, crista in vertice plumosa densissima.

Linné, fn. Suec. II. p. 72. β. *Gallina crista in vertice plumosa densissima, et undequaque diffusa spectabilis.*

Gerin. ornithol. II. tab. 216.

- a. *Das wriße Huhn mit schwarzem Federbusche.* *
- b. *Das schwarze Huhn mit weißem Federbusche.* *
- c. *Das goldfarbige Goldlackhuhn.* *
- d. *Das silberfarbige Silberlackhuhn.* *
- e. *Das achat- oder chamoifarbige.* *
- f. *Das schieferblaue.* *
- g. *Das geschuppte oder hermelinartige.* *
- h. *Die Wittwe, mit kleinen weißen Perlen auf bräunlichem Grunde.* *
- i. *Das feuerfarbige.* *
- k. *Das steinfarbige Huhn.* *
- l. *Das weiße Huhn mit dem großen Barte.* *
- Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 401. 402.
- δ. PENTADACTYLUS. *Das fünfzehige Huhn.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 410. n. II.
das fünfzehige Huhn.
- Briffon, ornith. I. p. 46. B. Coq à cinq doigts.
- Büffon, Vögel, IV. p. 169. *das fünfzehige Huhn.*
- Latham, Syn. II. 2. p. 703. Darking Cock.
- Latham, Syst. ornith. II. p. 626. n. 1. δ. *Gallus pentadactylus, domesticus, quinque digitis in utroque pede.*

Krünitz, Encykl. XXVI. p. 17. n. 17. das fünfzehige Huhn.

Borkhausen, Magaz. I. p. 214. γ.

ε. CRISPUS. Das Strupphuhn. (2).

Müller, Natur-syst. II. p. 470. e. das Kraushuhn.

Borowesky, Thierreich. II. p. 180. f. der Straub-hahn.

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 205. c. das krause Huhn.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 405. n. 5. das Strupphuhn, Straubhahn, Krullhahn, frisirter Hahn, türkischer Hahn; frei-ständischer Hahn mit krausen tockigen Federn.

Halle, Vögel, p. 422. n. 443. das krause Huhn mit umgekehrten Federn.

Onomat. hist. nat. VI. p. 441. n. 8. das Kraus-huhn.

Gesner, Thierb. p. 220. Hüner, so da Wollen tragen, m. e. mitteln. Fig.

Eberhard, Thiergech. p. 63. n. 3. die straubige Henne.

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 243. β. der Strupp-hahn.

Briffon, ornith. I. p. 46. n. 3. Coq frisé.

Büffon, Vögel, IV. p. 163. der Straubhahn, Krauß-hahn, tab. 87.

Latham, Syn. II. 2. p. 704. Crisped Cock.

Latham, Syst. ornith. II. p. 626. n. 1. ε. Gallus crispus, pennis sursum reflexis.

Pontoppidan, Dänem. p. 172. Purrhöns.

Cetti, Sardin. II. p. 101. das Straubhuhn.

Bankroft, Guian. p. 106. Hüner mit schuppichten und ungleichen Federn.

Neue Maunigfaltigk. III. p. 308. Hüner mit gekräuselten Federn.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 158. ♂. *Gallus crispus*.

Linné, fn. Suec. II. p. 72. ♂. *Gallina crispa*, nostratis Frislandica, pennis reflexis caput versus et velut inversis, *Krullhaena*.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 269. *Gallina lanigera?*

Gerin, ornithol. II. p. 71. tab. 215. *Gallus cincinatus*.

ζ. ECAUDATUS. *Das Kluthuhn.* (3)

Müller, Naturfyst. II. p. 470. b. *das ungeschwänzte Huhn*.

Borowsky, Thierreich, II. p. 181. n. 1. *der Kluthahn*.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 505. b. *der Kluthahn*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 402. n. 3. *das Kluthuhn; ungeschwänzte Huhn; Kaularsch; persische und virginische Huhn.*

Halle, Vögel, p. 421. n. 439. *das ungeschwänzte Huhn*.

Onomat. hist. nat. VI. p. 441. n. 5. *das ungeschwänzte oder persische Huhn.*

Brisson, ornithol. I. p. 48. n. 5. *Coq sans croupion, ou de Perse.*

Büffon, Vögel, IV, p. 167. *der Kluthahn*, tab. 91.

Latham, Syn. II. 2. p. 705. *Rumpleß or persian Cock.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 627. ζ. *Gallus ecaudatus, cauda seu uropygio carens.*

Krünitz, Encycl. XXVI. p. 16. n. 16. *der Kluthahn.*

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 243. γ. *der Kluthahn, Bolliges.*

Pontoppidan, Dännem. p. 172. *Gomphön.*

Borkhausen, Magaz. I. p. 215. ε. *Gumbert.*

Linné,

(3) Nach *Brisson* eine eigne Gattung.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 158. γ. Gallus ecan. datus.

Linné, fn. Suec. II. p. 72. γ. Gallina cauda sive uropygio carens; Gumphöns.

η. PUMILIO. Das Zwerghuhn. (4)

Müller, Natursyst. Suppl. p. 123. d. das Kriechhuhn.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 403. n. 4. das Zwerghuhn; holländische Hühnchen; Canishühnchen.

Briffon, ornith. I. p. 46. n. 2. Coq nain.

Büffon, Vögel, IV. p. 157. das kleine Javani-sche Zwerghuhn.

Latham, Syn. II. 2. p. 705. Dwarf Cock.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 627. η. Gallus pu-milio, pedibus brevissimis.

Krünitz, Encykl. XXVI. p. 12. n. 5. das kleine Javanische Zwerghuhn.

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 243. δ. der Zwerghahn; Krüper.

Borkhausen, Magazin, I. p. 215. ξ. Krupphahn.

Gerin. ornithol. II. p. 70. tab. 214.

Ω. PUSILLUS. Das englische Zwerghuhn.

Müller, Natursyst. II. p. 470. f. das Zwerghuhn.

Borowsky, Thierreich, II. p. 179. c. das engli-sche Zwerghuhn.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 404. c. Bantamhühner.

Halle, Vögel, p. 420. n. 438. das kriechende Huhn, mit ganz kurzen Schenkeln.

Onomat. hist. nat. VI. p. 442. n. 9. das Zwerghuhn.

Briffon, ornith. I. p. 47. B. Coq de Bantam.

Büffon, Vögel, IV. p. 158. der Hahn von Bantam; englische Zwerghahn.

Latham, Syn. II. 2. p. 706. Bantam Cock.

Latham, Syst. ornith. II. p. 627. ♀. *Gallus pusillus*, tibiis pennatis, pennis posticis elongatis.

Krünitz, Encykl. XXVI. p. 13. n. 8. der *Hahn von Bantam*; *gestiefelte, rauchfüßige Hahn*; *Kriechhahn*; *Kruphahn*.

Borkhausen, Magaz. I. p. 215. ♀. *Zwerghahn*.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 158. ε. *Gallus pusillus*, tibiis pennatis.

Gerin. ornithol. II. tab. 212.

¶. PLUMIPES. *Das rauchfüßige Huhn.*

Briffon, ornith. I. p. 47. A. Coq patu.

Latham, Syn. II. 2. p. 706. *Roughfooted Cock*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 627. i. *Gallus plumipes*, pedibus ad digitos usque plumosis.

Gerin. ornithol. II. tab. 212.

Borkhausen, Magaz. I. p. 216. ♀.

¶. TURCICUS. *Das türkische Huhn.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 180. e. *das türkische Huhn*.

Halle, Vögel, p. 421. n. 440. *das Türkische Huhn*.

Bechstein, Naturgesch.-Deutschl. III. p. 407. n. 8. *das Türkische Huhn*.

Onomat. hist. nat. VI. p. 440. n. 3. *das türkische Huhn*.

Briffon, ornith. I. p. 46. D. *Coq de Turquie*.

Büffon, Vögel IV. p. 161. *der Türkische Hahn*.

Latham, Syn. II. 2. p. 707. *Turkish Cock*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 627. k. *Gallus turcicus*, pulchris coloribus variegatus.

Krünitz, Encykl. XXVI. p. 14. n. 11. *der türkische Hahn*.

Borkhausen, Magazin, I. p. 216. i.

¶. PATAVINUS. *Das paduanische Huhn.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 181. k. *das paduanische Huhn*.

Bechstein,

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 408. n. 9.
das Paduanische Huhn; *große welsche Huhn*;
Hahn von Caux.

Onomat. hist. nat. VI. p. 440. n. 2. *das große welsche Huhn*.

Briffon, ornith. I. p. 46. C. Coq de Padoue.

Büffon, Vögel, IV. p. 170. *das Paduanische Huhn*.

Latham, Syn. II. 2. p. 707. Paduan Cock.

Latham, Syst. ornith. II. p. 628. λ. Gallus Patavinus corpore duplo maiore.

Krünitz, Encykl. XXVI. p. 17. n. 19. *der paduanische Hahn*.

Gerin, ornithol. II. p. 66. tab. 209. 210.

Encycl. oecon. XIII. p. 27. Poule de Mirebalais.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 266. Gallus maior exoticus, *Paduanischer Hahn*.

μ. MORIO. - *Das Mohrenhuhn.* (5)

Müller, Natursyst. II. p. 470. c. *das Mohrenhuhn*.

Borowsky, Thierreich, II. p. 180. h. *das Mohrenhuhn*.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 205. ε. *das Neggerhuhn*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 408. n. 10. *das Mohrenhuhn*.

Onomat. hist. nat. VI. p. 441. n. 7. *das schwarze oder Mohrenhuhn*.

Briffon, ornith. I. p. 48. n. 4. Coq negre ou de Mozambic.

Büffon, Vögel, IV. p. 165. *das Mohrenhuhn*.

Borkhausen, Magazin, I. p. 216 k. Gallus Aethiops.

Latham, Syn. II. p. 708. Negro Cock.

Latham, Syst. ornith. II. p. 628. μ. Gallus Morio, crista et palearibus nigris.

(5) Nach Briffon eine eigne Gattung.

Krünitz, Encycl. XXVI. p. 16. n. 15. das schwarze oder Mohrenhuhn.

Naturforsch. XVIII. p. 239. Mohrenhühner.

Isenflamm, pract. Anmerk. über die Muskeln, p. 398.

v. NIGER. Das schwarze Huhn.

Ist, nach Latham, mit dem vorhergehenden einerley. Ich habe auch außer dem Gimelinschen, kein Synonym weiter finden können.

ξ. TOPHACEUS. Das beulenstirnige Huhn.

Pallas, N. G. merkw. Th. IV. p. 20. Hühner mit Beulen auf dem Scheitel, tab. 3.

Latham, Syst. ornith. II. p. 628. v. Gallus topheus, vertice tuberoso.

o. LANATUS. Das Wollhuhn.⁽⁶⁾

Müller, Natursyst. II. p. 470. d. das Straubhuhn.

Borowsky, Thierreich, II. p. 180. g. das Japanische Huhn.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 205. d. das Wollhuhn.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 406. n. 6. das Wollhuhn.

Onomat. hist. nat. VI. p. 441. n. 6. das Straubhuhn.

Brisson, ornith. I. p. 48. n. 6. Coq du Japon.

Latham, Syn. II. 2. p. 708. Silk-Cock.

Latham, Syst. ornith. II. p. 628. o. Gallus lanatus, pennis pilorum aemulis.

Krünitz, Encycl. XXVI. p. 15. n. 14. das japanische Huhn.

Folgender, vielleicht noch hieher gehörigen Varietäten finde ich in unserem System nicht gedacht.

a. Der asiatische wilde Hahn.

Büffon, ois. ed. in 8. p. 166. Coq sauvage de l'Asie.

Büffon,

(6) Nach Brisson eine eigne Gattung.

Büffon, Vögel, IV. p. 156. *der asiatische wilde Hahn.*

b. *Der Akoho.*

Büffon, l. c. p. 167. Acoho, ou Coq de Madagascar.

Büffon, Vögel, IV. p. 157. *der Akoho; der Hahn von Madagaskar.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 410. n. 14. *der Hahn von Madagaskar.*

Krünitz, Encykl. XXVI. n. 4. *der Acoho.*

c. *Das Huhn aus der Meerenge von Darien.*

Büffon, l. c. p. 168. Poule de l'Isthme de Darien.

Büffon, Vögel, IV. p. 158. *das Huhn aus der Meerenge von Darien.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 411. n. 15.

Krünitz, Encykl. XXVI. p. 12. n. 6.

d. *Das Huhn von Camboge.*

Büffon, l. c. p. 168. Poule de Camboge.

Büffon, Vögel, IV. p. 158. *das Huhn von Camboge.*

Krünitz, Encykl. XXVI. p. 12. n. 7.

e. *Das indianische Halbhuhn.*

Büffon, l. c. p. 170. Demi-poule d'Indes.

Büffon, Vögel, IV. p. 160. *das Indianische Halbhuhn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 411. n. 17. *das Indische Halbhuhn.*

Krünitz, Encykl. XXVI. p. 13. n. 9.

Allgem. Reis. VIII. p. 93. *Indianische Halbhühner.*

f. *Das englische Huhn.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 179. d. *der Englische Hahn.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 205. a. *der Englische Hahn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 407. n. 7.
das Englische Huhn.

Halle, Vögel, p. 421. n. 441. *das Englische Huhn.*
Onomat. hist. nat. VI. p. 441. n. 4. *das Englische Huhn.*

Briffon, ornith. I. p. 46. E. *Gallus Anglicanus*,
Coq d'Angleterre.

Büffon, loc. c. p. 171. *Coq d'Angleterre.*

Büffon, Vögel, IV. p. 161. *der englische Hahn.*
M. 2. Figg.

Frisch, Vögel, tab. 129. *der englische Hahn*, tab.
 130. *die englische Henne*, (cf. *Bechstein* l. c. p.
 675. 676.)

Krünitz, Encykl. XXVI. p. 14. n. 10. *der englische Hahn.*

g. Das hamburgische Huhn.

Büffon, l. c. p. 172. *Coq de Hambourg.*

Büffon, Vögel, IV. p. 162. *der Hamburgische Hahn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 397. c. *der Hamburgische Hahn.*

Krünitz, Encykl. XXVI. p. 14. n. 12. *Sammet-hosen.*

h. Das Huhn von Sansevarre.

Büffon, l. c. p. 172. *Poules de Sansevare.*

Büffon, Vögel, IV. p. 170. *die Hühner von Sansevarre.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 451. n. 16. *die Sansevarrischen Hühner.*

Krünitz, Encykl. XXVI. p. 17. n. 18.

i. Der gehörnte Hahn.

Latham, Syst. ornith. II. p. 628. ξ . *Gallus cornutus*, *vertice cornibus donato.*

Worm, de cornuto Gallo. — *Bartholin.* epist. Cent. I. ep. 38. p. 112.

Seaerin, de gallis cornutis, ib. ep. 60. p. 245.

Lochner, gallus cornutus. — Eph. nat. cur. Dec. II. an. 8. obsf. 26. p. 74. c. f.

Francus, pullus cornutus, ibid. Vol. I. obsf. 147. p. 317. c. f.

Gerin. ornithol. II. tab. 213.

k. *Das sechszehige Huhn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 410. n. 12.

l. *Die Spornhenne.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 410. n. 13.

m. *Das Bastardentenhuhn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 411. n. 18.

Taube, Naturk. von Zelle, II. p. 257.

Mannigfaltigk. II. p. 600.

n. *Die Hühner in Xensi, mit Schafwolle auf dem Leibe?*

Dapper, China, p. 14.

Büffon, Vögel, IV. p. 164. n. 84.



Sonnini de Moncourt, über die Hühner des mittägigen Amerika, — in *Rozier* obsf. sur la Phys. VI. p. 130.

Hannemann, de gallinae quibusd. mirabilibus. — Eph. nat. cur. Dec. III. an. 3. obsf. 60. p. 69.

Hanow, beurtheilte Seltenheiten, die man an Hühnern gefunden. — Merkwürdigk. d. Nat. I. p. 293.

Bemerk. bey Erziehung junger Hühner. — Han. növ. nützl. Samml. 1756. p. 1565.

Ob die Hühner in einer Stadt mehr zu erhalten kosten, als sie eintragen? — Fränk. Samml. V. p. 442.

Naturgesch. des Huhns. — Gothaisch. Hofkal. 1777.

Eine wunderbare Geburt und Veränderung der Natur von einer Henne, Straßburg 1538. fol. I. B.

Von monströsen Hühnern. — Bresl. Nat. und Kunstgesch. 19. Vers. p. 297.

Büchner, von einer Henne, welche zwey Küchlein ausgebrütet, mit doppelten Köpfen, vier Flügeln, und vier Füßen. — ibid. 1726. Sect. 36. p. 745.

Imago pulli gallinacei bicipitis. — *Lambec.* bibl. L. VI. app. p. 317.

Rommel, de pullo gallinaceo quatuor alis. ac totidem pedibus praedito. — Eph. nat. cur. Dec. II. an. 5. obs. 148. p. 301. c. f.

Stolterfoht, descript. galli quadrupedis. — Nov. lit. maris Balth. 1703. p. 67. c. f.

Hoffmann, de pullo gallinaceo quadrupede. — Eph. nat. cur. Dec. III. an. I. obs. 142. p. 237. cum figg.

Graff, de pullo gallinaceo monstroso. ib. Vol. IV. obs. 106. p. 426.

Von der Missgeburt einer Henne. — Hamb. Magaz. II. p. 649.

Hühner mit Entenfüßen. — Bresl. Nat. und Kunstgesch. 21. Vers. p. 176.

Von Hühnern mit *rauen Füßen*. — Neue Gesellschaftl. Erzähl. III. p. 337. IV. p. 286.

Hainneiaun, de mira metamorphosi plumarum in gallina. — Nov. lit. maris Balth. 1705. p. 27.

Hannemann, coloris plumarum in gallina mutatio. — Eph. nat. cur. Dec. II. an. 8. obs. 163. p. 371.

Harder, gallina ex carbonibus devoratis fatua, et anatome gallinae subito enectae. — in Obs. thesaur. obs. 16. et 17. p. 67. c. f.

Harder,

Harder, de gallinarum ductibus cholodochis, vesicula lactea, etc. ib. obs. 18. p. 72.

Peyer, exercit. de glandulis intestinorum, acc. anatome ventriculi gallinacei. Schafhus. 1677. 8.

Brickmann, de gallo, cuius ossa crassa et spongiosa. — Commerc. Norib. 1742. p. 175. c. f.

Verdries, de medulla in ossibus femoris gallinae lapidea. — Eph. nat. cur. Dec. III. an. 9. obs. 252. p. 434.

Gahrliep, de cystide monstrosa in gallina domestica. ib. Dec. II. an. 8. obs. 195. p. 494. c. f.

Borrich, de iecore gallorum monstrosae magnitudinis. — Act. Haffn. Vol. I. obs. 92. — Manget. bibl. I. 2. p. 387.

Hartmann, de gallinae utero hydropico, de hernia pulli gallinacei, de hepate gallinaceo pingui. — Eph. nat. cur. Dec. III. an. 2. obs. 191 — 194. p. 302. ff.

Bukkii, obs. de hepate gallinae macilentae magno et ponderoso. — Nov. lit. mar. Balth. 1704. p. 361.

Ein Fleischgewächse im Magen einer Henne. Wittenb. Wochenbl. XVI. p. 29.

Strauß, diss. de Ovo galli. Giesl. 1670. 4.

Relation von einem Hahne, der Eyer gelegt; — Tenzels monathl. Unterred. 1696. p. 884.

Gockelii, eyerlegender Hahn, sämmt seinem gelegten Hahnen- oder Basiliskeney, nebst einem Anhange von allerhand seltsamen Eyern. Ulm. 1697. 8.

Bartholin, galli ovipari anatome. — Hist. anatom. Cent. I. hist. 99. p. 162.

Id. de gallo oviparo. — Epist. Cent. III. ep. 52. p. 212.

Henr. Secretae à Zavorziz, de gallo gallinaceo, ova ponente. — Eph. nat. cur. Dec. I. an. 3. obs. 177. p. 285.

- Cleyer*, de ovo gallinaceo praegnante, et hepate gallinarum insigni. ib. Dec. II. an. I. obs. 17. p. 38.
- Ledel*, de gallo gallinaceo oviparo. ib. Dec. II. an. I. obs. 145. p. 359.
- Gründel*, de gallo gallinaceo oviparo. ib. Dec. II. an. 5. obs. 211. et 212. p. 435.
- Gahr liep*; notabilia quaed. circa formationem pulli gallinacei. — Eph. Nat. cur. Dec. II. an. 10. obs. 4. p. 13. c. f.
- Hannaei* gallina superfoetans. ib. Dec. II. an. 8. obs. 117. p. 259.
- Lanzon*. gallina pullum pariens. ib. Dec. III. an. I. obs. 42. p. 60. cf. Dec. II. an. 4. append. obs. 28. — it. Bresl. Samml. 1717. Novemb. p. 326. — Journal des Scav. 1678. Juill. p. 280.
- J. Dan. Maior*, de pullo gallinacio, pullis incubante ib. Dec. I. an. I. obs. 6. p. 9.
- Kochansky*, de gallina reviviscente. ib. Dec. II. an. I. obs. 132. p. 333.
- Camerarius*, caro gallinacea quomodo cocta facilis fiat. — Syll. memorab. Cent. XII. P. 43. p. 1011.
- Ob man von vielen Hühneressen das Podagra bekomme. — *Schaarschmidt*, medic. chirurg. Nachr. II. Jahrg. p. 97.
- Schröder*, de gallorum vario apud veteres usu. Lips. 1743. 4.
- Golzii*, Alecfromachia. Lub. 1709. 4.
- Scaliger*, gallinaceus et eius cantus. — de Subtil. ex. 239. p. 736.
- Innichenhöfer*, orat. de Gallicinio. Witt. 1623.
- Vinding*, diss. phys. phil. de Gallicinio. Hafn. 1674. 4.
- Reland*, orat. de galli cantu, Hierosolymis auditio. Traj. ad Rhen. 1718. 8.

Beson-

Besondere Freundschaft zweyer Hähne. — Neueste Mannigfalt. III. p. 193.

Hartmann, Anatome Caponis inedia enecti. — Eph. nat. cur. Dec. II. an. 7. obs. 17. p. 36.

Schröck, de podagra et ossium excrecentia in Capone. — ib. Dec. II. an. 4. obs. 174. p. 341.

Vom Ausbrüten der Hühner durch Capaunen. — Hannöv. Beytr. 1762. p. 395. 782. 1258.

Geissler, von einem im Bauche einer Henne gebildeten Küchlein. — Fränk. Samml. 1761. St. 31. p. 49.

Reaumur; art de faire eclorre et de elever en toute saison des oiseaux domestiques de toutes espèces, etc. II. p. 239. ff.

Eine Henne brütet Enteneyer. Hannöv. Magaz. 1780. p. 479.

Hühner über einer brennenden Lampe auszubrüten. Hannöv. gel. Anz. St. 72. 1751. p. 654.

Geöffnete Eyer auszubrüten, um die allmäßliche Bildung des Hühnchens zu beobachten. — Hamb. Magaz. XIX. p. 135.

Von künstlicher Ausbrütung der Eyer sind die Schriften verzeichnet, in *Krünitz* Encykl. III. p. 188.

Von Hühnereyern und Merkwürdigkeiten der Eyer überhaupt. S. *Krünitz* l. c. Art. Ey. — *Böhmer*, Handb. d. Naturgesch. II. 1. p. 533 — 543.

Berechnung über den Nutzen der Hühner. — *Leopolds Landwirthsch.* Sorau 1750. 4. p. 516.

Hühner mit Knochen, so schwarz wie Ebenholz. — *Lichtenbergs Magaz.* III. 2. p. 155.

Sonderbares Hühnerey. — ib. I. 2. p. 83.

Brütende Henne unterscheidet die faulen Eyer von den guten. Ib. I. 3. p. 65.

- In der Leber eines Hahns Kiesel u. a. Steine. ib. I.
4. p. 218.
- Wie das Hühnchen im Ey die Schale durchbricht.
ib. II. 4. p. 216.
- Wie die Küchlein in Cairo in Oefen ausgebrütet
werden. — Schwed. Abhandl. I. p. 38. X.
p. 253.
- Wie die Chinefer sie ausbrüten. ib. XXX. p. 202.
- Von den Krankheiten, sonderlich dem Pips der
Hühner. Zink: Leipz. Samml. X. p. 964. et
1090. — Hannöv. gel. Anz. 1754. p. 473. 545.
758. — Hannöv. nützl. Samml. 1757. p.
222. — Phys. ökon. Patriot. II. p. 365. —
Berlin. Samml. I. p. 364. — Witt. Wochenbl.
X. p. 91.
- Eine gute Fütterung für die Hühner: — Gaz. litt.
de Berlin 1774. n. 552. Berlin. Samml. VIII.
p. 277.
- Küchlein in kurzer Zeit fett zu machen: Gaz. litt.
de Berlin 1770. n. 349. Berlin. Samml. III.
p. 396.
- De ovo et pullo vid. *Blasii* anat. animal. p. 258.
m. K.
- Garmanni*, Oologia curiosa. Cygn. 1691. 4.
- Libavii*, diss. de ovo gallinarum et pulli ex eo ge-
neratione. Coburg 1610. 4.
- Schoockii* diss. de ovo et pullo. Ultraj. 1643. 12.
- Anonymi* diss. de ovo et pullo. Wratisl. 1661. 12.
- Marcelli*. *Malpighii*, de formatione pulli in ovo
liber. Lond. 1666. et 1672. 4. c. fig.
- Aldes*, observat. naturales in ovis factae. Amst.
1673. 12.

a. MOTMOT. *Der Katraka.*

Müller, Natursyst. II. p. 471. n. 2. *der ungespornte Hahn.*

Borowsky,

Borowsky, Thierreich, II. p. 181. n. 6. *der ungespornte Hahn.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 442. *der amerikanische Fasan.*

Brisson, ornith. I. p. 76. n. 3. *Faisan de la Guiane.*

Büffon, Vögel, V. p. 262. *der amerikanische Fasan, oder Katraka.* M. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 422. *Katraka.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 632. n. 9. *Phasianus (Motmot) fuscus subtus rufescens, cauda cuneata, rectricibus lateralibus rufis.*

Schneider, zool. Abhandl. p. 142. *der amerikanische Fasan.*

Moehring, av. gen. p. 80. n. 103. *Columbae ad finis.*

8. PARRAKA. *Der Parraka.* (7).

Büffon, Vögel, V. p. 313. *der Parraka.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 632. n. 12. *Phasianus (Parraqua) superistatus fuscus, subtus fulvus, cauda elongata, apice integra.*

Bankroft, Guian. p. 106 *Hannaqua.*

Sainml. zur Phys. u. N. G. II. p. 601. *der Parraka.*

Barreire, Fr. equinox. p. 140. *Phasianus vertice fulvo circato.*

Donndorff, Handb. d. Thiergeesch. p. 324. n. 2. *der Parraka.*

9. MEXICANUS. *Der mexikanische Fasan.*

Büffon, Vögel, V. p. 313. *der Hoitlallotl.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 257. *der Hoitlallotl.*

Latham,

(7) Es scheint noch nicht ganz entschieden zu seyn, ob nicht diese Gattung mit der vorhergehenden eineley ist.

Latham, Syst. ornith. II. p. 632. n. 10. *Phasianus* (*Mexicanus*) fulvo-albus, cauda elongata, tectricibus viridi-nitentibus.

Raj. Synops. av. p. 158?

10. CRISTATUS. Der Hoazin.

Müller, Natursyst. suppl. p. 125. n. 9. *der Hoizin*.
Borowsky, Thierreich, II. p. 172. n. 4. *der Hoizin; amerikanische Schlangenfresser*.

Onomat. hist. nat. IV. p. 255. *Hoactzin*.

Briffon, ornith. I. p. 86. n. 15. *Hocco brun du Mexique*.

Büffon, Vögel, V. p. 297. *der Hoizin, oder gehäubte Kayennische Fasan*. m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 422. *der Hoizin*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 631. n. 7. *Phasianus* (*Cristatus*) fulvo-fuscus, capite cristato, fascia alarum dupli pallida, cauda apice lutea.

Charleton, onomast. zoic. p. 113. n. 10. *Hoactzin*.

Jonston, av. p. 172. *Hoactzin*.

Diction. des animaux II. p. 478.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 324. n. 3. *der Hoizin*.

3. COLCHICUS. Der gemeine Fasan. (8).

Müller, Natursyst. II. p. 472 n. 3. *der Fasan*.

Leske, Naturgesch. p. 224. n. 2. *der Fasan*.

Borowsky, Thierr. II. p. 173. n. 2. *der gemeine Fasan*.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 206. n. 2. *Phasianus* (*Colchicus*) rufus, variegatus, capite viridi caerulecente, cauda cuneata, genis papillosis.

Beckstein,

(8) Wird etwa 7. höchstens 10. Jahr alt. Nährt sich von allerhand Getraide; frisst auch gern Mispeln und verschiedene Beeren. Begattet sich im März und Aprill. Nimmt man der Henne die Eyer, so legt sie oft über dreysig. Brütet 20 bis 25 Tage.

- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 470. n. 2. *der gemeine Fasan.*
- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. III. p. 412. *der gemeine Fasan.* p. 440. *Phasian; Fasanenvogel.*
- Funke*, Naturgesch. I. p. 220. *der Fasan.*
- Ebert*, Naturi. II. p. 110. *der Phason.*
- Halle*, Vögel, p. 433. n. 453. *der Fasan.* Fig. 30.
- Meyer*, Thiere, II. p. 1. tab. 2. *der Fasan* (mit dem Gerippe in 2. Vorstellungen.)
- Gatterer*, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 258. n. 234. *der Fasan.*
- Beckmann*, Naturhist. p. 50. c. *der Phasian.*
- Neuer Schaupl. d. Nat. II. p. 758. *Fasan.*
- Onomat. hist. nat. VI. p. 432. *Fasan.*
- Handb. d. Naturgesch. II. p. 68. *der Fasan.*
- Handb. d. deutsch. Thiergeesch. p. 114. *Phasian.*
- Walther*, oekon. N. G. Deutschl. p. 127. *Fasan.*
- Klein*, av. p. 114. n. 1. *Phasianus simpliciter.*
- Klein*, Vorbereit. p. 211. n. 1. *Fasan.*
- Klein*, verb. Vögelhist. p. 118. n. 1. *gemeiner Fasan.*
- Klein*, stemmat. av. p. 25. tab. 29. B.
- Klein*, Vögeleyer, p. 32. tab. 14. fig. 7. 8.
- Brisson*, ornithol. I. p. 73. n. 1. *Faisan.*
- Büffon*, ornith. V. p. 201. *der Fasan;* m. 2. figg.
- Gesner*, Vögelb. p. 105. *Fasan.* fig. p. 106. schl.
- Batsch*, Thiere, I. p. 421. *der gemeine Fasan.*
- Latham*, Syst. ornith. II. p. 629. n. 4. *Phasianus (Colchicus) rufus, capite caeruleo, cauda cuneata, genis papillosis.*
- Bock*, N. G. von Preuss. IV. p. 391. *der Fasan.*
- Pontoppidan*, Dännem. p. 172. n. 2. *Fasan.*
- Siemssen*, meklenb. Vögel, p. 244. n. 2. *der gemeine Fasan.*
- Kolbe*, Vorgeb. d. g. Hoffn. Ed. in 4. p. 394. *Fasan.*
- Pallas*, nord. Beytr. III. p. 17. *der Fasan.*

Allgem. Reis. V. p. 202. VII. p. 632. XI. p. 692.

Fasanen.

Naturforsch. XVIII. p. 69. *der Fasan.*

Scopoli, Beim. a. d. N. G. p. 135. n. 166. *der gemeine Fasan.*

Lichtenberg, Magaz. II. I. p. III. *der Fasan.*

Beckmann, Bibl. Vi. p. 397. *der Fasan.*

Krünitz, Encycl. LII. p. 214. *Fasan.*

Eberhard, Thiergesch. p. 65. n. 1. *der Fasan.*

Geoffroy, mater. med. VII. p. 633. *der Fasan.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 46. *Fasan.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 279. *der Fasan.*

Borkhausen, Magaz. I. p. 218. n. 92.

Meidinger, Vorles. I. p. 141. n. 2. *der Fasan.*

Oekonom. Zool. p. 86. n. 26. *der Fasan.*

Jablonsky, allgem. Lex. p. 320. *Fasan.*

Anweis. Vögel zu fang. etc. p. 424. *der Phasan.*

Loniceri, Kräuterb. p. 670. *Phasan.*

Anonym. Naturgesch. des Fasans. Lpz. 1780. 8.

Onomatol. forestal. I. p. 682.

Onomatol. oecon. pract. I. p. 1025.

Lemmery, Materialex. p. 867.

Regnard, voy. de Lapponie p. 105.

Ronnefort, descript. de Madagascar. p. 120.

Flacourt, hist. de Madagascar. p. 165.

Hamel, relation de la Coréc. p. 587.

Bosmann, descr. de la Guinée. p. 319.

Villault de Bellefond, relat. des Côtes d' Afrique.
p. 270.

Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 56. *Phasianus.*

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 28. n. 1. *Phasianus vulgaris.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 158. n. 3. *Phasianus (Colchicus) rufus, capite caeruleo.*

Kramer, Austr. p. 356. *Phasianus cauda erecta, capite laevi.*

Moehring,

Moehring, av. gen. p. 53. n. 50. *Tetrao*.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 331. *Phasianus. Fasan.*
Pafian.

Charleton, onom. zoic. p. 72. n. 3. *Phasianus;*
Phasidis ales.

Belon, hist. nat. des ois. p. 253. *Faisan. c. f.*

Jonston, av. p. 60. *Phasianus.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 168. *Phasianus Col-*
chicus.

Zinnan. Uov. p. 28. tab. 2. fig. 5. *Fagiano.*

Bomare, Dictionn. IV. p. 343. *Faisan.*

Dictionn. des animaux. II. p. 146. *Faisan.*

Aristot. hist. anim. L. 6. c. 2. n. 19. *Φασιανοί*

Aelian. de nat. aniin. L. 13. c. 18. *Φασιανοί.*

Plin. hist. nat. L. 10. c. 48. L. 11. c. 37. *Phasianae*
aves.

Palladius, de re rust. L. 1. c. 29. *Phasiani.*

Sueton. Vitell. c. 13. *Phasianus.*

Sueton. Caligul. c. 29. *Phasianae.*

Petron. Satyr. 79. 1. *Phasidos aves.*

Lamprid. Alexand. c. 41. *Phasianus.*

Martial. epigr. L. 13. ep. 72. *Phasis.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 325 n. 4.
der *Fasan.*

β. TORQUATUS. *Der Fasan mit dem Halsringe.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 441. n. 3.
der *Fasan mit dem Halsringe.*

Latham, Syn. Suppl. p. 208. *Ring Pheasant.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 629. β. *Ph. rufus,*
capite caeruleo, cauda cuneata, collo torque
albo.

γ. VARIUS. *Der bunte Fasan.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 175. b. *der bunte Fasan.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 441. n. 2.
der *bunte Fasan; weissbunte Fasan.*

Brisson, ornith. I. p. 75. A. Faisan panaché.

Büffon, Vögel, V. p. 238. der bunte Fasan; m. e. Fig.

Latham, Syn. II. 2. p. 267. Variegated Pheasant.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 630. γ. Phasianus Varius.

Borkhausen, Magaz. I. p. 218. n. 92. β.

δ. ALBUS. Der weiße Fasan.

Borowsky, Thierreich, II. p. 175. a. der weiße Fasan; Silberfasan.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 440. n. 1. der weiße Fasan (fälschlich Silberfasan).

Brisson, ornith. I. p. 75. b. Faisan blanc.

Büffon, Vögel, V. p. 236. der weiße Fasan.

Latham, Syn. II. 2. p. 716. White Pheasant.

Latham, Syst. ornith. II. p. 630. δ. Phasianus albus.

Götz, Naturgesch. einig. Vögel. p. 20. der weiße Phasan.

Geoffroy, mater. med. VII. p. 645.

ε. HYBRIDA. Der Fasanenbastard.

Müller, Natursyst. II. p. 473. Bastardfasane.

Borowsky, Thierreich, II. p. 175. c. der Fasanenbastard.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 442. n. 5. der Fasanenbastard.

Brisson, ornith. I. p. 75. C. Faisan bastard.

Büffon, Vögel, V. p. 239. der Bastardfasan, oder Fasanenbastard; m. e. Fig.

Latham, Syn. II. 2. p. 716. Hybridal Pheasant.

Latham, Syst. ornith. II. p. 630. ε. Phas. hybridus.

Geoffroy, mater. med. VII. p. 642.

Onomat. forestal I. p. 682.

Borkhausen, Magazin, I. p. 218. n. 92. γ.

♂. GALLOPAVONIS. Der türkische Fasan.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 441. n. 4.
der Türkische Fasan.

Büffon, Vögel, IV. p. 222. ein Bastard, der aus
der Vermischung der Puter mit dem Fasanen
entstanden seyn soll.

Büffon, Vögel, V. p. 240. der Fasanputer.

Latham, Syn. II. 2. p. 717.

Latham, Syst. ornith. II. p. 630. ♂. Ph. Gallopa-
vonis.

Philos. transact. LI. p. 883. tab. 19.



Anon. Précis de la nature d'élever les Faisans et les
Perdreaux. Paris 1772. 12.

Berlin. Samml. V. p. 555.

Hunter, de rara Phasiani varietate. — Phil. trans-
act. LXX. p. 527.

Camierarius, Phasianorum caro grata, eorum orna-
mentum naturale. — Syll. memorab. Cent.
VII. P. 63. p. 473.

Unterricht, was bey Anlegung einer Phasanerey
zu beobachten. — Oekon. Nachr. I. p. 891.
VII. p. 417.

Chladenii dissert. de iure Phasianorum eorumque
banno.

Von den, in Brandenb. Landen seit langen Zeiten
her angelegten Fasanerien. — Beckmann
Beschr. der Chur und Mark Brandenburg, I.
p. 808.

Börner, Stadt- und Landwirthsch. p. 227.

Zückert, Speis. a. d. Thierreich. p. 92.

Büchotz, Abhandl. vom Federvieh. Münst. 1777.
p. 185.

Bergius, Poliqey- und Cameral-Magaz. III.
p. 5.

- Von der Fasanenzucht — Neue oekonom. Nachr.
Leipz. 1769. p. 611.
- Von Anleg. der Fasanerien. — Jungs Forstwirthschaft, II. p. 236.
- Streins Realwörterbuch, art. *Fasan*.

4. ARGUS. *Der Argusfasan.*

- Müller, Natursyst. II. p. 473. n. 4. der *Pfau-fasan*.
- Borowsky, Thierreich, II. p. 176. n. 3. der *Argusfasan*.
- Ebert, Naturl. II. p. 111. *Pfaufasan; Argus*.
- Neuer Schapl. d. Nat. II. p. 769. n. 5. *Fasan mit blauen Flecken*.
- Onomat hist. nat. VI. p. 431. der *Pfaufasan*.
- Büffon, Vögel, V. p. 257. der *Argusfasan*.
- Martini, Naturlex. III. p. 185. *Argusfasan*.
- Latham, Syst. ornith. II. p. 629. n. 3. *Phasianus (Argus) luteus, nigrō punctatus, facie rubra, occipite cristato caeruleo*.
- Marsden, Beschr. von Sumatra, p. 134. *Kuh-Auh*.
- Bomare, Diction. IV. p. 349. — Dict. des anim. II. p. 151.

5. PICTUS. *Der chinesische Goldfasan.* (9)

- Müller, Natursyst. II. p. 474. n. 5. der *bunte Fasan*.

Leske,

(9) Wird etwa 10. höchstens 15. Jahr alt. Frisst Reis, Hanf, Weizen, Gersten, braunen Kohl, Sallat, auch Laub von Hekken, besonders grüne Pflaumen und Birnen, und verschiedene Insekten. Begattet sich im April. Das Weibchen legt zu Ende dieses Monats in einem Busch in ein rund geschartes Loch 12—15 Eyer, etwas Englisher als die vom gemeinen Fasanen, hellrostfarben, oder schmutzig röthlichweiss. Brütet 23. Tage. Die jungen sind ganz grau, etwas gelblicher als ein gemeiner Fasan, und bleiben in dieser Kleidung ein ganzes Jahr. Die mehrere

Leske, Naturgesch. p. 224. n. 3. *der bunte Fasan*.
Borowsky, Thierreich, II. p. 173. n. 1. *der chinesische Goldfasan*, tab. 29.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 206. n. 3. *Phasianus (Pictus) crista flava, pectore coccineo, remigibus secundariis caeruleis, cauda cuneata*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 472. n. 3. *der Goldfasan*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 443. n. 3. *der Goldfasan*, p. 450 *rother Fasan*; *dreyfarbiger Fasan aus China*, *gemaelter Fasan*, *bunter Fasan*; *chinesischer Blutfasan*; *chinesischer Goldhahn*.

Ebert, Naturl. II. p. 111. *der bunte chinesische Fasan*.

Halle, Vögel, p. 436. n. 455. *der rothe Fasan*; *mit langen rothen Ohrenfedern*.

Neuer Schapl. d. Nat. II. p. 769. n. 3. *blutrother Fasan*.

Onomat. hist. nat. VI. p. 444. *der bunte Fasan*.

Klein, av. p. 114. n. 3. *Phasianus sanguineus*.

Klein, Vorbereit. p. 211. n. 3. *der rothe Sinesische Fasan*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 118. n. 3. *blutrother Fasan*.

Briffon, ornithol. I. p. 76. n. 4. *Faisan doré de la Chine*.

Büffon, Vögel, V. p. 245. *der chinesische dreyfarbige, rothe oder Goldfasan*. M. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 421. *der chinesische Goldfasan*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 631. n. 5. *Phasianus (Pictus) crista flava, pectore coccineo, remigibus secundariis caeruleis, cauda cuneata*.

Seligmann, Vögel, III. tab. 31. der bunte chinesische Fasan.

Götz, Naturgesch. einig. Vögel, p. 1. der Goldfasan, tab. 1.

Naturforsch. VII. p. 39. *Phasianus aureus Sinensis Briss.*

Berlin. Samml. X. p. 154. der Goldfasan.

Allgem. Reis. XI. p. 692. die japanischen Fasanen?

Kämpfer, Japan; in *Du Halde Chin.* IV. p. 141. die Fasanen?

Meidinger, Vorl. I. p. 151. n. 3. der bunte Fasan.

Borkhausen, Magazin, I. p. 218. n. 93.

Beckmann, Bibl. VI. p. 397. der chinesische Goldfasan.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 28. n. 2. *Phasianus crista flava, pectore coccineo.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 158. n. 4. *Phasianus (Pictus) crista flava, pectore coccineo, remigibus secundariis caeruleis.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 168. *Phasianus pictus.*

Bomare, Dictionn. IV. p. 348. — Diction. des anim. II. p. 151.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 326. n. 5. der chinesische Goldfasan.

6. NYCTHEMERUS. Der chinesische Silberfasan. (10)

Müller, Natursyst. II. p. 474. n. 6. der weiße Fasan.

Borowsky, Thierreich, II. p. 176. n. 4. der schwarz und weiße Fasan.

Blumen-

(10) Findet sich, wie der Goldfasan, jetzt auch in den Menagerien Deutschlands. Das Weibchen legt 18—20; — und die alten sehr häufig unfruchtbare Eyer. Sie haben die Grösse kleiner Hühnereyer, sind fleischfarbig, mit vielen feinen weissen Puncten bestreuet. Ihre grösste Schwere ist 31/4. Loth.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 206. n. 4. *Phasianus (Nycthemerus) albus, crista abdomineque nigra, cauda cuneata.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 472. n. 4. *der Silberfasan.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 451. n. 4. *der Silberfasan.*

Neuer Schapl. d. Nat. II. p. 769. n. 4. *weißer Fasan, mit abhangenden Kopffedern.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 443. *der weiß und schwarze Fasan.*

Klein, av. p. 114. n. 4. *Phasianus Sinensis, albus, capite nigris pennis dependentibus.*

Klein, Vorbereit. p. 211. n. 4. *weißer Sinesischer Fasan.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 118. n. 4. *weißer Fasan, mit abhangenden Kopffedern.*

Brisson, ornith. I. p. 77. n. 5. *Faisan blanc de la Chine.*

Büffon, Vögel, V. p. 252. *der schwarz und weiße Fasan aus China.* M. 2. Figg.

Batsch, Thiere, I. p. 422. *der schwarz und weiße Fasan.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 631. n. 6. *Phasianus (Nycthemerus) albus, crista abdomineque nigra, cauda cuneata.*

Seligmann, Vögel, III. tab. 27. *der schwarze und weiße chinesische Fasan aus China mit seiner Henne.*

Götz, Naturgesch. einig. Vögel, p. 14. *der Silberfasan; tab. 2.*

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 136. n. 167. *der weiß und schwarze Fasan.*

Beckmann, Bibl. VI. p. 398. *der chinesische Silberfasan.*

Borkhausen, Magazin, I. p. 219. n. 94.

Linne,

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 159. n. 5. *Phasianus* (*Nycthemerus*) *albus*, *crista abdomineque nigris*.

Hermann, tab. affin. anim. p. 168. *Ph. Nycthemerus*.

Bomar. Dictionn. IV. p. 348. — Dictionn. des anim. II. p. 149. 151.

Donndorff, Handb. d. Thiergeesch. p. 326. n. 6. der *chinesische Silberfasan*.

7. SUPERBUS. *Der rothe chinesische Fasan.*

Müller, Natursyst. Suppl. p. 124. n. 7. *der chinesische Fasan*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 628. n. 2. *Phasianus* (*Superbus*) *muticus rufus viridi caeruleo que varius*, *carunculis frontis subrotundis*, *palarium subulatis*.

A. Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Das Geschlecht ist mit vier Gattungen vermehrt. Bey der *erstern* Gattung sind die Varietäten β , δ , η , ϑ , κ , λ , ν , ξ , bey der *dritten*, die Varietäten β bis ζ , hinzugekommen.

B. Neuere Gattungen.

1. Der afrikanische Fasan.

Latham, Syn. Suppl. p. 210. *African Pheasant*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 631. n. 8. *Phasianus* (*Africanus*) *corpoе caeruleo — cinereo subtus albo*, *capite cristato*, *rectricibus duabus intermediis apice*, *lateralibus toto nigris*.

2. Der purpurfarbene indianische Fasan.

Latham, Syn. Suppl. p. 208. tab. 114. *Impeyan Pheasant*.

Latham,

Latham, Syst. ornith. II. p. 632. n. 11. *Phasianus* (*Impejanus*) *cristatus purpureus viridi* — *nitens*, *subtus niger*, *colli pennis aureo cupreo viridi* — *que versicoloribus, cauda integra rufa*.

3. *Der schwarz und weiße indianische Fasan.*

Latham, Syn. Suppl. p. 210. Coloured Pheasant.

Latham, Syst. ornith. II. p. 633. n. 13. *Phasianus* (*Leucomelanos*) *cristatus niger*, *corpore pen-*
nis albo - marginatis.

102. GESCHLECHT. NUMIDA. *Das Perl-*
huhn,

Müller, Natursyst. II. p. 476. Gen. CII.

Leske, Naturgesch. p. 224. Gen. VIII.

Borowsky, Thierreich, II. p. 182. Gen. XXX.

Bümenbach, Handb. d. N. G. p. 204. Gen. XLIII.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 462. Gen. LX.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 455. Gen. XL.

Brisson, ornith. I. p. 49. Gen. IV. *Meleagris*.

Büffon, Vögel, IV. p. 238. ff.

Batsch, Thiere, I. p. 410. Gen. CIX.

Latham, Syst. ornith. II. p. 621. Gen. LII.

Pallas, N. G. merkw. Thiere, IV. p. 12. ff.

Hermann, tab. affin. anim. p. 169.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 326. Gen. LXIX.

I. MELEAGRIS. *Das gemeine Perlhuhn. (1)*

Müller, Natursyst. II. p. 476. *das Perlhuhn.*

Leske, Naturgesch. p. 225. *das Perlhuhn.*

Borows-

(1) Ein lebhafter, unruhiger, unter sich geselliger, sonst aber zänkischer Vogel, der so gar den Truthahn furchtbar ist. Wird etwa 10 bis 12. Jahr alt. In ihrem ursprünglichen Vaterlande sieht man sie zu 200 bis 300. In Tehama an der bergichtigen Gegend,

- Borowsky*, Thierreich, II. p. 182. n. 1. *das Perlhuhn*. tab. 30.
- Blumenbach*, Handb. d. N. G. p. 204. n. 1. *Numida (Meleagris) rostro cera instructo, nares recipiente*.
- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 462. *das gemeine Perlhuhn*.
- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. III. p. 455. n. 1. *das gemeine Perlhuhn*, p. 467. *das Perlin, Paganus*, fälschlich *Knarrhuhn, Knorrhuhn*. — *Afrikanisches, numidisches, fremdes, barbarisches, tunisches, mauritanisches, lybisches, guineisches, aegyptisches Huhn; Pharaohuhn, Hühner aus Jerusalem*.
- Funk*, Naturgesch. I. p. 223. *das Perlhuhn*.
- Ebert*, Naturl. II. p. 109. *das Perlhuhn*.
- Halle*, Vögel, p. 422. n. 444. *das Perlhuhn*. fig. 28.
- Meyer*, Thiere, I. tab. 75. *das Perlhuhn*, mit dem Gerippe.
- Gatterer*, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 264. n. 237. *das Perlhuhn*.
- Neuer Schaupl. d. Nat. VI. p. 421. *Perlhuhn*.
- Onomat. hist. nat. V. p. 644. *das Perlhuhn; die Henne aus Guinea*.
- Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 115. *das Perlhuhn*.
- Klein*, av. p. III. n. 2. *Alector Guineensis; Gallina Guineae; africana*.

Klein,

Gegend, sind sie nach Niebuhr so häufig, daß die Knaben sie mit Steinen werfen, und nach der Stadt zum Verkauf bringen. Sie lieben wie die Pfauen erhabene Orter. Die Begattungszeit fällt in den März und Aprill. Das Weibchen legt bis 24. Eyer, welche etwas über 3. Wochen bebrütet werden. Das Fleisch wird von den mehresten als sehr delicat angegeben, gleichwohl behauptet Sparrmann, es sey sehr trocken, und weit schlechter als gewöhnliches Hühnerfleisch.

- Klein*, Vorbereit. p. 206. n. 2. *Perlhuhn*.
Klein, verb. Vögelhist. p. 115. n. 2. *Perlhuhn*.
Klein, stemmat. av. p. 25. tab. 26. fig. 1. a. b.
Klein, Vögeleyer, p. 32. tab. 13. fig. 5. 6.
Briffon, ornith. I. p. 49. n. 1. *Peintade*.
Büffon, Vögel, IV. p. 237. *das Perlhuhn*; mit
2. Figg.
Gesner, Vögelb. p. 216. *ein frembder wilder Han*,
aus Africa oder Barbarien. M. e. gut. Abbild.
Batsch, Thiere, I. p. 419. *das gemeine Perlhuhn*.
Latham, Syn. Suppl. p. 204. *Guinea Pintado*.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 621. n. 1. *Numida*
(*Meleagris*) *nigra*, maculis rotundatis albis, re-
migibus extus albo transversim striatis, vertice
corneo.
Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 393. *das Perlhuhn*.
Siemssen, meklenb. Vögel, p. 248. n. 1. *das gemeine*
Perlhuhn.
Niebuhr, Beschr. von Arabien, p. 168. *Perlühner*.
Fernan, Surin. II. p. 139. *das Perlhuhn*.
Adanson, Senegall. p. 250. *Perlühner*.
Hasselquist, Paläst. (ed. germ.) p. 317. n. 42. *Gal-*
lina (*Meleagris*) *vertice corneo*.
Sparrmann, Reis. p. 346. *Perlühner*.
Reis nach d. Insel Frankreich u. Bourbon. p. 186.
Pintadohühner.
Allgem. Reis. III. p. 336. *Pintado oder guineische*
Henne.
Pallas, N. G. merkw. Th. IV. p. 15. *das gemeine*
Perlhuhn.
Perrault, *Charras u. Dodart*, Abhandl. a. d. N.
G. II. p. 17. anatomische Beschr. vieler Pintaden
tab. 48. *Pintade, Art indianischer Hühner*. tab.
49. die Zergliederung.
Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 135. n. 165. *das*
Perlhuhn.

Eber.

- Eberhard*, Thiergesch. p. 64. *das Perlhuhn*.
Meidinger, Vorles. I. p. 141. *das Perlhuhn*.
Beckmann, Bibl. VI. p. 392. *das Perlhuhn*, XVI.
 p. 417. *das Perlhuhn*.
Le Vaillant, Reis. nach Afr. I. p. 230. *das Perlhuhn*.
Naturforsch. XVII. p. 69. n. 143. *das Perlhuhn*.
Beckmann, Beytr. zur Gesch. d. Erfind. III. p. 214. *Perlühner*.
Döbel, Jägerprakt. III. p. 162. *Perlinen*, oder *Afrikanische Hüner*.
Hannöv. Magaz. 1769. p. 702.
Allgem. Harzmagazin, I. p. 39.
Borkhausen, Magazin, I. p. 220. n. 95.
Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 28. n. 2. *Gallus vertice corneo*.
Charleton, onom. zoic. p. 75. n. 13 *Gallina Africana* sive *Guineensis*.
Kramer, Austr. p. 355. n. 2. *Gallus vertice corneo*.
Perlun.
Moehring, av. gen. p. 52. n. 48. *Meleagris*.
Barrere, ornithol. p. 79. *Gallus niger maculis ovalibus et orbiculatis*.
Belon, hist. nat. des ois. p. 246. *Poule de la Guinée*.
Jonston, av. p. 84. *Gallinae Guineae*.
Gerin, ornithol. II. p. 79. tab. 230.
Schaefer, element. ornithol. tab. 46.
Zinnan, Uov. p. 27. tab. 2. n. 4.
Bomar, Diction. d' hist. nat. VIII. p. 550. — Dict. des anim. III. p. 471.
Scylacis Periplus. p. 122. *Meleagrides aves*.
Kennet's, parochial. antiquit. p. 287. *Aves africanae, afrae*.
De la Mare, Comment. urban. lib. 25. p. 949.
Cauche, relat. de Madagascar. p. 133. *Acanques*.
Aristot.

Aristot. hist. anim. L. 6. c. 2. n. 19. Μελεαγρίδαι.

Aelian. de nat. anim. Lib. 4. c. 42. Μελεαγρίδαι.

Athen. Deipnosoph. Lugd. 1612. fol. p. 655. Μελεαγρίδων γενος.

Plin. hist. nat. Lib. 10. c. 26. 48. 52. Meleagrides. — Numidicae aves?

Colimella, de re rust. L. 8. c. 2. Meleagris.

Varro, de re rust. L. 3. c. 9. Gallinae africanae.

Martial. epigr. L. 3. ep. 58. Gallinae guttatae.

Sueton. Caligul. c. 22. Meleagrides.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 326. das eigentliche Perlhuhn.

β. Das weißbrüstige Perlhuhn.

Müller, Natursyst. II. p. 477.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 467. n. 2.

Briffon, ornith. I. p. 50. A. Peintade à poitrine blanche.

Büffon, Vögel, IV. p. 247. 254.

Lathani, Syn. II. 2. p. 687.

Latham, Syst. ornith. II. p. 621. n. 1. β.

Borkhausen, Magaz. I. p. 221. γ.

γ. Das ganz weiße Perlhuhn. *

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 467. n. 3.

Briffon, ornithol. I. p. 50. Meleagrides omnino albo.

Latham, Syst. ornith. II. p. 621. n. 1. δ.

Gerin. ornithol. II. tab. 231.

Edw. glan. III. p. 269.

Borkhausen, Magazin, I. p. 221. β.

δ. Der Perlhühnbastard. *

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 467. n. 4.

2. MITRATA. Das gehaubte Perlhuhn. (2)

Müller, Natursyst. Suppl. p. 126. n. 3. das Kronenperlhuhn.

Borowsky, Thierreich, II. p. 184. n. 3. das gehaubte Perlhuhn.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 468. das gehaubte Perlhuhn.

Büffon, Vögel, IV. p. 241. das Afrikanische Huhn. p. 279. das kleinhelmichte Perlhuhn.

Batsch, Thiere, I. p. 419. das gehaubte Perlhuhn.

Latham, Syst. ornith. II. p. 622. n. 2. *Numida* (*Mitrata*) nigra, maculis albis, vertice corneo, gula carunculata.

Pallas, N. G. merkw. Th. IV. p. 19. das gehaubte Perlhuhn. tab. 3. fig. I.

Colemella, de re rust. L. 8. c. 2. *Gallina Africana*, quam plerique *Numidicain* dicunt; *Meleagridi* similis.

Perrault, *Charras u. Dodart*, Abhandl. a. d. N. G. II. p. 22. das afrikanische Huhn.

3. CRISTATA. Das buschige Perlhuhn.

Müller, Natursyst. Suppl. p. 126. n. 2. das Haubenperlhuhn.

Borowsky, Thierreich, II. p. 184. n. 2. das buschige Perlhuhn.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 468. das buschige Perlhuhn.

Büffon, Vögel, IV. p. 276. das buschige Perlhuhn.

Batsch, Thiere, I. p. 419. das buschige Perlhuhn.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 622. n. 3. *Numida* (*Cristata*) nigra, albo maculata, vertice cristato, collo caeruleo, subtus sanguineo.

Pallas,

(2) Wird von *Büffon*, und den Paris. Academisten für das Weibchen vom gemeinen Perlhuhn gehalten.

Pallas, N. G. merkw. Th. IV. p. 16. das buschichte Perlhuhn. tab. 2.

A. Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Das Geschlecht ist mit zwey Gattungen vermehrt. Bey der ersten Gattung ist die Var. β . hinzugekommen.

B. Neuere Gattungen.

I. Das ägyptische Perlhuhn.

Latham, Syst. ornith. II. p. 622. n. 4. Numida (Aegyptiaca) nigra caeruleofuscata maculata, vertice cristato, capite colloque rufis.

Gerini, ornithol. II. p. 80. tab. 232. Meleagris altera.

103. GESCHLECHT. TETRAO. Das Berg-huhn. (Waldhuhn.)

Müller, Natursyst. II. p. 478. Gen. CIII.

Leske, Naturgesch. p. 225. Gen. IX.

Borowsky, Thierreich, II. p. 185. Gen. XXX.

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 202. Gen. XLII.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 473. Gen. LXII.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 469. Gen. XLI.

Ebert, Naturl. II. p. 114. ff.

Halle, Vögel, p. 437 — 454.

Neuer Schaupl. d. Nat. IV. p. 68.

Onomat. hist. nat. VII. p. 509.

Klein, av. p. 114. E. p. 115. F. G.

Brisson, ornith. I. p. 51. Gen. V. Lagopus. p. 61. Gen. VI. Perdix.

Büffon, Vögel, V. p. 7. ff. VI. p. 5. ff.

Batsch, Thiere, I. p. 410. Gen. CVII.

Latham, Syst. ornith. II. p. 633. Gen. LV. *Tinamus*. p. 634. Gen. LVI. *Tetrao*. p. 643. Gen. LVII. *Perdix*.

Hermann, tab. affin. anim. p. 166.

Downdorff, Handb. der Thiergesch. p. 327. Gen. LXX.

* *Mit kahlen Fleck über den Augen, und befeiderten Füßen. Berg hühner.*

† *Mit vierzähigen Füßen.*

I. UROGALLUS. Der Auerhahn. (3)

Müller, Naturfyst. II. p. 479. n. 1. *der Auerhahn*.

Leske, Naturgesch. p. 228. n. 6. *der Auerhahn*.

Borowsky, Thierreich, II. p. 186. n. 2. *der Auerhahn*.

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 204. n. 7. *Tetrao (Urogallus) pedibus hirsutis, cauda rotundata, axillis albis; der Auerhahn*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 473. n. 1. *der Auerhahn*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 470. n. 1. *der Auerhahn* p. 482. *Urhahn; Ohrhahn; Auhahn; Waldhahn; wilder Hahn; Gurgelhahn; Alphahn; Riethahn; Bergfasan; Spillhahn; Krugelhahn; Federhahn*.

Funke, Naturgesch. I. p. 225. *der Auerhahn*.

Ebert, Naturl. II. p. 114. *der Auerhahn*.

Halle, Vögel, p. 445. n. 469. *das Auerhuhn*.

Meyer,

(3) Flügelweite 3. Fuss 10. Zoll. *Briss*. Gewicht bisweilen 14. Pfund. *Gesn. Penn.* Hat außerordentlich scharfes Gehör und Gesicht. Fliegt niedrig. Lässt sich leicht zähmen. Hält sich am Tage mehr auf der Erde auf, und geht des Abends auf die Bäume schlafen. Das Weibchen brütet 4 Wochen, und bedeckt, wenn es Hungers halber aufsteigen muss, die Eyer mit Blättern, Moos, u. d. gl.

Meyer, Thiere. I. p. 19. tab. 16. der *Auerhahn*.
tab. 17. das Gerippe.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 266. n.
241. der *Auerhahn*.

Pennant, ärct. Zool. II. p. 292. A. der *Auerhahn*.

Beckmann, Naturhist. p. 50. a. der *Auerhahn*.

Neuer Schaupl. d. Nat. I. p. 431. *Auerhahn*.

Onomat. hist. nat. IV. p. 636. *Auerhahn*.

Handb. der Naturgesch. II. p. 47. der *Auerhahn*.

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 115. der *Auer-
hahn*.

Klein, av. p. 115. n. 1. *Lagopus maximus*; *Uro-
gallus maior*.

Klein, Vorbereit. p. 214. n. 1. *Auerhahn*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 120. n. 1. *Auerhahn*;
Orhahn; *Bergfasan*.

Klein, Stemmat. av. p. 25. tab. 27. fig. 1. a. b.

Klein, Vögeleyer, p. 33. tab. 15. fig. 1.

Gesner, Vögelb. p. 223. *Orhan*, *Urhan*; *Auer-
han*. fig. p. 224.

Briffon, ornith. I. p. 51. n. 1. *Coq de Bruyeres*,
ou de Limoges.

Büffon, Vögel, V. p. 7. der *Auerhahn*; m. 2. Figg.

Martini, Naturlex. III. p. 508. *Auerhahn*.

Batsch, Thiere, I. p. 412. der *Auerhahn*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 634. n. 1. *Tetrao*
(*Urogallus*) *fusco-rufus*, *capite colloque cine-
reis*, *gula abdomineque nigris*, *axillis albis*.

Bock, N. G. von Preuss. p. 393. der *Auerhahn*.

Beseka, Vögel Kurl. p. 69. n. 141. der *Auerhahn*.

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 47. *Auerhähne*.

Fischer, Liv. p. 89. n. 118. *Auerhahn*.

Pennant, Reis. d. Schottl. I. p. 306. *Auerhähne*.

Pontoppidan, Norweg. II. p. 191. *Tiur*, *Teer*,
Tödder.

Leem, Finnm. p. 129. *Auerhähne*.

- Scheffler*, Lappl. p. 392. *Auerhahnen*.
Ssteller, Kamtschatk. p. 193. *Auerhüner*.
Pennant, britt. Zool. p. 85. tab. 34. 35.
Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 137. n. 168. der
Auerhahn.
Döbel, Jägerprakt. I. p. 44. *Auerhahn*.
Naturforsch. XVII. p. 70. n. 144. der *Auerhahn*.
Zorn, Petinotheol. II. p. 277. *Auerhahn*.
Krünitz, Encykl. II. p. 710. *Auer-Hahn*.
Goeze, nützliches Allerl. II. p. 224. n. 27. *Auer-*
hahn.
Eberhard, Thiergesch. p. 65. *Auerhahn*.
Louiceri, Kräuterb. p. 640. *Uhrhan*.
Lichtenberg, Magazin für das Neueste, etc. II. 4.
 p. 176. VI. I. p. 139. *Auerhahn*.
Linné, Abhandl. II. p. 298. n. 105. der *Auerhahn*.
Oekon. Zool. p. 87. n. 28. der *Auerhahn*.
Jablonsky, allgeim. Lex. p. 82. *Auerhahn*.
Meidinger, Vorles. I. p. 143. n. 5. der *Auerhahn*.
Anweis. Vögel zu fang. p. 98. *Auerhahn*.
Beckmann, Bibl. V. p. 353. VI. p. 392. XVII.
 p. 156.
Schwed. Abhandl. 1751. p. 139.
Heppe, wohlred. Jäger. p. 40.
Altmann, Helvet. p. 221.
Lemmery, Marteriallex. p. 1203.
André u. Bechstein, Spazierg. I. p. 158.
Schriften der berlin. Gesellsch. N. Fr. V. p. 469.
Zückert, Speis. a. d. Thierreiche, p. 93.
Onomatol. forestal. I. p. 147.
Borkhausen, Magaz. I. p. 221. n. 96.
Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 56. *Urogallus*.
Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 28. n. 1. *Urogallus*.
Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 159. n. 1. *Tetrao*
 (*Urogallus*) *pedibus hirsutis, rectricibus exte-*
 rioribus subbrevioribus, axillis albis.

Müller,

Müller, zool. dan. prodr. p. 27. n. 221. *Tetrao* (*Urogallus*) *pedibus hirsutis, cauda rotundata, axillis albis.*

Kramer, Austr. p. 356. n. 1. *Tetrao rectricibus exterioribus brev., alarum basi alba macula.* *Auerhan.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 369. *Urogallus maior.*
Auer-Han; Ohr-Han. p. 371. *Urogallina maior.* *Auer-Hähne; Grugel-Han.*

Charleton, onomast. zoic. p. 73. n. 4. *Urogallus.*

Sibbald, Scot. illustr. p. 16. tab. 14. 18. *Capricalca.*

Girald. topogr. hybern. p. 706. *Pavo sylvestris.*

Jonston, av. p. 61. *Urogallus maior; Tetrix Aristotelis.*

Nieremb. hist. nat. p. 135. *Tetrao.*

Belon, av. p. 249. *Urogallus f. Tetrao.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 166. *Tetrao Urogallus.*

Schäfer, element. ornithol. tab. 42.

Gerini, ornithol. II. p. 83. tab. 236. 237.

Plin. hist. nat. L. 10. c. 22. *Tetraones.*

Bomare, diction. III. p. 310. — Dict. des anim. I. p. 702.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 327. n. 1. der *Auerhahn.*



Kurze, jedoch zuverlässige Nachricht von denen Auerhahnen, von M. F. J. M. P. A. in den Stuttg. Select. phys. Oeconom. 1750. St. 3. p. 239.

Hagstrom, essai pour nourrir les Coqs de Bruyères avec toutes sortes de plantes. — Journ. oeconom. Mai 1765. p. 223.

Hoffmann, obs. de capillis foliisque pini, in ventriculo urogalli repertis. — Eph. nat. cur. Gent. IX. et X. Append. p. 463.

Von der Nahrung des Auerhahns im rauhen Winter. — Hanow Seltenth. d. Nat. und Oecon. I. p. 270.

7. PHASIANELLUS. *Der Spitzschwanz.* (4)

Müller, Natursyst. II. p. 480. *der canadische fasianenartige Auerhahn.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 286. n. 97. *der Spitzschwanz.*

Büffon, Vögel, V. p. 138. *das langschwänzige Haselhuhn aus Hudsonsbay.* M. e. Fig.

Latham, Syn. Suppl. p. 212. *Long-tailed Grouse.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 635. n. 2. Tetrao (Phasianellus) testaceus nigricante varius, rectricibus duabus intermediis elongatis, maculis ocellaribus notatis.

Martini, Naturlex. III. p. 560. *langschwänziges Haselhuhn a. d. Hudsonsbay.*

Seligmann, Vögel, V. tab. 12. *das langschwänzige Haselhuhn a. d. Hudsonsbay.*

Allgem. Reis. XVI. p. 651. *der Auerhahn?*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 160. n. 5. Tetrao (Phasianellus) pedibus hirsutis, cauda cuneiformi, rectricibus tribus lateralibus albis.

Linné, Syst. Nat. Ed. XII. p. 273. n. 1. β.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 328. n. 2. *der Spitzschwanz.*

2. TETRIX. *Das Birkhuhn.* (5)

Müller, Natursyst. II. p. 480. n. 2. *das Birkhuhn.*

Leske, Natursyst. p. 327. n. 5. *das Birkhuhn.*

Borows-

(4) Flügelweite 24. Zoll. Gewicht 2. Pfund. Penn.

(5) Gewicht des Männchens 4 Pfund, des Weibchens 2 Pfund. Penn. Von dem Genuss der harzigen, stark riechenden Knospen der Balsampappel, erhält ihr Fleisch einen angenehmen Geruch und Geschmack. In Northumberland finden sie sich jetzt fast

Borowsky, Thierreich, II. p. 188. n. 3. *der Birkhahn*.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 203. n. 6. *Tetrao* (*Tetrix*) *pedibus hirsutis, cauda bifurcata, remigibus secundariis basin versus albis; der Birkhahn; deutsche Fasan.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 475. n. 2. *der Birkhahn*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 483. n. 2. *das Birkhuhn*, p. 496. *der kleine Auerhahn; Heidelhahn; Laubhahn; Brennhahn; Spillhahn; Spielhahn; Maoshahn; Schildhahn; schwarze Waldhahn; Kurre, Moorhuhn.*

Funke, Naturgesch. I. p. 227. *das Birkhuhn.*

Ebert, Naturl. II. p. 115. *das Birkhuhn.*

Halle, Vögel, p. 447. n. 472. *das Birkhuhn.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 269. n. 242. *der Birkhahn.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 293. C. *das schwarze Waldhuhn; Birkhuhn.*

Beckmann, Naturhist. p. 50. b. *der Birkhahn.*

Neuer Schaupl. d. Nat. I. p. 757. *Birkhahn.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 630. *das Birkhuhn.*

Handb. d. deutsch. Thiergeesch. p. 115. *das Birkhuhn.*

Gesner, Vögelb. p. 225. *Laubhan; Bromhan; kleiner Bergfasan; kleiner Orhan*, fig. p. 226.

Klein, av. p. 116. n. 2. *Lagopus, Urogallus minor.*

Klein, Vorbereit. p. 215. *Birkhahn, Spielhahn, Laubhahn.*

Klein, verb. Vögelh. p. 120. n. 2. *Birkhahn.*

Klein, Stemmat. av. p. 25. tab. 27. Fig. 2. a. b.

fast gar nicht mehr, seitdem man die Heide, die ihnen zum Futter und zum Schutze diente, weggebrannt hat; in Liefland hingegen sind sie so häufig, dass ein bemühter Handwerker jährlich weit über 100. verzehrt.

- Klein*, Vögeleyer, p. 33. tab. 15. Fig. 3.
Brisson, ornithol. I. p. 52. n. 2. Coq. de bruyeres à queue fourchue.
Büffon, Vögel, V. p. 32. der Birkhahn; m. 2. Figg.
Batsch, Thiere, I. p. 413. Birkhuhn.
Latham, Syn. Suppl. p. 213. Black Grous.
Latham, Syst. ornith. II. p. 635. n. 3. Tetrao (Tetrix) nigro-violacea, cauda bisutca, remigibus secundariis versus basin albis.
Beseke, Vögel Kurl. p. 69. n. 145. der Birkhahn.
Siemßen, meklenb. Vögel, p. 146. n. 1. das Birkhuhn, Baarkhohn.
Bock, N. G. von Preuß. IV. p. 395. das Birkhuhn.
Fischer, Livil. p. 90. n. 119. Birkhahn.
Taube, Slavon. I. p. 22. Birkhühner.
Leem, Finnim. p. 130. *
Scheffer, Lappl. p. 392. Birkhüner.
Pallas, Reis. II. p. 52. 226. 667. tab. 7. Ausz. II. p. 27. Birkhühner.
Pennant, Reis. d. Schottl. I. p. 125. Birkhahn, (Capercalze, Auercalze, Capercally.)
Pontoppidan, Dänem. p. 172. Urhane.
Pontoppidan, Norw. II. p. 121. Aurfugl.
Linné, Abhandl. II. p. 298. n. 106. das Birkhuhn.
Steller, Kamtschatk. p. 193. Birkhüner.
Scopoli, Beim. a. d. N. G. I. p. 139. n. 169. der Birkhahn.
Döbel, Jägerprakt. I. p. 48. Birk-Hahn.
Naturforsch. XVII. p. 70. n. 145. das Birkhuhn.
Martini, Naturlex. III. p. 526. Birkhuhn.
Krünitz, Encycl. V. p. 382. Birkhahn, Berg-hahn.
Eberhard, Thiergesch. p. 65. das Birkhuhn.
Pennant, britt. Thiergesch. p. 86. tab. 36. 37.
Meidinger, Vorl. I. p. 143. n. 4. das Birkhuhn.
Schwed.

Schwed. Abhandl. XIII. p. 139. XXI. p. 142. *Birkhähne.*

André und Bechstein, Spatzierg. III. p. 173. 178. *Birkhahn.*

Beckmann, Bibl. I. p. 338. VI. p. 394. IX. p. 581. X. p. 365. *Birkhahn*, *kleiner Auerhahn*.

Jablonsky, allgem. Lex. p. 145. *Birkhähn.*

Börner, Stadt- und Landwirthsch. II. p. 233. *Birkhuhn.*

Heppe, wohlred. Jäg. p. 69. *Mooshahn.*

Oeconom. Zool. p. 88. n. 29. *das Birkhuhn.*

Zückert, Speis. a. d. Thierreich, p. 93.

Onomatol. forestal. I. p. 331.

Weygand: Bresl. Sainini. 34. Vers. Nov. 1725. Cl. 4. Art. 7.

Schreber, neue Kameralschrift. V. p. 286.

Borkhausen, Magazin, I. p. 222. n. 97.

Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 56. *Tetrao*.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 28. n. 3. *Tetrao minor.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 159. n. 2. *Tetrao (Tetrix) pedibus hirsutis, cauda bifurcata, remigibus secundariis basin versus albis.*

Müller, zool. dan. prodr. p. 27. n. 222. *Tetrao (Tetrix) pedibus hirsutis, cauda bifurcata, remigibus secundariis basin versus albis.*

Kramer, Austr. p. 356. n. 2. *Tetrao omnibus remigibus secundariis a medio basin versus albis, cauda bifurca. Birkhan, Schildhan.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 372. *Urogallus minor; Birk-Han, Spilhan, Laubhan*, p. 373. *Urogallina minor; Birkhenne.*

Charleton, exereitat. p. 82. onom. zoic. p. 73. n. 14. *Urogallus minor.*

Rzaczynsky, aust. hist. nat. Polon. p. 422. *Urogallus minor.*

Fonston,

Fonston, av. p. 61. *Urogallus minor*.

Hermann, tab. affin. anim. p. 167. *Tetrao Tetrix*.

Gerin. ornithol. II. p. 82. tab. 233. 234. 235.

Salerne, ornithol. p. 137.

Dorndorff, Handb. d. Thiergefch. p. 328. n. 3.
der Birkhahn.

B. TETRIX ALBA. *Das weiße Birkhuhn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 496. n. 1.
das weiße Birkhuhn.

Latham, Syst. ornith. II. p. 636. n. 3. γ. Tetr. sor-
dide alba, ac obsolete ferrugineo undulata, ro-
stro nigro, pedibus ferrugineis.

Neue Schwed. Abhandl. VI. p. 224. *Beschreib. ei-
nes ganz hell grauen, oder beynahe weißen
Birkhuhns*, *Tetrao Tetrix* fem.

Mus. Carlson. fasc. III. tab. 66.

γ. UROGALLUS MINOR PUNCTATUS. *Das
Bastardbirkhuhn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 497. das
Bastardwaldhuhn.

Batsch, Thiere, I. p. 413. das *Auerbirkhuhn*.

Halle, Vögel, p. 451. n. 474. das *Schnarchhuhn*.

Neuer Schaupl. d. Nat. I. p. 432. *Bastardauer-
hähne*.

Onomat. hist. nat. IV. p. 632. *Eine Spielart vom
Birkhuhn.*

Klein, Stemmat. av. p. 25. tab. 28. Fig. 1. a. b. c.
Lagopus hybridus.

Klein, Vögeleyer, p. 33. Fig. 2. *Zwitter vom
Auerhahn und Birkhenne*.

Briffon, ornith. I. p. 53. A. Coq de Bruyeres pi-
queté.

Büffon, Vögel, V. p. 56. das *Auerbirkhuhn*; Af-
ter- oder *Bastardauerhahn*:

Martini,

- Martini*, Naturlex. I. p. 105. *Auerbirkhuhn.*
Latham, Syn. Suppl. p. 214. spurious Grouse.
Latham, Syst. ornith. II. p. 636. n. 1. *δ.* Tetr. hy-
bridus; cauda bifurca, subtus albo maculatus.
Pennant, arct. Zool. II. p. 293. E. *das Bastard-*
waldhuhn.
Beseke, Vögel Kurl. p. 69. n. 145. *Rakkelhanar.*
Schwed. Abhandl. VI. p. 173. *Rackelhauer.*
Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 28. n. 2. *Grygallus.*

δ. T. corpore nigro alboque variegato, macula pecto-
rali maxima, atro nitente. *

Latham, Syst. ornith. II. p. 636. n. 1. *β.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 497.

Muf. Carlson. fasc, III. tab. 65. Tetr. *Tetrix mas*, var.

ε. T. albo nigroque maculata. *

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 497. n. 2.

das bunte Birkhuhn.

21. *NEMESIANUS*. *Das bunte Waldhuhn.* (*)

Latham, Syst. ornithol. II. p. 637. n. 4. *Tetrao*
(*Nemesianus*) corpore nigro rufoque vario,
cauda rufa, apice nigra, nigroque maculata.

Scopoli, Bemerk. a. d. N. G. I. p. 141. n. 171. *der*
bunte Rauchfuß.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 516. n. 6.
das bunte Waidhuhn.

22. *BETULINUS*. *Das schwarzfüßige Waldhuhn.* (**)

Latham, Syst. ornith. II. p. 637. n. 5. *Tetrao* (*Be-*
tulinus) cauda nigra, maculis rufis transversis
varia, uropygio albido nigro fasciato.

Scopoli,

(*) Nach *Bechstein* ein Haselhuhn, dessen Haut beym Ausstopen
so erweitert worden, dass es die Grösse des Birkhuhns er-
reicht hat.

(**) Nach *Bechstein* ein junges Haselhuhn.

Scopoli, Beitr. a. d. N. G. I. p. 141. n. 172. der kleine bunte Rauchfuß.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 518. das kleine bunte Waldhuhn.

3. CANADENSIS. Das canadensische Waldhuhn.

Müller, Natursyst. II. p. 482. n. 3. das canadische Berghuhn.

Halle, Vögel, p. 453. n. 477. das dunkle Schneehuhn.

Gatterer, vom Nutz. und Schad. d. Thiere, II. p. 276. n. 243. das Sprossenhuhn, Waldrebhuhn.

Pennant, arct. Zool. II. p. 287. n. 89. das gefleckte Waldhuhn.

Onomat. hist. nat. IV. p. 641. das braune Haselhuhn von der Hudsonsbay.

Klein, av. p. 117. n. 6. *Lagopus e fusco et albo in inferiore corporis parte; e fusco et nigro in superiore; ad oculos duabus lineis albis varia, freti Hudsonis.*

Klein, Vorbereit. p. 217. n. 6. das braune Haselhuhn von der Hudsonsbay.

Klein, verb. Vögelhist. p. 121. n. 6. *Hudsons Haselhuhn.*

Briffon, ornith. I. p. 56. n. 6. *Gelinote de la Baye de Hudson.*

Büffon, Vögel, p. 121. das kanadensische Berghuhn, oder dunkle Schneehuhn.

Latham, Syn. Suppl. p. 214. Spotted Grouse.

Latham, Syst. ornith. II. p. 637. n. 6. *Tetrao (Canadensis) fulvus, cinereo varius subtus albus lunulis nigris, rectricibus nigris, apice fulvis, lituris duabus albis ad oculos.*

Seligmann, Vögel, III. tab. 37. das braune fleckigte Haselhuhn.

Martini,

Martini, Naturlex. III. p. 524. kanadensisches Berg-huhn.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 159. n. 3. Tetrao (Canadenis) pedibus hirsutis, rectricibus nigris apice fulvis, lituris duabus albis ad oculos.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 329. n. 4. das gefleckte Waldhuhn.

b. CANACE (Das Weibchen vom vorigen.)

Müller, Natursyst. II. p. 185. n. 7. das weißgefleckte Huhn.

Onomat. hist. nat. IV. p. 640. das kleinere Holz-huhn aus Canada.

Briffon, ornith. I. p. 57. n. 7. Gelinote de Canada.

Latham, Syst. ornith. II. p. 637. n. 6. β. Tetr. cauda integra, macula alba pone aures naresque (femina).

Seligmann, Vögel, V. tab. 13. das schwarzgefleckte Hasel- oder Birkhuhn.

Ellis, Reis. n. Hudsonsmeerbus. p. 35. das braune und fleckigte Birkhuhn.

4. LAGOPUS. Das Schneehuhn.

Müller, Natursyst. II. p. 482. n. 4. das Schnee-huhn.

Leske, Naturgesch. p. 227. n. 4. das Schneehuhn.

Borowsky, Thierreich, II. p. 189. n. 4. das Schnee-huhn.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 203. n. 5. Tetrao (Lagopus) pedibus lanatis, remigibus albis, rectricibus nigris, apice albis; intermediis albis; das Schneehuhn; Rypen.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 477. n. 4. das Schnee-huhn.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 508. n. 4. das Schneehuhn, p. 513. das weiße Birkhuhn, Hasel-

- Haselhuhn, oder Rebhuhn; Rypen; Weißhahn;*
Schneehase; Ptarmigan.
- Ebert, Naturl. II. p. 116. das Schneehuhn, Stein-*
huhn, Hasenfuß.
- Halle, Vögel, p. 452. n. 475. das Schneehuhn.*
- Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 276. n.*
244. das Schneehuhn.
- Onomat. hist. nat. IV. p. 628. das Schneehuhn.*
- Klein, av. p. 116. n. 4. Lagopus simpliciter.*
- Klein, Vorbereit. p. 215. n. 4. Schneehuhn.*
- Klein, verb. Vögelhist. p. 120. n. 4. Schneehuhn,*
Hasenfuß.
- Gesner, Vögelb. p. 450. Schneehuhn. m. e. Fig.*
- Pennant, arct. Zool. II. p. 294. D. der Ptarmi-*
gan; Schneehuhn von der Hudsonsbay.
- Brisson, ornithol. I. p. 60. n. 12. Gelinote blanche.*
- Büffon, Vögel, V. p. 101. das Schneehuhn.*
- Martini, Naturlex. III. p. 640. Schneehuhn.*
- Batsch, Thiere, I. p. 415. das europäische Schnee-*
huhn.
- Latham, Syst. ornith. II. p. 639. n. 9. Tetrao*
(Lagopus) cinereo alboque varius, pedibus la-
natis, remigibus albis, rectricibus nigris apice
albis, intermediis albis.
- Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 396. das Schnee-*
huhn.
- Beseke, Vögel Kurl. p. 70. n. 146. das Schneehuhn.*
- Fischer, Livil. p. 90. 120. weißes Morasthuhn;*
Schneehuhn.
- Leem, Finnm. p. 130. weiße Haselhühner.*
- Olaffen, Isl. I. p. 309. i. Riupa.*
- Pallas, Reis. II. p. 226. — Ausz. I. p. 86. das*
Schneehuhn.
- Pennant, Reisen d. Schottl. I. p. 71. 124. 306.*
Schneehühner.
- Scheffer, Lappl. p. 392. Schneehüner.*

Cranz, Grönl. p. III. *Rypen*.

Egede, Grönl. p. 88. *Rypen*; *Schneehuhn*.

Pontoppidan, Norweg. II. p. 173. *Rype*.

Lichtenberg, Magaz. II. I. p. 189. *Schneehuhn*.

Naturforsch. XVII. p. 71. n. 146. *das Schneehuhn*.

Götz, *Naturgesch. einiger Vögel*, p. 51. tab. 3. *das Schneehuhn*.

Scopoli, Beitr. a. d. N. G. I. p. 140. n. 170. *das Schneehuhn*.

Neue schwed. Abhandl. III. p. 107. *Tetrao Lagopus*.

Beckmann, Bibl. VI. p. 475. *Schneehuhn*.

Roberg, et *Lithenius*, de Lagopede. Ups. 1732. 4.

Börner, Stadt- und Landwirthsch. II. p. 234. n. 4.

Gött. gel. Anz. 75. p. 449. cf. 1772. p. 467.

Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 56. *Lagopus*.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 28. n. 4. *Lagopus*.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 159. n. 4. *Tetrao* (*Lagopus*) *pedibus lanatis, remigibus albis,* *rectricibus nigris, apice albis, intermediis totis albis*.

Linné, fn. Suec. I. n. 169. *Tetrao rectricibus albis,* *intermediis nigris, apice albis*.

Müller, zool. dan. prodr. p. 28. n. 223. *Tetrao* (*Lagopus*) *pedibus lanatis, remigibus albis,* *rectricibus nigris, apice albis, intermediis albis*.

Kramer, Austr. p. 356. n. 3. *Tetrao rectricibus albis, intermediis nigris, apice albis. Schneehuhn*.

Sibbald, Scot. illustr. p. 76. *Lagopus*.

Charleton, onom. zoic. p. 74. n. 5. *Perdix alba f.* *Lagopus*.

Fonston, av. p. 68. *Perdix alba seu Lagopus*.

Scheuchzer, phys. Sacr. L. 9. c. 48. p. 1009. *Lagopedes*.

Hermann, tab. affin. anim. p. 164. 167. *Tetrao Lagopus*.

Philos. transact. LXIII. p. 224. Tetr. Lagopus.

Martin: act. Soc. Lond. III. p. 55. Tetrao mutus.

Bomar. Diction. I. p. 355. VIII. p. 348. — Dict. des

Anim. I. p. 367. III. p. 386. Arbenne; Orbaine;

Perdrix blanche; Lagopede; Poule de neige.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 329 *das Schneehuhn.*

β. Das blonde Schneehuhn.

Müller, Natursyst. II. p. 483. *ein buntes Schneehuhn.*

Gesner, Vögelb. p. 452. *das Steinhuhn.* m. e. Fig.
Neue schwed. Abhandl. III. p. 108.

Gerin. ornithol. II. p. 85. tab. 240. *Tetr. varius.*

γ. Das schottische Schneehuhn.

Onomat. hist. nat. IV. p. 633. *der Mur-Hahn.*

Gesner, Vögelb. p. 337. *Murhan.* Gallus palustris.

Briffon, ornith. II. p. 55. n. 5. *Gelinote d'Ecosse.*

Büffon, Vögel, V. p. 73. *das Schottische Haselhuhn;* *der Mur- oder Moorhahn.*

Martini, Naturlex. III. p. 577. *Schottisches Haselhuhn.*

δ. Das rothe Schneehuhn. (6)

Halle, Vögel, p. 453. n. 476. *das rothe Haselhuhn.*

Klein, av. p. 117. n. 5. *Lagopus altera.*

Klein, Vorbereit. p. 217. n. 5. *Rothes Holz-, Haselhuhn.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 121. n. 5. *Rothes Haselhuhn, Holzhuhn.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 632. *die arabische Alchata.*

Briffon,

(6) Nach *Latham* eine eigne Gattung, zu welcher auch die Synonymen der vorhergehenden Varietät gehören sollen. *Briffon* und *Büffon* machen aus beyden besondere Gattungen.

- Briffon*, ornith. I. p. 58. n. 9. Gelinote hupée.
Büffon, Vögel, V. p. 88. das rothe Haselhuhn; m. e. Fig.
Latham, Syn. Suppl. p. 216. Red Grous.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 641. n. 15. Tetrao (Scoticus) rufo et nigricante transversim stria-tus, rectricibus 6. utrinque exterioribus nigri-cantibus.
Martini, Naturlex. III. p. 569. rothes Haselhuhn.
Pennant, britt. Thiergesch. p. 87. tab. 38.
Frisch, Vögel, tab. 112. das Haselhuhn? (Weib.-chen).
Sibbald, Scot. illustr. p. 16. Lagopus altera.
Charleton, onom. zoic. p. 73. n. 7. Attagen; Perdix Asclepia.
Belon, hist. nat. des ois. p. 241. Francolin.
Jonston, av. p. 62. Attagen.
Bomare, Diction. IV. p. 573. — Diction. des anim. I. p. 707.

23. ALBUS. *Das weiße Waldhuhn.* (?)

- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 477. n. 5. das weiße Waldhuhn.
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 513. n. 5. das weiße Waldhuhn.
Büffon, Vögel, V. p. 115. das Schneehuhn, oder weiße Rebhuhn von Hudsonsbay; m. e. Fig.
Martini, Naturlex. III. p. 652. Schneehuhn von Hudsonsbay.
Pennant, arct. Zool. II. p. 288. n. 99. das weiße Waldhuhn. Titelkupf.
Latham, Syst. ornith. II. p. 639. n. 10. Tetrao (Albus) aurantius, fasciis atris et lituris albis va-
- G 2 rius,

(?) Sollte dies wohl eine eigne Gattung seyn? Die Synonymen dieser und der vorhergehenden Gattung werden häufig verwechselt. — Flügelweite, nach *Pennant*, 23. Zoll, Gewicht 24. Unzen.

rius, digitis hirsutis, rectricibus atris apice albis, intermediis totis albis.

Seligm̄ann, Vögel, III. tab. 39. *das weiße Birkhuhn.*

Ellis, Reis. nach Hudsonsmeerbus. p. 36. *das weiße Rebhuhn.*

Schlözer, Erdbeschr. von Amer. p. 112. *das weiße Rebhuhn.*

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 330. n. 6. *das weiße Waldhuhn.*

24. RUPESTRIS. *Das Felsenhuhn.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 291. n. 100. *das Felsenhuhn.*

Latham, Syn. Suppl. p. 217. Rock Grous.

Latham, Syst. ornith. II. p. 640. n. 11. *Tetrao (Rupestris) aurantius*, fasciis atris et lituris albis varius, digitis plumosis, rectricibus atris apice albis, intermediis totis albis, loris nigris.

25. LAPPONICUS. *Der Rehusak.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 295. E. *der Rehusak.*

Latham, Syn. Suppl. p. 216. Rehusak Grous.

Latham, Syst. ornith. II. p. 640. n. 12. *Tetrao (Lapponicus) dorso nigro ferrugineo vario, collo ferrugineo nigro maculato, pectore crissoque albis.*

5. CUPIDO. *Der Schneemerkur. (8)*

Müller, Natursyst. II. p. 483. n. 5. *der Pensylvanische Fasan.* Tab. XIX. Fig. 3.

Borowsky, Thierreich, II. p. 190. n. 5. *der Schneemerkur.*

Ebert, Naturl. II. p. 117. *der pensylvanische Fasan.* Halle,

(8) *Büffon* scheint diese Gattung mit dem *Kragenhuhn* für einerley zu halten.

Halle, Vögel, p. 454. n. 478. *Das dunkelbraune Birkhuhn, mit Merkursflügeln am Kopfe. Schneemerkur.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 278. n. 245. *Schneemerkur; gefiederte Cupido.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 185. n. 96. *der Schneemerkur.*

Onoimat. hist. nat. IV. p. 625. *der kl. intre Auerhahn.*

Klein, av. p. 117. n. 7. *Lagopus s. Urogallus minor, americanus.*

Klein, Vorbereit. p. 217. n. 7. *der kleinere Auerhahn aus Amerika.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 121. n. 7. *amerikanischer Birkhahn; Gaukler.*

Brisson, ornith. I. p. 59. n. 10. *Gelinote hupée d' Amerique.*

Büffon, Vögel, V. p. 235. *der Schneemerkur.*

Martini, Naturlex. III. p. 645. *Schneemerkur.*

Batsch, Thiere, I. p. 412. *der Schneemerkur.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 638 n. 8. *Tetrao (Cupido) subcristatus fusco-rufescens, nigro et albicante transversim striatus, alis succenturiatis cervicalibus.*

Seligmann, Vögel, IV. tab. 104. *der amerikanische Birkhahn.*

Schöpf, Reis. d. Nordamer. II. p. 8. *Tetrao Cupido.*

Neue Mannigfaltigk. I. p. 3. *der Schneemerkur.*

Linne', Syst. Nat. Ed. X. I. p. 106. n. 6. *Tetrao (Cupido) pedibus hirsutis, alis succenturiatis cervicalibus.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 166. *Tetrao Cupido.*

6. UMBELLUS. *Das Kragenhuhn.*

Müller, Natursyst. II. p. 485. n. 6. *das Kragenhuhn.*

- Borowsky*, Thierreich, II. p. 185. n. 1. *der Auerhahn mit der Halskrause*, tab. 31.
- Halle*, Vögel, p. 454. n. 480. *das Birkhuhn mit dem Kragen*.
- Onomat. hist. nat. IV. p. 627. *der pensylvanische Auerhahn*.
- Klein*, verb. Vögelhist. p. 169. *Birkhahn mit dem Kragen*.
- Briffon*, ornith. I. p. 59. n. 11. *Gelinote hupée de Pensylvanie*.
- Büffon*, Vögel, V. p. 118. *das Kragenhuhn; Mandelhuhn*; m. e. Fig.
- Martini*, Naturlex. III. p. 581. *das Kragenhuhn*.
- Batsch*, Thiere, I. p. 412. *das Kragenhuhn*.
- Latham*, Syn. Suppl. p. 215. Ruffed Grouse.
- Latham*, Syst. ornithol. II. p. 638. n. 7. *Tetrao (Umbellus) fusco rufo nigroque variegatus, subtus fulvo-albus, rectricibus nigro fasciatis apice cinereis, cervicali umbone existante*.
- Seligmann*, Vögel, VII. tab. 38. *der Auerhahn mit der Halskrause*.
- Pennant*, arct. Zool. II. p. 282. n. 95. *das Kragenhuhn*.
- Schöpf*, Reisen durch Nordamer. II. p. 8. *Tetrao umbellus. Phasanen*.
- Neue Mannigfaltigk. III. p. 211. *das Kragenhuhn*. Fig. p. 224.
- Hermain*, tab. affin. anim. p. 166. *Tetrao Umbellus*.
- Donndorff*, Handb. d. Thiergesch. p. 331. n. 7. *das Kragenhuhn*.

8. TOGATUS. *Das Mantelhuhn.* (9)

- Müller*, Natursyst. II. p. 485. n. 8. *das Mantelhuhn*.

Onomat.

(9) Nach *Latham* das Weibchen von *Tetrao Umbellus*.

Onomat. hist. nat. IV. p. 639. *das große Holz-huhn aus Canada.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 638. n. 7. *β.* Tetr. pennis axillaribus maioribus nigris azureis.

Brissot, ornith. I. p. 57. n. 8. *grosse Gelinote de Canada.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 166. *Tetrao To-gatus.*

9. **BONASIA.** *Das Haselhuhn.*

Müller, Natursyst. II. p. 485. n. 9. *das Hasel-huhn.*

Leske, Naturgesch. p. 272. n. 3. *das Haselhuhn.*

Borowsky, Thierr. II. p. 191. n. 6. *das Haselhuhn.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 203. n. 4. *Te-trao (Bonasia) pedibus hirsutis, rectricibus cine-reis, punctis nigris fascia nigra: exceptis inter-mediis duabus; das Haselhuhn.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 476. n. 3. *das Hasel-huhn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 500. n. 3: *das Haselhuhn*, p. 507. *Haselwildpret; Roth-huhn; Jerpe.* tab. 18.

Funke, Naturgesch. I. p. 228. *das Haselhuhn.*

Ebert, Naturl. II. p. 116. *das Haselhuhn.*

Halle, Vögel, p. 449. n. 473. *das Haselhuhn.*

Meyer, Thiere, II. p. 25. tab. 89. *das Haselhuhn,* mit dem Gerippe.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 278. n. 247. *das Haselhuhn.*

Neuer Schaupl. d. Nat. III. p. 670. *Haselhuhn.*

Onomat. hist. nat. II. p. 461. IV. p. 634. *das Hasel-huhn.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 296. *das Haselhuhn.*

Handb. d. deutsch. Thiergesch. p. 116. *das Hasel-huhn.*

Klein, av. p. 116. n. 3. *Lagopus Corylorum*.

Klein, Vorbereit. p. 215. n. 3. *Hasel-*, *Hasselhuhn*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 120. n. 3. *Haselhuhn*; *Rotthuhn*.

Klein, stemmat. av. p. 25. tab. 26. fig. 3. a. b.

Klein, Vögeleyer, p. 33. tab. 15. fig. 4.

Greiner, Thierb. p. 335. *Haselhun*; m. e. Fig.

Briffon, ornith. I. p. 53. n. 3. *Gelinote*.

Büffon, Vögel, V. p. 62. *das Haselhuhn*; mit 2. Figg.

Martini, Naturlex. III. p. 552. *Haselhuhn*.

Batsch, Thiere, I. p. 413. *das Haselhuhn*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 640. n. 14. *Tetrao* (*Bonasia*) *rufescens fusco-maculatus*, rectricibus cinereis punctis nigris fascia nigra, exceptis intermediis duabus.

Beske, Vögel Kurl. p. 70. n. 147. *das Haselhuhn*.

Bock, N. G. von Preuß. IV. p. 397. *das Haselhuhn*.

Fischer, Liv. p. 90. n. 121. *Haselhuhn*.

Taube, Slavon. I. p. 22. *Haselhühner*.

Pennant, Reis. d. Schottl. I. p. 71. *Haselhühner*.

Pallas, Reis. Ausz. I. p. 87. *das Haselhuhn*.

Naturforsch. XVII. p. 71. n. 147. XVIII. p. 235. *Haselhuhn*.

Linné, Abhandl. II. p. 298. n. 107. *das Haselhuhn*.

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 142. n. 173. *das Haselhuhn*.

Döbel, Jägerprakt. I. p. 48. *Haselhuhn*.

Loniceri, Kräuterb. p. 676. *Haselhuhn*.

Zorn, Petinotheol. II. p. 280. *das Hassel-Hun*.

Krünitz, Encycl. XXII. p. 191. *Hasel-Hun*.

Heppe, wohlred. Jäger. p. 185. *Haselhuhn*.

Anweis. Vögel zu fang. p. 301. *Haselhuhn*.

Merklein, Thierreich. p. 294. *Hasel-Hun*.

Beckmann, Bibl. VI. p. 395. *das Haselhuhn*.

Schwed.

Schwed. Abhandl. 1751. p. 142. *Haselhuhn.*

Eberhard, Thiergesch. p. 65. n. 3. *das Haselhuhn.*

Meidinger, Vorl. I. p. 142. n. 3. *das Haselhuhn.*

Jablonsky, allgem. Lex. p. 434. *Haselhuhn.*

Fischer, livländ. Landwirthsch. p. 634. *Haselhuhn.*

Frisch, Vögel, tab. 112. *das Haselhuhn.*

Zückert, Speis. a. d. Thierreich, p. 92.

Borkhausen, Magazin, I. p. 223. n. 98.

Onomatol. forestal. II. p. 58.

Onomatol. oeconom. praet. II. p. 40.

Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 56. *Bonasia.*

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 28. n. 5. *Bonasia.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 160. n. 7. *Tetrao*

(*Bonasia*) *pedibus hirsutis, rectricibus cinereis,*
punctis nigris fascia nigra, exceptis intermediis
duabus.

Müller, zool. dan. prodr. p. 28. n. 224. *Tetrao*

(*Bonasia*) *pedibus hirsutis, rectricibus cinereis,*
punctis nigris fascia nigra, exceptis intermediis
duabus.

Kramer, Austr. p. 356. n. 4. *Tetrao rectricibus*
cinereis punctis nigris fascia lata nigra, exceptis
intermediis duabus. Haselhun.

Charleton, onom. zoic. p. 73. n. 6. *Gallina Corylorum.*

Charleton, exercitat. p. 82. n. 7. *Gallina Corylorum.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 277. *Gallina Corylorum.*
Haselhun, Rotthun.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 366. *Attagen.*

Jonston, av. p. 63. *Gallina Corylorum.*

Genin, ornithol. II. p. 84. tab. 238.

Hermann, tab. affin. anim. p. 164. *Tetrao Bonasia.*

Bonare Diction. V. p. 59. — *Diction. des anim.*
 II. p. 258.

Douendorff, Handb. d. Thiergesch. p. 331. n. 8.
das Haselhuhn.

26. CANUS. *Das graue Waldhuhn.*

Latham, Syn. Suppl. p. 217. Helsingian Grous.
Latham, Syst. ornith. II. p. 640. n. 13. Tetrao
 (Canus) corpore cano fusco undulato, rostro
 pedibusque nigris.

11. ALCHATA. *Das pyrenäische Haselhuhn.*

Müller, Natursyst. II. p. 487. n. 11. *das pyrenäische Haselhuhn.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 192. n. 7. *das Pyrenäische Haselhuhn*, tab. 31. B.

Halle, Vögel, p. 441. n. 463. *der Feldengel.*

Halle, Vögel, p. 454. n. 479 *das Afrikanische Waldhuhn.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 282. n. 249. *der Feldengel.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 632. *die Arabische Alchata.*

Klein, av. p. 115. n. 5. *Perdix Alchata seu Filacotoa.*

Klein, Vorbereit. p. 213. n. 5. *arabische Alchata.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 119. n. 5. *arabisches Rebhuhn*, p. 121. n. 3. *afrikanischer Rauchfuß*, p. 169. n. 2. *kleiner Birkhahn mit zwey laugen Schwanzspitzen.*

Brisson, ornith. I. p. 54. n. 4. *Gelinote des Pyrénées.*

Büffon, Vögel, V. p. 76. *das Pyrenäische Haselhuhn; Feldengel; Ganga.* M. 2. Figg.

Martini, Naturlex. III. p. 561. *das pyrenäische Haselhuhn.*

Batsch, Thiere, I. p. 214. *das pyrenäische Haselhuhn.*

Latham,

Latham, Syst. ornith. II. p. 641. n. 16. Tetrao (Alchata) olivaceo - flavicante nigro rufoque varius, abdomine albo, rectricibus duabus intermediis duplo longioribus subulatis.

Seligm. Vögel, VII. tab. 39. der kleine Auerhahn mit zwey nadelförmigen Federn in dem Schwanz.

Shaw, Reise, p. 163. der Kitawiah.

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 22. Tetrao Alchata.

Neue Schwed. Abhandl. III. p. 108. Tetrao Alchata.

Belon, hist. nat. des ois. p. 259. Perdrix de Damas ou de Syrie.

Hist. Prov. I. p. 354. Grandoule.

Hermann, tab. affin. anim. p. 164. Tetrao Alchata.

β. Das Senegallische Berghuhn. (10)

Müller, Natursyst. Suppl. p. 127. n. 9. a. das Senegallische Berghuhn.

Büffon, Vögel, V. p. 83. Senegalisches Berg- oder Haselhuhn. M. e. Fig.

Martini, Naturlex. III. p. 526. Senegalisches Berg-huhn.

Latham, Syn. II. 2. p. 749. n. 14. A. Senegal Grous.

Latham, Syst. ornith. II. p. 642. n. 17. Tetrao (Senegalus) pedibus hirsutis testaceus, rectricibus duabus mediis duplo longioribus.

γ. Das langgeschwänzte Berghuhn.

Büffon, Vögel, V. p. 87. das langgeschwänzte Waldhuhn.

27. NAMAQUA. Das afrikanische Waldhuhn.

Latham, Syn. Suppl. p. 215. Namaqua Grous.

Latham,

(10) Nach *Latham* eine eigne Gattung.

Latham, Syst. ornith. II. p. 642. n. 19. Tetrao (Namaqua) pedibus hirsutis, dorso castaneo, abdomine nigricante, rectricibus duabus mediis longioribus subulatis.

Sparrmann, Reis. n. d. Vorgeb. d. g. H. p. 147.

28. INDICUS. *Das indianische Waldhuhn.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 650. n. 23. Perdix (India) mutica rufa fasciolis nigris, sincipite albo lunula nigra, remigibus secundariis albo nigroque alternatim fasciatis, medio rufis.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 128. *das indische Haselhuhn*, p. 129. *die chinesische Wachtel*, tab. 96.

29. ARENARIUS. *Das russische Sandhuhn.*

Büffon, Vögel, V. p. 142. *das russische Sand- oder Steppenhuhn.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 642. n. 18. Tetrao (Arenarius) torque, abdomine et crisco atris, rectricibus fusco et griseo fasciatis apice albis, intermediis 2. fulvescentibus.

Pallas, Reis. Ausz. III. Anh. p. 10. n. 27. Tetrao arenaria, Tataris *Dsherdak*.

Pallas, nord. Beytr. III. p. 17. *das langschwänzige Berghuhn.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 164. T. arenaria. Comment. Lips. XXII. p. 665.

†† *Mit dreizehigen Füßen.*

30. PARADOXUS. *Das Bastardberghuhn.*

Müller, Natursyst. Suppl. p. 127. n. 9. b. *das Bastardhuhn.*

Büffon, Vögel, V. p. 140. *das Bastardberghuhn.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 643. n. 20. Tetrao (Paradoxus) pedibus tridactylis hirsutis, dorso griseo

griseo nigroque undulato, abdomine nigro maculis pallidis latioribus, colli macula fulva.

Pallas, Reis. Ausz. II. Anh. p. 13. n. 25. *Tetrao paradoxus*, tab. F.

Hermann, tab. affin. anim. p. 163. *Tetr. paradoxus*.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 332. n. 9. *das Baslaräberghuhn.*

** *Mit warziger Haut um den Augen, und nackten Füßen.*

† *Mit Sporen an den Füßen, bey dem Männchen: Rebhühner.*

10. FRANCOLINUS. *Der Frankolin.*

Müller, Natursyst. II. p. 486. n. 10. *das indische Huhn.*

Halle, Vögel, p. 441. n. 464. *das Ciprische Rebhuhn.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 513. *der Frankolin.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 168. *Cyprisches Rebhuhn.*

Brisson, ornith. I. p. 68. n. 13. *Francolin.*

Büffon, Vögel, VI. p. 59. *der Frankolin.* M. 2. Figg.

Martini, Naturlex. III. p. 543. *Frankolin.*

Batsch, Thiere, I. p. 415. *der Frankolin.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 644. n. 6. *Perdix (Francolinus) calcarata*, corpore vario, abdomine gulaque atris, cauda cuneata.

Seligmann, Vögel, VII. tab. 36. *das Haselhuhn.*

Hasselquist, Palaest. (ed. germ.) p. 330. n. 43. *Tetrao orientalis.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 161. n. 12. *Tetrao (Orientalis) pedibus antice pilosis, abdomine gulaque atris, collari ferrugineo, cauda cunei-formi.*

Zinnan, Uov. p. 28. tab. 3. Fig. 6. *Francolino.*

Bomare,

Bomare, Diction. IV. p. 573. — Dict. des anim.
II. 219.

31. MADAGASCARIENSIS. *Das madagascari-*
sche Rebhuhn.

Latham, Syn. Suppl. p. 219. *Pintado Partridge.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 645. n. 8. *Perdix*
(*Madagascariensis*) *calcarata*, supra varia, ab-
domine nigro, maculis albis, fascia per ocu-
los alteraque infra nigris.

12. RUFUS. *Das rothe Rebhuhn.*

Müller, Natursyst. II. p. 488. n. 12. *das rothe*
Rebhuhn, tab. 24. Fig. 4.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 479. n. 7. *das Roth-*
huhn.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 519. n. 8.
das Rothhuhn, p. 524. *rothes Rebhuhn*; *grie-*
chisches Rebhuhn; *Berghuhn*, *Steinhuhn*; *rothes*
europeäisches Rebhuhn; *italianisches Rebhuhn*;
welsches Rebhuhn; *rothfüßiges Rebhuhn*; *Per-*
nise; *Cottorna*. — cf. p. 672.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 525. a.
das griechische Rothhuhn.

Borowsky, Thierreich, II. p. 192. n. 8. *das ro-*
the Rebhuhn.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 203. n. 3. *Tetrao*
(*Rufus*) *pedibus nudis calcaratis rostroque san-*
guineis, *gula alba cincta fascia nigra*, *albo pun-*
ctata.

Ebert, Naturl. II. p. 118. *das rothbeinige oder*
spanische Rebhuhn.

Halle, Vögel, p. 440. n. 462. *das Rothhuhn.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 283. n.
250. *das rothe Rebhuhn.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 517. *das Rothhuhn.*

Klein.

Klein, av. p. 115. n. 4. *Perdix graeca*.

Klein, Vorbereit. p. 212. n. 4. *das feuerrothe Feldhuhn aus Griechenland*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 119. n. 4. *griechisches Rebhuhn*.

Briffon, ornithol. I. p. 67. n. 12. *Bartavelle*.

Büffon, Vögel, V. p. 37. *das rothe Rebhuhn, oder griechische Feldhuhn*.

Martini, Naturlex. III. p. 620. *rothes Rebhuhn*.

Batsch, Thiere, I. p. 416. *das rothe Feldhuhn*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 647. n. 12. *Perdix (Rufa) pedibus calcaratis rostroque sanguineis, gula alba cincta fascia nigra albo punctata*.

Frisch, Vögel, tab. 117. *das rothe italiänische Rebhuhn*.

Altmann, Helvetien, p. 224.

Anweis. Vögel zu faug. p. 602. *rothe Rebhühner*.

Onomatol. forestal. III: p. 145.

Linne', Syst. Nat. Edit. VI. p. 28. n. 6. *Perdix rufa*.

Linne', Syst. Nat. Ed. X. I. p. 160. n. 8. *Tetrao (Rufus) rostro pedibusque sanguineis, gula alba cincta fascia nigra albo punctata*.

Kramer, Austr. p. 357. n. 5. *Tetrao rectricibus cinnereis superiore medietate hinc inde rufis*.

Charleton, onom. zoic. p. 74. n. 12. *Perdix graeca*.

Fonfton, av. p. 68. *Perdix graeca*.

Zimmer, Uov. p. 29. tab. 3. Fig. 7. *Pernice*.

Bomare, Dictionn. VIII. p. 349. — Diction. des anim. III. p. 388.

Belon, hist. nat. des ois. p. 257. *Perdrix de Grece*.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 332. n. 10. *das rothe Rebhuhn*.

B. Das rothe europäische Rebhuhn. (1)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 519. und die p. 524. angeführten Synonymen. (s. vorher.)

Klein, av. p. 115. n. 4. *Perdix rufa*.

Briffon, ornith. I. p. 66. n. 10. *Perdrix rouge*.

Büffon, Vögel, VI. p. 51. *das rothe europäische Rebhuhn*.

Gesner, Vögelb. p. 415. *Rothun*, oder *Welsches Räbhun*, fig. p. 416. schl.

Martini, Naturlex. III. p. 632. *rothes europäisches Rebhuhn*.

Latham, Syn. Suppl. p. 220. *Guernsey Partridge*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 647. n. 12. β .

Scopoli, Beimerk. a. d. N. G. I. p. 143. n. 174. *das Steinhuhn oder Berguhn*.

Charleton, onom. zoic. p. 74. n. 2. *Perdix rufa*.

Jonston, av. p. 68. *Perdix rufa*.

γ. Das weißbunte Rebhuhn.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 527. c. *das weißbunte Rebhuhn*.

Büffon, Vögel, p. 58. *das roth- und weiße Rebhuhn*.

Briffon, ornith. I. p. 66. n. 10. A. *Perdrix rouge blanche*.

δ. Das Rebhuhn aus der Barbarey. (2)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 525. b. *das barbarische Rothhuhn*.

Briffon, ornith. I. p. 67. n. 11. *Perdrix rouge de Barbarie*.

Klein, av. p. 115. n. 4. *Perdix barbara*.

Büffon, Vögel, VI. p. 73. *rothes Rebhuhn aus der Barbarey*. M. e. Fig.

Martini,

(1) Nach *Briffon* und *Büffon* eine eigne Gattung.

(2) Nach *Briffon* und *Büffon* eine eigne Gattung.

Martini, Naturlex. III. p. 632. *rothes Rebhuhn aus der Barbarey.*

Latham, Syn. II. 2. p. 770.

Latham, Syst. ornith. II. p. 647. n. 12. γ.

Seligmann, Vögel, III. tab. 35. *das rothfüßige Rebhuhn aus der Barbarey.*

Shaw, Reis. p. 163. *das Rebhuhn in der Barbarey.*

Cetti, Sardin. II. p. 111. *das große rothe italienische Rebhuhn?*

13. PERDIX. *Das gemeine Rebhuhn.*

Müller, Natursyst. II. p. 488. n. 1. *das graue oder gemeine Rebhuhn.* tab. 24. fig. 5.

Leske, Naturgesch. p. 226. n. 2. *das Rebhuhn.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 193. n. 9. *gemeine Rebhuhn.*

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 202. n. 2. *Tetrao (Perdix) pedibus nudis calcaratis, macula nuda coccinea sub oculis, cauda ferruginea, pectore brunneo.* *Das Rebhuhn.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 478. n. 6. *das gemeine Rebhuhn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 527. n. 9. *das gemeine Rebhuhn*, p. 553. *Räbhuhn; Reppuhhn; Rufuhhn; Felduhhn; Wilduhhn; graues Rebhuhn.*

Funke, Naturgesch. I. p. 228. *das Rebhuhn.*

Ebert, Naturl. II. p. 118. *das gemeine Rebhuhn.*

Halle, Vögel, p. 437. n. 459. *das gemeine Rebhuhn.*

Meyer, Thiere, II. p. 25. tab. 88. *das Rebhuhn;* mit dem Gerippe.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 284. n. 252. *das Rebhuhn.*

Neuer Schaupl. d. Nat. VII. p. 68. *Rebhuhn.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 515. *das Felduhhn.*

Handb. der Naturgesch. II. p. 68. *das Rebhuhn.*

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 116. *das Rebhuhn.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 298. A. *das gemeine Rebhuhn.*

Beckmann, Naturhist. p. 50. c. *das Rebhuhn.*

Klein, av. p. 114. n. 1. *Perdix cinerea, vulgaris, no-*
stras.

Klein, Vorbereit. p. 212. n. 1. *gemeines Feldhuhn.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 118. n. 1. *gemeines Reb-*
huhn.

Klein, Stemmat. av. p. 25. tab. 26. fig. 2. a. b.

Klein, Vögeleyer, p. 32. tab. 15. fig. 5.

Gesner, Vögelb. p. 407. *Räbhun;* m. e. ziemlich
guten Fig.

Briffon, ornith. I. p. 61. n. 1. *Perdix grise.*

Büffon, Vögel, VI. p. 12. *das gemeine oder graue*
Rebhuhn, m. e. Fig.

Martini, Naturlex. III. p. 587. *das gemeine Reb-*
huhn.

Batsch, Thiere, I. p. 416. *das gemeine Rebhuhn.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 645. n. 9. *Perdix (Ci-*
nerea) calcarata, cinereo rufo et nigro varia,
macula nuda coccinea sub oculis, cauda ferru-
ginea, pectore brunneo.

Beseke, Vögel Kurl. p. 71. n. 148. *das Feldhuhn.*

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 48. n. 2. *das Reb-*
huhn; Rapphohn.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 399. *das Reb-*
huhn.

Fischer, Lvl. p. 90. 122. *Rebhuhn.*

Taube, Slavon. I. p. 22. *Rebhühner.*

Pallas, Reisen, III. p. 296. *Rebhühner,* p. 473.
(*Rebhühnerfang.*)

Stralenberg, Asien, p. 354. *Feld- oder Rebhüh-*
ner.

Pontop-

- Pontoppidan*, Dännem. p. 172. *Agerhöne*.
Pennant, britt. Thiergesch. p. 88. tab. 41. fig. 1. 2.
Pallas, nord. Beytr. III. p. 16. *Feldhühner*.
Boswell, Beschr. von Corsica p. 45. *Rebhühner*,
Borkhausen, Magaz. I. p. 224. n. 99.
Neue schwed. Abhandl. IV. p. 47. *Rebhühner*.
Linné, Abhandl. II. p. 298. n. 108. *das Rebhuhn*.
Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 143. n. 175. *das Rebhuhn*.
Naturforsch. XVII. p. 72. n. 148. *das graue Rebhuhn*.
Zorn, Petinotheol. II. p. 119. 281. 507. *das Feld- oder Rebhuhn*.
Döbel, Jägerprakt. I. p. 49. *Rebhuhn*.
Naumann, Vogelsteller, p. 176. *Feldhühner*.
Eberhard, Thiergesch. p. 65. *das Rebhuhn*.
Loniceri, Kräuterb. p. 675. *Rebhuhn*.
Walther, ökon. Naturgesch. Deutschl. p. 162. *Rebhuhn*.
André, u. *Bechstein*, Spazierg. III. p. 66. 70. 72. *Rebhuhn*.
Anweis. Vögel zu fang. p. 444. *das Rebhuhn*.
Geoffroy, mater. med. VII. p. 625. *das gemeine Rebhuhn*.
Lichtenberg, Magazin für das Neueste, etc. III. I. p. 63. 65. *das Rebhuhn*.
Meidinger, Vorles. I. p. 142. n. 2. *das Rebhuhn*.
Jablonsky, allgem. Lex. p. 879. *Rebhuhn*; *Wildhuhn*.
Merklein, Thierreich, p. 338. *Rebhun*.
Mannigfaltigk. I. p. 298. II. p. 623.
Börner, Stadt- und Landwirthsch. II. p. 236.
Oekon. Zool. p. 88. n. 30. *das Rebhuhn*.
Beckmann, Beschr. der Kurm. Brandenb. I. p. 811.
Onomatol. forestal. III. p. 143.
Onomatol. oecon. pract. III. p. 39.

Lemmery, Materiallex. p. 854.

Hannöv. Beytr. 1759. p. 266.

Anon. Précis de la nature d'elever les Faisans et les Perdreaux. Paris 1772. 12.

Aldrovand. encom. Perdicis: in Dornav. amphitheatr. I. p. 433.

Clodii, diss. de Perdice. Witteb. 1671. 4.

Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 56. *Perdix*.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 28. n. 7. *Perdix cinerea*.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 160. n. 9. *Tetrao* (*Perdix*) *pedibus nudis, macula nuda coccinea pone oculos, cauda ferruginea, sterno brunneo.*

Müller, zool. dan. prodr. p. 28. n. 125. *Tetrao* (*Perdix*) *pedibus nudis calcaratis, macula nuda coccinea sub oculis, cauda ferruginea, pectore brunneo.*

Kramer, Austr. p. 357. n. 5. *Tetrao macula nuda coccinea pone oculos, rectricibus ferrugineis.*

Rebhun.

Schwenkfeld, av. Silef. p. 327. *Perdix. Räbhun; Wild-Hun.*

Charleton, onom. zoic. p. 74. *Perdix cinerea*. p. 75. n. 7. *Perdix vulgaris*.

Rzaczynsky, hist. nat. Polon. p. 147. *Perdix*.

Fonston, av. p. 68. *Perdix cinerea seu minor*.

Forskål, fn. orient. p. VII. n. II. *Tetrao Perdix; turc. Tjeklik; ad Tor Schingan; Djiddae Hädjal.*

Schaeffer, element. ornithol. tab. 54.

Zinnan. Uov. p. 30. tab. 3. fig. 8. *Starna*.

Bonare, Diction. VIII. p. 343. — Diction. des anim. III. p. 383.

Aristot. hist. anim. L. 9. c. II. n. 123. 144. Περδικες.

2. B. Mos. c. 16. v. 13. — Psalm 78. v. 26. —

Jerem. c. 17. v. 1. — Sam. 26. v. 20.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 332. n. II.
das gemeine Rebhuhn.

Donndorff, Natur u. Kunst; III. p. 354. das Reb-
huhn.

β. Das grauweiße Rebhuhn.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 553. n. 1.

Briffon, ornith. I. p. 62. A. Perdix grise blanche.

Büffon, Vögel, VI. p. 31. das grauweiße Reb-
huhn.

Martini, Naturlex. III. p. 613. grauweisses Reb-
huhn.

Latham, Syn. II. 2. p. 763.

Latham, Syst. ornith. II. p. 646. n. 9. β.

γ. Das ganz weiße Rebhuhn.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 553. it.
p. 672.

Frisch, Vögel, tab. 116. das weiße Rebhuhn.

Martini, Naturlex. III. p. 639. weisses Rebhuhn.

Scaliger, exerc. in Cardan. 59. Perdices albae?

Pontoppidan, Dännem. p. 172. not. 20. ein weisses
Rephuhn.

δ. Das Rebhuhn mit dem Halsbande.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 553. n. 3.

Latham, Syn. II. 2. p. 764.

ε. Das bunte Rebhuhn. *

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 553. n. 2.

32. DAMASCENUS. Das Damaszener Rebhuhn. (3)

Halle, Vögel, p. 439. n. 460. das Damascener-
feldhuhn.

Klein, av. p. 114. n. 2. Perdix Damascena.

Klein, Vorbereit. p. 212. n. 2. Damascener.

(3) Nach *Briffon* eine Varietät von *Tetr. Perdix*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 118. n. 2. *Damascener*.

Briffon, ornith. I. p. 62. B. *Perdrix de Damas*.

Büffon, Vögel, VI. p. 33. *das Damascener- oder kleine graue Rebhuhn*.

Martini, Naturlex. III. p. 610. *damaszener Rebhuhn*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 646. n. 10. *Perdix (Damascena) cauda ferruginea, pectore brunneo, pedibus flavis*.

Charleton, onomast. zoic. p. 74. n. 4. *Perdix Damascena*.

Jonston, av. p. 68. *Perdix Daimascena*.

Bomare, Diction. VIII. p. 350. n. 6. Dict. des anim. III. p. 388.

33. MONTANUS. *Das Bergrebhuhn. (4)*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 554. n. 4. *das Bergrebhuhn*.

Briffon, ornithol. I. p. 62. n. 2. *Perdix de montagne*.

Büffon, Vögel, VI. p. 36. *das Bergrebhuhn*; m. e. Fig.

Martini, Naturlex. III. p. 608. *Bergrebhuhn*; *schwarzbraunes Rebhuhn*.

Latham, Syn. II. 2. p. 765. n. 10. *Mountain Partridge*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 646. n. 11. *Perdix (Montana) dilute castanea, capite et collo supremo fulvis, rectricibus septem extimis pallide castaneis*.

34. RUBRICOLLIS. *Das rothkehlige afrikanische Rebhuhn.*

Büffon, Vögel, VI. p. 69. *das rothe afrikanische Rebhuhn*; m. e. Fig.

Martini,

(4) Nach Bechstein eine Varietät oder vielmehr ein sehr altes Männchen des gemeinen Rebhuhns.

Martini, Naturlex. III. p. 590. das rothe afrika-nische Rebhuhn.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 643. n. 13. Perdix (Rubricollis) calcarata, corpore fusco maculato, crisco albo, orbitis gulaque nudis rubris.

35. PETROSUS. Das Felsenrebhuhn.

Büffon, Vögel, VI. p. 74. das Felsenrebhuhn; Rebhuhn von Gambia.

Martini, Naturlex. III. p. 612. Rebhuhn von Gambia.

Latham, Syst. ornith. II. p. 648. n. 14. Perdix (Petrosa) fusca, rostro, pedibus iridibusque rubris, macula pectoris ferruginea.

36. PERLATA. Das Perlrebhuhn.

Müller, Natursyst. Suppl. p. 129. n. 23. das Perlberghuhn.

Briffon, ornith. I. p. 65. n. 9. Perdix de la Chine.

Büffon, Vögel, VI. p. 75. das Perlberghuhn, oder das geperlte Chinesische Rebhuhn.

Martini, Naturlex. III. p. 586, das Perlberghuhn.

Latham, Syst. ornith. II. p. 648. n. 15. Perdix (Perlata) calcarata fusca, albido et rufescente maculata, dorso rufescente striato, gula alba, lateribus capitis fasciis duabus nigris, superciliis rufis.

β. Das afrikanische Perlrebhuhn. (5)

Latham, Syn. III. 2. p. 773. n. 15. A.

Latham, Syst. ornith. II. p. 648. n. 16. Perdix (Afra) calcarata fusca, fasciolis striisque albidis, superciliis colloque subtus, albo nigroque variis, remigibus caudaque lineolis transversim albis.

(5) Nach *Latham* eine eigene Gattung.

37. CAPENSIS. Das Rebhuhn vom Cap.

Latham, Syst. ornith. II. p. 643. n. 1. *Perdix (Capensis) subbicalcarata cinereo-nigricans*, grise-scente transversim lineata, pectore strigis albis, pedibus rubris.

35. BICALCARATUS. Das doppeltgespornte sene-galische Rebhuhn.

Müller, Natursyst. II. p. 490. n. 15. der Doppel-sporn.

Briffon, ornithol. I. p. 65. n. 8. *Perdrix du Se-negal*.

Büffon, Vögel, VI. p. 67. der Doppelhorn, m. e. Fig.

Martini, Naturlex. III. p. 542. das Senegalische Rebhuhn.

Batsch, Thiere, I. p. 416. der Doppelhorn.

Onomat. hist. nat. VII. p. 511. das Rebhun aus Senegal mit zwey Sporen.

Latham, Syst. ornith. II. p. 643. n. 2. *Perdix (Bi-calcarata) bicalcarata*, rufo fusco et albido varia, superciliis nigris.

Adanson, Senegal. p. 37. 38. 71. 217. Rebhühner.

Hermann, tab affin. anim. p. 168. Tetr. bicalca-ratus.

38. ZEYLONENSIS. Das doppeltgespornte zeila-nische Rebhuhn.

Latham, Syn. Suppl. p. 222. Chittygong Partrid-ge? (das Weibchen?)

Latham, Syst. ornith. II. p. 644. n. 3. *Perdix (Cey-lonenfis) bicalcarata*, capite, collo corporeque antice albo nigroque vario, postice ferru-gineo.

Neueste Mannigfaltigk. I. p. 211. Fig. 1. 2.

39. SPADICEUS. *Das rothbraune madagascarische Rebhuhn.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 644. n. 4. *Perdix (Spadicea) bicalcarata fusco - rubra, rostro flavo, pedibus rubris.*

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 132. *das rothe madagascarische Rebhuhn.*

40. NUDICOLLIS. *Das glattkehlige Rebhuhn.*

Büffon, Vögel, VI. p. 69. *die Glattkehle.*

Martini, Naturlex. III. p. 590. *die Glattkehle.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 644. n. 5. *Perdix (Nudicollis) bicalcarata, corpore variegato, collo antice nudo rubro.*

41. GINGICUS. *Das Rebhuhn aus Gingi.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 648. n. 17. *Perdix (Gingica) rufo - grisea, superciliis albo nigro - que variis, uropygio tectricibusque alarum mediis nigro, minoribus griseo maculatis.*

Sonnerat, Reis. nach Ostind. u. Chin. II. p. 130. *das Rebhuhn aus Gingi.*

42. PONDICERIANUS. *Das Rebhuhn von Pondichery.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 649. n. 18. *Perdix (Ponticeriana) calcarata, rufa, nigro fasciata, subtus alba, lunulis nigris, rectricibus duabus mediis fasciis quatuor albidis, lateralibus in - xis nigro fasciatis.*

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 129. *das Rebhuhn von Pondichery.*

β. Tetr. mutica fusca, nigro fasciata, collo pectore - que albo maculis nigris, rectricibus fasciis nigris. *

Latham, Syn. Suppl. p. 221.

Latham, Syst. ornith. II. p. 649. n. 18. β . (An femina?)

43. NAEVIUS. *Der Okokolin.*

Klein, av. p. 58. n. 3. *Corvus cristatus.*

Klein, Vorbereit. p. 110. n. 3. *Straußrabe.*

Klein, verb. Vögelh. p. 58. n. 3. *Straußrabe.*

Brisson, ornith. I. p. 63. n. 3. *Perdrix de montagne du Mexique.*

Brisson, ornith. I. p. 177. n. 10. *Rollier hupé du Mexique.*

Büffon, Vögel, VI. p. 142. *der Okokolin, oder das Mexikanische Bergrebhuhn.*

Martini, Naturlex. III. p. 609. *mexikanisches Bergrebhuhn.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 649. n. 19. *Perdix (Naevia) fusco pallente et fulvo varia, capite, gutture et lateribus nigro maculatis, rostro pedibusque incarnatis.*

†† *Mit ungehörnten Füßen: Wachteln.*

* *Mit vierzehigen Füßen.*

44. FERRUGINEUS. *Die große chinesische Wachtel.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 651. n. 26. *Perdix (Ferruginea) rufo-fusca, dorso tectricibusque alarum lineis longitudinalibus flavescentibus, pennis elongatis mucronatis.*

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 133. *die große chinesische Wachtel.*

45. JAVANICUS. *Die javanische Wachtel.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 651. n. 27. *Perdix (Javanica) cinerea, lunulis obscuris, genis nigris, fronte, sincipite abdominalisque fulvis, tectricibus maculis lunatis nigris.*

46. VIRIDIS. Die grüne Wachtel.

Latham, Syst. ornith. II. p. 650. n. 22. *Perdix (Viri-*
dis) viridis, alis castaneis nigro punctulatis,
rostro pedibusque pallide rubris.

16. VIRGINIANUS. Die virginische Wachtel.

Müller, Natursyst. II. p. 490. n. 16. *das virgini-*
sche Rebhuhn.

Onomat. hist. nat. VII. p. 519. *das Virginische*
Rebhuhn.

Klein, av. p. 115. n. 6. *Perdix virginiana.*

Klein, Vorbereit. p. 213. n. 6. *Amerikaner aus*
Virginien.

Klein, verb. Vögelhist. p. 119. n. 6. *Virginisches*
Rebhuhn.

Brisson, ornith. I. p. 64. n. 7. *Perdrix d'Ame-*
rique.

Martini, Naturlex. III. p. 591. *das amerikanische*
Rebhuhn.

Latham, Syst. ornith. II. p. 650. n. 24. *Perdix*
(Virginiana) mutica nigro varia, supra fusco-
rufescens, subtus flavescentes, fascia nigra supra
et infra oculos, linea verticali fulva.

Büffon, ois. II. p. 399. *Perdrix d'Amerique.*

Seligmann, Vögel, IV. tab. 109. *das amerikanische*
Rebhuhn.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 161. n. 10. *Tetrao*
(Virginianus) pedibus nudis, fascia nuda supra
et infra oculos, linea verticali fulva.

17. MARILANDUS. Die marylandische Wachtel.

Müller, Natursyst. II. p. 490. n. 17. *das mari-*
ländische Rebhuhn.

Halle, Vögel, p. 439. *das Amerikanische Reb-*
huhn. Fig. 31.

Onomat.

Onomat. hist. nat. VII. p. 514. *das Rebhuhn aus Neu-England.*

Klein, av. p. 115. n. 3. *Perdix novae Angliae.*

Klein, Vorbereit. p. 212. n. 3. *Neuengländer.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 119. n. 3. *Neuengländer.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 297. n. 101. *das Rebhuhn von Maryland.*

Briffon, ornith. I. p. 64. n. 6. *[Perdix de la nouvelle Angleterre.*

Büffon, Vögel, VL p. 77. *das Marilandische Rebhuhn.*

Martini, Naturlex. III. p. 619. *das Marilandische Rebhuhn.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 651. n. 25. *Perdix (Marilanda) rufa, nigro varia, subtus albida undulatim lineata, superciliis gulaque albida.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 161. n. 10. *Tetrao (Marilandicus) pedibus nudis, cervice albo nigroque punctata.*

Philos. transact. XVII. p. 992. *American Partridge.*

Du Pratz, Louis. II. p. 86.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 333. n. 12. *das Marylandische Rebhuhn.*

47. KAKELIK. *Der Kakelik.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 655. n. 42. *Perdix (Kakelik) rostro, palpebris pedibusque coccineis, pectore cinereo, dorso albo et cinereo undulato.*

48. CASPIUS. *Die caspische Wachtel.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 655. n. 43. *Perdix (Caspia) cinerea, spadiceo-maculata, naribus, orbitis et temporibus calvis pedibusque luteis.*

14. MEXICANUS. *Der Kolenikui.*

Müller, Natursyst. II. p. 489. n. 14. *das mexicanische Rebhuhn.*

Müller, Natursyst. Suppl. p. 130. n. 26. *der Colenicui.*
Onomat. hist. nat. III. p. 128. *Colcuicuiltic: die roth
gestreifte mexicanische Wachtel.*

Briffon, ornithol. I. p. 72. n. 20. *Caille de la
Louisiane.*

Büffon, Vögel, VI. p. 139. *der Kolenicui,* m.e. Fig.

Martini, Naturlex. III. p. 616. *Kolenicui.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 653. n. 31. *Perdix
(Mexicana) mutica, rostro pedibusque sanguineis,
corpo transversim striato, linea superciliari gulaque albis.*

Fonston, av. p. 224. *Colcuicuiltic.*

49. FALKLANDICUS. *Die maluinische Wachtel.*

Büffon, Vögel, VI. p. 116. *die Maluinische Wachtel,* m. e. Fig.

Martini, Naturlex. III. p. 691. *die Maluinische
Wachtel.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 653. n. 32. *Perdix
(Falklandica) mutica, corpore supra fuscescen-
te, iuguloque flavescente lunulis fuscis, pecto-
re imo abdomineque albis.*

50. NOVAE HISPANIAE. *Die neuspanische
Wachtel.*

Müller, Natursyst. Suppl. p. 129. n. 24. *der Colin.*

Briffon, ornith. I. p. 72. n. 19. *grande Caille du
Mexique.*

Büffon, Vögel, VI. p. 136. *der große Kolin.*

Martini, Naturlex. III. p. 615. *Kolin.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 653. n. 33. *Perdix
(Novae Hispaniae) mutica, capite cristato, cor-
pore fulvo, remigibus apice albis.*

Fonston,

Fonston, av. p. 223. *Coturnix alia omnium maxima fulva*.

51. COYOLCOS. *Der Koyolkos.*

Müller, Natursyst. Suppl. p. 129. n. 25. *der Coyolcos.*

Onomat. hist. nat. III. p. 454. *Coyolcozque.*

Briffon, ornith. I. p. 71. n. 18. *Caille du Mexique.*

Büffon, Vögel, VI. p. 138. *der Koyolkos, oder Koyolkozque.*

Martini, Naturlex. III. p. 618. *Koyolkos.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 653. n. 34. *Perdix (Coyolcos) mutica fulva, corpore supra fulvo albo nigroque vario, subtus fulvo.*

Fonston, av. p. 223. *Coyolcozque seu Collisonalis.*

52. SUSCITATOR. *Der Wecker.*

Briffon, ornith. I. p. 70. n. 15. *Caille de Java.*

Büffon, Vögel, VI. p. 122. *die Javanische Wachtel oder der Wecker.*

Martini, Naturlex. III. p. 688. *Javanische Wachtel.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 654. n. 35. *Perdix (Suscitator) flavicante rufo nigro et griseo variegata, rostro longiore.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 333. n. 13. *die javanische Wachtel.*

53. STRIATUS. *Die gestreifte Wachtel.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 654. n. 36. *Perdix (Striata) mutica, corpore variegato, pectore nigro, maculis albis, gula nigra, vitta supra oculos maxillarique albis.*

54. GRISEUS. *Die graue Wachtel.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 654. n. 37. *Perdix (Grisea) mutica, supra griseo nigroque varia, subtus*

subtus cinereo grisea, iugulo, pectore abdomi-
neque fasciis nigris.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 133. die
braune Wachtel aus Madagaskar.

55. COROMANDELICUS. *Die Wachtel aus Co-*
romandel.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 654. n. 38. Perdix
(Coromandelica) mutica corpore fasciolis li-
neisque pallidis, supra castaneo subtus flavo,
fascia per oculos flavescente, gula alba.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 134. die
kleine Wachtel aus Gingi.

56. NOVÆ GUINEÆ. *Die neuguineische Wachtel.*

Büffon, Vögel, VI. p. 128. die Neu-Guineische
Wachtel. m. e. Fig.

Martini, Naturlex. III. p. 692. *Wachtel von Neu-*
Guinea.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 655. n. 39. Perdix
(Novae Guineae) mutica, corpore fusco, tectri-
cibus alarum flavescente marginatis.

Sonnerat, Reis. n. Neuguinea, p. 61. die neugui-
neische Wachtel.

57. MANILLENSIS. *Die kleine luzonische Wachtel.*

Büffon, Vögel, VI. p. 127. die kleine Luzonische
Wachtel. m. e. Fig.

Martini, Naturlex. III. p. 690. *kleine Luzonische*
Wachtel.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 655. n. 40. Perdix
(Manillensis) mutica, corpore supra nigrican-
te, subtus flavescente, fasciis nigricantibus gula
alba.

Sonnerat, Reis. n. Neuguin. p. 22. die kleine Wach-
tel der Insel Luçon, m. e. Fig.

18. CRISTATUS. *Die mexikanische Wachtel.*

Müller, Natursyst. II. p. 491. n. 18. *die mexikanische Wachtel.*

Ebert, Naturl. II. p. 119. *die mexikanische Wachtel.*

Onomat. hist. nat. III. p. 453. *die gehaubte Wachtel von Mexico.*

Brisson, ornith. II. p. 72. n. 21. *Caille hupée du Mexique.*

Büffon, Vögel, VI. p. 135. *der Zonekolin.*

Martini, Naturlex. III. p. 618. *Zonekolin.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 652. n. 30. *Perdix (Cristata) mutica, corpore variegato, crista dependente gulaque fulvis.*

Fonston, av. p. 223. *Colin genus Quaultzonecolin nuncupatum.*

19. SINENSIS. *Die kleine chinesische Wachtel.*

Müller, Natursyst. II. p. 491. n. 19. *die chinesische Wachtel.*

Halle, Vögel, p. 444. n. 467. *die chinesische Wachtel.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 304. n. 254. *die chinesische Wachtel.*

Onomat. hist. nat. III. p. 453. *die chinesische Wachtel.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 169. *chinesische Wachtel.*

Brisson, ornith. I. p. 71. n. 17. *Caille des Philippines.*

Büffon, Vögel, VI. p. 117. *die Chinesische Wachtel;* m. e. Fig.

Martini, Naturlex. III. p. 685. *chinesische Wachtel.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 652. n. 29. *Perdix (Chinensis) mutica, corpore griseo maculato, iugulo nigro arcu albo.*

Selig-

Seligmann, Vögel, VII. tab. 37. die chinesische Wachtel.

20. *COTURNIX.* Die gemeine Wachtel. (6)

Müller, Natursyst. II. p. 492. n. 20. die gemeine Wachtel, tab. 24. fig. 6.

Leske, Naturgesch. p. 226. n. 1. die Wachtel.

Borowsky, Thierreich, II. p. 194. n. 10. die Wachtel.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 202 n. 1. Tetrao (Coturnix) pedibus nudis, corpore griseo maculato, superciliis albis, rectricibus margine lunulaque ferruginea; die Wachtel.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 480. n. 8. die Wachtel.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 556. n. 10. die Wachtel. p. 580. Schlagwachtel; Quakel.

Funke,

(6) Ein scheuer Vogel, der sehr schnell, aber nicht gern fliegt, flach über der Erde hinstreicht, und wegen seiner Schwere und kurzen Flügel nur eine kurze Strecke fliegt. Kommt zu Anfang des Mayes, seltener zu Ende des Aprils, bey uns an, und zieht aufs späteste zu Anfang des Octobers wieder weg. Wahrscheinlich ziehen sie des Nachts, denn noch nie hat man sie am Tage auf ihren Wanderungen bemerkt, und gehen vermutlich von uns nach dem südlichen Russland, und von da in die asiatische Turkey; denn auf ihren Wanderungen werden sie im südlichen Russland zu tausenden gefangen, und in Fässern nach Moskau und Petersburg geschickt. Sie ziehen nicht Trupp- sondern Familienweise, wie man sie im Herbst antrifft. Das Weibchen legt nur einmal des Jahrs, und zwar sehr spät, mehrentheils erst zu Ende des Julius, 8, 14, bis 20 Eyer, mehrentheils auf einem Waizenacker, seltener auf einer Wiese, und brütet drey Wochen. Die Männchen sind im ersten Jahre fast gar nicht von den Weibchen zu unterscheiden, und bekommen erst im zweyten Jahre die beyden grossen rostfarbigen Flecke auf der Brust, die in der Jägersprache das Schild genannt werden.

- Funke*, Naturgesch. I. p. 229. die Wachtel.
Ebert, Naturl. II. p. 119. die Wachtel.
Halle, Vögel, p. 442. n. 466. die Wachtel.
Meyer, Thiere, II. p. 22. tab. 80. *Wachtel*; *Diccurhicvogel*.
Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 305.
 n. 256. die Wachtel.
Neuer Schaupl. d. Nat. IX. p. 396. *Wachtel*.
Onomat. hist. nat. III. p. 449. die Wachtel.
Handb. der Naturgesch. II. p. 73. die Wachtel.
Handb. d. deutsch. Thiergeesch. p. 117. die Wachtel.
Pennant, arct. Zool. II. p. 298. B. die Wachtel.
Klein, av. p. 115. n. 1. *Coturnix vulgaris*, nostras.
 Quiscula; Quisquila; Qualea; Quaquila.
Klein, Vorbereit. p. 213. n. 1. Quakel.
Klein, verb. Vögelhist. p. 119. n. 1. *gemeine Wachtel*.
Klein, stemmat. av. p. 25. tab. 27. fig. 3. a. b.
Klein, Vögeleyer, p. 33. tab. 15. fig. 6.
Gesner, Vögelb. p. 538. *Wachtel*; m. e. gut. Abbildung.
Briffon, ornith. I. p. 69. n. 14. Caille.
Büffon, Vögel, VI. p. 79. die Wachtel; m. e. Fig.
Martini, Naturlex. III. p. 657. die Wachtel.
Batsch, Thiere, I. p. 417. die Wachtel.
Latham, Syn. Suppl. p. 222. Quail.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 651. n. 28. *Perdix*
 (*Coturnix*) *mutica*, corpore griseo-maculato,
 superciliis albis, rectricibus margine lunulaque
 ferruginea.
Beseke, Vögel Kurl. p. 71. n. 149. die *genuine*
 Wachtel.
Siemissen, meklenb. Vögel, p. 49. n. 3. die Wachtel.
Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 400. die Wachtel.
Cetti,

- Cetti*, Sardin. II. p. 115. *die Wachtel.*
Fischer, Liv. p. 91. n. 123. *Wachtel; Schnarrwachtel.*
Pallas, Reis. Ausz. III. p. 296. *Wachteln.*
Molina, Chili, p. 209. *die Wachteln.* *
Taube, Slavon. I. p. 22. *Wachteln.*
Kolbe, Vorgeb. d. g. Hoffn. ed. in 4. p. 395. *die Wachteln.*
Pontoppidan, Dännem. p. 172. n. 3. *Wachtel.*
Pontoppidan, Norweg. II. p. 192. *Vagtel.*
Hasselquist, Paläst. ed. germ. p. 331. n. 44. *Tetrao Israelitarum.*
Pennant, britt. Thiergesch. p. 89. tab. 42.
Zorn, Petinotheol. I. p. 162. 360. 425. 542. II. p. 65. 82. III. p. 145. 186. 283. 556. 719. *die Wachtel.*
Lichtenberg, u. *Voigt*, Magaz. für das Neueste, etc. VII. 2. p. 115. *Wachteln.*
Le Vaillant, Reis. n. Afr. I. p. 74. *Wachteln.*
Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 144. n. 176. *die Wachtel.*
Linné, Abhandl. II. p. 282. n. 32. p. 285. n. 49. p. 299. n. 109. *die Wachtel.*
Naturforsch. XVII. p. 73. n. 149. *die gemeine Wachtel.* XXII. p. 136. *Wachtel.*
Oekonom. Zool. p. 89. n. 31. *die Wachtel.*
Beckmann, Naturhist. p. 51. *die Wachtel.*
Eberhard, Thiergesch. p. 65. *die Wachtel.*
Geoffroy, mater. med. VII. p. 412. *die Wachtel.*
Naumann, Vogelsteller, p. 177. *die Wachtel.*
Meidinger, Vorles. I. p. 142. n. 1. *die Wachtel.*
Döbel, Jägerprakt. I. p. 51. *die Wachtel.*
Loniceri, Kräuterb. p. 676. *die Wachtel.*
Merklein, Thierreich. p. 405. *Wachtel.*
André, u. *Bechstein*, Spazierg. II. 162. *die Wachtel.*

- Goeze**, Nützl. Allerl. II. p. 225. n. 28. *die Wachtel.*
Jablonsky, allgem. Lex. p. 1314. *Wachtel.*
Hervieux, von Canarienvögeln. p. 180. *die Wachtel.*
Sander, Natur u. Relig. p. 226. *die Wachtel.*
Walther, ökonom. Naturgesch. Deutschl. p. 171. *Wachtel.*
Börner, Stadt- und Landwirthsch. II. p. 237. n. 7.
Derham, Physicotheol. p. 572.
Anweis. Vögel zu fang. p. 562.
Neues Hamburg. Magaz. St. 84. p. 462.
Borkhausen, Magazin, I. p. 225. n. 100.
Zückert, Speis. a. d. Thierreich. p. 94.
Bresl. Natur- u. Kunstgesch. Vers. 28. p. 409.
Ventzky: Pommersche Nachr. 1748. n. 6.
Allgem. Reis. VII. p. 39. 616. *Wachteln.*
Mem. de Mathem. et de Phys. III. p. 91. 92.
Tournefort, voy. au Levant. p. 169. 281. 313.
De la Porte, Reisen, V. p. 386.
Onomatol. forestal. III. p. 772.
Lemmery, Materiallex. p. 360.
Hahn, diss. de Coturnicibus. Regiom. 1712. 4.
Zacutus Lusit. de coturnicibus earumque epilepsia; in Medic. Princip. hist. Lib. 5. edit. oper. Tom. I. p. 838.
Camerarius, Coturnicum esus an convulsiones pariat. Syll. memorabil. Cent. 16. Part. 16. p. 1303.
Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 56. *Coturnix.*
Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 28. n. 8. *Coturnix.*
Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 161. n. 13. *Tetrao* (*Coturnix*) pedibus nudis, corpore griseo-maculato, superciliis albis, rectricibus margine lunulaque ferruginea.
Müller, zool. dan. prodr. p. 28. n. 226. *Tetrao* (*Coturnix*) pedibus nudis, corpore griseo-maculato,

culato, superciliis albis, rectricibus margine lunulaque ferruginea.

Kramer, Austr. p. 357. n. 7. Tetrao pedibus nudis, corpore griseo-maculato, linea superciliorum alba. *Wachtel*.

Charleton, onom. zoic. p. 75. n. 15. Coturnix.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 247. Coturnix. *Wachtel*; *Quackel*.

Moehring, av. gen. p. 54. n. 51. Coturnix.

Heerkens, av. Fris. p. 151. Coturnix.

Belon, hist. nat. des ois. p. 264. Caille.

Rzatczynsky, hist. nat. Polon. p. 375. Coturnix.

Sibbald, Scot. illustr. p. 16. Coturnix.

Zinnan, Uov. p. 36. tab. 5. fig. 19. Quaglia.

Plin. hist. nat. L. 10. c. 23. Coturnices.

Varro, de re rust. L. 3. c. 5. Coturnices.

Aristot. hist. anim. L. 9. c. 6. n. 137. c. 10. n. 144.

'Opetuyes.

Hermann, tab. affin. anim. p. 167. Tetrao Coturnix.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 334. n. 14. die gemeine *Wachtel*.

Donndorff, Natur und Kunst, III. p. 364. die *Wachtel*.

β. Die große polnische *Wachtel*.

Borowsky, Thierreich, II. p. 196. die große polnische *Wachtel*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 581. n. 4. die große *Wachtel*.

Briffon, ornith. I. p. 70. A. grande Caille.

Büffon, Vögel, VI. p. 114. die große Polnische *Wachtel*.

Martini, Naturlex. III. p. 687. große polnische *Wachtel*.

Latham, Syn. II. 2. p. 782.

Latham, Syst. ornith. II. p. 652. n. 28. ♂.

Rzarzynsky, act. hist. nat. Polon. p. 277.

γ. *Die weiße Wachtel.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 581. n. 5.

die weiße Wachtel.

Biffon, Vögel, VI. p. 115. *die weiße Wachtel.*

Martini, Naturlex. III. p. 692. *die weiße Wachtel.*

δ. *Die Sandwachtel.* *

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 580. n. 2.

ε. *Die Mohrenwachtel.* *

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 580. n. 3.

ξ. *Die bunte Wachtel.* *

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 581. n. 6.

η. *Die aschgraue Wachtel.* *

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 582. n. 7.

θ. *Die schwarze Wachtel.* *

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 582. n. 8.

** *Mit dreyzehigen Füßen.*

58. **GIBRALTARICUS.** *Die Wachtel von Gibraltar.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 656. n. 45. *Perdix (Gibraltarica) tridactyla mutica, corpore supra fusco, nigro-fasciato, subtus flavescente albo, tectricibus alarum maculis, pectore lunulis nigris.*

59. **ANDALUSICUS.** *Die Wachtel von Andalusien.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 656. n. 46. *Perdix (Andalusica) tridactyla mutica, corpore rufo, nigro undulato, subtus flavescente.*

60. **NIGRICOLLIS.** *Die schwarzäugige Wachtel.*

Brisson, ornithol. I. p. 70. n. 16. *Caille de Madagascar.*

Büffon,

Büffon, Vögel, VI. p. 120. die Madagaskarische Wachtel; m. e. Fig.

Martini, Naturlex. III. p. 690. Madagaskarische Wachtel.

Onomat. hist. nat. III. p. 452. die Wachtel von Madagascar.

Latham, Syst. ornith. II. p. 656. n. 47. Perdix (Nigricollis) tridactyla mutica, corpore supra cinereo rufo et nigro vario, guttare et collo inferiore nigris.

61. LUZONIENSIS. Die luzonische Wachtel.

Büffon, Vögel, VI. p. 126. die dreyzeeige Luzonische Wachtel; m. e. Fig.

Martini, Naturlex. III. p. 686. dreyzehige Luzonische Wachtel.

Latham, Syst. ornith. II. p. 656. n. 48. Perdix (Luzoniensis) tridactyla mutica, supra fusca, subtus flava, capite albo nigroque vario, tectricibus alarum apice flavis, macula nigra.

Sonnerat, Reis. n. Neuguinea, p. 22. die dreyzehige Wachtel.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 335 n. 15. die luzonische Wachtel.

* * * Gegend um den Augen mit wenigen Federn bedeckt. Füsse blos, ungespornt, vierzehig. Die Tinamus.

62. GUIANENSIS. Der Tocro. (?)

Büffon, Vögel, XIII. p. 244. der Tocro oder das Guianische Rebhuhn.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 650. n. 21. Perdix (Guianensis) rufo-fusca, nigro maculata et varia,

(7) Diese Vögel halten sich in Wäldern auf, und setzen sich des Nachts auf die Sträucher. Das Weibchen legt 12—15. weisse Eyer. Das Fleisch ist von vortrefflichem Geschmack.

gula cinerea, per oculos vitta fulva, remigibus
xtus maculis rufis.

Bankroft, Guian. p. 106. *das guianische Rebhuhn.*
p. 107. *Mans?*

Samml. zur Phys. u. Naturgesch. III. p. 108. *der
Tocro.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 165. *Tocro.*

63. MAIOR. *Der Macucagua.* (8)

Halle, Vögel, p. 98. n. 7. *die Brasilianische
Trappe.*

Klein, av. p. 18. n. 4. *Tarda Mucucagua.*

Klein, Vorbereit. p. 35. n. 4. *die Trappe Muku-
kagua.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 19. n. 4. *Mucucagua.*

Brisson, ornith. I. p. 63. n. 4. *Perdrix du Brésil.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 235. *der Macucagua;*
m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 633. n. 1. *Tina-
mus (Brasilienfis) fusco-olivaceus*, *fusco macu-
latus*, *abdomine albido vario*, *tibiis postice sca-
bris.*

Fermin, Surin, II. p. 169 *die erste Art Rebhühner.*

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 107. *der Magoua.*

Jonston, av. p. 180. *Macucagua.*

Barrere, Fr. equinox. p. 13. — Ornith. p. 81. *Per-
dix maior olivacea longiusculo et nigro rostro.*

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 335. n. 16.
der Macucagua.

64. CINEREUS. *Der aschgraue Tinamus.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 239. *der aschgraue Ti-
namus.*

Latham,

(8) In der XII. Edit. hat Linné diesen Vogel noch zu *P Sophia Crepitans* gerechnet. Auch *Brisson* verwechselt beyder Syno-
nymen.

Latham, Syst. ornith. II. p. 633. n. 2. *Tinamus* (*Cinereus*) *cineredo-fuscus*, capite cerviceque rufescentibus.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 107. *der asch-graue Tinamou.*

65. VARIEGATUS. *Der bunte Tinamus.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 240. *der bunte Tinamus*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 634. n. 3. *Tinamus* (*Variegatus*) *rufo fusco nigricanteque fasciatus*, subtus rufus, pileo nigro, gula abdomineque medio albis.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 107. *der bunte Tinamou.*

Barrere, Fr. equinox. p. 319. *Perdix minor cirrhata*, rostro atro. *Petite perdrix.*

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 335. n. 17. *der bunte Tinamus.*

66. Sovi. *Der Soui.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 242. *der Tinamus Soui*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 634. n. 4. *Tinamus* (*Soui*) *fusco-nebulosus*, subtus rufus, gula albo varia, capite supra colloque postice nigra.

Sammlung zur Phys. und N. G. III. p. 107. *der Soui.*

Barrere, Fr. equinox. p. 319. *Perdix minor fulva.* *Perdrix cul-rond.*

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 336. n. 18. *der Soui.*

A. Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Edit. XII.

Edit. XIII.

- p. 273. n. 1. β . *Phasianellus*. p. 747. n. 7. *Tetrao Phasianellus*.
 p. 275. n. 7. *Tetrao Canace*. p. 749. n. 3. b. *Canace*.

Das Geschlecht ist mit *sechs* und *vierzig* Gattungen vermehrt. Bey der 2ten Gattung sind *drey*, bey der 11ten *drey*, bey der 12ten *vier*, bey der 13ten *sechs*, bey der 20ten *drey* Varietäten aus einander gesetzt, und bey der 4ten die Varietäten γ und δ . hinzugekommen.

B. Neuere Gattungen.

1. Das arragonische Rebhuhn.

Latham, Syn. Suppl. p. 223. Arragonian Partridge.

Latham, Syst. ornith. II. p. 645. n. 7. *Perdix (Arragonica) calcarata*, *pedibus antice hirsutis, remigibus, abdomine femoribusque nigris*.

Faun. Arragon. p. 81. 3. tab. 7. Fig. 3.

2. Das asiatische Rebhuhn.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 649. n. 20. *Perdix (Asiatica) rufo-flavescens, fusco nigroque variegata, subtus albida, fasciolis nigris, pedibus obtuse calcaratis*.

3. Die Wachtel von der Hudsonsbay.

Latham, Syn. Suppl. p. 224. Hudsonian Quail.

Latham, Syst. ornith. II. p. 655. n. 41. *Perdix (Hudsonica) mutica, corpore rufo-fuscescente pallido, cervice albo maculata, alis dorso caudaque lineis transversis distantibus albis*.

4. Die indianische Wachtel.

Latham, Syst. ornith. II. p. 655. n. 44. *Perdix (Cambaiensis) rufo-flavescens; nebulis saturatioribus, digito postico mutico*.

SECHSTE ORDNUNG.

PASSERES. (*Singvögel. Sperlingsartige Vögel.*)

104. GESCHLECHT. COLUMBA. *Die Taube.*

Müller, Natursyst. II. p. 496. Gen. CIV.

Leske, Naturgesch. p. 253. Gen. XXXVI.

Borowsky, Thierreich, III. p. 205. Gen. LXXV.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 199. Gen. XLI.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 483. Gen. LXIII.

Ebert, Naturl. II. p. 321.

Halle, Vögel, p. 455.

Neuer Schaupl. d. Nat. VIII. p. 796.

Onomat. hist. nat. III. p. 175.

Pennant, arct. Zool. II. p. 300.

Klein, av. p. 118. Gen. XVII.

Brisson, ornith. I. p. 12. Gen. I.

Büffon, Vögel, VI. p. 144.

Batsth, Thiere, I. p. 411. Gen. CXIII.

Latham, Syst. ornith. II. p. 589. Gen. IV.

Hermann, tab. affin. anim. p. 208.

Donndorff, Handb. d. Thiergeesch. p. 336. Gen. LXXI.

* Mit geradem, mittelmäßigem Schwanz.

I. OENAS. *Die Holztaube.* (wilde Taube.) (9)

Müller, Natursyst. II. p. 496. n. 1. die *Feldtaube*. *

Leske, Naturgesch. p. 253. n. 1. die *Feldtaube*. *

Borowsky, Thierreich, III. p. 207. n. 2. die *wilde Taube*; *Bergtaube*.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 199. n. 1. *Columba* (*Oenas*) *caerulescens*, *cervice viridi nitente*,

(9) Die mit einem * bezeichneten Synonymen gehn auf diese und die folgende Gattung zugleich. S. die folgende Anmerk.

- te, dorso postico albo, fascia alarum apiceque caudae nigricante, *Haustaube*; *Feldtaube*; *Holztaube*. *
- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 483. n. 1. a. die wilde Taube.
- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. III. p. 679. die wilde Taube.
- Hale*, Vögel, p. 470. n. 497. die Holztaube.
- Gatterer*, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 315. n. 257. die wilde Taube; *Bergtaube*, *Holztaube*; *blaue Holztaube*; *kleine Holztaube*; *Lochtaube*, *Blochtaube*; *Blocktaube*; *Hohltaube*; *Waldtaube*; *Blautaube*.
- Pennant*, arct. Zool. II. p. 306. A. die Feldtaube. Neuer Schäapl. d. Nat. VIII. p. 798. die Bergtaube.
- Onomat. hist. nat.* V. p. 669. *Feldtaube*. *
- Klein*, av. p. 119. n. 8. *Columba lignorum*, proprie.
- Klein*, Vorbereit. p. 220. n. 8. *Holztaube*.
- Klein*, verb. Vögelhist. p. 123. n. 8. *Holztaube*.
- Klein*, Vögeleyer, p. 33. tab. 16. Fig. 6.
- Gesner*, Vögelb. p. 524. *wilde Taube*; in e. schl. Fig.
- Handb. der deutsch. Thiergesch.* p. 117. *Holztaube*.
- Briffon*, ornith. I. p. 20. n. 5. *Pigeon sauvage*.
- Büffon*, Vögel, VI. p. 147. die wilde Taube, p. 158. *Holztauben*.
- Batsch*, Thiere, I. p. 427. die Bergtaube.
- Latham*, Syn. Suppl. p. 197. Stock Dove.
- Latham*, Syst. ornith. II. p. 589. n. 1. *Columba* (*Oenas*) *caerulescens*, *cervice viridi nitente*, *dorso postico cinerascente*, *fascia alarum dupli* *apiceque caudae nigricante*.
- Beseke*, Vögel Kurl. p. 71. n. 150. die *Feldtaube*.
- Siemßen*,

- Siemßen*, meklenb. Vögel, p. 42. n. 1. *die gemeine Holztaube.*
- Bock*, Naturgesch. von Preuss. IV. p. 402. n. 150. *die Feldtaube.*
- Fischer*, Livil. p. 91. n. 124. *gemeine Taube, wilde Taube.*
- Taube*, Slavon. I. p. 23. *wilde Tauben.*
- Leem*, Finnm. p. 132. *Holztauben.*
- Pennant*, Reis. d. Schottl. I. p. 271. *wilde Tauben.*
- Boswell*, Beschr. von Corsica, p. 45. *wilde Taube.*
- White*, N. G. von Engl. p. 61. n. 8. p. 77. *Holztaube; Feldtaube.*
- Linné*, Abhandl. II. p. 299. n. 111. *die Feld-Taube.*
- Pontoppidan*, Dänem. p. 172. n. 1. a. *Waldtaube.*
- Pontoppidan*, Norw. II. p. 132. *Waldtauben.*
- Zorn*, Petinotheol. II. p. 302. *die Hohl-Taube.*
- Döbel*, Jägerprakt. I. p. 152. *Hol-, oder Blau-Taube.*
- Naumann*, Vogelsteller, p. 160. *die gemeine Holztaube.*
- Naturforsch. XVII. p. 74. n. 150. *die Feldtaube.*
- Anweis. Vögel zu fang. p. 557. *Hohltaube.*
- Meidinger*, Vorl. I. p. 145. n. 1. *die Feldtaube.*
- Oekonom. Zool. p. 90. n. 32. *die Feldtaube.*
- Neueste Mannigfaltigk. I. p. 570. *Holztauben.*
- Jablonsky*, allgem. Lex. p. 1183. *Taube.* *
- Rozier*, obs. sur la physique etc. XIX. p. 306.
(Fang auf den Pyrenäen.)
- Mem. d' Agriculture etc. 1787. p. 159. (An columba Livia Briss.?)
- Borkhausen*, Magazin, I. p. 208. n. 85. *Holztaube.*
- Linné*, Syst. Nat. Ed. II. p. 56. *Columba.* *
- Linné*, Syst. Nat. Ed. VI. p. 29. n. 1. *Oenas.*
- Linné*, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 162. n. 1. *Columba (Oenas) caerulescens, collo supra viridi nitente, fascia alarum apiceque caudae nigricante.*
- Müller,*

Müller, zool. dan. prodr. p. 28. n. 227. *Columba* (*Oenas*) *caerulescens*, *cervice viridi-nitento*, *dorso postico albo*, *fascia alarum apiceque caudae nigricante*. *

Briinniche, ornith. bor. p. 60. n. 203. *Columba Oenas*. *

Kramer, Austr. p. 358. n. 1. *Columba caerulescens*, *collo nitido*, *macula duplii alarum nigricante*, *a. Oenas*, *Holtaube*.

Charleton, onom. zoic. p. 77. n. 3. *Columba Cavernalis*.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 240. *Columba fera arborea*, *Holtaube*; *Koltaube*; *Blawe Taube*; *wilde Taube*.

Sibbald, Scot. illustr. p. 114. *Oenas*.

Forskål, fn. orient. p. VII. n. 13. b. *Columba vulgaris*, *Hudjaefa?*

Belon, hist. nat. des ois. p. 312. *Pigeon fuyard*.

Fonston, av. p. 92. *Oenas seu Vinago*.

Schaefer, element. ornithol. tab. 28.

Donndorff, Handb. d. Thiergeesch. p. 337. n. 1. *die Holztaube*.

a. DOMESTICA. *Die gemeine Haustaube.* (10)

Borowsky, Thierreich, III. p. 207. *die Feldtaube*; *Haustaube*.

Bech-

(10) Bey dem Taubengeschlecht findet man die grösste Verwirrung fast in der ganzen Ornithologie. Bald werden Gattungen zu Spielarten, bald wieder Spielarten zu Gattungen gemacht, u. s. w. und es wird sehr schwer halten, hierin zur völligen Gewissheit zu kommen. Die meisten neuern Ornithologen nehmen die gemeine Haustaube als *Spielart* von der wilden, oder als von ihr ursprünglich abstammend an. Die Fruchtbarkeit der Haustauben ist erstaunlich; denn ob sie gleich jedesmal nur 2 Eyer legen, so kann man doch, da sie mehrmals brüten, von einem einzigen Paar binnen vier Jahren an funfzehntausend erhalten.

- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 284. b. die *zahme Taube*; *Feldflüchter*.
- Funke*, Naturgesch. I. p. 214. die *Taube*.
- Ebert*, Naturl. II. p. 121. die *Tauben*.
- Halle*, Vögel, p. 464. n. 481. die *gemeine Taube*.
- Meyer*, Thiere, I. p. 50. tab. 80. die *Taube*.
(schlecht.)
- Gatterer*, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 320. n. 258. die *gemeine zahme Taube*; *Feldtaube*; *Haustaube*; *Hoftaube*; *Monatstaube*; *Bauertaube*; *Pastetentaube*; *Flugtaube*; *Schlagtaube*; *Feldflüchter*.
- Neuer Schapl. d. Nat. VIII. p. 800. 806. *eigentliche Haustaube*.
- Onomat. hist. nat. III. p. 179. die *Haus-, oder Hof-Taube*.
- Handb. d. Naturgesch. III. p. 55. die *Daube*.
- Handb. d. deutsch. Thiergesch. p. 117. *Haus-taube*.
- Sander*, oekonom. Naturgesch. II. p. 22. die *Taube*.
- Walther*, oekonom. N. G. Deutschl. p. 169. *Tauben*.
- Klein*, av. p. 118. n. 1. *Columba rusticorum*, *vulgaris*, *arvorum*.
- Klein*, Vorbereit. p. 218. n. 1. *Bauer-, Feld-, Pastetentaube*.
- Klein*, verb. Vögelhist. p. 122. n. 1. *Feldtaube*.
- Gesner*, Vögelb. p. 507. die *gemeine Taube*; m. e. Fig.
- Briffon*, ornith. I. p. 13. n. 1. *Pigeon domestique*.
- Büffon*,

erhalten. Die Eyer werden von beyden Geschlechtern wechselseitig 17. Tage bebrütet. Das Alter der Tauben erstreckt sich auf 8 bis 12. Jahre. Doch hat man auch Beispiele von einigen, die 20. Jahr alt geworden sind. In den deutschen Synonymen der verschiedenen Spielarten herrscht grosse Verwechslung.

- Büffon*, Vögel, VI. p. 144. *die Taube*. p. 147.
gemeine Haustaube. p. 151. *Haustauben*. p. 165.
zahme Haustauben.
- Batsch*, Thiere, I. p. 427. *die Haustaube*.
- Latham*, Syst. ornith. II. p. 589. n. 2. *Columba (Domestica) minor versicolor*, dorso inferiore albo.
- Bock*, N. G. von Preuss. IV. p. 402. *die Haus-taube*.
- Cetti*, Sardin. II. p. 128. *die zahme Taube*.
- Knox*, Ceyl. p. 57. *Tauben*.
- Pennant*, britt. Thiergesch. p. 92. tab. 44.
- Pontoppidan*, Dännem. p. 172. n. 1. b. *Monatstaube*.
- Pontoppidan*, Norweg. II. p. 132. *zahme Tauben*.
Naturforsch. XVII. p. 75. n. 151. *die Haustaube*.
- Stopoli*, Beim. a. d. N. G. I. p. 147. n. 177. *die Feldtaube*.
- Merklein*, Thierreich, p. 399. *Taube*.
- Loniceri*, Kräuterb. p. 647. *Taube*.
- Geoffroy*, mater. med. VII. p. 386. 392. *die Taube*.
- Oekon. Zool.* p. 90. n. 32. β. *die Haustaube*.
- Lemmery*, Materiallex. p. 332. u. p. 1160.
- Onomatol. forestal.* III. p. 543.
- Onomatol. oecon. pract.* III. p. 508.
- Preuss. Sammler*, I. p. 166.
- Büchotz*, Abhandl. vom Federvieh, p. 239.
- Börner*, Stadt- und Landwirthsch. II. p. 137.
- Zückert*, Speis. a. d. Thierreich, p. 15.
- Beckmann*, Naturhist. p. 51. n. 1. a. *die gemeine Taube*.
- Borkhausen*, Magazin, I. p. 204. n. 84.
- Hannöv. Magaz. 1771. p. 95. 1773. p. 301.
- Ludovici*, Kaufmannslex. II. p. 1507.
- André, u. Bechstein*, Spazierg. VII. p. 257. 272. 334.
 Aller-

Allerneueste Mannigfaltigk. II. p. 665. 683.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 29. n. 2. *Columba domestica*.

Linné, Syst. nat. Ed. X. I. p. 162. n. 1. β . *Col. domestica*.

Kramer, Austr. p. 358. n. 1. β . *Columba domestica s. vulgaris*.

Charleton, onomast. zoic. p. 76. *Columba domestica*.

Brünniche, ornith. bor. p. 63. n. 219. *Columba prolifera*. *Columba oenas domestica*.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 237. *Columba domestica*. *Columba cicur*. *Columba cellaris*. *Heimische Taube*; *Schlagtaube*.

Moehring, av. gen. p. 54. n. 52. *Columba*.

Sibbald, Scot. illustr. p. 115. *Columba domestica*.

Rzaczynsky, hist. nat. Polon. p. 183. *Columba*.

Belon, hist. nat. des ois. p. 313. *Pigeon*.

Pr. sp. Alpin. Aegypt. I. p. 198. *Columba*.

Du Tertre, hist. des Antill. II. p. 266. *Pigeon*.

Foufion, av. p. 89. *Columba domestica*.

Bomare, Diction. VIII. p. 501. — Diction. des anim. III. p. 453.

Plin. hist. nat. L. 8. c. 27. L. 10. c. 34. 53. L. 18. c. 16. *Columbae*.

Varro, de re rust. L. 3. c. 7. *Columba*.

Columella, de re rust. L. 8. c. 8. *Columba cellaris*.

Palladius, de re rust. L. 1. c. 24. *Columba*.

Aelian. nat. anim. L. 3. c. 15. περισερα. c. 44. *Adorata*.

Aristot. hist. anim. L. 9. c. 11. n. 119. περισερα.

Douendorff, Handb. der Thiergesch. p. 337. n. 2. *die Feldtaube*.

B. LIVIA. Die Stocktaube. (1)

Halle, Vögel, p. 471. n. 499. die Bergtaube.

Onomat. hist. nat. III. p. 184. die italienische Strich-taube.

Klein, av. p. 119. n. 10. *Columba Livia*.

Klein, Vorbereit. p. 220. n. 10. *Feldtaube*; *Feld-flüchter*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 123. n. 9. *Stocktaube*.

Gesner, Vögelb. p. 525. *Lochtaube*.

Briffon, ornith. I. p. 18. n. 3. *Biset*.

Büffon, Vögel, VI. p. 155. die Bergtaube; wilde Taube; m. e. Fig.

Latham, Syn. II. 2. p. 605 n. 2. A. *Biset Pigeon*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 590. n. 1. *β. Col-dom. Livia*, *cinereo-caerulescens*, *fascia alarum duplice nigra*, *dorso inferiore alba*.

Fermin, Surin. II. p. 144. * die sogenannte Holz-taube.

Charleton, onomast. zoic. p. 76. n. 1. *Columba livia*.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 240. *Columba fera saxatilis?*

Rom. orn. I. p. 83. — Hist. Prov. I. p. 490.

Jonston, av. p. 92. *Columba livia*.

y. SAXATILIS. Die Felsentaube. (2)

Halle, Vögel, p. 470. n. 498. die Felsentaube.

Onomat. hist. nat. III. p. 188. die Felsstaube.

Klein, av. p. 119. n. 9. *Columba Rupicola*.

Klein, Vorbereit. p. 220. n. 9. *Felsentaube*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 123. n. 11. *Felsentaube*.

Briffon, ornith. I. p. 19. n. 4. *Pigeon de roche*, ou *Rocheraie*.

Büffon,

(1) Nach *Briffon* eine eigne Gattung.

(2) Nach *Briffon* u. a. eine eigne Gattung. *Raj.* u. a. halten sie wieder mit *Col. Livia* für einerley.

Büffon, Vögel, VI. p. 158. *Felsen- oder Stein-tauben.*

Latham, Syn. II. 2. p. 608. Rock Pigeon.

Latham, Syst. ornith. II. p. 590. n. 2. γ. Col. dom. *Rupicola*, *cinerea*, *pectore dilute vina-ceo*, *fascia alarum duplice fusco-nigricante*, *remigibus maioribus fuscis*.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 240. *Columba fera sa-xatilis?*

Charleton, onom. zoic. p. 77. n. 2. *Palumbus Ru-picola*.

§. HISPANICA. Die spanische Taube. (3).

Müller, Naturfyst. II. p. 499. n. 2. *die spanische Taube.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 210. n. 4. *die Spa-nische Taube; Mondtaube.*

Bechstein, Naturgeschichte, I. p. 487. *die spanische Taube.*

Ebert, Naturl. II. p. 122. *die spanische oder römi-sche Taube.*

Onomat. histor. natur. III. p. 182. *die Spanische Taube.*

Briffon, ornith. I. p. 13. n. 2. *Pigeon romain.*

Büffon, Vögel, VI. p. 176. *die Spanische Taube.*

Büffon, Vögel, VI. p. 178. *die römische Taube,* m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 426. *die Mond- oder Mo-natstaube.*

Latham, Syn. II. 2. p. 608. *Roman Pigeon.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 590. n. 2. δ. Col. dom. *Hispanica*, *versicolor*, *cera albido furfu-racea.*

Büchotz, Abhandl. vom Federvieh, p. 251.

(3) Nach Briffon eine eigne Gattung. Einige wollen auch die spanische Taube wieder von der römischen trennen.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 163. n. 10. *Columba* (*Hispanica*) *cinerea*, *remigibus*, *rectricibus*, *plumis* *pedum* *rostroque* *albis*.

ε. **DASYPUS.** *Die Trommeltaube.*

Müller, Natur-syst. II. p. 499. n. 3. *der Federfuß*.
Borowsky, Thierreich, III. p. 210. n. 3. *die Trommeltaube.*

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 200. a. *die Trommeltaube.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 486 *die Trommeltaube.*

Ebert, Naturl. II. p. 122. *die Trommeltaube.*

Haller, Vögel, p. 464. n. 482, *die Trummeltaube.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 324. n. 260. *Tummeltaube*; *Rauhfuß*; *Rodler*; *Glu-glu*.

Klein, av. p. 118. n. 5. *Tympanistae.*

Klein, Vorbereit. p. 219. n. 5. *Trummeltauben.*

Klein, verb. Vögelhistor. p. 123. n. 5. *Trummeltauben.*

Klein, Vögeleyer, p. 33. tab. 16. fig. 5.

Brisson, ornith. I. p. 14. A. *Pigeon patu.*

Büffon, Vögel, VI. p. 179. *der ungehäubte Rauchfuß oder Trommeltaube*; m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 427. *die Trommeltaube.*

Latham, Syn. II. 2. p. 609. *Rough-footed Pigeon.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 590. n. 2. ε. Col. dom. *Dasyptus*, *peditibus hirsuto-pennaceis.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 404. *der Federfuß*.
Naturforsch. XVII. p. 75. n. 152. *der Federfuß.*

Brünniche, ornith. bor. p. 62. n. 214. *Columba* (*Tympanista*) *pennis in basi rostri recurvatis*.
Trommel-Due.

Kramer, Austr. p. 359. n. 1. λ. *Columba crista duplice, una in fronte, altera in occipite.* *Rodler*; *Trummeltaube.*

Charleton, onomast. zoic. p. 77. n. 8. *Columba pedibus hirsutis*.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 239. *Columbae dasypodes. Rauchfüßige Tauben; gehöslete, oder Reufische Tauben.*

Zinnan. Uov. degl' Uccell. p. 32. tab. 4. fig. 12.

Rom, orn. I. p. 78.

Donndorff, Handb. der Thiergeesch. p. 338. a.

ξ. C R I S T A T A. *Die Mohntaube.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 682. *die Mönchstaube.*

Brisson, ornith. I. p. 14. B. *Pigeon hupé.*

Büffon, Vögel, VI. p. 179. *der gehäubte Rauchfuß*. p. 180. *die gehäubte Monatstaube.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 324. n. 261. *die Mohntaube.*

Latham, Syn. II. 2. p. 609. *Crested Pigeon.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 591. n. 1. Col. dom. *Cristata*, *pedibus hirsuto-pennaceis, capite cristato.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 239. *Columbae cristatae.*

Köppichte Tauben.

Fonston, av. p. 90. *Columba cypria alia.*

η. N O R W E G I C A. *Die norwegische Taube. (4)*

Brisson, ornith. I. p. 14. C. *Pigeon de Norwege.*

Büffon, Vögel, p. 201. n. 1. *Schwenkfelds Norwegische große Taube.*

Latham, Syn. II. 2. p. 609. *Norway Pigeon.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 591. n. 1. Col. dom. *Norwegica*, *capite cristato, corpore niveo, pedibus plumosis.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 239. *Columba Norwegica.*

(4) Soll, nach Schwenkfeld, fast die Grösse eines Huhns haben.

Brünniche, ornith. bor. p. 62. n. 215. *Columba* (*Mercurialis*) *corpore niveo*, *pileo capitis*, *pedibus pennatis*, *alisque unicoloribus?* *Svalle Due?*

Fonston, av. p. 90. *Columba norwegica*, *tota alba*.

a. *Alis glaucis.* b. *Nigris.* c. *Rufis.* d. *Flavis?**

9. BARBARICA. Die Barbareytaube.

Halle, Vögel, p. 467. n. 489. *die Barbareytaube.*
Onomat. hist. nat. III. p. 178. *die numidische Taube.*
Brisson, ornithol. I. p. 14. *D. Pigeon de Barbarie.*
Büffon, Vögel, VI. p. 201. *die Barbareytaube;*
kretische Taube, cyprische Taube.

Latham, Syn. II. 2. p. 609. *Barbary Pigeon.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 591. n. 2. 9. Col.
 dom. *Barbarica*, *area oculorum nuda tubercu-
 lata, furfuracea, macula alarum duplice nigri-
 cante.*

Kramer, Austr. p. 358. n. 1. ζ . *Columba barbarica*
 f. *Numidica. Indianer.*

Brünniche, ornith. bor. p. 62. n. 217. *Columba* (*Turca*) *oculis magnis lucidis, palpebris nudis
 rubris, rostro minuto?*

10. CUCULLATA. Die Schleyertaube.

Müller, Natursyst. II. p. 505. n. 5. *die Hauben-
 taube.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 200. e. *die Schleyer-
 taube; Zopftaube.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 486. *die Schleyer-
 taube.*

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. III. p. 685.
Schleyertaube.

Halle, Vögel, p. 466. n. 487. *die Jakobiner-
 taube; Fig. 34.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 335. n. 263. *Schleyertaube*, *Kappentaube*; *Koppennonne*; *Perückentaube*; *Dictertaube*; *Venustaube*, *cyprische*, *russische oder englische Taube*.

Onoīnat. hist. nat. III. p. 178. *die Mönchtaube*.

Klein, av. p. 118. n. 5. *Columba cucullata*.

Klein, Vorbereit. p. 219. n. 5. *Haubentaube*.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 123. n. 5. *Venus-taube*.

Brisson, ornith. I. p. 15. E. *Pigeon nonain*.

Gesner, Vögelb. p. 507. *Englische oder Reußische Taube*, m. e. Fig.

Büffon, Vögel, VI. p. 181. *die Jakobiner- und Nonnentaube*, m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 426. *die Perückentaube*.

Latham, Syn. II. 2. p. 610. *Jacobine Pigeon*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 591. n. 2. 1. Col. *domest. Cucullata*, *pennis occipitis reflexo-erectis*.

Pontoppidan, Däanem. p. 172. n. 3. *Parykdue*.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 404. *die Schopf- oder Haubentaube*.

Naturforsch. XVII. p. 75. n. 154. *die Haubentaube*.

Merklein, Thierreich, p. 391. *cyprische Tauben*; m. e. Fig.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. L. p. 162. n. 3. *Columba (Cucullata) pennis occipitis reflexo-erectis*.

Linné, fn. Suec. p. 75. n. 207. ζ. *Columba cu-cullata*.

Charleton, onom. zoic. p. 76. n. 3. *Columba cu-cullata*.

Kramer, Austr. p. 358. n. 1. ζ, *Columba cucullata* f. *Jacobeae*. *Paruckentaube*.

Brünniche, ornith. bor. p. 61. n. 211. *Columba (Cucullata) colore vario, fasciis alarum corpori concoloribus, capite, oculis, remigibus pri-*

moribus et rectricibus albis, pennis occipitis in cucullum reflexo erectis; *Paryk Due.*

Zonston, av. p. 90. *Columba cucullata*.

Aldrovand, ornith. p. 254. *Columba cypria cucullata*.

Bonare, Diction. VIII. p. 509. — Dict. des anim. III. p. 452.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 338. c. die Schreyertaube.

x. HISPIDA. Die Strupptaube.

Müller, Natursystem, II. p. 500. n. 6. die rauhe Taube,

Bechstein, Naturgeschichte I. p. 488. die Strupptaube.

Onomat. hist. nat. III. p. 182. die Strobeltaube.

Briffon, ornith. I. p. 15. G. Pigeon frisé,

Büffon, Vögel, VI. p. 202. die wollichte Taube.

Latham, Syn. II. 2. p. 610. Laced Pigeon.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 591. n. 2. z. Col. dom. *Hispida*, plumis minimis erectis, per dorsum alasque dispersis.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 239. *Columbae crispa*e.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 164. n. 19. *Columba* (*Hispida*) plumis minimis erectis, per dorsum alasque dispersis.

λ. TURBITA. Das Möwchen.

Müller, Natursyst. II. p. 501. n. 7. die Meewentaube,

Borowsky, Thierreich, II. p. 211. n. 7. das Möwchen.

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 200. c. das Möwchen.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 487. die Möwentaube,

Bechstein,

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 683. *das Mevchen*.

Halle, Vögel, p. 467. n. 488. *die Möventaube*.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 325. n. 264. *die Mewentaube*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 123. *Mövechen*.

Briffon, ornith. I. p. 15. Pigeon à gorge frisée.

Büffon, Vögel, VI. p. 187. *das Mövchen*; *die Möventaube*, m. e. Fig.

Latham, Syn. II. 2. p. 611. Turbit pigeon.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 592. n. 2. λ. Col. dom. *Turbita*, pennis in pectore recurvis.

Pontoppidan, Dännem. p. 172. n. 4. *Mefike*.

Büchotz, Abhandl. vom Federvieh, p. 247. n. 5. *Halskrausentaube*.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 162. n. 4. *Columba* (*Turbita*) pennis in pectore recurvatis.

Kramer, Austr. p. 358. n. 1. ♂. *Columba turbita* dicta. *Türkl.*

Brünniche, ornith. bor. p. 62. n. 216. *Columba* (*Turbita*) pennis in pectore recurvatis, rostro minuto. *Maefekke*.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 338. d. *das Mövchen*.

a. Alis flavis. b. Rufis. c. Atris. d. Glaucis.
e. Argenteis. f. Albis. g. Albis, rectricibus
nigris. h. Fasciatis. aa. Fascia atra. bb. Fascia
caerulea. cc. Fascia spadicea. *Briunn.* l. c.

μ. LATICAUDA. *Die Pfauentaube*.

Müller, Natursystem, II. p. 501. n. 8. *der Breitschwanz*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 211. n. 8. *die Pfauentaube*, *Schüttelkopf*, *Zittertaube*.

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 200. f. *die Pfauentaube*; *der Hühnerschwanz*.

- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 487. die Pfauentaube.
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 685. die Pfauentaube.
Halle, Vögel, p. 465. n. 484. die Pfauentaube.
Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 326. n. 265. die Pfauentaube.
Onomat. hist. nat. III. p. 191. die Pfauentaube.
Klein, av. p. 118. n. 3. *Columba laticauda*, tremula.
Klein, Vorbereit p. 219. n. 3. Pfauentaube.
Klein, verb. Vögelhist. p. 122. n. 3. Pfauentaube.
Brisson, ornith. I. p. 18. P. Pigeon-Paon.
Brisson, ornithol. I. p. 18. Q. Pigeon Trembleur.
Columba tremula.
Batsch, Thiere, I. p. 426. die Pfauentaube.
Latham, Syn. II. 2. p. 611. Broad and narrow-tailed Shaker Pigeons.
Latham, Syst. ornith. II. p. 592. n. 2. μ. Col. dom. *Laticauda cauda erecta multipenni patula*.
Büffon, Vögel, VI. p. 183. die Pfauentaube.
Pontoppidan, Dänem. p. 172. n. 5. Hoystiert.
Büchotz, Abh. vom Federvieh, p. 247. 252.
Boek, N. G. von Preußl. IV. p. 404. Pfauentaube.
Naturforsch. XVII. p. 75 n. 155. Pfauentaube.
Linne', Syst. Nat. Ed. X. I. p. 162. n. 5. *Columba (Tremula) cauda erecta multipenni patula*.
Kramer, Austr. p. 359. n. 1. ♀. *Columba tremula laticauda*, Pfauentaube.
Brünniche, ornith. bor. p. 61. n. 209. *Columba (Tremula) cauda erecta multipenni patula, reticibus 36. Hoy-Stiert*.
Charleton, onom zoic. p. 77. n. 7. *Columba tremula*; *Laticauda vel Acuticauda*.
Dictionn. des animaux, III. p. 451.

Donn-

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 338. e. die
Pfauentaube.

a. Nivea, b. Variegata, *Brünn.* l. c. *

v. GYRATRIX. *Der Tümmler.*

Müller, Natursyst. II. p. 502. n. 9. der *Taumler*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 292. n. 9. die *Tummeltaube*; *Tümmler*.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 200. d. *der Timler*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 487. die *Purzeltaube*.

Halle, Vögel, p. 468. n. 491. die *Tummeltaube*.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 326. n. 266. die *Tummeltaube*.

Onomat. hist. nat. III. p. 181. die *Purzeltaube*.

Klein, av. p. 119. n. 6. *Gyratrices*.

Klein, Vorbereit. p. 220. n. 6. *Taumler*.

Klein, verb. Vögelh. p. 123. n. 6. *Taumler*.

Brisson, ornith. I. p. 17. N. Pigeon culbitant.

Büffon, Vögel, VI. p. 197. *der Tümmler*; m. e. Fig.

Ratsch, Thiere, I. p. 428. die *Tummeltaube*.

Latham, Syn. II. 2. p. 612. *Tumbler* Pigeon.

Latham, Syst. ornith. II. p. 592. n. 2. v. Col. dom. *Gyratrix*, sub volatu se gyrans.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 404. *Taumler*.

Naturforsch. XVII. p. 76. n. 156. der *Taumler*.

Büchotz, Abhandl. vom Federvieh, p. 247. 254.

Kramer, Austr. p. 359. n. 1. n. *Columba Gyratrix*, *Burzerl*, *Burzler*.

Charleton, onom. zoic. p. 76. n. 4. *Columba Gyratrix*.

Jonston, av. p. 90. *Columbae gyratrices*.

Brünniche, ornith. bor. p. 60. n. 205. *Columba* (*Vertaga*) *iride lucida albida*, *pupilla atra*, *in volatu retrorsum volubilis*, *Tumler*.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 338. f. der
Tämmler.

- a. Atra, alis totis et abdomine albis. * (*Skade.*)
- b. Atra, alis ad dimidium et abdomine albis. * (*Knokel-Skade.*)
- c. Alba, pileo et rectricibus nigris; mandibula superiore nigra, inferior alba. * (*Kalotte.*)
- d. Nigra, remigibus septem primoribus albis. *
- e. Nigra, remigibus septem primoribus rectricibusque omnibus albis. *
- f. Atra rectricibus albis. *Hybrida.* *
- g. Caerulea, h. Atra, i. Alba. } *Unicolores.* *
- k. Rufa, l. Flava. } *Gneyser.*
- m. Guttate alarumque fasciis flavis vel rufis. *
- n. Cauda patula; corpore plerumque toto albo. * (*Huuulrumped.*)
- o. Atra, variis coloribus intertextis. *
- p. Alba, variis coloribus intertextis. *

Brünniche, ornith. boreal. l. cit.

ξ. **GALEATA.** *Die Helmtaube.*

Miller, Natursyst. II. p. 502. n. 10. *die Helmtaube.*

Halle, Vögel, p. 468. n. 492. *die Helmtaube.*

Onomat. histor. natur. III. p. 179. *die Helmtaube.*

Brisson, ornith. I. p. 18. O. *Pigeon cuirassé.*

Büffon, Vögel, VI. p. 191. *die Helmtaube; gehäubte Taube.*

Latham, Syn. II. 2. 612. *Helmet Pigeon.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 592. n. 2. ξ, Col. dom.

Galeata, capite, remigibus rectricibusque concoloribus, a corpore diversicoloribus.

Pontoppidan, Dänneim. p. 172. not. 21. *Croso-nobel.*

Charleton, onom. zoic. p. 76. n. 5. *Columba galeata*.

Brünniche, ornith. bor. p. 61. n. 210. *Columba (Galeata) colore vario, fasciis alarum corpori concoloribus, capite, oculis, remigibus primo-ribus et rectricibus albis, pennis occipitis in galeam erectis, Krossonobel.*

Dictionn. des anim. III. p. 452.

Fonston, av. p. 90. *Columbae galeatae*.

o. T U R C I C A. *Die türkische Taube.* (5)

Müller, Natursyst. II. p. 502. n. 11. *die türkische Taube.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 486. *die türkische, arabische, persische Taube.*

Klein, av. p. 118. n. 6. *Columba turcica*.

Klein, Vorbereit. p. 219. n. 6. *Kreiselschnäbler.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 123. n. 6. *Kreiselschnäbler.*

Brisson, ornithol. I. p. 16. H. *Pigeon turc.*

Büffon, Vögel, VI. p. 177. *die türkische Taube;* ill. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 427. *die türkische Taube.*

Latham, Syn. II. 2. p. 612. *Persian or turkish Pigeon.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 593. n. 1. o. Col. dom. *Turcica*, *cera papillofa rubra.*

Charleton, onom. zoic. p. 76. n. 6. *Columba turcica*. (mit der folgenden verwechselt.)

Brünniche, ornith. bor. p. 62. n. 217. *Columba (Turca) oculis magnis lucidis, palpebris nudis rubris, rostro minuto? Tyrk?*

Fonston, av. p. 90. *Columba turcica seu persica.*

Bonare, Dictionn. VIII. p. 510. — Diction. des anim. III. p. 453.

- π. TA-

(5) Hat viel Ähnlichkeit mit der folgenden; wird auch häufig damit verwechselt, und beyde von vielen für einerley gehalten.

π. TABELLARIA. Die Brieftaube.

Müller, Natursyst. II. p. 503. n. 12. die Posttaube.

Borowsky, Thierreich, III. p. 213. n. 11. die Posttaube; Pavedette.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 200. g. die Posttaube, türkische Taube.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 486. türkische Taube.

Ebert, Naturl. II. p. 123. die Posttaube.

Halle, Vögel, p. 465. n. 486. die Pavedette, Brieftaube, Curiertaube.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 327. n. 269. Brieftaube, Briefträger.

Onomat. hist. nat. III. p. 190. die Brieftaube, cyprische Taube.

Klein, av. p. 118. n. 4. Columba tabellaria.

Klein, Vorbereit. p. 219. n. 4. Pavedette.

Klein, verb. Vögelhist. p. 123. Pavedette.

Klein, Vögeleyer, p. 33. tab. 16. Fig. 5.

Brisson, ornith. I. p. 16. I. Pigeon Messager.

Buffon, Vögel, VI. p. 202. die Brieftaube.

Latham, Syn. II. 2. p. 613. Carier Pigeon.

Latham, Syst. ornith. I. p. 593. n. 2. π. Col. dom.

Tabellaria, cera lata carunculata albida, palpbris nudis.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 405. die Pavedette.

Pontoppidan, Dänem. p. 172. n. 6. Pavedette.

Niebuhr, Reisebeschreibung durch Arabien, II. p. 239.

Volney, Voy. en Syrie et en Egypte, I. p. 85.

Beckmann, phys. ökon. Bibl. XV. p. 56.

Hamb. Magazin, XIX. p. 618.

Alb. Columbi, de columbis tabellariis, Regiom, 1714. 4.

Goeze, nützl. Allerl. II. p. 227.

Leipzig. ökonom. Abhandl. II. p. 86. n. 7.

Linné,

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 163. n. 6. *Columba* (*Tabellaria*) *cera lata verrucosa, palpebris nudis.*

Kramer, Austr. p. 359. *Columba tabellaria, Banzcadeten.*

Brünniche, ornith. bor. p. 62. n. 213. *Columba* (*Tabellaria*) *rostro longiore, cera lata verrucosa, ad dimidium tecto, palpebris nudis, Pavedette.*

Diction. des anim. III. p. 452. *Pigeon Cavalier, Porteur des Lettres.*

Donndorff, Handb. d. Thiergeesch. p. 338. h. *die Brieftaube.*

g. GUTTUROSA. *Die Kropftaube.*

Müller, Natursyst. II. p. 500. n. 4. *der Kropfer.*

Müller, Naturs. Suppl. p. 131. n. 4. *der Kropfer.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 210. n. 5. *die Kropftaube.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 200. b. *die Kropftaube.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 486. *die Kropftaube.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 683. *Kropftaube, Kröpper.*

Halle, Vögel, p. 465. n. 483. *die Kropftaube.*

Onomat. hist. nat. III. p. 181. *die Kropftaube.*

Klein, av. p. 118. n. 2. *Columba gutturosa.*

Klein, Vorbereit. p. 219. n. 2. *Kropfer; Kropper, Krepper.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 122. n. 2. *Kropfer.*

Klein, Vögeleyer, p. 33. tab. 16. Fig. 5.

Briffon, ornith. I. p. 16. k. *Pigeon grand gosier.*

Büffon, Vögel, VI. p. 168. *Kropftaube; mit einer Fig.*

Batsch, Thiere, I. p. 427. *die Kropftaube.*

Latham, Syn. II. 2. p. 613. *Powter Pigeon.*

Latham,

- Latham*, Syst. ornith. II. p. 593. n. 2. q. Col.
dom. *Gutturosa*, pectore inflato.
- Börner*, Stadt- und Landwirthsch. II. p. 137. n. 2.
- Büchotz*, Abh. von Federvieh, p. 247.
- Merklein*, Thierreich, p. 391. *holländische Tauben*.
- Linné*, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 162. n. 2. Columba (Gutturosa) pectore inflato.
- Kramer*, Austr. p. 358. n. 1. γ. Columba gutturosa.
- Brünniche*, ornith. bor. p. 62. n. 212. Columba (Gutturosa) gutture inflato. *Kropf-Due*.
- Charleton*, onom. zoic. p. 76. n. 2. Columba gutturosa.
- Fonston*, av. p. 90. Columbae gutturosae.
- Diction. des anim. III. p. 451.
- Donndorff*, Handb. d. Thiergeesch. p. 338. g. die *Kropftaube*.
- a. *Maior*, *Heelkroppert*, b. *Minor*, *Halvkroppert*.
Brünniche, orn. bor. p. 62.
- aa. *Alba*, rectricibus nigris. * *Brünn.* l. c. n. 1.
- bb. *Nigra*, remigibus primoribus albis. * *Brünn.* l. c. n. 2..
- cc. *Rufa*, remigibus primoribus albis. * *Brünn.* l. c. n. 3.
- dd. *Flava*, remigibus primoribus albis. * *Brünn.* l. c. n. 4.
- ee. *Die weinsuppenfarbige Kropftaube*. *
Müller, Naturfyl. Suppl. p. 131. a.
- Büffon*, Vögel, VI. p. 169. n. 1. Pigeon Grosségorge soupe en vin.
- Büchotz*, Abhandl. vom Federvieh, p. 247.
- ff. *Die bunte, Isabelfarbige Kropftaube*. *
Büffon, Vögel, VI. p. 169. n. 2. Pigeon Grosségorge chamois, panache.

Büchotz,

Büchotz, Abhandl. vom Federvieh, p. 247.

gg. *Die schneeweisse Kropftaube.* *

Müller, Natursyst. Suppl. p. 131. b.

Büffon, Vögel, VI. p. 169. n. 3. Pigeon Grosse gorge blanc comme un Cigne.

Büchotz, Abhandl. vom Federvieh, p. 247.

hh. *Die weiße rauchfüssige Kropftaube mit langen Flügeln.* *

Müller, Natursyst. Suppl. p. 131. c.

Büffon, Vögel, VI. p. 169. n. 4. Pigeon Grosse gorge blanc pattu à ailes longues.

Büchotz, Abhandl. vom Federvieh, p. 247.

ii. *Die graue, gefleckte und sanftgraue Kropftaube.* *

Müller, Natursyst. Suppl. p. 131. d.

Büffon, Vögel, VI. p. 170. n. 5. Pigeon Grosse gorge gris panaché et gris doux.

Büchotz, Abhandl. vom Federvieh, p. 248.

kk. *Die stahlgraue bandirte Kropftaube.* *

Müller, Natursyst. Suppl. p. 131. e.

Büffon, Vögel, VI. p. 170. n. 6. Pigeon Grosse gorge gris de fer, gris barré et à rubans.

Büchotz, Abhandl. vom Federvieh, p. 248.

ll. *Die silber spiegelnde, graue gesprengelte Kropftaube.* *

Müller, Natursyst. Suppl. p. 131. f.

Büffon, Vögel, VI. p. 170. n. 7. Pigeon Grosse gorge gris piqué comme argenté.

Büchotz, Abhandl. vom Federvieh, p. 248.

mm. *Die Hyacinthen-Kropftaube.* *

Büffon, Vögel, VI. p. 170. n. 8. Pigeon Grosse gorge jacinthe, de couleur bleue ouvragée en blanc.

Büchotz, Abhandl. vom Federvieh, p. 248.

nn. *Die feuerfarbige oder hochrothe Kropftaube.* *

Büffon, Vögel, VI. p. 170. n. 9. *Pigeon Grosse-gorge couleur de feu.*

Büchotz, Abhandl. vom Federvieh, p. 248.

oo. *Die nußholzfarbige Kropftaube.* *

Müller, Natursyst. Suppl. p. 132. h.

Büffon, Vögel, VI. p. 171. n. 10. *Pigeon Grosse-gorge couleur de bois de noyer.*

Büchotz, Abh. vom Federvieh, p. 248.

pp. *Die kastanienbraune Kropftaube; mit ganz weißen Schwungfedern.* *

Müller, Natursyst. Suppl. p. 132. i.

Büffon, Vögel, VI. p. 171. n. 11. *Pigeon Grosse-gorge couleur de marron avec les pennes de l'aile toutes blanches.*

qq. *Die Mohrenkropftaube.* *

Müller, Natursyst. Suppl. p. 132. k.

Büffon, Vögel, VI. p. 171. n. 12. *Pigeon Grosse-gorge maurin d'un beau noir velouté, etc.*

Büchotz, Abh. vom Federvieh, p. 248.

rr. *Die schieferfarbige Kropftaube, mit weißen Schwungfedern.* *

Büffon, Vögel, VI. p. 172. n. 13.

σ. EQUES. *Die Rittertaube.* (6)

Halle, Vögel, p. 468. n. 493. *die Rittertaube.*

Brissot, ornith. I. p. 17. L. *Pigeon Cavalier.*

Büffon, Vögel, VI. p. 205. *die Rittertaube.*

Latham, Syn. II. 2. p. 614. *Horseman - Pigeon.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 513. n. 2. σ. Col. domest. *Eques*, pectore inflato, cera carunculata.

Kramer, Austr. p. 359. n. 1. i. *Columba eques.*

τ. PER-

(6) Bastard von der *Kropftaube* und *Brieftaube*.

r. PERCUSSOR. *Die Wendetaube.* (?)

Halle, Vögel, p. 467. n. 490. *die Klatschtaube*, *Klatscher*.

Briffon, ornith. I. p. 17. M. *Pigeon batteur*.

Büffon, Vögel, VI. p. 200. *die Wendetaube*.

Latham, Syn. II. 2. p. 614. *Smiter Pigeon*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 593. n. 1. r. Col. dom.

Percussor, sub volatu se gyans, ac alas veloci-
ter percussans.

Kramer, Avstr. p. 358. n. 1. η. *Columba percus-
sor*. *Plätscher*.

Brünniche, ornith. bor. p. 63. n. 218. *Columba*
(*Percussor*) *versicolor*, varie et indeterminate vo-
lans. *Dreyert*.

Büchotz, Abh. vom Federvieh, p. 247. 254.

Diction. des anim. III. p. 452.

v. JUBATA. *Die Mähnentaube.*

Latham, Syn II. 2. p. 614. *Turner Pigeon*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 594. n. 2. v. Col.
dom. *Jubata*, cervice pennis iubae equinae in-
star reversis.

Halle, Vögel, p. 468. n. 494. *die mähnige Taube*.

q. MACULATA. *Die Schnippentaube.* (?)

Büffon, Vögel, VI. p. 194. *die Maskentaube*.

Bechstein, Naturgeschichte, I. p. 485. *Maskentaube*,
Schnippentaube, *Brilltaube*.

Halle, Vögel, p. 468. n. 495. *die Brilltaube*.

Latham, Syn. II. 2. p. 615. *Spot Pigeon*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 594. n. 2. q. Col.
dom. *Frontalis*, corpore albo, macula frontis
caudaque concoloribus.

Pontoppidan, Dännem. p. 172. not. 21. *Sneppert*.

L 2

Brün-

(7) Schlägt im Fluge so stark mit den Flügeln, dass es ein Ge-
räusch giebt, als ob zwey Bretter an einander schlugen.

(8) Ist nicht mit N. 52. p. 780. zu verwechseln.

Briinniche, ornith. bor. p. 61. n. 206. *Columba* (*Fulicaria*) corpore albo, fronte maculata, cauda fronti concolore. *Snippert*.

- a. Macula frontali et rectricibus rufis, mandibula superiore alba. *
 - b. Macula frontali et rectricibus atris, mandibula superiore atra. *
- Briinn.* orn. bor. loc. cit.



Smellie, Philosoph. der Naturgesch. II. p. 9.

Jac. Vaniere, de S. I. Columbae et Vites. Paris 1696. 8.

Anon. A Treatise on domestic pigeons.

Du pigeon; in Erreurs populaires, l. 2. c. 3. p. 241.

Memoire sur les pigeons, sur leurs colombiers, et sur la maniere d'y gouverner les oiseaux domestiques. — Journ. Oecon. 1761. p. 16.

Sur la maniere de rafraichir l'air des Colombiers. — Nouvel. Oecon. Tom. II. p. 110.

Erfahrungen, Versuche, und Anmerkungen über die Taubenzucht. — Hannöv. Beytr. 1761. p. 825. u. 866.

Ob es vortheilhaft sey, Tauben bey der Landwirthschaft zu halten. — Nachr. der Schles. patr. Gesellsch. 1781. p. 111.

Vom Halten der Tauben in den Städten. — Wittenb. Wochenbl. IX. p. 9.

Eine wohlfeile Art, die Tauben im Winter zu erhalten. — Hannöv. Magaz. 1771. p. 958.

Mittel wider die Raute der Tauben. — Berlin. Samml. IV. p. 263.

Tauben vor der Flucht zu bewahren. — Berlin. Samml. III. p. 618.

Salanders Tauben- und Bienenzucht. Frct. 1723. 8.

Von

Von dem Schaden, den die Tauben in der Landwirthschaft verursachen. — *Schönfeld*, Landwirthsch. p. 195.

Nützliches und vollständiges Taubenbuch, m.e.K. Ulm 1790. 8.

Woher die Tauben die Pocken bekommen. Hamburg. Magaz. XV. p. 651. cf. *Universalregister*.

Böhmius, de columba bicipite. Eph. nat. cur. Dec. II. an. 6. obs. 57. p. 137. c. fig.

Borrich. anatom. Columbae. — Act. Hafn. Vol. I. Obs. 96. — *Manget*, Bibl. I. 1. p. 388.

Camerarii sanguinis Columbini vis in oculis fugilatis, columbarum usus medicus. — Syll. memorabil. Cent. 6. P. 94. p. 414.

Num pulli columbini bonis cibis sint annumerandi? in *Zacut. Lusit. medic. princ. hist.* L. 2. ed. oper. T. I. p. 265.

Ausführl. Geschichte der Tauben. — Leipz. ökonom. phys. Abhandl. II. p. 65. — *Büffons Vögel*, VI. p. 317. ff.

Allgemeine Haushalt. u. Landwissensch. I. p. 864.

Der kluge Landmann. Francf. u. Leipzig 1713. 4. p. 393.

Magazin für den Landmann, II. p. 57.

Halle, Magie, IV. p. 268.

13. MONTANA. *Die Bergtaube.* (9)

Müller, Natursyst. II. p. 504. n. 13. *die Bergtaube.* Onomat. hist. nat. III. p. 186. *die Bergtaube.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 125. n. 27. *Rothe Bergtaube.*

Briffon, ornith. I. p. 32. n. 29. *Pigeon roux de Cayenne.*

L 3

Latham,

(9) In *Büffons Vög.* VI. p. 217. sind alle hieher und zu N. 24. p. 781. gehörige Synonymen unter einander geworfen.

Latham, Syn. Suppl. p. 197. Partridge Pigeon.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 594. n. 3. Columba (Montana) orbitis nudis sanguineis, corpore rufo, subtus flavo.

Seligm. Vögel, V. tab. 14. das Bergrehhuhn.

Neue Mannigfaltigk. III. p. 293. die rothen Täuben.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 163. n. 7. Columba (Montana) obscure rufa, subtus flava, orbita oculorum nuda sanguinea.

3. TETRAOIDES. Die Steinhuhnähnliche Taube.

Latham, Syn. IV. 2. p. 614. n. 4. Tetraoid Pigeon.

Latham, Syst. ornith. II. p. 594. n. 4. Columba (Tetraoides) capite colloque nigris, margine nigro.

Scopoli, Beim. a. d. N. G. I. p. 149. n. 180. die dem Steinhuhn (Tetr. Rufus) ähnliche Taube.

14. LEUCOCEPHALA. Die weißgekrönte Taube. (10)

Müller, Natursyst. II. p. 504. n. 14. der Weißkopf.

Halle, Vögel, p. 478. n. 517. die Taube mit weißer Platte.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 328. n. 271. der Weißkopf.

Onomat. hist. nat. III. p. 183. die Taube mit der weißen Krone.

Pennant, arct. Zool. II. p. 305. n. 105. die Taube mit dem weißen Scheitel.

Klein, av. p. 120. n. 18. Columba capite albo.

Klein, Vorbereit. p. 221. n. 18. Weißkopf.

Klein,

(10) Nach *Büffon* eine Abänderung von der gemeinen wilden Taube.

Klein, verb. Vögelhistor. p. 124. n. 18. *Weißkopf.*

Briffon, ornithol. I. p. 34. n. 33. Pigeon de roche de la Jamaïque.

Büffon, Vögel, VI. p. 235. die weißgekrönte Taube; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 594. n. 5. Columba (Leucocephala) caerulescens, orbitis verticeque albis, remigibus rectricibusque fuscis.

Seligmann, Vögel, I. tab. 50. die Taube mit der weißen Krone.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 164. n. 13. Columba (Leucocephala) caerulescens, vertice depresso albo.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 339. n. 3. die weißköpfige Taube.

15. LEUCOPTERA. Die weißflügelige Taube. (1)

Müller, Naturaust. II. p. 504. n. 15. der Weißflügel.

Onomat. hist. nat. III. p. 177. die braune indianische Taube.

Klein, av. p. 120. n. 26. Columba indica fusca.

Klein, Vorbereit. p. 223. n. 26. indianische braune Taube.

Klein, verb. Vögelhist. p. 125. n. 26. braune indianische Taube.

Briffon, ornith. I. p. 25. n. 15. Pigeon des Indes.

Büffon, Vögel, VI. p. 222. die braune Indianische Taube; m. e. Fig.

Latham, Syn. Suppl. p. 197. White-winged Pigeon.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 595. n. 6. Columba (Leucoptera) fusco - rufescens, orbitis nudis

(1) Nach Büffon eine Abänderung von der gemeinen wilden Taube.

caeruleis, rectricibus cinereis, apice albis, intermediis fuscis.

Seligmann, Vögel, III. tab. 47. die braune indianische Taube.

Linne, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 164. n. 14. Columba (Leucoptera) palpebris nudis caeruleis, iridibus oculorum fulvis.

4. FUSCA. Die braune Taube von Carthagena.

Ist, nach *Latham*, mit der vorhergehenden einanderley.

5. NOVAE SEELANDIAE. Die neuseeländische Taube.

Latham, Syst. ornith. II. p. 603. n. 37. Columba (Zealandica) rubra, abdomine albo, uropygio caeruleo, cauda nigra.

6. CARIBAEA. Die ringelschwänzige madagascari-sche Taube.

Halle, Vögel, p. 476. n. 511. die Taube mit der dunkelblauen Bind' um den Schwanz.

Klein, av. p. 120. n. 19. Columba cauda torquata, seu fascia notata.

Klein, Vorbereit. p. 222. n. 19. Ringelschwanz.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 124. n. 19. Ringelschwanz.

Brisson, ornith. I. p. 35. n. 34. Pigeon à queue annelée de la Jamaïque.

Büffon, Vögel, VI. p. 258. der Ringelschwanz; die blaue madagascari-sche Ringeltaube; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 603. n. 36. Columba (Caribaea) caerulescens, abdomine albo, capite, collo inferiore pectoreque purpurascens, cauda fascia transversa nigra.

β. Col. cauda cuneata, orbitis dentatis flavescentibus, corpore caerulescente. *

Latham, Syn. Suppl. p. 199. — Syst. ornith. II. p. 603. n. 36. β.

Jacquin, Vög. p. 30. n. 24.

16. GUINEA. Die guineische Taube. (2)

Müller, Natursyst. II. p. 405. n. 16. die guineische Taube.

Halle, Vögel, p. 478. n. 515. die graubraune Taube, mit rother Membrane um die Augen.

Ouonat. hist. nat. III. p. 180. die Taube mit dreyeckigten Flecken.

Klein, av. p. 120. n. 25. Columba Guineensis.

Klein, Vorbereit. p. 222. n. 25. Taube von Guinea.

Klein, verb. Vögelhist. p. 125. n. 25. guineische Taube.

Briffon, ornith. I. p. 33. n. 30. Pigeon de Guinée.

Büffon, Vögel, VI. p. 254. die Guineische Ringeltaube mit dreyeckigen Flecken; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 602. n. 35. Columba (Guinea) orbitis nudis rufis, alis maculis albis triquetris, rectricibus apice nigris.

Seligmänn, Vögel, III. tab. 45. die Taube mit dreieckichten Flecken.

Somnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 139. die Turteltaube vom Vorgebürge der guten Hoffnung.

Linneé, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 163. n. 9. Columba (Guinea) rectricibus cinereis apice nigris, orbita oculorum nuda rubra.

17. CORONATA. Der Kronenvogel.

Müller, Natursyst. II. p. 405. n. 17. die große Kronentaube.

(2) Nach Büffon eine Spielart von der europäischen Ringeltaube.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 201. n. 2. *Columba (Coronata) caerulescens supra cinera, orbitis nigris, crista erecta, humeris ferrugineis; der Kronvogel.*

Briffon, ornith. I. p. 78. n. 6. *Faisan couronné des Indes.*

Büffon, Vögel, VI. p. 266. *der Kronenvogel.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 596. n. 9. *Columba (Coronata) orbitis nigris, crista erecta, corpore caerulescente, humeris ferrugineis.*

Sonnerat, Reis. n. Neuguin. p. 60. *die Kronentaube.*

Götz, Naturgesch. einiger Vögel, p. 65. *der Kronenvogel*, tab. 4.

Seligmann, Vögel, IX. tab. 28. *große gekrönte indianische Taube.*

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 148. n. 179. *die grunzende oder blöckende Taube; die Taube mit aufrecht stehendem Federbusch.*

Donndorff, Handb. d. Thiergefch. p. 339. n. 4. *der Kronvogel.*

7. CRISTATA. *Der Rouloul.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 596. n. 10. *Columba (Cristata) fusco-rufescens cristata, subtus capite colloque nigris, dorso caudaque viridibus, fronte setis sex longissimis erectis.*

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 136. *der Rouloul aus Malacca*, tab. 100.

Mus. Carlson. fasc. III. tab. 64. *Phasianus cristatus.*

Philos. transact. LXII. p. 1. tab. 1. *Uncommon Bird from Malacca.*

β. *Latham*, Syst. ornith. II. p. 597. n. 10. β.

8. ALBICAPILLA. *Die grüne, grauköpfige Taube.*

Büffon, Vögel, VI. p. 233. *die grüne, grauköpfige Taube der Insel Antigua.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 597. n. 11. Columba (Albicapilla) viridis, vertice cano, colli lateribus rufescente aureis, remigibus primoriis caudaque nigris.

Sonnerat, Reis. n. Neuguin. p. 40. *die grüne, grauköpfige Taube der Insel Antigua.*

9. POMPADORA. *Die Pompadurtaube.*

Latham, Syn. Suppl. p. 198.

Latham, Syst. ornith. II. p. 597. n. 12. Columba (Pompadora) viridis, alis purpurascens, remigibus nigris, genis gulaque flavis.

β. Latham, Syst. ornith. II. p. 597. n. 12. (*Femina.*)

10. ERYTHROPTERA. *Die rothflügelige Taube.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 597. n. 15. Columba (Erythroptera) granatina, subtus, nucha, dorso remigibusque nigris, fronte superciliisque albis, cauda a medio ad apicem nigra.

β. Latham, Syst. ornith. II. p. 598. n. 15. β. Col. gutture et pectore albis, superciliis ferrugineis, remigibus caudaque nigricantibus.

γ. Latham, Syst. ornith. II. p. 598. n. 15. γ. Col. nigro-rubescens, superciliis colloque subtus albis, pedibus rubris.

11. STRIATA. *Die gestreifte Taube.*

Müller, Natursyst. II. p. 506. n. 18. *die gestreifte Taube.*

Klein, av. p. 120. n. 21. Columba turtur Ind. orientalis, alis dorsoque ex cinereo seriatim quasi squamatis.

Klein,

Klein, Vorbereit. p. 222. n. 21. *graugeschuppte Turteltaube*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 124. n. 21. *graugeschuppte Turteltaube*.

Brisson, ornith. I. p. 26. n. 17. *Tourterelle rayée des Indes*.

Rüffon, Vögel, VI. p. 303. 305. *die gestreifte Indianische Turteltaube*; in. e. Fig.

Latham, Syn. Suppl. p. 200. *Barred Turtle*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 608. n. 53. *Columba (Striata) orbitis lorisque candidis, corpore cinereo nigro fasciato, subtus rufo*.

Seligmann, Vögel, I. tab. 31. *die quergestreifte Taube*.

19. PALUMBUS. *Die Ringeltaube*.

Müller, Natursyst. II. p. 506. n. 19. *die Ringtaube*.

Leske, Naturgesch. p. 254. n. 2. *die Ringeltaube*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 205. n. 1. *die Ringeltaube*, tab. 75.

Blumenbach, Handb. d. N.G. p. 201, n. 3. *Columba (Palumbus) rectricibus postice atris, remigibus primoribus margine exteriore albidis, collo utrinque albo, Ringeltaube; große Holztaube; Schlagtaube; Blochtaube; Kohltaube; Holztaube*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 490. n. 2. *die Ringeltaube*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 779. *die Ringeltaube*.

Ebert, Naturl. II. p. 123. *die Ringeltaube*.

Halle, Vögel, p. 469. n. 496. *die große Ringeltaube*.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 329. n. 273. *die Ringeltaube*.

Beckmann,

- Beckmann, Naturhist. p. 51. b. *die Ringeltaube*.
Pennant, arct. Zool. II. p. 307. b. *die Ringeltaube*.
Onomat. hist. nat. V. p. 3. *die Ringtaube*.
Handb. der deutsch. Thiergeesch. p. 117. *die Ringeltaube*.
Klein, av. p. 119. n. 7. *Columba torquata*.
Klein, Vorbereit. p. 220. n. 7. *Ringeltaube*.
Klein, verb. Vögelhist. p. 123. n. 7. *Ringeltaube*.
Klein, Stemmat. av. p. 27. tab. 29. Fig. 1. a—c.
Klein, Vögeleyer, p. 33. tab. 15. Fig. 2.
Gesner, Vögelb. p. 526. *Ringeltauben; Blochtauben*.
Briffon, ornith. I. p. 20. n. 6. *Pigeon raimier*.
Buffon, Vögel, VI. p. 238. *die Ringeltaube*; in. e. Fig.
Batsch, Thiere, I. p. 428. *die Ringeltaube*.
Latham, Syn. Suppl. p. 198. *Ring-Pigeon*.
Latham, Syst. ornith. II. p. 601. n. 32. *Columba (Palumbus) cinerea*, rectricibus postice atris, remigibus primoribus margine exteriore albidis, collo utrinque albo.
Beske, Vögel Kurl. p. 71. n. 151. *die Ringeltaube*.
Siemssen, meklenb. Vögel, p. 43. n. 2. *die Ringeltaube*.
Bock, Naturgesch. von Preuss. IV. p. 405. *die Ringeltaube; Waldtaube*.
Fischer, Livil. p. 91. n. 125. *Ringeltaube; Waldtaube*.
Cetti, Sardin. II. p. 130. *die Holz- oder Ringeltaube*.
Molina, Chil. p. 208. *Ringeltauben?*
Pontoppidan, Dännem. p. 172. n. 7. *Ringeltaube*.
White, N. G. von Engl. p. 66. n. 6. *Ringeltaube*.
Adan.

- Adanson*, Senegal. p. 93. *Felsintauben*.
Leem, Finn. p. 132. * *Ringeltauben*.
Pennant, brit. Thiergeesch. p 94. tab. 45.
Linné, Abhandl. II. p. 299. n. 110. die *Ringeltaube*.
Zorn, Petinotheol. II. p. 300. *Ringel-Taube*.
Döbel, Jägerprakt. I. p. 52. *Ringel-Taube*.
Naumann, Vogelsteller, p. 160. *Ringeltaube*.
Naturforsch. XVII. p. 76. n. 157. die *Ringtaube*.
Anweis. Vögel zu fang. p. 556. *Ringeltaube*.
Scopoli, Beitr. a. d. N. G. I. p. 147. n. 178. die
wilde Taube, *Ringeltaube*.
Lonniceri, Kräuterb. p. 649. *Holztaube*; *Bloch-*
taube; *Waldtaube*.
Neues hamburg. Magaz. St. 37.
Börner, Stadt- und Landwirthsch. p. 137. n. 3.
Angenehme Landluft, p. 311.
Zückert, Speis. a. d. Thierreich, p. 97.
Borkhausen, Magazin, I. p. 208. n. 86.
Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 56. *Palumbus*.
Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 29. n. 3. *Palumbus*.
Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 163. n. 11. *Colum-*
ba (*Palumbus*) rectricibus postice atris, remi-
gibus primoribus margine exteriore albidis, col-
lo utrinque albo.
Müller, zool. dan. prodr. p. 28. n. 228. *Colum-*
ba (*Palumbus*) rectricibus postice atris, remi-
gibus primoribus margine exteriore albidis,
collo utrinque albo.
Kramer, Austr. p. 359. n. 2. *Columba* collo utrin-
que albo, pone macula fusca, *Wildtaube*;
Ringtaube.
Schwenkfeld, av. Silef. p. 313. *Palumbus*. *Rin-*
gel Taube.
Charleton, onom. zoic. p. 77. n. 1. *Palumbus* tor-
quatus.

Rzaczyns.

- Rzaczynsky, hist. nat. Pol. p. 143. Palumbus.
Sibbald, Scot. illustr. p. 109. Palumbus.
Zinnan. Uov. p. 32. tab. 4. Fig. 14. Colombaccio.
Olin, uc. p. 54. — Hist. Prov. I. p. 490. — Rom.
orn. I. p. 84. tab. 14.
Bomare, Diction. VIII. p. 508. — Dict. des anim.
III. p. 458.
Plin. hist. nat. L. 10. c. 24. Palumbes.
Aristot. hist. anim. L. 9. c. II. n. 119. 121. Φαττα.
Domendorff, Handb. d. Thiergeesch. p. 339. n. 5.
die Ringeltaube.

11. CAERULEA. Die blaue mexicanische Taube.

- Brisson, ornith. I. p. 35. n. 35. Pigeon bleu du Mexique.
Büffon, Vögel, VI. p. 216. der Tlacahoilotl.
Latham, Syst. ornith. II. p. 601. n. 31. Columba (Caerulea) caerulea, subtus tectricibusque alarum rubris, capite colloque rubro variegatis.

12. HOILOTL. Die mexicanische Bergtaube.

- Brisson, ornith. I. p. 32. n. 28. Pigeon de Montagne du Mexique.
Büffon, Vögel, VI. p. 215. Hoilotl.
Latham, Syst. ornith. II. p. 601. n. 30. Columba (Hoilotl) rufo-purpurea, tectricibus alarum minoribus albis.
B. Latham, Syst. ornith. II. p. 601. ad n. 30.

42. NAEVIA. Die braune, schwarz gefleckte neugspanische Taube.

- Brisson, ornith. I. p. 23. n. 11. Pigeon sauvage du Mexique.
Latham, Syst. ornith. II. p. 601. n. 29. Columba (Naevia) fusca, supra nigro-maculata, subtus fulvescens, tectricibus caudae inferioribus cinereis.

43. MEXICANA. *Die braune mexicanische Taube.*
Briffon, ornith. I. p. 23. n. 10. Pigeon du Mexique.

Büffon, Vögel, VI. p. 215. *die braune Taube aus Neuspanien, Cehoilitl.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 601. n. 28. *Columba (Mexicana) fusca, orbitis coccineis, pectore candido, alis extremis albis.*

44. PACIFICA. *Die Taube von den Inseln des stillen Oceans.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 600. n. 27. *Columba (Pacificæ) dorso fusco-virescente, capite, collo, pectore abdomineque cinereo-albis, cauda nigricante.*

B. *Latham*, Syst. ornith. II. p. 600. n. 27. *Col. capite, collo, pectore abdomineque albidis, dorso, tectricibus alarum caudaque subviridibus, basi rostri gibba.*

45. CURVIROSTRA. *Die krummschnäbige Taube.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 600. n. 25. *Columba (Curvirostra) viridis subtus flavescens, dorso castaneo, fascia alarum dupli rectricumque lateraliū unica nigris.*

46. ST. THOMAE. *Die Taube von der Insel St. Thomae.*

Halle, Vögel, p. 471. n. 500. *die grüne Papagaitaube.*

Klein, av. p. 119. n. 11. *Columba ex insula St. Thomae sylvestris.*

Klein, Vorbereit. p. 220. n. 11. *Papageytaube von der Insel St. Thomae.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 113. n. 10. *Thomas-taube.*

Briffon,

Briffon, ornith. I. p. 38. n. 40. Pigeon verd de l'Isle de S. Thomas.

Büffon, Vögel, VI. p. 228. die Papagaytaube (3)

Latham, Syst. ornith. II. p. 600. n. 24. Columba (St. Thomae) viridis; tectricibus caudae inferioribus flavis, remigibus et apice caudae viridi-fuscis.

Marcgr. hist. nat. Brasil. p. 213. Columbae sylvestris species ex Insula St. Thomae.

Jonston, av. p. 208. Columbae sylvestris species ex Insula S. Thomae allata.

47. A R O M A T I C A. Die olivenfarbige amboinische Taube.

Briffon, ornith. I. p. 37. n. 39. Pigeon vert d'Amboine.

Büffon, Vögel, VI. p. 229. Amboinische grüne Taube; m. e. Fig.

Latham, Syn. II. 2. p. 631. n. 21. Aromatic Pigeon.

Latham, Syst. ornith. II. p. 599. n. 23. Columba (Aromatica) viridi-olivacea, dorso castaneo, fascia alarum dupli flavicante et nigra, remigibus nigris, margine flavis.

20. C Y A N O C E P H A L A. Die blauköpfige Taube. (*)

Müller, Natursyst. II. p. 507. n. 20. der Blaukopf. Onomat. histor. natur. III. p. 179. blauköpfige Turteltaube.

Halle, Vögel, p. 474. n. 506. die mohrenköpfige Turteltaube.

Klein,

(3) Hier sind alle zu dieser, der folgenden, und 69ten Gattung gehörige Synonymen, unter einander geworfen.

(*) Die Trivialbenennung *Cyanocephala* kommt im System p. 781. n. 56. nochmals vor.

- Klein*, av. p. 119. n. 15. *Columba capite nigro.*
Klein, Vorbereit. p. 221. n. 15. *Jamaicanische Turteltaube, mit schwarzem Kopfe.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 124. n. 15. *Jamaicanische Turteltaube.*
Briffon, ornith. I. p. 34. n. 2. *Tourterelle de la Jamaique.*
Büffon, Vögel, VI. p. 308. *Jamaizenische Turteltaube; m. e. Fig. p. 311 der Blaukopf.*
Latham, Syn. Supplim. p. 100. *Blue-headed Turtle.*
Latham, Syst. ornith. II. p. 608. n. 54. *Columba (Cyanocephala) vinaceo-fusca, capite gulaque caeruleis, fascia suboculari alba.*
Linné, Syst. nat. Ed. X. I. p. 163. n. 12. *Columba (Cyanocephala) capite caeruleo.*

48. SURATENSIS. *Die Taube von Surate.*

- Latham*, Syst. ornithol. II. p. 609. n. 55. *Columba (Suratensis) grisea, collo supra nigro, nucha alba, vertice rufo-fasciata, rectricibus alarum cinereo-griseis, rachibus nigris.*
Sommerat, Reis. nach Ostind. und Chin. II. p. 39. *die Turteltaube von Surate.*

49. CAMBAYENSIS. *Die graue, weißbauchige Taube von Surate.*

- Latham*, Syst. ornith. II. p. 609. n. 56. *Columba (Cambayensis) grisea, subtus alba, capite subvinaceo, collo subtus nigro rufo vario, rectricibus lateralibus nigro griseoque dimidiatis.*
Sommerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 140. *die graue Turteltaube von Surate.*

50. MALABARICA. *Die malabarische Taube.*

- Latham*, Syst. ornith. II. p. 609. n. 57. *Columba (Malabarica) cinerea, subtus alba, alis medio maculis*

maculis ovatis, rectricibus lateralibus a basi ultra medium nigris, reliqua parte albis.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 140. die Taube von der Küste Malabar.

21. MADAGASCARIENSIS. Die blaue Madagascariische Taube.

Müller, Natursyst. II. p. 507. die madagascariische Taube.

Briss., ornith. I. p. 36. n. 36. Pigeon-ramier bleu de Madagascar.

Büffon, Vögel, VI. p. 259. die blaue Madagascariische Ringeltaube; der Funningo, m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 604. n. 40. Columba (Madagascariensis) pedibus plumosis, cauda violacea, corpore caeruleo-nigro.

Bontecoeü, voyag. aux Indes oriental. p. 16.

β. Die grüne madagascariische Taube. ()

Müller, Natursyst. Suppl. p. 132. der Gelbschwanz.

Briss., ornith. I. p. 36. n. 37. Pigeon-ramier verd de Madagascar.

Büffon, Vögel, VI. p. 260. grüne Madagaskariische Ringeltaube; Founingo-maïtsu, m. e. Fig.

Latham, Syn. II. 2. p. 641. n. 35. Var. A.

Latham, Syst. ornith. II. p. 604. n. 41. Columba (Australis) viridis, abdomine, crisco, femoribusque maculatis, humeris violaceis.

Bont. Ind. orient. p. 62. Columba viridissimi coloris.

51. FRANCIAE. Die holländische Taube.

Latham, Syst. ornith. II. p. 604. n. 42. Columba (Franciae) caerulea, orbitis nudis, uropygio caudaque rubris, pennis colli angustis elongatis, apice acuminatis.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 137. die holländische Taube.

52. MACULATA. Die grüne, weißgefleckte Taube.

Latham, Syst. ornith. II. p. 605. n. 43. *Columba (Maculata) saturate viridis, corpore supra albido maculato, abdomine nigricante, cauda nigra, apice ferruginea.*

52. AENEA. Die kupferfarbene Muskattaube.

Müller, Natursyst. II. p. 508. n. 22. die moluccische Taube.

Müller, Natursyst. Suppl. p. 133. d. die moluccische Taube.

Onomat. hist. nat. VI. p. 5. die Molluccische Taube.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 330. n. 274. die Muskatringeltaube.

Brisson, ornith. I. p. 38. n. 41. Pigeon-ramier des Moluques.

Büffon, Vögel, VI. p. 251. die Molukkische Ringeltaube; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 602. n. 33. *Columba (Aenea) pedibus plumosis, rostro pedibusque virescentibus, corpore aeneo.*

β. Büffon, Vögel, VI. p. 253. n. 1. die kupferfarbige Muskatringeltaube.

Latham, Syn. II. 2. p. 637.

Latham, Syst. ornith. II. p. 602. n. 33. β.

Sonnerat, Reis. n. Neuguin. p. 60. die kupferfarbene Muskattaube; m. e. Fig.

53. ALBA. Die weiße Muskattaube.

Büffon, Vögel, VI. p. 253. n. 2. die weiße Muskatringeltaube von Neu-Guinea.

Latham, Syst. ornith. II. p. 602. n. 34. *Columba (Alba) corpore albo, remigibus primoribus caudaque ad apicem nigris.*

Sonnerat,

Sommerat, Reis. nach Neuguinea, p. 60. die weiße
Muskaittaube.

23. VIRIDIS. Die grüne amboinische Taube.

Müller, Natursyst. II. p. 508. n. 23. die amboinische Taube.

Müller, Natursyst. Suppl. p. 132. die amboinische Taube.

Briffon, ornith. I. p. 39. n. 43. Tourterelle verte d'Amboine.

Büffon, Vögel, VI. p. 296. der Türvert. n. 1.
purpurbrüstige amboinische Turteltaube; m. e.
Fig. p. 300. amboinische grüne Turteltaube.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 609. n. 58. Columba (Viridis) aenea, collo subtus purpureo-violetaceo.

54. MELANOCEPHALA. Die schwarzkappige Taube.

Müller, Natursyst. Suppl. p. 133. die batavische Taube.

Büffon, Vögel, VI. p. 296. 297. der Türvert. n. 2. batavische Turteltaube, m. e. Fig. p. 300. batavische Turteltaube. p. 301. schwarzgehaubte Javanische grüne Taube; Taube mit schwarzer Kappe.

Latham, Syst. ornith. II. p. 610. n. 59. Columba (Melanocephala) viridis, capite cinerascente, occipite nigro, gula, abdomine imo crisoque flavis, rectricibus tribus exterioribus purpureo coccineis.

Naturforsch. J. p. 269. n. 7. die schwarzgehaubte Taube.

Berlin. Samml. IX. p. 192. die javanische Taube mit schwarzer Kappe.

Neueste Mannigfaltigkeit. I. p. 189. n. 7.

55. JAVANICA. Die javanische Taube.

Müller, Natursyst. Suppl. p. 133. der Grünrücken.

Biffon, Vögel, VI. p. 296. 298. der Türvert, n. 3.
javanische Turteltaube; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 610. n. 60. Columba
(Javanica) viridis, capite colloque vinaceo - ru-
bris, abdomine obseuriore, remigibus primo-
ribus fuscis.

56. CYANOCEPHALA. Die blaugescheitelte chine-
sische Taube. (5)

Latham, Syst. ornith. II. p. 610. n. 61. Columba
(Caeruleocephala) viridis, subtus rubens; verti-
ce caeruleo, remigibus rectricibusque cacrûleo-
nigranticibus.

54. MARTINICA. Die martinikische Taube.

Müller, Natursyst. II. p. 508. n. 24. Die martini-
kische Taube.

Brissot, ornith. I. p. 32. n. 27. Pigeon violet de la
Martinique.

Büffon, Vögel, VI. p. 217. die violette Martiniki-
sche Taube; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 595. n. 7. Colum-
ba (Martinica) subviolacea, abdomine rufes-
cente, remigibus interius rufis.

Du Tertre, hist. des Antill. II. p. 254. Perdrix
rousse?

β. Brissot, ornith. I. p. 25. n. 14. Pigeon de la Mar-
tinique.

Büffon, Vögel, VI. p. 217. die Martinikische
Taube; rothe Kayennische Taube. (mit Col.
Montana verwechselt.)

Latham, Syn. II. 2. p. 618. n. 7. Var. A.

Latham,

(5) Ist nicht mit n. 20. p. 778. zu verwechseln.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 595. n. 7. β . Col. fusco-rufescens, torque violaceo-aureo, alis nigro-maculatis, rectricibus lateralibus nigro terminatis, apice summo albo.

25. JAMAICENSIS. *Die jamaicaische Taube.* (6)

Müller, Natursyst. II. p. 508. n. 25. *die jamaicaische Taube.*

Briffon, ornithol. I. p. 33. n. 31. *Pigeon de la Jamaïque.*

Büffon, Vögel, VI. p. 236. *eine andere Jamaicensische Taube.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 595. n. 8. *Columba (Jamaicensis) fusco-purpurascens, subtus alba, rectricibus caeruleis, linea alba terminatis.*

26. SENEGALENSIS. *Die senegalische Taube ohne Halsband.*

Müller, Natursystem, II. p. 509. *die Senegalische Taube.*

Briffon, ornith. I. p. 31. n. 25. *Tourterelle à gorge tachetée du Sénégal.*

Büffon, Vögel, VI. p. 289. *die senegalische Turteltaube mit gefleckter Kehle*, m. e. Fig. p. 290. *die senegalische Turteltaube ohne Halsband.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 610. n. 62. *Columba (Senegalensis) fusco-rufescens, subtus alba, collo subtus nigro-maculato, rectricibus tribus extimis, ultima medietate albis.*

7. VINACEA. *Die senegalische Taube mit dem Halsbande.* (7)

Briffon, ornith. I. p. 30. n. 24. *Tourterelle à collier du Sénégal.*

M 4

Büffon,

(6) Wird häufig mit *Columba Leucocephala*, p. 772. n. 14. verwechselt.

(7) Nach *Büffon* eine Varietät von der vorigen.

Büffon, Vögel, VI. p. 290. die senegalische Tureltaube mit schwarzem halben Ring auf dem Halse; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 611. n. 63. Columba (Vinacea) griseo-fusca, subtus alba, collo superiore torque nigro, remigibus fuscis albido extus marginatis.

27. NICOBARICA. Die nikobarische Taube.

Müller, Natursystem, II. p. 509. n. 27 die nicobarische Taube.

Halle, Vögel, p. 477. n. 513. die Hahmentaube.

Onomat. histor. natur. III. p. 187. die nicobarische Taube.

Klein, av. p. 120. n. 23. Columba Nincombar.

Klein, Vorbereit. p. 222. n. 23. indianische Taube von Ninkombar.

Klein, verb. Vögelhist. p. 124. n. 23. Nincombar.

Briffon, ornithol. I. p. 40. n. 44. Pigeon de Nincombar.

Büffon, Vögel, VI. p. 264. die Taube von der Insel Nicobar; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 605. n. 44. Columba (Nicobarica) cauda alba, corpore nigro, remigibus caeruleis, dorso viridi-nitente, pennis colli elongatis.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 164. n. 15. Columba (Nicobarica) cauda alba, corpore nigro, remigibus caeruleis, dorso viridi-nitente, pennis colli elongatis.

Bomare, diction VIII. p. 510. n. 2. — Dict. des Anim. III. p. 460.

58. SPECIOSA. Die cayennische Taube.

Büffon, Vögel, VI. p. 263. die Kayennische Ringeltaube; m. e. Fig.

Latham,

Latham, Syst. ornith. II. p. 605. n. 45. Columba (Speciosa) ferruginea, cauda nigricante, collo inferiore pectore que rufo albo purpureo que undulatis.

59. CORÈNSIS. Die graue südamerikanische Taube.

Latham, Syn. Suppl. p. 201. Grey Pigeon.

Latham, Syst. ornith. II. p. 605. n. 46. Columba (Corensis) cauda aequali, orbitis denudatis atro-punctatis, corpore griseo.

28. SINICA. Die gestreifte chinesische Taube.

Müller, Natursyst. II. p. 509. n. 28. die chinesische Taube.

Halle, Vögel, p. 476. n. 512. die Turteltaube aus China; von kurzer Taille.

Onomat. hist. nat. III. p. 189. die chinesische Taube.

Klein, av. p. 120. n. 22. Columba sinensis, elegans.

Klein, Vorbereit. p. 222. n. 22. Sinesische Taube.

Klein, verb. Vögelh. p. 124. n. 22. chinesische Taube.

Brisson, ornith. I. p. 26. n. 16. Tourterelle rayée de la Chine.

Büffon, Vögel, VI. p. 302. 305. die gestreifte Chinesische Taube; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 608. n. 52. Columba (Sinica) fusca, nigro fasciata, abdomine sub-sanguineo, remigibus nigris, rostro nigro.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 164. n. 17. Columba (Sinica) rectricibus dorsoque fuscis, abdome sanguineo, alis flavis, remigibus nigris.

60. EIMEENSIS. Die purpurbrüstige Taube.

Latham, Syst. ornith. II. p. 599. n. 21. Columba (Eimensis) fusco-virescens, fronte colloque

Subtus vinaceis, pectore tectricibusque alarum
fusco-rubris, fascia pectorali alba.

61. PURPUREA. *Die grüne purpurköpfige Taube.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 599. n. 20. *Columba*
(*Purpurea*) *viridis*, capite colloque purpura-
scentibus, pectore fulvo, crisco rubro.

62. RUBRICAPILLA. *Die violette, rothköpfige
Taube.*

Büffon, Vögel, VI. p. 234. *die violette rothköpf-
ige Taube von Antigua.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 599. n. 19. *Columba*
(*Rubricapilla*) *atro-violacea*, pileo orbitisque
nudis rubris, collo, dorso superiore pectore-
que griseoscentibus.

Sommerat, Reis. n. Neuguin. p. 41. *die violette
rothköpfige Taube.*

63. JAMBU. *Die Taube von Sumatra.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 598. n. 18. *Columba*
(*Jambos*) *viridis*, supra rubra, pectore albo.

64. PURPURATA. *Die Taube mit purpurfarbenem
Scheitel.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 598. n. 17. *Columba*
(*Purpurata*) *viridis*, pileo coccineo, crisco ful-
vo, capite, collo pectoreque albis.

29. INDICA. *Die grüngeflügelte indianische Taube. (8)*

Müller, Natursyst. II. p. 509. n. 29. *die india-
nische Taube.*

Onomat. hist. nat. III. p. 182. *die grüngeflügelte
Taube.*

Halle, Vögel, p. 475. n. 507. *die rosenrote Tur-
tautaube, mit grünen Flügeln.*

Klein,

(8) *Büffon* hält sie für das Weibchen von seiner *Tourterelle de la
Jamaïque*. (*Col. cyanocephala*, p. 778. n. 20.)

Klein, av. p. 120. n. 20. *Columba turture nostrata minor*; principibus coloribus superbiens Indiae orientalis.

Klein, Vorbereit. p. 222. n. 20. *Scharlattaube aus Ostindien*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 124. n. 20. *Scharlattaube*.

Briffon, ornith. I. p. 39. n. 42. *Pigeon-ramier d'Amboine*.

Büffon, Vögel, VI. p. 308. 311. *die grüngeflügelte Indianische Taube*.

Latham, Syn. Suppl. p. 198. *Green-winged Pigeon*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 598. n. 16. *Columba (Indica) corpore purpureo, humeris viridibus, pileo caerulecente, remigibus primoribus rectricibusque nigris*.

Seligmann, Vögel, I. tab. 27. *die grüngeflügelte Taube*.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 164. n. 18. *Columba (Indica) corpore purpureo, humeris viridibus, superciliis albis*.

β. *Latham*, Syst. ornith. II. p. 598. n. 16. β. *Col. rectricibus alarum violaceis, remigibus viridibus*.

30. CANADENSIS. *Die kanadische Taube*.

Müller, Natursyst. II. p. 510. n. 30. *die kanadische Taube*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 303. n. 106. *die Canadische Taube*.

Briffon, ornithol. I. p. 29. n. 21. *Tourterelle de Canada*.

Büffon, Vögel, VI. p. 285. *die Kanadensische Tureltaube, mit langem Schnauze*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 613. n. 72. *Columba (Canadenfis) cauda cuneata, corpore griseofusco*

fusco subtus albido, remigibus primoribus apice flavicantibus, rectricibus extimis albis.

65. SANGUINEA. *Die weiße, blutfleckige Taube.*

Büffon, Vögel, VI. p. 299. *die weiße blutfleckichte Turteltaube.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 611. n. 66. *Columba (Sanguinea) corpore toto albo, macula pectorali, rostro pedibusque sanguineis.*

Sommerat, Reis. n. Neuguin. p. 21. *die weiße blutfleckigte Turteltaube.*

66. CRUENTA. *Die graue blutfleckige Taube.*

Büffon, Vögel, VI. p. 298. *die graue blutfleckichte Turteltaube.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 611. n. 65. *Columba (Cruenta) grisea, collo subtus albo, cervice violacea, fasciis alarum tribus grisecentibus, macula pectoris sanguinea.*

Sommerat, Reis. n. Neuguin. p. 21. *die graue blutfleckigte Turteltaube.*

31. AFRA. *Die afrikanische Taube.*

Müller, Natursyst. II. p. 510. n. 31. *die africanische Taube.*

Büffon, Vögel, VI. p. 289. *Senegalische Turteltaube; m. e. Fig.*

Briffon, ornithol. I. p. 30. n. 23. *Tourterelle du Senegal.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 611. n. 64. *Columba (Afra) griseo-fusca subtus albida, maculis testricum alarum violaceo azureis, rectricibus extimis basi exteriore maculaque apicis albis.*

32. TURTUR. *Die Turteltaube.*

Müller, Natursyst. II. p. 510. n. 32. *die Turteltaube.*

Leske,

- Leske*, Naturgesch. p. 254. n. 3. *die Turteltaube*.
Borowsky, Thierreich, III. p. 292. n. 10. *die Turteltaube*.
Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 201. n. 4. *Columba* (*Turtur*) *rectricibus apice albis, dorso griseo, pectore incarnato, macula laterali colli nigra lineolis albis*; *die Turteltaube; Wegetaube*.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 491. n. 3. *die Turteltaube*.
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 680. *die Turteltaube*.
Ebert, Naturl. II. p. 123. *die Turteltaube*.
Halle, Vögel, p. 472. n. 501. *die Turteltaube*.
Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 332. n. 275. *die Turteltaube*.
Onomat. hist. nat. VII. p. 640. *die Turteltaube*.
Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 117. *die Turteltaube*.
Klein, av. p. 119. n. 12. *Columba Turtur*.
Klein, Vorbereit. p. 220. n. 12. *Turteltaube*.
Klein, verb. Vögelhist. p. 124. n. 12. *Turteltaube*.
Klein, Stemmat. av. p. 27. 29. Fig. 3. a. b.
Klein, Vögeleyer, p. 33. tab. 16. Fig. 3. 8.
Gesner, Vögelb. p. 529. *Turteltaube*; m. e. zieml. gut. Fig.
Brisson, ornith. I. p. 21. n. 7. *Tourterelle*.
Büffon, Vögel, VI. p. 271. 281. *die Turteltaube*, m. e. Fig.
Batsch, Thiere, I. p. 428. *die Turteltaube*.
Latham, Syn. Suppl. p. 199. *Common Turtle*.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 605. n. 47. *Columba* (*Turtur*) *rectricibus apice albis, dorso griseo, pectore incarnato, macula laterali colli nigra lineolis albis*.
Frisch, Vögel, tab. 140. *die Turteltaube*.

Bescke,

- Beseke*, Vögel Kurl. p. 71. n. 153. die Turteltaube.
- Siemßen*, meklenb. Vögel, p. 44. n. 3. die Turteltaube.
- Cetti*, Sardin. II. p. 136. die Turteltaube.
- Fischer*, Livl. p. 91. n. 126. Turteltaube.
- Molina*, Chil. p. 208. Turteltaube.
- Niebuhr*, Beschr. von Arab. p. 168. Turteltauben.
- Boswell*, Beschr. von Corsic. p. 45. die Turteltaube.
- White*, N. G. von Engl. p. 59. n. 13. die Turteltaube.
- Taube*, Slavon. I. p. 23. Turteltauben.
- Pallas*, nord. Beytr. III. p. 15. die Turteltauben.
- Georgi*, Reis. p. 173. Turteltaube.
- Forskål* faun. Orient. p. VII. n. 12. a. Columba Turtur. *Djahleb*. — Descr. animal. p. 4. n. 14. *Columba Turtur*; rectricibus fuscis: extimis apice et extrorsum, reliquis apice albis, intermediis exceptis.
- Pontoppidan*, Dännem. p. 172. n. 8. Turteltaube.
- Pennant*, britt. Thiergesch. p. 94: tab. 44.
- Boßmann*, Reis. n. Guinea, p. 390. Turteltauben.
- Allgem. Reis. IV. p. 388. Turteltauben.
- Scopoli*, Bem. a. d. N. G. I. p. 149. n. 181. die Turteltaube.
- Merklein*, Thierreich, p. 392. Turteltaube.
- Zorn*, Pétinotheol. II. p. 303. die Turteltaube.
- Döbel*, Jägerprakt. I. p. 52. Turteltaube.
- Anweis. Vögel zu fang. p. 557. Turteltaube.
- Naumann*, Vogelsteller, p. 161. die Turteltaube.
- Meidinger*, Vorl. I. p. 145. n. 3. die Turteltaube.
- Börner*, Stadt- und Landwirthsch. II. p. 137. n. 4. Hamb. Magazin, XIX. p. 58.
- Zückert*, Speis. a. d. Thierreich, p. 97.
- Geoffroy*, mater. med. VII. p. 397. Turteltaube.
- Lemmer*,

- Lemmery*, Materiallex. p. 1160.
Neue Mannigfaltigk. III. p. 293.
Neueste Mannigfaltigk. I. p. 570.
Loniceri, Kräuterb. p. 650. *Turtel-Taube*.
André u. Bechstein, Spazierg. II. p. 26. *Turteltaube*.
Lichtenberg, Magaz. für das Neuste, etc. III. I. p. 63.
Borkhausen, Magazin, I. p. 209. n. 87.
Naturforsch. XVII. p. 76. n. 158. *Turteltaube*.
Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 56. Turtur.
Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 29. n. 4. Turtur.
Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 164. n. 20. Columba (Turtur) rectricibus apice albis, dorso griseo, pectore incarnato, macula laterali colli.
Kramer, Austr. p. 359. n. 3. Columba area oculorum nuda coccinea laevi, collo postice semicirculo nigro; *wilde Turteltaube*.
Charleton, onom. zoic. p. 77. n. 5. Turtur.
Schwenkfeld, av. Siles. p. 362. Turtur, *Turteltaube*.
Rzaczynsky, hist. nat. Pol. p. 302. Turtur.
Sibbald, Scot. ill. p. 179. Turtur.
Jonston, av. p. 92. Turtur.
Zinnan, Uov. p. 33. tab. 4. Fig. 15. Tortora.
Schlichten, obs. phil. de Turture eiusque qualitatibus, usu antiquo et emblemate, ad illustranda varia S. S. loca, Hal. 1739. 4.
Riedlinus, Turturum dubia castitas. — Eph. nat. cur. Dec. III. an. 5. et 6. obs. 129. p. 260.
Hartmann, anatomie Turturis, pinguedine suffocatae, — ibid. Dec. II. an. 7. obs. 32. p. 69.
Camerarius, Turtur sapientum caro, dysenteriae et strabismi remedium. — Syll. memorab. Cent. VIII. p. 89. p. 621.
Second. Voyage de Siam. p. 248.
Geronier, hist. nat. et polit. de Siam. p. 35.

Dampier,

Dompier voy. I. p. 406. II. p. 83. III. p. 155. IV. p. 139.

Voyage de Frézier, p. 74. p. III.

Le Gentil, voy. I. p. 94.

Charlevoix, hist. de St. Domingue, I. p. 28.

Histoir. des Navigations aux terres australes, II. p. 52.

Nouv. voy. aux Isles de l'Amerique, II. p. 67.

Bomare, Diction. XI. p. 439. — Diction. des anim. IV. p. 410.

Plin. hist. nat. L. 10. c. 24. Turtur.

Varro, de re rust. L. 3. c. 5. et 8. Turtures.

Columella, de re rust. L. 8. c. 9. Turtures.

Palladius, de re rust. L. 1. c. 25. Turtures.

Aristot. hist. anim. L. 6. c. 6. n. 65. L. 9. c. 2. n. 22. L. 9. c. II. n. 127. $\tau\gamma\upsilon\gamma\omega\epsilon\varsigma$.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 340. n. 6. die Turteltaube.

β. Die Turteltaube mit schwarzen, weißgefleckten Seitenhalsfedern.

Latham, Syn. II. 2. p. 645. n. 4. A. Spotted-necked Turtle.

Latham, Syst. ornith. II. p. 606. n. 1. β.

γ. Die portugiesische Turteltaube. (9)

Halle, Vögel, p. 474. n. 505. die Portugiesen-taube.

Klein, av. p. 119. n. 14. *Columba Portugallensis*.

Klein, Vorbereit. p. 221. n. 14. *Portugallische Taube*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 124. n. 14. *Portugiesische Tanbe*.

Briffon, ornith. I. p. 23. n. 9. *Pigeon de Portugal*.

Büffon, Vögel, VI. p. 302. 305. die portugiesische Taube.

Latham,

(9) Nach *Briffon* eine eigne Gattung.

Latham, Syn. II. 2. p. 646. Portugal Turtle.

Latham, Syst. ornith. II. p. 606. n. 47. γ. Col. fusca, macula laterali colli albo nigroque varia, rectricibus cinereis, lateralibus latere exteriore, omnibus apice albis.

δ. Die aschgraue Turteltaube von der Insel Luçon.

Büffon, Vögel, VI. p. 298. die aschgraue Turteltaube.

Latham, Syn. II. 2. p. 646. Luzonian Turtle.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 606, n. 47. δ. Col. griseo-cinerea, subtus vinaceo-grisea, macula colli nigra, pennis apice albis, rectricibus intermediis duabus nigris, lateralibus albis.

Sonnerat, Reis. n. Neuguin. p. 22. die aschfarbene Turteltaube.

ε. Die braune chinesische Turteltaube. (1)

Latham, Syn. IV. p. 647. Chinese Turtle.

Latham, Syst. ornith. II. p. 606. n. 48. Columba (Orientalis) fusco-grisea, lateribus colli peninis nigris, apice griseo-cinereis, fascia alarum flava.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 138. die braune Chinesische Turteltaube.

Latham, Syst. ornith. II. p. 607. n. 49. Columba (Aegyptiaca) testaceo-incarnata, gula maculata, plumis nigris, apice bilobo-truncatis, ferrugineis.

Forskål, fn. orient. p. 5. n. 15. Columba testaceo-incarnata: gula maculata, plumis nigris, apice bilobo-truncatis, ferrugineis.

ζ. Die

(1) Latham nimmt Sonnerats Tourterelle brune de la Chine, und Forskåls Columba testaceo-incarnata, als zwey besondere Gattungen an.

ξ. Die weiße Turteltaube. *

Lichtenberg u. Voigt, Magazin für das Neueste,
etc. VII. 2. p. 97.

η. Die Ohrenturteltaube. *

Müller, Natursyst. II. p. 511. die Ohrtaube.

Halle, Vögel, p. 472. n. 502. die Turteltaube
mit Ohren.

Klein, av. p. 119. n. 12. Turtur auritus; Eardove.

Klein, Vorbereit. p. 221. Turteltaube mit Ohren.

Klein, verb. Vögelhist. p. 124. n. 12. Ohrtaube.

Büffon, Vögel, VI. p. 281. Ohrentauben.

Zorn, Petinotheol. II. p. 303.

Raji Synops. p. 184. n. 26. Turtur auritus.

Sloane, Jam. p. 304. tab. 262. fig. 2. Eardove.

67. SURINAMENSIS. Die Surinamische Taube.

Latham, Syst. ornith. II. p. 607. n. 50. Columba
(Surinamensis) cinerea subtus alba, gula viridi
nigroque varia, rostro caeruleo.

Fermin, Surin. II. p. 144. die Turteltaube.

33. RISORIA. Die Lachtaube. (2)

Müller, Natursyst. II. p. 512. n. 33 die Lachtaube.

Leske, Naturgesch. p. 254. n. 4. die Lachtaube.

Borowsky, Thierreich, III. p. 214. n. 12. die Lach-
taube.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 201. n. 5. Colum-
ba (Risoria) supra lutescens, lunula cervicali
nigra.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 492. n. 4. die Lach-
taube.

Ebert, Naturl. II. p. 124. die Lachtaube.

Halle, Vögel, p. 473. n. 503. die Lachtaube mit
schwarzem Bogen im Nacken.

Gatterer,

(2) Wird von Büffon, Kramer, u. a. als eine Spielart oder Ab-
änderung von der gemeinen Turteltaube angesehen.

- Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 352. n. 276. *die Lachtaube.*
Neuer Schaupl. d. Nat. V. p. 6. *Lachtaube.*
Onomat. hist. nat. III. p. 188. *die gemeine Turteltaube.*
Handb. d. deutsch. Thiergesch. p. 118. *die Lachtaube.*
Klein, av. p. 119. n. 13. *Columba turtur indica.*
Klein, Vorbereit. p. 221. n. 13. *Lachtaube aus Indien.*
Klein, verbess. Vögelhistor. p. 124. n. 13. *Lachtaube.*
Klein, Vögeleyer, p. 32. tab. 16. fig. 4.
Briffon, ornith. I. p. 22. n. 8. *Tourterelle à collier.*
Büffon, Vögel, VI. p. 271. 279. 282. *die Lachtaube;* m. e. Fig.
Batsch, Thiere, I. p. 428. *die Lachtaube.*
Latham, Syst. ornith. II. p. 607. n. 51. *Columba (Ristoria) supra lutescens, subtus alba, lunula cervicali nigra.*
Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 405. *die Lachtaube.*
Fischer, Liv. p. 92. n. 127. *Lachtaube.*
Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 150. n. 182. *die Lachtaube.*
Naturforsch. XVII. p. 76. n. 159. *die Lachtaube.*
Börner, Stadt- und Landwirthsch. II. p. 137. n. 5.
Leipz. ökonom. Abhandl. II. p. 158.
Zückert, Speis. a. d. Thierreich, p. 97.
Bresl. Natur- u. Kunstgesch. Versl. 19. p. 182.
Borkhausen, Magazin, I. p. 209. n. 88.
Linneé, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 165. n. 21. *Columba (Ristoria) supra lutescens lunula cervicali nigra.*
Kramer, Austr. p. 359. n. 3. *β. Turtur; einheimische Turteltaube, Lachtaube.*

Briünniche, ornith. bor. p. 63. n. 220. *Columba risoria*. Turteldae.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 364. *Turtur turcicus*.

Lachendes Teublin; *Türkisch Teublin*; *Indienisch Turtur Teublin*.

Fonston, av. p. 92. *Turtur indicus*.

Bomare, Diction. XI. p. 442. — Diction. des anim. IV. p. 412.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 341. n. 8. *die Lachtaube*.

β. Die graue chinesische Lachtaube.

Latham, Syn. II. 2. p. 649. Chinese grey Turtle.

Latham, Syst. ornith. II. p. 608. n. 51. β. Col. fusca subtus vinaceo-grisea, vertice griseo, cer-vice lunula nigra maculis albis, rectricibus late-ralibus nigris, albo maculatis.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. China, II. p. 137. *die graue chinesische Turteltaube*.

γ. Die Bastardlachtaube.

Müller, Natursystem, II. p. 512. *die Bastardturteltaube*.

Brisson, ornithol. I. p. 22. n. 8. A. Tourterelle Mulet.

Büffon, Vögel, VI. p. 279. *Zwittertaube*.

Latham, Syn. II. 2. p. 649. Hebridal Turtle.

Latham, Syst. ornith. II. p. 608. n. 51. γ. Turtur hybridus.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 365. *Turtur mixtus*; *Zwitter Turtel Taube*.

δ. Die weiße Lachtaube. *

Götz, Naturgesch. einiger Vögel, p. 117. n. 7.

Naturforsch. XVI. p. 47. n. 5.

34. PASSERINA. Die Sperlingstaube. (3)

Müller, Naturfyst. II. p. 512. n. 34. die Sperlingstaube.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 493 n. 6. die Sperlingstaube.

Halle, Vögel, p. 473. n. 504. die Falousetaube.

Halle, Vögel, p. 477. n. 514. die graue Turteltaube, mit schwarzen Schuppen und rothen Schwungfedern.

Onomat. hist. nat. III. p. 188. die kleinste gefleckte Turteltaube.

Pennant, archt. Zool. II. p. 306. n. 107. die Erdtaube; Sperlingstaube.

Klein, av. p. 120. n. 24. Columbus minimus. Tur tur minimus guttatus.

Klein, Vorbereit. p. 222. kleinste Taube; kleinste punktirte Turteltaube.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 124. n. 24. kleinste Turteltaube.

Briffon, ornith. I. p. 27. n. 19. petite Tourterelle d'Amerique.

Büffon, Vögel, VI. p. 313. die Sperlingstaube; Kokozin; m. 2. Figg.

Batsch, Thiere, I. p. 429. die Sperlingstaube.

Latham, Syn. Suppl. p. 100. Ground Pigeon.

Latham, Syst. ornith. II. p. 611. n. 67. Columba (Passerina) rectricibus remigibusque obscurioribus, corpore purpurascente, rostro pedibusque flavis.

Seligmann, Vögel, I. tab. 52. die kleinste gefleckte Turteltaube.

N 3

Bankroft,

(3) Liebt besonders die Beeren des Zahnwehbaums (*Xanthoxylum Clava Herculis* Linn.) wovon ihr Fleisch einen angenehmen Geschmack bekommt. Die französischen Insulaner nennen sie wegen ihrer grossen Fettigkeit und des feinen Geschmacks wegen, *Ortolane*. Jung gefangen werden sie zahm.

Bankroft, Guian. p. 107. die kleine Turteltaube des Ray mit gesprenkelten Flügeln.

Scopoli, Beim. a. d. N. G. p. 151. n. 183. die ganz kleine amerikanische Taube.

Neueste Mannigfaltigk. I. p. 570. *Steintauben*.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 165. n. 22. *Columba* (*Passerina*) rectricibus remigibusque obscurioribus, corpore purpurascente, rostro pedibusque flavis.

Fonston, av. p. 199. *Picuipinima*.

Pison, hist. nat. p. 86. *Picuipinima*.

Nouv. voy. aux Isles de l' Amerique, II. p. 237.

35. MINUTA. Die Zwergtaube.

Müller, Natursyst. II. p. 512. n. 35. die Zwergtaube.

Briffon, ornith. I. p. 28. n. 20. petite Tourterelle brune d' Amerique.

Latham, Syst. ornith. II. p. 612. n. 68. *Columba* (*Minuta*) fusca alis punctatis 5. f. 7. chalybeis, rectricibus extimis apice albis.

68. MALACCENSIS. Die malakkische Taube.

Latham, Syst. ornith. II. p. 612. n. 69. *Columba* (*Malaccensis*) nigro undulatum lineata, supra cinereo - grisea, subtus cinerea, collo lateribus albo, rectricibus fuscis, lateribus versus apicem albis.

Sommerat, Reis n. Ostind. u. Chin. II. p. 180. die kleine Turteltaube von Queda.

69. VERNANS. Die grüne philippinische Taube.

Müller, Natursyst. Suppl. p. 132. a. die grüne Taube,

Briffon, ornithol. I. p. 37. n. 38. Pigeon vert des Philippines.

Büffon,

Büffon, Vögel, VI. p. 228. die grüne philippini-sche Taube, m. e. Fig. p. 232. die grüne Taube von der Insel Luçon und Antigua.

Latham, Syn. II. 2. p. 630. n. 20. Parrot-Eigen.

Latham, Syst. ornith. II. p. 599. n. 22. Columba (Vernans) viridis subtus flavens, alarum marginie exteriore luteo.

Raj. Syn. p. 196. n. 15. tab. 2. fig. 15. Columba maderaspatana, variis coloribus eleganter depicta.

Sonnerat, Reis. n. Neuguin. p. 40. die grüne Taube der Insel Luçon und Antigua; m. 2. Figg. M. u. Weibch.

** Mit langen keilförmigen Schwänzen.

36. MIGRATORIA. Die Wandertaube. (4)

Müller, Natursyst. II. p. 513. n. 36. die Wandertaube.

N 4

Leske,

(4) Gewicht, nach Penn 9. Unzen. Die Anzahl dieser Vögel, besonders wenn sie wandern, ist ganz ungeheuer, und übersteigt fast allen Glauben. Wenn sie die Noth zwingt, ihren Aufenthalt zu verändern, so fliegen sie millionenweise in einer Herde, und halten im eigentlichen Verstande das Sonnenlicht eine beträchtliche Strecke weit auf. Wo sich ihr Schwarm niedlerlässt, da richten sie, wie die Heuschrecken, unter den Blumen und Früchten schreckliche Verwüstungen an; und dabey machen sie einen solchen Lärm, dass die Menschen einander weder hören noch verstehen können. Eine nicht sonderlich zahlreiche Gesellschaft von Indianern schlug einst in einer Nacht über 18000. mit Stöcken todt. Auf einen Schuss mit der Muskete werden zuweilen über 120. getötet. Sie nisten auf Bäumen, bauen in den Wäldern Nest an Nest, und binden durch ihre Nester Baum an Baum viele Meilen weit zusammen. Wenn die Irokesen merken, dass die jungen Tauben flick sind, so hauen sie die Bäume um, und treffen oft auf einem Baume wohl 100. Paar junge Tauben an. Oft brechen die Zweige starker Eichen

von

- Leske*, Naturgesch. p. 254. n. 5. die *Wandertaube*.
- Borowsky*, Thiereich, III. p. 214. n. 13. die *Wandertaube, Strichtaube*.
- Blumenbach*, Handb. der N. G. p. 202. n. 6. *Columba (Migratoria) orbitis denudatis sanguineis, pectore rufo*.
- Halle*, Vögel, p. 476. n. 510. die *röthliche Wandertaube aus Karolina, mit langem Schwanz, und vergoldeter Schulter*.
- Gatterer*, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 332. n. 278. *Wandertaube; Zugtaube; Strichtaube; amerikanische Taube*.
- Onomat. hist. nat.* III. p. 184. die *langgeschwänzte Taube*.
- Pennant*, archt. Zool. II. p. 300. die *Wandertaube*. Tab. 14. ober. Fig.
- Klein*, av. p. 119. n. 16. *Palumbus Carolinensis*.
- Klein*, Vorbereit. p. 221. n. 16. *langgeschwänzte Holztaube aus Karolina*.
- Klein*, verb. Vögelhistor. p. 124. n. 16. *langgeschwänzte Holztaube*.
- Briffon*, ornith. I. p. 24. n. 12. *Pigeon sauvage d'Amerique*.
- Büffon*, Vögel, VI. p. 225. die *Wandertaube*; m. e. Fig.
- Batsch*, Thiere, I. p. 429. die *Wandertaube*.
- Latham*, Syst. ornith. II. p. 612. n. 70. *Columba (Migratoria) cauda cuneata, orbitis denudatis sanguineis, corpore cinereo, pectore rufo*.
- Seligmann*, Vögel, I. tab. 46. die *Strichtaube*.
- Shaw*, Reise, p. 352. not. t. *Strichtauben*.

Loskiel,

von dem Gewicht der aussitzenden Menge, und der Boden unter den Bäumen, worauf sie eine Nacht gesessen haben, ist einige Zoll hoch mit Mist bedeckt. Das Fleisch wird frisch, gebrüchert und getrocknet gegessen.

Loskiel, Geschichte der Mission der evangelischen Brüder unter den Indianern in Nordamerika.

Barby, 1789. p. 514.

Lichtenberg u. Voigt, Magaz. für das Neueste, etc. VI. 2. p. 168. *wilde Tauben*.

Linné, Abhandlung. II. p. 280. n. 13. *die Schwanz-Tauben*.

Schwed. Abhandl. XXI. p. 268.

Goeze, Natur, Menschenl. u. Vorbeh. I. p. 356.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 164. n. 16. *Columba (Macroura) cauda cuneiformi longa, pectore purpurascente*.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 341. n. 9. *die Wandertaube*.

37. CAROLINENSIS. *Die carolinische Taube.*

Müller, Natursyst. II. p. 514. n. 37. *die carolinische Taube*.

Halle, Vögel, p. 478. n. 518. *die Turteltaube, mit einem großen Flecken aus Gold, Karmin, und Grün an der Seite des Halses*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 504. *die Carolinische Taube*, tab. 14. unt. fig.

Klein, av. p. 119. n. 17. *Columba Turtur Carolinensis*.

Klein, Vorbereit. p. 221. n. 17. *Langgeschwänzte Turtel aus Karolina*.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 124. n. 17. *Langgeschwänzte Turteltaube*.

Briffon, ornithol. I. p. 27. n. 18. *Tourterelle de la Caroline*.

Büffon, Vögel, VI. p. 317. *die Karolinische Turteltaube*; m. e. Fig.

Lathain, Syst. ornith. II. p. 603. n. 71. *Columba (Carolinensis) cauda cuneata, corpore rufocinereo subtus rufescente, orbitis caeruleis*.

Seligmann, Vögel, I. tab. 48. die carolinische Tur-teltaube.

Fonston, av. p. 199. Picacureba.

70. MELANOPTERA. *Die schwarzgefliigte Taube.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 615. n. 78. Columba (Melanoptera) cauda cuneata, corpore caerule-flescente, remigibus nigris.

Molina, Naturgesch. von Chili, p. 208. Columba melanoptera.

38. AMBOINENSIS. *Die braunrothe amboinische Taube.*

Müller, Natursyst. II. p. 514. n. 38. die amboinische Taube.

Briffon, ornith. I. p. 31. n. 26. Tourterelle d'Am-boine.

Büffon, Vögel, VI. p. 303. die amboinische Tur-teltaube.

Latham, Syst. ornith. II. p. 614. n. 74. Columba (Amboinensis) cauda cuneata, corpore rufo, collo undulato nigricante.

39. CAPENSIS. *Die capsche Taube.*

Müller, Natursyst. II. p. 514. n. 39. die capsche Taube.

Müller, Natursyst. Suppl. p. 135. n. 45. der Schwarzhals.

Briffon, ornith. I. p. 29. Tourterelle du Cap de bonne éspérance.

Büffon, Vögel, VI. p. 293. das Afrikanische Tur-teltäubchen; die Turteltaube mit schwarzen Halskragen; das kapische Turteltäubchen; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 614. Columba (Capensis) cauda cuneata, corpore griseo-fusco, subtus

subtus albo, remigibus primoribus latere interiore rufis.

71. MACROURA. *Der Turocko.*

Müller, *Naturfyst. Suppl.* p. 134. n. 43. *der Langschwanz.*

Büffon, *Vögel*, VI. p. 292. *der Turokko; die breitschwänzige Senegalische Turteltaube;* m. e. Fig.

Latham, *Syst. ornith.* II. p. 615. n. 76. *Columba (Macroura) macroura, cauda cuneata, corpore cinnamomeo subtus albido, rectricibus apice albis.*

40. MARGINATA. *Die gerändelte Taube. (5)*

Müller, *Naturfyst.* II. p. 515. n. 40. *die gerändelte Taube.*

Brisson, *ornith.* I. p. 24. n. 13. *Tourterelle d'Amérique.*

Halle, *Vögel*, p. 475. n. 508. *die langschwänzige Turteltaube, Schwanztaube.*

Büffon, *Vögel*, VI. p. 286. *langgeschwänzte Turteltaube; amerikanische Turteltaube.*

Latham, *Syst. ornithol.* II. p. 614. n. 73. *Columba (Marginata) cauda cuneata, corpore supra fusco, subtus fusco-cinereo, pectore rubro, rectricibus apice nigris, albo marginatis.*

Seligmann, *Vögel*, I. tab. 29. *die langgeschwänzte Taube.*

A. Ver.

(5) Nach Büffon zu *Columba Canadensis* n. 30. gehörig.

A. Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Edit. XII.

p. 279. β. Col. domeſt.	p. 769. n. 2. Col. Domeſt.
Var.	ſlīca —
p. 279. n. 2. Col. Hispanica.	p. 770. n. 2. β. Var.
p. 279. n. 3. Col. Dasypus.	p. 770. n. 2. ε. Var.
p. 280. n. 4. Col. Gutturoſa.	p. 771. n. 2. η. Var.
p. 280. n. 5. Col. Cucullata.	p. 770. n. 2. ι. Var.
p. 280. n. 6. Col. Hispida.	p. 770. n. 2. κ. Var.
p. 280. n. 7. Col. Turbita.	p. 770. n. 2. λ. Var.
p. 280. n. 8. Col. Laticauda.	p. 770. n. 2. μ. Var.
p. 280. n. 9. Col. Gyratrix.	p. 771. n. 2. ν. Var.
p. 280. n. 10. Col. Galeata.	p. 771. n. 2. ξ. Var.
p. 281. n. 11. Col. Turcica.	p. 771. n. 2. ο. Var.
p. 281. n. 12. Col. Tabellaria.	p. 771. n. 2. π. Var.

Das Geschlecht ist, der Anzahl nach, mit 31. Gattungen vermehrt. Wenn man aber hiezu nimmt, dass 11. Gattungen der XII. Edition jetzt nur als Varietäten angenommen, und deren Stellen mit andern besetzt worden, so beträgt die Summe der neu hinzugekommenen Gattungen 42. Auch die Spielarten β. γ. ξ. η. ι. σ. τ. ν. φ. von Nro. 2. sind neu. — Bey der 21ten Gattung ist die Varietät β; bey der 22ten die Var. β; bey der 24ten die Var. β; bey der 29ten die Var. β; bey der 32ten die Varietäten β. γ. δ. ε; bey der 33ten die Var. β. γ; bey der 34ten die Var. β. γ. δ. hinzugekommen.

B. Unbestimmtere Thiere.

1. Die Waalia in Abyssinien.

Brüce, Reis. nach den Quellen des Nils, V. p. 188. n. 8. tab. 38. *Waalia*.

Gmelin, Anhang zu Brüce Reisen, p. 31. *Columba viridis*, *subtus flava*, *alarum tectoribus purpureis*,

pureis, remigibus nigris apice albidis, cauda
fordide caerulecente, subtus fulvo alboque
varia.

Meyer, Uebersicht des neuest. zool. Entdeck. Lpz.
1793. p. 128. n. 6.

C. Neuere Gattungen.

1. Die olivenfarbige Taube mit purpurfarbenen Schultern, in Indien.

Latham, Syn. Suppl. p. 201. n. 60. β . Purple
shouldered Pigeon.

Latham, Syst. ornith. II. p. 597. n. 13. Columba
(Phoenicoptera) olivacea, subtus cinera-
scens, capite colloque flavescentibus, tectrici-
bus alarum minoribus purpurascensibus, maio-
ribus remigibusque secundariis albo nigroque
striatis.

2. Die asiatische Taube.

Latham, Syn. Suppl. p. 202. n. 60. γ . Indian
Pigeon.

Latham, Syst. ornith. II. p. 597. n. 14. Columba
(Asiatica) cinereo viridis, capite cinereo, ma-
cula alarum corporeque subtus albo, remigibus
nigris, albo extus marginatis.

3. Die Taube von der Insel Tanna.

Latham, Syst. ornith. II. p. 600. n. 26. Columba
(Tannensis) viridis, tectricibus alarum albo-
maculatis, remigibus secundariis ad apicem
margine flavis.

Vielleicht eine Spielart von *Columba Curviro-*
stra Gmel. Syst. p. 777. n. 45.

4. Die braune neuseeländische Taube.

Latham, Syst. ornith. II. p. 603. n. 38. Columba
(Brunnea) pileo, collo supra, dorso tectricibus-
que

que alarum brunneis, pectore collo, subtus uropygioque viridi splendidis.

5. Die goldflügelige Taube.

Latham, Syst. ornith. II. p. 604. n. 39. *Columba* (*Chalcoptera*) *fusco-cinerea*, *rufo-marginata*, *fronte gulaque albis*, *fascia alarum cupereo-aurea bifida*, *rectricum ad apicem nigra*.

White, Reis. nach Neu-Süd-Wallis, — in dem Magaz. merkw. Reisebeschr. V. p. 129. *die goldflügeliche Taube*.

6. Die bantamische Taube.

Latham, Syst. ornith. II. p. 615. n. 77. *Columba* (*Bantamensis*) *cauda cuneata*, *orbitis denudatis carneis*, *collo, pectore hypochondriisque albo nigroque undulatis*.

Mus. Carlson. fasc. III. tab. 67. Columba Bantamensis.

7. Die Taube von St. Domingo.

Latham, Syst. ornith. II. p. 615. n. 79. *Columba* (*Dominicensis*) *cauda cuneata*, *corpore griseo*, *capite subtus albo*, *macula verticis, fascia sub oculis et torque colli nigris*.

Büffon, pl. enl. 487. *Tourterelle de St. Domingue*.

105. G E S C H L E C H T. A L A U D A. Die Lerche.

Müller, Naturfyst. II. p. 517. Gen. CV.

Leske, Naturgesch. p. 254. Gen. XXXVII.

Borowsky, Thierreich, III. p. 195. Gen. LXXIII.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 179. Gen. XXVII.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 493. Gen. LXIV.

Ebert, Naturl. II. p. 125.

Halle,

- Halle*, Vögel, p. 305. Gen. VI.
Pennant, arct. Zool. II. p. 365.
Neuer Schaupl. d. Nat. V. p. 92.
Onomat. hist. nat. I. p. 234.
Klein, av. p. 71. Gen. VI.
Brisson, ornith. I. p. 404. Gen. XXXIX.
Büffon, Vögel, XIV. p. 152. ss.
Batsch, Thiere, I. p. 317. Gen. LXXIV.
Latham, Syst. ornith. II. p. 491. Gen. XLI.
Hermann, tab. affin. anim. p. 210.
Donndorff, Handb. d. Thiergefch. p. 342. Gen. LXXII.

I. ARVENSIS. *Die Feldlerche.* (6)

- Müller*, Natursyst. II. p. 517. n. 1. die Ackerlerche.
Borowsky, Thierreich, III. p. 196. n. 2. die Acker-Feld-, Saat-, Himmel-, Sangerche.
Blumenbach, Handb. d. N.G. p. 179. n. 1. Alauda (Arvensis) rectricibus extimis duabus extorum longitudinaliter albis: intermediis inferiori latere ferrugineis. *Feldlerche; Pardale.*
Bechstein, Naturgesch. I. p. 494. n. 1. *Feldlerche; gemeine Acker- oder Sandlerche.*
Funke, Naturgesch. I. p. 231. die Ackerlerche.
Ebert, Naturl. II. p. 125. die Ackerlerche.
Halle, Vögel, p. 306. n. 271. die Feldlerche.
Meyr, Thiere, II. tab. 98. *Feldlerche.*
Neuer Schaupl. der Natur, V. p. 94. n. 1. *Ackerlerche.*
Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 377. n. 307. die Lerche.
Onomat. hist. nat. I. p. 240. *Kornlerche, Weglerche, Brachlerche.*

Pennant,(6) Flügelweite 12 1/2 Zoll, Gewicht 1 1/2 Unzen, *Penn.* Kann über 24. Jahre alt werden. —

- Pennant*, arct. Zool. II. p. 367. A. die Feldlerche.
- Handb. der deutsch. Thiergeesch. p. 122. Saatlerche.
- Beckmann*, Naturhist. p. 51. *Die Lerche*.
- Klein*, av. p. 71. n. 1. *Alauda simpliciter*.
- Klein*, Vorbereit. p. 134. n. 1. *Himmellerche*.
- Klein*, verb. Vögelhist. p. 72. n. 1. *Himmelsterche*.
- Klein*, Stemmat. av. p. 13. tab. 15. Fig. 1. a. b. c. d.
- Klein*, Vögeleyer, p. 23. tab. 9. Fig. 1.
- Gesner*, Vögelb. p. 316. *Heidlerch*, *Gesanglerch*, *Himmellerch*, *Holzlerch*, fig. p. 317.
- Brisson*, ornith. I. p. 404. n. 1. *Alouette*.
- Büffon*, Vögel, XIV. p. 152. die *Lerche*; m. e. Fig.
- Batsch*, Thiere, I. p. 343. *Saatlerche*.
- Latham*, Syst. ornith. II. p. 491. n. 1. *Alauda (Arvensis) nigricante-griseo-rufescente et albido vario, subtus rufo-alba, rectricibus extimis duabus extrotsum longitudinaliter albis, intermediis interiori latere ferrugineis*.
- Beseke*, Vögel Kurl. p. 72. n. 153. die *Feldlerche*.
- Siemßen*, meklenb. Vögel, p. 104. n. 1. die *Feldlerche*, *Leewaark*.
- Bock*, N. G. von Preuss. IV. p. 406. die *Ackerlerche*.
- Cetti*, Sardin. II. p. 143. die *Ackerlerche*.
- Fischer*, Livil. p. 92. n. 128. *Feldlerche*.
- White*, N. G. von Engl. p. 63. n. 7. p. 66. n. 1. *Feldlerche*.
- Georgi*, Reis. I. p. 173. *Feldlerche*; *Shaworonok*.
- Pallas*, nord. Beytr. III. p. 14. IV. p. 14. die *gemeine Feldlerche*.
- Pontoppidan*, Dännem. p. 172. n. 1. *Sanglerche*.
- Pontoppidan*, Norweg. II. p. 158. *Sang-Lerke*.
- Kolbe*,

Kolbe; Vorgeb. d. g. Hoffn. Ed. in 4. p. 398. *die Lerche.*

Forskål, fn. orient. p. VII. n. 16. *Alauda arvensis.*
Kunbar vel Kombara.

Linné, Abhandlung. II. p. 300. n. 113. *die Acker-Lerche.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 289. *die Feldlerche.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 58. *Feldlerche.*

Naumann, Vogelsteller, p. 178. *die Lerche.*

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 152. n. 184. *die Feldlerche.*

Forstlex. II. p. 688. *Feld- oder Kornlerche.*

Martini, Naturlex. I. p. 226. *Ackerlerche.*

Oekon. Zool. p. 92. n. 33. *Ackerlerche.*

Naturforsch. XVII. p. 77. n. 160. *die Ackerlerche.*

Naturgesch. aus den besten Schriftst. VIII. p. 681.
die Lerche.

Meidinger, Vorles. I. p. 146. n. 1. *die gemeine Lerche.*

Schwed. Abhandl. XXXVIII. p. 294. *Lerche.*

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 120. *die Lerche oder Feldlerche.*

Jablonsky, allgem. Lex. p. 598. *Lerche.*

Börner, schlesische ökonom. Nachr. 1781. p. 97.
n. 179

Eberhard, Thiergech. p. 83. *die Lerche.*

Hannöv. Magaz. 1779. p. 130.

Zückert, Speis. aus d. Thierreich, p. 95.

Merklein, Thierreich, p. 307. *Lerche.*

Hamburg. Magaz. VI. p. 161.

Geoffroy, mater. med. VII. p. 280. *die gemeine Lerche.*

Valentini, Alaudarum commestio minus laudabilis. — Eph. nat. cur. Vol. II. Obs. 120. p. 278.

Gozze, nützl. Allerl. I. p. 18.

Anweis. Vögel zu fang. p. 358. *die Lerche.*

Borkhausen, Magaz. I. p. 166. n. 37.

André u. Bechstein, Spazierg. II. p. 228. 233.

Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 57. Alauda.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 165. n. 1. Alauda (*Arvensis*) rectricibus extinis duabus extrofsum longitudinaliter albis, intermediis interiore latere ferrugineis.

Müller, zool. dan. prodr. p. 28. n. 229. Alauda (*Arvensis*) rectricibus extinis duabus extrofsum longitudinaliter albis, intermediis interiore latere ferrugineis.

Charleton, exercitat. p. 88. Alauda.

Charleton, onom. zoic. p. 80. n. 8. Alauda.

Moehring, av. gen. p. 43. n. 32. Alauda.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 191. Alauda vertice plano; coelipeta; *Feldlerche*; *große Lerche*; *Himmellerche*.

Sibbald, Scot. p. 364. Alauda vulgaris.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 354. Alauda non cristata; alauda terrena.

Belon, hist. nat. des ois. p. 269. Alauda non cristata seu gregalis. *Alouette*.

Jonston, av. p. 99. Alauda, p. 100. Alauda non cristata.

Schaefer, element. ornithol. tab. 18.

Zinnian. Uov. p. 55. tab. 8. fig. 43. Lodola.

Herkens, av. Fris. p. 1. Alauda.

Bomare, diction. I. p. 157. Alouette ordinaire.

Salerne, hist. nat. des Ois. p. 90. Alavette.

Du Tertre, hist. des Antill. II. p. 55.

Sloane, Jamaic. I. p. 51.

Vie du Comte Marsigli P. X. p. 148.

Aristot. hist. anim. L. 4. c. 1. L. 9. c. 25. *Kορυδος*.

Aelian. de nat. anim. L. 1. c. 35. L. 3. c. 30. L. 4. c. 5. L. 6. c. 46. L. 16. cap. 5. *Kορυδος*, *Kορυδαλος*.

Donndorff,

Donndorff, Handb. der Thiergeesch. p. 342. n. 1.
die gemeine Lerche.

β. Die weiße Lerche.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 599. b.
die weiße Lerche.

Klein, av. p. 72. n. 4. *Alauda alba*.

Klein, Vorbereit. p. 135. n. 4. *weiße Lerche*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 72. n. 4. *weiße Lerche*.

Brisson, ornith. I. p. 405. A. *Alouette blanche*.

Büffon, Vögel, XIV. p. 181. die weiße Lerche;
m. e. Fig.

Latham, Syn. II. 2. p. 369. A. White Lark.

Latham, Syst. ornith. II. p. 491. n. 1. β. *Alauda candida*.

Pontoppidan, Däneim. p. 173. n. 7. *weissgraue Lerche*.

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 105. n. 1. β. die weiße Feldlerche.

Götz, Naturgesch. einiger Vögel, p. 116. n. 5.

Naturforsch. I. p. 63. n. 9. — XIII. p. 17. — XVI.
p. 48. n. 1. *weiße Lerche*.

Müller, zool. dan. prodr. p. 28. ad n. 229.

Brünniche, ornith. bor. p. 63. ad n. 222.

Barrere, Sp. nov. cl. III, Gen. 16. p. 40. *Alauda alba sine crista*.

γ. Die schwarze Lerche.

Haller, Vögel, p. 316. n. 280. die schwarze Lerche.

Brisson, ornith. I. p. 405. B. *Alouette noire*.

Büffon, Vögel, XIV. p. 186. die schwarze Lerche;
m. e. Fig.

Latham, Syn. II. 2. p. 370. Dusky Lark.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 492. n. 1. β. *Alauda nigra*.

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 14. die schwarze astrachanische Lerche.

Naturforscher, II. p. 2. n. 4. die schwarze Lerche.

8. Die langfüßige Lerche.

Latham, Syst. ornith. II. p. 492. n. 1. δ.

7. R U F A. Die schwarzbraune Lerche. (7)

Büffon, Vögel, XIV. p. 188. die schwarze Lerche mit falben Rücken.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 492. n. 2. Alauda (*Fulva*) fusco-nigricans, cervice, dorso scapularibusque rufo-aurantiis, alis caudaque obscuris.

2. P R A T E N S I S. Die Wiesenlerche. (8)

Müller, Natursystem, II. p. 518. n. 2. die Wiesenlerche.

Borowsky, Thierreich, III. p. 198. n. 3. die Wiesenlerche; Brachlerche.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 496. die Wiesenlerche; Hüster.

Ebert, Naturl. II. p. 125. die Wiesen- oder Brachlerche.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 378. n. 308. Wiesenlerche; Löwerke.

Pennant, arct. Zool. II. p. 368. C. die Wiesenlerche.

Neuer Schaupl. der Nat. V. p. 94. n. 2. Wiesenlerche.

Onomat. hist. nat. I. p. 245. die Wiesenlerche.

Klein, stemmat. av. p. 13. tab. 15. fig. 2. a — c. Alauda stratorum?

Briffon, ornith. I. p. 406. n. 3. Alouette du Prez, ou la Farlouse.

Büffon,

(7) Die Trivialbenennung: *Rufa*, kommt im Syst. p. 793. n. 28. nochmals vor.

(8) Bock, Fischer, u. a. wollen sie als eine Abart von der Feldlerche ansehen.

- Büffon, Vögel, XIV. p. 203. die Wiesenlerche,
p. 204. kleine Lerche; Holz- oder Heidelerche,
Bastardlerche; Buschlerche; Gartenlerche.
- Batsch, Thiere, I. p. 344. Wiesenlerche.
- Latham, Syst. ornith. II. p. 493. n. 5. Alauda (Pratensis) viridi-fusca, rectricibus duabus extrorsum albis, linea superciliari alba.
- Fischer, Livil. p. 92. n. 129. Wiesenlerche; Him-melslerche.
- Cetti, Sardin. II. p. 148. die Wiesenlerche.
- White, N. G. von England, p. 63. n. 10. p. 66.
n. 2. Wiesenlerche.
- Pontoppidan, Dämmen. p. 173. n. 2. Englerke.
- Siemssen, meklenb. Vögel, p. 105. n. 2. die Wie-senlerche.
- Meidinger, Vorles. I. p. 146. n. 2. die Wiesen-lerche.
- Eberhard, Thiergeesch. p. 84. die Wiesenlerche.
- Borkhausen, Magaz. I. p. 168. n. 38.
- Linné, Abhandl. II. p. 300. n. 112. die Wiesen-lerche.
- Sammnl. zur Phys. u. N. G. III. p. 123. die Wiesen-lerche.
- André u. Bechstein, Spazierg. IV. p. 99.
- Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 29. n. 2. Alauda praten-sis.
- Linné, Syst. nat. Ed. X. I. p. 166. n. 2. Alauda (Pratensis) rectricibus extimis duabus extrorsum albis, linea superciliorum alba.
- Charleton, onom. zoic. p. 81. n. 3. Alauda praten-sis.
- Müller, zool. dan. prodr. p. 28. n. 230. Alauda (Pratensis) rectricibus extimis duabus extrorsum albis, linea superciliorum alba.
- Belon, hist. nat. des ois. p. 271. Farlouse, fallope, alouette de près.

Fonston, av. p. 101. *Alauda pratorum*.

Zinnan. Uov. p. 55. tab. 8. fig. 44. *Mattolina?*

Zinnan. Uov. p. 50. tab. 7. fig. 37. *Spippola minor*.

Hermann, tab. affin. anim. p. 215. *Alauda pratensis*.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 43. n. 2. die *Wiesenlerche*.

β. *Die weiße Wiesenlerche.* (9)

Brisson, ornith. I. p. 407. *A. Farlouse blanche*.

Büffon, Vögel, XIV. p. 213. *die weiße Wiesenlerche*.

Büffon, ois. IX. p. 51. *Variété de la Farlouse*.

δ. *Die schwarzfüßige Wiesenlerche.*

ε. *Die ganz schwarze Wiesenlerche.* *

Beske, Vögel Kurl. p. 72. n. 154.

12. MINOR. *Die kleine Feldlerche.* (10)

Pennant, arct. Zool. II. p. 368. D. *die Brachlerche*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 494. n. 8. *Alauda (Minor) rubro fusca, subtus maculata, gula abdomineque albis, iugulo pectoreque obscure flavescitibus*.

Britt. zool. Nr. 139. *Field-Lark*.

13. ITALICA. *Die italienische Lerche.* (1)

Halle, Vögel, p. 315. n. 278. *die Wachtellerche*.
Brisson,

(9) *Brisson* rechnet hieher auch die *Spipola alba sive Boarina Aldr.* ingl. die *Spipola tertia Fonst Willughb. Raj u. Razc.*

(10) Unter den Synonymen dieser und der vierten Gattung herrscht grosse Verwechslung; in der arct. Zool. werden beyde für einander angenommen, und *Büffons Farlouzanne* (*Alauda Ludoviciana* n. 14.) als Abart davon angesehen.

(1) *Latham* ist geneigt, sie als eine Spielart von *Alauda arborea* anzusehen.

Brisson, ornith. I. p. 409. n. 7. Alouette d'Italie.

Büffon, Vögel, XIV. p. 235. die Giarola.

Latham, Syst. ornith. II. p. 492. n. 4. Alauda (Italica) fusco-castanea, subtus alba, capite vitta annulari albicante, rectrice extima alba, proxima apice alba.

Naturgesch. aus den besten Schriftst. VII. p. 696.
die italienische Lerche.

3. ARBOREA. Die Baumlerche. (2)

Müller, Natursyst. II. p. 519. n. 3. die Baumlerche.

Borovesky, Thierreich, III. p. 198. n. 4. Waldlerche, Heidelerche, Baumlerche.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 495. n. 2. die Waldlerche, Düllerche.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 597. die Waldlerche.

Ebert, Naturl. II. p. 125. Heidelerche.

Halle, Vögel, p. 310. n. 272. die Waldlerche.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 379. n. 309. die Baumlerche; Gereutlerche; Schmervogel.

Pennant, arct. Zool. II. p. 367. B. die Waldlerche.

Nener Schapl. d. Nat. V. p. 93. Heide-Waldlerche, p. 94. n. 3. Baumlerche.

Onomat. hist. nat. I. p. 238. Heidelerche, Buschlerche, Holzlerche.

Handb. der deutsch. Thiergeesch. p. 122. Heidelerche.

Klein, av. p. 71. n. 2. Alauda sylvestris, pratorum.

Klein, Vorbereit. p. 135. n. 2. Heide-Wiese-Brach-Mittel-Wald-Steinlerche.

(2) Die Baumlerche, Wiesenlerche, Pipplerche und Gereutlerche werden von den mehresten Schriftstellern verwechselt.

- Klein*, verb. Vögelhist. p. 72. n. 2. *Wiesenlerche*,
Brachlerche.
- Klein*, stemmat. av. p. 13. tab. 15. fig. 4. a—c.
- Klein*, Vögeleyer, p. 24. tab. 9. fig. 5.
- Brisson*, ornith. I. p. 405. n. 2. *Alouette de bois ou Cujelier*.
- Büffon*, Vögel, XIV. p. 190. *die Baum- oder Waldlerche*.
- Batsch*, Thiere, I. p. 314. *die Waldlerche*.
- Latham*, Syst. ornithol. II. p. 492. n. 3. *Alauda (Arborea) varia, capite vitta annulari alba cincto*.
- Siemssen*, meklenb. Vögel, p. 106. n. 3. *die Baumlerche*.
- Pontoppidan*, Dännem. p. 173. n. 3. *Heedelerke, Pibelerke*.
- Linné*, Abhandlung. II. p. 300. n. 112. *die Baumlerche*.
- Bock*, N. G. von Preuss. IV. p. 407. *die Baumlerche; Haideleterke*.
- Cetti*, Sardin. II. p. 145. *die Baumlerche*.
- White*, N. G. von Engl. p. 62. n. 2. p. 63. n. 1. p. 66. n. 3. et 5. *Holzlerche*.
- Fischer*, Liv. p. 92. n. 130. *Baumlerche*.
- André u. Bechstein*, Spazierg. III. p. 145. 150. Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 122. *Baumlerche, Waldlerche*.
- Scopoli*, Rem. aus der N. G. I. p. 153. n. 186. *Baumlerche, Heydelerche*.
- Naturforsch. XVII. p. 78. n. 161. *Baumlerche*.
- Zorn*, Petinotheol. II. p. 292. *die Heide-Lerche*.
- Döbel*, Jägerprakt. I. p. 59. *Heidelerche*.
- Onomat. forestal. II. p. 695. *die Heidelerche*.
- Borkhausen*, Magazin, I. p. 169. n. 40.
- Börner*, schlesische ökonom. Gesellschaft 1781.
p. 98.

Naturgesch. aus den besten Schriftst. VIII. p. 687.

Heidelerche.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 29. n. 2. *Alauda arborea*.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 166. n. 3. *Alauda (Arborea) capite vitta annulari alba cincto*.

Müller, zool. dan. prodr. p. 28. n. 231. *Alauda (Arborea) capite vitta annulari alba cincta*.

Kramer, Austr. p. 362. n. 3. *Alauda lineola superciliorum alba, torque in collo pallido, cauda brevissima; Ludllerche, Waldlerche*.

Charleton, onomast. zoic. p. 81. n. 2. *Alauda arborea*.

Charleton, exercitat. p. 88. *Alauda arborea*.

Sibbald, Scot. p. 249. *Alauda arborea*.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 137. *Alauda arborea*.

Barrere, Sp. nov. class. III. Gen. 16. p. 40. *Alauda non cristata fusca*.

Zinnan. Uov. p. 55. tab. 8. fig. 44. *Mattolina?*

Hermann, tab. affin. anim. p. 215. *Alauda arborea*.

Bonaparte, diction. I. p. 159. *Alouette des bois*.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 343. n. 3. *die Baumlerche*.

14. LUDOVICIANA. *Die louisianische Lerche.* (3)

Büffon, Vögel, XIV. p. 216. *die Louisianische Lerche oder Farlousanne*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 368. ad D. *Farluzzanne*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 494. n. 9. *Alauda (Ludoviciana) fuscō nigricans, subtus fulva, iugulo pectoreque flavescente griseis, pectore fuscō maculato*.

O 5

15. RU-

(3) Nach Pennant eine Spielart von *Alauda minor* n. 12. dem auch *Latham* beyzupflichten nicht abgeneigt ist. *Büffon* sagt, sie habe viel Aehnliches mit der *Wiesenlerche*.

15. RÜBRA. *Die pensylvanische Lerche.*

Brisson, ornithol. I. p. 413. n. 13. Alouette de Pensylvanie.

Büffon, Vögel, XIV. p. 253. die pensylvanische Lerche; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 494. n. 10. Alauda (Rubra) obscure fusca, subtus fulvo-rufescens, maculis fuscis varia, genis nigricantibus, superciliis pallide rufis.

Pennant, arct. Zool. II. p. 366. n. 196. die rothe Lerche.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 87. pensylvanische Lerche.

Brittische Thiergesch. p. 102. n. 5. die englische Rothlerche.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 126. die rotbäckigste pensylvanische Lerche.

Naturgesch. aus den besten Schriftst. VIII. p. 700. die Lerche mit braunen Backen aus Pensylvanien.

16. MOSELLANA. *Die Morastlerche.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 255. die Morastlerche; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 495. n. 1. Alauda (Mosellana) rufa fusco-varia, subtus rufescens, pectore fusco-maculato, fasciis tribus subocularibus fuscis.

Naturgesch. aus den besten Schriftst. VIII. p. 701. die Sumpflerche.

4. CAMPESTRIS. *Die Gereuthlerche.*

Müller, Natursyst. II. p. 519. n. 4. die Feldlerche.

Borowsky, Thierreich, III. p. 199. n. 5. die Feldlerche; braunfalte Lerche, Guckerlein.

Halle, Vögel, p. 312. ad n. 272. die Gereutlerche.
(mit der Heidelerche und Wiesenlerche ver-
wechselt.)

Klein, Steinmat. av. p. 13. tab. 15. Fig. 3. a—c.
Alauda dumetorum.

Briffon, ornith. I. p. 408. n. 5. Alouette de champ.

Büffon, Vögel, XIV. p. 224. die Gereuthlerche,
Brachlerche oder Spioplette; m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 344. die Feldlerche.

Gesner, Vögelb. p. 143. Gickerlein, Guckerlein,
Grienvögelein; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 495. n. 12. Alauda
(Campestris) rectricibus fuscis, inferiore me-
diate, exceptis intermediis duabus, albis,
gula pectoreque flavescente.

Pontoppidan, Dännem. p. 173. n. 4. Marklerke.

Linné, Abhandlung, II. p. 300. n. 112. die Feld-
lerche.

Siemsen, meklenb. Vögel, p. 107. n. 4. die Brach-
lerche.

Döbel, Jägerprakt. I. p. 59. Spießlerche; Kraut-
vögelgen.

Borkhausen, Magazin, I. p. 168. n. 39. Brach-
lerche.

Zorn, Petinotheol. II. p. 297. die Brach- oder Koth-
lerche.

Storr, Alpenreise, I. p. 78. Feldlerche.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 125. Spioplette.

Schrift. der berlin. Gesellsch. N. Fr. VII. p. 465.
n. 52. die Feldlerche.

Naturgesch. aus den best. Schriftst. VIII. p. 694.
die Gereuthlerche.

Börner, schles. ökon. patr. Gesellsch. 1781. p. 98.
Alauda campestris.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 29. n. 4. Alauda cam-
pestris.

Linné,

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 166. n. 4. *Alauda* (*Campestris*) rectricibus fuscis, inferiori medietate, exceptis intermediis duabus, albis, gula pectoreque flavescente.

Müller, zool. dan. prodr. p. 29. n. 232. *Alauda* (*Campestris*) rectricibus fuscis, inferiori medietate, exceptis intermediis duabus, albis, gula pectoreque flavescente.

Brünniche, ornith. bor. p. 64. n. 226. *Alauda campestris*.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 349. *Stoparola*, *Acredula*, *Glariana*; *Stoppelvogel*; *Stöpling*; *Spies-Lörche*; *Grienvögelin*; *Greinerlin*; *Gückerlin*.

Rzaczynsky, aust. hist. nat. Polon. p. 42. *Zdzoto*.

β. SPINOLETTA. *Die florentinische Lerche.* (4)

Müller, Natursyst. II. p. 520. n. 7. *die florentinische Lerche*.

Halle, Vögel, p. 316. n. 279. *die braunfalte Lerche*.

Latham, Syn. II. 2. p. 378. n. 10. A.

Latham, Syst. ornith. II. p. 495. n. 12. β. A. rectricibus fuscis, extimis duabus oblique dimidiatto albis.

Büffon, Vögel, XIV. p. 233. *die Spinoletta*.

Cetti, Sardin. II. p. 149. *die florentinische Lerche*.

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 153. n. 187. *Alauda Spinoletta*.

Borkhausen, Magazin, I. p. 169. n. 39. β.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 125. *Spinoletta*.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 166. n. 7. *Alauda* (*Spinoletta*) rectricibus fuscis, extimis duabus oblique dimidiato -albis.

17. MA-

(4) Länge, nach *Cetti*, nicht über 5 Zoll.

17. MALABARICA. *Die malabarische Lerche.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 495. n. 13. Alauda (Malabarica) fusca, pennis rufo-marginatis, apice albo-maculatis, collo rufescente, maculis sagittatis nigris.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 158. die Haubenlerche von der Küste Malabar, tab. 113. Fig. 1.

18. GINGICA. *Die Lerche aus Gingi.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 496. n. 14. Alauda (Gingica) cinereo-rufa, capite cinereo, subtus vittaque per oculos nigra.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 158. die kleine graue Lerche aus Gingi, tab. 113. Fig. 2.

19. TATARICA. *Die tatarische Lerche. (5)*

Müller, Natursyst. Suppl. p. 136. die Tartarlerche.

Büffon, Vögel, XIV. p. 287. die schwarze Steppenlerche, oder die tatarische Lerche; m. e. Fig.

Latham, Syn. Suppl. p. 177. Black Lark.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 496. n. 15. Alauda (Tatarica) fusco-nigricans, pennis albido-marginatis, remigibus rectricibusque nigris.

Pallas, Reis. III. p. 647. die schwarze Steppenlerche.

Pallas, Reis. Ausz. II. Anh. p. 8. n. 15. Alauda tatarica, tab. C.

Pallas, Reis. Ausz. II. p. 240. III. p. 365. 474. die schwarze Steppenlerche.

Hermann, tab. affin. anim. p. 216. Alauda tatarica.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 343. n. 4. die schwarze Steppenlerche.

20. MU-

(5) Latham rechnet hierher auch die Tunagra Sibirica, Syst. Genel. p. 829. n. 42.

20. MUTABILIS. Die veränderliche Lerche. (6)

Büffon, Vögel, XIV. p. 289. die veränderliche Lerche.

Latham, Syst. ornith. II. p. 496. n. 15. β . A. nigra, pennis marginé canis, subtus toto nigra, remigibus rectricibusque fuscis.

5. TRIVIALIS. Die Pipplerche. (7)

Müller, Natursyst. II. p. 519. n. 5. die Pieplerche.

Borowsky, Thierreich, III. p. 200. n. 6. die Pieplerche, Leimvogel.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 496. n. 4. die Pieplerche, Gereuthlerche, Heidelerche.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 598. die Pieplerche.

Ebert, Naturl. II. p. 126. die Pieplerche.

Onomat. hist. nat. VII. p. 260. Pipplerche.

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 123. die Pippplerche.

Pennant, arct. Zool. II. p. 392. L. Der Grashüpfer; die Pieplerche.

Klein, av. p. 71. ad n. 2. Alauda fistulans.

Klein, Vorbereit. p. 135. n. 2. Pfeif- oder Pieplerche.

Klein, verb. Vögelhist. p. 72. n. 2. Pfeiflerche.

Briffon, ornith. I. p. 407. n. 4. Alouette de buisson.

Büffon, Vögel, XIV. p. 218. die Pipplerche; m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 344. die Pipplerche.

Latham, Syst. ornith. II. p. 493. n. 6. Alauda (Trivialis) nigricante et olivaceo-varia, subtus

(6) Nach Latham eine Varietät von *Alauda Tatarica*, n. 19.

(7) Aus den verschiedenen Synonymen, welche sich von dieser und andern Gattungen bey den Naturhistorikern finden, lässt sich beurtheilen, wie schwankend und unzuverlässig, besonders die deutschen Benennungen, bey den Lerchenarten sind.

tus albo-flavicans, maculis nigricantibus, rectrice extima dimidiato, secunda apice alba.

Brittisch. Thiergesch. p. 103. tab. 50. fig. *Buschlerche*.

White, N. G. von Engl. p. 33. p. 34. n. 14. p. 59. n. 14. die *Pieplerche*.

Pontoppidan, Dännem. p. 173. n. 5. *Havelerke*.

Zorn, Petinotheol. II. p. 298. die *Pip-Lerche*.

Sammel. zur Phys. u. N. G. III. p. 124. die *Pieplerche*.

Naturgesch. aus den best. Schriftst. VIII. p. 692. *Pieplerche*.

Börner, Schles. patriotisch. Schrift. 1781. p. 98. n. 183.

André u. Bechstein, Spazierg. II. p. 104.

Siemsen, meklenb. Vögel, p. 108. n. 5. die *Pieplerche*.

Meidinger, Vorles. I. p. 146. n. 4. die *Pieplerche*.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 166. n. 5. Alauda (*Trivialis*) rectricibus fuscis, extima dimidiata alba, secunda apice cuneiformi alba, linea alarum duplii alba.

Müller, zool. dan. prodr. p. 29. n. 233. Alauda (*Trivialis*) rectricibus fuscis, extima dimidiata alba, secunda apice cuneiformi alba, linea alarum duplii albida.

Brünniche, ornith. bor. p. 64. n. 227. Alauda *Trivialis*. *Hauge-Hylde-Pibe-Lerke*.

Jonston, av. p. 122. Anthos?

Hermann, tab. affin. anim. p. 215. Alauda *trivialis*.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 344. n. 5. die *Piplerche*.

6. CRISTATA. *Die Haubenlerche*.

Müller, Natur-syst. II. p. 520. n. 6. die *Haubenlerche*.

Müller,

- Müller*, Natursyst. Suppl. p. 136. n. 13. der Rostflügel.
- Borowsky*, Thierreich, III. p. 200. n. 7. die Haubenlerche, Kobellerche, Kothmönch.
- Blumenbach*, Handb. d. N. G. p. 180. n. 2. Alauda (Cristata) rectricibus nigris, extimis duabus margine exteriori albis, capite cristato. Haubenlerche, Heidelerche.
- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 496. n. 5. die Haubenlerche.
- Ebert*, Naturl. II. p. 125. Heidelerche; Haubenlerche.
- Halle*, Vögel, p. 312. n. 273. die Haubenlerche; Fig. 17.
- Gatterer*, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 379. n. 311. Haubenlerche, Schopflerche.
- Neuer Schaupl. d. N. V. p. 94. n. 6. gehaubte Lerche.
- Klein*, av. p. 71. n. 3. Alauda capitata cristata, viarum.
- Klein*, Vorbereit. p. 135. n. 3. Kobel-Koth-Wege-Heubellerche.
- Klein*, verb. Vögelhist. p. 72. n. 3. Kobellerche, Wegelerche, Kothlerche.
- Klein*, Stemmat. av. p. 13. tab. 15. Fig. 6. a—c.
- Klein*, Vögeleyer, tab. 9. Fig. 4.?
- Briffon*, ornith. I. p. 410. n. 8. Alouette hupée, ou Cochevis.
- Büffon*, Vögel, XIV. p. 265. die Zopfleiche; m. e. Fig. p. 267. Weinlerche; Kammlerche; gehörnte Lerche; Lerche von Brie; große Lerche.
- Batsch*, Thiere, I. p. 344. die Haubenlerche.
- Gesner*, Vögelb. p. 360. Heubellerch, Kobellerch, Weglerch, fig. p. 361.

- Latham, Syst. ornith. II. p. 499. n. 25. Alauda (Cristata) rectricibus nigris, extimis duabus margine exteriore albis, capite cristato.
- Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 408. die Haubenlerche, Schubslerche.
- Siemßen, meklenb. Vögel, p. 109. n. 6. die Haubenlerche, Töppellerch; Heidlerch.
- Cetti, Sardin. II. p. 146. die Haubenlerche. *
- Fischer, Livl. p. 92. n. 131. Haubenlerche, Wege-lerche.
- Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 152. n. 185. die Schopflerche.
- Naturforsch. XVII. p. 79. n. 162. die Haubenlerche.
- Pontoppidan, Dännem. p. 173. n. 6. Toplerke.
- Sammel. zur Phys. u. N. G. III. p. 224. die Heide-lerche.
- Naumann, Vogelsteller, p. 74. Heidelerche.
- Naturgesch. aus den best. Schriftst. VIII. p. 703. die Haubenlerche.
- Jagd- und Forstlex. II. p. 700. die Haubellerche.
- Meidinger, Vorl. I. p. 146. n. 3. die Heidelerche.
- Börner, Schles. ökon. patr. Gesellsch. 1781. p. 98. Haubenlerche.
- Anweis. Vögel zu fang. p. 321. die Heydelerche.
- Borkhausen, Magaziin, I. p. 170. n. 41.
- Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 166. n. 6. Alauda (Cristata) rectricibus nigris, extimis duabus margine exteriori albis, capite cristato.
- Müller, zool. dan. prodr. p. 29. n. 234. Alauda (Cristata) rectricibus nigris, extimis duabus margine exteriori albis, capite cristato.
- Kramer, Austr. p. 362. n. 1. Alauda crista depen-dente, Kothlerche, Schopflerche.
- Schwenfeld, av. Siles. p. 193. Alauda cristata; Heubel-Lerch, Kott-Lerche, Lürle.
- Sibbald, Scot. ill. p. 17. Alauda cristata.
- II. Band II. Th. P Rzeczyński

- Rzaczynsky*, auch hist. nat. Pol. p. 315. *Alauda capellata*, viarum. *Dzierlatka*.
- Charleton*, onom. zoic. p. 81. *Alauda galerita*, *cassita*, *cristata*.
- Belon*, hist. nat. des ois. p. 267. *Cochavis*.
- Salerne*, ornithol. p. 194. *Cochavis*.
- Fonston*, av. p. 100. *Alauda cristata maior*.
- Zinnan*. Uov. p. 64. tab. 9. Fig. 56. *Lodola capellata*.
- Donndorff*, Handb. d. Thiergeesch. p. 344. n. 6. *die Haubenlerche*.

21. **NEMOROSA.** *Die Waldlerche.*

- Brisson*, ornithol. I. p. 411. n. 9. *petite Alouette hupée*.
- Büffon*, Vögel, XIV. p. 277. *die kleine Zopflerche*, oder *Lulu*; p. 279. *Waldlerche*.
- Latham*, Syst. ornithol. II. p. 499. n. 26. *Alauda (Cristatella) cristata*, corpore supra fusco subtus albicante, remigibus rectricibusque fuscis, pedibus subrubris.
- Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 225. *die Steinlerche*.
- Naturgesch. aus den besten Schriftst. VIII. p. 706. *die kleine Haubenlerche*.
- Britt. Thiergeesch. p. 102. *die kleine Schopf- oder Haubenlerche*.
- Schwenkfeld*, av. Siles. p. 193. *Alauda arborea*; *Heide Lerche*; *Mittel Lerche*; *Baumlerche*; *Wald Lerche*; *Stein Lerche*.
- Rzaczynsky*, auch hist. nat. Polon. p. 354. *Alauda arborea seu sylvatica*.
- Fonston*, av. p. 100. *Alauda cristata minor*.

22. **UNDATA.** *Die Coquillade.*

- Büffon*, Vögel, XIV. p. 281. *die Coquillade*; m. e. Fig.

Latham,

Latham, Syst. ornithol. II. p. 500. n. 27. Alauda (Undata) cristata nigricans rufo varia, subtus alba, pectore nigro maculato, rectricibus alarum maioribus apice albis.

Sammel. zur Phys. und N. G. III. p. 225. die Co-quillade.

Naturgesch. aus den besten Schriftst. VIII. p. 707. die provenzalische Lerche.

23. SENEGALENSIS. Die senegalische Lerche.

Müller, Natursyst. Suppl. p. 137. n. 15. die sene-gallische Lerche.

Brissot, ornith. I. p. 411. n. 10. Alouette hupée du Senegal.

Büffon, Vögel, XIV. p. 285. die senegalische Zopf-lerche.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 500. n. 28. Alauda (Senegalensis) fusco griseoque varia, subtus albida, collo inferiore fusco maculato, rectricibus duabus extimis extus rufo-albis.

Naturgesch. aus den besten Schriftst. VIII. p. 708. die Grisette, oder senegalische Haubenterche.

Adanson, Senegal. p. 217. 251. Lerchen?

24. TESTACEA. Die gibraltarische Lerche.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 500. n. 29. Alauda (Testacea) testacea subtus albida, vertice rectricibusque alarum nigro-maculatis, rectricibus quatuor exterioribus testaceo-albis.

25. LUSITANA. Die portugiesische Lerche.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 500. n. 30. Alauda (Lusitana) fusco flavescens, pennis medio fuscis, subtus rectricibusque exterioribus flavescente albis.

26. AFRICANA. Die afrikanische Lerche.

Büffon, Vögel, XIV. p. 263. der Sirli vom Cap; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 499. n. 24. Alauda (Africana) fusca, rufo alboque varia, subtus alba maculis fuscis, alis caudaque fuscis.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 224. der kap-sche Sirli.

Naturgesch. aus den besten Schriftst. VIII. p. 703. der Sirli vom Vorgeb. der gut. Hoffn.

Hermann, tab. affin. anim. p. 216. Alauda curvi-rostris.

27. CINEREA. Die graue Lerche.

Büffon, Vögel, XIV. p. 261. die aschgraue Lerche.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 499. n. 23. Alauda (Cinerea) cinerea, abdomine albo, remigibus rectricibusque fuscis, rectrice extima extus apice alba.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 224. die graue Lerche.

Naturgesch. aus den besten Schriftst. VIII. p. 703. die Aschlerche.

28. RUF A. Die Lerche vom de la Plata. (8)

Büffon, Vögel, XIV. p. 259. die Lerche vom de la Plata; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 498. n. 22. Alauda (Rufa) nigricans, rufo-nebulosa, corpore sub-tus gulaque albis, rectricibus duabus extimis albo-marginatis.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 223. die Variole.

Naturgesch. aus den besten Schriftst. VIII. p. 782. der Schäcke.

8. CA-

(8) Die Trivialbenennung *Rufa* ist im Syst. p. 792. n. 7. schon einmal vorgekommen.

8. **CAPENSIS.** *Die capsche Lerche.*

Müller, Natursystem, II. p. 520. n. 8. *die capsche Lerche.*

Brisson, ornith. I. p. 411. n. 11. Alouette du Cap de bonne espérance.

Büffon, Vögel, XIV. p. 247. *die capsche Lerche.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 498. n. 20. Alauda (Capensis) rectricibus tribus lateralibus apice albis, gula lutea, nigro marginata, superciliis flavis.

Samml. zur Phys. und N.G. III. p. 126. *die capsche Calandra.*

Naturgesch. aus den besten Schriftst. VIII. p. 698. *gelbe Halsbinde.*

29. **NOVAE SEELANDIAE.** *Die neuzeeländische Lerche.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 497. n. 19. Alauda (Novae Zealandiae) obscura, pennis cineraescente marginatis, abdomine albo, superciliis albis, fascia oculari nigra.

β. A. *cinerea*, subtus cinereo-alba, remigibus rectricibusque nigris, margine exteriore albis. *

Latham, Syst. ornith. II. p. 497. n. 19. β.

30. **MONGOLICA.** *Die mongolische Lerche.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 292. *die mongolische Lerche;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 497. n. 18. Alauda (Mongolica) capite colloque ferrugineis, vitta annulari verticis marginali maculaque medio albis, gula macula bifida.

Pallas, Reis. Anz. III. Anh. p. 8. n. 19. Alauda Mongolica.

Schwed. Abhandl. XL. p. 192. *die mongolische Lerche.*

31. SIBIRICA. *Die sibirische Lerche.* (9)

Büffon, Vögel, XIV. p. 291. die Lerche vom Irtis-fluß.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 497. n. 17. β. Al. flavo-ferruginea subtus albida, iugulo ferrugineo vario, remigibus secundariis maxima parte albis.

Pallas, Reis. Ausz. II. Anh. p. 9. n. 15. * III. p. 365. Anh. p. 8. * Alauda Calandra.

9. CALANDRA. *Die Kalanderlerche.*

Müller, Natursyst. II. p. 521. n. 9. die Kalander-lerche.

Ebert, Naturl. II. p. 126. Kalander.

Halle, Vögel, p. 315. n. 276. die große Ringlerche. Onomat. hist. nat. II. p. 398. die große Lerche.

Klein, av. p. 72. n. 7. Alauda Calandra.

Klein, Vorbereit. p. 137. n. 7. die Kalandra Lerche.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 73. Calandra.

Briffon, ornithol. I. p. 408. n. 6. Grosse Alouette ou Calandre.

Büffon, Vögel, XIV. p. 238. die Kalanderlerche, oder große Lerche; m. e. Fig.

Pennant, arct. Zool. II. p. 366. n. 197. die Calandra.

Latham, Syn. Supplem. p. 177. Calandre Lark.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 498. n. 17. Alauda (Calandra) rectrice extima exterius tota alba, secunda tertiaque apice albis, fascia pectorali fusca.

Gesner, Vögelb. p. 361. Kalander oder Galander, p. 472 kleiner Tetrax.

Cetti, Sardin. II. p. 139. die Ringlerche; m. e. Fig.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 58. die große Lerche. Pallas,

(9) Nach Latham eine Varietät von Alauda Calandra, n. 9.

Pallas, Reis. III. p. 697. — Ausz. III. Anh. p. 8.
not. * *Calander*.

Sammnl. zur Phys. und N. G. III. p. 126. *die Calandra*.

Naturgesch. aus den besten Schriftst. VII. p. 697.
die Kalanderlerche.

Charleton, onom. zoic. p. 81. n. 4. *Alauda Calandra*.

Fonston, av. p. 100. *Calandra*.

Barrere, ornith. p. 40. *Alauda non cristata cinerea*, pectore albo maculofo.

Belon, hist. nat. des ois. p. 270. *Calandre*.

Salerne, ois. p. 196. *Kalandra*.

Hermann, tab. affin. anim. p. 216. *Alauda Calandra*.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 344. n. 7.
die Kalanderlerche.

10. ALPESTRIS. *Die Schneelerche*.

Müller, Naturfyst. II. p. 521. n. 10. *die Berglerche*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 201. n. 8. *die Berglerche*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 498. n. 6. *die Berglerche*.

Ebert, Naturl. II. p. 126. *die Schneelerche*.

Halle, Vögel, p. 314. n. 274. *die gelbköpfige Lerche*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 365. n. 195. *die Uferlerche*.

Klein, av. p. 72. n. 5. *Alauda gutture flavo*, *Virginiae et Carolinae*.

Klein, Vorbereit. p. 136. n. 5. *gelbbärtige Lerche*.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 73. n. 5. *gelbbärtige amerikanische Lerche*.

Klein, stemmat. av. p. 13. tab. 15. fig. 5. c. d.

Brisson, ornith. I. p. 412. n. 12. Alouette de Virginie.

Büffon, Vögel, XIV. p. 249. die Schneelerche oder Berglerche.

Batsch, Thiere, I. p. 343. Berg- oder Winterlerche.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 498. n. 21. Alauda (Alpestris) rectricibus dimidio interiore albis, gula flava, fascia suboculari pectoralique nigra.

Boek, N. G. von Preuss. IV. p. 408. Berglerche, nordische Schneelerche.

Seligmann, Vögel, II. tab. 64. gelbbärtige Lerche.

Lepetchin, Tageb. d. russ. Reis. I. p. 194. wilde zweyschöpfige Alpenlerche.

Pennant, Reis. d. Schottl. I. p. 285. Berglerche.

Pallas, Reis. III. p. 647. Schnelerche.

Pallas, Reis. Ausz. I. p. 99. III. p. 474. Schneelerchen.

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 48. die Schneelerche.

Linné, Abhandlung. II. p. 280. n. 14. die Caroliner-Lerche.

Naturforsch. XVII. p. 79. n. 163. Berglerche; türkische Lerche.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 126. Schneelerche.

Borkhausen, Magaz. I. p. 171. n. 42.

Naturgesch. aus den besten Schriftst. VIII. p. 699. die virginische Lerche.

Naumann, Vogelsteller. p. 179. die Schneelerche.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 166. n. 8. Alauda (Alpestris) rectricibus dimidio inferiore albis, gula flava, fascia suboculari pectoralique nigra.

22. FLAVA. Der Priestergürtel. (10)

Büffon, Vögel, XIV. p. 257. die sibirische Lerche.

Latham,

(10) Nach *Latham* eine Varietät von *Alauda Alpestris* n. 10.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 498. n. 21. β . *Al. rufa griseo varia subtus alba*, vertice nigro-maculato, fascia pectorali suboculari lorisque nigris.

Naturgesch. aus den besten Schriftst. VIII. p. 207.
der Priestergürtel oder die sibirische Lerche.

Borkhausen, Magaz. I. p. 171. n. 43. gelbe sibirische Lerche.

33. OBSCURA. Die unbestimmte Lerche.

Büffon, Vögel, XIV. p. 296. eine Lerchenart, von der es ungewiß ist, ob sie zu den Lerchen gehöre.

II. MAGNA. Die Riesenlerche. (1)

Müller, Natursyst. II. p. 522. n. II. die Riesenlerche.

Borowsky, Thierreich, III. p. 196. n. I. die Riesenlerche. tab. 73.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 498. not. c.

Halle, Vögel, p. 314. n. 275. die große Amerikanische Baumlerche.

Klein, av. p. 72. n. 6. *Alauda magna*.

Klein, Vorbereit. p. 136. n. 6. *Dubbellerche*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 73. n. 6. *Dubbellerche*.

Briffon, ornithol. I. p. 225. n. 15. *Merle à collier d'Amerique*.

Büffon, Vögel, IX. p. III. die amerikanische Amsel mit dem Ringkragen; m. e. Fig.

Pennant, archt. Zool. II. p. 308. n. 108. der halbe Mond; die amerikanische Ringamsel.

Latham, Syn. II. I. p. 6. n. 3. A. Crescent Staare.

(1) Nach *Briffon* eine Amsel; nach *Pennant* ein Staar; nach *Catesby* eine Lerche; nach *Latham* eine Varietät von *Sturnus Ludovicianus*; p. 802. n. 3. — Gewicht, nach *Pennant*, zwischen 3. und 4. Unzen.

Latham, Vögel, II. I. p. 6. n. 3. Var. A. der *Staar mit dem halben Monde*. Amerikanische *Staar*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 323. n. 3. A. *Sturnus supra fusco-rufescente et nigricante varius, subtus flavus, fascia pectorali curva nigra, rectricibus tribus lateralibus albis*.

Sligmann, Vögel, II. tab. 66. die große *Lerche*.

Fermin, Surin. II. p. 181. die amerikanische *Lerche*?

Linneé, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 167. n. 9. *Alauda magna* subtus flava, fascia pectorali curva nigra; rectricibus tribus lateralibus albis.

Gentlem. Magaz. XXIII. tab. p. 324. Large Lark.

Hermann, tab. affin. anim. p. 210. 214. *Alauda magna*.

A. Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Edit. XII.

p. 288. n. 7. *Alauda Spinoletta*.

Edit. XIII.

p. 794. n. 4. β . *Spinoletta*.

Var.

Das Geschlecht ist, der Anzahl nach, mit 22. Gattungen vermehrt; da aber die 7te der XIIten Edition jetzt als Spielart von einer andern aufgeführt worden, so sind der neuhinzugekommenen Gattungen überhaupt 23.

Bey der 1sten Gattung sind *vier*, bey der 2ten *drey* Varietäten aus einander gesetzt.

B. Unbestimmtere Thiere.

1. Die Winterlerche des Scopoli.

Scopoli, an. I. p. 129. n. 188. *Alauda brumalis*.

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 154. n. 188. die *Winterlerche*.

Büffon, Vögel, XIV. p. 295. die *Winterlerche*.

2. *Alauda*

2. *Alauda pectore lutescente, punctis atris.*

Kramer, Austr. p. 362. n. 4. Austr. *Breinwogl*;
Norimb. Krautvogl; *Styr. Schnelvogl*.

In der Büffonschen Vögelübersetzung wird dies
Synonym; p. 264. zu *Alauda pratenis*, und
p. 219. wieder zu *Alauda trivialis* gerechnet.

3. *Alauda hispanica Hasselq.*

Hasselquist, Reis. n. Palaestina, p. 335. n. 46.

Büffon, Vögel, XIV. p. 582. die spanische Lerche.
Vielleicht *Alauda arvensis*?

4. *Die Grillenlerche; in den sumpfigen Gegenden von England.*

Halle, Vögel, p. 315. n. 277. die Lerchenheuschrecke.

Büffon, ois. IX. p. 59. Locustelle.

Büffon, Vögel, XIV. p. 214. die Grillenlerche.

Pennant, britisch Zoolog. p. 95. the Willow Lark.

Pennant, brit. Thiergeesch. p. 103. tab. 50. fig. 4.
Weidenlerche.

Naturgesch. aus den best. Schriftst. VIII. p. 694.
die Lerchenheuschrecke.

Latham, Syst. ornith. II. p. 494. n. 7. *Alauda (Obscura) olivaceo-fusca, nigricante varia, subtus flavicans, rectricibus colli pectoreque maculis fusciscentibus, rectrice extima dimidiato, secunda apice albo-cinerascente?*

5. *Thufu-Tytlinger. Olaffen*, Isl. I. p. 310. b. —
Müll. zool. dan. prodr. p. 29.

C. Neuere Gattungen.

1. *Die Yeltonische Lerche.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 288. die Yeltonische
Lerche.

Latham,

Latham, Syst. ornith. II. p. 496. n. 16. *Alauda* (*Yeltoniensis*) *nigra supra rufescente-varia, sexta remigum margine exteriore alba, rectricibus duabus intermediis rufis.*

Forster, philos. transact. LVII. p. 350. *Alauda yeltoniensis.*

Vielleicht eine Spielart von *Alauda tatarica*?

106. G E S C H L E C H T. S T U R N U S. Der Staar.

Müller, Natursyst. II. p. 523. Gen. CVI.

Leske, Naturgesch. p. 255. Gen. XXXVIII.

Borowsky, Thierreich, III. p. 201. Gen. LXXIV.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 180. Gen. XXVIII.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 498. Gen. LXV.

Halle, Vögel, p. 272. Gen. IV.

Pennant, arct. Zool. II. p. 308.

Neuer Schapl. d. Nat. VII. p. 408.

Onomat. hist. nat. VII. p. 358.

Klein, av. p. 64. Gen. IV.

Briffon, ornith. I. p. 280. Gen. XXVI.

Büffon, Vögel, VII. p. 5. sqq.

Batsch, Thiere, I. p. 318. Gen. LXXVIII.

Latham, Vögel., II. 1. p. 1. Gen. XXX.

Latham, Syst. ornith. I. p. 321. Gen. XXXI.

Hermann, tab. affin. anim. p. 210.

Donndorff, Handb. d. Thiergeesch. p. 345. Gen. LXXIII.

1. V U L G A R I S. Der gemeine Staar. (2)

Müller, Natursyst. II. p. 523. n. 1. die *Sprehe*.

Leske, Naturgesch. p. 255. n. 1. der *gemeine Staar*.

Borows-

(2) Gewicht etwa 3 1/2 Unze. Brütet zweymal; 18—20. Tage. Kann über 10. Jahr alt werden.

- Borowsky*, Thierreich, III. p. 202. n. 1. *der gemeine Staar*, tab. 74.
- Blumenbach*, Handb. d. N.G. p. 180. n. 1. *Sturnus (Vulgaris) rostro flavescente, corpore nigro punctis sagittatis albis*; *der Staar*.
- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 498. n. 1. *der gemeine Staar*.
- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. III. p. 714. *der gemeine Staar*.
- Funke*, Naturgesch. I. p. 239. *der Staar*.
- Ebert*, Natürl. II. p. 140. *Sprehe*.
- Halle*, Vögel, p. 272. n. 227. *der gemeine Staar*.
- Gatterer*, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 380. n. 314. *der Staar*.
- Pennant*, arct. Zool. II. p. 309. A. *der gemeine Staar*.
- Neuer Schaupl. der Nat. VIII. p. 408. *Sprehe*.
- Onomat. hist. nat. VII. p. 363. *der gemeine Staar*.
- Handb. der Naturgesch. II. p. 212. *der Staar*, p. 214. *Wiesenstaar*.
- Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 123. *Staar*; *Stär*; *Stärlein*; *Sprehe*; *Spren*.
- Klein*, av. p. 64. n. 1. *Sturnus pratorum, vulgaris*.
- Klein*, Vorbereitung. p. 121. n. 1. *Rinderstaar*; *Spreche*.
- Klein*, verb. Vögelhist. p. 63. n. 1. *gemeiner Wiesenstaar*; *Rinderstaar*; *Sprehe*.
- Klein*, stemmat. av. p. 10. tab. 12. fig. 5. a. b. c.
- Klein*, Vögeleyer, p. 22. tab. 8. fig. 7.
- Gesner*, Vögelb. p. 484. *Staar oder Rinderstaar*; m. e. ziempl. gut. Fig.
- Briffon*, ornith. I. p. 280. n. 1. *Etourneau*.
- Büffon*, Vögel, VIII. p. 5. *der Staar*; m. e. Fig.
- Batsch*, Thiere, I. p. 357. *der gemeine Staar*.
- Latham*, Syn. Suppl. p. 137. *Common Stare*.
- Latham*, Vögel, II. 1. p. 1. n. 1. *der gemeine Staar*.
Latham,

Latham, Syst. ornithol. I. p. 321. n. 1. *Sturnus (Vulgaris) rostro flavescente, corpore nigro nitente, punctis albis.*

Beseke, Vögel Kurl. p. 72. n. 155. *die Sprehe.*

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 85. n. 1. *die gemeine Sprehe.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 409. *der Staar.*

Cetti, Sardin. II. p. 174. *der Staar.*

Fischer, Liv. p. 93. n. 132. *Sprehe.*

Fabricius, Reis. nach Norweg. p. 59. *der gewöhnliche Sprehe.*

Pennant, Reis. d. Schottl. I. p. 17. *die Staare.*

Pallas, Reis. Ausz. I. p. 99. Ill. p. 475. *die Staare.*

Lepechin, Tageb. d. russ. Reis. III. p. 13. *Staare.*

Pontoppidan, Dännem. p. 173. n. 1. *Stär.*

Pontoppidan, Norweg. II. p. 185. *Stär, oder Star.*

Hasselquist, Paliästin. (ed. germ.) p. 335. n. 48. *Sturnus vulgaris.*

Leske, Reis. durch Sachsen, p. 31. *die Staare.*

Pennant, britt. Thiergesch. p. 99.

Borkhausen, Magazin, I. p. 164. n. 35.

Linné, Abhandlung. II. p. 283. n. 40. *die Staare,* p. 284. n. 44. p. 301. n. 14. *Staare.*

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 155. n. 189. *der ge- meine Staar.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 58. *Staar.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 323. *der Star.*

Naumann, Vogelsteller, p. 122. *der Staar.*

Hervieux, von Canarienvögeln, p. 170. *der Star.*

Beckmann, Naturhist. p. 55. *der gemeine Staar.*

Meidinger, Vorles. I. p. 146. n. 1. *der gemeine Staar.*

Naturforsch. XVII. p. 79. n. 164. *die Sprehe*, XXI. p. 133. *Staar.*

Naturforsch. XXV. p. 14. *der Staar.*

Auweis. Vögel zu fang. p. 521. *der Staar.*

Jablonsky

- Jablonsky*, allgem. Lex. p. 1116. *Staar.*
André u. Bechstein, Spazierg. II. p. 214. 222.
Oekon. Zool. p. 93. n. 34. *der Staar.*
Loniceri, Kräuterb. p. 680. *Staar.*
Zückert, Speis. aus d. Thierreich, p. 98.
Lemmery, Materiallex. p. 1087.
Beckmann, Bibl. VIII. p. 533. *der Staar.*
Mannigfaltigkeit. II. p. 159.
Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 57. *Sturnus.*
Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 29. n. 1. *Sturnus.*
Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 167. n. 1. *Sturnus*
 (*Vulgaris*) *rostro flavescens, corpore nigro,*
punctis albis.
Müller, zool. dan. prodr. p. 29. n. 235. *Sturnus*
 (*Vulgaris*) *rostro flavescens, corpore variegato*
punctis albis.
Kramer, Austr. p. 361. n. 1. *Sturnus rostro flaves-*
cente, corpore nigro, punctis albis. Starl.
Schwenkfeld, av. Siles. p. 351. *Sturnus. Staar;*
Spreche:
Charleton, onomast. zoic. p. 84. n. 3. *Sturnus.*
Moehring, av. gen. p. 32. n. 9. *Sturnus.*
Rzaczynsky, hist. nat. Polon. p. 291. *Sturnus.*
Sibbald, Scot. p. 157. *Sturnus.*
Fonston, av. p. 107. *Sturnus vulgaris.*
Heerkens, av. Fris. p. 169. *Sturnus.*
Schaefer, element. ornithol. tab. 65.
Zinnan. Uov. p. 69. tab. 10. fig. 60. *Storno.*
Russel, Alepp. p. 69. *Stare.*
Levin, britt. Birds II. tab. 56.
Belon, hist. nat. des ois. p. 322. *Etourneau; San-*
sonnet.
Voy. en Barbar. p. 271. *Etourneau.*
Plin. hist. nat. L. 10. c. 42. *Sturnus.*
Aristot. hist. anim. L. 9. c. 34. n. 202. *Ψαρος.*
Aelian. de nat. anim. L. VI. c. 46. *Ψαρ.*

Donn-

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 345. n. 1.
der gemeine Staar.

Donndorff, Natur und Kunst, III. p. 176. der
Staar.

β. Der weiße Staar.

Briffon, ornith. I. p. 281. A. Etourneau blanc.

Büffon, Vögel, VIII. p. 24. der weiße Staar.

Latham, Syn. II. 1. p. 3. White Stare.

Latham, Vögel, II. 1. p. 3. Var. A. der weiße
Staar.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 322. n. 1. β. *Sturnus*
albus.

Götz, Naturgesch. einiger Vögel, p. III. n. 1. ein
weißer Staar.

Naturforscher, XVI. p. 46. n. 1. weißer Staar.

Schwenkfeld, av. Silef. p. 353. *Sturnus candidus*.

Jonston, av. p. 107. *Sturnus totus candidus*.

Rozier, observat. XIV. p. 228.

γ. Der schwarz und weiße Staar.

Briffon, ornithol. I. p. 281. B. Etourneau blanc et
noir.

Büffon, Vögel, VIII. p. 24. der schwarz und
weiße Staar.

Latham, Syn. II. 1. p. 4. Pied Stare.

Latham, Vögel, II. 1. p. 3. Var. B. der bunte
Staar.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 322. n. 1. γ. *Sturnus leucomelas*.

Schwenkfeld, av. Silef. p. 352. *Sturnus ut pica varius*. Elster-Staar.

δ. Der weißköpfige Staar.

Briffon, ornithol. I. p. 281. C. Etourneau à tête
blanche.

Büffon, Vögel, VIII. p. 24. der weißköpfige Staar.

Latham,

Latham, Syst. ornithol. I. p. 322. n. 1. ♂. *Sturnus leucocephalus*.

Fonston, av. p. 108. *Sturnus alter*.

e. Der aschgraue Staar.

Briffon, ornith. I. p. 282. D. *Etourneau gris*.

Büffon, Vögel, p. 25. *der aschgraue Staar*.

Latham, Syn. II. 1. p. 4. *Grey Stare*.

Latham, Vögel, II. 1. p. 44. Var. C. *der graue Staar*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 322. n. 1. ε. *Sturnus cinereus*.

Charleton, onom. zoic. p. 84. ad n. 8. *Sturnus cinereus*.

Fonston, av. p. 108. *Sturnus tertius*.

a. CAPENSIS. Der capsche Staar. (3)

Müller, Natursystem, II. p. 524. n. 2. *der Capsche Staar*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 204. n. 3. *der Capische Staar*.

Onomat. histor. natur. VII. p. 359. *der Capische Staar*.

Briffon, ornith. I. p. 282. n. 3. *Etourneau du Cap de bonne Esperance*.

Büffon, Vögel, VIII. p. 31. *der Elsterstaar, oder Staar vom Vorgeb. der gut. Hoffn. m. e. Fig.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 4. n. 2. *der Capsche Staar*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 322. n. 2. *Sturnus (Capensis) nigricans, capitis lateribus subtusque albis*.

3. LU-

(3) *Büffon* rechnet hieher auch den *Sturnus Contra*, p. 803. n. 7. und alle daselbst bemerkte Synonymen. Auch *Latham* nimmt letztern als eine Spielart davon an.

3. LUDOVICIANUS. *Der louisianische Staar.* (4)
Müller, Natursyst. II. p. 524. n. 3. *der louisianische Staar.* Tab. 20. Fig. 3.
Pennant, arct. Zool. II. p. 309. n. 109. *der louisianische Staar.*
Onomat. histor. natur. VII. p. 362. *der Louisianische Staar.*
Brisson, ornith. I. p. 283. n. 4. *Etourneau de la Louisiane.*
Büffon, Vögel, VIII. p. 37. *der Louisianische Staar.*
Latham, Vögel, II. 1. p. 5. n. 3. *der Louisianische Staar.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 323. n. 3. *Sturnus (Ludovicianus) griseo fuscoque maculatus, subtus flavus, linea capitis superciliisque albis, gula nigra.*

4. CONTRA. *Der Kontra.* (5)

- Müller*, Natursyst. II. p. 525. *der bunte indianische Staar.*
Halle, Vögel, p. 295. n. 250. *die schwarze Bengalische Amsel. Der Kontra von Bengalen.*
Onomat. histor. natur. IV. p. 511. *die Elster von Bengalen.*
Klein, verb. Vögelhistor. p. 70. n. 37. *Tag und Nacht Drossel.*
Brisson, ornith. I. p. 181. n. 9. *Troupiale de Bengal.*
Büffon, Vögel, VIII. p. 35. *Staar Kontra; mit e. Fig.*
Latham, Syn. II. 1. p. 5. *Contra Stare.*
Latham, Vögel, II. 1. p. 5. n. 2. *Var. A. der Contra-Staar.*

Latham,

(4) *Latham* rechnet auch die *Alauda magna* Linn. p. 801. n. 11. als Spielart hieher.

(5) S. vorher Anmerk. 3.

Latham, Syst. ornith. I. p. 322. n. 2. β . *Sturnus fuscus macula oculari fascia alari abdomineque albis.*

Seligm. Vögel, VI. tab. 82. *der schwarz und weiße indianische Staaar.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 167. *Sturnus (Contra) fuscus, macula oculari, fascia alari abdomineque albis.*

5. CINCLUS. Der Wasserstaar. (6)

Müller, Natur-syst. II. p. 525. n. 5. *der Wasserstaar.*

Leske, Naturgesch. p. 255. n. 2. *der Wasserstaar.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 203. n. 2. *der Wasserstaar; Wasseramsel.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 499. n. 2. *der Wasserstaar.*

Ebert, Naturl. II. p. 140. *Wassermerle.*

Halle, Vögel, p. 296. n. 252. *die schwarze Wasseramsel.*

Gatterer, vom Nutz. u. Schi. d. Th. II. p. 383. n. 315. *Wasseramsel; Seeamsel.*

Neuer-Schaupl. d. Nat. IX. p. 552. *Wasseramsel.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 361. *Wassiramsel.*

Handb. der Naturgesch. II. p. 313. *die Wasseramsel.*

Handb. der deutsch. Thiergeesch. p. 124. *Wasserstaar.*

Klein, av. p. 68. n. 18. *Turtur aquaticus.*

Klein, Vorbereit. p. 129. n. 18. *Wasserdroßel.*

Q 2 Pennant,

(6) Gewicht, nach *Pennant*, $2\frac{1}{2}$ Unze. Dieser Vogel scheint, wie *Pallas* bemerk't, die Ordnung der Grallen mit den Passeribus zu verbinden, indem er seinem Schnabel und Füßen nach ohne allen Zweifel zu den letztern gehört, hingegen die Stellung seines Körpers und seine Oekonomie ihn zu den ersten hinbringen. *Pallas* hat auch am angef. O. die ausführlichste Beschreibung von ihm gegeben. Vid. *Zoolog. Ecyr.* I. B. p. 550.

- Pennant*, arct. Zool. II. p. 310. *B. der Wasserstaar.*
Gesner, Vögelb. p. 39. *Wasseramsel*; m. e. Fig.
Briffon, ornith. II. p. 275. n. 19. *Merle d'eau.*
Büffon, Vögel, VIII. p. 53. *der Wasserstaar.*
Latham, Syn. Suppl. p. 142. *Water Ouzel.*
Latham, Vögel, II. 1. p. 45. n. 50. *die Wasseramsel oder der Wasserstaar.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 343. n. 57. *Turdus (Cinclus) fusco-nigricans, genis, gutture, collo inferiore et pectore niveis, ventre supremo fusco-rufescente, imo rectricibusque nigricantibus.*
Beseke, Vögel Kurl. p. 72. n. 156. *der Wasserstaar.*
Siemßen, meklenb. Vögel, p. 87. n. 2. *die Bachsfrihe.*
Cetti, Sardin. II. p. 177. *die Bachamsel.*
Leem, Finnm. p. 138. *Elve-Kald.*
Pontoppidan, Dänem. p. 173. n. 2. *Strömstår; Bachvogel.*
Pallas, Reis. I. p. 96. *die Wasseramsel.*
Pallas, Reis. Ausz. I. p. 87. *die Wasseramsel.*
Pallas, nord. Beytr. IV. p. 70. *Sturnus Cinclus.*
Zorn, Petinotheol. II. p. 440. *die Wasser-Amsel.*
Linné, Abhandl. II. p. 301. n. 118. *die Wasseramsel.*
Döbel, Jägerprakt. I. p. 75. *Wasser-Amsel.*
Beckmann, Bibl. III. p. 171. *die Wasseramsel.*
Schrift. der berlin. Gesellsch. N. Fr. VII. p. 455. n. 24. *der schwarze Blauspecht.* *Sitta Melaina.*
Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 185. n. 223. *die Wasseramsel.*
Anweis. Vögel zu fang. p. 170. *die Wasseramsel.*
Meidinger, Vorles. I. p. 146. n. 2. *der Wasserstaar.*
Günther, Nest. u. Ey. tab. 67. *Wasseramsel.*

André

André u. Bechstein, Spazierg. I. p. 161.

Borkhausen, Magaz. I. p. 165. n. 36.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 168. n. 4. *Sturnus* (*Cinclus*) *niger*, pectore albo.

Müller, zool. dan. prodr. p. 29. n. 236. *Sturnus* (*Cinclus*) *niger*, pectore albo.

Kramer, Austr. p. 374. n. 3. *Motacilla* pectore albo, capite et collo piceis, corpore nigricante.

Wasser-Amsel; *Bach-Amsel*.

Charleton, onom. zoic. p. 108. n. 9. *Tringa*.

Charleton, onom. zoic. p. 108. n. 12. *Merula* aquatica.

Merrot, pinac. rer. natural. Britan. p. 183.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 302. *Merula aquatica*.
Bachamsel; *Seéamsel*.

Jonston, av. p. 107. *Merula aquatica*.

Zinnian, Uov. p. 109. tab. 19. fig. 97. *Merla ac-* quauola.

Levin, britt. Birds. II. tab. 63.

Dec. Russ. I. p. 307. 314.

Soc. nat. Lips. 1747. p. 444. tab. 8. fig. 3. *Turdus* musicus palustris dumetorum arundinaceus.

Aristot. hist. anim. L. 9. c. 9. n. 158. Κιγκλος?

Hermann, tab. affin. anim. p. 212. *Sturnus* *Cin-* clus.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 346. n. 2.
der *Wasserstaar*.

6. MILITARIS. Der weißstreifige Staar.

Büffon, Vögel, VIII. p. 46. der weißstreifige Staar;
m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 6. n. 4. der magellani-
sche Staar.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 313. n. 4. *Sturnus* (*Militaris*) *griseus*, pectore gulaque sanguineis.

7. MONTANUS. Der Bergstaar. (7)

Latham, Syst. ornith. I. p. 325. n. 1. *Sturnus (Mortitanus)* (*foll ohnstreitig montanus heißen,*) *cinerous*, *capitis parte inferiore et gula ex cinereo et albo variis, ventre cano rufescente maculato, rostri apice nigro.*

8. LOYCA. Der chilefische Staar.

Latham, Vögel, II. I. p. II. n. 14. *der rothbrüftige Staar.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 325. n. 12. *Sturnus (Loyca) fusco alboque maculatus, pectore coccineo.*

Donndorff, Handb. der Thiergeesch. p. 346. n. 3. *der chilefische Staar.*

9. MEXICANUS. Der mexicanische Staar.

Briffon, ornith. I. p. 254. n. 4. *Cotinga du Mexique.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 43. *der Caxcaxtototl.*

Latham, Vögel, II. I. p. II. n. 13. *der mexikanische Staar.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 326. n. 15. *Sturnus (Mexicanus) caeruleus nigro variegatus, iridibus luteis.*

10. OBSCURUS. Der Schilfstaar.

Briffon, ornithol. I. p. 283. n. 3. *Etourneau de la nouvelle Espanne.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 42. *der Schilfstaar oder Tolocatzanatl.*

Latham, Vögel, II. I. p. II. n. 12. *der braunköpfige Staar.*

Latham,

(7) Soll, nach Beckstein, nichts anders als *Motacilla alpina* (p. 957. n. 65.) seyn, und auch *Sturnus collaris* n. 16, dahin gehören. S. Naturgesch. Deutschl. III. p. 715. *

Latham, Syst. ornith. I. p. 326. n. 14. *Sturnus (Junceti) niger capite fusco.*

11. ZEYLANICUS. *Der zeylonisthe Staar.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 10. n. 11. *der zeylanische Staar.*

Ist nach **Latham**, mit *Turdus Ochrocephalus*, p. 821. n. 70. einerley.

12. FUSCUS. *Der olivenfarbige Staar.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 10. n. 10. *der braune Staar.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 325. n. 10. *Sturnus (Olivaceus) fusco-olivaceus, subtus flavescens, vitta oculari caerulea.*

13. VIRIDIS. *Der grüne Staar.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 10. n. 9. *der grüne Staar.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 325. n. 9. *Sturnus (Viridis) viridis supra caerulescens, macula sincipitis poneque oculos unica, scapulari duplice alba.*

14. SERICEUS. *Der Seidenstaar.*

Latham, Syn. Suppl. p. 137. *Silk Stare.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 9. n. 8. *der Seidenstaar.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 324. n. 8. *Sturnus (Sericeus) pallide griseus, capite flavescente-albo, basi remigum albo, remigibus rectricibusque nigris.*

15. CARUNCULATUS. *Der gelapppte Staar.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 8. n. 6. *der belapppte Staar.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 324. n. 6. *Sturnus (Carunculatus) niger, dorso tectricibusque alarum ferru-*

ferrugineis, ad basin mandibulae inferioris pala
lea duplice carunculata fulva.

16. COLLARIS. *Der Staar mit dem Halsbande.* (8)

Latham, Vögel, II. 1. p. 7. n. 5. *der Staar mit dem Halsbande.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 323. n. 5. *Sturnus (Collaris) fusco-nigricans, dorso maculato, uropygio albo vario, gula alba, fusco-maculata, remigibus caudaque apice fuscis.*

Scopoli, Beim. a. d. N. G. I. p. 156. n. 192. *der Staar mit dem Halsbande.*

17. DAURICUS. *Der daurische Staar.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 48. *der daurische Staar;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 12. n. 15. *der daurische Staar.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 325. n. 13. *Sturnus (!Dauricus) corpore supra ex atro violaceo, sub-
tus ex cinerascente albo, capite et cervice cae-
rulecente-canis, verticis litura violaceo-atra
(feminis fusca.)*

Douendorff, Handb. der Thiergesch. p. 346. n. 4. *der daurische Staar.*

*Veränderungen gegen die XII. Edition, und Ver-
mehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit zwölf Gattungen vermehrt.
Bey der ersten Gattung sind fünf Varietäten aus einander
gesetzt.

107 GE-

(8) Siehe vorhergehende Anmerk. Auch *Latham* hält ihn mit den *Macrilla* statt für einerley und zieht alle in seinem Syst. p. 957. angeführte Synonymen, selbst seinen eigenen *Alpine Warbler* höher.

107. GESCHLECHT. TURDUS. Der Krammetsvogel. (Drossel.)

Müller, Natursyst. II. p. 527. Gen. CVII.

Leske, Naturgesch. p. 256. Gen. XXXIX.

Borowsky, Thierreich, III. p. 162. Gen. LXVII.

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 180. Gen. XXIX.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 500. Gen. LXVI.

Funke, Naturgesch. I. p. 233.

Ebert, Naturl. II. p. 127.

Halle, Vögel, p. 277. Gen. V.

Neuer Schaupl. der Natur. II. p. 406.

Onomat. hist. nat. VII. p. 610.

Klein, av. p. 65. Gen. V.

Brisson, ornith. I. p. 213. Gen. XXII.

Biffon, Vögel, VIII. p. 202.

Pennant, arct. Zool. II. p. 310.

Batsch, Thiere, I. p. 3117. Gen. LXXIII.

Latham, Vögel, II. 1. p. 13. Gen. XXXI.

Latham, Syst. ornith. I. p. 326. Gen. XXXII.

Hermann, tab. affin. anim. p. 209.

Douendorff, Handb. der Thiergeesch. §p. 347. Gen. LXXIV.

I. VISCIVORUS. Der Ziemer. (9)

Müller, Natursystem, II. p. 528. n. 1. die Misteldrossel.

Leske, Naturgesch. p. 256. n. 1. die Misteldrossel, Schnarre.

Borowsky, Thierreich, III. p. 164. n. 2. Mistel-, Schnarrdrossel.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 180. n. 1. Turdus (Viscivorus) dorso fusco, collo maculis albis, rostro flavescente; Schnarre, Zierner, Mistler, Brachvogel; Zaritzer.

Q 5

Bechstein,

(9) Gewicht an 5. Unzen. Penn. Wird über 15. Jahr alt.

- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 500. n. 1. *die Misteldrossel*.
- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. III. p. 610. *die Misteldrossel*.
- Funke*, Naturgesch. I. p. 233. *die Misteldrossel*.
- Ebert*, Naturl. II. p. 128. *Misteldrossel*; *Ziemer*.
- Halle*, Vögel, p. 277. n. 233. *die große Drossel*.
- Meyer*, Thiere, II. p. 17. tab. 66. *der Mistler*.
- Gatterer*, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 384. n. 316. *die Schnarre*; *Zarer*; *Zerrer*; *Zeher*; *Zaritzer*; *Mistelfink*; *Mistelziemer*; *Schnerrer*; *Schneer*; *Ziering*.
- Pennant*, arct. Zool. II. p. 318. B. *die Misteldrossel*.
- Beckmann*, Naturhist. p. 52. a. *die Schnarrdrossel*.
- Neuer Schaupl. d. Nat. VII. p. 722. *Schnarre*.
- Onomat. hist. nat. VII. p. 637. *Misteldrossel*.
- Handb. der deutsch. Thiergeesch. p. 125. *Misteldrossel*.
- Klein*, av. p. 65. n. 1. *Turdus viscivorus maximus*.
- Klein*, Vorbereit. p. 122. n. 1. *Schnarrdrossel*, *Misteldrossel*; *Schnarre*.
- Klein*, verb. Vögelh. p. 65. n. 1. *Schnarre*, *Ziemer*.
- Klein*, Stemmat. av. p. 12. tab. 13. Fig. I. a—c.
- Gesner*, Vögelb. p. 430. *Mistler*, Fig. p. 431. gut.
- Briffon*, ornith. I. p. 213. n. 1. *Große Grive*.
- Büffon*, Vögel, VIII. p. 261. *die Misteldrossel*; m. e. Fig.
- Batsch*, Thiere, I. p. 338. *die Misteldrossel*.
- Latham*, Vögel, II. 1. p. 13. n. 1. *die Misteldrossel*.
- Latham*, Syst. ornith. I. p. 326. n. 1. *Turdus (Viscivorus) supra griseo-fuscus, subtus albo-flavicans, maculis nigricantibus varius, rectricibus tribus extimis albo-terminatis*.
- Beseke*, Vögel Kurl. p. 73. n. 157. *die Misteldrossel*.
Siemßen,

- Siemßen, meklenb. Vögel, p. 88. n. 1. die Mistel-drossel; Schnarr; Brakvogel.
- Bock, Naturgesch. von Preuß. IV. p. 410. die Mi-steldrossel.
- Cetti, Sardin. II. p. 152. die Misteldrossel.
- Fischer, Livil. p. 93. n. 133. die Misteldrossel.
- White, N. G. von Engl. p. 65. n. 1. p. 129. Mi-steldrossel.
- Pennant, britt. Thiergesch. p. 95. tab. 47. Fig. 1. der Mistler.
- Pontoppidan, Dännem. p. 173. n. 1. Simmersnä-re; doppelter Kramsvogel.
- Naturforsch. XVII. p. 80. n. 165. die Mistel-drossel.
- Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 158. n. 193. der Mist-ler, oder Schnärre.
- Zorn, Petinotheol. II. p. 304. der Mistler.
- Oekonom. Zool. p. 94. n. 35. der gemeine Kram-metsvogel oder Ziemer.
- Döbel, Jägerprakt. I. p. 54. Schnerre.
- Naumann, Vogelsteller, p. 84. Schnarre oder Schnarrziemer.
- Anweis. Vögel zu fang. p. 385. Mistler.
- Meidinger, Vorles. I. p. 147. n. 1. die Misteldrossel.
- Hamb. Magazin, XIX. p. 531. XXI. p. 269.
- Zückert, Speis. aus dem Thier. p. 96.
- Jablonsky, allgem. Lex. p. 683. Mistler.
- Beckmann, Bibl. VIII. p. 535. die Schnarre.
- Borkhausen, Magazin, I. p. 160. n. 29. Mistler.
- Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 168. n. 1. Turdus (Visci-vorus) dorso fusco, collo maculis albis, rostro flavescente.
- Müller, Zool. dan. prodr. p. 29. n. 237. Turdus (Viscivorus) dorso fusco, collo maculis albis, rostro flavescente.

Kramer, Austr. p. 361. n. 6. *Turdus pedibus fuscis, alis subtus albentibus*, *Zaritzer*; *Mistler*; *Zerrer*.

Charleton, onom. zoic. p. 83. n. 1. *Turdus viscivorus*.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 359. *Turdus maximus*, *Schnarre*, *Schnerre*, *Mistler*.

Rzaczychsky, auct. hist. nat. Pol. p. 423. *Turdus maximus*.

Sibbald, Scot. ill. p. 155. *Turdus viscivorus*.

Belon, hist. nat. des ois. p. 324. *Grive*, *Siferre*.

Fonston, av. p. 103. *Turdus viscivorus*.

Zinnan, Uov. p. 39. tab. 5. Fig. 21. *Tordo viscado*.

Heerkens, av. Fris. p. 193. *Turdus*. (cum reliq. specieb.)

Levin, britt. Birds, II. tab. 57.

Donndorff, Handb. d. Thiergeesch. p. 347. *der Ziener*.

Donndorff, Natur u. Kunst, III. p. 520. *der Ziener*.

a. PILARIS. *Der gemeine Krammetsvogel.* (10)

Müller, Natursyst. II. p. 528. n. 2. *die Wacholder-Drossel*.

Leske, Naturgesch. p. 256. n. 2. *der Ziener*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 165. n. 2. *der Krammetsvogel*.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 181. n. 2. *Turdus (Pilaris) rectricibus nigris, extimis margine interiore apice albicantibus, capite uropygioque cano*; *der Krammetsvogel*.

Rech-

(10) Gewicht 4 Unzen. *Penn*. Die deutschen Benennungen, dieser, der vorhergehenden, ingl. der *dritten* und *vierten* Gattung, werden häufig verwechselt.

- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 501. n. 2. *die Wacholderdrossel*.
- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. III. p. 611. *die Wacholderdrossel*.
- Funke*, Naturgesch. I. p. 234. *der eigentliche Krammetsvogel*.
- Ebert*, Naturl. II. p. 127. *Wacholderdrossel*.
- Halle*, Vögel, p. 279. n. 234. *Kramsvogel*.
- Meyer*, Thiere, II. p. 18. tab. 65. *Kramtvogel*.
- Gatterer*, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 385. n. 317. *der Kammetsvogel*; *Krambsvogel*; *Schomerling*; *Schacker*, etc.
- Pennant*, arct. Zool. II. p. 317. A. *der Ziemer*.
- Beckmann*, Naturhist. p. 52. b. *der Kramsvogel*.
- Neuer Schaupl. der Natur, IV. p. 725. *Krammetsvogel*.
- Onomat. hist. nat. VII. p. 630. *der Krammetsvogel*.
- Handb. der Naturgesch. p. 78. *der Krametvogel*.
- Handb. der deutsch. Thiergeesch. p. 124. *der Krammetsvogel*.
- Klein*, av. p. 65. n. 2. *Turdus simpliciter*; *Turdus mediocris pilaris*.
- Klein*, Vorbereit. p. 123. n. 2. *Großziemer*; *Blauziemer*; *Wacholderdrossel*.
- Klein*, verb. Vögelhist. p. 65. n. 2. *Krametvogel*.
- Klein*, Stemmat. av. p. 11. tab. 13. Fig. 4. a. b. c.
- Gesner*, Vögelb. p. 425. *Reckholderdvogel*, fig. p. 427. gut.
- Brisson*, ornith. I. p. 217. n. 5. *Litorne ou Tourdelle*.
- Büffon*, Vögel, VIII. p. 276. *der Ziemer oder Krammetsvogel*; m. e Fig.
- Batsch*, Thiere, I. p. 339. *der Ziemer*.

Latham,

Latham, Vögel, II. I. p. 21. n. II. die *Wacholder-drossel*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 330. n. I. *Turdus (Pilaris) fusco-rufescens*, subtus nigricante varius, rectricibus nigris, extimis margine interiore apice albicantibus, capite uropygioque cano.

Beske, Vögel Curl. p. 73. n. 158. die *Wacholder-drossel*.

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 89. n. 2. der *Schaker*.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 410. der *Krammetvogel*.

Fischer, Livil. p. 94. n. 134. *Krammetvogel*.

Cetti, Sardin. II. p. 153. der *Ziemer*.

Boswell, Beschr. von Corsic. p. 45. die *Drossel*.

White, N. G. von Engl. p. 61. n. 3. *Krammets-vogel*.

Taube, Slavon. I. p. 22. *Krammetsvögel*.

Lepechin, Tageb. d. russ. Reis. III. p. 13. *Drosseln*.

Pennant, Reis. d. Schottl. II. p. 17. *Wacholder-drosseln*.

Pontoppidan, Dännem. p. 173. n. 2. *Kramsvogel*.

Pontoppidan, Norweg. II. p. 131. *Krametsfugl*.

Georgi, Reis. d. Russl. p. 173.

Pennant, britisch. Thiergeesch. p. 96. tab. 48.

Fig. 2.

Borkhausen, Magazin, I. p. 160. n. 30.

Naturforsch. XVII. p. 81. n. 166. die *Wacholder-Drossel*.

Schwed. Abhandl. XXVIII. p. 299. *Ziemer*.

Zorn, Petinotheol. II. p. 308. *Wacholder-Drossel*.

Döbel, Jägerprakt. I. p. 53. *Krammets- oder Kran-nabet Vogel*.

Naumann, Vogelsteller, p. 85. *Ziemer*, oder *Krammetsvogel*.

Linné, Abhandl. II. p. 283. n. 39. *Krammetsvogel*.
Scopoli,

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 158. n. 194. *Krammetvogel*; *Zeumer*.

Anweis. Vögel zu fang. p. 349. *Kranwets. Vogel*.
Meidinger, Vorles. I. p. 147. n. 2. der Ziener.

Loniceri, Kräuterb. p. 677. *Krametvogel*; *Zymmer*.
Oekonom. Zool. p. 94. n. 3. die *Wacholderdroffel*.

Beckmann, Bibl. VIII. p. 535. der *Kramtsvogel*.

Jablonsky, allgem. Lex. p. 550. *Krammets-Vogel*.
Krünitz, ökon. Encykl. XLVI. p. 758. *Krammets-Vogel*.

André u. Bechstein, Spazierg. I. p. 56. *Krametsvogel*.

Schönfeld, Landwirthsch. p. 707.

Physik. oekonom. Zeit. 1785. II. p. 631.

Berlin. Intell. Blatt, 1784. n. 287. p. 2297.

Neues allgem. Harzmagaz. 1768. St. 5. p. 318.

Matthioli, epist. An *Turdi salubre praebeant alimento?* Epist. medic. I. p. 55.

Zückert, Speis. aus dem Thierr. p. 95.

Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 57. *Turdus simpl.*

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 29. n. 6. *Turdus pilaris*.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 168. n. 2. *Turdus (Pilaris) rectricibus nigris, extimis margine interiore apice albicantibus, capite uropygioque cano.*

Müller, zool. dan. prodr. p. 29. n. 238. *Turdus (Pilatis) rectricibus nigris, extimis margine interiore apice albicantibus, capite uropygioque cano.*

Kramer, Austr. p. 361. n. 7. *Turdus rectricibus nigris, extimis margine interiore apice albican-tibus, capite cano; Kranabetsvogel; Kranabeter.*

Charleton, onom. zoic. p. 83. n. 2. *Trichas.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 359. *Turdus medius*;
Groß-Ziemer; *Blaw.-Ziemer*, *Krammetvogel*.
Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 424. *Turdus pilaris*.

Sibbald, Scot. p. 211. *Turdus pilaris*.

Fonston, av. p. 103. *Trichas*.

Hermann, tab. affin. anim. p. 210. *Turdus pilaris*.

Hist. Prov. I. p. 492. *Grive*.

Voyage en Barbarie, p. 271. *Grive*.

Levin, britt. Birds, II. tab. 60.

Plin. hist. nat. L. 10. c. 25. c. 42. c. 53. L. 17. c. 9.
Turdi.

Varro, de re rust. L. 3. c. 2. c. 5. *Turdi*.

Columella, de re rust. L. 8. c. 10. *Turdi*.

Palladius, de re rust. L. 1. c. 26. *Turdi*.

Aelian. de nat. anim. L. 1. c. 35. *Κιχλας*.

Aristot. hist. anim. L. 6. c. 1. n. 12. *Κιχλας*.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 347. *der
 gemeine Krammetsvogel*.

Donndorff, Natur und Kunst, III. p. 523. *der ge-
 meine Krammetsvogel*.

β. *Der kleinere Krammetsvogel*.

γ. *Der bunte Krammetsvogel*.

Klein, av. p. 67. n. 10. *Turdus pilaris*, *maculis
 lunatis variegatus*.

Klein, Vorbereit. p. 127. n. 10. *die bunte Dros-
 sel mit mondformigen Flecken*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 68. ad n. 16.

Brisson, ornith. I. p. 218. *B. Litorne tachetée*.

Büffon, Vögel, VIII. p. 284. *der gefleckte Zirmer*.

Halle, Vögel, p. 291. n. 242. *der weißköpf-
 ge Krammetsvogel*.

Latham, Syn. II. I. p. 25. n. II. A. — *Latham*,
 Vögel, II. I. p. 22. n. n. II. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 330. n. II. β. T. ni-
 gro maculatus, capite collo subtusque albo, gu-
 la

la pectoreque rufis, dorso fusco, uropygio cinereo.

d. Der weißköpfige Krammetsvogel.

Briffon, ornith. I. p. 218. A. Litorne à tête blanche.

Büffon, Vögel, VIII. p. 284. der weißköpfige Ziener.

Latham, Syn. II. I. p. 25. n. II. B.

Latham, Vögel, II. I. p. 22. n. II. Var. B.

Latham, Syst. ornith. I. p. 330. n. II. γ. T. capite cerviceque albis corpore communi.

Naturforsch. I. p. 62. n. 4. ein Krammetsvogel mit ganz weißem Kopfe.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 360. *Turdus pilaris*, Λευκοκεφαλος.

e. Der Krammetsvogel mit weißem Kopf und Halse, etc.

Latham, Syn. II. I. p. 26. n. II. C.

Latham, Vögel, II. I. p. 22. n. II. Var. B.

Latham, Syst. ornith. I. p. 330. n. II. δ. T. capite colloque albis, corpore albo inaculis magnis nigricantibus.

14. AFRICANUS. Die geränderte Drossel.

Latham, Syn. Suppl. p. 143. Margined Thrush.

Latham, Vögel, II. I. p. 81. n. 123. die geränderte Drossel.

Latham, Syst. ornith. I. p. 362. n. 130. *Turdus (Africannus) nigricans*, pectore pennis nigris, rufo-marginatis, subtus rufo-flavus, pedibus cinereis.

29. TRIPOLITANUS. Die olivenfarbige barbarische Drossel.

Büffon, Vögel, IX. p. 175. die olivenfarbene Ansei aus der Barbarey.

Latham, Vögel, II. I. p. 21. n. 10. die Tripolische Drossel.

Latham, Syst. ornith. I. p. 329. n. 10. *Turdus (Tripolitanus) olivaceo-flavus*, subtus albidus, remigibus nigris, rectricibus nigricantibus, apice albis.

30. **BARBARICUS.** Die grüne barbarische Drossel.

Büffon, Vögel, VIII. p. 306. die kurzbeinichte Drossel aus der Barbarey.

Latham, Vögel, II. I. p. 20. n. 9. die Drossel aus der Barbarey.

Latham, Syst. ornith. I. p. 329. n. 9. *Turdus (Barbaricus) virescens*, pectore albo nigricante-maculato, uropygio caudaque apice luteis.

Shaw, Reis. p. 164. die grüne Drossel.

31. **AONALASCHKAE.** Der Krammetsvogel von Unalaska.

Pennant, archt. Zool. II. p. 315. n. 118. der Krammetsvogel von Unalaska.

Latham, Vögel, II. I. p. 20. n. 8. die Unalaschka-Drossel.

Latham, Syst. ornith. II. p. 329. n. 8. *Turdus (Aonalaschkae) fuscus*, obscure maculatus, pectore flavo, nigro maculato, uropygio cauda-que apice luteis.

32. **ILIACUS.** Die Weindrossel. (1)

Müller, Natursyst. II. p. 530. n. 3. die Zipdrossel.

Leske, Naturgesch. p. 257. n. 3. die Weindrossel; Zippe.

Borowsky, Thierreich, III. p. 166. n. 4. die Wein-drossel, Weissdrössel, Zipdrossel.

Blumen-

(1) Gewicht 2 1/4 Unze. *Penn.* Wird häufig mit *Turdus Musicus* verwechselt.

- Blumenbach*, Handb. d. N. G. p. 181. n. 3. *Turdus (Iliacus)* alis subtus ferrugineis, superciliis flavescenscentibus. *Rothdrossel*.
- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 502. n. 4. *die Rothdrossel*.
- Funke*, Naturgesch. I. p. 233. *die Weindrossel; Drossel*.
- Ebert*, Naturl. II. p. 128. *die Zipdrossel*.
- Halle*, Vögel, p. 282. n. 235. *die Weißdrossel; Pfeifdrossel*.
- Meyr*, Thiere, II. p. 18. tab. 67. *Rothdrossel*.
- Gatterer*, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 391 n. 318. *die Hunttdrossel; Winterdrossel; Heide-drossel; Walddrossel; Heideziemer, Rehente*.
- Pennant*, arct. Zool. II. p. 319. D. *der rothfittige Krammetsvogel*.
- Onomat. hist. nat.* VII. p. 617. *die Rothdrossel*.
- Handb. der deutsch. Thiergeesch.* p. 126. *Rothdrossel*.
- Klein*, av. p. 66. n. 3. *Turdus iliacus; Illas aut Tylas*.
- Klein*, Vorbereit. p. 124. n. 3. *Ziep-, Pfeifdrossel*.
- Klein*, verb Vögelhist. p. 65. n. 3. *Zipdrossel; Pfeifdrossel; Weißdrossel; Singdrossel*.
- Klein*, Stemmat. av. p. 11. tab. 14. Fig. 6. a – c.
- Klein*, Vögeleyer, p. 23. tab. 9. Fig. 1.
- Gesner*, Vögelb. p. 432. *Winsel; Wintze; Berg-trostel; Boemerlein; Beemerziemar; Weintro-stel; Rottrostel; Bitter; Gixerlein; Wein-gartvogel*; m. e. Fig.
- Brisson*, ornith. I. p. 216. n. 5. *Mauvis*.
- Büffon*, Vögel, VIII. p. 296. *die Rothdrossel*; m. e. Fig.
- Batsch*, Thiere, I. p. 339. *die Rothdrossel*.
- Latham*, Vögel, II. 1. p. 19. n. 7. *die Rothdrossel*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 329. n. 7. *Turdus (Iliacus)* griseo-fuscus, subtus albidus, maculis fuscis, alis subtus ferrugineis, superciliis albicantibus.

Beseke, Vögel Kurl. p. 74. n. 159. die *Zipdroffel*.

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 90. n. 3. die *Rothdroffel*; *Zippdroffel*.

Bock, N. G. von Preuß. IV. p. 411. die *Weindroffel*.

Fischer, Livil. p. 94. n. 135. *Pfeifdroffel*.

White, N. G. von Engl. p. 61. n. 2. p. 70. *Weißdroffel*.

Pennant, Reis. d. Schottl. II. p. 17. *Zipdroffeln*.

Pennant, britt. Thiergesch. p. 97. tab. 48. fig. 6. *Rothdroffel*.

Linné, Abhandlung. II. p. 283. n. 39. p. 301. n. 117. die *Zipdroffel*.

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 20. *Turdus Iliacus*.

Neue Schwed. Abhandl. IV. p. 48. *Turdus Iliacus*.

Zorn, Petinotheol. II. p. 313. *Rothdroschel*; *Weindroschel*.

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 160. n. 196. *Rothdroffel*; *Winterdroffel*.

Borkhausen, Magazin, I. p. 161. n. 31. *Weißdroffel*.

Naturforsch. XVII. p. 81. n. 167. die *Zipdroffel*.

Meidinger, Vorles. I. p. 147. n. 3. die *Weindroffel*.

Döbel, Jägerprakt. I. p. 54. *Zipp-Droffel*.

André u. Bechstein, Spazierg. II. p. 266. *Rothdroffel*.

Krünitz, Encycl. IX. p. 642. die *Weiß- oder Ziepdroffel*.

Naumann, Vogelsteller, p. 77. *Zippdroffel*.

Geoffroy, mater. med. VII. p. 741. *Weindrossel*;
Gesangdrossel.

Zückert, Speis. a. d. Thierreich, p. 96.

Anweis. Vögel zu fang. p. 163. *Rotdrossel*.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 29. n. 7. *Turdus viscivorus*.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 169. n. 4. *Turdus (Musicus) alis subtus ferrugineis, linea superciliarum albicante*.

Müller, zool. dan. prodr. p. 29. n. 239. *Turdus (Iliacus) alis subtus ferrugineis, superciliis albicantibus*.

Kramer, Austr. p. 361. n. 9. *Turdus alis subtus ferrugineis, linea supra oculos albicante*. *Rothdroschl*; *Walddrüscherl*; *Winterdroschl*.

Charleton, onom. zoic. p. 83. n. 3. *Illas*, non nullis *Tyllas*.

Schwenkfeld, av. Silef. p. 361. *Turdus minor*;
Kleinziemer, *Heide-Drossel*; *Bergdrossel*;
Winself; *Gixerle*.

Sibbald, Scot. p. 195. *Turdus Iliacus*.

Rzaczynsky, hist. nat. Pol. p. 296. *Turdus minor*.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Pol. p. 424. *Turdus Illas seu Tylas*.

Fonston, av. p. 103. *Illas*.

Hermann, tab. affin. anim. p. 210. *Turdus Iliacus*.

Levin, britt. Birds, II. tab. 59.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 348. n. 3.
die Weindrossel.

Donndorff, Natur u. Kunst, III. p. 529. *die Wein-drossel*.

β. Die bunte Weindrossel. *

Frisch, Vögel, tab. 28. Fig. 2.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 611.

32. MINOR. Die kleine Drossel.

Pennant, archt. Zool. II. p. 315. n. 117. der kleine Krammetsvogel.

Klein, av. p. 69. n. 23. *Turdus minimus*.

Klein, Vorbereit. p. 131. n. 23. die kleinste Drossel.

Klein, verb. Vögelhist. p. 69: n. 24. kleine carolinische Drossel.

Briffon, ornith. I. p. 217. n. 4. *Mauvis de la Caroline*.

Büffon, Vögel, VIII. p. 250. die kleine karolinische Drossel; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 18. n. 5. die kleine Drossel.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 328. n. 5. *Turdus (Minor) fusco-rufescens*, corpore subtus maculis nigricantibus vario, gula, abdomine crisoque albis.

Seligmann, Vögel, II. tab. 62. die kleinste Drossel.

33. JAMAICENSIS. Die jamaicaische Drossel.

Latham, Vögel, II. 1. p. 17. n. 4. die Jamaikaische Drossel.

Latham, Syst. ornith. I. p. 329. n. 4. *Turdus (Jamaicensis) fusco-cinerens*, subtus albus, gula iuguloque longitudinaliter fusco-striatis, pectore cinereo.

34. GUIANENSIS. Die guianische Drossel.

Büffon, Vögel, VIII. p. 248. die guianische Drossel; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 17. n. 3. Die Guianische Drossel.

Latham, Syst. ornith. I. p. 328. n. 3. *Turdus (Guianensis) viridi-fuscus*, subtus flavescente-albus, maculis longitudinalibus nigricantibus.

4. MUSICUS. Die Singdrossel. (2)

Müller, Natursyst. II. p. 530. n. 4. die Singdrossel.

Leske, Naturgesch. p. 257. n. 4. die Singdrossel.

Borowsky, Thierreich, III. p. 67. n. 5. die Singdrossel; Winddrossel.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 181. n. 4. Turdus (Musicus) remigibus basi interiore ferrugineis.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 501. n. 3. die Singdrossel; Zipdrossel.

Funke, Naturgesch. I. p. 233. die Singdrossel.

Ebert, Naturl. II. p. 128. Singdrossel; kleine Misteldrossel; Rothdrossel.

Halle, Vögel, p. 283. n. 236. die Gesangdrossel.

Meyer, Thiere, II. p. 18. tab. 66. Weißdrossel.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 390. n. 319. die Sangdrossel; Sommerdrossel.

Pennant, arct. Zool. II. p. 318. C. die Singdrossel.

Onomat. hist. nat. VII. p. 624. Weißdrossel; Singdrossel; Zippe.

Handb. der deutsch. Thiergeesch. p. 125. Zippe; Pfeifdrossel.

Klein, av. p. 66. n. 4. Turdus minimus, nostras.

Klein, Vorbereit. p. 124. n. 4. Sangdrossel; weinrothe Drossel.

Klein, verb. Vögelhist. p. 66. n. 4. Weindrossel; rothe Drossel; Sangdrossel.

Klein, Steinimat. av. p. II. tab. 14. Fig. 7. a—c. d.

Gesner, Vögelb. p. 433. Trostel; Droschel; Drossel; Durstel; Sangdruschel; Weißtrostel.

Brisson, ornith. I. p. 214. n. 2. petite Grive.

Büffon, Vögel, VIII. p. 227. die Weißdrossel; m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 338. Weißdrossel.

Latham, Syn. Suppl. p. 139. Mavis - Thrush; Songthrush.

- Latham*, Vögel, II. I. p. 15. n. 2. die Singdrossel.
Latham, Syst. ornith. I. p. 327. n. 2. *Turdus* (*Musicus*) supra griseo-fuscus, subtus albo-rufescens, maculis nigricantibus varius, remigibus basi interiore ferrugineis.
Beske, Vögel Kurl. p. 74. n. 160. die Singdrossel.
Siemßen, meklenb. Vögel, p. 91. n. 4. *Sangdros-*
sel; *Graagdrossel*; *Wiendrossel*.
Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 414. die Sing-
drossel.
Fischer, Livil. p. 94. n. 136. *Singdrossel*.
White, N. G. von Engl. p. 63. n. 2. p. 66. n. 2.
p. 70. *Singdrossel*.
Pallas, nord. Beytr. IV. p. 20. *Turdus musicus*.
Pontoppidan, Dännem. p. 173. n. 3. *Taletroft*.
Olaffen, Reis. d. Isl. I. p. 310. *Thröstir*; *Skogar-*
thröstur.
Borkhausen, Magazin, I. p. 162. n. 32. *Singdrossel*.
Günther, Nest. u. Ei. tab. 33. *Weißdrossel*.
Linne, Abhandl. II. p. 283. n. 39. *Weindrosseln*.
Naturforsch. XVII. p. 82. n. 168. die Singdrossel.
Neue Schwed. Abhandl. IV. p. 48. *Turdus musicus*.
Scopoli, Rem. a. d. N. G. I. p. 159. n. 195. *Weiß-*
drossel, oder *Zippe*.
Zorn, Petinetheol. II. p. 306. die eigentlich soge-
nannte *Droschel*; *Sang-*, oder *Weiß-* *Droschel*.
Döbel, Jägerprakt. I. p. 55. *Weindrossel*, *Pfeif-*
drossel.
Anweis. Vögel zu fang. p. 163. *Weißdrossel*.
Meidinger, Vorl. I. p. 147. n. 4 *Singdrossel*.
Krinitz, Eneykl. IX. p. 643. *Rothdrossel*; *Berg-*
drossel; *Winterdrossel*.
Antré u. Bechst in, Spazierg. II. p. 196.
Müller, zool. dan. prodr. p. 29. n. 240. *Turdus* (*Musicus*) remigibus basi inferiore ferrugi-
neis.

Kramer,

Kramer, Austr. p. 361. n. 8. *Turdus alis subtus ochreis. Weindroschl; Weißdroschl; Sommerdroschl.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 361. *Turdus musicus. Sangdrossel; Zierdrossel.*

Rzaczynsky, auch hist. nat. Polon. p. 424. *Turdus musicus.*

Belon, oif. p. 226. *petite grive.*

Jonston, av. p. 104. *Turdus simpliciter dictus.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 210. *Turdus iliacus.*

Schaefer, element. ornithol. tab. 68.

Zinnan, Uov. p. 37. tab. 5. fig. 20. *Tordello.*

Levin, britt. Birds. II. tab. 58.

Russel, Alepp. p. 65.

Donndorff, Handb. der Thiergeesch. p. 348. n. 4. *die Singdrossel.*

Donndorff, Natur und Kunst, III. p. 531. *die Singdrossel.*

β. Die weißköpfige Singdrossel.

Brisson, ornithol. I. p. 215. A. *petite grive à tête blanche.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 239. *Weißdrossel mit weißer Kopfplatte.*

Aldrovand, ornithol. II. p. 601.

Jonston, av. p. 103. *Turdus leucocephalus.*

γ. Die gehäubte Singdrossel.

Brisson, ornith. I. p. 215. B. *petite grive hupée.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 240. *die gehäubte Drossel des Schwenkfeld.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 362. *Turdus musicus cri-status. Kobeldrossel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 17. n. 6. *die Singdrossel mit dem Federbusch.*

d. Die weiße Singdrossel.

Büffon, Vögel, VIII. p. 239. die weiße Gesang-drossel.

Klein, verb. Vögelhist. p. 68. n. 17. weiße Drossel.

Frisch, Vögel, tab. 33. zweyerley weiße Dros-seln.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 615.

Naturforscher, I. p. 62. n. 5.

e. Die Singdrossel mit weißem Halsringe. *

Frisch, Vögel, tab. 27. fig. 2.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 611.

f. Die graue Singdrossel. *

Latham, Vögel, II. 1. p. 17. n. 5.

5. OLIVACEUS. Die olivenfarbige afrikanische Drossel.

Müller, Natursystem, II. p. 531. n. 5. Olivendros-sel.

Onomat. histor. natur. VII. p. 626. die olivenfar-bige Drossel.

Briffon, ornithol. I. p. 240. n. 43. Merle olive du Cap de bonne esperance.

Büffon, Vögel, IX. p. 133. die olivenfarbige cap-sche Amsel.

Latham, Vögel, II. 1. p. 60. n. 80. die oliven-farbige Drossel.

Latham, Syn. II. 1. p. 66. n. 80. Olive Trush.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 351. n. 88. Turdus (Olivaceus) fusco-olivaceus, subtus fulvus, remigibus rectricibusque lateralibus intus fuscis.

35. INDICUS. Die olivenfarbige indianische Dros-sel.

Briffon, ornith. I. p. 241. n. 45. Merle olive des Indes.

Büffon,

Büffon, Vögel, IX. p. 138. die olivenfarbige indische Amsel.

Latham, Vögel, II. I. p. 61. n. 81. die Indische Drossel.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 351. n. 89. *Turdus (Indicus) viridi-olivaceus*, remigibus intus fuscis, extus flavescentibus.

36. **CINEREUS.** Die aschgraue indianische Drossel.

Briffon, ornith. I. p. 237. n. 39. Merle cendrée des Indes.

Büffon, Vögel, IX. p. 139. die aschfarbige indische Amsel.

Latham, Vögel, II. I. p. 61. n. 82. die aschfarbige Drossel.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 352. n. 90. *Turdus (Cinerascens) cinereo-nigricans*, subtus dilutior, tectricibus alarum maioribus, remigibus, rectricibusque lateralibus nigris.

6. **MIGRATORIUS.** Die Wanderdrossel.

Müller, Natursyst. II. p. 531. n. 6. die Wanderdrossel.

Pennant, arct. Zool. II. p. 312. n. 112. der Krammetsvogel mit der rothen Brust.

Onomat. hist. nat. VII. p. 623. die Zug- oder Wanderdrossel.

Klein, av. p. 68. n. 17. *Turdus musicus Carolinensis*.

Klein, Vorbereit. p. 129. n. 17. Karolinische Sangdrossel.

Briffon, ornithol. I. p. 220. n. 9. Grive de Canada.

Büffon, Vögel, IX. p. 292. der canadische Ziener; III. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 23. n. 12. die Wanderdrossel.

Latham,

Latham, Syst. ornithol. I. p. 330. n. 12. *Turdus (Migratorius) griseus abdomine rufo, palpebris albis, rectrice extima interiore alba.*

Seligmann, Vögel, II. tab. 58. *die carolinische Strichdrossel.*

Kalm, Reis. n. d. nördl. Amer. p. 58.

Donndorff, Handb. d. Thiergefch. p. 349. n. 5. *die Wanderdrossel.*

7. TRICHAS. *Die gelbbrüstige Drossel.*

Müller, Natursyst. II. p. 531. n. 7. *die maryländische Drossel.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 371. n. 200. *der Sänger mit der gelben Brust.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 371. n. 201. *der Sänger mit orangegelben Schenkeln.*

Onomat. hist. nat. III. p. 901. *die marilandische Bachstelze mit gelber Kele.*

Klein, verbess. Vögelhistcr. p. 166. n. 1. *Gelbbrüschchen aus Maryland.*

Briffon, ornithol. I. p. 448. n. 58. *Figuier de Maryland.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 106. *der schwarzbaiklige Feigeneßer.*

Martini, Naturlex. V. p. 122. *marylandische Bachstelze.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 519. n. 36. *Sylvia (Trichas) olivacea, corpore subtus flavo, fascia oculari nigra.*

Seligmann, Vögel, VII. tab. 25. *das Gelbkehlchen aus Maryland.*

8. CANORUS. *Der bengalische Banjahbu. (3)*

Müller, Natursyst. II. p. 532. n. 8. *die bengalische Merle.*

Halle,

(3) Ist, nach *Latham*, mit *Lanius Faustus*, p. 311. n. 26. einerley.

Halle, Vögel, p. 500. n. 264. *die gelbfüßige braune bengalische Drossel.*

Neuer Schaupl. der Nat. II. p. 407. n. 23. *braungelbe Misteldrossel.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 614. *die Amsel oder Drossel von Bengala.*

Klein, av. p. 70. n. 30. *Turdus bengalensis.*

Klein, Vorbereitung. p. 132. n. 30. *braungelber Mistler.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 69. n. 30. *braungelber Mistler; Baniahbow.*

Brisson, ornithol. I. p. 230. n. 25. *Merle de Bengal.*

Büffon, Vögel, IX. p. 124. *der bengalische Banjahbu; m. e. Fig.*

Latham, Vögel, II. I. p. 32. n. 32. *die Schreydrossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 336. n. 34. *Turdus (Canorus) griseus, subtus ferrugineus, linea alba pone oculos, cauda rotundata.*

Seligmann, Vögel, VI. tab. 79. *die braune indische Drossel.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 169. n. 5. *Turdus (Canorus) griseus, subtus ferrugineus, linea alba ad latera capitis, cauda rotundata.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 211. *Turdus Canorus.*

9. RUFUS. *Die rostfarbige Drossel.*

Müller, Natursyst. II. p. 532. *der rothe Krammetsvogel.*

Halle, Vögel, p. 296. n. 253. *die fuchsfarbene große Gesangdrossel.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 634. *die rothe Drossel.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 312. n. 111. *der rostfarbige Krammetsvogel.*

Klein,

Klein, av. p. 69. n. 19. *Turdus rufus*.

Klein, Vorbereit. p. 130. n. 19. *rostige Drossel*.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 68. n. 20. *rostige Drossel*.

Brisson, ornithol. I. p. 220. n. 8. *Grive de la Caroline*.

Büffon, Vögel, VIII. p. 334. *die Spottdroßel der Franzosen*.

Batsch, Thiere, I. p. 340. *die französische Spott-droßel*.

Latham, Vögel, II. I. p. 36. n. 4. *die roßfarbige Drossel*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 338. n. 4. *Turdus (Rufus) ferrugineus, subtus dilutior maculatus, remigibus unicoloribus, cauda rotundata, rectricibus rufis*.

Seligmann, Vögel, II. tab. 56. *die fuchsfärbige Drossel*.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 169. n. 6. *Turdus (Rufus) ferrugineus, subtus dilutior maculatus, remigibus unicoloribus, cauda rotundata*.

10. POLYGLOTTUS. Die amerikanische Nach-tigall.

Müller, Natursyst. II. p. 532. n. 10. *der Melodist*.

Leske, Naturgesch. p. 257. n. 5. *der vielstimmige Krammetsvogel*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 168. n. 6. *die Spott-droßel*.

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 181. n. 5. *Turdus (Polyglottus) fusco-cinereus, subtus albidus, maculis verticis, alarum et caudae candidis; die americanische Nachtigall; Sinfonte*.

Halle, Vögel, p. 297. n. 255. *die graue lang-schwänzige Spottdroßel; Vielzungige Drossel; Vierhundertzunge*.

Gatterer,

- Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 393. n. 320. *Spottdroßel; Spötter.*
- Pennant, arct. Zool. II. p. 310. n. 110. *der Spötter; Centcontlatolli.*
- Onomat. hist. nat. VII. p. 632. *die größere Spott-droßel.*
- Klein, av. p. 69. n. 21. *Turdus minor cinereo-albus, immaculatus.*
- Klein, Vorbereit. p. 130. n. 21. *graue langschwän-zige Droßel.*
- Klein, verb. Vögelhist. p. 68. n. 22. *graue lang-ge schwänzte Droßel.*
- Briffon, ornithol. I. p. 232. n. 29. *grand Mo-queur.*
- Büffon, Vögel, VIII. p. 322. *die große Spott-droßel des Briffon*, p. 327. *die Spottdroßel; m. e. Fig.*
- Büffon, Vögel, VIII. p. 334. *der Spötter des Ca-tesby.*
- Batsch, Thiere, I. p. 340. *die eigentliche Spott-droßel.*
- Latham, Vögel, II. 1. p. 36. n. 42. *die Spott-droßel, oder der Spottvögel.*
- Latham, Syst. ornithol. I. p. 339. n. 45. *Turdus (Polyglottus) obscure cinereus, subtus pallido-cinereus, remigibus primoribus exteriore diami-dio albis.*
- Seligmann, Vögel, II. tab. 54. *graue langschwän-zige Droßel.*
- Kalm, Reis. n. d. nördl. Amer. p. 361.
- Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 169. n. 7. *Turdus (Polyglottus) obscure cinereus, subtus pallide cinereus, macula alarum albida.*
- Charleton, onom. zoic. p. 68. n. 3. *Mimus, sive Picus garrulus Indicus.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 242. *Turdus Polylglottus*.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 349. n. 6.
die amerikanische *Nachtigall*.

II. ORPHEUS. Der Spottvogel.

Müller, Natursyst. II. p. 533. n. 11. der *Sänger*.
Onomat. hist. nat. VII. p. 628. die *kleine Spottdroßel*.

Klein, av. p. 80. n. 27. *Sylvia inferne ex albo cinerea, superne ex terreo colore cinerascens, genis albis; alis fusco et albo variis, rostro pedibusque nigricantibus*.

Klein, Vorbereit. p. 151. n. 27. *bunter Wenzel*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 81. n. 30. *Weißschmuzziger Wenzel mit weißen Backen*.

Brisson, ornith. I. p. 231. n. 27. *Moqueur*.

Büffon, Vögel, VIII. p. 320. *Brissons Spottvogel*, p. 321. *Cencontlatolli*.

Büffon, Vögel, VIII. p. 336. *der Spötter des Edwards*.

Lathami, Vögel, II. 1. p. 37. n. 43. *der Orpheus*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 339. n. 47. *Turdus (Orpheus) dorso fusco, pectore rectricibusque lateribus albidis, superciliis albis*.

Seligmann, Vögel, IV. tab. 51. *der kleinere Spötter*.

Linneé, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 169. n. 8. *Turdus (Orpheus) dorso fusco, pectore rectricibusque lateralibus albidis, alis fascia alba*.

Charleton, onomast. zoic. p. 114. n. 17. *Polyglotta*.

Fonston, av. p. 177. *Polyglotta*.

β. *Der hunte Spottvogel.* (+)

Briffon, ornith. I. p. 232. n. 28. *Moqueur varié*.

Büffon,

(4) Nach *Briffon* eine eigne Gattung.

Büffon, Vögel, VIII. p. 321. *der Tzonpan*. p. 318.
die bunte *Spottedroßel*.

Latham, Syn. II. I. p. 41. — *Latham*, Vögel,
II. I. p. 38. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 340. n. 47. β . *T. griseo-fuscus*, nigro et candardi varius, subtus
albus, cinereo et nigro maculatus.

Nieremberg, hist. nat. L. 10. e. 77. *Tzonpan*.

v. Der Thenca. (5)

Latham, Syst. ornithol. I. p. 339. n. 46. *Turdus*
(*Thenca*) *fusco-cinereus*, subtus pallido-cine-
reus, remigibus rectricibusque apice albis.

Vidaure, Chil. p. 74. *der Thenca*.

**37. SANDWICHENSIS. Die Drossel von den Sand-
wichinseln.**

Latham, Vögel, II. I. p. 35. n. 40. die *Sandwi-
chische Drossel*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 338. n. 42. *Turdus*
(*Sandvicensis*) *pallide fuscus*, subtus cum sinci-
pite *cinereo-albus*, abdomine *fuscescente*.

**38. PACIFICUS. Die Drossel von den Freundschafts-
inseln.**

Latham, Vögel, II. I. p. 35. n. 39. die *Drossel*
vom *stillen Meere*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 338. n. 41. *Turdus*
(*Pacificus*) *cinereus*, corpore subtus genisque
fuscescente-albis, loris *obscuris*, cauda *nigra*
apice *alba*.

39. SURATENSIS. Die Drossel von Surate.

Latham, Vögel, II. I. p. 35. n. 38. die *Suratische*
Drossel.

Latham,

(5) Ich weiß nicht, warum *Latham* den Vogel als eine eigne
Gattung aufstellt, da *Molina* ihn selbst nur für eine Spielart
ausgibt.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 338. n. 40. *Turdus* (*Suratensis*) capite cristato colloque nigris, sub-tus griseus, dorso uropygioque flavescentibus, alis viridibus nitentibus, remigibus primoribus caudaque nigris.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 151. die *Amsel von Surate*.

40. PHILIPPENSIS. Die philippinische Drossel.

Büffon, Vögel, VIII. p. 311. die kleine philippini-sche Drossel.

Latham, Vögel, II. 1. p. 35. n. 37. die Philippi-nische Drossel.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 338. n. 39. *Turdus* (*Philippensis*) olivaceo-fuscus, collo pectore-que rufis, albo-maculatis, abdomine flavescenti-albo.

41. SHANHU. Der Schonhu.

Latham, Vögel, II. 1. p. 34. n. 36. die *Shonhu-Drossel*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 337. n. 38. *Turdus* (*Shanhu*) viridi-fuscus, capite, collo inferiore, pectore abdomineque griseis, orbitis, gula iuguloque nigris, macula aurium alba.

42. NOVÆ HOLLANDIAE. Die neuholländische Drossel.

Latham, Vögel, II. 1. p. 34. n. 35. die *Neuhollän-dische Drossel*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 337. n. 36. *Turdus* (*Novae Hollandiae*) caerulecente-plumbeus, facie, gula iuguloque nigris, remigibus nigri-cantibus, rectricibus lateralibus apice albis.

12. PLUMBEUS. Der Thili.

Müller, Natursyst. II. p. 533. n. 12. die *bleysfarbige Drossel*.

Halle,

Halle, Vögel, p. 298. n. 256. die schwarzblaue geschlankte Drossel; mit hellrothen Schenkeln.

Onomat. histor. natur. VII. p. 631. die bleyfärbige Drossel.

Pennant, archt. Zool. II. p. 314 n. 116 der Tilly.

Klein, av. p. 69. n. 22. Turdus viscivorus plumbeus.

Klein, Vorbereit. p. 130. n. 22. die bleyfarbige Drossel mit rothen Beinen.

Klein, verb. Vögelhist. p. 68. n. 23. Hochschwanz mit rothen Füßen.

Brisson, ornithol. I. p. 238. n. 40. Merle cendré d'Amerique.

Büffon, Vögel, VIII. p. 308. der Tilly, oder die aschgraue amerikanische Drossel; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 31. n. 29. die rothbrunige Drossel.

Latham, Syst. ornith. I. p. 334. n. 29. Turdus (Plumbeus) ater, axillis luteis, cauda cuneata. (Mas).

Seligmann, Vögel, II. tab. 60. die Drossel mit rothen Füßen.

Vidaure, Chil. p. 76. der Thile. oder Chile.

Linne, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 169. n. 9. Turdus (Plumbeus) caerulescens, gula atra.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 350. n. 7 der Thili.

β. Latham, Syst. ornithol. I. p. 334. n. 29. β. T. caerulescens, gula atro-punctata, cauda cuneata, rectricibus quatuor exterioribus apice albis. (Femina).

43. GRASSIROSTRIS. Die dickschnäbige Drossel.

Latham, Vögel, II. I. p. 31. n. 30. die dickschnäbige Drossel.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 335. n. 30. *Turdus* (*Crassirostris*) *rufo-fuscus*, *subtus cinereus*, *pennis longitudinaliter medio striatis, rectricibus lateralibus obscure rufis*.

44. **ULIETENSIS.** *Die Drossel von Ulieta.*

Latham, Vögel, II. I. p. 32. n. 31. *die rothbraune Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 335. n. 31. *Turdus* (*Ulietensis*) *rufo-fuscus*, *alis, cauda rotundata pedibusque nigricantibus, rostro incarnato.*

45. **PALLIDUS.** *Die graugelbe Drossel.*

Latham, Vögel, II. I. p. 28. n. 27. *die blaße Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 334. n. 27. *Turdus* (*Pallidus*) *corpore slavecente-cinereo, subtus albido, collo lutescente, rectricibus fusco-cinereis, extimis apice albis.*

46. **SIBIRICUS.** *Die sibirische Drossel.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 342. *die Sibirische Drossel.*

Latham, Vögel, II. I. p. 28. n. 26. *die Sibirische Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 333. n. 26. *Turdus* (*Sibiricus*) *niger supereiliis, alis subtus crissoque albis.*

Pallas, Reis. Ausz. III. Anh. p. 5. n. 10. *Turdus sibiricus.*

47. **RUFICOLLIS.** *Die rothhälfige Drossel.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 341. *die rothhälfige Drossel.*

Latham, Vögel, II. I. p. 28. n. 25. *die rothhälfige Drossel.*

Latham,

Latham, Syst. ornith. I. p. 333. n. 25. *Turdus* (*Ruficollis*) corpore supra fusco, subtus albo, collo rectricibus lateralibus rufis.

Pallas, Reis. Ausz. III. Anh. p. 5. n. 9. *Turdus ruficollis*.

48. **OBSCURUS.** *Die dunkelbraune Drossel.*

Latham, Vögel, II. I. p. 27. n. 24. *die dunkle Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 333. n. 24. *Turdus (Obscurus)* corpore fusco, pectore nigricante, superciliis, gula crisoque albis.

49. **PHOENICURUS.** *Die rothschwänzige Drossel.*

Latham, Vögel, II. I. p. 27. n. 23. *die rothschwänzige Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 333. n. 23. *Turdus (Phoenicurus) viridi-olivaceus*, fascia per oculos nigra, superciliis albis, collo inferiore, pectore rectricibusque lateralibus rufis.

50. **RUFICAUDUS.** *Die gelbrothschwänzige Drossel.*

Latham, Vögel, II. I. p. 27. n. 42. *die gelbrothschwänzige Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 333. n. 22. *Tetrao (Ruficaudus) olivaceo-fuscus*, subtus purpureo albus, rectricibus lateralibus a basi ad medium rufis.

51. **MALABARICUS.** *Die malabarische Drossel. (6)*

Latham, Syn. Suppl. p. 140. *Malabar Thrush.*

Latham, Vögel, II. I. p. 26. n. 21. *die Malabarische Drossel.*

(6) *Latham* hält ihn für das Weibchen von der folgenden Gattung. Die Trivialbenennung *Malabaricus* kommt im System p. 837. n. 125. nochmals vor.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 333. n. 21. *Turdus* (*Malabaricus*) *cinereo-fuscus*, *subtus rufofuscus*, *capite colloque albo lineatis*.

Somnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 152. *der greise Eisvogel von der Küste Malabar.*

52. **PAGODARUM.** *Die Bramanendrossel.*

Latham, Syn. Suppl. p. 140. *Pagoda Thrush.*

Latham, Vögel, II. I. p. 26. n. 20. *die Pagoden-Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 332. n. 20. *Turdus* (*Pagodarum*) *cristatus griseus*, *capite, corpore subtus, reinigibus caudaque nigris, abdomine albo lineato, crissio albo.*

Somnerat, Reis. nach Ostind. und Chin. II. p. 148. *der Bramanen-Eisvogel.*

53. **CAYENNENSIS.** *Die aschgraue cayennische Drossel.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 291. *der cayennische Zitmer.*

Latham, Vögel, II. I. p. 25. n. 19. *die Cayennische Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 332. n. 19. *Turdus* (*Cayanus*) *cinereus*, *subtus albus; pennis medio nigricantibus, gula nigricante, alis nigris tectricibus maioribus ferrugineo-marginatis.*

Hermann, tab. affin. animi. p. 210. *Turdus cayennensis.*

54. **VARIEGATUS.** *Die schwarz und weißbunte Drossel.*

Latham, Vögel, II. I. p. 25. n. 18. *die bunte Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 332. n. 18. *Turdus* (*Variegatus*) *albescente nigroque variegatus, corpore supra fusco, subtus albescente.*

Fermín.

Fermin, Surin. II. p. 169. *die zweote Art von Drosselfeln.*

55. STRIATUS. *Die gelbrückige Drossel.*

Latham, Vögel, II. I. p. 25. n. 17. *die gelbrückige Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 332. n. 17. *Turdus (Striatus) flavo griseoque variegatus, stria dorsi longitudinali flava.*

Fermin, Surin. II. p. 168. *die erste Art von Drosselfeln.*

56. FUSCUS. *Die braune Drossel.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 314. n. 15. *der braune Krammetsvogel.*

Latham, Vögel, II. I. p. 25. n. 16. *die braune Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 332. n. 16. *Turdus (Fuscus) olivaceo-fuscus, pectore abdomineque albescentibus, maculis nigris fuscis.*

57. MUSTELINUS. *Die lohgelbe Drossel.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 314. n. 114. *der hellbraune Krammetsvogel.*

Latham, Vögel, II. I. p. 24. n. 15. *die lohgelbe Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 331. n. 15. *Turdus (Mustelinus) rufo-fuscus, subtus albus maculis nigris, genis albo maculatis, uropygio, remigibus caudaque fuscis.*

58. CAMTSCHATKENSIS. *Die kamtschatkische Drossel.* (?)

Pennant, arct. Zool. II. p. 319. E. *der Kamtschatkische Krammetsvogel.*

(7) Ist, nach *Latham*, mit *Motacilla Calliope* p. 977. n. 129. einigerley.

Latham, Vögel, II. I. p. 24. n. 14. die Kamtschatkische Drossel.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 331. n. 14. *Turdus (Calliope) fusco ferrugineus*, subtus flavescente albus, gula cinnabrina, albo nigroque marginata, loris nigris, superciliis albis.

59. NAEVIUS. Die gefleckte Drossel.

Pennant, arct. Zool. II. p. 314. n. 113. der bunte Krammetsvogel.

Latham, Vögel, II. I. p. 23. die gefleckte Drossel.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 331. n. 13. *Turdus (Naevius) obscure cinereus*, pileo nigricante, fascia pone oculos corporeque subtus ferrugineis, tectricibus alarum remigibusque ferrugineo maculatis, pectore fascia nigra.

60. HUDSONIUS. Die hudsonische Drossel.

Pennant, arct. Zool. II. p. 316. n. 120. der Krammetsvogel von der Hudsonsbay.

Latham, Syn. Suppl. p. 143. Hudsonian Thrush.

Latham, Vögel, II. I. p. 81. n. 124. die Hudsonische Drossel.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 362. n. 131. *Turdus (Hudsonius) caeruleo-cinereus*, vertice, nucha, tectricibus alarum uropygioque pallide-casta-neo marginatis, cauda cinerea rotundata.

61. NOVEBORACENSIS. Die neuyorkische Drossel.

Pennant, arct. Zool. II. p. 316. n. 121. der Krammetsvogel von Neuyork.

Latham, Syn. Suppl. p. 144. New-York Thrush.

Latham, Vögel, II. I. p. 81. n. 125. die Neu-yorkische Drossel.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 362. n. 132. *Turdus (Noveboracensis) nigro subferrugineoque nebulosus*, subtus nigricans, remigibus caudaque nigris

nigris viridi-nitentibus, supra et infra oculos
vitta nigra.

62. CURAEUS. Der Cureu.

Molina, Chil. p. 223. der Cureu.

Latham, Vögel, II. 1. p. 83. n. 131. die Chilefische Drossel.

Latham, Syst. ornith. I. p. 342. n. 53. Turdus (Curaeus) ater nitens, rostro substriato, cauda cuneiformi.

Vidaure, Beschr. von Chile, p. 75. der Kereu.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 350. n. 8. der Cureu.

13. NITENS. Die grüne angolische Drossel.

Müller, Natursyst. II. p. 534. n. 13. die grüne Drossel.

Onomat. hist. nat. VII. p. 622. die grüne Amsel aus Angola.

Brisson, ornith. I. p. 244. n. 53. Merle vert d'Angola.

Latham, Vögel, II. 1. p. 53. n. 60. die Glanz-drossel.

Latham, Syst. ornith. I. p. 346. n. 66. Turdus (Nitens) viridis, macula tectorum alarum violacea nitida.

3. Buffon, Vögel, IX. p. 114. die angolische grüne Amsel; m. e. Fig.

Latham, Syn. II. 1. p. 56. A. — Suppl. p. 143. — Vögel, p. 53. n. 60. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 347. n. 66. β. T. olivaceo-nitens, caeruleo violaceoque splendens, alis maculis nigricantibus.

Edw. tab. 300. Blue and green Daw?

63. AENEUS. Die Schillerdrossel.

Brisson, ornith. I. p. 245. n. 54. Merle verd à longue queue du Senegal.

Büffon, Vögel, IX. p. 109. die goldgrüne senegalische Amsel.

Latham, Vögel, II. I. p. 53. n. 61. die Schillerdrossel.

Latham, Syst. ornith. I. p. 347. n. 67. Turdus (Aeneus) viridis nitens, capite nigro aureo, abdomine cupreo, uropygio rectricibusque duabus intermediis purpureo splendentibus, cauda longissima cuneiformi.

64. AURATUS. Die Golddrossel.

Büffon, Vögel, IX. p. 116. die violette guianische Amsel; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 54. n. 62. die Gold-drossel.

Latham, Syst. ornith. I. p. 347. n. 68. Turdus (Auratus) viridis auratus, capite, collo corporeque subtus violaceis; cauda fasciaque alarum caeruleis.

65. LEUCOGASTER. Die weißbäuchige Drossel.

Büffon, Vögel, IX. p. 169. die violette weißbäuchige afrikanische Amsel.

Latham, Vögel, II. I. p. 54. n. 64. die weißbäuchige Drossel.

Latham, Syst. ornith. I. p. 348. n. 71. Turdus (Leucogaster) violaceus, abdomine albo, remigibus nigricantibus.

65. ROSEUS. Die rosenfarbige Drossel, (*)

Müller, Naturfyst. II. p. 534. n. 15. die rosenfärbi-ge Drossel.

Borovus-

(*) Kommt in grosser Zahl in die Gegend von Aleppo im Julius und August, wo sie die Schwärme von Heuschrecken verfolgt, und

Borowsky, Thierreich, III. p. 163. n. 1. die Acker-drossel.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 504. n. 9. die rosen-farbige Drossel.

Halle, Vögel, p. 301. n. 267. die rosenfarbige Ackerdrossel, mit liegendem Federbusche; See-staar.

Pennant, arct. Zool. II. p. 320. G der rosen-rothe Krammetsvogel (*Heuschreckenvogel*.)

Onomat. hist. nat. VII. p. 633. die rosenfarbige Drossel.

Klein, av. p. 71. n. 37. *Turdus roseus*, capite ex nigro caeruleo, et cirro retro compto, alis et cauda nigris; rostro ultra dimidium lutescente.

Klein, Vorbereit. p. 134. n. 37. rosenfarbige Drossel.

Klein, verb. Vögelhist. p. 70. n. 35. haarzopf-ge Drossel.

Briffon, ornith. I. p. 228. n. 20. Merle couleur de rose.

Büffon, Vögel, IX. p. 55. die rosenfarbige An-sel; m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 341. die rosenfarbige Ansel.

Latham, Syn. Suppl. p. 142. Rose-coloured Thrush.

Latham, Vögel, II. I. p. 46. n. 52. die rosenfarbi-ge Drossel.

Latham, Syst. ornith. I. p. 344. n. 59. *Turdus* (*Roseus*) subincarnatus, capite, alis caudaque nigris, occipite cristato.

Seligmann, Vögel, I. tab. 39. die rosenrothe oder fleischfarbene Ansel des Aldrovandi.

Bock, Naturgesch. von Preuss. IV. p. 415. die ro-senfarbige Bruch-Weidendrossel.

Lepe-

und vertilgt, daher dieser Vogel von den Türken für heilig gehalten wird. In England ist er nur selten.

- Lepechin*, Tageb. d. russ. Reis. I. p. 267. die rosenfarbenen Drosseln.
- Pallas*, nord. Beytr. IV. p. 23. die rosenfarbene Drossel.
- Linné*, Abhandl. II. p. 301. n. 116. die rosenfarbene Drossel.
- Gmelin*, Reis. d. Russl. I. p. 153.
- Wirsing*, Vög. tab. 1. turdus asiaticus.
- Scopoli*, Bem. a. d. N. G. I. p. 156. n. 191. die rosenfarbne Drossel.
- Martini*, Naturlex. I. p. 219. tab. 14. Ackerdroßel.
- Linné*, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 170. n. 1. Turdus (Rous) subincarnatus, capite, alis caudaque nigris, occipite cristato.
- Charleton*, onom. zoic. p. 84. n. 5. Merula rosea.
- Fonston*, av. p. 107. Merula rosea.
- Brückmann*, epist. itin. p. 161. avis incognita.
- Forskål*, fn. orient. p. VI. n. 16. Turdus Seleucis; Grylli-vora. Arab. *Sararmar*.
- Forskål*, descript. anim. p. 5. n. 16. Turdus (Seleucis) rostro pedibusque flavicantibus; abdome dorsoque incarnatis, cauda, alis femoribusque fuscis.
- Russel*, Alepp. p. 70. Locust bird. (Heuschreckenvogel.)
- Levin*, britt. bird. II. tab. 64.
- Hermann*, tab. affin. anim. p. 210. Turdus roseus.

66. LEUCURUS. Die weißschwänzige Drossel.

- Latham*, Syn. Suppl. p. 142. White-tailed Thrush.
- Latham*, Vög. II. 1. p. 46. n. 51. die weißschwänzige Drossel.
- Latham*, Syst. ornith. I. p. 344. n. 58. Turdus (Leucurus) niger, uropygio, femoribus caudaque à basi fere ad apicem albis.

Faun. arragon. p. 72. *Corvus totus niger, rectricibus basi albis?*

16. **CAFER.** *Die caffersche Drossel.*

Müller, Natursyst. II. p. 534. n. 16. *die cafrische Drossel.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 613. *die gehaubte Amsel vom Vorgeb. d. g. H.*

Brisson, ornithol. I. p. 229. n. 23. *Merle hupé du Cap de bonne esperance.*

Büffon, Vögel, IX. p. 151. *die gehaubte Amsel;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 65. n. 92. *die Capsche Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 354. n. 99. *Turdus (Cafer) nigricans subcristatus, capite nigro-violaceo, uropygio ventreque albis, crisco rubro.*

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 154. *die schwarzköpfige Grasmücke aus China.*

β. Latham, Syn. II. 1. p. 72. n. 92. Var. A. — Vögel, II. 1. p. 66. n. 92. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 354. n. 16. β. T. fusco-cinereus, fusco lineatus, subtus cinereo-albus, capite nigro, crisco coccineo rectricibus tribus lateralibus apice albis.

67. **MACROURUS.** *Die langschwänzige Drossel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 66. n. 93. *die langschwänzige Drossel.* Tab. 40.

Latham, Syst. ornith. I. p. 354. n. 100. *Turdus (Macrourus) nigro-caerulescens, ventre rufo, uropygio rectricibusque tribus extimis albis.*

β. Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 153. *die langgeschwänzte Grasmücke aus Gingi.* — Latham, Vögel, II. 1. p. 66. ad n. 93.

68. AMBOINENSIS. *Die amboinische Drossel.*

Briffon, ornith. I. p. 226. n. 16. Merle d'Amboine.

Büffon, Vögel, IX. p. 153. die amboinische Amsel.

Latham, Vögel, II. I. p. 66. n. 94. die Amboinische Drossel.

Latham, Syst. ornith. I. p. 354. n. 101. *Turdus (Amboinensis) fusco-rubescens*, corpore subtus remigibusque minoribus prima medietate flavescentibus, rectricibus subtus auratis.

69. BORBONICUS. *Die bourbonische Drossel.*

Briffon, ornith. I. p. 239. n. 42. Merle de l'Isle de Bourbon.

Büffon, Vögel, IX. p. 154. die Amsel von Bourbon.

Latham, Vögel, II. I. p. 67. n. 95. die Bourbonische Drossel.

Latham, Syst. ornith. I. p. 355. n. 102. *Turdus (Borbonicus) cinereo-olivaceus*, subtus flavicollis, vertice nigro, rectricibus fuscis, fasciis duabus saturationibus.

70. OCHROCEPHALUS. *Die gelbköpfige Drossel. (8)*

Latham, Syn. Suppl. p. 143. Yellow-crowned Thrush.

Latham, Vögel, II. I. p. 67. n. 96 die gelbköpfige Drossel. (*Tsut-ju-Craven*, in Java)

Latham, Syst. ornith. I. p. 355. n. 103. *Turdus (Ochrocephalus) pileo genisque flavis*, corpore subtus cinereo, remigibus rectricibusque obscure viridibus, sub genis striga alba.

71. ORIENTALIS. *Die schwarze indianische Drossel.*

Briffon, ornith. I. p. 227. n. 19. Merle des Indes.

Büffon,

(8) Ist, nach *Latham*, mit *Sturnus Ceylanicus*, p. 804. n. 11, einanderley.

Büffon, Vögel, IX. p. 160. der Terat-Balon,
oder die indische Drossel.

Latham, Vögel, II. 1. p. 67. n. 97. die Drossel mit
dem aschgrauen Steife.

Latham, Syst. ornith. I. p. 355. n. 104. Turdus
(Orientalis) niger, subtus albus, uropygio ci-
nereo, fascia per oculos nigra, rectricibus ni-
gris, tribus extimis apice albis.

72. NIGERRIMUS. Die Savigala.

Briffon, ornith. I. p. 217. n. 18. Merle doré de Ma-
dagascar.

Büffon, Vögel, IX. p. 162. die madagascarische
Goldamsel, oder Savigala; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 68. n. 98. die schwarz-
wangige Drossel.

Latham, Syst. ornith. I. p. 356. n. 105. Turdus
(Savi-jala) splendide niger, marginibus pen-
narum citrinis, giture, remigibus, rectricibus-
que nigris.

73. HISPANIOLENSIS. Die olivenfarbige do-
mingische Drossel.

Briffon, ornith. I. p. 240. n. 44. Merle olive de
St. Domingue.

Büffon, Vögel, IX. p. 172. die olivenfarbne Do-
mingische Amsel.

Latham, Vögel, II. 1. 68. n. 99. die Drossel von
Hispaniola.

Latham, Syst. ornith. I. p. 356. n. 106. Turdus
(Hispaniolensis), olivaceus, subtus griseus,
remigibus rectricibusque fuscis, extus violaceis.

β. Die olivenfarbige cayennische Drossel. *

Büffon, ois. III. p. 404. — Pl. enl. 558. 2. Mer-
le olive de Cayenne.

Büffon, Vögel, IX. p. 173. die olivenfarbige ka-
yennische Amsel; m. e. Fig.

Latham,

Latham, Syn. II. I. p. 76. *

Latham, Syst. ornith. I. p. 356. n. 106. β . T. olivaceus subtus griseo-albus, crisco flavescente, remigibus rectricibusque fuscis.

74. ALBIFRONS. *Die weißstirnige Drossel.*

Latham, Vögel, II. I. p. 64. n. 91. die weißstirnige Drossel.

Latham, Syst. ornith. I. p. 354. n. 98. *Turdus (Albifrons) plumbeo nigricans*, subtus obscure flavescentia, sincipite macula alba.

β . *Latham*, Syn. II. I. p. 71. n. 91. Var. A.

Latham, Syn. Suppl. p. 143. — Vögel, II. I. p. 65. n. 91. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 350. n. 98. β . T. niger, corpore subtus lateribusque sincipitis utrinque macula albis.

17. CAPENSIS. *Die capsche Drossel.*

Müller, Natursyst. II. p. 535. n. 17. die capsche Drossel.

Onomat. hist. nat. VII. p. 614. die braune Amsel vom Vorgeb. d. g. H.

Briffon, ornith. I. p. 230. n. 24. Merle brun du Cap de b. E.

Büffon, Vögel, IX. p. 147. die braune capsche Amsel.

Latham, Vögel, II. I. p. 64. n. 90. die bräunliche Drossel.

Latham, Syst. ornith. I. p. 353. n. 97. *Turdus (Capensis) nigricans*, abdomine subflavescente, crisco luteo.

β . *Büffon*, Vögel, IX. p. 148. Abänderung der braunen kapschen Amsel.

Latham, Syn. II. I. p. 71. n. 90. Var. A. — Vögel, II. I. p. 64. n. 90. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 353. n. 97. β .

18. *ATRICAPILLUS.* *Die schwarzköpfige Drossel.*

Müller, Natursyst. II. p. 535 n. 18. die *Amsel*.

Onomat. hist. nat. VII. p. 612. *die schwarzköpfige Amsel vom Vorgeb. d. g. H.*

Briffon, ornith. I. p. 252 n. 66. *Merle à tête noire du Cap de bonne Esperance.*

Büffon, Vögel, IX. p. 145. *die schwarzköpfigte capsche Amsel;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 63. n. 89. *die schwarzköpfige Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 353. n. 96. *Turdus (Atricapillus) nigricans, capite atro, abdomine uropygioque rufis, macula alarum alba.*

75. *MAURITIANUS.* *Die Drossel von Isle de France.*

Büffon, Vögel, IX. p. 144. *die grüne Amsel von der Isle de France;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 63. n. 88. *die Mauritius-Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 349. n. 75. *Turdus (Mauritianus) teto corpore virescente caeruleo, pennis capitis collique longioribus angustis.*

76. *MINDANAENSIS.* *Die Drossel von Mindanao.*

Büffon, Vögel, IX. p. 143. *die Amsel von Mindanao.*

Latham, Vögel, II. I. p. 63. n. 87. *die Mindanaische Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 353. n. 95. *Turdus (Mindanensis) caeruleo-chalybeus, corpore sub-tus strigaque longitudinali alarum albis.*

77. *MADAGASCARIENSIS.* *Der Tanaombé.*

Briffon, ornith. I. p. 234. n. 33. *Merle de Madagascar.*

Büffon, Vögel, IX. p. 141. der *Tanaombé*, oder
madagascarische Amsel; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 62. n. 86. die *Madagas-
karische Drossel*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 352. n. 94. *Turdus
(Madagascariensis) fuscus, subtus albus, pecto-
re lateribusque rufescentibus, macula alarum
rufo-aurea, rectricibus duabus intermediis, la-
teraliumque marginibus viridi-auratis, extimis
margin'e exteriore albis.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 210. *Turdus ma-
dagascarius*.

78. **SENEGALENSIS.** *Die Senegalische Drossel.*

Briffon, ornith. I. p. 231. n. 26. *Merle du Sé-
négal.*

Büffon, Vögel, IX. p. 140. die *braune Senegali-
sche Amsel*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 62. n. 85. die *Senegalsche
Drossel*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 352. n. 93. *Turdus
(Senegalensis) griseo-fuscus, ventre sordide
albo, remigibus rectricibusque fuscis.*

79. **LONGIROSTRIS.** *Die lang schnäbige Drossel.*

Latham, Vögel, II. I. p. 62. n. 84. die *lang-
schnäbige Drossel*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 352. n. 92. *Turdus
(Longirostris) fusco-virescens, subtus flavus,
superciliis rectricibusque extus flavescentibus.*

80. **GRISEUS.** *Die graue Drossel.*

Latham, Vögel, II. I. p. 61. n. 83. die *graue
Drossel*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 352. n. 91. *Turdus
(Griseus) griseus, subtus griseo-rubescens, ver-
tice cerviceque albidis.*

Sonne.

Sonnevat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 150. die graue Amsel aus Gingi.

19. PALMARUM. Die Palmendrossel.

Müller, Natursyst. II. p. 535. n. 19. die Palmendrossel.

Onomat. hist. nat. VII. p. 620. die Palmidrossel.

Briffon, ornith. I. p. 242. n. 47. Palmiste.

Büffon, Vögel, IX. p. 166. die Palmenamsel; m. e. Fig. (eigentlich p. 167.)

Latham, Vögel, II. I. p. 69. n. 101. die Palm-Drossel.

Latham, Syst. ornith. I. p. 356. n. 103. Turdus (Palmarum) viridi-olivaceus, subtus subcinerreus, sincipite genisque nigris, maculis utrinque tribus albis.

β. Die schwarzköpfige Palmendrossel. (?)

Briffon, ornith. I. p. 242. n. 48. Palmiste à tête noire.

Büffon, Vögel, IX. p. 166. Palmiste.

Latham, Syn. II. I. p. 77. n. 101. Var. A. — Vögel, II. I. p. 69. n. 110. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 357. n. 108. β.

81. MONACHA. Die Nonnendrossel.

Büffon, Vögel, IX. p. 176. die abyssinische Nonne, oder Molopita.

Latham, Vögel, II. I. p. 70. n. 102. die Nonnen-Drossel.

Latham, Syst. ornith. I. p. 357. n. 109. Turdus (Monacha) fusco-luteus, subtus lutescens, capite colloque inferiore nigris.

82. AETHIOPICUS. Die aethiopische Drossel.

Büffon, Vögel, IX. p. 177. die schwarz und weiße abyssinische Amsel.

Latham, Vögel, II. I. p. 70. n. 103. die Aethiopische Drossel.

Latham, Syst. ornith. I. p. 357. n. 110. *Turdus* (*Aethiopicus*) *niger*, corpore subtus fasciaque alarum albis.

83. **ABYSSINICUS.** *Die abyssinische Drossel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 179. die braune abyssinische Amsel.

Latham, Vögel, II. I. p. 70. n. 104. die Abyssinische Drossel.

Latham, Syst. ornith. I. p. 357. n. III. *Turdus* (*Abyssinicus*) *fuscus*, remigibus caudaque saturationibus, gutture fuscescente, corpore subtus fulvo.

84. **COCHINCHINENSIS.** *Die cochinchineische Drossel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 181. der kochinchineische Grünling.

Latham, Vögel, II. I. p. 71. n. 106. *Die Drossel mit schwarzem Kinne.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 357. n. 113. *Turdus* (*Cochinchinensis*) *viridis*, loris gulaque nigris, sub gula lunula lata flava, ad basin rostri utrinque macula caerulea.

85. **CINNAMOMEUS.** *Die zimmetfarbige Drossel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 150. die kayennische Amsel mit der Halsbinde; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 71. n. 107. die schwarzbriüftige Drossel.

Latham; Syst. ornith. I. p. 358. n. 114. *Turdus* (*Cinnamomeus*) *testaceo-ruber*, collo inferiore nigro undique albo marginato, tectricibus alarum nigris, minoribus albo-, mediis maiori- busque rufo-terminatis.

86. RUFIFRONS. Die rothstirnige Drossel.

Büffon, Vögel, IX. p. 170. die gelbrothe cayennische Amsel.

Latham, Vögel, II. I. p. 72. n. 108. die gelbrothe Drossel.

Latham, Syst. ornith. I. p. 358. n. 115. *Turdus (Rufifrons) fuscus, sincipite, lateribus capitis corporeque subtus rufis, tectricibus alarum nigris flavo-marginatis, cauda cinerea, tectricibus inferioribus albis.*

87. CANTANS. Der Arada.

Büffon, Vögel, XIII. p. 193. der Arada; mit e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 72. n. 109. die flötende Drossel.

Latham, Syst. ornith. I. p. 358. n. 116. *Turdus (Arada) rufo-fuscus, nigricante transversim striatus, subtus albidus, sub oculis macula nigra, albo-punctata, genis colloque interiore rufo-fulvis.*

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 103. der Arada.

88. CORAYA. Der Coraya.

Büffon, Vögel, XIII. p. 199. die Ameisen-Nach-tigall, mit gebändertem Schwanz.

Latham, Vögel, II. I. p. 73. n. 110. die Coraya-Drossel.

Latham, Syst. ornith. I. p. 358. n. 117. *Turdus (Coraya) rufo-fuscus, pileo lateribusque capitis et colli nigris, gula, iugulo strigisque sub oculis albis, cauda grisea, fasciis nigris.*

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 104. der Coraya.

89. FUSCIPES. Die braunfüßige Drossel.

Latham, Vögel, II. I. p. 74. n. 111. die lohflügelige Drossel.

Latham, Syst. ornith. I. p. 359. n. 118. *Turdus* (*Fuscipes*) *cinereus*, *subtus obscure rufus*, *pileo nigro*, *tectricibus alarum flavescente fasciatis*.

90. ALAPI. *Der Alapi.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 201. *die buntflügeliche Ameisen-Nachtigall.*

Latham, Vögel, II. I. p. 74. n. 112. *die weißrückige Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 359. n. 119. *Turdus* (*Alapi*) *fucus*, *subtus cinereus*, *collo inferiore pectoreque nigris*, *tectricibus alarum albo punctatis*, *dorso macula alba*.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 102. *der Alapi.*

91. CIRRHATUS. *Die geschopfte Drossel.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 183. *der Ameisenvogel mit dem Zopf.*

Latham, Vögel, II. I. p. 74. n. 113. *die Drossel mit schwarzem Federbusche.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 359. n. 12. *Turdus* (*Cirrhatus*) *cristatus griseo-cinereus*, *pileo*, *collo inferiore pectoreque nigris*, *gula albo varia*, *tectricibus alarum apice*, *rectricibus margine et apice albis*.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 102 *der gehäubte Ameisenfresser.*

92. TITINNABULATUS. *Der Glockenspieler.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 187. *der Ameisenvogel, Glöckner.*

Latham, Vögel, II. I. p. 75. n. 114. *die Läute-Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 359. n. 121. *Turdus* (*Campanella*) *fucus*, *subtus uropygioque rufo-fulvus*, *gula alba*, *pileo genisque albis, nigro*

nigro maculatis, superciliis strigaque pone oculos nigris.

Sammel. zur Phys. u. N. G. III. p. 102. der *Glockenspieler*.

93. BAMBLA. *Der Bambla.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 190. der *Ameisenvogel*, *Bamb'a*, oder *Weißbinde*.

Latham, Vögel, II. I. p. 75. n. 115. die *schwarzflügelige Drossel*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 360. n. 122. Turdus (Bambla) nebulosus, supra rufo-fuscus, subtus cinerascens, alis nigris fascia alba, cauda nigricante brevi.

Sammel. zur Phys. u. N. G. III. p. 103. der *Bambla*.

94. AURITUS. *Die weißöhrige Drossel.* (10)

Büffon, Vögel, XIII. p. 185. der *weißöhrigte Ameisenvogel*.

Latham, Vögel, II. I. p. 76. n. 116. die *weißöhrige Drossel*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 360. n. 123. Turdus (Auritus) rufo-olivaceus, fusco-varius, abdomine albo, gula iuguloque nigris, vertice fasciaque pectorali rufo-fuscis, vitta aurium argentea.

Sammel. zur Phys. u. N. G. III. p. 102. der *weißöhrige Ameisenfresser*.

95. COLMA. *Der Colma.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 181. der *Ameisenvogel*, *Colma*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 76. n. 117. die *Colma-Drossel*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 360. n. 124. Turdus (Colma) rufo-fuscus, subtus cinereus, lunula

(10) Ist nach Latham, mit *Pipra Leucotis* p. 1003. n. 19. einetley.

nuchae rufa, iugulo albo nigroque vario, macula narium gulaque albis;

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 102. *der Colma.*

B. Der Tetema. (1)

Büffon, Vögel, XIII. p. 182. *der Ameisenvogel Tetema*; m. e. Fig.

Latham, Syn. II. I. p. 86. — Vögel, II. I. p. 77. n. 117. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 360. n. 124. **B.**

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 102. *der Tetema.*

96. TINNIENS. Der Läutvogel.

Büffon, Vögel, XIII. p. 175. *der größere läuten-de Ameisenvogel*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 77. n. 118. *die Larum-Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 360. n. 125. *Turdus (Tinniens) fuscus, subtus albus, pectore nigricante nebuloso.*

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 101. *der große Befroi.*

Donndorff, Handb. d. Thiergeesch. p. 350. n. 9. *der Läutvogel.*

97. LINEATUS. Die gestreifte cayennische Drossel. (2)

Büffon, Vögel, XIII. p. 177. *der kleinere läutende Ameisenvogel.*

Latham, Vögel, II. I. p. 78. n. 119. *die gesprenkelte Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 361. *Turdus (Lineatus) fusco-olivaceus, subtus albus fusco punctatus, lateribus colli albo lineatis, rectricibus alarum maculis rufis.*

98 FOR.

(1) Büffon hält den *Tetema* für das Männchen, und den *Colma* für das Weibchen. Latham umgekehrt.

(2) Nach Büffon eine Abart vom vorigen.

98. FORMICIVORUS. *Der Palikour.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 178. *der Ameisenvoget, Palikour*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 78. n. 120. *die Ameisendrossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 361. n. 127. *Turdus (Formicivorus) rufo-fuscus*, subtus albidus, macula dorsali, collo inferiore pectore que nigris, tectricibus alarum flavo-maculatis, cauda rufa.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 101. *der Palikour.*

β. T. jugulo rufo, nigro marginato; cauda apice nigro, inter scapulas macula alba. *Latham* l. c. *

γ. T. jugulo nigro medio albo. *Lath. l. c.* *

δ. T. abdomine et crisco cinereis, femoribus rufo-fuscis. *Lath. l. c.* *

99. CYANURUS. *Die blauschwänzige Drossel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 183. *der Blauling*; mit e. Fig.

Büffon, Vögel, XIII. p. 174. *der himmelblaue Ameisenvoget.*

Latham, Vögel, II. I. p. 79. n. 121. *die blauschwänzige Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 361. n. 128. *Turdus (Cyanurus) rufo-fuscus*, subtus flavus, abdome caeruleo fasciato, pileo lateribusque colli striga longitudinali nigris, fascia pectorali caudae caeruleis.

100. REX. *Die Königsdrossel.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 171. *der größte Ameisenvogel*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 80. n. 122. die Königs-Drossel.

Latham, Syst. ornith. I. p. 361. n. 129. *Turdus* (*Graillarius*) *fusco-nebulosus*, *subtus rufescens*, *maxillae inferioris striga*, *macula pectoris crissaque albis*, *nucha plumbea*.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 100. der König der Ameisenfresser.

20. SINENSIS. Der Hoamy.

Müller, Natursyst. II. p. 335. n. 20 der chinesische Krammetsvogel.

Onomat. histor. natur. VII. p. 635. die chinesische Drossel.

Briffon, ornithol. I. p. 219. n. 7. Grive de la Chine.

Büffon, Vögel, VIII. p. 312. der chinesische Hoamy.

Latham, Vögel, II. I. p. 33. n. 33. die chinesische Drossel.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 337. n. 35. *Turdus* (*Sinensis*) *rufescens*, *capite fuscō-striato*, *superciliis albis*, *rectricibus fuscis strigis obscurioribus*, *pedibus flavis*.

101. ARCUATUS. Die Bogendrossel.

Latham, Vögel, I. I. p. 34. n. 34. die mondähnliche Drossel.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 337. n. 36. *Turdus* (*Arctuatus*) *rufo-fuscus*, *corpo subtus superciliis, lorisque albis, cervice, iugulo pectore que rubentibus, genis lunulaque sub gula nigris*.

102. MELANOPIS. Die Drossel mit schwarzem Gesichte.

Ist nach *Latham*, mit *Turdus Shannu* p. 814. n. 41. einerley.

103. VIO LACEUS. Die violette Drossel.

Latham, Syn. II. I. p. 57. n. 63. Violet Thrush.

Latham, Vögel, II. I. p. 54. n. 63. die violette Drossel.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 347. n. 69. Turdus (Violaceus) violaceo-nitens, pennis capitis, colli, pectoris tectricibusque alarum caeruleo-chalybeis, macula alarum feinoribusque intus albis.

Sonnerat, Reis. nach Ostind. und Chin. II. p. 147. die blaue chinesische Amsel.

104. LEUCOCEPHALUS. Die weißköpfige Drossel.

Latham, Vögel, II. I. p. 55. n. 66. die weißköpfige Drossel.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 348. n. 73. Turdus (Leucocephalus) cinereo-griseus, capite colloque albis, alis caudaque viridi-cupreis, remigibus nigris, macula alarum alba.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 149. die chinesische Dominicaner Amsel.

105. NIGRICOLLIS. Die schwarzhälfige Drossel.

Latham, Vögel, II. I. p. 56. n. 68. die schwarz-hälfige Drossel.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 349. n. 76. Turdus (Nigricollis) fusco-ferrugineus, subtus fusco-albus, capite toto albo, collo, remigibus caudaque nigris, secundariis apice albis.

106. RUBIL. Der Bubil.

Latham, Vögel, II. I. p. 56. n. 70. die Pfeif-Drossel.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 349. n. 78. Turdus (Boubil) fuscus, pone aures fascia nigra.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 150. der chinesische Bubil.

107. PERSPICILLATUS. *Die Brillendrossel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 108. *die chineſische Amsel;*
m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 57. n. 71. *die Brillen-*
Drossel.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 349. n. 79. Turdus
(Perspicillatus) griseo-viridis subtus flavescen-
tibus, capite colloque cinereis, sincipite lunu-
laque sub oculis nigris.

108. FLAVUS. *Die gelbe Drossel.*

Latham, Vögel, II. I. p. 58. n. 74. *die gelbe*
Drossel.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 350. n. 82. Turdus
(Flavus) fulvus orbitis albis, fascia oculari ni-
gra.

Sommerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 152. *die*
gelbe chineſische Amsel.

109. VIRIDIS. *Die grüne chineſische Drossel.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 339. *die Drossel Chaumi.*

Latham, Vögel, II. I. p. 60. n. 79. *die grüne*
Drossel.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 351. n. 87. Turdus
(Virescens) griseo-viridis, corpore subtus, su-
perciliis maculaque suboculari albis, gula grisea
albo-maculata, pectore lateribusque rufis.

110. ATER. *Die schwarzkehlige Drossel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 134. *die schwarzkehligte do-*
mingische Amsel.

Latham, Vögel, II. I. p. 59. n. 78. *die schwarz-*
kehlige Drossel.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 351. n. 86. Turdus
(Jugularis) griseo-fuscus, subtus flavo-virescens
maculis sparsis nigris, facie, gula iuguloque ni-
gris, rufo-marginatis.

21. DOMINICUS. *Die grau und weiße domingosche Drossel.*

Müller, Natursyst. II. p. 436. n. 21. *die domingische Drossel.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 607. *die Amsel von St. Domingo.*

Brisson, ornith. I. p. 237. n. 38. *Merle de S. Domingue.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 338. *die domingosche Drossel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 38. n. 44. *die Domingo-Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 340. n. 48. *Turdus (Dominicus) subfuscus, subtus albus, remigibus primoribus basi albis, rectricibus 3. extimis albis.*

III. BRASILIENSIS. *Die brasiliatische Drossel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 39. n. 45. *die gelbbäuchige Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 340. n. 49. *Turdus (Brasiliensis) niger, subtus flavescentia, dorso infimo ferrugineo, fascia alarum alba, rectricibus tribus exterioribus, apice, extimis toto albis.*

22. MERULA. *Die (gemeine) Amsel. (3)*

Müller, Natursyst. II. p. 536. n. 22. *die Merle, oder Amsel.*

Leske, Naturgesch. p. 257. n. 6. *die Amsel.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 169. n. 8. *die Amsel, Schwarzdrossel.*

Blumen.

(3) Gewicht 4. Unzen. Penn. Zuweilen, aber selten, finden sich Amseln mit schwarzen Schnäbeln und schwarzen Füßen. — Brütet 2. mal. Die jungen Männchen ähneln vor der ersten Mauser der Mutter mehr als dem Vater; der gelbe Schnabel kommt erst im Frühjahr zur Zeit der Paarung zum Vorschein.

- Blumenbach*, Handb. der N. G. p. 182. n. 6. *Turdus (Merula) ater*, rostro palpebrisque flavis; die *Amsel*.
- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 503. n. 6. die *Schwarzdroffel*.
- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. III. p. 612. die *schwarze Amsel*.
- Funke*, Naturgesch. I. p. 234. die *Schwarzäroffel*.
- Ebert*, Naturl. II. p. 129. die *Amsel*.
- Halle*, Vögel, p. 285. n. 237. die *Amsel*.
- Meyer*, Thiere, II. p. 18. tab. 68. *schwarze Amsel*.
- Gatterer*, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 395. n. 322. die *Amsel*.
- Pennant*, arct. Zool. II. p. 321. I. die *Amsel*.
- Beckmann*, Naturhist. p. 52. c. die *Amsel*.
- Neuer Schaupl. der Natur*. I. p. 282. *Amsel*.
- Onomat. hist. nat.* VII. p. 618. *gemeine Amsel*; *Kohlamsel*.
- Handb. der Naturgesch. II. p. 199. die *Amsel*.
- Handb. der deutsch. Thiergeesch. p. 126. die *Amsel*.
- Klein*, av. p. 66. n. 5. *Turdus niger*; *Merula simpliciter*.
- Klein*, Vorbereit. p. 125. n. 5. *Schwarze Drossel*; *Amselmeerle*.
- Klein*, verbess. Vögelhistor. p. 66. n. 5. *Amsel*; *Meerle*.
- Klein*, stemmat. av. p. II. tab 13. fig. 2. a — c.
- Gesner*, Vögelb. p. 34. *Amsel*; *Merl*; *Merlaer*; *Merel*; *Lyster*. Fig. p. 35.
- Brisson*, ornith. I. p. 221. n. 10. *Merle*.
- Büffon*, Vögel, IX. p. 5. die *Amsel*; in. 2. Fig. M. u. N.
- Batsch*, Thiere, I. p. 340. die *Amsel*.
- Latham*, Syn. Suppl. p. 141. *Black-bird*.
- Latham*, Vögel, II. I. p. 39. n. 46. die *Schwarzdroffel*.

Latham,

- Latham*, Syst. ornithol. I. p. 340. n. 50. *Turdus* (Merula) rostro, palpebris pedibusque fulvis.
Beske, Vögel Kurl. p. 74 n. 161. *die Merle*.
Siemsen, meklenb. Vögel, p. 92. n. 5. *die Schwarze drossel*.
Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 415. *die Merle*.
Fischer, Liv. p. 94. n. 138. *schwarze Amsel*.
Cetti, Sardin. II. p. 164. *die Amsel*.
White, N. G. von Engl. p. 64. n. 11. p. 66. n. 4. *Schwarze Amsel*.
Adanson, Senegal. p. 278. *Amseln?*
Boswell, Beschr. von Corsic. p. 45. *die Amsel*.
Pallas, nord. Beytr. IV. p. 10. *die schwarze Amsel*.
Carver, Reis. durch Nordamer. p. 391. *Krähenamsel?*
Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 161. n. 197. *die schwarze Amsel*.
Pontoppidan, Dännem. p. 173. n. 4. *Selsort*.
Pontoppidan, Norweg. II. p. 183. *Soolsort*.
Georgi, Reis. I. p. 173.
Borkhausen, Magaz. I. p. 162. n. 33. *die Amsel*.
Naturforscli. XVII. p. 83. n. 171. *die Merle*.
Krünitz, Encykl. I. p. 701. *Amsel*.
Döbel, Jägerprakt. I. p. 55. *Schwarz-Amsel*.
Naumann, Vogelsteller, p. 82. *schwarze Amsel*.
André u. Bechstein, Spazierg. III. p. 12. 16.
Lichtenberg, Magaz. für das Neueste, etc. III. I. p. 62. VI. 3. p. 135.
Hervieux, Canarienvög. p. 133. *Amsel*.
Zorn, Petinotheol. II. p. 318. *die gemeine schwarze Amsel*.
Geoffroy, mat. med. VII. p. 544. *Amsel*.
Meidinger, Vorles. I. p. 147. n. 5. *die Amsel*.
Anweis. Vögel zu fang. p. 89. *Amsel*.
Forst-, Fisch- u. Jagdlex. I. p. 86. *Schwarzamsel*.
Börner,

- Börner*, neue schles. ökonom. Nachr. II. p. 99.
schwarze Amsel.
- Loniceri*, Kräuterb. p. 676. *Amsel.*
- Lemmyry*, Materiallex. p. 727.
- Oekon. Zool.* p. 95. n. 37. *die Amsel.*
- Zablonsky*, allgem. Lex. p. 47. *Amsel.*
- Zückert*, Speis. aus d. Thierreich, p. 97.
- Haus- u. Landbibl. II. p. 477.
- Linné*, Syst. Nat. Edit. II. p. 57. *Merula nigra.*
- Linné*, Syst. Nat. Edit. VI. p. 29. n. 2. *Merula nigra.*
- Linné*, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 170. n. 12. *Turdus (Merula) ater, rostro palpebrisque fulvis.*
- Müller*, zool. dan. prodr. p. 29. n. 241. *Turdus (Merula) ater, rostro pedibusque fulvis.*
- Kramer*, Austr. p. 360. n. 3. *Turdus ater, rostro palpebrisque fulvis. Amaxl.*
- Brünniche*, ornithol. bor. p. 66. n. 234. *Turdus Merula.*
- Charleton*, onom. zoic. p. 83. n. 3. *Merula.*
- Schwenkfeld*, av. Silef. p. 300. *Merula nigra. Amsel; Meerle.*
- Rzaczynsky*, aust. hist. nat. Polon. p. 394. *Merula vulgaris.*
- Sibbald*, Scot. p. 214. *Merula.*
- Jonston*, av. p. 104. *Merula.*
- Zinnan*. Uov. p. 39. tab. 5. fig. 22. *Merla.*
- Belon*, ois. p. 30. *Merle noir.*
- Salerne*, hist. nat. des ois. p. 126. 176.
- Heerkens*, av. Fris. p. 245. *Merula.*
- Hist. Prov. I. p. 491. *Merle.*
- Levin*, britt. Birds. II. tab. 61. *Black-bird.*
- Voyage en Batbar. I. p. 272. *Merle.*
- Plin*, hist. nat. L. 10. c. 29. c. 53. *Merulae.*
- Aristot*, hist. anim. L. 9. c. 2. n. 52. 169. *Kotuφos.*

Aelian.

Aelian. de nat. anim. L. 12. c. 28. Κοσσυφος.
Dönnendorff, Handb. der Thiergesch. p. 351. n. 10.
die Amsel.

β. Die weissköpfige Amsel.

Briffon, ornith. I. p. 222. A. Merle à tête blanche.
Büffon, Vögel, IX. p. 24. die weissköpfige Amsel.
Latham, Syn. II. 1. p. 44. White-headed Black-bird.
Latham, Vögel, II. 1. p. 41. n. 46. Var. A. die weissköpfige Schwarzdrossel.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 341. n. 50. β. T. capite albo, pone oculos alasque supra albo variegatus, rostro, pedibus iridibusque luteis.

Aldrov. ornithol. II. L. 16. c. 6. p. 277. Merula Leucocephalos.

Charleton, onom. zoic. p. 84. n. 1. Merula Leucocephalus.

Jonston, av. p. 104. Merula Leucocephalus.

γ. Die bunte Amsel.

Briffon, ornithol. I. p. 222. B. Merle varié.

Büffon, Vögel, IX. p. 23. die weissgefleckte Amsel.

Klein, av. p. 68. n. 16. Turdus niger. Merulus variegatus.

Klein, Vorbereit. p. 129. n. 16. schwarzgefleckte Amsel.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 68. n. 19. schwarz gefleckte Amsel.

Latham, Syn. II. 1. p. 44. Pied Black-bird.

Latham, Vögel, II. 1. p. 41. n. 46. Var. B. die bunte Schwarzdrossel.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 301. Merula varia; weiss- gescheckte Amsel.

Jonston, av. p. 104. Merula ex albo et nigro maculata.

d. Die weiße Amsel.

Briffon, ornithol. I. p. 223. C. Merle blanc.

Büffon, Vögel, IX. p. 23. die weiße Amsel.

Latham, Syn. II. I. p. 44. White Black-bird.

Latham, Vögel, II. I. p. 41. n. 46. Var. C. die weiße Schwarzdrossel.

Krünitz, Encycl. I. p. 713. weiße Amseln.

Hannov. nützl. Samml. 1756. St. 44. weiße Amsel.

Journal encycl. 1772. VII. 141.

Berlin. Samml. V. p. 177. die weiße Amsel.

Aldrovand. ornith. II. L. 16. p. 276. Merula candida.

Charleton, onomast. zoic. p. 84. n. 2. Merula candida.

Schwenkfeld, av. Sileſ. p. 301. Merula candida.

Jonston, av. p. 104. Merula tota candida.

Varro, de re rust. L. 3. c. 9. Merula alba.

Plin. hist. nat. L. 10. c. 30. Merula candida.

112. AURANTIUS. Die weißkehlige Drossel.

Klein, av. p. 69. n. 27. Turdus fuscus.

Klein, Vorbereit. p. 131. n. 27. Pomeranzschnäbler; graue Amsel.

Klein, verb. Vögelhist. p. 69. n. 28. Pomeranzschnäbler.

Briffon, ornith. I. p. 835. n. 31. Merle de la Jamaïque.

Büffon, Vögel, IX. p. 149. braune jamaikanische Amsel.

Latham, Vögel, II. I. p. 41. n. 47. die Drossel mit weißem Kinne.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 341. n. 51. Turdus (Leucogenus) fusco-niger, gula abdomineque albis.

β. *Latham*,

- β. *Latham*, Syn. II. I. p. 45. Var. A. — *Latham*,
Vögel, II. I. p. 42. n. 48. Var. A.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 342. n. 51. β. T.
gula corpore concolore.
- γ. *Latham*, Syn. II. I. p. 45. Var. B. — *Latham*,
Vögel, II. I. p. 42. n. 48. Var. B.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 342. n. 51. γ. T.
corpore toto nigro, rostro pedibusque fulvis.
Fermin, Surin. II. p. 162. die Amsel.
- δ. *Brisson*, ornith. I. p. 244. n. 51. Merle d' Amerique. (4)
Latham, Syn. II. I. p. 45. Var. C. — *Latham*,
Vögel, II. I. p. 42. n. 48. Var. C.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 342. n. 52. *Turdus*
(*Americanus*) corpore violaceo-nitente, sub-
tus obscuro, remigibus apice rufis, rostro pe-
dibusque luteis.

113. **LABRADORIUS.** *Die labradorische Drossel.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 316. n. 122. *der Kram-*
metsvogel von Labrador.
Latham, Vögel, II. I. p. 42. n. 48. *die Labrado-*
rische Drossel.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 342. n. 54. *Turdus*
(*Labradorius*) atro-nitens, caeruleo viridique
varians, rostro pedibusque nigris.
Philos. transact. LXII. p. 400. n. 22.

23. **TORQUATUS.** *Die Ringamsel. (*)*
Müller, Natursyst. II. p. 537. n. 23. *die Ring-*
drossel.

U 2

Leske,

(4) Nach *Brisson* eine eigne Gattung, wofür ihn auch *Latham* im
Syst. ornith. aufgenommen hat.

(*) Findet sich in Europa bis Lappland, aber weder in Russland
noch in Sibirien. Auch an den Ufern des caspischen Meers;
und überwintert in Persien.

Leske, Naturgesch. p. 257. n. 7. *die Ringamsel*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 170. n. 9. *die Ringdrossel; Ringmerle*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 502. n. 5. *die Ring-drossel*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 612. *die Ringamsel*.

Ebert, Naturl. II. p. 129. *die Ringmerle*.

Halle, Vögel, p. 287. n. 238. *die Dianenamsel*.

Meyer, Thiere, II. tab. 68. *Bergamsel*.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 396. n. 323. *Ringamsel; Schildamsel; Stockziemer*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 321. H. *die Ring-amsel*.

Onomat. histor. natur. VII. p. 636. *die Ring-amsel*.

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 127. *Ringamsel; Meeramsel*.

Klein, av. p. 66. n. 6. *Turdus torquatus*.

Klein, Vorbereit. p. 125. n. 6. *Ringdrossel*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 66. *Ringdrossel; Schneedrossel; Rößdrossel*.

Gesner, Vögelb. p. 37. *Ringamsel*; m. e. Fig.

Brisson, ornith. I. p. 223. n. 12. *Merle à collier*.

Büffon, Vögel, IX. p. 36. *die Ringelamsel*; mit e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 341. *die Berg- oder Ringamsel*.

Latham, Syn. Suppl. p. 141. *Ring-Onzel*.

Latham, Vögel, II. I. p. 43. n. 49. *die Ring-drossel*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 343. n. 56. *Turdus (Torquatus) nigricans*, torque albo, rostro ha-vescente.

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 39. n. 6. *die Schild-drossel*.

Beck,

- Bock*, N. G. von Preuss. IV. p. 416. *Ringdrossel*.
Fischer, Liv. p. 94. n. 139. *Ringdrossel*.
White, N. G. von Engl. p. 37. p. 42. p. 61. n. 1.
 Ringamsel.
Pontoppidan, Dännem. p. 173. n. 5. *Ringtrost*.
Pallas, nord. Beytr. IV. p. 55. *Turdus torquatus*.
Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 162. n. 198. *die Ringamsel*.
Zorn, Petinotheol. II. p. 319. *die Berg-Amsel*.
Naturforsch. XVII. p. 84. n. 172. *die Ringdrossel*.
Borkhausen, Magaz. I. p. 163. n. 34. *Ringamsel*.
Nunmann, Vogelsteller, p. 82. *die Ringamsel*.
Meidinger, Vorles. I. p. 147. n. 6. *die Ringamsel*.
Krünitz, Encykl. I. p. 714. *Meeramsel; Ringel-Amsel*.
Forst-, Fisch- u. Jägdlex. I. p. 87. *Meeramsel*.
Börner, neue schles. ökonom. Nachr. II. p. 100.
Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 29. n. 3. *Merula torquata*.
Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 170. n. 13. *Turdus (Torquatus) nigricans*, torque albo, rostro flavescente.
Müller, zool. dan. prodr. p. 30. n. 242. *Turdus (Torquatus) nigricans*, torque albo, rostro flavescente.
Schwenkfeld, av. Siles. p. 302. *Merula torquata*; *Ringamsel*; *Schneeamsel*; *Röß-Amsel*.
Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 394. *Merula torquata*.
Sibbald, Scot. p. 215. *Merula torquata*.
Jonston, av. p. 106. *Merula torquata*.
Tavernier, voyages II. p. 24?
Hermann, tab. affin. anim. p. 200. *Turdus torquatus*.
Levin, britt. Birds II. tab. 62.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 351. n. 11.
die Ringamsel.

β. Die weiße Ringamsel.

Büffon, Vögel, IX. p. 48. die weiße Ringamsel.

γ. Die weißgefleckte Ringamsel.

Büffon, Vögel, IX. p. 49. die weißgefleckte Am-
sel.

114. SAXATILIS. Die Steindrossel. (5)

Latham, Vögel, II. I. p. 50. n. 57. die Stein-
Drossel.

Latham,

(5) Die in unserm System angeführten beyden Synonymen aus *Raj* und *Willughb.* sind auch p. 310. bey n. 25. (*Lanius infaustus*) citirt, und was *Lathams Rock Thrush* betrifft, so findet sich im *Syst. ornith.* p. 326. dass er ihn mit seinem *Rock Shrike* (*Lanius infaustus Gmel.*) für einerley ausgegeben, und beyde zu seinem *Turdus infaustus* gerechnet hat. Ich beziehe mich im Ganzen hier auf dasjenige, was ich bereits im ersten Bande dieser Beyträge p. 216. not. 8. angeführt habe. Fast bey keiner Gattung findet sich eine grössere Verwechselung der Synonymen, als bey *Lanius Infaustus* p. 310. n. 25. *Lanius Faustus* p. 311. n. 26. und *Turdus Saxatilis* p. 833. n. 14. Ich will zum Besten derer, die den Lathamschen Index ornithologicus nicht besitzen, hier ausführlich bemerken, wie dieser Ornithologe die Synonymen geordnet hat. A. *Corvus Infaustus* *Latham* *Syst. ornith.* I. p. 159. n. 22. == a) *Corvus Infaustus* *Linn.* *fn. suec.* n. 93. — b) *Corvus Infaustus* *Brünn.* p. 10. — c) *Corvus Infaustus* *Müll.* *dan. prodr.* p. 12. n. 93. — d) *Lanius Infaustus* *Linn.* XII. I. p. 138. n. 25. — e) *Coryus russicus* *Gmelin* it. p. 50. tab. II. — B. *Turdus Infaustus* *Latham* I. c. p. 335. n. 32. == a) *Turdus Saxatilis* *Gmel.* *Syst.* I. p. 833. n. 114. — b) *Lanius Infaustus* *Gmel.* *Syst.* I. p. 310. n. 25. c) *Borowsky Thierr.* II. p. 84. n. 4. — d) *Merula Saxatilis*, *Raj.* *Syn.* p. 68. 3. e) *Will.* p. 145. tab. 36. — f) *Brisson*, II. p. 238. 13. — g) *Faun. Arragon.* p. 85. — h) *Klein*, av. p. 70. 32. — i) *Merle de roche* *Büffon*, III. p. 351. (maior). — k) *Codiroso maggiore*, *Olin.* uc. t. p.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 335. n. 32. *Turdus* (*Infaustus*) *nigricante fusco*, *rufescenteque varius*, *capite cinereo rufescente maculato*, *rectricibus lateralibus rufis*.

115. EREMITA. *Die einsame philippinische Drossel.*

Briffon, ornithol. I. p. 234. n. 32. *Solitaire des Philippines.*

Büffon, Vögel, IX. p. 99. *einsame philippinische Amsel*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 50. n. 56. *die Einfiedler-Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 346. n. 63. *Turdus* (*Eremita*) *fuscus*, *apicibus pennarum fasciis nigricante albido terminatis*, *subtus fordide albo rufescens fusco-striatus*, *remigibus rectricibusque griseo-marginatis*.

116. MANILLENSIS. *Die manillische Drossel.*

Briffon, ornith. I. p. 233. n. 31. *Solitaire de Manille.*

Büffon, Vögel, IX. p. 96. *die manillische einsame Amsel*; m. e. Fig.

U 4

Latham,

47. — 1) *Zinnian*. Uov. p. 40. t. 6. f. 23. — m) *Steinöthel*, *Wirsing*. Vög. tab. 16. — n) *Greater Redstart*, *Albin*. III. t. 55. — o) *Will*. p. 197. t. 36. — p) *Rock Crow*, *Arct. Zool*. II. p. 252. F. — q) *Rock Shrike*, *Lath. Syn*. I. p. 176. — r) *Rock Thrush*, *Lath. Syn*. III. p. 54. 57. — C. *Turdus Saxatilis*. *Latham* I. c. p. 336. n. 33. — a) *Lanius Infaustus minor*, *Gmel*. Syst. I. p. 310. 25. β — b) *Turdus Saxatilis Linn*. Syst. XII. I. p. 294. 14. — c) *Kramer Austr*. p. 360. 2. — d) *Scopoli ann*. I. p. 199. — e) *Borowsky Thierr*. III. p. 168. 7. — f) *Merula Saxatilis minor*, *Briffon*, II. p. 240. 14 — g) *Turdus ruber cyaneo capite*, *Klein av*. p. 67. 8. — h) *Frisch* tab. 32. — i) *Merle de roche*, *Büffon*, III. p. 351. t. 23. Pl. enl. 562. — k) *Günth*. Nest. u. Ey. tab. 75. — l) *Lesser Rock Shrike*, *Lath. Syn*. I. p. 177. n. 27. A.

Latham, Vögel, II. I. p. 49. n. 55. die Manillische Drossel.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 345 n. 62. *Turdus (Manillensis) fuscocaerulescens*, subtus rufus, fuscocaeeruleoque maculatus, uropygio caeruleo-lescente, remigibus rectricibusque fuscocaeeruleis nigricantibus.

117. SOLITARIUS. Die einsame Amsel.

Halle, Vögel, p. 292. n. 243 die einsame Drossel.

Klein, av. p. 67. n. 14. *Turdus, passer Solitarius dictus*.

Klein, Vorbereit. p. 127. n. 11. *Spreedrossel*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 67. n. 16. *Spreedrossel; einsame Drossel*.

Gesner, Vögelb. p. 38. *Passer solitarius*; m. e. Fig.

Briffon, ornithol. I. p. 233. n. 30. *Solitaire*.

Briffon, Vögel, IX. p. 86. die einsame Amsel.

Latham, Vögel, II. I. p. 48. n. 54. die einsame Drossel.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 345. n. 61. *Turdus (Solitarius) fuscus albido punctatus, genis, collo pectore alisque caeruleo adumbratis, rectricibus nigricantibus*.

Cetti, Sardin. II. p. 170. der braune Einsiedler.

Rzaczynsky, hist. nat. Polon. p. 221. *Passer Solitarius*.

Fonscol, av. p. 105. *Passer Solitarius*.

Beckmann, Bibl. VIII. p. 539. die einsame Amsel.

Hermann, tab. affin. anim. p. 210. *Merula solitaria*.

Donndorff, Handb. der Thiergeesch. p. 352. n. 12. die einsame Amsel.

24. CYANUS. Die Blauamsel. (")

Müller, Natursyst. II. p. 538. n. 24. die blaue Merle.

Halle,

(6. Wird häufig mit dem vorhergehenden verwechselt.)

Halle, Vögel, p. 290. n. 240. die blaue Gesang-drossel.

Onomat. histor. natur. VII. p. 615. die einsame Drossel.

Klein, av. p. 77. III. n. 1. *Sylvia gula caerulea, pectora rubro.*

Klein, Vorbereit. p. 145. n. 1. *Blaukehlein mit rother Brust.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 78. n. 3. *Blauvogel; Steinrotele.*

Gesner, Vögelb. p. 42. *Blaievögel.*

Briffon, ornithol. I. p. 236. n. 37. Merle bleu.

Büffon, Vögel, IX. p. 75. die Blauamsel.

Batsch, Thiere, I. p. 342. die Blauamsel.

Latham, Vögel, II. 1. p. 48. n. 53. die blaue Drossel.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 345. n. 60. *Turdus (Cyanus) pennis marginé cinereo - caeruleis, ore palpebrisque luteis.*

Latham, Syn. Suppl. p. 142. Blue Thrush.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 416. die blaue Merle; *Blauvogel.*

Cetti, Sardin. II. p. 169. der blaue Einsiedler.

Seligmann, Vögel, I. tab. 35. die blaue Amsel; der einsame Sperling.

Naturforsch. XVII. p. 84. n. 173. die blaue Merle.

Beckmann, Bibl. VIII. p. 537. die blaue Stein-Amsel.

White, N. G. von Engl. p. 87. die Blaudrossel.

Charleton, onom. zoic. p. 88. Caeruleo.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 347. *Rubicilla maior Saxatilis. Blau-Vogel, Stein-Rötele; Blau-Stein-Amsel; Stein-Drossel; Klein Blau-Zimmer.*

Fonston, av. p. 106. *Passeri Solitario congener.*

Faun. Arragon. p. 85. *Turdus plumbeus.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 210. *Turdus Cyanus.*

25. ARUNDINACEUS. Die Rohrdrossel.

Müller, Naturhist. II. p. 238. n. 25. die Rohrdrossel.
 Leske, Naturgesch. p. 258. n. 8. die Rordrossel.
 Borowsky, Thierreich, III. p. 170. n. 10. die Rohr-drossel.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 504. n. 8. die Rohrdrossel.

Funke, Naturgesch. I. p. 234. die Ro-rdrossel.

Ebert, Naturl. II. p. 229. die Rohrdrossel.

Halle, Vögel, p. 304. n. 270. die singende Rohr-drossel.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 397. n. 326. Rohrdrossel; Weidendrossel; Bruchdrossel.

Onomat. hist. nat. VII. p. 611. die Rohrdrossel.

Klein, Vorbereit. p. 133. Bruch-, Weiden-, Rohr-drossel.

Klein, verb. Vögelhist. p. 70. n. 38. Bruchdrossel.

Brisson, ornith. I. p. 219. n. 6. Rousserolle ou Roucherolle.

Büffon, ois. III. p. 293. tab. 18. — Pl. enl. 513. Rousserolle.

Büffon, Vögel, VIII. p. 254. die Rohrdrossel; m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 339. die Rohrdrossel.

Latham, Syn. II. I. p. 32. n. 28. Suppl. p. 141. Reed Thrush.

Latham, Vögel, II. I. p. 28. n. 28. die Rohrdrossel.

Latham, Syst. ornith. I. p. 334. n. 28. Turdus (Arundinaceus) fusco-ferrugineus, subtus al-bido-testaceus, remigibus fuscis apice rufescen-tibus.

Bock, Naturgesch. von Preuss. IV. p. 416. Rohr-drossel.

Fischer, Livil. p. 95. n. 140. Rohrdrossel.

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 94. n. 7. die Rohr-drossel; groote Ruhrspaarling.

Pallas, Reis. I. p. 370. die Schilfdrossel.

Pallas,

Pallas, nord. Beytr. III. p. 15. *Rohrdrossel.* IV.
p. 25. *Turd. arundinaceus.*

Naturforsch. XVII. p. 83. n. 170. *Bruchdrossel.*

Schrift. der danziger Gesellsch. I. p. 444.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 170. n. 15. *Turdus (Arundinaceus) griseus, subtus albidus, lineolis transversim lunatis fuscis, pedibus caerule-scentibus.*

Charleton, onom. zoic. p. 105. n. 2. *Rousserolle*
seu *Roucherolle*, *Gallorum*, *Bellonio Alcyon*
vocalis.

Jonston, av. p. 163. *Junco.*

Jonston, av. p. 182. *Acototloquichitl*, seu *passer*
aquaticus.

Belon, hist. nat. des ois. p. 224. *Alcyon vocalis.*

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 352. n. 13.
die Rohrdrossel.

3. Latham, Syst. ornith. I. p. 334. n. 28. β . T. fu-sco-testaceus, subtus superciliisque albidis, uro-pygio rectricibusque rufis, lateralibus fascia ni-gra, quatuor extimis apice albis.

Latham, Vögel, II. I. p. 30. n. 28. Var. A.

26. MORRO. *Die gelb und schwarze afrikanische Drossel.*

Müller, Natursyst. II. p. 538. n. 26. *die afrikani sche Drossel.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 624. *die afrikanische Amself.*

Briffon, ornith. I. p. 244. n. 52. *Merle du cap de bonne esperance.*

Büffon, Vögel, IX. p. 101. *die gelbe und schwarze afrikanische Drossel.*

Latham, Vögel, II. I. p. 52. n. 58. *die Afrikanische Drossel.*

Latham,

Latham, Syst. ornith. I. p. 346. n. 64. *Turdus (Morio) ater nitens, remigibus primoribus rufis, apice nigro.*

118. BICOLOR. *Die grünlich braune capsche Drossel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 123. *die grünlich braune capsche Amsel.*

Latham, Vögel, II. I. p. 58. n. 75. *die Drossel mit weißem Steifse.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 350. n. 84. *Turdus (Bicolor) viridi fuscus, abdomine uropygique albis.*

119. ERYTHROPTERUS. *Die rothflügelige Drossel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 107. *Senegalische Pödobe.*

Latham, Vögel, II. I. p. 52. n. 59. *die rothflügelige Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 346. n. 65. *Turdus (Erythropterus) ater alis rufis, crissō rectricibusque lateribus apice albis, cauda cuneiformi.*

120. CHRYSOGASTER. *Die orangegrüne Drossel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 121. *Orangengrüne senegalische Amsel; m. e. Fig.*

Latham, Vögel, II. I. p. 58. n. 73. *die orangenbäuchige Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 350. n. 81. *Turdus (Chrysogaster) viridis fulvo splendens, subtus fulvus nitidus, remigibus quibusdā extus albis.*

β. *Die orangeblaue Drossel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 122. *Orangenblaue sene galische Amsel; m. e. Fig.*

Latham, Syn. II. I. p. 63. n. 73. Var. A. — Vögel, II. I. p. 58. n. 73. A.

Latham,

Latham, Syst. ornith. I. p. 350. n. 81. β . T.
caerulescens, pennis margine saturioribus,
corpore subtus fulvo.

121. UROVANG. Die aschfarbige madagaskarische Drossel.

Brisson, ornith. I. p. 239. n. 41. Merle cendrée
de Madagascar.

Büffon, Vögel, IX. p. 128. die aschfarbige ma-
dagaskarische Amsel; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 59. n. 76. die asch-
graue Drossel.

Latham, Syst. ornith. I. p. 351. n. 85. Turdus
(Ourovang) cinereo nigricans, capite, collo,
pectore, dorso tectricibusque alarum olivaceis,
abdomine flavescente.

27. SURINAMUS. Die surinamische Drossel.

Müller, Natursyst. II, p. 539. n. 27. die suri-
namische Drossel.

Onomat. hist. nat. VII. p. 636. die Surinamische
Amsel.

Brisson, ornithol. I. p. 251. n. 65. Merle de Su-
rinam.

Büffon, Vögel, IX. p. 164. die Surinamische
Amsel.

Latham, Syst. ornith. I. p. 356. n. 107. Turdus
(Surinamus) ater nitens, vertice, uropygio ma-
culaque laterali pectoris luteis.

Latham, Vögel, II. 1. p. 69. n. 100. die Surinami-
sche Drossel.

122. COLUMBINUS. Die Taubendrossel.

Büffon, Vögel, IX. p. 130. die philippinische
Amsel der Taubenhäuser.

Latham, Vögel, II. 1. p. 59. n. 77. die Tauben-
drossel.

Latham,

Latham, Syst. ornith. I. p. 348. n. 70. *Turdus (Columbinus) viridi-nitens*, corpore toto ver-sicolore.

123. DOMINICANUS. — *Die Dominikanerdrossel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 156. *die philippinische Amsel.*

Latham, Vögel, II. I. p. 54. n. 65. *die Dominikaner-Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 348. n. 72. *Turdus (Dominicanus) fuscus violaceo-chalybeo varie-gatus*, capite corporeque subtus fuscescente-albis.

124. CANTOR. — *Die philippinische Sangdrossel.*

Latham, Vögel, II. I. p. 55. n. 67. *die Musik-drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 348. n. 74. *Turdus (Cantor) virescenti-ater*, caeruleo violaceo que nitens, remigibus caudaque nigris.

Büffon, Vögel, IX. p. 132. (mit *Turdus Colum-binus* verwechselt.)

Sonnerat, Reis. n. Neuguin. p. 42. *der Sänger oder die kleine Merle, von der Insel Panai.*

125. MALABARICUS. — *Die gelbstirnige Drossel.* (7)

Latham, Vögel, II. I. p. 56. n. 69. *die gelbstir-nige Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 349. n. 77. *Turdus (Ma-labaricus) viridis nitens*, fronte flava, gutture nigro, maxilla inferiore striga caerulea, tectri-cibus alarum caeruleofuscis.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 150. *die kleine Amsel aus Malabar.*

126. SE-

(7) Da die Trivialbenennung *T. Malabaricus*, p. 816. n. 51. schon einmal vorgekommen, so könnte man diese *T. Flavifrons* nennen.

26. SELEUCIS. Die Seleucische Drossel.

Forskal, faun. orient. p. 6. n. 16. Turdus Seleucis: *Grylli vora*; arab. *Samarmar*.

Büffon, Vögel, IX. p. 44. not. 9. die Selencische Drossel.

28. ZEULONUS. Die Zeylanische Drossel.

Müller, Natursyst. II. p. 539. n. 28. die zeylonesische Merle.

Onomat. hist. nat. VII. p. 639. die Ceylonische Amsel.

Brisson; ornith. I. p. 241. n. 46. Merle à collier du cap de bonne espérance.

Büffon, Vögel, IX. p. 117 Ceylonische Amsel mit schwarzem Brustschild.

Latham, Vögel, II. 1. p. 57. n. 72. die Zeylanische Drossel.

Latham, Syst. ornith. I. p. 349. n. 80. Turdus (Zeylonus) viridis, subtus luteus, linea oculari utrinque in pectus nigrum ducto.

Seligmann, Vögel, IX. tab. II. die grüne Aelster von der Insel Ceylon.

A. Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Edit. XII.

p. 294. n. 14. Turdus Saxa- p. 310. n. 25. ♂. Lanius In-
tilis. faustus minor.

Das Geschlecht ist mit acht und neunzig Gattungen vermehrt. Bey der 2ten Gattung sind vier, bey der 4ten drey, bey der 11ten zwey, bey der 12ten eine, bey der 16ten eine, bey der 19ten eine, bey der 22ten drey, bey der 25ten drey Varietäten hinzugekommen.

Edit. XIII.

B. Unbe-

B. Unbestimmtre Thiere.

1. Brissons Bergamsel.

Brissot, ornith. II. p. 232. n. II. tab. 21. Fig. 2.
— Ed. in 8. I. p. 223. n. II. *Merula montana*;
Merle de Montagne. — *Turdus fusco-nigricans*, marginibus pennarum griseis, taenia supra pectus transversa, ad rufum vergente, restringibus nigricantibus.

Büffon, Vögel, IX. p. 39. *Bergamsel*.

Raj. Syn. p. 67. n. 12. *Merulae congener?*

Raj. Syn. p. 65. n. 3. *Merula Saxatilis*.

Willough. orn. p. 144. tab. 30. *Merula montana*.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 29. — Fn. Suec.

I. p. 186. *Merula montana*.

Linné, fn. suec. I. p. 186. II. p. 221. β . *Turdus nigricans*, torque fusca, rostro flavelcente.

Charleton, onom. zoic. p. 84. n. 3. *Merula Montana Germanorum*.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 301. *Merula alpina*.

Birg-Amsel; *Stein-Amsel*; *Hag-Amsel*.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Pol. p. 394. *Merula alpina Schwenkf.*

Jonston, av. p. 106. *Merula montana*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 343. n. 56. β .

Soll, nach *Büffon*, das Weibchen — nach *Latham* ein junger Vogel von *Turdus Torquatus* seyn.

2. Die Port-Jackson-Drossel.

White, voy. t. p. 157. Port Jackson Thrush.

White, Reis. n. Neu-Süd-Wallis; — in dem Magaz. merkw. Reisebeschr. V. p. 125. die *Port-Jackson-Drossel*.

Meyer, zoolog. Entdeck. p. 52. *Port-Jacksons-Drossel*.

Vielleicht eine Spielart von *Turd. Novae Hollandiae*, p. 814. n. 42.

3. Die

3. Die ockergelbe Drossel.

Mus. Carls. IV. n. 85. *Turdus Ochrogaster.*

Latham, Vögel, II. I. p. 84. n. 134. *ockergelbe Drossel.*

4. Die lauchgrüne Drossel.

Mus. Carls. IV. n. 86. 87. *Turdus prasinus.*

Latham, Vögel, II. I. p. 85. n. 135. *lauchgrüne Drossel.*

C. Neuere Gattungen.

1. *Turdus australis*; Mus. Carls. fasc. III. tab. 69.

Latham, Syst. ornith. I. p. 338. n. 43. *Turdus (Australis) corpore fusco-nigricante, pectore abdomineque albis.*

Latham, Vögel, II. I. p. 84. n. 133. *die Südindische Drossel.*

2. Persian Thrush. *Latham*, Syn. Suppl. p. 145.

Latham, Syst. ornith. I. p. 343. n. 55. *Turdus (Persicus) niger, corpore subtus cinereo, alis fuscis, sub oculis macula alba, rostro pedibusque flavis.*

Latham, Vögel, II. I. p. 82. n. 127. *die persische Drossel.*

3. Orange-headed Thrush. *Latham*, Syn. Suppl. p. 145.

Latham, Syst. ornith. I. p. 350. n. 83. *Turdus (Citrinus) cinereus, capite, collo, pectore abdomineque fulvis, crrosso maculaque alarum albis.*

Latham, Vögel, II. I. p. 83. n. 139. *die orangenköpfige Drossel.*

4. Yellow-breasted Thrush. *Latham*, Syn. II. I. p. 78. n. 105.

Latham, Vögel, II. I. p. 71. n. 105. *die gelbbrüsti ge Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 357. n. 112. *Turdus* (*Pectoralis*) *fuscus*, collo inferiore pectoreque rufescente - flavis.

Büffon, ois. III. p. 403. — Pl. enl. p. 641. f. 2.
Petit merle brun à gorge rousse de Cayenne.

5. Gingi Thrush. *Latham*, Syn. Suppl. p. 144.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 662. n. 133. *Turdus* (*Ginginianus*) *griseus*, capite nigro - cristato, alis virescenti - nigris, remigibus primoribus basi caudaque apice rufis, supra oculos fascia nuda flava.

Sommerat, voy. Ind. II. p. 194. Petit Martin de Gingi.

Latham, Vögel, II. 1. p. 82. n. 126. die Gingische Drossel.

6. Dauma Thrush. *Latham*, Syn. Suppl. p. 145.

Latham, Syst. ornith. I. p. 362. n. 134. *Turdus* (*Dauma*) *lunulis nigris*, supra *fuscus*, subtus *albus*, tectricibus *alarum minoribus nigris* albo variegatis, remigibus primoribus *fuscis* apice castaneis.

Latham, Vögel, II. 1. p. 82. n. 128. die Cowal-Drossel.

7. Black and scarled Thrush. *Latham*, Syn. Suppl. p. 146.

Latham, Syst. ornith. I. p. 363. n. 135. *Turdus* (*Speciosus*) *ater*, abdome, dorso postico, tectricibus *alarum intermediis maculis tribus remigum rectricibusque lateralibus coccineis*.

Latham, Vögel, II. 1. p. 83. n. 130. die schwarz und rothe Drossel.

8. *Turdus minutus*. *Maf Carlson*, fasc. III. tab. 68.

Latham, Syst. ornith. I. p. 363. n. 136. *Turdus* (*Minutus*) supra *fuscoc ferrugineus*, subtus *ferrugineus*.

rugineo-cinereus, gula albida, alis et cauda nigro ferrugineoque notatis.

Latham, Vögel, II. I. p. 84. n. 132. die kleinste Drossel.

108. G E S C H L E C H T. A M P E L I S. *Der Seidenenschwanz.*

Müller, Natursyst. I. p. 240. Gen. CVIII.

Leske, Naturgesch. p. 258. Gen. XL.

Borowsky, Thierreich, III. p. 171. Gen. LXVIII.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 182. Gen. XXX.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 504. Gen. LXVII.

Onomat. hist. nat. I. p. 381.

Batsch, Thiere, I. p. 317. Gen. LXXII.

Latham, Vögel, II. I. p. 86. Gen. XXXII.

Latham, Syst. ornith. I. p. 363. Gen. XXXIII.

Hermann, tab. affin. anim. p. 211.

Donndorff, Handb. d. Thiergeesch. p. 352. Gen. LXXV.

I. G A R R U L U S. *Der gemeine Seidenenschwanz.* (8)

Müller, Natursyst. II. p. 540. n. I. der Seiden-
schwanz.

Leske, Naturgesch. p. 258. der Seiden-
schwanz.

Borowsky, Thierreich, III. p. 171. der Seiden-
schwanz, tab. 68.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 182. n. I. Ampelis
(Garrulus) occipite cristato; racheos s. costae
remigum secundariorum apice coccineo com-

X 2 plana-

(8) Gewicht 3 3/4 bis 4 Loth. Die Anzahl der hornartigen Spitzen an den Flügelfedern ist sehr verschieden. Gewöhnlich hat das Männchen 9, das Weibchen nur 5. Vielleicht kommt es dabey wohl mit auf das Alter des Vogels an. Schade, dass noch Niemand bisher die Jungen gesehen hat.

- planato. *Seidenschwanz, Pfesservogel; Sterbevogel; Röhmer.*
- Bechstein**, Naturgesch. I. p. 505. *der gemeine Seidenschwanz; die Haubendrossel.*
- Bechstein**, Naturgesch. Deutschl. III. p. 614. *der Seidenschwanz.*
- Funke**, Naturgesch. I. p. 234. *die Haubendrossel.*
- Ebert**, Naturl. II. p. 130. *der Seidenschwanz.*
- Halle**, Vögel, p. 302. n. 268. *das Seidenschwänzchen*, Fig. 16.
- Meyer**, Thiere, I. tab. 70. *Seidenschwanz.*
- Gatterer**, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 398. n. 329. *der Seidenschwanz, Seidenschweif.*
- Neuer Schaupl. d. Nat.** VIII. p. 169. *Seidenschwanz.*
- Onomat. hist. nat.** I. p. 384. *der Seidenschwanz; böhmische Schwätzer.*
- Handb. der deutsch. Thiergeesch.** p. 127. *der Seidenschwanz.*
- Klein**, av. p. 70. n. 34. *Turdus cristatus, rostro brevi ad ortum lato.*
- Klein**, Vorbereit. p. 133. n. 34. *Seidenschwanz.*
- Klein**, verb. Vögelhist. p. 69. n. 33. *Seidenschwanz; böhmische Haubendrossel.*
- Klein**, Stemmat. av. p. 11. tab. 13. Fig. 5. a—c.
- Gesner**, Vögelb. p. 29. *Behemle, Zinzerelle; Seidenschwanz;* m. e. schl. Fig.
- Briffon**, ornith. I. p. 250. n. 63. *Jaseur de Boheme.*
- Büffon**, Vögel, IX. p. 221. *der Seidenschwanz; m. e. Fig.*
- Batsch**, Thiere, I. p. 336. *der Seidenschwanz.*
- Latham**, Vögel, II. 1. p. 86. n. 1. *der gemeine Seidenschwanz.*
- Latham**, Syst. ornith. I. p. 369. n. 1. *Ampelis (Garrulus) occipite cristato, remigibus secundariis apice membranaceo colorato.*

Befeke,

- Beséke, Vögel Curl. p. 74. n. 162. der Seiden-schwanz.
- Siemßen, meklenb. Vögel, p. 95. n. 1. gemeine Seidenschwanz.
- Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 417. der Seiden-schwanz.
- Fischer, Livil. p. 95. n. 141. gemeiner Seiden-schwanz.
- Fischer, Zusätze zur N. G. von Livil. p. 48.
- Lepechin, Tageb. der russ. Reis. II. p. 5. Seiden-schwänze.
- White, N. G. von Engl. p. 20. p. 62. n. 17. Sei-den-schwanz.
- Linné, Abhandl. II. p. 301. n. 19. der Seiden-schwanz.
- Lange, Briefe zur Naturgeschich. p. 38. Seiden-schwanz.
- Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 18. n. 2. Böhmlein.
- Schwed. Abhandl. XXXVIII. p. 299. Seiden-schwänze.
- Borkhausen, Magazin, I. p. 159. n. 28. europäi-scher Seidenschwanz.
- Götz, Naturgesch. einig. Vögel, p. 44. der Sei-den-schwanz.
- Naturforsch. I. p. 71. XVII. p. 85. XXII. p. 127. XXV. p. 14. Seidenschwanz.
- Lichtenberg, Magaz. für das Neuste, etc. I. 3. p. 66. Seidenschwänze.
- Zorn, Petinotheol. II. p. 315. 559. der Seiden-schwanz.
- Döbel, Jägerprakt. I. p. 56. Seidenschwanz.
- Naumann, Vogelsteller, p. 88. Seidenschwanz.
- Beckmann, Bibl. I. p. 187. VIII. p. 538. der Sei-den-schwanz.
- Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 750. der Seiden-schwanz.

- Meidinger*, Vorles. I. p. 148. der gemeine Seiden-schwanz.
- Anweis. Vogel zu fang. p. 121. Seidenschwanz.
- André u. Bechstein*, Spazierg. II. p. 308.
- Oekonom. Zool. p. 96. n. 38. der europ. Seiden-schwanz.
- Jablonsky*, allgem. Lex. p. 1057. Seidenschwanz.
- Neue Mannigfaltigk. II. p. 204. Seidenschwanz.
- Eberhard*, Thiergesch. p. 73. der Seidenschwanz.
- Gorze*, Natur, Menschenl. u. Vorsth. I. p. 614. II. p. 242. III. p. 257. der Seidenschwanz.
- Wirsing*, Vögel, tab. 4. Seidenschwanz.
- Onomatol. forestal. I. p. 402.
- Piller*, element. hist nat. I. p. 40. Ampelis Gar-rua.
- Fränkische Samml. II. p. 439.
- Wittenb. Wochenbl. 1777. p. 278.
- Gothaisch. Hofkalender, 1780. p. 64.
- Linné*, Syst. Nat. Ed. II. p. 56. Garrulus bohe-micus.
- Linné*, Syst. Nat. Ed. VI. p. 30. n. 1. Garrulus Bohemicus.
- Linné*, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 95. n. 10. Lanius (Garrulus) remigibus secundariis apice mem-branaceo colorato, cauda integra.
- Müller*, zool. dari. prodr. p. 30. n. 243. Ampelis (Garrulus) occipite cristato, remigibus secun-dariis apice membranaceo colorato.
- Kramer*, Austr. p. 363. n. 1. Ampelis remigibus quibusdam apice membranaceo terminatis. Zu-serl; Seidenschweiff.
- Brünniche*, ornith. bor. p. 8. n. 25. 26. Lanius Gar-rulus.
- Moehring*, av. gen. p. 42. n. 29. Ampelis.
- Schwenckfeld*, av. Silef. p. 229. Bombycilla. — Fulio; Galerita varia; Microphoenix; Incen-diaria;

diaria; Gallulus Sylvester. Seidenschwanz, Schnee-Leschke; Behemle; Schneevogel; Wipflerz.

Charleton, onom. zoic. p. 68. n. 5. Garrulus Bohemicus Gesneri.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 381. Garrulus Bohemicus.

Jonston, av. p. 44. Garrulus Bohemicus Gesn. f. Ampelis Aldrov.

Salerne, hist. nat. des oiseaux, p. 253.

Forskal, descript. anim. p. 7. n. 6. Lanius Ampelis.

Gerin. ornithol. II. p. 42. tab. 106.

Levin, brit. Birds, II. tab. 65.

Hermann, tab. affin. anim. p. 211. Ampelis Garrulus.

Aristot. hist. anim. I. 9. c. 16. Γναφαλος?

Donndorff, Handb. d. Thiergefch. p. 351. n. 1. der gemeine Seidenschwanz.

β. Der carolinische Seidenschwanz. (9)

Pennant, arct. Zool. II. p. 322. n. 123. der Prip.

Klein, av. p. 70. n. 35. Turdus garrulus carolinensis.

Klein, Vorbereit. p. 133. n. 35. grauer Seidenschwanz.

Klein, verb. Vögelhist. p. 70. n. 34. grauer Seidenschwanz, p. 166. n. 2. carolinischer Seidenschwanz.

Klein, av. p. 98. n. 11. Fringilla cristata Xomotl dicta.

Klein, Vorbereit. p. 181. n. 11. Strausfinke.

Klein, verb. Vögelh. p. 87. n. 11. Straußfink.

X 4 Halle,

(9) Länge, nach Pennant nur 7. Zoll. Auch sollen beim Weibchen die rothen Anhänge an den Flügeln fehlen. Brisson führt ihn als eine eigne Gattung auf.

Halle, Vögel, p. 304. n. 269. der schwarzbraune karolinische Seidenschwanz.

Brisson, ornith. I. p. 251. n. 64. Jaseur de la Caroline.

Büffon, Vögel, IX. p. 249. der karolinische Seidenschwanz des Catesby und Edwards; mit 2. Figg.

Latham, Syst. ornith. I. p. 364. n. 1. β.

Latham, Syn. II. 1. p. 93. n. 1. Var. A. — Vögel, II. 1. p. 88. n. 1. Var. A.

Seligmann, Vögel, II. tab. 92. der carolinische Seidenschwanz (fig. Catesb.)

Seligmann, Vögel, VII. tab 32. der carolinische Seidenschwanz. (fig. Edw.)

Götz, Naturgesch. einiger Vögel, p. 49.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 5. n. 10. β. Garulus carolinensis.

2. POMPADORA. *Der Pompadour.*

Müller, Natursyst. II. p. 541. n. 2. der Pompadur.

Borowsky, Thierreich, III. p. 172. n. 2. der Pompadur.

Brisson, ornith. I. p. 254. n. 5. Cotinga pourpré.

Büffon, Vögel, XIII. p. 141. der Pacapac oder Pompadour; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 91. n. 6. der Pompadur-Seidenschwanz.

Latham, Syst. ornith., I. p. 365. n. 6. Ampelis (Pompadora) purpurea, tectricibus alarum proximis ensiformibus elongatis carinatis rigidis.

Seligmann, Vögel, IX. tab. 31. der Pompadour.

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 750. der Pacapac.

Hermann, tab. affin. anim. p. 213. Ampelis Pompadora.

β. *Der*

β. *Der purpurgraue Pompadour.* (10)

Briffon, ornithol. I. p. 255. n. 6. *Cotinga gris-pourpré.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 144. *der purpurgraue Pacapac.*

Latham, Syn. II. 1. p. 97. A. Grey Chatterer.

Latham, Syst. ornith. I. p. 366. n. 6. β.

γ. *Der graubraune Pompadour.*

δ. *Der graue Pompadour.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 145. *der graue Cotinga.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 91. n. 6. Var. A. *der graue Seidenschwanz; Pacapat.*

3. CARNIFEX. *Der rothe Seidenschwanz.*

Müller, Natursystem, II. p. 542. n. 3. *der Mörder.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 173. n. 3. *der rothe Seidenschwanz.*

Halle, Vögel, p. 293. n. 244. *die rothe Surinamische Drossel.*

Klein, av. p. 68. n. 12. *Turdus totus ruber.*

Klein, Vorbereit. p. 128. n. 12. *Rothe Wittewal.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 67. n. 12. *rother Witwal.*

Briffon, ornith. I. p. 255. n. 7. *Cotinga rouge.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 146. *Louette, oder der rothe Cotinga aus Cayenne;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 91. n. 7. *der rothe Seidenschwanz.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 366. n. 7. *Ampelis (Carnifex) ruber, fascia oculari, remigum reticulimque apicibus nigris.*

Seligmann, Vögel, II. tab. 77. *der surinamische Rothvogel.*

Bankroft, N. G. von Guiana, p. 92. der rothe
Neuntödter oder Fleischervogel von Surinam.
Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 751. der rothe
cayennische Cotinga.

Moehring, av. gen. p. 79. n. 101. Fringillae ad-
finis.

Hermann, tab. affin. animi. p. 213. Ampelis Car-
nifex.

8. COCCINEA. Der schillernde Seidenschwanz.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 366. n. 8. Ampelis
(Cuprea) olivacea, pennis apice cupreo-auran-
tiis, pileo rubro, genis aurantiis, pectore et
abdomine sanguineis margine viridi. nitentibus.

Latham, Vögel, II. I. p. 94. n. 11. der schillern-
de Seidenschwanz.

4. COTINGA. Der blaubrüstige Seidenschwanz.

Müller, Natursyst. II. p. 542. n. 4. der brasiliani-
sche Seidenschwanz.

Müller, Natursyst. Suppl. p. 147. n. 4. der Fünf-
fleck.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 166. n. 1. purpur-
brüstiger blauer Witteval.

Brisson, ornith. I. p. 252. n. 1. Cotinga.

Buffon, Vögel, XIII. p. 129. der Blaugürtel. Co-
tinga mit dem Orden; in e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 89. n. 2. der rothbrüsti-
ge Seidenschwanz.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 364. n. 2. Ampelis
(Cotinga) nitidissima caerulea, subtus purpurea,
alis caudaque nigris.

Seligmann, Vögel, VII. tab. 31. der blaue Mana-
kin mit purpurfarbner Brust.

Seligmann, Vögel, IX. tab. 30. der Manakin mit
purpurfarbner Brust.

Salerne,

Salerne, ornith. p. 174. Grive de Rio-caneiro;
Cotinga ou Grive au cordon bleu.

5. MAYNANA. *Der Seidenvogel.*

Müller, Natursyst. II. p. 542. n. 5. *der majennische Seidenschwanz.*

Briffon, ornith. I. p. 253. n. 2. *Cotinga de Maynas.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 139. *der Cotinga mit seidenartigen Federn;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 90. n. 5. *der feidenartige Seidenschwanz.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 365. n. 5. Ampelis (Maynana) nitida caerulea, gula violacea, remigibus intus albis.

Salerne, ornith. p. 174. Grive ou Cotinga de Maynas.

Hermann, tab. affin. anim. p. 213. Ampelis Maynana.

6. CAYANA. *Der cayennische Seidenschwanz.*

Müller, Natursyst. II. p. 542. n. 6. *der cajennische Seidenschwanz.*

Halle, Vögel, p. 223. n. 161. *der mexicanische schwarzblaue Würger.*

Klein, av. p. 54. n. 6. *Lanius Ococolin dictus.*

Klein, Vorbereit. p. 102. n. 6. *der Okokolin.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 53. n. 31. *Mexikaner Neuntödter.*

Briffon, ornithol. I. p. 253. n. 3. *Cotinga de Cayenne.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 134. *der Guereiva; Cayennische Cotinga;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 89. n. 3. *der rothkehlige Seidenschwanz.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 365. n. 3. Ampelis (Cayana) nitida caerulea, collo subtus violaceo, remigi-

remigibus rectricibusque nigris, caeruleo-marginaliatis.

Seba, thes. II. p. 102. tab. 96. n. 3. *Ococolin*, species pici.

De Laet, nov. orb. p. 542. *Quereiva*.

Fonston, av. p. 180. *Quereiva*.

7. TERSA. *Der Tersinne*.

Müller, Natursyst. II. p. 543. n. 7. *der bunte Seidenschwanz*.

Büffon, Vögel, XIII. p. 137. *der Tersinne*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 365. n. 4. *Ampelis* (*Tersa*) *nitida-caerulea*, dorso nigro, abdomine albo-flavescente.

Latham, Vögel, II. I. p. 90. n. 4. *der blaubrüstige Seidenschwanz*.

9. CARUNCULATA. *Der weiße Seidenschwanz*.

Briffon, ornithol. I. p. 257. *Cotinga blanc*.

Büffon, Vögel, XIII. p. 152. *der Guira-Panga*, oder der *wiße Cotinga*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 92. n. 8. *der Seidenschwanz mit Fleischzapfen*, tab. 41.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 366. n. 9. *Ampelis* (*Carunculata*) *alba*, uropygio, remigibus rectricibusque flavescente-adumbratis, fronte denudata, elongata, carunculata.

De Laet, nov. orb. p. 557. *Guira-panga*.

Hermann, tab. affin. anim. p. 213. *Ampelis alba*.

10. VARIEGATA. *Der Averano. (Sommervo-*

gel).

Briffon, ornithol. I. p. 256. n. 9. *Cotinga tacheté*.

Büffon, Vögel, XIII. p. 155. *der Averano*; gefleckte *Cotinga*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 93. n. 9. *der bunte Seidenschwanz*.

Latham,

Latham, Syst. ornithol. I. p. 367. n. 10. Ampelis (Variegata) cinerea, nigrante virescenteque variegata, capite obscure fusco, remigibus nigrantibus, sub gula carunculis duabus carnosis elongatis nigris.

Pison, hist. nat. p. 93. Guira-punga.

Fonston, av. p. 196. Guirapunga, p. 197. Ave de Verano.

Maregrav. Brasil. p. 201. Guira-punga Brasilien-sibus.

Hermann, tab. affin. anim. p. 211. 214. Ampelis Averano.

Domdorff, Handb. d. Thiergesch. p. 353. n. 2. der Averano.

II. CRISTATA. Der gehäubte Seidenschwanz.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 368. n. 14. Ampelis (Cristata) capite cristato, alis caudaque nigris, abdomine genisque albis, dorso rubro.

Latham, Vögel, II. 1. p. 94. n. 12. der Kronen-Seidenschwanz.

A. Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Das Geschlecht ist mit 4. Gattungen vermehrt. Bey der 2ten Gattung sind vier Varietäten aus einander gesetzt.

B. Neuere Gattungen:

I. Der rothflüglige Seidenschwanz; in Afrika.

Latham, Syn. Suppl. p. 146. Red-winged Chatterer.

Latham, Vögel, II. 1. p. 93. n. 10. der rothflügliche Seidenschwanz.

Latham,

Latham, Syst. ornith. I. p. 367. n. 12. Ampelis
(Phoenicia) caeruleo-nigra, alarum tectricibus
minoribus fulvo-coccineis.

2. Der goldgelbe Seidenschwanz.

Mus. Carls. fasc. III. tab. 70. Ampelis luteus.

Lathami, Vögel, II. I. p. 94. n. 13. der gelbe Sei-
denschwanz.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 368. n. 13. Ampelis
(Lutea) corpore supra fusco-olivaceo, subtus
uropygio rectricibusque lateralibus luteo, ma-
cula faucium alba.

* **EINGESCHÖBENES GESCHLECHT.**
Colius. *Der Colius*. (*Kegelschnabel*; *Ke-
gelschnäbler*; *Keilschwanz*.)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 189. Gen.
LXXIV.

Brisson, ornith. I. p. 393. Gen. XXXVI.

Büffon, Vögel, XIII. p. 53. sqq.

Latham, Vögel, II. I. p. 95. Gen. XXXIII.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 368. Gen. XXXIV.

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 744. sqq.

Donndorff, Handb. der Thiergeesch. p. 353. Gen.
LXXVI.

i. CAPENSIS. *Der capische Colius.*

Müller, Naturfyst. II. p. 549. n. 12. der Kegel-
schnabel.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 189. der ka-
pische Kegelschnäbler.

Brisson, ornith. I. p. 394. n. 1. Coliou du cap de
bonne esperance.

Büffon, Vögel, XIII. p. 59. der kapsche Kegel-
schnabel; in. e. Fig.

Onomat. hist. nat. IV. p. 844. *der Emmerling mit dem langen keilförmigen Schwänze vom Vorgebürgen der guten Hoffnung.*

Handb. der Naturgesch. II. p. 255. *der Coliou auf dem Vorgeb. d. g. Hoffn.*

Latham; Syst. ornith. I. p. 368. n. 1. *Colius (Capensis) rectricibus extimis externe albis, corpore cinereo subtus albido.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 95. n. 1. *der capsche Kegelschnäbler.*

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 744. *der Coliou.*

Donndorff, Handb. der Thiergeesch. p. 354. *der capsische Kegelschnäbler.*

2. SENEGALENSIS. *Der senegalische Colius.*

Müller, Natursyst. II. p. III. n. 5. *der senegallische Langschwanz.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 660. *der Würger mit dem Busche aus Senegall.*

Handb. der Naturgesch. II. p. 256. *der Coliu von Sinegal.*

Brisson, ornithol. I. p. 394. n. 2. *Coliou hupé du Sénégal.*

Büffon, Vögel, II. p. 241. *der langgeschwänzte senegalische Würger.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 61. *der gehäubte senegallische Colius; m. e. Fig.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 96. n. 2. *der Senegallische Kegelschnäbler.*

Latham; Syst. ornithol. I. p. 368. n. 2. *Colius (Senegalensis) vinaceo-griseo-caeruleo, capite cristato.*

Linné, Syst. Nat. Ed. XII. I. p. 134. n. 5. *Lanius (Macrourus) cauda cuneiformi longissima caeruleo, capite cristato.*

3. ERYTHROPUS. Der rothfüßige Colius.

Latham, Vögel, II. I. p. 96. n. 3. der weißrückige Kegelschnäbler, tab. 42.

Latham, Syst. ornith. I. p. 369. n. 3. *Colius (Leuconotus) cristatus cinereus subtus albus*, dorso infimo uropygioque castaneo-purpureis, medio vitta longitudinali alba.

4. STRIATUS. Der gestreifte Colius.

Büffon, Vögel, XIII. p. 63. der gestreifte *Colius*.

Latham, Vögel, II. I. p. 97. n. 4. der gestreifte Kegelschnäbler.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 369. n. 4. *Colius (Striatus) griseo-rubescens*, subtus fuscō transversim striatus, pectore griseo-ruso, abdomine ruso, cauda viridi.

5. PANAYENSIS. Der *Colius von Panay*.

Büffon, Vögel, XIII. p. 64. der *Colius von Panay*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 97. n. 5. der *Panayische Kegelschnäbler*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 369. n. 5. *Colius (Panayensis) griseo-cinereus*, capite cristato, pectore striis transversis nigris, abdomine rufo.

Sonnerat, Reis. nach Neuguinea, p. 42. der *Koliu von Panai*; m. e. Fig.

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 746. der *Coliou von der Insel Panay*.

A. Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Das ganze Geschlecht ist hier neu; findet sich aber schon beym *Briffon*. Die 1ste und 2te Gattung sind aus andern Geschlechtern hieher versetzt; die übrigen drey sind neu hinzugekommen.

B. Neuere

B. Neuere Gattungen.

1. Der grüne Colius in Neuholland.

Latham, Syn. Suppl. p. 147. Green Coly.

Latham, Vögel, II. I. p. 97. n. 6. der grüne Kegelschnäbler.

Latham, Syst. ornith. I. p. 369. n. 6. Colius (Viridis) viridis nitens, sincipite palpebrisque nigrosericeis, remigibus rectricibusque nigris antibus.

2. Der aschgraue indianische Colius.

Latham, Syn. Suppl. p. 147. Indian Coly.

Latham, Vögel, II. I. p. 97. n. 7. der Indische Kegelschnäbler.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 370. n. 7. Colius (Indicus) cinereus, subtus rufus, sincipite gulaque flavis, loris orbitisque nudis flavis.

109. GESCHLECHT. LOXIA. Der Kernbeißer.
(Dick Schnabel).

Müller, Natursyst. II. p. 544. Gen. CIX.

Leske, Naturgesch. p. 259. Gen. XLI.

Borowsky, Thierreich, III. p. 131. Gen. LXI.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 183. Gen. XXXI.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 506. Gen. LXVIII.

Ebert, Naturl. II. p. 131.

Halle, Vögel, p. 396. Gen. IV.

Onomat. hist. nat. IV. p. 833.

Pennant, arct. Zool. II. p. 323.

Klein, av. p. 94. Trib. IV.

Brisson, ornith. I. p. 370. Gen. XXXIV. Coccothraustes, p. 305. Gen. XXXVII. Pyrrhula, p. 401. Gen. XXXVIII. Loxia.

Batsch, Thiere, I. p. 317. Gen. XXXVI.

Latham, Vögel, II. I. p. 99. Gen. XXXIV.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 370. Gen. XXXV.

Hermann, tab. affin. anim. p. 216.

Donndorff, Handb. der Thiergeesch. p. 354. Gen. LXXVII.

I. CURVIROSTRA. Der Kreuzschnabel. (1)

Müller, Natursystem, II. p. 544. n. 1. der Kreuzschnabel.

Leske, Naturgesch. I. p. 259. n. 1. der Kreuzschnabel.

Borowesky, Thierreich, I. p. 131. n. 1. der Kreuzschnabel. Tab. 61.

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 183. n. 1. *Loxja* (*Curvirostris*) *rostro forcicato*. Kreuzschnabel; Krummschnabel; Grünnitz.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 507. n. 1. der Kreuzschnabel.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 595. der Kreuzschnabel; Grünnitz.

Funk, Naturgesch. I. p. 332. der Kreuzschnabel.

Ebert, Naturl. II. p. 132. der Kreuzvogel.

Halle,

(1) Die Grösse einer Lerche sagt wohl zu wenig. Er ist noch grösser als ein Domptaffe. — Falsch ist es, wenn man im Allgemeinen behauptet, dass sein Gesang schlecht sey; er ist vielmehr, besonders bey abgerichteten Vögeln, der Nachtigall ihrem ähnlich. — Diejenigen, die man in den Stuben hält, geben zwar im October und November oft ein unangenehmes lautes Geschrey von sich, wovon aber wahrscheinlich ihr Naturtrieb, sich kurz vor dem Winter zu paaren, die Ursach ist — Die vornehmste Nahrung dieses Vogels ist der *Cimex abievis*, der unter den sich fest anschliessenden Schuppen der Tannenzapfen Schutz wider den Winter sucht. Die Kreuzvögel brechen gegen den Winter eine Menge Zapfen ab, um aus ihnen die Wanzen hervorzuholen, und sie sind ihnen vielleicht ein Aphrodisiacum, dass eben desfalls so früh ihre Begattungen und Geburten erfolgen. — Zuweilen finden sich auch Kreuzschnäbel, deren Oberkiefer von der rechten zur linken gebogen ist, und alsdann ist auch der Unterkiefer anders gekehrt. — Kann über 10. Jahr alt werden.

Halle, Vögel, p. 404. n. 416. *der Tannenvogel*;
Tannenpapagai; *Zapsenbeißer*; *Zapfennager*.
Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 398 n.
 330. *der Kreuzschnabel*; *Krummschnabel*; *Gri-
 nitz*.

Pennant, archt. Zool. II. p. 323. n. 124. *der Kreutz-
 schnabel*.

Beckmann, Naturhist. p. 53. d. *der Kreuzschnabel*.
 Neuer Schaupl. der Nat. IV. p. 769. *Kreuzschna-
 bel*.

Onomat. hist. nat. III. p. 536. *der Kreuzvogel*.
 Handb. der Naturgesch. II. p. 258. *der Creuzschna-
 bel*, tab. 4.

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 127. *Kreutz-
 schnabel*.

Klein, av. p. 96. n. 13. *Coccothraustes curvirostra*.

Klein, Vorbereit. p. 178. n. 13. *Kreuzschnabel*.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 96. n. 16. *Kreutz-
 schnabel*.

Klein, stemmat. av. p. 19. tab. 19. fig. 19. a. b.

Gesner, Vögelb. p. 355. *Kreuzvogel oder Krumb-
 schnabel*; Fig. p. 356.

Brisson, ornith. I. p. 401. n. 1. *Bec-croisé*.

Büffon, Vögel, IX. p. 21. *der Kreuzschnabel*;
 m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 350. *der Kreuzschnabel*.

Latham, Vögel, II. 1. p. 99. n. 1. *der gemeine
 Kreuzschnabel*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 370. n. 1. *Loxia (Cur-
 virostra) rostro forficato, corpore versicolore,
 remigibus rectricibusque fuscis, oris exteriori-
 bus vitidi-olivaceis, cauda furcata*.

Beseke, Vögel Kurl. p. 75. n. 163. *der Kreuzschna-
 bel*.

Siemsen, meklenb. Vögel, p. 97. n. 1. *der Kreuz-
 schnabel*; *Krüützschnabel*.

- Bock*, N. G. von Preuss. IV. p. 418. *der Kreutzschnabel*.
Fischer, Liv. p. 96. n. 142. *Kreuzschnabel*.
White, N. G. von Engl. p. 15. p. 62. n. 16. *Kreuzschnabel*.
Pontoppidan, Dännem. p. 173. n. 1. *Korsnäh.*
Seligmann, Vögel, VIII. tab. 93. *der Krummschnabel; ein Er und eine Sie*.
Pennant, britt. Thiergesch. p. 120. *Krummschnabel*.
Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 165. n. 200. *der Krummschnabel*.
Naturforsch. II. p. 66. — XII. p. 92. — XVII. p. 86. n. 176. — XXI. p. 197. n. 5. — XXII. p. 142 — XXV. p. 17. *Kreuzschnabel; Kreuzvogel*.
Lichtenberg, Magazin für das Neueste, etc. I. 3. p. 67. *Kreuzschnäbel*.
Zorn, Petinotheol. II. p. 344. *der Krumm-Schnabel*.
Döbel, Jägerprakt. I. p. 57. *Grinitz; Creutz-Vogel*.
Naumann, Vogelsteller, p. 130. *Kreutzvogel*.
André u. Bechstein, Spazierg. I. p. 21. *der Kreuzschnabel*.
Bechstein, Must. schädl. Thiere, p. 134. n. 2. *der Kreuzschnabel*.
Schwed. Abhandl. XIX. p. 134. *Kreuzschnabel*.
Neue schwed. Abhandl. IV. p. 49. *Kreuzschnäbel*.
Goeze, nützl. Allerl. II. p. 283. n. 7. *der Kreuzschnabel*.
Goeze, Natur, Menschenl. und Vorl. I. p. 614. V. p. 297. *der Kreuzschnabel*.
Smellie, Philosoph. der Naturgesch. II. p. 255.
Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 620. *der Kreuzschnabel*.

- Borkhausen*, Magaz. I. p. 137. n. 1. *Kreuzschnabel*.
Beckmann, Bibl. V. p. 383. VI. p. 162. VIII. p. 538.
der Finnische Papagey; Kreuzvogel.
Erxleben, phys. Bibl. III. p. 278. *Kreutzschnabel*.
Oekon. Zool. p. 97. n. 93. der *Kreutzschnabel*.
Meidinger, Vorles. I. p. 148. n. 1. der *Kreuzschnabel*.
Jablonsky, allgem. Lex. p. 558. *Krinitz*.
Anweis. Vögel zu fang. p. 352. der *Krummschnabel*.
Forst-Fisch- und Jagdlex. II. p. 598. *Krinitz*; *Grünitz*; *Grönitz*.
Mannigfaltigk. 1776. p. 463. *Kreutzschnabel*.
Börner, schles. ökonomin. Nachr. 1781. p. 100.
Loxia curvirostra.
Krinitz, Encycl. XLIX. p. 267. *Kreuz-Vogel*.
Hannov. Seltenheit. der Nat. I. p. 278.
Allgem. Gesch. d. neuesten Entdeck. in Russl. und
Pers. VI. p. 241.
Schrift der berlin. Gesellsch. N. Fr. VII. p. 465. n.
53. der *Kreutzschnabel*.
Eberhard, Thiergesch. p. 82. der *Kreutzschnabel*.
Koelreuter, act. hist. acad. Palat. III. p. 62.
Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 56. Loxia.
Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 30. n. 2. Curvirostra.
Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 171. n. 1. Loxia
(Curvirostra) rostro forficato.
Müller, zool. dan. prodr. p. 30. n. 244. Loxia
(Curvirostra) rostro forficato.
Moehring, av. gen. p. 40. n. 24. Loxias.
Schwenckfeld, av. Siles. p. 252. Curvirostra. *Krinitz*; *Krinis*.
Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 391. Loxia;
Crucifera, Cruciata.

Sibbald, Scot. p. 254. *Loxia*.

Hermann, tab. affin. anim. p. 216. 218. *Loxia curvirostra*.

Schaefer, element. ornithol. tab. 45.

Levin, britt. Birds II. tab. 66.

Faun. Arragon. p. 85. — Hist. prov. II. p. 317.

Bomare, dictionn. I. p. 463. *Bec-croisé*.

Donndorff, Handb. der Thiergeesch. p. 354. n. 1. *der Kreuzschnabel*.

Donndorff, Natur und Kunst, I. p. 553.

β. *Der braunrote Kreuzschnabel mit rothem Kopfe.*

Brisson, ornith. I. p. 403. A. *Bec-croisé roussatre*.

Büffon, Vögel, IX. p. 32. *der pyrenäische Kreuzschnabel*.

Barrere, ornithol. cl. 3. gen. 18. sp. 2. *Loxia pyrenaica ex subrufo nigricans, cervice et capite coccineis*.

γ. *Der größere Kreuzschnabel mit dickem und kürzerem Schnabel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 48. *der große Krummschnabel; m. e. Fig.*

Krünitz, Encycl. XLIX. p. 284. *der große Kreuz-Vogel.*

Borkhausen, Magaz. I. p. 139. *Loxia (Pytyopsitacus) rostro subforficato, digito medio breviore.*

13. LEUCOPTERA. *Der weißflüglige nordamerikanische Kernbeißer.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 323. ad n. 124. *die amerikanische Art.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 371. n. 2. *Loxia (Falcirostra) rostro forficato, corpore croceo-coccineo, alis nigris, fasciis duabus albis, remigibus secundariis apice albis, cauda nigra.*

Latham,

Latham, Syn. Suppl. p. 148. White-winged Crossbill.

Latham, Vögel, II. I. p. 103. der weißflügelige Kreuzschnabel.

50. PSITTACEA. Der Papageykernbeißer.

Latham, Syst. ornith. I. p. 371. n. 3. Loxia (Psittacea) olivaceo-fusca, capite colloque flavis, mandibula superiore adunca, inferiore subtruncata.

Latham, Vögel, II. I. p. 104. n. 3. der papagey-schnäbelige Kernbeißer, tab. 43.

2. COCCOTHRAUSTES. Der gemeine Kernbeißer. (2)

Müller, Natursyst. II. p. 546. n. 2. der Dickschnabel, tab. 25. fig. 1.

Leske, Naturgesch. p. 259. n. 2. der Kirschfink.

Borovský, Thierreich, III. p. 132. n. 2. Kirschfink; Steinbeißer.

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 183. n. 2. Loxia (Coccothraustes) linea alarum alba, remigibus mediis apice rhombatis, rectricibus latere tenuiore baseos nigris; Kernbeißer, Kirschknäpper.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 510. n. 4. der Kirschfink; Dickschnabel.

Funke, Naturgesch. I. p. 303. der Kernbeißer.

Ebert, Naturl. II. p. 131. der Kirschfink.

Halle, Vögel, p. 396. n. 405. der Kirschenfink; Fichtenhacker; Fig. 25.

Meyer, Thiere, II. tab. 75. Kernbeißer.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 399. n. 332. der Kernbeißer; Kirschenschneller; Klepper; Kirschleske.

Pennant, arct. Zool. II. p. 329. C. der Kernbeißer.

- Neuer Schaupl. der Natur. V. p. 457. *Kernbeißer*.
 Onomat. histor. natur. III. p. 35. *der Kernbeißer*;
Nußbicker; *Nuß- oder Tannhäger*.
 Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 128. *Kern-
beißer*.
 Beckmann, Naturhist. p. 52. a. *der Kirschenfink*.
 Klein, av. p. 94. n. 1. *Coccothraustes*, simpli-
citer.
 Klein, Vorbereit. p. 175. n. 1. *brauner Steinbeißer*;
Kirschleske.
 Klein, verbess. Vögelhistor. p. 94. n. 1. *brauner
Steinbeißer*; *Kirschfink*; *Klepper*.
 Klein, stemmat. av. p. 19. tab. 19. fig. II. a. b.
 Gesner, Vögelb. p. 486. *Steinbeißer*; *Klepper*;
Kernbeiß; *Bollenpick*; m. e. gut. Fig.
 Brisson, ornith. I. p. 370. n. 1. *Gros-bec*.
 Buffon, Vögel, X. p. 5. *der Kernbeißer*; m. 2.
 Figg. M. u. W.
 Batsch, Thiere, I. p. 348. *der gemeine Kernbeißer*.
 Latham, Syn. Suppl. p. 148. *Grosbeak*.
 Latham, Vögel, II. 1. p. 104. n. 4. *der gemeine
Kernbeißer*.
 Latham, Syst. ornithol. I. p. 371. n. 4. *Loxia*
 (*Coccothraustes*) *cinerero-castanea*, *linea ala-
rum alba*, *remigibus mediis apice rhombeis*,
rectrieibus latere tenuiore baseos nigris.
 Seligmann, Vögel, VI. tab. 83. *brauner Kern-
beißer*.
 Siemssen, meklenb. Vögel, p. 98. n. 2. *der Kern-
beißer*; *Kaarnbicker*.
 Bosc. N. G. von Preuss. IV. p. 420. *der Dick-
schnabel*.
 Fischer, Liv. p. 96. n. 144. *Dickschnabel*.
 Cetti, Sardin. II. p. 179. *der Kernbeißer*.
 White, N. G. von Engl. p. 15. p. 62. n. 15. *Kirsch-
fink*.

Pallas,

- Pallas*, nord. Beytr. IV. p. 15. *Dickschnabel*.
Pontoppidan, Dännem. p. 173. n. 2. *Kirsebärfugl*.
Linne, Abhandl. II. p. 302. n. 122. *der Kirschfink*.
Pennant, britt. Thiergesch. p. 118. tab. 56. fig. 1. *Kernbeißer*.
Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 166. n. 201. *der Kernbeißer*.
Borkhausen, Magazin, I. p. 139. n. 2. *Dickschnabel*; *Kirschfink*.
Naturforsch. XVII. p. 87. — XXII. p. 143. — XXV. p. 19. *Kernbeißer*.
Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 620. *der Kirschfink*.
Zorn, Petinotheol. II. p. 325 *der Kirsch-Fink*.
Döbel, Jägerprakt. I. p. 56. *Kern-Beißer*; *Kirsch-Schneller*; *Kirsch-Knepper*.
Noumann, Vogelsteller, p. 142. *der Kernbeißer*,
Bechstein, Mußt. schädl. Th. p. 133. n. 1. *der Kirschfink*.
André u. Bechstein, Spazierg. II. p. 70. III. p. 312.
Krünitz, Encycl. XXXIX. p. 191. *Kirschfink*.
Goeze, nützl. Allerl. II. p. 379. *Kernbeißer*.
Meidinger, Vorles. I. p. 148. n. 2. *der Kirschfink*.
Anweis. Vögel zu fang. p. 338. *der Kernbeiß*.
Beckmann, Bibl. VIII. p. 538. *der Kirschfink*.
Jablonsky, allgein. Lex. p. 526. *Kernbeißer*.
Wirsing, Vögel, tab. 16. *Kernbeißer*.
Onomatol. forestal. II. p. 482.
Mannigfaltigk. 1776. p. 463. 2.
Oekonom. Zool. p. 97. n. 4. *der Kernbeißer*.
Heister; de glandulis in inglevie Coccothraustae
observatis. — Eph. nat. curios. I. p. 408. c.
fig.
Linne, Syst. Nat. Edit. II. p. 56. *Coccothraustes*.

- Linné*, Syst. Nat. Ed. VI. p. 30. n. 1. Coccothraustes.
Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 171. n. 2. Loxia (Coccothraustes) linea alarum simplici alba, rectricibus latere tenuiore baseos albis.
Müller, zool. dan. prodr. p. 30. n. 245. Loxia (Coccothraustes) linea alatum alba, remigibus mediis apice rhombeis, rectricibus latere tenuiore baseos nigris.
Kramer, Austr. p. 364. n. 1. Loxia linea alarum duplii alba. *Kernbeißer*; *Nußbeißer*.
Schwenckfeld, av. Siles. p. 236. Coccothraustes; *Leske*; *Kirsch-Leske*, *Steinbeißer*; *Lysklicker*; *Kirschfinke*; *Klepper*; *Bollenbeißer*.
Fonston, av. p. 108. Coccothraustes.
Belon, hist. nat. des ois. p. 337. Gros-bec; Pinçon royal.
Schaefer, element. ornithol. tab. 57.
Levin, britt. Birds, II. p. 67.
Roman, orn. I. p. 151. tab. 23.
Faun. Arragon. p. 85. — Hist. Prov. I. p. 493.
Hermann, tab. affin. anim. p. 217. Loxia Coccothraustes.
Donndorff, Handb. d. Thiergeesch. p. 355. n. 2. der gemeine Kernbeißer.

3. ENUCLEATOR. Der große Kernbeißer.

- Müller*, Natursyst. II. p. 546. n. 3. der Krappensfresser.
Borowsky, Thierreich, III. p. 133. n. 3. der Kernfresser.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 509. n. 2. der Kernfresser; Fichtenhacker.
Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 399. n. 331. der große Kernbeißer.
Pennant, arct. Zool. II. p. 324. n. 125. der Fichtendickschnabel.

Onomat.

Onomat. hist. nat. III. p. 846. der *Canadensische Kernbeisser*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 95. n. 13. *Parisvogel*.

Brisson, ornith. I. p. 378. n. 15. *Gros-bec de Canada*.

Büffon, Vögel, X. p. 59. der *Talbit*, oder *canadische Kernbeisser*, oder *Hartschnabel*; m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 349. der *canadische Kernbeisser*.

Latham, Syn. Suppl. p. 148. *Pine Grosbeak*.

Latham, Vögel, II. I. p. 106. n. 5. der *Fichtenkernbeisser*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 372. n. 5. *Loxia* (*Enucleator*) *sordide roseo fusco griseoque varia*, *linea alarum dupli alba*, *rectricibus totis nigricantibus*.

Seligmann, Vögel, V. tab. 18. der *größte Dickschnabel*, der *Er*; tab. 19. die *Sie*.

Beseke, Vögel Kurl. p. 76. n. 164. der *Krappenfresser*; tab. 7. fig. 1. u. 2.

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 99. n. 3. der *Parisvogel*.

Bock, Natürgeesch. von Preuss. IV. p. 421. *Parisvogel*; *pomeranzenfarbiger oder rother Kernbeisser*.

Fischer, Livil. p. 96. n. 145. *großer Kernbeisser*; *finnischer Dompfaffe*; *finnischer Papagey*.

Lepechin, Tageb. d. russ. Reis. I. p. 197. der *Kernbeisser*.

Pennant, Reis. d. Schottl. I. p. 91. der *große Rothschwanz*.

Linné, Abhandl. II. p. 302. n. 123. der *Kernbeisser*.

Schwed. Abhandl. XIX. p. 132.

Neue Schwed. Abhandl. IV. p. 49. *Talbitur*.

Naturforsch. XVII. p. 87. n. 178. *der Krappennfresser.*

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 622. *der Dur-bet.*
Pennant, brit. Thiergesch. p. 119. *der Kernfresser.*

Mannigfaltigk. 1776. p. 463. n. 3.

Meidinger, Vorles. I. p. 148. n. 3. *der kanadische Kernbeißer.*

Linné, amoenit. acad. VII. p. 127. *Loxia Enucleator.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 171. n. 3. *Loxia (Enucleator) linea alarum duplii alba, rectricibus totis nigricantibus.*

Müller, zool. dan. prodr. p. 30. n. 246. *Loxia (Enucleator) linea alarum duplii alba, rectricibus totis nigricantibus.*

Levin, brit. Birds. II. tab. 68.

Hermann, tab. affin. anim. p. 178. *Loxia Enucleator.*

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 355. n. 3. *der große Kernbeißer.*

51. NAEVIA. *Der gefleckte capsche Kernbeißer. (3)*

Büffon, Vögel, X. p. 121. *der gefleckte Kernbeißer; m. e. Fig.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 373. n. 7. β. *Loxia fusca, pennis medio nigris, subtus albida, nigro striata, tectricibus alarum uropygioque luteis.*

Latham, Syn. II. 1. p. 114. n. 7. Var. A. — Vögel, II. 1. p. 109. n. 7. A.

52. MA-

(3) Die Büffonschen Synonymen sind p. 862. n. 39. β. nochmals aufgeführt, und dieser Vogel daselbst als Spielart von *Loxia Capensis* aufgenommen, wofür ihn auch Latham ansieht.

52. MACROURA. *Der langgeschwänzte Kernbeisser.*

Büffon, Vögel, X. p. 157. 160. *der schwarze langgeschwänzte Sperling; der schwarze Sperling von Juda;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 109. n. 8. *der langschwänzige Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 773. n. 9. *Loxia (Longicauda) nigra, tectricibus alarum dorsoque inter alas fascia transversa rufo-lutea, cauda longiore cuneiformi.*

53. AUREA. *Der goldrückige Kernbeisser.*

Latham, Vögel, II. I. p. 110. n. 9. *der goldrückige Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 373. n. 8. *Loxia (Aurea) nigra, dorso uropygioque luteis, tectricibus alarum fuscous nigro maculatis.*

54. RUBICILLA. *Der caucasische Kernbeisser.*

Latham, Vögel, II. I. p. 108. n. 6. *der Cauca-sische Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 372. n. 6. *Loxia (Rubicilla) coccinea albo maculata, abdomine crisoque roseis, tectricibus alarum maioribus fuscis, cauda nigra.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 218. *Loxia Rubicilla.*

4. PYRRHULA. *Der Dompfaffe. (4)*

Müller, Natursyst. II. p. 547. n. 4. *der Thum-pfaffe; tab. 25. Fig. 3.*

Leske,

(4) Nährt sich hauptsächlich von allerley Saamen, Beeren, Kno-spen, und Insekten. Im Bauer kann man ihn mit blossem Rübsaamen viele Jahre unterhalten. Wird sehr leicht zahm, und

- Leske*, Naturgesch. p. 260. n. 3. der *Gimpel*.
Borowsky, Thierreich, III. p. 135. n. 5. der *Dompfaff*; *Giempel*.
Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 183. n. 3. *Loxia* (*Pyrrhula*) *artubus nigris, rectricibus caudae remigumque posticarum albis*. *Dompfaff*, *Blutfink*; *Liebig*, *Rothfink*; *Gicker*.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 509. n. 3. der *Gimpel*.
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 587. der *Dompfaff*; *Giempel*; *Hahle*.
Funke, Naturgesch. I. p. 270. der *Dohmpfaff*.
Ebert, Naturl. II. p. 131. *Gympel*; *Thumherr*.
Halle, Vögel, p. 401. n. 409. der *Blutfink*, *Dommherr*, *Dummherr*.
Meyer, Thiere, II. tab. 8. der *Blutfink*.
Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 400. n. 333. der *Dommpfaff*; *Rothschlegel*; *Schniegel*; *Goldfink*; *Pfäfchen*.
Beckmann, Naturhist. p. 52. b. der *Dompfaffe*.
Pennant, arct. Zool. II. p. 319. A. der *Dompfaffe*.
Neuer Schaupl. der Natur, I. p. 274. III. p. 417. *Blutfink*; *Gimpel*.
Onomat. hist. nat. IV. p. 856. *Blutfink*.
Handb. der Naturgesch. II. p. 256. der *Thumpfaff*.
Handb. der deutsch. Thiergeesch. p. 128. der *Dompfaff*; *Hoylen*.
Klein, av. p. 95. n. 5. *Coccothraustes sanguinea*.
Klein, Vorbereit. p. 176. n. 5. *Thumpfaffe*; *Lohfinke*; *Rottvogel*.
Klein,

und es gehört dazu gar nicht viel Zeit und Geduld, wie *Büffon* meint. Dass er aber im Zimmer so leicht hecke, wie einige vorgeben, widerspricht wenigstens meiner eignen vieljährigen Erfahrung. Noch weniger ist mir ein Beyspiel bekannt, dass sich ein Dompfaffe mit einer Kanarien-Sie gepaart habe. — Wird an 20 Jahr alt.

Klein, verb. Vögelhist. p. 94. n. 5. *Thumpfaffe*.
Klein, Stemmat. av. p. 19. tab. 19. Fig. 13. a. b.
Gesner, Vögelb. p. 43. *Blutfink*; p. 44. *Pfäfflein*; *Güger* (*Quetsch das Weibch.*) m. e. mit telm. Fig.

Brisson, ornith. I. p. 395. *Bouvreuil*.

Buffon, Vögel, XIII. p. 6. *der Gimpel*; m. 2. Figg. M. u. W.

Batsch, Thiere, I. p. 349. *der Dompfaff*.

Latham, Syn. Suppl. p. 152. *Bulfinch*.

Latham, Vögel, II. I. p. 135. n. 51. *der Gimpel*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 387. n. 56. *Loxia* (*Pyrrhula*) *cinerea*, artibus nigris, tectricibus caudae remigumque posticarum albis.

Beseke, Vögel Kurl. p. 77. n. 165. *der Dompfaff*.

Siemsen, meklenb. Vögel, p. 101. n. 4. *der ge meine Dompfaff*; *Dohnpaap*.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 421. *der Thumpfaffe*.

Fischer, Livil. p. 96. n. 143. *Dompfaffe*.

White, N. G. von Engl. p. 30. p. 66. n. 7. *Blutfink*.

Linne, Abhandl. II. p. 302. n. 120. *der Blutfink*.

Scopoli, Beitr. a. d. N. G. I. p. 167. n. 202. *der Gympel*.

Pontoppidan, Dännem. p. 173. n. 3. *Dompfaffe*.

Pontoppidan, Norweg. II. p. 130. *Domherre*.

Naturforsch. XVII. p. 88. n. 179. *der Thumpfaffe*. XXI. p. 197. *Liebiche*.

Borkhausen, Magaz. I. p. 140. n. 3. *Blutfink*.

Zorn, Petinotheol. II. p. 27. 328. *der Blut-Fink*.

Döbel, Jägerprakt. I. p. 56. *Gümpel*; *Rothschlegel*; *Schnigel*.

Naumann, Vogelsteller, p. 89. *Schniel oder Dom pfaffe*.

André u. Bechstein, Spazierg. II. p. 308.

Samml.

- Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 743. der *Gümpel*.
 Beckmann, Bibl. VI p. 477. *Dompfaffe*.
 Krünitz, Encycl. XVIII. p. 535. *Gimpel*.
 Oekonom. Zool. p. 98. n. 41. der *Gimpel*.
 Meidinger, Vorl. I. p. 148. n. 4. der *Gimpel*.
 Jablonsky, allgem. Lex. p. 272. *Duhmpfaffe*.
 Anweis. Vögel zu fang. p. 237. *Gimpel*.
 Loniceri, Kräuterb. p. 682. *Blutfink*.
 Eberhard, Thiergesch. p. 82. *Blutfink*.
 Forst.-Fisch.-u. Jagdlex. I. p. 1047. *Gimpel*.
 Börner, Schles. ökon. Nachr. 1781. p. 101. *Loxia*
 Pyrrhula.
 Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 56. *Pyrrhula*.
 Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 30. n. 3. *Pyrrhula*.
 Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 171. n. 4. *Loxia*
 (*Pyrrhula*) artibus nigris, tectricibus caudae
 remigumque posticarum albis.
 Müller, Zool. dan. prodr. p. 30. n. 247. *Loxia*
 (*Pyrrhula*) artibus nigris, tectricibus caudae
 remigumque posticarum albis.
 Charleton, onom. zoic. p. 91. n. 9. *Rubicilla*.
 Moehring, av. gen. p. 40. n. 25. *Pyrrhulas*.
 Schwenfeld, av. Siles. p. 262. *Fringilla sanguinea*. *Blut-Finke*; *Luh-*, *Loh-Finke*; *Rottvogel*; *Bollenbeisser*; *Gümpel*.
 Rzaczynsky, auct. hist. nat. Pol. p. 419. *Rubicilla* seu *Pyrrhula*.
 Belon, hist. nat. des oif. L. 7. c. 17. fol. 13. Pi-
 voine.
 Salerne, hist. nat. des oif. p. 258. *Ebourgeonneux*, etc.
 Schaefer, element. ornithol. tab. 59.
 Zinnan, Uov. p. 59. tab. 8. Fig. 48. *Monachino*.
 Levin, britt. Birds. II. tab. 70.
 Faun. Arragon. p. 86. — Rom. orn. I. p. 158.
 tab. 24. Fig. 2.

Jonston,

Jonston, av. p. 122. *Pyrrhula seu Rubicilla*.
Hermann, tab. affin. anim. p. 178. *Loxia Pyrrhula*.
Bomare, Dictionn. II. p. 48. *Bouvreuil*.
Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 256. n. 4.
der *Dompfaffe*.

β. *Der schwarze Dompfaffe.* (5)

Briffon, ornith. I. p. 396. A. *Bouvreuil noir*.
Klein, av. p. 96. n. II. *Coccothraustes atricilla*.
Klein, Vorbereit. p. 178. n. II. *Thumdechant*.
Klein, verb. Vögelhist. p. 95. n. II. *Thumdechant*.
Büffon, Vögel, XIII. p. 28. *der schwarze Gimpel*.
Latham, Syn. II. I. p. 144. n. 51. A. *Black Bulfinch*. — Vögel, II. I. p. 137. n. 51. Var. A.
Latham, Syst. ornith. I. p. 387. n. 56. β.
Zorn, Petinotheol. II. p. 330. ad §. 2.
Naturforsch. II. p. 2. *schwarzer Gimpel*.
Beseke, Vögel Kurl. p. 77. ad n. 165.

γ. *Der weiße Dompfaffe.*

Briffon, ornith. I. p. 396. B. *Bouvreuil blanc*.
Büffon, Vögel, XIII. p. 27. *der weiße Gimpel*.
Latham, Syn. II. I. p. 144. n. 51. B. — Vögel, II. I. p. 137. n. 51. Var. B.
Latham, Syst. ornith. I. p. 388. n. 56. β.
Schwenkfeld, av. Siles. p. 263. *Pyrrhula candida*.

5. CAR-

(5) *Zorn* versichert mit Gewissheit, dass ein Weibchen, mit Hanf gefüttert, davon öfters kohlenschwarz werde. *Beseke* gedenkt eines schwarzen Dompfaffen, der lange im Käfig gehalten war, nachdem er aber in Freyheit gesetzt war, und in der Stube umher flog, in der Mauserzeit die schwarze Farbe verlohr und seine gewöhnliche Farbe wieder annahm, die er auch mehrere Jahre, welche er wieder im Käfig zugebracht, bey behalten hat.

5. CARDINALIS. Der Cardinalvogel. (6)

Müller, Natursyst. II. p. 547. n. 5. der Haubenblutfink; tab. 25. Fig. 2.

Borowsky, Thierreich, III. p. 134. n. 4. der Haubenblutfink; tab. 61. B.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 184. n. 4. Loxia (Cardinalis) cristata rubra, capistro nigro, rostro pedibusque sanguineis: der Indianische Haubenfink; die virginische Nachtigall.

Halle, Vögel, p. 399. n. 407. der Karminrothe Kirschenfink; Kardinalfink; (gehaubter kleiner Papagey Seb.)

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 401. n. 334. indianische Haubenfink.

Pennant, arct. Zool. II. p. 325. n. 126. der Cardinal; der virginische Kernbeisser.

Onomat. hist. nat. IV. p. 838. der karminrothe Kirschenfink.

Klein, av. p. 94. n. 3. Coccothraustes indica cristata.

Klein, Vorbereit. p. 176. n. 3. rother Steinbeisser.

Klein, verb. Vögelhist. p. 94. n. 3. rother Steinbeisser.

Briffon, ornith. I. p. 379. n. 17. Gross-bec de Virginie, dit vulgairement Cardinal hupé.

Büffon, Vögel, X. p. 74. der Cardinal mit dem Zopf; m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 350. der Cardinal mit dem Zopf.

Latham, Syn. Suppl. p. 150. Cardinal Grosbeak.

Latham, Vögel II. I. p. 112. n. 13. der Cardinal-Kernbeisser.

Latham, Syst. ornith. I. p. 375. n. 14. Loxia (Cardinalis) cristata rubra, capistro nigro, rostro pedibusque sanguineis.

Selig-

(6) Soll, nach Bescke, auch in Kurland nisten.

- Seligmann*, Vögel, II. tab. 76. der Rothvogel.
Frisch, Vögel, tab. 4. Fig. 1. der indianische Haubenfink, oder die virginische Nachtigall.
Beske, Vögel Kurl. p. 77. n. 166. der Haubenblutfink.
Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 168. n. 203. Loxia rubra; der rothe Dickschnabel.
Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 422. rother Steinbeisser.
Schöpf, Reis. d. Nordamer. II. p. 199. der rothe Vogel.
Kalm, Reis. n. Nordamer. p. 40.
Naturforsch. XVII. p. 89. n. 180. der Haubenblutfink.
Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 172. n. 5. Loxia (Cardinalis) rubra, facie nigra.
Charleton, onom. zoic. p. 85. n. 5. Coccothraustes indica, Cardinalis.
Gentl. Magaz. XXII. tab. p. 512. Red bird.
Hermann, tab. affin. anim. p. 179. Loxia Cardinalis.
Donndorff, Handb. d. Thiergeeschich. p. 356. n. 5.

94. CARLSONI. *Der ungehäubte Cardinalvogel.* (?)

Latham, Syst. ornith. I. p. 375. n. 14. ♂. L. rubra, mento nigro, uropygio, cauda, alis pedibusque fuscis.

Latham, Vögel, II. 1. p. 114. not. i.

55. INDICA. *Der indianische Kernbeisser.*

Briffon, ornith. I. p. 379. n. 16. Gros-bec des Indes.

Latham, Vögel, II. 1. p. 114. n. 14. der Indianische Kernbeisser.

Latham, Syst. ornith. I. p. 376. n. 15. *Loxia* (*Boetoneensis*) *cristata rubra*, rostri basi tectricibusque alarum obscurioribus, rostro pedibusque flavis.

6. **MADAGASCARIENSIS.** *Der madagascariische Kernbeißer.*

Müller, Natursyst. II. p. 548. n. 6, *der Madagascariische*.

Brissot, ornith. I. p. 337. n. 20. *Cardinal de Madagascar*.

Büffon, Vögel. X. p. 175. *der Foudis*.

Latham, Syn. Suppl. p. 150. *Madagascar Grosbeak*.

Latham, Vögel, II. I. p. 114. n. 15. *der Madagascariische Kernbeißer*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 376. n. 16. *Loxia (Madagascariensis) rubra*, fascia oculari nigra, dorso nigricante-maculato.

7. **MEXICANA.** *Der mexikanische Kernbeißer.* (8)

Müller, Natursyst. II. p. 548. n. 7. *der Mexikanische*.

Onomat. hist. nat. IV. p. 852. *der Schwarzflügel; rothe Mexicanischer Vogel von Sperlingsart*.

Klein, av. p. 95. n. 8. *Coccothraustes alis nigris*.

Klein, Vorbereit. p. 177. n. 8. *Schwarzflügler*.

Klein, verb. Vögelh. p. 95. n. 18. *Schwarzflügler*.

Brissot, ornith. I. p. 380. n. 18. *Gros-bec du Mexique*.

Latham, Vögel, II. I. p. 116. n. 17. *der Mexikanische Kernbeißer*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 377. n. 18. *Loxia (Mexicana) rubra*, alis caudaque nigris.

Linne',

(7) Die Trivialbenennung *L. Mexicana* kommt p. 854. n. 26. nochmals vor.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 172. n. 8. *Loxia (Mexicana) rubra, alis nigris.*

56. **BRASILIANA.** *Der gesprenkelte Kernbeisser.*

Büffon, Vögel, X. p. 82. *der sprenkliche Kernbeisser;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 116. n. 18. *der Brasiliische Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 378. n. 19. *Loxia (Brasiliana) fusca, subtus rufescens, maculis albis nigro annulatis, capite abdomineque medio rubris, lunula nuchae caudaque apice albis.*

8. **DOMINICANA.** *Der Dominicanercardinal. (9)*

Müller, Natursyst. II. p. 548. n. 8. *der Dominicanner.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 846. *der brasiliatische Finke.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 98. n. 18. *Brasilianer Fink.*

Brisson, ornith. I. p. 377. n. 13. *Gros-bec du Brésil.*

Büffon, Vögel, X. p. 82. 83. *Guira-tirica.*

Latham, Vögel, II. I. p. 117. n. 20. *der Dominicaner-Kernbeisser.*

Latham, Syn. Suppl. p. 151. *Dominican Gros-beak.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 377. n. 21. *Loxia (Dominicana) nigra, capite gulaque coccineis, pectore, abdomine remigumque margine albis.*

Seligmann, Vögel, IV. tab. 22. *der Dominicanercardinal.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 172. n. 6. *Loxia (Dominicana) nigra, capite gulaque coccineis, pectore, abdomine remigumque margine albis.*

Fonston, av. p. 203. *Guira tirica*.

Hermann, tab. affin. anim. p. 218. *Loxia dominicana*.

B. Der gehäubte Dominicanercardinal. (10)

Büffon, Vögel, X. p. 190. *der gezopfte domingische Kardinal*; m. e. Fig.

Latham, Syn. II. I. p. 123. n. 20. *A. Crested dominican Grosbeak*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 378. n. 22. *Loxia (Cucullata) cinerea*, capite cristato gulaque coccineis, pectore abdomineque albis, cauda longiore, rectricibus lateralibus nigricantibus.

Latham, Vögel, II. I. p. 117. n. 20. *Var. A. der Dominikaner-Kernbeisser mit dem Federbusche*.

γ. Der Pabst. (1)

Pennant, arct. Zool. II. p. 325. n. 127. *der Pabst*.

Brissot, ornith. I. p. 339. n. 22. *Cardinal Dominicain*.

Büffon, Vögel, X. p. 189. *der domingische Sperling*.

Latham, Syn. II. I. p. 124. n. 20. *β. — Vögel*, II. I. p. 118. n. 20. *Var. B.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 378. n. 21. *β. L. cinerea subtus nivea*, capite anteriore guttureque rubris, rectricibus nigris cinereo-marginalis, extima margine exteriore alba.

Fonston, av. p. 208. *Tije guacu Paroara*.

57. SIBIRICA. Der sibirische Kernbeisser.

Latham. Vögel, II. I. p. 119. n. 21. *der Sibirische Kernbeisser.*

Latham,

(10) Nach *Latham* eine eigne Gattung. Ueberhaupt werden die Synonymen bey dieser Gattung und den dahin gerechneten Varianten sehr verwechselt.

(1) Ist nicht mit *Emberiza Ciris*, der auch diese deutsche Benennung gegeben wird, zu verwechseln.

Latham, Syst. ornith. I. p. 378. n. 23. *Loxia (Sibirica) coccinea*, *fusco-maculata*, *subtus paleo* *coccinea*, *capistro purpureo*, *alis albo nigroque fasciatis*, *rectricibus nigris*, *extima alba*.

Pallas, Reis. Ausz. II. Anh. p. 13. n. 24. *Loxia sibirica*.

Lepechin, Tageb. d. russ. Reis. I. p. 182. *Loxia*, *vertice, gula et pectore coccineis*, *dorso fusco rubro irrorato*, *imo abdomine fordide albo?*
Duratschok; *Tschetschewiza*.

58. VIRGINICA. Der virginische Kernbeißer.

Latham, Vögel, II. 1. p. 119. n. 22. *der gelbbäuchige Kernbeißer*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 327. n. 131. *der Dick schnabel mit dem gelben Bauche*. Ist nach *Latham*, mit *Tanagra Mississippensis*, p. 889. n. 23. β. einerley; vid. *Syst. ornith.* I. p. 421. n. 6.

9. CRISTATA. Der Haubenkernbeißer.

Müller, Natursyst. II. p. 559. n. 9. *der Hauben kernbeißer*; tab. 21. Fig. 1.

Onomat. hist. nat. IV. p. 845. *der Einke aus Etiopien*.

Latham, Vögel, II. 1. p. 120. n. 23. *der Kernbeißer mit dem Federbusche*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 378. n. 24. *Loxia (Cristata) albicans*, *fronte cristata*, *uropygio pedibusque rubris*, *rectricibus intermediis longissimis*.

10. ERYTHROCEPHALA. Der rothköpfige Kernbeißer.

Müller, Natursyst. II. p. 549. n. 10. *der Rothkopf*.
Onomat Z 4

Onomat. hist. nat. IV. p. 848. *der Sperling aus
Angola mit dem rothen Kopfe.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 95. n. 14. *rothköpfiger
Grünling.*

Briffon, ornith. I. p. 368. n. 69. *Cardinal d' An-
gola.*

Latham, Syn. Suppl. p. 150. *Paradise Grosbeak.*

Latham, Vögel, II. I. p. 116. n. 19. *der Paradies-
Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 377. n. 20. *Loxia
(Erythrocephala) cinerascens, capite purpu-
rascente, pectore albo-maculato.*

Seligmann, Vögel, VI. tab. 75. *der Paradies-
Sperling.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 172. n. 9. *Loxia
(Erythrocephala) cinerascens, capite purpu-
rascente, pectore albo maculato.*

11. M A J A. *Der Majan. (*)*

Müller, Natursyst. II. p. 549. n. 11. *der Weiß-
kopf.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 850. *der chinesische Finke.*

Briffon, ornith. I. p. 365. n. 65. *Maia de la Chine.*

Buffon, Vögel, XI. p. 81. *der Majan.*

Latham, Vögel, II. I. p. 144. n. 68. *der weisskö-
pfige Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 391. n. 72. *Loxia
(Maja) fusca, capite albo.*

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 96. *der Kernbeisser
oder Dickschnäbler aus Malacca.*

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 629. *der Majan.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 219. *Loxia Maja.*

13. FLAVICANS. *Der gelbliche Kernbeisser.*

Müller, Natursyst. II. p. 550 *der gelbe Kernbeisser.*
Onomat.

(*) Ist nicht mit *Fringilla Maja*, p. 924. zu verwechseln.

Onomat. hist. nat. IV. p. 848. *der gelbliche Finke.*
 Bankcroft, N. G. von Guiana, p. 108. *der gelbe Finke.*

Latham, Vögel, II. I. p. 132. n. 44. *der gelbe Kernbeißer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 385. n. 48. Loxia (Flavicans) flava, dorso flavicante, capite fulvo.

60. BONARIENSIS. *Der schwarz und saffrangelbe Kernbeißer.*

Büffon, Vögel, XI. p. 165. *der schwarz und saffrangelbe Fink.*

Latham, Vögel, II. I. p. 132. n. 43. *der saffrangelbe Kernbeißer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 385. n. 47. Loxia (Bonariensis) nigricans, subtus flavescens, capite colloque superiore caeruleis, iugulo pectoralre que fulvis.

Hermann, tab. affin. anim. p. 219. *Noir-Souci.*

14. ORYZIVORA. *Der Reißvogel.*

Müller, Natursyst. II. p. 550. n. 14. *der Reißfresser.*

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 184. n. 5. Loxia (Oryzivora) fusca, temporibus albis, rostro rubro.

Halle, Vögel, p. 407. n. 417. *der Reißfink.*

Neuer Schapl. der Natur. VII. p. 88. *Reismäher.*

Onomat. hist. nat. V. p. 373. *der Reißfresser.*

Klein, av. p. 96. n. 12. Coccothraustes caeruleus.

Klein, Vorbereit. p. 178. n. 12. *Reismäher.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 95. n. 12. *Reismäher.*

Brisson, ornith. I. p. 377. n. 12. Gros-bec cendré de la Chine.

Büffon, Vögel, X. p. 88. *der Padda oder Reisvogel;* m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 349. *der Padda.*

Latham, Syn. Suppl. p. 151. Java Grosbeak.

Latham, Vögel, II. I. p. 122. n. 29. der Reiskernbeisser.

Latham, Syst. ornith. I. p. 380. n. 31. Loxia (Oryzivora) fusca temporibus albis, rostro rubro, capite caudaque nigris.

Seligmann, Vögel, III. tab. 81. 82. der chinesische Reisvogel *Padda* genannt, M. u. W.

Bankroft, Guian. p. 107. der guianische Reisvogel.

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 622. der *Padda*.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 173. n. 1. Loxia (Oryzivora) fusca, temporibus albis, rostro rubro.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 357. n. 6. der Reissvogel.

62. FLABELLIFERA. Der Fächerschwanz.

Pennant, arct. Zool. II. p. 326. n. 130. der Fächerschwanz.

Büffon, Vögel, X. p. 87. der Fächerschwanz; m. 2. Figg. M. u. W.

Latham, Vögel, II. I. p. 122. n. 28. der fächerschwänzige Kernbeisser.

Latham, Syst. ornith. I. p. 380. n. 30. Loxia (Flabellifera) rubro-fusca, subtus rubescens, remigibus caudaque fuscis.

Hermann, tab. affin. anim. p. 217. Loxia Flabelli-cauda.

15. PANICIVORA. Der weissflügelige Kernbeisser.

Briffon, ornithol. I. p. 397. n. 4. Bouvreuil noir d'Afrique.

Büffon, Vögel, XIII. p. 30. der grosse schwarze afrikanische Gimpel.

Onomat. histor. natur. IV. p. 854. *der schwarze Africanische Domherr.*

Latham, Vögel, II. I. p. 138. n. 52. *der weissflügelige Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 388. n. 57. Loxia (Panicivora) nigra, alula alba, rostro incarnato.

16. MALACCA. *Der malackische Kernbeisser.*

Müller, Natursyst. II. p. 551. n. 16. *der malackische Kernbeisser.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 851. *der Blauschnabel aus China.*

Klein, av. p. 88. n. 5. Passer Sinensis rostro caeruleo.

Klein, Vorbereit. p. 165. n. 5. *Blauschnabel aus China.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 91. n. 5. *Blauschnabel.*

Brisson, ornith. I. p. 375. n. 8. Grosbec de Java.

Büffon, Vögel, X. p. 108. *der Jacobiner*, p. 109. *der javanische Kernbeisser*, p. 111. *der Jacobin*, p. 112. *der Jacobin*; m. e. Fig. n. 3. p. 107. *der indianische Sperling mit weißer Brust.*

Latham, Vögel, II. I. p. 133. n. 47. *der Malackische Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 385. n. 51. Loxia (Malacca) ferruginea, capite abdomineque nigris, rostro caeruleo.

Seligmann, Vögel, IX. tab. 45. fig. 2. *der indische Sperling mit weißer Brust.*

β. *Der (sogenannte) chinesische Sperling.*

Klein, av. p. 90. n. 19. Passer fuscus, capite nigro.

Klein, Vorbereit. p. 168. n. 19. *brauner Sperling mit schwarzem Kopfe.*

Klein,

- Klein*, verbess. Vögelhistor. p. 92. n. 17. *schwarzköpfiger brauner Sperling*.
Halle, Vögel, p. 377. n. 367. *der zimmetfarbne Sperling aus China*.
Briffon, ornithol. I. p. 374. n. 7. *Gros-bec de la Chine*.
Büffon, Vögel, X. p. 105. *die chinesischen Sperlinge*.
Latham, Syn. II. I. p. 141. Var. A. — Suppl. p. 152. — Vögel, II. I. p. 134. n. 47. A.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 386. n. 51. β . *L. ferruginea*, capite colloque inferiore nigris.
Seligmann, Vögel, II. tab. 85. *die chinesischen Sperlinge*.
Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 183. n. 29. *Fringilla (Chinensis) ferruginea*, capite atro, rostro caeruleo.

17. MOLUCCA. *Der moluckische Kernbeißer*.

- Müller*, Natursyst. II. p. 551. n. 17. *der moluckische Kernbeißer*.
Briffon, ornith. I. p. 376. n. 10. *Gros-bec des Moluques*.
Büffon, Vögel, X. p. 108. III. *der moluckische Domino*.
Latham, Vögel, II. I. p. 134. n. 48. *der Molukkische Kernbeißer*,
Latham, Syst. ornithol. I. p. 386. n. 52. *Loxia (Molucca) fuscescens*, capite, iugulo rectricibusque nigris, subtus uropygioque albo nigroque undulata.

18. PUNCTULARIA. *Der Gobryvogel. (2)*

- Müller*, Natursyst. II. p. 551. n. 18. *der gesprenkelte Kernbeißer*.

Halle,

(2) Die Synonymen dieser und der beyden vorhergehenden Gattungen werden gar häufig verwechselt. Im *Büffon*, (loc. cit.) ist

Halle, Vögel, p. 380. n. 378. der *Tigersperling*,

Fig. 23.

Onomat. hist. nat. IV. p. 856. *rostiger Sperling mit getiegertem Unterleibe.*

Klein, av. p. 89. n. 6. Passer Sinensis ferrugineus.

Klein, Vorbereit. p. 166. n. 6. *brauner Sperling aus China.*

Klein, av. p. 90. n. 18. Passere vario maculato.

Klein, Vorbereit. p. 168. n. 18. *rostiger Sperling mit getiegertem Unterleibe.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 92. *rostiger Sperling mit getiegertem Unterleibe.*

Brisson, ornithol. I. p. 375. n. 9. Gros-bec ta-
cheté de Java.

Büffon, Vögel, X. p. 108. b. p. III. n. 2. der *Jaco-¹⁵
biner*, p. 109. *Gouery.*

Latham, Vögel, II. I. p. 135. n. 50. *der getüpfel-
te Kernbeißer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 386. n. 54. Loxia
(Punctularia) ferruginea, abdomine nigro albo-
maculata.

Seligmann, Vögel, II. tab. 79. *der Gobryvogel.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 173. n. 13. Loxia
(Punctularia) ferruginea, abdomine nigro albo-
maculata.

19. HORDEACEA. *Der gelbsteifige Kernbeißer.*

Müller, Natursyst. II. p. 551. n. 19. *der Gersten-
fresser.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 849. *der Gerstenfink.*

Latham, Vögel, II. I. p. 133. n. 45. *der Kern-
beißer mit gelbem Steiß.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 385. n. 49. Loxia
(Hordeacea) fulva, temporibus albis, cauda
pectoreque atris.

20. SAN-

ist alles so unter einander geworfen, dass man sich gar nicht heraus finden kann.

20. SANGUINIROSTRIS. *Der rothschnäbige Kernbeißer.*

Müller, Natursystem, II. p. 552. n. 20. *der Blutschnabel.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 858. *der Finke mit dem blutrothen Schnabel.*

Latham, Syn. II. I. p. 151. n. 69. *Red-billed Grosbeak.*

Latham, Vögel, II. I. p. 144. n. 69. *der rothschnäbige Kernbeißer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 392. n. 73. *Loxia (Sanguinirostris) grisea, subtus albida, rostro pedibusque sanguineis, gula nigra.*

21. ASTRILD. *Der senegalische Kernbeißer.*

Müller, Natursyst. II. p. 552. n. 21. *der senegalische Kernbeißer.*

Onomat. histor. natur. IV. p. 835. *der gestreifte Sperling.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 92. n. 23. *glattköpfiger Rothschnabel.*

Brisson, ornithol. I. p. 365. n. 64. *Senégali rayé.*

Büffon, Vögel, XI. p. 73. *der gestreifte Senegali,* p. 180. *Lackschnabel.*

Latham, Vögel, II. I. p. 145. n. 71. *der gestreifte Senegalift.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 392. n. 75. *Loxia (Astrild) grisea fusco-undulata, rostro, orbitis pectoreque coccineis.*

Seligmann, Vögel, VI. tab. 74. fig. 2. *glattköpfiger Rothschnabel.*

Seligmann, Vögel, IX. tab. 44. *der Rothschnabel.*

Linneé, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 173. n. 16. *Loxia (Astrild) grisea, fusco-undulata, rostro, temporibus pectoreque coccineis.*

B. Büffon,

$\beta.$ Buffon, Vögel, XI. p. 77. der Serevan.

Latham, Syn. II. I. p. 153. Red-rumped Gros-beak.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 392. n. 75. $\beta.$ L. cinereo-fusca, subtus albida, uropygio crisoque coccineis.

Latham, Vögel, II. I. p. 145. n. 71. A. der Kernbeißer mit rothem Steifße.

$\gamma.$ Buffon, Vögel, XI. p. 78. der kleine senegallische Sperling.

Latham, Syn. II. I. p. 153. n. 71. B. White-rumped Grosbeak.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 392. n. 75. $\gamma.$ L. fusca, subtus uropygioque incarnata, vertice, collo dorsoque caeruleis, per oculos fascia coccinea.

Latham, Vögel, II. I. p. 146. n. 71. B. der Kernbeißer mit weißem Schwanz.

63. LEUCURA. Der weißschwänzige Kernbeißer.

Latham, Vögel, II. I. p. 146. n. 72. der weißschwänzige Kernbeißer.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 393. n. 76. "Loxia (Leucura) cinerea, dorso luteo, pectore abdomineque flavescentibus, cauda alba, rectricibus duabus extimis nigris.

22. CYANEA. Der hellblaue Kernbeißer. (3)

Müller, Natursyst. II. p. 552. n. 22. der hellblaue Kernbeißer.

Brisson, ornithol. I. p. 381. n. 19. Gros-bec bleu d'Angola.

Onomat. hist. nat. IV. p. 845. der kornblumfarbige Finke.

Latham,

(3) Latham ist geneigt, ihn als Spielart von *Loxia Caerulea* anzusehen.

Latham, Syn. II. I. p. 117. n. II. B. — Vögel,
II. I. p. 112. n. II. Var. B.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 374. n. 12. Loxia
(*Cyanea*) *caerulea*, remigibus rectricibusque
nigritis.

Seligmann, Vögel, V. tab. 20. *der blaue Dick-*
schnabel, (*Azulam* portugies.)

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 170. n. 207. *der*
blaue Dick schnabel.

Linné, Syst. Nat. Edit- X. I. p. 174. n. 17. Loxia
(*Cyanea*) *caerulea*, remigibus rectricibusque
nigris.

23. VIRENS. *Der grünliche Kernbeißer.*

Müller, Natursyst. II. p. 553. n. 23. *der Grünling*.
Onomat. histor. natur. IV. p. 860. *der grüne Surinamische Finke*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 392. n. 74. Loxia
(*Virens*) *virens humeris caeruleis*.

Latham, Vögel, II. I. p. 144. n. 70. *der blau-*
schulterige Kernbeißer.

24. ANGOLENSIS. *Der angolische Kernbeißer.*

Müller, Natursyst. II. p. 553. n. 24. *der angolische*
Kernbeißer.

Onomat. hist. nat. IV. p. 834. *der angolische Finke*.

Latham, Vögel, II. I. p. 138. n. 53. *der Ango-*
lische Kernbeißer.

Latham, Syst. ornith. I. p. 389. n. 60. Loxia (*An-*
golensis) *nigro-caerulea*, ventre ferrugineo,
macula alarum alba.

64. FERRUGINEA. *Der braunköpfige Kernbeißer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 389. n. 62. Loxia (*Fer-*
ruginea) *nigra*, marginibus pennarum flavis,
subtus flavescens, pectore ferrugineo, capite
gulaque fuscis.

Latham,

Latham, Vögel, II. I. p. 138. n. 54. *der braunköpfige Kernbeißer.*

65. MELANURA. *Der schwarzschwänzige Kernbeißer.*

Latham, Vögel, II. I. p. 138. n. 55. *der grauhälgige Kernbeißer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 389. n. 63. *Loxia (Melanura) cervice fusca, iugulo uropygioque griseis, abdomine rufescente, alis caudaque nigris, macula alarum, remigibus apice crisoque albis.*

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 155. *der chinesische Kernbeißer.*

66. AURANTIA. *Der Bouveret.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 33. *der Bouveret; m. 2. Figg. M. u. W.*

Latham, Vögel, II. I. p. 139. n. 56. *der pomeranzengelbe Kernbeißer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 390. n. 66. *Loxia (Aurantia) fulva, pileo, alis caudaque nigris.*

Sammel. zur Phys. und N. G. II. p. 744. *der Bouveret.*

67. TORRIDA. *Der weisschnäbige Kernbeißer.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 34. *der weisschnäbliche Gimpel.*

Latham, Vögel, II. I. p. 139. n. 57. *der weisschnäbige Kernbeißer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 389. n. 61. *Loxia (Torrida) nigra, pectore abdomineque castaneis.*

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 169. n. 204. *der Amerikaner.*

Sammel. zur Phys. und N. G. II. p. 744. *der weisschnäbliche Gimpel.*

25. LINEOLA. Der weissgestreifte Kernbeisser. (4)

Müller, Natur-syst. II. p. 553. n. 25. der gestreifte Kernbeisser.

Onomat. histor. natur. IV. p. 849. der schwarze Finke aus Asien, mit einer weißen Linie von der Stirne gegen den Wirbel zu.

Latham, Vögel, II. 1. p. 141. n. 63. der Linien-Kernbeisser.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 390. n. 68. Loxia (Lineola) caeruleo-nigra, linea frontali, temporibus, macula alarum corporeque subtus albis.

68. HAMBURGICA. Der hamburgische Gimpel. (*)

Müller, Natur-syst. II. p. 547. ad n. 4. der hamburgische Baumläufer.

Halle, Vögel, p. 368. n. 363. der Baumsperling.

Klein, av. p. 88. ad n. 2. Hamburg-the-Creeper.

Klein, Vorbereit. p. 164. ad n. 2.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 90. ad n. 2.

Briffon, ornith. I. p. 396. n. 2. Bouvreuil de Hambourg.

Büffon, Vögel, XIII. p. 50. der hamburgische Gimpel; in e. Fig.

Siemsen, meklenb. Vögel, p. 102. n. 15. der hamburgische Dompfaffe.

Hermann, tab. affin. anim. p. 216. Loxia scandens.

Latham, Vögel, II. 1. p. 142. n. 64. der Hamburger Kernbeisser.

Donndorff, Handb. der Thiergeesch. p. 357. n. 7. der hamburgische Gimpel.

26. MEXI

(4) Latham rechnet hieher auch Büffons Bouveron IV. p. 328. und Briffons Pyrrhula africana nigra minor. (Gmel. Syst. p. 865 n. 46.)

(*) Ist nach Latham mit Fringilla montana, p. 925. n. 37. einigerley.

26. MEXICANA. Der gelbköpfige neuspanische Kernbeißer. (5)

Müller, Natursyst. II. p. 553. n. 26. der Gelbkopf.
Onomat. hist. nat. IV. p. 853. Mexikanischer Goldammer.

Klein, av. p. 92. n. 9. Emberiza flava Mexicana.
Klein, Vorbereit. p. 172. n. 9. mexikanischer Goldammer.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 93. n. 6. mexikanischer Goldammer.

Briffon, ornithol. I. p. 334. n. 12. Moineau du Mexique.

Büffon, Vögel, XI. p. 48. der gelbköpfige Häufling; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 133. n. 46. der gelbköpfige Kernbeißer.

Latham, Syst. ornith. I. p. 385. n. 50. Loxia (Mexicana) grisea, fronte gula uropygio superciliisque luteis.

Seligm. Vögel, II. tab. 87. der Häufling mit dem gelben Kopf.

Linneé, Syll. Nat. Edit. X. I. p. 174. n. 19. Loxia (Mexicana) grisea, fronte, gula, uropygio superciliisque luteis.

27. CHLORIS. Der Grünling. (6)

Müller, Natursyst. II. p. 554. n. 27. der Grünfink.

A a 2 Leske,

(5) Man muss diesen Vogel nicht mit *Loxia Mexicana* p. 848. n. 7. verwechseln. Zum Unterschiede könnte man diesen *L. Ochrocéphala* nennen.

(6) Gewicht etwas über zwey Loth. Ein stiller Vogel, der sehr leicht zähm wird, dass er so gar aus der Hand frisst. Nährt sich im Sommer von allerley Gesäime, besonders Hanf; frisst auch Raupen und andere Insekten. im Winter W cholderbeeren und Baumknospen. Auch an Gersten kann man ihn gewöhnen. Das Fleisch ist im Herbst schmackhaft.

- Leske*, Naturgesch. p. 260. n. 4. *der Grünfink.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 135. n. 6. *der Grünfink; Grünling; Grünschwanz.*
- Blumenbach*, Handb. der N. G. p. 184. n. 6. *Loxia (Chloris) flaviganti-virens*, remigibus primoriibus antice luteis, rectricibus lateralibus quatuor basi luteis. *Grünfink; Grünschwanz; Zwunsche.*
- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 511. n. 5. *der Grünling; Schwanz.*
- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. III. p. 588. *der Grünling.*
- Ebert*, Naturl. II. p. 132. *der Grünfink; Grünvogel.*
- Halle*, Vögel, p. 400. n. 408. *der grüngelbe Fink.*
- Meyer*, Thiere, II. tab. 28. *der Grünling.*
- Gatterer*, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 402. n. 337. *der Grünfink.*
- Pennant*, arct. Zool. II. p. 329. B. *der grüne Dickschnabel.*
- Berckmann*, Naturhist. p. 53. c. *der Grünfink.*
- Neuer Schaupl. der Nat. III. p. 530. *Grünfink.*
- Onomat. histor. natur. IV. p. 840. *der grüngelbe Finke.*
- Handb. der deutsch. Thiergeesch. p. 128. *Grünling; Wohnütz; Swunsch.*
- Klein*, av. p. 95. n. 4. *Coccothraustes viridis.*
- Klein*, Vorbereit. p. 176. n. 4. *grüngegelber Dickschnäbler; Grünling; Grünvogel; Hirsvoget; Kuttvogel.*
- Klein*, verb. Vögelhist. p. 94. n. 4. *Grünling.*
- Klein*, stemmat. av. p. 19. tab. 19. fig. 14. a. b.
- Gesner*, Vögelb. p. 141. *Chloris. Grünling; Grünfink; Kuttvogel; Tutter; Rappfink; Hirsenvogel; Fig. p. 142.*

Briffon,

- Briffon*, ornith. I. p. 359. n. 54. Verdier.
Büffon, Vögel, XI. p. 225. der Grünfink oder
 Grünling; mit e. Fig.
Batsch, Thiere, I. p. 351. der Grünfink.
Latham, Syn. Suppl. p. 152. Greenfiuch.
Latham, Vögel, II. I. p. 127. n. 36. der Grün-
 ling.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 382. n. 39. Loxia
 (Chloris) flaviganti-virens, remigibus primori-
 bus antice luteis, rectricibus lateralibus quatuor
 basi luteis.
Frisch, Vögel, tab. 2. der Grünling.
Wirsing, Vögel, tab. 53. 54. der Grünling.
Günther, Nest. u. Ey. tab. 62. Grünling.
Beseke, Vögel Kurl. p. 77. n. 167. der Grünfink.
Siemßen, meklenb. Vögel, p. 103. der Grünling;
 Gröönling; Gröönschwanz.
Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 422. der Grün-
 fink.
Fischer, Liv. p. 97. n. 146. Grünfink.
Cetti, Sardin. II. p. 183. der Grünfink.
White, N. G. von Engl. p. 64. n. 14. Grün-
 ling.
Pennant, britt. Thiergeesch. p. 121. tab. 56. fig. 5.
 Grünfink.
Storr, Alpenreise, I. p. 78. Grünfink.
Pontoppidan, Däunem. p. 173. n. 4. Svenske.
Borkhausen, Magaz. I. p. 141. Grünling.
Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 170. n. 206. der
 Grünling.
Linné, Abhandl. II. p. 302. n. 121. der Grün-
 fink.
Zorn, Petinotheol. II. p. 336. der Grünling.
Döbel, Jägerprakt. I. p. 62. Schwantz; Schwan-
 schel; welscher Hänfling.
Naumann, Vogelsteller, p. 66. der Schiurusch.

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 633. der Grünfink.

Naturforsch. XVII. p. 89. n. 181. der Grünfink.

Onomatol. forestal. I. p. 1072. Grünzling; Grinzling.

Krünnitz, Encykl. XX. p. 215. Grünfink.

Börner, schles. ökonom. Gesellsch. 1782. p. 101. n. 200.

Anweis. Vögel zu fang. p. 253. Grünling.

Loniceri, Kräuterb. p. 682. der Grünfinke.

Meidinger, Vorles. I. p. 148. n. 5. der Grünfink.

Zabłonsky, allgem. Lex. p. 414. Grünling.

Angenehme Landlust, p. 162.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 2. Chloris.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 174. n. 2. Loxia (Chloris) flavicanti-virens, remigibus primoribus antice luteis, rectricibus lateralibus quatuor basi luteis.

Müller, zool. dan. prodr. p. 30. n. 248. Loxia (Chloris) flavicanti-virens, remigibus primoribus antice luteis, rectricibus lateralibus quatuor basi luteis.

Kramer, Austr. p. 367. n. 5. Fringilla remigibus primoribus antice luteis, rectricibus tribus lateralibus basi luteis. Grünling.

Brünniche, ornith. bor. p. 67. n. 242. 243. Loxia Chloris.

Charlton, enom. zoic. p. 80. n. 5. Chloris; Fringilla viridis.

Moehring, av. gen. p. 41. n. 26. Chloris.

Schwarkfeld, av. Siles. p. 295. Linaria viridis; welscher Hänfling; Hirsch-Fink; Hirschvogel; grüner Finke.

Rzaczynsky, aust. hist. nat. Polon. p. 379 Fringilla viridis.

Rzaczyns-

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 391. *Linaria viridis*.

Sibbald, Scot. p. 18. *Chloris*.

Belon, hist. nat. des ois. p. 366. *Bruyan*; *Verdan*; *Verdier*; *Verdereule*; *Verdere*.

Barrere, ornithol. gen. 30. sp. 6. *Passer subviridis*, *alarum extreimis nigricantibus*.

Salern, hist. nat. des ois. p. 255. *Bruant*; *Chloris*, etc.

Jonston, av. p. 101. *Chloris*.

Zinnan. Uov. p. 6. tab. 19. fig. 54. *Verdone*.

Levin, britt. Birds II. tab. 69. *Greenfinch*.

Roman, ornith. I. p. 112. tab. 17. fig. 1. — *Faun.*
Arragon. p. 86.

Bomare, dictionn. IX. p. 283. *Verdier commun*.

Hermann, tab. affin. anim. p. 219. *Loxia Chloris*.

Aristot. hist. anim. L. 9. c. 20. n. 168. *Xλωρις*.

Aelian. de nat. anim. L. 4. c. 47. *Xλωρις*.

Plin. hist. nat. L. 10. c. 29. *Chlorion*.

Donndorff, Handb. der Thiergeesch. p. 357. n. 8.
der Grünfink.

69. SINENSIS. Der chinesische Kernbeißer.

Latham, Vögel, II. 1. p. 129. n. 37. *der chinesische Kernbeißer*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 383. n. 40. *Loxia (Sinensis) fusca subtus rufescens, capite colloque griseo-virescentibus, remigibus rectricibusque nigris, apice albidis*.

Somnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 157. *der chinesische Grünfink*.

28. BUTYRACEA. Der gelbstirnige Kernbeißer. (?)

Müller, Natursyst. II. p. 554. n. 28. *der Buttervogel*.

A a. 4

Onomat.

(?) Ist nicht mit *Fringilla Butyracea* p. 913. n. 22. zu verwechseln.

Latham rechnet *Büffons Vert-brinett* und *Verdier du Cap de b. E.* hieher.

Onomat. històr. natur. IV. p. 837. der grünliche Fink.

Büffon, Vögel, XI. p. 254. der butterfarbige Ditschnabel.

Latham, Vögel, II. I. p. 129. n. 38. der gelbstirnige Kernbeißer.

Latham, Syst. ornith. I. p. 383. n. 41. Loxia (Butyracea) virescens, fronte, superciliis, pectore abdomineque flavis, cauda apice alba.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 174. n. 21. Loxia (Butyracea) virescens, fronte, superciliis, pectore abdomineque flavis, caudae apice alba.

Hermann, tab. affin. anim. p. 219. Loxia butyracea.

70. DOMINICENSIS. Der grünbraune dominische Kernbeißer. (8)

Büffon, Vögel, XI. p. 257. der dominische Grünfink.

Latham, Vögel, II. I. p. 130. n. 39. der Kernbeißer von St Domingo.

Latham, Syst. ornith. I. p. 383. n. 42. Loxia (Dominicensis) viridi-fusca, subtus rufa fusco-maculata, regione oculorum erissoque albis.

71. AFRICANA. Der afrikanische Kernbeißer. (9)

Büffon, Vögel, XI. p. 258. der capsche Grünfink.

Latham, Vögel, II. I. p. 130. n. 40. der Afrikanische Kernbeißer.

Latham, Syst. ornith. I. p. 384. n. 43. Loxia (Africana) viridi-fusco-griseoque variegata, subtus alba, tectricibus alarum rufis, rectrice extima macula alba.

(8) Ist nicht mit *Loxia Dominicanus* p. 848. n. 8. zu verwechseln.

(9) Ist nicht mit *Loxia Afra* p. 857. n. 74. zu verwechseln.

29. CANADENSIS. Der canadische Kernbeisser.

Müller, Natursyst. II. p. 555. n. 29. der canadische Kernbeisser.

Pennant, arct. Zool. II. p. 328. n. 136. der Canadische Dickschnabel.

Onomat. hist. nat. IV. p. 837. der Kernbeisser aus Canada.

Briffon, ornith. I. p. 372. n. 4. Gros-bec de Cayenne.

Büffon, Vögel, X. p. 85. der gelbgrüne Kernbeisser.

Latham, Vögel, II. I. p. 121. n. 27. der Canadische Kernbeisser.

Latham, Syst. ornith. I. p. 379. n. 29. Loxia (Canadensis) viridi-olivacea, subtus flavo-olivacea, capistro nigro.

β. Latham, Syn. II. I. p. 128. n. 27. Var. A. —
Vögel, II. I. p. 122. n. 27. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 380. n. 29. β. L.

30. SULPHURATA. Der gelbkehlige Kernbeisser.

Müller, Natursyst. II. p. 555. n. 30. die Gelbkehle.

Onomat. hist. nat. IV. p. 859. der Dickschnäbler vom Vorgebürge der guten Hoffn.

Briffon, ornith. I. p. 871. n. 2. Gros-bec du cap de bonne esperance.

Latham, Vögel, II. I. p. 131. n. 41. der schwefelgelbe Kernbeisser.

Latham, Syst. ornith. I. p. 384. n. 45. Loxia (Sulphurata) fusco-olivacea gutture ventreque luteis, superciliis flavis.

72. FLAVIVENTRIS. Der gelbbäuchige Kernbeisser.

Briffon, ornith. I. p. 372. n. 3. Gros-bec jaune du cap de bonne esperance.

Latham, Vögel, II. I. p. 131. n. 42. der gelbbanwirte Kernbeisser.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 384. n. 46. Loxia (Flaviventris) viridi-olivacea, dorso fusco-maculato, subtus superciliisque luteis, cauda subforcipata.

B. **Latham**, Syn. II. I. p. 138. n. 42. Var. A. — Vögel, II. I. p. 132. n. 42. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 384. n. 46. **B.** L. viridi-olivacea, subtus flava, collo superiore, genis gulaque cinereis.

31. COLLARIA. Der Nonnen Kernbeisser.

Müller, Natursyst. II. p. 555. n. 31. der Kragenvogel.

Onomat. hist. nat. IV. p. 845. der Finke mit gelber Brust und gelbem Halskragen.

Büffon, Vögel, X. p. 100. der Nonnen-Kernbeisser, m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 126. n. 34. der Nonnen-Kernbeisser.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 382. n. 37. Loxia (Collaris) flavescens, pectore collarique flavis, temporibus nigris.

B. **Büffon**, Vögel, X. p. 122. der gesprenkelte Kernbeisser mit der Halsbinde; m. e. Fig.

Latham, Syn. II. I. p. 134. n. 34. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 382. n. 37. **B.**

Latham, Vögel, II. I. p. 127. n. 34. Var. A.

73. GRISEA. Der grauweiße Kernbeisser.

Pennant, archt. Zool. II. p. 328. n. 135. der graue Dickschnabel.

Biffon, Vögel, X. p. 102. der grauweiße Kernbeisser.

Latham,

Latham, Vögel, II. I. p. 127. n. 35. *der graue Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 382. n. 38. *Loxia (Grisea) caeruleo-grisea, facie colloque inferiore albis.*

32. BENGALENSIS. *Der bengalische Kernbeisser.*

Müller, Natursyst. II. p. 555. n. 32. *der bengalische Kernbeisser.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 836. *der Bengalische Sperling.*

Klein, av. p. 88. n. 4. *Passer Bengalensis.*

Klein, Vorbereit. p. 165. n. 4. *Gelbkopf; bengalischer Sperling.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 90. n. 4. *Gelbkopf.*

Briffon, ornith. I. p. 333. n. 1. *Moineau de Bengale.*

Büffon, Vögel, X. p. 98. *der Goldkopf.* *Loxia (Chrysocephala) fusca, pileo flavo, abdomine, crisco maculaque aurium albis, rostro pedibusque carneis.*

Latham, Vögel, II. I. p. 126. n. 33. *der Bengalische Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 382. n. 36. *Loxia (Bengalensis) grisea, pileo flavo, temporibus albidis, abdomine albido fuscō-maculato.*

Seligmann, Vögel, VI. tab. 84. *der gelbköpfige indianische Sperling.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 175. n. 23. *Loxia (Benghalensis) grisea, pileo flavo, temporibus albidis, abdomine albido fuscō-maculato.*

33. MALABARICA. *Der malabarische Kernbeisser.*

Müller, Natursyst. II. p. 555. n. 33. *der malabarische Kernbeisser.*

Latham, Vögel, II. I. p. 147. n. 74. *der Malabarische Kernbeisser.*

Latham,

Latham, Syst. ornith. I. p. 394. n. 81. *Loxia* (*Malaearica*) *cineræa*, remigibus rectricibusque *nigris*, gula crassoque *albis*.

74. A F R A. *Der schwarzbauchige Kernbeisser.*

Latham, Vögel, II. I. p. 147. n. 75. *der schwarzbauchige Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 394. n. 82. *Loxia* (*Melanogastra*) *lutea*, fuscoc-contaminata, gula, pectori abdonsineque *nigris*, alis caudaque *fusca*.

75. C A F F R A. *Der Mohrenkernbeisser.*

Büffon, Vögel, XI. p. 192. *der langschwänzige Kernbeisser.*

Batsch, Thiere, I. p. 348. *der Mohrenkernbeisser.*

Latham, Vögel, II. I. p. 153. n. 90. *der Mohren-Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 393. n. 78. *Loxia* (*Caffra*) *atra*, remigibus *fusca*, humeris *sanguinis*.

Lichtenberg u. Voigt, Magaz. für das Neueste etc. IV. I. p. 102. *Loxia caffra*. *Langschwanz.*

76. T O T T A. *Der Hottentottenkernbeisser.*

Latham, Syn. Suppl. p. 156. *Totty Grosbeak.*

Latham, Vögel, II. I. p. 153. n. 89. *der Hottentotten-Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 393. n. 79. *Loxia* (*Totta*) *testaceo fusca*, subtus *albida*, remigibus rectricibusque omnibus *nigris*, summo apice *albis*.

77. A S I A T I C A. *Der asiatische Kernbeisser.*

Latham, Vögel, II. I. p. 147. n. 76. *der Asiatische Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 394. n. 83. *Loxia* (*Asiatica*) *cineræo-rubescens*, subtus *cineræa*, abdomine

mine pallide rubro, capite, tectricibus alarum
majoribus, remigibus caudaque apice nigris.

β. *L. cinereo-caeruleo-scapularis*, capite, alis caudaque ni-
gris, remigibus rectricibusque duabus interme-
diis apice albis. *

Latham, Syn. Suppl. p. 153. n. 76. A. — Vögel,
II. I. p. 148. n. 76. Var. A.

Latham, Syst. ornith. p. 394. n. 83. β.

78. CANORA. *Der braunwangige Kernbeisser.*

Latham, Syn. Suppl. p. 154. Brown-cheeked Gros-
beak.

Latham, Vögel, II. I. p. 148. n. 77. *der braun-
wangige Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 394. n. 84. *Loxia (Ca-
nora) virescens*, subtus cinerea, genis fuscis
flavo circumdatis.

79. LINEATA. *Der gestreifte Kernbeisser.*

Latham, Vögel, II. I. p. 148. n. 78. *der gestrei-
fe Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 395. n. 85. *Loxia (Li-
neata) nigra subtus alba*, lateribus corporis ba-
siique remigum primorum albo nigroque trans-
versim striatis.

80. PERLATA. *Der geperlte Kernbeisser.*

Latham, Vögel, II. I. p. 149. n. 79. *der geperlte
Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 395. n. 86. *Loxia
(Perlata) nigra subtus fusca*, postice albo nigro-
que varia.

81. FASCIA T A. *Der bandirte Kernbeisser.*

Latham, Vögel, II. I. p. 149. n. 80. *der gebän-
derte Kernbeisser.*

Latham,

Latham, Syst. ornith. I. p. 395. *Loxia (Fasciata) testaceo-fusca, nigro undulata, sub gula fascia sanguinea.*

Latham, Syn. Suppl. p. 154. *Fasciated Grosbeak.*

32. CANTANS. Der Sangkernbeisser.

Latham, Vögel, II. I. p. 149. n. 81. *der Singkernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 395. n. 88. *Loxia (Cantan.) fusca nigricante transversim lineata, subtus alba, cauda cuneiformi.*

34. MELANOCEPHALA. Der schwarzköpfige Kernbeisser.

Müller, Natursyst. II. p. 556. *der schwarzköpfige Kernbeisser.*

Halle, Vögel, p. 398. n. 406. *der gelbe Kirschfink mit dem Mohrenkopfe.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 852. *gelber Schwarzkopf.*

Klein, av. p. 94. n. 2. *Coccothraustes citrea tota, capite nigro.*

Klein, Vorbereit. p. 176. n. 2. *gelber Schwarzkopf.*

Klein, verb. Vögelh. p. 94. n. 2. *gelber Schwarzkopf.*

Brisson, ornith. I. p. 373. n. 5. *Gros-bec de Gambie.*

Latham, Vögel, II. I. p. 143. n. 65. *der Gambia-Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 391. n. 69. *Loxia (Melanocephala) lutea, capite atro.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 175. n. 26. *Loxia (Melanocephala) lutea, capite atro.*

33. ERYTHROMELAS. Der roth- und schwarze Kernbeisser.

Latham, Vögel, II. I. p. 143. n. 66. *der schwarzköpfige Kernbeisser.* Tab. 44.

Latham,

Latham, Syst. ornith. I. p. 391. n. 70. *Loxia* (*Erythromelas*) *rubra*, remigibus rectricibusque obscurioribus, capite atro.

84. CORONATA. *Der schwarz gehäubte Kernbeisser.*

Klein, av. p. 95. n. 10. *Coccothraustes*, *Phoenicuri* species.

Klein, Vorbereit. p. 178. n. 10. *amerikanischer Thumherr.*

Klein, verb. Vögelh. p. 95. n. 10. *amerikanischer Thumherr.*

Briffon, ornith. I. p. 400. n. 10. *Bouvreuil hupé d'Amerique.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 143. n. 67. *der Kernbeisser mit schwarzen Federbusche.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 391. n. 71. *Loxia* (*Coronata*) *cristata*, supra coccinea, subtus cyanea, macula colli inferioris cristaque nigra.

35. CANA. *Der eisengraue Kernbeisser.*

Müller, Natursyst. II. p. 556. n. 35. *der graue Kernbeisser.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 837. *der graue Fink.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 92. n. 22. *lichtgrauer Sperling.*

Briffon, ornith. I. p. 369. n. 72. *Pinçon cendré des Indes.*

Büffon, Vögel, XI. p. 46. *der eisengraue Sperling;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 146. n. 73. *der aschgraue Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 393. n. 77. *Loxia* (*Cana*) *cana* remigibus rectricibusque fuscis, pedibus rubris.

Seligmann, Vögel, VI. tab. 74. *der graue Fink.*

Linné,

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 175. n. 27. *Loxia* (*Cana*) remigibus rectricibusque fuscis, pedibus rubris.

36. PHILIPPINA. *Der philippinische Kernbeisser.*

Müller, Natur-syst. II. p. 556. n. 36. *der philippinische Kernbeisser.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 855. *der Kernbeisser von den Philippinischen Inseln.*

Briffon, ornith. I. p. 373. n. 6. *Gros-bec des Philippines.*

Büffon, Vögel, X. p. 95. *der Tucnam-Courvi;* m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 350. *der Toucnam-Courvi.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 380. n. 32. *Loxia (Philippina) fusca, subtus albido-flavicans, vertice pectoreque luteis, gula fusca.*

Latham, Vögel, II. I. p. 123. n. 30. *der Philippinische Kernbeisser.*

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 622. *der Toucnam-Courvi.*

Donndorff, Handb. d. Thiergeesch. p. 358. n. 9. *der philippinische Kernbeisser.*

β. Der Baglafecht.

Büffon, Vögel, X. p. 115. *der Baglafecht.*

Batsch, Thiere, I. p. 351. *der Baglafecht.*

Latham, Vögel, II. I. p. 124. n. 30. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 381. n. 32. β. *Loxia cauda remigibus virescente fuscis, margine flavis.*

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 622. *der Baglafecht.*

35. ABYSSINICA. *Der abyssinische Kernbeisser.*

Büffon, Vögel, X. p. 117. *der abyssinische Kernbeisser.*

Batsch, Thiere, I. p. 351. *der abyssinische Kernbeisser.*

Latham,

Latham, Vögel, II. I. p. 125. n. 31. *der abyssi-*
nische Kernbeisser.

Latham, Syst. ornith. I. p. 381. n. 33. *Loxia*
(*Abyssinica*) *corpore flavo, vertice, genis, gula*
pectoreque nigris, alis caudaque fuscis.

Sammel. zur Phys. u. N. G. II. p. 622. *der abyssi-*
sche Dickschnabel.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 358. n. 10.
der abyssinische Kernbeisser.

86. PENSILIS. *Der Nelicourvi.*

Latham, Vögel, II. I. p. 125. n. 32. *der Hangnest-*
Kernbeisser.

Latham, Syst. ornith. I. p. 381. n. 34. *Loxia*
(*Pensilis*) *vitidis subtus grisea, crisco rubro,*
capite colloque inferiore flavis, remigibus re-
ctricibusque nigris.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 156. *der*
Nelicourvi aus Madagascar; tab. 112.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 359. n. 11.
der Nelicourvi aus Madagascar.

37. STRIATA. *Der gestrichelte Kernbeisser.*

Müller, Natursyst. II. p. 556. n. 37. *der buntge-*
streifte Kernbeisser.

Onomat. hist. nat. IV. p. 858. *der Kernbeisser von*
der Insel Bourbon.

Briffon, ornith. I. p. 376. n. 11. *Gros-bec de l' Isle*
de Bourbon, ou Jacobin.

Latham, Vögel, II. I. p. 134. n. 49. *der gestri-*
chelte Kernbeisser.

Latham, Syst. ornith. I. p. 386. n. 53. *Loxia*
(*Striata*) *fusca, ferrugineo-striata, subtus alba*
iugulo nigro.

38. LUDOVICIANA. *Der louisianische Kernbeisser.*

Müller, Natursyst. II. p. 557. n. 38. *der louisiani-*
sche Kernbeisser.

Onomat. hist. nat. IV. p. 850. der Finke aus Iudovicien.

Pennant, arct. Zool. II. p. 326. n. 128. der Dick-schnabel mit rother Brust.

Brisson, ornith. I. p. 378. n. 14. Gros-bec de la Louisiane.

Büffon, Vögel, X. p. 80. das Rosenkehlfchen.

Latham, Vögel, II. I. p. 120. n. 24. der rothbrü-stige Kernbeisser.

Latham, Syst. ornith. I. p. 379. n. 25. Loxia (Ludoviciana) nigra, pectore, ventre, alarum fascia basique remigum albis.

87. MACULATA. Der gefleckte Kernbeisser.

Pennant, arct. Zool. II. p. 336. n. 129. der gefleck-te Dick Schnabel; tab. 16. obere Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 120. n. 25. der gefleckte Kernbeisser.

Latham, Syst. ornith. I. p. 379. n. 26. Loxia (Maculata) obscure fusca, albo maculata, subtus albida maculis subfuscis, superciliis pallidis, rectricibus duabus extimis apice albo - maculatis.

88. OBSCURA. Der dunkelbraune Kernbeisser.

Pennant, arct. Zool. II. p. 327. n. 132. der dun-kelbraune Dick Schnabel.

Latham, Vögel, II. I. p. 121. n. 26. der dunkel-braune Kernbeisser.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 379. n. 27. Loxia (Obscura) fusco-nigricans, gula media corpo-reque subtus albis, lateribus fusco - maculatis, rectricibus alarum albo bifasciatis.

39. CAPENSIS. Der capsche Kernbeisser.

Müller, Natursyst. II. p. 557. n. 39. der capsche Kernbeisser.

Onomat. hist. nat. IV. p. 838. der schwarze Sperling vom Vorgebürge der guten Hof.

Brisson, ornith. I. p. 354. n. 45. Pinçon du cap de bonne esperance.

Büffon, Vögel, XI. p. 161. der schwarz und gelbe Fink.

Latham, Syn. II. I. p. 113. n. 7. Cape Grosbeak.

Latham, Syn. Suppl. p. 149. Cape Grosbeak.

Latham, Vögel, II. I. p. 108. n. 7. der Capsche Kernbeisser.

Latham, Syst. ornith. I. p. 373. n. 7. Loxia (Capensis) atra, uropygio tectricibusque alarum luteis.

β. Büffon, Vögel, X. p. 121. der gefleckte capsche Kernbeisser. (10)

Latham, Vögel, II. I. p. 109. n. 7. Var. A.

40. NIGRA. Der schwarze Kernbeisser.

Müller, Natursyst. II. p. 557. n. 40. der schwarze Kernbeisser.

Halle, Vögel, p. 402. n. 410. der schwarze Domherr.

Onomat. hist. nat. IV. p. 854. der schwarze Domherr.

Klein, av. p. 95. n. 6. Coccothraustes nigra. Rubicilla minor nigra. Mariposa nigra.

Klein, Vorbereit. p. 177. n. 6. Schorsteinfeger.

Kein verb. Vögelhist. p. 95. n. 6. Schorsteinfeger.

Brisson, ornith. I. p. 397. n. 3. Bouvreuil noir du Mexique.

Büffon, Vögel, XIII. p. 43. der schwarz und weiße Rundschnabel; m. e. Fig.

Latham, Vögel II. I. p. 140. n. 60. der schwarze Kernbeisser.

(10) Ist p. 845. n. 51. schon als eine eigne Gattung aufgeführt.

Latham, Syst. ornith. I. p. 388. n. 59. *Loxia* (*Nigra*) nigra, macula alba humeri basique remigum duarum exteriorum.

Seligmann, Vögel, III. tab. 36. *das kleine schwarze Rothschwänzlein*.

Bankroft, N. G. von Guian. p. 108. *der kleinere schwarze Rothschwanz*.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 175. n. 28. *Loxia* (*Nigra*) nigra, macula alba humeri remigumque duarum exteriorum.

89. CRASSIROSTRIS. *Der dick Schnäbige Kernbeisser.*

Latham, Syn. Suppl. p. 152. *Thick-billed Gros-beak.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 141. n. 61. *der dickschnäbliche Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 390. n. 65. *Loxia* (*Crassirostris*) nigra, remigibus primoribus reticibusque duabus intermediis basi albis, rostro gibboſo.

β. *Loxia pileo coccineo nitido, postice quadrato.* *

Latham, Syn. Suppl. p. 152. — Syst. ornith. I. p. 390. n. 65. β. — Vögel, II. 1. p. 141. ad n. 61.

90. AMERICANA. *Der schwarzbrüstige Kernbeisser.* (1)

Latham, Vögel, II. 1. p. 141. n. 62. *der schwarzbrüstige Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 390. n. 67. *Loxia* (*Pectoralis*) corpore supra fasciaque pectoris nigris, subtus fasciaque alarum gemina alba.

41. CAE-

(1) Das Vaterland ist noch nicht ganz ausgemacht.

41. CAERULEA. Der himmelblaue Kernbeisser.

Müller, Natursyst. II. p. 558. n. 41. der himmelblaue Kernbeisser.

Halle, Vögel, p. 403. n. 411. der blaue Kernbeisser.

Pennant, arct. Zool. II. p. 327. n. 133. der blaue Dickschnabel.

Klein, av. p. 95. n. 7. Coccothraustes caerulea.

Klein, Vorbereitung. p. 177. n. 7. blaue Dickschnäbler.

Klein, verb. Vögelhist. p. 95. n. 7. blauer Dickschnabler.

Briffon, ornith. I. p. 399. n. 7. Bouvreuil bleu de la Caroline.

Büffon, Vögel, XIII. p. 40. der blaue amerikanische Gimpel; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. III. n. II. der blaue Kernbeisser.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 374. n. II. Loxia (Caerulea) caerulea, alis fuscis, fascia baseos purpurea.

Seligmann, Vögel, II. tab. 78. der blaue Kernbeisser.

Schöpf, Reis. d. Nordamer. II. p. 109. der blaue Vogel.

Bankroft, N. G. von Guian. p. 108. der guianische Blaufinke?

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 175. n. 29. Loxia (Caerulea) caerulea, alis fuscis, fascia baseos purpurea.

β. Briffon, ornith. I. p. 398. n. 6. Bouvreuil bleu du Brésil. (2)

Latham, Syn. II. 1. p. II7. n. II. Var. A. — Vögel, II. 1. p. III. n. II. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 374. n. II. β. Loxia tota caerulea, loris macula nigra.

(2) Nach Briffon eine eigne Gattung.

42. ORIX. *Der Grenadier.*

Müller, Natursyst. II. p. 564. n. 7. *der afrikanische Ammer.*

Onomat. hist. nat. V. p. 719. *der afrikanische Ammer.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 98. n. 20. *neu entdeckter Fink.*

Briffon, ornith. I. p. 338. n. 21. *Cardinal du cap de bonne esperance.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 115. n. 16. *der Grenadier-Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 376. n. 17. *Loxia (Orix) fulvo-sanguinea, facie pectoreque atris, alis rectricibusque nigricantibus.*

Seligmann, Vögel, VI. tab. 72. *der Grenadier.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. p. 177. n. 5. *Emberiza (Orix) grisea, fronte abdomineque nigris, collo uropygioque fulvis, rostro nigro.*

B. *Büffon*, Vögel, X. p. 84. *der roth und schwarze Kernbriffer; m. e. Fig.*

Latham, Syn. II. 1. p. 121. n. 16. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 376. n. 17. β.

Latham, Vögel, II. 1. p. 115. n. 16. Var. A.

91. ERYTHRINA. *Der carmoisinrothköpfige Kernbeisser. (3)*

Latham, Vögel, II. 1. p. 265. n. 29. *der karmoisinköpfige Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 444. n. 33. γ. *Fringilla cinereo-rubescens, subtus alba, capitis, uropygii gutturisque pennis apice ruberrimis, remigibus rectricibusque fuscis, margine lutescentibus.*

92. FLA-

(3) Nach *Latham* eine Varietät von *Fringilla rosea*, p. 923. n. 91.

92. FLAMENGO. Der upsalische Kernbeisser. (4)

Latham, Syn. Suppl. p. 155. Flamingo Grosbeak.
Latham, Vögel, II. I. p. 152. n. 88. der Flamingo Kernbeisser.

Latham, Syst. ornith. I. p. 388. n. 56. d. Loxia alba, capite, collo, pectore abdomineque roseis.

43. VIOLACEA. Der violettfarbige Kernbeisser.

Müller, Natursyst. II. p. 558. n. 43. der violetfarbige Kernbeisser.

Halle, Vögel, p. 403. n. 413. der purpurblaue Kernbeisser.

Pennant, act. Zool. II. p. 328. n. 134. der purpurrothe Dickschnabel.

Onotnat. hist. nat. IV. p. 859. der purpurblaue Kernbeisser.

Klein, av. p. 95. n. 9. Coccothraustes purpurea.

Klein, Vorbereit. p. 177. n. 9. Purpurklepper.

Klein, verb. Vögelist. p. 95. n. 9. Purpurklepper.

Brisson, ornith. I. p. 400. n. 9. Bouvreuil violet de Bahama.

Büffon, Vögel, XIII. p. 46. der violette Dickschnabel, oder violette Gimpel mit rother Kehle und Augenbrauen, m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 112. n. 12. der purpurfarbene Kernbeisser.

Latham, Syst. ornith. I. p. 375. n. 13. Loxia (Violacea) violacea, superciliis, gula crissaque rubris.

Seligmann, Vögel, II. tab. 80. der purpurfarbene Kernbeisser.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 176. n. 30. Loxia (Violacea) violacea, superciliis, gula anoque rubris.

Gentl. Magaz. XXIII. tab. p. 128.

(4) Nach Latham eine Varietät von *Loxia Pyrrhula*.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 359. n. 12.
der violettfarbige Kernbeisser.

44. GROSSA. Der weißkehlige Kernbeisser.

Müller, Natursyst. II. p. 558. n. 44. der große
Kernbeisser.

Onomat. hist. nat. IV. p. 848. der Amerikanische
blaue Fink.

Brisson, ornith. I. p. 381. n. 20. Gros-bec bleu
d'Amerique.

Büffon, Vögel, X. p. 56. der blaue amerikani-
sche Kernbeisser.

Latham, Vögel, II. I. p. 110. n. 10. der weißkeh-
lige Kernbeisser.

Latham, Syst. ornith. I. p. 374. n. 10. *Loxia* (Gros-
sa) cano-caerulescens, iugulo rectricibusque
atris, gula alba, rostro rubro.

45. MINIMA. Der kleine Kernbeisser.

Müller, Natursyst. II. p. 558. n. 45. der kleine
Kernbeisser.

Onomat. hist. nat. IV. p. 853. der kleinste Fink.

Latham, Syn. Suppl. p. 154. Dwarf Grosbeak.

Latham, Vögel, II. I. p. 151. n. 83. der Zwerp-
Kernbeisser.

Latham, Syst. ornith. I. p. 396. n. 92. *Loxia*
(Minima) fusca, subtus testacea, remigibus
primoribus basi, secundariis posterius albis.

B. *Loxia* corpore subtus cinereo-albo: inter rostrum
et oculos, marginibusque alarum flavescens. *

γ. *Loxia* corpore toto subtus uropygioque albis. *

Latham, Syst. ornith. I. p. 396. ad n. 92. —

Vögel, II. I. p. 151. ad n. 81. — Syn. Suppl.
p. 154.

46. FUSCA. Der braune Kernbeißer. (5)

Müller, Naturfyst. II. p. 559. n. 46. der braune Kernbeißer.

Onomat. hist. nat. IV. p. 848. der braune Krummschnabel.

Brisson, ornithol. I. p. 398. n. 5. petit Bouvreuil noir d'Afrique:

Büffon, ois. IV. p. 368. Bouveron. — pl. enl. n. 319. fig. I. Bouvreuil à plumes frisées du Brésil.

Büffon, Vögel, XIII. p. 35. der kleine schwarze afrikanische Gimpel.

Latham, Vögel, II. I. p. 140. n. 58. der braune Kernbeißer.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 389. n. 64. Loxia (Fusca) fusca, subtus albida, remigibus a tertia ad nonam basi omnino albis.

Hermann, tab. affin. anim. p. 218. Loxia fusca.

93. SEPTENTRIONALIS. Der nördliche Kernbeißer. (6)

Pennant, arct. Zool. II. p. 329. ad A. Loxia atra.

Latham, Vögel, II. I. p. 140. n. 59. der nördliche Kernbeißer.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 388. n. 58. Loxia (Septentrionalis) atra, macula alarum alba.

47. MINUTA. Der kleinste Kernbeißer.

Müller, Naturfyst. II. p. 559. n. 47. der Zwerg.

Onomat. hist. nat. IV. p. 854. der kleine Finke.

Büffon, Vögel, XIII. p. 39. der rothbauchigste Rundschnabel.

Latham, Vögel, II. I. p. 150. n. 83. der kleine Kernbeißer.

Bb 5

Latham,

(5) Die Synonymen aus Brisson und Büffon, rechnet Latham zu *Loxia Lineola*, p. 854. n. 25.

(6) Nach Pennant eine Varietät von *Loxia Pyrrhula*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 396. n. 90. Loxia (Minuta) grisea, uropygio subtusque ferruginea, remigibus 4, 5, 6, basi utrinque albis, cauda integra.

Bankroft, N. G. von Guiana, p. 108. der graue Gimpf. (7)

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 176. n. 31. Loxia (Minuta) grisea, uropygio subtusque ferruginea, remigibus 4, 5, 6, basi utrinque albis, cauda integra.

48. BICOLOR. Der zweifarlige Kernbeißer. (8)

Müller, Natursyst. II. p. 559. n. 48. der zweifarlige Kernbeißer.

Onomat. histor. natur. IV. p. 836. brauner Amerikanischer Diefelfinke.

Klein, av. p. 98. n. 16. Fringilla fusca americana.

Klein, Vorbereit. p. 183. n. 16. brauner amerikanischer Diefelfinke.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 98. n. 16. brauner Fink.

Briffon, ornithol. I. p. 352. n. 40. petit Pinçon rouge.

Biffon, Vögel, XI. p. 145. der kleine braune Fink; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 150. n. 82. der orangebäuchige Kernbeißer.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 395. n. 89. Loxia (Bicolor) fusca, subtus rubra.

Seligmann, Vögel, IV. tab. 61. das kleine braune Rothkehlein.

Linné,

(7) Hier heißt es: er sey etwas größer als ein Rabe; das verstehe ich gar nicht. Das Original habe ich nicht zur Hand. In der Note steht *Loxia cana* Linn.; der es aber nach der Beschreibung nicht seyn kann.

(8) Ist nicht mit *Fringilla bicolor* zu verwechseln.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 176. n. 32. Loxia (Bicolor) fusca, subtus rubra.

Hermann, tab. affin. anim. p. 219. Loxia bicolor.

β . *Latham*, Syst. ornith. I. p. 395. n. 89 β . Loxia fusca, subtus alba, gula pallide ferruginea.

49. TRIDACTYLA. *Der dreyzehige Kernbeißer.* (9)

Büffon, Vögel, X. p. 119. der Guiffo-Balito.
(Guiffo balito-dimmo-won jerck.)

Batsch, Thiere, I. p. 351. der Guiffo-Balito.

Beckmann, Bibl. VIII. p. 540. der Guiffo-Balito.

Latham, Vögel, II. I. p. 151. n. 85. der dreyzehige Kernbeißer.

Latham, Syst. ornith. I. p. 397. n. 93. Loxia (Tridactyla) nigra, capite, collo interiore vittaque longitudinali abdominis rubris, tectricibus alarum fuscis, albo marginatis.

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 623. der Guiffo-balito.

Hermann, tab. affin. anim. p. 217. Guiffo-balito.

A. Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Edit. XII.

p. 301. n. 12. Loxia Colius. p. 842. n. 1. Colius capensis.
p. 306. n. 42. Loxia Mada. p. 305. n. 27. Lanius bico-

gascarina.

Edit. XIII.

lor.

Das Geschlecht ist, der Anzahl nach, um 44. Gattungen vermehrt. Da aber zwey derselben in andere Geschlechter versetzt, und an deren Stelle zwey andere einge-

(9) Der gezähnte Schnabel und die nur mit 2. Vorder- und 1. Hinterzehe versehenen Füsse, machen einen ganz besondern Character aus, der wohl für ein eigenes Geschlecht zureichend wäre.

eingeschoben worden; so sind der neu hinzugekommenen Gattungen überhaupt 46. — Bey der 1ten Gattung sind *drey*, bey der 4ten *drey*, bey der 8ten *drey*, bey der 21ten *drey*, bey der 29ten *zwey*, bey der 31ten *zwey*, bey der 36ten *zwey*, bey der 39ten *zwey*, bey der 41ten *zwey*, bey der 42ten *zwey*, und bey der 48ten gleichfalls *zwey* Varietäten aus einander gesetzt.

B. Unbestimmtere Thiere,

1. Der graue Kernbeißer.

Latham, Vögel, II. I. p. 155. n. 93. der graue Kernbeißer.

Mus. Carls. IV. n. 88. *Loxia cinerea*.

2. Der Javanische Kernbeißer.

Latham, Vögel, II. I. p. 155. n. 94. der Javanische Kernbeißer.

Mus. Carls. IV. n. 89. *Loxia javensis*.

3. Der rostrothe Kernbeißer.

Latham, Vögel, II. I. p. 155. n. 95. der rostrothe Kernbeißer.

Mus. Carls. IV. n. 90. *Loxia ferruginea*.

4. Der Kernbeißer mit halbem Halsringe.

Latham, Vögel, II. I. p. 157. n. 99. der Kernbeißer mit dem halben Halsringe.

Actes de la Soc. d'hist. nat. Vol. I. p. 1. n. 81. *Loxia semitorquata*.

C. Neuere Gattungen.

1. Der Franziskaner in Guinea.

Latham, Vögel, II. I. p. 157. n. 98. der Franziskaner Kernbeißer.

Isert: Schrift der berlin. Gesellsch. N. Fr. IX. p. 332.

Loxia (Franciscana) coccinea, capite abdomineque nigra, alis griseis, tab. 9.

2. Der

2. Der hudsonische Kernbeißer.

Latham, Vögel, II. I. p. 156. n. 96. der Kernbeißer aus der Hudsonsbay.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 379. n. 28. Loxia (Hudsonia) fusca, abdomine albo, lateribus fuscō-maculatis, tectricibus alarum rufo bifasciatis.

3. Der gesellschaftliche Kernbeißer vom Cap.

Latham, Vögel, II. I. p. 156. n. 97. der gesellige Kernbeißer.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 381. n. 35. Loxia (Socia) rufo-fusca, subtus flavescentes, capistro nigro, cauda brevi.

4. Der gelbe Kernbeißer von Sumatra.

Latham, Vögel, II. I. p. 154. n. 91. der grün-gelbe Kernbeißer.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 384. n. 44. Loxia (Hypoxantha) flavicans, fronte superciliisque luteis, remigibus rectricibusque nigris, margine flavescentibus.

Mus. Carlson. fasc. III. tab. 71. Loxia hypoxantha.

5. Der braunrote asiatische Kernbeißer.

Latham, Syn. Suppl. p. 155. Eastern Grosbeak.

Latham, Vögel, II. I. p. 152. n. 87. der östliche Kernbeißer.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 387. n. 55. Loxia (Undulata) fusco-rubra, corpore subtus fusco-undulato, cauda pallide rubro-cinerea.

6. Der grauköpfige indianische Kernbeißer.

Latham, Syn. Suppl. p. 155. Ash-headed Grosbeak.

Latham, Vögel, II. I. p. 152. n. 86. der grauköpfige Kernbeißer.

Latham,

Latham, Syst. ornith. I. p. 394. n. 80. *Loxia (Indica) nigricans*, subtus albida, capite colloque cinereis, cauda apice alba.

7. *Der grasgrüne Kernbeißer von Java.*

Latham, Vögel, II. I. p. 154. n. 92. *der lauchgrüne Kernbeißer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 396. n. 91. *Loxia (Prasina) viridi olivacea*, subtus cano - flavicans, utopygio rubro, pedibus flavis. (*mas.*)

Mus. Carls. fasc. III. tab. 72. *Loxia prasina.*

β. *Loxia fuscō - olivacea*, subtus cano flavicāns, uropygio obsolete rubro, pedibus flavis. (*femina*)

Latham, loc. cit. β.

Mus. Carlson. fasc. III. tab. 73.

110. GESCHLECHT. EMBERIZA. *Der Amer.*

Müller, Natursyst. II. p. 560. Gen. CX.

Leske, Naturgesch. p. 260. Gen. XLII.

Borowsky, Thierreich, III. p. 145. Gen. LXIII.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 184. Gen. XXXII.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 523. Gen. LXXII.

Funke, Naturgesch. I. p. 236.

Ebert, Naturl. II. p. 133.

Halle, Vögel, p. 383. Gen. II.

Pennant, arct. Zool. II. p. 330.

Neuer Schäapl. der Natur. I. p. 267.

Onomat. hist. nat. III. p. 771.

Klein, av. p. 91. trib. IV.

Brisson, ornith. I. p. 382. Gen. XXXV.

Buffon, Vögel, XII. p. 128. sqq.

Batsch, Thiere, I. p. 317. Gen. LXXV.

Latham, Vögel, II. I. p. 158. Gen. XXXV.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 397. Gen. XXXVI.

Hermann, tab. affin. anim. p. 219.

Domin.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 359. Gen. LXXVIII.

I. NIVALIS. *Der Schneeammer.* (10)

Müller, Naturfyst. II. p. no. n. 1. *der Schneeammer.*

Leske, Naturgesch. p. 260. n. 1. *der Schneeammer;* tab. 5. fig. 1.

Borowsky, Thierreich, III. p. 147. n. 2. *der Schneeammer.*

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 184. n. 1. *Emberiza (Nivalis) remigibus albis, primoribus extrosum nigris; rectricibus nigris, lateralibus tribus albis; der Schneeammer; Schneevogel.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 526. n. 6. *der Schneeammer; Schneesperling.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 590. *der Schneeammer.*

Funke, Naturgesch. I. p. 236. *der Schneeammer.*

Ebert, Naturl. II. p. 134. *der Schneeammer; Winterling.*

Hallé, Vögel, p. 387. n. 390. *der Schneevogel; nordischer Lerchenammer.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 402. n. 338. *der Schneeammer.*

Pennant,

(10) Länge 6 1/2 Zoll. Flügelweite 10. Zoll. — Gewicht eine Unze fünf Quentchen. Penn. Brütet in Grönland im May. Die Knaben fangen sie im Herbst, wenn sie sich, um auszuwandern, an den Küsten in grossen Heerden versammeln, und sie werden getrocknet geessen. Es scheint, dass sie die Länder innerhalb des ganzen arctischen Kreises zu ihrem Sommeraufenthalt wählen; von dort aus überschwemmen sie, wenn in der kalten Zone der Winter eintritt, die südlichen Länder in ungeheurer Anzahl. — Man hat diese Vögel zuweilen zu den Lerchen gezählt. Die Ursach giebt Linné selbst an: fn. suec. p. 83. *Rostro cum Emberiza convenit; pollicis ungue longiore, et quod per terram curvatur, ad glandas propinca accedit.*

- Pennant*, arct. Zool. II. p. 331. n. 138. *der Schneeammer*.
- Neuer Schaupl. d. Nat.* I. p. 268. *Schneeammer*.
- Onomat. histor. natur.* I. p. 243. *Alauda hiemalis*;
Schneelerche; *Winterlerche*.
- Handb. der deutsch. Thiergeesch.* p. 129. *Schneeammer*.
- Klein*, av. p. 91. n. 4. *Emberiza varia*. *Passer hybernus*. *Avis peregrina*.
- Klein*, Vorbereit. p. 170. n. 4. *Schneeammer*; *Winterling*; *Neuvogel*; *gescheckter Emmerling*; *Wintersperling*.
- Klein*, verbess. Vögelhistor. p. 93. n. 4. *Schneeammer*.
- Brisson*, ornith. I. p. 383. n. 9. *Ortolan de neige*.
- Büffon*, Vögel, XII. p. 173. *der Schnee-Ortolan*,
oder *Schnee-Ammer*; m. e. Fig.
- Batsch*, Thiere, I. p. 347. *der Schneeammer*.
- Latham*, Syn. Suppl. p. 157. *Snow-Bunting*.
- Latham*, Vögel, II. 1. p. 158. n. 1. *der Schnee-Ammer*.
- Latham*, Syst. ornithol. I. p. 397. n. 1. *Emberiza (Nivalis) remigibus albis, primoribus extrotsum nigris, rectricibus nigris, lateralibus tribus albis*.
- Seligmann*, Vögel, V. tab. 21. *der Schneevogel aus Hudsonsbay*.
- Beséke*, Vögel Kurl. p. 78. n. 168. *der Schneeammer*.
- Siemßen*, meklenb. Vögel, p. 110. n. 1. *der Schneeammer*; *Schneevagel*; *Strietvagel*.
- Bock*, N. G. von Preuß. IV. p. 423. *Schneeammer*.
- Fischer*, Liv. p. 97. n. 147. *Schneeammer*.
- Fischer*, Zus. zur N. G. von Livil. p. 48. *Schneevogel*.

Lepechin,

- Lepechin*, Tageb. d. russ. Reis. II. p. 5. *Schneevogel*, III. p. 13. *Schneeammer*.
- Pennant*, Reis. d. Schottl. I. p. 41. *Schneeammer*.
- Phipps*, Reis. nach d. Nordpol. p. 99. *der Schneeammer*.
- Schöpf*, Reis. d. Nordamer. II. p. 13. *Schneevogel*.
- Pallas*, Reis. Ausz. III. p. 475. *Schneeammer*.
- White*, N. G. von Engl. p. 30. p. 44. *Schneeammer*.
- Leem*, Finnm. p. 135. *der Schneevogel*.
- Pontoppidan*, Dännem. p. 173. n. 1. *Sneefugl*; *Sneekok*.
- Pontoppidan*, Norweg. II. p. 182. *Sneefugl*; *Vinterfugl*.
- Olaffen*, Isl. I. p. 310. c. *Snio Tytlingar*; *Tytlings-Bilke*; *Snio-Tytiling*.
- Pennant*, brit. Thiergesch. p. 130. tab. 57, fig. 6. *Schneeammer*.
- Pallas*, nord. Beytr. III. p. 17. *Schneeammer*.
- Linné*, Abhandl. II. p. 283. n. 36. p. 302. n. 124. *der Schneeammer*.
- Scopoli*, Bem. aus der N. G. I. p. 176. n. 214. *der Schnee-Emmerling*.
- Martini*, Naturlex. II. p. 389. *Schneeammer*.
- Naturforsch. XVII. p. 89. n. 182. *die Schneeammer*.
- Schwed. Abhandl. II. p. 134. *Schneesperling*; tab. 1. fig. 9 — 11.
- Schwed. Abhandl. XXXVIII. p. 298. *Schneeammer*.
- Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 738. *der Schneeammer*.
- Berlin. Samml. IX. p. 572. *Schneeammer*.
- Börner*, Schles. ökon. Gesellsch. 1781. p. 101. *Emberiza nivalis*.

Borkhausen, Magazin, I. p. 142. n. 5. *Schneeammer*.

Meidinger, Vorles. I. p. 149. n. 1. *der Schneammer*.

Jablonsky, allgem. Lex. p. 1013. *Schneevogel*.

Schrift. der Drontheim. Gesellsch. III. p. 514.

Linneé, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 1. *Avis nivalis*.

Linneé, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 176. n. 1. *Emberiza (Nivalis) remigibus albis: primoribus extorsum nigris, rectricibus nigris, lateralibus tribus albis*.

Müller, zool. dan. prodr. p. 30. n. 250. *Emberiza (Nivalis) remigibus albis: primoribus extorsum nigris, rectricibus nigris; lateralibus tribus albis*.

Kramer, Austr. p. 372. n. 7. *Meerstiglitz*.

Olaus M. de gent. septentr. L. 19. c. 156. *Avicula nivalis*.

Schwenkfeld, av. Silef. p. 256. *Emberiza varia*.

Winterling, *Neuvogel*.

Rzatczynsky, aust. hist. nat. Pol. p. 397. *Nivalis avis. Passer hibernus. Hortulanus ex albo vriegatus. Snegula*.

Bomar. diction. VI. p. 273. *Ortolan de neige*.

Levin, britt. Birds, II. tab. 71.

Hermann, tab. affin. anim. p. 220. *Emberiza nivalis*.

Donndorff, Handb. d. Thiergeesch. p. 360. n. 1. *der Schneammer*.

β. Der weißfleckige Schneammer. (1)

Brisson, ornithol. I. p. 389. n. 9. *A. Ortolan de neige tacheté*.

Latham,

(1) *Bechstein u. Otto* halten *Frischens* *weißfleckigen Ammer* für ein *Gold-Ammer* Männchen. S. *Bechsteins* N. G. Deutschl. III. p. 591. — *Büffons Vögel*, XII. p. 179. not. 2.

Latham, Syn. II. I. p. 163. Var. A. Spotted Bunting.

Latham, Vögel, II. I. p. 160. n. I. Var. A. der gelbfleckte Schnee-Ammer.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 398. n. I. β.

γ. Der schwarzbrüstige Schneammer.

Briffon, ornithol. I. p. 389. n. 9. B. Ortolan de neige à poitrine noire.

Latham, Syn. II. I. p. 163. Var. B. Black-breasted Bunting.

Latham, Vögel, II. I. p. 160. n. I. Var. B. der schwarzbrüstige Schnee-Ammer.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 398. n. I. γ. Emberiza flavescente-alba, capistro corporeque subtus nigricantibus, alis caudaque albo nigro-que variis.

δ. Der Schneammer mit dem Halsbande. (2)

Klein, av. p. 98. n. 10. Fringilla capite albo.

Klein, Vorbereit. p. 181. n. 10. Weißkopf.

Klein, verb. Vögelhist. p. 97. n. 10. Weißkopf.

Briffon, ornithol. I. p. 390. n. 9. D. Ortolan de neige à collier.

Büffon, Vögel, XII. p. 195. der Schneortolan mit dem Halsbande, oder der weißköpfige; mit e. Fig.

Latham, Syn. II. I. p. 163. Var. C.

Latham, Vögel, II. I. p. 161. n. I. Var. C. der bunte Ammer.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 398. n. I. δ. E. corpore fusco-rubro, capite colloque albis, pectore macula difformi caeruleofuscata, alis caudaque albo nigroque variis.

(2) Albin hat diesen Vogel zuerst abgebildet. Otto hält es noch für ungewiss, ob er zu dem Schneammer gehört, weil er in Gestalt und Farbe von ihm abweicht, und auf einer Eiche sitzend abgebildet ist.

7. MUSTELINA. Der Eisammer.

Latham, Vögel, II. I. p. 161. n. 2. der lohgelbe Ammer.

Latham, Syst. ornith. I. p. 398. n. 2. *Emberiza (Glacialis) nigra pennis flavo-fusco marginatis, gula uropygioque flavescentibus, subtus alba flavo obscure maculata.*

Linné, faun. suec. II. p. 85. n. 227. β . (Variet. *Emb. nivalis*.)

Fabric, faun. groenl. p. 119. *Pulli?*

Nach *Bechstein* ein sehr altes Männchen von der folgenden Gattung.

25. MONTANA. Der Bergammer.

Latham, Vögel, II. I. p. 162. n. 3. der Bergammer.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 398. n. 3. *Emberiza (Montana) cinerea, subtus flavescente-undulata, capite castaneo, fronte saturatiore, gula alba, rectricibus tribus extimis albis.*

2. HYEMALIS. Der schwarze Ammer. (3)

Müller, Naturfyst. II. p. 561. n. 2. der Wintervogel.

Pennant, arct. Zool. II. p. 334. n. 139. der schwarze Ammer.

Klein, av. p. 89. n. 8. *Passer nivalis, cervice alba.*

Klein, Vorbereit. p. 166. n. 8. *Weißnacken.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 91. n. 7. *Weißnacken.*

Briffon, ornith. I. p. 389. n. 9. C. *Ortolan de neige noir.*

Büffon,

(3) Länge 6 1/2 Zoll. Flügelweite 9. Zoll. Gewicht 1 1/2 Unze
Penn. — *Briffon* und *Büffon* halten ihn für eine Abart von *Emberiza nivalis*.

Büffon, Vögel, XII. p. 194. der Jacobinortolan,
und schwarze Schneeammer; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 164. n. 4. der schwarze
Ammer.

Latham, Syst. ornith. I. p. 399. n. 4. Emberiza
(Hyemalis) nigra, ventre albo.

Seligmann, Vögel, I. tab. 72. der Schneevogel.

Kalm, Reis. d. Nordamer. p. 49.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 360. n. 2.
der schwarze Ammer.

3. MILIARIA. Der Grauammer. (4)

Müller, Natursyst. II. p. 562. n. 3. der graue
Ammer.

Borowsky, Thierreich, III. p. 149. n. 4. der graue
Ammer; Gerstammer.

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 185. n. 2. Em-
beriza (Miliaria) grisea, subtus nigro-macu-
lata, orbitis rufis; die graue Ammer.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 524. n. 2. der graue
Ammer; Strumpfieinker.

Funke, Naturgesch. I. p. 237. die graue Ammer.

Ebert, Naturl. II. p. 133. die graue Ammer.

Halle, Vögel, p. 384. n. 382. der große ler-
chenfarbne Ammer.

Pennant, arct. Zool. II. p. 341. B. der gemei-
ne Ammer.

Klein, av. p. 91. n. 1. Emberiza alba.

Klein, Vorbereit. p. 169. n. 1. grauer großer Am-
mer; Knustknipper.

Cc 3

Klein,

(4) Länge 7 1/2 Zoll. Flügelweite 11 1/3 Zoll. Büff. Nistet
selten auf der blosen Erde, sondern 3—4. Zoll über dem
Boden in dem dichtesten Grase, das stark genug ist, sein Nest
zu tragen. Die Jungen verlassen das Nest, schon ehe sie fliegen
können, und laufen im Grase. Wird leicht zahm.

- Klein*, verb. Vögelhist. p. 93. n. 1. *grauer Ammer*; *großer Ammer*; *Knipper*.
- Klein*, Stemmat. av. p. 18 tab. 18. fig. 5. a. b.
- Gesner*, Vögelb. p. 475. *weiße Emmeritze*.
- Brisson*, ornith. I. p. 390. n. 10. Proyer.
- Büffon*, Vögel, XII. p. 237. *der graue Ammer*; m. e. Fig.
- Batsch*, Thiere, I. p. 346. *der graue Ammer*.
- Latham*, Vögel, II. 1. p. 169. n. 8. *der Gerstenammer*; *gemeiner Ammer*.
- Latham*, Syst. ornithol. I. p. 402. n. 12. *Emberiza (Miliaria) grisea*, *subtus nigro-maculata*, *orbitis rufis*.
- Siemßen*, meklenb. Vögel, p. III. n. 2. *die graue Ammer*; *Ortolan*.
- Bock*, N. G. von Preuss. IV. p. 424. *die graue große Ammer*.
- Fischer*, Liv. p. 98. n. 148. *grauer Ammer*.
- Cetti*, Sardin. II. p. 184. *die graue Ammer*.
- Pallas*, Reis. III. p. 647. Ausz. III. p. 474. *Grauammer*.
- White*, N. G. von Engl. p. 24. p. 66. n. 8. *graue Ammer*.
- Pennant*, brit. Thiergesch. p. 128. tab. 58. Fig. 7.
- Pontoppidan*, Dänem. p. 174. n. 2. *Kornlärke*.
- Naturforsch. XVII, p. 91. n. 183. *die graue Ammer*.
- Neue Schwed. Abhandl. III. p. 109. *Emberiza Miliaria*.
- Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 740. *die Grauammer*.
- Borkhausen*, Magaz. I. p. 143. n. 6. *Hirsenammer*; *Grauammer*.
- Martini*, Naturlex. II. p. 374. *große graue Ammer*.
- Börner*, schles. ökon. Nachricht. 1781. p. 101. *Gerfling*.
- Günther*, Nest. u. Ey. tab. 70. *Gerflammer*.
- Linne*,

- Linné*, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 4. Emberiza.
- Linné*, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 176. n. 2. Emberiza (Calandra) grisea nigro-maculata. — Fn. suec. II. n. 228. Emberiza (Calandra) grisea, nigro maculata.
- Müller*, zool. dan. prodr. p. 38. n. 251. Emberiza (Miliaria) grisea, subtus nigro-maculata, orbitis rufis.
- Kramer*, Austr. p. 372. n. 6. Brassler.
- Brünniche*, ornith. bor. p. 68. n. 247. Emb. Calandra.
- Charleton*, exercitat. p. 84. n. 16. Cynchramus, p. 87. n. 14. Emberiza alba.
- Charleton*, onom. zoic. p. 79. n. 14. Emberiza alba. p. 75. n. 16. Cynchramus.
- Mehring*, av. gen. p. 41. n. 28. Spinus.
- Schwenkfeld*, av. Silef. p. 290. Hordeola. Gerstling; Gerst-Vogel; Gersthammer, welsche Goldammer: weisse Emmeritz.
- Sibbald*, Scot. P. II. L. 3. p. 18. Emberiza alba Gesneri.
- Belon*, hist. nat. des ois. p. 266. Pruyer.
- Fonston*, av. p. 97. Emberiza alba. p. 72. Cynchramus. p. 101. Alaudæ congreger.
- Zinnan*, Uov. p. 63. tab. 9. fig. 55. Strilozzo.
- Faun. Arragon. p. 680. — Roman. ornithol. I. p. 155. tab. 24. Fig. 1.
- Hist. Prov. I. p. 195. — *Levin*, britt. Birds II. tab. 75.
- Bomare*, diction. IX. p. 336. — Diction. des anim. III. p. 389.
- Donndorff*, Handb. der Thiergesch. p. 360. n. 3. der graue Ammer.

4. HORTULANA. *Der Ortolan.* (5)

Müller, Natursyst. II. p. 562. n. 4. *der Ortolan*;
tab. 25. Fig. 4.

Leske, Naturgesch. p. 261. n. 2. *der Gartenammer*.
Borowsky, Thierreich, III. p. 148. n. 3. *der Ortolan*; *Fettammer*.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 185. n. 3. *Emberiza (Hortulana) remigibus nigris, primis tribus margine albidis: rectricibus nigris, laterilibus duabus extrorsum nigris. Ortolan; Kornfink; windsche Goldammer*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 525. n. 4. *der Gartenammer*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 590. *Ammerling*, *Grünzling*; *Hortulan*.

Funke, Naturgesch. I. p. 237. *der Ortolan*.

Ebert, Naturl. II. p. 135. *der Ortolan*.

Halle, Vögel, p. 385. n. 383. *der Ortolan*. Fig. 24.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 403.
der Ortolan.

Berkmann, Naturhist. p. 53. b. *der Ortolan*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 341. D. *der Ortolan*.

Onomat. hist. nat. III. p. 776. *Fettammer*; *Gärtner*.

Handb. der deutsch. Thiergeesch. p. 129. *Ortolan*, *Brachamsel*.

Klein, av. p. 91. n. 2. *Emberiza miliaria pinguiscens*.

Klein, Vorbereit. p. 170 n. 2. *Fettammer*.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 93. n. 2. *Fettammer*.

Brisson, ornith. I. p. 384. n. 4. *Ortolan*.

Büffon, Vögel, XI. p. 128. *der Ortolan*; mit e. Fig.

Batsch, Thiere, I. 345. *der Ortolan*.

Latham,

(5) In Cypern wird ein beträchtlicher Handel damit getrieben, und jährlich oft an 160000 aus dieser Insel verschickt.

Latham, Syn. Suppl. p. 157. *Ortolan Bunting.*

Latham, Vögel, II. I. p. 164. n. 5. *der Gartenamher.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 399. n. 5. *Emberiza (Hortulana) remigibus nigris, primis tribus margine albidis, rectricibus nigris, lateralibus duabus extrorsum albis.*

Bock, Naturgesch. von Preuss. IV. p. 424. *der Fettammer.*

Cetti, Sardin. II. p. 192. *Ortolan.* *

Fischer, Livil. p. 98 n. 149. *Fettammer.*

Pallas, Reis. Ausz. III. p. 74. *Ortolan.*

Pallas, nord. Beytr. III. p. 15. *der Ortolan.*

Taube, Slavon. I. p. 22. *Ortolane.*

Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 3. *Ortulan.*

Linné, Abhandl. II. p. 286. n. 5. p. 303. n. 126. *der Ortolan.*

Naturforsch. XVII. p. 91. n. 184. *Fettammer.*

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 735. *der Hortulan.*

Borkhausen, Magaz. I. p. 143. n. 7. *Ortolan.*

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 177. not. n.

Martini, Naturlex. II. p. 365. *Fettammer.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 57. *Ortolahn.*

Naumann, Vogelsteller, p. 73. *Ortolan.*

Eberhard, Thiergesch. p. 81. *der Ortolan.*

Anweis. Vögel zu fang. p. 173. 333. *Hortulan.*

Forstlex. II. p. 387. *Ortolan.*

Oekonom. Zool. p. 98. n. 42. *der Ortolan.*

Meidinger, Vorl. p. 149. n. 2. *der Gartenammer.*

Jablonsky, allgem. Lex. p. 762. *Ortolan.*

Ludovici, Kaufmannslex. IV. p. 369.

Zückert, Speis. aus dem Thierr. p. 96.

Börner, schles. ökon. Nachr. 1781. p. 101. *Emberiza Hortulana.*

Gothaisch. Hofkalender, 1780. p. 149.

Beckmann, Churmark. f. I. p. 873.

Koburgisch. Magazin, 1760. n. II. p. 161.

Goeze, Natur, Menschenl. u. Vorf. VI. p. 261.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 5. *Hortulana*.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 177. n. 3. *Emberiza* (*Hortulana*) *remigibus nigris*, *primis tribus* *margine albidis*, *rectricibus nigris*: *lateralibus* *duabus extrorsum nigris*.

Linné, fn. suec. I. p. 208. *Fringilla remigibus nigris*: *primis tribus* *margine albidis*: *rectricibus nigris*: *lateralibus* *duabus extrorsum albis*.

Brünniche, ornith. bor. p. 68. *Hortulanus*.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 386. *Hortulanus*. *Miliaria Varronis*. *Jüt.-vogel*.

Kramer, Austr. p. 371. n. 4. *Emberiza capite virecente*, *annulo circa oculos gulaque flavescens*. *tibus*. *Ortulan*.

Zinnan, Uov. p. 41 tab. 6. Fig. 25. *Ortolano*.

Hist. prov. I. p. 494. *Ortolanus*.

Salerne, ois. p. 296. *Hortolan*; *Ortolan*; *Jardinier*.

Bomare, Diction. VI. p. 272. — Diction. des anim. III. p. 289.

Varro, de re rust. L. 3. c. 5. n. 2. *Miliariae*.

Aristot. hist. anim. L. 3. c. 12. *Κενχραμος*.

Donndorff, Handb. d. Thiergeeschich. p. 361. n. 4. *der Ortolan*.

β. Der gelbe Ortolan.

Halle, Vögel, p. 386. n. 384. *der gelbliche Ortolan*.

Onomat. hist. nat. III. p. 777. n. 1. *eine gelbe Spielart*.

Briffon, ornith. I. p. 385. n. A. *Ortolan jaune*.

Briffon, Vögel, XII. p. 141. *der gelbe Ortolan*.

Latham, Syn. II. I. p. 168. n. 5. A. — Vögel, II. I. p. 166. n. 5. A.

Latham,

Latham, Syst. ornith. I. p. 399. n. 5. β . Emberiza
flavescens tota, reinigibus margine albis.

Martini, Naturlex. II. p. 367.

Jonston, av. p. 72. Hortulanus flavus.

γ . *Der weiße Ortolan.*

Halle, Vögel, p. 386. n. 385. ganz weiße Or-
tolane.

Onomat. hist. nat. III. p. 172. eine schneeweisse
Spielart.

Briffon, ornith. I. p. 385. B. Ortolan blanc.

Büffon, Vögel, XII. p. 141. der weiße Ortolan.

Latham, Syn. II. I. p. 168. n. 5. B. — Vögel, II.
I. p. 166. n. 5. B.

Latham, Syst. ornith. I. p. 400. n. 5. β . E. tota
nivea.

Martini, Naturlex. II. p. 369.

Jonston, av. p. 72. Hortulanus albus.

δ . *Der weißschwänzige Ortolan.*

Halle, Vögel, p. 386. n. 388. Ortolan mit weissem
Schwanze.

Onomat. hist. nat. III. p. 777. Eine Spielart mit
einem weißen Schwanz.

Briffon, ornith. I. p. 385. C. Ortolan à queue
blanche.

Büffon, Vögel, XII. p. 142. der weissgeschwänzte
Ortolan.

Latham, Syn. II. I. p. 168. n. 5. C. — Vögel,
II. I. p. 166. n. 5. IC.

Latham, Syst. ornith. I. p. 400. n. 5. δ . E. corpo-
re ut in primo, cauda alba.

Martini, Naturlex. II. p. 369.

Jonston, av. p. 72. Hortulanus albicilla.

Zinnian, Uov. p. 42. tab. 6. Fig. 27. Ortolano con
la coda bianca.

8. *Der schwarze Ortolan.*

Halle, Vögel, p. 386. n. 387. *Ortolan mit schwarzem Leibe*, etc.

Onomat. hist. nat. III. p. 777. n. 4. *Eine Spielart mit grünem Kopf und Hals*, etc.

Brisson, ornith. I. p. 385. D. *Ortolan noir*.

Biffon, Vögel, XII. p. 142. *der schwärzliche Ortolan*.

Latham, Syn. II. I. p. 168. n. 5. D. — Vögel, II. I. p. 166. n. 5. D.

Latham, Syst. ornith. I. p. 400. n. 5. e. E. corpore nigricante, capite colloque virescentibus, rostro rubro, pedibus cinereis.

Martini, Naturplex. II. p. 365.

Zinnian, Uov. p. 42. tab. 6. Fig. 26. *Ortolano con il collo verde*.

26. SINENSIS. *Der chinesische Ammer.*

Latham, Vögel, II. I. p. 166. n. 6. *der chinesische Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 400. n. 6. *Emberiza (Sinensis) rubro-fusca, subtus lutea, tectricibus alarum minoribus flavescentibus, remigibus, rectricibus strigaque abdominis longitudinali fuscis.*

5. CITRINELLA. *Der Goldammer.*

Müller, Natursyst. II. p. 563. n. 5. *der Goldammer.*

Leske, Naturgesch. p. 261. n. 3. *der Goldammer.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 149. n. 5. *der Goldammer, Emmerling.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 185. n. 4. *Emberiza (Citrinella) rectricibus nigricantibus: extimis duabus latere interiore macula alba acuta, der Goldammer, Gelbgans.*

- Bechstein, Naturgesch. I. p. 523. n. 1. der Goldammer; Embritz.
- Funke, Naturgesch. I. p. 236. Goldammer.
- Ebert, Naturl. II. p. 134. Goldammer; Gelbling.
- Halle, Vögel, p. 383. n. 381. der Goldammer.
- Meyer, Thiere, I. tab. 94. der Goldammer. M. u. W.
- Gatterer, vom Nutz. u. Schädl. Th. II. p. 405. n. 340. die Goldammer, Gaalammer, etc.
- Pennant, arct. Zool. II. p. 341. C. der gelbe Ammer.
- Onomat. hist. nat. II. p. 831. der Gröning.
- Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 130. Emmerling; Hämmerling.
- Klein, av. p. 92. n. 5. Emberiza flava.
- Klein, Vorbereit. p. 171. n. 5. Goldammer; Gaalammer; Gelbling; Geelgerft; Embritz; Aemmerling; Grünfing.
- Klein, verb. Vögelist. p. 93. n. 5. Goldammer.
- Klein, Stemmat. av. p. 18. tab. 18. Fig. 6. a. b.
- Gesner, Vögelb. p. 474. Emmeritz; Embritz; Emmering; Emmerling; Gilbling; Gilberschen; Kornvogel; Geelgorft. p. 475. Gorse; Gurse; m. e. Fig.
- Brisson, ornith. I. p. 382. n. 1. Bruant.
- Buffon, Vögel, XII. p. 206. der Goldammer; m. e. Fig.
- Batsch, Thiere, I. p. 346. der Goldammer.
- Latham, Syn. Suppl. p. 157. Yellow-Bunting.
- Latham, Vögel, II. 1. p. 167. n. 7. der Goldammer.
- Latham, Syst. ornith. I. p. 400. n. 7. Emberiza (Citrinella) rectricibus nigricantibus, extimis duabus latere interiore macula alba acuta.
- Befeké, Vögel Kurl. p. 78. n. 169. die Goldammer.

Siemßen,

- Siemßen*, meklenb. Vögel, p. 112. n. 3. *Goldammer*; *Geelgöschen*.
- Bock*, N. G. von Preuss. IV. p. 424. *Goldammer*.
- Cetti*, Sardin. II. p. 193. *der Goldanimer*.
- White*, N. G. von Engl. p. 63. n. 6. *Goldammer*.
- Fischer*, Livil. p. 98. n. 150. *Goldammer*.
- Pontoppidan*, Dännem. p. 174. n. 4. *Goldverling*; *Gulspuru*.
- Pallas*, nord. Beytr. III. p. 17. *der gemeine Emmerling*.
- Linné*, Abhandl. II. p. 302. n. 125. *der Goldammer*.
- Pennant*, brit. Thiergeesch. p. 129. n. 2. *Goldammer*.
- Borkhausen*, Magazin, I. p. 144. n. 8. *Goldammer*.
- Zorn*, Petinotheol. II. p. 346. *der gelbe Emmerling*.
- Scopoli*, Bern. a. d. N. G. I. p. 172. n. 209. *der Goldammer*.
- Döbel*, Jägerprakt. I. p. 62. *Goldammer*; *Grünschling*.
- Naumann*, Vogelsteller, p. 71. *Grünschling*; *Gehling*.
- Beckmann*, Naturhist. p. 53. a. *der Goldammer*.
- Eberhard*, Thiergeesch. p. 81. *der Goldammer*.
- Naturforsch. XVII. p. 91. n. 185. *Goldammer*.
- Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 739. *die Goldammer*.
- Neue Schwed. Abhandl. III. p. 109. *Emberiza citrinella*.
- Goeze*, nützl. Allerl. II. p. 387. n. 8. *der Goldammer*.
- Krünitz*, oekon. Encykl. X. p. 784. *Emmerling*.
- Oekonom. Zool. p. 99. n. 43. *Goldammer*.
- Martini*, Naturlex. II. p. 371. *Goldammer*.
- Forstlexikon. I. p. 592. *Emmerling*.
- Schrift. der Dronheim. Gesellsch. III. p. 414.

Anweis.

- Anweis. Vogel zu fang. p. 172. *Emmerling.*
Meidinger, Vorlesung. I. p. 149. n. 3. *der Goldammer.*
André u. Bechstein, Spazierg. III. p. 21. 47. *Goldammer.*
Börner, schles. ökonomin. Gesellsch. 1781. p. 101.
Emberiza Citrinella.
Zablonsky, allgem. Lex. p. 297. *Emmerling.*
Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 56. *Emberiza.*
Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 31. n. 3. *Citrinella.*
Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 177. n. 4. *Emberiza (Citrinella) rectricibus nigricantibus: extimis duabus latere interiore macula alba acuta.*
Linné, fn. suec. I. p. 205. *Fringilla rectricibus nigricantibus, extimis duabus latere interiore alba acuminata macula.*
Kramer, Austr. p. 370. n. 1. *Emberiza rectricibus nigricantibus, extimis duabus, latere interiore, alba acuminata macula, gula pectore que flavis. Ammering; Goldammering.*
Brünniche, ornith. bor. p. 68. n. 249. *Emberiza Citrinella.*
Schwenkfeld, av. Siles. p. 218. *Aureola. Gaul-Ammer; Geelgerft.*
Rzaczynsky, auct. hist. nat. Pol. p. 368. *Aureola.* p. 392. *Lutea altera.*
Jonston, av. p. 101. *Lutearum genus alterum.*
Belon, ois p. 364. 365. *Verdier; Serrant.*
Barrere, ornithol. p. 56. *Passer ex cinereo flavus.*
Salerne, ornithol. p. 293. *Verdier, etc.*
Schaefer, element. ornithol. tab. 32.
Levin, britt. Birds, II. tab. 73.
Faun. Aragon. p. 86. — Hist. Prov. I. p. 495.
Donndorff, Handb. d. Thiergeesch. p. 362. n. 5. *der Goldammer.*

β. *Der fahle oder weißliche Goldammer.* *

Büffon, Vögel, XII. p. 219. — *Latham*, Vögel, II. I. p. 168. not. y.

Zorn, Petinotheol. II. p. 53.

γ. *Der gefleckte Goldammer.* * *Latham*, l. c.

6. OLIVACEA. *Der olivenfarbige Ammer.*

Müller, Natursyst. II. p. 563. n. 6. *der Olivenammer.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 775. *der Ammer aus der Insel Dominique.*

Brisson, ornith. I. p. 392. n. 14. *Bruant de St. Domingue.*

Büffon, Vögel, XII. p. 259. *der olivenfarbige Ammer.*

Martini, Naturlex. II. p. 364. *Ammer von Domingo.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 410. n. 38. *Emberiza (Olivacea) olivacea, subtus albidior, gula aurantia, fascia pectorali nigricante.*

27. PASSERINA. *Der Sperlingsammer.*

Müller, Natursyst. Suppl. p. 155. n. 25. *der Sperlingsammer.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 528. n. 9. *die Sperlingsammer.*

Büffon, Vögel, XII. p. 278. *der Sperlingsammer.*

Latham, Vögel, II. I. p. 190. n. 35. *der Sperlingsammer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 403. n. 14. *Emberiza (Passerina) griseo - fusca, subtus cinera-scens, vertice medio, iugulo rectricibusque nigris, duabus extimis albo nigroque dimidiatis.*

Pallas, Reis. Ausz. I. Anh. p. 4. n. 10. *Emberiza passerina.*

28. PUSILLA. *Der kleine Ammer.*

Büffon, Vögel, XII. p. 284. *der kleine Ammer.*

Latham, Vögel, II. I. p. 210. n. 67. *der kleine Ammer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 414. n. 54. *Loxia (Pusilla) supra passerina, subtus albida, capite supra et lateribus fasciis quinis testaceis, interiectisque nigris quatuor.*

Pallas, Reis. Ausz. III. Anh. p. 8. n. 20. *Emberiza pusilla.*

29. RUSTICA. *Der Bauernammer.*

Büffon, Vögel, XII. p. 285. *der Bauernammer.*

Latham, Vögel, II. I. p. 210. n. 68. *der Bauernammer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 413. n. 51. *Emberiza (Rustica) supra passerina, subtus alba, capite nigro, fasciis tribus longitudinaliter albis.*

Pallas, Reis. Ausz. III. Anh. p. 8. n. 21. *Emberiza rustica.*

30. FUCATA. *Der geschminkte Ammer.*

Büffon, Vögel, XII. p. 287. *der geschminkte Ammer.*

Latham, Vögel, II. I. p. 210. n. 69. *der geschminkte Ammer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 419. n. 73. *Emberiza (Fucata) passerina, cervice cano-cinerea, corpore subtus lineaque supra et infra oculos alba.*

Pallas, Reis. Ausz. III. Anh. p. 8. n. 22. *Emberiza fucata.*

31. SPODOCEPHALA. *Der grauköpfige Ammer.*

Büffon, Vögel, XII. p. 288. *der grauköpfige Ammer.*

Latham, Vögel, II. I. p. 211. n. 70. der grauköpfige Ammer.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 419. n. 74. Emberiza (Spodocephala) passerina, subtus flavescens, capite et collo cano-cinereis, capistro nigro.

Pallas, Reis. Ausz. III. Anh. p. 9. n. 24. Emberiza Spodocephala.

32. CHRYSOPHRYX. Der Ammer mit gelben Augenbrauen.

Büffon, Vögel, XII. p. 289. der Ammer mit gelben Augenbrauen.

Latham, Vögel, II. I. p. 211. n. 71. der gelbstreifige Ammer.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 419. n. 75. Emberiza (Chrysophrys) passerina, vertice nigro, superciliis citrinis, fascia a medio verticis ad nucham alba.

Pallas, Reis. Ausz. III. p. 9. n. 25. Emberiza chrysophrys.

33. MAELBYENSIS. Der Ammer aus Südermannland. (*)

Latham, Syn. Suppl. p. 160. Maelby Bunting.

Latham, Vögel, II. I. p. 208. n. 64. der Maelbyische Ammer.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 401. n. 8. Emberiza (Maelbyensis) capite colloque plumbeocinereis, gula albida, abdomine ferrugineo.

34. RUTILA. Der röthliche Ammer.

Büffon, Vögel, XII. p. 286. der röthliche Ammer.

Latham, Vögel, II. I. p. 211. n. 72. der röthliche Ammer.

Latham,

(*) Nach Bechstein eine Varietät von *Emberiza Hortulana*. N. G. Deutschl. III. p. 592.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 411. n. 40. Emberiza
(Rutila) ex sanguineo rufa, subtus sulphurea,
alis ex griseo ferrugineis.

Pallas, Reis. Ausz. III. Anh. p. 9. n. 23. Emberiza rutila.

35. FERRUGINEA. *Der rostfarbige Ammer.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 338. n. 147. der rostfarbige Ammer.

Latham, Vögel, II. 1. p. 192. n. 36. der rostfarbene Amur.

Latham, Syst. ornith. I. p. 411. n. 41. *Emberiza* (*Ferruginea*) *ferruginea*, abdomine remigum-que primorum maculis duabus albis.

36. AMERICANA. *Der schwarzkohlige Ammer.* (6)

Pennant, arch. Zool. II. p. 338. n. 144. der Ammer mit schwarzer Kehle. Tab. 17. unt. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 193. n. 37. der schwarzhäckige Ammer; tab. 46. Fig. I.

Latham, Syst. ornith. I. p. 411. n. 42. Emberiza
(Americana) cinerea, fusco striata, superciliis,
striga sub oculis abdomineque flavis, gula alba,
iugulo macula alba.

37. BRASILIENSIS. Der brasilianische Ammer.

Onomat. hist. nat. III. p. 772. *der brasiliische Emmerlingvogel.*

Halle, Vögel, p. 382. f. der gelbe Gesangssperling.

Dd 2 *Briesson,*

(6) Latham hat im Syst. ornith. I. c. noch die besondere Abtheilung gemacht, dass er Pennants Ammer mit schwarzer Kehle als Spielart von seinem eignen *Black-throated Bunting* (Syn. II. I. p. 197. n. 37. t. 44.) annimmt, und ihn folgender Gestalt characterisiert: *Emberiza cinereo-fusca, subtus albida, fronte superciliisque flavis, fascia sub oculis lunulaque frontis nigra, gula flava, medio macula triguerra nigra*; und sagt von ihm: er bewohne die Hudsonsbay, sey 7 1/2 Zoll lang, niste auf der Erde, und lege weisse, schwarz gefleckte Eyer, cf. Syn. Suppl. p. 158.

Brisson, ornith. I. p. 392. n. 13. Bruant du Brésil.

Büffon, Vögel, XII. p. 252. der Guirnegat, oder brasiliische Ammer; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 194. n. 38. der Brasilische Ammer.

Latham, Syst. ornith. I. p. 412. n. 43. Emberiza (Brasiliensis) virescens, flavo fuscoque varia, subtus verticeque lutea.

Martini, Naturlex. II. p. 362. brasiliische Ammer.

Fonston, av. p. 203. Guiranheemgatu.

38. MEXICANA. Der mexicanische Ammer.

Büffon, Vögel, XII. p. 255. der mexikanische Ammer oder die gelbe Therete.

Latham, Vögel, II. I. p. 195. n. 39. der Mexikanische Ammer.

Latham, Syst. ornith. I. p. 412. n. 44. Emberiza (Mexicana) fuscescens, facie gulaque luteis, corpore subtus forside albo fusco maculato.

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 741. der gelbe mexikanische Ammer.

39. MILITARIS. Der Maltheserammer.

Latham, Vögel, II. I. p. 195. n. 40. der Kriegs. Ammer.

Latham, Syst. ornith. I. p. 412. n. 45. Emberiza (Militaris) flavescente-fusca, subtus alba, pectore dorsoque infimo flavis.

Hasselquist, Palaest. (ed. gerin.) p. 336. n. 48. Emberiza Meliteniis.

40. MELANOCEPHALA. Der schwarzköpfige Ammer. (7)

Büffon, Vögel, XII. p. 198. der schwarzköpfige Ammer.

Latham, Vögel, II. I. p. 195. n. 41. der schwarzköpfige Ammer.

Latham, Syst. ornith. I. p. 412. n. 45. Emberiza (Melanocephala) flava, dorso rufo, capite colloque superiore nigris, remigibus rectricibusque fuscis.

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 171. n. 208. der schwarzköpfige Emmerling.

Borkhausen, Magaz. I. p. 145. n. 10. schwarzköpfiger Ammer.

41. BRUMALIS. Der Winterammer.

Latham, Vögel, II. I. p. 195. n. 42. der Winterammer.

Latham, Syst. ornith. I. p. 412. n. 47. Emberiza (Brumalis) flavo-fusca, siacipite corporeque subtus flavis, collo superiore cum lateribus cinereo, remigibus fuscis.

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 175. n. 213. der Winteremmerling.

42. COCCINEA. Der carmoisinfrothe Ammer. (8)

Büffon, Vögel, XII. p. 292. der Ammer von Karlsruh.

Dd 3 Latham,

(7) Was ich aus diesem Vogel machen soll, weiss ich nicht. Scopoli führt Kleins *Emberiza capite nigro* (prodr. p. 92. n. 10.) als Synonym an; Klein aber *Albinus greater Bramling* III. n. 63. und dies ist *Fringilla tapponica*, p. 900. n. 1. Ein Schreibfehler ist es wohl, wenn Latham das Kleinsche Synonym zweymal, hier, und bey *Fringilla tapponica* anführt. Bechstein meint, es könnte wohl *Emberiza aureola*, p. 875. n. 47. seyn.

(8) Nach Bechstein mit *Loxia Pyrrhula* einerley. N. G. Deutschl. III. p. 591.

Latham, Vögel, II. I. p. 213. not. u. der Ammer von Karlsruh.

Latham, Syst. ornith. I. p. 410. n. 34. Emberiza (Coccinea) corpore supra argenteo, subtus coccineo, crisso albo, rostro, capite remini- gibusque nigris, postremis, occipite et cauda ex atro cæruleis.

43. BADENSIS. Der baadensche Ammer. (9)

Büffon, Vögel, XII. p. 291. der baadensche olive- venfarbige Ammer.

Latham, Vögel, II. I. p. 213. n. 77. der Baaden- sche Ammer.

Latham, Syst. ornith. I. p. 411. n. 39. Emberiza (Badensis) olivacea, nigricante striata, subtus pallidior, gula aurantia, pectore nigricante- striato.

Borkhausen, Magaz. I. p. 145. n. 9. badischer Ammer.

44. ERYTHROPHTHALMA. Der rothäugige Am- mer.

Müller, Natursyst. II. p. 582. n. 6. das Roth- auge.

Onomat. hist. nat. III. p. 971. der schwarze Sper- ling.

Pennant, archt. Zool. II. p. 334. n. 140. das Roth- auge.

Klein, av. p. 89. n. 7. passer niger, oculis rubris, iride nigra.

Klein, Vorbereitung. p. 166. n. 7. schwarzer Sperling.

Klein, verb. Vögelhist. p. 91. n. 6. schwarzer Sperling.

Brissot, ornith. I. p. 353. n. 44. Pinçon de la Caroline.

Büffon,

(9) Nach Bechstein 1. c. mit *Fringilla Citrinella* einerley.

Büffon, Vögel, XI. p. 158. der schwarze rothaugige Fink.

Latham, Vögel, II. I. p. 196. n. 43. der rothäugige Ammer.

Latham, Syst. ornith. I. p. 413. n. 48. Emberiza (Erythrophthalma) nigra, rubro relucens, abdomine rufescente, macula alarum alba.

Seligmann, Vögel, II. tab. 68. der schwarze Sperling mit rothen Augen.

Linne, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 180. n. 3. Fringilla (Erythrophthalma) nigra, rubro relucens, abdomine rufescente, macula alarum alba.

45. **LEUCOPHRYs.** *Der weißgescheitelte Ammer.* (10)

Pennant, arct. Zool. II. p. 330. n. 137. der Weißkopf; tab. 16. untere Fig.

Latham, Syn. Suppl. p. 159. White-crowned Bunting.

Latham, Vögel, II. I. p. 196. n. 44. der weißköpfige Ammer.

Latham, Syst. ornith. I. p. 413. n. 49. Emberiza (Leucophrys) ferrugineo-fusca, subtus alba, crisso flavo, vertice nigro, medio vitta superciliisque albis.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 354. n. 6. der Weißkopf.

46. **LUCTUOSA.** *Der Trauerammer.*

Büffon, Vögel, XII. p. 290. der Trauerammer.

Latham, Vögel, II. I. p. 197. n. 45. der Trauerammer.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 414. n. 52. Emberiza (Luctuosa) nigra, barba thracia, fronte pectore abdomine uropygio et ani regione albis.

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 177. n. 215. der Trauervogel.

(Ist nach Bechstein mit *Muscicapa Atricapilla* einerley. N. G. Deutschl. III. p. 591.)

47. AUREOLA. Der gelbbüstige Ammer.

Müller, Natursyst. Suppl. p. 156. n. 27. der Gelbhals.

Pennant, arct. Zool. II. p. 340. A. der Sibirische Ammer; Goldammer des Pallas.

Büffon, Vögel, XII. p. 282. der sibirische Goldammer.

Latham, Vögel, II. I. p. 198. n. 46. der gelbbüstige Ammer.

Latham, Syst. ornith. I. p. 414. n. 53. Emberiza (Aureola) rufa, subtus flava, fascia pectorali transversa ferruginea, vertice, genis gulaque nigris.

Pallas, Reis. Ausz. II. Anh. p. 12. n. 23. Emberiza Aureola.

48. SANDWICHENSIS. Der Ammer von Unalasha.

Pennant, arct. Zool. II. p. 338. n. 145. der Ammer von Unalasha.

Latham, Vögel, II. I. p. 198. n. 47. der Sandwichische Ammer.

Latham, Syst. ornith. I. p. 414. n. 55. Emberiza (Arctica) fusca, subtus albida fusco-striata, sub oculis striga nigra, superciliis flavis.

49. UNALASCHENSIS. Der nordwestamerikanische Ammer. (1)

Pennant arct. Zool. II. p. 339. n. 148. der nordwestamerikanische Ammer.

Latham,

(1) Nach *Latham* vielleicht eine Spielart vom vorigen. Cf. *Latham* Vögel, II. I. p. 199. n. 48.

Latham, Syst. ornith. I. p. 415. n. 156. *Emberiza* (*Aonalaeschkenensis*) *rufo-fusca*, *subtus albi-*
da fusco-striata, *abdomine medio albo*.

50. **ATRICAPILLA.** *Der schwarzgescheitelte Am-*
mer.

Pennant, arct. Zool. II. p. 338. n. 146. *der Am-*
mer mit schwarzem Scheitel.

Latham, Vögel, II. I. p. 194. n. 49. *der bekränz-*
te Ammer.

Latham, Syst. ornith. I. p. 415. n. 57. *Emberiza*
(*Atticapilla*) *rufo-fusca*, *subtus cinerea*, *gula*
alba, *vertice luteo*, *sincipite strigaque per ocu-*
los ad nucham nigris.

β. *Emberiza pectore nigro nebuloso.* *Lath.* Syn.
Suppl. p. 159. — Syst. ornith. I. p. 415. n. 57.
β. * — Vögel II. I. p. 200.

51. **PITHYORNUS.** *Der sibirische Fichtenammer.*

Müller, Natursyst. Suppl. p. 256. n. 26. *der Rost-*
bürzel.

Rüffon, Vögel, XII. p. 280. *der Ammer Pi-*
thyornus.

Latham, Vögel, II. I. p. 200. n. 50. *der Fichten-*
Ammer.

Latham, Syst. ornith. I. p. 413. n. 50. *Emberiza*
(*Pithyornus*) *rufa*, *abdomine cano*, *striga ver-*
ticis cana, *lateribus nigro-marginata*, *macula*
genarum, *temporum pectorisque alba*.

Pallas, Reis. Ausz. II. p. 290. Anh. p. 12. n. 22.
Emberiza Pithyornus.

52. **CINÉREA.** *Der aschgraue Ammer.*

Onomat. hist. nat. III. p. 772. *der Emmerlings-*
vogel von Canada.

Pennant, arct. Zool. II. p. 339. n. 149. *der asch-*
graue Ammer; tab. 17. ob. Fig.

Brisson, ornith. I. p. 391. n. II. Bruant de Canada.
Büffon, Vögel, XII. p. 271. der röthliche und blaue Ammer.

Latham, Syn. Suppl. p. 159. Cinereous Bunting.
Latham, Vögel, II. I. p. 201. n. 51. der aschgraue Ammer.

Latham, Syst. ornith. I. p. 415. n. 58. Emberiza (Cinerea) griseo-scapularis, fusco castaneo-que varia, subtus albida, castaneo-maculata, tectricibus caudae rufo-albidis, remigibus rectricibusque fuscis.

Martini, Naturlex. II. p. 376. die kanadische Ammer.

53. CAERULEA. Der himmelblaue Ammer.

Onomat. hist. nat. III. p. 773. der himmelblaue Emmerlings-Vogel von Canada.

Pennant, arct. Zool. II. p. 339. n. 151. der blaue Ammer.

Brisson, ornith. I. p. 391. n. 12. Bruant bleu de Canada.

Büffon, Vögel, XII. p. 269. der kanadische Ammer.

Latham, Vögel, II. I. p. 201. n. 52. der blaue Ammer.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 415. n. 59. Emberiza (Caerulea) caerulea rufo-varia, subtus dilutior, vertice rufo, tectricibus alarum majoribus, remigibus caudaque fuscis.

Martini, Naturlex. II. p. 377. der kanadische himmelblau Ammer.

54. CYANEA. Der Indigoammer.

Müller, Natursyst. II. p. 574. n. 6. die blaue Merle.

Onomat. hist. nat. VII. p. 427. der blaue Hänfling aus Carolina.

Pennant,

Pennant, arct. Zool. II. p. 340. n. 152. der Indigo-Ammer; Indigo-Vogel.

Klein, av. p. 97. n. 8. Fringilla caerulea.

Klein, Vorbereit. p. 181. n. 8. blauer Diefelfinke.

Klein, verb. Vögelhist. p. 97. n. 8. blauer Diefelfinke.

Briffon, ornith. I. p. 307. n. 6. Tanagra bleu de la Caroline.

Büffon, Vögel, p. 54. der Minister, oder Blauhälfing; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 202. n. 53. der Indigo-Ammer.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 515. n. 60. Emberiza (Cyanea) cyanea, vertice saturatiore, remigibus rectricibusque fuscis caeruleo-marginalitis.

Seligmann, Vögel, II. tab. 90. der blaue Hänfling.

8. QUELEA. Der rothschnäbige senegalische Ammer. (2)

Müller, Natursyst. II. p. 564. n. 8. der indianische Ammer.

Onomat. hist. nat. VI. p. 206. der Indianische Ammer.

Briffon, ornith. I. p. 337. n. 19. Moineau à bec rouge du Sénégal.

Büffon, Vögel, X. p. 153. der rothschnäbige sene galische Sperling.

Latham, Vögel, II. I. p. 187. n. 28. der Ammer mit schwarzem Gesichte.

Latham, Syst. ornith. I. p. 409. n. 31. Emberiza (Quelea) grisea, fronte nigra, rostro coccineo.

B. Büffon,

(2) Latham rechnet hierher auch Briss. *Passer crythrorhynchos Capitis bona* spei, ornith. I. p. 337. n. 18. und hält ihn für das Weibchen.

B. Buffon, Vögel, X. p. 151. der senegalische Sperling?

Latham, Syn. II. I. p. 193. n. 28. A. — Vögel, II. I. p. 188. n. 28. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 409. n. 31. *β. Emberiza rufo-rubra*, supra fusco nigricante variegata, facie gulaque nigra.

55. TETRIX. Der Weberammer.

Latham, Vögel, II. I. p. 188. n. 29. der Weber-Ammer.

Latham, Syst. ornith. I. p. 409. n. 32. *Emberiza (Tetrix) rufo-fusca*, saturiore varia, subtus flava, superciliis strigaque verticali flavis, pectore medio striga lata nigra.

56. RUBRA. Der Ammer von der Insel Frankreich.

Buffon, Vögel, X. p. 152. die Sperlinge von Isle de France; m. 2. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 189. n. 30. der karmoisinrothe Ammer.

Latham, Syst. ornith. I. p. 409. n. 33. *Emberiza (Rubra) coccinea*, cervice dorsoque olivaceo nigroque variegatis, strigis coccineis sparsis, abdomine cinereo, remigibus rectricibusque nigris.

9. CAPENSIS. Der capsche Ammer.

Müller, Natursyst. II. p. 565. n. 9. der capsche Ammer.

Briffon, ornith. I. p. 287. n. 7. Ortolan du cap de bonne espérance.

Buffon, Vögel, XII. p. 171. der capsche Ortolan; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 180. n. 23. der Capsche Ammer.

Latham,

Latham, Syst. ornith. I. p. 407. n. 28. Emberiza (Capensis) nigro rufescenteque varia, subtus grisea, gula albida, fascia oculari maxillarumque nigricante.

Martini, Naturlex. II. p. 377. capsche Ammer.

B. **Büffon**, Vögel, XII. p. 169. der gelbbäuchigste Ortolan vom Vorgebirge der guten Hoffnung.

Latham, Syn. II. I. p. 186. n. 23. A. — Vögel, II. I. p. 180. n. 23. A.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 407. n. 28. **β.** Emberiza supra varia, subtus flava, lateribus capitis strigis tribus nigris in maculam ad nucham coepuntibus.

γ. **Büffon**, Vögel, XII. p. 169. das Weibchen; m. e. Fig.

Latham, Syn. II. I. p. 186. n. 23. C. — Vögel, II. I. p. 181. n. 23. B.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 407. n. 28. **γ.** Emberiza supra varia, subtus alba, striga maxillari dupli, medio alarum longitudinaliter rufo.

δ. **Büffon**, Vögel, XII. p. 273. der kayennische Ammer; (Bonjour. Commendeur) m. e. Fig.

Latham, Syn. II. I. p. 187. n. 23. D. — Vögel, II. I. p. 181. n. 23. C.

Latham, Syst. ornith. I. p. 408. n. 28. **δ.** Emberiza supra varia, subtus alba, vertice giseo nigroque vario, striga pone oculos maxillarique nigra, pectore cinerascente.

57. FUSCA. Der bandirte Ammer.

Latham, Vögel, II. I. p. 181. n. 24. der streifschwänzige Ammer.

Latham, Syst. ornith. I. p. 408. n. 29. Emberiza (Fasciata) fusco-nebulosa, subtus alba, naribus gula,

gula genisque fasciculis plumosis, remigibus caudaque fuscis, saturatiore fasciatis.

10. LUDOVICIA. Der louisianische Ammer.

Müller, Natursyst. II. p. 565. n. 10. der louisianische Ammer.

Pennant, arct. Zool. II. p. 397. n. 143. der Ammer von Louisiana.

Onomat. histor. natur. III. p. 780. der Emmerling aus Ludovicien.

Brisson, ornithol. I. p. 386. n. 6. Ortolan de la Louisiane.

Büffon, Vögel, XII. p. 167. der Louisianische Ortolan; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 174. n. 13. der Louisianische Ammer.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 404. n. 18. Emberiza (Ludovicia) grisea, subtus pallida, pectore rufo, capite supra arcu nigro.

Martini, Naturlex. II. p. 380. Ammer aus Louisiana.

11. CIA. Der Zipammer.

Müller, Natursyst. II. p. 565. n. 11. der Zipammer.

Borowsky, Thierreich, III. p. 150. n. 6. der Zipammer; Wiesenammer.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 526. n. 5. der Zipammer.

Ebert, Naturl. II. p. 135. der Zipammer.

Onomat. histor. natur. III. p. 781. die Wiesenemmeritz.

Gesner, Vögeln. p. 476. Wiesenmertz; Ceppa; m. e. Fig.

Brisson, ornith. I. p. 383. n. 3. Bruant de Pré.

Büffon, Vögel, XII. p. 230. *der Zipammer*; m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 347. *der Zipammer*.

Latham, Vögel, II. I. p. 186. n. 27. *der Zipammer*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 402. n. 11. *Emberiza (Cia) rufescens*, capite lineis nigricantibus sparsis, superciliis albis.

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 113. n. 4. *die Zippamer*.

Borkhausen, Magazin, I. p. 146. *Barthemmerling*. Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 740. *die Zipammer*.

Scopoli, Rem. a. d. N. G. I. p. 173. n. 210. *der Emmerling mit schwarzem Bart*.

Martini, Naturlex. II. p. 397. *Wiesenammer*; *Wiesenemmeritz*.

Charleton, onom. zoic. p. 79. n. 14. *Emberiza pratensis*.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 386. *Hortulanus cinereus*, species tertia Aldrovandi; germ. *Knipper*.

Kramer, Auflr. p. 371. n. 3. *Steinemmerling*; *grauköpfige Wiesen-Ammering*.

Fonston, av. p. 97. *Emberiza pratensis*, p. 96. *Paseribus congener*.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 365. n. 12. *der Zipammer*.

12. CIRLUS. *Der Zirlammer*.

Müller, Natursyst. II. p. 566. *der gefleckte Ammer*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 527. n. 7. *Emberiza Elaeathorax*. *Zaunammer*.

Halle, Vögel, p. 387. n. 389. *der braunfalte Ammer*, mit gelbem Unterleibe; *Zirlammer*; *Pfeifammer*.

Onomat.

Onomat. hist. nat. III. p. 782. die Zaunemmeritzze.

Klein, av. p. 91. n. 3. Emberiza s. Cirlus.

Klein, Vorbereit. p. 170. n. 3. Zirlammer.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 93. n. 3. Zirlammer.

Brisson, ornithol. I. p. 383 Bruant de haye.

Büffon, Vögel, XII. p. 223. der Zirlus oder Zizi; m. 2 Figg. M. u. W.

Batsch, Thiere, I. p. 347. der Cirlus.

Latham, Vögel, II. 1. p. 184. n. 26. der Zaunammer. (In der Note hat Bechstein über diese Gattung viel merkwürdiges gesagt.)

Latham, Syst. ornithol. I. p. 401. n. 10. Emberriza (Cirlus) supra varia, subtus lutea, pectore maculato, superciliis luteis, rectricibus duabus extimis macula alba cuneata.

Martini, Naturlex. II. p. 369. gefleckte Ammer, Hakenammer, weißfleckige Ammer.

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 740. die Zirlammer.

Belon, hist. nat. des ois. p. 365. Verdier de haie.

Jonston, av. p. 101. Luteae primum genus.

Diction. des anim. II. p. 290. Bruant tacheté. Zivalo.

Roman. ornith. I. p. 114. tab. 17. Fig. 2.

Donndorff, Handb. d. Thiergeesch. p. 363. n. 7. der Zirlus.

13. FAMILIARIS. Der gesellige Ammer.

Müller, Natursyst. II. p. 566. n. 13. der asiatische Ammer.

Onomat. hist. nat. III. p. 775. der Haus-Emmerling.

Büffon, Vögel, XII. p. 267. der gesellige Ammer.

Latham,

Latham, Vögel, II. I. p. 189. n. 31. der gesellige Ammer.

Lathom, Syst. ornith. I. p. 410. n. 35. Emberiza (Familiaris) cinerea griseo-maculata, apicibus rectricum albis, dorso postico flavo.

Martini, Naturlex. II. p. 360. Hausammer; Hausämmerling.

Obeck, Reis. n. Chin. p. 134.

14. FLAVEOLA. Der Ammer mit gelbem Gesichte.

Müller, Natursyst. II. p. 566. n. 14. der Gelbling.

Onomat. hist. nat. III. p. 776. der gelbliche Emmerling..

Büffon, Vögel, XII. p. 257. der gelbliche Ammer.

Latham, Vögel, II. I. p. 190. n. 32. der Ammer mit gelbem Gesichte.

Latham, Syst. ornith. I. p. 410. n. 36. Emberiza (Flaveola) grisea, facie (fascia ist wohl ein Druckfehler) flava.

Martini, Naturlex. II. p. 370. gelbliche Ammer.

15. AMAZONA. Der Amazonenammer.

Müller, Natursyst. II. p. 566. n. 15. die Amazone.

Büffon, Vögel, XII. p. 261. der Amazonen-Ammer.

Martini, Naturlex. II. p. 360. Amazonen-Ammer.

Latham, Vögel, II. I. p. 190. n. 33. der Amazonen-Ammer.

Latham, Syst. ornith. I. p. 410. n. 37. Emberiza (Amazona) fusca, vertice fulvo, crisco albido.

16. ORYZIVORA. Der Reisammer. (3)

Müller, Natursyst. II. p. 567. n. 16. der Reisdieb.
Halle,

(3) Merkwürdig ist es, dass, wie *Pennant* sagt, unter den Myriaden dieser Vögel, die im September nach Carolina ziehen, kein einziges Männchen angetroffen wird.

Halle, Vögel, p. 389. n. 394. *der Reisortulan*.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 405.
n. 341. *der Reißdieb*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 335. n. 141. *der Reisanmer*.

Onomat. hist. nat. III. p. 778. *der carolinische Ortolan*, *Reisvogel*.

Klein, av. p. 92. n. 6. *Emberiza Carolinensis*. cf. p. 163. n. 5.

Klein, Vorbereit. p. 171. n. 6. *Reisammer*; *karo- linischer Fettammer*. cf. p. 301. n. 5.

Klein, verb. Vögelhist. p. 93. n. 8. *Reisammer*.

Briffon, ornith. I. p. 387. n. 8. *Ortolan de la Caroline*.

Büffon, Vögel, XII. p. 200. *der Reisammer*; m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 347. *der Reisanmer*.

Latham, Vögel, II. I. p. 182. n. 25. *der Reis- Ammer*. (p. 183. *Bob Lincoln*; *Conquendle*.)

Latham, Syst. ornith. I. p. 408. n. 30. *Emberiza* (*Orizivora*) *fusca*, *cervice rufescente, abdomi- ne nigro, rectricibus mucronatis*.

Seligmann, Vögel, I. tab. 28. *der carolinische Ortolan oder Reisvogel*.

Seligmann, Vögel, IX. tab. 81. *der carolinische Emmering*.

Martini, Naturlex. II. p. 385. *Reißammer*.

Bartram, Reis. durch Carolina, p. 295. *der Reiß- vogel*.

Linné, Abhandl. II. p. 281. n. 16. *Reisfink*.

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 739. *die Reiß- ammer*.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 179. n. 1. *Fringilla* (*Oryzivora*) *fusca*, *cervice fulva, macula alarum dorsoque postico albis*.

Amoenit. academ. IV. p. 576. *Fringilla oryzivora*.

Hermann,

Hermann, tab. affin. anim. p. 222. *Emberiza oryzivora*.

Donndorff, Handb. d. Thiergeeschich. p. 363. n. 8. der *Reisammer*.

β. Der louisianische Reisammer.

Büffon, Vögel, XII. p. 204. der *louisianische Reißammer*; m. e. Fig.

Latham, Syn. II. I. p. 189. n. 25. Var. A. — Vögel, II. I. p. 183. n. 25. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 408. n. 30. β. *Emberiza fusco-olivacea*, subtus flavescens, uropygio flavo fusco transversim lineato, tectricibus alarum maioribus remigibusque nigris albo-marginalis.

17. SCHOENICLUS. Der Rohrammer.

Müller, Natursyst. II. p. 567. n. 17. der *Rohrsperling*.

Leske, Naturgesch. I. p. 261. n. 4. der *Rohrsperling*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 151. der *Moosämmerling*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 524. n. 3. der *Rohrammer*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 591. *Rohrammer*.

Funke, Naturgesch. I. p. 236. *Rohrammer*.

Ebert, Naturl. II. p. 135. *Rohrsperling*.

Halle, Vögel, p. 305. die *Rohrdrossel*.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 406. *Rohrammer*.

Pennant, archt. Zool. II. p. 342. E. der *rote Ammer*.

Onomat. hist. nat. III. p. 777. der *capische Gärtner*.

- Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 130. *der Rohr-sperling.*
- Briffon*, ornithol. I. p. 386. n. 5. *Ortolan de roseau.*
- Büffon*, Vögel, XII. p. 149. *der Rohrammer;*
m. 2. Figg M. u. W.
- Gesner*, Vögelb. p. 474. *Rohrspatz.*
- Batsch*, Thiere, I. p. 345. *der Rohrammer.*
- Latham*, Syn. Suppl. p. 157. *Reed-Bunting.*
- Latham*, Vögel, II. I. p. 170. n. 9. *der Rohr-ammer.*
- Latham*, Syst. ornithol. I. p. 402. n. 13. *Embe-
rica (Schoeniclus) capite nigro, corpore griseo
nigroque rectricibus extimis macula alba cunei-
formi.*
- Beske*, Vögel Kurl. p. 78. n. 170. *der Röhr-
sperling.*
- Siemßen*, meklenb. Vögel, p. 113. *die Rohrammer;*
Ruhrspaarling.
- Bock*, Naturgesch. von Preuss. IV. p. 425. *der
Rohrsperling.*
- Fischer*, Livil. p. 98. n. 151. *Wassersperling.*
- Pallas*, nord. Beytr. IV. p. 15. *der Rohrammer.*
- Pontoppidan*, Dännem. p. 174. n. 5. *Rörspuruv.*
- Naturforsch. XVII. p. 92. n. 186. *der Rohrsperling.*
- Zorn*, Petinotheol. II. p. 348. n. 428. *Meß-, oder
Rohrammerling.*
- Döbel*, Jägerprakt. I. p. 75. *Rohrsperling.*
- Naumann*, Vogelsteller, p. 72. *Schiebgen oder
Rohrammer.*
- Anweisung. Vögel zu fang. p. 174. *Moos-Em-
merling.*
- Martini*, Naturlex. II. p. 387. *Rohrammer; Reit-
maise.*
- Pennant*, brit. Thiergesch. p. 129. t. 58. f. 1. 2.
Rohrammer; Schlußschmätzer.

Börner,

Börner, schles. ökonom. Nachr. 1781. p. 102. *Emberiza Schoeniclus*.

Borkhausen, Magaz. I. p. 146. n. 12. *Rohrammer*.
Meidinger, Vorlesung. I. p. 149. n. 4. *der Rohrspeling*.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 6. *Schoeniclos*.

Linneé, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 182. n. 26. *Fringilla (Schoeniclus) rectricibus fuscis, extimis duabus macula alba cuneiformi, corpore griseo nigroque, capite nigro*.

Kramer, Austr. p. 371. n. 5. *Rohrammering; Meerspatz*.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 323. *Passer arundinarius. Rohrspatzlin; Rohrspar*.

Charleton, exercitat. p. 86. n. 7. *Passer arundinaceus*.

Charleton, onom. zoic. p. 78. n. 7. *Passer Junco*.

Rzaczynsky, auch hist. nat. Polon. p. 406. *Passer arundinarius*.

Hist. prov. I. p. 494. *Ortolan de roseaux*.

Levin, britt. Birds, II. tab. 75.

Bomare, Diction. VI. p. 272. *Ortolan de roseaux*.

Hermann, tab. affin. anim. p. 222. *Emberiza Schoeniclus*.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 363. n. 9. *der Rohrspeling*.

β. Latham, Syn. III. p. 175. n. 9. Var. A. — *Vögel*, II. I. p. 172. n. 9. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 403. n. 13. *β. Emberiza fusca, subtus cinerascens, capite colloque nigricantibus, rectricibus duabus extimis toto, tertia a medio ad apicem albis*.

58. ARUNDINACEA. *Der astrachanische Rohrammer.*

Latham, Vögel, II. I. p. 213. n. 78. *der Schilfammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 403. n. 13. γ. *Emberiza alba*, remigibus obscuris, rectricum prima utrinque alba, secunda albo nigroque dimidiata, cauda aequali.

59. PROVINCIALIS. *Der Gavotte. (*)*

Büffon, Vögel, XII. p. 160. *der Gavotte aus der Provence; Gavoué, der bartige Chic*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 172. n. 10. *der Bart-Ammer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 403. n. 15. *Emberiza (Provincialis) griseo nigroque varia*, subtus maculaque alaruin alba, macula suboculari fasciaque maxillari nigris.

Hist. Prov. I. p. 494.

60. LESBIA. *Der lesbische Ammer.*

Büffon, Vögel, XII. p. 162. *der Chic oder Mitiene*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 172. n. 11. *der Lesbische Ammer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 404. n. 16. *Emberiza (Lesbia) griseo nigroque varia*, subtus orbitisque alba, sub oculis albo nigroque ter stria-ta, rectricibus lateralibus partim albis.

Hist. Prov. I. p. 494.

Hermann, tab. affin. anim. p. 222. *Emberiza Mytilene.*

61. LOTHARINGICA. *Der lothringische Ammer.*

Büffon, Vögel, XII. p. 164. *der Lothringische Ortolan*; m. 2. Figg. M. u. W.

Latham,

(*) Nach Beckstein eine junge Cia. f. N. G. Deutschl. III. p. 592.
— Cf. *Latham*, Vögel, I. c. nec. p.

Latham, Vögel, II. 1. p. 173. n. 12. der Lothringsche Ammer.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 404. n. 17. Emberiza (Lotharingica) nigro-inaculata, supra rufa, subtus cinerascens, striga per oculos maxillaeque inferioris nigra, rectricibus lateralibus albo nigroque variis.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 528. n. 8. Emberiza fusciceps? der Bergammer; braunköpfige Ammer?

18. PSITTACEA. Der Papageyammer:

Müller, Natursyst. II. p. 568. n. 18. der Papageyammer.

Klein, av. p. 94. n. 8. Linaria cauda longa.

Klein, Vorbereit. p. 175. n. 8. langgeschwänzter Hänfling aus Brasilien.

Klein, verb. Vögelhist. p. 100. langgeschwänzter Hänfling.

Brisson, ornith. I. p. 347. n. 35. Linotte à longue queue du Brésil.

Büffon, Vögel, XI. p. 219. die braune Wittwe.

Latham, Vögel, II. 1. p. 174. n. 14. der Papageyammer.

Latham, Syst. ornith. I. p. 404. n. 19. Emberiza (Psittacea) cinereo-fusca, alis fulvis, rectricibus duabus longissimis.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 178. n. 11. Emberiza (Psittacea) cinereo-fusca, alis fulvis, rectricibus duabus longissimis.

19. PARADISAEA. Die Wittwe. (4)

Müller, Natursyst. II. p. 568. n. 19. der Paradiesammer; tab. 21. Fig. 4.

Ee 4

Borows-

(4) Der Name Wittwe, der dieser und noch einigen andern hier gehörigen Gattungen gegeben wird, und der theils der schwarzen

Berowsky, Thierreich, III. p. 146. n. 1. der Paradiesammer; tab. 63. Fig. 1. u. 2.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 185. n. 5. Emberiza (Paradisaea) fusca, pectore rubro, rectricibus intermediis quatuor elongatis acuminate, duabus longissimis, rostro rubro.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 529. n. 10. der Paradiesammer.

Halle, Vögel, p. 381. c. der Schwanzsperling mit karminrother Brust.

Onomat. hist. nat. VI. p. 198. der Indianische Schwanzsperling.

Klein, av. p. 90. n. 22. Passer cauda longissima et mutabili.

Klein, Vorbereit. p. 169. n. 22. Sperling mit sehr langem und veränderlichem Schwanz.

Klein, verb. Vögelh. p. 92. längstgeschwänzter Sperling.

Briffon, ornith. I. p. 340. n. 25. Veuve.

Büffon, XI. p. 198. die Wittwe mit dem goldenen Halsbande; m. 2. Figg. im Sommer- u. Winterkleide.

Batsch, Thiere, I. p. 348. Wittwen; Widhavogel.

Latham, Vögel, II. I. p. 175. n. 15. der Paradiesammer.

Latham, Syst. ornaith. I. p. 405. n. 20. Emberiza (Paradisaea) fusca, pectore rubro, rectricibus inter-

zen Farbe, theils des schleppenden Schwanzes wegen, für diese Vögel schicklich zu seyn scheint, ist ihnen aus einem Irrthum beygelegt worden; denn die Portugiesen haben sie *Vögel aus Whidba* (welches eigentlich das Königreich Juida ist, aber doch mit dem portugiesischen Worte, welches eine Wittwe bedeutet, viel Ähnlichkeit hat) genennet, weil sie auf dieser afrikanischen Küste sehr gemein sind. S. Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 632.

intermediis quatuor elongatis acuminatis, duabus longissimis, rostro nigro.

Seligm., Vögel, IV. tab. 67. der rothbrüstege langgeschwänzte Fink.

Scopoli, Rem. a. d. N. G. I. p. 177. n. 216. der langgeschwänzte Emmerling.

Sammel. zur Phys. und N. G. II. p. 632. die Wittwe mit dem goldenen Halsbande.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 178. n. 12. Emberiza (Paradisaea) fusca, pectore rubro, rectricibus duabus longioribus acuminatis, intermediis duabus longissimis.

Fonston, av. p. 96. Passer indicus macrourus alius.

20. SERENA. Die Dominikanerwittwe.

Müller, Natursyst. II. p. 569. n. 20. der Langschwanz.

Onomat. hist. nat. VII. p. 748. der Ammer mit keilförmigem langen Schwanz.

Brisson, ornith. I. p. 341. n. 26. petite veuve.

Büffon, Vögel, XI. p. 205. die Dominikanerwittwe; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 176. n. 16. der Dominikaner-Ammer.

Latham, Syst. ornith. I. p. 405. n. 21. Emberiza (Serena) pileo nigro, vertice rubro, cauda cuneiformi, rectricibus duabus intermediis longissimis, pedibus griseis.

21. VIDUA. Die große Wittwe.

Müller, Natursyst. II. p. 569. n. 20. die Wittwe.

Onomat. hist. nat. VI. p. 203. langgeschwänzter Sperling.

Brisson, ornithol. I. p. 342. n. 27. grande veuve.

Büffon, Vögel, XI. p. 208. die große Wittwe.

Latham, Vögel, II. I. p. 176. n. 17. der lang-schwänzige Ammer.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 405. n. 22. Emberiza (Vidua) nigricans, subtus albida, rectricibus intermediis quatuor elongatis acuminatis, duabus longissimis, rostro rubro.

Charleton, exercitat. p. 87. Passer indicus macrourus.

Charleton, onom. zoic. p. 79. n. 13. Passer indicus macrourus.

Petiv. gazophyl. tab. 55. Fig. 1. Passer indicus cauda longissima?

Fonston, av. p. 96. Passer indicus Macrourus rostro miniaceo.

22. PRINCIPALIS. Die gesprenkelte Wittwe.

Müller, Natursyst. II. p. 570. n. 23. der bunte Ammer.

Onomat. histor. natur. VII. p. 747. der bunte Ammer.

Brisson, ornithol. I. p. 368. n. 70. Veuve d'Angola.

Büffon, Vögel, XI. p. 213. die gesprenkelte Wittwe; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 177. n. 18. der gesprenkelte Ammer.

Latham, Syst. ornith. I. p. 406. n. 23. Emberiza (Principalis) variegata, pectore rufo, rectricibus mediis quatuor longissimis, rostro pedibusque rubris.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 60. der Sperling mit dem langen Schwanz.

23. REGIA. Der Königsammer.

Müller, Natursyst. II. p. 570. n. 23. der Königsammer; m. e. Fig.

Onomat.

Onomat. hist. nat. VII. p. 749. der Königsammer.
Briffon, ornith. I. p. 342. n. 28. Veuve de la côte d'Afrique.

Büffon, Vögel, XI. p. 203. die Wittwe mit vier Fäden; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 178. n. 19. der Königsammer, oder die schafschwänzige Wittwe.

Latham, Syst. ornith. I. p. 406. n. 24. Emberiza (Regia) rectricibus intermediis quatuor longissimis aequalibus, apice tautum penuatis, rostro rubro.

62. LONGICAUDA. Der gelbschulterige Ammer.

Büffon, Vögel, XI. p. 211. die Wittwe mit Achselbändern; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 179. n. 20. der gelbschulterige Ammer.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 406. n. 25. Emberiza (Longicauda) nigra, humeris fulvis albo marginatis, rectricibus elongatis, sex intermediis longissimis.

63. PANAYENSIS. Der Ammer von Panay.

Büffon, Vögel, XI. p. 217. die Wittwe mit der feuerrothen Brust.

Latham, Vögel, II. 1. p. 179. n. 21. der Panaysche Ammer, oder die Wittwe mit dem Feuerzeichen.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 407. n. 26. Emberiza (Panayensis) nigra, macula pectoris coccinea, rectricibus quatuor intermediis longissimis aequalibus acuminatis.

Sonnerat, Reis. nach Neuguinea, p. 42. die Wittwe der Insel Panai.

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 633. die rothbrüstige Wittwe.

64. ANGOLENSIS. Der angolische Ammer.

Latham, Vögel, II. I. p. 179. n. 22. der Angolische Ammer.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 407. n. 27. Emberiza (Angolensis) nigra, capite superiore colloque flavis, cauda elongata.

24. CIRIS. Der gemahlte Ammer.

Miller, Natursyst. II. p. 570. n. 24. der Pabstvogel.

Pennant, arct. Zool. II. p. 337. n. 142. der gemahlte Ammer. Mariposa pintada (Span.)

Onomat. histor. natur. III. p. 773. der dreyköpfige (mag wohl dreyfarbige heißen sollen) Diestelfink.

Klein, av. p. 97. n. 7. Fringilla tricolor.

Klein, Vorbereit. p. 180. n. 7. blauköpfiger Diestelfinke.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 97. n. 7. blauköpfiger Diestelfink.

Klein, av. p. 98. n. 13. Fringilla purpurea.

Klein, Vorbereit. p. 182. n. 13. Kardinälchen.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 98. n. 13. Cardinalchen.

Brisson, ornithol. I. p. 362. n. 58. Verdier de la Louisiane, dit vulgairement Pape.

Büffon, Vögel, XI. p. 238. der Pabst, oder blauköpfige Diestelfink; m. 2. Figg. M. u. W.

Latham, Syn. Suppl. p. 159. Painted Bunting.

Latham, Vögel, II. I. p. 203. n. 54. der gemahlte Ammer.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 416. n. 61. Emberiza (Ciris) capite caeruleo, abdomine fulvo, dorso viridi, pennis viridi-fuscis.

Seligmann, Vögel, II. tab. 88. der dreyfarbige Fink.

Selig-

Seligmann, Vögel, V. tab. 25. der gemahlte Vogel.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 63. der gemahlte Fink; ein Er und eine Sie.

Scopoli, Beni: aus der N. G. J. p. 184. n. 222. amerikanischer Fink; Mariposa.

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 633. der blauköpfige Diefelfink.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 179. n. 13. Emberiza (Ciris) capite caeruleo, abdomine fulvo, dorso viridi, pennis viridi-fuscis.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 364. n. 11. der gemahlte Ammer.

65. QUADRICOLOR. Der vierfarbige Ammer.

Büffon, Vögel, X. p. 105. der vierfarbige Kernbeisser.

Latham, Vögel, II. I. p. 205. n. 55. der Ammer mit rothem Steifße.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 417. n. 63. Emberiza (Quadricolor) viridis, capite colloque caeruleis, cauda cum tectricibus abdomineque superiore rubris, pectore abdomineque infimo fuscotentibus.

66. CYANOPIS. Der Ammer mit blauem Gesichte.

Brisson, orith. I. p. 361. n. 57. Verdier de Java.

Büffon, Vögel, XI. p. 247. der javanische Grünfink.

Latham, Vögel, II. I. p. 205. n. 56. der Ammer mit blauem Gesichte.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 417. n. 64. Emberiza (Cyanopis) viridis, subtus, dorso infimo uropygioque rufa, fronte, genis gulaque caeruleis, tectricibus caudae abdomineque medio rubris.

67. VIRIDIS. Der grüne Ammer.

Brisson, ornith. I. p. 361. n. 56. petit Verdier des Indes.

Büffon, Vögel, XI. p. 249. der kleine indianische Grünfink.

Latham, Vögel, II. I. p. 206. n. 57. der grüne Ammer.

Latham, Syst. ornith. I. p. 417. n. 65. Emberiza (Viridis) viridis subtus alba, remigibus caudaque caeruleis.

Fonscol, av. p. 101. Chloris indica.

68. PLATENSIS. Der fünffarbige Ammer.

Büffon, Vögel, XII. p. 262. der fünffarbige Ammer.

Latham, Vögel, II. I. p. 206. n. 58. der Ammer vom Platastrom.

Latham, Syst. ornith. I. p. 417. n. 66. Emberiza (Platensis) fusco-virescens, subtus cinereo-alba, dorso nigro-maculato, oris alarum extus, remigibus rectricibusque flavo-marginatis.

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 742. der fünffarbige Ammer.

69. BORBONICA. Der Mordoré-Ammer.

Büffon, Vögel, XII. p. 264. der Mordoré-Ammer.

Latham, Syn. II. I. p. 210. n. 59. Bourbon Bunting.

Latham, Vögel, II. I. p. 207. n. 59. der Bourbonische Ammer.

Latham, Syst. ornith. I. p. 418. n. 67. Emberiza (Borbonica) rufo-rubra, alis caudaque fusco-rubris.

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 742. der mordorefarbene Ammer.

70. CALFAT. Der Calfat-Ammer.

Büffon, Vögel, XII. p. 276. der Calfat-Ammer.

Latham, Vögel, II. 1. p. 207. n. 60. der Calfat-Ammer.

Latham, Syst. ornith. I. p. 418. n. 68. Emberiza (Calfat) cinerascens, capite gulaque nigris, pectore abdomineque vinaceis, regione oculorum nuda rosea, lateribus capitis fascia alba.

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 742. der Calfat,

71. CHLOROCEPHALA. Der gelbköpfige Ammer.

Latham, Vögel, II. 1. p. 207. n. 61. der grauköpfige Ammer.

Latham, Syst. ornith. I. p. 418. n. 69. Emberiza (Tunstalli) fusca, dorso tectoribusque alarum nigro variegatis, capite colloque viridiolivaceis, cauda bifurca.

72. GRISEA. Der Gonambuch-Ammer.

Brisson, ornith. I. p. 393. n. 15. Bruant de Surinam.

Büffon, Vögel, XII. p. 265. der Gonambuch-Ammer.

Latham, Vögel, II. 1. p. 208. n. 62. der graue Ammer.

Latham, Syst. ornith. I. p. 418. n. 70. Emberiza (Grisea) grisea, tectoribus alarum pectoreque rubro variegatis.

Martini, Naturlex. II. p. 396. die surinamische Ammer.

73. SURINAMENSIS. Der surinamische Ammer.

Latham, Vögel, II. 1. p. 208. n. 63. der Surinamische Ammer.

Latham.

Latham, Syst. ornith. I. p. 418. n. 71. *Emberiza* (*Surinamensis*) supra fusco-nebulosa, subtus flavescens, pectore nigro maculato.

Fermin, Surin. II. p. 183. *der Hirsenvogel.*

74. CYANELLA. *Der Blauammer.* (5)

Latham, Vögel, II. I. p. 202. n. 5. *der bläuliche Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 416. n. 60. β . *Emberiza caerulea-nitens*, interscapuliis humerisque ex caeruleo ferrugineoque variis, remigibus reticulisque fuscis, margine caerulefcentibus.

75. RUFICAPILLA. *Der rothgescheitelte Ammer.*

Latham, Vögel, II. I. p. 212. n. 74. *der rothkappige Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 438. n. 14. *Fringilla* (*Ruficapilla*) corpore supra fusco, subtus cinereo, gula ferruginea, capistro albo, capillitio insuper rufescente, cauda nigra.

A. Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Edit. XII.

p. 309. n. 7. *Emberiza Orix.* p. 863. n. 42. *Loxia Orix.*

Das Geschlecht ist überhaupt mit 51. Gattungen vermehrt. Da aber zwey derselben, die 44te und 54te aus andern Geschlechtern hieher versetzt sind, und die 7te der XIIten Edition durch eine neue ersetzt worden, so beläuft sich die Anzahl der neu hinzugekommenen Gattungen auf funfzig. — Bey der 1sten Gattung sind vier, bey der 4ten fiinf, bey der 8ten zwey, bey der 9ten

Edit. XIII.

(5) Nach *Latham* eine Varietät von *Emberiza Cyanea*.

9ten vier, bey der 16ten zwey, bey der 17ten zwey Varietäten aus einander gesetzt.

B. Neuere Gattungen.

1. Der gelbflüglige Ammer, von den Falklands-Inseln.

Latham, Syst. ornith. I. p. 401. n. 9. Emberiza (Chrysoptera) rufo-fusca, subtus alba, pectore tectricibusque alarum minoribus flavis, iugulo fascia fusca.

2. Der graue chinesische Ammer.

Amoenit. acad. IV. p. 245 n. 20. Emberiza mixta.

Latham, Vögel, II. I. p. 209. n. 66. der gemischte Ammer.

Latham, Syst. ornith. I. p. 416. n. 62. Emberiza (Mixta) grisea, pectore gulaque caeruleis, ab domine albo.

An distincta species?

3. Der asiatische Ammer.

Latham, Syn. Suppl. p. 160. Gaur Bunting.

Latham, Vögel, II. I. p. 209. n. 64. der Gaur. Ammer.

Latham, Syst. ornith. I. p. 419. n. 72. Emberiza (Asiatica) cinerea, alis caudaque fuscis.

III. G E S C H L E C H T. T A N A G R A. Der Tanager. (Merle.)

Müller, Natursyst. II. p. 572. Gen. CXI.

Leske, Naturgesch. p. 262. Gen. XLIII.

Borowsky, Thierreich, III. p. 173. Gen. LXIX.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 163. Gen. XXXIII.

Bonapart, Naturgesch. I. p. 506. Gen. LXVIII.

Pennant, arch. Zool. II. p. 343.

- Onomat. hist. nat. VII. p. 424.
Briffon, ornith. I. p. 304. Gen. XXXI.
Biffon, Vögel, XII. p. 5. sqq.
Latham, Vögel, II. 1. p. 214. Gen. XXXVI.
Latham, Syst. ornith. I. p. 419. Gen. XXXVII.
 Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 633. u. 734.
Hermann, tab. affin. anim. p. 214.
Donndorff, Handb. d. Thiergeesch. p. 365. Gen. LXXIX.

I. JACAPA. *Der Silberschnabel.*

Müller, Natursyst. II. p. 572. n. 1. *die schwarze Merle.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 186. n. 1. *Tanagra (Jacapa) atra, fronte, iugulo pectoreque coccineis.*

Onomat. hist. nat. II. p. 827. *Chichiltot tl.*

Briffon, ornithol. I. p. 317. n. 29. *Cardinal pourpré.*

Büffon, Vögel, XII. p. 38. *der Silberschnabel; an. 2. Figg. M. u. W.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 214. n. 1. *die rothbrüstige Merle.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 419. n. 1. *Tanagra (Jacapa) atra, fronte, iugulo pectoreque coccineis.*

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 57. *die Amsel mit rother Brust.*

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 637. *der Silberschnabel.*

Fernand. hist. nov. Hisp. p. 51. *Chichiltotl Tepuzcullulae.*

Salerne, ornithol. p. 271. *Cardinal pourpre-foncé.*

Gerin, ornithol. n. 279. *Passer indicus capite et pectore vinaceo.*

Ornithol. ital. Floren. 1771. p. 69. n. 334. Avis americana cardinalis niger dicta; brachyura, capite et inferna corporis parte vinacea.

Hermann, tab. affin. anim. p. 214 Tanagra Japa.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 365. n. 1. der Silberschnabel.

2. BRASILIA. Der scharlachfarbige Tanager. (6)

Müller, Natursyst. II. p. 573. n. 2. die scharlachfarbige Merle.

Borowsky, Thierreich, III. p. 174. n. 2. die scharlachfarbne Merle.

Ono-nat. hist. nat. II. p. 829. Chiltototl, VII. p. 426. rothe brasiliatische Amsel.

Brissot, ornith. I. p. 315. n. 24. Cardinal.

Büffon, Vögel, p. 16. der scharlachfarbigste Tanagra; in. 2. Figg. p. 18. der rothe Sperling ohne Schwanz. — ibid. der rothe Sperling mit dem Schwanz. p. 19. der Tijepiranga des Marcegrav; der Chiltototl des Fernandez; die brasiliatische Amsel des Belon.

Latham, Vögel, II. I. p. 215. n. 2. die Brasiliische Merle.

Latham, Syst. ornith. I. p. 420. n. 2. Tanagra (Brasilia) coccinea, alis caudaque nigris.

Samml. zur Phýs. u. N. G. II. p. 637. der Scharlachfarbne Tanagra.

Charleton, onom. zoic. p. 79. n. 3. Passer indicus sine uropygio. n. 4. Passer indicus porphyromelanus.

Charleton, onom. zoic. p. 84. n. 6. Merula brasiliensis Bellonii.

Fonston, av. p. 96. Passer sine uropygio erythromelanus.

F f. 2

Fonston,

(6) Ist nicht mit *Tanagra brasiliensis* p. 895. n. 15, zu verwechseln.

Fonston, av. p. 97. *Passer porphyromelanus*.

Fonston, av. p. 107. *Merula brasiliaca*.

Pison, hist. nat. Bras. p. 94. *Tijepiranga*?

β. *Briffon*, ornith. I. p. 315. n. 25. *Cardinal ta-*
cheté. (7)

Büffon, Vögel, XII. p. 21. *der gefleckte Cardinal*.

Latham, Syn. II. I. p. 216 n. 2. Var. A. — Vö-
gel, II. I. p. 216. n. 2. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 420. n. 2. β. *Tana-*
gra coccinea, pectore et dorso supremo maculis
lunatis virescentibus variegatis, alis caudaque
nigris.

Aldrov. ornith. II. p. 629. *Merula apus*.

Charleton, onom. zoic. p. 84. n. 7. *Merula indi-*
ca, *Apos dicta*.

Fonston, av. p. 107. *Merula indica Apos*.

γ. *Briffon*, ornith. I. p. 316. n. 26. *Cardinal à col-*
lier. (8)

Büffon, Vögel, XII. p. 22. *der Cardinal mit dem*
Halsbande.

Latham, Syn. II. I. p. 216. n. 2. Var. B. — Vö-
gel, II. I. p. 216. n. 2. Var. B.

Latham, Syst. ornith. I. p. 420. n. 2. γ. *Tana-*
gra coccinea, maculis binis in utroque colli la-
tere semilunariibus caeruleis, alis et cauda ni-
gris, marginibus alarum caeruleis.

Aldrov. ornith. II. p. 569. *Passer indicus sine uro-*
pygio *alius cyanerythromelas*.

Raj. Syn. av. p. 87. n. 14. *Passer indicus cyanery-*
thromelas *sine uropygio* Aldr.

Fonston, av. p. 96. *Passer indicus sine uropygio*
cyanerythromelanus.

3. Ku-

(7) Nach *Briffon* eine eigne Gattung.

(8) Nach *Briffon* eine eigne Gattung.

3. RUBRA. Der rothe Tanager. (9)

Müller, Natursyst. II. p. 573. n. 3. die rothe Merle.
Pennant, archt. Zool. II. p. 343. n. 154. der Canadische Tanager.

Onomat. hist. nat. VII. p. 432. die rothe Amer aus Canada.

Brisson, ornith. I. p. 316. n. 28. Cardinal de Canada.

Büffon, Vögel, XII. p. 25. der canadische Tanager; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 216. n. 3. die rothe Merle.

Latham, Syst. ornith. I. p. 420. n. 3. Tanagra (Rubra) rubra, alis caudaque nigris, rectricibus apice albis.

Charlevoix, nouv. France, III. p. 156.

Du Pratz, hist. de la Louis. II. p. 139.

Gemelli Carreri, voy. autour du monde, VI. p. 322.

β. Seligmann, Vögel, IX. tab. 33. der Scharlachsperling. (10)

Halle, Vögel, p. 402. n. 412. der karminfarbne Kernbeisser, mit schwarzem Schwanz und Flügel.

Büffon, Vögel, XII. p. 17. der Scharlachrothe Sperling des Edwards.

Latham, Syn. II. 1. p. 217. — Latham, Vögel, II. 1. p. 216. n. 3. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 421. n. 3. β.

6. OLIVACEA. Der olivenfarbige Tanager.

Büffon, Vögel, XII. p. 54. der olivenfarbige Tanager.

Ff 3

Pennant,

(9) Ein scheuer Vogel, der in Neuyork im May erscheint, und im August zurück geht. Die Schwanzspitzen sind nicht alle mal weiss.

(10) Nach Büffon mit Tanagra brasiliaca n. 2. einerley.

Pennant, arch. Zool. II. p. 344. n. 155. der olivenfarbige Tanager.

Latham, Vögel, II. I. p. 217. n. 4 die olivenfarbige Merle.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 421. n. 4. Tanagra (Olivacea) viridi-olivacea, subtus alba, gula pectoreque luteis, remigibus rectricibusque fuscis.

23. MISSISSIPPIENSIS. Der mississippiische Tanager.

Büffon, Vögel, XII. p. 28. der mississippiische Tanager; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 217. n. 5. die Mississippi-Merle.

Latham. Syst. ornith. I. p. 421. n. 5. Tanagra (Mississippensis) tota rubra.

Samuel. zur Phys. u. N. G. II. p. 637. der Tanager aus Mississippi.

Hermann, tab. affin. anim. p. 214. Tanagra mississippiaca.

Donndorff, Handb. d. Thiergeschich. p. 366. n. 2. der mississippiische Tanager.

B. *Latham*, Syst. ornith. I. p. 421. n. 6. Tanagra (Variegata) rubro virescenteque flavo variegata. (¹)

Latham, Vögel, II. I. p. 218. n. 5. Var. A. die bunte Merle. Tab. 47.

y. *Briffon*, ornith. I. p. 316. n. 27. Cardinal du Mexique. (²)

Büffon, Vögel, XII. p. 23. mexikanischer Vogel von Papagaifarbe.

Latham,

(1) Nach *Latham* eine eigne Gattung. Auch rechnet derselbe die *Loxia Virginica* p. 840. nebst dem Synonym aus *Pennant* mit hiher.

(2) Nach *Briffon* eine eigne Gattung.

Latham, Syn. II. I. p. 219. n. 5. Var. B. Mexican Tanager.

Latham, Vögel, II. I. p. 218. n. 5. Var. B. die Mexikanische Merle.

Latham, Syst. ornith. I. p. 421. n. 5. β . Tanagra rubra, capite, alis caudaque amethystinis, cervice tectricibusque alarum viridibus, scapularibus flavis virescente marginatis.

Hernandez, hist. mex. p. 709. Avis Mexicana Psittaci colore.

25. AESTIVA. Der Sommer-tanager.

Müller, Natursyst. II. p. 590. n. 8. der rothe Fliegenfänger.

Onomat. hist. nat. V. p. 372. der rothe Fliegenfänger.

Pennant, arct. Zool. II. p. 343. n. 153. der Sommer-tanager.

Klein, av. p. 97. n. 9. Fringilla rubra.

Klein, Vorbereit. p. 181. n. 9. rother Finke.

Klein, verb. Vögelhist. p. 97. n. 9. rother Fink, p. 168. Sommer Rothvogel.

Briffon, ornithol. I. p. 277. n. 37. Gobe-mouche rouge de la Caroline.

Latham, Vögel, II. I. p. 219. n. 6. die Sommer-Merle.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 422. n. 7. Tanagra (Aestiva) rubra, rostro flavescente, remigibus intus fuscis.

Seligmann, Vögel, III. tab. 12. der rothe Fliegenstecher.

Seligmann, Vögel, VII. tab. 29. der rothe Sommer-vogel.

Sammkl. zur Phys. und N. G. III. p. 19. der rothe Sommervogel oder Fliegenstecher des Catесby.

Schlözer, Erdbeschreib. von Amer. p. 283. Rothvögel.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 181. n. 13. Fringilla (Rubra) tota rubra.

26. MAGNA. Der große Tanager.

Büffon, Vögel, XII. p. 10. der große Tangara; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 219. n. 7. die große Merle.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 422. n. 8. Tanagra (Magna) fusco-olivacea, fronte genisque cæruleis, striga maxillari nigra, gula crisoque rubris, superciliis maculaque gulæ albis.

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 637. der große Tangara.

4. JACARINA. Der Jacarini.

Müller, Natursystem, II. p. 570. n. 4. der Gabelschwanz.

Onomat. hist. nat. IV. p. 455. Jacarine.

Brissot, ornith. I. p. 311. Tangara noir du Brésil.

Büffon, Vögel, XII. p. 93. der Jacarini.

Latham, Vögel, II. 1. p. 233. n. 34. die Jacarini-Merle.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 429. n. 32. Tanagra (Jacarina) atro-violacea, alis subtus albi-cautibus, cauda divaricata bifurca.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 96. der Jacarini.
Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 734. der Jacarini.

Fenston, av. p. 205. Jacarini.

Hermann, tab. affin. anim., p. 167. 214. Tanagra Jacarina.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 366. der Jacarini.

5. VIO-

5. VIOLACEA. Der Teitei.

Müller, Natursyst. II. p. 574. n. 5. die violetfär-
bige Merle.

Borowsky, Thierreich, III. p. 173. n. 1. die violet-
färigte Merle, tab. 69.

Onomat. hist. nat. III. p. 981. der violette Fink,
VII. p. 434. Tanagra violacea.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 506. die violetfarbige
Merle.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 191.

Briffon, ornith. I. p. 312. n. 18. Tangara noir et
jaune du Brésil.

Büffon, Vögel, XII. p. 97. der Teitei; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 234. n. 35. die Gold-
Merle.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 429. n. 33. Tana-
gra (Violacea) violacea subtus et sincipite flavif-
firma, remigibus intermediis rectricibusque late-
ralibus intus albis.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 53. die Goldmeise.

Saintl. zur Phys. und N. G. II. p. 735. der Tei-
tei.

De Laet, nov. orb. p. 557. Guranhæ- engera.

Fonston, av. p. 106. Teitei Brasiliensibus; quam
etiam vocant Guiranhemgeta, et Guraundi.

Salerne, ornithol. p. 290. Teitei.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 266. n. 4.
der Teitei.

β. CHLOROTICA. Der schwarz und gelbe Ta-
nager. (3)

Müller, Natursyst. II. p. 578. n. 23. die schwarz-
gelbe Merle.

Briffon, ornithol. I. p. 213. n. 19. Tangara noir
et jaune de Cayenne.

Ff 5

Büffon,

(3) Nach Briffon eine eigne Gattung.

Büffon, Vögel, XII. p. 99. 126. *cayennische Tan-*
gara; kleiner Ludwig.

Latham, Syn. II. I. p. 240. n. 35. Var. A.

Latham, Vögel, II. I. p. 235. n. 35. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 430. n. 33. β. Ta-
nagra nigra nitens, abdomine, pectore fronte-
que luteis, rectrice extima interius macula
alba.

27. CAERULEA. *Der blaue Tanager.* (4)

Büffon, Vögel, X. p. 174. *der blaue Sperling.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 427. n. 27. Tana-
gra (Caerulea) tota caerulea.

Latham, Vögel, II. I. p. 230. n. 28. *die blaue*
Merle.

7. GYROLA. *Der rothköpfige Tanager.*

Müller, Natursystem, II. p. 574. n. 7. *die grüne*
Merle.

Halle, Vögel, p. 415. n. 430. *der grüngelbe Fink,*
mit rothem Kopfe und blauer Brust.

Onomat. histor. natur. III. p. 976. *der rothköpfige*
Grünfink.

Klein, av. p. 98. n. 12. *Fringilla pectore caeruleo.*

Klein, Vorbereitung, p. 182. n. 12. *blaubrüstiger*
Finke.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 97. n. 12. *blaubrütt-*
iger Fink.

Briffon, ornithol. I. p. 310. n. 13. *Tangara vert*
du Perou.

Büffon, Vögel, XII. p. 80. *der grüne Tangara*
mit dem rothbraunen Kopfe; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 229. n. 27. *die roth-*
köpfige Merle.

Latham,

(4) Büffon scheint ihn für eine Spielart von *Tanagra Cayana* n. 8.
zu halten.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 427. n. 26. *Tanagra* (*Gyrola*) *viridis*, capite rubro, collari flavo, pectore caeruleo.

Seligmann, Vögel, I. tab. 45. *der rothköpfige Fink*.

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 639. *der Rouverdin*.

28. VARIABILIS. *Der veränderliche Tanager.*

Latham, Vögel, II. I. p. 230. n. 29. *die Schiller-Merle*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 428. n. 28. *Tanagra* (*Variabilis*) *viridis caeruleo fuscoque splendens*, *uropygio virescente*, *fascia per oculos nigra*, *remigibus rectricibusque nigricantibus*.

29. TRICOLOR. *Der dreyfarbige Tanager.*

Brisson, ornithol. I. p. 318. n. 31. *Tangara varié à tête verte de Cayenne*.

Büffon, Vögel, XII. p. 65. *dc.; dreyfarbige Tanager; gefleckte grünköpfige kayennische Tanager*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 231. n. 30. *die grünköpfige Mérle*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 428. n. 29. *Tanagra* (*Tricolor*) *viridis splendens*, *subtus viridi-flavescens*, *rectricibus alarum violaceis*, *capistro dorsoque superiore nigris*, *uropygio fulvo*.

β. *Brisson*, ornithol. I. p. 319. n. 32. *Tangara varié à tête bleue de Cayenne*.

Büffon, Vögel, XII. p. 66. *gefleckte blauköpfige Tangara*; m. e. Fig.

Latham, Syn. II. I. p. 235. n. 30. Var. A. —

Latham, Vögel, II. I. p. 231. n. 30. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 428. n. 29. β.

18. GRISEA. Der graue Tanager.

Pennant, arch. Zool. II. p. 344. n. 156. der graue Tanager.

Büffon, Vögel, XII. p. 67. der graue und oliven-farbene Tangara: m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 232. n. 31. die graue Merle.

Latham, Syst. ornith. I. p. 428. n. 30. Tanagra (Grisea) olivaceo-grisea, subtus grisea, alis caudaque nigricantibus, griseo-marginatis.

8. CAYANA. Der grüne cayennische Tanager. (5)

Müller, Natursystem, II. p. 574. n. 8. die gelbe Merle.

Onomat. histor. natur. VII. p. 427. die grüne Amer aus Cayenne.

Brisson, ornithol. I. p. 309. n. 12. Tanagra vert de Cayenne.

Biffon, Vögel, X. p. 173. der grüne Sperling; m. e. Fig.

Büffon, Vögel, XII. p. 60. der grüne kayennische Tangara; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 228. n. 26. die Merle mit gelbrothem Kopfe.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 427. n. 25. Tanagra (Cayana) fulva, dorso viridi, pileo rufo, genis nigris.

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 638. der Passe-vert.

β. Büffon, Vögel, XII. p. 64. der grüne Tanagra mit blauem Kopfe.

Latham, Syst. ornith. I. p. 427. n. 25. β. Tanagra flava, dorso flavescente-viridi, capite caeruleo, alis caudaque viridibus.

Latham,

(5) Ist nicht mit *Tanagra cayanensis* p. 894. n. 14. zu verwechseln.

Latham, Syn. II. I. p. 232. — *Latham*, Vögel, II. I. p. 229. n. 26. Var. A.

9. **ATRATA.** *Der glänzendschwarze Tanager.*

Müller, Natursystem, II. p. 575. n. 9. der Köhler.

Onomat. histor. natur. III. p. 772. *der schwarze Emmerling.*

Büffon, Vögel, XII. p. 123. *der glänzend schwarze Tangara.*

Latham, Vögel, II. I. p. 236. n. 38. *die schwarze Merle.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 430. n. 35. *Tanagra (Atrata) atra nitens*, dorso subviolaceo.

10. **MEXICANA.** *Der mexicanische Tanager.*

Müller, Natursyst. II. p. 575. n. 10. *die mexicanische Merle.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 430. *die mexikanische Ammer.*

Briffon, ornith. I. p. 305. n. 2. *Tanagra bleu de Cayenne.*

Büffon, Vögel, XII. p. 55. *der schwarz und blaue kayennische Tangara.*

Latham, Vögel, II. I. p. 227. n. 24. *die schwarz und blaue Merle.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 426. n. 23. *Tanagra (Mexicana) nigra subtus flavicans, pectore uropygioque caeruleis.*

Seligmann, Vögel, IX. tab. 40. *die schwarz und blaue Meise.*

β. *Briffon*, ornithol. I. p. 305. n. 3. *Tanagra bleu de Barbades.* (6)

Büffon, Vögel, XII. p. 74. *der blaue weißbäuchige Tangara.*

Latham,

(6) Nach *Briffon* und *Büffon* eine eigne Gattung.

Latham, Syn. II. I. p. 231 n. 24. Var. A. —
Latham, Vögel, II. I. p. 228. n. 24. Var. A.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 426. n. 23. 3 Tanagra nigra subtus alba, capite, collo inferiore pectoreque caeruleis, tectricibus caudae caeruleis.

30. GUJANENSIS. Der grüne guianische Tanager.

Büffon, Vögel, XII. p. 59. der grüne Tangara mit rothbrauner Stirne.

Latham, Vögel, II. I. p. 228. n. 25. die grauköpfige Merle.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 427. n. 24. Tanagra (Guianensis) viridis capite cinereo-cano, fronte fasciaque verticis dupli rufis.

11. TATAO. Der Paradies-tanager.

Müller, Natursyst. II. p. 575. Paradiesmerle.

Onomat. histor. natur. VII. p. 433. der bunte Paradiesfink.

Brissot, ornithol. I. p. 304. n. 1. Tangara.

Büffon, Vögel, XII. p. 65. der siebenfarbige Tangara; m. 2. Figg.

Latham, Vögel, II. I. p. 232. n. 32. die Paradies-Merle.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 428. n. 31. Tanagra (Tatao) violacea, dorso nigro, uropygio fulvo, capite viridi, pectore aliquæ violaceis.

Seligmann, Vögel, IX. tab. 39. Paradiesmeise.

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 639. der Septicolor.

Jonston, av. p. 209. Tangara prima Brasilien-sibus.

Salerne, ornith. p. 250. Tangara de Cayenne?

31. **NIGRICOLLIS.** Der schwarzkehlige Tanager. (*).

Büffon, Vögel, XII. p. 76. der schwarzkehlige Tangara; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 233. n. 33. die schwarzkehlige Merle.

32. **ALBIROSTRIS.** Der weisschnäbige Tanager.

Müller, Natursyst. II. p. 575. Weisschnabel.

Onomat. hist. nat. VII. p. 425. der Weisschnabel.

Büffon, Vögel, XII. p. 121. der weisschnäblichste Tangara.

Latham, Vögel, II. I. p. 236. n. 39. die weisschnäbige Merle.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 430. n. 37. Tanagra (Albirostris) nigra, macula alarum basique caudae flavis, rostro albo.

33. Müller, Naturfyst. II. p. 577. n. 18. der Weisschnabel.

13. **GULARIS.** Der purpurkehlige Tanager.

Müller, Natursystem, II. p. 576. n. 13. die Purpurkehle.

Onomat. hist. nat. VII. p. 429. der amerikanische Ammer mit rother Kehle.

Briffon, ornith. I. p. 320. n. 34. Cardinal d'Amérique.

Büffon, Vögel, XII. p. 50. der rothköpfige Tangara.

Latham, Vögel, II. I. p. 226. n. 21. die rothkappige Merle.

Latham, Syst. ornith. I. p. 425. n. 20. Tanagra (Gularis) nigra, subtus alba, capite rubro, iugulo purpureo.

14. CA-

(*) Ist nach Latham mit Motacilla Geira, p. 988, n. 36. einerley.

14. CAYENENSIS. Der Negertanager.

Müller, Natursyst. II. p. 576. n. 34. die cajennische Merle.

Onomat. histor. natur. VII. p. 427. der schwarze Ammer aus Cayenne.

Brisson, ornith. I. p. 311. n. 17. Tangara noir de Cayenne.

Büffon, Vögel, XII. p. 105. der schwarze Tanagra.

Latham, Vögel, II. 1. p. 235. n. 36. die Neger-Merle.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 430. n. 34. Tanagra (Cayanensis) nigra nitida, pectore utrinque alisque subtus flavis.

32. RUFICOLLIS. Der rothkehlige Tanager.

Latham, Vögel, II. 1. p. 236. n. 37. die rothkehlige Merle.

Nach Latham, Syst. ornithol. I. p. 441. eine Varietät von *Fringilla noctis*.

15. BRASILIENSIS. Der türkisblaue brasiliianische Tanager. (?)

Müller, Natursyst. II. p. 576. n. 15. die brasiliische Merle.

Onomat. hist. nat. VII. p. 425. der blaue Fink aus Brasiliën.

Brisson, ornith. I. p. 306. n. 4. Tanagra bleu du Brésil.

Büffon, Vögel, XII. p. 36. der dunkelblaue brasiliische Tangara; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 223. n. 16. die dunkelblaue Merle.

Latham,

(7) Ist nicht mit *Tanagra brasilia* n. 2. zu verwechseln. Ich begreife nicht, wie Latham und Brisson, Kleins *Fringilla caerulea* hier anführen können. Dies Synonym gehört ohnestreitig zu *Emberiza cyanea* p. 876. n. 14.

Latham, Syst. ornith. I. p. 424. n. 15. **Tanagra** (*Brasiliensis*) nigra, subtus alba, iugulo uropygioque caerulefcentibus, facie pectoreque nigris.

Fonston, av. p. 203. *Guiraienoia Brasiliensis*.

16. DOMINICA. *Der domingische Tanager.*

Müller, Natursyst. II. p. 576. n. 16. *die domingische Merle.*

Onomat. histor. natur. VII. p. 429. *die Ammer von St. Domingo.*

Briffon, ornithol. I. p. 314. n. 21. *Tangara de S. Domingue, ou Esclave.*

Büffon, Vögel, XII. p. 44. *der Sklave;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 224. n. 17. *die Dominische Merle.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 424. n. 16. *Tanagra (Dominica) nigro-maculata, supra olivaceofusca, subtus albida.*

Satmll. zur Phys. und N. G. II. p. 638. *der domingische Tangara.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 211. *Tanagra Mancipium.*

17. MILITARIS. *Der Kriegstanager.*

Müller, Natursyst. II. p. 577. n. 17. *der Cardinal.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 174. n. 3. *die braune Merle.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 431. *der braune amerikanische Fink.*

Klein, av. p. 98. n. 16. *Fringilla fusca americana.*

Klein, Vorbereit. p. 183. n. 16. *brauner amerikanischer Drostelfinke.*

Klein, verbell. Vögelhistor. p. 98. n. 16. *brauner Fink*, (mit *Loxia bicolor* p. 865. n. 48. verwechselt.)

- Brisson*, ornithol. I. p. 317. n. 30. Cardinal brun.
- Büffon*, Vögel, XII. p. 114. der braune Cardinal des Herrn Brissons.
- Latham*, Vögel, II. 1. p. 237. n. 40. die Kriegs-Merle.
- Latham*, Syst. ornithol. I. p. 431. n. 38. Tanagra (Militaris) fusca, pectore iugulo gula humerisque sanguineis.
- Seligmann*, Vögel, IV. tab. 59. der größere Rothschwanz.
- Seligmann*, Vögel, IX. tab. 32. der Schirley.
- Bankroft*, N. G. von Guian. p. 108. der größere Rothschwanz des Edwards.

33. LEUCOCEPHALA. Der weißköpfige Tanager.

Onomat. hist. nat. VI. p. 743. Quatoztlî.

Brisson, ornithol. I. p. 313. n. 20. Tangara à tête blanche du Brésil.

Büffon, Vögel, XII. p. 110. ein kleinerer Vogel als der Stieglitz, oder der brasiliische Quatozli des Seba.

Latham, Syn. II. 1. p. 243. n. 21. White-headed Tanager.

Latham, Vögel, II. 1. p. 238. n. 41. die weißköpfige Merle.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 431. n. 39. Tanagra (Albisfrons) fusco-nigra, subtus flavescens, gula iuguloque pallide rubris, pectore alisque purpureo-rubris, fronte alba.

34. FLAVA. Der gelbe Tanager.

Brisson, ornith. I. p. 314. n. 22. Tangara jaune du Brésil.

Büffon, Vögel, XII. p. 108. der brasiliische Guira-perea des Marcgrave.

Latham,

Latham, Vögel, II. I. p. 238. n. 42. die gelbe Merle.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 431. n. 40. Tanagra (Flava) obscure flava, abdomine nigro maculato, collo inferiore pectoreque nigris.

Jonston, av. p. 206. Guiraperea Brasiliensibus.

Sclaterne, ornith. p. 273. Guira perea.

35. AMBOINENSIS. Der amboinische Tanager.

Onomat. histol. natur. II. p. 399. Calatti.

Klein, av. p. 92. n. 7. Emberiza Amboinensis, Calatti dicta.

Klein, Vorbereit. p. 171. n. 7. amboinischer Fettammer.

Klein, verb. Vögelhist. p. 94. n. 9. amboinischer Fettammer.

Brisson, ornithol. I. p. 306. n. 5. Tangara bleu d'Amboine.

Büffon, Vögel, XII. p. 111. der Calatti des Seba.

Latham, Vögel, II. I. p. 238. n. 43. die Amboinische Merle.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 431. n. 41. Tanagra (Amboinensis) nigro cyaneoque varia, subtus nivea, macula tectricum purpurea, cauda fusca, apice rufo.

36. CANORA. Der himmelblaue Tanager.

Brisson, ornith. I. p. 307. n. 7. Tangara bleu de la nouvelle Espagne.

Büffon, Vögel, XII. p. 106. der Kräutervogel, oder der Xiuhtototl des Fernandez.

Latham, Syn. II. I. p. 245. n. 44. Caerulean Tanager.

Latham, Vögel, II. I. p. 239. n. 44. die himmelblaue Merle.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 432. n. 43. Tanagra (Canora) cyanea, maculis fulvis varia, alis cyaneis fulvo nigroque variis, rectricibus nigris, apice albis.

19. EPISCOPIUS. *Der Bischoff.*

Müller, Natursyst. II. p. 577. n. 19. *der Bischoff.*

Onomat. hist. nat. III. p. 807. *der Bischoff.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 344. n. 157. *der Bischoff.*

Briffon, ornith. I. p. 314. n. 23. *Evêque.*

Büffon, XII. p. 47. *der blaue Tangara oder Bischof.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 224. n. 18. *die Bischofs-Merle.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 424. n. 17. Tanagra (Episcopus) cinerea, alis caudaque extus caeruleis.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 367. n. 5. *der Bischoff.*

β. Tanagra cinereo livida, alis caudaque caerulecentibus, macula humerali albicante. *

Latham, Syst. ornithol. I. p. 424. n. 17. β.

Mus. carlson. fasc. III. tab. 54.

Bechstein, Zusätze zu Lathams Vögeln, p. 730. n. 13. *die blaue Atzel.* Gracula Glauca.

20. SAYACA. *Der Sayacu.*

Müller, Natursyst. II. p. 577. n. 20. *die graue Merle.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 432. *der bunte brasiliensische Fink.*

Briffon, ornith. I. p. 308. n. 10. Tanagra varié du Brésil.

Büffon, Vögel, XII. p. 87. *der gefleckte brasiliensische Tangara.*

Latham,

Latham, Vögel, II. I. p. 225. n. 19. die Sayaku-Merle.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 425. n. 18. Tanagra (Sayaca) caua, alis subcaeruleis.

Seligmann, Vögel, IX. tab. 41. Sayacu.

Fonston, av. p. 189. Sayacu Brasiliensisibus.

21. PUNCTATA. Der gefleckte Tanager. (8)

Müller, Natursyst. II. p. 577. n. 21. die gesprenkelte Merle.

Onomat. hist. nat. VII. p. 432. der punctirte India-nische Ammer.

Briffon, ornith. I. p. 309. n. 11. Tangara verd pi-queté des Indes.

Büffon, Vögel, XII. p. 85. der Sayacu; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 225. n. 20. die gefleckte Merle.

Latham, Syst. ornith. I. p. 425. n. 19. Tanagra (Punctata) viridis, nigro-punctata, subtus flavescente-albida.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 52. die grüngefleckte Meise.

22. VIRENS. Der grüne Tanager.

Müller, Natursystem, II. p. 578. der brasiliatische Grünling.

Onomat. hist. nat. VII. p. 434. der grüne brasiliische Ammer.

Briffon, ornith. I. p. 310. n. 14. Tangara vert du Brésil.

Büffon, Vögel, XII. p. 52. der grüne brasiliatische Tangara.

Latham, Vögel, II. I. p. 226. n. 22. die grüne Merle.

Gg 3

Latham,

(8) Ist nach Büffon mit dem vorhergehenden einerley. Nach Latham vielleicht das Weibchen oder ein Junges davon.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 426. n. 21. *Tanagra* (Virens) viridis, subtus flavescens, loris gulaque nigris, fascia maxillari caerulea.

37. SINENSIS. *Der chinesische Tanager.* (*)

Latham, Vögel, II. I. p. 227. die chinesische Merle.

Latham, Syn. Suppl. p. 161.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 426. n. 22. *Tanagra* (Sinensis) viridi olivacea, subtus flava, remigibus rectricibusque flavo-marginatis, basi remigium ferruginea.

24. CRISTATA. *Der gehäubte Tanager.*

Müller, Natursyst. II. p. 578. n. 24. die Haubenmerle.

Borowsky, Thierreich, III. p. 174. n. 4. die Hau-
brunnerie.

Onomat. hist. nat. VII. p. 428. die gehäubte Amsel aus Cayenne.

Briffon, ornith. I. p. 319. n. 33. *Tangara noir hu-pé de Cayenne*.

Buffon, Vögel, XII. p. 11. der gehäubte oder kup-
pichte *Tangara*; m. 2. Figg.

Latham, Vögel, II. I. p. 219. n. 8. die Hauben-
merle.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 422. n. 9. *Tanagra* (Cristata) nigricans, crista aurantia, gula uro-
pigoque fulvis.

38. BONARIENSIS. *Der violette Tanager.*

Buffon, Vögel, XII. p. 14. der violette *Tangara*.

Latham, Vögel, II. I. p. 220. n. 9. die violette
Merle.

Latham, Syst. ornith. I. p. 430. n. 36. *Tanagra* (Bonariensis) atro-violacea, alis caudaque viri-
di-nitentibus.

39. ATRA.

(*) S. die Anmerk. 2, bey *Fringilla Sinica*, n. 20.

39. ATRA. *Der Tanager mit schwarzem Gesichte.*

Büffon, Vögel, XII. p. 30. *der Tangara mit schwarzer Kappe*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 220. n. 10. *die Merle mit schwarzem Gesichte.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 422. n. 10. *Tanagra (Melanopis) cinerea, capite anterius, colloque toto inferiore nigris.*

40. PILEATA. *Der Huttanager.*

Büffon, Vögel, XII. p. 77. *der schwarzplättige Tangara*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 221. n. 11. *die Hutmehrle.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 423. n. 11. *Tanagra (Pileata) caerulecente-cinerea subtus alba, vertice strigaque lateribus colli nigris, inter rostrum et oculos macula alba. (mas.)*

β. Brissón, ornith. I. p. 308. n. 9. *Tangara cendré du Brésil.* (?)

Büffon, Vögel, XII. p. 77. *der schwarzplättige Tangara.*

Latham, Vögel, II. I. p. 221. n. 11. *das Weibchen.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 423. n. 11. β. *Tanagra caerulecente-cinerea subtus alba (femina).*

41. MELANICTERA. *Der schwarzkappige Tanager.*

Büffon, Vögel, XII. p. 124. *der schwarzköpfige Tangara*; m. 2. Figg. M. u. W.

Latham, Vögel, II. I. p. 222. n. 12. *die schwarzkappige Merle.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 423. n. 12. *Tanagra (Melanictera) ferrugineo-fusca, subtus lutea, pileo*

(9) Nach Brissón eine eigene Gattung.

pileo genisque nigris, alis albo longitudinaliter striatis.

Hermann, tab. affin. anim. p. 214. *Tanagra melanictera*.

42. SIBIRICA. *Der sibirische Tanager.* (10)

Latham, Vögel, II. I. p. 239. n. 46. *die Sibirische Merle*.

Latham, Syn. Suppl. p. 177.

43. ATRICAPILLA. *Der schwarzköpfige Tanager.*

Büffon, Vögel, XII. p. 32. *der mordorefarbigte Tangara*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 222. n. 13. *die schwarzköpfige Merle*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 423. n. 13. *Tanagra* (*Atricapilla*) *rufo-rubra*, capite, alis caudaque nigris, striga alarum alba.

44. STRIATA. *Der Tanager mit gefurchten Klauen.*

Büffon, Vögel, XII. p. 33. *der Tangara mit gefurchten Krallen*.

Latham, Vögel, II. I. p. 222. n. 14. *die Merle mit gefurchten Klauen*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 423. n. 13. *Tanagra* (*Striata*) *nigra subitus flava*, capite caeruleo nigroque striato, dorso infimo aurantio.

45. NIGERRIMA. *Der schwarze guianische Tanager.* (11)

Büffon, Vögel, XII. p. 34. *der schwarze Tangara, und der braunrothe Tangara*.

Latham,

(10) Nach *Latham* mit *Alauda tatarica* p. 795. n. 15. einerley.

(11) Im Syst. ornith. hat *Latham* keinen *Guiana* Tanager, und *Büffons* *Tangara noir* als das Männchen; -- *Büffons* *Tangara rufa* aber als das Weibchen von *Oriolus Leucopterus* p. 392. n. 40. angenommen.

Latham, Vögel, II. I. p. 223. n. 15. die Guiani-sche Merle.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 183. n. 31. β . *Oriolus fusco-cinnamomeus subtus cinerascens*.

46. CAPENSIS. Der capsche Tanager. (2)

Latham, Vögel, II. I. p. 240. n. 47. die Capsche Merle.

Latham, Syst. ornith. I. p. 335. n. 30. β . *Turdus ferrugineo-fuscus*, subtus ferrugineo alboque varius, cauda in medio nigricante lateribus fuscō-rufescentibus.

A. Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Edit. XII.

p. 315. n. 6. *Tanagra Cya-* p. 876. n. 54. *Emberiza Cya-nea*.

Edit. XIII.

nea.

p. 316. n. 18. *T. Albirostris*. p. 894. n. 12. β . Var.

p. 317. n. 23. *T. Chlorotica*. p. 890. n. 5. β . Variat.

Das Geschlecht ist mit 22. Gattungen vermehrt. Da aber 2. der XII. Edit. in andere Geschlechter versetzt, und 1. als Var. von einer andern angenommen worden, so beträgt die Anzahl der neu hinzugekommenen Gattungen überhaupt 25. — Bey der 2ten Gattung sind drey, bey der 3ten zwey, bey der 8ten zwey, bey der 10ten zwey Varietäten aus einander gesetzt.

B. Unbestimmtere Thiere.

1. *Tanagra rufis*. Mus. Carls. IV. n. 94.

Latham, Vögel, II. I. p. 240. n. 48. die rostrote Merle.

Gg 5

2. Tana-

(2) Nach *Latham* eine Varietät von *Turdus Grassostris* p. 815.
n. 43.

2. *Tanagra ornata*. Mus. Carl. IV. n. 95.

Latham, Vögel, II. I. p. 240. n. 49. die geputzte Merle.

C. Neuere Gattungen.

I. *Der stille Tanager*.

Biffon, ois. IV. p. 304. Oiseau silentieux.

Biffon, pl. enl. p. 742. Tangara de la Guiane.

Büffon, Vögel, XII. p. 119. der stille Vogel; der guianische Tangara; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 241. n. 50. die stille Merle.

Latham, Syst. ornith. I. p. 432. n. 42. *Tanagra* (Silens) viridis capite subtusque incana, superciliis vitta oculari, fasciaque iugulari nigris.

Hermann, tab. affin. anim. p. 214. *Tanagra taciturna*.

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 735. der stille Vogel.

2. *Der schöne Tanager*.

Latham, Syn. Suppl. p. 162. tab. 112. Capital Tanager.

Latham, Vögel, II. I. p. 239. n. 45. die schöne Merle; tab. 47. Fig. 2.

Latham, Syst. ornith. I. p. 432. n. 44. *Tanagra* (Capitalis) supra viridis, subtus flava, capite colloque inferiore nigris.

112. GESCHLECHT. FRINGILLA. Der Fink.

Müller, Natursyst. II. p. 579. Gen. CXII.

Leske, Naturgesch. p. 262. Gen. XLIV.

Borowsky, Thierreich, III. p. 136. Gen. LXII.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 186. Gen. XXXIV.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 512. Gen. LXXI.

Ebert,

- Ebert*, Naturl. II. p. 136.
Pennant, arct. Zool. II. p. 345.
Neuer Schaupl. der Natur, III. p. 52.
Onomat. hist. nat. III. p. 970.
Klein, av. p. 87. Gen. X. trib. I.
Halle, Vögel, p. 366. Gen. I. p. 390. Gen. III.
 p. 407. Gen. V.
Briffon, ornith. I. p. 320. Gen. XXXII. *Carduelis*. p. 327. Gen. XXXIII. *Passer*.
Büffon, Vögel, XI. p. 5. ff.
Batsch, Thiere, I. p. 318. Gen. LXXVII.
Latham, Vögel, II. I. p. 242. Gen. XXXVII.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 432. Gen. XXXVIII.
Hermann, tab. affin. anim. p. 215. 218.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 367. Gen. LXXX.

I. LAPPONICA. *Der lappländische Fink.* (3)

- Müller*, Natursyst. II. p. 579. n. I. *der lapp-ländische Fink*.
Müller, Natursyst. Suppl. p. 161. n. 40. *Spornfink*.
Pennant, arct. Zool. II. p. 351. n. 176. *der Lapp-ländische Fink*.
Onomat. hist. nat. II. p. 643. *der lappländische Diefelfink*.
Klein, av. p. 92. n. 10. *Emberiza capite nigro, luteis maculis vario*.
Klein, Vorbereit. p. 172. n. 10. *Schwarzköpfiger Goldammer*.
Klein, verb. Vögelhist. p. 93. n. 10. *Schwarzköpfiger Goldammer*.
Briffon, ornith. I. p. 350. n. 38. *Pinçon de montagne*.
Büffon, Vögel, XI. p. 133. *der große Bergfink*.
 p. 139. *der gespornte Fink*.
Batsch,

(3) Länge 5. Zoll, Flügelweite 7 Zoll, Gewicht 1/2 Unze. *Penn.*

Batsch, Thiere, I. p. 356. *der gespornte Fink.*

Latham, Vögel, II. I. p. 256. n. 14. *der Lerchenfink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 410. n. 18. Fringilla (Lapponica) capite nigro, corpore griseo nigroque, superciliis albis, rectricibus extimis macula alba cuneiformi.

Pallas, Reis. Ausz. II. Anh. p. II. n. 20. Fringilla calcarata; Tab. E.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 30. n. 5. Carduelis lapponica.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 180. n. 5. Fringilla (Lapponica) capite nigricante maculato, macula pone oculos alba.

Müller, Zool. dan. prodr. p. VIII. Fringilla (Lapponica) capite nigro, corpore griseo nigroque superciliis albis, rectricibus extimis macula alba cuneiformi.

Jonston, av. p. 99. Montifringillae congener.

Hermann, tab. affin. anim. p. 221. Fringilla calcarata.

Donndorff, Handb. d. Thiergeesch. p. 367. n. 1. *der lappländische Fink.*

5. SURINAMA. *Der surinanische Fink.*

Müller, Natursyst. II. p. 580. n. 2. *der surinamische Fink.*

Büffon, Vögel, XI. p. 182. *der surinanische Fink.*

Latham, Vögel, II. I. p. 270. n. 41. *der Surinamische Fink.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 447. n. 47. Fringilla (Surinama) grisea, -remigibus utrinque albis, rectricibus lateralibus intus albis.

6. LONGIROSTRIS. *Der lang schnäbige Fink.*

Büffon, Vögel, XI. p. 163. *der lang schnäbliche Fink.*

Latham,

Latham, Vögel, II. I. p. 271. n. 42. der lang-schmälige Fink.

Latham, Syst. ornith. I. p. 447. n. 48. Fringilla (*Longirostris*). *fusco flavoque varia*, *subtus subfulva*, *capite nigro*, *collo torque castaneo*, *rectricibus olivaceis intus flavo-marginatis*.

3. CÆLEBS. Der Buchfink. (4)

Müller, Natursyst. II. p. 580. n. 3. der Buchfink.

Leske, Naturgesch. p. 262. n. 1. der Finke.

Borowsky, Thierreich, III. p. 137. n. 2. der Buchfink; *Garten-*, *Roth-*, *Waldfink*.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 186. n. 1. Fringilla (Cælebs) *artubus nigris*, *remigibus utrinque albis*, *tribus primis immaculatis*; *rectricibus duabus oblique albis*; der Buchfink.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 512. n. 1. der gemeine Fink.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 584. der gemeine Fink.

Funke,

- (4) Das Finkennest ist eines der künstlichsten. Es ist eine Halbkugel, oder vielmehr eine oben eingedrückte Kugel, rund wie gedrechselt, unten mit Spinngewebe und Haaren fest auf die Äste geflochten, mit Moos und einzelnen Reischen künstlich durchwebt, inwendig mit Federn, Diestelflocken, und allerhand Thierhaaren gut ausgefüttert, und auswendig mit Flechtenmoos von dem Baume, auf dem es steht, vermittelst Spinnengewebe so fest wie angeleimt, völlig umlegt, so, dass es Mühe kostet, das Nest von der Rinde des Baumes, auf welchem es steht, zu unterscheiden. — *Linné*s Beimerkung, dass im Winter die Weibchen nach Süden ziehen, und nur die Männchen bleiben, finde ich bey *Pennant*, *White*, *Borkhausen*, u. a. bestätigt. *Bechstein* aber leugnet die Richtigkeit dieser Beobachtung; und versichert, dass nur so viel gegründet wäre, dass im Frühjahr die Männchen in eignen Schaaren 14 Tage eher wiederkämen als die Weibchen, und dass es eine Seltenheit sey, wenn man unter einer Schaar von etlichen hunderten 1. oder 2. Weibchen anträfe, und so umgekehrt.

- Funke*, Naturgesch. I. p. 266. *der Buchfink.*
- Ebert*, Naturl. II. p. 136. *der eigentliche gemeine Fink.*
- Halle*, Vögel, p. 407. n. 418. *der Fink; Buchfink.*
Fig. 27.
- Meyer*, Thiere, II. tab. 30. *der Fink.*
- Gatterer*, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 406.
n. 34. *der Fink.*
- Pennant*, arct. Zool. II. p. 355. *F. der Buchfink.*
- Neuer Schaupl. d. Nat.* III. p. 53. *gemeine Fink.*
- Onomat. hist. nat.* IV. p. 674. *der Buchfink; eigentliche Fink.*
- Handb. der Naturgesch.* II. p. 238. *der Fink.*
- Handb. der deutsch. Thiergesch.* p. 130. *gemeiner Fink; Schilafink.*
- Klein*, av. p. 96. n. 1. *Fringilla simpliciter.*
- Klein*, Vorbereit. p. 179. n. 1. *Buchfinke.*
- Klein*, verb. Vögelhist. p. 96. n. 1. *Buchfink.*
- Klin*, Vögeleyer, p. 29. tab. 9. Fig. 9.
- Gesner*, Vögelb. p. 110. *Fink; m. e. mittelm.*
Fig.
- Briffon*, ornithol. I. p. 346. n. 36. *Pinçon.*
- Büffon*, Vögel, XI. p. 83. *der Fink; m. e. Fig.*
- Batsch*, Thiere, I. p. 355. *der Buchfink.*
- Latham*, Vögel, II. 1. p. 250. n. 10. *der gemeine Fink.*
- Latham*, Syn. Suppl. p. 165. *Chaffink.*
- Latham*, Syst. ornith. I. p. 437. n. 12. *Fringilla (Caelebs) artibus nigris, remigibus utrinque albis, tribus primis immaculatis, rectricibus duabus oblique albis.*
- Frisch*, Vögel, tab. 1. Fig. 1. 2. *Fink.*
- Beseka*, Vögel Kurl. p. 78. n. 171. *der Buchfink.*
- Siemssen*, meklenb. Vögel, p. 115. n. 1. *der Buchfink; Bootfink; Dorpfink.*

- Bock, Naturgesch. von Preuss. IV. p. 426. der Buchfink.
Fischer, Livil. p. 99. n. 152. Buchfink.
Cetti, Sardin. II. p. 195. der Buchfink.
White, N. G. von Engl. p. 23. Buchfinken.
Pallas, Reis. Ausz. III. p. 476. Buchfinken.
Pallas, nord. Beytr. IV. p. 9. die Finken.
Storr, Alpenreise, I. p. 79. Buchfink.
Pontoppidan, Dänem. p. 174. n. 1. Buchfinke.
Pontoppidan, Norweg. II. p. 130. Bogfinke.
Linné, Abhandl. II. p. 303. n. 127. der Buchfink.
Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 178. n. 217. der
gemeine Fink.
Borkhausen, Magaz. I. p. 149. n. 15. Buchfink.
Zorn, Petinotheol. II. p. 330. gemeine Fink.
Naturforsch. XVII. p. 93. n. 187. der Buchfinke.
Döbel, Jägerprakt. I. p. 62. Fink.
Naumann, Vogelsteller, p. 58. Finke.
Krünitz, Encycl. XIII. p. 415. Fink.
Oekonom. Zool. p. 99. n. 44. der Bachfinke.
Goeze, nützl. Allerl. II. p. 388. n. 9. Fink.
André u. Bechstein, Spazierg. I. p. 258. 261.
Schwed. Abhandl. XXXVIII. p. 294. Buchfinke.
Neue Schwed. Abhandl. IV. p. 49. der Buchfink.
Meidinger, Vorl. p. 149. n. 1. der Buchfink.
Anweisung. Vögel zu fang. p. 189. der Fink.
Beckmann, Naturhist. p. 54. b. der Buchfink.
Hervieux, Canarienvög. p. 137. Fink.
Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 629. der Fink.
Forst.-Fisch.-und Jagdlex. I. p. 745. Finke.
Loniceri, Kräuterb. p. 682. Buchfink.
Eberhard, Thiergeesch. p. 80. der Fink.
Jablonsky, allgem. Lex. p. 333. Fink.
Naturgesch. der schönst. Vögel, II. p. 16.
Schröder, Jagdkunst, p. 138.
König, Helvetia curiosa, p. 831.

Linné,

- Linné*, Syst. Nat. Ed. II. p. 56. Fringilla.
Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 30. n. 1. Fringilla.
Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 179. n. 2. Fringilla (*Coelebs*) artubus nigris, remigibus utrinque albis, tribus primis immaculatis, rectricibus duabus oblique albis.
Charleton, exercitat. p. 88. n. 3. Fringilla.
Charleton, onom. zoic. p. 80. n. 3. Fringilla.
Moehring, av. gen. p. 41. n. 27. Fringilla.
Schwenkfeld, av. Siles. p. 261. Fringilla. *Finke*; *Buch. Finke*; *Rotte-Finke*.
Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 379. Fringilla; *Vinelia avis Alberti*.
Sibba'd, Scot. illustr. p. 18. Fringilla.
Barrere, ornith. p. 55. *Passer subtus spadiceus*, superne subcaeruleus et subvirescens.
Salerne, ois. p. 266. *Pinson commun*, fringilla, etc.
Belon, nat. des ois. p. 371. *Grinson*, Pinson, Quinson.
Fonston, av. p. 98. Fringilla.
Zinnan. Uov. p. 61 tab. 9. Fig. 52. *Frinquello*.
Levin, britt. Birds, II. tab. 79.
Roman. ornith. I. p. 142. tabl. 22. Fig. II.
Faun. Arragon. p. 87. — *Russ. Alepp.* p. 70.
Bomare, Diction. VII. p. 35. *Pinçon ou Pinson*.
Turner, histor. av. voc. *Fringilla*.
Donndorff, Handb. d. Thiergeesch. p. 367. n. 2. der *Buchfink*.

b. Das *Weibchen*.

- Müller*, Natursyst. II. p. 581. ad n. 3. *Waldfink*.
Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 180. n. 6. Fringilla (*Sylvatica*) artubus remigibus rectricibusque nigris, duabus utrinque extinis a medio extrorsum albis.

Linné,

Linné, Syst. Nat. Ed. XII. I. p. 318. n. 3. β . Fringilla Sylvia.

Linné, fn. suec. II. p. 85. n. 232. β . Fringilla Sylvatica artibus remigibus rectricibusque nigris; duabus utrinque extimis a medio extrorsum albis.

β . *Latham*, Syst. ornith. I. p. 433. n. 12. ε .

γ . *Briffon*, ornith. I. p. 348. A. Pinçon à ailes et queues noires. (5)

Büffon, Vögel, XI. p. 106. der Waldfink.

Latham, Syn. II. I. p. 258. n. 10. Var. A.

Latham, Vögel, II. I. p. 252. n. 10. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 437. n. 12. β . Fr. cinerascens, subtus incarnata, rectricibus alarum albis, medio nigris, remigibus rectricibusque nigris.

δ . *Briffon*, ornith. I. p. 359. C. Pinçon blanc.

Büffon, Vögel, XI. p. 112. der weiße Fink.

Latham, Vögel, II. I. p. 253. n. 10. Var. β .

Latham, Syst. ornith. I. p. 437. n. 12. γ .

Schwenkfeld, av. Siles. p. 262. Fringilla candida.

Gesner, Vögelb. p. 110. ganz weiße Finken.

Zorn, Petinotheol. II. p. 53. schneeweisse Finken.

Anweis. Vögel zu fangen, p. 191. schloßweisse Finken.

Angenehm. Zeitvertr. m. Vögeln, p. 101.

Angenehme Landlust, p. 135.

ε . *Briffon*, ornith. I. p. 349. D. Pinçon à collier.

Büffon, Vögel, XI. p. 113. der Ringelfink.

Latham, Vögel, II. I. p. 253. n. 10. Var. C.

Latham,

(5) Ist nach Beckstein ein junges Männchen, nach Latham eine Spielart vom Weibchen. Briffon rechnet die vorher bey δ angeführten Synonymen hieher.

- Latham*, Syst. ornith. I. p. 437. n. 12. ♂.
Schwenkfeld, av. Siles. p. 262. *Fringilla torquata*.
 ♂. *Latham*, Vögel, II. 1. p. 253. ad Var. C. not. h.
Latham, Syst. ornith. I. p. 438. n. 12. ♂.
 ♀. *Latham*, Vögel, II. 1. p. 253. ad. Var. C. not. h.
Latham, Syst. ornith. I. p. 438. n. 12. ♀.

4. MONTIFRINGILLA. Der Bergfink. (6)

- Müller*, Natursyst. II. p. 581. n. 4. der Bergfink.
Leske, Naturgesch. p. 262. n. 3. der Bergfink.
Borowsky, Thiereich, III. p. 136. n. 1. der Quäker; Bergfink; Schne-, Tannen-, Missfink,
Rowert, Gegler; tab. 62.
Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 186. n. 2. *Fringilla* (*Montifringilla*) *alarum* *basi* *subtus* *flavissima*; der Bergfink; Winterfink; Quäckfink;
Nikawitz; Zetscher; Gegler, etc.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 514. n. 2. der Bergfink.
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 589. der Bergfink; Gräcker.
Funke, Naturgesch. I. p. 265. Bergfink.
Ebert, Naturl. II. p. 136. Bergfink; Waldfink.

Halle,

(6) Ist nicht mit *Fringilla montana*, p. 925. n. 37. zu verwechseln.
 — Findet sich häufig unter den gemeinen Finken, und kommt zuweilen in grossen Scharen. In England nistet er nicht, zieht aber zuweilen dahin. *Latham* erzählt, dass ihm einst 18 auf einmal gebracht wären, die alle auf einen Schuss geschossen worden. In Frankreich sieht man sie zuweilen in unermeßlichen Flügen so häufig, dass der Boden von ihrem Miste ganz bedeckt wird und jede Nacht über sechs hundert Dutzend gerödtet werden. In Thüringen lassen sie sich vorzüglich vom Anfang des Octobers bis zu Ende des Märzese sehen, wo sie wieder in die nördlichen Gegenden zurück gehen. Einzeln sind sie unter den gemeinen Finken, Sperlingen und Goldammern, den ganzen Winter hindurch auf den Häusern, vor den Scheunen und Ställen anzutreffen.

- Halle, Vögel, p. 409. n. 419. der Bergfink.
Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 407.
 n. 344. der Bergfink; Quecker; Nikabiz; Ni-
 kowiz, Zehrling, etc.
Pennant, arch. Zool. II. p. 355. E. der Bergfink.
 Neuer Schaupl. d. Nat. III. p. 54. n. 2. Bergfink.
 Onomat. hist. nat. II. p. 643. der angermanuländi-
 sche Diestelvogel.
 Handb. der deutsch. Thiergeesch. p. 132. der Buch-
 fink; Bergfink, etc.
Klein, av. p. 96. n. 2. *Fringilla hyberna*; mon-
 tana.
Klein, Vorbereit. p. 179. n. 2. *Winterfinke*.
Klein, verb. Vögelh. p. 96. n. 2. Bergfink.
Klein, Steinmat. av. p. 19. tab. 19. Fig. 16. a—c.
Gesner, Vögelb. p. III. *Waldfinke*.
Brisson, ornith. I. p. 349. n. 37. *Pinçon d'Ar-
 dennes*.
Büffon, Vögel, XI. p. 115. der Bergfink, oder
 Gägler. p. 127. n. 7. *Bergnachtigall*.
Batsch, Thiere, I. p. 356. der Bergfink.
Latham, Vögel, II. I. p. 254. n. 13. der Bergfink.
Latham, Syst. ornith. I. p. 439. n. 17. *Fringilla*
 (*Montifringilla*) *nigra*, pennis rufo-margina-
 tis, subtus uropygioque alba, jugulo pectore-
 que rufescens, rectricibus lateralibus nigri-
 cantibus, extus albo marginatis.
Siemssen, meklenb. Vögel, p. 116. n. 2. der Berg-
 fink.
Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 427. der Bergfink.
Fischer, Livil. p. 99. n. 153. *Berg-, Tannen-,
 Wald-, Winterfink*.
Fischer, Zus. zur N. G. von Livil. p. 48. der
 Bergfink.
Cetti, Sardin. II. p. 195. *Bergfink.* *
Pennant, Reis. d. Schottl. I. p. 41. *Bergfinken*.

- Lepechin*, Tageb. d. russ. Reis. II. p. 5. *Bergfinken*.
- Pallas*, Reis. Ausz. III. p. 474. *Tannenfinken*.
- Storr*, Alpenreise, I. p. 79. *Bergfink*.
- Linné*, Abhandl. II. p. 304. n. 128. *Bergfink*.
- Pontoppidan*, Dämmem. p. 174. n. 2. *Queker*, *Buchfinkens Hurkind*.
- Zorn*, Petinotheol. II. p. 341 *Bergfink*; *Gäbler*; *Quäcker*.
- Borkhausen*, Magaz. I. p. 150. n. 16. *Bergfink*.
- Döbel*, Jägerprakt. I. p. 62. *Quäcker*, *Zehrling*, *Buch-Fink*.
- Naumann*, Vogelsteller, p. 74. *Quäcker*.
- Scopoli*, Bem. aus der N. G. I. p. 179. n. 218. *der Bergfink*.
- Krünitz*, Encyk. XIII. p. 419. *Bergfink*.
- Naturforsch. XIII. p. 185. XVII. p. 93. *Bergfink*.
- Sammnl. zur Phys. u. N. G. II. p. 630. *der Bergfink*.
- Meidinger*, Vorlesung. I. p. 150. n. 2. *der Bergfinke*.
- Anweis. Vögel zu sang. p. 435. *Quäcker*; *Nicabitz*.
- Forst.-Fisch.-u. Jagdlex. I. p. 750. *Buchfink*. *Gögler*.
- Zablonsky*, allgem. Lex. p. 180. *Buchfink*, *Bergfink*.
- Linné*, Syst. Nat. Ed. VI. p. 30. n. 7. *Montifringilla*.
- Linné*, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 179. n. 3. *Fringilla* (*Montifringilla*) *alarum basi subtus flavisima*.
- Kramer*, Austr. p. 367. n. 3. *Nicowitz*, a corrupta voce *Feawetz*; alibi *Quecker*, *Pienken*.
- Charleton*, onom. zeic. p. 80. n. 4. *Montifringilla*.
- Schwenkfeld*, av. Siles. p. 262. *Fringilla hyberna*.
- Ορεστιζη. *Wald-Finke*; *Winter-Fink*, *Danzen-Fink*.

Schwenk.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 229. *Aurivittis*. *Queck*;
Quecker; *Golifinke*; *Quetschfinke*; *Laubfinke*.
Rzaczynsky, auct. hist. nat. Pol. p. 379. *Fringilla montana*. *Montifringilla*.

Jonston, av. p. 99. *Fringilla montana*.

Beton, hist. des ois. p. 372. *Montan* ou *Mountain*;
Pinson d'Ardennes, nommé par quelques-uns
Paisse de bois, ou *Moineau de bois*.

Salerne, hist. nat. des ois. p. 269. *Pinson de mon-
tagne*, etc.

Turneri hist. av. voc. *Montifringilla*.

Amoenit. academ. IV. p. 596.

Roman. orn. p. 146. tab. 22. Fig. 2. *Fringilla mon-
tana*.

Levin, britt. Birds. II. tab. 80.

Bonare, dictio. VII. p. 36. *Pinçon de montagne*
 où des Ardennes.

Dundorff, Handb. d. Thiergesch. p. 368; n. 2.
der Bergfink.

β. *Latham*, Syn. II. I. p. 262. n. 13. Var. A.

Latham, Vögel, II. I. p. 256. n. 13. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 439. n. 17. β. *Eringilla*
*superciliis fasciaque nuchae nigris, corpore sub-
 tus uropygioque albis, gula pectoreque rufes-
 centibus, tectricibus alarum fascia albente*.

γ. *Briffon*, ornith. I. p. 330. A. *Pinçon d'Ardennes*
 à tête blanche.

Büffon, Vögel, XI. p. 129. *Bergfinken mit einem
 ganz weißen Kopfe*.

Latham, Syn. II. I. p. 262. n. 13. Var. B.

Latham, Vögel, II. I. p. 256. n. 13. Var. B.

Latham, Syst. ornith. I. p. 439. n. 17. β.

Aldrov. ornith. p. 131. *Montifringilla leuco-
 cephalos*.

5. LULENSIS. *Der schwedische Fink.*

Müller, Natursyst. II. p. 582. n. 5. *der schwedische Fink.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 354. B. *der Fink von Lulea.*

Onomat. hist. nat. II. p. 643. *der westgothische Diefelfink.*

Brisson, ornithol. I. p. 324. n. 2. *Chardonneret de Suede.*

Büffon, Vögel, XI. p. 296. *der Stieglitz mit vier Streifen.*

Latham, Vögel, II. I. p. 280. n. 56. *der schwedische Fink.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 452. n. 63. *Fringilla (Lulensis) fusca, pectore humerisque rufis, alis nigris macula rufa, collo corporeque subtus albis.*

Schrift. der berl. Gesellsch. N. Fr. VII. p. 465. n. 54. *der schwedische Fink.*

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 30. n. 6. *Carduelis Lulensis.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 180. n. 4. *Fringilla (Lulensis) fusca, pectore humerisque rufis, alis nigris macula rufa.*

40. ERYTHROCEPHALA. *Der rothköpfige Fink.*

Latham, Vögel, II. I. p. 279. n. 55. *der rothköpfige Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 452. n. 62. *Fringilla (Erythrocephala) olivacea capite colloque coccineis, orbitis nigris, fascia tectorum duplice alba.*

41. PSITTACEA. *Der Papageyfink.*

Latham, Vögel, II. I. p. 279. n. 54. *der Papagey-Fink.*

Latham,

Latham, Syst. ornith. I. p. 451. n. 61. *Fringilla (Psittacea) viridis*, facie uropygio rectricibusque coccineis, lateralibus intus fuscis.

7. CARDUELIS. Der Stieglitz. (7)

Müller, Natursyst. II. p. 582. n. 7. *der Diestelfink*; tab. 25. Fig. 5.

Leske, Naturgesch. p. 262. n. 3. *der Stigliz.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 138. n. 3. *der Stieg-*
litz.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 187. n. 4. *Frin-*
gilla (Carduelis) fronte iuguloque coccineis, re-
migibus antrorsum flavis, rectricibus duabus ex-
timis medio, reliquisque apice albis; der
Stieglitz.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 516. n. 5. *der Stieg-*
litz; tab. 1. Fig. 2.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 585. *der*
Stieglitz.

Funke, Naturgesch. I. p. 267. *der Stieglitz.*

Ebert, Naturl. II. p. 137. *der Stieglitz.*

Hh 4

Halle,

(7) Hält sich des Sommers über in Gärten, Feldhölzern und Vorhölzern auf, bleibt den ganzen Winter bey uns, und zieht nur seiner Nahrung halber bald da bald dort hin. Diese besteht in allerhand Sämereyen von Diesteln, Wegbreit, Habichtskraut, Klettern, Sallat, Kohl, Rüben, Cichorien, Lein und Dotter, etc. Blattläuse aber frisst er nicht, wie man gemeinlich glaubt. Im Käfig giebt man ihm Mohn und Hanf. Von dem Genuss des letztern soll er schwarz werden. — Wird 20. bis 24. Jahr alt. — Im He ist versammeln sich diese Vögel familienweise aufs Höchste zu Herden von 15 bis 20 — Seltener paart sich ein Stieglitz Weibchen mit dem Kanarienmännchen. — In Persien fürtet man sie wegen Mangel des Hanfsaainens, mit Wallnüssen (*Pallas*). Dass dieser Vogel mehr als andere mit der fallenden Sucht behaftet wird, wenn man ihn im Käfig hält, ist bekannt; dass diese Krankheit aber von einem Wurm herrühre, der in den Schenkeln sitzet, wird von aufmerksamen Beobachtern billig gelehnt.

- Hölle*, Vögel, p. 411. n. 421. der *Stieglitz*.
Meyer, Thiere, I. tab. 92. der *Stieglitz*.
Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 408.
 n 345. der *Stieglitz*, *Stechlitz*, *Jupitersfink*.
Pennant, arct. Zool. II. p. 357. H. der *Goldfink*; *Stieglitz*.
Beckmann, Naturhist. p. 54. c. der *Stieglitz*.
 Neuer Schapl. d. N. III. p. 54. VIII. p. 573.
Stieglitz.
 Onomat. hist. nat. II. p. 642. der *Stieglitz*.
 Handb. der Naturgesch. II. p. 226. der *Diestelfink*.
 Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 130. *Stieglitz*.
Klein, av. p. 97. n. 4. *Fringilla Jovis*. *Carduelis*.
Klein, Vorbereit. p. 180. n. 4. *Diestelfinke*; *Stieglitz*; *Rothvogel*.
Klein, verb. Vögelhist. p. 96. n. 4. *Diestelfink*.
Klein, Stemmat. av. p. 20. tab. 19. Fig. 18. a—c.
Klein, Vögeleyer, p. 30. tab. 9. Fig. II.
Gesner, Vögelb. p. 55. *Diestelfink*; m. e. Fig.
Briffon, ornith. I. p. 320. n. 1. *Chardonneret*.
Büffon, Vögel, XI. p. 260. der *Stieglitz*; *Truns*,
Rothvögelchen, *Kletter*, *Diestelfink*; p. 264.
Stechlick; m. e. Fig.
Batsch, Thiere, I. p. 354. der *Stieglitz*.
Latham, Vögel, II. I. p. 274. n. 51. der *gemeine Stieglitz*.
Lathami, Syst. ornith. I. p. 449. n. 58. *Fringilla* (*Carduelis*) *remigibus antrorsum luteis, extima immaculata*.
Besek, Vögel Kurl. p. 79. n. 172. der *Diestelfink*.
Siemßen, meklenb. Vögel, p. 117. n. 3. der *Stieglitz*.
Bock, N. G. von Preuß. IV. p. 427. der *Stieglitz*.
Cetti, Sardin. II. p. 203. der *Stieglitz*.
Fischer, Livil. p. 99. n. 154. *Stieglitz*.

- Pontoppidan*, Dänneim. p. 174. n. 3. *Stieglitz*.
Pontoppidan, Norweg. II. p. 186. *Stillitz*.
Leem, Finnm. p. 136. *der Stieglitz*.
Storr, Alpenreis. I. p. 79. *Fringilla Carduelis*.
Pallas, nord. Beytr. III. p. 15. *Stieglitz*. IV. p. 9.
Diestelfink.
Linné, Abhandlung. II. p. 304. n. 129. *der Diestelfink*.
Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 174. n. 211. *der Stieglitz*.
Zorn, Petinotheol. II. p. 333. *der Diestel-Fink*.
Hervieux, Canarienvög. p. 179. *der Stieglitz*.
Döbel, Jägerprakt. I. p. 63. *Stieglitz*.
Naumann, Vogelsteller, p. 69. *der Stieglitz*.
Eberhard, Thiergesch. p. 79. *der Diestelfink*.
Anatre u. Bechstein, Spazierg. II. p. 320.
Naturforsch. XVII. p. 93. n. 189. *der Diestelfink*.
Sammnl. zur Phys. u. N. G. II. p. 634. *der Stieglitz*.
Anweis. Vögel zu fang. p. 529. *Stieglitz*.
Naturgesch. der schönsten Vögel, p. 64.
Lemmer, Materiallex. p. 241.
Loniceri, Kräuterb. p. 682. *Diestelvogel*.
Geoffroy, mater. med. VII. p. 380. *Stieglitz*.
Neu Hamburg. Magaz. St. 37.
Oekonom. Zool. p. 99. *der Stieglitz*.
Schles. ökonom. Gesellsch. 1782. p. 102. *Diestelfink*.
Reinmann, de Cardueli viginti duos annos nato,
 per integrum adhuc annum, pennis omnibus
 amissis, cantante et saltante. — Nov. act. nat.
 cur. II. p. 597. c. f.
Hartmanni anatome Carduelis fame pereintae. —
Eph. nat. cur. Dec. II. an. 7. obf. 18. p. 39.
Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 56. *Carduelis*.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 30. n. 4. *Carduelis vulgaris*.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 180. n. 9. *Fringilla (Carduelis) remigibus antrorsum luteis: extima immaculata, rectricibus duabus extiniis medio, reliquisque apice albis.*

Kramer, Austr. p. 365. n. 1. *Fringilla remigibus antrorsum luteis, extima immaculata; rectricibus duabus extiniis toto, reliquis apice albis.*
Stieglitz.

Charleton, onom. zoic. p. 79. n. 1. *Carduelis; Chrysomitris; Aurivittis.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 233. *Carduelis. Stieglitz; Distelvogel, Distel-Fink; Rottvogel.*

Sibbald, prodr. L. 3. c. 4. p. 18. *Carduelis.*

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 370. *Carduelis seu Astralaginas; Zena Bellonii; Aurivittis ornithologorum, Chrysomitris.*

Fouston, av. p. 97. *Carduelis.*

Belon, hist. nat. des ois. p. 353. *Chardonneret.*

Barreré, ornithol. p. 57. *Carduelis capite rubro, corpore fulvo, etc.*

Salerne, hist. nat. des ois. p. 274. *Chardonneret, etc.*

Bernare, dictionn. II. p. 355. *Chardonneret.*

Schaefer, element. ornithol. tab. 24.

Zinnan. Uov. p. 58. tab. 8. 42. *Cardellino.*

Turner, hist. av. art. *Carduelis.*

Faun. Arragon. p. 87.

Roman. ornithol. p. 132. tab. 120.

Hist. Prov. I. p. 511.

Russel, Alepp. p. 70.

Levin, britt. Birds. II. tab. 81.

Hermann, tab. affin. anim. p. 220. Fr. *Carduelis.*

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 369. n. 4. *der Stieglitz.*

B. Der

β. Der weißköpfige Stieglitz.

Brisson, ornith. I. p. 321. A. Chardonneret à tête blanche.

Büffon, Vögel, XI. p. 284. der Stieglitz mit weißen Augenbrauen, und weißer Stirne.

Latham, Syn. II. I. p. 282. n. 51. Var. A.

Latham, Vögel, II. I. p. 275. n. 51. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 450. n. 58. β.

Aldrov. ornith. II. p. 801. Carduelis ciliis et rostri ambitu niveo colore refulgentibus.

Fonston, av. tab. 36. Carduelis ciliis albis.

γ. Der Stieglitz mit gestreiftem Kopfe.

Brisson, ornith. I. p. 321. B. Chardonneret à tête rayée.

Büffon, Vögel, XI. p. 285. der Stieglitz mit roth und gelb gestreiftem Kopfe.

Latham, Syn. II. I. p. 283. n. 51. Var. B.

Latham, Vögel, II. I. p. 276. n. 51. Var. B.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 450. n. 58. γ.

Browne, I. c. *Fringilla subfuscata*, capite vario striato, striis quandoque rubris, quandoque flavis.

δ. Der schwarzköpfige Stieglitz.

Brisson, ornithol. I. p. 322. C. Chardonneret à tête jaune.

Büffon, Vögel, XI. p. 285. der Stieglitz mit der schwarzen Kappe.

Latham, Syn. II. I. p. 283. n. 51. Var. C.

Latham, Vögel, II. I. p. 276. n. 51. C.

Latham, Syst. ornith. I. p. 450. n. 58. δ.

Halle, Vögel, p. 412. n. 422. der Schwalbenstieglitz.

ε. Der weißlichste Stieglitz.

Brisson, ornithol. I. p. 322. D. Chardonneret blanchâtre.

Büffon,

Büffon, Vögel, XI. p. 286. der weißliche Stieglitz.

Latham, Syn. II. I. p. 283. n. 51. Var. D.

Latham, Vögel, II. I. p. 276. n. 51. Var. D.

Latham, Syst. ornith. I. p. 450. n. 58. e.

Aldrovand. orn. II. p. 801. Carduelis subalbida.

♂. Der weiße Stieglitz.

Briffon, ornithol. I. p. 322. E. Chardonneret blanc.

Büffon, Vögel, XI. p. 286. der weiße Stieglitz; m. e. Fig.

Latham, Syn. II. I. p. 283. n. 51. Var. E.

Latham, Vögel, II. I. p. 276. n. 51. Var. E.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 450. n. 58. ♂.

Aldrovand. orn. II. p. 801. Carduelis alba, capite rubro.

Cetti, Sardin. II. p. 205. weiße Stieglitze.

Jonston, av. p. 97. Cardueles totae prorsus albæ.

η. Der schwarze Stieglitz.

Briffon, ornithol. I. p. 323. F. Chardonneret noir.

Büffon, Vögel, XI. p. 288. der schwarze Stieglitz.

Latham, Syn. II. I. p. 284. n. 51. Var. F.

Latham, Vögel, II. I. p. 277. n. 51. Var. F.

Latham, Syst. ornith. I. p. 450. n. 58. η.

Ω. Der schwarze, gelbköpfige Stieglitz.

Briffon, ornith. I. p. 323. G. Chardonneret noir à tête jaune.

Büffon, Vögel, XI. p. 290. der schwarze Stieglitz mit orangefarbigem Kopfe.

Latham, Syn. II. I. p. 285. n. 51. G.

Latham, Vögel, II. I. p. 277. n. 51. Var. G.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 451. n. 58. Ω.

Aldrov.

Aldrov. ornith. II. p. 801. *Cardueli congener, rostro fasciola crocea circumdato.*

i. *Der Bastardstieglitz.*

Brisson, ornithol. I. p. 323. H. Chardonneret mulet.

Büffon, Vögel, XI. p. 291. *der Bastardstieglitz.*

Latham, Syn. II. 1. p. 285. n. 51. Var. H.

Latham, Vögel, II. 1. p. 277. n. 51. Var. H.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 451. n. 58. 1.

ii. *Der gelbbreustige Stieglitz.* *

Büffon, ois. VII. p. 283. n. 1. Chardonneret à poitrine jaune.

Büffon, Vögel, XI. p. 284. *der Stieglitz mit gelber Brust.*

λ. *Das Rehlein.* *

Pennant, brit. Thiergesch. p. 122.

Büffon, Vögel, XI. p. 294. n. 10.

Latham, Vögel, II. 1. p. 278. not. k. Var. I.

μ. *Der Imperial.* *

Cesti, N. G. von Sardin. II. p. 203.

Büffon, Vögel, XI. p. 294. n. 11.

Latham, Vögel, II. 1. p. 278. not. k. Var. K.

8. MELBA. *Der grüne Stieglitz.*

Müller, Natursyst. II. p. 584. n. 8. *der grüne Stieglitz.*

Onomat. histor. natur. V. p. 135. *der grüne Fink.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 98. n. 19. *grüner Stieglitz.*

Brisson, ornithol. I. p. 326. n. 7. Chardonneret verd.

Büffon, Vögel, XI. p. 299. *der grüne Stieglitz, oder der Maracaxao; m. e. Fig.*

Latham,

Latham, Vögel, II. I. p. 278. n. 52. der grüne Stieglitz.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 451. n. 59. Fringilla (Melba) viridis, facie caudaque rubris, abdomine albo nigroque undulato.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 62. der grüne Stieglitz, (das Männchen.)

Seligmann, Vögel, V. tab. 23. der grüne Stieglitz, (das Weibchen.)

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 180. n. 10. Fringilla (Melba) facie caudaque rubris, abdomine albo nigroque undato, dorso viridi.

Hermann, tab. affin. anim. p. 220. Fringilla Melba.

43. A F R A. Der afrikanische Fink.

Latham, Vögel, II. I. p. 279. n. 54. der Fink mit rothem Gesichte.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 451. n. 60. Fringilla (Afra) fusco-viridis, genis pallide coccineis, cauda coccinea, remigibus nigricantibus extus aurantiis.

9. ALARIO. Der capsche Fink.

Müller, Natursystem, II. p. 584. n. 9. der capsche Spatz.

Klein, av. p. 90. n. 21. Passer capensis.

Klein, Vorbereit. p. 169. n. 21. Kapsperling.

Klein, verb. Vögelhist. p. 92. n. 19. Capsperling.

Brisson, ornithol. I. p. 336. n. 17. petit moineau du cap de bonne esperance.

Latham, Vögel, II. I. p. 305. n. 85. der Capsche Fink.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 462. n. 95. Fringilla (Alario) capite collo pectoreque atris, corpore castaneo subtus albo, rectricibus quatuor lateraliibus lineola nigra.

Linné,

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 179. n. 14. *Emberiza* (*Alario*) *capite pectoreque atro*, *abdomine albo*, *alis rubris*.

43. LEUCOTIS. *Der weissöhrige Fink.*

Latham, Vögel, II. I. p. 304. n. 84. *der weissöhrige Fink.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 462. n. 94. *Fringilla* (*Leucotis*) *capite dorso tectricibusque alarum purpureis*, *subtus flava*, *remigibus primoribus caudaque caeruleis*, *macula aurium alba*.

β. *Latham*, Vögel, II. I. p. 304. n. 84. *der Erste.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 462. n. 94.

γ. *Latham*, Vögel, II. I. p. 304. n. 84. *der Zweyte.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 462. n. 94. β.

δ. *Latham*, Vögel, II. I. p. 304. n. 84. *der Dritte.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 462. n. 94. γ.

ε. *Latham*, Vögel, II. I. p. 305. n. 84. *der Vierte.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 462. n. 94. δ.

ζ. *Latham*, Vögel, II. I. p. 305. n. 84. *der Fünfte.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 462. n. 94. ε.

10. AMANDAVA. *Der amandavische Fink.* (8)

Müller, Natursyst. II. p. 584. n. 10. *der bengalische Spatz.*

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 187. n. 5. *Fringilla* (*Amandava*) *fusca rufescensque albo-punctata*; *der Fink von Bengal.*

Onomat. hist. nat. III. p. 970. *der purpurfarbene ostindische Fink.* *Amaduvad.*

Klein, av. p. 98 n. 15. *Fringilla rubra*, *minima*.

Klein, Vorbereit. p. 182. n. 15. *rothe kleinste Sieglitz*, *Düstelfincke.*

Klein,

(8) Grösse eines Zaunkönigs; etwa 4. Zoll lang. *Latham*.

- Klein*, verbess. Vögelhistor. p. 98. n. 15. *rother kleinster Stiglitz*.
- Brisson*, ornith. I. p. 364. n. 62. Bengali piqueté.
- Büffon*, Vögel, XI. p. 68 *der punctirte Bengali*; m. e. Fig.
- Latham*, Syn. Suppl. p. 168. Amadavade Finch.
- Latham*, Vögel, II. I. p. 301. n. 82. *der getiegerte Bengali*, tab. 49.
- Latham*, Syst. ornithol. I. p. 461. n. 92. Fringilla (Amandava) fusca rufescensque albo-punctata, rectricibus nigris apice punto albo.
- Seligmann*, Vögel, IX. tab. 45. fig. 1. *Amandavat*.
- Linné*, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 180. n. 11. Fringilla (Amandava) rectricibus purpureis, medietate postica atris.
- Charleton*, exercitat. p. 95. n. 2. — Onom. zoic. p. 89. n. 2. *Regulus indicus*.
- Hermann*, tab. affin. anim. p. 220. Fringilla Amandava.
- β. *Brisson*, ornith. I. p. 363. n. 61. Bengali brun. (9)
- Büffon*, Vögel, XI. p. 67. *der braune Bengali*; *braun getiegerte, eigentliche Bengali*; m. e. Fig.
- Latham*, Syn. II. I. p. 312. n. 82. Var. A.
- Latham*, Vögel, II. I. p. 301. n. 82. Var. A.
- Latham*, Syst. ornithol. I. p. 461. n. 92. β.

II. GRANATINA. Der brasiliatische Fink.

- Müller*, Natursystem, II. p. 584. n. 11. *der Granatvogel*.
- Borowsky*, Thierreich, III. p. 140. n. 5. *der Granatvogel*, tab. 62. B.

Onomat.

(9) Noch nicht vier Zoll lang. *Latham*. — Nach *Brisson* und *Büffon* eine eigene Gattung. *Bechstein* hat in einer Anmerk. bey der Uebersetzung des *Lathamschen* Werks I. c. aus eigener Erfahrung viel artige Bemerkungen hiebey geliefert.

Onomat. hist. nat. III. p. 671. *der brasiliische rothgelb und blaue Fink.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 98. n. 21. *rothschnäblerger Diestelfink.*

Brisson, ornithol. I. p. 367. n. 67. Grenadin.

Büffon, Vögel, XI. p. 221. *der rothschnäbliche Diestelfink;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 306. n. 87. *der Brasiliische Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 463. n. 97. Fringilla (Granatina) cauda cuneiformi, corpore rufescente, rostro rubro, temporibus, uropygio abdomineque violaceis.

Seligm. Vögel, VI. tab. 86. *der roth und blaue brasiliische Fink.*

Bankroft, N. G. von Guiana, p. 109. *der roth und blaue brasiliische Finke.*

Linneé, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 181. n. 16. Fringilla (Brasiliana) cauda cuneiformi, corpore rufescente, temporibus, uropygio abdomineque violaceis, rostro rubro.

Hermann, tab. affin. anim. p. 220. Fr. Granatina.

$\beta.$ Fr. loris fuscis, corpore poslice violaceo. *

Latham, Syst. ornithol. I. p. 463. n. 97. $\beta.$

Latham, Vögel, II. I. p. 306. n. 87. Var. A.

$\gamma.$ Fr. abdomine infimo femoribusque corpore concoloribus. *

Latham, Syst. ornithol. I. p. 463. n. 97. $\gamma.$

Latham, Vögel, II. I. p. 306. n. 87. Var. B.

$\delta.$ Fr. cauda rubescente. *

Latham, Syst. ornithol. I. p. 463. n. 97. $\gamma.$

Latham, Vögel, II. I. p. 306. n. 87. Var. C.

44. ZEYLANICA. Der zeylanische Fink.

Latham, Vögel, II. 1. p. 306. n. 88. der Zeylani-sche Fink.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 463. n. 98. Fringilla (Zeylanica) flava, dorso virescente, capite nigro, corpore subtus albo nigricante vario, remigibus rectricibusque nigricantibus.

B. *Latham*, Vögel, II. 1. p. 307. n. 88. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 463. n. 98. β. Fr. dorso viridi, pectore abdomineque flavescente-albis, capite fusco rubro. An femina?

45. FUSCICOLLIS. Der braunkehlige Fink.

Latham, Vögel, II. 1. p. 307. n. 89. der braun-kehlige Fink.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 463. n. 99. Fringilla (Fuscicollis) ferruginea, vertice uropygio crisoque viridibus, gula fusca macula subrubra, macula remigum rectricibusque dimidiato-flavis.

46. IGNITA. Der Feuerfink.

Latham, Vögel, II. 1. p. 307. n. 90. der Feuer-Fink.

Latham, Syst. ornith. I. p. 464. n. 100. Fringilla (Ignita) fusco-rubra nitens, rostro, remigibus caudaque obscuris.

42. TRISTIS. Der amerikanische Stieglitz.

Müller, Natursyst. II. p. 585. n. 12. der america-nische Fink.

Pennant, arct. Zool. II. p. 345. n. 159. der Gold-fink; der amerikanische Stieglitz

Onomat. histor. natur. III. p. 980. der amerikani-sche Stieglitz.

Klein, av. p. 97. n. 5. Fringilla, Carduelis ame-ricana.

- Klein*, Vorbereit. p. 180. n. 5. *gelber Diestelfinke*.
Klein, verb. Vögelhist. p. 97. n. 5. *gelber Diestelfink*.
Brisson, ornithol. I. p. 324. n. 3. Chardonneret d' Amerique.
Büffon, Vögel, XI. p. 303. *der gelbe Stieglitz*; m. e. Fig.
Halle, Vögel, p. 413. n. 423. *der gelbe Stieglitz*.
Latham, Syn. Suppl. p. 166. American Goldfinch.
Latham, Vögel, II. 1. p. 230. n. 57. *der Amerikanische Stieglitz*.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 452. n. 64. Fringilla (*Tristis*) flava, fronte nigra, alis fuscis.
Seligmann, Vögel, II. tab. 86. *der americanische Stieglitz*.
Seligmann, Vögel, VIII. tab. 64. *der americanische Stieglitz*, ein Er und eine Sis.
Linneé, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 181. n. 14. Fringilla (*Tristis*) flava, fronte nigra, alis fuscis.
Fermin, Surin. II. p. 182. *Diestelfink oder Stieglitz*.
Hermann, tab. affin. anim. p. 220. Fringilla tristis.
Charlevoix, nouv. France. III. p. 156.

13. ZENA. *Der bahamische Fink. (10)*

- Müller*, Natursyst. II. p. 587. n. 13. *der bahamische Fink*.
Halle, Vögel, p. 413. n. 424. *der schwarze Fink mit gelbrothem Unterleibe und Kinne*.
Pennant, arct. Zool. II. p. 347. n. 164. *der Bahamafink*.
Onomat. hist. nat. III. p. 981. *der bahamische Fink*.
Klein, av. p. 97. n. 6. Fringilla bahamenfis.

Klein, Vorbereit. p. 180. n. 6. der Fink von Bahama.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 97. n. 6. bahamischer Fink.

Brisson, ornithol. I. p. 353. n. 43. Pinçon de Bahama.

Büffon, Vögel, XI. p. 156. der schwarz und weiß köpfige Fink; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 270. n. 40. der pomeranzengelbe Fink.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 446. n. 46. Fringilla (Zena) nigra subtus alba, linea supra infraque oculos candida, pectore fulvo, gula macula flava.

Seligmann, Vögel, II. tab. 84. der bahamische Fink.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 181. n. 15. Fringilla (Zena) capite nigro, fascia alba alarum supra infraque oculos, pectore fulvo.

14. LEPIDA. Der havanische Fink.

Müller, Natursyst. II. p. 585. n. 14. der havanische Fink.

Büffon, Vögel, XI. p. 183. der havanische Fink.

Latham, Vögel, II. I. p. 289. n. 67. der artige Fink.

Latham, Syn. Suppl. p. 167. lepid Finch.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 455. n. 73. Fringilla (Lepida) fusco-virens, fascia supra-oculari, infra-oculari gulaque fulvis, pectore nigro.

Hermann, tab. affin. anim. p. 219. Fringilla lepida.

Donndorff, Handb. d. Thiergeesch. p. 370. n. 5. der havanische Fink.

47. CARTHAGINENSIS. Der Fink von Carthagena.

Latham, Syn. Suppl. p. 169. n. 101. *Carthagena Finch.*

Latham, Vögel, II. I. p. 309. n. 99. *der Fink von Carthagena.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 465. n. 108. *Fringilla (Carthaginensis) tota cinerea fusco flavoque marginata, rostro pedibusque pallide fuscis.*

48. AETHIOPS. Der Negerfink. (1)

Latham, Syn. Suppl. p. 165.

Latham, Vögel, II. I. p. 263. n. 21. Var. B.

Latham, Syst. ornith. I. p. 442. n. 25. β . *Fringilla tota nigra, rostro pedibusque concoloribus.*

15. AUTUMNALIS. Der Herbstfink.

Müller, Natursyst. II. p. 585. n. 15. *der Herbstfink.*

Büffon, Vögel, XI. p. 184. *der Herbstfink.*

Latham, Vögel, II. I. p. 288. n. 66. *der Herbstfink.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 455. n. 72. *Fringilla (Autumnalis) virens, pileo ferrugineo, crisco testaceo.*

16. CITRINELLA. Der Citronenfink. (2)

Müller, Natursyst. II. p. 586. n. 16. *der Citronenfink.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 139. n. 4. *der Citronenfink.*

Briffon, ornith. I. p. 357. n. 51. *Serin d' Italie.*

I i 3 Büffon,

(1) Nach Latham eine Varietät von *Fringilla Nitens*, p. 909. n. 49.

(2) Ist nicht mit *Emberiza Citrinella* p. 870. n. 5. zu verwechseln.

Büffon, X. p. 199. 200. 203. der *Verturón*, oder italienische Kanarienvogel. *Citrinlein*, *Zitrichen*; m. 2. Figg. M. u. W.

Latham, Vögel, II. I. p. 288. n. 64. der *Citronen-Fink*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 454. n. 70. *Fringilla* (*Citrinella*) *subvirescens*, dorso fusco-maculato, pedibus incarnatis, corpore subitus flavescente.

Gesner, Vögelb. p. 142. *Citrinlein*; m. e. Fig.

Charleton, onom. zoic. p. 80. n. 7. *Citrinella*.

Fouston, av. p. 101. *Citrinella Gesneri*, quam Galli *Tarin* vocant.

Zinnan. Uov. p. 62. tab. 9. fig. 53. *Verzellino*.

Hermann, tab. affin. anim. p. 220. *Fringilla Citrinella*.

Amusemens innocens, ou le parfait Oiseleur.
p. 42.

17. SERINUS. Der Girlitz. (3)

Müller, Natursyst. II. p. 586. n. 17. der *Grünfink*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 140. n. 6. der *Grünfink*; *Girlitz*; *Hiragrill*.

Ebert, Naturl. II. p. 138. *Hirngrillen*; *Girlitze*.

Halle, Vögel, p. 395. n. 402. das *Kanarienzeichen*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 511. n. 6. der *Hirngrill* (unter den *Loxiis*).

Gesner, Vögelb. p. 143. *Fädemlein*; *Schwäderlein*; *Girlitz*, m. e. schl. Fig.

Brisson, ornith. I. p. 356. n. 50. *Serin*.

Büffon,

(3) Wird im Käfig an 15 Jahr alt; *Gesn.* — *Scopoli* und *Bechstein* zählen ihn des Schnabels halber unter die *Loxias*. —

Büffon verwechselt ihn mit dem Kanarienvogel und dem Citronenfinken, und sieht alle drey als Abänderungen an. — Einige betrachten ihn so gar als einen wild gewordenen Bastard vom Kanarienvogel.

Büffon, Vögel, X. p. 199. 200. *Cini*, *Cinit*, *Cigni*.
p. 201. der grüne Kanarienvogel aus Provence.
p. 203. *Serin*.

Batsch, Thiere, I. p. 351. der eigentliche Grünfink.

Latham, Vögel, II. I. p. 287. n. 63. der Girlitz.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 454. n. 69. *Fringilla* (*Serinus*) *subvirescens*, mandibula inferiore albida, dorso lateribus fusco-maculatis, fascia alarum flava.

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 169. n. 205. der gelbgrüne Dickschnabel.

Naturforsch. XIII. p. 187. *Fringilla Serinus*, vergl. mit XV. p. 158. (4)

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 624. der *Cini*.

Kramer, Austr. p. 368. n. 7. *Fringilla* vertice collo antice pectore et uropygio flavis, dorso virescente; remigibus rectricibusque nigricantibus margine albidis. *Hirn-Grillerl.*

Belon, hist. nat. des ois. p. 354. *Serin*.

Belon, portr. des ois. p. 90. *Serin*; *Senicle*; *Cerisin*; *Cinit*; *Cedrin*.

Fouston, av. p. 101. *Serinus Gesneri*.

Hermann, tab. affin. anim. p. 220. *Fringilla* *Serinus*.

Donndorff, Handb. der Thiergeesch. p. 370. n. 6. der Grünfink; *Girlitz*.

18. SENEGALA. Der senegalische Fink:

Müller, Natur system, II. p. 586. n. 18. der sene-galische Fink.

Brisson, ornithol. I. p. 364. n. 63. *Sénégali rouge*.

(4) Sander und Götz fanden beyde die braunen Flecken auf dem Rücken, und an der Seite nicht. Auch Kramer gedenkt ihrer nicht.

Büffon, Vögel, XI. p. 71. der *Senegali*; rubinfarbene *Senegali*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 303. n. 83. der *Senegalische Fink*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 461. n. 93. Fringilla (*Senegal*) *fusco ferruginea*, vertice subtusque *rufa*, rostro rubro nigro. striato.

β. *Büffon*, IV. p. 100. n. 2. le *Danbick*. *

Büffon, Vögel, XI. p. 72. der *Danbick*.

Latham, Vögel, II. I. p. 304. *Danbik*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 462. n. 93. β.

19. NOCTIS. Der *Nachtfink*. (5)

Müller, Natursyst. II. p. 586. n. 19. der *Nachtfink*.

Briffon, ornith. I. p. 339. n. 23. *Pere noir*.

Büffon, Vögel, X. p. 155. der *schwarze Sperling*, p. 156. *Tohualtototl*.

Latham, Vögel, II. I. p. 262. n. 20. der *Fink mit gelbrothem Kinn*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 441. n. 24. Fringilla (*Noctis*) *nigra*, gula lorisque *rufis*, rostro nigro.

31. MARTINICENSIS. Der *martinikische Fink*. (6)

Latham, Vögel, II. I. p. 312. n. 110. der *Martinikische Fink*.

49. NITENS. Der *glänzende Fink*. (7)

Briffon, ornithol. I. p. 340. n. 24. *Pere noir à bec rouge*.

Büffon,

(5) *Latham* rechnet auch die *Tanagra ruficollis*, p. 894. n. 32. als Varietät höher.

(6) Nach *Latham* eine Varietät vom vorhergehenden, und mit *Tanagra ruficollis* einerley.

(7) Nach *Büffon* eine Varietät von *Fringilla Noctis*, n. 19.

Büffon, Vögel, X. p. 157. der brasiliische Sperling; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 262. n. 21. der glänzende Sperling.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 442. n. 25. Fringilla (Nitens) chalybeo - nigra, rostro pedibusque carneis,

Charleton, onom. zoic. p. 79. n. 13. 2. Passer indicus brachyurus.

Fonston, av. p. 96. Passer indicus brachyurus.

b. Büffon, Vögel, X. p. 156. der cayennische Sperling; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 262. n. 21. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 442. n. 25. β. Fr. tota nigra rostro pedibusque concoloribus. (8)

50. MELANICTERA. Der schwarz- und orange-farbene Fink. (9)

Büffon, Vögel, X. p. 156. der makaische Sperling; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 263. n. 22. der schwarz- und orangefarbige Fink.

Latham, Syst. ornith. I. p. 442. n. 26. Fringilla (Melanictera) nigra, abdomine albo-maculato, alis caudaque ferrugineo-marginatis.

51. MELANOLEUCA. Der weißbrüstige Sperling. (10)

Büffon, Vögel, X. p. 156. der javanische Sperling; m. e. Fig.

Li 5

Latham,

(8) Latham ist noch ungewiss, ob Büffons Moineau de Cayenne als Spielart hieher gehöre; rechnet aber die Fringilla Aethiops, p. 908. n. 48. als Spielart hieher.

(9) Nach Büffon eine Varietät von Fringilla Noctis, n. 19.

(10) Nach Büffon eine Varietät von Fringilla Noctis.

Latham, Vögel, II. I. p. 263. n. 23. der weiß.
brüstige Fink.

Latham, Syst. ornith. I. p. 442. n. 27. Fringilla
(*Melanoleuca*) nigra, fascia pectoris alba.

52. PECORIS. Der Kuhfink.

Briffon, ornith. I. p. 352. n. 41. Pinçon de Vir-
ginie.

Büffon, Vögel, XI. p. 148. der braune Fink.

Pennant, arct. Zool. II. p. 345. n. 158. der Kuh-
fink.

Latham, Vögel, II. I. p. 263. n. 24. der Kuhfink.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 443. n. 28. Fringilla
(*Pecoris*) fusca, subtus dilutior, cauda sub-
forcipata.

Latham, Syn. Suppl. p. 165. Cowpen Finch.

Seligmann, Vögel, II. tab. 68. der braune Sper-
ling.

Donndorff, Händb. der Thiergesch. p. 370. n. 7.
der Kuhfink.

20. SINICA. Der chinesische Fink. (1)

Müller, Natursyst. II. p. 586. n. 20. der chine-
sische Fink.

Briffon, ornith. I. p. 355. n. 47. Pinçon de la
Chine.

Büffon, Vögel, XI. p. 167. der olivenfarbige
Fink.

Latham,

(1) Ist nicht mit *Fringilla Sinensis* p. 915. n. 66. zu verwechseln.

— Im Suppl. p. 161. sagt *Latham*, dass der chinesische *Tanager* p. 897. n. 37. der größten Wahrscheinlichkeit nach, das Weib-
chen von diesem chinesischen Finken sey. Er muss aber in der
Folge seine Meinung wieder geändert haben, denn er führt im
Syst. ornith. nicht nur beyde als verschiedene Gattungen auf,
sondern citirt auch die Stelle aus dem Suppl. nicht. — Cf.
Latb. Vögel, II. I. p. 227.

Latham, Vögel, II. I. p. 271. n. 43. der Chinesische Fink.

Latham, Syst. ornith. I. p. 447. n. 49. Fringilla (Sinica) rufo-olivacea, subtus testacea, remigibus rectricibusque nigris basi luteis.

53. MELANOCEPHALA. Der schwarzköpfige Fink.

Latham, Vögel, II. I. p. 272. n. 45. der schwarzköpfige Fink.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 448. n. 52. Fringilla (Melanocephala) ferrugineo-fusca, capite, iugulo remigibusque nigris, cervice abdomineque albis, rostro rubro.

54. FUSCA. Der braune Fink.

Latham, Vögel, II. I. p. 272. n. 46. der braune Fink.

Latham, Syst. ornith. I. p. 448. n. 53. Fringilla (Fusca) fusca, marginibus pennarum nigricantibus, subtus fusco-alba.

55. NAEVIA. Der weißwangige Fink.

Latham, Vögel, II. I. p. 272. n. 44. der weißwangige Fink.

Latham, Syst. ornith. I. p. 448. n. 51. Fringilla (Naevia) cinerea maculis obscuris, subtus cinerea, genis albis, loris rufis, striga maxillari nigra.

56. EUSTACHII. Der Fink von St. Eustach.

Klein, av. p. 90. n. 15. Passer africanus eximius.

Klein, Vorbereit. p. 167. n. 15. großer Africander.

Klein, verb. Vögelhist. p. 91. n. 14. großer Africander.

Brissón, ornithol. I. p. 356. n. 48. Pinçon de l' Isle de St. Eustache.

Büffon,

Büffon, Vögel, XI. p. 169. der gelbe und rothe Fink.

Latham, Vögel, II. I. p. 272. n. 47. der Fink von St. Eustach.

Latham, Syst. ornith. I. p. 448. n. 54. Fringilla (Eustachii) flava subtus aurantia, macula infra oculos caerulea, alis caudaque rubris.

57. VARIEGATA. Der bunte Fink.

Briffon, ornith. I. p. 356. n. 49. Pinçon varié de la nouvelle Espagne.

Büffon, Vögel, XI. p. 171. der Tuite.

Latham, Vögel, II. I. p. 273. n. 48. der bunte Fink.

Latham, Syst. ornith. I. p. 448. n. 55. Fringilla (Variegata) rubro flavo caeruleo alboque variegata, pectore lutescente-nebuloso, rectricibus apice margine albo.

21. NIVALIS. Der Schneefink. (3)

Müller, Natursyst. II. p. 587. n. 21. der Schneefink.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 187. n. 3. Fringilla (Nivalis) fusca subtus nivea, remigibus secundariis rectricibusque albis; der Schneefink.

Briffon, ornith. I. p. 351. n. 39. Pinçon de neige ou Niverolle.

Büffon, Vögel, XI. p. 142. der Schneefink.

Latham, Vögel, II. I. p. 259. n. 15. der Schneefink.

Latham, Syst. ornith. I. p. 440. n. 19. Fringilla (Nivalis) nigra subtus nivea, remigibus secundariis rectricibusque albis.

Donndorff, Handb. d. Thiergeesch. p. 370. n. 8. der Schneefink.

B. Latham,

(3) Ist nicht mit *Emberiza nivalis* zu verwechseln.

β. Latham, Vögel, II. I. p. 259. n. 15. n. i.

Latham, Syst. ornith. I. p. 440. n. 19. β. Fr. hy-
pochondriis nigro striatis, rectricibus extimis
macula cuneiformi alba.

58. MONTICOLA. Der kanadische Bergfink. (4)

Pennant, arct. Zool. II. p. 347. n. 163. der Baum-
fink; Feldsperling.

Brisson, ornith. I. p. 335. n. 15. Moineau de Ca-
nada.

Büffon, Vögel, X. p. 187. der kanadische Sper-
ling.

Latham, Vögel, II. I. p. 260. n. 16. der Berg-
sperling.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 434. n. 3. Fringilla
(Canadenlis) castaneo et griseo - fusco varia,
subtus cinerascens, macula ad basin rostri ru-
fescente, fascia alarum duplii alba.

59. CAPSA. Der Dattelsperling.

Büffon, Vögel, X. p. 161. der Dattelsperling.

Latham, Vögel, II. I. p. 260. n. 17. der Dattel-
sperling; Capsa-Fink.

Latham, Syst. ornith. I. p. 440. n. 2. Fringilla
(Capsa) rufa grisea, facie gulaque alba, alis
caudae nigris, cauda fo: sicata.

Shaw, Reis. p. 164. der Capsa-Sperling.

Sammel. zur Phys. u. N. G. II. p. 624. der Dat-
telsperling.

60. AR-

(4) Ich finde bey Pennant in der arctischen Zoologie alle in un-
serm System hier und bey *Fringilla montana*, p. 925. n. 37.
bemerkte Synonymen zusammen gezogen; gleichwohl scheint
Pennant beyde für verschiedene Gattungen zu halten. Da er
aber so sehr viel Aehnlichkeit mit unserm *Feldsperling* hat, so
hat er die wenigen Veränderung vielleicht dem Clima zu
 danken, und ist weiter nichts als die amerikanische Art unsers
Feldsperlings.

60. ARCUATA. Der Halbmondfink.

Briffon, ornith. I. p. 336. n. 16. Moineau du cap de bonne espérance.

Büffon, Vögel, X. p. 194. der kapsche Sperling oder Kernbeisser; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 269. n. 18. der Halbmond Fink.

Latham, Syst. ornith. I. p. 440. n. 21. Fringilla (Arcuata) castanea, subtus alba, capite colloque inferiore nigris, torque taeniaque pone oculos albis.

61. ELEGANS. Der schöne Fink.

Büffon, Vögel, X. p. 179. der bunte afrikanische Sperling; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 261. n. 19. der schöne Fink.

Latham, Syst. ornith. I. p. 441. n. 22. Fringilla (Elegans) supra viridis collo cinereo, pectore flavo, capistro gula uropygio caudaque rubris, abdomine maculis lunatis albis.

62. BUTYRACEA. Der gelbe Fink. (5)

Müller, Natursyst. II. p. 587. n. 22. der indianische Grünling.

Onomat. hist. nat. III. p. 671. der indianische Grünling.

Klein, av. p. 89. ad. n. 13.

Klein, Vorbereit. p. 167. ad n. 13. in fin.

Klein, verb. Vögelhist. p. 91. ad n. 13.

Briffon, ornith. I. p. 360. n. 55. Verdier des Indes.

Büffon, Vögel, XI. p. 251. der indianische Grünling; m. e. Fig.

Latham,

(5) Ist wahrscheinlich doch wohl mit *Loxia butyracea*, p. 855. einherley. Latham rechnet so gar Büffons *Vert brûnet*, und *Verdier du Cap de b. E.* zu *Loxia butyracea*.

Latham, Vögel, II. I. p. 289. n. 68. der gelbe Fink.

Latham, Syst. ornith. I. p. 455. n. 74. Fringilla (Butyracea) virens, superciliis pectore abdomineque flavis, remigibus primoribus margine exteriori albis.

Seligmann, Vögel, II. tab. 63. der indianische Grünling.

Bankroft, N. G. von Guian. p. 109. der guianische Grünling.

Hermann, tab. affin. anim. p. 220. Fringilla butyracea.

23. CANARIA. Der Kanarienvogel. (6).

Müller, Natursyst. II. p. 587. n. 23. der Canarienvogel; tab. 25. Fig. 7.

Leske, Naturgesch. p. 263. n. 4. der Kanarienvogel.

Borowsky, Thierreich, III. p. 141. n. 7. der Canarienvogel.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 188. n. 6. Fringilla (Canaria) rostro corporeque albo-flavescente, rectricibus remigibusque virescentibus; der Canarienvogel, ehedem Zuckervöglein.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 521. n. 9. der Canarienvogel.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 895. der Kanarienvogel.

Funke, Naturgesch. I. p. 260. der Kanarienvogel.

Ebert, Naturl. II. p. 137. der Canarienvogel, Canariensperling, Zuckerspatz.

Halle, Vögel, p. 369. n. 364. der Kanarienvogel.

Meyer, Thiere, II. tab. 32. Kanarienvogel.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 409. n. 346. der Canarienvogel.

Neuer

(6) Gewicht 220. Gran Halle.

- Neuer Schäapl. d. Nat. II. p. 23. *Canarienvogel.*
 Onomat. hist. nat. II. p. 490. *Canarienvogel.*
 Handb. der Naturgesch. II. p. 239. *Canarienvogel.*
 Handb. der deutsch. Thiergeesch. p. 132. *Canarienvogel.*
Klein, av. p. 88. n. 3. *Passer canarius.* *Avis canaria.*
Klein, Vorbereit. p. 164. n. 3. *der kanarische Sperling.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 90. n. 3. *Canariensperling.*
Klein, Steininat. av. p. 17. tab. 18. Fig. 3. a. b.
Brisson, ornith. I. p. 358. n. 52. *Serin des Canaries.*
Büffon, Vögel, X. p. 195. *der Kanarienvogel;*
 m. 2. Figg. M. u. W.
Batsch, Thiere, I. p. 351. *der Canarienvogel.*
Latham, Vögel, II. I. p. 284. n. 62. *der Canarienvogel.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 454. n. 68. *Fringilla (Canaria) rostro corporeque albo - flavicante,
 remigibus rectricibusque virescentibus.*
Bock, Naturgesch. von Preuss. IV. p. 427. *der Canarienvogel.*
Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 4. *Kanarienvogel.*
Beckmann, Naturhist. p. 54. d. *der Kanarienvogel.*
Döbel, Jägerprakt. I. p. 68. *Canarienvogel.*
 Naturforsch. XVII. p. 94. n. 190. *der Canarienvogel.*
Wirsing, Vögel, tab. 18. et 29. *Canarien-Vogel.*
Zorn, Petinotheol. II. p. 356. *der Canarien-Vogel.*
Oekonom. Zool. p. 100. n. 45. *der Kanarienvogel.*

Her.

- Hervieux*, traité des Serins des Canaries. Par. 1713. 12.
- Hervieux*, Nachricht von den Canarienvögeln. Nürnb. 1771. 8.
- Unterricht von den verschiedenen Arten der Canarienvögel und der Nachtigallen. Fr. u. Lpz. 1772. 8. m. K.
- Beckmann*, Beytr. zur Gesch. der Erfind. I. p. 562. *Canarien-Vögel.*
- Beckmann*, Bibl. IV. p. 468. VI. p. 476. *Canarienvogel.*
- Sammel. zur Phys. u. N. G. II. p. 624. *der Canarienvogel.*
- Borkhausen*, Magaz. I. p. 153. n. 18. *Canarienfink.*
- Lichtenberg*, Magaz. für das Neueste, etc. I. 3. p. 63.
- Anweis. Vögel zu fangen, p. 124. 608.
- Angenehme Landlust, p. 349—406.
- Angenehm. Zeitvertreib, p. 47. sqq.
- Coler*, oeconom. rural. et domest. Fr. 1680. fol. * I. p. 621.
- Allgem. Gesch. von Amerika mit *Baumgartens* Vorr. I. p. 557.
- Barrington*: philos. transact. LXIII. p. 249.
- Krünitz*, Encycl. VII. p. 576. *Canarien-Vogel.*
- Smellie*, Philos. der Naturgesch. I. p. 182.
- Amusemens innocens*, p. 51. 61.
- Journal encycl. 1773. p. 538.
- Gazette litter. de Berlin, 1773. p. 230.
- Bresl. Samml. VII. Vers. Febr. 1719. p. 193. Vom Canarienvögel-Handel.
- H. B. D.* kurze doch gründliche Nachricht von den Canarienvögeln. — Stuttg. select. phys. oeconom. 1749. I. p. 65.
- Abhandl. von den Canarienvögeln, aus dem XIV. B. des englischen kurzen Systems der natürliche. II. Band II. Th.
- Kk Geschich.

Geschichte, p. 156. — Hannöv. gel. Anz. 1754. St. 90.

Von der Canarienvögeln Zucht und Lust. — Lpzg. Samml. 1758. St. 155. p. 933.

Neue lustige und vollständige Jagdkunst, so wohl von den Vögeln als auch andern Thieren, nebst einer Nachricht von den Canarienvögeln. Leipz. 1760. 8.

Eine Erfahrung über die Krankheit der Canarienvögeln. Wittenb. Wochenbl. 1769. p. 350.

Le Serin de Canarie; Poème, p. Mr. l'Abbé B. Lond. 1755. 8.

Acanthides Canariae s. Spini; gallice les Serins. Carmen Auth. Joh. Lud. Clairambault. Paris, 1737. 8.

Von den Canarienvögeln, nach Anleitung eines lateinischen Gedichts des Herrn Clairambault. Phys. ökonom. Patriot. Hamb. 1758. 4. p 203.

Lut. Schroetkii obs. de raro passerum canariensium colore. Misc. nat. cur. A. 1675. et 76. obs. 230.

Naturgesch. der schönsten Vögel, p. 65.

Goeze, nützl. Allerl. II. p. 389.

Von den Krankheiten und Kur der Canarienvög. — Neues berlin. Intelligenzbl. 1785. p. 1693.

Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 56. *Canaria*.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 30. n. 9. *Canaria*.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 181. n. 18. *Fringilla (Canaria) rostro corporeque albicaute, rectricibus remigibusque virescentibus*.

Briinniche, ornith. bor. p. 69. n. 259. *Fringilla Canaria*.

Charleton, onom. zoic. p. 79. n. 12. *Passer Canarius*.

Schwenckfeld, av. Siles. p. 298. *Luteola Canaria. Canaria avicula. Citrina canariensis. Avicula faccha-*

saccharina. Canarien-Vogel; Zucker-Vogel;
Canarien-Zeisle.

Rzaczynsky, hist. nat. Pol. p. 303. Passer Ca-
narius.

Fonston, av. p. 98. Passer Canarius.

Zinnan. Uov. p. 60. tab. 8. Fig. 49. tab. 9. Fig. 50.
Passere di Canaria.

Hist. Prov. I. p. 512. Serin des Canaries.

Hermann, tab. affin. anim. p. 220. Fringilla Ca-
naria.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 371. n. 9.
der Kanarienvogel.

β. Buffon, Vögel, X. p. 274. der Zeifig von Mo-
zambique; m. 2. Figg.

Latham, Syn. II. 1. p. 296. n. 62. Var. A.

Latham, Vögel, II. 1. p. 286. n. 62. Var. A. der
Fink von Mozambik.

Latham, Syst. ornith. I. p. 454. n. 68. β.

γ. Brisson, ornith. I. p. 258. n. 52. A. Serin mulet.

Buffon, Vögel, X. p. 208.

24. FLAVEOLA. Der Saffranstirnige Fink. (7)

Müller, Natursyst. II. p. 589. n. 24. der Gelbfink.

Latham, Vögel, II. 1. p. 288. n. 65. der saffran-
stirnige Fink.

Latham, Syst. ornith. I. p. 455. n. 71. Fringilla
(Flaveola) flava, dorso virescente, fronte ful-
va, remigibus rectricibusque nigris, flavo-mar-
ginatis.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 428. der Gelbsinke,
Graufinke, Goldfinke.

25. SPINUS. Der Zeifig. (8)

Müller, Natursyst. II. p. 598. n. 25. der Zeifig.

Kk 2 Leske,

(7) Latham vermutet, es sey ein Bastardvogel.

(8) Nistet in Schwarzwäldern, besonders in Fichtenwäldern auf
den äußersten Spitzen der hohen Zweige, seltener auf Erlen-
bäumen

Leske, Naturgesch. p. 363. n. 5. der *Zeisig*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 142. n. 8. der *Zeisig*.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 188. n. 7. *Fringilla (Spinus) reinigibus medio luteis: primis quatuor immaculatis, rectricibus basi flavis, apice inigris; der Zeisig; Erlenfink.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 520. n. 8. der *Zeisig*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 594. der *grüne Hänfling oder Zeislein*.

Funke, Naturgesch. I. p. 268. der *Zeisig*.

Ebert, Naturl. II. p. 139. der *Zeisig*. *Ziesel*; *Zießchen*, *grüne schwarzplattige Hänfling*.

Halle, Vögel, p. 393. n. 400. das *Zeischen*.

Meyer, Thiere, II. tab. 76. *Zeistein*.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 410. n. 347. der *Zeisig*; *Zeißig*; *Zinsle*; *Ziesel*; *Zifng*; *Erlenfink*; *Zeisgen*; *Ziesgen*; *Zeislein*; *Zischen*, *Zeischen*; *Zeisichen*.

Beckmann, Naturhist. p. 54. e. das *Zeisgen*.

Pen-

bäumen, die an Wäldbächen stehen. Das Nest ist auswendig mit Puppengehülsen und haarigem Corallenmoos an den Zweig befestigt. Auswendig sind einige Reischen und Würzelchen mit diesen Haarflechten, Distelbüsten und Pflanzenwolle verwebt, und die inwendige Fütterung besteht aus ganz kleinen Würzelchen. Uebrigens ist es sehr gut gebauet und halbkugelförmig. Dass sehr selten ein solches Nest gefunden wird, kommt wohl ohnstreitig daher, weil es nicht nur sehr hoch angelegt, sondern auch klein und von den Blättern und Zweigen, besonders in der Entfernung schwer zu unterscheiden ist. Daher sagt auch *Kramer*, dass man in den Waldungen an der Donau junge Zeisige zu tausenden anträfe, bey denen die ersten Federn noch nicht verloren gegangen, und dass es doch selten sey, Junge im Neste zu finden. Das Weibchen legt 5. bis 6. weissgrüne Eyer Brütet wahrscheinlich mehrmals im Jahre. — Das Männchen begartet sich gern mit der Kanariensie. So auch umgekehrt. — Wird etwa 10 Jahr alt. — Das Fleisch ist fett und wohlschmeckend. — In Preussen fängt man oft viele tausende.

Pennant, arch. Zool. II. p. 357. I. der Zeifig.
Neuer Schaupl. d. N. III. p. 617. X. p. 166.
Zeifig.

Onomat. hist. nat. VII. p. 259. der Zeifig.

Handb. der Naturgesch. II. p. 228. der Zeifich.

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 131. Zeifig.

Klein, av. p. 94. n. 6. *Linaria viridis*.

Klein, Vorbereit. p. 174 n. 6. *Zeisgen*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 99. n. 6. *Zeisichen*.

Klein, Stemmat. av. p. 20. tab. 18. Fig. 4. a—c.

Gesner, Vögelb. p. 555. *Zinslein*; *Zeiselein*; *Ziesel*; *Zischen*; *Gelbvogel*; *Sisgen*; m. e. Fig.

Brisson, ornith. I. p. 325. *Tatin*.

Büffon, Vögel. XI. p. 321. der *Zeifig*; m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 355. der *Zeifig*.

Latham, Syn. Suppl. p. 166. *Siskin*.

Latham, Vögel, II. 1. p. 281. n. 58. der gemeine *Zeifig*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 452. n. 65. *Fringilla (Spinus) reinigibus medio luteis, primis quatuor immaculatis, rectricibus basi flavis, apice nigris.*

Beseke, Vögel Kurl. p. 79. n. 173. der *Zeifig*.

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 118. n. 4. der *Zeifig*, *Ziesk*.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 428. das *Zeischen*.

Cetti, Sardin. II. p. 205. der *Zeifig*.

Fischer, Lvl. p. 99. n. 155. *Zeifig*.

Pontoppidan, Norweg. II. p. 178. *Süsgen*.

Pennant, britt. Thiergesch. p. 125. n. 6. tab. 57. Fig. 5. *Zeischen*.

Pallas, nord. Beytr. III. p. 15. *Zeifige*.

Linné, Abhandl. II. p. 304. n. 130. der *Zeifig*.

Storr, Alpenreise, I. p. 79. *Zeifig*.

Scopoli, Beitr. a. d. N. G. I. p. 175. n. 212. das *Zeisein*.

Döbel, Jägerprakt. I. p. 65. *Zeisig*.

Naturforsch. XVII. p. 95. n. 192. der *Zeisig*. XXV.
der *Strumpfweber*.

Naumann, Vogelsteller, p. 68. der *Zeisig*. p. 71.
der *Strumpfweber*.

Zorn, Petinotheol. II. p. 352. das grün-gelbe
Zeislein.

Onomat. forestal. I. p. 752. *Erlenfinke*.

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 635. der *Zeisig*.

André u. Bechstein, Spazierg. II. p. 385. 390.
Zeisig.

Oekonom. Zool. p. 100. der *Zeisig*.

Hamb. Magaz. XVIII. p. 243.

Dresdner Magazin, I. p. 7. tab. I. (Ein Nest mit
6. Eyern.)

Goeze, nützl. Allerl. II. p. 389. n. II. der *Zeisig*.

Krünitz, Encycl. XIII. p. 419. *Erlenfink*.

Schles. ökonom. Gesellsch. 1781. p. 103. *Fringila*
Spinus.

Meidinger, Vorlesung. I. p. 150. n. 5. der *Zeisig*.

Eberhard, Thiergesch. p. 79. der *Zeisig*.

Jablonsky, allgem. Lex. p. 1430. *Zeislein*.

Anweis. Vögel zu fang. p. 578. das *Zeislein*.

Loniceri, Kräuterb. p. 683. *Zeislein*.

Hannöv. neue gesellsch. Erzähl. IV. p. 138.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 30. n. 8. *Spinus*.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 181. n. 19. *Fringilla* (*Spinus*) remigibus medio luteis; primis
quatuor immaculatis, rectricibus basi flavis, api-
ce nigris.

Kramer, Austr. p. 366. n. 2. *Fringilla* remigibus
medio luteis; primis quatuor immaculatis, re-
tricibus duabus extimis, reliquisque apice al-
bis; *Zeisel*; *Zeiserl*.

Charleton, exercitat. p. 87. *Spinus* seu *Ligurinus*.

Charleton, onom. zōic. p. 79. n. 2. *Spinus seu Ligurinus*.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 297. *Luteola germanica*. Χλωρίς Euberi et Peuceri. *Serinus quasi Syren*. *Seris*. *Citrina*. *Zeifich*, *Zeisel*; *Zeisgen*; *Zensle*; *Zifse*.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 420. *Spinus seu Ligurinus*; *Serinus*; *Citrina*; *Luteola*; *Zizela*.

Fonston, av. p. 94. *Acanthis*.

Belon, hist. nat. des ois. p. 355. Θεαυπίς. *Traupis*, *Tarin*.

Barrere, ornith. p. 57. *Carduelis virescens*, capite et alis nigris.

Salerne, hist. nat. des ois. p. 288.

Roman, ornith. p. 118. tab. 18. Fig. 2.

Histoire. Prov. I. p. 513.

Levin, britt. Birds. II. tab. 82.

Romare, diction. VIII. p. 431. *Tarin*.

Hermann, tab. affin. anim. p. 220. *Fringilla Spinus*.

Dondorff, Handb. d. Thiergesch. p. 371. n. 10. der *Zeifig*.

β. Der schwarze Zeifig.

Klein, av. p. 93. n. 5. *Linaria f. Luteola nigra*?

Klein, Vorbereit. p. 174. n. 5. *schwarzer Hälfing*?

Klein, verbess. Vögelhist. p. 99. n. 5. *schwarzer Häfling*?

Briffon, ornithol. I. p. 325. A. *Tarin noir*.

Buffon, Vögel, XI. p. 340. *der schwarze Zeifig*.

Latham, Syn. II. I. p. 291. n. 58. Var. A.

Latham, Vögel, II. I. p. 283. n. 58. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 453. n. 65. β.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 297. *Luteola nigra*.

γ. Der Zeisig von Neuyork. (9)

Pennant, arct. Zool. II. p. 346. n. 160. *der Zeisig von Neuyork.*

Büffon, Vögel, XI. p. 338. *der neuyorksche Zeisig;* m. 2. Figg. M. u. W.

Latham, Syn. II. I. p. 291. n. 58. Var. B.

Latham, Vögel, II. I. p. 283. n. 58. Var. B.

Latham, Syst. ornith. I. p. 452. n. 64. β. *Fringilla olivaceo-fusca, subtus alba, collo, pectore uro-pygioque flavis, remigibus rectricibusque nigris, albo marginatis.*

δ. Der olivenfarbige Zeisig.

Büffon, Vögel, XI. p. 339. *der olivenfarbne Zeisig.*

Latham, Syn. II. I. p. 291. n. 58. Var. C.

Latham, Vögel, II. I. p. 283. n. 58. Var. C.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 453. n. 65. γ.

ε. Der schwarzbrüstige Zeisig. Bechst. *

Latham, Vögel, II. I. p. 283. not. m. Var. B.

ζ. Der bunte Zeisig. Bechst. *

Latham, Vögel, II. I. p. 284. not. o. Var. C.

η. Der weiße Zeisig. Bechst. *

Latham, Vögel, II. I. p. 284. not. o. Var. D.

ς. Der Bastardzeisig?

Büffon, Vögel, XI. p. 337. *der Bastardzeisig.*

62. MEXI-

(9) In der ersten Ausgabe des arct. Zool. giebt *Pennant* diesen Zeisig von Neuyork für eine eigne Gattung aus. In der neuen Ausgabe 1792. aber versichert er, dass er mit *Fringilla Tristis*, p. 907 n. 12. einerley sey. *Latham* hat ihn in der Synops. als Varietät vom Zeisig, im Syst. ornith. aber ebenfalls als Spielart vom amerikanischen *Stieglitz* aufgeführt.

62. MEXICANA. Der mexicanische Zeisig.

Brisson, ornithol. I. p. 326. n. 5. Tarin du Mexique.

Büffon, Vögel, XI. p. 342. der Acatechili.

Latham, Vögel, II. I. p. 284. n. 59. der Mexikanische Zeisig.

Latham, Syst. ornith. I. p. 453. n. 66. Fringilla (Mexicana) fusco - virescens, subtus albida.

Fernandez, hist. av. nov. Hisp. c. 13. Acatechichili seu avis confricans se ad arundines.

63. CATOTOL. Der schwarze mexicanische Zeisig.

Brisson, ornithol. I. p. 326. n. 6. Tarin noir du Mexique.

Büffon, Vögel, XI. p. 341. der Catotol.

Latham, Vögel, II. I. p. 284. n. 60. der schwarze Mexikanische Zeisig.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 453. n. 67. Fringilla (Cacatototl) nigricante fulvoque varia, subtus candida.

Fernand. nov. Hisp. c. 197. Cacatototl.

64. BARBATA. Der bärtige Fink.

Molin. N. G. von Chili, p. 219. der Siu; Span. Gilghero.

Latham, Vögel, II. I. p. 312. n. III. der bärtige Fink.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 456. n. 76. Fringilla (Barbata) lutea, alis viridibus, nigro rubroque maculatis, gula barbata.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 372. n. II. der Siu.

65. DIUCA. Der Diuka.

Latham, Vögel, II. I. p. 313. n. II2. der Diuka-Fink.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 456. n. 77. Fringilla
(Diuca) caerulea gula alba.

66. SINENSIS. Der chinesische Zeisig. (10)

Latham, Vögel, II. I. p. 284. n. 61. der Chine-
sische Zeisig.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 477. n. 50. Fringilla
(Asiatica) olivacea subtus flava, capite nigro,
tectricebus alarum minoribus fasciis duabus ni-
gris, remigibus rectricibusque nigris, basi fla-
vis.

Somnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 157. der
chinesische Tarrain.

26. FLAMMEA. Der Brandfink. (1)

Müller, Natursyst. II. p. 590. n. 26. der Brand-
fink.

Pennant, archt. Zool. II. p. 354. D. der feuerfar-
bige Fink.

Onomat. histor. natur. III. p. 375. der rothgehaubte
Fink.

Klein, Vorbereit. p. 174. n. 5. schwarzer Häuf-
ling?

Klein, verbess. Vögelhist. p. 99. n. 5. schwarzer
Hänfling?

Briffon, ornithol. I. p. 349. n. 36. E. Pinçon
hupé.

Büffon, Vögel, XI. p. 110. der Brandfink.

Latham,

(10) Ist nicht mit *Fringilla Sinica* p. 910. n. 20. zu verwechseln.

(1) Nach *Briffon* eine Varietät von *Fringilla Coelebs*. — *Kleins Luteola nigra* rechnet *Briffon* zur Var. β von *Fringilla Spinus*. *Latham* ist ihm hierin gefolgt, führt aber den *Klein* bey *Fringilla flammea* ebenfalls an. Eins ist wohl ein Schreibfehler: — *Limné* hat zwar schon in der X. Edition *Kleins Luteola nigra* zu seiner *Fringilla flammea* gerechnet. Aber *Klein* sagt von dem Vogel nichts weiter, als dass er *verticem flavicantem* habe, und beruft sich auf *Schwenckfeld*. Wohin soll nun das Synonym gehören?

- Latham, Vögel, II. I. p. 253. n. II. *der rothhau-
lige Fink*, tab. 48. fig. I.
- Latham, Syst. ornithol. I. p. 438. n. 13. Fringilla
(Flavimea) fusca, crista flammnea, corpore sub-
tus roseo.
- Beske, Vögel Kurl. p. 79. n. 174. *der Brand-
fink?*
- Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 428. *der Brand-
finke.*
- Naturforsch. XVII. p. 95. n. 193. *der Brand-
fink.*
- Korkhausen, Magazin, I. p. 158. n. 20. *schwarzer
Hälfing; Brandfink.*
- Linne, Syst. Nat. Edit. VI. p. 30. n. 2. Fringilla
crista flammnea.
- Linne, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 182. n. 20. Frin-
gilla(Flammea) fusca, crista flammnea.

27. FLAVIROSTRIS. *Der gelbschnäbige Fink. (2)*
- Müller, Natursyst. II. p. 915. n. 27. *der Gelbschna-
bel.*
- Pennant, arct. Zool. II. p. 353. A. *der arctische
Fink.*
- Onomat. histor. natur. IV. p. 176. *der braune
Riset.*
- Brisson, ornithol. I. p. 348. n. 36. B. *Pinçon
brun.*
- Büffon, Vögel, XI. p. 108. *der gelbschnäbliche
Fink.*
- Latham, Vögel, II. I. p. 254. n. 12. *der Arktische
Fink.*
- Latham, Syst. ornithol. I. p. 438. n. 16. Fringilla
(Flavirostris) fusca, rostro flavicante, pennis
pectore apice roseis, cauda subforcipata.
- Fischer, Liv. p. 99. n. 156. *Gelbschnabel.*

Pallas,

(2) Nach Brisson eine Varietät von *Fringilla Coelebs*.

Pallas, Reis. Ausz. II. Anh. p. II. n. 21. *Fringilla flavirostris* Lin.

Borkhausen, Magazin, I. p. 158. n. 21. *Gelbschnabel*.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 30. n. 3. *Fringilla fusca*.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 182. n. 21. *Fringilla (Flavirostris) fusca*, rostro flavicante.

28. CANABINA. Der Bluthänfling. (3)

Müller, Natursystem, II. p. 590. n. 28. *der Hänfling*.

Leske,

(3) Bey dieser und den 4. folgenden Gattungen findet nicht nur eine grosse Verwechslung der Synonymen statt, sondern es scheint auch nach neuern Bemerkungen noch nicht ganz ausgemacht, ob dies wirklich lauter verschiedene Gattungen oder zum Theil nur Spielarten sind. Die auffallende Verschiedenheit in den Farben der Hänflingsmännchen, die blos im Alter und in der Jahrszeit ihren Grund hat, hat zu grossen Verwirrungen Anlass gegeben. Bechstein hat aus vieljährigen Beobachtungen und Erfahrungen es neuerlich sehr wahrscheinlich gemacht, dass die *Fringilla Canabina*, *Linota*, und *Montium* ein und eben derselbe Vogel sind, und auch *Fringilla Argentoratensis* als Spielart hieher gehöre. Ihm nach ist denn die *Fringilla Canabina* ein altes Männchen des gemeinen Hänflings, oder der *Linota*; und die *Fringilla montium* ein einjähriges Männchen, so im gemeinen Ausdruck *grauer Hänfling*, *Weißhänfling*, *Mehlhänfling* heisst, dahingegen jenein, wenn es wenigstens 3. Jahr alt ist, der Name *Bluthänfling* zukommt. — *Steinhänfling* oder *gelber Hänfling*, ist der graue Hänfling nach dem zweyten Mausern. S. *Lath. Vögel*, II. 1. p. 292. not. 9. — Den *Bluthänfling* und *gemeinen Hänfling* hat schon Zorn für einerley gehalten; und Buffon ist gleichfalls der Meinung, dass der *Steinhänfling* (*Fr. montium*) nur als Abart hieher gerechnet werden möge. So viel ist gewiss, dass die rothe Farbe der Kopfplatte und der Brust sich im Zustande der Gefangenschaft bey ersten Mausern verlieret, und nie wiederkommt, und dass sie bey denen, die jung in die Stube gebracht werden, niemals zum Vorschein kommt. — Der Vogel soll über 16. Jahr alt werden.

Leske, Naturgesch. p. 263. n. 6. *der Hänfling*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 142. n. 9. *der Hänfling*.

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 189. n. 8. *Fringilla (Canabina) reinigibus primoribus rectricibusque nigris, utroque margine albis; der Hänfling; Leinfink; die Artsche*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 518. n. 6. *der Hänfling*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 593. *der Bluthänfling*.

Funke, Naturgesch. I. p. 264. *der Bluthänfling*.

Ebert, Naturl. II. p. 138. *Hänfling; Flachsfinke*.

Halle, Vögel, p. 390. n. 395. *der Karminhänfling*.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 411. n. 348. *Hänfling; Brauhänfling; Grauhänfling; Steinhänfling; Leinfink; Artsche*.

Neuer Schäapl. der Nat. III. p. 615. *Hänfling*.

Onomat. hist. nat. III. p. 671. *der grosse Hänfling; Stockhänfling*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 352. n. 178. *der größere Rothkopf; Hänfling*.

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 131. *Hänfling*.

Klein, av. p. 93. n. 1. *Linaria simpliciter*.

Klein, Vorbereit. p. 173. n. 1. *Bluthänfling; blutrothe Brüstling; Flachsfinke; Krauthänfling*.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 99. n. 1. *Bluthänfling*.

Klein, stemmat. av. p. 18. tab. 18. fig. 8. a. b.

Klein, Vögeleyer, p. 29. tab. 9. fig. 13.

Brisson, ornithol. I. p. 343. n. 30. *grande Linotte de vigues*.

Büffon, Vögel, XI. p. 5. *der Bluthänfling; m. e. Fig.*

Batsch,

Batsch, Thiere, I. p. 353. *der Bluthänfling*.

Lathain, Syn. Suppl. p. 167. *greater Redpole*.

Latham, Vögel, II. I. p. 294. n. 74. *der Bluthänfling*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 458. n. 82. *Fringilla (Canabina) fusco-castanea*, subitus albo-rufescens, fascia alarum longitudinali alba, macula verticis pectoreque rubris.

Beseke, Vögel Kurl. p. 79. n. 176. *der Hänfling*.

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 119. n. 5. *der Bluthänfling; Rothböster; Hemperling*.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 429. *der Hänfling*.

Fischer, Liv. p. 99. n. 157. *Bluthänfling*.

White, N. G. von Engl. p. 24. *Hänfling*.

Pallas, Reis. Ausz. III. p. 475. *Bluthänfling*.

Linné, Abhandl. II. p. 304. n. 131. *der Hänfling*.

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 48. *der Hänfling*.

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 180. n. 219. *der Hänfling; Flachsink*.

Zorn, Petinotheol. II. p. 338. *der Hänfling oder Leinfink*.

Döbel, Jägerprakt. I. p. 63. *Hänfling*.

Naumann, Vogelsteller, p. 70. *Hänfling*.

Hervieux, Canarienvög. p. 146. *Hänfling*.

Naturgesch. der schönsten Vögel, p. 26. *Hänfling*.

Naturforsch. XVII. p. 96. n. 195. *der rothbrüstige Hänfling; Krauthänfling*.

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 627. *der Bluthänfling*.

André u. Bechstein, Spazierg. IV. p. 61. 65. 132.
136.

Günther, Nest. u. Ey. tab. 58. *Hänfling*.

Anweis. Vögel zu fang. p. 284. *Hänfling*.

Forst. Fisch.-u. Jagdlex. II. p. 26. *Hänfling*; *Hanf-finke*; *Flachsfinke*.

Krünitz, Encycl. XX. p. 686. *Hänfling*.

Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 56. *Linaria rubra*.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 30. n. 10. *Linaria maior*.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 182. n. 22. *Fringilla (Canabina) remigibus primoribus rectricibus que nigris, utroque margine albis*.

Kramer, Austr. p. 368. n. 8. *Fringilla remigibus nigris: primoribus margine utroque albis; rectricibus nigris, utroque margine albis. Hanef-ferl; Hämpfling*.

Charleton, enom. zoic. p. 80. n. 6. 2. *Linaria marina* Aldrovandi.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 295. *Linaria mitior*.
Henfling; *Krauthenfling*.

Fonston, av. p. 99. *Linaria marina*.

Rzaczynsky, aust. hist. nat. Polon. p. 390. *Linaria rubra maior*.

Faun. Arragon. p. 87.

Levin, britt. Birds, II. tab. 84.

Hermann, tab. affin. anim. p. 220. *Fringilla cana-bina*.

Döndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 372. n. 12.
der *Hänfling*.

β. Der weiße Hänfling. *

Büffon, Vögel, XI. p. 31. n. 1.

Latham, Vögel, II. 1. p. 293. n. 4.

Zorn, Petinotheol. II. p. 52.

Naturforsch. XIX. p. 86.

γ. Der schwarze Hänfling. *

Latham, Vögel, II. 1. p. 293. n. 5.

Naturforsch. II. p. 2. n. 3.

♂. *Der Hänfling mit schwarzen Füßen, grünlichem Schnabel, und gabelförmigem Schwanz.* *

Büffon, Vögel, XI. p. 31. n. 2.

Latham, Vögel, II. 1. p. 294.

♀. *Der Bastardhänfling.* *

Latham, Vögel, II. 1. p. 293. n. 6.

67. LINOTA. *Der gemeine Hänfling.* (4)

Briffon, ornith. I. p. 343. n. 29. Linotte.

Büffon, Vögel, XI. p. 13. *der gemeine Hänfling*, p. 14. *der graue Hänfling*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 291. n. 73. *der gemeine Hänfling*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 457. n. 81. *Fringilla (Linota) fusco-eastanea*, subitus albida, fascia alarum longitudinali alba, rectricibus nigris, marginibus undique albis.

Halle, Vögel, p. 392. n. 398. *der gemeine graue Hänfling, ohne Karmin.*

Cetti, Sardin. II. p. 202. *der braune Hänfling?*

Beseke, Vögel Kurl. p. 79. ad n. 176. *einfärbig brauner Hänfling.*

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 120. n. 5. β. *der graue Hänfling.*

Borkheusen, Magazin, I. p. 156. n. 23. *gemeiner grauer Hänfling; gemeiner Hänfling.*

Gesner, Vögelb. p. 367. *Linaria. Leinfink; Schöfflein; Flachsfinke; Henffling; Rubin.* Fig. p. 368.

Charleton, onom. zoic. p. 80. n. 6. *Linaria.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 294. *Linaria. Henffling; Leinfinke; Flachs-Finke.*

Sibbald, Scot. prodr. P. II. L. 3. p. 18. *Linaria vulgaris.*

Rzaczynsky, auch hist. nat. Polon. p. 390. *Linaria; Aegithus; Miliaria; Linota; Papaverina.*

Zonston,

(4) S. die vorhergehende Anmerkung.

Jonston, av. pag. 99. Linaria.

Belon, ois. p. 356. Arydos; Salus. Linotte; Leinotte; Lunotte; Linette.

Barrere, ornithol. p. 55. Passer ex cinereo bae-ticus.

Zinnan. Uov. p. 61. tab. 9. fig. 51. Fanello.

Hist. Prov. I. p. 511.

Levin, britt. Birds. II. tab. 83.

29. LINARIA. Der Flachs-fink.

Müller, Natursystem, II. p. 591. n. 29. der Flachs-fink.

Leske, Naturgesch. p. 264. n. 7. der kleine roth-plättige Hänfling.

Borowsky, Thierreich, III. p. 143. n. 10. der Flachs-fink; Citrinchen; Ziferinchen.

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 189. n. 9. Fringilla (Linaria) remigibus rectricibusque fuscis, in margine obsolete pallido, litura alarum albida; das Citrinchen; Gräseln; Steinschößlein; der Bergzeifig; Meerzeifig; Flachs-fink; Carmin-hänfling.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 520. n. 7. der Flachs-fink.

Halle, Vögel, p. 391. n. 396. der kleine Karmin-hänfling, p. 392. n. 397. der kleine Karmin-hänfling.

Meyer, Thiere, II. tab. 25. rothplattige Hänfling.

Gatterer, vom Nutz. und Schad. der Thiere, II. p. 412. n. 349. der Flachs-fink; Zwitscherling; Tschezke; Bluthänfling; Rothhänfling; Kraut-hänfling; Schwarzbärtchen, etc.

Pennant, arct. Zool. II. p. 353. n. 179. der kleine Rothkopf; Karminhänfling.

- Onomat. hist. nat. IV. p. 811. *der gemeine Hänfling.*
- Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 131. *Zwitscherlein.*
- Klein*, av. p. 93. n. 3. *Linaria rubra minor.*
- Klein*, Vorbereitung, p. 174. n. 3. *das Schwarzbärtchen; Zitzcherlein, Tschetzke.*
- Klein*, verbess. Vögelhistor. p. 99. n. 3. *Schwarzbärtchen; rothplattiger Hänfling; Tschätzschke.*
- Klein*, stemmat. av. p. 18. tab. 18. fig. 10. a. b.
- Klein*, Vögeleyer, p. 29. tab. 9. fig. 14.
- Gesner*, Vögelb. p. 368. *Schößzerlein; Stockhenfeling; Tschütscherlein; Finet*, m. e. Fig.
- Brisson*, ornithol. I. p. 344. n. 31. *petite linotte de vignes.*
- Büffon*, Vögel, XI. p. 310. *das Zitscherlein oder der Meerzeifig*; m. e. Fig.
- Batsch*, Thiere, I. p. 354. *das Zitscherlein.*
- Latham*, Syn. Suppl. p. 167. *Lesser Redpole.*
- Latham*, Vögel, II. I. p. 295. n. 75. *der Flachs-fink.*
- Latham*, Syst. ornithol. I. p. 458. n. 83. *Fringilla (Linaria) fusco griseoque varia, subtus albo rufescens, fascia alarum duplici albida, vertice pectoreque rubris.*
- Beseke*, Vögel Kurl. p. 80. n. 176. *der Flachs-fink.*
- Siemßen*, meklenb. Vögel, p. 121. n. 7. *der Flachs-fink.*
- Bock*, N. G. von Preuss. IV. p. 429. *Tschetzschke.*
- Cetti*, Sardin. II. p. 202. *der karmosinrothe Hänfling?*
- Fischer*, Livil. p. 99. n. 158. *Schwarzbärtchen; Flachs-fink.*
- Olaffen*, Isl. I. p. 312. c. *Audna - Tytlingr?*
- Pontoppidan*, Dännem. p. 174. n. 6. *Graafskan.*
- Pontoppidan*, Norweg. II. p. 154. *Irisk?*

Lepechin,

- Lepechin*, Tageb. d. russ. Reis. III. p. 13. *Häuf-*
linge.
Egede, Grönl. p. 88. *Irsker?*
Cranz, Grönl. p. 112. *kleine Singvögel*, die den
Hänflingen gleichen?
Pennant, britt. Thiergesch. p. 127. n. 9. *Flachs-*
fink mit kleinerm Kopfe.
Storr, Alpenreise, I. p. 79. *Flachsfinke*.
Linné, Abhandlung. II. p. 304. n. 132. *der Lein-*
Fink.
Naturforsch. XVII. p. 95. n. 194. *der Hänfling*;
grauer Hänfling; *Steinhänfling*, p. 96. n. 196.
Schwarzbärtchen; *Tschetzsche*.
Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 635. *das Zit-*
scherlein.
Döbel, Jägerprakt. I. p. 65. *Zwitscherling*, p. 66.
Zitscherling.
Naumann, Vogelsteller, p. 69. *Schättgen*, *Schit-*
scherling.
Anweis. Vögel zu fang. p. 249. *Gräslein*, oder
Meerzeifstein.
Börner, schles. ökonom. Gesellsch. 1782. p. 103.
Flachsfinke.
André u. Bechstein, Spazierg. II. p. 314.
Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 30. n. 10. *Linaria*
minor.
Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 182. n. 23. *Fringilla*
(*Linaria*) *remigibus rectricibusque fuscis mar-*
gine obsolete pallido, *litura alarum albida*.
Kramer, Auflsr. p. 369. n. 9. *Grafel*; *Meerzeisel*;
Tschötscherl.
Schwenkfeld, av. Silez. p. 343. *Querula*. *Zötscher-*
lin; *Schößerle*; *Stockhenffling*; *Todtenvogel*;
Meusevogel.
Charleton, onom. zoic. p. 80. n. 6. I. *Linaria*
rubra.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 391. *Linaria rubra minor*.

Fonston, av. p. 99. *Linaria rubra*.

Faun. Arragon. p. 87. —

Roman. ornithol. p. 137. tab. 21.

Barrington, miscellan. p. 217.

Levin, britt. Birds. II. tab. 85.

Bomare, dictionn. V. p. 151. petite Linote de vigne.

Hermann, tab. affin. anim. p. 220. *Fringilla Linaria*.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 373. n. 12. das *Citrinchen*.

68. MONTIUM. Der Berghänfling. (5)

Klein, av. p. 93. n. 2. *Linaria fera*.

Klein, Vorbereit. p. 173. n. 2. *Steinhänfling*.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 99. n. 2. *Steinhänfling*.

Klein, Stemmat. av. p. 18. tab. 18. fig. 9. a. b.

Briffon, ornith. I. p. 346. *Linotte de montagne*.

Büffon, Vögel, XI. p. 33. *der Steinhänfling*.

Latham, Vögel, II. I. p. 297. n. 76. *der Berghänfling*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 459. u. 84. *Fringilla (Montium) nigro-rufelcenteque varia*, subtus albida, pennis in collo inferiore medio nigris, fascia alarum alba, uropygio rubro.

Sammel. zur Phys. und N. G. II. p. 627. *der Stein-hänfling*.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 294. *Linaria fera*; *Saxatilis. Stein-Henfling*.

β. Der

(5) S. vorher. Anmerk. 3. cf. *Bechstein*, N. G. Deutschl. III. p. 593. 594. *Latham*, Vögel, II. I. p. 293. n. 1. — Uebriegens muss man sich hüten, dass man nicht wegen der Aehnlichkeit in der Benennung die Synonymen *Fr. Montana*, *Monticula*, *Montifringilla* und *Montium* mit einander verwechsle.

- β. *Der kleine Berghänfling.* (6) *canis*
- Klein, av. p. 93. n. 4. Linaria pectore subluteo.
 Klein, Vorbereit. p. 174. n. 4. gelber Quittenhänfling.
 Klein, verb. Vögelhist. p. 99. n. 4. gelber Quittenhänfling; gelbkehlig Hänfling.
 Brisson, ornith. I. p. 345. n. 32. petite Linotte ou Cabaret.
 Buffon, Vögel, XI. p. 36. der kleine Hänfling;
 m. e. Fig.
 Pennant, arct. Zool. II. p. 354. C. der Berghänfling.
 Latham, Vögel, II. 1. p. 297. n. 76. Var. A. der kleine Hänfling.
 Leem, Finn. p. 137. noch eine Art von lieblich singenden Vögeln, etc.?
 Belon, hist. nat. des ois. III. p. 31. Picaveret.
 Levin, britt. Birds. II. tab. 86.

69. ARGENTORATENSIS. *Der Straßburgische Hänfling.* (7)

- Brisson, ornithol. I. p. 346. n. 34. Linotte de Strasbourg.
 Buffon, Vögel, XI. p. 32. der straßburgische Hänfling oder Gyntel.
 Gesner, Vögelb. p. 150. Gintel; m. e. Fig.
 Latham, Vögel, II. 1. p. 298. n. 77. p. 293. n. 3. der Straßburger Hänfling.
 Latham, Syst. ornithol. I. p. 460. n. 87. Fringilla (Argentoratensis) fusca, subtus rufa, fusco-maculata, abdomine infimo albido.
 Aldrovand. orn. p. 825. Gyntel.

L 1 3

70. AN-

(6) Nach Brisson eine eigne Gattung.

(7) Nach Bechstein eine Varietät vom gemeinen Hänfling. S. vorher. Anmerk. 3.

70. ANGOLENSIS. Der angolische Fink. (*)

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 100. n. 9. *angolischer Hänfling*.

Brisson, ornithol. I. p. 368. n. 71. *Linotte d'Angola*.

Büffon, Vögel, XI. p. 41. *die Vengaline*; m. 2. Figg. M. u. W.

Latham, Vögel; II. 1. p. 299. n. 78. *der Angolische Fink*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 460. n. 87. *Fringilla (Angolensis) fusco-cinerea*, *fusco maculata*, *subtus spadicea*, *capistro gulaque nigris*, *genis guttureque albo-maculatis*, *uropygio luteo*.

Seligmann, Vögel, V. tab. 24. *zweyerley Hänflinge aus Angola*.

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 628. *die Vengaline*.

Philos. Transact. LXIII. p. 254. †

71. ATRA. Der dunkelbraune Fink.

Büffon, Vögel, XI. p. 51. 53. *der braune Hänfling*.

Latham, Vögel, II. 1. p. 299. n. 79. *der dunkelbraune Fink*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 460. n. 89. *Fringilla (Obscura) fusco-nigricans*, *pectore uropygio que cinerascentibus*, *pennis apice dilutioribus*.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 60. *der braune Hänfling*.

72. MACROURA. Der langschwänzige Fink.

Latham, Vögel, II. 1. p. 300. n. 80. *der langschwänzige Fink*.

Latham,

(*) Ist nicht mit *Fringilla Angolensis* Ed. XII. p. 323. n. 31. — XIII. p. 920. n. 32. b. zu verwechseln.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 460. n. 90. *Fringilla* (*Macroura*) cauda elongata cuneiformi, corpore fusco-nigricante maculato, subtus cinerascente, rectricibus duabus intermediis marginibusque lateralium virescentibus.

30. **PETRONIA.** *Der Graufink.*

Müller, Natursyst. II. p. 591. n. 30. *der Waldfink.*

Halle, Vögel, p. 410. n. 420. *der graubraune Fink;* mit gelben Flecken an der Brust.

Klein, av. p. 96. n. 3. *Fringilla subcana*, macula lutea in pectore.

Klein, Vorbereit. p. 179. n. 3. *Graufinke.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 96. n. 3. *Graufink.*

Klein, Stemmat. av. p. 17. tab. 18. fig. 2. a. b.

Klein, Vögeleyer, p. 29. tab. 9. fig. 8.

Brissot, ornithol. I. p. 331. n. 6. *Moineau de bois.*

Büffon, Vögel, X. p. 181. *der Graufink;* m. e. Fig. it. p. 130. not. g.

Batsch, Thiere, I. p. 352. *der Graufink.*

Latham, Syn. Suppl. p. 164. *Ring Sparrow.*

Latham, Vögel, II. I. p. 248. n. 4. *der Graufink; Ringspelung.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 435. n. 6. *Fringilla* (*Petronia*) *grisea*, superciliis albis, gula lutea, rectricibus lateralibus apice intus macula alba.

Cetti, Sardin. II. p. 198. *der wilde Sperling?*

Pallas, Reis. Ausz. III. p. 476. *graue Hänflinge.*

Naturforsch. XVII. p. 94. n. 191. *der Graufinke.*

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 624. *der Graufink.*

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 183. not. q. *ein anderer rarer Sperling.*

Fonscol, av. p. 96. *passer torquatus.*

Belon, hist. des ois. p. 362. Moineau à la Sulcie ou à collier jaune.

Zinnan. Uov. p. 80. tab. II. fig. 71. *Passera marina*.

Hermann, tab. affin. anim. p. 218. 219. Fringilla Petronia.

Donndorff, Handb. d. Thiergefch. p. 273. n. 14. der Waldfink.

β. Fringilla supra nigro et rufescente varia, subtus cinereo-alba, fascia alarum alba, rectricibus griseo-fuscis extus rufescentibus. * (8)

Latham, Syst. ornithol. I. p. 435. n. 6. β.

Briffon, ornithol. I. p. 329. n. 3. Passer campestris. Moineau de campagne ou Friquet.

Klein, av. p. 88. n. 2. Passer arboreus, montanus ferus.

Klein, Vorbereit. p. 164. n. 2. Baumsperrling, Gersten-Felddieb; Wald-Weidensperling.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 90. n. 2. Baumsperrling.

Raj, av. p. 88. 16. Passer Sylvester.

Albin, orn. III. tab. 65. Red-headed Sparrow.

Charleton, onom. zoic. p. 78. n. 5. Passer sylvestris.

Fonston, av. p. 96. Passer in juglandibus degens.

Rzaczynsky, hist. nat. Polon. p. 291. Passer campestris; poln. Ir.

Frisch, Vögel, tab. I. fig. 2. Baumsperrling?

γ. *Passer torquatus*. Briss. ornith. I. p. 330. n. 4. *

Latham, Syst. ornithol. I. p. 436. n. 6. γ.

Charleton, onom. zoic. p. 78. n. 6. | Passer torquatus.

Schwenk-

(8) *Briffon* nimmt diese und die folgende Var. γ. als eigne Gattungen an; *Latham* aber als Spielarten von *Fringilla Petronia*. Die Ornithologen mögen hier entscheiden.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 323. Passer torquatus.
Ringel-Sperling; Ringelspatz; Feld-Sperling;
Wald-Sperling.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 405. Passer
torquatus, seu passer campestris. Passer Sylvaticus;
poln. Wrobel lesny, polny, Ma-
zurek.

73. STULTA. *Der dumme Sperling.* (*)

Brisson, ornith. I. p. 330. n. 5. Moineau fou.
Büffon, Vögel, X. p. 167. der italienische Sperling.
Latham, Vögel, II. I. p. 249. n. 5. der dumme
Sperling.

Latham, Syst. ornith. I. p. 436. n. 7. Fringilla
(Stulta) griseo - rufescens, ferrugineo macula-
ta, subtus flavescens, fascia alarum dupli-
cata, alba.

Charleton, onom. zoic. p. 79. n. 10. Passer
stultus.

Fonston, av. p. 96. Passer stultus Bononiensium.
Rom. ornith. I. p. 108.

74. BONONIENSIS. *Der gesprenkelte Sperling.*

Brisson, ornith. I. p. 332. n. 7. Moineau de Bo-
logne.

Latham, Vögel, II. I. p. 249. n. 6. der gespren-
kelte Sperling.

Latham, Syst. ornith. I. p. 436. n. 8. Fringilla
(Bononiensis) alba nigro subflavoque maculata,
subtus albo flavescens, capite albo maculis sub-
luteis vario, rectricibus subflavis.

Charleton, onom. zoic. p. 78. n. 2. Passer macu-
latus, flava cauda.

Ll 5

Rzaczyns.

(*) Nach Büffon eine Varietät von *Fringilla montana*, p. 925.
n. 37.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 406. *Passer montanus*, tricolor. *Moschowiter-Sperling*.
Fonston, av. p. 95. *Passer maculatus*.

75. LEUCURA. Der weißschwänzige Sperling.

Briffon, ornith. I. p. 332. n. 8. *Moineau de Bologne à queue blanche*.

Latham, Vögel, II. I. p. 249. n. 7. *der weißschwänzige Sperling*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 436. n. 9. *Fringilla (Leucura) flavicans, castaneo-maculata, lineolis candidis variegata, subtus capiteque albolutescens, rectricibus cinereo candidantibus*.

Charleton, onom. zoic. p. 78. n. 4. *Passer Albicilla*.

Fonston, av. p. 96. *Passer Albicilla*.

76. BRACHYURA. Der kurzschwänzige Sperling.

Briffon, ornith. I. p. 332. n. 9. *petit moineau de Bologne*.

Latham, Vögel, II. I. p. 250. n. 8. *der kurzschwänzige Sperling*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 436. n. 10. *Fringilla (Brachyura) flavescens, pectore abdomineque magis albicantibus, remigibus rectricibusque fluorescentibus*.

Charleton, onom. zoic. p. 79. n. 9. *Passer brachyurus nostras*.

Fonston, av. p. 96. *Passerculus brachyurus nostras*.

77. DALMATICA. Der dalmatische Sperling. (9)

Briffon, ornith. I. p. 333. n. 10. *Moineau d'Esclavonie*.

Latham.

(9) *Latham* vermutet, dass diese, und die vier vorhergehenden Gattungen vielleicht bloße Spielarten von einer andern, z. B. von *Fringilla Domestica*, *Montana*, oder *Petronia* seyn möchten.

Latham, Vögel, II. I. p. 250. n. 9. der Dalmatische Sperling.

Latham, Syst. ornith. I. p. 437. n. 11. Fringilla (Dalmatica) rufescens, subtus albida remigibus rectricibusque rufescentibus.

Raj. Syn. p. 87. n. 5. Passer Illyricus.

32. BENGALUS. Der bengalische Fink.

Müller, Natursyst. II. p. 591. n. 32. der bengalische Fink.

Brisson, ornith. I. p. 363. n. 6. Bengali.

Büffon, Vögel, XI. p. 62. der Bengali.

Latham, Vögel, II. I. p. 300. n. 81. der blaubäuchige Fink.

Latham, Syst. ornith. I. p. 461. n. 91. Fringilla (Benghalus) dilute caerulea, capite dorsoque griseis, lateribus capitis purpureis.

b. Müller, Natursyst. II. p. 591. n. 31. der angolische Spatz.

Onomat. hist. nat. III. p. 671. der angolische Finke mit blauem Bauche.

Klein, verb. Vögelhist. p. 100. n. 12. Purpurläufing.

Büffon, Vögel, XI. p. 64. Azulinha. (portugies.)

Seligmann, Vögel, V. tab. 26. der Fink mit dem blauen Bauch.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 182. n. 24. Fringilla (Angolensis) dorso fusco, abdomine caudaque caeruleis.

33. JAMAICA. Der Pisang-Fink.

Müller, Natursyst. II. p. 591. n. 33. der jamaikische Fink.

Klein, av. p. 89. n. 12. Passer caeruleo-fuscus.

Klein, Vorbereit. p. 167. n. 12. blaubunter Sperling.

Klein,

- Klein*, verb. Vögelhist. p. 91. n. 11. *blaubunter Sperling*.
Briffon, ornith. I. p. 352. n. 42. *Pinçon de la Jamaïque*.
Büffon, Vögel, XI. p. 151. *der Banana*.
Latham, Vögel, II. 1. p. 264. n. 25. *der Pisan-Fink*.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 443. n. 29. *Fringilla (Jamaica) grisea pectore viridi-caerulecente, remigibus rectricibusque nigris*.

78. CANA. Der grauköpfige Fink.

- Klein*, av. p. 89. n. 13. *Passer Serino affinis, e cinnereo luteo et fusco varius*.
Klein, Vorbereit. p. 167. n. 13. *Kanarienbastard*,
Klein, verb Vögelh. p. 91. n. 12. *Canarienbastart*,
mit *Muscicapa atricapilla*, p. 935. n. 10. verwechselt.
Briffon, ornith. I. p. 359. n. 53. *Serin de la Jamaïque*.
Latham, Vögel, II. 1. p. 264. n. 26. *der grauköpfige Fink*.
Latham, Syst. ornith. I. p. 443. n. 30. *Fringilla (Cana) luteo-fusca subtus lutea, capite gulaque griseis, rectricibus fuscis lineolis albis*.

79. SAVANNARUM. Der Erdfink.

- Klein*, av. p. 89. n. 11. *Passer pratorum*.
Klein, Vorbereit. p. 166. n. 11. *Erd-, Wiesen-sperling*.
Klein, verb. Vögelh. p. 91. n. 10. *Wiesensperling*.
Briffon, ornith. I. p. 334. n. 13. *Moineau de la Jamaïque*.
Latham, Vögel, II. 1. p. 265. n. 27. *der Erd-fink*.

Latham,

Latham, Syst. ornith. I. p. 443. n. 31. Fringilla (Savannarum) nebulosa abdomine albo, iugulo pectoreque fuscescentibus, remigibus apice superciliisque luteis.

80. COCCINEA. Der Scharlachfink.

Latham, Vögel, II. I. p. 265. n. 28. der Scharlachfink.

Latham, Syst. ornith. I. p. 444. n. 32. Fringilla (Coccinea) fulvo-coccinea, alis caudaque nigricantibus, remigibus fulvo-marginatis, rectricibus apice nigris.

81. PUNICEA. Der rothbrüstige Fink.

Pennant, arct. Zool. II. p. 346. n. 162. der Fink mit der rothen Brust.

Latham, Vögel, II. I. p. 266. n. 30. der rothbrüstige Fink.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 444. n. 34. Fringilla (Punicea) nigra, genis corporeque toto subtus coccineis, rectricibus alarum fasciolis duabus albis.

82. FERRUGINEA. Der rostfarbige Fink.

Pennant, arct. Zool. II. p. 349. n. 168. der rostfarbige Fink.

Latham, Vögel, II. I. p. 266. n. 31. der rostfarbige Fink.

Latham, Syst. ornith. I. p. 445. n. 35. Fringilla (Ferruginea) fusca ferrugineo-marginata, subtus pallida, pectore maculis obscuris, regione oculorum alba.

83. ALBICOLLIS. Der weißkehlige Fink.

Pennant, arct. Zool. II. p. 348. n. 165. der Fink mit weißer Kehle.

- Brisson*, ornith. I. p. 367. n. 68. Moineau de Pensilvanie.
- Latham*, Vögel, II. I. p. 267. n. 32. der weißkehlige Fink.
- Latham*, Syn. Suppl. p. 166. White-throated Finch.
- Latham*, Syst. ornith. I. p. 445. n. 36. Fringilla (Pensilvanica) nigricans rufo varia, subtus genisque cinereo-alba, fascia oculari nigricante, superciliis fulvis, gula alba.
- Seligmann*, Vögel, VIII. tab. 94. der Sperling mit weißer Brust.

84. FASCIATA. Der bandirte Fink.

- Pennant*, arct. Zool. II. p. 349. n. 169. der bandirte Fink.
- Latham*, Vögel, II. I. p. 267. n. 33. der bandirte Fink.
- Latham*, Syst. ornith. I. p. 445. n. 37. Fringilla (Fasciata) maculata, supra ferruginea, subtus alba, cauda fusca, fasciis numerosis nigricantibus.

85. GRAMINEA. Der Grasfink.

- Pennant*, arct. Zool. II. p. 349. n. 170. der Grasfink; graue Grasvogel.
- Latham*, Vögel, II. I. p. 268. n. 34. der Grasfink.
- Latham*, Syst. ornithol. I. p. 445. n. 38. Fringilla (Graminea) cinereo ferrugineo nigroque varia, subtus alba, pectore lateribusque maculatis, genis remigibus rectricibusque fuscis.

86. CINEREA. Der aschgraue Fink.

- Pennant*, arct. Zool. II. p. 352. n. 177. der aschgraue Fink.
- Latham*, Vögel, II. I. p. 268. n. 35. der aschgraue Fink.

Latham,

Latham, Syst. ornith. I. p. 445. n. 39. *Fringilla* (*Cinerea*) *fusca*, ferrugineo-marginata, capite lateribus lineis duabus gulaque griseis, iugulo grisecente, abdomine medio albo.

87. *NORTONIENSIS*. *Der Fink von Nortonfond.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 350. n. 173. *der Fink von Nortonfond.*

Latham, Vögel, II. I. p. 268. n. 36. *der Nortonfunk.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 446. n. 42. *Fringilla* (*Nortoniensis*) *nigra* subtus *alba*, iugulo ferrugineo-maculato, remigibus caudaque nigricantibus, rectrice extima linea longitudinali *alba*.

88. *HIEMALIS*. *Der Winterfink.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 350. n. 171. *der Winterfink.*

Latham, Vögel, II. I. p. 269. n. 37. *der Winterfink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 446. n. 43. *Fringilla* (*Hiemalis*) *fusca*, nigro-nebulosa, subtus *alba*, collo inferiore pectore lateribusque fuscoculatis.

89. *STRIATA*. *Der gestreifte Fink.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 348. n. 167. *der gestreifte Fink.*

Latham, Vögel, II. I. p. 269. n. 38. *der streifköpfige Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 446. n. 44. *Fringilla* (*Striata*) *fusca* nebulosa, subtus genis gulaque *alba*, capite vittis tribus nigris, fronte lophisque *flavis*.

90. PURPUREA. Der Purpurfink.

Pennant, arct. Zool. II. p. 351. n. 175. der purpurrothe Fink.

Briffon, ornithol. I. p. 399. n. 8. Bouvreuil violet de la Caroline.

Latham, Vögel, II. I. p. 269. n. 39. der Purpurfink.

Latham, Syst. ornith. I. p. 446. n. 45. Fringilla (Purpurea) subviolacea, ventre candido, remigibus intus, caudaque a medio ad apicem fuscis.

Seligmann, Vögel, II. tab. 82. der purpurfarbne Fink.

91. ROSEA. Der rosenfarbige Fink.

Büffon, Vögel, XI. p. 186. der rosenfarbigte Fink.

Latham, Vögel, II. I. p. 311. n. 105. der rosenfarbige Fink.

Latham, Syst. ornith. I. p. 444. n. 33. Fringilla (Rosea) rosea, capistro argenteo, dorso lituris ex griseo fuscescentibus vario, alis caudaque nigricantibus, rectricum margine exteriori roseo,

Pallas, Reis. Ausz. III. Anh. p. 9. n. 26. Fringilla rosea.

Pennant, arct. Zool. II. p. 351. ad n. 174. Fringilla rosea.

β. Fringilla nigricans, pennis margine rubris, capite pectoreque coccineis, priore maculis fuscis, abdome incarnato. *

Latham, Syst. ornith. I. p. 444. n. 33. β.

Latham, Vögel, II. I. p. 311. ad n. 105.

Pennant, arct. Zool. II. p. 350. n. 174. der Fink mit carmoisinfrothem Kopfe.

92. ILLIACA. Der Drosselfink.

Latham, Vögel, II. I. p. 313. n. 113. der Drosselfink.

Latham, Syst. ornith. I. p. 438. n. 15. Fringilla (Iliaca) cinereo-olivacea, pennis apice fuscis, subtus alba, pectore maculis griseo-fuscis, remigibus fuscis margine rufis, uropygio caudaque rufis.

34. TRICOLOR. Der dreyfarbige Fink.

Müller, Natursyst. II. p. 592. n. 34. der dreyfarbige Fink.

Büffon, Vögel, XI. p. 185. der dreyfarbigte Fink.

Latham, Vögel, II. I. p. 307. n. 91. aer Fink mit blauem Gesichte.

Latham, Syst. ornith. I. p. 464. n. 101. Fringilla (Tricolor) nigra, capite uropygioque cyaneis, humeris viridibus, abdomine flavescente.

Bankcroft, N. G. von Guian. [p. 110. der amerikanische Sperling des Seba.

93. CYANOMELAS. Der blauköpfige Fink.

Büffon, Vögel, XVI. p. 172. der schwarz und blaue Zartschnabel; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 508. n. 92. der blauköpfige Fink.

Latham, Syst. ornith. I. p. 464. n. 102. Fringilla (Cyanomelas) caerulea, linea frontali gula lunulaque dorsali nigris, remigibus fuscis, cauda nigricante.

94. PICTA. Der azurköpfige Fink.

Latham, Vögel, II. I. p. 308. n. 93. der azurköpfige Fink.

Latham, Syst. ornith. I. p. 464. n. 103. Fringilla (Picta) purpurascens, vertice alis caudaque

caeruleis, uropygio flavo, collo pectore cristo-
que rubris.

95. CYANOCEPHALA. *Der blauhaubige Fink.*

Latham, Vögel, II. I. p. 308. n. 94. *der blauhaubi-
ge Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 464. n. 104. Fringilla
(Cyanocephala) rubro-fusca, vertice uropy-
gioque cyaneis, subtus flava, nucha rubra, or-
bitis albis.

96. TORQUATA. *Der Ringelfink.*

Latham, Vögel, II. I. p. 308. n. 95. *der Rin-
gelfink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 465. n. 105. Fringilla
(Torquata) subruba, uropygio caeruleo, lu-
nula gulari nigra, remigibus nigris, caeruleo
terminatis, ad apicem macula alba.

97. MULTICOLOR. *Der vielfarbige Fink.*

Latham, Vögel, II. I. p. 309. n. 96. *der Fink mit
grünem Steifse.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 465. n. 106. Fringilla
(Multicolor) nigra, subtus flavescens, dorso
infimo femoribusque viridibus, tectricibus ala-
rum macula remigumque secundariarum fascia
alba.

35. M A J A. *Der Maja.* (10)

Müller, Natursyst. II. p. 592. n. 35. *der Purpur-
fink.*

Briffon, ornithol. I. p. 366. n. 66. Maia de Cuba.

Büffon, Vögel, XI. p. 79. *der Maja*; m. e. Fig.

Latham, Syn. II. I. p. 315. n. 86. Cuba Finch.

Latham, Vögel, II. I. p. 305. n. 86. *der Fink von
Cuba.*

Latham,

(10) Ist nicht mit *Loxia Maja*, p. 849. n. 11. zu verwechseln.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 462. n. 96. *Fringilla (Maia) purpurascens fascia pectorali saturata.*

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 629. *der Maia.*

Charleton, onom. zoic. p. 112. n. 4. *Maja.*

Fonston, av. p. 171. *Maia.*

36. DOMESTICA. *Der gemeine Sperling.* (1)

Müller, Natürsyst. II. p. 592. n. 36. *der Sperling.*

Leske, Naturgeschichte. p. 364. n. 8. *der Haus-sperling.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 144. n. 11. *der Sperling; Spatz.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 189. n. 10. *Fringilla (Domestica) remigibus rectricibusque fuscis, gula nigra, temporibus ferrugineis; der Sperling; Lüning.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 514. n. 3. *der Haus-sperling.*

Funke, Naturgesch. I. p. 304. *der Sperling.*

Halle, Vögel, p. 366. n. 361. *der Haus-sperling.*

Meyer, Thiere, II. tab. 87. *Sperling.* M. u. W.

Mm 2

Gatte-

(1) Brütet gewöhnlich vier Mal im Jahr, und legt zwar gemeinhin nur 5. bis 6. zuweilen aber auch wohl 8. Eyer. Die Männchen streiten so heftig um die Weibchen, dass sie oft zur Erde niederfallen. Man hat gesehen, dass sie sich wohl 20. Mal nach einander begatten. Vielleicht ist daher der Vogel so sehr zu Krämpfen geneigt. Sechzehn Paar Sperlinge in einem Dorfe, geben 12800. Junge, oder 6400. Paar Sperlinge. Man will auch berechnet haben, dass jeder Sperling jährlich für einen Gulden Getraide und Feldfrüchte verzehre, und dass in einem Lande von 300. Dörfern sechs Millionen Sperlinge befindlich sind, die jährlich sechs Millionen Gulden Schaden thären. Dem ohnerachtet steht der Nutzen des Sperlings mit dem Schaden den er thut, im Verhältniss. Man hat beobachtet, dass zwey Sperlinge zur Fütterung ihrer Jungen in einer Woche 3260. Raupen gebraucht haben. Das Fleisch ist essbar.

- Gatterer*, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 413.
n. 351. *der Sperling*; *Spatz*; *Felddieb*; *Hausdieb*; *Gerstendieb*; *Hausperling*; *Kornsperring*; *Lüning*; *Speicherdieb*; *Kornwerfer*.
- Pennant*, auct. Zool. II. p. 356. *G. der Sperling*.
- Neuer Schaupl. d. Nat.* VIII. p. 341. *Hausperling*.
- Onomat. hist. nat.* VI. p. 200. *der gemeine Sperling*.
- Handb. der Naturgesch.* II. p. 230. *der Sperling*.
- Handb. der deutsch. Thiergesch.* p. 132. *Sperling*.
- Klein*, av. p. 88. n. 1. *Passer domesticus*.
- Klein*, Vorbereit. p. 163. n. 1. *speicherdieb*, *Kornwerfer*, *Spatz*.
- Klein*, verb. Vögelhist. p. 90. n. 1. *Spatz*.
- Klein*, Stemmat. av. p. 17. tab. 18. Fig. 1. a. b.
- Klein*, Vögeleyer, p. 29. tab. 9. Fig. 7.
- Gesner*, Vögelb. p. 469. *Spatz*; *Spar*; *Hauspar*; *Sperck*; *Sperlingk*; m. e. in mittelm. Fig.
- Brisson*, ornith. I. p. 327. n. 1. *Moineau franc*.
- Büffon*, Vögel, X. p. 124. *der Hausperling*; m. 2. Figg.
- Batsch*, Thiere, I. p. 352. *der Hausperling*.
- Latham*, Syn. Suppl. p. 163. *House Sparrow*.
- Latham*, Vögel, II. 1. p. 242. n. 1. *der Hausperling*.
- Latham*, Syst. ornith. I. p. 432. n. 1. *Fringilla (Domestica) remigibus rectricibusque fuscis, corpore griseo nigroque, fascia alarum alba solitaria*.
- Beseke*, Vögel Kurl. p. 80. n. 177. *der Sperling*.
- Siemßen*, meklenb. Vögel, p. 122. n. 8. *der Hausperling*; *Spaerling*; *Lüning*.
- Bock*, N. G. von Preuß. IV. p. 429. *der Sperling*.
- Cetti*, Sardin. II. p. 197. *der Hausperling*.
- Fischer*, Lvl. p. 100. n. 159. *Sperling*.
- Pallas*, Reise Ausz. III. p. 373. *Sperlinge*.

Pontop-

- Pontoppidan*, Däineth. p. 174. n. 7. *Spuru*.
Pontoppidan, Norweg. II. p. 185. *Spurre*; *Huus-Kald*.
S. G. Gmelin, Reis. d. Russl. III. p. 327. 328.
Linne, Abhandl. II. p. 305. n. 133. *der Sperling*.
Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 181. n. 220. *der Haus-sperling*.
Günther, Nest. u. Ey. tab. 57. *Rauch-Sperling*.
Sander, oekonom. Naturgesch. II. p. 34. *Sperling*.
Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 623. *der Haus-sperling*.
Goeze, nützl. Allerl. II. p. 391. n. 12. *der Sperling*.
Goeze, Natur, Menschenl. u. Vorf. III. p. 165. *Sperling*.
Bechstein, Must. schädl. Th. p. 135. n. 3. *der Haus-sperling*.
André u. Bechstein, Spazierg. VI. p. 360. *der Haus-sperling*.
Naturforsch. XVII. p. 96. n. 197. *der Sperling*; *Faulsperling*.
Zorn, Petinotheol. II. p. 349. *Hauß-Sperling*.
Döbel, Jägerprakt. I. p. 66. *Haus-, Hof-Sperling*.
Naumann, Vogelsteller, p. 201. *Sperling*.
Jablonsky, allgem. Lex. p. 1103. *Sperling*.
Breidenstein, Naturgesch. des Sperlings deutscher Nation. Giesl. 1779. 8.
Borkhausen, Magaz. I. p. 158. *Sperling*; *Dorf-sperling*.
Forst- u. Jagdlex. III. p. 437. *Sperling*.
Neue Mannigfalt. 1776. p. 468. *Spatz*.
Geoffroy, mater. med. VIII. p. 593. *der Haus-sperling*.
Anweis. Vögel zu fang. p. 302. *Sperling*.
Merklein, Thierreich, p. 362. *Sperling*.
Kraft, Ausrott. grauf. Th. I. p. 564. *Spatz*.

- Beckmann*, Naturhist. p. 54. a. *der Sperling*.
Schrift. der berlin. Gesellsch. N. Fr. V. p. 153.
Sperlinge.
Allgemein. Magaz. II. p. 104. *Sperlinge*.
Bresl. Nat. u. Kunstgesch. XXIX. Vers. p. 71. XVIII.
 Vers. p. 70.
Bresl. Samml. II. p. 97. 180.
Leche: Schwed. Abh. VII. p. 154.
Wittenberg. Wochenbl. IV. p. 245. n. 257. XIII.
 p. 89.
Berlin. Intell. Bl. 1784. p. 625.
Berlin. Samml. VIII. p. 278. V. p. 493.
Beckmann, phys. ökon. Bibl. XVI. p. 391. X.
 p. 392.
Loniceri, Kräuterb. p. 680. *Spatz; Spar*.
Everhard, Thiergesch. p. 80. *der Sperling*.
Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 56. *Passer domesticus*.
Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 30. n. 12. *Passer domesticus*.
Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 183. n. 27. *Fringilla (Domestica) remigibus rectricibusque fuscis, corpore griseo nigroque, fascia alarum alba solitaria*.
Kramer, Austr. p. 369. n. 10. *Fringilla remigibus rectricibusque fuscis, gula nigra, temporibus ferrugineis, uropygio testaceo. Hauspatz*.
Charleton, onom. zoic. p. 78. n. 1. *Passer domesticus*.
Schwenkfeld, av. Siles. p. 321. *Passer domesticus. Sperling; Sperg.*
Sibbald, Scot. p. 159. *Passer domesticus*.
Rzaczynsky, hist. nat. Pol. p. 297. — Auct.
 p. 406. *Passer domesticus*.
Belon, hist. des ois. p. 361. *Moineau*.
Prosp. Alpin.. Aegypt. I. p. 197. *Passer*.
Fonston, av. p. 98. *Passer domesticus*.

- Schaefer*, element. ornithol. tab. 53.
Roman. ornith. I. p. 99. tab. 16. Fig. 1.
Faun. Arragon. p. 87.
Hist. Prov. I. p. 518.
Russel, Alepp. p. 70.
Chefeld. Anatom. cap. 5. ad init. (Scelet.)
Levin, britt. Birds. II. tab. 77.
Zinnian, Uov. p. 79. tab. 11. *Passera domestica*.
Bomare, diction. V. p. 421. Franc-moineau.
Hermann, tab. affin. anim. p. 220. *Fringilla dome-*
stica.
Plin. hist. nat. L. 10. c. 36. L. 30. c. 3. c. 11. c. 15.
Passeres.
Aelian. de nat. anim. L. 4. c. 38. Στρουθοι.
Donndorff, Handb. d. Thiergeesch. p. 273. n. 15.
der Sperling.

β. Der weiße Sperling.

- Briffon*, ornith. I. p. 328. A. Moineau blanc.
Büffon, Vögel, X. p. 128. *weiße Sperlinge*.
Latham, Syn. II. I. p. 250. — Suppl. p. 163.
White Sparrow.
Latham, Vögel, II. I. p. 243. Var. A. *der weiße*
Sperling.
Latham, Syst. ornith. I. p. 433. n. 1. β.
Beske, Vögel Kurl. p. 80. n. 177.
Siemßen, meklenb. Vögel, p. 123. n. 8. β.
Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 182.
Fischer, N. G. von Livil. p. 100.
Naturforsch. I. p. 62. n. 6. — XVI. p. 48. n. 3
XVII. p. 97. XIX. p. 86.
Zorn, Petinotheol. II. p. 51.
Götz, Naturgesch. einiger Vögel, p. 117. n. 6.
Borkhausen, Magaz. I. p. 158.
Lichtenberg, Magaz. für das Neueste, etc. VI.
2. p. 118.

- Charleton*, onom. zoic. p. 78. n. 1. *Passer albus*.
Schwenkfeld, av. Siles. p. 322. *Passer niveus*.
Müller, zool. dan. prodr. p. 32. ad n. 263. *Variat. alba*.
Brünniche, ornith. bor. p. 69. *Passeres albi*.
Mus. Wormian. p. 310. *Passer niveus*.
Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 407.
Fenston, av. pag. 95. *Passer albus*.

γ. Der gelbe Sperling.

- Brisson*, ornith. I. p. 328. *B. Moineau jaune*.
Büffon, Vögel, X. p. 129. *gelbe Sperlinge*.
Latham, Syn. II. 1. p. 251. *Yellow Sparrow*.
Latham, Vögel, II. 1. p. 244. Var. *B. der gelbe Sperling*.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 433. n. 1. γ. Fr. *flava*,
supra castaneo adumbrata.
Charleton, onom. zoic. p. 78. n. 1. *Passer flavus*.
Fenston, av. p. 95. *Passer flavus*.

δ. Der schwarze Sperling.

- Büffon*, Vögel, X. p. 129. *ganz schwarze Sperlinge*.
Latham, Vögel, II. 1. p. 244. Var. C. *der schwarze Sperling*.
Latham, Syn. Suppl. p. 163. *Black Sparrow*.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 433. n. 1. δ. Fr. *tota nigra*.
Müller, zool. dan. prodr. p. 32. ad n. 263. Var. *tota nigra*.
Brünniche, ornith. bor. p. 69. n. 266. Var. *tota nigra*.
Aldrov. ornith. II. p. 556. f.

*ε. Der blaue Sperling. **

- Latham*, Vögel, II. 1. p. 245. not. p. Var. D.
Scopoli,

Scopoli, Bein. a. d. N. G. I. p. 182. not. q. *schwarz-*
blauer oder dunkelbleyfarbiger Sperling.

ξ. *Der aschgraue Sperling.* *

Latham, Vögel, II. 1. p. 245. not. p. Var. E.

η. *Der bunte Sperling.* *

Latham, Vögel, II. 1. p. 244. not. l.

Naturforsch. I. p. 63. n. 7.

ς. *Der lohgelbe Sperling.* *

Latham, Vögel, II. 1. p. 245. not. p. Var. G.

Lapeirouse: neue Schwed. Abhandl. III. p. 109.

ι. *Der blaßsemmelfarbene Spérling.* *

Naturforsch. I. p. 63. n. 8.

κ. *Der dunkelbleyfarbene oder mattschwarze Sper-*
ling.

Naturforsch. II. p. 2. n. 2.

λ. *Der Bastardsperling.* *

Latham, Vögel, II. 1. p. 245. not. p. Var. H. et I.

37. MONTANA. *Der Feldsperling.* (2)

Müller, Natursystem, II. p. 593. n. 37. *der Baum-*
sperling.

Borowsky, Thierreich, III. p. 145. n. 12. *der*
Baum-Bergsperling.

Mm 5

Bechstein,

(2) Wohnt nicht so wohl in, als neben den Dörfern und Städten, und nistet in den hohen Bäumen, in Gärten und Weiden, die an Bächen stehen. Findet sich doch aber auch oft in Dörfern auf dem Misthof unter den Hausperlingen. Brütet 2. bis 3. Mal des Jahrs, und legt jedesmal 5, 6, auch 7. Eyer. Die Eyer sind bläulich weiß, und haben dunkel purpurfarbene Flecken, die am stumpfen Ende zusammenfließen. Das Fleisch schmeckt noch angenehmer, als das vom Haus-sperling. — Nach *Latham* gehört auch die *Loxia Hambur-*
gensis hierher.

- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 515. n. 4. *der Feldsperling; Feldspatz.*
- Halle*, Vögel, p. 367. n. 362. *der Feldsperling.*
- Gatterer*, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 409. n. 352. *der Feldsperling; Rothsperling; Bergsperling; Baumsperling; Holzsperling; Muschelsperling.*
- Pennant*, arct. Zool. II. p. 347. n. 163. *der Baumfink; Feldsperling?*
- Neuer Schaupl. d. Nat. VIII. p. 342. *Feld-Baum-Rothsperling.*
- Onomat. histor. natur. VI. p. 204. *der Baumsperling.*
- Klein*, av. p. 90. n. 20. *Passer montanus, minimus.*
- Klein*, Vorbereit. p. 168. n. 20. *Bergsperling.*
- Klein*, verbess. Vögelhist. p. 92. n. 18. *Bergsperling.*
- Briffon*, ornith. I. p. 328. n. 2. *Moineau de montagne.*
- Briffon*, Vögel, X. p. 163. *der Feldsperling.*
- Batsch*, Thiere, I. p. 353. *der Feldsperling.*
- Latham*, Syn. Suppl. p. 163. *Tree Sparrow.*
- Latham*, Vögel, II. I. p. 245. n. 2. *der Feldsperling.*
- Latham*, Syst. ornithol. I. p. 433. n. 2. *Fringilla (Montana) remigibus rectricibusque fuscis, corpore griseo nigroque, alarum fascia alba gemina.*
- Seligmann*, Vögel, VIII. tab. 59. zwey *Gebirgs-Sperlinge; ein Er und eine Sie.*
- Siemsen*, meklenb. Vögel, p. 124. n. 9. *Feldsperling; Feldpaarling; Boomspaarling.*
- Bock*, N. G. von Preuss. IV. p. 431. *Wald-Weiden-Berg-Baumsperling.*
- Fischer*, Liv. p. 100. n. 160. *Bergsperling.*
- Pontop-*

- Pontoppidan*, Dännem. p. 174. n. 8. *Skovspurv*.
Pennant, britt. Thiergeesch. p. 124. *Baumsperling*.
Naturforsch. XVII. p. 97. n. 198. *der Baumsperling*; *Zätschker*.
Zorn, Petinotheol. II. p. 352. *Feld- oder Rothsperling*.
Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 183. n. 221. *der Feldsperling*.
Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 624. *der Baum-sperling*.
Döbel, Jägerprakt. I. p. 67. *Holzmuschel*, oder *wilder Sperling*.
Bechstein, Must. schädl. Th. p. 137. n. 4. *der Feldsperling*.
André u. Bechstein, Spazierg. II. p. 232. *Feldsperling*.
Frisch, Vögel, tab. 7: fig. 2. *der Baumsperling*.
Forst- u. Jagdlex. III. p. 437. *Sperling*.
Anweis. Vögel zu fang. p. 515. *Feldsperling*.
Borkhausen, Magazin, I. p. 158. n. 27. *Feldsperling*.
Linne, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 183. n. 28. *Fringilla (Montana) remigibus rectricibusque fuscis, corpore griseo nigroque, alarum fascia alba gemina*.
Kramer, Austr. p. 370. n. 11. *Fringilla remigibus rectricibusque fuscis, vertice spadiceo, uropygio virescente*. — *Passer vertice rubro in cavitatibus arborum nidulans*. *Alberti*. — *Feld-spatz; Rohrspatz*.
Charleton, onom. zoic. p. 78. n. 3. *Passer montanus*.
Schwenkfeld, av. Silef. p. 322. *Passer montanus*; *Wald-Sperling; Weiden-Sperling*.

Rzaczyns-

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Pol. p. 406. *Passer montanus*.

Fonston, av. p. 95. *Passer montanus*.

Belon, hist. des ois. p. 363. *Friquet*.

Roman. ornith. p. 105. tab. 16. Fig. 2.

Histoir. Prov. I. p. 519.

Zinnan. Uov. p. 81. tab. 12. Fig. 72. *Passera montanino*.

Levin, britt. Birds, II. tab. 78.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 374. n. 16. *der Feldsperling*.

β. Der weiße Feldsperling. *

Latham, Vögel, II. I. p. 247. not. z. Var. A.

γ. Der bunte Feldsperling. *

Latham, Vögel, II. I. p. 247. not. z. Var. B.

δ. Der gehaubte Feldsperling. *

Latham, Vögel, II. I. p. 247. not. z. Var. C.

ε. Der Bastard-Feldsperling?

Latham, Vögel, II. I. p. 247. not. z. Var. D.

98. PINETORUM. Der Fichtenfink. (3)

Lepechin, Tageb. der russ. Reis. II. p. 188. *der Bergspatz*; (russ. *Gornaja Owſjanka*) tab. 7. fig. 1.

Büffon, Vögel, XI. p. 187. *der Bergspatz*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 314. n. 115. *der Fichtenfink*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 445. n. 40. *Fringilla (Pinetorum) supra ex rufescente-testacea, sub-tus flava, fascia pectorali transversa ferruginea*.

99. SYL-

(3) Ist nach Beckstein mit *Emberiza Aureola* einerley. S. N. G. Deutschl. III. p. 596.

99. SYLVATICA. Der Waldfink. (4)

Lepechin, Tageb. d. russ. Reis. II. p. 189. der Waldsperling; (russ. *Ljesnoi Worabei.*) tab. 7. fig. 2.

Büffon, Vögel, XI. p. 190. der Waldsperling; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 314. n. 116. der Waldfink.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 446. n. 41. Fringilla (Sylvatica) capite fasciato, corpore supra griseo nigroque vario, pectore atque imo abdomine canis.

100. HUDSONIA. Der Fink aus der Hudsons-bay. (5)

Latham, Vögel, II. I. p. 313. n. 114. der Fink aus der Hudsonsbay.

101. FLAVICOLLIS. Der gelbkehlige Fink.

Pennant, arct. Zool. II. p. 348. n. 166. der Fink mit gelber Kehle.

Latham, Vögel, II. I. p. 309. n. 97. der gelbkehlige Fink.

Latham, Syn. Suppl. p. 168. Yellow-throated Finch.

Latham, Syst. ornith. I. p. 465. n. 107. Fringilla (Flavicollis) cinerea subtus albicans, gula alba macula flavescente, remigibus obscuris.

102. CRISTATA. Der Fink mit schwarzem Gesichte. (6)

Pennant, arct. Zool. II. p. 350. n. 172. der Mohr. *Büffon*,

(4) Ist nach *Bechstein* mit *Emberiza Pithyornus* einerley. S. N. G. Deutschl. 1 c.

(5) Ist nach *Pennant* und *Latham* mit *Emberiza Hyemalis* einerley.

(6) *Büffon* nimmt die 2te Fig. in den Pl. entl. n. 181. (Moineau de la Caroline) als das Weibchen der ersten an. *Pennant* scheint

Büffon, Vögel, X. p. 177. *der gezopfte Sperling aus Karolina*; m. 2. Figg. M. u. W.

Latham, Syn. Suppl. p. 164.

Latham, Vögel, II. I. p. 247. n. 3. *der Fink mit schwarzem Gesichte*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 434. n. 4. *Fringilla (Cristata) cristata rubro-fusca, corpore subtus uropygio cristaque coccineis*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 435. n. 5. *Fringilla (Carolinensis) rubro-fusca, abdomine albo, facie fasciaque pectoris nigra, iugulo uropygioque coccineis*.

38. BICOLOR. *Der Bahama-Fink.* (?)

Müller, Natursystem, II. p. 594. n. 38. *der zwey-farbige Sperling*.

Halle, Vögel, p. 377. n. 369. *der schwarze Wald-sperling, mit grünlichem Hinterleibe*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 347. n. 164. *der Bahamafink*.

Klein, av. p. 89. n. 9. *Passerulus bicolor, Bahamensis*.

Klein, Vorbereit. p. 166. n. 9. *Grünsperling aus Bahama*.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 91. n. 8. *Grünsperling*.

Briffon, ornithol. I. p. 363. n. 59. *Verdier de Bahama*.

Büffon, Vögel, XI. p. 255. *der bahamische Grün-fink*.

Latham,

scheint dies zu bezweifeln. *Latham* macht zwey verschiedene Gattungen daraus; rechnet *Büffons Friquet hupé*, und *Moineau de Cayenne* zu seiner *Fringilla Cristata*; — *Büffons Moineau de Caroline* aber und *Pennants black-faced Finch* zu seiner *Fringilla Carolinensis*. In der Synops. hielt er noch beyde für einerley.

(7) Ist nicht mit *Loxia Bicolor* zu verwechseln.

Latham, Vögel, II. I. p. 290. n. 69. der Bahamafink.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 456. n. 75. Fringilla (Bicolor) capite pectoreque nigris, dorso alis caudaque obscure virescentibus.

Seligmann, Vögel, II. tab. 74. der bahamische Sperling.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 183. n. 31. Fringilla (Zena) capite pectoreque nigris, dorso alis caudaque obscure virescentibus.

103. ABYSSINICA. Der Worabé.

Büffon, Vögel, X. p. 279. der Worabé.

Latham, Vögel, II. I. p. 290. n. 70. der Fink mit schwarzem Halsbande.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 457. n. 79. Fringilla (Abyssinica) flava, subtus collarique cervicis nigra, alis caudaque nigris marginibus flavescens-tibus.

104. ULTRAMARINA. Der Lasur-Vogel.

Büffon, Vögel, X. p. 281. der Lasur-Vogel.

Latham, Vögel, II. I. p. 290. n. 71. der Ultramarinfink.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 457. n. 78. Fringilla (Ultramarina) tota intense caerulea, rostro albo, pedibus rubris.

105. SYRIACA. Der Habesch.

Büffon, Vögel, X. p. 282. der Syrische Habesch.

Latham, Vögel, II. I. p. 291. n. 72. der Tripoli-sche Fink.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 457. n. 80. Fringilla (Syriaca) fusco nigricante flavoque varia, subtus albida maculis obscuris, vertice rubro.

39. CRISPA. Der Krausfink.

Müller, Natursyst. II. p. 594. n. 39. der Krausfink.

Brisson, ornithol. I. p. 370. n. 74. Pinçon frisé.

Büffon, Vögel, XI. p. 173. der gekrausste Fink; in e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 273. n. 49. der krause Fink.

Latham, Syst. ornith. I. p. 449. n. 56. Fringilla (Crispa) olivacea subtus lutea, capite nigro, pennis plurimis recurvatis.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 61. der gekrausste gelb und scharze Sperling.

Hermann, tab. affin. anim. p. 220. Fringilla crispa.

106. INDICA. Der indianische Fink.

Brisson, ornith. I. p. 369. n. 73. Pinçon à collier des Indes.

Büffon, Vögel, XI. p. 175. der Fink mit doppeltem Halsbande.

Latham, Vögel, II. I. p. 273. n. 50; der Fink mit dem Halsbande.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 449. n. 57. Fringilla (Indica) cinereo-fusca, subtus rufo-alba, capistro iugulo torque colli albis, fascia pectorali alis caudaque nigris.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 62. der Fink mit einem Halsstreif.

107. OCHRACEA. Der ockergelbe Fink.

Latham, Syn. Suppl. p. 169. Oker Finch.

Latham, Vögel, II. I. p. 310. n. 101. der ocker-gelbe Fink.

Latham, Syst. ornith. I. p. 465. n. 109. Fringilla (Ochracea) alba, capite collo inferiore pectore tectricibusquealarum ochraceis, rostro pedibusque flavis.

108. TES-

108. TESTACEA. *Der ziegelrothe Fink.**Latham*, Syn. Suppl. p. 169. Testaceous Finch.*Latham*, Vögel, II. I. p. 310. n. 102. *der ziegelrothe Fink.**Latham*, Syst. ornith. I. p. 465. n. 110. Fringilla (Testacea) testaceo-ferruginea, nigro nebulosa, remigibus rectricibusque fuscis, rostro pedibusque carneis.

A. Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Edit. XII.

Edit. XIII.

p. 318. n. 6. Fringilla Erythrophthalma. p. 874. n. 44. Emberiza Erythrophthalma.

p. 323. n. 31. Fr. Angolen-sis. p. 920. n. 32. Fr. Bengalus. b.

Das Geschlecht ist mit *neun und sechzig* Gattungen vermehrt. Da aber 2. Gattungen der XII. Edit. anderswohin versetzt, und an deren Stelle neue eingeschaltet worden, so beträgt die Anzahl der neu hinzugekommenen Gattungen überhaupt *ein und siebenzig*. — Bey der 3ten Gattung sind *sieben*, bey der 4ten *drey*, bey der 7ten *neun*, bey der 21ten *zwei*, bey der 23ten *drey*, bey der 25ten *vier*, bey der 36ten *vier* Varietäten aus einander gesetzt.

B. Unbestimmtere Thiere.

I. *Der niedliche Fink.**Latham*, Syn. Suppl. p. 168. Lovely Finch.*Latham*, Vögel, II. I. p. 309. n. 98. *der niedliche Fink.**Latham*, Syst. ornith. I. p. 441. n. 23. Fringilla (Formosa) viridis, gula iuguloque flavescensibus,

abdomine albo nigroque fasciato, rostro pedibusque rubris.

Vielleicht das Weibchen von *Fringilla Ele-*
gans, p. 912. n. 61.?

2. Der Nootka-Fink.

Latham, Syn. Suppl. p. 170. Nootka Finch.

Latham, Vögel, II. 1. p. 310. n. 104. der Nootka-
Fink.

Latham, Syst. ornith. I. p. 442. n. 35. β . *Fringilla*
tota nigra rostro albo.

Vielleicht eine Spielart von *Fringilla Nitens*.
p. 909. n. 49.?

3. Der ostindische Sperling. *Fringilla Inda*.

Latham, Vögel, II. 1. p. 312. n. 108. der ostin-
dische Sperling.

Lichtenstein, hamburgisches Naturalienverzeich-
niß 1793. p. 46. n. 446.

4. Der rothschwänzige Fink. *Fringilla Phoenicurus*.

Latham, Vögel, II. 1. p. 312. n. 109. der roth-
schwänzige Fink.

Lichtenstein, Naturalienverzeichniß, p. 47. n. 447.

C. Neuere Gattungen.

1. Der spitzschwänzige Fink.

Latham, Vögel, II. 1. p. 311. n. 106. der spitz-
schwänzige Fink.

Latham, Syst. ornith. I. p. 459. n. 85. *Fringilla*
(*Caudacuta*) fusco rufoque varia, superciliis,
gula cerviceque rufis, cauda integra, rectrici-
bus omnibus apice acutis.

2. Der georgische Fink.

Latham, Vögel, II. 1. p. 311. n. 7. der Georgische
Fink.

Latham,

Latham, Syst. ornith. I. p. 460. n. 86. Fringilla (Georgiana) fusca subtus albida, tectricibus alarum minoribus toto, remigibus rectricibusque extus rufis, gula iuguloque murinis, striga submaxillari divaricata nigra.

3. Der Kaiserfink; (in China.)

Latham, Vögel, II. I. p. 310. n. 100. der Kaiserfink.

Latham, Syn. Suppl. p. 169. Imperial Finch.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 466. n. 111. Fringilla (Imperialis) ferrugineo-fusca, vertice subtusque flava, remigibus caudaque breviore obscuris.

4. Der Fink mit rostfarbenem Halsbande; (auf Terra del Fuego).

Latham, Vögel, II. I. p. 310. n. 103. der Fink mit rostfarbenem Halsbande.

Latham, Syn. Suppl. p. 170. Rusty-collared Finch.

Latham, Syst. ornith. I. p. 466. Fringilla (Australis) fusca, collari ferrugineo.

* EINGESCHOBENES GESCHLECHT.
PHYTOTOMA. Der Pflanzensäger.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 511. Gen. LXX.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 189. Gen. LXXVI.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 466. Gen. XXXIX.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 375. Gen. LXXXI.

I. RARA. Die Rara.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 512. der seltene Pflanzenmäher.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 190. *der seltene Pflanzenmäher.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 466. n. 1. *Phytotoma Rara.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 375. *die Rara.*

113. GESCHLECHT. MUSCICAPA. Der Fliegenfänger. (Fliegenschnäpper.)

Müller, Natursyst. II. p. 595. Gen. CXIII.

Leske, Naturgesch. p. 268. Gen. XLIX.

Borowsky, Thierreich, III. p. 175. Gen. LXX.

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 190. Gen. XXXV.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 529. Gen. LXXIII.

Pennant, arct. Zool. II. p. 358.

Neuer-Schaupl. der Nat. III. p. 127.

Onomat. hist. nat. V. p. 668.

Brisson, ornithol. I. p. 257. Gen. XXIV.

Büffon, Vögel, XIV. p. 5. ff.

Batsch, Thiere, I. p. 359.

Latham, Vögel, II. 1. p. 314. Gen. XXXVIII.

Latham, Syst. ornith. II. p. 467. Gen. XL.

Hermann, tab. affin. anim. p. 228.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 375. Gen. LXXXII.

1. PARADISI. Der paradiesartige Plattschnabel oder Katondieb.

Ist schon p. 445. n. 11. unter dem Namen *Todus Paradiseus* vorgekommen, und muss also hier wegfallen. — S. zool. Beytr. II. 1. p. 559. n. II. not. 4.

2. MUTATA. Der veränderliche Fliegenfänger.

Müller, Natursyst. II. p. 596. n. 2. *der madagaskarische Fliegenfänger.*

Onomat.

Onomat. hist. nat. IV. p. 371. der *Fliegenfänger aus Madagascar.*

Brisson, ornith. I. p. 276. n. 36. Gobe-mouche à longue queue de Madagascar.

Büffon, Vögel, XIV. p. 113. der *Fliegenfänger Schet;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 336. n. 45. der *veränderliche Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 481. n. 55. Muscicapa (Mutata) capite cristato, cauda cuneata, rectricibus intermediis longissimis, palpebris caeruleis.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 116. der *mada-gaskarische Schet.*

β. *Der Schet-all.* (8)

Brisson, ornithol. I. p. 275. n. 34. Gobe mouche à longue queue de Madagascar.

Büffon, Vögel, XIV. p. 115. der *Schet-all.*

Latham, Syn. II. 1. p. 348. n. 45. Var. A.

Latham, Vögel, II. 1. p. 377. n. 45. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 481. n. 55. β.

γ. *Der Schet-Vululu.* (9)

Brisson, ornithol. I. p. 276. n. 35. Gobe mouche à longue queue blanche de Madagascar.

Büffon, Vögel, XIV. p. 116. der *Schet-Vululu.*

Latham, Syn. II. 1. p. 348. Var. B.

Latham, Vögel, II. 1. p. 337. n. 45. Var. B.

Latham, Syst. ornith. II. p. 481. n. 55. γ.

7. STRIATA. *Der gestreifte nordamerikanische Fliegenfänger.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 363. n. 194. der *gestreifte Fliegenfänger.*

Nu 3

Latham,

(8) Nach Brisson eine eigne Gattung.

(9) Nach Brisson eine eigne Gattung.

Latham, Vögel, II. 1. p. 338. n. 46. der gestreifte Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 481. n. 56. *Muscicapa (Striata) cinereo-virens*, dorso nigro striato, subtus flavescens, gula lateribusque pectoris fusco-maculatis, rectricibus extimis tribus apice albis.

3. MARTINICA. Der martinikische Fliegenfänger.

Müller, Natursyst. II. p. 596. n. 3. der martinikische Fliegenfänger.

Onomat. hist. nat. V. p. 371. der Martinikische Fliegenfänger.

Briffon, ornithol. I. p. 259. n. 3. *Gobe-mouche hupé de la Martinique*.

Büffon, Vögel, XIV. p. 49. der martinikische geschoßte Fliegenfänger; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 341. n. 52. der Martinikische Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 483. n. 62. *Muscicapa (Martinica) capite cristato, corpore fusco subtus cinereo, remigum margine extiore albido*.

8. FUSCA. Der schwarzkappige Fliegenfänger.

Pennant, arct. Zool. II. p. 360. n. 186. der Schwarzkopf.

Klein, av. p. 74. n. 5. *Luscinia nigricans*. *Muscipeta nigrescens*.

Klein, Vorbereit. p. 139. n. 5. schwarze Grasmücke.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 75. n. 5. schwärzliche Grasmücke.

Briffon, ornithol. I. p. 260. n. 6. *Gobe mouche brun de la Caroline*.

Büffon,

Büffon, Vögel, XIV. p. 52. der schwärzliche carolinische Fliegenfänger; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 341. n. 53. der schwarzkappige Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornith. II. p. 483. n. 63. Muscicapa (Fusca) fusca subtus albo flavicans, pileo nigro, cauda subforficata.

Seligmann, Vögel, III. tab. 6. schwarzer Fliegenstecher.

4. TYRANNUS. Der gabelschwänzige Fliegenfänger.

Müller, Natursystem, II. p. 597. n. 4. der Tyrann.

Onomat. histor. natur. V. p. 374. der Tyrann.

Pennant, arct. Zool. II. p. 359. n. 182. der Gabelschwanz.

Brissón, ornithol. I. p. 268. n. 2. Tyran à queue fourchue.

Büffon, Vögel, XIV. p. 93. der Savannenfliegenfänger; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 343. n. 59. der gabelschwänzige Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 484. n. 69. Muscicapa (Tyrannus) cauda longissima forficata, corpore nigro, subtus albo.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 114. der Savanna.

Sander, Großs. u. Schön. d. Nat. III. p. 172. der Tyrann.

22. FORFICATA. Der schwalbenchwänzige Fliegenfänger.

Büffon, Vögel, XIV. p. 108. der Fliegenfänger mit gespaltenem Schwanz; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 344. n. 60. der schwalbenchwänzige Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 485. n. 70. *Muscicapa (Forficata) cauda longissima forficata*, corpore pallide griseo, subtus albo, tectricibus alarum cinereis albido undulatis, inferioribus rubris.

Sammel zur Phys. und N. G. III. p. 115. *der mexikanische Fliegenfänger.*

5. SURINAMA. *Der surinamische Fliegenfänger.*

Müller, Natursyst. II. p. 597. n. 5. *der surinamische Fliegenfänger.*

Onomat. hist. nat. V. p. 374. *der surinamische Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. I. p. 348. n. 69. *der Surinamische Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 487. n. 78. *Muscicapa (Surinama) cauda rotundata, apice albo, corpore nigro subtus albo.*

23. FULIGINOSA. *Der dunkelbraune Fliegenfänger.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 54. *der braune Fliegenfänger von Cayenne*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 348. n. 70. *der dunkelbraune Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 487. n. 79. *Muscicapa (Fuliginosa) fusca, flavescente-marginata, subtus albida, pectore subrufo.*

24. AURANTIA. *Der orangenbrüstige Fliegenfänger.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 48. *der gelbrothe Fliegenfänger mit pomeranzfarbiger Brust*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 348. n. 71. *der orangenbrüstige Fliegenfänger,*

Latham.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 487. n. 80. Muscicapa (Auranitia) rufo virescens, subtus alba, pectore pallide-aurantio, capite cerviceque oliveo fuscis.

Berlin. Samml. IX. p. 196. der pomeranzenfarbige Fliegenschnäpper.

25. CORONATA. Der gekrönte Fliegenfänger.

Büffon, Vögel, XIV. p. 80. der rubinrothe geschopfte Fliegenschnäpper; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 348. n. 72. der gekrönte Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornith. II. p. 487. n. 81. Muscicapa (Coronata) crista erecta rotundata, corpore supra fusco, subtus crista lateribusque capitis coccineis.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 112. n. 9. der rothe gehäubte Fliegenschnäpper.

26. RUFESCENS. Der gelbrothe Fliegenfänger.

Büffon, Vögel, XIV. p. 82. der gelbrothe Fliegenschnäpper von Cayenne; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 349. n. 73. der gelbrothe Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornith. II. p. 487. n. 82. Muscicapa (Rufescens) rufescente-nitens, subtus rufo-alba, remigibus nigris, vertice macula rufa.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 111. n. 4. der braune cayennische Fliegenschnäpper.

27. CINEREA. Der aschgraue Fliegenfänger.

Briffon, ornith. I. p. 277. n. 38. Gobe-mouche roux de Cayenne.

Latham, Vögel, II. I. p. 349. n. 74. der grauhälfige Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornith. II. p. 488. n. 83. *Muscicapa* (*Cinerea*) *rufo-fusca*, *abdomine rufescente*, *capite colloque cinereis*, *uropygio pectore caudaque rufis*.

28. PYGMAEA. *Der Zwerghliegenfänger.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 88. *der kleine gefleckte Fliegenvogel von Cayenne*. — *der kleinste Mückenfänger*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 349. n. 75. *der Zwerghliegenfänger.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 488. n. 84. *Muscicapa* (*Pygmaea*) *fusco-cinerea*, *subtus flavescentis*, *capite cerviceque rufis nigro maculatis* *sub oculis fascia pallida*.

29. MINUTA. *Der kleinste Fliegenfänger.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 88. *die erste Art Mückenfänger.*

Latham, Vögel, II. I. p. 350. n. 76. *der kleinste Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 488. n. 85. *Muscicapa* (*Minuta*) *olivaceo-grisea*, *dorso supremo corporeque subtus viridi adumbratis*, *striis alarum flavescentibus sparsis*.

30. BARBATA. *Der bärtige Fliegenfänger.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 46. *der bärtige Fliegenfänger*; m. z. Figg. M. u. W.

Latham, Vögel, II. I. p. 350. n. 77. *der bärtige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 488. n. 86. *Muscicapa* (*Barbata*) *olivaceo-fusca*, *subtus uropygio que virescente-flava*, *vertice aurantio*.

Sammil. zur Phys. u. N. G. III. p. III n. 3. *der bärtige cayennische Fliegenfänger.*

Donn-

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 176. n. 1.
der bärtige Fliegenfänger.

31. RUBRICOLLIS. Der Piauhau.

Brisson, ornith. I. p. 265. n. 15. Grand Gobe-mouche noir de Cayenne.

Büffon, Vögel, XIV. p. 149. der Piauhau; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 350. n. 78. der purpurkeh-lige Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 489. n. 87. Muscicapa (Rubricollis) nigra iugulo maris speciosa purpureo-coccinea.

Samml. zur Phyl. und N. G. III. p. 119. der Piauhau.

6. CRINITA. Der amerikanische Fliegenfänger. (10)

Müller, Natursyst. II. p. 597. n. 6. der amerikani-sche Fliegenfänger.

Onomat. hist. nat. V. p. 370. der amerikanische Fliegenfänger.

Klein, av. p. 69. n. 28. Turdus cristatus. Musci-capa cristata, ventre luteo.

Klein, Vorbereit. p. 132. n. 28. Schuppdrossel.

Klein, verb. Vögelhist. p. 59. n. 29. Schopfdrossel.

Brisson, ornithol. I. p. 272. n. 28. Gobe-mouche hupé de Virginie.

Büffon, Vögel, XIV. p. 111. der grüngezopfte Fliegenfänger.

Pennant, arct. Zool. II. p. 360. n. 184. der Flie-genfänger mit dem Federbusche.

Latham, Vögel, II. 1. p. 344. n. 61. der Fliegen-fänger mit dem Federbusche.

Latham, Syst. ornith. II. p. 485. n. 71. Muscicapa (Crinita) capite cristato colloque caerule-scenti-

(10) Gewicht 1. Unze. Penn.

scentibus, abdomine flavescente, dorso virescente, remigibus rectricibusque rufis.

Seligmann, Vögel, III. tab. 4. der gehaubte Fliegenstecher mit gelbem Bauch.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 116. der virginische Fliegenschnäpper mit grüner Kuppe.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 170. n. 10. *Turdus (Crinitus)* capite colloque caerule-scente, abdomine flavescente, dorso virescente, rectricibus remigibusque rufis, capite cri-fato.

Gentl. Magaz. XXII. tab. p. 556.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 376. n. 2. der amerikanische Fliegenschnäpper.

32. FEROX. Der Tyrannenfliegenfänger.

Brisson, ornith. I. p. 268. n. 21. *Tyran de Cayenne*.

Büffon, Vögel, XIV. p. 137. der Tyrann von Cayenne; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 345. n. 62. der Tyrannen Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornith. II. p. 485. n. 72. *Muscicapa (Ferox) fusca*, subtus flavesiens, collo inferiore pectoreque coccineis.

13. Der kleine cayennische Tyrann.⁽¹⁾

Brisson, ornith. I. p. 269. n. 22. petit Tyran de Cayenne.

Büffon, Vögel, XIV. p. 138. der kleine cayennische Tyrann.

Latham, Syn. II. I. p. 358. n. 62. Var. A.

Latham, Vögel, II. I. p. 345. n. 62. Var. A.

Latham, Syst. ornith. II. p. 485. n. 72. β.

33. LU-

(1) Nach *Brisson* eine eigne Gattung.

33. LUDOVICIANA. Der louisianische Fliegenfänger.

Büffon, Vögel, XIV. p. 141. der Louisianische Tyrann.

Latham, Vögel, II. 1. p. 345. n. 63. der Louisianische Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornith. II. p. 486. n. 73. Muscicapa (Ludoviciana) griseo fusca, subtus flavescens, gula cinerea, tectricibus alarum maioribus albo variegatis, remigibus rectricumque marginibus rufis.

Sammel. zur Phys. u. Naturgesch. III. p. 118. der louisianische Tyrann.

34. AUDAX. Der Caudec.

Büffon, Vögel, XIV. p. 139. der Tyrann Caudec; in. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 345. n. 64. der gelbkap-pige Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornith. II. p. 486. n. 74. Muscicapa (Audax) nigricans rufo undulata, subtus flavicans, vertice flavo, capistro albo, uropygio caudaque rufis.

Sammel. zur Phys. u. N. G. III. p. 118. der Caudec.

9. ATRICAPILLA. Der gemeine Fliegenschnäpper. (2)

Müller, Natursyst. II. p. 598. n. 9. der schwarze Fliegenfänger.

Leske,

(2) Die richtige Auseinandersetzung der zu dieser Gattung, und den dahin gerechneten Varietäten, gehörigen Synonymen ist mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Ich habe sie indessen so geordnet, wie sie nach Anleitung unsers Systems geordnet werden müssten. Neuerlich aber hat Beckstein durch die Bekanntmachung vieljähriger eigner Beobachtungen hierüber ein ganz neues Licht verbreitet; dass ich also nothwendig seine Beimerkungen

Leske, Naturgesch. p. 268. n. 1. der schwarzrückige Fliegenfänger.

Borowsky, Thierreich, III. p. 176. n. 2. der schwarze Fliegenfänger.

Blumen-

kungen hier mittheilen muss. Er macht aus diesen Vögeln drey verschiedene Gattungen. 1) *Der Fliegenfänger mit dem Halsbande*, den er *Muscicapa collaris* genannt wissen will. Dies ist *Muscicapa atricapilla* Gmel. n. 9. γ. — *Pied Fly-catcher Lath.* Ver. B. — *Gobe-mouche noir à collier Buff.* — Er ist oben schwarz, um den Hals geht ein weisser Kragen, und die äussere Schwanzfeder hat einen weissen Streifen. Findet sich nur einzeln in Europa und Deutschland. Kommt unter den Vögeln seines Geschlechts zuerst in Thüringen an. Fliegt einzeln, bis zur Mitte des Mayes in den Gärten am Fuße des Thüringer Waldes herum, begiebt sich alsdann tief in die Berge in die Buchwälder, und zieht zu Ende des Augusts wieder weg. Nistet in hohlen Eichen oder auf niedrigen Buchästen jährlich Einmal. Das Nest besteht aus Moos und Thierhaaren. Legt 4. bis 6. bläulich grüne braungefleckte Eyer. Brütet 14. Tage. — 2) *Der schwarzrückige Fliegenfänger*. *Muscicapa atricapilla Linn.* — *Gobe-mouche de Lorraine Buff.* — *Pied Fly-catcher Lath.* — Frisch tab. 24. Fig. 2. — Ist oben schwarz, unten und an der Stirn weiß, und die beyden äussersten Schwanzfedern haben einen weissen Streifen. — Er ist der dümmste Vogel unter seinen Verwandten, der sich fast mit Steinen tott werfen lässt. Kommt in Thüringen zu Ausgange des Aprills oder zu Anfang des Mayes, etliche Tage nach der vorhergehenden Art in Gesellschaft von 12. bis 20. an, und verschwindet im September unvermerkt. Nistet in hohlen Eichen, Buchen und besonders Aspen. Das Nest besteht nur aus einer Unterlage von Moos und Haaren. Legt 4. bis 6. braunlich gewässerte Eyer. — 3) *Der schwarzgrauie Fliegenfänger*. *Muscicapa Muscipeta Bechst.* — *Traquet* — Ist am Oberleibe graubraun, und die drey äussersten Schwanzfedern haben einen weissen Fleck. Er kommt in der ersten Hälfte des Mayes etliche Tage nach dem vorhergehenden an, und wird einzeln auf den Feldbäumen, in Alleen und Gärten, und in gebürgigen Gegenden, wo Hölzer, Bäume und Hecken sind, angetroffen. Ist sehr schen, und versteckt sich gern in den be-
lanbten

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 190. n. 1. *Muscicapa* (*Atricapilla*) *nigra*, subtus frontisque macula alaruunque speculo albis, rectricibus lateralibus extus albis; *der Fliegenfänger*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 530. n. 2. *der schwarzhückige Fliegenfänger*.

Funke, Naturgesch. I. p. 269. *der Fliegenfänger*.

Pennant, Arch. Zool. II. p. 364. B. *der scheckige Fliegenfänger*.

Onomat. hist. nat. V. p. 668. *der schwarze Fliegenfänger*.

Klein, av. p. 75. n. 12. *Luscinia alis variegatis*.

Klein, Vorbereit. p. 141. n. 12. *schwarze Grasmücke mit bunten Flügeln*.

Klein, verb. Vögelh. p. 76. n. 12. *schwarze Grasmücke mit bunten Flügeln*.

Brisson, ornithol. I. p. 431. n. 27. *Traquet d'Angleterre*.

Büffon, Vögel, XV. p. 249. *das englische Weißkehlchen*.

Martini, Naturlex. V. p. 50. *englische Bachstelze*.

Halle, Vögel, p. 343. n. 323. *der schwarze Fliegenstecher?*

Latham, Vögel, II. 1. p. 316. n. 2. *der bunte Fliegenfänger*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 467. n. 2. *Muscicapa* (*Atricapilla*) *nigra*, subtus frontisque macula

Iaubten Ästen, wo ihm die Insecten, die im Schatten ihre Zuflucht suchen, zur Beute werden. Er nistet in Hecken, Büsche und die dichten Zweige der Bäume, z. B. in Lindenalleen, auch in hohle ofne Bäume. Sein Nest besteht aus Moos, zarten Wurzeln, und ist innwendig mit Haaren gefüttert. Er hat unter allen Fliegenfängern noch den meisten Kunsttrieb. Legt 3. bis 5. Eyer, die auf weissem Grunde braune Punkte haben. S. *Latham*, Vögel, II. 1. p. 317. not. v. — Ist nicht mit *Motacilla Atricapilla* zu verwechseln.

cula alarumque speculo albis, rectricibus late-
ralibus extus albis.

Seligmann, Vögel, II. tab. 59. die schwarze Gras-
mücke mit bunten Flügeln. M. u. W.

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 125. n. 1. der schwar-
ze Fliegenfänger.

Bock, Naturgesch. von Preuß. IV. p. 432. der
schwarze Fliegenfänger.

Naturforsch. XVII. p. 97. n. 200. der schwarze
Fliegenfänger. (Lauter Mischmasch.)

Fabric. Reis. nach Norwegen, p. 334. Muscica-
pa atricapilla?

Neue schwed. Abhandl. IV. p. 50. Muscicapa atri-
capilla.

Sander, Gross. u. Sch. in der Nat. III. p. 171. der
schwarze Fliegenschnapper.

Borkhausen, Magaz. I. p. 172. n. 44. der schwar-
ze, braune Fliegenfänger.

Hermann, tab. affin. anim. p. 228. 229. Musci-
capa Atricapilla.

Müller, zool. dan. prodr. p. 32. n. 268. Motacilla
(Leucomela) nigra, subtus macula alarum linea-
que transversa pone rostrum albis?

Levin, britt. Birds. III. tab. 88.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 376. n. 3.
der gemeine Fliegenschnäpper.

β. *Briffon*, ornith. I. p. 264. n. 13. Gobe-mouche
noir. (3)

Latham, Vögel, II. 1. p. 316. n. 2. Var. A. cf.
not. 1. et p. 319. n. 3.

Latham, Syst. ornith. II. p. 468. n. 2. β.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 31. n. 17. Ficedula
secunda.

Zonston, av. p. 311. Ficedula tertia Aldrovandi.

γ. *Büffon*,

(3) Nach *Briffon* eine eigne Gattung.

γ. **Büffon**, Vögel, XIV. p. 17. der schwarzplättige Fliegenfänger; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 316. n. 2. Var. B. cf. p. 318. n. 2.

Latham, Syst. ornith. II. p. 468. n. 2 γ.

Samml. zur Phys. u. N.G. III. p. 110. der schwarz-rückige, oder der lothringische Fliegenfänger. Neueste Mannigfalt. IV. p. 199. Meerschwarzplättchen.

Zorn, Petinotheol. II. p. 383. der schwarz und weißscheckigte schmatzende Fliegenvogel.

Börner, schles. ökon. Nachr. 1781. p. 104. Muscicapa atricapilla.

Kramer, Ausl. p. 377. n. 16. Motacilla, fronte, torque, pectore et alarum macula albis, vertice tergo et cauda nigra. Meerschwarzplattl; Baumschwalbl.

10. **RUTICILLA.** Der rothschwänzige Fliegen-fänger.

Müller, Natursyst. II. p. 598. n. 10. der Roth-schwanz.

Onomat. hist. nat. V. p. 373. der Rothschwanz.

Pennant, arct. Zool. II. p. 370. n. 199. der Schwarzkopf.

Briffon, ornith. I. p. 264. n. 14. Gobe-mouche d'Amerique.

Büffon, Vögel, XIV. p. 73. der rothschwänzige Fliegenschnäpper.

Latham, Syst. ornith. II. p. 473. n. 22. Muscicapa (Ruticilla) nigra subtus alba, pectore macula alarum basique remigum rectricumque flavis.

Seligmann, Vögel, III. tab. 34. amerikanisches Rothschwänzlein.

Seligmann, Vögel, IV. tab. 55. das kleine amerikanische Rothsche Wänzlein.

Pallas, Naturgesch. merkw. Th. VI. p. 20. die fünfte Art Plattschnabel.

β. Seligmann, Vögel, VII. tab. 47. der Fliegenfänger mit gelbem Schwanz. (das Weibch.)

Büffon, Vögel, XIV. p. 77 Edwards Fliegen-schnäpper mit gelbem Schwanz.

II. VIRENS. Der grünliche Fliegenfänger. (4)

Müller, Natursyst. II. p. 599. n. II. der grüne Fliegenfänger.

Halle, Vögel, p. 324. n. 288. die falbe Grasmücke mit braunen Flügeln.

Pennant, arct. Zool. II. p. 361. n. 187. der aschgraue Fliegenfänger.

Onomat. hist. nat. V. p. 375. der grüne Fliegen-fänger.

Klein, av. p. 74. n. 7. Luscinia, Muscicapa fusca.

Klein, Vorbereit. p. 140. n. 7. Fahle Grasmücke mit braunen Flügeln.

Klein, verb. Vögelhist. p. 75. n. 7. Falbe Grasmücke mit braunen Flügeln.

Brisson, ornithol. I. p. 261. n. 7. Gobe-mouche cendré de la Caroline.

Büffon, Vögel, XIV. p. 66. der braune Fliegen-schnäpper aus Carolina; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 339. n. 47. der aschgraue Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornith. II. p. 482. n. 57. Musci-capa (Virens) fusco-virens, subtus lutea, superciliis albis.

Seligmann, Vögel, III. tab. 8. der kleine braune Fliegenstecher.

35. VIRI-

(4) Gewicht, nach Pennant, neun Pfenniggewicht.

35. VIRIDIS. *Der geschwätzige Fliegenfänger.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 359. n. 183. *der Schwätzer.*

Klein, av. p. 69. n. 26. *Turdus pectoraleo.*

Klein, Vorbereit. p. 131. n. 26. *gelbbrüstige Drossel.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 69. n. 27. *gelbe Drossel.*

Briffon, ornithol. I. p. 245. n. 55. *Merle vert de la Caroline.*

Büffon, Vögel, IX. p. 157. *die grüne karolinische Amsel.*

Lathom, Vögel, II. I. p. 339. n. 48. *der geschwätzige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 482. n. 58. *Muscicapa (Viridis) obscure viridis, subtus lutea, superciliis maculaque sub oculis candidis, imo ventre fodi de albo, rectricibus fuscis.*

Seligmann, Vögel, II. tab. 100. *die gelbbrüstige Drossel.*

Linne', Syst. Nat. Ed. X. I. p. 171. n. 16. *Turdus (Virens) subtus lutescens, superciliis albis.*

36. SIBIRICA. *Der sibirische Fliegenfänger.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 364. A. *der braune Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. I. p. 340. n. 49. *der Sibirische Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 482. n. 59. *Muscicapa (Sibirica) fusca subtus cinerea, gula crisoque albo maculatis.*

37. ERYTHROPIS. *Der rothstirnige Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. I. p. 340. n. 50. *der Fliegenfänger mit rothem Gesichte.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 482. n. 60. *Muscicapa (Erythropis) supra varia subtus alba, fronte rubra, sub alis rufa.*

- 12. CAYANENSIS.** *Der cayennische Fliegenfänger.*
 Müller, Natursyst. II. p. 599. *der cajennische Fliegenfänger.*
 Onomat. hist. nat. V. p. 360. *der Cajennische Fliegenfänger.*
 Brisson, ornith. I. p. 270. n. 24. *Gobe-mouche de Cayenne.*
 Buffon, Vögel, XIV. p. 84. *der Fliegenschnäpper mit gelbem Bauche;* m. e. Fig.
 Latham, Vögel, II. 1. p. 343. n. 58. *der Cayennische Fliegenfänger.*
 Latham, Vögel, II. 1. p. 346. n. 65. *der gelbbäuchige Fliegenfänger.*
 Latham, Syn. Suppl. p. 173. *Cayenne Flycatcher.*
 Latham, Syst. ornith. II. p. 484. n. 68. *Muscicapa (Cayanensis) fusca, subtus lutea, superciliis albis, vertice sanguantio.*
 Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 111. n. 4. *der braune cayennische Fliegenfänger.*

- 13. CANADENSIS.** *Der canadische Fliegenfänger.*
 Müller, Natursyst. II. p. 599. n. 13. *der canadische Fliegenfänger.*
 Onomat. hist. nat. V. p. 369. *der canadische Fliegenfänger.*
 Pennant, archt. Zool. II. p. 362. n. 190. *der Canadische Fliegenfänger.*
 Brisson, ornith. I. p. 270. n. 25. *Gobe-mouche cendré de Canada.*
 Latham, Vögel, II. 1. p. 342. n. 55. *der Canadische Fliegenfänger.*
 Latham, Syst. ornith. II. p. 484. n. 65. *Muscicapa (Canadensis) cinerea subtus lutea, loris luteis, vertice nigro maculato.*

38. CINNAMOMEA. Der zimmetfarbige Fliegenfänger.

Latham, Vögel, II. I. p. 342. n. 56. der zimmetbraune Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornith. II. p. 484. n. 66. Muscicapa (Cinnamomea) flavo-cinnamomea nebulosa, subtus uropygio fasciaque tectricum flavescentibus, rectricibus obscuris ferrugineo maculatis.

39. SPADICEA. Der Fliegenfänger mit gelbem Steife.

Latham, Vögel, II. I. p. 342. n. 57. der Fliegenfänger mit gelbem Steife.

Latham, Syst. ornith. II. p. 484. n. 67. Muscicapa (Spadicea) rubro-fusca, subtus obscure flavescentis, uropygio flavo, remigibus rectricibusque fuscis.

44. OLIVACEA. Der olivenfarbige Fliegenfänger.

Müller, Natursystem, II. p. 599. n. 14. der olivenfarbige Fliegenfänger.

Onomat. histor. natur. V. p. 372. der olivenfarbige Fliegenfänger.

Pennant, arct. Zool. II. p. 361. n. 188. das Rothauge.

Klein, av. p. 74. n. 6. Luscinia, Muscicapa oculis rubris.

Klein, Vorbereit. p. 139. n. 6. die bunte Grasmücke mit rothen Augen.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 75. n. 6. Rothauge, p. 167. n. 2. olivenfarbiger Fliegenstecher.

Briffon, ornithol. I. p. 271. n. 27. Gobe-mouche de la Jamaïque.

Büffon, Vögel, XIV. p. 57. der olivenfarbige Fliegenschnäpper von Jamaika; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 340. n. 51. der rothäugige Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 482. n. 61. Muscicapa (Olivacea) olivacea, subtus albidior, superciliis albis, oculis rubris.

Seligmann, Vögel, III. tab. 8. der rothaugige Fliegenstecher.

Seligmann, Vögel, IV. tab. 43. der olivenfarbige Fliegenstecher.

Browne, Jam. p. 476. Oriolus subolivaceus, canorus, rostri apice attenuato, adunco.

β. *Briffon*, ornith. I. p. 271. n. 26. Gobe-mouche olive de Canada. (5)

Latham, Vögel, II. I. p. 341. n. 51. Var. A.

Latham, Syst. ornith. II. p. 483. n. 6. β.

15. SENEGALENSIS. Der senegalische Fliegenfänger.

Müller, Natursyst. II. p. 600. n. 15. der Senegaleische Fliegenfänger.

Onomat. histor. natur. V. p. 373. der Senegallische Fliegenfänger.

Briffon, ornithol. I. p. 262. n. 10. Gobe-mouche à poitrine rouge du Sénégal.

Büffon, Vögel, XIV. p. 34. der senegalsche Fliegen schnäpper mit rother Brust.

Latham, Vögel, II. I. p. 321. n. 5. der Senegalsche Fliegen schnäpper.

Latham, Syst. ornith. II. p. 470. n. 8. Muscicapa (Senegalensi) varia, superciliis albis, rectricibus extimis dimidiato-albis.

β. *Briffon*, ornithol. I. p. 263. Gobe-mouche à poitrine noire du Senegal. (6)

Büffon,

(5) Nach *Briffon* eine eigne Gattung.

(6) Nach *Briffon* eine eigne Gattung.

Büffon, Vögel, XIV. p. 35. der Senegalsche Fliegenfänger mit schwarzer Brust.

Latham, Syn. II. I. p. 329. n. 5. Var. A.

Latham, Vögel, II. I. p. 322. n. 5. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 470. n. 8. β.

40. CRISTATA. Der gehäubte Senegalische Fliegenfänger.

Briffon, ornithol. I. p. 274. n. 33. Gobe-mouche hupé du Senegal.

Büffon, Vögel, XIV. p. 37. der geschopfte Senegalsche Fliegenfänger; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 322. n. 6. der gehäubte Senegalsche Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 470. n. 9. Muscicapa (Cristata) cristata castanea, subtus cinerea, capite colloque inferiore nigro-virescentibus, rectricibus castaneo-purpureis, cauda elongata.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 110. der gehäubte senegallische Fliegenfänger.

41. BORBONICA. Der bourbonische Fliegenfänger. (?)

Briffon, ornithol. I. p. 274. n. 32. Gobe-mouche hupé de l'isle de Bourbon.

Büffon, Vögel, XIV. p. 37. der geschopfte Fliegenfänger von der Insel Bourbon; m. e. Fig.

Latham, Syn. Suppl. p. 171. Bourbon Flycatcher.

Latham, Vögel, II. I. p. 322. n. 7. der Bourbonische Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornith. II. p. 470. n. 10. Muscicapa (Borbonica) cristata spadicea, subtus cinerea, capite nigro-virescente, rectricibus pallide spadiceis.

(7) Nach Büffon eine Abart vom vorigen.

43. MELANOPTERA. *Der braunkehlige Fliegenfänger.*

Briffon, ornithol. I. p. 261. n. 8. Gobe-mouche à collier du Sénégal.

Büffon, Vögel, XIV. p. 42. der braunkehliges Fliegenschnäpper; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 323. n. 8. der braunkehlige Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornith. II. p. 471. n. 11. *Muscicapa* (*Collaris*) *plumbeo-cinerea*, *subtus fasciaque alarum alba*, *collo inferiore subcastaneo*, *rectricibus nigris*, *lateralibus apice albis*.

43. NIGRIFRONS. *Der schwarzstirnige Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 323. n. 9. der schwarzstirnige Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornith. II. p. 471. n. 12. *Muscicapa* (*Nigrifrons*) *fusca*, *subtus fusco-olivacea*, *fronte lateribusque capitinis nigris*, *guttura flavo*.

44. LEUCURA. *Der weisschwänzige Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 323. n. 10. der weisschwänzige Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornith. II. p. 471. n. 13. *Motacilla* (*Leucura*) *cinereo-grisea*, *subtus alba*, *rectricibus lateralibus nigro alboque oblique dimidiatis*.

45. PONDICERIANA. *Der coromandelische Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 324. n. 11. der Coromandelische Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornith. II. p. 471. n. 14. *Muscicapa* (*Pondiceriana*) *cinereo-grisea*, *subtus alba*, *superciliis albis*, *rectricibus alarum albo-maculatis*,

tis, rectricibus lateralibus griseo alboque dimidiatis.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 154. die Grasmücke von Pondichery; Indianische Nachtigall.

46. A F R A. Der gelbfleckte Fliegenfänger.

Latham, Vögel, II. I. p. 324. n. 12. der gelbfleckte Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornith. II. p. 472. n. 15. Muscicapa (Afra) fordide flava, maculis obscuris, vertice rufo nigro striato, alis caudaque rufis.

47. C A N A. Der Kinki-Manou.

Briffon, ornithol. I. p. 266. n. 17. Grand gobemouche cendré de Madagascar.

Büffon, Vögel, XIV. p. 142. der Kinki-Manou; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 324. n. 13. der aschfarbige Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornith. II. p. 472. n. 16. Muscicapa (Cana) cinerea, capite saturatiore, rectricibus nigris, duabus extimis apice cinerascentibus, remigibus intus albis.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 119. Kinki-manou.

48. M A D A G A S C A R I E N S I S. Der Vira-ombé.

Briffon, ornith. I. p. 442. n. 46. grand Figuier de Madagascar.

Latham, Vögel, II. I. p. 325. n. 14. der Madagaskarische Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 472. n. 18. Muscicapa (Madagascariensis) viridi. olivacea, gutture flavo, collo inferiore pectoreque flavescentibus.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 154. der
Vira-ombé aus Madagascar.

49. UNDULATA. Der wellenförmig gezeichnete
Fliegenfänger.

Büffon, Vögel, XIV. p. 32. der Fliegenfänger
von der Insel Frankreich.

Latham, Vögel, II. I. p. 325. n. 15. der wellen-
förmige Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 472. n. 19. Musci-
capa (Undulata) albido fuscoque undulatim va-
ria, capite fuso-nigricante, alis rufo-fuscis.

50. TECTEC. Der Tectec.

Brisson, ornithol. I. p. 258. n. 2. Gobe-mouche
de l'isle de Bourbon.

Büffon, Vögel, XIV. p. 38. 39. not. I. Muscicapa
borbonica.

Latham, Vögel, II. I. p. 325. n. 16. der Indische
Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 473. n. 20. Musci-
capa (Tectec) fusca, pennis rufescente-margi-
natis, subtus rufescens, collo inferiore sordide
albo.

51. RUFIVENTRIS. Der Fliegenfänger mit gelb-
rotem After.

Büffon, Vögel, XIV. p. 38. not. o.

Latham, Vögel, II. I. p. 326. n. 17. der Fliegen-
fänger mit gelbrottem After.

Latham, Syst. ornith. II. p. 473. n. 21. Muscicapa
(Rufiventris) nigra, abdomine criso macula ala-
rum basique caudae fulvo-rufis.

52. COMATA. Der koppige Fliegenfänger.

Latham, Vögel, II. I. p. 326. n. 18. der koppige
Fliegenfänger.

Latham,

Latham, Syst. ornithol. II. p. 474. n. 25. Muscicapa (Comata) nigra, capite cristato, corpore subtus, uropygio rectricibusque duabus intermediis apice albis, crrosso flavo.

53. HAEMORRHUSA. Der Fliegenfänger mit rothem After.

Latham, Vögel, II. I. p. 326. n. 19. der Fliegenfänger mit rothem After.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 475. n. 26. Muscicapa (Haemorrhusa) fusco-undulata, capite subcristato caudaque nigris, pectore abdomineque albis, crrosso rubro.

β. Latham, Vögel, II. I. p. 326. n. 19. Var. A. Der Fliegenfänger mit gelbem After.

Latham, Syn. II. I. p. 335. n. 19. Var. A. Yellow-vented Flycatcher.

Latham, Syst. ornith. II. p. 475. n. 26. β. Muscicapa fronte verticeque cristato nigris, lateribus colli, pectore abdomineque albis, crrosso flavo.

54. PSIDIJI. Der Guava-Fliegenfänger.

Latham, Vögel, II. I. p. 326. n. 20. der Guava-Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornith. II. p. 475. n. 27. Muscicapa (Psidiij) fusca, subtus superciliisque albis, crrosso flavescente, fascia suboculari nigra.

Sonnerat, Reis. n. Neuguin. p. 24. der kleine Kujavier.

55. MELANICTERA. Der Malkala-kourla.

Latham, Vögel, II. I. p. 327. n. 21. der gelbbüstige Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornith. II. p. 475. n. 28. Muscicapa (Melanictera) cinereo-fusca luteo mixta, pectore luteo, capite nigro, remigibus rectricibusque obscuris flavescente-mARGINatis.

56. NITENS. Der grünglänzende Fliegenfänger.

Latham, Vögel, II. I. p. 337. n. 22. der grüne Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornith. II. p. 475. n. 29. *Muscicapa* (*Nitens*) *viridis nitens*, gutture pectoreque rufis, uropygio abdomineque flavis, cauda longiore.

57. SINENSIS. Der chinesische Fliegenfänger.

Latham, Vögel, II. I. p. 327. n. 23. der bekränzte Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornith. II. p. 475. n. 30. *Muscicapa* (*Sinensis*) *virescenti-grisea*, subtus flavescentia capite nigro, superciliis gulaque albis, collo inferiore pectoreque griseis.

58. GRISEA. Der graukehlige Fliegenfänger.

Latham, Vögel, II. I. p. 328. n. 24. der graukehlige Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornith. II. p. 476. n. 31. *Muscicapa* (*Grisea*) *nigra* subtus rubescens, collo inferiore saturate-griseo, fascia alarum alba.

59. FLAVICOLLIS. Der gelbhälsige Fliegenfänger.

Latham, Vögel, II. I. p. 328. n. 25. der gelbhälsige Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornith. II. p. 476. n. 32. *Muscicapa* (*Flavicollis*) *viridis*, fronte mystacibusque nigris, vertice orbitis collo inferiore maculisque tribus abdominis flavis, rectricibus 2. intermediiis apice albis.

60. FLAMMEA. Der pomeranzenfarbige Fliegenfänger.

Latham, Syn. Suppl. p. 171. *Flammeous Flycatcher*.

Latham, Vögel, II. I. p. 328. n. 26. der pomeranzenfarbige Fliegenfänger.

Latham,

Latham, Syst. ornith. II. p. 474. n. 23. Muscicapa (Flammea) nigra, corpore subtus dorso postico fascia alarum caudaque apice fulvis.

61. FUSCESCENS. Der Fliegenfänger mit orangefarbenem After.

Latham, Vögel, II. I. p. 329. n. 27. der Fliegenfänger mit orangefarbenem After.

Latham, Syst. ornith. II. p. 476. n. 33. Muscicapa (Fuscescens) subcrißata fuscescens, subtus albida, uropygio crissoque fulvis, cauda subfornicata.

62. LUZONIENSIS. Der Tessacourbé.

Latham, Vögel, II. I. p. 329. n. 28. der schwarze Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornith. II. p. 476. n. 34. Muscicapa (Luzoniensis) violaceo-atra, subtus obscure grisea, macula alarum alba.

Sonnerat, Reis. nach Neuguinea, p. 24. der schwarze Fliegenschnapper.

63. PHILIPPENSIS. Der philippinische Fliegenfänger.

Büffon, Vögel, XIV. p. 110. der philippinische Fliegenfänger.

Latham, Vögel, II. I. p. 330. n. 29. der Philippinische Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornith. II. p. 476. n. 35. Muscicapa (Philippensis) griseo-fusca, subtus alba superciliis albis.

Sammel. zur Phys. u. N. G. III. p. 115. der philippinische Fliegenfänger.

64. CAERULEA. Der azurblaue Fliegenfänger.

Büffon, Vögel, XIV. p. 44. der blaue philippinische Fliegenschnäpper.

Latham,

- Latham*, Syn. Suppl. p. 172. Azure Flycatcher.
Latham, Vögel, II. I. p. 330. n. 30. der azurblaue
 Fliegenfänger.
Latham, Syst. ornith. II. p. 476. n. 36. Muscicapa
 (Caerulea) caeruleo-nitens, subtus caerulecen-
 ti-alba, macula occipitis pectorisque nigra.
 Samml. zur Phys. und N. G. III. p. III. der blaue
 philippinische Fliegenfänger.

65. CYANOCEPHALA. Der blauköpfige Fliegen-
 fänger.

Latham, Vögel, II. I. p. 330. n. 31. der blauköpfi-
 ge Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornith. II. p. 477. n. 37. Muscicapa
 (Cyancephala) saturate rubra, pennis apice
 nigris, subtus fuscescens, capite atro-caeruleo,
 cauda forficata, apice nigro.

Sonnerat, Reis. n. Neuguin. p. 23. der blauköpfige
 Fliegenschnäpper von der Insel Luçon.

66. MANILLENSIS. Der gelbkehlige Fliegenfän-
 ger.

Latham, Vögel, II. I. p. 330. n. 32. der gelbkeh-
 lige Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornith. II. p. 477. n. 38. Muscicapa
 (Manillensis) grisea subtus flava, dorso aliquo
 castaneis, fascia genarum duplo, alarum soli-
 taria, rectricibusque lateralibus albis.

Sonnerat, Reis. n. Neuguin. p. 23. der gelbkehlige
 Fliegenschnäpper der Insel Luçon.

67. FLABELLIFERA. Der Fächerschwänzige Flie-
 genfänger.

Latham, Vögel, II. I. p. 331. n. 33. der Fächer-
 schwänzige Fliegenfänger, tab. 50.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 477. n. 39. Musci-
 capa (Flabellifera) fusco-olivacea, capite tor-
 queaque

queque colli nigris, corpore subtus superciliis
macula alarum rectricibusque lateralibus albis.

68. SUPERCILIOSA. Der Fliegenfänger mit Augenbrauen.

Latham, Vögel, II. I. p. 232. n. 34. der Fliegenfänger mit Augenbrauen.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 477. n. 40. Muscicapa (Superciliosa) cinerea, subtus incarnata, superciliis rectricibusque duabus intermediis nigris, lateralibus albis.

69. CALEDONICA. Der neucaledonische Fliegenfänger.

Latham, Vögel, II. I. p. 232. n. 35. der olivenfarbige Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornith. II. p. 478. n. 45. Muscicapa (Caledonica) viridi-olivacea, subtus flavo-albida, gula crisoque flavis, remigibus ferrugineis.

70. LUTEA. Der dunkelgelbe Fliegenfänger.

Latham, Vögel, II. I. p. 232. n. 36. der dunkelgelbe Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornith. II. p. 478. n. 46. Muscicapa (Lutea) obscure-flava, tectricibus alarum remigibusque nigricante-nebulosis, cauda ad apicem nigricante.

71. OCHROCEPHALA. Der gelbköpfige Fliegenfänger.

Latham, Vögel, II. I. p. 232. n. 37. der gelbköpfige Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornith. II. p. 479. n. 47. Muscicapa (Ochrocephala) flavecente viridis subtus alba, capite collo pectoreque aureo-flavis.

72. FLAVIFRONS. *Der gelbstirnige Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. I. p. 333. n. 38. *der gelbstirnige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 479. n. 48. *Muscicapa* (*Flavifrons*) *flavo olivacea*, *subtus fronteque flavo*, *pone oculos lunula alba*, *alis caudaque fuscis.*

73. NAEVIA. *Der gesprenkelte Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. I. p. 333. n. 39. *der gesprenkelte Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 479. n. 49. *Muscicapa* (*Naevia*) *nigricans* *subtus pallidior*, *dorso medio humerisque albo nebulosis.*

74. MULTICOLOR. *Der rothbäuchige Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. I. p. 333. n. 40. *der rothbäuchige Fliegenfänger*; tab. 51.

Latham, Syst. ornith. II. p. 479. n. 50. *Muscicapa* (*Erythrogaster*) *nigra* *fronte fascia que alarum albis*, *pectore abdome que coccineis.*

75. SANDWICHENSIS. *Der Sandwichische Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. I. p. 333. n. 41. *der Sandwichische Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 479. n. 51. *Muscicapa* (*Sandvicensis*) *fusca* *subtus superciliisque albidis*, *pectore ferrugineo*, *tectricibus alarum remigibus rectricibusque lateralibus apice albis.*

76. OBSCURA. *Der dunkelfarbige Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. I. p. 334. n. 42. *der dunkelfarbige Fliegenfänger.*

Latham,

Latham, Syst. ornith. II. p. 479. n. 52. *Muscicapa* (*Obscura*) *fusca* *subtus cinerascens*, *abdomine rufo imbuto*, *cauda longiore integra*, *rectricibus apice acutiusculis*.

27. MACULATA. Der gefleckte Fliegenfänger.

Latham, Vögel, II. I. p. 334. n. 43. *der buntfliglige Fliegenfänger*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 480. n. 53. *Muscicapa* (*Maculata*) *ferrugineo-fusca*, *subtus fusco-rufescens*, *rectricibus alarum apice ferrugineo-albis*, *rectrice extima apice intus alba*.

16. CAPENSIS. Der capsche Fliegenfänger. (C).

Müller, Natursystem, II. p. 600. n. 16. *der capsche Fliegenfänger*.

Onomat. histor. natur. V. p. 369. *der Capische Fliegenfänger*.

Briffon, ornithol. I. p. 262. n. 9. *Gobe-mouche du Cap de bonne espérance*.

Latham, Syn. II. I. p. 327. n. 3. Var. A.

Latham, Vögel, II. I. p. 320. n. 3. Var. A.

Latham, Syst. ornith. II. p. 468. n. 3. β . M. *fusca subtus alba pectore nigro*, *fascia alarum rufa*, *rectricibus apice albis*.

17. TORQUATA. Der Fliegenfänger mit dem Halsbande.

Müller, Natursystem, II. p. 600. n. 17. *der Ringkragen*.

Onomat. hist. nat. V. p. 774. *der Fliegenfänger mit dem Ringkragen*.

Briffon, ornithol. I. p. 263. n. 12. *Gobe-mouche à collier du Cap de B. E.*

Latham,

(8) Nach *Latham* eine Spielart vom Folgenden,

Latham, Vögel, II. I. p. 318. n. 3. der *Capsche Fliegenfänger*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 468. n. 3. *Muscicapa (Torquata) nigra subtus alba, pectore rufo, remigibus intimis apice albis.*

78. BICOLOR. Der schwarz und weiße Fliegenfänger.

Büffon, Vögel, XIV. p. 63. der *weißäugige Fliegenschnäpper von Cayenne*; — *der schwarz und weiße Fliegenfänger des Edwards*; mit e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 320. n. 4. *der schwarz und weiße Fliegenfänger*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 469. n. 4. *Muscicapa (Bicolor) corpore subtus fronte orbitis uropygio fascia alarum rectricibusque apice albis.*

Seligmann, Vögel, IX. tab. 38. *der schwarz und weiße Fliegenfänger*.

B. Büffon, Vögel, XIV. p. 62. *der Gillit von Cayenne*; m. e. Fig.

Latham, Syn. II. I. p. 328. n. 4. Var. A.

Latham, Vögel, II. I. p. 321. n. 4. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 469. n. 4. *β. M. alba, occipite cervice alis uropygio caudaque nigris.*

18. CAROLINENSIS. Der Katzenvogel.

Müller, Natursystem, II. p. 600. n. 18. *der Carolinische Fliegenfänger*.

Onomat. histor. natur. V. p. 360. *der Carolinische Fliegenfänger*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 362 n. 189. *der Katzenvogel*.

Briffon, ornithol. I. p. 260. n. 6. *Gobe-mouche brun de la Caroline*.

Büffon,

Büffon, Vögel, XIV. p. 104. *der virginische Fliegenfänger*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 341. n. 54. *der Katzen-Fliegenfänger*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 483. n. 64. *Muscicapa (Carolinensis) fusca, subtus cinerea, capite nigro, crisso rubro*.

Seligmann, Vögel, III. tab. 32. *der Fliegenschnäpper mit schwarzer Platte; der Katzenvogel*.

Seligmann, Vögel, IX. tab. 15.

Bartram, Reis. durch Carolina, p. 297. *der Kazzenvogel*.

Saintml. zur Phys. und N. G. III. p. 15. *der virginische Fliegenschnäpper*.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 377. n. 4. *der Katzenvogel*.

29. OCHROLEUCA. *Der goldkehlige Fliegenfänger.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 363. n. 193. *die Goldkehle*.

Latham, Syn. Suppl. p. 173. *Goldenthroat Flycatcher*.

Latham, Vögel, II. I. p. 351. n. 80. *der goldkehlige Fliegenfänger*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 489. n. 89. *Muscicapa (Ochroleuca) olivacea, subtus albida, gula marginata alarum fulvis, remigibus rectricibusque olivaceo-viridibus*.

30. ATRA. *Der Phoebe-Fliegenfänger.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 363. n. 192. *der dunkelbraune Fliegenfänger*.

Latham, Syn. Suppl. p. 173. *Phoebe Flycatcher*.

Latham, Vögel, II. I. p. 351. n. 79. *der Phoebus-Fliegenjäger*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 489. n. 88. *Muscicapa* (*Phoebe*) *cinereo-olivacea* *subtus flaves-*
scens, *pectore cinerascente*, *rectrice extima la-*
tere exteriore alba.

81. NOVEBORACENSIS. *Der Fliegenfänger von Neuyork.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 362. n. 191. *der grüne Fliegenfänger.*

Latham, Syn. Suppl. p. 174. Hanging Flycatcher.

Latham, Vögel, II. I. p. 352. n. 83. *der blaß-grüne Fliegenfänger; kleiner grüner Hänge-vogel.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 489. n. 92. *Muscicapa* (*Noveboracensis*) *pallide viridis*, *capite cinerascente*, *abdomine medio albo*, *fascia alarum duplii alba*, *macula narium lateribusque corporis flavis.*

82. ACADICA. *Der neuschottländische Fliegenfänger.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 360. n. 185. *der Neuschottländische Fink.*

Latham, Syn. Suppl. p. 174. Lesser crested Flycatcher.

Latham, Vögel, II. I. p. 352. n. 82. *der Neuschottländische Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 489. n. 91. *Muscicapa* (*Acadica*) *subcristata cinereo-viridis*, *subtus flavescente-alba*, *fascia alarum duplii alba.*

83. AEDON. *Der rothgraue Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. I. p. 357. n. 95. *der rothgraue Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 478. n. 42. *Muscicapa* (*Aedon*) *fusco-ferruginea*, *subtus flavescenti-albida*, *cauda elongata*, *rectricibus interne-*
diis

diis subaequalibus, extima utrinque longe breviore.

Pallas, Reis. Ausz. III. Anh. p. 5. n. 11 * Muscicapa Aēdon.

84. FERRUGINEA. Der braunrothe Fliegenfänger.

Latham, Vögel, II. 1. p. 357. n. 96. der braunrothe Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 477. n. 41. Muscicapa (Ferruginea) fusco-murina, subtus flavo-alba, gutture candido, alis nigris, pennarum margine ferrugineo.

85. NIGRA. Der Societäts-Fliegenfänger.

Latham, Syn. Suppl. p. 174. Society-Flycatcher.

Latham, Vögel, II. 1. p. 352. n. 84. der Societäts-Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 474. n. 24. Muscicapa (Nigra) nigra, corpore toto nigro, rostro capite interscapulio pedibusque atris.

86. OCHRACEA. Der afrikanische Fliegenfänger.

Latham, Syn. Suppl. p. 175. African Flycatcher.

Latham, Vögel, II. 1. p. 353. n. 87. der Afrikanische Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 472. n. 17. Muscicapa (Ochracea) collo et pectore cinereo-ferrugineis, alis caudaque nigro-cinereis.

87. ALBIFRONS. Der weißstirnige Fliegenfänger.

Latham, Syn. Suppl. p. 175. White-fronted Flycatcher.

Latham, Vögel, II. 1. p. 353. n. 85. der weißstirnige Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornith. II. p. 469. n. 5. Muscicapa (Albifrons) supra nigro-fusca, iugulo et pectore

sordide albis, abdomine dilute ferrugineo, fronte albida, pedibus nigris.

88. MELANOLEUCA. *Der schäckige Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. I. p. 357. n. 97. *der schäckige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 469. n. 6. *Muscicapa (Melanoleuca) nigra*, dorso albo, femoribus albo nigroque annulatis, rectricibus albis apice nigris.

19. PETECHIA. *Der Peteschchen-Fliegenfänger. (*)*

Müller, Naturfyst. II. p. 601. n. 19. *der gefleckte Fliegenfänger.*

Onomat. hist. nat. V. p. 772. *der gefleckte Fliegenfänger.*

Briffon, ornithol. I. p. 259. n. 4. *Gobe-mouche brun de la Martinique.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 106. *der braune martinikische Fliegenfänger*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 347. n. 66. *der Peteschchen-Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 486. n. 75. *Muscicapa (Petechia) fusca subtus cinerea rufo-maculata, gutture crisoque rufis.*

89. VIRGATA. *Der gestrichelte Fliegenfänger.*

Biffon, Vögel, XIV. p. 71. *der gefleckte Fliegenfänger von Cayenne*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 347. n. 67. *der gestrichelte Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 486. n. 76. *Muscicapa (Virgata) subcribata fusca, subtus sordide alba fusco-striata, fascia alarum dupli rufa.*

90. AGI-

(*) Ist nicht mit *Metacilla Petechia*, p. 983. n. 30. zu verwechseln.

90. AGILIS. Der geschäftige Fliegenfänger.

Büffon, Vögel, XIV. p. 69. der olivenfarbige Fliegenfchnäpper aus Cayenne; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 347. n. 68. der geschäftige Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornith. II. p. 486. n. 77. Muscicapa (Agilis) fusco-olivacea subtus albida, gutture subrufo, remigibus caudaque nigricantibus.

20. GRISOLA. Der gestreifte europäische Fliegenfänger.

Müller, Natursyst. II. p. 601. n. 20. der gestreifte Fliegenfänger.

Leske, Naturgesch. p. 268. n. 2. der gestreifte Fliegenfänger.

Borowsky, Thierreich, III. p. 176. n. 3. der gestreifte Fliegenfänger.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 530. n. 1. der gestreifte Fliegenfänger.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 606. der graue Fliegenfänger.

Onomat. histor. natur. V. p. 371. der gestreifte Fliegenfänger.

Klein, av. p. 79. n. 12. Sylvia pestilentialis.

Klein, Vorbereit. p. 147. n. 12. Todtenvogel; Pestilenzvogel; Nosselrinke.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 79. n. 16. Todtenvogel.

Klein, Stemmat. av. p. 14. tab. 16. fig. 9. a — c. Sylvia fusca.

Klein, Vögeleyer, p. 25. tab. 10. fig. 7. 8.

Briffon, ornithol. I. p. 257. n. 1. Gobe-mouche.

Büffon, Vögel, XIV. p. 10. der graue gestreifte Fliegenfchnäpper; m. e. Fig.

- Latham*, Vögel, II. I. p. 314. n. 1. der gestreifte Fliegenfänger.
- Latham*, Syst. ornith. II. p. 467. n. 1. *Muscicapa* (*Grisea*) *subfuscata* subtus albicans, collo longitudinaliter maculato, crisso rufescente.
- White*, N. G. von Engl. p. 11. Stopparola?
- White*, N. G. von Engl. p. 34 n. 19. p. 49. Fliegenschnepper.
- Bock*, N. G. von Preuss. IV. p. 432. der Todtenvogel.
- Siemssen*, meklenb. Vögel, p. 126. n. 2. der gestreifte Fliegenfänger; Graag Hüting.
- Borkhausen*, Magazin, I. p. 172. n. 45. graubrauner Fliegenfänger.
- Naturforsch. XVII. p. 98. n. 202. der gestreifte Fliegenfänger.
- Neue schwed. Abhandl. IV. p. 50. *Muscicapa Grisola*.
- Zorn*, Petinotheol. II. p. 382. der Hauss-Schnäzzzer.
- Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 110. der gemeine oder gestreifte Fliegenschläpper.
- Börner*, schles. ökon. Nachr. 1781, p. 104. *Muscicapa Grisola*.
- Levin*, brit. Birds. III. tab. 87.
- Douendorff*, Handb. der Thiergesch. p. 277. der gestreifte Fliegenschläpper.

21. VARIEGATA. *Der bunte Fliegenfänger.* (9)

- Müller*, Natursyst. II. p. 607. n. 21. der bunte Fliegenfänger.
- Onomat. hist. nat. V. p. 375. der bunte Fliegenfänger.
- Latham*, Vögel, II. I. p. 317. n. 2. Var. C.

Latham,

(9) Nach Latham eine Spielart von *Muscicapa Atticapilla*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 468. n. 2. ♂. M. fusca,
subtus fronte lateribus capitis lineaque longitudinali ab humero ad dorsum albis.

91. DICHROA. Der zweyfarbige Fliegenfänger.

Latham, Vögel, II. I. p. 355. n. 91. der zweyfarbige Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 490. n. 94. Muscicapa (Dichroa) corpore supra cinereo subtus ochraceo, cauda et rectricibus ochraceis cinerisque.

92. DESERTI. Der rufige Fliegenfänger.

Latham, Vögel, II. I. p. 355. n. 92. der rufige Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornith. II. p. 478. n. 44. Muscicapa (Deserti) corpore ex ferrugineo nigricante fuliginoso, alis caudaque nigricantibus, rostro flavieante.

A. Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Edit. XII.

p. 324. n. 1. Muscicapa Pa. p. 445. n. 11. Todus Pararadisi.

p. 326. n. 7. Muscicapa p. 305. n. 23. Lanius Emilia.

p. 326. n. 8. Muscicapa p. 889. n. 25. Tanagra Rubra.

Edit. XIII.

diseus.

ria.

Aestiva.

Das Geschlecht ist um 71. Gattungen vermehrt. Da aber die 1ste Gattung, weil sie schon anderswo aufgeführt worden, hier wegfallen muss; zwey hingegen in andere Geschlechter versetzt, und an deren Stelle neue aufgenommen worden, so beträgt die Anzahl der

neu hinzugekommenen Gattungen überhaupt zwey und siebenzig. — Bey der 2ten Gattung sind drey, bey der 9ten drey, bey der 10ten zwey, bey der 14ten zwey Varietäten aus einander gesetzt.

B. Unbestimmtere Thiere.

1. *Muscicapa Meloxantha.* *Mus. Carls.* IV. n. 97.

Latham, Vögel, II. I. p. 346. n. 5. *der gelbbäuchige Fliegenfänger.*

2. *Der weiße Fliegenfänger.*

Mus. Carlson. III. tab. 74. *Muscicapa alba.*

Lathain, Vögel, II. I. p. 354. not. q. *der weiße Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 490. n. 96. *Muscicapa (Alba) tota alba, capite sulphureo-flavicante.*

Vielelleicht eine Spielart von *Motacilla Flava*?

3. *Muscicapa superciliosa.* *Mus. Carls.* IV. n. 96.

Latham, Vögel, II. I. p. 335. n. 90. *der stolze Fliegenfänger.* *Muscicapa superba.*

4. *Der dunkle Fliegenfänger.*

Lichtenstein, hamburg. Naturalienverzeichniß, 1793. p. 48. n. 462. *Muscicapa obscura.*

Latham, Vögel, II. I. p. 358. n. 98. *der dunkle Fliegenfänger.*

5. *Der fuchsköpfige Fliegenfänger.*

Lichtenstein, l. c. p. 48. n. 463. *Muscicapa adsimilis.*

Latham, Vögel, II. I. p. 358. n. 99. *der Fuchsköpfige Fliegenfänger.*

6. *Der grünbeinige Fliegenfänger.*

Lichtenstein, l. c. p. 48. n. 464. *Muscicapa Choloropus.*

Latham,

Latham, Vögel, II. I. p. 358. n. 100. der grünbeinige Fliegenfänger.

7. Der weißgefranzte Fliegenfänger.

Lichtenstein, l. c. p. 48. n. 462. Muscicapa Striata.

Latham, Vögel, II. I. p. 358. n. 101. der weißgefranzte Fliegenfänger.

8. Der Fliegenfänger mit weißem Gesichte.

Lichtenstein, l. c. p. 49. n. 466. Muscicapa Cristatella.

Latham, Vögel, II. I. p. 358. n. 102. der Fliegenfänger mit weißem Gesichte.

9. Der blaubunte Fliegenfänger.

Lichtenstein, l. c. p. 49. n. 467. Muscicapa naevia.

Latham, Vögel, II. I. p. 358. n. 103. der blaubunte Fliegenfänger.

10. Der kleine Todtenvogel.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 432. n. 202.

Naturforsch. XVI. p. 98. n. 202.

Borkhausen, Magazin, I. p. 174. ad n. 45.

C. Neuere Gattungen.

1. Der neuholändische Fliegenfänger.

Latham, Vögel, II. I. p. 354. n. 88. der Neuholändische Fliegenfänger.

Latham, Syst. ornith. II. p. 478. n. 43. Muscicapa (Novae Hollandiae) fusca subtus albida, sub oculis utrinque ad aures striga flava.

White, voy. to New South-Wales. tab. p. 161.
Yellow-eared Flycatcher.

White, Reis. n. Neusüdwallis; in dem Magaz. merkw. Reisebeschr. V. p. 188. der gelböhrlige Fliegenfänger.

- Meyer*, Uebersl. der zool. Entdeck. p. 53. n. 1. *Mūscicapa novae Hollandiae*.
2. *Der nette Fliegenfänger*; in China.
Latham, Syn. Suppl. p. 173. *Nitid Flycatcher*.
Latham, Vögel, II. 1. p. 352. n. 81. *der nette Fliegenfänger*
Latham, Syst. ornith. II. p. 489. n. 90. *Muscicapa (Nitida) pallide viridis, tectricibus alarum margine albo, remigibus rectricibusque nigricantibus, margine flavo*.
3. *Der Sperlingsfliegenfänger*; auf der Insel Tanna.
Latham, Syn. Suppl. p. 175. *Passerine Flycatcher*.
Latham, Vögel, II. 1. p. 353. n. 86. *der Sperlingsfliegenfänger*.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 490. n. 93. *Muscicapa (Passerina) nigricans subtus alba, cauda nigra*.
4. *Der javanische Fliegenfänger*.
Latham, Vögel, II. 1. p. 354. n. 89. *der Javanische Fliegenfänger*.
Latham, Syst. ornith. II. p. 495. n. 95. *Muscicapa (Javanica) cauda longissima rotundata, corpore nigro ferrugineoque vario subtus albo, iugulo nigro, superciliis albis*.
Mus. Carlson. III. tab. 95. *Muscicapa Javanica*.
5. *Der cambajische Fliegenfänger*.
Latham, Vögel, II. 1. p. 556. n. 93. *der Cambajische Fliegenfänger*.
Latham, Syst. ornith. II. p. 495. n. 97. *Muscicapa (Cambaiensis) nigra nitens dorso viridi-flavescente, corpore subtus fulvo-flavo, tectricibus alarum fascia duplii alba*.
6. *Bichsteins kleiner Fliegenfänger*.
Bichstein, Naturgesch. I. p. 531. n. 4. *der kleine Fliegenfänger*.

Latham,

Latham, Vögel, II. 1. p. 356. n. 94. der kleine Fliegenfänger. Muscicapa parva. Abbild. auf dem Titelblatt.

114. GESCHLECHT. MOTACILLA. Die Motacilla. (Bachstelze; Wedelschwanz; Sänger.)

Müller, Natursyst. II. p. 602. Gen. CXIV.

Leske, Naturgeschichte, p. 269. Gen. L.

Borowsky, Thierreich, III. p. 183. Gen. LXXII.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 190. Gen. XXXVI.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 531. Gen. LXXIV.

Ebert, Naturl. II. p. 140.

Halle, Vögel, p. 317. Gen. I. p. 327. Gen. II. p. 330. Gen. III.

Pennant, arct. Zool. p. 370.

Onomat. hist. nat. V. p. 259.

Klein, av. p. 73. trib. I. Luscinia. p. 76. trib. II. Troglodytes. p. 77. trib. III. Sylvia.

Brisson, ornith. I. p. 413. Gen. XL. Ficedula.

Büffon, Vögel, XV. u. XVI. B.

Batsch, Thiere, I. p. 318. Gen. LXXX.

Latham, Syst. ornith. II. p. 501. Gen. XLII. Motacilla. p. 506. Gen. XLIII. Sylvia.

Hermann, tab. affin. anim. p. 225. sqq.

Donndorff, Handb. der Thiergeesch. p. 377. Gen. LXXXIII.

I. LUSCINIA. Die Nachtigall. (10)

Müller, Natursyst. II. p. 602. n. 1. die Nachtigall.

Leske, Naturgesch. p. 269. n. 1. die Nachtigall.

Borows-

(10) Kommt in Deutschland in der Mitte des Aprils an, wenn die Knospen des Weißdorn gebrochen sind. Die Männchen treffen etwa 8 Tage eher als die Weibchen ein, zuweilen noch etwas

Borowsky, Thierreich, III. p. 185. n. 2. die Nachtigall.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 190. n. 1. Motacilla (Luscinia) rufo-cinerea, armillis cinereis; die Nachtigall; *Phionele*.

Bechst in, Naturgesch. I. p. 531. n. 1. die Nachtigall; Rothvogel.

Funk, Naturgesch. I. p. 253. die Nachtigall.

Ebert, Naturl. II. p. 141. die Nachtigall.

Halle, Vögel, p. 317. n. 281. die Nachtigall; Tagphilomele; Rothvogel; Fig. 18.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II: p. 421. n. 357. die Nachtigall.

Pennant, arct. Zool. II. p. 388. A. die Nachtigall.

Neuer-Schaapl. d. Nat. VI. p. 11. Nachtigall.

Onomat. hist. nat. IV. p. 885. die Nachtigall; Tagschläger; Dörling; Rothvogel. Andow.

Handb. der Naturgesch. II. p. 264. die Nachtigall.

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 133. die Nachtigall.

Klein,

etwas früher, und singen alle des Nachts vor und nach Mitternacht, um die bey hellen Nächten vorüber streichenden Weibchen an sich zu locken. Nachher hört man sie nicht alle mehr des Nachts schlagen, sondern nur beym herannahenden Morgen, und den Tag über abwechselnd: am fleissigsten zu der Zeit, wenn die Weibchen brüten; nachher haben sie mit Fütterung der Jungen zu thun. Die Singzeit dauert etwa drey Monathe. Jede Nachtigall hat ihren eignen Stand, den sie alle Jahre wieder auffsucht, und duldet in der Nähe keine andere. In ihrem Gesange hat man 16. verschiedene Absätze gezählt; und der Kreis, den ihre Stimme erfüllt, mag, wenn die Luft stille ist, an eine englische Meile im Durchmesser betragen. Dass das Weibchen so gut als das Männchen singe, ist eine alte aber irrite Behauptung. Der Gesang ist das einzige untrügliche unterscheidende Zeichen des männlichen Geschlechts. Sonst sind M. u. W. dem äussern Ansehen nach, nicht zu unterscheiden. Zu Anfang des Septembers ziehen die Nachtigallen wieder weg. — Wird im Käfig 10—17. Jahr alt.

Klein, av. p. 73. n. 1. *Luscinia simpliciter*. *Avis rubicunda*.

Klein, Vorbereit. p. 138. n. 1. *kleine Nachtigall*; *Rotvogel*; *Dörling*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 74. n. 1. *kleine Nachtigall*.

Klein, Stemmat. av. p. 12. tab. 16. Fig. 1. a. b.

Klein, Vögeleyer, p. 24. tab. 10. Fig. 5.

Gesner, Vögelb. p. 380. *Nachtigall*; m. e. Fig.

Briffon, ornith. I. p. 420. n. 13. *Rosignol*.

Büffon, Vögel, XV. p. 7. *die Nachtigall*; m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 360. *die Nachtigall*.

Latham, Syn. Suppl. p. 180. *Nightingale*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 506. n. 1. *Sylvia (Luscinia) rufo-cinerea*, *subtus cinereo-alba*, *rectricibus fusco-rufis*, *armillis cinereis*.

Beseke, Vögel Kurl. p. 80. n. 178. *die Nachtigall*.

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 127. n. 1. *die Nachtigall*.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 433. *die Nachtigall*.

Cetti, Sardin. II. p. 210. *die Nachtigall*.

Fischer, Livil. p. 101. n. 161. *Nachtigall*.

White, N. G. von Engl. p. 33. n. 7. p. 59. n. 7. p. 62. n. 1. p. 65. n. 4. p. 77. *die Nachtigall*.

Pontoppidan, Dänem. p. 174. n. 1. *Nachtigall*.

Kämpf, Japan; in *Du Halde Chin.* IV. p. 142. *Nachtigallen*.

Isert, Reis. n. Neuguinea, p. 117. *Nachtigall*.

Linné, Reis. d. Schwed. I. p. 320.

Hasselquist, Palaest. p. 343. n. 13. *Motacilla Luscinia*.

Pallas, nord. Beytr. III. p. 15. *Nachtigall*.

Linné, Abhandl. II. p. 283. n. 38. p. 305. n. 134. *Nachtigall*.

Pennant,

- Pennant*, brit. Thiergesch. tab. 54. *Nachtigall.*
- Dieskau*, Naturgesch. der Nachtigall. Römh. 1779. 8.
- Scopoli*, Bem. aus der N. G. p. 189. n. 227. *die Nachtigall.*
- Beckmann*, Naturhist. p. 55. a. *die Nachtigall.*
- Zorn*, Petinotheol. II. p. 150. 369. 688. *Nachtigall.*
- Aedologie, ou traité du Rossignol franc, ou Chanteur. Paris, 1751. 12.
- Aedologie oder Abhandl. von der Nachtigall. Strasb. 1752. 12. c. f.
- Eberhard*, Thiergesch. p. 84. *die Nachtigall.*
- Unterricht von den verschiedenen Arten der Canarienvögel und Nachtigallen. Frsf. u. Lpzg. 1732. 8.
- Döbel*, Jägerprakt. I. p. 63. *Nachtigall.*
- Naumann*, Vogelsteller, p. 143. *Nachtigall.*
- Hervieux*, von Canarienvög. p. 162. *die Nachtigall.*
- Neueste Mannigfaltigk. IV. p. 203. 223. *die Nachtigall.*
- Allerneueste Mannigfalt. II. p. 714.
- Lichtenberg*, Magaz. für das Neueste, etc. II. 1. p. 110. *die Nachtigall.*
- Berl. Samml. X. p. 155. *die Nachtigall.*
- Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 226.
- Goeze*, nützl. Allerl. II. p. 394. n. 13.
- Goeze*, Natur, Menschenl. u. Vorseh. III. p. 193.
- Beckmann*, phys. ökon. Bibl. IV. p. 468. XVI. p. 37.
- Anweis. Vögel zu fang. p. 396.
- Naturforsch. XVII. p. 98 n 203.
- Merklein*, Thierreich, II. p. 318.
- Börner*, Stadt- u. Landwirthsch. II. p. 249.
- Neu Hamburg. Magaz. XIV. p. 459.
- Beckmann*, Churmark Brandenb. I. p. 614.

Elsholz.

- Elsholzens Tischbuch*, p. 164.
Tänzer, notabil. venatoris, p. 96. n. 121.
André u. Bechstein, Spazierg. I. p. 238. 240.
Olla potrida, 1785. p. 70.
Allgemein. Magaz. der Nat. etc. XII. p. 95.
Preufs. Sammler, II. p. 1616.
Wittenberg. Wochenbl. 1777. p. 267.
Neue Anmerk. über alle Theile der Naturl. III.
 p. 565.
Hannöv. Magazin, 1778. p. 379.
Aldrov. *encomium Lusciniae*, — in *Donav.*
 Amph. I. p. 386.
Petri Fradelii laus Lusciniae, 4.
Bresl. Nat. und Kunstgesch. VIII. Vers. p. 453.
Loniceri, Kräuterb. p. 681.
Zablonsky, allgem. Lex. p. 715.
Oekonom. Zool. p. 100. n. 46.
Meidinger, Vorles. I. p. 153. n. 1.
Schles. ökonom. Gesellsch. 1781. p. 104.
Naturgesch. aus den best. Schrifft. VIII. p. 708.
Onomatol. foreslal. II. p. 891.
Zückert, mater. aliment. p. 113.
Wirsing, Vögel, tab. 55. — *Günther*, Nest.
 u. Ey. tab. 65. *Nachtigall*.
Hist. Prov. I. p. 498.
Voy. en Barbarie, I. p. 273.
Zinnan. Uov. p. 54. tab. 8. fig. 42. *Rusignuolo*.
Russel, Alepp. p. 7.
Gentl. Magaz. XXII. tab. p. 265.
Bomare, dictionn. X. p. 95. — Dictionn. des
 anim. III. p. 714. — Cours d'hist. nat. IV.
 p. 48.
Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 57. *Luscinia*.
Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 8. *Lusci-
 nia*.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 184. n. 1. Motacilla (Luscinia) rufo-cinerea, genuum annulis cinereis.

Kramer, Austr. p. 375. n. 9. Motacilla rufo-cinerea, genuum annulis cinereis; *Au-Vogel*; *Auen-Nachtigall*.

Kramer, Austr. p. 376. n. 10. Motacilla toto corpore rufo, subtus pallidiore. *Wald-Nachtigall*; *Wald-Vogel*.

Charleton, onomast. zoic. p. 92. n. 14. Luscinia.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 295. Luscinia, p. 296. Luscinia minor. *Dörling*.

Rzaczynsky, hist. nat. Polon. p. 286. Luscinia seu Philomela, Aedon, Acredula.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 391. Luscinia minor seu montana.

Belon, hist. nat. des ois. p. 335. Rossignol; Roussignol.

Moehring, av. gen. p. 44. n. 34. Luscinia.

Sibbald, Scot. III. 2. p. 18. obs. 12. Luscinia seu Philomela.

Barrere, ornithol. p. 42. G. 18. sp. 5. Ficedula tota fulva, canora.

Salerne, hist. nat. des ois. p. 230. Rossignol franc; rossignol chanteur; rossignol de bois.

Fonston, av. p. 123. Luscinia.

Plin. hist. nat. L. 10. c. 29. Luscinia.

Turner, histor. av. voc. Luscinia.

Aelian. de nat. animal. L. 1. c. 43. L. 3. c. 40. L. 5. c. 38. L. 12. c. 28. *Anðaw*.

Aristot. hist. anim. L. 4. c. 9. L. 5. c. 9. L. 9. c. 15. 49. *Anðaw*.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 377. n. 1. die Nachtigall.

C. Die große Nachtigall. (1)

Borowsky, Thierreich, III. p. 185. der Sprosser.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 534. n. 2. der Sprosser;
Winternachtigall. Motacilla Philomela.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 604. b.
oben.

Onomat. hist. nat. IV. p. 886. Nachtphilomele;
Sprosser; Sproßvogel; Nachtsänger; Schläger;
Φιλομηλη.

Halle, Vögel, p. 318. n. 282. die Nachtphilomele;
Sprosser.

Klein, av. p. 73. n. 1. Nacht-Schläger.

Klein, Vorbereit. p. 138. n. 1. Sproßvogel; Spros-
ser; Nachtschläger.

Klein, verb. Vögelhist. p. 74. n. 1. große Nachtigall;
Nachtschläger.

Briffon, ornithol. I. p. 421. A. grand Rossignol.

Büffon, Vögel, XV. p. 59. die große Nachtigal.

Latham, Syn. II. 2. p. 411. Var. A. Greater Nightin-
gale.

Latham, Syst. ornith: II. p. 506. n. 1. β. Luscinia
maior.

Siemsen, meklenb. Vögel, p. 128. n. 1. β. der
Sprosser.

Fischer, Livil. p. 101. n. 161. der Nachtschläger.

Döbel, Jägerprakt. I. p. 63. Sprosser.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 229. der
Sprosser.

Borkhausen, Magazin, I. p. 177. n. 50. die große
Nachtigall.

Anweif. Vögel zu fang. p. 594. Sprosser.

Dieskau, Naturgesch. der Nachtigall, p. 12. der
Sprosser.

Frisch, Vögel, tab. 21. fig. 1. a.

Qq 2

γ. Die

(1) Nach Halle, Bechstein, Borkhausen, u. a. eine eigne Cat-
tung.

γ. Die weiße Nachtigall. (2)

Briffon, ornithol. I. p. 421. B. Rossignol blanc.

Büffon, Vögel, XV. p. 62. die weiße Nachtigall.

Latham, Syn. II. 2. p. 412. Var. B. White Nightingale.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 507. n. 1. β. Luscinia candida.

Naturforsch. XVI. p. 49. weiße Nachtigall.

Sammel. zur Phys. und N. G. III. p. 229.

Allerneueste Mannigfaltigk. IV. p. 250.

Plin. hist. nat. E. 10. c. 29. Luscinia candida.

2. CALIDRIS. Die jamaicaische Motacille.

Müller, Naturyst. II. p. 604. n. 2. die Grasmücke.

Onomat. hist. nat. V. p. 262. die amerikanische Nachtigall.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 76. n. 18. Jamaicaische Nachtigall.

Briffon, ornithol. I. p. 457. n. 75. grand Figuier de la Jamaïque.

Büffon, Vögel, XVI. p. 163. der große Jamaicaische Feigenfresser; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 543. n. 134. Sylvia (Calidris) fusco-virescens, subtus fulva, linea oculari subocularique nigra, rectricibus apice luteis.

Seligmann, Vögel, V. tab. 16. die amerikanische Nachtigall.

Martini, Naturlex. V. p. 143. amerikanische Nachtigall.

Neueste

(2) *Büffon* will im *Plinius* gelesen haben, dass eine weisse Nachtigall in Rom 6000. Sestertien gekostet habe. In einigen Exemplaren, die ich nachgeschlagen habe, lese ich nur sechs Sester- tien.

Neueste Männigfaltigk. IV. p. 248. amerikanische
oder spanische Nachtigall.

Naturgesch. mit Merian. Kupf. p. 798. n. 35. der
große Feigenvogel von Jamaika.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 184. n. 2. Motacilla
(Calidris) supra fuscō, virescens, subtus fulva,
linea oculari subocularique nigra.

52. BONARIENSIS. Die Motacille mit weißem
Kinne.

Büffon, Vögel, XVI. p. 174. der schwarz und
rothgelbe Zartschnabel.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 543. n. 135. Sylvia
(Bonariensis) nigra subtus ferruginea, gula lo-
ris abdomine medio rectricibusque extimis apice
albis.

53. PALMARUM. Der Bimbele. (3)

Büffon, Vögel, XVI. p. 176. der Bimbele, oder
unächte Hänfling.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 544. n. 136. Sylvia
(Palmarum) fusca, subtus albo - flavescens,
uropygio olivaceo, remigibus rectricibusque
fuscis.

54. BANANIVORA. Der Bananist.

Büffon, Vögel, XVI. p. 179. der Bananist.

Latham, Syst. ornith. II. p. 544. n. 137. Sylvia
(Bananivora) griseo-nigricans, subtus uropy-
gioque flavescente, fascia per oculos nigra, su-
perciliis macula alarum rectricibusque apice
albis.

55. VERMIVORA. Der Wurmfreßer.

Pennant, arct. Zool. II. p. 378. n. 217. der Wurm-
freßer.

Brisson, ornithol. I. p. 457. n. 76. Figuier de Pensylvanie.

Büffon, Vögel, XVI. p. 169. der Wurmfresser.
Onomat. hist. nat. III. p. 903. die Bachstelze aus Pensylvanien.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 544. n. 138. *Sylvia* (*Vermivora*) *viridi-olivacea* *subtus albida*, capite collo subtus pectoreque aurantiis, fascia per oculos arcuque supra nigris, superciliis albis.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 95. der Wurmfresser.

Martini, Naturlex. V. p. 151. *pensylvanische Bachstelze*.

Naturgesch. mit Merian. Kupf. p. 800.

Encycl. meth. Oiseaux, I. p. 666.

56. MADAGASCARIENSIS. Der Foudi-jala. (4)

Brisson, ornithol. I. p. 422. n. 14. Rossignol de Madagascar.

Latham, Syst. ornith. II. p. 507. n. 2. *Sylvia* (*Madagascariensis*) *fusco-olivacea*, *subtus rufo-fusca*, capite rufo, gutture albo, macula pone oculos fusca.

3. MODULARIS. Die Winternachtigall. (5)

Müller, Natursyst. II. p. 604. n. 3. die Baumnachtigall.

Leske,

(4) Die Trivialbenennung *Madagascariensis*, kommt p. 981. n. 28. nochmals vor.

(5) Nährt sich im Frühjahr von Insekten und Gewürmen. Im Herbst von Beeren, sonderlich Wacholderbeeren; frisst auch Hanfsamen, und anderes kleines Gesame. Zähm kann man sie mit Brodt, gekochtem Fleisch, Hirsenkleyen mit Milch, und dergl. unterhalten. Nistet jung aufgezogen, auch im Zimmer. Soll die Blättern bekommen und häufig daran sterben.

- Leske**, Naturgesch. p. 269. n. 2: die braungefleckte Grasmücke.
- Borowsky**, Thierreich I. III. p. 186. die Braunelle; Baumnachtigall.
- Bechstein**, Naturgesch. I. p. 536. n. 7. die Braunelle: Isserling.
- Bechstein**, Naturgesch. Deutschl. III. p. 604. n. 6. braunfleckige Grasmücke.
- Halle**, Vögel, p. 322. n. 283. die graufalbe Gesanggrasmücke, Baumnachtigall. Curruca canora.
- Halle**, Vögel, p. 336. n. 308. das Bleikehlchen.
- Halle**, Vögel, p. 336. n. 309. der braune Fliegenstecher.
- Gatterer**, vom Nütz. u. Sch. d. Th. II. p. 424. n. 358. Baumnachtigall; Braunelle; Wollenträumper.
- Pennant**, arct. Zool. II. p. 391. H. die Baumnachtigall.
- Neuer Schaupl. der Nat. II. p. 950. Braunelle; Braunellchen.
- Onomat. histor. natur. V. p. 267. die schön singende Bachstelze.
- Handb. der deutsch. Thiergechl. p. 136. Braunehlchen, Braunellein.
- Klein**, av. p. 77. n. 4. Sylvia gula plumbea.
- Klein**, Vorbereit. p. 145. n. 4. Bleykehlein mit gelbgfleckten Augen.
- Klein**, verb. Vögelhist. p. 79. n. 6. Bleykehlein mit gelbgfleckten Augen.
- Gesner**, Vögelb. p. 474. Prunelle.
- Brisson**, ornith. I. p. 420. n. 12. Fauvette de Haye ou Passe-buse.
- Büffon**, Vögel, XV. p. 129. die Prunell-Grasmücke, oder die Winternachtigall, p. 130. Wintergrasmücke, p. 131. wilder Sperling;

- Strauchgrasmücke; Falkensperling*, p. 132. *Zaun-sperling*; m. e. Fig.
- Batsch*, Thiere, I. p. 360. *die Baumnachtigall*.
- Latham*, Syst. ornith. II. p. 511. n. 13. *Sylvia (Modularis) supra griseo-fusca, tectricibus alarum apice albis, pectore caerulecente-cinereo*.
- Beske*, Vögel Kurl. p. 80. n. 579. *die Baumnachtigall*.
- Fischer*, Liv. p. 101. n. 163. *Baumnachtigall*.
- Bock*, N. G. von Preuss. IV. p. 436. *die Baum-nachtigall*.
- Cetti*, Sardin. II. p. 212. *die braune Grasmücke*.
- Pontoppidan*, Dännem. p. 174. n. 2. *Graairisk; grauer Hänfling?*
- Leem*, Finnm. p. 136. ** *Graairisk*.
- Naturforsch.* XVII. p. 100. n. 204. *die Baum-Nachtigall*.
- Zorn*, Petinotheol. II. p. 153 390. *die Brunelle*.
- Martini*, Naturlex. V. p. 17. *die Baumnachtigall*.
- Samml. zur Phys. und N. G.* III. p. 234. *die braun-fleckigte Grasmücke, oder Brunelle*.
- Sander*, Gross. u. Sch. in der Nat. II. p. 77. *das Braunellein*.
- Neueste Mannigfaltigk.* III. p. 775. *Baumnachtigall*.
- Neues hamburg. Magaz.* St. 37. *Baumnachtigall*.
- Linne'*, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 10. *Passer canus*.
- Linne'*, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 184. n. 3. *Motacilla (Modularis) supra griseo-fusca, tectricibus alarum apice albis, pectore caerulecente-cinereo*.
- Charleton*, onomast. zoic. p. 89. n. 3. *Curruga Hypolais; Passer sepiarius*.

Kramer, Austr. p. 376. n. 14. *Motacilla fusca*, capite cinereo, pectore ochraceo-testaceo, iridibus croceis? — *Braunellerl*, *Prunellerl*.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 416. *Pru-*
nella.

Fonston, av. p. 121. *Muscicapā altera*, *Muscicapa quinta*.

Belon, hist. des ois. p. 375. petit mouchet; m. e. schl. Fig.

Zinnan. Uov. p. 45. tab. 6. fig. 30. *Magnanima Aldr.*

Bomare, diction. IV. p. 370. — Diction. des anim. II. p. 174.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 378. n. 2. die *Winternachtigall*.

57. JUNCORUM. *Der Buschfänger.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 397. n. 240. *der Busch-*
sänger.

Klein, av. p. 89. n. 10. *Passerculus simpliciter*.

Klein, Vorbereit. p. 166. n. 10. *brauner Zwerg*.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 91. n. 9. *brauner Zwerg*.

Briffon, ornithol. I. p. 335. n. 14. *Moineau de Virginie*.

Büffon, Vögel, XI. p. 51. *der kleine braune Sper-*
ling des Catesby.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 511. n. 14. *Sylvia (Juncorum) fusca tota*, subtus dilutior, cauda subforcipata.

Seligmann, Vögel, II. tab. 70. *der kleine Sperling*.

58. AQUATICA. *Die Wasser-Motacille.* (6)

Latham, Syst. ornithol. II. p. 510. n. 11. *Sylvia (Aquatica) rufescens*, *fusco-maculata*, abdo-
mine,

Qq 5

(6) Ich weiss keinen Grund von dieser Benennung anzugeben.

Scopoli hält den Vogel für die *Binsennachtigall*.

mine, uropygio, maculaque pone oculos albidis, fascia alarum alba.

Scopoli, Bern. a. d. N. G. I. p. 195. n. 235. *Sylvia Schoenobaenus*.

4. **SCHOENOBAENUS.** *Die Binsennachtigall.*

Müller, Natursystem, II. p. 604. n. 4. *die Binsennachtigall.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 391. I. *die Binsennachtigall.*

Brissot, ornithol. I. p. 419. n. 11. *Fauvette de bois*, ou *Rousetté*.

Büffon, Vögel, XV. p. 106. *die Waldgrasmücke*, oder *Rousetté*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 510. n. 10. *Sylvia (Schoenobaenus) testaceo-fusca*, subtus pallide testacea, capite maculato, remigibus extus rufo-marginatis.

Sammel. zur Phys. u. N. G. III. p. 232. *die Waldgrasmücke*.

Neue Schwed. Abhandl. IV. p. 52. M. Schoenobaenus.

Neueste Mannigfaltigk. III. p. 779. *Binsennachtigall.*

Forstkål, fn. arab. p. 6. n. 17. *Abuffaej*. — Descript. anim. p. 6. n. 17. *Motacilla (Schoenobaenus) supra nigro cinereoque maculata*, rectricibus, intermediis exceptis, basi albis.

Hasselquist, Palaest. (Ed. germ.) p. 37. n. 50. *Motacilla (Yvica) corpore fusco-viridescente*, pectore ferrugineo.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 9. *Schoenobaenus*.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 184. n. 4. *Motacilla (Schoenobaenus) testaceo-fusca*, subtus pallide testacea, capite maculato.

Charleton, exercitat. p. 97. *Lusciniola Bellonii*.
Charleton, onom. zoic. p. 92. *Lusciniola Bellonii*.
Fonston, av. p. 123. *Lusciniola*.
Belon, hist. nat. des ois. p. 338. *Roufette*; m. e. schl. Fig.

Bonare, diction. X. p. 114. — Dict. des anim. III. p. 725.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 379. n. 3. die *Binsennachtigall*.

5. CAMPESTRIS. Die Feldnachtigall.

Müller, Natursyst. II. p. 608. n. 5. die *jamaicai-sche Nachtigall*.

Onomat. histor. natur. V. p. 262. die *Grasmücke aus Jamaika*.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 81. n. 31. *Hecken-wenzel*.

Briffon, ornithol. I. p. 456. n. 74. *Fauvette de Haye de la Jamaïque*.

Büffon, Vögel, XVI. p. 185. der *einfarbige Zartschnabel*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 544. n. 139. *Sylvia (Campestris) grisea*, capite virescente-cinereo, rectricibus concoloribus, abdomine albido.

Seligmann, Vögel, V. tab. 17. die *americanische Grasmücke*.

Martini, Naturlex. V. p. 144. *Jamaikaische Nach-tigall*; *Feldnachtigall*.

Neueste Manuigfalt. IV. p. 249. *Feldnachtigall*.

Linne, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 184. n. 5. *Motacilla (Campestris) grisea*, capite cinereo, rectricibus concoloribus, abdomine albido.

59. MACROURA. Die langschwänzige capsche Motacille.

Büffon, Vögel, XV. p. 147. die *gefleckte Grasmücke vom Vorgeb. d. g. H.* m. e. Fig.

Latham,

Latham, Syst. ornithol. II. p. 545. n. 140. *Sylvia* (*Macroura*) *fusca*, *subtus albo-flavescens*, *maculis nigricantibus*, *superciliis albis*, *cauda cuneiformi elongata*.

Martini, Naturlex. V. p. 96. *capische Bachstelze*.

60. LONGICAUDA. *Die langschwänzige chinesische Motacille.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 545. n. 141. *Sylvia* (*Longicauda*) *olivaceo-virescens*, *vertice rufescente*, *remigibus fuscis*, *cauda cuneiformi elongata*.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 161. *die kleine langgeschwänzte Grasmücke aus China*.

6. CURRUCA. *Die Grasmücke.* (?)

Müller, Natursyst. II. p. 605. n. 6. *der Nachtfänger*.

Leske, Naturgesch. p. 269. n. 3. *die fahle Grasmücke*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 187. n. 4. *der Nachtfänger*; *große graue Grasmücke*; *Spottvogel*.

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 191. n. 2. *Motacilla (Curruca) supra fusca*, *subtus albida*, *rectricibus fuscis*, *extima margine tenuiore alba*; *die Grasmücke*, *der Heckenschmatzer*, *Weidenzeifig*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 535. n. 5. *die gemeine Grasmücke*.

Funke, Naturgesch. I. p. 256. *die fahle Grasmücke*.

Ebert, Naturl. II. p. 142. *die Grasmücke*.

Halle, Vögel, p. 323. n. 284. *die gemeine Grasmücke*; *Kukkuksommer*; *schnarrende schwarz-röthliche Grasmücke*.

Gatterer,

(?) Von ihr werden die meisten Kuckuckseyer ausgebrütet. Kann über 10. Jahr alt werden.

- Gatterer**, vom Nutz. und Schad. der Thiere II.
p. 424. n. 359. die *Grasmücke*; *Grasemücke*;
Grasemunke, etc.
- Pennant**, archt. Zool. II. p. 395. U. die *Gras-*
mücke.
- Neuer Schaupl. d. Nat.** III. p. 507. *Grasmücke*.
- Onomat. hist. nat.** III. p. 532. die *Grasmück*.
- Onomat. hist. nat.** IV. p. 892. die *Baumnachtigall*;
Grasmücke schlechtweg; *hochgelbe Grasmücke*;
Grasmücke mit Nachtigallen Gesang.
- Klein**, Vorbereit. p. 139. n. 3. *braungefleckte Gras-*
mücke.
- Klein**, verbess. Vögelhistor. p. 75. n. 3. *braunge-*
fleckte Grasmücke.
- Klein**, stemmat. av. p. 13. tab. 16. fig. 3. a. b.
- Klein**, Vögeleyer, p. 24. tab. 10. fig. 6.
- Briffon**, ornithol. II. p. 417. n. 7. *Fauvette babil-*
larde.
- Büffon**, Vögel, XV. p. 97. die *graue oder die*
geschwätzige Grasmücke; m. e. Fig.
- Batsch**, Thiere, I. p. 361. die *graue Grasmücke*.
- Latham**, Syst. ornithol. II. p. 509. n. 9. *Sylvia*
(*Currucula*) *supra fusca*, *subtus albida*, *rectrici-*
bis fulcis, *extima margine tenuiore alba*.
- Beske**, Vögel Kurl. p. 80. n. 181. *der Nachtfän-*
ger.
- Siemßen**, meklenb. Vögel, p. 130. n. 2. die *Gras-*
mücke; *Grasmügg*.
- Bock**, N. G. von Preuss. IV. p. 436. die *Gras-*
mücke; *fahlgelbe Grasmücke*.
- Fischer**, Liv. p. 101. n. 162 *braungefleckte Gras-*
mücke; *Nachtigalknecht*.
- Pontoppidan**, Dännem. p. 174. n. 3. *Gräsmutte*.
- Linneé**, Abhandl. II. p. 283. n. 38. *Baumnachtigall*.

- White*, N. G. von Engl. p. 60. n. 3. p. 63. n. 5.
Grasmücke.
- Scopoli*, Bem. aus der N. G. I. p. 189. n. 228. die
graue Grasemücke; der *Spottvogel*.
- Martini*, Naturlex. V. p. 148. *Grasmücke*.
- Zorn*, Petinotheol. II. p. 375. der dem Mönch nicht
unähnliche Dornreich oder Hecken-Schmatzer.
- Naturforsch. XVII. p. 100. n. 205. der *Nacht-
 sänger*.
- Neue schwed. Abhandl. IV. p. 51. die *fahle Gras-
 mücke*; *Krukan*.
- Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 232. die *fahle
 Grasmücke*.
- Goeze*, nützl. Allerl. II. p. 397. n. 14. *graufleckige
 Grasmücke*.
- Neueste Mannigfalt. IV. p. 250. *Nachtsänger*.
- Döbel*, Jägerprakt. I. p. 65. die *Grasmücke*.
- Loniceri*, Kräuterb. p. 684. *Graßmück*.
- Elsholz*. Tischb. p. 169. *Grasmücke*.
- Zückert*, mater. aliment. p. 114.
- Seibiz*. de aliment. fac. p. 894.
- Tänzer*, notab. venat. p. 100. n. 126. *Graß-
 Mücke*.
- Jablonsky*, allgem. Lex. p. 409. *Grasmücke*.
- Eberhard*, Thiergesch. p. 84. die *Grasmücke*.
- Borkhausen*, Magazin, I. p. 179. n. 52. *Graß-
 mücke*.
- Linné*, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 21. *Curruga*.
- Linné*, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 184. n. 6. *Motacilla*
 (*Curruga*) supra fusca, subtus albida, rectrici-
 bus fuscis, extima margine tenuiore alba.
- Charleton*, onom. zoic. p. 91. n. 12. *Canneva-
 rola*.
- Schwenkfeld*, av. Silef. p. 255. *Curruga*. *Grase-
 mücke*; *Grasemüsche*.
- Sibbald*, Scot. illustr. II. 3. p. 17. *Curruga*.

Rzaezyne-

Rzaczynsky, hist. nat. Pol. p. 278. *Curruga*, *An-*
dithia, *Hypolais*, *Passer lepiarius*.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Pol. p. 377. *Curruga*
seu *passer grainineus*.

Jonston, av. p. 125. *Hypolais* seu *Curruga*.

Belon, hist. nat. des ois. p. 340. *Fauvette brune*;
m. e. ziempl. gut. Fig.

Barrere, ornithol. Cl. 3. Gen. 18. Sp. 2. *Ficedula*
rostro et pedibus luteis maior.

Barrere, l. c. Gen. 24. Sp. 6. *Parus subviridis* seu
Curruga.

Zinnan. Uov. p. 57. tab. 8. Fig. 46. *Cannevarola*;
Faun. Arragon. p. 88.

Aristot. hist. anim. L. 6. c. 6. n. 82. Υπολαις.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 379. n. 4.
die *Grasmücke*.

61. PASSERINA. *Die kleine Grasmücke.*

Onomat. histor. natur. III. p. 533. die *kleine Gras-*
mücke.

Briffon, ornith. I. p. 414. n. 3. petite *Fauvette*.

Buffon, Vögel, XV. p. 72. *die kleine Grasmücke*;
m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 508. n. 5. *Sylvia* (*Pa-*
serina) *grisea*, *subtus cinereo-alba*, *rufescente*
varia, *abdomine albo*, *superciliis albidis*.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 230. *die kleine*
Graßmücke.

Histoir. Prov. I. p. 507. *Passerinette*.

Zinnan. Uov. p. 46. tab. 6. Fig. 31.

7. HIPPOLAIS. *Die Bastardnachtigall.* (*)

Müller, Natursyst. II. p. 605. n. 7. *die Gelb-*
brust.

Bechstein,

(*) Ich habe die Synonymen dieser und der folgenden Gattung
so geordnet, wie sie nach Anleitung unsres Systems geordnet
werden

Bechstein, Naturgesch. I. p. 542. n. 20. die *Bastardnachtigall*.

Onomat. hist. nat. V. p. 266. die *Grasmücke*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 390. G. die *Bastardnachtigall*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 507. n. 4. *Sylvia (Hippolais) virescente - cinerea, subtus flavescentia, abdomine argenteo, artubus fuscis, superciliis albidis*.

Fischer, Zusätze zur N. G. von Livil. p. 50. n. 499. *Gelbbrust; Bastardnachtigall*.

Pontoppidan, Dänneim. p. 174. n. 4. Motacilla Hippolais.

Martini, Naturlex. V. p. 70. *Gelbbrust*.

Neue schwed. Abhandl. IV. p. 51. Motacilla Hippolais.

Bechstein: Naturforsch. XVII. p. 39. n. 1. die *Bastardnachtigall*.

Borkhausen, Magaz. I. p. 180. n. 53. *grünlichgraue Grasmücke*.

Neueste Mannigfaltigk. IV. p. 56. *Gelbbrust*.

Naumann,

werden mussten; muss aber bemerken, dass *Bechstein* beyde für einerley hält. Auch *Büffon* ist der Meinung, und *Briffon* giebt *Linné's Motacilla Hippolais* als Synonym von seiner *Currucā* an. So ordnete auch *Linné* die Synonymen in der XII. Edition p. 330. n. 7. So viel ist wohl richtig, dass *Bechsteins* Meinung, die *Hippolais* des *Linné*, die *Currucā* des *Briffon*, die *Petty-Chaps* des *Pennant*, und die *Fauvette* des *Büffon* mit einander zu vereinigen, die grösste Wahrscheinlichkeit hat, und ich trage kein Bedenken, meine vorige Meinung, da ich beyde trennte, zurückzunehmen. Ihm nach kommt der Vogel als Zugvogel in den letzten Tagen des Aprils, wenn schon die Knospen der Bäume völlig ausgebrochen sind, an, und zieht in den letzten Tagen des Augusts wieder weg. Macht ein sehr niedliches Nest auf kleine Fichten oder hohe Büsche in eine Gabel, legt 5. dunkelfleischfarbene ganz ovale, mit einzelnen dunkelrothen Punkten, besonders nach der Spitze zu, bestreute Eyer, und brütet jährlich nur einmal.

Naumann, Vogelsteller, p. 148. *Schackruthgen*.
Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 19. *Ficedula septima*.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 185. n. 7. *Motacilla (Hippolais) virescente-cinerea*, subtus flavescentia, abdomine albido, artibus fuscis.

Müller, zool. dan. prodr. p. 32. n. 270. *Motacilla (Hippolais) virescente-cinerea*, subtus flavescentia, abdomine albido, artibus fuscis, superciliis albidis.

Kramer, Austr. p. 377. n. 18. *Motacilla subtus albida*, supra fusca? *braune Grasmücke; kleiner Spottvogel?*

Zinnan, Uov. p. 44. tab. 6. fig. 29?

Donndorff, Handb. d. Thiergefchich. p. 379. n. 5. *die Bastardnachtigall*.

62. HORTENSIS. *Die Gartengrasmücke.* (9)

Briffon, ornith. I. p. 414. n. 2. *Fauvette*.

Büffon, Vögel, XV. p. 64. *die grüngelbe Grasmücke, oder Bastard-Nachtigall*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 507. n. 3. *Sylvia (Hortensis) griseo-fusca*, subtus rufescens-alba, superciliis albidis, rectricibus fuscis, extus griseo-marginatis, extima oblique dimidiata alba.
Sammil. zur Phys. u. N. G. III. p. 229. *die Grasmücke*.

Donndorff, Handb. d. Thiergefch. p. 379. n. 6. *die Gartengrasmücke*.

63. RUFA. *Die kleinste Grasmücke.* (10)

Briffon, ornith. I. p. 418. n. 8. *Fauvette rousse*.
Büffon,

(9) S. die vorhergehende Anmerkung.

(10) Nach Bechstein gehört Frisch *kleinste Grasmücke*, tab. 24. nicht hieher. Vgl. Naturgesch. Deutschl. III. p. 608. — Naturforsch. XXVII. p. 50.

Büffon, Vögel, XV. p. 118. die kleine gelbrothe Grasmücke, oder der Weidenzeisig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 516. n. 27. *Sylvia* (*Rufa*) *griseo-fusca*, subtus superciliisque rufescens.

Sammel. zur Phys. u. N. G. III. p. 234. die rothe Grasmücke.

Borkhausen, Magaz. I. p. 181. n. 54. kleinste Grasmücke.

Fonston, av. p. 115. *Passer Trogledytes Bellonii*.
Belon, hist. nat. des ois. p. 348. Petite fauvette; Fauvette rousse.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 380. n. 7. die kleinste Grasmücke.

8. SALICARIA. Der Rohrsänger.

Müller, Natursyst. II. p. 606. n. 8. der Rohrsänger.

Borowsky, Thierreich, III. p. 184. n. 1. der Rohr-sperling; Rohrsänger; Schilf-schnätzer; Weidengucker.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 513. n. 22. der Weiderich.

Halle, Vögel, p. 323. n. 285. die kleine braungelbe Grasmücke.

Neuer Schapl. der Natur, III. p. 508. n. 3. kleine graugelbe Grasmücke.

Peunant, arct. Zool. II. p. 392. M. der Weiderich; Rohrsänger.

Klein, Vorbereit. p. 139. n. 4. Weidenmücke; Weidenzeisig; kleine graugelbe Grasmücke.

Klein, verb. Vögelhist. p. 75. n. 4. Weidenmücke.

Klein, Stemmat. av. p. 13. tab. 16. fig. 2. a. b.

Klein, Vögeleyer, p. 25. tab. 10. fig. 10.

Gesner, Vögelb. p. 548. Weidenguckerlein; m. e. Fig. schl.

Brisson,

- Brisson*, ornith. I. p. 415. n. 5. Fauvette de roseau.
Büffon, Vögel, XV. p. 112. die Rohrgrasmücke;
Weiderich; m. e. Fig.
Batsch, Thiere, I. p. 362. der Rohrsperling oder
Schilfsschmatzer.
Latham, Syn. Suppl. p. 118. Sedge Warbler.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 516. n. 26. *Sylvia*
 (*Salicaria*) *cinerea subtus alba*, superciliis albis.
Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 436. die Weiden-
 mücke.
Fischer, Zus. zur N. G. von Livil. p. 50. n. 500.
Weidenmücke; *Weidenzeisig*.
White, N. G. von Engl. p. 40. p. 59. n. 16. p. 64.
 n. 15. *Weiderich*.
Pallas, nord. Beytr. IV. p. 25. *Curruca arundi-*
nacea Briss.
Tengmalm: neue schwed. Abhandl. IV. p. 52. M.
Salicaria.
Bechstein: Naturforsch. XXVII. p. 45. der *Wei-*
derich, p. 47. *Rohrsänger*; *Schilfsschmatzer*;
Weidengucker; *Rohrsperling*; *Rohrgrasmücke*;
Rohrschliffer; *Schilfdornweich*; *Weidenmücke*;
Wyderle; *Zyste*.
Naturforsch. XVII. p. 101. n. 206. *der Rohrsänger*.
Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 233. *der Rohr-*
sänger.
Neueste Mannigfalt. IV. p. 322. *Rohrsänger*.
Linneé, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 185. n. 8. *Motacilla*
 (*Salicaria*) *cinerea subtus alba*, superciliis albis.
Schwenckfeld, av. Silef. p. 330. *Petronella?* *Stein-*
fletsche?
Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 419. *Salici-*
aria.
Sibbald, Scot. illustr. II. 3. p. 17. *Avis Stopparolae*
similis.
Fonston, av. p. 121. *Stopparola alia*.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 380. n. 8.
der *Rohrsänger*.

9. SYLVIA. Der *Waldsänger*. (1)

Müller, Naturfyst. II. p. 606. n. 9. der *Waldsänger*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 188. n. 5. der *Waldsänger*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 536. n. 6. das *Müllerchen*; *kleine graue Grasmücke*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 604. die *fahle Grasmücke*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 394. S. das *Weißkehlchen*; die *Steinfletsche*.

Onomat. hist. nat. VII. p. 309. der *Waldsänger*.

Briffon, ornith. I. p. 415. n. 4. *Fauvette grise ou Grisette*.

Büffon, Vögel, XV. p. 91. der *Waldsänger oder die graue Grasmücke*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 514. n. 23. *Sylvia (Cinerea) supra cinerea, subtus alba, rectrice prima longitudinaliter dimidiato alba, secunda apice alba*.

Frisch, Vögel, tab. 21. Fig. 2. a. die *fahle Grasmücke*.

Bock,

(1) Die *M. Curruc* und *M. Sylvia* sind einander so ähnlich, dass sie leicht verwechselt werden können. Beyde sind oben grau und unten weiss, mit einiger Beynischung von roth. Sie unterscheiden sich aber 1) durch die Grösse. Denn *Mot. Sylvia* ist grösser als die *Curruc*. 2) *M. Sylvia* ist am Kopfe aschgrau, am Rücken grau, rostfarbig. Die Schwungfedern an der äussersten Kante sind rostfarbig. *M. Curruc* hat nur eine Farbe, am Kopf und Rücken aschgrau und keine Beynischung von Rostfarbe; außerdem noch einen kleinen dunklen Fleck hinter dem Ohr, der gar nicht bey der *Sylvia* ist. Beyde halten sich in Gärten auf, und werden *Erbsevögel* genannt, weil die Gärtner meinen, dass sie den Erbsen Schaden thun. *Tengmalm*.

Bock, Naturgesch. von Preuss. IV. p. 437. *der Waldsänger.*

Fischer, Livil. p. 102. n. 168. *Waldsänger.*

White, N. G. von Engl. p. 34. n. 9. p. 59. n. 10.
p. 64. n. 12. p. 66. n. 5. *Weißkehlschen.*

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 25. *Motacilla Sylvia.*

Tengmalm: neue schwed. Abhandl. IV. p. 51.
Motacilla Sylvia.

Borkhausen, Magaz. I. p. 181. n. 56. *der Waldsänger.*

Naturforsch. XVII. p. 101. n. 207. *der Waldsänger.*

Martini, Naturlex. V. p. 195. *Waldsänger.*

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 231. *die graue Grasmücke. Stopparola.*

Neueste Mannigfalt. IV. p. 415. *Waldsänger.*

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 31. n. 15. *Cineraria.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 185. n. 9. *Motacilla (Sylvia) supra cinerea, subtus alba, rectrice prima longitudinaliter dimidiato alba, secunda apice alba.*

Jonston, av. p. 121. *Stopparola pectore et ventre fere candido.*

Faun. Arragon. p. 83. n. 5.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 380. n. 9.
der Waldsänger.

B. Briffon, ornithol. I. p. 463. n. 4. *Mesange cendrée.* (2)

Büffon, Vögel, XVII. *die weisskehliche Meise.*

Rr 3 Latham,

(2) Nach *Briffon* eine eigne Gattung. — *Latham* hat die Synonymen hier dergestalt geordnet, dass er zur *Motacilla Sylvia Linnei*, *Brünn.* u. *Müll.* *M. Sylvia*, *Sepp.* *Turdus Calamoxenus*; *Briss.* *Parus cinereus*, *Büff.* *mesange cendrée* u. a. rechnet; *Briffons Currucă cinerea* aber als Spielart davon annimmt, und dazu die in unserem System bemerkten Synonymen aus *Aludrov.* *Raj.* *Büffon*, *Salerne*, *Pennant* und *Willoughb.* zählt.

Latham, Syst. ornith. II. p. 515. n. 23. β . *Sylvia supra rufo-cinerea*, subtus rufo-alba, gula alba, rectrice extima extus toto, intus dimidiato, alba.

Raj. Synops. p. 77. A. 6. *Ficedulae affinis?*

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 25. *Parus cinereus Briss.*

γ . *Büffon*, Vögel, XV. p. 96. *die Bouscarle*; m. e. Fig.

10. FICEDULA. *Die Beccafige.* (3)

Müller, Natursyst. II. p. 606. n. 10. *der Feigenfresser.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 191. n. 4. *Motacilla (Ficedula) subfuscata*, subtus alba, pectore cinereo maculato; *die Beccafige.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 536. n. 8. *der Feigenfresser.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 605.

Pennant, arct. Zool. II. p. 391. K. *der Feigenfresser.*

Klein, av. p. 79. n. 13. *Sylvia rectricibus alarum macula alba.*

Klein, Vorbereit. p. 147. n. 13. *Braunellchen; brauner Fliegenschnepper mit einem weißen Flügelfleck.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 80. n. 17. *Braunellchen.*

Briffon, ornith. I. p. 413. n. 1. *Beccafige.*

Büffon,

(3) Ist schon lange als ein sehr schmuckhafter Vogel berühmt, und besonders von der Insel Cypern, in Töpfen mit Wein-essig und wohlriechenden Kräutern eingemacht, zu 1000. bis 1200. Töpfen alle Jahr versender. — *Bechstein* vermutet, ob es wohl nicht der schwarzgräue Fliegenfänger seyn möge. — S. vorher die Not. 2. bey *Muscicapa Atricapilla* n. 9. ingl. *Lath.* Vögel, II. 1. p. 320, not. v.

Büffon, Vögel, XV. p. 196. der gemeine Feigenfresser.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 517. n. 28. Sylvia (Ficedula) subfuscus, subtus alba, pectore cinereo-maculato.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 437. der Wüstling; Rothauge; Feigenesser. (sogar mit Muscicapa Olivacea p. 938. n. 14. verwechselt)

Fischer, Lvl. p. 101. n. 165. kleine Grasmücke.

Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 6. Spitzlerke, tab. 12.

Martini, Naturlex. V. p. 53. der Feigenesser.

Naturforsch. XVII. p. 101. n. 208. der Feigenesser.

Borkhausen, Magaz. I. p. 182. n. 57. Feigenfresser; Braunelle.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 240. der braune Fliegenschnäpper.

Neueste Mannigfalt. IV. p. 49. Braunellchen.

Günther, Nest. u. Ey. tab. 59. Wüstling.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 18. Ficedula quarta.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 185. n. 11. Motacilla (Ficedula) subfuscus, subtus alba, pectore cinereo maculato.

Charleton, onom. zoic. p. 81. n. 9. Ficedula; m. e. unricht. Abbild.

Rzaczynsky, hist. nat. Pol. p. 280. Ficedula.

Barrere, ornithol. Cl. 3. gen. 18. sp. 1. Ficedula rostro et pedibus luteis.

Jonston, av. tab. 33. Ficedula.

Forskål, fn. orient. — descr. anim. p. 8. n. 13. Becquefigue?

Bonaparte, diction. II. p. 5. — Diction. des anim. I. p. 64. Becfigue.

Hermann, tab. affin. anim. p. 228. *Motacilla Ficedula*.

Donndorff, Handb. der Thiergeesch. p. 381. n. 10. die Beccafuge.

64. NAEVIA. Die gefleckte Grasmücke.

Onomat. hist. nat. III. p. 534. die gefleckte Grasmücke.

Briffon, ornithol. I. p. 418. n. 9. Fauvette tachetée.

Büffon, Vögel, XV. p. 126. die graufleckige Grasmücke.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 517. n. 29. *Sylvia (Naevia) fusco-rufescens*, *flavicante-varia sub-tus alba*, *pectore flavicante maculis albis*, *re-tricibus nigricantibus albo extus marginatis*.

Martini, Naturlex. V. p. 95. bunte Grasmücke.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 234. die gefleckte Grasmücke.

Fonston, av. p. 121. Boarina.

65. ALPINA. Die Alpengrasmücke. (4)

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 191. n. 3. *Motacilla (Alpina) griseo-ferruginea*, *gula alba*, *maculis lunatis fuscis*, *tectricibus alarum nigri-cantibus*, *versus apicem linea punctatis alba*; die Flüe. (d. h. Felsen-) Lerche.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 546. n. 27. die Alpen-grasmücke; Flüelerche.

Büffon, Vögel, XV. p. 141. die Alpengrasmücke.

Andrä, Briefe aus der Schweitz, p. 102. tab. 13. Flüelerche.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 335. die Grasmücke der Alpen.

Martini,

(4) Ist nach *Blumenbach* (1. c.) *Bechstein* (N. G. Deutschl. III. p. 715.) und selbst nach *Latham* mit *Sturnus Montanus*, p. 804. n. 7. und *Sturnus collaris*, p. 805. n. 16. einerley.

Martini, Naturlex. V. p. 9. *Bachstelze der Alpen*.
Neue schwed. Abhandl. III. p. 110. Motacilla al-
pina.

Storr, Alpenreise, I. p. 79. Fringilla gularis.

Manetti, ornith. tab. 338. fig. 1. Fringilla seu Pas-
ser in Etruria *Sordone* dict.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 381. n. 11.
die *Alpen-Grasmücke*.

66. PATAGONICA. Die patagonische Motacille.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 517. n. 30. Sylvia
(Patagonica) cinerea subtus albo-maculata, su-
perciliis albis, alarum maculis fasciaque fusca,
rectricibus extimis albis.

67. PROVINCIALIS. Der Pitchou.

Büffon, Vögel, XV. p. 145. der *Pitchou*; mit
e. Fig.

Latham, Syn. Suppl. p. 181. Dartford Warbler.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 517. n. 31. Sylvia
(Dartfordiensis) saturate rufo-fusca, subtus fer-
ruginea, abdomine medio albo, palpebris iri-
dibusque coccineis, pedibus flavis.

Martini, Naturlex. V. p. 155. *Pitschou*.

Samml. zur Phys. u. Naturgesch. III. p. 236. der
Pitchou.

68. AFRICANA. Die schwarze afrikanische Mota- cille. (*)

Onomat. hist. nat. III. p. 534. die *Capische gefleckte*
Grasmücke.

Brisson, ornith. I. p. 419. n. 10. Fauvette tachetée
du Cap de bonne Espérance.

Büffon, Vögel, XV. p. 147. die *gefleckte Gras-
mücke vom Vorgeb. d. g. H.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 518. n. 32. *Sylvia (Africana) nigra rufescente-varia*, subtus alba-rufescens, fascia utrinque sub gula nigra, rectricibus fuscis, rufo-marginatis.

Martini, Naturlex. V. p. 96. *capische Grasmücke*.

69. NOVEBORACENSIS. *Die Motacille von Neuyork.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 381. n. 225. *der Sänger von Neuyork.*

Büffon, Vögel, XV. p. 150. *die gefleckte Louisianische Grasmücke*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 518. n. 33. *Sylvia (Noveboracensis) cinerea fusco-varia*, subtus flavescens nigro striata, superciliis albis.

70. UMBRIA. *Die dunkelbraune Motacille.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 382. n. 226. *der dunkelbraune Sänger.*

Büffon, Vögel, XV. p. 151. *die dunkelfarbige Louisianische Grasmücke.*

Martini, Naturlex. V. p. 65. *die schattirte Louisianische Bachstelze.*

71. FLAVICOLLIS. *Das Gelbkehltchen.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 372. n. 203. *das Gelbkehltchen.*

Klein, av. p. 87. n. 14. *Parus americanus*, gutture luteo.

Klein, Vorbereit. p. 162. n. 14. *gelbkehlige Meise aus Amerika.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 89. n. 14. *gelbkehlige Meise.*

Briffon, ornithol. I. p. 467. n. 10. *Mesange grise de la Caroline.*

Büffon, Vögel, XVII. p. 150. *die graue gelbkehlige Meise*; m. e. Fig.

Latham,

Latham, Syst. ornithol. II. p. 518. n. 35. *Sylvia* (Flavicollis) grisea subtus alba, gutture luteo, fronte superciliis lateribusque colli nigris, fascia alarum duplii alba.

Seligmann, Vögel, III. tab. 24. die americanische Meise mit gelber Kehle.

Naturgesch. a. d. best. Schr. Vögel, p. 849. n. 4.

72. RUFICAUDA. Die braunrothschwänzige Motacille.

Büffon, Vögel, XV. p. 154. die Cayennische Grasmücke mit rothgelbem Schwanz.

Latham, Syst. ornith. II. p. 519. n. 37. *Sylvia* (Ruficauda) rufo-fusca, subtus alba, gula rufo circumdata fusco maculata, tectricibus alarum caudaque rufis.

Martini, Naturlex. V. p. 43. cayennische Bachstelze mit röthlichem Schwanz.

73. FUSCICOLLIS. Die gelbbäuchige cayennische Motacille.

Büffon, Vögel, XV. p. 155. die Cayennische Grasmücke mit brauner Kehle und gelben Bauch.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 520. n. 38. *Sylvia* (Fuscicollis) fusco-virescens pectore abdomineque fulvo-flavis, alis fuscis, rubescente marginatis.

Martini, Naturlex. V. p. 43. Cayennische Bachstelze mit brauner Kehle und gelben Bauche.

74. CAERULESCENS. Die blaugraue Motacille.

Büffon, Vögel, XV. p. 156. die blaulichte Dominische Grasmücke.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 520. n. 39. *Sylvia* (Caerulescens) cinereo-caerulescens, subtus alba, gula nigra, alis fuscis, tectricibus macula alba, remigibus extus cinereo-caerulecentibus.

Martini,

Martini, Naturlex. V. p. 29. die blaulichte Do-
mingische Bachstelze.

75. AMERICANA. Die gelbrückige amerikanische
Motacille. (5)

Latham, Syst. ornithol. II. p. 520. n. 40. *Sylvia*
(Americana) cinereo-caerulescens, interscapu-
laribus olivaceo-flavis, iugulo pectoreque fla-
vis, abdomine fasciaque alarum albis.

76. PENSILIS. Die gelbhäfige Grasmücke.

Büffon, Vögel, XV. p. 158. die gelbhäfige Gras-
mücke; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 520. n. 41. *Sylvia*
(Pensilis) grisea abdomine superciliisque albis,
collo subtus flavo, alis albo nigroque fasciatis,
rectricibus lateralibus quatuor albo-maculatis.

Martini, Naturlex. V. p. 80. Gelbhals.

Dondorff, Handb. der Thiergeesch. p. 381. n. 12.
die gelbhäfige Grasmücke.

77. ALBA. Die gemeine Bachstelze. (6)

Müller, Natursystem, II. p. 607. n. 11. die weiße
Bachstelze.

Leske, Naturgesch. p. 270. n. 10. die weiße Bach-
stelze.

Borowsky, Thierreich, III. p. 188. n. 6. die weiße
Bachstelze; Wassersterz.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 191. n. 5. *Mota-
cilla* (*Alba*) pectore nigro, rectricibus duabus
lateralibus dimidiato-oblique albis; das Acker-
männchen; weiße oder graue Bachstelze.

Bechstein,

(5) *Latham* rechnet auch *Büff.* *Figuier cendré de la Caroline* (Gmel Syst. p. 1007 n. 4) mit hieher. Im System steht Ha-
bitat in *Europa*, durch einen Schreibfehler, für *America*.

(6) In den Eingeweiden hat man Iaspis und Porphyrs gefunden. S. Schrift. der berl. Gesellsch. N. Fr. VI. p. 400.

- Bechstein, Naturgesch. I. p. 539. n. 14. die weiße Bachstelze.
- Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 607. die weiß und schwarze Bachstelze.
- Funke, Naturgesch. I. p. 258. Ackermannchen.
- Ebert, Naturl. II. p. 141. die sogenannten weißen Bachstelzen.
- Halle, Vögel, p. 336. n. 310. die gemeine Bachstelze.
- Meyer, Thiere, II. p. 21. tab. 77. weiße und schwarze Bachstelze. M. u. W.
- Gatterer, vom Nutz. und Schad. der Thiere II. p. 426. n. 362. die Bachstelze; weiße blaue oder graue Bachstelze; Wasserstelze; das Ackermannchen; Stiftsfräulein; Klosterfräulein; Wegesterz; Quecksterz; Wackelfärt; Wackfährt; Wippfährt.
- Pennant, arct. Zool. II. p. 368. E. die weiße Bachstelze.
- Beckmann, Naturhist. p. 55. b. die Bachstelze.
- Neuer Schaupl. d. Nat. I. p. 473. Bachstelze.
- Onomat. hist. nat. V. p. 259. die gemeine Bachstelze.
- Handb. der deutschen Thiergesch. p. 135. graue Bachstelze; schwarzkehliche Bachstelze.
- Klein, av. p. 78. n. 6. Sylvia pectora nigro.
- Klein, Vorbereit. p. 146. n. 6. Klosterfräulein; Quecksterze.
- Klein, verbess. Vögelhist. p. 79. n. 9. Klosterfräulein; graues Schwarzkehlein.
- Klein, Steinmat. av. p. 14. tab. 16. fig. 6. a. b.
- Klein, Vögeleyer, p. 26. tab. 10. fig. 19.
- Gesner, Vögelb. p. 545. weiße oder graue Wasserstelze; m. e. mittelm. Fig.
- Brisson, ornith. I. p. 437. n. 38. Lavandiere.

Büffon, Vögel, XVI. p. 28. die weiße Bachstelze;
m. 2. Figg. M. u. W.

Batsch, Thiere, I. p. 362. die weiße Bachstelze.

Latham, Syn. Suppl. p. 178. White Wagtail.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 501. n. 1. *Motacilla (Alba) pectore nigro, rectricibus duabus lateralibus dimidiato oblique albis.*

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 131. n. 3. die weiß-bunte Bachstelze; witte Weepstirten; Queekstaart; Wippstaart; Schweienschierd.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 437. die weiße Bachstelze.

Fischer, Livil. p. 102. n. 166. weiße Bachstelze; Bebeschwanz; Wipssteert.

Cetti, Sardin. II. p. 208. not. 223.

Pontoppidan, Dänem. p. 174. n. 7. Steenpikker.

Pontoppidan, Norweg. II. p. 137. Erle?

Olaffen, Reis. d. Isl. I. p. 310. Mariu-Erla.

White, N. G. von Engl. p. 60. n. 4. weiße Bachstelze.

Fermin, Surin. II. p. 163. Bachstelze?

Adanson, Senegall. p. 97. Bachstelzen?

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 186. n. 224. die graue Bachstelze.

Naturforsch. XVII. p. 102. n. 209. die weiße Bachstelze.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 251. die weiße Bachstelze.

Schwed. Abhandl. XXXVIII. p. 234. weiße Bachstelze.

Neue schwed. Abhandl. I. p. 299. weiße Bachstelze.

Linné, Abhandl. II. p. 287. n. 53. p. 305. n. 125. weiße Bachstelze.

Pennant, britt. Thiergesch. p. 178.

Zorn,

- Zorn, Petinotheol. II. p. 432. die blauliche Bachstelze.
- Lichtenberg, Magaz. für das Neueste, etc. IV. 4. p. 143. Beschr. einer weissen Bachstelze mit vier Füssen.
- Martini, Naturlex. V. p. 87. gemeine Bachstelze.
- Krünitz, Encyk. III. p. 329. schwarzkehligte Bachstelze.
- Döbel, Jägerprakt. I. p. 65. Bachstelze oder Ackermännlein.
- Naumann, Vogelsteller, p. 153. Bachstelze.
- Angen. Landlust, p. 97. schwarzkehligte Bachstelze.
- Borkhausen, Magazin, I. p. 174. n. 46. gemeine Bachstelze.
- André u. Bachstein, Spazierg. I. p. 213. gemeine Bachstelze.
- Naturgesch. aus den best. Schriftst. Vög. p. 761. die weiße Bachstelze.
- Börner, schles. ökon. Nachr. 1781. p. 105. Motacilla alba.
- Anweis. Vögel zu fang. p. 106. schwarzkehligte Bachstelze.
- Neueste Mannigfaltigk. IV. p. 130. gemeine Bachstelze.
- Tänzer, notabil. Venator. p. 108. n. 136. Bachstelze.
- Loniceri, Kräuterb. p. 677. Bachstelz.
- Geoffroy, mater. med. VII. p. 551. die gemeine Bachstelze.
- Merklein, Thierreich, p. 251. Bachstelze; Queckstelze; Kloster-Nonne.
- Lemmer, Materiallex. p. 756.
- Elsholz, Tischbuch, p. 165.
- Zückert, mater. aliment. p. 113.
- Onomatol. forestal. I. p. 182.

Onomat.

Onomat. oeconom. pract. I. p. 391.

Zablonsky, allgein. Lex. p. 98. *Bachstelze*.

Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 57. Motacilla.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 1. Motacilla alba.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 185. n. 12. Motacilla (Alba) pectore nigro, rectricibus duabus lateribus dimidiato oblique albis.

Kramer, Austr. p. 373. n. 1. Motacilla pectore nigro; *graue Bachstelze*.

Charleton, onom. zoic. p. 90. n. 1. Motacilla alba, albicula, *Aristoteli Cnipologus*.

Moehring, av. gen. p. 44. n. 33. Motacilla.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 306. Motacilla alba; *Bachstelze*; *weiße, graue Wasserstelze*.

Sibbald, Scot. illustr. II. 3. p. 18. Motacilla alba.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 396. Motacilla alba seu Codatremula, *Cnipologus Turneri*, *Cinclus Sipontini*.

Fonston, av. p. 120. Motacilla alba.

Barrere, ornithol. Cl. III. gen. 19. sp. 1. Motacilla alba.

Belon, hist. nat. des ois. p. 349. Lavandiere.

Bellon, observat. p. 16. Culicilega.

Zinnan, Uov. p. 51. tab. 7. fig. 38. Coda tremola.

Hist. Prov. I. p. 498.

Bomare, diction. II. p. 53. — Diction. des anim. I. p. 274.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 382. n. 13. das *Ackermannchen*.

B. Die Bachstelze von der Insel Luçon.

Latham, Syn. II. 2. p. 396. Collared Wagtail.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 502. n. 1. γ. M. cinerea, pectore nigro, capistro gula genis fascia alarum rectricibusque duabus extimis albis.

Sonnerat, Reis. n. Neuguin. p. 24.

77. ALBIDA. Die weißliche Bachstelze. (7)

Latham, Syst. ornithol. II. p. 501. n. 1. β . M. albida, dorso, tectricibus alarum caudaque cinerascentibus, rostro pedibusque purpurascen-tibus.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 608. * 1.

78. MADERASPATENSIS. Die Bachstelze von Madras. (8)

Briffon, ornithol. I. p. 440. n. 44. Bergeronette de Madras.

Büffon, Vögel, XVI. p. 75. der Sticherling von Madras.

Latham, Syst. ornith. II. p. 502. n. 2. Motacilla (Maderaspensis) nigra, ventre albo, fascia alarum longitudinali alba, rectricibus duabus intermediis nigris, lateralibus albis.

79. CINEREA. Die aschgraue Bachstelze. (9)

Briffon, ornithol. I. p. 437. n. 39. Bergeronette grise.

Büffon, Vögel, XVI. p. 46. der graue Sticher-ling: m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 502. n. 3. Motacilla (Cinerea) cinerea, subtus alba, fascia pectorali fusca, rectrice prima alba, secunda basi apice-que alba.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 608. * 2.

White,

(7) Nach *Latham* und *Bechstein* eine Varietät, oder vielmehr eine junge *Motacilla alba*.

(8) Ist nicht mit *Motacilla Maderaspatica*. Edit. XII. p. 334. n. 28. zu verwechseln, welches eigentlich *Madagascariensis* heißen soll.

(9) Besteht, nach *Bechstein*, theils nur aus den Jungen der *Mota-cilla alba*, theils *Boarula*, p. 997. n. 51.

White, N. G. von Engl. p. 60. n. 6. *graue Bachstelze*?

Schwenkfeld, av. Siles. p. 307. *Muscicapa I. Cruniclega cinerea. Sticherling; Fliegenstecher; Mückenstecher.*

Martini, Naturlex. V. p. 102. *graue Bachstelze.*

Naturgesch. mit Merian. Kupf. p. 765.

Barrere, ornithol. Cl. III. gen. 19. sp. 2. *Motacilla cinerea.*

Belon, hist. nat. des ois. p. 351. Autre sorte de Lavandiere?

80. INDICA. *Die Indianische Bachstelze.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 503. n. 7. *Motacilla (Indica) griseo-virescens, subtus flavescens, pectore lunulis duabus nigris confluentibus, rectricibus duabus extimis femoribus crisoque albis.*

Sonnarat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 162. *die graue indische Bachstelze.*

81. VIRIDIS. *Die grüne Bachstelze.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 505. n. 13. *Motacilla (Viridis) pallide viridis, subtus alba, capite cinereo, alis caudaque cinereis, albo marginatis.*

82. TSCHUTSCHENSI. *Die Tschutschische Bachstelze.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 369. H. *die Tschutschische Bachstelze.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 505. n. 12. *Motacilla (Tschutschensis) olivaceo-fusca, subtus loris fasciaque duplii alarum alba, rectrice prima tota, secunda latere interiore alba.*

83. A F R A. Die gelbbraune afrikanische Motacille. (10)

Büffon, Vögel, XVI. p. 72. die kleine kapsche Bachstelze.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 505. n. 11. Motacilla (Afra) flavescente-fusca, subtus flava, crisso albo, superciliis, alis caudaque nigris.

Martini, Naturlex. V. p. 110. die kleine kapsche Bachstelze.

Naturgesch. aus den best. Schriftst. p. 771. die kleine Bachstelze vom Vorgeb. der gut. Hoffnung.

84. C I T R E O L A. Die gelbköpfige Bachstelze.

Pennant, arct. Zool. II. p. 369. G. der Gelbkopf.

Büffon, Vögel, XVI. p. 69. die zitrongelbe Bachstelze.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 504. n. 9. Motacilla (Citreola) cinereo-caerulescens, capite, collo corporeque subtus flavis, nucha lunula nigricante.

Pallas, Reis. Ausz. III. Anh. p. 6. n. 14. Motacilla Citreola.

Lepechin, Tageb. der russ. Reis. II. p. 187. die Bachstelze mit dem gelben Bauch. (russ. Shel. tobrjuschka.) Motacilla pectore abdomine capiteque flavo, nucha nigra, rectricibus duabus lateralibus dimidiato-albis.

12. F L A V A. Die gelbe Bachstelze. (1)

Müller, Natursyst. II. p. 608. n. 12. die gelbe Bachstelze.

Ss 2

Leske,

(10) Ist nicht mit *Motacilla africana*, p. 958. n. 68. zu verwechseln.

(1) Die Synonymen und Beschreibungen dieser und der sitten Gattung (*Motacilla Boarula*, p. 997.) werden dergestalt verwechselt, dass man oft gar nicht herauskommen kann. Der eine sagt das von der *Flava*, was der andere von der *Boarula* sagt,

Leske, Naturgesch. p. 271. n. II. die gelbe Bachstelze.

Borowsky, Thierreich, III. p. 189. n. 7. die gelbe Bachstelze.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 540. n. 15. die gelbe Bachstelze.

Funke, Naturgesch. I. p. 258. die gelbe Bachstelze; Kuhstelze.

Ebert, Naturl. II. p. 258. Kuhstelzen.

Meyer, Thiere, II. tab. 78. gelbe Bachstelze.

Pennant, arct. Zool. II. p. 369. F. die gelbe Bachstelze.

Onomat. hist. nat. V. p. 264. die gelbe Bachstelze.

Handb. der deutsch. Thiergeesch. p. 135. die gelbe Bachstelze.

Klein, verb. Vögelhist. p. 168. n. 4. gelbe Bachstelze.

Brisson, ornith. I. p. 438. n. 40. Bergeronette du Printemps.

Büffon, Vögel, XVI. p. 54. der Frühlings-Sticherling; m. e. Fig.

Gesner, Vögelb. p. 545. gelbe Wasserstelze; m. e. schl. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 362. die gelbe Bachstelze.

Latham,

sagt, und so umgekehrt. So gehts auch mit Bestimmung der Charaktere und Ordnung der Synonymen. Sie passen größtentheils auf beyde. In der XII. Edit. p. 331. rechnete Linné die Synonymen von *M. Boarula* zu seiner *Motacilla flava*. Jetzt hat man beyde gerrennt, aber sie sind gewiss noch nicht gehörig vertheilt. *Bechstein* rechnet sogar Büffons Bergeronette jaune zur *Motacilla flava* Linn und die Bergeronette de Printemps zur *M. Boarula*. Mir ist es sehr wahrscheinlich, dass, da vieles von dem, was von der einen gesagt wird, nach Verschiedenheit des Alters, des Geschlechts und der Jahreszeit, auch auf die andern passt, daher diese Verwirrung und Verwechslung entstanden seyn möge.

Latham, Syn. Suppl. p. 179. Yellow Wagtail.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 504. n. 8. Motacilla (Flava) pectore abdomineque flavis, rectricibus duabus lateralibus dimidiato oblique albis.

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 132. n. 4. die gelbe Bachstelze; das geele Wähpftierten; de Lämmerhierd.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 438. die gelbe Bachstelze; Kuhstelze.

Fischer, Liv. p. 102. n. 167. Kuhstelze.

Fischer, Zusätze zur N. G. von Livil. p. 49. gelbe Bachstelze; Kuhstelze.

Beséke, Vögel Kurl. p. 80. n. 180. die gelbe Bachstelze.

Cetti, Sardin. II. p. 208. Bachstelze mit gelbem Bauch?

White, N. G. von Engl. p. 60. n. 5. gelbe Bachstelze.

Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 8. Gulspink.
 Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 253. die gelbe Bachstelze.

Naturforsch. XVII. p. 102. n. 210. die gelbe Bachstelze.

Seligmann, Vögel, VII. tab. 48. die gelbe Bachstelze.

Martini, Naturlex. V. p. 75. Frühlingsbachstelze.

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 187. n. 225. die gelbe Bachstelze.

Neueste Mannigfalt. IV. p. 57. gelbe Bachstelze.

Naturgesch. aus den best. Schriftst. Vög. p. 767. die Frühlingsbachstelze.

Anweis. Vögel zu fang. p. 108. die gelbe Bachstelze.

Borkhausen, Magazin, I. p. 176. n. 48. gelbe Bachstelze.

André u. Bechstein, Spazierg. II. p. 178. die gelbe Bachstelze?

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 2. Motacilla flava.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 185. n. 13. Motacilla (Flava) pectore abdomineque flavo, rectricibus duabus lateralibus dimidiato oblique albis.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 307. Muscipeta. II. Crucilega flava. *Gelber Sticherling*; *Ixlin*.

Fonston, av. p. 121. Motacilla flava altera.

Donndorff, Handb. der Thiergeesch. p. 383. n. 14. die gelbe Bachstelze.

β. *Büffon*, Vögel, XVI. p. 74. der Sticherling von Timor.

Latham, Syn. II. 2. p. 401. n. 6. Var. A. Timor Wagtail.

Latham, Syst. ornith. II. p. 504. n. 8. β. M. cinerreo-grisea, subtus flava, superciliis flavis, remigibus rectricibusque nigris, fascia alarum alba.

Martini, Naturlex. V. p. 194. Bachstelze von Timor.

γ. *Büffon*, Vögel, XVII. p. 182. die gelbe Meise des Gmelin; m. e. Fig. (2)

Latham, Syst. ornith. II. p. 504. n. 8. γ.

δ. *Büffon*, Vögel, XVII. p. 185. die kaspische Meise. (3)

Latham, Syst. ornith. II. p. 504. n. 8. δ.

ε. *Büffon*,

(2) Zieht im Anfang des Frühlings heerdenweise nach Astrachan; nistet aber daselbst nicht, sondern begiebt sich über die Wolga nach Russland, um da zu brüten, und kommt im Herbst nach den Ufern der caspischen See zurück. Nährt sich hauptsächlich von Samen; frisst aber auch Insekten.

(3) ist vorzüglich bey Empeli häufig vorhanden. Hält sich bey den Häusern, auf den Straßen, und am Strande heerdenweise auf,

• Büffon, Vögel, XVII. p. 187. die gesprengte Meise.

Latham, Syst. ornith. II. p. 504. n. 8. 2.

13. TIPHIA. Die Wässerstelze. (4)

Müller, Natursyst. II. p. 608. n. 13. die Wässerstelze.

Onomat. histor. natur. III. p. 892. die Bachstelze aus Bengala; der grüne indianische Sperling.

Klein, av. p. 75. n. 17. Luscinia Bengalensis.

Klein, Vorbereit. p. 142. n. 17. die bunte Grasmücke von Bengala.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 76. n. 17. bengalische Nachtigal.

Brisson, ornithol. I. p. 442. n. 47. Figuier de Bengal.

Büffon, Vögel, XVI. p. 78. der grün und gelbe Feigenfräßer; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 532. n. 91. (Siehe nachher Motacilla Zeylonica, n. 87.)

Seligmann, Vögel, IV. tab. 53. der grüne indische Fliegenschnäpper.

Martini, Naturlex. V. p. 196. Wässerstelze.

Naturgesch. aus den best. Schriftst. Vög. p. 775. der grüne und gelbe Feigenvogel.

Neueste Mannigfalt. IV. p. 449. die Wässerstelze.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 186. n. 14. Motacilla (Tiphia) viridis, subtus flavescens, alis nigris fasciis duabus albis.

85. SINENSIS. Die chinesische Motacille.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 533. n. 93. Sylvia (Sinensis) viridis, subtus incarnata, macula auf, so dass ihrer oft mehr als zehn auf einen Schuss getötet werden.

(4) Ist, nach Latham, mit Motacilla Zeylonica, p. 964. n. 87. einerley.

rium poneque oculos pallida, rectricibus mucronatis.

86. SINGALENSIS. *Die cingalesische Motatille.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 533. n. 92. *Sylvia (Cingalensis) viridis variegata*, subtus flava, collo inferiore fulvo.

87. ZEYYLONICA. *Die schwarz gescheitelte zeylonische Motacille.* (5)

Latham, Syst. ornithol. II. p. 532. n. 91. *Sylvia (Zeylonica) viridis subtus flavescens*, vertice nucha aliquis nigris, fascia alarum bifida alba.

Latham, Syn. Suppl. p. 474.

88. OLIVACEA. *Die olivenfarbige zeylonische Motacille.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 532. n. 90. *Sylvia (Olivacea) olivacea*, corpore subtus albo, capistro flavescente.

89. CARYOPHYLLACEA. *Die nelkenfarbige Motacille.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 352. n. 89. *Sylvia (Caryophyllacea) dilute caryophyllea*, alis caudaque obscuris, rostro pedibusque rubris.

90. ALBICAPILLA. *Die weißgekrönte Motacille.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 532. n. 87. *Sylvia (Albicapilla) viridis*, subtus albida, gula macula verticis subocularique albis.

91. GRISEA. *Der cayennische Grauling.* (6)

Büffon, Vögel, IX. p. 180. *der cayennische Grauling*; m. e. Fig. — XIII. p. 184. *der Grisin von Cayenne*.

Latham,

(5) Nach *Latham* mit *Motacilla Tiphia* p. 961. n. 13. einerley.

(6) Nach *Büffon* eine Abart von *Turdus Cirrhatus* p. 826. n. 91.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 532. n. 88. *Sylvia* (*Grisea*) *cinereo-grisea*, *subtus fasciaque per oculos alba*, *vertice, collo inferiore pectoreque nigris*.

92. MACULATA. *Die Ortolanenpivotे.*

Büffon, Vögel, XV. p. 208. *die Ortolanenpivotे;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 532. n. 86. *Sylvia* (*Maculata*) *nigro-maculata*, *supra fusca*, *subtus cinereo-alba*, *alis caudaque nigris*, *rectricibus duabus extimis margine exteriore apice que toto albis*.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 241. *die Pi-vote.*

93. MASSILIENSIS. *Der Fift.*

Büffon, Vögel, XV. p. 207. *der Fift von Provence;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 531. n. 85. *Sylvia* (*Massiliensis*) *fusco rufoque varia*, *subtus rufo-alba*, *pectore nigro-maculato*, *sub oculis macula flavescente*, *rectricibus duabus extimis albis*.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 241. *der Fift.*

94. PILEATA. *Die schwarzkappige Motacille.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 531. n. 84. *Sylvia* (*Pileata*) *rufo-fusca*, *capite pectoreque nigris*, *fronte, gula, superciliis, uropygio rectricibusque lateralibus a basi ad medium albis*.

95. AURANTIA. *Die orangebrüstige Motacille.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 23. *der grünbraune Steinschmätzer;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 531. n. 83. *Sylvia* (*Aurantia*) *nigricans*, *viridi nebulosa*, *subtus fulve-*

fulvescens, gula macula tectricum tectricibus caudae rectricibusque lateralibus apice albis.

Martini, Naturlex. V. p. 189. grünbrauner kapscher Steinschmätzer.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 250. der braun-grünliche Weisschwanz.

96. HOTTENTOTTA. Die Hottentottenmotacille.

Büffon, Vögel, XVI. p. 21. der große Capsche Steinschmätzer.

Latham, Syst. ornith. II. p. 531. n. 82. *Sylvia* (Hottentotta) fulvo-fusca, subtus gulaque albida, vertice pectoreque nebulosis, abdomine superiore uropygioque fulvis, rectricibus lateralibus basi albis.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 249. der kapsche Weisschwanz.

Martini, Naturlex. V. p. 188. großer Steinschmätzter vom Kap.

97. LEUCORHOA. Der senegalische Weisschwanz.

Büffon, Vögel, XVI. p. 25. der senegalische Weisschwanz.

Latham, Syst. ornith. II. p. 531. n. 81. *Sylvia* (Leucorhoa) rufo-fusca, subtus albo-flavescens, pectore rubefcente, uropygio basique caudae albis.

Martini, Naturlex. V. p. 190. Senegalischer Steinschmätzer.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 251. der senegalische Weisschwanz.

14. STAPAZINA. Die spanische Motacille.

Müller, Natursyst. II. p. 608. n. 14. die spanische Bachstelze.

Pennant, arct. Zool. II. p. 394. Q. der röthlichbraune Weisschwanz.

Onomat. hist. nat. VII. p. 756. das schwarzkehlichen; rothe Bachstelze.

Klein, av. p. 80. n. 26. Sylvia s. Nigricilla, gutture nigro nigrisque alis, corpore aeruginoso.

Klein, Vorbereit. p. 150. n. 26. schwarzkehlicher Schwarzschwanz.

Klein, verb. Vögeln. p. 81. n. 29. Schwarzkehlicher Schwarzschwanz.

Brisson, ornithol. I. p. 436. n. 37. Cul-blanc roux.

Büffon, Vögel, XIV. p. 17. et 19. der rothe Weisschwanz.

Latham, Syst. ornith. II. p. 530. n. 80. Sylvia (Stapazina) ferruginea, area oculorum alis caudaque fuscis, rectricibus extimis latere albis.

Seligmann, Vögel, II. tab. 61. die röthlichbraune Grasmücke.

Martini, Naturlex. V. p. 162. die rothe Bachstelze.

Neueste Mannigfalt. IV. p. 325. die rothe Bachstelze.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 186. n. 16. Motacilla (Hispanica) ferruginea, area oculorum alis caudaque fuscis, rectricibus extimis latere albis.

B. Brisson, ornith. I. p. 435. n. 36. Cul-blanc rous-satre. (?)

Büffon, Vögel, XVI. p. 18. der rothgelbliche Weisschwanz.

Onomat. hist. nat. VII. p. 755. die röthliche Bachstelze.

Latham, Syn. II. 2. p. 469. n. 76. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 530. n. 80. B. Sylvia rufescens, subtus albida, taenia per oculos nigra,

(7) Nach Brisson eine eigne Gattung.

nigra, rectricibus 2. intermediis nigris, laterilibus albis utrinque versus apicem nigro fimbriatis.

Linné, Syst. Nat. Ed. XII. p. 332. ad n. 14. oben.

15. OENANTHE. *Der Weißschwanz.*

Müller, Natursyst. II. p. 609. n. 15. *der Weißschwanz.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 192. n. 11. *das Weißkehlchen.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 541. n. 17. *der Weißschwanz; Steinkletsche; Steinschwacker.*

Bechstein, N. G. Deutschl. III. p. 605. *der gelbbrüftige Fliegenvogel mit oberhalb weißem Schwanze; der Weißschwanz.*

Funke, Naturgesch. I. p. 258. *der Steinschwacker.*

Halle, Vögel, p. 339. n. 314. *das Weißkehlchen.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 426. n. 364. *das Weißkehlchen.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 393. P. *der Weißschwanz.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 752. *der Steinschmatzer.*

Klein, av. p. 78. n. 9. *Sylvia buccis nigris.*

Klein, Vorbereit. p. 147. n. 9. *schwarzrückige Grasmücke; Weißkehlein mit schwarzen Backen.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 79. n. 12. *Weißkehlein mit schwarzen Backen.*

Gesner, Vögelb. p. 387. *Oenanthe?*

Briffon, ornith. I. p. 434. n. 1. *Cul-blanc, ou Vitrec, ou Moteux.*

Buffon, Vögel, XVI. p. 5. *der grosse Steinschätzzer oder Weißschwanz; m. 2. Figg. M. u. W.*

Batsch, Thiere, I. p. 362. *das Weißkehlchen.*

Latham, Syn. Suppl. p. 182. *Wheat-eat.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 529. n. 79. *Sylvia (Oenanthe) dorso cano, fronte linea supra oculos,*

los, uropygio basique caudae albis, per oculos
fascia nigra.

Beseke, Vögel Kurl. p. 81. n. 182. der Weiß-
schwanz.

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 183. n. 5. die weißge-
schwanzte Bachstelze.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 211. Grasmücke mit
schwarzem Rücken.

Cetti, Sardin. II. p. 221. der Weißbürtzel.

Pontoppidan, Dämmen. p. 174. n. 9. Steendolp;
Steenşprette.

Pontoppidan, Norweg. II. p. 185. Steendulp,
Steenşquette; Quicastiert.

White, N. G. von Engl. p. 25. Steinquäcker.

Oloffen, Reis. d. Isl. I. p. 311. Steindepill.

Pennant, Reis. d. Schottl. I. p. 285. Weißchwänze.

Pallas, nord. Beytr. III. p. 14. der Steinquäcker.
IV. p. 22. Motacilla Oenanthe.

Linné, Abhandl. II. p. 305. n. 136. das Weiß-
kehlchen.

Schwed. Abhandl. XXXVIII. p. 294 fahle Gras-
mücke.

Pennant, britt. Thiergesch. p. 115. tab. 54. Fig.
5. 6.

Naturforsch. XVII. p. 103. n. 211. der Weiß-
schwanz.

Borkhausen, Magaz. I. p. 183. n. 58. Stein-
schmatzer.

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 190. n. 230. der
Steinschmatzer.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 248. der gelb-
brüstige Fürgensthnäpper.

Zorn, Petinotheol. II. p. 378. der größere Stein-
schmatzer.

Tänzer, notab. Venat. p. 100. n. 127. Stein-
Klatsche.

Martini,

- Martini*, Naturlex. V. p. 185. *Steinschmacker*.
Döbel, Jägerprakt. I. p. 65. *Steinklatsche*.
 Naturgesch. m. merian. Kupf. p. 756. *Weißschwanz*.
Landlust. p. 302. *Steinbeißer*.
Börner, schles. ökon. Nachr. 1781. p. 227. Mot.
Oenanthe.
 Neueste Mannigfalt. IV. p. 410. *Weißschwanz*.
Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 57. *Oenanthe*.
Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 31. n. 4. *Oenanthe*.
Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 186. n. 17. *Motacilla*
 (*Oenanthe*) *dorso cano, fronte alba, oculorum fascia nigra*.
Kramer, Austr. p. 374. n. 4. *Motacilla dorso cano,*
fronte, uropygio et linea supra oculos albis.
Steinschwatz; *Steinschnapperl*.
Charleton, onom. zoic. p. 91. n. 13. *Oenanthe*,
Vitiflora s. *Vitisera*.
Belon, nat. des ois. p. 352. *Cul-blanc ou Vitrec*.
Hist. provenc. I. p. 498.
Voy. en Barbar. I. p. 273.
Zinnan, Uov. p. 41. tab. 6. Fig. 24. *Culo-bianco*.
Bomare, diction. III. p. 507. — Diction. des
 anim. I. p. 806.
Plin. hist. nat. L. 10. c. 29. *Oenanthe?*
Aelian. de nat. animal. L. 12. c. 9. *Κρυκλος?*
Aristot. hist. anim. L. 9. c. 49. *Ουανθη?*
Donndorff, Handb. d. Thiergeesch. p. 283. n. 15.
 der *Weißschwanz*.

β. *Der graue Weißschwanz.* (8)

- Brisson*, ornith. I. p. 434. n. 34. *Cul-blanc gris*.
Büffon, Vögel, XVI. p. 15. *der graue Weiß-*
schwanz.
Onomat. hist. nat. VII. p. 754. *die graue Bach-*
stielze.

Latham,

(8) Nach *Brisson* eine eign. Gattung.

Latham, Syn. II. 2. p. 467. n. 75. Var. A. Grey
Wheat - ear.

Latham, Syst. ornith. II. p. 530. n. 79. ♂. *Sylvia*
corpo^ra supra fulvo albidoque vario, collo in-
fimo griseo maculato, rectricibus duabus inter-
mediis toto nigris.

Linne'^e, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 186. n. 17. ♂. Mota-
cilla subtus pallida, rectricibus introrsum albis,
dorso undulato.

γ. *Der aschgraue Weisschwanz* ⁽⁹⁾

Briffon, ornith. I. p. 435. n. 35. Cul-blanc cendré.

Büffon, Vögel, XVI. p. 16. *der aschgraue Weiss-
schwanz*.

Onomat. hist. nat. VII. p. 753. *die aschgraue Bach-
stelze*.

Latham, Syn. II. 2. p. 468.

Latham, Syst. ornith. II. p. 530. n. 79. γ. *Sylvia*
supra cinerea, griseo-fusco varia.

Martini, Naturlex. V. p. 14. *ashgraue Bach-
stelze*.

Neueste Manuigfalt. III. p. 773. *ashgraue Bach-
stelze*.

δ. *Latham*, Syst. ornith. II. p. 530. n. 79. δ. *Sylvia*
supra alba, gula alis rectricibus intermediis fere
totis, aliarumque maculis binis atris.

Scopoli, Rem. a. d. N. G. I. p. 191. ad n. 230. *der
oben weiße Steinschmätzer*.

16. RUBETRA. *Das Braunkehlchen*.

Müller, Natursyst. II. p. 609. n. 16. *das Braun-
kehlchen*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 192. n. 12. *das
Braunkehligen; Todtenvogel; Pfäfgen*.

Bech.

(9) Nach Briffon eine eigne Gattung.

- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 541. n. 18. *das Kohl-vögelchen.*
- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. III. p. 605. *das Krautvögelchen.*
- Halle*, Vögel, p. 338. n. 313. *das schwarzbraune Braunkehlchen, Todtenvogel.*
- Pennant*, arct. Zool. II. p. 394. R. *das Braunkehlchen.*
- Onomat. hist. nat.* V. p. 272. *das schwarzbraune Braunkehlchen.*
- Klein*, av. p. 78. n. II. *Sylvia Petrarum.*
- Klein*, Vorbereit. p. 147. n. II. *Steinfletsche; Steinpatsche.*
- Klein*, verbess. Vögelhistor. p. 79. n. 14. *Steinfletsche.*
- Gesner*, Vögelb. p. 504. *Todtenvögelein; mit e. Fig.*
- Briffon*, ornithol. I. p. 430. n. 26. *grand Traquet ou Tarier.*
- Büffon*, Vögel, XV. p. 452. *der kleine Steinschmäzzer oder Braunkehlchen; m. e. Fig.*
- Batsch*, Thiere, I. p. 362. *das Braunkehlchen.*
- Latham*, Syst. ornith. II. p. 525. n. 58. *Sylvia (Rubbetra) nigricans, superciliis albis, macula alarum alba, gula pectoreque flavescente.*
- Beseke*, Vögel Kurl. p. 81. n. 183. *das Braunkehlchen.*
- Siemßen*, meklenb. Vögel, p. 134. *der Steinschmäzzer; Steenbicker.*
- Bock*, N. G. von Preuss. IV. p. 439. *das Braunkehlchen.*
- Fischer*, Livil. p. 101. n. 164. *Braunkehlchen; Fliegenschnäpper.*
- Fischer*, Zus. zur N. G. von Livil. p. 50. n. 501. *Braunkehlchen.*

White, N. G. von Engl. p. 61. n. 8. Motacilla Rubetra.

Pontoppidan, Dänem. p. 174. n. 10. Motacilla Rubetra.

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 22. der Steinschmazzer.

Pennant, britt. Thiergeschichte, p. 116. tab. 55. fig. 3. 4.

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 195. n. 237. der bräunliche Fliegenvogel.

Borkhausen, Magazin, I. p. 183. n. 59. Gelbbrüstchen; Gelbkehltchen; Steinflieger.

Naturforsch. XVII. p. 103. n. 212. das Braunkohlchen.

Zorn, Petinotheol. II. p. 380. der kleine Stein-Schmätzer.

Sammel. zur Phys. u. N. G. III. p. 245. das Braunkohlchen.

Martini, Naturlex. V. p. 36. Braunkohlchen; Fliegenstecher, Nosselink; Nesselink; schwarzbraune Braunkohlchen.

Neueste Mannigfalt. III. p. 804. Braunkohlchen.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 5. Rubetra.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 186. n. 18. Motacilla (Rubétra) nigricans superciliis albis, macula alarum alba, gula pectoreque flavescente.

Kramer, Austr. p. 375. n. 5. Motacilla capite et dorso griseo nigroque variis; pectore testaceo, uropygio rufescente. Gestettenschlager.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 307. Muscipeta III. Nosselinke; Todten Vogel.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Pol. p. 397. Muscipeta IV. Jonstoni.

Jonston, av. pag. 121. Muscicapa quarta. Todten vogel.

Belon, hist. nat. des ois. p. 361. Tatier.

Onomat. forestal. III. p. 490.

Bomare, diction. XI. p. 134. — Diction. des anim. IV. p. 272. 416.

Donndorff, Handb. d. Thiergeesch. p. 383. n. 16. das Braunkehlchen.

98. FERVIDA. Das Senegalische Weißkehlchen.

Büffon, Vögel, XV. p. 260. das Senegalische Weißkehlchen, der Steinschmätzer.

Latham, Syst. ornith. II. p. 525. n. 59. *Sylvia* (Fervida) fusca rufo-marginata, subtus flavescente-alba, pectore rufescente, maculis alarum duabus albis.

99. MONTANELLA. Die Sibirische Motacille.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 526. n. 60. *Sylvia* (Montanella) testacea, fusco-maculata, subtus superciliisque flavescentibus, macula aurium nigra.

Pallas, Reis. Ausz. III. Anh. p. 5. n. 12. Motacilla montanella.

100. MAGNA. Das große Weißkehlchen.

Büffon, Vögel, XV. p. 270. das große Weißkehlchen.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 525. n. 57. *Sylvia* (Magna) fusca, subtus rufescens, gula albescente, remigibus rectricibusque rufo fuscoque dimidiatis, exterioribus duabus extus albis.

Martini, Naturlex. V. p. 201. großes Weißkehlchen.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 246. das große Braunkehlchen.

101. PHILIPPENSIS. *Der große philippinische Steinschmätzer.* (10)

Briffon, ornith. I. p. 433. n. 32. *grand Traquet des Philippines.*

Büffon, Vögel, XV. p. 266. *der große philippinische Steinschmätzer.*

Latham, Syn. II. 2. p. 453. n. 52. *Philippine Warbler.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 525. n. 56. *Sylvia (Philippensis) nigro-violacea, subtus capite que rufo-albo, pectore caerulecente, rectrice extima extus rufescente alba.*

Martini, Naturlex. V. p. 154. *philippinische große Bachstelze.*

Neueste Mannigfalt. IV. p. 256. *große pensylvanische Bachstelze.*

102. COROMANDELICA. *Die coromandelische Motacille.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 524. n. 55. *Sylvia (Coromandelica) nigra flavescente-maculata, subtus nigra fasciata, uropygio et abdomine rufescens, remigibus caudaque nigris.*

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 161. *der kleine indianische schwarzrückige Fliegenfänger.*

103. PERSPICILLATA. *Die Brillenmotacille.*

Büffon, Vögel, XV. p. 274. *der Clignot; oder der Blinzer.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 524. n. 54. *Sylvia (Perspicillata) nigra, macula alarum alba, orbitis nudis carunculatis flavis.*

Martini, Naturlex. V. p. 31. *der Blinzer.*

(10) Vielleicht eine Spielart von *Motacilla fulicata*. p. 996.
n. 39.

17. RUBICOLA. Das Weißkehlchen.

Müller, Natursyst. II. p. 610. n. 17. das Weißkehlchen; tab. 26. Fig. 1.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 542. n. 19. der Steinpicker; Weißkehlchen; Christöffelchen.

Halle, Vögel, p. 343. n. 323. der schwarze Fliegenstecher, mit weißem Halsringe?

Ononiat. hist. nat. VI. p. 845. das Weißkehlchen; der Fliegenstecher.

Klein, av. p. 78. n. 8. Sylvia lutea, capite nigro,

Klein, Vorbereit. p. 146. n. 8. gelber Sticherling,

Klein, verb. Vögell. p. 79. n. 11. Gelbschwarzkehlein,
mit *M. Rubetra* und *Flava* verwechselt.

Klein, Vögeleyer, p. 25. tab. 10. fig. 14.

Brisson, ornith. I. p. 429. n. 25. Traquet.

Büffon, Vögel, XV. p. 259. das Weißkehlchen.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 523. n. 49. Sylvia (Rubicola) grisea, subtus rufescens, iugulo fascia alba, loris nigris, uropygio maculaque alarum albis.

Fischer, Zus. zur N. G. von Livil. p. 50. n. 502.

Weißkehlchen.

White, N. G. von Engl. p. 61. n. 9. Steinschmatzer.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 244. das Weißkehlchen.

Borkhausen, Magaz. I. p. 184. der Schollenhüpfer.

Scopoli, Bein. a. d. N. G. I. p. 194. n. 236. der schwarze und weiße Fliegenschnäpper.

Martini, Naturl. V. p. 198. Weißkehlchen.

Pennant, britt. Thiergeschichte. p. 118. tab. 55.
Fig. 5. 6.

Neueste Mannigfalt. IV. p. 450. Weißkehlchen.

Charleton, onom.-zoic. p. 91. n. 7. Rubetra.

Charleton, exercit. p. 79. n. 7. Rubetra.

Kramer, Austr. p. 375. n. 6. Motacilla nigricans, macula alarum magna, superciliis albis, pectorale et gula ochreis. Christöfl.

(Mit Mot. *Rubetra* verwechselt.)

Sibbald, Scot. illustr. II. 3. p. 18. Oenanthe tertia.

Fonston, av. p. 121. Muscicapa.

Belon, nat. des ois. p. 360. Traquet; Groulard, Tharier, Thyon.

Hist. Prov. I. p. 508.

Zinnan, Uov. p. 52. tab. 7. fig. 40. Occhio di Bue.

Donndorff, Handb. d. Thiergechich. p. 384. n. 17. das Weißkehlchen.

β. Lepechin, Tageb. d. russ. Reis. II. p. 186. Motacilla superne nigricans, torque albo interrupto, interne ferruginea, capite atro, nucha albicans, macula alarum oblonga candida, dorso nigro, marginibus pennarum rufescentibus. Tschekantschik. tab. 7. das Männch.

18. ATRICAPILLA. Der Klosterwenzel. (1)

Müller, Natursyst. II. p. 610. n. 18. der Klosterwenzel.

Borowsky, Thierreich, III. p. 193. n. 13. der Klosterwenzel; Mönch.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 192. n. 6. Motacilla (Atricapilla) testacea, subtus cinerea, pileo obscuro; der Klosterwenzel; Mönch.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 534. n. 3. der Mönch; schwarzköpfige Grasmücke.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 606. der Mönch mit der schwarzen Platte. p. 607. der Mönch mit der röthlichen Platte.

Halle, Vögel, p. 340. n. 315. der Mönch mit schwarzer Platte.

(1) Ist nicht mit *Muscicapa Atricapilla* zu verwechseln.

- Halle*, Vögel, p. 341. n. 317. *der Mönch mit rothbrauner Platte?*
- Gatterer*, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 427. n. 366. *der Mönch; Schwarzkopf; Graspatz; Schwarzkäppchen*, etc.
- Pennant*, archt. Zool. II. p. 390. F. *die Schwarzkäpppe.*
- Onomat. hist. nat.* II. p. 43. *die schwarzköpfige Bachstelze.*
- Klein*, av. p. 79. n. 14. *Sylvia atricapilla.*
- Klein*, Vorbereit. p. 148 n. 14. *Mönch, Schwarzkopf; Graspatz; Mönch mit schwarzer Platte.*
- Klein*, verb. Vögelhist. p. 80. n. 18. *Klosterwenzel; Schwarzkopf*, etc.
- Klein*, av. p. 79. n. 15. *Sylvia vertice subrubro.* (das Weibch.)
- Klein*, Vorbereit. p. 148. n. 15. *Mönch mit röthlicher Platte. Cardinälchen.*
- Klein*, verbess. Vögelhist. p. 80. n. 19. *Mönch mit röthlicher Platte. Cardinal.*
- Klein*, Vögeleyer, p. 26. tab. 10. Fig. 17.
- Gesner*, Vögelb. p. 140. *Schwarzkopf; Münchlein.*
- Brisson*, ornithol. I. p. 416. n. 6. *Fauvette à tête noire.*
- Büffon*, Vögel, XV. p. 75. *die schwarzplattige Grasmücke; m. 2. Fig. M. u. W.*
- Batsch*, Thiere, I. p. 362. *der Mönch.*
- Latham*, Syst. ornithol. II. p. 508. n. 6. *Sylvia (Atricapilla) testacea, subtus cinerea, pileo obscuro.*
- Beseke*, Vögel Kurl. p. 81. n. 184. *der Klosterwenzel.*
- Siemßen*. meklenb. Vögel, p. 135. n. 7. *der Mönch.*
- Bock*, N. G. von Preuss. IV. p. 439. *der Schwarzkopf; Mauskopf.*
- Cetti*, Sardin. II. p. 213. *der Schwarzkopf.*
- White,*

- White, N. G. von Engl. p. 12. p. 34. n. 8. p. 58.
n. 6. p. 63. n. 9. der Klosterwenzel.
- Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 1. Havskade.
- Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 190. n. 229. der
Mönch mit der schwarzen Platte.
- Martini, Naturl. V. p. 112. Klosterwenzel; After-
nachtigall; Grasmückchen, Grasspatz; Kardi-
nälchen; Mönchlein, etc.
- Pennant, britt. Thiergesch. p. 112. tab. 53. Fig. 5.
- Tengmalm: neue Schwed. Abhandl. IV. p. 52.
Motacilla Atricapilla.
- Naturforsch. XVII. p. 103. n. 213. der Kloster-
wenzel.
- Borkhausen, Magaz. I. p. 189. n. 68. Kloster-
wenzel.
- Frisch, Vögel, tab. 23. Fig. 1. et 2. Mönch mit
schwarzer (M.) — und mit röthlicher Plat-
te. (W.)
- Zorn, Petinotheol. II. p. 372. der Mönch, mit
dem schwarzen Ober-Kopf, oder Platte.
- Zorn, Petinotheol. II. p. 373. der Mönch mit der
röthlich-oder braunen Platte.
- Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 231. der Mönch
mit der schwarzen Platte.
- Neueste Männigfalt. IV. p. 142. Klosterwenzel.
- Linne', Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 16. Atrica-
pilla.
- Linne', Syst. Nat. Edit. X. I. p. 187. n. 19. Motacilla
(Atricapilla) testacea, subtus cinerea, pileo ob-
scuro.
- Kramer, Austr. p. 377. n. 15. Motacilla testacea
subtus subcinerea pileo obscuro. Schwarzplattl.
- Schwenkfeld, av. Silef. p. 227. Atricapilla. Münch-
lin; Schwarzkopf; Grasspatz.
- Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 366. Atri-
capilla.

Fonston, av. p. 125. *Atricapilla*. p. 126. *Atricapilla*.
la alia castaneo vertice.

Zinnan, Uov. p. 56. tab. 8. Fig. 45. *Capinero*.

Belon, obs. p. 19. *Atricapilla*.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 384. n. 18.
der Klosterwenzel.

β. *Briffon*, ornith. I. p. 417. n. 6. A. Fauvette noire
et blanche.

Latham, Syst. ornith. II. p. 509. n. 6. β.

Zinnan, Uov. p. 44. tab. 12. Fig. 29. 1.

γ. *Büffon*, Vögel, XV. p. 89. *die kleine Colombade*.

Latnam, Syn. II. 2. p. 416.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 509. n. 6. γ. *Sylvia*
supra nigricans, lateribus griseis, gula alba.

δ. *Büffon*, Vögel, XV. p. 152. *die grünliche louisianische Grasmücke*.

Latham, Syn. II. 2. p. 417.

Latham, Syst. ornith. II. p. 509. n. 6. δ. *Sylvia* fu-
scovirescens, pileo nigricante, cervice cinereo,
superciliis albis, alis caudaque nigricantibus.

104. MELANOCEPHALA. *Die schwarzköpfige Motacille*.

Cetti, Sardin. l. c. noch eine kleinere Art Schwarz-
kopf.

Latham, Syst. ornith. II. p. 509. n. 7. *Sylvia* (*Mela-*
nocephala) ex virescente cinerea, subtus gri-
sea, vertice nigro, oculorum fascia rubra.

105. MOSCHITA. *Die Moschita*.

Cetti, Sardin. l. c. *Moschita* oder *Noschita*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 509. n. 8. *Sylvia*
(*Moschita*) *plumbea*, pileo rufescente.

19. PENSYLVANICA. Das Blutrothkehlchen.

Müller, Naturyst. II. p. 610. n. 19. die pensylvani-
sche Bachstelze.

Pennant, arct. Zool. II. p. 377. n. 215. das Blut-
rothkehlchen. (Ed. angl. II. N. 298. Bloody side
Warbler.)

Onomat. hist. nat. III. p. 905. die Bachstelze aus
Pensylvanien mit einem gelben Kopf.

Onomat. hist. nat. V. p. 268. die Pensylvanische
Bachstelze.

Briffon, ornithol. I. p. 458. n. 78. Figuier à tête
jaune de Pensilvanie.

Büffon, Vögel, XVI. p. 140. der rothbrüstige Fei-
genesser; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 540. n. 120. Sylvia
(Pensylvanica) pileo flavescente, hypochondriis
sanguineis.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 91. Fliegenschnäp-
per mit rother Brust.

Martini, Naturlex. V. p. 84. die gelbköpfige Bach-
stelze aus Pensylvanien.

Neueste Mannigfaltigk. IV. p. 663. gelbköpfige
Bachstelze.

Naturgesch. mit Merian. Kupf. Vög. p. 792. der
Feigenvogel mit der rothen Brust.

o6. RUFICAPILLA. Die martinikische Motacille.

Onomat. histor. natur. III. p. 902. die Bachstelze
von der Insel Martinique.

Briffon, ornithol. I. p. 444. n. 50. Figuier de la
Martinique.

Büffon, Vögel, XVI. p. 137. der Martinikische
Feigenfreßer.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 540. n. 119. Sylvia
(Ruficapilla) viridi-olivacea, subtus flava, col-
lo subtus pectoreque strigis fuscis, vertice rufo,
rectrici-

rectricibus duabus exterioribus intus lutescentibus.

Martini, Naturlex. V. p. 123. die Martinikische Bachstelze.

Neueste Mannigfalt. IV. p. 199. die Martinikische Bachstelze.

Naturgesch. mit Merian. Kupf. Vög. p. 791. der rothköpfige Feigenvogel.

Feuillée obs. p. 113. Chloris Eritachoides?

20. C H R Y S O P T E R A. Die goldflügelige Motacille.

Müller, Natursystem, II. p. 611. n. 20. der Gelbflügel.

Onomat. hist. nat. IV. p. 905. die Bachstelze aus Pensylvanien mit einer schwarzen Kehle.

Onomat. hist. nat. V. p. 263. die Pensylvanische Bachstelze mit gelben Flügeln.

Pennant, arct. Zool. II. p. 376. n. 212. der Goldflügel.

Briffon, ornithol. I. p. 458. n. 77. Figuier à gorge noire de Pensylvanie.

Büffon, Vögel, XVI. p. 145. der goldflügeliche Feigenfresser; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 541. n. 123. *Sylvia* (Chrysoptera) fusca, subtus alba, pileo maculaque alarum luteis, gula fasciaque per oculos nigris.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 89. der Fliegen schnäpper mit goldenen Flügeln.

Martini, Naturlex. V. p. 79. Gelbflügel.

Neueste Mannigfaltigk. IV. p. 61. Gelbflügel.

Naturgesch. m. Merian. Kupf. Vög. p. 794. der Feigenvogel mit goldenen Flügeln.

107. CHRYSOCEPHALA. Die Motacille mit orangefarbigem Kopf.

Büffon, Vögel, XVI. p. 150. der pomeranzenfarbige Feigenfresser.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 541. n. 124. Sylvia (Chrysocephala) rufo-fusca subtus alba, capite anterius colloque subtus fulvis, tectricibus alarum albo nigroque variegatis, cauda nigra.

Naturgesch. m. Merian. Kupf. Vög. p. 795. der orangefarbige Feigenvogel.

108. CRISTATA. Die gezopfte Motacille.

Müller, Natursyst. Supplem. p. 176. n. 57. der Hayduck.

Büffon, Vögel, XVI. p. 151. der gezopfte Feigenfresser.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 541. n. 125. Sylvia (Cristata) virescens, supra fusca, subtus grisea, capite crista plicatili fusca albo marginata.

Neueste Mannigfaltigk. IV. p. 55. die gehäubte Bachstelze.

109. MULTICOLOR. Die schwarz und gelbe Motacille.

Büffon, Vögel, XVI. p. 152. der schwarze Feigenfresser; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 541. n. 126. Sylvia (Multicolor) nigra, subtus alba, colli pectorisque lateribus cauda a basi ad medium fascia que alarum rufis.

110. AEQUINOCTIALIS. Die olivenfarbige Cayennische Motacille.

Büffon, Vögel, XVI. p. 143. der olivenfarbige Feigenfresser; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 542. n. 127. Sylvia (Aequinoctialis) fusco-viridis, subtus flavescente-alba,

te-alba, gutture pectoreque pallide flavis, remigibus rectricibusque fuscis.

Naturgesch. aus den best. Schriftst. Vög. p. 796. der olivenfarbene Feigenwogel.

III. PROTONOTARIUS. Der Protonotar.

Pennant, arct. Zool. II. p. 382. n. 227. der Protonotar.

Büffon, Vögel, XVI. p. 154. der Protonotaire.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 542. n. 128. Sylvia (Protonotarius) flava, dorso olivaceo, uropygio cinereo, remigibus rectricibusque cinereo et nigricante variis.

Naturgesch. m. Merian. Kupf. p. 796. der Protonotair.

112. SEMITORQUATA. Die Motacille mit halbem Halsbande.

Pennant, arct. Zool. II. p. 382. n. 228. der Sänger mit dem halben Halsbande.

Büffon, Vögel, XVI. p. 156. der Feigenfresser mit halben Halsbande.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 542. n. 129. Sylvia (Semitorquata) fusca, subtus flavo-cinerascens, cervice infima lunula flava, rectricibus quatuor extimis intus albis.

Naturgesch. m. Merian. Kupf. p. 797. Feigenwogel mit der halben Halsbinde.

113. FULVA. Die orangegelbbäuchige Motacille.

Pennant, arct. Zool. II. p. 383. n. 229. der Sänger mit orangengelbem Bauche.

Büffon, Vögel, XVI. p. 158. der gelbkehlige Feigenfresser.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 542. n. 130. Sylvia (Fulva) fulvo-olivacea, subtus rufa, collo inferiore, crissoque flavis.

Naturgesch. m. Merian. Kupf. p. 797. *der Feigenvogel mit gelber Kehle.*

114. F U S C A. *Die olivenbraune louisianische Motacille.*

Müller, Naturyst. Suppl. p. 175. n. 55. *der Flügelfleck.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 383. n. 230. *der olivenbraune Sänger.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 159. *der olivenbraune Feigenfresser.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 543. n. 131. *Sylvia (Fusca) fusco-olivacea, subtus albo-flavescens, collo subtus griseo alboque nebuloso, rectricibus duabus extimis intus ad apicem albo-maculatis.*

Naturgesch. m. Merian. Kupf. Vög. p. 797. *der olivenbraune Feigenvogel.*

Neueste Mannigfalt. IV. p. 53. *der Flügelfleck.*

115. P I N G U I S. *Der Fettling. (2)*

Pennant, arct. Zool. II. p. 383. n. 231. *der Mönch.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 161. *der fette Feigenfresser.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 543. n. 132. *Sylvia (Pinguis) griseo-olivacea, subtus albida, macula verticis uropygioque flavis, rectricibus quatuor extimis intus albo maculatis.*

Naturgesch. m. Merian. Kupf. p. 798. *der Fettling.*

116. C A N A. *Das Graukehlchen.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 283. n. 232. *das Graukehlchen.*

Büffon,

(2) Die Bezeichnung *Fettling*, (Graffers) wird in Louisiana außer dieser, auch den drey vorhergehenden, und der nächstfolgenden Gattung, wegen ihrer ausnehmenden Fettigkeit gegeben. Sie halten sich häufig auf den Tulpenbäumen auf, besondere aber lieben sie die grosse Magnolie. (*Magnolia grandiflora* Linn.)

Büffon, Vögel, XVI. p. 162. *der aschgraue Feigenfresser mit aschgrauer Kehle.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 543. n. 133. *Sylvia (Cana) cinerea, subtus grisea, cauda nigra, rectricibus 1, 1, toto, 2, 2, 3, 3, apice albis.*

Naturgesch. m. Merian. Kupf. Vög. p. 798. *der aschfarbene Feigenvogel mit der aschfarbenen Kehle.*

21. CORONATA. *Die gekrönte Motacille.*

Müller, Natursyst. II. p. 611. n. 21. *die gekrönte Bachstelze.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 375. n. 211. *die Goldkrone.*

Onomat. hist. nat. III. p. 904. *die aschgraue gefleckte Bachstelze aus Pensylvanien.*

Onomat. hist. nat. V. p. 263. *die pensylvanische Bachstelze mit gelbem Kopfe.*

Briffon, ornith. I. p. 460. n. 81. *Figuier cendré tacheté de Pensylvanie.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 174. *der gekrönte Feigenfresser; m. e. Fig.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 538. n. 115. *Sylvia (Coronata) nigro-maculata, pileo hypochondriis uropygioque flavis, fascia per oculos guaque nigra.*

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 88. *zwey Fliegenfänger mit goldenen Kronen, ein Er und eine Sie.*

Martini, Naturlex. V. p. 67. *die gekrönte Bachstelze.*

Neueste Mannigfaltigk. IV. p. 55. *gekrönte oder pensylvanische Bachstelze mit gelbem Kopfe.*

Naturgesch. m. Merian. Kupf. Vög. p. 794. *der Feigenvogel mit der goldenen Krone.*

22. S E N E G A L E N S I S. *Die braune Senegalische Motacille.*

Müller, Natursyst. II. p. 611. n. 22. die Senegali-sche Bachstelze.

Onomat. hist. nat. VI. p. 849. die Bachstelze von Senegal.

Brissot, ornith. I. p. 432. n. 29. Traquet du Sé-négal.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 526. n. 61. Sylvia (Senegalensis) fusca, remigibus intus rufis, re-tricibus nigris, apice albis.

117. L E U C O M E L A. *Die schwarz und weiße Motacille.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 469. n. 7. Musci-capa (Leucomela) nigra, pileo nucha uropy-gio abdomine rectricibusque maxima parte albis.

118. E R Y T H R O G A S T R A. *Die rothbäuchige Motacille.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 513. n. 18. Sylvia (Erythrogaster) nigra, subtus abdomine uro-pygio caudae castanea, pileo cinerascente, macula remigum alba, armillis nigris.

119. M A U R A. *Das Mohrenköpfchen.*

Müller, Natursyst. Suppl. p. 174. n. 52. das Moh-renköpfchen.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 526. n. 62. Sylvia (Maura) nigra griseo marginata, subtus alba, gula ferruginea, macula alarum uropygio basi-que caudae albis.

Pallas, Reis. Ausz. II. Anh. p. 9. n. 17. Motacilla maura.

Neueste Mannigfalt. IV. p. 202. Mohrenköpfchen.

β. *Latham*, Syst. ornith. II. p. 526. n. 62. **β.** *Sylvia rufo-fusca*, subtus albida, superciliis rufis, gula abdomine uropygio basique caudae albis.

120. SUPERCILIOSA. *Die Motacille mit gelben Augenbrauen.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 526. n. 63. *Sylvia (Superciliofa) virescens* subtus pallida, superciliis flavis, lineola verticis pallida.

121. FERRUGINEA. *Die braunrothkehlige Motacille.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 526. n. 64. *Sylvia (Ferruginea) cinerea*, subtus albida, gula colloque ferrugineis.

122. CYANURA. *Die blauschwänzige Motacille.*

Müller, Natursyst. Suppl. p. 155 n. 53. *der Blauschwanz.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 527. n. 65. *Sylvia (Cyanura) cinereo-flavescens*, subtus superciliisque flavo-albis, alis caudaque fuscis, uropygio rectricumque marginibus caeruleis.

Pallas, Reis. Ausz. II. Anh. p. 10. n. 18. *Motacilla cyanurus.*

Neueste Mannigfaltigk. IV. p. 801. *Blauschwanz.*

123. AUROREA. *Die daurische Motacille.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 125. n. 66. *Sylvia (Aurorea) nigra*, vertice griseo albo, fronte maculaque alarum albis, corpore subtus rectricibusque lateralibus fulvis, 2. intermediis nigris.

Pallas, Reis. Ausz. III. Anh. p. 6. n. 13. *Motacilla aurorea.*

124. STRIATA. *Der Seegler.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 373. n. 207. *der Schwarzkopf*, p. 374. (in Neuyork *der Seegler.*)
Latham,

Latham, Syst. ornithol. II. p. 527. n. 67. Sylvia (Striata) nigro striata, supra cinerea, subtus alba, fascia alarum duplice alba, rectricibus duabus extimis apice macula alba.

125. INCANA. Der Graukopf.

Pennant, arct. Zool. II. p. 374. n. 208. der Graukopf.

Latham, Syst. ornith. II. p. 527. n. 68. Sylvia (Incana) laete grisea, subtus fasciaque alarum duplice alba, iugulo aurantio, gula pectoreque flavis.

126. FLAVIFRONS. Die gelbstirnige Motacille.

Pennant, arct. Zool. II. p. 376. n. 213. der Sänger mit der gelben Stirn.

Latham, Syst. ornith. II. p. 527. n. 69. Sylvia (Flavifrons) griseo-caerulescens, subtus albâ, pileo maculaque alarum flavis, iugulo fasciaque oculorum nigris, rectricibus extimis albo maculatis.

127. BLACKBURNIAE. Die blackburnische Motacille.

Pennant, arct. Zool. II. p. 384. n. 234. der Blackburnische Sänger.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 527. n. 17. Sylvia (Blackburniae) pileo atro, linea verticali et suboculari, loris pectoreque medio flavis, fascia alarum crasso rectricibusque extimis tribus albis, per oculos vitta magna.

128. MITRATA. Die schwarzkappige Motacille.

Pennant, arct. Zool. II. p. 372. n. 204. der Sänger mit der Kappe.

Klein, av. p. 85. n. 5. Parus cucullo nigro.

Klein, Vorbereit. p. 159. n. 5. *schwarzgekappte Meise*.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 88. n. 5. *schwarzgekappte Meise*.

Briffon, ornithol. I. p. 471. n. 16. *Mesange à collier de la Caroline*.

Büffon, Vögel, XVII. p. 146. *die Meise mit dem Halsbande*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 528. n. 71. *Sylvia (Mitrata) olivacea*, subtus capite antice gulaque Auteis, torque nigro.

Seligmann, Vögel, III. tab. 20. *schwarzgekappte Meise*.

Naturgesch. a. d. best. Schr. Vögel, p. 848.

β. *Büffon*, Vögel, XIV. p. 56. *der citrongelbe Fliegenschnäpper*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 528. n. 71. β. *Sylvia griseo-virescens*, subtus flava, capite colloque inferiore nigro-sericeis, fronte lateribus capitis corporeaque subtus flavis.

129. CALLIOPE. *Die rubinkehlige Motacille.* (3)

Latham, Syn. Suppl. p. 140. tab. in tit.

Pallas, Reis. Ausz. III. p. 211. *die sangreiche Motacilla Calliope*.

Pallas, Reis. Ausz. III. Anh. p. 7. n. 17. *Motacilla Calliope*.

130. LITTOREA. *Die Strandmotacille.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 552. n. 163. *Sylvia (Littorea) supra obscurae viridis*, subtus ochroleuca, remigibus rectricibusque nigricantibus.

Neueste Mannigfaltigk. IV. p. 413. *die Strandbachstelze*.

131. LON-

(3) Ist nach *Latham* mit *Turdus Camtschaticensis* p. 817. n. 58. einherley.

131. LONGIROSTRIS. *Die lang schnäbige Motacille.*

Büffon, Vögel, XVII. p. 34. — p. 35. *Rapischkin pers.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 552. n. 165. *Sylvia (Longirostris) cinerea subtus atra, rostro longo.*

Martini, Naturlex. V. p. 119. *die lang schnäbige Bachstelze, oder der persische Langschnabel.*

Neueste Mannigfalt. IV. p. 196. *langschnäbliche Bachstelze.*

132. OCHRURA. *Die gelbschwänzige persische Motacille. (4)*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 668. not. 2. et 3.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 552. n. 165. *Sylvia (Ochrura) capite cinereo, cervice et dorso ante atro, iugulo et pectore splendide nigris, abdomine flavo.*

Neueste Mannigfalt. IV. p. 129. *persischer Gelbschwanz.*

133. OBSCURA. *Die graubraune Motacille.*

S. unten die Anmerk. n. 4.

134. SUNAMISICA. *Die sunamische Motacille. (5)*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 608. not. 4.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 552. n. 166. *Sylvia (Sunamisica) ex cinereo rufescens, mente gula que nigris, pectore et abdomine rufescens, pennarum apice albo, crisso niveo, rectricibus intermediis fuscis, lateralibus fulvis.*

U u 2

135. MU-

(4) Latham verwechselt Character und Synonymen bey dieser und der folgenden Gattung. Die Mot. obscura fehlt in seinem Index ornithol. ganz; und die Synonymen aus Gmelin und Pallas hat er zur Mot. Ochrura gezogen. Bechstein hält die Mot. Ochrura für eine alte Motacilla atrata s. Erikkus.

(5) Nach Bechstein eine junge Motacilla Phoenichurus.

135. MURINA. *Die mausfahle Motacille.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 528. n. 73. *Sylvia (Murina) murina*, subtus fasciaque per oculos alba, capite collo abdomineque medio nigris.

136. SPINICAUDA. *Die stachelchwänzige Motacille.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 528. n. 74. *Motacilla (Spinicauda) fusca*, subtus humerisque alba, pileo flavo nebuloso, cauda cuneiformi, rectricibus apice nudis subulatis.

137. MAGELLANICA. *Die magellanische Motacille.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 528. n. 75. *Sylvia (Magellanica) fusco flavescens*, nigro undulata, subtus cinereo-flava, nigricante transversim striata, cauda breviore nigra lineis transversis.

138. CITRINA. *Die citrongelbe Motacille.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 529. n. 76. *Sylvia (Citrina) flava*, striis nigricantibus, subtus uropygioque flavo, genis collo inferiore pectore que albis, cauda breviore nigra apice flavescente.

139. LONGIPES. *Die langfüßige Motacille.*

Latham, Syn. Suppl. p. 181. Long-legged Warbler.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 529. n. 77. *Sylvia (Longipes) pallide viridis*, subtus cinerascens, fronte genis colloque lateribus cinereis, supra oculos lunula alba, cauda brevissima.

140. VARIA. *Die bunte Motacille.*

Müller, Natursystem, II. p. 612. n. 23. die bunte Bachstelze.

- Pennant, arch. Zool. II. p. 375. n. 210. der Weißkopf.
- Onomat. hist. nat. IV. p. 896. schwarz und weiß-bunte Grasmücke; schwarze Grasmücke mit weißgestreiftem Rücken.
- Klein, av. p. 75. n. II. Luscinia, quae Muscicapa ex fusco et albo varia, Sloan.
- Klein, Vorbereit. p. 141. n. II. schwarz und weiß-bunte Grasmücke.
- Klein, verbess. Vögelhistor. p. 76. n. II. schwarz und weiße Grasmücke.
- Brisson, ornith. I. p. 454. n. 69. Figuier varié de S. Domingue.
- Büffon, Vögel, XVI. p. 133. der bunte Feigenfresser; m. e. Fig.
- Latham, Syst. ornithol. II. p. 539. n. 118. Sylvia (Varia) albo nigroque maculata, fasciis alarum duabus albis, cauda bifida.
- Seligmann, Vögel, VIII. tab. 90. der schwarz und weiße Baumhacker.
- Martini, Naturlex. V. p. 40. die bunte Bachstelze von Domingo.
- Neueste Mannigfalt. IV. p. 807. bunte Bachstelze von St. Domingo.
- Naturgesch. mit Merian. Kupf. Vög. p. 791. der gescheckte Feigenvogel.

24. CAPENSIS. Die capsche Bachstelze.

Müller, Natursyst. II. p. 612. n. 24. die capsche Bachstelze.

Onomat. hist. nat. V. p. 263. die Bachstelze vom Vorgeb. d. g. H.

Brisson, ornithol. I. p. 440. n. 43. Bergeronette du Cap de b. E.

Büffon, Vögel, XVI. p. 70. der Kapsche Sticheling; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 505. n. 10. *Motacilla (Capensis) fusca subtus albida, fascia pectorali fusca, superciliis albis, cauda nigra, rectricibus lateralibus oblique albis.*

Martini, Naturlex. V. p. 110. *Bachstelze vom Kap.*

Neueste Mannigfaltigk. IV. p. 141. *kapische Bachstelze.*

Naturgeschichte aus den besten Schriftst. Vögeln, p. 770.

25. ICTEROCEPHALA. Die gelbgescheitelte Motacille.

Müller, Natursyst. II. p. 612. *Gelbkopf.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 380. n. 222. *der Sänger von Quebec.*

Onomat. hist. nat. III. p. 896. *die Bachstelze mit einem gelben Kopf von Canada.*

Briffon, ornithol. I. p. 451. n. 64. *Figuier à tête jaune de Canada.*

Büffon, Vögel, XVI. *der gelbköpfige Feigenfresser; m. e. Fig.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 538. n. 113. *Sylvia (Icterocephala) grisea, subtus albida, pileo luteo, fascia oculari nigra, duabusque alaribus flavis.*

Martini, Naturlex. V. p. 83. *die gelbköpfige Bachstelze aus Konada.*

Naturgesch. aus den best. Schriftst. Vög. p. 787. *der Feigenvogel mit gelbem Kopf.*

26. DOMINICA. Die domingische Motacille.

Müller, Natursyst. II. p. 612. n. 26. *die domingische Bachstelze.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 894. *die Harlekinsgrasmücke; die gelb, braun und blaue Grasmücke.*

Halle,

Halle, Vögel, p. 326. n. 296. Harlekinsgrasmücke.

Klein, av. p. 75. n. 16. Luscinia diversicolor.

Klein, Vorbereit. p. 142. n. 16. gelb-bräun- und blaue Grasmücke.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 76. n. 16. gelbraune und blaue Grasmücke.

Briffon, ornith. I. p. 462. n. 65. Figuier cendré de S. Domingue.

Büffon, Vögel, XVI. p. 122. der aschgraue Feigenfresser mit gelber Kehle; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 538. n. 114. Sylvia (Dominica) cinerea, subtus alba, macula ante oculos lutea, pone alba, infra nigra.

Martini, Naturlex. V. p. 44. die Domingoische aschgraue Bachstelze.

Neueste Mannigfalt. III. p. 809 domingoische aschgraue Bachstelze.

Naturgesch. aus den best. Schriftst. m. Merian. Kupf. Vög. p. 788. der aschfarbene Feigenvogel mit gelber Kehle.

27. CINCTA. Die Motacille mit dem Gürtel. (6)

Müller, Natursyst. II. p. 613. n. 27. die canadische Bachstelze.

Pennant, arct. Zool. II. p. 381. n. 223. der Sänger mit dem Gürtel.

Onomat. histor. natur. III. p. 894. die aschgraue Bachstelze von Canada.

Briffon, ornithol. I. p. 453. n. 67. Figuier cendré de Canada.

Büffon, Vögel, XVI. p. 127. der Canadische Feigenfresser; m. e. Fig.

Uu 4

Latham,

(6) Da in der XII. Edition die Trivialbenennung *M. Canadensis* Nro. 42. nochmals vorkommt, so ist zu Vermeidung einer Zweydeutigkeit hier dafür *Cincta* gesetzt worden.

- Latham*, Syst. ornithol. II. p. 539. n. 116. *Sylvia* (*Cincta*) *cinerascens*, *subtus alba*, *vertice fascia-que abdominali lutea*, *pectore fusco maculato*.
Martini, Naturlex. V. p. 14. *die aschgraue kana-densisch Bachstelze*.
 Neueste Mannigfalt. III. p. 774. *ashgrau kana-densische Bachstelze*.
 Naturgesch. mit Merian. Kupf. Vög. p. 789. *der Feigenvogel mit dem Gürtel*.

28. MADAGASCARIENSIS. Der Cherik. (?)

- Müller*, Natursyst. II. p. 613. n. 28. *die madagas-carische Bachstelze*.
Onomat. hist. nat. V. p. 267. *Motacilla Maderaspata*n.
Briffon, ornith. I. p. 446. n. 55. *petit Figuier de Madagascar*.
Rüffon, Vög., XVI. p. 80. *der Cherik; Tcherik*; m. e. Fig.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 533. n. 94. *Sylvia* (*Madagascariensis*) *virescens*, *subtus albida*, *gula anoque flavis*, *palpebris albis*.
Martini, Naturlex. V. p. 121. *maderaspatanische Bachstelze*.
 Neueste Mannigfalt. IV. p. 198. *grünliche mada-gascarische oder maderaspatanische Bachstelze*.
 Naturgesch. aus den best. Schriftst. m. Merian. K. Vög. p. 776. *der Cherik*.

140. BORBONICA. Die bourbonische Motacille.

- Onomat. histor. natur.* III. p. 893. *die Bachstelze von der Insel Bourbon*.

Briffon,

(7) In der XII. Edition steht hier durch einen Schreib- oder Druckfehler *Maderaspatana*, welcher Fehler auch in die *Onomat. hist. nat.* übergetragen worden. Uebrigens ist die Trivialbenennung *Madagascariensis*, p. 952. n. 56. schon einmal vorgekommen.

Brisson, ornith. I. p. 419. n. 60. Figuier de l'Isle de Bourbon, ou petit Simon.

Büffon, Vögel, XVI. p. 82. der kleine Simon; mit e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 533. n. 95. *Sylvia (Börbonica) griseo-fusca*, subtus griseo-flavescens, remigibus rectricibusque griseo marginatis.

Martini, Naturlex. V. p. 41. *Bächstelze der Insel Bourbon*.

Neueste Mannigfalt. III. p. 808. *Bachstelze der Insel Bourbon*.

Naturgesch. aus den best. Schriftst. Vög. p. 777. der kleine Simon.

141. MAURITANA. Die blaugraue Motacille. (8)

Büffon, Vögel, XVI. p. 84. der blaue Feigenfresser; Feigenfresser der Insel Frankreich; mit e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 534. n. 96. *Sylvia (Mauritana) griseo-caerulescens*, subtus alba, remigibus rectricibusque nigris, margine albis.

142. LIVIDA. Die blaue madagascarische Motacille. (9)

Büffon, Vögel, XVI. p. 84. der blaue Feigenfresser; madagascarische Feigenfresser.

Latham, Syst. ornith. II. p. 534. n. 97. *Sylvia (Lividus) griseo-caerulescens*, criso albido, remigibus caudaque nigris, rectricibus duabus exterioribus albis.

Naturgesch. aus den best. Schriftst. Vög. p. 777. der blaue Feigenfresser.

Uu 5

143. FLA.

(8) Nach Büffon das Weibchen von der folgenden Gattung.

(9) Nach Büffon das Männchen der vorhergehenden Gattung.

143. FLAVESCENS. *Die gelbbäuchige senegalische Motacille.* (10)

Büffon, Vögel, XVI. p. 85. der Senegalische Feigenfresser; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 534. n. 98. Sylvia (Flavescens) fusca, subtus citrina, genis albidis, remigibus rectricibusque fuscis.

143. Büffon, Vögel, XVI. p. 86. der Feigenfresser Nro. 3. (1)

Latham, Syst. ornithol. II. p. 534. n. 99. Sylvia (Rufigastra) olivaceo-fusca, subtus rufo-flavescens, remigibus rectricibusque fuscis.

144. UNDATA. *Die gefleckte Motacille.* (2)

Büffon, Vögel, XVI. p. 86. der gefleckte Feigenfresser; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 534. n. 100. Sylvia (Undata) nigra, marginibus pennarum uropygioque rufis, subtus alba, remigibus caudae cuneata fuscis.

145. FUSCATA. *Die braunrückige Motacille.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 87. der braune Senegalische Feigenfresser; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 535. n. 101. Sylvia (Fuscata) fusca, subtus grisea, lateribus rufescentibus, remigibus rectricibusque obscurioribus, cauda elongata.

146. SUB-

(10) Nach Büffon eine Abart von *Motacilla Undata*.

(1) Nach Büffon eine Abart des Geschlechts oder des Alters von *Motacilla Undata*. Nach Latham eine eigne Gattung.

(2) Ist nach Büffon das Männchen, wovon N. 143. α und β Abarten seyn sollen.

146. SUBFLAVA. Die blonde Motacille. (3)

Büffon, Vögel, XVI. p. 87. der blonde senegali-
sche Feigenfresser; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 535. n. 102. Sylvia
(Subflava) rufo-fusea, subtus grisea, uropygio
pallido, lateribus corporis rufescentibus, cauda
cuneiformi.

3. Büffon, Vögel, XVI. p. 87. der graubäuchige
Senegalische Feigenfresser; m. e. Fig. (4)

29. AUROCAPILLA. Die goldfarbig gescheitelte
Motacille.

Müller, Natursyst. II. p. 613. n. 29. der Goldkopf.

Pennant, arct. Zool. II. p. 315. n. 119. der Gold-
kopf.

Onomat. histor. natur. V. p. 261. die gelbköpfige
Bachstelze aus Pensylvanien.

Klein, verb. Vögelhist. p. 166. n. 4. goldgekrönte
Drossel.

Briffon, ornithol. I. p. 448. n. 57. Figuier à tête
d'or de Pensilvanie.

Büffon, Vögel, VIII. p. 315. die kleine domingo-
sche Drossel; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 328. n. 6. Turdus
(Eurocapillus) olivaceus, subtus albus, vertice
aureo, superciliis nigris, pectore nigro-macu-
lato.

Seligmann, Vögel, VII. tab. 42. die goldgekrönte
Drossel.

Neueste Mannigfaltigk. IV. p. 64. die gelb- oder
goldköpfige Bachstelze.

30. PE.

(3) Nach Büffon eine Abart von *Motacilla Fuscata*:

(4) Nach Büffon das Weibchen von *Motacilla Fuscata*. Was für
eine grosse Unbestimmtheit herrscht noch unter allen diesen
Gattungen!

30. PETECHIA. Die rothköpfige Motacille.

Müller, Naturfyst. II. p. 613. n. 30. die gefleckte Bachstelze.

Pennant, arct. Zool. II. p. 373. n. 206. der Rothkopf.

Onomat. hist. nat. III. p. 904 die Bachstelze aus Pensylvanien mit einem rothen Kopf.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 167. n. 4. gelber Rothkopf.

Briffon, ornithol. I. p. 443. n. 49. Figuier à tête rouge de Pensilvanie.

Büffon, Vögel, XVI. p. 91. der rothköpfige Feigenfresser; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 535. n. 103. Sylvia (Petechia) olivacea, subtus flava, rubro guttata, pileo rubro.

Seligmann, Vögel, VII. tab. 46. der Rothkopf mit gelbem Leib.

Martini, Naturlex. V. p. 65. gefleckte Bachstelze.

Naturgesch. aus den best. Schriftst. p. 780. der Feigenvogel mit rothem Kopfe.

147. ALBICOLLIS. Die olivenfarbige weißkehlig Motazille.

Briffon, ornithol. I. p. 445. n. 52. Figuier de S. Domingue.

Büffon, Vögel, XVI. p. 94. der weißkehligte Feigenfresser.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 535. n. 104. Sylvia (Albicollis) viridi-olivacea, subtus albo-flavicans strigis rufescentibus, rectricibus lateralibus intus dimidiato-sulphureis.

Martini, Naturlex. V. p. 46. domingoische olivenfarbige und schwefelgelbe Bachstelze.

Neueste Mannigfalt. III. p. 810. domingische olivenfarbige, und schwefelgelbe Bachstelze.

Naturgesch. a. d. best. Schrift. p. 780. der Feigenvogel mit der weißen Kehle.

148. LUDOVICIANA. Die louisianische Motacille. (5)

Pennant, arct. Zool. II. p. 380. n. 220. der louisianische Sänger.

Onomat. hist. nat. III. p. 900. die ludoviciana-sche Bachstelze.

Brisson, ornith. I. p. 446. n. 55. Figuier de la Louisiane.

Büffon, Vögel, XVI. p. 96. der gelbkehlige Feigenfresser.

Latham, Syst. ornith. II. p. 535. n. 105. Sylvia (Ludoviciana) viridi-olivacea, subtus alba luteo varia, collo subtus flavo, fascia alarum duplice alba, rectricibus duabus exterioribus apice intus albis.

Naturgesch. a. d. best. Schrift. p. 780. der Feigenvogel mit gelber Kehle.

149. CHLOROLEUCA. Die grün und weiße Motacille.

Onomat. hist. nat. III. p. 900. die kleine Bachstelze von der Insel Dominique.

Brisson, ornithol. I. p. 445. n. 53. petit Figuier de S. Domingue.

Büffon, Vögel, XVI. p. 98. der grün und weiße Feigenfresser.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 536. n. 106. Sylvia (Chloroleuca) viridi-olivacea, subtus flavicans, capite

(5) Brisson verwechselt diesen Vogel mit Edw. Pine-creeper (Certhia Pinus, p. 478. n. 16.)

capite colloque superius cinereis, rectricibus lateralibus intus dimidiato. luteis.

Martini, Naturlex. V. p. 45. *kleine Domingoische Bachstelze*.

Neueste Mannigfalt. III. p. 10. *Domingoische kleine Bachstelze*.

Naturgesch. a. d. best. Schrift. p. 782. *der grün und weiße Feigenvogel*.

150. AURICOLLIS. Die pomeranzenkehlige Motacille.

Pennant, arct. Zool. II. p. 380. n. 221. *der Sänger mit orangengelber Kehle*.

Onomat. hist. nat. III. p. 896. *die größere Bachstelze aus Canada*.

Briffon, ornith. I. p. 449. n. 59. *grand Figuier de Canada*.

Büffon, Vögel, XVI. p. 100. *der pomeranzenkehlige Feigenfresser*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 536. n. 107. *Sylvia (Auricollis) olivacea, subtus flava, collo subtus pectoreque flavo-aurantiis, crisco rectricibusque lateralibus intus albis*.

Martini, Naturlex. V. p. 104. *die große kanadische Bachstelze*.

Neueste Mannigfalt. IV. p. 138. *große kanadische Bachstelze*.

Naturgesch. a. d. best. Schrift. p. 782. *Feigenvogel mit orangefarbener Kehle*.

151. MACULOSA. Die Motacille mit gelbem Steiß. (6)

Pennant, arct. Zool. II. p. 373. n. 205. *der Sänger mit dem gelben Rumpfe*.

Briffon,

(6) Ist nicht mit *Motacilla maculata*, p. 965. n. 92. zu wechseln.

Brisson, ornith. I. p. 447. n. 56. Figuier tacheté de Pensilvanie.

Büffon, Vögel, XVI. p. 102. der grauköpfige Feigenfresser; m. e. Fig.

Latham, Syn. Suppl. p. 182. Yellow-rumped Warbler.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 536. n. 108. *Sylvia (Maculosa) nigro-maculata*, supra viridi-olivacea, subtus uropygioque lutea, capite cinerreo, fascia alarum dupli, rectricibusque lateralibus medio intus albis.

Seligmann, Vögel, VII. tab. 45. der Fliegenfänger mit gelbem Bürzel.

Martini, Naturlex. V. p. 152. pensylvanische bunte Bachstelze.

Naturgesch. m. merian. Kupf. Vög. p. 783.

152. FUSCESCENS. Die hellbraune Motacille.

Onomat. hist. nat. IV. p. 897. die lichtbraune Mausfarbene Grasmücke.

Klein, av. p. 175. n. 14. *Luscinia*, *Muscicapa pallide fusca*.

Klein, Vorbereit. p. 142. n. 14. lichtbraune Grasmücke.

Klein, verb. Vögelh. p. 76. n. 14. lichtbraune Grasmücke.

Brisson, ornith. I. p. 550. n. 61. Figuier de la Jamaique.

Büffon, Vögel, XVI. p. 105. der braune Feigenfresser.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 537. n. 109. *Sylvia (Fuscescens) fuscescens*, subtus rufo griseoque varia, per oculos iuguloque saturate fuscis.

Martini, Naturlex. V. p. 107. Jamaicensische Bachstelze.

Naturgesch. m. Merian. Kupf. p. 783.

153. TIGRINA. Die getiegerte Motacille.

Pennant, arct. Zool. II. p. 379. n. 219. der gefleckte Sänger.

Onomat. hist. nat. III. p. 895. die dunkle Bachstelze von Canada.

Klein, verb. Vögelhist. p. 168. n. 3. gelbbunter Fliegenstecher.

Briffon, ornith. I. p. 451. Figuier brun de Canada.

Büffon, Vögel, XVI. p. 108. der gelbfleckigste Feigenfresser; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 537. n. 110. Sylvia (Tigrina) fusco et olivaceo-viridi varia, subtus flava, collo subtus pectoreque nigro-maculata, pone oculos macula rufa, fascia alarum alba.

Seligmann, Vögel, VII. tab. 47. der gelbfleckte Fliegenfänger.

Martini, Naturlex. V. p. 35. die braune kanadische Bachstelze.

Neueste Mannigfalt. III. p. 803. braune oder dunkle kanadische Bachstelze.

Naturgesch. a. d. best. Schr. in: Merian. K. p. 785. der braun und gelbe Feigenvogel.

B. Briffon, ornith. I. p. 450. n. 62. Figuier brun de S. Domingue. (7)

Büffon, Vögel, XVI. p. 110. der braune Feigenfresser von St. Domingo.

Onomat. hist. nat. III. p. 899. die dunkle Bachstelze von der Insel Dominique.

Martini, Naturl. V. p. 34. die braune Bachstelze von St. Domingo.

Latham, Syst. ornith. II. p. 537. n. 110. β.

Neueste

(7) Nach Büffon das Weibchen. Nach Briffon eine eigne Gattung.

Neueste Mannigfalt. III. p. 802. braune oder dunkle Bachstelze der Insel St. Domingo.

154. VIRENS. Die grünliche Motacille.

Pennant, arct. Zool. II. p. 377. n. 214. der grüne Sänger.

Onomat. hist. nat. III. p. 905. die Bachstelze aus Pensylvanien mit einer schwarzen Kehle.

Briffon, ornith. I. p. 458. n. 77. Figuier à gorge jaune de Pensilvanie.

Büffon, Vögel, XVI. der schwarzkehlige Feigenfresser; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 537. n. 112. Sylvia (Virens) viridi-olivacea, subtus alba, genis, lateribus colli pectoreque flavis, collo subtus nigro, fascia alarum duplici alba.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 90. der grüne Fliegenschnäpper mit schwarzer Brust.

Naturgesch. a. d. best. Schr. p. 787. der Feigenvogel mit der schwarzen Halskruse.

31. DUMETORUM. Der Heckenspringer.

Müller, Natursyst. II. p. 614. n. 31. der Heckenspringer.

Onomat. hist. nat. V. p. 264. die Bachstelze so sich in Dornhecken aufhält.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 535. n. 4. die graue Grasmücke; die weiße, blasse Grasmücke; der Dornreich. Motacilla dumetorum?

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 604. Motacilla dumetorum?

Halle, Vögel, p. 343. n. 324. der braune Heckenvogel?

Halle, Vögel, p. 343. n. 325. die Heckennittwe; kleinste Heckenschmatzer; Wittwe?

Zorn, Petinotheol. II. p. 377. der kleinste Gatung Hecken-Schmatzer?

Neueste Mannigfalt. III. p. 811. *Dorndreher*?

Latham, Syst. ornithol. II. p. 522. n. 45. *Sylvia* (*Dumetorum*) *cinereo-fusca*, *capite caerule-scente*, *gula pectoreque albis*.

Kramer, Austr. p. 377. n. 19. *blaue Grasmücke*; *Weißbartl*; *Dorngreul*.

32. CINNAMOMEA. Der Zimmtvogel. (8)

Müller, Natursyst. II. p. 614. n. 32. der Zimmetvogel.

Latham, Syst. ornith. II. p. 474. n. 23. β . *Muscicapa cana subtus coccinea*, *gula nigra*, *remigi-bus quatuor primis basi rubris*.

Neueste Mannigfalt. IV. p. 464. *Zimmetvogel*.

155. NIGRIROSTRIS. Die schwarzschnäbige Motacille.

Latham, Syst. ornith. II. p. 522. n. 46. *Sylvia* (*Nigrirostris*) *fusco-olivacea subtus alba*, *pe-ctore rufo nigro striato*, *loris gulaque rufo-fla-vis*, *striga maxillari nigricante*, *rectrice extima toto, sequente apice alba*.

156. LUTESCENS. Die schwarzgelbstirnige Motacille.

Latham, Syst. ornith. II. p. 523. n. 48. *Sylvia* (*Lutescens*) *ferrugineo-fusca*, *subtus rufo-alba*, *fronte gulaque flavescens*, *macula au-rium obscure rubra*.

157. BOREALIS. Die nördliche Motacille.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 522. n. 47. *Sylvia* (*Borealis*) *viridi-olivacea*, *subtus flava*, *fronte genis*

(8) Nach *Latham* eine Varietät von *Muscicopa Flammaea*, p. 942. n. 60.

genis gulaque ferrugineis, rectricibus lateralibus apice albis.

158. CAMTSCHATKENSIS. Die kamtschatkische Motacille.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 552. n. 162. Sylvia (Kamtschatkensis) fusco olivacea, abdomine medio albo, fronte genis gulaque pallide ferrugineis, rostro elongato.

Pennant, arct. Zool. II. p. 393. O. der Langschnabel.

159. AWATCHA. Die Motacille von Awatcha.

Pennant, arct. Zool. II. p. 395. T. der Sänger von Awatcha.

Latham, Syst. ornith. II. p. 553. n. 167. Sylvia (Awatcha) fusca, subtus alba, pectore nigro. maculato, rectricibus lateralibus basi fulvis.

Latham, Syn. Suppl. p. 184. Awatcha Warbler.

33. CAPRATA. Die luzonische Motacille.

Müller, Natursyst. II. p. 614. n. 33. der Zaunhüpfer.

Onomat. hist. nat. VI. p. 847. das Luçonische Weißkehlichen.

Briffon, ornithol. I. p. 432. n. 30. Traquet de l' Isle de Luçon.

Büffon, Vögel, XV. p. 262. der Traquet von der Insel Lüsson, oder der Zaunhüpfer; m. 2. Figg. M. u. W.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 524. n. 52. Sylvia (Caprata) nigra, uropygio crasso maculaque tectorum albis.

Neueste Mannigfalt. IV. p. 454. der Zaunküpfen.

34. PHOENICURUS. Der Häusröthling. (9)

Müller, Natursyst. II. p. 618. n. 34. das Schwarzkehlchen.

Leske, Naturgesch. p. 269. n. 4. der Wistling.

Borowsky, Thierreich, III. p. 193. n. 14. das Schwarzkehlchen; der Saulocker.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 192. n. 7. *Motacilla (Phoenicurus) gula nigra, abdomine caudaque rufis, capite dorsoque cano*; das Schwarzkehlchen.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 539. n. 13. das Rothschwänzchen; Mauernachtigall.

Halle, Vögel, p. 331. n. 302. das Schwarzkehlchen; Rothkehlchen mit schwarzem Kinne; Hausrothkehlchen; Rothschwanz.

Pennant, arct. Zool. II. p. 388. der Wistling; das Schwarzkehlchen.

Onomat. hist. nat. V. p. 269. das Schwarzkehlchen.

Handb. der deutsch. Thiergeesch. p. 136. Stadtrothschwänzlein; Hausrothschwänzlein; Röthling; Rothsterz; Schwarzkehlchen.

Klein,

(9) Einer der ersten Sänger des Frühlings, der sich gern in den Städten und Dörfern von den Spitzen der Dächer, von hohen Bäumen und Stangen herab, früh Morgens und Abends spät, auf eine helltönende angenehme und erfreuliche Weise hören lässt. Nährt sich zwar besonders von Insekten, frisst aber im Herbst auch Wacholder- und Hollunderbeeren, und wird um diese Jahreszeit mit letztern in Sprenkeln gefangen. Bey trübem Wetter kommt er zuweilen nach den Bienenstöcken, und fängt Bienen weg. Brütet jährlich zwey Mal, und nistet auch zwischen den Dachsparren unter den Ziegeln. Selten erfolgen nach seiner Ankunft noch starke Nachtfröste. Gewöhnlich verlässt er uns um die Herbstnachtgleiche. Brütet auch Kukukseyer aus, wenn dieser dazu kommen kann sein Ey in das Nest zu legen, verlässt aber auch seine eignen Eyer, wenn ein Mensch sie berührt hat, oder auch nur nahe dabey gewesen ist. Siehe nachher Anmerk. 4. bey *Motacilla Erithacus*.

Klein, av. p. 77. n. 2. *Sylvia thorace ex albo variegata*.

Klein, Vorbereit. p. 144. n. 2. *Schwarzkehlein*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 78. n. 2. *Schwarzkehlein*; *Hausrötele*, *Wüstling*, *Rottzagel*; *Saulocker*.

Klein, Stemmat. av. p. 14. tab. 16. Fig. 8. a. b.

Gesner, Vögelb. p. 447. *Hausrötelein*; *Rothschwanzlein*; *Rotzägel*; *Rothstertz*; mit einschl. Fig.

Briffon, ornith. I. p. 422. n. 15. *Rosignol de muraille*.

Büffon, Vögel, XV. p. 165. *die schwarzkehlige Mauernachtigall*, m. 2. Figg. M. u. W.

Batsch, Thiere, I. p. 561. *das Schwarzkehlchen*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 511. n. 15. *Sylvia (Phoenicurus) gula nigra, abdonine caudaque rufis, capite dorsoque canis, fronte alba*.

Beseke, Vögel Kurl. p. 81. n. 185. *das Schwarzkehlchen*.

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 135. n. 8. *das Schwarzkehlchen*; *Hüting*; *Rothstiert*.

Bock, N. G. von Preussl. IV. p. 440. *das Schwarzkehlchen*.

Fischer, Livil. p. 102. n. 170. *Erizchen*; *Rothbäuchlein*.

White, N. G. von Engl. p. 34. n. 17. p. 59. n. II. p. 64. n. 2. *Hausröteln*.

Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 12. *Blodfugl*; *Blodstert*.

Linne, Abhandl. II. p. 305. n. 137. *das Schwarzkehlchen*.

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 192. n. 232. *das Waid-Rothschwanzlein*.

Borkhausen, Magazin, I. p. 185. n. 62. *Schwarzkehlchen*; *Gartenrothschwänzchen*.

- Naturförsch. XVII. p. 104. n. 214. das Schwarz-
kehlchen.
- Döbel, Jägerprakt. I. p. 64. der Rothschwanz.
- Naumann, Vogelsteller, p. 148. der gemine Roth-
schwanz.
- Zorn, Petinotheol. II. p. 386. der Haus - Röth-
ling; das Haus - Rothschwänzlein.
- Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 239. das Schwarz-
kehlchen.
- Goeze, Natur, Menschl. u. Vorf. V. p. 195. der
Hansröhling.
- Nenelle Mannigfalt. IV. p. 403. das Schwarz-
kehlchen.
- Pennant, britt. Thiergesch. p. III. tab. 53. Fig.
6. 7
- Anweis. Vögel zu fang. p. 502. der Röthling oder
Rothschwänzlein.
- Martini, Naturlex. V. p. 179. Schwarzkehlchen.
- Tänzer, notab. Venatoris, p. 98. n. 124. Roth-
Schwanz.
- Anweis. Vögel zu fang. p. 502. der Röthling, oder
Rothschwänzlein.
- Meidlinger, Vorles. I. p. 153. n. 4. das Schwarz-
kehlchen.
- Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 31. n. 11. Ruticilla.
- Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 187. n. 21. Motacil-
la (Phoenicurus) gula nigra, abdomine rufo,
capite dorsoque cano.
- Kramer, Austr. p 376. n. 11. Waldrothschwanz.
- Charleton, onom. zoic. p. 91. n. 10. Ruticilla s.
Phoenicurus.
- Schwenkfeld, av. Siles. p. 346. Rubicilla; Ruticil-
la; Rubecula domestica aestiva; Luscinia mu-
rorum. Haus-Rötele; Wüftling; Rothschwanz;
Rotzagal; Sommer Rötele.
- Sibbald, Scot. illustr. II. 3. p. 18. Ruticilla.

Rzaczyns-

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Pol. p. 418. Rubicilla.
Barrere, ornithol. Cl. 3. gen. 18. sp. 6. Ficedula
seu Rubecula phoenicurus.
Belon, observ. p. 17. Ruticilla.
Belon, hist. nat. des ois. p. 347. Rossignol de mur
ou de muraille.
Jonston, av. p. 122. Ruticilla seu phoenicurus.
Bonare, diction. X. p. 100. — Diction. des
anim. III. p. 717.
Faun. Arragon. p. 89. — Hist. prov. I. p. 501.
Zinnan, Uov. p. 53. tab. 8. Fig. 41. Culo-ranzo,
Culo-rosso.
Plin. hist. nat. L. 10. c. 29. Phoenicurus.
Aristot. hist. anim. L. 9. c. 49. Φοινικούρος.
Donndorff, Handb. d. Thiergeesch. p. 385. n. 19.
der Hausröthling.

β. Der aschgraue Hausröthling: (10)

Brisson, ornith. I. p. 423. A. Rossignol de murail-
le cendré.

Büffon, Vögel, XV. p. 179. die aschgraue Mauer-
nachtigall.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 512. n. 15. γ. Ru-
ticilla cinerea.

Borkhausen, Magaz. I. p. 186. n. 62. β.

Neueste Mannigfalt. IV. p. 405. not. c.

γ. Der Hausröthling mit gefleckter Brust. (11)

Brisson, ornith. I. p. 423. B. Rossignol de muraille
à poitrine tachetée.

Xx 4. Büffon,

(10) Ist, nach Brisson, eine Varietät vom Männchen; nach Bork-
hausen ein junges Weibchen.

(11) Ist, nach Brisson, eine Spielart vom Weibchen; nach Bechstein
ein junges im Herbst gleich nach der Mauser gefangenes Männ-
chen. Mit letzterin stimmt Borkhausen in so wiet überein, dass
er es für das Männchen im Herbst hält, ehe es weggeht, zu
welcher

Büffon, Vögel, XV. p. 179. *Mauernachtigall mit gelbroth gefleckter Brust.*

Klein, av. p. 78. n. 10. *Sylvia thorace argentata.*

Klein, Vorbereit. p. 147. n. 10. *Fleckkehlein mit silberstückem Brustatz.*

Klein, verb. Vögelh. p. 79. n. 13. *Fleckkehlein mit silberstückem Brustatz.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 512. n. 15. *β. Rusticilla pectore maculato.*

Frisch, Vögel, tab. 20. Fig. 2. b. *das Roth-schwänzlein mit rothgesprengter Brust.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 603.

Borkhausen, Magaz. I. p. 186. n. 62. γ.

Neueste Mannigfalt. IV. p. 406. not. d.

δ. Motacilla Titys. (2)

Latham, Syst. ornith. II. p. 512. n. 16. *Sylvia (Tithys) remigibus nigricantibus, rectricibus rufis, intermedio pari nigro extrorsum rufescente.*

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 25. *Motacilla Titys. Linn.*

Halle, Vögel, p. 332. n. 303. *das Gartenschwarzkehlchen.*

Zorn,

welcher Zeit die sonst weisse Stirn grau wird, und die Kehle untenher weisse Flecken bekönint.

(2) Hier finde ich abermals eine grosse Verwechslung der Synonymen, und ganz verschiedene Meinungen der Naturforscher. In der X. Edit. nahm *Linne* die *Motacilla Titys* als eine eigne Gattung an. In der XIIten führt er sie als das Weibchen von *Motacilla Phoenicurus* auf. Unter den Neuern hat *Latham* l. c. sie wieder als eine eigne Gattung angenommen. *Borkhausen* ist eben der Meinung, zieht *Scopoli's Sylvia Tithys*, und *Gmelins Motacilla Gibraltariensis* als Synonymen zusammen; will aber doch *Linne's Motacilla Titys* davon getrennt wissen, ob sie gleich *Scopoli* mit der seinigen vereinigt. So viel hat seine Richtigkeit, dass die Beschreibungen bey dieser und den beyden folgenden Gattungen, dergestalt in einander laufen, dass es schwer hält, ~~zu~~ mit Gewissheit darüber zu bestimmen.

Zorn, Petinotheol. II. p. 387. das Wald- oder Gartenrothschwänzlein; der Garten Röthling?

Pontoppidan, Dämm. p. 174. n. 13. Titys; tab. 12.

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 192. n. 233. das Haus-Rothschwänzlein.

Borkhausen, Magaz. I. p. 186. n. 64. Motacilla Titys. Hausrothschwänzchen; Mauernachtigall; Schwarzbüstchen. p. 187. graues Rothschwänzchen.

Neueste Mannigfalt. IV. p. 139. Hausrothschwänzchen.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 31. n. 14 Rubecula.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 187. n. 23. Motacilla (Titys) remigibus nigricantibus, rectricibus rufis: intermedio pari nigro extrorsum rufescente.

Kramer, Austr. p. 376. n. 12. Motacilla corpore nigro, cauda rufa? Hausrothschweift.

160. GIBRALTARIENSIS. Das Rothschwänzchen von Gibraltar. (3)

Klein, av. p. 80. n. 25. Sylvia s. Reticilla corpore griseo, gutture nigro.

Xx 5

Klein,

(3) Nach Borkhausen gehört diese Gattung, wie ich eben vorher bemerkt habe, zu *Motacilla Titys Linn.* — Brisson führt sie für sich allein auf; und Buffon sieht sie als eine Abart von *Motacilla Phoenicurus* an. Vergleicht man vollends die verschiedenen Synonymen bey den Ornithologen, so wird die Verwirrung noch grösser. In unserm System ist Edw. Grey Redstart, von Pennants Grey Redstart getrennt; ersterer zu *M. Gibraltaicensis*, und letzterer zu *M. Erithacus* gerechnet. Aber Pennant führt Edwards selbst mit an; citirt auch Brissons und Buffons Ronge queue, die unser System zu *M. Erithacus* zählt; beruft sich auch auf Latham Syn. IV. p. 423 n. 12. dies ist wieder *M. Gibraltaicensis*; und Latham vereinigt endlich Edw. und Penn. Grey Redstart, mit seinem Grey-Redstart, und rechnet sie mit Brisson zu *Mot. Gibraltaicensis*.

Klein, Vorbereit. p. 150. n. 25. *schwarzkehlig grauer Rothschwanz*.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 81. n. 28. *schwarzkehlig grauer Rothschwanz*.

Handb. der Naturgesch. II. 272. *das Blaukehlchen von Gibraltar*.

Brisson, ornith. I. p. 424. n. 16. *Rossignol de muraille de Gibraltar*.

Büffon, Vögel, XV. p. 180. *Edwards grauer Rothschwanz*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 513. n. 17. *Sylvia (Gibraltariensis) cinerea, fronte abdomineque albis, genis colloque subtus nigris, uropygio reticibusque lateralibus rufis*.

Seligmann, Vögel, II. tab. 57. *das graue Rothschwänzlein*.

35. ERITHACUS. Das gemeine Rothschwänzchen.⁽⁴⁾

Müller, Natursyst. II. p. 618. n. 35. *der Rothschwanz*.

Leske,

(4) Ich habe die hieher gehörigen Synonymen nach Anleitung unsres Systems geordnet, finde aber bey genauer Untersuchung derselben wiederum nicht wenige Zweydeutigkeiten, die die richtige Auseinandersetzung derselben, in Rücksicht auf die vorhergehenden Gattungen, erschweren. Was ich über die Naturgeschichte dieses Vogels bey den Ornithologen gesagt finde, ist grossentheils auch auf die *M. Phoenicurus* so anwendbar, dass auch der genaueste Kritiker, wenn er der Wahrheit die Ehre geben will, oft nicht wissen wird, wohin die Beschreibung eigentlich gehört; dies ist um so gewisser, da man selbst bey denen, die beyde umständlicher beschrieben haben, findet, wie sehr sie an Sitten und Lebensart einander gleichen. Merkwürdig bleibt es immer, dass von der *M. Erithacus* sich weit weniger Synonymen, als von der *M. Phoenicurus* finden; dass Siemsen des ersten unter den mecklenburgischen Vögeln gar nicht gedenkt; dass Burkhanen versichert, ihn nur einmal gesehen zu haben; dass

Leske, Naturgeschichte. p. 270. n. 5. das Rothschwänzchen.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 538. n. 12. der Wiftling.

Pennant, arct. Zool. II. p. 389 C. das Rothschwänzchen.

Onomat. hist. nat. III. p. 819. das Röthschwänzlein.

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 136 Gartenrothschwänzlein.

Klein, av. p. 78. n. 4. *Sylvia gula grisea*, thorace longa, cauda tota rubra?

Klein, Vorbereit. p. 146. n. 4. Graukelein, mit rothem Schwanz, und langem Brustplatz?

Klein,

dass *Barrere*, *Salerne*, *Belon*, u. a. seiner gar nicht erwähnen, u. d. gl. daher denn auch *Beseka* auf den Gedanken gefallen, dass die *M. Phoenicurus* und *Erythacus* ein und eben derselbe Vogel seyn mögen, wie denn auch schon *Briffon* beyde Linneische Synonymen, unter seinem *Phoenicurus* mit einander verbinder. Es kommt hierzu noch ein Umstand, der die Sache erschwert. In unserin System ist *Frisch*, tab. 20. citirt, aber die Figur nicht bemerkt. Eben so citirt auch *Latham* den *Frisch*. *Briffon* führt ihn gleichfalls an, und beruft sich auf *Klein*. Wenn aber das richtig ist, was *Bechstein* (Naturgesch. Deutschl. III. p. 602. sq.) über die Frischischen Vögel gesagt hat, so kann keine von den Figg. tab. 20 hieher gehören. Ihm nach ist a) das Rothschwänzchen mit ganz rotem Schwanz (*Phoenicurus*, *Rubicilla*) das Weibchen von *Motacilla Phoenicurus Linn.* und zwar eine Varietät, weil ihm die schwarzen mittlern Schwanzfedern fehlen b) Das Rothschwänzlein mit halb rotem, halb schwarzem Schwanz, *Phoenicurus inferiore parte caudae nigra*) das Weibchen von *Motacilla Suecica Linn.* womit auch *Zorn* (II. p. 431.) und *Büffon* (XV. p. 191.) übereinstimmen. c) Das Rothschwänzlein mit einer schwarzen Mittelfeder (*Phoenicurus media penna caudae subnigra*) das alte Weibchen von *Motacilla Suecica L.* — Auf diese Art würde denn *Kleins* *Sylvia gula grisea* thorace longa, cauda tota rubra, zu *Motacilla Phoenicurus L.* — *Kleins* *Sylvia gula grisea fimbriata* aber zu *Motacilla Suecica L.* gehören.

Klein, verb. Vögelhist. p. 79. n. 7. *Graukelein mit ganz rothem Schwanz, und langem Brustlatze.*

Klein, av. p. 78. n. 5. *Sylvia gula grisea fimbriata?*

Klein, Vorbereit. p. 146. n. 5. *Graukelein schwarz verbrämt, mit halb roth, und halb schwarzem Schwanz?*

Klein, verb. Vögelhist. p. 79. Fig. 8. *Graukelein, schwarz verbreht, mit halbrothem, und halb schwarzem Schwanz.*

Gesner, Vögelb. p. 448. *Rothschwänzlein.*

Brisson, ornith. I. p. 425. n. 18. *Reuge-queue à collier.*

Büffon, Vögel, XV. p. 184. *der Rothschwanz; m. e. Fig.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 513. n. 19. *Sylvia (Erythacus) dorso remigibusque cinereis, abdome rectricibusque rufis, extimis duabus cineris.*

Beseke, Vögel Kurl. p. 82. n. 186. *der Rothschwanz.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 440. *das Rothschwänzlein; Gartenröhling; Bienen schnappe.*

Fischer, Livil. p. 102. n. 169. *Rothschwanz.*

Martini, Naturlex. V. p. 172. *Rothschwänzchen.*

Naturforsch. XVII. p. 104. n. 215. *der Rothschwanz.*

Borkhausen, Magaz. I. p. 186. n. 63. *das Waldrothschwänzchen.*

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 239. *der Rothschwanz.*

Neueste Mannigfalt. IV. p. 401. *Rothschwanz.*

Meidinger, Vorles. I. p. 153. n. 5. *Rothschwänzchen.*

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 12. *Phoenicurus.*

Linné,

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 187. n. 22. Motacilla (Erithacus) dorso remigibusque cinereis; abdomine rectricibusque rufis, extimis duabus cinereis.

Jonston, av. p. 122. Phoenicurus.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 385. n. 20. das Rothschwänzchen.

B. **Briffon**, ornith. I. p. 424. n. 17. Rouge-queue. (5)
Büffon, Vögel, XV. p. 192. der graue Rothschwanz.

161. GUJANENSIS. Der guianische Rothschwanz.

Büffon, Vögel, XV. p. 195. der Guianische Rothschwanz; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 514. n. 20. Sylvia (Guianensis) grisea subtus alba, alis caudae rufis.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 240. der guianische Rothschwanz.

Naturgesch. mit Merian. Kupf. Vög. p. 741.

162. ATRATA. Der schwarze Rothschwanz.

Latham, Syst. ornith. II. p. 514. n. 21. Sylvia (Atrata) nigra fusco-marginata, pileo cinereo, remigibus rectricibusque 2. intermediis fuscis, lateralibus rufis.

36. GUIRA. Der Guira. (6)

Müller, Natursyst. II. p. 616. n. 36. die brasilianische Bachstelze.

Halle,

(5) Nach Briffon eine eigne Gattung. Nach Büffon das Weibchen von *M. Erithacus*.

(6) Macht ein offenes, flaches, aus breitem welken Grase und Fasern zuammen gesetztes Nest zwischen den kleinen Zweigen eines Baums, und legt weisse, verlorenen schwarz gefleckte Eyer. Pennant.

Halle, Vögel, p. 342. n. 320. der grüne Mönch,
mit hellblauem Kopfe.

Pennant, arct. Zool. II. p. 384. n. 233. der Guira.
Onomat. hist. nat. V. p. 266. der grüne Brust-
wenzel aus Brasilien.

Brisson, ornithol. I. p. 455. n. 71. Pipit verd du
Brésil.

Büffon, Vögel, XVI. p. 198. der Guiraberaba;
m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 547. n. 147. *Sylvia*
(Guira) viridis subtus uropygique luteo, genis
gulaque nigris, linea lutea cinctis.

Seligmann, Vögel, IX. tab. 41. der Guira Guacu
beraba.

Martini, Naturlex. V. p. 33. die brasiliatische
Rachstelze.

Salerne, ornith. p. 249. Guiraguacu beraba.

Fonston, av. p. 205. Guiraguacu beraba.

37. SUECICA. Das Blaukehlchen. (?)

Müller, Natursyst. II. p. 616. n. 37. das Blaukehl-
chen.

Borowsky, Thierreich, III. p. 194. n. 15. das Blau-
kehlchen; die Wassernachtigall.

Becustrin, Naturgesch. I. p. 538. n. 11. das Blau-
kehlchen.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 601. 602.

Halle, Vögel, p. 334. n. 307. das Blaukehlchen.

Meyer, Thiere, I. tab. 93 Blauhrlein?

Gatterer, vom Nutz. und Schad. der Thiere II.
p. 429. das Blaukehlchen; Bleykehlchen; Spie-
gelvogelchen; Wegflecklein; Weidenguckerlein;
Carlsvogel.

Pennant, arct. Zool. II. p. 289. E. das Blaukehl-
chen.

Onomat.

(7) S. zum Theil die Anmerk. 4.

- Onomat. histor. natur. II. p. 52. der *Carlsvogel*.
Klein, av. p. 77. n. 2. *Sylvia gula caerulea, thorace ex albo variegata*.
Klein, Vorbereit. p. 145. n. 2. *Blaukehlein mit weißgeflecktem Brustlatze*.
Klein, verb. Vögelhist. p. 78. n. 4. *Blaukehlein mit weißgeflecktem Brustlatze*.
Klein, av. p. 80. n. 24. *Sylvia, s. Ruticilla gutturre albo, zona caerulea fimbriato*.
Klein, Vorbereit. p. 150. n. 24. *Weißkehlein mit blauverbrämtten Gürtel*.
Klein, verb. Vögelhist. p. 81. n. 27. *Rothschwanz mit weißer blau verbrämpter Kehle*.
Gesner, Vögeln. p. 548. *Weidengückerlein*; m. e. schl. Fig.
Brisson, ornithol. I. p. 425. n. 19. *Gorge-bleue*.
Büffon, Vögel, XV. p. 225. *das Blaukehlchen*; m. 2. Figg.
Batsch, Thiere, I. p. 361. *das Blaukehlchen*.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 521. n. 43. *Sylvia (Suecica) cinereo-fusca, pectore ferrugineo, fascia caerulea, rectricibus fuscis versus basin ferrugineis*.
Seligmann, Vögel, II. tab. 55. *das blaukehlige Rothschwänzlein*.
Beseke, Vögel Kurl. p. 82. n. 187. *das Blaukehlchen*.
Siemßen, meklenb. Vögel, p. 136. n. 9. *das Blaukehlchen*.
Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 440. *das Blaukehlchen*.
Fischer, Zufätze zur N. G. von Livil. p. 49. n. 498. *das Blaukehlein*.
Linneé, Abhandl. II. p. 305. n. 138. *das Blaukehlchen*.

Naturforsch. XVII. p. 104. n. 216. das Blaukehlchen.

Naturforsch. XXII. p. 139. Blaukehlchen, XXV. p. 19. Rothschwanz; Schildnachtigall.

Günther, Nest. u. Ei. tab. 74. Blaukelein.

Zorn, Petinotheol. II. p. 430. die Blau-Kehle.

Sammel. zur Phys. und N. G. III. p. 243. das Blaukehlchen.

André und Bechstein, Spazierg. III. p. 220. 225. Blaukehlchen.

Börner, Stadt- und Landwirthsch. II. p. 249.

Neueste Mannigfalt. III. p. 781. Blaukehlchen.

Naturgesch. m. Merian. Kupf. Vög. V. p. 746.

Naumann, Vogelsteller, p. 148. der zweyten Rothschwanz, oder die Schildnachtigall.

Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 57. Ruticilla.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 7. Avis carolina.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 187. n. 24. Motacilla (Suecica) pectore ferrugineo fascia caerulea, rectricibus fuscis, versus basio ferrugineis.

Kramér, Austr. p. 375. n. 7. Motacilla pectore caeruleo macula flavelcente albedine cincta. Blaukröpfl.

Barrere, ornithol. Cl. 3. Gen. 19. sp. 6. Motacilla pyrenaica, cinerea, iugulo et pectore coeruleis.

Donndorff, Handb. der Thiergeesch. p. 385. n. 21. das Blaukehlchen.

β. Brisson, ornith. I. p. 426. n. 20. Gorge bleue de Gibraltar. (8)

Büffon, Vögel, XV. p. 232. das Rothkehlchen von Gibraltar.

γ. Büffon,

(8) Nach Brisson eine eigne Gattung. Er rechnet Kleins Ruticilla guttula albo, und Edwards blue throated Redstart dazu, den Büffon für das Weibchen annimmt.

γ. Buffon, Vögel, XV. p. 233. der Spiegelvogel.
Latham, Syst. ornith. II. p. 522. n. 43. β. Sylvia
macula pectoris argentea.

38. SIALIS. Dr Blauvogel.

Müller, Natursyst. II. p. 616. n. 38. die amerika-
nische Bachstelze.

Pennant, arch. Zool. II. p. 370. n. 198. das blaue
Rothkehlchen.

Onomat. hist. nat. VI. p. 844. das blaue Rothkehl-
chen aus Carolina.

Klein, av. p. 77. n. 3. Rubecula americana cae-
rulea.

Klein, Vorbereit. p. 145. n. 3. Blaukehlein mit ro-
them Unterleibe, sonst blau.

Klein, verb. Vögelhist. p. 78. n. 5. Brustwenzel
mit rothem Unterleibe, sonst blau.

Klein, av. p. 80. n. 21. Sylvia thorace rubro, su-
premo corpore et cauda caeruleis.

Klein, Vorbereit. p. 150. n. 21. Wenzel mit rothem
Kamisol.

Klein, verb. Vögelhist. p. 80. n. 24. Wenzel mit
rothem Kamisol.

Brisson, ornithol. I. p. 428. n. 23. Rouge-gorge
bleue de la Caroline.

Büffon, Vögel, XV. p. 235. das blauhälfige Roth-
kehlchen; m. 2. Figg. M. u. W.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 522. n. 44. Sylvia
(Sialis) supra caerulea, subtus rufo-rubra, ab-
domine albo.

Seligmann, Vögel, I. tab. 47. das blaue Roth-
kelein.

Seligmann, Vögel, II. tab. 94. der Blauvogel.

Linné, Abhandl. II. p. 281. n. 18. die Sialische Mo-
tacille.

Martini, Naturlex. V. p. 12. amerikanische Bachstelze.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 244. der Blauvogel.

Neueste Mannigfaltigk. III. p. 771. die amerikanische Bachstelze.

39. FULICATA. Die philippinische Motacille.

Müller, Natursystem, II. p. 617. n. 39. die philippinische Bachstelze.

Onomat. hist. nat. VI. p. 848. die philippinische Bachstelze.

Briffon, ornith. I. p. 433. n. 31. Traquet des Philippines.

Büffon, Vögel, XV. p. 264. der Philippinische Steinschmätzer; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 524. n. 53. *Sylvia* (*Fulicata*) nigro-violacea, crisso castaneo, macula teclericum alba.

Samml. zur Phys. u. Naturgesch. III. p. 246. die philippinische Bachstelze.

Martini, Naturlex. V. p. 153. philippinische Bachstelze.

Neueste Mannigfalt. IV. p. 255. philippinische Bachstelze.

40. CAYANA. Die blaue cayennische Motacille.

Müller, Natursyst. II. p. 617. n. 40. die mexicanische Bachstelze.

Onomat. hist. nat. III. p. 769. Elatototl.

Briffon, ornithol. I. p. 455. n. 72. Pipit bleu de Cayenne.

Büffon, Vögel, XVI. p. 191. der blaue Pitpit; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 445. n. 143. *Sylvia* (*Cayana*) caerulea, capistro humeris alis caudaque nigris.

Martini,

Martini, Naturlex. V. p. 125. die mexikanische Bachstelze.

Neueste Mannigfaltigk. IV. p. 201. mexikanische Bachstelze.

β. *Büffon*, Vögel, XVI. p. 193. der blaue Manaki.

Latham, Syn. II. 2. p. 503. n. 138. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 546. n. 143. β.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 53. der blaue Manakin.

γ. *Büffon*, Vögel, XVI. p. 193. der blaue Pitpit von Cayenne; m. e. Fig.

Latham, Syn. II. 2. p. 503. n. 138. Var. B.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 546. n. 143. γ.

163. CYANOCEPHALA. Die blauköpfige Motacille.

Briffon, ornith. I. p. 455. n. 70. Pipit verd.

Briffon, Vögel, XVI. p. 139. der grüne Pitpit.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 546. n. 144. *Sylvia* (*Cyanocephala*) *viridis*, capite tectricibusque alarum caeruleis, gula griseo-caerulescente, remigibus fuscis.

Martini, Naturlex. V. p. 104. die grüne cayennische Bachstelze.

164. LINEATA. Die blaukappige Motacille.

Büffon, Vögel, XVI. p. 197. der blaukappige Pitpit.

Latham, Syst. ornith. II. p. 546. n. 145. *Sylvia* (*Lineata*) *corpo* *subtus* *maculaque* *verticis* *cae-*
ruleis, *fronte* *vitta* *superciliari* *lateribusque* *colli*
caeruleo *nitidis*, *fascia* *pectoris* *abdominisque*
alba.

165. CYANEA. Die blaue neuholländische Motacille.

Latham, Syst. ornith. II. p. 545. n. 142. *Sylvia* (*Cyanea*) *nigro-cyanea*, *subtus* *alba*, *capite* *ni-*

gro-sericeo tumido, sincipite genis lunulaque cervicis caeruleo-nitidis, fascia per oculos nigra.

Phillips, Bot. Bay. tab. p. 157. (*das Männch.*)
p. 159. (*das Weibch.*) Superb Warbler.

White, voy. tab. p. 256.

Meyer, zool. Entdeck. p. 54. n. 2. Motacilla (*Superba*) nigra, remigibus fuscis, abdomine albo, fronte genisque caeruleis.

β. *Latham*, Syst. ornith. II. p. 545. n. 142. β. *Sylvia griseo-nigricans*, capite gula cerviceque cyanis, tectricibus alarum fuscis, remigibus re-tricibusque nigris.

Sonnerat, Reis. n. Neuguin. p. 23. *der blauköpfige Fliegenschnäpper von der Insel Luçon*; m. e. Fig.

41. VELIA. Der rothbäuchige Blauvogel. (9)

Müller, Natursyst. II. p. 617. n. 41. *die surinamische Bachstelze*.

Onomat. hist. nat. IV. p. 895. *purpurfarbige Grasmücke*.

Klein, av. p. 75. n. 15. *Luscinia ex caeruleo et rubro varia*.

Klein, Vorbereit. p. 142. n. 15. *blaurothe Grasmücke*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 76. n. 15. *blau und rothe Grasmücke*.

Briffon,

(9) *Latham* unterscheidet hier folgende Varietäten. β) M. fronte uropygioque aureis, corpore subtus caerulescente, ventre imo castaneo. *Briff. av.* III. p. 536. n. 73. *Sylvia Surinamensis caerulea*. — γ) M. Caerulea dorso imo abdomineque rufis. *Edw. tab.* 22. Red-billed Blue-bird. *Banks. Guian.* p. 182? — δ) M. dorso fusco nigricante, pectore abdomineque coccineis. *Fernan. Surin. II* p. 194. Rouge-gorge; — vid. *Syst. ornith.* II. p. 547.

- Brisson*, ornith. I. p. 456. n. 73. Pipit bleu de Surinam.
- Büffon*, Vögel, XVI. p. 195. der bunte Pitpit; m. e. Fig.
- Latham*, Syst. ornithol. II. p. 546. n. 146. Sylvia (Velia) nigra, viridi-caeruleo-varia subtus rufa, collo subtus violaceo, uropygio viridi-aureo.
- Seligmann*, Vögel, VIII. tab. 43. der Blauvogel mit dem rothen Bauch.
- Bankroft*, N. G. von Guiana, p. 110. der rothbäuchige Blauvogel?
- Fermin*, Surin. II. p. 176. Rothkehltchen?
- Martini*, Naturlex. V. p. 193. die surinamische Bachstelze.
- Neueste Mannigfalt. IV. p. 414. surinamische Bachstelze.
- Linné*, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 188. n. 26. Motacilla (Velia) caerulea, ventre elunibusque rufescens-tibus.

43. CANADENSIS, Die canadische Motacille.

- Müller*, Natur-syst. II. p. 617. n. 42. die canadische Bachstelze.
- Pennant*, arct. Zool. II. p. 372. n. 202. das canadische Schwarzkehltchen.
- Onomat. hist. nat. III. p. 894. die aschgraue Bachstelze von Canada.
- Klein*, verbess. Vögelhistor. p. 167. blauer Fliegenstecher.
- Brisson*, ornithol. I. p. 453. n. 67. Figuier cendré de Canada.
- Büffon*, Vögel, XVI. p. 130. der blaue Canadische Feigenfresser; m. e. Fig.
- Latham*, Syst. ornithol. II. p. 539. n. 117. Sylvia (Canadensis) supra caerulea subtus alba, iugulo remigibus rectricibusque nigris.

Seligmann, Vögel, VII. tab. 42. *blauer Fliegenfischer*.

Martini, Naturlex. V. p. 108. *die kleine kanadensische graue Bachstelze*.

Naturgesch. m. Merian. Kupf. Vög. p. 790. *der blaue Feigenvogel*.

Neueste Mannigfaltigk. IV. p. 140. *die kleine graue kanadensische Bachstelze*.

43. CAERULEA. *Die schieferfarbene Motacille*.

Müller, Natursyst. II. p. 618. n. 43. *die blaue Bachstelze*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 378. n. 216. *der himmelblaue Sänger*.

Onomat. histor. natur. V. p. 261. *die blaue Bachstelze*.

Brisson, ornithol. I. p. 559. n. 79. *Figuier cendré de Pensilvanie*.

Büffon, Vögel, XVI. p. 142. *der eisengraue Feigenfresser*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 540. n. 121. *Sylvia (Caerulea) supra caerulea subtus alba, alis caudaque nigris*.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 92. *kleiner eisengrauer Flirgenfänger*.

Martini, Naturlex. V. p. 23. *die blaue Bachstelze*.

Naturgesch. mit Merian. Kupf. Vög. p. 793. *der eisengraue Feigenvogel*.

Neueste Mannigfaltigk. III. p. 780. *blaue Bachstelze*.

β. *Büffon*, Vögel, XVI. *der schwarzköpfige cayennische Feigenfrässer*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 540. n. 21. β.

166. CYANA. Die weißbäuchige Motacille.

Latham, Syst. ornith. II. p. 541. n. 122. Sylvia (Cyane) saturate cyanea, subtus nivea, a rostro ad alas striga atra.

Pallas, Reis. Ausz. III. Anh. p. 7. n. 18. Motacilla Cyane.

167. ARUNDINACEA. Die Rohrmotacille. (10)

Latham, Syst. ornithol. II. p. 510. n. 12. Sylvia (Arundinacea) supra olivaceo-fusca, subtus albida, loris et orbitis fusco-albescentibus, angulo carpi subtus luteo-fulvo, cauda subcuneata fusca.

Lichtenberg u. Voigt, Magaz. für das Neueste, etc. IV. 1. p. 145. Motacilla arundinacea.

44. SIBILLA. Der Fitert.

Müller, Naturfystem, II. p. 618. n. 44. der Zischler.

Onomat. histor. natur. VI. p. 847. die Bachstelze aus Madagascar.

Brisson, ornithol. I. p. 431. n. 28. Traquet de Madagascar.

Büffon, Vögel, XV. p. 268. der Fitert, oder das Madagascarische Weißkehlchen.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 523. n. 50. Sylvia (Sybilla) nigricans, subtus alba, pectore rufo, rectricibus nigris, macula alarum alba.

Sammnl. zur Phys. und N. G. III. p. 246. der Zischler.

Yy 4

Neueste

(10) Latham rechnet hieher noch folgende Synonymen: *Turdus arundinaceus minimus*, Sepp. *Vog. tab. p. 101.* (*Avis?*) *id. p. 97.* (*Nidus*) *Passer arundinaceus minor*, Raji *Syn. p. 47.* A. 3? *Will. p. 99?* *Rohrsperling*, Günth. *Nest. u. Ei. tab. 12?* *Bouscarle de Provence*, Büff. V. p. 134? *Pl. ent. 655.* Fig. 2? *Lesser Reed-Sparrow*, Will. p. 144? *Reed Wren*, Lath. *Syn. Suppl. p. 184.* *Gentl. Mag. LV. 462. t. p. 640.*

Neueste Mannigfalt. IV. p. 197. die madagaskari-sche Bachstelze.

45. RUBECULA. Das Rothkehlchen. (1)

Müller, Natursyst. II. p. 618. n. 45. das Rothkehl-chen.

Leske, Naturgesch. p. 270. n. 6. das Rothkehlchen.
Borowsky, Thierreich, III. p. 194. n. 16. das Rothkehlgen.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 192. n. 8. Mota-cilla (Rubecula) grisea, gula pectoreque ferru-gineis; das Rothkehlchen; Rothbrüstchen; Roth-bart.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 537. n. 10. das Roth-kehlchen.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 601. das Roth-klein.

Funke, Naturgesch. I. p. 256. das Rothkehlchen.

Halle, Vögel, p. 330. n. 301. das Rothkehlchen.

Meyer, Thiere, I. tab. 93. das Rothkehlchen?

Gatterer, vom Nutz. und Schad. der Thiere, II. p. 429. n. 371. das Rothkehlchen; Rothkröpf-chen; Waldrothlein, etc.

Pennant, arct. Zool. II. p. 389. D. das Rothkehl-chen.

Neuer Schaupl. der Nat. VII. p. 266. Rothkehlchen.

Onomat. hist. nat. V. p. 271. das Rothkehlchen.

Handb. der Naturgesch. II. p. 273. das Rothkehl-chen.

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 136. das Roth-kehlchen, etc.

Klein, av. p. 77. n. 1. Sylvia sylvatica.

Klein, Vorbereit. p. 144. n. 1. Rothkelein; Roth-brüstein; Waldrotlein; Rottkröpplein;

Klein,

(1) Die Jungen haben vor dem ersten Mausern das Orangeroth an der Kehle und Brust nicht.

Klein, verbess. Vögelhiſt. p. 78. n. 1. *Rothkehlein*;
Wald- oder Hausrötelein.

Klein, Stemmat. av. p. 14. tab. 16. fig. 13. a — c.

Klein, Vögeleyer, p. 26. tab. 10. fig. 16.?

Gesner, Vögelb. p. 445. *Waldrötelin*; *Rötelein*;
Winterrötelein; *Rotbrüſlein*; *Rotkropf*. Fig.
p. 446. mittelm.

Briffon, ornithol. I. p. 427. n. 21. *Rouge-gorge*.

Büffon, Vögel, XV. p. 212. *das Rothkehlchen*;
m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 361. *das Rothkehlchen*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 520. n. 42. *Sylvia*
(*Rubecula*) *grisea*, *gula pectoreque ferrugineis*.

Beseke, Vögel Kurl. p. 83. n. 188. *das Rothkehl-*
chen.

Siemſen, meklenb. Vögel, p. 137. n. 10. *das Roth-*
kehlchen.

Bock, N. G. von Preuß. IV. p. 440. *das Roth-*
kehlchen.

Fischer, Zus. zur N. G. von Livil. p. 50. n. 503.
Rothkehlchen.

Cetti, Sardin. II. p. 217. *das Rothkehlchen*.

White, N. G. von Engl. p. 60. n. 1. *Roeteln*, p. 63.
n. 4. *Rothkehlchen*.

Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 14. *Rödfinke*;
Rödkielke.

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 10. *das Rothkehlchen*.

Linné, Abhandl. II. p. 306. n. 139. *das Rothkehl-*
chen.

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 191. n. 231. *das*
Rothkehlchen.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 242. *das Roth-*
kehlchen.

Naturforsch. XVII. p. 104. n. 217. *das Rothkehl-*
chen

Pennant, brit. Thiergesch. III. tab. 55. fig. 2.

- Zorn*, Petinotheol. II. p. 388. *das Rothkehlein.*
Döbel, Jägerprakt. I. p. 64. *Roth-Kehle.*
Naumann, Vogelsteller, p. 149. *Rothkehlgeln.*
Anweis. Vögel zu fang. p. 497. *das Rothkehlien.*
Eberhard, Thiergesch. p. 84. *das Rothkehlgeln.*
Jablonsky, allgem. Lex. p. 942. *Rothkehle.*
Goeze, Natur, Menschenl. und Vorf. V. p. 204.
das Rothkehlchen.
André u. Bechstein, Spazierg. I. p. 192. *das Rothkehlchen.*
Meidinger, Vorles. I. p. 153. n. 6. *das Rothkehlchen.*
Oekonom. Zool. II. p. 101. *das Rothkehlchen.*
Dieskau, Naturgesch. der Nachtigall, p. 42.
Martini, Naturlex. V. p. 164. *Rothkehlchen.*
Wirsing, Vögel, tab. 25. *Rothkehlein.*
Borkhausen, Magaz. I. p. 185. n. 61. *Rothkehlchen;*
Rothbrüftchen.
Tänzer, notabil. Venator. p. 98. n. 123. *Roth-Kehle.*
 Neue Mannigfaltigk. III. p. 179. — Neueste
 Mannigfaltigk. IV. p. 328. *Rothkehlchen.*
Loniceri, Kräuterb. p. 683. *Rothbrüftlein.*
Elsholz, Tischb. p. 169. *Rothkehlchen.*
Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 57. *Erithacus.*
Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 13. *Erithacus.*
Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 188. n. 28. *Motacilla (Rubecula) grisea gula pectoreque fulvis.*
Kramer, Austr. p. 376. n. 12. *Rothkröpf.*
Charleton, onom. zoic. p. 91. n. 8. *Rubecula,*
Erithacus.
Schwenckfeld, av. Siles. p. 345. *Rubecula. Rottkählichen; Rottbrüftlin; Wald-Rötelin; Rottkröpflin; Winter-Rötele.*
Sibbald, Scot. illustr. II. 3. p. 18. *Rubecula.*

Rzaczynsky, hist. nat. Polon. p. 279. *Erithacus Phoenicurus Plinio*; *Rubrica Gesnero*; *Rubecula et Ruticilla Gazae*; *Silvia aliis*.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 418. *Rubecula Schwenfeldii*, *Erithacus Ruticilla Gazae*; *Sylvia*.

Barrere, ornithol. Cl. 2. Gen. 18. sp. 4. *Ficedula fulva*, pectore rubro.

Belon, hist. nat. des ois. p. 348. — Obs. p. 16. *Gorge-rouge*; *Rubeline*; *Rouge-bourse*; *Gadrille*; *Roupie*; *Berée*.

Bomare, diction. V. p. 165. — Diction. des anim. III. p. 720.

Onomatol. forestal. III. p. 206.

Zinnan. Uov. p. 46. tab. 6. Fig. 32. *Pettirosso*.

Hist. Prov. I. p. 508. *Rouge-gorge*.

Jonston, av. p. 121. *Rubecula*.

Plin. hist. nat. L. 10. c. 29. *Erithacus?*

Aelian. de nat. animal. L. 7. c. 7. *Ἐριθαῖος*.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 386. n. 22. *das Rothkehlchen*.

β. *Briffon*, ornithol. I. p. 427. n. 22. *Rouge-gorge de Bologne*. (2)

Latham, Syn. II. 2. p. 444. n. 38. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 521. n. 42. β. *Sylvia cinerea*, *gula alba*, *collo inferiore pectoreque rufis*, *tectricibus alarum albo nigro rufoque variis*, *remigibus tectricibusque nigris rufo-marginatis*.

Zinnan. Uov. p. 50. tab. 7. fig. 36. *Spippola maggiore*.

Jonston, av. p. 121. *Spipola prima*.

γ. *RUBECULA TOTA ALBA*. *Das ganz weiße Rothkehlchen*.

Ist mir wenigstens noch nie vorgekommen.

46. Tro-

(2) Nach *Briffon* eine eigne Gattung.

46. TROGLODYTES. Der Zaunkönig. (*)

Müller, Natursyst. II. p. 619. n. 46. der Zaunkönig.

Leske, Naturgesch. p. 270. n. 7. der Schneekönig.

Borowsky, Thierreich, III. p. 190. n. 9. der Zaunkönig; Schneekönig; Winterkönig; Zaunschliefer.

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 192. n. 9. Motacilla (Troglodytes) grisea, alis nigro cinereoque undulatis. Zaunkönig; Zaunschlüpfer.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 545. n. 26. der Zaunkönig.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 609. der Schneekönig; Winterzaunkönig.

Funke, Naturgesch. I. p. 259. der Zaunkönig.

Ebert, Naturl. II. p. 144. Schneekönig.

Haile, Vögel, p. 327. n. 298. der Schneekönig.

Meyer, Thiere; II. tab. 79. der Schneekönig.

Gatterer, vom Nutz. u. Schad. der Th. II. p. 430. n. 372. der Zaunkönig; Schlupfkönig; Zaunschlipflein, etc.

Pennant, arct. Zool. II. p. 387. n. 239. der Zaunkönig.

Neuer Schaupl. der Nat. X. p. 159. Zaunkönig.

Onomat. histor. natur. V. p. 273. der Winterkönig.

Handb. der Naturgesch. II. p. 275. der Schneekönig.

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 137. Zaunkönig, etc.

Klein, av. p. 76. n. 1. Troglodytes simpliciter.

Klein,

(*) Die deutschen u. a. Benennungen, dieser, der 48. und 49. Gattung werden häufig verwechselt; auch nicht selten ihre Naturgeschichte unter einander geworfen.

- Klein*, Vorbereit. p. 143. n. 1. *Winterkönig*, *Zaunschlipflein*, *Meisekönig*; *Nesselkönig*; *Dornkönig*, *Schuppkönig*.
- Klein*, verb. Vögelhist. p. 77. n. 1. *Winterkönig*.
- Klein*, Stemmat. av. p. 14. tab. 16. Fig. 4. a. b.
- Klein*, Vögeleyer, p. 25. tab. 10. Fig. 13.
- Gesner*, Vögelb. p. 473. *Zaunschlipflein*; m. e. mittelm. Fig.
- Brisson*, ornith. I. p. 428. n. 24. *Roitelet*.
- Büffon*, Vögel, XVI. p. 215. *der Nesselkönig oder Troglodyt*; m. e. Fig.
- Latham*, Syst. ornith. II. p. 547. n. 148. *Sylvia (Troglodytes) grisea*, superciliis albidis, alis nigro cinereoque undulatis.
- Beseke*, Vögel Kurl. p. 83. n. 189. *der Zaunkönig*.
- Siemßen*, meklenb. Vögel, p. 138. *der Zaunkönig*.
- Nettelköning*: *Tuunkonning*; *Groote Jochen*.
- Bock*, N. G. von Preuss. IV. p. 441. *der Zaunkönig*.
- Fischer*, Zuf. zur N. G. von Livil. p. 51. n. 504. *der Zaunkönig*.
- Cetti*, Sardin. II. p. 224. *der Schneekönig*.
- White*, N. G. von Engl. p. 60. n. 2. p. 66. n. 7. p. 88. *der Zaunkönig*.
- Pontoppidan*, Dännein. p. 174. n. 15. *Thomas im Zaine*.
- Pennant*, Reis. d. Schottl. II. p. 280. *der Zaunkönig*.
- Pennant*, britt. Thiergesch. p. 114.
- Naturforsch.* XVII. p. 105. n. 218. *der Zaunkönig*.
- Neue schwed. Abhandl.* IV. p. 51. *der Schneekönig*; *Tomlingen*.
- Zorn*, Petinotheol. I. p. 324. II. p. 154. 393. 704. *der Zaunschlieffer*; *Zaunschlupfer*.
- Borkhausen*, Magaz. I. p. 190. n. 69. *Zaunkönig*.
- Scopoli*, Beitr. a. d. N. G. I. p. 196. 239. *der Zaunkönig*.

- Döbel*, Jägerprakt. I. p. 67 *Zaunkönig*.
Naumann, Vogelsteller, p. 149. *Zaunkönig*.
Goeze, Natur, Menschenl. u. Vorf. VI. p. 109.
Zaunkönig.
André u. Bechstein, Spazierg. III. p. 56. *Zaunkönig*.
Anweis. Vögel zu fang. p. 575. *Zaunköniglein*.
Martini, Naturlex. V. p. 205. *Zaunschlüpfen*, etc.
Hanöv. Merkwürdigk. der Natur, I. p. 290.
Geoffroy, mater. med. VII. p. 602. *der Zaunkönig*.
Tänzer, notab. Venator. p. 110. n. 139. *Zaunkönig*.
Eberhard, Thiergesch. p. 85. *der Zaunkönig?*
Jablonsky, allgem. Lex. p. 1427. *Zaunkönig*.
Neueste Mannigfalt. IV. p. 454. *Zaunkönig*.
Loniceri, Kräuterb. p. 684. *Königlein*.
Elsholz, Tischb. p. 170.
Linneé, Syst. Nat. Ed. II. p. 57. *Troglodytes*.
Linneé, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 20. *Troglodytes*.
Linneé, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 188. n. 29. Motacilla
 (*Troglodytes*) *grisea alis nigro cinereoque undulatis*.
Kramer, Austr. p. 378 n. 20. *Schneekönig*; *Könnickerl*; *Zaunschlupferl*.
Charleton, onom. zoic. p. 79. n. 11. *Troglodytes*.
Schwenckfeld, av. Siles. p. 324. *Passer Troglodytes*.
Regulus apriens; *Schneekönig*, *Meuse-König*,
Nößelkönig, *Zaunschlipflin*.
Sibbald, Scot. illustr. II. 3. p. 18. *Passer Troglodytes Aldrovandi*, perperam *Regulus*.
Rzaczynsky, hist. nat. Polon. p. 290. *Passer Troglodytes Ornithologis*, *Passer Sepium Turnero*.
Rzaczynsky, auch. hist. nat. Pol. p. 405. *Passer Troglodytes Gesneri*, *Passer sepiarius*, *Trochilus*.

Barre.

Barrere, ornith. Cl. 3. Gen 23. sp. 1. *Trochilus fulvus*.

Belon, nat. des ois. p. 344. Obs. p. 17. Roitelet; Boeuf de Dieu; Berichot; Roi beraud.

Fonston, av. p. 115. *Passer Troglodytes*.

Bomare, dictionn. X. p. 63. — Diction des anim. III. p. 607.

Onomat. forestal. III. p. 1048.

Faun. Arragon. p. 89. — Hist. Prov. I. p. 510.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 386. n. 23. der Zaunkönig.

β. Der Zaunkönig von Buenosayres. (3)

Büffon, Vögel, XVI. p. 231. der Zaunkönig von Buenosayres; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 548. n. 149. *Sylvia (Platensis) supra rufo nigroque varia subtus alba, remigibus rectricibusque fasciatis*.

γ. Der louisianische Zaunkönig. (4)

Büffon, Vögel, XVI. p. 232. der Zaunkönig von Louisiana; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 548. n. 150. *Sylvia (Ludoviciana) rufo-fusca, superciliis, genis subtusque flavescens, remigibus caudaque fasciatis*.

168. FURVA. Der Surinamische Zaunkönig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 548. n. 151. *Sylvia (Furva) fusca subtus pallidior, dorso alis caudaque nigricante fasciatis*.

Fermín, Surin. II. p. 184. der Zaunkönig.

47. CALENDULA. Die Rubinkrone. (5)

Müller, Naturfyst. II. p. 611. n. 47. der Ringelkönig.

Onomat,

(3) Nach Latham eine eigene Gattung.

(4) Nach Latham eine eigene Gattung.

(5) Länge 4. Zoll; Gewicht 4. Drachmen. Penn.

Onomat. hist. nat. V. p. 262. die Pensylvanische Calendula.

Pennant, arct. Zool. II. p. 386. n. 237. die Rubinkrone.

Klein, verb. Vögelhist. p. 167. n. 2. Zaunkönig mit der rubinfarbigen Krone.

Brisson, ornithol. I. p. 473. n. 18. Poul ou Souci de Pensilvanie.

Büffon, Vögel, XVI. p. 246. das pensylvanische Königlein. p. 249. das rubingeckrönte Königlein; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 549. n. 154. Sylvia (Calendula) cinereo-virescens, linea verticali rubini colore, abdomine alisque subtus flavescentibus.

Seligmann, Vögel, VII. tab. 44. der rubingeckrönte Zaunkönig.

Neueste Mannigfalt. IV. p. 321. der Ringelkönig.

β. Büffon, Vögel, XVI. p. 251. ein Vogel der hinten am Kopfe mit einer Art von karminfarbenen Krone umgeben ist.

48. REGULUS. Das Goldhähnchen (6)

Müller, Natursyst. II. p. 620. n. 48. der Haubenkönig.

Leske, Naturgesch. p. 270. n. 8. der Zankönig.

Borowsky, Thierreich, III. p. 189. n. 8. das Goldhähnchen; der Haubenkönig, Sommerzaunkönig.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 193. n. 10. Motacilla (Regulus) remigibus secundariis exteriori margine flavis, medio albis, crista verticalli crocea; das Goldhähnchen.

Rech-

(6) Gewicht 96. bis 120. Gran, nach Büffon. Wird oft mit dem Zaunkönig und Weidenzeisig verwechselt, ob er sich gleich von beyden sehr unterscheidet.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 544. n. 26. *das Goldhähnchen*.

Funke, Naturgesch. I. p. 260. *das Goldhähnchen*.

Ebert, Naturl. II. p. 145. *gekrönter Zaunkönig*; *Goldhähnchen*; *deutscher Colibrit*.

Halle, Vögel, p. 328. n. 300. *der Sommerzaunkönig, mit goldner Krone*; Fig. 19.

Meyer, Thiere, I. tab. 34. *Goldhänlein*.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 431. n. 374. *der Haubenkönig*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 386. n. 238. *der Haubenzaunkönig*.

Neuer Schaupl. der Natur, III. p. 478. *Goldhänchen*.

Onomat. hist. nat. V. p. 270. *der Sommerzaunkönig*.

Handb. der Naturgesch. II. p. 274. *das gekrönte Königchen*; *Goldhähnchen*.

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 137. *Goldhähnchen*.

Klein, av. p. 76. n. 3. *Trochilus*. *Regulus cristatus*.

Klein, Vorbereit. p. 143. n. 3. *Gekröntes Königchen*; *Sommerzaunkönig*; *Ochsenäuglein*; *Goldhänlein*; *Streuslein*.

Klein, verb. Vögelh. p. 77. n. 3. *gekröntes Königchen*. p. 167. *Zaunkönig mit der goldenen Krone*.

Klein, Stemmat. av. p. 14. tab. 16. fig. 5. a—c. Id. tab. 28. fig. 2:

Gesner, Vögelb. p. 138. *Regulus vel Trochilus*. *Goldhendlein*; *König der Vögel*; *Parra*.

Brisson, ornith. I. p. 472. n. 17. *Poul ou Souci*, appellé vulgairement Roitelet hupé.

Büffon, Vögel, XVI. p. 234. *der Haubenkönig*, *das Goldhänlein*, oder *das Königlein*; mit e. Fig.

- Batsch**, Thiere, I. p. 361. *das Goldhähnchen*.
Latnam, Syst. ornith. II. p. 548. n. 152. *Sylvia (Regulus) virescens*, remigibus secundariis exteriori margine flavis, medio albis, vertice luteo.
Seligmann, Vögel, IV. tab. 110. *der Zaunkönig*.
Seligmann, VII. tab. 44. *der goldgekrönte Zaunkönig*.
Beske, Vögel Kurl. p. 83. n. 190. *der Haubenkönig*.
Siemßen, meklenb. Vögel, p. 140. n. 12. *das Goldhähnchen*.
Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 442. *Goldhähnlein*.
Fischer, Livil. p. 102. n. 171. *gekrönter Zaunkönig*.
White, N. G. von Engl. p. 61. n. 10. *Ochsenauge*.
Pallas, nord. Betr. III. p. 2. *der gekrönte Zaunkönig*.
Pontoppidan, Däunem. p. 174. n. 16. *Fuglekonge*.
Olaffson, Isl. I. p. 311. f. *Rindill*; *Musarbroder?*
Linne, Abhandl. II. p. 306. n. 140. *der Sommerzaunkönig*.
Pennant, britt. Thiergeschichte. p. 114. tab. 53. Fig. 3.
Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 197. n. 240. *das Goldhähnlein*.
Naturforsch. XVII. p. 106. n. 219. *der Haulenkönig*.
Naturforsch. XXV. p. 19. *Goldämmerchen*.
Wirsing, Vögel, tab. 14. *Gold-Vögelein*. M. u. W.
Zorn, Petinotheol. I. p. 332. II. p. 94. 150. 395. *Gold-Hähnlein*.

- Martini*, Naturlex. V. p. 211. gekrönter Zaunkönig; *Ochsenäuglein*; *Tannennhäuslein*; *Waldzeistein*; *Weidenmeise*; *Weidenzeistein*, etc.
- Döbel*, Jägerprakt. I. p. 68. *Gold-Hähnchen*.
- Naumann*, Vogelsteller, p. 151. *Goldämmerchen*.
- Borkhausen*, Magaz. I. p. 191. n. 70. *Goldhähnchen*.
- Anweis. Vögel zu fang. p. 575. *Goldhähnlein*.
- Goeze*, nützl. Allerl. II. p. 397. n. 18. *Goldhähnchen*.
- Goeze*, Natur, Menschenl. u. Vorl. V. p. 226. das *Goldhähnchen*.
- André u. Bechstein*, Spatzierg. II. p. 337. *Goldhähnchen*.
- Beckmann*, Naturhist. p. 55. c. der Zaunkönig.
- Neueste Mannigfalt. IV. p. 460. gekrönter Zaunkönig.
- Hauöv. Seltenh. der Nat. I. p. 284.
- Tänzer*, notab. Venatoris, p. 111. *Goldhähnchen*.
- Linné*, Syst. Nat. Ed. II. p. 57. *Regulus*.
- Linné*, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 22. *Regulus cristatus*.
- Linné*, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 188. n. 30. *Motacilla (Regulus) remigibus secundariis exteriori margine flavis, medio albis*.
- Kramer*, Austr. p. 378. n. 21. *Motacilla remigibus secundariis exteriori margine flavis, medio nigris. Goldhannel*.
- Charleton*, onom. zoic. p. 89. n. 1. *Regulus cristatus*.
- Schwenkfeld*, av. Siles. p. 344. *Regulus. Gold-Hälin*; *Ochsen-Euglin*; *Streuslin*; *Tan-Meislin*; *Wald-Zinslin*.
- Sibbald*, Scot. illustr. III. 3. 4. p. 18. *Parus sylvaticus*.

Rzaczynsky, aust. hist. nat. Pol. p. 404. *Parus sylvaticus*; p. 417. *Regulus cristatus*; *Cladorinchus*, *Regaliolus*, *Regillus*, *Senator*, *Rex avium*, *Calendula*.

Belon, nat. des ois. p. 345. *Poul*; *Soulcie*, *Soucie*, *Sourcicle*.

Borlase, nat. hist. of Cornwall. p. 247. *Regulus cristatus*; Wood-Titmouse of Gesner.

Barrere, ornithol. Cl. 2. gen. 23. *Trochilus cristatus*. gen. 24. *Parus nigricans*, *macula rubente in vertice*.

Salerne, nat. des ois. p. 239. *Roitelet crete*; *Sucet*; *Suet*; *petit boeuf*; *Bissoudet*.

Bomare, diction. X. p. 65. — Diction. des anim. III. p. 707.

Hist. Prov. I. p. 509. *Roitelet*.

Philos. Transact. XXVIII. p. 170.

Fouston, av. pag. 120. *Parus sylvaticus*. p. 114. *Regulus*.

Plin hist. nat. L. 10. c. 74. *Trochilus*, *Rex avium*?

Hermann, tab. affin. anim. p. 224. ff. Mot. *Regulus*.

Donndorff, Handb. d. Thiergeschich. p. 387. n. 24. *das Goldhähnchen*.

B. *Büffon*, Vögel, XVI. p. 255. *das Meisenköniglein*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 549. n. 153. *Sylvia (Elaea) cristata virescens*, *subtus cinereo-albida*, *occipite crisoque pallide flavo*, *tectricibus alarum margine*, *rectricibusque lateralibus apice albis*.

Hermann, tab. affin. anim. p. 225. *Regulo-Parus*.

49. TROCHILUS. Der Weidenzeisig. (7)

Müller, Natursyst. II. p. 620. n. 49. der Läufer.

Leske, Naturgesch. p. 270. n. 9. der Weidenzeisig.

Boroewsky, Thierreich; III. p. 191. n. 10 der Zaunkönig; grüner König; die kleinste Grasmücke.

Beckstein, Naturgesch. I. p. 543. n. 24. der Weidenzeisig.

Ebert, Naturl. II. p. 144. der kleinste Zaunkönig; Winterkönig.

Halle, Vögel, p. 328. n. 299. der Zaunkönig.

Z z 3 Gatt-

- (7) Fast unter allen Motacillen ist bey keiner die Verwirrung und Verwechselung der Synonymen grösser als hier. Man hat diesen Vogel oft mit der *Motacilla Salicaria*, oft mit der *M. Hippotais*, oft auch mit dem Weibchen der *M. Regulus* verwechselt. Eben so ist es auch mit den in unserm System hieher gerechneten Varietäten beschaffen, die ich hin und wieder theils bald als Spielarten von andern Gattungen, theils als ganz eigene Gattungen aufgeführt und wieder mit andern Synonymen verwechselt finde. Neuerlich hat Beckstein (Naturforsch. XXVII. p. 50. und 54.) die Sache auf eine ganz andere Art aus einander gesetzt. Er trennt den *Yellow Wren* des Pennant, von dem *Pouillot* des Buffon, nennt erstern den *Fitis* (*Motacilla Fitis*) und verbündet den letztern, den er *Weidenzeisig* nennt, mit der *Motacilla Trochilus* Linn. — Als deutsche Synonymen vom *Fitis* werden p. 54. angegeben: *Großer Weidenzeisig*; *Sommerkönig*; *Wisperlein*; *Astvogel*, in Thüringen: *Laubvögelchen*. — Vom *Weidenzeisig* finden sich p. 58. folgende Synonymen: *Kleiner Weidenzeisig*; *grüner König*; *kleinste Grasmücke*; *Tyrannchen*; *Schmittel*; *Weidenzeiseln*; *eigentliche Grasmücke*; *kleine gelbrothe Grasmücke*; *Läufer*; *Mitwaldlein*; in Thüringen: *kleinstes Laubvögelchen*. Das Gewicht des erstern beträgt 2. Quentchen, des letztern 1 1/2 Quentchen. — Der *Fitis* finde ich auch in Naumanns Vogelsteller p. 147. gedacht. — Es soll Frischens *Weidenzeisig*, tab. 24 Fig. 1. seyn. S. Naturgesch. Deutschl. III. p. 608. it. N G des In- und Auslandes p. 543. n. 23. — Lathani citirt hier noch *Frisch*, tab. 24. Fig. 2 so aber zu *Muscicapa atricapilla*, p. 934. n. 9. gehört S. oben Anmerk. 2. bey *Muscicapa atricapilla*.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 431. n. 373. *der Sommerkönig; das Seidenvögelchen; Tyrannchen; Smittl.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 385. n. 326. *der gelbe Sänger.*

Ouomat. hist. nat. III. p. 891. *der Aſilvogel.*

Handb. der deutsch. Thiergeſch. p. 137. *Sommerkönig; Weidenzeifig.*

Klein, av. p. 76. n. 2. *Trochilus capite laevi.*

Klein, Vorbereit. p. 143. n. 2. *Sommer-Tyrannchen.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 77. n. 2. *Sommerkönig-Tyrannchen.*

Briffon, ornith. I. p. 441. n. 45. *Pouillot ou Chantre.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 201. *der Pouillot oder Sänger; m. e. Fig.*

Batsch, Thiere, I. p. 362. *der Zaunkönig.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 550. n. 155. *Sylvia (Trochilus) cinereo-virens, alis subtus tectricibusque flavescensibus, superciliis luteis.*

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 141. n. 13. *die kleine Grasmücke.*

Bock, N. G. von Preuß. IV. p. 442. *der Läufert; gelber Sticherling.*

Cetti, Sardin. II. p. 222. *der Zaunkönig?*

White, N. G. von Engl. p. 32. 33. n. 1. p. 58. n. 2. p. 65. n. 4. *kleinster Zaunkönig?*

Pontoppidan, Dänem. p. 174. n. 17. *Spurrekonige; Fagerfis.*

Hasselquist, Palaest. (Ed. germ.) p. 338. n. 52. *Motacilla hispanica.*

Bartram, Reis. d. Carolina, p. 300. *der gelbbrüflige Sänger.*

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 14. *der Zaunkönig mit gelben Augenbrauen.*

Teng-

- Tengmalm: neue Schwed. Abhandl. IV. p. 52.
M. Trochilus.
- Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 195. n. 238. das
Weidenzeifstein.
- Naturforsch. XVII. p. 106. n. 220 der Laufer.
- Naturforsch. XXVII. p. 54. n. 6. der Weidenzei-
fig. (Siehe unten Anmerk. n. 7.)
- Borkhausen, Magazin, I. p. 191. u. 71. Sommer-
könig; Bachkönig; Weidenzeischen. p. 192.
Ba.köfchen.
- Zorn, Petinotheol. II. p. 391. die eigentliche Gras-
mücke; Weiden Zeifstein.
- Döbel, Jägerprakt. I. p. 68. Weiden-Zeifig.
- Martini, Naturlex. V. p. 116. der Läfer.
- Tänzer, notabil. Venator. p. III. Weiden-Zeifig.
- Neueste Mannigfalt. IV. p. 194. der Sänger
- Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 31. n. 23. Regulus non
cristatus.
- Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 188. n. 31. Motacila
(Trochilus) cinereo-virens, remigibus sub-
tus flavescentibus, superciliis luteis.
- Kramer, Austr. p. 378. n. 22. Motacilla cinereo-
virescens, subtus flavescentis, superciliis luteis.
Schmittl.
- Charleton, onom. zōic. p. 89. n. 2. Asilus.
- Möhring, av. gen. p. 44. n. 35 Asilus.
- Rzaczynsky, auch. hist. nat. Pol. p. 417. Regulus
non cristatus.
- Fonston, av. p. 114 Regulus non cristatus.
- Barrere, ornithol. Cl. 3. gen. 23. sp. 2. Trochi-
lus ex flavo cinereus, capite nigro.
- Belon, nat. des ois. p. 344. Chantre ou Chanteur.
- Salerne, ornithol. p. 242 Chafty.
- Faun. Arragon. p. 89. — Hist. prov. I. p. 510.
- Donndorff, Handb. d. Thiergeesch. p. 388. n. 25.
der Weidenzeifig.

β. Der (sogenannte) gelbe Zaunkönig. (8)

Klein, av. p. 86. n. II. *Parus luteus Carolinensis*.

Klein, Vorbereit. p. 161. n. II. *gelbe Meise aus Karolina*.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 89. n. II. *gelbe Meise*.

Briffon, ornith. I. p. 443. n. 48. *Figuier de la Caroline*.

Büffon, Vögel, XVI. p. III. *der braun und gelbe Feigenfresser*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 550. n. 155. β.

Seligmann, Vögel, III. tab. 26. *die carolinische gelbe Meise*.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 68. *der gelbe Zaunkönig*.

Schriften der berlin. Gesellsch. N. Fr. III. p. 195.
Motacilla Acredula.

Naturgesch. aus den best. Schriftenst. m. Merian. Kupf.
p. 785. *der braun und gelbe Feigenvogel*.

Linneé, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 24. *Regulus cinereus*.

Linneé, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 189. n. 22. *Motacilla (Acredula) supra cinereo virescens, remigibus fuscis, septimo octavo nono apice albis*.

γ. Der große Weidenzeisig.

Briffon, ornithol. I. p. 442. n. 45. *A. grand Pouillot*.

Büffon, Vögel, XVI. p. 213. *der große Sänger*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 550. n. 155. δ.

δ. Hasselquist, Palaest. (Ed. germ.) p. 337. n. 51.
Motacilla corpore ex fusco viridescente, pectore ferrugineo.

Büffon, Vögel, XVI. p. 209. *die Bachstielze mit grünlichbraunem Leibe, und roßfarbiger Brust*.

Latham,

(8) Nach *Briffon*, u. a. eine eigene Gattung.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 551. n. 156. *Sylvia* (Mediterranea) *fusco-virescens* *subtus ferruginea*, *collo subtus pectoreque fulvis*. (9)

169. AESTIVA. *Die canadische Sommermotacille.* (10)

Pennant, arct. Zool. II. p. 374. n. 209. *der Gelbkopf.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 381. n. 224. *der olivenfarbige Sänger.*

Brisson, ornith. I. p. 444. n. 51. *Figuier de Canada.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 89. *der gefleckte Feigenfresser*; m. e. Fig.

Latham, Syn. Suppl. p. 183.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 551. n. 157. *Sylvia* (*Aestiva*) *viridi-olivacea* *subtus flava*, *collo subtus pectoreque maculis rubescentibus, rectricibus lateralibus, intus luteis.*

Zz 5

Latham,

(9) Nach *Latham* eine eigene Gattung.

(10) In unserm System ist *Büffons Figuier de Canada*, pl. enl. n. 58.

Fig. 2. als Varietät: *Motacilla corpore supra fusco*, aufgeführt.

Ich habe indessen alle Synonymen unter der Hauptbenennung zusammen gefasst und bemerke nur noch, wie sehr die Ornithologen auch hier in deren Auseinandersetzung von einander abweichen. — *Büffon* hält den, in den Pl. enl. tab. 58. Fig. 1. abgebildeten Vogel (*Figuier de la Caroline*) für das Weibchen von Fig. 2. (*Figuier de Canada*) — *Pennant* hält beyde für ganz verschiedene Gattungen: rechnet *Brissots Ficedula canadensis*, *Büffons Figuier tacheté*, und Pl. enl. tab. 58. Fig. 2. *Figuier de Canada*, zu seinem *Yellow-poll Warbler*; — Pl. enl. Fig. 1. aber *Figuier de la Caroline*, zu seinem *Olive Warbler*. — *Latham* ist ihm hierin gefolgt, und führt den *Yellow-poll Warbler*, mit den dahin gezogenen Synonymen unter der Trialbenennung *Sylvia Aestiva*; den *Olive-Warbler* aber als *Sylvia Carolinensis* auf. Von ersterm sagt *Pennant*: Sein Nest sey sehr schön, und aus Daunen mit verwelktem Grase untermischt, gemacht; die inwendige Seite sey mit feinen Fasern gefüttert; die Eyer seyen an dem breiten Ende gefleckt. Der Vogel sey aus Neu-York unter dem Namen *Swamp-Bird* (*Sumpfvogel*) gefunden.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 551. n. 158. *Sylvia* (*Carolinensis*) *viridi-olivacea* *subtus flavescens*, *remigibus caudaque fuscis*, *rectricibus flavo-marginatis*.

170. SUTORIA. *Der Schneidervogel* ⁽¹⁾

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 193. n. 11. *Motacilla* (*Sartoria*) *tota pallide lutea*; *der Schneidervogel*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 551. n. 159. *Sylvia* (*Sutoria*) *tota flava*.

Naturforsch. I. p. 270. n. 8. *Motacilla Sutoria*; *Oiseau Tailleur*; *Taylor Bird*; *die Schneider-Bachstelze*; *Nätherin*.

Smellie, Philos. der Naturgesch. II. p. 63. *der Schneidervogel*.

Sander, Natur und Relig. p. 124. *der Schneider-vogel*.

Berlinische Samml. IX. p. 192. *der Schneider-vogel*.

Neueste Mannigfaltigk. I. p. 192. *der Schneider-vogel*; m. e. Fig.

Göttingischer Taschenkalender 1781. *Schneider-vogel*.

Dönnstorff, Handb. der Thiergesch. p. 388. n. 26. *der Schneidervogel*.

50. CAFFRA. *Die caffersche Motatille*.

Müller, Natursyst. Suppl. p. 173. n. 51. *der Hottentot*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 514. n. 22. *Sylvia* (*Caffra*) *olivacea*, *gula caudaque ferrugineis*, *superciliis albis*.

Neueste Mannigfaltigk. IV. p. 140. *Hottentotten-Bachstelze*.

171. Gu-

(1) Gewicht, nach *Pennant*, 3516. einer Unze.

171. GULARIS. Die schwarzkehlige Motacille.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 552. n. 160. Sylvia (Gularis) supra ferruginea, subtus alba, gula alis caudaque nigris.

172. FLAVICAUDA. Die gelbschwänzige amerikanische Motacille. (2)

Pennant, arct. Zool. II. p. 379. n. 218. der Gelbschwanz.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 167. n. 2. gelbschwänziger Fliegenstecher.

Seligmann, Vögel, VII. tab. 47. der Fliegenfänger mit gelbem Schwanz.

173. TSCHEKANTSCHIA. Die zwitschernde Motacille. (3)

Latham, Syst. ornithol. II. p. 552. n. 161. Sylvia (Tschekantschia) supra nigricans, subtus ferruginea, capite atro, nucha albicante, torque et macula alarum oblonga albis, dorso nigro.

Lepechin, Tageb. der russ. Reis. II. p. 186. tab. 7. fig. 2. Tschekantschik. Motacilla superne nigricans torque albo interrupto, inferne ferruginea, capite atro, nucha albicante, macula alarum oblonga candida, dorso nigro, marginibus pennarum rufescentibus.

174. MELANOPE. Die schwarzfußige Motacille.

Latham, Syst. ornith. II. p. 503. n. 5. Motacilla (Melanopa) caerulecenti-cinerea, subtus flava, loris et gutture nigris, superciliis et rectricibus utrinque 3. lateralibus albis, extima margine exteriore nigra.

Pallas, Reis. Ausz. III. Anh. p. 7. n. 16. Motacilla Melanope.

51. BOA.

(2) Nach Latham mit *Muscicapa Ruticilla*, p. 935. n. 10. einerley.

(3) Das russische Wort *Tschekantse* bedeutet Zwitschern.

51. BOARULA. Die Kuhstelze. (4)

Müller, Natursyst. Suppl. p. 173. n. 50. die Rinderstelze.

Halle, Vögel, p. 337. n. 311. die gelbe Bachstelze?

Klein, av. p. 78. n. 7. *Sylvia flava*.

Klein, Vorbereit. p. 146. n. 7. *Kuhstelze*.

Klein, Stemmat. av. p. 16. tab. 7. fig. 7. a — c.

Klein, Vögeleyer, p. 26. tab. 20. fig. 18.

Klein, verb. Vögelhist. p. 79. n. 10. *Kühstelze*; gelbbrüstige Bachstelze.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 540. n. 16. die Kuhstelze.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 607. gelbbrüstige Bachstelze.

Briffon, ornithol. I. p. 439. n. 41. Bergeronette jaune.

Büffon, Vögel, XVI. p. 58. der gelbe Sticherling; m. e. Fig. cf. p. 66.

Latham, Syn. Suppl. p. 178.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 502. n. 4. *Motacilla (Boarula) cinerea*, subtus flava, rectrice prima tota, secunda latere interiore alba.

Seligmann, Vögel, VII. tab. 49. die graue Bachstelze.

Frisch, Vögel, tab. 23. fig. 2. a. die gelbbrüstige Bachstelze.

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 187. n. 226. die Kuhstelze.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 253. die kleine gelbe Bachstelze.

Martini, Naturlex. V. p. 74. die gelbe Bachstelze.

Neueste Mannigfalt. IV. p. 136. graue oder gelbe Bachstelze.

Andre

(4) S. oben die Anmerk. 1. bey *Motacilla flava*, n. 12.

André u. Bechstein, Spazierg. II. p. 177. die gelbe Bachstelze.

Naturgesch. mit Merian. Kupf. Vög. p. 768. gelbe Bachstelze.

Zorn. Petinotheol. II. p. 434. die gelbe Bachstelze?

Linné, Syst. Nat. Edit. XII. I. p. 331. ad n. 12. Motacilla cinerea.

Charleton, onomast. zoic. p. 90. n. 2. Motacilla flava.

Schwenkfeld, av. Silef. p. 307. Motacilla flava.
Kuhstelze; kleine Bachstelze; geelle Bachstelze;
Kuhstieſſe.

Sibbald, Scot. illustr. II. 3. p. 18. Motacilla flava.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Pol. p. 396. Motacilla flava; Motacilla minor; Florus.

Fonſton, av. p. 121. Motacilla flava.

Barrere, ornithol. Cl. 3. Gen. 19. Sp. 3. Sylvia flava.

Belon, hist. nat. des ois. p. 351. Bergerette, ou Bergeronette jaune.

Schaefer, element. ornithol. tab. 23. fig. 1.

Faun. Arragon. p. 85. n. 11.

Zinnan. Uov. p. 51. tab. 7. Fig. 39. Coda tremola gialla.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 388. n. 27. die Kuhstelze.

β. *Pallas*, Reis. Ausz. III. p. 6. n. 15. Motacilla campestris.

γ. *Briffon*, ornithol. I. p. 440. n. 42. Bergeronette de Java. (5)

Büffon, Vögel, XVI. p. 64. der Sticherling von Java.

Latham, Syn. II. 2. p. 339. n. 4. A. Javan Wagtail.

Latham,

(5) Nach Briffon eine eigene Gattung.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 503. n. 4. β . *Motacilla fusco-olivacea* subtus flava, collo inferiore et pectore griseis, rectrice prima tota, secunda et tertia latere interiore, apiceque albis.

A. Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Das Geschlecht ist mit 125. Gattungen vermehrt. Bey der 1sten Gattung sind *drey*, bey der 9ten *drey*, bey der 11ten *zwey*, bay der 12ten *fünf*, bey der 14ten *zwey*, bey der 17ten *zwcy*, bey der 18ten *vier*, bey der 35ten *zwey*, bey der 37ten *zwey* Varietäten aus einander gesetzt. Bey der 15ten sind die Varietäten γ und δ , bey der 34ten die Varietäten β und γ hinzugekommen.

B. Unbestimmtere Thiere.

i. Buffons Locustelle.

Büffon, ois. V. p. 42. La Locustelle.

Büffon, Vögel, XIV. p. 214. die Grillenlerche.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 515. n. 25. *Sylvia* (*Locustella*) *fusco-viridis*, maculis nigricantibus, subtus *flavescens*, pectore *saturatiore*, cauda *cuneata*, rectricibus apice *mucronatis*.

Halle, Vögel, p. 315. n. 277. die Lerchenheuschrekke.

Naturgesch. aus den besten Schriftst. VIII. p. 694. die Lerchenheuschrekke.

Ich weiss nicht, was ich aus diesem Vogel machen soll. *Latham* verwechselt — so scheint mirs wenigstens, — eine grosse Anzahl Synonymen, die zu *Alauda trivialis* p. 796. n. 5. gehören, mit dieser, mir ganz unbekannten Gattung, und zieht so gar seinen *Grashopper Warbler* II. 2. p. 429. n. 20. hieher. Man muss die vorher angeführte Stelle selbst nachlesen.

2. *Sylvia*

2. *Sylvia Zya. Scopoli ann. I. n. 234.*

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 193. n. 234. *der braun und röthlich bunte Fliegenvogel.*

Borkhausen, Magazin, I. p. 188. n. 65. *Weißkehlchen; Braunellch-n.*

Etwa ein Weibchen von *Motacilla Rubecula*?

3. *Die graue Grasmücke.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 535. n. 4. *die graue Grasmücke; weiße bläff. Grasmücke; der Dornreich.* Motacilla dumetorum.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 604.

4. *Die Südliche Motacille.*

White, Reise nach Neusüdwallis -- in dem Magazin merkw. Reisebeschr. V. p. 128. *die Südliche Bachstelze.* (Ed. angl. tab. p. 239.)

Meyer, zool. Entdeck. p. 54. n. 1. Motacilla (Australis) cinerea, subtus flava, gula fere albida. Götting. gelehrt. Anzeig. 1791. p. 50.

An *Motacilla aut Muscicapā*?

5. *Der Traquet vom Vorgebürge der guten Hoffnung.*

Büffon, ois. V. p. 233. Traquet du Cap de bonne esperance.

Büffon, Vögel, XV. p. 272. das Capische Weißkehlchen

Latham, Syn. II. 2. p. 450. n. 47. Var. A. Sybil Watbler.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 523. n. 51. Sylvia (operata) fusco-viridis, subtus uropygioque rufo-grisea, rectricibus duabus intermediis nigricantibus, lateralibus fulco-fulvo oblique dimidiatis.

Martini, Naturlex. V. p. 201. *Kapisches Weißkehlchen*.

Etwa das Weibchen von *Motacilla Sybilla*?

6. Motacilla (Cucullata) virens, subtus flava, fronte genisque nigris, cauda cuneiformi.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 528. n. 72. *Sylvia cucullata*.

Vielleicht eine Varietät von *Motacilla Mitrata*.

7. Motacilla (Minima) pallide fusca, subtus albida, rostro caudaque brevissima flavescentibus.

Latham, Syst. ornith. II. p. 529. n. 78. *Sylvia Minima*.

Vielleicht eine Varietät von *Motacilla Longipes*; oder von der nachher anzuführenden *Motacilla Pusilla*.

C. Neuere Gattungen.

1. Der Spitzkopf.

Bechstein: Naturforsch. XXVII. p. 43. n. 2. Motacilla (Longirostra) fronte fusca, et in fine caudae fuscae lineola flavescente.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 543. n. 21. *der Spitzkopf*.

2. Das Laubvögelchen.

Bechstein: Naturforsch. XXVII. p. 47. n. 4. Motacilla (Sibillatrix) superciliis luteis, supra virescens, subtus flavescens.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 544. n. 25. *das Laubvögelchen; der Zischer*.

3. Die gesperberte Grasmücke.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 537. n. 9. Motacilla Nisoria. *Die gesperberte Grasmücke; große Grasmücke; großer Feigenfresser*.

4. Die

4. *Die kleinliche Bachstelze.*

White, Voy. to new South - Wales, tab. p. 257.

White, Reis. nach Neufüdwallis; in dem Magaz. merkw. Reisebeschr. V. p. 128. *die kleinliche Bachstelze.*

Meyer, zool. Entdeck. p. 56. n. 3. Motacilla (Puffilla) fusca subtus pallida, cauda prope apicem fascia fusca.

5. *Die schöne Bachstelze.*

White, Reis. nach Neufüdwall. I. c. Motacilla elegans.

6. Motacilla (Sylviella) cinereo-fusca, subtus fordinde alba, rectricibus duabus intermediis brevioribus subalatis.

Latham, Syn. Suppl. p. 185. Lesser White-throat, tab. 113.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 515. n. 24. Sylvia Sylviella.

7. Motacilla (Canescens) fusco-canescens, subtus alba, capite nigro, fronte albo-striata, pectore crisoque striis nigris, macula alarum rectricum basi marginibusque fulvis.

Latham, Syn. Suppl. p. 187. Van Diemens Warbler.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 553. n. 168. Sylvia canescens.

Meyer, zool. Entdeck. p. 57. n. 5. Motacilla canescens.

8. Motacilla (Aequinoctialis) fusco-testacea, subtus alba, uropygio pallido, rectricibus fasciis obsoletis.

Latham, Syn. Suppl. p. 187. Equinoctial Warbler.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 553. n. 169. *Sylvia Aequinoctialis*.

Ist nicht mit *Motacilla Aequinoctialis* p. 972. n. 110. zu verwechseln.

9. *Motacilla (Nigricollis) subcristata*, supra pallide grisea, subtus incarnata, pileo cervice remigibus rectricibusque nigris.

Latham, Syn. Suppl. p. 187. Black-necked Warbler.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 553. n. 170. *Sylvia Nigricollis*.

10. *Motacilla (Plumbea) plumbea*, subtus cinerea, remigibus rectricibusque obscuris.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 553. n. 171. *Sylvia Plumbea*.

11. *Motacilla (Cambaiensis) fusco-nigricans*, subtus nigra nitida, abdomine imo criscoque rufo-ferrugineis, rectricibus alarum albis.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 554. n. 172. *Sylvia Cambaiensis*.

12. *Motacilla (Guzurata) virescens* subtus alba, vertice spadiceo, remigibus caudaque fuscis.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 554. n. 173. *Sylvia Guzurata*.

13. *Motacilla (Asiatica) fusca*, subtus flavicans, capite colloque nigris, loris gulaque albis, cauda elongata.

β. *Motacilla fusca*, fronte superciliis corporeque subtus albis, rectricibus lateralibus dimidiatis albis.

Latham, Syst. ornith. II. p. 554. n. 174. *Sylvia Asiatica*.

115. GESCHLECHT. PIPRA. *Der Manakin.*

Müller, Naturfyst. II. p. 621. Gen. CV. *Zeifig.*

Leske, Naturgesch. p. 264. Gen. XLVI.

Borowsky, Thierreich, III. p. 161. Gen. LXVI.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 192. Gen. XXXVII.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 550. Gen. LXXVI.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 190. Gen. LXXIX.

Onomat. hist. nat. VI. p. 521.

Briffon, ornithol. II. p. 166. Gen. LV. *Rupicola*, p. 167. Gen. LXI. *Manacus*.

Büffon, Vögel, XIII. p. 65. sqq.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 554. Gen. XLIV.

Hermann, tab. affin. anim. p. 222.

Donndorff, Handb. d. Thiergeesch. p. 389. Gen. XXXIV.

I. RUPICOLA. *Der Felsenhahn.*

Müller, Naturfyst. II. p. 621. n. 1. *der Steinzeifig.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 161. n. 1. *der Felsen-*
hahn, tab. 66.

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 193. n. 1.

Pipra (*Rupicola*) *crista erecta margin'e purpurea*,
corpo're croceo, *tectricibus rectricum truncatis*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 550. *der Felsenhahn*;
Bergzeifig.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 190. *der*
Felsenhahn.

Onomat. histor. natur. VI. p. 859. *der gelbe Wie-*
dehopf.

Briffon, ornith. II. p. 166. n. 1. *Coq-de-roche*.

Büffon, Vögel, XIII. p. 109. *der Klippenhahn.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 554. n. 1. *Pipra* (*Ru-*
picola) *crista erecta margin'e purpureo*, *corpo-*
re croceo, *tectricibus rectricum truncatis*.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 54. der *Wiedehopf*.
Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 748. der *Felsen-*
hahn.

Götz: Naturforsch. XIX. p. 78. der *Felsenhahn*.
Neueste Mannigfalt. II. p. 125. der *Felsenhahn*.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 21. n. 2. *Upupa cro-*
cea.

Barrere, Franc. equinox. p. 132. *Gallus ferus sa-*
xatilis, croceus, cristatus e plumis constructam
gerens.

Barrere, ornithol. Cl. 3. Gen. 21. sp. 2. *Upupa*
americana, crocea faxatilis.

Gerin, ornith. II. p. 64. tab. 206. *Upupa america-*
na lutea.

Bomare, diction. II. p. 628. Coq de roche.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 389. n. 1.
der Felsenhahn.

B. Der peruanische Felsenhahn. (6)

Büffon, Vögel, XIII. p. 115. der *peruanische Klip-*
penhahn; m. e. Fig.

Latham, Syn. II. 2. p. 519. n. 1. A. Peruvian Ma-
 nakin.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 555. n. 2. *Pipra (Pe-*
ruviana) corpore croceo-rubro, tectricibus ala-
rum maioribus cinereis, remigibus caudaque
nigris, tectricibus rectricum non truncatis.

Naturforsch. XVII. p. 14.

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 749. der *pe-*
ruvianische Felsenhahn.

2. PAREOLA. Der blaurückige Manakin.

Müller, Natursystem, II. p. 622. n. 2. der *Mei-*
senzeifig.

Borowsky, Thierreich, III. p. 162. n. 2. der *schwar-*
ze Manakin.

Briffon,

(6) Nach *Latham* eine eigene Gattung.

Briffon, ornithol. II. p. 172. n. 10. Manakin noir
hupé.

Büffon, Vögel, XIII. p. 70. der Tije oder große
Manaki; m. 2. Figg.

Latham, Syst. ornith. II. p. 555. n. 3. Pipra (Pa-
reola) crista sanguinea, corpore nigro, dorso
caeruleo.

Onomat. histor. natur. V. p. 29. Manacus cristatus
niger.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 58. der Manakin
mit blauem Rücken.

Jonston, av. p. 206. Tijeguacu Brasiliensibus.

14. SUPERBA. Der dreyfarbige Manakin.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 556. n. 4. Pipra
(Superba) aterrima, verticis mediis plumis lon-
giusculis et flammeo-rubris, dorsi inter alas
area lunata dilute caerulea, remigibus primori-
bus fuscescentibus.

Pallas, Naturgesch. merkw. Th. VI. p. 11. der
dreyfarbige Manakin, tab. 3. Fig. I.

Onomat. hist. nat. V. p. 31. Manacus superbus
Pall.

3. CRISTATA. Der purpurfarbige Manakin.

Müller, Natursyst. II. p. 622. n. 3. Haubenzeisig.

Halle, Vögel, p. 379. n. 374. der purpurfarbene
kleine Sperling mit dem güldnen Fließe.

Onomat. histor. natur. V. p. 29. gehaubter Roth-
schnabel.

Klein, av. p. 90. n. 14. Pässer cristatus, rostro
rubro.

Klein, Vorbereit. p. 167. n. 14. gehaupteter Roth-
schnabel.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 91. n. 13. gehaubter
Rothschnabel.

Briffon, ornith. II. p. 173. n. 12. Manakin rouge hupé.

Büffon, Vögel, XIII. p. 96. *Piticitli*, oder der ganz kleine und gekappte brasiliische Vogel.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 559. n. 15. Pipra (Cristata) crista lutea, corpore purpureo, cauda rubra.

Fermin, Surin. II. p. 176. das Surinamische Zeislein.

4. RUBETRA. Der rothgelbe Manakin.

Müller, Natursystem, II. p. 622. n. 4. der Gelbusch.

Halle, Vögel, p. 504. n. 566. das gelbrothe Kolibrispechtchen, mit zerscheiteltem Federbusche.

Onomat. hist. nat. V. p. 30. der Gelbschups.

Klein, av. p. 108. n. 10. Falcinellus rubetra.

Klein, Vorbereit. p. 199. Gelbschups.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 110. n. 13. Gelschopf.

Briffon, ornithol. II. p. 173. n. 11. Manakin roux hupé.

Büffon, Vögel, XIII. p. 94. *Rubetra*, oder der gekappte Amerikanische Vogel.

Latham, Syst. ornith. II. p. 559. n. 17. Pipra (Rubetra) crista lutea, corpore testaceo, remigibus rectricibusque testaceis (für caeruleis).

15. TORQUATA. Der Manakin mit dem Halsbande.

Briffon, ornithol. II. p. 172. n. 8. Manakin à collier.

Büffon, Vögel, XIII. p. 92. der Vogel, der bey den Brasilianern den Namen Maizi als Miacatotol führt.

Latham,

Latham, Syst. ornithol. II. p. 560. n. 18. Pipra (Torquata) nigra, capite rubro, collo torque aureo cincto, alis caeruleis, cauda nigra.

16. GRISEA. *Der graue Manakin.*

Halle, Vögel, p. 379. n. 376. *der buntflüglige Sperling mit liegendem Federbusche.*

Klein, av. p. 90. n. 16. Passer in occipite cristatus, crista plumacea dependente.

Klein, Vorbereit. p. 168. n. 16. *Straussperling.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 92. n. 15. *Straussperling.*

Briffon, ornithol. II. p. 174. n. 13. *Manakin gris hupé.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 98 *Coquantototl, oder der kleine gehüubte Vogel in Sperlingsgestalt.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 560. n. 20. Pipra (Grisea) cristata grisea, subtus flavescens, sin- cipite luteo, tectricibus alarum minoribus fla- vescientibus, maioribus rubris.

5. ALBIFRONS. *Der weißbuschige Manakin.*

Müller, Natursyst. II. p. 622. n. 5. *Weißbusch.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 183. *der Zartschnabel mit weißem Gesichte; m. e. Fig.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 560. n. 21. Pipra (Albifrons) crista alba, corpore rubro testaceo, dorso nigro, gutture albo nigro marginato, fe- moribus caerulecentibus.

Seligmann, Vögel, IX. tab. 34. *der Manakin mit weißem Gesichte.*

β. Büffon, Vögel, XIII. p. 100. *der weißstraußigte Manaki.*

Latham, Syn. II. 2. p. 531. n. 18. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 561. n. 21. β.

6. ERYTHROCEPHALA. Der goldköpfige Männakin.

Müller, Naturfyst. II. p. 622. n. 6. *der Goldkopf.*
 Onomat. hist. nat. V. p. 28. *der rothköpfige Dornreich, mit schwarzem Körper, purpurnen Rücken, und kurzem Schwanz.*
 Onomat. histor. natur. II. p. 827. *der Chichiltotol-vogel.*

Klein, av. p. 94. n. 7. *Linaria Mexicana.*
 Klein, Vorbereit. p. 175. n. 7. *gelber Dickkopf.*
 Klein, verb. Vögelhist. p. 100. *gelber Dickkopf.*
 Klein, av. p. 86. n. 13. *Parus auro-capillus.*
 Klein, Vorbereit. p. 161. n. 13. *rothköpfiger Dornreich.*
 Klein, verb. Vögelhist. p. 89. n. 13. *rothköpfiger Dornreich.*

Briffon, ornith. II. p. 169. n. 4. *Manakin à tête d'or.*
 Biiöffon, Vögel, XIII. p. 82. *der goldköpfigte Manaki; m. e. Fig.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 556. n. 7. *Pipra (Erythrocephala) nigra, vertice armillisque fulvis.*

Halle, Vögel, p. 363. n. 354. *die schwarze goldköpfige Meise.*

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 747. *der weiß-kuppichte Manakin.*

Halle, Vögel, p. 395. n. 401. *der amerikanische schwarze Hänfling mit goldfarbenem Kopfe.*

Seligmann, Vögel, I. tab. 41. *die schwarze Meise mit dem goldfarbenem Kopf.*

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 203. n. 248. *die schwarze Meise mit rothgelbem Kopf.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 191. n. 10. *Parus (Erythrocephalus) niger capite femoribusque fulvis.*

Petiv. Gaz. tab. 46. Fig. 7. *Avicula nigra*, capite
e luteo croceo.

Seba, mus. I. p. 96. tab. 60. Fig. 7. *Avicula Me-*
xicana de Chichiltototl.

β. *Der rothköpfige Manakin.* (?)

Halle, Vögel, p. 395. n. 401. *der amerikanische*
schwarze Hänfling, mit rothem Kopfe.

Onomat. hist. nat. V. p. 31. *Manacus rubro-capillus.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 100. n. 7. *rother Dickkopf.*

Briffon, ornithol. II. p. 170. n. 5. *Manakin à tête*
rouge.

Büffon, Vögel, XIII. p. 82. *der rothköpfige Manaki.*

Latham, Syn. II. 2. p. 523. n. 5. A.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 557. n. 8. *Pipra ni-*
gra, vertice armillisque rubris.

Salerne, ornith. p. 250. *Tangara appellé Manakin.*

Fonston, av. p. 209. *Tangarae secunda species*
Brasiliensibus.

7. AUREOLA. *Der roth und schwarze Manakin.*

Müller, Naturhist. II. p. 623. n. 7. *der Rothkopf.*

Briffon, ornith. II. p. 170. n. 6. *Manakin rouge.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 76. *der rothe Manaki;*
m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 558. n. 11. *Pipra*
(*Aureola*) *nigra capite pectoreque coccineis, re-*
miribus antrorsum macula alba.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 51. *der rothe und*
schwarze Manakin.

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 747. *der rothe*
Manakin.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 191. n. 11. *Parus*
(*Aureola*) *niger, capite pectoreque coccineis,*
remigibus antrorsum macula alba.

β. Der schwarz und gelbe Manakin. (8)

Briffon, ornithol. II. p. 171. n. 7 Manakin orangé.

Büffon, Vögel, XIII. p. 80. der pomeranzenfarbigte Manaki; m. e. Fig.

Latham, Syn. II. 2. p. 525. n. 9. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 558. n. II. β. P. nigra, capite collo inferiore pectore abdomine marginibusque alarum aurantiis, remigibus intus macula alba.

Samml. zur Phys und N. G. II. p. 747. der orangefarbene Manakin.

8. LEUCOCEPHALA. Der weißköpfige Manakin.

Müller, Natursyst. II. p. 623. n. 8. der Weißkopf.

Onomat. hist. nat. VI. p. 521. der Weißkopf.

Büffon, Vögel, XIII. p. 107. die weißköpfige Surinamische Pipra.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 557. n. 9. Pipra (Leucocephala) nigra, capite albo.

9. LEUCOCAPILLA. Der weißkappige Manakin.

Müller, Natursystem, II. p. 623. n. 9. der Rohrzeifig.

Borowsky, Thierreich, III. p. 162. n. 3. der weißgehäubte Manakin.

Hölle, Vögel, p. 379. n. 377. der schwarze Sperling, mit weißer Opferhaube; Schleiersperling.

Onomat. hist. nat. V. p. 28. Manacus albo-capillus.

Klein, av. p. 90. n. 17. Passer toto corpore niger, vitta alba.

Klein, Vorbereit. p. 168. n. 17. Weißkopf.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 92. n. 16. Weißkopf, p. 168. weißköpfige Meise.

Briffon, ornithol. II. p. 169. n. 3. Manakin à tête blanche.

Büffon,

(8) Nach *Briffon* und *Büffon* eine eigene Gattung.

Büffon, Vögel, XIII. p. 82. *der weissköpfige Manaki*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 557. n. 8. *Pipra* (*Leucocapilla*) *atra*, *pileo albo*.

Seligmann, Vögel, VII. tab. 5. *der weissgekappte Manakin*.

Linneé, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 190. n. 9. *Parus* (*Pipra*) *ater*, *capite supra albo*.

Seba, II. p. 102. tab. 96. Fig. 5. *Avis de Cacatototl toto corpore nigra, cum vitta alba*.

10. GUTTURALIS. *Der weisskehlige Manakin.*

Müller, Natursyst. II. p. 623. n. 10. *Weisskehlenchen*.

Onomat. hist. nat. V. p. 30. *Manacus gutture albo*.

Briffon, ornith. II. p. 168. n. 2. *Manakin à gorge blanche*.

Büffon, Vögel, XIII. p. 89. *der weisskehligte Manaki*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 557. n. 10. *Pipra* (*Gutturalis*) *nigra*, *gutture albo*.

11. SERENA. *Der weissstirnige Manakin.*

Müller, Natursyst. II. p. 624. n. 11. *der Luftling*.

Onomat. hist. nat. V. p. 27. *Manacus alba fronte*.

Briffon, ornithol. II. p. 172. n. 9. *Manakin à front blanc*.

Büffon, Vögel, XIII. p. 91. *der weissstirnigte Manaki*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 556. n. 5. *Pipra* (*Serena*) *nigra*, *fronte alba, uropygio cyaneo, ventre fulvo*.

12. MANACUS. *Der schwarzkappige Manakin.*

Müller, Natursyst. II. p. 624. n. 12. *der Weißnacken*.

Onomat.

Onomat. hist. nat. V. p. 27. *der Manakin.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 167. n. 5. *schwarzköpfige Grasmücke.*

Brisson, ornithol. II. p. 168. n. 1. *Manakin.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 73. *der schwarzkappige Manaki;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 556. n. 6. *Pipra* (*Manacus*) *nigra subtus alba, macula cervicis alarumque alba.*

Seligmann, Vögel, VII. tab. 50. *der schwarzgekappte Manakin.*

Säminl. zur Phys. u. Naturgesch. II. p. 747. *der schwarzgekappte Manakin, oder Nußknacker.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 389. n. 2. *der Nußknacker.*

B. *Latham,* Syst. ornithol. II. p. 556. n. 6. *B.*

13. MINUTA. *Der kleine Manakin.*

Müller, Natursyst. II. p. 624. n. 13. *Zwergzeifig.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 108. *der kleinste Manakin.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 558. n. 12. *Pipra* (*Minuta*) *grisea, capite nigro albo punctato, pectore flavescente, lineis transversis nigris.*

Linneé, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 189. n. 34. *Mo-*
tacilla (*Minuta*) *grisea, capite nigro, punctis*
albis sparsis. (9)

17. STRIATA. *Der Manakin mit gestreiftem Kopfe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 558. n. 13. *Pipra* (*Striata*) *cinereo-fusca, subtus flavesens, vertice nigro, striis albis, loris remigibusque se-*
cundariis apice flavis, alula rectriceque extima
apice albis.

18. NAE-

(9) *Pallas* vermutet, dass dies Synonym, so wie *Mus. Ad. Frid.* 2. p. 24. zu *Xanx Minutissima* p. 423. n. 2. gehöre. *S. nord.*
Beytr. III. p. 5.

18. NAEVIA. *Der gefleckte Manakin.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 71. *der gefleckte Fliegen-schnäpper von Cayenne.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 559. n. 14. Pipra (Naevia) fusca, subtus fulva, gula iuguloque nigris, pectore fascia alarum bifida rectricibusque apice albis.

19. LEUCOTIS. *Der weißohrige Manakin.*

Ist wohl mit *Turdus Auritus*. p. 827. n. 94. einerley. S. Latham, Syst. ornithol. I. p. 360. n. 123.

20. ATRICAPILLA. *Der schwarzgekrönte Manakin.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 104. *der aschgraue Manaki; m. e. Fig.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 561. n. 22. Pipra (Atricapilla) cinerea, subtus griseo-alba, rectricibus alarum maioribus, remigibusque nigricantibus, vertice nigro.

21. PAPUENSIS. *Der Orangen-Manakin.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 166. *der Orangen-Manaki.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 561. n. 23. Pipra (Papuensis) nigro virescens, subtus albida, pectore macula ovata fulva, rectricibus 2. intermediis brevioribus.

22. HAEMORRHOA. *Der Manakin mit rothem After.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 561. n. 24. Pipra (Haemorrhoa) nigricans, subtus alba, crisco macula coccinea.

23. NIGRICOLLIS. *Der schwarzkehlige Manakin.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 561. n. 25. *Pipra* (*Nigricollis*) *nigro-caeruleascens* *subtus alba*, *gula crisoque nigris.*

24. CAPENSIS. *Der capsche Manakin.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 561. n. 26. *Pipra* (*Capensis*) *obscura* *subtus fulvo-flavescens.*

25. CINEREA. *Der aschgraue Manakin.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 562. n. 27. *Pipra* (*Cinerea*) *cinerea*, *abdomine cinereo-albido.*

26. MUSICA. *Der Organist.*

Büffon, Vögel, XII. p. 89. *der Organist*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 562. n. 28. *Pipra* (*Musica*) *nigricans*, *corpore subtus uropygioque fulvis*, *gutturē genisque nigris*, *vertice nuchaque caeruleis*, *fronte flava.*

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 734. *der Organist.*

A. Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Das Geschlecht ist mit *dreyzehn* Gattungen vermehrt. Bey der *1sten* Gattung sind *zwey*, bey der *5ten* *zwey*, und bey der *12ten* gleichfalls *zwey* Varietäten auseinander gesetzt.

B. Unbestimmtere Thiere.

1. *Pipra* (*Picicitli*) *cinerea*, *capite colloque atris*, *macula candente*, *oculos ambiente*, *acumine in pectus usque procedente.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 559. n. 16.

Fernand, nov. Hisp. p. 53. 6. CC. *Avis Picicitli Tetzcoquensis.*

Büffon,

Büffon, Vögel, XIII. p. 97. 98. der Mexikanische
Picitili.

An vere Pipra?

2. *Pipra* (*Miacatotol*) nigra, plumis cudentibus
intersertis, ventre pallente, alis caudaque in-
ferne cinereis.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 560. n. 19.

Fernand, nov. Hisp. p. 30. *Miacatotol*, seu avis
germinis Maizi.

Büffon, Vögel, XIII. p. 92. der Vogel, der bey
den Brasilianern den Namen *Maizi de Miacatotol* führt.

An Pipra?

116. GESCHLECHT. PARUS. *Die Meise.* (Maise.)

Müller, Natursyst. II. p. 625. Gen. CXVI.

Leske, Naturgeschichte, p. 264. Gen. XLVI.

Borowsky, Thierreich, III. p. 177. Gen. LXXI.

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 194. Gen.
XXXVIII.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 546. Gen. LXXV.

Funke, Naturgesch. I. p. 272.

Ebert, Naturl. II. p. 146.

Halle, Vögel, p. 354. Gen. IX.

Pennant, auct. Zool. II. p. 395.

Neuer Schaupl. d. Nat. V. p. 584.

Onomat. hist. nat. V. p. 176.

Klein, av. p. 84 Gen. IX.

Briffon, ornithol. I. p. 461. Gen. XLI.

Büffon, Vögel, XVII. p. 8. sqq.

Batsch, Thiere, I. p. 318. Gen. LXXIX.

Latham, Syst. ornith. II. p. 562. Gen. XLV.

Hermann, tab. affin. anim. p. 224.

Donn-

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 390. Gen. LXXXV.

I. BICOLOR. *Die amerikanische Haubenmeise.*

Müller, Natursyst. II. p. 625. n. 1. *die zweyfarbige Meise.*

Halle, Vögel, p. 363. n. 352. *die graue Haubenmeise.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 395. n. 241. *die amerikanische Haubenmeise.*

Klein, av. p. 86. n. 12. *Parus cristatus pectoris rubro.*

Klein, Vorbereit. p. 161. n. 12. *rothbrüstige Kobelmeise.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 89. n. 12. *rothbrüstige Kobelmeise.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 179. *die zweyfarbige Meise.*

Brisson, ornith. I. p. 468. n. 9. *Mesange huppée de la Caroline.*

Büffon, Vögel, XVII. p. 142. *die carolinische Schopfmeise*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 567. n. 13. *Parus (Bicolor) capite cristato, antice nigro, corpore cinereo, subtus ex albido rufescente.*

Seligmann, Vögel, III. tab. 14. *die gehaubte Meise.*

Naturgesch. a. d. best. Schriftst. Vögel, p. 848. *die carolinische Haubenmeise.*

Müller, zool. dan. prodr. p. IX. *Parus (Bicolor) capite cristato antice nigro, corpore cinereo, subtus ex albido rufescente.*

2. CRISTATUS. *Die (gemeine) Haubenmeise.* (10)

Müller, Natursyst. II. p. 626. n. 2. *die Haubenmeise.*

Leske,

(10) Brütet nicht selten auch in Eichhörnchen-Bauen (Kobeln) daher der Name *Kobelmeise*. Legt rundliche, weisse, am stumpfen

Leske, Naturgesch. p. 264. n. 1. *die Haubenmeise*.
Borowsky, Thierreich, III. p. 179. n. 2. *die Haubenmeise*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 548. n. 4. *die Haubenmeise*.

Funke, Naturgesch. I. p. 272. *die Haubenmeise*.

Ebert, Naturl. II. p. 147. *die Haubenmeise*.

Halle, Vögel, p. 358. n. 347. *die Haubenmeise*.

Meyer, Thiere, II. tab. 26. *die Hauben-Meise*.

Gatterer, vom Nutz. u Sch. d. Th. II. p. 433. n. 379. *die Haubenmeise*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 400. F. *die Haubenmeise*.

Onomat. hist. nat. VI. p. 183. *die Haubenmeise*.

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 138. *Haubenmeise*; *Kappmeise*.

Klein, av. p. 85. n. 6. *Parus cristatus*.

Kein, Vorbereit. p. 159. n. 6. *Haubenmeise*; *Kobel-Schopff-Straus-Haubel-Heidenmeise*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 88. n. 6. *Haubenmeise*.

Klein, Vogeleyer, p. 29. tab. 4. Fig. II.

Gesner, Vögelb. p. 378. *Kobelmeißlein*; *Straußmeißlein*; *Heydenmeißlein*; m. e. schl Fig.

Brisson, ornith. I. p. 466. n. 8. *Mesange hupée*.

Büffon, Vögel, XVII. p. 134 *die Schopfmeise*; m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 359. *die Haubenmeise*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 567. n. 14. *Parus (Cristatus) griseo-rufescens cristatus, collari nigro, ventre albo*.

Beseke, Vögel Kurl. p. 84. n. 191. *die Haubenmeise*.

Siemßen,

pfen Ende röhlich punctirte Eyer. — Die Haube besteht aus schwarz und weissen Schuppen, die nach dem Wirbel zu immer länger werden, und daselbst einen Schopf bilden.

- Siemßen*, meklenb. Vögel., p. 142. n. 1. *Haubenmeise*; *Töppelmeesken*.
- Bock*, N. G. von Preuß. IV. p. 443. die *Haubenmeise*.
- Fischer*, Livil. p. 104. n. 174. *Haubenmeise*.
- Pontoppidan*, Dännem. p. 175. n. 1 *Topmeiso*.
- Scopoli*, Bem. a. d. N. G. I. p. 199. n. 243. die *Schopfmeise*.
- Storr*, Alpentreis. I. p. 80. *Parus cristatus*.
- Zorn*, Petinotheol. II. p. 365. die *Schopf-Meise*.
- Angenehme Landlust, p. 223. die *Schopfmeise*.
- Naturforsch. XVII. p. 107. n. 221. die *Haubenmeise*.
- Döbel*, Jägerprakt. I. p. 66. die *Kupp-Meise*.
- Borkhausen*, Magaz. I. p. 197. n. 77. *Haubenmeise*; *Meisenkönig*.
- André u. Bechstein*, Spazierg. II. p. 409. die *Haubenmeise*.
- Onomat. forestal. II. p. 808. die *Kuppmeise*; *Kupfmeise*; *Haubelmeise*.
- Börner*, schles. ökon. Nachr. 781. p. 107. *Parus cristatus*.
- Tänzer*, notab. Venator. p. 107. *Kupp-Meise*.
- Anweis. Vögel zu fang. p. 373. *Schopfmeise*.
- Linné*, Syst. Nat. Edit. II. p. 57. *Parus cristatus*.
- Linné*, Syst. Nat. Ed. VI. p. 32. n. 2. *Parus cristatus*.
- Linné*, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 189. n. 1. *Parus (Cristatus) capite cristato*.
- Charleton*, onom. zoic. p. 90. n. 5. *Parus cristatus*.
- Schwenckfeld*, av. Siles. p. 321. *Parus cristatus*. *Straus-Meisin*; *Kobelmeise*; *Heubel-Meise*.
- Rzaczynsky*, auct. hist. nat. Pol. p. 404. *Parus cristatus*.
- Fonston*, av. p. 120. *Parus cristatus*.

Barrere, Sp. nov. Cl. 3. Gen 24. p. 49. *Parus cristatus*.

Salerne, ornith. p. 156. *Mésange coiffeté à bouquet*, à perruche; *Mésange crêtée*, *hupée*, *chaperonnée*.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 390. n. 1. *die Haubenmeise*.

3. MAIOR. Die Kohlmeise. (1)

Müller, Natursyst. II. p. 626. n. 3. *die Kohlmeise*.

Leske, Naturgesch. p. 265. n. 2. *die Kolmeise*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 180. n. 3. *die Kohl-, Brand-, Spiegel-, Finkmeise*.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 194. n. 1. *Parus (Maior) capite nigro, temporibus albis, nucha lutea*; *die Kohlmeise*, *Pickmeise*; *Finkmeise*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 547. n. 1. *die Kohlmeise*.

Funke, Naturgesch. I. p. 272. *die Kohlmeise*.

Ebert, Naturl. II. p. 146. *die Kohlmaise*.

Halle, Vögel, p. 354. n. 343. *die große schwarze Maise*, mit weißen Schläfen und gelbem Nacken.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 343. n. 380. *die Kohlmeise*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 398. A. *die Kohlmeise*.

Onomat. hist. nat. VI. p. 185. *die große schwarze Maise*.

Bbb 2

Handb.

(1) *Kohlmeise*, *Kohlenmeise*, wegen ihrer kohlenschwarzen Kopfplatte, oder weil sie in den Mauern einzelner Häuser nahe an den Wäldern, z. E. der Kohlenbrenner nistet. — *Spiegelmeise* von der glänzend schwarzen Kopfplatte. — *Finkmeise* von ihrem, dem Finkenschlage nicht ganz unähnlichen Gesange; — *Speckmeise*, *Schinkenmeise*, weil sie des Winters oft in die Häuser kommen, und Löcher in den Speck fressen. — Tötet Vögel, z. E. Goldammer, graue Ammer, so gar Finken, und frisst ihnen das Gehirn aus. Ja man weiß Beispiele, dass diese Meisen schlafenden kleinen Kindern die Augen ausgehackt haben. Dass sie den Bienenitöcken nachtheilig sind, hat schon Aelian bemerkt. Das Fleisch ist essbar, hat aber einen etwas bitteren Geschmack. — Wird etwa 5. bis 6. Jahr alt.

- Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 138. *Kohlmeise.*
Klein, av. p. 94. n. 1. *Parus major*
Klein, Vorbereit. p. 158. n. 1. *Kohlmeise*; *Spiegel-*,
Brand -, *große Meise*.
Klein, verb. Vögelhist. p. 87. n. 1. *Kohlmeise*.
Klin, Stemmat. av. p. 16. tab. 17. Fig. 8. a. b.
Gesner, Vögelb. p. 376. *große oder Spiegelmeise*;
 m. e. zieml. gut. Fig.
Briffon, ornith. I. p. 461. n. 1. *grosse Mésange ou*
Charbonniere.
Biffon, Vögel, XVII. p. 29. *die große oder*
Kohlmeise; m. e. Fig.
Batsch, Thiere, I. p. 359. *die Kohlmeise*.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 562. n. 1. *Parus*
 (*Maior*) *viridi-olivaceus subtus flavescens, capite nigro, temporibus albis, gula lutea*.
Beske, Vögel Kurl. p. 84. n. 192. *die Kohlmeise*.
Siemßen, meklenb. Vögel, p. 143. n. 3. *die große*
Kohlmeise.
Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 443. *die Kohlmeise*.
Fischer, Livil. p. 103. n. 172. *große Meise*.
Cetti, Sardin. II. p. 225. *die große Art*.
White, N. G. von Engl. p. 65. n. 2. *Spiegel-*
meise.
Pontoppidan, Dännem. p. 175. n. 2. *Musvit*.
Pontoppidan, Norweg. II. p. 155. *Kiöd-Meise*;
Musvit; *Talg-Oxe*.
Pallas, nord. Beytr. IV. p. 10. *die große Meise*.
Linné, Abhandl. II. p. 306. n. 141. *die Kohlmeise*.
 Schwed. Abhandl. XXXVIII. p. 298. *Kohlmeise*.
 Naturforsch. XVII. p. 107. n. 122. *die Kohlmeise*.
Döbel, Jägerprakt. I. p. 66. *die Piss- oder Groß-*
meise.
Naumann, Vogelsteller, p. 139. *die Kohlmeise*.
Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 199. n. 242. *die*
Kohlmeise.

Zorn,

- Zorn, Petinotheol. II. p. 358. *die Kohl-Meise.*
Angenehme Landlust, p. 219. *die Kohlmeise.*
Auweis. Vögel zu fang. p. 369. *die Kohlmeise.*
Onomat. forestal. II. p. 803. *Pickmeise; Großmeise.*
Börner, schles. ökon. Nachr. 1781. p. 107.
Goffroy, mat. med. VII. p. 59. *die große oder Kohlmeise.*
Tänzer, notabil. Venator. p. 107. *die Schwartz-Meise.*
Eberhard, Thiergesch. p. 85. *die große Meise.*
Goeze, Natur, Menschenl. u. Vorf. VI. p. 86. *Kohlmeise.*
Anré u. Bechstein, Spatzierg. I. p. 282. *die Kohlmeise.*
Naturgesch. a. d. best. Schriftst. Vögel, p. 825. *die Kohlmeise.*
Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 57. *Parus maior.*
Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 32. n. 1. *Parus maior.*
Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 189. n. 2. *Parus (Maior) capite nigro, temporibus albis, nucha lutea.*
Charleton, onom. zoic. p. 90. n. 1. *Parus maior.*
Möhring, av. gen. p. 45. n. 36. *Parus.*
Schwenkfeld, av. Siles. p. 318. *Parus Carbonarius, Fringillago. Kol-Meise; Spiegel-Meise; Brand-Meise, große Meise.*
Sibbald, Scot. illustr. II. 3. p. 18. *Parus maior.*
Rzaczynsky, aust. hist. nat. Pol. p. 403. *Parus Carbonarius.*
Jonston, av. p. 120. *Parus maior.*
Journal de physique Aout. 1776. p. 127. *Serre-fine; Bargne, etc.*
Belon, nat. des ois. p. 376. *Premiere éspce de Mésange, Mesange, Nonnette.*

Schaefer, element. ornithol. tab. 52.

Faun. Arragon. p. 90. n. 1.

Aristot. hist. anim. L. 8. c. 3. Αιγυθαλος.

Aelian. de nat. anim. L. 1. c. 58. Αιγυθαλος.

Donndorff, Handb. d. Thiergefch. p. 391. n. 2.
die Kohlmeise.

β. *P. fusco-olivaceus*, subtus sordide flavicans, capite nigro, temporibus cinereis, rostro forficato. *

Latham, Syst. ornith. II. p. 563. n. 1. β.

Levin, britt. Birds. I. t. tit. praef. Cross - billed Titmouse.

γ. *Die kleinere Kohlmeise.* *

Büffon, Vögel, XVII. p. 43. die kleine Kohlmeise,
kleine Speckmeise.

16. CYANEUS. *Die lasurblaue Meise.*

Brisson, ornith. I. p. 463. n. 3. grosse Mélange bleue.

Büffon, Vögel, XVII. p. 153. die grosse blaue Meise; m. e. Fig.

Pennant, arct. Zool. II. p. 399. C. die lasurblaue Meise.

Latham, Syn. Suppl. p. 189. Azure Titmouse.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 563. n. 3. Parus (Cyanus) dilute caeruleus, subtus albus, uropygio et vertice cano-albidis, cervicis albae fascia lata, humeris tectricibusque caudae caeruleis.

Lepechin, Nov. comment. Petrop. XIV. p. 498. tab. 13. Fig. 1. Parus dorso caeruleo, etc.

Jonston, av. pag. 120. Parus indicus.

15. IGNOTUS. *Die Strömsche Meise.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 398. B. die Strömsche Meise.

Büffon,

Büffon, Vögel, XVII. p. 162. die unbekannte Mei-
se des Ström.

Latham, Syst. ornith. II. p. 563. n. 2. Parus (Stroe-
mei) viridi-flavescens, pectore rufo-macula-
to, abdomine caeruleo, cauda forticata, re-
ctricibus duabus exterioribus extus albis.

4. AMERICANUS. Die Kriechmeise. (2)

Müller, Natursyst. II. p. 626. n. 4. die amerika-
nische Meise.

Pennant, arch. Zool. II. p. 396. n. 243. die Kriech-
meise.

Onomat. hist. nat. VI. p. 177. die amerikanische
Finkenmeise.

Briffon, ornithol. I. p. 452. n. 66. Figuier cen-
dré de la Caroline.

Büffon, Vögel, XVI. p. 124. der aschgraue Fei-
genfresser mit dem Halskragen.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 571. n. 28. Parus
(Americanus) caerulescens, temporibus pecto-
re dorsoque flavescentibus, hypochondriis pur-
purascientibus.

Seligmann, Vögel, III. tab. 28. Finkmeise.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 190. n. 4. Parus
(Americanus) caerulescens, temporibus pecto-
re dorsoque flavescentibus, hypochondriis pur-
purascientibus.

Hermann, tab. affin. anim. p. 225. Parus ameri-
canus.

(2) Büffons Figuier de la Caroline, und Figuier cendré à collier,
rechnet Latham zu Motacilla Americana, p. 960. Ueberhaupt
werden die Synonymen hier sehr verwechselt. Ob dies auch
eine Meise seyn mag?

5. CAERULEUS. Die Blaumeise. (3)

Müller, Natursyst. II. p. 627. n. 5. die Blaumeise.

Leske, Naturgesch. p. 265. n. 3. die Blaumeise.

Borowsky, Thierreich, III. p. 180. n. 4. die Blau-, Pimpel-, Käsemeise.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 194. n. 2. *Parus (Caeruleus) remigibus caerulecentibus: primo-ribus margine exteriori albis, fronte alba, vertice caeruleo. Blaumeise, Jungfermeise; Blau-müller.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 548. n. 5. die Blaumeise.

Funke, Naturgesch. I. p. 273. *Blaumeise*.

Ebert, Naturl. II. p. 147. *Blaumeise*.

Halle, Vögel, p. 356. n. 345. die blaue Maisé; Fig. 21.

Meyer, Thiere, I. tab. 33. *Blau-Meise*.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 434. n. 381. *Blaumeise, Mehlmeise; Meelmeise*, etc.

Pennant, arct. Zool. II. p. 399 D. die Blaumeise.

Onomat. hist. nat. VI. p. 180 die blaue Maisé.

Handb. der deutsch. Thiergeesch. p. 138. *Blau-maise; Braubling*, etc.

Klein, av. p. 85. n. 3. *Parus caernleus*.

Klein, Vorbereit. p. 158. n. 3. *Blaumeistein, Käsemeischen*.

Klein, verb. Vögelh. p. 87. n. 3. *Blaumeise*.

Klein, Stemmat. av. p. 16. tab. 17. fig. 10. a. b.

Klein, Vögeleyer, p. 29. tab. 4. Fig. 10.

Gesner, Vögelb. p. 376. *Blaumrise; Mehlmeisselein*.

Briffon, ornith. I. p. 462. n. 2. *Mésange bleue*.

Büffon, Vögel, XVII. p. 75. die blaue Meise; m. e. Fig.

Batsch,

(3) Gewicht, nach Büffon, drey Drachmen.

Batsch, Thiere, I. p. 359. die Blaumeise.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 566. n. 12. Parus (Caeruleus) olivaceo-virescens, subtus luteus, remigibus caeruleiscentibus, primoribus margine exteriore albis, fronte alba, vertice caeruleo.

Beseke, Vögel Kurl. p. 84. n. 193. die Blaumeise.

Siemßen, meklenb. Vög. p. 144. n. 3. die Blaumeise.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 444. die spechtartige Blaumeise.

Fischer, Liv. p. 103. n. 173. Blaumeise.

Cetti, Sardin. II. p. 225. Parus caeruleus.

Pallas, Reis. Ausz. III. p. 475. Blaumeise.

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 10. die blaue Meise.

Pontoppidan, Dännem. p. 175. Blaaemeise.

Storr, Alpenreise, I. p. 80. Parus caeruleus.

Scopoli, Beitr. aus der N. G. I. p. 200. n. 244. die Blaumeise.

Naturforsch. XVII. p. 107. n. 223. die Blaumeise.

Döbel, Jägerprakt. I. p. 66. n. 3. Blau- oder Mehlmeise.

Naumann, Vogelsteller, p. 139. Pümpelmeise oder Blaumeise.

Borkhausen, Magaz. I. p. 199. n. 79. Blaumeise.

Zorn, Petinotheol. II. p. 361. die Blau-Meise.

Angenehme Landlust, p. 221. Blaumeise.

Onomat. forestal. II. p. 806. Blaumeise; Pimpelmeise.

Börner, schles. ökonom. Nachr. 1781. p. 107. Parus caeruleus.

Anweis. Vögel zu fang. p. 371. Blaumeise.

Wirsing, Vögel, tab. 32. -- Günther, Nest. u. Ei. tab. 66. Blaumeise.

Goeze, Allerl. II. p. 396. n. 16. Blaumeise.

- Goeze**, Natur, Menschenl. u. Vorf. VI. p. 101.
Blaumeise.
- André und Bechstein**, Spazierg. II. p. 370. *Blaumeise*.
- Linné**, Syst. Nat. Edit. VI. p. 32. n. 3. *Parus caeruleus*.
- Linné**, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 190. n. 4. *Parus (Caeruleus) remigibus caerulecentibus: primis marginis exteriore albis, fronte alba, vertice caeruleo*.
- Charleton**, onomast. zoic. p. 90. n. 2. *Parus minor*.
- Kramer**, Austr. p. 379. n. 3. *Parus remigibus caerulecentibus: prima margine exteriore alba; vertice caeruleo; Blaumeise*.
- Schwenkfeld**, av. Siles. p. 320. *Parus caeruleus*.
Parus montanus. *Blaum-Miſlin*; *Meel-Meise*; *Bin-Meise*; *Pimp-l-Meise*.
- Sibbald**, Scot. illustr. II. 3. p. 18. *Parus caeruleus*.
- Rzaczynsky**, auct. hist. nat. Pol. p. 403. *Parus caeruleus*.
- Fonfton**, av. p. 120. *Parus caeruleus*.
- Belon**, hist. nat. des oif. p. 369. *Mesange bleue*; *Marenge*.
- Salerne**, ornith. p. 212. *petite Ardelle*.
- Zinnan**. Uov. p. 76. tab. II. Fig. 68. *Parozolino o Fratino*.
- Faun. Arragon.** p. 90.
- Hermann**, tab. affin. anim. p. 225. *Parus caeruleus*.
- Donndorff**, Handb. der Thiergesch. p. 391. n. 3. *die Blaumeise*.
- B.** P. capite remigibus rectricibusque sordide albis, dorso pallide viridi, abdomine pallide flavo. *
- Günther**: Naturforsch. I. p. 63. n. 14. *weiße Blaumeise*.

γ. P. cinereus, dorso flavescente, rostro pedibusque pallidioribus. *

Götz: Naturforsch. XVI. p. 48. n. 2.

17. SAEBYENSIS. *Die Säbysche Meise.* (5)

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. III. p. 597.
not. * I.

Büffon, Vögel, XVII. p. 84. *die Säbysche Meise;*
m. e. Fig.

6. ATRICAPILLUS. *Die schwarzköpfige canadische Meise.*

Müller, Natursyst. II. p. 627. n. 6. *das Schwarzköpfchen.*

Pennant, act. Zool. II. p. 397. n. 245. *die canadische Meise.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 178. *die Meise aus Canada.*

Briffon, ornithol. I. p. 464. n. 6. *Mesange à tête noire de Canada.*

Büffon, Vögel, XVII. p. 67. *die schwarzköpfige kanadensische Meise.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 566. n. 10. Parus (Atricapillus) pileo gulaque nigris, corpore cinereo subtus albo.

Philos. Transact. LXII. p. 407.

7. ATER. *Die Tannenmeise.* (6)

Müller, Natursyst. II. p. 627. n. 7. *die Tannenmeise.*

Leske, Naturgeschichte, p. 265. n. 4. *die Tannenmeise.*

Borows-

(5) Nach Latham mit *Parus Cyanus* p. 1007. einerley. Auch Bechstein ist der Meinung.

(6) Ich begreife noch nicht, wie Latham Cetti's *Cingallegra* hier anführen kann. Nach Cetti's Beschreibung muss dies *Parus Caernensis* seyn.

- Borowsky*, Thierreich, III. p. 181. n. 5. die Tannenmeise; kleine Kohlmeise; Holzmeise; Waldmeise.
- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 547. n. 2. die Tannenmeise.
- Funke*, Naturgesch. I. p. 273. die Tannenmeise.
- Ebert*, Naturl. II. p. 146. die Tannenmaise.
- Halle*, Vögel, p. 356. n. 344. die Tannenmaise.
- Gatterer*, vom Nutz. und Schad. der Thiere II. p. 434. n. 382. die Tannenmeise; Hundsmeise; Sperrmeise; Kreuzmeise.
- Pennant*, arct. Zool. II. p. 396. n. 244. die Tannenmeise.
- Onomat. hist. nat. VI. p. 177. die Tannenmaise.
- Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 138. Tannenmaise.
- Klein*, av. p. 85. n. 2. *Parus sylvaticus*.
- Klein*, Vorbereit. p. 158. n. 2. *Tannenmeise*; *Wald-, klein Kohlmeise*.
- Klein*, verb. Vögelhist. p. 87. n. 2. *Tannenmeise*; *Hundsmeise*.
- Klein*, stemmat. av. p. 16. tab. 17. fig. 9. a. b. *Parus carbonarius*.
- Gesner*, Vögelb. p. 377. *Kohlmeiß*; m. e. schl. Figur.
- Briffon*, ornithol. I. p. 464. n. 5. *Mésange à tête noire*.
- Briffon*, Vögel, XVII. p. 44. die kleine Kohlmeise; m. e. Fig.
- Batsch*. Thiere, I. p. 359. die Tannenmaise.
- Latham*, Syst. ornithol. II. p. 564. n. 8. *Parus (Ater) dorso cinereo, capite nigro, occipite pectoreque albo*.
- Beseke*, Vögel Kurl. p. 84. n. 194. die Tannenmeise.

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 145. n. 4. die kleine Kohlmeise.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 444. die graue Waldmeise.

Fischer, Liv. p. 104. n. 175. Tannenmeise.

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 10. die schwarze Meise.

Zorn, Petinotheol. II. p. 362. die Tann-Meise.

Sopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 201. n. 245. die Schwarzmeise; Sperrmeise.

Naturforsch. XVII. p. 108. n. 224. die Tannenmeise.

Naumann, Vogelsteller, p. 139. die Tannenmeise.

André u. Bechstein, Spazierg. II. p. 276. Tannenmeise.

Angenehme Landlust, p. 222. die Holzmeise.

Onomatol. forestal. II. p. 307. Waldmeise; Holzmeise.

Anweis. Vögel zu sang. p. 372. Holzmeise.

Wirsing, Vögel, tab. 59. Tannenmeise.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 32. n. 4. *Parus ater*.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 190. n. 5. *Parus (Ater) capite nigro, dorso cinereo, occipite pectoreque albo*.

Charleton, onom. zoic. p. 90. n. 1. *Parus major*, Carbonarius.

Kramer, Austr. p. 379. n. 4. *Parus capite nigro, vertice albo, dorso cinereo pectore albo*; Speermeise; Creuzmeise.

Schwenkfeld, av. Silef. p. 320. *Parus ater*; *Parus caninus*; Hunds-Meise; kleine Kol. Meise.

Jonston, av. p. 120. *Parus ater*.

Barrere, ornith. Cl. 3. Gen. 24. sp. 1. *Parus ater*, Carbonarius.

Rzaczynsky, auch hist. nat. Polon. p. 404. *Parus Carbonarius minor*.

Salerne,

Salerne, ornith. p. 212. petit Charbonnier.

Histoir. Prov. I. p. 516.

Donndorff, Handb. der Thiergeesch. p. 391. n. 4.
die Tannenmeise.

8. PALUSTRIS. *Die Sumpfmeise.* (7)

Müller, Natursyst. II. p. 627. n. 8. die Sumpfmeise.

Borowsky, Thierreich, III. p. 181. n. 6. die Sumpf-By-Plattenmeise; Asch-Nonnenmeise.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 548. n. 5. die Sumpfmeise; Mönchmeise; Speckmeise.

Halle, Vögel, p. 357. n. 346. die Nonnenmaise.

Gatterer, vom Nutz. und Schad. der Thiere, II. p. 435. n. 388. die Sumpfmeise; Plattenmeise, etc.

Pennant, arct. Zool. II. p. 400. E. die Sumpfmeise.

Onomat. histor. natur. VI. p. 188. die Hundsmaise; Sumpfmaise.

Handb. der deutsch. Thiergeesch. p. 139. Holzmaise; Waldmaise; Plattenmaise, etc.

Klein, av. p. 85. n. 4. *Parus fuscus*, *cinereus*, *palustris*, *atricapillus*.

Klein, Vorbereit. p. 159. n. 4. Münchmeise; Mönchmeise; Meisenkönig; schwarzköpfiger Dornreich; Graumeise; Aschmeise; Murmeise; Kottmeise; Rindmeistein.

Klein,

(7) Hält sich mehr in Wäldern als in Gärten auf, lebt von kleinen Samenkörnern, greift Bienen, Wespen und Raupen an; sammelt einen Vorrath von Hanfsamen, wenn sie dazu Gelegenheit hat. Lebt gern auf Erlen und Weiden an sumpfigen Orten. Legt 5. bis 7. weisse mit hellbraun, besonders am stumpfen Ende punctirte Eyer. Lässt sich schwer im Bauer halten, und wird oft vor ihrem Tode, wenn man sie ein Jahr gehabt hat, blind.

- Klein*, verbess. Vögelhist. p. 88. n. 4. *Münchmeise*.
Klein, Stemmat. av. p. 16. tab. 17. fig. II. a — c.
Gesner, Vögelb. p. 377. *Murmeise*; *Murmefß*;
Rietmeiß; *Reitmeiß*; *Kolmeiß*; m. e. Fig.
Briffon, ornith. I. p. 465. n. 7. *Mesange de ma-*
rais, ou *Nonnette cendrée*.
Büffon, Vögel, XVII. p. 57. *die aschgraue Non-*
nemmeise; m. e. Fig.
Batsch, Thiere, I. p. 359. *die Plattenmeise*.
Latham, Syn. Suppl. p. 189. *Marsh Titmouse*.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 565. n. 9. *Parus*
(Palustris) capite nigro, dorso cinereo, tempo-
ribus albis.
Beseke, Vögel Kurl. p. 84. n. 195. *die Sumpf-*
meise.
Siemßen, meklenb. Vögel, p. 145. n. 5. *die Sumpf-*
meise.
Fischer, Zus. zur N. G. von Livil. p. 51. n. 505.
Sumpfmeise; *Hundemeise*.
White, N. G. von Engl. p. 65. n. 2. *Sumpfmeise*.
Pontoppidan, Dännem. p. 175. n. 4. *Graameise*.
Storr, Alpenreise, I. p. 80. *Parus palustris*.
Naturforsch. XXV. p. 19. *Plattmeise*.
Pallas, nord. Beytr. IV. p. 10. *die Mauermeise*.
Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 201. n. 246. *die*
Hundsmoise.
Zorn, Petinotheol. II. p. 363. *die Platten-Meisse*;
Nonn-Meisse; *Hanf-Meisse*.
Borkhausen, Magazin, I. p. 200. n. 81. *Sumpf-*
meise.
Naumann, Vogelsteller, p. 139. *die Plattmeise*.
Angenehme Landlust, p. 222. *Hanfmeise*.
Anweis. Vögel zu fang. p. 372. *Hanfmeise*.
Börner, schles. ökon. Nachr. 1781. p. 107. *Parus*
palustris.

Onomat. forestal. II. p. 807. *Hanfmeise; Schwarzm-eise.*

Naturgesch. aus den best. Schriftst. Vög. p. 829.

Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 57. *Parus palustris*.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 32. n. 5. *Parus palu-stris*.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 190. n. 6. *Parus (Palustris) capite nigro, temporibus albis, dor-so cinereo.*

Charleton, onom. zoic. p. 90. n. 3. *Parus palu-stris*.

Brünniche, ornith. bor. p. 73. *Parus palustris*.

Kramer, Austr. p. 379. n. 5. *Hundsmeise.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 320. *Parus fuscus, cine-reus, palustris, atricapillus. Graw-Meßlin; Mur-Meise; Asch-Meise; Kott-Meise; Ried-Meßlein.*

Rzaczynsky, auch hist. nat. Polon. p. 404. *Parus fuscus.*

Fonston, av. p. 120. *Parus palustris.*

Zinnan. Uov. p. 77. tab. 12. fig. 68. I. *Parolozino palustre.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 392. n. 5. *die Sumpfmeise.*

β. *Büffon*, Vögel, XVII. p. 64. *Meise von Louisiana.*

Latham, Syn. II. 2. p. 541. n. 8. A.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 565. n. 9. β.

Borkhausen, Magazin, I. p. 200. 201. (8)

γ. *Latham*,

(8) Die zwey weissen Binden auf den Flügeln, deren bey der Hauptgattung in unsrem System gedacht wird, habe ich so wenig, als die weissen Flecken beym Anfange eines jeden Flügels, deren *Scopoli* erwähnt, an den Exemplaren, die ich gesehen habe, gefunden. *Borkhausen* macht dieselbe Bemerkung, und glaubt, dass hier vielleicht mehrere Arten verwechselt würden, und dass *Gmelins Parus palustris* β, die *Linneische Parus palu-stris*; — hingegen *Gmel. Parus palustris* α, so wie die *Scopoli-sche Meise* dieses Namens eine andere Art seyn mögen.

v. Latham, Syn. II. 2. p. 542. n. 8. B.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 566. n. 9. β.

9. VIRGINIANUS. *Die virginische Meise.*

Müller, Natursyst. II. p. 627. n. 9 die virginische Meise.

Pennant, arct. Zool. II. p. 396. n. 242. die virginische Meise.

Klein, av. p. 74. n. 8. Luscinia uropygio luteo.

Klein, Vorbereit. p. 140. n. 8. Gelbsteiß.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 75. n. 8. Gelbsteiss.

Brisson, ornithol. I. p. 470. n. 14 Mesange de Virginie.

Büffon, Vögel, XVII. p. 148. die Meise mit gelben Bürzel; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 567. n. 15. Parus (Virginianus) fusco-olivaceus, subtus griseus, uropygio luteo.

Seligm. Vögel, III. tab. 16. die Meise mit gelbem Bürzel.

Naturgesch. aus den best. Schriftst. Vög. p. 849.

Meise mit dem gelben Steiß.

10. PEREGRINUS. *Die Meise mit rothem Steiß. (9)*

Müller, Natursyst. II. p. 618. n. 10. die ausländische Meise.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 564. n. 4. Parus (Peregrinus) uropygio coccineo, corpore cincereo, subtus albo.

18. GRISEUS. *Die graue, rothgekrönte Meise. (10)*

Beckstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 597. not. * 2.
Büffon,

(9) Ist, nach Latham, mit *Parus coccineus* p. 1015. n. 31. einerley.

(10) Ist, nach Beckstein, mit *Motacilla Regulus*, p. 995. n. 48. einerley. Latham l. e. schreibt sie mit *Fringilla Flammula* p. 915. n. 20. für verwandt zu halten.

Büffon, Vögel, XVII. p. 167. die graue, rothschitlichte Meise.

Latham, Syst. ornith. II. p. 564. n. 6. Parus (Griseus) griseus vertice coccineo.

Olaffen, Isl. I. p. 312. c. *Audua Tytlingr?*

Hermann, tab. affin. anim. p. 225. Parus griseus.

I9. A F E R. *Die schwarzbrüstige afrikanische Meise.*

Büffon, Vögel, XVII. p. 168. die afrikanische Meise.

Latham, Syst. ornith. II. p. 564. n. 7. Parus (Afer) nigricans, genis nucha abdomineque albis, collo subtus, pectoreque nigris.

II. C A U D A T U S. *Die Schwanzmeise.* (1)

Müller, Natursyst. II. p. 628. n. II. die Schwanzmeise.

Leske, Naturgesch. p. 265. n. 5. die langeschwänzte Meise.

Borowsky, Thierreich, III. p. 182. n. 7. die Schwanz-Schnee-Zagelmeise; Pfannenstiel; Winzapfer.

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 194. n. 3. Parus (Caudatus) vertice albo, cauda corpore longiore; die Schwanzmeise; Moormeise; Backofendrescher.

Beckstein, Naturgesch. I. p. 549. n. 6. die Schwanzmeise.

Funke, Naturgesch. I. p. 372. die Schwanzmeise.

Ebert, Naturl. II. p. 147. Schwanzmaise; Weinzapfer.

Halle,

(1) Länge bis zum Afer 2 1/2, bis an das Ende des Schwanzes 6. Zoll; Flügelweite 6 1/2 Zoll. Gewicht 2 1/3 Drachmen. Aldrovand kannte den Unterschied zwischen *Parus Caudatus* und *Pendulinus* nicht. S. Ludwigii delect. opusc. ad scient. nat. spec. Lips. 1790. I. p. 148.

Halle, Vögel, p. 358. n. 348. die *Schwanzmeise*.

Meyer, Thiere, II. tab. 27. die *Schwanzmeise*.

Gatterer, vom Nutz. u. Schad. der Th. II. p. 435. n. 384. die *Schwanzmeise*; *Belzmeise*; *Bergmeise*; *Pfannenstieglitz*, etc.

Pennant, arct. Zool. II. p. 400. I. die *langgeschwänzte Meise*.

Onomat. hist. nat. VI. p. 181. die *Schwanzmeise*.
Handb. der deutsch. Thiergeesch. p. 139. *Schwanzmeise*, etc.

Klein, av. p. 85. n. 7. *Parus caudatus*.

Klein, Vorbereit. p. 160. n. 7. *langgeschwänzte Meise*; *Zahlmeise*; *Pfannenstieglitz*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 88. n. 7. *langgeschwänzte Meise*.

Klein, Stemmat. av. p. 16. tab. 17. fig. 12. a. b.

Klein, Vögeleyer, p. 28. tab. 4. fig. 7.

Gesner, Vögelb. p. 378. *Schwanzmeißlein*; *Pfannenstielein*; *Zagelmeiß*, *Pfannenstieglitz*; m. e. schl. Fig.

Brisson, ornithol. I. p. 469. n. 13. *Mesange à longue queue*.

Büffon, Vögel, XVII. p. 114. die *langgeschwänzte Meise*; m. e Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 358. die *Schwanzmeise*.

Latham, Syn. Suppl. p. 190. *Long-tailed Titmouse*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 569. n. 20. *Parus (Caudatus) albo roseo nigroque longitudinaliter varius, vertice albo, cauda longiore*.

Beseke, Vögel Kurl. p. 84. n. 196. die *Schwanzmeise*.

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 146. n. 6. die *Schwanzmeise*.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 445. die *Schwanzmeise*.

- Pallas*, nord. Beytr. IV. p. 14. die Schwanzmeise.
Storr, Alpenreise, I. p. 80. Parus caudatus.
Naturforsch. XVII. p. 108. n. 225. Schwanzmeise.
Tengmalm: neue schwed. Abhandl. IV. p. 52. die langgeschwänzte Meise.
Scopoli, Bem. aus der N. G. p. 202. n. 247. die Schwanzmeise.
Zorn, Petinothol. II. p. 324. 366. die Schwanz-Meise.
Döbel, Jägerprakt. I. p. 66. die Schwanz-Meise.
Naumann, Vogelsteller, p. 139. Spiegelmeise; Trufelsbolzen; Pfannenstiel. (ganz falsch beschrieben.)
Angenehme Landlust, p. 223. die Schneemeise.
Anweis. Vögel zu fang. p. 373. Schneemeise.
Börner, schles. ökonom. Nachr. 1781. p. 107. Parus caudatus.
Onomat. forestal. II. p. 809. die Schneemeise; Mehlmieise.
Naturgesch. aus den besten Schriftst. Vögel, p. 842. Schwanzmeise.
Borkhausen, Magazin, I. p. 201. n. 82. Schwanzmeise; Pfannenstielchen.
André und Bechstein, Spazierg. II. p. 394. 399. Schwanzmeise.
Goeze, Natur, Menschenl. u. Vorseh. VI. p. 106. Schwanzmeise.
Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 57. Parus caudatus.
Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 32. n. 6. Parus caudatus.
Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 190. n. 7. Parus (Caudatus) vertice albo, cauda corpore longiore.
Charleton, onom. zoic. p. 90. n. 4. Parus caudatus.
Moehring, av. gen. p. 45. n. 37. Orites.

Schwenk-

Schwenkfeld, av. Siles. p. 319. *Parus caudatus*; *Parus monticola*. *Schwanz-Meise*; *Zahlmeise*; *Berg-Meißlin*; *Pfannenstieglitz*.

Rzaczynsky, auch hist. nat. Polon. p. 404. *Parus caudatus*.

Kramer, Austr. p. 379. n. 6. *Belzmeise*; *Pfannenstiel*.

Jonston, av. p. 121. *Parus caudatus*.

Belon, hist. nat. des ois. p. 368. *Perd sa queue*; *Mélange à longue queue*.

Salerne, ornith. p. 216. *Boulard*, etc.

Journal de physique. Aout. 1776. p. 129. *Meuniere*, *Materat*.

Hermann, tab. affin. anim. p. 224. *Parus caudatus*.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 392. n. 6. *die Schwanzmeise*.

20. CAPENSIS. *Die capsche Meise*.

Büffon, Vögel, XVII. p. 130. *die Halbtrauer*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 570. n. 22. *Parus (Capensis) cinereo-griseus*, *remigibus nigris albo-marginatis*, *cauda nigra*, *subtus alba*.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 160. tab. 115. *die kleine Meise vom Vorgeb. d. g. Hoffnung*.

Naturgesch. aus den best. Schriftst. Vög. p. 845.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 392. n. 8. *die Capmeise*.

12. BIARMICUS. *Die Bartmeise.* (2)

Müller, Natursyst. II. p. 628. n. 12. *das Bartmännchen*.

Ccc 3 Borowsky,

(2) Es scheint mir noch nicht so ganz ausgemacht, ob *Kramer's Pendulus* hieher gehöre. *Kramer* führt weiter kein Synonym an, als *Mont. Ait. bonon.* und dies ist *Parus Pendulinus Lian.*

- Borowsky*, Thürreich, III. p. 183. n. 8. *das Bartmännchen; Bartmeise.*
- Blumenbach*, Handb. der Naturgesch. p. 195. n. 4. *Parus (Biarmicus) vertice cano, cauda corpore longiore, capite barbato; das Bartmännchen; der Indianische Sperling.*
- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 549. n. 7. *die Bartmeise; Schilfmeise.*
- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. III. p. 592. *indianische Sperling.*
- Ebert*, Naturl. II. p. 148. *das Bartmännchen.*
- Halle*, Vögel, p. 360. n. 349. *die Bartmeise.*
- Onomat. histor. natur.* VI. p. 178. *die Bartmeise.*
- Pennant*, arct. Zool. II. p. 401. H. *die Bartmeise.*
- Klein*, av. p. 86. n. 8. *Parus barba nigra utrinque ab oculis dependente.*
- Klein*, Vorbereit. p. 160. n. 8. *spitzbärtiger Langschwanz.*
- Klein*, verb. Vögelhist. p. 88. n. 8. *spitzbärtiger Langschwanz.*
- Briffon*, ornith. I. p. 468. n. 12. *Mesange barbue ou Moustache.*
- Büffon*, Vögel, XVII. p. 86. *die Bartmeise; mit 2 Figg. M. u. W.*
- Lotham*, Syn. Suppl. p. 190. *Bearded Titmouse.*
- Latham*, Syst. ornithol. II. p. 570. n. 23. *Parus (Biarmicus) rufus, vertice cano, cauda corpore longiore, capite barbato, crisco nigro.*
- Seligmann*, Vögel, III. tab. 5. *der kleinste Neuntöter.*
- Pallas*, Reis. Ausz. I. p. 370. *Rietmeise, III. p. 475. Bartmeise.*
- Tengnalm*: neue schwed. Abhandl. IV. p. 55. *Parus biarmicus.*
- Scopoli*, Ber. a. d. N. G. I. p. 198. n. 241. *die Barthmeise.*

Borkhan.

Borkhausen, Magaz. I. p. 203. n. 83. *Bartmeise*;
Rohrmeise.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 190. n. 8. *Parus* (*Biarmicus*) *vertice cano*, *cauda corpore longiore*.

Kramer, Austr. p. 373. n. 1. *Rohrspatz*; *persianischer Spatz*; *türkischer Spatz*?

Salerne, ornith. p. 217. *Parus barbatus*, seu *pascerulus arundinaceus*?

Hermann, tab. affin. anim. p. 224. *Parus biarmicus*.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 392. n. 7. *das Bartmännchen*.

21. ALPINUS. *Die Alpenmeise.* (3)

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. III. p. 597. not. * 3.

Büffon, Vögel, XVII. p. 169. *die Alpenmeise*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 569. n. 21. *Parus* (*Alpinus*) *niger*, *subtus rufescens*, *nigro maculatus*, *linea alba abasi rostri ad cervicem directa*, *ungue postico longissimo*.

22. SINENSIS. *Die chinesische Meise.*

Büffon, Vögel, XVII. p. 171. *die chinesische Meise*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 570. n. 24. *Parus* (*Sinenis*) *ferrugineo-fuscus*, *capite colloque dilutioribus*, *remigibus caudaque elongata fuscis*, *nigro marginatis*.

23. MALABARICUS. *Die malabarische Meise.*

Büffon, Vögel, XVII. p. 172. *die malabarische Meise*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 564. n. 5. *Parus* (*Malabaricus*) *griseus*, *gula alis rectricibusque* CCC 4 duabus

(3) Nach Bechstein vielleicht ein junger *Parus Caudatus*.

duabus intermediis nigris, corpore subtus, uropygio macula alarum basique tectricum lateraliu[m] fulvis.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 159. die Meise von der Küste Malabar.

24. SIBIRICUS. Die sibirische Meise.

Biffon, Vögel, XVII. p. 132. die sibirische Meise mit dem weißen Gürtel; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 371. n. 25. Parus (Sibiricus) griseo-fuscus, subtus albida, abdome rufo-griseo. collo infetiore medio nigro, hypochondriis rufescentibus.

B. Latham, Syn. II, 2. p. 556. n. 23. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 371. n. 25. *B. P.* cinereo-fuscus, subtus fronteque albus, collo subtus pectoreque medio nigra, cauda longiore obscura.

25. KNJAESZIOK. Der Knjasziok. (*)

Biffon, Vögel, XVII. p. 174. der Knjästok.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 572. n. 30. Parus (Knja-stik) albus, subtus macula continua, linea oculari et collari lividis.

26. HUDSONIUS. Die Meise von der Hudsons-bay. (4)

Pennant, arct. Zool. II. p. 397. n. 246. die Meise von d'r Hudsons bay.

Büffon, Vögel, XVII. p. 176. die Hudsonsmeise.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 566. n. 11. Parus (Hudsonius) fuscotubescens, dorso cinereo, jugulo

(*) Das russische Wort bedeutet einen kleinen Fürsten; ein Prinz.

(4) Länge 5 Jds. Zoll. Flügelweite 7. Zoll. Gewicht 1½. Unze.
Penn.

iugulo atro, fascia suboculari pectoreque albis,
hypochondriis rufis.

27. MACROCEPHALUS. *Die großköpfige Meise.*

Büffon, Vögel, XVII. p. 178. *die großköpfige
Meise.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 571. n. 26. Parus
(Macrocephalus) niger, abdomine albido, pe-
ctore subfulvo, fronte maculaque alarum albis.

28. NOVAE SEELANDIAE. *Die neuseeländische
Meise.*

Büffon, Vögel, XVII. p. 179. *die Neuseeländische
Meise.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 571. n. 27. Parus
(Novaë Zealandiae) cinereo-ruber, subtus rufo-
griseus, superciliis albis, rectricibus duabus in-
termediis nigris, lateralibus medio macula qua-
drata alba.

13. PENDULINUS. *Die Beutelmeise (5)*

Müller, Natursyst. II. p. 629. n. 13. *die Beutel-
meise.* tab. 21. Fig. 5.

Leske, Naturgesch. p. 265. n. 6. *der Pendulin.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 178. n. 1. *die Beutel-
meise; Pendulino, Remitz, Cottonvogel.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 195 n. 5. Parus
(Pendulinus) capite subferrugineo, fascia ocula-
ri nigra, remigibus rectricibusque fuscis, mar-
gine utroque ferrugineo. *Pendulinmeise; Re-
mitz.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 550. n. 8. *die Beutel-
meise.*

Funke, Naturgesch. I. p. 273. *die Beutelmeise.*

Ebert, Naturl. II. p. 148. *die Beutelmeise.*

(5) Legt 4. oder 5. schneeweisse, fast durchsichtige Eyer. Brütet
gewöhnlich zweymal.

Halle, Vögel, p. 361. n. 351. die Pendulinmeise, Sumpfmaise, litthauische Remitzvogel mit dem Hängeneste; Rohrmaise; Vollhynische Beutelmaise mit dem Schnabel des Fliegenpießer; Grasmücke an Stimpfen; Fig. 22.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 436. n. 385. die Beutelmeise; Florentinermeise, etc.

Onomat. hist. nat. VI. p. 189. polnische Beutelmaise.

Klein, av. p. 86. n. 10. *Parus lithuanicus* nidum suspendens.

Klein, Vorbereit. p. 161. n. 10. vollhynische Beutelmeise.

Klein, verb. Vögelh. p. 88. n. 10. vollhynische Beutelmeise.

Klein, Stemmat. av. p. 17. tab. 17. fig. 13. a. b.

Briffon, ornith. I. p. 467. n. 11. Mésange de Pologne ou Remiz.

Büffon, Vögel, XVII. p. 95. der Remiz; m. e. Fig.

Batsch, Thiere, p. 358. der Pendulin.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 568. n. 18. *Parus (Pendulinus) capite subferrugineo, fascia oculari nigra, remigibus rectricibusque fuscis, margine utroque ferrugineo.*

Fischer, Livil. p. 104. n. 176. Beutelmeise.

Rutschkov, orenb. Topogr. p. 244. Remes.

Strahlenberg, Asien, p. 416. Remes.

Pallas, nord. Beytr. III. p. 2. IV. p. 14. Remes-vogel.

Naturforsch. XVII. p. 109. vollhynische Beutelmeise.

Allgem. Magaz. II. p. 238. 249. Remitz; mit Abbild. des Vogels und Nests.

Hamburg. Magaz. XVIII. p. 228 litthauische Remitzvogel; mit Abbildung des Vogels und des Nests. (Titius Abhandl.)

Smellie, Philos. der Naturgesch. II. p. 63. *Pendulin*.

Börner, schles. ökon. Nachr. 1781. p. 108. *Parus pendulinus*.

Meidinger, Vorles. I. p. 150. n. 6. *der Pendulin*.

Christ. Friedr. Ludwigii, delect. opusculor. ad scient. nat. spectant. Lips. 1790. p. 147. c. Fig. (Abhandl. von Titius.)

Journal de physique. Aout. 1776. *Mesange de marais*.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 189. n. 33. *Motacilla (Pendulinus) capite ferrugineo, macula nigra oculari, remigibus rectricibusque fuscis, margine utroque ferrugineis*.

Rzaczynsky, aust. hist. nat. Pol. p. 402. *Parus nidum suspendens*.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 393. n. 9. *die Beutelmeise*.

29. NARBONENSIS. *Die Meise von Languedoc.*

Büffon, Vögel, XVII. p. 110. *der Pendulin*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 568. n. 19. *Parus (Narbonensis) rufo-griseus, vertice cano, alis caudaque nigricantibus rufo-marginatis, remigibus primoribus margine albis*.

Hist. Prov. I. p. 517. *Pendulino ou Canari sauvage*.

14. CELA. *Die guianische Meise.*

Müller, Natursyst. II. p. 629. n. 14. *die gefleckte Meise*.

Onomat. hist. nat. VI. p. 183. *die gefleckte Meise*.

Büffon, Vögel, XVII. p. 160. *die schwarze Meise oder Cela des Linné*.

Latham,

Latham, Syst. ornithol. II. p. 568. n. 16. Parus
(Cela) niger, rostro albo, macula alarum basi-
que caudae flavis.

Bankroft, N. G. von Guian. p. 110. die schwarze
Meise.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 191. n. 12. Parus
(Cela) niger, rostro albo, macula alarum basi-
que caudae flavis.

30. AMATORIUS. Die verliebte Meise.

Büffon, Vögel, XVII. p. 156. die verliebte Meise.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 568. n. 17. Parus
(Amorosus) caeruleo - nigricans, macula ala-
rum longitudinali rufo flavoque dimidiata.

31. COCCINEUS. Die scharlachrothe Meise. (6)

Büffon, Vögel, XVII. p. 164. die ausländische
Meise.

32. INDICUS. Die indianische Meise.

Büffon, Vögel, XVII. p. 180. die indianische
Meise.

Latham, Syst. ornith. II. p. 572. n. 29. Parus
(Indicus) cinereus, subtus albidus, pectore ab-
domine crisoque ferrugineis, rostro pedibus
alis caudaque nigro fuscis.

Veränderungen gegen die XII. Edition, und Ver-
mehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Das Geschlecht ist mit acht Gattungen vermehrt.
Bey der 8ten Gattung sind drey Varietäten auseinander
gesetzt.

(6) Nach *Latham* mit *Parus peregrinus*, p. 1010. n. 10. einerley.

117. GESCHLECHT. HIRUNDO. *Die Schwalbe.*

Müller, *Naturfyst.* II. p. 630. Gen. CXVII.

Leske, *Naturgeschichte*, p. 266. Gen. XLVII.

Borowsky, *Thierreich*, III. p. 154. Gen. LXV.

Blumenbach, *Handb. d. Naturgesch.* p. 196. Gen. XXXIX.

Bechstein, *Naturgesch.* I. p. 552. Gen. LXXVIII.

Funke, *Naturgesch.* I. p. 274.

Ebert, *Naturl.* II. p. 149.

Halle, *Vögel*, p. 345. Gen. VIII.

Pennant, *act. Zool.* II. p. 401.

Neuer Schaupl. d. Nat. VII. p. 792.

Onomat. hist. nat. IV. p. 216.

Klein, av. p. 82. trib. 2.

Brisson, *ornithol.* I. p. 293. Gen. XXX.

Batsh, *Thiere*, I. p. 318. Gen. LXXXI.

Latham, *Syst. ornith.* II. p. 572. Gen. XLVI.

Hermann, *tab. affin. anim.* p. 229.

Donndorff, *Handb. d. Thiergehicht*, p. 394.
LXXXVI.

1. RUSTICA. *Die Rauchschwalbe.* (?)

Müller, *Naturfyst.* II. p. 630. n. 1. *die Rauchschwalbe.*

Leske,

(?) Die Benennungen dieser und der *dritten Gattung* (*Hirundo urbica*) werden häufig verwechselt. Diese Schwalbe ist es eigentlich nicht, von der behauptet wird, dass sie sich im Herbst in Sümpfe und Teiche verstecke, sondern die *Uferschwalbe*; doch versichern es auch mehrere von der *Rauch-* und *Haus-*
schwalbe. Die ganze Sache ist überhaupt noch nicht auf Reine. Für die Wanderungen der Schwalben giebt es Zeugnisse, die schlechterdings unverwerflich sind. Aber eben so unwidersprechliche Thatsache ist es auch, dass man Schwalben, — nicht einzeln, nicht etwa im Herbst, sondern mitten im Winter bey 6, 10, und mehreren aus dem Schlamm in den Teichen und andern

- Leske**, Naturgesch. p. 266. n. 1. die Rauchschwalbe.
Borowsky, Thierreich, III. p. 155. n. 2. die Rauchschwalbe, Stachelschwalbe.
Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 196. n. 1. Hirundo (Domestica) rectricibus, exceptis duabus intermediis, macula alba notatis; die Rauchschwalbe, Feuerschwalbe, Stadtschwalbe.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 553. n. 1. die Rauchschwalbe; Feuerschwalbe.
Funke, Naturgesch. I. p. 274. die Rauchschwalbe.
Ebert, Naturl. II. p. 150 die Rauchschwalbe; Bauernschwalbe; Küchenschwalbe.
Halle, Vögel, p. 349. n. 336. die Rauchschwalbe.
Meyer, Thiere, II. tab. 86. Hausschwalbe.
Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 477. n. 387. die Rauchschwalbe; Feuerschwalbe, Küchenschwalbe, Stadtschwalbe.
Pennant, arct. Zool. II. p. 401. n. 247. die Rauchschwalbe.
Onomat. hist. nat. IV. p. 249. Fensterschwalbe, Leimschwalbe, Giebelschwalbe, Hauschwalbe.
Handb. der deutsch. Thiergeesch. p. 139. Rauchschwalbe, etc.
Klein, av. p. 82. n. 2. Hirundo domestica.
Klein, Vorbereit. p. 154. n. 2. Rauch - Küchenschwalbe.
Klein, verb. Vögelh. p. 84. n. 2. Rauchschwalbe, Bauern, Küchen-, Brücheschwalbe.
Klein, Stemmat. av. p. 15. tab. 17. Fig. 2. a—c.
Klein, Vögeleyer, p. 27. tab. 10. Fig. 2.
Gesner, Vögelb. p. 453. Hauschwalb; Schwalbe; Schwalm; m. c. zieml. gut. Fig.
Briffon,

dern Gewässern gefunden hat, die in der Stubenwärme aufgelebt und herumgeflogen sind. Am Ende dieses Geschlechts wird man ein untrügliches Verzeichniß mehrerer hier gehörigen Schriften finden.

- Brisson**, ornith. I. p. 294. n. 1. Hirondelle de Cheminée.
- Batsch**, Thiere, I. p. 363. die Rauchschwalbe.
- Latham**, Syn. Suppl. p. 192. Common Swallow.
- Latham**, Syst. ornithol. II. p. 572. n. 1. Hirundo (Rustica) nigro caerulescens, subtus albida, fronte gulaque castaneis, rectricibus lateralibus macula alba notatis.
- Beske**, Vögel Kurl. p. 84. n. 197. die Rauchschwalbe.
- Siemsen**, meklenb. Vögel, p. 148. n. 1. die Rauchschwalbe, Rookschwänen.
- Bock**, N. G. von Preuss. IV. p. 446. Rauchschwalbe; Bauernschwalbe.
- Fischer**, Lvl. p. 105. n. 177. gemeine, oder Bauernschwalbe.
- Cetti**, Sardin. II. p. 227. die Rauchschwalbe.
- Wolf**, Reis. n. Zeilon, p. 136. die Schwalbe.
- Forster**, Reis. Ed. in 8. I. p. 48. die gewöhnliche Haus-schwalbe.
- White**, N. G. von Engl. p. 7. 17. 21. p. 33. n. 3. p. 54. p. 56. p. 58. n. 3. p. 63. n. 8. p. 66. n. 6. p. 101. p. 128. Rauchschwalbe.
- Fabric**. Reis. n. Norw. p. 181. Hirundo rustica.
- Pallas**, Reise Ausz. II. p. 8. III. p. 185. Rauchschwalbe; Haus-schwalbe.
- Pontoppidan**, Dännem. p. 175. n. 1. Marksvale; Forstuesvale; Feldschwalbe.
- Pontoppidan**, Norweg. II. p. 186. Svale.
- Adanson**, Senegall. p. 97. 131. Schwalben.
- Linné**, Abhandl. II. p. 306. n. 142. die Rauchschwalbe.
- Bartram**, Reis. d. Karolina, p. 288. Hirundo cerdo. Rauchschwalbe.
- Scopoli**, Bem. aus der N. G. I. p. 204. n. 249. Haus-schwalbe; Stachelschwalbe.

- Naturforsch. XVII. p. 109. n. 1. *die Rauchschwalbe.*
 Stralsund. Magaz. I. p. 22. *Rauchschwalbe.*
 Allgem. Reis. IV. p. 267. *Schwalben.*
 Zorn, Petinotheol. II. p. 399. *die Hauss Schwalbe.*
 Meidinger, Vorles. I. p. 150. n. 1. *die Rauchschwalbe.*
 Goeze, nützl. Allerl. II. p. 400. *Rauchschwalbe;*
Stadtschwalbe.
 André u. Bechstein, Spatzierg. I. p. 303. *die Rauchschwalbe.*
 Beckmann, Naturhist. p. 56. a. *die Hausschwalbe.*
 Eberhard, Thiergesch. p. 78. *gemeine Schwalbe.*
 Borkhausen, Magazin, I. p. 192. n. 72. *Rauchschwalbe; Stachelschwalbe; innere Hausschwalbe.*
 Geoffroy, mat. med. VII. p. 525. *Hausschwalbe.*
 Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 57. *Hirundo domestica.*
 Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 32. n. 1. *Hirundo domestica.*
 Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 191. n. 1. *Hirundo (Rustica) rectricibus, duabus intermediis exceptis, macula alba notatis.*
 Charleton, onom. zoic. p. 89. *Hirundo.*
 Kramer, Austr. p. 380 n. 1. *Hirundo rectricibus, excepto pari intimo, alba macula notatis. Hausschwalbe.*
 Schwenkfeld, av. Siles. p. 286. *Hirundo I. Hausschwalbe; Giebel Schwalbe.*
 Möhring, av. gen. p. 46. n. 38. *Hirundo.*
 Sibbald, Scot. illustr. II. 3. p. 21. *Hirundo domestica.*
 Rzaczynsky, hist. nat. Pol. p. 283. *Hirundo domestica.*
 Schaefer, element. ornithol. tab. 40.
 Zinnan, Uov. p. 48. tab. 7. Fig. 35. *Rondine minore.*

Philos. Transact. LI. p. 459. LIII. p. 101. LXV.

p. 528. 343.

Plin. hist. nat. L. 10. c. 24. c. 53. L. 18. c. 26. c. 35.
Hirundines.

Aelian. de nat. anim. L. 1. c. 52. L. 3. c. 24. 25.
Χελιδών.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 394. n. 1.
die Rauchschwalbe:

B. Die weiße Schwalbe.

Brisson, ornith. I. p. 294. n. 1. Hirondelle blanche.

Latham, Syn. II. 2. p. 563. White Swallow.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 573. n. 1. B.

Will. ornith. p. 155. Hirundo prorsus candida.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 450. weiße Schwalben.

Naturforsch. I. p. 63. n. 10. et II. ganz weiße Stachelschwalbe.

Götz, Naturgesch. einiger Vögel, p. 116. n. 4.

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 149. n. 1. B. weiße Rauchschwalbe.

Ledel: hirundo alba. Eph. nat. cur. Dec. III. an. 1.
obs. 54. p. 84.

Wallin, diss. de hirundine alba. Ups. 1733. 4.

Rzaczynsky, auct. hist. nat Pol. p. 285. Hirundo candida.

Aelian. de nat. anim. L. 10. c. 34. Χελιδόνες λευκαί.

13. TAHITICA. Die tahitische Schwalbe.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 573. n. 2. Hirundo (Tahitica) fuscō-nigricans, corpore supra caeruleo-nitente, fronte colloque subtus purpureo-fulvis, cauda subforsicata nigra.

2. ESCULENT A. Die Salangane. (8)

Müller, Natursyst. II. p. 631. n. 2. die chinesische Schwalbe.

Leske, Naturgesch. p. 266. n. 2. die chinesische Schwalbe.

Borowsky, Thierreich, III. p. 156. n. 3. die chinesische Schwalbe.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 198. n. 4. Hirundo (Esculenta) rectricibus omnibus macula alba notatis; die Salangane.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 555. n. 6. die Indianische Schwalbe.

Ebert,

(8) Zehen solche Vögel wiegen zusammen etwa $2\frac{1}{2}$ Unze, und $1\frac{1}{2}$ Drachme. Nisten auf unterschiedenen Höhen von 50. bis 300. Fuss. Der Stoff dieser so berufenen Tunkinsnester ähnelt der Hausenblase, ist aber noch nicht weiter bekannt genug. Zur Verfertigung des Nests braucht der Vogel 2 Monathe, dann legt er 2. Eyer, die in 15. bis 16. Tagen ausgebrütet werden. So bald die Jungen flück sind, fängt man an die Nestchen einzusammeln, welches mit grosser Gefahr verbunden ist, und vielen Menschen das Leben kostet. Die Nester werden getrocknet, gereinigt und in Körbe gelegt, an die Chineser verkauft. Der Preiss hängt von ihrer Weisse und Feine ab. Die von der besten Sorte sind sehr rar. 125 Pfund werden von 300. bis zu 1400. Thalern bezahlt. Auf der Insel Java werden ohngefähr etwas über 2500. Pfund solcher Nestchen eingehämmelt. Die Insel zieht also, wenn man 125. Pfund nur zu 1000. Thaler rechnet, 20,000. Thaler. Die Nester werden zu einem schleimigen Brey gekocht, des Nachts in Thau gesetzt, und mit Zucker vermengt. Sie werden auch zu Suppen und andern Speisen genommen. Sie müssen aber, wie es heisst, 24. Stunden kochen. Dieser Vogel bewohnt die Sundaischen und andere Inseln des Indischen Archipelagus bis Neu-Guinea; Java, Sumatra, Coromandel, Tunkin; soll aber in China selbst nicht angetroffen, und nur deswegen die chinesische Schwalbe genannt werden, weil die meisten Nester nach China kommen, und da-selbst verbraucht oder weiter verkauft werden. Auch die Vögel werden gegessen, sind aber schwer zu bekommen, und werden für sehr erhitzend gehalten.

- Ebert, Naturl. II. p. 152. die chinesische Felsen-schwalbe.
- Halle, Vögel, p. 353. n. 341. Hirundo sinensis nido eduli.
- Gatterer, vom Nutz. u Sch. d. Th. II. p. 438. n. 388. die Indianische Schwalbe.
- Onomat. hist. nat. IV. p. 238. die chinesische Felsen-schwalbe mit dem eßbaren Neste.
- Klein, av. p. 84. n. 7. Hirundo sinensis nido eduli.
- Klein, Vorbereit. p. 157. n. 7. Sinesische Felsen-schwalbe.
- Klein, verb. Vögelhist. p. 86. n. 10. Sinesische Fel-senschwalbe.
- Brisson, ornith. I. p. 300. n. 14. Hirondelle de ri-vage de la Cochinchine.
- Latham, Syst. ornithol. II. p. 580. n. 26. Hirun-do (Esculenta) nigricans, subtus albida, rectri-cibus omnibus apice albis.
- Valentini, mus. museor. I. p. 468. c. 23.
- Museum Wormian. p. 311.
- Allgem. Reis. VIII. p. 120. Saroy Boura (Nester.)
- Allgem. Reis. XI. p. 407. (Nester.)
- Mannigfaltigk. II. p. 510. von indianischen Vogel-nestern.
- Bohns Waarenlager, p. 598. (das Nest.)
- Halle, Magie, III. p. 570. die eßbaren Vogel-nester.
- Fabri, geographisches Lesebuch, I. p. 70. von den eßbaren Vogelnestern im Orient.
- Lichtenberg, Magaz. für das Neueste, etc. II. 3. p. 3. Beschreibung des eßbaren Vogelnestes.
- Verhandlingen van het Bataviaasch Genootschap der Kunsten en Weetenschappen, Th. 3.
- Houttyn, Natuurlyke Historie I. Deels. V. Stuk. 607.
- Christ. Wang, Schwed. Koch. u. Haushalt. Buch, a. d. schwed. übers. Greifsw. 1772. p. 540.

Beckmann, phys. ökon. Bibl. IV. p. 590.

Philos. Transact. XXIII. p. 1396. 36. *Hirundo maritima*.

Snellie, Philosoph. der Naturgesch. II. p. 68.

Meidinger, Vorles. I. p. 151. n. 5. *die chinesische Schwalbe*.

Goeze; Natur, Menschl. u. Vorf. IV. p. 82.

Hennings Geschichte des Carnatiks, in Beziehung auf das Tanjoursche Gebiet, etc. Th. 2. 1785.

Marsden, Sumatr. p. 141. Layong-Layong.

Voy. de Siam. I. p. 278 f. — Forrest. voy. p. 28.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 191. n. 2. *Hirundo (Esculenta) rectricibus omnibus macula alba notatis*.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 395. n. 2. *die Salangane*.

14. BORBONICA. *Die bourbonische Schwalbe*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 580. n. 27. *Hirundo (Borbonica) fusco-nigricans, subtus grisea fusco-maculata, cauda integra*.

B. *Latham*, Syn. II. 2. p. 581.

Latham, Syst. ornith. II. p. 580. n. 27. B. *Hirundo fusco-nigricans, subtus grisea, maculis longitudinalibus fuscis, rectricibus 3. exterioribus apice albido*.

Pl. enl. n. 544. f. 2. *Hirondelle de Bourbon?*

15. FRANCICA. *Die Schwalbe von der Insel Frankreich*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 580. n. 28. *Hirundo (Francica) nigricans, subtus uropygioque albido*.

16. AMERICANA. *Die amerikanische Schwalbe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 581. n. 29. Hirundo (Americana) fuscō - nigricans, viridi. nitens, subtus albida, uropygio crissoque rufis.

β. *Latham*, Syst. ornith. II. p. 581. n. 29. β. Hirundo fuscō nigricans subtus albida, gula, uropygio crissoque rufis.

3. URBICA. *Die Hausschwalbe.* (9)

Müller, Naturfyst. II. p. 632. n. 3. die Hausschwalbe.

Leske, Naturgesch. p. 267. n. 3. die Hausschwalbe.

Borowsky, Thierreich, III. p. 154. n. 1. die Haus-, Giebel-, Fenster-, Leimschwalbe; tab. 65.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 197. n. 2. Hirundo (Agrestis) pedibus hirsutis, rectricibus immaculatis, dorso nigro caerulecente, tota subtus alba. Die Hausschwalbe; Fensterschwalbe; Mehlschwalbe; Spyrschwalbe.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 553. n. 2. die Hausschwalbe.

Funke, Naturgesch. I. p. 275. die Hausschwalbe.

Ebert, Naturl. II. p. 150. die Hausschwalbe.

Halle, Vögel, p. 350. n. 337. die Fensterschwalbe; Landschwalbe.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 439. n. 389. die Hausschwalbe; Dorffschwalbe, Spirkenschwalbe, Speyerl, etc.

Ddd 3

Pennant,

(9) Die Anekdote, dass mehrere Schwalben dieser Art, wenn sie einen Sperling nicht aus ihrem Neste loswerden können, sich versammeln und ihn einmauern, finde ich schon bey Conrad. Gesner, 1. c. und in dem Buche vom P. Bongeant: Sur le langage des Bêtes, à la Haye, 8. 1739. p. 79, aber ich bezweifle ihre Richtigkeit.

- Pennant*, archt. Zool. II. p. 402. n. 248. *die Haus-schwalbe*.
- Onomat*. hist. nat. IV. p. 249. *die Fensterschwal-be*; *Lainschwalbe*.
- Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 140. *Dorf-schwalbe*, etc.
- Klein*, av. p. 82. n. 1. *Hirundo domestica*.
- Klein*, Vorbereit. p. 154. n. 1. *Haus-schwalbe*.
- Klein*, verb. Vögelhist. p. 84. n. 1. *Haus-schwalbe*.
- Klein*, Stemmat. av. p. 15. tab. 17. Fig. 3. a—c.
- Gesner*, Vögelb. p. 460. *Mursspyr*, *Münsterspyr*; *Kirchschwalb*, *Weißspyri*.
- Brisson*, ornith. I. p. 295. n. 2. petite Hirondelle, ou Martinet à cul blanc.
- Batsch*, Thiere, I. p. 363. *die Haus-schwalbe*.
- Latham*, Syn. Suppl. p. 192.
- Latham*, Syst. ornithol. II. p. 573. n. 3. *Hirundo (Urbica) nigro-caerulescens*, subtus alba, re-ctricibus immaculatis.
- Beseke*, Vögel Kurl. p. 84. n. 198. *die Haus-schwalbe*.
- Siemßen*, meklenb. Vögel, p. 149. n. 2. *die Kir-chenschwalbe*.
- Bock*, N. G. von Preuss. IV. p. 450. *die Haus-schwalbe*.
- Cetti*, Sardin. II. p. 229. *die Haus-schwalbe*.
- Fischer*, Livil. p. 105. n. 178. *die Haus-schwalbe*.
- White*, N. G. von Engl. p. 8. *Rauchschwalben*. p. 33. n. 4. p. 58. n. 4. p. 66. n. 6. p. 94. p. 128. n. 4. *Haus-schwalbe*.
- Pontoppidan*, Dännem. p. 175. n. 2. *Byesvale*; *Skorste nsvale*.
- Pallas*, Reis. Ausz. II. p. 8. *Haus-schwalbe*.
- Linne'*, Abhandl. II. p. 306. n. 143. *die Haus-schwalbe*.

- Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 205. n. 250. die Spyrschwalbe; Mehlschwalbe.
- Naturforsch. XVII. p. 110. n. 227. die Haus-schwalbe.
- Schwed. Abhandl. XXXVIII. p. 294. Haus-schwalbe.
- Zorn, Petinotheol. II. p. 400. die zweyte Haus-schwalbe.
- Döbel, Jägerprakt. I. p. 67. Haus-Schwalbe.
- Erxleben, physik. Bibl. II. p. 198.
- Goeze, nützl. Allerl. I. p. 21. II. p. 401. Mehlschwalbe.
- Borkhausen, Magaz. I. p. 194. n. 73. Mehlschwal-be; äußere Haus-schwalbe; Spyrschwalbe.
- Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 57. Hirundo rustica.
- Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 32. n. 2. Hirundo rustica.
- Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 192. n. 3. Hirundo (Urbica) rectricibus immaculatis, dorso nigro-caerulecente.
- Charleton, onom. zoic. p. 90. n. 1. Hirundo agrestis, rustica n. 4. Hirundo Apos minor.
- Schwenkfeld, av. Siles. p. 288. Hirundo II. Hirundo domestica altera. Hirundo apus minor.
- Leimschwalbe; Laubenschwalben; Dachschwalben, Fensterschwalben; Kirchschwalben.
- Kramer, Austr. p. 380. n. 2. Speyerl.
- Rzaczynsky, hist. nat. Polon. p. 283. Hirundo agrestis.
- Faun. Arragon. p. 90.
- Zinnan, Uov. p. 48. tab. 7. Fig. 34. Rondone miuore.
- Donndorff, Handb. d. Thiergeesch. p. 295. n. 3. die Haus-schwalbe.

B. *Pennant*, arct. Zool. II. p. 403. ein Exemplar mit einem schwarzen Rumpfe.

Latham, Syn. II. 2. p. 565.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 574. n. 3. **B.** *Hirundo nigricans*, subtus alba, remigibus rectricibusque apice albis.

γ. Die weiße Häusenschwalbe. *

Beske, Vögel Kurl. p. 84. n. 198.

Naturforsch. I. p. 63. n. 12.

Zorn, Petinotheol. II. p. 52.

Borkhausen, Magazin, I. p. 194. ad n. 73.

17. PANAYANA. Die Schwalbe von Panay.

Latham, Syst. ornith. II. p. 574. n. 4. *Hirundo (Panayana) nigro-sericea*, subtus alba, fronte gulaque ferrugineo-flavis, gula lunula nigro-marginata.

Sommerat, Reis. n. Neuguin. p. 43. die Schwalbe von Antigua.

18. R U F A. Die Schwalbe mit braunrotem Bauche.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 574. n. 5. *Hirundo (Rufa) nigro-splendens*, subtus rufa, fronte albida.

19. C A P E N S I S. Die Capschwalbe.

Latham, Syst. ornith. II. p. 574. n. 6. *Hirundo (Capensis) nigro-caerulescens*, subtus flavescens nigricante striata, pileo rufo, rectricibus lateralibus macula alba.

4. R I P A R I A. Die Uferschwalbe. (10)

Müller, Natursyst. II. p. 632. n. 4. die Uferschwalbe.

Leske,

(10) Nach *Zorn* brütet sie gewöhnlich zwey Mal. Sie legt unter allen inländischen Schwalbenarten die kleinsten Eyer.

- Leske*, Naturgeschichte, p. 267. n. 4. die Uferschwalbe.
- Borowsky*, Thierreich, III. p. 156. n. 4. die Ufer-, Sand-, Strand-, Wasserschwalbe.
- Blumenbach*, Handb. der Naturgesch. p. 197. n. 3. Hirundo (Riparia) cinerea, gula abdomineque albis. *Uferschwalbe; Erdschwalbe.*
- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 554. n. 3. die Uferschwalbe.
- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. III. p. 60. *Ufer- oder Erdschwalbe.*
- Funke*, Naturgesch. p. 275. die Uferschwalbe.
- Ebert*, Naturl. II. p. 151. die Uferschwalbe.
- Halle*, Vögel, p. 251. n. 338. die Uferschwalbe.
- Gatterer*, vom Nutz. und Schad. der Thiere II. p. 440. n. 390. die Uferschwalbe; *Wasserschwalbe*, etc.
- Pennant*, arct. Zool. II. p. 403. n. 249. die Uferschwalbe.
- Onomat. hist. nat. IV. p. 244. die Erdschwalbe.
- Handb. der deutschen Thiergeesch. p. 140. *Uferschwalbe.*
- Klein*, av. p. 83. n. 3. Hirundo riparia.
- Klein*, Vorbereit. p. 155. n. 3. *Erdschwalbe; Ufer-, Sand-, Rhein-, Wasserschwalbe.*
- Klein*, verb. Vögelhist. p. 84. n. 3. *Uferschwalbe.*
- Klein*, Stemmat. av. p. 16. tab. 17. fig. 5. a — c.
- Klein*, Vögeleyer, p. 27. tab. 10. fig. 4.
- Gesner*, Vögelb. p. 460. *Rheinvogel oder Rheinschwalbe*; m. e. Fig.
- Brisson*, ornithol. I. p. 299. n. 12. Hirondelle de rivage.
- Batsch*, Thiere, I. p. 364. die Uferschwalbe.
- Latham*, Syst. ornithol. II. p. 575. n. 10. Hirundo (Riparia) cinerea, gula abdomineque albis.

- Bock*, N. G. von Preuss. IV. p. 450. *Rein-, Strand-, Uferschwalbe.*
- Fischer*, Liv. p. 105. n. 179. *Strandschwalbe.*
- Citti*, Sardin. II. p. 237. *die Uferschwalbe.*
- White*, N. G. von Engl. p. 33. n. 5. p. 50. n. 5.
p. 108. p. 109. p. 128 *die Uferschwalbe.*
- Pontoppidan*, Dännem. p. 175. n. 3. *Digsvale;*
Jordsvale, *Salbakke.*
- Zorn*, Petinotheol. II. p. 401. *die Wasserschwalbe.*
- Döbel*, Jägerprakt. I. p. 67. *die Uferschwalbe.*
- Naturforsch.* XVII. p. 112. n. 228. *die Uferschwalbe, Bergschwalbe.*
- Stralsund. Magaz.* I p. 22. *Strandschwalbe.*
- Hannöv. Magaz.* 1766. n. 97. p. 1546.
- Lichtenberg*, Magaz. für das Neueste, etc. II. I.
p. 201. *eine Art Schwalbe mit weißem Steifse?*
- Goeze*, nützl. Allerl. II. p. 401. *Uferschwalbe.*
- Beckmann*, Naturhist. p. 56. c. *die Erdschwalbe.*
- Borkhausen*, Magazin, I. p. 194. n. 74. *Uferschwalbe.*
- Meidinger*, Vorles. I. p. 151. n. 3. *die Uferschwalbe.*
- Linné*, Syst. Nat. Edit. II. p. 57. *Hirundo riparia.*
- Linné*, Syst. Nat. Edit. VI. p. 32. n. 4. *Hirundo riparia.*
- Linné*, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 192. n. 4. *Hirundo (Riparia) cinerea gula abdomineque albis.*
- Charleton*, onom. zoic. p. 90. n. 2. *Hirundo riparia; Drepanis; Falcula.*
- Kramer*, Austr. p. 381. n. 4. *Gestetten-Schwalbe.*
- Schwenkfeld*, av. Siles. p. 288. *Hirundo riparia; Ripariola. Ufer-Schwalbe; Rein-Schwalbe; Wasser-Schwalbe.*
- Sibbald*, Scot. illustr. p. 27. *Hirundo riparia.*

Rzaczynsky, hist. nat. Polon. p. 283. Hirundo riparia.

Foufzon, av. p. 117. Hirundo riparia.

Zinnan. Uov. p. 49. tab. 12. fig. 35. Rondine riparia.

Philos. Transact. LIII. art. 24. p. 101.

History of Scilly by *Heath*. p. 300?

Hermann, tab. affin. anim. p. 194. Hirundo riparia.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 396. n. 4. die Uferschwalbe.

20. RUPESTRIS. *Die Felsenschwalbe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 576. n. 11. Hirundo (Rupestris) murina, subtus albida, remigibus caudaque nigricantibus, rectricibus latere interiore macula ovali alba.

Scopoli, Beitr. aus der N. G. I. p. 207. n. 253. die Felsenschwalbe.

21. MONTANA. *Die Bergschwalbe.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 576 n. 12. Hirundo (Montana) cinerea subtus rufescens, rectricibus, duabus intermediis extimisque exceptis, latere interiore macula ovata alba.

5. PURPUREA. *Die Purpurschwalbe.* (1)

Müller, Natursyst. II. p. 630. n. 5. die Purpurschwalbe.

Gatterer, vom Nutz. und Schad. der Thiere, II. p. 440. n. 391. die Purpurschwalbe.

Pennant, arct. Zool. II. p. 403. n. 250. die Purpurschwalbe.

Onomat.

(1) *Pennant* und *Latham* rechnen auch die *Hirundo Violacea* p. 1026. n. 36. hieher; und letzterer nimmt die *Hirundo Subis* n. 7. als das Weibchen an.

Onomat. histor. natur. IV. p. 243. die Purpurschwalbe.

Briffon, ornithol. I. p. 302. n. 17. Martinet de la Caroline.

Latham, Syst. ornith. II. p. 578. n. 22. Hirundo (*Purpurea*) violacea, caeruleo-nitens, cauda forficata.

Seligmann, Vögel, III. tab. 2. die purpurfarbene Schwalbe.

Schöpf, Reis. durch Nordamer. II. p. 308. die Martinschwalbe.

Linné, Abhandl. II. p. 281. n. 23. die Purpurschwalbe.

Goeze, Natur, Menschenl. und Vorst. IV. p. 95. Purpur-Schwalbe.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 396. n. 5. die Purpurschwalbe.

6. *APUS*. *Die Mauerschwalbe.* (2) (eigentliche Spyr-schwalbe.)

Müller, Natursyst. II. p. 633. n. 6. die Mauer-schwalbe.

Leske, Naturgesch. p. 267. n. 5. die Mauerschwal-be, tab. 5. Fig. 9.

Borows-

(2) *Scopoli* und *Borkhausen* machen *Linné* den Vorwurf, dass er die Beschreibung dieses Vogels von todten Exemplaren genommen, wo es vielleicht gescheinen habe, als ob alle vier Zehen vorwärts stünden, welches sich aber nicht so verhalte, vielmehr stünde die vierte Zehe nur mehr seitwärts, so dass sie, wenn die übrigen ausgebreitet wären, mit denselben gleiche Richtung zu haben schiene. — *Latham* ist der Meinung, dass aus den vier Gattungen *Hirundo Apns*, *Melba*, *Cayenneensis*, und *Sinensis*, wegen der mancherley besondern Abweichungen wohl ein eigenes Geschlecht gemacht werden könne. *Ex digitis omnibus anticis, naribus ellipticis cum duplicatura in latere interno, mandibula quoque inferiore deflexa posset haec avis cum sequentibus* (die ich eben genannt habe,) *proprium genns constituere.* — *Scopoli* hat dies schon geäusseret, l. c. p. 207.

Borowsky, Thierreich, III. p. 157. n. 5. *die Mauer-, Steinschwalbe.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 198. n. 5. *Hirundo* (*Apus*) *nigricans*, *gula alba*, *digitis omnibus quatuor anticis*. *Mauerschwalbe*; *Steinschwalbe*; *Thurmschwalbe*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 554. n. 4. *die Mauerschwalbe.*

Funke, Naturgesch. I. p. 275. *die Mauerschwalbe.*

Ebert, Naturl. II. p. 151. *die Mauerschwalbe.*

Halle, Vögel, p. 351. n. 39. *die Mauerschwalbe*, Fig. 20.

Meyer, Thiere, II. tab. 85. *Mauerschwalbe.*

Gatterer, vom Nutz. und Schad. der Thiere, II. p. 140. n. 392. *die Mauerschwalbe*; *Spirschwalbe*; *Spyrschwalbe*, *Spiirschwalbe*; *Geyerschwalbe*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 404. n. 251. *die Mauerschwalbe.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 236. *die Spir-Schivalbe.*

Handb. der deutsch. Thiergeesch. p. 140. *Mauerschwalbe.*

Klein, av. p. 83. n. 4. *Hirundo muraria*, *saxatilis* f. *speluncaris*.

Klein, Vorbereit. p. 155. n. 4. *Mauerschwalbe.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 85. n. 4. *Mauerschwalbe*; *Spirschwalbe*.

Gesner, Vögelb. p. 461. *Spir*; *Spyrschwalb*; *Gerschwalb*; *Geyerschwalb*; m. e. zieml. gut. Fig.

Briffon, ornith. I. p. 301. n. 15. *Martinet.*

Batsch, Thiere, I. p. 363. *die Mauerschwalbe.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 582. n. 32. *Hirundo* (*Apus*) *nigricans*, *gula alba*, *digitis omnibus quatuor anticis*.

Beseke, Vögel Kurl. p. 85. n. 199. *die Mauerschwalbe.*

- Siemßen*, meklenb. Vögel, p. 151. n. 4. *die Mauerschwalbe*; *Peerdenschwälken*; *Spierschwälken*.
- Bock*, N. G. von Preuss. IV. p. 451. *die Mauerschwalbe*.
- Fischer*, Liv. p. 105. n. 180. *Mauerschwalbe*.
- Cetti*, Sardin. II. p. 232. *die Mauerschwalbe*.
- White*, N. G. von Engl. p. 34. n. 11. p. 43. p. 54. p. 59. n. 15. p. 115. p. 128. *die Thurmenschwalbe*.
- Pontoppidan*, Dännem. p. 175. n. 4. *Stensvale*; *Kirkesvale*.
- Linné*, Abhandl. II. p. 307. n. 144. *die Mauerschwalbe*.
- Siopoli*, Bem. a. d. N. G. I. p. 205. n. 251. *die Thurmenschwalbe*.
- Naturforsch. XVII. p. 113. n. 229. *die Mauerschwalbe*, n. 230. *die Kirchenschwalbe*?
- Zorn*, Petinotheol. II. p. 396. *Stein- oder Mauerschwalbe*.
- Döbel*, Jägerprakt. I. p. 67. *Thurm- oder Mauerschwalbe*.
- Goeze*, nützl. Allerl. II. p. 401. *Thurmenschwalbe*; p. 402 *Pier- oder Spyrschwalbe*.
- Borkhausen*, Magazin, I. p. 195. n. 75. *Mauerschwalbe*.
- Stralsund. Magaz. I. p. 22. *die Thurmenschwalbe*.
- Meidinger*, Vorles. I. p. 131. n. 4. *die Mauerschwalbe*.
- Linné*, Syst. Nat. Edit. II. p. 57. *Hirundo apus*.
- Linné*, Syst. Nat. Edit. VI. p. 32. n. 3. *Hirundo apus*.
- Linné*, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 192. n. 5. *Hirundo (Apus) nigricans*, *gula alba*, *digitis omnibus quatuor anticis*.
- Charleton*, onom. zoic. p. 90. n. 3. *Hirundo apus maior*.

Kramer, Austr. p. 380. n. 3. *Hirundo tota nigra*,
gula albicante. *Speyer*; *große Thurmenschwalbe*.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 289. *Hirundo IV.* *Hi-*
rundo muraria; *Apes*; *Depes*. *Mauerschwal-*
be; *Geyer Schwalbe*; *Spir Schwalbe*.

Sibbald, Scot. illustr. II. p. 31. *Hirundo apus*.

Rzaczynsky, hist. nat. Pol. p. 283. *Hirundo mu-*
ratia seu saxatilis.

Faun. Arragon. p. 90.

Zinnan. Uov. p. 47. tab. 7. Fig. 33 *Rondone*.

Donndorff, Handb. der Thiergeesch. p. 396. n. 6.
Mauerschwalbe.

32. SINENSIS. *Die chinesische Schwalbe*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 583. n. 35. *Hirun-*
do (Sinensis) fusca, *subtus griseo-rufescens*,
pileo rufo, *gula orbitisque albis*.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 155. *die*
große chinesische Schwalbe.

7. SUBIS. *Die kanadische Schwalbe. (3)*

Müller, Natursyst. II. p. 633. n. 7. *die kanadische*
Schwalbe.

Onomat. hist. nat. IV. p. 247. *die Schwalbe von*
der Hudsonbay.

Klein, verb. Vögelhist. p. 86. n. 7. *Hudsons Mauer-*
schwalbe.

Brisson, ornith. I. p. 302. n. 18. *Hirondelle de*
la Baye de Hudson.

Latham, Syst. ornith. II. p. 578. n. 22. *H. nigro-*
caerulescens, *ore subtusque cinereo-exalbida*.

Seligmann, Vögel, V. tab. 15. *die große amerika-*
nische Schwalbe.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 192. n. 6 *Hirun-*
do (Subis) nigro-caerulescens, *ore subtusque*
cinereo-exalbida.

8. SENE-

(3) Nach *Latham* das Weibchen von *Hirundo Purpurea*, n. 5.

8. SENECALENSIS. *Die senegalische Schwalbe.*

Müller, Natursyst. II. p. 634. n. 8. *die senegalische Schwalbe.*

Briffon, ornithol. I. p. 296. n. 5. *Hirondelle du Sénégal.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 574. n. 7. *Hirundo (Senegalensis) nigra, caeruleo-nitens, subtus uropygioque rufa, remigibus rectricibusque nigris.*

23. AMBROSIACA. *Die Ambraschwalbe.*

Halle, Vögel, p. 348. n. 334. *die Ambraschwalbe; holländische Seeschwalbe.*

Onomat. histor. natur. IV. p. 239. *Ambraschwalbe.*

Klein, av. p. 82. n. 4. *Hirundo ambram griseam redolens.*

Klein, Vorbereit. p. 153. n. 4. *Amberschwalbe.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 84. n. 5. *Ambraschwalbe.*

Briffon, ornithol. I. p. 300. n. 13. *Hirondelle de Rivage de Senegal.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 575. n. 9. *Hirundo (Ambrosiaca) griseo-fusca, subtus dilutior, cauda maxime forficata.*

Seba mus. I. p. 102. tab. 66. Fig. 4. *Hirundo marina indigena.*

β. *H. cinerascens, subtus cinereo-alba, cauda elongata maxime forficata.* *

Latham, Syst. ornithol. II. p. 575. n. 9. β. —
Syn. Suppl. p. 193.

24. FASCIATA. *Die weißbäuchige Schwalbe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 575. n. 8. *Hirundo (Fasciata) nigra, fascia abdominis, maculaque femorum albis.*

9. T A P E R A. Die brasiliische Schwalbe.

Müller, Natursystem, II. p. 634. n. 9. die amerikanische Schwalbe.

Onomat. histor. natur. IV. p. 248. die Amerikanische Tapera.

Klein, av. p. 83. n. 1. Hirundo americana, Tapera dicta.

Klein, Vorbereit. p. 155. n. 1. die amerikanische Tapera.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 85. n. 5. Tapera.

Brisson, ornith. I. p. 298. n. 10. Hirondelle d'Amérique.

Latham, Syst. ornith. II. p. 579. n. 23. Hirundo (Tapera) rectricibus subaequalibus, corpore fusco subtus griseo-fusco, abdomine albo.

Fonscol, av. p. 198. Tapera.

25. T O R Q U A T A. Die Schwalbe mit der braunen Brustbinde.

Latham, Syst. ornith. II. p. 579. n. 24. Hirundo (Torquata) fusca, subtus alba, fascia pectorali femoribusque fuscis.

26. L E U C O P T E R A. Die weißflügelige Schwalbe.

Latham, Syst. ornith. II. p. 579. n. 25. Hirundo (Leucoptera) cinerea caeruleo-nitens, subtus uropygio aliquo nebulofo albis.

β. Latham, Syn. II. 2. p. 517. n. 27. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 579. n. 25. β. H. supra fusca subtus alba, fusco-maculata.

10. P E L A S G I A. Der Stachelschwanz. (4)

Müller, Natursystem, II. p. 634. n. 10. die carolinische Schwalbe.

Halle,

(4) Bewohnt viele Theile von Nordamerika. Kömmt in Neuyork, und Pensylvanien bisweilen früh, bisweilen spät im May an.

Halle, Vögel, p. 353. n. 341. die Amerikanische Schwalbe mit gestachlten Schwänze.

Pennant, arct. Zool. II. p. 405. n. 252. der Stachelschwanz, tab. 18.

Onomat. hist. nat. IV. p. 241. die amerikanische Schwalbe mit dem spitzen Schwänze.

Klein, av. p. 84. n. 6. Hirundo cauda vel sexies divisa.

Klein, Vorbereit. p. 156. n. 6. Schwalbe mit wohl sechsmal getheiltem Schwänze.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 86. n. 9. Schwalbe mit vielmal getheiltem Schwänze.

Brisson, ornith. I. p. 298. n. 9. Hirondelle de la Caroline.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 581. n. 30. Hirundo (Pelasgia) fusca gula albida, rectricibus aequalibus apice nudo subulatis.

Seligmann, Vögel, IV. tab. 107. die amerikanische Schwalbe mit dem flachlichten Schwänze.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 192. n. 7. Hirundo (Pelagica) rectricibus aequalibus, apice subulatis nudis.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 397. n. 7. der Stachelschwanz.

β . *Pennant*, arct. Zool. II. p. 405. ad n. 252. unten.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 581. n. 30. β .

γ . *Latham*, Syst. ornithol. II. p. 581. n. 30. γ .

27. ACUTA.

Bauet in Schornsteinen, und macht aus kleinen kurzen Reisern, die sie mit dem Gummi des Pechbaums zusammen klebt, ein merkwürdiges Nest, das an der Spitze offen ist, und die Form des dritten Theils von einem Cirkel hat. Sie legt im Junius 4. bis 5. Eyer, und verlässt das Land im August. Sie hängen oft mit den Füßen fest an der Schornsteinwand, und halten sich mit ihrem scharfen Schwänze.

27. **A C U T A.** *Die martinikische spitzschwänzige Schwalbe.* (5)

Briffon, ornithol. I. p. 297. n. 8. *Hirondelle de la Martinique.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 581. n. 31. *Hirundo (Acuta) nigra subtus fusca, gula grisea, rectricibus apice nudo subulatis.*

3. *Latham*, Syst. ornith. II. p. 581. ad n. 31. *H. corpore subtus rubro-fusco.*

II. **M E L B A.** *Die Alpenschwalbe.*

Müller, Natursyst. II. p. 634. n. 11. *die spanische Schwalbe.*

Halle, Vögel, p. 352. n. 340. *die größte Gibraltarschwalbe.*

Onomat. histor. natur. IV. p. 240. *die große Gibraltarschwalbe.*

Klein, av. p. 83. n. 2. *Hirundo maxima freti Hudsonis.*

Klein, Vorbereit. p. 155. n. 2. *große Gibraltarschwalbe.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 85. n. 6. *Gibraltar-schwalbe; barbarische Schwalbe.*

Briffon, ornithol. I. p. 299. n. 11. *grande Hirondelle d'Espagne.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 582. n. 33. *Hirundo (Melba) griseo-fusca, gula abdomineque albis.*

Seligmann, Vögel, II. tab. 53. *die größte Schwalbe.*

Cetti, Sardin. II. p. 232. *die Gibraltarschwalbe.*

White, N. G. von Engl. p. 125. *große weißbäuchige Gibraltarsche Schwalbe.*

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 207. n. 252. *die Alpenschwalbe.*

Eee 2 Linne,

(5) Sollte sie wohl von der vorigen wesentlich verschieden seyn?

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 192. n. 8. Hirundo (Melba) fusca, gula abdomineque albis.

28. CAYENNENSIS. *Die cayennische Schwalbe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 583. n. 34. Hirundo (Cayanensis) violaceo-nigricans, capite nigro, gutture fascia oculari bifida, femoribusque albis.

29. DAURICA. *Die sibirische Schwalbe.*

Müller, Natursyst. Suppl. p. 179. n. 13. die russische Schwalbe.

Müller, Natursyst. Suppl. p. 179. n. 14. die sibirische Bergschwalbe.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 576. n. 13. Hirundo (Daurica) caerulea, subtus alba, temporibus uropygioque ferrugineis, rectrice extima, longissima, macula alba intus notata.

Pallas, Reis. Ausz. II. Anh. p. 10. n. 19. Hirundo alpestris.

Berlin. Samml. IV. p. 565. daurische Steinschwalbe; m. e. Fig.

29. ERYTHROCEPHALA. *Dierothköpfige Schwalbe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 577. n. 14. Hirundo (Erythrocephala) nigricans, supra alba marginata, subtus alba, capite rubro, alis caudaque fusca.

30. UNALASCHKENSIS. *Die Schwalbe von Unalashka.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 577. n. 15. Hirundo (Aoonataschkenensis) nigricans, subtus cinerascens, uropygio albido.

31. INDICA. *Die indische Schwalbe.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 577. n. 16. Hirundo (Indica) fusca, pileo rufo, corpore subtus albido.

32. NIGRA.

32. NIGRA. *Die schwarze Schwalbe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 577. n. 17. Hirundo (Nigra) tota nigra, alis longissimis, cauda forficata.

B. Latham, Syst. ornithol. II. p. 577. ad n. 17. H. fascia frontali alba.

33. DOMINICENSIS. *Die Schwalbe von St. Domingo.*

Halle, Vögel, p. 353. n. 342 die Gesangschwalbe. Onomat. hist. nat. IV. p. 237. die Gesangschwalbe. Klein, av. p. 83. n. 5. Hirundo cantu alaudam referens.

Klein, Vorbereit. p. 156. n. 5. Sangschwalbe.

Klein, verb. Vögelhist. p. 86. n. 8. Sangschwalbe.

Briffon, ornith. I. p. 295. n. 3. Hirondelle de St. Domingue.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 577. n. 18. Hirundo (Dominicensis) nigro-chalybea, abdomine albo rectricibus nigricantibus.

Feuillée observat. III. p. 267. Hirundo cantu alaudam referens.

34. PERUVIANA. *Die Schwalbe von Peru.*

Briffon, ornithol. I. p. 297. n. 7. grande Hirondelle de Peru.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 577. n. 19. Hirundo (Peruviana) nigra subtus albá, fascia abdominali cinerascente, alis caudaque pallide griseis.

Feuillée, obs. III. p. 269. Autre Hirondelle ou Hirundo maxima Peruviana. Avis praedatoris calcaribus instructa?

35. CINEREA. *Die graubäuchige Schwalbe.*

Briffon, ornith. II. p. 297. n. 6. Hirondelle du Peru.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 578. n. 20. Hirundo (Cinerea) nigra nitens, subtus cinerea, rectricibus margine griseo-flavescens.

Feuillee, obs. III. p. 269. Hirondelle, ou Hirundo minima Peruviana cauda bicorni?

36. VIOLACEA. Die violette Schwalbe.

Ist nach *Pennant*, und *Latham* mit *Hirundo Purpurea*, p. 1020. n. 5. einerley.

37. CHALYBEA. Die stahlglänzende Schwalbe.

Brissot, ornithol. II. p. 296. n. 4. Hirondelle de Cayenne.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 578. n. 21. Hirundo (Chalybea) nigro-chalybea, subtus fusco-grisea, rectricibus nigris.



Thomasi diff. de hibernaculis hirundinum. Lips. 1658. 1671. 1702.

Bresl. Nat. u. Kunstgesch. VII. Vers. p. 321. VIII. p. 457. XIX. p. 283. XXVIII. p. 409. Von der Wiederkunft der Störche und Schwalben.

Neu hamburg. Magaz. XVIII. St. p. 195. Von dem Winteraufenthalt der Schwalben.

Hamburg. Magaz. IV. p. 406. desgl.

Koburg. Magaz. I. p. 45 desgl.

Neues brem. Magaz. I. p. 412. desgl. V. p. 151.

Oekonom. phys. Ausz. VI. p. 116. IX. p. 140. desgl.

Hannov. Magaz. 1766 p. 1201. — 1767. p. 79. 315. 1021. 1437 — 1769. p. 167 desgl.

Comment. Lipl. Vol. XIII. p. 667. desgl.

Titius: Wittenb. Wochentbl. 1771. p. 78. desgl. XXIII. p. 453.

Leche: diff. de commoratione hybernalii et peregrinationibus Hirundinum. Aboae 1764.

Vogel,

- Vogel*, neue medicin. Bibl. VI. B. 4. St. p. 296.
Büffon, Naturgeschichte der Vögel, I. Einleitung, p. XXII. sqq.
Stralsund. Magaz. I. p. 20. desgl. p. 145.
Sperling, diss. de Hirundine. Wittenb. 1635. 4.
Heunius de hirundinum usu et efficacia in medica-
cina Gryphisw. 1652.
Praetorius, von des Storches und der Schwalben
Winterquartier. Fref. 1678. 8.
White de hirundine domestica. Phil. Transact.
LXIV. p. 196.
White de hirundine rustica, Apo et riparia. ib.
LXV. p. 258.
Ledel de hirundine alba. — Eph. nat. cur. Dec.
III. an. 1. obs. 54. p. 84.
Wallin, diss. de hirundine alba. Ups. 1733. 4.
Oeuvres de *Regnard*, Tom. I. p. 121. (von erstarr-
ten Schwalben.)
Barrington, miscellan. p. 225. (vom Win-
terschlaf der Schwalben in Sümpfen.)
Praetorius Winterflucht der nordischen Sommer-
vögel. Lpzg. 1678 8.
Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 446. vom Win-
teraufenthalt der Schwalben.
Klein, Abhandl. der Danziger Gesellsch. I. p. 474.
Klein, av. p. 195. — Vorbereit. p. 357. —
Verb. Vögelhist p. 208.
Olaus M. de gent. septentr. XIX. p. 20.
Rzaczynsky, hist. nat. Polon. p. 284.
Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 87.
Borkhausen, Magaz. I. p. 193.
Smellie, Philos. der Naturgesch. II. p. 235.
Beckmann, phys. Bibl. I. p. 187. V. p. 203.
Pallas, Reis. Ausz. II. p. 8.
Fischer, N. G. von Livil. p. 106.
Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 613.

- Deutsche Zeit. 1784. p. 24. — *Goeze*, nützl.
 Allerl. II. p. 244. List einer Schwalbe.
Goeze, nützl. Allerl. II. p. 57. ob die Rauch-
 schwalben die Kühe stechen? — I. p. 452.
 verspätete Schwalben.
 Onomat. hist. nat. IV. p. 218.
Zorn, Petinotheol. I. p. 432. 435. 442. 451. II.
 p. 159.
-

*Veränderungen gegen die XII. Edition, und Ver-
 mehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Edit. XII.

p. 345. n. 12. Hirundo Pra-

Edit. XIII.

p. 695. n. 1. Glareola Au-
 tincola.

Das Geschlecht ist mit 25. Gattungen vermehrt.
 Da aber die 12te Gattung der XII. Edit. anderswohin
 versetzt, und deren Stelle durch eine neue ersetzt wor-
 den; so beträgt die Anzahl der neu hinzugekommenen
 Gattungen überhaupt 26 — Bey der 1sten Gattung
 sind *zwey*, bey der 3ten *zwey*, bey der 10ten *drey* Va-
 rietäten aus einander gesetzt.

**118. GESCHLECHT. CAPRIMULGUS. Die
 Nachtschwalbe. (Tagsehläfer; Ziegenmelker.)**

Müller, Natursyst. II. p. 636. Gen. CXVIII.

Leske, Naturgeschichte, p. 267. Gen. XLVIII.

Borowky, Thierreich, III. p. 151. Gen. LXIV.

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 198. Gen.
 XL.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 551. Gen. LXXVII.

Pennant, a ct. Zool. II. p. 406.

Onomat. hist. nat. II. p. 607.

Klein, av. p. 81. trib. I.
Brisson, ornithol. I. p. 289. Gen. XXIX.
Batsch, Thiere, I. p. 318. Gen. LXXXII.
Latham, Syst. ornith. II. p. 583. Gen. XLVII.
Hermann, tab. affin. anim. p. 229.
Donndorff, Handb. d. Thiergeichichte, p. 397.
Gen. LXXXVII.

I. EUROPAEUS. Die europäische Nachtschwalbe. (6)

Müller, Natursyst. II. p. 636. n. I. die europäische Nachtschwalbe; tab. 21. Fig. 7.

Leske, Naturgesch. p. 268. n. I. die europäische Nachtschwalbe.

Borowsky, Thierreich, III. p. 152. n. I. der Nachtrabe; Tagschläfer; tab. 64.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 198. n. I. Caprimulgus (Europaeus) narium tubulis obsoletis.

Nachtschwalbe, Ziegenmelker; Ziegensauger; Hexe; Nachtrabe.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 571. die europäische Nachtschwalbe.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 665. Nachtrabe.

Funke, Naturgesch. I. p. 330. die Nachtschwalbe.

Ebert, Naturl. II. p. 153. Ziegenmelker; bärige Schwalbe.

Halle, Vögel, p. 345. n. 330. die große Nachtschwalbe.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 441. n. 394. die Nachtschwalbe.

Pennant, arct. Zool. II. p. 408. A. der europäische Ziegenmelker.

Neuer Schapl. d. Nat. X. p. 216. Ziegenmelker.

Eee 5 Onomat.

(6) Die Sage, dass der Vogel die Ziegen ausmelke, hat sich von Aristoteles Zeiten bis hieher fortgepflanzt. Auch Aelian giebt sie, nach seiner gewöhnlichen Art, für Wahrheit aus.

- Ouomat.** hist. nat. II. p. 607. *Tagschläfer.*
Handb. der Naturgesch. II. p. 148. *Hexe.*
Handb. der deutsch. Thiergeesch. p. 141. *Nacht-schwalbe*, etc.
Klein, av. p. 81. n. 1. *Hirundo caprimulgus.*
Klein, Vorbereit. p. 152. n. 1. *grossbärtige Schwal-be; Hexe; Milchauger; Ziegensauger; Kindermelker; Tagschläfer; Nachtschade; Nacht-vogel; Pfaffe.*
Klein, verb. Vögelh. p. 83. n. 1. *Hexe.*
Klein, Stemmat. av. p. 15. tab. 17. Fig. 1. $\alpha - \gamma$.
Gesner, Vögelb. p. 49. *Caprimulgus.*
Briffon, ornithol. I. p. 289. n. 1. *Tette-chevre; Crapaud-volant.*
Biffon, pl. enl. p. 193. *Crapaud-volant.*
Batsch, Thiere, I. p. 365. *Geismelker.*
Latham, Syn. Suppl. p. 194. *European Goat-sucker.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 584. n. 5. *Caprimulgus (Europaeus) niger, cinereo fusco ferugineo et albo varius, subtus albo-rufescens, fasciis fuscis.*
Beseke, Vögel Kurl. p. 85. n. 200. *die europäische Nahtschwalbe.*
Siemßen, meklenb. Vögel, p. 153. n. 1. *die euro-päische Nachtschwalbe; Dagschlap.*
Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 452. *Nachtschwal-be, Nachtschatten.*
Fischer, Livil. p. 108. n. 181. *Nachtschwalbe.*
Cetti, Sardin. II. p. 238. *die Nachtschwalbe; Zie-genmelker.*
White, N. G. von Engl. p. 84. n. 18. p. 38. p. 60. n. 19. *Ziegenmelker.*
Pallas, Reise Ausz. I. p. 370. *Nachtschwalbe.*
Pallas, nord. Beytr. III. p. 15. *Nachtschwaibe.*

- Pontoppidan*, Dänem. p. 175. n. 1. *Natravn*;
Natskade; *Aftenbakke*.
- Linné*, Abhandl. II. p. 283. n. 37. p. 307. n. 145.
europeische Nachtschwalbe.
- Linné*, Reis. durch Westgothland, p. 34. (das
Nest.)
- Naturforsch. XVII. p. 114. n. 231. XXI. p. 199.
Nachtschatten; *Ziegenmelker*.
- Schwed. Abhandl. XXXVIII. p. 297. *Nacht-
schwalbe*.
- Lange*, Briefe zur Naturgesch. p. 40. *Tagschläfer*.
- Scopoli*, Bem. aus der N. G. p. 209. n. 254. *gemei-
ne Geismelker*.
- Lichtenberg*, Magaz. I. 3. p. 59. *Nachtschwalbe*;
tab. 3. Fig. 4. (der Fuß.)
- Lichtenberg u. Voigt*, Magaz. V. 2. p. 17. *Zie-
genmelker*.
- Schneider*, zool. Abhandl. p. 144. *die Nacht-
schwalbe*.
- Goeze*, nützl. Allerl. II. p. 402. III. p. 295. *Zie-
genmelker*.
- Naumann*, Vogelsteller, p. 154. *der Tagschläfer*.
- André u. Bechstein*, Spatzierg. I. p. 342. *der Tag-
schläfer*.
- Mannigfaltigk. III. p. 11. *Ziegensauger*.
- Eberhard*, Thiergesch. p. 78. *Ziegensauger*.
- Beckmann*, Naturhist. p. 56. *Nachtschwalbe*.
- Jablonsky*, allgem. Lex. p. 715. *Nachtrabe*.
- Meidinger*, Vorles. I. p. 151. *Nachtschwalbe*.
- Borkhausen*, Magaz. p. 196. n. 76. *Nachtschwalbe*.
- Linné*, Syst. Nat. Ed. II. p. 57. *Caprimulgus*.
- Linné*, Syst. Nat. Edit. VI. p. 32. n. 5. *Capri-
mulgus*.
- Linné*, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 193. n. 1. *Capri-
mulgus (Europaeus) narium tubulis obsoletis*.

- Linné*, Syst. Nat. Ed. XII. I. p. 346. n. 1. *Caprimulgus (Europaens) narium tubulis obsoletis.*
- Charleton*, onom. zoic. p. 71. n. 8. *Caprimulgus.*
- Möhring*, av. gen. p. 46. n. 38 *Hirundo.*
- Kramer*, Austr. p. 381. n. 5. *Hirundo cauda integra, ore setis ciliato. Muckenstecher; Nachtrabl.*
- Schwenkfeld*, av. Siles. p. 232. *Caprimulgus. Fur nocturnus. Connilus nocturnus. Nachtschade; Tageschläffer; Nacht-Räblin; Nachtvogel; Pfaff.*
- Rzaczynsky*, auch hist. nat. Pol. p. 369. *Caprimulgus.*
- Schaeffer*, element. ornithol. tab. 23.
- Gerin*, ornithol. I. p. 91. tab. 99.
- Faun. Arragon. p. 91. — Hist. Selb. p. 62. 94.
- Hist. Prov. I. p. 338. Chathuant.
- Zinnan*, Uov. p. 94. tab. 15. Fig. 84. Covaterra.
- Hermann*, tab. affin. anim. p. 176. 229.
- Plin*. hist. nat. L. 10. c. 40. *Caprimulgi.*
- Aristot*. hist. anim. L. 9. c. 39. n. 213. Αιγοθηλας.
- Aelian*. de nat. anim. L. 3. c. 39. L. 16. c. 22. Αιγοθηλας.
- Donndorff*, Handb. der Thiergesch. p. 398. n. 1. *die europäische Nachtschwalbe.*

3. VIRGINIANUS. *Die langfittige Nachtschwalbe.*

- Klein*, av. p. 81. ad n. 1. *Whip Poor Will.*
- Klein*, Vorbereit. p. 152. *Whip Poor Will.*
- Klein*, verbess. Vögelhistor. p. 83. *Whippoorwill.*
- Brisson*, ornith. I. p. 291. *Tette chevre de Virginie.*
- Pennant*, arct. Zool. II. p. 407. n. 254. *der langfittige Ziegenmelker; tab. 18. ob. Fig.*
- Latham*, Syn. Suppl. p. 194. *Virginia Goat sucker.*
- Latham*, Syst. ornithol. II. p. 585. n. 6. *Caprimulgus (Virginianus) fusco-nigricante rufescente cine-*

cinereoque varius, subtus albidus fasciis nigricantibus, gula lunula alba.

Seligmann, Vögel, III. tab. 21. der *Whip-Poor-Will*, oder kleine *Geismelker*.

Seligmann, Vögel, IV. tab. 112. der *Whip-Poor-Will*, oder der kleine amerikanische *Geismelker*.

Carver, Reis. d. Nordamer. p. 385. die *Nachtschwalbe*.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 193. n. 1. *B. Caprimulgus minor americanus*.

Gerin. ornithol. I. p. 92. tab. 100.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 398. der *langfittige Ziegenmelker*.

4. CAROLINENSIS. Die kurzfittige Nachtschwalbe.

Halle, Vögel, p. 347. n. 331. die karolinische *Nachtschwalbe*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 406. n. 253. der *kurzfittige Ziegenmelker*.

Onomat. hist. nat. II. p. 608. der *Tagschläfer von Carolina*.

Klein, av. p. 81. ad n. 1. *Caprimulgus Carolinensis Catesbeji*.

Klein, Vorbereit. p. 152. der *karolinische Ziegensauger*.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 83. die *carolinische Nachtschwalbe*.

Briffon, ornithol. I. p. 290. n. 2. *Tette-chèvre de la Caroline*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 584. n. 4. *Caprimulgus (Carolinenesis) griseo nigricanteque undulatus, subtus griseo-rufescens, lineolis nigricantibus, rectricibus tribus exterioribus latere intiore albis*.

Seligmann, Vögel, I. tab. 16. der *carolinische Nachtrab oder Geismelker*.

5. GRISEUS. Die graue Nachtschwalbe.

Latham, Syst. ornith. II. p. 584. n. 3. Caprimulgus (Griseus) griseus alis nigricantibus griseofasciatis, rectricibus fasciis fuscis.

6. JAMAICENSIS. Die Nachtschwalbe von Jamaica.

Halle, Vögel, p. 347. n. 333. die flachköpfige Nachtschwalbe.

Klein, av. p. 82. n. 3. Hirundo caprimulgi species, Guirequerell.

Klein, Vorbereit. p. 153. n. 3. eine Abart von unserm Ziegenmelker aus Jamaika.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 84. n. 4. zweyter Brasilianer.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 584. n. 2. Caprimulgus (Jamaicensis) ferrugineus, nigro-striatus, alis albo variegatis, remigibus fuscis maculis albis, rectricibus fasciis nigris.

7. GRANDIS. Die große Nachtschwalbe.

Briffon, ornith. I. p. 293. n. 7. Grand-Tette-chèvre tacheté du Bresil.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 583. n. 1. Caprimulgus (Grandis) nigricante albo flavescenteque variegatus, subtus albo nigroque varius, area oculorum flavescente, pedibus albis.

Fonston, av. p. 191. Ibijau species magnitudine Noctuae.

8. ALBICOLLIS. Die weißkehlig Nachtschwalbe.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 585. n. 7. Caprimulgus (Albicollis) rufo fuscus, albo nigricanteque varius, subtus fuscus nigricanteque transversim lineatus, gula macula triangulari alba.

9. RUFUS. Die rothbraune Nachtschwalbe.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 586. n. 9. Caprimulgus (Rufus) rufus nigro-varius, tectricibus alarum corporeque subtus fasciis nigricantibus, remigibus rufo-nigroque, rectricibus nigro-fasciatis.

10. GUIANENSIS. Die guianische Nachtschwalbe.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 586. n. 8. Caprimulgus (Guianensis) fulvus, maculis difformibus, striisque rufis notatus, sub, gula lunula alba.

11. BRASILIANUS. Die brasiliatische Nachtschwalbe.

Halle, Vögel, p. 348. n. 335. die Amerikanische Nachtschwalbe.

Onomat. hist. nat. II. p. 609. der Ibijau; brasiliische Tageschläffer.

Klein, Vorbereit. p. 84. n. 3. Brasiliander; Ibijau.

Brisson, ornithol. I. p. 292. n. 6. Tette-chèvre tacheté du Brésil.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 586. n. 10. Caprimulgus (Brasilianus) nigricans, flavescente varius, punctulis albis, subtus albo nigroque varius, area oculorum flavescente-alba.

Möhring, av. gen. p. 83. n. 110. Nycticorax.

Fouston, av. p. 191. Ibijau Brasiliensis, Noitibo Lusitanis.

12. SEMITORQUATUS. Die Nachtschwalbe mit weißem Halsbande.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 586. n. 11. Caprimulgus (Semitorquatus) nigricans, rufo griseo-que maculatus, collo inferiore lunula alba.

13. CAYENNENSIS. *Die cayennische Nachtschwalbe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 587. n. 12. Caprimulgus (Cayanus) rufo griseoque varius, nigro undulato-lineatus, gula fascia que alarum alba, temporibus rufis, striis 5. nigris.

14. ACUTUS. *Die spitzschwänzige Nachtschwalbe.*

Latham, Syn. Suppl. p. 195. Sharp-tailed Goat-sucker.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 587. n. 13. Caprimulgus (Acutus) nigricante fasciatus, supra griseus subtus rufus, capite colloque rufo-fuscis, rectricibus apice subulatis.

2. AMERICANUS. *Die amerikanische Nachtschwalbe.*

Müller, Natursyst. II. p. 638. n. 2. der Geismelker; tab. 26. Fig. 4.

Borowsky, Thierreich, III. p. 153. n. 2. der amerikanische Tagschläfer.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 442. n. 395. die amerikanische Nachtschwalbe.

Halle, Vögel, p. 347. n. 332. die Nachtschwalbe mit 2. Röhren auf der Nase.

Klein, av. p. 81. n. 2. Hirundo Jamaicensis, naribus conspicilia mentientibus.

Klein, Vorbereit. p. 153. n. 2. Brillennase.

Klein, verb. Vögelh. p. 83. n. 2. Brillennase.

Briffon, ornith. I. p. 291. n. 4. Tette-chèvre de la Jamaique.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 587. n. 14. Caprimulgus (Americanus) toto corpore griseo nigro et xerampelino variegatus, naribus cylindraceis.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 193. n. 2. Caprimulgus (Americanus) narium tubulis eminentibus.

Möhring, av. gen. p. 47. n. 40. Caprimulgus.

Barrere, Franc. equinox. p. 147. *Strix sylvatica* maior, pulla. *Noctua minor*, ex pallido et fuscō varia.

15. TORQUATUS. *Die Nachtschwalbe mit goldenem Halsbande.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 587. n. 15. *Caprimulgus (Torquatus) cinereo-fuscus*, maculis obscure flavis et albicantibus varius, torque aureo, rectricibus binis intermediis longioribus.

A. Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Edit. XII.

p. 346. n. 1. *β.* *Capr. min.* p. 1028. n. 3. *Caprimulgus americ.*

Edit. XIII.

Virginianus.

Das Geschlecht ist mit dreyzehn Gattungen vermehrt.

B. Neuere Gattungen.

1. Die asiatische Nachtschwalbe.

Latham, Syn. Suppl. p. 195. n. 16. *Bombay Goat-sucker.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 588. n. 16. *Caprimulgus (Asiaticus) cinerascens*, nigro ferrugineoque nebulosus, pectore fasciis cinereis, striga verticali nigricante, maxillari maculaque gulae pallidis.

2. Die indianische Nachtschwalbe.

Latham, Syn. Suppl. p. 196. n. 17. *Indian Goat-sucker.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 588. n. 17. *Caprimulgus (Indicus) cinerascens*, nigro transversim

II. Band II. Th.

Fff

lineatus,

lineatus, genis pectore alisque ferrugineo-maculatis, rectricibus caerulecentibus nigro-fasciatis, extima ferrugineo nigroque varia.

3. Die gehäubte Neuholländische Nachtenschwalbe.

Latham, Syst. ornith. II. p. 588. n. 18. *Caprimulgus* (*Novae Hollandiae*) *fusco nigro albidoque nebulosus*, *subtus albidus*, *collo pectore que fasciis obscuris*, *crista frontali erecta setacea*.

Phillips, bot. Bay, tab. p. 270. *Crested Goat-sucker.*

White, Reis. nach Neu-Süd-Wallis, p. 129. *der gehäubte Ziegenmelker.*

Meyer, zool. Entdeck. p. 58. n. 1. *Caprimulgus* (*Cristatus*) *cinereo fuscus*, *subtus pallidus*, *remigibus caudaque fasciis pallidis numerosis*, *vibrissis utrinque erecto-cristatis.*

Wiederhohlung der neu hinzugekommenen Gattungen.

In dem Geschlecht	Vultur.	g. Gattungen.
— —	Falco.	84. —
— —	Strix.	32. —
— —	Lanius.	28. —
— —	Psittacus.	94. —
— —	Ramphastos.	8. —
— —	Buceros.	8. —
— —	Buphaga.	—
— —	Crotophaga.	1. —
— —	Glaucopis.	1. —
— —	Corvus.	26. —
— —	Coracias.	11. —
— —	Oriolus.	32. —
— —	Gracula.	4. —
— —	Paradisea.	6. —
— —	Trogon.	4. —
— —	Bucco.	16. —
— —	Cuculus.	26. —
— —	Yunx.	1. —
— —	Picus.	32. —
— —	Sitta.	5. —
— —	Todus.	14. —
— —	Alcedo.	26. —
— —	Merops.	14. —
— —	Upupa.	5. —
— —	Certhia.	29. —
— —	Trochilus.	33. —
— —	Anas.	79. —

627. Gattungen.

Fff 2

Von

Von umstehender Seite	627. Gattungen.
In dem Geschlecht <i>Mergus</i> .	2. —
— — —	Alca. 7. —
— — —	<i>Aptenodytes</i> . 9. —
— — —	<i>Procellaria</i> . 17. —
— — —	<i>Diomedea</i> . 3. —
— — —	<i>Pelecanus</i> . 24. —
— — —	<i>Plotus</i> . 2. —
— — —	<i>Phaëton</i> . 2. —
— — —	<i>Colymbus</i> . 17. —
— — —	<i>Larus</i> . 9. —
— — —	<i>Sterna</i> . 19. —
— — —	<i>Rynchops</i> —
— — —	<i>Phoenicopterus</i> . 1. —
— — —	<i>Platalea</i> . —
— — —	<i>Palamedea</i> . —
— — —	<i>Mycteria</i> . —
— — —	<i>Cancroina</i> . —
— — —	<i>Scopus</i> . 1. —
— — —	<i>Ardea</i> . 59. —
— — —	<i>Tantalus</i> . 14. —
— — —	<i>Corrra</i> . 1. —
— — —	<i>Scolopax</i> . 29. —
— — —	<i>Tringa</i> . 18. —
— — —	<i>Charadrius</i> . 20. —
— — —	<i>Recurvirostra</i> . 1. —
— — —	<i>Haematopus</i> . —
— — —	<i>Glareola</i> . 1. —
— — —	<i>Fulica</i> . 18. —
— — —	<i>Vaginalis</i> . 1. —
— — —	<i>Parra</i> . 10. —
— — —	<i>Rallus</i> . 21. —
— — —	<i>Psophia</i> . 1. —
— — —	<i>Otis</i> . 5. —

Von umstehender Seite.	939. Gattungen.
In dem Geschlecht	Struthio.
— — —	Didus.
— — —	Pavo.
— — —	Meleagris.
— — —	Penelope.
— — —	Crax.
— — —	Phasianus.
— — —	Nūmida.
— — —	Tetrao.
— — —	Columba.
— — —	Alauda.
— — —	Sturnus.
— — —	Turdus.
— — —	Ampelis.
— — —	Colius.
— — —	Loxia.
— — —	Emberiza.
— — —	Tanagra.
— — —	Fringilla.
— — —	Phytotoma.
— — —	Muscicapa.
— — —	Motacilla.
— — —	Pipra.
— — —	Parūs.
— — —	Hirundo.
— — —	Caprimulgus.

1630. Gattungen.

VERZEICHNIS

AUSLÄNDISCHER SYNONYMEN.

- 41. Geschlecht. *Vultur.***
1. **Gryphus.**
 - Condor*, spanisch.
 - Cuntur*, in Peru.
 - Gryp*, holländ.
 - Ouyrard-Ovasson*, bey den Maragnonen.
 - Rot; Ruch*, bey den oriental. Völkern.
 3. **Papa.**
 - Moine*, französ.
 - Monk*, holländ.
 - Cosquauthli; Cozaquau-thli*, in Mexico.
 5. **Aura.**
 - Menschen-eeter*, holländ.
 - Kreng-Raue*, bey den Engländern in Jamaica.
 - Gallinache*, *Marchand*, bey den französ. Reisebeschreib.
 - Turkey Buzzard*, bey d. europ. Engländern.
 - Zamuro*, auf d. Küsten des südl. Amerika.
 - Suguntu*, in Peru.
 - Tzopilotl*, in Mexico.
 - Kianchia*, *Oroua*, in Guiana.
 - Urubus*, in Brasilien.
 7. **Percnopterus.**
 - Râchaene*, arab.
 - Safran-bacha*, bey den Türken in Syrien.
 - Chapon de Pharaon*, oder *de Mahomet*, bey den Franzosen in Aegypten.
 - Boleta*, in Spanien?
 12. **Cinereus.**
 - Harecatching Vulture*, engl.
 - Sep Popielaty*, poln.
- 42. Geschlecht. *Falco.***
1. **Serpentarius.**
 - Slangea - Vreeter*, am Cap.
 34. **Harpyia.**
 - Ytzquauthli*, in Mexico.
 - Urutaurana*, in Brasilien.
 - Orenoko-Eagle*, engl.
 - Calquin*, in Chili.
 38. **Barbatus.**
 - Ziloo*, bey den Mongolen.
 3. **Sach**, an den sarmatischen Alpen.
 39. **Albicilla.**
 - Fiske-Orn*, norweg.
 - Pistoina*,

- Pistoina*, krainisch.
Hafs-Orn; *Fisk-ljusen*, schwedisch.
Eto, bey den Tungusen?
Maitaslisja, lettisch.
Bilogwoſt, russisch.
Nektoralik; *Tertersoak*;
Eſaruktorsoak; *Ting-miarlurksoak*, grönländ.
2. *Melanaetos*.
Ehrglis, lettisch.
Kokkas, ehſtnisch.
Orzel mnieyſzy, poln.
3. *Leucocephalus*.
Wapow-Eſtequan-Mickſue, an d. Hudsonsb.
4. *Oſſifragus*.
Offraga, lat.
Orfraye, Bris-os, franz.
Aquilaſtro, italien.
Sea-Eagle; *Osprey*, engl.
Gaafe-Örn, dänisch.
Skaſt, ſchles.
Quertrantabueſſos, *Chebalos*, span.
Orzel-tomignat; *Orzel-morski*, poln.
Tepnymys, russisch.
Soudaqua, bey den Hun-ronen.
Peres, hebr.
5. *Chryſaetos*.
Grand-aigle; *Aigle royal*; *Aigle noble*; *Aigle doré*, französ.
- Golden Eagle*, engl.
Arent, holländ.
Landörn, dänisch.
Örn, schwed.
Karagush, russ.
Przedny, poln.
12. *Milvus*.
Milan, französ.
Ecouffe; *Ecouffle*; *Huan*, alt französ.
Mitvio; *Nibbio*; *Poyana*, ital.
Mulano, span.
Wowe; *Wou*, holländ.
Kite; *Glead*, engl.
Kania, poln.
Glada, schwed.
Wannags, lettisch.
Kannakul, ehſtn.
Glente, dänisch.
Aturusia, sardin.
62. *Ater*.
Mäuseahr, deutsch.
Küken-Dieff, holländ.
Black Gled, engl.
25. *Furcatus*.
Snake Hawre, in Carolina.
26. *Haliaetus*.
Fisktius, schwed.
Skopnia, polnisch.
71. *Pondicerianus*.
Oifau brame, französ.
Bramary-Kite, engl.

Tehil, in Hindostan.
Kueronden, tamulisch.

15. *Buteo*.

Poana, ital.
Buzzard, engl.
Goiran, in Frankr.
Quidvogel, schwed.
Kaine, krainisch.
Skiör-Vänge, norweg.
Oerne-Falk, dänisch.
Alferraz, in Arragonien.
Aftoreddu, in Sardin.

28. *Apivorus*.

Slaghök, schwedisch.
Muse-Höeg; *Muse-Vaa-ge*, dänisch.
Spend-Höeg; *Morads-Höeg*, norweg.

29. *Aeruginosus*.

Bozzagro, italien.
Moor-Buzzard, engl.
Tapaju; *Falcu-tapaju*, in Sardin.
Höense-Höeg; *Dverg Glente*, dänisch.
Hoense-Tyy, norweg.

30. *Javanicus*.

Lang, in Java.

7. *Rusticolus*.

Millekulartok, in Grönland?

30. *Palumbarius*.

Accipiter, latein.

Autour, französ.
Goose-hawk, engl.
Astore, italien.

Sletfalk; *Graa-Falk*; *Hvid-Falk*; *Bla-Fugl*.
Guulbeck, dänisch.
Due-Falk; *Stor-Höeg*, norweg.

Gastrzabwielki; *Jastrzab-golebiow*, poln.
Komishark-papanasew, an d. Hudsonsb.
Bauge, das
Männchen; *Jurra*, das
Weibchen; in China.

13. *Gentilis*.

Falcone, ital.
Faucon, französ.
Örn, schwed.
Höense-Höeg, dänisch.
Slantfalk, bey den dänischen Falkonierern.
Blaafugl, mit bläulicher Wachshaut.
Guulbek, mit gelbgrüner Wachshaut. nach Brünn.
Halkon, spanisch.
Sokol, poln.

ξ. Ater.

Tlotli, in Mexico.
Nebbi, in Brasil.

98. Melanoleucus.

Kaloe Koeroelgoya, ceylonisch.

27. Gyrfalco.

Bialozor, poln.

Kretzel, moskow.

Gyrfalkon, *Gerfalcon*, engl.

Wannags, lettisch.

Kul, ehstn.

Habicht, in Livland.

16. Tinnunculus.

Cercerelle, *Quercerelle*,

Ecrecelle, alt französ.

Mezy, zu Sologne.

Rabaillet, zu Chalons.

Ratier, in Provence.

Pitrion, in Touraine.

Pitri, zu Saumur.

Preneur des Mulots, in Beauce.

Canibello, *Tittinculo*, *Tintarello*, *Garinello*, italienisch.

Cernicalo, *Zernicalo*, spanisch.

Kestrel, *Kestril*, engl.

Pustolka, poln.

Stanchel, *Stunnel*, *Stonegall*, in Schottl.

Postoka, *Splinza*, *Skoltsch*, krainisch.

Kirke-Falk; *Spurv-Haeg*, dänisch.

Kyrko-Falk, schwed.

Tilibrieu, *Tilibriu*, in Sardin.

Acertello, *Fottivento*, (nach Zinnan.)

Gheppia, (nach Cetti.)

31. Nisus.

Mouchet, *Emouchet*, französisch.

Spar-hawk; *Sparrow-hawk*, engl.

Croguler, poln.

Spacshoek, schwed.

Sparviero, das

Weibchen.

Moscardo, *Terzuolo*, das italien.

Männchen.

Spadderi, in Sardin.

Spurre-Hog, dänisch.

Wehja wunnags, lettisch.

Wihna-kul, ehstn.

Σπιζιας, griech.

21. Columbarius.

Smal Bird Hawk; *Jan der Becaissich* Hudl.

23. Vespertinus.

Kobez, in Ingrien.

Kober, um Astrachan.

Derbnitschok, russisch.

14. Subbuteo.

Hobreau, französ.

Hobby, engl.

Laerke-Falk, *Blaafalk*, dänisch.

Masshu, schwed.

Krogulek, poln.

118. *Aetalon*.

Loyette, alt franzöf.

Passetier; *Preneur des Passes*, ou de *Passerets*, in einigen franzöf. Provinzen.

Smerlo, *Smeriglio*, ital.

Merlin, engl.

Zack, schottl.

Orzemlik, poln.

Αισαλον, griech.

43. *Geschlecht. Strix.*

1. *Bubo*.

Bubo, latein.

Grand-Duc, franzöf.

Barbaian, an einig. Ort. in Frankr.

Great-horn-owl; *Eagle owl*, engl.

Duc, *Dugo*, ital.

Buho, span.

Mocho, portugies.

Chassetou, Sayoyard.

Petive, in Provence.

Puhacz, Sowalezna, poln.

Uf, schwed.

Schnifuit, holländ.

Sternugler, dänisch.

Bergugle; *Roper*, Kat-

Ugl-Hane, norweg.

Sova, krainisch.

Uspis, lettisch.

Jinnefeshiiip, ehstu.

Buas, griech.

Janschuph, hebr.

Lün; *Ulün*, russisch.

Ackia, *Ackyk*, tatarisch.

Zagan Schubo; *Zagan Gorochun*, kalmückisch.

13. *Virginiana*.

Natowokey Omissew, an der Hudsonsbay.

Looloo, auf den Freundschaftsinseln.

14. *Zeylonensis*.

Raia Allia, in Zeylon.

3. *Asio*.

Siutitok, *Tunnudliorbik*, in Grönland?

4. *Otus*.

Asio, *Otus*, latein.

Hibou; *moyen Duc*, französisch.

Chat huant cornu, an einigen Orten Frankr.

Choue; *Cornerote*, in Bourgogne.

Ducquet, in Gascogne.

Chat huant de Bruyeres, in Sologne.

Chouant, in Anjou und Bretagne.

Cloudet, an einigen andern Orten.

Horn-Owl, engl.

Guso; *Barbagianni*, ital.

Mocliuelo, spanisch.

Horn-Ugla, schwed.

Horn-Ugle, dänisch.

Puszczynk,

- Puszczik**, poln.
Cluk-nocny; **Sowa ur-sata**, polnisch?
Mala-Sova, krainisch.
Amisk-oho, an der Hudsonsbay.
- Brachyotos**.
Mouse-Hawk, bey den Engl. an d. Hudsonsb.
Thotose causew, bey den Eingebohrnen daselbst.
Woodcoock-Owl, an einigen Orten in Engl.
- Indica**.
Bakkamaena, auf Zeylan.
- Carniolica**.
Wald-Aüfl, im Oesterreichischen.
Giu, in Bologna.
Tshuk, krainisch.
- Scops**.
Houette, **Chouette**, französisch.
Little-Horn Owl, engl.
Alocharello, **Zivetta**, **Chirino**, italien.
Boom-Wiltge, holländ.
Sowka, poln.
- Nyctaea**.
Harfäng, schwed.
Gysfugl; **Lemäns-Grils**;
Gys-ugt, norwegisch.
Jäggelosko, lappisch.
Opik; **Opirksoak**, grönl.
- Cinerea**.
Omissew-Athinetou, an der Hudsonsbay.
- Aluco**.
Hulotte, französ.
Choue, in Burgund.
Trembleur, in Champagne. (nach Salerne)
Alocho, ital.
Corusa, portugies.
Xura; **Kura**, katalon.
Howlet, engl.
Lelok; **Sowka**; **Puszzik**, poln.
Nachtugle, dänisch.
Har-Ugglan, schwed.
Putwiſta; **Puhze**, lettisch.
Surisprakul, ehstn.
- Flammea**.
Chouette des Eglises, voi-lée, blanche, **Effraye**, **Frésaye**, französ.
Fresaye, in Orleans,
Presaie, in Poitou.
Bresague, in Gascogne.
White-Owl, engl.
Kerkugle; **Ransugle**, holländisch.
Krakugle, dänisch.
Tuidara, in Brasilien.
Sirea, **Istria**, in Sardinien.
Ulu, auf Hindostan.
Bum, persisch.
- Stridula**.

9. Stridula.

Chat-huant, franzöf.*Leech-Owl; Fog-Owl;**Schreech-Owl*, engl.*Har-Uggla*, schwed.*Nat-Ugle*, dänisch.*Cabeça*, in Katalonien.*Massifū*, arabisch?*Bane*, syrisch?

11. Funerea.

Cabeticuch; Cabaducutch,

an der Hudsonsbay.

12. Passerina.

Katugle, dänisch.*Cucumiau*, in Sardinien.*Shipomas-pish*, an der
Hudsonsbay.44. Geschlecht, *Lanius*.

12. Excubitor,

Montagasse; Arneat, in
Savoyen.*Pouchari; Bouchari*, in
Bourgogne.*Butcher-bird; Adder-
bird*, engl.*Gaza; Sperviera; Fal-
conetto; Oresto; Castris-
ea; Verla; Stragazzzi-
na; Ragazzvia*, ital.*Buferlotto*, in Bologna.*Tornskade, Harpax*, dä-
nisch.*Klavert*, norwegisch.*Warfogel*, schwedisch.*Velch; Skrakoper*, krai-
nisch.*d Zierzba; Strokos;*
Wiekzy, poln.*Wapau Whisky*
John, an der*White Whisky*
John, Hudsl.

31. Leverianus.

Vale Savane, in Cayenne.

7. Nengeta.

Guiraru Nhengeta, in
Brasilien.

8. Curvirostris.

Vanga, in Madagascar.

12. Collurio.

*Pie-escrayere; Pie-an-
crouelle*, franzöf.

15. Pitangua.

Cuiriri, in Brasilien.*Bemtere*, portugies.

17. Rufus.

Schet-Be, in Madagascar.

18. Barbarus.

Gonolek, bey den Negern
am Senegal.

22. Madagascariensis.

Calic-Calic, das
Männchen, in Ma-*Bruia*, das
Weibchen, dagas-
car.

28. Leucorhynchos.

Langraien, in Madagasc.

38. Viri-

38. *Viridis.*

Tcha-chert, in Madagascar.

39. *Leucocephalus.*

Tcha-chert-be, in Madagascar.

25. *Infaustus.*

Lappskata; *Olyksfogel,* schwed.

Röd-tiuxa, jemt.

45. *Geschlecht.* *Pſittacus.*

Pſittacus, latein.

Ψιττάνη, griechisch.

Παπαγαῖος, neugriech.

Ara s, deutsch.

Ara, lat.

Maccav, engl.

Kakadu, deutsch.

Cacatua, latein.

Cockatoo, engl.

Lor y, deutsch.

Lorius, latein.

Lori, engl.

Sittich, Sittig,

deutsch.

Perroquet,

franzöl.

Poppinjay,

Poppingay,

engl.

Parrot, engl.

Papagalo, ital.

Papagio, span.

P a r k i t,

deutsch,

Perruche,

franzöl.

Perroqueet,

engl.

Pſittacula,

latein.

P e t i t e

perruche

franzöl.

Parrakeet

engl.

Pappausek, illyrisch.

Papuga, poln.

Dadi, türkisch.

Tuzzenu, alt mexican.

(nach de Laet.)

Papagaut, alt franzöl.

1. *Macao.*

Ara, in Brasil.

2. *Aracanga.*

Aracanga, in Brasilien.

3. *Ararauna.*

Ararauna, in Brasil.

die bunt-

farbigen

Papa-

geyen.

die klei-

nen mit

langem

Schwan-

ze.

die kleinen

mit kurzem

Schwanze.

die kleinen

mit kurzem

Schwanze.

die kleinen

mit kurzem

Schwanze.

6. Severus.
Maracana, in Brasil.
15. Pertinax.
Tui-aputejuba, in Brasil.
32. Aestivus.
Ajuru-curau, in Brasil.
42. Collarius.
Xaxabes, in Jamaica.
46. Geschlecht. *Ramphastos*.
9. Pavonius.
Xochitenacatl, in Mexico.
2. Piperivorus.
Koulik, in Cayenne.
10. Torquatus.
Cochitenacatl, in Mexico.
7. Malabaricus.
Cherry deanisch, in Bengal.
3. Rhinoceros.
Engang, in Sumatra.
4. Nasutus.
Tock, in Senegall.
Tullaek, *Dymludy*, in Arabien.
50. Geschlecht. *Corvus*.
1. Corax.
Corvus, latein.
Koçaz, griechisch.
Cuorvo, spanisch.
- Corvo*, italien.
Raven, engl.
Corbeau, franzöf.
Corbin, alt franzöf.
Escrabeau, in Guienne.
Corbillats, } die Jun.
Corbillards, } gen.
Korp, schwed.
Krak, poln.
Ravn, dänisch.
Korp, norweg.
Rauf, holländisch.
Oreb, hebr.
Gerabib, arab.
Calak, pers.
Woron, russisch.
Pullugak; *Kernektok*, grönländ.
Velch-Oru, krainisch.
Krauklis, ehstnisch.
Kaar, lettisch.
Hawram, illyrisch.
Kakekew, auf Hudsonsb.
Eatoas, auf den Sandwich-Inseln.
Koenai, am Natkafund.
3. Corone.
- Corneille*, franzöf.
Greille; *Greillat*, alt franzöf.
Grolle, in Touraine.
Agrolle, in Bourbon.
Canale, in Sologne.
Crouas, in Auvergne.
Croace, in Piemont.
- Corrice*;

- Cornice ; Cornacchia ;
Cornacchio ; Gracchio ;
Corvo ordinario, ital.
Corneia, spanisch.
Crow, engl.
Wraka, illyrisch.
Graula ; Busaroca ; Cu-
cula, catalon.
Κορωνη, griech.
Κουγαρα, Κομβα, neu-
griech.
Kurka, chald.
Oru, krainisch.
Turlak, burät.
Blaa-Rage, dänisch.
Maldivian Crow, in Loui-
siana ?
Hahaseu, an d. Hudsonsb.
Kaenne, am Natkafund.**
- 4. Frugilegus.**
Frayonne, um Paris.
Graye, alt französ.
Grolle, nach Belon.
Rook, engl.
Roka. schwed. oeland.
Koore Krey; *Roek*, hol-
ländisch.
Gawron, poln.
Σπερμολογος, griech.
Karok, in Pommern.
- 5. Cornix.**
Corneille mantelée, fran-
zösisch.
Malacchia, *munacchio*,
italien.
- 22. Dauricus.**
Cornille du Senegal,
französisch.
White-breasted Crow,
engl.
Aladtu, bey den Mon-
golen.
- 24. Jamaicensis.**
Chattering Crow; *Ca-
can Walk*, engl.
Gabbeling Crow, bey den
Engl. in Jamaica.
- 6. Monedula.**
Monedula, latein.
Chouette; *Chouchette*,
französ.
Chicas;

Chicas; Chocas; Choucas; Chacotte; Cornillon, in einigen französ. Provinzen.

Jack-Daw, engl.

Ciagula; Tattula; Pola

Monacchia, ital.

Graio; Graia, spanisch.

Beena, im Graubündt-schen.

Choue, Caue, Cauette, Cauvette, in Savoyen.

Tschauka, türkisch.

Graake, in der Schweitz.

Ka, Kaw, holländisch.

Kawka; Kawa, illyrisch.

Zegzolka, poln.

Gaeg; Hannekin, im Niederländischen.

Kaja, schwed.

Allicke, dänisch.

Kaa; Kaie; Ravn-Kaa-te, norweg.

Galka, russisch.

Tun, burät.

Kohsa; Kowahrna, lett.

Ack, estnisch.

Anapha, hebr.

7. Glandarius.

Jeay, französ.

Geai; Gai; Jayon

Gayon; Jaques; Ja-

cute; Geta; Gautereau

Vautrot, in verschied.

französ. Provinzen.

Jay; Ja Ja, engl.

Ghiandaja; Gaza verla,

Berta; Bertina; Bartino, italien.

Gayo, Cayo, spanisch.

Gaita, Gralla, in Cataloni.

Girau; Richau, in Bra-bant.

Soyka, poln.

Skow-Skade, dänisch.

Kornskrika; Noëtskrika; Aellonskrika, schwed.

Sillawahrns, *Wahrna*, lettisch.

Paskrat, estn.

Schoia, krainisch.

Ronscha, russisch.

Mæðækongræves, griech. nach Belon.

Kægænæžæ, neugriech.

Piga, in Sardin.

10. Caryocatactes.

Casse-noix, französ.

Nut-cracker, engl.

Merle Alpadie, ital.

Nodde-krige, dänisch.

Not-kraake; Noddeskri-ger, norweg.

Nottckraka; Notweka, schwedisch.

Garga, türkisch.

Klesk; Grabulusk, poln.

Kostobryz; *Kedrowka*, russisch.

Ongolo, tungusisch.

Pähkla-

Bähklatraat, ehstnisch.
Nootekraaker, holländ.

13. *Pica*.

Pica, latein.
Pie, französ.
Jaquette; *Dame*; *Agasse*; *Agace*; *Ajace*; *Ouasse*, an verschied. französ. Orten, und zu verschied. Zeiten.

Gazza; *Ragazza*; *Are-gazza*; *Gazzuola*; *Gazza dominicana*; *Gazzara*; *Pica*; *Putta*, italien.

Grassa, in Catalonien.
Pega; *Picata*; *Pigazza*, spanisch.
Pye; *Piot*; *Magpye*.

Piapet, engl.
Skata, schwed.
Skade; *Huus-Skade*, dänisch.

Skior; *Skiaere*; *Skate*; *Tunfugl*, norweg.
Skiurra, upländ.

Skära, gothländ.
Häster, in Livil.
Aexter, in Flandern.

Schaggata, lettisch.
Harrakas, ehstn.
Ketsakas, in der livil. Wiek.

Strakavel; *Krizstela*, illyrisch.

II. Band II. Th.

Stroka, poln.

Praka, krainisch.

Soroka, russisch.

Sastharei, burät.

Saschinga, tungus.

Oue-ta-kee-aske, an d. Hudsonsbay.

She - pecum - mentewuck, in einigen Gegenden der Hudsonsb.

Kisæ; *Kittæ*; *Ποκιλις*, griech.

Aryasgea, neugriech.

15. *Brachyurus*.

γ. *Bengalensis*.

Breve, französ.

Madras-Jay, engl.

Ponnunki-pitta; *Ponnandutty*, in Indien.

16. *Canadensis*.

Whiskijohn, } an d. Hud.
Whiskijack, } sonsbay.

19. *Eremita*.

Sonneur, französ.

Wood-Crow from Switzerland, engl.

Corvo Spilato, italien.

Kruk-lesney; *Nocay*, polnisch.

si. *Geschlecht*. *Coracias*.

1. *Garrula*.

Rollier; *Rollier d'Euro-pe*, französ.

Roller, engl.

Ggg *Ellekra-*

- Ellekrage*, dänisch.
Blaa-kraake, norweg.
Allekräka, schwed.
Spanjk-kräka, schwed.
Bläkräka, finnländ.
Kraska, poln.
Shagarag, in der Barba-rey?
52. Geschlecht. *Oriolus*.
1. *Galbula*.
Avis icterus, *Galgulus*, latein.
Loriot, französ.
Lorion; *Lourion*; *Louriou*; *Aurion*; *Loriol*; *Oriol*; *Orio*, alt französ.
Oriot; *Piloriot*; *Bilotrot*; compere *Loriot*;
Laufot; *Merle-jaune*; *Merle doré*; *Cortpandu*, in verschied. französ. Provinz.
Lutronne, bey Aberville?
Oriolo; *Regalbulo*; *Gualbedro*; *Galbero*; *Reigalbero*; *Garbella*; *Regeyo*, *Melziozallo*, *Brusola*; *Rigogalo*, ital.
Oropendola; *Oroyendola*, spanisch.
Witwal; *Gulden Trush*; *Oriole*, engl.
Wilga, *Wywielga*, poln.
Zwolga, russisch.
- Wahlod*, lettisch.
Canarin Salvatico, in Sardin.
Papagaletto, zu *Sassari*.
4. *Icterus*.
Troupiale, französ.
Yellow and black Pie;
Bonana bird from Jamaica, engl.
Guira-Tangeima, in Brasilien.
Tapou, in Guiana.
52. Geschlecht. *Gracula*.
2. *Calva*.
Gouling, französ.
Iting, *Tabaduru*, auf den Philipp. Inseln.
6. *Sularis*.
Dial; *Dyal*, in Bengalien.
7. *Quiscula*.
Pie de la Jamaique, französ.
Purple Jackdaw, engl.
Tordo, span.
Tequixquiacatzanatl, in Mexico.
54. Geschlecht. *Paradisea*.
- Manucodiata*, in versch. Sprachen.
Oiseau de Paradis, französisch.
Bird of Paradise, engl.
Passaros

- Passaros de Sol*, portugiesisch.
Bourong-aru, in Neuguinea.
Boeres, in Indien.
55. Geschlecht. *Trogon*.
2. *Curucui*.
Couroucou à ventre jaune französ.
Red bellied Curucui, engl.
Curucui, in Brasilien.
Tzinitzcan, in Mexico.
7. *Fasciatus*.
Pilliehorra, in Zeilan.
Rantvan-kondea, cingalesisch.
57. Geschlecht. *Cuculus*.
1. *Canorus*.
Cuculus, latein.
Coucou, französ.
Cocou; *Coquu*, *Cocu*; *Coux*, an verschied. Orten Frankr.
Coudiou, in der Provence.
Couconat, die Jungen in Sologne.
Dinde sauvage, in einig. Gegenden von Bourgogne.
Cuculo; *Cucco*, *Cuco*, *Cucho*, ital.
Cuelillo, span.
Cuckow, engl.
- Kukulka*; *Kukauka*; *Gzeg-zolka*, poln.
Zezula, russisch.
Koekkoek, holländ.
Giög, *Kukert*, *Kuk*, dän.
Kuk-Manelen, cimbr.
Gouk, norweg.
Dsegguse, lettisch.
Käggi, ehstn.
Cucu, in Sardin.
Kukauza, krainisch.
Giök, schwed.
Geeka, lappisch.
Kockok; *Kockunt*, fläm.
Ziez gale, illyrisch.
Konkuζ, griech.
Kanoniζ, *Kanaknoζ*, verdorb. Griech.
Kaath; *Schalac*; *Schachaph*; *Banchem*; *Ea-chem*, hebr.
27. *Tahitius*.
Ara Weveroa, auf den Freundsch. Inseln.
31. *Ridibundus*.
Quapactototl, in Mexico.
32. *Guira*.
Guira Acangatara, in Brasil.
40. *Pyrrhocephalus*.
Malkoha, cingalesisch.
21. *Cornutus*.
Atingacu-camacu, in Brasilien.

58. Geschlecht. *Tunx.*1. *Torquilla.**Torcal*, französ.*Wryneck*, engl.*Torcallo*, *Toricollo*, *Col-lotorto*; *Verticella*, ital.*Draaihals*, holländ.*Giökttyta*, schwed.*Vendehals*, *Dreyhals*, dänisch.*Saogouk*, norweg.*Säd-Gjök*, finnaland.*Wääinkal*, ehstnisch.*Tshudesch*, krainisch.*Kretogtow*, poln.*Iuyξ*, griech.59. Geschlecht. *Picus.*1. *Martius.**Pic-noir*, französ.*Great-black Woodpecker*, engl.*Pigoccio-nero*, italien.*Kraajspecht*, holländ.*Hackespett*, dänisch.*Sort-Spaet*; *Sort-Hakke*.*Spaet*; *Sort-Trae*.*Kloppe*; *Trae-Pikke*;*Lie-Hast*, norweg.*Trillkräka*; *Spillkräka*, schwed.*Toile*, gotläud.*Tscherna*, *Schouna*, krain.*Kärrik*; *Pu-Kornstaga*, ehstn.*Dzieciol*, poln.2. *Principalis.**Grand pic-noir à bec blanc*, französ.*White-billed Woodpecker*, engl.*Carpenteros*, spanisch.*Corta-pao*, portugies.*Quatottomiti*, in Mexico.4. *Lineatus.**Ipecu*, in Brasil.9. *Auratus.**Pic aux ailes dorées*, französ.*Gold-winged Woodpecker*, engl.*Ou-thee-quan-nor-ow*, an der Hudsonsbay.*Hittot*; *Pint*, bey den Schwed. in Amerik.40. *Miniatuſ.**Toekan*, malaiisch.12. *Viridis.**Pic-verd*, französ.*Woodspite*; *Rainfowl*;*Highoe*; *Heawhole*; *Green Woodpecker*, engl.*Pigoccio verde*, ital.*Wedknarr*; *Grönspit*;*Gröngjoling*, schwed.*Grönspett*, dänisch.*Zhiaina*, lappisch.*Deteu*; *Detela*, krain.*Meltsas*, ehstn.*Zolna*, poln.13. *Ben-*

13. Bengalensis. β
Kerella, auf Zeilan.
17. Maior.
Epeiche ou pic varié, französ.
Great spotted Wood-pecker, engl.
Cul-rosso, ital.
Grüllenrenna, schwed.
Hakke-Spaet; *Trae-Spaet*; *Trae-Klak*, dän.
Cobilar, krainisch.
Dzennis, lettisch.
Rähn, ehstn.
Toccadorza, in Sardin.
18. Medius.
Pic-varié, französ.
Middle spotted Wood-pecker, engl.
Flag-Spaet, *Flack-Spärre*, dänisch.
Kraakspinte, norweg.
Zuhku, lettisch.
Räudrösa, ehstn.
19. Minor.
Petit Epeiche, französ.
Piannet, in Engl.
Pipra, in Ital.
Lille Trae-Pikke, norwegisch.
59. Geschlecht. *Sitta*.
- i. Europaea.
Sitterelle; *Torchepot*, französ.
- Percepot*; *Chauffepot*, in der Normandie.
Grimpard; *Grimpant*, in der Picardie.
Macon; *Pic-macon*, in Lothringen.
Cendrille; *Dos-bleu*; *Pic-bleu*; *Tape-bois*; *Beque-bois eendré*; *Casse-noix*, in Iffoudun.
Planot, in Dauphiné.
Nuthatch; *Nutjobber*, engl.
Pico; *Picchio*, ital.
Nätväcka; *Natpacka*, schwed.
Spaet-Mrysse, dänisch.
Nat-Vakke; *Egde*; *Eremit*, norweg.
Chlaen, in der Schweitz.
Picotella, in Catalon.
Agascakan, in der Turkey.
Dzieciot modrawy, poln.
Barleß, krainisch.
Kleiner, in Oesterreich.
Raporino, in Ravenne.
Maloidjetet; *Sliepuschka*; *Butschock*; *Polfyk*, in Russl. (nach Gmelin.)
Kököbyka, jakutisch.
Okudong, bey den arinzischen Tataren.
Oetjälged, bey den Ostiacken am Käss.
Schondokon, tungus.

7. Carolinensis.
Unmisku - Apethayhish,
 an der Hudsonsbay?
8. Sinensis.
Kou-kay-komin, in China.
60. Geschlecht. *Todus.*
1. Viridis.
Perroquet de terre, auf
 St. Domingo.
- II. Paradiseus.
Wallubora, zeylanisch.
Waygehoë, Wardioë, auf
 den Papus-Inseln.
61. Geschlecht. *Alcedo.*
- I. Cristata.
Tohorkey; Hito, in Amboina.
Vintsi, auf den Philippinen.
3. Ispida.
Martin-pechour, französ.
Kingsfisher, engl.
Piombino, ital.
Tsvogel, holländ.
Puzzzone di santo Martini, in Bosă.
Zimorodek, poln.
Ju-loang, in China.
7. Alcyon.
Kiskeman; Kiskemaraſue,
 in Indien.
26. Cayennensis.
Taparara, in Guiana.
28. Tuta.
Erooro, in Otaheite.
9. Capensis.
Tye-tzoy, in China.
15. Galbula.
Venetore, bey den Ein-
 gebohrnen in Guiana.
Colibri des grands bois,
 bey den Creolen.
Jacamaciri, in Brasil.
63. Geschlecht. *Merops.*
- I. Apiaſter.
Guépier, französ.
Bee-eater, engl.
Graulo; Ghiovardo; Lugo dell' Api, ital.
Byeneeter, holländ.
Varuar, arab.
Schtschura; Schtschurka,
 an der Wolga.
Shaeghagho, um Yemen.
Meragau, bey den Cam-
 pidaneſen.
- Pardal de san jura*, zu
 Algher.
- Piona, Apiolo*, an ver-
 schied. Orten in Sardin.
- β. Aegyptius.
Chaddaejr, arab.
2. Congener.
Formique, in Spanien.
3. Superciliosus.
Patirich Tirich, in Ma-
 dagascar.

- 18. Novae Seelandiae.** **29. Coccinea.**
Kogo; Poe - Vogel, in *Eee-eve*, auf den Sand-
 Neu-Seeland. *wich-Inseln.*
- 64. Geschlecht. Upupa.** **Hevro-taire**, auf Atui.
- 1. Epopis.** **34. Sannio.**
Hupe; Puput, französ. *Neghobarra*, auf Köni-
Upupa, latein. *gin Charlotten Sund.*
- Hoop; Hoopoe*, engl. **38. Cardinalis.**
Upuba, italien. *Kuyameta*, auf der Insel
Harfugl, schwed. *Tanna.*
- Herfugl*, dänisch. **39. Carunculata.**
Aerfugl, norweg. *Fulehajuh*, auf den
Smerda Kaura; *Smer-* *Freundsch. Inseln?*
- duch*, krainisch. **2. Muraria.**
- Badda Dsegguse*; *Pup-* *Grimpereau de muraille*,
pukis, lettisch. *französ.*
- Sittane rääftas*; *Pähkla* *Echelette*, zu Clairmont.
- öhk*, estn. *Ternier*, zu Auvergne.
- Pupusa*, in Sardin. *Pitschal*, in Savoyen.
- Dudek*, poln. *Pitschard*, das. und bey
Duchiphath, hebr. *Neuchatel*, in der
 Schweitz.
- 65. Geschlecht. Certhia.** *Wall creeper; Spider cat-*
1. Familiaris. *cher*, engl.
- Grimpereau*, französ. *Pico, Pichio*, ital.
- Creeper*, engl. *Dziećat murowy*, poln.
- Picchio, Piccolo*, ital. *Paxaco araneco*, in Ar-
- Krypare*, schwed. *ragon.*
- Trae-Pikker*; *Lichesten*, **25. Latenia.**
- dänisch. *Angala-Dian*, auf Ma-
- Bartniczek*, polnisch. *dagascar.*
- 27. Pacifica.** **66. Geschlecht. Trochilus.**
- Huhu*, auf O-Waihi. *Oiseau-mouche*, französ.
- 28. Obscura.** *Humming-bird*, engl.
- Akaiearua*, auf O-Waihi? **G gg. 4.** **Guia-**

- Guianumbi*, in Brasil.
Aratira; *Arataratagua-cu*, das.
Pegafrol, portugies.
Tomineios, in Spanien.
Quinti; *Quinde*, in Peru.
Huitzitzil; *Hoitzitzil*, in Mexico.
Quirissia, das. nach Nieremb.
Vicililin, in Gomara.
Guachichil, in Neuspanien.
25. *Cyanurus*.
Tayauquitototl, in Neuspanien.
12. *Colubris*.
Ourissia; *Guaracyaba*; *Guaraeygaba*; *Huitzitzil*; *Vicililin*, bey verschiedenen americ. Nationen.
67. Geschlecht. *Anas*.
1. *Cygnus*.
Cygne, französ.
Swan; *Elk*, engl.
Cino; *Cigno*, ital.
Cisne, span.
Svane, dänisch.
Svane, norweg.
Oels; *Elbs*, in der Schweitz.
Gulbis, lettisch.
Lük, ehstn.
- Labec*, poln.
Labod, krainisch.
Kuvros, griech.
54. Hyperborea.
Oie de neige, französ.
Snow Goose, engl.
Bjeloi gus, russisch.
Trung-Chaß, jakutisch.
Ungula - Choteng, bey den obdonischen Ostjaken.
4. *Tadorna*.
Tadorne, französ.
Sheldrake; *Bourrough Duck*, engl.
Jugås, schwed.
Grav - Gaas; *Brand-Gaas*; *Grav . Drage*, dänisch.
Ring - Gaas; *Urgaas*; *Fager - Gaas*, *Röd-Baelle*, norweg.
Avekong, in Island.
Hav - Simmer, auf den Feroë-Inseln.
It - alla - kaß, bey den Baschkiren.
5. *Spectabilis*.
Canard à tête grise, französisch.
Grey-headed Duck; *King-Duck*, engl.
Soë - Orre; *Hav - Orre*, norweg.
Siorakitsok, grönländ.
Kinga-

Kingalik , das	grön-länd.	Laggel , ehstn.
Männchen.		Laggias , ehstn. die kleinere Art.
Kaiortok , das		Ges , die zahme
Arnau- { Weib- iartuk , } chen.		Gans,
6. Fusca .		Dzika Ges , die pol. nisch. wilde,
<i>Double Macrense</i> ; <i>grande Macreuse</i> , französ.		<i>Tlalacotl</i> , in Mexico.
Great black Duck , engl.		67. Ruficollis .
Svart-Orre ; Svart-And ;		<i>Tschagwoi</i> , bey den Ostiaken.
<i>Sorte</i> , norweg.		<i>Tschagu</i> , samojetisch.
Svaerta , schwed.		<i>Morskaja Kasarka</i> , russ.
Glowienka , poln.		<i>Tschakwoi Aßjutsch</i> , lap. pisch.
62. Nilotica .		<i>Sunkfur</i> , bey den Kalmücken.
Bah , arabisch.		46. Casarca .
8. Marila .		<i>Krasnye Utki</i> ; <i>Karagatki</i> , an der Wolga.
Polsk - Edelman , dänisch.		15. Mollissima .
9. Anser .		<i>Oie à duvet</i> , französ.
Jars , das Männch.	fran-	<i>Eiderduck</i> ; <i>Cuthbert-Duck</i> , engl.
Oie , das Weibch.		<i>Eddergaas</i> ; <i>Ederfugl</i> , dänisch.
Oison , die Jungen,	zösl.	<i>Aerfugl</i> , norweg.
Goose , engl.		<i>Eider</i> , <i>Ad</i> ; <i>Ada</i> ; <i>Gu-dunge</i> , schwed.
Grey-lag-goose , engl.		<i>St. Cuthberts-Ente</i> , auf einig. Schott. Inseln.
Ocha , das Männch.	ital.	<i>Aedar - Fugl</i> ; <i>Aedur-Fugl</i> , in Island.
Papera , die Jungen,		<i>Edder - Eadder - Aeder</i> .
Ganso , span.		<i>Aer - Aee - Fugl</i> , in ver-
Gaas , dänisch.		Ggg 5 schie.
Gaas , norweg.		
Klinger - Gaas ; Graa-Gaas , die wilde. ibid.		
Guneniki , in Kamtschatka.		
Vilgiäs , in Island.		
Meschafökß , lettisch.		

- schiedenen nördlichen Gegenden.
- Aee-Aestraig*, im Dront-heimisch.
- Aera*, in Bohuslehn.
- Colca*, schottisch?
- Aaeboer*, auf Bornholm.
- Mittek*, grönl.
- Arnaulik*, das Männchen,
- Arnauiaak; Sio-vartok*, das Weibchen.
- Arnaulisk*, ein Junges.
- Eiderblicke*; *Aerblick*, auf Feröe.
16. Moschata.
- Muscovi-Duck*; *Cairo-Duck*; *Guinea-Duck*; *Indian-Duck*, engl.
- Canard Franc*, bey den Franzosen in Guiana.
- Tureka Katzka*, poln.
- Apeca Apoa*; *Ipecaguan*, in Brasilien.
19. Clypeata.
- Souchet*, französ.
- Shoveler*, engl.
- Krop-And*; *Stock-And*; *Leffel-And*, dänisch.
- Taschenmaul*, in der Schweitz.
- Schauffl. Ente*, im Oesterreichischen.
20. Strepera.
- Chipeau*, französ.
- Godwall*; *Gray*, engl.
- Roep-Eend*, holländ.
- Knarand*, dänisch.
23. Clangula.
- Garrot*, französ.
- Golden-Eye*, engl.
- Quattr' Ochi*, ital.
- Hwin-And*; *Blanke-Kniv*, dänisch.
- Bruuns-Kop*, dänisch.
- Ring-Oie*, norweg.
- Knipa*, Dopping, schwed.
- Kertlutokipiarsuk*, grön-ländisch.
26. Glaucion.
- Morillon*, französ.
- Spoon bill'd Duck*, engl.
- Krekkop*; *Dykker*, dänisch.
- Brunnacke*, schwed.
- Capo-rosso*, bey den Venetianern.
- Ulluagolik*, grönländ.
96. Glocitans.
- Moklok*; *Mokloschka*, Klektunja, an der Lena.
27. Penelope.
- Canard siffleur*, französ.
- Wheber*; *Whistling*; *Widgeon*, engl.
- Brunn-Nakke*; *Blas-And*; *Graes-And*; *Stiert-And*, dänisch.
- Wriand*,

Wriand, schwed.

Piula, in Catalonien.

28. *Acuta*.

Canard à longue queue,
französ.

Cracker; *Sea-Pheasant*;
Pin-tail, engl.

Vinter-And, dänisch.

Ala, schwed.

Schilochwoštka, russisch.

Tzitzihoa, in Mexico.

29. *Hyemalis*.

30. *Glacialis*.

*Canard à longue queue
d'Islande*, französ.

*Canard à longue queue
de terre neuve*, französ.

Canard de Mitlon, franz.

Long-tailed Duck, engl.

Swallow-tailed Sheldrake,
engl.

Gadisse; *Klaeshan*; *Un-*
gle; *Dykene*; *Angle-*
taske; *Troeforer*, dä-
nisch.

Hav-Old; *Hav-Aeller*,
Ha-Alla; *Ha-Old*;

Havelda, norweg.

Haavella, isländ.

Aglek, grönländ.

31. *Ferina*.

Millouin, französ.

Pochard; *Poker*; *Great*
red-headed Wigeon, engl.

Brun-Nakke, dänisch.

Röd-Nakke; *Kiärnd*.

And, norweg.

Raudawa; *Raudewith*,
lettisch.

32. *Querquedula*.

Sarcelle, französ.

Garganey, engl.

Kernell, bey Straßburg.

Krek-And; *Saur-And*,
norweg.

Cercelle; *Cercerelle*; *Ale-*
brande; *Garfotte*; *Ha-*

Iebran, in verschied.
Provinzen Frankr.

Oert, isländ.

Prischke, lettisch.

Cyranka, poln.

33. *Crecea*.

Petite Sarcelle, französ.

Teal, engl.

Schyf Taling, holländ.

Krik-And, dänisch.

Atteling-And, cimbr.

Heste-Lort-And; *Krek-*
Aender; *Saur-Aender*,
norweg.

Arta, schwed.

Kraecka, westbothn.

Cyranta, poln.

Pepatzka, in Mexico?

Aradone, in Sardin.

Crabedu, bey den Alghe-
resen.

Kothantl; *Pfeiffantl*, im
Oesterreichischen.

34. Circia.

Sarcelle d'Eté, franzöf.
Summer-Teal, engl.
Prihkschke, lettisch.

35. Histrionica.

Canard à collier de terre neuve, französisch.
Stone-Duck; Harlequin-Duck; Dusky and spotted Duck, engl.
Jan Pottagie Eend, holländisch.
Grav-And; Straun-And, isländ.
Tornauiarfuk, grönländ.

113. Domestica.

40. Boschas.

Anas, latein.
Canard, franzöf.
Duck, engl.
Auatre, Anitra, ital.
Anade, span.
Aden, portugies.
Blaa-Hals; Blaa-Nakke; Blaakoll; Graes-And; Stock-And, norweg.
Anka, schwed.
Kaczka, poln.
Ratza, krainisch.
Stock-Ente, im Oesterreichischen.
Bebe, indian.
Kaerthlutok; Kongmatajok, grönländ.

Metzcanauhtli, in Mexico.
Nyrra, griech.
Kenar, arab.

43. Sponsa.

Canard d'Eté, franzöf.
Summer Duck, engl.
Tzitzitzomyayauhqui, in Mexico.

118. Rufina.

Schmakowaja Utka, russ.

120. Arabica.

Scar-chir, arab.

121. Alexandrina.

Sau-Sarai, arab.

45. Fuligula.

Petit morillon, franzöf.
Tufted-Duck, engl.
Capo-negro, in Venedig.
Toppertje, holländ.
Tröld-And, norweg.
Wigga, schwed.

68. Geschlecht. *Mergus*.

1. Merganser.

Harle, franzöf.
Goosander; Dun Diver; Sparling-Fowl, engl.
Garganey; Ganner, italienisch.
Skalle-flugger, dänisch.
Fisk-And; Mort-And, norweg.
Skrake,

Skrake, das
Männch.
Skrakan, das
Weibch.

Wrakfogel, smoländ.

Gaura; *Gaigula*, lettisch.

Skiör; *And*; *Gul Önd*;
Geir-Fugl, isländ.

Krukmorski, poln.

Paikpiarsuk; *Pararsuk*,
grönländ.

3. Serrator.

Top-And; *Shraekke*, dän.

Vatus-Önd, isländ.

Pajk; *Nyaliksak*, grönl.

5. Albellus.

Piette, französ.

Smew, engl.

Hvid-Side, dänisch.

Topp-Önd, isländ.

Monachetto, in Toscana.

69. Geschlecht. *Alca*.

4. Arctica.

Macareux, französ.

Puffin; *Pope*; *Coulter-*
neh; *Mullet*; *Gulden-*
head; *Bottlenose*; *Hele-*
gug, engl.

Paptegaaiduiken, hol-
ländisch.

Lunde; *Soë-Papegøy*,
norweg.

Lund-Taeller, norweg.
die Jungen.

Praest, isländ.

Killengak, grönländ.

3. Impennis.

Grand Pingouin, franz.

Great-Auk, engl.

Angle-Mager; *Penguin*;
Brillefugl; *Fiärt*, nor-
wegisch.

Geirfugl; *Goifugl*, is-
ländisch.

Iasarokitsok, grönländ.

2. Pica.

Petit Pingouin, französ.

Black-billed Auk, engl.

Spidsnaebbet Alk, nor-
wegisch.

Akpa, grönländ.

Vuthamaria Calicatezu,
an den Küsten von Can-
dia.

1. Torda.

Pingouin, französ.

Auk; *Murre*; *Razor-bill*,
engl.

Klub-Alk; *Klympe*, nor-
wegisch.

Tord; *Tordmule*, schwe-
disch.

Klumbenefia, isländ.

Scaut, schott.

9. Psittacula.

Inypilahelap, bey den
Koräten.

Chuichanchtschkun, bey den
Itälmenen.

Heka.

- Hekatschitschir*, bey den Kurilen.
10. *Cirrhata*.
- Mytschogatka*, am Bol-schajareka.
- Igilma*, in Ochozk, und am penshinischen Meer-busen.
- Kytchuguigalli*, bey den Koräten.
- Tschelaata*, am Kamtschatkaflusse.
- Etubirga*, bey den Kurilen.
5. Alle.
- Petit guillemot*, französ.
Little Auk, engl.
Soe-Konge; *Jacob*; *Soren-Jacob*; *Peer-Driker*; *Perdykker*; *Per-super*; *Boefiaer*; *Borre-fiaer*; *Hys-Thomas*, norweg.
Rotteke, holländ.
Halkion; *Havdirdell*, is-ländisch.
Fulkop, auf den Feröe-Inseln.
Akpalliarfuk; *Akpalliar-sungoak*; *Kaerrak*; *Ijar-soakale*, grönländ.
70. *Geschlecht. Procellaria*.
1. *Pelagica*.
- Petrel*, französ.
Storm-finck, engl.
- Soren-Peder*; *St. Peders-Fugl*; *Vestervinds-Are*; *Sondenvinds-Fugl*, *Uveyrs-Fugl*; norweg.
Stormvaders - *Fogel*, schwed.
Strunkvit, auf den Feröe-Inseln.
3. *Glacialis*.
- Fulmar*; *Petrel Puffin gris blanc*, französ.
Haffhert; *Seahorse*, engl.
Skraap; *Liere*; *Skrabe*, norweg.
Kakordlungnak, grönl.
72. *Geschlecht. Pelecanus*.
1. *Onocrotalus*.
- Pelican*, französ.
Pelecan, engl.
Grotto, *Agrotto*, ital.
Wattadragaren, schwed.
Livane; *Libane*, in Bra-bant.
Kruk-wodny, poln.
Baba, russisch.
Kik; *Hakik*, hebr.
Chatta, chald.
Ahdjirbu, arab.
2. *Aquilus*.
- Tuilleur*, französ.
Man of war bird, engl.
Rabihorcado, span.
Raboforcado, portugie-sisch.
3. *Carbo*.

3. Carbo.

Cormoran, französ.*Cormoran*, engl.*Crot Pescherot*, in Burgund.*Skarv*; *Strand-Ravn*, norweg.*Skrie-Skarv*, norweg. (Müll.)*Bettlaar*; *Hviidlaaring*;*Blik-Skarv*, norw. isl. (Brünn.)*Hopling*; *Student*, auf Feroe. (Brünn.)*Hafs-Tjader*, schwed.*Okaitsofik*, grönländ.*Okaitsoak*, *Kidlingaejouk*, grönl. ein Junges.

4. Graculus.

Shag, engl.*Aalekrage*, dänisch.*Skarv*, *Fiskeren*, norweg.*Sma*; *Skarfur*, isländ.*Chracholec*, poln.

5. Bassanus.

Fou de Bassan, französ.*Soland Goose*, engl.*Hav-Sule*; *Tosse-fugl*;*Jan van Gent*, norweg.*Sula*, isländ.*Kuksfuk*, grönländ.?75. Geschlecht: *Colymbus*.

1. Grylle.

Petit guillemot noir, französ.*Kajaver*; *Cajor*; *Groenland-Dove*; *Sea-turtle*; *Black-guillemot*, engl.*Teiste*, norweg.*Silde-Perris*, norweg. ein Junges.*Trista*, schwed.*Zhielkes*, lappisch.*Serbak*; *Sarpak*; grönl.

2. Troile.

Guillemot, französ.*Guillemot*, *Toolish Guillemot*; *Sea-Hen*, engl.*Aalge*; dänisch.*Lomvie*; *Lomgivie*, *Langvine*; *Lumbe*, norweg.*Doppan*, lappisch.*Tuglok*, grönländ.

3. Septentrionalis.

Plongeon à gorge rouge, französ.*Red-throated Loon*, engl.*Loom*, dänisch.*Loom*, *Lumme*, norweg.*Gakkor*; *Gakatte*, lappisch.*Liomen*, auf Feröe.

4. Arcticus.

Plongeon à gorge noire, französ.*Speckled Loon*; *Black-throated Diver*, engl.*Hymber*, *Imber*; *Ember*, norweg.*Kakkar*.

- Kakkardaja*, ehstn.
Lom, schwed.
5. *Glacialis.*
Grand plongeon tacheté;
Imbrim; französ.
Greatest speckled Diver;
Northern Diver, engl.
Hav - Hymher; norweg.
Vas Humber, *Halsbaan-det Lom*; *Brusen*; *Humberine*? isländ.
Tudlik; grönländ.
6. *Immer.*
Grand-plongeon, französ.
Embergoose; *Imber*, engl.
Hav - Immer; *Lom Imber*; *Ember - Gaas*; *Ommer*; *Morte ferie*, norwegisch.
Efarokitsok, grönländ.
7. *Cristatus.*
Grebe, *Grebe huppé*, französ.
Crestet Grebe; *Nasse*, engl.
Jurar, ital.
Sperga, venet.
Foet, *Füüt*, holländ.
Topped - Havskiaerre;
Halskraved Dykker;
Top Skero, norweg.
Sef - Ond, isländ.
8. *Auritus.*
Petit Grebe huppé, französisch.
- Eared Dobchick*; *Eared Grebe*, engl.
Söe - Höne, dänisch.
Söe - Horre; *Sav - Orre*, norweg.
Flaue - Flit, isländ.
19. *Cornutus.*
Sekerp, an der Hudsonsb.
Water - Witch, in New-york.
76. *Geschlecht. Larus.*
1. *Rissa.*
Lille - Soloet, dänisch.
Ritsa, norweg.
Skegla, *Ritar*, isländ.
Tattarak, grönländ.
2. *Tridactylus.*
Krykie, norweg.
Skierro, isländ.?
Tattarak, grönländ.?
Kihris, lettisch.
Kowit; *Kallakul*, ehstn.
Ribitw; *Trzonek*; poln.
14. *Eburneus.*
Mouette blanche, französ.
Ivory Gull, engl.
Nayauarsuk, grönländ.
3. *Canus.*
Graa - Nakke, dänisch.
Hvidmaase, norweg.
Mäse; *Fiskmäse*, schwedisch.
Straule, lappisch.
Gafke, finnisch.

- Trzonek mnieysfry**, poln.
Karsaak, grönländ.
- 6. Marinus.**
Goeland noir, französ.
Black-backed Gull, engl.
Svart Bag; Blaamaage, dänisch.
Hav-Maase, norweg.
Hafstrut; Svartrut, schwed.
Gairo, lappisch.
Nayardluk; Nayardlurk-soak, grönländ.
- 7. Fuscus.**
Goeland à manteau gris-brun, französ.
Herring Gull, engl.
Sild-Maage, dänisch.
Gullfötting; Egmor, norweg.
Märs, schwed.
Veyda-Bialla, isländ.
Soe-Unge; Skurre; Granafur, isl. ein Junges.
- 8. Glaucus.**
Goeland tendré, französ.
Glaucous Gull, engl.
Perlemaage, dänisch.
Dalvik, lappisch.
Naya; Nayavek; Nayainak; Pukteralik, grönländisch.
- 9. Ridibundus.**
Mouette rieuse à pattes rouges, französ.

- Black-headed Gull**; **Brown-headed Gull; Petit black Cap, or Sea Crow**, engl.
Kurlik, ehstn.
- 10. Parasiticus.**
Labbé à longue queue, französ.
Arctic Bird; arctic Gull, engl.
Struuntjager; Tya-jo; Jo-Tyv; Kive; Maase-Fat; Maase-Skid; Truen; Levar-Jo; Spotte-Jo; Jo-Bonde; Tuufva; Kiufva, norwegisch.
Kioe, isländ.
Skajite; Haskel, lappisch.
Efungak; Isingak; Merriarsairfok, grönländ.
- 77. Geschlecht. Sterna.**
- 2. Hirundo.**
Grande hirondelle de mer, französ.
Sra-Swallow; Great Tern, common Tern; Spurre; Skrage, engl.
Zeezwalluw, holländ.
Taerne; Krop-Kirre, dänisch.
Haetting-Taerne; Sand-Taerne; Tende-Löber; Tenne; Tende; Sandtal, norweg.
- Hhh** **Tarna**,

- Tarna*, schwed.
Zhierrek, lappisch.
Therne; *Kriia*, isländ.
Makauka, krainisch.
Mackerell Gull, in Neu-
 engl.
Imerkoteilak, grönländ.
3. *Nigra*.
Gachet, französ.
Glitter; *Sort-Kirre*, dä-
 nisch.
Söe-Svale; *Sort-Tärne*,
 norweg.
78. *Geschlecht. Rynchops*.
1. *Nigra*.
Bec-en-eiseau, französ.
Sea-Crow; *Cutwater*,
 engl.
Taya, indian.
Coddel Kauka; *Suemoodra Cavky*, malabar.
79. *Geschlecht. Phoeni-
 copterus*.
1. *Ruber*,
Becharu; *Flamant*, fran-
 zösisch.
Fenicottero, ital.
Feamenoo, span.
Mangone, in Sardin.
Gentarubia, zu Oristano.
80. *Geschlecht. Platalea*.
1. *Leucordis*;
Spatule, französ.
1. *Pale*; *Pallette*; *Poche*;
Cueiller; *Truble*, an
 verschied. Ort. Frankr.
Spoon-bill, engl.
Beccarova glia, ital.
Lepelgans; *Schoffelaar*,
 holländ.
Schuffel, dänisch.
Skovl, Neb; *Bred-Neb*,
 norweg.
Calpetra; *Kolpiza*, russ.
81. *Geschlecht. Palamedea*.
1. *Cornuta*.
Camouole, in Cayenne.
Anhima, in Brasil.
Horned Screamer, engl.
2. *Cristata*.
Crested Screamer, engl.
Cariama, in Brasil.
82. *Geschlecht. Mycteria*.
1. *Americana*.
Touyouyou, in Cayenne.
Zabiru-guacu, in Brasil.
84. *Geschlecht. Ardea*.
4. *Grus*.
Grue, französ.
Crane, engl.
Gru, *Grua*, ital.
Grulla, *Gruz*, span.
Erua, portugies.
Kraanvogel, holländ.
Krye, in der Schweitz.
Trane, dänisch.
- Zoraw*,

- Zoraw**, poln.
Trana, schwed.
Gerzah, illyrisch.
Gabilan, catalon.
Dserwe, lettisch.
Kung, ehstn.
Scheriau, krainisch.
Tegavos, griech.
Hagur, hebr.
- II. Gigantea.**
- Ak-Turna**, bey den Baschkiren.
Keugolok, bey den sibir. Tataren.
Sterchy, russisch.
- 7. Ciconia.**
- Cicogne blanche**, französ.
White Stork, engl.
Ovevaar, holländ.
Stork, dänisch.
Starks; *Dfese*; *Swehtelis*; *Swehtsputus*; *Schiguris*, lettisch.
Tonekung, ehstn.
Bocian, poln.
Sterchi, russ.
Legled, türkisch.
Bel-arje, in der Barba-rey.
Chasidah, hebr.
Zakid, arab.
- 8. Nigra.**
- Cicogne noire**; *Cicogne brune*, französ.
Black-Stork, engl.
- Den Sorte Stork**, dänisch.
Sziaſt, poln.
- 9. Nycticorax.**
- Bihoreau**, französ.
Night-Heron, engl.
Stepowron, poln.
- 12. b Cinerea.**
- Heron**, französ.
Common Heron, engl.
Airone; *Aerone*, ital.
Fiske-Heyer; *Skid-Heyre*; *Skred-Heyre*, dän.
Heine, norweg.
Haeger, schwed.
Guorga, lappisch.
Garnis; *Gahrnis*, lettisch.
Czapla, poln.
Balakel, türkisch.
Schalach, hebr.
Bargoch, arab.
- 21. Stellaris.**
- Butor**, französ.
Bittern, engl.
Trombatto; *Tarabuso*, italien.
Galerand, in Bretagne.
Butoor; *Roerdomp*, holländisch.
Hortyhel, in Bayern.
Gazola, portugies.
Rorarum, dänisch.
Dumpis, lettisch.
Merrehiiüp, ehstn.

- Bak; Bunk*, poln.
Gelve, türkisch.
Corvu ambiadaſru, in Sardinien.
Gangia, bey den Algären.
Buik, russisch.
- 85. Geschlecht. Tantalus.**
1. Loculator.
Grand Courlis d'Amérique, französ.
Wood-Pelikan, engl.
Masarino, portugies.
Nimmersatt, holländ.
Tacab Mise, persisch.
Curicaca, in Brasil.
 2. Falcinellus.
Courlis verd, französ.
Scythe bill'd Heron, engl.
Ror-Drum, dänisch.
 3. Arquata.
Courlis, *Courlis*, französisch.
Common Curlew, engl.
Torquato; *Arcase*; *Charlot*, ital.
Hanikens, holländ.
Gruy, in der Schweitz.
Schrye, in Friesl.
Wallop, in Ostfriesl.
Caroli, milanesisch.
Heel-Spove; *Regn-Spaaer*, dänisch.
 4. Phaeopus.
 5. Rusticola.
 6. Gallinago.
- Lang-Neeh*; *Spue*, norwegisch.
Gusgastak, lappisch.
Grytan, poln.
- Corlieu*; *petit Courlis*, französ.
Whimbrel; *Blaffer*, engl.
Tarangalo, ital.
Girardello, milanese.
Mellem-Spoue, dänisch.
Gaasspou; *Smaa-Spue*; *Spove*, norweg.
Spoe, isländ.
Grytan maly, poln.
- Becasse*, französ.
Wood-Cock, engl.
Accegia; *Beccagia*, ital.
Holz-Sneppe, dänisch.
Rutte; *Blom-Rokke*, norwegisch.
Schneffa, krainisch.
Pardiva; *Stomka*, poln.
Kikkuts, lettisch.
Poello-Tilder, ehisl.
Pudda di matta, in Sardinien.
Cabone de murdego, im Campidanesischen.
Pudda de mudeja, außerhalb Campidano.
- Becassine*, französ.
Snipe, engl.

Pizzar.

Pizzardella, italien.

Steen-Sneppe; *Dobbelt-Sneppe*; *Hosse-Giög*, dänisch.

Trolldrukke; *Maekegouk*; *Myre-Hest*; *Myre-Bock*; *Myr-Sneppe*; *Myr-Snipe*, norweg.

Mall-Snaeppa, schwed.

Perkohnkasse; *Perkohn-nuasis*; *Kikkukahsa*, lettisch.

Metskits; ehstn.

Kofitza, krainisch.

Rekas, *Baranek*, poln.

Koza Baranek, poln.

Beccarin Reale, im Toscanischen.

Beccacino, in Sardin.

Myr-Skitt, isländ.

Mekastak, lappisch.

Siguktok, grönländ.

Jelue, türkisch.

8. Gallinula.

Petite becassine, französ.

Gid; *Jacksnipe*; *Judcock*, engl.

Half-Schnepf, holländ.

Ror-Sneppe, dänisch.

Pokerl, krainisch.

Kulyk, poln.

10. Glottis.

Barge variée, französ.

Greenshank, engl.

Høft-Fugl, norweg.

Tschoket, krainisch.

Leverfina, neapolit.

Pluiero, bolognes.

Girardel, milanes.

11. Calidris.

Chevalier aux pieds rouges, französ.

Redshank; *Poolsnipe*, engl.

Laxe Tite; *Lax Titung*, norweg.

Kurlyk czerwonemi nogami, poln.

12. Totanus.

Corlieu, französ.

Spotted Snipe; *spotted Redshank*, engl.

Rodbeen, dänisch.

Quikketield; *Squaptield*; *Strand-Kield*; *Stilk*;

Skrieg-Kield; *Soelskin-Stöd*, norweg.

Stelkur, isländ.

Buvadak, lappisch.

87. Geschlecht. *Tringa*.

1. Pugnax.

Combattant; *Paon de mer*, französ.

Ruff, *Reeve*, engl.

Kemperken, holländ.

Staal-Sneppe; *Bruuskop-Sneppe*, dänisch.

Brus-Kop; *Bruus-Hane*, norweg.

- Brushane*, schwed.
Kolmierzyk; *Ptak-bitny*, poln.
- 2. Vanellus.**
- Vanneau*, franzöf.
Lapwing; *Bastard Plover*, engl.
Pavoncella, ital.
Dix-huit; *Papechien*, an verschied. Ort. Frankr.
Vibe, dänisch.
Kybits, norweg.
Kehwahla, lettisch.
Kiwit; *Sehmalis*; *Semale*
Kiwaitis, ehrln.
Tschibes, russ.
Czayka, poln.
Lepera d'arzola, in Campidano.
Gavi-Gavi, bey den Saffaresen.
- 4. Interpres.**
- Coulon-chaud*, franzöf.
Turnstone; *Sea Dotterel*, engl.
Veydetite, dänisch.
Kutte Rutte, norweg.
- 5. Striata.**
- Chevalier rayé*, franzöf.
Striated Sandpiper, engl.
Flöre; *Strand-Eig*; *Fiär Plifter*, norwegisch?
Sarbursuk; *Sarguarsuk*, *Sirkariarfungoak*, grön-ländisch.
- 8. Lobata.**
- Smaellebot*; *Nordvest-Fugl*; *Lita*, *Fisk-Lita*, norweg.
Bieggush, lappisch.
Nelloumirsortok; *Nelloumirsortungoak*, grönl.
- 13. Ocrophus.**
- Becasseau*; *Cul-blanc*, franzöf.
Green Sandpiper, engl.
Horse-Giög, dänisch.
Skodde-Fugl; *Fjord-Geed*; *Maskker-Goux*; *Ros-Gouge*, norweg.
Culbianco, *Gambettola*; *Giarola*, *Pivinello*; italien.
Pstry Kulyk, poln.
- β. Littorea.**
- Chevalier varié*, franzöf.
Shore Sandpiper, engl.
Strand-Bekkafin; *Skodefole*; *Plougeller*; *Klov-Mand*; *Taage-Hest*, dänisch.
Laekiadudra, isländisch?
Kuibgas, ehrln.
- 14. Hypoleucus.**
- Guignette*, franzöf.
Common Sandpiper, engl.
Lille Myrstikkel; *Lille Becassin*; *Myr-eller*; *Strand-Sneppa*, norwegisch.
Virlen,

Virlen, bornholm.
Fäntilder; *Sopatil*, ehst-
nisch.

88. Geschlecht. *Chara-
drius*.

I. *Hiaticula*.

Pluvier à collier, franz.
Sea-lark, engl.
Faticula, ital.
Praefte-Krave; *Sand-
Vrister*, dänisch.
Strand-Piper; *Strand-
Elg*; *Sand-Rönne*;
Sand-Muling; *Sand-
Sneppé*, norweg.

Strand-Pipare, schwed.
Trulls, holländ.
Grylle, scan.
Sandloe, isländ.
Pago, lappisch.
Urineglia de riu, bey
den Algheresen.
Ziriolu, bey den Orista-
nesen.
Tukagvajok, grönland.
Matuitui, in Brasil.

5. *Morinellus*.

Guignard, franzöf.
Dotterel, engl.
Pomerants-Fugl; *Citron-
fugl*, dänisch.
Pehrloe; *Bold Tiäd*;
mindre Akerloe, nor-
wegisch.

Lauhol; *Laf-Uhl*, lap-
pisch.

6. *Apricarius*.

*Pluvier doré à gorge
noire*, französ.
Spotted Plover, *Alwar-
grim Plover*, engl.
Hieilo, dänisch.

Heyloe; *Brokfugl*; *My-
relœ*; *Akerla*, norwe-
gisch.

Ackerhoen, schwed.

Hjeile, ciimbr.

Altvargrim, oeländ.

Myrpitta, smoländ.

Lo, isländ.

Bizhiutzh; *Huet*; *Huit*;
Hutti; *Huttich*, lap-
pisch.

Kajorrövek; *Kajordlek*,
grönland.

Hawks-Eya, bey den
Engl. an der Hudsons-
bay.

89. Geschlecht. *Recurvi-
rostra*.

I. *Avocetta*.

Avocette, französ.
Scooping Avocetta, engl.
Beccastorta, ital.
Klyde; *Lau-Fugl*; *For-
keert Regn Spove*, dä-
nisch.

Filippa, im Oristanesi-
schen.

90. Geschlecht. *Haematoptus.*

1. *Ostralegus.*

Huitrier, französ.

Seapie, engl.

Oystercatcher, engl.

Strand-Skade, dänisch,

Kield; *Strand-Skur*; *Ronekalv*;

Sagan; *Tiadarur*;

Glib; *Tield*,

norweg.

Strand-Skjura, öland.

Marspitt, gothländ.

Tiälderew, isländ.

Sagan, lappisch.

91. Geschlecht. *Fulica.*

4. *Chloropus.*

Poule d'eau, französ.

Common Water-Hen;

More-Hen, engl.

Porzanone, ital.

Vandhöne, dänisch.

Pudda da'ba, in Sardin.

Giaddina d'eva, in Salsari.

Puglietta, zu Algher.

2. *Atra.*

Foulque; *Morelle*, französisch.

Coot, engl.

Fulaga; *Polon*, ital.

Blis-Höne; *Eras-And*;

Vard-Höne; *Rör-Höne*;

Bondelöber, dänisch.

Bläs-klacka, schwed.

Meer-Coot, holländ.

Lyska, poln.

Puliga, in Sardin.

Flüsteres, in Carolina.
(Lawf.)

92. Geschlecht. *Parra.*

3. *Jacana.*

Yohualquachitli, in Mexico.

II. *Brasilienfis.*

Aguapecaca, in Brasil.

93. Geschlecht. *Rallus.*

1. *Crex.*

Rale de genet; *Roi des cailles*, französ.

Rail; *Daker-hen*, engl.

Re di quaglia, ital.

Kwartel Koning, holländ.

Skov-Snarre, dänisch.

Akerrixe; *Ager-Hone*, norweg.

Kornknarren, schwed.

Corn-Crek, schottl.

Rostz, krainisch.

Keczan-Derkacz, poln.

2. *Aquaticus.*

Rale d'eau, französ.

Water-rail; *Bilcock*;

Brook-ouzel, engl.

Galla Mareza, span.

Water-Rall, holländ.

Vagtel Konge, dänisch.

Strand-

Strand-Snarre; Strand-Rixe; Vand - Rixe; Vand - Höne; Vand-Vachtel, norweg.

Ford-Koene, feroens.

Puddighina de Malta, in Sardin.

3. Porzana.

Marouette; petit rale d'eau, französ.

Girardin; spotted Gallinule, engl.

12. Crepitans.

Meadow Clapper, in Neuyork.

95. Geschlecht. *Otis.*

1. Tarda.

Outarde, französ.

Bustard, engl.

Ostarde; Houtarde; Bustarde, alt französ.

Starda, ital.

Trapp, schwed.

Sigha, lettisch.

Tuzok, ungarisch.

Gustarde, schottisch.

Drop; Trop, poln.

Drofa, illyr.

Otis; Ωτις; Ουτις, griech.

Alhabari, hebr.

3. Tetrax.

Petite Outarde; Cane petiere, französ.

Field-Duck; little Bustard, engl.

Gallina pratajuola, Fasarella, ital.

Pudda campina, in Sardinien.

Giaddinu di canpu, zu Sassari.

Pittara; Pidrostia, zu Oristano.

96. Geschlecht. *Struthio.*

1. Camelus.

Autruche, französ.

Ostrich; Ostridge, engl.

Struzza, ital.

Vagel-Struis, holländ.

Avestrusz, span.

Ema; Ema di Gei, portugiesisch.

Jacuah, hebr.

Namitha, chald.

Neahnia; Thär ed Sjamel, arab.

2. Casuarius.

Casoar, französ.

Casuel, Gasuel, alt französisch.

Cassawar; Cassowary, engl.

Kasuaris, holländ.

Eme; Emeu, in Indien.

3. Rhea.

Nhanda-Guacu, in Brasilien.

Hhh 5

Thaut.

Thouyouyou, in Guiana.
Tardu; *Tandu*; *Andu*,
 in Indien.

Sallian, auf d. Ins. Ma-
 ragnan.

Suri, in Chili,

97. Geschlecht. *Didus*.

I. *Ineptus*.

Dronte; französ.

Hooded Dodo, engl.

Dod-aars; *Walghvogel*,
 holländ.

98. Geschlecht. *Pavo*.

I. *Cristatus*.

Paon, französ.

Peacock, engl.

Pavone, ital.

Pavon, span.

Päfogel, schwed.

Pacauw, holländ.

Pau, krainisch.

Paw, poln.

Tuchiim, hebr.

Cavaz, chald.

Tauza, syrisch.

99. Geschlecht. *Meleagris*.

I. *Gallopavo*.

Dindon; *Coq d'Inde*,
 französ.

Turkey, engl.

Gallo d'India, ital.

Payon de las Indias,
 span.

Indiot; *Gall d'Indi*, in
 Catalonien.

Indiyk, poln.

Ondettutaques, bey den
 Wilden in Canada.

Arynanussu, am Mississipi,
 und in Brasilien.

Huexototl, das
 Männch. } in Me-

Cihuatotolin, das
 Weibch. } xico.

100. Geschlecht. *Crax*.

I. *Alector*.

Hocco de la Guiane, fran-
 zösisch.

Crested Curassow; *Pea-
 cock Pheasant of Guiana*,
 engl.

Ano, in Afrika.

Mitu-poranga, in West-
 indien.

Tepetototl, in Mexico.

Quirizai, in Jamaïca.

101. Geschlecht. *Phasianus*.

I. *Gallus*.

Coq; *Poule*, französ.

Cock, engl.

Gallo, ital.

Gallo, span.

Gol, *Gog*, alt französ.

Gau; *Geau*, savoyard.

Haan, *Hoem*, holländ.

Hane, dänisch.

Hoens; *Tupt*, schwed.

Petel;

Petel; *Kokusch*, krain.
Kokosz, poln.
Achau, in Chili.
Sikvi; *Sakvia*, hebr.

3. *Colchicus.*

Faisan, *Faisante*; *Faisanne*; *Faise*; *Faisanteaux*; *Faisanneaux*; *Faisau*, französ.

Phasianus, latein.

Pheasant, engl.

Fagiano, ital.

Faisan, span.

Fazant, holländ.

Fazyan; *Bazant*, poln.

Surglum; *Suglum*, türkisch.

Thi - Khi, chines.

Thisionis, rabbin.

Madsharskoy; *Petuschok*, am Kumafluss.

102. *Geschlecht. Numida.*1. *Meleagris.*

Peintade, französ.

Guinea - Hen; *Pintado*, engl.

Gallina di Numidia, ital.

Quetele, in Congo.

Acangues, in Madagascar.

103. *Geschlecht. Tetrao.*1. *Urogallus.*

Coq de bruyere, französisch.

Coq de Limoges; *Coq de bois*; *Faisan bruyant*, in einigen französischen Provinzen.

Cock of the Wood; *Mountain*, engl.

Gallo cedrone, ital.

Norsk - Kalkan, dänisch.

Tiur; *Tödder*; *Teer*, norweg.

Kjäder, schwed.

Devi Pitale, krainisch.

Meddens, *Mednis*, lettisch.

Metsis, ehstn.

Möttus, im Pernauischen.

Tetrez, slavon.

Stolzo, bey den Graubündern.

Ziufzhia, lappisch.

Dukiphat, hebr.

7. *Phasianellus.*

Long - tailed Grouse;

Sharp-tailed Grouse, engl.

Au - Kuskow, an der Hudsonsbay.

2. *Tetrix.*

Petit Tétras, *Coq de bruyere à queue fourchue*, französ.

Black Cock; *Black Game*; *Black Grouse*, engl.

Sforzello, ital.

Urhane, dänisch.

Aarfugl;

- Aarfugl; Aerefugl; Orhöne; Orhöne*, norweg.
Orne, schwed.
Birkhaan, holländ.
Orrar, lappisch.
*Rubbens; Tetteris; Tet-
tera mahte*, lettisch.
Tedder, ehstn.
Dziki Kur; Czietzew, poln.
4. *Lagopus*.
*Gelinote blanche; Lago-
pede*, französ.
*Francoline blanche; Ar-
benne; Poule de neige*, an verschiedenen Orten
 Frankr.
*White Game; Ptarmi-
gan*, engl.
Daina; Gallina bianca, ital.
*Rype; Field-Skov-Lie-
Snee-Rype; Hareford*, norweg.
Snöripa, schwed.
*Cheruna, Rieufak; Gi-
ron*, lappisch.
Riupa, isländ.
Rebalino, bey den Graubünd.
So; Tuddokanna, ehstn.
Akeiksek; Kauio, grönl.
9. *Bonasia*,
Gelinote, französ.
Hazel Grouse, engl.
- Hierpe; Hiärpe*, schwedisch.
Podlesk, krainisch.
Laukuirbe; Kurrata, lettisch.
Pöldpii, ehstn.
Jarzabek, poln.
Jabantan, türk.
- II. *Alchata*.
Ganga, französ.
*Perdrix de Damas, ou de
Syrie*, französ.
Partridge of Damascus; little pin-tailed Grouse, engl.
Ganga, span.
Cata, Kata, türk.
Kitaviah, in der Barba-
 rey.
12. *Rufus*.
*Bartavelle, Perdrix de
Grèce*, französ.
*Greek Partridge; Great
red Partridge*, engl.
Starna montana, ital.
Acker-hoena, schwed.
Cottorna, krainisch.
Cabugi, Cubugi, arab.
13. *Perdix*.
Perdrix grise, französ.
Common Partridge, engl.
Perdice, ital.
Perdez, span.
Agerhöne, dänisch.
Raphöne, norweg.
- Rapp-*

Rapp-hoena, schwed.
Laukuirbe, *Kurrata*, lettisch.
Pöldpii, ehstn.
Jerebitza, krainisch.
Kuro-patwa, poln.
Kore, hebr.

36. *Perlatus*.*Tche-tou*, in China.20. *Coturnix*.

Caille, französ.
Quail, engl.
Quaglia, ital.
Cuaderviz; *Quaderviz*, span.

Vagtel, dänisch.*Wachtel*, schwed.*Kwakkel*; *Kwartel*, holländisch.*Perpelitza*, krainisch.*Greesa*; *Paipola*, lettisch.*Putspassarat*, ehstn.*Przepiorka*, poln.*Quakkel*, flandr.*Circuri*, im Campidanesischen.*Trespodres*, im Capo di Sopra.*Ορτυξ*, griech.*Shelav*, hebr.*Katta*, arab.*Moregzag*, pers.104. *Geschlecht. Columba*.1. *Oenas*.2. *Domestica*.*Pigeon*, französ.*Dove*, engl.*Colombo*, ital.*Paloma*, span.*Doffer*, holländ.*Dufiea*, schwed.*Golob*, krainisch.*Mescha Balloschi*, lettisch.*Metstuike*, ehstn.*Gahlah*, poln.*Jon*, *Jonah*, hebr.*Kaphtar*, pers.*Aetekeha*, arab.*Fugargen*, türk.3. *Hispanica*.*Pigeon-romain*, französ.*Runt-Pigeon*, engl.*Tronfo*, *Asturnellato*, italien.4. *Dasyurus*.*Pigeon-pattu*, französ.*Rough footed Dove*, engl.*Colombo co' piedi pennati*, italien.*Ruigpooten*, holländ.19. *Palumbus*.*Pigeon-ramier*, französ.*Ring-Pigeon*; *Ring-Dove*, engl.*Columbo torquato*; *Columbo favoro*; *Colombaccio*, ital.*Paloma tortatz*, span.*Mansean*,

Monseau, brabant.

Ring-duif, holländ.

Krieff-Dove, flandr.

Ringel-Due, dänisch.

Ring-Dufwa, schwed.

Siutut, oeländ.

Skude, bornholm.

Cushat, im nördl. Theil von Engl.

Palombe, zu Perigord.

Mausard, in der Picardie.

Grzywacz, poln.

Griunik, krainisch.

32. Turtur.

Tourterelle, französ.

Turtle, *Turtle Dove*, engl.

Tortora, *Tortorella*, ital.

Tortola, span.

Tortel-duif, holländ.

Turtur-Dufwa, schwed.

Trakawke, poln.

Tευγιον, griech.

Tor, hebr.

Tetaru, perf.

34. Passerina.

Petite tourterelle de S.

Domingue, ou de Martinique, französ

Ground Dove; *Ground*

Pigeon, engl.

Least Barbados Turtle, 2.

engl.

Mosch-Duifge, holländ.

Cocotli; *Cocotzin*, in Mexico.

Picuipinima, in Brasil.

35. Minuta.

Tlapalcototli, in Mexico.

105. Geschlecht. *Alauda*.

1. Arvensis.

Alouette, französ.

Louette, *Alavette*; *Layette*, in Guienne.

Mauvette, zu Paris.

Field-lark; *Sky-lark*, engl.

Lodola, *Lodola campestris non capellata*, ital.

Lurlen, bey Bale.

Sang-larke, dänisch.

Lärka, schwed.

Cugniada, span.

Ziluhri, lettisch.

Lerke, ehstn.

Lauditza, krainisch.

Skowronek, poln.

Skrzwan, illyr.

Uanseta, in Catalon.

Shawronek, russisch.

Butschumur, tungus.

Alaud, celtisch.

Calandra, zu Saffari.

Pispanti, bey den Campidanesen.

Kunbar; *Kombara*, arab.

2. Pratensis.

Farlouse, französ.

Titlark, engl.

Spipola,

- Spipola*, *Calandrino*;
Scorzzetta, ital.
Rulifar, *Zekkuli*, lettisch.
3. *Arborea*.
Cujelier; *Alouette de bois*, französ.
Cochelivier; *Cochelirieu*;
Pieno; *Fluteux*; *Alouette fluteuse*; *Lutheux*;
Turlut; *Turlitoir*; *Musette*; *Trelus cotrelus*, an verschiedenen Orten Frankreichs.
Pironat, in einigen Ggenden von Bourgogne.
Coutrioux, in Saintonge.
Alouette calandre, in Nantes.
Tottovilla, ital.
Skow-larke; *Heede-larke*;
Lyng-larke, dänisch.
Zippa, krainisch.
Dzierlatka, poln.
Accucadita, in Sardin.
Mattolina, toskanisch?
4. *Campestris*.
Sipolette, französ.
Meadow Lark, engl.
Mark lerke, dänisch.
Zdzoto, poln.
Kurbukon, tungus.
- β. *Spinoletta*.
Pispoletta, in Sardin.
Piuli, hin und wieder in Sardinien.
- Quina*, italien.
Mala zippa, krainisch.
6. *Cristata*.
Cochevis, französ.
Crested-Lark, engl.
Lödola capellata, ital.
Toplarke; *Veylaerke*, dänisch.
Alouette duppée, in Solgne.
Verdange, in Perigord.
Zihrlis ar Zekkuli, lett.
Dzierlatka czubata, poln.
9. *Calandra*.
Grosse alouette; *Calandre*, französ.
Calandre Lark, engl.
Calandra; *Chalandria*, ital. span.
Couloffade, in der Provence.
Alouette de Bruyere, um Orleans.
Corydalos, in Venedig.
10. *Alpestris*.
Hauße col-noir; *Alouette de Virginie*, französ.
Shore Lark, engl.
Bisnoi-Shavronek, russ.
Chi-chup-pi-sue, an d. Hudsonsbay.
106. *Geschlecht. Sturnus*.
1. *Vulgaris*.
Etourneau, französ.
Estour.

- Eſtournal*, perigord.
Tournal, in Guienne.
Stare, *Sterling*, engl.
Storno, ital.
Eſtorino, span.
Sturino, portugies.
Stornell, catalon.
Spreuve, in Flandern.
Staer, dänisch.
Star, norweg.
Stare, schwed.
Starl, krainisch.
Szpak; *Spatzek*; *Sspatzek*; *Sharzek*, poln.
Skworez, russisch.
Buchosthir, burät.
Φαρ, Φαρος, griech.
Sarfir, *Zezir*, hebr.
Alzarazir, arabisch.
5. *Cinclus*.
Merle d'eau, französ.
Water-Ouzel, engl.
Merla acquajuola, ital.
Fosse-Fald; *Fosse-Kald*;
Quärn - Kald; *Strom*.
Stär; *Bakke-Fugl*; *El*.
ve-Konge, norweg.
Watnstore, schwed.
Povodni Koß, krain.
Mirlu de riu, in Sardin.
107. *Geschlecht. Turdus.*
- I. *Viscivorus*.
Draine, französ.
Ciferre; *Focasse*; *Focade*; *Grive de brou*; *Grive provençale*; *Gilloniere*; *Trie*; *Trage*; *Truie*; *Treiche*; *Trainie*; *Trictrac*, in verschied. Provinzen Frankreichs.
Miffel-bird, *Shrite*; *Mifsel Thrush*, engl.
Tordo; *Tordo viscado*; *Tordella*, ital.
Penyellwyn, alt britt.
Hautgrive, in Lothringen.
Verquette, in Bugey.
Dobbelt Kramsfugl, dänisch.
Biörk-Traft, schwed.
Mattschinsch; *Matsnings*, lettisch.
Rääft; *Zobboſe - Rääft*, ehstn.
Turdu fuerinu, in Sardinien.
Geratauk, türkisch.
2. *Pilaris*.
Litorne, *Tourdelle*, französisch.
Fieldfare, *Feldefare*, engl.
Cha-Cha; *Cla-Cla*; *Fia-Fia*; *Tia-Tia*; *Cancoine*; *Serre-montagnarde*, in verschied. französ. Provinzen.
Gardena; *Tordo mezzano*, ital.
Tordo; *Zorzol*, span.
Graae-

Graae - *Trost*; *Field-Trost*; *Norden* - *Vinds-Pipe*, norweg. *Kramsfogel*, schwed. *Simmeren*, auf Bornholm. *Snöskata*, uppländ. *Reckholter*; *Wechholter*, in der Schweitz. *Mellsstrads*, lettisch. *Halrääf*, ehstn. *Cased y ddryccia*, alt brittisch. *Brinauka*, krainisch. *Gluch* - *jemiolucha*; *Drozd-Srzedni*; *Kwic-zot*, poln. *Kwicziela*, illyr. *Drosd*, russ. *Smortitu*, in Sardin.

3. Iliacus.

Mauvis, französ. *Grive-montagnarde*; *Grivette*; *Roselle*; *Grive-champenoise*; *Grive des Ardennes*; *Grive de vendage*; *Tris*; *Siffleur*, an verschied. Ort. Frankreichs.

Boute-quelon, *Calandrote*, um Montbard. *Redwing*; *Swinepipe*; *Wind-Thrush*, engl. *Tordo sassello*, itäl. *Malvis*, span. *Tort-alaroity*, catalon.

II. Band II. Th.

Can; *Quan*, in Brie. *Klera*, sinoländ. *Kladra*, ostrogoth. *Tall-Traßt*, westmann. *Nat-Vax*, norweg. *Veigezizatzh*, lappisch. *Drozd-mniyssy*, poln. *Giraweckz*, illyr.

4. Musicus.

Grive, französ. *Toudre*; *petit Touard*; *Oiseau Dunetto*; *Sisel-le*; *Vendanette*; *Gri-vette*; *Mauvette*, in verschied. französ. Provinzen. *Tordo mezzano*, ital. *Zorzar*, span. *Throstle*; *Song-thrush*, engl.

Droßig; *Drosch*, krainisch. *Laulorääftas*, ehstn. *Drozd*, poln. *Ceiliog brou fraith*, in Wallis.

22. Merula.

Merle, französ. *Black-bird*, *Amzell*, engl. *Merla*, ital. *Mierla*, span. *Metroa*, portugies. *Lyster*, holländ. *Sälsort*, dänisch.

III

Sort

Sort - Troft; Sol - Sort,
norweg.

Traſt; Kohl - Traſt,
schwed.

Tr aderyndu; Ceiliog
mwyatch, alt britisch.

Koſ, krainisch.

Kos, poln.

Muſträäſt, ehſtn.

Tſcheravi - Drost, russ.

Felweck; Eelweck, tür-
kisch.

23. *Torquatus.*

Merle à collier,

Merle à plas- } franzöf.
tron blanc,

Merle terrier; Buiffon-
nier, in einigen Gegen-
den Frankreichs.

Merle gris;

Merle d' Es-

pagne,

Merle de Sa-

voye,

Torcal noir,

Ring - Ouzel, engl.

Ring - Drossel, dänisch.

Ring - Troft, norweg.

Gielavaelgo, lappisch.

108. *Geschlecht. Ampelis.*

1. *Garrulus.*

Jaseur de Boheme, franz.

Bohemian Chatterer; Prib
chatterer; *Waxen chat-*
terer, engl.

Beccofrisone; Galleto del
bosco; Vcello del mon-
do novo, ital.

Siden - Svands, norweg.

Sidenſwanz, schwed.

Snetuppa, uppländ.

Skitteren, auf Christia-
naoe.

Brkoſtaſ, böhmisch.

Sihdeast, lettisch.

Žedwabnicka, poln.

3. *Carnifex.*

Coyoltototl, in Mexico.

Arara; Apira, in der
goriponnischen Sprache
in Guiana.

Ouette, bey den Creolen.

109. *Geschlecht. Loxia.*

1. *Curvirostra.*

Bec - croisé, franzöf.

Croſſbill; Sheld - apple,
engl.

Korsfugl, norweg.

Korsnaef; Kiaegelrifare,
schwed.

Gryllſingroes, alt brit.

Krzywonos, poln.

Selenoi - Kleſt, russ.

12. *Leucoptera.*

Aſtchu Achaschich, an
der Hudsonsbay.

2. *Coccothraustes.*

Gros - bec, franzöf.

Pinçon royal, in Maine.

Groſſe -

Grosse-tête, in der Picardie.

Malousse; *Amalousse gatete*; *Pinçon maille*; *Ebourgeonneux*, in Sologne.
Casseragnon; *Casse-noix*; *Cassenoyaux*, in Champagne.

Gros-pinçon; *Pinçon d'Espagne*, in Saitonge.

Durbec, in Perigord.
Geai de bataille; *Coche-pierre*, in einigen Ort. Frankreichs.

Grosbeak; *Hawfinch*, engl.
Frosone; *Frisone*; *Grisone*; *Franquet del-né*; *Franquet montano*, ital.
Pinça mec; *Pinça rogné*, in Catalon.

Stenkneck, schwed.
Swirpis, lettisch.

Gylfinbratf, alt britt.

Dleschk, krainisch.

Picu-grossu, in Sardin.

Re d'alipinti, bey den Sassaresen.

3. Enucleator.

Dur-bec, franzöf.

Pine-Grosbeak; *Great-est Bulfinch*, engl.

Kirsebaer-Fugl, dän.

Norsk-Papegoy; *Nödde-Knekker*; *Kierne-Bider*;

den guulhaerdede Dom-Oxe, norweg.

Tallbit; *Swänsk-Papa*; *ja*, schwed.

Natt-waka, westboth.

Ptakrayski, poln.

Wuscanithow, an der Hudsonsbay.

4. Pyrrhula.

Bouvreuil, franzöf.

Bouvreux, *Bourgeonier*; *Bouvrer*; *Bouvier*, in Unter-Normandie.

Boeuf; *Pinçon maille*, in Sologne.

Choppard; *Grosse tête noir*, in Picardie.

Pive, in Provence.

Pivane, in Berry.

Pion; *Pione*, in Lothringen.

Pivoine, in Paris.

Pinçon d'Auvergne, in Saintogne.

Pinçon rouge; *Siffleur*; *Fluteur*; *Groulard*; *Prêtre*; *Perroquet de France*; *Ecoffonneux*; *Ebourgeonneux*; *Rosignol moner*; *Civiene*; *Tapon*, in verschied. französ. Provinzen.

Gimpl, krainisch.

Dompape, dänisch.

- Domherre; Blod-Finke,** 110. Geschlecht. *Emberiza.*
norweg.
- Domherre,** schwed.
- Bulfinch,** engl.
- Cifolotto;** *Monachino,* italien.
- Pilart,** in Brabant.
- Franquelle - invernengk,** in den Alpen.
- Smilges;** *Shwapulis,* lettisch.
- Popek,** poln.
- Blask,** illyr.
- 16. Malaccä.**
- Mungul,** in Indien.
- 27. Chloris.**
- Verdier,** französ.
- Bruyan;** *Bruant;* *Verdun;* *Verdier;* *Verde-reule;* *Verdere,* in verschied. französ. Provinzen.
- Greenfinch,** engl.
- Verdone,** ital.
- Verdelham,** portugies.
- Svenske,** dänisch.
- Swenska,** schwed.
- Verderol,** catalon.
- Schwonez,** böhm.
- Grindling,** krainisch.
- Dzwoniek;** *Konopka,* polnisch.
- Zeglolka,** illyr.
- 77. Asiatica.**
- Lap-tzoy,** in China.
- 1. Nivalis.**
- Ortolan de neige,** französisch.
- Snow Bunting,** engl.
- Sneekok;** *Vinter-Fugl,* dänisch.
- Snee-Fugl;** *Fläster;* *Sneespurre;* *Snee-Titing;* *Soelskrigger,* norwegisch.
- Snösparf,** schwed.
- Alaipy,** lappl.
- Illwärtsfogel,** in Dalekarlien.
- Hardvärsfogel,** uppländisch.
- Sino-Tyllingur;** *Soelskrikia;* *Tytlings-Blike,* isländ.
- Pulma;** *Pulmuinen;* *Lumipulmonen;* *Lumispulmonen,* finnisch.
- Sioelaerka,** in Schonen.
- Lumenpoinia,** bey Abo.
- Kopanaursak;** *Kopanungarsuk;* *Amauligakau-dit,* grönländ.
- Sniegula;** *Sniczniczka,* poln.
- Podoroshink,** russisch.
- Mapathecusisch,** an der Hudsonbay.
- 2. Hyemalis.**
- Ortolan Jacobin,** französ.
- Snow**

- Snow Bird; Black Bunting*, engl.
Chuck - bird, bey den Amerikanern.
Snovogel, schwed.
3. *Miliaria*.
Proyer, französ.
Chic - perdrix, in Provence.
Tchi - pardrix, zu Montelimar.
Teitei, in Brie.
Tride - Prele, zu Lyon.
Verdiere des Prés, zu Lothringen.
Bunting, engl.
Strilozzo, ital.
Korn - Laerke, dänisch.
Knötter, norweg.
Predicatore, in Piemont.
Macottu; Orgiale, in Sardin.
4. *Hortulana*.
Ortolan, französ.
Hortolan; Jardinier, an verschied. Orten Frankr.
Benaris; Benarie, in Languedoc.
Ortolan, engl.
Ortolano, ital.
Tordino, ital. (nach Sallern.)
Ogrodniczek, poln.
5. *Citrinella*.
Bruant, französ.
- Verdelat*, in der Provence.
Verdat, in Sologne.
Verdale, in Languedoc.
Verdoie, in Poitou.
Verdange, in Perigord.
Binery, um Orleans.
Bardeant, in Guienne.
Verdier; Chic - jaune; Vertmontant; Verdier buissonnier; *Verdin*; *Verdon; Rousette*, in verschied. französ. Provinzen.
- Yellow - hammer; Yellow Bunting*, engl.
Zivolo, Zigolo, ital.
Jasine, in Brabant.
Sarrant, in Maine.
Gulspurv; Gulvesling, dänisch.
Skur, norweg.
Sternardt, krainisch.
Stehrsts, lettisch.
Trznadel, poln.
Strnad, illyr.
Offänka, russ.
Altachan, burät.
- II. *Cia*.
Bruant fou; Bruant des près, französ.
Foolish Bunting, engl.
Cirlo matto, ital.
Chic - farinous, in Prov.
Pieux des Rochers, in Mantua.

- Geel-Göschens, in Pom-
mern.
- Gluszek*, poln.
- ii. Geschlecht. *Tanagra*.
1. Jacapa.
Bec d'argent, französ.
Red-breasted Blackbird,
engl.
Jacapu, in Brasil.
2. Brasilia.
Tye-piranga, in Brasil.
Chiltototl, in Mexico.
4. Jacarina.
Jacarini, in Brasil.
5. Violacea.
Teitei, *Guiranhemgeta*;
Guraundi; *Gurauthe*
engera, in Brasil.
15. Brasiliensis.
Turquin, französ.
Guira-genobia, in Brasil.
33. Leucocephala.
Quatotztli, in Brasil.
35. Amboinenensis.
Calatti, in Amboina.
36. Canora.
Xiuhtototl, in Mexico.
- ii. Geschlecht. *Fringilla*.
1. Lapponica.
Grand mountain; *Pinçon*
de montagne, französ.
Lappland Finch, engl.
- Rouffolan, in Dauphiné?
- Tecurmasfish*, an der
Hudsonsbay.
- Narksarmiutak*, grönl.
3. Caelebs.
- Pinçon*, französ.
Pinson commun; *Pin-*
gard; *Pinchard*; *Pin-*
chon; *Glaumet*; *Huit*;
Pichot; *Guignot*; *Ri-*
che-prisur, in verschied.
französ. Provinzen.
- Chaffinch*, engl.
Fringuello, ital.
Bog-Finke; *Bo-Finke*,
dänisch.
- Finke*; *Bofink*, schwed.
- Penkewa*, böhm.
- Snow-fleck*; *Shoul-fall*,
schott.
- Pinça*, catalon.
- Schinkowitz*, krainisch.
- Schubbe*, lettisch.
- Metskask*, ehstn.
- Zieba*, poln.
- Pinkawa*; *Pienkawa*, il-
lyrisch.
4. Montifringilla.
Pinçon d'Ardenne, fran-
zösisch.
- Tioguet*, in einigen Ge-
genden von Burgund.
- Quinçon de montagne*, in
Savoyen.
- Ardennet*, in Sologne.
- Pichot*

Pichot montain; Pichot de mer; Ebourgeonneau; Pinson d'Artois,
in Orleans.

Ruses innocentes, nach
Fontin.

Bramble; Brambling;
Bramlefinch; Bierfinch;
Montainfinch, engl.

Fringuello montanino,
italien.

Quaker; Bogfinkens Hoer-
Unge; Akerlan, dän.
Norrquint, schwed.
Pinosch, krainisch.

7. Carduelis.

Chardonneau, französ.
Cardaline, in der Pro-
vence.

Cardelino, in Perigord.
Cardina; Chardonneau;
Chardrier, in Guienne.
Cadoreu, in der Picardie.
Golfinch; Thift!efinch,
engl.

Cardello; Cardellino; Cal-
derugio, ital.

Sirguerito; Siele colore;
Forte pintacilgo, span.

Cardina, catalon.
Distelvink; Putter, hol-
ländisch.

Ziglis; Kammulis, let-
tisch.

Tiglits, ehstn.
Guas a Sierri Paneuryn,
wall.
Sczygiel, poln.
Steglik, illyr.

16. Citrinella.

Citril Finch, engl.
Verzellino, um Rom.
Luguarinera, Beagana;
Raverin, an einig. Ort.
Italiens.

Gaffaru, catalon.
Vidarino, im Bolognesischen.
Lequilla, zu Neapel.
Scarino, in Genua.
Citrinella, im Tridentini-
schen.

Citril, in Wien.
Sare, türkisch.

17. Serinus.

Serin, französ.
Serin; Scarzerin, in Ital.
Canari de Montanya, ca-
taloniisch.
Schwederle, in der
Schweitz.
Grilitsch, krainisch.

23. Canaria.

Serin des Canaries, fran-
zösisch.
Canary - Bird; Canary-
Finch, engl.
Passera di Canaria, ital.
Kanarek; Kanary, poln.

25. Spinus.

- Tarin*, franzöf.
Lucre, in der Provence.
Terin; *Tirin*, an verschied. Orten Frankr.
Siskin; *Aberdivine*, engl.
Lucarino, ital.
Sischen, friesl.
Sisgen; *Sifken*, dänisch.
Siska; *Groniska*, schwed.
Zieschen, livländ.
Zitskens; *Kiwulis*, lettisch.
Paolind, ehstn.
Saisl, krainisch.
y Dreiniog, wall.
Cyz, poln.
Czisz, illyr.
Tschischk, russisch.
Utlugan, türkisch.

28. Canabina.

Grande linotte de vignes, franzöf.

Greater red-headed Linnet; *Greater Redpoll*, engl.

Passerell vermell, catalon.
Torrn - Irrisk; *Sidse*.
Rönnicke, dänisch.

Hämpling, schwed.
Himpulinda, *Hacotidinen*, finnisch.

Sommerhämpling, finnisch.

Kanepu - Putrini, lettisch.

Wästrik; *Linna Wästrik*, ehstn.

Makolagwa, poln.
Konoplánka, russ.

29. Linaria.

- Sizerin*, franzöf.
Lesser Redpole; *Lesser red headed Linnet*, engl.
Stone Redpole, um London.
Moirisk; *Graa - Sifken*, dänisch.
Graefiska, schwed.
Sisserönnike, lappisch.
Dadji, lettisch.
Wastrick, ehstn.
Tschetschotka, russisch.
Urachon Trogoi, burätisch.
Orpingmiutak; *Anarak*; v. diminutive *Anaran-goaok*; *Nennamak*, grön-ländisch.

30. Angolensis.

Tobaque, *Negril*, das Männch. nach *Benguelinha*, das Weibch. Edw.

30. Petronia.

- Sultie*, franzöf.
Ring-Sparrow, engl.
Passera alpestris, ital.
Passerell dorat, catalon.

36. Domestica.

- Moineau franc*, franzöf.
Pafferon,

- Pafferon*, in der Provence.
Passiere, in Saintonge.
Passerat, in Guienne.
Parat, in Languedoc.
Pierrot; *Moinet*, in der Picardie.
Pierrot, zu Paris.
Paisse; *Paisforelle*, in Nantes.
Grospillery; *Guilleri*, in der Normandie.
House Sparrow, engl.
Passera domestica, ital.
Pardat, span.
Mosch, holländ.
Graa-Spurv, dänisch.
Huus-Spurv; *Huus-Kald*, norweg.
Grabetz, krainisch.
Swirlulis; *Swihpuris*, lettisch.
Warblane, ehstn.
Alderyng to, alt britt.
Curculeus, zu Campidano.
Furfuragiu, am obern Cap.
Biddiso, zu Sassari.
Wrobel domowy, poln.
Worabin, russisch.
Ziphur, hebr.
Azbar, arab.
37. *Montana*.
- Friquet*; *Moineau de montagne*, französ.
Tchouet, in Guienne.

- Passeron de muraille*, in Provence.
Paerssiere folle, in Saintonge.
Paisse de Saule, in Anjou.
Saulet, in Nantes.
Petrat, *Petra*, in Orleans.
Pardal roynier, catalon.
Mountain Sparrow, engl.
Passera montanino, ital.
Skov-Spurre, dänisch.
Orkiaer, norweg.
Tolfán y mynydd, alt britt.
Wrobel gorny, poln.
39. *Crispa*.
- Pinson frisé*, französ.
Frizzled Finch, engl.
Beco de prata, portugies.
106. *Indica*.
- Collheirinho*, portugies.
113. *Geschlecht. Muscicapa*.
14. *Olivacea*.
- Whip-Torn-Kelly*, in Jamaica.
80. *Atra*.
- Phoeby bird*; *Bee-eater*, in Neuyork.
81. *Noveboracensis*.
- Small green hanging Bird*, in Newyork.

114. Geschlecht. Motacilla.

1. Luscinia.

Rossignol, französ.*Nightingale*, engl.*Russignuolo*, *Uffignuolo*, italien.*Ruissenot*, span.*Nachtegael*, holländ.*Nattergal*, dänisch.*Naecktergahl*, schwed.*Slausz*, krainisch.*Lagsdigalla*, lettisch.*Oepitk*, ehstn.*Slowik-Wiekszy*, poln.*Slawick*, illyr.*Passarilante*, bey den Iglesiensern.*Tachmas*, hebr.*Ranun*, arab.

3. Modularis.

Trainie-buisson; *Mouchet*;*Fauvette d'hiver*, franz.*Passeron*, zu Marseille.*Gratte-paille*, in Brie.*Burette*, in Berry.*Burette*, *Brunette*, in der Normandie.*Passe-Passe buissonniere*, in Anjou.*Passe-sourde*, in Perigord.*Tifit*, in Lorraine.*Graffet*; *Chic d'auvresse*, in der Provence.*Passere matto*, in Boulogne.*Fauvette des haies*; *Passe-buse*; *Rossignol d'hiver*, in den nördlichen französ. Provinzen.*Hedge-Sparrow*; *Hedge-Warbler*, engl.*Passera Salvatica*, ital.*Graa-Irrisk*, dänisch.*Järnsparf*, schwed.

6. Currucca.

Fauvette, französ.*Fauvette babillard*, französisch.*Babbing Warbler*, engl.*Beccafico canapino*, ital.*Graes-Smutte*, dänisch.*Kruka*, schwed.*Lagsdigallakalpas*, lettisch.*Potamida*, auf der Insel Creta.*Cannevarola*, im Bolognesischen.*Piegzia*, poln.*Pienige*, illyr.

8. Salicaria.

Fauvette des roseaux; französ.*Sedge-Bird*, engl.*Wyderle*; *Zepste*, in der Schweiz.*Wierzbowniozka*, poln.

10. Ficedula.

Beccafigue, französ.*Beccafico*, ital.*Cyprias*;

Cyprius; *Uccelli di Cypro*, ital.

Vinette, in Bourgogne.

Beccafigua; *Papasigo*, catalon.

Figogadka, poln.

II. Alba.

Lavandiere, französ.

Walcerono, in der Provence.

Enguane-pastre; bey Montpellier.

Peringleo, in Guienne.

Batajaſſe, in Saintonge.

Battiquouë, in Gascogne.

Semeur, in der Picardie.

Bergeronette; *Vachette*, in Nantes.

Hoche-queue, in Lothringen.

Crosse-queue; *Branle-queue*, in Bourgogne.

Damette, in Bougey.

White Wagtail, engl.

Cutrettola del petto nero, ital.

Coda tremola; *Entretola*, ital.

Codinzinzola; *Bouarina*, zu Rom.

Cutrettola, in Toscana.

Bellarina, in der Lombardey.

Aveloa, portugies.

Quick Stertz, flandr.

Vipſtier; *Havre-Fugl*; *Steen-Pikker*; *Rendeſteens* - *Snager*, dänisch.

Erle; *Lin-Erle*; *Elle-Kongens-Datter*, norwegisch.

Mari-Erla, isländ.

Aerla; *Suedes-aerla*, schwed.

Wooestraekia, ostbothnisch.

Zeemala; *Zeelawa*, lettisch.

Hännelinne, ehstn.

Pliska Paſtariza, krais.

Pliszka; *Trzesiogonek biaty*, poln.

15. Oenanthe.

Cul-blanc; *Vitrec*; *Motteux*, französ.

Train-charrue; *Garde-charrue*; *Tournematte*, in Sologne.

Trotte chemin, bey Romerentin.

Artile; *Arquille*; *Monterelle*, in Beauce.

Wheat-ear; *Fallow-Smith*; *White Tail*, engl.

Culo-bianco, ital.

Steen-dolp; *Stensquette*; *Steen-Gylp*, dänisch.

Stiens.

- 16.** *Steensquetta*; *Steens-gwaetta*, schwed.
Steinde-Pitt, isländ.
Bella, krainisch.
Fornarola; *Petragnola*, in den apenninischen Gebirg.
Kyffektak; *Kuffektak*, grönländ.
- 17. Rubicola.**
- Traqnet*, französ.
Piglia-moche, um Boulogne.
Tracas, in Bourgogne.
Tourtræ, zu Semur.
Martelot, um Languedoc.
Semetro, um Metz.
Stone-Smich; *Stone-chat-ter*; *Moor-Titling*, engl. (Raj. u. Will.)
Mortetter; *Black-berry-eater*; *Blac-cap*, engl. (Charleton.)
Barada, ital.
- 18. Atricapilla.**
- Fauvette à tête noire*, französ.
Testo-russo, das Weibch. in der Provence.
Black cap, engl.
Capinero; *Capinera*, *Caponegro*, ital.
Dlask, in Böhmen,
- Hav Skade*;
Spikke,
Brun-Skalde, dänisch.
das Weibch.
Filomela, in Sardin.
Figoiadka, poln.
- 33. Caprata.**
- Maria copra*, auf der Insel Luçon.
- 34. Phoenicurus.**
- Rossignol de muraille*, französ.
Redstart, engl.
Codirocco; *Corosolo*; *Reverzal*, ital.
Culrosso, boulogn.
Wüftling, in Schlesien.
Blod-Fugl; *Blod-stiert*; *Röd-stiert*, dänisch.
Roedstjert, schwed.
Erikins, lettisch.
Czerwony-agonok, polnisch.
- 35. Erithacus.**
- Rouge-queue*; *Rouge-queue à collier*, französ.
Red-tail; *Grey Red start*, engl.
Ohrmannisch, lettisch.
Czerwonorzyczek, poln.
- 45. Rubecula.**
- Rouge-gorge*, französ.
Bosote,

- Bosote*, in Bourgogne.
Rubiette, in Anjou.
Rubienne, in Maine.
Beree, in der Normandie.
Ruche, in Sologne und Poitou.
Frilleuse; *Roupie*, in der Picardie.
Red-breast; *Robin Red-breast*; *Ruddok*, engl.
Peti-rosso, ital.
Pettusso; *Pechietto*, italienisch.
Thomas Gierdel, in Engl. (Penn.).
Petiroxo, portugies.
Pita-rotti, catalon.
Rothorstje, holländ.
Smarnza; *Taschitza*; *Taschtza*, krainisch.
Rod-Hals; *Röd-Kielke*; *Röd-Fiuke*; *Tommi-Liden*, dänisch.
Peter-Ronsmad, norwegisch.
Rotgel, schwed.
Gil, polnisch.
Czir-wenka; *Zer-wenka*, illyrisch.
Configliere, bey den Algheresen.
Occhio di bue, zu Oristano.
Frater Gavino, zu Sassari.
- } nach Cetti.

46. *Troglodytes*.

- Roitelet*, *Troglodyte*, französ.
Roi bedelet, in der Provence.
Roi bouti, in Saintonge.
Roi bery, in Sologne.
Quion - *Quion*, in Poitou.
Arrepit, in Guienne.
Rebetre, in der Normandie.
Berichon; *Roi bertaud*, in Anjou.
Ratillon; *Ratereau*; *Petit rat*, um Orleans.
Tourre-buisson; *Roi de froidure*, in Bourgogne.
Wren, engl.
Reattino, ital.
Sericciolo, zu Toscana?
Re di Siepe; *Re di Macchia*, zu Rom?
Perchia chagria, in Sizien?
Thomas i Giaerdet; *Nelle-Konge*; *Tomme-Liden*; *Gierd-Smutte*; dänisch.
Petermannsmad; *Muse-Broder*, norweg.
Stresch; *Stoerschek*, krainisch.
Strzyzyk;

Strzyzyk; Watowe oczko;
Krol Myszy; Pokrzywka, poln.
Bilbil, türkisch.

48. Regulus.

Roitelet; Roitelet hupé,
 französ.

Golden - crested - Wren;
Capped - Wren, engl.

Fior - Rancio; Occhio-
bovino, ital.

Capo d'ore, zu Verona.

Boarino della Stella, zu
Geneve.

Papazzino, zu Bologne.

Koniinsken, flandr.

Sivigio, alt breton.

Fugle - Konge, dänisch.

Zeplihts, lettisch.

Tühahne, ehstn.

Kralitsch, krainisch.

Krolik - czubaty, pol-
 nisch.

Seroé, in der Turkey.

49. Trochilus.

Pouillot; Chantre; Chan-
 teur, französ.

Reatin, boulon.

Fisi, in der Provence.

Fenerotet, in Bourgogne.

Tuit, in Lorraine.

Frelot, Frelotte; Fouillet;
Toutt - vive, in So-
 logne.

Vetti - vetto; Totitolo,
 in Orleans.

Fretillet, in Champagne.

Yellow Wren; green
Wren, engl.

Xiuxerra, catalon.

Krolik nieczubati, pol-
 nisch.

116. Geschlecht. *Parus.*

1. Cristatus.

Mésange huppée, fran-
 zösisch.

Crested Titmouse, engl.

Top - Meise, dänisch.

Tofs - Myssa, schwed.

Meshatt, in Uppland.

Sikora czubata, pol-
 nisch.

2. Maior.

Grosse - mésange; Char-
 bonniere, französ.

Bezenge, Serrurier, in
 Provence.

Messingle; Mersangle, in
 Picardie.

Anderelle; Anderolle,
Anderzelle, in Sologne.

Patron des Marechaux,
 das.

Cendrille, in Poitou.

Croque - abeille, in Bour-
 bonne.

Serre - fine; Bargne; Cre-
 vecassis, Larderiche;
Moineau

- Moineau de bois; Mesange brûlée, an verschiedenen Orten Frankreichs.*
- Great Titmouse; Ox-eye, engl.*
- Spernuzzola, ital.*
- Parisola domestica, italienisch.*
- Parussola, in der Lombardey.*
- Cintinpotola, in Toscana.*
- Testa nera, in Piemont.*
- Majenze, in Savoyen.*
- Tschirnabo, in der Gegend der Alpen.*
- Tintilaum, portugies.*
- Poligola, in Bologna.*
- Mese, in Brabant.*
- Een - Maes; Coelmaes, holländ.*
- Musvit, dänisch.*
- Talg - Oxe; Kiöd - Meise, norweg.*
- Snitza, krainisch.*
- Sihle, lettisch.*
- Sikorna, Czarna wietka, poln.*
- Ala, in der Turkey.*
- 5. Caeruleus.**
- Mesange bleue, französ.*
- Parussolin; Rospedino; Fratino, in Bologne.*
- Petite cendrille bleue, in Berry.*
- Petite ardelle; Arderolle bleue, in Sologne.*
- Serre fine à tête blanche, in Provence.*
- Blue Titmouse, engl.*
- Parozolina, ital.*
- Milchemo, span.*
- Chamoris; Alionire; Milheiro, in Spanien und Portug.*
- Blaameise, dänisch.*
- Blamees, schwed.*
- Sihle; Sneedse, lettisch.*
- Blava Snitza; Blauman-ditz, krainisch.*
- Sikora modra; Bargiel, poln.*
- 6. Atricapillus.**
- Kiß - Kiss - Keschisch, an der Hudsonsb.*
- 7. Ater.**
- Petite charbonniere, französisch.*
- Colemouse, engl.*
- Sikora czarna; Mniewsza, poln.*
- 8. Palustris.**
- Mesange de marais; Nonnette cendrée, französisch.*
- Marsh Titmouse, engl.*
- Paron.*

- Paronzino**, ital.
Craa-Meise; Lille-Musvit, dänisch.
Tete; Hamp-Meis, norwegisch.
Entita; Tomlinge, schwedisch.
Aeschmeifle; Kaatmeifle, in der Schweitz.
Sikora - popielata, polnisch.
- ii. Caudatus.**
- Mesange à longue queue*, französ.
Perd sa queue, in Orleans.
Queue de poilon, in Singtonie.
Demoiselle, in Verdun.
Fourreau; Gueule de four, in Sologne.
Moiniet, Moignet, zu Montbard.
Dame; Meuniere; Materat; *Monstre*, hin und wieder in Frankreich.
Long-tailed Titmouse, engl.
Pulzonzino, ital.
Wintepptker, in Cöln.
Lappmesen, schwed.
Gaugarza, krainisch.
Sikora zdtugim ogonem, poln.
- 12. Biarmicus.**
- Moustache*, französ.
Bearded Titmouse, engl.
Parosolino barbato delle paludi, span.
Uffatsch, in Astrachan.
- 26. Hudsonius.**
- Peche-ke-ke-schisch*, an der Hudsonsb.
- 13. Pendulinus.**
- Mesange de Pologne*, französ.
Penduline Titmouse, englisch.
Pendulino, in Bologna.
Remez; Remis; Remiz; *Remezawyptak*; *Remicz*; *Remitsch*; *Remisch*; *Romisch*, in Polen.
- 29. Narbonensis.**
- Dabussaire*, in Languedoc.
- 117. Geschlecht. Hirundo.**
- i. Rustica.**
- Hirondelle de cheminée*, französ.
House-Swallow; Chimney-Swallow, engl.
Rondine; *Rondine minore*; *Rondinella, Rondola*, ital.

- Forstu - Svale;** *Mark-Svale*, dänisch.
Lade - Svale, norwegisch.
Ladu - Swala, schwedisch.
Laustaza, krainisch.
Besdeliga, lettisch.
Päfokenne, ehstn.
Rzecholka, poln.
- 2. Esculenta.**
- Salangane*, französ.
Esculent Swallow, englisch.
Chim, im Orient.
Lawid, in Java.
Berondaya; *Waled*, bey den Bergjavanern.
Layong - Layong, in Sumatra.
- Die Nester heißen
Nidi esculenti, } latein.
Nidi halcyonum, }
Nidi edules, }
Nids des Alcyons, französisch.
Vogelnestjes, holländ.
Saroi-bura, chines.
Jenwa - Joniku, japan.
Suffu, javan.
Saron - baerong, malayisch.
- 3. Urbica.**
- Hirondelle de muraille*; *Martinet à cul blanc*;
- II. Band II. Th.**
- Petit martinet**, französisch.
Martin; *Martlet*; *Martinet*, engl.
Conca de moru, in Sardinien.
Balestruccio, in Toscana?
Bye - Svale; *Tag - Skiägs-Svale*; *Hvid - Svale*; *Rive*; *Skornsteens - Svalle*, dänisch.
Hinus - Svale, norweg.
Hus - Swala, schwed.
Turts, ehstn.
Huda - urnik, krainisch.
Jaskotzka, poln.
- 4. Riparia.**
- Hirondelle de Rivage*, französ.
Sand-martin; *Shore-bird*, engl.
Roudine riparia; *Drepane*, ital.
Dig - Svale; *Fjord-Svale*; *Blint-Svale*; *Sol-Bakke*, dänisch.
Sand - Rönne; *Strand-Svale*; *Dig-Sulu*; *Sand-Sulu*, norweg.
Strand - Swala; *Back-Swala*, schwed.
Grzebielucha, poln.
- 6. Apus.**
- Martinet*, französ.
Kkk **Black**

<i>Black Martin</i> ; <i>Swift</i> , engl.	ii8. Geschlecht. <i>Caprimul-</i> <i>gus</i> .
<i>Rondone</i> , ital.	
<i>Barbarottu</i> , <i>Vargia</i> , in Sardin.	i. <i>Europaeus</i> .
<i>Martinet-grand</i> ; <i>Hiron-</i> <i>delle-grande</i> ; <i>Marte-</i> <i>let</i> ; <i>Moutardier</i> , an verschied. Orten Frank- reichs.	<i>Engoulevert</i> ; <i>Tette-che-</i> <i>vre</i> ; <i>Crapaud-volant</i> , französ.
<i>Steen-Swalm</i> , hollän- disch.	<i>Dorr-Hawk</i> ; <i>Night-</i> <i>Farr</i> ; <i>Night-Hawk</i> ; <i>Fern Owl</i> ; <i>Churn-Owl</i> ; <i>Goatsucker</i> , engl.
<i>Sten-Kirke-Söe-Muur-</i> <i>Swale</i> , dänisch.	<i>Cavaterra</i> ; <i>Tetta vache</i> ;
<i>Ring-Svale</i> ; <i>Svart-Sulu</i> ; <i>Field-Sulu</i> , norwe- gisch.	<i>Calcabotto</i> ; <i>Caprimul-</i> <i>go</i> , ital.
<i>Ring-Swala</i> , schwei- disch.	<i>Passa-litorta</i> , in Sardin.
<i>Tschurkste</i> , lettisch.	<i>Aftenbakke</i> ; <i>Natravn</i> ;
<i>Jurz</i> , poln.	<i>Nat Skade</i> , dänisch.
<i>Jerzyk</i> , polnisch?	<i>Gedemarker</i> , norweg.
	<i>Nattskräfva</i> ; <i>Nattskär-</i> <i>ra</i> , schwed.
	<i>Quältnarren</i> , smoländ.
	<i>Kozodoy</i> , poln.

* * * * *

R e g i s t e r n a c h d e n S e i t e n z a h l e n.

II. bedeutet den zweyten Theil. Die mit *Cursuschrift* gedruckten Wörter beziehn sich auf das Verzeichniß der ausländischen Synonymen, und die dabey stehende erste Zahl zeigt das *Geschlecht*, die zweyte die Gattung an.

A.

- Aaeboen* 67. 15
- Aalekrage* 72. 4
- Aalge* 75. 1
- Aalscholwer* 880
- Aarfugl.* 103. 2
- Aasgeyer* 6. 9. II. 13
- Aaskrähe* 350
- Aaskrac* 50. 5
- Aasrabe* 337
- ABC Kybitz* 1091
- Abendfalk* 122
- Aherdevine* 112. 25
- Ablicke* 50. 6
- Abou Douch'n* 21
- Abou Hannes* 1008
- Abuffsaej.* II. 618
- Acalchitli* 410
- Acamacu* 561
- Acangues* 102. I
- Acanthus* II. 519
- Acatechili* II. 521
- Acatechichiätl* II. 521
- Accegia* 86. 6
- Achalalactli* 519
- Accipitres* I. 109
- Accucadita* 105. 3
- Acertello* 42. 16
- Achau* 101. I
- Acitli* 885
- Ack* 50. 6
- Ackerdrossel* II. 283

- Ackerboen* 88. 6
- Acker - Hoena* 103. 12
- Ackerkrähe* 348
- Ackerlerche* II. 207
- Ackerloe* 88. 5
- Ackermännchen* II. 636
- Ackertrappe* II. 2
- Ackervogel* 1093
- Acoho* II. 57
- Acototloquichitl* II. 315
- Acredula* II. 220
- Ad* 67. 15
- Ada* 67. 15
- Adder - bird* 44. 12
- Adebar* 958
- Aden* 67. 40
- Adjum* 907
- Adler* 18 ff. 25 ff.
- Adlereule* 119. 144
- Adlergeyer* 12. 24
- Adventsvogel* 882
- Aederfugle* 738
- Ae - Aesteing* 67. 15
- Aedon* II. 596
- Αγδων* II. 610
- Aegerste* 374
- Aegerster - Specht* 532
- Aegerst - Specht* 534
- Aegithus* II. 528
- Aehbähr* 958
- Aehrenträger* II. 28
- Aecrone* 84. 12

K k k 2

Aelke

- Aelke 355
Aellonskrika 50. 7
 Aelster 374. 381. 538
 Aelsterspecht 533
 Aemmerling II. 413
 Aentrich 783
Aera 67. 15
Aerblick 67. 15
Aerefugl 103. 2
Aerfugl 738
 Aerla II. 114. 11
Aerone 84. 12
Aesalo 86. 126
Aeschmeifile 116. 8
Aethiops II. 501
Aethyia 880
Aexter 50. 13
 Aftenbakke II. 811
 Afterfalke 189
 Aftergoldflügel 518
 Afternachtigall II. 663
Agace 50. 13
Agami 974. 1154
Agasse 50. 13
 Agelaster 374
Ager-Hön 1140
Ager-Höne 103. 13
 Agerluster 374
 Aghiron 963
Agrolle 50. 3
Agrotto 72. 1
 Ahdjirbu 847
 Ahr 77
Ajace 50. 13
 Ajaja 940
Ajascakan 59. 1
Aιγιθαλος II. 758
 Aigle 19 ff.
Αιγοθηλας II. 812
 Aigrette 973
 Aist 959. 964
 Ajuru - catinga 248
 Ajuru - curau 282
- Akaiearua* 65. 28
Akeiksek 103. 4
 Akerla 88. 6
Akerlan 112. 4
Aker-Rixe 1140
Akkaviak 949
 Akoko II. 57
Akpa 69. 2
Akpalliarfuk 69. 5
Akpalliarfungoak 69. 5
Ak-Turna 84. 11
 Ala 67. 28—116. 3
 Alactu 354
Alaipy 110. 1
 Alap 48
Alapi II. 294
Alario II. 494
 Alaster 374
Alaud 105. 1
Alauda II. 206 ff.
Alaudae congener II. 407
Alavette 105. 1
Albatross 836. 840 ff.
Albatrus 840
Albicilla 22. II. 538
Alca 814 ff.
Alcatraz 860
Alcedo 563 ff.
Alchata II. 106
Aleyon II. 315
Alderyng 10 112. 36
Alebrande 67. 32
Alector II. 37. 40. 46. 78
 Alelster 374
 Alester 374
Alexanderspapagey 241
Alferraz 42. 15
Algarte 374
Alhabari 95. 1
Alionire 116. 5
Alk 814. 819
Alk 69. 4 ff.
 Alle 823

Alle-

- Allekräka 51. I
 Allicke 256
Alocbarello 43. 5
Alocho 43. 7
 Alouette-de-mer 1067. 1076 ff.
 Alouette II. 208 ff.
 Alpengrasstücke II. 632
 Alpenkrähe 384
 Alpenlerche II. 232
 Alpenmeise II. 775
 Alpenschwalbe II. 803
 Alpenstrandläufer 1066
 Alpkachel 384
Altachan 110. 5
Altekeba 104. I
 Aluco 160
 Alwargrim 1093
Alzarazir 106. I
 Amaduvad II. 495
Amalouffe 109. 2
Amauligakaudil 110. I
 Amaxl II. 304
 Amazon 282
 Amazone II. 433
 Amazonenammer II. 433
 Amazonenpapagey 280. 285.
 289
 Ambraschwalbe II. 800
 Ameisendrossel II. 297
 Ameisenfresser II. 294 f.
 Ameisen-Nachtigall II. 293 f.
 Ameisenvogel II. 294 ff.
 Amerikaner II. 123. 369
 Amethystkolibri 685
 Amethystsmaragd 680
Amisk-obo 43. 4
 Ammer 407. 426. II. 390. ff.
 405. 413
 Ammering II. 415
 Ammerling II. 408
 Ampelis II. 323
 Amsel 413. 423. 437. 1093.
 II. 233. 242. 257. 274. 281.
 ff. 291. 301. 451
- Amselmerle II. 302
 Amselmeve 930
Amzell 107. 22
 Anaca 303
Anapha 50. 6
Anarak 112. 29
Anarangoak 112. 29
 Anas 694. 784. II. 7
 And 67. 19 ff. — 68. 1. ff.
Anderelle 116. 3
Anderolle 116. 3
Andezelle 116. 3
Andu 96. 3
Angala-Dian 651
 Angeltasche 765
 Angeltaske 765
Angle-Mager 69. 3
 Anhima 942
Anhinga 864
 Ani 333. 613
Ano 100. I
 Anser 718. 828
Anseres 694
 Anter 783
 Anthos II. 223
 Antigore 956
 Antrach 783
Apeca-Apoa 67. 16
 Apiaster 594 ff.
Apiolo 63. I
Apira 108. 3
Aptenodytes 825
Apus II. 798
Apute-Juba 245
Aquila 31 ff.
Aquilastro 42. 4
Aquilus 850
 Araber II. 5
Arent 42. 5
Aracanga 225
Aracari 315
Arada II. 293
Aradone 67. 33
 K k k 3
- Arapa.

Arapapa 946
Arara 108. 3
Aras 222
Aratarataguacu 66
Aratoca 66
Ar - Wereroa 57. 27
Arbenne 103. 4
Arcase 86. 3
Ardea 948 ff.
Ardeae affinis 603
Ardelle II. 702
Ardennel 112. 4
Ardeola 978
Aregazza 50. 13
Arguille 115. 15
Argusfasan II. 72
Arimanon 258
Arnauiaik 67. 15
Arnauiartak 67. 5
Arnaulik 67. 15
Arnear 44. 12
Arpschnarp 1139
Arquata 1019
Arrepit 114. 46
Arrian 16
Arschfuss 883
Arta 67. 33
Artile 114. 15
Artsche II. 525
Arynanussu 99. 1
Aschenente 717
Aschlerche II. 228
Aschmeise II. 766
Afilus II. 727
Afsvogel II. 725
Afio 146
Aster 374
Astkrähe 351
Astore 42. 30
Astoreddu 42. 15
Astralaginas II. 490
Astrild II. 366
Asturnellatg 104. I. 8.

Atitchou Achaschich 109. 12
Atototl 639
Atricapilla II. 661
Attagen 851. II. 99
Attelingant 773
Atthis 440
Attinguacu camacu 493
Aturulia 42. 12
Atzel 374. 435. ff. II. 468
Atzeldohle 436 ff.
Audna - Tytlingr II. 530
Auen - Nachtigall II. 110
Auerbirkhuhn II. 93
Auerocalze II. 90
Auerhahn II. 84. 88. 102. 107
Auk 69. 1
Au - Kuskow 103. 7
Aura 6
Aureola II. 15
Aurfugl II. 90
Auricoma 674
Auriol 405
Auriou 52. 1
Aurivittis II. 490
Aurorapapagey 289
Auroraparkit 268
Austerfresser 1109
Austermann 1109
Austerndieb 1109
Austernfischer 1108
Austersammler 1109
Austerschnepfe 1110
Auroyr 42. 30
Autruche II. 12
Au - Vogel II. 610
Avarou 945
Avekong 67. 4
Aveloa 114. 11
Averano II. 332
Avestruß 96. 1
Avicula II. 745
Avicula nivalis II. 402
Avocette 1105

Ave-

- Avesette 1023. 1105
 Avesettschnepfe 1106
 Avozette 1106
 Awerhan II. 85
 Ayaya 941
 Ayoquantol 423
 Azbar 112. 36
 Azeldohle 435 ff.
 Azulam II. 368
 Azulinha II. 539
 B.
 Baarkhohn II. 90
 Baba 846
 Bachamsel II. 244
 Bachkönig II. 727
 Bachsprehe II. 244
 Bachstelze II. 268. 575. 605.
 ff. 634 ff. 636. 732
 Bachvogel II. 244
 Backöfchen II. 727
 Backofendrescher II. 770
Back-Swala 117. 4
 Badda Dsegguse 63. I
 Bagiafecht II. 384
 Bab 67. 62
 Bahamasfink II. 499. 558.
 Bak 84. 21
 Bakkamaena 43. 20
 Bükke-Fugl 106. 5
 Balabani 103
 Balbul 795
 Balbusard 56
 Balbuzard 56
 Balestruccio 117. 3
 Balicassio 370
 Ballarina 114. II
 Baltimore 419
 Bainbea II. 295
 Banana II. 540
 Bananist II. 613
 Banchem 57. I
 Baujahbu II. 268
 Bantanhühner II. 53
 Barada 114. 17
 Baranek 86. 6
 Barbaien 43. I
 Barbacanni 43. 4
 Barbareztaube II. 150
 Barbarottu 117. 6
 Barbates 735
 Barbu 459
 Bardeanz 110. 5
 Baretino 50. 7
 Bargach 84. 12
 Barge 1023. ff. 1036. ff. 1042.
 1108
 Bargiel 116. 5
 Bargne II. 757
 Barker 1040
 Barlakzel 84. 12
 Barless 54. 5
 Barliata 735
 Bartadler 20
 Bartavelle II. 111
 Bartdohle 337
 Bartemmerling II. 431
 Bartfalk 20
 Bartgeyer 15. 20
 Bartmännchen II. 773
 Bartmeise II. 773
 Bartniczek 65. I
 Bartparkit 251
 Bartvogel 335. 458 ff.
 Basianer 860
 Bassanus 860
 Bastardadler 12
 Bastardauerhahn II. 92
 Bastardbaltimore 420
 Bastardberghuhn II. 108
 Bastardbirkhuhn II. 92
 Bastardbussard 68
 Bastardeisvogel 555 ff.
 Bastardentenhuhn II. 59
 Bastardfasan II. 70
 Bastardhäfling II. 528
 Bastardkranich 943

- Bastardlachtaube II. 196
 Bastardlerche II. 213
 Bastardnachtigall II. 623. 625
 Bastardsverling II. 553
 Bastardstieglitz II. 493
 Bastardwaldhuhn II. 92
 Bastardwasserhuhn 163 ff.
 Bastardzeisig II. 520
Baragasse 114. 11
 Bart 758
Battiq.öüe 114. 11
 Bauernäinimer II. 417
 Bauergans 723
 Bauernschwalbe II. 782
 Bauertaube II. 143
Bauge 42. 38
 Baumente 792
 Baum-Endtke 734
 Baumeule 154. 161
 Baumfalk 123
 Baumfink II. 509
 Baumgans 733
 Baumganss 733
 Baumhäckel 617. 652
 Baumhackl 535
 Baumhackerl 537
 Baumhacker 452. 502. ff. 510.
 527. ff. 533. 536. 541. 549.
 ff. 592. II. 677
 Baumhatzel 361
 Baumhecker 548
 Baumheekel 618
 Baumkleber 617
 Baumklette 617. 631. 646.
 660. 663
 Baumkletterer 548. 642
 Baumkletterlein 618
 Baumläufer 616. ff. II. 370
 Baumläuferlein 617. 628
 Baumlerche II. 215. 226. 233
 Baumnachtigall II. 614
 Baumpelikan 1002
 Baumpicker 546
 Baumreiter 617
 Baumrutscher 617
 Baumsehnepfe 609
 Baumischwalbe II. 577
 Baumspecht 536
 Baumspelting II. 370. 536. 553
 Baumsteiger 617
Bazant 101. 3
Beaganà 112. 7
Bebe 67. 40
 Bebeschwanz II. 638
Beccagia 86. 6
Beccaroveylia 80. I
Becas 86. 6
Becasse 1027
Becasseau 1069
Becassine 1031. 1036. 1041
Beccacino 86. 7
Beccafico 114. 10
Beccafico canapino 114. 6
Beccafige II. 630
Beccofigua 114. 10
Beccarin reale 86. 7
Beccastorta 89. I
Beccofrisone 108. I
Bec-croisé II. 339
Bec-en-oiseau 933
Becfigue II. 630
Becharu 347
Beco de prata 112. 39
Becquefigue II. 631
Bee-eater 596 ff.
Bee-eater 113. 80
Beemerziemer II. 259
Beena 50. 60
Beerold 405
Beginen 1050
Behemle II. 259. 324
Beinbrecher 30
Beinbrecheradler 31
Bekassine 1032
Bekkasine 1074
Bel-arje 84. 4

- Belch 1126
 Belchinen 1126
Bella 115. 15
 Belzmeise II. 773
 Bemtere 44. 15
Benaris 110. 4
 Bengali II. 496. 539
Benguelinba 112. 70
Bennarie 110. 4
 Bentaveo 205
Beque noir - cendré 59. I
 Beren 136. II. 715
 Bergadler 10
 Bergammer II. 404. 439
 Bergäusel 217. II. 308. 320
 Bergdohle 383
 Bergdol 384
 Bergelster 189
 Bergeinsiedler 387
 Bergente 709. 717. 770
 Bergeremit 387
 Bergerette II. 733
 Bergeronette II. 641. ff. 677.
 732
 Bergenle 182
 Bergfalke 12. 96. 109. 110
 Bergfasan II. 54
 Bergfink II. 475. 482. 509
 Berggans 727
 Berghänfling II. 532
 Berghu 139
 Berghuhn. 1036. II. 83. 107.
 110
 Bergkrähe 385
 Berglärche II. 231
 Bergmeise II. 771
 Bergnachtigall II. 483
 Bergrebhuhn II. 118
 Bergreiher 968
 Bergschneppe 1026
 Bergschwalbe II. 794. ff. 804
 Bergspatz II. 556
 Bergsperling II. 509. 553
 Bergstaar II. 246
 Bergtaube II. 139. 146. 165
 Bergtrostel II. 259
 Bergtul 384
Bergugle 43. I
 Bergulu 141
 Bergzeisig II. 529. 739
Bericbon 114. 46
 Berichot II. 719
 Beringsgans 715
 Berkuti 38
 Bernakelgans 730. 733
 Bernicla 730
 Bernikel 734
 Berolst 403
Berongdayä 117. 2
Berta 50. 7
Bertina 50. 7
Besdeliga 117. I
Bettlaar 72. 3
 Beutelgans 845
 Beutelmeise II. 777
Bezenge 116. 3
 Bhu 139
Bialozor 42. 37
 Biberente 805
 Bibertaucher 804
Biddiso 112. 36
 Biekelchen 772
 Biekilchen 774
Bielogwoſt 42. 39
Bjeloc gus 67. 45
 Bienenfalk 68
 Bienenfänger 595
 Bienenfrass 595
 Bienenfresser 593
 Bienenfchnappe II. 700
 Bienenschwalbe 597
 BienenSpecht 596
 Bienenverrätherkukuk 588
 Bienenvogel 595
 Bienenwolf 595
 Bieresel 503
 K k k 5

Bier-

- Bierhold 503
 Bierholz 403
 Bierole 403
 Bierkelchen 774
 Bihorean 966
Bilbil 114. 46
Bilcock 93. 2
Bidorot 52. 1
 Bimbele II. 613
Bijery 110. 5
 Binmeise II. 762
 Binsennachtigall II. 618
Biörk. Trast 107. 1
 Birckilgen 774
 Birgamsel II. 320
 Birkfalte 109
 Birkheher 390
 Birkhuhn II. 88. 95. 100
 Bisamente 739
 Bischoff II. 468
 Biset II. 146
Risnoi - shavronek 105. 10
 Bissourdet II. 724
 Bistarda II. 4
 Bitter II. 259
 Bittern 984
Bizbiutzb 88. 6
 Blakolls-Oend 787
Blaaefugl 42. 13
Blaa Hals 67. 40
Elaakoll 67. 40
Blaakraake 51. 1
 Blaamage 906
 Blaamager 910
Blaameise 116. 5
Blaa-Nukke 67. 40
Blaa-Rage 50. 2
 Blabrach 991
Blaffer 86. 4
Black-Cock 103. 2
Black-Game 103. 2
Black Grous 103. 2
Black-bird II. 302
- Blakberry-eater* 114. 17
Black-cap 114. 17
Bläkräka 51. 1
Blamees 116. 5
 Blankeknio 755
Blas - And 91. 2
Bläsenörk 1128
 Blaser 101
Blask 109. 4
 Bläfschen 1125
 Bläffenente 777
 Bläffengans 715
 Blasgiicker 1125
 Blassente 786. 1125
 Blässgen 1127
 Blashuhn 1125
Bläcklaka 91. 2
 Blässl 1127
 Blässling 1125
 Blauamsel II. 312
 Blauammer II. 448
 Blauauge 336. 357
 Blaubäckchen 116
 Blaubeerschnepfe 1021
 Blaudrossel II. 313
 Blauente 787
 Blauflügel 640
Blaufuß 57. 59. 60. 73. 96.
 1021
 Blaugürtel II. 330
 Blauhals 296
 Blauhänfling II. 427
 Blaukehlchen II. 698. 702
 Blaukehlein II. 313. 702. 705
 Blau Kehle II. 704
 Blaukopf 225. 232. 243. 271.
 275. 635. 778. II. 177
 Blaukrähe 390
 Blauling II. 297
Blaumanditz 116. 5
 Blaumeise II. 760
 Blaumerle II. 313
 Blaumüller II. 760

Blau-

- Blaurack 391
 Blaurock 391
 Blauschnabel II. 361
 Blauschwanz 663. II. 672
 Blauspecht 544
 Blautaube II. 140
 Blauziemer II. 253
 Blauvogel II. 705. 708 f.
 Blaw - Meisslin II. 762
 Blawvogel II. 313
 Blawzimmer II. 313
 Bleikehlichen II. 615
 Bless 1126
 Blessing 1127
 Bleyfalke 104. f. 136
 Bleykehlchen II. 702
 Bleykehlein II. 615
Blik - Skarv 72. 3
Blind - Svale 117. 4
 Blinzer II. 659
 Blishöne 1126
 Blochtaube II. 140. 172
 Blocktaube II. 140
Blod - Finke 109. 4
 Blodfugl II. 693
Blodstiert 114. 34
 Blodstert II. 693
 Blomrokke 1027
 Blongior' 998
 Blumenkönig 644
 Blumenprinz 645
 Blumenschwänzel 561
 Blumenspecht 660 ff.
 Blümiente 786
 Blutfink II. 350
 Bluthänfling II. 524. 529
 Blutkopf 460
 Blutpapagey 232
 Blutrothkehlchen II. 665
 Blutschnabel II. 366
 Blutschwanz 416
 Boarina II. 632
Boarino della stella 114. 48
 Boarula II. 732
 Boat - bill 947
 Bob - Lincoln II. 435
Bocian 84. 4
Boefaeer 69. 5
 Boemerlein II. 259
 Boeres 54
Boeuf 109. 4
Boeuf de Dieu II. 719
Bo - Finke 112. 3
 Bogendrossel II. 298
Bog - Finke 112. 3
Bog - Finkens Hoer - Unge 112. 4
 Böhmer II. 324
 Föhmlein II. 325
 Bohnengans 729
 Bölchinien 1126
Bold - Tiät 88. 1
Boleta 45. 7
 Bollenbeisser II. 346
 Bollenpick II. 344
 Bellihes II. 52
 Bombycilla II. 326
 Bonana 423
 Bonasia II. 102
Bondelöber 91. 2
 Bonjour - Commendeur II. 429
 Bondrée 69
 Booin - Spaarling II. 554
Boom - Uiltze 43. 5
 Bootfink II. 478
Boro - Nagossum 751
 Boschas 773. 785
Bosore 114. 45
 Bottervogel 803
Bottlerose 69. 4
Bouarina 114. 11
Bouchari 44. 12
 Boulard II. 773
 Boulboul 221
Bourgeonnier 109. 4
Bouron - aru 54
Bourrough - Duck 67. 4
Bouze.

- Boure-quelon* 107. 1
Bouveret II. 369. 370
Bouveron II. 393
Bouvier 109. 4
Bouvrer 109. 4
Bouvreuil II. 351. 362. 383.
 387. 389. 391. 544
Bouvreux 109. 4
Bozzagro 42. 29
Braakvogel 1093
Erachamisel 1078
Bracher 595. 1003
Brachhenne 1094
Brachhuhn 1017. 1085
Brachlerche II. 207. 212. 214.
 215. 219
Brachschnepfe 1017
Brachvogel 1001. ff. 1015.
 1017. 1056. 1084. 1090.
 II. 249
Brakvogel II. 251
Bramanendrossel II. 278
Bramanen-Eisvogel II. 278
Braynary-Kite 42. 71
Bramble 112. 4
Brambling 112. 4
Bramlefinch 112. 4
Brandente 760. 768. 794
Brandeule 167
Brandfalk 67
Brandfink II. 522
Brandgans 67. 4
Brandgans 708
Brandgeyer 67. 71
Brandmeise II. 756
Branta 730
Brantangel 925. 929
Brasilianer II. 37
Brassler II. 407
Braubling II. 760
Braule-queue 114. 11
Braunellchen II. 615. 630
Braunelle II. 615
- Braunellein* II. 615. 631
Braunellerl II. 617
Braunflügel 680
Braunhäublein 1077
Braunhäufling II. 525
Braunkehlchen II. 655. 658
Braunkopf 295. 407. 549. 912
Braushahn 1050
Braut 791
Bred-Neb 80. 1
Breggush 87. 8
Breinvogl II. 235
Breitfuss 864
Breitschnabel 746. 757
Breitschnabler 746
Breitschnabelkopf 746
Breitschwanz II. 153
Brennhahn II. 89
Brenta 733
Brentgans 732
Brenthus 732
Brefague 43. 8
Breve 381
Brieftaube II. 158
Briefträger II. 158
Brillefugl 69. 3
Brillendrossel II. 301
Brillenente 755. 756
Brilleneule 181
Brillennotacille II. 659
Brillennase II. 816
Brilltaube II. 163
Brinauka 107. 2
Bris-os 42. 4
Brkostaw 108. 1
Brokfugle 1095
Bromhan II. 89
Brook-Ouzel 93. 2
Bröseexter 361
Bruant II. 413 ff.
Bruchdrossel II. 314
Brücheschwalbe II. 782
Bruchschnepfe 1031

Bruch-

- Bruchweidendrossel II. 283
 Bruder Berholft 403
 Bruia 44. 22
 Bruninvogel 693
 Brunette 114. 3
 Brunnakke 67. 27. 31. — 761.
 768
Brunn-Skalle 114. 18
 Brusen 85. 5
 Bruskop 87. I
 Brusola 52. I
 Brustling II. 525
 Brustwenzel II. 702. 705
 Bruuns Kopper 1052
 Bruus-Hane 1052
 Eruyant II. 735
 Bubil II. 299
 Bubo 139
 Bucco 457
 Buceros 323
 Buchfink II. 477
 Buchfinkens Hukind II. 484
Buchoschir 106. I
 Eüffelkopfsente 752
 Buferlotto 44. 12
Bubo 43. I
 Buhu 139
 Buik 985
Buitsonnier 107. 22
 Bülau 403
 Bulfinch II. 351
 Büloh 403
 Bülow 403
 Bumi 438
Bunk 84. 21
 Bunkkopf 710
 Buntdziessel II. 259
 Buntflügel 882
 Bunting 403 ff.
 Buntschwänzel 121
 Buntspecht 508. 530. 533. 535.
 538 ff.
 Buntwenzel 632
- Eu-onk 998
 Buphaga 331.
Bureete 114. 3
 Burgemeister 908. 909
 Eufard 54
Busaroca 50. 3
 Buschadler 18
 Buschelster 189
 Buscheule 161. 165. 170
 Fuschhahn II. 50
 Fuschhuhn II. 39 f.
 Euschlerche II. 213. 215. 223
 Euschänger II. 617
 Buschschnepte 1026
 Euse 64
 Bussaar 2
 Bussard 63
 Eusshart 7. 63. f. 66. f. 123
 Eusshardfalk 64
 Bustard II. 7
 Busthart 65
Butcher-bird 44. 12
 Euteo 63. 70
Butoor 84. 12
 Butor 984 ff.
Butschock 59. I
Butschumur 105. I
 Buttelnase 166
 Buttervogel II. 375
Euvadak 86. 12
 Buzzard 7
Buzzard 42. 15
Bvag 42. I
 Byeneeter 63. I
 Eyesvale II. 790
 Bymeise II. 766
 Byrold 403
- C.
- Caapwachtel 384
Cabaducutch 43. II
 Cabeca 43. 9
Cabericuch 43. II
Cabizoni 770

Cabone

- Cabone de murdego* 86. 6
Cabugi 103. 12
Cabure 151
Cacádu 260
Cacalotl 341
Cacao-Walke 50. 24
Cacatolotl II. 521. 744
Cadoreu 112. 7
Caelebs II. 477
Caeruleo II. 313
Cage 702
Cahuitahü 705
Caica 297
Caille II. 125 ff.
Calak 50. 2
Calandra II. 230. 407
Calandrino 105. 2
Calandrote 107. 3
Calao 324. 326 f.
Calatti II. 462
Calcabotto 118. 1
Calderugio 112. 7
Calecutisch Huhn II. 33
Calendula II. 719
Calfat-Ammir II. 447
Calicatzu 69. 2
Calic-Calce 208
Calidris 1039. 1071. 1075.
 1077
Callaeus 335
Calliope II. 674
Calpetra 80. 1
Calquin 42. 34
Camelus II. 11
Can 107. 3
Canace II. 95
Canale 50. 3
Canard 711. ff. 783. ff. II. 8
Canard 67. 16 ff.
Canaria II. 514
Canariensink II. 513
Canarienbastard II. 540
Canariensperling II. 511
Canarienvogel II. 511
Ganaren-Zeisle II. 515
Canarin-Salvatico 52. 1
Cancoine 107. 2
Cancroma 914
Canibello 42. 16
Canishühnchen II. 53
Canne-petiere II. 8
Cannevarola II. 622
Cantor II. 318
Canutsvogel 1074
Caparoch 174
Capella coelestis 1031
Capercally II. 90
Capercalze II. 90
Capinero II. 664
Capmeise II. 773
Capo d'ore 114. 48
Capo negro 67. 45.—114. 18
Capo-rosso 67. 26
Capricalca II. 87
Caprimulgus II. 808 ff.
Caprotherus 914
Capfa-Fink II. 509
Capfa-Sperling II. 509
Capschwalbe II. 792
Capsperling II. 494
Capsturnivogel 838
Caracara 54
Carbo 713. 852
Carbonarius II. 765
Cardeline 112. 7
Cardellino II. 490
Cardello 112. 7
Cardina 112. 7
Cardinal II. 354. f. 360. 390.
 450 ff. 463. 465. 662
Cardinalbaumläufer 624
Cardinälichen II. 444. 662
Cardinalente 540
Cardinalspecht 540
Cardinalvogel II. 354 f.
Carduelis II. 476. 487. 519.
 Car.

- Carfunkel 688
 Cariama 942 ff.
 Caripira 851
 Carlsvogel II. 702
 Carminhänfling II. 529
 Carnifex II. 329
 Caroli 86. 3
 Caroliner 917
 Carolinerlerche II. 232
 Carouge 422
 Carpenteros 59. 3
 Carririni 18
 Caryocatactes 18
 Casarka 778
 Cased - y - ddryccin 107. 2
 Casoar 96. 2
 Casparus 1144
 Casper 1140
 Cassimor 96. 2
 Cassé-noix 767. — 109. 2
 Cassenoyaux 109. 2
 Casseraignon 109. 2
 Cassike 414 ff.
 Cassique 416 ff.
 Cassowary 96. 2
 Castagneux 890
 Castor 804
 Castrica 44. 12
 Casuar II. 15
 Casuarius II. 15
 Casuaris II. 15
 Casuel II. 16
 Cata 103. 12
 Catarractes 828. 875. 915
 Catharina 294
 Catotol II. 521
 Caudec II. 573
 Caue 50. 6
 Cauette 50. 6
 Cavaz 98. 1
 Caxcaxtototl II. 246
 Cayo 50. 6
 Cedrin II. 503
 Cehoilotl II. 176
 Ceiliog brou fraith 107. 4
 Ceiliog myarcb 107. 22
 Cela II. 16. 779
 Cenchramus 1123. II. 31
 Cendrille 59. 1. — 116. 3
 Centcontlatolli II. 271. 272
 Cephus 881. 915
 Cercelle 67. 32
 Cercerelle 42. 16. — 67. 32
 Cerisin II. 503
 Cernicalo 42. 16
 Certhia 617. ff. 620
 Chacamel II. 39
 Cha, cha 1107. 2
 Chachalacametl II. 39
 Chacotte 50. 6
 Chadara 733
 Chaddaejir 63. I
 Chaffinch II. 478
 Chafty II. 727
 Chalandra 105. 9
 Chalandria 105. 9
 Chalois 140
 Chamoris 116. 5
 Chantre II. 726
 Chapon de Pharaon 45. 5
 Charadrius 1067. 1083 ff. 1096
 Charah 184
 Charbonniere II. 756. 766
 Chardonneau 112. 7
 Chardrier 112. 7
 Charlot 86. 3
 Charniergans 861
 Chartologoi - Nagossum 751
 Chasidab 84. 7
 Chassarka 728
 Chassetou 43. I
 Chat 72. I
 Chaterring 50. 24
 Chat-huant 137. 165. 168.
 172. 812
 Chatte-

- Chatterer 108. 1
 Chaumi II. 300
 Chausse-pot 59. 1
 Chebalos 42. 4
 Cheela 155
 χελιδων II. 785
 Chelanopex 710
 χελανοπηξ 710
 Cherik II. 680
 Cheriway 26
 Cherry-deanisch 46. 7
 Cbruna 103. 4
 Chevalier 1056
 Chic II. 439
 Chic d'auvassé 114. 3
 Chicus 50. 6
 Chichiclli 177
 Chichiltotol Tepuzcullulae
 II. 450
 Chichiltotol-Vogel II. 744
 Cbi - cbup - pi - sae 105. 10
 Chic - jaune 110. 5
 Chic - perdrix 110. 3
 Chim 116. 2
 Chineserente 791
 Chineserschwalbe f. Salangane
 Chin Tchien - Khi II. 28
 Chipeau 750
 Chirino 43. 5
 Chirurgien 1134
 Chlän 546
 Chlorion II. 375
 Chloris II. 371. 446. 666
 Chocas 50. 6
 Chongorgalu 704
 Choppard 109. 4
 Choroi 772
 Chouant 43. 4
 Choucari 371
 Choucas 356
 Choudet 43. 4
 Chouchette 50. 6
 Choue 43. 4. 7
- Chouette 170. 176. ff. 43. 8 f.
 Chougt 359
 Chout 359
 Bracholec 72. 4
 Christöffelchen II. 660
 Chrysaetos 33
 Chrysomitriss II. 490
 Chuatotolin 99. 1
 Chuck - bird 110. 2
 Chuc - nocny 43. 4
 Chue 50. 6
 Chuicanitscbkun 69. 9
 Churge II. 8
 Churn - Owl 118. 1
 Cia II. 430
 Ciagula 50. 6
 Cicogne 345. 959
 Ciconia 950. 958
 Cifoletta 109. 4
 Cigni II. 503
 Cigno 67. 1
 Cincinportala 116. 3
 Cinclus 1058. 169. II. 243.
 640
 Cineraria II. 629
 Cini II. 503
 Cinit II. 503
 Cino 67. 1
 Circia 774
 Circuri 103. 20
 Ciris II. 431
 Ciserre 107. 1
 Cisne 409
 Citril 112. 16
 Citrinellä II. 412. 501
 Citrincha II. 519
 Citrinlein II. 501
 Citronenfink II. 501
 Citronvogel 415. 1090
 Civiere 109. 4
 Cla - cla 107. 2
 Cladoriuchus II. 724
 Clanga 42

- Clericus 340
 Clignot II. 659
 Cnipologus II. 640
 Cnupio 197. 1
 Cobilar 59. 17
 Coccothraustes II. 337. 354.
 361. 382. 387. 391
 Cochelirieu 105. 3
 Cochelivier 105. 3
 Cochevierne 109. 2
 Cochevis II. 225
 Cochicat 316
 Cochitenacatl 46. 10
 Cochlearius 946
 Cocho 294
 Cock 101. 1
 Coco 1012
 Cocoi 974
 Cocorli 104. 34
 Cocotzin 104. 34
 Cocou 57. 1
 Coci 57. 1
 Codatremula II. 640
 Coddel Kauka 78. 1
 Codinzinzola 114. 11
 Codiroffo 114. 34
 Coelipeta II. 210
 Coelmaes 116. 3
 Cojover 872
 Colca 67. 15
 Coleuicuiltic II. 125
 Colemouse 116. 7
 Colenicui II. 125
 Colgrave 337
 Colherado 941
 Colibri 645. f. 648. f. 660 f.
 721
Colibri des grands bois 61. 15
 Colibrit f. Calibri
 Colibritchen 656. 664 ff.
 Colin II. 125. 128
 Coliou 334 ff.
 Colius 633. 651. II. 334
 II. Bayd II. Th.
- Collheirinho 112. 106
 Collotorio 58. 1
 Collurio 193
 Colma II. 295
 Colnud 371
 Colombade II. 664
 Colubris 676
 Columba II. 139 ff.
 Columbae affinis 490
 Columbarius 120
 Colymbus 868 ff.
 Combattant 1051
 Commendeur 412 f.
Conca de moru 117. 3
 Condor 2
 Condoro 2
 Conquendle II. 434
 Configliere 114. 45
 Contra II. 240
Cook-of-the Wood 103. 1
 Coot 91. 2
 Coppered-Wreen 114. 48
 Coq II. 47
 Coq d'Inde II. 33
 Coq de Bruyeres II. 85
 Coq de bois 103. 1
 Coq de Limoges 103. 1
 Coq de roche II. 739
 Coquillade II. 226
 Coquu 57. 1
 Coracias 386 f. 390. 409.
 420
 Corax 340
 Coraya II. 293
 Corbeau 348
 Corbin 50. 2
 Cormoran 858
 Cornaechia 50. 3
 Corneia 50. 3
 Corneille 344
 Conerote 43. 4
 Cornice 50. 3
 Cornillon 50. 6
- LII
- Cornix

- Cornix 346. 349. f. 394. 410. Crapaud - volant II. 810
 436. 538 Cravant 735
 Corn - crêk 93. I Crax II. 39. 41
 Corone 340 Crecca 771
 Corossal 114. 34 Creeper 618 ff.
 Corrira 1014 Crescerelle 111
 Corroya - barza 50. 5 Crested - Lurk 105. 6
 Corta - pao 59. 2 Creutzmeise II. 765
 Corusa 43. 7 Creutz - Tale 359
 Corvo 50. 2 Creutzvogel II. 340
 Corvu ambidastru 84. 21 Crevechassis 116. 3
 Corvus 336. ff. 440. II. 121 Crex 992. 1040. 1138
 Corydalos 105. 9 Cristatella 436
 Coscoroba 705 Croace 50. 3
 Cosquauthli 5 Croguler 42. 31
 Costototl 411 Croque - abeille 116. 3
 Cotinga 187. ff. II. 328 f. 330 Crossenobel II. 156
 Cotta 1129 Cross - bill 109. 1
 Cottonvogel II. 777 Crossé - queue 114. 11
 Cottorna II. 110 Crotophaga 329. 332
 Coturnix 38. Crot - Pescherot 72. 3
 Coucou 467 ff. Crouas 50. 3
 Couconat 57. I Crow 50. 3 ff.
 Coudiou 57. I Cruciatu II. 341
 Coulacissi 302 Crucifera II. 341
 Coulassade 105. 9 Cuaderviz 103. 20
 Coulavan 407 Cubugi 103. 12
 Coulon 1057 Cucco 57. I
 Coulon - chaud 87. 4 Cuchillo 57. I
 Courre 1014 Cucho 57. I
 Courier 1014 Cuckow 57. I
 Courlew 115 ff. Cuco 57. I
 Courly 1002. ff. 1015. ff. 1098 Cucu 57. I
 Courlis 86. 3 Cucula 50. 3
 Couroucou 453 Cuculo 57. I
 Coutriox 105. 3 Cuculo affinis 488
 Coux 57. I Cuculus 315. 464. ff. 517
 Covaterra II. 812 Cucumiau 43. 12
 Cowaldrossel II. 322 Cugniada 105. I
 Crabedu 67. 34 Cujelier II. 216
 Crabier 977 ff. Cuilliere 946
 Cracker 67. 28 Cujovit II. 38
 Cracra 84. 4 Cuiriri 205

Cuit 396
Cubianco 87. 13
Cul-blanc 1069. II. 651 ff.
Culicilega II. 640
Culo-bianco II. 654
Cul-rosso 59. 17. — 114. 34
Cuntur 2
Cuorvo 50. 2
Cupido II. 100
Curafoe II. 41
Curassauer 681
Curasso II. 40. 43
Curculeus 112. 36
Cureu II. 281
Curiaca 1002
Curicaca 85. 1
Curiertaube II. 158
Curlew 86. 3
Curquichu 18
Cursarius 1083
Curuca 664. II. 616. 620
Curucui 453
Curvirostra II. 338
Curwillett 1092
Curwy 52
Cusbat 104. 19
Cuthberts-Ente 738
Cutrettola 114. 11
Cutrettola del petto nero 114.
 II
Cutwater 78. 1
Cyanopus 96
Cybindus 109
Cygne 67. 1
Cygnus 694
Cynchramus II. 407
Cyprias 114. 10
Cyranca 67. 32
Cyranta 67. 33
Cyz 112. 25
Czapla 84. 12
Czarna wierka 116. 3
Czayka 87. 1

Czerwonyrztek 114. 34
Czerwony-ogonok 114. 34
Czeczem 103. 2
Cziesz 112. 25
Czir-wenka 114. 45
 D.
Dabuffaire 116. 29
Dachike 355
Dadi 45
Dadsi 112. 29
Daffer 104. 1
Dagschläp II. 80
Daina 103. 4
Daker-Hen 93. 1
Dalvek 76. 8
Damascener-Rebhuhn II. 118
Dame 50. 13. — 116. 11
Danette 114. 11
Damier 838
Danwick II. 504
Dannenfink II. 484
Dasypus II. 148
Dattelsperling II. 509
Daube II. 143
Daunenspecht 528
Daw II. 281
y Dreiniog 112. 25
Dea 588
Deffyt 1122
Demoiselle 423. — 116. 11
Dendrofalke 123
Derbnitschok 42. 23
Detela 59. 12
Deteu 59. 12
Deurvogel 945
Devi-Bitele 103. 1
Dhul 355
Diabolus 1129
Diadeinkranich 749
Dianenamsel II. 308
Dickfuß 1097
Dickkopf 751. 754. II. 744 f.
 L 112
 Dick-

- Dickschnabel II. 337. ff. 343.
368. 372. 386. 389. 391.
503
Didus II. 19
Diestelfink 426. II. 394. 427.
444. 465. 475. 486 ff. 495 ff.
Diestelvogel II. 483. 489
Dig-Sulu 117. 4
Digsvale II. 794
Dikaja Pikaliza 1087
Dilafkarfs 853
Dinde sauvage 57. I
Dindon II. 31. 37
Diomedea 839. 840 ff.
Distelvink 112. 7
Dittchen 1094
Dittertaube II. 151
Diuka II. 521
Dix-buit 87. I
Dlaſk 114. 18
Dleſchb 109. 2
Dobbelschnepfe 1031
Dobbel-Kramsfugl 107. I
Dod-aars 97. I
Dodo 97. I
Doel 355
Dohle 333. 355. 433 f. 438 f.
Dohmpfaff II. 351
Dohnpaap II. 351
Dolken 1079
Dolmetscher 1057
Domherr II. 350. 363. 387
Domberre 109. 4
Domicella 270
Dominikeule 176
Dominikfalk 130
Dominikanerdrossel II. 318
Dominikanerente 779
Dominikanerkardinal II. 357
Dominikanerkernbeisser II. 358
Dominikanerwittwe II. 441
Domino II. 364
Dom-Oxe 109. 3
- Dompage* 109. 4
Dompfaffe II. 347. 349. 370
Domschnepfe 1004
Doole 357
Doppan 75. 2
Doppelschnepfe 1017. 1030.
1042
Doppelsporn II. 26. 120
Dopping 67. 25
Dorfschwalbe II. 789
Dorfspeling II. 549
Dorling II. 606
Dorndrechsler 194
Dorndreher 193. II. 690
Dornflügel 1100
Dorngreuel 194. II. 690
Dornheher 194
Dornkönig II. 717
Dornreich 194. II. 622. 689.
744. 766
Dornträher 196
Dorntreter 194
Dorpink II. 478
Dorr-Hawk 118. I
Dos bleu 59. I
Dotterel 1057
Doucker 889
Dove II. 140 ff.
Draaihals 58. I
Drachwa II. 3
Draine 107. I
Drake 783
Dreckkrämer 609
Dreckvogel 6
Drehhals 496
Drehvogel 497
Drepanis II. 794
Dreyhals 494
Dreyzee 542
Drofa 95. I
Drongo 183
Dronte II. 19
Drop 95. I

- Drosch 107. 4
 Droschel II. 263
 Drossel 203. 407. 408. 413.
 416. 423. 435. 439. II. 242.
 248. ff. 329. 579. 683
Droßig 107. 4
Drosd 107. 2
Drozd 107. 4
Drozd-mniyssy 107. 3
Drozd-srzedny 107. 2
Δρυονολαπτης 504
Dsegguse 57. I
Dsennis 59. 17
Dservis 50. 5
Dserwe 84. 4
Dsnerdk II. 108
Dſeſe 84. 7
Dubbellerche II. 233
Duc 43. 1 ff.
Düchelein 887
Duchentlein 887
Duchipbatb 64. I
Duck 140. 712. ff. 766
Duckchen 889
Ducker 889
Ducquer 43. 4
Dudak II. 3
Dudek 64. I
Dudu II. 19
Dufira 104. I
Dugo 43. I
Dukipbat 103. I
Dullerche II. 215
Dummherr II. 350
Dumpis 84. 21
Dun-Diver 68. I
Dunlin 1036
Dünnebein 1099
Duppelschnepfe 1031
Duratschok II. 359
Dur-bec II. 348.—109. 2
Durstel II. 263
Dütchen 1056
Düte 1094
Dyal 53. 6
Dyker 757
Dykere 765
Dykker 884
Dymludj 329
Dzieciot 59. I
Dzieciot-modramy 59. I
Dziečtot-muromy 65. 2
Dzieki Kur 103. 2
Dzierlatka II. 226
Dzierlatka czubata 105. 6
Dzwoniek 109. 27
- E.
- Eachem* 57. I
Eardove II. 194
Eatoas 50. 2
Ebelvogel II. 19
Ebeher 958
Ebiger 958
Ebourgeonneux II. 352.—109.
 2. 4.—112. 4
Echasse 1099
Echelle 65. 2
Ecoffonneux 109. 4
Ecousse 42. 12
Ecrecelle 42. 16
Edder 738
Edeldame 230
Edelfalke 79
Ederfugl 67. 15
Edolio 471
Eee-eve 65. 29
Eehweck 107. 22
Een-Maes 116. 3
Efraye 43. 8
Egde 546
Egerste 374
Egester 374
Eggenschär 1139
Egmor 76. 7
Egretta 974
Ebrylis 42. 2

- Eichelheher 360
 Eichelkrähe 361
 Eichelrabe 361
 Eichvogel 77
 Eider 377
Eiderblicke 67. 15
Eiderduck 67. 15
 Eidergans 736
 Eiderente 738
 Eidervogel 737
 Einsiedler 387. II. 20. 712
 Einsiedler-Drossel II. 311
 Eisammer II. 404
 Eisente 766. 809
 Eiskiebitz 1065
 Eismöwe 834
 Eisstrandläufer 1064
 Eissturm vogel 835. 837
 Eisente 755. 761. 766
 Eisvogel 369
 Eisvogel 569
 Elaeathorax II. 431
 Elatototl II. 706
 Elb 697
Elbs 67. I.
 Elbsch 696
Elg 87. 3
Elk 67. I
Elle-Kongens Datter 114. II
 Elle-Krage 392
Elo 42. 39
 Elster 189. 317. 373. f. 417.
 439. II. 242
 Elsteralk 818
 Elsterentchen 809
 Elsterrabe 531. 533
 Elsterstaar II. 241
 Elstertoukan 318
 Elve - Kald II. 244
 Elve - Konge 106. 5
Ema 96. I
Embar 75. 4
 Ember 882
 Embergans 882
 Emberiza II. 390. 398. ff. 475
 Einbritz II. 413
 Emerillon 127 f.
 Eme II. 15
 Emeu II. 15
 Emmeritzte II. 406
 Emmering II. 413
 Emuerling II. 400. 412
 Emmerlingsvogel II. 419
Emouchet 42. 31
 Endrach 740
Engang 46. 3
 Englerche II. 213
Engoulevert 118. I
Engouane-pastre 114. II
 Ente 694. ff. 708. 711. ff. 736.
 738. 782. 785. 802
 Entenadler 42. 57
 Entengeyer 71
 Entenrothkehlchen 779
 Entenfößer 43. 57
 Enter 783
 Entita 116. 8
 Enrich 783
 Entvogel 783
 Enucleator II. 346
 Epeiche 59. 17
 Epervier 107
 Episcopus II. 468
 Epopos 608
 Εποψ 612
 Epouvantail 930
 Eques II. 162
 Erdbull 984
 Erdfink II. 540
 Erdgans 709
 Erdgeyer 11
 Erdgürtelmeise
 Erdschwalbe II. 793
 Eremit 387
 Eremita 386. II. 311
 Eremitrabe 387

- Erithacus II. 698. 714
 Erizchen II. 693
 Erizkins 114. 34
 Erle II. 638
 Erlenfink II. 516
 Erooro 61. 28
 Erpel 783
 Erua 84. 4
 Erythra 1123
 Erythrocyanos 223
 Erythroxantos 225
 Erztaucher 892
 Esarokistok 75. 6
 Esaruktorsoak 42. 39
 Esclave 50. 2
 Escorbeau 50. 2
 Eselschreyer 845
 Esquimeauxbrachvogel 1016
 Esquimeauxschneipe 1016
 Estorino 106. 1
 Estournat 106. 1
 Estourneau II. 239
 Esungak 76. 10
 Ete 289
 Etourneau II. 237
 Etubirga 69. 10
 Eule 138 ff.
Eutretola 114. 11
 Eveque II. 468
 Excubitor 189
 Eyder - Gans 736
 Eysengartt 568. 570
 Eys - Endte 811
 Eysvogel 570
 Eyvogel 919
 F.
 Fächerschwanz II. 362
 Fädemlein II. 502
 Fagerfis II. 726
 Fager Gaas 67. 4
 Fagergans 709
 Fagergiäs 710
 Fogiano 101. 3
- Faisan 1155. II. 36. — 103. 1
Faisanne 101. 3
Faisante 101. 3
Faisanneau 101. 3
Faisanteau 101. 3
 Faise 101. 3
 Faiseau 101. 3
 Falcata 1004
Falcinellus 631. 639. 644.
 650. 662. 665. 674. 1003.
 II. 742
 Falco 17
Falcone 42. 13
Falconello 44. 12
Falconellus 127
Falcula II. 794
 Falk 42. 30. ff. 17. 30 ff.
 Falkeneule 173. 174
 Falkensperling II. 616
 Falkmöve 905
 Falkonirer - Schmieglein 128
 Fallope II. 213
Fallow Smith 114. 15
 Farlousanne II. 217
 Farlouse II. 212
 Farluzzanne II. 217
 Farzer 1154
 Fasan II. 27. 36. ff. 45. ff. 65.
 66. 100
 Fasanenbastard II. 70
 Fasanenente 762
 Fasanenvogel II. 67
 Fasanenputer II. 71
Fasarella 95. 3
 Fastenschlier 1017. 1094
 Faucon 73 ff.
 Fauvette II. 615. 619. 623.
 625. ff. 662
Fauvette d'hiver 114. 3
Fauvette des baies 114. 3
Fauvette des roseaux 114. 8
Fauvette à tête noire 114. 18
 Fazant 101. 3

- Fazyan 101. 3
 Federfasan II. 84
 Federfuß 682
 Federkappe 791
 Fedoa 1036. 1039
 Feigenfresser II. 268. 631. 665 ff.
 Feigenfresser II. 612. ff. 680.
 ff. 709. ff. 728. 759
 Feigenvogel II. 613 ff.
 Felddieb II. 536. 548
 Feldengel II. 106
 Feldflüchter II. 143. 146
 Feldhuhn II. 111. 113
 Feldkrähe 345. 348
 Feldläufer 1093
 Feldlerche II. 207. 214. 218
 Feldnäher 1018
 Feldnachtigall II. 619
 Feldpfau 1053
 Feldspatz II. 554
 Feldsperling II. 509. 553
 Feldtaube II. 139. 146
 Feldwächter 1139
 Feliceps 143
 Felsenhahn II. 739
 Felsenhuhn II. 100
 Felsenlerche II. 632
 Felsenrebhuhn II. 119
 Felsenschwalbe II. 787. 795
 Felsentaube II. 146. 175
 Felveck 107. 22
 Fenicottero 79. I
 Felstaube II. 146
 Fenerotet 114. 49
 Fensterschwalbe II. 782. 789
Fern-Owl 118. I
 Feroë - Kriechente 766
 Festvogel 291
 Fettanammer II. 408. 467
 Fettgans 817. 825 ff.
 Fettling II. 669
 Feuchtarisch 853
 Feuerfink II. 498
 Feuerrabe 348. 385
 Feuerschwalbe II. 782
Fia - Fia 107. I
Fialster 110. I
Fjäreplit 1072
Fiärt 69. 3
 Ficedula II. 576. 605. ff. 631.
 713
 Fichtenammer II. 425
 Fichtendickschnabel II. 346
 Fichtenfink II. 556
 Fichtenhacker II. 343. 346
 Fichtensänger 640
Fieldfare 107. 2
Field-Duck 95. 3
 Field-Lark II. 214
Field-Rype 103. 4
Field-Trost 107. 2
Fier - Plister 87. 3
Fierre - Mous 1072
Figogatka 114. 10. 18
 Fliguier II. 268. 612. ff. 647.
 665. ff. 670. ff. 677. ff. 709.
 f. 728. ff. 759
Filippa 89. I
Filomele 114. 18
 Finet II. 530
 Gingah 183
 Fink 426. 437. II. 359. 372.
 383. 390. 423. 441. 444.
 454. 458. 465. 474. ff. 539.
 560
 Finkenbeisser 193
 Finkenfalke 116
 Finkenhabicht 116
 Finkenpapagey 277
 Finkensperber 116
 Finkenwürgvogel 198
 Finkmeise II. 755. 759
Fiöre 87. 3
Fior - Rancio 114. 48
 Fischaar 57. 60. 72
 Fischadler 22. f. 29. 31. 43. 56
 Fisch-

- Fischahr 57. 319
 Fischer 315. 901. 923. 926
 Fischerfalk 59. 114
 Fischfresser 316
 Fischermeve 898. 905
 Fischgeyer 22. 67. 72
 Fischjäger 907
 Fischmeise 923
 Fischerlein 927
 Fischhabicht 56. 58
 Fischmeve 901. 906. 923. 927
 Fischtreiber 806
 Fischreiger 971
 Fischreiher 970
 Fischhäher 971
 Fischweihe 60
Fisk 114. 49
 Fisk - Aender 804
 Fiske - Gjoe 58
Fiske - Heyer 84. 12
 Fiske - Oernen 24
 Fiskeren 856
Fisk - Litta 87. 8
Fisk ljus:n 42. 9
Fisk - Mäse 76. 3
 Fisktius 42. 26
 Fist II. 642
 Fisterlein 1073
 Fitert II. 711
 Fitis II. 725
 Flabellifera II. 362
 Flachslink II. 525. 528. 529
 Flagspette 535
Fläk - Spärre 59. 18
 Flamant 934
 Flambant 934
Flamenco 79. 1
 Flamengo II. 391
 Flammer 934
 Flamingo 934
 Flammenreiger 935
 Flammenreiber 935
 Flammenvogel 934
Flaue - Flit 75. 8
 Fleischervogel II. 330
 Fleckkehlein II. 696
 Fliegenente 712. 748
 Fliegenfänger 560 II. 455. ff.
 564. ff. 594. 659. 688. 710.
 732
 Fliegenkolibri 692
 Fliegenschnäpper 411. 560.
 636. II. 564. ff. 575. 631.
 647. 653. 656. 665. 749
 Fliegenstecher 203. II. 455.
 567. 572. 578. 615. 657.
 709. 731
 Fliegenvogel 664. ff. 678. ff.
 685. 687. 690. II. 577. 657
 Florentinermeise II. 778
 Florus II. 733
 Flöytetyten 1079
 Flüelerche II. 639
 Flügelfleck II. 669
 Flugtaube II. 143
 Flussadler 56
 Flussteufelchen 1129
Flussterers 91. 2
Fluteur 109. 4
Fluteux 105. 3
 Flycatcher II. 580 ff.
 Focke 965
Foer 75. 7
Forkeert - Regn - Spove 89. 1
 Formicivorus II. 297
Formique 63. 2
Fornarola 114. 15
 Forstue Svale II. 783
Forze pintacilgo 112. 7
Forzana 93. 2
Fosse - Fald 106. 5
Fosse - Kald 106. 5
 Fottivent 42. 16
 Fou 861
Fou de Baffan 72. 5
 Foudi - jala II. 614
LII 5

Foudis

- Foudis II. 356
 Fouillet 114. 49
 Foulque 1128
 Fourreau 116. 11
 Francolin II. 99. 109
 Francoline blanche 103. 4
 Franquelle - ivernengk 109. 4
 Franquet 109. 2
 Franzente 772
 Franziskaner II. 396
 Frater Givino 114. 45
 Fratino 116. 5
 Fratzenvogel 322
 Fräulein von Numidien 951
 Fregatta 835
 Fregatte 850
 Fregatvogel 851
 Frelot 114. 49
 Fremdling 81. 841
 Fremdlingsfalke 81
 Fresaye 43. 8
 Frefeke 795
 Frelillet 114. 49
 Fringilla 426. 437. II. 327.
 374. 390. 427. 434. 444.
 454. 465. 474. ff. 633
 Fringillae affinis II. 330
 Fringuillago II. 757
 Fringuello 112. 3
 Friquet II. 536
 Frisone 109. 2
 Froschgeyer 69
 Froschgeyerl 70
 Froson 109. 2
 Frühlingsbachstelze. II. 645
 Frühlingspapagey 313
 Frühlingstichlerling II. 644
 Fuchseule 148
 Fuchsgans 708
 Fugle - Konge II. 722
 Fuit 114. 49
 Fulaga 91. 2
 Iuleabajub 65. 39
- Fulica 1115. f. 1136
 Fullo II. 326
 Fulmar 834
 Fünffleck II. 330
 Funingo II. 179
 Funingo - maitsu II. 179
 Furfuragiu 112. 36
 Fürstenschneepfe 1031
 Fuselier 502
 Füt 75. 7
- G.
- Gaalammer II. 413
 Gaas 721
 Gaaseörn 32
 Gaaffpon 86. 4
 Gabelgeyer 49
 Gabelschwanz 835. II. 456.
 567
 Gabilan 84. 4
 Gachet 925
 Gacke 355
 Gaddevierusch 1072
 Gadelbusch 764
 Gadisse 765
 Gadrille II. 715
 Gaffaru 112. 16
 Gänseaar 113
 Gänseadler 24. 31. 42
 Gänsehabicht 76
 Gänsehirt 609
 Gänselfägetaucher 802
 Gaey 50. 6
 Gagl 734
 Gabrnis 84. 12
 Guigula 68
 Gairo 76. 6
 Gaiske 76. 3
 Gaity 50. 7
 Gakatte 75. 3
 Gakkor 75. 3
 Galander II. 230
 Galbero 52. 1
 Galbula 402. 590

Gale.

- Galerand* 84. 21
Galerita II. 326
Galleto del bosco 108. I
Galgenregel 31
Galgenvogel 337
Galculus 390. 399
Galka 50. 6
Galla-Mareza 93. 2
Gallina II. 43. ff. 48. ff. 80.
 105
Gallina pratajula 95. 3
Gallina di Numidia 103. I
Gallina bianca 103. 4
Gallinae II. I ff.
Gallinache 41. 5
Gallinago 1030
Gallinazo 7
Gallinula 1037. 1070. 1118.
 1123. 1145
Gallo 101. I
Gallocedrone 103. I
Gallo d'India 98. I
Gallopavo II. 30. 42
Gallus II. 44. 46. ff. 80. 740
Galskregl 392
Gambetta 1056
Gambettola 87. 13
Gambettstrandvogel 1056
Gambiakernbeisser II. 382
Gamsengeyer 24
Ganga II. 106
Ganner 803
Ganet 860
Gans 703. 718. 711. 780. 827.
 871. 995
Ganss 725
Ganso 67. 9
Garatauk 107. I
Garhella 50. 2
Garbenkrähe 391
Gardena 107. 2
Garde-charrue 114. 10
Garga 50. 10
Garganey 67. 32. — 68. 1
Gargoas 886
Gorgia 84. 21
Garinello 42. 16
Garnis 84. 12
Garrot 754
Garrula 390
Garrulus 392. II. 323
Garsotte 67. 32
Gartenammer II. 408
Gartenfink II. 477
Gartengrasinücke II. 625
Gartenlerche II. 213
Gartenröhrling II. 697. 700
Gartenrothschwänzlein II. 693.
 699
Gartenschwarzkehlchen II. 696
Gärtner II. 435
Garza 969
Garzetta 973
Gäse-Oern 42. 4
Gafuel 96. 2
Gattair 795
Gau 101. I
Gaukler 950
Gaugarza 116. II
Gaul 734
Gaulamer II. 415.
Gaura 68. I
Gauzerenau 50. 7
Gavia 907. 1079. 1084. 1088.
 1094
Gavi-gavi 87. I
Gavotte II. 438.
Gawron 50. 2
Gay 50. 7
Gayo 50. 6
Gaza 44. 12
Gaza verla 50. 7
Gazola 84. 21
Gazza 50. 13
Gazzara 50. 13
Gazzuola 50. 13

- Geai de bataille* 109. 1
Geau 101. 1
Geay 361. 383
Gebirgsperling II. 554
Gebürggans 727
Gebüschnfalke 189
Gedemarker 118. 1
Geeka 57. 1
Geelheinlein 1123
Geelfüssel 1123
Geelerst II. 413
Gegler II. 482
Geier s. Geyer
Geirfugl 68. 1. — 69. 4
Geiskopffschnepfe 1045
Geismelker II. 810
Geist 385
Geisvogel 1017. 1053
Gelbbein 1025
Gelbbeinlein 1123
Gelbbrust 1122. II. 623
Gelbbrüstchen II. 268. 657
Gelbbrüstel 642
Gelbbusch II. 742
Gelbfink II. 515
Gelbflügel 424. II. 666
Gelbgans II. 412
Gelbhals II. 424. 636
Gelbkehlichen II. 268. 634. 657
Gelbkopf 425. 977. II. 371.
 379. 643. 678. 729
Gelbling II. 413. 433
Gelbnase 1046
Gelbschnabel 23. 44. 106. 564.
 989. 523
Gelbschopf II. 742
Gelbschupps 793. II. 742
Gelbschwanz II. 675. 731
Gelbschwarzkehlein II. 661
Gelbspecht 513
Gelbsteiss 423 II. 769
Gelbvogel 401. 415
Gelinote II. 94. 98. ff. 104
Gelinote blanche 103. 4
Gelsregel 391
Gelve 84. 21
Gemsenadler 23
Gentarubia 79. 1
Gentelmann 861
Gerabib 50. 2
Tεραυος 355
Gereuthlerche II. 215. 218.
 222
Gerfalke 100
Gerfault 101
Gerschwalbe II. 797
Gerstammer II. 405
Gerstendieb II. 536. 548
Gerstenfink II. 365
Gerstenfresser II. 365
Gersthammer II. 407
Gerstling II. 407
Gerstvogel II. 407
Gertraudsvogel 217
Gerzab 84. 4
Ges 67. 9
Gesangdrossel II. 263. 269. 313
Gesanggrasmücke II. 615
Gesangkolibri 637. 639. 646
Gesanglerche II. 208
Gesangschwalbe II. 805
Gesangspöring II. 419
Gestettenschlager II. 657
Gestettenschwalbe II. 794
Geta 50. 7
Gewittervogel 1017. 1021
Geyer I. ff. 55. 59. 104
Geyeradler II. 12. 18
Geyereule 173 f.
Geyerfalke 13. 95. 99
Geyerkönig 4
Geyerle 104
Geyerpapagey 295
Geyerschwalbe II. 797
Gheppio 42. 16
Ghiandaia 50. 6

- Gbiovaro* 63. I
Giaddina d'eva 91. 4
Giaddina di campa 95. 3
Giarola 87. 13. II. 215
Gibitz 1053
Gibraltarshwalbe II. 803
Gickerlein II. 219
Giebelschwalbe II. 782. 789
Gieker II. 350
Gielawaelgo 107. 23
Gierd - Smutte 114. 46
Gierfalk 99
Giertruds - fugl 218
Gil 114. 45
Gilberschen II. 413
Gibling II. 413
Gilghero II. 521
Gillit II. 594
Gilloniere 107. I
Giloch 1017
Gimpel II. 350. 362. 369. 370.
 389. 391. 393
Gimpereau 548
Gimpl 109. 4
Gingi - Drossel II. 322
Gintel II. 533
Giög - Kukert 57. I
Giök 57. I
Gjöktita 58. I
Girandello 86. 4
Girardel 86. 10
Giran 50. 7
Girardin 93. 3
Giraweczk 107. 3
Girlitz II. 502
Giron 103. 4
Girrmeve 928
Giu 43. 22
Gixerlein II. 259
Glada 42. 12
Glandarius 360
Glanzdrossel II. 281
Glareola 1039. f. 1051. 1068. f.
1071. 1077. 1111. ff. 1123.
 1144
Glariana II. 220
Glattkehle II. 121
Glaucion 757
Glaucus 758
Glaukopis 28. 335
Glaumer 112. 3
Glead 42. 12
Glente 42. 12
Glib 90. I
Glitter 926
Glockenspieler II. 294
Glöckner II. 294
Glottis 1037. 1124
Glowienka 67. 6
Glucb - jemioluchba 107. 2
Gluckente 759
Glücksvogel 219
Gluglu II. 148
Gluth 1097
Glutt 1037. 1124
Glutthahn 1124
ΓναΦελος II. 327
Gnauts 884
Gneyser II. 156
Goatsucker II. 810 ff.
Gobe - mouche 560. ff. II. 455.
 564. ff. 577. 581. ff.
Gobryvogel II. 364
Godwall 67. 20
Gog 101. I
Gogl 734
Goifugl 69. 3
Goiland 905
Goiran 42. 15
Goifar 1017. 1018
Goisser 1004
Gol 101. I
Golab 104. I
Goldadler 31. 33. 38
Goldammer II. 371. 408. 412.
 424. 475

Gold-

- Goldammering II. 415
 Goldämmchen II. 722
 Goldamsel 403. II. 287
 Goldäuglein 754
Golden - crested Wren 114.
 48
Golden - Eye 67. 23
 Golddrossel 403. 418. 430. II.
 282
 Goldfasan II. 72
 Goldfink II. 350. 485. 488.
 489. 515
 Goldflügel 516. II. 666
 Goldfuß 116. 119
 Goldgeyer 15. 20
 Goldhahn II. 73
 Goldhähnchen II. 720
 Goldhänlein II. 721
 Goldhannel II. 723
 Goldhendlein II. 721
 Goldkehle 450. 676. 595
 Goldkopf II. 379. 683. 744
 Goldkrähe 391
 Goldkrone II. 670
 Goldmeise II. 457
 Goldmerle 403. II. 457
 Goldpapagey 256
 Goldrabe 337
 Goldregenpfeifer 1094
 Goldspecht 516
 Goldvogel 590
 Goldvögelein II. 722
 Golkrabe 337
Golob 104. I
 Gomphön II. 52
 Gonambuch - Ammer II. 447
 Gonolock 205
Gosander 68. I
 Goose 67. 9
 Gorfou 829
 Gorge - bleue II. 703 f.
 Gorge - rouge II. 715
 Gornajä - Owlsjänka II. 556
- Gorse II. 413
 Görtan 526
 Goshawk 77
 Gottesvogel 468
 Göttin 588
Gouk 57. I
Goustarde 95. I
 Gowry II. 365
 Graab el Sahara 385
Graae - Trost 107. 2
Graa - Gaas 67. 9
 Graairisk II. 616
Graa - Irrisk 114. 3
Graake 50. 6
Graa - Meise II. 767
Graa - Nakke 76. 3
Graa - Spurv 112. 36
 Graafskiken II. 530
 Grabeule 161
Grabetz 112. 36
Grabulisk 50. 10
Gracchio 50. 3
 Gracula 433. 439. II. 468
 Graculus 384. 855. 861
Graefiska 112. 29
Graes - Smutte 114. 6
 Graio 50. 6
 Gräker II. 482
Gralla 50. 7
Grallae 934 ff.
Granafür 76. 7
 Granatvogel II. 496
 Grandoule II. 107
 Grasel II. 531
 Grasemücke II. 621. f. Gras-
 mücke
 Grasemunke II. 621
 Grasemüsche II. 622
 Grasfink II. 542
 Grashuhu 1144
 Grashüpfer II. 222
 Grasläufer 1139
 Gräsllein II. 529. 531

Gras-

- G**rasmücke 411. II. 285. 566.
 575. 578. 612. 615. 619.
 620. ff. 625. 632. 647. 651.
 661. 664. 687. 708. 725. f.
 748. 778
Grasmügg II. 621
Grasrätscher 1139
Grassa 50. 13
Graschnepfe 1031
Graffet 114. 3
Gräfsmutte II. 621
Graspatz II. 662
Graspecht 521. 535
Grasvogel II. 542
Gratte-paille 114. 3
Grauammer II. 405
Grauentchen 772
Graufink II. 515. 535
Grauhänfling II. 525
Graukehlchen II. 669
Graukelein II. 699
Graukopf III. 527. II. 673
Graula 50. 3
Grauling II. 648
Graulo 61. 1
Graumeise II. 766
Graumeve 901. 905
Grauspecht 497. 544. ff. 756
Grav-Drage 67. 4
Grav-Gaas 67. 4
Graw-Entlein 772
Graw-Eule 162
Graw-Meisslin II. 768
Gray 67. 20
Graye 50. 4
Grebe 884^{ff.}
Greenfinch II. 373
Greenshank 1037
Greesa 103. 20
Greif 2. 9. 10
Greiff 2. 21
Greifgeyer 2. 21
Greilla 50. 3
Greille 50. 3
Greinerlin II. 220
Greis 824
Grenadier 505. II. 390
Grenadin II. 497
Greae 883
Griegelster 189
Griel 1097
Grieltrappe II. 6
Grienvögelein II. 219
Grieshennl 1085
Gri-Gri 128
Grilitsch 112. 17
Grillenlerche II. 235
Grillvogel 1084 1091. 1094
Grillenlerche II. 734
Grimmer 20. 49
Grimpant 59. 1
Grimparel 59. 1
Grimpereau 626 ff. 640 ff. 646
Grindling 109. 27
Grinson II. 480
Grinzing II. 374
Grisette II. 227
Grisin II. 648
Grisone 109. 2
Grissla 75. 1
Griunik 104. 19
Grive 1060 II. 250. ff. 256.
 270. 298
Grive de brou 107. 1
Grive provençale 107. 1
Grive montamarde 107. 3
Grive des Ardennoises 107. 3
Grive de vendage 107. 3
Grive champenoise 107. 3
Grivette 107. 3. 4
Grolle 50. 3 f.
Gronfiska 112. 16
Grönspett 523. 527
Grönsplik 59. 12
Grönjulung 59. 12
Gröönling II. 373

- Gröönschwanz II. 373
 Gros. beak II. 344 ff.
 Gros. bec II. 344 ff.
Grosstellerie 112. 36
Gros-pinçon 109. 2
 Grössel 1139
 Gross-Ente 786
Grosse-tête 109. 2
Grosse-tete nvire 109. 4
 Grossfalk 95
 Grosskopf 321
 Grossmeise II. 756
 Grossherzog 139
 Grossmaul 457
 Grossschnäblerfalk 123
 Grossschnäblerpapagey 277
 Grossziemer II. 253
 Gros-Yeux II. 7
Grotto 72. I
Groulard 109. 4. II. 661
 Grous II. 90. 94. 99. ff. 106
Gru 84. 4
Grua 84. 4
 Grue 951
Grulla 84. 4
 Grün, das vergoldete 682
 Grünbein 1037. 168
 Grünsink II. 371. 445. 458.
 503. 558
 Grünfuss 1117
 Grünfüssel 1068
 Grünitz II. 338
 Grünkehlchen 639
 Grünkrähe 391
 Grünling II. 292. 368. 371.
 469. 510
 Grünlingsblauspecht 554
 Grünrücken II. 182
 Grünschling II. 414
 Grünschnabel 993
 Grünschnäbler 1097
 Grünschwanz II. 372
 Grünspecht 521. ff. 617
 Grünsperling 555. 558
 Grünvogel II. 370
 Grünzling II. 374. 408
 Grüper 617
 Grus 949. 959
Gruy 86. 3
Gruz 84. 4
Grygallus II. 93
 Gry-gry 128
Grylle 871
Grylle 88. I
Gryllenrenna 59. 17
Gryllfingroes 109. I
Gryllivora II. 284. 319
Grylltaucher 871
Gryphus 2
Grytan 86. 3
Grzebielucha 117. 4
Grzywacz 104. 19
Guacchichil 66
Guacu-guacu 900
Guainumbi 670. 672. f. 681 ff.
Gualbedro 52. I
 Guan II. 37
Guara 1010
Guaracyaba 66. 12
Guaracygaba 66. 12
 Guarabe 239
Guarauna 1015
Guns à Sierra Paneúrym 112. 7
 Guava-Fliegenfänger II. 587
 Guckang 466
 Guckérlein II. 218
 Guckgu 466
 Guckguck 466
 Guckufer 466
 Gudunge 67. 15
 Guépier 598
 Guereira II. 331
Gueule de four 116. 11
Gufo 43. 4
 Gugauh 466
Gugelfahraus 403. 405
Gugel-

- Gugelfihaus 405
 Güger II. 351
 Gugug 466
 Guianumbi 66
 Guiffo - Balito II. 395
 Guignard 1090
 Guignette 1073
 Guillemot 870 ff.
 Guillerie 112. 36
 Guinea - Hen 103. 1
 Guira II. 701
 Guira - Acangatara 57. 32
 Guiraba 239
 Guiraberaba II. 702
 Guiracoereba 651
 Guiraguacuberaba II. 702
 Guiraienoja II. 465
 Guira - Guianumbi 321
 Guiranheemgatu II. 420
 Guirarau - Nbengeta 44. 7
 Guirapanpa II. 332 f.
 Guira - Tangeima 409
 Guiranhemgeta II. 457
 Guiraperea II. 467
 Guiratinga 974
 Guira - tirica II. 357
 Guirnegat II. 420
 Guit - guit 631. ff. 636. 650
 Gukker 466
 Gulaundente 729
 Gulbis 67. 1
 Guldenhead 69. 4
 Gulfürtling 76. 7
 Gulin 53. 2
 Gull 849
 Gulo 845
 Gulspink II. 645
 Gulspur 110. 5
 Gulvesling 110. 5
 Gumbert II. 52
 GümpeII. 350
 Güorga 971
 Guraundi II. 457
 Gurgelhahn II. 84.
 II. Band II. Tb.
- Gurfe II. 413
 Gusgastak 1019
 Güsvogel 1021
 Güthvogel 1017
 Gutnuerle 403
 Guulbek 42. 13
 Guignor 112. 3
 Gybitz 1055
 Gyfitz 1053. 1055. 1079
 Gylfinbrauf 109. 1
 Gympel II. 350
 Gyntel II. 533
 Gyratrix II. 155
 Gyrfalco 99. 101
 Gyrfalk 99
 Gyrtan - maly 86
 Gysfugl 43. 6
 Gywitt 1055
 Gzegzolka 57. 1
 H.
 Haalla 67. 30
 Haan 101. 101
 Haarbull 1035
 Haarschnepfe 1034. 1073
 Haavella 765
 Habereau 124
 Haberlämmchen 1031
 Habesch II. 559
 Habich 77
 Habicht 40. 55. 61. 76. 104.
 115. 116. 129. 130
 Habichtseule 172 ff.
 Hacht 77
 Hackespott 503
 Hacotidinen 112. 28
 Haddae 48
 Hädjal II. 116
 Haeger 84. 12
 Haematopus 1108
 Haf - Meve 898. 908
 Haf - Orn 42. 39
 Haf - Tjäder 72. 3
 Hafstrut 76. 6
 Haf-Sula 861
- M mm
- Hag.

- Hag-Amsel II. 320
 Hagedash 1014
 Hagelgans 706. 1126
 Hagent 786
 Häger 361
Hagur 84. 4
Habaseu 50. 22
 Hahle II. 350
 Hahn 46
 — indianischer II. 41
 Hahnentaube II. 184
 Haidenpfeifer 1093
Hakik 70. I
Hakkardaja 75. 4
Hakke-Spaet 59. I
 Halbe Mond II. 233
 Halbente 756. 868. ff. 877. 880
 Halbhuhn II. 57
 Halbmeve 928
 Halbmondsfink II. 510
 Halbschnabel 528
 Halbschnepfe 1034
 Halbtrauer II. 773
Halcon 42. 13
 Halcyon 570
Halebrand 67. 32
Half-Schnepf 86. 8
Haliaetus 56
Halkion 69. 5
Halträuf 107. 2
Halsbaandet-Lom 75. 5
 Halsbinde 667. II. 229
 Halsdreher 497
Halskrausentaupe II. 153
Halskraved-Dykker 75. 7
 Halsregel 391
 Halswinder 496
Halvkroppert II. 160
 Hämmerling II. 415
Hämpfling II. 527
Hamp-Meis 116. 8
 Hane II. 48
Haneffерl II. 527
Hanffincke II. 527
 Hänfling II. 371. 373. 426.
 439. 522. ff. 528. 534. f.
 613. 744 ff.
 Hanfmieise II. 767
Hangnestkernbeisser II. 385
Hangvogel 301
Hanik 766
Hanikens 85. 3
Hannaquaw II. 65
Hannekin 50. 6
Hännelinne 114. II
Hardvärsfogel 110. I
Ha-Old 67. 30
Hare-fod 103. 4
Harekenblatt 1031
Harfäng 43. 6
Harfugl 63. I
 Harle 802
 Harlekin 280. 775
Harlekinsgrasmücke II. 678
Harlekinspecht 536
Harpax 44. 12
Harpunirer 538
Harpunreiber 1002
Harpyia 18
Harrakas 50. 13
Hartschnabel II. 347
Har-Ugglan 43. 7 f.
Haselhuhn 1036. 1045. II. 88.
 95. 98. f. 103. 109
Haselwildpret II. 103
Hasenaar 31
Hasenadler 26. 31
Hasenfuss II. 96
Hasengeyer 13 f.
Hasenstösser 14
Haskel 76. 10
Häster 374
Hatschen 783
Hatzler 361
Hätzler 361
Hauaar 49
Haubellerche II. 225
Haubelmieise II. 753

Hauben-

- Haubenadler 25
 Haubenalk 821
 Haubenblutsink II. 354
 Haubendrossel II. 324.
 Haubeneisvogel 576
 Haubenente 791. f. 795
 Haubenfalk 97
 Haubenfink II. 354
 Haubengeyer 25
 Haubenheher 364
 Haubenhuhn II. 49
 Haubenkernbeisser II. 359
 Haubenzolibri 661. 687. 690 ff.
 Haubenkönig II. 720
 Haubenkorwaran 857
 Haubenlerche II. 223. 226.
 Haubenmeise II. 752
 Haubennierle 436. II. 470
 Haubenpapageytaucher 821
 Haubenspecht 505. 507 ff.
 Haubensteissfuß 883
 Haubentaube II. 150
 Haubentaucher 883
 Haubenzeisig II. 741
 Haugelerke II. 223
 Hausammer II. 433
 Hausammerling II. 432
 Hausdieb II. 548
 Hauselster 735
 Hausente 782
 Hauseule 178
 Hausgans 725
 Haushahn II. 46
 Hauskade II. 663
 Hauskrähe 344
 Hausröthele II. 693. 713
 Hausrötelein II. 693
 Hausröhling II. 692
 Hausrothschwänzlein II. 692
 Hausrothschwänzchen II. 697
 Hausrothschweifl II. 697
 Hausschmätzer II. 600
 Hausspar II. 548
 Hausspatz II. 550
- Haussperling II. 547
 Hausschwalbe II. 782. 789
 Haustaube II. 143
 Haustefel 1050
 Hautgrive 107. 1
 Hav - Aare 713
 Hav - Aelder 765
 Havdirdell 69. 5
 Havelda 67. 30
 Havelerke II. 223
 Havellaea 765
 Havgasse 880
 Hav - Heft 70. 3
 Hav - Humber 75. 5
 Hav - Immer 75. 6
 Hav - Maase 76. 6
 Hav - Old 67. 30
 Hav - Orre 67. 5
 Havre - Fugl 114. 11
 Hav - Simmer 67. 4
 Hav - Skade 114. 18
 Hav - Skiärn 884
 Hav - Skiärre 75. 7
 Hav - Sula 861
 Hawfinch 109. 2
 Hawk 43. 4 ff.
 Hawks - Eye 88. 6
 Hawram 50. 2
 Hayduk II. 666
 Hazel Grouse 103. 9
 Heatototl 802
 Hecknammer II. 432
 Heckenschmatzer II. 620. 689
 Heckenspringer II. 689
 Heckenvogel II. 689
 Heckenwenzel II. 619
 Heckenwittwe II. 619
 Heckschnärre II. 639. 39
 Hedge - Sparrow 114. 3
 Hedge - Warbler 114. 3
 Heedelerke II. 216
 Heelkroppert II. 160
 Heelspove 1019
 Heerdtschnepfe 1031

- Heergans 970
 Heerholz 361
 Heerschnepfe 1030
 Heervogel 609
 Hegre 971
 Heher 334. 360. 374. 383. 409
 Heidedrossel II. 259
 Heidehuhn 1050
 Heidelhahn II. 89
 Heidenelster 391
 Heidlerche II. 208. 213. 215.
 222. 225. 226
 Heidenmeise II. 753
 Heideziemer II. 259
 Heiduckenadler 18
 Heiloe 1093
 Heilomer 1092
 Heire 84. 12
 Heister 374
 Heisterschnepfe 1110
Hekatschitschir 69. 9
 Helegug 69. 4
 Helias 991
 Helkregel 391
 Helmtaube II. 156
 Helmvogel 328
 Helsing 731
 Hemperling II. 526
 Henfling II. 527 f.
 Hennotter 958
 Herbstente 779
 Herbstpapagey 293
 Herfugl 611
 Heringsmeve 908
 Herold 361
 Heron 950. 967. ff. 970 ff.
 Herrenschnepfe 1031
 Herenvogel 360
 Hesse 374
 Heteropus 8
 Hetz 376
 Hetzle 360
 Hetzler 361
 Heubellerche II. 225
 Heubelmeise II. 754
 Heumäher 595
 Heuschreckenvogel II. 283
 Heuvogel 595
Heyro-taire 63. 29
Hembole 59. 12
 Hexe II. 809
 Heydelerche II. 225. f. Heide-
 lerche
 Heydemieisslein II. 753
 Heyer 360
 Heyle 1093
Heyloe 88. 6
Hiärpe 103. 9
Hiaticula 1084
 Hibou 43. 4
Hjeile 88. 6
Hieilo 88. 6
 Hierengrill 617
Hierpe 103. 9
Higboe 59. 12
Himantopodi 1100
Himantopus 1081
 Himbrinen 879
 Himmelgeiss 1019. 1031
 Himmellerche II. 207. 213
 Himinelsziege 1030
Himpulinda 112. 28
Hinnularia 44
Hippolais II. 623
Hippomanucodiata 443
 Hirngrill II. 502
Hirn-Grillerl II. 503
 Hirondelle 922. ff. II. 783 ff.
 Hirschfink II. 347
 Hirschvogel II. 372. 374
 Hirundo 880. 921. II. 781.
 812
Hiro 61. 1
Hittor 59. 9
Hoactli 975
Hoactzin II. 66
Hoamy II. 298
Hoazin II. 66
 Hobby

- Hobby 125
Hobreau 42. 14
Hocco II. 40
Hocche-queue 114. 11
Hochschwanz II. 275
Hoeg 42. 28 ff.
Hoen 101. I
Hoens 101. I
Hofspferling II. 549
Hoftaube II. 143
Hohlente 754
Hohlkrähe 501 ff.
Hohlschnabel II. 140
Hohlschnäbler 316. 319
Hohtaube II. 140
Hohu 975
Hoilotl II. 175
Hoitlallotl II. 65
Hoitzitzel 66
Hoitzillin 646
Hoitzin II. 66
Hökkö II. 40
Hoko II. 39
Hol-Taube II. 142
Holzeule 162
Holzhacker 545
Holzhackerspecht 505
Holzhäher 360
Holzheher 360
Holzhuhn 502. II. 98. 102
Holz-Krae 394
Holzkrähe 391. 502
Holzkrahe 302
Holzlerche II. 208. 213. 215
Holzmeise 764. 766
Holzmuschel II. 555
Holzschnepfe 1026. 1077
Holzschierey 361. 368
Holzsneppa 86. 6
Holztaube II. 139. 172
Honigadler 10
Honigbussard 69
Honigkukkuk 487
Honiglauger 556. 660. ff. 681
Honigweiser 488
Honigzeiger 487
Honney-Guide 488
Höns II. 48
Hookoo 621
Hoop 64. I
Hoopoe 611
Hopling 72. 3
Horbel 1125
Hordeola II. 407
Hörnereule 143
Horneule 139 ff.
Hornohreule 143
Hornschnabel 1131
Hornträger 943
Hornvogel 323
Horrevogel 361
Horsegiag 1032. 1069
Hortulana II. 408
Hortulanus II. 402. 431
Hoft-Fugl 86. 8
Hortyhel 984
Hottentot II. 730
Hottentottenkernbeisser II. 380
Hottentottenkrähe 337
Hottentottenrabe 337
Houbara II. 9
Houerte 43. 5
Houtarde 95. I
Howlet 43. 7
Hoystiert II. 154
Hozitzanatl 380
Hrafni-Oend 793
Hraukur 857
Hrossa-Gökr 1032
Hrota 734
Huan 44. 12
Hubara II. 9
Huda-urnik 117. 3
Hudjacfa II. 142
Hudsonsbayfalke 93. 94. 107
Huet 88. 6
Huexototl 99. I
Huhn II. 46

- Hühnerartige Vögel II. 1
 Hühneraar 9. 51
 Hühneralk 821
 Hühnerdieb 49. 129
 Hühnerfalk 66
 Hübnergeyer 40. 49. 66. 71
 Hühnerhabicht 66. 76. 105
 Hühnerschwanz II. 153
 Hühnerweihe 9. 53. 66. 71
 Huhu 161
Hubu 65. 27
 Huhuy 139
Huid - Maase 76. 3
Huit 88. 6
 Huitrier 1109
Huitzitzil 66
 Hulote 161
 Humming - bird 683
 Hundsmeise II. 764
 Hüner s. Hühner
Hupe 64. 1
 Huru 40
Hus - Swala 117. 3
 Hutsche 374.
Hutmerle II. 471
Huttanager II. 471
Hutti 88. 6
Huttich 88. 6
 Hüting II. 600. 693
 Hunis - Kald II. 549
Huus - Spurv 112. 36
Huus - Svale 117. 3
 Huw 140
Hvidlaaring 853. 856
Hvidside 68. 5
Hvid - Svale 117. 3
Hviidlaaring 72. 3
 Hvinand 755
 Hvin - Ander 755
Hvit 112. 3
Hydrocorax 323. 326
Hyeiler 1095
Hyldekerke II. 223
Hymber 879
 Hypolais II. 616. 623
Hys - Thomas 69. 5
 I
Iabantan 103. 9
Iabiru 944
Iabiru - guacu 945
Iacacinthli 1119
Iacamaciri 591
Iacamar 589
Iacana 1133 ff.
Iacapa II. 450
Iacapani 411
Iacarini II. 456
Iacauquitotol 496
Jack 42. 118
Jäck 361
Iaco 265
Iacob 69. 5
Iacobin II. 385
Iacobiner II. 363. 365
Iacobinerin 690
Iacobinerortolan II. 405
Iacu II. 38
Jacuab 96. 1
Jaculator 538
Jacupema II. 37
Iacurntu 143
Jacura 50. 7
Iadreka 1041
Iägervogel 327.
Iagdfalk 81
Jäggelosko 45. 6
Iaguacati - guacu 578
Iaguilma 250
Ia - Ia 50. 7
Iaik - Obreule 153
Iakdaw 556
Iakobinertaube II. 150
Iaku II. 38
Ialouisiertauhe II. 197
Iamac 424
Ian van Gent 72. 5
Iännefeliüp 43. 1
Ian Pottagie Eend 67. 33
Ian-

- Ianschupb 43. 1
 Ianrilder 87. 13
 Iapu 417
 Iaques 50. 7
 Iaquins-Ente 779
 Iardinier II. 408
 Iärn-Spurf. 114. 3
 Iars 67. 9
 Jarzabek 103. 9
 Iaseur II. 324
 Iasine 110. 5
 Iaskorzka 117. 3
 Iastrzabgolebiow 42. 30
 Iastrzabwielki 42. 30
 Iaticula 88. 1
 Iay 361
 Iayon 50. 7
 Ibijau II. 815
 Ibis 1004. ff. 1007
 Icawetz II. 484
 Ieterus 401. 408 ff.
 Jean le blanc 44
 Jedwabnicka 108. 1
 Jelloo 42. 38
 Jelwe 86. 6
 Lendaya 238
 Lenwa-Ioniku 117. 2
 Ierebitza 103. 13
 Iernalco 42. 16
 Ierpe 103
 Jerzyk 117. 6
 Igilina 823
 Igylma 823
 Ijarsonkale 69. 5
 Intivoc 52
 Illas II. 259
 Illwärsfogel 110. 1
 Imbenfrats 596
 Imbenwolf 596
 Imber 882
 Imbrifoetus 505. 506
 Imerkoreilak 77. 2
 Immenfrass 595
 Immenwolf 595
 Immer 882
 Immertaucher 882
 Imperiale II. 493
 Incendiaria II. 326
 Indianer 957. II. 150
 Indigo-Ammer II. 426
 Indigo-Vogel II. 427
 Indiyk 99. 1
 Inseparable 299
 Interpres 1057
 Inypilabelap 69. 9
 Io-Bonde 76. 10
 Iocade 107. 1
 Iocasse 107. 1
 Iochen II. 717
 Iochualsuachili 1134
 Io-Fugl 914
 Log-Owl 43. 8
 Ioli 670
 Ion 104. 1
 Iona 104. 1
 Lord-Geed 87. 8
 Lord-Koene 93. 2
 Lord-Svale II. 794
 Iota 7
 Iote 7
 Io-Tyv 914
 Ipatka 816
 Ipecacu 67. 16
 Ipecu 508
 Iprump 983
 Ir II. 536
 Irisch II. 530
 Irsker II. 531
 Isarokitsok 69. 3
 Isingak 76. 10
 Isländer 116
 Isländerente 764
 Ispida 557. 564. ff. 597
 Isserling II. 615
 Junco II. 315
 Jungfer 270. 950
 Jungfernreise II. 760
 Junovogel II. 22

Iupitersfink II. 488
 Iupujuba 416
 Iurar 75. 7
 Iurra 42. 3
 Iurz 117. 6
 Iütvogel 1018. II. 410
 Iuwelenkolibri 680
 Iwolga 52. 7
 Ixlin II. 646
 Lynx 497

(K.)

Ka 50. 6
 Kaa 356
 Kaath 57. 1
 Kaapwachtel 381
 Kaar 50. 2
 Kaarnbicker II. 344
 Kaatmeiffe 116. 8
 Kaburre 152
 Kaczka 67. 40
 Kaenne 50. 2
 Käfer-Endtle 888
 Käferentchen 889
 Kaggi 57. 1
 Kaerrak 69. 5
 Kaerthutok 67. 40
 Kagolka 761
 Kahlfacken 435
 Kahlfuss 143
 Kahlhals 4. 371
 Kahlkopf 6. 371. 944
 Kaja 50. 6
 Kaine 42. 15
 Kajordlek 88. 6
 Kajorrovek 88. 6
 Kaiortok 67. 5
 Kaiserfink II. 563
 Kaiservogel 951
 Kajuhrvogel 872
 Kakakew 50. 2
 Kakatoo 261
 Kakatoeha 262
 Kakatoes 262
 Kakatu 260. ff. 263

Kakelik II. 124
 Kakopit Tsioi 644
 Kakordluk 70. 3
 Kakordlungnak 70. 6
 Kakordluvek 70. 3
 Kakugtanak 70. 3
 Kalanderlerche II. 230
 Kalekut II. 30
 Kalekuter II. 30
 Kalkun II. 31
 Kallakul 76. 2
 Kaloe - Koeroelgoya 42. 13
 Kalotchenfalk 129
 Kalotte II. 155
 Kalv 1110
 Kameelstrauss II. 11
 Kameelvogel II. 11
 Kamichy 943
 Kammadler 18
 Kammelerche II. 224
 Kaminreiber 970
 Kampfhahn 1050
 Kanarek 112. 23
 Kanarienbastard II. 540
 Kanarienvogel II. 502. 511 ff.
 Kanarienzeischen II. 502
 Kanary 112. 23
 Kanepu putnini 112. 28
 Kania 42. 12
 Kaninchen - Eule 160
 Kannakul 42. 12
 Kanutsvogel 1074
 Kanutsstrandvogel 1074
 Kaphtar 104. 1
 Kappenönne II. 151
 Kappentaube II. 151
 Kappentaucher 801
 Kappenmeise II. 753
 Kap - Racke 390
 Kapsperling II. 494
 Karagarky 67. 46
 Karagusib 42. 5
 Karakara 54. 1155
 Karakka 46

- Kardinal II. 358. f. Cardinal
 Kardinälchen II. 444
 Kardinalfink II. 354
 Karechel 348
 Karminente 793
 Karminhänfling II. 525. 529
 Karminpelikan 935. 940
 Karnellen 772
 Karok 348
 Kärrik 59. 1
 Karsaak 76. 3
 Kasarka 728
 Kasarken 730
 Käsemeise II. 760
 Kasuar II. 151
 Kasuaris 96. 2
 Katondieb 559
 Katta 103. 20
 Katreka II. 64
 Katugle 43. 13
 Kat-Ugl-Hane 43. 11
 Katzenfeule 148
 Katzenvogel II. 594
 Kauio 103. 4
 Kaularsch II. 52
 Kautkegef 899
 Kantz 156. ff. 170. 177
 Käutzchen 146. 178
 Käutlein 148. 169. 178
 Kautzeule 165
 Kaw 50. 6
 Kawa 50. 6
 Kawka 50. 6
 Kaye 356
 Kayke 355
 Kedrowka 50. 10
 Keeask. 917
 Kegelschnabel 334
 Kegelschnäbler 334
 Kehwuhla 87. 1
 Keichreiher 956
 Keilhaken 1010. 1017. 1022.
 f. Keulhaken
 Keilschwanz 590. II. 334
 Kekuschka 769
 Keczan-Derkacz 93. 1
 Keltreu 1133
 Kemperken 87. 1
 Kenar 67. 40
 Kevχpaμος II. 408
 Keptuschka 1061
 Kerella 59. 13
 Kereu II. 281
 Kerkugle 43. 8
 Kernektock 50. 2
 Kernel 770 f.
 Kersenriefe 402
 Kepθιοց 620
 Kernbeisser II. 337. ff. 343.
 383. 391. f. 445. 453
 Kernfresser II. 346
 Kertlutockpiarsuk 67. 23
 Kestrel 111
 Keugolok 84. 11
 Keulhaken 1094. f. Keilhaken
 Keylhaken 1094
 Kjäder 103. 11
 Kiankia 41. 5
 Kiärndz-And 67. 31
 Kibgeyer 13
 Kibiz 1053
 Kιχλατ II. 256
 Kidlingaejouk 72. 3
 Kiebith 1053
 Kiebitz 1043. 1059. ff. 1080.
 1135
 Kieder 168
 Kiefiz 1052
 Kield 90. 1
 Kielrabe 337
 Kield 1110
 Kierne-Bider 109. 3
 Kievitz 1053
 Κιγκλος II. 254. 654
 Kibris 76. 2
 Kik 70. 1
 Kikkukaljsa 86. 7
 Kikkuts 86. 6
 Mmm 5
 Kildir

- Kildir 1088
 Killengak 69. 4
 Kindermeiler II. 810
 Kingalik 67. 5
 Kingsfisher 63. 1
 Kink 430
 Kinki-Manou II. 585
 Kioe 914
 Kiöd. Meise II. 756
 Kioegelrifare 109. 1
 Kiolo 1152
 Kioven 914
 Kirchenfalte 110
 Kircheule 164. 170
 Kirchschwalb II. 1790. 798
 Kirkesvale II. 798
 Kirreule 168
 Kirrmeve 928
 Kirschdieb 402
 Kirschdrossel 403
 Kirschfink II. 343. 354. 382
 Kirschhold 402
 Kirschknäpper II. 343
 Kirschleske II. 343
 Kirschschneller II. 343
 Kirschvogel 402
 Kirsebärfugl II. 345
 Kirve 914
Kiskeman 61. 7
Kiskemarasue 67. 7
Kiß. -Kiß. -Keschibj 116. 6
 Kitawiah II. 107
 Kite 42. 12
 Kitt 377
 Kittivake 897
 Kiuufva 76. 10
 Kive 914
 Kiwit 87. 1
 Kiwitz 1070. 1100
 Kiwulis 112. 25
 Klaas 355
 Klaber 545
 Kladra 107. 3
 Klaeshan 67. 28
 Klage 173
 Klagefrau 173
 Klangente 754
 Klapperente 755
 Klapperralle 1145
 Klashan 765
 Klashanik 766
 Klatschtaube II. 163
 Klauber 547
 Klausrapp 387
 Klavert 44. 12
 Kleberblauspecht 545
 Kleiber 545
 Kleinent 772
 Kleinspecht 617
 Kleinziemer II. 261
 Klektunja 67. 96
 Klener 545. 547
 Klepper II. 343
 Klera 107. 3
 Klesk 50. 110
 Klette 641. 662. f. *Falcinellus*
 Kletter II. 488
 Kletterspecht 626
 Klettervogel 617
 Klinger 754
Klinger-Gaas 67. 9
 Klippenhahn II. 739
 Klippenvogel 900
 Klosterfräulein II. 637
 Klosterwenzel II. 661
 Klov-Mand 87. 13
 Klub-Alk 819
Klumbenfus 69. 1
 Kluthuhn II. 52
 Klyde 1106
 Klympe 69. 1
 Knäckente 769
 Knappeule 149. 161
 Knarand 750
 Knarreule 168
 Knarrhuhn 1154. II. 78
 Knecht 1139
 Kneifer 802. 806

- Kniäscok II. 776
 Kniäsziock II. 776
 Knibgas 87. 13
 Knipa 67. 23
 Knipper II. 406. 431
 Knokkel-Skade II. 156
 Knorrhuhn II. 78
 Knötter 110. 3
 Knurre II. 505
 Knutge-Gef 899
 Koato—o—oo 581
 Kobelente 754. 793
 Kobellerche II. 224
 Kobelregerlein 1084. 1112
 Kobeltaucher 883
 Kober 42. 23
 Kobetz 122
 Kockok 57. I
 Kockunt 57. I
 Koekkoek 57. I
 Koenai 50. 2
 Kogo 63. 18
 Kohlamsel II. 302
 Köhler II. 461
 Kohleule 165
 Kohlfalk 85
 Kohlmeise II. 755
 Kohltaube II. 172
 Kobkrost 107. 22
 Kohlvögelchen II. 656
 Kohsa 50. 6
 Kokkas 42. 2
 Konkuš 57. I
 Koko 1012
 Kököbyka 59. I
 Kokosz 101. I
 Kokusch 101. I
 Kolbentaucher 803
 Kolenicui II. 125
 Kolibri 660
 Kolibridiane 690
 Kolibrispecht 645. 650. 663.
 670 ff.
 Kolin II. 125
 Kolkrabe 337
 Kolakraue 337
 Köllje 354
 Kolmnieszik 87. I
 Kolpiza 80. I
 Koltaube II. 142
 Kombara II. 209
 Komishark-papanasew 42. 301
 Kommandeur 413
 Kongmutajon 67. 40
 Könickerl II. 718
 König II. 725
 Königlein II. 720
 Königsammer II. 442
 König der Vögel II. 721
 Königsdrossel II. 297
 Königsente 715
 Königsfischer 565. 567
 Königsgans 711
 Königsheher 444. 447
 Königsparadiesvogel 446
 Königsplattschnabel 559
 Königsvogel 446. 849
 Königsweihe 49
 Koninsken 114. 48
 Konopka 109. 27
 Konoplenka 112. 28
 Kontra II. 242
 Koore-Krey 50. 4
 Kopanauarsuk 110. I
 Kopanungarsuk 110. I
 Köppel 91
 Koppenriegerlein 1084. 1112
 Kopp-Riegerle 1112
 Kopas 50. 2
 Kore 103. 13
 Korkorre 934
 Kormoran 852
 Kornknarren 93. I
 Korn-Luerke 110. 3
 Kornlerche II. 207
 Kornskrika 50. 7
 Kornsperling II. 548
 Kornvogel II. 413

- Kornwerfer II. 548
 Korp 50. 2
 Korschun 52
 Kors-Fugl 109. 1
 Korsnaef 109. 1
 Κορυδαλος II. 210
 Κορυδαος II. 210
 Kos 107. 22
 Kositza 86. 7
 Koß 107. 22
 Kostobryz 50. 10
 Kothhahn 609
 Kothantl 67. 33
 Kothahn 622
 Kothlerche II. 219
 Kothmönch II. 225
 Kottler 545
 Kottwiese II. 766
 Κοττυφος II. 304
 Koza-Baranek 86. 7
 Kou kay-konn 59. 8
 Koulik 314
 Kourier 1014
 Kowabrna 50. 6
 Kowit 76. 2
 Koyolkos II. 126
 Kozodoy 118. 1
 Kraaispecht 59. 1
 Kraako 352
 Kraakspinte 59. 18
 Kraanvogel 84. 4
 Krabbenfresser 977. 982
 Kräe 344
 Krag 50. 2
 Krage 352
 Kragenente 775
 Kragenhuhn II. 101
 Kragenkolibri 686. 690
 Kragenpapagey 243
 Krähe 342. f. 350. 373. 380.
 f. 292. 410.
 Krähendohle 304. 385
 Krähenpelikan 855
 Krähenspecht 502
 Krährabe 344
 Kraecka 67. 33
 Krai 50. 5
 Kralitsch 114. 48
 Krakugle 43. 8
 Krametsfugl II. 254
 Krammetsvogel II. 249. ff. 252
 Kramsfugl 107. 2
 Krammsvogel II. 252
 Krammtvogel II. 252
 Kran 350
 Kranabeter II. 255
 Kranabetsvogel II. 255
 Kranich 952
 Kranich 943. f. 949. 951. f.
 956. f. 979
 Kranig 951
 Kranugli 173
 Kranveitl 348
 Kranwetsvogel II. 255
 Krappenfresser II. 346
 Kraska 51. 1
 Krasnye-Utki 67. 46
 Krauklis 50. 2
 Krauselster 189
 Krausfink II. 560
 Kraushahn II. 51
 Kräutervogel II. 467
 Krauthänfling II. 525. 519
 Krautvögelchen II. 219. 656
 Krautvogl II. 235
 Krebsfresser 946
 Kreiselschnäbler II. 157
 Krekkop 67. 26
 Kremer 1106
 Kreng-Rave 41. 5
 Krepper II. 159
 Kretogtow 58. 1
 Kretzel 42. 37
 Kreuzdohle 359
 Kreuzelster 809
 Kreuzmeise II. 764
 Kreuzschnabel II. 338
 Kreuzvogel II. 339

- Krick 259. 277. 281. ff.
 Krickelster 189
 Kriechelster 391
 Kriechente 770. ff. 774. f. 778 f.
 Kriechentlein 791
 Kriechhuhn II. 53. ff.
 Kriechmeise II. 759
 Kriecke 774
Krieff-Dove 104. 19
 Kriegente 770
 Kriegssammer II. 240
 Kriegsschiff 842
 Kriegsschiffsvogel 841
 Kriegstanager II. 465
 Kria 923
 Krikand 771. 773
 Krikente 772
 Krikke 770
 Krinis II. 341
 Krinitz II. 341
 Kritschäne 1127
 Kritschele 1127
Krizstela 50. 13
 Krogulek 42. 14
Kroka 50. 5
 Krokke 899
Krolik czubaty 114. 48
Krolik nieczubaty 114. 49
Krol Myszy 114. 46
 Kronadler 18
 Kronenadler 18. 25
 Kronenfalk 19
 Kronengeyer 19
 Kronenseidenschwanz II. 333
 Kronentaube II. 169
 Kronenvogel II. 169
 Kronschnepfer 1017
 Kronvogel 488
 Krop-Due II. 160
 Kropfgans s. Pelikan
 Kropfpelikan 845. 1002
 Kropftaube II. 159
 Kropfskirne 923
 Kröpper II. 159
 Krößler 1052. 1139
 Krückelster 189. 198
 Kruckelster 189
 Krückente 772
 Krückentlein 772
 Krugelhahn II. 84
Kruk 50. 2
Kruka 114. 6
 Krukko 757
Kruk-lesney 50. 19
Kruk-modny 72. I
Krukowsky 67. I
 Krullhahn II. 51
 Krumb Schnabel II. 339
 Krummschnabel 187. 1017.
 1106. II. 338
 Krummschnabel - Ente 781.
 1006
 Krünitz II. 338
 Krüper II. 53
 Kruphahn II. 53. f.
 Krüppel 1137
 Krüützschnabel II. 339
 Krye 952
 Krykkie 899
 Krykie 76. 2
 Krypare 65. I
Krzymonos 109. I
 Kübitz 1053
 Küchenschwalbe II. 782
 Kuckuck 315. 464. ff. 517
 Kuckucksamme II. 620
 Kuckucksköster 609
 Kueronden 42. 71
 Kugelelster 391
 Kugelfishaus 305
 Kuh-Auh II. 72
 Kuhfink II. 506
 Kuhnhahn II. 31
 Kuh scheisse II. 732
 Kuhstelze II. 644. f. 732
 Kujavier II. 587
Kuk 57. I
 Kukauza 466 — 57. I
 Kukaw.

- Kukawka 57. 1
 Kükendieff 42. 62
 Kukepluck 175
 Kukert 57. 1
 Kukkuk s. Kuckuck
 Kukkuks-Manden 57. 1
 Kukfuk 72. 5
 Kukulka 57. 1
 Kul 42. 27
 Kulik 86. 7
 Kulkrabe 337
 Kummulis 112. 7
 Kunbar II. 209
 Kunthur 3
 Kuntür 2
 Kupfmöise II. 754
 Kuppmöise II. 754
 Kura 43. 7
 Kurassauer 681. II. 40
 Kurassovogel II. 41
 Kurbukon 105. 4
 Kurg 84. 4
 Kurka 50. 3
 Kurki 951
 Kurlik 76. 9
 Kurlik *czerwonemi nogami* 86.
 11
Kuro Parwa 103. 13
 Kurrata 103. 13
 Kurre II. 89
 Kurruku 452
 Kurzschwanz 27. 36. 381. 647.
 650
 Kusko II. 44
 Kuskovogel II. 41
 Kussékrak 114. 11
 Küstenjäger 1070
 Kutgegeef 899
 Kutberthsente 737
 Kuttengeyer 4
 Kuppe-Rutte 87. 4
 Kuttvogel II. 372
 Kuyameta 65. 38
 Kwakkel 103. 20
 Kwartel 103. 20
 Kwartel Koning 93. 1
 Kwickziela 102. 2
 Kwickzod 107. 2
 Kybitz 1052. 1079. 1087. 1101
 Kyssektaq. 114. 15
 Kytschuguigalli 69. 10
- L.
- Labee 67. 1
 Lack schnabel II. 366
 Lachfalke 102
 Lachgans 716
 Lachkukuk 478
 Lachmöve 907. 911. 913
 Lachtaube II. 194
 Lachweyhe 111
 Lade-Suale 117. 1
 Ladu-Swala 117. 1
 Laeniadudra 87. 13
 Laf-Ubl 88. 1
 Laggel 67. 9
 Laggias 67. 9
 Lagopede 103. 4
 Lagopus II. 83. 89. 92. 94. 95.
 704
 Lagsdigalla 114. 1
 Lagsdiagalla kalpas 114. 6
 Lämmergeyer 20
 Lämmerhierd II. 645
 Lanarius 103
 Landadler 33
 Landörn 32
 Landralle 1149
 Landzeiger 838
 Lanette 102. 104
 Lang 73
 Langbein 1099
 Langevige 876
 Langfuss 1099
 Langhals 650. 761. 864
 Langivie 875
 Langgrainen 44. 28
 Lang-Nech 86. 3

Lang.

- Langschnabel 472. 627. 805.
 II. 675. 691
 Langschwanz 54. 647. 664.
 766. II. 335. 774
Langvine 75. 2
 Lang-Zunge 498
 Lanier 102
 Lanius 182
Lappmeesen 116. 11
Lappskata 44. 25
Lap-tzoy 109. 77
Lapwing 87. 1
Larderiche 116. 3
 Lark II. 211 ff.
Lärka 105. 1
 Lärmente 750
 Larus 839. 895. ff. 927
 Lasur - Vogel II. 559
 Laubfinke II. 485
 Laubhahn II. 89
 Laubvögelchen II. 725. 736
 Lauditz 105
 Läufer II. 725
 Lauferfalk 69
 Laufugl 1106
 Laufvogel 1014
 Lauhol 88. 5
Laukuirbe 103. 9. 13
Laulorääftas 107. 4
Lauriol 52. 1
Laufot 52. 1
Laustaza 117. 1
 Lautedrossel II. 294
 Lavändiere II. 637
Lavit 117. 2
Lax-Tite 86. 11
Lax-Titing 86. 11
 Layette 105. 1
 Layong - Layong II. 788
Leech-Owl 43. 9
 Leewaark II. 208
 Leffler 739
 Legled 84. 4
Lemans-Griis 43. 6
 Leichenäule 178
 Leichenhühnchen 178
 Leichvogel
 Leimschwalbe II. 782. 789
 Leimvogel II. 222
 Leiner 750
 Leinsink II. 525. 528
 Lelok 43. 7
 Lepelgans 746. 757. — 88. 1
 Lepelente 757
 Lepelschnute 746. 757
Lepera d'arzola 87. 1
 Lepler 939
 Lepturus 866
 Lepus 885
Lequilla 112. 16
 Lerche II. 206 ff.
 Lerchenaminer II. 399
 Lerchenart II. 233
 Lerchenfalk 114. 116. 123
 Lerchenfink II. 476
 Lerchengeyer 105
 Lerchenhuhn 1141
 Lerchenhabicht 113
 Lerchenheuschrecke II. 235.
 734
 Lerchenkätzchen 178
 Lerchenschnepte 1016
 Lerchensperber 112
 Lerchenstösser 116
 Lerke 105. 1
 Leske II. 346
 Leucordia 938
 Leucotis II. 495
Levar-Io 76. 10
Leverfina 86. 10
 Likane 72. 1
 Lichtenstein 65. 1
 Liebig II. 350
Lie-Hast 59. 1
Lie-Rype 103. 4
Ljesnoi Worabei II. 557
 Lignarius 505

- Lille - Solver* 76. 1
Lille - trae - Pikke 58. 19
Limosa 1015. ff. 1037. 1041
Linaria II. 375. 439. 525. 529.
 744
Lin - Erle 114. 11
Linota II. 528
Linotte II. 439. 525. 537 ff.
Liom 877
Lita 87. 8
Litorne II. 253
Livane 72. 1
Lo 88. 6
Lochgans 708
Lochtaube II. 146
Loculator 1001
Locust - bird II. 284
Locustelle II. 235. 734
Lodola 105. 1 ff.
Löffelente 745. 749. 757
Löffelgans 846. 938 ff.
Löffelreiher 937
Löffelschnabel 946
Löffler 938 ff.
Lohfink II. 350
Lohong II. 5
Lom 877
Lomben 874
Lom - Imber 75. 5
Lommie 875. 878
Lomvie 75. 1
Lomgivie 875
Lomvifvie 875
Looloo 43. 13
Loom 874. 877
Lootensbaumläufer 651
Lootenvogel 651
Lorch 883
Lori 234 ff.
Lorion 52. 1
Lriot 406 f.
Lorrind 984
Lorry 269
Lory 234. ff. 272
Lory - Noira 269
Louette II. 329
Lounam 889
Lourion 52. 1
Louwa 853
Lowerke II. 212
Loxia II. 337. ff.
Loyca II. 246
Loyelte II. 42. 118
Lucarino 112. 25
Lucre 112. 25
Luderkrähe 501
Luderrabe 6
Luftling II. 747
Luftschiffer 116
Luftvogel 445
Luguarinera 112. 7
Lük 67. 1
Lum 875. 877
Lumb 878
Lumbe 878
Lumenpoinca 110. 1
Lumer 874
Lumipulmönen 110. 1
Lumme 874. 878
Lün 43. 1
Lun 79
Lund 816. — 69. 4
Lunde 815
Lund - Talle 816
Lüning II. 547
Lupo dell' Apì 63. 1
Lürle II. 225
Lurlen 105. 1
Luscinia 642. II. 566. 575. 578.
 581. 605. ff. 647. 679. 687.
 694. 708
Lusciniola II. 619
Lutea II. 432
Luteola II. 519
Lutheux 105. 3
Lutronne 52. 1
Lyros 358
Lyng - Larke 105. 3

- Lyfka 91. 2
 Lyflikker II. 346
 Lyfslicker 1076
 Lyster II. 302
 Maafur 9101
 Maar 910
 Maase - Fot 76. 10
 Maase - Skit 76. 10
 Macao 222. 225
 Macao - Krähe 389
 Macareux 816
 Machallerschnepp 1029
 Mackerell 77. 25
 Mackukava 1154
 Macon 59.
 Macottu 110. 3
 Macreuse 712 ff.
 Macroule 1128
 Macucagua 1155. II. 137
 Madenfresser 332
 Madbarskoy 101. 3
 Maefekke II. 153
 Maehinentaube II. 163.
 Maekergouk 86. 7. — 87. 8.
 Mähnenpapagey 822
 Mäs 76. 3
 Mäse 76. 3
 Mäuseaar 42. 53. 65
 Mäusefalke 56. 64. 69
 Mäusegeyer 65
 Mäusegeyerl 70
 Mäusehabicht 65. 69. 114
 Mäusewächter 65. 69
 Mäuser 65
 Magnanima II. 617
 Magoua II. 136
 Magpie 375
 Maguari 962
 Maja II. 360. 546
 Majan II. 360
 Majenze 116. 3
 Mainate 434
 Maipuri 297
 II. Band II. Tb.
- Maisdieb 438
 Mais II. 351 ff.
 Maitaslisja 42. 93
 Maizi de Miacototl II. 742.
 751
 Manastak 86. 7
 Makauka 77. 2
 Makawuanna 285
 Makolagwa 112. 28
 Makosch 1144.
 Makreuler Enten 713
 Malacchia 50. 5
 Malarofloii - Filin 154
 Mala - Seva 43. 4
 Mala - Zippa 105. 14
 Malkala - Kourla II. 587
 Malkoba 57. 40
 Mallemugge 834
 Mallemucke 834
 Mull - Snaeppe 86. 7
 Maloidjetel 59. I
 Malouffe 109. 2
 Maltheserammer II. 420
 Malthesergeyer 8 f.
 Malvis 107. 3
 Manacus II. 739.
 Manaki II. 707.
 Manakin II. 330. 707. 739.
 744 f.
 Manchot 827
 Mancipium II. 463
 Mandelkrähe 390
 Mandelkran 394
 Mango 673
 Mangone 79. I
 Man of - war - bird 72. 2
 Manseau 104. 19
 Manseni 60
 Mantelhuhn II. 102
 Mantelmeve 906
 Manucodiata 442 ff. 603. 613
 Mapatbecusisch 110. I
 Maracana 229. 267
 Maracaxao II. 493
- N n n
- Mara-

- Maragon* 63. 1
Marail II. 38
Maraye II. 38
Marchand 41. 5
Marcolph 360
Mareca 744
Marenge II. 762
Margiäs 734
Maria - capra 114. 33
Marin. Erle II. 638
Mariposa II. 387. 444
Maritjemaat 324
Marklerke II. 219
Markolphus 301. 368
Markvale II. 783
Markward 361. 368
Marouette 1145
Mar-Skitt 87. 7
Marspitt 90. 1
Martelot 114. 17
Martin 104. 448
Martinet II. 790
Martingans 723
Martin-pecheur 565
Märtig 907
Martlet 117. 3
Märzente 786 f.
Masarino 85. 1
Maschente 786
Maskarin 267
Maskentaube II. 163
Massbu 42. 14
Mashubu 43. 9
Materet II. 773
Matkern 1123
Matkneltzell 1123
Matkuillis 1068
Mattolina II. 214. 217
Mattschinisch 107. 1
Matsnings 107. 1
Matuitui 1085
Maubeche 1077
Mauchler 1002
Mauerfalke 114
Mauerklette 626
Mauerklettervögel 626
Mauerläufer 626
Mauermeise II. 767
Mauernachtigall II. 692. 697
Mauerschwalbe II. 697
Mauerspecht 626
Mausadler 102
Mausard 104. 19
Mauseule 161
Mauskopf II. 662
Mauslittig 255
Mauvette 105. I. 4
Mauvis II. 259
Mayspecht 545
Mayvogel 925. 930
Mayvöglein 930
Mazurek II. 537
Meadow-Clapper 93. 12
Mebé 927
Meddens 103. I
Medmis 103. I
Meelmeise II. 760
Meeradler 31. 57. 59. f. 850
Meeramsel II. 308
Meer-Coot 91. 2
Meerdrehhals 887
Meerelster 1109
Meergans 845
Meerle II. 302
Meerlerche 1076
Meerhaafe 885
Meerhuhn 1037. 1115
Meerheher 391. 395
Meermeben 904
Meerpapagey 822
Meerpygmäe 827
Meerrachen 805. 883
Meerrind 984
Meerschwalbe 597. 917 ff.
Meerschwalm 913
Meerschwarzblättchen II. 577
Meerspatz II. 437
Meerstieglitz II. 402
Meer-

- Meerteufel 1128
 Meerzeisig II. 529
 Meerzeisslein II. 531
 Meerzeisel II. 531
 Mefike II. 153
 Mehlhänsfling II. 524
 Mehlmeise 760. 772
 Mehrabé 350
 Mehlschwalbe II. 789
 Meise 545. 643. II. 461. 469.
 629. 634. f. 646. 728. 744.
 746. 751 f.
 Meisekönig II. 717
 Meisenkönig II. 754. 766
 Meisenköniglein II. 724
 Meisenzeisig II. 740
 Melanaëtos 26
 Melanope II. 731
 Melba II. 493. 803
 Μελεαγρίδαι II. 81
 Meleagris II. 29. 77
 Melker 168
 Mellemspove 1022
 Mellisuga 660. ff. 677. 680.
 687
 Mellistrasds 101. 2
 Melodist II. 270
 Melros 107. 22
 Melziorallo 52. 1
 Menscheneeter 41. 5
 Menschenfresser 6
 Merch 803. 883
 Merel II. 302
 Merganser 802
 Mergus 888
 Mergus 801. ff. 804. 818. 877.
 880
 Meriarfeirfok 76. 10
 Merillus 126
 Merl II. 702
 Merla 107. 22
 Merla acquajuola 106. 5
 Merlaer II. 302
 Merle 216. f. 380. f. 435. 448.
 II. 244. 266. f. 268. 275.
 ff. 301. 312. 426. 449. f. 579
 Merle jaune 52. 1
 — doré 52. 1
 — d'eau 106. 5
 — à collier 107. 23
 — à plastron 107. 23
 — terrier 107. 23
 — blanc 107. 23
 — d'Espagne 107. 23
 — de Savoie 107. 23
 — gris 107. 23
 Merlin 126. 127
 Merops 593. 627
 Merrebülp 84. 21
 Mersangle 116. 3
 Merula 369. 413. II. 245. 284.
 301. 451 f.
 Merzente 786. 790
 Mesange 640. II. 629. 634.
 674. 752 f.
 Mescha Ballofschi 104. 1
 Mesibasobß 67. 9
 Mese 116. 3
 Mesbart 116. 2
 Mesingle 116. 3
 Metss 103. 1
 Metskask 112. 3
 Metskits 86. 7
 Metstuike 104. 1
 Metzcanauhtli 67. 40
 Meuniere II. 773
 Meuschagatka 823
 Meusekönig II. 718
 Meusevogel II. 531
 Meve 832. 895. ff. 921
 Mevenbüttel 913
 Mevendücker 809
 Mevenschnabel 874
 Mevenschnäbler 875
 Meventaube II. 153
 Meventaucher 809
 Meyspecht 548
 Meyvogel 925
 Nnn 2

Mezy

- Mezy* 42. 16
Miacatotol II. 742. 751
Microphoenix II. 326
Mierla 107. 22
Miethhuhn 1142
Mignatur-Eule 153
Milan 49 f.
Milchemo 116. 5
Milchsauger II. 810
Milbeire 116. 5
Millekultartok 42. 7
Miliaria II. 405. 410. 528
Millouin 767
Millwürger 194
Milvio 42. 12
Milvus 48. 71
Mimus II. 271
Minirer-Eule 160
Minister II. 427
Mino 435
Minor 434
Mirlein 127
Mirlu de riu 106. 5
Missel-bird 107. 1
Mississippi-Tanager II. 454
Misteldrossel II. 249. 263
Mistelfink II. 250
Mistelziemer II. 250
Mistfink II. 482
Mistler II. 249. 268
Mitilene II. 438
Mitschagatka 823
Mittek 67. 15
Mittelente 762. 767
Mitteleule 172
Mittelfalk 99
Mittelkrähe 345
Mittellerche II. 226
Mittelspecht 534
Mitu II. 41
Mituporanga II. 40 f.
Mitwaldlein, II. 725
Mocha 43. 1
Mockvogel 414
Moclinelo 43. 4
Moderente 712. 717
Mogilnik 46
Mohntaube II. 149
Mohr II. 557
Mohren 803
Mohrenhuhn II. 55
Mohrenkernbeisser II. 380
Mohrenkopf 421
Mohrenköpfchen II. 671
Mohrenkropftaube II. 162
Mohrenmütze 801
Mohrenvogel 801
Mohrenwachtel II. 134
Mohrenwasserhuhn 1129
Moignet 116. 11
Moine 41. 2
Moineau 485. 494. II. 371.
 379. 427. 485. 509. 535. ff.
 540. 542. 550. ff. 617
Moinet 112. 36
Moinier 116. 11
Mokrok 67. 96
Mokloschia 67. 97
Molliceps 1033
Molopita II. 291
Momot 321
Monacha 742. II. 281
Monacchia 50. 6
Monachetto 68. 5
Monachino II. 352
Monachus 45
Monathstaube II. 143. 147. 149
Mönch 4. II. 661. 669. 702
Mönchente 742
Mönchmeise II. 766
Mönchsgeyer 4
Mönchschwan II. 19
Mönchstaube II. 151
Mond, der halbe II. 233
Mondtaube II. 147
Monedula 355. 385. 361
Monk 41. 2
Mönnik 1059

- Monstre* 116. 11
Montagasse 44. 12
Montain II. 485
Montan II. 485
Montifringilla II. 482
Montifringillae congener II. 476
Mook 487
Morente 796
Moorhahn II. 98
Moorhuhn II. 89
Moormeise II. 770
Moor-titling 114. 17
Moosämmerling II. 435
Mooshahn II. 89
Mooskuh 998
Moosochse 984
Moosreicher 984
Moosriegel 984
Mooschnepfe 1031 f.
Möosweiher 44. 57
Moosweyhe 57. 71
Moqueur II. 271 ff.
Morasthuhn II. 96
Morastlerche II. 218
Mordoré - Ammer II. 446
Moreggag 103. 20
More-Hen 91. 4
Morcelle 91. 2
Morente 717. 748. 796
Morfex 853
Morgenländer 396
Morillon 757. ff. 796
Morinell 1089.
Morinelle 1058
Morio II. 55. 315
Mornell 1081
Mornellecken 1090
Mornellgybitz 1090
Mornellstrandläufer 1057
Morphno congener 43
Morphnos 43
Morskaja - Kafurka 67. 67
Mort - Aender 804
Morie - ferie 75. 6
- Mortetter* 114. 17
Moscardo 42. 31
Mosch 112. 36
Mosch-Duifge 104. 34
Moschita II. 664
Moschusente 740
Mosendtle 748
Mossemmerling II. 436
Moskuh 984
Mossreigel 984
Motacilla II. 605. ff. 640
Motacille II. 605 ff.
Morerelle 114. 15
Moteux II. 652
Motmot II. 64
Mothünlein 1068
Mörrus 103. 1
Moucher 42. 31. — 114. 3
Monette 899. ff. 920
Mountain 103. 1
Moustache II. 774
Moutardier 117. 6
Möventaube II. 153
Möwe 895
Möwchentaube II. 152
Mübeslin 930
Muckendtle 748
Mückenfänger II. 570 ff.
Mückenstecher II. 642. 812
Mückente 748
Mugente 748
Mülane 52
Müllerchen II. 628
Mullet 69. 4
Munaccia 50. 5
Münchlin II. 663
Münchmeise II. 767
Mungul 109. 16
Münsterspyr II. 789
Mur - Endtle 748
Murentlein 772
Mur - Han II. 98
Mur - Meise II. 766
Murre 824
- N n n 3

- Murspecht 626
 Murspyr II. 790
 Musabroder II. 722
 Muscatus 677
 Muschelkönig 805
 Muscicapa II. 564. ff. 617
Muse-Broder 114. 46
 Musette 105. 3
 Muskatringeltaube II. 180
 Muskattaupe II. 180
Musträfst 107. 22
 Musvit II. 756
 Mutu II. 41 f.
Muur-Swale 117. 6
 Mycteria 944
 Myrebute 1033
Myre-Hest 86. 7
Myr eller 87. 13
 Myrelœ 1093
Myre-Skite 1032
Myre-Snipe 1033
 Myrtle 127. 128
Myrpitta 88. 6
Myr-Sneppe 1032
Myr-Snipe 86. 7
 Myrstikkel 1074
Mytschagarka 69. 10
 N.
 Naahmah II. 12
 Nabelkraye 358
 Nachtgael 114. 1
 Nacht - Eule 160. 162. 164.
 169. 172
 Nachtfink II. 504
 Nachtigall II. 270. 354. 585.
 605. 612. 646
 Nachtigallsknecht II. 621
 Nachtkopf 1134
 Nachtpheonie II. 611
 Nachtrabe 387. 965. 980. II.
 809
 Nachtrabl II. 812
 Nachträblin II. 812
 Nachtram 966
 Nachtrapp 162
 Nachtreiher 665. 980
 Nachtsänger II. 620
 Nachtschade II. 810
 Nachtschatten II. 811
 Nachtschläger II. 611
 Nachtschnabel 348
 Nachtschwalbe II. 808 ff.
Nachzugle 43. 7
 Nachtyogel II. 810
 Nadelschwanz 761
 Naektergahl 114. 1
Namitha 96. 1
 Napaul II. 36
 Napol II. 36
Narksarmiutak 112. 1
 Nashornvogel 323. 327
Nasse 75. 7
 Nasutus 313
Natowokey-Omissew 43. 13
 Natravn II. 811
 Natskade II. 811
Nattergal 114. 1
Natterhals 494
Natterwindel 497
Natterzwang 496
Nartskärra 118. 1
Natzkräfva 118. 1
Nat-Ugle 43. 9
Nat-Vake 107. 2
Nat-Vakke 59. 1
Nutimaka 109. 1
 Natwacke 546
Naya 76. 8
Nayainak 76. 8
Nayardluk 76. 6
Nayardlurksoak 76. 6
Nayavek 76. 8
Nayauarfuk 76. 14
Naywieksky 107. 1
 Nazarvogel II. 21
Neahina 96. 1
Nebbi 42. 13
Nebelkrähe 350

- Neemka 734
 Negerfink II. 501
 Negerinerle II. 462
 Negertanager II. 462
 Negobarra 65. 34
 Negral II. 70
 Nekorilik 42. 39
 Neliconurvi II. 385
 Nelle-konge II. 46
 Nelloumirsortuk 87. 8
 Nelloumirsortangoak 87. 8
 Nengeta 186
 Nennamak II. 29
 Nesselfink II. 657
 Nesselkönig II. 717
 Nettelkonning II. 717
 Nenengländer II. 124
 Neunmörder 189
 Neuntödter 103. 184. ff. 194.
 II. 330
 Nenvogel II. 400
 Nbanda-guncu 96. 3
 Nhanduapoa 945
 Nibbio 42. 12
 Nickschneepfe 1025
 Nicobar II. 184
 Nicowitz II. 484
 Night-Hawk 118. 1
 Night-Iarr 118. 1
 Nightingale II. 607
 Nikabitz III. 483
 Nikawitz II. 482
 Nil-Ente 715
 Nilreiher 1006. 1008
 Nimmersatt 845. 1001
 Nisus 116
 Nissertokoon 25
 Nisserwerk 21
 Niverolle II. 508
 Nocay 50. 19
 Nochototol 638
 Nochtototl 637
 Noctua 158. 163. 172
 Nödde-Knekker 109. 3
 Nodde-Krige 50. 10
 Nodde-Skriger 50. 10
 Noddy 919. 10
 Noerskrika 50. 7
 Noira 269
 Noitibo II. 815
 Non 50. 5
 Nonne 809. II. 291
 Nonnendrossel II. 291
 Nonnenentchen 809
 Nonnengans 733
 Nonnenkernbeisser II. 378
 Nonnenuise II. 766
 Nonnentaube II. 151
 Nonnette II. 257
 Nooteckraaker 50. 10
 Nootka 215
 Nordgans 727. 731
 Nordmöve 834
 Nordvogel 914
 Nordwestvogel 1063
 Norks 806
 Norrquint 112. 4
 Norsk-Kalkan 103. 1
 Norsk-Papegoy 109. 3
 Nortonsundfink II. 543
 Nosehita II. 664
 Nosselsinke II. 599. 657
 Not-Kraake 50. 10
 Nottekraka 50. 10
 Notpacka 59. 21
 Norweka 50. 10
 Nucifraga 367
 Numenius 1001. ff. 1018. 1042
 Numida II. 17
 Nussbeisser 360. 367. II. 346
 Nussbicker II. 344
 Nussbrecher 367
 Nussbreischer 360
 Nusshäger II. 344
 Nusshacker 345. 367
 Nusshäher 360
 Nussheher 360. 366
 Nusshehr 368
 Nnn 4
 Nuss-

- Nussknacker 361. 367. II. 748
 Nusskrähe 368
 Nusskresscher 367
 Nusspicker 367
 Nuthatch 546 ff.
 Nutjabber 59. I
 Nutkracker 368
 Nyaliksak 68. 3
 Nyctea 156
 Nycticorax 965. II. 815
 Nyraca 794
- O.
- Occhio bovino 114. 48
 Occhio di Bue II. 661. — 114.
 45
 Ocha 67. 9
 Ochra 1070
 Ochropus 1124
 Ochsenäuglein II. 721
 Ochsen-Euglein II. 723
 Ochsenhacker 331
 Oenus 984
 Ococolin 412. II. 331
 Ocotzinitzean 410
 Ocrophus 1069
 Oedicnemus s. Charadrius
 Oelb 697
 Oelbs 67. I
 Oelong-oelong 48
 Oenanthe II. 652
 Oenas II. 139
 Oepirk 114. I
 Oern 42. 5
 Oerne-Falk 42. 15
 Oert 771
 Oetjälged 59. I
 Offänka 110. 5
 Ogrodniczek 110. 4
 Ohnschwanz II. 17
 Ohnvogel 845
 Ohrenkolibri 679
 Ohrentaucher 886
 Ohrenturteltaube II. 194
- Ohreule 139
 Ohrhahn II. 84
 Ohrkönig 148
 Ohrkutz 150
 Obrmannisch 114. 35
 Ohrtaube II. 194
 Oie 703
 Oivavđη II. 654
 Oiseau-brame 42. 71
 Oiseau-Dunette 107. 4
 Oiseau-mouche 664 ff.
 Oiseau-royal 949
 Okaitfok 72. 3
 Okokolin II. 721. 331
 Okudong 51. I
 Olivendrossel II. 266
 Olivenwasserhuhn 1116
 Olor 701
 Olores 701
 Olyksfogel 44. 25
 Ombrette 947
 Omissew-Athinetou 43. 26
 Ommen 75. 6
 Onderrutaques 99. I
 Ongalo 50. 10
 Onocrotalus 844
 Oostvogel 1084
 Opernkranich 950
 Opik 43. 6
 Opirksoak 43. 6
 Orangen Manakin II. 749
 Orangenspecht 515
 Oreb 50. 2
 Oresto 44. 12
 Orfruye 42. 4
 Organist II. 750
 Orgiale 110. 13
 Orhan II. 85
 Orböne 103. 2
 Orne 103. 2
 Orrar 103. 2
 Orio 52. I
 Oriolo 52. I ff.
 Oriolus 401

Oriot 52. I
 Orites II. 772
 Orix II. 390
 Orkanmöhwen 832
 Or-Kautz 150
 Orkiaer 112. 37
Oropendola 52. I
Oroyendola 52. I
 Orozd 107. I
 Orpheus II. 272
Orpingmiutak 112. 29
 Ortolan II. 197. 400. 408. 428.
 430. 434. 436. 438
 Ortelano II. 410
 Ortolanenpivot II. 649
 Ortulan II. 410
Optywes II. 133
 Ortygometra 1141
 Oru 50. 3
 Oryx II. 390
Oryzivora II. 361. 433
Orzel-mniejszy 42. 2
Orzel-morsky 42. 4
Orzel-zomignat 42. 4
Orzemlik 42. 118
Osprey 42. 4
Ossifragus 30
Ostarde 93. I
Ostralegus 1109
Ostrich 96. I
Ostridge 96. I
Otis II. I
Ottervogel 190. 199
Otterwindel 497
Otus 147 ff.
Ouasse 50. 13
Ouera-kee-aske 50. 13
Ouette 108. 3
Oueriffia 66
Ourooua 41. 5
Ontarde II. 3
Ou-the-quan-nor-ow 59. 9
Ohyarard, Ovasson 41. I
Ouzel II. 244

Ovevaar 84. 7
 Owl 43. I ff.
 P.
Paaum 98. I
 Pabst II. 358
Pabstyogel II. 440
Pacapao II. 328
 Padda II. 361
Päfogel 98. I
Paerffiere folle 112. 37
 Pagati II. 78
 Pageluhn II. 22
Pago 88. I
 Pagodendrossel II. 278
Päbkla ölk 64. I
Pabklatraat 50. 10
 Paik 68. 3
Paikpiarsuk 68. I
 Paille-en-cul 867 ff.
Paipala 103. 20
Paiße 112. 36
Paiße buissonniere 114. 3
Paiße de bois II. 485
Paiße de Saule 112. 37
Paißorelle 112. 36
 Palamedea 942
Pale 80. I
 Palikour II. 297
Palleete 339.—80. I
 Palmendrossel II. 291
 Palmienpapagey 258
 Palmiste II. 291
Paloma 104. I.—19
 Pahumbarius 76
Palombe 104. 19
Palumbus II. 172
Panicivora II. 362
Paolino 112. 25
 Paon II. 22
Paon de mer 1051
Paon d'Inde II. 33
 Papa 4
Papafigo 114. 10
Papagaletto 52. I
 N n 5
 Papa-

- Papagaut 45
 Papagey 221. ff. 391. 392. II.
 347
 Papageyammer II. 439
 Papageyfink II. 486
 Papageykernbeisser II. 341
 Papageytaube II. 176
 Papageytaucher 814
Papagello 45
Papagio 45
 Papaverina II. 578
Papazzino 114. 48
 Pape II. 444
Papechieu 87. 2
Papera 67. 9
 Paperl 308
 Papilionvogel 631
 Pappausek 45
 Pappegaaiduiken 69. 4
Pappuga 45
 Papusfettgans 826
 Papuspenguin 826
 Paradiesammer II. 439
 Paradieseisvogel 589
 Paradiesfink II. 462
 Paradiesheher 560. 588
 Paradies - Iacamar 589
 Paradieskolibri 661
 Paradiesmeise II. 462
 Paradiesmerle II. 462
 Paradiespapagey 249. 288
 Paradiesracker 430
 Paradiessperling II. 360
 Paradiestanager II. 462
 Paradiesvogel 420. 442. ff. 568
 Paradiesvogelkönig 446
 Paradieswiedehopf 613
 Paradisea 442
 Paragua 274
 Parakeet 246
 Pararsuk 68. 1
 Parat 112. 36
 Pardal de San Jura 63. I
 Pardal roynier. 112. 37
 Pardalus 1019
 Pardat 112. 36
 Pardel 1053. 1094
 Pardelvogel 1094
 Pader 1078
Pardwastomka 86. 6
 Pareola II. 740
Parissola 116. 3
 Parisvogel II. 347
 Parkini 301
 Parkit 245
Paronzino 116. 8. II
Parosolino 116. 12
 Parozolino II. 762. 768
 Parra 1131. II. 721
 Parraka II. 65
 Parrot 45
 Partridge II. 112 ff.
 Paruckentaube II. 151
 Parus 634. 671. 723. 751. ff.
 757.
Parussola 116. 3
Parussolin 116. 3
 Parykdue II. 151
 Pasian II. 67
Paskrat 50. 7
Pasokenne 117. I
Passalirorta 118. I
Passarilante 114. I
Passaros del Sol 54
 Passe - busé II. 615
 Passe - vert II. 460
Passe - Sourde 114. 3
 Passer II. 312. 363. ff. 375.
 402. 440. ff. 450. f. 494.
 536. f. 626. 718. 741
Passera salvatica 114. 3
 Passerat 112. 36
Passere - matto 114. 3
Passell vermell 112. 28
Passell dorat 112. 30
 Passerculus II. 538. 558. 617
 Passeres II. 139
 Passerinette II. 623
 Passe-

- Pafferon 112. 36. 37. → 114. 3
 Passetier 42. 118
 Passiere 112. 36
 Pastetentaube II. 143
 Patirich Tirich 63. 3
 Patron des Marechaux 116. 3
 Pau II. 22
 Pauwies II. 40 ff.
 Pauxi II. 44
 Pavedette II. 158
 Pavo 949. II. 21
 Pavon 98. I
 Pavoncella 87. 2
 Pavon de las Indias 98. I
 Pavone 98. I
 Paw II. 22
 Pawlun II. 22
 Pawuone 250
 Paxaco-araneco 65. 2
 Peacock 98. I
 Pechietto 114. 45
 Pecusſisch 42. 21
 St. Peders Fugl 70. I
 Peer-Drikker 69. 5
 Peerdchwälken II. 798
 Pega 50. 13
 Pegafrol 66
 Pebrloe 88. 5
 Peintrude 102. I
 Πελαργος 962
 Pelecanus 843 ff.
 Πελεκανος 848
 Πελεκαινες 940
 Pelican 746. 843. ff. 939. f.
 1002
 Pendolino 116. II. 12
 Pendulin II. 777
 Pendulinmeise II. 778
 Pendulino II. 777
 Pendulinus II. 777
 Penelope 759. 768. II. 36
 Penguin 817. 825. ff. 840 ff.
 Penkerva 112. 3
 Penyellmyn 107. I
 Pennants Avoſette 1107
 Penguin 63. 3
 Pepazka 67. 33
 Pequen 160
 Percepor 59. I
 Perchia chagria 114. 46
 Percusſor II. 163
 Perdez 103. 13
 Perdezornados 963
 Perdice 103. 13
 Περδινες II. 116
 Perdix II. 113 ff.
 Perdrix 1155. II. 106. 113 ff.
 1112. 107
 Perd sa queue II. 773
 Perdykker 69. 5
 Pere-noir II. 504
 Peres 42. 4
 Peringleo 114. II
 Περισεραι 145
 Perkohnkaffe 86. 7
 Perkobnuoffis 86. 7
 Perlberghuhn II. 119
 Perlemage 910
 Perlente 164
 Perlhuhn II. 77
 Perlin II. 78
 Perlrebhuhn II. 119
 Perlreiber 988
 Pernice II. III
 Pernise 110
 Perpelitza 103. 20
 Perroquet 45
 Perroquet de terre 60. I
 Perroquet de France 109. 4
 Persuper 69. 5
 Peruche 232. ff.
 Perükentaube II. 151
 Periquetl 308
 Pestilenzvogel II. 599
 Petel 101. I
 Perer-Ronsmad 114. 45
 Petersmannsmad 114. 46
 St. Petersvögel 832

- Peteschensliegenfänger II. 598
 Petit - rat 114. 46
Petive 43. 1
Petra 112. 37
Petragnola 114. 15
Petrar 112. 37
 Petrel 832
Petronella II. 627
Pettirocco II. 715
Petrutto 114. 45
Petuschok 101. 3
 Pfäffchen II. 350. 625
 Pfaffe 340. 1125. II. 810
 Pfannenstiel II. 770
 Pfannenstielein II. 771
 Pfannentieglitz II. 771
 Pfau II. 21 ff.
 Pfauenfasan II. 27. 41. 77
 Pfauenpfesserfräss 314
 Pfauenreiher 948
 Pfauentaube II. 153
 Pfesserfräss 313
 Pfesserfresser 314
 Pfeffervogel 314. II. 324
 Pfeifammer II. 431
 Pfeifdrossel II. 259. 299
 Pfeif-Endtlein 761
 Pfeifente 759. 795
 Pfeifer 431. 1072
Pfeiffanzl 67. 33
 Pfeiflerche II. 222
 Pfeilschwanz 761. 812
 Pfingstvogel 402
 Pfisterlein 1073
 Pflanzenmäher II. 563
 Pflanzenläger II. 563
 Pfulschnepfe 1031. 1036. 1037
 1040. 1041. 1044
 Phaeopus 1021
 Phaëton 828. 867
 Phalacorax 844. 933
 Phalaris 1127
 Phalarope 1063
 Phalaropus 1049 ff.
- Pharaohuhn II. 79
 Phasan II. 67. 102
 Phasanenpfau II. 27
 Phascades 772
 Phasianellus II. 88
 Phasianus II. 45. 170
 Phau II. 22
Pheasant 101. 3
 Philomachus 1052
 Philomele II. 606
 Phöbusliegenfänger II. 595
Phoeby bird 113. 80
 Phoenicopterus 934
 Phoenicurus II. 692. 700
 Φωκινούρος II. 695
 Phytoptoma II. 563
Piana 63. 1
Pianet 50. 13. — 59. 19
 Piauhau II. 571
 Pibilerke II. 216
 Pic 502. ff. 560. 627
Pica 367. 374. 408. 538. 827.
 1110 f.
Picae 222 ff.
Picata 50. 13
 Picaveret II. 533
Picchio 59. 1. — 65. 1. 2
Pichot 112. 3
 Pickmeise II. 755
Picicitli II. 742. 750
Pico 59. 1. — 65. 2
Picotella 59. 1
Pic - bleu 59. 1
Pic - noir 502
Pic - verd 523
Pictarne 77. 2
Picu - grossu 109. 2
Picuipinima II. 198
Picus 405. 497. 500. ff. 547.
 ff. 592. 627. II. 271
Pidracchia 95. 3
Pie 375. 439
Pie - encrouelle 44. 12
Pie - escrayere 44. 12
Pie-

- Pie-grieche 184 f. 437 f.
Piegzia 114. 6
Pienige 114. 6
Pienkawa 112. 3
Pienken II. 484
Pieu 105. 3
Pieplerche II. 222
Pierrot 112. 36.
Pierschwalbe II. 798
Piette 68. 5
Piga 50. 7
Pigazza 50. 13
Pigeon II. 140 ff.
Figlia-mocbe 114. 17
Pigoccio 59. 1 ff.
Pilard 109. 4
Pillieborra 55. 7
Pillu 1012
Piliorit 52. 1
Pimpelineise II. 760
Pinca 109. 2. 112. 3
Pincard 112. 3
Pinchard 112. 3
Pinçon II. 346. 387. 394. 422.
 475. ff. 506. ff. 560
Pingoïn 817 ff.
Pinkawa 112. 3
Pinosch 112. 4
Pinquin II. 10
Pinsel 919
Pinson f. *Pinçon*
Pint 59. 9
Pintaden 838
Pintado II. 79
Pin-tail 67. 28
Piombino 61. 3
Pione 109. 4
Pior 50. 13
Pipe II. 31
Piphuhn II. 33
Pipiri 201
Pipit II. 702. 707. 709
Pipit-bleu II. 706. 709
Pipit-verd II. 707
Pip-Lerche II. 223
Pipoletta 105. 4
Pipra II. 739. — 59. 19
Pique-boeuf 332
Pirol 401 f.
Pirold 403
Pirouat 105. 3
Pisangdohle 436
Pisangazeldohle 436
Pisangdrostiel 421
Pisangfink II. 539
Pisangpirol 422
Pisangvogel 424
Piscator 114
Pischik 1087
Pispanti 105. 1
Pitangua 204
Pitarotti 114. 45
Pitchou II. 633
Pithyornus II. 425
Pitirozo 114. 25
Pitiu 521
Pitri 42. 16
Pitron 42. 16
Pitschal 65. 2
Pitschard 65. 2
Pitschou II. 633
Pittara 95. 3
Piula 67. 27
Pindi 105. 4
Pive 109. 4
Pivinello 87. 13
Pivoine 109. 4
Pivote II. 649
Pizzardella 86. 6
Planeus 845. 855
Planga 42
Planot 59. 1
Plapperer 435
Platalea 937
Platea 937
Plattenmeise II. 766
Plattschnabel 555. ff. II. 578
Plauderer 266. 435

- Plauderrackenvogel 391
 Plautus 815. 824. 827. 836.
 841. 872. 901. 910. 913
Pliska-pastarica 114. 11
Pliszka 114. 11
 Plongeon 877
 Plotus 864. 1186
Plougeller 87. 13
 Plover 1086
Pluiero 86. 10
 Plümmagenente 791
 Plumente 715. 791
Pluvialis 1038. 1083. 1094
 Pluvier 1088 ff.
Poana 42. 15
Pocbe 80. I
 Poeliceps 870 ff.
Podlesk 10. 3. 9
 Podobe II. 316
 Podoroshink 110. I
Poello-Tilder 86. 6
Poe-Vogel 83. 18
 Pokerl 86. 8
Pokrzywka 114. 46
 Pola 50. 6
 Polarente 815. 820. 878
 Polarhalbente 878
 Polarmeve 913
 Polartaucher 878
Pöldpii 103. 9. 13
 Poligola 116. 3
 Poliopus 1122
 Polmeve 913
Polsk-Edelmand 87. 8
Polsyk 59. I
 Polyglotta II. 272
 Polyglottus II. 270
 Polytinus 660 ff.
 Pomeranzvogel 1090
 Pompadour II. 338
 Pompadurtaube II. 171
Ponnandurty 50. 13
Ponnunki-pitta 50. 13
 Poopoo 581
 Popék 109. 4
Popinjay 45
Porphyrio 1115. ff. 1119
 Port-Jackson-Drossel II. 320
 Porzana 1144 f.
Porzane 91. 4
Porzanone 1118
 Possenreißer 1089 f.
Postoka 42. 16
Postoina 42. 39
 Posttaube II. 158
Potamida 114. 6
 Pouacre 997
Pouchari 44. 12
 Pouillot II. 725. 726. 728
 Poul II. 724
 Poule d'eau 1117
 Poule d'Inde II. 33
Poule de neige 103. 4
 Poule Sultane 1120 ff. 1141
Povodni Koß 106. 5
Poyana 42. 12
 Praka 344
Praëst 69. 4
Praestekratte 1085
Praestekrave 88. I
 Pratincola 1111
Predicatore 110. 3
 Prediger 318
Preneur des Mulots 42. 16
Preneur des Pâsses 42. 118
Presaire 43. 8
 Prib 108. I
 Priestergürtel II. 233
Pribkschke 67. 33
 Prip II. 327
Procellaria 830
 Promerops 608. ff. 612 ff.
 Protonotar II. 668
 Proyer II. 406
 Prunelle II. 615
 Prunellerl II. 617
 Prunell-Grasmücke II. 615
Przedney 42. 5
 Prze-

- Przeplorka 103. 20
 Ψαρ II. 239
 Ψαρος II. 239
 Psittacula 822
 Psittacus 222
 Psophia 1154
 Pstry - Kulyk 87. 13
 Ptak - bitny 87. 1
 Ptakraysky. 109. 3
 Ptarmigan II. 196
 Pterophoeniclus 413
 Ptynx 865
 Pudda campana 95. 3
 Pudda d'aba 91. 4
 Pudda de maria 86. 6
 Pudda de malleja 86. 6
 Puddighina de maria 92. 2
 Pudelschnepfe 1035. 1042
 Puder II. 30
 Puffin 815. 839
 Puffinmöwe 834
 Puffinvogel 839
 Puffinus 830. 839
 Puglietta 91. 4
 Pubacz 43. 1
 Puhi 139
 Puhlschnepfe 1043
 Puhuy 139
 Pubze 43. 7
 Pu - Kornstaja 59. 1
 Pukteralik 76. 8
 Puliga 91. 2
 Pullugak 50. 2
 Pulmu 110. 1
 Pulmuinen 110. 1
 Pulross 1078. 1094
 Pulzoncino 116. 11
 Pulvier 1094
 Pumilio II. 53
 Pümpelmeise II. 761
 Punsch - Eule 162
 Pupin 839
 Pupukis 64. 1
 Pupusa 64. 1
- Pupur 64. 1
 Purpurazeldohle 438
 Purpurdohle 438
 Purpurdrossel 412. 437
 Purpurfink II. 544
 Purpurbärling II. 539
 Purpurhuhn 1119
 Purpurkehle II. 463
 Purpuklette 639
 Purpuklepper II. 391
 Purpuköpfchen 637. 751
 Purpureiher 968. 992. 1010
 Purpurschwalbe II. 795
 Purpurvogel 639. 1120
 Purrhöns II. 51
 Purzeltaube II. 151
 Pustolka 42. 16
 Puszczyk 43. 4
 Puszczik 43. 7
 Putchen II. 31
 Puter II. 30
 Puterhahn II. 30
 Puthe II. 31
 Purpassarat 103. 20
 Putta 50. 13
 Putter 112. 7
 Putwista 43. 7
 Purzone di Sante Martinu 61. 3
 Pye 50. 13
 Pygargus 105
 Pygnacanthus 857
 Pylsteert 762
 Pyrol 403
 Pyrrhocorax 383. 561
 Pyrrhula II. 337. 349
- Q
- Quachilton 1119
 Quackel II. 131
 Quackente 754
 Quäcker II. 482
 Quäckfink II. 482
 Quackreiher 965
 Quaderviz 103. 20
 Quaglia II. 133

Quail 103. 20
Quakel II. 129
Quakkel 103. 20
Qualea II. 130
Quällknarren 118. 1
Quan II. 37
Quan 107. 3
Quapachtototl 478
Quaquila II. 130
Quärn - Kald 106. 5
Quatotomomi 506
Quatoztlı II. 466
Quattr' Ocbi 67. 23
Quauhtzonecolin II. 128
Quecker II. 483
Quecksterz II. 637
Queekstaart II. 638
Quellje 767
Quercerelle 42. 16
Quereiva 332
Querquedula 769. 773. 778. 797
Querula II. 531
Quetele 102. 1
Quethu 829
Quertrantabueflos 42. 4
Quetsch II. 351
Quetschfinke II. 485
Queue de Poitou 116. 11
Quicastiert II. 653
Quidvogel 42. 15
Quiin - Ander 755
Quijubatui 239
Quikketield 86. 11
Quina 105. 4
Quinçon de montagne 112. 4
Quinde 66
Quinson II. 480
Quintli 66
Quion - quion 114. 46
Quirizui 100. 1
Quiscula 438. II. 130
Quisquila II. 130
Quitmaase 910
Quittenhänfling II. 533

R.

Raab 340
Raabe 391
Raaf 50. 2
Raage 349. 356
Rüäst 107. 1
Raatgaas 334
Rab 337
Rabaillet 42. 16
Rabalino 103. 4
Rabe 222. 307. 326. 336. ff.
 344. 351. 391. 396. 1125
Rabenkrähe 340
Räbhuhn II. 113
Räbhun II. 112
Rabiborcado 72. 2
Raboforcado 72. 3
Rachaeme 41. 5
Rachamah 12
Rache 390
Rackelhaner II. 93
Racker 391
Rackervogel 391
Rädbeener 1040
Radgans 734
Ragazza 50. 13
Ragazzvia 44. 12
Räbn 59. 17
Raia Allia 43. 14
Rail 93. 1
Rainfowl 59. 12
Rake 391
Rakettenkolibri 688
Rakettenfliegenvogel 688
Rakkelhanar II. 93
Rale d'eau 93. 2
Rale de genet 93. 1
Rall 928
Ralle 1138 ff.
Rallus 928. 1117. 1136.
 1138 ff.
Ramphastos 313
Ranivan - kondea 55. 7
Ranun 114. 1

Ranz.

- Ranzeule 148
 Ranzugle 43. 8
 Raphöne 103. 13
 Raphus II. 19
 Rapischkin II. 675
 Raporino 59. I
 Rappe 341
 Rappfink II. 372
Rapp-boena 103. 13
 Rara II. 563
 Räsgenkopf 746
 Ratereau 114. 46
 Rätschen 283
 Ratschente 789
 Rathsherr 900
 Ratier 42. 16
 Ratillon 114. 46
 Ratza 67. 40
 Räuber 18
 Raubfalk 99
 Raubkrähe 345
 Raubvögel 1
 Rauch 348
 Rauchfuß 47. II. 93. 148 ff.
 Rauchfußadler 42
 Rauchfußfalke 47
 Rauchfußgeyer 84
 Rauchkopf 576 f.
 Rauchschwalbe II. 781
 Rauchsperling II. 549
 Raudama 67. 31
 Raudewirth 67. 31
 Raudbristlinger 1080
 Raudrosa 58. 18
 Raupentödter 438
 Raven 50. 2
 Raverin 112. 7
 Ravn 50. 2
 Ravn-Kaare 50. 6
 Ray-Gaas 734
 Razor-bill 820
 Reatin 114. 49
 Rearino 114. 45
 Rebétre 114. 46
 II. Band II. Tb.
- Rebhuhn 1046. II. 99. f. 109.
 ff. 113
 Rebluhnschnepfe 1044
 Recuryrostra 1105
Re d'alipinti 1091 2
Re di Siepe 114. 45
Re di Macchia 114. 45
Re di Quaglia 93. 1
 Redpole II. 526. 530
 Redstaate 114. 34
 Redtail 114. 35
 Redwing 107. 3
 Regaliolus II. 724
 Regenbogenspecht 674
 Regenbogenvogel 680
 Regenkatze 403
 Regenkuckuck 473
 Regenpfeiffer 1078. 1083
 Regenschnepte 1037
 Regenvogel 1021
 Regenwölp 1018
 Regenworp 1017. 1021
 Regenwulp 1017. 1021
 Regeyo 52. 148
 Regillus II. 724
Regina aurarum 5
Regn-Spaer 86. 3
 Regulus II. 720. 728
 Rehlein II. 493
 Rehusak II. 100
 Reigalbero 52. 1
 Reigel 972
 Reiger 969. 985
 Reiger-Ente 795
 Reigerfalk 99
 Reihel 970
 Reiher 945. 948. ff. 963. ff.
 969. ff.
 Reinschwalbe II. 794
 Reissaminer II. 433
 Reissdieb II. 433
 Reissfink II. 361. 434
 Reissfresser II. 361
 Reiskernbeisser II. 362

- Reissmäher II. 361
 Reissortolan II. 434
 Reisspirol 414
 Reissvogel II. 361. 434
 Reitenmeiss II. 767
 Rekholter 107. 2
 Remassoff 116. 12
 Remes II. 778
 Remez 116. 12
 Remezatryptak 116. 12
 Remicz 116. 12
 Remisch 116. 12
 Remitsch 116. 12
 Remitz II. 777
 Rendesteens-Snager 114. 11
 Renomist 1050
 Repphuhn II. 113
 Reuter 1056. 1070. 1134
 Reutervogel 444
 Revezal 114. 34
 Rexavium II. 724
 Rex Warwouwarum 4
 Reyger 965
 Reyhengans 734
 Rhaad II. 9
 Rhea II. 17
 Rheinente 810
 Rheinreicher 972
 Rheinschwalbe II. 793
 Rheintaucher 809
 Rheinvogel 1123. II. 793
 Rhinoceros 327
 Rhyndace 615
 Ribiw 76. 2
 Richau 50. 7
 Riche-prieur 112. 3
 Ried-Meisslein II. 768
 Riedschneepfe 1027. 1031. 1042
 Riemenbein 1099
 Riese 673. 975
 Riesengans 706
 Riesenlerche II. 233
 Riesenpelikan 845
 Riesenreiher 975
 Riesenvogel 836
 Riethahn II. 84
 Rietmeise II. 774
 Rietmeiss II. 767
 Rietschnepfe 1027. 1031
 Rieušak 103. 4
 Rigogalo 52. 1
 Rindenkleber 617
 Kinderstaar II. 237
 Rinderstelze II. 732
 Rindmeislein II. 766
 Ringamsel II. 233. 707
 Ringdrossel II. 307
 Ringduif 104. 19
 Ringel-Duc 104. 19
 Ringelfalk 98. 105. 107
 Ringelfink II. 481. 546
 Ringelgans 710. 732
 Ringelkönig II. 719
 Ringelkuckuck 517
 Ringelineve 900
 Ringelrabe 326
 Ringelralle 1146
 Ringelschwanz II. 168
 Ringelspatz II. 537
 Ringelsperling II. 537
 Ringeltaube II. 168. 172. 179 ff.
 Ringente 757
 Ring-Gaas 67. 4
 Ring-Giäs 719
 Ringkragen II. 593
 Ringlerche II. 230
 Ringmerle II. 308
 Ring-Oie 67. 23
 Ring-Ouzel 107. 23
 Ringpapagey 252
 Ring-pigeon 104. 19
 Ring-Sparrow II. 535
 Ringsperling II. 535
 Ringtaube II. 173
 Ringtrost II. 309
 Ringvia 874
 Rinnenschnabel 840
 Ripariola II. 794

Riset II. 523
 Rissa 896
Risfa 76. I
 Rittelgeyer III
 Rittertaube II. 162
 Rittlweyer III. 113
 Riupa II. 96
 Roc 41. I
 Rocheraie II. 146
Röd-Bælle 67. 4
Rödbeen 86. 12
Röd-Hals 114. 45
Röd-Kielke 114. 43
Röd-Finke 114. 45
 Rodler II. 148
Röd-Nakker 768
Röd-tiuxa 44. 25
 Roek 348
Roep-Eand 67. 20
Roerdomp 84. 21
Roedstjert 114. 34
 Roeteln II. 713
 Rohrammer II. 435
 Rohrammering II. 437
 Rohrbüller 948
Rohrdommel 982. 983. 997
Rohrdrossel II. 314. 435
Rohrfalke 57. 59
Rohrgeyer 71. 73. 107
Rohrgrasrincke II. 627
Rohrhahn 1125
Rohrhenne 1125
Rohrhennl 1118
Rohrhühlein 1117
Rohrmeise II. 778
Rohrmeve 922. 927
Rohrmotacille II. 711
Rohrpompe 984
Rohrlänger II. 626
Rohrschliffer II. 627
Rohrschnepfe 1034
Rohrschwalm 922. 927
Rohrspar II. 437
Rohrspatz II. 436. 555. 775

Rohrspatzlin II. 437
Rohrspeling 922. II. 314. 435.
 626
Rohrtrumm 984
Rohrtrummel 984
Rohrwangel 194
Rohrwürger 194
Rohrzeisig II. 746
Roi bedelet 114. 46
Roi bertaud II. 719
Roi bery 114. 46
Roi boati 114. 46
Roi de Cailles 1140
Roi de froidure 114. 46
Roi des Vautours 5
Roitelet II. 717
Roka 50. 4
Roller 391. 392
Rollier 379. 392. ff. II. 122
Romisch 116. 12
Rondine 117. I. ff.
Rondinella 117. I
Rondone II. 784 ff.
Rondola 117. I
Ronekalv 90. I
Ronkje 670
Ronscha 50. 7
Rooche 348
Rook 50. 4
Rooke 348
Roper 43. I
Ror-Drum 85. 12
Rordrumb 985
Ror-Höne 91. 2
Rorreigel 984. 987
Ror-Sneppe 86. 8
Rör-Spurv II. 436
Rortrumm 984
Roselle 107. 3
Rosenkehlchen II. 386
Ros. Gouge 87. 13
Rospedino 116. 3
Rosdrossel II. 308
Rosente 790
 Ooo 2

Roff.

- Rossgeyer 13
 Rossignol II. 607. 693
Rossignol moner 109. 4
Rossignol d'hiver 112. 3
 Rostbürzel II. 425
 Rostflügel II. 224
 Rostweihe 71
Rostz 93. 1
Rotborstje 114. 45
 Rötelein II. 713
 Rötel-Geyer 112
 Rötel-Weyh 51. III
 Rotfüßel 1039
 Rotgansen 735
 Rotgel 114. 45
 Rothauge II. 422. 581. 631
 Rothbacken 520
 Rothbart 779. II. 712
 Rothbauch 316. 518
 Rothbüchlein II. 693
 Rothbein 904. 1038. 1055
 Rothblässchen 1117
 Rothbüster II. 526
 Rothbrust 1025
 Rothbrüstlein 677
 Rothbrüstchen II. 712
 Rothdroschel II. 260
 Rothdroschl II. 261
 Rothdrossel II. 259
 Rothgeyerlein 112
 Röthelgeyerlein 112
 Röthelweihe III
 Rothfalke 126
 Rothfink II. 350. 477
 Rothfuß 1038
 Rothfußgans 730
 Rothfüsler 1039
 Rothgans 733
 Rothhals 669. 741. 760. 767.
 891. 1046
 Rothhalsgans 727
 Rothhälslein
 Rothhänfling II. 519
 Rothhuhn II. 103. 110
 Rothkappe 689
 Rothkehlnchen II. 692. 705. 712
 Rothkehlein II. 705
 Rothkehle II. 1714
 Rothknillis 1114
 Rothnussel 1114
 Rothkopf 767. II. 359. 525.
 529. 684. 744
 Rothkröpfchen II. 712
 Rothkröpplein II. 712
 Rothlerche II. 218
 Röthling II. 692
 Rothschienkel 1039 f.
 Rothschlegel II. 350
 Rothschnabel 247. 911. 366.
 II. 741
 Rothschwanz 264. 680. II. 347.
 388. 466. 692. 698. 700. f.
 704
 Rothschwänzchen II. 692
 Rothschwänzlein II. 388. 577.
 700
 Rothspecht 530. 535
 Rothsperling II. 555
 Rothsterz II. 692
 Rothstiert II. 693
 Rothvogel II. 329. 355. 606
 Rothvögelchen II. 488
 Rotges 733
 Rotjes 733
 Rotkropff II. 713
 Rotte-Finke II. 480
 Rott-Endtle 794
 Rottke 69. 5
 Rötteren 76. 1
 Rott-Hals 794
 Rott-Hun II. 104
 Rott-Kopf 794
 Rottrostel II. 259
 Rottvogel II. 350. 490
 Rottzagel II. 693
 Rotzägel II. 693
 Rouch 348
 Roucherolle II. 314

- Rouck 348
 Rouge-bourse II. 715
 Rouge-gorge II. 705. 713
 Rouge-queue II. 700
 Rough-footed Dove 104. I. 8
 Rouloul II. 170
 Roupie II. 715
Rousette 110. 5
Roussalan 112. I
 Roufferolle II. 314
 Rouflette II. 618
 Rouffignal II. 610
 Rouverdin II. 559
 Rowert II. 482
Rubbens 103. 2
 Rubecula II. 697. 705. 712
 Rubeline II. 715
 Rubetra II. 605. 742
 Rubicilla II. 352. 387. 694
 Rubicola II. 660
Rubienne 114. 45
Rubiette 114. 45
 Rubin 677. II. 528
 Rubinkrone II. 719
Ruch 41. I
Ruché 114. 45
 Ruck 348
 Ruderente 749
 Rufkuhn II. 113
 Ruhrdruimp 985
 Ruhrspaarling II. 314. 436
Ruigpooten 104. I. 8
Ruijsenor 114. I
Rulissar 105. 2
Rund-pigeon 104. I. 8
 Rundschnabel II. 387. 393
 Rupicola II. 739
Ruses innocentes 112. 4
 Rusgenkopf 796
Russignuolo 114. I
 Rusticola 1028
 Ruticilla II. 694. 704
Rutte 86. 6
 Rüttel-Weyh 51. 64
 Ryle 1004
 Rynchops 932
 Rypen II. 95
 Rytfa 897
Rzebolka 117. I
 S.
 Saatkrähe 347
 Saatlerche II. 207
 Saatrabé 348
 Saatvögel 1021
 Säbelschnabel 1006
 Säbelschnäbler 1105
 Sach 20
 Sacre 95
 Sacker 94
 Sackgans 845
Säd-Giek 58. I
 Safran-bacha 45. 7
Sagan 90. I
 Säger 801. 806
 Sägeschnäbler 801. ff. 806. 808
 Sägetaucher 801. ff. 808
 Sagysfer 1004
Saisl 112. 25
 Sakerfalk 94
Sakvia 101. I
 Salaczac 565
 Salangane II. 786
 Salbakke II. 794
 Salicaria II. 627
Sallian 96. 3
 Sälsort 107. 22
 Samarmar II. 284. 319
 Sammetente 712
 Sammethosen II. 58
 Sammethuhn 1142
 Sammethünlein 1143
 Sammetvogel 712
 Sandhuhn 1111. II. 108
 Sandläufer 1068. 1073. 1075
 Sandläuferl 1074
 Sandlo 1085
Sandloe 88. I
Sandmartin 117. 4
 Ooo 3

Sand-

- Sandmuling 1084
 Sandpfeifer 1063. 1073
 Sandreger 997
 Sandregerlein 1084
Sand-Rönne 88. 1. — 117. 4
 Sandschwalbe II. 793
Sand-Sneppe 88. 1
 Sandstrandläufer 1111
Sand-Sulu 117. 4
 Sandtal 923
 Sandtärne 923
 Sandvogel 1084. 1112
 Sandvrister 1085
 Sandwachtel II. 134
 Sangdrossel II. 263. 267
 Sangdruschel II. 263
 Sänger II. 268. 272. 605. ff.
 634. 668. f. 671. 678. f.
 688. f. 710. 726. 728
 Sangkernbeisser II. 382
 Sanglarke 105. 1
 Sanglerche II. 207
 Sangschwalbe II. 805
 Sansonnet II. 239
 Saogouk 58. 1
 Saphirkolibri 684
 Sarbarsuk 87. 3
 Sarcelle 752. ff. 770
 Sare 112. 16
 Sarguarsuk 87. 3
 Saroi-bura 117. 2
 Saron-baeron 117. 2
 Sarpak 75. 1
 Sarfir 106. 1
 Sascharei 50. 13
 Saschuga 50. 13
 Sashabe 298
 Sattelkrähe 351
 Satyra II. 36
 Soulet 112. 37
 Saulocker II. 692
 Savigala II. 287
 Sauer. And 67. 32
 Savannenfliegenfänger II. 567
- Sau-Sarai* 67. 121
 Sav. Orre 75. 8
 Sayacu II. 468 f.
 Scalucher 853
 Scaluer 853
 Scarchir 67. 120
 Scarino 112. 7
 Scarzerin 112. 17
 Scaut 69. 1
 Schabbelschnabel 1106
 Schach 204
 Schäckchen 774
 Schackruthgen II. 625
 Schagguta 50. 13
 Schaeghagha 63. 1
 Schakarnel II. 39
 Schaker II. 254
 Schalach 84. 12
 Schalac 57. 1
 Schalaster 374
 Schallente 746. 757
 Schaluchorn 852
 Scharbe 852
 Scharbege 806
 Scharlachfink II. 541
 Scharlachsperling II. 453
 Scharlachvogel 270
 Scharlatkehlein 556
 Scharlatvogel 270
 Scharlattaube II. 187
 Schartenschnäbler 935
 Schaschaph 57. 1
 Schattenvogel 947
 Schättgen II. 531
 Schaufelente 947
 Scheck 1079
 Scheckente 809
 Scheerenfalk 55
 Scheerengeyer 47
 Scheerke 928
 Scheermesserschnäbler 819
 Scheerschnabel 819
 Scheerschnäbler 820
 Scheerschwänzel 49

Scheer-

Scheerschwanz 183
 Scheidenschnabel 1131
 Scheidenvogel 1131
 Scheissfalke 914
 Schelladler 42. 57
 Schellente 757
 Schellenentenadler 42
 Scheller 387
Scheriau 84. 4
 Scherr. Endtlin. 752
 Schet II. 565
 Schet all II. 565
Schet be 44. 17
 Schet - Vululu II. 565
 Scheuneule 178
 Schiebgen II. 436
 Schieldrake 709
 Schiffsschwanz 436
 Schiffsvogel 840
Schiguris 84. 4
 Schild II. 129
 Schildamsel II. 308
 Schildente 745. 790
 Schildfink II. 478
 Schildhahn II. 89
 Schildkrähe 350
 Schildnachtigall II. 704
 Schildreiher 965
 Schilfdornreich II. 627
 Schilfdrossel. II. 314
 Schilfmeise II. 774
 Schilfsschmätzer II. 436. 626
 Schilfstaar II. 246
 Schillerdrossel II. 282
 Schillermerle II. 459
Schilochwoßku 67. 28
 Schiltkrahe 353
 Schimmel 717
 Schindelkriecher 617
 Schingau II. 116
 Schinkenmeise II. 755
 Schirley II. 466
 Schitscherling II. 531
 Schittreiber 969

Schlachter 102
 Schlacke II. 228
 Schlaghan 883
 Schlagtaube II. 143. 172
 Schlagwachtel II. 129
 Schlangenfresser 18
 Schlangenhabicht 55
 Schlangenhals 865
 Schlangenkopf 864
 Schlangenvogel 864
 Schleier - Aufse 167
 Schleyer - Aufse 165
 Schleyereule 161. 164
 Schleyersperling II. 746
 Schleyertaube II. 150
 Schlächt. Endte 807
 Schluchent 806
 Schlucker 852
 Schklupfkönig II. 716
Schmakowaja - Utka 67. 118
 Schmalente 790
 Schmarotzermeeve 913
 Schinellchen 790
 Schnielvogl II. 235
 Schmerl 125. 126
 Schmerling 127
 Schmervogel II. 215
 Schmetterling 631
 Schmierung 1123
 Schmierlein 126. 128
 Schmil. Ende 790
 Schmirring 1123
 Schmittel II. 725
 Schmünten 780
 Schnarchhuhn II. 92
 Schinarf 1139
 Schnarrdrossel II. 249
 Schnarre II. 249
 Schnarrente 750
 Schnarrgans 803
 Schnarrichen 1139
 Schnarker 1139
 Schnarrkormoran 858
 Schnarrs 1139

- Schnarrwachtel 1139
 Schnärz 1139 II
 Schnarrzieimer II. 251
 Schnatterente 749
 Schnatterer 783
 Schnecke 314
 Schneeammer II. 399
 Schneedohle 355
 Schneedrossel II. 308
 Schneeeule 156
 Schneefink II. 482. 508
 Schneegacke 355
 Schneegans 706. 845
 Schneegeyer 137
 Schneehase 96
 Schneehuhn II. 94. 95. 99
 Schneekönig II. 716
 Schneekrähe 357
 Schneelerche II. 231. 400
 Schneefeschke II. 327
 Schneemeise II. 770
 Schneemeye 931
 Schneemerkur II. 100
 Schneeortolan II. 399
 Schneesperling II. 399
 Schnee - Vogel II. 327. 399. 405
Schneffa 86. 6
 Schneiderbachstelze II. 730
 Schneidervogel II. 730
 Schnepf 1004. 1011. 1107
 Schnepfe 1015. ff. 1026. 1057.
 1070. 1080
 Schnepfchen 1031
 Schnepfenkuckuck 480
 Schnepfenreiher 999
 Schnepfensandläufer 1067
 Schnepff 1027
 Schnuppe 1026
 Schnepphuhn 1026
 Schnerre II. 251
 Schnetz 1139
 Schnibbe 1031
 Schnid II. 351
 Schniegel II. 350
 Schnippentaube II. 163
 Schnirring 922
 Schöbbeje 803
 Schoenobenus II. 618
 Schoeniclus 1076. II. 435
Schoffelaar 80. 1
 Schoia 361
 Schollenhüpfer II. 660
 Scholucher 853
Schondokon. 59. I
 Schonhudrossel II. 274
 Schopfente 796
 Schopfdrossel II. 571
 Schopfheher 364
 Schopflerche II. 225
 Schopfmeise II. 752
 Schopftaube II. 151
 Schorsteinfeger II. 387
 Schäfferle II. 531
 Schößzerlein II. 530
 Schößzlein II. 528
 Schottengans 861
 Schottische Gans 733. 860
 Schreckvogel 806
Scbreech - Owl 43. 8
 Schreyer 42. 1088
 Schreydrossel II. 269
 Schreyfalk 136
 Schreykibiz 1088
 Schreyvogel II. 39
 Schryck 1139
Schrye 86. 3
Schitschura 63. 1
Schitschurka 63. 1
 Schubbe 112. 3
 Schubut 139
 Schubuteule 139
 Schuffel 80. 1
 Schuffler 939
 Schufut 139
 Schuhu 139 f.
Schuifuit 43. 1
 Schuluer 853
 Schulz von Bülaus 405

- Schulz von Milo 403
 Schuna 59. I
 Schuppdrossel II. 571
 Schuppenente II. 778
 Schuppkönig II. 717
 Schups 796
 Schüttelkopf II. 153
 Schwäderlein II. 502
 Schwalbe II. 781
 Schwalbenfalke 51. 116
 Schwalbengeyer 23. 116
 Schwalbenneve 923
 Schwalbenschwanz 49. 54.
 588 ff.
 Schwalbenspecht 509
 Schwalbenstieglitz II. 491
 Schwalm II. 782
 Schwan 694. ff. 705
 Schwanentaucher 845
 Schwangans 696. 703 f.
 Schwanzeisvogel 595
 Schwanzente 764
 Schwanzkiwiz 1088
 Schwanzmeise II. 770
 Schwanzperling II. 440
 Schwanztaube II. 201. 203
 Schwanzwiedhofp 613
 Schwarzbärt 252
 Schwarzbärtchen II. 529
 Schwarzdrossel II. 301
 Schwarzflügel 104
 Schwarzflügler II. 356
 Schwarzkamni 613
 Schwarzkäppchen II. 662
 Schwarzkappe II. 662
 Schwarzkehle 453
 Schwarzkehlchen 631. II. 692.
 709
 Schwarzkelein II. 637
 Schwarzkopf 186. 408. 549.
 796. 921. 1095. II. 382.
 566. 662
 Schwarzköpfchen II. 763
 Schwarzkragen 1089
 Schwarzmeise II. 768
 Schwarzplatte II. 663
 Schwarzrücken 705
 Schwarzschnabel 818. 1057 f.
 Schwarzschwanz II. 651
 Schwarzspecht 501. 509 ff.
 Schwarztaucher 1126
 Schwätzer II. 324. 579
 Schwederle 112. 17
 Schweimer 103
 Schweitzereinsiedler 387
 Schweizereremit 387
 Schweitzerkiebitz 1067
 Schweitzerkrähе 385
 Schweitzerrabe 385
 Schwemmerfalke 103
 Schweymer 102
 Schwienhierd II. 658
 Schwimmer 49. 102. 114. 116
 Schwimmschnepfe 1025
 Schwimmvögel 694
 Schwoinz II. 372
 Schwonez 109. 27
 Schyf - Taling 67. 33
 Scolopax 1015 ff.
 Scops 154. 951
 Scopus 947
 Scrage 77. 2
 Scricciolo 114. 45
 Scythe bill & Heron 84. 21
 Scythrops 322
 Sczygiel 112. 7
 Sea - Crow 78. I
 Sea - Lark 88. I
 Sea - Pheasant 67. 28
 Sea - pie 90. I
 Secretair 17
 Sedge - bird 114. 8
 Seeadler 30
 Seeamsel II. 243
 Seeclester 815
 Seente 712. 794. 796
 Seefalk 59
 Seefasan 855
 Ooo 5

- Seeflunder 882
 Seegler II. 670. 835
 Seehahn 878. 883
 Seehahntaucher 879
 Seeheher 855
 Seekrähe 855. 901
 Seelerche 1058. 1083
 Seemeve 901. 906 f.
 Seemornell 1058
 Seemüve 907
 See-Orre 713
 Seepapagey 283. 815
 Seeparkit 822
 Seepfau 949. 1050
 Seepferd 834
 Seerabe 802. 851. 861
 Seerache 802
 Seerebhuhn 1111
 Seerothkehlchen 876
 Seeschwalbe 599. 905. 913.
 921. 930
 Seeschwalm 913
 Seestaaar II. 283
 Seetaube 824. 871. 875. 1096
 Seetaucher 570. 879
 Seeteufel 883
 Seewasserrabe 853
 Sef-Oend 884
 Segler 670. 835
 Sehmalis 87. I
 Seidenbracher 1007
 Seidenschwanz II. 323 ff.
 Seidenschwanzdrossel 561
 Seidenschweif II. 324
 Seidenstaar II. 247
 Seidenvogel II. 331
 Seidenvögelchen II. 726
 Sekeep 75. 19
 Sekretairvogel 17
 Selenoi-Klest 109. I
 Seleucis II. 284. 319
 Selningur 1072
 Selsort II. 303
 Semala-Kiwiris 87. I
 Semetro 114. 17
 Seimeur 114. 11
 Senator 901. II. 724
 Senegali II. 367. f. 503
 Sengo 382
 Senicle II. 503
 Sep.-Popielaty 41. 12
 Septicolor II. 462
 Serbak 75. I
 Serce 114. 48
 Serin II. 502
 Serinus II. 502
 Serrant II. 515
 Serrator 801. 806. 809
 Serre-fine II. 757
 Serre-montagnarde 107. 2
 Serrurier 116. 3
 Shag 72. 4
 Shagareg 393. 396
 Shanhu II. 274
 Sharzek 106. I
 Shearwater 837. 839
 Sheland 103. 20
 Sheld-appli 109. I
 Sheldrake 67. 4
 She-peconi-memewuok 50. 13
 Sheregrig 395
 Shipomas-pish 43. 12
 Shore bird 117. 4.
 Shoveler 67. 19
 Shraekke 68. I
 Shrite 107. I
 Shul-fall 112. 3
 Shwapulis 109. 4
 Sialis II. 705
 Sichelente 751
 Sichelreiber 1001 ff.
 Sichelschnabel 822. 1003
 Sichelschnepfe 1007
 Sichler 1004
 Sidensvands 108. I
 Sidenswanz 108. I
 Südse-Rönnike 112. 28
 Siele-colore 112. 7

- Siffleur 107. 3
 Sigba 95. 1
 Sigurtok 86. 7
 Sihdeast 108. 1
 Sible 116. 3. 5
 Siisgen II. 517
 Sikora - Zdtugim - ogozem 116.
 - II
 Sikora - czarna - mnieyssa 116. 7
 Sikora - czubata 116. 2
 Sikora - mod'ra 116. 3
 Sikora - popielata 116. 8
 Sikorna 116. 3
 Sikvi 101
 Silberfasan II. 70. 74
 Silberreiher 973
 Silberschnabel II. 450
 Sildemaage 909
 Sildeperris 873
 Sild - Maage 76. 7
 Sillawabrn 50. 7
 Siltane - rääftas 63. 1
 Simmeren 107. 2
 Simmersnarre II. 251.
 Simon II. 681
 Sincialo 247
 Singdrossel II. 259. 263
 Singkernbeisser II. 382
 Singschwan 694
 Singvogel II. 139
 Sino - Tyrlingur 110. 1
 Sinsonte II. 270
 Sioelaerka 110. 1
 Siokakistok 67. 5
 Sirguerite 112. 7
 Sirkfariarsfungosk 87. 3
 Sirli II. 218
 Sirfair 795
 Sisben 112. 25
 Siselle 107. 4
 Siserre II. 352
 Sisgen II. 517
 Sisken 112. 25
 Siska 112. 25
- Siskin II. 517
 Siferönnike 112. 29
 Sitta 544. ff. 548
 Sittich f. Sittig
 Sittich - Lori 231
 Sittig 222
 Sittvogel 222
 Siu II. 521
 Siuitok 43. 3
 Siurut 104. 19
 Sivigio 114. 48
 Sizerin 112. 29
 Skade 376. II. 156
 Skajite 76. 10
 Skallefluger 805
 Skära 50. 13
 Skarfur 72. 4
 Skartsen 853
 Skaru 72. 3
 Skast 31
 Skara 50. 10
 Skate 50. 13
 Skegea - Ritur 897
 Skiarre 378
 Skid - Heyre 84. 12
 Skierro 76. 2
 Skiör 376
 Skiorand 804
 Skiör - Vänge 42. 15
 Skiuorra 50. 13
 Sklav II. 463
 Skoarra 749
 Skodde - Fugl 87. 8
 Skode - Fole 87. 13
 Skoetsch 42. 16
 Skoppia 42. 26
 Skorsteensvale II. 790
 Skovlarke 105. 3
 Skovl - Neb 80. 1
 Skovskade 50. 7
 Skovsnarre 1140
 Skovspurre 112. 37
 Skovspurw II. 555
 Skowronek 105. 1

- Skozetta 105. 2
 Skraap 70. 6
 Skrabe 839
 Skräkan 68. I
 Skräke 307
 Skrake 68. I
 Skred - Hyre 84. 12
 Skrie 72. 3
 Skrug - Kield 1040
 Skrzwan 105. I
 Skua 915
 Skude 104. 19
 Skur 110. 5
 Skure 76. 7
 Skworez 106. I
 Sky lark 105. I
 Slaetfalk 42. 13
 Slaghön 42. 28
 Slangen - Vreeter 42. I
 Slausz 114. I
 Slawick 114. I
 Sliepuschka 59. I
 Slowik - Wiekszy 114. I
 Sma 72. 4
 Smalle - Bot 1063
 Small green hanging - bird 113.
 81
 Smaragdkolibri 684
 Smaragdparkit 246
 Smarnza 114. 45
 Sma - Spue 86. 4
 Smerda - Kaura 64. I
 Smerduch 64. I
 Smerillus 126
 Smew 68. 5
 Smilges 109. 4
 Smirle 103
 Smirlein 127
 Smittl II. 726 f.
 Smortiu 107. 2
 Smyrle 127
 Smyrlin 127
 Snake - Hawk 42. 25
 Sneedse 116. 3
 Sneefugl II. 401
 Sneekok II. 401
 Snee - Rype 103. 4
 Snekke 86. 6
 Sneppert II. 163
 Sneespurre 110. I
 Snee - Titing 110. I
 Snetuppa 108. I
 Sniegula 110. I
 Sniozniczka 110. I
 Snio - Tytling II. 401
 Snio - Tytlingur II. 401
 Snipe 1015
 Snippert II. 164
 Sniza 116. 5
 Snösparf 110. I
 Snov - Bunting 110. I
 Snow - fleck 112. 3
 Snoripa 103. 4
 Snöskata 107. 2
 Snovogel 110. 2
 Snow - Bunting II. 400
 So 103. 4
 Sobmer 909
 Societätsfliegenfänger II. 597
 Soco 388
 Soë - Höne 75. 8
 Soë Horre 75. 8
 Soë - Konge 69. 5
 Soelskin - Stöd 86. II
 Soelskrigger 110. I
 Soel - Skrikia 110. I
 Soë. Orre 67. 5
 Soestierne 813
 Soesvale 926
 Soke 772
 Sokol 42. 13
 Solandgänse 861
 Sol Bakke 117. 4
 Solend 861
 Solitaire II. 311 f.
 Solvet 897
 Sommerdrossel 403. II. 263
 Sommerente 791
 Som.

- Sommerhalbente 772. 774 ff.
 Sommerhäpling 112. 28
 Sommerkönig II. 726
 Sommermerle II. 455
 Sommermotacille II. 729
 Sommerrötele II. 694
 Sommertanager II. 455
 Sommertyrannchen II. 726
 Sommervogel II. 332. 455
 Sommerzaunkönig II. 720
 Sondenvinds - Fugl 70. I
 Songtrush II. 263
 Sonnengeyer 4
 Sonnenreiger 991
 Soolsoort II. 303
 Sopatil 87. 13
 Sordonne II. 633
 Soren - Jacob 69. 5
 Soren - Peder 70. I
 Sorentlein 772
 Soroka 50. 13
 Sortbag 907
 Sorte 67. 6
 Sortkirre 926
 Sort - Spaet 59. I
 Sort - Tärne 77. 2
 Sort - Trost 107. 22
 Sofove 305
 Souchet 746
 Soucie II. 724
 Soudqua 42. 4
 Soui II. 137
 Souimanga 622. 633. ff. 637.
 640. 647 f.
 Soulcie II. 724
 Sourcicle II. 724
 Sova 431. I
 Sovalezna 43. I
 Sova - ursata 43. 4
 Sovi II. 137
 Sovimanga 622
 Sovka 43. 5. 7
 Soyka 50. 7
 Spaarling II. 548
 Spacshoek 42. 31
 Spaczek 106. I
 Spadderi 42. 31
 Spaet 59. I ff.
 Spaet Meyffe 59.
 Spalzfuss 329
 Spansk - kräka 51. I
 Sparling - Fowl 68. I
 Sparrow II. 535
 Sparrow - Hawk 117
 Sparverius 129
 Sparviero 42. 31
 Spassvogel 216
 Spatel - Ente 745. 757
 Spatelgans 939
 Spatule 939
 Spatz 677. II. 494. f. 539. 548.
 775
 Spatzek 106. I
 Spatzéule 178
 Specht 222. 500. 591
 Spechtkrähe 502
 Spechtmeise 544
 Spechtpirol 408
 Speckente 760
 Speckmeise II. 755. 760
 Speicherdieb II. 548
 Speralster 189
 Sperber 54. 111. 116. 126
 Sperberfalk 55. 116
 Sperberschwalbe 54
 Sperhereule 174
 Sperck II. 548
 Sperg II. 550
 Sperga 75. 7
 Sperling 556. II. 313. 348. 358.
 360. 363. 379. 383. 422.
 427. f. 440. 442. 451. 458.
 460. 504. ff. 510. 535. ff.
 542. 545. 547. 560. 562.
 615. 617. 741. 746. 774
 Sperlingsartige Vögel II. 139
 Sperlingsammer II. 416
 Sperlingshabicht 111
 Sper-

- Sperlingspapagey 289
 Sperlingsspecht 510
 Sperlingstaube II. 197
 Spernuzzola 116. 2
 Sperrmeise II. 764
Sperviera 44. 12
 Sperwer 116
 Spettmeyse 546
 Speyer II. 799
 Speyerl II. 789
 Spheniscus 825
 Spiegelente 771. 786. 790
 Spiegelmeise II. 772
 Spiegelvögelchen II. 702
 Spielhahn II. 83
 Spiesente 762. 764
 Spiesgans 880
Spikke 114. 18
 Spiesslerche II. 219 f.
 Spillhahn II. 84
Spillkräka 59. I
 Spinioletta II. 220
 Spinus II. 407. 515
 Spipola II. 214. 715
 Spiquette II. 219
 Spirer 922
 Spirkenschwalbe II. 789
 Spirsenschwalbe II. 797
 Spitzgeyer 104. 107
 Spitzkopf II. 736
 Spitzlerke II. 631
 Spitzschwanz 762. 764. 766.
 II. 88
Sπιγίας 42. 31
Splinza 42. 16
 Spoe 1019
 Sponsa 791
 Spoon - bill 80. I
 Spoon - bill - Duck 67. 26
 Sporengans 705
 Spornfink II. 475
 Spornflügel 1131
 Spornhenne II. 59
 Spornvogel II. 27
 Spottdrossel II. 270. f. 272
 Spötter 102. 913. II. 271
Spotte. Io 76. 10
 Spottvogel 216. II. 272. 620.
 625
 Spov 1019
 Spreedrossel II. 312
 Sprehe II. 206
 Spren II. 237
 Sprenzchen 116. 127
Spreuve 106. I
 Sprinz 96. 116
 Sprinzel 119
 Sprossenhuhn II. 94
 Sprosser II. 611
 Sprossvogel II. 611
Spue 86. 3
 Spurre II. 549 — 77. 2
 Spurrehonge II. 726
 Spürschwalbe II. 797. f. Spyr-
 schwalbe
 Spurv II. 549
 Spyrschwalbe II. 789. 791. 796
 Squaiotta 981
 Squakko - Reiher 979
Squaptield 86. 11
 Srakoper 44. 12
Staal - Sneppe 87. I
 Staar 406. 409. 412. 425. 431.
 435. 437. II. 236 ff.
 Stachelschnabel 1106
 Stachelschwalbe II. 782 ff.
 Stachelschwanz 752. II. 801
 Stadtrothschwänzlein II. 692
 Stadtschwalbe II. 782
Stalzo 103. I
Stanchel 42. 16
Stannel 42. 16
 Stär II. 238
Starda 95. I
 Stare II. 233. 236 ff.
 Starik 821
 Starl II. 239
 Starna II. 116. — 103. 12
 Statt

- Stauden-Ragerl 998
 Stecklick II. 488
 Stechlitz II. 488
 Steenbicker II. 656
 Steendolp II. 653
 Steendulp II. 653
 Steengall III.
Steengylp 114. 15
 Steenpikker II. 638
Steen-Sneppe 86. 7
 Steensquette II. 653
 Steensvale II. 798
Steen-Swalm 117. 6
Steenugle 43.
Steglik 112. 7
Stehrfs 110. 5
 Steinadler 27. 33. 42. 62. 65
 Steinamsel 218. f. II. 313. 320
 Steinauffe 170. 178
 Steinbeisser II. 342. 354. 654
 Steindepill II. 653
 Steindohle 385
 Steindreher 1057. 1097
 Steindrossel 218. II. 310. 313
 Steinemerling II. 431
 Steineule 169. 172
 Steinfalk 108. 109
 Steinfletsche II. 627. 656
 Steingässel 1068
 Steingeyer 23. 43. 49. 107
 Steinhäfling II. 525. 532
 Steinheher 367
 Steinhetz 384
 Steinhuhn II. 96. 98. 110
 Steinhuhntaube II. 166
 Steinkautz 170
 Steinkletsche II. 652
 Steinkrähe 385
 Steinmerle 217
 Steinparde 1097
 Steinpatsche II. 656
 Steinpicker 1076. II. 660
 Steinquäcker II. 653
 Steinrabe 337
 Steinrappen 385
 Steinröthel 217. 219
 Steinröte II. 313
 Steinschmack 111
 Steinschmacker II. 654
 Steinschmätzer III. II. 649 ff.
 706
 Steinschnappérl II. 654
 Steinschnepfe 1025
 Steinschößlein II. 519
 Steinschwacker II. 652
 Steinschwalbe II. 797. 804
 Steinschwatzer II. 654
 Steintaube II. 198
 Steintohle 385
 Steintule 385
 Steinvogel II. 44
 Steinwälzer 1097. 1057
 Steinzeisig II. 739
 Steissfuß 669. 883 ff.
 Stelkr 1056
 Stellers Ente 745
 Stellers Krähe 365
 Stelzenläufer 934. 1099
Stenkneck 109. 1
Stepowron 84. 9
 Steppenfalke 103
 Steppenralle 1112
 Steppenhuhn II. 7. 108
 Steppenlerche II. 221
 Sterbevogel II. 324
 Sterch 959
 Sterchy 84. 7
 Stercoraire 914
 Stercorarius 896
Sterling 106. 1
 Stern 917
 Sternadler 315
Sternardt 110. 5
 Sternente 811 ff.
 Sterzente 789
 Sticherling II. 641. ff. 660.
 677. 732

- Stickup 1041
 Stieglitz II. 486. ff. 495. 498
 Stiftsfraulein II. 637
 Stiglitz II. 487
 Stilk 86. 111
 Stillitz II. 489
 Stinkhahn 609
 Stinkvogel 435.
 St. Johnsfalk 94
 Stockadler 27
 Stockente 746
 Stockerfalk 94
 Stockeule 154. 168. 178
 Stockfalk 76. 95. 116
 Stockhänfling II. 525. 531
 Stocktaube II. 146
 Stokziemer II. 308
 Stolucherez 853
 Stone-chatter 114. 17
 Stonegall 42. 16
 Stonesmich 114. 17
 Stopparola II. 220. 600. 627
 Stöpling II. 220
 Stoppelvogel II. 220
 Storch 945. 957. f. 1007
 Störenete 789
 Storfuglen 875
 Stork 84. 4
 Stormfinch 70. 1
 Storm-Fugl 70. 3
 Storm-Stär 106. 5
 Stormwaders-Fugl 70. 1
 Stornell 106. 1
 Storno II. 239
 Stoerschek 114. 46
 Storzello 103. 2
 Stossadler 18.
 Stösser 49. 116
 Stosfalk 123
 Stossgeyer 49
 Stossmeve 915
 Stossvogel 49
 Straber 803
 Stragazzina 44. 12
 Strakavel 50. 13
 Strandbachstelze II. 674
 Strandbekassin 1070
 Strand-Elg 88. 1
 Strandelster 1110
 Strandhäster 1110
 Strandheister 1110
 Strandhühnlein 1070
 Strandjäger 913
 Strand-Kield 86. 11
 Strandläufer 1049. 1059. ff.
 1075. 1114. 1155
 Strandläuferlein 1073
 Strandmotacille II. 674
 Strandpfeifer 1083
 Strand-Pipaare 88. 1
 Strand-Piper 88. 1
 Strand-Ravn 720
 Strandreuter 1099
 Strand-Rixe 93. 2
 Strand-Schnepfe 1039
 Strand-Schwalbe II. 793
 Strandskade 1110
 Strand-Skur 90. 1
 Strand-Snarre 93. 2
 Strand-Sneppe 87. 13
 Strand-Svale 117. 4
 Strand-Swala 117. 4
 Strandvogel 1057. 1078
 Straßburger Taucher 809
 Straußhahn II. 51. 56
 Strauchgrasmücke II. 616
 Straule 76. 3
 Strauss II. 10
 Strausbastard II. 17
 Straussente 754. 795
 Straussfink II. 327
 Strausskasuar II. 17. 19
 Straussmeise II. 753
 Straussrabe II. 122
 Straussstancher 803. 883
 Straussvogel II. 12. 14
 Strea 43. 8
 Streithuhn 1050

Streit-

- Streitschnepfe 1052
 Streitvogel 1050
 Strepet II. 6
Stresch 114. 46
 Streuslein II. 721
 Strichdrossel II. 268
 Strichtaube II. 146. 200
 Strietvagel II. 400
 Strilozzo II. 407
 Strix 138
Syrnud 110. 5
 Strobeltaube II. 152
Stroka 50. 13
Strokos 44. 12
 Strömstaar II. 244
 Strontjäger 914
Στρουθος II. 15
 Strumpfwirker II. 405
Strunkvit 70. 1
 Struntjäger 913
 Strupptaube II. 152
 Strupphuhn II. 51
 Struthio II. 10
 Struthiocamelus II. 12
Strutza 96. 1
Struntjager 76. 10
 Struisshahn 1050
Strzyzyk 114. 46
 Student 72. 3
Sturino 106. 1
 Sturmfink 834
 Sturmineve 834
 Sturmseegler 1063
 Sturmschwalbe 831
 Sturmtaucher 831
 Sturmverkündiger 834. 839
 Sturmvogel 830
Sturnus 407. 431. 435. 437.
 II. 236 ff.
 Stuttnefia 876
 Subbuteo 123
 Sucet II. 724
 Südmeerschwalbe 926
 Südfeerabe 340
- Suedes-aerla* 114. 11
Suenmoodra Cavy 78. 1
 Suet II. 724
 Sufflator 101
Suglim 101. 3
Suguntu 41. 5
Sula 844. 861
Sula 72. 5
 Sulcie 112. 30
 Sultan 1119
 Sultanshuhn 1119
 Summvögelein 677
 Sumpfbussard 71
 Sumpfeule 181
 Sumpffalk 103
 Sumpfhacht 108
 Sumpflerche II. 218
 Sumpfmeise II. 766. 778
 Sumpfschnepfe 1029
 Sumpfschnærze 1153
 Sumpfvögel 934
 Sumpfweihe 64
Sunksur 67
Surglum 101. 3
Suri II. 17
Surisprakul 43. 7
 Suscitator II. 126
Suffu 117. 3
Svaerta 67. 6
Svale II. 783
Svale 117. 1 ff.
Svan 696.—67. 1
Svane 67. 1
Svart-And 67. 6
 Svarbag 874
 Svartbach 906
 Svartbakur 874
Svart-Orre 67. 6
Svartrrut 76. 6
 Svenske II. 713
Swala 117. 1 ff.
 Swallow II. 783 ff.
Swänsk-papoja 109. 3
Swehtelis 84. 7

- Swehtspitus* 84. 7
Swenf ka 109. 27
Swilpüris 112. 36
Swimmern 102
Swinepipe 107. 3
Swirbulis 112. 36
Swirpis 109. 2
Swunsch II. 372
Sylvia 556. 632. 635. 646. ff.
 II. 313. 481. 599. 605. ff.
 628. 697. ff. 705. 713. 732
Sziast 84. 8
Szpak 106. I
 T.
Taade - Hest 87. 13
Tabaduru 53. 2
Tacab - Mise 85. I
Tacco 472
Tachmas 114. I
Tadorna 709 ff.
Tafelente 767
Tageule 156
Tagerl 357
 Tag- und Nacht-Drossel II.
 242
Tagphilomele II. 606
Tagschläfer II. 808
Tagschläger II. 606
Tahe 355
Tailleur 72. 3. II. 730
Talbit II. 347
Talg - Oxe II. 756
Tal - trast 107. 3
Tamatia 458. 946
Tanager II. 449 ff.
Tanagra II. 449 ff.
Tanaombé II. 289
Tanas 114
Tangara II. 456. ff. 745
Tan - Meislin II. 723
Tannenbaumhacker 640
Tannenbaumläufer 640
Tannenelster 367
Tannensink II. 482
 Tannenheher 366
Tannenkriecher 640
Tannenmäuslein II. 723
Tannenmeise II. 763
Tannenpagagai II. 339
Tannenvogel II. 339
Tannhäger II. 344
Tann - Meisse II. 365
Tantalus 1001 ff.
Tapera II. 801
Tawg II. 25
Taparana 61. 26
Tape - bois 59. I
Tapon 109. 4
Taraba 292
Tarabuso 84. 21
Tarangalo 86. 4
Tarier II. 656
Tarin II. 502. 517
Tarna 77. 2
Tarne 923
Tarrain II. 522
Tarrok 898
Tartarlerche II. 221
Taschenmaul 746
Taschbitza 114. 45
Taschbitza 114. 45
Tatao II. 462
Tattarak 67. I ff.
Tattula 50. 6
Taube 823. 838. 871. II. 139
Taubendrossel II. 317
Taubenfalke 49. 76. 120
Taubengeyer 76
Taubenhabicht 76. 121
Taubensperber 120
Taubenstösser 116
Tauchente 795. 801. 809
Tauchentchen 889
Taucher 801. 819. 870. 876.
 ff. 1095
Taucherchen 889
Täucherlein 894
Tauchermeye 909

Tau-

- Tauchergans 802
 Taucherhuhn 870
 Taucherhühner 870 ff.
 Taucherkiebitz 802
 Taucherniöve 874
 Tauchersäge 803
 Tauchertaube 871
 Tauchgans 802
 Taumelgabe II. 155
 Taumler II. 155
 Tauza 98. 1
 Tavoua 291
 Taya 78. 1
 Tchachert 211
 Tchachert-Be 211
 Tche - cou 103. 36
 Tchi - perdrix 110. 3
 Tchirnabo 116. 3
 Tchouet 112. 37
 Teal 772
 Tectec II. 586
 Tecurmasib 112. 1
 Tedder 103. 2
 Teer II. 85
 Teherik II. 680
 Tebil 42. 71
 Teift 812
 Teista 872
 Teitei II. 457
 Teitei 110. 3
 Ten 923
 Tendelöh 923
 Ten - ru - julon 585
 Tepetotol II. 43
 Tepynms 42. 4
 Tequixquiacatzanatl 53. 7
 Terek 1023
 Terin 112. 25
 Tern 929 ff.
 Ternatanheher 588
 Ternier 65. 2
 Terinne II. 333
 Tertesoak 42. 9
 Terzuolo 42. 31
- Tessacourbé II. 589
 Testa - nera 116. 3
 Testo - russo 114. 18
 Tetaru 104. 32
 Tetema II. 296
 Tetrao II. 83. ff. 91. 131
 Tetras 102. 3
 Tetrax II. 6. 230
 Terrez 103. 1
 Tetrix II. 88. 429
 Terra - vache 118. 1
 Tette - chevre II. 810
 Tettera mabte 103. 2
 Tetteris 103. 2
 Teublin II. 196
 Teucher 807
 Teufelsbolzen II. 772
 Textor 421
 Thage 859
 Thale 355
 Thalk 355
 Tbär - ed - Sjammel 96. 1
 Tharier II. 661
 Tharu 26
 Thaumantias 680
 Thauschnarre 1117. 1142
 Thecau 290
 Theghel 1133
 Thenca II. 273
 Therete II. 420
 Therna 923
 Thi - kbi 101. 3
 Thili II. 274
 Tbissonis 101. 3
 Tistlefinch 112. 4
 St. Thomastaucher 890
 Thomas im Zaune II. 717
 Thomas Gierdet 114. 45
 Thornkrafer 189
 Thornkrätzer 189
 Thoroſe caſew 43. 4
 Thouyou II. 17
 Thouyouyou 96. 3
 Threguet 1133

- Thufu - Tytlinger II. 235
 Thula 980
 Thumherr II. 350
 Thumpfasse II. 349
 Thurmeule 165
 Thurnfalk 110
 Thurmschwalbe II. 797
 Thurmwiedehopf 387
 Thütvogel 1094
 Thyon II. 661
 Tinadur 90. 1
 Tiälderen 1110
 Tia - Tia 107. 2
 Tic - Tic 556
 Tjeklik II. 116
 Tield 90. 1
 Tigermieve 931
 Tigersperling II. 365
 Tije II. 741
 Tije guacu Paroara II. 358
 Tijepiranga II. 451
 Tigris 112. 7
 Tilger 805
 Tilibrücke 42. 16
 Tilbriu 42. 16
 Tilly II. 275
 Timphahn 1129
 Tinanius II. 135
 Tingmarlurksoak 42. 39
 Tinunculus 110
 Tintarello 42. 16
 Tintilaum 116. 3
 Tinus 813
 Tioquet 112. 4
 Tiphia II. 647
 Tirica 305
 Tirin 112. 25
 Titiri 201
 Titit 114. 3
 Titlark 105. 2
 Titmouse II. 767 ff.
 Tittinculo 42. 16
 Titys II. 696
 Tjuva 76. 10
 Tiur II. 85
 Tlalacotl 67. 9
 Tlapolcoatl 104. 35
 Tlauhquechul 941
 Tlauhquechultototl 580
 Tlotli 42. 13
 Tobaque 112. 70
 Toccadorza 59. 17
 Tock 46. 4
 Toco 320
 Toero II. 135
 Tocototl 147
 Tödder II. 84
 Todier 556
 Todteneule 165. 178
 Todtenvogel 165. 178. 627.
 II. 531. 599. 655
 Todtenvögelein II. 656
 Todus 555 ff.
 Toekan 59. 40
 Tofs - Myssa 116. 2
 Toborkey 61. 1
 Toile 59. 1
 Tok 328
 Tolchiquatli 176
 Tole 355
 Tolfan y mynydd 112. 37
 Tolocatzanatl II. 246
 Toli Tolo 114. 49
 Tölpel II. 19
 Tolu 493
 Tomineios 66
 Tomlinge 116. 8
 Tomme - Liden 114. 46
 Tommi - Liden 114. 45
 Tonekurg 84. 7
 Topaskolibri 662
 Topasrubin 681
 Topau 327
 Topfkarfr 857
 Toplarke 105. 6
 Topmeise II. 754
 Töppellerch II. 225
 Töppelmeesken II. 754

- Tepp - Oend 68. 5
 Toppertje 67. 45
 Top - Skero 75. 7
 Tor 104. 32
 Torche - pot 548 ff.
 Torciollo 58. I
 Torcol 497
 Torcol noir 107. 22
 Torcollo 58. I
 Tord 69. I
 Tord - Alk 819
 Tordella 107. I
 Tordello II. 265
 Tordino 110. 4
 Tordmule 69. I
Tordo 57. 27. — II. 252 ff.
 Tordo mezzano 107. 2. 4
 Tordo Saffello 107. 3
 Tordo viscido 107. I
Torn - Irrisk 112. 28
 Tornoviarfuk 776
 Tornskade 199
Torquato 86. 3
 Torquilla 496
 Tort - alaroity 107. 3
 Tortel - Duif 104. 32
 Tortola 104. 32
 Tortora 104. 32
 Tortorella 104. 32
 Tosse - Fugl 72. 5
 Totanus 1039
 Tottler 545
 Tottovilla 105. 3
 Toucnam - Courvi II. 384
 Toudre 107. 4
 Toukan 493
 Toulu 493
 Touraco 488
 Tourd 107. 4
 Tourdelle II. 253
 Tournel 106. I
 Tourne - matte 114. 15
 Tourre - buisson 114. 46
 Tourterelle II. 172. ff. 178
- Toute - vive 114. 49
 Touyou II. 17
 Tovi 304
 Tracas 114. 17
 Trachelia 1112
 Trae - Kloppe 59. I
 Trae - Pikke 59. I. — 65. I
 Trage 107. I
 Tragopan 327
 Traine 107. I
 Traine - buisson 114. 3
 Traine - charrue 114. 15
 Trakawke 104. 32
 Trana 84. 4
 Trane 64. 4
 Trappe II. I
 Trappenzwerg II. 6
 Trappgans II. 2
 Traquet II. 575. 656. 659. f.
 671. 691. 735. 706. 711
 Trauerammer II. 423
 Trauerente 714
 Trauereule 172
 Trauerpirol 426
 Trauervogel 322. II. 424
 Traupis II. 519
 Treiche 107. I
 Trembleur 43. 7
 Trenka II. 273
 Trespodres 103. 20
 Trichas 255. 268
 Trick 1097
 Tričtrac 107. I
 Tride - Prele 110. 3
 Trie 107. I
 Triel 1098
 Trieltrappe II. 6
 Trillkräka 59. I
 Tringa 1049. ff. II. 245
 Tris 107. 3
 Trochilus 660. II. 724. 725
 Troeförer 67. 30
 Troglodyt II. 717

- Troglodytae adfinis 638. 639.
646. 671. 675
Troglodytes 670. II. 605. ff.
717
Tregon 452 ff.
Troill 874
Treiltanucher 874
Trolldrucke 86. 7
Trombotto 84. 21
Trommeltaube II. 148
Trompetter 155
Trömpetero 1155
Trompetervogel 325. 1154
Tronfo 104. I. 8
Trop 95. I
Tropikente 867
Tropiker 866
Tropikmeve 868
Tropikvogel 828. 866 ff.
Trösel 772
Trost 107. 22
Trostel II. 262
Trostle 107. 4
Trotte-chemin 114. 15
Troie 107. I
Troupial 401. 560. II. 242
Truble 80. I
Truen 76. 10
Trulls 88. I
Trummeltaube II. 148
Truns II. 488
Truo 848
Trupial 401. 408. f. Troupial
Trush II. 266 ff.
Truthahn II. 29. ff. 36 ff.
Trzefiogonek-biaty 114. II
Trznadel 110. 5
Trzonek 76. 2
Trzantek mniejszy 76. 3
Tschagrawi 918
Tschagu 67. 67
Tschagwai 67. 67
Tsanahoei 380
Tschakwoi Assjah 728
Tschätschke II. 530
Tschauka 50. 6
Tschekantschik II. 661. 731
Tschelaata 69. 10
Tscheravi-Drost 107. 22
Tscherna 59. I
Tschetschatka 112. 29
Tschetschewinza II. 359
Tschetzschke II. 530
Tschezke II. 529
Tschiavitle 170
Tschiavitl 180
Tschibischk 112. 25
Tschokerl 357
Tschoket 86. 10
Tschötscherl II. 531
Tschudesch 58. I
Tschuk 43. 22
Tschuri 956
Tschurkste 117. 6
Tschütscherlein II. 530
Tucan 317. f. Toucan
Tuch-Endte 807
Tuchiim 98. I
Tucnam-Courvi II. 384
Tuddokanna 103. 4
Tudlik 75. 5
Tuglok 75. 3
Tühane 114. 48
Tui 305
Tui-Apuejuba 45. 15
Tuidara 43. 8
Tuiete 289
Tuipara 299
Tuite II. 508
Tuitirica 305
Tuju II. 17
Tukogunjok 88. I
Tul 355
Tulkop 69. 5
Tullaek 329
Tullfisch 1113
Tulpendrossel 419
Tummeltaube II. 155

Tümm-

- Tünnler II. 155
Tun 50. 62
Tunfugl 50. 13
Tunnudliorbik 43. 3
Tupt 101. 1
Turdus 203. 403. 408. 413.
 561. II. 245. 248. ff. 327.
 571. 579. 683
Turdu Suerino 107. 1
Tureka Caczka 67. 16
Turkey II. 36
Türkl II. 155
Turlak 355
Turlut 105. 3
Turlutoir 105. 3
Turnstone 1057
Turoko II. 203
Turpane 712
Turtle 104. 32
Turteltaube II. 172. 177. 188.
 195. 197 ff.
Turts 117. 3
Turtur II. 188
Turvert II. 181 ff.
Tutter II. 372
Tuunkonning II. 717
Tuzok 95. 1
Tuzzenu 45
Tya - jo 76. 10
Tyetzoy 61. 9
Tylas II. 259
Tympanstoe II. 145
Tyrann 202. ff. II. 567.
 572 ff.
Tyrannchen II. 725 f.
Tyrannenfliegenfänger II. 572
Tyrannus 415. II. 567
Tyrk II. 157
Tytlingr II. 770
Tyhngs - Blicke II. 401
Tzinircum 55. 2
Tzitziboba 67. 28
Tzonpan II. 273
Tzopilotl 41. 5
- U.
- Uanseta* 105. 1
Ucelli di Cypro 114. 10
Ucello del mondo novo 108. 1
Uet - Uet 1133
Uf 43. 1
Uferlerche 1083. II. 231
Uferschnepfe 1041. 1046
Uferschwalbe II. 792
Userstrandläufer 1070
Ugla 43. 4 ff.
Ubdenis 72. 3
Uhr - Eule 150
Uhu 139. 144
Urubu 6
Ul 161
Ule 162
Ulluagolik 67. 26
Ultramarinfink II. 559
Ulu 83. 8
Ultin 43. 1
Ulula 139. 162. 169
Umbellus II. 101
Umbrette 947
Ungewittervogel 831
Ungle 765
Unglücksrabe 218
Unglücksvogel 216 ff.
Ungula - Chorenny 67. 54
Unkenfresser 64
Unniska - Apethaybisb 59. 1
Upuba 64. 1
Upupa 387. 607. ff. II. 740
Urachon Trogoi 112. 29
Uraleule 175
Urana 351
Urgaas 67. 4
Urgiäs 710
Urhahn II. 84
Uria 870. ff. 872
Uril 858
Urinator 892
Urinatrix 831. 889
Urineglia de rin 88. 1

- Urogallus II. 84
 Urona 50. 5
 Urovang II. 317
 Urrind 984
 Urubitinga 62.
 Urutaura 18
 Utzaurana 42. 34
 Urutavi 18
 Uspis 43. I
 Usrind 984
 Ussatsch 116. 12
 Uffignuolo 114. I
 Utugan 112. 25
 Uveyrs - Fugl 70. I
 Uzana 50. 5
 V.
 Vachette 114. II
 Vachtel II. 131
 Vachtelkonge 1143
 Vagel Strais 96. I
 Vaginalis 1131
 Vagtel 103. 20
 Valeria 28
 Vale Savane 44. 12
 Vandhöne 1118
 Vandrix 1143
 Vanellus 1052. 1101
 Vanga 187
 Vangoline II. 534
 Vanneau 1053. 1079. 1132 f.
 Vard - Höne 91. 2
 Vargia 117. 6
 Varuar 63. I
 Vas - Humber 75. 5
 Vatus - Ond 68. 3
 Vautour 6 ff.
 Vautrot 50. 7
 Vaza 275
 Vberschnabel 1106
 Veigerzatzh 107. 3
 Velch 44. 12
 Velch - Oru 50. 2
 Vendagette 107. 4
 Vendebals 58. I
- Venetore 61. 15
 Venustaube II. 151
 Verdale 110. 5
 Verdan 110. 5
 Verdange 105. 6
 Verdelat 110. 5
 Verdeelham 109. 27
 Verdere II. 375
 Verdereule II. 375
 Verderol 109. 27
 Verdiers des près 110. 3
 Verdier II. 373. 375. 444. ff.
 510. 559
 Verdoie 110. 5
 Verdone II. 375
 Verkehrschnabel 932
 Verla 44. 12
 Verquette 107. I
 Verticella 58. I
 Vermontant 110. 5
 Verturon II. 502
 Verzellino II. 502
 Vestenvinds - Are 70. I
 Vetti - vetto 114. 49
 Vetula 472
 Veuve II. 440 ff.
 Veyda - Bialla 76. 7
 Veydetite 1057
 Veylarcke 105. 6
 Vibe 1054
 Vicilin 66
 Vidarino 112. 16
 Viduel 402
 Vielfrass 805. 845
 Vieräuglein 754
 Vierhundertzunge II. 270
 Viguer II. 585 ff.
 Vilgiüs 67. 9
 Vinago II. 142
 Vinette 114. 10
 Vinterfugl II. 401
 Vintsi 564
 Violettfleck 651
 Violettreiher 976

Vipstiert 114. II
Vira-ombé II. 585
Virginianer 514
Virien 1074
Viscivorus II. 249
Vitifera II. 654
Vitiflora II. 654
Vitrec II. 652
Vogel 367. 405. 411. 639.
 646. 1039. II. 21. 445. 454.
 466. 742
Vogelfalke 116
Vogelgeyer 14
Vogelgeyerle 69
Vogelheine 845
Vogelnestjes 117. 2
Vulpanser 709
Vultur 1
Vuthamaria 69. 2

W.

Waalia II. 204
Wäänkäl 58. I
Wäbke 772
Wacholderdrossel II. 252
Wacholderschnepfe 1029
Wachtel 355. II. 122 ff.
Wachtelgeyer 103
Wachtelhabicht 116
Wachtelkönig 1138. 1149
Wachtellerche II. 214
Wächter 189
Wackelstätt II. 637
Wackstätt II. 637
Wagtail II. 638. 732
Wablod 52. 2
Wahnkrengel 196
Wähpstierten II. 645
Wabrna 50. 5.—50. 7
Walathee 189
Walcerono 114. II
Waldauffe 163
Waldäuffel 161
Walddröfcherl II. 261

Walddrossel II. 259
Waldeule 153. 178
Waldfink II. 477. 480. 482.
 535. 557
Waldgeyer 55. 64. 66
Waldgrasmücke II. 618
Waldhahn II. 84. 88
Waldherr 192
Waldhoff 387
Waldhöher 192
Waldhuhn II. 83. 99
Waldjäger 1071
Waldkatze 198
Waldkautz 365
Waldlerche II. 215. 226
Waldmeise II. 764. 766
Waldnachtigall II. 610
Waldpelikan 1001
Waldrabe 384
Waldrehbhuhn II. 94
Waldröthlein II. 712
Waldothschwänzlein II. 693.
 700
Waldothschweiffl II. 694
Waldsänger II. 628
Waldschneepfe 1026. 1077
Waldsperling II. 536. 555. 557
Waldstaet 368
Waldtaube II. 140. 173
Waldvogel II. 610
Waldzeislein II. 723
Waldzinslein II. 723
Waled 117. 2
Wallop 86. 3
Walghvogel II. 19
Wälscher Hahn II. 31
Wallubora 50. II
Wanderdrossel II. 267
Wanderfalk 81. 92
Wandertaube II. 199
Wandwäher 111
Wandwehe 111
Wannags 42. 12.—37
Wannenweher 110

- Wan-Krengel 192. 194. 196.
 200
 Wapacuthn 159
Wapau. Whiski. John 44. 12
Wapow. Estiquan. Micksue 42. 3
 Warblane 112. 36
 Warbler II. 687 ff.
Wardroe 60. 111
Warfogel 44. 12
 Warkrengel 194. 200
 Warte 783
 Warten 783
 Warvogel 190
 Wasseramsel II. 243
 Wasserblisser 932
 Wasserdrossel 1063. f. II. 243
 Wasserfalke 64
 Wasserhenne 1117
 Wasserhennl 1118
 Wasserhuhn 801. 889. 1045.
 1147. 1056. 1068. 1093.
 1101. 1115. 1134 ff.
 Wasserhühnchen 1031. 1034.
 1142. 1153
 Wasserhühnlein 570. 1069
 Wasserläufer 1117. 1143
 Wassermerle II. 243
 Wassermotacille II. 617
 Wassernachtigall II. 702
 Wasserrochs 984
 Wasserpfau 949
 Wasserrabe 325. f. 852
 Wasserralle 1142. 1144
 Wasserrehhuhn 1026
 Wassersäbel 1106
 Wassersäbler 1105
 Wasserscherer 839. 932
 Wasserschnarel 819
 Wasserschneider 932
 Wasserschuepfe 1031. 1041.
 1047. 1073. 1149
 Wasserschwalbe II. 793
 Wassersperling II. 436
 Wasserstaar 412. II. 243
 Wasserstelze 1142. 1147. II.
 637. 644. 647
 Wassersterz II. 636
 Wassertreter 1117. 1142
 Wasserwielfrass 845
 Wasservögel 694
 Wasservogel 64
Wästrik 112. 28 f.
Water-Hen 91. 4
Water-Ouzel 106. 5
Water-rail 93. 2
Water-Winch 75. 19
Warnstare 106. 5
Wattadraganca 72. I
Waygelhoe 60. 11
 Weberammer II. 428
 Weberpirol 421
Wechbolter 107. 2
 Wecker II. 126
 Wedelschwanz II. 605 ff.
Wedknarr 59. 12
 Weepstirten II. 638
 Wegtaube II. 189
 Wegesterz II. 637
 Wegflecklein II. 702
 Weglerche II. 207. 215
Wchja. mannags 42. 31
 Weichmilane 49
 Weidendrossel II. 314
 Weidengucker II. 626
 Weidenzuckerlein II. 626. 702
 Weidenlerche II. 235
 Weidenmeise II. 723
 Weidenmüecke II. 626
 Weidensperling II. 536. 555
 Weidenzeisig II. 620. 626. 725
 Weidenzeislein II. 723
 Weiderich II. 626
 Weidewall 402
 Weihe 48. 64. 72. 104
 Weihfalke 49
 Weihrauchvogel 403
 Weindrossel II. 258. 263
 Weingartvogel II. 259

Wein-

- Weinlerche II. 225
 Weinzapfer II. 770
 Weifsarsch 1064
 Weissback 764. 766. 815
 Weissbäckchen 723
 Weissbartl II. 690
 Weissbauchadler 39
 Weissbürzel II. 653
 Weissblässe 1125
 Weissdrostel II. 258. 263
 Weissflügel II. 167
 Weissfußadler 46
 Weißhahn II. 97
 Weißhänfling II. 524
 Weisskehlchen 645. II. 575.
 628. 652. 658. 660. 711.
 735. 747
 Weisskehlein II. 652
 Weisskopf 20. 23. 29. 44. 107.
 251. 278. 584. 920. 166.
 II. 360. 403. 423. 677. 746
 Weisskragen 74
 Weissnacken II. 404. 747
 Weisschnabel 505. 575. 635.
 II. 463
 Weisschwänzel 38
 Weisschwanz 23. 44. 667. II.
 650. ff. 652
 Weissspecht 533
 Weisspyr II. 790
 Weissstirn 743
 Weissrostel II. 263
 Weisszopf 809. 811
 Wendehals 496
 Wendetaube II. 163
 Wenzel 635. ff. 646. ff. II.
 272. 705
 Wespenfalk 68
 Wespenfresser 69
 Wetterrabe 836
 Wettervogel 1017. 1021
 Wey 51
 Weygehoe 560
 Weyhe f. Weihe
- Weyrauch 405
Wheat-ear 114. 11
 Wbeber 67. 27
 Whilka 714
Whimbrel 86. 4
Whippoorwill II. 812
Whip-Tom-Kelly 113. 14
Whiskijack 50. 16
Whiskijohn 50. 16
Whistling 67. 27
White-Game 103. 4
White-Whiski-John 44. 12
 Whourao-roa 581
Widgeon 67. 27
 Widhavögel II. 440
 Widhopff 609
 Wiedehopf 608. II. 739 f.
 Wiedehoppe 609
 Wiedewall 502
 Wiedhopf 264. 607 ff.
 Wiegwehen 111
Wiekszy 44. 12
Wierzbowniozka 114. 8
 Wieselchen 807
 Wiesenaminer II. 430
 Wiesen-Ammering II. 431
 Wiesenemmerling II. 431
 Wiesenknaerer 1139
 Wiesenläufer 1139
Wiesenlerche II. 212. 215. 234
 Wiesenschnarcher 1139
 Wiesenschwalbe 1111
 Wiesensperling II. 540
 Wiesenstaar II. 237
Wigga 67. 45
Wibma-kul 42. 31
 Wildelster 191
 Wildendtle 747
 Wildente 767
 Wildetur 384
 Wildhuhn II. 113
 Wildtaube II. 175
 Wildwald 189
Wilga 52. 1

- Wilwol* 52. I
Wimbrell 1022
Wind trusb 107. 3
Windvogel 1017
Windwahl 111
Winkernell 1144
Winsel II. 259
Wintepptker 116. 11
Winterammer II. 421
Winterdrossel II. 259
Winterenimerling II. 421
Winterente 764. 766. 809
Winterfalk 97
Winterfink II. 482. 543
Wintergrasmücke II. 615
Winterhalbente 769
Winterkönig II. 716. 725
Winterkrähe 351
Winterlerche II. 232. 400
Winterling II. 400
Winterrötelein II. 713
Winterrücke 803
Wintermeve 897. 900
Winternachtigall II. 611. 614
Wintersperling II. 400
Wintervogel II. 404
Winterzaunkönig II. 716
Wintze II. 259
Wipstaart II. 638
Wippstärt II. 637
Wippsterz II. 327
Wipssteert II. 638
Wistling II. 692. 699. f. *Wüst-*
ling
Wittewalch 402
Wittewall 402. 421. II.
 329 f.
Wittwe II. 439
Wittwall 402
Woaestraekia 114. 11
Wohnütz II. 372
Wollentrumper II. 615
Wollhuhn II. 56
Wood-Cock 86. 6
- Wood-Crow from Switzerland*
 50. 19
Wood-lark 105. 3
Woodpecker 503 ff.
Wood-Pelikan 85. I
Wood-Titmouse II. 724
Woodchack 199
Woodspite 59. 12
Worabé II. 559
Worobin 112. 36
Woron 50. 2
Worona 50. 5
Wotowe oczko 114. 46
Wou 42. 12
Woupauchou-chuckitkow 414
Wowe 42. 12
Wrakfogel 68. I
Wrangengel 423
Wren 114. 45 ff.
Wriand 67. 27
Wrobel domowy 112. 36
Wrobel gorny 112. 37
Wrobel lesny II. 537
Wrobel troistego koluro 112.
 74
Wrynek 497
Wullah 723
Wundarzt 1136
Wunderkolibri 670
Würgengel 189. 194
Würger 112. 182. ff. 423. II.
 331. 335
Würgvogel 189
Wurmfreßer II. 613
Wuscanithow 109. 3
Wüstling II. 631. 694. f. *Wist-*
ling
Wuwe 51
Wy 51
Wyderle II. 627
Wynkernell 1144
Wyt 783
Wymielga 52. I

X.

Xanthornus 409. 423. f. 432
 Xaxabes 298
 Xiuhtototl II. 467
 Xiuxerra 114. 48
 Xochitenacatl 320
 Xochitototl 411. 421
 Xomotl II. 327
 Xura 43. 7

Y.

Yacapitzahoac 890
 Yaku II. 38
 Yandu 96. 3
 Yapou 52. 4
 Yardu 96. 3
 Yayaquitotorl 66. 25
 Yayk - Ohreule 153
 Yellow - hammer 110. 5
 Yohualeuachili 1134
 Yohualtototl II. 504
 Yr - aderyndu 107. 22
 Yrung - Chaff 67. 54
 Ysvogel 61. 3
 Yunx 496
 Ytzquauitli 42. 34
 Yztatczonyayaubqui 67. 43

Z.

Zagan - Goruchun 43. I
 Zagan - Schubo 43. I
 Zagelmeise II. 770
 Zahlmeise II. 771
 Zakid 84. 4
 Zamuro 41. 5
 Zanoë 380
 Zapfenbeisser II. 339
 Zapfennager II. 339
 Zapp 1126
 Zarer II. 250
 Zaritzer II. 249
 Zartschnabel II. 545. 613. 619
 Zätschker II. 555
 Zaunammer II. 431
 Zaunemmeritze II. 432
 Zaunhüpfer II. 691

II. Band II. Th.

Zaunkönig II. 716. 725
 Zaunschlüpfer II. 716
 Zaunschlüpferl II. 718
 Zaunschliefer II. 716
 Zaunschlipflein II. 716
 Zaunsperling II. 616
 Zdzoto II. 220
 Zeelawa 114. 11
 Zeemala 114. 11
 Zeezmallum 77. 2
 Zegloška 109. 27
 Zegzolka 50. 6
 Zeher II. 250
 Zehrling II. 483
 Zeischen II. 516
 Zeislein II. 517
 Zeischen II. 516
 Zeisig II. 515. 739
 Zeislein II. 516
 Zeissig II. 516
 Zena II. 490. 499
 Zeplihs 114. 48
 Zepste 114. 8
 Zerrer II. 250
 Zer - wenka 114. 45
 Zetscher II. 482
 Zeuner II. 255
 Zezir 106. I
 Zezula 57. I
 Zbiaelkes 75. I
 Zbiacna 59. 12
 Zhierrek 77. 2
 Zieba 112. 3
 Ziegenmelker II. 808 ff.
 Ziegensauger II. 809
 Ziemer II. 249. 252. 253. 267.
 278
 Ziepammer II. 430
 Ziedrossel II. 260
 Zierdrossel II. 265
 Ziering II. 250
 d' Zierzba 44. 12
 Ziesel II. 516
 Ziesgen II. 516

Qqq

Zies.

- Zießchen II. 516
Ziez gale 57. 1
Zifitz 1053
Ziglis 102. 7
Zigolo 110. 5
Zibluri 105. 1
Zihluris 105. 6
Zimmermann 505. 522
Zimmetvogel II. 690
Zimorodek 61. 3
Zinsle II. 516
Zinslein II. 517
Zinzerelle II. 324
Zipdroffel II. 258. 263
Zipbur 112. 36
Zippdroffel II. 261
Zippa 105. 3
Zippammer II. 431
Zippe II. 258. 263
Ziriolu 88. 1
Zirlanimer II. 431
Zirzente 774
Zischen II. 516
Zischer II. 711. 737
Zischeule 168
Ziserinchen II. 529
Zising II. 516
Zitrinchen II. 502
Zitskens 112. 16
Zittertaube II. 153
Zitzcherlein II. 530
Zitzil 669
Ziufzia 103. 1
Zivetta 43. 5
Zivolo 110. 5
Zobboſe - Rääſt 107. 1
Zolna 59. 12
Zonca 157.
Zonecolin II. 128
- Zopflerche* II. 225. 226 ff.
Zoram 84. 4
Zorca 152
Zorch 883
Zorkol 107. 2
Zorزال 107. 4
Zötscher II. 531
Zschokrell 355
Zuckerfresser 641 f.
Zuckerspatz II. 511
Zuckervogel 641. 648
Zuckervögelein II. 511
Zugdrossel II. 267
Zugtaube II. 200
Zuhku 59. 18
Zuserl II. 326
Zwerg II. 393. 617
Zwergente 776
Zwergeule 177
Zwergfalke 126. 130
Zwergfliegenfänger II. 570
Zwerghuhn II. 52
Zwergkernbeisser II. 392
Zwerglöfller 942
Zwergpapagey 259. 299
Zwergpapageytaucher 825
Zwergpelikan 857
Zwergreuter 1078
Zwergtaube II. 198
Zwergtrappe II. 6
Zwergzeifig II. 748
Zwitscherling II. 529
Zwitterauerhahn II. 92
Zwitterfalk 110
Zwittertaube II. 196
Zwuntsche II. 372
Zya II. 735
Zymmer II. 255
Zyste II. 627


Einige Verbesserungen.

Im ersten Theile.


S. 73. Z. 7. l. Austr. — Z. 11. l. F. Aeruginosus. —
S. 187. nach Z. 21. setze: Lathám Syst. ornith. I. p. 667. n. 1.
Ampelis cinerea. — S. 191. Z. 4. l. Harpax. — S. 229.
Z. 5. von unten, für *Maracana*, l. der grüne blau gescheitelte
Aras. — S. 259. Z. 13. l. der langschwänzige Zwergpapagey. —
S. 299. Z. 25. l. der kurzschwänzige Zwergpapagey. —
S. 964. Z. 27. und 28. sind ganz wegzustreichen. — S. 1153.
Z. 6. l. daurische.


Im zweyten Theile.

S. 284. Z. 19. l. Samarimar? — Z. 23. l. fuscis? — S. 499.
Z. 26. l. der pomeranzengelbe Fink. — Z. 31. l. p. 346.
n. 161. der orangengelbe Fink. — S. 620. Z. 4. von unten
l. Kukkuksamme. — S. 742. letzte Zeile. l. führt? — S. 734.
letzte Zeile, nach *nachlesen*, setze: cf. p. 235. n. 4.









SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 01038 4113