

490.9  
Y97


490.9-Y97



1200500743807



始



2-3845

2

~~60-561~~

490.9

Y97



湯本求真纂著

漢醫學



道  
通  
天  
地

有  
形  
外  
思

入  
風  
雲  
變

德  
中

剛  
柔  
善

研精而  
不徒率  
用與  
惟  
深  
克



溫故

知新

丁酉秋

溫故

以國美  
物道濟

天下

新平題

## 皇漢醫學自序

余父母ノ命ニ從ヒ醫ヲ金澤醫學專門學校ニ學ビ明治三十四年業ヲ卒ヘ或ハ病院ニ奉職シ或ハ門戸ヲ開キテ診療ニ從事ス明治四十三年長女ヲ疫痢ノ爲ニ亡ヒ修得セル醫術ノ頼ミ少キヲ恨ミ煩悶懊懐スルコト數月精神殆ンド錯亂セントスルニ至リシガ偶々故恩師和田啓十郎先生著醫界之鐵椎ヲ讀ミテ感奮興起シ始テ皇漢醫學ヲ學ブ爾來星霜ヲ經ルコト十有八其ノ間東西南北ニ流轉シ窘窮具ニ至ルト雖モ未ダ曾テ其志ヲ變ゼズ努力研究ノ結果漸ク此學ヲ明ニシ得ルト俱ニ舊時代ノ醫學ト雖モ其蘊奧ニ達シ能ク之ヲ活用スルトキハ

日新ノ醫學ヲ凌駕スルコト多々ナルヲ知悉セリ然レドモ如何セン世ヲ擧ゲテ歐米醫學ノ下ニ走り復此學ヲ顧ルモノナク將ニ滅亡ノ危期ニ瀕セルヲ是レ余ガ日夜痛嘆措ク能ハザル所亦坐視スルニ忍ビザル所ナルガ故ニ此頽勢ヲ挽回センガ爲メ淺學菲才ヲ顧慮スルノ違ナク本書ヲ公ニシ以テ滿天下具眼ノ士ニ之ヲ訴フ

昭和二年六月上旬

田端ノ陋屋ニテ  
纂著者謹デ識ス

緒言

仲景師ヲ出セル支那ニアリテハ其醫方ヲ順ルモノナリカスルニモ之ヲ入ルモノナリカスルニモ之ヲ於テハ能ク之ニ活用セリ故ニ又之ヲ皇漢醫學ト稱ス

仲景師ハ曾テ長沙ノ大守タリシガ故ニ斯ク略稱スルナリ

法ハ治法ニシテ方ハ治劑ナリ

撰ハ拾ヒ取るノ意ナリ

漢方中ニハ醫聖張仲景師ノ遺訓ヲ信ズル古方學派、昔唐宋元明清ノ醫術ヲ奉ズル後世學派及此二派ヨリ分岐セシ折衷學派ノ三派アリト雖モ余ハ古方派ヲ信ズルコト深キガ故ニ本書ノ内容モ亦其大半ハ仲景師ノ傷寒論、金匱要略ニ基キタル所以ニシテ此以外ニ引用セシ諸家ノ論說治驗ト雖モ皆悉ク師ノ所論ヲ演繹擴充セシモノ、ミニ限レリ

余ノ古方派タル所以ハ尾臺榕堂氏ガ其著類聚方廣義題言中ニ

長沙ハ千古用方ノ鼻祖ナリ、然レドモ其方ハ則チ咸三代聖賢ノ精製ニ出デ、長沙集メテ之ヲ大成セルノミ、其方タルヤ、簡明正嚴、條理秩然、寬猛ノ治、和攻ノ法、周悉該備セザルハナシ、故ニ講習諸練、以テ其意ヲ精究シ、其義ヲ推廣セバ、則チ萬病ノ治ハ、之ヲ掌ニ運スベシ、

ト曰ヘルガ如ク師ノ方法ハ支那古文明ノ精華ニシテ終始一貫ノ條理備ルヲ知リタルニヨルモノニシテ又後世派ヲ排スル所以ハ同書同題下ニ

世醫動モスレバ、輒チ古方寡少、以テ衆病ニ應ジ難キヲ謂フ、是ニ於テカ千金外臺ヨリ宋明諸家ノ方ニ至リ、撰拾シ以テ集メ、曰ク此ノ如クナラザレバ、則チ悉ク諸病ヲ愈ヤス能ハ

附言



越へ逐ト同ジ

典刑ハ書籍ノ  
意ナリ

ズト、殊ニ知ラズ諸家趣ヲ異ニシ、伎術流レ同ジカラザルヲ、故ニ其論ヲ立テ方ヲ制スルヤ  
各同ジカラズ、而モ雜擾亂拾シ、以テ施設ニ供ス、宜ナルカナ其方法ハ統一セズ、而シテ治  
療ニ規則ナキヤ、夫レ疾病ノ多キ、其變ヤ窮リアラズ、苟モ病ヲ越テ方ヲ求メバ、何ゾ底  
止スルコトアラシヤ、且ツ方ハ長沙ヨリ古キハ莫シ、又長沙ヨリ善キハ莫シ、實ニ萬世不刊ノ  
典刑ト爲ス、豈後世諸家私意捏造ノ方ト、日ヲ同ウシテ語ルベケンヤ、故ニ能ク長沙ノ方ニ  
從事シ、幼ヨリ而シテ壯ニ、而シテ老ニ、造次顛沛必ズ斯ニ於テシ、猶身當時ニアリテ、親  
シク其提誨ヲ受クルガ如クナレバ、自然伎精ニ術熟シ、其病ニ沿ムニ方ルヤ、活機靈動シ、  
唯意ノ向フ處、法ニ背キテ法ニ符シ、轍ヲ離レテ轍ニ合シ、操縱自在、左右原ニ違フ、疾病  
萬殊ト雖モ、又何ゾ應ジ難キコトカ之レ有ラン、此ヲ之レ簡ヲ以テ繁ヲ御スト謂フナリ、易  
簡ニシテ天下ノ理ヲ得ルトハ、豈信ナラズヤ、陳實功曰ク、方ハ多キニ在ラズ、心契スレバ  
則チ靈、證ハ難キニ在ラズ意會スレバ則チ明ト、至言ト謂フベシ、  
ト謂ヘルガ如ク此學派ハ漫然諸家ノ方劑ヲ拾集セシニ過ギザレバ各方劑間ニ連絡統一ナク且ツ  
其方劑ノ過半ハ病症ノ枝葉ニ基キテ組成セラレタレバ方劑ノ箇數殆ンド無限大ニ増加シ後進ヲ  
シテ取捨ニ惑シムルニ止リ其肯綮ニ觸レシモノ乏シキヲ以テナリ然レドモ古方中ニ求メ得ザル  
生々乳、輕粉等ノ驅微藥其他後世方ニ俟ツベキモノ稀ナラザレバ必シモ之ヲ棄ツベカラズ要ス

ルニ先ヅ古方ニ就テ醫術ノ大本ヲ修得シ後餘力アラバ後世方ニ及スベシ

本書ニ諸家ノ論說治驗ヲ網羅セシ所以ハ仲景師ノ勤テ古訓ヲ求メ博ク衆方ヲ采ルノ意ニ基キ讀  
者ヲシテ研究ニ便ナラシメンガ爲ニシテ漫然剪刀ト糊ヲ濫用セシニアラズ。

諸家ノ治驗ヲ掲ゲテ余ノ治驗ヲ載セザル理由ハ自書自讚ノ謗リヲ避ケンガ爲ニ外ナラズ

本書立論ノ多クハ余ノ經驗的事實ヲ基礎トシ之ニ理論ヲ添加セシモノナレバ假令理論中多少ノ  
誤謬アリトスルモ事實ニ於テハ斷ジテ虛偽ナシ故ニ偶々理論ノ錯誤ヲ摘發シタル餘勢ニ乘ジ坊  
主ガ憎クケリヤ袈裟マデモナル俗諺ヲ如實ニシ事實ヲモ亦僞リト速斷シ玉石俱焚スル勿レ

本書ニ引用セシ書籍ハ概シテ漢文ナレバ若シ原文ノ儘之ヲ掲載セバ漢字制限論又ハ廢止論、羅  
馬字廣メ會等ノ流行ヲ來シ一般ニ漢籍の智識低下セシ現今ナレバ普通ノ讀者ニハ難解ナル處ナ  
キニシモアラズト思考シ或ハ意譯シ或ハ直譯シタルガ斯ク稱スル余ト雖モ漢學衰頹ノ兆アリシ  
明治初年時代ノ産ニシテ而モ此學ヲ專攻セシニアラザレバ造詣深カラザルガ故ニ誤譯ナキヲ保  
シ難シ讀者之ヲ諒セヨ





引用書目

今村亮氏著 三病考  
 著者不明 杏壇漫錄  
 羽佐間芝瓢氏著 老妻新書  
 著者不明 柚木流眼療秘傳書  
 博濟病院編纂 博濟堂脚氣提要  
 和漢醫學講習所輯錄 温知醫談  
 藤田謙造氏著 温知堂雜著  
 齊藤貴氏編 徳本翁遺方

小松帶刀氏編 徳本遺稿  
 同 上 徳本傳  
 和田啓十郎氏著 醫界之鑑椎  
 小泉榮次郎氏編 和漢藥物考  
 同 上 黒鏡ノ研究  
 月野七五郎氏 和漢藥物學  
 一色直太郎氏 藥物學  
 森嶋庫太氏著 外科總論  
 桂秀馬氏著 此他猶多キモ本書ニ重大ナル關係アラザレバ之ヲ略ス

皇漢醫學第壹卷目次

總論

洋漢二醫學ノ比較概論……………一  
 表裏<sup>中表</sup>內外、陰陽虛實、主客本末……………三  
 腹證、腹診法……………六  
 腹證、腹診法ノ尊重スベキ所以……………九  
 脈證、脈診法……………二一  
 總說……………二四  
 浮……………二七  
 芤……………二八  
 滑……………二八  
 洪……………二九  
 數附疾……………二九  
 疾……………三〇  
 促……………三〇  
 微……………三五  
 實……………三五  
 牢……………三四  
 革……………三四  
 伏……………三三  
 沈……………三三  
 緊……………三二  
 弦……………三二  
 促……………二〇

瀉……………二五  
 細……………二五  
 軟……………二六  
 弱……………二六  
 虛……………二六  
 散……………二六  
 緩……………二七  
 遲……………二七  
 結……………二七  
 代……………二八  
 動……………二八  
 長……………二八  
 短……………二八  
 婦人……………二九  
 小兒……………二九  
 怪脈(七種ノ死脈)……………三〇  
 (1)彈石……………三〇

(2)解索……………三一  
 (3)雀啄……………三一  
 (4)屋漏……………三一  
 (5)蝦遊……………三一  
 (6)魚翔……………三一  
 (7)釜沸……………三一  
 所謂強心藥ハ真正ナル強心藥ニアラズ……………三二  
 瘀血ノ害毒……………三二  
 瘀血ノ腹證……………三二  
 瘀血ノ脈證……………三二  
 瘀血ノ外證……………三二  
 傳染病ハ自家中毒ナル前提アルニアラザレバ成立スル能ハズ……………三三  
 傳染病ノ過半ハ其病原體ニ基キテ治ヲ施スベキニアラズ其發現スル證ニ隨ヒテ治スベキモノナリ……………三三

漢方ノ傳染病療法ハ主トシテ細菌性毒素ヲ驅逐スルニアリ……………三六  
 洋方ハ局處的療法ニ偏倚ス……………三六  
 漢方ノ鎮痛療法ハ原因療法ナリ……………三七  
 漢方劑ハ複合作用ノ發顯ヲ期待スルモノナリ……………三七  
 漢方劑ハ一方ニテ能ク數多ノ能力ヲ發揮ス……………三九  
 漢方劑ノ藥物配合法ハ極テ巧妙ナリ漢方劑ハ其溫度ヲ適宜加減シ得ルノ利アリ……………三七  
 漢方的治療中ニ瞑眩症狀ノ發起スルハ其原因療法タルノ確證ナリ……………三七  
 各論……………三七  
 傷寒論ノ大意……………三七  
 太陽病篇……………三九

太陽病ニ關スル師論註釋……………三九  
 桂枝湯ニ關スル師論註釋……………三九  
 桂枝湯方……………三九  
 桂枝加桔梗湯方……………三九  
 桂枝加半夏湯方……………三九  
 桂枝湯ノ腹證……………三九  
 先聲ノ論說、治驗……………三九  
 桂枝ノ醫治効用……………三九  
 芍藥ノ醫治効用……………三九  
 芍藥應用上ノ注意……………三九  
 大棗ノ醫治効用……………三九  
 甘草ノ醫治効用……………三九  
 生姜ノ醫治効用……………三九  
 桂枝加桂湯ニ關スル師論註釋……………三九  
 桂枝加桂湯方……………三九  
 桂枝加芍藥湯及桂枝加芍藥大黃湯ニ關スル師論註釋……………三九



先輩ノ論說、治驗……………二八三

黃耆建中湯ニ關スル師論註釋……………二八六

黃耆建中湯方……………二八六

先輩ノ治驗……………二八八

當歸建中湯ニ關スル師論註釋……………二八八

當歸建中湯方……………二八九

腹證……………二八九

先輩ノ治驗……………二八九

歸耆建中湯方……………二九二

先輩ノ論說……………二九二

黃耆及建中劑ハ肺結核ニ應用スベカラズ……………二九二

膠飴ノ醫治効用……………二九五

黃耆桂枝五物湯ニ關スル師論註釋……………二九六

耆黃桂枝五物湯方……………二九六

先輩ノ論說……………二九六

知覺麻痺ハ知覺神經ノ原發的病變ニ

因ルニアラズ病毒ニ因リテ惹起セラレシ續發的知覺神經病變ノ結果ナリ……………二九六

黃耆芍藥桂枝苦酒湯ニ關スル師論註釋……………二九六

黃耆芍藥桂枝苦酒湯方……………二九九

防已茯苓湯ニ關スル師論註釋……………三〇〇

防已茯苓湯方……………三〇一

先輩ノ論說……………三〇一

防已黃耆湯ニ關スル師論註釋……………三〇三

防已黃耆湯方……………三〇四

先輩ノ論說……………三〇四

桂枝甘草湯ニ關スル師論註釋……………三〇五

桂枝甘草湯方……………三〇六

腹證……………三〇六

半夏散及湯ニ關スル師論註釋……………三〇七

半夏散及湯方……………三〇八

先輩ノ論說……………三〇九

桂枝人參湯ニ關スル師論註釋……………三〇九

桂枝人參湯方……………三〇〇

先輩ノ論說……………三〇〇

苓姜朮甘湯ニ關スル師論註釋……………三〇一

苓姜朮甘湯方……………三〇三

腹證……………三〇三

先輩ノ論說治驗……………三〇三

乾姜ノ醫治効用……………三〇六

苓桂朮甘湯ニ關スル師論註釋……………三〇一

苓桂朮甘湯方……………三〇三

腹證……………三〇三

先輩ノ論說、治驗……………三〇三

苓桂甘棗湯ニ關スル師論……………三〇一

苓桂甘棗湯方……………三〇三

腹證……………三〇三

苓桂五味甘草湯ニ關スル師論註釋……………三〇四

苓桂五味甘草湯方……………三〇六

苓甘五味姜辛湯ニ關スル師論註釋……………三〇七

苓甘五味姜辛湯方……………三〇七

苓甘五味姜辛夏湯ニ關スル師論註釋……………三〇八

苓甘五味姜辛夏湯方……………三〇九

先輩ノ治驗……………三〇九

苓甘五味姜辛夏仁湯ニ關スル師論註釋……………三〇九

苓甘五味姜辛夏仁湯方……………三〇九

先輩ノ論說……………三〇〇

苓甘姜味辛夏仁黃湯ニ關スル師論註釋……………三〇一

苓甘姜味辛夏仁黃湯方……………三〇二

先輩ノ治驗……………三〇二

五味子ノ醫治効用……………三〇三

細辛ノ醫治効用……………三〇四

澤瀉湯ニ關スル師論註釋……………三〇五

澤瀉湯方……………三〇七

先輩ノ治驗……………二四七

澤瀉ノ醫治効用……………二四七

茯苓澤瀉湯ニ關スル師論註釋……………二四八

茯苓澤瀉湯方……………二四九

先輩ノ論說治驗……………二四九

茯苓甘草湯ニ關スル師論註釋……………二五〇

茯苓甘草湯方……………二五〇

先輩ノ論說治驗……………二五〇

五苓散ニ關スル師論註釋……………二五二

五苓散方……………二五二

先輩ノ論說治驗……………二五二

茵陳五苓散ニ關スル師論註釋……………二五三

茵陳五苓散方……………二五三

先輩ノ治驗……………二五三

猪苓湯ニ關スル師論註釋……………二五三

猪苓湯方……………二五三

猪苓加甘草湯方……………二五三

猪苓加大黃湯方……………二七二

猪苓加薏苡仁湯方……………二七二

先輩ノ論說治驗……………二七二

猪苓ノ醫治効用……………二七三

阿膠ノ醫治効用……………二七五

滑石ノ醫治効用……………二七六

牡蠣澤瀉散ニ關スル師論註釋……………二七七

牡蠣澤瀉散方……………二七七

先輩ノ論說……………二七七

葶藶ノ醫治効用……………二七八

商陸ノ醫治効用……………二七九

海藻ノ醫治効用……………二七九

八味丸ニ關スル師論註釋……………二八〇

八味丸方……………二八〇

腹證……………二八四

先輩ノ論說治驗……………二八五

地黃ノ醫治効用……………二八七

薯蕷ノ醫治効用……………二八八

山茱萸ノ醫治効用……………二八九

麻黃湯ニ關スル師論註釋……………二九〇

麻黃湯方……………二九〇

麻黃加桔梗湯方……………二九一

先輩ノ論說治驗……………二九一

麻黃ノ醫治効用……………二九二

杏仁ノ醫治効用……………二九二

麻黃加朮湯ニ關スル師論註釋……………二九五

麻黃加朮湯方……………二九六

先輩ノ論說……………二九六

甘草麻黃湯ニ關スル師論註釋……………二九七

甘草麻黃湯方……………二九七

先輩ノ論說、治驗……………二九九

麻黃附子甘草湯ニ關スル師論註釋……………三〇一

麻黃附子甘草湯方……………三〇一

麻黃附子細辛湯ニ關スル師論註釋……………三〇三

麻黃附子細辛湯方……………三〇四

先輩ノ論說治驗……………三〇四

麻黃杏仁甘草石膏湯ニ關スル師論註釋……………三〇六

麻黃杏仁甘草石膏湯方……………三〇六

先輩ノ論說……………三〇七

麻黃杏仁薏苡甘草湯ニ關スル師論註釋……………三〇八

麻黃杏仁薏苡甘草湯方……………三〇九

先輩ノ論說治驗……………三〇九

薏苡仁ノ醫治効用……………三〇〇

牡蠣湯ニ關スル師論註釋……………三〇四

牡蠣湯方……………三〇四

先輩ノ論說……………三〇四

桂枝二麻黃一湯ニ關スル師論註釋……………三〇五

桂枝二麻黃一湯方……………三〇五

先輩ノ論說……………三〇六





葛根加大黃湯方……………三六三  
 葛根加桔梗大黃湯方……………三六三  
 葛根加苓朮湯方……………三六四  
 葛根加朮附湯方……………三六四  
 葛根加苓朮附湯方……………三六四  
 先輩ノ論說治驗……………三六四

葛根黃連黃芩湯ニ關スル師論註釋……………四〇二  
 葛根黃連黃芩湯方……………四〇三  
 先輩ノ論說……………四〇三  
 發汗劑ノ禁忌……………四〇五  
 發汗劑應用ノ科學的根據……………四〇七

目次終

皇漢醫學 第壹卷


湯本求真著

總論

洋漢二醫學ノ比較概論

凡ソ學術ノ何タルヲ問ハズ理論ト事實トガ常ニ一致契合シ其間ニ毫厘ノ差ヲ生ゼザルコト數學ニ於テハトモシカラシニハ理論ノ研究ヲダニ勤テ怠ラザルトキハ更ニ經驗的智識ヲ要セザル理ナリト雖モ醫學ノ如キハ靈妙不可思議的活物タル人類ニ對スル學術ナレバ單純ナル理論ノ能ク解釋シ得ル處ニアラザレバ經驗的智識ヲ俟タザルベカラズト云ハシヨリハ人體經驗的事實ニ基キシ理論ニアラザレバ真正ノ理論ニアラズト斷ズルガ寧ロ適切ナレバ須ク人體經驗的事實ヲ先トシ理論ヲ其後タラシメザルベカラズ、然ルニ洋醫ノ過半ハ科學萬能主義者ニシテ苟モ科學ノカヲ以テスレバ何等解決セザルナシトノ妄想ヨリ試驗管ト人體トヲ同視シ動物試驗ヲ以テ金條玉科トナシ是等ヨリ得タル結論ヲ直ニ至妙不可解ナル入身ニ試ムルガ故ニ俗諺ノ勘定ガ合フヲ

洋漢二醫學ノ比較概論



錢足ラズノ如ク研究室裏ノ理論ハ精細微妙ヲ極ムルノ觀アルモ臨床上ニハ權威ナキナリ是ニ反シテ漢方ハ數千年前ヨリ幾千萬億ノ人體ニ就キ病理、藥能ヲ討究シ百練千磨ノ後完成セラレシモノナレバ其理論ハ一見空漠ノ感ナキニアラザレドモ其實ハ然ラズ秩序整然、終始一貫セル條理アリ藥方亦然ルガ故ニ實地上ニハ赫々タル偉効ヲ奏ス是レ余ガ實驗ノ證スル處ナリ併シ乍ラ此議論ハ洋方ノ短所ヲ舉ゲテ長所ヲ掲ゲズ漢方ノ長所ヲ説キテ短所ニ及サザレバ其偏斷ナルハ余ト雖モ之ヲ承認スルニ吝ナルモノニアラズ余ハ漢醫方アルヲ知リテ洋醫方アルヲ知ラザルモノニアラズ又經驗的智識ノミヲ尊重シテ科學的智識ヲ無視スルモノニモアラズ拙著漢方醫學解説ノ自序ニ

余ノ本書アル所以ハ醫聖張仲景師ノ創設セル東洋古醫學ヲ西洋醫學ノ原理ヲ以テ解説シ其長所ヲ明ニスルト共ニ現代治療術ノ短所ヲ探リ以テ二醫學ノ融合統一ヲ期スルノ宿望ニ出ツ鈍劣ナル余輩固ヨリ斯ル大任ニ當ルノ資格ナシト雖モ勉クトモ其連鎖タリ媒灼人タルヲ得バ望ミ足レリ希クハ讀者諸君余ヲ以テ漢醫方ヲノミ妄信スル頑愚ノ徒トナス勿レ。

ト述ベシガ如ク余ハ元來洋漢醫方折衷主義者ニシテ洋醫方ノ長所ハ益、之ヲ助長スルト共ニ其短所ハ斷然廢棄シ其長所ニ配スルニ漢醫方ノ長所ヲ以テセル一新醫術ノ出現センコトヲ希望スルモノナリ然ルニ今獨リ漢醫方ノ長所ヲ力説スル所以ハ此醫方ハ將ニ滅亡セントシ僅ニ餘喘ヲ

保ツノ悲境ニ沈淪セルヲ以テ其長所ヲ發揮スルハ急務中ノ急務ナリト信ジタルガ爲ニシテ洋醫方ノ短所ヲ舉ゲタルハ比較論究上已ムヲ得ザルニ出タルノミ豈、好シテ此醫方ヲ痛罵シ以テ快トスルモノナランヤ。

**表裏 半表 內外・陰陽虛實・主客本末**

表裏ノ表トハ皮膚ヲ指スノ辭ニシテ此部ニ病毒集中スレバ一種ノ病症ヲ發ス之レ即チ表證ト稱スルモノニシテ發汗解熱藥ヲ用ヒテ病毒ヲ汗腺ヨリ排除シ盡スヲ以テ原則トス若シ此發汗ニシテ微セザレバ病毒ハ轉ジテ呼吸・消化・泌尿器等ニ入り諸般ノ疾病ヲ惹起ス裏トハ消化管ノ意ニシテ此部ニ病毒集積シ實證ヲ呈スルコトアレバ瀉下藥ヲ用ヒテ病毒ヲ驅逐スルヲ以テ規矩トス若シ然ラザレバ病毒ハ遂ニ內位ニ侵入シ往々不治ノ難症ヲ誘發ス半表半裏トハ胸腹二腔ノ中間部ノ義ニシテ氣管支・肺・心・肝・脾・胃ノ所在ニ該當スルガ故ニ若シ此部ニ病毒集積スルトキハ右諸臟器ノ一乃至數個ヲシテ發病セシム是レ即チ半表半裏證ト稱スルモノニシテ此病毒ハ和劑ヲ用ヒテ緩解スルト共ニ其一部ヲ皮膚・呼吸・泌尿器ヨリ排泄スルヲ以テ準繩トス斯如ク病毒ハ表ヨリ半表半裏或ハ裏ニ裏ヨリ內ニ又ハ表ヨリ內ニ半表半裏ヨリ內ニ轉入スト雖モ屢、是レト正反對ニ內ヨリ裏或ハ半表半裏或ハ表ニ又ハ裏ヨリ半表半裏或ハ表ニ半表半裏ヨリ表ニ轉出

表裏(半表半裏)內外・陰陽虛實・主客本末

スルコトアリ是レ人間ノ活物タル所以ナレバ單純ナル理論ノ能ク解決シ得ル所ニアラザルナリ。  
 内外トハ相對的ノ辭ニシテ内トハ皮膚・呼吸器・消化管以外ノ臟器組織ヲ云ヒ外トハ内以外ノ臟器組織ヲ云フ故ニ内ニ對スルトキハ裏ハ外ナレドモ表ニ對スルトキハ裏モ亦内ニシテ半表半裏ハ表裏ノ中間ニ位スルヲ以テ此名アルモノナレバ裏ニ對スルトキハ外ナレドモ表ニ對スルトキハ内ナリ斯如ク師ノ表裏内外ヲ分ツ所以ハ要スルニ病毒ノ所在ヲ明示スルト共ニ其轉變狀態ヲ明ニシ醫ラシテ正シク之ニ對應セシメンガ爲ナリ。

陰陽ノ陰即チ陰證トハ消極的及寒性ノ意ニシテ病勢沈伏シテ發顯シ難ク脈ハ沈遲・沈弱・沈細・沈微ニシテ力ナク惡寒・厥冷等ノ症アルヲ云ヒ陽即チ陽證トハ積極的及熱性ノ義ニシテ病勢發揚シテ開顯セザルハナク脈モ亦之ニ準ジテ浮數・浮大・滑大・洪大トナリ多ク熱發スルヲ云フ斯如ク陰證ト陽證トハ全ク正反對ニシテ霄壤ノ差アレバ嚴密ニ之ヲ分タザルベカラズ何トナレバ假令同一病タリトモ其陰タルト陽タルトニヨリ治法ヲ異ニスルノ要アレバナリ例ヘバ感冒ノ表證アルニ當リ若シ陰證ナルトキハ發表藥ニ熱性・發揚性ヲ有スル附子・細辛ヲ配セル桂枝加附子湯・麻黃附子細辛湯等ヲ處スベキモノニシテ陽證ナレバ發表藥ニ冷性・沈降性ナル石膏ヲ伍セル葛根湯加石膏・小青龍湯加石膏等ヲ投ズベキモノナリ若シ此法則ニ隨ハズ陰證ニ與フルニ附子

細辛アラザル桂枝湯、麻黃湯等ヲ以テシ陽證ニ處スルニ石膏ヲ含ザル葛根湯、小青龍湯等ヲ以テスルトキハ其何レモ共ニ治セザルノミナラズ反テ増惡ヲ致ス又若シ此法則ニ正反シ陰證ニ與フルニ葛根湯加石膏、小青龍湯加石膏等ヲ以テシ陽證ニ處スルニ桂枝加附子湯、麻黃附子細辛湯等ヲ以テスルトキハ陰證ハ益、陰位ニ陥リ陽證ハ瀰、陽證ニ進展シ不測ノ變ヲ招來ス然ルニ此理ヲ辨セザル洋醫ハ檢溫器ヲ以テ唯一ノ指針トシ體溫ノ昇降ダニ認ムレバ其陰タルト陽タルトヲ問ハズ一律的ニ同一ナル解熱劑ヲ處シ溫藥ヲ與フベキ陰證ニ反テ陰冷ナル水藥ヲ投ジ尙更ニ水瀉ヲ貼スルガ故ニ輕微ナル感冒ト雖モ容易ニ治スル事ナク往々加答兒性肺炎等ヲ誘發セシメ病者ヲシテ危地ニ彷徨セシム。

虛實ノ虛即チ虛證トハ空虚ノ意ニシテ病毒未ダ去ラザルニ精力既ニ虛乏セルモノナレバ脈ハ細、小、微、弱トナリ腹部モ亦軟弱無力ニシテ恰モ棉花ヲ按ズルガ如ク彈力消失セシ護謨球ヲ撫スルガ如シ故ニ勿論吐下スベカラズ發汗モ亦大ニ戒慎スベク主トシテ和法ヲ施スベキモノナリ之ニ反シテ實即チ實證トハ充實ノ義ニシテ病毒體內ニ充實スルモ體力猶是レト對抗シツ、アルモノナレバ一般ニ壯實ノ觀アリ實、長、大、滑等ノ脈狀ヲ呈シ腹部ハ緊滿シテ力アリ或ハ堅硬ニシテ抵抗強キモノナレバ汗吐下ヲ徹底的ニ行ザルベカラザルモノナリ、故ニ假令數十日便秘ストモ下劑ヲ嚴禁スベキ虛證アリ一日數十行下劑ストモ下劑ヲ投ゼザルベカラザル實證アル

表裏(半表半裏)内外、陰陽虛實・主客本末

和法トハ汗吐下以外ノ治法ノ總稱ナリ

ナリ洋醫ノ多數ノ深ク此別ヲ解セズ專ラ體温ノ上昇ト便通ノ秘結トヲ以テ汗下ヲ決ス誤レリト云フベシ。

主客ノ重トハ證ノ主人ノ意ナレバ始ヨリ現ハレテ終始不動ナル症狀ヲ云ヒ客トハ其客人ノ義ナレバ後ニ發シテ隱見出沒スル症狀ヲ云フ、例ヘバ桂枝湯證ノ主症ハ頭痛チレバ病初ヨリ出現シテ恒存動ナルモ乾嘔ハ其客症ナレバ後ニ發現シテ必在的ナラズ、故ニ桂枝湯ハ頭痛ヲ主目的トシテ用ユベク乾嘔ヲ主目的トスベキニアラズ、是レ主客ノ別ニシテ治療巧拙ノ分ル、處ナレバ肝銘セザルベカラズ。

本末ノ本ハ病ノ根本ニシテ末ハ其末節枝葉ナレバ病根ヲ拔去スレバ枝葉ノ症狀ハ治セズシテ自ラ散ズルノ理ナリ、故ニ病ヲ診スルニハ必ズ本末ヲ辨セザルベカラズ。

### 腹證、腹診法

漢醫方ノ腹證、腹診法ハ東漢ノ時、長沙ノ大守タリシ醫聖張仲景師ノ著ナル傷寒論、金匱要略ニ胚胎スルモ其搖籃タリシ支那ニアリテハ晉唐以降、醫術ハ漸次、頽廢シ仙術、陰陽五行等ノ空論臆說ヲ逞クセシガ爲メ、復之ヲ顧ミルモノアラザリシニ本朝ニ傳來シテヨリ漸次進歩ノ曙光ヲ見ルヲ得タリ就中吉益東洞翁輩出シ復古ノ學ヲ絶叫セシヨリ俄然長足ノ發達ヲ遂ゲ此醫方

中最重要ノ位置ヲ占ルニ至レリ然ラハ腹證腹診法トハ如何答テ曰ク洋醫方ニ於テハ解剖、組織、生理、病理等ノ基礎醫學及理化學、器械類進歩ノ關係上、個々臟器ノ病變ニ對スル診斷法ハ精細周密ナレバ甲臟器ニ原發的病變アレバ乙或ハ乙丙等ノ臟器ニ續發的病變ヲ惹起スルノ事實理由ヲ知悉スルモ原發的病變アル甲臟器及續發的病變アル乙其他ノ臟器ヨリ發スル紛淆セル症狀中ヨリ是等數臟器ノ病變ニ固有ニシテ且一定不變ナル他覺症ヲ腹部ニ於テ檢出シ是ヲ以テ處劑ノ目標トシ適方ヲ處スルトキハ此目標ヲ呈スルニ至ラシメタル數臟器ノ病變ハ其原發的タルト續發的タルトヲ問ハズ皆悉ク治療スルノ事實ヲ知ラズ隨テ此目標ニ對スル方劑ヲ有セズ之ニ反シテ漢醫方ニ於テハ數千年間ノ經驗ニヨリ此目標ヲ熟知スルノミナラズ、之ニ對スル方劑ヲ有スルガ故ニ此目標ヲ腹證ト名ケ之ヲ診スル方法ヲ腹診法ト稱シ、之ヲ以テ診斷治療ノ基本トナスナリ、詳言スレバ此腹證ニ脈證、舌證、外證ヲ參照スレバ直ニ其治療法即チ用ユベキ方劑確定スルモノナレバ腹證ト方劑トハ恰モ影ノ形ニ於ケルガ如ク常ニ相隨伴スベキモノニシテ離割スベカラザルモノトス、例ヘバ小柴胡湯、柴胡姜桂湯、大柴胡湯、四逆散等ノ柴胡劑應用上ノ目標タル胸脇苦滿ナル腹證ハ胃加答兒ニモ腸加答兒ニモ肝臟、膽囊、輸膽管ノ炎症ニモ「マラリヤ」ニモ脚氣ニモ心臟病ニモ肋膜炎ニモ肺結核ニモ腎炎ニモ子宮疾患ニモ屢現出スル腹證ナルガ、若シ是等ノ病者ニ胸脇苦滿證アルヲ認ムルトキハ尙更ニ脈、舌、外證ヲ參照シテ柴胡劑中

ノ適方ヲ選用スレバ右ノ諸症ハ皆盡ク治癒ス、故ニ假令肺炎加答兒ヲ胃加答兒ト誤診シ右側肋膜炎ヲ肝臟病ト錯誤ストモ腹證ダニ誤ラザレバ只病名ノ誤診タルニ止リ其療法ニハ誤リナキ理ナルヲ以テ洋醫ノ誤診即チ誤治トハ大ナル選庭アリ、又此理アルガ故ニ此診斷法ニヨルトキハ各種疾病ノ初期ニ當リ不定症狀ノミ存シ診斷困難ナル場合ト雖モ只病名ノ定ラザルニ止リ治法ニ至リテハ始ヨリ開然スル所ナクレバ或ハ治期ヲ遷延シ或ハ挽回シ難キ禍害ヲ病者ニ與フルノ失ナシ又同理ニヨリ此腹診法ニヨルトキハ病ヲ有スルニ拘ラズ之ヲ自覺セザル外觀的健康者ト雖モ其潜伏セル病根ヲ觸知シ得ルガ故ニ是ヲ拔去シ病ヲ未萌ニ制スルヲ得ベシ、仲景師ガ上工ハ未病ヲ治スト云ヘルハ蓋シ此謂ニ外ナラズ。

二個以上ノ臟器ニ病變併發シ又ハ甲臟器ニ原發的病變アリテ是ガ乙臟器ニ續發的病變ヲ起テシメタル場合例ヘバ胃腸加答兒ト子宮病ノ併發セシ際ニ於テモ胸脇苦滿證ダニ存スレバ復、柴胡劑中ノ適方ヲ選用ス爾ストキハ胃腸加答兒モ子宮病モ共ニ能ク治癒ス又脚氣ニ心臟病ヲ續發シタル時ト雖モ胸脇苦滿證ダニ實在スレバ復、同ジク柴胡劑中ノ適方ヲ選用ス爾ストキハ原發病タル脚氣ノ治スルニ隨ヒテ續發病タル心臟病モ亦自ラ治癒ス是レ漢方ノ微妙ナル所以ニシテ洋方ノ企及シ得ザル所ナリ。

### 腹證、腹診法ノ尊重スベキ所以

腹ハ生アルノ本ナリ故ニ百病ハ此ニ根ザス是ヲ以テ病ヲ診スルニハ必ズ其腹ヲ候フトノ東洞翁ノ一言ハ實ニ漢方腹證腹診法ノ大綱ヲ喝破セシモノニシテ之ヲ科學ニ立脚スル洋方ノ原理ニ照スモ亦多大ノ真理ヲ含蓄スルヲ知り得ベシ何トナレバ腹腔ハ身體中最大ナル空洞ニシテ胃、腸、肝、膽囊、輸膽管、脾、膵、腎、副腎、輸尿管、膀胱、攝護腺ヲ收メ女子ニアリテハ更ニ卵巢、輸卵管、子宮ヲ納ムレバ頭蓋腔ノ腦、五臟器ヲ、脊柱管腔ノ脊髓ヲ、胸腔ノ氣管、氣管支、肺、心、食道ヲ藏スルニ過ギザルトハ其箇數ニ於テ比倫スベキニアラザレバ少數臟器ヲ有スル體部ニ比シ多數臟器ノ存スル腹部ハ臟器ノ障礙即チ疾病ヲ發スルコト頻繁ニシテ此部ノ病症ガ他體部疾病ノ原因ヲ爲スノ多カルベキハ必然ノ理ナリ而已ナラズ此腔中ノ胃腸ハ全身ノ營養ヲ主宰スルモノナレバ若シ一朝此臟器ニ障礙ヲ來セバ直ニ全身ニ影響ヲ及スコト恰モ兵站部ノ缺陷ガ忽チ全軍ノ興敗ニ關スルト均シキヲ以テ特ニ重要ナリ。

胃腸ハ攝取器關トシテハ呼吸器ト異ルコトナシト雖モ呼吸器ハ環境ノ異ラザル限リハ各人同一ナル空氣ヲ吸入スルガ故ニ各個人ノ體質ニ於テ差別ナキ以上ハ其疾病モ單純一般的ニシテ各人同様ナルベキ理ナルニ反シ胃腸ノ攝取スル飲食物ハ貴賤貧富ノ差ニヨリ嗜好ノ異ルニヨリ各人

腹證、腹診法ノ尊重スベキ所以

此種性自家中  
毒ヲ食毒ト云

漢方下劑ヲ正  
用スレバ如何  
ニモ病者ヲシ  
テ脱セシメ  
ズ反テ肥體ナ  
ラシム是レ病  
毒ヲ排ズルモ  
體力ヲ奪ハザ  
ルガ爲ナリ以  
テ洋方下劑ト  
テ知ルベシ

尿中ニ腎上皮  
細胞等ヲ混ズ  
ルハ腎炎急劇  
ナルガ爲ナル  
ベキニシテ  
モ之ヲハ當  
然シテ腎臟障  
礙

各様ナレバ其疾病モ亦各人各様ニシテ複雑多端ナルベキハ必至ノ理ナリ、就中腸管ハ身體中最  
大最長ナル下水溝ニシテ食物ノ残渣及種々ノ老廢的毒物ヲ排泄スルノ任務アルモノナレバ若  
シ一度此排泄作用ニシテ障礙セラル、コトアランカ、爲ニ毒物ノ吸收ヲ促シ自家中毒症ヲ現出  
スルニ至ル余ノ實驗ニヨレバ一般ニ原因不明ト稱セラル、諸病ノ過半ハ概シテ此自家中毒症ニ  
根源ス「メチニコーフ氏」ガ人類ノ短命ナルハ腸性自家中毒ノ爲ナリト云ヒシハ愚説ヲ達筆ニ裏  
書スルモノニシテ漢方ニ下劑ノ種類多キハ宜ナリト云フベシ。

腎臟ハ液狀老廢分排泄ノ器關ナレバ若シ是ニ障礙アレバ毒物蓄積シ爲ニ一種ノ自家中毒ヲ來ス  
即チ體表體腔ニ水腫ヲ現ハシ或ハ網膜炎、心臟病、尿毒症ヲ惹起ス此事實理由ハ洋醫モ亦知悉  
スル處ナレドモ此事實以外腎臟障礙ヨリ續發スル疾病ノ夥多ナルヲ知ラザルハ彼等ガ尿ノ鏡  
見、定性定量試験ニ重キヲ措キ檢尿上、腎上皮細胞、血球、圓柱、蛋白等ヲ認メザレバ直ニ腎臟  
障礙ヲ否定スル科學萬能主義ニヨルナリ、何トナレバ此障礙ト是ノ尿變トハ必シモ常ニ一致セ  
ザルノミナラズ反テ不一致ノ場合多クレバナリ、余ノ實驗ニヨレバ水泡性結膜炎、同性角膜  
炎、虹彩炎、網膜炎、弱視等ノ眼患、頭痛、頭重、耳鳴、重聽、眩暈、震戰、搐搦、不眠、神  
經衰弱、「ヒステリー」、神經痛、知覺及運動麻痺等ノ五官器腦脊髓症狀、咳嗽、呼吸息迫、心  
悸亢進等ノ心肺症狀、胃内停水、惡心嘔吐、水瀉性下痢等ノ胃腸症狀ノ如キハ他原因ニ由ルモ

ノナキニアラザルモ其大半ハ腎臟機能障礙ノ結果タル尿性自家中毒症即チ水毒ニ職由ス以テ其  
害毒ノ如何ニ大ナルカラ知ルベシ。

婦人ハ月經障礙殊ニ其短少、閉止ノ多キト産後惡露停滯スルトニヨリ男子ハ遺傳其他ノ關係ヨ  
リ共ニ腹内ニ瘀血ヲ藏シ身體各部ニ疾病ヲ誘發ス。  
之ヲ要スルニ疾病ノ過半ハ腸管ノ排泄障礙即チ食毒ニヨルカ又ハ腎臟ノ排泄障礙即チ水毒ニヨ  
ルカ或ハ瘀血ノ停滯即チ血毒ニヨルカ若クハ此二乃至三因ノ合併ニヨルモノニシテ此他ノ所謂  
原因ナルモノハ皆盡ク誘因近因タルニ過ギザルモノナレバ此三因湧出ノ源泉タル臟器組織ヲ收  
藏スル腹部ハ百病ノ根本ナレバ病ヲ診スルニハ必ズ腹ヲ候ハザルベカラザルノ理ナレバナリ。

### 脈症、脈診法

洋醫ノ脈診ハ殆ンド形成的ニシテ之ヲ實用ニ供スルコトナシト雖モ稀ニハ微弱ノ脈狀アルニ際  
シ「カンフル」注射ヲ施スガ如ク脈診ニヨリテ療法ヲ定ムルコト全然ナキニアラズ然レドモ多ク  
ハ之ヲ以テ病名ヲ決シ豫後ヲトスルノ參考ニ供スルニ止リ脈診、治法間ニ於ケル不可分の關係  
ヲ認ムルニアラサレバ之ヲ輕視スルノ弊ヲ生ゼザルヲ得ザルナリ之ニ反シテ漢方ニアリテハ脈  
診ハ腹診ニ次ゲル重要ナル診斷法ニシテ且治法ヲ指示スル磁針タルノ任務ヲ負フモノトス今之

脈症、脈診法

ヲ具體的ニ論ゼンニ東洞翁ノ言ノ如ク多數ノ疾病ハ腹部ニ根帯スルモノナレバ腹診ノ重要ナルハ辨ヲ俟タザレドモ病症ノ種類ニヨリテハ何等腹部ト交渉ナク專ラ脈ニ其徵候ヲ現スモノアリ、又腹部ニ淵源シ腹證ヲ呈スルモノニアリテモ其虛ナルカ實ナルカ陰ナルカ陽ナルカラ決スルニハ必ず脈證ヲ參照スルノ要アリ、例ヘバ脈浮ナルトキハ病表ニアルノ徵ナレバ必ず發表劑ヲ施スベキモノナレドモ浮ニシテ弱ナルトキハ桂枝湯ヲ浮ニシテ緊ナルトキハ麻黃湯ヲ用ユベキモノナリ、是レ腹證ニヨラズ專ラ脈性ニ隨ヒテ治法ヲ決スル場合ナリ脈沈ナルトキハ病、裏ニアルノ候ナレバ腹證ニ隨ヒテ療法ヲ定ムベキモノナレドモ沈ニシテ實ナルトキハ下劑ヲ沈ニシテ微、弱、細、小ナルトキハ人參、乾姜、附子等ノ溫熱劑ヲ施スベキモノナリ、是レ腹證ト脈證ヲ對照シテ療法ヲ斷ズベキ機會ナリ而シテ桂枝證ハ陽證ニシテ表虛、麻黃湯證ハ同證ニシテ表實、下劑ノ證ハ同證ニシテ裏實、人參、乾姜、附子ノ證ハ陰證ニシテ裏虛ニ屬ス斯如ク脈證、脈診法ハ診斷療法ト極テ緊密ナル關係アレバ古來幾多ノ名醫若工前後輩出シテ研究ニ没頭シ遂ニ脈學ヲ完成シタリシナリ然レドモ脈ハ元來、敏感性ニシテ生理的ノ際ニ於テスラ些少ノ精神感動ニヨリ忽チ變動スルモノナレバ病的ノ場合ハ猶更諸般ノ影響ニヨリ種々多ク變化ス故ニ脈ヲ診シテ誤ナキヲ期センニハ多年ノ經驗ト熟練ヲ要ス、若シ此ニ深ク留意セザランカ到底脈ヲ以テ病ヲ診スルノ域ニ到達スル能ハズト知ルベシ、凡ソ何等ノ學藝タルヲ問ハズ總テ經驗ヨ

脈論ハ經國ノ  
產ナリシガ故  
ニ氏ヲシテ人  
專ニ和ハルナ  
王叔和ハ昔人  
ニシテ始テ傷  
脈論ヲ撰次シ  
リ神子ハ腹孔ナ

リ練リ出サル、直覺力發達セザレバ決シテ技術ノ奧堂ニ入ルコト能ハズ、脈診モ亦然リ畢竟脈ハ書ニヨリテ學ブベキモノニアラズ病者ニ就キ千辛萬苦シテ自得スベキモノナリ中神奉溪氏曰ク。

問テ曰ク越人ト雖モ脈ヲ以テ病ヲ知り王叔和脈經ヲ著テヨリ千載是ヲ以テ醫ノ先務トス然ルニ子獨リ古人云フ處ノ脈論毫モ治療ノ益ニアラズ反テ迷ヲ生メ害多シト云ハ如何ナル緣故ゾ。

答テ曰ク王子曰ク、胸中正シケレバ、則チ神子ハ瞭ナリ、胸中正カラザレバ、則チ神子ハ昧シシ其言ヲ聽クヤ、其昧子ヲ觀レバ、人焉ゾ瘦クシヤ、ト此言千載ノ格言ニシテ其人ノ眞偽虛實ヲ察スルニ眸子ヲ見ルヨリ近キハナシサテ其眸子ノ分ハ辨者モ言フ事能ハズ文人モ記スル事能ハズ唯默シテ心ニ識ルヨリ外ナシ脈モ亦是ト同ク口シテ言フベカラズ、筆シテ記スベカラザルモノ也サルヲ叔和ノ脈經ハ苟モ書キタルモノナレバ後人此書ニ依テ脈ヲ知ル事ハトテモカナハヌ事ト知ルベシ、斯イヘバトテ脈ヲ棄テント云フニ非ズ脈ヲ知ラザレバ病ノ應ヲ知ラズ病ノ應ヲ知ラザレバ藥ヲ施スベキ所ナシ其コレヲ知ルニ術アリ浮、沈、遲、數、滑、澀、ハ誰モ知ル所ナリ、其餘ノ脈ハ醫バ經閉ト知レタル病人ニテ經閉ノ脈ヲ知り懷胎ト知レタル人ニテ懷胎ノ脈ヲ知り何病ニテモ其症ノシカト知レタル脈ニテ診覺ヘ又常ニ心ヲトメテ



異變ノ脈ヲ見ハセバ其病ノ應ヲ考ヘ知ルヤウニ心掛テ習慣スレバ終ニ脈ヲ以テ病ヲ知ルノ地ニ至ル豈扁倉ニ譲ランヤ、是吾門脈ヲ學ブノ術ナリ脈經ヲ究メテソレニテ病ヲ知ント欲スルハ甚迂遠ニシテ彌迷ヒ終ニ真處ヲ知ル事能ハズ、是レ前ニ云如ク口シテ云ベカラズ筆シテ記スベカラザル者ヲ苟モ著シタル書ナレバ也。(下略)

ト洵ニ至言ナレドモ初學者ニハ學習ノ端緒トシテ其定型ヲ示スノ要アレバ脈學輯要中ヨリ拔萃シテ聊カ解説ヲ加ヘ猶淺田氏ノ注意ヲ掲ゲテ參考ニ供ス。

【總說】

朱奉議曰ク凡ソ初、指ヲ下スヤ先、中指端ヲ以テ按ジテ關位ヲ得ベシ掌後ノ高骨ヲ關トナス乃チ齊シク前後ノ二指ヲ下シ三部ノ脈トナス前指ハ寸口ナリ後指ハ尺部ナリ若シ人臂長ケレバ乃チ疎ニ指ヲ下シ臂短ケレバ則チ密ニ下ス。

余曰ク先ツ中指端ニテ高骨即チ橈骨結節部ヲ按ジ次デ示指及便指ヲ中指ニ接シテ下ストキハ寸、關、尺、三部ノ脈ニシテ中指端ノ當ル所ハ關位、示指ノ觸ル、部ハ寸口、便指ノ按ズル所ハ尺部ナリトノ意ナリ。

徐春甫曰ク脈ニ三部アリ曰ク寸、曰ク關、曰ク尺、寸ハ天ニ法リ關部ハ人ニ法リ尺部ハ地ニ法ルナリ寸部ハ上、胸ヨリ心、肺、咽喉、頭目ニ疾アルヲ候フナリ關部ハ中、胸膈ヨリ以下

貯ハヒギナリ

十八難トハ脈  
證脈診法ヲ説  
キタル難經ノ  
ニトナリ  
見ルハ現ルト  
同シ  
六數ハ一呼吸  
時ニ六至アル  
七極ハ七  
至アル脈、三  
至アル脈ナリ  
至アル脈ナリ  
風ハ感冒ナリ  
痰ハ腹内ニ病  
云フ  
冷ハ陰證ト同  
氣ハ神經症ナ  
室ハ實ト同義  
ナリ

小腹ニ至リ疾アルヲ候フナリ脾、胃、肝、膽ハ皆中ニ在ルナリ尺部ハ下、小腹ヨリ腰、腎、膝、筋、足ニ病アルヲ候フナリ大腸、小腸、膀胱ハ皆下ニアルナリ。

按ズルニ此レ十八難三部上中下診候ノ法ナリ(中略)今病者ヲ診スルニ上部ニ疾アレバ應、寸口ニ見レ中部ニ疾アレバ應關上ニ見レ下部ニ疾アレバ應尺中ニ見ル此レ其最モ的實明驗ナルモノニシテ春甫ノ言ヤ誣ザルト爲ス。

吳山甫曰ク東垣、此事難知ヲ著シテ謂フ脈ハ神アルヲ貴ブ神アルハ力アルナリ六數、七極、三運、二敗ト雖モ猶生クト此レ診家精一ノ旨ヲ得タルナリ(中略)脈ノ來ルヤ力アルヲ以テ陽證ト爲シ沈微ニシテ力ナキヲ陰證トナス(中略)浮ニシテ力アルヲ風トナシ力ナキヲ虛トナス沈ニシテ力アルヲ積トナシ力ナキヲ氣トナス遲ニシテ力アルヲ痛トナシ力ナキヲ冷トナス數ニシテ力アルヲ熱トナシ力ナキヲ瘡トナス各其部ニ之ヲ見ス(下略)

滑伯仁曰ク脈ヲ察スルニハ須ク上下來去至止ノ六字ヲ識ルベシ此六字明ナラザレバ陰陽虛實ヲ別ツベカラザルナリ上ルモノヲ陽トナシ來ルモノヲ陽トナシ至ルモノヲ陽トナス下ルモノヲ陰トナシ去ルモノヲ陰トナシ止ルモノヲ陰トナス上ルモノハ尺部ヨリ寸口ニ上リ下ルモノハ寸口ヨリ尺部ニ下ル來ルモノハ骨肉ノ分ヨリ皮膚ノ際ニ出デ去ルモノハ皮膚ノ際ヨリ骨肉ノ分ニ還ル。

面ハ然ト同  
ナリ  
候ハ怒ノ意ニ  
シテ依リハ仿  
佛ノ體ナリ

手ハ弱切ノ  
意ナリ  
候ハ弱切ノ  
意ナリ  
切ハ弱切ノ  
意ナリ

脈底ハ陽證ノ  
候ナリ  
候ナリ  
候ナリ

脈論

陳遠公曰ク脈ヲ看ルニハ須ク神アリ神ナキヲ看ルベシ寔ニ是レ秘訣ナリ而ラバ神アリ神ナキ  
ハ何ヲ以テ之ヲ別ツヤ浮、沈、遲、數、滑、大、小ノ各脈ヲ論ズルナク按指ノ下ニ若シ  
條理アリ先後秩然トシテ亂レザルモノハ此レ神アルノ至リナリ若シ按指シテ充然トシテ力ア  
ルモノハ神アルノ次ナリ其餘、按指シテ微々鼓動スルモノモ亦神アリト云フベシ倘之ヲ按ジ  
テ散亂スルモノ或ハ有リ或ハ無キモノ或ハ來ルニ力アリテ而モ去ルニ力ナキモノ或ハ輕按ス  
レバ有リ而モ重按スレバ絶テ無キモノ或ハ時トシテハ續キ時トシテハ斷ツモノ或ハ續カント  
欲シテ能ハズ或ハ接セント欲シテ得ズ或ハ沈細ノ中ニ條々依稀ノ狀アリ或ハ洪大ノ内ニ忽チ  
飄渺ノ形アルハ皆是レ神ナキノ脈ナリ脈至ツテ神ナキハ即チ長ルベシト爲ス當ニ大補ノ劑ヲ  
用ヒテ急ニ之ヲ救フベシ倘、因循等待セバ變ジテ死脈トナル而シテ後ニ之ヲ救フモ晚シ  
汪石山曰ク(上略)夫レ脈經ノ一書拳拳トシテ人ニ示スニ診法ヲ以テス而モ關卷入着、硬チ形  
ヲ觀、色ヲ察シ彼此參伍シ以テ死生ヲ決スベキヲ言フ望、聞、問、切ハ醫ノ一モ缺クベカラ  
ザルヲ見ルベキナリ覺、得テ偏廢スベケンヤ  
董西園曰ク老者ハ氣血已ニ衰フ脈ハ衰弱ニ宜シ過旺ナレバ則チ病ナリ若シ脈盛ニシテ躁ナラ  
ズ健飯常ノ如キハ此レ稟ノ厚キニシテ壽ノ徵ナリ若シ強ニシテ躁疾ナレバ孤陽トナス少壯者  
ハ脈充實ニ宜シ弱ナレバ則チ病多シ其氣血日ニ盈ルノ年ニシテ之ヲ得ルハ不足ノ謂ナルガ故

孩提強弱ハ幼  
兒ノ意ナリ  
氣絶ハ人事不  
省ナリ  
暴病ハ突發病  
ニシテ氣絶ハ  
病毒ノ鬱積ス  
ルナリ

大毒ハ凡ナリ  
陽有餘ハ陽證  
ノ候ナリ  
火ハ九一及炎  
症ノ意ナリ  
陰不足ハ陰虛  
證ナリ

ナリ若シ脈體小ニシテ和緩ニ三部相等シキハ此レ稟ノ靜ニシテ養ノ定レルナリ惟、細ニシテ  
勁急ナルモノハ則チ不吉トナス故ニ脈ヲ執リ症ヲ審ニスルハ一成ノ矩ナリ人ニ隨ヒテ變通ス  
ルハ圓機ノ義ナリ肥盛ノ人ハ氣外ニ盛ニシテ肌肉豊厚ナレバ其脈多クハ洪ニシテ沈ナリ瘦小  
ノ人ハ氣中ニ急ニシテ肌肉淺薄ナレバ其脈多クハ數ニシテ浮ナリ酒後ノ脈ハ必ズ數ニシテ食  
後ノ脈ハ常ニ洪ナリ遠行ノ脈ハ必ズ疾ニシテ久饑ノ脈ハ必ズ空ナリ孩提機樞ノ脈數ナルハ常  
ト爲スナリ。  
徐春甫曰ク脈無キノ候ハ因ル處一ナラズ久病脈無ク氣絶スルモノハ死シ暴病脈無ク氣鬱スル  
者ハ治スベシ。(下略)

余曰ク久病ノ脈ナク人事不省ナルハ體力脱盡ノ爲ナレバ如何ニ多ク「カンフル」注射ヲ反覆  
スルモ効ナキ理ニシテ突發病ノ無脈、人事不省ハ病毒鬱積ノ致ス處ナレバ汗吐下モヨリ病  
毒ヲ驅逐スレバ治スベキモ「カンフル」注射ノ治シ得ル處ニアラザルナリ。

【浮】

十八難ニ曰ク浮ハ脈、肉上ニ在リテ行クナリ。  
張介賓曰ク大都、浮ニシテ力アリ神アルモノハ陽有餘トナス陽有餘ナレバ則チ火必ズ之ニ隨  
フ(中略)浮ニシテ力ナク空豁ナルヲ陰不足トナス(中略)若シ此等ヲ以テ表證トナストキハ則

脈證、脈診法

泛泛ハ浮ヲ形  
容シタル詳ナ  
リ  
濡ト裏トハ共  
ニ軟ト同意ナ  
リ

蕙ハ蕙ノ古字  
ナリ

熱實ハ陽明證  
ナリ  
小承氣湯ハ下  
劑ナリ  
厥ハ四肢又ハ  
全身ノ冷却ス  
ルヲ云ヒ多ク  
ハ人事不省ヲ  
伴フ

宿食トハ飲食  
物ノ停滯スル  
ヲ云フ

舉按ノ舉ハ輕  
ク按ズルヲ云  
ズルヲ云フ

寒熱ハ寒熱發  
熱ナリ虚勞ハ  
神結核ナリ  
外邪ハ屬ナリ  
フスヘナリ  
虚損ハ虚証ナ  
リ

チ害ヤ莫大ナリ。

張路玉曰ク浮脈ハ指ヲ下セバ即チ浮象顯レ之ヲ按ズレバ稍、減ジテ空ナラズ之ヲ舉グレバ泛  
泛トシテ流利シ虚脈ノ之ヲ按ジテ振ハズ其脈ノ之ヲ尋ネテ中空、濡脈ノ綿奧力ナキニ似ザル  
ナリ浮ハ經絡肌表ノ應トナス(中略)故ニ凡ソ浮脈ノ病ヲ主ルハ皆表ニ屬ス。

【朮】

張三錫曰ク朮ハ草名ニシテ其葉ハ蕙ニ類シテ中空、指下ニ浮大ニシテ力ナキモノ是ナリ亡  
血、陰虛、陽氣浮散ノ像ナリ(中略)諸失血過多及產後ニ多ク見ル。

張介賓曰ク浮大中空ニシテ按ズルニ蕙管ノ如シ其ハ孤陽脫陰ノ候ト爲シ失血、脫血ト爲ス。

【滑】

通思邈曰ク之ヲ按ズルニ珠子ノ動クガ如シ、名ケテ滑ト云フ滑ハ陽ナリ。

滑伯仁曰ク滑ハ濡ラザルナリ往來流利スルコト盤ヲ珠ノ走ルガ如シ。

按ズルニ傷寒論ニハ滑ヲ以テ熱實ノ脈トナス曰ク脈反テ滑、當ニ去ル處アルベシ之ヲ下セ  
バ乃チ愈ユ曰ク脈滑ニシテ疾ナルモノハ小承氣湯之ヲ主ル脈浮滑、此レ表ニ寒アリ裏ニ熱  
アルナリ、曰ク脈滑ニシテ厥スルモノハ裏ニ熱アルナリ曰ク脈滑ニシテ數ナルモノハ宿食ア  
ルナリト此レ皆陽盛熱實ノ候トナス然レドモ虛家ニ反テ滑脈ヲ見スモノアリ乃チ是レ元氣

外泄ノ候トス學者細心體認セザルベケンヤ。

【洪】

吳山甫曰ク洪ハ猶、洪水ノ洪ノ如シ脈ノ來ルヤ大ニシテ鼓ツナリ。

張介賓曰ク洪ハ大ニシテ實ナリ舉按ニ皆餘リ有リ洪脈ハ陽トナス(中略)血氣燔灼、大熱ノ候  
トナス浮洪ナレバ表熱トナシ沈洪ナレバ裏熱トナス(下略)

【數疾】

吳山甫曰ク數ハ醫者ノ一呼一吸ニ病者ノ脈來ルコト六至ナルヲ數ト云フ若シ七至、八至ナル  
モ則チ又數ナリ九至、十至、十一至、十二至ナレバ則チ數ノ極ナリ七至ヲ甚シト云ヒ八至ヲ  
已ニ治シ難シトナス九至以上ハ皆治セザルトナス嬰兒ノ若キハ純陽ノ氣ナレバ則チ七至、八  
至モ又其常ナリ大人ノ例ニ在ラズ。

張介賓曰ク五至、六至以上、凡ソ急、疾、緊、促ノ屬ハ皆其類ナリ寒熱トナシ虚勞トナシ外  
邪トナシ癰瘍トナス滑數、洪數ニハ熱多ク澁數、細數ニハ寒多ク暴數ニハ外邪多シ久數ハ必  
ズ虚損ナリ數脈ニハ陰アリ陽アリ。

汪石山曰ク大凡、病ニ數脈ヲ見ストキハ多クハ治シ難シ病久シクシテ脈數ナルハ尤モ宜キ所  
ニアラズ。

野ハ快ナリ  
眞陰虧損トハ  
陰虛證ノ甚キ  
ナリ

日ハ陽ニシテ  
月ハ陰ニシテ  
日アリテ月ナ  
シトハ陽アリ  
テ陰ナシトノ  
意ナリ  
僅ニ胸中數寸  
ノ間ニ呼吸シ  
テ根蒂ニ達ス  
ルコト能ハズ  
トハ淺表性ノ  
呼吸困難ナリ  
息道ナリ

魚際ハ搏指球  
ナリ

蕭萬興曰ク(上略)蓋シ數ハ本、熱ニ屬ス而ルニ眞陰虧損ノ脈モ亦急數ナリ然シテ愈ヨ數ナレ  
バ則チ愈ヨ虚ニシテ愈ヨ虚スレバ則チ愈ヨ數ナリ此ニシテ一タビ差フトキハ生死掌ヲ反ス。

【疾】

李士材曰ク六至以上ノ脈ニ兩種アリ或ハ名ケテ疾ト曰ヒ或ハ名ケテ極ト曰フ總テ是レ急速ノ  
形ニシテ數ノ極ナリ是レ惟、傷寒熱極及勞瘵虛憊ノ人、方ニ此脈ヲ見ス陰髓下ニ竭キ陽光上  
ニ亢リ日アリテ月ナシ之ヲ以テ死期ヲ決スベシ必ズ喘促聲嘶ニ至リ僅ニ胸中數寸ノ間ニ呼吸  
シテ根蒂ニ達スルコト能ハズ眞陰下ニ極リ孤陽上ニ亢リ而シテ氣ノ短ナルヤ已ニ極レリ。  
按ズルニ疾ハ乃チ數ノ甚キナリ(中略)之ヲ病者ニ驗スルニ脚氣惡證ノ脈、多クハ數疾ニシ  
テ來去スルコト甚ダ銳シ。

【促】

高陽生曰ク促ハ速ナリ迫ナリ、陽ナリ指下ニ之ヲ尋ヌルニ極數ニシテ寸口ニ併居スルヲ促ト云フ  
漸ク加ハレバ則チ死シ漸ク退ケハ則チ生ク。

楊仁齋曰ク促ハ陽ナリ貫珠シテ上リ寸口ニ促シテ魚際ニ出ツ之ヲ尋ヌルニ數急ニシテ時ニ止  
ルニ似テ復、來ル

方龍潭曰ク夫レ促脈ハ脈ノ疾促ニシテ寸口ニ併居スルノ謂ナリ蓋シ促ハ數ノ勝ルモノニシテ

數ハ促ノ源ナリ先ツ數ニシテ後、促ス此レ至數ノ極ナリ。

【弦】

李中梓曰ク(上略)叔和云フ弓弦ヲ張ルガ如シト巢氏云フ之ヲ按ジテ移ラズ綽綽トシテ琴瑟ノ  
絃ヲ按ズルガ如シト同父云フ中ヨリ直過シ指下ニ挺然タリト諸家ノ弦脈ヲ論ズルヤ深切著明  
ナリト謂フベシ、

吳山甫曰ク雙弦ハ脈ノ來ルヤ二線ヲ引クガ如キナリ肝實トナシ痛トナス若シ單弦ナレバ一線  
ノミ。

徐忠可曰ク一手ニ兩條ノ脈アルトキハ亦雙弦ト曰フ此レ乃チ元氣壯ナラザル人往々多ク此脈  
ヲ見ス亦虚ニ屬ス

案ズルニ弦脈ニハ大要ニアリ邪ノ少陽ニ在ルモノ有リ應邪ハ亦少陽ニ在リ故ニ金遺血氣收斂シ筋  
脈拘急スル者アリ故ニ多ク兼テ弦脈ヲ見ス胃氣衰敗シテ木邪、土ニ乘ズルノ者アリ虚勞ニ多ク弦細數

【緊】

案ズルニ緊ノ一脈ハ古今ノ脈書ニ其要領ヲ得タルモノナク皆弦ト相似タルヲ謂フ予ノ家君  
嘗テ曰ク素問、仲景謂ノ處ノ緊脈ハ必ズ諸家說ク所ノ如キニアラザルナリ蓋シ緊ハ散ゼザ  
ルナリ其廣サ界限アリテ脈ハ肉ト劃然、分明ナルヲ謂フナリ寒ハ收引ヲ主ル脈道之レガ爲

脈證、脈診法

緯ハしなやか  
ノ意ナリ  
振ハぬきでる  
さまなみく  
からかけ離れ  
てゐるさまナ  
リ

痛ハ一マラリ  
ヤ一ナリ  
症ハハ肋骨  
下ニアル凝結  
物ナリハ腸ノ  
性積ナリハ  
木邪ニ乘ズ  
トハ陰土ニ  
フベカテラズ  
隨行



管脈トハ血液  
淋巴液ノ總稱  
ナリ  
四末ハ四肢ナ  
リ

テ六脈系ノ如ク微細ニシテ軟、甚キハ無キニ至リ或ハ兩手俱ニ無ク或ハ一手先ツ伏ス其人ヲ察スルニ此脈アルニ應ゼザルニ今此脈アルハ應ニ下スベクシテ下ヲ失シ内結壅閉、營氣内ニ逆シ四末ニ達スルコト能ハザルニ緣ル此レ脈厥ナリ(下略)

余曰ク此脈厥アルニ際シ徒ニ「カンフル」注射ヲ事トシ下劑ヲ願ミザルノ醫家稀ナラズ猛省スベシ。

【革】

李東璧曰ク諸家ノ脈書ニハ皆以テ牢脈トナス故ニ或ハ革アリテ牢ナク牢アリテ革ナク混淆シテ辨タズ革ハ浮、牢ハ沈、革ハ虛、牢ハ實ニシテ形證ノ皆異ルヲ知ラザルナリ。

案ズルニ仲景曰ク脈弦ニシテ大、弦ナレバ則チ減トナシ大ナレバ則チ朮トナシ減ナレバ則チ寒トナシ朮ナレバ則チ虛トナス虛寒相搏ツ此ヲ名ケテ革トナス婦人ナレバ則チ半產漏下男子ナレバ則チ失精亡血トナスト此ニ因テ之ヲ觀レバ時珍諸家ノ誤リヲ辨ジ得タリトナス

【牢】

逯思邈曰ク牢脈ハ之ヲ按ズルニ實強ニシテ其脈ハ沈、伏ニ似タルアリ名ケテ牢ト曰フ牢ハ陽ナリ。

按ズルニ革ハ浮堅根ナキノ極ニシテ牢ハ沈堅根アルノ極ナリ當ニ之ヲ以テ之ヲ辨スベシ。

【實】

近ハ高ノ意ナ  
リ  
三焦ハ上焦、  
中焦、下焦ノ  
暑ニシテ上焦  
ハ乳以上ノ部  
ヲ中焦ハ乳以  
下臍ニ至ル部  
ヲ下焦ハ臍以  
下ノ體部ヲ云  
フ

滑伯仁曰ク實ハ虛ナラザルナリ按舉スルモ絶タズ迢迢トシテ長ク動キテ力アリ疾ナラズ遲ナラズ三焦氣滿ノ候トナシ嘔トナシ痛トナシ氣塞トナシ氣聚トナシ食積トナシ利トナシ伏陽内ニアリトナス。

張介賓曰ク實脈ニ真假アリ眞實ノモノハ知り易ク假實ノモノハ誤り易シ故ニ必ず其因ル所ヲ問ヒ而シテ兼テ形證ヲ察セバ必ず其神ヲ得ン方ニ是レ高手トス。

【微】

滑伯仁曰ク微ハ顯レザルナリ依稀輕細ニシテ、有ルガ若ク無キガ若シ氣血俱ニ虛スルノ候トナス。

張路玉曰ク微脈ハ有ルニ似テ無キガ若ク絶ヘントシテ絶ユルニアラズ而モ之ヲ按ズレバ稍、模糊ノ狀アリ弱脈ノ小弱ニシテ分明ナル細脈ノ纖細ニシテ力アルニ似ザルナリ。

【澹】

戴同父曰ク脈ノ來ルヤ蹇、澹、細ニシテ遲、流利圓滑ナルコト能ハザルモノハ澹ナリ滑ト相反ス。

細ト云フ

脈澹、脈蹇法

蹇ハさどまる  
停ノ意ニシテ  
澹ハしぶるノ  
義ナリ

食積ハ宿食ト  
同ジ  
伏陽ハ陽證伏  
匿ノ意ナリ

李中梓曰ク細ノ義タルヤ小ナリ微脈ハ則チ模糊トシテ見難ク細脈ハ則チ顯明ニシテ見易シ故ニ細ハ微ニ比スレバ稍稍、較大ナリ。

軟即チ濡ニシテ又  
裏裏ニ作ル

李東壁曰ク水上ノ浮濡ノ如ク重手ニテ之ヲ按ズレバ手ニ隨ヒテ沒スルノ象ナリ又曰ク浮細ニシテ綿ノ如キヲ濡ト云ヒ沈細ニシテ綿ノ如キヲ弱ト云ヒ浮ニシテ極細斷タザルヲ細ト云フ。李士材曰ク(上略)久病、老年ノ人在リテ之ヲ見スモ尙未ダ必絶ニ至ラズ其脈、症ト合ストナスナリ若シ平人及少壯、暴病ニ之ヲ見セバ名ケテ無根ノ脈トナス死ヲ去ルコト遠カラズ。

【弱】

李東壁曰ク弱ハ乃チ濡ノ沈ナルモノニシテ(中略)病後、老人ニ之ヲ見セバ順ニシテ平人、少年ニ之ヲ見セバ逆ナリ。

【虛】

周正倫曰ク虛ハ實セザルナリ力ナキヲ虛トナス按ジテ骨ニ至リ脈ナキモノハ之ヲ力ナシト謂フナリ。

【散】

滑伯仁曰ク散ハ聚ラザルナリ陽アリテ陰ナシ之ヲ按ズルニ指ニ滿チ散ジテ聚ラズ來去明ナラ

ズ誤クシテ根抵ナシ氣血耗散、府藏氣絶トナシ虛陽歛メザルヲ主ル。

【緩】

吳山甫曰ク緩ノ狀ハ琴弦ノ久シク更張ヲ失セルガ如ク緩ミテ整ハザルヲ緩ト曰ヒ遲ト同ジカラズ遲ハ數ヲ以テ言ヒ緩ハ形ヲ以テ言フ其別ヤ相違シ。

【遲】

吳山甫曰ク遲ハ醫者ノ一呼一吸ニ病者ノ脈來ルコト三至ナルヲ遲ト曰フ二至、一至モ則チ又遲ナリ若シ二呼二吸ニ一至ナルトキハ遲ノ極ナリ陰脈ナリ陽虛トナシ寒トナス。(下略)

按ズルニ程應旆曰ク遲脈ハ邪聚熱結、腹滿胃實ノ經隧ヲ阻住シテ成ル者アリ又知ラザルベカラズト今驗スルニ癰疽疔氣ノ隧道ヲ塞遏シテ遲脈ヲ見スモノアリ是レ雜病モ亦遲ヲ以テ概シテ寒ト爲スベカラザルナリ。

余曰ク師ガ脈遲汗出ツト雖モ云々ノ證ニ峻下劑タル大承氣湯ヲ用ユルニヨツテ之ヲ見レバ遲脈ハ必シモ陰證ノ徵ニアラザルヲ知リ得ベシ而已ナラズ余ノ實驗ニヨレバ現今遲脈アルノ病者ハ概シテ皆陽實證ニシテ下劑ノ適應症タラザルハナシ吳山甫ノ言悉ク信スベカラズ。

【結】

脈證、脈診法

經脈、隱道ハ  
血管系ノ意ナ  
リ  
癰疽ハ腹内ノ  
癰結物ヲ云フ  
傷寒以外ノ諸  
病ヲ雜病ト云フ







一、黒點アル事  
二、血が赤ナリ  
三、血が白ナリ  
四、血が黄ナリ  
五、血が紫ナリ  
六、血が青ナリ  
七、血が黒ナリ  
八、血が赤白ナリ  
九、血が赤黄ナリ  
十、血が赤紫ナリ  
十一、血が赤青ナリ  
十二、血が赤黒ナリ  
十三、血が白黄ナリ  
十四、血が白紫ナリ  
十五、血が白青ナリ  
十六、血が白黒ナリ  
十七、血が黄紫ナリ  
十八、血が黄青ナリ  
十九、血が黄黒ナリ  
二十、血が紫青ナリ  
二十一、血が紫黒ナリ  
二十二、血が青黒ナリ

王叔和曰ク魚翔ハ魚行カズシテ但、尾ヲ搏チ頭ヲ動カシ身ヲ搖シテ久住スルニ似タルモノ是ナリ。

(7) 釜沸

王叔和曰ク三部ノ脈、釜中ノ湯沸ノ如シ朝ニ得レバ暮ニ死シ夜半ニ得レバ日中ニ死シ日中ニ得レバ夜半ニ死ス。

橘窓書影ニ曰ク。

脈學ハ先、浮沈ニ脈ヲ經トシ緩、緊、遲、數、滑、瀉、大、脈ヲ緯トシテ病ノ進退、血氣ノ旺衰ヲ考究スルトキハ其餘ノ脈義、追々手ニ入ルモノナリ。

所謂強心藥ハ真正ナル強心藥ニアラズ。

病者ノ心臓漸ク衰ヒ脈力減弱スルニ至レバ洋醫ノ多數ハ「カンフル」注射ヲ反覆シ以テ萬全ノ策トシ若シ効ナク死スルアレバ之ヲ以テ天命ニ歸シ深ク怪マザルガ如キモ是レ甚ダ謂レナキノ治法ト云ハザルベカラズ何トナレバ抑モ心臓、脈力衰弱ノ原因タルヤ頗ル多端ニシテ決シテ單一ニアラズ即チ食毒ニ因ルアリ水毒ニ因ルアリ血毒ニ因ルアリ是等二乃至三毒ノ合併ニ因ルアリ又是等ノ原因ニ近因更ニ添加セルモ因ルモノアレバ果シテ其原因ノ何レニアルヤ洞察シ能ク之ヲ除去スルトキハ結果ニ過ギザル心臓、脈力ノ衰弱ハ治セズシテ自ら恢復スルノ理ナリ然ル

漢方ニ於テモ  
一、心臓衰弱等  
二、心臓興奮等  
三、心臓停止等  
四、心臓過動等  
五、心臓過弱等  
六、心臓過速等  
七、心臓過遲等  
八、心臓過強等  
九、心臓過弱等  
十、心臓過速等  
十一、心臓過遲等  
十二、心臓過強等  
十三、心臓過弱等  
十四、心臓過速等  
十五、心臓過遲等  
十六、心臓過強等  
十七、心臓過弱等  
十八、心臓過速等  
十九、心臓過遲等  
二十、心臓過強等

ニ其原因ヲ究メテ之ヲ驅除スルノ策ヲ講ゼズ千篇一律ナル「カンフル」注射ヲ以テ末節ニ過ギザル心臓脈力ノ衰弱ヲ治セントスルハ恰モ水源地ノ殖林、砂防工事ヲ怠リ河川改修ヲ施スコトナク而シテ下流ノ汎濫ヲ制セントスルガ如シ其効果ノ擧ラザルハ當ニ然ルベキ所ナリ若シ「カンフル」ニ果シテ効アリトセバ其ハ線香花火式一過性ノ効タルニ止リ斷ジテ永續スルコトナシ若シ永續的効果アリトセバ其ハ「カンフル」自家ノ効ニアラズシテ併用セシ他藥ノ効ニアラザレバ病者ノ體力未ダ全ク脱盡セズ「カンフル」ノ有無ニ拘ラズ自ら恢復スベカリシモノニシテ「カンフル」ヲシテ僥倖的ニ名ヲ成サシメタルナリ之ニ反シテ漢方ニアリテハ病原ヲ治スルノ方劑アルモ、「カンフル」的所謂強心藥アラザルニ反テ能ク強心作用ヲ全ウスルハ名ナクシテ實アルモノト謂フベシ。

### 瘀血ノ害毒

漢方ニ特説スル瘀血ノ意義ヲ討究スルニ瘀血ノ瘀字ハ汚穢ノ意ニシテ血字ハ無論血液ノ義ナレバ瘀血トハ汚穢ナル血液即チ正常血液ニ反スル血液ノ謂ニシテ之ヲ現代ニ解釋スレバ瘀血トハ變化シタル非生理的血液ニシテ既ニ血液タルノ資格ヲ喪失セルノミナラズ反テ人體ヲ害スル毒物ナレバ斯ル毒物ハ速ニ體外ニ排除スベク一刻ト雖モ存在セシムベカラザルモノナリ今眼光ヲ一轉シ他面ヨリ觀察ヲ下スニ婦人ニ月經アルハ妊娠豫備的造化ノ妙機ナレドモ月經血自家ハ

此機轉ニ關與スルニアラズシテ只此機轉ノ開始ヨリ完了ニ至ル期間内ニ發スル一現象タルニ過ギザルモノナリ換言スレバ月經血ハ此機轉ノ開始ト完了ヲ報ズル信號旗タルニ止リ此機轉ニ參與セザルノミナラズ實ハ此機轉ナル主人ヨリ解雇セラレシ不良ノ僕婢ニシテ而モ毒性ヲ有スルモノナレバ是ヲ上論ト對照スルトキハ月經血ハ即チ瘀血ナリトノ結論ニ到達ス故ニ月經血ニシテ若シ排泄阻碍セラレ或ハ全ク閉止スルコトアラシカ其毒力ハ能ク人ヲシテ病マシムルニ足ルノミナラズ既ニ抗菌性ヲ失ヒ且血液培養基ニ等シキ瘀血ハ細菌ノ寄生繁殖ニ好適ナル理ナレバ容易ニ各種ノ細菌ヲ誘致シ諸般ノ炎症病ヲ成立セシム而已ナラズ瘀血ノ停滯久シク且高度ナルトキハ生殖器ハ勿論之ニ隣接セル腸管・腸間膜淋巴腺等ノ血管内ニ沈着スルノミナラズ其一部ハ生理的血液ト共ニ全身ニ循環シ各種ノ臟器組織内ニ沈着シテ血塞ヲ生ジ肺・肝・脾・腎ニハ出血性硬塞ヲ來シ腦・肺ニハ血栓ヲ發シ心臟・血管壁ニ凝着シテ心臟瓣膜病・狹心症・動靜脈瘤・血管硬變等ヲ起シ尙是等ノ疾病ヨリ諸般ノ病症ヲ續發セシム斯ノ如キ複雜多端ナル病症ト雖モ皆悉ク月經ノ排泄阻碍ニ因ラザルハナケレバ機宜ヲ失セズ凱切ナル通經劑ヲ處スルトキハ經血ノ疎通スルハ勿論將來續發スベキ諸病ヲモ未然ニ制シ得ベキニ此種方劑ノ缺乏セル洋方ニアリテハ原病タル月經排泄阻碍ニ對スルニモ續發セシ諸病ニ應ズルニモ姑息苟安ナル對症療法ヲ施スノ外治略ナシ之ニ反シテ漢方ニ於テハ通經劑即チ驅瘀血劑トシテ瘀血ノ陽實性ナルニハ桃

仁、牡丹皮ヲ陰虛證ナルニハ當歸、芍藥ヲ陳久性ナルニハ蠶蟲、水蛭、虫蟲、乾漆ヲ配セル方劑アリ又續發的諸病ニハ此驅瘀血劑ヲ其對證方劑ニ合用若クハ兼用スルガ故ニ器質的變化ノ高度ニ達セシ古ノ所謂病膏盲ニ入リシモノニアラザレバ之ヲ治スルヲ難シトセズ。

讀者ハ以上樓說セシ處ニヨリ洋方中ニ需メ得ザル驅瘀血劑漢方中ニ具備シ此醫方ノ爲メ、萬丈ノ氣ヲ吐クヲ知リシナラン然レドモ若シ這ノ説明ノミニ止メンカ一家言ナリ獨斷ナリトノ誹謗ヲ免レザルベケレバ左ニ往聖先賢ノ論說治驗ヲ列舉シ以テ其然ラザラ立證セン。

仲景師曰ク

婦人(中略)經斷チテ未ダ三月ニ及バズ漏下ヲ得テ止マズ胎動、臍上ニアル者ハ瘕瘕、妊娠ヲ害ストナス(中略)血、止マザル所以ハ其瘕、去ラザルガ故ナリ當ニ其瘕ヲ下スベシ桂枝茯苓丸之ヲ主ル。

瘕トハ玉編ニ瘕ハ腹結病ナリト云ヒ尾台氏ハ蓋シ腹中ニ凝結ノ毒アリ之ヲ按ズレバ手ニ應ジテ徵知スベキヲ謂フト曰ヘルガ故ニ瘕トハ腹内ニ小腫瘤狀ヲナスモノナルヤ明ニシテ之ガ月經閉止ト子宮出血トニ因果的關係アルニヨリテ見レバ瘕ノ血塞ナルヲ推知シ得ベク又師ガ血止マザル所以ハ其瘕去ラザルガ故ナリト曰ヘルニヨリテ此出血ハ瘕即チ血塞ノ爲メ血流阻碍セラレ側枝血行ニ血壓昇騰セシ結果ナルヲ察シ得ベク又師ガ當ニ其瘕ヲ下スベシ桂枝茯苓丸之ヲ主ルト

瀉下ハ子宮出  
血ナリ  
桂枝茯苓丸中  
ニハ桃仁牡丹  
皮ヲ含ム

法ハ法則トシ  
テハ意ナリ假  
令ハ假設ノ義  
ナリ

曰ヘルニヨリテ此方ニ血塞及之ニ因ル出血ヲ治スルノ作用アルヲ知り得ベシ。  
又曰ク

産婦腹痛法、當ニ枳實芍藥散ヲ以テスベシ假令愈ヘザルモノ此レ腹中乾血アリテ臍下ニ著ク  
ト爲ス下瘀血湯之ヲ主ル又經水不利ヲ主ル

下瘀血湯方

大黃二兩 桃仁二十枚 蟅蟲二十枚

右三味之ヲ末トシ煉蜜ニ和シテ四九ト爲シ酒一升ヲ以テ一丸ヲ煎ジ八合ヲ取り之ヲ頓服  
ス新血下ルコト豚肝ノ如シ。

(註)徐靈臺氏曰ク新字ハ當ニ瘀字ニ作ルベシ尾臺氏曰ク新血ハ疑フラクハ乾血ノ誤ナラン

ト余曰ク前說理ナキニアラザルモ後說ヲ以テ優レリトス何トナレバ師ハ既ニ此レ乾血  
アリテ臍下ニ著クトナスト曰ヘルガ故ニ本方服後ニ下ルモノ、乾血タルヤ明ナレバナ  
リ而シテ乾血トハ瘀血ノ陳久ナルモノ、謂トス。

師ガ經水不利ヲ主ルト云ヒ又頓服ノ後乾血下ルコト豚肝ノ如シト曰ヘルニヨリテ之ヲ見レバ此  
腹痛ハ月經排泄不充分ナル原因ニヨリ瘀血久シク臍下部ノ血管内ニ凝滯シ即チ血塞ヲ形成シ以  
テ隣接部ノ知覺神經ヲ壓迫刺戟シタルニ由ルモノニシテ本方服後ニ鎮痛スル所以ハ神經刺戟ノ

原因タリシ乾血即チ血塞ガ豚肝狀ニ變化セラレテ排除セラレシニヨルナリ。

續建珠錄ニ曰ク

攝州船場ノ賈人某ナル者ノ女年十八、便秘シテ通ジ難キモノ茲ニ年アリ近日經閉三月ニ及ブ  
其父母窃ニ奸通ヲ疑フナリ乃チ醫ヲシテ察知セシム醫曰ク懷妊ナリト女肯ゼズ復、他醫ヲシ  
テ察セシム醫之ヲ察知スルコト能ハズ乃チ先生ヲシテ診セシム其腹ヲ按ズルニ臍下ニ一小塊  
アリ手ヲ之ニ近クレバ則チ痛ム先生曰ク是レ蓄血ナリ双身ニアラザルナリト乃チ大黃牡丹皮  
湯ヲ與フ湯ヲ服スルコト三貼ニシテ下利十數行、黑血ヲ糞ユ爾後塊半ヲ減ズ又當歸芍藥散ヲ  
兼用シテ幾モナク經水來リ大便平日ノ如シ。

月經閉止スルコト三月臍下部ニ小塊ヲ生ジタルモノ大黃牡丹皮湯ノ服用後、黑血ヲ下シ小塊ノ

半減シタルニヨリテ之ヲ見レバ其小塊ノ血塞タリシヤ疑フノ餘地ナシ。

類聚方廣義桂枝茯苓丸條ニ曰ク

經水調ハズ時々頭痛、腹中拘攣或ハ手足痺痺スルモノ或ハ經期ニ至ル毎ニ頭重眩暈、腹中腰  
脚疼痛スルモノ(中畧)經閉上衝頭痛、眼中ニ翳ヲ生シ赤脈縱橫、疼痛羞明、腹中拘攣スル  
モノヲ治ス。

頭痛、頭重、眩暈スルハ瘀血ノ頭腦ニ上衝シタルニ因リ翳ヲ生シ血管怒脹、疼痛、羞明スルハ

瘀血ノ害也

蓄血ハ瘀血ヲ  
蓄フルノ意ナ  
リ  
大黃牡丹皮湯  
中ニハ桃仁、  
牡丹皮アリ  
當歸芍藥散中  
ニハ當歸、芍  
藥アリ

其ノ眼球ニ波及セシガ爲ニシテ手足麻痺、腰脚疼痛スルハ其ノ腰部或ハ四肢ニ傳播シテ知覺神經ヲ侵襲シタルニヨルナリ。

全書桃核承氣湯條ニ曰ク

經水調ハズ上衝甚シク眼中ニ厚膜ヲ生ジ或ハ赤脈怒起、險胞赤爛或ハ齶齒疼痛、小腹急結スル者ヲ治ス。

經閉、上逆發狂スルヲ治ス。

此眼患及齶齒疼痛モ亦瘀血上衝ノ結果ニシテ發狂即チ精神病ヲ發スルハ其ノ劇甚ナルガ爲ナリ。

全書抵當湯條ニ曰ク

婦人經水不利ノモノ棄テ置キテ治セザレバ後必ず胸腹煩滿或ハ小腹鞭滿、善饑、健忘、悲憂、驚狂等ノ症ヲ發シ或ハ偏枯、癱瘓、勞瘵、鼓脹、膈噎等ノ症ヲ釀成シ遂ニハ起タザルニ至ル早ク此方ヲ用ヒテ血隨ヲ通暢シ以テ後患ヲ防クベシ。

(註)胸腹煩滿トハ煩シク感ズル胸腹部(胸ハ心下部ノ意ナリ)ノ膨滿ニシテ小腹鞭滿トハ下部ノ膨滿スルナリ善饑ノ善字ハ數ノ意ナレバ善饑トハ即チ多嗜症ニシテ健忘、悲憂、驚狂ハ神經衰弱、「ヒステリー」「ヒポコンデリー」等ノ神經症及精神病ナリ偏枯ハ半身不

桃核承氣湯中ニハ桃仁アリ  
險胞ハ眼瞼ナリ

抵當湯中ニハ水蛭、虻蟲、桃仁アリ

遂ニシテ癱瘓ハ脊髓麻痺ナリ鼓脹トハ腹部膨大病ノ總稱ナレバ子宮及卵巢ノ腫瘤ノ如キヲモ包含スルモノニシテ膈噎トハ食道、胃狹窄症ノ汎稱ナレバ食道癌、胃痛ヲモ含蓄スルナリ血隨ノ隨字ハあなみちノ意ナレバ血隨ハ即チ血管系ノ義ナリ。

以上ノ論說治驗ヲ熟讀玩味セバ愚說ノ誣妄ナラザルヤ瞭然タラン。

婦人ノ瘀血ハ獨リ月經障礙ニ因ルノミナラズ産後惡露排泄不全ニ因ルコト亦尠カラズ何トナレバ此惡露タルヤ妊娠期間中ニ生ゼル瘀血ニ外ナラザレバ分娩後自然ニ排出セラルベキ要約アルモノナレトモ或ハ自然良能作用ノ及バザルニヨリ或ハ人工的ニ之ヲ抑止スルニヨリ全ク排除セラレザルトキハ腹内ニ沈着シ各種疾患ノ淵源ヲナスコト月經障礙ニ於ケルト異ルコトナシ。

子玄子產論ニ曰ク

凡ソ産后三日必ず折衝飲ヲ用ヒ外證ト虛實ニ拘ル勿レ惡露未ダ盡キザル者、百患立ニ生ジ危斃待ツベキナリ之ヲ慎メ之ヲ慎メ。

(註)此說ハ一般論トシテハ甚ダ可ナルモ外證ト虛實ニ拘ル勿レト云フニ至リテハ極端ナリ學者盡ク信ズベカラズ。

生々堂治驗ニ曰ク

間街五條ノ北、笠屋伊兵衛ノ妻半産ノ后、面色黎黑ニシテ上氣頭暈ス先生之ヲ診スルニ脈緊

折衝飲ハ桂枝茯苓丸加味方ナリ

發熱汗出  
精神病ハ桃  
承發湯ノ反  
ナリ  
症狀即チ  
眩暈

ニシテ臍下結硬ス曰ク此レ蓄血アルナリト即チ抵當湯ヲ與フルコト三日ニシテ腰以下解怠ヲ覺ユ更ニ桃核承氣湯ヲ與フ果シテ大戰寒スルコト頃アリテ發熱汗出デ譫語、四肢痙攣シ前陰ヨリ血塊其形鶏卵ノ如キヲ出スコト六日間約二十餘ナリ仍ホ前方ヲ用ユルコト二句ニシテ宿患忘ル、ガ如シ。

(註) 黎黑ハ光澤ナキ黃黑色ニシテ頭暈ハ眩暈ナリ臍下結硬ハ下腹部ニ堅硬ナル凝塊アルノ意ナレバ即チ血塞ニシテ譫語ハ譫語ナリ痙攣ハ間代性痙攣ニシテ前陰ハ臍口ナリ。

此症ハ流産時惡露排泄不全ナリシガ爲メ、下腹部ニ血塞ヲ生ジ其餘波頭腦ニ及ビテ眩暈スルニ至ラシメシモノニシテ抵當、排核承氣湯ノ服用ニヨリ瘀血全ク排出セラレシガ爲メ治癒シタルナリ。

產育論ニ曰ク

凡ソ産后玉門不閉ニ桂苓黃湯ヲ與ヘテ瘀血ヲ除クトキハ則チ清血充暢シ其不閉ハ自ラ治ス。

(註) 玉門ハ臍口ナレバ玉門不閉ハ即チ會陰破裂ニシテ桂苓黃湯ハ桂枝茯苓丸ニ大黃ヲ加ヘテ煎劑トナシタルモノナリ會陰破裂ヲ治スルニ内服藥ヲ以テス微妙ナラズヤ。

又同書ニ曰ク

産后惡露下ラズ腹中脹痛スル者、桂苓黃湯ニ宜シ。

又曰ク

産后惡露日久シク斷タズ時々淋瀝スルトキハ當ニ其血色ノ汚濁、淺淡、臭穢ヲ審ニシテ方藥ヲ辨ズベシ淺淡ナレハ芎歸膠芥湯ニ宜シク汚濁臭穢ナレバ桂苓黃湯ニ宜シ。

(註) 惡露ノ血色淺淡ナルハ脫血ノ候ナレバ芎歸膠芥湯ヲ用ヒテ止血スベク其汚濁臭穢ナルハ瘀血ノ徵ナレバ本方ヲ以テ驅除スベシトノ意ナリ。

又曰ク

産后ノ氣喘ハ危シト爲ス危便方書ニハ敗血上攻ト名ク其面必ズ紫黑ナリ桂苓黃湯及獨龍散ニ宜シ。

(註) 氣喘トハ咯痰ヲ咯出スルコトナク喘鳴息迫スルヲ云フ是レ敗血即チ瘀血上攻ニヨルモノナレバ恐ラクハ肺栓塞ナラン。

類聚方廣義桂枝茯苓丸條ニ曰ク

産后惡露盡キザレバ則チ諸患錯出シ其窮リハ救ウベカラザルニ至ル故ニ其治タルヤ瘀血ヲ逐フテ以テ至要ト爲ス此方ニ宜シ。

同書桃核承氣湯條ニ曰ク

瘀血ノ管

産后悪露下ラズ少腹凝結シテ上衝急迫、心胸安カラザル者ヲ治ス凡ソ産后ノ諸患ハ多ク悪露盡キザルノ致ス所ナリ早ク此方ヲ用ユルヲ佳ト爲ス。

諸説皆悉ク愚説ヲ肯定スト謂フベシ。

婦人ニ瘀血多ク且之ニ胚胎スル疾病ノ夥多ナルハ前述ノ如シ然レトモ此瘀血ハ獨リ婦人ノ專有ニアラズ男子ニモ亦頗ル多キハ余ノ日常經驗スル處ニシテ其實例ハ枚舉スルニ遑ナキモ今其一例トシテ自體ニ於ケル經驗談ヲ試ミントス余ハ元來頑健ニシテ未ダ著患ヲ知ラザルモ只痔疾ヲ有シ時々胃部ノ膨滿停滯感、便秘、逆上、不眠ヲ發スルニヨリ腹證ニ隨ヒ大柴胡湯、桂枝茯苓丸合方ヲ用ユルニ服藥僅ニ一回ニシテ粘血便ヲ瀉下シ血壓大ニ下降スルノミナラズ前症亦大ニ減退スルヲ常トス然ルニ若シ大柴胡湯ノミヲ單用スレバ瀉下スト雖モ粘血便アルコトナク且逆上等ノ腦症及血壓ノ影響ヲ被ルコト甚ダ尠少ナリ此ニヨリテ之ヲ見レバ桂枝茯苓丸ニ驅瘀血作用アルコト益、明ニシテ男子ニモ瘀血アルヲ察知シ得ベク又左ノ吉益南涯氏ノ治驗

浪華島ノ内ノ賈人伊丹屋某ナルモノ嘗テ腹痛ヲ患フ腹中ニ一小塊アリ之ヲ按ズレバ則チ痛ミ劇シク身體危羸、面色青クシテ大便通シ難ク飲食故ノ如シ乃チ大柴胡湯ヲ與フ之ヲ飲ムコト歲餘ニシテ少ク差ユ是ニ於テ病者徐ニ怠慢シ藥ヲ服サズ既ニシテ七八月ヲ經テ前症復、發ス塊、前日ニ倍シ頗ル冬瓜ノ如ク煩悸喜怒スルコト劇キトキハ則チ狂ノ如シ衆醫交モ療シテ差

喜ハ數ノ意ナ  
此病者ニ與  
ルニ始ヨリ大  
柴胡湯、當歸  
芍藥散合方ヲ  
以テシタラン  
ニハ著シク其  
經過ヲ短縮シ  
得ベカリシナ

ヘズ復、治ヲ請フ先生再ビ與フルニ前方ヲ以テシ當歸芍藥散ヲ兼用ス之ヲ服スルコト月餘ニ日大ニ異物ヲ下ス其形狀ハ海月ノ如ク色灰白、囊ニ似タルアリ内空虚、以テ水醬ヲ盛ルベキアリ其餘ハ或ハ圓ク或ハ長ク或ハ大或ハ小或ハ紐ニ似タルアリ或ハ黃色、魚餃ノ如ク或ハ敗肉ノ如ク千形萬狀、枚舉スベカラズ此ノ如キコト九日ニシテ后、舊病頓ニ除ケリ。

(註)魚餃ノ餃ハ魚肉ノ腐リ爛リタルノ意ナレバ魚餃ノ如ク敗肉ノ如キモノハ即チ瘀血ニ外アラズ以テ當歸芍藥散ニ驅瘀血作用アルヲ知り得ベク又男子ニモ瘀血アルヲ察シ得ベシ

ニ據ルモ亦之ヲ證シ得ベシ然ラバ月經、妊娠等ノ係累ナキ男子ニシテ瘀血ヲ有スルハ何故ナカ答テ曰ク其源由ハ恐ラクハ多端ナランモ余ノ知り得ル範圍ニ於テハ三個ノ原因ニヨルモノニシテ先ツ其第一因トシテ遺傳ヲ舉ゲザルベカラズ凡ソ遺傳ニ關スル學說ヲ立ツルニハ直接的ニ論斷シ得ベキニアラザレバ統計其他種々ノ材料ヨリ間接的ニ推理歸納スルガ常ナレバ愚説モ亦之ニ隨ヒシモノニシテ余ノ經驗ニヨレバ父ヲ診シテ大黃牡丹皮湯ノ腹證アルトキハ其男女中ノ何人カニモ同湯ノ腹證アリ母ヲ診シテ當歸芍藥散ノ腹證アルトキハ其士女中ノ孰カニモ亦同散ノ腹證アリ父母ノ孰カニ桃核承氣湯或ハ桂枝茯苓丸證アル際ニ亦然ルガ常ナリ若シ此事實ニシテ僅少ノ實驗ヨリ得ラレシモノナランニハ父母ノ腹證ト男女ノ其レトガ偶然一致シタルモノト解シ得ラレザルニアラザレドモ幾度試驗ヲ反覆スルモ皆悉ク然ラザルハナキニヨリ偶然ノ暗合

トハナシ難シ是レ余ガ瘧血遺傳説ヲ主張スル所以ナリ。

其第二因ハ打撲等ノ外傷ニ因スル溢血ナリ凡ソ打撲ノ如キ輕微ナル外傷ハ何人ト雖モ屢、被ル處ニシテ若シ其度稍強ケレバ皮下又ハ筋肉内ニ溢血ヲ生ズ然ルニ此溢血ハ血管外ニ進出セシモモノナレバ既ニ血液タルノ性能ヲ失ヒ再ビ生理的狀態ニ復歸シ能ハザル死血即チ瘧血ナリ故ニ若シ之ヲ放置スルトキハ漸次血管内ニ吸收セラレ生理的血液ト共ニ普ク體内ヲ循環スルガ故ニ遂ニハ各種疾患ノ源泉タルニ至ル。

其第三ノ原因ハ熱性病ニ於ケル熱溶血症ナリ腸「チフス」ノ如キ高熱持長性傳染病ニアリテハ血球ハ細菌毒素ト高熱ノ爲ニ崩壊セラレ所謂熱溶血症ヲ現出ス然ルニ此溶血ハ非生理的血液即チ瘧血ニ外ナラザレバ治期ヲ失セズ之ヲ蕩滌スルニアラザレバ往々畏ルベキ腸出血ヲ喚起シ生命ヲシテ危險ナラシム假令幸ニシテ命脈ヲ保チ得ルモ此瘧血ニシテ去ラザル限りハ將來諸般ノ病症ヲ續發セシム。

### 瘧血ノ腹症

仲景師曰ク(上略)但、少腹急結スル者ハ乃チ之ヲ攻ムベシ桃核承氣湯之ヲ主ル、腸癰ナル者ハ小腹痛痞シ之ヲ按ズレバ即チ痛ミ(中略)大黃牡丹皮湯之ヲ主ル、(上略)此レ乾血アリテ臍下ニ著クト爲ス下瘧血湯之ヲ主ル、(上略)脈沈結、小腹鞭(中略)抵當湯之ヲ主ル、傷寒熱ア

リ小腹滿(中略)抵當丸ニ宜シ、ト斯ノ如ク師ガ瘧血治劑ハ皆悉ク少腹即チ下腹部ヲ目的トシテ處スベシト説クハ何故ナルカ答テ曰ク腹腔ハ身體中最大ナル腔洞ニシテ最少量ノ血液ヲ受容スル關係上、瘧血アルニ際シテハ他體部ニ比シ其ノ最モ多カルベキ理ニシテ而モ其一部ヲナセル骨盤腔ハ身體中最下位ノ腔洞ニシテ運動ヲ缺如スルニヨリ若シ瘧血アルニ會スルトキハ此部ニ最モ沈墜シ易ケレバ血塞ノ形成容易ナルベキ理ニシテ此形成セラレタル血塞ニシテ若シ一定度以上ノ容積ニ達スルトキハ腹診時ニ當リ能ク瘧血診斷ノ目標タリ得ベシ是レ師ガ瘧血治劑應用ノ目的ヲ下腹部ニ需メシ第一理由ナリ。

第二ノ理由ハ門脈ノ存在ニヨリテ生ズルモノナリ解剖、生理學ノ教ユル處ニヨレバ此靜脈ハ腹腔内諸臟器組織ノ靜脈血ト腸管ヨリ吸收セラレシ乳糜トヲ肝臟ニ輸送スル任務ヲ有ス然ルニ此靜脈ニハ他靜脈ニ於ケルガ如キ瓣膜裝置ヲ缺如スルニヨリ血液ノ前進ヲ促シ難キノミナラズ其逆流ヲ阻止スルヲ得ザルト尙此靜脈ノ下流タル肝内靜脈ハ無數ニ分岐シテ充實セル肝實質内ヲ通過スルガ爲メ其抵抗面甚大ナル關係トニヨリ此靜脈ノ血壓ハ極テ僅微ニシテ動モスレバ其起始部ニ逆流セントスル情勢アルモノナレバ若シ瘧血アルニ際シ此血壓ヲ絶無ナラシムルカ又ハ陰壓ヲ生ゼシムルコトアランカ忽チ逆流シ此靜脈ノ本源タル腹内諸臟器、組織ノ血管内ニ瘧血沈着シテ血塞ヲ成スベキ理ニシテ就中此靜脈ノ經路ト殆ンド一直線ヲナシ恰モ其本流タルノ觀



アル下腸間膜靜脈ノ起始部即チ下腹部ハ最モ頻繁ニ且強度ニ血塞ヲ生ズベキ理ナリ故ニ若シ此部ノ血塞ニシテ或限度以上ニ増大スルトキハ復能ク瘀血治劑應用ノ目標タリ得ベシ。

第三ノ理由ハ婦人ニ於テ始テ生ズルモノナレドモ其理ハ既ニ説キタレバ之ヲ略ス。如上ノ理アルヲ以テ若シ下腹部ニ於テ抵抗物ヲ觸知シ按ズルニ疼痛ヲ訴ヘ且、宿便、結石、寄生蟲、妊娠子宮ヲ否定スルトキハ皆悉ク之ヲ瘀血トナシ治療血劑ヲ撰用スベキモノニシテ此抵抗物及壓痛ヲ以テ瘀血ノ腹證ト稱ス。

瘀血ノ脈證

仲景師曰ク腸癰ナル者ハ少腹腫痞シ之ヲ按ズレバ則チ痛ミ淋ノ如ク小便自調シ時々發熱、自汗出テ復惡寒ス其脈遲緊ナルモノ膿未ダ成ラズ之ヲ下スベシ當ニ血アルベシ脈洪數ナルモノ膿已成ル下スベカラザルナリ大黃牡丹皮湯之ヲ主ルト此條文ハ盲腸炎ノ診斷療法ヲ説キシモノナレドモ今暫ク之ヲ措キ脈候ニ就キテ觀察スルニ凡ソ發熱惡寒スルトキハ脈必ズ浮數ナラザルベカラザルニ今之ニ反シテ遲緊ナル所以ハ一ツハ疼痛ニヨル反射作用ニヨルナランモ其過半ハ少腹痛痞即チ盲腸部ノ腫脹硬結ナル障礙物、血流ノ中間ニ嵌在スルニヨリ之ガ、血流ヲ阻碍シタル結果ト認ムベキモノナリ何トナレバ盲腸炎ノ化膿シタル場合即チ少腹腫痞減退スルトキハ脈洪數(之レ一ツハ化膿熱ノ爲ナルモ)ニ變ズルニヨリテ證シ得ラルレバナリ。

又曰ク太陽病六七日、表證仍在リ脈微ニシテ沈、反テ結胸セズ、其人狂ヲ發スルハ、熱下焦ニ在ルヲ以テナリ小腹ハ當ニ鞭滿スベシ(中略)抵當湯之ヲ主ルト表證仍在リト曰ヘバ惡寒發熱等ノ症アルモノナレバ脈ハ當ニ浮數ナルベキニ反テ微ニシテ沈(此沈ハ陰證ニ於ケル沈ト異リ沈ニシテ結スルナリ)ナル所以ハ瘀血ノ一變形タル少腹鞭滿ノ血液循環中ニ介在シ血流ヲ支障スルニヨルナリ。

又曰ク太陽病、身黃、脈沈結シ少腹鞭ク、小便利セザルモノハ血ナシト爲スナリ、小便自利シ其人狂ノ如キハ血證タルヲ諦ナリ抵當湯之ヲ主ルト此條文ハ血性黃疸ト瘀血性精神病ヲ論ゼシモノニシテ脈ノ沈結スル所以ハ前條ト異ルコトナシ。

王肯堂氏曰ク瘀血アレバ則チ脈ハ澁ナリ桃仁承氣湯ニテ之ヲ下スベシ。右諸論ヲ歸納スレバ瘀血一定度以上ニ増劇スルトキハ血流ヲ阻碍シ其應徵トシテ脈ニ血液不流行ノ象形ヲ呈スルモノナリトノ結論ヲ得ベシ然レドモ此レハ是レ其陽實性ニシテ高度ナルモノニ限レル脈狀ニシテ皆悉ク然ルニアラズ又此ノ脈狀ハ必ズ左脈ニ現レ右脈ニ於テ之ヲ見ルコトナシ是レ余ガ多年ノ經驗ナリ。

瘀血ノ外證

忍ブレド色ニ出ニケリ吾ガ戀ハ物ヤ思フト人ノ問フマデト云ヘル古歌アリ思ヒ内ニアレバ色外

瘀血ノ脈證、瘀血ノ外證。

桃仁承氣湯、  
ハ即チ桃核承  
氣湯ナリ

ニ現ルノ格言アルガ如ク喜怒哀樂ノ情緒ハ如何ニ之ヲ抑制セント欲スルモ必ズ其言動ニ顯ル、モノナリ疾病モ亦之レト同ジク體內ニ病毒アルトキハ必ズ其應徵ヲ外表ニ現スモノニシテ扁鵲ガ病ノ應ハ大表ニ現ルト曰ヒシモ亦此意ニ外ナラズ瘀血モ疾病ノ一ナレバ此理ニ漏ル、コトナク體內ニ瘀血アルトキハ必ズ外表即チ皮膚粘膜等ニ其徵候ヲ顯スモノニシテ此外部ニ現ハレタル症狀ヲ以テ瘀血ノ外證ト稱ス然レドモ此外證ハ千狀萬態ニシテ殆ンド端倪ヲ許サレバ之ヲ診シテ誤ラザルハ一ツニ醫ノ心眼ニ俟ツベキモノニシテ筆舌ノ能ク及ブ所ニアラザレドモ初學ノ階梯トシテ古人ノ論說治驗ヲ掲ゲ以テ其一端ヲ示シ餘ハ學者ノ研究ニ一任セントス。

仲景師曰ク

病人胸滿、唇痿シ、舌青ク、口燥キ、但水ヲ漱グコトヲ欲シテ、嘔ムコトヲ欲セズ、寒熱ナク、脈微大ニシテ來ルコト遅ク、腹滿タズ、其人我ガ滿ヲ言フ者ハ、瘀血アリト爲ス。

(註)但水ヲ漱グコトヲ欲シ嘔ムコトヲ欲セザルハ瘀血家ニ屢見ル處ナレドモ其確徵トナシ難シ

舌青キハ舌ニ黴血アルニヨルモノナレバ瘀血タルノ證左ナリ又腹滿更ニ無キニ拘ラズ病者之ヲ訴フルトキハ瘀血アルノ確證ナリ但シ此腹滿ハ下腹滿ナリト知ルベシ。

續藥錄ニ曰ク

(上略)仲景又別ニ瘀血ノ外證ヲ診察スルノ法アリ曰ク其身甲錯、曰ク胸中甲錯、胸中ハ蓋シ心胸ノ上ナリ

曰ク肌膚甲錯、(下略)

(註)甲錯トハ皮膚魚鱗ノ如ク龜甲ノ皺紋ノ如キヲ云フ是レ恐ラクハ瘀血アルガ爲メ生理的血液

ノ灌溉乏シク皮膚營養良好ナラザルニヨルナラン此徵候アルトキハ瘀血ノ存在ハ確實ナリ。

生々堂醫談ニ曰ク

鉞鍼

問テ曰ク醫ハ只藥石ノミ與ヘテ鉞鍼ヲ行フ事ハ至テ稀ナリ然ルニ子獨リ專ラ此術ヲ行フ是レ本、何人ヨリ傳フル處ニシテ又鉞鍼ハ如何ナル症ニ如何ナル効アルモノゾ。

答テ曰ク予ハ曾テ恒ノ師ト云フモノナク皆古人ヲ師トシテ學ブモノナレバ鉞鍼トテモ古人ノ跡ヲ見テ行フ也又鉞鍼ノ用ハ毒血ヲ去ルニ止マレトモ其奏スル所ノ功ハ預メ期スベカラズ種々無量ノ症ニ施シテ誠ニ奇効アルモノナリ内經ニモ鉞鍼ヲ以テ毒血ヲ取ル事數多見ヘタリ又明ノ龔廷賢ガ萬病回春ニ青筋症ハ北人多ク之ヲ患フト云ヘリ即チ痧病ナリ又清ノ郭志遠ガ痧脹玉衡モ皆同症ニシテ古ヨリ有ル處ノ術ナリ然レドモ本朝ニテハ其吟味粗ニシテ專ニ心ヲ付タル醫末アラズ山脇東門此術ヲ行ヒシト聞ク又方今荻野臺州刺絡篇ヲ著セリ郭有陶ハ始テ此術ヲ行ヒ大ニ効アルニ付テ其名モ高ク後一家ヲ成テ玉衡ヲ著シタルモノト見ヘタリサレド前



外ナラズ流石ノ中神氏モ茲ニ着眼セズ瘀血以外ニ痧病アリトナセシハ千慮ノ一失ニシテ氏ノ痧病論ハ即チ瘀血論ナレバ痧病ノ外證ヲ以テ瘀血ノ外證トナスベシ余ノ實驗ニヨレバ瘀血家ノ面色ハ概シテ暗紫黑色或ハ暗赤色ニシテ就中口唇ニ於テ甚シ中神氏ガ先ヅ血色ヲ見テ其レト定メト云ヘルハ蓋シ之ヲ云フナラン。

生々堂治驗ニ曰ク

京師油小路五條ノ北近江屋甚助ノ妻總身發斑シ大ナルモノハ錢ノ如ク小ナルモノハ豆ノ如シ色紫黒ニシテ日晡所必ズ痛痒ヲ發シ又牙齦常ニ血ヲ出ス先生之ヲ診スルニ臍下拘急シテ腰ニ徹ス桃核承氣湯ヲ與ヘ坐藥ヲ兼ヌ前陰ヨリ膿血ヲ出シ數日ナラズシテ乃チ痊ユ。

余曰ク此症ハ瘀血ノ一部内及裏ヨリ表ニ轉出シタルモノニシテ紫斑、出血、疼痛、瘙痒ガ

其外證ナリ。

又同書ニ曰ク

一婦人年三十久シク頭瘡ヲ患フ臭濃滴々トシテ流レテ止マズ或ハ髮粘結シテ梳ルベカラズ醫因リテ微毒ト爲シ之ヲ攻メテ愈ヘズ痛痒止ムコトナシ之ヲ先生ニ請フ其脈弦細ニシテ小腹急痛シ腰腿ニ引ク曰ク瘀血ナリト桂枝茯苓丸加大黃湯ヲ投ジ兼ヌルニ坐藥ヲ以テス月ヲ出ズシテ全ク瘡ユ後一夜腹痛スルコト二三陣大ニ畜血ヲ下スト云フ。

日晡所ハ日暮時ナリ

瀉ハ瀉ナリ

余曰ク此症モ亦瘀血ノ一部内及裏ヨリ表ニ轉出シタルモノニシテ頭部濕疹、疼痛、瘙痒ガ其外證ナリ。

又曰ク

醍醐村ニ道士アリ戒善ト名ク其妻年四十所總身ニ黃ヲ發ス故ヲ以テ醫者妄ニ黃疸ト名ク先生之ヲ按ジテ臍下ニ至レバ即チ痛ミ堪ヘザルヲ云フ桃核承氣湯ヲ與フルコト十餘日ニシテ全ク已ユ。

余曰ク是レ血性黃疸ナリシナリ余モ亦大柴胡湯、桃核承氣湯合方ヲ用ヒテ此種黃疸ヲ治シタリ。

方伎雜誌ニ曰ク

(ト略)然モ余七歳ノ女兒ノ經行ヲ療セシコトアリ服藥十餘日ニシテ治セリ此女ハ其後十四五歳ニシテ經行ニナリソレヨリ滯ナク十七歳ノ時初テ一子ヲ産セリ又二歳ノ女子ノ經行アリシヲモ療セリ初ハ小便血カト疑ヘリ因テ牝戸ヲ檢視スルニ經水ナリ洵ニ希代ノコト也二人共格別異ル症モナシ因テ但血ノ妄行ト見テ桂枝茯苓丸ヲ煎湯ニシテ用ヒ不日ニシテ愈タリ

(下略)

余曰ク是レ眞ノ月經ニアラズ瘀血ニ因ル子宮出血タリシナリ故ニ出血モ亦瘀血ノ外證タル

牝戸ハ陰口ナリ

瘀血ノ外證

ヲ知ルベシ。

裕堂翁療難指示前録ニ曰ク

(上略)凡ソ血熱證ハ舌色必ズ殷紅ヲ作ス宜シク之ヲ辨ズベシ。

余曰ク殷紅トハ鮮赤色ノ意ナリ余ノ實驗ニヨレバ瘀血家ニハ獨リ舌ノミナラズ口唇モ亦殷紅ヲ呈スルモノアリ。

橘窓書影ニ曰ク

余數年心ヲ潜メテ蓄血ノ證ヲ診スルニ舌上格別ノ胎モナク一面赤ク紫班點アル者アリ蓄血ノ症ニテ大患ナリ熱候輕シトテモ油斷ナラズ吐血或ハ下血シテ亡陽スル者アリ其人血症ヲ現サズトモ蓄血ノ症ト決斷シテ治療スベシ外邪ニ限ラズ難病ニテモ舌上此候アル人ハ蓄血症ト思フベシ又喘息、胸痛、肩背痛、皆蓄血ニ因テ血他竅ヨリ洩ル、者ハ愈、胃中ヲ攻撃スル者ハ吐血上奔シテ蓄血上ニ衝キ上達スルコト能ハズ下泄スルコト能ハザル者ハ死ス其時ニ當テ大吐血スル者亦死ス吐血シテ死スル者ハ脱氣也吐血セズシテ死スル者ハ壅塞ナリ余聞長崎吉益耕作七十餘ニテ中風ス手足不遂ニ因テ誤テ倒レ頭上ヲ石ニテ破リ出血數合シテ其後不遂愈タリト又長崎升齊ノ話ニ中風半身不遂ノ者癰疽ヲ發スル三人ヲ見タリト是亦天幸ト云フベシ蓄血表發セズ内鬱スル人ハ種々ノ惡症ヲ發スルコト有リ此條理ヲ能ク明メズバアルベカラズ。

此血症ハ出血ヲ云フナリ

頭出血ノ後半身不遂ノ治スルハ瘀血除去シテ蓄血ヲ發シテ愈ユルハ瘀血外發シタルニヨルナリ

ズ。

余曰ク淺田氏ガ瘀血ノ外證トシテ舌ノ鮮紅及紫班點ヲ舉ゲタルハ確說ナレドモ眼球結膜ニ右班點アルカ若クハ紫青色ヲ呈スレバ復瘀血ノ徵ナルヲ附加スルノ要アリ又喘息、胸痛、肩背痛、吐血、腦出血ノ瘀血ニ因ルモノ、多キハ余モ亦同感ナリ。

### 傳染病ハ自家中毒症ナル前提アルニアラザレバ成立スルコト能ハズ。

現今醫家ノ傳染病觀タルヤ細菌ヲ重視スルコト殊ニ甚シク苟モ細菌ダニ存スレバ獨力以テ能ク傳染病ヲ成立セシメ得ト妄信シ極テ之ヲ嫌厭畏怖スト雖モ是レ「ローベルトコッホ」氏以來勃興セシ細菌萬能說ノ感化ヲ受ケシ餘弊ニシテ循ノ一面ヲ見テ他面ヲ知ラザルノ偏見ナリ夫レ疾病成立ノ要約タルヤ内外二因ノ共存ヲ要スルモノニシテ外因ガ如何ニ人身ニ作用スルモ内因ノ共鳴ナカリセバ其ノ成立ヲ見ザルハ千古不易ノ鐵案ナリ傳染病ト雖モ等シク疾病タル以上ハ此原則ヨリ除外例ヲ求メ得ザルモノトス更ニ之ヲ具體的ニ論ゼンニ細菌ト雖モ一個ノ生物ニ外ナラザレバ自己ニ適スル營養物、水、溫度アルニアラザレバ其命脈ヲ保續スル能ハザルノ理ナリ然ルニ此營養物、水、溫度即チ自然的培養基ハ自家中毒症ナク抗菌力旺盛ナル健體ニ存セザルハ「コッホ」氏ノ「コレラ」菌體内侵入則チ「コレラ」病發生說ニ反對シ此菌ノ純粹培養ヲ嚙下

傳染病ハ自家中毒症ナル前提アルニアラザレバ成立スルコト能ハズ

シテ其ノ然ラザルヲ立證セシ一ベツテン、コウフ「ル」氏ノ献身の體驗ニ徴スルモ明ニシテ又  
 猛毒ナル「ヂフテリ」菌ガ口腔咽喉内ニ實在スルニモ拘ラズ發病セシメ得ザル實例及病原菌  
 ヲ保有シナガラ何等健體ト異ラザル所謂保菌者ノ存在スル事實ニ據ルモ亦之ヲ證明シ得ベシ何  
 トナレバ細菌學者ハ之等ノ事實ヲ先天的或ハ後天的免疫性ヲ以テ説明スト雖モ其所謂先天的及  
 後天的免疫性ナルモノハ細菌ノ寄生繁殖ニ適セル自然の培養基即チ自家中毒症ヲ先天的ニモ後  
 天的ニモ有セザリシトノ謂ニ外ナラザレバナリ何ゾ先天的免疫性ナルモノアラシヤ孟子ガ敵國  
 外患ナトキハ則チ其國亡ブト極論セシガ如ク敵國外患ハ國ノ士氣ヲ衝動シ敵愾心ヲ喚起スル  
 ガ故ニ深ク之ヲ憂フルニ足ラザレドモ畏レ猶且怖ルベキハ綱紀ノ紊亂人心ノ頹廢ナリ國亡ビテ  
 山河アリノ嘆アラシムル亡國ノ悲劇ハ敵國外患ノ度ニ比シ綱紀人心弛廢ノ程度ヨリ以上ニ甚ク  
 之ニ對スル反撥力全ク缺乏シタルガ爲ニシテ假令敵國ノ來寇スルナキモ自滅ノ日遠カラザリシ  
 モノナリ人體モ亦之レト同ジク假令如何ナル細菌ガ如何ニ多ク人身ヲ侵襲ストモ體力旺盛ナレ  
 バ之ニ乗ズルノ餘地ヲ與ヘズト雖モ或ハ瘀血ヲ祖先又ハ父母ヨリ遺傳スルニヨリ或ハ起居眠食  
 等ノ攝生ヲ怠ルニヨリ食、水、血、三毒ノ停滯即チ廣義ノ自家中毒症ヲ醸スニ至レバ細菌ニ對  
 スル抵抗力ハ減弱スルノミナラズ反テ其寄生繁殖ニ好適ナル培養基ヲ提供シ傳染病ヲ成立セシ  
 ムルモノトス醫餘ニ曰ク。

九竅トハ眼、  
 耳、鼻、口、  
 肛門、尿道口  
 ヲ云フ

毒ハきくひむ  
 しノ爲ニ木ガ  
 喰ハルハワ云  
 フ

悪ハ悪い、不  
 良、不善、よ  
 こし、ま(邪)悪  
 るもの、内人  
 等ノ由トナリ  
 蘇ハ由トナリ  
 蘇ハ折レクニ  
 蘇ハ折レクニ  
 ケルノ意ナリ

蘇ハ蘇ト同意  
 ナリ  
 厲ハえやみ  
 (疫)やくび  
 やうがみの意  
 ナリ

呂氏春秋ニ曰ク凡ソ人ノ三百六十節、九竅、五臟、六腑、肌膚ハ其ノ比センコトヲ欲スルナ  
 リ血脈ハ其ノ通ゼンコトヲ欲スルナリ筋骨ハ其ノ固カラシコトヲ欲スルナリ心志ハ其ノ和  
 センコトヲ欲スルナリ精氣ハ其ノ行カンコトヲ欲スルナリ此ノ若クナレバ則チ病ノ居ル所ナ  
 ク而シテ惡ノ由テ生ズルコトナシ病ノ留リ惡ノ生ズルハ精氣ノ鬱ナリ故ニ水鬱スレバ則チ汚  
 トナリ樹鬱スレバ則チ蠹トナリ草鬱スレバ則チ黃トナル國モ亦鬱スルコト有レバ主德通ゼズ  
 民欲達セズ此レ國ノ鬱ナリ國ノ鬱スル處久シケレバ則チ百惡並ビ起リ萬災叢ツテ至ル。

比ハ密ナリ通宜ナリ固ハ堅ナリ和ハ安ノ猶キナリ行ハ流ナリ惡ハ匿ナリ人苟モ精氣流行シ  
 支體堅固ナレバ病毒ノ蘇テ生ズルコトナシ黃ノ義ハ未ダ詳ナラズ允倉子ハ草鬱スレバ則チ  
 腐トナリニ作ル按ズルニ淮南子ノ原道訓ニ曰ク堅強ニシテ韜セズト張湛曰ク黃ノ音ハ折ナ  
 リト黃ハ疑フラクハ韜ノ訛ナラン此條ハ疾病ノ原由治亂ノ胚胎ニシテ議論痛切實ニ至言ト  
 ルナス。

淮南子曰ク生ヲ養フニハ以テ世ヲ經シ德ヲ抱キ以テ年ヲ終ルト能ク道ヲ體セリト云フベシ然  
 ガ若キハ血脈ニ鬱滯ナク五臟ニ鬱氣ナシ。  
 血脈ニ鬱滯ナク五臟ニ鬱氣ナケレバ則チ精神ハ内守シ肉腠ハ外拒シ厲風苛毒アリト雖モ之  
 ヲ侵スコト能ハズ道家ノ言ト雖モ亦至論ナリ家語ニハ蔚ヲ鬱ニ作り文字ニハ折ニ作ル。

傳染病ハ自家中毒症ナル前提アルニアラザレバ成立スルコト能ハズ

ト然ラバ苟モ血脈及五臟ニ滯滯即チ自家中毒症アルニアラザレバ厲風苛毒即チ百千ノ細菌アリトモ如何トモスベカラザルヤ明ニシテ是レ復愚説ヲ立證スルモノト言フベシ。

傳染病ノ過半ハ其病原體ニ基キテ治テ施スベキニアラズ其發現スル證

ニ隨ヒテ治スベキモノナリ。

溫疫論ニ曰ク

呵欠ハあくび  
ナリ  
嘔吐ハくしゃ  
ミナリ  
頭眩ハ眩暈ニ  
シテ眼花ハ目  
ガちらくす  
るナリ  
考ハ作ニ同ジ

邪ノ人ニ著クヤ酒ヲ飲ムガ如ク然リ凡ソ人酒ニ酔フトキハ脈必ズ洪ニシテ數、氣高ク身熱シ面目俱ニ赤シ乃チ其常ナリ其變ヲ言フニ及テハ各同ジカラザルアリ酔後妄言妄動シテ醒後全然知ラザル者アリ沈酔スト雖モ而モ神思終ニ亂レザル者、酔後應ニ面赤カルベキニ而モ反テ刮白ナル者、應ニ委弱ナルベキニ而モ反テ剛強ナル者、應ニ壯熱スベキニ而モ反テ惡寒戰慄スル者アリ酔ヒ易クシテ而モ醒メ易キ者アリ酔ヒ難クシテ而モ醒メ難キ者アリ呵欠及嘔吐ヲ發スル者アリ頭眩眼火及頭痛スル者アリ其氣血虛實ノ同ジカラザルト藏府稟賦ノ各異ルニ更ニ多飲少飲ノ別ヲ兼ヌルニ因レバ其情狀ヲ考スヤ各自ニ同ジカラズ酒ニ酔フヲ論ズルニ至ツテハ一ナリ醒ムルニ及ビテハ一切ノ諸態失スルガ如シ。

ト曰ヘルガ如ク均シク飲酒セシニ拘ラズ其醉態ノ千差萬別ナル所以ハ各自ノ稟賦體質ノ相異ルニヨルモノナレバ其治法ハ原因タル酒毒ニ執着スルコトナク其發現スル狀態ニ隨ヒテ講究セザルベカラズ何トナレバ其原因ノ酒毒ナルハ無論ナレバ之ヲ除去スルハ實ニ理想的手段ナレドモ酒類ガ既ニ體內ニ竄入シ普ク臟器組織ヲ浸潤スルニ際シ一舉ニシテ之ヲ拔去センコトハ古往今來不可能トナス處ニシテ恐ラクハ盡未來際此目的ヲ達スルノ日アラザルベシ斯ル難中ノ至難ナル空想ニ憧憬スルハ痴人夢ヲ説クニ等シガ故ニ醉者ノ狀態及酒毒所在ノ異ルニ隨ヒ或ハ發汗劑ヲ用ヒテ之ヲ汗腺ヨリ或ハ吐劑ヲ以テ口腔ヨリ或ハ下劑ヲ以テ肛門ヨリ或ハ利尿劑ヲ以テ尿道口ヨリ驅逐スルノ外策ナキノ理ナリ傳染病ニ於ケルモ亦之レト均ク假令同一ナル病原體ニ侵襲セラル、モ患者ノ體質及病毒所在ノ異ルニ隨ヒ千狀萬態ナル症狀ヲ發現ス然ルニ二三ノ病症ヲ除ケバ身體ヲ毀損スルナクシテ病原體ヲ滅殺シ其餘毒ナカラシムルハ全ク不可能ナレバ又吳有性氏ガ。

諸駁ハ乃チ人身ノ戶牖ナリ邪竅ヨリシテ入ル未ダ駁ニ由リテ出デザルモノアラズ經ニ曰ク未ダ府ニ入ラザルモノハ汗シテ已スベシ已ニ府ニ入ルモノハ下シテ已ヤスベシト麻徵君、復増シテ汗吐下ノ三法トナス總テ是レ其邪ヲ導引シ打シテ門戶ヨリ而チ出ス治法ノ大綱ト爲スベシ此ヲ舍テ、ハ皆標ヲ治スト爾云フ。

ト述ベシガ如ク其發現スル症狀ニ隨ヒ汗吐下ノ三法ヲ撰用セザルベカラザル理ナリ是レ仲景師ガ證ニ隨ヒテ之ヲ治スト説キ病名病原ニ拘ルコトナク專ラ病者ノ體質及病毒ノ所在ヲ闡明シ之アラズ其發現スル證ニ隨ヒテ治スベキモノナリ

二三ノ病症ト  
ハ化學的療法  
ノ應ズル微毒  
其他之等ノ病  
症ニ於テモ然  
全ニ下記ノ目  
的然リト云フ  
的然リト云フ  
戸牖ハ門ト窓  
ヲ云フ  
麻徵君ハ元人  
ニシテ張子法  
ニシテ吐和  
ラニシテ麻徵  
吳氏ガ麻徵君  
復増シシモ氏  
シタルガ如キ

口吻アルモ吐  
法ハ古ヨリ存  
シタルモノニ  
シテ只其衰減  
セシヲ強子  
和シテ強子  
氏復シタル  
ニ過キズ  
標トハ本末ノ  
末ト同意ナリ

ニ對應スル治劑ヲ創製シタル所以ナリ。  
斯ク論ジ來レバ洋方ノ所謂對症療法ト漢方ノ證ニ隨ヒテ之ヲ治ストハ更ニ擇ブ處ナキノ觀アル  
モ實ハ似テ非ナルノ甚キモノナリ何トナレバ前者ノ對症療法ナルモノハ病者ノ自覺スル不定症  
狀ヲ目的トシ其鎮靜ヲ期スルモノナレバ漢方ノ所謂標ヲ治スルモノニ過ギザルニ漢方ノ證ニ隨  
ヒテ之ヲ治スルハ斯ル淺薄皮想ナルモノト全然趣キヲ異ニシ他覺症狀ト自覺症トヲ打テ一丸ト  
セシ確固不動ナル症狀ヲ目的トシ之ニ對應ノ治方ヲ處スルモノナレバ證其レ自家ニ對シテハ原  
因療法トモ特效劑トモ稱ジ得ベキモノトス此詳細ニ至リテハ更ニ説述スト雖モ玉石混淆ノ虞レ  
アルヲ以テ筆端茲ニ及ベリ

漢方ノ傳染病療法ハ主トシテ細菌性毒素ヲ驅逐スルニアリ。

等シク傳染病ト稱スルモ其種類頗ル許多ナレバ古來絶ヘズ流行シ現今猶猖獗ヲ極ムル腸「チフ  
ス」ニ就キ説明ヲ試ミントス本病ハ「エベルト、ガフキー」氏ノ發見セル腸「チフス」菌ノ小  
腸粘膜ニ寄生繁殖スルニヨルモノニシテ此菌體自家ノ人身ヲ賊スル度ニ比シ其生産毒素ノ害毒  
反テ甚大ナルハ西洋醫學ノ教ユル處ナリ然レドモ發病ノ初期即チ細菌ノ箇數猶少ク毒素ノ産出  
多カラザルトキハ輕微ナル不定症狀ヲ呈スルニ過ギザルモ或限度以上ニ増加スレバ頭痛、項  
痛、四肢惰痛、惡寒發熱等ノ症ヲ發シ浮大、浮緊ノ脈狀ヲ現スニ至ル然ラバ是等ノ症狀ヲ發ス

ル理由如何答テ曰ク此毒素ニ對シ最モ敏感ナルハ延髓中ノ温生産中樞ナレバ毒素ノ刺戟ヲ受ク  
ルヤ此中樞ハ直ニ亢奮シ其歸結トシテ體温昇騰スルガ故ニ温調節中樞ハ職責上默視スル能ハズ  
之ヲ調節セントスルモ其方法トシテハ異常ノ體温ヲ體外ニ放散スルノ他ニ良策ナク又放散ニハ  
絶大ナル面積ヲ領シ無數ノ汗腺ヲ有スル皮膚ニ求ムルノ外奇術ナケレバ此中樞ハ配下ニ令シ毒  
素ヲ滿載セル血液ヲ間斷ナク皮膚面ニ輸送シ以テ温放散ニ努力スルモ自然ノ妙機ニモ自ラ程度  
アリ無限大ナルヲ得ザレバ遂ニ發汗セシムルニ至ラズ謝出ノ途ナキ毒素ハ筋骨ニ迫リテ頭項強  
痛、四肢惰痛ヲ作サシメ洩レント欲シテ洩ル、能ハザルガ爲メ惡寒發熱セシメ增量セシ血液ハ  
以テ淺在動脈ニ浮脈ヲ呈セシムルナリ是レ乃チ漢方ニ表證ト稱スルモノニシテ葛根湯、麻黃  
湯、大青龍湯等ノ發汗解熱劑ヲ用ヒテ自然良能作用ノ及バザル處ヲ補助鞭撻シ皮膚面ニ蟄集セ  
ル毒素ヲ體外ニ驅逐スルナリ。

然レドモ此發表ニテ全癒スルハ稀有ニシテ之ニヨリ表證緩解シ一時爽快ヲ覺ユルモ久シカラズ  
シテ體温ハ漸次昇騰シ口苦、惡心、嘔吐、食機不振、口渴、舌苔等ノ消化器症狀及咳嗽、胸痛  
等ノ呼吸器徵候ヲ發シ脈ハ浮性ヲ減シテ弦細ニ變ズ是レ漢方ニ於テ表證解セズシテ少陽ニ轉入  
スト稱スルモノニシテ此症狀ハ即チ少陽證ナリ斯如ク病狀ノ變化スル所以ハ温調節中樞疲勞困  
憊シ従前ノ如ク多量ノ血液ヲ體表ニ輸送シ得ザル必至ノ運命トシテ血液ガ體内部ニ充盈スルニ

漢方ノ傳染病療法ハ主トシテ細菌性毒素ヲ驅逐スルニアリ



至リシガ爲ニシテ表證ヨリ轉入ノ直後ニシテ舌未ダ白苔ナルトキハ小柴胡湯或ハ小柴胡加石膏湯ヲ白苔少シク黃變スルトキハ小柴胡加大黃湯或ハ小柴胡加石膏大黃湯ヲ白苔全ク黃變シ上腹部緊滿、壓痛アルトキハ大柴胡湯或ハ大柴胡加石膏湯ヲ處スベキモノトス今是等ノ諸劑ガ如何ニ作用スルヤヲ究ムルニ此六劑中ニ主藥トシテ共存セル柴胡ハ桂枝、麻黃、葛根トハ別義ニ於ケル發表藥ナレバ皮膚、呼吸器ヨリ毒素ヲ排出スルノ可能性アリ又柴胡ト同ジク六劑中ニ配用セラル、半夏ハ一種ノ利尿藥ナレバ泌尿器ヨリ毒素ヲ驅逐スルノ能力アリ又後ノ四劑中ノ大黃ハ瀉下藥ナレバ腸管ヨリ細菌毒素ヲ排除スベキハ論ナク又小柴胡湯ニ加用セラル、石膏ハ本來止渴解熱藥ナレドモ配合藥ノ如何ニヨリテハ發汗藥トナリ利尿藥トナリ緩下藥トナルモノニシテ之ヲ化學的ニ觀察スレバ含水硫酸「カルシウム」ニシテ「アルカリ」性ヲ有スルモノナレバ酸類中和ノ作用アリト云ハザルベカラズ翻リテ考フニ本病ノミナラズ多クノ細菌性熱病者ノ血液ハ毒素ノ猛襲ト高熱持久ノ爲メ固有ノ弱「アルカリ」性ヲ奪取セラレ酸性ニ化スル歸結トシテ酸毒症ヲ來スコト屢ナリ此時ニ方リ對證方中ニ石膏ヲ加用スレバ此畏ルベキ酸毒症モ忽チ消散スル多數ノ經驗ニ據テ之ヲ見レバ石膏ハ獨リ學理上ノミナラズ臨床上ニ於テモ亦能ク酸毒中和ノ能力ヲ發揮スト云フベシ斯ク觀シ來レバ右六劑中ノ或者ハ毒素ヲ皮膚、呼吸器、泌尿器ヨリ或者ハ皮膚、呼吸器、泌尿器、消化器ヨリ排泄スルモノニシテ又或者ハ此等ノ作用ノ外更ニ

酸毒中和ノ能力アルヤ明ナリ。

以上ノ方劑ヲ以テスルモ病勢猛劇ニシテ制禦シ得ザルトキハ脈ハ沈、實、遲等ニ變シ意識朦朧譫語、潮熱、腹滿、便秘或ハ下痢、(惡臭鼻ヲ衝クガ如キ毒便ナリ)食思欠損、舌黑苔等ノ症狀ヲ現ハス是レ漢方ニ於テ少陽證解セズシテ陽明ニ轉屬スト稱スルモノニシテ間斷ナキ毒素ノ刺戟ト持久セル高熱ノ爲メ、溫調節機ハ極度ニ攪亂セラレテ全ク其機能ヲ失ヒ、放散絶止ノ結果、毒素ハ謝出スルノ途ナク體內深ク消化管ニ集積スルニ至リシモノナレバ下痢ヲ用ユルノ外策ナキノ理ナリ故ニ漢方ニ於テ之ヲ以テ下劑ノ適應症トナスハ至當ノ見解ニシテ毒素集積ノ程度ト病者體質ノ異ルトニ隨ヒテ調胃承氣湯、桃核承氣湯、小承氣湯、大承氣湯ヲ撰用スルトキハ消化管内ニ集團セル毒素ハ細菌ト共ニ全ク掃蕩セラレ苦患ハ忽チ霧散雲消ス。

之ヲ要スルニ漢方ニ於テ表裏ヲ別チ汗下ノ劑ヲ用ユル所以ハ主トシテ毒素集中ノ部位及程度ト病者體質ノ如何ニヨリ適應ノ方ヲ用ヒテ之ヲ徹底的ニ驅逐センカ爲ナリ換言スレバ開戦ノ初期ニ於テハ病敵軍ノ虛ヲ衝キ努メテ其銳鋒ヲ挫キ次第ニ之ヲ包圍シ其全ク成ルニ至ルヤ一舉ニシテ之ヲ全滅スルノ治略ニシテ洋醫ガ待期的療法ト稱シ鹽里母赤酒劑ヲ與ヘテ曠日瀰久スルトハ同日ノ談ニアラザルナリ。

但シ本論ハ本病ノ陽證ニ終始スル定型ヲ述ベタルモノニシテ常ニ斯如クナルニアラズ現今目

漢方ノ傳染病療法ハ主トシテ細菌毒素ヲ驅逐スルニアリ

擊スルモノ、多クハ小承氣湯、大承證氣湯證ヲ現ハスニ至ラズ概シテ大柴胡湯、大柴胡加石  
膏湯證ニテ終リヲ告ケ偶、陽明證ヲ呈スルコトアルモ調胃承氣湯、桃核承氣湯證ヲ來スニ過  
キズ。

洋方ハ局處的療法ニ偏倚ス。

洋方ハ解剖、組織、生理、病理等ノ基礎醫學、理化學等ノ自然科學發達ノ關係上局所的療法殊  
ニ器械的療法ニ長ズルモ一利アレバ必ズ一害アリ一長アレバ必ズ一短アルハ免レ難キ處カ此進  
歩セル基礎醫學、科學ノ臨床醫學ニ累ヲ及スコト甚シク其臨床醫學タルヤ全身の觀察ノ下ニ全  
身の治療ヲ講スベキ病症ニ對スルニモ猶著シク局所的療法ニ偏倚ス然ルニ漢方ニアリテハ固ヨ  
リ基礎醫學ナク器械ナク局所的智識乏シケレバ局所的療法ニ偏セント欲スルモ偏スルニ由ナク  
勢已ムヲ得ズ綜合的診斷療法ノ研究ニ入カヲ傾注シタルガ爲メ腹診脈診法ノ進歩ト藥劑組織ノ  
發達ヲ促進シタルナリ今一二ノ例ヲ舉ゲテ之ヲ説明センニ現今醫家ノ胃擴張症ニ對スルヤ多ク  
ハ胃洗滌ヲ施シ以テ胃内蓄水ノ排除ヲ企圖スルモ是レ胃内蓄水ナル局所的所見ニ眩惑セル近視  
眼的治法ニシテ其肯綮ニ觸レシニアラザレハ如何ニ屢之ヲ反覆スルモ治スルノ期ナシ之ニ反シ  
テ漢醫ノ此症ニ應ズルヤ胃内蓄水ハ一ハ胃筋衰弱ニヨル收縮運動不全ノ爲ナルモ一ハ利尿機能  
ノ障礙ニヨルトナシ此見解ノ下ニ衰弱セル胃腸筋ニ緊張力ヲ附與スル藥物ニ利尿藥ヲ配セル方

基礎醫學科學  
ガ及スニ  
ラズシテ  
醫學ガ之  
ルナリ

劑ヲ用ユルガ故ニ一面ニ於テハ胃腸筋ノ收縮力漸次恢復スルト共ニ他面ニ在リテハ停滯セル水  
毒ハ泌尿器ヨリ排泄セラル、ヲ以テ兩々相待テ速ニ奏効シ根治セザルハナシ又下痢病ニハ漢方  
ニ於テモ洋方ノ如ク收斂藥ヲ用ユルコトナキニアラザルモ其原因ノ腸管ニ存ゼズシテ他臟器組  
織ニ在ルヲ認ムルトキハ或ハ發汗劑或ハ利尿劑ヲ以テ之ヲ治ス例ヘバ仲景師ガ太陽ト陽明トノ  
合病ノ者、必ズ自下利ス、葛根湯之ヲ主ル、ト曰ヒシハ發汗劑ヲ以テ下痢ヲ治スル場合ニシテ  
又師ガ(上略)此利ハ下焦ニアリ、赤石脂禹餘糧湯之ヲ主ル、復テ、利止マザルモノハ、當ニ其  
小便ヲ利スベシ、ト説キシ後半ハ利尿劑ヲ以テ下痢ヲ治スル機會ナリ是レ漢方ノ綜合的診斷療  
法タルノ證左ニシテ下痢ヲ治スルニ徒ニ腸管ノミニ執着シ流動食、收斂藥ニ信賴スルノ外他  
ルヲ知ラザル局所的療法ト撰ヲ異ニス。

漢方ノ鎮痛療法ハ原因療法ナリ。

凡ソ疼痛ナル自覺症狀ハ或種ノ病毒、知覺神經ノ末端ヲ刺戟スルニヨリテ發スル現象ナレバ勿  
論、病毒ハ本即チ原因ニシテ疼痛ハ末即チ結果ナリ然ルニ洋醫ノ鎮痛療法ヲ看ルニ概シテ「モ  
ルヒネ」等ノ麻醉藥ヲ主用シ痛覺ヲ鎮壓スルニ銳意ニシテ原因タル病毒ヲ不問ニ附スルガ如キ  
傾向アルニ漢方ニ於テハ病毒ノ撲滅ヲ主トシ鎮痛療法ヲ客トス是レ原因タル病毒ヲ除去スレバ  
結果ニ過ギザル疼痛ハ自ラ治スルノ理ニヨル例ヘバ急性多發性關節「ロイマチス」ノ劇痛ニ對

漢方ノ鎮痛療法ハ原因療法ナリ

シ麻黄杏仁薏苡甘草湯ヲ用ユル所以ハ方中ノ麻黄杏仁ハ水毒ヲ發表シ薏苡仁ハ水毒ヲ利尿ニヨリテ排除スルト共ニ血毒ヲ驅逐シ甘草ハ諸藥ニ和シテ其緩和作用ヲ逞スルガ故ニ病毒ノ消盡セラル、ニ隨ヒ自ラ鎮痛スルノ理ニヨルモノニシテ又彼ノ劇痛ヲ以テ發病スル急性盲腸炎ハ盲腸部ニ瘀血凝滯ノ遠因アリ種々ノ近因之ニ附帶シテ發炎スルモノナルガ之ニ應ズルニ大黃牡丹皮加意苡仁湯ヲ以テスルハ方中ノ桃仁、牡丹皮、冬瓜子、薏苡仁ハ大黃芒硝ノ援助ニヨリ瘀血ヲ瀉下シ冬瓜子、薏苡仁ハ炎性滲出液ヲ泌尿器ヨリ排除スルガ故ニ病毒ノ消滅セラルニ隨ヒ疼痛ハ治セズシテ雲散スルノ理ニヨルナリ以テ漢方的鎮痛療法ノ原因療法タルヲ知ルベシ。

漢方劑ハ複合作用ノ發顯ヲ期待スルモノナリ。

漢方劑ニハ洋方處方ノ如ク單味藥ニヨリ奏効ヲ期スルモノナク皆盡ク二味以上ノ同効異質藥物ヲ配合セルモノナレバ一味藥多量使用時ニ見ルガ如キ中毒ノ虞ナクシテ効力ハ反テ倍蓰ス例ヘバ發表劑タル葛根湯ハ發汗解熱藥タル葛根、麻黃、桂枝トヨリ解熱利尿劑タル越婢加朮湯ハ解熱藥タル麻黃、石膏ト利尿藥タル石膏、朮トヨリ桃核承氣湯、調胃承氣湯、大承氣湯、ハ等シク瀉下藥タル大黃、芒硝トヨリ成レルガ如クニシテ此他ノ諸方ト雖モ然ラザルハ稀ナリ是レ漢方劑ノ多クガ緩和無害ナル藥物ヨリ組成セラル、ニ拘ラズ奇蹟的偉効ヲ奏スル所以ナリ。

漢方劑ハ一方ニテ能ク數多ノ能力ヲ發揮ス。

洋方ニアリテハ一劑ニ多クノ効果ヲ望ミ得ザル關係上、水劑ニ散劑或ハ丸劑ヲ兼用シ時トスレバ猶更ニ頓服藥、含嗽藥、塗布藥、濕布藥、皮下注射、靜脈内注射、吸入、灌腸等ノ方法ヲ兼施シ以テ各個症狀ノ輕減ヲ企圖スルモ斯如キハ徒ニ煩雜ニ失スルノミナラズ各個ノ療法間ニ連絡統一アラザレバ自然良能作用ヲ適切ニ補助激勵スル能ハザルノ缺陷ヲ生ズ之ニ反シテ漢方劑ハ一方中ニ數多ノ能力アレバ病症比較的單純ナルモノニ於テハ一方ニテ能ク其各個症狀ヲ治シ得ベク其複雑ナルモノト雖モ數方ヲ合シテ之ニ對シ得ベク猶不足ヲ感ズレバ此合方ニ丸散劑ノ兼用ヲ以テ之ニ應ジ得ベシ而シテ此合方中ノ藥物ノ箇數頗ル多キモ方劑トシテハ極テ易簡ニシテ連絡アリ統一アレバ其効果タルヤ實ニ偉大ナリ例ヘバ葛根湯ハ葛根、麻黃、大棗、生姜、桂枝、芍藥、甘草ノ七藥物ヨリ成ルニヨリ藥物ノ箇數尠カラザルモ是レ決シテ烏合ノ衆ニアラズ何レモ百練千磨ノ精兵ニシテ葛根之等ヲ統御シ手足ノ如ク驅使スルガ故ニ精銳無比ニシテ向フ所風靡セザルハナシ乃チ主藥ナル葛根ノ證タル項背筋ノ強直性痙攣ヲ目的トシテ此方ヲ用ユレバ感冒ニテモ腸「チブス」ニテモ腦膜炎ニテモ「ロイマチス」ニテモ喘息ニテモ熱性下痢病ニテモ眼疾ニテモ耳疾ニテモ上顎竇蓄膿症ニテモ皮膚病ニテモ其他如何ナル病症ニテモ皆能ク之ヲ治ス又小柴胡湯ハ柴胡、黃芩、人參、甘草、大棗、生姜、半夏ノ七味ヨリ成リ是レ亦節度アリ訓練アル一隊ノ兵ナレバ主將タル柴胡ノ證ナル胸脇苦滿ヲ目標トシ之ヲ用ユレ

漢方劑ハ複合作用ノ發顯ヲ期待スルモノナリ  
漢方劑ハ一方ニテ能ク數多ノ能力ヲ發揮ス

パ氣管支炎ニテモ百日咳ニテモ肺結核ニテモ肋膜炎ニテモ腸「チフス」ニテモ「マラリヤ」ニテモ胃腸加答兒ニテモ肝臟病ニテモ腎臟腎孟ノ炎症ニテモ婦人病ニテモ皆悉ク之ヲ治ス又桂枝茯苓丸ハ桂枝、茯苓、芍藥、桃仁、牡丹皮ノ五味ヨリ成リ臍下部ノ瘀血塊、左直腹筋ノ攣急ヲ目的トシテ用ユルノ方ナレバ此ヲ目標トシ此方ヲ用ユレバ瘀血ニ因ル血管、血液ノ諸病ハ皆悉ク之ヲ治ス又黃解丸ハ山梔子、黃連、黃芩、大黃ノ四味ヨリ成リ心煩、心下痞、上逆、便秘ヲ目的トシテ用ユルノ劑ナレバ此ヲ目標トシ此方ヲ用ユレハ血管、血液ノ炎症機轉ニ因ル諸病ハ皆悉ク之ヲ治ス斯如ク一方ニテ能ク數多ノ能力ヲ發揮スルヲ以テ複雜ナラザル病症ハ右一方ノ應用ニテ足り更ニ不足ヲ感ズルコトナシ又假令甚ダ複雑ナルモノ例ヘバ葛根湯、小柴胡湯、桂枝茯苓丸、黃解丸ノ諸證併發シタル場合ト雖モ前ノ三方ヲ合セル葛根、麻黃、大棗、生姜、桂枝、芍藥、甘草、紫胡、黃芩、人參、半夏、茯苓、桃仁、牡丹皮ノ一方ニ後ノ一方ノ兼用ヲ以テ應ジ得ルガ故ニ毫モ遺憾ナシ而シテ此合方タル其包容スル藥物頗ル多シト雖モ是レ漫然聚集セシニアラス既ニ統一アリ訓練アル一隊ヲ編成セル三方ヲ合併セシモノナレバ繁ニ似タリト雖モ其實ハ甚ダ簡ニシテ恰モ統一アリ連絡アリ部署アル三軍ノ隊伍堂々敵陣ニ迫ルガ如ク兼用方ハ遊擊軍タル奇兵ノ短刀直入敵軍ノ虚ヲ衝クガ如クナレバ如何ニ頑強ナル病敵ト雖モ遂ニハ敗走セザルヲ得ザルナリ是レ古語ノ所謂簡ヲ以テ繁ヲ制スルノ精神ニ合致スルモノニシテ漢方ノ獨擅場ナリ。

漢方劑ノ藥物配合法ハ極テ巧妙ナリ。

洋方ニ於テモ藥物配合法ヲ無視スルニアラザレドモ配合禁忌ノ如キヲ除クバ殆ンド醫ノ任意ニシテ各人各様ノ觀アリ規矩準繩ノ見ルベキモノナキニ反シ漢方ニアリテハ數千年間ノ經驗ヨリ歸納セシ確固不拔ノ法則アリ藥物ノ配合法ハ巧妙ヲ極メリ例ヘバ漢醫ガ古來慣用シ洋醫モ鎮吐藥ノ不備ニ困惑スルノ餘近來頻リニ賞用シツ、アル半夏ノ如キ若シ之ヲ單味咀嚼スレバ甚ダ辛烈苛辣ニシテ嚙下ニ耐ヘザルモ之ニ配スルニ生姜或ハ甘草、大棗、蜂蜜ヲ以テシ煎炙ヲ經レバ辛辣ノ性自ラ消失スルノミナラス之ガ生姜ヲ得ルトキハ其鎮吐鎮咳作用ハ益、確實ニ甘草、大棗、蜂蜜等ノ緩和藥ヲ友トスルトキハ其鎮痛作用ハ彌、增加ス是レ半夏ヲ處スルニハ必ズ之等諸藥中ノ何レカラ配スル所以ナリ又大建中湯ハ山椒、人參、乾姜、飴ヨリ成ルノ劑ナルガ方中ノ山椒ハ其性味甚ダ辛辣ニシテ刺戟亢奮殺蟲作用アレバ弛緩セル胃腸筋ヲ刺戟シ其緊張力ヲ恢復セシムルノ外蛔蟲驅逐作用ヲ有スト雖モ其性既ニ辛辣ナルニ乾姜亦之ニ類似シ而モ更ニ人參ノ苦味ヲ以テスルガ故ニ飲服スルコト甚ダ難シ故ニ甘味アル飴ヲ加ヘ以テ此惡味ヲ矯正スルト同時ニ他面ニ於テハ其緩和作用ニヨリ疼痛其他ノ急迫症狀ヲ緩解シ又其滋養強壯性ヲ胃腸筋ニ附與シ以テ其緊張力恢復ニ資スルナリ。

漢方劑ノ藥物配合法ハ極テ巧妙ナリ  
 漢方劑ハ其溫度ヲ適宜ニ加減シ得ルノ利アリ

大黃ハ無論瀉下藥ナレドモ燥結セル宿便、結塊ニ奏効シ難ケレバ此目的ニハ之ニ瀉下溶解ノニ作用ヲ兼スル芒硝ヲ配用セザルベカラズ是レ桃核承氣湯、大黃牡丹皮湯、大承氣湯ニ此二藥ヲ併用スル所以ナリ然レドモ此二藥ノミヲ以テスルトキハ瀉下作用峻烈ニ過ギ衰弱セル病者ニ適セザレバ此際ニハ甘草ヲ加用シ以テ二藥ノ銳氣ヲ摧キ其作用ヲ緩慢ナラシムルヲ法トス例ヘバ腸「チフス」ノ末期又ハ再發時ノ如キ熱病的衰弱者ニ大黃、芒硝、甘草ノ三味ヨリ成ル調胃承氣湯ヲ用ユルニ能ク其目的ヲ達シ而モ脫力ヲ貽ササルハ此理アルガ爲ナリ。

漢方劑ハ其溫度ヲ適宜加減シ得ルノ理アリ。

適證ノ發表劑ト雖モ之ヲ熱服シ溫覆スルニアラザレバ發汗シ難ク緩和劑ハ溫服スルニアラザレバ其作用透徹セズ陰證ニハ溫熱劑ヲ暖服セシムルニアラザレバ其效果顯著ナラズ鎮吐劑ハ冰冷以テ微量頻服セシムルニアラザレバ其目的ヲ達スルコト能ハズ是レ余ノ實驗上僞リナキ事實ナリ然ルニ漢方ニ於テハ煎劑ヲ主トスル關係上服藥ノ冷熱ハ操縱自在ニシテ病症ノ種類ニ應ジテ其宜シキニ適セシメ得ルモ洋方ニアリテハ此理ヲ深く解セザルニヨルカ將又劑型ノ異ルニヨリ己ムヲ得ザルニ出ルカ此重要問題ヲ度外視スルヲ常トシ甚シキニ至リテハ熱服溫覆スベキ表證ニ冷性ナル水藥ヲ投ズルノミナラズ更ニ水囊ヲ貼シテ發汗ノ機ヲ阻止シ往々加答兒性肺炎ヲ誘起セシメ暖服溫包スベキ陰證ノ假面的體溫昇騰ニ對スルニモ亦同轍ニ出デ遂ニ病者ヲシテ死地

誤治セザレバ  
加答兒肺炎ヲ  
發スルコトナシ

但シ無智ニシ  
テ治ラザルモ  
ノハ例外ナリ

ニ陥ラシム是レ矛盾ナリ撞着ナリ。

漢方的治療中瞑眩症狀ノ發起スルハ其原因療法タルノ確證ナリ。

尙書ニ曰ク若シ藥瞑眩セズンバ厥疾瘳ヘズト是レ前人未發ノ眞理ニシテ醫モ病者モ俱ニ服膺スベキ金言ナレバ之ヲ説明センニ漢方劑ノ服用後往々其反應トシテ豫期セザル不快症狀現出スルコトアリ是レ即チ瞑眩ト稱スルモノニシテ此症狀ヲ發スルヤ之ヲ以テ中毒症狀ト誤認シ疑懼スルノ徒尠カラザレドモ其實ハ似テ非ナルノ甚シキモノナリ何トナレバ若シ中毒症狀ナレバ服藥ノ續行ニ隨ヒ益ス増悪スベキ理ナルニ瞑眩ハ藥劑ノ反應現象ニ過ギザレバ其症狀タルヤ一時的ニシテ藥劑ノ連用ニヨリ此症狀ハ固ヨリ本病モ亦脫然治癒スレバナリ今一二ノ實例ヲ擧ゲ之ヲ詳論センニ余曾テ重症ノ惡阻病者ニ半夏厚朴湯ヲ處シタリシニ服後反テ大嘔吐セシモ須臾ニシテ鎮吐シ數十日殆ント絶食ノ病者欣然攝食セリ此ニヨリテ之ヲ見レバ服藥後ノ嘔吐ハ此方ノ驅水毒作用實現ノ反應症狀タリシヤ明ナリ又此病者鎮吐ノ後腹證ニ隨ヒ桂枝茯苓丸加川芎大黃ヲ與ヘシニ數日ノ後腹痛ヲ發シ大子宮出血ト共ニ葡萄狀鬼胎ヲ排出シ日ナラズシテ故ニ復シタリ此ニヨリテ之ヲ見レバ服藥後ノ腹痛、子宮出血ハ此方ノ驅瘀血作用遂行ノ反映タリシヤ瞭然タリ。

獨リ是等ノ方劑ニ止マラズ此他ノ諸方ト雖モ其服用後時々種々ナル瞑眩症狀ヲ發現ス是レ病的

漢方的治療中瞑眩症狀ノ發起スルハ其原因療法タルノ確證ナリ



太陽トハ此機能亢進ガ體表ニ少陽トハ胸腹間ニ陽明トハ腹内ニ發スルヲ云ヒ三陰トハ皆此機能減衰ノ腹内ニ現ハル、ノ名稱ナレドモ太陰トハ其最モ輕微ナルモノヲ厥陰トハ其最モ重篤ナルモノヲ少陰トハ此二者ノ中間ニ位スルモノヲ云フナリ。

斯如ク傷寒論ハ病型ノ區々タル腸「チフス」ヲ其病勢、病位ニヨリ三陽三陰ノ六篇ニ大別シテ説述スルト共ニ更ニ各篇ニ個々ノ證治ヲ細論セルモノナレバ用意極テ周到ニシテ證ノ細大易劇ト其治方トヲ網羅シテ遺スコトナシ以下順次之ヲ講述セン。

太陽病篇

太陽病ニ關スル師論 註釋

傷寒論ニ曰ク

太陽ノ病タル、脈浮、頭項強痛シテ惡寒ス。

(註)吉益南涯氏之ヲ釋シテ曰ク

陽氣ハ血氣ノ表位ニ盛ナリトハ皮膚ニ充血甚キヲ云フ氣盛ニシテ血行疾速ナルガ滯メト云フナリ

太ハ太甚ナリ陽氣表位ニ盛ナルモノ之ヲ太陽ト云フ脈浮頭項強痛ハ此レ其候ナリ氣盛ニシテ血竅窒ス故ニ強痛ヲ致ス發出スルトキハ則チ項強ラズ惡寒セズ發熱汗出ルナリ日ヲ經ルトキハ内ニ迄ル蓋シ表位ハ氣ノ末ナリ末ハ氣常ニ乏シ今氣其末ニ盛ナルハ陽氣太甚ノ狀ナリ因テ名ケテ太陽ト曰フ。

張璐氏曰ク

脈浮ナル者ハ邪氣肌表ニ併<sup>ツラナル</sup>ルナリ。

程應旂氏曰ク

太陽經ノ見證ハ頭痛惡寒ヨリ確ナルハナシ故ニ首ニ之ヲ掲ク。

成無己氏曰ク

惡寒ハ膏肓然トシテ憎惡スルナリ風ニ當ラズト雖モ而モ自然ニ寒ス惡風ハ風ノ至ルヲ見レバ則チ惡ミ密室ノ内、幃帳ノ中ニ居ラ以テ得レバ則チ坦然自舒ナリ。

丹羽元堅氏曰ク

太陽病ハ表熱證是レナリ蓋シ邪ノ初感スルヤ必ず先ヅ表ヲ犯ス則チ正氣暢ビズ併セテ熱トナル。

此等ノ註釋ニヨリ師意ヲ付度シ得ラレザルニアラザレドモ之ヲ一言ニ盡セバ如何ナル病症タリトモ若シ脈浮頭項強痛シテ惡寒スルトキハ之ヲ以テ太陽病トナスベシトノ意ニシテ實ニ太陽病ノ大綱ヲ示スモノナリ而シテ脈ノ浮ナルハ淺在動脈ニ血液充盈スルノ候、頭項強痛スルハ頭部項部ガ他體部ニ比シ血液充盈ノ度強クシテ凝滯スルノ致ス所、惡寒スルハ將ニ發熱セントシテ發熱スル能ハザルノ徵ナリ斯如ク太陽病ハ病毒ノ體表殊ニ上半身ニ集中

蓋シ表位ハ氣ノ末ナリ云々ノ意ハ皮膚ハ心ノ去ルハ血液ノ乏シキガ常ナリ今反テ盛ナルガ故ニ太陽ト名ケシナリト云フナリ併ハならぶノ列スあはすノ意ナリ病字ニ作ルベキモノナリ轉モ共ニこぼりたれぎの意ナリ

セシモノナレバ之ヲ治スルニハ發汗解熱藥ヲ用ヒテ之ヲ汗腺ヨリ排除スルノ外策ナキモノ  
ナレドモ病者ノ體質各相等シカラザレバ之ニ對スル處方モ亦隨フテ各相等シキヲ得ザルナ  
リ凡ソ人ノ體質ハ千差萬別ニシテ逆睹スベカラザルガ如キモ窮極スレバ之ヲ二大別スルヲ  
得ベシ即チ其一ハ皮膚鬆粗ニシテ弛緩スルモノニシテ此稟賦アルノ人若シ太陽病ニ罹レバ  
脈浮弱自汗等ノ症狀ヲ發スルヲ以テ桂枝ヲ主藥トセル桂枝湯ヲ以テ之ヲ治スベキモノナリ  
而シテ他ノ一ハ皮膚緻密緊張スルモノニシテ此體質アルモノ若シ太陽病ニ侵サルレバ脈浮  
緊無汗等ノ徵候ヲ現スガ故ニ麻黃ヲ君藥トセル麻黃湯ヲ用ヒテ之ヲ療スベキモノナリ此ノ  
如ク太陽病ニ二大別アルヲ以テ先ヅ桂枝湯及之ニ由來スル諸方ニ就テ講述シ次ニ麻黃湯及  
之ニ淵源スル諸劑ニ及サントス。

桂枝湯ニ關スル師論 註釋

傷寒論ニ曰ク

太陽ノ中風、陽浮ニシテ陰弱、陽浮ナル者ハ、熱自ラ發シ、陰弱ナル  
者ハ、汗自ラ出ヅ、シヨク齎齎トシテ惡寒、セツク淅淅トシテ惡風、キウク翕翕トシテ發  
熱シ、鼻鳴リ乾嘔スル者、桂枝湯之ヲ主ル。

(註)太陽ハ太陽病ノ略ニシテ中風ハ風ニ中ルノ意ナレバ即チ現今ノ感冒ナリ故ニ太陽ノ中風ト

ハ脈浮頭項強痛シテ惡寒スル感冒ノ謂ナリ陽浮ニシテ陰弱ノ陽ハ外、陰ハ内ノ意ナレバ陽  
浮ニシテ陰弱トハ外ハ浮ビテ内ハ弱キ狀アル脈ヲ云フ陽浮ナル者ハ熱自ラ發シ陰弱ナル者  
ハ汗自ラ出ヅノ二句ハ脈狀ニヨリテ熱ト汗ノ出ルヲ豫斷シタル詞ナリ齎齎トシテ惡寒トハ  
ゾクゾクトシテサムケダツナリ淅淅トシテ惡風トハ水ヲカケラレシガ如クニサムクシテ風  
ニアタルヲ惡ムナリ翕翕トシテ發熱トハボツボトシテ熱ガ出ルナリ鼻鳴リ乾嘔トハ鼻ガ  
グスグスシテカラエツキスルコトナリ。

又曰ク

太陽病、頭痛發熱、汗出デ惡風スル者、桂枝湯之ヲ主ル。

又曰ク

太陽病、之ヲ下シテ其氣上衝スル者、桂枝湯ヲ與フベシ、上衝セザル  
者ハ、之ヲ與フベカラズ。

(註)太陽病ハ發表ヲ專トスベク下スベキニアラザルニ醫誤リテ之ヲ下シタルガ爲メ其反動トシ  
テ氣上衝スルモノハ桂枝湯ヲ與ヘテ上衝ノ氣ヲ低降スベキモノナレドモ其ノ候ナキモノニ



ハ與フベカラズトノ意ナリ而シテ氣トハ五官ニ觸レテ形ナクシテ活動力アルモノナレバ此  
場合ノ氣ハ即チ神經作用ノ意ニシテ上衝トハ方機ニ

凡ソ上衝ナル者ハ上逆ノ謂ニ非ズ氣少腹ヨリ上リテ胸ヲ衝クモノ是ナリ。

ト云ヘルガ如キモノナレバ氣上衝トハ則チ發作的上走性神經症ノ謂ナレドモ是レ上衝ノ劇  
ナルモノニシテ其緩ナルモノニアリテハ必シモ少腹ヨリ上リテ胸ヲ衝クニアラズ只上衝ノ  
應トシテ頭痛ヲ現ハスニ止ル前條ノ頭痛ハ即チ是レナリ。

又曰ク

太陽病、三日已ニ發汗シ、若クハ吐シ、若クハ下シ、若クハ溫鍼シ、

仍解セザル者、此レヲ壞病ト爲ス、桂枝ヲ與フルニ中ヲザルナリ、

其脈證ヲ觀テ、何ノ逆ヲ犯スカナ知り、證ニ隨ヒテ之ヲ治ス。

(註)三日トハ太陽病ニ罹リテヨリ三日許經過シタルノ意ニシテ發汗シトハ桂枝湯證ヲ誤リテ

麻黃劑ニテ發汗シタルナリ吐シトハ太陽病ハ吐スベカラザルニ復誤リテ吐シタルニテ下シ  
トハ下スベカラザルニ下シタルナリ溫鍼シトハ太陽病ハ汗解スベキモノナルニ古代ノ民間  
療法タル燒キ鍼ヲ體表ニ加ヘテ熱ヲ劫シタルナリ以上ノ諸療法ハ何レモ誤治ナルヲ以テ病

解ハ治ト畧同  
意ナリ

仍解セザルナリ此ヲ壞病ト爲ストハ右ノ錯治ノ爲メ病證類癢シタリトノ意ニシテ桂枝ヲ與  
フルニ中ラズトハ斯ノ如ク病證類癢シ既ニ桂枝湯證アルノ理ナケレバ此方ヲ與フルハ適當  
ナラズト云フナリ何ノ逆ヲ犯スカナ知りテトハ麻黃劑ニテ逆治シタルカ吐劑ニテ逆治シタ  
ルガ下劑ニテ逆治シタルカ溫鍼ニテ逆治シタルカヲ知りテノ意ナリ又證ニ隨ヒテ之ヲ治ス  
トハ症ニ隨ヒテ之ヲ治スト似テ非ナルノ甚シキモノナリ何トナレバ症ニ隨ヒテ之ヲ治スナ  
ルモノハ個々ノ症狀ヲ目的トシテ治ヲ施スモノナレドモ證ニ隨ヒテ之ヲ治スナルモノハ個  
々ノ症狀ガ必然的ニ相連系セル一群ヲ目的トシテ治ヲ行フモノナレバナリ例ヘバ脈浮弱、  
頭痛發熱、汗出デ惡風、鼻鳴リ乾嘔スル際ニ脈浮弱或ハ頭痛、或ハ發熱或ハ汗出或ハ惡風  
或ハ鼻鳴或ハ乾嘔ナル箇々ノ症狀ヲ目的トシテ治ヲ爲スハ即チ症ニ隨ヒテ之ヲ治スルモノ  
ニシテ脈浮弱、頭痛發熱、汗出デ惡風、鼻鳴リ乾嘔ノ全體ヲ目的トシテ治ヲ下スハ即チ證  
ニ隨ヒテ之ヲ治スルモノナリ。以テ二者間ニ大逕庭アルヲ知ルベシ。

又曰ク

桂枝ハ本解肌ヲ爲ス、若シ其人脈浮緊、發熱汗出ザレバ、與フベカラ  
ザルナリ、常ニ須ク此ヲ識ラシメ、誤ラシムルコ勿ルベキナリ。

桂枝湯ニ關スル師論 註

(註)解肌トハ肌膚ヲ和解スルノ意ナレバ桂枝ハ本解肌ヲ爲ストハ桂枝湯ハ本來肌膚ヲ和解スルノ方ニシテ麻黃湯ノ如キ純發汗劑ト異ルトノ意ヲ暗示スルナリ故ニ次句ニ於テ脈浮緊發熱汗出ザルモノ即チ麻黃劑ヲ用ヒテ發汗セシムベキ者ニハ此方ヲ與フベカラザルナリト斷言シタルニテ是レ桂枝、麻黃ノ應用上重要ナル鑑別點ナレバ復次句ニ常ニ須ク此ヲ識ラシメ誤ラシムルコト勿ルベキナリト特筆大書シ以テ警告ヲ與ヘシナリ尾臺榕堂氏ガ若シ其人脈浮緊發熱汗出ザレバ麻黃湯ヲ用ユベシ若シ證ニシテ煩躁或ハ渴スル者ニハ、大青龍湯ヲ用ユベシト云ヘルハ能ク師論ヲ釋セルモノト云フベシ。

又曰ク

太陽病、初桂枝湯ヲ服シ、反テ煩解セザル者、先風池風府ヲ刺シ、

卻テ桂枝湯ヲ與フレバ則チ愈ユ。

(註)太陽病ノ桂枝湯證アルニ當リ適方タル桂枝湯ヲ與フレバ煩即チ病苦解散スベキ理ナルニ反對ニ病苦ノ更ニ衰ヘザル者ハ先ツ風池風府ノ灸穴ヲ刺絡シ再ビ桂枝湯ヲ與フレバ直ニ治ストノ意ニシテ風池風府トハ甲乙經ニ風池ノ二穴ハ顛顛ノ後、髮際ノ陷中ニ在リ風府ノ一穴ハ項ノ髮際ノ上一寸大筋中宛々ノ中ニ在リト云ヘルガ故ニ風池ハ顛顛後頭縫合部ニアリテ風府ハ左右僧帽筋停止部ノ中央ニアルヲ知り得ベシ然ラバ何故ニ此二穴ヲ刺絡セザルベカ

ラザルカ答テ曰ク本條ノ病症ハ太陽病ナレバ本ヨリ脈浮、頭項強痛、惡寒ノ證アルモノニシテ頭項強痛スル所以ハ既述ノ如ク頭項部ガ他體部ニ比シ充血甚キ爲ナレバ若シ其充血ニシテ尙一層高度ニ達スルトキハ桂枝湯ヲ與フルモ藥力ヲ阻止シ以テ煩解セザルヲ致スナリ故ニ此二穴ヲ刺絡シ鬱滯ノ血液ヲ奪取スルトキハ藥力阻止ノ原因除却セラル、ニヨリ藥効ヲ奏スルニ至ルモノナリ。

又曰ク

太陽病、外證未ダ解セズ、脈浮弱ナル者ハ、當ニ汗ヲ以テ解スベシ、

桂枝湯ニ宜シ。

(註)外證未ダ解セズトハ頭項強痛、惡寒等ノ症狀未ダ全ク去ラザルヲ云フナリ。

又曰ク

太陽病、外證未ダ解セザル者ハ、下スベカラザルナリ、之ヲ下スヲ逆ト爲ス、外ヲ解セント欲スレバ、桂枝湯ニ宜シ。

(註)逆ト爲ストハ逆治ト爲ストノ意ニシテ正治ニアラザルヲ示スナリ外ヲ解セント欲スレバトハ外證ヲ治セント欲スレバノ義ナリ。

又曰ク

太陽病、先ツ發汗シテ解セズ。而シテ復之ヲ下シ、脈浮ナル者ハ、愈ヘズ、浮ハ外ニ在リト爲ス、而モ反テ之ヲ下ス、故ニ愈ヘザラシム、今脈浮ナルガ故ニ外ニ在ルヲ知ル、當ニ須ラク外ヲ解スベシ則チ愈ユ、桂枝湯ニ宜シ。

(註)太陽病先ツ發汗シテ解セズノ一句ハ此太陽病ニハ桂枝湯ヲ用ユベキモノナルニ誤テ麻黃劑ニテ發汗シタルガ故ニ治セズトノ意ヲ寓スルモノニシテ而モ復之ヲ下シトハ瀉下スベカラザル太陽病ヲ瀉下シタルニテ前ト今ト誤治ヲ再ビセルモノナレバ特ニ復字ヲ加ヘシナリ脈浮ナル者ハ、愈ヘズ云々トハ凡ソ浮脈ヲ呈スルモノハ病ノ外即チ表ニ在ルノ候ナレバ發表スベキガ正當ナルニ反對ニ瀉下スルヲ以テ瘥ヘズトノ意ニシテ今脈浮ナルガ故ニヨリ以下ハ再三ノ誤治ヲ經タルモ今浮脈ヲ見スニヨリテ病ノ尙外即チ表ニアルヲ知リ得ルガ故ニ當然發表劑ヲ用ヒテ外即チ外證ヲ治スベキモノニシテ爾スルトキハ直ニ治スルモノナルガ其發表劑トシテハ桂枝湯ヲ用スルガ宜シトノ意ナリ。

又曰ク

病人藏ニ他病ナク、時ニ發熱自汗出デ、愈ヘザル者ハ、其時ニ先テ、汗ヲ發スレバ則チ愈ユ、桂枝湯ニ宜シ。

(註)病者ヲ診シテ藏即チ内臟ニ病ナキ時ハ其病ハ必ズ表ニアリ此表ニアル病ニシテ時々發熱自汗出デ、久シク愈ヘザルモノハ其發熱自汗出ル以前ニ發汗スレバ直ニ治スルモノニシテ此レニハ桂枝湯ヲ用ユルガ宜シトノ意ナリ。

又曰ク

傷寒、大便セザルヲ六七日、頭痛熱アリ、小便反テ赤キ者ニハ、承氣湯ヲ與フ、其小便清キ者ハ、裏ニ在ラズ、仍表ニ在ルヲ知ルナリ、當ニ須ラク汗ヲ發スベシ、若シ頭痛スル者ハ、必ズ屺ス、桂枝湯ニ宜シ。

(註)本條ノ前半ハ桂枝湯證ト大承氣湯證トノ鑑別法ヲ說キシモノナレバ甚ダ重要ナリ即チ大承氣湯證ニモ桂枝湯證ニモ俱ニ頭痛アリ熱アリ大ニ疑似スルモ大承氣湯證ハ裏證即チ消化管ニ急性炎症アリ其餘波頭腦ニ迫リテ頭痛ヲ起シ外表ニ走リテ熱ヲ現セシモノナレバ其小便ハ必ズ赤濁ス之ニ反シテ桂枝湯證ハ表證即チ病專ラ體表ニアリテ頭痛、熱ヲ主症トシ内臟ニ變化ナキモノナレバ決シテ尿變ヲ呈スルコトナク常ノ如ク清澄ナリトノ意ナリ又後半ノ

桂枝湯ニ關スル師論註釋

傷寒論ニハ小  
承氣湯ノ四字  
ナレバ此四字  
ニ從ヒ此四字  
ヲ加ヘタリ



痞ハ下利清穀ノ如キ危急ノ症ニアラザレバ常法ニ則リ桂枝湯ヲ先ニシ大黃黃連瀉心湯ヲ後ニスルナリ。

又曰ク

陽明病、脈遲汗出ルコト多ク、微惡寒スル者ハ、表未ダ解セザルナリ、汗ヲ發スベシ、桂枝湯ニ宜シ、

(註)本條ハ陽明病ト太陽病ノ合併セシモノニシテ脈遲ハ陽明病ノ脈證、汗出ルコト多キハ二者共通ノ症ナレドモ微惡寒スルハ陽明證ニアラズシテ表證ナレバ此一症ニヨリテ表證ノ存ズルヲ知り桂枝湯ヲ用ユルナリ然レドモ此ノ病症ハ元來陽明病ニシテ太陽病ヲ兼ネシニ過キザルモノナレバ桂枝湯ヲ用ユルハ一時的ノ處置ニシテ表證全ク去レバ大承氣湯ヲ以テ陽明證ヲ治スベキモノトス。

又曰ク

病人煩熱、汗出デ、則チ解シ、又瘧狀ノ如ク、日晡所發熱スル者ハ、陽明ニ屬スルナリ、脈實ナル者ハ、之ヲ下スニ宜シク、脈浮虛ナル者ハ、汗ヲ發スルニ宜シ、之ヲ下スニハ大承氣湯ヲ與ヘ、汗ヲ發スルハ桂枝湯ニ宜シ、

湯ニ宜シ、

(註)病人煩熱即チ熱ノ爲ニ煩悶スルモ汗出デタルガ爲メ一旦輕快シ後又「マラリヤ」發作ノ如ク日暮時ニ發熱スルモノハ表證ヨリ直ニ陽明ニ轉屬セルモノナレバ脈ノ實ナルモノハ大承氣湯ヲ與ヘテ下スベク脈ノ浮虛ナルモノハ桂枝湯ニテ發汗スルガ宜シトノ意ナリ尾臺氏曰ク病人煩熱云々ト此症ハ脈浮虛ト雖モ恐ラクハ桂枝ニ麻黃一湯ヲ用ユルヲ佳ト爲サント此説是ナルガ如シ處方ノ際留意スベシ。

又曰ク

太陰病、脈浮ナル者ハ、汗ヲ發スベシ、桂枝湯ニ宜シ、

(註)師曰ク太陰ノ病タル腹滿シテ吐シ食下ラズ自利益ス甚シク時ニ腹自ラ痛ム若シ之ヲ下セバ必ズ胸下結硬ストサレバ太陰病トハ嘔吐下痢腹痛スル病症ノ名稱ナレバ本條ノ意ハ下痢病ニシテ脈浮ナルモノハ發汗スレバ治スモノニシテ其發汗ニハ桂枝湯ヲ用ユルガ宜シトノ意ナリ。

又曰ク

下利、腹脹滿、身體疼痛スル者ハ、先其裏ヲ溫メ、乃チ其表ヲ攻ム、裏

桂枝湯ニ關スル師論註釋

「マラリヤ」發作ノ如ク  
作時ニハ先ツ  
惡寒シ惡寒止  
スバ直ニ發熱  
ス此ノ如キ熱  
狀ヲ漢方ニハ  
寒熱往來ト云フ

此下痢便ハ淡  
白無臭ニシテ  
腹脹滿ハ陰證  
ナリ共ニ陰證  
ノ微ナレバ大  
熱ヲ用ニル逆  
湯ヲ先ツ其  
ヲ師ガ先ツ  
テ師ガ先ツ  
フ所以ナリ  
消息シテトハ  
有様ヲ見テノ  
意ナリ

陽且ノ桂枝ノ  
別名ナリ

ヲ温ムルハ四逆湯、表ヲ攻ムルハ枝桂湯、

(註)本條ハ陰證タル四逆湯證ト陽證タル桂枝湯證ト合併セシ場合ヲ述ベシモノニシテ即チ下利  
腹脹滿ハ四逆湯證、身疼痛ハ桂枝湯證ナリ而シテ下利腹脹滿ハ重症ナルガ故ニ先ツ四逆湯  
ヲ用ヒテ之ヲ治シ身體疼痛ハ輕症ナルヲ以テ後ニ桂枝湯ヲ與ヘテ之ヲ治スルナリ。  
又曰ク

吐利止ミテ身痛休マザル者ハ、當ニ消息シテ其外ヲ和解スベシ、宜シ  
ク桂枝湯ニテ少シク之ヲ和スベシ、  
下利後、身疼痛シ、清便自ラ調フ者ハ、急ニ當ニ表ヲ救フベシ、宜シ  
ク桂枝湯ニテ汗ヲ發スベシ、

(註)二條共ニ桂枝湯ノ下痢後身痛ヲ治スルヲ說キシモノナレドモ獨リ下痢後ニ限ラズ如何ナル  
場合ノ身疼痛ト雖モ其證ダニ存在スレバ皆悉ク桂枝湯ノ主治ナリト知ルベシ。  
金匱要略ニ曰ク

産後中風、之ニ續テ數十日解セズ、頭微痛惡寒シ、時時熱アリ、心下悶、  
乾嘔汗出ツ、久シト雖モ陽且ノ證、續テアルノミ、

(註)産後感冒ニ罹リ數十日ヲ經過スルモ治セズ微頭痛、惡寒、時々發熱、胃部苦悶、乾嘔スル  
モノハ感冒後久シク時日ヲ經ルモ桂枝湯證依然トシテ存在スルモノナレバ此方ヲ用ユベ  
シトノ意ナリ。

桂枝湯方

桂枝 芍藥 生姜 大棗各九、〇 甘草六、〇  
右細割シ水ニ合五勺ヲ以テ一合ニ煎シ滓ヲ去リ一日三回ニ分チテ温服ス、

桂枝加桔梗湯方

桂枝湯中ニ桔梗六、〇一丸、〇ヲ加フ  
煎法用法同前

(主治)桂枝湯證ニシテ咽喉痛スルモノ或ハ粘痰アリテ咯出シ難キモノ或ハ化膿症アルモノヲ  
治ス。

本方ハ吉益東洞翁ノ創方ナレドモ實ハ師ノ桂枝湯、桔梗湯、排膿湯三方ヲ合シタルモノナリ。  
桂枝加半夏湯方

桂枝湯中ニ半夏六、〇ヲ加フ。  
桂枝湯方 桂枝加桔梗湯方 桂枝加半夏湯方

下記ノ藥量ハ  
古ノ秤量ヲ瓦  
量ニ換算シタ  
ル大人一日量  
ナレバ小兒ニ  
ハ其年齡ニ準  
ジテ減ズベシ  
以下ノ諸方亦  
之ニ倣フベシ







痺ハ知覺不全  
痺ニシテ不  
仁ハ全麻痺ナ  
リ  
血肉ハ贅肉ニ  
シテノ如キヲ  
云フ  
月閉ハ月經閉  
止ニシテ胞衣  
ハ胎盤ナリ  
風痺失音ハ半  
身不遂ノ發語  
不能ヲ兼ネシ  
ナリ  
喉痺ハ咽喉疾  
患ナリ  
桂枝、桂、桂  
心、杜、桂、桂  
ト異ニスルモ  
皆現今ノ桂皮  
ト同物ナリ  
傷風ハ感冒ニ  
シテ腠理ハ皮  
膚ナリ

(主治) 九種ノ心痛、腹内冷氣痛忍ブベカラズ結氣壅痺、脚痺不仁、下痢ヲ止メ(中略)鼻中息肉

ヲ治シ血ヲ破リ月閉胞衣下ラザルヲ通利ス(權甄)

一切ノ風氣ヲ治シ(中略)九竅ヲ通シ關節ヲ利シ精ヲ益シ目ヲ明ニシ腰膝ヲ暖メ風痺、骨

節攣縮ヲ治シ(中略)肌肉ヲ生シ瘀血ヲ消シ疰癩、癰疽ヲ消シ草木ノ毒ヲ殺ス(明大)風僻

失音、喉痺、陽虛ノ失血、瘰疽、痘疽ヲ内托シ能ク血ヲ引キテ汗ニ化シ膿ヲ化シ(下略)(珍時)

杜桂

(氣味) 辛温ニシテ毒ナシ。

(主治) 上氣咳逆(中略)關節ヲ利シ中ヲ補シ氣ヲ益ス(下略)(經本)心痛、脇痛、脇風、筋ヲ温メ脈

ヲ通シ煩ヲ止メ汗ヲ出ダス(錄別)冷風疼痛ヲ去ル(權甄)

傷風ノ頭痛ヲ去リ腠理ヲ開キ表ヲ解シ汗ヲ發シ皮膚ノ風濕ヲ去ル(元)奔豚ヲ泄シ下焦ノ蓄

血ヲ散シ肺氣ヲ利ス(成無)手臂ニ横行シ痛風ヲ治ス(寧)

和蘭藥鏡ニ曰ク

桂

(試効) 神經ヲ融和温壯シ精氣ヲ活潑健運シ脈管ノ縱緩ヲ收固シ一切虚罷ノ諸症ニ用ヒテ精力

ヲ挽回シ壯神ノ要藥トス

患者虚憊ノ神經熱、腐敗熱ノ性アル熱病殊ニ胃腸ノ諸症ヲ兼ヌル者ニ効アリ熱病ノ患者

虚脱シテ嘔吐ヲ兼ヌルハ桂ヲ泡劑トシテ用ヒテ良シ

健胃及驅風ノ良効アリ故ニ胃腸虚衰シテ惡心嘔吐或ハ下痢ヲ發シ或ハ風氣痞滯ノ諸症ヲ

兼ネ在莖トシテ治セザル症(中略)ニ効多シ

表發ノ蒸氣ヲ發泄シ小便ヲ利シ精力虚損ノ留飲停水ノ運輸シ難キ水腫ヲ治ス。

萎黃病、處女病ノ虚弱ノ諸症或ハ婦人ノ抑鬱、憂悶、困苦、窮厄等神思ノ勞傷ニヨリ發

スル虚損ノ諸病ハ桂ニ幾那、鐵屑等ヲ加ヘテ散劑トシテ用ヒテ多ク驗アリ。

子宮病及孕婦等ノ虚弱ヨリ發スル諸症或ハ臨産ノ婦人精力虚乏シテ發スル瘧、衝逆、

眩暈、昏瞶等ヲ治シ催生分娩ヲ進メ胞衣死胎ヲ下ス。

婦人良血液匱乏不足シテ子宮動脈ニ盈滿セザルヨリ發スル經閉萎黃病ノ經閉此證多シ或ハ子宮動脈

弛虚緩弱ニシテ括約ヲ失フヨリ發スル月經過多ヲ治ス。

諸失血虚弱ニ屬スル症ハ桂ニ鐵劑等ノ收斂藥ヲ加ヘ散劑トシテ用ヒテ効多シ。

下利或ハ淋疾、白帶下ノ病毒ヲ驅除シテ後在莖トシテ治セザルモノハ對症ノ散劑丸藥等

ニ桂末ヲ加ヘ用ヒテ尤モ良シ

桂水

氣味芳竄ニシテ精氣ヲ爽活シ虚冷ヲ温壯シテ頭腦神經胃腸ノ衰弱ヲ強健ニシ破氣驅風及鎮痙ノ殊効アリ一切虚脱ノ諸症ニ用ヒテ精カヲ挽回スル良藥トス。

子宮病、喘息、<sup>ヒ</sup>痲不遂、<sup>チクセイ</sup>瘧疾、<sup>カンケイ</sup>痲痺等ニ桂露ニ橙汁ヲ適宜ニ加ヘ用ヒテ良驗アリ。

肺管ニ凝着セル粘液ヲ稀釋疏解シテ咯出セシメ胸肺ヲ淨刷開利シ痰喘壅盛、呼吸息迫等哮喘ノ諸症ヲ治スルニ左ノ方殊効アリ。

桂葱救喘飲(下畧)

和漢藥物考ニ曰ク

桂皮(ケイヒ) (漢産)

(成分)揮發油(桂皮油)一、〇乃至一、五%樹脂、護膜質、糖質、單寧酸等ナリトス。

藥物學ニ曰ク

揮發油ノ作用

一般ニ揮發油ハ皮膚刺戟作用ノ外多少ノ防腐作用ヲ有シ且適當量ヲ内服スレバ健胃ノ効アリ之ヲ吸入セシムレバ氣道ヲ防腐シ兼テ分泌ヲ減ズ故ニ肺壞疽、化膿性氣管支炎等ニ使用セラシル内服ニ由リテモ一部氣道ニ分泌セラレ亦同一ノ効果ヲ來ス又尿中ニ排泄セラレ利尿ヲ増シ

不遂ハ半身  
不遂ナリ  
指製痲痺ハ共  
リニ筋肉痲痺ナ

兼テ尿ヲ防腐ス又二三ノ物質ハ神經性諸病ニ應用セララル。

芳香苦味藥、純芳香藥及辛辣藥

此ニ屬スル藥物ハ皆揮發油ヲ含有スルガ故ニ多少ノ防腐作用ヲ有ス皮膚粘膜等ノ組織内ニ竄入シ得ルガ故ニ局處刺戟作用ヲ有シ之ヲ貼用スレバ灼熱充血ヲ來シ劇烈ナルモノヲ持長スレバ炎症ヲ誘起シ疼痛水泡ヲ發ス故ニ一定ノ揮發油ヲ含有スル生藥ハ又有効ナル皮膚刺戟藥トシテ使用セラル之ヲ内服セシムレバ胃腸ノ粘膜ヲ刺戟シ一部ハ反射的ニ一部ハ充血ノ結果トシテ其機能ヲ亢進セシム且其香味ニ依ル鼻口ヨリノ反射モ亦與ルガ故ニ健胃藥トシテノ効力ハ苦味藥ニ比シ更ニ偉大ナリトス然レトモ殊ニ劇烈ナルモノヲ大量ニ内服スレバ甚シキ炎症ヲ發シ然ラザルモ之ヲ連用スレバ慢性胃症ヲ喚起ス。

揮發油ハ腸ニ至リ其機能ヲ亢進シ其蠕動運動ヲ盛ニス是レ揮發油ヲ含有スル藥物ガ驅風藥トシテ使用セラル、所以ナリ而シテ大量ナレバ腹痛吐瀉ヲ發ス且充血ハ腹膜及接近部ノ臟器ニ及ブ是レ此種ノ藥物ハ時トシテ通經藥トシテ使用セラレ時トシテ子宮出血、流産等ノ原因ヲ爲ス所以ナリ。

揮發油ハ通常量ニ於テ吸收作用ノ認めベキナシト雖モ其一部ハ肺ヨリ排泄セラレ咯痰ヲ容易ニス故ニ氣管支疾患ニ應用セラル、コトアリ又其一部ハ「グリクロン」酸ト抱合シテ尿中ニ出

桂枝ノ醫治効用

桂枝ハ芳香ニシテ辛味アルモノヲ用ユベシ

利尿作用ヲ呈ス但シ大量ハ腎臟ヲ刺戟シ蛋白尿等ヲ發ス。肘後百一方ヨリ和蘭藥鏡ニ至ル所說ニヨリ桂枝ニ發汗解熱及止汗作用、鎮靜鎮痙鎮痛作用、亢奮強心強壯作用、祛痰作用、健胃驅風作用、瘀血疏通經催產胎盤及死胎ヲ下スノ作用、利尿作用、矯味矯臭作用アルヲ知リタルニ和漢藥物考ニヨレバ桂枝ハ其主成分トシテ桂皮油ナル揮發油ヲ含有スルガ故ニ藥物學所載揮發油ノ醫治効用ハ即チ桂枝ノ醫治効用ナリト云フベシ然ラバ桂枝ニハ防腐、皮膚刺戟、鎮靜、鎮痙、健胃驅風、通經、祛痰利尿ノ諸作用アルヤ明ニシテ舊學說ノ一半ハ茲ニ始テ科學的證明ヲ經タリト云フベク又師ノ桂枝ヲ多用セシ所以モ畧闡明セラレタリト謂フベシ。

然レトモ臨床上ニ於テハ皮膚鬆粗ニシテ弛緩シ自汗シ易キ體質ト上衝症トヲ主目的トシ既記諸說ヲ副目的トシテ桂枝ヲ應用スベキモノニシテ尙左說ヲ參照スベキモノトス。

藥徵ニ曰ク

桂枝、上衝ヲ主治スルナリ旁ヲ奔豚、頭痛、發熱、惡風汗出、身痛ヲ治スルナリ。氣血水藥徵桂枝ノ條ニ曰ク

(上畧)是レ皆衝氣ノ症ナリ表ニ在レバ頭痛ヲ作シ惡寒ヲ作シ疼痛ヲ作シ裡ニ在レバ悸ヲ作シ上衝ヲナス(中畧)小便不利スレバ則チ桂枝アリ自利スレバ則チ桂枝ナシ。

芍藥ノ醫治効用

體燥トハ化痰及既ニ化痰セナル疾患ノ總稱ナリ

東洞翁ハ師ノ芍藥去加諸方ヲ歷觀シ之ヲ歸納シテ曰ク芍藥ハ結實シテ拘攣スルヲ主治スルナリ旁ヲ腹痛、頭痛、身體不仁、腹滿、咳逆、下利、腫脹ヲ治スト此言信ニシテ徵アレバ之ヲ解說センニ芍藥ハ筋肉ノ觸診上、凝結充實ノ感覺アリテ攣急スルヲ目的トシテ用ユレバ腹痛モ頭痛モ身體不仁モ疼痛モ腹滿モ咳逆モ下利モ腫脹モ皆悉ク治ストノ意ニシテ其結實拘攣ヲ診スルニハ直腹筋ニ於テスベキハ既ニ述ベタル所ナリ斯ノ如ク本藥應用ノ原則ハ翁ノ所說ニテ盡セリト雖モ其枝葉ニ關スル智識亦時トシテ有要ナレバ左ニ之ヲ掲ゲリ。

本草備要ニ曰ク

白芍、苦酸微寒ニシテ(中畧)脾肺ヲ安ジ腠理ヲ固メ血脈ヲ和シ陰氣ヲ收メ逆氣ヲ斂メ酸ハ收斂ヲ主ル(中畧)中ヲ緩シ痛ヲ止メ汗ヲ斂メ胎ヲ安ジ勞ヲ補ヒ熱ヲ退ケ瀉利後重、脾虛腹痛、心痛、脇痛、肺脹喘逆ヲ治ス其收降ノ體ハ又能ク血海ニ入リテ厥陰ニ至ル鼻衄目澇、肝血不足、婦人胎產及一切ノ血病ヲ治ス。

傷寒論正義ニ曰ク

水氣ヲ逐フノ劑ニ未ダ曾テ芍藥アラズ和蘭藥鏡ニ曰ク

芍藥ノ醫治効用 芍藥應用上ノ注意

芍藥ハ新鮮ニシテ肥大充實ニシテ用ニベシ

芍藥

(試効)根ヲ用フ生根ハ微麻酔催睡質ノ臭氣アリ乾者ハ其臭消シテ微甘苦收斂ス。

鎮痙止痛ノ一藥トシ神思感動ヨリ發スル痙攣搐掣ノ諸症、神經諸筋ノ攣急、頭旋、眩暈、痲症、<sup>マイエン</sup>睡魔、小兒痲瘰、子宮衝逆痛、痛風等ニ良驗ヲ稱ス。

和漢藥物考ニ曰ク

朝比奈博士、奥野改造氏ノ報告ニヨレバ芍藥中ニハ〇、二七%ノ安息香酸ヲ含有スト。

芍藥應用上ノ注意

芍藥ハ一種ノ收斂藥ナレバ發汗、祛痰、瀉下、利尿ノ諸作用ヲ遺憾ナク發現ヒシムルニハ此藥物ヲ用ヒザルヲ通則トス故ニ一種ノ止汗劑タル桂枝湯ニ芍藥アリテ猛發汗劑タル麻黃湯、大青龙湯ニ之レナク鎮咳劑タル小青龍湯ニ芍藥アリテ祛痰劑タル桔梗湯、排膿湯ニ之レナク止瀉劑タル桂枝湯、桂枝加芍藥湯、葛根湯、黃芩湯ニ芍藥アリテ大瀉下劑タル小承氣湯、大承氣湯、大黃牡丹皮湯ニ之レナク利尿劑タル越婢加朮湯、五苓散、猪苓湯ニモ亦之レナキナリ固ヨリ斯ル單純ナル理由ヲ以テ全般ヲ律スル能ハザルハ無論ナレトモ芍藥配合劑ヲ用ユルニハ此點ニ深甚ナル注意ヲ拂ハザルベカラズ。

大棗ノ醫治効用

大棗ハ新鮮ニシテ核小ク肉厚キモノヲ用ニベシ

東洞翁曰ク大棗、擘引強急ヲ主治スルナリ旁ラ咳嗽、奔豚、煩躁、身疼、脇痛、腹中痛ヲ治スト此說頗ル卓見ナレバ之ヲ詳解シ且其不備ヲ補足センニ大棗ノ主治スル擘引強急ナルモノハ芍藥ニ於ケルト同ジク筋肉ニ現ル、モノナレトモ之ヲ芍藥ノ結實拘攣ニ比スレバ凝結充實ノ觸覺ニ於テ大ニ劣リ知覺過敏ニ於テ大ニ優リ且ツ牽引痛甚シク兼テ利水作用アルヲ異レトス是レ大棗ノ水毒アリテ芍藥ヲ禁忌スル場合即チ十棗湯、葶藶大棗瀉肺湯、越婢加朮湯、麻黃連翹赤小豆湯等ノ驅水劑ニモ亦用ヒラル、所以ナリ。

傷寒論正義、茯苓桂枝甘草大棗湯ノ條ニ曰ク

病人水氣アリ故ニ茯苓、大棗ハ以テ水氣ヲ治スルナリ。

山田業廣氏曰ク

大棗ヲ多量ニ用ルコト仲景ノ炙甘草湯、橘皮竹筍湯ハ三十枚ヲ用ヒ常歸四逆湯ハ二十五枚ヲ用ユ若年ノ頃ハ其精義ヲモ玩索セズシテ漫リニコノ三方ハ大棗ヲ多量ニ用ルモノト覺ヘ後世方ノ方後ニ姜棗水煎トバカリアルヲ怪シク思ヒシマデナルガ年長ズルニ隨ヒ大棗ニ面白キ味ノアルコトヲ畧會得セリ本草ニ脾ヲ養ヒ胃氣ヲ平ニス成無巳ノ解ニ甘ハ以テ之ヲ緩スナドハ誰モ知リタルコトナレトモ心氣ヲ補フコト成氏ノ十棗湯ノ注ニ大棗ノ甘ハ土ヲ益シ水ニ勝ル

大棗ノ醫治効用

ト云フコトナドニハ心ツカザルモノ多シ甘麥大棗湯ノ大棗ハ心脾ヲ補ヒ苓桂甘麥湯ノ大棗ハ水ヲ逐フノ功アルナリ。

此二說能ク愚論ヲ立證スト云フベシ。

### 甘草ノ醫治効用

甘草ハ大棗ト共ニ緩和藥ノ代表的藥物ナレバ組織殊ニ筋肉ノ急劇ナル緊縮ニヨリテ發スル疼痛其他諸般ノ急迫症狀ヲ緩解スル作用アルモノニシテ之ヲ大棗ニ比スレバ緩和作用ニ於テ彼ニ勝ルモ治牽引痛及利水ノ能力ナク腹證上ニ於テハ彼ト大同小異ナリトス東洞翁曰ク甘草、急迫ヲ主治スルナリ故ニ裏急、急痛、變急ヲ治ス而シテ旁ヲ厥冷、煩躁、衝逆等諸般急迫ノ毒ヲ治スルナリト又曰ク仲景ノ甘草ヲ用ユルヤ其急迫劇ナレバ則チ甘草ヲ用ユルコト亦多ク劇ラザレバ則チ甘草ヲ用ユルコト亦少シ是ニ由テ之ヲ觀レバ甘草ノ急迫ヲ治スルヤ明ケシ古語ニ曰ク病者急ヲ苦メバ急ニ甘ヲ食シテ以テ之ヲ緩フスト其レ斯ノ甘草ノ謂カト洵ニ服膺スベキ言ナレトモ簡約ニ失シ初學通曉シ易カラザレバ先輩ノ所說ヲ以テ之ヲ擴充セントス。

饗庭家説ニ曰ク

急迫ヲ緩フスルノ能アルコト只甘草ノミニ心得ルハ大ニ惡シ只甘草許ニアラズ此ヲ口中ニ味テ甘キ者ハ其効能ノ多少厚薄ノ不同アルベケレトモ急迫ヲ緩フスルハ各有コトナリ人參、阿

膠、大棗杯ノ類モ急迫ヲ緩フスルノ功能ハ有コトナリ甘草ヲ刺枝杯トキキナドニ俗家ニ用ルアリ畢竟ノ所ハ急迫ヲ緩フスル處有ガ故ナリ。

古方中炙甘草湯、芍藥甘草湯、建中湯、甘草粉蜜湯、茯苓甘草湯、甘草瀉心湯ノ類ハ甘草ヲ倍加セザレバ何モ効ナキ方ナリト知ルベシ中ニモ甘草大黃湯杯ハ大黃ニテ下シ甘草ニテ緩クスルハリ合ニテ其症解スルコト早シ甘草粉蜜湯杯ノ其切痛モ甘草ノ甘ニテ緩ムル故ニ効アルナリ此外建中湯ニ飴アルモ飴ノ甘ニテ其急痛ニ緩ミヲ付ル故功モ有ルコトナリ此等ノアンバインニ由テ甘草ハ急迫ヲ緩フスルト云フ効能アルコトヲ心ニ切ニ會得シテ用ベキナリ。

一人秘結ヲ患フ一應ノ通藥ヲ用テ治スルコトナシ因テ大黃甘草湯ヲ以テ甘草ヲ倍加シテ用ヒタレバ秘結終ニ全快シタリ此等モ大黃ヲ以テ通氣ヲ付ケ甘草ヲ以テ肛門急迫ヘユルミヲ付タルニ由テ全快シタルナリ其後此理ヲ考テ秘結ノ症ニ甘草ヲ倍加シテ利ヲ得ルコト屢ナリ。調胃承氣湯ノ甘草アルモ皆是レ急迫ヲ緩メテ効ヲ取シカケノ方ナリト知ルベシ方名調胃ノ名有レトモ全ク左様ニテハナシ。

予一小兒ヲ治ス其症足カバンテ舒ビス芍藥甘草湯ヲ用ユ五六貼ニシテ足舒ビタリ此モ其筋急ノ處ヲ甘草ノ甘ミヲ以テ緩フシタル故ナリ以上云フ處ノ經驗皆是レ急迫ヲ緩フスルノ功効ヨリ功ヲ得タルコトヲ知ルベシ。

甘草ノ醫治効用

甘草ハ長大肥實ニシテ甘味ニベシ

積氣ハ胃腸又  
ハ子宮ノ痙攣  
ナリ

此積氣ハ腹内  
ノ凝結物ヲ云  
フ下棒ノ如ク  
ハ柴胡ノ胸脇  
筋ノ結實拘攣  
肝積ノ肝鬱ハ  
後世方術ニ  
足ラズ取ルニ  
ニ甘草アリ

積氣ノ急ニ發シタルニ甘草ヲ用ルモ蟲痛ノ甚キニ甘草ヲ用ルモ腫物杯ノ痛甚キニ甘草ヲ用ルモ中風中氣杯ノ拘攣スルニ甘草ヲ用ルモ皆其病ニ緩ヲ付ケルヨリ功ヲ取コトナリ能々此理ヲ考テ廣ク諸病ニ經驗スベシ。

一醫ノ醫案ニ云フ一人甚性急氣ヲイラツコト常ナリ是レ皆積氣ナリ胸下棒ノ如クサシ込アリ大柴胡湯ニ甘草ヲ倍加シテ與ヘシトアリ此甘草ヲ此症ニ用ヒタルハ其性急ヤ積氣シコリニ緩ヲ付タル甘草ナリト知ルベシ又云フ近世大平ノ人逸樂ニ過ギテ肝積ノ人多シ大柴胡加甘草湯ナド其外甘草ノ藥劑是ヨリ考出セリトナリ是モ柴胡ニテ肝鬱ヲ治シ甘草ニテ肝積ニ緩ヲ付タル意ナリ又云フ甘麥大棗湯各等分ニシテ甘草ヲ用ユルモ是レ肝積ニ緩ヲ付タル甘草ナリ。

余曰ク大柴胡湯ニ甘草ヲ加フルハ大柴胡湯、芍藥甘草湯合方ノ意ナレバ謂レナナキニアラザレドモ余ノ經驗ニヨレバ此場合ヨリモ大柴胡湯、桃核承氣湯合方ヲ用ユル機會反テ多シ。此所說ニヨリ東洞翁立言ノ一部ハ具體的ニ解釋セラレタレバ眼光ヲ西洋學說ニ轉ジテ觀察ヲ試ミントス藥物學ニヨレバ甘草ハ矯正藥中ノ甘味藥ニ屬スルモノニシテ藥味ヲ矯正スルノ外咽喉、氣管ノ分泌ヲ亢進シ咯痰ヲ容易ナラシムル効アルノミナラズ「グリチルリチン」酸ナル甜味アル膠樣糖原質及糖、澱粉、粘液質ヲ含有スルガ故ニ同時ニ粘滑藥ノ作用ヲ兼有スルヲ知り得タリ然ルニ粘滑藥ナルモノハ又同書ニ

粘滑藥トシテ使用セラル、モノハ偉大ナル分子量ヲ有スル無晶形膠樣ノ物質ニシテ水分ヲ取ルトキハ漸々膨大シテ遂ニハ粘稠ナル假性溶液ヲ形成スルノ性ヲ有ス之ヲ粘膜、創面等ニ貼用センカ化學的、生理的共ニ全ク無力ニシテ只機械的ニ之ヲ包攝シ一定度マデ外來ノ刺戟ニ對シ之ヲ防禦スルノ性ヲ有スルノミ

即チ味覺、溫覺、痛覺等皆粘滑藥ニ由テ鈍麻セラル例ヘバ砂糖ノ水溶液ハ同一ノ比例一之ヲ「ゴム」漿ニ溶解シタルモノヨリ遙ニ甘ク冷水ハ同一溫度ノ乳汁ニ比シ大ナル低温ヲ感ゼシメ苛辣刺戟ノ味モ亦粘滑藥ヲ加フルトキハ著シク微弱トナルガ如シ。

局所刺戟藥ノ作用モ亦粘滑藥ニ由テ緩和セラル腸管ノ一部ニ一二滴ノ芥子油ヲ加ヘタル水ヲ注射シ其上下ヲ結紮スルトキハ暫時ニシテ粘膜ハ發赤腫脹シ腸腔ハ炎性滲出液ニ充サル、ニ至ルモ水ニ代フルニ一%ノ「アラビアゴム」溶液ヲ以テスルトキハ僅ニ充血ヲ來スノミ

粘滑藥ノ迅速ニ消化溶解セラレザルモノハ其吸收非常ニ緩慢ニシテ且同時ニ水竝ニ他ノ吸收セラレ易キ物質ノ吸收ヲ阻碍ス故ニ凡ソ藥物ヲ腸管ニ作用セシメントスルニハ寧ロ粘滑藥ヲ含有スル生藥ヲ擇ブヲ利トス又粘滑藥ノ大量ヲ内服セシムルトキハ腸内容稠厚トナルコトヲ得ズ爲ニ瀉下ヲ發スルコト恰モ硫酸「ナトリウム」等ノ鹽頭下劑ニ於ケルガ如シ。

粘滑藥ハ之ヲ腸管ノ加答兒症狀ニ用ユルトキハ腸壁ヲ被包シ刺戟ヲ防グガ故ニ疼痛ヲ抑制シ

甘草ノ醫治効用 生姜ノ醫治効用

和漢藥ノ有効  
ナル所以ナリ  
甘草ノ大量ヲ  
服シテ便通ヲ  
ズルハ漢醫ノ  
作用ノミニニ  
ラザルナリ

反射的ノ蠕動ヲ鎮靜シ其治癒ヲ促スノ効アリ殊ニ腸管内ニ於テ刺戟性ノ分解産物發生セルト  
キニ然リ又腐蝕性若クハ刺戟性物質ノ中毒ニ用キ或ハ刺戟性ノ味ヲ有スル藥物ノ調味等トシ  
或ハ瀉下藥、驅蟲藥ノ吸收ヲ妨ゲンガ爲メ配伍ス。

又屢々賦形藥或ハ結合藥トシテ使用セラル粘滑藥トシテ使用セラル、ハ「ゴム」、澱粉及是等  
ヲ含有スル生藥ナリ

ト説ケルガ如キモノナレバ此粘滑藥ノ醫治効用ヲ移シテ甘草ノ醫治効用トナシ得ベシ而シテ此  
森嶋氏ノ所論ハ東洞翁學說ノ一部ヲ科學的ニ立證セシモノニシテ吾人ヲ益スルコト鮮少ナラザ  
レトモ甘草ノ應用ヲバ獨リ皮膚、口腔、咽喉、氣管支、腸ノ疾病ニ止メ他體部ノ病症ニ及サ  
ルハ甚ダ不備ナリ。

### 生姜ノ醫治効用

生姜ハ矯正藥タル點ニ於テハ桂枝、大棗、甘草ト等シキモ其他ノ作用ニ至リテハ大ニ趣キヲ異  
ニシ主トシテ水毒ノ上逆ニヨル咳嗽、吃逆、惡心、嘔吐ヲ治スルモノニシテ本藥ノ應用ニヨリ  
下降セラレタル水毒ハ此藥ニ兼有スル利尿作用ニヨリ體外ニ排除セラル、ガ故ニ胃内ノ停水ハ  
自ラ消失シ食慾亢進ヲ來ス然レドモ此藥物ノ健胃作用ハ獨リ上理ニヨルノミナラズ其主成分ト  
シテ含有セラル、揮發油ノ胃粘膜刺戟作用亦與リテ大ニカアリトス故ニ本藥ハ水毒下降、利水、

生姜ハ八百屋  
ニ販賣スル新  
鮮ノモノヲ用  
ヒ藥舖ノ所購  
生薑ナルモノ  
ヲ用ユベカラ  
ズ何トナレバ  
後者ノ薑クモ  
似シ眞ノ生姜  
ニアラザレバ  
ナリ

粘膜刺戟ノ作用ニヨリテ鎮咳、鎮嘔其他ノ目的ヲ達シ得ベキ狀況ニ於テ始テ之ヲ用ユベキモノ  
ニシテ胃内ニ毫モ水氣ナキノミナラズ反テ高熱持久ノ爲メ體ノ内外共ニ乾燥甚シク濕潤ヲ要ス  
ルコト切ナルモノニハ禁忌ナリ師ガ大熱病ノ治劑タル白虎湯、白虎加人參湯、白虎加桂枝湯、  
調胃承氣湯、大承氣湯ニ之ヲ用ヒザルハ蓋シ故アリト云フベシ。

### 本草備要ニ曰ク

生姜 辛温(中畧)寒ヲ祛リ表ヲ發シ肺氣ヲ宣テ鬱ヲ解シ中ヲ調ヘ胃口ヲ暢テ痰ヲ開キ食ヲ  
下ス傷寒ノ頭痛、傷風ノ鼻塞、咳逆嘔噦、胸壅痰隔、寒痛濕瀉ヲ治ス水氣ヲ消シ血閉  
ヲ行リ(中畧)暴卒ヲ救フ 凡ソ中風、中氣、中畧、中惡、一切暴卒ノ病ハ姜汁ヲ重  
便ニ和シ飲ミテ効アリ姜汁痰ヲ開キ童便火ヲ降スナリ 狐臭ヲ療ス 姜汁ヲ瓶  
凍耳ニ搽リ塗ル 半夏、南星、厚朴、菌蕈、野禽ノ毒ヲ殺ス早行ニハ一塊ヲ含ム霧露、  
山嵐、邪氣ヲ辟ク汁ニ搗キ黃明膠ニ和シ熬リテ風濕痺痛ニ貼ス久ク食ヘハ熱ヲ積ミ目  
ヲ患フ多ク食ヒ酒ヲ兼レバ痔ヲ發ス瘡癰ノ人多ク食ヘバ惡肉ヲ生ズ涼ヲ要セバ皮ヲ留  
ム皮ハ辛涼、脾ヲ和シ水ヲ行シ皮膚水腫、腹脹痞滿ヲ治ス。

### 桂枝加桂湯ニ關スル師論註釋

### 傷寒論ニ曰ク

桂枝加桂湯ニ關スル師論 註釋

嘔噦ハ嘔吐吃  
逆ナリ  
胸壅痰隔ハ胸  
内ニ水氣性ノ  
略痰充滿スル  
ナリ  
瀉瀉ハ水氣性  
下ナリ  
孤臭ハ腋臭ナ  
リ  
南星ハ天南星  
ナリ  
鮮ハ鮮ナリ  
斐ハいるナリ

原文ニハ燒鍼  
令ニ其汗一ト  
アルモ其字ハ  
語調ヲ無フル  
ナラシムルハ  
メ之ヲ去リテ  
辨セリ

燒鍼ニテ汗セシメ、鍼處寒ヲ被リ、核起リテ赤キ者、必ズ奔豚ヲ發ス、氣少腹ヨリ上リテ心ヲ衝ク者、其核上ニ灸スルコト、各一壯、桂枝加桂湯ヲ與フ、更ニ桂二兩ヲ加フルナリ、

(註)古代ニハ燒キ針ヲ人體ニ刺シ發汗セシムル療法アリシガ如シ是レ固ヨリ正治ニアラザルニ師ガ特ニ之ヲ擧ゲシハ誤治ニヨリ病症轉變セル際ニ應ズル法ト方トヲ示サンガ爲ニシテ本條ノ意ハ燒鍼ニテ刺シタル部分ガ寒(邪氣)即チ細菌ノ侵襲ヲ被リ發赤腫脹スルモノハ必ズ奔豚ヲ發スルモノニシテ奔豚即チ氣下腹部ヨリ上リテ心臟ヲ衝クモノハ其發赤腫脹部ニ一壯ノ灸ヲ施シ桂枝加桂湯ヲ與フレバ奔豚ハ治スト云フナリ而シテ奔豚トハ類聚方廣義ニ藤田椿齋曰ク奔豚トハ悸シテ衝逆甚シキノ狀ヲ言フナリト金匱要略ニ曰ク奔豚病、少腹ヨリ起リテ咽喉ニ上衝シ發作スレバ死セント欲シ復還リ止ムト豚ハ運通ト古字ニハ通用セリ(中畧)案ズルニ吳崑ノ素問陰陽別論息貫ノ註ニ曰ク貫ハ奔ト同ジ息奔ハ息氣奔迫スルナリト斯レ亦以テ奔豚ノ義ヲ併發スベシ(下畧)ト云ヒ古方便覽本方條ニハ奔豚氣トテ塊物少腹ヨリ急ニ起テ心下へ衝キカケイキダハシク或ハ刺スガ如ク痛ムニヨ

シ持病ニ積氣アルモノニ此症アリ三黃丸或ハ硝石大圓ヲ考テ兼用スベシ一男子年六十積聚ヲ患ルコト數年發作時アリ奔豚氣上テ心ヲ沖キ息スルコトアタハズ氣力カヒナク俛仰スルコトヲ得ズ飲食ヲ思ハザルニ此方ニ三黃丸ヲ兼用シテ愈テ後再ヒ發セス。

ト曰ヒ證治摘要ニハ

桂枝加桂湯、氣少腹ヨリ心ニ上衝スルモノ世俗謂フ處ノ佐志古美ナルモノニ効アリ

ト説ケルガ故ニ即チ發作的上衝性神經症ノ劇烈ナルモノナリ。

本方ハ桂枝湯ノ桂枝ヲ增量セシニ過ギザレバ其主治ニ於テ大差アルニアラザレドモ桂枝湯ハ桂枝ノ量少キガ故ニ上衝ノ易症ヲ治シ本方ハ其量多キヲ以テ劇症ヲ療スルノ別アリ是レ東洞翁ガ本方ニ桂枝湯證ニシテ上衝劇ナルモノヲ治スト定義セル所以ナリ。

### 桂枝加桂湯方

桂枝一二、〇芍藥 大棗 生姜各七、〇甘草五、〇

煎法用法同前

### 桂枝加芍藥湯及桂枝加芍藥大黃湯ニ關スル師論註釋

傷寒論ニ曰ク

桂枝加桂湯方  
桂枝加芍藥湯及桂枝加芍藥大黃湯ニ關スル師論註釋  
桂枝加芍藥湯方  
桂枝加芍藥大黃湯方





桂枝加芍藥湯

拽起ハ引キ起  
スノ意ナリ

此レハ其人宿ニ癰瘕痼癖アルガ痢病ニツレテ固有ノ毒ヲ拽起シ由テ腹痛スル者ニ用フル劑  
ナリ假令バ宿食ニテ腹痛シ而シテ吐瀉已ツテ後尙腹痛止マザル者コレ固有ノ毒ノ所爲ナリ  
蓋シ桂枝加芍藥湯ハ痢毒ハサノミツヨカラズ只痛ミ甚シク或ハ痢毒既ニ解シテ痛止マザル  
モノ、類皆固有ノ毒ノコリシニ由ルナリ此方之ヲ主ル固有ノ毒アル人ハ其腹拘攣或ハ塊ナ  
ドアルモノナリ又毒劇シク痛止マザル者ハ桂枝加芍藥大黃湯ノ之ク所ナリ。

桂枝加芍藥大黃湯

橫骨ハ肋骨ナ  
リ

既ニ前ニ粗辨ス曾テ一人痢ヲ病ム桂枝加芍藥大黃ヲ用フ其人左ノ橫骨上ニアタリテ處ヲ定  
テ經リ二寸ホドノ際痛ミ堪エガタク始終手ヲ以テ按ジ居ル者ニ此方ヲ用ヒテ痢止ミ痛モ治  
シタリ是レ痢毒ナリ。

此方痢疾初起表證モアリ腹痛シテ裏急後重モ甚シカラザル者ニ之ヲ用ユコノ表證ハ葛根湯  
ナドヨリハ輕キ場ナリ又痢疾初起桂枝湯ナドノ場ニテ腹痛少シク強キ者ニ此方ヲ用フルコ  
トアリ亦痢中ノ調理ニ用ヒ其痛ノ劇シキ時ハ先ツ痛ヲ和ラゲ制センガ爲ニ之ヲ用ユルナリ  
余曰ク此二方證ハ桂枝茯苓丸證、桂枝茯苓丸加大黃證ト誤リ易キモ前二者ハ主トシテ右  
直腹筋攣痛シ後二者ハ左直腹筋攣痛スルヲ以テ之ヲ分ツベシ。

調運トハ痔瘻  
法ノ意ナリ

麻疹一哈ニ曰ク

卒爾ハ卒然、  
突然ノ意ナリ

予嘗テ一婦人ヲ治ス發熱二三日所疹子已ニ出デ卒爾トシテ沒ス之ヲ診スルニ腹滿拘攣甚シク  
臍邊ニ塊結有リ自ラ言フ經信利セズト因テ桂枝加芍藥湯ヲ作リテ之ヲ飲シメ又浮石丸方中ニセ  
ヲ以テ襟ツマミヘ服セシム其夜發熱甚シク疹子汗ニ從テ出デ經信利シテ諸症自ラ安シ。

余曰ク此症ハ始メ表ヨリ裏及内ニ轉入シタルモ適治ニヨリ裏及内ヨリ表ニ轉出セシモノニ  
ニシテ大倉氏ハ桂枝加芍藥湯兼用浮石丸ヲ以テシタルモ余ハ桂枝加芍藥湯桂枝茯苓丸加大  
黃合方ヲ處スベカリシモノト考フ。

二渡ハ二候ナ  
リ

渡邊萩之進年二十有五、發熱然ルガ如クニシテ汗無ク四五日ヲ經テ疹子不出、腹滿拘攣シテ  
二渡利セズ時ニ或ハ腰痛甚シ因テ桂枝加芍藥大黃湯ヲ作リテ之ヲ飲シム微利スルコト二三行ニ  
シテ、拘攣漸ク安シ其翼紫圓ヲ以テ之ヲ下ス水下ルコト五六行其夜熱眠シ發汗洗フガ如ク疹  
子汗ニ從テ出ツ疹子收テ全ク舊ニ復ス。

東洞南涯ノ二翁并ニ門人及其流ヲ汲ムノ醫ハ此二方ニ附子或ハ朮附子ヲ加用シ微毒「ロイマ  
チス」脚氣等ヲ治セリト云フ。

桂枝去芍藥湯ニ關スル師論註釋及腹證

桂枝去芍藥湯ニ關スル師論註釋及腹證  
桂枝去芍藥湯方 桂枝加葛根湯ニ關スル師論註釋

傷寒論ニ曰ク

太陽病、之ヲ下シテ後、脈促胸滿スル者ハ、桂枝去芍藥湯之ヲ主ル、

(註)太陽病ハ當ニ汗解スベキニ醫誤テ之ヲ下シタルガ爲メ氣上衝シ脈促胸滿即チ心下膨滿スル

モノハ本方ノ主治ナリトノ意ニシテ太陽病之ヲ下シテ後、氣上衝スルモノ桂枝湯ヲ與フベシノ場合ニ似タルモ其間ニ自ラ差別アリ即チ桂枝湯證ハ誤治ヲ經タルモ未ダ腹力脱弱ニ至ラズ尙直腹筋攣急スルガ故ニ芍藥ヲ含メル桂枝湯ヲ用ユルナレドモ本方證ハ誤治ニヨリ腹力ハ既ニ脱弱シ直腹筋攣急セザルノミナラズ此腹力ノ脱弱ガ上衝症ヲシテ劇ナラシメ脈促胸滿セシメタルモノナレバ桂枝湯ヨリ芍藥ヲ去リシ本方ヲ以テ之ニ對應スルナリ是レ東洞翁ガ本方ニ桂枝湯證ニシテ拘攣セザル者ヲ治スト定義シ又拘急セズ故ニ芍藥ヲ去ルナリト説キシ所以ナリ。

桂枝去芍藥湯方

桂枝 大棗 生姜各一、〇甘草七、〇

煎法用法同前

桂枝加葛根湯ニ關スル師論註釋

本方自家ハ實  
地上必要ナラ  
ザルモ之ヲ原  
方トシタル要  
方ヲ解スルニ  
方ヲ解スルニ  
方ヲ解スルニ  
方ヲ解スルニ

傷寒論ニ曰ク

太陽病、項背強ル<sup>シユ</sup>凡<sup>シ</sup>トシテ、反テ汗出デ惡風スル者ハ、桂枝加葛

根湯之ヲ主ル、

(註)項背強凡<sup>シ</sup>トハ項背筋ノ強直性痙攣ニシテ本方ノ君藥タル葛根ノ治スル處ナルガ強凡<sup>シ</sup>ト汗出ノ間ニ反字ヲ用ヒシ所以ハ本方證ト葛根湯證トノ鑑別法ヲ示サンガ爲ナリ即チ葛根湯モ葛根君藥ナレバ本方ト同ジク項背凡<sup>シ</sup>症アレドモ此方中ニハ臣藥トシテ麻黃アルガ故ニ無汗ノ症アルモ本方中ニハ麻黃アラザルヲ以テ無汗症ナキノミナラズ反對ニ桂枝湯證ノ如ク汗自ラ出ルモノナレバ特ニ反字ヲ用ヒテ本方證ハ葛根湯證ニ大ニ類似スルモ其間ニ汗出ト無汗トノ別アリトノ意ヲ暗示スルナリ東洞翁本方ニ定義シテ曰ク桂枝湯證ニシテ項背強急スル者ヲ治スト簡ニシテ要ヲ得タリト云フベシ。

桂枝加葛根湯方

桂枝 芍藥 大棗 生姜各七、〇甘草四、〇葛根九、五

煎法用法同前

括蕒桂枝湯ニ關スル師論註釋

桂枝加葛根湯方 括蕒桂枝湯ニ關スル師論註釋  
括蕒根ノ醫治効用

先服ハ本方ヲ  
麻痺ニ天然強  
疾等ニ活用  
セリ  
葛根ノ醫治効  
用ハ葛根湯證  
下ニ關スル

金匱要略ニ曰ク

太陽病、其證備り、身體強凡几然トシテ、脈反テ沈遲タリ、此ヲ痙ト爲ス、括蕒桂枝湯之ヲ主ル、

(註)太陽病、其證備リトハ脈浮、頭項強痛、惡寒等ノ症悉ク存スルヲ云ヒ身體強凡几トハ身體全部ガ強直性痙攣ヲ起セルヲ云フナレドモ然字ヲ添加シタルハ強直ノ劇ナラザルヲ示スモノニシテ又反字ヲ用ヒシハ太陽病ハ脈必ズ浮ナラザルベカラザルニ本方證ハ之ニ反シテ沈遲ナルヲ以テナリ。

括蕒桂枝湯方

桂枝 芍藥 大棗生姜各七、〇甘草五、〇括蕒根七、〇

右細割シ水三合ヲ以テ一合ニ煎シ滓ヲ去リ一日二回ニ分チテ温服ス。

括蕒根ノ醫治効用

本藥ハ虛熱ノ爲メ臟器組織枯燥セシ結果トシテ外表ニアリテハ輕キ強直性痙攣ヲ發シ裏ニ於テ口燥、口渴其他ノ症狀ヲ現ハスモノヲ治ス故ニ本藥ノ解熱止渴作用ハ石膏ニ類スルモ石膏ハ

括蕒根ハ一トク  
ワッロウコ  
ソノト發音ス  
ベキト至當ナ  
レ瓜蒌根ノ  
別名アル位ナ  
レ巴菴來ノ稱

呼ニ隨ヒ一トク  
ワッロウコ  
ト呼ブ  
土瓜根ヲ括蕒  
根ト稱スル  
藥舖アレバ之  
ヲ別セザル  
ベカラズ  
括蕒根法  
碎面  
白ナリ  
苦味少  
土瓜根碎面  
白ナラ  
ズ苦味  
甚シ

消渴トハ渴シ  
テ飲水スルモ  
其水體中ニ消  
失シテ尿利更  
ニ増加セザル  
ヲ云フハ腎部

多ク實熱ニ用ヒラレ其渴タル極テ劇烈ニシテ煩渴引飲水數升ヲ飲ント欲スルノ狀アルモ本藥ハ主トシテ虛熱ニ用ヒラレ其渴タル概シテ劇ナラズ渴シテ水ヲ嗜ムト雖モ煩渴引飲ノ情ナシ又本藥ノ治虛熱、止渴、鎮咳作用ハ麥門冬ニ似タルモ麥門冬ノ治虛熱、鎮咳作用ハ主ニシテ止渴作用ハ客ナルニ本藥ノ治虛熱、止渴作用ハ主ニシテ鎮咳作用ハ客ナリ又本藥ノ治虛熱、止渴作用ハ地黃ニ疑似スルモ地黃ノ治煩熱、治血作用ハ主ニシテ止渴作用ハ客ナルニ本藥ハ虛熱ヲ治スルモ煩熱ヲ治スルヲ得ズ又血症ヲ治スル能ハズシテ止渴作用強シ是レ本藥ガ石膏ニ伍用セラル、コト稀ニシテ麥門冬、地黃ト合用セラル、コト多キ理由ニシテ又石膏ガ主トシテ肺結核ノ初期、中期ニ用ヒラル、モ末期ニ用ヒラル、コト稀ナルニ本藥、麥門冬、地黃ガ其初期ニ用ヒラル、コト少クシテ中期以後ニ用ヒラル、コト多キ所以ナリ。

本草綱目括蕒ノ條ニ曰ク

根(修治)天花粉

(氣味)苦寒、毒ナシ。

(主治)消渴身熱(中略)大熱、虛ヲ補ス(下略)(經本)

腸胃中ノ痙熱、(中略)唇乾口燥、短氣ヲ除キ小便ヲ止メ月水ヲ通ズ(錄別)

熱狂、時疾ヲ治シ(中略)腫毒、乳癰、發背、痔瘻、瘡癩ヲ消シ膿ヲ排シ肌ヲ生シ肉ヲ

括蕒根ノ醫治効用

生シ撲損瘵血ヲ消ス(明)

(發明) 恭曰ク根ヲ用ヒ粉ニ作レバ潔白美好ニシテ之ヲ食ヘバ大ニ虛熱ニ宜シ。

呆曰ク括蕒根(中畧)消渴ヲ解シ津液ヲ行ル心中枯痲スル者、此ニアラザレバ除ク能ハズ。

成無己曰ク津液不足ナレバ則チ渴ヲナス括蕒根(中畧)枯燥ヲ潤シ津液ヲ通行ス是レ渴ノ

爲ニ宜シキ處ナリ。

時珍曰ク括蕒根(中畧)能ク渴ヲ止メ枯ヲ潤ス(中畧)火ヲ下シ(中畧)胃ヲ傷ハズ。

(附方) 虛熱咳嗽 天花粉一兩人參三錢末トナシ

每服一錢ヲ米湯ニテ下ス 集簡方

乳汁下ラズ 括蕒根ヲ燒キテ性ヲ存ジ研ギテ末トシ方寸七ヲ飲服ス

或ハ五錢ヲ酒水ニテ煎服ス 楊氏產乳

蕉窓雜話ニ曰ク

乳汁通セザルモノ格別ノ子細スラナクメ只通セントメ通ズルコト能ザルモノ也總テ虛實ニ拘ラ

ズ極上品ノ天花粉ヲ葛糕ノ如ク餅ニシテ砂糖ナド付テ大抵三斤許食スレバ必ず出ルモノ也。

橘窓書影ニ曰ク

幕府寄合酒井新三郎室飯田年四十(中畧)後時々血熱ヲ發シ肩背強急、齒痛ヲ發ス小柴胡湯加

地黃括蕒根ヲ與テ全治ス飯田侯臣ヲ使シテ謝ス、

余ノ小柴胡湯ニ括蕒根ヲ加ルモノハ去半夏加括蕒湯ノ意ニアラズ括蕒桂枝湯ノ意ニ本クナ

小柴胡湯証ニハ頭項強アルモ肩背強急ナルシ故ニ此湯ヲ用フ強急ハ頭項強アルヲ誤認シタルモノトス

糕ハ餅ト同シクむしもちナレバ葛糕トハくすもちナリ

去半夏加括蕒湯ハ柴胡湯ノ略稱ナリ千金獨活湯ハ地黃ヲ加ヘシモノナリ

葛根ノ主成分ハ澱粉ナルコト効用條下ニア

和漢藥物學ニ曰ク

括蕒根(天花粉)

(形態) 本品ハ甘藷ノ如ク長形ノ肥大根ニシテ連珠狀ヲナシ外部ハ黃褐色内部ハ白色ヲ呈シ多

量ノ澱粉ヲ含有ス此括蕒根ヨリ得タル澱粉ヲ天花粉ト稱ス白色ノ粉末ニシテ質重ク真餘

ノ匙ヲ挿入スルモ粘着セズ。

藥物ノ醫治効用ハ其主成分ノ性能ノミニヨリテ判定スベカラズ、

桂枝加葛根湯ノ君藥タル葛根モ括蕒桂枝湯ノ主藥タル括蕒根モ澱粉ヲ以テ其主成分トナスニ於

テハ相等シキニ一ツハ項背強凡几ト脈浮トヲ治シ一ツハ身體強凡几然ト脈沈遲ヲ治スルガ如ク

其作用ヲ異ニスルハ何故ナルカ此理ハ未ダ不明ニ屬スト雖モ分析上同一ナル主成分ヲ含有スル

藥物ヲ用ユレバ亦同一ナル効果アリト爲スベカラザルヲ極テ雄辯ニ物語ルモノナルヤ確實ナリ

淺田氏曰ク藥能ヲ分析ニ求ムルハ木ヲ割キ花ヲ求ムルガ如シト科學ヲ謳歌シテ他アルヲ知ラザ

ルノ醫家以テ如何トナス。

藥物ノ醫治効用ハ其主成分ノ性能ノミニヨリテ判定スベカラズ  
桂枝加葛根湯ニ關スル師論註釋

桂枝加黃耆湯ニ關スル師論註釋

金匱要略ニ曰ク

本條ノ註釋ハ和久田氏説ナリ

黄汗ノ病ハ、兩脛自ラ冷ユ、假令發熱スルモ、此ハ歷節ニ屬ス、黄汗ノ病ハ表虛ニヨルナリ、兩脛冷ルハ陽氣下ニ旺ゼザレバナリ、凡ソ表虛スルモノハ氣衝逆ス、氣衝逆スルモノハ、下部自ラ冷ユ、是レ内因病ノ常情ナリ、假令發熱ストモ、外因ノ邪氣ニアラザルコトヲ知ル、此病汗歷節ヨリ出ルヲ以テ、歷節病ニ屬スルモノトスルナリ、屬ハ手下ニツクノ意ニシテ正證ニアラザルヲ示ス、  
 歷節ハ歷節痛デ黄汗出ヅノ病名、食シ已テ汗出デ、又身常ニ暮ニ盜汗出ル者、此レ勞氣ナリ、又ハ、一ツアル次ニスル肋字ニテ、ソレニマタト譯ス、食事ガ已ト汗出ル、ソレニ又身ヨリ常々不斷ニ日暮ニナルト煩躁シテ、寐中ニ盜汗出ルモノハ、此ハ勞氣ノ然ラシムルトコロナリ、盜汗ハ睡眠ノ間ニ出ル汗ノ名、勞氣ハ(中畧)正氣ノ肌表ヲ衛リ固テ、津液ヲ内ニメグラシ、腠理ヘモラサヌハヅノモノガ、疲レ勞レテ其守衛ヲ失ヒタルヲイウ、心氣ノ勞ト誤認スベカラズ、暮ニ出ルトイウモノハ、蓋シ熱ニヨリテ出ルトコロノ汗、虛熱ハ多ク午後ヨリ日暮ニ出デ且盜汗ハ寐中ノ汗  
 ユヘ故ニ暮ノ字ヲ下スナリ。 若シ汗出デ、已テ反テ發熱スル者ハ、久々其身

裏理ハ皮膚ナリ

甲錯ス、發熱止マザル者ハ、必ズ惡瘡ヲ生ズ、

凡ソ發熱スルモノ、汗出デ已テ解スルヲ常トス、今汗出デ已テ

發熱スルモノ、常ト反ス故ニ反トイウナリ、然レバ則チ此發熱ハ表證ニ非シテ、氣血ノ鬱ニヨル、氣血ノ鬱ハ、乃チ正氣ノ勞ナリ、此汗此熱久々止マザレバ、津液枯渴シテ其身必ズ甲錯ス、甲錯ハ肌膚アレテ皸皮トナルナリ、發熱止マザルモノハ、氣血ノ鬱ガ散ゼザルユヘ、必ズ惡瘡ヲ發シテ、癰腫ト成ルコトヲ知ルナリ。

若シ身重ク、汗出デ已テ、輒チ輕キ者ハ、久々必ズ身膈ス、即チ胸中痛ム、

若シ汗イマダ出ザル前ニ身重ク、汗出デ已テ輒チ輕クナルモノハ、其身重ハ肌表ニ瘀水アルニヨルナリ、此證久々止マザレバ、必ズ身膈動ス、膈ハビク〜ビリ〜トウゴクナリ、此レ水氣經ニ入テ衝逆スルノ候ナリ、サテ身膈動スレバ即チ胸中痛ム、是レ其膈スルコト水氣ノ衝逆スルモノナルガ故ニ、同時ニ胸中痛ハ、氣上テ胸ヲ衝ケバナリ、是レ身膈ノ下即ノ字ヲ以テ相接スルモノ、膈痛間ヲ容レザルノ意ヲミルベシ、又腰ヨリ以上必ズ、汗出デ、下汗無ク、腰臑弛痛、物アリ皮中ニ在ルノ狀ノ如シ、劇キ者ハ食スルヲ能ハズ、身疼重、煩躁、小便不利ス、此ヲ黄汗ト爲ス、桂枝加黃耆湯之ヲ主ル、此ノ一

桂枝加黃耆湯ニ關スル師論註釋

段前ノ四段ヲ承テ又一等ノ劇症ヲ論ズ、故ニ又ノ字ヲ以テ上ニ接スルナリ腰ヨリ以上必ズ汗出デ、下汗無クノ二句ハ、前ノ兩脛自ラ冷ユト應ズ、下部冷テ汗出ルコトナキナリ、腰以下ニ及ブモノ、脛冷ヨリ一等重キヲ見ル、弛ハタルムナリ、腰腹ハ腰ノクロ、ノ處ユヘ、タルミタル如ク痛ム、是レ瘵水ト鬱熱トニヨルナリ、物アリ皮中ニアルガ如シトハ、麻痺ノ狀ナリ、肌ヲ循ルニ皮中ニ一物ヲ隔テタルゴトク覺ユルハ、吾身ノヤウニ覺ヘヌナリ、此ハ瘵水腰ニアツマリテ、陽氣下部ニノグリクダルクスクナキガユエナリ、劇キ者ハ食スルコト能ハズトハ、衝逆劇ク胸中窒塞シテ、食セントスレトモ、食スルコト能ハザルナリ、能ハズノ字、食氣ナキヲ云フニアラズ食ヲ欲スレドモ能ハザルノ意ヲ見ルベシ、例ニ曰ク身腫レテ冷狀ニ周痺ノ如ク胸中窒リ、食スルコト能ハズ、反テ聚痛シ暮躁シテ眠ルコトヲ得ズ、此ヲ黃汗ト爲スト、是ナリ、乃チ前ノ胸中痛ノ句ト應ジテ一等劇ニ至ルヲ見ル、身疼重モ、亦瘵水ト鬱熱トニヨルナリ、前ノ身重ト應ズ、煩躁ハ前ノ暮ニ盜汗出ヅニ應ズ、例ニ謂フ所ノ暮躁シテ眠ルコトヲ得ズトハ是ナリ、小便不利ハ、氣下降セザルニヨルナリ、以上ノ諸證ヲ加ヘテ、汗出ルモノヲ、眞ノ黃汗病ト名クルモノトスルナリ、而シテ其治法ハ榮衛ヲ和諧メ、血氣ノ鬱滯ナカラシメ、衝氣自低スルトコロ桂枝湯ヲ本方トシテ更ニ表托シテ肌膚ヲ實ニスルトコロノ黃者ヲ加テ服サシムレバ陽氣ハ肌膚ニ

旺ジ、衝氣ハ自ラ低降シ、腠理ハ自ラ固密ニシテ瘵水ハ止ムコト能ハズ、小便自利シテ、諸證悉ク退クモノ、信ニシテ徵アリ、

又同書ニ曰ク

諸病黃家、但其小便ナリ、假令バ脈浮ナル者ハ、當ニ汗ヲ以テ解スベシ、

桂枝加黃者湯之ヲ主ル、

(註)諸種ノ黃疸病者ハ但利尿劑ヲ用ヒテ利尿セシムレバ治スルモノナレドモ若シ脈浮ナリト假

定スレバ當ニ發汗劑ヲ以テ治スベキモノニシテ即チ本方ノ主治ナリトノ意ナリ、

桂枝加黃者湯方

桂枝 芍藥 大棗 生姜各五・五甘草三、五黃者九、〇

煎法用法ハ桂枝湯ニ同ジ

黃者ノ醫治効用

本藥ノ作用ハ余未ダ知悉セザルモ群籍ヲ涉獵シ揣摩シタル處ニヨレバ此藥物ハ身體虛弱、皮膚營養不良ニシテ皮膚及皮下組織内ニ水毒停滯セルヲ主治スル一種ノ強壯性止汗利尿藥ナルガ如シ。

本草綱目ニ曰ク

桂枝加黃者湯方 黃者ノ醫治効用  
桂枝加芍藥生薑人參湯ニ關スル師論註釋

黃家トハ黃疸病者ノ意ナリ





痞鞭ハ大柴胡湯等ニ於ケルモノ、實證ナルト異リ全ク虚證ニ屬スルモノナレバ實證ニ於ケルガ如ク堅鞭ナラズ恰モ薄板ヲ撫スルガ如キ凝結物タル程度ニ止ルモノトス。  
 又此心下痞鞭ハ一種ノ虚證タル桂枝去芍藥湯ノ胸滿、苓桂朮甘湯ノ心下逆滿ニ疑似スルモ此二方ノ胸滿、逆滿ハ氣上衝ノ餘波ニ過ギザルモノニシテ上衝劇ナルトキハ著明ニ現ハレ上衝稍低降スルトキハ減弱シ上衝全ク下降スルトキハ消失スル不定症狀ナレバ恒存的ナル人參ノ心下痞鞭ト區別スルヲ得ベシ而已ナラズ胸滿、逆滿ハ只心下部膨滿スルニ止リ抵抗アルニアラザレバ亦能ク人參ノ心下痞鞭ト鑑別スルヲ得ベシ。

桂枝加芍藥生姜人參湯方

桂枝 大棗人參各六、〇芍藥 生姜各九、五甘草五、〇

煎法用法同前

先輩ノ治驗

續建珠錄ニ曰ク

一老父大便通ゼザルコト數日上逆目眩ス醫備急圓ヲ與ヘテ自若タリ因テ分量ヲ倍加シテ之ヲ投ジ利スルコトヲ得タリ爾後身體麻痺シ上逆益甚クシテ大便復閉ツ醫ヲ更ユ醫診シテ之ニ與

備急圓ハ巴豆  
大黃劑ナリ

大劑ハ大量ノ  
意ニシテ承氣  
湯ハ即チ大承  
氣湯ナリ

フルニ大劑ノ承氣湯一服ヲ以テス下痢ヲ得ズ三貼ヲ服シテ下痢益ヲ傾クルガ如ク身體冷痛シテ臥スコト能ハズ大便復結ス又醫ヲ轉ズ醫地黃劑ヲ作テ之ヲ服セシム上逆尤モ劇シク面色醉ヘルガ如ク大便益通ゼズ是ニ於テ治ヲ先生ニ請フ先生之ヲ診スルニ心下痞鞭シ少腹ニカナシ即チ桂枝加芍藥生姜人參湯ヲ與フ之ヲ服スルコト三貼ニシテ衝氣即チ低レ大便快通シ二三日ヲ經テ冷痛止ミ臥スコトヲ得大便續テ快通シ二旬ノ後諸症去リ常ニ復ス。  
 余曰ク下劑ヲ用ヒズシテ大便ヲ快通セシム是レ漢方ノ至妙ナル處ナリ。

麻疹一哈ニ曰ク

松田菴妻年三十餘、發熱スルコト二三日、身熱頓ニ退キ口鼻清冷ニシテ四肢皆微厥シ脈診模索シ難ク頭冷汗ヲ出シ時ニ或ハ嘔逆ス其腹狀ヲ按ズルニ心下痞鞭、臍腹拘急甚シ自ラ言フ經候來ラザルコト兩月ト因テ桂枝加芍藥生姜人參湯ヲ與フ其明蒸々トシテ發熱シ遍身汗出テ疹子汗ニ從テ出ヅ而モ拘急未ダ安カラズ浮石丸ヲ兼與スルコト三四日所リ經信利スルコト常ニ倍シ疹收リテ後前證舊ニ復ス。

余曰ク本方ニ浮石丸ヲ兼用スルハ本方ニ桂枝茯苓丸加大黃ヲ合用スルノ正シキニ如ザルナリ。

先輩ノ治驗 八參ノ醫治効用

### 人參ノ醫治効用

古來人參ヲ以テ萬病ノ靈藥トナシ病者危篤ニ瀕スルアレバ病症ノ如何ヲ問ハズ證ノ表裏内外陰陽虛實ヲ論ゼズ必ズ此藥ヲ與フルガ常ナリシモ是レ皆後世派醫人ノ謬見ニシテ人參ハ斷ジテ萬能ノ神藥ニアラズ大觀スレバ此藥物ハ胃ノ衰弱、痞鞭ニ伴フ新陳代謝機能ノ減衰ヲ主目的トシ之ニ續發スル食機不振、惡心嘔吐、消化不良、下痢等ノ症狀ヲ副目的トシテ用ユベキモノニシテ若シ之ニ背反スレバ必ズ有害無効ナリ故ニ假令胃衰弱ノ徵アリトモ心下痞鞭アルニアラザレバ本藥ヲ用ユベカラズ心下痞鞭アリトモ此機能減衰ノ候アルニアラザレバ亦本藥ヲ用ユベカラザルナリ例ヘバ柴胡桂枝乾姜湯證ニハ屢胃衰弱、胃内停水ヲ呈スルコトアレドモ心下痞鞭アラザルガ故ニ本藥ヲ用ヒズ大柴胡湯證ニハ心下痞鞭アリト雖モ此痞鞭ハ實證ニシテ且ツ證ノ總ガ新陳代謝機能ノ亢進スルモノナレバ亦本藥ヲ用ヒザルナリ又附子ノ證ハ此機能極度ニ減衰セシモノナレバ本藥證ニ頗ル類似スルモ彼ニハ心下痞鞭アラザレバ之ヲ分ツニ難カラズ斯ノ如ク人參ハ新陳代謝機能減衰ヲ振起復興スルモノナレドモ附子ニ於ケルガ如ク其作用猛烈ナラザレバ之ヲ其機能ノ亢進セル陽證ニ用ユルモ利アリテ害ナシ是レ少陽ノ原方タル小柴胡湯ニモ本藥ヲ用ユル所以ナリ以テ二藥ノ別ヲ知ルベシ。

本草綱目ニ曰ク

輕症ニハ竹節人參ニテ可ナ  
ルモ重症ニハ  
御根人參或ハ  
ニベシ

根(氣味)甘微温ニシテ毒ナシ。

(主治)精神ヲ安シ魂魄ヲ定メ驚悸ヲ止ム(本經)

腸胃中冷、心腹鼓痛、胸脇逆滿、霍亂吐逆ヲ療シ(中略)血脈ヲ通シ堅ヲ破リ(下略)(別)

五勞七傷、虛損、痿弱ヲ主リ嘔噦ヲ止メ(中略)胸中ノ痰ヲ消シ肺痿及癆疾ノ冷氣逆上シ

傷寒ノ食下ラザルヲ治ス凡ソ虛ニシテ多夢紛紜スル者ニハ之ヲ加フ(續)煩躁ヲ止メ酸水

ヲ變ズ(李)食ヲ消シ胃ヲ開キ(下略)(大明)

肺胃ノ陽氣不足、肺氣ノ虛促、短氣、少氣ヲ治シ中ヲ補シ中ヲ緩シ(中略)渴ヲ止メ津液

ヲ生ズ(素)

男婦一切ノ虛證、發熱自汗、眩暈頭痛、反胃吐食、疰瘡、滑利久利、小便頻數、癩癧、

(中略)中風、中氣、痿痺、吐血、嗽血、下血、血淋、血崩、胎前產後ノ諸病ヲ治ス。(珍時)

余曰ク腸胃中冷ト云ヒ冷氣逆上ト曰ヒ陽氣不足ト稱スルモノハ即チ新陳代謝機能ノ病

的ニ減衰セシ候ナレバ人參ノ之ヲ治スルハ理ノ當ニ然ルベキ所ニシテ精神ヲ安シ魂魄

ヲ定メ驚悸ヲ止ムルハ此藥ノ胃性神經症ヲ治スルノ證左ナリ又血脈ヲ通ズルハ此藥ガ

新陳代謝機能減衰ヲ鼓舞スル結果ニシテ堅ヲ破ルハ即チ此藥ノ治心下痞鞭作用ノ謂ナ

リ又此藥ノ吐血、嗽血、下血、血淋、血崩ヲ治スルハ右機能減衰持久ノ爲メ血管弛緩

人參ノ靈治効用  
桂枝加厚朴杏子湯ニ關スル師論註釋

喉水ヲ變ズト  
ハ胃腸過多ヲ  
治スルノ意ナ  
リ  
少氣ハ呼吸ノ  
淺表ナルナリ  
中ハ中焦ノ略  
ニシテ主トシ  
テ胃ヲ云フナ  
リ

シ血液ノ滲漏ヲ制スル能ハザルニ因ル出血ニ限ルモノニシテ純止血藥ニアラズト知ルベシ。

藥徵ニ曰ク

人參、心下ノ痞堅、痞鞭、支結ヲ主治スルナリ旁ラ不食、嘔吐、喜唾、心痛、腹痛、煩悸ヲ治ス。

桂枝加厚朴杏子湯ニ關スル師論註釋

傷寒論ニ曰ク

喘家ニハ、桂枝湯ヲ作り、厚朴杏子ヲ加フルヲ佳トス、

(註)喘家トハ本來喘症アル病者ヲ云フ故ニ本條ノ意ハ元來喘症アル人若シ桂枝湯證ヲ現ストキ

ハ之ニ厚朴杏子ヲ加用スレバ佳ナリト云フナリ。

又同書ニ曰ク

太陽病、之ヲ下シテ微喘スル者ハ、表未ダ解セザルナリ、桂枝加厚朴

杏子湯之ヲ主ル、

(註)太陽病ヲ法ノ如ク汗解セズ誤下スルトキハ多クハ氣上衝スルモノナルガ若シ之ニ伴ヒテ微

此說ニヨリテ人參ノ用途始テ定マリシナリ喜唾トハ嘔吐ノ液ヲ吐クヲ云フナリ

杏子ハ杏仁ナリ

喘スルハ表證未ダ去ラザルノ徵ナレドモ桂枝湯獨力ノ治シ得ル處ニアラザレバ之ニ厚朴、

杏子ヲ加ヘシ本方ヲ以テ治スベシトノ意ナリ。

東洞翁本方ニ定義ヲ下シ桂枝湯證ニシテ胸滿、微喘スル者ヲ治スト云ヘルハ至言ニシテ胸滿ノ二字ヲ追加セシ所以ハ本方中ニ胸腹滿ヲ主治スル厚朴アレバ其證ニモ胸腹滿ナカルベカラザルノ理ナレドモ厚朴ノ用量少キガ故ニ只胸滿スルニ止リ腹滿セザルノ意ヲ表サンガ爲ナリ而シテ桂枝去芍藥湯ノ胸滿ニ比スレバ本方證ノ者ハ比較的實證ニシテ恒存的ナリ又此胸滿ハ人參ノ心下痞鞭ノ限局的ナルト異リ普遍的ニ膨滿スルモノトス。

### 桂枝加厚朴杏子湯方

桂枝 芍藥 大棗 生姜各七、〇甘草 厚朴 杏仁各五、〇

煎法用法同前

### 先輩ノ論說

類聚方廣義本方條ニ曰ク

本喘症アレバ之ヲ喘家ト謂フ喘家桂枝湯證ヲ見ス者、此方ヲ以テ發汗スレバ瘥ユ若シ喘邪ニ因リテ其勢急、邪喘ニ乘ジテ其威盛ナル者ハ此方ノ得テ治スル所ニアラザルナリ宜シク它方

桂枝加厚朴杏子湯方 先輩ノ論說  
桂枝加附子湯ニ關スル師論註釋

ヲ參考シ以テ治ヲ施スベシ拘拘タルベカラズ。

余曰ク此説信スベシ

桂枝加附子湯ニ關スル師論註釋

備寒論ニ曰ク

太陽病、發汗シ、遂ニ漏レテ止マス、其人惡風、小便難、四肢微急シ、以テ屈伸シ難キ者、桂枝加附子湯之ヲ主ル、

(註)太陽病、桂枝湯證ヲ麻黃劑ニテ誤汗シタルガ爲メ其藥力盡クルモ汗漏レ出デ、止マズ病者風ニ觸ル、ヲ惡ミ小便通ジ難ク四肢少シク變急シテ屈伸シ難キ者ハ本方ノ主治ナリトノ意ナリ而シテ汗漏レ出デ止マザルト惡風スル所以ハ誤治ニヨリ皮膚虛衰シタルト半ハ陰證ニ移リシタルニヨルモノニシテ小便ノ通ジ難キハ汗漏レ出デ止マザルガ爲メ多量ノ體液ヲ失ヒシ結果ニシテ四肢微急シテ、屈伸シ難キモ亦體液亡失ノ爲メ筋肉ノ榮養失調セラレシニ由ルナリ以上ノ症狀ハ誤治ニヨルトハ云ヘ尙表證全ク去ラザルト共ニ陰虛證ニ陥リシモノナレバ桂枝湯ヲ用ヒテ表證ヲ解シ附子ヲ以テ陰虛證ヲ治スルナリ故ニ本條ノ病症ハ虛證ニシテ表裏陰陽各相半スルモノト知ルベシ。

桂枝加附子湯方、

桂枝 芍藥 大棗 生姜各七、○甘草五、○附子二、五

煎法用法同前

桂枝加朮附湯方

前方中ニ朮七、○ヲ加フ

煎法用法同前

桂枝加苓朮附湯方

前方中ニ茯苓七、○ヲ加フ

煎法用法同前

余曰ク此二方ハ東洞翁ノ創製ナルモ余ハ前方ヲ用ヒズ後方ノミヲ用ユ。

桂枝加苓朮附湯ニ關スル鄙見

桂枝加苓朮附湯ハ吉益東洞翁ノ創方ナレドモ其實ハ師ノ桂枝加附子湯、桂枝去芍藥加茯苓朮湯ヲ合方セシニ外ナラザレバ本方ニハ勿論此二方ノ精神ヲ宿シ又此二方ノ原方タル桂枝湯ノ方意モ籠レルノミナラズ本方中ニハ茯苓、桂枝、朮、甘草ヲ包含スルガ故ニ苓桂朮甘湯ノ精神ヲ寓

桂枝加附子湯方 桂枝加朮附湯方 桂枝加苓朮附湯方  
桂枝加苓朮附湯ニ關スル鄙見 先聖ノ論說治驗

此惡風ハ純表証ノ惡風ト異ナル何トナレバ純表証ノモノナレバ必ズ頭痛或ハ發熱ヲ伴フヲ常トス然ラザルヲ以テ

附子ハ初診時ニハ一日量〇ニシテハ一日量〇ハ五ツ用ヒ漸次増シツベシ漸次増シツベシ漸次増シツベシ

シ又茯苓。芍藥、生姜、朮、附子ヲ有スルヲ以テ眞武湯ノ方意ヲモ含蓄ス故ニ本方ハ桂枝湯、桂枝加附子湯、桂枝去芍藥加茯苓朮湯、苓桂朮甘湯、眞武湯ニ關スル師論及諸說ヲ參照シテ活用スベキモノニシテ之ヲ概括的ニ説明スルハ至難ナリ是レ本方々意ノ複雑ニシテ臨床上應用範圍ノ廣大ナル所以ナリ。

先輩ノ論說治驗

類聚方ニ曰ク

桂枝加附子湯 桂枝湯證ニシテ惡寒或ハ支節微痛スル者ヲ治ス。

余曰ク此說、本方ノ定義トシテハ甚シク不備ナリ何トナレバ桂枝湯證ニ既ニ惡寒、身疼痛ノ症アルヲ以テ陰證ノ二字ヲ加フルニアラザレバ本方ノ定義トナスニ足ラザレバナリ。

方機ニ曰ク

濕家骨節疼痛スル者應鑑、七實或ハ半身不遂口眼喎斜南呂或ハ紫團スル者、或ハ頭疼重ノ者應鑑或ハ身體麻痺スル者、或ハ頭痛劇キ者、桂枝加朮附湯之ヲ主ル。

濕家眼目明ナラザル者、應鑑或ハ紫團或ハ七實或ハ耳聾或ハ肉瞶筋惕スル者、桂枝加苓朮附湯之ヲ主ル。余曰ク東洞翁ハ古方派復興ノ祖トモ稱スベキ醫傑ナレドモ惜ムラクハ其治術往々過劇ニシ

濕家トハ水毒又ハ散毒アル人ヲ云フ  
口眼喎斜ハ顔面神經麻痺ナリ  
應鑑ハ大黃劑  
南呂ハ甘遂劑  
柴圓ハ巴豆劑

テ峻下劑濫用癖アリシガ故ニ兼用方ニ關スル所說ハ盡ク信ズベカラズ。

建珠錄ニ曰ク

京南東福寺塔頭松月軒ノ某長老、病後肘骨突出シテ屈伸スルコト能ハズ先生之ヲ診スルニ腹皮變急、四肢沈惰シテ。時アリテ上逆ス桂枝加附子湯及芎黃散ヲ爲リテ之ヲ飲シメ時ニ梅肉散ヲ以テ之ヲ攻ムルコト數十日、肘骨故ニ復シ屈伸意ノ如シ。

余曰ク腹皮變急トハ即チ右直腹筋變急ノ謂ニシテ時アリテ上逆ストハ時々上衝發作アリシトノ意ナリ。

勢州白子、久住庄右衛門、伏枕スルコト三年可リ其疾ハ口眼喎斜、四肢不遂シテ居常涎ヲ唾シ語言通シ難シ先生之ヲ診シテ桂枝湯ヲ爲リ朮附各三兩ヲ加ヘテ之ヲ飲シメ時ニ平水丸ヲ以テ襟ヘ進ム出入スルコト半歲可リニシテ全ク常ニ復ス。

續建珠錄ニ曰ク

一男子骨テ頭重クシテ微ク痛ミ鼻中冷ヘ清涕止マザルヲ患フルコト年アリ此ニ於テ其腹ヲ按ズルニ少腹ヨリ心下ニ至ル迄變急シ脈微細飲食平日ノ如シ則チ桂枝加苓朮附湯ヲ與ヘ應鑑散ヲ兼用シテ諸症治スルコトヲ得タリ

余曰ク少腹ヨリ心下ニ至ル迄變急シトハ右直腹筋變急スルノ謂ナリ。

先輩ノ論說治驗

肉瞶筋惕ハ筋肉ノ間代性痙攣ナリ  
桂枝加朮附湯ノ連應症ハ亦湯ノ連應症ナリ  
芎黃散ハ應鑑散ト同ジ  
梅肉散ハ輕粉巴豆劑ナリ

平水丸ハ甘遂劑ナリ

此舌黑胎ハ必  
ズ瀉瀉セシナ  
ラン

濕瘡ハ數毒ナ  
リ危坐ハ跪坐  
同ジク兩膝ヲ  
地ニオナツケ  
テ尻ヲ足ノカ  
マトニオク  
ナリトハ僧ノ  
結跏趺坐スル  
儀ニシテ足ヲ  
スクミアハセテ  
スワルヲナリ

一丈夫年五十餘、手足麻痺シテ痛痒ヲ覺ヘズ頭重ク小便不利シ、舌上黑胎アリテ飲食平日ノ如シ與フルニ桂加枝朮附湯ヲ以テシ應鐘散ヲ兼用ス之ヲ服スルコト月餘、諸症悉ク瘥ユ。余曰ク陽證ノ黑胎ナレバ舌ハ必ズ乾燥シ飲食減スベキ理ナルニ黑胎アルニ拘ラズ飲食平日ノ如キハ陰證タルヲ明ナレバ此方ヲ處シタルナリ。

阪南ノ一旅客、某ナル者、嘗テ遊學シテ浪華ニ在リ刺ヲ通ジ謁シテ曰ク吾嘗テ濕瘡アリ百方効ナク往再トシテ今ニ至ル其始ハ身疼ミ腰痛ヲ四肢不仁、狀チ癱瘓ニ類シ危坐スルコト能ハズ唯跌跏僧ノ如クシ以テ安息ヲ得タリ今又咳一證ヲ加フ其咳輕カラズ之ニ依テ晝夜安臥スルコト能ハズ醫以テ勞瘵ト爲シ手ヲ束テ療セズ故ニ來テ診治ヲ請フト先生之ヲ診シテ曰ク此レ血咳ナリ勞瘵ニアラザルナリ乃チ桂枝加朮附湯ヲ與フ湯ヲ服シテ瘳ユルヲ得タリ謝シテ曰ク吾嚮ニ庸醫ニ委シテ殆ンド將ニ死ヲ救ハレザラントセリ幸ニ先生アリテ鬼錄ニ入ルヲ免ル、ヲ得タリト。

余曰ク此病者恐クハ肺微毒ナリシナラン。

成績錄ニ曰ク

一男子周身疼痛シ足痛殊ニ甚シ變ジテ大熱トナリ手ヲ近クベカラズ冷水ニ浸シ以テ堪ユ先生之ヲ診スルニ腹中實スル處ナシ乃チ桂枝加朮附湯ヲ與フ而ルニ瘥ユ。

陰証ハ發熱セ  
ザルモ變則トシ  
テ發熱スルヲ  
ナキニアラズ  
莖中ハ陰莖内  
内疝瘡ハ尿道  
内下疝ナリ

余曰ク表ニ大熱アルモ腹部虛軟ナルガ故ニ陰證發熱トナシ本方ヲ與ヘシナリ。

一男子年三十可リ尿膿淋瀝、莖中疼痛、身體羸瘦シ時トシテ蒸熱アリ醫曰ク毒骨髓ニ在リ藥ノ及ブ所ニアラザルナリト其人頗ル懼レ遂ニ先生ニ謀ル先生曰ク此レ内疝瘡ナリト桂枝加朮附湯ヲ與ヘ兼ヌルニ七寶丸ヲ以テヌ痛ミ止ミ膿清ミ遂ニ全治ヲ得タリ。

余曰ク若シ水銀劑ノミヲ以テシタランニハ斯ル捷効アラザリシナラン。

證治摘要ニ曰ク

按ズルニ凡ソ病人、每病、附子劑ノ症ヲ患フル者稀ニハ有リ其人下疝ヲ患フルトキハ則チ葛根加朮附湯ヲ與フルニ宜シ後桂枝加朮附湯ヲ與フレバ他藥ヲ用ヒズシテ瘥ユ此症ニ輕粉丸ヲ用ユレバ則チ多クハ死ス。

余曰ク此下疝ノ硬軟何レナルヤ明ナラザレドモ其何レニ屬スルニモ水銀劑ハ概シテ不適ナリ何トナレバ附子劑ノ證アル病者ハ外觀上平人ノ如クナレドモ其實ハ虛弱ニシテ峻藥ニ堪ヘザルモノナレバナリ。

桂秀馬氏ノ外科總論ニ曰ク

(甲)直接衝動法

凡ソ營養不良ナル老人或ハ惡液家ハ特ニ慢性炎ニ罹リ易シ是等ノ病者ニアリテハ全身營養

先單ノ論說治驗

養ヲ旺盛ニスルヲ以テ炎症物ヲ驅除スルコトヲ得加之赤酒其他ノ衝動藥ヲ與フルトキハ  
治癒最モ速ナリ舊來微毒ニ罹リ水銀劑沃度劑等寸効ヲ奏セズ數再發スル者ト雖モ單ニ強  
壯食餌法及入浴法ニヨリテ往々全治ヲ致スコトアリ亦以テ衝動法ノ偉効アルヲ知ルニ足  
ラン。

ト亦以テ私見ヲ證スルニ足ラン。

五郎兵衛街、近江屋某、三十五歳嘗テ傷風或ハ頭痛或ハ腦痛或ハ泄瀉ノ症ヲ患フ病ム毎ニ附  
子劑ニアラザレバ則チ癒ヘズ爾後下疳ヲ患フ予葛根加朮附湯ヲ與フ家人余ノ専門ニアラザル  
ヲ疑ヒ外科ニ託シテ之ヲ治ス輕粉丸ヲ與フ下利數行變症蜂起シ日ナラズシテ死ス。  
一男子二十歳、蠟燭疳ヲ患フ素陰莖ノ長サ四寸腐蝕シテ二寸半トナル先考桂枝加朮附湯ヲ與  
フルコト二十日他業ヲ用ヒズシテ腐蝕止ミ龜頭ヲ生ジテ故ニ復ス只陰莖ノ平素ヨリ短キコト  
一寸半。

余曰ク外科的疾物ヲ内服ノミニテ能ク之ヲ易治ス古方ノ微妙ナル以テ見ルベシ。

青州醫談ニ曰ク

痿弱ハ血氣ノ不知ヨリ氣ノトシテ廻ラヌ者ナリ故ニ痛痒ハ知レドモ舉動ナリ難シ治術ハ血ヲ  
和シ氣ヲ循ラス様ニスベシ桂朮附ヨシ痿弱ニ朮附ヲ用ヒテ腹中痞滿シテクルハ奏効スルノ兆

蠟燭疳トハ腐  
蝕性或ハ瘰癧  
性下疳ナリ

痿弱ハ運動麻  
痺ナリ  
桂朮附ハ桂枝  
加朮附湯ノ略  
稱ナリ

癩癧ハ下肢ノ  
運動麻痺ナリ  
伯州散ハ蛇  
角ノ黑燒合劑  
ナリト大丸ハ  
批素劑タル生  
乳ノ合劑ナリ  
結毒トハ陳久  
毒ノ一處者ニ  
云フ

ナリ。

類聚方廣義桂枝加附子湯條下ニ曰ク

此方ニ朮ヲ加ヘテ桂枝加朮附湯ト名ケ中風、偏枯、痿痺、痛風、小便不利或ハ頻數スル者ヲ治  
ス又微瘡、結毒、筋骨疼痛シ諸瘍疽、癩膿盡キズ新肉生ゼズ遷延癒ヘザル者ヲ治ス應鐘、伯州、  
七寶、十幹、梅肉ノ類宜シキニ隨ヒテ之ヲ兼用ス微瘡結毒ニハ或ハ熏劑ヲ用ユ熏劑ヲ用ユル者  
ハ其間湯藥ヲ停ム若シ心悸目眩、身潤動スル者ニハ茯苓ヲ加ヘテ桂枝加茯苓朮附子湯ト名ク、  
橘窓書影ニ曰ク

是歲秋八月佛蘭西「ミニストル」性「シユウレー」名列翁魯者疾アリ瘧エズ醫ヲ幕府ニ乞フ幕  
府議シテ余及鍼醫和田氏ヲ遣シ療セシム閣老山形侯參政敦賀侯、其命ヲ傳フ即チ促裝シテ橫  
濱ニ赴ク山口駿河守、栗木清兵衛接伴トシテ余等ヲ使館ニ導キ公使ヲ診ス其按ニ曰ク日本政  
府御目見醫淺田宗伯、佛國公使某ノ病ヲ診察シ得ルニ生質強健ナレドモ數歲困苦シテ戰闘等  
ヲ經タルユヘ筋骨弛緩シテ血氣ノ分利ヲ失ヒテ脈ニ遲緩ノ候アラハレ皮肉潤澤モ年輪ヨリハ  
枯稿シタリ且腰間ノ邊ニ打撲ノ痕アリテ臀肉右ノ方ヨリ瘦セタリ腰ハ一身ノ要關ニテ別シテ  
運動ノ處ユヘ氣血ノ分利鈍クナリテ苦惱セリ此病治セザルトキハ漸々腰以下ノ分利ヲ失テ步  
行難澁ニナルモノナリ内ヨリ血氣ヲ扶助シ外ヨリ經絡ヲ活動スル鍼治ヲ施ストキハ全癒ヲ得

先賢ノ論說治驗





師ガ若シ小便ノ色白キ者ハ少陰ノ病形ニシハ此病合ナリ

異常感覺或ハ疼痛ヲ發ス又筋肉モ營養失調ノ爲メ弛緩スルガ故ニ外表ニ在リテハ四肢倦怠脱力感ヲ生シ腹壁ハ軟弱無力トナリ裏ニ於テハ大便失禁或ハ下痢(完穀下痢)ヲ來ス又分解機轉減弱スルヲ以テ排泄物ノ臭氣消失シ尿ハ稀薄透明ニ變ズル等其他各種臟器組織機能ノ沈衰ヲ招來ス此時ニ際シ附子、鳥頭ヲ用ユルトキハ生機全ク絶滅セルニアラザレバ能ク是等ノ機能ヲ振起復興スト雖モ若シ然ラザルニ之ヲ用ユレバ極テ有害ナリ。

本草綱目ニ曰ク

鳥頭(氣味)辛温大毒アリ。

(主治)(上畧)寒濕痺、咳逆上氣ヲ除キ積聚寒熱ヲ破ル其汁ヲ煎シテ射罔ト名ケ禽獸ヲ殺ス(本)

胸上ノ痰冷ヲ消シ食下ラズ心腹冷痰、胸間痛ミ使仰スベカラズ目中痛テ久視スベカラズ

又胎ヲ墮ス(別)

惡風憎寒、寒冷痰心ヲ包ミ腸腹痛、疰癩、氣塊、齒痛ヲ主リ陽事ヲ益シ志ヲ強ム(經)

頭風、喉痺、癰腫、疔毒ヲ治ス(珍)

烏喙一名兩頭尖(氣味)辛微温、大毒アリ。

(主治)(上畧)歷節掣引シ腰痛ヲ行歩スベカラズ癰腫膿結、又胎ヲ墮ス(別)

男子腎氣衰弱、陰汗、癩癧、歲月消セズ(經)

腎氣衰弱ハ生補器衰弱ナリ陰汗ハ陰証ヲ示ス

陽事ヲ益シハ男子ノ生殖器ヲ旺盛ナラシムルノ意ナリ

射罔(氣味)苦、大毒アリ。

(主治)尸疰ノ癰堅及頭中風痺(別)

瘰癧、瘡根、結核、癰癧、毒腫、及蛇咬ニハ先ヅ取リテ肉ノ四畔ニ塗リ漸々瘡ニ近ク

(下畧)(經)

白附子

(氣味)辛甘大温、大毒アリ。

(主治)心痛、血痺、面上ノ百病、藥勢ヲ行ル(別)

中風ノ失音、一切ノ冷風氣、面疝、癰疽(明)

諸風冷氣足弱力無ク、疥癬、風瘡、陰下濕癢、頭面ノ痕、(下畧)(珍)

天雄

(氣味)辛温大毒アリ。

(主治)大風、寒濕痺、歷節痛、拘攣緩急、積聚ヲ破リ(中畧)筋骨ヲ強メ身ヲ輕クシ行ヲ健ニ

ス(本)

頭面風去來ノ疼痛、心腹ノ結聚ヲ療シ關節重ク行歩スベカラズ骨間ノ痛ヲ除キ陰氣ヲ長

シ志ヲ強メ人ヲシテ武勇力作倦マザラシム(別)

附子、烏頭ノ醫治効用

尸疰ハ尸(シ)カバネ)ヨリ傳フル病ナレバ即チ傳染病ナリ結核ハ淋巴腺腫ナリ

斷へくろがさ

大風ハ癩ナリ歴節痛ハ關節痛ナリ拘攣緩急ハ發作性ノ痲痺ナリ去來ノ疼痛ハ發作性ノ疼痛ナリ

陽道ヲ助ケハ  
男子ノ生殖器  
ヲ強ムルヲ云  
フ

風痰、冷痺軟、脚毒風ヲ治シ能ク氣喘促急ヲ止メ禽蟲毒ヲ殺ス(既)  
一切ノ風、一切ノ氣ヲ治シ陽道ヲ助ケ水腫ヲ暖メ腰膝ヲ補シ精ヲ益シ目ヲ明ニシ九竅ヲ  
通シ皮膚ヲ利シ血脈ヲ調ヘ四肢遂ゲズ胸膈ノ水ヲ下シ疔癩、癰結ヲ破リ膿ヲ排シ痛ヲ止  
メ(中畧)背脊偏僕、霍亂轉筋、汗ヲ發シ陰汗ヲ止メ炮食スレバ喉痺ヲ治ス(明)

側子

(氣味) 苦辛、毒アリ。

(主治) 癰腫、風痺、歷節、腰脚疼冷(下畧)(錄別)

脚氣、冷風濕痺、大風ノ筋骨變急ヲ療ス(權)

冷酒ニ調服スレバ遍身ノ風形ヲ治シテ神妙ナリ(教)

漏籃子

(氣味) 苦辛、毒アリ。

(主治) 惡癩、冷漏瘡、惡瘡、厲風、(珍時)

余曰ク以上ノ藥物ハ老稚、大小ノ差アルノミニシテ何レモ附子、烏頭ト同効ナリ。

藥徵ニ曰ク

附子 水ヲ透フコトヲ主ルナリ故ニ能ク惡寒、身體四肢及骨節疼痛或ハ沈重或ハ不仁或ハ厥

厲風ハ癩瘡ナ  
リ

風形ハ發疹ヲ  
云フナリ

知ハ白體ニ感  
ズルノ意ナリ

冷ヲ治ス而シテ旁ラ腹痛、失精、下利ヲ治ス。

余曰ク此說亦本藥作用ノ一面ヲ發スルモノナリ。

證治摘要ニ曰ク

門人稻葉節、附子ノ用法ヲ余ニ問フ答テ曰ク夫レ烏附ノ性タル猛烈ナリ之ヲ用ヒテ瞑眩シテ  
瘥ユル者アリ瞑眩セズシテ瘥ユル者アリ徒ニ中毒スル者アリ烏頭桂枝湯條ニ云フ其知ル者ハ  
醉狀ノ如シ吐ヲ得レバ病ニ中ルト爲スナリト又桂枝附子去桂加朮湯條ニ云フ胃狀ノ如シト此  
レ瞑眩シテ愈ユルナリ又之ヲ用ヒテ其病須臾ニシテ増劇シ頭痛眩暈或ハ身體不仁或ハ發熱上  
逆嘔吐等ノ症ヲ發スル者ハ其毒ニ中ルナリ速ニ附子ヲ止ムベシ復問フ瞑眩シテ吐ス者ト中毒  
シテ吐ス者ト何ヲ以テ之ヲ辨ズルヤ答テ曰ク瞑眩シテ吐ス者ハ其病愈テ後ニ吐スナリ中毒シ  
テ吐ス者ハ其病増劇シテ吐ス是レ其別ナリ凡ソ病ニ附子ヲ用ヒ即チ愈ヘテ心氣爽快ナル者ハ  
方證相對スト爲スナリ外科ノ結毒ヲ療スルニ其痼毒ヲ動カス爲ニスルトハ自ラ逕庭アリ然ラ  
ハ則チ附子ノ症候ハ如何答テ曰ク仲景云フ熱ナクシテ惡寒スル者ト又眞武湯證ニ曰ク腹痛下  
痢ト附子湯證ニ曰ク口中和ト是ニ由テ之ヲ考フレバ熱ナクシテ惡寒、大便滑或ハ瀉、口中和  
スル者ヲ以テ附子ノ準的ト爲スベシ凡ソ大便秘スル者ハ之ヲ用ユルニ中ラズ只冷秘ノ症ハ附  
子ヲ用ヒテ大便快通ス是レ冬節薄衣ノ人、或ハ婦人月經ノ時一身冰冷少腹痛ム者ニ多ク此症

外痔瘻ガ附子  
ヲ用ヒテ結毒  
ノ瘻ヲ瘥スル  
ノ病ヲ瘥スル  
ハ慢性炎症ニ  
急慢性炎症ニ  
シテ治スルノ  
手段ナレバ初  
期セザルベカ  
ラズ  
口中和トハ食

附子、烏頭ノ證治効用 桂枝去芍藥加附子湯ニ關スル師論註釋  
桂枝去芍藥加附子湯方 桂枝、芍藥、甘草、附子、大棗、膠、饴糖ニ關スル師論註釋

味平日ト變ラ  
ザルヲ云フ  
瀉ハ下劑ナ

アリ然レドモ百人中ノ一人ノミ又痛風ノ一證、附子ヲ用コルコト數日ナラザレバ則チ効ナキ者ニシテ若シ大便難ナレバ大黃劑ヲ兼用スルニ宜シ又附子ヲ久服シテ眼疾ヲ患フル者アリ速ニ附子ヲ止ムベシ然ラザレバ後失明ヲ致ス者アリ諸ヲ慎メ諸ヲ慎メ  
余曰ク此說完璧ニアラザレドモ甚ダ佳ナリ初學須ラク之ヲ熟讀スベシ。

桂枝去芍藥加附子湯ニ關スル師論註釋

太陽病之ヲ下シテ後、脈促胸滿スル者、桂枝去芍藥湯之ヲ主ル、若シ微惡寒スル者、桂枝去芍藥加附子湯之ヲ主ル、

(註)本方ハ桂枝去芍藥湯ニ附子ヲ加ヘシモノナレバ東洞翁說ノ如ク桂枝去芍藥湯證ニシテ微惡寒スル者ヲ治スルハ無論ナレドモ此惡寒ハ表證ノ惡寒ト異リ誤治ニヨル陰證ノ惡寒ナルヲ忘ルベカラズ。

桂枝去芍藥加附子湯方

桂枝 大棗 生姜各九、○甘草六、○附子三、○

煎法用法同前

桂枝附子湯ニ關スル師論註釋

傷寒八九日、風濕相搏ナ、身體疼煩、自ラ轉側スルコト能ハズ、嘔セズ渴セズ、脈浮虛ニシテ濇ル者、桂枝附子湯之ヲ主ル、

(註)傷寒八九日ハ傷寒ニ罹リテヨリ凡ソ八九日ヲ經タル頃ノ意ニシテ風濕相搏チトハ本ヨリ在ル所ノ水毒ニ外來ノ風邪ヲ感シテ相互ニ激スルナリ身體疼煩トハ身體全部ガ疼痛スルガ爲メ煩悶スルニテ自ラ轉側スルコト能ハズトハ自力ニテ寢返リ出來ザルナリ嘔セズ渴セズトハ讀ンデ字ノ如クナレドモ是レ師ノ深意ノ潛ム處ニシテ傷寒ノ八九日經過セシ處ハ少陽柴胡劑ノ證又ハ陽明白虎湯證ヲ現ハス時期ナレバ特ニ嘔セズ渴セズト云ヒテ柴胡、白虎ノ證ナキヲ暗示スルナリ又脈浮ハ表證アルノ徵ナレドモ虛ニシテ濇ルハ陰虛證ノ候ナレバ本條ノ病症ハ虛證ニシテ表裏陰陽相半スルモノトス。

桂枝附子湯方

桂枝九、五附子 生姜各七、○甘草五、○大棗七、○

右細剉シ水三合ヲ以テ一合ニ煎シ滓ヲ去リ一日三回ニ分チテ温服ス。

桂枝附子去桂加朮湯ニ關スル師論註釋

傷寒八九日、風濕相搏ナ、身體疼煩、自ラ轉側スルコト能ハズ、嘔セズ

桂枝附子湯方、桂枝附子去桂加朮湯ニ關スル師論註釋

本方ハ桂枝去芍藥湯ニ附子ヲ加ヘシモノナレバ東洞翁說ノ如ク桂枝去芍藥湯證ニシテ微惡寒スル者ヲ治スルハ無論ナレドモ此惡寒ハ表證ノ惡寒ト異リ誤治ニヨル陰證ノ惡寒ナルヲ忘ルベカラズ。

多少ニヨリ其作用ヲ異ニスルヲ示サシガ爲ナラン  
本方ハ太陽瀉ニ列スベキニアラザルモキニ明ノ便宜上モ之ヲ載セタ

渴セズ、脈浮虛ニシテ濇ル者、桂枝附子湯之ヲ主ル、若シ其人大便鞭ク、小便自利スレバ、去桂加朮湯之ヲ主ル、

(註)本方ハ桂枝附子湯ト異リ桂枝ナキガ故ニ上衝ノ候ナク朮アルヲ以テ小便自利ノ症アリ小便自利即チ尿利多キガ爲メ腸内枯渴シテ大便難キヲ致スナリ故ニ東洞翁ハ本方ニ定義シテ桂枝附子湯證ニシテ大便難ク小便自利シ上衝セザルモノヲ治スト説キシナリ尾臺氏曰ク

小便自利トハ猶不禁ト曰フガ如シ、朮、附子、茯苓ハ皆小便ノ不利、自利ヲ治ス猶桂麻ノ無汗自汗ヲ治スルガ如シ。

ト信ズベシ。

### 桂枝附子去桂加朮湯方

朮九、五附子七、○甘草五、○大棗 生姜各七、○

煎法用法同前 一服スレバ身痺ル、ヲ覺ヘ、半日許ニ再服シ、三服都テ盡ストキハ、其人胃狀ノ如シ、怪ム勿レ、即チ是レ朮附並ニ皮中ヲ走りテ、水氣ヲ逐ヒ、未ダ除クヲ得ザルガ故ノミ、

余曰ク東洞翁ガ附子、水ヲ逐フコトヲ主治スルナリト曰ヒシハ此方後ノ説ニ基キシナ

### 甘草附子湯ニ關スル師論註釋

金匱要略ニ曰ク

風濕相搏ナ、骨節煩疼、掣痛、屈伸スルヲ得ズ、之ニ近ケバ、則チ痛ミ劇シク、汗出テ短氣、小便不利シ、惡風衣ヲ去ルヲ欲セズ或ハ身微腫スル者、甘草附子湯之ヲ主ル、

(註)和久田氏曰ク濕ハシメルナリ、水ト曰ズシテ濕トイフモノハ水ノゴトク腫テモ、之ヲ按スニ其アト凹マズ、但皮膚ノシマリナクグザ／＼トスルモノ、肌膚ヲ濕スガ如クナルヲ以テ、濕トナヅク、俗ニ呼ンデワルブトリトイフノ類、皆濕症トスベキナリ、是レ亦正氣ノハリヨワキヲ以テ、水氣之ニ乗ズルモノユヘ、後世氣虛ノ候トスルナリ、サテ風濕相搏チトイフハ其人素濕氣アルトコロヘ、風邪ヲ感冒シテ、風邪ト濕氣ト相タ、カフヲ以テ名クルナリ、骨節疼煩ハ、フシトウヅキイタミテイキレモヤツクナリ、掣ハ、ヒクナリ、後ヨリ引キトムルガゴトク痛ムナリ、ビツクリトスルイタミヲ云フ、屈伸スルコトヲ得ズノ句、骨節疼煩ト應ズ、之ニ近ケバハ、手ヲ疼處ニ近クルナリ、汗出テハ、風濕相搏ヲハナリ、

甘草附子湯ニ關スル師論註釋 甘草附子湯方  
桂枝去芍藥加茯苓朮湯ニ關スル師論註釋

後世ハ後世派  
ノヲナリ

短氣ハ、呼吸ミチカシ、急迫スルナリ、小便不利ハ、氣衝逆シテ下降セザルニヨル、惡風尋常ヨリ重キヲ示サンガ爲ニ、衣ヲ去ルコトヲ欲セズノ一句ヲ補添シタルナリ、イヅレモ風邪濕氣相搏ツノ證ナリ、此證汗出テ短氣ハ表證ニシテ衝逆急迫スルヲ以テ桂枝甘草アリ、惡風骨節疼痛小便不利等ノ證アルユヘ朮附ヲ相伍ス、而シテ附子ノ分量多キモノハ、外證劇シク内寒アルヲ以テナリ、凡ソ内寒アルモノハ、右ノ小腹結聚腹皮軟弱ナルモノナリ。余曰ク此説是ナルモ骨節疼痛ヲ治スルハ獨リ朮附ノ作用ノミナラズ桂枝、甘草亦與リテカアルヲ追加セザルベカラズ。

東洞翁本方ニ定義シ骨節煩疼シテ屈伸スルコトヲ得ズ上衝汗出テ惡寒小便不利スル者ヲ治スト曰ヘリ此説亦佳ナルモ本方ハ桂枝附子湯ノ桂枝去芍藥湯ヨリ出發セシト異リ桂枝甘草湯ニ基ケルモノナレバ彼ニ比シテ上衝短氣ノ劇ナルヲ添加セザルベカラズ。

### 甘草附子湯方

甘草 朮各九、○附子六、○桂枝一二、○

右細割シ水ニ合ヲ以テ一合ニ煎シ滓ヲ去リ一日三回ニ分チテ温服ス。

桂枝去芍藥加茯苓朮湯ニ關スル師論註釋

傷寒論ニ曰ク

桂枝湯ヲ服シ、或ハ之ヲ下レ、仍頭項強痛、翕翕トシテ發熱、汗無ク心下滿微痛、小便利スル者、桂枝去桂加茯苓朮湯之ヲ主ル、

(註)傷寒論ハ著者ノ落筆セシヨリ今ニ至ル約二千有餘年、其間多數醫家ノ註釋改竄ヲ經タレバ或ハ註釋本文中ニ混入シ或ハ改竄ノ儘傳リシガ故ニ果シテ其何レガ眞何レガ僞ナルヤ往々判斷ニ苦シム處ニシテ又幾多議論ノ生ズル處ナリ本條モ亦此例ニシテ去桂ノ二字ガ即チ疑問ノ焦點ナリ。

尾台氏曰ク

桂枝去桂加茯苓朮湯ノ去桂二字ハ疑フベシ太陽篇、瓜蒂散條ニ曰ク病桂枝證ノ如ク頭痛マズ項強ラズト是レ頭痛項強ハ本桂枝湯症ナリ今己ニ桂枝湯ヲ服シ或ハ之ヲ下スト雖モ仍頭項強痛、翕翕トシテ發熱止マザルハ是レ桂枝湯症依然トシテ仍在ルナリ何ゾ桂枝ヲ去ルコトヲ得ンヤ况ンヤ主藥ヲ去ルノ理ナキヤヤ是レ故ニ桂枝去芍藥加附子湯、桂枝去芍藥加皂莢湯桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯、柴胡去半夏加栝實湯、木防己去石膏加茯苓芒硝湯ノ諸方ハ其去加スル所、皆臣佐藥ニ過ギズ以テ證トスベシ後徐靈胎ノ説ヲ讀ムニ

桂枝去芍藥加茯苓朮湯ニ關スル師論註釋

余ノ意ト符契ノ如ク合ス益鄙見ノ愆ヲザルヲ信ズ成無己亦曰ク頭項強痛翁翁トシテ發熱スルハ汗下ヲ經ルト雖モ邪氣仍表ニ在ルナリ心下滿微痛、小便自利スル者ハ則チ結胸ヲ成サント欲ス今外症未ダ罷シテ汗ナク小便不利シテ則チ心下滿微痛ス停飲ト爲スナリ桂枝湯ヲ與ヘ以テ外ヲ解シ茯苓朮ヲ加ヘ以テ小便ヲ利シ留飲ヲ行ルナリト是ニ由テ之ヲ見レバ成氏註スル所ノ本ニ去桂ノ二字ナキヤ必セリ。

吉益南涯氏去桂ヲ以テ去芍藥ノ誤リトシ其理由ヲ擧ゲテ曰ク、  
 本去桂ナリ今醫宗金鑑ニ從ヒ去芍藥ニ作レリ此症ヲ歷觀スルニ桂枝ヲ去ルノ理ナシ此レ水氣結滯シテ滿微痛ヲナシ而シテ頭項強痛ヲ致ス心下ノ水ヲ逐ハザレハ外發スルヲ得ズ故ニ桂枝湯ヲ服シ或ハ之ヲ下スモ解セザルナリ今茯苓朮ヲ加ヘ以テ水氣ヲ逐ヒ桂枝ヲ以テ其滿ヲ散ジ芍藥ヲ去リテ其力ヲ專ナラシメント欲スルナリ水氣ヲ逐フノ劑ニ未ダ管テ芍藥アラズ之ヲ去ル所以ヲ知ルベシ

ト今此二說ヲ比較スルニ尾台氏說ニ隨ヘバ本方ハ桂枝加茯苓朮湯ト稱スベキモノニシテ去字ハ全然無意味無用ノ長物ニ化スルガ故ニ余ハ南涯氏ニ左袒シ去桂ハ去芍藥ノ誤リト認メ本方ヲ桂枝去芍藥加茯苓朮湯ト名ケントス。

本方ハ桂枝湯ノ去加方ナレバ當ニ汗出ヅベキ理ナルニ翁翁トシテ發熱スルニ汗ナキハ何故ナルカ此理ハ南涯氏說ヨリ推究シ得ラレザルニアラザレトモ大倉氏ガ其著麻疹一哈ニ發熱ノ時固ヨリ留飲凝結ナク腹氣和暢シ表氣通透シテ疹子ノ候備ラバ用藥ハ之ヲ表汗スルニ宜シ若シ留飲凝結シテ腹氣和暢セザレバ則チ疹子ノ候備ラザルナリ蓋シ佗症先ヅ見ル、ガ故ナリ宜シク腹候ヲ詳悉シテ之ニ處スベシ留飲解散シ腹氣和暢スレバ表氣通暢シ疹子汗ニ從フテ出デ易シ(下略)

ト說ケルニ因テ之ヲ見レバ本方證ノ汗ナキハ小便不利ノ結果タル心下滿微痛即チ胃内停水ノ爲ナルヤ明ナリ。

桂枝去芍藥加茯苓朮湯方

桂枝 大棗 生姜 茯苓 朮各七、○甘草五、○

煎法用法ハ桂枝湯ニ同シ

茯苓ノ醫治効用

本草綱目ニ曰ク

茯苓

(氣味)甘平、毒ナシ。

桂枝去芍藥加茯苓朮湯方 茯苓ノ醫治効用

留飲ハ胃内ノ停水ナリ

胸膈逆氣ハ胸  
膈中ノ痰水ハ  
肺痿痰壅ハ  
心腹脹滿ハ  
小兒驚癇ハ  
女人ノ熱淋ハ  
主ル

煩滿ハ胃部膨  
滿シテ煩シキ  
膈中ノ痰水ハ  
胃邪ヲ伐テハ  
腎邪ヲ伐テハ  
心腹脹滿ハ水  
瀉ナリ  
驚癇ハ驚悸ハ  
疾急ナリ  
腎原因性奔豚  
腎原因性奔豚

膚腫ハ皮膚腫  
毒ノ爲ニ腫ス  
ノスルニテ水腫  
ノ輕キナリ

風眩ハ眩暈ニ  
シテ善忘ハ健  
忘ト同シ

(主治) 胸膈逆氣、憂恚驚邪恐悸、心下結痛、寒熱煩滿、咳逆、口焦舌乾、小便ヲ利ス久服

スレバ魂ヲ安シ神ヲ養フ(本)

消渴ヲ止メ睡ヲ好ミ(中略) 膈中ノ痰水、水腫、淋結、胸膈ヲ開キ臟器ヲ調ヒ腎邪ヲ伐チ

陰ヲ長シ氣力ヲ益シ神氣ヲ保ツ(別)

胃ヲ開キ嘔逆ヲ止メ善ク心神ヲ安シ肺痿痰壅、心腹脹滿、小兒驚癇、女人ノ熱淋ヲ主ル

(補)

五勞七傷ヲ補シ心ヲ開キ志ヲ益シ健忘ヲ止メ腰膝ヲ暖メ胎ヲ安ズ(大)

渴ヲ止メ小便ヲ利シ濕ヲ除キ燥ヲ益シ中ヲ和シ氣ヲ益シ腰臍間ノ血ヲ利ス(元)

水ヲ逐ヒ脾ヲ緩シ津ヲ生シ氣ヲ導キ火ヲ平ニシ泄ヲ止メ虛熱ヲ除キ腠理ヲ開ク(李)

膀胱ヲ瀉シ脾胃ヲ益シ腎積奔豚ヲ治ス(好)

赤茯苓

(主治) 結氣ヲ破ル(補) 心、小腸、膀胱ノ濕熱ヲ瀉シ竅ヲ利シ水ヲ行ル(珍)

茯苓皮

(主治) 水腫、膚脹、水道ヲ開キ腠理ヲ開ク(珍)

(發明) (宗奭曰ク) 茯苓ハ水ヲ行ルノ効多ク心脾ヲ益スルニ缺クベカラザルナリ(元素曰ク) 茯

苓(中略) 其用ハ五アリ小便ヲ利スルナリ腠理ヲ開クナリ津液ヲ生ズルナリ虛熱ヲ除クナ

リ瀉ヲ止ムルナリ(杲曰ク) (上略) 甘ニシテ淡、降ナリ其用ハ六アリ竅ヲ利シ濕ヲ除ク氣

ヲ益シテ中ヲ和シ驚悸ヲ治ス津液ヲ生シ小便多キ者ハ能ク止メ小便結スル者ハ能ク通ズ

(中略) 能ク脾ヲ益シ水ヲ逐フ濕ヲ除クノ聖藥ナリ。

茯神(氣味) 甘平、毒ナシ。

(主治) (上略) 風眩、風虛、五勞口乾ヲ療シ能ク驚悸、多恚、善忘ヲ止メ心ヲ開キ智ヲ益シ

魂魄ヲ安シ精神ヲ養フ(別)

勞乏ヲ補シ心下ノ急痛堅滿ヲ主リ(下略)(補)

神木

(主治) 偏風ノ口面喎斜、毒風ノ筋攣不語、心神驚掣、虛ニシテ健忘、(補) 脚氣ノ痺痛、諸筋

ノ攣縮ヲ治ス(珍)

本草備要ニ曰ク

茯苓 甘温ハ脾ヲ益シ陽ヲ助ケ淡滲ハ竅ヲ利濕シテ除ク色白ク肺ニ入り熱ヲ瀉シ而シテ下勝

膀胱ニ通ズ能ク心氣ヲ腎ニ通ズ熱ヲ心ヲ寧シ氣ヲ益シ榮ヲ調ヘ衛ヲ理シ魄ヲ定メ魂ヲ安ズ憂恚

驚悸、心下結痛、寒熱煩滿、口焦舌乾、咳逆嘔噦、膈中ノ痰水致ス所、水腫、淋瀝、澀瀉、

茯苓ノ醫治効用

遺精ヲ治ス小便結スル者ハ能ク通シ多キ者ハ能ク止ム津ヲ生シ渴ヲ止メ熱ヲ退ケ胎ヲ安ズ松根ノ靈氣結シテ成ル大サ斗ノ如ク色白ク堅實ナル者ヲ以テ良トス(中略)皮ハ專テ水ヲ行シ水腫、膚脹ヲ治ス。

茯神 主治略茯苓ニ同シ但茯苓ハ脾胃ニ入ルノ用多ク茯神ハ心ニ入ルノ用多シ心ヲ開キ智ヲ益シ魂ヲ安シ神ヲ養ヒ風眩、心虛、多患健忘ヲ療ス 即チ茯苓ノ根ヲ抱テ生ズル者ニシテ皮及中ノ木ヲ去テ用ユ 茯神ノ心木ハ黃松節ト名ク諸筋攣縮、風鳴邪、心掣健忘ヲ療ス 余曰ク茯苓、茯苓皮、茯神、神木ハ皆同効ナリ。

藥徵ニ曰ク

茯苓 悸及肉瞤、筋惕ヲ主治スルナリ旁ラ小便不利、頭眩、煩躁ヲ治ス。

曰クハ師曰クノ意ナリ肉瞤筋惕ハ筋肉ノ間代性痙攣ナリ

(上略)曰ク心下悸、曰ク臍下悸、曰ク四肢痙攣トシテ動キ、曰ク身瞤動、曰ク頭眩、曰ク煩躁ト一ツニ是レ皆悸ノ類ナリ小便不利シテ悸スルモノ茯苓ヲ用ユレバ則チ治シ其悸證ナキ者ニ之ヲ用ユルモ未ダ其効ヲ見ズ然ラバ則チ悸ハ茯苓ノ主治スル所ニシテ小便不利ハ其旁治ナリ頭眩煩躁モ亦然リ。

觀證辨疑ニ曰ク

裏水外行シテ疼痛スル者ハ發熱汗出ツ茯苓之ヲ主ル。

水ヲ吐スル者ハ茯苓、澤瀉之ヲ主ル。

心下痞(中略)

曰ク頭眩、曰ク小便不利スル者、ハ水滯リテ氣行カザルナリ茯苓之ヲ主ル。

心下悸(中略)

曰ク頭眩、曰ク厥曰ク癩眩ト是レ水氣上攻ノ症ナリ茯苓之ヲ主ル。

心下滿(中略)

曰ク上衝、曰ク頭眩、曰ク小便不利ト氣逆ノ症アル者ハ茯苓之ヲ主ル。

咳(中畧) 水血分ニ在リテ致ス者ハ茯苓之ヲ主ル。

本藥ノ作用ハ右諸說ノ如ク極テ多般ナレトモ余ノ實驗ニヨレバ本藥ハ尿利ノ頻數或ハ減少ト胃内停水及心悸亢進或ハ筋肉ノ間代性痙攣ヲ主目的トシ師論及右諸說ヲ副目的トシテ用ユベキモノニシテ其症狀ノ神經性タルト心臟或ハ腎臟原因性タルト問ハズシテ佳ナリ。

尤ノ醫治効用

藥徵ニ曰ク

尤 水ヲ利スルコトヲ主ル故ニ能ク小便ノ不利、自利ヲ治ス旁ラ身煩疼、痰飲、失精、眩胃、下利、喜睡ヲ治ス。

尤ノ醫治効用

曰クハ師曰クノ意ナリ

和漢藥物學ニヨレバ本藥中ニ鐵、カルシウム、ナトリウム、ネシウム、カリウム、クローリウム、硫酸鐵等ヲ含ムト云フ



此說全ク無稽ナルニアラザレトモ水ヲ利スルハ獨リ本藥ノ特能ニアラズ他藥ニシテ此作用ヲ有  
スルモノ多クナレバ利水ヲ以テ本藥ノ主治トナスハ妥當ナラザルノミナラズ斯ル抽象的解釋ニ  
ヨリ如何ニシテ臨床上之ヲ處シ得ベキカ漠然雲ヲ握ムガ如シト評セザルヲ得ズ。

尤ノ利尿藥タルハ辯ヲ俟タザレドモ臨床上ニ於テハ腎機能障礙ノ徵タル利尿ノ頻數或ハ減少ト  
胃内停水トヲ主目的トシ師論及下記諸說ヲ副目的トシテ之ヲ應用スベキモノナリ故ニ其作用ハ  
頗ル茯苓ニ類似スルモ本藥ハ此レト異リ温性ニシテ特殊ナル揮發油ヲ含ムガ故ニ胃腸粘膜ヲ刺  
戟充血セシムルモノナレバ此等ノ臟器ニ急性炎症アル場合即チ漢方ノ所謂裏熱アル際ニハ假令  
其ノ適應症具備ストモ之ヲ禁忌スベキモノニシテ先ツ急性炎症ヲ治シ後之ヲ施スベシ。

或ハ人アリテ間ハン利尿減少ヲ以テ腎機能障礙ノ徵トナスハ首肯スルモ利尿頻數症ヲ以テ亦此  
障礙ノ候トナスハ何故ナルカ答テ曰ク凡ソ利尿頻數ナルモノハ排尿ノ度數頻多ナルニ拘ラズ尿  
量反テ少キモノナリ即チ腎臟ハ其機能ヲ營爲セント欲スルモ之ヲ完全ニ遂行スル能ハザルヨリ  
生ズル症狀ナレバ利尿減少ヨリハ比較的腎臟ノ健全ナルヲ示スモノニシテ恰モ腸管ニ於ケル裏  
急後重ノ如シ大腸加答兒、赤痢等ニ於ケル裏急後重ハ腸内ノ毒物ヲ驅逐セント欲スル自然良能  
作用ニシテ而モ之ヲ完全ニ遂行シ得ザルヨリ發スル症狀ナレバ此症狀ナク(腸筋麻痺)シテ下痢  
スルニ比スレバ腸管尙未ダ甚シク衰ヘザルノ徵ナリ故ニ對證ノ下劑又ハ對證劑ニ大黃ヲ加用シ

テ良能作用ノ不足ヲ補助シ腸内ノ毒物ヲ一掃スレバ裏急後重ノ如キハ治セズシテ自ラ雲散ス腎  
臟ニ於ケルモ亦之レト等シク利尿頻數スルニ際シ茯苓、朮、澤瀉等ヲ有スル對證利尿劑又ハ對  
證劑ニ此等ノ藥物ヲ加用スレバ尙未ダ甚シク衰弱セザル腎臟ハ此有力ナル援助ニヨリ縱然其勢  
力ヲ挽回シ水毒ヲ悉ク驅逐スルガ故ニ利尿頻數ノ如キハ亦治セズシテ霧消スルナリ。

又間ハン胃内停水ハ如何ニシテ生ズルカ答テ曰ク凡ソ胃内停水ハ胃筋ノ衰弱ニヨリ胃壁弛緩縱  
張スルニ當リ若シ心臟或ハ腎臟ニ障礙アルトキハ尿排泄量減少ノ結果トシテ水毒蓄積ヲ來スニ  
因ルモノニシテ他體部ニアリテハ此水毒著シク過剰ナルニアラザレバ能ク之ヲ其組織内ニ收容  
スルガ故ニ目睹スベキ異狀ヲ呈スルニ至ラザレトモ弛緩縱張セル胃腔内ニ於ケル水毒ハ打、  
聽、觸診ニヨリ最モ明確ニ認知シ得ベシ是レ胃内停水ノ利尿障礙ト共ニ茯苓、朮、澤瀉等應用ノ  
主目的タリ得ル所以ニシテ此主目的アルニ際シ本藥ヲ用ユレバ此停滯セル水毒ヲ腎臟ヲ通ジテ  
體外ニ排除スルト共ニ此藥ニ含有セラル、揮發油ハ能ク健胃作用ヲ發揮スルヲ以テ他藥ノ協力  
ヲ得ルトキハ洋醫ノ難治ト稱スル胃擴張症ト雖モ之ヲ治スルヲ難シトセザルナリ。

今鄙見ノ誤ラザルヲ證センガ爲メ左ニ許叔微ノ體驗談ヲ掲ク本事方ニ曰ク  
微、飲酒ヲ患フルコト三十年、左下ヨリ聲アリ、脇痛、食減、嗜睡ス、酒ヲ飲ムコト半杯ニ  
シテ即チ止ム、十數日ナレバ必ズ酸水數升ヲ嘔ス、暑月ハ止右邊汗アリ。左邊絶ヘテナシ、

飲酒トハ胃内  
停水ノ宿患ト  
ナレルナリ

朮ノ醫治効用

澤瀉ハ胃ノ弛  
緩ニシテ  
科曰ハ四所  
穴ナリ  
神ハ現今ノ神  
ニアラズシテ  
胃ナリ  
胃ハ陰陽五行  
ニ當ル故ニ土  
ナリ  
ナリ

自ラ掃ル滯糞アラント、如シ水科曰ニ有ルトキハ、科盈タサレバ行カズ、但清メル者ハ行ク  
ベシ、而シテ濁ル者ハ停滯ス、以テ之ヲ決スベキノ路ナシ、故ニ積デ五六日ニ至レバ必ず嘔  
シテ去ルナリ、脾土ハ濕ヲ惡ム、而モ水ハ則チ濕ヲ流ス、若シ脾ヲ燥シ以テ濕ヲ去ル莫ケレ  
バ、土ヲ崇シ以テ科曰ヲ填ム、ト乃チ悉ク諸業ヲ屏ケ、只蒼朮麻油大棗丸ヲ以テ服ス、三月  
ニシテ疾除ク、此ヨリ常ニ服スルニ、嘔セズ痛マズ、胸膈寛利シ、飲飲スルコト故ノ如  
シ。

(註)此文ヲ意譯スレバ許叙微自身ガ胃内停水症ヲ患フルコト三十年胃内ニ水鳴アリ左季肋部疼  
痛、食慾減退、呑酸嘔噎スルガ故ニ飲酒スレバ輕快スルモ十數日後ニハ必ず酸敗セル胃内  
容物ヲ吐出シ夏季ニハ右半身ニ汗アルモ左半身ニナキヲ常トセリ故ニ自ラ胃擴張シ其内ニ  
停水アルモノト想像シ其理ヲ揣摩スルニ凡ソ胃擴張シテ停水スルハ恰モ水ガ凹所ニ在ルニ  
當リ其凹所ニ水ガ充滿セザレバ流出セザルガ如クニシテ停水中ノ清澄ナルモノハ流行スル  
モ汚濁ナルモノハ停滯シ去ルベキ路ナケレバ漸次増量シ五六日モ蓄積スルトキハ必ず嘔吐  
ヲ以テ之ヲ排出スルナリ元來胃ハ水ノ停溜ヲ嫌忌スルモノナレバ此停溜セル水ヲ去リ胃ヲ  
乾燥スルニアラザレバ治スルノ期ナキナリト思惟シ從來用ヒシ諸藥ヲ悉ク中止シ只蒼朮  
油大棗丸ヲ服用セシニ三ヶ月後ニ至リ殆ント全治シ此ヨリ後此方ヲ常服シタルニ嘔吐、疼

痛スルコトナク飲食ハ健時ノ如クナルニ至レリト云フナリ。

許氏ノ病理ヲ説クヤ甚ダ幼稚ナレドモ朮ノ胃内停水ヲ去リ健胃ノ殊効アルヲ物語ルモノナルヤ  
明ナリ而シテ此藥物ノ利尿作用ニ就テハ何等言及スル處ナキモ發汗セズ嘔吐セズ下痢セザルニ  
據テ之ヲ見レバ胃内停水ノ利尿ニヨリテ排除セラレシヤ疑フノ餘地ナシ。  
又問ハン本藥ヲ身煩疼ニ用ユル所以如何答テ曰ク利尿障礙ニヨリ水毒關節内ニ久シク停蓄スレ  
バ身煩疼ヲ來ス而シテ其理ハ左ノ淺田氏説

骨節疼痛ハ其痛ミ最モ裡ニ及ブ者ナリ説文ニ云フ骨節ハ骨肉ノ竅ナリト蓋シ三百六十骨節ハ  
神氣ノ遊行出入スル處ニシテ乃チ邪氣ノ遊行出入スル處ナリ、是ヲ以テ但風寒ノ此ニ迫ルノ  
ミナラズ痰飲微毒ノ如キモ久シク内ニ鬱スレバ則チ亦能ク骨節疼痛ヲ爲ス論ニ曰ク濕關節ニ  
流ルト是レナリ。

ノ如クナレバ利尿障礙ト胃内停水トヲ主目的トシ身煩疼ヲ副目的トシテ本藥ヲ用ユレバ胃内停  
水ノ驅逐セラル、ニ隨ヒ關節内ノ水毒消失スルガ故ニ身煩疼ハ自ラ治スルナリ。  
又問ハン茯苓、朮、澤瀉ヲ水瀉的下痢ニ用ユル所以如何答テ曰ク利尿障礙ニヨリ水毒消化管内  
ニ停滯スルコト一定度以上ニ達スルトキハ腸管ハ水瀉的下痢ヲ發シ以テ腎機能ヲ代償ス此際ニ  
當リ茯苓、朮、澤瀉ヲ用ユレバ此三藥ハ能ク腎機能ヲ恢復シ消化管内ノ水毒ヲ腎臟ヨリ排出ス

朮ノ醫治効用



水瀉ナ

明ハ...  
火...  
及...  
ノ...

則チ能ク飲食ヲ進ム勞倦ヲ祛リ脾ハ四肢ヲ主ル、虛ナ癥癰ヲ化ス枳實ト同スレバ則チ痞ヲ消ス一ハ消  
ナ積化中ヲ和スレバ則チ能ク嘔吐ヲ已メ痛ヲ定メ胎ヲ安ズ血燥濕ナキ者ハ用ユルヲ禁ズ  
能ク膿ヲ生シ痛ヲ作ス潰瘍之ヲ忌ム。

薤朮 甘ク温ク辛ク烈シ胃ヲ燥カシ脾ヲ強クス汗ヲ發シ濕ヲ除ク能ク胃中ノ陽氣ヲ升發シ吐  
瀉ヲ止メ痰水ヲ逐フ腫滿ヲ消シ惡氣ヲ辟ク一切風濕ノ邪惡ヲ辟ク暑風寒濕ヲ散シ瘰癧ヲ治スル  
ノ要藥ト爲ス陽明虛スレバ則チ宗筋緩ミ弛又能ク總テ痰、火、氣、血、濕、食、ノ六鬱ヲ解ス  
燥結汗多キ者ハ用ユルヲ忌ム。

余曰ク災沴ヲ弭ムト云ヒ惡氣ヲ辟クト言ヘルニ因テ之ヲ見レバ朮ニ殺菌性アルガ如シ  
其當否ハ未タ明ナラザレドモ本藥ニハ特種ノ揮發油ヲ含ムガ故ニ或ハ然ランカ此問題  
ハ暫ク之ヲ措キ夏時此ヲ以テ室内ヲ熏ズレバ蚊群悉ク死シテ墜落ス是ニヨリテ之ヲ見  
レバ此藥ニ殺菌性アルハ確實ナリ。

千金桂枝去芍藥加皂莢湯ニ關スル師論註釋

金匱要略ニ曰ク

千金桂枝去芍藥加皂莢湯、肺痿涎沫ヲ吐スヲ治ス、

金匱...  
ナリ...  
ノ...  
スル...  
稱...  
ルナリ

(註)方名ノ上ニ千金ノ二字ヲ冠セシ所以如何トナレバ仲景師ハ傷寒雜病論十六卷ヲ著シタリシ  
モ傷寒論十卷ノミ後世ニ傳リ餘ハ皆散逸シタリシニ宋朝ノ時、王洙ワウシュナル者靈簡中ヨリ師ノ  
金匱玉函要略方三卷ヲ發見シタリ然ルニ玉函ハ傷寒ノ證治ヲ説キシモノナレバ傷寒論ト大  
差ナク僅ニ字句ニ於テ多少ノ相違アルニ過ギザルニ金匱ニハ傷寒論中ニ求ムベカラザル論  
説方劑アリシガ故ニ必要欠クベカラザルモノナレドモ如何セン年所ヲ經ルノ久シキガ爲メ  
所々散佚シタリシヲ同朝ノ高保衡、孫奇、林億ノ三氏協力シ師ノ法方ヲ引用セシ千金方、  
外臺秘要等ノ古書中ヨリ之ヲ抄書シテ完本トナシ金匱要略ト命名セリ此際ニ編者等ガ師ノ  
法方ヲ引用セシ書籍或ハ其編著者ヲ尊敬スルノ精神ヨリ師ノ方名上ニ此書名或ハ編著者名  
ヲ冠シタルナリ是レ金匱要略ノ由來ニシテ本方ニ冠セシ千金ノ二字ハ此方ガ金匱ニ存ゼズ  
シテ千金方ヨリ抄録シタルヲ物語ルモノナリ此他ノ諸方ニ於ケルモ亦然リトス。  
而シテ肺痿トハ金匱ニ

熱上焦ニ在リ因テ咳スルヲ肺痿ト爲ス(中暑)咳唾膿血シ脈數虛ナル者ヲ、肺痿ト爲スト

熱上焦ニ在リ肺氣痿イナイシ、咳ニ濁唾涎沫アリ脈數ナル者ハ、名ケテ肺痿ト曰ク(中暑)故  
ニ以テ虛證ト爲ス、後世謂フ所ノ勞嗽是レナリ、尊生書ニ云フ勞ハ脾肺ヲ傷リ、甚シキハ

桂枝去芍藥加皂莢湯ニ關スル師論註釋 桂枝去芍藥加皂莢湯方  
自藥丸ニ關スル師論註釋