伊藤文庫記

特 7/0
494

十四五六八

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号 特7-494

ガラス使用

特7-494

本草滙卷十四目次

菓部

杏仁 二百十九
白梅 二百廿一葉附
桃花 二百廿三
大棗 二百廿五
木瓜 二百廿七
乾柿 二百廿九 柿霜附
石榴皮 二百卅一
烏梅 二百二
桃仁 二百廿二 桃臭附
桃葉 二百廿四 根皮附
雪梨 二百廿六
山楂 鄧山查二百廿八
柿蒂 二百三十
陳皮 二百卅二

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号 特7-494
ガラス使用

青皮 二百卅三 葉核附
胡桃 二百卅五
橡斗子 二百卅七
龍眼 二百卅九 核附
榧子 二百四一
檳榔 二百四三
胡椒 二百四五 華澄茄附
甜瓜蒂 即苦丁香 二百四七
甘蔗 二百四九
枇杷葉 二百四九 肉附
香橼 二百卅六
荔枝核 二百卅八
橄欖 二百四十
松子 二百四二
川椒 二百四四 椒目附
茶葉 二百四六
西瓜 二百四八
石蜜 即白沙糖 二百五十
紅糖 二百五一
藕 二百五二 蓮子 蓮房 蓮鬚 蓮子附
藕節 二百五三 附
蓮鬚 二百五四
荷葉 二百五五
芡實 二百五六

本草滙卷十四

吳門郊西郭佩蘭章宜纂輯

男　樹畹芳谷

姪　維均梅在　參閱

果部

杏仁　二百十九

味甘苦溫氣薄味厚濁而沉墜降也陰也入手太陰經散肺經之風寒下喘嗽之氣逆消心下之急滿潤大腸之氣秘杏仁專入肺經解錫毒消狗乃利下之劑

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号　特7-494
ガラス使用

肉爛索粉積攧瘢斑瘡。本經治欬逆上氣者。太陰爲潤肺也。消食積也。散滯氣也。按杏仁。散結潤燥。治肺中風熱咳清肅之臟。邪客之而然也。杏仁潤下。欬自除矣。（甚用有三。）

嗽下滯氣有功。因寒者用之爲宜。若杏仁。下喘治氣。桃仁。療狂治血。俱治大便秘。當以氣血分之。晝便難行陽氣也。夜便難。行陰血也。故虛人便秘。不可過泄。脉浮者屬氣。用杏仁陳皮。脉沉者屬血。用桃仁陳皮。陳皮入肺與大腸爲表裏。故並用爲使。又考括蔞仁與杏仁。均能治痰。然杏仁主散痰。從膝理中發散而去。表虛者忌服。蔞仁斂痰。從腸胃中滑潤而流。裏虛者忌服。若痰盛表裏俱實者。二味並用。同桑皮前胡薄荷桔梗蘇子貝母甘草五味橘紅紫菀治風寒入肺。咳嗽生痰。陰虛咳嗽。肺家有虛熱。熱痰者。忘之。風寒外邪。非痰逆肺分喘急促者。不得用。湯浸去皮尖炒黃研細。風寒肺病藥中。連皮尖川取其發散也。作湯。如白沫不解者。食之氣壅。雙仁者有毒。惡黃芩黃芪葛根。得火良。

烏梅　十一百　甘　酸澁。溫平。陰也。降也。入手足太陰足少陰

經定嗽定渴皆由斂肺之熱止吐止痢盡是固腸之力化痰生津安蛔滿熱餘惡肉而至速消酒毒以清神本經主下氣除煩熱安心者經曰熱傷氣邪客于胸中則氣逆而煩滿心亦不安為之不安此能斂浮熱而吸氣歸元故能安諸症也大腸虛脫則下痢虛火上炎則津液不足而口乾好唾酸能斂虛火化津液而腸脫所以主之也按烏梅得木氣之全故其味最酸脾肺二經血分藥也斂肺扶脾調虛止痢取其和胃之功仲景云生姜嘔家聖藥熬焦者烏梅代之多見其有和胃止嘔治躁渴之功脈緩虛者必神氣散脫取其收斂以酸收之法也若病未久有當發者又未可便以此收也恐食必爲害同川連白芍滑石甘草蓮肉扁豆葛根升麻橘紅作丸治下痢如神血痢不愈用烏梅胡黃連竈下土等分爲末茶調服甚驗蓋血得酸則斂得寒則止得苦則澁故也諸瘡瘍肉用梅肉燒存性研傅惡肉上一夜立盡久嗽不已烏梅肉微炒盥粟去筋膜炒等分爲末每服二錢睡時蜜湯下去核微炒若過食而齒齼音楚北國病者嚼胡桃肉解之忌豬肉

白梅　二百廿一味　酸鹹平。入手太陰足太陰經。中風牙閉。擦齦涎出便能開。乳腫癰毒。杵爛傅之。惡創止　按白梅。即霜梅也。功與烏梅相似。所主諸病。皆取其收斂之義。惟仲景治蚘厥烏梅丸。及虫蟨方中用者。取虫得酸即止之義。稍有不同耳。宗奭云。食梅則津液泄者。水生木也。津液泄則傷腎。腎外爲齒。故也。肝爲乙木。膽爲甲木。人之舌下有四竅。兩竅通膽液。故食梅則生津者。類相感也。素問曰。味過于酸。肝氣以津。又云。酸走筋。筋病無多食酸。不然。物之味酸者多矣。何獨梅能生津耶。取大青梅以鹽汁漬之。日晒夜漬。十日成矣。欠乃上霜。以〔葉〕搗濃汁飲之。治休息痢。夏衣生黴點。梅葉湯洗。即無葛衣洗之。經夏不脆。月水不止。梅葉炙。棕櫚皮灰。等分爲末。服二錢。酒下。初生小兒取〔根〕同桃李根。煮湯浴之。無瘡熱之患。

桃仁　二百廿二　苦辛甘。溫。氣薄味厚。陰中之陽。可升可降。入手足厥陰血分。亦入手陽明經。破諸經之血瘀。潤大腸之血燥。肌有血凝而燥痒。堪去心腹結痛而堅物可平。殺三虫。治陰癢。本經治癥瘕瘀積者。血有形

而屬陰。周流乎一身者也。一有凝滯。即爲瘀閉等病。或婦人月水不通。及心腹宿血堅痛。皆從是厥陰受病。肝爲藏血之臟也。苦可以泄滯。辛可以散結。甘溫通行而緩肝。故諸症自無。得天五之氣以生。苦重于甘。故破凝血用之。其功有四。一治熱入血室。一泄腹中滯血。一除皮膚血熱燥痒。一行皮膚凝滯之血。成無已曰。肝者血之原。血聚則肝氣燥。肝苦急。急食甘以緩之。桃仁雖專治結。亦須分虛實。實者宜之。虛者亦不可也。但用滋補血之

劑。則自濡潤而無閉結之患矣。若經閉由于血枯。腹痛由于血虛。便塞由于津液不足者。並不可服。如用之不當。能使下血不止。損傷陰眞。爲害非淺。同歸芍澤蘭延胡蘇子五靈脂紅花牛膝生地益母。治產後瘀血作痛。亦治經閉。同歸地麥冬芍草肉蓯蓉麻仁。治大腸血燥不通。婦人難產者。桃仁一個。劈開一片書可字。一片書出字。吞之即生。行血。連皮尖生用。活血潤燥。湯浸去皮尖。炒用。雙仁有毒。不用。桃樹生虫。煮豬頭汁澆之。即止。香附爲之使。〔附桃梟〕苦

溫小毒。治伏梁結氣。中惡腹痛盜汗不止者。用乾桃子一個。霜梅二個。葱根七個。燈心二莖。陳皮一錢。稻根。大麥苗各一撮。水二鍾煎服。驗。食桃成病。用以燒灰取吐。以類相攻也。此是桃實。舊樹經冬不落。如梟首磔木之狀。故名。酒拌蒸之。焙乾取肉用。

桃花 二百三十 苦平。利宿水痰飲積滯。通二便。鼈瘕石淋。禿瘡 三月三日。收未開桃花陰乾。與桑椹赤者。等分爲末。以豬脂和。先取灰汁洗去瘡。然後塗之。效。肥瘡可治。脚氣腫痛能消。按桃花。性走泄下降。利大腸甚快。用以治實氣閉塞者有功。若久服。即耗人陰血。損元氣。乾糞塞腸。脹痛不通。用毛桃花濕者一兩。和麵三兩。作餛飩。煮熟。空心食之。牛腹鳴如雷。當下惡物也。三月三日採花搗盡。陰乾用。千葉者不用。

桃葉 二百廿四 苦平。治傷寒無汗。療風襲項強。不得顧視。煆赤。以水酒之。令冷。鋪生桃葉于內。臥席上。以項着坑。蒸至汗出。良久即癒。按桃葉蒸汗。汗不出者。燒地令熱。去火。以少水洒之。布桃葉于上。厚二三寸。安席上臥之。溫覆。得大汗。被中傅粉。及燥。便癒也。然須顧表裏時日。凡桕葉麥麩皆可如此。

附桃根皮 除邪鬼。中

惡腹痛。解蠱毒疫癘瘡瘡蟲。天行疫癘。以東行桃枝黃疸如金。晴明時。清晨。勿令雞犬婦人見。取東引桃浸極細者一撮。切細。以水煎空腹服。後三五日。其黃離離如薄雲散開。百日方平復也。黃散後。可時時飲清酒一盃。則眼中易散。忌熱麵豬魚。刮去粗皮。取白皮入藥。

大棗 二百廿五 甘溫。氣味俱厚。陽也。可升可降。入足太陰陽明經。補脾胃而益氣。其生津止瀉之功。潤心肺而強脉。益五臟虛損之羸。經曰。裏不足者。以甘補之。又曰。形不足者。温之以氣。甘能補中。温能益氣。甘温能補脾胃而生津液。故本經。治通九竅。利四肢也。按

大棗屬土而有火味甘性緩。爲脾之菓。血分藥也。脾病宜食之。又曰。脾病人毋多食甘。毋乃相戾耶。不知言宜食者。指不足之脾也。如脾虛泄瀉之類。毋多食者。指有餘之脾也。如中滿腫脹之類。若無故頻食。則生虫損齒。貽害多矣。成無己曰。邪在榮衛者。甘辛以解之。故用棗棗以和榮衛。生發脾胃升騰之氣。仲景治奔豚。用大棗滋脾土以平腎氣也。治水飲脇痛。有十棗湯。益脾土而勝妄水也。好古曰。中滿者勿食甘。甘令人滿。故令人食甘多者。脾必受病。是以无用藥

国立国会図書館 タイトル『本草匯18巻』 請求記号 特7-494
ガラス使用

者。能隨其虛實而變用之。雖尋常品味。必獲奇功。苟執而泥之。即有良劑。莫展其長。學者當以格致爲亟也。小兒憲秋痢。蛔蟲與食。能止府病及齒痛。痰熱之人。俱不宜食。生者尤不利人。紅者功用相倣。差不及耳　堅實肥大者佳。忌與葱魚同食。殺烏頭附毒。入藥勞去核。

雪梨　二百廿六　甘寒。入手太陰少陰足陽明厥陰。經。涼心潤肺。降火消痰。痞塞結胸者熱結爲宜。搗汁飲。醒酒狂煩者。滌之良。生清六腑之熱。熟滋五臟之陰。按梨成于秋。花實皆白。其得西方之陰氣者乎。別錄止言其害。不著其功。陶隱居言梨不入藥。蓋古人論病。多主風寒外邪。用藥以溫熱爲補。而不知梨有散風熱潤肺涼心。消痰降火。解毒之功也。雖其性下行流利。然時運迭降。稟受遞殊。今人火熱痰病。十居六七。梨皆能潤。其益不少。但不可過食耳。尤宜于病酒煩渴。然多食令人寒中。若脾虛泄瀉。寒疾嘔吐。及西北真中風証。法咸忌之。餘梨不去病。

木瓜　二百廿七　味酸濇。氣溫。味薄氣厚。降多于升。陽中陰

也。入手足太陰血分。兼入足厥陰經。氣脫能收氣滯能和筋急者。得之即舒。濕腫者。遇之即愈。滋脾益肺。善走股膕循行肚腹。充達木氣。霍亂吐瀉必須濕浮脚氣最要。」本經主濕痺脚氣者。脾主四肢肌肉。其性惡濕而喜燥。濕氣侵入則爲濕痺。濕傷足絡。則成脚氣。木瓜溫能通肌肉之滯。酸能斂濡滿之濕。故脚氣濕痺。得之而自除也。」又治霍亂轉筋不止者。脾胃病也。夏月暑濕飲食之邪。傷于脾胃。則揮霍撩亂。上吐下瀉。甚則木乘脾土而筋爲之轉也。酸溫能和脾胃固虛脫。兼之入肝而養筋。所以能療肝脾所生之病也。按木瓜。稟東方之酸得木之正。故入厥陰治筋。非他藥所能儔匹。吐利轉筋。皆脾胃病。非肝病也。肝雖主筋。而轉筋則由濕熱或寒濕之邪襲傷脾胃。故轉筋必起于足脾。脾及宗筋。皆屬陽明。木瓜治轉筋。非益筋也。理脾以伐肝也。土病則金衰而木旺。故用酸溫以收脾肺之耗散。而藉其走筋以平肝邪。乃土中瀉木以助金也。木平。則土得令而金受蔭矣。木瓜最療轉筋。如轉筋時。但呼其名。及書上作木瓜字。皆愈。孟詵云。多食木瓜。損齒及

常皆伐肝之明驗。眞者皮薄色赤黃香而甘酸不澁去硬皮及子臼中杵碎晒乾陳久者良忌鐵器以牛乳汁拌蒸燒灰散池中可以毒魚。

山楂 即山查二百廿八　味酸微溫入足陽明太陰經消肉食之積治痞滿滯脹痾氣爲殃固香佐之而取效兒桃作痛沙糖調服以成功發小兒瘡疹化血塊痰積唐本治水痢。震亨治產後惡露不盡者。蓋積滯不行則成下痢。惡露高于太陰部分則爲兒桃痛。山查能入脾胃消積滯散瘀血故治水痢及產婦腹中病也按山查消去腥羶油膩肉食之積與麥芽之消穀積者不同。故幼科用之最多。老雞硬肉入山查數枚即易爛可以推其消肉之功矣若傷寒爲重症。仲景于宿滯不化者。但用大小承氣一百一十三方中。並不用山查爲其性緩不可以有弘任巨耳若胃家無食積及脾虛不能運化者。食之反致尅伐脾胃生氣如脾虛兼有積滯者。當與補藥同施。同紅麴麥芽橘皮白朮肉豆蔻厚朴砂仁。能消食健脾。同牛膝生地當歸續斷。益母澤蘭丹皮。清黃芩藥。治兒枕作痛。核有功力。不可去也。

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号　特7-494
ガラス使用

柿　二百九十味甘澁寒入手足太陰血分壓胃熱止口乾治血淋潤心肺消痰止渴療嗽潤聲本草治通耳鼻氣腸胃不足者鼻爲肺之竅耳爲腎之竅金水二臟最忌火熱二臟有火土炎則外竅閉而不通得甘寒之氣使火熱下行竅自清利矣又肺與大腸表裏濕熱傷血分則爲腸澼不足甘能益血寒能除熱臟氣清而腑病亦除也按柿稟地中之陰氣屬金有土屬陰有收斂肺血分之功故有健脾澁腸治嗽止血之功酒後食之令人易醉或心痛欲死別錄言解酒毒者非也凡血淋澀痛臟毒下血以乾柿燒灰或散或丸服之不可與鱉同食二物俱寒令人腹痛作瀉惟木香可解磨汁灌之即漸甦醒乾者寒氣稍減肺經無火因客風寒作嗽及感寒嘔吐者有痰者皆忌服中桐油毒可解又拌霜即柿上白霜也無者甘平冷濇入土焦藥能清心肺之火利津止渴化痰寧嗽又治咽喉口舌瘡痛同桑白皮百部貝母麥冬沙參貝母蘇子枇杷葉橘紅栝樓根作丸治肺火咳嗽生痰妙

柿蒂　二百三十味濇苦溫。療咳逆。治噦氣。　按柿蒂苦溫。能降逆氣之物也。震亨曰。人之陰氣。依胃爲養。土傷則木挾相火。直冲清道而上作欬逆。古人以爲胃寒用丁香柿蒂。不知其孰爲補虛。孰爲降火。不能清氣利痰。惟有助火而已。時珍云。咳逆者。氣自臍下冲脉直上至咽膈作呃咸蹇逆之聲也。南陽書以噦爲欬逆。溯洄集以欬嗽爲欬逆。皆非也。噦者。乾嘔有聲也。欬逆者。有傷寒吐下後。及久病產後。陰氣大虛。陽氣暴逆。自下焦逆至上焦而不能出者。有傷寒失下。及平人痰氣抑遏而然者。當視其虛實陰陽。或溫或補。或泄熱或降氣。或吐或下。可也。古方。單用柿蒂煮汁飲之。取其苦溫能降逆氣也。濟生柿蒂散加以丁香生姜之辛熱。以開痰散鬱。此從治之法也。

石榴皮　二百三一味酸濇氣溫。入足厥陰太陰少陰經。治瀉痢腸虛。止崩帶。欲脫。煎服。而下蚘虫。點汁止目淚。　按榴受少陽之氣而榮于四月。盛于五月。實于盛夏。熟于深秋。丹花赤實。具木火之象。故多食損肺齒而生痰涎。其皮味酸濇。故入斷下崩中之劑。善于收

藏新病者。勿蚤服也。不拘乾濕。勿化鐵器。漿水浸一宿夜。取出用。其水如墨汁。

【陳皮】二百三十味苦辛。溫。氣薄味厚。陽中之陰。可升可降。入足陽明太陰經。去白者名橘紅。性熱能除寒發表。入手太陰經。止嘔定衝。去白者。疏通尚掌。胸中寒邪滯氣。功在諸藥之上。味辛宜肺。香利于脾。頗有中和之妙。清痰滯氣。却無峻烈之嫌。留白者。和肺爲攝氣之爺。脾爲元氣之母。故爲二經要藥。同補藥。則補。同瀉藥。則瀉。同升藥。則升。同降藥。則降。君白術。則益脾胃。佐甘草。則補肺。獨用。則瀉肺損脾。加青皮。去滯氣。推陳致新。與蒼术厚朴同用。能去中脘已上至胸膈之邪。而平胃氣。再加葱白麻黃之類。則能發肉分至皮表有餘之邪。理氣燥濕。雖曰中和。然單服久服。亦能損真也。中氣虛。與氣不歸元者。忌與耗氣藥同用。陰虛欬嗽生痰。不宜與半夏南星等藥同劑。紋細色紅而薄。內多筋脈者。橘皮也。其味苦辛。紋粗色黃而厚。內多白膜者。橘皮也。其味辛甘。皮厚而虛。紋粗色黃。內多膜無筋者。柚皮也。其味甘多辛

少以此別之。即不差矣。橘皮性溫。柑柚皮性冷。不可不知。鹽洗潤透。刮去筋膜。晒乾用。最能降氣。如藥中多用人參。以此同入。不作脹。中燥人少服。其肉生痰。聚飲。甘者潤肺。酸者生痰。一物而表裏之異如此。

青皮 二百三三 苦烈。辛溫。氣味俱厚。沉而降。陰也。足厥陰引經之藥。兼入足少陽。太陰。經。破滯氣。即左肋下醫怒痛甚者。愈低而愈効。削堅積。即小腹中溫癉。熱盛經久不愈。必結癖塊者。是也。愈下而愈良。引諸藥至厥陰之分。下飲食入太陰之倉。按橘皮。乃橘之未黃而青色者。是也。功用與陳皮悉同。但陳皮治高。青皮治低。性較猛耳。陳皮浮而升。入脾肺氣分。青皮沉而降。入肝膽氣分。與枳殼治胸膈。枳實治心下。同意。疏利肝邪。有滯氣則破滯。無滯氣則損眞。乃肝膽二經氣分藥也。炒黑則入血分矣。然入肝者。以其色也。究竟主脾肺之症居多。癉脉自弦。肝風之巢。青皮入肝。滌痰。故癉家爲必需之品。破肝氣使之下行。故柴胡疏上焦之肝氣。青皮理下焦之肝氣。今人有多怒鬱滯。或小腹疼痛。用以疏通肝膽。行其氣也。若二經虛者。必當先補而後用。嘉謨曰。久瘧熟甚。必結癖塊。宜多服清脾湯。亦疏

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号　特7-494
ガラス使用

利肝邪之意耳。最能發汗。凡有汗者不可用也。（說出楊仁齋。）同人參鼈甲。能消癥母。同枳殼肉桂川芎。治左脇痛。凡欲施用。必與補劑同施。誤服立損眞氣。爲害不淺。脾肝氣虛者。切忌。老人禁之。以湯浸去甎切片。醋拌。炙炒過用。所以用醋者。肝欲散。急食辛以散之。以酸泄之。以苦降之也。其色青薄而光芳烈氣猛。市多以小柑小橙僞之。不可不愼辨也。（核入足厥陰。疏膀胱疝氣。一味炒去殼。酒服五錢。苦溫下氣。所以能入腎與膀胱。除因寒所生之病也。葉主乳癰肺癰。絞汁飲之。二症皆屬陽明厥陰。此能散二經滯氣故用之而効。

枇杷葉　二百三四　苦甘辛。平。氣薄味厚。陽中之陰。降也。入手太陰。足陽明經。下氣清熱。定咳消痰。清肺。則降火而除痰嗽。和胃。則寬中而止嘔噦。別錄治卒嘔不止者。噦也。其聲濁惡而長。經曰。樹枯者葉落。病深者聲噦。病者見此。是爲危証。枇杷葉善下氣。氣下則火不上升而胃自安。故卒嘔止也。（按枇杷葉偏理肺臟。故主肺風熱嗽有功。長于降氣。氣降則火清痰

順。但去毛不淨。則射人肺中。作嗽難療。胃寒嘔吐。及肺感風寒。咳嗽者。並忌之。（肉）味酸甘。滋潤五臟。少食止吐逆止渴。多食發痰發熱傷脾。同炙肉及熟麪食之。令人患熱黃疾。濕葉重一兩。乾者三葉重一兩者。爲氣足堪用。粗布拭去毛。或以栗杆作刷。以甘草洗過。塗酥炙用。治胃痛。以姜汁塗炙。乃良。

胡桃　二百五　味甘。氣熱。入手太陰足少陰經。養血潤腸。飲肺治喘。利三焦氣。益命門火。佐補骨而治痿強陰。兼胡粉而拔白變黑。銅物可銼。齒齾能解。按胡桃達命門之品也。稟火土之氣。本經雖云甘平。然其氣多熱。而孫眞人言其冷滑者。誤也。時珍云。三焦者。元氣之別使。命門者。三焦之本原。蓋一原一委也。命門指所居之府而名。爲藏精係胞之物。三焦指分治之部而名。爲出納熟腐之司。一以體名。一以用名。在七節之傍。兩腎之間。上通心肺。下通二腎。貫屬于腦。爲生命之原。相火之主。精氣之府。靈樞言之已詳。而扁鵲難經不知原委。體用之分。以右腎爲命門。以三焦

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号　特7-494
ガラス使用

爲有名無狀。承訛至今。莫之能正。至朱肱陳言。藏起之皮汁皆青黑。故能入北方。通命門。利三焦。爲補腎命之藥。夫命門氣與腎通。藏精血而惡燥。若腎命不燥。精氣內充。則飲食自健。肌膚光澤。腸腑潤而血脉通。命門既通。三焦自利。故上通于肺而止虛寒喘嗽。下通于腎而止腰脚虛疼。佐以破故紙。有水木相生之妙。（破故紙屬火。能使心包與命門之火相通。胡桃屬木。王潤血養血。血屬陰。陰惡燥。故也。）昔有兒病痰喘。五晝夜不乳食。夜夢觀音授方。令服人參胡桃湯灌之。即定。明日去胡桃皮。喘復作。仍連皮用而愈。蓋人參定喘。胡桃能斂肺。故也。（胡桃同生姜嚼服。亦妙。）

一味連皮空腹食之。最能固精。虛寒人服之。相宜。若肺有熱痰。命門火熾者。勿用。搗和胡粉。拔白鬚髮。內孔中。則生黑毛。殼外青皮。壓油塗髮。色如漆也。（油者。辛熱有毒。傷人咽肺。而瘡科取之。正用其毒也。）

香橼（一名枸櫞。三六。）

苦酸辛。溫。入手足太陰經。理上焦之氣。止嘔宜求。進中州之食。健脾宜簡。按香橼性雖中和。單用多用。亦損正氣。脾虛者。須與參朮並行。乃有相

成之盆耳。　陳久者良。去白炒。

橡斗子　二百三十七　苦溫。入足太陰陽明經。固精頗効。止痢稱奇。消石癰。如石不作膿。以斗子醋磨塗之。不過數次。膿脫肌。挼斗子。非果非穀而最益人。無氣而受氣。無味而受味。消食止痢。令人強健不肌。若新痢濕熱甚者。病齒罅及火病人。忌之。　去殼。水浸去澁味。蒸極熟。焙用。

荔枝核　二百三十八　味甘溫。濡。入厥陰經。治疝氣癪腫。療腎陰如斗。　按荔枝屬陽。性熱。主散無形質之滯氣。其實雙結而核有罕九。故核溫。通行肝腎。散滯癖邪。

治癲疝卵腫。類象形之意也。卒心痛。以一枚煆存性。研末酒服。瘡瘡出不爽快。煎湯飲之。焚殼亦解穢氣。

同青皮茴香等分。炒研酒服。治腎腫。荔枝殼。橡斗殼炒。石榴皮炒。甘草。各等分。以五錢水煎服。治赤白痢。

其性畏熱鮮者食多。即齦腫口痛。或衄血也。食荔枝多則醉。以殼浸水飲之。即解。此即食物不消。還以本物消之之意。

龍眼　二百三十九　味甘溫。平。入手少陰。足太陰經。補心虛而長智。悅胃氣以培脾。除健忘與怔忡。能安神而熟寐。

按龍眼性熏和平不熱不寒能助心益智故有益智之名歸脾湯用爲向導甘先入脾也道家有服龍眼法五更將不見水乾龍眼齒肉去核即用舌攪華池之法細細嚼至查成膏連口中津汩汩然嚥下又如前法食第二枚共服九枚末申二時又服九枚臨臥之核治胡臭以六枚同胡椒二十七粒研遇汗出即擦之食品以荔枝爲貴而資益則龍眼爲良蓋荔枝性熱而龍眼和平也

橄欖 二百四十味澀甘平入足陽明清咽喉而止渴解胎毒而敷痘小兒落地用橄欖一箇燒研硃砂末一二分和乳嚼生芝蘇和藥絹包與咂取下穢毒出痘稀少 消酒稱奇殺毒更異 按橄欖味澀性熱肺胃家果也醉飽宜之多食能致上壅其主用與訶黎勒相同中鰒鮓即河豚魚毒煮汁服解亦解諸魚骨鯁如無橄欖以核研末急水調服唇吻燥痛取仁研薄敷

榧子 二百四十一味澀甘平熟 云味厚氣薄降也入手太陰

陽明經。殺百種之蟲。手到而痊。療瘰癧。嘗則愈消穀食而治咳。助筋骨而壯陽。　按楸子。肺家果也。善殺腹間大小蟲。小兒有蟲積者。宜食之。東坡詩云。驅除三彭蟲。已我心腹疾。益指其殺蟲也。空腹食二十一枚。七日蟲皆下。多食。則引火入肺。大腸受傷。同鵝肉食。生斷節風。猪脂拌炒。黑皮自脫。同甘蔗食。其渣自軟。好食茶藥者。每日食七枚。以愈爲度。髮易落者。楸子三箇。胡桃二箇。側栢葉一兩。搗浸雪水。梳頭髮。取不落且潤也。　楸子皮。反豢豆。能殺人。

松子　二百四十二　甘溫。逐風痺。溫腸胃。治燥結。潤皮膚。　按松子。甘美大溫。中和之品也。善理肺燥。欬嗽故鳳髓湯中。用松子仁一兩。胡桃仁二兩。研膏。和熟蜜半兩。食後沸湯點服。又大便虛秘者。用松子仁。栢子仁。麻子仁。等分。研泥。溶白蠟和丸。黃芪湯下。陰虛多燥者。珍爲神丹。

檳榔　二百四十三　味苦辛。濇微溫。味厚氣輕。沉而降。陰中陽也。入手足陽明經。入胸膈。破滯積而不停。入腸胃。逐痰癖而直下。降至高之氣。疏後重之急。瘧疾與瘴癘

偕收。脚氣與殺蟲並選。至高之氣墜諸藥于下極。故治痢家後重如神。夫足陽明爲水穀之海。手陽明爲傳道之官。二經相爲貫輸。以運化精微者也。二經病。則水穀不化。或濕熱停久。變生痰癖虫積。此藥辛能散結。苦能殺虫。故可以除諸痰。闢廣地。煖淫蒸。多瘴癘之氣。皆珍爲上品。苟無瘴氣。寧無損正之憂乎。同黃連扁豆蓮肉橘紅白芍紅麴烏梅葛根枳殼。治滯下後重。一味檳榔。半兩爲末。以葱蜜湯服一錢。治諸虫在臟。凡病屬陰陽兩虛。中氣不足。無宿食者。悉在所忌。去空心者。刮去臍皮。見火無功。

川椒 二百四十粒 辛熱有毒。氣味俱厚。陽也。入手足太陰右腎命門氣分。兼入手厥陰經。溫脾土而擊三焦之冷滯。補元陽而蕩六腑之沉寒。伏癖氣癥。和水腫。累建奇功。殺虫止嘔。及腸虛恒收。速效。通血脈。則痿痺消除。行肢節。則機關健運。解醫結。療陰汗。絕傳尸勞症。治食茶面黃。按川椒。亭下不冲上。蓋導火歸元。除濕消食。溫脾補腎之劑也。

禀南方之陽。故入腎而奏扶陽益火之効。受西方之陰。故入肺而奏止嗽下氣之功。乃玉衡星之精。善辟疫伏邪。此蔵且有椒栢酒也。王清訣云。凡喫飯傷飽。覺氣上沖痞悶。以水吞生椒一二十顆。即散。取其能通三焦下惡氣也。若空心朝起。以沸湯送二十顆。有治寒祛冷之妙。有消食散寒之奇。久服則永不受風寒濕。大能温補下焦。亦神異之品也。藏元禮云。凡人嘔吐服藥不納。加川椒十粒便止。蓋嘔吐必有蛔在膈間。蛔見椒則伏也。然其功。雖芳草所不及。若服之既久。未免火自水中生。所以服椒者。往往有被其毒也。宜于命門虚寒中氣虚寒。有濕鬱者。若陰虚火旺之人。在所大忌。椒且苦辛。能行滲道。不行穀道。善消水腫。定喘燥濕。有功。又能治腎虚耳聾。如風水鳴鐘聲聲者。用巴豆葛蒲同碾細。以松脂黄蠟溶和爲挺。納耳中。扣之。一日一易。神驗。去核及閉口者。微炒出汗。乘熱入竹筒中。搗去裏面黄殼。取紅用。杏仁爲使。畏款冬。防風。附子。雄黄。中其毒者。涼水麻仁漿解之。五月勿食椒。

胡椒　二百四五　辛辣大熱氣味俱厚陽也入手足陽明經去胃口冷氣除大腸寒滑消冷積陰毒治反胃虛脹按胡椒屬火而性燥積寒久冷食已不飢吐利腥穢澄徹清冷此皆大寒之兆用爲得宜然走氣助火久服大傷肺氣及大腸經必致腸風臟毒昏目吐血牙齒痛用胡椒蓽茇者散其中浮熱也〔蓽澄茄〕辛散快氣乃胡椒之嫩者向陰者爲澄茄向陽者爲胡椒荊椒粗而薄圓去柄及皺皮酒蒸杵細晒乾用

忌同川椒

茶葉　二百四六　苦甘微寒氣薄輕浮陰中之陽可升可降入手足厥陰經消食下氣止渴醒眠解炙煿之味清頭目酒毒頭目不清熱熏土也以苦泄之　按茶葉之爲物也以其得天地清陽之氣兼得春初生發之意故其所主皆以清肅上膈爲功然以味甘不澀氣芬如蘭啊山者爲清貴上品堪入藥中古人多言其苦寒不利脾胃及多食發黃消瘦之說此皆語其粗惡者耳古有妄茶治痢方姜助陽茶助陰一寒一熱調平陰陽不問赤白冷熱用之皆良東坡云除煩去垢不可無茶然

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号　特7-494
ガラス使用

空心飲茶。直入腎經。且寒脾胃。乃引賊入門也戒之。

服威靈仙土茯苓者。忌。

甜瓜蒂　即苦丁香　二百四七

苦寒。氣薄味厚。浮而升。陰多于陽。入手太陰。足陽明。足太陰。經。理上焦之病。或水停。或食積。總堪平治。去胸中之邪。或實煩。或壅塞。咸致安寧。水泛皮中。得吐而瘥。濕家頭痛。喘鼻而愈。酸漿以爲引。湧泄誠有功。吹鼻中可出黃水。入口內堪去痰。誕。本經主大水身面四肢浮腫。黃疸。欬逆上氣者。皆脾胃虛。水氣濕熱乘虛而客之也。苦以湧泄。使水濕之氣外散。經曰。在高者。因而越之。病在胸膈。則氣不得歸元而爲咳。逆上氣。吐出胸中之邪。則氣順而咳逆止矣。　按甜瓜。感時令之火熱。稟地中之伏陰。爲陽明除濕熱之藥。極苦。性急。而上湧。堪爲膈間吐發之劑。素問所謂高者因而越之。上者湧之。越以瓜蒂香豉之苦。湧以赤小豆之酸。是也。難經曰。上部有脈。下部無脈。其人當吐。不吐者死。此飲食傷太陰脾土。生發之氣伏于下。宜瓜蒂散吐之。其方用瓜蒂二錢半。爲末。每用一錢。以香豉一合。熬黃赤。小豆二十一枚。熬黃。取吐止。素問所謂木鬱則

達之是也。吐去有形之物。則本得舒暢。天地交而萬物通矣。若尺脈虛絕者。又不宜用也。最能損胃耗氣。凡上部有實邪。可用。胸中無寒。皮中無水。頭面無濕。及一切亡血諸虛家病後產後。併脉微者。皆不可輕用。候用吐不止者。麝香解之用蒂約半寸許。嚼極乾。臨時研用。凡食瓜多作脹。食鹽花即化。或飲酒及水。服麝香尤勝。

西瓜 二百四十八味甘淡寒。解暑熱。消煩渴。利小水。解酒毒。

按西瓜。生冷之物也。世以爲醍醐灌頂。甘露洒心。取其一時之快。不知其傷脾助濕之害也。所以古人有天生白虎湯之號。稔知其寒也。而眞西山衛生歌云。瓜桃生冷宜少嚥。免致秋來成瘧痢。愚者妄云不傷脾胃。誤也。得酒氣。近糯米。即易爛。猫踏之。即易沙。

甘蔗 二百四十九味甘。平冷。氣薄味厚。陽中之陰。降也。入手足太陰。足陽明經。和中而下逆氣。助脾而利大腸。乾嘔不息。蔗漿薑汁同溫服。小兒痧口。用皮燒末摻之良。按甘蔗。脾之果也。其漿甘寒。能瀉火熱。素問所

謂甘溫除大熱之意若煎鍊成餹則甘溫而助濕熱所謂積溫成熱也其消渴解酒自古稱之而孟詵乃謂其共酒食發痰者豈不知其有解酒除熱之功耶今人皆以蔗漿爲性熱獨不觀王摩詰詩云飽食不須愁內熱大官還有蔗漿寒蓋詳于本草者耶惟胃寒嘔吐中滿滑瀉者忌之多食發虛熱動血同榧子食則澄軟

石蜜　即白沙糖　二百五十　甘溫入足太陰經生津解渴除咳消痰潤心肺燥熱助脾氣緩肝

按白沙糖即蔗汁煎而曝之凝結作餅塊者是也甘喜入脾多食則害必生于脾西北地高多燥得之有益東南地下多濕得之未有不病者比之紫沙糖性稍平功用實相同也

紅沙糖　二百五一　甘溫功用與白者相倣和血乃紅者獨長

按沙糖蔗汁之清而鍊至紫黑色者雖云與白者同功然而不逮白者多矣既經煎鍊則未免有濕熱之氣故多食能損齒生蟲糖生蟲火故也發痛脹滿與鯽魚同食成痔蟲與笋同食不消成癥身重不能行今

人每用爲調和。徒取適口而不知陰受其害矣但其性能和脾緩肝。故治脾胃及瀉肝藥中用爲先導。本草言其性寒。蘇恭謂其冷痢。皆昧此理。作湯下小兒丸散者。非也。

蓮子　二百五十二味甘平。濇。入手少陰。足太陰陽明。厥陰。少陰經。心腎交而君相之火邪俱靖。厚腸胃而瀉痢之滑脫均收。頻用能澀精。作粥令强健。按蓮子。産于污泥而不爲泥染。居于水中而不爲水沒。中含白肉。內隱清心。稟芳香之氣。得稼穡之味。乃脾之果也。脾者黃宮。所以交媾水火。會合木金者也。土爲元氣之母。母氣既和。津液相成。神乃自生。凡果動宿火。惟蓮可清心。但生食微動氣。蒸食則養神。大便燥澀者。勿服　不去心。令人作吐。凡使須去心蒸焙用。得茯苓白朮枸杞良。清心名〔蓮薏〕苦寒。能清心去熱。亦治血渴。産後渴。又張上舍治勞心吐血。用心七箇。糯米廿一粒。爲末。酒服。又醫林治小便遺精。用心一撮爲末。入辰砂一分。每服一錢。白湯下。效。〔石蓮子〕乃經霜後。堅黑如石。沉水者。置鹽鹵中。能浮者。入手少陰。足陽

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号　特7-494
ガラス使用

明太陽經。開胃進食。清心解煩。專治噤口痢。及濕熱滲入膀胱。白淋白濁等疾。今肆中石蓮子。其味大苦。產廣中樹上。不堪入藥。去殼用。

藕 二百五三 甘平。入手少陰足太陰經。生用。則滌熱除煩。散瘀而還爲新血。熟用。則補中和胃。消食而變化精微。解酒毒。及病後乾渴。治熟淋。併產後悶亂。蔽蓮藕。稟土氣而生。生寒熟溫。所主皆心脾血分之疾。乃水果中之嘉品也。凡物皆生冷。惟藕不同生冷。故產後獨藕不忌。爲能去瘀故也。〔節〕味帶澁。止血解熱。有

功。

蓮鬚 二百五四 味甘澁溫。入手足少陰經。清心而諸竅之出血可止。固腎而丹田之精氣無遺。鬚髮變黑。泄痢能除。〔按〕蓮鬚一物。本草不收。而三因方中。固真丸巨勝子丸。各補益方中。往往用之。其功大抵與蓮子相同。血家泄家。尊爲上品。蓋溫而不熱之劑也。忌地黃葱蒜。

荷葉 二百五五 苦平。助胃消食。澀精散瘀。產後胞衣不下。與蓮殼而同功。炒香爲末。煎汁飲之。或童便服。陽水浮腫。血脹。單研

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号　特7-494
ガラス使用

米飲調下。按荷葉中空。有陰中生陽之清氣張潔古枳朮丸方。用荷葉燒飯爲丸。夫震者動也。人感之生足少陽甲膽爲生化萬物之根蒂。飲食入胃。營氣上行。即甲膽之氣與三焦之氣同爲發生之氣。素問云。履端于始。序則不愆。荷葉生于水土之下。挺然獨立。其色青。其形仰。其中空。象震卦之體。食藥感此氣之化。胃氣何由不升。更以燒飯和藥。與白朮協力補脾。不致內傷。其利廣矣。

芡實　二百五十六　甘平。入足太陰少陰。經。益腎固精。而遺濁有賴。補中養氣。而泄瀉無慮。按芡實止瀉固精。獨于脾腎得力。則先後天之根本咸賴焉。吳子野云。人之食芡。必枚嚼而細嚥之。使藥液流通。轉相灌溉。其功過于乳石也。同蓮蕊鬚蓮子肉茯苓茯神等。爲末。用金櫻子搗汁熬膏。入藥九。名金鎖玉關丸。治精氣虛滑。同秋石茯苓蓮肉等。爲末。蒸棗和丸。鹽湯下。名四精丸。治思慮傷心。色慾過度。小兒不宜多食。以其難化也。

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号　特7-494
ガラス使用

本草滙卷十五目次

木部

栢子仁 二百五六
松香 二百五八
吳茱萸 二百六十
肉桂 二百六二
桂枝 二百六四
沉香 二百六六
白旃檀 即檀香 二百七十
側栢葉 二百七七
松節 二百七九
大腹皮 二百八一
桂心 二百八三
辛夷 二百八五
丁香 二百八七
降真香 二百九一

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号　特7-494　ガラス使用

烏藥 二百七二
沒藥 即木藥二百七四
安息香 二百七六
龍腦香 即冰片二百七八
阿魏 二百八十
胡桐淚 二百八二
厚朴 二百八四
梔白皮 即臭椿二百八六 香椿附
海桐皮 二百八八
乳香 即熏陸香二百七三
血竭 即騏驎竭二百七五
蘇合香 二百七七
樟腦 即韶腦二百七九
蘆會 即象膽二百八一
黃蘗 二百八三
杜仲 二百八五
乾漆 二百八七
金鈴子 即楝實二百八九 根皮石茱萸附

槐實 二百九十 枝葉根白皮附
秦皮 二百九二
皂莢 二百九三 子角刺附
訶黎勒 即訶子二百九五
蕪荑 二百九七
沒石子 即無食子二百九四
水楊葉 二百九六

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号 特7-494
ガラス使用

吳門郊西郭佩蘭章宜纂輯
男 樹畦馨阡
姪 維均梅在參閱
紫藤陳陸坤白筆校訂

木部

栢子仁 二百五六 味甘辛平陽也可升可降入足厥陰少陰經安神定悸壯水强陽潤血而容顏美少補虛而耳目聰明本經治驚悸者心藏神腎藏

精與志。心腎兩虛。則驚悸栢子仁入心入腎。故神志得養而寧定矣。又主風濕痺有功。恐非潤藥所能當是栢葉之獨擅耳　按栢子仁。肝經氣分藥也。性滋潤能降妄動邪火。于脉濟之鄉。甘而補。辛而潤。清香能透心腎。益脾胃。凉血補氣。仙家上品藥也。多油而滑。作瀉者多痰者。俱忌。蒸曝。粗紙印去油。已油者勿用。畏菊花羊蹄草。

側栢葉　二百五七　苦澁。性寒。陰中之陽。可升可降。入足厥陰經。止吐衄之來紅。定崩淋之下血。歷節風疼可愈。周身濕痺能痊。　按栢葉。屬陰。與金臨冬不凋。稟堅凝貞幹之質。性善守。能清肅妄行逆血于脉。滑數之病。補陰之要藥也。其性多燥。久服大益脾土。以滋其肺。極有止血之功。而無壅滯之害。然多服恐太燥。適中爲當。血家不宜多服。採之須得節氣。春採東夏採南。秋採西。冬採北。生肌去濕。是其獨步。有數種。葉上有微赤毛者。堪入藥。或生或炒。壯蠟桂爲之使。畏菊花羊蹄草。及麪麴伏硇硝。

松香　二百五八　味苦甘。溫。入手太陰足陽明經。治惡瘡死

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号　特7-494
ガラス使用

肌排膿抽風療陰囊溼痒止痛生肌風牙蟲痛刮脂化湯一漱止齲齒有孔松脂紙塞即無蟲蟲即從脂出也

按松香屬陽金而兼火土其性燥則可去濕其味甘則能除熱苦燥相兼則能殺蟲故外科取用極多也

古方有翠玉膏用貼軟癩選通明瀝青八兩銅綠二兩麻油三錢雄猪膽汁三箇先溶瀝青乃下油膽傾入水中扯拽器盛攤貼用又小金絲膏治一切腫毒瀝青乳白膠香各二兩乳香二錢沒藥一兩黃蠟三錢又以香油三錢同煎至滴下不散傾入水中扯千遍收貯貼用疥瘡濕瘡用松膠香研細少入輕粉先以油塗瘡糝末在上一日即乾頑者二三度大釜加水白茅襯甑又加黃沙寸許布松脂于上炊以桑薪湯減頻添熱水候松脂盡入釜中取出投于冷水既凝又蒸如此三過乃佳服之通神明去百病

松節　二百五九　苦溫搜風舒筋燥血中之濕釀酒頻吞治脚弱骨風

按松節松之骨也質堅氣勁有功于肢節故能舒筋止骨節之痛去濕搜骨內之風蓋各從其類也

吳茱萸　二百　辛苦大熱小毒氣味俱厚半沉半浮陽中陰也入足太陰血分又入少陰厥陰經氣分燥腸胃而止久滑之瀉散陰寒而攻心腹之疼祛冷脹而獨得開鬱滯有偏長寒中三陰腳氣乘虛而上冲冷結下焦痼氣控睾而內迫本經除濕血痺逐風邪者蓋風寒濕之邪多從脾胃而入脾胃主肌肉爲邪侵則腠理閉密而寒邪諸痺所從來矣辛溫走散開發故能使風寒濕之邪從腠理而出也　按茱萸燥急之物也能散能溫能堅能燥故所治之症皆取其散寒濕中燥濕解鬱而已獨入厥陰有功脾胃其旁及者也東垣云濁陰不降厥氣上逆甚而脹滿氣不得上下非茱萸不可治也愚成武言椒氣好下茱萸氣善上故多食茱萸有冲腦冲眼脫髮咽痛動火發瘡之害梅楊卿方用茱萸酒浸三宿以茯苓末拌之日乾每吞百粒溫酒下能治痰飲嘔吐酸水又咽喉口舌生瘡者以茱萸末醋調貼兩足心移夜便愈其性雖熱而能引熱下行乃謂其性上行不下者似不然也　若厥陰風邪頭痛用爲導引極得　如衝脈爲病逆氣裏急者亦宜以此主之　如症火極似水者即守眞所謂禁慄如喪神守皆屬于火之謂也此與柱附

乾薑之類同忌多用損元寇氏言其下氣最速腸虛之人不宜多服凡病非寒滯者勿用即因寒亦當斟量虛實適事爲效也如一切陰虛及五臟有熱無寒之人法所大忌寒傷胃脘腎氣臟逆宜醋炒茱萸同陳皮熟附爲丸姜湯下　臨瀉洗去苦烈汁焙乾用開口者佳蓼實爲之使惡丹參長紫石英

大腹皮　二百六十一　味辛微溫陽也可升可降入足太陰陽明經疏臟氣之壅逐皮膚之水痰滯結腫薑鹽煎飲濕鬱閉心辛溫可通　按大腹皮即檳榔外皮也其氣味所主與檳榔大約相同第檳榔性烈破氣最捷腹皮性緩下氣稍遲乃疏泄之藥也凡病涉虛者勿用其樹多集鴉鳥宜先以酒洗令黑汁去盡火焙用

肉桂　二百六十二　甘辛大熱小毒　與黃芩黃連爲使　小毒何施　陽中之陽浮也入足少陰太陰厥陰血分益火消陰救元陽之痼冷溫經煖臟扶脾胃之虛寒堅筋骨壯陽道乃助火之勳定驚痌通血脈屬平肝之績下焦寒冷非此不除奔豚疝瘕用之即効宜通百藥善墮胞胎　炒過便不

損胎。別錄治腰痛者。腰爲腎之府。動搖不能。腎將憊矣。補命門之眞陽而腰痛自除。冷疾霍亂轉筋者。脾與肝同受寒邪也。行二臟之氣。則前症止矣。按肉桂乃近根之最厚者。辛烈肉厚。本之純陽者也。經云。氣厚則發熱是也。入三焦散寒邪而利氣。下行而補腎。能導火歸原以通其氣。達子宮而破血墮胎。氣之薄者桂枝也。氣之厚者肉桂也。氣薄則發泄。桂枝上行而發表。氣厚則發熱。肉桂下行而補腎。其性慓悍。能走能守之劑也。若客寒犯腎經。亦能冲達而和血氣。脈遲在所必用。其逐瘀治癥有功。若蓋血雖

陰類。用之者必藉此陽和其。然其氣濁。能泛浮溜之火。不能益眞陽之火。故五火伏匿者。不可用也。蓋壯火散氣。故耳。曾世榮言。小兒驚風及泄瀉。並宜用五苓散。以瀉內火。滲土濕。內有桂。能抑肝風而扶脾土也。又醫餘錄云。有人患赤眼腫痛。脾虛不能飲食。肝脈盛。脾脈弱。用涼藥治肝。則脾愈虛。用煖藥治脾。則肝愈盛。但于溫平藥中。倍加肉桂。殺肝而益脾。一治兩得矣。傳云。木得桂而枯。是也。腎虛命門火衰。不能生土。完穀不化。產後下元不足。榮衛衰微者。可用。若

陰虛之人及一切血症非挾寒目疾非脾虛者不可誤投紫色而厚者佳忌見火及生葱石脂春夏禁服秋冬宜煎得人參甘草麥冬大黃黃芩柴胡地黃良

桂心　二百六十三　甘苦辛熱入手少陰厥陰足太陰血分理心腹之疾骨鑽九痛九種皆除補氣脉之虛五勞七傷多驗宜血氣而無壅利關節而有靈托癰疽痘毒能引血成膿薤白為使止心痛者寒邪觸之而然也腹內冷痛不可忍者陽虛氣不歸元因而為寒所中也補五勞七傷者益指陽氣虛羸下陷無實熱之謂也按甚心即用紫色厚者去上粗皮併內薄皮而取其心中近裏之味辛而最精者性略守治多在中故能止心痛入心引血化汗化膿益手少陰君火厥陰相火與命門同氣者也別錄云桂通血脉是矣入二三分于補陰藥中則能行地黃之滯而補腎由其味辛屬肺而能生腎水性溫行血而能通凝滯也行血破血乃其能事而斃權謂殺三蟲治鼻中息肉太明謂益精明目此皆非其性之所宜也何者味既帶甘焉

能殺蟲息肉由于肺有積熱瞳子神光屬腎桂辛而
大熱其不利于肺熱腎陰不足亦明矣益精明目徒
虛語耳況獨陽偏熱之質安可行之是症也又官桂
即在中之次厚者味稍淡于肉桂皮薄少肉因桂多
品而取其品之最高乃上等供官之桂也入足厥陰
太陰經主中焦有寒結聚作痛有桂草似桂心以
井陽木皮煮充者須辨之忌使同肉桂

桂枝 二百廿四 辛微熱氣味俱薄輕清而上行浮而升
陽也入手太陰足太陽經主傷風頭痛調營散邪無
汗能發有汗能止散皮膚之風理心脇之痛橫行爲
手臂之引經直行爲奔豚之向導按桂有四等在
下最厚者曰肉桂主治下焦去內外皮者即爲桂心
在中次厚者曰官桂主治中焦此桂枝即頂上細枝
條去粗皮用其最薄者味淡體輕主上行頭目透達
營衛散風邪而解肌又有一種柳桂乃桂之嫩經云
小枝條尤宜入上焦藥用

古云本草言桂能止煩出汗而仲景治傷寒當汗者皆用桂枝又云無汗不得用桂枝汗多者用桂枝又云桂枝閉汗也一藥二用其義何若曰本草湯此又用桂枝閉汗也一藥二用其義何若曰本草言桂辛甘能通脈出汗是調其血而汗自出也仲景云太陽中風陰弱者汗自出衛實營虛故發熱汗出又云太陽病發熱汗出者此爲營弱衛強陰虛陽必湊之故皆用桂枝發汗乃調其營則衛自和風邪無所容遂自汗而解非桂枝能開湊發汗也若桂枝者衛有風邪則病自汗出以之調和榮衛則邪從

汗而解非桂枝能閉汗孔也麻者不知出汗閉汗之意遂復表無汗者亦用桂枝湯下發汗發字當作出字汗自然發出非若麻黃能開湊發汗也亦有表虛裏虛者之辨醫者須宜詳辨麻黃遍徹皮毛故專于發汗而寒邪散桂枝透達營衛故能解肌而風邪去夫熱病自汗風傷衛氣腠理疎泄其脈浮緩而病尚淺必用爲君佐以芍藥甘草助陽斂表不致風邪褒犯營血之分不汗而解表虛法也陽脈濇陰脈弦法當腹中急痛必以芍藥爲君佐以桂枝甘草補中救裏不致寒毒攻

亂中氣裏虛法也。故桂枝湯小建中湯二藥各主其用。成無己曰桂枝本爲解肌若太陽中風脉緩營衛俱實脉浮緊發熱汗不出者不可與也必皮膚疎泄自汗脉浮緩風邪干衛乃可投耳然發散藥中又以甘棗爲使者辛甘能發散而又用其行脾胃之津液而和營衛不專于發散也故麻黄湯不用甘棗專于發散不待行其津液耳

辛夷　二百五十　辛溫氣味俱薄浮而散陽也入手太陰足陽明經通關利竅鼻寒頭痛咸宜清陽解肌體噤與增寒並選按辛夷卽今之木筆也清氣芳香能上竄頭目逐陽分之風邪故鼻塞涕出此能通之鼻氣通于天天者頭也肺也肺開竅于鼻而陽明胃脉環鼻而上行腦爲元神之府而鼻爲命門之竅人之申氣不足清陽不升則頭爲之傾尤竅爲之不利辛夷之辛溫走氣而入肺其體輕浮能助胃中清陽上通于天所以能溫中治頭面目鼻九竅之病寒風入腦同甘菊薯耳薄荷細辛甘草芫活藁本防風川芎治之其性走竄氣虛人禁服雖感風寒鼻塞亦不得

用頭腦痛屬血虛火熾者亦不可用齒病屬胃火者禁之產漢中剉去毛陰乾芳香爲之使惡赤石脂畏菖蒲蒲黃黃連石膏

沉香　二百六十味辛苦溫陽也可升可降入足太陰少陰兼入手少陰足厥陰經調和中氣破結滯而胃開溫補下焦壯元陽而腎煖療脾寒痰澼之血去冷風濕痺之邪轉筋吐瀉能止嘔噦氣治胃吮痛冷益右腎命門本經治風水毒腫者即風毒水腫也風爲陽邪鬱手經絡遇火相煽則發出諸毒沉香得雨露之精氣故能解風火之毒求腫者脾濕也脾惡溼而喜燥辛香入脾而燥溼則水腫自除按沉香色黑下墜溫而不燥故達腎而導火歸元有降氣之功無降氣之害抑陰助陽通天徹地保和衛氣爲上品藥也諸木皆浮此獨沉水故入肝木而治逆上之氣行氣而不傷氣溫中而不助火誠良劑也合于冷氣氣逆氣鬱氣結如中氣虛而氣不歸元及氣虛下陷者心經有實邪者均不可投設施火症反罹禍矣若非命門眞火衰者亦不宜入下焦藥

也同人參菖蒲遠志茯神棗仁生地門冬治思慮傷心心氣鬱結胃冷久咳用沉香紫蘇白薤各一錢爲末柿蒂湯服五六分轉胞不通并小腸脫愛病也乃強忍房事或過忍小便所致當治其氣則愈并利沉結鬱搗瑞者次之其餘不堪入藥取沉水不空心者磨細沉粉用忌日曝火焙唯嚼香甜者性平辛辣者性熱又一種雖沉水而中空有朽路者謂雞骨香俱不堪用

丁香二百六七十粒熟氣厚味薄升也陽也入手太陰足少陰陽明經溫胃寒之嘔逆散腎氣之奔豚消痃癖壅脹蛟症癖灰白治虛熾冷氣勞療胸痺陰痛腹痛治呃忒煖陰戶　按丁香辛熱而燥爲祛寒開胃之劑香氣走竄能行滯氣而除穢濁溫中健脾大有神功須于丸劑中同潤藥用乃佳獨用多用易于傷上損肺傷目非屬虛寒豈可概施　日華云丁香治口氣香也口居上地氣出焉脾有攝之意而濁氣上行發爲口氣治脾胃冷氣不和甚

良也。宋醫陳文中治小兒痘瘡不起。用異功散倍加丁香。官桂服之。亦有愈者。此丹溪所謂立方之時必運氣在寒水司天之際。又值嚴冬鬱遏陽氣。故用大辛熱之劑發之。若不分氣血虛實。熱經絡。一概用之。殺人必矣。以生薑汁和。扳去白髮塗孔中。即異常黑一切火熱證切忌。產交趾廣州。取紫色。去丁蓋乳子。發人背癰也。勿見火。畏鬱金。有雌雄二種。雄者類小。爲丁香。雌者大如山萸。爲雞舌香。即母丁香也。入藥最勝。

白旃檀　即檀香。二百七十

辛溫。陽中微陰。入手太陰足少陰。通行陽明經。開胃進食。療膈噎之吐。溫中散冷。引胃氣上升。按檀有紫白二種。白者辛溫。氣分之藥也。故能理衛氣而調脾肺。利胸膈。馨香芳馥。引清氣近處咽膈之上。遠行胸腹之中。最宜橙橘之屬佐以薑棗葛根縮砂豆蔻益知。通行陽明之經。緊者鹹寒。血分之藥也。能和營氣而消腫毒。治金瘡。然究竟諸香動火耗氣。非冷氣不舒者。不可輕服。古人夏月囊香以避汗氣。猶謂能散發眞氣而開毛孔。況服之不當

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号　特7-494
ガラス使用

者乎。非上乘沉水者不入藥。癰瘍潰後。及諸瘡膿多者忌之。

降眞香　二百七十一　辛溫。行瘀滯之血如神。止金瘡之血最驗。理肝傷吐血。勝似鬱金。塗刀傷出血。過于花蕊粟檀香色黃故走中央而理脾。降香色赤故走南方而理血。其氣清烈鮮紅者。行血下氣有功。用以同五倍子銅花等分傅金瘡出血甚驗。若紫黑色者。不堪用也。

烏藥　二百七十二　味辛。氣溫。氣厚于味。陽也。可升可降。入足陽明少陰經。主膀胱冷氣攻衝。療胸腹積停爲痛。七情鬱結。氣血停凝。用于風藥則疏風。用于脹滿則降氣。調婦人血氣。除小兒腹疼。　按烏藥辛溫芳竄。性善走瀉。故爲下氣溫中之要藥。能散結滯氣滯。調經溫血。佐香附于結濇。乃氣方標藥平劑。且能疏風寒。治腹疼。正以其熟而辛散耳。然味薄。無滋益人。不過疏散宣通。暢于香附而已。不必多用也。第專泄之品。與蔘藿者相宜。錦衣玉食之人。鮮有不蒙其害者。惟

海花輿

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号 特7-494　　ガラス使用

與參朮同行。庶無弊耳。故嚴用和。濟生方。治七情鬱結。以人參烏藥沉香檳榔爲四磨湯者。降中兼升。瀉中帶補也。氣血俱虛。及內熱者勿用。

乳香　即熏陸香。二百七三　味辛苦溫。微毒。純陽。可升可降。入足太陰手少陰兼入足厥陰經。行結腫。消瘡毒之用。活血氣。止諸痛之需。舒筋散氣。托裏護心　按乳香辛熱善竄。入心經。定十二經之痛。隨血氣上下部引經。故爲外科要藥。素問云。諸痛癢瘡。皆屬心火。乳香內消腫毒。外宣毒氣。活血甚有奇功。乳香活血。沒藥散血。故外科方中。每相兼用。但瘡疽已潰者勿服。膿多者勿敷。性能伸筋。故凡人筋不伸者。敷藥必用也。入一切膏藥。能消毒止痛。同續斷牛膝當歸紅麵丹皮及沒藥地黃川芎。治內傷胸脇作痛。同紫花地丁白及自斂金銀花夏枯草白芷連翹貝母甘菊甘草穿山甲沒藥。治一切癰疽疔腫。產波斯。乃赤松木脂所成。色白。箸上烘去油。同燈心研。則易細。或以酒研如泥。水飛晒乾。

沒藥　即本藥。二百七四　苦平。味厚。氣濕。陰也。降也。入足厥陰

經散血止痛消腫生肌內可治于藏府外可治于諸
經氣痛得之舒血泣見之洋
血肉受病經絡壅滯者分散有功血行氣暢瘀腫自
消堪與乳香功用聯璧也肌痛浦腫生
夫胸腹脇肋非瘀血停滯者不宜用若血虛虛痛孕
婦產後惡露去多及癰疽已潰者咸忌　產波斯亦
本液凝結而成色黃黑修治與乳香同
血竭　即騏驎竭　味甘鹹平氣薄味厚陰也降也入手
足厥陰手少陰經止痛行血能收瘡口折傷疼痛傳

之即合　按血竭熏熒惑之氣而結色赤象火味鹹
得陰氣而走血散瘀生新之聖藥也乳香沒藥氣血
兼理而此則專于血分凡血病無瘀積者不必用其
性急不可多使却能引膿　產自南番乃騏驎樹脂
結成狀若膠飴凝塊紅赤與血同色敲斷而有鏡臉
光彩似能射人取磨指甲弦間紅透甲者方真以火
燒之有赤汁湧出久而灰不變本色者有奪命之功
研入藥勿與衆藥同研恐化作塵飛也有海母血極
相似只味鹹腥氣此則鹹甘似梔子氣也得蜜陀僧

良。

安息香　二百七十六　味辛苦平。氣厚味薄。陽也。入手少陰經。治心腹惡氣結聚。瘴中惡勞瘵傳尸。服之行血下氣。燒之去鬼來神。按安息香。辟邪去惡之聖藥也。南海波斯國樹中之脂。熏火金之氣而有水芬香。辟惡。安息諸邪。故名安息。心藏神。神昏則鬼邪侵犯。此通神明而祛諸邪。故爲去惡之上藥。病非關邪氣者。勿服。今人取以和香者。亦辟惡之意也。　狀如松脂桃膠黃黑色。酒煮研。

蘇合香　二百七十七　甘溫。走竅逐邪。鬱結凝留咸霧釋。通神殺鬼妖邪。夢魘盡氷消。按蘇合香。產天竺國。乃是諸香汁煎成。故名合香。芬烈氣竄。能通諸竅藏府。開鬱和氣。凡香皆可通竅辟邪。況合衆香而成者乎。藥中只用蘇合油。如鰲音痴。粘者。眞也。亦番國樹生之膏。必濃而無滓者爲上。　附蘇合香丸　用蘇合油一兩。安息香末二兩。以無灰酒熬成膏。入蘇合油內。白木香附青木香白檀香沉香丁香麝香華撥。訶黎勒煨去核。硃砂。烏犀角鎊音傍。削屑

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号　特7-494
ガラス使用

各二兩龍腦熏陸各一兩爲末以香膏加煉蜜丸如梧子大蠟紙包收早取井花水溫冷任意化服治尸骨蒸鬼氣時氣卒心痛吐痢月閉小兒驚癇客忤大人中風中氣狐狸等病

龍腦香 即冰片二大辛苦溫陽中之陽升也散也入百七八手太陰足太陰經開通關竅散熱喉痺除目翳赤疼宣鬱火諸竅瘡毒生于管中摻舌脹出之口外按龍腦是西海波律國波律樹中乾脂也屬火善走大能散熱通利結氣甚知其寒而通利而未達其熱而輕浮飛越特其辛散之性似乎凉耳況諸香皆屬陽豈有香之至者而性反寒也風病入骨髓者用爲引經若在血脉肌肉輒用麝腦便引風入骨如油入麪矣時珍曰古方皆言龍腦辛凉能入心經故目疾驚風及瘡瘡心熱血瘀倒壓者用引猪血直入心竅使毒氣外散則活血瘡發此似是而未當也目與驚與瘡皆火病也火鬱則發之龍腦能引火熱之氣自外出從治之法也蓋辛主發散故耳其氣先入肺傳于心能走能散使壅塞通利則經絡條達而驚熱自

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号　特7-494
ガラス使用

平。瘡毒能出用豬心血引龍腦入心。非龍腦能入心也。沈存中云。痘瘡周密盛則變黑者。用生豬血一椽斗。龍腦半分。溫酒和服。故凡大人小兒風涎塞閉及暴得驚熱甚爲濟用。然非常服之物也。獨行則勢弱。佐使則有功。故廖瑩中熱酒服龍腦。九竅流血而死。非龍腦有毒。乃熱酒引其辛香散溢經絡。氣血沸亂而然也。凡病氣血俱虛。及小兒慢驚屬虛寒者。切不可用。眼目昏暗。屬肝腎虛者。不可入點藥。切戒。市家多以番硝混攙。然其質重色蒼。如砂細碎。龍腦輕浮潔白。片片相倖。須細辨之。入磁鑵同燈草藏密。不致耗蝕。相感志言。以杉木炭養之更良。今人多以樟腦升打亂之。不可不辨也。

樟腦　即㽲腦。二百七九

辛。熱。純陽。通關利滯。除濕殺蟲。着鞋中去腳氣。合硃砂。治蟲齒。按樟腦出韶州樟州故又名韶腦。狀似龍腦。白色如雪。樟樹脂膠也。稟龍火之氣。去濕殺蟲。乃其所長。故燒烟熏衣篋席簟。能辟壁風蛀蟲。醫林集要治腳氣腫痛者。用樟腦二兩。烏頭三兩。爲末。醋糊丸彈子大。每嚼十丸。于足心踏之。下以微火烘之。衣被圍覆。汗出如涎爲効。煉腦法。用銅盆。以陳壁土爲粉。糝之。却糝樟腦一重。又糝壁

土。如此四五重。以薄荷安土上。再用一盆覆之。黃泥封固。于火上款款炙之。勿令走氣。候冷取出。則腦皆升于上盆。如此升兩三次。可充亂片腦矣。故用片腦須要細辨。

阿魏　二百八十　辛溫。氣味俱厚。陽也。入足太陰陽明經。消肉積。破結聚。利膈氣。殺小蟲。樂癘瘴。按阿魏臭烈殊常。極臭而又能止臭。辛則走而不守。溫則通而能行。善殺諸蟲。化積塊。下細蟲極效。人之血氣。聞香則順。聞臭則逆。故凡脾胃虛弱之人。雖有堅積痞塊不可輕用。當先補養胃氣而堅積自消。經曰。大積大聚。其可犯也。消其半而止。蓋藥與病競。競乎根本者斃。同麝香硫黃蘇合油煎膏。貼一切痃癖塊　產波斯國。黑色者不堪。黃散者爲上。最難眞者。試法。以半銖安熟銅器中。一宿。沾阿魏處。白如雪者。又法。以一銖安柚樹上。樹立乾便是眞者。研細。用熟酒器上裹同把過。置地冷。入藥。

蘆會　卽象胆。二百八一　味苦。大寒。入足厥陰太陰經。又入手少陰經。主熱風煩悶。理驚癎。驚風。殺五疳鼻瘡。治蟲

齒疳瘡瘜瘻癬出黃汁。按廬會。稟陰寒之氣。主消不主補其功專于殺蟲清熱。痘以瀝熱爲咎。瀝熱去。則愈矣。故瀝瘡頑癬。以廬會一兩。炙甘草半兩。研末。先以溫漿水洗淨。拭乾傅之。極妙。凡脾胃虛寒作瀉。及不思食者。禁之。又以味苦象膽得名。產波斯。狀似黑錫。木滴脂淚結成也。先搗成粉。然後入藥。解巴豆毒。

胡桐淚　二百㱏　苦。大寒。氣味俱厚。陰中之陰也。入足陽明經。咽喉熱痛。磨掃取涎。療癰火毒。非此不愈。牙疳宜露膿臭者。桐淚杞根煎水漱。牛馬急黃黑汗者。水研三兩灌之瘳。牛馬性熱而又犯熱病。所以急黃黑汗。鹹寒能除大熱也。按胡桐淚。是車師國中胡桐樹脂也。稟地中至陰之氣。而兼水化。古方稀用。今治口齒家。多用爲最要。性寒滌熱。味㱏入骨。故大熱毒症能主治之。內經所謂熱淫于內。治以㱏寒是也。有木石二種。木淚乃樹脂流出者。其狀如膏油。石淚乃脂入土石間者。其狀成塊。形如小石片。子黃土色。重實而堅者爲上。又若硝石。得水便消。以其得鹵斥之氣。故入藥此爲勝。

黃蘗　二百八三　苦寒。氣味俱厚。沉而降。陰也。陰中之陽。入足少陰經。爲足太陽引經藥。肅清龍雷之火。滋濡腎水之枯。疏小便癃閉。療痿厥無力。黃蘗蒼朮。乃治痿要藥。腸風連下血者立效。熱痢先見紅者殊功。加黃者湯中使腰膝氣力湧出。和蒼朮散內。卽二妙散。俾下焦溼熱散行。佐澤瀉利小便赤濁。配細辛治口舌生瘡。酥炙之腸胃熱結。陰不足也。黃蘗之病。雖由溼熱。然必發于真陰不足之人。以至腸癖。痔漏。溼熱下注。濁血。洩痢。溼熱下犯腸胃。漏下赤白。膚熱甚痛。口瘡。寧疳。一皆陰虛血熱所致。以至陰之氣補至陰之不足。補陰其火自降。火降。其陰自寧。自然陰回熱解。溼燥而諸症悉安。本經之所主治者。蓋以此也。按黃蘗。性寒。走至陰。有瀉火補陰之功。非陰中有餘之火。不可用也。昔人稱其補陰。非其性補。蓋熱去則陰不受傷。卽謂之補亦宜也。若兩尺微弱。或左尺獨旺。皆不宜用。內經所謂強腎之陰。熱猶可。是矣。夫火有二。君火者。天火也。龍雷之火也。心火也。可以濕伏。可以水滅。可以直折。相火者。人火也。火也。可以水濕折之。當從其性而伏之。黃蘗雖陰火也。不可以水濕折之。當從其性而伏之。黃蘗雖

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号　特7-494
ガラス使用

云能去下焦溼熱之火邪。然須辨其氣血虛實。故東垣云。小便不通而渴者。謂熱在上焦氣分。肺熱則不能生水。法當滲淡之藥。猪苓澤瀉之類。瀉肺火而清肺金。滋水之化源。若邪熱在下焦血分。不渴而小便不通。乃素問所謂無陰則陽無以生。無陽則陰無以化。膀胱爲津液之藏。氣化則出。法當用陰中之陰藥。黃蘗知母是矣。相火燔灼。飛走狂越。從性而伏。不該直折。酒炒褐色。轉若爲幸。水中火起。辨論甚明。補陰其火自降。火降其陰自寧。火火。補脾洪數堪憑。虛弦閉澁。酒製。辨証斯文。然黃蘗知母。均有金水相生之義。究之黃蘗專制膀胱命門陰中之火。知母能清肺金滋腎水之化源。黃芩梔子入肺。黃連入心。黃蘗入腎。燥濕所歸。各從其類也。夫氣爲陽。血爲陰。邪火煎熬。則眞陰消涸。眞陰消涸。則邪火益烈。而陰虛火動之病隨之矣。取知蘗之苦寒以抑奪南扶北。誠如久旱甘霖。然惟火旺胃强者。爲能當之。倘中氣已殘。則邪火雖亢。命曰虛炎。從事弗衰。將有寒中之變。且味苦久服。有反從火化之害矣。今天下極其業尚以爲去熱治勞之妙藥。而不知眞元之火。與健運之職。已消亡而阻喪矣。獨不聞虛火可補。實火可瀉之說乎。苟非甘溫。則

大熱焉除也。必尺中洪大。按之有力。可炒黑暫用。不然便當痛絕。　產蜀中。選肉厚色黃者。炒褐色。生用則降實火。熟用則不傷胃。酒制則治上。鹽制則治下。蜜制則治中。惡乾漆。伏硫黃。

厚朴　二百四十八　苦溫。氣味俱厚。體重濁而微降。陰中陽也。入足太陰手足陽明經。治積冷。散腹鳴。下氣消痰。去實滿而寬脹。溫中和胃。調胸腹而止疼。本經主中風傷寒頭痛熱氣。血痺死肌者。蓋以風寒外邪。傷于陽分。則爲寒熱頭痛。風寒濕入腠理。則氣血凝澀而成痺。甚則肌肉不仁。此藥辛能發結。苦能燥濕。溫熱能祛風寒。故悉主之也。　按厚朴屬土。有火氣。藥之溫者也。能散胃中之實。除胸中之氣。善除寒脹痰食。乃結者散之之神藥也。散衛泄氣。除痞消脹。雖取苦洩之功。而佐枳實。然中氣虛弱。不能施化。而得之者。必須能運化精微。及飲食痰積。不損不能佐以人參甘草之甘。茯苓澤瀉之淡。生薑半夏之辛同用。其餘止嘔消痰。逼障除瘧。皆不發之發。爲裏之表藥也。故平胃散中。用以佐蒼朮。正爲瀉胃中之濕。平胃土。不使太過以至于中和而已。若謂溫補而泛用之。誤矣。因其味辛。故腹脹者用以提其滯氣耳。若氣實者。誤服參耆。脹悶宜此

瀉之與橘皮蒼术同用則能除濕滿所謂溫中益氣是也與枳實大黃同用則能泄實滿所謂消痰下氣是也益用苦則泄用溫則補耳然行氣峻猛但可施于元氣未虛邪氣方盛或客寒犯胃濕氣侵脾若脾虛之人雖有如上證亦不可投也同檳榔木香黃連滑石橘皮甘草白芍治滯下初起同白术人參白芍茯苓消腹脹佐牛薑橘皮藿香砂仁半夏止胃寒吐嘔本經主驚悸及別錄除驚去留熟者皆非其所宜也驚悸屬心虛于脾胃絕無相干氣味大溫之藥又豈能去留熟哉孕婦切不可用　産蜀梓州者獨勝質厚色紫者去粗皮薑汁浸透酥炙用乾薑爲之使惡澤瀉消石寒水石忌豆食之動氣

杜仲　二百八五　苦辛甘溫氣味俱薄沉而降陰也入足少陰腎之經兼入肝經氣分治腎勞之腰痛除足弱之酸疼脊中攣痛者必需屈伸不利者加用本經所主腰脊痛益精氣堅筋骨腳中酸痛不能踐地者蓋腰爲腎之府經曰動搖不能腎將憊矣又腎藏精而主骨肝藏血而主筋二經虛則腰脊痛而精氣之筋骨

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号　特7-494
ガラス使用

軟而脚不能踐地也。經曰腎苦燥。急食辛以潤之。肝苦急。急食甘以緩之。杜仲辛甘俱足。正能解肝腎之所苦。而補其不足者也。按杜仲稟陽氣之微。得金氣之原。溫而不助火。補下焦有功。古方只知滋腎。惟王好古云。是肝經氣分之藥。潤肝燥。補肝虛。發昔人所未發也。蓋肝主筋。肝充則筋健而屈伸利用。腎主骨。腎充則精足而骨髓堅強。杜仲甘溫能補。微辛能潤。故能入肝補腎。子能令母實也。杜仲從上從中。其色褐。爲土象。當爲腎之用藥。腰本腎之府。濕土之爲害。必侵腎水而腰先受之。據名據色。可以治之。若象形能使筋骨相着。又一義也。而本草主陰下濕癢小便餘瀝者。皆補腎之馴致者與。腎虛火熾者勿用。即用。當與黃蘗知母同入階牛膝枸杞續斷地黃五味菟絲子白膠黃蘗山藥治腎虛腰痛。及脚軟無力。若風冷傷腎。腰脊虛痛。一味杜仲炒黃酒漬日服。頻慣墮胎者。于兩月前。以杜仲八兩。糯米煎湯浸透。炒去絲。續斷二兩。酒浸焙乾爲末。以山藥五六兩爲丸。空心米飲下。或棗肉爲丸。糯米湯下。漢中產者良。爲四川腊厚潤者。去粗皮鹽酒炒。或酥蜜同拌炙。惡玄參蛇蛻。腰痛必以酒行。

爲効容易。

楮音櫧 白皮 即臭椿。二百八六 味苦澁涼小毒。味厚。陰也。降也。入手足陽明經。瀉血止渴利燥濕治滑遺腸風臟毒皆主殺蟲帶濁俱良。按楮根白皮。稟地中陰氣以生。專以固攝爲用。苦燥涼澁。多建功于濕熱有實腸之力。亦有益于外治。但痢疾滯氣未盡者。不可遽用。」療疔瘡瘑瘍煎洗甚得。時珍云。楮一種香椿。其性頗同。凡療疔瘡瘑瘍。皮入血分而性澁。楮皮入氣分而性利。故血分受病不足者。宜用椿皮。氣分受病有餘者。宜用楮皮。此心得之微也。然必病久而滑。乃爲相宜。若脾胃虛寒。及崩帶屬腎家真虛者。切不可用。徒燥之物也。宜入丸散。不入煎湯。凡使椿根。須取東引者。洗淨。刮去粗皮。拌生葱蒸過。掛乾。生用通利。醋炙固澁。香者名椿皮。色赤無毒。臭者名樗皮。色白。椿芽多食。動風神昏。

乾漆 二百八七 辛鹹苦溫。有毒。氣味俱厚。降也。陽中陰也。入手足陽明。手太陽。足厥陰。經。削年深堅固之積滯。破日久秘結之瘀血。去腸胃蛟蟲癥瘕。功烈于蘇木。除九種心疼。聚結。藉使手

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号　特7-494
ガラス使用

與火火金相搏。則未免有毒。毒而殺蟲。降而行血。二者已罄其功能矣。然性急烈。不可過用。血見乾漆。即化爲水。其損新血可知。凡血虛者不可輕餌。同荼蓼生地半枝連胡麻荊芥何首烏冬苦參。可治紫雲風。

入藥。宜黑漆搗碎。炒令烟盡。不爾。損人腸胃。若是濕漆。煎乾更好。中其毒者。多食蟹。及甘豆甘草黑豆湯解之。生漆瘡者。杉木湯。紫蘇湯。蟹湯。洛之。若入漆室。先以蜀椒塗口鼻。可免瘡矣。淮南子曰。蟹見漆而不乾。相感志云。漆得蟹而成水。蓋物性相別也。半夏爲之使。畏雞子。忌油腊。

海桐皮　二百八十八味

苦温平。氣薄味厚。陰中陽也。入足太陰陽明經。除腰脚不遂。血脈頑痺。瘡疥蠹疥癬。牙蟲風蹙。

按海桐皮。亷木中之陰氣。以生能行經絡。達病所。入血分。散風熱。及殺蟲。除濕熱。浸淫爲患。續傳信方。治腰膝因風濕痛不可忍者。用海桐皮二兩。牛膝苓翦羌活地骨皮各一兩。甘草半兩。薏仁二兩。生地十兩。並洗淨。搗乾。剉。以綿包。入無灰酒二斗浸之。冬二七。夏一七日。空心飲一盞。午晚再服。不

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号　特7-494
ガラス使用

得添減。此只治因風濕濕熱流注爲病。若陰虛血少火熾而得者。勿服。同眞川楝皮輕粉蛇牀子山大黃爲末。傅瘡妙。　產雷州。扁旗東似桐皮而堅韌。音但白黃。入水久而不爛者也。

金鈴子　即楝實。二珠苦酸寒。小毒。氣薄味厚陰中陽百八九也。入足陽明手足太陽經。主中濕傷寒。大熱煩狂。理膀胱小腸疝氣。吊痛。利小便水道。殺三蟲疥癬。本經主溫疾傷寒邪鬱久。至春變爲溫病。邪在陽明也。若寒之物。則能散陽明之邪熱。矣膀胱爲州都之官。小腸爲受盛之官。二經熱結。則小便不利。此藥味苦氣寒。走二經而導熱結。故水道自利。　按金鈴子。大寒極苦。能導小腸膀胱之熱。因引心包絡相火下行。故療熱厥暴痛心腹痛。及疝氣痛。爲要藥。甄權乃言不入湯使。則本經何以有治熱狂利小便之文耶。若肥胃虛寒者大忌。　川產者良。酒拌透蒸。待皮軟。刮去皮。取肉用。核肉不可同使。若用核。搥碎。以漬其根及皮。微寒。苦。酒和塗疥癬。甚良。雄根赤無子。大

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号　特7-494
ガラス使用

毒殺人。雌根白子多。取向東者。略刮外皮。每兩可入糯米五十粒同煎。殺毒追蟲。宜月前蟲頭向上。忌月後蟲頭向下也。先啖鷄餅少可。頓飲濃藥湯。若多瀉。以冷粥止之。不瀉。以熟葱湯粥發之。又石菜莫。即花落子。入外科用。苗香爲之使。

槐實　二百九十　苦寒。酸鹹。純陰。入手足陽明經。兼入足厥陰氣分。主疎導風熱。治陰下濕癢。五痔瘡瘻爲要。糞前有血。名外痔。糞後有血。名內痔。穀道四面努肉。名舉痔。頭上有孔。名痔瘻。瘡內有蟲。名蟲痔。槐角爲丑。地榆當歸防風枳殼爲佐。酒糊丸。梧子大。米飲下。清甘熟湯亦功。涼大腸。潤肝燥。按槐實感天地陰寒之氣。葉尖而黑。晝合夜開。即莢中子大如豆。堅而色紫。俗名爲槐角是也。肝經氣分之藥。爲苦寒純陰之劑。能除一切熱散一切結。清一切火涼血之要品也。枝葉苦平。煎湯治疥癬。及陰瘡濕癢。燒灰瀝塗癬亦効。或取北面不見日枝煎湯洗之。其根白皮。主痔瘡有蟲。及婦人產門癢痛。濃煎汁。先薰後洗。大便當有蟲出。不過三五度。即愈。去弟子五子。只取兩子三子者。以銅物擊破。用鳥牛乳浸一宿。蒸用。

槐花　二百九一　苦平。味厚氣薄。純陰也。入手足陽明厥陰血分。治臟毒。涼大腸。殺腹蟲。療膚熱。酒毒下血。半生半炒。同梔服。癰疽發背。炒熱酒飲汗之痊。按槐花。味以苦勝。故能除陽明厥陰二經積熱。證有功。然不可過用。若虛寒人脾胃作泄。及陰虛血熱者。即不宜服。陳久者良。入藥炒用。

秦皮　二百九二　苦寒。性濇。沉也。陰也。入足厥陰少陽經。治風寒濕邪成痺。除青白幻翳。遊睛。卻肝熱。止崩帶。主熱痢下重。療驚癎毒瘡。按秦皮產于秦地。爲肝膽二經之要藥。治目赤風淚。驚癎者。取其平木也。治下痢崩帶者。取其收濇也。又能治男子少精。益精有子。皆取其濇而補也。故老子曰天道貴濇。此藥乃崩痢驚癎所宜。而世止知其治目一節。幾于廢棄。良可惋也。取皮漬水便碧色。書紙青色者眞。大戟爲之使。惡吳茱萸苦瓠。

皂莢　二百九三　味鹹辛。溫。小毒。入手太陰陽明。兼入厥陰氣分。開竅通關。宣壅導滯。搜風逐痰。殺蟲治癬。按皂莢稟木氣而兼火金之性。故能治風木之病。木

性燥氣浮而散吹嚏鼻則通上竅導二陰則通下竅入腸胃則理風濕痰喘腫滿殺蟲塗肌膚則清風去癢散腫消毒疏散之力居多故能開閉結豁風痰中風傷寒門賴爲急濟之神丹（活人書治陰毒正氣散中風涎潮昏悶宜稀涎散皂莢一兩明礬五錢水調灌五分不大吐只微微涎出）若類中風由于陰虛及孕婦並皆禁之（子）取堅滿者煮熟去皮取白肉去黃燒存性治大腸虛秘瘰癧惡瘡（角）刺功用與皂莢同第其銳利能直達病所引諸藥性上行爲癰疽妒乳丁腫未潰之神藥若已潰者勿服

有三種一種猪牙皂莢全無滋潤洗垢不去一種粗大長虛而無潤一種圓厚短促皮薄肉多味薄尤好選赤肥不蛀者以新汲水浸一宿銅刀削去粗皮或酥或蜜反復炙透去子研用梢實爲之使惡麥冬畏人參苦參伏丹砂硫黃

沒石子（即無食子二百九四）苦溫入足少陰經益血生精染鬚髮而還少固腸治痿收陰汗以生肌（按沒石子熏春生之氣兼金水之性春爲發生之令故有功于止瀉固精澁氣之要藥玉金主收斂之用故有功于止瀉固精澁氣之要藥

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号　特7-494
ガラス使用

也若積滯多者不宜用也張仲景治陰汗取燒灰先以溫水浴過綿裹灰撲之甚良凡用不宜獨用名用蟲食成孔者入藥勿犯銅鐵器并被火鷙顙小紋細者佳砂盆研隔紙焙用

訶黎勒　即訶子二酸苦澁溫味厚陰也降也入手太陰陽明兼入足厥陰陽明少陰經酸澁能斂肺降火若溫可下氣寬中寧嗽化痰湯等化爲水則止腸風血生用則清金行氣煨熟則温腎固腸　按訶黎勒若重酸藥苦而能降酸而能澁上足寧肺下固大腸故有收斂降火之功秋金受濕以此酸澁但不利于上焦濕積生痰宜乎大腸不固之治也同人參則補肺同白朮則益脾同五味烏梅則斂肺同橘皮厚朴則下氣東垣云嗽藥不用者以其苦重瀉氣酸輕不能補肺也但斂嗽未久者不可驟用耳若久嗽火傷肺鬱用之亦何妨哉性急下行到底是治標之劑氣實者最効若氣虛暴嗽初瀉或肺有實熱瀉因濕熱氣喘因火冲者用之立致殺人不可不深戒也　產嶺南廣州六稜黑色肉厚者

佳。酒浸後蒸一伏時。去皮取肉焙用。用核則去肉或麪裹煨透去核。

【水楊葉】二百九六　苦平。止久痢而多功。浴瘡瘡而起發。按水楊生于涯涘之旁。得水土之氣偏多。能散濕熱。故久痢需之。瘡瘡頂陷漿滯不行。或風寒所阻。用水楊枝葉五觔。流水一大釜煎湯溫浴之。冷則添湯。良久。鬱起有暈絲者。漿行也。未滿再浴。虛者只洗頭面手足。初出及癢塌者。勿浴。若內服助氣血藥。更效。此方有變理之妙。黃鐘一動而蟄啓戶。東風一吹而堅氷解。腹之義也。

【蕪荑】二百九七　辛溫若平。入手太陰經。除肌膚骨節中淫淫如蟲行。逐寸白及腸中盪盪之喘息。腹中鼈瘕。兼藥而效。平時嗜酒。血入于酒。則爲酒鼈。平時多氣。血凝于氣。則爲氣鼈。虛勞冷痼。敗血雜痰。則爲血鼈。搖頭掉尾。如蟲之行。上侵人咽。下蝕人肌。或附脇背。或隱胸腹。大則如斛。小則如錢。治法。惟用蕪荑妙煎服之。兼用煖胃益血理中之劑。乃可殺之。若從事雷丸錫灰。無益也。痃熱有毒。錢氏訣靈。榆仁。黃連。各一兩。猪胆汁七枚。和入盌內。飯上蒸之九次。後入麝香半錢。湯浸蒸九。綠豆大。米飲下。和猪脂傳塗熱瘡。與蜂蜜亦療濕癬。按蕪荑。臭也。其氣臭如傷敗之物也。雖能治風淫邪氣之

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号　特7-494
ガラス使用

爲害而其功則長于走腸胃殺蟲消食積也故小兒痢瀉冷痢爲必資之要藥然多服久服不惟能發熱心痛亦能傷胃同肉豆蔻胡黃連盧會使君子青黛五穀蟲雷丸檳榔橘皮治小兒痢熱瀉痢及好吃泥土病　陳久者良必擇氣腥者佳小者卽山楡莢仁止堪爲醬及治鷄病入藥當用大者麪炒黃除痢症殺蟲外他用甚稀

本草滙卷十五　終

本草滙卷十六目次

木部二

蘇方木二百九八
巴豆二百巴霜剛子附
相思子三百二
木硾
枳實三百五
山梔子三百七
雞仁三百九

櫻桐皮二百九九
大風子三百一
桑白皮三百三椹葉枝汁霜俱附兼附
楮實卽穀實三百四
枳殼二百六
酸棗仁三百八
山茱萸二百十

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号　特7-494
ガラス使用

金櫻子 三百 十一
女貞實 三百 十三
枸杞子 三百 十五
石南葉 三百 十七
紫荊皮 百 十九
山茶花 三百 廿一
黃櫨葉 三百 廿三
赤茯苓 二百 廿五
琥珀 廿七
郁李仁 三百 十二
五加皮 三百 十四
地骨皮 即枸杞根 三百 十六
蔓荊子 三百 十八
芙蓉花 三百二十 根葉附
密蒙花 三百 廿二
白茯苓 三百 廿四
茯神 三百廿六 心中木附
豬苓 三百 廿八

雷丸 三百 廿九
竹葉 三百 卅一
竹瀝 三百 卅三
荊瀝 三百卅五 葉根莖附
震燒木 三百 卅七
桑寄生 三百 三十
竹茹 三百 卅二
天竹黃 三百 卅四
古槐板 三百 卅六

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号　特7-494
ガラス使用

本草滙卷十六

吳門郊西郭佩蘭章宜纂輯

男　樹嵎芬摒

姪　維均梅在　參閱

紫藤陳陸坤白筆校訂

木部二

蘇木　二百九八　甘辛酸鹹可升可降陽中陰也入手少陰足太陰厥陰經入藥惟取中心煎酒專行積血女科資通月水產後敗血立除外科仗散腫癰跌撲死血

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号　特7-494
ガラス使用

即逐同防風散表裏風氣調乳香治口噤風邪按蘇木乃三陰經血分藥也辛鹹消散兼有軟堅潤下之功故能祛一切凝滯留結之血與防風同用能散表裏風氣少用和血多用破血產後血虛腹痛者不宜用　產海島取中心文橫如紫角者細剉搥梅枝蒸之陰乾用

櫻櫚皮　二百九　苦澁氣平吐無鼻洪腸毒病十全奇效

崩中帶下赤白痢一七神功按櫻櫚皮性澁燒黑止血有功然宜于去血過多內無瘀滯滑而不止者

用之切當所謂澁可去脫也與亂髮灰同用更良若初發方熾者不宜遽用　年久敗者良炒極黑存性

巴豆　三百　性熱味辛大毒可升可降陽中陰也入手太陰陽明太陽足太陰陽明經蕩五藏滌六府幾于煎腸刮胃攻堅積破滯癖直可斬關奪門氣血與食一攻而始盡痰蟲及水傾倒而無遺胎兒立爛疔腫旋抽　按巴豆合六陽火氣而生稟剛雄猛烈之性乃斬將奪門之將氣血未衰寒積堅固有形者誠有神功與大黃同爲攻下之劑但大黃性冷腑病多熱

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号　特7-494
ガラス使用

者宜之巴豆性熱臟病多寒者宜之（巴豆入腹如火奪門無往不利世徒知其能下之急不知熱毒之性但可對待陰寒若木土金水不及縱有可下之證用之則木愈抑而脹土愈陷而廢金愈燥而發水愈涸而結矣故凡萬物合太陽火氣而生者皆有毒當斟酌之耳）故仲景治傷寒傳裏多熱者多用大黃東垣治五積屬臟者多用巴豆世俗不明此義徒以大黃爲王道之藥以巴豆爲劫霸之劑不亦謬乎若急治爲水穀道路之劑去皮心膜油生用若緩治爲消堅磨積之劑炒令紫黑用如炒至烟將盡可以止瀉可以通腸用之合宜効如桴鼓此王海藏能發千古之秘奧也然必審定脾胃果然久傷積冷凝滯脈沉而滑即王太僕所謂大寒凝內久利溏瀉愈而復發綿歷歲年者法當以熱下之則寒去利止宜用巴豆丸不瀉而愈苟用之不當則犯損陰之戒矣今人每每輕用試以少許沾之肌膚須臾發泡灼爛況腸胃柔脆之質無論下後耗損真陰即府藏被其薰灼能無潰爛之患耶即不得已急證欲借其開通道路之力亦須炒熟壓令油極淨入分許即止若投之老羸衰弱之人禍不旋踵（巴豆入丸散中去皮心膜揀水

煮五度。各一沸。擣如膏。用紙包壓去油。名爲巴霜。緊小色黃者爲巴。三稜色黑者爲豆。小而兩頭尖者爲剛子。其力更猛。燒殼存性。能止瀉痢。生研熟緩。生溫熟寒。不去膜則傷胃。不去心則作嘔。以沉香水浸。則能升能降。與大黃同用。瀉人反緩。爲其性相畏也。芫花爲之使。反牽牛。畏大黃連蘆。笋冷水。解其毒者。以此解之。

大風子　三百　辛熱。有毒。氣薄味厚。陽中之陰也。入足厥陰經。瘋癩癬疥瘑賴。以平復。楊梅惡毒。得此可掃。按大風子。屬金有火。有殺蟲劫毒之功。然性熱能燥痰傷血。用之外塗其功不可沒也。疥癬不愈。同樟腦水銀油胡桃合搗如泥。指擦有驗。　取油法。用子三斤。去殼及黃油者。研極爛。瓷器盛之。封口。入滾湯中。盞鍋密封。勿令透氣。文武火煎至黑色如膏。名大風油。可以和藥。若入丸藥。去油。入藥。

相思子　三百二　苦平。有毒。吐風痰。痰癖瘧痃。殺腹臟蠱毒。按相思子。大如小豆。半紅半黑。今誤爲赤小豆。善吐

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号　特7-494
ガラス使用

人宜辨產嶺南彼人以嵌首僊用妝龍腦香不耗

桑白皮 三百三 甘辛苦寒甘厚而辛薄可升可降陽中陰也入手太陰經瀉肺金之有餘逐水定喘氣餘爲火是辛以瀉之也然肺中有水則傷濕而生痰痰生熱而傷肺是以咳嗽吐血熱渴勞傷之候作矣今言逐水氣正所以瀉火邪也濕熱生痰爲要藥若勞極之嗽又當潤肺補肺之劑疏小腸之閉濕降氣寬膨止渴消燥痰定咳嗽吐血甘助元氣辛瀉火邪桑皮瀉肺是瀉肺中火邪非瀉肺氣也火去則氣得安矣遇刀刃傷作線縫用熟鷄血塗即合本經言傷中者中氣傷也五勞者五藏勞傷也六極者六府之中氣極也羸瘦者肌肉脫也崩中者血脫也脈絕者氣血兩虛之至故脈不來也之數者皆由陰不足則陽有餘陽有餘則火盛而內熱火與元氣不兩立惟甘可以補元惟寒可以除熱熱去而元氣自生諸證悉退按桑白皮西方之藥也甘能固元氣之不足辛以瀉肺氣之有餘性不馴良不宜多用時珍言其長于利水者乃實則瀉其子也故肺中有水氣及肺火有餘者皆宜之十劑云燥可去濕桑白皮之屬是矣錢乙治肺熱欬喘面腫身熱瀉白散用桑皮炒一兩地骨皮焙一兩甘草炒半兩每服一二

錢。入粳米百粒。食後煎服。蓋桑皮地骨。皆能瀉火從小便去。甘草瀉火而緩中。粳米清肺而養血。此乃瀉肺諸方之準繩也。若稱補氣者。非若參耆之正補。乃瀉邪所以補正也。愚者信爲補劑。而肺虛亦用之。大失桑皮之面目矣。若肺虛無火而小便利者。及因風寒而嗽者。不宜用也。子名〔桑椹〕桑之精華所結也。味甘微涼。爲涼血補陰之劑。止渴生精。瀉小腸熱。脾胃虛滑者。勿服。桑葉。手足陽明之藥。家者甘煖。經霜者去風明目。止渴長髮。〔桑葉〕麻葉。煮浙水。沐之七次。可長徑尺。垂露桑葉。焙研。空心飲服。止遍身盜汗。煮湯淋漬手足。去風痺殊勝。眼目青盲。古方用青桑葉焙乾。逐月按日。就地燒存性。每用一合。于瓷器內煎減二分。澄清溫洗。至百度有驗。正月初八。二月初四。三月初六。四月初四。五月初六。六月初四。七月初二。七月初七。八月二十。九月十二。十月十三。十一月初二。十二月三十。風眼眼下淚。用臘月不落桑葉煎湯日日洗自效。赤眼澁痛。桑葉爲末。紙卷燒烟熏鼻取效。海上方也。〔桑枝〕不冷不熱。治四肢拘攣。祛風癢。乾燥。凡煎藥用此者。亦取其能利關節。除風寒濕痺諸痛也。紫白癜風。用枝十斤。益母草三斤。煎膏。臥

時酒服。久久自効。枝灰。治大風瘡瘍。生眉髮。皮中白蟲。

〔主〕小兒口瘡。及鵝口。舌上生瘡。傳之神効。又塗刀傷燥疼。須臾血止。仍以白皮裹之。〔桑寄〕即灰汁。以桑皮綿紙襯淘籮底。用漆水淋下。瓷器盛之。重湯煮乾。別名〔木碗〕。能鑽筋透骨。爲傳癩疒風。拔疔引諸藥散毒之要品。取家園東行嫩根。銅刀刮去青黃潮皮。勿去涎。蜜炙用。出土。土者有毒。續斷桂心麻子。爲之使。

楮實　鄭穀實。三百四　甘寒。味厚氣薄。陰也。降也。入足太陰經。益腎助陽。療腫去水。健腰膝。壯筋骨。按楮實。本草載其功用大補益人。而修真秘旨。言久服令人成骨軟之疾。濟生秘覽。治骨喫用楮實煎湯飲之。豈非軟骨之徵乎。雖能消水健脾。然脾胃虛者勿服。水浸三日。投水浮者去之。晒乾。酒浸一伏時。蒸之焙用。

枳實　三百五　苦酸。寒。氣厚味薄。沉也。陰也。入足陽明太陰。瀉痞破積。有雷霆風行之勢。瀉痰有衝墻倒壁之威。解傷寒結胸。治痞痛。痛。別錄主除胸脇痰癖。逐停水。破結實。消脹滿心下急。痞痛。逆氣脇痛。安胃氣止溏瀉者。皆足陽明太陰受病。二經氣滯。則不能運化

精微而痰癖停水結實脹滿所自來矣胃之主口名曰賁門賁門與心相連胃氣壅則心下自急痞痛邪塞中焦升降不舒而氣上逆肝木鬱于地下則不能條達而脇痛得其破散衝走之力則諸證自除矣

按枳實卽枳殼之小者氣全性烈能瀉有形之物下達二往無回滑竅破結之劑也若云益氣必主以參朮薑棗之類破氣必佐以厚朴

面復言消痞也非脉沉弦滿實非病大實堅滿不可輕投小承氣湯傷寒必用轉重之間悉從胃而出名大承氣湯傷寒不用轉重之間悉從胃而出名小承氣則邪氣不保小承氣湯證而用大承氣湯證而用

大承氣則過傷正氣必致中滿不能食若枳朮丸以之監制是先用白朮補其虛後用枳化其瀉爲虛中之積設耳去濕必須白朮除痞必是枳實故胸中痞肺氣結也有桔梗枳殼湯心下痞脾血積也有白朮枳實湯益白朮補脾枳實去脾經積血脾無積血則心下不痞矣凡中氣虛弱勞倦傷脾發爲痞滿者當用補中益氣補其不足此藥所當忌也時醫不識病之虛實藥之補瀉往往概施損人眞氣爲害不淺設誤投之雖服參朮亦難挽其刻削之禍矣戒之戒之　產商丘　高河南　切片炒黑去麩用陳久者良與枳殼一

物。秋採爲實。冬採爲殼。今醫者惟以皮厚小者爲實。完大者爲殼也。

枳殼（三百六）苦酸。微寒。氣厚。味薄。浮而微升。陰中陽也。（枲曰。沉也。陰也。）入手太陰陽明經。去關膈壅塞之痰。泄胸中滯塞之氣。推宿食。散留結。削中州裏急後重。平兩脇虛脹。癥結。疏風癢。燒疹盈肌。破諸氣走痛如刺。誤犯誅罰無辜之條。必傷胸中至高之氣。本經主風癢痺麻。通利關節。止風痛者。蓋肺主皮毛。胃主肌肉。風寒濕入于二經。則皮膚瘙癢。或作痛。或麻木。此藥有苦泄辛散之功。兼能引諸風藥入于二臟。故爲治風所需。風邪既散。則關節自然通利矣。其療勞氣咳嗽。背膊悶倦者。蓋亦指風寒鬱于上焦。則肺氣滯而爲悶倦。肺苦氣逆。急食苦以泄之。枳殼味苦。能泄至高之氣也。又肺與大腸爲表裏。風邪入肺。則并入大腸。風熱相搏而爲腸風下血。資苦寒下泄之氣。則血熱清而風自除矣。按枳殼。氣味所主。與枳實大略相同。但形大于實。氣散性緩。故其行稍遲。是以能入胸膈肺胃之鄉。及入大腸也。然殼與實。上世未嘗分別。自

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号　特7-494
ガラス使用

枳殼　卷十八

枳殼治高。胸膈皮毛枳實治下。心腹腸胃。海藏分枳殼主氣。枳實主血。然仲景治上焦胸痺痞滿多用枳實。古方治下焦痢痔腸結多用枳殼。由是則枳實不獨治下。而枳殼亦不獨治高也。蓋人之一身。自飛門以至魄門。皆肺主之。三焦相通。一氣而已。則二物大抵皆主利氣。又何必分耶。且氣弱脾虛。以致傷食痞滿。法當補中益氣。則食自化。痞自散。若用枳殼枳實。是抱薪救火矣。脹滿因于實邪者。可用。若土虛不能制水。肺虛不能行氣。咳嗽不因于風寒入肺。氣壅者。服之禍不旋踵。二藥胎前產後。並不宜服。今世治胎氣不安。動輒資用。殊不知婦人懷孕。全賴血氣以養胎。氣血充足。則胎產自易。豈可用之。散之藥。且古方有瘦胎飲者。為湖陽公主設也。以彼奉養太過。其氣必實。故用此以耗其有餘之氣耳。若氣虛不運者。自當補其母之氣。以紫蘇飲加補氣藥用之。為正。若脉此義而用之。反致氣耗難產矣。瘦胎飲。宜于胎前氣盛藥滯者。故用枳殼蘇梗以順其氣。而使易產。若氣弱者。豈可妄投。寇宗奭言胎壯。則子有力易生。今服枳殼藥。反致無力。兼子亦氣弱難養也。此說甚是。潔古枳朮丸用枳實。為積滯者設也。

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号　特7-494
ガラス使用

積滯去。則脾胃自健。故謂之補脾胃之藥。非消導之外。別有補益也。參蘇敗毒散用之。亦以其能疏皮毛胸膈之病耳。配桔梗消膈上之痞。佐白朮能安胎。同甘草則瘦胎。和黃連能滅痔。同肉桂治右脇痛。久瀉不實者禁用。取翻肚如盆口狀者。去穰。麩炒黑。陳久者良。

山梔子　三百七十味苦。大寒。氣薄味厚。輕清上行。氣浮味降。陽中陰也。入手太陰血分。治心煩懊憹而眠臥不寧。疏膀下血滯而小便不利。療濕熱內鬱而發黃。治邪氣上沖而目赤。瀉三焦火鬱。除心痛熱厥。主諸血症解五種黃。消王支毒。羊躅也　傅湯火灼。按梔子。輕飄象肺。色赤象火。故能瀉肺中有餘之火。及心經客熱。金宮不被火擾。則治節之令。自能通調水道。下輸膀胱。得此氣化而出。故丹溪云。能屈曲下行。降火從小便中泄去也。仲景梔子茵陳。取其利小便而蠲濕熱耳。本草言治大小腸熱者。乃幸與庚合。又與丙合。故也。古方治心痛。恒用梔子。此爲火氣上逆。氣不得下者設。今人泥丹溪之說。不分寒熱。通用梔子。虛寒

者何以堪之冤氏言仲景治汗吐下後虛煩不眠用梔子豉湯治之因大黃寒而有毒以其虛而不用梔子寒而無毒又能治胃中熱氣既亡血亡精藏府失潤內生虛熱非此不可去也至煩躁症亦用此法煩者氣也躁者血也故用梔子以治肺煩（味苦入心治煩）香豉以治腎燥（入腎味鹹）胃熱大嘔者用此以止之然損胃伐氣尤血虛發熱脾胃虛弱便塞不由熱結小腸者均不可用瘡瘍因虛不斂則爲久冷敗瘡當用溫煖補益之劑所謂既潰之後毫厘寒藥不可用是也世人每以治諸血證不知血得寒則凝反爲敗症治實火之吐血順氣爲先氣行則血自歸經治虛火之吐血養正爲先氣壯則自能攝血此治療之大法不可少違者也誤用梔子其害必矣　七稜九稜者佳炒透治上焦中焦連殼治下焦去殼洗去黃漿治血病炒心胸中熱用仁肌表熱用皮家園者不入藥

酸棗仁（三百八）酸甘氣平可升可降陽中陰也入手少陰足少陽厥陰經兼入足太陰經助中正之府益君主之官斂氣而心守其液乃固表虛之汗肝旺而血

歸其經。用瘳徹夜無眠。膽熟多睡。生之功。膽虛不寐。熟之效。按酸棗仁。肝膽二經藥也。肝虛則陰傷而心煩不臥。肝藏魂。臥則魂歸于肝。肝不能藏魂。故目不得瞑。棗仁酸味歸肝。肝受養。故熟寐也。炒熟則芳香亦復醒脾。故歸脾湯用之。以治脾家血虛自汗不眠驚悸不嗜食也。聖惠方云。膽虛不眠寒也。炒熟爲末。竹葉湯調。益以肝膽相爲表裏。血虛則肝虛而膽亦虛。得熟棗仁以旺肝。則木來制土。脾主四肢。又主困倦。故令人睡。又衆濟方云。膽實多睡。熱也。生研爲末。薑茶湯下。益棗仁秋成者也。生則金氣全而制肝。肝木有制。則脾不受侮而運行不睡矣。世俗不知其用。誤以爲心家之藥。非其性矣。獨不知心君易動。悉由膽怯所致。若肝膽二經有實熱者。勿用。以其能收斂耳。君茯神遠志麥冬石斛五味龍眼人參。能止驚悸。若服固表藥而汗不止者。用棗仁一兩炒研。同地黃白芍麥冬五味龍眼肉竹葉。煎服取效。汗乃心液故爾。炒香研用。惡防己。

棘仁　甘溫。微寒。氣薄味厚。陽中之陰也。入足厥

陰經破心下結痰除膜邪熱結退翳膜赤筋埋睛傷淚出生治足睡熟治不眠本經治日痛赤腫睛爛者嗽唉爲風木之臟開竅于目風熱乘肝則肝血虛而目爲之病此藥溫能散風寒能除熱甘能補血肝氣和而目疾瘳矣按雞仁外能散風內能清熱療眼有功傳信方治一切目疾用黃連末雞仁去皮研膏等分和勻取棗二枚截下頭去核以藥塡滿仍合紮定于銀器中煎取以綿濾鑼收點眼甚効若日病不緣風熱而因于肝腎兩虛者勿用產巴西以湯浸去皮尖同苦硝木通水煮過取仁研膏入藥

山茱萸　三百十　味酸微溫陽中之陰可升可降入足厥陰少陰經氣分補腎助陽事腰膝之病不必慮也閉精縮小便遺洩之證寧有患乎月事多而可以止耳鳴響而還其聰按山茱萸氣厚而煖故于水木多功腎氣受益則封藏有度肝陰得養則疏泄無虞味酸本屬東方而功力多在北方者乙癸同源也大抵溫煖之劑偏益于元陽故四時之令春生而秋殺萬物之性喜煖而惡寒腎肝居至陰之地非陽和之氣

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号　特7-494
ガラス使用

則陰何以生乎。山萸正入二經。氣溫主補。味酸主收。故精氣益而腰膝強也。按壽方。有草還丹。益元陽元氣。固元精元神。服之延年續嗣。山萸酒浸。取肉一斤。破故紙酒浸。焙乾半斤。當歸四兩。麝香一錢。爲末。蜜丸。臨臥服。便利氣脫者。收滑有功。八味丸用之爲君。亦取其收濇以固精耳。同人乳沙苑蒺藜熟地黃人參麥冬牛膝甘菊。治腦骨痛。腦爲髓之海。髓足則腦痛自除。命門火熾。強陽不痿者。忌之。膀胱熱結。法當清利。不宜用此。陰虛血熱。當與黃蘗同用。產漢中。酒潤去核。核能滑精也。惡桔梗防風防已。

酸澁。溫平。氣薄味厚。陰中陽也。入足太陰。太陽。少陰。手太陽。明經。肩鍮元精。合閉蟄封藏之本。牢拴倉廩。贊傳道變化之權。按金櫻子。屬土而有金與水。脾肺腎之入。固其宜也。酸澁收斂最能止瀉。固精。千劑云。澁可去脫。脚虛滑洩不禁。非澁劑何以固之。膀胱虛寒。則小便不禁。腎與膀胱爲表裏。腎虛。則小便不禁。此藥味溫酸澁。能收斂虛脫之氣。自精氣固而陽氣充足。然澁者大繫于氣。不利丹溪所謂經絡隧道。以通暢爲平和。而味者取其澁精而

服之。致生別症。自作不靖。咎將誰執。雖然。惟無故而服以縱慾。則不可。若精滑者服之。亦何咎哉。若陰虛火熾滑脫者。不宜用。古方有水陸丹。同雞豆粉丸服。益氣補真最佳。去核。并白毛淨。採收當在九十月。取半黃者。乾擣末用。熬膏亦可。若至紅熟。則味已純甘。全無澁味。安在其收斂之功也。

郁李仁　三百十二　辛苦酸。平。陰中之陽。入足太陰氣分。兼入手陽明太陽經。潤達幽門。而關格有轉輸之妙。宜通水府。而腫脹無壅過之虞。本經治大腹水腫面目四肢浮腫者。經曰諸濕腫滿。皆屬脾土。又曰諸腹脹大。皆屬于熱。脾虛而濕熱客之。則小腸不利。水氣泛溢于面目四肢。茲辛苦能潤結熱。降下善導癃閉。小便利。則水氣悉從之而出矣。按郁李仁。甘苦而潤。性主降下。故能下氣利水。治大腸氣滯燥滿不通。又能愈目張不瞑。熬郁李酒食醉。有驗。所以然者。目系內連肝膽。恐則氣結膽橫。不下郁李能去結。隨酒入膽。結去膽下。目自然瞑矣。此蓋得肯綮之妙者也。雖能利水潤燥。然下後。令人津液虛損。燥結愈甚。乃治

標急之藥津液不足者慎勿輕服湯浸去皮尖及
雙仁者生蜜潤一宿漉淨晒乾研如膏用
女貞實 百三十四 苦平氣薄味厚陰中之陰降也入足少
陰厥陰經補中黑鬚髮明目養精神強陰健膝益腎
養神明耳珍主強陰健膝腰脊足少陰爲藏精之臟入
身之根本繫焉根本虛則五臟雖無病而亦不安百
疾叢生矣經曰精不足者補之以味益腎本寒肉虛
則熱而敗此藥氣味俱陰主入腎除熱補精之要藥
腎得補則五臟安而精神足百疾皆去矣按女貞
實得少陰之精乃上品無毒妙藥而古方罕知用者
遇冬月寒水之令而青翠不凋則其補腎之功尤可
推矣然雖曰補益偏于陰寒者也脾胃虛冷不宜久
服恐致腹痛作泄之患耳
五加皮 三百十四 辛苦氣溫微寒氣味俱厚沉而陰也入
手足少陰厥陰經明目舒筋健骨之緩弱剛強身之痺
縮便得力于閉蟄之宮堅筋壯骨之痛痺葉採作蔬食散一
氣去固結之風濕療日久之痛痺

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号　特7-494
ガラス使用

身之風軫蓳根煎酒飲治四木之風痺　按五加皮爲五車星之精故服食家誇之不已仙經贊其返老還童雖譽詞多溢然蓳酒久服卓有奇功乃搜風化濕强筋壯骨益血化痰之劑也今之陰痰脊疼腰痛脚軟及拘攣痀氣痛痺諸症皆屬腎肝二經之病腎得其養則妄水去而骨壯肝得其養則邪風去而筋强經云傷于濕者下先受之又云地之濕氣感則害人皮肉筋脉肝腎居下而主筋骨故風寒濕之邪多自下經先受若下部無風寒濕邪而有火及腎肝虛而有火者均不宜用得牛膝木瓜黃蘗麥冬生地薏苡仁石斛虎脛骨山藥治濕熱痿痺腰已下不能動同續斷杜仲牛膝山萸巴戟天破故紙治腎虛寒濕客之作腰痛　五葉者良四葉者亦好其氣與酒相宜遠志爲之使惡玄參蛇皮附秘授鶴應神管方五加皮川芎白芷生地熟地當歸白朮陳皮香附枳殼烏藥半夏青皮白芨白飲細辛貝母知母杏仁桑皮黃連黃芩黃蘗山梔天花苦參白蒺藜礬蚕天麻南星川烏草烏威靈仙白薯黃柴胡薄荷赤芍木通桃仁玄參豬苓澤瀉梔子前胡升麻麻黃牛膝杜仲山藥遠志續斷良薑何首烏甘草連翹藁本茵陳地榆防風荊芥獨活羌活金銀花蘇皮巴豆青楓葉益母草兩頭尖五倍子大楓子羌花山甲蒼耳子豨薟紅花槟榔牛旁子花椒官桂天

花粉。玄胡索。冬青葉。大尚。甘菊。龍胆草。藿香。蘇木。黃蓍。蒲公英。芙蓉葉。象皮。虎骨。鹿茸。猪牙皂角。巳上各七錢。地鰲虫四個。蜈蚣廿條。血餘一握。桃柳榆槐桑棟枝。各取嫩頭兩許。打前藥爲末。麻油十六斤。浸春夏六日。秋冬十日。油乾。再加油。將桑柴慢慢熬煎。各藥枯黑。去渣。再煎濃。徐徐投下丹粉。如藥油一斤。加丹五兩。手執槐柳枝不住攪。候滴水成珠。去火。藥溫。方下後藥。拌勻。收貯磁器內用。乳香。血竭。阿魏。各一兩。沒藥。輕粉。樟腦。雄黃。木香。沉香。龍骨。煆海螵蛸。赤石脂。各六錢。冰片。麝香。各三錢。

枸杞子 三百十五 味甘氣平。微寒。陽中之陰。可升可降。入足少陰厥陰經。明目疾。生目之血。除腎之精。潤肺固髓。健骨强筋。滋陰不致陰衰。興陽常使陽舉。更止消渴。尤補勞傷。 按枸杞平而不熱。性滋而補。兼能退熱。而專于補腎。潤肺生津。有補水制火之妙。爲腎肝真陰不足。勞乏內熱。平補之要藥也。所謂精不足者。補之以味。是矣。世人但知用黃芩黃連以治上焦之火。黃蘗知母以治下焦陰火。謂之補陰降火。而不知枸杞地骨。甘寒平補。使精氣充而邪火自退之妙。弘景云。離家千里。勿食枸杞。甚言其補精強陰之功耳。與地黃同功。而除蒸者未嘗用之。惜哉。真地黃五味麥冬。地骨皮青蒿鼈甲牛膝。爲除虛勞內熱。或發寒熱之要藥。加天冬百部。枇杷葉。兼可治肺熱

国立国会図書館 タイトル『本草匯18巻』 請求記号 特7-494
ガラス使用

咳嗽之因陰虛者。外臺枸杞酒治腎虛目昏者。用枸杞二斤浸酒三七日飲之。又四神丸小茴芝麻川楝肉各一兩拌炒楝取加熟地黃白朮茯苓各一兩。爲末煉蜜丸服。又痘夏虛病。以枸杞五味研細。滾水泡代茶飲之。若脾胃薄弱者。須與山藥蓮肉車前茯苓相兼用。爲妥。產甘肅者佳。取紅潤圓熟。味甘粒小。少核者。洗淨酒潤透。搗爛入藥。色黯顆大。止堪果食。今市家多以蜜拌欺人。不可不辨。至于土產者。味苦者。但能利大小腸。清心除熱而已。附秘傳（延齡養陽聖丹。此英國公征高麗得之。安南國王。如法制服。老年生子。十人。壽至百年。予向以試事寄都傅。自異人。今不敢秘。願以分世。第元精元陽人身至寶。豪質既厚。又能如法虔修。候時而用。自能取益。若藉此縱情。不惟天真剝削。抑有違立方之旨矣。）赤寶五錢　即生地。乳浸一宿。焙乾爲末。一陽精六錢　即熟地。酒潤晒末。地髓六錢　即天冬。酒浸一宿。晒乾爲末。金華四錢　即去心晒末。玉綠二錢半　即杜仲。童便浸一夜。刮去粗皮。銼碎。鹽水拌炒。取出晒乾爲末。仙杖四錢　即地骨皮。銼碎。水拌。晒爲末。金笋七錢　即蓯蓉。酒洗去甲。烘爲末。通天杖四錢　即牛膝。酒洗。晒乾爲末。補骨脂一錢　即破故紙。酒浸一宿。焙末。壽春三錢　即鎖陽。火酒洗七次。晒末。先登三錢　即青鹽。透明者。酥拌炒末。金英錢半　即甘菊去蒂。便拌晒末。九頂公三錢半　即附子。蜜水川椒煮一香。焙末。如字香二錢半　即丁香。登龍二錢半　即砂仁。去衣。薑汁炒末。吐蕃絲一錢　即北細辛。酷拌晒末。神行八

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号　特7-494
ガラス使用

錢卽穿山甲。火酒浸一夜。酥炙末。國老六錢卽粉甘草。去皮。蜜水炙末。陰飛圓者一對卽石燕。煆醋淬七次。薑汁浸晒爲末。朝雲二錢卽海馬。卽仙靈脾炙黃。二錢卽淫羊藿。乳浸焙末。飛仙四錢半卽紫梢花。河水浸一夜。紙上焙乾。五錢半卽雀腦。每個用硫黃。鳳仙子二錢卽急性子。八月采。井水浸一宿。冲天寶五錢卽鹿茸。酥炙爲末。離精三錢卽硃砂。研細。包蒸。爲末。坎髓五錢半卽黑芝麻。乳拌炒爲末。神珠六錢半卽建蓮子。去衣心。焙末。乾爲末。之英五錢半卽旱蓮子。酒洗晒末。水芝六錢卽雲苓。去皮膜。乳金翁五錢卽雲苓。去皮膜。乳浸。文武火爲末。右三十二味。共爲末。擇吉合養。忌婦人孝服。及跛跰殘疾鷄犬等。將藥裝磁瓶封固。重湯煮三香。取藥出。露一宿。做成一塊。入銀盒內。川紙筋鹽泥封固。將鐵線十字紮好。入鐵罐內。鎔鉛七斤。傾罐中。滿爲度。冷定。放灰缸內。三方火養四十九日。破罐開用。紫色黑色者去。共十二兩。研極細。每服五厘。漸加至一分。好酒送藥。銀罐收鎔蠟固口。防泄氣。

地骨皮　卽枸杞根。三百十六。甘淡苦寒。升也。陰也。入足少陰。手太陰少陽經。治在表無定之風邪。主傳尸有汗之骨蒸。瀉腎火。降肺中伏火。除肝熱。退胞中火邪。骨蒸肌

烙可解。吐血脉數無疑。按地骨皮甘淡性沉乃除熱涼骨之劑。爲三焦氣分之藥。所主皆在腎肝。夫腎水不足。則火旺。肝木不寧。則風淫。惟地骨皮滋水養木。故二經悉賴以治。所謂熱淫于內。治以甘寒。是也。能去風邪者。腎肝同治也。肝有熱。則風自內生。熱退風息。此與外感之風不同耳。時珍嘗以青蒿佐地骨。退熱屢有殊效。世人但知用黃芩黃連黃蘗知母。而不知枸杞地骨。甘能使精氣充。而又退火之妙也。中寒者勿服。洗淨。以熟甘草滲浸。焙乾用。

石南葉　三百十七

味辛苦平。有毒。可升可降。陰中陽也。入足厥陰少陰經。養腎衰。療腳弱。治風淫濕痺。療頭風殺蟲。按石南得火金之氣。爲療風痺腎弱充散之要藥也。今人絕不知用。蓋由甄氏論有令陰痿之說也。殊不知服此能令腎強。人藉此慾以致痿弱。歸咎于藥。良可慨也。女子久服。切切思男。亦以其補腎氣助陽火耳。同巴戟天肉蓯蓉鎖陽鹿茸枸杞子山茱萸治腎經虛寒精滑。同白蒺藜桑葉何首烏淫羊藿巴戟天五加皮兔絲子威靈仙虎骨治肝腎爲風

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号　特7-494
ガラス使用

寒濕所乘以致痺弱不能行動。湖浙甚多。生于石上。如枇杷葉。但背無毛。惡大小蒭。使五加皮。

蔓荊子　三百十八　苦辛。微寒。陰中之陽。升也。入足太陽厥陰經。頭風連于眼目。搜散無餘。濕痺甚而拘攣。太陰之邪。風則傷筋。寒則傷骨。展舒有効。本經主堅齒者。齒屬腎而牀屬陽明。陽明客風熱。則上攻牙齒。而動搖腫痛。散陽明之風熱。則安矣。按蔓荊子。氣味清辛。體輕而浮。上行能散風熱。故所主者。皆在風木之藏。目之與筋。皆肝所主也。若頭目痛不因風邪。而因于血虛有火者。忌之。元素云。胃虛人不可服。惡生瘀疾。　几使去蒂併白膜。酒浸一伏時。蒸之。焙乾。打碎用。惡烏頭石膏。

紫荊皮　三百十九　苦寒。降也。入手足厥陰血分。活血行氣消腫解毒。治血氣疼痛。療經水凝濟。　按紫荊苦寒。善降之物也。寒勝熱。苦走骨。色紫入營。故能治血消腫利小便。而解毒也。　皮梗及花。功用皆同。以川中厚而紫色。苦味如膽者。爲勝。

芙蓉花　三百二十　辛平。涼血散熱。消癰疽毒腫。排膿止痛。傅湯火灼瘡。　按芙蓉花不寒不熱。性滑涎粘。治癰

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号　特7-494
ガラス使用

腫殊有神効。近時瘍醫。秘其名爲清涼膏。鐵箍散皆此物也。不論已潰未潰。凡腫初起塗之。卽清涼痛消。已成者。卽膿聚毒出。妙不可言。或加生赤小豆末。尤妙。重陽前。取芙蓉葉研末。端午前。取蒼耳燒存性研末。等分。窖水調塗四圍。其腫自不走散。名鐵井欄。根葉皆用。

山茶花　三百廿一　氣味缺。仲醇味甘微辛。氣平微寒。吐血衄血能止。腸風下血並用。按山茶花有數種。而實珠花簇者爲最用。紅者爲末。薑便薑汁調服。可代鬱金。

窖蒙花　三百廿二　甘平。微寒。入足厥陰氣分。血分。養營和血。退翳開光。大人眥淚羞明。小兒疳疳攻眼。按窖蒙花爲厥陰肝家正藥也。觀本經所主。無非肝虛有熱所致。肝血虛則爲青盲膚翳。肝熱甚則爲赤腫眵淚。此藥甘以補血。寒以除熱。肝血足而諸症悉愈好古謂其潤肝燥。守眞以之治畏日羞明。誠謂此也。同空青木賊生地蟬蛻白蒺藜穀精草決明子羚羊角治青盲翳障。同甘菊枸杞生地蒺藜穀精。治肝腎虛目不能遠視。療眼疾外無他用矣。酒浸一宿。拌蜜

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号　特7-494
ガラス使用

蒸之日乾。

黃楊葉 三百廿三 苦平。主婦人有功難產。治暑月生瘡癤。塗。按黃楊堅膩青厚。四時不凋。爲世所重者。以其無火也。難產者。入達生散中。最妙。

白茯苓 三百廿四 味甘淡。平。氣味俱薄。浮而升。陽中之陰也。入手太陰。足太陽經。氣分。調脾胃而利小便。水濕多消。清肺熟而定洩瀉。氣機成利。滲中焦之水。眞水得養而津道自悉除。而中宮受益。滲下焦之水。眞水得養而津道自行。益燥長陰。導氣平火。本經主胸脇逆氣。心下結痛。寒熱煩滿。欬逆。口焦舌乾者。皆手少陰受邪也。憂恚怒恨驚悸。皆心志氣不足也。甘補。則心脾實。淡利。則邪熱解。諸症自平矣。中焦受濕熱。則口發渴。濕在脾。脾氣弱。則好睡。天腹者。脾土虛而不利水也。淋瀝者。脾受濕邪。水道不利也。按茯苓。生于古松之下。假土之精氣。松之餘氣而成。屬金。無中生有。得坤厚之精。爲脾家除濕行水之要藥也。本草言其利小便伐腎。東垣言其小便多者能止。滿者能通。并淡又言陰虛者不可用。義似相反。何哉。蓋茯苓滲淡。淡爲天之

陽。陽當上行。然氣薄爲陽中之陰。所以能生津液滋化源。而利水降下也。潔古謂其屬陽浮而升。言其性也。東垣謂其陽中之陰。降而下。言其功也。經云。飲食入胃。遊溢精氣。上輸于肺。通調水道。下輸膀胱。則知淡滲之藥俱先上升而後下降也。小便多。其源亦異。經云。肺氣盛則小便數。而虛則小便遺。心虛則少氣遺溺。下焦虛則遺溺。胞移熱于膀胱則遺溺。所謂肺盛者。實熱也。必氣壯脈強。宜茯苓以滲其熱。故曰小便多者能止也。若肺虛。心虛。胞熱。厥陰病者。皆虛熱也。必上熱下寒。脈虛而弱。法當用升陽之藥。升水降火。膀胱不約下焦虛者。乃火投于水。水泉不藏。腎陽之症。必肢冷脈遲。法當用溫熱之藥。峻補其下。三症皆非茯苓輩淡滲之藥所能治。故曰陰虛者不宜用也。愚謂氣重者主氣。味重者助血。茯苓雖滲淡。其味尚甘。況佐以人參等補劑。下行。亦能補虛而固腎矣。即施之陰虛。亦何妨哉。古方瑤臺雪。治脾虛不思食。及胃弱洩泄者。亦需此爲接引。茯苓二兩。砂仁一兩。汗具。陳皮二兩。薏仁八兩。炒。川椒一兩五錢。炒去白。木十兩。麪炒。山藥八兩。炒。芡實十兩。蓮肉廿兩。白糖二斤。同和。空心白湯下茯苓

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号　特7-494
ガラス使用

調服五錢。加炒大米亦可。惟豬苓一味。誠不宜耳。久病不足精滑便利者。切禁。汗多者。亦禁。凡用。去皮煮二三沸。切曝。須去赤筋。誤服損目。研細入水中攪之。浮者是其筋也。乳潤蒸用。產雲南。色白而堅實者佳。惡白斂。畏地榆雄黃。秦艽龜甲。忌米醋及酸物。

赤茯苓　三百廿五　甘淡氣平。降也。陽中陰也。入足太陰手少陰太陽氣分血分。破血氣。而瀉心與小腸之火。除濕熱。而有利竅行水之功。按赤茯苓。功力稍遜于白。但白者能補。赤者能瀉。通利小腸。瀉熱行水。赤之功當勝于白。補心益脾。白之功白優于赤。仲景云。白者入壬癸。赤者入丙丁。則此于導赤行水之外。無他長矣。其皮善開腠。治水。故水腫膚脹者。用此而水道開通。製忌同白茯苓。

茯神　三百廿六　甘平。陽中之陰。可升可降。入手少陰經。療眩運。定上氣之亂。安神志。益心氣之虛。止心下急痛堅滿。療虛勞驚悸善忘。朱雀丸治心神恍惚。水火不濟。川芎茯神丸。兩沉香半兩。爲末。食後。人參湯下。按茯神。即茯苓一種也。假松之氣。津盛發泄于外者。結爲茯苓。津氣不甚盛者。抱根而生。名

爲茯神有休附之義故魂魄不安不能附體者有收斂神氣之功焉然主治皆不異于茯苓也後人治心病必用茯神然茯苓亦未嘗不治心病也陶弘景始言茯苓赤瀉白補李杲復言赤入丙丁白入壬癸此能發前人之秘者時珍則謂茯苓茯神只當云赤入血分白入氣分各從其類不當以丙丁壬癸分也若人膀胱炁又毒風攣痛有松節散用茯神忘中木一名黃松節一兩同乳香二錢石器砂研爲末每服二錢木瓜酒下善治風寒冷濕搏于筋骨足攣難走之病

製忌同白茯苓

琥珀 三百廿七 甘平陽中微陰降也入手少陰太陽亦入足太陰厥陰經血分安神而定魂魄清肺而利小腸磨翳障而光明破結瘕而消瘀療金瘡蠱毒止心痛顛邪

按琥珀乃松脂之精液入地千年而凝結成者屬陽與金沿榮而入血分味甘色赤有良止之義故能安神定魄乃心與小腸表裏部藥也有下注之象丹溪言古方用爲利小便而燥脾土有功脾能運

化。則肺氣下降而小便可通。別說云。茯苓生成于陰。
于陰者也。故皆主安心利水而治燥。若因血少而小便不利者。反致燥
急之苦。金瘡者。惟患其血逆于膀胱。能止之和之。則
未有不瘳者也。然滲利之性。大不利于虛人。尤陰虛
內熱火炎水涸者。勿服。用水調側栢子末。安瓷鍋
中。同珀爇之。搗粉篩用。今市家多煮鷄蛋及青魚枕
造成。不可不細察也。秘傳防龍治癖膏。琥珀。麝香。朱
藥。珠。各一兩。阿魏。蘆會。各四
香。丁香。各二兩。先將生地熟
地。骨皮。黑白二丑。牡丹皮。肉蓯
蓉。破故紙。牛膝子。吳茱
萸。生烏梢骨。碎。補成靈仙。馬鞭草。凌霄花。枸杞子。玄

胡索。金銀花。大茴香。天花粉。側栢葉。蕳草。澄茄。萊菔子。
黃連。柴胡。何首烏。五加皮。過山龍。草果仁。牛膝。木鱉
子。草蔻。白朮。乾山藥。車前子。蒲公英。五靈脂。山楂仁。
水紅花子。檳榔。蓬朮。桃仁。紅花。澤瀉。枳殼。枳實。青皮。
百部。玄參。朴硝。前胡。貫仲。地榆。貝母。半夏。黃芩。續斷。
川烏。川椒。蒼朮。良薑。虎骨。當歸。厚朴。肉桂。陳皮。甘草。
防風。藿香。川芎。薑黃。仙茅。秦艽。杜仲。麻仁。黃芪。天麻。
石斛。沙參。南星。三稜。遠志。木通。砂仁。蘇子。大黃。蟅蝑。
皮硝。烏藥。甘遂。桔梗。香附。乾葛。白芷。連翹。蘇木。皂角。
各一兩俱切片。合一處。用麻油二十六斤。浸春夏六
日。秋冬十日。桑柴慢煎。候藥枯黑。濾查再煎。手執桃
柳榆槐枝。不住手攪。徐徐投下東丹。如油十斤。丹五
斤。煎至滴水成珠。去火候溫。徐
紂上臨貼。少加鱉甲灰。先服後方。然後貼膏。大參三
分。當歸。黃連。沙參。黃芪。白朮。各一
錢。陳皮八分。甘草
五分。柴胡四分。水二鍾。生薑一
片。大黑棗三个。同煎
患在中。加貝母半夏各五分。竹瀝一小鍾。在右。加山
查。萊菔子。神麴。麥芽各五分。在
左。加赤芍。紅花。桃仁

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号　特7-494
ガラス使用

各五分。有瘀。加卉夏。大便燥。加黃芩。桃仁熟。大黃。心下痞悶。加白芍。腹脹。加砂仁五味白芍。天寒。加乾薑。桂心。中寒。加附子。嘔吐。加陳皮生薑。冬月。加丁香藿香。能食而心下痞。加枳實青皮各五分。神驗。

豬苓 三百廿八 甘苦淡。平。氣味俱薄。降也。陽中陰也。入足太陽少陰經。瀉膀胱。分消水腫。開腠理。除濕。治淋。利白濁。帶下。解結秘暑溫。本經主痎瘧。蠱毒。暑必兼濕。淡以利竅。引暑濕之氣。從小便出。所以分消之也。按豬苓。稟戊土之陽。得風木之陰。利竅引水。無如此駛。音快升而又能降。大能走浚精氣。諸藥性。皆曰甘能助陽。豈眞味甘而有助哉。或謂其止遺精者。正謂脾家流濕入腎。因而滲泄。用之于滲濕藥中。遂能中病止遺耳。非眞能補腎也。然亦不下虛者皆不可用。蓋有可主劑。但可佐澤瀉而已。損而無益者也。今之吐瀉藥。俱用五苓散。皆謂脾之濕。賴豬苓澤瀉以去之。似爲脾胃藥也。不知二味。消水固能燥脾。水盡則反損腎。昏目。故不入補劑也。有濕者宜暫用。無濕症者。勿服。在白芍藥。白茯苓。人參橘皮。白朮澤瀉。治水腫之屬陽分者。在白芍生地。桑寄生。桑白皮。茯苓。澤瀉。琥珀。石斛。苡仁。肉桂。治水腫之屬陰分者　產衡山。作塊類豬糞。皮黑肉白而實者佳。水浸去皮。蒸晒行濕生用爲妙。

【雷丸】三百廿九　味苦鹹寒有毒氣薄味厚陰也降也入手足陽明經殺藏府諸蟲除嬰兒積病治熱結蠱毒療癲癎狂走按雷丸乃竹之餘氣得霹靂而生故名雷丸本經稱利丈夫別錄云久服陰痿似乎相反不知利者疎利也疎利太過則閉藏失職故陰痿也除殺蟲之外無他長產建平江寧大小如栗皮黑肉白甚堅實以竹刀刮去黑皮破開甘草水浸一宿酒拌蒸晒或炮用厚朴芫花爲之使惡葛根

【桑寄生】三百十　甘平入足厥陰經治懷妊漏血理腸氣生桑寄生搗汁服之崩中助筋骨除風濕按桑寄生感桑之精氣而成不寒不熱比桑尤勝除風濕益血脉之劑也故本草稱其主腰痛去風痺健筋骨固胎氣小兒背強癰腫之證或言鳥啄他子遺樹而生者非也眞者極難必連桑枝採者乃爲可用別樹生者殺人然吳中諸邑不可得必海外深山地煖不蠶桑無枝採之苦故多可取其葉圓而微尖厚而柔面青而光澤背淡紫而有茸斷其莖色深黃者爲眞

【竹葉】三百一　味淡甘寒陰中微陽可升可降入足陽明

每花顛

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号　特7-494
ガラス使用

手太陰少陰經。滌心經之煩熱。止氣逆之嘔吐。降肺氣解熱狂。按竹葉禀陰氣以生。種類甚多。惟味甘者爲勝。必生長甫及一年者。嫩而有力。然損氣之物也。所以古人以箬爲刮腸篦。脾虛洩泄者勿用。其用有二。除新久風邪之煩熱。止喘促氣生中半以上。故主治多在上焦。味苦者專瀉南方。上氣發熱。因奔走趁馬後。飲冷水所致者。竹葉爲君。同橘皮煎服。入藥。惟用篁竹爲上。堅而促節。體圓而質勁。皮白如霜。次用苦竹淡竹。肉薄節間有粉。今人呼爲水竹者。是也。又有薄殼者。名甘竹。餘不入藥。又

一種草類亦名淡竹葉。利小水。治喉痺亦効。見草部。

竹茹　三百二十味甘微寒。陰也。可升可降。入足陽明經。降氣逆而嘔噦（音訣）與噎膈皆平。下熱壅而勞復與血衄皆治。本經主溫氣寒熱者。邪氣客陽明所致。甘寒解陽明之熱。則邪氣退而嘔噦止矣。按竹茹。雖與竹葉同本。然其得土氣俱多。故能除土鬱。味帶甘。能降火清肌。主胃熱飽逆。經曰。諸嘔吐酸水。皆屬于熱。陽明有熱。則爲嘔噦。同木瓜橘皮麥冬枇杷葉人參蘆根汁石斛。則嘔噦可止。胃寒嘔吐。及感寒挾食作吐

忌用　刮去青皮用第三層
竹瀝三百卅三味甘氣寒陽中之陰可升可降入手太陰
足少陰太陰經痰在皮裏膜外者直達以宣通痰在
經絡四肢者屈曲而搜剔滌藏府之煩熱除陰虛之
大熱失音不語偏宜癲狂風痙決用　按竹瀝即竹
之津液也性滑流利走竅逐痰故爲中風家要藥凡
中風之證莫不由于陰虛火旺煎熬精液而爲痰壅
塞氣道熱極生風以致猝然僵仆此藥能搜剔經絡
痰結氣道通利則經脉流轉矣觀古人以此治中風
則知中風未有不因陰虛痰熱所致不然如果外來
風邪安得復用此甘寒滑利之品世人泥本草大寒
二字棄而不用經云陰虛則發熱竹瀝甘緩故能除
陰虛之有大熱雷曰火鴻心煩宜授竹瀝然非助以薑汁不能行
既經火煅又助薑汁制寒之有哉震亨曰人自幼食
筭以至衰年未見有因其寒而病者豈瀝非爭之液
乎淮陰子云槁竹有火不鑽不然則竹性雖寒亦未
必大寒也但實痰而能食者用荊瀝虛痰而不食者
用竹瀝更玩丹溪產後不得虛胎前不損子二語益

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号 特7-494
ガラス使用

知陰虛之病古方中無不用也天抵風火燥熱而有痰者宜之。竹瀝卽竹液。猶人身之血也。極能補陰。長于清火。況陰之不足。猶于火爍。血得其養而火有不寧靜哉。朱氏謂大寒言其功。不言其氣。殊謬。謂大寒爲氣。何害于功。昔姜公服竹汁餌桂。得長生。蓋竹汁性寒。以柱濟之。亦與用薑汁佐竹瀝之意相同。胃虛腸滑之人。及寒痰濕痰。及食積生痰者。不宜餌也。將竹截尺許。劈開。架空。下以火炙。其瀝自出。盛器用。

天竹黃 三方 四冊 味甘。氣寒。入足少陽手少陰經。祛痰解風熱。鎮心除驚癎中風失音不語。天弔客忤皆毆。按天竹黃。乃竹之津氣結成。今諸竹內往往有之。卽竹內所生。如黃土着竹成片。若善能涼心經。去風熱。豁痰利竅。氣味功用與竹瀝相倣。除小兒驚癎痰熱外。無別用。久川亦能寒中。生南海鋪竹中。此竹極大。又名天竹。本草作天竺。生天竺國者非。今人多燒諸骨及葛粉雜之。須辨。附秘授止痢奇方。天竹黃一兩。星。各二兩。蘆會五錢。麝香三錢。沈香五錢。先將茯苓。杏仁。赤石脂。罌粟殼。蜜炙。訶子。麵包煨。黃連。薑汁炒。黃芩。酒炒。肉果。麵煨。黃連。薑汁炒。枳殼。麩炒。白芍。酒炒。乾山藥。蒸。米仁。炒。草果。煮。木瓜。酒炒。厚朴。薑汁炒。陳皮。山查肉。鳳仙子。車前子。豬苓。木通。澤瀉。酒炒。白术炒。砂仁。炒。神麯炒。麥芽炒去殼。肉桂。當歸。酒炒。益智。蘇木。蒲黃炒。黑白丑炒。甘松。三柰。柴胡。酌。栗子炒。各二兩。晒乾。用麻油三十五斤。浸。春夏六。秋冬十日。藥

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号　特7-494
ガラス使用

乾加油煎藥至枯黑去杏再煎濃徐徐下東井十七斤桃榆柳槐枝不住手攪至滴水成珠去火候溫方下前細藥同收

荊瀝　三百　味甘氣寒陰也降也去心胃之煩熱化經絡之風痰治心頭濕濕欲吐理頭風旋運目眩

荊瀝化痰去風之妙藥也陶弘景言其治心風爲第一延年秘錄云熱多用荊瀝寒多用荊瀝並以薑汁助送則不凝滯但氣虛不能食者用竹瀝氣實能食者用荊瀝若胃弱者不宜進也

〔葉〕味苦寒治下部濕蘚癰腫癬氣腫滿用荊葉于堀中燒熏通泉穴及痛處汗出則愈

出李仲南永類方

〔根〕味甘苦辛溫有解肌發汗之功而世無知者考王氏奇方一人病風數年以七葉黃荊根皮同五加皮接骨草等分煎湯日服遂愈

荊莖治灼瘡發熱又青盲內障者春初取黃荊嫩頭九蒸九晒半斤用烏骨雞一隻以米飼五日盡淨皈上再飼以大麻子二三日收糞入瓶內熬黃和荊頭爲末煉蜜丸米飲下　此卽今荊杖之荊也取新採荊莖截尺許架兩磚上中間火炙盛兩頭流滴加薑汁傳送每瀝一杯加薑汁二匙

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号 特7-494
ガラス使用

特
7
10
494

古槻板 三百廿六 主鬼氣中惡腹痛。療夢悸邪祟所撓。
接古槻板。卽古塚棺木也。小兒夜啼以朽者燒明照
之。卽止若患前症以水酒和東引桃枝煎服。當得吐
止。彌古者佳。杉材最妙。

震燒木 三百廿七 掛門戶。火災能厭。煮汁服。治火驚心。
按震燒木。卽雷所擊之木也。方士取刻符印以召鬼
神甚奇。博物志云。用擊烏影。其烏自墮。

本草匯卷十六　終

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号　特7-494
ガラス使用



ガラス使用
国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻』　請求記号 特7-494