

嬰粟舍利別 三 枯夫亞浸 四
右調勻、每服一食匕、日三次

腹水腫 即脹滿

○方 〔選〕 主治腹水

炭酸安汶尼 一 或半 硝酸 適宜、飽和為度

蒸餾水 二 蜀葵舍利別 一 或半

右先合前二味、令飽和、加後二味調勻、每二時、服一食匕

○方 〔選〕 主治同前

海葱醋 一 炭酸安汶尼 適宜、飽和為度

蒸餾水 四 旃那舍利別 一

右調勻、每二時、服一食匕

○方 〔選〕 主治間歇性水腫

赤幾那皮 五 孕蓬酒石 半

茴香油糖 半

右為散、每服一劑、一日二三次

○方 〔選〕 主治水腫、因于蒸氣壓閉者

醋酸加里 半 洋芹水 五 民埋列里精 半

安質沒酒 二 海葱醋 一

右調勻、每二時、服一食匕

○方 〔選〕 主治水腫之原、不明者

寶菱塔利末 海葱末 各一

杜松子油 二 孕蓬酒石

甘草末 各一 桂皮末 二

右為散、每服半劑、一日二次

○方 〔選〕 主治同前

寶菱塔利葉 十二 浸出 孕蓬酒石 半

取液 五 甘草舍利別 半

右調勻、每二時服一食匙

○方〔經〕 主治同前

的列並油

石鹼

大黃 各一匙

單舍利別 適宜

右為〔經〕 藥、每服一茶匕、一日二三次

○方〔經〕 主治同前

杜松子 洋芥子

茴香 各細剉者 二匙

右以水三合半煮、取二合半、一日服

○方〔丹〕 主治水腫、因于心、肝、或腹膜之病者

醋酸加里 百二十

海葱舍利別 六匙

甘硝石精 三匙

實麥答里丁幾 半匙、至一匙

金雀花榨汁 六匙

水 八勺

右調勻、每六時、或八時、服六分之一

○方〔丹〕

杜松子精 四匙

酒石英 一勺

金雀花煎 十二勺

右調勻、每服六分劑、一日三次

○方〔丹〕

海葱末 六勺

實麥答利末 八勺、至十二勺

水銀丸 三十丸

右為十二丸、朝夕各取一丸、以金雀花煎一

盞送下

○方〔經〕 主治腹水

海葱 半匙、至二匙

實麥答利葉 一勺

右水浸、取液八勺、每一二時、服一食匕

○方〔經〕 主治各性腹水腫

瀉利塩 半勺、一勺、至二勺

酒石英 二匙、半勺、至一勺

熱湯 六勺、或八勺

右調勻、每二時、服二食匕、或三四次、分服

○越刺的留謨飲〔丹〕 急性水腫、無蛋白尿者

民垣列里精 九匙
越刺的留謨 一匙
薑舍利別 三匙

右調勻、每二時、取二茶匕、水一盞、和服

○越刺的留謨丸 每 主治水腫、要瀉下者

越刺的留謨 一匙
實斐答利斯 二匙至四匙

童胆越幾 十二人

右為四丸、每夜、服一丸

○刺篤比里丸 每 主治同前

刺篤比里脂 六人
薑末 二十人

為刺巴脂 十人
實斐答利斯 三人

菲阿斯越幾 十四人

右為十二丸、隔夜臨卧、服二丸

○方 選 利水劑無効者

藤黃 海葱 實斐答利葉

金硫黃 地榆越幾 各半匙

右調勻、二丸為一丸、每二三時、服一丸

○方 選 主治同前

藤黃 護謨安沒尼亞幾

硫酸加里 各一匙
蘆薈水製越幾 二匙

右調勻、一丸為一丸、每服四丸、一日二次

○方 選 主治同前

巴豆油 二滴 藤黃

格魯董篤越幾 各半
蜀葵根末 適量

右為八丸、每朝、服一丸

○藤黃蘆薈水銀丸 每

複方藤黃丸 五丸
水銀丸 三丸

右為二丸、朝夕用

○方 選 主治腹水腫

藤黃 為刺巴末 各一匙

右為一丸、每服三丸、至四丸、日三次

○方 主治水腫

過泥子越幾 海蔥末 藤黃 各二

右研和、二丸為一丸、每二三時、服一丸

○甘汞藥刺巴散

甘汞 五丸 根方藥刺巴散 廿丸、至

右為散、臨卧頓服、或分二包、朝夕、服一包

○方

甘汞 二丸 大黃末 二十

薑末 四丸 藥刺巴脂 二丸

右為糊丸、臨卧頓服

○方 主治水腫下劑

蘇甘沒扭 十丸 甘汞 六丸

香薷散 十丸 吐根 三丸

右為散、製劑六個、日服二劑

○方 主治腹水腫

蘇甘沒尼 四分 藥刺巴末 三分

生薑 一分

右為散、每服十丸、日二三次

○方 主治同前

格魯董篤 一匙、浸出 茴香油糖 半勺

右調勻

○巴豆丸 主治腹水 方出丁

○方 主治水腫兼便秘者

藥刺巴末 薑末 各一匙

酒石英 三匙 橙皮舍利別 適宜

右為散、劑每服一茶匕、日三次

○藥刺巴海那劑 主治水腫

複方藥刺巴散 半匙、至 海那舍利別 一匙

龍腦水 十五匙

右調勻、早朝頓服

○藥刺巴丸 〔丹〕 主治水腫及肝病

藥刺巴脂 三人

菲阿斯越幾 二人

右為一丸、臨卧用、翌朝服、複方梅那浸

○硝砂合劑 〔丹〕 主治水腫、因肝變質者、及黃疸

硝砂 二十人

蒲公英越幾 十五人

複方竜胆丁幾 一人 梅那浸 二人

右調勻、每服一劑、日二次、或三次

○實斐答利剝亞斯水 〔丹〕 方出心

○實斐答利海葱劑 〔丹〕 方出

○實斐答利海葱丸 〔丹〕 方出

○尿素劑 〔丹〕 方出

○方 〔丹〕 主治腹水、因心臟病、或像麻質者

煙草葉 二錢

沸湯 一山

右密閉浸漬、取液四勺、加銳烈燒酒二錢、每服四十滴、五十滴至二百滴、一日二次

肝臟充血

○病院白飲 〔丹〕 主治虛性肝充血初期、及肝臟

嗽衝 方出于

○硫酸芒硝水 〔丹〕 主治同前 方出于

○蘆薈梅那瀉利塩劑 〔丹〕 肝充血 方出于

○鹽製下劑 〔丹〕 主治同前 方出于

○硝酸梅那蒲公英飲 〔丹〕 主治肝充血後期、及

虛性肝充血 方出于

○安波尼大黃劑 〔丹〕 主治同前

硝砂香竄精 四錢 大黃丁幾 二錢

大黃浸 八錢

右調勻、朝夕服六分劑一

○竜胆越的兒大黃劑 〔丹〕 主治同前 方出于

○安息香酸安沒尼劑 每 主治肝臟充血、兼小

便稀少者 方出于慢性 氣管支炎

○甘汞下劑 每 主治慢性肝臟充血、及肝臟

衝 方出于 腦液衝

○芒硝蒲公英劑 每 主治實性肝充血 方出于 腫腸

○蘆薈那那刺巴劑 每 主治同前 方出于 痛風

○亞爾加里下劑 每 主治同前 方出于 頭痛

○瀉利塩劑 每 主治同前 方出于 癰疽

○酸性格倫僕合劑 每 主治同前

格倫僕丁幾 六克 芳香硫酸 一克半

橙皮舍利別 一克 橙皮浸 八克

右調勻、每服六分劑、一日三次

○硝塩酸合劑 每 主治同前 方出于 胃弱

○方 慢性肝充血、因心病、或肺患者

實麥谷利斯葉 二十八

右浸出、取液六克、或八克、為一日量

○綠藜蘆丁幾 每

右取十二滴至二十滴、為一日量

肝臟液衝

○方 肝臟衝初期

答麻林度 一克 純精酒石 半克

覆盆子舍利別 適宜

右調和、為散劑、朝夕、各服二茶匕

○方 主治同前

硝石 半克 純精酒石 六克 白糖 半克

右為散、每服一茶匕、日二三次

○方 肝臟衝終期

甘汞 金硫黃 各一克

失馮答葉末 六分 白糖 半斤
右為散製劑八個朝夕各服一劑

○方 慢性肝淤衝及硬結
甘汞 六分 菲阿斯越幾 一分

失馮答越幾 半斤 大黃末 半錢
右為三十九丸每三時服一丸

○方 鹽酸 二錢 水 八分 覆盆子舍利別 二分
右調勻每一時取一匕冷水和服

○方 慢性肝淤衝及肝硬結初起
蒲公英越幾 白屈菜越幾 各一錢

純精酒石 半斤 迷栗薩水 四分
右調勻每二時服一食匕

○方 硝砂 一錢至二分 水 八分 甘草越幾 半斤
右調勻每二時服一食匕

○方 右調勻每服一食匕一日用

○方 肝臟結締織淤衝 即粒狀復性又肝硬結
炭酸麻偪涅失 二分 大黃末 一錢

藥刺巴末 半錢
右為散每服一匙布匕日二三次

○方 杜松實傑列乙 半斤 海慈越幾 十斤
右調勻每服一食匕

○方 焯酸曹達 半斤 覆盆子水 五分
滿那舍利別 一分

○方 右調勻每二時服二匙布匕

○方 剝篤比里丸 每 主治同前 方出于尿毒症

○方 主治同前

○方 主治同前

○方 主治同前

○刺篤比里涅 半八至一八 甘草末 一八

右為散分二服每夜臨卧一服

○下泄煉劑 丹 主治同前 方出于痔疾

○又方 丹 主治同前

梅那煉劑 二 蘇甘沒拉煉劑

薑舍利別 各一 加糖炭酸鍊 二百二十

右調勻每朝服一茶匕

○擬製蛤兒斯鑛水 丹 主治同前 方出于痛風

○沃度加里合劑 丹 惡性肝硬結 方出于痛風

○規尼沃度鐵劑 丹 主治同前

規尼丁幾 一 沃度鐵舍利別 三至六

格綸僕浸 八

右調勻每服六分劑一日三次

○沃度鐵合劑 丹 主治同前 方出于風濕

○硝塩酸合劑 丹 主治同前 方出于胃弱

○方 湯 肝腫瘍

硫酸規尼 一八 百爾蘭獨留謨

乳糖 各半

右為散製劑八個每二時服一劑

○方 丹

規尼丁幾 大黃丁幾 忽布丁幾 各四

右調勻取一茶匕水一盞和服日二次

○方 瓜 肝臟硬結

赤沃汞 五八 硫酸越的兒 半

右溶和每服四滴至六滴日二次

○水銀軟膏 一

右為塗擦劑

○方 丹 主治同前

水銀軟膏 二 沃度加里 二八至四八

右混和塗擦

○硝鹽酸脚湯 肝脾慢性炎衝

鹽酸 一錢 硝酸 三錢

右調勻取適宜為脚湯

○沃實丁幾半錢慢性肝炎衝

右以毛筆塗擦于肝部

○解凝軟膏錢主治同前方出于腺病

脂肪肝

○方證

蒲公英越幾一錢 酒石英二錢

大黃丁幾半錢 薄荷水一錢

蒸餾水二錢 薄荷舍利別半錢

右調勻每二時服一食匕

○方證

蘆根越幾

蒲公英越幾各三錢

孕礬酒石半錢 薄荷水 蒸餾水 各二錢

右調勻每服一匕日四次

○方證

蒲公英越幾 石鹼 護謨安汶尼亞幾

大黃末各一錢 蘆薈一錢

右二丸為一丸衣石松子末朝午夕服四丸

○方證

孕礬酒石半錢 梅那浸四錢以二錢是取也

大黃舍利別一錢

右調勻每二時服一匕

肝臟肥蟲

○方證

沃度加里 一匙 水 四匙 橙皮舍利別 半匙
右調勻、每服一匕、一日三四次

○方 罇

沃度加里 一匙 蒸餾水 六匙

右溶和為膏法

○方 罇

鹽酸曹達 二匙 泉水 適量

右為膏法

○水銀軟膏 二匙

右塗擦于肝部

急性肝萎縮 又發黃熱

○方 罇

甘草 十二匙 葯刺巴末 半匙 白糖 一匙

右為散分八服、每二時一服

○方 罇

巴豆油 一滴 蓖麻子油 二匙

亞刺比亞末 一匙 蒸餾水 四匙

扁桃舍利別 一匙

右調勻、為乳劑、每一二時服一匕

○方 抑制腸內出血

明礬 二匙至五匙 乳糖 半刀

右為散、製劑十二個、每服一劑、日四次

○方 胃腸刺衝機敏銳者

醋酸莫非 十二分至八分 乳糖 半刀

右為散、製劑八個、朝夕各服一劑

○方 主治發黃熱

稀鹽酸 一匙至二匙 蜀葵根煎 或泉水 八匙

覆盆子舍利別 一匙 或單舍利別 一匙

右調勻、每二時服一食匕

○方 元氣沈衰者

幾那皮 半多、以水八 橙皮舍利別 三匙

右調勻、每二時服一食匕

○方 鑑

巴豆油 一滴至 亞刺比亞末 半多

泉水 四多 非阿斯越幾 五人至

右調勻、為灌腸劑

慢性肝臟萎縮

○牛膽丸 西方出

○規尼吐根丸 于胃弱

○規尼大黃丸 于頭痛

○蒲公英硝酸劑 丹 主治肝病、無炎候者

稀硝酸 一匙

蒲公英搽汁 六匙

蒲公英煎 八多

右調勻、每服六分之一、日三次

○硝酸浴湯 丹 主治肝機虛衰者

硝酸 一多 鹽酸 一多 至 溫湯 三十

右調勻、為浴湯

○又方 丹 主治胃弱、兼肝機變常、及便秘者

硝酸 四多 鹽酸 一多 溫湯 四瓦

右調勻、為脚湯

膽石

○需蘭度氏破石方 鑑

硫酸越的兒 三匙 的列並油 二匙

右調勻、每服六滴、至二十滴、日二三次、或每

朝取半匙肉羹汁和服

○的列並飲 主治胆石 方出慢性胃喉

○亞爾加里下劑 主治同前 方出于頭痛

○磷酸曹達蘆薈劑 主治同前 方出于痛風

○莫非飲 主治膽石痛

鹽酸莫非水 十五密至三十密 呀囉吩精 一匙同三密

忽氏鎮痛液 三十密 葭若丁幾 二十密

複方益智丁幾 一匙 水 一弓半

右調勻每二時服一劑至疼痛止

○葭若塗劑 主治同前

葭若越幾 百二十 罌粟殼越幾 二弓

罌粟殼舍利別 一弓

右調勻塗擦于肝部

○莫非注入方 主治同前 方出于神經痛

○亞篤魯非注入方 主治同前 方出于神經痛

黃疽

○方 黃疽因膽管加答流者

酒石英 一弓煮令溶 覆盆子舍利別 半弓

右調勻每二時服二匕

○方 厄 主治同前

大黃丁幾 一弓半 護謨漿 一弓

右調勻一日用

○方 燈 主治同前

蒲公英 半弓水煎 白屈菜越幾 二匙

失格列乙加大黃舍利別 半弓

右調勻每二三時服一匕

○方 扶 主治同前

蒲公英越幾 白屈菜越幾 各一匙

孕驗酒石 二錢 大黃丁幾 半錢

薄荷水 一斗 蒸餾水 二斗

薄荷舍利別 半錢

右調勻、每三時服一食匕

○方 醫 主治同前

苓麻林度 半錢 水煎 磷酸曹達 半錢

林檎舍利別 二錢

右調勻、每二時服一二匕

○皇水里沒奈埵 選 黃疽因肝病者 方出于 刺街熱

○方 醫 初生兒黃疽

失格列乙加大黃舍利別 一錢

右每服一匙布匕

○方 醫 主治同前

螻蛄石 一刃 茴香水 一斗

大黃丁幾 滿那舍利別 半錢

右調勻、每二時服一茶匕

○酒石蒲公英飲 再 主治黃疽、不係肝炎、及肝

管壅塞者

酒石英 一 蒲公英越幾 半 蒲公英煎 八

右調勻、每服六分之一、日三次

○方 醫 主治黃疽

蘆薈越幾 一錢 大黃末 半錢

蒲公英越幾 一錢 蜀葵根末 適宜

右為六十九丸、朝夕各服三丸、至四丸

○方 醫 黃疽、善便秘者

牛膽 石鹼 大黃末 各一錢

蒲公英越幾 適宜

右研和、二以為一丸、朝夕各服十九丸

○牛膽丸 再 主治黃疽、及膽汁缺乏 方出于 癰疽

○剥篤比里丸 再 主治黃疽、因膽汁分泌過止

者 方出于
尿毒症

○磷酸曹達蘆薈劑 〔丹〕 主治黃疸、因膽石者出方
于痛 風

○安息香酸丸 〔丹〕 主治黃疸、因肝機壅閉者出方
于尿 毒症

○硝酸銀丸 〔丹〕 主治黃疸、因十二指腸疾患者
方出于慢 性胃炊衝

○方 〔疾〕 黃疸、因于肝藏硬結者
葇荳根 一匁 大黃 五匁 白糖 一匁

右為散、製劑八個、朝夕各服一劑

○方 〔瘧〕 主治黃疸
皇水 二匁

右為脚湯

脾病

○方 主治肝及脾炊衝

孕蓬酒石 半匁

泉水 六匁

枸橈油糖 一匁

答麻林度 一匁

右調勻振盪、每二時服二食匕

○鐵砒石劑 〔丹〕 主治脾病

磷酸鐵舍利別 二匁

砒酸曹達水 三十密

右調勻、取一茶匕、和水一盞、午晚食後用

○方 〔毒〕 主治脾腫

溴素加里 十二匁

桂皮水 五匁

右調勻、每服一食匕、日三次

○溴素加里劑 〔丹〕 主治脾臟肥大 方出于
癩癩

○安汶尼亞大黃飲 〔丹〕 主治間歇熱後脾肥大
方出于依 卜昆埕兒

○規尼大黃丸 〔丹〕 主治同前

硫酸規尼 二丸 忽布越幾 五丸

複方大黃丸 三丸

右調勻為二丸每日午餐後服之

○方 燈 主治瘡母

硫酸規尼 十五丸 次實鐵 一匙

菖蒲根越幾 半匙 甘草膏 適宜

右為三十九丸每服二丸日三次

○方 燈 主治瘡疾及慢性瘡母

硫酸規尼 十丸 炭酸鍊蜜煉 一匙

芳香散 適宜

右為三十九丸衣桂末每服四丸日三次

○方 燈 主治瘡母

桂支水 四号 單尼酸 半丸至一丸

橙皮舍利別 三匙

右調勻為一日之量

○硝鹽酸脚湯 慢性脾狀衝 肝狀衝 方出于

脾狀衝

○方 急性脾狀衝

蒲公英越幾 三匙 酒石英 半号

蒸餾水 四号 老利兒水 一匙

右調勻每二時或三時服一食匕

○方 主治同前

老利兒水 一匙至二匙 覆盆子水 一号半

覆盆子舍利別 半号

右調勻每服一茶匕日四次

○方

珊篤里越幾 蒲公英越幾 各一匙

酒石葉液 半号 老利兒水 一匙

黑櫻實水 四勺 大黃舍利別 半勺

右調勻、每服一茶匕、日四次

○硝鹽酸脚湯 脾焮衝 方出千 肝焮衝

泌尿器病

腎焮衝

○甘汞下劑 越 腎外被焮衝 方出于 腦焮衝

○方 急 急性腎焮衝

蜀葵根 二錢、水煎 阿芙蓉丁幾 十滴至 三十滴

桂皮舍利別 半勺

右調勻、每服一食匕

○方 重 腎焮衝、及膀胱焮衝

甘扁桃 白罌粟子 各搗碎 泉水 一廿 者 半勺

亞刺比亞末 三匙 過爾托舍利別 半勺

○方 急 慢性腎盂炎

烏華烏爾失葉 半勺、加泉水適宜、煮四 分時、濾過、取液六勺

桂皮舍利別 半勺

右調勻、每二三時、服一匕

○石灰水 二勺 主治同前

右每服取一食匕、牛乳、或乳清一碗、和服

○方〔鑑〕 主治同前

刺答尼根 二匙、水煎 取液六分 橙皮舍利別 半分

右調勻、每服一食匕

○方〔鑑〕 慢性腎炎、兼衰弱及滋養不給者

幾那皮 半匙、水煎 取液六分 桂皮舍利別 半分

右調勻、每服一食匕

○方〔鑑〕 慢性膿膿腎炎

單寧 六分 白糖 半分

右為散、分六服、朝夕、各一服

○方〔鑑〕 主治同前

明礬 一分 血竭 六分

右為散、分六服、朝夕、各一服

○方〔鑑〕 膿膿腎炎、兼出血者

鹽酸鍊液 半匙 蒸餾水 四分

右調勻、每二時、取一匙布匕、糖水一盞、和服

○方〔鑑〕 主治腎、輸尿管、膀胱、及尿道慢性炎

拔爾撒骨拜霍 或的列並油 一分

右每服十滴、十五滴、二十滴、至三十滴、白糖

或冷水和服、日二次、至三次

○參兒水〔鑑〕 主治同前

右每服一二分、一日量十二分、至二十四分

○方〔鑑〕 主治腎病

結列阿曹篤 一分 蜀葵末 甘草膏 各適

右為六十九丸、每服一二丸、日三次

○水銀軟膏〔鑑〕 急性腎液衝

右外用

貌麗篤病

急性貌麗篤病

○方 鱉 主治急性貌麗篤病

菩提樹花 二錢浸出 取液四錢 吐酒石 一錢

單舍利別 三錢

右調勻、每三時服一匕

○方 鱉 主治同前

托弗兒散 十八人至 三十人 白糖 半匙

右為散分六包、每服一包、日二三次

○方 鱉 主治同前

接骨木花水 六錢 民埏列里精 半錢

蜀葵舍利別 二錢

右調勻、每一時服一匕

○硝石吐根劑 每方出于 加苓流 主治同前

○枸橼酸加里安沒尼劑 每方出于 肺嫩衝 主治同前

○方 糖 主治同前、兼便秘者

旃那葉 一錢浸出 取液三錢 蒲公英越幾 半錢

右調勻、每二時服一食匕

○病院白飲 每方出于 尿毒症 主治同前

○葯刺巴旃那劑 每方出于 尿毒症 主治同前

○剥篤比里丸 每方出于 尿毒症 主治同前

○攝度律多散 每方出于 于充血 主治同前

○越刺的留謨飲 每方出于 于腹水 主治同前

慢性貌麗篤病

○巴豆丸 每方出于 于腹水 主治慢性貌麗篤病、發腎臟粒狀

變性者 每方出于 于腹水

○方 鱉 主治同前

格魯董篤越幾 一錢 蘆薈越幾 二錢

非阿斯越幾 半錢

右為六十九、末石松子末、每日服一丸

○方 鱉 主治同前、發水腫者

藤黃

實叟峇利葉

海葱

杜松子越幾

各二十

右為六十九丸、每服一九、一日二三次

○方 主治同前

酒石英

半 水六

杜松實傑列乙

半

右調勻、每服一食匕

○方 主治同前

杜松子油

實叟峇利下幾

各半

甘硝石精

一匙

右調勻、每服十滴、至二十滴、日二三次

○方 主治同前

加應加根

三匙、水煎

格爾失屈實丁幾

一

接骨木子傑列乙

半

右調勻、每服一匕、日三次

○方 主治同前

刺發斯根

半、水煎

格爾失屈醋蜜

半

右調勻、每服一食匕

○方 主治同前

杜松實

半、浸出

酒石葉液

海葱舍利別

各半

右調勻、每一時、服一七

○方 主治慢性乳糜病

單寧

一匙

蘆根越幾

適宜

右為百二十九丸、每服四丸、日三次

○方 主治同前

單寧酸

六

白糖

一匙

右為散、分六服、每二時、一服

○方 主治同前

稀硝酸

二匙

覆盆子舍利別

二

右調勻、每服一匙、布匕

○方 蠶 主治同前

安息香華 一匁 白糖 一匙

右為散分六服或四服

○方 罌 主治同前

明礬 半匙至一匙 白糖 二匙 淨水 六匁

右調勻每一時服一食匕

○方 鐵 主治同前

沃度加里 二匙 水 十二匁

右調勻朝夕服一食匕至二食匕

○沃度加里合劑 每 主治豚肉狀腎疾因于微

毒者 方出于痛風風濕 振癢甲狀腺腫

○沃度鐵合劑 每 主治同前 方出關節病 甲狀腺腫

○沃度鐵肝油劑 每 主治同前 方出于 腺病

○方 論 主治同前

沃度鐵 鐵粉 各半 蜂蜜 適量

右為二十九丸朝夕各服一丸

○酸性幾那合劑 每 主治慢性貌麗篤病發粒

狀腎者 方出于腫瘍關節病 熱斑病癰腫

○撒里失涅劑 每 主治同前 方出于 間歇熱

○鐵百布失涅丸 每 主治同前 方出于 貧血

○肝油 每 主治同前 方出于 失聲

○方 登 主治發瘧者

葛苣水 四匁 越的兒舍利別

橙花舍利別 各三 薄荷油 五滴

麝香 十三匁 氏埤列里精 二匙

右調勻每二時服一匕

○方 登 貌麗篤病

迷栗薩精 拔爾撒謨

龍腦精 各一匁 硝砂精 二匙

右調勻為擦劑朝夕塗擦遍身

小兒貌驟篤病

○安質母吐根飲 丹

安質沒尼酒 七十 吐根酒 二錢

覆春花舍利別 三錢 氏埜列里精 二錢

水 六錢

右調勻、每二時服一小食匕、二三歲兒服量

○方 天

吐酒石 一錢 蒸餾水 四錢 覆盆子舍利別 二錢

右調勻、每二時服一茶匕

○方 援

實芟荅利葉浸 以十八至二十四

酒石英 三錢 海葱醋蜜 二錢至半錢

右調勻、振盞、每二時服一茶匕

○方 天

吐根浸 以二錢浸出者三錢 氏埜列里精

單舍利別 三錢

右調勻、每二時服一茶匕

○方 鑑

單寧 三錢 鉛糖 二錢 白糖 一錢

右為散、分六服、每三時一服

○方 援

實芟荅利丁幾 海葱丁幾 各三錢

右調勻、蘸布帛塗擦腰邊

○方 鑑

稀硝酸 一錢 單舍利別 二錢

右調勻、飲液和服

溺崩 可參考初篇

○方 鑑

甘油 半斤至一斤半 水 一斗 枸橼酸 或酒石酸半匙

右調勻、一日服量

○明礬乳清 馬尿崩方出于血

○方 鑊粉 桂末 各十 白糖 一匙

右為散分十二服、朝夕各一服

○方 重硫化安沒尼 阿芙蓉丁幾 各三十

蒸餾水 三 桂皮水 一

右調勻、每三時服一食已

○方 硃銅礬 阿芙蓉 各十

蒲公英越幾 蜀葵根末 各二

右二丸為一丸、朝夕各服五丸

○方 主治蜜尿

膽礬 五 硃砂精 一匙至

蒸餾水 適宜、全量至一

右溶和、每服十滴、至二十滴、日二次、至四次

○拔爾撒亭露 一 主治同前

右每服十滴、漸加至三十滴、日三次

○方 牛膽 石檢 各一

右為三十九丸、衣石松子末、每服五丸、日二次

○方 醋酸莫非 半 桂水 一 桂舍利別 半

右調勻、朝夕各服四滴

○方 尿崩 光菁丁幾 拔爾撒亭露 各二

硃砂精 半 複方迷迭香膏 二

右調和塗擦于脊推、脇腹、及腰部

百七

百七

百七

百七

百七

百七

百七

百七

百七

百七

溺血

○桂密斯秩爾丹丹 主治腎膀胱之虛性出血
桂皮丁幾六錢 稀硝酸二錢

右調勻、每二時、取三十滴、水一酒盞、和服

○刺答尼合劑丹 主治尿血

刺答尼越幾二十 水一 半

右調勻、每服一劑、日三次

○方通 溺血較多者

刺答尼越幾六錢 桂皮水五

收歛越的兒一錢 橙皮舍利別一

右調勻、每一時、服一食匕

○麥奴越幾水馬 主治急性尿血方出于

○方通 主治腎出血

單寧酸二 至五 白糖五

右為散、每服一劑、一日數次

○鐵礬水丹 方出于尿血、因腎內結石者

○鹽酸鐵劑丹 方出于主治同前

○酸性幾那合劑丹 方出于主治同前

○鐵塩酸劑丹 主治同前

○沒食酸水丹 主治同前

○沒食吐根散丹 主治同前

○方通 主治尿道出血

明礬一 蜀葵根煎三

右調勻、注射于尿道

溺石

○攝度律多散通 主治尿酸鹽結石

孕鹼酒石二 炭酸曹達二

右水二勺溶解臨用加枸橼酸半匙乘沸騰頃服

○方 扶尿石

炭酸曹達 半匙 酒石酸 白糖 各一

右為散製劑十二個每三時服一劑

○方 炭尿石

炭酸加里 一匙半 桂皮水 三勺

實亞格日舍利別 半勺

右調勻每服半食匕日四次

○方 尿石

的列並底那 半匙 石鹼 甘草膏 各二

右二勺為一丸朝夕服八丸至十九

○方 鑿主治腎石及腎疝

安息香酸 一匙 燐酸曹達 二匙

蒸餾水 四勺 單舍利別 一匙

右調勻四回分服

○方 尿石發疼痛及痙攣者

亞麻仁油 半勺 鷄子黃 適宜

泉水 五勺 過爾托舍利別 半

右調勻振盪每二時服一食匕

○方 主治膀胱砂石及加谷流

巴禮刺 半勺注沸湯十勺浸

巴禮刺 漬二時濾過取液 菲阿斯丁幾 二匙

右調勻每服二三食匕日三次

○苦味安沒尼水 尿中磷酸鹽過多者

硝砂香竄精 三匙 忽布丁幾 六匙

忽氏鎮痛液 三匙 複方竜胆丁幾 一匙

旃那浸 八勺

右調勻每服六分之一日二三次

○幾那刺亞斯飲 主治尿酸結石及衰弱者

剥篤亞斯水 三錢 複方幾那丁幾 六錢
黃幾那煎 八錢

右調勻、每服六分之一、日二三次

○硝塩酸合劑 丹 尿中亞爾加里

稀皇水 一錢半 莨菪丁幾 一錢

巴禮刺流動越幾 一錢 巴禮刺煎 八錢

右調勻、每六時服六分劑一、兼用九丸一粒

安息香酸 三十八 甘油 適宜

右研和、為六丸、衣銀箔

膀胱焮衝 加答流

○硝塩酸合劑 丹 主治膀胱刺衝症 方出于尿石

○方 鑑 急性膀胱焮衝

大麻子 三錢至六錢 苦扁桃 四個

右搗碎、加泉水二匕、為乳劑、加白罌粟舍利
別二錢、一日數次、服盡

○方 鑑 主治同前

油乳劑 六錢 老利兒水 二錢

菲阿斯越幾 三錢

右調勻、每一時服一匕

○方 鑑 主治同前

石松子 半錢 蜂蜜 一錢半

右調勻、每二時服一食匕

○方 鑑 主治同前

甘扁挑油 半錢 亞刺比亞末 二錢

蒸餾水 六錢 龍腦 二錢

右調勻、為乳劑、每二時服一匕

○方 鑑 膀胱加答流後期

的列並油 半錢

右每三四時取十滴至二十滴糖水和服
○方 罌 主治同前

石灰水 二勺
右每服取一匕乳汁一碗和服日二三次

○方 罌 主治同前
炭酸加里 一匙
覆盆子水 五勺

覆盆子舍利別 半勺
右調勻每服一食匕

○方 罌 主治發熱疼痛既退諸症荏苒者
烏華烏爾識 半勺水煎
取液六勺 覆盆子舍利別 一

右調勻每二三時服一匕
○方 寫 主治同前

烏華烏爾失 三匙水煎
取液五勺 炭酸曹達 一匙
宇露舍利別 六匙

右調勻每服二食匕日三次

○方 罌 主治淋疾膀胱加答流

華澄茄末 半勺
阿芙蓉 一匙至二匙
護護漿 舍利別 各四勺

右為六錠每服一錠日三次
○彌箇浸 罌 主治同前
方出於後淋

○方 寫 主治膀胱加答流
彌箇葉 六匙以熱湯十
勺浸出 瀝過
華澄茄丁幾 各半勺
彌箇丁幾

右調勻每服一食匕日三次

○彌箇剥答斯劑 罌 膀胱加答流及刺衝症
剥答斯水 十滴至十五滴
菲阿斯丁幾 四十滴
彌箇浸 一勺半

右調勻每服一劑日三次

○彌箇消石劑 罌 膀胱刺衝係于尿酸過多者
消石英 百八十八
彌箇浸 八勺

右調勻、每服六分之一、日三次

○弼箇蓬砂劑 疝 慢性膀胱加答流、或結石病

蓬砂 四十八 弼箇下幾 六

巴禮刺越幾 六 巴禮刺煎 八

右調勻、每六時、或八時、服六分之一

○方 通 膀胱加答流、或尿道、腔粘液漏

拔爾撒骨泮霍 一 銳烈燒酒 四

亞刺比亞末 二 拔爾撒篤露糖煉 一

薄荷水 橙花水 各一

右為乳劑、二日間、服之

○方 證 主治同前

拔爾撒骨泮霍 的列並底那 各半

煨製麻屈涅失 適宜

右為三十九、衣石松子末、每服三丸、至五丸、

一日三次

○方 通 主治同前

拔爾撒骨泮 四 麻屈涅失 二

右研和、四丸為一丸、日服四丸、至十六丸

○方 歷 主治慢性膀胱炎

龍腦 一 雷掃里涅 一 的列並底那 二

右為百二十九丸、每服二丸、漸加至六丸、或十

丸、日三次

○方 歷 主治慢性膀胱炎

龍腦 六 護謨 三 泉水 四

阿芙蓉 二 護謨舍利別 一

右調勻、每一時、服一丸

○方 通 主治慢性膀胱加答流

鉛糖 一 蒸餾水 一

右溶和、注射于膀胱

○方 通 主治膀胱加答流後期

皓礬 三錢
右溶和用法如前

蒸餾水 三錢

○方 糖 主治同前

硝酸銀晶 一錢半
至三錢 蒸餾水 三錢

右溶和用導尿管注射于膀胱

○方 匱 主治同前

硝酸銀 六錢 菲阿斯丁幾 一錢半

蒸餾水 一錢

右調勻少溫之為注射劑

○方 匱 主治同前

菲阿斯葉 一錢半 蜀葵根 三錢

右注沸湯適宜浸出取液八錢為注射劑

○石炭酸水 匱 主治慢性膀胱加答流 疔出子

右為射注射劑

○阿片坐藥 匱 主治慢性膀胱淋 疔出並

膀胱痙攣

○方 匱 鎮靖劑

油乳劑 六錢 阿魏丁幾 半錢

右調勻每二時服一茶匕

○莫非飲 匱 主治同前 疔出子

○方 匱 主治併私的里性膀胱痙攣

莫爾非 一錢 老利兒水 二錢 續草丁幾 一錢

右調勻每四分時服六滴至十滴至得效

○方 匱 利尿困難小便壓閉者

亞刺比亞末 二錢 鷄子黃 三個

石灰水 三錢 甘扁挑油 一錢

阿芙蓉丁幾 一錢 白罌粟舍利別 一錢

右調勻每半時或每一時服一食匕

○方 遺 痙攣性尿閉

阿魏 半 吐根 阿芙蓉 各二

薄荷油 二

右二丸為一丸、每服十丸、日三次

○方 遺 利尿困難者

扁桃乳 五 龍腦 二

右調勻、每二時、服二匕

○方 遺 主治膀胱痙攣發作

石松子 二 蒸餾水 六

阿芙蓉液 半 甘草舍利別 二

右調勻、每二時、服一食匕

○方 遺 主治小兒膀胱痙攣

石松子 亞刺比亞護謨 各二

扁桃舍利別 一

右調和為紙劑、每服一茶匕

○方 遺 主治痙攣性尿閉

葇岩越幾 一 家猪脂 一

右調和、外用

○方 遺 主治同前

亞篤魯比涅 四 亞爾齒兒 家猪脂 四

右調和、取少許、塗擦于臍下

○方 遺

阿芙蓉 半 葇岩越幾 十五 水銀軟膏 一

右調和、塗擦于患部

○方 遺 主治膀胱痙攣

菲阿斯葉 或葇岩葉、或煙草、

亞麻仁末 或蒸餅心

右調和、為鎮痙布

○阿片坐藥 遺 主治膀胱痙攣 方出于直腸痙腫

方 主治痙攣性尿閉、兼淋疾者

舍電阿芙蓉液 一 菲阿斯油 或硝砂揮發

右調勻塗擦于鼠蹊及膀胱邊

○方 主治瘰癧性尿閉

的列並油二錢 卵黃一錢 薄荷水三錢

右調勻為乳劑塗擦于橫膈及膀胱部

○方 主治同前

阿芙蓉丁幾錢 亞麻仁煎六錢

右調勻為灌腸劑

○方 主治同前

煙草葉半斤一刃 熟湯八錢

右浸出取液為灌腸劑

膀胱麻痺

溺閉

○方 膀胱麻痺及粘液漏

實阿斯末葉

烏華烏爾識葉各半

右以沸湯八分浸出半時濾過取液加遠志

舍利別半分每二時服一食匕

○方烏膀胱麻痺

的列並油 杜松子油

忽弗滿拔爾撒非答 芫菁丁錢各二

右調勻每服取二十滴至四十滴燕麥煎汁

和服日四次至六次

○方翹膀胱麻痺陽精無力及小便淋瀝

芫菁丁錢 浸芫菁一分于

右每服十滴漸加至一錢日二次

○方翹

芫菁二錢 甘扁桃油三錢

護謨一錢 水四錢

右調勻為乳劑二十四時間分服

○方保 膀胱底麻痺、發尿閉者
麥奴末 六分 白糖 半勺

右為散、製劑十二個、每服一劑、日二次

○方發 難產後膀胱麻痺

薩昆那葉 一錢 浸出 龍腦 二分 至
取液五分

右調勻、振盪、每一時、服一匕

○方修 主治膀胱麻痺

番木鱉越幾 四分 單軟膏 二錢

右調勻、塗消息子、插入尿道、日二次

○方修 主治同前

番木鱉越幾 四分 蒸餾水 四分

右調勻、為一日十四之注射劑

○硝砂揮發膏 銻或龍腦精

右塗擦于膀胱部

遺溺及淋瀝

○方錫 主治遺溺
的列並油 二錢

右每三四時、取五滴、至二十滴、糖水和服

○鐵光菁劑 卅 泌尿及生殖器衰弱、或遺尿等

光菁丁幾 一錢半 甘油 一錢

複方鏡合劑 八分

右調勻、每服六分之一、日三次

○又方 卅 主治同前

光菁丁幾 鹽酸鏡丁幾 各一錢

胡椒丁幾 一錢半 薩爾撒舍利別 一錢

水 八分

右調勻、每服六分之一、日三次

○方修 主治遺溺

舍電阿芙蓉液 半 番木鱉丁幾 一錢

麥奴丁幾 二錢

右調勻朝夕各服十滴至二十滴

○方 選 主治同前

芫菁末 半刀 鐵粉 一刃 甘草膏 適宜

右為九十九衣石松子末每服二丸至三丸

日三次

○方 婦人產後麻痺性遺溺

芫菁末 一 麥奴末 二十 白糖 一

右為散分六服每三時一服

○方 選 主治遺溺

麥奴 一 桂皮 半

右注沸湯適宜浸出取液四勺加後味

孕蓬酒石 二 桂皮舍利別 一

右溶和每一二時服一匕

○方 歷 主治同前

單寧酸 鑲粉 竜胆草越幾 各一

右為六十九每服一丸至三丸日三次

○方 麻痺淋瀝

葭苈越幾 四 番木鱉越幾 六 磷酸 一

右調勻每服十五滴糖水服日三次

○方 選 主治遺溺及遺精

葭苈根末 六 白糖 一

右為散分四服朝夕一服小兒四分服或六

分服

○方 列 主治遺溺

硫酸莫爾非 歇刺篤里涅 各十

家猪脂 一

右為軟膏取少許塗擦會陰日三次

○方 驗

小兒尿牀 葭苈越幾 二 甘草末 甘州膏 各十

右為十二丸、衣伊里斯末、每夜臨卧、服一丸

○方 〔未〕

葇若越幾 十二分、一、至五分、一、 白糖 五分

右為散、製劑十二個、每服一劑、日三次

○方 〔未〕

葇若越幾 一丸 蒸餾水 二勺

右調勻、每服一茶匙、日三次

○方 〔未〕

番木鱉越幾 八分 黑色酸化鍊 一匙

右為二十四丸、衣石松末、每服一丸、日三次

○方

抱水格魯刺兒 八分、至十六分、 水 一勺

右溶和、臨卧頓服、八歲至十六歲者服量

尿道狹窄

○方 主治尿道、及肛門痙攣性狹窄

葇若越幾 一匙至二匙 家猪脂 一勺

右混和、為塗擦劑

○方 〔劑〕 主治同前

葇若葉 十二人 沸湯 八勺

右浸出、為灌腸劑

○方 〔可〕 主治同前

菲阿斯葉 一刃 阿芙蓉 二分

澱粉 半匙 沸湯 二酒盞

右調勻、濾過、為灌腸劑

○方 尿道狹窄

沃度加里 十人 蠟軟膏 半勺

右調和、塗擦于陰莖、日二次

○方 〔畢〕 尿道狹窄、因粘膜肥厚者

硝砂 一匙半
至三匙

甘草末 三匙

右為散分九服每三時取一服燕麥汁送下

○方 鹽 主治同前

硝砂 半匙

硝鐵華 十五

甘草膏 一

右為球製劑十二個每服一劑日三四次

○方 尿道狹窄

實阿斯末葉 半多 沸湯 十二多

右浸出取液每二時服半碗

○方 頑固絞窄因纖維質滲出者

杜松實 二匙

薩毘那葉 一刃

右注沸湯適宜浸出四時濾過取液五多加

沃度加里 一刃

沃實謨 半多

調勻分三服午前用

遺精及陰萎

○攝度律篤散 每方出于充血 遺精每便秘者

○下泄煉劑 每方出于痔疾 主治同前

○大黃麻偈涅失亞劑 每方出于刺街熱 主治同前

○方 鹽 主治尿精

龍腦 一刃

硝石 半匙

消石英 一匙

右為散分五服朝午夕各一服

○方 鹽 主治遺精及陰萎

龍腦

硫酸規尼 各六

白糖 半匙

右為散分六包每服一包日三次

○方 鹽 主治同前

龍腦 六

竜胆越幾 一

蜀葵根末 適宜

右為六十丸每夜服五丸

○方 丹 主治遺精痛搦或氣道痙攣

龍腦 五

葭若越幾 三分

失趨答越幾 四丸

右加亞爾箇兒適宜為二丸、每夜臨卧、用

○方 遺精幾勃起者

龍腦 十丸 留怖里涅 一丸

蒲公英越幾 半匙 蜀葵根末 適宜

右為二十九丸、朝夕各服二丸

○方 主治同前

龍腦 一丸 亞刺比亞末 半匙

蒲公英越幾 半匙 蜀葵根末 適宜

右為二十九丸、朝夕各服二丸

○方 主治同前

龍腦 一丸 亞刺比亞漿 半匙

菩提樹花水 四勺 桂皮舍利別 半匙

右為乳劑、每二時、或每四時、與一匙

○方 主治同前

忍布末 或忍布越幾 二 白糖 或護膜末 一匙

右為散、分六包、每晚與一包、或二包

○方 主治遺精

溴素加里 十二丸 至 白糖 一匙

右為散、分六包、用法同前

○方 主治同前

溴素加里 二丸 蒸餾水 一匙

右溶和、每晚與一茶匙

○方 養陰具衰弱、及刺衝者

磷酸 一匙 龍腦 一丸 鍊粉 四十五丸

幾那皮末 一匙 葛斯加栗越幾 適宜

右為二百四十九丸、衣桂末、每服十丸、日三次

○方 遺精

阿仙藥 明礬 幾那皮 各一匙

硫酸鍊 半刀 括失亞越幾 一匙

右二丸為一丸，衣桂末，朝夕服十丸餘。

○方 主治陰萎

格倫僕半匙，以水十号末爾扶斯鎮痛液二
桂丁幾一匙 橙皮舍利別一号

右調勻，每三時服一食匕。

○方扶 主治同前

枯失亞越幾半号 硫酸鎂一刃
桂末半匙

右二丸為一丸，每服十丸，日二次，至三次。

○方置 主治陰萎衰弱者

華尼利丁幾一匙 香窩酸丁幾二匙
酒製桂水四号 桂舍利別一号

右調勻，每一時或二時服一食匕。

○羌菁丁幾一匙 痴鈍性陰萎

右每服三四滴，粘滑煎和服，日二次。

○酸性幾那合劑每 遺精，係神經虛衰者方出
于 病節

○亞鉛番木鱉丸每 主治同前方出
毒鬱憂

○規尼鐵劑每 主治同前方出
于 紫斑病

陰囊水腫

○方留 促水液之吸收

硝砂一号 醋 銳烈燒酒各四号
右溶和，微溫卷貼，日三次。

○方利 消散法

沃實謨丁幾一匙，至 蒸餾水二号
六匙
右調勻，卷貼，日二次。

○方 根治法

赤蒲萄酒一匙，至 亞爾箇兒一号，至
二匙

右調勻、注射于囊内

○方經根治法

沃實丁幾 一芍 蒸餾水 八芍

右調勻、注射于陰囊

○方經根治法

沃實謨 一芍半及至 沃度加里 一及至 二芍

蒸餾水 三芍

右調勻、注射于陰囊

對症方選卷之三終

版權免許 明治八年十二月八日

定價小拾錢

白川縣士族

著述 從六位高橋正純

大阪府第一區十七小區 淡路町四丁目六番地寓

大阪心齋橋通南一丁目

松村九兵衛

同 唐物町四丁目

淺井吉兵衛

東京馬喰町二丁目

嶋村利助

西京御幸町姉小路七

藤井孫兵衛

發兌書肆

