

特教叢刊

卷之六

第六十種

戴龍孫編著

茶

正中書局印行

434
213

編輯要旨

- 一、文字淺顯、簡短、撮要。
- 二、內容注重實際，使初營茶業者，作為範本，已有茶業經驗者，知所改進。
- 三、舊茶園的改進，參酌作者已往經驗。
- 四、一切設計，概以現在環境、財力、需要為原則。
- 五、除第一段和末段，略述茶的概況，及附開參考資料，以供有心者研究外，其餘專注意應用技術。
- 六、為求簡要起見，全篇不分章節。

MG
S571.1
4/2



一 茶的概況


1 茶業略史

「茶之始，其字爲茶」。此是鶴山集所載。茶於古時有稱爲茶、檟、茗、荈、護、苦楸等。日名茶、英名 tea、德名 tee、俄名 tschoi、法名 the。

我們發現茶種最早，植茶歷史亦最古，但究其起源於何時，學者還沒有定論。不過就我國消史上觀察，三代以上就認茶爲一種藥材，神爲珍品。秦漢以後，上等社會漸漸飲用。六朝更盛，並且有普及一般社會飲用的趨勢。唐宋需要益增，產地徧及全國，而一變爲重要的商品。元明茶業不減。唐宋但爲求出產量的增加，政府免除茶戶勞役，定有「引制」，不得私販。清初仍本明制，無所損益。五口通商，茶的出口，突飛猛晉。光緒中葉，茶葉出口，竟歲達二百多萬擔。嗣後時增時減。迨至清末民初，以迄近年，茶葉輸出，就逐漸衰落。印度、日本、錫蘭、臺灣等處，大量生產，世界茶市場，漸被侵奪，良可慨嘆。

2 茶的種類

日常習慣上供飲的茶，不論其製成品爲祁紅或武夷珍眉，商業上的名稱雖多，但是原料均取自茶樹的葉部。茶樹爲常綠灌木，間有爲半喬木或喬木狀，其學名爲「*thea sinensis*」。因爲多年的栽培和自然雜交，伏獲司徒德（Cohen Stuart）氏意見及印度赫勒（D. C. R. Harler）博士



研究的結果，分出四個大品種：

一、武夷種或中國種 (var. bohea) 中日栽培的茶種，多屬此種。樹身叢狀，小灌木，葉橢圓細小，肉厚，色綠，萌芽性強。

二、阿薩姆種或印度種 (var. assamica) 生於印度阿薩姆省山中，為二三丈之喬木，葉很大，色淡綠，肉厚，芽性強，含鞣質豐富，味苦，我國雲南亦有此種，通稱為普洱茶。

三、大葉種或皋盧種 (var. macrophylla) 產生中國的西南部，幹高丈餘，葉片大，肉薄，呈波紋形，味苦，品質不佳。

四、南越種或暹羅型種 (var. shan-form) 幹高二三丈，與印度種頗相似，葉形較大，肉厚，色深綠。

世界上所栽培的茶樹，不外上列數種。中日所種，大概屬中國種，印度錫蘭則多屬印度種及中國雜種，近年日本栽培的品種，其品性優良的，有宇治種、靜岡種、縮葉種等等，至於我國因為栽培歷史太久，變種更多，如紫心種、白心種、雞毛種、橢樹種等等，可惜缺乏準確研究，無從稽考了。

3 茶的形態及生理

茶樹是常綠植物，葉互生，葉柄短小，無托葉。深秋葉腋開花，有清香，花白色或淡紅色，花托花瓣和花萼，通常均為五至七片，亦有二十餘片的。雌雄蕊數目很多，普通有一百二十個左右，花藥分二

室，花粉色黃，有蜜腺清香，是爲異花受精植物。九、十月開花，寒露霜降最盛，經昆蟲的傳達，結成果實，待至次年寒露左右，纔達成熟。果實有圓形橢圓形或三角形，果殼堅韌，色棕黑，內含種子一至五枚，種子內有子葉二片和豐富的養分，是爲供給茶樹發芽的養料。至於種子成分爲多量脂肪，單寧，蛋白質等，所以也蒸榨油，每磅種子約有二百五十——三百顆。

茶樹的壽命甚長，能達數百年，但普通茶樹歷二三十年後，萌芽漸減，就宜加以剪刈，除去地上莖，生長機能，纔能恢復如初。茶樹木材堅緻，可供雕刻，根莖枝的一股生理現象和其他植物原無大異，茲不贅述。

4 國內外茶的生產概況

我國土地肥沃，氣候溫和，最適宜於種茶，其中以安徽、江西、江蘇、湖南、福建、四川、廣東爲最著，廣西、陝西、貴州、雲南、甘肅、河南、山東次之。其栽培，應積，據某英人於錫蘭觀察（Ceylon Observer）中發表爲三百萬畝，產茶六百萬擔。大英百科全書謂我國茶的消費量，平均每人年耗五磅，恐不可靠。查臺灣人，平均每人年耗一斤半，臺灣人飲茶，與國人相仿，今以最低限度計算，設我國每人平均年耗一斤，每年耗茶量爲四百五十萬擔，再加輸出，一百五十萬擔，則全國生產量約六百萬擔。至於國外，就印度、蘇聯、錫蘭、菲洲、日本、臺灣、荷印（即東印度）包括蘇門答臘及爪哇等，茶之栽培面積和生產量，列表如後：

植茶面積產

茶

額備

註

印度 八一九,〇〇〇英畝 三九八,八五九,〇〇〇磅

本統計錄自 Detailed Report of the General Committee of the Indian Tea Association of the Year 1934

蘇聯 一〇〇,〇〇〇公頃

據估計一九三七年第一次五年計劃完成後,可達上數

錫蘭 四八一,五四〇英畝 二二八,二二三,三六〇磅

據 Ceylon Directory 1935 改算而得

非洲 二七,七九一英畝 六,六四三,二八三磅

據 Dr. Harald H. Mann 之估計

日本 三九,三五一甲 四二,四八六,八〇〇公斤

本統計錄自臺灣茶業一九三五年出版統計,已折合臺灣面積單位甲

臺灣 四一,九二四甲 九,三二六,九二六公斤

同前

荷印 一三七,八五三公頃 六二,八五二,七五四公斤

本統計錄自荷印輸出農產物生產統計

註 甲與公頃相似,每公頃約等於中國十六畝,每英畝約等於中國六畝,每公斤等於中國二市斤。

5 茶葉貿易的今昔

茶葉貿易,長江流域始自魏晉,黃河以北,則始自唐,歷宋迄清,茶的對外貿易,更為興盛,特分三個時期說明如後:

一、興盛時期——自一八六六年至一八八五年,其中最多輸出額為二百餘萬擔。

二、中落時期——自一八八九年至一九一七年，則逐漸衰敗。

三、慘敗時期——自一九一八年至一九三二年之十五年中，最多輸出額爲九十萬擔，最少僅有三十餘萬擔。

世界需茶量，年年增加，六十年前，全世界僅需三萬萬磅，今則需十八萬萬磅，而我國茶的輸出量，反而慘敗至此，實因日本、印度、錫蘭等起而競爭，成爲我國茶的勁敵。最近數年，不特茶的輸出減少，竟有大批外茶源源輸入，價值達四百萬元，昔日華茶獨霸世界市場，今日連本國市場亦被外茶侵入，衰落迅速，誠使國人驚惶不置。

二 茶的生產

1 選擇園地

(i) 關於氣候方面——茶性喜溫暖，過寒過熱地帶，都不適宜。大概南緯三〇度至北緯三八度，均可栽種，但至北緯三八度，生長不能充分發育，南緯三〇度的熱帶地方，雖然發育茂盛，產量豐富，不過品質欠佳。所以我國植茶區域，自以長江流域各省爲最佳，因爲春間穀雨立夏之際，溫度大概概在攝氏表十五至二十度之間，冬季低溫，以不過零下十二度者爲宜。又茶的生長，與地勢方位有關，在適當溫度限界裏，地勢高而北向，產茶品質愈佳，因爲高處曉霧彌漫，在萌芽的時候，飽受雨露滋潤，且受日光，照耀頗遍，茶葉營養其光化作用，循序漸進，芽葉的柔嫩狀態，就能保持很久，所以葉

汁醇厚，而不苦澀，芳香雋永，非平原所產的茶所能比擬的。

(2) 關於土宜方面——凡是不過於黏重或者疏鬆的土壤，都可以種茶，惟茶的最適宜的土

項 目	評 點			
一、經濟上之地位	三里以內 九里以內 十五里以內	6點 4點 2點	六里以內 十二里以內 十五里以上	5點 3點 1點
二、傾斜度	10—15度 6—8度 1—2度	10點 6點 2點	8—10 3—5	8點 4點
三、土 壤	堆質壤土 砂質壤土 粘土及砂土	30點 10點 5點	壤地砂土 及堆土 砂礫土及砂土	20點 3點
四、含有機物質	10分者 中等 腐地質缺乏	5點 3點 及泥炭土	多者 過少	4點 2點 1點
五、耕層厚薄	7寸以上 6—8寸 2—4寸	10點 6點 2點	6—7寸 4—5寸	8點 4點
六、下層土	上下層同質壤土 砂質及粘質壤土 粘土	5點 4點 2點	強粘土及砂礫土	1點
七、濕 度	濕度適度者 易燥者 過濕者	10點 6點 2點	較易燥者 過燥者	8點 4點
八、耕作難易	最易 困難	5點 3點	中等 礫多	4點 1點
備 註				

壤，首推堆肥壤土，次爲砂質壤土，或砂質土，其表土深而含有腐殖質，及土壤中富有氮素、磷酸和鐵等成分，與深厚黏土內含磷酸腐殖質的，亦宜種茶。此外土宜的適合與否，與產茶的質味，也有密切關係，特分記如後：

(一) 生長黏土和乾燥地帶的茶，芽黃葉短，肉薄味良，茶樹發育不佳，如果施肥不足，茶葉就常含澀味，若濕氣適合，茶芽就由黃色轉綠，葉長莖粗，樹勢發育良好。

(二) 生長爐土的茶，味較苦，芽亦良好，但茶芽多呈黑色紫色或紅色。

(三) 生長含磷、鐵分豐富的土壤，茶葉製成紅茶，有特殊的色澤和香味，我國祁門紅茶，所以有特殊香味，就是這種緣故。

(3) 關於土地經濟位置方面——氣候土宜，均合於種茶，但土地的經濟價值，尚須加以考慮。如接近市鎮的茶園，雖然氣候土宜稍爲遜色，而其純益反較離市鎮較遠的沃土爲多，此則因肥料較易購置，人工亦易雇得，一切生產成本減少。其他尚有傾斜度、土性……等等，亦可就上表舉行調查，記其評語，以憑選擇。

2 整地方法

園地既經選得，即視其地形如何，加以整理，應該注意的事項如左：

(1) 已經墾殖的平原熟地，宜先行一二次深耕，除去土中雜草，整成凸畦，如普通菜園，位置宜

南向，畦形以東西爲良，畦行距離五尺至六尺不等，使土粒疏鬆，空氣流通。


(2) 注意排水是否良好，設係低窪之處，宜順其地勢，每隔一丈五尺左右，開掘大小水溝，形如魚骨，倘係山坡，亦須視其天然形勢，開溝洩水（如圖一）纔能免去園中積水影響茶的發育。

(3) 設係未經開墾平原，高低當然不一，就該應用人力或畜力開掘，劃高補低，移除障礙，開掘深度至少要超過一尺，能達二尺更好。

(4) 設在山麓崗陵，定有不少坡度，坡度則以二十五度爲限，蓋坡度過大，土中養分很易沖失。這種山陵，第一步於嚴冬引火焚燒清除地面，第二步用長鋤人力開墾，深度要達一二尺，坡度地的開墾，須作梯形，開墾起點應由上而下，梯的前面與二端須就山掘成方塊草皮，如牆疊成，惟須向內收縮，上窄下寬（如圖二）。

(5) 開墾時遇有樹根，就得截斷，不必向下再掘，免費人工，倘係大樹，那就剝了樹皮，任其腐爛。

(6) 大樹根伸進茶園裏，就宜開深溝，阻止樹根



圖一 梯田與平園排水系統


選集茶種，最好在茶實尚未成熟的時候行之，並應注意下舉各點：
 (1) 宜擇茶叢的形態生長完善的。

3 種子的選擇

伸入，免得吸收茶園水分。
 (7) 道路的開闢，應該完全依據自然的形勢，事先規畫支路與幹路（如圖三）。



(甲)



(乙)

景質園茶形梯、甲
 面剖園茶形梯、乙

二圖

(2) 茶樹的枝幹健全挺秀的。

(3) 茶樹毫末經過病蟲害的侵染。

(4) 茶葉狹長肥厚的。


(5) 茶葉品質良好，滋味醇厚而芳香的。

(6) 茶葉產量豐富的。

茶叢合了上述各點，就須分別標記，待它成熟（約霜降後十天），再擇肥滿充實的採取，隨即散置陰涼透風地板上，厚度不得過三寸，未裂開的茶果，宜藉日光使它開裂，妥慎收藏。其法用木炭細末，細土，與茶子混和，放在燥乾的地方，或用布袋埋入乾砂裏，使種子內發出的水分，被炭末吸收，茶子內部，熱度降低，便能保持休眠狀態，迨至播種時期，用清水將茶果傾入，除去輕浮，取其沉重子實，使它陰乾。

4 直播與育苗

(1) 直播——就是直接生長成叢，中途不變動它的地位，惟幼苗的保護困難，管理不便，獲利




甲、乙、梯、園、道、路、系、統
三圖

亦遲，是其短處。所以直播和植苗，各有利弊，不可偏廢。茲分述如後。

甲、播種期——採了種子，立即播種，固屬便利，但易被鳥雀田鼠竊食，不如早春播種為佳。春播最好的時期，約在春分之後，總之，要發芽後不受晚霜為標準，所以遇有春寒，須特別注意，以免茶苗凍死。

茶
的
生
產



株距三、四寸



圖茶播條本日 五圖

乙、播種深度——無論採取何種播種方法，先須掘地深約一尺，鋪上肥土六七寸，施以堆肥和糞等。種子種下，它的深度，日本和印度均為二寸，我國並無一定，往往因防鳥竊食，播種至五六寸深，不入土太深，發芽比較遲緩，通常參酌深淺，大概在立春種下，以深二寸半為適宜，春分前種下，以深二寸為佳。種既播下，就覆上一二寸細土，用草葉薄鋪，如是經一年後，苗高即達一尺許。

丙、播種量——播種分量，因排列不同，使用種子的分量，亦無一定，大概一畝地有一斗五升左右，即可敷用。

丁、播種排列

(甲)條播法——分一行播和二行播兩種：一行播種，畦寬三、四尺，畦上播種一行；二行播種，畦寬五尺，畦上播種二行，俟芽出土，再行間苗，去弱留強，令株間距離適度，條播法較點播所占地積少，採葉便利（如圖四），日本現已採用這種方法（如圖五）。



(乙) 點播法——分輪形法、四角法……等。如輪形法作寬五六尺內外的畦，每隔四五尺，作一直徑一尺至一尺五寸的輪形，用種子八顆，周圍播種，此法中耕不見，很費人工，現已不用，所以從略。至四角形點播法，畦寬五六尺，每四五尺作一平方，在四角各播種茶種五六枚，待發芽之後，擇留良苗一株即可（如圖式）。

(2) 育苗

甲 苗圃——不採用直接播種法，就宜將種子先播在苗圃裏，待幼苗長到適當高度，然後運往茶園內定植，其步驟先擇苗圃應注意的事項如後：

(甲) 地勢要稍有傾斜（五—十度）為宜。

(乙) 土性要濕潤肥沃。

苗圃地選擇定，做成五尺至六尺凸畦，留一部分細土放在一旁。如用撒播下種，注意粒間須隔一寸五左右，土蓋二三寸細土。如用條播下種，行間四寸左右，粒間一寸左右，為使每行均勻整齊，可用草繩先畫定位置下種以後，上蓋細土，一如撒播。

乙 幼苗培育——茶苗出土以後，一切雜草注意除去，隔一週或旬，澆水一次。當年生的茶苗，不耐暑熱，宜於五六月間在茶園內點黃豆，以防地面乾燥，一面防止雜草繁生和直射陽光。到了八月，施二次稀肥，到了十一月間即應就根，覆些鬆土，以防嚴寒。第二年和第三年，要觀察幼苗發芽，其有特別早遲或發育不良的茶苗，均宜拔去。至於苗圃內的幼苗出土以後，除培育方法相同

外，園內不必點種豆類。

(8) 其他

茶樹由種子蕃殖，時期較長，要求簡便的方法，也可採用園藝上各種蕃殖方法。因為茶樹是異花受精植物，容易發生雜交品種，不能保持純粹，若能就其優良原株舉行壓條扦插、分叢等法而蕃殖，亦可為保持良種的幫助。

甲、壓條法——三四月間，選擇植料龐大而生長旺盛的茶樹，將生長外圍嫩枝，徐徐攀下，用土堆壅，再用磚石壓緊，枝的上部，用竹桿或枝條支持，使它向上，其着土部分，經久即生根，隔年就能割下分別栽植。

乙、扦插法——三四月間，就茶叢生長旺盛的新枝，於一尺五寸處剪下，削成斜形，插在潤濕肥沃的茶園裏，任它生根。

丙、分叢法——春初陰濕天氣，將生長旺盛的幼齡茶叢，連根掘起一部而栽種之，此法簡而易行，頗可採用。

3 定植方法

定植是幼苗自苗圃或假植園內移植於茶園內。通常定植時期，要在十一月左右舉行，至遲不得過二月，至視幼苗的生長程度而定。大概幼苗生長達到一尺以上，定植最為適宜。定植前，要將園

地整理妥貼，並將直播排列的方式選定，將窟掘好，施下基肥，窟的大小，如直播，然後將幼苗挖出，擇健壯的茶苗，截去本幹，只留六寸左右，下部主根，也要截去若干，但枝根必修剪。幼苗剪過，隨即運至茶園內，不過搬運時候，要注意不得受日光直射及損傷樹皮，幼苗運送目的地後，就宜栽下，帶一成叢約植幼苗十餘株，每株稍稍間離，不可過密，阻礙發育。這種定植茶園，第二年發芽比較遲，但略加稀肥，促再發芽，一年過後，第三年就有相當收穫。

6 中耕與施肥

(1) 中耕——「茶山不要糞，一年三交釘，這是安徽茶話」，「釘」就是「定」的意，因茶係深根淺葉，中耕回氣愈多愈好，不行中耕發芽遲緩，產量減少。安徽茶話又云：「三年不挖，除非採花」，亦足表明不中耕祇有採花，中耕的重要可。普通除隨時加除草和翻耕外，每年應有三次中耕，中耕的時期，大概如後：

第一次在春分前淺耕，約三四寸深

第二次在小暑前淺耕，約三四寸深

第三次在晚秋深耕，約七八寸深

中耕時候應注意的事項：(一)勿傷茶細根。(二)凡茶園裏的雜草，非中耕能完全肅清，每年應在雜草開花時候除草，使它無法結實。(三)多年生雜草如青蒿節節生根，一挖能變數株生長很

速，要雨後用人工拔去，堆在一處，作為堆肥。(四)香蒲草(俗名回頭青)越鋤反越多，對於這種草，只有用人工挖出，又茶山上最多草類為蕨，可用棍子橫打，很容易除去。(五)茶園裏除下的雜草如能晒乾和豆秸、稻草、蕎麥秸、油菜秸等，覆蓋茶園，不但防止雜草叢生，防旱、防寒，並且可以供給有機物，促成細菌的繁殖，以改良土性。

(2)施肥——茶樹的收穫物，就是葉部，一年有二次以上採摘，非普通果木可比，果木尚須施肥，何況茶樹。茶樹施肥量宜多，惟次數則宜少，一年中至少分三次施肥，茲分述如後：

施肥期——第一次秋期中耕之後施肥，名曰秋肥，或稱基肥，如係山園，就宜稍稍提早。再秋肥施用目的為：(一)春季茶樹已二次採摘，樹勢已衰，急待恢復。(二)茶樹易受凍傷，須增進抗寒力。(三)為春茶收穫增多起見，必須注意施基肥，以促使多發芽頭。第二次在來年三月中旬施肥，名曰春肥。第三次在春茶收穫之後施肥，名曰夏肥。

肥料種類和施肥量——施肥多寡，須視茶園種類和茶樹的年齡各有不同，大概第一次基肥，普通用油粕、堆肥等有機肥料，每畝施肥量合約一千斤，第二次與第三次施肥量，亦以人畜糞尿為主，每畝合計約七八百斤。

茶農常用的肥料——農家對於茶園常用的肥料，有下列數種：

甲、人糞尿——為我國農人異常重視的肥料，因它的功效頗速，可以催促芽葉的生長。

乙、廐肥——是各種牲畜尿糞連同腐爛的糞糧而成，這種肥料含纖維質很多，新鮮的如馬羊

糞尿腐化時常常發生熱力，很能影響茶質變壞，所以要待它熱透或是混合其他肥料充作秋肥。

丙狗糞——也是茶樹特效肥料，據有經驗老農說：一經施用，葉質肥厚柔嫩，採出的茶確有特別芳香，惟狗糞搜集頗費工時。

丁草木灰——是一種速效鉀肥，要和腐肥混合同施，草木灰含鹼性，對於過分酸性的土壤，很有改變土性的作用。

戊油粕——各種油粕，都可施用，惟桐油和大豆粕最佳，其法先將油粕碾碎，和以人糞尿同施，

能預先投進糞缸中，使它腐爛更好。

己淤泥——此亦是極經濟而最不費錢的肥料，因淤泥裏含腐


殖質與細菌豐富，在茶園裏更當施用。

庚綠肥——綠肥種類很多，能充綠肥的植物，須有下列各條件：

(一)生長茂盛，產量豐富。(二)深根作物。(三)不結肥，能生長旺盛。

(四)易於腐爛的。能達上列四項條件的，當推豆科作物，因為豆科作物的根有根瘤，含有氮素，固定菌多，可以改良土壤物理性，增進它的化學作用。這種豆科作物當開花時，養料豐富，可用鎌刀割下，鋪蓋地面，耕進土裏。

施肥方法——無論施用何種肥料，均先將茶樹枝尖稍向下弄



七

直線處施下，因枝伸展之勢，與細根蔓延長度，恆屬相稱，視枝梢垂直線所指的地方，也就是根尖傳到地方，若是距根過近過遠，都不相宜。其法先在該處掘起一二寸左右淺溝一道，深須五寸，然後施下（如圖七），挖土覆蓋。

（一）修剪方法

修剪又名整定。樹修剪在使樹枝均一，日光透射，空氣流通，使它發育茂盛，所以凡是病弱枯老的枝，茶叢過密地方，都須加以修剪。

（1）剪枝法——茶樹播種後，到了第四年春，須行剪枝，其法將衰枝旁蘗和上年第一次摘葉後生長特長的枝，選擇剪去，令長短疎密，大體齊一。又本幹距地六七寸以下所生的枝，或枝梢垂近地面的，悉宜剪去，橫枝不要多留，使全樹都能感受日光雨露，所以樹形普通多剪成半圓形。至幹的高矮，有高型、中型、低型三種，要看距離和土壤肥瘠而定。

高型茶叢，高須三尺以上，行間須六尺，適於土層深厚肥沃園地。

中型茶叢，高約三尺，行間五尺，適於土層深厚。

低型茶叢，高約二尺五寸，適於土層淺薄。

條型茶叢，亦須整定如半圓筒形（如後圖十二）。至於修剪時期，暖地在第二次摘葉後施行，寒地在第一次摘葉後施行，剪枝深度，約一二寸。除初次兩年剪枝後，不必施肥，三年以上茶樹，剪後

應該施肥以資補養。

(2) 截根法——茶樹經二十年後漸次衰老，發育遲而收穫少，宜在十月下旬至十一月之間，茶梢停止伸長時，就在畦邊挖深一尺五六寸的溝，將衰老的大根，悉行截去，用堆肥和表土埋入，以促其發生新根恢復生機。

(3) 臺刈法——此法也是恢復老樹生機，常和截根法同時並行，由主幹距地七寸至九寸處，用鋒利鐮刀，將主幹斜刈，斜面宜向東或東南向，使從所餘主幹另發新枝，若單行臺刈，則宜在春季第一次摘葉以後行之，並且深耕施肥各行一次，一二年內要停止摘葉，到了第三年，再行剪枝，一次五年後方可摘葉。

8 病蟲害的防除方法

茶樹是常綠灌木，常年有嫩葉、花果等發生，害蟲和病菌，賴以滋生的機會很多，茲將茶的重要病蟲害和有害植物的名稱、藥劑的合分述如後：

(1) 茶樹重要害蟲

害蟲名稱	名性	狀	被	害	部	分	防	治	方	法
		為害時期								

茶毛蟲或名點蠹

Empoasca Guiperata Burt.

幼蟲底葉，體具黃黑色茸毛，有毒。

四月至九月，幼蟲食茶葉，為害最烈。

成蟲引誘成，青葉茶園，幼蟲用除蟲菊、石油乳劑噴射，皮膚受毒，用淡阿母尼亞水搽擦。

茶葉交織或名遊俠

Crania Minuscula Burt.

共有三種，一種圓筒形，結小枝為巢，棲於其中，一種形小，在葉面為巢，一種以葉片和小枝為圓形巢。

四月至十月，幼蟲食茶葉。

性喜羣居，一發見即一一捉下，引火焚燬，或用藥劑噴射均可。

茶葉織文名康心蟲

Zekara Rytina L.

幼蟲圓柱形，長一寸至二寸，頭呈黑褐色，成蟲有暮光性。

五月至八月，為害茶樹幹內。

茶葉堆上有黃褐色粉末，即為蟲糞，或在茶枝上找到有孔處，焚燬，或從孔中注入藥液，然後蓋密。

茶尺蠖

Boronia These Mast.

行走時後部曲到前部，前部再伸前去，顏色有綠灰赤褐等色。

五月至十月，為害新枝梢。

可捕捉幼蟲，將茶園內枯枝敗葉用藥劑噴射。

茶葉毒蛾

Hemiona Mediana Walk.

幼蟲綠色，常捲葉作繭，藏於其中，長約九分至一寸。

四月至九月，為害芽葉。

用手摘取其中幼蟲和繭殺之，用藥劑噴射。

茶毒蛾

Anataca Bipunctata Walk.

幼蟲如家蠶，肉紫色，一受驚動，前部即豎起，性喜羣居枝上。

五月至十月，為害新芽老葉。

剪去蟲枝焚燒，張取成蟲。

(2) 茶樹重要病害

病名	病	徵	為害時期	防	治	法
葉枯病	葉有枯萎情形	全年	全年	即宜剪去，引火焚燒。		
白羽紋病	葉梗均有羽紋情狀	全年	全年	多由濕度過甚，宜注意排水。		

(3) 茶樹重要有害植物

有害植物名	為	害	清	形	防	治	方	法
地衣	包圍較老茶樹的枝幹，吸收水分，並且易				用人丁將地衣括去。			
苔蘚	山園較老茶樹，生在陰濕的地方，最易生				用人工以棕刷刷去。			

(4) 藥劑調製

除蟲害的藥劑很多，但方法簡單而易取求的則很少，茲列舉數種於後至藥劑噴射，可用噴霧器，每具約價十餘元（如圖八）。



八圖
器噴噴便輕

此器使用簡便，僅以皮帶插入任何桶內，即可應用。

藥劑名稱

調

合

方

法

(以市斤計)

石油乳劑

取石油十斤，硬石鹼十斤，沸水五斤，先將石鹼溶解於沸水，然後加入石油，用力搖動，使油分離，名曰原液，且時加水至二十倍，於天晴時噴射。

除蟲粉及水浸液

用除蟲菊乾，磨成粉末，加用石灰或硫黃末三——四倍，用以撒布。用除蟲粉六斤水五十斤，浸一日即成，如助之以熱，更易浸出，用時再加水六倍，於陰天噴射。

烟草液

取殘葉烟草或烟粉一斤，溫水七——八斤，浸十二小時，或煮沸二三小時，用時加水十——二十倍，於雨後噴射。

雷公藤液

取一斤，和水十斤煮沸。小時，和清水六十斤於雨後噴射。雷公藤可栽在園四周，隨時採用，還是便利。

9 茶的品種改良方法

優良的茶樹，必來自優良的茶種，優良的茶葉，必產自優良的茶樹，所以茶的品種改良，實有提倡指導必要，茲特分述如後：

(1)目的——專注重於葉的產量和形態優良的。

甲、所希望於茶葉方面

(一)產量豐富。

(二)葉形狹長肥厚。

(三)葉汁濃厚而不苦澀。

(四)含單寧和茶素的成分低。

(五)滋味芳香。

(六)一枝的葉數多而葉節短的。

乙、所希望於葉叢方面：

(一)茶叢高度五六尺的。

(二)旁枝平均發達強健而挺直的。

(三)有抗病蟲害能力。

(四)有耐濕耐旱的習性。

(五)採摘時期早而壽命長的。

(2)進行步驟

(一)選種——在茶園內選擇合於上項條件，一一標記，編列號碼。

(二)培養種子——多施磷素肥料，培養種子，妥為收藏。

(三)篩種——將選得種子播種於苗圃內，俟苗長二三尺，去劣選良，而單株定植。

(四)茶株處理——定植以後，須注意遠隔其他茶園，以免雜交，待其開花結實，再分別選採種子。

詳記號數，如法播種，舉行遺傳試驗，初次二次三次，繼續舉行，因為初次遺傳的結果，不能認為可靠，所以要經過多次纔能確定。

10 一般茶園的缺點及其改良方法

(1) 一般茶園的缺點——向來一般茶農，視茶為野生樹，並無人視為利厚特用樹，而加意保護的。所以茶園既不實行更新，且尊重間作，不耕耘，不剪枝，亦不施肥，中耕更未注意。選擇優良品種，園地七零八落，管理不便，株叢稀疏，衰老不堪，絕少有強健側枝和旺盛的細枝，隨意採摘，甚至連葉帶莖，一齊採下，茶樹生長，影響不淺。

(2) 改進方法

- 甲、歸併移植——將疏救零星的茶叢，集在一處栽種，以減少現有面積。
- 乙、淘汰老劣——於歸併移植時，留強去弱。
- 丙、砍割老株——將茶樹老枝，除根截去，使它重抽新枝。
- 丁、育苗補植——歸併後的茶園，如感不足，可照前法育苗補植，以達整齊，增加生產。
- 戊、注意中耕除草——方法同前。
- 己、實行修剪——方法同前。
- 庚、實行單純茶園——即是不栽間作物，可以防止土壤沖刷。

11 經濟茶園的設計

茶園因地勢的高低，面積大小，以及已墾和生荒等關係，估計用費，不能一致，本篇設計，暫以熟地百畝為例，茲分別如後：

(1) 百畝茶園開辦費

項目	說明	明估	計價	目備	註
茶園	擬選擇村邊附近已墾熟地，每畝約地價二十元。	二、〇〇〇	〇〇	〇〇	
房舍	衛生員室一間，工友室二間，農具室一間，製茶室十間，畜舍草房一間，廚房草房一間。	一、〇〇〇	〇〇	〇〇	
傢具	桌、梳、床、櫃、及炊食用具。	一〇〇	〇〇	〇〇	
農具	包括鐵犁中耕器鋤耙等一切農具。	二〇〇	〇〇	〇〇	
製茶用具	包括竹籬、籃、手搖揉捻機、茶鍋及測萎室、發酵室等。	四〇〇	〇〇	〇〇	
牲畜	畜牛一頭。	七〇	〇〇	〇〇	
其他	雜費。	一〇〇	〇〇	〇〇	
合計		三、八七〇	〇〇	〇〇	

註 如係未墾地，則茶園地價僅需數百元已足，但須加開墾費，惟無論如何上項估計，當可足用。

(2) 百畝茶園經常費估計

項目	第一年	第二年	第三年	第四年	備註
領	一	二	三	四	
裝釘員薪金	四八〇・〇〇	四八〇・〇〇	四八〇・〇〇	四八〇・〇〇	
工	二四〇・〇〇	二四〇・〇〇	二四〇・〇〇	二四〇・〇〇	
忙	二四〇・〇〇	二四〇・〇〇	二四〇・〇〇	二四〇・〇〇	
肥	五〇・〇〇	五〇・〇〇	五〇・〇〇	五〇・〇〇	除去自 肥
飼	四〇・〇〇	四〇・〇〇	四〇・〇〇	四〇・〇〇	除去放 牧
藥	三〇・〇〇	三〇・〇〇	三〇・〇〇	三〇・〇〇	
修	三〇・〇〇	三〇・〇〇	三〇・〇〇	三〇・〇〇	
理	三〇・〇〇	三〇・〇〇	三〇・〇〇	三〇・〇〇	
房	三〇・〇〇	三〇・〇〇	三〇・〇〇	三〇・〇〇	
具	三〇・〇〇	三〇・〇〇	三〇・〇〇	三〇・〇〇	
修	三〇・〇〇	三〇・〇〇	三〇・〇〇	三〇・〇〇	
理	三〇・〇〇	三〇・〇〇	三〇・〇〇	三〇・〇〇	
金	三〇〇・〇〇	三〇〇・〇〇	三〇〇・〇〇	三〇〇・〇〇	
息	一〇〇・〇〇	一〇〇・〇〇	一〇〇・〇〇	一〇〇・〇〇	
種	一〇〇・〇〇	一〇〇・〇〇	一〇〇・〇〇	一〇〇・〇〇	
子	一〇〇・〇〇	一〇〇・〇〇	一〇〇・〇〇	一〇〇・〇〇	
費	一五〇・〇〇				
採					
製					
費					
包	一,二〇〇・〇〇				
採					
費					
工					
資					

茶園改費	110,000	310,000	310,000	310,000
其他	100,000	100,000	100,000	100,000
合計	1,780,000	1,640,000	1,650,000	2,160,000

註：第一年至第四年，需經常費八、二二〇元。

(3) 百畝茶園收入估計

項目	第一年	第二年	第三年	第四年	備註
開工	500,000	500,000	500,000	300,000	冬期間作物。
乾茶葉			5,000,000		平均每年可得乾茶二百石，最低每石作價五十元。
合計	500,000	500,000	5,000,000	300,000	

註：第一年至第四年共收入六、八〇〇元

兩抵不敷一四二〇元

自第五年起至三十年止，每年除去經常費外，可獲淨利二千金，如茶價高至每石百元，則每年可獲淨利七千五百金。

附言：

茶的生產

- (一) 如能間種除蟲菊、薄荷等藥用作物，獲利尤巨。
- (二) 後方社會人士當不乏有志於茶業的，其辦茶園，由大可小，最易管理，實為戰時後方增加生產的良法。

三 茶的焙製

1 採茶方法

(1) 採摘的年齡——茶樹生長了三年，就可採摘，不過收量不多，五六年以後，才能正式採摘，到了七八年後，發育極盛，收量也多。採茶天，以晴天最宜，採得茶葉，勿使強日直照，茶在筐裏，勿使堆壓，以免品質變劣，若遇大雨，應即停止採摘，但印度錫蘭則否。

(2) 採摘的時期——依地方氣候和製茶的目的而有遲早，我國長江流域，多在穀雨前後，大概茶的新開芽為四葉時，採摘尖芽和上部三葉，而留下一葉不採，就普通情形，頗多於立夏前後採摘，茲 數時期如後：

頭春茶 在穀雨前十日前後採摘，以供上等茶製造。

二春茶 在穀雨後十日前後採摘。

三春茶 在穀雨後二十日採摘。

夏茶(又名仔茶) 在小滿芒種後採摘。

秋茶(又名露白) 在夏茶採後所發出的新芽採摘的，這種茶芽採後，有礙明年春茶發育，且品質低劣，以不採摘為宜。惟印度、蘭爪哇等處尚屬熱帶，不在此例。

(3)採摘的方法——我國採茶，全憑婦孺小孩擔任，摘時須先將枯葉蛛網掃去，用拇指甲部與食指第二節肉部挾住新芽，用拇指甲截斷，不要傷及下葉腋芽。我國一般採茶習慣，往往連莖一次摘下，枝葉間生生不已的腋芽，不知加意保護，因而枝幹光禿，產量減少，一遇冬令，樹多凍死。

(4)採茶用具——大率是矮凳高手梯、筐籃、鐮刀、長鉤和雨具等。每日採摘數量，並無一定，大概第一次所採鮮葉，至多十七八斤，若雨後茶芽滋生很快，摘量約可增一倍。但我國農採摘手術不佳，連梗帶葉，每日亦可摘二三十斤，又普通茶園每畝產量，平均可達三四百斤。

(5)生葉的貯藏——採得鮮葉，若逢陰雨或焙製不及，務要注意貯藏，以免萎凋發酵，其法將鮮葉移進陰暗通風室內，將生葉散佈竹籬上，分別攔置。

2 普通焙製法

我國茶葉普通焙製法，多憑經驗用人工製造，因製法的不同，而有紅茶、綠茶、烏龍茶、磚茶、邊茶等等製法，茲分述後，餘者從略。

(1)紅茶——盛銷英國，製法分述如後：

甲、凋萎 將生葉鋪在竹籬上，晒於日光下，須時反轉，使乾燥均勻，遇雨天，生葉鋪在室內，以火

力使它凋萎，待葉色濃厚而不脆斷爲度。

乙、搓揉——將凋萎生葉，置在篩上，用力搓揉。若大規模製造，可放在揉臺上，用掌力或足力搓揉。搓揉的目的在擠除葉中殘餘水分，並使葉汁凝集葉面，以後用沸水沖泡，茶汁易於溶解。搓揉適度，乃解發揉，使它發酵。

丙、醱酵——搓揉過的葉，置筐桶中，覆以濕布，晒日光下，須常常反覆，使醱酵均一。待茶色變紅褐色而少帶青綠色，就其適度微乾，應即速解開葉塊，以防過度，並即散置日光下乾燥。


丁、乾燥——將晒乾的茶葉，再入二端開口，中隔竹片的籃焙爐，用炭火行火力乾燥（如圖九），如行薰香，於此時將珠蘭等香花，和葉同焙即可。

戊、篩分——將細同的茶葉，加以篩分，細薄的等級最好，粗大的視爲下品。

己、精製——經篩分的茶葉，再行足火五十分鐘，並再篩分，揀選然後貯藏出售，上項精製，通常多由茶號在鄉間收買後，集中精製。

(2) 綠茶——製銷美，製法分述如後：

甲、炒青——未炒，鍋熱度升高，見到鍋燒紅，約投下生葉半斤多，即發大爆聲，迅速用手緊貼葉面，於鍋底翻揚，使它熱力蒸發，當時約四五分鐘即可。



圖九 焙爐

高二尺五寸，直徑二尺，中央稍細。

乙、搓揉——與製紅茶相同，約需時十五分鐘。

丙、鍋焙——將搓揉過茶葉，待冷，取三四斤下鍋，火力較炒青減去三分之二，下鍋後，亦用手上下翻騰，減去水分，切忌翻轉不勻，使葉片久着鍋底。

丁、乾燥——已經鍋焙的茶葉，再取四五斤下鍋乾燥，其法用手曲作半弧形，將茶葉震盪翻轉，經二十分鐘，茶葉乾到八成，顯着灰白色時，輕輕攤盪十分鐘，就可出鍋，是爲毛茶。

戊、精製——通常精製工作，多由茶號辦理，法將毛茶經過篩分，並行足火，即一人管理二灶，伸兩臂如鳥翼，分插鍋內，輕輕推盪，待茶十分乾燥出鍋，並再篩分，而有熙春、針眉、鳳眉、秀眉、貢熙等等名目，茲不贅述。

(3) 烏龍茶——製法如後：


甲、凋萎——和製紅茶相似，先用竹籠攤在日光下，時時攪翻，約經半小時，移到室內，攤涼二小時，投進大圓篩，將葉反覆下擊，待葉呈茶褐色，青臭減少爲止。

乙、釜炒——下葉二三斤，上下翻轉，經六七分鐘，葉已柔軟，隨即取出，行第一次搓揉，其法入茶葉於麻布袋中，以足踏揉，約二分鐘後，解開揉塊，再用強火攪炒，行搓揉如前。

丙、乾燥——已搓揉的茶葉，入竹製焙籠中焙之，時時反轉，水分減少，火力宜減。

丁、精製——一如紅茶。

(4) 磚茶——取紅綠茶的粉末，除去土砂和雜物，用杉篾層層蒸三四分鐘，留意燥濕適度，然



式形茶磚 ○一圖

(一)採割—春茶採後(立夏以後)，即將茶枝葉用刀割下五六寸，再分切寸許

(二)釜炒—將葉傾入鍋內，炒至柔軟取出。


(三)搓揉 略施搓揉。

(四)日曬—攤放竹簾上，曬乾即成。

乙、再製方面—分細茶和粗茶二種，方法如下：

後置入預定模型裏，用強大壓力，經三小時後取出，就成磚茶。紅茶末製的，曰紅磚茶，綠茶末製的，曰綠磚茶，這種磚茶盛銷俄國和西藏等處(如圖一〇)。

(5)邊茶(或曰馬茶)——產四川西部，專門行銷西藏，每年達七百萬斤，祇以製法粗劣，並無出口，茲簡述如後：
甲、初製方面：



面剖灶及瓶茶 一一圖

(一)蒸——將茶葉裝入麻帕內，每帕重量相等（細茶一斤粗茶四斤），投入甌中（如圖一一），每次二包，上下相疊，底甌蒸至八分鐘先行取出，上包即移作底包再逐漸加入未蒸的茶包，輪流替換，蒸完為止，蒸時熱度約為攝氏九十三度左右。

(二)壓——先取篾筲入架，將蒸後茶葉投入筲裏，隨蒸隨壓，不過細茶就宜輕緩。粗細茶再製的異同。

項目	細茶	粗茶
製	收買春茶（撥雨前後所採的）集中一處，每十餘小時，翻攪一次，如是七八次，待葉色粗等即可，堆放時間宜略為揀剔，經二旬餘，名曰「做色」。	粗茶無須做色。
蒸	每大包為十六小甌，每甌一斤，共十六斤成一甌。	每大包為四小甌，每甌四斤，共十六斤成一甌。
壓	八分鐘，動作須精細。	四分鐘，須加重壓力。
包	每甌用黃紅紙印成藏文，包好（因藏人喜黃紅色），然後十六甌合一大包，再用黃油紙包裹，四大大包合裝度甌內，每包的上下二端附附茶葉各一包，用以賞給發子。	同
裝		上

機械焙製法



圖一 日本採茶園實景

機械焙製方法，是近年印度、日本……等這製茶廠所採用，在製茶上，確是一大進步，其略述如後：


(1) 摘茶——利用採摘器以代替人工採摘，速率約快三倍，不過茶園必須經過剪枝手術，嫩葉生長整齊，表面勻整始能應用（如圖一二）。

(2) 製茶

甲、凋萎 用室內凋萎，築室三層，每室兩旁設棚架一二十層（如圖一三），每層架茶床，床分鐵絲網、木板或竹篾等，大約每一平方公尺，攤生葉二斤半，室內有旋風機，使空氣流通，至熟氣裝置，多數利用樓下乾燥。

乾燥的餘熱，凋萎溫度約攝氏二十八到三十五度，經十二至十八小時即可。

乙、搓揉——搓揉機分圓筒形及方形兩種，又有單動雙動兩種，前者臺盤固定，後者筒與盤作反對方向。



圖三 印度凋萎室內景


的轉動，每機可放凋萎葉三百磅，迴轉三八、四五次不等。揉法方法，第一次歷四十分鐘，揉畢即在篩分機分篩，細的送發酵室，粗的再揉四十分鐘，再揉，但較嫩的葉一次已足篩分機的分時間很速，每重一千二百磅的葉，僅需十五分鐘即可（如圖一四）。

丙、發酵——茶葉經過揉法以後，就送入發酵室，此室是水泥建築，中央部稍高，周有小溝，壁上懸掛管，一管有小孔，以通流水，並有噴霧氣設備，以調節室中溫度，其濕度須在九〇至九五度之間，時間僅三至四時。

丁、烘焙——用吉生（Tabor）式，烘焙時間約為二十分鐘，溫度則為華氏一八〇到二四〇度之間，凡較大的乾燥機，每四〇分鐘，可烘乾茶四〇〇磅，烘焙燃料有用煤或乾柴，也有用電力的。

戊、精製——用切斷機和篩分機分篩，再經人工將少數茶梗揀剔，隨市場的需要，分成等第，以迎合市場。

4 茶的貯藏方法



圖一四 印度克勞伯之揉茶機

茶葉貯藏得宜，不但可以防止成品變劣，而且可以增益其香味，所以貯藏方法，也頗重要，茲分述如後：

(1) 貯藏前之手續——指沒有精製的茶。

甲、分篩——將茶葉經過各號篩篩分其法從起首的篩底，交次篩篩之，次篩的篩底，再交第三篩篩之，以及於最後一號爲止，如此可以分別粗細等級而名曰頭號茶、二號茶……等等篩後經風車除去一切輕片灰砂。

乙、發揀——用女工揀出茶內夾雜物及粗梗破片等等。

丙、官堆——將篩分揀別之各種同級茶葉再行混和使它十分勻淨，品質形式一無差異。

丁、補火——茶葉經過乾燥後，水分含有量，祇占百分之二左右，但因經過上列手續，攙置空氣中，很容易吸收水分，所以貯藏以前，應再補火一次（即再乾燥一次）。

(2) 貯藏器具——貯藏所用的器具，我國多用木箱、鉛罐、錫罐及瓦罐等等，大小形式，頗不齊一，木箱質輕價廉，易於運輸，鉛罐錫罐價貴太重，瓦罐質重易破，運輸不便，但沒有霉爛受潮之患，貯藏茶葉最爲一宜，我國零售茶，很多採用。

(3) 貯藏處所——要選高燥有地板的向南房舍，多開窗戶，有太陽時應開窗，陰雨要緊閉，方免潮濕。

5 焙製的改進與設計

(1) 改進的必要——我國製茶，不特農工初製的毛茶，全用人工，即茶號精製的茶，亦是如此，所以日人借此宣傳說：「華茶製法粗放，形式不佳，且足踏手揉，極不清潔，飲了不合衛生」。這種宣傳未免過甚，但也不無見地，所以為適應新時代的要求，以至和外茶相角逐，尚有改進的必要，如採用採茶鉗、搓揉機、烘乾機等等，大量生產，減低成本。不過以現在的環境和茶商之故步自封，完全採用機械，恐非所能，是又不得不變通了。

(2) 改進的事項

甲、初製方法簡陋——紅茶凋萎和品質優劣，最關重要，不過普通多利用日光，濕度高低，都是左右凋萎的，若遇陰雨，印束手無策。又綠茶要採後即製，國人手操作，遠不若機械之強有力而速，所以初製方面，速而採用凋萎室（如圖十二）和烘乾機，以圖補救。

乙、精製方法繁瑣——我國茶葉，製手續很是繁雜，更以採摘不精，夾雜太多，一茶之成，過篩風車，無慮數十百次。此外尚有庸人自擾，缺製，即綠茶出品，名目繁多，按紅茶名目僅有一種，而綠茶的名稱不可勝計，或以地名，或以時名，或以形名，或以物名，雖富有經驗之茶師，亦不能盡識，因而製造時，費時費工，莫此為甚，所以精製方面，更應畫一名稱。

(3) 百畝茶園焙製的設計

項目	說明	價備	註
調萎室三間設備	寬八尺長一丈八尺高約一丈房屋三間，向南前兩門，中間竹架，以便放葉開窗，二邊有木架，竹架分一二三格，中間竹架，以便放葉，室內空氣流通，溫度須加管理，則以不論天晴下雨，均能進行無礙。	三〇・〇〇	
發酵室二間設備	大小同調萎室，茶葉在室內發酵，較日光發酵均勻，且隨時可行，茶葉品質，可以提高。	四〇・〇〇	
手搖揉捻機二具	據安徽祁門茶業改良場試驗該機揉茶效率，確較人工揉捻高，每機每次可揉生葉十五公斤，需時十五分鐘，每小時揉四次，共揉葉六十公斤，而人工揉捻每小時亦揉十五分鐘，每小時至多不過十六公斤，其工作效率十五至四比，且較機揉捻，茶條緊細清潔，形式美觀，惟每具售價至少須六〇元。	一一〇・〇〇	
其他	如竹籃、竹籬、竹簾、篾筴、烘籠、茶鍋等等一切製茶零星器具。	二一〇・〇〇	
合計		四〇〇・〇〇	

6 茶的化學成分

茶為最適宜的飲料，可以助消化，又能除煩解渴，清神破悶，國人飲茶的風氣，頗為盛行，文人雅士，淪茗煮酒，傳為佳話，因茶有相當的藥作用，而非咖啡或刺太強，所可比。國氣晴雨露適於種茶。

所以茶的品質，也較任何國為優良，這還是我國茶所含單寧和茶素成分適量，所以芳香雋永，而不苦澀。茲將乾茶普通化學成分列表於後：

纖維組織 (cellular tissue)	五〇——六〇%
單寧 (tannin)	二二——一八%
水分 (water)	八——十%
膠質 (gums)	二——九%
蛋白質類 (albumin and casein)	二——四%
茶葉 (theine)	一——二%
蠟質及以太油 (wax and ether oils)	〇·一——〇·五%

據培洛(A. P. L.)氏分析我國茶葉，其成分如下：

成分	中國茶%	印度茶%	爪哇茶%
水分	四·五七五	四·五七六	四·五八〇
單寧	八·〇七〇	九·四三六	九·七四〇
水溶物	三六·〇五〇	四三·七五〇	四二·七五〇

灰分	五·三二〇	五·四二〇	五·〇五〇
可溶灰分	四·〇四五	三·五二〇	三·一五〇
茶素	二·五〇〇	三·二一〇	二·五三〇

又根據原頌周氏分析我國茶與印度、錫蘭茶浸出汗所含的茶素與單寧成分表如後：

	煎茶時間(分鐘)	茶素	單寧	以茶素爲一之比
中國茶	五	二·五八	三·〇六	一·一八
印度茶	五	三·六五	六·七七	一·八六
錫蘭茶	五	三·一五	五·八七	一·八六
中國茶	十	二·七九	三·七八	一·三五
印度茶	十	三·七三	八·〇九	二·二一
錫蘭茶	十	三·二九	七·三〇	二·一六

由上表可知我國茶所含的茶素單寧量之少，所以我國茶實是世界茶葉之冠。

附茶的簡易檢定法

(一) 色澤——盛茶於黑色漆盆裏，倒置桌上，鑑別其潤澤、枯燥、純青、碧黃、駁雜等，而記其評點。

(一) 形狀——盛茶於黑色漆盆裏，倒置桌上，鑑別其長短、伸縮、緊疏，而記其評點。
(二) 火度——盛茶於漆盆裏，吸嗅其原品的香氣和汁，而鑑別其火度之適否與強弱、煙焦等，而記其評點。

(三) 水色——入葉七分於茶壺內，注入沸水，經五分鐘，注其汁於玻璃管，鑑別其滑、碧、濁、黃，而記其評點。

(四) 蒸熱度——入葉七分於茶碗裏，注入沸水，審視其蒸熱是否過度，或不及，再鑑別其葉片是否破損、老幼和有無混合物等，而記下評點。

(五) 香氣——入葉七分於茶壺裏，注進沸水，嗅其芬芳、強弱，而記其評點。

(六) 味——入葉七分於茶壺裏，注進沸水，鑑別其含味是否甜、滑、苦、澀等，而記其評點。

(七) 貯藏——貯藏過久，檢視是否失散固有的香味和色澤，而記下評點。

(八) 貯藏——貯藏過久，檢視是否失散固有的香味和色澤，而記下評點。
以上不過是簡而易行的檢驗方法，至精密的檢驗方法，可參閱上海或漢口各商品檢驗局呈由實業部二十五年所頒佈的檢驗標準及施行細則。

四 茶的運銷

1 茶的包裝方法

茶的包裝，是製茶最後手續，茶葉沒有緊固的包裝，最易發霉或受潮，變為廢物，茲特分述如後：

(1) 選擇包裝材料——選擇包裝材料要注意事項如次：
 甲、選擇沒有特殊氣味的材料製成，並檢視有無破損漏洞。
 乙、材料應乾燥堅韌，不易破裂。
 丙、體質要輕，就可減少運輸費。
 丁、容積大小應一律，務使所裝茶葉重量相等。
 戊、不易受潮濕。

(2) 我國市場所用包裝材料

材料	優點	缺點	形狀	狀容	量	用	途
木材	價廉易購	松杉楊等木材易霉爛，但楓香板製茶則有異香。	用四寸厚板料製成長十寸高十四寸方形箱，內再裱糊皮紙。	約五〇餘斤	多用以裝茶運往遠處，如係出口須外加鉛罐錐密。		
錫	不易受潮	價貴。	罐形大小不一，口徑很小，有蓋。	不定	零售商家庭適用。		
馬口鐵	價廉易購	易銹。	方形，長方形，圓筒形，大小不一。	不定	零售商家出售時裝用，或預先裝出售。		
紙質	價廉易購	易破易潮。	同前	少量	同前		

陶 瓷 價廉不
易潮 易破。

罐形口徑很小。

不定

零售商貯藏茶葉之用。

麻 袋 質輕易
易破易受濕。

變形。

五六十斤或
百餘斤

近處運輸。

(3) 包裝時應注意事項

- 甲、裝箱或裝罐時用力振動，使茶葉滿密封，以免搬運時內部劇烈振動，發生摩擦破碎。
- 乙、茶葉裝就以後就應即刻慎密固封，以免免外界空氣侵入。
- 丙、用馬口鐵裝茶，內部應襯以紙質，可以防銹。
- 丁、無論用何種材料包裝出售，應在箱外或筒外標明商號、商標、重量、及飲茶說明，能加繪美術圖畫，更能增加美觀，取悅顧主。
- 戊、應顧全信譽，不得攙和劣等茶葉，欺騙顧主。

2 茶的運輸

茶葉經包裝完畢，即可運往國內各大商埠或國外銷售，因我國編員廣大，茶區遍全國，茶葉運輸，宜講求所取途徑，可以省費安全而迅速便捷並可以提早到達市場，售得善價茲將有關方面分述如下：

(1) 關於運費方面——事先應加以調查，如用火車輸運，或用人力畜力運送，要詳細比較運費高低，避免不必要的運費。

(2) 關於安全方面——我國治安不良，道途荆棘，安全問題，亦須多方調查。

(3) 關於迅速方面——應以迅速便捷為最要。

我國輸茶困難情形，據行政院農村復興委員會出版之中國農業之改進一書內載：「茶之生產多在山巔，由此以達市場，肩挑背負，已覺費力，再由市場轉達他處，沿途又多勒索，如祁門紅茶之在江西過渡，不計箱數，概須十元，其一例也。」又如祁門及至德之出品，必折道出九江，以報驗海關，故出口稅雖已免除，而此項不必要之運費，尚不免去。加之年來治安不良，盜匪如毛，安徽之北部，以及福建各地，當運輸之時，地方政府派兵保護，則又更有陋規之供應，我國政府對於茶之運輸，雖已令飭火車輪船減費，而其消耗，尚不可免，故祁門紅茶運至上海，竟較印度茶運至英國之水腳所費為大也。」

3 今後貿易的改進

我國茶葉之品質，既為世界第一，產額又甚富，誠對外貿易之一種特產。在十九世紀以前，我國是唯一產茶國，日本產茶，爪哇植茶，始於道光六年。印度植茶，始於道光十五年。錫蘭植茶，始於光緒二年。曾幾何時，印度茶的勢力，已凌駕我國，錫蘭、爪哇、日本起而大肆角逐，我國茶的銷路多被蠶

食，茶的出口貿易，遂一落千丈。若不急謀積極改進，殊難以應付時艱，因而競爭，爰本管見所及，略述如後：

(1) 以往貿易周折

甲、茶棧挾持——內地茶號，上海土莊，類多資本短小，收買原料，不得不向上海、漢口、九江等處茶棧借款，利息很高，且製品必須由棧出售，所索費用不少，有加佣、貼磅、補箱、貼現、扣茶篋、打包等等，不下二十餘種之多，這種耗費，有增至茶的成本百分之二十。

乙、洋商操縱——茶棧商人類多毫無眼光，唯利是圖，所以買賣茶價，全由洋商操縱。

(2) 今後貿易改進要點

甲、厘訂茶區——中國茶區過廣，難於統計，所以須厘訂茶區，先從外銷着手，選擇歷來外銷重要地點，經政府決定，例如平水茶產浙江，紅茶產安徽祁門，即就各該宜茶地區，畫定區域，指定平水、祁門產區，一切栽培製造和應改進的事項，都由政府督導之。

乙、協助運銷——茶區畫定，就宜組織運銷合作社，在統一指揮下，營共同的販賣，與在華外商直接交易，或直接運銷海外，以減少一切中間人的剝削。

丙、嚴定茶葉等級——嚴定茶葉標準等級，外商向我購茶，祇須指明等級、數量，即可交易，寄樣看樣等等手續和費用，即可減免了。

丁、指導宣傳——上述各項，能夠完成，對內對外的貿易，就應作有利的宣傳，例如紅茶盛銷英國，

綠茶盛銷美國，雖近年銷路被印度、錫蘭所奪，綠茶銷路被日本所奪，但宣傳工作，仍不可忽略。至於對內市場，如磚茶、邊茶盛銷西康、西藏，也要注意宣傳，否則反被外茶侵入，例如東三省市場被奪，福建茶市場被臺灣茶侵入，西康、西藏茶市，被印度茶侵入，真是不勝枚舉。

前曾屢言之，中國茶得天獨厚，得地獨宜，如人謀而臧，不患茶業不能復興，是在經營是業者圖之耳。

附言：

本文之成，深得郝協唐主任之鼓勵，與朱惠方主任、程淦藩教授、中國茶業公司劉軫兄之校訂指導，獲益良多，謹誌數語，藉表謝意。

五 參考資料

- 1 茶經 唐陸羽著
- 2 齊民要術 賈總協
- 3 造林學各論 陳嶸 中華農學會
- 4 實用農產製造學 何慶云 黎明
- 5 日本四十年來之茶業 劉軫 金大森林系
- 6 荷印之茶業 全國經濟委員會




- 7 日本臺灣之茶業 全國經濟委員會
- 8 印度錫蘭之茶業 全國經濟委員會
- 9 中國農業之改進 農村復興委員會 商務
- 10 中國茶業 朱美予 中華
- 11 中國茶業復興計畫 吳覺農 胡浩川 商務
- 12 中國茶業問題 趙烈 大東
- 13 中國茶業問題 吳覺農 商務
- 14 種茶法 程天綬 商務
- 15 最新種茶法 曾芝清 南星書店
- 16 種茶淺說 漢口商品檢驗局
- 17 茶樹害蟲 胡浩川 上海商品檢驗局
- 18 綠茶製造法淺說 漢口商品檢驗局
- 19 紅茶製造法注意的幾點 漢口商品檢驗局
- 20 紅茶製造法淺說 漢口商品檢驗局
- 21 江西之茶業 俞海清 上海商品檢驗局
- 22 祁門茶 改良場二十三年業務報告 祁門茶場

- 23 皖浙新安江流域之茶業 傅宏鎮 安徽茶業改良場
- 24 茶樹的起源 中華農學會報 69期 54頁
- 25 茶樹原產地考 中華農學會報 37期 吳覺農
- 26 中國茶葉之過去現在與將來 農商公報 9卷 1期 鄭煥華
- 27 中國產茶之簡史及歷年出口情形 中外經濟週刊 25期
- 28 中外茶業略史 科學 3卷 371頁
- 29 日本茶業 農學報 14期 5頁 陳壽彭譯
- 30 紅茶經營之祕訣 商業雜誌 5期 俞鶴巖
- 31 改進中國茶業計畫 國際貿易專報 5卷 5期 蔡無忌
- 32 在死亡線上掙扎的中國茶業 新中華 2(16) 蔡無忌
- 33 復興茶業意見書 中華農學會報 121期 徐方幹
- 34 茶 農林新報 十二年 341頁
- 35 寧茶專號 江西合作新報 1卷 11期
- 36 中國茶業之經濟調查報告 全國經濟委員會
- 37 改善華茶之新氣運 國際貿易導報 2卷 吳覺農
- 38 中國茶業之概況及改進之方法 安徽建設月刊(22) 公度

- 39 二十二省茶業消費 錢業月報(14) 9
- 40 一年來改選浙茶之回顧 江浙建設月刊 9(11) 呂允福
- 41 福建茶產研究 福建建設廳 林景亮
- 42 祁門紅茶 農村合作 2(3) 程世瑞
- 43 兩湖茶 中行月刊 7(6) 166頁
- 44 臨湘磚茶調查記 實業雜誌 211期 周濟獻
- 45 品質增進主義的華茶救濟談 中華農學會報 37期 葛應敬
- 46 羊樓洞茶業場民二十年試驗計畫 湖北建廳月刊 3卷 1-2期
- 47 茶業調查 農報 1卷 611頁
- 48 浙茶概述 浙光 2卷 8期 筱霞
- 49 中國茶的分類 農聲月刊 187 劉君豹譯
- 50 茶樹原產地及其種類之研究 劉軫
- 51 茶樹育種問題 浙江建設 10(8) 呂允福
- 52 茶樹栽培法 大衆農村月刊 1(3) 江少懷
- 53 茶之栽培及製造 科學世界 2:53頁 楊任農
- 54 改良茶業聲中談談幾種茶樹害蟲 科學的中國 6(12) 余致遠

- 55 紅茶製造法改良之我見 國際貿易導報 6 (6) 傅幼之
- 56 綠沱茶之製法 四川省農學院 3 (19) 頁 興唐
- 57 輸出茶的檢驗與貿易 國際貿易導報 6 (7) 33 頁 胡浩川
- 58 二十五年出口茶葉檢驗新辦法 國際貿易導報 1 (8) 28 頁
- 59 實業部核准茶葉檢驗標準 國際貿易情報 1 (8) 33 頁
- 60 茶之色素 中華農學會報 146 期 徐方幹譯
- 61 Tea Blending as a Fine Art, by T. M. Walsh, Philadelphia.
- 62 The Sphere of Tea, by H. H. Ghosh.
- 63 Tales and Songs From an Assam Tea Garden, Thacker Spink Co., Calcutta.
- 64 All about Tea, India
- 65 Detail Report of the General Committee of the India Tea Association for the Year 1934.
- 66 The Cultivation and Manufacture of Tea, by Edward.



版權所有
翻印必究

中華民國三十年十二月初版

茶

全一册 實售國幣三角

(外埠酌加運費)

主編者 教育部特種教育委員會

編著者 戴龍孫

發行人 吳秉常

印刷所 正中書局

發行所 正中書局

(1294)

