

27392

察證辨治啓迪集卷之六目錄

道三編

瘡瘍門

一內科外科之說

一瘡瘍因由

一瘡瘍脉候

一瘡瘍宜分經絡

一血氣多少之歌

一瘡瘍宜灸之說

一用蟻針之法

一九逆五順之說

一辨瘡瘍淺深

一瘡瘍虛實明辨

一瘡瘍外發為順
內發為逆

一瘡瘍飲食
居處忌戒

一癰疽之渴証

一內托之論理

一內消之論理

一踈通托裡和榮衛三法

一止痛

貴苦寒
賤芳香

一之說

一瘡瘍辨治次序

一瘡瘍奇効之內藥并諸方用捨之辨劑

一瘡瘍外治之妙劑 一平補腎藥服時辨說

一瘰癧論治 一疔瘡論治 一乳癰論治

一腸癰論治 一肺癰論治 一便毒論治

一醫癰証治 一諸疔瘡証治 一甲疽治法

一癭瘤証治 一瘰癧子治法 一疥癬証治

一月蝕瘡治法 一囊疽因証治 一癩風論治

一楊梅天疱瘡証治 一血虛少少之瘡 一發熱更久之瘡

一內痔破傷風門 一瘰癧因由 一瘰癧相類

一破傷風因 一破傷風証 一破傷風治法

一不緣瘡口開合 一專緣內氣之虛實說

癩風門

一癩風本源 一癩風顯証 一癩風診脉

一其病始於腑及于臟 一癩風屬肺 一皆血熱之病

一其病始於腑及于臟 一癩風屬肺 一皆血熱之病

一治癩風 宜汗 宜下 宜出血 一癩風神驗方法 一癩風宜禁

救急門

一五絕奇治 一自縊治法 一溺水治法

一凍死治法 一伏暑治法

一墜血衝心欲死急治 一屍死鬼擊治法

一急喉閉奇治 一虫蛇毒傷治法 一獸毒治法

一骨鯁治法

一竹木簽刺治法

一湯火取傷治法

一漆瘡治法

老人門

一子孫恭恪
一養老至理

一貴補陰忌燥劑

一四時攝養

一因証禁

一老境例証

一床枕椅衣製規

一戒孤坐獨寢

一使無忿怒

一飲食嚴慎

一食療
一藥治

一次序

一戒用峻劑

一書偏見之戒
一宜主內經之說

老人諸証大抵并扶老全真捷徑

一中風

一氣中

一痿弱

一虛煩

一補中益氣順逆

一內傷
一勞傷不同

一傷寒風之辨辨

一四証疑似

一秘結

一久泄

一欬嗽

一痢

一尿數

一積塊

一眼昏

一頭眩

一瘡腫

一陰虛陽虛

一扶老忌偏味
偏氣之說

一無事生事

一補真六條

一保生五條

一養生三條

卷六目錄畢

一	論六科	一	論六科
二	論六科	二	論六科
三	論六科	三	論六科
四	論六科	四	論六科
五	論六科	五	論六科
六	論六科	六	論六科
七	論六科	七	論六科
八	論六科	八	論六科
九	論六科	九	論六科
十	論六科	十	論六科

察證辨治啓迪集卷之六

日本洛下 雖知苦齋


道三編

瘡瘍門

○內科 外科 之說

集驗

夫醫有內外，科猶治有內外之道。內治修而外治不肅，則夷裔得于之而國其殆矣。



若

徐悅之龍銜素鐵
井濬之癰疽要妙
越人之偃側灸圖
萃伯之枕中刺經

皆治外病之奇術制於外

以固其內調於內而防之於外爵者解之滯者導之

○瘡瘍因由

生氣通天論曰膏粱之變足生大丁
又曰榮氣不從逆於肉理乃生癰腫
至真大要論曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火
經曰熱勝血則為癰 濕熱之毒取止死不潰爛

集驗

夫癰疽瘡癤皆由

氣血不和
喜怒不時
飲食不節
寒暑不調

而發多生於膏

梁富貴之人平昔所食肥膩炙博安坐不勞嗜慾
無節以致虛邪熱毒內攻煎熬氣血而成也○然
取感有淺深故取發有輕重大小之不同也

○瘡瘍脈候

夫瘡腫之生皆由陰陽不和血氣壅滯若不診脈
何以知陰陽勇怯氣血聚散耶故治瘡瘍診候之道
必不可闕也

浮而

有力風
無力虛

浮而數者熱也正應發熱其不發

熱而反惡寒者瘡疽之謂也

洪脈主血實腫熱洪大者瘡疽之病進也疽結膿
未成者宜下膿潰之後脈洪大則難治若自利者

不治

滑脈之診實大相兼往來流利瘡疽之病見滑

脈 膿未成者宜內消
潰後則宜托裏

數脈不時見則生惡瘡
浮數表熱 沈數裡熱 諸瘡洪數


者裡欲有膿結也

芤脈 主血虛 潰膿後易治脈病相應

實脈按舉有力邪氣勝則實 久病虛人 得之最忌

瘡疽之人得實脈宜下

弦脈按之則堅而弦春脈浮弦而平不時見弦



緊脈瘡腫得之亦主痛也

國

瘡瘍

身重脈緩濕勝除濕
諸痛脈弦去風
脈濡瀉氣補血

瘡瘍者火之屬須分內外以治其本

其脈

沈實當先疎其內以絕其源也
浮大當先托其裡恐邪氣入內也

傳

脈數而身無熱內有癰

滑則為實滑則主榮
數則為熱數則主衛 榮衛實

熱則結為癰

夫腸癰小腹腫按之則尿數如淋時發熱汗出

惡寒脈

遲緊者膿未成可下之當有血
洪數膿已成不可下大黃牡丹湯去之

瘡瘍宜分經絡之說

當視其所發之地各從其經而處治

發於身之表者一十七名

腦發督脉足太陽

背發中属督脉餘皆足太陽

髮發手足少陽

眉發手足太陽少陽

頤發手足陽明

頤領發手陽明

髭發手足陽明

腋發手太陽

穿當發衝三脉

腿發表足三陽裡足三陰

腎癰足厥陰

喉癰任脉

臍癰任脉陽明

乳癰內陽明外少陽乳頭足厥陰

臀癰足太陽

驕馬癰足厥陰

囊癰足厥陰

發於腔子之內四名

內疽平太陽經

肺癰平太陽經

腸癰手太陽手陽明

胃脘癰足陽明

夫十二經有氣血多少之不同而癰疽亦有淺深之異

故治法或



○血氣多少之歌

明傳

○多氣少血凡六經

心腎脾肺三焦膽

○少氣多血合四經

小腸膀胱命門肝

○氣血俱多胃大腸

宜隨血氣多少治

○若瘡生少血之經則血少而肌肉難長瘡久未

谷必成死証妄用驅逐之藥以伐陰分之血禍不旋踵

○瘡瘍宜灸之說

瘡瘍 自外而入者不宜灸 自內而出者宜灸之

外入者托之而不內 內出者接之而令外

凡人覺發背欲結未結赤熱腫痛先以濕紙覆其上立候之其紙先乾處即是癰頭也

最要微覺早灸為上策

一日三日十灸十活
三日四日六七活
五六日三四活
過七日則不可灸

精要

夫 癰則皮薄腫高 疽則皮厚腫堅 初發並宜灼艾 唯 癰成則宜針 疽膿成則宜烙

凡治癰疽不問男女用騎竹馬灸法無不安愈 兩穴各或五壯 蓋此二穴心脉肝過處凡癰 癰皆心火留滯而生灸之則心火流通即安可 以起死救危之効屢試屢驗矣

先從男左女右臂腕中曲橫紋起用薄篔一條 量至中指齊肉盡處為則剪斷 起足要離地五寸許兩旁更以兩人扶定毋令動傾却以量 臂則子貼定竹托從尾間起貼脊量至則子盡處以墨占之 非灸穴却開左右各同身一寸以百圍記之即是灸穴也

凡腦疽及項已上有瘡斷不可直灸灸足三里 氣海穴而漸服涼胸化血之藥

○用蟻針之法 精要

常治癰癤不問老幼癰腫舉作用大馬螞一條安

瘡疽頂上吮其正穴膿血出毒散如毒大而螞小

須三四條方見功腹傍黃者力大若吮正穴螞必

死矣其瘡即愈若血不止泥藕節貼白茅花

九逆之說附死証 **傳五**

其証有善而易治者為惡而難治逆

逆也又噫氣痞塞

喘咳身冷自汗目

睛耳聾恍惚驚悸

錯語皆是惡証也

轉項轉動不便四肢沈重
聲嘶色脫唇青黑面目四肢浮腫五
煩躁時咳腹痛甚泄利无度小便如淋六
膿血大澁焮腫尤甚膿水臭穢痛莫近七
喘兼氣短恍惚嗜卧八
未潰先黑陷下唇黑大便汚九

精要

動息自寧飲食知味一

便利調勻二

神彩精明語声清朗三

膿潰腫消色鮮不臭四

体氣和柔五

順也

凡

五順見三則吉

九逆見五則危

發背透膜者死

此言肝
俞已上

未潰內陷而青唇黑便汚者死

潰喉者死

陰入腹者死

入囊者死

鬚深及數者不治

頤後一寸三分毒銳者不治

辨瘡瘍淺深

精義

腫高而軟者發於血脉

凡腫下而堅者發於筋骨

肉皮色不相變發於骨髓

又以手按按瘡腫^根根牢而大者深^根根小而浮者淺也


又^初初生瘡之時便覺壯熱惡寒拘急頭痛精神不寧煩渴必深也

凡瘡腫^大大按之乃痛者膿深也^少少按之便痛者膿淺也

○瘡瘍虛實之明辨 精義

夫^虛虛者難補^實實者易瀉 補瀉之法不可輕用若或少^六或^六少^六差

利害甚大然虛實之証多端不可不辨^六六^世



腫起堅硬膿稠^腫腫下軟慢膿稀^瘡瘡疽之^實實也^虛虛也

泄瀉腸鳴飲食不入^嘔嘔吐^無無時^四四肢^冷冷皮寒小便^利利或小便時難^聲聲音不出^精精神不^爽爽^藏藏府之^虛虛也

大便硬小便澀^飲飲食如故^腸腸滿^膨膨脹^胃胃膈^痞痞悶^肢肢節^疼疼痛^口口苦^咽咽乾^煩煩渴^身身熱^神神昏^藏藏府之^實實也

膿水清稀瘡口不^合合聚腫不^赤赤肌寒肉^冷冷自汗色^脫脫氣血之^虛虛也

腫起色紫寒熱^瘡瘡痛^皮皮膚^壯壯熱^膿膿水^稠稠粘^頭頭自昏^重重氣血之^實實也

頭疼鼻塞目赤^心心驚^咽咽喉^不不利^口口舌^生生瘡^煩煩渴^飲飲

精滑不滯大便自利^腰腰脚^沈沈重^睡睡卧^不不寧^下下^虛虛也

有項不便四肢沈重^目目視^不不正^睛睛不^了了^食食不^知知味^聲聲嘶^色色敗^四四肢^浮浮腫^真真氣^之之^虛虛也

諸^痛痛^為為^實實^也也

其脉 洪大而數 者 實 也 微細而軟 者 虛 也

大抵瘡疽之發 虛中見惡候者不可救也 實証无惡候者自愈也

○瘡瘍 外發為順 內發為逆 **精要**

初發疽時一粒如麻豆大身軀便發熱生疽處亦肉熱腫大而高多生疼痛破後肉色紅紫為外發癰疽惡欲盛如用藥有理百人百可活初發疽時不拘大小身軀无熱自覺倦怠生疽處亦不熱數日之間漸々開大不腫不高不疼不痛低陷而壞爛破後色黑為內發未發見之先藏府已潰爛百人百不救

○瘡瘍 飲食 居處 之忌戒 **精要**

濕麪炙燔煎炒醃藏法酒肥牛羊雞鵝虫魚之類

宜禁之 性 熱者發熱 冷者損脾胃 有毒者發毒 皆當戒之

病者之室深戒 腋氣之人 妊娠之婦人 月經現行婦人 孝子 僧道

病人忌作勞叫怒憂嗜慾

○癰疽之渴証 **精要**

癰疽大作毒氣炎盛大渴急服神仙追毒丸每日

一服取下惡毒次服清腫湯

清腫湯治癰疽熱盛焮腫疼痛作渴

生地黄 黃芩 去心 芍藥 人參 知母

其中 白茯苓 各二兩 外麻 黃芪

括萋

麥門冬 各三兩

右咬咀煎服

疽疾既安之後忽發渴疾者多不救預服加減八味圓而防其未然久服求不生渴疾未發疽人有渴疾亦須服之

加減八味圓

疽疾未生 癰疽初生 疽瘡既安

渴証出來並用之

地黃

酒洒蒸 二兩

山藥

山茱萸

去核各 一兩

肉桂

味淡者 半兩

澤瀉

牡丹

茯苓

各八錢

五味子

炒一兩半

右細末煉蜜丸如桐子大每日五更初未言已前

或

温酒 塩酒

吞下三四十九累試累驗

忍冬圓治癰疽大能止渴治五疰諸瘻

忍冬根莖花葉皆用入瓶內以無灰酒浸以糠火煨一宿取出曬乾入甘中少許為末以所浸酒打麩糊丸如梧子大每服五七十九酒飲任下未然既疽渴証皆宜服之

○內托之論理

○治腫爛于外根盤不深形証在表其脉浮而病在皮肉之法也其時非氣盛則必侵于內急須內托宜復煎散除濕散骨使胃氣和平

又 浮露而淺者為癰宜外消
截伏而深者為疽宜內托

○內消之論理

精義

夫癰疽丹腫之生皆由陰陽不調榮衛凝滯之所
致也若初覺氣血鬱滯皮肉結聚腫而未潰可疎
滌風熱通利臟腑一二行則得內消矣不然則毒
熱不散反攻其內

○疎通托裏和榮衛之三法

國

治瘡之大要須明托裏疎通和榮衛之三法
內之外者其脉沈實發熱煩燥外無焮赤痛深於

內其邪氣深故疎通截府以絕其源

外之內者其脉數焮腫在外形証外顯恐邪氣極
而內行故先托裏也

內外之中者外無焮惡之氣內亦臟腑宜通知其
在經當和榮衛也

用此三法之後雖未瘥必無變証亦可使邪氣
峻減而易愈

○止痛

貴苦寒 賤芳香

之說

⑤ 今富貴之人不知其節飲食肥濃雜以厚味日久
太過其氣味俱厚之物乃陽中之陽不能走空竅

先行陽道逆於內理則濕氣大勝子能令母實火乃大旺熱濕既盛又損其真水水乏則從濕熱之化而上行其瘡多出背此為大寸之最重者也

非苦寒之劑為主為君不能除其苦楚疼痛也

諸瘡瘍有痛往々多用乳香沒藥雜以芳香之藥

止痛必無少減之理若使經絡流通臟腑去其壅

滯必無痛矣苦寒之劑除其疼痛某下於咽則痛

立止此神品藥也

諸瘡痛用芩連苦寒詳上下分根梢及加引經藥

○瘡瘍辨治之次序

傳

腫瘍

為

宜

瀉利

如大便閉反寒熱少服黃連湯微利煩熱退却與內托如此則榮衛通行而邪氣不能內傷也

腫瘍時嘔當作毒氣上攻治之○潰後嘔當作陰

虛補之○年老潰後發嘔不食參芪朮輩峻補

膿出反痛此虛也宜補風冷取逼者宜溫養之

疽發深而不痛者胃氣大虛必死肉多而不知痛也

資稟厚者用苦寒某稟氣薄者補中益氣加苦寒

黑瘦血熱人四物加芩翹鼠粘

肥人濕熱宜防風荆芥羌活能勝濕

諸瘡疼痛不可忍

癰疽發渴乃氣血兩虛用生芪以補氣飯地以補血或忍

冬九黃芪六一湯

加味十全大補湯治癰疽潰後補氣血進飲食凡

膿血出多陰陽兩虛此某有迴生起死之功醫

者辨經絡觸類而長之可也時令

⑤瘡瘍取發而有癰疽癰癰輕重淺深或止發於一

經或兼二經者止當求責於一二經則不可于

擾餘經也

宜於所見部分用引經藥

瘡瘍食肉乃自棄也乃瘡瘍榮氣而作也今反補

之自棄何異雖用藥施治而不能愈

瘡瘍及諸病面赤雖伏火熱禁不得攻裏為陽氣

拂前邪氣在經宜發表以去之雖大便日不見

宜多攻其表以發散陽氣少加潤燥之某以潤之

如見風脉風証只可用發表風藥便可以通利得

大便行也

精要

大抵治瘡要法須是臟腑

堅而不秘

則真氣

不耗邪無所留

凡瘡潰之後尚覺虛熱五香湯內加犀角末

集驗

凡瘡

未被毒攻藏府一毫熱菜不可用

已破藏府既虧飲食不進一毫冷菜不可用

林癰疽初發用追疔奪命湯以內消

化毒消腫托裏散內托千金散

中間敷 按毒生肌定痛藥 按毒散

大結果用生肌膏藥

○瘡瘍奇効之內藥 并諸方甲 捨之弁倒 林

榮衛返魂湯順氣勻血神仙妙劑

何首烏 忌鉄 當歸 木通 赤芍藥 炒

白芷 忌火 茴香 炒 土烏藥 炒 枳殼 麩炒

其中 右九味各等分水酒湯使隨証唯流注

加獨活每服四錢病在 上食後 下食前 服之

此藥大能順氣勻血夫 氣陽也 陽動則陰隨 氣運則血行

陽滯則陰凝 血死則肌死 肌死則未有不死者矣

故必 調其陽 和其陰 二者不可偏廢

只調陽不和陰則氣旺而血凝肌必不活加五香

連翹湯之類是也

只和陰不調陽則血旺而氣弱疾必再作如內補

十宣散之類是也

發背既久不愈乃前醫曾用涼藥過也去木通倍當

歸脾健肉自生

治流注加獨活去氣血凝滯

流注傷寒表未盡餘毒流於四肢經絡澁於所滯而後為流注也加升麻蘇葉潮熱加干葛

流注者非傷寒之罪乃醫者表之未足也

癰疽初發氣血凝滯取成病人氣血盛者減當歸多則生血發於他所再結癰腫

癰疽胃寒生痰加半夏並用生姜

瘡瘍在上去木通恐道虛下元難於用藥老人虛

弱宜去之

病人若自瀉先生白礬丸止瀉而後用此藥此藥丸湯細抹皆可水酒湯使臨時裁度之

是方雖仙授要在用之得當不然則有刻舟之患林內托復煎散治腫爛於外根盤不淺形証在表其脉多浮疼在皮肉邪氣盛而必侵于內須急內托以救其裏也

地骨 黃芪 防風 各三錢 芍藥

黃芩 白朮 茯苓 人參 甘草

當歸 防已 各一錢 柳桂 淡味者

右咀咀分四貼先蒼朮二兩水十盞煎至六盞

去木每用一盞半入藥煎至八分服此除濕散

鬱熱和胃氣若大便秘煩熱少服黃連湯微利

熱退却服之

○瘡瘍外治之妙劑

守効散点疔疽惡肉

砒霜生

白丁香

松香

輕粉

川烏

生礬各二錢

蜈蚣一條

煨乾

右為極細末針刺瘡口血出唾津調葉貼之瘡

上其根自潰

諸錠子之輕重

第一緊峻砒霜生用開瘡口

第二緊緩砒霜煨用去死肉

第三緩慢去砒霜用枯礬生好肉

加銅綠膽礬輕粉白丁香班猫草麻等和打糊

為錠子如麻黃粗細約二三寸長隨瘡口淺深

入之

疼者可治
不疼難治

諸收斂之劑

○五枯礬 栝柳

黃丹

血竭

黃柏

輕粉

龍骨 黃連

石膏

烏賊骨之類可撰用為

末乾摻

○治金瘡日久不斂

栝柳 黃連

木香

各等分

右細末乾貼

○一加輕粉

乳香

密陀僧

黃栢 麝香

○一加白芨

○加白芷

減半

精要 癰疽深潰見五臟僅隔膜大鯽魚去腸實生羊糞

烘焙焦黑為末摻之瘡口遂取

癰疽而瘡口不合肉白膿血少為瘡口冷滯乃病

人氣血枯竭不朝於瘡如此以艾葉煎湯避風

處洗瘡口了以松香烟熏瘡口

瘡口將收之際最忌急澁斂口之藥

○平補腎藥服時辨說

精要

腎脈太虛當用補藥如用鹿茸附子之輩是抱薪救火如用平補之藥腎氣卒難平復有一貴人痼疾正生此一証諸醫無策李氏云昔聞名醫講論

凡人五更初腎氣必開若一言咳嗽腎氣復合遇腎開時進一服平補藥其功勝尋常峻補之藥十數服以此策獻之二三日之後脉已平復若人有痼冷虛弱危困之疾用此法

加味十全湯治癰疽後虛補氣血進飲食

黃耆焙 大地黃酒酒蒸各一兩 五味子炒

當歸身焙 川芎 人參焙 白茯苓

甘草炙 白芍炒 桂心忌火 烏藥 白朮

末淋浸切麩炒 橘紅去白名五錢

右咬咀每服一兩入生姜東子煎服

○瘰癧論治

瘰癧者結核是也或在耳前連及頤頷

或在頸下連缺盆皆曰瘰癧耳後或在胸之側連兩脇皆曰馬刀手足少陽主

之多氣少血之病也

分經用藥則不致有犯禁壞逆之失也

以上病証不係膏梁丹毒火熱之變因虛勞氣鬱

取致止宜補形氣調經脈其瘡當自消散不待汗

之下之而已○丹溪曰纔得腫痛參之脈証但有

虛弱便補血氣可保終吉若用尋常驅熱拔毒藥

慮々之禍如指諸掌

傳集

瘰癧必起於少陽不守禁忌及陽明大抵食味之厚

曰風曰熱皆此二端須分虛實實者易治自非

斷慾息氣淡食神仙不能治也

少陽經少血多氣故婦人見之月經不行寒熱便

生稍久轉為潮熱危矣

集

白花蛇散治九漏瘰癧發項腋或痛或不痛

白花蛇酒浸去皮生犀角二錢牽牛一兩半炒

青皮五錢右細末每服一錢入臍粉半錢五

更糯米飲調服已時下惡物乃病根也十日再

服忌發風熱毒物已成瘡者一日可効

瞿麥飲治瘰癧馬刀

瞿麥穗半斤 連翹一斤

右粗末水煎服此藥經効累多不能速驗待歲月除

治瘰癧之藥劑

通劑 木通 琥珀 赤茯苓 牽牛 瞿麥

風劑 防風 白芷 杏仁 升麻 薄荷

白花蛇

寒劑 辰砂 犀角 玄參 連翹 梔子

大黃 黃芩

血劑 桂心 桃仁 當歸 紅花 亂髮


芍藥 血竭

氣劑 木香 黃芪 檳榔 枳殼 人參 沈香

去毒劑 木鱉魚 牛旁子 射干 輕粉

引經劑 柴胡 青皮

右察脉証隨



而撰用之

外治

集驗

五倍子 海蝶蛸 檳榔 雷丸 灵脂 麝香

右為末 清油調塗 濕則乾搽

半夏 南星 血竭 輕粉 少許

右為末以津唾調傳

林 治瘰癧有頭無頭大蜘蛛晒乾細研油調日兩度貼之

宗正

灸法以手仰肩上微舉肘取之肘骨尖上是穴隨

患處

艾炷如小筋頭大灸七壯

再灸如前三次不過求無病四五年患者用業

不効辰時著艾灸到申時即落

又以蒜片放瘰癧子上灸七壯一易蒜多灸取効

疔瘡論治

疔腫之証皆蓄熱毒深而成者也多見食鼠牛

義精傳

瘦馬之肉而成此証其形有十三種

一曰麻子疔其狀肉起頭如黍色黑多痒忌食麻子

二曰石疔其狀皮肉相連色如黑豆甚硬忌瓦石

三曰雄疔其狀如頭黑高如錢孔漿水出忌房室

四曰雌疔其狀瘡稍黃似灸瘡心凹如錢孔忌房室

五曰火疔其狀如湯火燒灼忌火燒烙

六曰爛疔其狀色黑有白班膿水流出忌食沸熱

爛食

七日三十六疔其狀黑頭淨起今日生一明日生

八日蛇眼疔其狀瘡頭如小豆似蛇眼忌嫉妬人見

九日塩膚疔其狀大如起面四邊皆赤大忌食塩

十日水洗疔其狀大如錢形瘡頭白裏黑忌飲水

水洗渡河

十一曰刀鎌疔其狀濶狹如薤葉長一寸忌針刺

刀切

十二曰浮漚疔其狀瘡体曲圓長而狹內黃外黑

黃處刺之大痛黑處刺之不痛

十三曰牛狗疔其狀肉色飽起縮不破

夫十三種疔其形狀雖各不同而其所由皆熱毒之甚也

治法並急用奪命丹雄黃丸下之去其毒銳勢次服二活散病勢緩用引經藥

斟酌施治如無他証有熱即退熱有腫即退腫

如身冷自汗嘔逆躁喘狂喝妄語直視者皆毒氣入內不可治也

疔腫初發時突起如釘故謂之疔令人惡心惡寒

四肢強痛一日瘡變為焦黑色根硬刺之不覺

痛皆其候也在手足頭面胸背骨節間最急其

餘處則可治毒入小腹則煩悶恍惚似醉如此者

以三二日死矣

雄黃丸下疔毒

雄黃各一 爵金各一 巴豆十四个去殼 麝少許

皂角各一 全蝎各一

右細末滴水為丸如菽豆大每服二十九清茶

如毒送下

二活散每服三不願食且忌食

羌活 獨活 當歸 烏藥 赤芍藥

金銀花 酒洗 連翹 天花粉 甘中節

白芷各四斤 紅花 蘇木 蘇木 荆芥 蟬蛻

葛根各三斤 白檀二斤

右細末，每服三斤煎倉耳湯調下

破毒錠

信木 礪砂 黃丹 雄黃 乳香各一字

班猫五斤去翅足 麝少許

右為末麪糊丸如棗豆大針開疔頭納棗一九


以膏菜護之

以大蒜爛膏塗疔四圍留疔頂艾灸以爆為度宜

多灸百餘壯無不愈者

集驗

有五疔生處



又有紅絲疔魚疔其名甚多

紅絲疔頭生手足間有紅紫一條急用針刺斷不然其絲入心必難治

魚疔狀似魚睛也

凡治疔皆刺瘡心至痛處又刺四邊十餘下令血

出敷菜菜力入針孔中則佳仍服發汗清心之

劑蓋諸瘡皆屬心火心清則毒氣消散矣

赤芍藥湯治一切疔瘡癰疽初覺憎寒疼痛

金銀花 赤芍藥 各二分 大黃 各七分 枳殼 各各半

當版 其中 枳殼 各各半

右咬咀分二貼水煎加酒服之

○乳癰論治

乳癰多因乳母不知調養所致

以致厥陰之氣不行故竅閉

而汁不通陽明之血沸騰故熱甚而化為膿

或因乳之子膈有滯痰含乳而睡口氣煖熱所

散而成結核初硬忍疼揉令核軟吮令汁透可
散否則結成矣乳 房陽明胃經 頭厥陰肝經 取屬也

治法

青皮 疎厥陰之滯
石膏 清陽明之熱
生甘草 節行汚濁之血
瓜蒌子 消導腫毒

或加沒藥青橘葉皂

角刺金銀花當版或 須以少酒佐之

或灸痛處二三壯而尤妙

乳癰証 有兒者名為外吹姦 有孕者名為內吹姦 可以急治敷散

不然出膿即用生肌定痛藥

初起則發散流氣之禁 勿妄用針刀

傳乳癰

刺甘節

未潰青皮瓜蒌桃仁連翹川芎橘葉皂角

已潰參其芎飯白芍青皮連翹瓜蒌甘節

右隨証加減煎服

治婦人乳中結核

瓜蒌仁三各連翹二各甘節青皮各一各

右作一服水煎食後細嚼之

又方青皮瓜蒌仁桃仁橘葉川芎

連翹甘節皂角刺各等分

右咬咀每二三錢水煎食後細嚼之

傳集驗

婦人積真髮結成隱核有如散魚其厚子大其硬如石不痛數年發為瘡如岩穴之凹名曰乳癌

已破者加參其飯柴胡

初硬多服疎氣行血之藥情志如意則可愈

潰後膿汁浸淫胸脇氣切痛諸銳去其蠹肉諸

膏生新肉漸收斂

此疾多生於憂鬱積忿中年婦人未破者尚可治既破者多難治

若能



仍服內托活血順氣之藥獲愈矣

腸癰論治

集驗

腸癰之為病初起覺腹中微痛小腹腫而強抑之則痛小便澁似淋時々汗出復惡寒其脉洪數者為有膿可下其脉遲緊者未有膿不可下

甚者腹肚脹大轉側有水声或

膿從臍出大便膿血

初以疎利之其道其滯次用排膿消毒托裏之藥調之

此其大法也

此疾陰陽偏勝喜怒無時伏於臍臍血凝氣滯回旋失度不能通行聚結成癰卒不曉其病庸醫

錯治則殺人

牡丹散治腸癰冷証腹濡而痛時々利膿

牡丹 人參 天麻 白茯苓 黃耆 木香

當歸 川芎 官桂 桃仁去皮各三分 香白芷

薏苡 甘草各二分

右剉散水煎食前服之

薏苡仁湯治腸癰腹中疝痛煩毒不安脹滿不食

尿澁

婦人產後虛熱多有此病縱非癰但疑似服之

薏苡仁 枳實仁各三 牡丹 薤仁各二

右咬咀為一服水煎服之

傳 大黃牡丹湯治腸癰

大黃四分 牡丹二兩 桃仁五十个 芒硝三合 瓜蒌子半升

右細切水六升煎取一升去粗入硝一沸分三

服

有膿即下膿
无膿即下血

腸癰當作濕熱積蘊治入風難治

○肺癰論治

集驗

肺癰者乃肺經感受風邪熱毒所致也多因久嗜

炙燻肥膩或勞傷氣血以致心火炎熾薰灼肺

金令咳嗽咳而不已遂成肺痿寸脉數而咳中

有濁唾涎沫若口中辟々燥欬又胸中隱々而

痛脉反滑數此為肺癰咳唾膿血

脉數而

虛者為肺痿
實者為肺癰

初起皆可殺若日久唾膿臭敗者不治也

其脉

微緊而數者未有膿
甚緊而數者已有膿也

若

膿如米粥及嘔膿不止脉浮大面色赤者皆難治
膿自止脉短而瀉面色黃白者皆可治

治法當

補肺
瀉火止嗽定喘為佳

升麻湯治肺癰乳間隱痛口吐膿血氣作腥臭

升麻

桔梗

薏苡仁

地榆

黃芩去心

赤芍藥

牡丹

生甘草

各三分

右粗末每服三錢水煎溫服

排膿散治肺癰吐膿後排膿補肺

嫩黃芪

白芷

五味子炒

人參各等分

右細末每服一錢食後蜜湯調服

四順湯治肺癰吐膿五心煩熱壅悶咳嗽

貝母去心 紫苑去苗 桔梗炒各一兩 甘草炙半兩

右劉散水煎冷服咳甚加杏仁三枚

一方薏苡細末糯米飲調下或入粥內者亦

下膿血便愈

傳肺癰其脉

緊數為膿未成也 緊去而但數者膿已成也

肺癰

先解表邪然後瀉肺湯桔梗湯隨証用之 以取膿此治腫瘍之例也 終以黃芪湯補裏之陰氣此治潰瘍之例也

○便毒論治

集驗

夫便毒者生於小腹下兩腿合縫之間初發寒熱交作腿間腫起疼痛是也夫腎為作強之官所藏者精與志也男女大慾不遂其志故敗精搏血留

聚中途結為便毒矣

觸與而動心 夢寐而不洩

既不得交

合故精血交滯而成腫結也初起慎忌寒涼之藥

惟當發散寒氣清利熱毒精血宣暢則自然愈矣

括蕞散治便癰等惡瘡

括蕞一升 金銀花 牛旁子炒各三升 生姜

甘草各半兩

右不犯銅鐵搥碎水酒煎沸空心溫服微利為度

三物湯治便癰

牡蛎 大黃 山梔子 各等分

右剉散水煎露一宿空心温服

傳丹溪曰便毒是厥陰經濕熱因勞倦而發

射干 三寸紫花者是也紅花者非也

同生姜煎食前服利二三行効

已結成膿者 大黃 酒拌 連翹 各五 枳實 各

厚朴 甘節 各二 桃仁 二十

右剉散入生姜水煎服

國消毒飲治便毒三四日可消

皂角刺 金銀花 防風 當歸 大黃

甘節 蕪仁 各等分

右咬咀水酒煎食前温服仍頻提掣手頂中之髮

立効

○醫癰証治

醫者居小腹之後此陰中之陰道遠位僻雖曰太陽多血然氣運不到血亦空來中年後尤慮患醫癰絕有腫痛參之脉証但見虛弱便與滋補血氣可保終吉若無積補之功其禍在結痂之後慎之羗活湯治足太陽經中尻醫生癰堅硬腫痛大作

左右脉俱緊按之無力

羌活

黃柏

酒炒各二分

防風

藁本

飯尾

各二分

桂三分

連翹

甘草炙

蒼朮

陳皮

各五分

黃耆一分半

右細剉作一服煎熟加少酒熱服空心以衣蓋覆攤上使藥力行去衣

○諸疔瘡之証治

附陰瘡

集驗

夫疔瘡有數種



之類也

血疔乃臟中虛怯邪熱相侵外乘分肉之間發於

肌膚之上初如紫芥破時血出遍身行處成瘡

氣血損傷皮肉虛痒

風疔乃足陽明胃經受風邪熱毒客於然谷之間

注在承山之側初如疥癬破時黃水浸淫漸生

遍躰或生小兒耳邊

牙疔皆由幼年好食甘甜煎燂辛熱之物胃經積

邪熱上牙齒之間發腫痛成腐肉敗血牙斷潰

爛臭穢難近以致牙齒脫落久不愈成大患

下疔乃男子玉莖生瘡皆取欲不遂交接不潔邪

毒浸淫或成便毒病或損爛陽物

應効散治氣瘰疬蝕瘡多年不効

地骨皮 冬月自取

右細末用紙撚蘸搽瘡口頻用自然生肉更用

米飲調二錢日進三服

博金散治下疳蝕鼻爛腫痛

白礬各五錢 細末於沙器內火上炮汁盡

密陀僧 白堊 二各 黃丹 輕粉 各一 乳香 五分 麝香 一字

風右細末先別用槐枝葱白塩其中煎湯淋洗搽

乾搽末甚者三五次瘥

麝香輕粉散治血疳陰蝕瘡耳疳瘡

麝香 輕粉 各五 乳香 沒藥 白礬 飛過各一兩

右細末乾貼

栝榔散治玉莖上陰頭疳瘡漸蝕透久不愈

栝榔 雄黃 輕粉 密陀僧 黃連

黃栢 朴硝 各等分

右細末先以葱白湯洗搽乾瘡 濕乾搽 乾油調塗

一方治下陰瘡疼不止

滑石 密陀僧 寒水石 根各半兩 臍粉 麝香 各少許

右細末或乾貼油調傳

一方治下部疳瘡

一 炉甘石 密陀僧 各一各半 輕粉 一分

龍骨 五分 麝 少許 椽斗子 燒灰存性

右細末先荆芥杜仲川椒煎湯浴洗而後用葉乾貼

青金散治走馬牙疳蝕損唇舌肉腐牙落臭爛神效

銅綠 砒製各等分

右研細用些少傳患處

治下疳用灯心燒灰入輕粉麝香少許研末乾貼效
陰頭生瘡用陳大螺蛳殼煨存生為末先塩湯洗傳之

陰頭瘡久不愈入皮肉連莖潰爛用荆芥黃柏馬

鞭蒼耳生葱煎湯洗去膿訶子燒灰入麝香少

許乾摻仍禁房事三五月

歌曰 陰瘡痒痛黃汁注 輕粉石膏濕乾傳 不然細研生白礬 冷水洗之根亦去

○ 甲疽治法

綠礬散治甲疽痛甚

綠礬 炒五分 苦薺 生 麝香 一字

右研細小絹袋盛葉納指於袋中線割定瘡即

去之

一方治甲瘡弩肉如蛇頭

一用硫黃末薄敷便消縮


○癭瘤証治

林人之血氣循環一身常欲無滯留之患



癭多結於頸項之間
痛隨氣凝結於皮肉之中
忽然腫起狀如梅李久則滋長

醫經 瘰有五種石肉筋血氣也
瘰有六種骨脂膿血石肉也



集驗

肉色不變
筋脈現露
赤脈交絡
隨憂惱而消長
堅硬而不可移

林治法

瘰有五種悉不可火破破則血崩多致大
在也
瘰有六証脂瘤破之去脂粉則愈餘五証
不可輕火也

昆布丸治一切癭瘤

昆布 洗 海藻 洗 小麥 醋煮乾 各一兩

右細末煉蜜丸如杏核大每一丸食後嚼嚥

一方治瘰用自然銅貯水瓮中逐日飲食皆用瓮
內之水其瘰自消或火燒烟氣久吸亦佳

瘰癧生皮膚頸項面上 大者如拳 或軟而不痛 小者如栗 硬而不痒

凡斷厚味用海藻 二兩洗 黃栢 二兩 為末置掌中

時々紙之以津唾吞下待消二分之一止藥

○痲子治法

一方取蜘蛛絲纏於痲根妙

一方以針穿頭髮於患處數次穿愈

一方天南星末醋調塗數次即落

一方灸痲子上壯以水滴之即去

一方用雞肫黃擦之自落

○疥癬証治 夫疥癬者由脾經濕熱客於肌膚所致也

風毒之 浮淺者為疥 沈深者為癬

癬則發於肺之風毒也久而不愈延及遍身浸淫潰爛

或 一者有細虫而能傳染人也

五疥

- 一曰火疥嫩赤疼痛有膿
- 二曰馬疥隱起帶根搔不知痛
- 三曰水疥涪漏含漿摘破出水
- 四曰乾疥痒而搔之皮肉起乾痂
- 五曰濕疥薄皮小瘡常流汁

是也

癬起於肌膚癢疹或

或如莓苔走散內藏汁

而外有筐

六癬

- 一乾癬搔則出白屑索然彫枯
- 二濕癬搔則多汁浸淫如虫行
- 三風癬搔則痺頑不知痛痒
- 四牛癬如牛領之皮厚而且堅
- 五狗癬時作微痒白点相連
- 六刀癬輪廓全無縱橫不定

是也

治法



庶絕其根

當歸飲子治瘡疥風癬濕毒燥痒

當歸 川芎 白芍藥 地黄 防風 蒺藜

荆芥 各一錢半 何首烏 黃芪 甘草 各一

右作一服水煎食遠服或為末亦可

熏疥方 明信 雄黃 各半 椒末 一

右研細用紙方尺熟艾攤平摻勻菜末捲成長

錠点火慢烟熏疥癬其煙莫令透眼耳口鼻為効

治濕癬方

黃連 明礬 各 胡粉 黃丹 水銀 各一

右細末和猪脂研令水銀星令散磁盒收用傳之

抹散治乾癬不癢

天南星 草烏頭 各一枚 生用

右細末羊蹄根汁調塗三瘡

團治身上廔痒

四物湯加黃芩煎調浮萍末一錢日三服

金一方治諸癬

以半夏二兩搗末以陳醬汁調和摩塗癬上日
二三次即瘥

○治乾濕諸癬股內陰下濕臭或作瘡

用胡粉一物傳之常用大驗

神掃散治諸癬

羊蹄根 燒存性 明礬 巴豆 花椒

右各等分細末米醋調塗患處

○月蝕瘡治法

胡粉散治耳疔月蝕瘡

胡粉 炒黃 枯礬 黃丹 煨

黃連

輕粉

胭脂 半斤

麝 少許

右細末先溫漿水入盥洗拭乾傳之乾者油調敷

一方胡粉 東壁土 和末乾摻

○囊疽因証治法

囊癰濕熱下注也有作膿者此濁氣順下流入滲

道因陰道或虧水道不利而然膿盡自安不藥可

也在善於調攝耳

丹溪曰治囊疽數人悉由濕熱入肝經處治而用

補陰藥佐之雖膿潰皮脫畢丸懸掛者不死

○癩風論治

林

白癩者面皮頸項身軀皮肉色變白肉色不同亦
不痒痛也是風邪搏於皮膚血氣不和取生也

一方治紫白癩風

硫黃 輕粉 杏仁 各等分

右為極細末姜汁調擦

又云治紫癩風硫黃末醋調以茄蒂蘸擦患處

紫白癩一般風附子硫黃最有功姜汁調勻茄蒂

蘸擦三度永無踪

一方 硫黃 一兩半醋 海螵蛸 一斤

右細末浴後生姜蘸擦數度絕根

追風丹治癩風

蒼木 米泔浸焙 何首烏 荊芥 苦參 各等分

右細末和皂角膏丸如梧子大每服五十九空

心酒下忌動風物

○ 楊梅 瘡 証治 天庖

楊梅瘡或名綿花近年以來極多至今未息世

俗多用疔風之菜治之但庸醫務速効輕粉丹麝

等毒劑幸而氣血實盛者得愈無事怯弱之人變

生壞証不知戒守變成疔風又輕粉多用兼以麝

香透入骨節遂成風塊經年痛痺膿爛輕粉但量

人虛實用之可也

疑辨素無天疱楊梅綿花等瘡近來盛行閱諸方皆無
治法惟丹溪通聖中加減量入厚薄治療得效雖
遲而病者十無一壞世俗皆不遵用惟口傳筆授
不審虛實冷熱遂以輕粉雄黃龍麝諸毒之劑攻
之殊不知此藥賦厚血實之人可庶幾也
稟薄血少之人死期迫

但以解毒 祛風 涼血量人虛實功效保全

患家亦不可求速效反自取死誠可警矣

薰藥 汞 輕粉 雄黃 鉛錫各一

木鱉子五 麝三分

右將汞鉛化開共為末以紙捲入如筒燃之令患
人飲食以壯其胃然後令正坐薰其瘡以綿被圍
之勿令某烟風泄出汗其患即効

體虛 氣弱之人不宜薰恐發腫

○ 括蒼人一方

當歸 芍藥 川芎 胡麻等醉仙散 八味

羌活 何首烏 白芷 姜蚕炒 荆芥

連翹 黃芩 梔子 皂角刺 玄參

甘草 芙蓉葉 葳靈仙各一

右為末米糊丸梧子大每服七十九茶下煎服
亦可實熱瘡盛者入輕粉二錢

破傷風門

○破傷風因


若夫破傷風証因事擊破皮肉往往視為尋常殊不知風邪乘虛而客襲之漸變為惡候又諸瘡久不合口風邪亦能內襲或用湯淋洗

○破傷風証

其為証皆傳蟠經絡燒爍真氣是以寒熱間作甚則口噤目斜身躄強直如角弓反張之狀死在旦夕

○破傷風治法

治法同傷寒有



故不離平汗下和

三法也是故

偏邑野人不知此殺人之易

○不緣瘡口開合避風犯風專緣內氣之虛實之說

因破傷風有因外傷於風所作者俱是血受病
血屬陰五藏之脈生故此傷始雖在表即傳入臟
故多死也

又此病或

瘡口坦露不避風寒而无筋傷
瘡口閉合密避風邪而反病此
病已十分安全而忽有此

大抵皆由内氣虛而有鮮熱者得之内氣壯實而
無鮮熱者雖傷而无所害也

癩風門

癩風本源

經曰肺風或為癩風者榮衛熱肘其氣不清故使
鼻柱壞而色敗皮膚癢潰風寒客於脉而不去故

名曰癩風

大風病是受得天地間殺物之風古人謂之癩風
者以其酷烈暴悍可畏耳

夫八方之風起因於八方

應其時則物生
違其時則殺物

之稟受有殺氣者則感而受之如持虛受物

原其取由多是熱血得寒致或夏月勞甚入寒水
冬月酒後踢水履霜

及入水取魚由是濕熱鬱于內而不散風寒客于外而不行內外拂鬱既久而漸成肌肉之敗腐經脈謂熱勝則肉腐是也

○癘風顯証

凡癘風肌肉麻木瘡癬疔瘡膿汁淋漓眉髮墮落手足脂脫頑痺痛痒白皮脫落鼻梁塌倒眼爛齒豁色粘唇揭病証之惡無起乎此

○癘風診脈

脈浮而大浮為風虛大為氣強風虛相搏必成癘痒久々而為癘

傳脈

浮緩者易治洪大而數者難愈

脈溢者病在上覆者病在下皆為不治之証也

○其病始於腑而及于臟之說

傳此証歸重於二陽明之經手陽明大腸足陽明胃脾肺二

經之腑也脾主皮毛脾主肌肉乃腑及於臟病也其熱毒

積于中而形於外耳故治法必先取陽明後及太陰

○癘風屬肺

生虫屬木皆血熱之病


經曰脈風成為癘先樺皮散從少至多服五七日

灸承漿穴七壯再灸二灸之後服一聖散泄熱去脈風戒房事三年病愈此治肺風之法也

然此疾非止肺臟有之以其病發於鼻俗呼為肺
 風鼻腫準赤脹大而為瘡乃血隨氣化也氣既不
 施則血為之聚血既聚則使肉爛而生虫至生虫
 則厥陰主之宜瀉火熱利氣之劑虫自不生也
 用藥皆疎泄肺氣也灸承漿乃陽明
祛逐血分之邪熱之任脉之
 會取以通脉散風也

傳濕熱甚必生風風甚則生虫

治法必先



之急務也治雖多門大畧不越乎此也

○大風有上下分之說

其疔瘡與瘡上躰多者氣受之上下同得者血氣

俱受甚重下躰多者血受之非醫者神手病者鉄心罕有免者

丹溪云在上者以醉仙散取臭涎惡血於齒縫


所出雖有上下道路之異然皆不外乎陽明一經

治此病者須知此意

○大風五臟見証并邪來順逆

洞虛云大風有五黑色不治餘皆可治

虫食



或

痺 痛

如針刺狀

自足起者為逆風 頭面來為順風 多因感寒熱與痰濁雜氣而成

○治癘風

宜汗 宜下 宜出血

因

內經論病針二百日眉毛再生針同發汗也但無藥者用針一汗可抵千針 一人病風面黑爬搔不已眉毛脫落刺其面大出血如墨每刺自額至顙隔日一刺至二十餘日方已

○但癘証

在經宜針 在表宜汗

經絡有惡血留滯故宜出血或

於腫上 於委中

腸胃有穢惡虫積故宜下

皆宜泄表裏血氣邪熱之毒也

○癩風神驗之方法

樺皮散治肺風遍身瘡疥癩痒

樺皮 四兩 燒灰

杏仁 二兩 去皮 尖別研

枳殼 四兩 燒存性

荊芥 二兩

甘中 灸半兩

右細末每服二錢食後酒調下

傳醉仙散治癘風遍身癩疹癩痒麻木

胡麻子 牛旁子 葛荊子 枸杞子 四味俱炒 此系色

白蒺藜 苦參 瓜蒌根 防風 各五各

右細末每一兩半入輕粉一錢拌勻每服一錢茶

清調下晨午夕各一服後數日先於牙縫內出臭涎

渾身疼痛昏悶如醉後利下膿血惡臭病根乃去

通天再造散治大風惡疾

鬱金 五分 大黃 一兩 炮 白牽牛 六各半 生半炒 皂角刺 一兩 經年 黑大者

右細末每服五錢日未出時以無灰酒調面東服之

當日必利下惡物或臭膿或虫如虫口 黑色乃是多年 赤色乃是近年

數日後又進一服無虫積乃止

二聖散 皂角刺三斤炭火燒存性為細末每服

二錢用大黃煎湯調服

升麻湯治諸風熱疔躄上如鼠走口反縱皮色變 上

外麻 三兩 茯神 人參 防風

犀角 鎊 羚羊角 鎊 羌活 各兩 官桂 半兩

右改咀水煎入竹瀝少許溫服

河間曰 早服禪皮散 午前升麻湯下 馮青丸 晚服二聖散 皆是緩劑疎油

脉中之風熱也

瀉青丸方見小兒門

浮萍散治諸風疥癬及疔疾

淨萍

四名

荊芥

川芎

甘中

麻黃

去節

赤芍藥

當歸

各二名

右咬咀入葱白水煎熱服取汗

用桑柴灰熱湯淋汁洗頭面最妙

傳

一方倉耳葉為君苦參為佐酒浸烏鱗魚代補蛇

之缺研細糊丸如桐子大每服五六十九熱茶

清送下日三服一二月而安○若入紫萍尤捷

紫萍多水蛭寒月於山沼取之洗去泥略蒸乾用

法治手指彎曲節間痛甚漸至斬落

草麻子去殼

黃連

剉如小豆大

右各一兩水一升小瓶浸

春夏三日秋冬五日

取草麻子

破平且時而東以浸菜水服一粒漸加四五粒

微利不妨忌猪魚累獲神効

要

一法治惡疾遍身生瘡濃煎萍湯浴浸半日大効

此神方也

心

一方 倉耳

淨萍

鼠粘子

炒各等分

右為末每服一二名豆淋酒調下

一法四物湯加黃芩煎調淨萍末服之

癘風宜禁


斷諸般肉魚腥椒料果實煨燒炙燂又茄子等物

只宜淡粥熟菜淡酒煮熟

○要丹溪云宜絕味斷慾予嘗治五人得効者惟一婦

人耳因貧甚無物可喫也

○用藥之外



獨淡內觀又在夫人而不

在乎醫也

○或從上

漸而來者皆是可治之病人見病勢之

緩多忽之雖施治病愈不能絕味斷色皆不免再

發再發則終不救矣

○不仁極狠之業雖有悔言而無悔心良得其情然

亦有傳染者

○林切戒房室公私無務一切口味悉宜屏置

救急門

○五絕奇治

囊

歷 繼 溺 廢

死此名五絕

產後暈絕

用半夏一味為末如豆大吹納鼻中須臾即活

○自縊治法

○

救自縊自且至夕雖已冷可活心下微温者一日
 以上可活急抱使繩寬解法切不可割斷微々撚
 正喉嚨放仰卧用被盖急用竹管吹其兩耳一人
 急牽髮不放手就用脚踏兩肩一人摩其胸及屈
 伸其手足摩將之如治以粥湯少許灌之
 又以手揜其口勿令透氣兩時氣急即活
 一方刺雞冠血滴著口中即活

男用此
女用雄

仍塗喉下

○溺水治法

○

先解開溺者口橫放筋一隻令其牙啣之覆瓿以
 溺者腹覆在其上令頭垂出水。或橫腹圓木上
 亦可水出

仍取壁土一堵置地上以死者仰卧其上更以壁
 土覆之止露口目自然水氣翕入土中
 仍急用竹管各於口耳鼻膻糞門內更迭吹之令
 上下氣相通

又用半夏末少許搗其鼻如略活用清粥飲灌之
 又急解去衣帶艾灸臍中即活矣

○一法取小蛙皂角為末葱白汁和丸棗核樣內下

末一錢煎桃葉湯調下

○急喉閉奇治

急喉閉腫痛手足厥冷即時氣閉不通用皂角三皮擲水一盞灌下立愈

○虫蛇毒傷治法

毒蛇螫人急掘地坑以埋瘡處堅築其上毒即入土中痛止

蛇入人竅急用刀割尾挾辛辣物用絲縛定自出不可拔

中蛇毒勿渡水渡水甚

辟蛇法雄黃成塊秤五兩帶之入山則諸蛇不敢近

蛇傷不可便貼膏菜及生肌散之類謂毒不出也

先用大黃黃芩牽牛滑石類瀉十餘行即時減腫然後敷貼

一方治蛇毒及一切虫傷

五靈脂 酒洗去沙石 雄黃 五斤

右為末每服三升酒調服又以末傳之

龍腦薄荷苛治蛇毒 研汁調摩温酒服

手塗傷處露中心 毒氣出來自平復

細辛草撥及雄黃 好酒研來入麝香 不問蛇毒并惡犬 管交下服便安康 一方毒蛇傷入眼黑口噤手足強直毒氣入腹

一部中其水自出效

○凍死治法

四肢直口噤只有微氣大釜炒灰令煖以袋盛熨
心上冷即易之日開氣出以清粥少々進之若不
先溫其心便多則寒熱相爭必死
凡冬月凍倒扶在煖處不得便與熱湯及向火灸
雪中行凍便近火脚指墮落
下方治凍死
生薑 研
陳皮 去白
右各一兩水煎溫服

○伏暑治法

不可使冷冷之即死用溫湯熨心腹間如途中則
用路上熱土放臍腹間令人尿其中
○墜墮瘀血冲心欲死之急治
若氣絕不能言取菜不能及急壁開口以熱小便

灌之

○魘死鬼擊治法

房中被鬼打作聲叫喚不省竈心土研末每服二
錢新汲水調下

又灸兩足大拇指聚毛中三五壯

或中鬼氣忽倒地四肢冷手握拳鼻口出血雄黃

末一錢煎桃葉湯調下

○急喉閉奇治

急喉閉腫痛手足厥冷即時氣閉不通用皂角三皮擲水一盞灌下立愈

○虫蛇毒傷治法

毒蛇螫入急掘地坑以埋瘡處堅築其上毒即入土中痛止

蛇入人竅急用刀割尾挾辛辣物用絲縛定自出不可拔

中蛇毒勿渡水渡水則痛甚

辟蛇法雄黃成塊秤五兩帶之入山則諸蛇不敢近

㊟

蛇傷不可便貼膏菜及生肌散之類謂毒不出也先用大黃黃芩牽牛滑石類瀉十餘行即時減腫然後敷貼

一方治蛇毒及一切虫傷

五靈脂

酒洗去沙石乾用一兩

雄黃

五名

右為末每服三小酒調服又以末傳之

歌

龍腦薄荷苛治蛇毒

研汁調摩温酒服

手塗傷處露中心

毒氣出來自平復

細辛草撥及雄黃

好酒研末入麝香

又 一方毒蛇傷入眼黑口噤手足強直毒氣入腹

白礬甘中各等分為末每服二錢冷水調下

○治蜈蚣毒歌
蜈蚣毒須頭垢搽
 桑葉芋根研取汁
 雄黃雞冠血亦佳
 各般塗傳總除他

○獸毒治法
林

犬咬亦不可便貼膏菜及生肌散之類

治犬咬腫疼毒氣入腹嘔不可食頭痛

南星生用 防風各等分

右為末摻傷處

一方用生葱搗爛貼之

一方以牛糞塗之

一方嚼杏仁傳之

○治猫傷塗薄苛汁良

○治鼠咬津調麝香塗

一方治犬咬人發狂刮虎骨末酒服方寸匕極妙

○骨鯁治法

治骨硬入喉 縮砂 其中各等分

右為末綿裹噙之旋々嚥津久之隨痰出

一方野苧根洗淨搗如泥每龍眼大一丸噙喉中効

一方用螻蛄腦一物吞亦治刺不出傳之即出

一方以瞿麥為末服方寸匕又口衄鷓鴣則下

一方治鯁骨橫喉中六七日不出取鯉魚鱗皮合

燒作屑以水服之則出未出更服

○竹木簽刺治法

林 治諸刺在肉中不出以象牙末搽○搗蜻蛚付之○生牛膝莖搗末塗之即出○以頭垢塗之○取白茅根燒末脂膏和塗之

要精

治箭鏃入骨不拔

巴豆

炒去殼

蟋蟀

右研勻塗傷處須痛定必微痒且忍待極痒便撼動箭鏃拔之立出

一方以蠓蛄搗取汁滴上三五度箭頭自出

○湯火取傷治法

林

治湯火取傷赤爛熱疼

赤石脂

寒水石

大黃

各等分

右細末新汲水調塗

妙方草麻子蛤粉等分為末

湯傷油調塗
火傷水調塗

一方蛤蜊殼燒末油調塗神妙

一方柳枝燒灰塗之

一方薤與蜜搗塗甚速

一方傳濕牛尿痛止

一方治湯火爛瘡杵生胡麻如泥厚封之

一方中熱油痛甚以白蜜塗之○以石膏末傳瘡上

○漆瘡治法

治漆瘡用磨刀石泥塗之妙

一方薄苛煎湯洗之

一方以韭葉研付之

一方湯溶芒硝濃搽之

一方蜀椒煎湯洗之

一方取解蟹黃塗之

一方莧菜煎湯洗之

一方杉木煎湯洗之

一方芥菜葉煎湯洗之

一方荷葉煎湯洗之

一方黃櫨木煎湯類洗之

老人門

○子孫恭恪
養老至理

貴補陰忌燥劑

○高年之人真氣耗竭五臟衰弱全仰飲食以資氣

血

司馬公曰父母有疾專當以迎醫驗方合藥為務

事親者亦不可以不知醫
程子曰病卧于床委之庸醫比之不慈不孝可不慎歟

林為子與婦一有不及孝道便虧

古者井田之法行鄉閭之教與人知禮讓比屋可封肉食不及幼壯五十方絕食肉○當時之人血氣充和筋骨堅凝腸胃清厚今則不然幼少食肉強壯恣號食及五十疾已蜂起氣耗血濁筋暴骨痿腸胃壅閉涎沫充溢○而况人身之陰難成易虧六七十後陰不足以配陽孤陽幾欲飛越因天

生胃氣尚尔留連又藉米穀之陰羈縻而不走耳取陳前証皆是血少經日腎惡燥烏附丹劑非燥而何矣血少之人若防風半夏蒼朮香附但是燥劑且不敢多况烏附丹劑乎

憲老人倦怠不能自調在人資養以延遐筭為人子者深宜察寒温審饘菜依四時攝養之法順五行休旺之氣恭恪奉親無怠無忽

○四時攝養

林謹於攝生者
春夏奉以生長之道
飲食有節
秋冬奉以收藏之理

起居有常少思寡欲恬澹虛無精神內守此不藥之藥也經曰

春三月此謂發陳天地俱生萬物以榮夜臥早起廣步於庭

夏三月此謂蕃秀天地氣交萬物華實夜臥早起無厭於日

秋三月此謂容平天氣以急地氣以明早卧早起與雞俱興

冬三月此謂閉藏水冰地圻無擾乎陽早卧晚起必待日光

○因証禁

○惠若

生冷無節
飢飽失且
調停無度

動成疾患

凡人疾病未有不由八邪

外感於風寒暑濕
內飢飽勞逸

是也常宜慎之

衛生寶鑑曰

飢飽勞逸

則

傷氣
傷胃
氣耗
氣滯

夫老人內虛脾弱陰虧性急內虛胃熱則易飢而思食脾弱難化則食已而再飢陰虧難降則氣鬱

而成痰至於視聽言動皆成廢懶百不如意怒火易熾雖有孝子順孫亦是動輒拒腕况未必孝順乎

物性之熱者炭火製作者氣之辛辣者味之甘膩者

其不可食也明矣

雖然腸胃堅厚

者世俗觀之何妨奉養縱口

袖氣深壯

固快一時積久必為患害由是觀之多不如少少不如絕

○老境例証

○丹溪云人生至六十七十之後精血俱耗平居無

事已有熱証何者頭眩目眇肌痒尿數鼻涕牙落涎多寐少足弱耳聾健忘昏暈腸燥面垢髮白眼花久坐兀睡未風先寒食過易飢笑則有淚但是老境無不有此○烏附丹劑不可妄施至於飲食烹炮亦宜有節

○床枕椅衣制製規

○床榻不須高廣

低則易于升降

狹則不容漫風

枕宜低長實以菊花

低則寢無鏹風

長則轉不落枕

坐椅宜作矮禪床樣坐可足履地易於與居。老人多困坐則成眠左右置欄面前設几免閃倒之傷。

衣服不宜寬長宜窄衣貼身煖氣著射免蹴絆之失

○戒孤坐獨寢

○奉養老人常令人隨侍不可令孤坐獨寢緣孤僻易于傷感繞覺孤寂便成鬱悶。平生為性各有好嗜見即喜之時為尋求布于左右

○使無忿怒

○眉壽之人形氣雖衰心亦自壯但不能隨時人事遂其所欲雖居温給亦常不足。全在奉承顏色隨其所欲嚴戒婢使子孫不令違背若忿怒一作因而飲食便成疾患

○飲食嚴慎

○君子愛人以德小人愛人以姑息况施於所尊者哉惟飲與食將以養生不以致疾若以所養轉為所害恐非君子之所謂孝與敬也

好生惡死好安惡病人之常情為子為孫必先開之

以義理曉之

安於中和之味者
心收火降
欲縱火勝

○食療藥治次序

○為入子者遇其父不慎而有疾病且先詳食醫之法食療未愈然後命藥貴不傷其臟腑也

飲食不可頓飽但頻々與食恐腸胃虛薄不能消化也

○戒用峻劑

○上壽之人血氣已衰身軀昏倦風氣不順宿疾時

發或秘或泄或冷或熱此皆老人之常態也

宜順治之温平順氣進食補虛中和之藥

不同年少用狼虎之劑務求速効

汗之則陽氣泄
吐之則胃氣逆
瀉之則元氣脫
立致不虞大戒也

○一書偏見之戒宜主內經之說

先明之書者以胃氣為主恐誤外感作內傷
守真書者以熱為主恐誤以寒為熱

不若先主於內經則自然活潑之地

老人諸証大抵

○老人中風氣虛血澁尤為難療大抵察之在前

○初覺

半身或手足指或二指麻痺
口眼掉搖
口角流涎

皆中風之兆

也或因

痰
氣
食

隨証治之

至中則危矣

○老人氣中者先以蘇香灌之却隨寒熱虛實調之

○經曰無故而瘖脉不至不治自已謂氣暴逆也氣

復則已

世俗治風多用

烏菜順氣散治風調氣
八味順氣散補虛行氣

○老人有內臟精血虛耗使皮血肉筋骨痿弱無力

○以能運動故致痿躄

風氣皆外所因

痿則內臟不足之所致

也

痿証

肺金燥
血液衰少

不能榮養百骸古方混入風

治丹溪懶世之罹此疾者丁寧告戒痿之取不足者乃陰血也諸方補陽氣之劑也能免實之虛虛之患乎不虛之病

○虛煩發熱老人多有此証

○或用心于經史作勞發熱頭痛而脉浮數或微執事經常用心

細皆無力悉似傷寒妄發散汗泄則氣血愈虛禍

不旋踵宜補中益氣湯

○補中益氣順逆

○東垣所謂飲食勞倦內傷元氣則胃腕之陽不外

舉并心肺之氣陷入中焦而用補中益氣治之此

實是也

但于氣之降者固効於氣之外者反增其病

豈可特為通行之法乎

○內傷勞傷不同

勞倦傷誠不足矣

飲食傷有有餘不足

飲食自倍而停滯故宜踈下或壅盛者吐之

飢餓不飲食胃氣空虛為不足須補益

辨人

得土以養百骸

失土以枯四肢

胃主傷四臟無生氣病日篤矣

○傷風寒之辨

傷寒初感之証必頭痛發熱惡寒無汗脈緊乃是傷風惡風有汗鼻流清涕脈浮而緩或嗽喘

○四証疑似

傷寒外感必惡寒無汗寒熱無間斷左寸與右寸脈大能食知味頭痛筋骨疼手背熱鼻氣不利

內傷亦惡寒但避風得溫煖處或添蓋衣便不覺寒自汗寒熱不常右寸與氣口脈大妨食不知味尿黃多唾手心熱頭痛時或有之

痰飲發寒熱腰背痛或肢節痛或欬或短氣脈弦微

沈滑或雙弦偏弦

脚氣必先從脚起緩弱痺痛或筋骨酸疼或胸滿氣

急壯熱憎寒勞傷困熱無氣以動懶言脈浮夾風

沈滑兼熱沈緊夾寒沈細夾濕脈緩軟為虛宜分

治

○秘結

老人大便閉不可用大黃巴豆蓋津液枯竭用之

則愈耗通後必再閉甚於前潤腸湯丸之類用之

○久泄

老人久患泄瀉胃中津液耗少無積聚者必當先


實脾土養陰外胃氣為主

○欬嗽

老人咳嗽多白必肺氣不足惟宜滋陰補氣降痰為主不可驟用劫劑恐有風寒濕熱等邪得滋無由消散宜加減二陳湯

○痢

濕熱滯下多由



風寒皆能作痢

但自虛實不同况老人脾氣弱

主補而兼



實者宜下中病則止

切不可初行劫瀉之藥

宜審氣血虛實而治

○尿數

老人小便頻數惟宜滋陰補腎氣為主

有熱者宜滋腎丸忌熱燥丹劑耗損真陰

○積塊

老人積聚有原氣胃氣虛者惟宜攻補兼濟以大湯菜補劑養之以丸藥緩消之不可峻下急攻損

傷正氣故曰養正積自除

○眼昏 熱邪攻心 或風火上升 或血虛 或氣弱 或天

團 中年已上 眼目昏暗 非素有熱証 不可服苦寒之藥 及温燥風劑

大抵是 原氣 陰氣 不足

能遠視 者乃氣虛 而血盛 老人桑榆之象也

不能近視 者乃血虛 而氣盛 皆火有餘 原氣不足

惟宜甘寒冲淡地黄山藥之類 滋陰養氣

林 老人 目暗 耳聾 腎水衰而心火盛也

○頭眩

團 老人頭眩當

氣虛者用升陽補氣 血虛者用滋陰補血


實者 痰涎 風火 食邪

也 痰涎鬱遏者宜開痰導滯 風火所動者宜清上降火 食邪者宜消導

若因外感而得分四氣皆宜散邪

○瘡腫

團 癰疽之疾 年高人最宜慎之



疽則皮肉紋起不澤

癰則皮光

並用灸法甚妙

痛灸至不痛
如不痛灸至痛

○陰虛陽虛

○世俗言虛損之病似指陽虛而議治殊不知人身之虛悉是陰虛病在可治者皆陰虛也陽果虛損其死甚易焉能救

扶老全真捷徑

○扶老忌偏味之說偏氣

○中年已上之人氣血兩虛精神短少頭每痛日晡微熱食少力倦腰膝酸痛固真飲子最宜此方備

五味合五氣中和補五臟之真精益三焦之原氣生津液利機關飲食自倍固不可例用香燥金石之劑

醫經萍洄曰陰陽之在人

均則寧
偏則病

○無事生事

○無病服藥無事生事此誠不易之論也潔古之明言也夫天之生物五味備焉食之以調五臟過則生疾



久而增氣氣增而又大身之由也

酸傷筋自
辛傷皮毛自
甘傷肉自
苦傷氣自
鹹傷血自

嗜欲食五味則必自裁制勿使過焉

五
穀為養
果為助
畜為益
菜為充

氣味合而食之補精益氣倘用之

不時食之不節猶或生疾况菜乃攻邪之物無病而可服哉無故求益生之祥病反生焉

液

過

鹹味凝變色
苦皮粘毛折
辛筋急爪枯
酸肉胔胸唇揭
甘骨痛髮落

○補真

通玄集云其補真妙理只要心頭無事內外俱忘

一齊放下

抑怒以養陰

忍喜以全陽

淡食以養胃
內觀以養補
則水生火降

行以一心對無窮之事不亦勞乎

心悲

陰集

不悲不樂恬澹無為者

志樂

則

陽散

謂之元和

傳 調中益氣湯曰空心温服寧心絕思藥必神效也
○保生

人待老而保生是猶貧而後苦積勤雖勤亦無益矣

得 人少年時不知道知道亦不能信行至老乃知道
便以晚矣病難養也晚而自保猶得延年益壽若
年少壯而能行道者神仙速矣

行 不適其性而強云為逐強處即病生
賢者造形而悟
愚者臨病不知


山居四要曰

察 汗出
醉時 不可扇生褊枯

入夜不可多食肉令人陽事興恐不可制

○養生

著養生五難



五者無於

宵中則不祈善而有福不求壽而自延也

經 聖人舉事行止雖常在時俗之間然其見為則與

聖時俗有異尔聖人為無為事無事

晚食當肉

緩步當車

無罪當貴

無災當福

瑣顏蠲四當

察證辨治啓迪集卷之六



