



丹溪心法附餘卷之二十二

休寧東山古菴方廣約之類集

小兒門

上

小兒諸病

九十九

丹溪心法

○乳下小兒常多濕熱食積痰熱傷乳為病大槩肝與脾病多小兒易怒肝病最多大人亦然肝只是有餘腎只是不足

○小兒初生未經食乳急取其草一寸火上炙熟細切置
地上出火毒一時許用水一小盞熬至三分之一去滓用
新綿蘸滴兒口中令嚥盡須臾吐痰及瘀血方與乳食年
長知膚無病

○小兒急慢驚風發熱口禁手心伏熱痰熱咳嗽痰喘此
類証並用湧法吐之重劑瓜蒂散輕劑用苦參赤小豆末
須臾薑汁調服之後用通聖散為末蜜丸服間以桑樹上
牛兒陰乾焙末調服以平其氣驚有二証一者熱痰
主急驚當吐瀉之一者脾虛乃為慢驚所以多死當養
脾急驚只用降火下痰養血慢驚者先實脾土後散

風邪只用朱砂安神丸重於血藥中求之

○小兒驚然無故大叫作發者必死是火大發則虛其氣
故也

入方里龍丸 治小兒急慢驚風

牛膽南星 一兩

青礞石煅 一兩

青黛 半兩

蘆薈 二錢

辰砂 三錢

僵蚕 半錢

蜈蚣 一條

燒存性 天竺黃 半兩

右為末甘草煎膏丸如雞頭大每服一二丸急驚即美

密薄荷湯下慢驚煎桔梗白朮湯下

治驚而有熱者

人參五分

茯苓分

白芍藥

酒炒白朮

一錢

右吹咀姜水煎夏月加黃連生甘草竹葉

通聖散見斑疹類

朱砂安神丸見驚悸類

瓜蒂散見疸類

○痔病或肚大筋青

胡黃連丸 治痔病腹大

胡黃連

半錢去
果子積

阿魏一錢半醋浸
去肉積

神麴

二錢去
面積

麝香四粒

炒黃連

一錢去
熱積

右為末猪膽汁丸如黍米大每服二三十九白朮湯送

下 又云胡黃連丸十二粒白朮湯下

五積丸 治小兒諸般疳積

丑頭末

一兩黃連半兩

陳皮一兩

青皮半兩

山查半兩

右炒焦黑色為末每用巴豆霜半錢前藥末半錢糯米

餅丸麻子大小兒二歲十在五更姜湯下至天明大便

泄為度溫弱補之未利再服三五丸

烏犀丸

丑頭末

三兩青皮三兩

史君子肉

半錢白蕪荑半錢

鶴虱五錢

蒼朮一錢燒紅

碎另研

苦練根皮五錢

右炒令焦黑色為末，麩丸，麻子大，每三五丸，米飲送下。食前量小兒大小加減。

黃龍丸

三稜 三兩 黑角義木 三兩 青皮 一兩 山查肉 七錢

乾姜 七錢半

右用麩丸，麻子大，日晒乾，食後姜湯下。量兒大小加減。

○烏犀黃龍問服，食前服烏犀，食後服黃龍。

肥兒丸 治小兒疳積

蘆薈 另研 胡黃連 三錢 炒麩 四錢 黃連

白朮 山查 炒半 藍黃 炒二錢

右為末，蘆薈和勻，猪膽汁丸，米大，每六十九，食前米

飲下

疳黃食積

白朮 黃連 苦參 山查 炒

右為末，麩糊丸，麻子大，食後白湯下十五丸。

食傷胃熱熏蒸

白朮 一兩 半夏 半兩 黃連 半兩 平胃散

右用粥丸，食後白湯下二十九丸。

○心法附錄曰：小兒疳病者，小兒臟腑嬌嫩，飽則易傷乳。

哺飲食一或失常，不為疳者，鮮矣。疳皆因乳食不調耳。

肥無節而作也或嬰幼缺乳粥飯太早耗傷形氣則疳之根生延及歲月五疳病成甚者胸陷喘噦乳食直瀉腫滿不利腹脇脹疼皮發紫瘡肌肉光紫與夫疳勞渴瀉面稿色天骨露齒張腹硬不食者皆危篤矣凡此等類虛扁復生難施其巧

○子熟

炒芍藥

香附

滑石一兩

甘草三錢

黃連二錢

右作四服水一盞半生姜三片煎乳母服

○風痰

南星

一兩切用白礬末半兩水一兩指厚浸酒乾研細入

白附子二兩

石為末飛白麵糊丸如芡實人每服一二十丸姜蜜薄

荷湯化下

白附丸

牛膽南星

一兩須用黃粘牛胆臘月粉南星親手修合風乾隔一年用牛胆瀝入二三次者佳

大陳半夏

研粉白南星水一兩切作片用臘月雪

更枯白礬二錢半

右為末宿蒸餅丸如桐子大用姜汁蜜湯送下有熱加

薄荷葉

紫金丸

治小兒哮喘不止端午日修合

黑椒四十九粒浸透去皮研如泥次入 人言一錢 鵝管石一錢

右為末丸如黍米大朱砂為衣每一丸或二丸量兒大小空心冷茶清下當日忌生冷葷腥熱物服藥病止後更服白附丸三五貼

○小兒腹痛多是飲食所傷宜

白朮上 陳皮中 青皮中 山查中

神麴炒中 砂仁下 麥蘆中 甘草下

受寒痛者加藿香吳茱萸有熱加黃芩水煎服

○小兒腹脹

蘿蔔子蒸 紫蘇 乾葛 陳皮等分

甘草減半

食減者加白朮煎服

小兒好喫粽成腹脹疼用白酒麴末同黃連末為丸服之愈

又方 治小兒腹脹

茯苓皮 陳皮 赤小豆 蘿蔔子炒

不通各半錢 木香二分 甘草些少

右咬咀姜一片煎服

○小兒吐瀉黃疸

三稜中 莪朮中 青皮中 陳皮上

神麴炒中

茯苓上

麥蘖下

黃連下

甘草下

白朮上

右為末調服

傷乳食吐瀉加山查

特氣吐瀉加滑

石發熱加薄荷

○夏月小兒吐瀉用益元散錢氏五補五瀉之藥俱可

用吐瀉腹痛吐乳調脾以平胃散入熟蜜加蘇合香丸

名萬安膏用米湯化下

○夏月熱病六一散最妙

○小兒痢疾

黃連下

黃芩下

陳皮上

甘草中

右以水煎服

赤痢加紅花桃仁

白痢加滑石末

又方治小兒食積痢

炒神麴中

蒼朮中

滑石中

白芍上

黃芩中

白朮上

甘草下

陳皮下

右咬咀水煎下保和丸

一方加茯苓

○小兒赤痢壯熱用藍青搗汁每服三五錢之妙

○小兒黑斑紅斑瘡痒癩疹並宜用防風通聖散為末調

服

○小兒口糜

戴云謂滿口生瘡者便是

江茶二錢 粉草二錢

右為末敷之一方用黃丹一錢炒過傳之

又方

苦參一錢 黃丹一錢 五倍子二錢 青黛一錢

右等分為末敷之

又方

青黛二錢 芒硝一錢

右為末敷口中吐嚙俱宜

又方

黃柏二錢 細辛三分 青鹽五分

右等分為末嚙之吐出涎不過三日愈亦治大人

胎毒口瘡五倍子黃丹甘草江茶芒硝等分為末敷之

○龜胸

蒼朮中 酒栢中 酒芍藥上 陳皮上

防風中 威靈仙下 山查中 當歸上

痢後加生芋中水煎服

○小兒夜啼此是邪熱乘心

黃連一錢 姜汁炒 甘草二分

右用竹葉二十片煎服 又方加入參二錢半作二服

入姜一片煎

又法夜啼不止潛取捕雞窠草一握置小兒身下

○小兒脫肛

戴云脫肛者大腸脫下之說

○脫囊即外腎腫大

戴云脫囊者陰囊腫大墜下不收上之說或云潰爛陰丸脫出

入方

木通中 甘草下 黃連炒中 當歸上

黃芩中

右以水煎服

又方 治脫肛

用東北方陳壁土泡湯先熏後洗

又方 治脫囊

紫蘇葉莖為末如爛乾傅如未破用香油調鵝翎掃青荷葉包上

○小兒木舌

戴云木舌者舌腫硬不和軟也又重舌者亦是此類二者皆是熱病

入方

百草霜下 芒硝下 滑石上

右為米酒調傳之

重舌用好膽礬研細傳之

○咯血

戴云咯紅者即唾內有血非吐血與咳血同

入方

黑豆上

甘草中

陳皮中

右水煎食後服

○小兒尿血

甘草湯調益元散加升麻煎服尤妙

○小兒喫泥胃氣熱故也

入方

軟石膏中

黃芩中

陳皮中

茯苓上

白朮上

甘草下

右用水煎服

又方

膩粉一錢砂糖和丸如麻子大米飲下一丸瀉出土之

瘡

○小兒鮮顱乃是母氣虛熱多耳

戴云即初生小兒頭二骨未合而開者

入方

四君子與四物子母皆可服有熱加酒炒黃芩黃連
生甘草煎服外用帛束緊用白欬末傅之

○小兒吐蛇虫

以苦練根為君佐以二陳湯煎服

小兒冬月吐蛇多是胃寒胃虛所致錢氏白朮散加丁香
二粒

錢氏白朮散

藿香

白朮

木香

白茯苓

甘草

人參錢一

乾葛二錢

右為末每一錢至二錢水煎服

○小兒口瘡

治法用搖鼻方

鬱金下

藜蘆中

瓜蒂下

右為末水調搖之

○小兒禿頭

用白炭燒紅碎長流水令熟洗之內又服酒製通聖
散除大黃而用酒炒入研為末再用酒拌乾每服一
錢水煎頻服 外又用胡荽子伏龍肝懸龍尾即梁
塵黃連白礬為末油調傅

又方

松樹厚皮燒灰二兩

黃丹水飛

寒水石細一兩

白礬枯 黃連

大黃各半兩

輕粉四盞或四分

白膠香熬飛 傾石

右為末熬熱油調傳瘡上須先洗了瘡痂傳之佳

又方 治小兒癩頭并身癩等証

松皮燒灰 白膠香 枯礬 大黃

黃栢等分

右為末用熱油調敷

○小兒頭瘡

臘猪油半生 雄黃 水銀等分

右研和勻洗淨傳瘡上

又方

川芎 酒片苓 酒芍藥 陳皮半兩

酒白朮 酒當歸半兩 酒天麻 蒼朮

蒼耳半錢 酒栢 酒粉草四錢 防風三錢

右為末水盪起煎服日四五次服後聽片時

又方 單治頭瘡

松樹皮厚者燒 白膠香熬沸 傾石

黃丹水飛 白礬火飛 黃芩 黃連

大黃各三錢 蛇床子 寒水石三錢 白芷

無名異炒少木香少許輕粉

右為極細末熬熟油調敷瘡上須洗淨瘡去痂傳之佳

又小兒瘡

猪牙皂角法胡椒些小枯礬 輕粉

右為末槿腦燭油捺七日如嬰桃膠窠去椒

○小兒臍腫汁中

用枯白礬末付或黃指為末付之 又小兒臍不乾

伏龍肝塗 或用枯礬煨過白龍骨等分付之

○小兒天火丹臍腹起者赤瘡不效

蚯蚓泥炒調付

○小兒赤瘡 主執傷血

用生芋木通荆芥苦藥帶表之類外以芭蕉油塗患

處芒硝濃煎汁洗之 又方雞子清調伏龍肝傳之

○小兒耳後月蝕瘡

黃連 枯白礬等分

右為末傳之

○小兒鼻赤

雄黃中 黃丹上

右同為末無根水調傳之 又蒼耳葉酒蒸焙乾為末

調服最解食毒 又鼻下一道赤者名曰蠶以黃連末

傳之

羊夷膏 專治小兒鼻流清涕不止

辛夷葉一兩洗淨焙乾

細辛

木通

白芷各半兩

杏仁一兩去皮研如泥

木香半兩

右為細末次用杏仁泥羊骨髓猪脂各一兩同諸藥和勻於瓦石器中熬成膏赤黃色為度於地上放冷入腦麝各一錢拌勻塗顙門上每用少許塗鼻中

○小兒變蒸是胎毒散也

○乳兒瘡疾痞塊

川芎二錢

生芩

白芍藥一錢 陳皮

半夏

炒芩一錢

甘草二分

右作一服姜三片就煎下川山甲末半錢

○胎熱胎寒新增

附諸方

釀乳方 楊氏方 解胎中受熱生下面赤眼閉不開大小便

不通不能進乳食

澤瀉二兩

猪苓

赤茯苓

天花粉

茵陳

甘草一兩

生地黄二兩

右以咀每服二錢水一盞煎至半盞食後令乳母捏去

宿乳却服

生地黄湯楊氏方治小兒生下遍體皆黃狀如金色身上壯熱大小便不通乳食不進啼叫不止此胎黃之候皆因母受熱而傳於胎也凡有此證乳母宜服此藥并略與此兒服

生乾地黄 當歸 赤芍藥 川芎

天花粉各等分

右以咀每服五錢水一盞煎服

當歸散楊氏方治小兒胎中受寒生下再感外風面色青

白四肢厥冷大便青黑及腹皮盤腸內吊病並皆治之

當歸剉微 黃耆蜜炙 細辛 黃芩

龍骨細研 桂心 赤芍藥各半兩

右為末每服以乳汁調下一字日三服看兒大小加減

釣藤膏楊氏方治內吊腹疼

沒藥 乳香銼三 木香 姜黃各四錢

木鱉針

右先將後三味為細末同煎二味拌和煉蜜成劑收沙罐內量兒大小加減煎釣藤湯化下次服魏香散

魏香散錢氏方

蓬莪朮半兩 真阿魏一錢

右先用溫水化阿魏浸蓬莪朮一晝夜焙乾為末每服

台熱

心法附錄卷之五十一

五

二三百七許

一字煎紫蘇米飲空心調下

胎寒傷氣痛楊氏方

方用沒藥乳香各少許研細用木香一塊於乳鉢內磨水半盞調乳香沒藥末煎數沸服之立効
茴香散 宣明方治小兒盤腸氣痛

茴香炒

木香

黑附子

金鈴子

去核用皮

蘿蔔子炒

檳榔

破故紙炒

白豆蔻

煨各等分

右以咀每服二錢水盞半入鹽煎服

木香散 經濟方治小兒盤腸氣痛不已面青手冷日夜啼叫尿如米泔

川練子

二箇去皮核用巴豆三十五粒去皮同炒令豆黃去豆不用

木香

黃史君子肉

延胡索

茴香

各一錢

右同為末清米飲空心調下量兒大小服之

勻氣散 治氣滯不勻宿食不消心腹刺痛嘔吐惡心調脾胃進飲食

脾胃進飲食

丁香

檀香

木香

白豆蔻

各四錢

藿香

甘草

各八錢

砂仁

四錢

沉香

三錢

陳皮

四錢

右為細末用塩湯調不拘時服

○膈風撮口 新增

附諸方

官風散 治初生小兒臍風撮口多啼不乳口出白沫

全蠲二十一箇頭尾全者去毒用好酒塗炙為末

麝香一字別研

右同和為細末用半字金錢煎湯調服

辰砂殭蠶散 治小兒臍風撮口

辰砂

白殭蠶直者去絲

蛇蛻皮炒二錢

麝香別研

右為細末少許用蜜調傅唇口

治撮口 張氏方 治小兒斷臍為風濕所乘或尿在抱裙之內遂成臍風面赤喘急啼聲不出名曰撮口並皆治之

赤脚金頭蜈蚣一枚

錫稍四尾

姜蚕七箇

嬰麥半錢

右為末先將鴉翎管吹藥入鼻內使嚏噴啼哭為可醫後用薄荷湯調服之

定命散 陳氏方 治因剪臍傷於風濕致令唇青撮口

赤脚蜈蚣半條酒炙

川烏頭三箇射香少許

右為末和勻每服半字金錢薄荷湯調下

治撮口 湯氏方

用白姜蚕為末蜜調塗口唇內即瘥白姜蚕要死者

治撮口 聖惠方

用牛黃一錢研竹瀝一合調勻滴入口中

方

取活蝎虎一箇江廣名壁虎裝瓶內硃砂細末不拘多少亦入瓶內封口食砂月餘取出其身赤色陰乾為細末每服一二分酒下大効

方

用川山甲尾上甲三片羊油炙黃色蝎稍七箇共為極細末用人乳汁調塗乳上令兒吮之用厚衣包裹須臾小兒冷汗出愈

方

小兒落胎之時視其臍軟者無臍風即不須治臍硬直者定有臍風速用簪尖於臍根傍刺破一二處入射香末少許灸三炷後無臍風

又方同前

珍珠四十九粒研極細

黃丹

血竭各五分

白礬飛過

蛤粉

棗貓兒

飛虫青灰色棗子大頭上有兩角棗

上有之陰乾三枚無此味亦可

右六味為細末凡人家新生小兒綿裹臍帶離肚五六寸處先用軟線繒住却於線外將臍咬斷片時去線待血流盡用鷓鴣翎管送藥一二分入臍大孔內近肚處臍有三孔

大孔以手指輕輕揉散艾灸臍頭三炷結作紇絡軟帛腰
裹切不可常時揭看待臍落去自無風矣此方萬不失
一 又云臍硬直者宜用此法臍軟者不必用此法

一方

兒初生七日若有臍風必自發出青筋一道行至肚却
生兩岔待行至心不治必死知者常視其青筋初發速
照青筋頭上灸三炷或行至生兩岔處亦照兩岔頭上
截灸六炷青筋自消兒必活矣

一方

小兒初生七日急患臍風撮口百無一活父母坐視其
死而無救良可憫哉一秘法極有神驗世罕知之凡兒
患此者齒齦之上有小泡子如粟米狀急以溫水蘸青
熟綿裹手指輕輕擦破即開口便安不用服藥

○鵝口口瘡新增

附諸方

保命散 治小兒鵝口

白礬錢一 馬牙硝五錢 朱砂木飛一錢

右為細末每用一字取白鵝糞以水攪取汁調塗舌上
額頰內未用藥時先以手指纏亂頭髮指舌上拭舌上
垢然後用藥傳之

一 捻金散 治小兒鵝口口瘡

雄黃三錢 鵬砂一錢 龍腦少許 甘草半錢

右為末乾摻患處或用蜜調搽

一方 小兒白屑滿舌狀如鵝口葛氏方

用髮纏指頭蘸井花水拭口上如下脫濃煮粟米汁以

綿纏筋頭拭之却用煨過黃丹摻之

一方 小兒初生舌下有膜如柘榴子連於舌根令兒言

語不發

可摘斷之微有血無害如不止燒髮灰摻之葛氏方

瀉心湯錢氏方治小兒口瘡

用黃連去蘆為末蜜水調服 洗心散尤妙方見火門

殊礬散 和劑方治口瘡鵝口不能乳者

用殊砂細研白礬等分為末使亂髮纏指楷舌上令淨

以藥付之

一方 治小兒口瘡

枯過白礬一兩 黃丹一錢半 乳香

右件煉蜜為丸如皂子大臨卧嚙化小兒用筋頭點

一方 治小兒心有客熱滿口生瘡楊氏方

用天南星末醋調貼脚心又有用吳茱萸末米醋調塗

亦可

又方

用巴豆一粒去殼搗碎黃丹少許和捏餅外用紙護貼
眉心立止

真黃散 治小兒走馬疳

雞腔脛黃皮不以多少油燈上燒存性研細末入黃柏
枯礬射香一字用米泔水攪口內貼

立効散 同前

青黛

黃柏末

白礬煨

五倍子銹

右為細末用米泔水攪口內貼

牙疳散

珍珠七箇

二胡青一分

白礬煨三

千里沉石灰半

右為細末米泔水攪口貼

一方 治小兒牙疳

用白礬裝於五箇石子內合燒過為末貼之

○重舌木舌新增

附諸方

青液散 治嬰孩小兒鵝口重舌及口瘡

青黛一錢

龍腦一字

朴硝一錢

右為細末用蜜調鵝翎少許付上

一方 治小兒舌下生舌名曰重舌 楊氏方

用針刺去惡血即愈

治小兒重舌千金方

用竹瀝清黃蘗無時點舌上亦有用真蒲黃塗亦可

一方 治小兒舌腫塞口欲滿者

用紫雪一分竹瀝半合細研和勻頻置口中以盡為度

○胎驚夜啼新增

附諸方

一方 治小兒在胎中受驚故生未滿月而發驚楊氏方

用硃砂研細同牛黃少許取猪乳汁調稀抹入口中入

射香當門子者尤妙

治胎癩驚風湯氏方

用全蝎頭尾全者以生薄苧葉裹之以綿扎定火上炙

燥研為末入射香硃砂少許麥門冬湯下

真珠散湯氏方 治小兒客忤驚風痰熱心煩恍惚睡臥驚

跳特或咬牙啼叫不已小便赤澁或吐黃沫

真珠末

海螵蛸

滑石各一

茯苓

人參

白附子各二

全蝎各半錢

朱砂一錢

腦子

射香各半

金銀箔五片

右為末每服半錢燈心麥門冬煎湯入蜜少許調下

金箔鎮心丹

治嬰孩小兒鎮心解熱退驚安神除煩燥

止啼

全蝎縛用薄紗包慢火上火乾

天麻煨

防風去芦

羌活去芦 牛黃

赤茯苓去皮 犀角

甘草各一錢 射香

辰砂飛一錢 金箔二十片

右為細末煉蜜五九如皂角子大薄紗煎湯不拘時候服

治小兒夜啼

用蟬蛻二七枚全者去翅足為末入硃砂一字蜜調為

丸使吮之

燈花散三因方治邪熱在心內燥夜啼

用燈花三兩顆石為末燈心煎湯調末口中以乳汁送

下日二服

龍腦散澹寮方治小兒夜啼不住

蟬蛻洗去翅足鈎藤有鈎子 龍腦

茯苓去皮

人參各等分

右為末每服一錢水半鍾煎服不拘時

乳頭散湯氏方治夜啼不止腹中疼痛

黃耆

當歸

甘草炙

赤芍藥

木香各等分

右為末每挑少許着乳頭上使吮乳就服之

○變蒸熱發熱新增

附諸方

惺惺散湯氏方治小兒變蒸發熱或咳或痰涎鼻塞聲重
相似傷寒者此藥宜服

人參去芦半白朮

白茯苓

甘草

白芍藥

天花粉

桔梗去芦各

細辛二錢半去

葉六兩

右為末每服二錢水半盞姜一片薄切一葉煎服

神仙黑散子陳氏方治小兒變蒸與傷寒相似者當詳其

証若上唇中心有白點子者為變蒸宜服此藥

麻黃去節

大黃

杏仁和皮各

右燒灰存性為末每服一字水半盞煎服抱男於溫暖

處連進之有微汗身涼即瘥

生犀散 骨蒸肌熱瘦悴頰赤口乾日晚潮熱夜有盜汗

五心煩熱

犀角剉末二地骨皮

赤芍藥

柴胡

乾葛各一

甘草各二

右每服三錢水一鍾煎半鍾食遠溫服

○丹毒益熱新增

附諸方

四順青涼飲子和劑方治一切丹毒積熱壅滯咽喉腫閉

方見火門

牛黃散和劑方治五種丹毒

鬱金

桔梗去芦

天花粉

甘草

葛粉 各等分

右為末每服一錢薄荷湯入蜜調下

白芷散錢氏方治赤遊丹腫

白芷一兩

寒水石二兩

右為末米醋調付患處或腫至外腎有破處只用水調

生料四物湯湯氏方治血熱生瘡遍身腫疼

生乾地黄

赤芍藥

川芎

當歸去芦此

風續加

黃芩減半

右吹咀每服三錢水一盞煎服

防已散湯氏方治小兒伏熱毒之氣遍身赤腫入腹入腎

切防其殺人

漢防已半兩

朴硝

犀角

黃芩

黃耆

川升麻各二錢

右吹咀每服三錢水一鍾加竹葉蘆薈半鍾溫服

漏芦散湯氏方治五腫丹毒并諸瘡癬

漏芦

麻黃去根節連翹

川升麻

川芒硝

黃芩各二錢

白欬七錢半

甘草二錢半

川大黃一兩

右咬咀每服二錢水一盞煎服不拘時

方 治丹毒發作恐其入腹一時無藥

急以針於紅點處刺出惡血使毒於此而散

方 治走馬火丹

用景天一名慎火草一名仙指搗不拘多少搗爛取汁

塗之即効

土黃散 治赤流丹毒

先用小針刀子刺去流頭赤暈惡血毒汁次用

土硝一兩

大黃末一兩

右二件相合新汲水調拌勻用雞翎蘸藥時時塗掃

伏龍肝散 應驗方 治赤腫赤毒火毒走注

伏龍肝不拘多少用雞子清調敷赤腫處大効

升麻飲 經驗方 治小兒一切丹毒遍身壯熱煩渴

升麻

黃芩

大黃各一錢 麥門冬去心

葛根

朴硝

右為末和勻熟水調下半錢或咬咀作一服白水煎服

五福化毒丹 和劑方 治小兒蘊積熱毒驚惕狂燥煩赤咽

乾口舌生瘡夜臥不寧譫語煩渴頭面身體多生瘡癩

玄參水洗

桔梗各二錢 白茯苓二錢

人參去芦

牙硝枯

青黛各一錢

甘草炙七分

射香二釐

右為末煉蜜丸如雞頭大金銀箔為衣薄荷湯化下
九

消毒犀角飲和劑方治大人小兒內蘊邪熱咽膈不利痰涎壅嗽眼赤臉腫腮項結核腫壅毒聚遍身風疹瘡毒赤癩及瘡癬已出未出不能快透並皆治察小兒疹痘欲出已出熱尚未解急進此藥三四服快透消毒應手神效

鼠粘子四錢荆芥

甘草各一錢防風去芦半錢

一方加黃芩一錢

犀角錢五分如無以升麻代之

右用水一鍾煎至半鍾溫服

牛黃丸聖惠方治小兒心經積熱兩頰紅如塗胭脂手足常熱口乾燥

○上焦熱壅

牛黃一錢 天竺黃二錢錢餘三錢 大梔子四錢

右除牛黃天竺黃二味另研外再同四味研極細煉蜜為丸一周兒黃米大服三十九乳下三歲小兒菉豆大服三十九薄荷湯下

道小赤散錢氏方治大人小兒心經內虛邪熱相乘煩燥悶亂傳流下部小便赤澁淋閉臍下滿痛

生地黃 木通 甘草各二錢 一方加黃芩二錢

右用水一鍾竹葉十片煎至半鍾溫服

大連翹飲活幼方治小兒心經邪熱心與小腸受盛乃水

實之處常宜通利壅則結滑則脫熱則澁盛則淋平涼

心火三焦自順不待疾作而解證成而察者疎急有之

矣一十五味加湯使用統覺蘊熱客熱寒邪風邪冒入

肺經心將受之心不受觸傳于小腸或閉或澁或赤或

白淋瀝不通榮衛不順壅之作疾其發多端以至膈熱

眼目腫赤唇亡白澇津液不生喘喘稠盛須在表裏俱

得其宜驚風悉能散之痰熱亦自消除連翹之功可謂

大矣

連翹

瞿麥穗

滑石

車前子

牛蒡子

赤芍藥各八分山梔子

木通

川當歸

防風各四分黃芩一分柴胡

甘草各一分

荊芥穗二錢蟬退半錢

右用水一鍾半竹葉十片燈心十莖煎至一鍾服無時

天一丸韓飛霞方治小兒百病

燈心用十斤以米粉漿洗乾研末入水澄之浮者不用

赤白茯苓去皮

澤瀉去皮

滑石水飛過

猪苓去皮

澤瀉去皮

人參一斤

湯去渣瀉淨煉成膏

如錫糖可入藥

一方人參六兩白朮六兩甘草四兩同熬膏亦妙

右燈心等五味各足分兩為細末以人參膏和成丸如

圓眼大硃砂為衣貼金箔任病換引大段小兒生理本

天一生水之妙凡治病以水道通利為捷徑也

○廣按小兒陰不能配陽血不能配氣故凡疾作皆屬

火韓先生定此方清心而利小便正所以散火也凡

小兒蘊熱丹毒驚風痰熱變象發熱之症用此最當

而嘔吐瀉痢諸症無不治也

人參生犀散 解時氣寒壅咳嗽喘心忪驚悸臟腑或

秘或瀉及一切風熱

前胡七錢 杏仁去尖桔梗各三錢 人參三錢

甘草炙二錢

右每服三錢水一鍾煎半鍾食後溫服

天竺黃散 涼膈退潮熱

天竺黃七分大黃 蟬蛻各二分白殭各二分

川羌活 全蝎去毒 甘草各五分

右為細末每服一錢麥門冬煎湯調下

張砂湯 退虛熱和胃進飲食去心驚邪熱

白芍藥 人參 甘草各三錢 茯苓三錢

硃砂五分 石蓮肉五錢

直熱 心法附錄卷之三十三 二八

右為末次入硃砂研勻每服五分薄奇湯調服

耳露飲 鮮五毒治煩熱

寒水石 石膏各一兩甘草半兩

右為末如餅諸毒氣用生姜自然汁調服傷寒時氣作

熱發狂新汲水滴薑汁調服

瀉青丸 錢氏方治小兒肝經風熱目赤腫痛

當歸 龍膽草 川芎 山梔子

大黃濕紙裹 羌活 防風各二錢

右為末煉蜜丸如雞頭大竹葉沙糖湯化下一丸

三黃丸 全嬰方治小兒諸熱善治身黃黃疸衄血便血

黃芩 黃連去須 大黃各一錢

右為末滴水為丸茶清下三五十九

地膚子湯 千金方治小兒熱毒入膀胱中忽患小便不通

欲便則澀痛不出出少瘀血須臾復出

地膚子 瞿麥 知母 黃芩

枳實 升麻 葵子 猪苓各六分

海藻 橘皮 通草各三分 大黃一錢八分

右用水一盞煎至半盞去粗溫服

石葦散 活幼方治小兒熱淋沙淋石淋

石葦 海金沙 木通 滑石各一錢

右用水一盞煎至半盞去粗不拘時溫服

八正散 治小兒心經蘊熱臟腑秘結小便淋瀝方見火

梔子仁散 湯氏方治小便不通心神煩熱

梔子仁 五枚 茅根 冬葵根 各半 甘草 一錢

右為末每服二錢煎服

勻氣散 御藥院方治小兒脾肺氣逆喘嗽面浮膏膈痞悶

小便不利

桑白皮 二兩 陳皮 去白 一兩 桔梗 炒 一兩 甘草 炙 一兩

藿香葉 半兩 木通 四兩 赤苓 去皮 一兩

右吹咀每服三錢水一盞姜三片煎半盞溫服

○中惡天吊 新增

附諸方

蘇合香丸 和劑方治小兒卒中惡毒心腹刺痛方見氣滯

辟邪膏 楊氏方治小兒卒中惡毒心腹刺痛悶亂欲死凡

腹大而滿診其脉緊細而微者生緊大而浮則死急服

蘇合香丸再以皂角末搐鼻次服沉香降氣湯加人參

茯苓不愈進以辟邪膏無不效者客忤亦可服

降真香 白膠香 沉香 虎頭骨

鬼臼 龍膽草 人參 茯苓 各半兩

右為末入雄黃半兩射香一錢煉蜜為丸乳香湯化下

及令兒帶燒卧處尤妙

沉香降氣湯方見氣滯

九龍控涎散湯氏方治小兒蘊熱痰塞經絡頭目仰視名

為天吊

滴乳香一錢天竺黃二錢雄黃二錢別鵝茶二錢

白礬一錢煨甘草二錢荊芥穗一錢炒

菘豆一百粒半生赤脚蜈蚣一條酒浸

右為末每服半錢至一錢煎人參薄荷湯亦

釣藤散湯氏方治小兒天吊潮熱

釣藤 人參去芦 犀角屑 各半 全蝎二錢半

甘草一分 天麻二錢半

右為末每服一錢煎至半或普溫服

牛黃膏 治小兒風癇迷悶抽搐涎潮

牛膽南星依前製 全蝎去毒炒 蟬蛻去足各

殭蚕炒 白附子 防風 天麻煨各一

右為細末蒸棗去皮核取肉研為丸如小豆大用荆芥

生薑同煎湯研化食遠服

斷癇丹楊氏方治癇即愈而復作者

黃耆炙 釣藤釣子 細辛去苗葉 甘草炙各半

蛇退三寸 酒 蟬殼四箇 去 牛黃一 字別

右為末秦因為丸如麻子大煎人參湯下一歲十九大
小減用

細辛大黃湯湯氏方治風痼熱痼

細辛去苗土 大黃炮 防風去芦各其草半二錢

右吹咀每服二錢水半盞加犀角屑少許煎服

竹瀝膏湯氏方治小兒諸痼

白朮錢半 大附子祛皮犀角錢未各厚朴黃芩

半錢 全蝎七箇每一箇用大葉薄荷裹湯定慢火炙黃色

右為末取竹瀝為膏丸黑豆大母服用金錢薄荷湯化

下一丸隨元大小加減

至寶丹錢氏方治諸痼急驚卒中客忤並宜服之

安息香約一兩半為末無灰一箇飛過濾過沙石

琥珀研 硃砂 雄黃各一兩飛研水飛銀箔五十片

龍腦 射香各二錢 牛黃半兩各 生烏犀角

生玳瑁硝礬一 入金箔五十片一

右生犀玳瑁搗羅為細末入餘藥令勻將安息香膏以

重湯煮凝成和搜為劑如乾即入少熟蜜丸如梧桐子

大二歲服二丸人參湯化下大小量意加減

一方醫方集成治小兒癩痼及婦人心風諸疾

用其遂末一錢猪心一箇取三管頭血三條和其遂末

將猪心批作兩半以藥入在內用線纏定以皮紙包裹
水濕入文武火內煨熟不可過度除紙以藥細研辰砂
末一錢和勻分作四丸每服一丸猪心煎湯化下再服
別取猪心煎湯此方神效

龍腦地黃膏宣明方治小兒急慢驚風痰涎上潮心胸天
吊驚纏喉風小兒胸膈不利一切熱毒大有神效如病
不愈與分肢散一二服吐利得快常服此藥

川大黃別搗 甘草各半兩 雄黃水蜜者一分

射香一錢別 生腦子一錢

右五味各製了再入乳鉢內同研細煉蜜為膏油紙裹

如有前病煎薄荷湯下旋丸如皂子大化下如小兒大
人睡驚及心神恍惚前金銀湯下一丸常服新汲水下
大解暑毒如孕婦人常服水生男婦亦無疾病如有大
人陽毒傷寒加輕粉二厘 龍腦抄水化下 一丸杏核大
小兒看年紀大小加減服立效

分肢散宣明方治小兒卒風大人人口眼喎斜風涎暴心驚
癇天吊走馬喉閉急驚一切風熱等疾

芭豆半兩 不川大黃一兩 朴硝半兩

右入黃為末後入芭豆霜朴硝一處細研用油紙包起
如有前患每服半錢熱茶下吐下頑涎立愈如小兒膏

喉驚吊等先服龍腦地黃膏一服次服此藥一字茶下
時上吐下瀉微瀉以吐利得快為初大人半錢小兒一
字看虛實加減只是一二服見効不宜頻服如吐瀉不
定以葱白湯立効

○急慢驚風新增

附諸方

牛黃清心丸 治小兒諸病狂亂驚癇痰涎壅塞精神昏
憤見中風

一方 治小兒口噤牙關不開諸藥不効者

用天南星末一錢腦子少許研勻用紙蘸生姜自然汁

湛藥於左右六牙根上搽之便開

金箔鎮心丸 和劑方治風痰壅熱心神恍惚急驚搐搦

紫荷車 黑豆末煮軟二錢半 山藥 一兩 甘草 五錢

牙硝 一錢半 人參 五錢 射香 研半錢 金箔 十二片

龍腦 一錢 茯苓 五錢 朱砂 研飛一兩

右為末煉蜜成劑每兩作五十九丸以金箔為衣每服一

丸薄許湯下常服安心止驚散邪涼膈

抱龍丸 抱龍之義抱者保也龍者肝也肝應東方青龍

木木生火謂生我者父母也肝為母心為子母安則子

安况心藏神肝藏魂神魂既定驚從何生故曰抱龍丸

卷之三十三 三十四 三十五

理嬰孩諸驚四時瘟疫邪熱以致煩燥不寧痰嗽氣急
瘡疹欲出發搐並宜投此其藥性溫平不僭不燥常服
驅風化痰鎮心解熱和脾胃益精神

琥珀

人參

天竺黃

檀香

白茯苓

錢各七

甘草

炙一兩

枳殼

麸炒

枳實

麸炒各

辰砂

水飛二兩半

白山藥

炒

兩牛膽南星

錢

金箔

五十片

右各味為細末和勻取新汲水丸如芡實大陰乾用葱

白煎湯或薄荷湯痰壅嗽甚姜湯研化服

南星膏 治小兒精神不定恍惚不寧恐畏多哭常服去

風退熱消痰鎮心除百病

牛膽南星

臘月黃牛膽

內掛當風

上乾用五錢炒

和汁盛

人參

白朮

山藥

白茯苓

茯神

去木

羌活

甘草

炙各三錢

白僵蚕

去嘴

全蝎

去毒薄荷湯

浸炙各三錢

辰砂

飛別

射香

一字

右為細末入辰砂射香研勻煉蜜丸如芡實大金箔為

衣薄荷湯調化食後服

天麻丸 湯氏方治急驚風四肢拘急壯熱口噤

天麻

雄黃

烏蛇肉

蟬殼

乾蝎

射香

細研

天竺黃

細研

桂心

天南星

白附子

膩粉

白芷

半夏湯泡七次

右為末煮棗肉丸如菉豆大每服三五丸薄荷酒送下
珍珠丸全嬰方治小兒急驚風發搐涎潮壯熱及痰嗽擁

塞肚腹脹硬

白附子一錢 滑石一錢 巴豆十五粒 輕粉一錢

天南星一錢

右為末麵糊丸如菉豆大二歲一二丸葱心白湯送下

一方加蝎尾半錢炒

牛黃奪命散後卒方治小兒肺脹喘滿膏高氣急兩脇扇
動陷下作坑兩鼻竅張悶亂嗽渴聲啞不鳴痰涎潮塞

俗云馬脾風若不急治死在朝夕

白牽牛半生 黑牽牛半生 川大黃二兩

檳榔半兩 廣木香二錢

右為一處研作細末入輕粉少許每服二錢用蜜水或
漿水調下不拘時候微利為度

驅風膏全嬰方治小兒肝風筋脉拘急面赤目青眼驚搐

連劄及胎風

辰砂 蝎尾炒 當歸 草龍膽

川芎 山梔子 川大黃 羌活

防風去芦 甘草各一錢

驚風
心法附錄卷之三十一
三十一
右為末入射香少許煉沙糖丸如雞頭子大三歲一丸
薄苛竹葉蜜湯化下

瀉青丸 聖惠方治小兒肝臟實熱手尋衣領亂捻物目直
視不搖得心熱則搖身反折強直目連割或目內青或
臟腑殮泄諸藥不止脾虛肝盛者見母毒

○唐按已上二方皆瀉肝經風熱之劑也夫小兒肝常
有餘脾常不足故急驚風乃肝氣有餘宜用瀉青丸
之類瀉之慢驚風乃脾氣不足宜用醒脾散之類補
之

大効疎風散 活幼方治嬰孩小兒驚熱痰風四證聚結於
胸臆之間令兒昏困沉重因竅不通諸脉氣閉所以默
默欲食不食欲起不起倦伏不知其證候者但不經吐
利宜與服之立見甦省

錦文大黃 一錢半

鷄心栴榔 一錢半

黑牽牛 七分半炒

陳橘皮 去白一錢

右為末二歲兒服半錢蜜少許薄苛湯調下看大小加
減服之

紅綿散 湯氏方治夾驚傷寒

麻黃 去節

全蝎 炒

甘草 炙

天麻

大黃 煨

布裹白附子

蘇木 炒各等分

右為末每服一錢水半盞煎服

全蝎觀音散 治慢驚慢驚者因又吐瀉而脾胃先虛脾
胃與肝母子也母虛亦令子衰二經俱虛則生頑涎頑
涎者脾肺所出也涎則溢流在於咽喉如水雞之聲特
復瘦瘠是也此方主之

全蝎去毒十日天麻煨

防風

白芷

黃芪蜜炙甘草

茯苓格二錢人參二錢

白糯米姜汁去皮炒

右為細末用棗肉煎湯調勻不拘時候

烏蝎四君子湯 治小兒慢驚慢脾風吐瀉不止

人參

白朮

茯苓

甘草

川烏去皮尖全蝎去毒十日

右以咀姜三片棗一枚水一鍾煎五分食前服

理中湯 治小兒吐瀉手足厥冷加附子名附子理中湯

回陽方見中寒

八仙散湯氏方治慢驚虛風

天麻

白附子

花蛇肉

防風去芦

南星炮

半夏麩

冬瓜子

全蝎各等分

右以咀每服一錢水半盞姜棗薄切煎服加川烏尤妙

醱乳法湯氏方治慢驚嗜多驚馬啼凡面黃脉細者難治

人參 木香 藿香 沉香

陳皮 神麴 麥蘖各等分 丁香減半

右咬咀每服四錢水一碗姜十片紫蘇十葉棗三枚砂
甕內煮至半碗乳母食後捏妳汁服之即便臥霎時令
藥入乳之絡次食兒吮不可過飽亦良法也

吉州醒脾散 湯氏方

人參 橘紅 甘草炙 白朮

白茯苓 全蝎各半兩 木香 半夏麴各二錢半

白附子四箇 陳倉米二百粒 南星一箇

右為末每服一錢水半盞姜三片棗三枚煎服

水附湯 幼幼方 治慢脾風身弓髮直吐乳貪睡汗流不

大附子一箇 白朮二兩 木香半兩 肉豆蔻一箇

甘草半兩

右咬咀每服二錢水半盞姜三片棗三枚煎服

○唐按此方用附子不必疑蓋小兒慢驚風皆由吐瀉
後脾氣大虛時作瘵瘵非若急驚搐搦之緊猛也此
方溫寒燥濕行氣健脾適合其宜

神效萬金丹 瑞竹堂方 治小兒慢驚風急驚風十無一失

硃砂 研細末 真輕粉 研細末

右二味各等分不以多少用青高內虫兒取出於淨磁

蓋內將硃砂輕粉以虫汁就成丸如黃米大量兒大小
加減服之半歲一歲小兒服一丸乳汁送下如取虫時
法止於七月初五日取高虫則靈驗

一方 治急慢驚風神效

硃砂一分 輕粉一分 姜蚕七箇炒 全蝎三箇去毒炒

右為細末用人乳汁調服 詩曰七箇姜蚕三箇蝎一

粒硃砂一片雪不論急風與慢風用時須用生人血

天麻防風丸 和劑方治一切驚風壯熱痰盛驚喘

姜蚕自死者去絲蟻 天麻煨 防風

人參各一兩 干黃一錢研入 蝎去毒炒 朱砂

雄黃 射香各一錢 甘草炙二兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三丸薄許湯化下

大天南星丸 和劑方治小兒急慢驚風涎潮發搐目睛上

視

天南星牛膽製 硃砂三錢別研 腦子

人參各半兩 乳香各半兩 全蝎十四箇射香一錢半

牛黃 天麻 防風各二錢

右為末煉蜜丸如雞頭大每服一丸荆芥薄許湯下

奪命散湯氏方治急慢驚風痰潮壅盛滯塞於咽喉間命

在須臾服此藥者無有不愈

青礞石一兩入沙鍋內同煅通紅須消盡為度候藥冷如金色取去未細

未細

右為末急驚風痰發熱者薄苛自然汁入蜜調服慢驚
脾虛者以青州白丸子再碾煎稀糊入熟蜜調下神效
青州白丸子方見中風

抱龍丸 治痰嗽驚風時作潮熱

干膽南星兩 天竺黃半兩 辰砂

雄黃各二錢

射香一錢別研

右為末煉蜜丸如芡實大甘草薄苛湯化下一丸

生疔膏幼幼方 治急慢驚風

天麻二錢半 硃砂二錢 姜黃二錢 白附子二錢

全蝎二十一 黑附子二錢 射香半字 蜈蚣一條酒

南星一錢半 花蛇二錢 酒浸多乾

右為末和勻煉蜜丸如雞頭大每服一丸金銀箔薄苛

湯化下

○廣按用附子者熟則流通痰火之理也

太青膏錢氏方

全蝎尾法精生 硃砂研一 養血一錢

天麻一錢 天竺黃一 字白附子生一 射香半

烏梢蛇肉酒浸焙乾

卷之三十三 三十三

右為末蜜和成膏每服一丸如皂角子大同牛黃膏溫
薄苛湯化一處服之五歲以上同其露散服方見中暑
牛黃膏聖惠方治小兒驚風作熱涼膈鎮心除咳嗽止煩

熱

甘草末二錢雄黃一錢川詳硝一錢棗豆粉半兩

寒水石性研一錢片腦二錢鬱金末一錢

右研勻煉蜜和成膏薄荷水化半皂角子大食後

厚砂保命丹秘方

射香一錢南星炒白附子炮珠砂各半兩

此合石翻兩散七次用米

右件為末用端午粽尖為定用金箔點號若急驚薄苛
湯下慢驚荆芥湯化下熱驚薄苛湯下風驚荆芥湯下
備急丸應驗方治急慢驚風

右以五月五日取地龍數條用竹分分中截作兩段看

地龍跳得急者慢者各一處研爛用硃砂末同研和

勻得所丸如小菉豆大忌驚用急跳者慢驚用慢跳者

用金錢薄苛湯送下量八小加丸數如合藥後分明寫

記急慢各另包裹收貯

愈風丹儒門事親方治大小兒一切諸風

芍藥 川芎 白僵蚕炒 桔梗

卷之三

細辛去葉 羌活各半 麻黃去節 防風去芦

白芷 天麻 全蝎各一兩 甘草三錢

天南星半兩 硃砂半兩 為

右為細米煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼茶酒任

下

全蝎散直指方 治小兒驚風

人參 陳皮各一錢 全蝎炙三箇 甘草炙半錢

南星濕紙裹煨

右以咀每服一錢水半鍾紫蘇姜棗煎服有熱加防風

硃砂丸宣明方 治小兒急慢驚風及風熱生涎咽喉不利

取驚積

硃砂 天南星 芭豆霜各半

右為末麵糊和丸黍粒大看病虛實大小每服二丸或

天吊戴上海服四五丸薄許水下之愈

珍珠丸宣明方 治小兒虛中積熱驚癇等疾

芭豆霜 膩粉各二錢 滑石三錢 天南星

粉霜各二錢 蝎稍 續隨子去皮各二錢

右為末研令極細以糯粥為丸如黃米大小兒二歲以

下每服三丸至五丸十五歲每服五丸至十丸茶湯下

荆芥湯亦得量虛實加減

祛風羌活散 散風邪止驚搐退肌熱

羌活 粉草 天麻 茯苓

川芎各二錢 荆芥穗 白僵蚕炒 白朮

白附子炮各一錢 桔梗二錢 防風半一錢 全蝎半錢去

硃砂五分 天南星炮一錢

右為細末薄苜湯調下 如傷風鼻塞流涕葱白湯下

喘嗽氣促桑白皮湯調下 若常服白湯亦可

真珠天麻丸 驚風痰熱壅盛及撮口

南星炮 天麻炮 白附子炮各一錢 巴豆霜十箇

全蝎炮 溫石二錢 防風 半夏姜汁炒

右為細末麵糊丸如小豆大百苜霜為衣每服五六十

丸淡姜湯下

至聖保命丹 胎驚吊腹目上視手足抽掣角弓反張痰

盛急慢驚風

全蝎十四枚去毒 防風五錢 白附子炮 南星炮

蟬蛻去土 僵蚕直者各一兩 天麻五錢 硃砂

射香各一錢

右為末後入硃砂射香和勻以粳米飯為丸如芡實大

每服一丸金錢薄苜煎湯化下急者二丸

青珠丸 急慢驚風痰熱往來

天麻

半夏

南星

白附子

川烏

錢各一

乾蝎

頭尾全七枚

姜蚕

七枚

青黛

羌活

二錢

硃砂

一錢為衣

右用研入巴豆七粒去油研勻麵糊為丸如黍米大每

服五丸金錢薄荷湯下如驚睡瀉得青色是驚積白

色是疳積赤色是熱積

安神散

治搐搦

用全蝎四箇塘水浸一宿南星大者一箇開一穴入蝎

在內以南星末蓋其口用麵裹火煨令赤色取出放地

坑土宿去南星用蝎為末每服一字磨刀水調下

犀角散 虛風有涎胃氣弱或吐乳喉中作聲

酸棗仁

麥門冬

去心

人參

茯苓

去皮各錢

硃砂

一錢

右為細末每服半錢磨犀角用湯下日二服此藥壓驚退

熱安心定神

睡驚丸 和劑方 治心蘊邪熱怔忡不安睡中驚啼風痰壅

盛

茯苓

去皮

鐵粉

蛇黃

史君子

去核各半兩

腦子

半兩

右為末糯米糊丸如皂莢子六朱砂為衣薄荷湯調下

安神丹御藥院方 治小兒心神不安困卧多驚痰涎壅盛

硃砂

人參各二錢半

乳香各兩

酸棗仁炒去

遠志去心二錢半

右為末蜜丸如榛子大金箔為衣每服一丸人參湯化

下

寧眠散御藥院方 治小兒風痰搐搦夜卧多驚

天南星炮製 人參去芦

白附子炮各半兩 乾蝎二十箇

乾赤頭蜈蚣一條酒浸

酥炙微黃

乳香

血竭各二錢半

右為末每服一字用水酒少許浸薄苛酒下

寧心膏全嬰方治小兒精神不定恍惚不寧恐畏多哭如

人將捕眠睡驚驚常服鎮心除百病

人參去芦

白朮

白茯苓去皮 茯神

山藥

羌活

甘草各一錢

硃砂一錢

腦麝各一錢

右為末煉蜜丸如雞頭大二歲一丸薄苛湯化下

○五疳五軟新增

附諸方

蘆薈丸 湯氏方 治脾胃積熱遂成疳疾宜服此藥

黃連去心

龍膽草

蕪荑各一兩

去皮先炒黃

赤

五疳

五疳

五疳

五疳

右各件為末別入麩者三錢半和勻飯飲完如黍米
大隨大小加減空心米

驚甲散湯氏方治疰勞瘵

驚甲

九筋者沸湯浸出
用童子小便塗之

黃芪

白芍藥

生熟地黄

當歸

人參

地骨皮

右收咀每服二錢水半盞煎服不拘時

宿壯丸

湯氏方治骨蒸瘵癆肌體黃瘦

木香

宣黃連

生地黄

銀州柴胡

驚甲

九筋者沸湯浸出
用童子小便塗之

青皮

右為末宿壯丸一枚入藥於內麻繩纏定於沙鍋內懸炮

煮熟取出細研壯子為丸如麻子大米飲下大小加減

不拘時

大胡黃連丸湯氏方治驚疰腹脹虫動多睡肌體黃瘦五

心煩熱

胡黃連

黃連

苦練子

白無美

乾蟾頭

二錢半
燒存性

蘆薈

射香

青黛

右將前四味為末猪膽汁和為劑每一胡桃大入巴豆

仁一枚在內却用油單紙一層裹之蒸熟又入後四味

粉丸如麻子大每服十四五丸清米飲下食後卧時

日三服

龍膽丸 和劑方治小兒疳發熱

龍膽草去

黃連

史君子去

青皮去

右為末猪膽汁丸如蘿蔔子大每服二十九以意加減
臨卧温水下

胡黃連丸 直指方治小兒熱疳

胡黃連

川黃連

各半硃砂二錢半

右為末入猪膽內繫定虛懸於銚中煮一時又取出入
蒼蒼青黛各二錢半去足蝦蟆灰二錢射香少許粳米
飲丸如麻子大每服十九米飲湯下

蒼蒼丸 陳氏方治小兒五疳

蒼蒼

蕪荑去皮

青黛去

真射香少許

檳榔

宣連各半

胡黃連

獾猪膽心筒

蟬殼二十

右為末猪膽丸如麻子大每服五十九飯飲吞下

肥兒丸 和劑方治小兒疳病夫小兒疳病者多因關乳喫
食太早以致脾胃受傷虛而生濕濕而生熱濕熱太甚
所以生虫日漸羸瘦腹大髮豎不能行步面黃口臭發
熱面無精采此藥殺虫退熱進食

神麩炒

黃連各一

麥去

肉豆蔻煨

麥去

五年

法附錄卷之三

四十八

五

史君子肉各半

木香各二

木香各二

右為細末猪膽汁并麵糊為丸如粟米大每服四五十九用米湯送下食前服

褐丸子瑞竹堂方治小兒陰陽不和臟腑怯弱乳食不消

心腹脹滿嘔逆氣急或腸鳴泄瀉頻併腹中冷痛食癥

乳癖疝氣痞結積聚腸胃或秘或痢頭面浮腫不思乳

食及察五腫疳疾八種痢疾肌肉消瘦氣麓腹大神色

昏惰情意不樂常服散冷熱氣調和臟腑進飲食生肌

肉悅顏色功效非常不能盡述

羅蔔子一兩陳皮去白青皮去白

三稜炮

蓬木炮各半黑牽牛生七錢半

胡椒二錢

木香一錢半

右為末麩糊和丸如棗豆大空心用羅蔔子煎湯送下

或生姜湯亦可量兒大小加減丸數

○廣按此藥緊峻去病有功病退則已不可過服恐傷

正氣

薑薈丸和劑方治疳氣羸瘦面色痿黃腹脇脹滿頭髮作

穗揉鼻咬甲好喫泥土利色無定寒熱往來目澀口臭

齒斷黑爛常服長肌肉退黃殺疳虫進飲食

大皂角

乾蝦蟆配上等分同燒貯性

青黛二錢

蘆薈

硃砂

射香各一

右研勻湯浸蒸餅和丸如麻子大每三歲兒服二十九不計時米湯下量大小加減服

史君子丸和劑方治小兒五疳脾胃不和心腹膨脹特作疴痛不進飲食漸致羸瘦並宜服之

史君子去皮兩厚朴製

陳皮去白

川芎各二錢半

右為末煉蜜為丸如皂子大三歲一丸陳米飲化下

○廣按此方用藥平和可以久服

六神丸全嬰方治小兒疳氣消瘦臟腑怯弱泄瀉虛滑乳食減少飲食無度心腹脹滿

木香

丁香

肉苳蔻煨

訶子炮

史君子炮去皮各半兩

蘆薈一兩

右為末棗肉和丸如菉豆大三歲二十九米湯下

○廣按疳本濕熱宜用苦寒藥今此方用苦溫藥何也殊不知疳久泄瀉虛滑則為濕寒宜用苦溫藥本草

云苦寒去濕熱苦溫去濕寒是也

六蘆薈丸發明治疳殺虫和胃止瀉

胡黃連

黃連

蘆薈研

木香

白蕪荑

雷丸

青皮去白

鶴虱微炒各

右為細末粟米飯和丸如菉豆大米湯送下二十九無

時

傑聖丸 治小兒疳病通用

蘆薈

五靈脂

好夜明砂焙砂仁

陳皮

青皮

莪朮煨

木香

史君子煨黃連

蝦蟇日乾炙焦

右為末用雄豬膽二枚取汁和藥調勻為丸麻子大每

服十五丸米飲送下

大蘆薈丸 治諸疳

蘆薈

蕪荑

木香

青黛

檳榔

黃連炒各二錢蟬殼炒

胡黃連半

射香少許

右為末豬膽汁二枚取汁混和糕為丸麻子大每服二十

丸米飲下

黃連丸 治疳疾

黃連研

蕪荑去

史君子去殼半兩

右為末用雄豬膽丸如粟豆大每服二十九米飲空心

送下

蘆薈丸 治疳殺虫

蘆薈半兩

史君子焙

三稜生

石榴皮焙

草龍膽生各五分苦練根焙

五年

心去寸餘

三三

三三

右為細末麵糊丸如蘿蔔子大每服五丸量大小加減
米飲送下疳熱麥門冬湯下

布袋丸 治諸疳疾面黃腹大飲食不潤肌膚

夜明沙揀淨燕蕒炒去 史君子肥白者微炒

白茯苓去皮 白朮無油者 人參去芦 甘草

蘆薈細研各半兩

右為細末湯浸蒸餅和丸如彈子大每用一丸以生絹
袋盛之次用精猪肉二兩同藥一處煮候肉熟爛提取
藥於當風處懸掛將所煮肉汁令小兒食之所懸之
藥第二日仍依前法煮食只法可藥盡為度

六神丸 治諸疳

木香濕紙 黃連去鬚 神麩 川練子肉

燕蕒炒各 麥蘗炒各

右為細末以雄豬膽蒸熟為丸如麻子大每服三四十
丸量大小加減米飲送下

肥兒丸 疳病蒸熱腹脹滿面色萎黃飲食遲化大小
便澀滯

麥蘗炒 川黃連 大燕蕒 神麩炒

胡黃連各半兩

右為末以雄豬膽汁丸如麻子大每服三十丸食前米

飲送下乳母忌食酒麵生冷

如聖丸 治熱疳瀉

胡黃連

川黃連

蕪荑

史君子各二兩

射香五分

乾蝦蟆五箇剉碎酒熬成膏

右為末以蝦蟆膏子丸如麻子大每服二十九人參湯

送下

肉棗丸 因疳而瘡侵入口鼻

用肉棗二枚去核入青礬如核大在內以火煨存性為

末入射香少許清油調塗

煮肝散 疳眼翳膜羞明不見物

夜明沙

蛤粉

製精草略

右為末每服一錢五七歲以上二錢用確猪肝如匙大

一片批開糝藥在內攤勻以麻絮定米泔水半碗煮肝

熟撈出肝傾湯碗內薰眼分肝作三次嚼食仍用肝湯

熱下日三服不拘時如大人雀目空心服至夜便見物

如患目久不効日作二服見効

小葶丸 幼幼方 治胎中受熱遍身筋軟

鹿茸

川牛膝

肉苁蓉

木瓜

杜仲

兔絲子

當歸

熟地黃

天麻

青鹽各等分

右為末用煉蜜為丸如菘豆大鹽湯溫酒化下皆可

羚羊角散 幼幼方 治小兒面紅唇白肌熱項軟

熟地黃 酒浸 白茯苓 羚羊角 酸棗仁 炒

虎脛骨 酒炙 肉桂 防風 甘草 各等

右為末溫酒鹽湯化下皆可

羚羊角丸 楊氏方 治小兒五六歲骨氣虛筋脉弱不能行

者

羚羊角屑 白茯苓 去皮 防風 去芦 虎脛骨 去土醋炙

酸棗仁 炒 生棗 各半 葛根 桂心

當歸 炒 各二

右為末煉蜜丸如菘豆大食前以溫酒研破三五丸服

之一月漸漸即可行也

○吐瀉痢瘡 新增

附諸方

觀音散 和劑方 治小兒外感風冷內傷飲食嘔逆吐瀉不

進乳食

石蓮肉 炒 去心 白扁豆 一錢 茯苓 一錢

人參 一兩 神麴 炒 二 白芷 綿黃芪

木香 甘草 各一

全蝎觀音散 和劑方 治小兒外感風冷內傷飲食脾胃受

上為

公法村余

五十五

三

傷嘔逆吐瀉不進乳食又則漸漸羸瘦大抵脾虛則瀉
胃虛則吐脾胃俱虛吐瀉不已此藥大能溫養脾胃進
飲食及治吐瀉致虛將成驚風

石蓮肉

人參去芦

白扁豆各一錢

全蝎炒

天麻

木香

甘草炙去

羌活

防風去芦

白芷

黃芪各半

神麩一錢

白茯苓去皮七分

右為末每二錢乳汁調服或以咀每服五錢用水一盞
棗子煎服

人參白朮散錢氏方治小兒脾胃又虛嘔吐泄瀉頻併不

止津液枯竭發熱煩渴多燥但欲飲水乳食不進羸困
失治變成風癇不問陰陽虛實並宜服之

人參去芦

白朮

白茯苓去皮

木香

藿香去上

甘草炙五分

乾薑一錢

右吹咀用水一盞煎至半盞去滓溫服

異功散錢氏方溫中和氣治吐瀉不思食凡治小兒虛冷
病先於數服以正其氣

人參去芦

白朮

白茯苓去皮 甘草炙去

橘紅各一錢

右用水二盞生姜三片棗子一枚煎至七分去滓溫服

醒脾散集成治小兒吐瀉不止痰作驚風脾困昏沉默
不食

木香

天麻

人參去芦

白茯苓去皮

白朮

甘草炒

白殭蚕炒

白附子各半錢

全蝎二分半炒

右用水一盞生姜三片棗子一枚煎至七分去滓温服

辰砂益元散應驗方治小兒中暑吐瀉小便赤少夜卧不

寧心煩作渴常服寧心解熱

益元散兩

辰砂一錢半

右研勻每服五錢用燈心竹葉湯調服如嘔吐生姜湯

調服

黃連香薷飲全嬰方治小兒陰陽不順清濁相干霍亂吐

瀉體熱煩燥昏冒多渴

厚朴去皮姜製

黃連二味與生姜汁拌

香薷三錢

右取咀一服用水一盞酒半煎至七分去滓水中頓

冷服

一方加白匾豆炒

黃龍充全嬰方治小兒中暑吐瀉胃悶煩渴昏迷身熱有

痰

半夏 二兩米醋
半升黃乾

白茯苓 甘草各半

右為末生姜汁煮麴糊為丸如小豆大每服二十九煎

生姜灯心湯送下量大小加減丸數

五苓散 全嬰方治大人小兒中暑伏熱煩渴身熱頭痛霍

亂吐瀉小便赤少心神恍惚

澤瀉 錢一 白朮 五錢 猪苓 半錢 肉桂 錢一

赤茯苓 半錢

右為細末每服一錢熱湯調下不拘時服加辰砂名辰

砂五苓散去辰砂加生料平胃散用蒼朮橘皮甘草厚

朴二方共一處生姜棗子同煎名胃苓散

香朴飲子 集成 治小兒伏熱吐瀉虛喘胸亂如發驚壯

人參 去芦 白茯苓 去皮 甘草 炙去 紫蘇

木瓜 澤瀉 香薷 半夏 麴

白扁豆 陳皮 去 烏梅 厚朴 各四

右用水一盞煎至七分去滓溫服

玉露散 一名甘露飲 治小兒中暑昏迷煩渴不止心燥體

熱頭疼或伏熱吐瀉亦作傷風體熱煩渴

石膏 寒水石 各一兩 甘草 半兩

右為細末每服五錢灯心湯調下暑熱冷水下吐不止

生姜湯下

人參散 宣明方治小兒虛熱煩渴因吐瀉煩渴不止

人參 一兩

茯苓 二兩

生犀

桔梗 各二錢

甘草

乾葛 各半兩

右為末每服用二大錢水一鍾加入灯心五莖同煎至

六分溫服無時煩渴者以新竹葉湯下量年紀加減服

內救散 調氣進食止瀉嘔

木香

人參

白朮

茯苓

甘草

茯苓 各等分

藿香 各半

右為末每服一錢米飲調下

益普散 錢氏方治脾胃虛寒嘔吐不止或泄瀉腹痛並皆

治之

丁香 四錢 不見火

訶子 去核

青皮 去白各一兩 甘草 炙

陳皮 去白二兩

右為末每服二錢水半盞煎食前服

藿香散 經劑方治小兒吐乳嘔逆身熱面青不進乳食

藿香 錢一

丁香

人參

白朮

茯苓

神麴

扁豆 各半錢

右為末每服半錢白湯調下一方用紫蘇木瓜湯調下

殊沉煎 按萃方治小兒嘔吐不止

殊砂 飛過二錢

沉香 錢一

藿香 二錢

滑石 半兩

丁香十四箇

右為細末每服半錢用新汲水一盞芝蔴油點成花子

炒藥在上須臾墜濾去水却用別水送下

助胃膏湯氏方治小兒冷氣入胃嘔吐不已

白豆蔻十四箇 木香二錢

縮砂仁四十箇 乾山藥一兩

肉豆蔻四箇 人參去芦

白朮 白茯苓

甘草各半兩

右為末每服一錢陳紫蘇木瓜湯調下一方煉蜜

丸如芡實大一歲一丸米湯調下

訶子湯湯氏方治臟寒泄瀉

訶子取

人參去芦

白茯苓去皮

白朮各一

木香炮

陳皮去白

甘草炙

肉豆蔻各半兩

右為末每服二錢水一盞姜三片煎半盞溫服寒甚者

加附子

白朮丁香丸 水瀉脾虛飲食不進水穀不化

白朮不油者二錢半 半夏錢半

湯丁香半錢

右為細末用生姜自然汁煮糊為丸如梧桐子六十歲

上下可服二十五丸七八歲二十九丸五六歲十四丸

二三歲十九丸週歲五七丸用姜湯或米湯無時送下

服不止日進二服新洩一服見効舊洩三服即止

乳豆丸 應驗方 治小兒傷冷泄瀉滑腸不禁面青腹痛

肉豆蔻 麵裹煨

乳香 二錢

右為末 麵糊為丸 如菽豆大 米湯下 三十九

紫霜丸 治宿滯不化胸腹痞滿泄瀉如痢當以藥推利

杏仁 五十箇 去皮尖別研

黛赭石 火煨醋淬

芭豆 去皮心膜油炒

赤石脂 兩

右研勻湯浸蒸餅丸如黍米大三歲以上服三丸以乳

汁或米飲下

玉餅子 吐瀉驚疳乳食不消肚脹潮熱咳嗽急慢驚風

及痢疾

半夏 大者十箇 小者五十粒 去

滑石

寒食麵 各一

右為末滴水丸如菽豆大捏作餅每服五七餅或八九

餅或十一二餅姜湯送下看大小加減一方加輕粉

木香換柳丸 治小兒初得痢疾赤白相雜裏急後重

方見痢疾

○廣按小兒痢疾皆因感寒停積飲食所致初得一二

日間元氣未虛宜用此丸與玉餅子分寒熱利之日

子既久涉虛宜用香連丸木香散之類和之繼用豆

蔻香連丸水黃木香丸之數服之

香連丸 治冷熱不調下痢赤白裏急後重 方見痢疾

胃風湯 治風冷乘虛客于腸胃水穀不化泄瀉不利腸

鳴疔痛或下如荳汁或頃下瘀血 方見胃風

木香散 經濟方 治諸般瀉痢日久不安並皆治之

白木 用麴 麥芽 木香 人參

當歸 陳紅麴 各一錢 同 茯苓

神麴 甘草 青皮 各一錢

右為末每服半錢或二錢白湯調下一方用紫蘇木瓜

湯調下

荳蔻香連丸 和劑方 治小兒乳食不節腸胃虛弱冷熱之

氣客於腸間下痢赤白腹內疔痛日夜頻併不欲飲食

黃連 微炒二分 肉蔻 二箇 麴 木香 半兩 丁香 二錢

訶子 炮去核 半兩

右為細末粟米粥和丸黍米大每服二十九米湯下大

小加減丸數

水煮木香丸 治下痢赤白裏急後重

真人養臟湯 治冷熱不調下痢赤白或如膿血魚腦裏

急後重臍腹絞痛並皆治之 並見痢疾

木香散 湯氏方 治冷痢腹痛不食

木香 炮半 厚朴 姜製 白木 半錢 龍骨

當歸淨洗焙乾姜炮

訶子肉各二錢半

右為米水半盞姜三片煎服隨大小加減

一方 治休息痢及痔瀉日久不能安者湯氏方

用雞子一枚打破用黃蠟一塊如指大銚內溶以雞子

拌和炒熟空心食之

赤石脂散錢氏方治因瀉痢後肛門不收

真赤石脂搗去

伏龍肝各等

右為末每用半錢傅腸頭上頻用

又方 治瀉痢後脫肛

用陳槐花不拘多少為末陳米湯調下

養育湯 治內傷生冷外感風寒均異壯熱或發寒熱

方見瘡類

草菓飲張氏方治發瘡寒多熱少或遍身浮腫者

厚朴

青皮去白

草菓

麝香

半夏麩

甘草炙

丁香皮

細麩炒

良姜各等

右吹咀每服二錢水一盞姜三片棗一枚空心煎服

○廣按以上二方治小兒瘡疾寒多熱少無汗者

清脾湯 治因食傷脾停滯痰飲發為寒熱方見瘡類

常山飲張氏方治一切瘡疾

常山一錢 人參 草果 知母

甘草 厚朴姜汁製一宿 貝母

半夏麴 茯苓絡五

右吹咀每服二錢水半盞姜三片棗一枚空心煎服忌

雞肉牛肉諸般毒食

○廣按已上二方治小兒瘧疾熱多寒少有汗者

鬼哭飲湯氏方治瘧疾久未愈者

常山 大腹皮 茯苓 薑黃醋炙

甘草炙各

右為末用桃柳枝各七寸同煎臨發時服之略吐山嵐

不妨

露星飲湯氏方治久瘧成勞

秦艽去芦 白朮 柴胡去芦 茯苓去皮

半夏麴 檳榔 黃芩 常山

甘草各等

右吹咀每服二錢酒醋各一盞姜三片煎露一宿次早

服

○感冒四氣新增

附諸方

蘇黃湯錢氏方治傷寒發熱咳嗽喘急

蘇黃湯 蘇黃湯 蘇黃湯 蘇黃湯 蘇黃湯 蘇黃湯 蘇黃湯 蘇黃湯 蘇黃湯 蘇黃湯

麻黃去節水煎

肉桂去粗皮甘草一錢

杏仁炒令黃色

右咬咀每服四錢水一盞煎服有汗不宜服

人參羌活散和劑方

羌活

白獨活

柴胡去芦

川芎

人參

甘草炙

白茯苓各一兩前胡

桔梗去芦

地骨皮

天麻酒浸焙六散去穢附

右咬咀每服二錢水半盞姜一片薄切一示棗半枚煎

服 瘡疹未發亦可服

解肌湯湯氏方治傷寒發熱心煩燥渴

麻黃去節半兩或

用七錢半

人參

芍藥

獨活各半川芎

前胡各二錢

右咬咀每服二錢薄切一葉姜一片水半盞煎服

七寶散湯氏方治感寒頭昏體熱小兒乳母同服

紫蘇葉

香附子炒去毛橘皮

甘草

桔梗

白芷

川芎各一兩

加麻黃半

右咬咀每二錢水一盞姜一片棗半枚煎服

參蘇飲和劑方治感冒發熱頭疼或因痰飲凝結為熱此

藥解肌退熱寬中快膈止嘔吐開胃進食

紫蘇葉

乾葛

半夏製

前胡去苗

人參去苗

白茯苓各六分

枳殼去穰

甘草炙去

桔梗去芦

陳皮各四分

一方加木香少許

右用水一盞生姜三片棗一枚煎溫服

不換金正氣散和劑方治四時傷寒感冒風濕瘡疫時氣

頭疼壯熱或霍亂吐瀉臟腑虛寒下痢赤白並宜服之

厚朴製

藿香去土

甘草炙皮

半夏製

蒼朮製

陳皮各八分

右用水一盞姜三片棗子一枚煎至半盞溫服

黃連香薷散治伏暑發渴或作瘧痢並宜服之方見中

紅綿散

治夾驚傷寒方見驚風

金沸草散

和劑方治風化痰除頭目昏痛項頸強急往來

寒熱肢體煩疼胸膈滿悶痰涎不利咳嗽喘滿涕唾稠

粘及時行寒疫壯熱惡風

旋覆花去梗

前胡各七分

荆芥錢

麻黃七分

甘草炙

半夏製

赤芍藥各二分

右用水一盞生姜三片棗子一枚煎至八分溫服

薄荷散湯氏方治熱極生風痰涎壅盛

薄荷葉兩半

羌活

全蝎

麻黃去節

甘草一錢二分

天竹黃

白附子炮

姜蚕各二分

右為末每服一錢水半盞煎服加竹葉少許尤妙

華蓋散 治肺感寒邪咳嗽鼻塞聲重方見咳嗽

潤肺散 和劑方治肺感風寒咳嗽喘急鼻流清涕

貝母麩炒 杏仁去皮麩炒 麻黃去根

人參各二兩 阿膠炒半兩 陳皮二錢半 甘草一兩

桔梗兩半

右以咀每服二錢水一盞食後煎服

人參散 經濟方治咳嗽發熱氣喘吐紅

人參 天花粉各等分

右為末每服半錢蜜水調下

百部丸 湯氏方治小兒感寒咳嗽

百部焙乾 麻黃去節各二錢半 杏仁四十箇去皮尖

右為末煉蜜丸如芡實大熟水化下

一方加松子肉五十粒同杏仁入沙糖為丸噉化尤妙

瀉肺散 錢氏方治肺氣壅盛咳嗽不已

桑白皮 地骨皮各一兩 甘草各二錢半

右為末每服四錢水一盞粳米同煎食後服

補肺散 錢氏方治肺氣不足咳嗽喘急

阿膠炒一兩半 牛蒡子 甘草各半錢 馬兜鈴兩半

杏仁七箇去皮尖 糯米四兩

右為末每服四錢水一盞煎至六分食後服

流金丸全嬰方治小兒咳嗽痰盛

半夏一錢 白礬二錢 寒水石六錢 硃砂一錢

雄黃一錢

右為末麵糊為丸菘豆大生姜湯下每服二十九六小

加減丸數

雄黃丸 治小兒諸般咳嗽鹽醋等哮並治大人

雄黃五錢 半夏兩 人言胡 明礬

巴豆另研各一錢

右用明礬火化開入信末同枯乾再研為末再炒成砂

同前藥為末和勻麵糊丸如粟米大每服三十九大小

加減臨症桑白皮湯冷送下或冷茶湯下亦可

升麻葛根湯錢氏方治大人小兒時氣瘟疫頭痛發熱肢

體煩疼及瘡疹未發疑似之間並宜服之

升麻 白芍 甘草各一錢 葛根二錢

右用水一盞煎至半盞去粗稍執服日二三服

柴胡升麻湯和劑方治時行瘟疫壯熱惡風頭痛體疼口

燥咽乾心胃煩滿寒熱往來咳嗽痰盛涕唾稠粘

柴胡去苗 前胡去苗 乾葛 石膏

赤芍藥各七分 升麻二分 桑白皮微炒 黃芩各四分

荆芥五分

右父咀作一服水一鍾半煎八分食後服

人參前胡湯湯氏方治小兒感冒發熱

前胡一錢四分柴胡去苗半夏湯泡七次黃芩

人參去芦桔梗去芦甘草各七分

右用水一盞生姜三片棗子一枚煎至半盞溫服

柴苓散湯氏方治腹中伏執候如温狀

柴胡去苗麥門冬去心人參去芦赤茯苓去皮

甘草各一分黃芩去芦四分

右用水一盞入小麥二十粒青竹葉七片煎服

地骨皮散集成治虛熱潮作亦治傷寒壯熱

知母 柴胡去苗甘草炙法人參去芦

地骨皮去赤茯苓去皮半夏製各七分

右用水一盞生姜三片煎至半盞去滓溫服

加減建中湯湯氏方治傷寒發熱自汗虛煩

熟地黄 甘草炙人參各半黃耆各兩

白芍藥三兩

右吹咀每服二錢水半盞煎服

田方導赤散救華方治小兒傷寒煩熱小便赤色大便稠

色面赤

生地黃

木通

甘草各等分

右為末每服四錢水一小鍾竹葉三五片同煎溫服

益黃散按萃方治小兒客熱在內不思乳食宜服導赤散

次服此藥方見小兒吐瀉

柴苓湯 治小兒傷寒煩熱小便赤色大便褐色面赤

柴胡主諸

半夏

人參

黃芩

甘草

白朮

茯苓

澤瀉

猪苓各五分

桂三分

右吹咀水一盞生姜三片煎至半盞去粗溫服無特

三黃犀角散湯氏方治臟腑熱秘

犀角屑

大黃酒蒸

鈞藤

槐子仁

甘草

黃芩各半兩

右為末看兒大小加減熱湯調服

○廣按小兒多有鬱熱因外感風寒內傷乳食而鬱熱

發於外鼻塞者是因外感而發以麻黃湯人參羌活

湯以後之類治之鼻不塞者是因內傷而發宜升麻

葛根湯柴胡升麻湯以後之類治之

○痛疝氣

新增

附諸方

化蟲散

治嬰孩小兒蛔厥腹痛切切方曰蛔厥多似

慢驚但唇口紫者是蛔厥 湯氏曰每月初五日巳前
蟲頭向上可取巳後可安

雷丸 三錢 史君子 祛穢 鶴虱 三錢 其鱗
大音 各三

右為細末用猪肉煮汁調空心服大者二錢小者一錢

換柳遣虫散 治嬰孩蛔虫咬心吐涎疼痛惡哭不止

換柳 炒存 鶴虱 貫衆 乾漆 炒存

蕪荑 川練子 史君子肉 雷丸

雄黃 黃丹 炒 錫灰 星 如規 木香 各二

巴豆 祛皮心 輕粉 各一

右為細末酒煮糊丸如黍米大五更早用猪肉葱油煎
將肉細嚼莫吞引虫頭向上吐去肉用猪肉汁調化虫
散送服換柳丸至巳時取下虫積可進食五歲可服七
分十歲服一錢大人亦可服

化虫圓 和劑方治一切疳虫攻刺心腹疼痛不已叫哭吞
眼

胡椒 炒 鶴虱 換柳 苦棟皮 各五

白礬 粘一分 錢

右為末麵糊丸如麻子大量兒大小加減米飲下

靈蘇散 錢氏方治小兒虫咬心痛欲絕者

五靈脂末二錢

白礬火枯

右為末每服二錢水一盞煎服不拘時當吐出虫即愈
安虫散錢氏方凡虫不可盡去宜安之

檳榔

胡粉炒黃

川練子去皮鶴虱

白礬枯過二錢半

右為末每服一錢温米飲調下

川練丸錢氏方治上中二焦虛或胃寒虫動作痛

乾漆五錢許碎

雄黃二錢

巴豆霜

右為末麵糊丸如黍米六看兒大小每服取東向石榴
根煎湯下痛者煎有子苦棟根湯下入蕪荑湯下亦可

蕪荑散錢氏方治諸虫作痛

白蕪荑去扇乾漆各等分

右為末每服一錢米飲調下臨發時服

化虫丸湯氏方治因疳生虫五心煩熱

蕪荑

黃連

神麩炒

麥蘖炒各等分

右為末麵糊丸如黍米六空心米飲下

三稜散湯氏方治積氣肚痛

縮砂仁

葶草炙

益智炒去

三稜

義木

青皮去穢炒各等分

右為末白湯點下

治疝氣方 湯氏方

羌花 醋浸

木香

檳榔

三稜 炒各兩

附子炮

茯苓 去皮

青皮 去白

全蝎

肉桂

硃砂 各二錢

右為末將硃砂浸洗去土頓在湯瓶上候成膏子和糠

醋打麵糊丸如菴豆大每服二十九空心温酒下未效

再服

一方

小兒心痛欲絕一時無藥可察急用艾灸足大拇指

男左女右

小兒疝痛可灸足大拇指甲後以韭菜聚毛間名大敦

穴男左女右

○積聚癖塊 新增

附諸方

快膈消食丸 集成消食積

縮砂仁

橘皮

京三稜

莪朮

神麴

麥芽 各半兩

香附子 一兩

右為末麵糊丸如麻仁大食後白湯下隨大小加減

紫霜丸

治乳哺失節宿滯不化胸膈痞滿嘔吐惡心便

利不調乳食減少又治傷寒傳裏大便酸臭乳食不消

責

三附錄卷之三

七

三

或已得汗身熱不除及變蒸發熱多日不解因食成癩
先寒後熱並宜服之方見吐瀉痢瘡

十全丹湯氏方治小兒乳哺不調傷於脾胃丁奚哺露

枳殼炒白

檳榔

青皮

陳皮各半

木香二錢

蓬朮

三稜

砂仁各半

丁香二錢

香附子炒一

右為末神麴打麵糊和丸如黍米大空心米湯送下五

十九

異香散治小兒疳積腫脹調理脾胃

三稜

莪朮

青皮

陳皮

半夏麴

藿香

桔梗

益智仁

枳殼

香附子

砂仁

丁香

甘草絡等

右剉散生姜三片棗一枚同煎食遠服

香稜丸治小兒積氣發熱肚腹膨脹肢體瘦弱飲食不

為肌膚

木香

丁香

檳榔去臍

枳殼麴

茸松

史君子去

神麴炒

麥芽炒各二

三稜煨

莪朮煨

青皮

陳皮

香附炒各

胡黃連錢一

續

...

...

...

右為細末蒸餅丸如黍米大用米飲送下食遠服

三稜散

三稜

義木

甘草

益智去殼

青皮

陳皮

神麴

麥芽各二錢

右為細末用白湯調化下不拘時候

七聖丸湯氏方消積滯調脾胃

芫花先用醋浸一宿炒漸乾加入三稜義木同炒微焦取出用

蓬莪朮

陳皮去白

京三稜

川練取肉

青皮去白

杏仁去皮尖

右件為細末入巴豆二十粒去油和白醋糊丸如粟

米大每歲常服二丸臨卧熟水送下常服宜去巴豆

六味三稜丸

五六箇月小兒未喫穀食有癖積者

義木煨

三稜煨

神麴炒

麥蘖炒

青皮

陳皮各等

右為細末稀麵糊丸如黍豆大每服二十九白湯下

三稜煎丸

飲食過多痞悶疼痛食不消化久而成癖又

治婦人血積血塊乾血氣經閉

義木黑角者

三稜各一兩二味濕紙包煨

大黃去皮

右為末先以大黃銀石器內好醋漬令平慢火熬微乾

入二味為丸如黍豆大每服十九至二十九食後溫白

湯送下虛實加減服大人如梧桐子大每服四十九
月蟾丸秘方治小兒脾癖癥瘕

木香 人參 黃耆 當歸

桔梗 黃連 三稜炮 蓬朮

驚甲酥炙 夜明沙 綠礬 枳實

史君子 苦練根皮 訶子各一兩 蝦蟆燒存性 錢半

右件為末如菘豆大每服三四十九食前米飲下已生
冷雜果子發脾之物大人癥瘕丸如梧桐子大空心服
減夜明沙蝦蟆黃連服五七十九

一方 治小兒癖積膏藥

用水紅花子炒二錢大黃朴硝山梔子 石灰各一錢

酒醉雞旦大一塊共搗和為膏用青綿布攤貼再用湯
瓶熱熨用手帕勒之三日後揭起肉黑如墨是其效也

一方 治小兒癖積丸藥

用三稜義木阿魏蘆薈白木陳皮各二錢水紅化子炒
三錢大黃三錢為細末棗肉搗為丸如菘豆大每服三
十丸空心米飲下

甘遂散 湯氏方治胸膈伏熱內停飲食以致臟腑不舒氣

結脹滿

甘遂煨令 青皮去白 黃芩 大黃炒各

右吹咀每服二錢水半盞煎服以利為度

取水方湯氏方積水疝水並皆治之

其遂

青皮去白

陳皮去白

木香炮各兩

檳榔一箇生用

右為末紫蘇木瓜湯點下忌服甘草

退腫消毒散湯氏方治積水驚水或飲水過多停積於脾

或四肢腫而身熱宜用藥內消之其腫自退

蘿蔔子

赤小豆

甘草炙

陳皮各半兩

木香二錢半

右吹咀每服二錢水一小盞薑棗煎服

勻氣散御藥院方治脾肺氣逆喘嗽面浮胃膈痞悶小便

不利

桑白皮二兩

陳皮去白兩半

桔梗炒一兩

甘草炙一兩

藿香葉酢兩

木通四兩

赤茯苓去皮一兩

右吹咀每服二錢水一小盞薑棗二片煎服

木香散湯氏方治心經伏熱小便不通

木通一兩

牽牛半兩炒

滑石一兩

右為末灯心葱白水煎二錢不拘時服

○調理脾胃

附諸方

參苓白朮散 治小兒脾胃虛弱不進飲食方見調補脾胃

四君子湯 調脾胃進飲食見補損

溫脾散和劑方治脾胃不和腹腸虛脹不進飲食困倦無

力

訶子炮去核

人參各半

白朮

木香

桔梗各半

茯苓

藿香

陳皮

黃芪各半

甘草二錢

右以咀每服二錢水半盞薑棗煎服不拘時

丁香散和劑方治胃虛氣逆嘔乳不食

人參半兩

丁香

藿香葉各二錢半

右以咀每服二錢水半盞煎熟入乳汁少許煎服

和中散和劑方治脾胃不和嘔逆惡心乳食不進

厚朴六兩

乾姜炮

甘草各二兩

白朮三兩

右以咀每服四錢水一小盞薑棗煎服

調中散湯氏方治脾胃不和

人參去芦

白茯苓去皮

白朮

甘草炙

乾姜炮

藿香葉

宿砂仁

香附子炒去毛

丁香等分

右為末每服一錢姜棗煎湯下如肚疼以白湯點下

醒脾散湯氏方治小兒脾胃怯弱為風冷所乘體熱頭疼

調胃

公法附錄卷之三

五十一

二百七

霍亂

天南星

二箇重
八錢者

人參去芦

丁香四十分

白茯苓

藿香葉

白朮

甘草各兩

右為末生薑冬瓜子煎服

加減觀音散湯氏方調理脾胃宜常服之

白朮炒

人參去芦

白蘆豆蒸

白茯苓皮去

麥蘖炒

黃芪蜜水

甘草

乾山藥

神麴

香附子

炮去毛
各等分

右為末每服一錢空心米湯調下

平胃散經濟方治吐逆頻併手足心熱不進飲食

紅麴

二錢半
年久者甘草一錢

白朮一錢半
麩炒

右為末每服半錢前棗子米飲下

銀白散簡易方治小兒百病

霍香云土

天麻炒

糯米炒方用糯
粟各半兩

姜蚕炒

川升麻

甘草炒各二錢半

白附子半錢

木香

濕紙裹煨
一錢

白朮剉以藜豆同炒
香不用豆

山藥

黃紙炒

人參各一兩

白茯苓一兩

白蘆豆

一兩

右為末隨証加減常服沸湯或米飲調下慢驚搐搦射

香飯飲下 急驚定後吐不止陳米飲下 夾驚傷寒

發搖簿苛葱白湯下 壯熱面赤乾葛金錢薄苛湯下

天柱倒行步脚軟濃米飲下 疝氣腹急多渴百合湯

下 飲食不知飽飢不生肌肉炒麥芽生姜煎湯下

神氣脫語言不正及吐瀉藿香湯下 暴瀉紫蘇木瓜

湯下 白赤痢不進飲食米飲煎粟殼湯下 稟受

怯弱每日服常服調理脾胃姜棗湯下 和劑云木

香黃芪白附子姜蚕糯米藿香加知母其味各等分

瀉黃散長萃方瀉脾熱日黃口不能吮乳

藿香七錢

山梔子二兩

甘草半兩

石膏兩半

右剉用蜜酒微炒香為細末每服一錢至二錢水一盞

同煎清汁服

聖功散 按萃方 溫中和氣治吐瀉不思飲食凡小兒虛冷

病先與數服以正其氣方見吐瀉痢瘡

進食散 進食神效

白扁豆微炒 石蓮肉炒去心 人參各二錢半 茯苓一錢

神麴二錢 甘草炙 白芷 木香

黃芪蜜水塗炙

右為細末每服嬰孩一字二三歲半錢四五歲一錢用
水半鍾生姜一片棗子半枚煎十數沸調末服之

人參沉香散 治脾氣虛

人參

木香

白朮

沉香各五錢

茯苓三兩

甘草

白芷各三錢

右為末每服一錢米飲調下嘔吐藿香湯下

○小兒雜方新增

附諸方

小兒初生回氣法保生要方

小兒初生氣欲絕不能啼哭者必是難產或冒寒所致急以綿絮包裹抱懷中未可斷臍帶急燃大紙撚蘸油點燈於臍帶上往來過帶薰燒之蓋臍帶連兒腹待火

氣由臍入腹更以熱醋湯盪洗臍帶須臾氣回啼哭如常方可浴洗浴洗了方斷臍帶

通小兒大小便法保生要方

小兒初生大小便不通腹脹欲絕者急令婦人以溫水先嗽了口吸咂兒前後心并臍下手足心共七處每一處凡三五次嗽口吸咂取紅赤為度須臾自通不爾無生益有此證知此法可得再生

煉臍法

嘗聞子在母腹中胞胎十月止於臍中與母通氣初降生之時雖曰胎胞已破始於兒口鼻中接天地之氣而

呼吸之其臍中所通之氣猶未盡絕况收生之母不明
通氣之大理不知斷臍之細功粗心妄意以致斷臍之
初因所通之氣招風入內者有之其法新生小兒綿裹
臍帶離肚五六寸處先用軟綿繒住却於線外將臍咬
斷片時去線待血流盡以手輕輕揉散艾灸臍頭三五
炷結作紆絡軟帛腰裹切不可常時揭着待臍根落去
自然無事一法小兒降生之後即將軟線貼臍根繒住
待第三日離肚二指將臍剪斷用生姜自然汁或香油
和麩裹臍四圍將臍頭鋪艾灸三炷謂之薰臍後不招
風

封頤法醫集成

射香

蜈蚣末

牛黃末

青黛末各

薄荷半字

蝎尾去尾毒為末半錢

方作半字

右為未熟棗內和成膏新綿上塗勻貼於額上四方可
出一指許火上炙火頻射香日裏外小兒可用此塗弄

浴法

浴體法錢氏方

天麻錢

蝎尾毒

硃砂各半

烏蝎肉

酒浸

青黛

白礬各半

射香七字

右為末每用其錢水一碗桃枝一握同煎溫熱浴兒勿

雜方

心法附錄卷之三十三

八十二

七三三十八號

浴背

雄黃鮮毒丸 治小兒痰熱上攻發作纏喉風喉痺雙鵝

腫痛湯藥不下咽痛頰腫等証用此藥吐之

雄黃兩

巴豆去油四箇

鬱金錢

右為末醋糊丸如黍米大熟茶清下七丸至十九丸吐出

頑涎即甦大効如口噤以物幹開灌之下咽無不活者

吐風散 治小兒急中風口噤不開不省人事

全蝎一箇

瓜蒂十箇

赤小豆三十粒

右為末一歲一字温米飲調下未出再服

○廣按丹溪云小兒急慢驚風發熱口噤手心伏熱痰

熱咳嗽痰喘此類証並宜湧法吐之別此方可以通

用

救生散

猪牙皂角炮 天南星生

半夏生

荆芥穗

川烏

天麻

防風

疆蚕去嘴

細辛

全蝎去毒各一錢

草烏炮

薄荷各五分

雄黃分五

右為末入射香一字藥少許研勻用竹管盛藥吹入鼻

中開閉再用生薑汁調藥搽牙根上

疎風散 治小兒五臟中風身體不能自收冒悶不知疼

痛口不能言筋脉拘急手足抽掣

防風

犀角

麻黃去節

人參

當歸

川芎

羌活

遠志去心

茯神去木

甘草炙各

右次咀用水煎食前服未除病根不成癩疾

白餅子錢氏方治小兒停乳以致嘔吐泄瀉腹脹潮熱驚

疳喘嗽等証用此藥下之

巴豆

二十四箇去皮用水天南星炮

半夏湯炮七次

輕粉

滑石各一

右研勻巴豆後入衆藥以糯米飯為丸小豆大拾作餅

子煎葱湯下

○廣按人乳味甘戀膈易於停積所以小兒之病多繫

於此此方用南星半夏以豁痰飲用輕粉滑石以瀉

濕熱用巴豆以通利積滯推陳致新之妙用也

寶鑑三稜煎丸 治小兒飲食過多痞悶疼痛宿食不化

久而成癖

廣朮

黑角

荆三稜

二味濕紙裹煨

大黃

去皮八兩

右將大黃為末銀石器內以好醋浸令透慢火熬成膏

和二藥為丸麻子大或菘豆大每一二十丸食後溫水

下

雜方 卷之三十三 五

廣米化癖丸 治乳食不消心腹飽脹壯熱喘急嘔吐痰涎食癥乳癖

代赭石醋淬當歸炒朱砂研枳殼炒

廣米炮荆三稜炮各木香兩射香

巴豆去油各二錢半

右為末研勻麵糊丸如麻子大每一歲兒二丸米飲下

○廣按已上三方消導之劑也但有寒熱輕重之分宜

選用為妙

一方 治小兒外腎腫硬及陰瘡

用乾地龍為末先葱椒湯於避風處洗次用津唾調傅

其上

三白散 和劑方治小兒膀胱疔熱風濕相乘陰囊腫脹以

致大小便不利皆治

白牽牛兩桑白皮 木通去節白朮

陳皮各五錢

右為末每服二錢姜湯調下空心服

牡丹散 濟生方治小兒外腎偏墜

防風去芦牡丹皮去木各

右為末每服二錢溫酒調服如不飲酒益湯點服亦可

疳瘡方

白礬煨

五倍子各一錢

右為末蓋木洗淨貼患處

金華散錢氏方治小兒一切濕瘡疔癬等瘡

苗藥

黃連各半兩黃丹一兩

輕粉一錢

右同研勻先以溫水洗然後貼之

一方湯氏方治濕癬瘡

用蛇床子為末先以雞根煎湯洗次用臘月猪脂調藥

傳之

羊蹄散 小兒頭癬久不瘥者

白礬半兩

羊蹄根兩

黃丹少

右搗爛入米醋半盞調均候癬極痒搽之至疼即止隔

日洗云再搽

治大腸虛弱肛門脫下湯氏方

龍骨

訶子肉各一兩沒石子大者二枚

瞿麥殼去穢醋塗

右為末白湯點服仍用葱湯薰洗令軟欵欵以手托上

又用執一片燒紅以醋澆之氣上即用脚布疊數層壓

定使熱氣上透不可過熱令病者臀坐布上如覺布溫

逐旋減之常得溫熱為度并常服前藥

治鼻衄湯氏方用生蘿蔔去葉搗汁仰頭滴入鼻中或血

妄行取汁飲之立効

白歛散湯氏方治小兒凍耳成瘡或癢或痛

黃蘗

白歛各等

右為末先以湯洗瘡後用生油調塗

生附散湯氏方治凍爛脚成瘡

用生附子為末麩水調貼之即愈

香薷煎湯氏方治小兒白禿不生髮燥痛

陳香薷二兩

胡粉兩

猪脂半兩

右用水一大盞煎香薷取汁三分去滓入胡粉猪脂相

和令勻塗令頭上日日頻用之

苦黃散湯氏方治小兒齒不生

大苦窮

乾地黃各半兩山薑預

當歸

為藥

甘草各二錢五分

右為末熟湯調服用搽齒脚

黃連散張子和方治頭瘡

川黃連

黃柏去粗皮

真輕粉

草決明各等

右為末用生小油調藥於瘡上塗立効

一方治小兒耳邊鼻下赤爛濕痒名曰蝕耳瘡勿勿方

黃丹

菘豆粉錢

白礬飛

右研細末付瘡上唾調亦可

軟膏膏 治一切風熱及小兒頭瘡

巴豆 七箇 瀝青 黃蠟 香油 各五

膩粉 錢一

右先將瀝青香油黃蠟熬次入巴豆不住手攪候巴豆焦黑色去巴豆却入膩粉令勻放冷敷瘡上

大烏散 治小兒癰疽腫毒

南星 赤小豆 草烏 黃栢 各等

右為末生薑自然汁調貼患處或用米醋調尤佳

搨皮散 治嬰孩小兒解癩癧作疼痛

搨皮 去粗皮此樹在處處有即包藍樹葉木也

右不拘多少切碎用水煎溫湯頻洗

白芩散 治小兒癩癧膿汁不乾

白芩 貝母 去心各 輕粉 二

右為末先搨皮散洗過後用清油調傅

龍骨散 治小兒疳積

白礬 錢一 龍骨 錢半 黃丹 錢一 乾胭脂 錢

射香 字一

右為末以綿杖子展却耳中膿水用藥末一字搽在耳中勿令風入

耳瘡方

黃連 去須 蛇床子 各一輕粉 一字

右為米鵝毛管吹藥入耳內

連床散 治嬰孩小兒滿頭如癩瘡毒及手足身上陰器

膏囊痒則抓爛黃水汁淋瀉燥痛

黃連 去鬚 蛇床子 錢五分 五倍子 一分

輕粉 五分

右為末先以荆芥葱煎湯洗拭乾後用清油調傳

金銀散 治嬰孩小兒眉間生瘡名煉銀瘡

煨金銀 輕粉 五分

右為末用麻油調傳

澤瀉散 治小兒鼻下兩旁瘡名澤瀉

澤瀉 欒金 甘草 蛇床子 各一分

右為末用甘草煎湯調食後服

地黃湯 治小兒鼻血

川芎 生地黃 赤芍藥 當歸 各一分

蒲黃 少許

右吹咀用水煎不拘時服

蒲黃散 治初生小兒大小便下血

生蒲黃 油頭髮 燒灰 各一分

右為末用生地黃汁或米飲調服

立効散 治小兒瀉血

蒲黃 生地黃 生薑草 赤茯苓

右吹咀用水煎入髮灰調勻食後服

聖惠方 治小兒龜背

大黃煨三錢 天門冬法 百合 木通

杏仁麩炒尖 枳殼炒 桑白皮蜜炒 葶藶紙

朴硝各五錢

右為末煉蜜丸如芡實大用溫湯調化食後仍用灸兩乳前各一寸半上兩行三骨間六處各灸三壯春夏從下灸起秋冬從上灸起依法灸之

枳殼丸 治小兒龜背

枳殼炒 防風去芦 獨活去芦 大黃煨

前胡去芦 當歸 麻黃去節各三錢

右為末麵糊丸如黍米大用米飲食後服仍用灸肺俞穴在三椎下兩傍各一寸半心俞穴五椎下兩傍各一寸半膈俞穴七椎下兩傍各一寸各灸三壯

芳黃散 治小兒齒遲

川芎 山藥 當歸 芍藥炒

甘草炙各二錢半

右為末用白湯調化食後服將乾藥末搽齒根

百蒲丸 治小兒語遲

人參

石菖蒲

麥門冬去心

遠志去心

川芎

當歸

乳香

朱砂各二

右為末煉蜜丸如黍米大用米飲食後服二十九

虎骨丸 治小兒行遲

虎脛骨炙

酥油

生地黄

酒洗

白茯苓

去皮

酸棗仁炒

去殼

肉桂去粗皮

防風

當歸酒洗

川芎

牛膝

酒洗去芦

右為末煉蜜丸如黍米大服二十九木瓜湯食前服

牡蠣散 治小兒盜汗

牡蠣煅

錢

黃芪

蜜炙

生地黄

兩

右以咀分作三服水煎不拘時

○廣按小兒如草頭之露水之泡用藥不可不謹也

夫小兒之病多因脾胃嬌嫩乳食傷積痰火結滯而

然其証不一且舉其尤者而言乳食傷胃則為嘔吐

乳食傷脾則為泄瀉吐瀉既久則成慢驚或為疳病

乳食停積則生濕痰痰則生火痰火交作則為急驚

或成喉痺痰火結滯則成癇吊或為喘嗽胎熱胎寒

者稟受有病也臍風撮口者胎元有毒也鵝口口瘡

者胃中有濕熱也重舌木舌者脾經有實火也胎驚

夜啼者邪熱乘心也變蒸發熱者胎毒將散也丹毒者火行於外也蘊熱者火積於中也中惡者外邪乘也睡驚者內火動也痢者腹中食積也瘡者膈上痰結也外感發熱者鼻塞聲重也內傷發熱者口苦舌乾也心痛者虫所齧也赤心痛者寒所鬱也積有常所有形之血也聚無定位而形之氣也胃者主納受也脾者主運化也脾胃壯實則四體安康脾胃虛弱則百病蜂起業童科者不可不調脾胃為切要哉

丹溪心法附餘卷之二十二終

