




57







Trans from Courtyard Lib.

OCT 31 1999

消瘤方

用向陽槐枝於菜油灯盞火上

以槐枝

薰熱浸油熨瘤上如法熨數次其瘤自消

腸癰門

附胃腕癰

夫腸癰者乃陰陽偏勝喜怒無時伏於臟腑之中
結在腸胃之內血凝氣滯回旋失度不能通行
聚結成癰致生腫痛孫真人云卒得腸癰而不
曉其病候錯則殺人其病初起覺腹中微痛小
腹腫而強抑之則痛小便澀似淋時汗出復
惡寒其身皮甲錯腹皮緊急如腫之狀按之濡

或發熱無汗灑淅惡寒皆其候也其脉洪數者為有膿也可下脉遲緊者未有膿不可下也甚者腹脹轉側有水聲或遠臍生瘡汁從臍出或大便下膿血或一足不能舉凡此皆為惡候胃脘痞者經曰胃脉沉細沉細者氣逆者人迎反盛則熱聚於胃口而不行故胃脘為痞也治法亦與腸瘕頗同初以疎利之藥導其滯次以排膿消毒托裡之藥調之此其大法也

脉經問曰羽林婦何以知腸有膿師曰脉滑而數

滑則為實數則為熱滑則為榮數則為衛數

下降榮滑上升榮衛相干血為敗濁小腹痞堅

小便或澀或自汗出或復惡寒膿為已成設脉

遲緊則為瘀血血下即安

薏苡附子敗醬散 治身甲錯腹皮急如腹脹本

無積聚身熱脉數者 附子炮二 敗醬五分

薏苡錢一 右為末每服一錢水煎頓服小便

當下而愈

三因方 苡仁 附子同前 敗醬一兩二分

每用四錢水一盞半煎七分去渣空心服

千金大黃牡丹湯 治腸癰小腹痞堅或偏在膀

胱左右其色白堅大如掌熱小便自調時自汗

出脉遲堅者未成膿可下之常有血脉數則膿

已成不復可下 大黃四兩 牡丹皮三兩 芒硝

二兩 冬瓜仁一升 薤仁五升 右水五升煮一

升頓服當下膿血

無擇意以湯 腸癰腹中痛煩燥不安或脹滿不

食小便澀婦人產後虛熱多有此病縱非癰但

疑是者便可與或有差亦無妨 冬瓜子四兩

意以五兩 牡丹皮 薤仁各三兩 如無冬瓜仁

以瓜蒌仁代之每服五錢水煎服 姚氏去薤

仁用杏仁 雀氏加芒硝二兩

醫案曰女子腹痛百方不治脉滑數時作熱腹微

急孫尚診曰腹痛脉當沉細今脉滑數此腸癰

也以雲母膏一兩作丸如梧桐子大用牛皮膠

溶化温酒調膠水吞九子下餉時服尽下膿血

一盆而安

昔一婦人腸中痛不可忍大便從小便中出楊吉
老之壻李生診之曰夫乳脉見於寸部者乃積
血在胸今乳見於關乃腸生瘕也乃出雲母膏
作百十九煎苦著湯吞下利膿血數升而安
右腸瘕五方丹溪所集也前三方置於篇首者
蓋亦腫瘍瀉利例也後二方用膠黃著煎湯吞
藥者乃潰瘍補例也

四聖散 一名神効括萎散

治腸瘕、疽五發乳瘕便毒

服之神應

大生瓜萎 一枚去皮

粉草 研末四錢

乳香 研末一錢

沒藥 研末三錢

右用好酒二大盃漫

火煎至一盃分作二次兩日服盡大便順導惡
物妙 若乾瓜萎則用兩枚若疾甚者再服以
退為度此方極佳 盃音碗

牡丹皮散 腸瘕冷症腹濡而痛時、利膿

丹皮 人參 天麻 白茯苓 黃耆 木香

川芎 菴仁 去皮尖 川芎 官桂 各三分 白芷

苡仁 甘草 右用水煎溫服

梅仁湯 腸瘕裡急隱痛大便閉澁

梅核仁四十九枚

大黃三兩

牡丹皮一兩七分

冬瓜仁四兩

犀角一兩半

每服七

芒硝二兩

錢水煎服下利膿血三兩行為度

神仙蠶礬丸 治腸瘕神妙此藥不拘老幼皆可

服之無不取效最止疼痛不動臟腑乃內托之

藥也 方見瘕疽門

丹溪曰腸瘕大腸有熱積死血流注桃仁承氣湯

加連翹秦艽近肛門破入風者難治用防風類

河間射干湯 治胃脘瘕人逆脉逆而盛嗽膿血

營衛不流熱聚胃口成瘕 梔子仁 赤茯苓

射干去毛 升麻各一兩 赤芍一兩 白朮五錢

每服五錢水煎將熟入生地黄汁一合蜜半合

再煎溫服不拘時

復元通氣散 治諸氣澁耳聾腹瘕便瘕瘡疽無

頭止痛消腫

青皮 陳皮各四兩 甘草三寸半 川山甲炒

瓜蒌根各二兩 金銀花一兩 連翹一兩 右為末熱酒調下

痔漏門

痔者肛門內外有癰脹疼者是也東垣謂濕熱風燥四氣相合而致也痔有五種謂牡痔牝痔脉痔腸痔血痔也古方又有酒痔氣痔虫痔翻花久嗜辛熱炙煨新酒及房勞憂思蘊積熱毒憤鬱之氣所致也或藏於肛門之內或突於肛門之外若蘊毒深者其狀大蘊毒淺者其狀小大者如蓮花鷄冠挾苑之狀小者如牛妳鷄心櫻

菜之類久而不愈有妨行坐或出鮮血或流膿水則成漏矣治法在外者宜點之洗之在內者宜祛其風而除其濕消其熱而解其毒斯得治之法矣

東垣秦艽蒼朮湯

治痔疾若破謂之痔漏大便

秘澁必作大病此由風熱乘食飽不通氣逼大腸而作也受病者燥氣也為病者胃濕也胃刑大腸則化燥火以乘燥熱之實勝風附熱而來是溫熱風燥四氣相合故太腸頭成塊者濕也

作大病者風也若大便燥結者主病無變火邪也熱結不通去燥屎者其西方肺主諸氣其体收下亦助疾病為邪須當破氣藥兼之治法全矣服之其疾立愈不可作丸以判湯與之効如

神 秦艽 一錢 澤瀉 分三 蒼朮 製七分 防風根

五分 薤仁 去皮一錢 當歸根 三分酒洗第 黃柏 去

五分 大黃 必許雖大便秘 楨即 一錢細末 皂角

五分 煨存性去皮一錢 右除楨即薤仁皂角仁

三味候煎成藥研勻調入外餘咬咀作一服水

三盞煎至一盞二分去渣入前三味再上火煎

至一盞空心熱服待少時以羹饀壓之不犯胃

氣也服藥日忌生冷硬物及酒麪大料物乾姜

之類犯之則藥無効如有白膿加玉朶白葵花

須除萼去心細剪入青皮五分不去白入上藥

同煎又用木香三分為細末同楨即等三味再

上藥同煎依上法服餌古人以此疾多以歲月

除之此藥一服立愈若病久者再服必愈

秦艽白朮丸

秦艽去芦 歸稍洗 菀仁酒浸去皮尖 地榆錢三 澤瀉

皂角仁燒存性去皮各半兩 枳實炒 白朮各半兩

右為細末和菀仁泥研勻煎熱沸湯麩糊丸鷄

豆大焙乾白湯下空心宿食消盡服之少時以

羹膳壓忌生冷硬物冷水菜并濕麩酒及五辣

辛熱大料物之類犯之則藥無驗十服必愈

蒼朮澤瀉丸

蒼朮四兩去皮 澤瀉 枳實 秦艽各二兩 地榆

皂角子燒存性各一兩 右為細末燒餅為丸如桐子

大每服三十丸米飲湯或酒下

一婦人產後痔作瘡有頭如蒜頭大或下鮮血或

紫血大便疼與黑神散又多食肉太飽此濕熱

在大腸 郁李仁去皮 麻仁 槐角各七錢 枳實

皂角仁五錢為末 蒼朮 歸尾 生地各三錢 大黃

錢炒一 右分六帖內三仁另研煎服

又方 治痔用鷄冠花不拘多少濃煎湯每服一

盞空心服 本草云鷄冠花性涼治瀉血

丹溪治番花痔頭向上是大腸熱甚收縮為主用

四物解毒加枳殼白朮槐角秦艽

治番花痔 荆芥 防風 朴硝 右煎藥湯洗

之次用木鱉子鬱金研末龍腦些少水調塗上

痔藥膏子治外痔番花脫出黃水不止腫痛病並

用銀潤篋蘸藥塗傳日一次重者五七次立愈

先用藥水洗拭乾却傳此膏用真葉灰不拘多

少淋濃汁兩碗熬至一碗却入草烏片大黃片

各二錢再漫火熬至半碗入甘草一錢數沸下

淨細石灰半匙頭不可多略沸三五次用絹一

重花紙二重如絞漆狀濾過再熬成膏候冷用

真胆礬五分研極細末放入膏中用瓦器盛貯

封之臨用入龍腦末和勻傳之

治腸痔鱉甲丸 鱉甲 蝟皮 川山甲

白礬 附子 猪牙皂角 各半兩炙焦 存性二分

右細末研勻蒸餅丸如桐子大米飲下二十丸

食前日三服

又方 槐花 白礬 附子 右細末

研勻蒸餅丸如桐子大每服二十九米飲下食

前日三服

丹溪治二十三年不愈者三服止用蓮花蕊散

蓮花蕊

黑牽牛頭末

各一兩半

當歸

半兩

荖紅

許少

右為末先忌食肉五七日空心令食肉一頓就

取溫酒下三錢約兩時辰取下膿血或虫是効

海藏外臺治五十歲痔不瘥塗熊胆取瘥神効諸

方不及此

七聖丸治大腸疼痛不可忍王叔和云積氣生

於脾藏傍大腸疼痛陣難當漸交稍瀉三焦濕

莫漫多方左紀綱

羌活

一兩

楨郎

木香

川芎

桂枝

去皮各半兩

大黃

八錢煨

郁李仁

去皮另研一兩

右除郁李仁另研外為細末煉蜜丸桐子大驗

虛實臨時斟酌丸數白湯下取大便微利一服

而愈切禁不得多利大便若大行其病甚

治鼠痔結核作渴疼痛方

皂角

炙

川山甲

黃耆

荊芥

槐子

木香

蝟皮

鱉甲

醋炒

桔梗

露蜂房

炒焦

芍藥

各一兩

大黃

五錢

右為末煉蜜丸桐子大每服三十九溫酒下食前日三服未止加至四五十丸

治痔疾下血疼痛不止以玩月沙不拘多少慢火

熬令黃色為末每二錢入乳香五分空心溫酒

調下日三四服瘥

秦艽羌活湯 治痔漏成塊下垂疙瘡不任其痒

升麻根

柴胡

甘草

麻黃根

各五分

黃耆

秦艽

防風根

藁本

細辛

炒

紅花

羌活根

水煎服

治痔有虫咬穀道痒或下膿血多取槐白皮濃煎

汁安盆中生薰之塞其谷道湯冷更煖之良久

欲大便當出出不过三度即愈如用末綿裹納

下部

淋瀝藥 治下部痔腫大腸頭痒痛

葳靈仙

枳壳

各一兩

右為粗末熬水薰洗

冷即再煖臨卧避風洗三次梔乾貼蒲黃散

丹溪治腸風痔漏有虫如絲細黑頭取去除根

瞿麥半斤 猪牙皂角一打

右为末入猪腰子一隻内用米泔煮空心食之

少頃肚痛上攻虫皆隋出作地坑埋之薄粥補

當歸郁李仁湯 治痔漏大便硬努出大腸頭下

垂多血苦痛不能忍 皂角仁另研細末調服 郁李仁

秦艽各一錢 麻子仁半一錢 當歸稍 生地黄

蒼朮各五分 澤瀉分 枳實分 大黃三小

右除皂角仁研細末餘藥剉如麻豆大水三大

盞煎一盞去渣入皂角末調在内空心食前候

宿食消於服之忌風寒處大小便如欲凉大腸

寬大腸則用枳殼去穰入巴豆鉄線纏煮透去

巴豆入藥用若丸藥則搗爛用煎藥則乾用

治腸痔 每大便下血槐樹上木耳取末之飲服

方寸瘥日三服良

治腸痔多年不瘥下血不止木賊枳壳各二兩乾

姜一兩大黃一分四味並剉一處入銚子内炒

黑色存性三分搗羅温粟米湯調食前服二錢

七甚妙

治痔濕瘡方

鷄子

一個煮熟去黃取白切炒

明礬

如皂角子大匙

上枯過用三分

藥送入瘡孔內立効日三易

又方 川山甲

一兩燒存性

肉苳蔻仁

三筒同為末

米飲調二錢服治氣痔膿血甚者刺蝟皮一兩燒服中病即已不必盡劑

治痔神應散

治五種腸風下血上廁糞前有血

名外痔糞後有血名內痔大腸不收名脫肛穀道四面有努肉名如痔頭上有孔漏出名腸風

並治之

黃牛角

一枚酌中老槌碎

蛇蛻皮

一條白者

猪牙皂角

七莖

川山甲

七片

刺蝟皮

一兩剉

右五味細剉入甕瓶內以黃泥封固候乾先用

小火燒令烟出後用大火煨令通赤為度取出

攤開候冷搗羅為末服時先令患者臨卧時細

嚼胡桃仁一個如糊用無灰好酒一盞送下不

可言語便睡至五更時以溫酒調下藥末三錢

至辰時更進一服雖年久不過三服立効

丹溪治腸風痔漏如神大樹木上寄生葉取乾為

末酒水米飲任下或丸桐子大服三十九亦可
千金方 治五痔方蒼耳莖葉以五月五日採乾
為末水服方寸七或丸桐子大服之立効

洗痔疼 用荆芥朴硝葉寄生定痛解毒去風涼
大腸熱安胎如腫者加倍子木鱉子研極細調
服而愈

又方 五倍子朴硝葉寄生蓮房水煎洗一方
加百藥煎洗

洗痔方 輕者用朝東馬齒莧劉寄奴濃煎湯薰
待溫却用手洗拭乾重者加大青葉梗乾者一
半同煎

丹溪治痔瘻用灰莧蒂根煎濃湯先薰後洗
又方 取河水頻洗用蝸牛塗之

一方治痔 用雄鷄胆片腦和勻貼之
一方 熊胆塗之神効

蒲黃散 治下部痔漏 蒲黃 血竭非
右為細末每用少許貼於患處

薰痔法 蝟皮切方三 雄黃東大 熟艾鷄子

右為末用瓦器以灰實一半如燒香法安長桶內坐其上薰之烟氣從口出為佳凡三度薰永瘡勿犯風冷忌鷄肉毒物

丹溪治痔瘡 大蒜十片頭垢捏成餅子先安頭

垢餅於痔頭上外以蒜片以艾灸之

本事方 治一判官乘驛入駱谷有痔疾因此大

作其狀如胡瓜貫於腸頭熱如澆灰火至驛僵

仆主驛吏云此病之曾患來須灸即瘡用柳枝

濃煎湯先洗痔便艾炷其上連灸三五壯忽

其一道熱氣入腸中因轉瀉鮮血穢物一時出

至痛楚瀉後遂失胡瓜所在登驛而馳去

無擇云腸癖如痔如大疔中有小山突出為痔人

於九竅中凡有小肉突出皆曰痔不特於肛門

邊生有鼻痔眼痔牙痔等其狀不一方書分出

五種曰牡曰牝曰脉曰腸曰氣牝痔者肛邊生

瘡腫突出一日數枚膿潰即散牡痔者肛邊發

露肉珠狀如鼠妳時時滴瀆膿血脉痔者腸口

顆發癰且痛且痒出血淋漓腸痔者腸內結

栝有血寒熱往來登溷脫肛氣痔者遇恐怒則發肛門腫痛氣散則愈又方有酒痔每遇飲酒發動瘡腫痛而流血血痔則每遇大便清血隋下而不止宜解熱調血順氣為主若久不愈必至穿穴為漏矣

治痔切勿用生砒毒氣入腹反至奄忽忌喫生冷硬物冷菜之類及酒濕麪五辣辛熱大料物及乾姜之類犯之無効此東垣格言也

秦艽防風湯 治痔漏每大便時疼痛

秦艽 防風 歸身 白朮各錢半 甘草炙

澤瀉分六 黃柏分五 大黃煨 陳皮分各三 柴胡

升麻分各三 桃仁分卅箇去尖另研 紅花分卅

右水煎空心熱服

烏金散 治痔漏

川山甲 蝟皮燒存性 黃牛角腮煨碎 牙皂角

槐子 皂莢刺 枳壳 貫衆 阿膠分各等

川山甲炒 右為細末每服錢半用胡桃肉爛研

併調酒食前服大腸熱荊芥湯下漏血不止川湯下

蝟皮丸 治諸痔出血裡急後重

川芎 白芍 松壳各五錢 槐花炒三錢

艾葉炒 地榆 黃蓍 白礬枯 貫衆各半兩

蝟皮一兩 炙焦 大皂角一條 炙 猪後蹄垂甲十箇 炙焦

蜂房炒焦二錢五分 川山甲炒焦二錢五分 皂角刺畧燒一錢五分

一方有蟬退洗淨畧燒二錢 右為末醋糊丸

如桐子大每服七十丸

逐瘀湯 治熱痔通利大小便取下黑物

川芎 赤芍 生地 白芷 五靈脂 枳殼

阿膠 蓬木炮 茯苓 茯神 木通

生甘草各一分 大黃生 菝葜去皮各一分半

每服三錢姜三片蜜三匙煎服以利為度汚血

作疼通用

釣腸丸 治久新諸痔肛邊腫疼或痒挾虛寒而

作者 括萎二箇燒存性 蝟皮剉碎確內燒存性二箇

白礬 綠礬枯 胡桃仁十五箇燒存性 白附子生

半夏 南星 鷄冠花五兩燒 枳殼 附子去皮

訶子去核各二兩 右為末醋麩糊丸梧子大每服

二十丸空心臨卧温酒下

槐角丸 治諸痔出血及痔頭上有孔名瘻

槐角炒一兩 地榆一兩 川歸一兩 黃芩一兩

防風一兩 枳殼一兩 右為末酒糊丸如梧子大

每服五十九米飲下

乾葛湯 治酒痔

白乾葛 枳殼 半夏 茯苓 生地各半兩

黃芩 甘草各一分 杏仁五錢 每服三錢黑豆

百粒姜五片白梅一個水煎服

橘皮湯 治氣痔

陳皮 枳殼 川芎 槐花炒各半兩 枳郎

木香 薤仁 紫蘇 二葉 香附 甘草各錢半

每服三錢姜東煎服

黑玉丹 治腸風及痔 兩頭疼不可忍用此去虫

拔根三五服見效 頭皮剉入 猪懸蹄百隻

牛角腮一兩 槐角二兩 雷丸 脂麻各二兩

乱髮皂角煎湯洗培 敗棕剉各一兩 苦練根剉二兩半

右用磁罐內燒存性 研細末入乳香一兩射香

四錢研合和勻酒糊丸如桐子大每服五十丸
先細嚼胡桃一枚以酒吞下日二服甚者日
三服空心及食前服

又方 治同上

人參 黃耆 參 生地 川歸 川芎 条苓

升麻 枳殼 槐角 各等 右為細末麵糊丸

如桐子大每服三寸丸空心米湯下

敷藥蝸牛膏 蝸牛 一枚 腦子 射香各少許搽

之用磁合盛次早取并附之

一方 熊胆 錢一 射香 分一 片腦 厘五 共為細末

點田中大螺數枚碗盛候汁出取以點之

一方 寒水石 朴硝 共為末以津調手指點

藥附痔上

一方 蝟皮燒灰生酒油和附 治腸痔下部者

如虫蝕灸末用

一方 治諸痔用川山甲自尾根盡處數除三鱗

不用取第四五大鱗橫三行燒存性為末入射

香少許臘茶一匙同調空心服以澄下濃者附

瘡上其冷如冰冷永不痛大効

肘後方 治漏 蜂房一枚炙黃赤色為末每用

一錢臍猪脂調附瘡上

一方 用兔系子炒黃黑色為末用少許和鷄子

黃調附亦治谷道中赤腫

一用木鱉子槌去油煎湯洗一用槐柳枝煎湯洗

又方 飲酒多之人生痔一黃丸以生地黃汁為

丸空心淡酒吞下三五十九立効

二八通玄丹 梅東先生方

宣連

八兩用茱萸四兩炒去茱萸

川歸

二兩

烏梅肉

槐角

枳殼各二兩

右五藥末以雄猪肚一箇洗

淨入藥在內外以韭菜四五斤包其肚用水醋

共數碗煮肚熟為度去韭菜并肚以藥爛搗丸

如桐子大每服空心白湯下五七十九

疔痔 用鱧魚乾燒炬薰之虫尽死而愈

治穀道遺生瘡久不愈者 用鷄內金燒灰存性

研細末就患處如神

皂角煎丸 治內痔漏腸頭裏面生核寒熱往來

滿尺皂角

二挺六庄

白礬煨

刺蝟皮炙

薏苡仁

白芷

杏仁

炒去皮

甜葶藶

炒

川芎

桂枝各半

猪後蹄垂甲

十枚燒

右為細末煉蜜入如桐子大每服五十九空心

用棗白皮煎湯送下

拔毒散 敷痔腫毒處

大黃

黃蘗

白芨

石羔

黃芩

黃連

白欵

梔子

朴硝

各等分

右為末用井花水調塗

湯火門

凡湯火傷急向火炙雞極痛強忍一時即不痛慎

勿以冷物塌之及井底泥得之使熱氣不出爛

入肌肉

火燒以好酒洗之再以鹽傳其上如皮塌者以酒

熬牛皮膠傳之

熱酒傷用糯米粉炒黑末酒調傳之

治湯火灼未成瘡者用艾白根燒灰鷄子黃和傳

之如成瘡用白密封之以竹中取膜貼上日三次

治湯火瘡麩皮炒黑灰為末傳上神妙此方有補性始終皆可用

治湯火瘡取舊烹銀爐中燒過焦黃土研細如粉以生姜調於帛上貼之痛止

一方用溶銀鍋子細末油調傳上佳

保生救苦散 治火燒熱油損或至皮肉肌及一切狗咬損傷并刀斧傷田生寒水石不拘多少

為極細末調塗之或乾上然不如油調塗其痛

立止並不作膿無分毫厚一苦楚月近完復永無

破傷風症

冰霜散 治火燒皮爛大痛

寒水石 生 牡礪 燒 朴硝 青黛 輕粉 各分

右為細末新水或小油調塗立止

治火燒 桐油 水銀 各分 右二件以柳條不

住手撓成膏再入大黃石羔二末和以牛皮膠入少水溶開外用貓兒肚底毛細剪摻上貼之

以青黛傳之妙

治湯火瘡爛者以黃蜀葵花落者淨器收之入水

此少待爛成水傳上神妙

熱油燒外痛以蜜傳之立安 梅師方

治湯火瘡至妙 用劉寄奴為末先以粳米漿鷄

翎掃傷處後以藥末搽上不痛且無痕大凡湯

傷先用鹽末搽之護肉不壞然後傳藥

又方以榆白皮末猪脂油塗瘡愈

顛撲損傷門

按發明經云夫從高墜下惡血留於內不分十二

經絡聖人俱作風中肝經留於脇下以中風癱

之血者皆肝之所主惡血必歸於肝不問何經

之傷必留於脇下蓋肝主血故也痛甚則必有

自汗但人汗出皆為風症諸痛皆屬於肝木况

敗血凝澁從其所屬入於肝也從高墜下逆其

所行之血氣非肝而何以破血行經藥治之

內經云肝脉搏堅而長色不青當病墮若搏因血

在脇下令人嘔逆金匱云寸口脉浮微而澁然

當亡血若汗出設不汗出者當身有瘡被刀斧

所傷亡血故也

金瘡出血脉沉小者生浮大者死

砍瘡出血一二石者脉大二十日死

砍刺出血不止者其脉止脉来大者七日死滑

細者生

從高顛什内有血腹脹滿脉弦者生小弱者死

劉宗厚云按破傷有瘀血在内脉堅強實則生虛

小弱者死若亡血過多脉虛細小者生浮大數

實者死皆為脉病不相應也

十和云諸落馬墜井打撲傷損閃肭損折杖瘡腫

發焮痛不止者可峻下二三十行痛止腫消宜

以通經散導水丸等藥或加湯劑瀉之後服和

血消腫散毒之藥

劉宗厚曰按子和於墮車落馬杖瘡閃肭者俱用

峻下其有心恙牙關緊急者云是驚涎堵塞於

上俱用三聖散先吐後下其法雖峻然果有經

涎瘀血停留於内焮痛腫脹發於外者亦奏捷

功但於出血過多老弱之人脉虛大者亦當責求

又曰謹按打撲金刃損傷是不因動氣而病生於外

外受有形之物所傷乃血肉筋骨受病非如六淫七情為病有在氣在血之分也所以損傷一症專從血論但須分其有瘀血停積而亡血過多之症蓋打撲墜墮皮不破而內損者必有瘀血若金刃傷皮出血或致亡血過多二者不可同法而治有瘀血者宜攻利之若亡血者兼補而行之又察其傷有上下輕重淺深之異經絡氣血多少之殊惟宜先逐瘀血通經絡和血止痛然後調氣養血補益胃氣無不効也頃見圍

城中軍士被傷不問頭面手足胸背輕重治者例以大黃等藥利之後大黃缺少甚者遂以巴豆代之以為不於初時瀉去毒氣後則多致危殆至於略人手指亦悉以藥利之殊不知大黃之藥惟與有瘀血者相宜其有亡血過多元氣胃氣虛弱之人不可服也其巴豆大熱有毒止能破堅逐積用於此疾尤非切當所以有服下藥過後其脉愈見堅大治者不察又以為瘀血未盡而復下之因而夭折人命可不慎歟

凡損傷切不可食冷水血見寒則凝但一系血入
心即死攻以下瘀血之劑治之

金櫃治馬墜及一切筋骨損方

大黃一兩酒浸

緋帛如手大燒存性

亂髮如鷄子大燒存性

炊單布一尺燒灰

敗蒲二寸一把

桃仁四十九粒去皮尖

甘草炙如中指節

七味以童便煎成入酒一大盞

次下大黃去滓分溫三服先剉敗蒲席半領煎

湯浴衣被覆斯須通利痛楚立瘥

復元活血湯 從高墜下惡血留於脇下疼痛實

不可忍 柴胡五錢

當歸六錢 甘草 川山甲

炮各二錢 大黃一兩酒浸

莢仁五十枚去皮尖 紅花

瓜蒌根各二錢

右件桃仁研爛剉如豆大每服

一兩水二中半酒半中煎至七分食前服以利

為度得利後痛或不尽服乳香神應散

靈樞云墜墮惡血留於脇下則傷肝、胆之經行

於脇下屬厥陰少陽宜以柴胡為引用為君以

當歸活血脈又急者痛也以甘草緩其急亦能

生新血陽生陰長故也為臣川山甲括萎根桃

仁紅花破血潤血為之佐大黃酒製以蕩滌敗血為之使

當歸道滯散 治損傷瘀血大便不通紅腫暗青

疼痛昏悶畜血內壅欲死

大黃一兩 當歸三錢 射香必 右二味為細末

入射香和勻每服三錢熱酒調下其瘀血自下

若骨節傷折疼痛以定痛接骨紫金丹治之

定痛乳香神應散 東垣方 治從高墜下疼痛

不可忍及腹中疼痛 乳香 沒藥 雄黑豆

葉白皮 獨科栗子各一 破故布二

當歸一兩 水蛭半兩 右為末每服五錢醋一盞

沙石器內煎至六分入射香少許溫服

定痛接骨紫金丹

麝香 沒藥 紅娘子各半 烏藥二錢

地龍去土二錢半 川烏 草烏炮各一兩 五靈脂半兩

木鱉子去壳半兩 茴香二錢半 黑丑五生用 骨碎補

威靈仙 金毛狗脊 防風 自然銅醋淬煨

各五錢 禹餘糧四錢 陳皮 青皮各五分

右為細末醋糊丸桐子大每服十九至二十九
溫酒送下

三因鷄鳴散 從高墜下及木石所壓凡是損傷
瘀血凝滯疼痛欲死兼以此藥推陳致新神效

此方治血滯於肺部氣分也 大黃酒浸一兩

杏仁三十粒 去皮尖 右研細酒一碗煎至六分去滓

鷄鳴時服至晚取下瘀血即愈若便覺氣絕取
藥不及急劈開口以熱小便灌之

王海藏云若登高墜下撞打及傷心腹胸中積血

不散以上中下三焦部分分之以易老犀角地

黃湯桃仁承氣湯抵當湯丸之類下之亦有以

小便同煎治之者更有內加生地當歸煎服者

亦有加大黃者惟智者擇之

潔古巴戟湯 治從高墜下及打撲內損昏冒嗜

卧不能飲食此謂血閉臟腑不通 巴戟去心

大黃各半兩 當歸 地黃 芍藥 川芎各一兩

右水煎以利為度

嚴氏奪命散 治刀刃所傷及從高墜下木石壓

損瘀血凝滯心腹疼痛大小便不通

水蛭用石灰拌慢火炒令黃色半兩 黑丑二兩 右為末每服

二錢熱酒調下約行四五里再用熱酒調黑丑

末二錢催之須下惡血成塊以及為度

破血止痛行經之劑

破血散 治乘馬損傷跌其脊骨惡血留於脇下

其痛苦楚不能轉側

羌活 防風 桂各一錢 柴胡 連翹各二錢

歸稍二錢 水蛭炒烟尽研二錢 射香少許另研

右分作二服每服二大錢酒水一盞除水蛭射

香外另研如坭煎餘藥一大盞調一味食前服

地龍散 治腰痛或打撲損傷從高墜下惡血

留於太陽經中令人腰脊或脛膕臂腰中痛不

可忍 中桂 地龍各四分 羌活二錢 黃栢

甘草各一錢 蘇木六分 麻黃五分 桃仁六枚

歸稍一分 每服五錢水煎服

三因加味芎藭湯 治打傷敗血入胃嘔吐黑血

川芎 當歸 白芍 百合浸半日 荊芥穗各一分

右水漚各半煎服

元戎加味四物湯 治虛人損傷不禁下者

四物湯加川山甲水煎服

花蕊石以治一切金刃箭鏃傷及打撲傷損猶

犬咬幼或至死血瘀傷處以藥搽之其血化為

黃水以搽藥便活不疼痛如內損血入臟腑煎

童子小便入酒少許調一大盞服之立効若牛

觝腸出不損者急納腸入用細系或桑白皮為

線縫合肚皮縫上搽藥血止立活如無桑白皮

用生麻縷亦可並不可封裏瘡口恐作膿血如

瘡乾以津液潤之然後搽藥婦人產後敗血不

盡血迷血暈惡血奔心胎死腹中胎衣不下至

死者但心後覺煖急以童子小便調一盞取下

惡物如肝片終身不患血風血氣症若膈上有

血化為黃水即時吐出或隨大便出

石硫黃兩四 花蕊石兩二 右二味相拌合勻先

用帛筋和鹽坭固濟瓦礫子一箇內可容藥候

坭乾入藥在內再用坭封口候乾安在四方磚

上上書八卦五行字用炭一秤籠疊周匝自己
午時從下着火漸上徹直至經宿火冷炭尽
又經宿出確細研以絹羅子篩極細磁盒盛之
依法使用

雜方

本事方 治打撲墜損惡血攻心悶亂疼痛水仙
散未展荷葉陰乾一味為末食前以熱童便一
盞調下三錢以利下惡物為度

經驗方

治打撲損筋傷骨折

黃栢一兩

兩

半夏

五

右為細末用生姜自然汁

調如稀糊敷以帛花貼如乾再敷如骨折先以
絹帛封縛次用杉樹皮夾定良久痛止即瘥
熱乃是血活筋骨復舊輕者三五日重者不過
旬日矣

本事方

治跌仆傷筋損骨痛不可忍

此方乃神
龜相授

生地

為末

藏瓜姜糖

各一

生地

四兩
切

右都炒令勻熱以布裹罨傷折處冷則易之
治打撲內損筋骨疼痛

乳香 沒藥 芍藥 川芎 川椒去子及

當歸各半 自然銅煨三錢 右為細末用黃蠟

四兩溶開入藥末不住手攪勻濕丸如彈子大

每服一丸用好酒煎開消盡乘熱一服吃盡看

何處痛向痛處卧霎時服三五丸立効

衍義云 沒藥通滯血打傷撲損疼痛皆以酒化

服夫血滯導而行之則痛腫消焉

肘後方 治被打瘀血在骨節下出者

生鉄斤一 酒非五煎取一升飲之

丹溪治一人因上山惡血瘀入內損傷食少脉絃

治宜活血和氣

川芎錢三 青皮錢二 芍藥 活石各錢 丹皮五分

炙甘草錢一 桃仁七枚 水煎服之

綴耳鼻法 治擦落耳鼻用髮入確子塩坭固濟

煨為末乘急以所擦落耳鼻蘸灰綴定以軟帛

縛定立効

肩穿法 凡負重擔肩破者剪猪兒頭上毛不語

唾粘之

遠行脚打泡 以生麩水調為糊貼過夜即乾不
可擦破

又方用飯粘搗貼以帛覆之過夜次日平復効
抵金用 跌撲傷損閃扭出骨竅等症

蚕沙炒黃 荒豆粉炒黃各 枯礬二兩

右為末 醖醋調敷患處厚帛貼之絹帛綁扎換
敷三四次即愈忌產婦

秘傳神効散 治跌撲損傷骨折骨碎筋斷疼痛
不可忍者此藥極能理傷續斷累驗若神

用路上或墻脚下過往人便溺處經久碎瓦片
取來洗淨火煨醋淬五七次瓦黃色為度以刀
刮細末每服三錢好酒調服不可以藥微賤而
輕忽其功也

一字散 治跌撲傷損功效同前
半兩錢五枚火煨醋 甜瓜子仁五錢 珍珠三錢
右為末每服一字好酒調下

治跌撲傷損 用蟹二隻連殼搗爛好酒二碗濃
煎去渣飲之留渣敷患處

治損傷神効 治跌傷骨折急取雄鷄一隻量患
人酒量多少成一碗半碗將鷄刺血於酒中溫
之令患人熱飲其痛立止驗甚

癘風

內經云脉風成癘此疾非止肺腎二臟有之以其
病發於鼻俗呼為肺風也鼻準赤而脹大乃血
隨氣化也氣不施則血聚血聚則肉潰而生虫
此屬厥陰當以藥疎之可用局方升麻湯下錢
氏瀉青丸是也餘病各隨經而治之癘風成癩
樺皮散主之從少至多服五七月後灸承漿七
壯瘡愈勿止藥再灸同止 承漿一名懸漿在
唇下宛宛中足陽明任脉之會療偏風口喎面

腫消渴口齒疳蝕虫瘡灸之佳每灸七壯至七
七壯止灸則血脉宣通其風應時而愈文炷如
小竹筋頭大不可灸破血肉但令當脉灸亦能
愈疾

樺皮散 治肺臟風毒遍身瘡疥及癭疹瘙痒

杏仁 泡去皮尖水一碗煮至五分取出曬乾另研末 荆芥穗 各二兩

枳殼 燒去穰炭火存性 樺皮 燒存性各四兩 炙甘草 五錢

右五味為末每服二錢食後溫酒調下日進三次

凌霄散 治癘風神効

蟬退 地龍 去土焙 白僵蚕 全蝎 各七錢

凌霄花 五錢 右為末每服二錢酒調下無時常

宜浴每浴坐於湯中浸一時久服藥神効

四聖保命丹

大黃 五錢 黃栢 八兩 苦參 荆芥 各五錢 輕粉 二錢 旱蟾

瓜萎根 防風 各五錢 輕粉 二錢

右為末每服一錢茶清一盞調下空心日午臨

卧各一服服五七日後先於牙縫內中臭黃涎

渾身疼痛次後便利膿血病根悉去

加減何首烏散 治紫白癩風筋骨疼痛四肢少力眼紅無白鼻梁崩壞皮膚瘡疥及手足皴裂睡卧不安行步艱辛

何首烏 蔓荊子 石菖蒲 荊芥穗

甘菊花 枸杞子 威靈仙 苦參 各五錢

右為末每服三錢蜜茶調下無時

參毛丸 治大麻風

苦參 一斤 蘇毛 半斤 煨 存性 為末陳米糊為丸

桐子大每服五十九丸酒送下一日二次

仙方鯨鯉散 此方治大麻風極似絕勝他方 寶

穿山甲活者大約重十觔為妙剖開肚不去腸

雜以真生漆一觔塗在肚內陰乾七日用坭

包火煨存性研極細末每服三分或五分火

酒調下用真青布被上下蓋之出汗臭不可

聞不得見風待汗乾被上俱是小虫服十日

眉毛復出身上膿水瘡皆愈一月即脫躰除

根

愈風散 治一切惡風癩疾除鼻梁崩壞者不治

外其餘不問新久無不收功

淡豈豉 真輕粉 只壳 俱為末每

服一二錢五更空心糯米湯調下至早飯後稍

覺困倦欲睡不睡乃藥力搜風使然當逐下惡

物再服後調乳丸調理

鶴虱丸 治大麻風不搖等症 以効為度

鶴虱二兩 防風一兩 地榆 麻黃去節 雄黃另研

天麻各半 右為細末醋糊為丸梧桐子大每

服三十五丸酒下日三 忌雞猪魚蒜粘滑油

燒炙胡椒房失能如此調養則萬全矣若初起三五年者十全八九如縱恣無忌憚者則不能收全功

癘瘡方

明礬末 黃蠟 新鮮土茯苓 過路珍珠草

紫背天葵根子各一兩 右為末煉化黃蠟加生

密糖拌搗為丸梧子大每服三十九米飲下

初服一日三次後只一日一次

又秘方 治大麻風癩疾

死人蛆虫洗净銅片上焙乾為末每用一二錢
用皂角刺煎濃湯調下 若腫而有疔瘡者乃
陽明經濕熱壅盛先以防風通聖散服二三帖
然後再服此藥蓋此藥有補功以皂針為引故
能達表能久服之極有神功非泛常草不可比
倫也用遭橫死者於檢屍場中問作人買之極
多不難

終

