

洞虛子論，痰之為病，成偏頭風，成雷頭風，成太陽頭痛，眩運，如坐舟車，精神恍惚，或口眼瞤動，或眉稜耳輪俱痒，或頷腮四肢遊風，腫硬似疼，非疼，或渾身燥痒，搔之則隱疹隨生，皮毛烘熱，色如錦班，或齒頰似痒似痛，而疼無定所，滿口牙浮痛痒不一，或噯氣吞酸，鼻聞焦臭，喉間草腥氣心煩，鼻塞，咽喉不利，咯之不出，咽之不下，或因噴嚏而出，或因舉動而唾，其痰如墨，如破絮，或如桃膠，或如蜋肉，或心下如停水鐵，閉滯

妨悶，嗳嘆連聲，狀如膈氣，或寢夢刑戮刀兵，劍戟或夢入人家，四辟圍繞，暫得一竇，百計得出，則不知何所，或夢在燒人地上，四面烟火枯骨，焦氣撲鼻，無路可出，或不因觸發，忿怒悲啼，雨淚而寤，或時郊行，忽見天邊兩月交輝，或見金光數道，回頭無有，或足膝酸軟，骨節腰腎疼痛，呼吸難任，或四肢肌骨間痛，如掣琴乍起乍止，並無常所，或不時手癱麻，疼狀如風濕，或如芒刺，不安，或如毛虫所螫，或四肢不舉，或手

足重滯或眼如姜黃膠粘痒澁開闔甚難或陰晴交變之時胸痞氣結或齒痒咽痛口糜舌爛及其奮然而發則噴嚏連聲初則涕唾稠粘次則清水如注或眼前黑暗腦後風聲耳內蟬鳴眼瞼肉惕惟洞虛子備此疾若述甚詳悉乃能治療病勢之來則胸腹間如有二氣交紐喧塞煩鬱有如烟火上衝頭面烘熱眼花耳鳴痰涎涕淚並從肺胃間湧起凜然毛豎噴嚏千百次後遍身煩躁則衣凍體稍只片時或春秋乍

涼之時多加衣衾亦得暫緩或頓飲冰水而定或痛飲一醉而終不能逐去病根乃得神秘沉香丸方屢獲大効愈入數萬但不欲輕傳匪人故以隱語括之詩曰甌裏翻身甲帶金于今頭戴草堂深相逢二八求斤正硝煅青礞倍若沉十七兩中零半兩水丸梧子意須斟驅除怪病安心志水瀉雙身却不住

大黃蒸八黃芩八青礞石一兩硝煅沉香半兩右為末水丸如梧子大白湯食後空心服

○治飲之劑

心下有痰飲胸脇支滿目眩苓桂木甘草湯主之

茯苓四錢桂枝一錢白朮各三錢甘草二錢

水煎服

小便自利短氣有微飲當從小便去之亦前病者脉伏其人欲自利利反快雖利心下續堅滿此為留飲欲去故也

甘草半夏湯主之

甘遂去心大戟乾者三枚半夏十二枚芍藥五枚甘草一兩如指大一枚以水二升煮取半升去粗以蜜半升和藥汁煎取八合頓服之

縣飲十枣湯主之

芫花

洗淨醋拌經宿炒令黑勿焦

甘遂

同前製大戟去皮流水煮

大戟

長者一時洗净日乾

各等分

為末

以水一升五合

先煮肥大棗十枚

取八合去渣納藥末強盛人五分平旦服

之不下更加五分下後以糜粥調之

溢飲者當發其汗大小青龍湯主之大青龍湯

麻黃

去節六錢桂枝去皮二錢甘草二錢杏仁四枚去

石膏

研碎二錢生姜二錢大棗二枚水三碗半煎去粗

溫服取微汗汗多者溫粉撲之

小青龍湯

麻黃去節三錢

五味子

半夏各二錢

乾姜

甘草炙

細辛

桂枝去皮各三錢

水七碗煮麻

黃至六碗去沫內諸藥煮取二碗

膈間支飲其人喘滿心下痞堅面色黧黑其脉沉  
緊得之數十日醫吐下之不愈木防已湯主之  
虛者即愈實者三日復發復愈不愈者宜防已  
湯去石膏加茯苓芒硝湯主之微利則愈

木防已

石膏各三錢

桂枝二錢

人參四錢

水三碗煎一椀溫服

加茯苓四錢芒硝三錢

去石膏名防已苓硝湯

心下有支飲其人善冒眩澤瀉湯主之

澤瀉五錢

白朮二錢

水碗半煎

一椀溫再服

支飲胸滿者厚朴大黃湯主之

厚朴三錢大黃六錢枳實五錢

水煎溫服

支飲不得息芩蘚大棗瀉肺湯主之

芩蘚炒令黃色搗丸大棗十二枚

先以水三升煮

秉至二升去秉內芩蘚煮取一升頻服

嘔家本渴者為欲解今反不渴心下有支飲故

也

小半夏湯主之

方在嘔吐門

腹滿口舌乾燥此脇間有水氣已椒蘚黃丸主之  
防已

椒目 莩苓炒大黃各一

右為末蜜丸如梧子大先服一丸日三服稍  
增<sub>其</sub>中<sub>有</sub>津液渴者加芒硝五錢

卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸者半夏加茯苓湯  
主之 方見嘔吐門

假令瘦人臍下有悸吐涎沫而顛眩此水也五苓  
散主之 白朮 茯苓 猪苓<sub>各三錢</sub> 澤鴻錢

桂錢右為末白飲服方寸匕日三服飲暖水出愈  
水氣去後心胸間虛氣滿不能食茯苓飲消痰氣  
能令食 茯苓 人參 白朮<sub>名陳皮半錢</sub> 枳實 生姜<sub>各四錢</sub> 水煎連進三服每一服後如  
人行八九里復進

欬逆倚息不得卧小青龍湯主之青龍湯服後多  
唾口燥寸脉沉尺脉微手足厥逆氣從小腹上  
衝胸咽手足痺其面翕然如醉狀因復下流陰  
股小便難時復冒者與茯苓五味甘草湯主之

卷之三

三

三

三

三

三

三

三

三

茯苓 桂枝 鎔各四 甘草 鎔三 五味子 錢作三服  
衝氣即降而反更發胸滿者 茯苓甘五味姜辛湯主之

錢 三  
茯苓 錢五味子 鏃 甘草 乾姜 鎔三 細辛

水三鍾煎一鍾日三服

數滿即止而更復渴衝氣復發者以細辛乾姜為熱藥也服之當遂渴而渴反止者為支飲也支飲者法當胃胃者必嘔嘔者復納半夏以去其

水苓甘五味姜辛夏湯主之

茯苓

五味子

半夏

錢

四

甘草

細辛

干姜 鎔各二

水煎日三服

水去

嘔止

其人形腫者

加杏仁

主之

其症應納

麻黃

以其人遂癰故不納之

若逆而納之者必厥

所以然者以其血虛

麻黃發其陽故也

若面熱

如醉此

為胃熱上衝

其面前方

加大黃

三錢以利之

先渴後嘔

為水停心下

此屬飲家

小半夏茯苓湯主之

半夏錢

茯苓半錢

生姜

片水煎服

五穀湯治五穀最妙

旋覆花

人參

橘紅

枳實

白朮

茯苓

厚朴

半夏

粟澤鴻

猪苓

前胡

桂心

白芍藥

甘草

等分各

每兩分

二服

姜十片水二

盞煎去渣溫服無時忌肉食生冷等物因酒

成飲加葛花砂仁

治心腹中脫痰水冷氣心下浮濛嘈雜腸鳴多噏

口中清水自出脇肋急脹痛不欲食此胃氣虛

冷所致其脉沉弦細遲旋覆花湯

細辛

陳皮

桂心

人參

甘草

桔梗

芍藥

半夏

旋覆花

各半錢

赤茯苓

每服四錢姜七片煎去渣溫服

木香半夏丸

治痰涎上湧心胸不利常服消痰

寬膈

半夏一

木香鐵陳皮

茯苓

姜屑

人參

白附子

草蔻

各五錢

右為末

糊丸

食後

生姜湯

下五十丸

降痰丸

治三焦氣滯下痰飲消食利膈痞滿

蘇

稠粘面熱目赤支體倦怠不思飲食常服升

降滯氣

消化瘀血

木香

檳榔

青皮

陳皮

枳殼

大黃

半夏

湯

京三稜

黑牽

牛乳

一兩

右為末

麵糊丸

食後

薑湯下

吐劑

治嘔噦妙方

砒霜

麵

海螵硝各一錢

為末水調作餅子慢火炙黃再研令細每服

一字用井花水作一呷服良久吐出為度小

兒減半

忌食熟物

凡吐

寒痰

藜芦瓜蒂

吐不透者用附子尖炮

瓜蒂散

赤小豆

瓜蒂炒等分

右末香豉丁合

水二盞煮作稀粥去渣取三之二和末一錢

頓服之不吐少加得快吐乃止

三聖散

防風

瓜蒂

各二兩

藜蘆

去苗及心或半兩或半一兩

右為各粗末每服約半兩以蓋汁三碗先用二碗煎三五沸去蘿蔔次入二碗煎至三沸却將原二盞同一處煎二沸去渣放溫徐徐服之不必盡劑以吐為度

稀涎散

猪牙皂角

不蛀者去皮熬

綠礬

半兩

白礬

一兩

右為末每服一錢溫水下

半兩

白礬

一兩

右為末每服一錢溫水下

○治溫和中之劑

枳木湯 枳實畔白朮二兩 水煎作三服

桔梗半夏湯 桔梗 半夏 陳皮 生姜水煎導痰湯 治一切痰涎壅盛胞膈留飲痞塞不通

二陳湯 加枳實南星改白朮用赤茯苓此方加桔梗一兩木香一兩沉香半兩名二香導痰湯又方無二香加入參瓜萎仁

神木丸 治痰飲 方在吐酸停飲門

茯苓澤瀉湯 小半夏加茯苓湯並見前

治風痰之劑

玉壺丸 治痰飲 方在頭痛門

水煮金花丸 治風痰頭眩嘔吐咳嗽

南星

半夏

生用

寒水石

白麵

天麻

五錢

雄黃一錢

滴水丸

菜豆大

每服五七十丸日乾煎

漿水沸下藥煮浮為度澆出淡漿水浸另用

姜湯下通聖加半夏亦可服

○熱痰之劑

小陷胸湯

半夏

黃連

瓜蒌仁

水煎服

卷之三

十一

三

半夏丸 爪姜仁 半夏一兩 製各 姜汁打糊丸  
小黃丸 人參 黃芩 南星 半夏 生姜

姜汁糊丸

○寒痰之劑

消飲丸 煙治宿酒停飲胸滿嘔逆目視矇眬腹  
中水聲痛不思飲食 白木五茯苓二枳實七  
乾姜一右末 蜜丸三菜豆大每服溫水半下二三十丸  
化痰丸 半夏三陳皮 乾姜 白木一  
姜汁糊丸姜湯下二十丸

溫中化痰丸 青皮 陳皮 乾姜 良姜  
倍木丸 治五飲

乾姜 肉桂各半 白木一

為末蜜丸小大升每服二三十丸米飲下  
丁香半夏丸 檳榔一兩 丁香 半夏各一細辛  
乾姜 人參各半 姜汁糊丸一 服三十丸姜湯

姜桂丸 南星 半夏 官桂各一

糊丸葛豆大姜湯半下五七十丸

○理氣之劑

赤水正傳

十一

三

卷之三  
十七  
四七湯 治全六合

半夏五錢 茯苓四錢 蘇葉厚朴各三錢 姜東煎

三仙丸

南星

半夏各五錢

香附五兩

糊丸姜湯下四十丸

蘇子降氣湯

前胡

厚朴陳皮

甘草

川歸

桂各二錢 蘇子半夏各五錢

姜東煎

六合湯

治七情氣鬱結成痰涎狀如破絮或如梅核咯不出還不下嘔逆惡心

陳皮

半夏

茯苓

厚朴

香附

紫蘇莖

等分每服四錢生姜三片水煎服

加味化痰丸

人參白朮半夏製茯苓

桔梗

各一枳實

香附

前胡

甘草

半兩

右為細末用半夏末姜汁糊丸每服五十丸

白姜湯下

二生湯 治胃冷有痰

附子皮臍半夏等分

每服四錢水二盞生姜十片煎至七分溫服

加木香少許尤佳

水玉湯 治眉稜骨痛不可忍此痰厥也

半夏製每服三錢姜十片煎八分食後溫服

又宜服溫膽湯

仲景茯苓飲 治胸停水飲水氣滿不飲食

白术 茯苓各一人參七錢陳皮 枳實錢五

每服水二鐘生姜一錢煎七分服

又方 治痰飲伴水無時節者其源以飲冷過度  
遂令脾胃氣弱食不消化飲食入胃則皆變冷  
水反吐不停 赤石脂一觔搗篩服方寸匕酒  
飲任服稍稍加至三錢七服盡一觔終身不吐

冷水又不下利補五臟令人肥健有入痰飲服  
諸藥不効服此即痊

二賢散 此消痰飲之要藥也

陳皮二兩甘草半兩 為末每服二錢沸湯下

治一切痰方 陳皮一觔去穰取紅淨外以甘草  
鹽各四兩水五碗慢火煮乾焙為末白湯點服  
清健丸 治一切痰飲

枳實 白术各二陳皮 半夏 南星 山查

各一白芥子 黃芩 蒼朮各一川連 川歸

砂仁錢五右為末用神曲五兩為粉取竹瀝二  
碗姜汁半盞煮糊丸梧子大每服八十九丸  
白湯送下

竹瀝達痰丸 半夏滾姜湯尾上微火炮透去皮臍白茯苓  
去皮二兩陳皮去白二兩大黃酒浸透臍乾二兩白术 黄芩酒炒各一兩搗碎如金色  
各三甘草炙人參一兩搗碎如金色青礞石硝一兩搗碎用焰兩白附子生用一兩搗碎如金色  
沉香錢五右為細末用竹瀝一大碗半生姜汁二  
盞和勻入鍋內火熬一刻許令熟將前藥和  
搗為稀醬樣磁器盛臍乾仍以竹瀝姜汁如

前法搗勻和臍乾如此三次仍前竹瀝姜汁  
和丸如小豆大每服一百食遠白米湯下能  
運痰從大便出不損元氣神妙神妙

半夏利膈丸 治風痰頭疼目眩咽喉不利涕唾  
稠粘并治酒過停飲嘔逆惡心胃脹引痛腹內  
有聲 半夏湯泡三兩白附子生用二兩天南星生用一  
兩白术 茯苓去皮一右為末白礬 人參去皮一貝母  
八味丸 治脾虛不得克制腎水多吐痰唾而不

咳者

附子

炮

皮

臍桂心

各一

山茱萸肉

山藥

各四

白茯苓

澤瀉

牡丹皮

各二

懷熟地黃

兩八

右為末蜜丸

梧子大

每服五十丸

空心

鹽

湯下

葉氏分涎湯

治風痰留滯膈間

喘滿惡心

涎唾

不利

橘紅

人參

桔梗

枳實

半夏

洗湯

七次令軟每片用姜汁浸一个切四分等姜十片每服三錢水一盞煎食後服不得轉移

半夏

茯苓

枳殼

炒去

稼熟風化

指迷茯苓丸

治中脘留伏痰飲臂痛難舉手足

不得轉移

半夏

茯苓

枳殼

炒去

稼熟風化

辰砂祛痰丸

治酒食過多酸鹹作成痰飲聚于胸中凝則嘔逆惡心流則臂痛頭

目昏眩腰脚疼痛深則

左癱

右癱

右癱

右癱

右癱

右癱

瘧減則蹶然倒地此藥神妙

利

利

利

利

利

利

一半半夏

生姜

製作餅陰乾

陳皮

白礬

生

荆芥

各一

為末姜汁糊丸

梧桐子大

每食後服

五十丸

姜湯吞下忌動風動氣物

檳榔散

治胸膈停滯痰飲腹中虛鳴食不消化

時或嘔逆

杏仁

去皮旋覆花梗

半夏

湯洗

七次洗

檳榔 桔梗 炒去芦 白术 乾姜 炮橘 紅各一

甘草 炙人參各半

兩

吳仙舟百上選方治癆飲上氣不思飲食小便不

利頭目昏眩

吳茱萸湯泡

白茯苓各等分

右為末蜜丸

梧子大半

每服三十丸滚湯溫酒

辰砂化痰丸

治風化痰安神定志利咽膈清頭

目白礬桔辰砂飛各

天南星炮五錢

一半夏洗三

右為末以姜汁麵糊丸梧子大辰砂為衣每服二十丸姜湯下

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, ROC

防風丸

治風痰上攻頭痛惡心項急目眩旋暉

痰涎壅滯昏憤

天麻酒浸一夜

甘草炙川芎各一

兩

防風各一硃砂五錢

右為末麵糊丸梧子大半

每服一錢荆芥湯下

控涎丹一名妙應丸

凡人忽冒背手腳頸項腰

脇隱痛不可忍連筋骨牽引釘痛半卧不寧時時走易不定俗醫不曉謂之走注使用風藥及對灸皆無益又疑是風毒結聚欲作癰疽亂治亦非也此乃是痰涎伏在心膈上下變疾狀或

金人頭痛不可舉或神思昏倦多睡或飲食無味痰唾稠粘夜間喉中如鋸聲口流唾涎手腳重腿冷痺氣不通誤認為癱瘓亦非也丸有此疾但用是藥不過數服其疾如失

甘遂去心紫大戟去皮真白芥子各一兩

右為末煮糊丸梧子大晒乾臨卧淡姜湯或滾水下五七丸至十九丸痰猛氣實加丸數不妨其効如神加減法

脚氣加明松脂一錢檳榔木瓜各一兩卷柏半

兩先以鹽水煎半日次日白水煮半日同前藥為丸每服二十丸加至四五十丸再服下惡物立効驚癇加硃砂全蝎各二錢每用八九丸常與之三五服去盡酒痰加雄黃全蝎各二錢每服十九走注腰痛加核桃三箇燒灰每服三十丸加至五十丸溫酒下脚氣走注于前方內加吳茱萸驚氣成塊者加川山甲炒鱉甲燒各三錢玄胡索蓬术各四錢每服五十丸加至七十丸以利為度腎痺痛加木鳖子去

穀研一兩桂半兩熟藥加益硝等分每服三  
兩丸寒痰加胡椒丁香蝎桂各等分每服半  
十五丸

茯苓半夏湯 治胃氣虛弱身重有痰恶心欲吐  
風邪羈絆于脾胃之間當先實脾胃方在嘔門  
御寒紫宸湯 解宿酒嘔噦惡心痰唾進飲食  
木香半兩檀香俱不藿香 砂仁 葛花  
茯苓 官桂兩 各一陳皮 乾葛 良姜 丁香  
火不見 炙甘草兩 二每服四錢水煎不拘時服

柴胡半夏湯 治痰症不敢見風眼澁頭痛有痰  
眼黑惡心尤尤欲吐風來覺皮肉緊手足重難  
舉居煖處有微汗便減如見風即復作肝湯名補  
柴胡 蒼朮各一兩半夏半錢茯苓錢神曲炒  
糞本錢各一升 麻分 姜五片水煎食遠服  
枇杷葉散 治痰逆此藥溫胃食

青皮去穰草豆蔻各半前胡 枇杷葉 人參  
半夏湯泡茯苓去皮 大腹皮 白朮 厚朴粗去  
皮姜汁炒各一兩 姜三片每服四錢水煎不拘時熱服

清氣化痰丸

治上焦痰火壅盛或嗽或喘煩熱

口乾胃膈痞悶

天南星三兩半夏湯泡黃連

黃芩各二兩五茯苓

桔梗仁去殼杏仁去皮各四兩

陳皮

枳實

麸炒六兩

各甘草二兩右為末姜汁煮麵

糊丸

梧子大每服七十丸

食後姜湯下

清氣化痰丸

清利胃膈順氣化痰寬中健脾消

導飲食治痰之聖藥也

半夏半斤南星六兩桔梗

黃連

紫蘇子炒蘿蔔子炒

枳實  
麸炒橘紅

茯苓

山楂各四兩

乾姜生

香附子炒甘草

黃芩兩右將南星切作十字塊半夏每箇切作二塊皂莢六兩白礬三兩多用水將南星半夏皂莢白礬一處浸三宿煮南星透為度只將南星半夏晒乾同衆藥為末水糊丸梧子大每服七八十九丸加至百丸食遠或噎或睡茶清下

○怔忡驚悸門

生生子曰：惊者心中惕惕然動不自安也。驚者從外而入或耳聞異聲目擊異物驚而懼也。憚者中心畏怯動而怕驚也。惊者止于心不自

安憇則心既動而又恐懼然畏懼如人將捕之驚而駭也治怔忡之法惟當益其心血壯其神氣治驚悸則有諸經之証當分別治之

治驚之法內經曰驚者平之平常也使平日常見常聞則何驚之有張子和治衛德新之妻被盜而驚乃以平法治之良愈

黃帝曰足陽明病惡人與火聞木音則惕然而驚鍾鼓不為動聞木音而動何也岐伯曰陽明者胃也胃者土也土惡木故驚也 又曰東方青

色入通于肝其病發驚駭 脾移熱于肝則為驚駭卧而驚者屬肝卧則血歸于肝今血不靜血不歸肝故驚悸于卧也

仲景曰食少飲多水停心下甚者則悸微者短氣飲水多必心下悸必五飲停蓄閉于中脘最使人驚悸  
痰飲驚悸皆属于脾土

東垣云六脉俱大按之空虛必面赤善驚上熱乃手少陰心之脉也此氣盛多而亡血以甘寒鎮墜之劑瀉火與氣以墜氣浮以甘辛溫微苦峻

補其血，熟地生地，此胡升麻白芍丹皮川芎黃  
蓍之類以防血溢，上竭井寒，鎮鑿之劑。  
舟溪云：怔忡，太槩屬血虛與痰。有慮便動者，屬  
虛時作時止，痰因火動，瘦人多是血虛。肥  
人多是痰飲。真覺心跳者，是血少，宜四物安  
神之類。又曰：病自驚而得者，驚則神不守舍，  
舍空得液則成痰也。血氣入舍，則痰拒其神，不  
得歸焉。擣涎丹加原砂遠志。

豬心血丸 治勞後心跳大虛症

歸身 白芍 側柏 川芎 錄各五錢 陳皮 甘草  
黃連 錄各二硃砂一錢  
溫膽湯 治心膽虛怯，觸事易驚或夢寐不祥，遂  
致心驚膽懾，氣鬱生涎，涎與氣搏，交生諸症，或  
短氣悸乏，或自汗，此膽虛不能統脾，上則脾之水飲作渴。  
半夏 橘紅 竹茹 枳實炒各 甘草炙各二兩  
白茯苓一兩 每服五錢，薑五片，枣一枚，水一盞  
煎七分，食前服。

仲景半夏麻黃丸 治心下悸

半夏 麻黃等分煉蜜丸小盒大飲服三丸

煎心丸

治驚悸

辰砂

油浸

黃松節

龍齒

苗醋煮

黃志

右只取辰砂龍齒等分為末，猪心血為丸，芡實大，每服一丸，以麥門冬葉菉豆燈心白蜜水煎，荳熟為度，臨卧湯下。小兒磨化半丸，量歲數與之。

蜜陀僧散

治驚氣入心絡，不能語者，昔有為狼

及大蛇所驚，皆服此而安。

蜜陀僧研極細末

茶調下一錢七服即愈。

寒水石散 治因驚心氣不行，鬱而生涎，結為飲，遂為大疾。忪憚少遇，驚則發，尤宜服之。

寒水石煅滑石飛生甘草各等分為末，每服二錢，熱則新汲水下，怯寒則姜東湯下，加龍腦少許。

定志丸 心氣不足，驚悸恐怯。

石菖蒲 炒遠志去心，茯苓各二錢，參一錢，辰砂五錢。  
衣為末，蜜丸梧子大，每服五十丸，米湯下。

安神鎮心丸 治驚悸，消風痰。

石菖蒲 遠志 人參 茯神 川芎 山藥

麥門冬

鉄粉

天麻

半夏

南星

菝葜

各一  
細辛

辰砂

各五  
錢

右為末

生薑五兩

取汁

入水煮糊

丸

大另以

硃砂

為衣

每服二

十五丸夜卧生薑湯下小兒減半

菝葜丸

治驚悸

方在癲門

東垣羌活勝濕湯 治卧而多驚悸多驚冒邪在少陽厥陰也加柴胡五分如淋加澤瀉五分此下焦風寒二經合病也經曰肺腎之病同下治為俱在下焦非風藥行經不可也

羌活 獨活 防風 藥本

各一  
錢

蔓荆子

三分

川芎 二分

甘草

五分

水二鍾煎服

東垣硃砂安神丸

治外物所驚

宜鎮平之

黃連半錢

甘草

當歸

生地

各五分

硃砂一錢

右為細末

浸蒸餅

為丸

黍米大

硃砂

為衣

每服十五丸

食後津唾嚥

下

一方

當歸地黃各

心澹澹動

綱目云澹澹因痰動也心澹澹動者謂不怕驚而心自動也驚恐亦曰心中澹澹恐謂怕驚而心

亦動也

其澹澹自動之病屬二經干屬厥陰心主經曰心主手厥陰之脉是動則病心中澹澹大動面赤目黃喜笑不休視盛虛寒熱陷下取之是刺灸之法也又曰太陽司夫寒淫所勝病心澹澹大動胸脇胃脘不安治以甘熱是運氣之寒傷心主也其二屬少陽病經云一陽發病少氣善歎善噫其傳為心掣是也

○怒

國立圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

怒在陰陽為陰遏而不得伸也經云陰出之陽則怒入云血并于上氣并于下心煩冤善怒東垣

云多怒者風熱陷下于地是也

怒屬肝膽經云在臟為肝在志為怒又云肝藏血血有餘則怒入云膽為怒

丹溪治怒方 香附末六兩 甘草末一兩

右和勻每服五錢白湯調下

運氣怒皆屬木太過內經曰陽氣者太怒則形氣絕而血菀于上使人薄厥又云暴怒傷陽怒則

氣逆甚則嘔血及食泄是也

生生子曰面青善怒亦是肝氣太過當益肺金以制之毋徒平木此五行勝復之理用藥之法亦當要識此意不然必不能杜根也

○善太息

運氣善太息皆屬燥邪傷膽經云陽明在泉燥淫所勝病善太息又云陽明之勝太息嘔苦又云少陰司天地乃燥淒愴數至腸痛善太息是也內經善太息皆取心膽二經岐伯曰思憂則心系

急心系急則氣道約約則不利故太息以出之又曰膽病者善太息口苦嘔宿汁視足少陽脉之陷下者灸之

徐仲子士偉曰家君肄業過勞塲屋晏北志堅不解吐衄盈盆虛羸骨立夜卧含腮則夢爭鬪轉闊轉負恐畏之態無可名狀呼號之聲轟然若雷而不能騰出于口家人侍睡者莫不縮首伸舌如是者十年所矣每五七夜必一發過勞則連發發尤猛歷訪師友多作心血不足治惟補

心安神補心安神藥投之漢始也終莫識為何  
症捫心苦思思每達旦更幾寒暑矣十日偶觀  
素問藏氣法時篇論有曰肝病令人善怒虛則  
目睭睭無所見耳無所聞善恐如人將捕之恍  
然警悟乃知為魂遊症也何言之夫夜卧屬氣  
于肝肝主藏血藏魂者作文既苦衄血過度則  
魂失養惟是交睫若魘則夢爭鬪肝虛則膽怯  
故多負多恐也非峻補不奏功又思草木之劑  
不堪任重乃以鹿角膠三錢侵晨酒溶服五日

而睡卧安半月而肌肉生一月而神氣完始能  
出戶厥後每見血症虛憊者崩中眩暈者投前  
劑莫不响應夫人徒知鹿角膠補虛之功勝于  
參蓍而不知鹿角膠可以峻補肝血蓋血盛而  
竟自安也

○恐

生生子曰恐與驚悸相似實非驚悸也張子和云  
驚者為自不知恐者為自知故也蓋驚者聞響  
即驚恐者心中恍恍然自知如人將捕之狀及

不能獨自坐卧必須人為伴侶方不恐懼或夜必用燈照無燈燭亦恐惧者是也

○臟腑恐有四

一曰腎經云在臟為腎在志為恐又云精氣并于腎則恐是也

三曰肝膽經云肝藏血不足則恐戴人曰膽者敢也驚怕則膽傷矣蓋肝膽實則怒而勇敢肝膽虛則善怒而不敢也

三曰胃經云胃為恐

西曰心經云心怵惕思慮則傷神傷神則恐悞失周本心年六十歲形氣俱實因大恐正月間染病心不自安如人將捕之狀夜卧亦不安兩年後欲飲以人參白朮當歸身為君陳皮為佐加鹽炒黃柏炙玄參各少許煎服月餘而安  
經云恐傷腎丹溪用鹽炒黃柏炙玄參引參歸等藥入補腎足少陰経也

治膽虛常多畏恐不能獨卧如人捕之狀頭目刺人參 枳殼 桂心 芡菊 茯神 五味子 山茱萸 柏杞子各三 桔子仁 熟地黃各一

右為末每服二錢溫酒調服

治膽虛冷目眩頭疼心神恐畏不能獨處胸中滿悶

茯神一兩枳殼半錢遠志 防風 細辛 白朮

人參 前胡 桂心 甘菊 熟地黃各三分

右為末每服三錢水一盞姜三片煎六分溫服不拘老幼皆可服

治膽虛目暗喉痛數唾眼目眩眉五色所障夢見

被人爭訟恐懼面色變者補膽防風湯

防風一錢細辛 川芎 茯苓 甘草 獨活

前胡

各八分

入

參

七

東

二

枝

水

煎

食

前

服

運氣善恐皆屬肝木虛經云木不及曰委和委和

之紀其病淫動注恐是也

生生子曰經云恐傷腎予在苕見一友人與一女

子私合正值陽敗之際為人驚破恐懼走歸精

流不止而斃又觀六十家小說載一女子與一

少年亦如上故事特揭附此以為好色傷生者

之戒

○善悲

內經云在臟為肺在志為悲文云精氣并于肺則悲是也肺虛母仲景云婦人臟躁喜悲傷欲哭象如鬼神所附數欠伸甘麥大棗湯主之

甘草

兩

小麥

升

大棗

十

水六升煮三升分三服

脾氣亦補


許學士治一婦人數次無故悲泣不正或謂之有祟祈禳請禱備至終不應予忽憶金櫃有一證云婦人臟躁悲傷欲哭象如鬼神靈數欠伸者宜甘麥大棗湯子急令治藥盡劑而愈古人識

病制方種絕妙如此


運氣云悲證皆屬寒水攻心經云火不及曰伏明休明之紀其病昏惑悲忘從水化也又云太陽司天寒氣下臨心氣上從喜悲數欠又云太陽則入心善忘善悲治以諸熱是也

○姪娘善悲

綱目述管先生治一姪娘四五箇月臟躁悲傷遇晝則慘感淚下數欠象若神靈如有所憑醫與



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



大宮詹少溪吳馭閱校

終

巫皆無益與神景大寒湯一名投而愈

赤水玄珠第八卷目錄

欵嗽門

欵嗽



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



終

赤水玄珠第八卷

新安生生子孫一奎著輯



○咳歎明

○臟腑皆有歎

黃帝問曰肺之令人咳何也岐伯對曰五臟六腑皆令人歎非獨肺也帝曰願聞其狀岐伯曰皮毛者肺之合也皮毛先受邪氣邪氣以從其合也此邪從外受之主謂寒氣其寒飲食入胃從肺脉上至於肺則肺寒寒邪從外受也肺寒則外內合邪因而

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

客之則為肺歟

謂肺先受邪也

五臟各以其時受病

謂正月也非其時各傳以與之人與天地相參

故五藏各以治時感於寒則受病微

則為歟甚

則為泄為痛乘秋則肺先受邪乘春則肝先受

之乘夏則心先受之乘至陰則脾先受之乘冬

則腎先受之帝曰何以異之岐伯曰肺歟之狀

歟而喘息有音甚則吐血

取太淵穴也

心歟之狀則

心痛喚中介介如梗狀甚則咽腫喉痺

取太陵穴也

肺歟之狀則兩脇下痛甚則不可以轉轉則

兩脇下滿

取太衝穴也

脾歟之狀則右脇下痛陰

陰引肩背甚則不可以動

動則歟劇取太白穴也

腎歟之狀則腰背相引而痛甚則歟涎

取太溪穴也

帝曰六腑之歟柰何安所受病岐伯曰五臟之

火歟乃移於府肺歟不已則胃受之胃歟之狀

然而嘔嘔甚則長魚出

取三里穴也

肝歟不已則膽

受之膽歟之狀則嘔嘔膽汁

取陽陵泉穴也

肺歟不已則

大腸受之大腸歟之狀而遺失

取巨虛上廉穴也

心歟不已則小腸受之小腸歟之狀而失氣氣與歟俱

未水未火

失取巨虛下廉也脈數不已則膀胱受之膀胱數狀  
而遺溺取委中穴也久數不已則三焦受之三焦數  
狀數而腹滿不欲食飲此皆聚於胃關於肺使  
人多涕唾而面浮腫氣逆上取支竅也溝亢帝曰治之柰  
何岐伯曰治臟者治其俞治府者治其合浮腫  
者治其經論說數

按素問曰咳嗽煩冤者是腎氣之逆也示從篇太陽  
發病少氣善數善泄夏脉不反則令人上見  
咳嗽下為氣泄

凡咳嗽面赤胸腹脇常熱惟於足乍有涼時其脉  
洪者熱痰在胃膈也宜小陷胸湯礞石丸之類  
清膈降痰甚而不已者宜吐下其痰熱也面白  
悲嘆或脇急脹痛或脉沉絃細遲而咳者寒飲  
在胃腹也宜辛熱去之

○脉治

脉經曰關上脉微為數脉緊者肺寒雙弦者  
數而脉弦濶為少血

脉細傷溫

脉浮而緩傷風

數則為熟沉數者裏熱

脉弦為水偏弦為飲

洪滑多痰

脉沉為留飲

肺脉微急為芤而唾血

脉浮直者生者浮軟

○芤證死脉

芤而脉緊者

芤而羸瘦脉形堅大者

肌瘦下脫形熱不丟

芤而脫形發熱脉小堅急者

咳而嘔腹脹且泄其脉弦急者皆死不治

仲景曰人嗽十年其脉弱者可治實大數者死其

脉虛者必苦悶其人本有支飲在胃中故也治

屬飲家

上氣面浮腫有息其脉浮大不治又

加利尤甚

脉浮短者其人肺傷諸氣微少不

過一年死法當嗽也

芤數羸瘦脉形堅大者死

死芤而脫形身熱脉小堅急以疾是逆也不

過十五日死全文見診

○論芤與數本一證

子和云內經陰陽應象論云秋傷於濕冬生芤嗽

五臟生成篇云，嗽嗽上氣，診要經終篇云，春刺秋分環為嗽，嗽示從容篇云，嗽嗽煩冤者，腎氣之逆也。此四篇中連言咳嗽，其餘篇中止言嗽而不言嗽，如生氣通天論云，秋傷於湿，上逆而咳，與大象論文義同，而無嗽字，乃知咳即嗽，明謹按，嗽與嗽本兩字，義內經已作一證，連言之愚詳大抵，嗽者氣動也，陽也；嗽者兼血也，陰也。况是證其本雖殊，其標則一，故世俗不以為疑，唯索古發，內經微旨，其義見下。

病機機要云，嗽謂無痰而有聲，肺氣傷而不清也；嗽謂無聲而有痰，脾濕動而為痰也；咳嗽謂有聲有痰也。因傷肺氣動於脾濕，而然也。夏月嗽而發熱者，謂之熱嗽，小柴胡四兩加石膏一兩，知母半兩，冬月嗽而發寒熱，謂之寒嗽，小青龍加杏仁服之，蜜煎、生姜湯、蜜煎、橘皮湯燒生姜、胡桃皆治無痰而嗽者，此乃大例，更當隨時隨證，加減之痰而能食者，太承氣微下之，痰而不能食者，厚朴湯主之。

○論嗽分六氣無熱無寒

子和因素問言皮毛者肺之合也邪因而客之則為肺嗽後人見是斷嗽然可以辨其六者之狀風乘肺者日夜無度汗出頭痛痰涎不利熱乘肺者急喘而嗽面赤潮熱手足寒孔子亦每多有之

火乘肺者咳喘上壅涕唾出血甚者七竅血溢燥乘肺者氣壅不利百節內痛頭面汗出寒熱往來皮膚乾燥細瘡燥痒太便秘澁涕唾粘稠

寒乘肺者或因形寒飲冷冬月卧湿地或冒冷風寒秋冬水冷中感之嗽急而喘此非六氣之云乎

○論湿痰主嗽

潔古曰嗽者秋傷于濕積於脾經曰秋傷於湿冬必嗽嗽大抵素秋之氣宜清而肅反動之則氣必上衝而為咳嗽甚則動于濕而為痰也是知脾無留濕雖傷肺氣不為痰也在痰者寒少熱多各隨五臟而治之假令湿在肝經謂之風痰

也溫在心經謂之熱痰，溫在脾經謂之濕痰。溫在肺經謂之氣痰。溫在腎經謂之寒痰。宜隨證而治之。然而無痰者以辛甘潤其肺，欬而嗽者治痰為先。故以南星半夏勝其痰，而嗽自愈。枳殼陳皮利其氣而痰自下。

劉宗厚曰：按此論欬因溫在於經致痰為欬，五臟亦皆有之。可謂發內經之秘矣。然至氣鬱津液不降或停水飲所致或腎氣虛弱火炎水涸津液湧而為痰，延於上。此氣飲及真臟為病，非諸

經留溫致病也。故易老云半夏止能消痰之標而不能治痰之本是矣。

舟溪曰：咳嗽有風寒、有火、有痰、有勞、有肺脹、風寒者鼻塞聲重、惡寒是也。宜發散行痰，又有聲啞及喘嗽，遇冬則發，皆為寒包熱也。解表則熱自除，感冷則嗽，膈上有痰也。宜解表豁痰。凡者有聲痰少，面赤是也。勞者盜汗出，兼痰多，吐紅作寒熱，是也。宜補陰清金，痰者嗽動便有痰，出痰止是也。主豁痰肺脹者，動則喘滿，氣急聲出，嗽止是也。

重者是也宜收斂此因火傷極遂成抑遏脹滿

肺脹抑遏不得眠者難治

飲水一二口而暫止者熱嗽也呷熱湯而暫停者

冷嗽也熱嗽以小柴胡湯冷嗽理中湯並加五

味子

又有先因傷溫傷寒解利不盡病雖退然飲食減少不生肌肉身倦無力稍勞則躰熱痠痛狀如勞症但不吐血不發潮熱經二三年此是餘毒伏在經絡其脉弦再發則愈

又有咳而不思食飲此皆痰聚於胃屬於肺令人多涕唾而面浮腫此氣逆也謂氣上逆肺壅而不下治以異功白朮散

治嗽最要分肺虛實新嗽挾虛者可用人參風寒邪盛及久嗽熱鬱者切不可用五味子亦然凡飲酒後嗽甚者熱嗽也飲酒後嗽減者寒嗽也

涎稠黃者為熱青白者為寒

凡嗽春是春升之氣或外感夏是火炎上最重秋是濕熱傷肺冬是風寒外束也

丹溪曰。上半日嗽多屬胃中有火。用貝母石膏降胃火。半後嗽多屬陰虛。必用四物湯加知母炒柏先降其火。黃昏嗽多些火氣浮於肺。不宜用涼藥。宜五味子五倍子飲而降之。

治嗽藥大槩多用生姜。以其辛散也。咳嗽非蛤粉青黛瓜萎貝母不除。看痰者加痰藥。用藥發散之後必以半夏逐其痰。庶不再來。治嗽多用粟壳不必疑。但要先去病根。此收後藥矣。咳之為病有一咬則出痰者。脾勝溫而痰滑也。

有連數十數聲不出痰者。肺燥勝痰濕也。滑者宜南星半夏皂角灰之屬燥其脾。若利氣之劑所當忌也。澁者宜枳殼紫蘇杏仁之屬利其肺。若燥肺之劑所當忌也。

咳嗽口燥咽乾有痰不用半夏。用瓜蒌貝母之飲水者不用瓜蒌恐滯膈不快。

○乾咳嗽

乾咳嗽者無痰出而咳嗽連聲者是也。此本於氣澁澁之微者。數十數聲方有痰出。澁之甚者。雖

咳十數聲亦無痰出

舟溪云乾咳嗽極難治此係火鬱之症痰鬱火邪在中以苦桔梗開之下用補陰藥不已即成勞倒倉法好此不得志者有之宜用補陰方四物

湯加竹瀝炒柏之類

陰虛咳嗽四物湯加竹瀝姜汁主之。陰分嗽者多屬陰虛治用知母勿用生姜以其辛散故也肺虛嗽此好色腎虛者有乏人參膏以陳皮生姜佐之

仲景厚朴麻黃湯  
款而脉浮者

厚朴

五兩

麻黃

四兩

石膏

二兩

杏仁

半升

半夏

半  
乾姜

二兩

細辛

二兩

小麥

一升

五味子

半升

右以水一斗三升先煮小麥熟去渣納諸藥  
煮取三升溫服一日三服

三拗湯 治咳嗽感冒風寒鼻塞聲重方在傷風門

敗毒散

治瘧疾

身熱鼻塞

方在瘧門

華蓋散

治感寒而嗽脅滿聲重

本草綱目

卷之三

本草綱目

卷之三

蘇子

陳皮

赤茯苓

棗白皮

麻黃各一錢

炙甘草五錢

每服八錢入姜水煎服

橘蘇散

治傷風咳嗽身熱有汗

陳皮

蘇葉

杏仁

五味子

半夏

棗白

皮炒

貝母

白术各一錢

甘草分

姜三片水煎

神木散

治四時瘟疫發熱惡寒及傷寒咳嗽

蒼朮五兩

白芷

細辛

羌活

川芎

炙甘

草各一兩

每服五錢

姜三片

葱白三寸水煎服

○若傷風鼻塞可為末以葱茶調下

金佛草散

治感寒咳嗽發熱惡寒無汗

荆芥四兩

麻黃去

前胡各三錢

炙甘草

赤芍

藥半夏各一錢

旋覆花三錢

分二服每姜三片

水煎服

橘皮湯 治喉嚨

陳皮

紫苑

麻黃

當歸

杏仁

炙甘草

黃芩各二錢

分二服水煎服

○治暑嗽之劑

白术湯 治欬而脉細

白术 白茯苓 半夏 各等分每服一两水  
一鍾半姜三片煎 調神麴末二錢 一方加

黃芩

白术木香散 喘嗽腫滿欲變水氣者

白术 猪苓 甘草 澤瀉 木香 楝榔

兩陳皮 二桂枝 錢滑石

右為末每服五錢入姜煎  
機要欬氣丸 咳以痰喘肺氣浮腫

大橘皮湯 感溫面腫上喘

滑石錢 炙甘草 木香 楝榔各一  
錢半陳皮錢三

右分二帖水煎服

○治燥嗽之劑

千金五味子湯 治咳嗽不已皮膚乾燥喉中有

血胃脇疼痛 五味子 桔梗 紫苑 菟草  
續斷各二錢 竹茹三錢 赤小豆一撮 生地 柴白皮各五錢  
作二帖水煎服

冲和神功丸 大黃 煥 詞子 麻子仁 人參  
右為末入麻仁研勻加煉蜜為丸梧子大每五十丸溫水下

按丹溪曰詞子治肺氣因火傷極遂鬱遏脹滿  
取其味酸苦有收斂降火之功若佐以海粉香  
附爪萎青黛半夏曲治嗽非止澁之藥也

楊文治癆嗽利胃膈方

太瓜萎去子洗淨搗破刮皮細切焙乾半夏四十九顆湯洗十遍搗碎焙乾為末以洗爪萎實熱水并穰同熬成膏為丸梧子大生姜湯下二十九丸

衍義云有婦人患肺熱久嗽身如火炙肌瘦將成肺  
痨以枇杷葉木通款冬花紫苑杏仁桑皮各等分大黃減半各如常製蜜丸櫻桃大食後夜卧含化一丸未終劑而愈

丹溪潤肺散 貝母一兩 瓜萎五錢 青黛錢五

為末，姜汁蜜調成膏，噙化下。

抑痰丸 瓜萎仁一兩 半夏麵二錢 貝母三錢

為末，炊餅丸，麻子大

海蛤丸 咳逆上氣，痰飲心痛。

海蛤燒為瓜萎仁帶穰和勻，為丸，麻子大。白湯下。  
杏仁煎 咳嗽寒熱，嗔多喜少，面色不潤，食少，脉弦緊。杏仁去皮尖用童便浸一日，一換，夏月一日三換，浸半月，取出，洗淨，焙乾研令極細，每

服一束，大用薄荷一葉，白蜜少許，水一盞，煎食後服，甚不過二劑，永瘥。

丹溪肺鬱，痰嗽，睡不安者，  
九味清化丸

貝母 杏仁

右為末，砂糖入姜汁，蒸餅丸，噙化。

潤下丸 治氣實有痰，又治積氣，并太陽經氣滯，痰嗽。陳皮去白，甘草一兩，食鹽五錢。右以水拌，焙乾，為末，蒸餅丸，如梧子大，或為末，白湯點服，立効。

治肺燥痰多，煉蜜一 北五味四 右用五味，

入蜜內浸十日後臨卧挑一匙於口內徐

嚥下潤肺消痰

玉液散 治久近喘嗽口渴

天花粉 知母 貝母 各一人參 甘草各五

錢各五

右為末每服二錢先熔下黃蠅二錢同入米

飲中調下

○治火熱之劑

丹溪云火嗽宜清金化痰丸 清化丸與清金丸  
同用專治熱嗽及咽痛蓋若能燥濕熱輕能治

上取燈籠草藥為細末餅為丸每服五十丸  
清金丸一名與點丸去肺火降膈上熱痰與  
清化丸同用黃芩一味炒為末水丸服

痰因火動逆上作嗽者先治火次治痰用知母止  
嗽清肺金滋陰火火鬱嗽用調子海石瓜蒌  
仁青黛半夏曲香附以開之喘嗽不拘老幼  
久近上壅善嗽等疾槐花為末滴水丸如梧子  
大白湯或姜湯吞

梔子仁湯 發熱咳嗽煩躁面赤咽痛

梔子仁 赤芍 大青 知母 各一升 麻

黃芩 石膏 杏仁 各二錢 柴胡 半錢 甘草 二錢

豉百粒水煎服

麥門冬湯 次熱乘肺欬唾有血

血妨門

仲景加減小柴胡湯 欬而寒熱往來

熱以

此

膏七錢

知每

三錢

柴胡

半錢

黃芩

膏七錢

知每三錢

柴胡

半夏

黃芩

半夏

姜三片

水煎服

甘草 乾姜 五味子

地骨皮散 知母 柴胡 甘草 人參 地骨

皮 茶芩 半夏 姜三片

水煎服

水煎服

人參

地骨

皮

茶芩

半夏

姜三片

地骨皮散 知母 柴胡 甘草 人參 地骨

皮 茶芩 半夏 姜三片

水煎服

水煎服

人參

地骨

皮

茶芩

半夏

姜三片

水煎服

人參

地骨

皮

茶芩

半夏

姜三片

水煎服

玉節齋治咳嗽活套

杏仁去皮橘紅七分 五味子 桔梗 炙甘草

各五

春多上升之氣宜潤肺抑肝加川芎芍藥各一

半夏 門冬黃芩知母各五

若傷風致咳

鼻

流清涕宜辛涼解散加防風薄荷紫蘇黃芩

夏多火熱炎上最重宜清金降火加桑白皮知母

黃芩麥冬石膏  
秋多濕熱傷肺宜清熱濕加蒼朮桑白皮各一

赤木卷之三

防風黃芩山梔子炒

冬多風寒外感，宜解表行痰，加麻黃桂枝半夏牛乾姜防風各一。肺經素有熱，再加酒炒黃芩知母各五分。若發熱頭疼鼻塞，聲重，再加藁本川芎。

前胡柴胡錢各一

君有痰加半夏枳殼。風痰加南星，濕痰脾困少食加白朮蒼朮。口燥咽乾勿用半夏南星。宜加知母蜜水貝母黃芩瓜萎仁。若痰積食積作咳嗽者，用香附瓜萎仁貝母海石藥以治咳也。

青黛半夏曲軟石膏山楂子枳實黃連姜汁為  
末，蜜調噙化。

因欬而有痰者，咳為重。主治在肺，因痰而致欬者，痰為重。主治在脾。是食積痰或痰氣上升，以致咳嗽，只治其痰，消其積，而咳自止。不必用肺藥，以治咳也。

熱嗽咽喉乾痛，臭出熱氣，其痰嗽而難出色黃，且濃，或帶血絲，或出血腥臭，或堅如覲肉，不似風寒之嗽，痰清而白。宜金佛草散，仍以辰砂化痰藥，以治咳也。

丸或薄荷煎八風丹含化熱嗽於金佛草散中加五味杏仁茶等

有熟嗽咽痛失聲服冷藥而聲愈哑者宜以生姜汁調消風散少進之或只一味姜汁亦得冷熱嗽後失音者丸宜嗽而失聲者非獨熱嗽有乏宜審其症用藥佐以橄欖丸含化仍濃煎獨味枇杷葉熱服

○有嗽而吐痰與食俱出者此蓋飲致肝氣不利而肺又有客邪肝濁遺肺清道清濁相干宜二

陳湯加木香杏仁細辛枳殼  
有飲冷熱酒或飲冷水傷肺致嗽俗謂之寒肺宜紫苑飲

病嗽者所嗽之痰或痰或濃或時有血腥異常語聲不出補肺湯半帖加杏仁貝母款花阿膠百合各五分煎去渣調鍾乳粉咽痛者更加桔梗五分甚者加秦艽五分嘔者去地黃加半夏如其數

時行嗽發熱惡寒頭疼鼻塞氣急用參蘇飲加細

辛

治寒痰嗽劑

東垣曰咳嗽脉弦微面白者寒也難經云肺金太過則外症面白善噫悲愁不樂欲哭其內症喘咳上喝逆氣煩心脅滿煩熱夜則涕出多嚏鼻塞不通肺金大實以子助母也心脾肺皆受寒邪涎出口甘水反侮土寡于畏也腹中大寒病名曰寒嗽白有泡肺中氣虛而為大寒子助母也當於肺中瀉腎水非辛熱之藥不退也

甘涎沫者胃中寒而不和以辛甘熱去之飲酒者多有此反化

半夏溫肺湯 治心腹中脘痰水冷氣心下溼溼嘈雜常多唾口中清水自出脇肋急脹痛不欲食此胃氣虛冷所致其脉沉絃細遲 旋覆花  
人參 細辛 桂心 甘草 陳皮 桔梗

芍藥 半夏各五錢 赤茯苓三錢

右每服六錢姜三片水煎服

丁香半夏丸 心下停飲冷痰頭目眩運睡卧口

中多涎

枳榔錢

丁香

半夏各一

細辛

乾姜

人參錢五

右為末生姜汁為丸梧子

大每服三十丸日三次姜湯下

姜桂丸

治寒痰咳嗽脉沉面色黧黑小便急痛

足寒而逆心多恐怖

天南星

半夏各一

官桂

粗皮兩去

右為末蒸餅為丸如桐子大每

服五七十丸食後生姜湯下

治嗽加減法

如心下痞悶加枳實五錢

如身

熱甚加黃連五錢如體重加菝葜白朮各一

兩如氣上逆者加苦草蘚五錢如氣促加人參桔梗各五錢如氣浮腫加郁李仁杏仁各五錢如大便秘加大黃五錢

○治氣嗽之劑

羅太無人參款花散 肺胃虛寒久嗽不已咽喉滿悶咳嗽痰涎嘔逆惡心腹脹滿腰背倦疼或虛勞冷嗽及遠年近日一切嗽病

款冬花 人參 五味子 紫苑 杏仁

木香

枳榔

紫蘇葉

桑白皮各一

半夏各錢

錢右煉蜜為丸如芡實大每服一丸食後細嚼淡姜湯下

治癆壅氣嗽群藥不成功者

大半夏五十枚橘紅一枚作一帖水二鐘煎至一鐘不可攬動恐麻人食後連進三帖立効其名半橘湯

蘇子降氣湯 氣逆咳嗽脅痛滿

有入患氣嗽將期或教以橘紅生姜焙乾神曲等分末為丸如梧子大食後及夜米飲吞三五十

丸舊患膀胱氣因服此并瘳

局方四七湯 治咳而痰涎在咽喉間不下

東垣加減三奇湯 敷逆上氣喘促脅痛不利

桔梗 陳皮 甘草 青皮 人參 紫蘇

桑白皮

各五錢

半夏

七錢

杏仁

二錢

五味子

四錢

右每服六七錢入姜煎服

經驗方 治冬嗽氣嗽生訶子一枚含之嚥津頻

燕之瘥後不知食味煎換柳湯服之便知

○滋陰之劑