


證類本草

十死木

古
特1
393

六
取
意
映
入



涵竹文庫

重修政和經史證類備用本草卷第十四增記

成都唐慎微續證類

中興全康監復富德意醫務建盟醫醫撰藥肉醫官編聖藥經撰藥人醫學醫書孝忠奉

救校勘

木部下品總九十九種

一十八種神農本草經白字

七種名醫別錄墨字

二十一種唐本先附注云唐附

二十七種今附昔醫家常用有注云今附

九種新補



一種新定

二十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

巴豆

蜀椒 目葉崖椒續注

皂莢 鬼皂莢續注

訶梨勒 隨風子附唐附

柳華 葉實子附

棟實 即金鈴子也根附皮續注

椿木葉 樗木附唐附 樗白皮續注

郁李仁 附根

莽草

無食子 附唐

黃藥根 附今

雷丸

榭音若 唐附皮附

白楊皮 附唐

枕椰子 附今

蘇方木 附唐

檉樹皮 葉山檉續注

桐葉 花梧桐皮油續注

胡椒 附唐

釣樟根皮 樟材續注

千金藤 附今

南燭枝葉 附今

無患子 附今

梓白皮 附葉

橡實 唐附橡樹皮續注

石南 附實

木天蓼 唐附子續注

黃環

益智子 附今

溲音疏 音疎

鼠李

椰子皮 藥附今附

枳音棋 音鉅唐附

小天蓼 附今

小檠 附唐

英遂 附唐

紫荊木 附今

紫真檀

烏白木 唐附子續注

南藤 附今

鹽麩子 樹白皮根白皮今附葉上穉子續注 杉材 附杉菌

接骨木 附唐

楓柳皮 附唐

赤瓜 切絞木 附唐

樺木皮 附今

楹藤子 附今

榧實

藥荊 唐附子續注

扶移木 附新

木鼈子 附今

藥實根

釣藤

藥華

蔓椒

感藤新補

赤檉木今附那三春柳是也

突厥白附今

賣子木附唐

婆羅得附今

甘露藤新補

大空附唐

椿英新定

水楊葉附唐

楊榼木附唐

儻子新補

楠材

柘木新補

柞木皮新補

黃榼新補

椶櫚皮附新補

木槿新補

芫花本在草部今移

二十六種陳藏器餘

楸木皮

楸木皮

沒離梨

柯樹皮

敗扇

松根

檉木灰

柳桐皮

竹肉

桃竹筍

鬻子桐子

馬瘍木

木細辛

百家筋

檟木皮

刀鞘

芙蓉樹

丹桂木皮

結殺

杓

車家鷄棲木

檀

百荆

木黎蘆

瓜蘆

諸木有毒

戎州巴豆



巴豆味辛温生温熟寒有大毒主傷寒温瘧寒熱破癥
瘕結聚堅積留飲痰癖大腹水脹蕩練五藏六腑開通
閉塞利水穀道去惡肉除鬼毒蠱疰邪物殺蟲魚療女
子月閉爛胎金瘡膿血不利丈夫陰殺班蝮毒可練餌
之益血脉令人色好變化與鬼神通一名巴椒生巴郡

川谷八月採陰乾用之去心皮荒花為之使惡藥草畏

云出巴郡似大豆最能驚人新者佳用之皆去心皮乃
研又熬冷黃黑別搗如膏乃和丸散爾道方亦有練餌
法服之乃言神仙吞一教便欲死而鼠食之三年重
似櫻桃葉頭微赤十二月葉漸凋至四月落及五月葉
漸生七月花八月結實九月成十月採其子三枚共葉
各有殼裂出眉州嘉州者良今按陳藏器本草云巴豆
主癰痔瘡氣痞滿腹內積聚冷氣血塊宿食不消痰飲
吐水取青黑大者每日空腹服一枚去殼勿令白膜破
乃作兩片并四邊不得有損缺吞之以飲壓令下以間
腹內熱如火痢出惡物雖痢不虛若久服亦不痢白膜
破者去之生南方樹大如圖極高不啻一丈也臣禹錫
等謹按藥性論云巴豆使中其毒用黃連汁大豆汁解
之忌芦笋醋治冷毒火種痲痺大腹能落胎日華子破心
腹積聚結氣治十種水種痲痺大腹能落胎日華子破心
腫消腫毒殺腹疰蟲治惡瘡息肉及疥癩丁腫兒
合九散敷不效去心膜煮玉度換水各煮一沸

圖經曰巴豆出巴蜀川谷今嘉眉戎州皆有之木高一
二月葉漸凋一月復漸生至四月舊葉落盡新葉齊生
即花發成穗微凋黃色五六月結實作房生青至八月
熟而黃類白豆歲漸七自落即收之一房有二瓣一瓣
有實一粒一道至兩三道彼土人呼為
起如線一房為上等他處亦稀有
金線巴豆彙為上呼為

雷公云殺人以巴豆之與豆及剛子須在子細認勿誤用
若剛子類小似棗核兩頭尖巴豆即穎有三稜色黑
修事巴豆敲碎以麻油并酒等可煮巴豆了研膏後用
每修事一兩以酒麻

油各七合盡為度
聖惠方治中風口喎巴豆七枚去皮開研啣左手塗右手
史即便正洗去藥
并頰抽掣中指

又方治牙疼用巴豆一粒限至黃熱去殼用芥一稜切
負作蓋剝去中心可安巴豆在內以蓋子合之


用帛裹有患處
左右塞耳中
外臺秘要文仲方主唯腹大動暈水聲皮膚黑名曰木
去皮尖蒸令黃二味搗丸如小豆
大水下一丸以利為度勿飲酒

千金方主大人小兒風癱瘡癩心迷悶方巴豆二
兩搗破以水七升煮取三升以帛染拭之
又方治寒癰宿食久飲不消大便秘巴豆仁一升清酒
五升煮三三日夜研令大黃合酒微火煎之丸如
胡豆大每服一丸水

下散吐者服二丸
又方治喉痺已死有齒氣者巴豆
去皮針線穿入喉中牽出

千金翼皮治小兒身腫并手足腫兼癰毒巴豆五十枚去
經驗方取鮮待御傳治氣痢巴豆一兩去皮心熬細研
肝花佳如食素人
以蒸餅丸服之

大見本草



又方治耳卒聾巴豆一粒蠟裹

又方治箭鏃入骨不可拔取巴豆微熬與蠟同研塗

動箭鏃即拔之立出夏候卿云初在開州得方箭鏃出

後速以生肌膏傅之說者云燕治踏脚得方後至洪州

勝金治喉閉經喉風巴豆兩粒紙緊角可通得入鼻用

十全方治疥瘡入巴豆十粒火炮過黃色去皮膜右噴手

如熏即着外腎以黃丹塗甚妙

初廣方治毒毒切巴豆去皮不油馬牙齦

買相公筒去皮搗末出油二兩淡漿水半斤灌之

施州崔椒



蜀椒



蜀椒味辛温大熱有毒主邪氣欬逆温中逐骨節皮膚

死肌寒濕痺痛下氣除六腑寒冷傷寒温瘧大風汗不

出心腹留飲宿食腸澼下痢洩精女子字乳餘疾散風

和瘕結水腫黃疸鬼疰蠱毒殺蟲魚毒又服之頭不白

輕身增年開腠理通血脉堅齒髮調關節耐寒暑可作

膏藥多食令人乏氣口閉者殺人一名巴椒一名蒼

毅音生武都川谷及巴郡八月採實陰乾杏仁為之使畏款冬陶隱

居云出蜀都北鄙人家種之皮肉厚腹裏白氣味濃江陽

巴椒有毒不可服而此為一名恐不爾又有秦椒黑色

在中品中凡用椒皆火微熬之令汗出謂為汗椒令

有勢力椒目冷別入藥用不得相雜唐本注云椒目味

苦寒無毒主水腫脹滿利小便便今椒出金州西域者最

善臣禹錫等謹按爾雅云椒者大椒之別名郭云今

椒樹叢生實大者名為數詩唐風云椒聊且陸機云椒

樹似菜萸更有針刺葉堅而滑蜀人作茶吳人作茗皆合

莫其葉以為香今成臯諸山間有椒謂之竹葉椒其樹

亦如蜀椒少毒熱不中合藥也可著飲食中又用蒸鷄

形最佳香東海諸島上亦有椒樹枝葉皆相似子長不

圓甚香其味似橘皮烏上箴鹿食此椒葉其肉自然作

椒橘香藥性論云蜀椒使畏雄黃又名陸機有小毒能

治冷風頑頭痛下淚腰脚不遂虛損留結破血下諸石

水能治嗽主腹內冷而痛除齒痛又云椒目使治十二

種水氣味苦辛有小毒主和巴口丹蒲松脂以煎浴為

筒子內耳中抽腎氣虛耳中如風水鳴或如打鐘聲之

聲卒暴聾一日一易若神驗日華子云漢椒破殼結開

胃治天行時氣溫疾產後宿血治心腹心腹氣壯陽痿

陰汗暖腰膝縮小便故日主膀胱急又云椒葉熱無毒

治黃花伏梁氣及內外腎釣并堆流轉筋和艾及葱研

圖經曰

蜀椒生武都川谷及巴郡今歸峽及蜀川陝洛

有針刺葉堅而滑可羹飲食甚辛香四月結子無花但

生於葉間如小豆類而樹皮紫赤色八月採實焙乾此

椒江准及比土皆有之莖實都相類但不及蜀中者皮

肉厚腹裏白氣味濃烈耳服食方單服椒紅補下宜用

蜀椒也常宙獨行方治諸瘡中風者生蜀椒一升取火

麵合洩裹椒勿令漏氣分作兩裹於糖灰火中燒熟及

熱出之刺頭作孔當瘡上置著使氣射入瘡中冷則

易之須使瘡中出水及遍淋出汗即差施州又有一種

崖椒彼土人四季採皮入藥云味辛性熱無毒主肺氣

上常蒸艾嫩并野薑精末酒服錢七甚効忌塩下又有

七

七

蔓椒餘云生雲中川谷及丘塚間採莖根煮釀酒陶甒
居云俗呼為摻似椒黨音黨小不香耳今亦無復分別
或云即金椒是也黨字生關中江東其木似博莖間有
刺子辛辣如椒主遊蠱飛尸及腹冷南人淹藏以炸果
品或以寄遠吳越春秋云越以其蜜丸蠶與
黨同報吳增封之禮然則黨之相贈尚矣

八雷公云子先須酒拌令濕蒸從巳至午收令密蓋除
向下水四畔無氣後取出便

入甕器中盛勿令傷風用也

食療云溫壯大者土上氣咳嗽久風濕痺又患齒痛醋
之使熱斷開口封其瘡上冷易熱者三五度易之治
傷損成弓風又去久患口瘡去開口者以水洗之以麩
拌煮作醃空吞之三五匙飯壓之再服差又散溫辛

有毒主風邪腹痛痲寒溫中去齒痛堅齒髮明口止嘔
逆戒癩生毛髮出汗下氣通神去老益血利五藏治生
產後諸疾下乳汁以服令人氣喘從十月勿食及閉口
者大心子細黑者

是秦椒白色也

聖惠方 治因熱取涼睡有蛇入口中拋不出用刀

外臺秘要 治瘡腫生熱末麩釜下

千金方 有人陰冷漸冷氣入陰囊腫滿恐死日夜夜
通日再易之取消差

肘後方 治金瘡中風蜀椒量瘡口大小用麩作饅飽糖
數枚以差

替換之妙

又方 蛇毒以閉口椒

孫真人 損氣傷心令人多忘

又方 治心腹俱痛以布裹椒薄

子門方 治腹內虛冷久服駐顏用生椒擇去不折者除
其黑子用四十粒以漿水浸經一宿盡令口合

大見本草


十四

八

八

八

八



空心新及水下去積年冷煖藏腑久服則能駐顏黑髮明目令人思飲食妙

勝金方 治好食生茶用椒末不限多少以糊丸如梧子大茶下十九

深師方 治手足皴裂服四合水煮之去滓漬之半食頃出令深須更復浸乾塗羊猪髓腦極效

姚和衆 治小兒水瀉妳疥散一分去目為末酥調之少以傳腦上日可三度

譚氏 治小兒水瀉椒紅散及人年五十已上患瀉用椒二兩醋二升煮醋盡慢火焙乾為末瓷器貯之每服二錢匕酒或水飲下之

又方 治漆瘡漢椒湯洗之即愈

援神契 椒薑禦瘟補益聰明

衍義曰 蜀椒須微炒使出汗又須去附紅黃殼去殼之法先微炒乘熱入竹筒中以袂春之搗取紅如未盡更揀更春以盡為度凡用熱須如此其中子謂之椒目治盜汗丸功將目微炒精為極細末用半錢匕以

猪牙皂莢



皂莢



生諸上脣煎湯一合調暗睡眼無不效蓋椒目能行水又治水蠱

皂莢味辛鹹温有小毒主風痺死肌邪氣風頭淚出利

九竅殺精物癢腹脹滿消穀除欬囊結婦人胞不落

明目益精可為沐藥不入湯生雍州川谷及魯鄒縣如

猪牙者良九月十月採莢陰乾拓實為之使惡麥門冬畏空青人參苦參陶隱

居云今屢屢有長尺二者良俗人見其皆有蟲孔而未嘗見蟲形皆言不可近令人惡病殊不爾其蟲狀如草葉上青蟲英微欲黑使出所以難見爾但取青莢生者看自知之唐本注云此物有三種猪牙皂莢最下其形曲決薄惡全無滋潤洗垢不去其尺二寸者全龐大長虛而無潤若長六七寸圓厚節促直者皮薄多肉味濃大好臣禹錫等謹按藥性論云皂莢使土破堅藏腹中痛能隨胎又曰將皂莢於酒中盡取其精於火內煎之成膏塗帛貼一切腫毒兼能止痛陳藏器云鬼皂莢作浴湯去風瘡疥癬搜葉去衣垢疥髮長頭生江南澤畔如皂莢高一二尺日華子云皂莢通關節除頭風消痰殺勞盡治骨蒸開胃及中風口疳入藥去皮子以酥炙

之用

圖經曰皂莢出雍州川谷及魯鄒縣今所在有之以懷孟州者為勝木極有向大者此有三種本經云

形如猪牙者良陶注云長尺一者良唐注云長六寸圓厚節促直者皮薄多肉味濃大好今醫家作味風氣丸

煎多用長皂莢治齒及取精藥多用猪牙皂莢所用雖殊大抵性味不相遠九月十月採莢陰乾用張仲景治雜病方欬逆上氣唾濁但坐不得卧皂角丸主之皂莢杵末一物以蜜丸大如梧子以棗膏和湯服一九日三夜一服崔元亮海上方療腹脹滿欲瘦病者猪牙皂角相續量長一尺微火煨去皮子搗篩蜜丸大如梧子欲服藥先與煮羊肉兩盞呷洗三兩口後以肉汁下藥上丸以快利為度覺得力更服以利清水利即停差移一月以來不得食肉及諸油脂又治熱勞以皂莢長一尺續成者亦可須無孔成實者以土酥一大兩微上塗於火上緩炙之不得令酥下待酥盡即搗篩蜜丸如梧子大每日空腹飲下十五丸漸增至二十九丸重者不過兩劑差其初生間葉芽以為蔬茹更益人核中白肉亦入治肺藥又炮核取中黃心嚼餌之治膈痰吞酸又米醋熬嫩刺針作膿煎以付瘡癬有奇妙

雷公云凡使須要赤膩肥并小蚌者然用新及水浸

為度藥出隨之去子情篩皂莢一兩酥二分于收得揀取圓滿堅硬不注若用瓶盛下水於火畔煮待炮熟剥

去硬皮一重了取阿裏白軟肉兩片去黃其黃
消人腎氣將白兩片用銅刀細切於日中乾用
聖惠方 治時氣三日頭痛煩熱用皂角煉作灰為末非
之先用暖水沐浴後
服藥須臾汗愈出

外臺秘要 治卒中風口喎以皂角五兩去皮為末以三
年大醋和右喎塗左左喎塗右乾更傳之

又方 齧齒方擣皂角去皮
炙為末塗齒上吐之

又方 弱死一宿者尚活擣皂角紙
裹內下部須臾出水即活

千金方 鼻以竹管吹入鼻中

又方 鬼覺不悟皂莢
末刀圭起死人

又方 鷓鴣產吞皂角
子二枚立差

肘後方 卒腫滿身面洪用皂角剝炙令黃剉三升酒
一斗浸合器煮令沸服一升口三服頻作

又方 小兒身上惡瘡先以皂角水洗
拭乾以少油淋膏爛傅焦即差

經驗方 治食氣遍身黃腫氣喘食不得心胃滿悶不挂
皂七枚去油
煎陳橘食

梅師方 治霍亂轉筋皂莢末吹一
小豆入中得嚏便差

又方 治卒外腎偏痛皂莢和
皮為末水調付之良

孫真人 治咳嗽皂莢燒研碎
二錢之鼓湯下之

又方 治大小便不通關格不利燒
皂莢細研粥飲下三錢立通

又方 傷寒無問陰陽神驗方以皂角一挺肥者燒令
赤為末以水五合和頻服陰陽傷寒以酒和服

又方 治腰痛不覆也取子一千二百箇淨洗令乾以酥
熬令香為末蜜丸如梧桐大空心以蒺藜子酸棗

子湯下

三十九

又方 治卒死以末吹鼻中

又方 治誤食食物落鼻中及入眼不出吹皂角取嚏

又方 人好麗以末吹鼻中

斗門方

簡要濟衆 治中風口噤不開延朝吐方用皂角一挺去皮塗猪脂炙令黃色為末每服一錢匕非時

溫酒服如氣實麻瀉調二錢匕如牙關用白梅搯齒口開即灌藥以吐出風涎差

博濟方 治皂莢水并惡水入口內熱痛不止以皂莢子燒存性一分沙糖半兩先殺研皂子令細續入以沙糖和勻

如膏含之

千金方 治牙痛用猪牙皂角煎為末楷疼處良

靈苑方 治急喉閉後巡不收方以皂莢去皮子生半兩為末勻服以筋頭點腫處更以醋調藥末

孫尚藥 治卒中風昏若醉形體憊悶四肢不收或倒

大病故傷人也此證風涎潮於上膈痺氣不通宜用救急稀涎散猪牙皂角四枚頭是肥膏不刺削去黑皮晋

磨一兩光明通莖者二味開錫羅為細末并研為最如有患者可服半錢重者三字七溫水調灌下不大嘔吐

只是微上涎稀冷出或一升二升當時性惺惺次緩而調治不可便大殺吐之恐過傷人命累經效不能盡述

感應神仙傳 崔言者取諫左親騎軍一旦得疾雙眼昏

有瘡如癩皆為惡疾勢不可救因為洋州駱谷子歸寨使遇一道流自谷中出不言名姓授其方曰皂角刺一

二升為灰承久熬研為末食上濃煎大黃湯調一錢匕服一旬鬚髮再生肌膚悅潤愈眼目倍常明得此方後

如入山不知所之及鐵銀以破碎

雖百十年不壞以拖皂莢則一文破碎

衍義曰 皂莢其子炒搗去赤皮仍將骨浸軟煮熟以糖調之可食甚味道守五藏風熱壅其莢不蟬肥者

微炙爲末一兩入生白礬末半兩膩粉半兩風涎潮寒
氣不通水調灌一二錢但過咽則頂吐涎丸用白礬者
分鬲下涎也又暑中濕熱時或
以兩合磨木燒碎瘧疾和濕氣

廣州訶梨勒



訶梨勒味若温無毒主冷氣心腹脹滿下食生交愛州

唐本草注云樹似木梳音患花白子形似楓子青黃色皮
肉相著水摩或散服之唐木先附臣禹錫等謹按菓病
云訶梨勒苦酸下宿物止腸游久洩赤白痢波斯船上
來者六路黑色肉厚者良陸俄疏云訶梨勒使亦可單

用味苦并能通利津液主破腎臟結氣止水道黑髮
目昏子消痰下氣除煩治水腫中瀉利醒亂氣
後急氣未足月人痛胎及胎動欲生脹悶氣喘并患痢人
燒熏及熱煎湯熏通手後洗

圖經曰訶梨勒生交愛州今嶺南皆有而廣州最盛株
八月實熟時採六路者佳黃南異物志云廣州法聖寺

佛殿前有四五株子極小而味不澁皆是六路每歲
州貢只以此寺者寺有古并木根蘊水味不減每子
熟時有佳客至則院僧煎湯以延之其法用新摘訶子

五枚甘草十皆碎破汲水下井水同煎色若新茶今
其樹謂之乾明舊木沈有六七株古井亦在南海風俗
尚貴此湯然煎之不必及如昔時之法也訶梨勒主痢

本經不載張仲景治氣痢以訶梨勒十枚麩裹陳灰火
中煨之令麩黃熟去核細研爲末和粥飲頓服又長服
方訶梨勒陳橘皮厚朴各三大兩擣篩蜜丸大如梧子
服二十九至三十九丸唐劉禹錫傳信方云子苦赤白下
諸藥服過久不差轉爲白膿冷狐瘡軍傳此法用阿梨

勒三枝上好者兩枝炮取皮一枚生取皮同末之以沸
漿水一兩合服之淡亦得若空冰痢加一錢錢其章
未若微有膿血如二七共血多加三七皆效又取其
入白蜜研注目中治風赤痛神良其子未熟時風
墜者謂之隨風子暴乾收之彼人尤珍貴益
小者益用治痰癆咽喉不利含三數枚殊勝
八海藥云按徐表南州記云生南海諸國味酸溫無
咳嗽並宜使皮其主嗽肉多治眼痛赤白諸利及嘔吐
梨勒即六菱是也按波斯將阿梨勒大腹等船上用防
不雲或遇大魚放涎滑水救里不通無也遂乃煮此洗
其涎滑尋化爲水可量治氣功力者乎大腹訶子性焦
訶梨恒鷄謂唐言天竺未生故林云
雷公云凡使勿用此梨勒者梨勒如精勒雜品力若何
精勒多此雜物文只有六路或多或八路至十三路號曰
其訶梨勒以刀削用之

外臺秘要

治一切風痰風霍亂食不消大便澀詞

又方

治風熱衝頂熱悶訶梨一枚以火者

經驗方

治嗽氣嗽久者亦主之生訶梨一枚含之熱汁
便有末此知連州

廣濟方

治嘔逆不能食訶梨勒皮二兩去核熬為末
蜜和丸如梧桐子大空心服二十九日三服

孫真人

治常患氣以訶梨三枚濕紙裹紙乾即
剝去核細嚼以生乳一升下之日三服

又方

治一切氣宿食不消訶梨
一枚入夜含之至明嚼燕

集驗方

取訶梨勒皮搗為末飯和為丸米飲空腹下三
七丸已百

子母秘錄

治小兒霍亂訶梨一枚水沸
湯研一半頓服未差再服

大觀本草

訶梨



食醫心鏡下氣消食并茶青色訶梨一枚打碎為末糖
五沸飯如麩塵色著少鹽服

廣異記云高仙芝大食得訶梨勒長五寸物置於脾中
便覺腹中痛因大利十餘行物為訶梨為崇特

欲赤之後問大食長老云此物人帶一切病消利
者出惡物耳仙芝甚保大寶木被誅遂失所在

金光明經流水平長者子除病品云

衍義曰訶梨勒氣虛人亦宜緩七煨熟少服
此物雖滿腸而又泄氣蓋其味苦澀

赤柳



柳華




柳華味若寒無毒主風水黃疽面熱黑加疥惡瘡金瘡

一名柳絮

葉主馬疥加瘡取煎煮以洗馬疥立愈又療心腹內血

止痛實主潰癰逐膿血

子汁療渴生琅邪川澤陶隱居云柳即今水楊柳也花
熟隨風伏和飛雪陳元方以為



警當用其未舒時子亦隨花飛正應水漬汁爾柳葉亦
宜貼灸瘡皮葉藥漆瘡唐本注云柳與水功全不相似
木楊葉圓闊而赤枝條細柳葉狹長青綠枝條長軟
此論用柳不載水楊水楊亦有寒毒主瘰癧本草不錄樹枝及
木中盡骨枝皮味苦寒無毒主瘰癧熱淋可為浴湯主風瘙癢
風腫癢酒煮合主瘰癧木中蟲牙可為浴湯主風瘙癢
隱囊大効此人間柳樹是也陶云水楊非也臣禹錫等
謹按藥性論云苦柳華使主止血而治濕痺四肢攣急膝
痛陳藏器云柳絮本經以絮為花即初發時黃藥子
為飛絮以絮為花其誤甚矣江東人通名楊柳北人都
不言楊楊樹葉短柳樹葉長日華子云葉治天行熱病
丁磨傳尸骨蒸勞湯火磨毒入腹熱悶服金不藥人發
大熱悶并下水氣煎膏續筋骨長肉
止痛牙齒煎含枝煎汁可消食也
圖經曰柳華實生葉蜀川澤今蜀處有之俗所謂楊
藥也子乃飛絮也陳無時其教皮及根亦入藥葛洪治
瘰癧腫毒如乳等多用之常留獨行方主丁磨及及花
葉煎柳枝葉作膏塗之今人作浴湯膏藥齒牙藥亦
用其枝為最要之藥按楊柳異類今人謂柳為楊柳非

也說文楊蒲柳也柳小楊也其類非一蒲柳其枝勁韌
可為箭筈左傳所謂董澤之蒲又謂之蘆符即上條水
楊是也今河先沙地多生此又生水傍葉籠而白木理
微赤白杞柳即詩云無伐我樹杞陸机云杞柳也其木
人以爲車轂共山其水傍魯國汶水傍純生杞也又孟
子云告子曰以仁性爲仁義猶以杞柳爲桮棬是也今
人取其細條火逼今柔細弱作簞籬河朔尤多又下有
赤柳木生河西沙地皮赤葉細即是今所謂聖柳者又
名春柳爾雅曰聖河柳即聖云今河傍赤莖小楊皆切
詩疏云皮正赤如絳一各兩師枝葉似於是也其大冲
詰一名聖乳醫方
稀用故附於此


陳藏器云絮主止血治小兒一
日五日寒熱煎柳枝浴

外臺秘要治黃疸柳枝以水一斗
煮取濃汁半升服令盡

肘後方治乳癰二三白種痛不差但堅紫色者
用煎柳根皮法云熬令溫熨腫一宿愈

又方燒灰以粉塗之

人鬼本草



又方 取柳白皮細切以

孫真人 治牙齦疼柳枝一握細剉入

集驗方 治腫柳枝如柳指大長三尺二十枚水煮

子母秘錄 小兒疳積煩柳葉一斤水一斗煮取

斗門方 治耳痛有膿不出及離已結聚柳根

又方 治耳卒風毒腫起用柳葉樹上蠶糞以水

又方 治卒風毒腫氣急痛以柳白皮一斤剉以酒

古今錄驗 治齒痛以楊柳白皮卷如指許大含

又方 治牙齦風腫以柳枝剉一斤大豆一升合炒豆炮

冊房鏡源 治牙齦風腫以柳枝剉一斤大豆一升合炒豆炮

別說云 謹按藥帖灸瘡良藥入也治於陰暗處為浮

可以捍作種以代羊毛極柔軟

衍義曰 柳華經曰味苦即足物生有黃蘗者也及其華

繁之下連小黑子因風而起得小濕處便主如地丁之

類多不因積植於人家庭院中自然生出蓋亦如柳絮

燕子而飛陳葢器之說然古人以絮為花陶隱居亦

曰花隨風狀如飛雪誤矣經中有實及子汁諸家不詳

今人亦不見用汪華氏之謂柳為尼俱律陀木其子極

細如人妾因極小妾果至大是知小黑子得因風而起

蘭州棟子



梓州椹子



梓州棟花



煉實味苦寒有小毒主溫疾寒熱大熱煩狂殺三蟲疥

瘍利小便水道

根微寒療蛇蟲利大腸生荆山山谷陶隱居云處處有

取葉佩之云辟惡其根以若酒摩塗疥甚良其汁作藥食之去蛇蟲唐本注云此有兩種有雄有雌雄者根赤無子有毒服之多使人吐不能止時有至死者雌者根白有子微毒用當取雌者臣禹錫等謹按藥性論云棟

實亦可單用主人中大執狂失心燥悶作湯浴不入湯服華子云棟皮若微毒治遊風熱毒風癩惡瘡疥癩小兒吐熱並煎湯浸洗服食真足生子者雌樹皮一兩可入五十粒糯米煎殺毒瀉多以冷粥止不瀉者以執瀉殺人不不可誤服

圖經曰棟實即金鈴子也生荆山山谷今處處有之以

開花紅紫色芬香滿庭間實如彈丸生青熟黃十二月採實其根紫無時此種有雌雄七者根赤無子有大毒獨行方主燒蟲攻心如刺口吐清水取根到水煮令濃赤黃色以汁合米煮作藥隔宿勿食來旦從

雷公云凡採得後曬乾酒拌浸令濕蒸符上皮軟剝去皮取肉去核勿單用其核碎捷用藥水煮

一伏時了用如使肉則不使核使核

外臺秘要方治長蟲棟實涼若酒中漬宿以

大觀本草

卷十四

卷十四



千金方 治小兒蛇蟲棟木皮削上卷

又方 燒灰和猪膏傅之

又方 治小兒秃瘡

肘後方 治瘰癧若著口裏東行棟根細剉

經驗方 小兒殺蟲定疼痛抵聖散以苦棟二兩白蕪夷

時服

又方 治臟毒不血以苦棟子炒令黃為末

又方 治丈夫本臟氣傷膀胱連小腸等氣金鈴子一百

於銅罐內炒金鈴子赤熱為度取出核為末

斗門方 治蛔蟲咳心用若棟

又方 治五種蟲以棟皮去其蒼者

又方 治癰疽棟皮濃煎浴

荆楚歲時記 餅豕食棟

又云 畏棟

木檮



木椿



椿木葉味苦有毒主洗瘡疥風疽水煮葉汁用之

皮主其蠶

樗木根葉尤良唐本注云二樹形相似樗木陳樗木實為別也今按陳藏器本草云樗木味苦

有小毒皮主赤白久痢口鼻中并蟲去疥蠶主鬼注傳尸蠶毒下血根皮去鬼氣取一握細切以童兒小便二升砂一合宿浸絞取汁煎一沸三五日一度服葉似椿散木也唐本先附臣禹錫等謹按藥性論云樗白皮使味苦微熱無毒能治赤白痢腸滑痔疾瀉血不位童子云樗皮主并痢得地論同療之根皮尤良俗呼為虎眼樹本經樗木殊不相似孟詵云椿溫動風重十二經脈五臟六腑多食令人神昏血散又女子血崩及產後血不止月信來多可取東引細根一大握洗之以水一兒并煎分再服便斷不止赤帶下又椿俗名楮椿療小粒葱白小兒以意服之枝葉與皮功用者同日華子云能皮溫無毒止瀉及腸風


圖經曰 椿木樗木舊並不載所出州土今南北皆有之

木疎而氣臭樗木實而葉香可散樗東人呼為鬼目葉脫處有浪如樗蒲子又如眼目故得此名其木最為無用莊子折謂吾有大木人謂之樗其木擁腫不中繩墨小枝曲拳不中規矩立於塗匠者不顧是也並採無時爾雅云樗山樗郭璞注云樗以樗色一詩唐風云山有樗陸機云俗語云種樗樗漆和似如差狹耳吳人以其葉為茗許慎以樗讀為棲今人言樗失其聲耳然則樗類之別種也樗根莖汁主下血及小兒并煎亦取白皮和倉粉米葱白斗草豉同煎飲服血痢便斷唐劉禹錫著樗根藥法云每至立秋前飲服血忌痢或是水穀痢兼腰疼等取樗根一大兩搗篩以好麵粉作餅純子如皂莢子大清水煮

食瘡 肉主瘡癩食則中滿蓋壅經脈也

雷公云 樗木根九使根不近西頭者上及不用莖葉只用根採出并生蒸蒸半日出生蔥細剉用袋盛

大見本草



御聖南畔陰乾
用偏利弱蓋也

肘後方 治小兒頭生白髮不生
搗葉心取汁傳之六效

經驗方 治皮毒赤白痢香椿淨洗
取皮日乾為末飲下錢立效

子母秘錄 治小兒疳積白皮日乾
研濃汁糊和九如括子大十歲三四九量

人加減一丸內竹筒中吹入

楊氏產乳 療疳疔困重搗白皮
鼻中三度差服九以飲下

類服多少
量兒大小

又方 近效療久痢及疳痢棟搗白根皮
土深不用見狗及風細切搗如光取麵
子如小棗大勿令破熱煮吞七枚重者

不過七服皆空肚忌油膩熱毒物

又方 疳痢疔夜無度者取搗根濃汁
米泔一鷄子許灌下部再度即差其驗如神
小兒

三六
其妙

衍義曰 椿木葉椿搗皆臭但一種有花
不實世以無花不實木身大其幹端有者為椿

根葉故口未見椿上其有者惟椿木上
有花者為椿用

故知古人命名曰不言椿而用椿者以顯
有花者為椿用

且依此推窮洛陽女子年四十六七
飲無度多食

魚鱗攝理之方其如也後以飲啖過常
蓄毒在臟日

以此血痢藥不效又以腸風藥則甚
蓋腸風則有血

而無膿凡如此已半年餘氣血漸弱
食漸減服藥則腹愈痛血愈下服藥則

稍愈或服溫平藥則病不知如此者
命待盡或有八服成人參散病家亦不

遂愈後問其方治大腸風虛飲酒過
度熱下痢膿血

疾痛多日不蓋得根白皮一兩人參
錢七空心以溫酒調服如不飲酒以
溫米飲代忌油膩

麥麴青菜葉子餅
物鷄指魚其地

郁李花



濕州郁李仁



郁李仁味酸平無毒主大腹水腫面目四肢浮腫利小便水道

根生齒斷腫齲切齒堅齒切去白蟲一名爵李一名車下李一名棣生高山川谷及丘陵上五月六月採根

禹云山野處有子熟赤色亦可噉之臣禹錫等謹按
圖經云其年香有少澁味也又圖經云樹高五六尺葉
花及樹並似大李惟子小若櫻桃味酸爾雅云常棣
一名棣郭云今山中有棣樹子如櫻桃可食詩小雅云
常棣之華陸機云許慎曰白棣樹也如李而小如櫻
正白今官園種之又有赤棣樹亦似白棣葉如刺榆葉
而微圓子正赤如郁李而小五月始熟關西天水隴西
多有之藥性論云郁李仁百味若辛能治腸中結氣關
裕不通根治齒痛宣結氣破結聚日華子云郁李仁開
泄五藏膀胱急痛宣腰膝冷膿消宿食下氣又云根涼
無毒治小兒熱發作湯
浴風艸牙濃煎含之

圖經曰郁李仁木益不載所出州土但云生高山川谷
及丘陵上今處處有之木高五六尺枝條葉花
皆若李惟子小若櫻桃赤色而味其酸核隨子熟六月
採根并實取核中仁用陸機本草云唐棣即郁李也
一名雀梅亦曰車下李所在山中皆有其華或白或赤
六月月中成實如李子可食今選京人家園圖仁一種
莖作長條花極繁密而多葉亦謂之郁李不堪入藥用
高蜜獨行方療脚氣浮腫心腹滿大小便不通氣急喘
大觀本草

○
大見本草
草味辛温苦有毒主風頭腫乳癰疔瘰除結氣疥

草莽州福



草莽州蜀



楊氏產乳膏身腫滿水氣急卧不得即李仁一大合
煎湯流
行義曰柳李仁其子如海李子至紅熟堪嚼微滿其仁
煎湯流
風神牙

息者以郁李仁十二分搗碎水研取汁意效仁搗碎如
粟米取三合以汁煮米作粥空腹食之佳必效方療癰
取車下李仁微湯退去皮及並人者與乾麩相拌薑之
為餅如微乾和淡水和黃勿令至熟空腹食一枚當快利如不
為二餅如微乾和淡水和黃勿令至熟空腹食一枚當快利如不
利更食一故或微熟粥汁以劑為度若至午後兩利不止
即服以錯飲止之利後當虛病以劑為度若至午後兩利不止
肉等無不効但病重者李仁與麩相半輕者以
意減之病減之後服者亦任量力累拭神驗
雷公云九採得先湯浸一宿漉出陰乾研如膏
食療云氣結者酒服仁四十九粒更
外臺秘要張文仲齧齒以柳李根白皮切
姚和衆治小兒多熱不痊後熟湯研
又方治卒心痛郁李仁三上枚爛嚼以新汲水下之
飯温湯尤妙須臾痛止却煎薄鹽湯熱呷之



癢殺蟲魚瘰癧痺不通乳難頭風瘰癧可用沐勿令入眼

一名蕘一名春草生上 山谷及宛句五月採葉陰

乾以和米內水中魚吞即死浮出人取食之無妨

性論云蕘春草釋曰藥草也今俗呼為蕘草郭云一名

腫毒瘰癧血治瘰癧除濕風不入湯服主頭瘰癧白禿殺蟲

與白欬赤小豆為末鷄子白調如糊協毒腫乾即更易

上一日華子云治皮膚麻痺並濃煎湯淋風於于痛瘰癧

亦濃煎汁含

後坤口

圖經曰蕘草亦曰蕘草出上谷及宛句今南中州郡及

月採葉陰乾一說蕘生藥木石間右方治風毒瘰癧

酒皆用蕘草今醫家取其葉煎湯熱含以頃間吐之

治牙齒風痺甚効此木也而兩雅釋草云蕘春草釋曰

藥草蕘草也郭璞云一名芒草蕘音述故尔然謂之草

者乃蔓生

者是也

唐本餘 治胎

雷公云凡使採得後便取葉細剉又生甘草水蓼二味

草水蓼同蒸一日去諸藥二件取

出熟乾用之勿用尖有孳生者

聖惠方 治牙齒中或於痛處咬之低頭吐滓勿熱之疼痛

定便

又方 治瘰癧發腫而壅結成核用蕘草一兩為末

肘後方 治瘰癧瘡未潰蕘草末鷄子白塗紙厚貼上藥後

五升熱合軟

梅師方 治齒腫痛蕘草郁李仁各四兩水

周禮煎氏掌除蠱物以

衍義曰經一名春草呼為蒟草濃煎湯淋漆皮膚疥癩本

然如椒爾雅釋草云檗春草釋曰今莽草也與本經合

今當其言之石南條中陶隱居注

無食子味苦温無毒主赤白痢腸滑生肌肉出西戎唐

注云生沙磧間樹似檉今注一名沒石子出波斯國主

小光輝等謹按藥性論云陰食子使治大人小兒大腹

冷滑劑不禁受成式酉陽雜俎云無石子出波斯國波

斯呼為摩賊樹高六七丈圍八尺葉似桃而長三月

孔者入藥用其樹一年生無食子初青熟乃黃白蟲蝕成

大如指長三寸上有紋中仁如栗黃可噉之

海藥謹按徐長南荆記云波斯國大小如藥子味温

温浴了即以帛微裹後傳張仲景使治陰汗取燒研先以微

果番胡呼為汝食子今人呼墨食子轉謬矣

雷公云墨食子丸用勿令犯銅鐵并火火警者顆小文

上研令及却焙乾研了用勿擣能為黑犀色

千金方治急痺蝕口鼻者沒石

子母秘錄治產後痢沒石子一個燒為末和

宮氣方治小兒女前不較沒石子二個

衍義曰先石于今人合他藥桑髭

明州黃藥



癭

紫

藥紅州泰



藥赤州施



興元府苦藥

黃藥根味苦平無毒主諸惡腫瘡癢喉痺蛇大咬毒取根研服之亦含亦塗藤生高三四尺根及塗似小桑生

嶺南

今附巨禹錫等謹按日華

圖經


黃藥根生嶺南今夔峽州及明越秦隴州山

及並似小桑十月採根秦州者為勝藤生高三四尺根
麥枝梗赤色七月開白花其根物採濕時紅赤色暴乾
即苗開州與元府又產一種苦藥子大抵與黃藥相類
主五藏和氣治肺壓熱除煩燥亦入馬藥用春採根暴
乾又下有藥實根條云生蜀郡山谷藥茶云即藥子也
用其核仁本經誤載根字疑即黃藥之實然云生葉似
杏花紅白色子肉味酸此為不同今亦稀用故附於此
孫思邈千金月令藥忽生瘡疾一二年者以萬州黃藥
子半斤須緊重者為上如輕虛即是他州者力慢須用
一倍取無灰酒一斗投藥其中固濟瓶口以糠火燒一
復時停勝待酒冷即開患時時飲一盞不令絕酒氣
經三五日後常須把鏡自照覺錯即停飲不爾便令人
項細也劉禹錫傳信方亦著其效云得之邕州從事張
峇七目擊有効復已試其驗如神其方並同有小異處
惟燒酒侯香氣出外瓶頭有津出即
止不待一宿火仍不得太猛酒有灰

大觀本草

十四

十六



經方

治咯血黃藥漢防已各一兩為末每服一錢匕水一盞小麥二十粒同煎食後溫服

斗門方

治癩氣用黃藥子一斤浸洗淨酒一斗浸之每以線子逐日早晚常服一盞忌一切毒物及不得喜怒但

度瘦知其效

簡要濟眾

治鼻衄不止黃藥子為末每服二錢匕煎薄膠湯下良久以新汲水調麵末一匙頭服之

又方

傳瘡藥黃藥子四兩為末以冷水調傳瘡上乾即旋傳之

兵部手集

治鼻衄出血兩頭不止謂之血汗王即中得方以新汲水磨黃藥子一梳勿令絕稀頓服

差立

衍義曰

黃藥亦治馬心肺熱有功

雷丸味苦

鹹寒微寒有小毒主殺三蟲逐毒氣胃中熱

利丈夫不利女子作歷膏除小兒百病逐邪氣惡風汗

出除皮中熱結積蠱毒白蟲寸白自出不止久服令人

陰痿一名雷矢一名雷實赤者殺人生石城山谷及漢

中土中八月採根暴乾嘉實厚朴為之使惡葛根陶隱居云今出建平宜都間累七唐

連如丸本經云利丈夫別錄云久服陰痿於事相反唐本注云雷丸竹之苓也無有苗蔓皆零無相連者今出

房州倉州唐注此物性寒本經云利丈夫不利女子別錄云久服令陰痿者於事相反按此則疎利男子元氣

不時利女子穢氣其義顯矣臣禹錫等謹按沒范子云雷矢出漢中色白者善子孟詵云雷丸神農苦黃帝岐伯

桐君其有毒扁鵲其無毒李氏大寒藥性論云雷丸君惡莖根味苦有小毒能逐風完花為使主癩癩在走殺

蛇蟲日華子云入藥炮用

雷公云

凡使用其草水浸一宿子銅刀刮上黑皮破

未出日乾却以酒洋知前從已至未遂日乾用

經驗前方 下寸白蠶雷丸一味水浸軟去皮切焙乾為末每有疾者五更初先食炙肉水許便以錢七藥篩滿調半錢服之服時須六銜及上半月日盡乃下

榑若



榑若味甘苦平無毒主痔止血療血痢止渴取豚炙用之皮味苦水煎濃汁除蠱及瘰俗用甚效臣禹錫等謹按藥性論云榑皮亦可單用主治惡瘡煎湯洗之良日華子云榑支味溢能止瘰癧並五藏圖經曰榑若本經不載所出州土今處處山林多有之木高丈餘若即葉也與榑相類亦有身但小不

中用耳不拘時採其葉并皮用膏洪洗諸爛瘡乳瘡並用此皮切三升水一斗煮五升春夏冷用秋冬温用洗瘡洗畢乃傳諸膏謂之赤龍皮湯又治毒攻下部生瘡者榑皮合梓煮汁如飴糖以導之千金翼方療蠱毒以榑木北陰白皮一大握長五寸以水三升煮取一升空腹分服即吐蠱出也

温服

又方 治蜈蚣癩用榑葉燒灰細研以泔別浸

孫真人 煎湯服一雞子林疾榑葉三片

簡要濟衆 治吐血解葉不拘多小搗末每服


又方 若鼻中查留膿血解葉先以泔

子母秘錄 治小兒及大人赤白痢新解皮一斤去黑皮

大輿本草

卷三十四

十七



酒服

立愈

衍義曰：嫩若亦有斗，但不及檫木，雖堅而不堪充材。藥初絞腸風及血痔，濃多者尤佳。亦燒為炭，但不及檫木。

白楊



白楊枝皮味苦無毒，主毒風脚氣腫，四肢緩弱，不隨毒氣遊坊。其在皮膚中，疥癬等酒漬服之。取葉圓大者，今

按陳藏器本草云：白楊去風痺，宿血折傷，血瀝在骨肉間，痛不可忍。及皮膚風癢腫，雜五木為湯，將漬損處，此

土極多，極多人種。蓋同樹，大皮白，或云葉無風，白動此。其後音移，非白楊也。唐本先附，臣禹錫等謹按：日華子云：味酸，冷，治瘰癧，血並酒服，煎膏可。續筋骨，非尋常楊柳，并松楊樹葉，如梨者，此也。圖經曰：人種於無特，此下又有水楊柳，相以注水，岸名曰楊，其皮於無特，此下又有水楊柳，相以注水，岸亦名曰楊，其皮於無特，此下又有水楊柳，相以注水，岸故亦名曰楊，其皮於無特，此下又有水楊柳，相以注水，岸今謂之楊柳，其皮於無特，此下又有水楊柳，相以注水，岸青楊葉長，柳葉亦長，細核時，題切揚，今注曰：白楊，葉則大，置一名高，飛一曰：細核，時題切揚，今注曰：白楊，葉則蒲楊亦曰：核，柳亦曰：蒲楊，葉亦曰：細核，時題切揚，今注曰：白楊，葉則音及作矢，與核，柳亦曰：蒲楊，葉亦曰：細核，時題切揚，今注曰：白楊，葉則鮮能分別，矢與核，柳亦曰：蒲楊，葉亦曰：細核，時題切揚，今注曰：白楊，葉則積年不損，者取白，並見赤，華條必，枝方，療腹，滿，痔，堅，如，石，還內，酒中，密封，以丹，布，袋，盛，於，屋，東，掛，乾，用。入膏公云：未出，用布，袋，盛，於，屋，東，掛，乾，用。

廿九



外臺秘要

治口瘡以
鐵上燒作
脂傅之

千金方

治疔瘡
取白楊皮
三斤

梅師方

治牙疳
以白楊枝
煎之

孫真人

將水煎
和鹽含之

行義曰

白楊水
耀間居人
脩蓋多此
水也然

則無此

事嘗官
未耀問
熱見之
但風微
時當風
經者其

葉孤絕

處則往
往獨搖
以其蒂
細長葉
重微風
雖過

故往來

卒無已
時勢使
然也其
葉而青
光

青白木

身微白
故曰白
楊非如
粉之白

桃柳子



桃音柳音

子味苦平無毒
主宿血其木似
栝櫨堅硬斫

其內有麩大者
至數斛食之不
飢其皮堪作
纆生嶺南

山谷附

圖經曰

桃柳生嶺南
山谷今二廣
州柳皆有之
人家亦

大者至

數石食之不
飢其皮至柔
堅韌可以作
纆其子

作穗生

木端不拘
時月標之
嶺表錄異云
桃柳木枝葉

並茂與素類等小異然葉下有鬚如龜馬尾廣人以此縛約不用針線木性如木浸清即愈張而為故人以制轉奕局又其木剛作發動利如鐵中石更利借

陳藏器云華陽志云日挑御木取挑御麵以牛酪食

更利惟中鶴根破之推木皮中亦有白粉如白木乾中

作餅餌食之得飽有推木皮中亦有白粉如白木乾中

之木林屑者可作麵餅長生南文按根極是也又有

數斛土人取次為餅蜀志曰茂木高山大者四五圍

八却志曰樹多根葉如烏翼其色黃如人面落食之

廣志曰樹多根葉如烏翼其色黃如人面落食之

海藥云按嶺南缺云生廣南山谷間有皮葉與蕃薯

中子木皮內有麵食之極利益氣補虛去積腰

脚無力久服軀身碎穀錄異云挑御麵以此也

蘇方木味辛鹹平無毒主破血產後血脹悶欲死者水

煮若酒煮五兩取濃汁服之効者本注云此人用藥色

愛州亦有樹似菴羅葉若榆葉而無齒抽條長丈許花

黃子生青熟黑今按陳藏器本草云蘇方寒主霍亂嘔

逆皮人常嘔吐用水煎服之破血當以酒煮為良唐本

候不調及尊勞排膿止痛消癰腫損瘵血氣心腹痛月

雷公云角者號曰木中赤色其皮倍常百片須細剉

了重搗拌細條梅枝蒸

從已至申出陰乾用

肘後方治血暈蘇方三兩細剉水五升煮取二升

海藥云平無毒徐表南海記生海岸葉似絳木若女槿味

起衝心腹中攪痛及經脈不通男女中風口禁不語宜

此法細研乳頭香細末方寸匕酒煎蘇方去滓調服立

吐惡
物差

樟樹皮大寒主時行頭痛熱結在腸胃陶隱居云山中

槐葉如檉檉亦多識用之制取裏皮去上甲煎服之夏

日作飲去熱唐本注云此樹所在皆有生溪澗水側

葉似檉而狹長樹大者連抱高數仞皮極厚殊不似

檀俗人取煮汁以療水皮斷痲取嫩葉按火爛瘡有

効臣禹錫等謹按日華子云樟樹皮味苦無毒下水氣

止熱痢安胎主姙娠人腹痛又云葉冷無毒治腫爛惡

瘡盜禱晉又云山梓樹皮平無毒治

熱毒風傷腫毒知人採葉為餅茶

雷公云心九使勿用三四年者無力用二十年以來者

上麓皮細剉蒸從已至未出焙乾用榨牛九採得用

銅刀取作兩片去兩翅用紙袋盛於舍東掛待乾用

肘後方治毒氣攻手足腫痛以樹皮絞飲之

衍義曰梓木皮今人呼為梓柳然葉謂柳非

槐木最大者高五十大尺合二三人抱圍南北

甚多此亦下材也不堪為器

用效皮取以器構槐與其

花桐



桐梧



桐葉味苦寒無毒主惡蝕瘡者陰皮主五疔殺三蟲療

賁純氣病○治主傳諸瘡銅諸肥大三倍生桐柏山谷

陶隱居云桐樹有四種青桐葉似梧而無子桐梧色白

葉似青桐而有子子肥亦可食白桐與桐無異惟有

花子爾花二月舒黃紫色禮云桐始華者也崗桐無子

是作琴瑟者今此云花便應是白桐堪作琴瑟一名荷

人家多植之唐本注云古本草桐花歸俗肥大三倍今
云傳瘡恐誤矣豈有故破傷雜傳桐花者臣禹錫等謹
撰爾雅注云覘一名桐郭云今格桐詩大雅云梧桐生
矣于彼朝陽是也又曰桐木一名榮郭云即梧桐與櫟
桐一也藥性論云白相皮能治五淋沐髮去頭風生髮
滋潤百華子云桐油冷微毒傳惡瘡疥及宜水腫塗鼻
交處能
辟鼠

圖經曰桐生桐柏山谷今處心有之其類有四種舊
與子其華二月舒黃紫色一名子子肥美可食白桐有花
所用花葉者是也舒黃紫色一名子子肥美可食白桐有花
陸機草本疏云白桐宜為琴瑟雲南祥何人續以為布
似毛布是作琴瑟宜為桐白桐二種也又曰梓實桐皮
曰椅今人云梧桐也或曰雅謂之櫟又謂之榮是白桐梧
桐二種俱有椅名也或曰梧桐以知日月正閏生十二
葉一處有六葉從下數一葉為一月至上一二葉有閏
十三葉小餘者視之則知閏何月也故曰梧桐不生則
九州異或云今南人作油者為桐開紅花無實有紫桐花如
大於梧子耳江南有積桐秋開紅花無實有紫桐花如

百合實堪糖煑以取嶺南有刺桐葉如梧桐花似數如
掌枝幹有刺花色深紅生金瘡止血珠効又梧桐白皮
懸蹄青龍五生膏中用之其膏傳瘡并酒服之
子母秘錄小兒疳積用皮水煎傳

衍義曰桐各有一治瘰癧條其復列于後一難洗用今四種
者葉三枚開白花亦不結子藥性論云皮能治五淋沐
髮去頭風生髮一種在桐早春先開淡紅花狀如破子
花成筒子或作桐油日華子云桐油冷微毒一種破子
桐四月開淡黃小花一如棗花枝頭出絲隨地成油雷
清衣復五六月結桐子今人收炒作果動風氣此是月
今清明之日桐如華者一種尚桐無花不中作琴體重
胡椒味辛大温無毒主下氣温中去痰除藏腑中風冷
生西戎形如鼠李子調食用之味甚辛辣禹錫等謹按
日華子云調五藏止霍亂心腹冷痛世
腎氣皮主冷痢後一切魚肉驚薑毒

海藥云 謹按徐表南州記生南海諸國去胃口氣虛
和氣不宜多服損肺一云何
陰者澄茄向陽者胡椒也

雷公云 凡使子每用內無殼者用方大漢椒使殼胡
椒使子每用內無殼者用方大漢椒使殼胡

食療云 治五臟風冷吞服若冷氣吞六七枚
治之佳亦宜吞服若冷氣吞六七枚

孫真人 四十粒以胡椒三
粒以胡椒三

段成式 酉陽雜俎 苗蔓生莖極柔弱長寸半有細條與
苗蔓生莖極柔弱長寸半有細條與

葉齊條上結子兩兩相對葉晨開暮合則畏其子於
葉齊條上結子兩兩相對葉晨開暮合則畏其子於

衍義曰 胡椒去胃中寒痰吐水食已即吐甚驗過劑
胡椒去胃中寒痰吐水食已即吐甚驗過劑

釣樟 樟根皮主金瘡止血 陶隱居云出桂陽邵陵諸處
樟根皮主金瘡止血 陶隱居云出桂陽邵陵諸處

人多識此刮根皮屑以療金瘡陶隱居云出桂陽邵陵諸處
人多識此刮根皮屑以療金瘡陶隱居云出桂陽邵陵諸處

採乾作屑亦主療金瘡言劉豐世曰採用之爾唐本注云
採乾作屑亦主療金瘡言劉豐世曰採用之爾唐本注云

釣樟生柳州山谷樹高大餘葉似楠音南葉而尖長背
釣樟生柳州山谷樹高大餘葉似楠音南葉而尖長背

有赤毛若枇杷葉八月九月採根皮日乾也臣禹錫等
有赤毛若枇杷葉八月九月採根皮日乾也臣禹錫等

謹按蕭炳云俗人取莖葉置門上辟天行時疾別錄云
謹按蕭炳云俗人取莖葉置門上辟天行時疾別錄云

似烏藥取其根摩報治霍亂日華子云溫無毒治黃疸
似烏藥取其根摩報治霍亂日華子云溫無毒治黃疸

脚氣水腫煎服將皮煎湯洗滌痰厥風密疥癬陳旸器
脚氣水腫煎服將皮煎湯洗滌痰厥風密疥癬陳旸器

云樟材朱辛溫無毒主惡氣中惡心服痛風注霍亂腹
云樟材朱辛溫無毒主惡氣中惡心服痛風注霍亂腹

脹宿食不消常吐酸臭水酒煮服之無藥處用之江東
脹宿食不消常吐酸臭水酒煮服之無藥處用之江東


脚氣除疥癬風痒作履除脚氣懸名豫章因木為名也
脚氣除疥癬風痒作履除脚氣懸名豫章因木為名也

千金藤主一切血毒諸氣霍亂中惡天行虛勞瘡瘡瘰
千金藤主一切血毒諸氣霍亂中惡天行虛勞瘡瘡瘰

嗽不利癰腫蛇大毒藥石發癩癩悉主之生北地者根
嗽不利癰腫蛇大毒藥石發癩癩悉主之生北地者根

大如指色黑似漆生南土者黃赤如細辛附
大如指色黑似漆生南土者黃赤如細辛附

療



的稱 錢

大和本草
廬間有一種藤似木蓼又有烏虎藤連樹冬青亦名千
金藤又江西山林間有草生葉頭有瘦子似鶴膝葉如
柳亦名千金藤似荷葉只餘許大亦呼為千金藤一名
古藤主痢及小兒大腹千金者以貫為名置俱一物亦
狀異而功名同南北所用若取鈞樟未知孰
是其中有草今並入木部草部亦重載也
海藥云謹按南州記云生嶺南山野陳氏云呼為石黃
發皆並宜煎服浸
酒治風輕身也

江州南燭




南燭枝葉味苦平無毒止泄除睡強筋益氣力久服輕
身長年令人不饑變白去老取莖葉搗碎漬汁浸粳米
九浸九蒸九暴米粒緊小正黑如瑩珠袋盛之可適遠
方日進一合不飢益顏色堅筋骨能行取汁炊飯名烏
飯亦名烏草亦名牛筋言食之健如牛筋也色赤名文
燭生高山經冬不凋今附益腸胃搗汁浸蒸晒乾服又

各南
燭也
圖經曰南燭本經不載所出州土云坐高山今惟江東
州郡有之株高三五尺葉類苦棟而小陵冬不
凋冬生紅子作穗人家多植庭除間俗謂之南天燭不
拘時採其枝葉用亦謂之南燭草木謹按陶隱居登真
隱訣載太極真人青精乾石飯飯法餽音迅之為言
發也謂以酒密蒸草輩險擯而暴之也亦作迅凡內外



諸書並無此字惟施於今飯之名耳云其種是木而似
草故號南燭草木一名族藥一名南續一名復卓一名
惟那木一名草木之王生嵩高少室抱犢雞頭山江左
吳越至多土人名之曰猴菽或曰染菽粗與直名相仿
佛也此木至難長初生三四年枝若菘菜之屬亦頗似
各從其和城所稱而正號是南燭也其子如菜更九月熟
酸美可食葉不相對似茗而圓厚味小酢冬夏常青枝
莖微紫大者亦高四五尺而甚肥脆易摧折也作飯法
以生白粳米一斛五斗更春治浙取一斛二斗木葉五
斤燥者用三斤亦可雜莖皮益嘉煮取汁輒今膏冷以
斷米七擇坎之漏即渡字也今課其時月從四月生新
葉至八月末色皆深九月至三月用宿葉色皆淺可隨
時進退其斤兩寧小多合採軟枝莖皮幹石臼中搗碎
假令四五月中作可用十許斤熟春以解二千湯漬染
得一斛以九月淹解二千米北來正爾用水漬二宿
不然隨湯煮漬米令上可走蝦周時乃鹿而吹之初米
正作紅色既得蒸便如緝若一過汁漬不得好色亦可
淘去更以新汁漬之酒瀆皆用此汁當令飯作正青色
乃止向所餘汁一斗以其三過洒飯頂作高格暴令乾

當三過蒸暴每一燥輒以清汁搜令泥七耳曰可服
升勿復血食亦以填胃補髓消滅三蟲上元室經曰子
謂也今芳山道士亦作此飯或以寄遠重蒸過食之甚
香其也孫思邈千金月令南燭煎益髮及客顏兼補
暖方三月三日采葉并藥子入大淨甕中乾盛以童子
小便浸甕瓶固濟其口置開處經一周年取服每日
一兩火溫酒服之每酒一盞調煎一匙極有效驗
聖惠方治一切風疾若能久服輕身明目黑髮駐顏
到五斤水五斗慢火煎取二斗去滓別於淨鍋中
慢火煎如稀錫以瓷甕盛溫酒下一匙日三服
又方治小兒誤吞銅鐵物在喉內不下
無患子皮有小毒主澀垢去面黥喉痺研內猴中立開
又主飛尸子中人燒令香辟惡氣其子如漆珠生山谷
大樹一名噤婁一名桓今附錄陽經雜類云昔有神巫曰瑤鼎



能符劔百鬼擒鬼以無患木摩殺之世人競取此
木為器用却鬼因曰無患曰曰云無患子皮平

陳藏器云

有小毒主幹垢去面黥喉閉飛尸研內後
中立問子中人燒令香辟邪惡氣子黑如

漆珠子深山大樹一名禁萎一名桓上患字聲訛也博
物志云桓葉似柳子核堅正黑可作香縵用辟惡氣浣

垢古今注云程雅問木曰无患何也答曰昔有神巫曰
理既能用獻百鬼得鬼則以此冰為棒上殺之世人相

以為器用獻鬼故曰無患也纂文云無患各禁
姿實好去垢今僧家貫之為念珠紅紙為也

纂文無患木名也實可以去垢核黑如雅問櫃木曰無
患則以此木為答曰昔有神巫曰无患此木能作符劔百

眾鬼所惡競取為器用以厭鬼故號无患
衍義曰紫無患子今擇子取以為念珠出佛經惟取

紫紅色小者佳今入藥絕少西路亦有之

梓白皮



梓曰皮味苦寒無毒主熱去三蟲療目中疾○葉搗傳

猪瘡飼猪肥大三倍生河內山谷之皮梓亦有三種當

用梓素不腐者葉療手脚火爛瘡桐葉皮此以肥猪之

法未見應在商丘子養猪經中唐本注云此二樹花葉

取以飼並能肥大且易養今見李氏本草博物志但云

飼猪使肥今云傳緒瘡並訛矣別錄云皮主吐逆胃反

去三蟲小兒熱瘡身頭熱煩蝕瘡湯浴之并封傳嫩葉

注爛瘡臣禹錫等謹按爾雅云梓釋曰別二名也即

云即椒詩廊風云荷桐梓漆蠶縹云梓者椒之疏理白
色而生子者為梓梓實桐皮曰椅則大同而小別也蕭
炳云樹似桐而葉小花紫日華子云煎湯洗小兒壯熱
一切瘡疥皮膚瘙癢梓樹皮有脂出惟椒梓佳餘即不
矣甚

圖經曰梓白皮生河內山谷今道皆有之木似桐而
風云荷桐梓漆陸機云梓者椒之疏理白也詩廊

為梓梓實銅皮白椅大謂之虎小雅云北山有快
搜亦椒之屬也江東人謂之虎小雅云北山有快
陸機云其枝葉水理如秋山椒也然鼠花之實都不相

是也鼠李一名鼠梓或云即此也然鼠花之實都不相
類也一物而名同也梓之入藥當用有子者為使椒梓
官寺及人家園亭多植之崔元亮集驗方療毒腫不閉

硬軟取椒葉十重傳腫上即以舊帛裹之日三易當重
重有毒氣為水流在葉中如冬月取乾葉塩水浸良久
用之或取筋皮到爛搗傳之皆効又癩上氣欬嗽腹瀉
羸頓者椒葉三斗以水三斗煮三十沸去滓煎九如

棗大以竹筒內下部中立愈篋中方椒葉一味為煎療

療煎椒葉中取十斤水一石淨釜中煎煮三斗又別
換鍋煎取七八升又換鍋煎取二升即成煎內不津
中凡患者先取麻油半合蠟一分研令細米粉二錢同
而脂又取杏仁七粒生薑少許同研令細米粉二錢同
入膏中搗令勻先塗瘡上經二日米乃拭却以篋子
勻塗椒煎浦瘡上仍用軟帛裹却二日一度拭却更上
新藥不過五六上已作頭便生肌平浸末灰者即內消
差後須將慎半年已來採葉及煎
台時禁孝子婦女僧人鷄犬見之

鄂州椽實



橡實味苦微温無毒主下痢厚腸胃肥健人其殼為散
及煮汁服亦主痢并堪染用一名杼斗斛櫟皆有斗以
櫟為勝所在山谷中皆有唐本先附臣禹錫等謹按爾雅云相杼釋曰杼一名杼即
云杵樹詩唐風云集于杓杞陸機云今杵櫟也徐州人謂櫟為杵或謂為杼其子為皂或言皂斗其殼為汁可
以染皂今京洛及河內言杵斗謂櫟為杵五方通語也
百華子云櫟樹皮平無毒治水痢消瘰癧除惡瘡杼斗
子澁腸止瀉煮食可止飢禦瘵歲止腸風崩
中帶下令熱瀉痢并染鬚髮入藥並搗炒焦用
圖經曰橡實櫟木子也本經不載所出州土云所在山
九月結實其實為皂斗櫟皆有斗而以櫟為勝不向
時採其皮并實用爾雅云櫟其實杼釋曰櫟以櫟之木
而杼盛實之房也其實櫟也其葉自裹詩秦風云山
有苞栩陸機云秦人謂杵櫟為櫟又唐風云集于苞栩
陸機云今杵櫟也徐州人謂櫟為杼或謂之杼今京洛
及河內謂櫟亦為杼五方通語也然則杵櫟也杼也杼

也皆櫟櫟之通名也

雷公云九使去龜皮一重取櫟實蒸

食療云主止痢不宜多食


孫真人枕中記云櫟子非果非穀而最益人服食未能

止痢令人強健不極

衍義曰櫟實櫟木子也葉如栗葉在處有但堅而不堪

善為炭他木皆不及其殼堪染皂若曾經雨水者其色
淡不若不經雨水者雖亦有殼但小而不及櫟木所實
者

道州石南



石南味辛苦平有毒主養腎氣內傷陰衰利筋骨皮毛

療脚弱五藏邪氣除熱女子不可久服令思男

實殺蠱毒破積聚逐風痺一名鬼其生華陰山谷二月

四月採葉八月採實陰乾五加皮為之使爾隱居云今

批把葉方用亦稀唐本注云葉似茵草凌冬不凋以葉細者為良閩中者好為療風邪丸散之要其江山巴南

者長大如批把葉無氣味殊不在用今醫家不復用實

臣禹錫等謹按蜀本云終南斜谷近石虜甚饒今市人多以瓦甯為石甯以石甯為石南不可不審之藥性論云石南臣主除熱惡小菌無毒能添腎氣治軟脚煩悶

能養取月內令人陰痿

圖經曰石南生華陰山谷今南北皆有之生於石上株

極有高大者江湖間出者葉如批把葉有小刺

凌冬不凋春生白花成簇秋結細紅實閩隴間出者葉

似莽草青黃色背有紫點兩多則并生長及二三寸根

橫細紫色無花實葉至茂密南北人多移以植亭宇間

陰翳可愛不透日氣入藥以閩中葉細者良二月四月

採葉四月採實陰乾魏王花木記曰南方石南木取皮

中作魚羹和之木羨今不聞用之下有楠材條其木類

似石楠而更高大葉差小其

材中梁柱今醫方亦稀用之

衍義曰

石楠葉狀如批把葉之小者但背無毛光而不

有十五餘花大小如椿花甚細碎每一苞約彈許大成

一花六葉一朶有七八葉淡白綠色葉未微淡赤

色花既開葉滿花但見葉不見花
脫落漸生新葉治腎衰却弱最相宜
山東頻少人以此故小用明南北江東
二浙甚多乾多用南實今醫家忽可用

信陽軍木天蓼



木天蓼味辛温有小毒主癥結積聚風勞虛冷生山谷
中唐本注云作藤蔓葉似佛花白子如棗許無定形中
以釀酒風冷癥瘕大效所在皆有今出安州中州今按
陳藏器本草云木天蓼今時所用出鳳州樹高如冬青

不凋出深山人云多服損壽以其逐風損氣故也不當
以藤大蓼為注既云木蓼豈更藤生自有藤膠爾唐本
先附臣禹錫等謹按藥性論云大蓼子使味若辛微熱
無毒能治中賤風口面啞斜主冷痰癱氣塊女子虛勞
圖經曰木天蓼味辛温有小毒主微結損髮風勞虛冷
五月採子子作毬形似蒜其毬子可藏作果飲之亦治
諸冷氣蘇公云作藤蔓生者自是藤天蓼也又有一種
小天蓼生天目山四明山木如梔子冬不凋然
則天蓼有三種雖其狀不同而體療甚相似也

聖惠方治風立有奇効用木天蓼一斤去皮細剉以
二七日後開每空心日午初夜各温飲一
盞老幼臨時加減若長服日只每朝一盞

黃環味苦平有毒主蠱毒鬼疰鬼魅邪氣在藏中除欬
逆寒熱一名凌泉一名大就生蜀郡山谷三月採根陰

乾鷲尾為之使惡夜冷防已陶隱居云似防已亦作車
輻理解蜀都賦云清珠黃環者或云是大戟花定非

常收

也用甚稀市人歎有識者唐本注云此物襄陽巴西人謂之就葛作藤生根亦葛類所云似防已作車輻解者近之人取葛根誤得食之吐刺不止用土漿解乃差此真黃環也餘處亦稀惟襄陽大有本經用根今云大戟花其也其子作角生似皂荚花尖與葛同時矣今園庭種之大者莖徑六七寸所在有之謂其子名狼跋子今太原科劔南來者乃鷄屎葛根壯也臣禹錫等謹按藥性論云黃環使惡乾薑大寒有小毒治上氣急寒熱及邪百

雷州益智子



○益智子味辛温無毒主遺精虛漏小便餘瀝益氣安中

補不足安三焦調諸氣夜多小便者取二十四枚碎入

益同煎服有奇驗按山海經云生崑崙國今附陳藏

器云止嘔噦廣志云葉似蕺菜長丈餘其根上有小枝

高八九尺無葉蔓子叢生大如棗中瓣黑皮白核小者

名益智含之辟

圖經曰益智子生崑崙國今嶺南州郡往往有之葉似

蕺菜作穗生其上如棗許大皮白中人黑人細者佳含之

以續命

齊氏要術云益智子

顧微枝有十子子肉白滑四破去之或外皮密煮為糖

味辛

瘦音疏音味辛苦寒微寒無毒主身皮膚中熱除邪氣

止遺溺通利水道除胃中熱下氣可作湯沐一名巨骨

生熊耳川谷及田野故丘墟地四月採漏蘆為之使陶

疏一名揚櫃一名牡荊一名空疏皮白中空時時有節

子似拘杞子熟色赤味甘苦未代乃無識者此實真也

非人籬援之揚櫃也李當之此說於論牡荊乃不為大

乖而溢引瘦疏恐斯誤矣又云瘦疏與空疏亦不同掘

耳疑應作熊耳熊耳山名都無掘耳之號唐本注云瘦

疏形似空疏樹高丈許白皮其子八九月熟色赤似拘

杞子味若必兩兩相並與空疏不同空疏一名揚櫃子

為莢不似瘦疏今注瘦疏拘杞雖則相似然瘦疏有刺

拘杞無刺以此為別爾臣禹

錫等謹按藥性論云瘦疏使

圖經文具拘

蜀州鼠李



鼠李主寒熱癰瘡

其皮味苦微寒無毒主除身皮熱毒一名牛李一名鼠

梓一名柺音生田野採無時唐本注云此藥一名趙李

主諸瘡寒熱毒痺子主牛馬六畜瘡中蟲或生搗傅之

或和脂塗皆効子味若採取日乾九蒸酒漬服三合日

再能下血及碎肉除疔瘻積冷氣大良皮子俱有小毒

臣禹錫等謹按日華子云味若涼微毒治水腫皮主風痺

圖經曰

鼠李即烏巢子也本經不載所出州土但云生
田野今蜀川多有之枝葉如李子實若五味子

色醫黑其材紫色味牛若實熟時採日乾九蒸酒浸服
能下血其皮採無時一名牛李劉禹錫傳信方主大人

口中痔瘡并發背萬不失一用山李子根亦名牛李子
蓄薇根野外者住各細切五升以水五大斗煎至半日

已來汁濃即於銀銅器中盛之重湯煎至一二升看猶
稠即於甕瓶于中盛少少溫含咽之必差忌醬醋油脂

熱麵大約不宜食肉如患發背重湯煎令極稠和如膏
以帛塗之瘡上神効襄州軍事柳岸妻竇氏患口瘡十

五年盡落亦斷壞
不可近用此方遂差

食療云

微寒主腹脹滿其根有毒煮濃汁含之治蠶
齒并疳蝕人脊骨者可煮濃汁灌之良其

肉主脹滿鼓脹和麴作餅子空心食之少臨
當瀉其根汁亦空心服一盞治脊骨痺

衍義曰鼠李即牛李子也木高七八尺葉如李但然而
至秋則子落尚在枝是處皆有故經不言所出
今關陝及湖南江南北甚多亦少與子兩用

椰子



椰子皮味苦平無毒止血療鼻衄吐逆霍亂煮汁服之

殼中肉益氣去風

漿服之主消渴塗頭益髮令黑生安南樹如椶櫚子殼

可為器交州記曰椰子中有漿飲之得醉今附巨禹錫

子云皮入
藥灸用

圖經曰 椰子出安南今嶺南州郡皆有之木似桃柳無
枝間如桂物尖外有龜皮如櫻包次有殼圓而且堅裏
有膏至白如猪脂厚半寸許味亦似胡桃膏裏有漿四
五合如乳飲之冷而氣盛人多取殼為器甚佳不拘時
月採其根皮用南人取其肉糖飴漬之寄至北中作果
味甚佳也

陳藏器

理水廣志白汁有餘清
如水美如蜜可食之

海藥云

謹按交州記云生南海狀若海櫻實名椰子大
如橈許大分有龜皮如大腹子豆蔻之類內有
漿似酒飲之不醉主消渴吐血水腫去風熱雲南者亦
好武侯討雲南將立令將士剪除椰樹不令小邦有此
異物多食動氣也

衍義曰

椰子開之有汁如乳極其香白別是一種氣土
中又有一塊瓢形如瓜萋上有細龍起亦白色
但欲虛紋若掃人裙褶其味亦如其汁又着殼一重白
肉剛取之皆可與瓠羹煎為果汁色如白酒其味如瓠

然謂之酒者好事者當日強名之取其殼為酒器如酒
中有毒則酒沸起今人皆漆其裏則全失用椰子之意
根音矩音味其平無毒主頭風小腹拘急一名木蜜其
木皮溫無毒主五疔和五藏以木為屋屋中酒則味薄
此亦奇物唐本注云其樹徑尺木名白石葉如桑拓其
附臣禹錫等謹按蜀本云字或單作枸音矩云木
名出蜀近酒醋薄酒味江南人呼謂之木蜜也

卅九

冬儲備又
以辟蟲毒

食療云

多食癸蠅蟲昔有南人脩舍用此俚
有一片落在酒甕中其酒化為水味

荆楚歲時記云

採是白石木子山中多有之蓋荷裏一

小天蓼味甘溫無毒主一切風虛羸冷手足疼痺無論

冬儲備又
以辟蟲毒

老幼輕重浸酒及煮汁服之十許日覺皮膚間風出如
蟲行生天目山四明山樹如梔子冬不凋野獸食之更
有木天蓼出山南大樹今市人貨之云久服促壽當是
其逐風損氣故也本經有木天蓼即是此也蘇注云藤
生子辛與木又異應是復有藤天蓼江淮南崗有木蓼
作藤著樹葉如梨光而薄子如棗辛甘大主風血羸痺
腰脚疼冷取皮釀酒即是蘇引為天蓼注者夫如是則
有三天蓼俱能逐風其中優劣小者最為勝附今

圖經文具木天蓼條下

小藥味苦大寒無毒主口瘡疔腫殺諸蟲去心腹中熱

氣一名山石榴

唐本注云其樹枝葉與石榴無別世花
異子細黑圓如牛李子爾生山石榴所
在皆在襄陽峴山東者為良陶於藥木附見二種其
是此陶云皮黃其樹乃皮白今太常所貯乃葉多刺者
名白刺藥非小藥也今注陳藏器本草云凡是藥木皆
皮黃今既不黃而自然非藥小藥如石榴皮黃子赤如
物杞子兩頭尖人對枝以葉黃若云子
黑而圓恐是別物非小藥也唐本先附

圖經文具藥條下

茨菴音迷味甘苦平無毒主三蟲下氣消穀

唐本注云葉
枝木槿及似
榆作小樹其子如溲疏兩兩相並四四相對而色赤味
甘糞樹枝汁和作粥甚美以飼小兒殺菟蟲不入方用
陸機草木疏名擊迷一名弄先蓋檀榆之類也所在山
谷有之今按陳藏器本草云茨菴主六畜瘡中因煮汁
乍粥灌之蛆立出皮甚為緊
生北上山林間唐本先附

紫荊



紫荊木味苦平無毒主破宿血下五淋濃煮服之令人

多於庭院間種者花艷可愛今附臣禹錫等謹按日華

雖疽衰痺飛尸蠱毒腫下癢蛇虺蟲蠶狂犬等毒並煮
汁服亦煮汁洗瘡腫除血長膏一名紫荊樹似黃荊葉
小無極非田氏之荊也至秋子熟正紫圓如小株生江
東林澤間有之日華子紫荊木通小腸皮梗同用其功
用亦

圖經曰紫荊舊不載所生州郡今處北有之人多於
院間種植木似黃荊葉小無極花深紫可愛或

云田氏之荊也至秋子熟如小
名紫珠江東林澤間尤多
衍義曰紫荊木春開紫花甚細碎共作朶生山無常處
葉出光紫微圓
或生於木身之上或附根上之直出花花羅

紫真檀味鹹微寒主惡毒風毒隋隱居云俗人摩以塗
風毒諸腫亦効然不及

青木香又主金瘡止血亦療淋用之唐本注去此物出
崑崙盤盤國也雖不生中華人間亦有之也臣禹錫等
謹按日華子云
此紫真檀無毒

陳藏器云檀樹如檀出海南本功外
腹痛霍亂中惡鬼氣殺蟲

外臺秘要止血止痛至妙凡裹鷄瘡用故
布帛不寬不急如繫衣帶即好

千金方治功腫以紫檀細
碎大醋和傳腫上



梅師方

治金瘡止血急利
真紫檀末傳之

烏白木根皮味苦微温有毒主暴水瘰結積聚生山南

平澤

唐本注云樹高數仞葉似梨杏花黃白子黑色今按陳藏器本草云烏白葉好染皂子多取壓為油

塗頭令黑變白為燈極明服一合令人下痢去陰下水

唐本先附臣禹錫等謹按日華子云烏白根皮涼治面

風通大小便以慢火炙令脆汁盡黃乾後用又云子涼無毒壓汁梳頭可染髮炒作湯下水氣

斗門方

治大便不通用烏白木方停一寸來劈破以水煎取小半盞服之立愈不用多喫其功神

聖蕪能取水
衍義曰烏白葉如小杏葉但微薄而綠色差淡子八九

月熟初青後黑分為三辨取子出油然燈及染髮

泉州南藤



南藤味辛温無毒主風血補衰老起陽強腰脚除痺變

白逐冷氣排風邪亦煮汁服亦浸酒冬月用之生依南

樹故號南藤莖如馬鞭有節紫褐色一名丁公藤生南

山山谷南史解叔謙鴈門人母有疾夜於庭中稽顙祈

告關空中云得一公藤治即差訪謙及本草皆無至宜都山中見一翁伐木云是丁公藤療風乃拜泣

不得之及漬酒法受畢失翁所在母疾遂愈今附之

大考本草
圖經曰南藤即丁公藤也生南山山谷今出泉州榮州

如杏葉而尖採無時此下又有千金藤云生北地者根
大如指色黑似漆生南土者黃赤如細辛又有植藤子
生廣南山林間木如通草藤三年方熟紫黑
色一名象豆今醫家並稀用故但附於其類

陳藏器云氣味辛烈亦磨服之變白不老出藍田八月採日乾用

鹽麩子味酸微寒無毒除痰飲瘴瘵喉中熱結喉痺止

渴解酒毒黃疸飛尸蠱毒天行寒熱痰嗽變白生毛髮

取子乾搗為末食之嶺南人將以防瘴

樹白皮主破血止血蠱毒血刺殺蛇蠱并煎服之

根白皮主酒疸搗碎米泔浸一宿平旦空腹温服一二

升葉如椿生吳蜀山谷子秋熟為穗粒如小豆上有鹽

似銀食之酸鹹止渴一名叛奴鹽今附臣禹錫等謹按

日齊効一曰華子云鹽麩葉止秋子

治中蠱毒毒藥消酒毒根用并同

陳藏器云蜀人為之酸桶樽物志云酸桶七月出穗
之酢桶矣吳人謂之為主音穗上有鹽者可為羨亦謂
謂之為鹽也

杉材



宜州杉菌



杉材微温無毒主療漆瘡陶隱居云削作柿煮以澆漆瘡無不即差又有鼠查生去

地高尺餘許其以洗深多差又有漆姑葉細多生石
 邊亦療漆瘡其鷄子反蟹並是舊方唐本注云杉材木
 水煮汁浸將脚氣種蒲服之療心腹脹滿夫惡氣其鼠
 查漆姑有別功列出下品臣禹錫等謹按日華子云味
 辛治風毒實豚霍亂止氣並煎湯
 服舟淋洗須是油杉及臭者良
 圖經曰杉類而功直葉附枝生若刺針爾雅云被音
 彼結与杉同舉糞注云粘似松生江南可以為船又楷
 材作柱埋之不腐也又人家常用作桶板甚耐水醫師
 取其節煮汁浸將脚氣殊效唐柳上州募救三死方云
 元和十二年二月得脚氣夜半啞絕脅有塊大如石且
 死因大寒不知人三日家人號哭榮陽鄭洵美傳杉木
 湯服半食頃大下三日氣通塊散杉木節一大升橘葉
 切一大升北地無葉可以皮代之大腹攢榔七枚合子
 碎之童子小便三大升共煮取一大升半分兩服若一
 服得快利即停後服已前三死真死大會教者皆得
 不死恐他人不幸有類余病故傳焉又杉齒出宜州生
 積年杉木上若齒狀云味苦性微
 溫主心脾氣疼及暴心痛採無時

斗門方

治霍亂用黃杉木劈開作片

衍義曰

山杉其幹端直大抵如松冬不凋但葉闊成枝虜
 滿今處
 屬有之

接骨木




接骨木味甘苦平無毒主折傷續筋骨除風養齒齒可

作浴湯唐本注云葉如陸英花亦杉似但作樹高一二
 丈許木輕虛既心研枝挿便生人家亦種之一

天現林詳

卷十四

五十一



本之類者所在皆有之唐本先附臣禹錫等謹按陳藏器云接骨木有小毒根皮主痰飲下水腫及痰瘰瘻服之當刺下及吐不可多服葉主瘡小兒服三葉大人服七葉並生椿絞汁服得吐為度本經云無毒誤也圖經曰接骨木舊不載所出州土今近京皆有之木高者其木輕盪無心研枝插土便生人家亦種之葉主瘡多也又上有枳椇條云其木至尺木名白石葉如桑拓其子作房似珊瑚核在其端人多食之即寺小雅所謂南山有栲是也陸机云栲如栲也木似白楊所在山中皆有枝拘不直取之其莖如飴人九月熟謂之木蜜本從南方來能敗酒若以為屋柱則一屋之酒皆薄

產書云治產後心悶手脚煩熱氣力欲絕血暈連心以水一升煎取半升分溫兩服或小便數惡血不止服之即差此木煮之三徧其力一服此是起死人力

楓柳皮味辛大熱有毒主風齩齒痛出原州唐本注云葉似

槐莖赤根黃子六月熟綠色而細利取莖皮用之唐本先附

陳藏器云有殊蘇為誤矣又云有毒轉明其謬水煎

為最止痢

梅師方治中熱遊及火燒除外痛以柳白皮燒為末傳之兼治灸瘡亦同效

斗門方治白虎風所患不以精年久治無効痛不可忍為度即差今之寄生楓樹上者方堪用其葉亦可制風霜粉丸妙矣

赤爪側紋切木味苦寒無毒主水痢風頭身癢生平陸所

任有之

實味酸冷無毒汁服主水痢沐頭及洗身上瘡拜一名

羊棘一名鼠查唐本注云小樹生高五六尺葉似香葉子似虎掌爪木如小林擒赤色出山南

中安商等州
唐本先附

陳藏器云

陶注松條中鼠查一名羊採即赤瓜也黃
裏其子房生為抹又瓜木一名羊採一名鼠查
抹此乃名同耳抹以小查而赤人食之生高原

樺木皮味苦平無毒主諸黃疸濃煮汁飲之良堪為燭

者木似山桃取脂燒碎鬼今附臣禹錫等謹按陳藏器
云晉中書令王眠傷寒身驗

方中作極字濃煮汁冷飲主傷寒
時行熱毒瘡特良今之蛇豆瘡也

靈苑方治乳痛癰初發腫痛結硬欲破膿令一服差
以此來真梓皮無灰酒服方寸匕服之以及

差已

衍義曰梓木皮燒為黑灰合他藥治肺風毒
及取皮上有紫黑花白口裏鞞弓韃

楸藤子味澁甘平無毒主蠱毒立痔喉痺及小兒脫肛

通

間樹如通草藤也三年方始熟紫黑色一名象豆今附
臣禹

錫等謹按日華子云
治飛尸入藥多用

圖經文具南
藤條下

衍義曰楸藤子紫黑色微光大一二寸圓扁治五痔有
功燒成黑灰微存性米飲調服入多則去肉作

藥懸垂
腰間

樞實味其無毒主五痔去三蟲蠱毒鬼疰生永昌陶

居云今出東陽諸即食其子療寸白蟲唐本注云此物
是蟲部中彼子也尔雅云彼杉也其樹大連抱高數仞

扶移木皮味苦平有小毒去風血脚氣疼痺腕損瘀血
痛不可忍取白皮炙酒浸服之和五木皮煮作湯將
脚氣疼腫殺瘰癧賦王患風瘙燒作灰置酒中令味正經
時不敗生江南山谷大十數圍無風葉動善友而後
合詩云棠棣之華備具反而鄭注云棠棣移也亦名移
楊圓葉弱蒂微風大搖新補見

宜州木鼈子



木鼈子味甘温無毒主折傷消結腫惡瘡生肌止腰痛

除粉刺黥黯婦人乳癰肛門腫痛藤生葉有五花狀如

署預葉青色面光花黃其子似枯樓而極大生青熟紅

內上有刺其核似鼈也故以為名出朗州及南中七八月

採之今附臣禹錫等謹按日


圖經云木鼈子出朗州及南中今湖廣諸州及抗越全

青色面光四月生黃花六月結實似枯樓而極大生青

熟黃內上有刺其核似鼈故以為名每一實其核三四

十枚八月九月採其葉始蒸食

取嫩實及苗葉作始蒸食
孫用和治痔方以木鼈子三枚去皮儻碎破盆內研
至黑之至通手即洗
日不過三二次



衍義曰小龍子蔓生歲一枯葉如蒲桃實如大括樓熟則紅黃色故有刺不似刺人今荆南之南皆有
之九月十月熟實中之子曰木龍子但根不死春旋生苗其子一頭尖者為雄九指特須雌雄相合麻繼纏定及其生也則去其雄者方結實

藥實根味辛温無毒主邪氣諸痺疼酸續絕傷補骨髓

那疏

一名連木生蜀郡山谷採無特唐本注云此宗子也當州渝州本經用根恐誤載根字子味辛平無毒主破血上痢消腫除盛注蛇毒樹生葉似杏花紅白色子肉味酸其用其核仁

圖經文具黃
經文具黃
系條下

興元府釣藤



釣藤微寒無毒主小兒寒熱十二驚瀉商隱居云出建

釣

惟療小兒不入餘方唐本注云出梁州葉細長莖間有刺若釣者是其臣禹錫詩謹按蜀本云味苦藥性論云釣藤臣味其平能主小兒驚帝與

圖經曰物藤本名不載所出州土蘇恭云出梁州今亦採字或作吊葛洪治小兒方多用之其赤湯治卒得癩


用釣藤其草名二分水五合煮取二合服如小棗大
日五夜三良又廣濟及崔氏方
煎小兒驚癇諸湯飲皆用吊藤波

衍義曰納藤中空二經不言之長八九尺或一二丈者
致酒瓮中盜取酒以氣吸之酒
既山消消不漸專治小兒驚熱

花藥



花藥



藥華味苦寒無毒主目痛淚出傷皆消目腫生漢中川
谷五月採快明為之使唐本注云此樹葉似木槿而薄
實如熟豌豆圓黑堅硬堪為數珠者是也五月六月花
可收南人取合黃連作煎療目赤爛大効花以染黃色

好

圖經曰藥花生崇平川谷今南方及都下園圃中或在
似酸漿其中自文如熟豌豆圓黑堅堪為數珠者五月

採其花亦可染黃南人取以合黃連作煎療目赤爛甚効
採義曰藥華今長安山中亦有其子即謂之木
藥子携至京師都為數珠未見其入藥

蔓椒味苦温無毒主風寒濕痺歷節疼除四肢厥氣膝

痛一名豕椒一名猪椒一名豨椒一名狗椒生雲中川

谷及丘冢間採莖根煮釀酒陶隱居云山野處上有俗
呼為膠以椒薑音黨小不

香爾一名豨椒
以蒸病出汗也

圖經文具蜀
椒條下

食療主賊風
藥急

感藤味甘平無毒調中益氣主五藏通血氣解諸熱止渴除煩悶治腎鈞氣如木防已生江南山谷如鷄卵大斫藤斷吹氣出一頭其汁甘美如蜜葉生研傳蛇蟲咬瘡一名其藤其感聲近又名其藤也新補見陳藏器日華子赤桤木無毒主剥驢馬血入肉毒取以火炙用熨之亦可莫汁浸之其木中脂一名桤乳入合質汗用之生河西沙地皮赤色葉細今附臣禹錫等謹按爾雅疏云陸棧云生水傍皮正亦如絳一名而師枝葉似松日華子云赤桤木温圖經文具桤華條下衍義曰赤桤木人謂之三春柳以其一羊三秀也花肉紅色成細德河西者成人取滑枝為糖

甚多
突厥白味苦主金瘡生肉止血補腰續筋出突厥國色白如灰乃云石灰其諸藥合成之夷人以合金瘡中國用之今醫家見用經效者潞州出焉其根黃白色狀似茯苓而虛軟苗高三四尺春夏葉如薄荷花似牽牛而紫上有白稜二月八月採根暴乾今附

渠州賣子木



賣子木味甘微鹹平無毒主折傷血內溜續絕補骨髓

止痛安胎生山谷中唐本注云其葉似柿出劔南中州唐本先附(臣禹錫等謹按今渠州

歲貢作買子木

圖經曰賣子木本經不載所出州土注云出劔南中州今惟渠州有之每歲土貢謂之買子木殊高五

七尺木經寸許春生嫩枝條葉尖長一二寸俱青綠色枝稍淡紫色四五開碎花百十枝圍簇作大朵焦紅

色隨花便生子如株日在花中黑而光紫每株花栽三五大朵耳五月採其枝葉用

雷公云凡採得後龜搗用酥炒令香盡為度然入用每一兩用酒二分為度

婆羅得味辛温無毒主冷氣塊温中補腰腎破疝瘕可

染髭髮令黑樹如柳子如草音麻生西國附今

海藥云謹按徐氏云此西海波斯國似中華柳樹也方家多用

甘露藤味甘温無毒主風血氣諸病久服調中温補令

人肥健好顏色止消渴潤五藏除腹內諸冷生嶺南藤

蔓如筋一名肥藤人服之得肥也已上二種新補品陳藏器曰準子

犬空味辛苦平有小毒主三蟲殺蟻蝨生山谷中取根

皮作末油和塗蟻蝨皆死唐本注云根皮赤葉似楮小圓厚作小樹抽條高六七尺

出襄州山谷所在亦有秦隗人名為獨空唐本先附

椿莢主大便下血今近道處處有之夏中生莢樗之有

花者無莢有莢者無花常生臭樗上未見椿上有莢者

然世俗不辯椿樗之異故俗中名此為椿莢其實樗

耳新定

衍義文具椿木條下

水楊葉



水楊葉嫩枝味苦平無毒主久痢赤白痔和水絞取汁

服一升日二大效今注水楊葉圓闊而赤枝條短硬多生水澤傍与楊柳相似既生水岸故

名水楊也唐本先附

圖經文具白楊條下

楊櫨木味苦寒有毒主疽癩惡洽水煮葉汁洗瘡立差

生籬垣間一名空疏所在皆有唐本

櫨子味辛辣如椒主遊蠱飛尸著喉口者刺破以子楷

之令血出當下涎沫煮汁服之去暴冷腹痛食不消殺

腥物木高大莖有刺新補見陳藏器

圖經文具蜀椒條下

楠材微温主霍亂吐下不止陶隱居云削作梯煮服之筋無他藥用此巨禹錫等

謹按日華子云味辛微熱毒治轉筋

衍義曰楠材今江南等略造船塢皆此木也緣木性堅而善居水久則多中空為白蟻所穴

柘木味甘温無毒主補虛損取白皮及東行根白皮者

汁釀酒主風虛其龍勞損虛羸瘦腰腎冷夢與人交接

洩精者取汁服之無刺者良木主婦人崩中血結及主

瘡疾蕪堪染黃新補見陳藏器日華子

行義曰柘木裏有紋亦可施為書葉刺蚕曰柘蚕葉

韋有驗餘如經然不及桑葉陳行結及皮煮汁釀酒治風虛耳

柞木皮味岩平無毒治黃疸病皮燒末服方寸匕生南

方葉細今之作梳者是新補見陳藏器日華子

黃蘆味苦寒無毒除煩熱解酒疽目黃煮服之亦洗湯

又漆瘡及赤眼堪染黃生洛山谷葉圓木黃川界甚

有之新補見陳藏器日華子

楊氏產乳治漆瘡煎黃蘆木汁洗之最良

櫻櫚



櫻櫚子平無毒澁腸止瀉利腸風崩中帶下及養血

皮平無毒止鼻洪吐血破致治崩中帶下腸風赤血痢

入藥燒灰用不可絕過新補見陳藏器日華子

圖經曰櫻櫚亦曰梅櫚出嶺南及西川江南亦有之木

高一二丈傍無枝味葉大而圓政生枝端有次

綿州羌花



絳州羌花



滁洲羌花



相重被於四傍每皮一匝一節二句一採轉復生上
六七月生黃白花八九月結實作房如魚子黑色九月
脆一作羣之山其木多撥且心石
行義曰及吐血乃佐之他故亦每歲剛取撥皮不尔凍死
花如魚子
熟淹為果

木槿平無毒止腸風瀉血主痢後熱渴作飲服之令
人得睡入藥炒用取汁度絲使得易絡

花涼無毒治腸風瀉血并赤白痢炒用作湯代茶喫治
風新補見陳藏器

行義曰木槿如小葵花淡紅色五葉成一花朝開暮斂花與枝兩用湖南人家常多種植為離障餘如

芫花味辛苦温微温有小毒主效逆上氣喉鳴喘因腫
 短氣蟲毒鬼瘡疔瘰癧腫殺蟲魚消胸中痰水喜噉
 水腫五水在五藏皮膚及腰痛下寒毒肉毒久服令人
 虛一名去水一名毒魚一名杜芫其根名蜀桑根療疥
 瘡可用毒魚生淮源川谷三月日採花陰乾使反其草
 向隱居云近道處七有用之微熬不可近眼臣禹錫等
 謹按蜀本圖經云苗高二三尺葉似白煎及物葉根皮
 黃生花落不堪用也藥性論云芫花使有大毒能治心
 腹脹滿去水氣利五藏寒痰深唾如膠者上通利血脈
 治惡瘡風痺濕一切毒風四肢卒急不能行步能瀉水
 腫脹痛日華子云療敷瘡癰腫疥在有小樹子在峻崗傍
 三月中盛
 花淺紫色
 圖經曰長二尺根入土深三五寸白色似榆根春生苗

葉小而尖似楊柳枝葉二月開紫花頗似紫荊而作穗
 又似藤花而細三月三日採其花須未成葉帶細
 小未生葉時收之葉生花落即不堪用矣吳普本草云
 芫花一名敗華一名兒草一名黃大戟二月生花加厚
 則黑花有紫赤白者三月天落尺葉乃生是也而今
 州山者花黃謂之黃芫花漢太倉公淳于意治臨淄女
 子薄吾燒音饒瘕瘕瘕為病腹大上膺黃蘗循之瘕
 然意欲以芫花一振即出燒可敷升病遂愈張仲景治
 太腸中風吐下嘔逆者可攻十棗湯主之芫花熱其逐
 大戟二物等分各篩末取大棗十枚水一升半煮取
 八合去滓內諸藥強人一歲錢羸人半七溫服之不
 明且更加半七下後糜粥自養病懸飲者亦主之胡治
 治水腫及支飲辟飲加大黃甘草并煎成下之各一兩棗
 十枚同煮如法一方又加大黃甘草并煎成下之各一兩
 方疑雪湯療天行毒病七八日熱積聚胃中煩亂欲死
 起人死榆方取芫花一斤以水三升煮取一升半漬故
 布薄背上一再薄熱則除當濕四肢護冷逆也吳
 普又云芫花根一名赤芫根神農帝雷公若有毒生即
 錄驗療暴中冷傷寒鼻塞喘嗽喉中壅塞失音者取

荒花一虎口切暴乾令病人以為自縊就裏春荒花根
令飛揚入其七孔中當眼淚出口鼻皆羅刺畢七耳勿
住令荒根盡則
止病必松此差

經驗方

治痔瘻有頭風用荒花入土根不限多少以
淨水洗却入木臼搗用少許水絞取汁於銀

銅器內慢火煎成膏將絲線於膏內燙過繫痔繫時微
痛候心躁落時以紙燃子入膏藥於竅內永除根本未
落不得
使水

三国志

魏初平中有青牛先生常服荒花年如
五六十年人或視識之謂其已百餘歲矣

一十六種陳藏器餘

○ 楸木皮味苦澁平無毒燒作灰主破血止血初生子
實白色作房如魚子有小毒破血但戟人喉未可輕服
皮作繩入土千歲不爛昔有人開塚得之索已生根此

木類嶺南有虎散桃柳冬葉蒲葵椰子檳榔多羅等皆
相似各有所用楸樹一名椶櫚即今川中椶櫚

海藥云謹按徐表南州記云生嶺南山谷平溫土全
瘡疥癬生肌止血並宜燒灰使用其光黃白

色有大毒不
堪服食也

○ 楸木皮味苦小寒無毒主吐逆殺三蟲及皮膚蟲前膏

粘傳惡瘡疔癰腫疔野鷄病除膿血生肌膚長肋骨

葉痔傳瘡腫亦煮湯洗膿血冬取乾葉湯採用之范江

方諸腫癰潰及內有刺不出者取楸葉十重貼之生山

谷間亦植園林以為材用與梓樹本同末異若栢葉之

有松身蘇敬以二木為一誤也其分析在解紛條中矣

圖經文具紫白

海藥云 微温主消食澁腸下氣及

聖惠方 治頭極痒不痛出瘡用揪葉

人方 治痰瘡多時不差痒痛出黃水用揪

外臺秘要 得暫三易止痛消腫食膿血良无北勝於衆

羊冬以先收乾者臨時湯沃用之 又主患癩破下

此法大良无北勝於衆法主癩瘡潰後及東瘡有刺不

出甚良冬无北勝於衆法主癩瘡潰後及東瘡有刺不

人方 療口吻瘡揪葉皮

千金翼 治小兒頭髮不生取

肘後方 治瘰癧子孔中大効

子母秘錄 治小兒頭上瘡髮不生揪葉

沒離梨味辛平無毒主上氣下食生西南諸國以此梨

勒上有毛少許也

海藥 微温主消食澁腸下氣及

柯樹皮味辛平有小毒主大腹水病取白皮作煎令可

丸如梧桐子大平旦三丸須臾又一丸一名木奴南人

用作大船者也

海藥云 謹按廣志云生廣南山谷臨志云是木奴樹

為度每朝空心飲下三九浮氣水腫

並從小便出故波斯家用為船也



敗扇主蚊子新造屋柱下四隅埋之蚊永不入燒為主
和粉七身上主汗弥敗者佳

○拾根法王 一作松味辛平小毒主水瘰取根白皮煮汁

服之一盞當下水如病已困取根搗碎坐其取氣水自

下又能爛人牙齒齒有蟲者取片子許大內孔中當

爛落生以南山谷高丈許直上无枝莖上有刺山人折

取頭茹食之亦治冷氣一名吻頭

○檿木灰娘 味甘温小毒主卒心腹癥瘕堅痛疔癰癩

為白灰淋取汁以釀酒七熟漸七從半合温服增至一

盞即愈此灰入染家用生江南深山大樹七有數種

取葉厚大白花者入藥自餘用染灰一名禪音禪灰本經

汗於病者床下灰之勿令病人知也

○柳桐皮 味甘温無毒主爛絲葉搗封蛇蟲蜘蛛咬

皮為末服之亦主蠶咬毒入肉者鷄犬食欲死煮汁灌

之絲爛即差樹似青桐葉有極生山谷人取皮以温絲

也

○竹肉 味鹹温有大毒主殺三蟲毒邪氣破老血灰汁煮

三度煉訖然後休常菜茹食之煉不熟者戟人喉出血

手爪尺脫生苦竹枝上如鷄子似肉齧應別有功人未

識之一名竹實也

挑竹筴味苦有小毒主六畜瘡中蛆搗碎內之蛆盡出
亦如皂李葉能殺蛆蟲南人謂之黃筴灰汁煮可食不
爾戟人喉其竹叢生醜類非一張鼎食療云慈竹夏月
逢雨滴汁著地生蓴似鹿角色白取洗之和薑醬食之
主一切赤白痢極驗鬘子桐子有大毒壓爲油毒鼠主
死摩疥癬蟲瘡毒腫一名虎子桐似梧桐生山中
馬場木根皮有小毒主惡瘡疥癬有蟲者爲末和油塗
之出江南山谷樹如櫪也
木細辛味苦温有毒主腹內結積癥瘕大便不利推陳
去惡破冷氣未可輕服令人利下至困生終南山冬月

不獨苗如大戟根似細辛

百家筋主狂狗咬乞取煎汁飲之又燒筋頭爲灰傳吻

上驚口瘡

樽木皮葉煮洗蛇咬亦可作屑傳之樽木木也出江南
也

刀鞘無毒主鬼打卒得取二三寸燒末服水下之此是
長刀鞘也腰刀弥佳

天有大毒主風痺偏枯筋骨挛縮癱廢皮膚不仁

疼冷等取枝葉擣碎大甌中蒸令熱鋪著床上展臥其
中冷更易骨節間風盡出當得大汗補藥及羹粥食之

慎風冷勞復生江南深山葉長厚冬月不凋山人摠識也

○丹桂木皮主癩湯風取一握去上黑打碎煎如糖塗風上桂木似杉木生江南深山

○結殺味香主頭風去白屑生髮入膏藥用之生西國樹花胡人將香油傅頭也○杓打人身上結筋二下筋散矣車家鷄棲木無毒主失音不語雜方云作灰服一升立効也○檀秦皮注蘇云檀似秦皮按檀樹取其皮和榆皮食之可斷殺爾雅云檀苦塗其葉堪爲飲樹體細堪作斧柯至夏有不生者忽然葉開當有大水農人候之以

則水旱號爲水檀又有一種葉如檀高五六尺生高原亦四月開色正紫亦名檀根如葛極主瘡疥殺蟲有小毒也爾雅無檀苦茶唯言橫若茶郭注樹小似柘子冬生葉可煮作羹今早採者爲茶晚採者爲茗一名救蜀人呼名之苦茶前面已有茗苦茶又引爾雅疑此誤矣○右荆欒荆注蘇云用當欒荆非也按石荆似荆而小生水傍作灰汁沐頭生髮齊廣濟方云一名水荆主長髮是也

○木菴蘆蘆注陶云蒲蘆一名鹿驪生山南人用蒲北人用根功在本經木菴蘆有毒非蒲蘆樹生如茱萸樹

特1
393

高二尺有毒殺蟲山人以瘡疥用之

瓜蘆苦采注陶云又有瓜蘆木似茗取葉煎飲通夜不

寐按此木一名臯蘆而葉大似茗味若澁南人煮爲飲

其渴明日除煩不睡消痰和水當茶用之廣州記曰新

平縣出臯蘆葉大而澁南越志云龍川縣有臯蘆葉似

茗土人謂之過羅

諸木有毒合口椒有毒椒白色有毒木耳惡蛇蟲從下

過有毒生楓木上者令人笑不止採歸色變者有毒夜

中視光有毒欲爛不生蟲者有毒並生擣冬瓜蔓主之

重脩政和經史證類備用本草卷之十四



国立国会図書館 タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』 請求記号 特1-393

ガラス使用