

丁氏醫學叢書

中西醫方會通

上海  
梅白格路安昌里第一百零一號  
即在愛文義路新聞巡捕房後面  
醫學書局發行



丁氏醫學叢書

中西醫方會通

上海  
梅白格路安昌里第一百零一號  
即在愛文義路新開巡捕房後面  
醫學書局發行

# 中西醫方會通序

蘇子瞻曰藥雖進於醫手方多傳自古人故漢書藝文志列方技爲四種凡經方十一家後漢張仲景輿興抉擇經方撰金匱玉函經集周秦以前之大成加減合度君佐不素後世推爲醫方之鼻祖豈平尙已自是以降名醫騁興良方秘法層出不窮如晉葛洪之肘後備急方唐孫思邈之千金要方宋王荅之博濟方許叔微之本事方沈括之蘇沈良方董汲之族舍備要方王昉之全生指迷方陳師文等之和劑局方夏德之衛生十全方及奇疾方陳自明之婦人良方陳言之三因方郭稽中之新增產育寶慶方李迅之集驗背疝方嚴用和之濟生方金劉完素之宜明論方及傷寒直格方元沙圖穆蘇之瑞竹堂經驗方危亦林之世醫得效方明周定王權之普濟方張介賓之新方八陣吳岷之古方攸國朝鄂爾泰等之刪補名醫方論王子接之古方選注吳儀洛之成方切用等或自成一家或祖述前哲非不桀然雄觀借多經驗未稿選擇未精泥沙雜糅甄別爲難後學不敢輕試往往束閣而爲蠹簡良可慨焉惟欲本此羅列之成方面理董之以爲科學則非精研乎泰西之藥物學者必不能說明方劑是猶匠人染

人之業。雖我國所素有而欲說明其義。則非待今日之重學化學家不可也。而過渡時代。治國醫學者。按其經驗之成績。以倣西醫。治西醫學者。按其學理之新穎。以斥國醫。若有不可並立之勢。豈知中西醫學各有短長。吾人於此正宜擇善而從。不善而改。何必強分國界。限以爲必不可通也哉。且彼之學說。雖以科學法例爲利器。而基礎終出於經驗。然則我國醫學。經數千年之遺傳。數千萬人之實驗。中藥稿有良材。制方之多。精義誠不得以理論之。或有悠謬。而并沒其經驗之良方。明矣。吾友丁君仲祐。達於中西醫學。治病多奇效。又深信西醫學。說之可據。數年間。譯撰新醫書三十餘種。更深信外國醫方。可以參用。而補我之缺也。於是講述中西醫方會通全書。分十章。一呼。吸器病。二。消化器病。三。神經系病。四。傳染病。五。全身病。六。皮膚病。七。泌尿器及生殖器病。八。目病及耳病。九。外科各病。十。婦科各病。中西醫方各居其半。分別部居。拔其精粹。一片保存國粹。保守利權之深心。於斯益見。且使學者深明西人所用之藥。不至妄用。並知外國所傳之方。亦廣流傳。厥後彼此會診。不致互相非難。動輒以消新舊相嫉之意。見此誠過渡時代必不可緩之著作也。於其將出版也。略述管見以敘之。

宣統二年二月越醫何炳元廉臣氏序

# 中西醫方會通目次

## 第一章 呼吸器病

衄血	一
鼻加答兒	三
膿濁	五
氣管支加答兒	六
喉頭加答兒	七
咳嗽	八
失音	十四

## 第二章 消化器病

鵝口瘡	二十六
鵝齒	二十七

喘息	十五
肺勞	十七
咯血	二十一
肋膜炎	二十三
肺炎	二十四
肺氣腫	二十五

口糜	二十九
扁桃腺炎	三十一

胃弱	三十二
胃加答兒	三十六
食傷	三十六
胃潰瘍	三十八
瘰	三十九
溜飲	四十一
胃癌	四十三
霍亂	四十四

下痢	四十七
痺疴	五十
便秘	五十四
蝨蟲	五十八
條蟲	六十
疝痛	六十一
痔	六十五

### 第二章 神經系病

卒中	六十八
腦充血	七十五
腦貧血	七十五
癩痢	七十七

臥私的里	七十八
依卜昆培兒	八十
頭痛	八十二
附傷頭痛	八十二

#### 第四章 傳染病

神經痛	八十五	神經衰弱症	九十二
眩暈	八十六	不眠症	九十三
船暈	八十七	神經性心悸	九十五
夜驚	八十八	書癡	九十六
驚風	八十九		
赤痢	九十六	麻疹	一百十一
流行性感胃	一百	瘧疾	一百十二
百日咳	一百二	癩病	一百十五
馬脾風	一百四	丹毒	一百十七
破傷風	一百六	軟下疳	一百十八
流行性耳下腺炎	一百七	附便毒橫痃	一百十八
脚氣	一百八	淋病	一百二十一

梅毒……………一百二十六

胎毒……………一百三十三

### 第五章 全身病

衰弱……………一百三十五

蜜尿病……………一百四十六

佝僂病……………一百三十九

癆瘵病……………一百四十七

癆瘵質新……………一百四十

黃膽……………一百五十

痛風……………一百四十一

貧血症……………一百五十三

肥肝症……………一百四十四

吃逆……………一百五十四

脹滿……………一百四十五

### 第六章 皮膚病

贅疣……………一百五十五

寄生性匍行疹……………一百五十九

天泡瘡……………一百五十六

白禿風……………一百五十九

贅毛症……………一百五十八

手足汗……………一百六十一

酒樽鼻	一百六十二
毛虱	一百六十三
皸裂	一百六十四
火傷	一百六十五
癩風	一百六十七
面皰	一百七十
腋臭	一百七十二
雀斑	一百七十三
疥癩	一百七十四
魚疣	一百七十五
凍瘡	一百七十五

第七章 泌尿生殖器病

血尿	一百九十一
----	-------

頭虱	一百七十七
禿髮症	一百七十八
衣虱	一百七十九
汗疹	一百八十
乾癬	一百八十一
疥癬	一百八十二
禿瘡	一百八十五
頑癬	一百八十八
狼瘡	一百八十九
紅斑性狼瘡	一百八十九

陰瘰	一百九十一
----	-------

遺精·····一百九十三

遺尿·····一百九十五

章八章 目病耳病

星翳·····一百九十八

雀目·····一百九十九

局所性睫毛脫炎·····二百一

眼瞼緣炎·····二百二

乾性結膜炎·····二百四

第九第 外科各病

咬傷·····二百九

創傷·····二百十二

挫傷·····二百十二

膀胱加答兒·····一百九十七

單性結膜炎·····二百四

顆粒結膜炎·····二百五

耳漏·····二百六

耳瘻·····二百八

癰疽·····二百十六

打撲·····二百十七

癰疽·····二百十九

癰瘍……………二百二十一

第十章 婦科各病

墮加答兒……………二百二十二

惡阻……………二百二十六

月經違常……………二百二十七

乳閉……………二百三十二

乳多……………二百三十四

乳腺炎……………二百三十四

中西醫方會通目次終

# 中西醫方會通

丁氏醫學叢書

南洋大臣考取最優士無錫丁福保編纂

## 第一章 呼吸器病

衄血 Epistaxis 鼻孔出血

病解

衄血者。當身體毫無疾病之時。偶然而起。或須於頭痛頭重耳鳴等之前。微而發者亦有之。

其他於婦人月經閉止。癩疹。痘疥等之熱性傳染病經過中而發生。當月經閉止之時。或頭部充血之際而出血。決無他之原因。反得治頭痛。為月經之代償作用也。然

遇血友病（些少之出血而久不克止。遂陷於危險之病。）貧血者。重病之恢復期。老人等之衄血。以速行治療法為佳。

攝生法

遇有衄血之時。則靜臥而高其頭部。前額及額顳部以水或冰敷冷却之。以紙或綿塞其鼻孔。若冷却陰部。克奏奇效。頭部充血之少壯者。以藥飭便通。禁

飲食過飲。於山麓田野散步為宜。

處方

外國方

● 過格魯兒錠液

水

右藥水蘸於柔軟之紙布。或棉球。填塞於鼻內。

一錢

八十錢

●明礬

右溶於水二合中。洗滌鼻孔。

一錢

●芒硝

右爲一包。每一時至二時。溶於水中而服之。

五分至一錢五分

而服之。

桔 萎

一錢

阿仙露

五分

右用水少許。燒和以綿或紙爲桿狀。

粘於其尖端。而塞入鼻孔。

的列並底油

右蘸於紙片或綿球。塞入鼻內。

中國方

●苦梅丸(上池秘錄)治吐血無時

時

茜草根

艾葉 各一兩

烏梅肉 五錢

右煉蜜爲丸。

●髮灰散(上池秘錄)治鼻衄不止

止

髮灰

亂髮

右爲末。吹鼻中立愈。

●陶氏生地芩連湯(醫癩藥方)

規矩)治鼻或衄流一切去血

失脾

犀角

生地黃

黃芩

連翹

梔子

芎藭

芍藥

柴胡

桔梗

甘草

●生地黃湯(醫癩藥方規矩)治

衄血

生地黃

茅根

柏葉 各三錢 川芎

山梔子 黃芩

桔梗 蒲黃

阿膠 牡丹皮

白芍藥 各一錢 甘草 三分

●桔萎入簡少許。浸於綿花。或揉軟之

紙。塞入鼻中(救急撮要)

●五倍子末。吹入鼻孔有效。(衛生易簡方)

●山梔子或荆芥煎服。(廣惠濟急方)

●衄血。搗茗荷之根。取其汁溶於醋中。

吞服(農家至寶配)

鼻加答兒 Coryza 鼻感冒

病解

此症專指其中之急性者而言。

於經驗上極有效。鼻湯宜拭除之。

大抵因感觸寒氣，或用沃度（穢）劑等而發。

鼻中乾燥，催起閉塞之感，覺微痛。屢起噴嚏。

有時於最初時，發惡寒，微熱，血熱，鼻汁先呈水狀而透明。

其後變為稠稠濃厚之液。經五六日至十餘日，則諸症消退。然苟滋養未克完全，則轉為慢性症而起。屢疾患者不少。

（加答兒，極輕之炎症，有核體流出之義。）

攝生法 鼻邪為輕微之症候。世人大抵輕視之。極為不可。俗語不云乎。感冒為萬病之基。故病初即發於彼中。用葛湯或發汗之藥。令其十分發汗。或令仰臥。於前額以冰或水。冷却之亦可。二三日停止飲

料。

處方

外國方

●加密列花

接骨木花

●接骨木花

硝砂

搖齒。分作兩份。每日取一份。分四次

●薄荷腦

鹽粉

右調和。取許少吸入。

五分

一錢

●格魯兒糖丁糖

右每一二時。用十滴至二十滴。

●民埋列里精

甘硝石精

右調和。一日分三次服。

●不換金正氣散（醫遊手引草）

治四季感冒。

荏朮 厚朴

陳皮 半夏

蜜香 甘草 各等分

右煎服。

●和解湯（醫遊手引草）治虛人感冒初發。

五分

一錢

人參 一錢 桂枝 一錢

芍藥 七分 半夏 五分

茯苓 七分 乾姜 五分

白朮 七分

右姜棗水煎。

●香蘇散(萬病方組)治頭痛發熱。秦月宜用之。

香附子 三錢 紫蘇 二錢

陳皮 三錢 甘草 五分

右四味。入生姜葱白煎。

●升陽發表湯(萬病方組)治冬月正傷寒。頭形發熱。身痛。

麻黃 杏仁

桂枝 甘草

川芎 白芷

羌活 防風

升麻

右九味。入姜棗煎。

●葛根葱白湯(醫藥方規矩)治頭痛發熱。及月宜用之。

川芎 葛根

芍藥 知母 各一錢半

葱 四莖 生姜 二片

●人參敗毒散(醫藥方規矩)治時疫感冒。初病寒發熱頭痛。

人參 茯苓

羌活 獨活

前胡 柴胡

芍藥 枳殼

桔梗 甘草

生薑 各等分

●芍藥散(張氏醫通要)感冒

惡寒發熱。骨節疼痛。無汗或嘔。通。人迎脈緊盛。

紫蘇 柴胡 各二錢

川芎 葛根

枳殼 桔梗

陳皮 半夏

茯苓 各一錢 甘草 七分

生姜 三片 大棗 一枚

右水煎熱服。

●神效沃雪湯(張氏醫通要)傷寒感冒。四時初發。總司。

蒼朮 乾姜 炮

甘草 各六兩 厚朴 姜

芍藥 葛根 各四兩

右水煎。

●神授太乙散(醫藥方規矩)

治四時感冒不正之氣。陰陽兩  
敗。

紫蘇 梨皮  
香附子 川芎  
白芷 葛根  
羌活 升麻  
芍藥 枳殼  
甘草 右姜葱水煎。

●羌活蒼朮湯(醫藥方規短)

治感冒風寒。用於寒冷時月及  
雖在溫暖時。

羌活 蒼朮

膿漏 Blennorrhoea 慢性鼻加答兒 臭鼻

病解

膿漏、爲慢性之鼻加答兒。大都由急性鼻加答兒轉成。分泌之膿汁、其臭一氣劇烈者。因結核病梅毒而生。又有因鼻

柴胡 黃芩

橘皮 半夏

枳殼 甘草

川芎 各一錢 姜

右水煎。

●振田風藥(妙藥妙術集)

當歸 香附子

羌活 茯苓

陳皮 乾姜

蒼朮 赤芍

生地黃 各二錢 黃芩 一錢半

肉桂 一錢 桂心 二錢

川芎 二錢 茴香 二錢

甘草 五錢

右十五味。盛入布囊煎服。

●振田藥(妙藥秘濟)

大丁香 木香

甘草 大黃 各五分

枇杷葉 乾姜

香附子 川芎

迎翹 續砂

藜朮 柴胡

生薑 各一錢 桂枝

山梔子 各二錢

右爲煎藥。

孔久受刺激。或從事於煤煙塵埃等之事業而發者。始起時分泌稀薄之粘液甚多。其後漸出濃厚而呈黃色之膿汁。凡臭氣劇烈之患者。不能識別各物之香臭。且因鼻腔腫大。藉口腔發呼吸作用。起頭痛。偏頭痛。或前額壓重。其梅毒性。或結核性者。施全身之療法。非結核性者。用下列之方。

攝生法 罹急性鼻加答兒。即施治療。便不至轉為慢性。臭氣劇烈之工場。或飛塵滿目之處。不可居也。

氣管支加答兒 *Bronchitis catarrhalis*

病解

此症多因感冒而發。先起乾燥。略有粘膠無色之咯痰。胸部之中央微有疼痛。發熱之有無不定。如此種症狀。經二

週至三週。則痰呈帶黃色或綠色。混有泡沫。經一週至二週。諸症若漸退。便可冀其全治。初病勢甚劇。則犯肺癆。害氣管之毛細管。

老者及幼者。因咳嗽劇烈而起衰弱。或呼吸困難。卒以致斃。  
攝生法 尋常之氣管支加答兒。輕微

外國方

● 百倍石炭酸糜里斯林

右塗布鼻孔。

● 薄荷油

右於鼻口塗布少許。而吸入之。

● 百露坡爾撒散

薄荷油

十分之一滴

的列芬底油

一錢

右塗布鼻孔。

硼酸

一錢

右溶於水二合中。洗滌鼻孔。

● 硼酸末

薄荷油

十分之一滴

右撒布於棉球。塞入鼻孔內。

● 炭酸安母尼亞

樟腦

六分

刺納林

十八錢

右為軟膏。塗布鼻孔。

● 明礬

一錢

右溶於水一合五勺中。洗滌鼻孔。

之際。即保養於暖室內。飲葛湯生薑湯等。使之發汗而溫授其身體。

處方

外國方

●接骨木花

若提樹花

過泥子

右爲振出藥煎之。分作三份。每日取一份。分數次服。

●蜀葵根

三錢

茴香

右爲煎藥。一日分三次服。

五分

●加密列花

硝砂

接骨木花

右爲振出藥煎之。分作二份。每日取一份。分三次服。

●遠志根

茴香

右爲振出藥煎之。分作三份。每日取

一份。分三次服。

●硝砂加過泥子精

吐根舍利別

右以水混溶。分作兩份。每日取一份。分三次服。

●撒爾矢爾續曹達

右混和爲散藥。分作六包。一日三次。空中國方見咳嗽條下。

### 喉頭加答兒 *Laryngitis catarrhalis*

病解

此症爲喉頭內面粘膜之嫩弱。發病後經一週間。大抵就也。多由感冒而發。起始時喉頭覺痒。而起。治然亦有因虛寒不完。全或有性而轉爲咳嗽。因之咯出含白色泡末之痰。及至既慢性症者。小兒之喉頭加答兒。幾爲馬牌聲聲帶則聲音啞而不響。咳嗽漸粗。應戒。風者不少。宜注意。藥物療法。用下列之處

方

攝生法 不可發演說。或音曲等之高聲。嚴禁飲酒。喉邊纏以毛絨或毛絲。烈風或寒冽之候。不宜出外。

處方

外國方

明礬

薄荷腦

十錢  
五錢

右爲錠二十個。每日取一個。溶解於一合。或一合半之水中。分數次合漱。

③單寧酸

五錢

右研爲散。分作五包。每日取一包。溶解於二合。或三合之水中。致致合漱。

中國方

●參蘇飲(萬病方祖)治四時感

冒。發熱頭痛。咳嗽聲重而有痰。

陳皮

紫蘇

茯苓各一錢半  
半夏

咳嗽 Cough

桔梗

葛根

甘草

木香

各五分

右十一味。入姜煎服。

●消風白解散(醫癘藥方規矩)

治感冒咳嗽發熱。

荆芥

陳皮

白芷

生薑

麻黃  
蒼朮

甘草

等分

烏梅

右水煎溫服。

●金沸草散(張氏醫通靈要)治

秋時感冒咳嗽。

旋覆花

前胡

半夏

芍藥

右生薑三片。大棗一枚。水煎。

●小青龙湯(張氏醫通靈要)治

冬時感冒咳嗽。

桂枝

麻黃

乾姜

五味子

芍藥 三錢  
芎藭 三錢  
杏仁 二錢  
細辛

半夏 三錢  
茯苓 三錢  
甘草 二錢

等分

各五分

右七味。水煎溫服。

病解

氣道之反對運動。而深吸息之後。一旦以急劇之連聲性呼吸。閉其已閉之聲門。此時所發之一種聲音。曰咳嗽。強健之人。大抵由吸引劇烈之氣。或胃寒氣。或有塵埃烟砂之刺激氣管或咽喉而發。耳道。舌根。若受刺激。亦發咳嗽。病者之發生。大都係鼻。氣管。及加寒兒。黃狀的里。格魯布。肺帶。肺氣腫。百日咳。喉頭炎。氣道潰瘍。喉頭之小腫瘍等。其他因呼吸器疾患之症。低性發作而來。咳嗽為身體帶脈。環流之際。既發之作用。顏面或頸部之筋脈。怒張。(有青筋顯出)顏面是青紅色。此一例也。又於發作時。因氣壓上肺而發。肺氣腫者亦多。通常帶咳嗽而咯出者。為痰塊。若無痰塊之時。而發咳嗽。則自無痰塊咯出。此謂之乾咳。起於耳道之刺激。喉

頭炎。氣管支炎。百日咳等。健康之人。有塵埃烟砂等之衝入氣道內。始發咳嗽。呼吸器有疾患之人。因吸入寒冷。或溫暖之空氣。或體合塵埃之空氣。使發咳嗽。然亦有因病性之不同。雖具發咳嗽之原因。亦不發咳嗽者。即人事不省。喉頭及氣管支炎。喉管氣管支炎。或呼吸器之力量弱者。例如筋肉不其發達之小兒。因熱病而呼吸筋衰弱之人。均不易發咳嗽。此物之性質。雖有效。大都由粘液。膿球及上皮而成。或有因病症而含血球。彈力纖維。結核菌者。

攝生法 咳嗽中之輕症。若以等間日之往往轉成重症。如肺疾患等。諺曰。傷風不礙。或發。故當注意。以速行療治為佳。食物擇少鹽味而富於滋養者食之。飲料

中外之酒類宜禁。飲橙汁。枸橼汁。葛湯等。寒例之日。不宜出外。非寒季而當應烟。眠天之時。亦宜登居室內。頸部纏毛絨或綿布。不令其冷却。不可發唱歌。演說等之滑稽。咳地宜吐出。不可嚥下。

方 處

外國方

●龍腦 二分

●芫 二分

●杏仁末 五分

●乾姜末 二分

●樺木根末 二錢

●青豆粉 三錢

右以水飴及蜂蜜調成煉藥。為二日量。一服三次。

●臭菜加里 一錢

杏仁末

二分

薄荷油糖

二分

達刺鼠尾護膜

一分

右爲錠劑。日服三次。

●薄荷腦

五分

荷香油

五分

白糖

十錢

右爲錠劑。作三十個。每次服二個。日三次。

●半夏

五分

攝退瓦根末

一錢

龍腦

一分

乾姜末

五分

右研爲散。分作六包。日服三包。

●半夏

一錢

乾姜末

一錢

乾姜末

五分

亞刺比亞護膜末

一錢

右研爲散。分作八包。日服三包。

●吐根

五分

龍腦

五分

半夏末

二錢

右爲丸。分作百八十粒。日服三粒。至十五粒。

●安息香酸

一分

桔梗末

五分

龍腦

五錢

右研爲散。分作三包。日分三次服。

中國方

●八味生薑丹治小兒咳嗽。

杏仁

生薑 各七錢

乾姜

四錢 桂枝 二錢

款冬

紫菀 各三錢

右同研細末。爲丸一百粒。

●瀉逆湯治咳嗽逆倚。不能臥。乘沿不驗者。

乾姜

蘇子 各七分

半夏

杏仁

桂枝

各五分 山椒 二分

右六味。作一劑。以水一合六勺煎。煮煎至八勺。去滓。加入白砂糖五錢。煉如飴。每日服三次。

●青黛散(上池秘錄)治小兒咳嗽。不已者。

青黛 各等分

石二味盛絹袋。白湯數服下。

●姜糖膏(上池秘錄)治痰飲及久咳。

冰砂糖 三十錢 薑 姜 五兩

各等分

各等分

各等分

各等分

各等分

橙皮 十錢

右爲末。煉蜜調和。

●九仙散（上海秘錄）治一切久嗽。

人參 款冬花

桑白皮 桔梗

阿膠 五味子 各一錢

烏梅 一分 貝母 五分

粟殼 三錢

右生姜水煎。溫服。

●石夏圓（上海秘錄）治痰嗽。

半夏 一兩泡

滑石 一兩火裡去火毒

右生姜煎爲丸。

●人參款花湯（醫證藥方規矩）

治久嗽喘急。或虛勞冷嗽。連年

不効者。

款冬 五味子

紫菀 桑白皮

人參 各一兩 生姜

大棗

右爲煎藥。

●杏仁五味子湯（醫證藥方規矩）

諸嗽通用。

杏仁 茯苓 各一錢

橘皮 七分 五味子

桔梗 甘草 各五分

右水煎溫服。

●麻黃杏仁湯（醫證藥方規矩）

治秋冬感寒。連夜哮喘不止。

麻黃 羌活 各八分

蒼朮 柴胡 各五分

防風 當歸 各四分

黃芩 三分 草豆蔻 六分

黃芪 一錢半 五味子 五粒

甘草 各三分生四分

右煎服。

●酒肺除喘湯（醫證藥方規矩）

治連年咳嗽。

人參 甘草 生

杏仁 薄荷 各三分

五味子 麻黃

紫菀 陳皮

石薺 款冬

桔梗 半夏

枳殼 烏梅

桑白皮 醫藥發抄各五分

生姜 細茶

右爲煎藥。

●人參治肺湯(醫藥方規矩)

治咳嗽久時。咳唾血。

桔梗

桑白皮

地骨皮

知母

人參

烏梅

阿膠

桑白皮

杏仁

甘草

右入棗蜜爲煎藥。

●清氣化痰湯(醫藥方規矩)

治痰火通用之方。

陳皮

杏仁

枳殼

黃芩酒

瓜蒌

茯苓

天南星

半夏

生姜

右姜汁或蜜爲丸。

●清火寧嗽湯(醫藥方規矩)

治咳嗽吐痰。有熱痞悶。

枳殼

桔梗

前胡

貝母

黃芩

茯苓

麥門冬

桑白皮

甘草

生姜

右爲煎藥。

●利金湯(醫藥方規矩)治肺燥。瀉。不利而咳。

桔梗

甘草

貝母

橘皮

枳殼

茯苓

生姜

右爲煎藥。

●貝母湯(張氏醫通靈要)治諸咳久不差。

貝母 姜製

黃芩 生

乾姜 生

陳皮

五味子 一兩

桑白皮

半夏

柴胡

桂心 各半兩

木香

甘草 各一兩

右爲粗末。每服五錢。杏仁七個。生姜七片。水煎溫服。

●補肺湯(張氏醫通靈要)治肺胃虛寒。咳嗽。

五味子 一錢

乾姜

桂心 款冬

麥門冬 各三錢

桑白皮 姜汁和蜜多黃二錢

右水煎。溫分三服。

●二冬膏（張氏醫通靈要）治肺

胃燥熱。痰瀉欬嗽。

天門冬 去心 麥門冬去心等分

右二味熬膏。白蜜收。不時噴熱嚔之。

●專嗽化痰湯（醫錄方規矩）

治經年喘嗽不止。

半夏 茯苓

陳皮 甘草

紫蘇 葛根

桔梗 前胡

麻黃 杏仁

桑白皮 生姜

烏梅

●二陳皮（醫方大成）治脾胃濕

痰及痰。一切通用。

半夏 二錢半 陳皮 一錢

茯苓 一錢半 甘草 一錢

烏梅 半個 生姜 三片

右水煎溫服。

●清肺湯（醫方大成）治一切咳

嗽。上焦燥盛者。

桔梗 一錢 茯苓 一錢

陳皮 一錢 桑白皮 一錢

貝母 一錢 當歸 七分

麥門冬 七分 杏仁 七分

山梔子 七分 黃芩 一錢二分

甘草 三分 五味子 七粒

右十二味水煎溫服。

●治久咳喘（名方選）

射干 生款冬

蘇子 檳榔

杏仁 伏龍肝 各等分

右六味水煎頓服。

●治小兒久咳（名家方選）

半夏 茯苓

桔梗 貝母

馬兜鈴 各等分 黃芩 減半

甘草 少許

右七味水煎分服。

●治痰方

白刀豆 松脂

右二味為末。白湯送下。

失音 Aphonia 失聲 聲門麻痺

病解

失音，係不能完全發音之症。其原因，或有為一時性，或有為永久性者。此症之發徵者，曰嘔聲。大部犯此症，如答兒，格魯布流行性感冒等之喉頭，以從事於講談、演說、唱歌等之職業，往往易犯此病。即因喉頭疲勞而發之聲門收縮筋之麻痺，或歇斯伯里（Scherr）以發發生嘔嘔等是也。本症因所起之原因而施藥各異。無單獨之療法。不過舉從來實驗製劑所應用之方劑一二而已。蓋此種製劑，有時亦克奏效於歇私的里性失音者。間有當發嘔聲，不能為清音之談話者，亦為聲門筋之不全症也。

攝生法

雖咽喉之加答兒，或輕微之

處方

外國方

●阿仙藥末

亞利比亞誼誼

薄荷油

甘草末

甘草末

甘草末

●甘草末

龍腦

阿仙藥 五錢  
薄荷油 五滴  
右為適宜之錠劑。金銀箔為衣。  
中國方

●治失音（上范秘錄）

菊花 一分 麥粉 一分

白糖 一片 胡椒 一兩

乾姜 五分

右研細末。煉蜜為丸。

●治不出聲（世寶傳受錄）

大根 三段 皂角五分去子皮

右入水一盞。煎至一半服用。

●又方（藥方記）

半夏 一錢 調蛋白質服用。

喘息 Asthma bronchiale 喘息 喘症 痰喘 氣管枝喘息

病解 罹此症者。呼吸之呼息大抵不利。息數減少。而息數增加者不多見也。呼吸時。發笛聲狀之音響。先有全身不和。倦怠疲勞。心悸充滿之前兆。夜間猝然發作者。亦有之。起時。患者突然醒覺。胸內覺苦悶。或於半睡半起之間。驚有困夢。由是呼吸漸漸不和。皮膚蒼白。顏面呈青紫色。眼珠突出。喘勢頗著。不能言。因苦悶而或臥坐於床上。冷汗淋漓。如此經二三點鐘。得以稍發音聲。各症候消失。大覺喘快。因疲勞而熟睡。此後全復健康。有時其症候全不消失。反覆而互致週之久者。

攝生法 宜居於空氣清朗高燥之地。航海操舟等頗佳。凡身加答兒(感冒)氣管支加空兒。或精神激昂。變易常習。以香氣劇烈之花草置於室內。睡眠於暗室中。冒寒風塵烟外出等。皆宜禁之。又不可飲酒喫煙。食品擇富於滋養品而易消化者。

外國方  
 尿酸安母尼亞 一錢  
 水 十錢  
 右每次取三十滴至四十滴。和水服用。一日數次。  
 沃度加里 二分五釐  
 白糖 一錢  
 右為錠十個。每服四個。一日服二次。  
 ●臭素加里 一錢

白糖 一錢  
 右為錠二個。每服二三個。一日服三次。  
 中國方  
 ●青龍丹(名家方選)治哮喘痰喘。不得安臥。  
 薄荷 十錢 枳殼 五錢  
 川芎 三錢 皂莢 五分  
 甘草 四錢 細辛 四分  
 龍腦 五錢 麝香 五釐  
 右八味為末。蜜丸。白湯送下。  
 ●紫金丹(名家方選)治喘息。  
 磁石 一錢 豆豉 一錢  
 枯礬 各三錢

右三味爲末，糊丸，梧桐子大。朱砂爲衣。每服五粒。冷茶或冷水送下。以大便色黑爲證。

●信貝丸(上池秘錄)理喘急喘息。

茶 實生熟者佳 百合根

礬石 各等分

右三味搗碎，調爲丸。

●得肺百合湯(醫藥方規矩)

治喘促咳嗽，遺久不効者。

人參 百合

河子 覆盆子

天門冬 生地黃

紫苑 知母

馬兜鈴 木香 各一錢

陳皮 七分 甘草 三分

姜 梅

●參蘇溫肺湯(醫藥方規矩)

治肺寒喘息。

半夏 四錢 人參 四錢

肉桂 四錢 甘草 四錢

陳皮 四錢 木香 四錢

桑白皮 四錢 紫蘇 五錢

茯苓 五錢 白朮 六錢

五味子 四錢

右水煎。

●理喘息方(上池秘錄)

白朮 糖霜 各等分

右二味調合，生姜湯飲下。每服二錢。

一日二次。

●治喘息或痰喘哮喘

(名家方選)

桂枝 香附子

甘草 乾姜

蜀羊臍 香薷 各一錢

丁香 二分 葛粉 一分

梗米 寒裂

南橘葉 陰干各一錢

右十味爲末，白湯送下。

●治喘滿方(名家方選)

礬石 辰砂

枳實 各等分

右三味爲末，白湯送下。神効。

肺勞 Phthisis pulmonum 勞瘵 傳尸 肺結核

病解

肺勞由高糧爲結核菌之一種  
 滋養，滲透於肺臟之實質內而發者。其  
 爲一千八百八十一年德國醫學大家古  
 羅氏之創見。本症之經過，大抵爲慢性。其  
 初期，病狀甚微，在氣力剛強之人，延至命  
 在旦夕，始乞醫藥治療者，往往有之。人當  
 登高處或疾走之時，覺心悸、五逆、呼吸促  
 迫、中宵或清晨微發咳嗽、心身疲弱等。夜  
 間睡眠時，盜汗甚盛。食思減損，身體羸弱，  
 形容枯槁，胸部墜重。此爲肺勞之初期。意  
 狀漸漸增進，則呼吸愈促，迫咳亦劇。時  
 時吐出黃色粘痰之痰塊，含有血斑，衰弱  
 與疲勞，至此益著。漸漸陷於虛脫，或痰塊  
 栓塞氣道，或咯血增劇而昏倒，遂致於死。

者若之，然精神與身體大異，雖臨死尙明  
 敏，勇壯有絕大之志氣者不少。  
 攝生法 強壯勞者，恪守攝生法，較用  
 藥尤要。故患本病者，須嚴守左列之攝生  
 法，實行而不可怠。

住所

諸客人生計而異，隨意遷徙，適當  
 之處，固難。然以山間綠谷或海濱爲佳。  
 經濟上若不能遷此等之地，則宜將都會  
 而棲息於田舍居宅，必向南，常通風，清  
 淨之空氣，如欲增台濕氣，於室內置水  
 之碟，以便可故海濱之生活，爲本症所最  
 適當者。

適當者  
 衣服 衣服宜溫暖而輕快，柔軟而清  
 潔者。襯衣必須用毛絨。薄衣須防感冒。厚

食物

食物宜滋養多而富於脂肪者。  
 如牛奶、鵝馬乳、鰵魚肝油。夏時選請淡而滋  
 養多者。如鵝肉、鵝肉、鵝卵。飲料用最良之  
 葡萄酒、麥酒、茶、咖啡（稱薄者）等。與米飯  
 不甚相宜。總以常食肉類爲佳。

行爲及運動 日觀氣力之恢復，避  
 於營間或海濱間，或離都會喧嘩之市而  
 置處於郊外田舍。然當曉露未乾，晚霞漸  
 淡之候，決不可全行外。如散步、快走、舞、  
 騎、擊劍等之劇烈運動，則每有害行爲。  
 以嚴肅爲主。就簡易而規律嚴正之職務，  
 縱使無常，苟能集思勞神之事，亦極爲有  
 害。少年則智慧之發動宜慎。嚴禁手淫。以

本可吸烟。身體時時以鹽水擦之。

豫防法 如前所述。防勞傷由一種之

傳染蔓延而成患者之略。宜注意。不可

散於各處。不然則附者於患者之被衣衣

服。乾燥飛散。而瀰於室內之空氣中。棲

息其中之人。往往傳染。所最當注意者。為

自牛乳種痘而起之傳染病。乳牛及痘

牛(按痘於乳牛者)之有結核菌。其與

否。須加注意。不然。或含蓋此菌。而施用

之後。侵入於體中。遂陷於可恐怖之肺結

核也。

處方

外國方

●肝油

咖啡末

動物炭

二十四錢

一錢五分

七分五釐

右二味。浸肝油中三日。絹布濾過。每

日服過液四錢至六錢。

肝油

十六錢

乾姜舍利別

十六錢

鹽漿

十六錢

丁香油

六滴

右混和一日服三次。每服四錢。

●肝油

二十四錢

亞刺比亞護膜

一錢五分

白糖

一錢五分

薄荷腦

一分

右入膠囊百五拾個。一日服十個至

十五個。

●胡麻油

六錢

薄荷油

一滴

右為合劑。二日分。一日服三次。

●薄荷腦

一錢

酒精

一錢

●薄荷腦

五分

白糖

二分半

●亞刺比亞護膜

二分半

右為丸散。分作二十五粒。一日服數

次。每服一粒。

●薄荷腦

三分

桂皮油

五釐

鹽酸聖古尼混

二分

煙性麻個混矢亞

滴宜

右以蜜蠟為丸。分作六十粒。一日服

三次。每服十粒。

中國方

●人參固本丸(上池種)治肺

勞虛熱。

人參 二兩 麥門冬

天門冬 生地黃

熟地黃 各四分

右爲蜜丸。

●滋血湯(名家方選)治血熱氣

虛。經行不順。或勞瘵。

馬鞭草 荆芥 各八分

牡丹皮 二分 桂枝

芍藥 當歸

枳殼 各四分 梅仁 一分

右爲煎藥。

●三才湯(醫藥方規矩)治脾

肺虛勞瘵。

天門冬 人參

熟地黃 各等分

右爲煎藥。或蜜丸。

●七寶散(名家方選)既欲成勞

瘵。疑似之間。宜用此方。兼治蟲

積爲羸瘦者。

半夏 厚朴

良姜 各八分 甘草

青皮 草菓

烏梅 各五分

右七味。水煎溫服。

●神授丸(名家方選)勞瘵之症。

先系四花患門。後宜服此方。

大黃 皂角

桃仁 檳榔

雷丸 各一錢 安息香 一分

右六味。糊丸。搗切葉汁送下。附病根。

●乾坤丸(名家方選)治心氣虛

勞。及勞瘵初發。

乾牛 二十錢 茯苓

礬 各十錢 大棗四十錢去核

右四味調和爲末。糊丸。梧子大。每服

二十粒。

●劫勞散(醫藥方規矩)治心

腎俱虛。勞嗽無痰。或有血肺萎。

芍藥 一錢 黃芪

甘草 人參

茯苓 熟地黃

當歸 五錢子

半夏 阿膠 各四分

右入姜棗爲煎藥。

●黃芪散(醫藥方規矩)治咳

血成勞。

黃芪 麥門冬

勞嗽。有潤肺者。

熟地黃 桔梗  
芍藥 各一錢 甘草 八分

右為煎藥。

●救陽理勞湯（醫藥學方規類）

治勞傷氣耗。倦怠。動作喘

乏。表熱。自汗。心煩。

黃耆 人參

白朮 當歸

陳皮 桂枝

五味子 甘草

右入姜棗為煎藥。

●黃芪歸甲湯（醫藥學方規類）

治客熱。肌肉消瘦。盜汗。咳血等。

桑白皮 半夏

甘草 各二分半 地骨皮

知母 黃耆

秦艽 茯苓

芍藥 柴胡 各三分三釐

鱉甲 天門冬 各五分

桂枝 人參

桔梗 各一分六釐 紫苑

生地黄 各三分

右水煎。

●紫苑散（張氏醫通靈要）治咳

唾有血虛勞肺癆。

紫苑 人參 各二兩

麥門冬 桔梗

茯苓 阿膠

貝母 各一兩 五味子

桑甘草 各五錢

右為散。每服五錢。水煎。

●加味逍遙散（醫方大成）治虛

當歸 芍藥

白朮 柴胡

茯苓 甘草 各一錢

牡丹皮 山梔子 各七分

右八味水煎。

●歸命丹 治勞瘵。

天石 沈香 各二十錢

烏犀角 五錢 黃芩

知母 麥門冬

生地黄 各三錢 黃蘗 一錢半

川芎 黃連

木香 柴胡

右十二味為蜜丸。

●瓊玉膏 治乾咳。嗽。大能填精

補髓。化腸胃勞瘵尤妙。

地黃 四斤 茯苓 十一兩  
人蔘 六兩 白蜜 二斤

先將地黃蒸汁去渣，入蜜煉稠，再將  
參苓為末和入，磁罐封固，水煮半日，  
白湯化服，加琥珀沉香各五錢，尤佳。

●蛤蚧散 治癆瘵瘦弱，肺損咳  
嗽等症。

### 咯血 Apoplexia pulmonalis 肺出血

病解 咯血，因氣管支炎，高聲之哨歌，時  
時，強烈咳嗽，皆得見瓦斯，沃度瓦斯之吸  
引等而起。大都自肺氣管支出血，自喉頭  
氣管而發者較少。起咯血之時，先於胸部  
感熱灼疼痛，咽頭癢，與咳嗽同時而出。  
此時心悸亢進，顏面青白，起惡寒瘧疾，其  
神經質之人，眩暈猝倒者有之。本症由咽

蛤蚧 二對 鱉甲

貝母 桑白皮

甘草 各二兩 人參 一兩

右俱用酥酒溶化，入醋等分，和勻，炙

煎藥黃色勿焦，茯苓一兩，炒杏仁六

兩，炒搗去油，每二錢，水煎，或為散。

●治肺癆方。

喉及氣管而發者，雖屬輕微，亦最宜慎重。  
不可怠於療養。

攝生法 咯血時先將衣帶鬆緩，仰臥

於清淨明潔之室，禁語，除恐怖之念，令

精神安靜。若胸部覺悶苦之狀，則以濕布

或冰袋冷卻之，或貼芥子泥於足部，然後

施藥。徐與以含食鹽之微溫水。

麥皮 知母

當歸 各三兩 鱉甲

柴胡 地骨皮 各一兩

青葉 五葉 烏梅 一個

天花粉

右為煎藥。

曾患咯血之人，或有此素質之人，防結  
核（病質）須常守規律之職務，避鏡馬  
疾走，體操等之劇烈運動。寒風烈風之際，  
不可外出。食物選清潔而富滋養者，酒類，  
茶，咖啡之濃厚者宜禁。住居宜避紅塵，親  
揚之街衢，選出清水明之環境，居之居室  
以日光和煦者為宜。身體須常保清淨，每

日或隔日入浴一次。房事宜慎重。

處方

外國方

●的列並的油

十滴

右入膠漿。或滴於糖水。每一時服一次。

●浸食子酸

三錢

桂皮舍利別

三十二錢

右混和。每二三時服二錢。

●浸食子酸

一錢

再留酒精

二錢

右溶解。每十分時服十滴。

●骨湃巴拔爾撒誤

六錢

酒精

六錢

甘硝石精

六錢

右為水藥。一日三回。每服十五滴。

稀硫酸

七錢

的列並底油

二錢半

酒精

二錢半

右為水藥。每一時取三十滴。糖水沖服。

●安知必林

一錢

薄荷水

十錢

右為水藥。每二時服十五滴。

中國方

●豆蘇湯(雲林醫聖)

黑豆 二合 紫蘇莖葉 二條

烏梅 二個

右水煎熟。入薑汁三匙。食後服。

●清咯湯(醫錄藥方規矩)治咯

血。

陳皮 半夏

茯苓

知母

貝母

生肌黃 各一錢

桔梗

梔子 各五分

桑白皮 一錢半

杏仁

阿膠 各五分 甘草 五分

桂皮 二分

右歸一劑。生薑三片。水煎服。

●心勝散(醫方大成)

人參 大 蒲黃

小薊 地黃

當歸 烏梅

川芎 各等分

右水煎。

肋膜炎 Pleuritis 胸膜炎 肋膜焮衝 脇痛

病解

肋膜爲覆於胸腔內而與肺膜已故胸側壁刺者之時即行癒養而不可

外面之處之菲薄透明膜有粘滑之液體

息也。

出呼吸之間有減少肺胸腔摩擦之作用

攝生法 食物以富於滋養且易消化

所謂肋膜炎者即發於此膜之炎性也或

之液動物爲宜胸部纏毛絨布等身帶須

起自急性或起自慢性起自急性者最重

安靜平臥發熱而頭部壓重之時以冰袋

發熱胸側感劇痛滲出液體滯留於膜之

冷却之口渴則飲橙實汁橙實汁加砂糖

內外肺被其壓迫因之呼吸困難(濕性)

以水稀釋之本症變爲肺疾其易以標注

又有起始時無液之滲出者(乾性)吸收

意不可忽於發治也

此滲出之液病癒雖有全愈之象亦有不

處方

幸而變爲膿汁者此時內服藥不克奏效

外國方

非施穿胸術不可自慢性而來者不過發

的列並底油

後熱胸部有微痛呼吸微有促進等而已

二錢

患者苟以等閒目之仍從事於日常之業

八錢

務則身體漸次衰弱終至倒於病床而後

五錢

右混和即真壹個塗擦局部。

沃度仿乳

一錢

刺納林

七錢

脈脂

七錢

右研和塗擦胸部。

沃度丁凝

四錢

五倍子丁凝

四錢

右混和塗擦局部。

水楊酸

五分

山慈姑末

一錢半

右爲散藥分作三包一日三次每服

一包。

一分

安質歐魯松

五分

茯苓末

五分

右爲散藥，分作五包，一日三次，每服一包。

●酒石酸加里

二錢

大黃末

一錢

母皮末

一錢

右爲散藥，分作九包，一日三次，每服一包。

中國方

●龍膽瀉肝丸（張氏醫通靈藥）

治肝熱溼熱，腹脹滿痛，小便赤

肺炎 Pneumonia 格魯布性肺炎 肺腺菌

滑。 柴胡 枳殼 各半錢

車前 木通 各八分

當歸 龍膽 各八分

生地黃 二錢 生薑 三片

右水煎，食遠熱服。

●推氣散（醫藥方規矩）治右

脇氣脹，不食，

黃 枳殼

肉桂 各五錢 甘草 一錢

右爲散，每服二三錢，加姜棗水煎，去滓溫服。

●疎肝湯（醫道重寶記）

黃連二錢，先浸吳茱萸之煎汁後煎

柴胡 當歸各一錢半

青皮 枳殼 各一錢 川芎 桃仁

芍藥 各七分 紅花 五分

右九味煎。

病解

肺炎之起始時，惡寒戰慄，四肢倦怠，精神不決，熱甚盛，達溫氏三十九度

至四十度以上，病者有重病之成，胸部苦悶，并于右胸或左胸之疾病發生部覺疼

痛，喉中亦有咯痰，其痰初含血色，漸變爲鐵鏽色，低語唯尚能連續而不能高聲，因發熱而起煩躁不眠，食思缺損等症。

輕症則此等之感覺甚微，若等閉目之則

轉爲不測之大患者不少，然此種肺炎，通常所稱爲加答兒性肺炎是也。

攝生法 寒冷之候，深夜着薄衣而外出，或冒雨雪等而出行，均宜加慎，居室須

常保四五之溫度。食物還清淡而富于滋養者。因發熱而口渴之時。加入白糖于橙質內以水稀釋後而飲。遇頭痛胸痛。則服冰袋于該部。老人酒客虛弱者。若疑本症。宜慎重不可怠于療養。

處方

外國方

●安質散龍林

甘草末

一分  
五分

右為散藥。分作三包。一日分三次服。

●櫻爾失爾發曹達

右分二次服。

●試 腦

五分

安息香酸

五分

茴香油

一錢

乳 糖

五分

右為散藥。分作六包。包於蠟紙。每二時至三時服一包。

●硝 石

二錢

●薑 末

二錢

右混和為散。分作十二包。每二三時服一包。

●安息香酸

二分五厘

白 糖

一錢二分

右為散藥。分作十包。包於蠟紙。每二時服一包。

帝列並底油

二錢半

醋 酸

五分

薔薇水

二錢

枸橛油

一分二厘五毛

右混和卵黃一個之四分之一塗擦胸部。

●遠志根

一錢

過泥子

二分

硝 砂

二分

右盛入布袋中。為振出藥。一日分數回服。

吐根酒

右二三時取十滴。和水四錢服。

肺氣腫 *Empysemata pulmonum* 肺脹

病解

肺氣腫者何。肺脹之氣泡膨脹。比尋常肺體延長之謂也。本症多起於唱歌者、演說者、音樂師、鍛工、木匠等。大抵中

年以上之人為多。因呼吸出入不完全而  
呼吸不利。遂起氣息之短促。血行之際。當  
故時起。氣管支加窄。見而咳嗽。喘息之諸  
症亦發作。咳嗽甚繁。氣息喘滿。苦澀不堪。  
吐混含白色泡沫之痰。因早此等症狀。故  
適當又稱為喘息。本症於寒冷之候最多。  
實則甚少。故溫暖之年。多輕症。寒烈之年  
多重症。

攝生法 所處之職業。為本症之一大  
原因。即如前述之演說家。鍛工。木匠等之  
職業。又常為喘息。本症於寒冷之候最多。  
實則甚少。故溫暖之年。多輕症。寒烈之年  
多重症。

## 第二章 消化器病

### 鵝口瘡 A phthae infantum

病解 此症由一種之酵母作用而發。  
口腔粘膜有如乳汁之凝固而呈白色之

膜。散於其上。粘膜之全面。呈深赤色。知覺  
過敏。在乳兒則往往不能哺乳。以致營養

缺損。  
攝生法 親母或乳母。常宜清拭小兒

右每服十滴。一日三次。

#### ●硫液尼尼

六分

右為糊九四十粒。一次服一二粒。一  
日三次。

#### ●荷

一錢

右以甘草糖漿斯調製為丸。分作六  
十粒。每日早晚服四粒。

#### ●水素還元糖

五分

右以蒲公英糖漿斯調製為丸。分作  
二十粒。每日早晚服二粒。

#### ●薄荷腦

一分

萬靈坡爾椒散

十錢

酒精

五錢

外國方

之口腔。不可怠忽。而哺乳後爲尤要。小兒若不肯嗜乳。則代以牛乳。誕生後之小兒。飲肉羹汁亦可。

處方

外國方

●礪砂

右以水一合溶解之。爲含嗽藥。

●鹽酸加里

右以水五勺溶解之。傾於麻布或綿布上。拭口內。

●塗布劑

重碳酸曹達

右以水五十滴溶解之。爲塗布料。

齶齒 Zahucaris 牙風

病解

本症爲飲食之停滯於齒間。以致腐敗而發生酸類。害及齒質者。起始時。

所占部分甚小。終至彌蔓及於全齒。其次

●撒魯兒

右以水八錢溶解之。爲塗布藥。

五分

●礪砂

虞里斯林

右混和時時塗布於口內。

一錢三分

七錢五分

●安息香酸

水

右蘸布片拭口內。

五錢

五十錢

中國方

●辰砂散(推香堂方)治鵝口疳

發口中生瘡糜爛疼痛。

辰砂

辰砂

枯礬

右研細末。搽花色爲度。以竹管吹患

上。

●治鵝口疳方

石膏

礪砂

右四味細末。和水以鳥羽塗之。

滑石

辰砂 各等分

(名家方選)

●治小兒口疳不能吮乳方。

大青 三錢

右水煎。

●治鵝口疳方。

天南星細末。和稠傅足心。甚妙。

(名家方選)

(上池程錄)

復發及於隣接之齒牙。磨蝕面呈褐色。或呈黑色。其腐蝕甚重者。齒神經亦暴露者。疼痛甚劇。雖六尺之壯男。必致輾轉而不堪其苦。

**攝生法** 齒牙常保清淨。故每朝不可不掃除。又牙粉之惡劣者。往往損傷齒質。

宜擇其完全者而用之。刷牙。亦當選擇其良美者。甘味之食物。及菓實類。不可食。食後。必須掃除口腔為要。

處方

外國方

●丁香油 一分

●龍腦 一分

●芒硝 五分

●硝石 一分

右煉和填充齒窩。

●龍腦 一錢  
的列並底油 十二滴

加耶布底油 十滴

右浸於適宜之棉球。填充齒窩。

●樟腦 一分

丁子油 二分半

的列並底油 二分半

加耶布底油 二分半

右蘸於棉球。填充齒窩。

●芒硝末 二錢

右以水二合溶解之。為含漱藥。

●重碳酸鈣 一錢

右為一包。以水二合溶解之。為含漱藥。

●結麗阿曹篤 一錢

亞爾側根兒 五錢

右混和製適宜之棉球。填充齒窩。  
中國方

●起延散(上池秘錄)治風牙蟲  
牙痛痒不可忍者。

良姜 草烏頭

細辛 荆芥 各等分

右為末。每用少許於痛處擦之。

●定痛散(上池秘錄)治牙風疼  
痛立効。

川烏頭 乳香 各二錢

細辛 半兩 白芷 一兩

右為末。每用少許擦牙痛處。引涎吐之。

●定痛散(醫道重寶記)治蟲蝕  
齒痛甚。

當歸 生地黃

細辛 乾姜  
白芷 蓮翹  
黃連 山椒  
苦參 桔梗  
烏梅 各等分 甘草 少

右十二味，煎先口噙漱，後嚥下。

●治齒齦方。

莎草根

烏藥 各當分

右二味水煎，須與合之而飲下。

(名家方選)

口糜 *Stomatitis coarctata* 加答兒性口內炎

病解

口內熱而成疼痛。飲食物中含

鹽分或溫熱者。易起刺戟而妨咀嚼。其加

答兒蔓延於咽喉之時。則嚥下困難。唾液

流出。嗜痰。齒齦及其他之粘膜腫起潮紅。

甚至糜爛剝脫而流涎。放惡臭。舌上生白

苔。味覺障害。如此種症候。經一二週後。病

症雖消散。轉為慢性之時。妨聽覺。嚥下發

音。均有障礙。大都因烟草(中國曰香烟)

強酒。苛辛食物之刺激而起。大酒家。唱歌

家。演說家等。易罹此症。

攝生法 初起時若肺痛吐盛。則臥於

床上。濕保其身體。以微溫水或冷水含漱。

頸部纏以濕濕布。服以胃脘下所列之發

汗藥。用下列通利之。若有劇痛之時。用冰

水冷却其頸部。喫煎。飲酒。發音。苛辛性之

食物宜避之。

處方

外國方

●以石。入齒窩有効。

(周憲王普濟方)

●咬碎石窩根而入於齒窩。

(古今醫統)

●硝石

一錢

鹽酸加里

五分

右混和塗布口中。

●格魯兒酸加里末

一錢

硼砂末

五分

右混和為散藥三包。以一包溶解於

水五勺含嗽。

●硼砂

二分

鹽酸加里

一錢

辰砂

一分

右爲散藥塗布口內。

●阿仙靈

薄荷油

十滴

沒藥末

五錢

右爲丸藥四百五十九，每回十粒，含於口內。

硼砂

一錢

蜂蜜

五錢

右混和爲塗布料。

●沒食子酸

莫里斯林

一錢

右混和塗布口內。

●石炭酸

複方規那丁幾

一錢半

沒藥丁幾

一錢

茴香油

十滴

酒精

十錢

右混和，以五六滴和於水三勺內，含嗽。

●硼砂

一錢

莫里斯林

一錢

右以水一合溶解二味，爲含嗽藥。

●明礬

一錢

右以水一合溶解之，爲含嗽藥。

中國方

●口糜散(醫方大成)治口疳糜爛。

黃栢 一兩 黃連 一兩

雄黃 一錢 芫花 一錢

片腦 五分

右五味爲細末，以一分許附銜上。

●清涼散(妙藥秘傳)治口糜。

大丁子 和辛 各五錢

川芎 石菖 各六錢

五倍子 十六錢 紫椴 十錢

蓮葉霜 二十錢

右爲細末調合。  
●黃花散(上池秘錄)治口舌生疳。

黃連 黃蘗

玄胡索 青黛

蜜陀僧 各等分

右爲末，每用棉貼疳上，有津吐去。

●一切口病傳藥(上池秘錄)

硼砂 辰砂

枯礬

右爲細末傳之。

●治舌下爛破方。

百草霜

黃燐

白礬燒各等分 甘草少

右四味細末。醋解。烏翎傳之。

(上池秘錄)

甘草 五分

右三味水煎。食前含之。初憐痛不可忍。二三必効。(名家方選)

扁桃腺炎 Tonsillitis 喉痺

病解

扁桃腺炎。為扁桃腺腫起之病。急性者。多發於感冒後。使兩側之扁桃

腺。軟口蓋呈暗紅色而浮腫。喉下困難。發熱。頭痛。淋巴腺腫大。言語帶鼻音而不明。

獨勢增劇。則局部化膿。不可不行戒開術。

攝生法 扁桃腺炎初起時。速以煎過

冷水之布片纏繞於頸圍。用溫湯漱口。或

行溫浴。使其十分發汗便佳。屬化膿性者。

口中含冰片。待其溶解便吐出。腫起極劇

之時。以水輕吸之亦可。不症之慢速者。往

楊梅皮

南燭實 各二錢

●治產後熱毒口中腐爛不得食者方。

性類急性症。或以具膿病質之人為多。此

等入當常行海浴。

處方

外國方

撒里失爾酸曹達

右頓服。(退熱)

●安質歐發林

右頓服。(退熱)

●安知必林

右頓服。(退熱)

●鹽酸加里 五分

右以水一合溶解之。為含嗽料。

●硼砂 五錢

右以水五合溶解之。為含嗽料。

●硼酸 一錢

薄荷油 一滴

右以水五合溶解之。含嗽。

中國方

●治咽喉腫痛或喉痺喉風。土龍 燒存性

右一味大加升麻葛根湯用。

胃弱 Dyspepsia 消化不良脾胃虛弱

(經驗方)

病解

胃弱者何。因胃液與蠕動均不完全而食物不易消化之謂也。故此病對於胃之實質絕無障礙。離之時覺精神沈鬱。頭部壓重。全身倦怠。食量極少。易生飽滿之感。心下之壓重及膨脹。若成微痛。於胃部發悶痛者亦有之。發酸氣。嘔酸液。因嘈嘔呃吐。以致誘起加答兒。

攝生法

胃弱之原因。大都由精神過勞。運動缺乏。或不合養生法而起。或起於衰弱。重病及重病之恢復期。老人等往往有之。但蠕動之不完全。以安逸放棄者為多。胃液之變化。由精神過勞而來。宜擇善良之食物。行適當之運動。精神不令其過

勞。宜食微有刺激之食物。(生姜、芥子、山萮菜之類)。服稀薄之酒類。其中以麥酒(含苦味甚多之物)為最佳。但刺激性之食料。因習慣而效果漸漸薄弱。須極注意。令不成習慣為要。

處法

外國方

●芳香丁幾

苦味丁幾

酒精

右混和。每食後用三十滴。

●葛術丁幾

規那丁幾

大黃丁幾

右每服十五滴。一日三回。用於食後。

●東方健質亞那丁幾

大黃丁幾

右混和每食前用二十滴。

●橙皮末

大黃末

重碳酸曹達

右為散藥。分作十包。一日服三包。

●常藥末

桂皮末

丁子末

茴香末

一錢

八錢

四錢

一錢二分

一錢

一錢二分

一錢

一錢

二分

一分

一分

薄荷油

半滴

右爲散藥。分十包。每回一包。食後服。

●苦辛末

二分

重碳酸曹達

五分

胡椒末

三厘

右爲散。分四包。一日三回。每回一包。

タカヂヤスタ一七

五分

重碳酸曹達

二錢半

右爲散藥。分三十包。一日三回。每食

後即用。

●括矢亞越幾斯

三分

蒲公英末

五分

木香末

五分

藜香末

七分

右爲丸藥。分百六十粒。二日間分服。

●括矢亞越幾斯

一錢

硫酸鐵

五分

右爲丸藥。分四十九丸。一日三回。每回

一九。

●健質亞那越幾斯

五分

大黃末

五分

右混和作二十九丸。一日三回。與以一

丸乃至二丸。

●百布達

二錢半

白糖

十錢

桂皮末

一錢

達拉侃篤護謨

適宜

右爲錠劑。作五十個。每食後用一二

片。

●タカヂヤスタ一七

五分

百布達

二錢

達拉侃篤護謨

適宜

右爲錠劑。作六十個。每食後即服用

二個。

タカヂヤスタ一七爲工學博士高

峯讓吉氏所創製。爲微黃白色。有一

種味嚼機香味之粉末。其作用能消

化澱粉性食物。能治吾人常用澱粉

性食物者及小兒之消化不良。去胃

部之疼痛。嚴重膨滿。有整梗通增進

食欲之利。

中國方

●白豆蔻散(上池秘錄)治脾胃

虛弱。不進飲食。

白豆蔻仁

厚朴 姜製

白朮

陳皮 去白

甘草 各等分

●檳榔散(上池秘錄)療吐酸水。

每食則發作醋水吐出。

檳榔子 十六分 茯苓 八錢

人參 六分 橘皮 六分

右五味。搗篩為散。

●乾姜丸(上池秘經) 治胸中寒熱心滿。清唾瀉口。欬欲吐。食不化。

乾姜 肉桂

礬石 半夏

蜀椒 各一錢

牛蜜丸

●內消散(醫藥方規矩) 治過食寒硬之物。食傷太陰。或嘔吐痞滿脹痛。

痞滿脹痛。

鹽皮 半夏

茯苓 山查子

我朮 山稜

砂仁 香附子

神麴 干姜

枳殼

右為煎藥。

●枳實大黃湯(醫藥方規矩) 治食積大便不通及腹痛。

枳實 厚朴

大黃 枳殼

甘草 右或加木香為煎藥。

右或加木香為煎藥。

●快氣湯(醫藥方規矩) 治一切氣結。心腹脹滿。噎噎吞酸。嘔吐及宿酒不食。

吐及宿酒不食。

砂仁 甘草

香附子 各三錢二分 枳殼

陳皮 各一錢 生姜

右為煎藥。

●神候丸(醫藥方規矩) 治宿食不消。腹脹脹痛。

胡椒 二錢半 蠟尾 七枚

木香 二錢半 巴豆 二分半

請

右為丸。朱砂為衣。

●消食清鬱湯(醫藥方規矩) 治嗜食悶亂。惡心發熱。

陳皮 半夏

茯苓 山查子

神麴 香附子

川芎 麥芽

枳殼 山梔子

黃連 炙炒 蒼朮

藜香 甘草

生、姜

右水煎。

●丁香半夏湯(醫藥方規知)

治脾胃宿冷停痰、嘔吐吞酸。

陳皮 丁香

木香 人參

肉豆蔻 各二分 藜香 五分

半夏 三錢

右入姜水煎。

●清胃二陳湯(藥方選)治吞酸

嗜酸水。

陳皮 半夏

茯苓 黃連、姜

香附子 山梔子 各一錢

蒼朮 川芎

枳殼 各八分 神麩 五分

芍藥 七分 甘草 三分

生、姜

右水煎。

●順氣和中湯(藥方選)治嘔吐

反胃、嗜雜吞酸、痞悶噎膈、心腹

刺痛。

陳皮 鹽一錢 香附子 酸一錢

山梔子 姜一錢 茯苓 姜

半夏 各七分 砂仁 炒三分

甘草 炙三分 黃連 姜六分

白朮 七分 枳殼 五分

神麩 六分 生、姜

右長流水煎。

●參苓白朮散(萬病方組)治脾

胃虛而飲食不進、嘔吐瀉利。

人參 茯苓

白朮 白扁豆

山茶 各一錢 桔梗

蓮肉 薏苡仁

縮砂 各七分 甘草 五分

右十味水煎。

●香砂二陳湯(醫藥手引草)

陳皮 一錢半 香附子 一錢半

半夏 六分 縮砂 六分

神麩 六分 甘草 六分

以上 姜煎。

●枳實導滯湯(藥毒手引草)得

濕熱物不消化、痞滿不安者主

之。

茯苓 白朮

黃芩 黃連 各三錢

澤瀉 一錢 大黃 一兩 香附子 黃連 各四兩  
枳實 神曲 各五錢 右爲末，神鎚煑，糊丸。

右糊丸。

●香連丹 治久積，心胸痞痛，或

●治胃弱方。

白椒

●香連丹 治久積，心胸痞痛，或

右每留空心吞下六個，久服大有效。

●有酸噯氣時，宜時時食生蘿蔔。  
(瀨湖簡方)

胃加答兒 Gastritis catarrhalis

世界人類中，無有如日本人之易罹諸胃病者。故歐美入稱此症爲日本病。而胃加答兒於日本諸病中爲最多。無貴賤老少男女之別均罹之。有急性慢性之二種。

食傷 Gastritis catarrhalis acuta 傷食 食滯 急性胃加答兒 急性胃炎

病解 食傷俗語謂之急性胃加答兒。其症狀惡食物，常催起惡心嘔吐，心下覺壓重或膨滿，或如灼如刺，大便秘結，舌上生白苔，唾液雖多而失食物之味，身體倦意，頭部大抵眩暈，頭痛，動悸，遇有職務，便

生厥心，常不免有噯氣，吞酸。此種病狀，往往亘數日至數週間。過此時期，則各症依然消除，或全愈。此後若不注意攝生法，則轉爲慢性加答兒症。

見之原因，食事尤宜注意。不可過多，亦不可過少。又當空腹飢餓之時，不可任意飲食腐敗物，熱性物，冷性物，刺戟物。例如腐敗肉類，粗製銘酒，酸敗之牛乳，劇熱之飲料，冰，雪，芥子，山薑菜，蕃椒，胡椒等之食物。

攝生法 暴食，暴飲，爲起急性胃加答

皆宜忌。

處方

外國方

●芳香丁酸

薄荷油

右為水藥。一日三回分服。

●稀鹽酸

苦味丁酸

右為水藥。每食後服用十五滴。

●大黃末

重碳酸曹達

當藥

薄荷油

右為散藥。一日三回。

●重碳酸曹達

水楊酸曹達

一錢

三十滴

一錢半

二分

五分

二分

二滴

五分

二分半

右為散藥。分六包。每二時一包。

●重碳酸曹達

列曹兒寧

乳糖

右為散藥。一包。每二時一包。

次硝酸蒼鉛

重碳酸曹達

右為散藥。分六包。一日三回分服。

中國方

●保安丸(張氏醫通鼻要)治積

痞滿消腹發熱。

山查肉 姜汁泡二宿

半夏 姜汁炒 橘 紅 炒

神曲 炒使血用紅麴

麥藥 炒去殼 茯苓 茶

連翹 萊菔子

一分二厘五毛

二厘

五分

一錢

黃連 姜汁炒各五錢

右為末。水泛為丸。每服二錢。茶清送下。

●越鞠丸(上池秘錄)統治六鬱。

胸膈痞滿。吞酸嘔吐。飲食不消。

香附子 醋炒 蒼朮 泔浸炒

撫芎 炒 枳殼 炒

梔子 炒 各等分

右麵糊為丸。

●香砂二陳湯(醫捷手引草)治

輕食傷。

陳皮 香附子各一錢半

茯苓 一錢 半夏

縮砂 神曲

甘草 各六分

右姜煎。

●保和丸(調子引草)凡有過食者皆宜之。但傷物者可加

神

山楂子 一分 神 糖

半夏 茯苓 各一兩

雞鶩子

陳皮

遠 棗 各五錢

右制丸。

●左右丸(醫務方知)治胃

傷食滯塞諸食品。

枳 榔 陳皮

厚 朴 長 朮

香附子

神 糖

地膚子 各十錢 麥 芽 七錢

蒼 朮 縮 砂

木 五錢

右爲糊丸。

●中正湯 治食傷吐逆不安。又

理霍亂中熱。厚積宿食。

半 夏 五 分 白 朮 四 分

藜 香 橘 皮

乾 姜 厚 朴

大 黃 各 三 分 黃 連 二 分

木 香 甘 草 各 一 分

右十味水煎服。

●平胃散(醫道日用綱目)治脾

胃不化。飲食不進。或食滯。

蒼 朮 八 錢 厚 朴

陳 皮 各 五 錢 甘 草 三 錢

右四味。人姜棗爲向家。

●治食滯方

升 麻 一 錢 芫 花 子 一 錢

右爲細末。用白湯。(妙藥抄獨集)

●食傷腹痛。或飲酒傷。良

(奇効醫述)

胃潰瘍 Ulcus ventriculi chronicum 穿穴胃瘻 胃監通 胃瘻

病解

胃潰瘍者於胃腐損膜之內面。而思吐血。其時患者之胃部覺微熱。口一而帶惡末之血液。甚至於胃壁有孔。胃中

腐爛敗。即有滲汁漏出。或有血液流出。中覺有一種之甘味。其次則吐出暗紅色之物。沁入腸內。而誘起腹膜炎。因之致死。

本症以十七歲至二十五歲之婦人罹之最多。男子亦多有以此年齡內發之者。

攝生法

吐血之時使患者仰臥於床上。身體絕不搖動。精神安寧。恐惡其氣。胃部儘以冰漿或濕潤之布片。日濕則含。冰片決不可飲溫水。

處方

外國方

●人工加爾斯所泉鹽

右每朝一錢。以微溫湯溶解用之。

●次硝酸鈣

丁子油

龍腦末

三錢

二十滴

五分

右爲散劑。分作十五包。一日服三包。

(宜以薄紙包之)

●單藥散

右爲散劑。分作六包。一日六回分服。

●糖漿

右爲散劑。分作三包。和於葛湯中。一日服二包。

●糖漿

●糖漿

●糖漿

右爲散劑。每回十五滴。一日服二回。

●橙皮油

●帝列並油

右爲散劑。每回用十滴。一日服二回。

中國方

●射干湯 (張氏醫通鑿要) 治迎

逆而咳喘。痰湧不流。粘聚胃口

等。

射干 去毛

赤茯苓 去皮

梔子仁 姜汁炒 升麻 各一兩

赤芍藥 半兩 白朮 生半兩

右爲散劑。每服五錢。水二升。煎去滓。

入煎藥汁。各再煎。日再服。於日晡

熱。每回加芍藥皮各一錢。甘草二

病解

瘧爲發於胃肺之瘧。其性疼痛。

請其謂之胃瘧。婦人罹之者。名男子中以二黃良者。神經實者。虛弱者。爲多。初起惡心。

瘧 (antialia) 胃瘧

胃肺瘧 胃瘧 胃氣痛 胃瘧 胃瘧

嘔氣、頭暈、復於心下或脇、胸、背等發如灼  
如後如前如嚙之劇痛甚劇烈者、張力之  
大可發可抽、延乘以大男子而極力牽之  
猶以為未足、雖七尺之壯夫患之必不是  
其痛有因之而悶絕者。

攝生法 與食飲料如茶及咖啡等物

宜忌、澱粉、糖等變成之食物不可食、若  
攪胃加答兒、胃弱等、不潔瘵瘵可以全愈  
貧血、萎黃病、歇私的里、及早設法治癒、不  
至誘起本症、此症行局部之壓迫、能令苦  
痛輕快、或熱尋常之鷄卵酒服之、復將溫  
石、或大麥粉之粗者、及芥子泥攤布於紙  
上、敷於一部分亦佳。

處方

外國方

薄荷油

一分二厘

次硝酸銻

五分

依的兒性瀉草丁錐

五分

右為水藥、以二十乃至三十滴、和砂

糖水服之。

薄荷油

右每服一、滴、以白糖水或茶、混和服

用之。

單寧酸 オレキシ

二分半

龍應末

二分

桂皮末

二分

右為丸藥、作三十九、每食後服十九。

次硝酸銻

五分

菲沃私越幾斯

二分

甘草末

適宜

右為散藥、分作十包、一日服三包。

散劑

重碳酸厚達

一錢

右為散藥、分作五包、食後半時服一

包。

中國方

酒脾湯(醫部手引草)

茯苓 七錢半 厚朴 七分半

半夏 九分 桂枝 九分

生薑 九分 黃芩 四分

甘草 四分 人參 三分

以上八味、以水三合、煎為一合半、常

用加淮竹汁、各七分五厘、或加

石膏。

化積湯(齊方大成)主用於婦

人氣積、血塊、微瘕等。

桃仁 紅花

當歸 川芎

芍藥 地黃  
陳皮 半夏  
玄胡 青皮  
三錢 莖朮

貝母 木香

末甘草末服之。

● 糖膽少許，以清水溶服之。

(廣惠濟方)

● 木香爲末，以熱酒調服。  
● 香附子爲末，以白湯服之，或稍加麴砂。

溜飲 Gastritis catarrhalis chronica 慢性胃加答兒 慢性胃氣 淡飲胃風

病解 且溜飲微候之慢性胃加答兒。

弱發覺。

大抵如發急性胃加答兒之病狀。食思缺。

攝生法 胃加答兒。不問急性與慢性。

損胃部覺壓重或微痛。吐酸暖氣。往往困。

大都由飲食不衛生而來。若不守此攝生法。雖有絕妙之藥劑。亦難奏效。食物以

之發生。生厚舌苔。大便稀結。羸弱常事。而

食易消化而富於滋養者爲宜。牛乳肉羹

下痢者亦有之。精神較急性症更爲衰。能

汁。鷄卵。鰾牛肉。烏肉。少脂肪之魚類。牡蠣

作事不能勞心勞力。雖有所思。往往半途

等。以及生蔬菜。澱粉類。豆類皆不宜食。飲

中止。起神經的疾。稍有障礙。即極憂慮。

料以陳葡萄酒良好之麥酒。稀茶等爲宜。

營養次。第缺乏之身軀。肌瘦。面而憔悴。形容

其他如溫泉。礫泉之入浴。適當之散步。郊

枯槁。幾如老人。慢性加答兒之甚久。有

自數月以至數年而不能治者。往往因衰

外之運動等爲最相宜。

處方

外國方

● 苦味丁幾

五錢

瘦方機丁幾

五錢

右爲水藥。每食半時前。服十五滴。

● 芳香丁幾

五錢

括矢亞丁幾

二錢

葛溜丁幾

二錢

右爲水藥。食後服三十滴。

● 稀鹽酸

右每食後用十滴。

◎重碳酸曹達

五錢

檳性蔗糖淨矢亞

五錢

薄荷油糖

十錢

右為散藥。食後用一分二厘五毛。

薄荷油糖 薄荷油糖者。薄荷油一滴。

研印白糖三分者也。

◎百布膠

一錢

乳糖

二錢

右為散藥。分作二十包。每食後用一

包。

嚼嚥兼使弱者用左方

◎根性蔗糖淨矢亞

三錢

大黃末

一錢

生麥

五分

右為散藥。分作十二包。一日服數回。

每回與一包。

◎根性蔗糖淨矢亞

一錢

茴香油糖

一錢

右為散藥。分作六包。一日服三包。

茴香油糖 茴香油糖。以茴香油一滴。

研印白糖五分者也。

◎菓里矢爾酸曹達

六分

重碳酸曹達

二錢半

右為散藥。分作十二包。一日服三回。

每回服一包。

◎蕃椒末

二分

大黃末

一錢

重碳酸曹達

五錢

右為散藥。分作十二包。每食後服一

包。

中國方

◎澤瀉湯(醫藥法規矩)治心下支何眩暈。

蒼朮 八錢 澤瀉 二十錢

右水煎。

◎甘遂半夏湯(藥方選)治留飲

自利。心下痞堅滿者。

甘遂 三枚 半夏 十二枚

芍藥 半兩 甘草 一枚指大

右為煎藥。

◎桂苓朮甘湯(醫藥法規矩)

治心下支飲。身重之滿。目眩者。

桂枝 三兩 生姜 三兩

甘草 二兩 白朮 二兩

茯苓 二兩

右為煎藥。

◎順妙散(藥寶明集)

白牡蠣 二十錢 丁子 二分

萎朮 二錢 甘草 二錢

縮砂 五分

右爲細末用之。

●瀉飲下藥(藥資程頤)

大黃 二錢 硝石 五錢

黃連 一錢半 黃芩 一錢半

牡蠣 五錢 胡椒 一錢

茴香 一錢 鼠李 二錢

甘草 二錢

右爲丸藥。

●活胃散(擬定藥方記)

茴香 八分 蘇合里 八分

萎朮 八分 牡蠣 一錢六分

肉桂 四分 甘草 二分

胡椒 二分

胃癌 Carcinoma ventriculi 領癆 胃腫

病解 胃癌大抵起於四十歲以上之人。不問男女皆患之。其形狀不一。或磊磊

隆起或扁平廣布。現出於胃部者亦有之。

本症之切要症候爲得赤色。吐出咖啡狀

之血液。同時有同質之大便。下泄極過本

症一次。則血液變稠。身體衰弱營養缺乏

而死。藥物療法。古來所無。及至最近始有極奏效之二三良方如下。

攝生法 對於胃癌已發生之人。不克

藉食物助其營養。不過食流動性之食物。

(如肉白布。肉。肉。肉。牛乳。雞卵等)可

令身體不至十分衰弱。而患者之死期待

右爲細末。以白湯服用之。

●治痰飲方

人參 白朮

甘草 丁香

乾姜 各一錢

以上爲煎藥(醫方大成)

延長而已。本症之善治法。即防爲患胃疾

患所誘導。雖輕微胃症。亦宜設法善治。於

此以攝生藥用二者並行爲要。

處方

外國方

●長橋蘭藥片

右酒劑。每日四錢。分二回乃至三回服用之。

●昆錫蘭格皮

四錢

右細劑。以水二合煎之。一日分三回服用。

●積砂末

二分半

右疼痛劇烈時。每二時作一次服下。

●大黃越幾斯

五分

煎苜蓿葉斯

五分

霍亂 *Catarrhalis intestinalis acuta* 急性胃腸炎

**病解** 本症爲急性之胃腸加答兒。當晚春初秋之候。氣候之寒暄無定。或成感冒風寒。或合不潔之飲料水。及飲食物之不合養生者。因之而起此症。此症之起。於夜半忽覺腸胃部異常苦悶。催起嘔吐。腸部

右爲三十九。一日服用二九乃至三九。

中國方

●清上涼血湯(海渡慈航)

當歸 一錢 川芎 五分

赤芍藥 一錢 生地黃 二錢

熟地黃 一錢 百合 一錢

貝母 一錢 梔子仁 一錢

牡丹皮 一錢 桃仁 一錢

麥門冬 一錢 蒲黃 七分  
阿膠 七分

●犀角地黃湯(醫道日用綱目)

犀角 牡丹皮 各二錢

生地黃 二錢半 赤芍藥 一錢半

玄參 黃連

黃芩 各一錢

右七味煎。

起山鳴。解之周圍發痛而下瀉。排出之便。初爲軟便。次爲綠色之液體。有時瀉下如米泔汁之物。吐瀉劇烈之時。一點鐘內有數回。則患者覺異常口渴。四肢厥冷。眼窩陷落。壯年之患者。大抵一日至一晝夜。

吐瀉不止。經二三日後。雖有全愈之望。而老者弱者。衰弱者。過劇烈之霍亂時。陷於昏睡狀。往往因以致斃。  
**攝生法** 飲料以茶或葛湯爲宜。腹部宜纏毛絨。病症劇烈者。行芥子浴。食料用

肉糜汁或雞卵。固形物。以不食爲佳。酒類  
惟良美之葡萄酒可飲。然亦不可過度。口  
渴。飲小冰塊或荷湯。爲預防之目的。當飲  
冷慕泰之候。夜眠宜注意。又宜避不潔之  
飲料。或飲食物之不合衛生者。如過飲。暴  
食。將腐敗之物。不消化之食物等。皆是也。

處方

外國方

●芳香粉砂精

薄荷油

炭酸氫側理矢亞

右振盪。每二十分時。用十五滴。

●薄荷油

龍腦

阿仙藥

右作錠劑六個。分二日服用。

●車寧酸

甘草末

右以甘草越幾斯製爲丸。每共爲三

十九。每一時用二丸。

●胡椒末

硫黃末

阿仙藥

薄荷油

龍腦

桂皮末

右爲丸。每作百八十九。一回服十

五粒。乃至二十粒。一日服用三四回。

中國方

●霍香正氣散（醫道日用綱目）

腹痛吐瀉及感風寒濕濕不正

之氣者。以此治之。

二分

三分

五分

二分

二分

一分

一分

二分

二分

二分

二分

二分

二分

二分

二分

二分

藜香 三錢

白朮 二錢

半夏 二錢

大腹皮 一錢

白芷 一錢

甘草 五分

右十一味。入姜棗煎之。

●不換金正氣散（醫道日用綱

目）四時之傷寒瘟疫。及感深

山嵐之氣。海邊之瘴氣。寒熱

往來。霍亂吐瀉。或違方之水土

不服者。以此治之。

蒼朮 厚朴

陳皮 半夏

藜香 各二錢

右六味。入姜棗煎之。

厚朴 二錢

桔梗 二錢

紫蘇 一錢

茯苓 一錢

甘草 五分

厚朴 二錢

半夏 二錢

藜香 二錢

甘草 五分

厚朴 二錢

桔梗 二錢

紫蘇 一錢

茯苓 一錢

甘草 五分

厚朴 二錢

半夏 二錢

◎五苓散(醫道日用綱目)傷於暑氣，身熱煩渴，心恍惚，小便亦澀，大便澀者，以此治之。

澤瀉 一錢半 白朮 一錢  
猪苓 一錢 赤茯苓 一錢  
肉桂 五分

右五味為散，用酒米飲服下，復飲多，溫使之出汗，或人姜棗煎之。

●生肌散(醫道日用綱目)暴中暑氣，上肢息絕者，以此治之。  
人參 麥門冬

五味子 各等分  
右三味煎服之。

●紅四子(中國經驗方)治霍亂，吐瀉，傷食，腹痛。

青皮 陳皮

藜朮 三錢  
乾姜 香附子 各三錢  
山椒 二錢

右研細末，糊丸。  
●藜朮散(醫藥學方規矩)治陽傳人，霍亂吐利，冷汗不止，脈伏或澀者。

附子 干姜  
甘草 桔梗 各五錢

半夏 醋製 良姜 各二錢半  
右用水煎服。

●回生散(醫藥學方規矩)治霍亂吐瀉，但有一點胃氣存者，服之回生。

陳皮 五錢 藜香 五錢  
右水煎溫服之。

●香薷散(妙藥方組)治暑熱，霍亂吐瀉腹痛。

香薷 十錢 白扁豆 五錢  
厚朴 三錢 陳皮 三錢  
茯苓 三錢 黃連 二錢  
甘草 五分

右七味為細末，投白湯或冷水中用之。

●金府丸(上海秘錄)治腹痛霍亂之諸症。  
菊明石 二兩 磁黃 五兩

金箔 十五片  
右研末，制丸，金箔為衣。

●六和湯(醫藥學方規矩)治風寒暑氣，證交見霍亂。

半夏 縮砂

杏仁 人參 茯苓 各四錢

下痢 Diarrhoea

病解 誘起下痢症之疾病甚多即各種寒患之症便是也。下腹脹胃食物之過飽。腸管於解剖上呈硬化者亦有之。或絕無障害而下痢者亦有之。其他症之誘因而猝然發生者。大抵以夏期爲多。基於不消化物之攝取胃弱等。來自急性者。最初於腹部覺不快。復成痙攣。同時當鳴腸腹。稍細片時。即有便意。往往排出水狀之便或瓦斯。放屁。而腹痛遂止或速瀉而發痛復下痢者有之。或通便後而便意不止。俗云絞肚。腸內如有異物之病。此年當則努力日益減少。

攝生法 急性宜一日行數回溫浴。湯亦可。浴後臥於溫室。食物宜擇消化易而營養分多者。飲料用赤葡萄酒。每回四錢。適當於茶湯內約半分許。急性之下痢者。每日食流動狀之物一回。肉兔汁。稀粥汁。以毛絨。毛布。帶絨包其下。腹以保溫。用火爐亦有致其他之攝生法。與霍亂症下痢者大同小異。

處方 外國方 藥收丁幾 大黃丁幾

篤藥按爾羅漢丁幾(十倍者三十錢) 薄荷油 二分 右混和。一回十五滴。一日服三回。	吉納丁幾 一錢 五倍子丁幾 五分 右混和。每回十五滴。一日服用三回。	蘇木越幾斯 五分 薄荷油 二分 胡椒末 五分 右爲丸藥。分作百二十九。一日服六十九。
大黃丁幾 一錢 五倍子丁幾 五分 右混和。一回十五滴。一日服用三回。	大黃丁幾 一錢 吉納丁幾 五分 右混和。每回十五滴。一日服用三回。	胡椒末 一錢 胡散末 二錢 右以芍粉爲丸藥。分作百八十九。每回三十九。乃至四十九。一日服用三回。
石櫛根皮丁幾(十倍者) 右混和。一回十五滴。一日服用二回。	單酸酸苦鎔 五分 重炭酸曹達 二分 右爲散藥。分作三包。一日服三回。	刺答尼亞越幾斯 一錢 大黃越幾斯 三分 右爲丸藥。分作六十九。每二時服四丸。
阿仙藥丁幾 一錢 薄荷油 二分 右混和。每回四十五滴。一日服用三回。	大黃末 一分乃至二分 右爲一包。一次服下。	中國方 小駐車丸(漢方大成)治小兒
大黃丁幾 一錢 薄荷油 二分 右混和。每回四十五滴。一日服用三回。	阿仙藥 一錢 薄荷油 二分 右爲一包。一次服下。	大黃末 一分乃至二分 右爲一包。一次服下。

切一之泄利。

常歸 三錢 黃連 七錢半

乾姜 七錢半 柯子 一錢

右爲末以阿膠一兩水煎爲汁混和

爲粟粒大之丸每回二三十九與米飯同服之。

飯同服之。

●六柱飲(醫務手引草)治滑脫

不止酒利完穀。

人參 一兩 茯苓

附子 木香 各五錢

阿子 二錢半 肉苁蓉 二錢半

右入姜棗水煎。

●八柱散(醫務手引草)治腸胃

虛寒滑泄不禁者。

人參 白朮

肉豆蔻 干姜

阿子 葛葉散

甘草 滑子 各半分

右爲末每服四錢。人生姜五片。棗一枚煎如膠人參一匙調服。

●快中丸(醫務手引草)治食

滯痞積或泄瀉。

麥芽 七錢 枳殼 六錢

厚朴 四錢 木香

板櫛 各三錢 青皮

陳皮 白朮 各三錢

右糊丸。

●八珍散(醫務藥方規矩)治脾

虛泄瀉。

人參 白朮

茯苓 甘草

黃耆 山藥

白扁豆 粟米

右爲散白湯送下。

●芍藥湯(醫務藥方規矩)治下

痢腹痛後重。

芍藥 四兩 當歸尾

黃芩 各五錢 大黃 三錢

木香 板櫛 各三錢

桂枝 一錢 黃連 五錢

右爲煎藥。

●三白散(醫務藥方規矩)治一

下泄瀉如神。

白朮 芍藥

茯苓 澤瀉

厚朴 黃連

干姜 烏梅

生姜

右爲應藥。

●治腹痛青黃(醫藥學方規中)

治鼠竇下利。腹稀無度。

黃連 黃芩

枳實 白朮

連翹 大黃

滑石 木通

車前子 海金沙

枳殼 茯苓

右十二味水煎。

●從中黃(張氏醫藥學)治大

人小兒之泄瀉。

白朮 茯苓

陳皮 各三錢 芍藥 五錢

薤白 二錢 乾姜 一錢

右爲細末。白湯送下。

●止下痢不止方。

石榴皮 人參

甘草 各等分

右二味爲末。煎取汁。用半湯飲之。

●治下痢。

罌粟殼 二兩 阿膠 一兩

甘草 一朱炒

右入水二杯。煎一杯用之。

(妙藥妙術集)

●治泄瀉如神(劉草窗方)

蒼朮 三錢 陳皮 去白

防風 各一錢

右爲丸。如菘豆大。久泄加升麻六

分。(張氏醫藥學)

●五倍子末。用白湯服下。

●宜食薑糖。

●煎石榴皮爲濃汁。混初水飲用之。

(濟生方)

瘰癧 Tubercles mesenteric 小兒慢性腸加答兒

病解 本症爲小兒之慢性腸加答兒。食不良之牛乳。米粉。不消化之食物等。其因食物營養不全而發。即母乳之不足。或便秘。或便秘。或下痢。腹部膨脹。而身體羸

瘦。顏面蒼白。不克安眠。食慾非常增進。時時飲食。不知腹之飽否。凡物之可食者則

必食之而後洗。幸以衰弱致發本症為誤。醫所謂五疳之一疳之名由小兒嗜食甘味而得。其他之三疳。即肝疳（驚風）心疳（驚風後之病呆病）肺疳（慢脾鼻加答兒）是也。

**攝生法** 小兒之發養食物以母乳為佳。固無論矣。若母乳不良。或缺乏之時。用新鮮而純良之牛乳。亦無不可。除乳汁外。食米粥之稀稠者。及肉黃汁。鷄卵豆腐等。富於滋養品而易消化之物。亦可食也。然乳汁不足。而以澱粉製之粥粉。或餅菓。葡乳汁不足。而以澱粉製之粥粉。或餅菓。子蔬。菜。果。物。等。食。則。頗。有。害。蓋。疳。疳。之。發。生。都。基。於。此。者。

處方  
外國方  
●次簡登五給 二厘乃至一分

乳糖 一分  
右研和。為散藥十包。一日用三回。  
(由年齡而異服用量)

●單寧酸異化還 二厘乃至五厘  
白糖 一分

右研和。為散藥一包。一日三回。每回用一包。(依年齡而定服量)

●過洛魯兒滋液  
右依年齡。用二滴乃至五滴。一日服用二回。

中國方  
●退疳丸(上油秘錄)治小兒常疳。

桃花八錢 陰乾 大黃 四錢半  
紅花 三錢 檳榔 四錢  
人參一錢四分 木香 三錢

丁子 二錢 甘草 五錢  
右為末。米糊作丸。

●當歸丸(中國經驗方)小兒諸疳通治。

胡黃連 炒黑三錢九兩  
丁香 炭 各一兩  
熊頭

右研細末。麥糊為丸。

●神勝丸(中國經驗法)五疳妙方。

白朮 一兩 海貝 一串 墨燒  
海人草 一錢 墨燒 人參 二分  
麝香 一朱

右研細末。麥糊作丸。

●金玉印(中國經驗方)治五疳。

赤天肝 陰子霜 蘇吳霜

黃 栝 生 菝 朮 各等分

甘草 一分 金屑 一分

右研細末。以糊為粟粒大丸。以朱砂衣。小兒用六七粒。大人用二十粒。

●五疳消食圓(中國經驗方)消疳殺蟲退熱磨積進食。

使君子 麥芽

陳皮 神麩

蘇秦仁 龍胆

黃連 山查子 各等分

右研細末。米糊為丸。如黍大。每十九。米飲送下。

●五疳保童圓(中國經驗方)治

五疳。

使君子 一兩 常山藟霜 五分

赤蛙霜 五分 海人草霜 二分

赤海鼠霜五分

右研細末。為麻子大丸。

●加減保童圓(中國經驗方)治五疳。

菝朮 青皮 各三兩

熊胆 二兩 三稜 二兩

乾漆 一兩 丁子 一兩

木香 一兩 肉豆蔻 一兩

人參 一兩 使君子 二分

右研細末。以糊為粟粒大丸。用五粒。或十粒。一日服兩三度。

●紅藥(中國經驗方)治五疳。驚癇。疳疾。一切小兒胎毒諸病。皆有效。

有。

蟾 青黛

右鹽炒炙土器上。為細末。青黛等分。糊丸。為南天實大。

●白丸子(名家方選)五疳殺蟲之良劑也。

雞胆 五錢 黃連 二錢半

黃芩 二錢半 甘草 一錢

右四味。糊丸。銀箔為衣。

●馬明湯(名家方選)療小兒疳癆。疳症。

馬明退 一錢 隨人壯少

青黛 五分 大黃 二分

甘草 三分

右四味。以水二合。半。煎取一合。俟寒。溫適宜服之。

●馬明湯(又方)

馬明退

紅花 各五分

大黃 二分 甘草 三分

右四味水煎。 (名家方選)

●保童圓 治小兒五疳。

葦朮 二兩 青皮 一兩三分

丁子 一兩 三稜 一兩

使君子 一兩 龍腦 一分

透肉 一分 丁香 一分

人參 一分 甘草 少

胡黃連 一分

右十一味。為小粒丸。晝年數用之。

●小兒五疳之妙藥。

赤 蛙晒乾七錢 使君子 一錢半

麻 沈 一錢 胡黃連 一錢半

蕪 荑仁 二錢 檀榔子 二錢

熊 胆 一錢

右研細末。為細丸用之。

●理中圓(上池秘錄)治小兒諸疳。

萬年青霜 乾漆 各等分

蕎麥粉 減半

右為小丸。每服十粒或二十粒。

●萬金丸 治疳。消積。消食。止瀉。

和胃。追蟲。

蒼 朮 二兩 陳 皮

厚 朴 夜明砂 各一兩

右為末。用蘇香一兩化水。入酢少許。

蒸麩糊。或煮薑肉搗丸。

●消疳丸(醫方秘苑)治小兒五疳。

蒼 朮 厚 朴

陳 皮 枳 殼

檀 榔 神 曲

山查子

右水煎。

●治五疳方。

生黑漆 一錢 陳 米 三錢

右以米糊為綠豆大丸。以白湯送下。

日服三次。

(中國經驗方)

●五疳妙方。

山 薤 二錢 紅 花 二十日

山 梔 子 三十錢

右三味燒黑。以白湯服用之。

(中國經驗方)

●五疳妙方。

赤 犬 肝 陰 干 厚 朴 各等分

右為麻子大丸。一日用三十粒。

(中國經驗方)

魚肝油二錢 梨霜

山前草霜各四錢 山查子 二錢

使君子 炒二錢 牛膝炒黑一錢

右研細末，調丸為粟粒大。

(中國經驗方)

●治五疳方

蘇霜 常山蟲霜

蠟霜

右等分末，一日用二三度。

(中國經驗方)

●五疳妙方(石川圭馬傳)

川芎 香附子

黃連 黃芩 各五兩

人參 一分半 粟 一錢

赤天肝

右末糊丸，一日三次，隨年數而增其

一次。(中國經驗方)

●治疳蟲奇方

檳榔 杜若 等分

右二味為細末，和糰貼紙，敷于肩背

最妙。(名醫聖方)

便秘 (obstipation alvi) 塊結

癆解 史移者何，通利較牛時，便而秘

結之等使，或於通利時覺困重之謂也。此

症大段因消化不良而起，亦有因運動不

足，食水不足之飲食物，積上腸之習慣

等而發。下腹覺壓重，瓦斯充滿於腸中，病

症增進，則呼吸促進，腹部膨滿，食慾障害

因之催起，吞嚥，噯氣，心身之作用既衰，便

塞頭痛頭重，不安安眠，病勢更增，則參熱

疼痛，并至吐瀉。

攝生法 在平常之便秘，則養成定時

排便之習慣使可，即每日起床後，以冷水

食朝飯，經片時後，即行上廁，小兒過多飲

乳汁及澱粉性之食物，收飲性之藥物等，

哺乳時更換乳母，人工的營養兒。(母乳

粉或牛乳等而養育者，則稀薄乳汁，童

兒供以牛乳肉之混合物，菓物，多量之食

料，肝油等，行水沐浴，湯沐浴，頗佳。

處方

外國方 大黃末 一錢

蘆薈末 五分

石鹼末 五分

右爲丸藥，分作四百丸，每服二十丸至三十丸。

●旂那葉 一錢

右以蒲公英越斯爲丸藥，分作四十九丸，一日服五丸乃至八丸。

●牛胆 二錢

石鹼 二錢

蘆薈 一錢

胡安子末 二錢

薑黃油 五滴

右爲丸藥，分作九十九丸，一回服五粒，乃至十粒，一日三回服用。

●大黃末 三錢

蘆薈 二錢

沒藥 二錢

薄荷油 十滴

右爲丸藥，分作百二十九丸，一日服一回，乃至二回，每回與二九乃至四九。

●破黃華 二錢

藥製散劑溫更說 二錢

尚香油糖 二錢

右爲散藥十包，一日服三回，每回一包。

●藥製巴根末 一分

重酒酸加里 二分

生薑末 五厘

右爲散藥四包，每朝服一包，十錢

●人王加爾兒斯泉藥 十錢

右分三回，每服用一包。

人王加爾兒斯泉藥 人王加爾兒斯泉藥 日本藥局方，以芒硝搗碎。

爲粗末，用不越三十五度之溫，至全

風化而放苦之，大抵於五十度而乾燥，以失其重量之半爲度，乃篩過，取其粉末四十七分，混和硫酸加鹽說

末二分，食鹽末十五分，重碳酸曹達

三十六分，而製成之，有瀉下之效，於

變性胃加答兒，脂肪過多症，腦充血

等，尤有良効，用量，一回一錢乃至四

錢，以水一合溶解，於空服時服其一

分，十五分時運腸之後，概服其餘剩

者。

●藥製巴根末溫更說 十六錢

右納於廣口玻璃瓶，分四回服之，主

用於妊婦之便秘。

●腹方甘草散 五錢

右分八包，每服用一包，小兒之便秘

實用之。

複方甘草散 複方甘草散一名クレ  
ヲ氏和胸散。谷那末。甘草末各二分。  
小茴香。硫黃各一分。白糖六分。  
和者。(日本藥局方)

複方安息香丁幾

右每服二十滴乃至三十滴。朝夕用  
之。

瀉 耶

右以水十二錢。溶服用之。

三錢

胡麻油

右每服

四錢

右混和。一日數回分服。

通利之理及瀉利藥之類別

通治藥。即下劑。內服之際。有甚多

量液。或柔軟糞便之作用。而發通

利藥之思稱。其効力最微少者。謂之  
軟下藥。較是稍強者。謂之緩下藥。

發腹痛。腸部虛不。瀉頻回之液  
狀便者。謂之緩下藥。然下劑之分類。

常由人任意而規定。用軟下藥及  
緩下藥之大量。能呈緩下作用。用較

下藥之少量。能呈緩下之効。通常大  
量。右腸部。謂之瀉劑。於軟下藥

與緩下藥之區別。象牛子。藤黃。在緩  
下藥。與緩下藥之區別。以李子。巴豆。

藥。與各門下藥。

凡內服下藥。起瀉下之理。古來雖經  
幾多之試驗。尚未得完全之成蹟。唯

此類之藥物。於增進於腸之蠕動機。  
或移小腸內容物於大腸。吸收水分

動之効力。如鹽類下劑之排泄水樣  
便。即由於此理者也。

適合於實地之下劑。鹽類下劑之  
作用。為對腸管全部。使腸內容物

從速排泄者。故於某種機。不免排瀉  
其中之糞分。而不適為經久持長

之下瀉。反之如腐香。大黃。則能促進  
大腸最下部之運動。以排泄糞分既

收已畢之糞便。故於實地。鹽類之瀉  
下藥。以大黃。蓋實論適當。但此等機

關於便秘之應用。而於。瀉藥等之  
藥性。則對於瀉藥之目的。或於腸助

瀉。多。宜。其用法之時。則其瀉下藥  
不得不實用。類下劑者也。

中國方

瀉腸湯(醫方大成)大腸結燥

不通者。主用此方。

地黃 二錢 甘草 二錢

大黃 一錢 常歸 一錢

升麻 一錢 桃仁 一錢

麻仁 一錢 紅花 三分

●瀉導湯(醫道日用綱目)治火

便閉結不通。

桃仁 一錢 紅花 一錢

升麻 一錢 大黃 一錢

麻仁 一錢 當歸 一錢

生地黃 五分 熟地黃 五分

甘草 五分

(右九味入楮椰子末五分煎之。

●三黃丸(上池秘錄)治大便秘

頑而心下痞者。及大人小兒之

諸疾。

大黃 六兩 黃連

黃芩 各三兩

右糯米丸。

●七寶圓(上池秘錄)大便不通

妙方也。

大黃 一兩二分 木香

枳殼 柴胡

阿子 各二分 桃仁 三分

甘草 一分

右煉蜜爲丸。

●脾約丸(上池秘錄)治腸胃虛

燥。大便秘結。

麻仁 一錢半 枳實

厚朴 芍藥 各三錢

大黃 四錢 杏仁 一錢二分

右爲末。蜜丸。

●承氣丸(古方九章方)治腹中

堅塊。大便不通者。

大黃 四兩 硝石 六兩

右二味各爲末。糊丸。爲梧桐子大。每

服八九丸。

●人參大黃丸(古方九章方)治

心下痞硬。大便難者。

大黃 寸兩 黃芩

人參 各五兩

右三味各爲末。糊丸。

服用之法。爲丸如梧桐子大。每服二

十七八九丸。白湯送下。

●通幽湯(醫道藥方)短。治大

便秘結。出堅。

常歸 二錢半 升麻 三分

桃仁 一錢 熟地黃 二錢三分

生地黄二錢三分 甘草生炙五分

檳榔子 五分 紅花 少

●通治凡(藥寶明集)治大便秘

結。

大黃 四錢 川芎 四錢

黃連 二錢 黃芩 一錢

鼠李子 一錢 甘遂 五分

右爲細丸。

●松脂丸(名家方選)治心下痞

積。大便秘結者。

松脂 七錢 大黃 三錢

右二味爲末。糊丸。白湯送下。

蛭蟲 Ascaris lumbricoides 蛭蟲 蛭蟲

病解

蛭蟲爲棲宿於人和腸管中之

小蟲呈圓柱狀帶黃赤色或褐色兩端細

而中央粗大長約三四寸至七八寸小兒

往往吞之其寄生有時雖無害有時亦

惹起患帶若在腸內因之起腹痛便後下

痢在胃內起嘔吐食思缺乏精神不快小

兒則起鼻孔癢痒睡孔散火起燥寒頭痛

眩暈或全身疥癩瘰癧爲危險然有毒體

以下則子症候自消矣。

攝生法

蓋特別之攝生法給小兒取

食粉餅或糖果等之可食物因之而患此

瘵者或無故於熱或結胸瀉等何妨也

治之法

處方

外因方

五厘

大黃 如鷄子大

右三味大黃爲末。巴豆杏仁各搗如

膏和入大蜜蜜丸。

●巴豆丸 蘇癩結。心下硬痛。

巴豆 三枚 杏仁 七枚

白糖

右作餅劑十二個。一日服三回。每回

一個。用藥紙或青藥紙包之。

●驅蟲藥

大黃末 五厘

乳糖 一分

右研末爲散。分作十二包。一日服

三回。每回一包。

●施綿支那末

牽牛子末

一錢  
二分

右研和為散藥。分作六包。每時用一  
包。

中國方

●棟陳湯(萬病回春)治少兒疳

蟲。

苦棟根皮 三錢 陳皮

半夏 一錢 茯苓 各一錢

甘草 五分

右對為一劑。薑煎服。

●金玉丸(各家方選)凡小兒難

病。驚風及胎毒者。此丸主之。

紅花 二錢半 蘇風霜 二錢半

巴豆 一錢半 麝香 五分

牽牛子 一錢半 積雪草 五錢

海人草 三錢 大黃 二錢半

右八味為末。糊丸如芥子大。辰砂為

衣。自初生兒至三歲。服六七丸。日服

三次。於空心時以白湯送下。用宜隨

病淺深。丸數以二十丸為限。

●殺蟲丸(上池秘錄)殺就蟲。

烏梅 蜀椒

右二味為細末。糊丸如小豆大。

●三味安蟻湯(上池秘錄)治就

丁子 良姜

鷓鴣菜 各五錢

石水煎。

●化蟲園(上池秘錄)治小兒痰

氣。蛇蟲。

鶴虱 二兩 海人草 二兩

蜀椒 牡蠣 各一兩

右為末。米糊為丸用之。

●妙應丸(小兒療法調法記)

檳榔 腹子

黃連 各半兩 黑豆

白豆蔻 各一兩 木香

白蘆根 二分半 使君子 二分半

右為末。以皂角湯為丸。

●安蟻散(醫方規矩)治吐

就。

烏梅 二錢 黃連

蜀椒 藿香

檳榔 各一錢 胡粉

白礬 各五分

●神命丸(藥寶明集)

攝綿 丁子

檳榔 大黃

條蟲 Taenia 真田蟲

玄胡索 槐花  
 枳實 人參  
 黃連 山查子  
 茯苓 白朮  
 甘草 使君子

蘆薈 熊膽  
 沉香 右糊丸  
 ●紅花散 下小兒蛔蟲  
 朴硝 大黃 黃連

紅花 鬱金  
 檳榔 青皮  
 木香 各中  
 右水煎服

病解 條蟲為雌雄生殖器兩具之囊蟲，傳撥於人體之腸管內。其外空消化而胎蟲遊離，漸漸發育長大。其種類因媒介物分為左之三種。

(一)因豚肉而傳播者 此種條蟲曰有鈎條蟲。其頭如針頭大。其四個吸盤。(二)因牛肉而傳播者 此種條蟲曰無鈎條蟲。其頭頗大。與有鈎條蟲相類似。亦有四個吸盤。

(三)因魚肉而傳播者 此種條蟲曰裂頭條蟲。其頭是棍頭狀。其面之側緣。具裂狀之吸盤。此條蟲之媒介物。大都係鱈魚之類。

凡患條蟲寄生之徵候者。必消化不良。飢餓頗甚。或平素所嗜好者。一時皆嫌避之。便通不整。鼻孔肛門等覺發痒。時發腹痛。起下痢。瞳孔散大。心悸充進者不少。此時病者若有條蟲之小片吐出或瀉下。則行

療治法。

攝生法 牛、豚、鯉之生肉。須熟炒而食。服藥物之前數日。多食流動性食物。如肉羹汁、鷄卵、牛奶、茶等。除服藥十劑之外。食鹽鱈魚與葱、薑、蒜、胡椒等。(準傳法)

處方 外國方  
 ●給馬越與斯

蓖麻子油

二錢

右二味以蜜蠟作丸。每百八十粒。分

為三十九丸。每隔半時服用之。

●新鮮石榴根皮

十五錢

右用水二合。漬一晝夜。煎為半量。

隔一時間而用二回。

●苔蘚花

五錢

蜂窠

十錢

右二味為煉藥。於一時間內用二回。

●加麻刺

二錢

右為三包。三回服用。

除蟲驅除藥之種類及服用之注意

除蟲之驅除藥。內服之際。雖有直接

觸着蟲體而使其死滅之効。而其內

殺之法。每由除蟲之種類及藥品之

新法而大有差異其方法。在下項指

生法之下。經療法之準備以後。始可

服用藥物。於除蟲之種類。以從牛內

傳播之無鉤除蟲為最難驅除。除蟲

藥之藥。以植物性之藥品為主。而稍

經時日及屬於舊陳者。其効分較新

鮮者有天壤之異。故買藥製藥。以製

是等藥品之越幾斯強為最佳。方今

通行之除蟲驅除藥如左。

(外國藥) (用量)

給馬根 一回二錢乃至八錢

給馬洗動越幾斯 一回三分乃至一錢

苔蘚花 一回二錢乃至五錢

加皮粉

一回五分乃至二錢

(中國藥)

(用量)

南瓜實

一回七錢乃至十五錢

檳榔子

一回五分乃至一錢

石榴根皮

一回一錢五分乃至五錢

(主為煎劑用之)

中國方

●療瘰癧方

南瓜實粉 十錢

右加白帶末。一日數回服用。

(妙藥專藥)

●治瘰癧

檳榔子 二錢

右為細末。日吞服。 (參寶明集)

疝痛 Intestinal 腸疝痛 疝氣

病解

胃痛發於胃部之疼痛劇烈

者。雖放散於胃部。而起嘔吐。然後反嘔。腕

面。體尿意者。尙少。疼痛並不連續。而有間

歇。因外壓(以手掌壓胃部)而能得緩解。

若其時疼痛增劇。決非單純之胃痛。其原

因。大抵爲食未結之果實。新麥酒。酸。豆。蔬

菜。或下痢(下列增進腸之蠕動機能。率

引腹膜而起痛痛)之吸收。麴毒等。

攝生法。胃痛發生時。不可飲食。疼痛

緩解後。食肉羹汁。牛乳。米粥汁等之流質

物。用溫石。火熨。溫濕布。溫其腹部。飲葛粉

等飲料。如成慢性痛痛。宜常行溫浴。

處方

外國方

●生牛蒡根

酒精

五十錢

五十錢

大黃

桂皮

一錢

五分

薄荷油

酒精

二錢

二分半

右每回十滴乃至十五滴。和糖水服

用之。

甘草

少

●牛黃丸(醫方大成)小兒五疳

時宜其用。有功效。

右七日間分出於冷處。溫過。每服二

十滴。一日三次。

(使瀉下異物)

●蓖麻子油

右一回服用。

一錢

●芳香種砂精

大黃丁幾

一錢

●薄荷油

右混和。每回十五滴。一日三四回服用。

二錢

●薄荷油

酒精

二錢

●薄荷油

酒精

二錢

●薄荷油

酒精

藥草根

右細切。作振出藥三個。每次一個。一

日三次。

中國方

●烏芥通氣散(醫方大成)治一

切之痛氣。

常 麴

香附子

陳皮

白朮

玄胡索

木香

各等分

右水煎。

●牛黃丸(醫方大成)小兒五疳

時宜其用。有功效。

人參 一錢 山藥 一錢  
 肉豆蔻 三錢 莖朮 一錢  
 丁香 二錢 黃柏 一錢半  
 木香 二錢 香附子 四錢  
 檳榔子 一錢半 芍藥 二錢  
 甘草 三分 牛黃 二末  
 右研細末爲丸。

●吳茱萸加附子湯(醫方大成)  
 寒痛腹痛。牽引頭九。屈而不伸。  
 脈沉遲者。以此爲主方。

吳茱萸 生薑 各三錢  
 人參 一錢 大棗 二枚  
 附子 二錢  
 右爲煎藥。

●逆挽湯(醫癘手引草)痢病瀉  
 瀉之主方也。先與此方。可試處。

蒼朮 一錢 肉桂 一錢  
 茯苓 八分 乾姜 八分  
 枳殼 八分 生薑 一錢  
 甘草 一分 人參 六分  
 右水煎。裏急後重者。加檳榔木香。  
 煨乾姜。

●溫脾湯(張氏醫通纂)治積  
 久熱。痢赤白。

大黃 四錢 人參  
 甘草 炮製 各二錢  
 熟附子 一錢  
 右五味。水煎。溫服。冷痢。去甘草。加  
 桂心三錢。倍人參。附減大黃一錢。

●逐瘀湯(醫癘手引草)治赤  
 痢血痢。痛不可忍。於血痢。其効。

如神。

阿膠 枳殼  
 茯苓 茯苓  
 白芷 川芎  
 生地黃 莖朮  
 通草 五靈芝  
 甘草 生各一錢 檳榔 一錢半  
 大黃 一錢半 芍藥 一錢  
 右入蜜服。

●痢効湯(中國經驗方)治痢氣

木香 吳茱萸  
 茴香 玄胡索  
 益智 蒼朮  
 香附子 當歸  
 川烏頭 山梔子  
 砂仁 甘草

右水煎服。

◎退痛散(中國經驗方)一切痢氣之主方也。

檳榔 石榴皮 或根 甘草

右四味水煎服。

◎四君子湯(醫道重寶記)凡諸病氣虛者主用之。

人參 白朮 茯苓 各二分 甘草 一分

右四味入姜棗煎。

◎尚香散(名家方選)治疝氣腹脹痛或引囊及盛去者。

鹿角霜 五兩 尚香 二兩 胡椒 一兩

右三味爲末糊丸。

◎神効丸(上池秘錄)治一切痢氣。

木香 吳茱萸 各七分

茴香 玄胡索

益母仁 蒼朮

香附子 當歸

川烏頭 山梔子 各一錢

砂仁 七分 甘草 三分

右爲末糊丸。

◎十味蒼柏散(醫藥方規矩)

治痢痛。

蒼朮 栝子仁

香附子 君 香皮

玄胡索 益智

桃仁 臣 茴香

附子 甘草 佐

◎神明散(醫藥方規矩)治痢氣。

玄胡索 三十錢 吳茱萸 三十錢

木香 五錢 甘草 二錢半

右爲散用白湯送下。

◎退痛散(妙藥秘錄)治痢氣。

檳榔 石榴皮

陳皮 甘草 各等分

右水煎。

◎治疝氣小腹痛。

五靈脂 玄胡索

烏頭 等分 吳茱萸 等分

右水煎。(上池秘錄)

◎治疝氣方。

胡桃肉 黑胡椒

紅花 各等分

右照常服用。

(妙藥妙集)

右十三味為水瀉丸。

●治久年痛氣。

●治痛氣。

●治痛氣。

●治痛氣。

當歸

長鬍子

菊葉 六月中取之陰乾一錢

柚核 大

川芎

蒼朮

益智

藤葉 同時取之陰乾一錢

苦夏根 皮

山查子 各中

木香

茴香

右二味應用。

(中國經驗方)

甘草 少

右水煎服。

砂仁

吳茱萸

●治痛氣。

●治痛氣。

索肉

橘核

罌子木 一錢

甘草 五分

天木壘

橙皮

川烏頭

川楝子

柏子 三粒

(中國經驗方)

胡椒

山梔子

右水煎。

右三味等分為細末白湯送下。

### 痔 Haemorrhoids 痔疾

#### 病解

本症為發於肛門內外之痔瘡。其種類甚多。直腸痔瘡有血液積聚。而痔脈怒張。有如瘤之形狀。現於肛門之內者。曰內痔。靜脈破裂而出血者。曰痔血。肛門之周圍起腫瘡。開口於外方之皮府。或

內方之直腸。皆口痔。然痔瘡之痔。指

宜痔而言。宜痔有內外之二種。現於肛門

外者曰外痔。生於肛門內者曰內痔。其症

痛。肛門常覺刺熱。便通之際。疼痛頗劇。繼

以出血者有之。肛門瘻而糜爛之時。起

用烈者亦不少。

攝生法 刺或劇烈之食物如芥子胡

椒。胡椒。薑等之含辛味者與酒精飲料如

酒。葡萄酒。皆宜忌。行適當之運動。洗滌或

藥與本症有絕大之關係。凡關於坐面營養速動不足之人。(例如官吏、商家、學生等) 腫之最易。男子較女子易罹此症。

處方

外國方

●重酒石酸加里

二錢

●硫黃華

二錢

右爲散藥。分作三包。每日用。

●カスカラ、サクラダ 洗滌痔幾斯

右每限十滴至二十滴。一日服三四回。

●人工加兒爾斯泉鹽

三錢

右每鴨和酒宜之水。一回用之。

●複方甘草散

三錢

●重碳酸曹達

五分

右爲散劑。分作六包。一日服三包。

●游那葉末

一錢

大黃末

五分

●硫黃華

二錢

白 糖

五錢

右爲散藥。分作拾包。一日服三包。

●重酒石酸加里

七錢

● 粉

二錢半

右研細爲粉。以其一錢乃至二錢。溶於白糖水。於午前服用之。

● 藥性腐偏遠矢亞

五錢

白糖末

五錢

茴香油

十滴

右研和爲散劑。一日服二回。以其一錢。和於牛乳或水用之。

●安息香脂

一錢

(宜以巴刺質紙包之)

● 蜜 蠟

五錢

五倍子

五錢

● 柯柯阿醋

一錢半

右四味。爲坐藥十個。朝夕一個。插入於肛內。

● 單尼寧

二分

● 莫里斯林軟膏

三錢

右藥和。貼布於患部。

● 五倍子

一錢

安息香脂

七錢

阿列布油

二錢

右爲軟膏。於疼痛時塗布之。

● 安息香脂

一錢

● 刺納林

五分

● 薔薇水

三錢

右藥和。爲塗布劑。

中國方

●當歸連翹湯(醫聚類方規類)

治痔漏。

當歸 連翹

防風 黃芩

荆芥 白芷

芍藥 生地黃

山梔子 大黃

人參 阿膠

地榆 各等分 烏梅 一個

甘草 減 大棗

●參芪湯(醫道日用綱目)治肛

門漏出虛。

人參 黃芪

當歸 芍藥

白朮 生地黃

茯苓 各一錢 升麻

桔梗 陳皮 各五分

甘草 三分

右十一味入姜棗煎服。

●秦芫防風湯(醫道日用綱目)

痔漏每日大便時疼痛者以此

治之。

秦芫 一錢半 防風 一錢半

當歸 一錢半 澤瀉 六分

黃柏 五分 大黃 三分

陳皮 三分 柴胡 三分

升麻 三分 桃仁 五分

紅花 一分 甘草 一分

右十三味煎用。

●三神丸 治無酒色但飲食久

虛成痔者。

枳殼 皂角

五倍子 右爲末蜜丸。

●蝮牛肝 治痔漏瘻痔上其痛

立消。

蝮牛 一錢 片磁

麝香 各少許

右搗細取汁。

●加味四物湯(醫方大成)內痔

痔漏下血者主用之。

當歸 芍藥

川芎 地黃

黃芩 黃柏

槐花 各等分

右水煎。

●治痔濕方。

荆芥 槐實

地黃 各八錢 大黃 五錢

右四味水煎以鹿角子絹二十錢分

爲七分。臨時搗入煎湯送下。凡七日

服盡。  
(名家方選)

◎痔瘡洗方

天木香 木綿實 各十錢

右二味煎汁。洗瘻下最妙。

(名家方選)

◎煎痔法

取馬鬣溫而蒸之。  
(名家方選)

◎治疣瘡方

胆礬 枯礬

莽草 各五分

右三味水煎。洗痔。每日三次。其疣自

消。  
(名家方選)

◎痔瘻便藥方

蜆蚶油 蝸牛油

杉脂油 琥珀油 各等分

右四味調和傅患處。  
(名家方選)

◎治痔瘻方

紅花 四錢 草薺 三錢

桔梗 三錢 甘草 二分

白朮 三錢

右五味。作四帖煎服。  
(藥寶照集)

◎煎痔藥方

蒼蘆 芫荽

桐皮

右水煎。  
(妙藥秘藏)

◎治痔瘻方

槐花 炒 枳殼 各等分

右以醋及糊爲糊。做大丸。藥以二千

粒。用於食前。  
(得効方)

### 第二章 神經系病

#### 卒中 Apoplexie foudroyante 卒中風

病解

卒中因腦蓋腔之出血而起。罹之者以平素富饒之人與酒客及平生懶惰或精神過勞之人爲多。人體十分肥滿

者最易罹此症。大抵四十歲以上之男子。罹之較多。三十歲以下者。除未患梅毒之時。罹之者少。女子較男子少。身體勞動過劇之時。或精神發揚之時。往往發生。雖咳嗽及噴嚏。亦爲其誘因。發之前。先患眩暈。頭痛。鈍痛。精神緩鈍等。或有身體倦怠。精神抑鬱。便秘等症。患者嗜飲。腦中有異常之感覺。稍經時日。漸漸不省人事者有之。或毫無前兆。猝然不省人事。卒然倒仆。因之而四肢痠軟者有之。通常雖卒中症者。倒仆時便全身弛緩。顏色蒼白而失活動之能。卒倒後經數日。或致時而死者。係重症。昏迷之度。漸漸減少。而仍得醒覺者。爲輕症。但其時患者之苦。大抵運動澀滯。不克隨意言語。或記憶力減少。世事皆記憶。而近事反不能記憶。辨別事理。非富理

純。有時氣質亦變化。溫和者一變而爲粗暴。剛毅者一變而爲柔弱。或癡呆者亦多。本症之輕症。世間稱之謂中風。攝生法。多血者肥滿者多飲酒者。恒爲卒中之一原因。或有爲祖父之遺傳者。預防法。不可耐飲。排便之際。不可努力。恐致血液壓上。熱湯汗浴最易發生此症。故不可不廣苟非衰弱之人。均宜食淡泊之物。警導。使預防其發。常執規律。最正之職業。不可流於安逸安樂。發病時。身體宜安靜。臥床須十分延停。不可稍有鼓瑟。傍人發高聲。而令病者醒覺。最爲有害。故患此病者。宜臥於靜室。顏面紅潮均熱之時。宜令面部稍高。用冰袋冷却之。

●人工加爾兒斯泉  
右分八包。一日服用二包。  
十錠  
但有卒中之一原因者。爲預防之法。平素宜一日一包。早朝服用。又當整理便通。

●復方大帶丸  
右一同服用五粒乃至十粒。  
五錠

●游那藥  
舍利藥 五錠  
薄荷藥 一錠  
右作振出藥三個。每回一個。一日服用二回。

中國方  
●八味順氣散(醫方大成)一中  
風。正氣虛衰。延緩醒者。宜用此藥。

白朮一錢 茯苓一錢  
 青皮一錢 陳皮一錢  
 白芷一錢 烏藥一錢  
 人參一錢 甘草五分

●烏藥順氣散(醫方大成)中

(風)通身麻痺。言語蹇澀。口眼

喎斜。喉中氣急。面有痰者。宜用

此藥。

麻黃二兩 陳皮二兩  
 烏藥二兩 川芎二錢  
 枳殼二錢 枳殼二錢  
 白芷二錢 甘草二錢  
 桔梗二錢 炮姜二錢

●防風通聖散(雲林醫聖)(中

風)治中風風熱邪。

防風四分 當歸四分

川芎四分 白芍藥四分  
 連翹四分 薄荷四分  
 麻黃四分 石膏八分  
 桔梗八分 黃芩八分  
 白朮三分 梔子三分  
 荆芥三分 滑石二錢四分  
 大黃四分 芒硝四分  
 甘草一錢

右鈞爲一劑。生薑煮服。

●小續命湯(醫方大成)辛倒而

人事不省。口眼喎斜。言語蹇澀。

痰涎甚多。筋脈拘攣。轉側不能。

元氣大虛者用此藥。

麻黃一錢 人參一錢  
 黃芩一錢 芍藥一錢  
 川芎一錢 甘草一錢

杏仁一錢 防己一錢  
 肉桂一錢 防風一錢  
 附子五分

●大秦芫湯(醫道日用綱目)

(中風)中風手足。舌強不能言。

語者。用此藥養血。則節自榮。

右水煎服用。

秦芫二錢 羌活二錢  
 獨活二錢 防風二錢  
 白芷二錢 白朮二錢  
 石膏二錢 黃芩二錢  
 芍藥二錢 生地黃二錢  
 熟地黃二錢 茯苓一錢  
 川芎五分 細辛五分  
 甘草五分  
 右十五味煎。

●薏苡仁湯(張氏醫通氣要)治

中風濕痺。關節煩疼不利。

薏苡 一兩 芍藥 一錢半

當歸 一錢半 麻黃 八分

蒼朮 一錢 肉桂 八分

炙甘草 七分 生姜 七片

右水煎。

●貝母瓜蒌湯(醫方大成)(中

風)中風。口眼喎斜者。以此治之。

貝母 瓜蒌仁

甘松 荆芥

防風 (羌活)

黃栢 黃芩

黃連 白朮

陳皮 肉桂

麗靈仙

天花粉

右入姜煎服。

●十仙湯(醫道日用綱目)(中

區)中風。半身不遂。身痺等。有

桃仁 七錢 白芷

薑本 稀莖 各五錢

丁子 (甘松)

白檀 各四錢 真蒲根

石薺蒲 桑白皮 各三錢

右用酒洗湯。

●五枝湯(醫道日用綱目)(中

風)用於中風之痺。或半身不遂。

椿枝 槲樹皮

榆枝 柳枝

桑枝 各等分

右煎湯。

●稀莖丸(上池秘傳)治中風。

稀莖 一味 不拘多少。五月間採收。洗去上。摘其

葉及枝頭。用好酒九蒸九曝。不必大

燥。但取蒸黑為度。綠蜜為丸。

●五輪湯(醫方思矩)治中風

諸病。

人參 五分 白朮

茯苓 芍藥

川芎 生地黃

熟地黃 半夏

天麻 各一錢 當歸 五分

黃連 黃芩

陳皮 防風  
 四活 羌活 各六分  
 梧子仁 四分 天南星 一錢半  
 甘草

右水煎。

●加減續燥湯（醫道日用綱目）

左半身手足不遂。嗜欠。眼口歪。  
 斜。目昏。痰火。筋起。筋骨時痛。心  
 悸等者。以此治之。

芍藥 二錢 當歸 一錢二分  
 川芎 白朮  
 茯苓 半夏  
 天南星 天麻 各一錢  
 陳皮 薑炒 生地黃  
 熟地黃 酸棗仁  
 黃芩 牛膝 各八分

羌活 桃仁  
 防風 肉桂 各六分  
 黃柏 二分 紅花  
 甘草 各四分

右二十一味。入竹瀝姜汁煎之。

●加減除濕湯（醫道日用綱目）

右半身手足不遂。筋骨疼痛者。  
 以此治之。

白朮 一錢二分 茯苓  
 當歸 陳皮  
 半夏 赤芍藥  
 蒼朮 黃連  
 黃芩 烏藥  
 枳殼 羌活 各一錢  
 白芷 九分 人參  
 川芎 桔槔

防風 甘草 各八分  
 右十八味。入姜煎服。  
 ●參茸三聖散（張氏醫通醫要）  
 治風中血脈。左手肘發。口目左  
 喎。

當歸 肉桂

人參 各等分

右爲散。每服五錢。去滓。早暮各一服。  
 ●攝生飲（藥方規矩）治一切卒  
 中無熱者。

蒼朮 細辛  
 石膏 各一錢 木香  
 半夏 一錢半 天南星 一錢半  
 甘草 一錢  
 右七味。水煎服。  
 ●清痰順氣湯（藥方規矩）治風

中經絡、口眼喎斜。

貝母

雲蘇 木瓜 各五分  
右十味、姜煎。

●附子散(藥方規矩)治左半身

不遂、四肢無力、痰涎壅盛者。

麻黃大 附子中

右十五味、水煎服。

細辛少 干姜

●愈風湯(藥方規矩)治一切風

桂枝 人參

此方。 愈風湯(藥方規矩)治一切風

防風 川芎

此方。 愈風湯(藥方規矩)治一切風

羚羊 各中 竹瀝

人參二錢二分 白朮二錢二分

右水煎。

常歸二錢二分 川芎

●勻氣散(藥方規矩)治手足不  
能屈伸、半身不遂、口眼喎斜、風

●祛風導痰湯(藥方規矩)治中  
風中氣、痰氣迷悶。

藥不愈者。

風中氣、痰氣迷悶。

木香 四錢 烏藥 三錢

天南星 半夏

陳皮 半夏

天麻 人參 各一錢

茯苓 連翹

茯苓 各一錢 芍藥酒炒一錢

沉香 白芷

黃芩 白朮

羌活 各七分 甘草 二分

青皮 甘草

枳殼 瓜蒌仁 各一錢

●順元散(藥方規矩)治痰涎忽

寒氣犯中氣症。

天南星 一錢 川烏頭 各半錢

木香 二錢半

右三味水煎服。

●傷正湯(藥方規矩)治風中氣

絡口眼喎斜。

烏藥 防風

荆芥 細辛

黃芩 芍藥

當歸 天麻

川芎 白朮

茯苓 陳皮

半夏 枳殼

白芷 白礬

甘草 生薑

右十八味水煎服。

●如程散(藥方規矩)治中風口

眼喎斜神方。

當歸 川芎

白朮 芍藥

茯苓 陳皮

半夏 枳殼

白芷 桔梗

白礬 防風

荆芥 細辛

黃芩 烏藥

甘草 生薑

天麻

右十九味水煎服。

●木香順氣散(藥方規矩)治中

氣痰詞。

木香 檳榔 各五分

桂枝 干姜

甘草 各一分 烏藥

香附子 青皮

陳皮 半夏

厚朴 枳殼 各一錢

生薑

右十三味煎服。

●地黃散(藥方大成)中風

腎虛弱舌瘡不能言足癱不能

行者用此治之。

熟地黃 巴戟

山茱萸 肉蓯蓉

石解 附子

五味子 茯苓

石菖 遠志

肉桂 麥門冬

右每一劑。入薄荷少許。入姜棗水煎。

服之。

### 腦充血 Gellinypernamie 逆上

病解

循環於吾人頭腦之血液。較平日檢送或多或少之時。必起疾病。前者之現象曰腦充血。後者之現象曰腦貧血。腦充血者。因過飲酒類。精神過勞。喫烟過度。便秘。心臟疾患。月經閉等而起。其症狀。為

面部紅潮。耳鳴。頭痛。眼火閃發。眩暈。惡心。嘔吐等。有時發謔語。虛性者。顏面呈蒼白色。頭搖耳鳴。頭部覺壓重。四肢倦怠。療法之目的。大都用下所列之藥劑。

● 臭素加里 一錢  
● 砒酸加里 一錢  
● 崩那葉末 四錢  
● 大黃末 五分  
● 芒硝 三分

● 臭素加里 一錢  
● 砒酸加里 一錢  
● 崩那葉末 四錢  
● 大黃末 五分  
● 芒硝 三分

● 臭素加里 一錢  
● 砒酸加里 一錢  
● 崩那葉末 四錢  
● 大黃末 五分  
● 芒硝 三分

● 臭素加里 一錢  
● 砒酸加里 一錢  
● 崩那葉末 四錢  
● 大黃末 五分  
● 芒硝 三分

### 腦貧血 Gehimnemie 辛荷

攝生法 酒客或肥胖者。平常服加爾兒斯泉。務使不至便秘。充血頗甚之時。頭

右以水溶解之。一日三回服用。

● 臭素樟腦 一分  
● 乳糖 一錢  
● 臭素加里 一錢  
● 崩那葉末 四錢  
● 大黃末 五分  
● 芒硝 三分

● 臭素加里 一錢  
● 砒酸加里 一錢  
● 崩那葉末 四錢  
● 大黃末 五分  
● 芒硝 三分

● 臭素加里 一錢  
● 砒酸加里 一錢  
● 崩那葉末 四錢  
● 大黃末 五分  
● 芒硝 三分

● 臭素加里 一錢  
● 砒酸加里 一錢  
● 崩那葉末 四錢  
● 大黃末 五分  
● 芒硝 三分

病解 腦貧血既如前述。為腦部血液

卒然減少之症。此俗所謂卒倒是也。起始

時。眼火閃閃。耳鳴。眩暈頗甚。四肢厥冷。

汗滿背。遂至失神。其外觀上與逆上異者。

但顏面呈蒼色。頗甚耳。大部起於重病後。

或劇烈勞動。或病血者等。婦人女子。固非

常之驚愕而卒倒者有之。其療法當卒倒

之際。顏面蓋以冷水。用下列之方以療之。

其經久者。大部由亡血而發。行貧血性下

之療法便佳。

撕生法 人若猝然卒倒失神。先令患

者平臥。額面灌以冷水或香水等。將下記

之氣附藥含於口內。以水導下。此時纏絡

身體之衣服市帶。以弛緩為要。

處方 外國方

●薄荷腦

右管適宜入於口內。

●薄荷腦

麝香

龍腦

丁香

肉豆蔻

右昆布。以蜂蜜適宜混酒。以辰砂看

●硝石

麝香

龍腦

薄荷腦

右混和。為氣附藥。

●安母尼亞水

右失神之際。宜令嗅入之。

與奮藥及氣附藥 與奮藥。有發揚

精神及身體諸機能沈衰之效果。而

往往使用之時。於健全之體。生急慢

二性之疾患。此與奮藥中。於失神之

際。有回復生氣之作用者。俗稱之曰

氣附藥。有左之數種。

藥名 使用法

麝香……………內服

龍腦……………皮下注射或內服

酒精……………內服

勃蘭地酒……………內服

依的兒……………嗅用

甘硝石精……………內服

薄荷腦……………嗅入或內服

癩痢 Epitheliosis

病解 此症爲伴失神與癩瘰之慢性疾患。基於大膿皮質之機能之反射刺激。發生時有重症癩瘰之別。重症發生之前。不問有癩瘰與否。均猝然卒倒。全身之筋肉起攣攣。大呼吸而軀幹反張。眼目直視上方。顏面呈蒼白色。其次則口中噴白色之泡沫。呼吸斷續。此時往往有瀉瀉屎尿者。發此種症狀後。暫時即解。呼吸亦暫顏面皮膚仍如常。漸漸或立眠症。醒後覺頭痛。或倦怠。或即變爲健體者。亦有之。癩瘰症者。有三種之別。一種爲時益而片時間。意識朦朧者。一種爲時息而之意證低亡者。一種有強暴之行爲者。其原因爲遺傳。其他如婦人之生殖器癩。膿皮之炎。癩。

內寄生蟲之異常發育。精神過勞等。皆爲本症之誘因也。  
 攝生法 雖本症者。宜避精神之興奮。不可過勞。或作事過勞。營規則嚴正之生活。禁飲酒及房事。手淫等。夜間不可作事。養成早起之習慣。強壯者。食蔬菜類。虛弱者。擇富於滋養品而易消化之物。以防便秘。此症往往猝然發生。不可於河海岸或中陸等危險之處游玩。或獨對火爐等而取暖。凡危險之事。不可不慎。苟有發作之前兆。可別則嚙下一握之食鹽。以預防其發生。

- 外國方
- 臭紫加里 一錢
  - 大黃末 二分
  - 桂皮末 五分
  - 右爲百二十九。一回用三十九。一日三回服用。
  - 礬砂 五分
  - 癩草末 一錢
  - 臭紫莖末 二分
  - 右爲百二十九。一回用三十五。一日三回服用。
  - 臭紫加里 一錢
  - 右以水一合溶解。一日分二回乃至四回服之。
  - 臭紫莖末 一錢

錫萃丁幾

一錢 中國方

水

二十錢

●人蓮丸(上池秘錄)治癩病積。

右一日服三回。但服用之際。當以適宜之水或茶。混和用之。

人參 黃連 吳茱萸 各等分

●吳素加里

一錢

右糊丸。

斯爾仿那兒

五分

馬壘

●多鬆散(上池秘錄)理癩病。

右研和為四包。臨床時服用。兼患不眠者。一包。

水 蛭 各燒為霜等分

歇私的里 *Lysteria*

病解 自春機發動期至二十五歲之婦人。罹此症者甚多。男子較少。其徵候。先有精神之變。喜怒哀樂之情。極易。精神。性發作反張。身體屈曲。出嚙語。其時牽引。暫時興奮。健康者。毫不介意之刺戟。彼則衣服。咬嚼物體。或呈忿怒之狀。或呈悲哀。以為極重大。他人所不信認者。彼則故意。嗜食木片土塊。生如有球體。上下於。誇張其事。柔和之婦人。一變而為粗劣。嗜嗜。嗜之成覺。此謂之歇私的里。皮膚之。

知覺改常。以針或刀。刺之。絕無痛痒之。成覺。以鈍器與之。接觸。覺異常疼痛者。有。之。分泌物。亢盛。生理上之衛生。絕不緊要。屢屢進出。多量之乳汁。淚。尿。液之。排。異常增加者。有之。其原因。為遺傳性。有。神經。之。質。之人。亦易發生。其他。基於。妊娠。血。

●據藥劑方

大 奎

水 蛭 各為霜等分

右二味。服一錢。白湯送下。日二服。至七日不發者。可令試食。極弱。如再。發者。又作。前法。食。不發者。為。全。愈。

(名家方選)

生殖器之疾患、精神之激動、久時之鬱悶、攝生法、以安慰精神爲惟一之策。宜爲溫泉之入浴、郊外之散步、玩物以消空閒之時日、總以不注意家事爲要食品宜擇富於營養而爲患者所好之物、信用之醫師、須十分尊敬、賴伊醫治。

處方

外國方

●臭奈加里

炭酸鐵

攝草木

右爲丸藥百二十粒、一回服十五粒、一日三回。

●阿魏

蘆香

藥用石鹼

一錢

一錢

一錢

玫瑰蜜

右爲丸藥、均作二百四十九、用六粒、乃至十粒、一日分三四回服。

●海狸香丁幾

琥珀丁幾

加蜜刺花油

右每服十五滴、一日三回。

●海狸香丁幾

攝草木丁幾

薄荷油

右混和、每回服十五滴、一日三回服用。

●琥珀丁幾

芳香丁幾

薄荷油

右混和、以二十滴乃至三十滴和於

一錢

一錢

一錢

糖水、一日二回服用。

●依的兒製攝草木丁幾

甘肅石精

右混和、每回十五滴、一日三回服用。

●橙花

歐栗酸柔

細草根

薄荷葉

泊美藍

右作茶出茶四個、每次一個、一日三次服用。

●橙花

刺片

薄荷葉

細草根

右爲藥出藥、一日服三回、乃至五回。

一錢

一錢

一錢

植物性神經病及其製法 植物性神經病。其植物性之藥物。而能達其作用於植物性者也。例如海狗髮。回生之菊。橡膠。呈與會作用。滋草有鎮痲之効等是也。而本種藥物之効用。大都本於各藥物所含有之揮發油。或揮發性物質者。至其製法。則浸劑。(抽出藥) 丁幾劑。凡藥於血之道。如古來稱用之煎劑。斷不能以供用者也。茲舉中外藥中之植物性神經藥之著明者。列之如左。

丁香	胡椒								
丁香	胡椒								
丁香	胡椒								
丁香	胡椒								
丁香	胡椒								
丁香	胡椒								
丁香	胡椒								
丁香	胡椒								
丁香	胡椒								
丁香	胡椒								

●清血劑(藥方書)治諸血之道。  
香附子 百六十錢  
三分全部一酒浸。二蒸。三炒。  
當歸 二十錢 川芎 二十錢  
我 十錢  
右為細末。白湯送下。  
●血之道藥(妙靈秘膏)治一切血之道。  
蒲黃 四錢 我 九 四錢  
香附子 四錢 茯苓 四錢  
右為煎藥。

依卜昆埤兒 Hippodriasis 憂鬱病 心風 心疾

病解 罹此症者。常憂慮自己身體之狀況。雖微小之障害。或不屈。亦有如而恐。業之人。易罹此症。精神之激動或疲。罹重病之虞。在精神病與神經病之中間。勞。咖啡。茶。煙。之應用。或陰萎等。皆為誘。起本症之原因。起憂鬱。怯懦。陰癆。場惡。經過公園。廣街等。忽發眩暈。心窩。覺壓迫。心悸。亢進。全身蒼白。冷汗。淋漓。覺異常衰。

弱。身神均若減者然。便秘等。其他文  
呈種種之症候。本症殊無發病之療法。今  
強舉於下。

**攝生法** 禁規律正之業務。擇富於  
滋養之食物。令患者極信用之醫師。懇  
之。優遊於山水花木之間。便適宜整理。行  
游泳。習舟。銃。蹴。走等。則大佳。

**處方**

**外國方**

●焦性磷酸鈣

一錢

鹽酸規尼迨

五分

右爲丸藥。勻作百八十九丸。一回二

丸。一日三四服用。

●焦性磷酸鈣

五分

利皮古氏肉桂發斯

二錢

右爲丸藥。勻作百五十九丸。一回十九。

一日三四服用。

●次亞磷酸曹達

二錢

機那越發斯

一錢

右爲丸藥。勻作三百丸。每服五丸。乃

至八九。一日三次服用。

中國方

●正氣天香湯(醫道日用綱目)

治諸氣逆上。心胸脇痛。

香附子 八錢 烏壘 二錢

陳皮 一錢 紫蘇 一錢

干姜 五分

右水煎。

●分心氣飲(醫道藥方規矩)治

男婦一切氣不和而發作之諸

症。

大腹皮

芍藥

通草 半夏

桑白皮 茯苓

桂枝 甘草

陳皮 青皮

羌活 各四錢 紫蘇 十六錢

右加姜棗煎心草水煎。

●治婦人一切之病氣及男子氣鬱。

香附子 三分炒

茯神 三錢

陳皮 二錢炒

甘草 三分

右爲末。白湯送下。(醫方大成)

頭痛 Cephalgia

(附) 偏頭痛 Hemiparitia

病解 起頭痛之原因甚多，分為自症、係於腦充血及貧血或吸烟飲酒過度或候性而來與習慣性而來之二種。

(習慣性頭痛) 熱帶諸症，例如瘧疾、流

行性感冒、瘧疾、痘毒等，往往發頭痛，亦有(覺學性頭痛) 為神經衰弱等所誘，因而發者，大都由幼學、書讀、手淫等所致，其症

等相伴而起。梅毒及酒精中毒，亦誘起頭痛。神經衰弱症中之腦膜炎、神經衰弱

候於前頭及後頭覺沉重，理解力非常散退，目前所讀過者，雖關於執業之事，亦均忘却，即幾回反覆，亦茫然而不克記憶。神經弱，消化不良，思便秘，不克安眠。頭面

者 (習慣性頭痛) 此症療治甚難，大都由神經過勞而發。俗間曰逆上之頭痛，即此。四圍如被壓迫，或破碎，或刺衝，或有悶感，或持數甚久，精神倦怠，食慾缺乏，原因大帶

等，往往有之。(偏頭痛) 發於頭部之一側，其中以起於

左側者為多。因神經過勞所致。即政治家、學者及妙齡孀婦之婦女，亦往往有之。身體勞動之人，如田舍野婦，則罹之甚少。發作時突然而來，或因興奮過勞，消化不良而起。患者大都起於全身不穩，惡心、頭重、閃光、惡寒之後，發痛在前額顳額部，漸次擴制，繼起嘔吐者亦有之。其發作時所患之半面呈蒼白色，他半面呈潮紅色。

攝生法 頭部以冷水或冰袋冷却之，以醋、酒精洗滌，大覺爽快。食物用富於滋養品者，脂肪過多之物不可食。以水泳、操舟為佳。郊外之散步，如女子摘草、男子狩

流獵、蹴鞠等，能奏卓效。又習慣性頭痛，患者

時現蒼白色，時現潮紅色，無定。本症身置

困室之地，如官吏、職工、新聞記者，政治家

因釣魚而全愈者有之。由明水秀之地。爲  
頭痛療法之途徑也。本症不宜飲酒喫烟。  
切戒手淫。精神休養。爲治療法上所必要。  
養成早寢早起之習慣。決不可於深夜營  
業。或日已數竿。尚在睡眠中也。

處方

外國方

●硫酸規尼涅

一分半

茶

五分

薄荷腦

一厘

右爲二十四丸。一日三回分服。

●臭素樟腦

五分

茶

二錢

右爲百丸。一回服用十粒。

●癩草酸規尼涅

三分

珈琲末

二錢

右爲百丸。一回服十粒。

●枸橼酸鐵規尼涅

二分

右爲九藥。分作二十四丸。朝夕二丸。

(貧血家頭痛)

●東方大丸

右爲九藥。一回五丸。乃至十五丸。用

於通利之目的。

●安知必林

一分

右爲一包。作一次服。

●咖啡末

五錢

龍腦

一分

臭素加里

一錢

右爲二十包。一日服三包。

●フエナセチン

二分

茶

二錢

右爲五包。一回服一包。

●撒里失爾酸曹達

八分

右爲三包。一回服用一包。

●安質歌貌林

一分

龍腦

五厘

茯苓末

五分

右爲散藥六包。日服三回。每回一包。

●沃度加里

二分半

白糖

一錢

右二味。加達刺龍爲酸讀末少許。作

錠劑十二個。一日服二回。每回服三

個。

●臭素加里

二錢

白糖

三錢

達刺龍爲酸讀

二分

右作錠劑十八個。一日服二回。每回

服用一個乃至二個。

●薄荷油

阿列布油

刺納林

右混和爲塗布藥。

●棒狀薄荷桿

右厚探患部用。

●薄荷油

酒 精

右溶和。擦入患部。

●薄荷油

魚 膠

右魚膠加適宜之水溫溶。冷後滴下薄荷油。攤布於絹布或麥冷紗上。微得淡紅或微綠之色彩。則當以洋紅或綠素着色。

中國方

一分

十滴

五分

五分

五分

五分

二滴

一錢

●羌黃湯(名家方選)治頭項痛牽引肩背者。

防 風 獨 活 各五分

桂 枝 芍 藥 各五分

櫻 皮 姜 黃 各三分

甘 草 一分

右七味水煎服。

●石亭丸(名家方選)治頭痛諸藥不効者。

礞 黃 三十錢 硝 石 十五錢

百 騎 霜 五錢

右三味爲末。糊丸如梧子大。每服自五九至一錢五分。冷茶送下。

●邵梁丸(上池秘錄)治肝腎上逆頭痛。

川 芎 石 膏 等分

逆頭痛。

右爲糊丸。

●菊芍散(上池秘錄)治風熱上攻。頭痛不止。

甘 菊 花 旋 覆 花

石 膏 防 風

甘 草 蔓 荆 子

羌 活 枳 殼 各二兩

右姜五片。水煎服。

●大陽散(醫藥方規矩)治風寒頭痛如破。

荆 芥 香 附 子

石 膏 生 白 芷 各等分

右爲散。白湯下。

●芍辛湯(醫藥方規矩)治熱逆頭痛。

川 芎 一錢半 細 辛 五分

逆頭痛。

白芷 一錢 甘草 炙六錢

生薑 五片 茶 一撮

右水煎。

●治頭痛。

芒硝 辰砂

白芷 黃連

右爲末以白湯送下。

●治頭痛。

黃連 黃芩

石黃 磁砂各十三錢

長砂 乳香

右爲末以白湯送下。

●治頭痛。

薤子 川芎 各六錢

白芷 天南星

烏頭 各一錢 當歸 三錢

右水煎服。

### 神經痛 Nerve Pain

#### 痛解

本症因神經之炎性而發。其作

狀疼痛。初有蟻走狀之感。次發輕微之

疼痛。漸漸劇烈。或猝然起劇痛者亦常有之。

該部之皮膚呈紅赤色。或起水疱。此等痛

因微原痛增加。因神經而發。其詳則詳

見神經痛。其痛常由神經而起。其痛

感起神經痛。

#### 攝生法

精神宜安。避行疼痛部之後

序。或於熱氣或海中沐浴。

處方

外國方

●安加必林

●安加必林

甘草末

右爲丸藥三十粒。一回服用十五粒。

●微里失爾酸曹達

右以水或湯作一次服用。

●安加必林

茯苓末

●安加必林

胡蘆油

胡蘆油

右塗布於移動部。

●臭漆加里

一錢

刺納林

一錢

右塗於背、腰、患部。

●樟草末

一錢

薄荷油

一分

右爲丸藥六十九，每服十九，一日服

加耶和底油

一錢

二回。

的列並底油

一錢

●薄荷腦

一分

胡椒油

一錢

胡椒油

一分

右塗布患部。

●刺賢拜兒油

一錢

加耶布底油

二錢

薄荷油

五分

酒精

十錢

眩暈 Vertigo

病解

眩暈發於食卒。由身外諸物之振盪，或回轉神經之症。或由許多之神經病、腦症等之症候而來。或由胃腸之疾患而發。胃腸疾患中，尤以下腹之滯澀、腸起、此症最易。有神經病者，虛弱者，善飲酒者，肥滿者，重病之恢復期，貧血者，及婦女等，平素往往罹此症。

攝生法

眩暈時，以安靜爲要。劇烈時，服催眠藥使之安眠。因頭部充血而發者，宜冷卻該部。空腹時，食物不可過多。貧血極甚者，重症之恢復時等，貧血卒起立，乘舟車時，舟車不可疾走。常發眩暈之人，不利於觀運動物（波動、車輪之回轉等）因注視之際，於生理作用上，往往起眩暈故也。

處方

外國方

●調草丁酸

二錢

薄荷油

一滴

右每服十五滴，一日服三次。

●薄荷腦

一分

丁香 一錢

香附子 一錢

治寒症 五分

● 瘧疾木脂

大黃 二分

硫黃 五分

酒石英 五分

白芷 五分

右為散梨，分作二十包，一回一包，一日三次。

右以外，應用於頭痛之內服藥，氣附

紫，腦藥，神經藥等之內用劑，大抵皆

能於木瘧奏效。

中國方

● 清量化痰湯（醫道日用綱目）

治散量。

陳皮 一錢半 半夏 一錢半

茯苓 一錢半 枳實 一錢

黃芩 八分 川芎 八分

白芷 七分 羌活 七分

防風 六分 細辛 六分

天南星 六分 甘草 三分

右十二味，入姜煎服。

● 當歸川芎各一錢，以水煎飲。

● 荆芥為末，以白湯送下（廣靈壽急方）

船章 *Mohus nauticus seekrankelets* 注船病

病解 康健之入。往往當乘船之際，起惡心嘔吐，腸起時油，食思缺乏，越有反胃之嘔吐，且起面黃蒼白，身體不穩之虞。此種症狀曰船暈。大都因船位動搖劇烈之時，或船體不甚動搖，而凝視四圍之波

浪高捲而發。又有人雖水波平靜，船而振動之時，即覺神經注之船暈者有之。本症與在高塔，或車上俯視周圍時所發之眩暈為相同之腦疾也。

預防法 乘船之際，擇搖動甚微之大處方 外國方

安知必林

二分 薄荷腦

二分

廣旦斯林

二分

薄荷

三分 白糖

三錢

龍腦

一分

薄荷腦

一分 薄荷油

一錢

龍腦

一錢

龍腦

一分 薄荷油

五滴

右為神。每回服十五滴。

一錢

乳糖

五分 右為神。一回服三十滴。

一錢

滋養精

一錢

右為最藥。分作三包。一回服一包。

薄荷腦

一錢

右着色為淡紅。一回用十五滴。

適宜

夜驚 Pavor nocturnus 夜夢鬼交

病解 自二歲至十二三歲之小兒。其

之小兒。或有胃弱。下痢。飽食之小兒。往往

眠後。一二三時。間。突然醒覺。其形怖之

發此症。

兒為佳。易驚悸之小兒。寢室宜通背蓋燈。約在就睡前之三十分。時。入浴一次。頗為

舉動。如於夢中。撲所見之鬼。他。同。常。妖

攝生法

夜驚。多發於小兒之精神成

適當。

驚之狀。傍人。恐。驚。之。向。在。手。睡。字。起。之

動。劇。烈。之。時。或。因。查。問。飲。食。過。度。之。故。故

處方

間。經。十二。分。至。二十。分。時。始。安。靜。而。眠。如

其。父。母。須。注。意。小。兒。之。晚。餐。不。可。過。飽。當

外國方

此。種。病。狀。每。夜。數。回。反。覆。或。通。宵。不。止。時

兒。童。之。面。前。不。可。為。妖。怪。鬼。魅。之。談。發。作

●吳素加里

或。於。發。作。後。發。汗。此。謂。之。夜。驚。體。質。虛。弱

時。不。可。以。威。嚇。懲。罰。等。制。之。寧。以。慰。諭。小

白糖

二分半

右製錠劑六個。臨臥前服二三個。

鹽酸規尼運

一分半

白糖

五分

右為丸藥。勻作六十九。一日二回分服。

白糖

二分

右為丸藥。勻作三十九。臨床前服十五丸。

皇素曹達

一分半

五丸

水

十五錢

皇素加里

一分半

右一日三四服用。

鹽酸規尼運

二厘

中國方

### 驚風 *Tetanus infantum* 小兒抽搐

#### 病解

本症為發於二歲至五歲間之因得此病。其化不良。急性肺炎。助膜炎。生小兒抽搐症。突然而來。毫無預兆。發時夫驚。期。喉。抽。搐。等而起。

處方

神思及知覺。眼珠定視。四肢強骨均挺直。

攝生法

小兒之精神。不可激動。即父母亦不可責備。其受驚。或驚怖之舉動。

外國方

一分半至五分

時發抽搐。呼吸不。大小便失禁。面青。咳。

先將其大體。使血液之。及呼吸管。

皇素加里

右為錠劑。隨年歲而定。量。一日三。

頻之。動。有。之。之。

無。當。之。及。以冷。

何服用。

二。

外。發。作。時。短。而。不。醒。覺。以。臨。眠。時。當。若。

亦。若。仍。無。效。應。則。下。部。貼。以。芥。子。泥。

皇素曹達

二。

不。醒。眠。而。醒。覺。性。往。有。三。發。作。者。通。常。

亦。若。仍。無。效。應。則。下。部。貼。以。芥。子。泥。

合。將。藥。酸。送。

二。

右研品。作散藥十二包。由年齡而定  
分量。朝夕二回服用。

◎蘇羅散(萬病回春)治慢驚風

右爲末。於二三歲兒。當食前用五分。

四至五歲兒。於食前用一分。皆以蜜湯

送下。

◎人參湯(小兒療治調法)最

能利氣。

柴胡 黃芩

人參 半夏

枳殼 防風

甘草

右水煎。此於小兒療治中加枳殼防

風也。

◎宜風散(小兒療治調法)治

急驚風。證候不定。

檳榔 二枚 陳皮

甘草 各五分 黑牽牛 四兩半

(半生半炒)

右爲末。於二三歲兒。當食前用五分。

四五歲兒。於食前用一分。皆以蜜湯

送下。

◎五福化毒丹(小兒療治調法

記)治急驚風。痰涎壅滯之症。

桔梗 微炒 玄參 焙各六兩

茯苓 五兩 青黛 炒

牙硝 人參 各三兩

炙甘草 一兩半 麝香 半分

銀箔 八片

右爲末。煉蜜爲丸。每一兩爲十二丸。

於一歲兒。一九分四服。用薄荷油服

之。

◎黃耆湯(萬病回春)治慢驚風

之神藥。

人參 一分

黃耆 二分 蜜水炒

炙甘草 五分 炒芍藥 一分

右水煎。

◎龍虎丹(中國經驗方)治急驚

風之方。

真珠 白姜 蠶

全蝎 龍腦

麝香 甘松 各三分

木香 二分 香附子 三分

菝葜 二分 牛黃 二分

甘草 五厘 沈香 二分

右十二味。糊丸。辰砂爲衣。

◎龍虎丹(中國經驗方)治急驚

蕪風。

全 媽二錢二分 珠二錢二分  
香附子一錢一分 龍腦二錢二分  
甘 松一錢二分 藜朮一錢  
木 香一錢 三稜 八分  
丁 香一錢 麝香一錢  
甘 草一錢一分

開有用人參三分二分，今用八分。  
右研細末，以三年之乾研糊爲丸。如  
麻子大白湯送下。

●七味湯(中國經驗方)治初生  
至三月之驚症。

黃 連 甘 草 各 大  
黃 芩 青 皮  
肉 桂 桔 梗  
遠 志 各 中

右水煎服。

●龍腦丸(中國經驗方)治小兒  
驚癇。

龍 腦一錢 烏 梅 九分  
黃 芩 七分 青 皮  
黃 連 苦 參 各五分  
右龍腦浸汁，日中晒干，研末爲丸。

●鎮驚散(醫方大成)用於急驚  
風抽搐或喉口紅等。

天 南 星 防 風  
蟬 退 薄 荷  
甘 草 白 附 子  
右爲散。

●驚風五疳丸 治驚風五疳。  
麝香 龍腦 各四厘  
烏犀角 五厘 一角 四厘

小茴香 一兩 川芎 一兩

琥 珀 三分二厘  
右七味爲細末糊丸。

●積雪湯(名家方選)治急慢驚  
風。

積 雪 草 藍 藤 各八分  
菝 菝 三分 牛 黃 二分  
右四味水煎服。

●雲金錠(上海秘錄)治急慢驚  
風。大有神效。

人 參 一錢半 白 朮 一錢半  
茯 苓 一錢半 茯 神 一錢半  
赤 石 脂 一錢半 辰 砂 一錢半  
麝 香 牛 黃  
姜 薑 五雲芝 各五分  
青 礬 石 一錢

右爲末。每樽爲丸。金箔爲衣。

⑤寶氣飲（此藥方規矩）治小

兒各病風。此藥不能言。

天麻 羌活 人參

白蘊 各三分 甘草

生薑 各少

神經衰弱症 Neurassthenie

治小兒驚風。熱毒行。抽搐頭固不已者。

連錢草生者一握。碎而相水。取汁。用之大驗。或加薑草。（名家方選）

馬同退 二錢 蜀羊泉

紅花 各一錢 連錢草 五分

右四味水煎。腹痛。加青皮。木香。山椒。（名家方選）

病解 此症大抵因過勞而起。其腦部者。配滋補劑。理力。不能爲精神上之事業。常於前頭。及後頭覺疼痛。思考力減衰。或嗜眠。或精神興奮。而不安眠。起神經性之消化不良。食思減損。情念薄弱。往往有陰痿遺精等症。犯其吞。隨者。背部覺麻重。步行疲弱。四肢寒冷。或覺疼痛。

攝生法 爲精神上之事業。不可過度。例如思想。憂慮等。不可過勞。酒煙及香料等。不可過食。戒房事。淫。食富於滋養品之食物。精神令其安靜。身體之運動。不可不爲。亦不可過度。若有餘暇之人。宜選居於山間或海濱。以傾浴礦泉或海水。爲釣魚。操舟。打獵等事。遊樂之類。遊山水之陶境。不然。即以冷水每週厚。令身體行。

頭部之按摩。於鼻起。亦不可深化營業。處方

外脚方

●柳酸酸親尼運

甘草末 一分

右爲丸。分作三十九。每服五丸。朝夕用之。

●焦性磷酸鈣 二分

●焦性磷酸鈣

● 豆酸規尼溼 一分

● 甘草末 一分

● 右爲丸類。分作六十九。一回服五丸。

● 朝夕服用。

● 吳索加里

● 細草末 一錢

● カスカラ、サグラダ皮末 二分

● 右爲丸藥六十粒。每服五丸。一日服

● 三回。

● 焦性磷酸鐵

● カスカラ、サグラダ流動越幾斯 五分

● 水 六十滴

● 右爲倍類。於十五日內服之。

● 安知必林 一分

● 右於頭痛時。作一次服之。

● 斯爾仿那兒 二分半

● 右爲催眠藥。一回服用。

● 次亞磷酸鈣 三分

● 磷酸鐵 三分

● 規那丁糖 二分

● 右以水一合溶解。一日三回。於十日

● 間服訖。

● 焦性磷酸鐵 一錢

● 規那丁糖 一錢

● カスカラ、サグラダ流動越幾斯

● 毒或鳳梨、イスセンツ 五分

● 波利酒 五分

● 白糖 百錢

● 右爲酒料。朝夕飲一勾乃至五勾。

### 不眠症 *Insomnia*

● 病解 夜間寤寐之時。因腦髓益妨害

● 睡眠之事。而有不能睡眠者。曰不眠症。爲

● 此症原因之疾病甚多。而神經系之疾患。最易時起此症。其他病的症狀。如痛覺障

● 礙。疲勞。悲哀。苦慮等。而不能睡眠。於自覺

● 及他覺。毫無何等之原因。而起不眠症者。

● 曰神經性不眠症。老人婦女等。往往罹之。

● 攝生法 有此病症者。夜間不可勉強

藥業。不可午睡。早晨。或臨時宜稍飲葡萄酒。或行按摩法。就寢。行溫浴亦可。平素精神。上事業者。查問。此。頗有益於身體。食物。避辛烈之味。茶。咖啡。酒類等。不可過飲。

處方

外國方

●斯爾仿那兒

右為四包。臨臥時。以一包作一次服。

●吳素加里

右以水一茶杯溶解。臨臥時作一次服。

●斯爾仿那兒

安知必林

右為四包。一回服用一包。(神經性之疼痛者)

中國方

●珍香散(醫方大成)心氣不足。

精神恍惚。虛汗。睡少。盜汗。多等症。常服此方。自能補益氣血。心神安鎮。

神安鎮。

麝香一錢 茯苓一兩

人參二錢 桔梗二錢

甘草二錢 山藥二兩

遠志一兩 黃耆一兩

辰砂三錢 木香二錢半

右為末。溫酒調服。

●養心湯(醫方大成)勤政勞心。

痰多。睡少。心神不足。以此為主方。

方。

人參 麥門冬

黃連 茯苓

當歸 芍藥

遠志 栝子仁

酸棗仁 陳皮

甘草 蓮肉 各等分

●高香丸(上池秘錄)治肝火鬱熱。不能安臥。

熱。不能安臥。

龍膽草 山梔子 炒黑

大黃 酒蒸 川芎

當歸 酒洗 防風

右等分。蜜丸。竹葉湯下。

●高枕無憂散(醫方秘傳)治夜不眠。

治夜不眠。

陳皮 半夏

茯苓 枳殼

竹茹 麥門冬

龍眼肉 石薺 各一錢半

甘草 一錢半 人參 五分

●安神復醒湯(醫藥方規矩)

治不眠。

當歸 川芎

芍藥 熟地黃

益智 酸棗仁

遠志 山藥

龍眼肉 生薑

大棗

右水煎。

●酸棗湯(醫藥方規矩)治虛

勞煩擾奔氣在胸中而不眠。

酸棗仁 五升 人參

桂枝 生薑 各二兩

石葶 茯苓

知母 各三兩 甘草 兩半

右爲散藥。

神經性心悸 Nervous palpitation

解病

平素雖無心臟實質之疾患。亦

無精神疲弱。身體勞作等。往往起心悸亢

進。呼吸促迫。胸部壓重。脈搏不正者。曰神

經性心悸。本症爲神經性心臟之疾病。婦

人有生殖器之疾患者。貧血者。歇私的。里

衣下。昆埋里等之患者。往往發此症。加理

之嗜好者。嗜飲酒者。房事過度者。亦易發

此症。

攝生法

貧血者用麥黃病條下所得

之強劑。多血者。飲炭酸泉。或加爾尼斯泉。

夜間不可過勞。不可妄起。食富於營養品

而消化較易之物。酒類。茶。咖啡。煙(中

國曰香烟)等。不可過食。爲有規律之晚

務。又當常常運動。每於早起後。以冷水擦

擦身體。

處方

●安知必林

五分

鈣粉

一分

右爲散藥。分作五包。一回用一包。

●安貞歐貌林

三分

丁香 一分

桂皮 一分

茯苓 一分

右爲散藥。分作五包。一回服用一包。

●臭素加里

蘇草

一錢  
二錢  
右爲丸藥。分作百八十丸。一回服用  
三十九。一日服用三回。

書痙 Scheikrampf 口吃

病解

書痙爲發於手指過勞之局部

性痙攣症。寫字。縫工。電信。技手等。往往

觸之。於職業上使用手指之時。起局部之

痙攣或震蕩。肌肉強縮。不克寫字。或縫衣

等。此爲痙攣症之起發門者。或口吃。

攝生法 平素以寫字爲職業者。以寫

大字或草字爲佳。書橫文之時。用軟首筆  
而不用硬筆。

處方 外國方

●的列並底油

刺實珥爾油

二錢  
一分

胡麻油

右塗布於局部。

●加耶布底油

阿列布油

右塗擦於局部。

二錢  
二錢

第四章 傳染病

赤痢 Dysentria 痢病 痢證

病解

赤痢爲瘴氣性之傳染病。起於

晚春初秋之候。便通甚初凝結。其次下痢。劇烈之腹痛與裏急後重。初排出膿黃色

之便。其次則瀉下混血液之粘液。上面後

裏急後重。因之患者不得安息。熱度雖不

高。亦覺衰弱。起不眠。食慾減損。嘔吐。煩渴等症。利尿困難。顏瘦。瘦削。裏急後重。發熱。排遺物漸帶黃色。則爲治愈之象。否則體力稍耗。因之致疑。

**攝生法** 身體宜保安靜。宜戒煙。禁步行。強壯者。絕食二日便可。虛弱者不可食肉羹汁。乳汁。米飯。麵包。馬鈴薯等飲料。用加入牛乳之紅茶。加赤葡萄酒之清水。起煩渴嘔吐者。飲冰片或冷水便佳。預防法當流行時。不可至他處之屋上。閣。或飲污水。并不可與患者之襯衣。臥衾相接觸。凡飲食行爲。常宜守嚴格之規律。

**處方**

●撒里矢爾酸鈣  
重碳酸曹達

五分  
三分

右爲散藥四包。一日服用三包。

●鹽基性沉食酸鈣  
重碳酸曹達

五分  
三分

右爲散藥四包。一日三回服用。

●單寧酸  
柯柯阿膠

二分  
一錢

●單寧酸  
次硝酸鈣

二分  
一錢

右作錠劑十個。每二時服用二個。

●單寧酸  
亞刺比亞酸

一錢  
三錢

白糖  
右作錠劑二十個。每二時服用三個。

一錢  
十二錢

●赤葡萄酒  
カスカラ、サグラダ

十二錢  
三分

石榴根皮越斐斯  
一分

白糖  
二錢

右爲飲料。用一回乃至二回。爲赤痢之預防劑。

**中國方**

●芍藥加芒硝湯(醫方大成)痢疾便膿血。裏急後重者。以此爲主方。

芍藥  
當歸

黃連  
黃芩

木香  
肉桂

檳榔  
甘草

大黃  
芒硝

右水煎。

●行和芍藥湯(醫道日用集)赤痢。白痢初起。頭上則急。

腹痛或腹脹者。以此治之。

芍藥 二錢 當歸 一錢

黃連 一錢 黃芩 一錢

大黃 七分 檳榔子 五分

木香 五分 肉桂 五分

甘草 五分

右九味煎。空心服下。

●調和飲(醫道日用綱目)治痢

病久不癒者。

芍藥 三錢 當歸 一錢半

川芎 黃連

黃芩 桃仁 各一錢

升麻 五分

右七味煎。

●赤白鷄身丸(張氏醫通纂要)

治赤白痢。

白鷄冠花 赤鷄冠花

身伊羅 各等分

右鷄丸如豆大。以丹爲衣。每服五九。

白湯送下。

●牛扁丸(張氏醫通纂要)治一

切痢疾甚妙。

牛扁

右黑霜糊丸如粟豆大。每服二十圓。

以白湯送下。

●和中湯(醫撥手引草)痢疾不

甚實。不甚虛。不偏寒偏熱。不問

赤白通用。

芍藥 枳殼

厚朴 青皮

茯苓 各中 綿砂

木香 乾姜 各小

甘草 右九味水煎。

●如神丸(名家方選)治痢疾神

方。

阿片 一錢 黃連

沈香 砂仁

黃栢 甘草 各三分

右六味爲末。小麥糊爲丸。如梧子大。

朱砂爲衣。

●黃連丸(上池秘錄)療痢無問

冷熱神驗。

黃連 一兩 茯苓 二兩

皮膠 一兩

右先搗連茯苓末。以少許水銜膠和

丸。

●香連圓(上池秘錄)治一切痢

疾。

木香 三錢 黃連 五錢

右爲細末糊丸。

●香連丸(上泄秘錄)治一切痢疾。

黃連 五兩 甘草 二兩

右以蜜水界拌濕。置鍋中。煎湯蒸良久。取出晒乾。如此者九次。然後入木香一兩爲末糊丸。

●三奇散(醫療藥方規矩)治下痢後重。

枳殼 生一兩 黃芩 二兩

防風 一兩

右爲煎藥。

●蒼朮地榆湯(醫療藥方規矩)治痢疾下血。

蒼朮 三兩 地榆炒黑一兩

右爲煎藥。

●清涼四黃湯(醫療藥方規矩)治積熱下痢赤後重甚。

黃連 黃芩 黃柏 黃蘗 各二錢

山梔子 栝子仁 芍藥 芩草 烏梅 神鷄 各五錢 滑石 一兩 大黃 海金沙 三錢 羌活 二錢半

右爲煎藥。

●玄白散(醫療藥方規矩)治痢疾初起。裏急後窘迫。

芍藥 大黃 生地黃 當歸

檳榔 枳殼 茯苓 牽牛半生半炒

黃連 各二錢

右水煎。

●輕車湯(醫療藥方規矩)治男婦一切血痢。

黃連 六兩 干姜 當歸 阿膠 各三兩

右水煎。

●厚朴湯(醫療藥方規矩)治二三年熱痢不止。

厚朴 干姜 膠 各四錢 黃連 六錢 柘榴皮 艾葉 各五錢

右水煎。

●參附芍藥湯(醫道重寶配)治

久痢。

芍藥一錢半 人參一錢

當歸一錢 茯苓一錢

山藥一錢 陳皮一錢

砂仁七錢 甘草五分

右加烏梅、燈心草、蓮肉等煎之。

●痢病丸(妙藥秘製)治痢疾。

黃柏八錢 葛粉四錢

胡椒一錢 赤石脂四錢

右糊丸。

●黃連湯(張氏醫通靈要)治赤

白痢。

阿膠三錢 黃連一錢半

當歸一錢半 炮姜

黃蘗炒黑 炙甘草各一錢

石榴一錢半

右除阿膠水煎去滓，納膠烱化，溫分

三服。

流行性感胃 Influenza

病解

此症自古昔以來，公屬於蔓延頗廣之傳染病。無老幼貧富強弱健否之

恙，與人種亦無關係。無論何人，均易傳染。

當流行時，數回反覆傳染者，往往有之。流

行於家畜之時，以馬爲多，而貓及狗較少。

先發惡寒，頭暈，發熱，發冷，復發發熱，

常感冒諸症。起頭暈咳嗽及全身諸筋之

疼痛。經過二三日，便向回復期。有心臟病

者，或老人小兒，往往病勢增劇。或妊娠難

之，則起流產。或神經之慢性病因而增進。

或謂因此病而月經不調，而瘧風反可全

治。

攝生法 流行性感胃。其病毒潛處於

大氣中而傳染。流行時宜注意。避寒冷及

至病已發生，則守感冒諸症條下所列之

養身法。以保養身體。發熱劇而口渴不堪

時，則食橙實汁或蜜柑便佳。頭痛劇烈之

處方

外方

●撒里失爾酸曹達

右爲二包。作二回服用。

●安知必林

撒粉

五分

二分

二分

右爲散藥。分作二包。一日二次服用。

安質歐說林

八厘

茯苓末

五分

右爲散劑。三包。一日三回服用。

安知歐說林

一分

乳 糖

五分

右爲散藥。四包。一日三回服用。

硫酸規尼理

一分

右爲六丸。一日用一回。或隔日用一回。以預防之目的服用之。

中國方

桂枝湯(醫方大成)用於頭痛

發熱。汗出而惡風。鼻噎。乾嘔。脈緩者。

桂枝 一錢半 芍藥 一錢半

甘草 一錢

杏仁 十個

甘草 五分

右加生薑三片。入水二盞。煎一盞。溫服。

服。

麻黃湯(醫方大成)頭痛發熱。

身體疼痛。骨節不列。惡寒。無汗。

而喘。脈尺寸俱緊者。以此治之。

麻黃 二錢 桂枝 一錢三分

甘草 六分 杏仁 十個

右水煎溫服取汗。

神虎湯(雲林醫報)如感冒傷

風。鼻塞。聲重。及四時瘟疫。頭熱

發熱。宜用此方。

羌活 一錢 川芎 一錢

細辛 二錢 蒼朮 二錢半

香白芷 一錢 藥本 一錢

炙甘草 一錢

右到稍萎三片。葱白三根同煎。不拘

時溫服。

柴胡升麻湯(醫藥方規矩)

治時行溫疫。惡風。壯熱。頭痛。痰

咳。

桑白皮 黃芩 各六分

升麻 五分 荆芥

芍藥 前胡

柴胡 石膏

葛根 各一錢 生姜

右水煎服。

九味羌活湯(醫道日用綱目)

用以治自春至秋之間之傷寒。

傷風。

羌活 一錢半 防風 一錢半

蒼朮 一錢半 白芷 一錢

川芎 黃芩  
生地黃 各一錢 細辛 四分  
甘草 少

右入生薑棗煎服。

●八解散(醫藥方規矩)治四時感冒、發吐瀉、少力者之飲食勞傷。

人參 白朮

茯苓 半夏  
藜香 各二兩 甘草 一兩  
厚朴 二兩

百日咳 *Tussis convulsiva* 連聲咳 頓咳 疫咳

病解 百日咳為一種之接觸傳染病。小兒初生以後六月以至七歲之間。罹之者多。男子較女子輕。強壯者較虛弱者重。症候之經過。約分三期。第一期曰加答兒期。起鼻、咽喉、眼結膜之加答兒。有微熱。年長之小兒發之較遲。幼稚之小兒病勢增進甚急。蔓延及於氣管支。使喉頭發腫聲。此種症狀之連續。自三日至六週。第二期即痙攣期。初則身神違和。喉頭覺接痒。胸骨覺灼痛。其次則咳嗽增加。患兒不堪

其煩悶。咳嗽之發作中。吸息延長。而放叫鳴之音聲。稍有粘稠液吐出。顏面浮腫。作蒼白色。起結膜充血。白血者有之。咳嗽發作之回數。每二十四點鐘內約六十回。其連續有十五分之久。此種症狀之連續。自四週至六週之間。第三期即減退期。發作漸漸減輕。遂至全行消失。然加答兒症尚持續。咳嗽之發作。但夜間甚稀少。努力亦衰。起始時之粘稠而呈白色之痰。至此時則稀稠而呈黃色。此期之連續。自二週至

三週。漸漸治愈。  
攝生法 百日咳為氣中之炭酸增加。咳嗽之回數亦增加。炭酸減少。咳嗽之回數亦減少者。故病室宜寬廣。流通佳良之空氣。夏季宜終日開牖戶。冬季則終日閉。障室之牖戶。每日遷換病室一二回。天朗氣清之日。散步庭園。寒風迅烈之日。安居室內。室內之空氣宜濕潤。故爐上置以水盆。室內每日撒布二十倍之石炭酸水。二三次。咳嗽發作若劇烈者。則浴微溫湯。約

三十分鐘。浴後即就寢。食品擇富滋養料而易消化之物。流質狀之物。易起嘔吐。故食細細之肉類。雞卵。麵包等。稍飲牛乳。肉糜汁亦可。預防法。離隔患兒。健全者不可使與病者之衣衾。手巾。呼吸。唇痰等相接。流行時。小兒不可在校舍之遊戲場。

處方

外國方

加答兒期

●重碳酸曹達

食鹽

右研和爲散藥一包。以水五勺溶解。一日三回服用。

加答兒期

●遠志根末

半夏末

五分 一分

杏仁末

白糖

右研和爲散藥十包。一日服四回。每回一包。

●鹽酸規尼涅

白糖

右研和爲散藥十包。孩兒服一包。和溫牛乳與之。一日三回服用。

●鹽酸規尼涅

白糖

右研和爲散藥十包。每二時。孩兒用一包。乳兒用半包。

●單寧酸規尼涅

白糖

右研和爲散藥。午前及午後。各與一包。

●單寧酸規尼涅

白糖

右研和爲散藥。午前及午後。各與一包。

包。

●單寧酸規尼涅

重碳酸曹達

白糖

右研和爲散藥十包。每二時服一包。用於乳兒及二歲以下之小兒。

●臭素加里

白糖

右研和爲散藥八包。每一時與一包。

●安息香脂末

右吸入於鼻腔內。

●石炭油

右朝夕塗布於胸部。

●硼酸末

右吸入於鼻孔內。

中國方

二分 一錢

二分半 二分半

二分半 二分

一分 二分

三錢 五分

五分 二分

五分 八錢

五分 五分

●治小兒久咳方。

忍冬 劫烏棗  
甘草 各等分

右三味水煎服。兼取白刀豆數枚。投於豬灰中。去皮爲末。白湯攪和調服。之若不止者服紫圓五六粒亦可。

(名家方選)

●治小兒痰癆方。

天南星 巴豆  
朱 各半兩

右三味爲細末。糊丸。服必便膿血。丸藥以不化而下爲度。(名家方選)

●小兒咳嗽妙方。

椒目 桔梗

莖朮 各等分

右水煎服。(中國經驗方)

●治小兒痰癆而吐乳者。

半夏 桔梗  
苦辛 丁子

右研細末。爲丸用服。(醫方大成)

馬脾風 Oroup 格魯布 傷風

病解

馬脾風大約起於一歲至七歲之小兒。男子較女子罹之者多。發輕微咳嗽。稍發熱而呈嘔吐。食思缺損。形容憔悴。遊嬉時現心身不和之狀態。如此三日或四五日間。症候更增進。聲音啞而音調卑。此時咳嗽如幼鷄之鳴聲。有時發吠聲之劇咳。或呼吸促迫。幾至窒息。症候既如此。

則小兒苦悶。官不堪名狀。雖片時亦不克安靜。自掖胸邊。摸頸部。或向右或向左。遂致身體衰弱。不能支持其苦痛。其後衰弱愈甚。驚怖噪擾之狀。一變而爲安靜無慾。精神恍惚諸症。此際已命在旦夕矣。本症瀕死之狀。似無何等之苦痛。宛若睡眠。攝生法 馬脾風。夏時少而冬時多。故

寒烈之候。小兒之咳嗽。不可不注意。縱使病症輕微。亦不可怠於療養。因馬脾風之初期。大抵以微弱之咳嗽爲原因也。及至本症之徵候已見。宜先令患兒靜臥。食牛乳。肉羹汁。酒類等之滋養強壯食物。貼冰壺或濕布於其頸部。

處方

外國方

● 碱設規尼暹

一分乃至一分半

右以飯米爲丸劑。均作二十九。每二

時用二九。

● 鹽酸加里

一錢

水 四十八錢

右以水液解。爲含嗽藥用之。

● 攝溫瓦根末

一錢

過泥子

二分

甘草末

二錢

水 飴

適宜

右混和。以水飴爲煉。一日服數回。

爲二日之量。

● 精製希列並底油

一錢

右以亞刺比亞護膜及白糖煉和。

時間中。分二回服之。

● 石灰水

水

六錢

右混和。每三時用二錢。

● 安母尼亞齒香精

五錢

龍腦

五分

右溶解混和。每時服十滴。

中藥方

● 無價散(小兒療治調法記)馬

脾風有効。

珠砂 二分半 輕粉 半分

甘遂 一分半包於麩煮焙乾

右爲末。以香油一滴。入溫漿水少許

之中。浮置右藥末於其上。俟藥末

下沉。乃去之。而用其漿水。

● 牛黃奪命散(小兒療治調法

記)於馬脾風有効。

白牽牛

黑牽牛 各半生半熟取頭末五分

大黃 檳榔 各一兩

右爲末。於三歲之兒。以其一分。和冷

漿水用之。

● 治暴喘并馬脾風方。

(名家方選)

巴豆 大黃

雞冠石 各等分

右三味。爲細末。煉蜜爲丸。十歲以上。

每服三分。然後服白虎湯。最佳。

破傷風 Tetanus 強直痙攣

病解 破傷風內上壤中所生之一種 肉浸汁頗佳。其預防法當行破傷風免疫 徵菌。寄於身體之損傷部或接種部。漸 漸漸蔓延於全身。先於頭部起痙攣。由是頭 頸、脊部、四肢等覺緊張。終至全身不能自 由。而倒臥於床上。自三日至五日後。呼吸 促迫。心臟麻痺。卒以致死。由外傷而來者。 曰外傷性破傷風。由嬰兒之臍割而來者。 曰初生兒破傷風。因傷風而發者。曰 傷風質斯性破傷風。其他曰原發性破傷 風。療法以日本北里博士血清療法為最 佳。費藥製劑。除用下列之方外。無良策也。

攝生法 患者宜安靜。故住於開散之 靜室。禁音響。訪問。及他之各種刺激。以白 蠟塞耳。食物擇流動性而富於滋養物者。

肉浸汁頗佳。其預防法當行破傷風免疫 注射。初生兒之臍割。傷創用手術等之時。 須注意。

外方 吳素加里 二錢  
水 右二分二回服用。 三十錢

吳素曹達 二錢  
薄荷水 十錢  
右一日二回。和水一合服之。

中國方 羌活防風湯(齊道日用綱目)  
破傷風邪氣在外者。以此治之。

羌活 防風  
當歸 芍藥  
川芎 藥本 各一錢  
地榆 五分 細辛 五分  
甘草 三分  
右九味煎。

●大芎黃湯(齊道日用綱目)破 傷風在內者。以此治之。

川芎 一錢 黃芩 一錢半  
大黃 一錢半 羌活 一錢半  
右四味煎。以大便下為度而止藥。  
●白朮湯(齊道日用綱目)治破傷 風之汗大出。不止。筋攣。手足搖 搦者。

芍藥 四錢 白朮 二錢  
 葛根 二錢 升麻 一錢  
 黃芩 一錢 甘草 五分  
 右六味煎。

流行性耳下腺炎 Parotitis 蝦蟇瘟

●保命丹(上海秘錄)治破傷風。  
 辰砂 麝香 別研  
 川烏頭 半夏 各一錢  
 藥渣 三錢 雄黃 五分

右爲末，棗肉炒丸。  
 ●治破傷風(中國經驗方)  
 芥朮 草烏頭  
 右二味等分，爲細末，用溫酒送下。

病解

罹此症者，耳下腺墩衝躍起，顏

貌奇異，兩頰突出，因之稱爲多福風。病之

起始時，惡寒戰慄，發熱，身體倦怠，食慾減

乏，頭痛，起嘔吐，經過一、二日，耳下微痛，其

次則咀嚼閉口亦困難，耳下腺漸次膨起。

蔓延而至頰部、頸部，顏面呈奇態，發病後

經十日，至十四日，可期全愈。本症一時之

流行甚盛。

攝生法 本症爲危險較少之疾病，自

然放任，罔慮不可，苟保護於溫室內，寒洩

之候，不獨外風便可，該部以綿或布片包

裹之，疼痛劇烈之時，貼以水蛭亦無害。

處方

●外國方  
 沃度丁幾 一錢  
 酒精 三錢  
 右溶解，塗布於局部。

●水銀軟膏  
 右取適宜之量，塗擦於局部。

●石鹼擦劑  
 五錢

右塗布局部。

中國方  
 ●加設敗毒散(醫方大成)治蝦

蟇瘟病。

葛活 枳殼

茯苓 川芎

桔梗 葛根

升麻 甘草

右八味，水煎溫服。

●荆防敗毒散(張氏醫通纂)

治療最速。

一 人參敗毒散加牛蒡子薄荷各一錢

一 防風 一 鉅半

脚氣 Beriberi 緩風 濕痺 脚弱

病解 本症為一種之傳染病。因皮膚之知覺障害、筋之萎縮、麻痺、水腫、脈搏增加等之經過、而分為三種。第一種曰乾性脚氣。步行踴躍、而膝部若不堅固、下肢呈蟻行狀之感覺。緊壓下腹、則有疼痛。稍動作、便心悸亢進。脈搏增加。輕症呈此種之症候。惡克就治。若病勢增加、則下脚有衰弱及麻痺之感。遂至步行極為艱難。其次則四肢均麻痺。尿量減少。經數月而愈。患者極羸瘦。雖少許之動作、亦覺困難。終日惟仰臥而已。然精神如常。第二種為水腫症。脚氣。症候與第一種無異。但起浮腫。先起足腫。或自胫骨為始。漸漸波及於全身。浮

腫面呈黑白色。尿量大抵減少。第三種為惡性脚氣。身體強健者。猝然而來。或經乾性症之諸症候而轉成。本症最為危險。起時稍有微熱。知覺失度及麻痺。脈搏之數增加。心悸亢進。呼吸促進。心下苦悶。并起惡心嘔吐。尿量減少。皮膚呈青色。數日間因劇烈之呼吸促進。煩悶致斃者不少。

飯或如肉類之濃厚食物。以食蔬菜之淡泊食物為宜。資性虛弱。或已衰弱之患者。則食牛肉、雞卵、牛乳等之滋養多而消化易之物。飲料如日本酒麥酒等。含酒精性之別較者。不可食。

攝生法 脚氣病之原因。諸說紛紛無定。因之預防法及攝生法亦無定。但在舉方今醫家汎稱之攝生法如左。

（食物）平常不食食米飯。而以食麥、小豆等之淡泊者為佳。魚類均不可食。凡身體

強壯而向未有衰弱之患者。尤不宜食米

（住居）所居之地。宜選高燥而清氣新鮮之處。濕地或海濱均有害。

（行為）夜間兩脚不可露出。雖酷暑之後。或穿長襪或著襪衣而臥。職業與本症有絕大之關係。執坐業之人。或居矮屋之人。易起此症。倘如學生或居段之人。較諸車夫馬丁等羅之者多。富有者較貧乏者為多。罹病中所最當慎者。劇烈之勞動與房

事是也。往往有輕微之脚氣症因之而至危者。

處方

外國方

硝石

三錢

大黃

一錢

龍膽末

一錢

牽牛子末

五分

右爲丸藥。分作三百八十九丸。一日服

三回。每回三十九丸。

●人工加爾兒斯泉鹽

十錢

右分八包。一日服三回。每回一包。

●人工加爾兒斯泉鹽

十錢

當藥末

三分

右爲錠劑。作三十圓。每回用三個。一

日三回。

中國方

●羌活導滯湯(醫道重訂記)治

脚氣初起。一身悉痛。手足腫痛。

大小便秘結者。

羌活

獨活

當歸

各二錢

防已

一錢半

枳實

一錢

大黃

四分

右六味煎。

●沉香散(名家方選)治脚氣氣

急者。

沉香

二分半

香附子

木瓜

各二錢

締砂

五分

甘草

一錢

檳榔末

五分

鹽

少許

右七味水煎去滓。納檳榔。鹽。攪調溫

服。

●如神丹(名家方選)治脚氣腫

滿。氣衝於心。氣急不可忍者。

羌花

甘草

大戟

各五分

大黃

三分

右四味爲細末。稀糊爲丸。如梧桐子

大。每服五分或一錢。空心時姜湯送

下。宜隨虛實增減之。利水則佳。然勿

令大泄。

●松葉酒(名家方選)治脚氣手

足不仁。或身急及風濕。身體疼

痛不已者。

松葉

三錢

烏頭

姜活

各一錢

右三味。以好酒一升漬一宿。日盡一

●黑豆湯(名家方選)治脚氣上

冲。

黑豆 五錢 大黃 八分

檳榔 一錢

右三味以水三合先煮黑豆取二合

去滓入諸藥再煮成一合熱服

●避衝飲(名家方選)治脚氣

急上行心欲死者

檳榔末 二錢 生姜 五分

京便 二合

右三味攪調一次服下

●七家檳榔湯(名家方選)治脚

氣疎通之劑也

桂皮 三分 大黃

檳榔 一錢 枳實 各五分

甘草 各二分

生姜 各二分

右七味水煎服

●烏頭湯(名家方選)治脚氣遇

身紅腫者

烏頭 桑白

檳榔 各一錢 大黃 三分

商陸 三錢 生姜 七分

右六味以水三合先煮烏頭減一合

容諸藥煮之取一合日三貼

●平水丸(上池秘錄)治脚氣腫

滿水病及下部病

吳茱萸 芒硝

芫花 各三兩 商陸 四兩

甘遂 一兩

右諸丸或蜜丸

●加減青木香丸(上池秘錄)治

脚氣衝心

青木香 六分 大腹檳榔七分

桂心 四分 芍藥 六分

枳實 七分 大黃 一錢

右末和蜜爲丸

●流脚氣急方

礬石 五錢 芍藥

甘草 各五分

右三味水煎洗脚頗妙或少加鹽亦

佳。(名家方選)

●每夜以鹽擦腿膝熱湯溫浸其

足甲。(救急方)

麻疹 Morbilli

病解 本症為急性傳染病。大抵由患者之血液、淚液、涕汗、唾液、呼吸及肌膚蒸發之氣而傳染。或自看護者之身而而傳染。先於皮膚生赤色之斑點。發小結節時。或有一種熱候。人類於畢生之間。必罹一回。當其性症流行之時。在小兒期時。則接觸而傳染者頗佳。但已發病之人。不復傳染。此間稱為免病質者。即此類也。

攝生法 身體靜臥於溫暖之室。不可在戶外逍遙散步。室內足清靜之空氣。又當垂帷帳。使光線不至直射患者頭面。或背窗戶而避光之過明。患者雖口渴不堪。決不可飲冷水。宜食混食糜之溫水。或溫牛乳。為潤食物用肉羹汁。即宜。避其傳染。

雖病必要。然人生必須經過麻疹一次。則當其性症流行之時。令小兒與患者相接觸。後面或免病性頗佳。但惡性症流行之時。不可出外。亦不可令與病兒接近也。

處方

外國方

●加密列花 二錢

洋浮接骨木花 一錢

杏仁 二分

右為二包。入麻袋內為振出藥。一日三回服用。

●櫻汁 十錢

單含利別 二十四錢

右混和。患者已渴之時。取二錢。以水

溶解用之。

●安質狀貌林 一分半

右應於年餘。一回服用之。

●安知必林 一分乃至二分

右應於年餘。一回服用。

中國方

●蘇葛湯(醫藥方規矩)治麻疹之初。熱而未見點者。

紫蘇 葛根

甘草 各二錢 芍藥 一錢半

陳皮 縮砂 各五分

生藥

●升麻葛根湯(麻痘養生集)治麻疹有效。

葛根 三錢 升麻 三錢 芍藥 二錢 甘草 一錢 右四味加姜汁水煎

瘧疾 Malaria intermittens 開散法

病解

一種之微菌生存浮遊於土壤及空氣中。傳入人體內。後便起定期之發熱。名曰瘧。即於二十四點鐘四十八點鐘七十二點鐘之確定期。發生後身神經和衰弱。而消化不良。關節痛等。其寒熱。或毫無豫兆。猝然起倦怠。頭痛。嘔吐。惡寒戰慄。皮膚寒冷。而呈蒼白。因戰慄而咬牙。體溫極高。胸內覺苦悶。嘔吐眩暈而失神者。有之。此謂之寒戰期。經一二點鐘。寒戰遂止。頓覺爽快。同時全身發灼熱。皮膚發赤而腫脹。心悸亢進。體溫益高。此謂之發熱期。如此種病狀。連續二三點鐘或片刻間。皮膚溫潤。脈搏復常。體溫下降。全身發

汗。覺倦惰疲勞面腫。此謂之發汗期。由是以觀。發作後經六點鐘至二十四點鐘後。便復常態。直至次同之發作。絕無障害。則發熱之名。概屬是也。

攝生法

食物宜擇富滋養品而消化容易之物。如米粥。肉羹。牛乳等。飲料除良好之赤葡萄酒外。不宜飲酒。茶。咖啡等。亦為有害。

(預防法) 家宅之周圍。宜多種向日莢。陰濕之土地。宜開通溝渠。浸溼河身。不可出入於流行此症之地。若不得已。而必欲旅行該地。宜擇乾燥之時節。避梅雨之候。家屋宜流通空氣。夜間閉鎖窗戶。清晨或黃

昏。當烟露冥濛之時。若欲外出。則用布巾裹於頸部。香粉。西瓜。胡瓜。糖質等之酸性藥物。不可食。飲咖啡。茶等。河水不可用。雨水。雪水。井水。不得已亦可用之。必須煮沸後方可。飢渴。過勞。及感冒。皆為本症之一大原因。

方

外國方

●鹽酸規尼涅

一錢

右為丸藥。勻作八十九。每服十九。乃至十五丸。於發作前六時乃至八時。間服用之。

●硫酸規尼涅

二分半

煨製麻僞濕矢並

二分

右爲丸劑。勻作六十九。一回服二十丸。一日三回。

●機那皮

五錢

桂皮

一錢

右爲煎劑。二分六回服用。

●鹽酸規尼涅

一分乃至二分

礞砂

五厘

大黃末

五分

右研和。作散劑十包。免熱時。每時用一包。

●單寧酸規尼涅

二分半

白糖

一錢

右爲散劑。分作三包。一日服三回。

中國方

●九味清脾飲(妙藥秘發)治瘧

瘧多寒少。凡諸瘧通用。

青皮

厚朴

蒼朮

半夏

柴胡

黃芩

茯苓

草薢

甘草

生薑炒

右水煎。

●勝金丹(上池秘錄)治諸瘧日久不愈。

常山四兩酒蒸。檳榔一兩

右糯米丸。隨夜臨臥。冷酒送下。

●截瘧湯(醫方大成)治截瘧方。

柴胡

陳皮

甘草

五分

右爲煎劑。

●截瘧飲(上池秘錄)

燈心草 一錢 龜板 五分

辰砂 隨氣五分

右爲細末。白湯送下。

●人參實衛湯(醫藥方規矩)治瘧疾不止自汗。

黃耆

人參

甘草

白朮

芍藥

右水煎。

●人參截瘧飲(醫藥方規矩)治虛人截瘧一切瘧。

人參

白朮

茯苓

厚朴

薤白

青皮

知母

草薢

常山

木鱉子

柴胡 各八分 烏梅 桂枝 甘草 各三分 生姜 大棗 右水煎。

●常山飲子(醫藥方規矩)治諸瘧諸藥不効者。

常山 草葉 知母 各二錢 良姜 一錢半 烏梅 一錢半 甘草 一錢 大棗

●常山丸 撮搗盡。

常山 黃連 香鼓 各三兩 附子 二兩 右蜜丸。

●清脾湯(醫方大成)瘧發而熱多寒少。口苦咽乾。大小便赤澀。

脈來頻數者。用此治之。

青皮 厚朴 白朮 黃芩 半夏 柴胡 茯苓 草葉 甘草 右水煎。

●截瘧清肺湯(醫方大成)截瘧用之。

貝母 二錢 人參 一錢 右水二碗。煎爲一碗。至八分。去滓。隨發日之五更服之。全瘧則當再服。

●治療方。

陳皮 半夏 茯苓 葶藶仙 各一錢 蒼朮 厚朴

柴胡 黃芩 各八分

青皮 檳榔子 各六分 甘草 一錢半

右入生姜三片。水與酒各一碗。水煎至八分。乘飢服之。(世寶傳受藥)

●治療方。

何首烏 二錢 厚皮 茯苓 柴胡 黃芩 各八分 白朮 一錢 雷歸 一錢 葶藶仙 一錢

右入生姜三片。井水一碗。川水一碗。煎至八分。加酒五合再煎。空心服之。

(世寶傳受藥)

●治療方。

梨實 常山 各五分 山椒 三分

右以水一合半，煮八分服之。

(名家方選)

● 散藥方。

椒目一錢 厚朴八分

右二味以水一合半，煮至一合，一次服之。

● 治藥母方。

反鼻 常山

(名家方選)

大黃 磁甲 各一錢

古四味為散，白湯送下。(名家方選)

● 治瘡方。

唐常山 檳榔子

艾葉 三年者為佳

右三味各一錢，入水三杯，煎二杯用之。

● 理藥方。

(妙領鈔集)

大蒜

右一味搗敷臍心，著紙而覆，即不復發。

(上池秘錄)

● 散藥方。

人參 白朮 各一兩

生薑 四片

右為煎藥。

### 癩病 Iqna 天形病 厲風

病解

本症為合選傳錄之一種傳染病。最近時歐洲之中土，幾無此症。但第五、八、十世紀之時，遍發於全歐。現今如地中海、黑海、カスピヤン海之沿岸，及其島嶼、那威、リフランド、モルダン、土耳其等處，仍猖獗。並非利加之沿岸、印度、中國、亞米

利加等，亦盛行。本症為慢性之全身病。皮膚之全而有黃赤色、暗赤色之斑點或結節。知覺過敏或麻痺。通常分為三種。

(諸節癩) 此症者，頭髮眉毛脫落，眼瞼外展，鼻、唇、四肢、手掌、足趾等起結節。發病之初，大抵以發斑為始。斑點之中央消滅，而周圍如輪狀。經歲月之後，蔓延於全身。其大如豆或胡桃，呈扁平或半球狀。通常為污褐色，放光澤而硬固者有之。柔軟而



病之潰瘍面。

●重碳酸曹達

三十錢

乾燥食鹽

五錢

右混和爲浴劑用之。

●砒酸鐵

三十錢

右爲一回之入浴料。

中國方

●加味金龍丸(上池秘錄)治天

刑病。

大楓子去殼百錢 伏龍肝 三十錢

大黃

芎藭

當歸

紅花

### 丹毒 Erysipelas

病解 本症亦爲一種之傳染毒。乃「ストプトコックス」球菌之侵入創傷面或潰瘍面而發。大都在顏面部及顏

面中之鼻部近傍。發生最易。患部潮紅腫著。覺疼痛。發腫起。全身之症狀有四十度四十一度之高熱。惡寒戰慄。病勢漸漸

蔓延。則中央就盛。而周圍擴大。自面部而至頭部漸漸蔓延於身體。使其頭部時。毛髮往往脫落。重症經一二日。熱候即消散。

連翹

皂角刺各二十錢

當其下膿血亦水時。其毒若紫黑色者。乃多年之疾。若赤色者。近日之疾。此藥數日用之。蟲積下盡則止藥。

●癩疾專藥(上池秘錄)

大楓子 生去皮 枯礬

大黃

右爲末。和大楓油塗之。

大黃

●治癩病。

當歸

紅花

沈香

大楓子 各十錢 白蛇

烏蛇 各十五錢

右爲糊丸。

●治癩病。

大楓子 十四錢 煅磁石 十五錢

川芎 片腦

大黃 各八分 烏蛇 五錢

白蛇 蒂香 各四錢

玉牛黃 五分

右爲丸架。

(妙藥秘選)

重症則延緩至二三週之久。

**攝生法** 丹毒因病毒侵入創傷面而發。故於創面或潰瘍處須十分消毒。

處方

外用方

●石炭酸

胡粉油

右塗布患部。

●石炭酸

華搗林

右攤於布片。貼布於患部。

●石炭酸

酒精

帝列並氏油

虞里斯林

右塗布患部。

●依比知河兒

華搗林

右塗布患部。

●安息香酸

加耶布底油

篤露拔爾撒謨

十滴

十滴

二十滴

一錢

一錢

二錢

一錢

十滴

一滴

二厘

胡麻油

右塗擦患部。

中國方

●丹毒貼藥(中國經驗方)

寒水石

黃連

右等分爲細末。以水煉灰。

●丹毒貼藥

青黛土朱等分爲末。以水煉和。加蓋少許貼之。

(中國經驗方)

二錢

軟下疳 Ulcus molle 疳疔 下疳

(附)便毒 橫痃 Bubo

**病解** 軟下疳爲生於生殖器之軟性梅毒毒波及於全身。而本症不波及於全身。且潛伏期甚短。大抵最長者經三四日。

潰瘍亦傳染毒之一種也。與梅毒相異之

於病毒之傳染部。發生水泡。其破裂之痕跡遺下潰瘍。此症難得傳染於猿猴。而梅毒

毒無此佳質。有時與梅毒同行傳染。硬軟二性之下疳同發。此謂之混合下疳。

便毒為軟下疳之續發症。經過其發生部之水腫脹。起炎甚多。此謂之便毒或謂之橫痃。其發生急劇者。則有疼痛及惡臭。

慢者。則無疼痛。慢性便毒。多起於下疳之末期。急性便毒。起於初期。初起時皮膚發赤。經一週至數週間。水腫脹化膿而生潰瘍。其後外面有破綻。漏出之膿汁甚多。經時甚久。而治愈之後。留巨大之瘻。其位置與下疳之位置有關係。

攝生法 恪守梅毒條下所列之攝生。發使毒而疼痛劇烈之時。宜安臥。患部收沃度丁幾與五倍子丁幾之合劑。施硼酸之冷藥法。復貼冰袋於其上而冷却之。若仍不消矣。則待其化膿後截開之。

處方

外國方

●沃度仿謨末

五錢

鉅鉛華

五分

右混和。撒布於患部。

●沃度仿謨末

五分

耶瑞細末

五分

右研和。撒布於患部。

●沃度仿謨末

五分

石松子末

五分

右研和。撒布於患部。

●沃度仿謨末

五分

柯柯阿酸

一錢

右乘溫混和為桿狀。插入患部。

右為軟膏。貼布於患部。

●沃度丁幾

五錢

五倍子丁幾

五分

右混和。便毒之尚未化膿者。以此塗布之。

●硼酸

二錢

右為一包。以水三合溶解。便毒之未化膿而疼痛劇烈者。以此行冷藥法。

中國方

●下疳膏(名家方選)下疳通治之奇膏也。

黃柏

各等分

輕粉

炒

右三味。煉和傅患處。

●通真散(醫藥學方規矩)治便毒如神。

赤牛 一錢半 大黃  
當歸 各三錢 甘節 二錢  
姜 一錢半 木鼈子 三個  
穿山甲 二錢

●追毒散(醫藥方規矩)治便毒核効方。

常歸 赤芍藥  
金銀花 天花粉  
白芷 各一錢 強蕊 六枚  
芒硝 二錢 木鼈子 十個  
穿山甲 三片 大黃 三錢  
右酒煎。

●驅毒湯(名家方選)治疳疔痛甚或腐爛者。

鹿角 二錢 土伏苓 三錢  
蟻蛭霜 二分 羅鼠霜 一錢半

紅螺 甘草 各三分  
當歸 丁香  
川芎 大黃 各五分

右十味。總輕粉五分。和藥爲末。糊丸。  
●單衫散(名家方選)治疳瘡毒。

六錢而忌油鹽者。

杉一味。研爲細末。和鷄子傳患處。

●瘰疬導消湯(醫藥方規矩)治陰莖腫痛。

扁竹 四錢 瞿麥 三錢  
滑石 二錢 甘草 一錢  
大黃 一錢 燈心  
右水煎。

●下疳乾藥(妙藥秘製)

黃柏 四錢 輕粉 一分  
長青丹 十二錢 唐土 八錢

阿仙藥 一錢

右研細末。散布患部。

●下疳洗藥(醫藥要法)

蛇床子 苦蔥

忍冬 荆芥 各等分

右水煎爲洗藥。

●治便毒方。

大黃 三錢 枯礬 一錢

木鼈子 二錢 穿山甲 一錢

巴豆 三粒

右糊丸酒下。

●傳下疳腐爛方。

角石 五分 百藥煎 三分

輕粉 二分

右三味爲末。和黃蜀葵汁。先用溫湯洗患處。然後擦之。(名家方選)

(上池秘錄)

●治初發便毒用之不過三貼而

神効。

胡桃 七個炒

右一味爲末酒送下。(名家方選)

●下便毒方。

川 芎 大 黃

薔 薇 各 等 分

右三味爲散酒服一錢。日三次。

(名家方選)

●治便毒變後核不消方。

虎杖一味爲末。每服一錢。日二次。三

白湯或溫酒送下。(名家方選)

### 淋病 Gonorrhoea

病解

淋病爲病毒之瀰蔓於生殖器者。此病毒於一千八百七十九年所發見。男子犯尿道粘膿龜頭。女子則發於陰。子宮口。外陰部等。大抵因手淫。蓄時交接。交接較久。房事過度。與有白帶下之婦人交媾而生。通常分爲急性淋疾與慢性淋疾二種。

(急性淋疾) 男子發於傳染後之一二日。尿道稍感疼痛。尿通之時。含劇烈之尿意。往往有之。臨自尿道引出透明粘稠之糸。

分泌液汁。稍經時日。則淌出帶綠色或黃色之膿汁。發病後經五六日以上之病症

漸漸增劇。排尿之疼痛愈劇。尿含膿汁甚多。甚則不潔尿之時。膿液滴出。而於噴鼻。禪等皆帶黃綠色之斑點。夜間陰囊勃起。成劇痛而妨安眠。終至全身之骨接疼痛。而身陷於衰弱。

女子於最初時。在病毒傳染部。受毒作起。半植半生淫情之感。次於排尿之際。覺灼痛。病勢愈增進。小陰唇腫起發赤。其初稍

分泌膿汁。經時未久。而淌出甚多。遂有子宮發炎症。

(慢性淋疾) 男子則如急性淋疾之症狀。經五六週間。而病勢尙不減退。尿道不成疼痛。分泌純膿狀或水膿狀之液汁。朝間將尿道自後方向前方摩擦之時。夜中瀉留之分泌物如滴狀而流出。女子則因急性淋症之全愈期內。多行交媾。而轉爲慢性症者。其症候與急性症無大異。較此稍有輕快之處者。亦復不少。要之慢性淋疾。其

經過間症及緩慢。無顯著之變症。故患者往往延誤開日之。以致經年稍久。不克全治者甚多。

凡因瘧疾而發起之各病中。最多者男子爲淋濁丸毒。女子爲子宮頸或子宮疾患。其尿道之疾患。女子較男子治療甚易。

**攝生法** 預防法。須宜不濕之交。交媾後即放尿。翰鼻褲不可緊。追緊結食物。避苛烈性。(芥子胡椒番椒薑山蒼藥之類)及脂肪性。牛豕猪肉家屬魚肉北鷄肉之脂肪多者。者。飲料避酒精性(麥酒啤酒燒酒等)及炭酸飲料。(ラムチンヤンパン酒。セルテル泉醜騰散等)大小便之通利宜整。

處方  
外國方

●骨湃巴拔爾撒誤

復方刺賢唾兒精

亞則比亞唾誤

白糖

右混和。加薄荷水。使全量爲三十二錢。一日服三回。每回與四錢。

四錢

二錢

二錢

二錢

●竹湃巴拔爾撒誤

單澄茄

右以蜜蠟爲丸藥。一日三回服用。

一錢

二錢

●單寧酸

右分五包。每包以水二合溶解。一日三回注射。

二分半

(陰莖勃起性)

●復布林

一錢半

●臭菜加里

樟腦

●弱酸

●明礬

右爲一包。以水二合溶解。爲注射藥。多於小兒用之。

一錢半

二厘

一錢半

●明礬

右爲一包。以水一合溶解。但明礬從病之經過。常用左之分量。

一分半

第一週 八厘 水一合

第二週 九厘 同

第三週 一分 同

第四週 一分一厘 同

第五週 一分二厘 同

第六週 一分三厘 同

●胡瓜根末

一錢

白鷄頭花末

二錢

大黃末

一分

右爲六包。一日三回。每回以一包內服。

(慢性症)

●單寧酸

一分二厘

柯柯阿酪

適宜

右造坐藥八個。每日用一二個。

●沃度仿說

一分二厘

柯柯阿酪

適宜

右爲總香大之桿狀。插入於尿道。

●白橙油

二分

甘草末

五分

右研細。以膠囊六個包之。每食後用二個。一日三回。

●白橙油

一分

薄荷油

右混和。每食後內用十滴。

中國方

●水香湯(醫方大成)小便澀而有餘瀝者。以此治之。

木香

木通

檳榔

茴香

芍藥

當歸

青皮

澤瀉

陳皮

甘草

肉桂

各五分

●海金沙散(醫方大成)腎淋用此治之。

海金沙

一兩

滑石

一兩

甘草

二錢半

右水煎。

●石韋散(醫方大成)治砂淋。小

便不利而壅中痛者。

石韋

二兩

覆麥

一兩

滑石

五兩

車前子

三兩

冬葵

二兩

服此方者。當斷鹽食。否則不治。

●五淋散(醫道重寶記)治氣砂

血膏勞之五淋。

赤芍藥

五錢

山梔子

五錢

赤茯苓

三錢

當歸

一錢半

甘草

一錢半

黃耆

一錢半

白六味。入腎心煎之。

●八正散(醫道日用綱目)治熱

淋。血淋。

大黃

五錢

扁蓄

五錢

木通

五錢

瞿麥

五錢

滑石

五錢

車前子

五錢

車前子 各等分 甘草 炒

右八味。入麝心煎之。

●小兒毒湯(名家方選)治氣結

內淋疾。小便澀下膿血者。

山豬屎 二錢 滑石 七分半

澤瀉 七分半 阿膠 七分半

茯苓 七分半 木通 七分半

忍冬 七分半 大黃 三錢

右八味。用水煎服。此方解毒利水淋

家應用之要方也。

●牛角散(上池秘錄)療血淋。

牛角 細末 蒲黃 各等分

右二味。以白湯送下。日二錢或三錢。

以血止爲度。

●琥珀散(上池秘錄)治氣淋。血

淋。苔淋。砂淋。

滑石 二錢 琥珀

木香 各一錢 當歸

右爲末服用。

●快行散(上池秘錄)治淋疾。

池脂子 紅花

木通 芫沙 各等分

右水煎。

●三神散(上池秘錄)治諸淋急

痛。

海金砂 一錢半 滑石 二錢

右末每服二錢半。多用燈心木通麥

門冬煎水煎。入蜜調服。

●排膿散(上池秘錄)理淋疾。

鹿枝 合煎

滑石 甘草 各等分

右四味爲末。每服一錢。生薑湯飲下。

日三服。

●滑石甘散(古方丸散方)治

淋。小便不利。或渴者。

滑石 甘草 三兩

右三味各研末。合爲散。服法每服一

錢。溫湯下。

●二蛇湯 治淋疾疼甚者。

牛膠 木通

鱉退 各一錢 白礬 二分

當歸 金銀花

忍冬 各一錢 烏蛇

白蛇 各五錢

右九味。配百二賦。每貼以水二升煎

煮一日用之。

●二朮散(醫藥方規矩)治冷  
淋氣滯澀痛。

木香 當歸

芍藥 青皮

尚香 檳榔

澤瀉 陳皮

甘草 各三分 桂枝 炒

通草

右水煎。

●當歸散(醫藥方規矩)煎  
宜常服之。

當歸 川芎

芍藥 黃芩 各一斤

白朮 半斤

右水煎。

●理淋疾疼痛方。

阿膠 滑石

大黃 甘草 各等分

右四味爲末。每服一錢。白湯送下。

(上池秘錄)

●治淋疾疼痛甚者。

更絲子 七分 甘草二錢三分

右二味。水煎服。(名家方選)

●救淋方 治痛甚者。

阿膠 三錢 大黃 二錢

附子 一錢

右三味。水煎溫服。(名家方選)

●治淋奇方 治膿痲最妙。

甜瓜皮 五錢 甘草 一錢

右二味。水煎服。(名家方選)

●治淋方。

沒藥 乳香

琥珀 各五分 白砂糖 三十錢

亂髮箱

右五味爲末。三五日間以白湯服盡。

服藥中最禁鹽味。

(江戸前田長庵方)

●救淋方 治痛甚者。

雄黃 大黃

海金砂 各等分

右三味。研細末。白湯送下。

(名家方選)

●治淋奇方。

柞枝湯加蘇鐵葉爲末。提調送下最

妙。●又方。(名家方選)

山茶花二錢或三錢車前

狸麥、木通

芒 藟 各五分

石五味、水煎服。

(名家方選)

●治淋疾方。

人參 中小 肉桂

桂心 茯苓 各中

丁子 小 車前子 中小

白鷄頭花 大

右煎服。

(珍藥手引草)

●治淋疾方。

夏枯草 八分

木通

紅花 四分

右六味爲末，以水二盞，煮取一盞服之。

●赤小豆三分，炒爲粉末，與葱一本，同入酒中熟煎，而後用之。

●竹茹五錢，入水二杯，煎一杯，空服用之。

(修葺秘旨)

(農家至寶記)

(孫氏集驗方)

●小麥十錢，燈心五分，入水一杯半，煎一

杯用之。

●癰病痛甚者，以桃膠二錢，甘草一錢爲

一貼，入水一合，煎五勺，日用三四貼，或

研胡桃爲泥狀，加砂糖，以熱湯服用。

(救急撮要)

梅毒 Syphilis 花柳病 獸毒 結毒

病解

梅毒準ハストガルラン氏之

說、爲類似結核菌之一種劇毒作用。其病

毒接觸於人類、則傳染而發本症。其經過

可分爲第一期(局部疾患)第二期第

三期。

(第一期梅毒) 第一期梅毒、即所謂局

部之疾患、屬梅毒之初期、病毒感受後、約

經二三週、於受毒部生扁平或結核狀之

硬結、此硬結爲梅毒之確然標準。若生潰

瘍、硬結潰爛、則非真正之梅毒。基於坊

間所謂下疳(軟性下疳非梅毒)或他之

原因而然。時或有梅毒性變結與軟性下

疳合併而發者。曰混合下疳。硬結大如小

豆或豌豆或五厘之銅幣者不少。復有與

此硬結同時或經一二週後於水腫顯發



須擇左器之沃度與純黃泉中之適宜者。然後入浴。若經濟困難。或他地無此等溫泉者。則用鹽湯或硫黃湯。

(豫法防)梅毒為一種寄生菌之作用。已如前述。故此病毒。潛藏於天空中。他體與之接觸。必被感染。即此處所述之預防法。宜注意之。非虛語也。

(因生殖器而傳染者)今日大部會之梅毒。大部由生殖器而蔓延者。彼大花杆梅毒之淫波浪子。常為此病毒傳染之媒介。不可不注意也。

(因乳母而傳染者)乳母不可不注意檢。定有此病毒之素因與否。不然。往往病毒傳於小兒。招終身之災。

(因器具而傳染者)梅毒患者所使用之器具。往往因之傳播病毒。又因診視該患

者之器具而傳染者。復亦不少。(因手指及口唇而傳染者)產婆及醫師當診治患者之時。因手指等關於患者發傷皮膚之病毒。以致傳染者不少。又口唇之傳播。大部由接吻而起。

(因種痘而傳染者)直梅毒患者之痘漿所接種之痘。往往為病毒蔓延之媒介。方今不用人痘而用牛痘者。或恐傳染此病也。其他為梅毒蔓延之媒介者有種種。或直接或間接。故常宜注意。以圖不罹此等之惡疾。

方

外國方

●水銀軟膏  
二分乃至五分  
一分

阿列布油

右煉和。納於硝子罐內。製二個乃至五個用之。

右為全身療法。於第一期及第二期之梅毒。在二日間。以指塗擦股之內外面。避非薄之皮膚。又二日間。塗擦胸及頸部。(避乳腺部)復二日間。以指頭塗擦背脊部。至皮膚乾潤而止。如瘡。日以後。乃行溫浴。於第七日。行第二回之塗擦。須連用三十四乃至五十回。行塗擦法之時期。於午前最宜。擦入后。不可劇動。又使用本劑之時。須避口內之症狀。故當以木炭末為齒磨粉。每朝採用之。亦為局外布。用於梅毒性各之皮疹及硬結腫。

●水銀中毒預防劑

(齒磨)

木炭末

十錢

靛那末

五錢

吉納

五分

丁香

一錢

薄荷油

一滴

右研和爲齒磨粉。

●樹皮

木炭末

五錢

鹽酸加里

一錢

沒藥

二錢

草撥

五分

右研和爲齒磨粉。

●菖蒲根末

炭酸麻僞涅矢亞

三錢

五錢

炭酸石灰

三十錢

丁香油

十滴

龍腦

二分

右研和爲齒磨粉。

●石鹼末

五錢

炭酸石灰

十錢

三奈末

二分

薄荷油

二滴

龍腦

二分

亞尼林紅色藥

適宜

右研和爲齒磨粉。

●鹽酸加里

右爲五十倍之水溶液。於此加適宜

薄荷油而含漱。

●單尼寧

薄尼寧

右爲百倍之水溶液而含漱。

●明礬

右爲百倍乃至八十倍之水溶液而含漱。

●沃度加爾末

乾燥白糖末

右研和爲散劑。分爲十五包。一日用

三包乃至五包。但本劑宜貯於瓶內

或壺內。

●沃度仿讓

華攝林

右爲膏藥。於梅毒性皮疹、橫痃、潰瘍

諸膿腫等塗布之。

●沃度加里

留水

右無服白滴。一日服三回。三日服乾。

●沃度加里

肝油

五分  
八錢

右一日服三回，分三日服之。

●沃度鐵舍利別

威里斯林

六錢  
一錢

右一日服三回，分三日服之。

沃度劑，於不落屑性之梅毒性皮膚疹無水銀劑之效者，及輕症第二期梅毒，有熱發或疼痛者，與梅毒之潛伏期及重症，而內臟有障害者，如貧血性、陰病性、營養不給等疾患之梅毒症，皆適用之。

沃度劑，常呈副作用，而發鼻加答兒、咽喉加答兒、頭痛等，故凡呈感冒症候者，當暫時停止。

●撒兒沙根

規那皮

四錢  
四錢

右加適宜之酒精，製為丸劑，勻作百丸，一日服三回，每回服用五丸。

●瘡疥水脂

大黃末

一錢  
五分

●瘡疥末

石檢末

五分

●瘡疥辛効丸

中國方

治瘰

胡桃皮

甘草

二錢  
二錢

右細剉，充麻袋之半，為煎藥，一日服三回，分二日間服用之。

●瘡疥木

甘草根

八錢  
一錢

過泥子

右細剉，充麻袋之半煎煮之，在二日間分六回服用之。

●瘡疥水脂

大黃末

一錢

石檢末

五分

右加適宜之酒精，製為丸劑，勻作百丸，一日服三回，每回服用五丸。

●瘡疥辛効丸

中國方

治瘰

毒腫疹或骨痛。

牛膝

川芎 各二錢

沈香

上茶 一錢

白粉

赤小豆

山梔子 各一錢

右七味為散丸，如綠豆大，土茯苓湯送下，日服五十粒，七日可愈。

●七寶丹（上池秘錄）治瘡毒瀉疾，骨節疼痛者。

牛膝

礮粉 各二錢

雞舌香

土茯苓 一錢

消石

大黃 八錢

右研末，為糊丸。

●梅肉丸（上池秘錄）治諸惡毒疔瘡，其他惡瘡悉療之。

梅肉丸

治諸惡毒

疔瘡，其他惡瘡悉療之。

微棍 七錢半 山梔子 七錢半

巴豆 三分半 輕粉 三分半  
黃連 五分 殺肉 今代梅肉即照梅

右研梅極透。登研巴豆。合爲糊丸。

●魚州散(上池秘錄)治諸惡毒瘡。

反鼻 角石  
津盤 各等分

右研末。每服一錢。酒送下。以醉爲度。

●黃金丹(上池秘錄)治諸瘡。結毒。骨節痛。肉腐爛。喉鼻破壞。

龜板 二兩 珠砂  
石決明 各六錢

右糊丸。以土茯苓湯送下。

●酒煮解毒湯(名家方選)治諸瘡毒。經年不愈。或骨節疼痛者。

寧山中 白芷

防風 沒藥

甘草 芍藥

貝母 各五錢 金銀花

陳皮 各三錢 皂角刺 一錢

右十味。合二錢五分爲一劑。酒煎。日

服一劑。三日或七日服訖。煎法以酒

三合。煮取二合。再入酒二合。煮取一

合。若不嗜酒者。酒水各半服之。

●威寧丸(名家方選)治微毒奇瘡。

槐花

薰陸 納土器上微火消燥使焦而

入槐花調和

棗肉 炒爲末 胡桃仁各二十錢

輕粉 五錢

右五味爲末。糊丸。每服一分。兼用後

湯。

●土茯苓 五錢 萎蕤 三錢

右二味。以水五合。煎取三合。溫服。禁

醋油酒臭物魚鳥。

●大苦參湯(名家方選)治瘡毒。

苦參 髮灰

靈天蓋 露房霜

雄黃 朱砂

茗 輕粉

反鼻 乳香 各一兩

右十味。糊丸。如梧子大。日一錢半。或

二錢。白湯送下。

●大解毒湯(名家方選)治微毒。

發瘡。或骨節疼痛。或下疳。腐爛。

不問新久。難愈者。

土茯苓 川芎

通草 忍冬

茯苓 各九錢 大黃一錢二分

右八味以水三合煮取二合服之。

●梓葉湯(名家方選)治微毒之發與未發者及骨節疼痛者。

梓葉 忍冬 各一錢

大黃 川芎 各五分

甘草 三分

右五味水煎服多服益佳。

●土骨皮湯(名家方選)治諸毒氣在表將發者。

土骨皮 忍冬 各二錢

防風 大黃 各八分

羌活 桂枝 各五錢

甘草 三分

右七味水煎服。

●東山丸(名家方選)治結毒經年不愈者。

大黃 輕粉 各二錢

竹茹 八錢 甘草 五分

黃連 三分 川芎 五分

阿仙藥 三錢

右七味爲末糊丸辰砂爲衣。

●甲字丸(名家方選)治微毒。

黃芩 黃柏 各三分

大黃 輕粉 各三分

鹿角霜 六分

右五味糊丸辰砂爲衣日服五分或三分。

●解毒劑(古方九散方)大小散毒家一切必用之。

茯苓 大木 大

忍冬 大川芎 中

和大黃 中甘草 小

土茯苓 大大

右水二合煮取一合溫分二服。

●治微毒方。

鹿角 五錢 黃柏 三錢

右二味爲末分爲七服七日服訖每服用土茯苓一斤剉細分爲七分其一分以水九合煎取四合煎汁送下。

散藥 (名家方選)

●治微毒諸藥無效骨節疼痛不止方。

麝鼠霜 (名家方選)

右一味溫酒送下。

●洗微毒痛甚者方。

茵陳 五兩 蒲黃 一兩

右二味煎汁洗之 (名家方選)

胎毒 Syphilis hereditaria 先天性梅毒 避毒

病解 本症為遺傳性之梅毒。乃父母在第二期梅毒時所遺傳之者。父之遺傳精蟲為媒介。母之遺傳。由於卵或母與胎兒連絡之血液而傳達。大都於生後四週或五、六週時發病。病毒初犯鼻孔。發極微之鼻鳴。漸次增進。生褐色之結痂。因之鼻孔閉塞。次呈圓形。（其大如一厘之銅幣或二、三、四、五厘之銅幣）或發不毛形之帶褐色斑點。生於眉毛。鬚。唇之附近。手掌。足趾等。同時有皮膚脫落（如糠狀）其他全身發赤色之疹。毛髮大抵脫落。身體之營養。十分缺乏。

攝生法 欲供小兒全身之營養。用良好之人乳最佳。若無良好之人乳。雖牛乳  
 處方 外國方  
 沃度加里 五分  
 白糖 五分  
 大黃末 五分  
 達賴假偽証說 一錢  
 右造錠劑五十個。一日服二回。每回服用一個。  
 ●水銀軟膏

右塗布於發疹部。  
 ●土茯苓 一錢  
 大黃 二分  
 硫黃華 五分  
 胡荽子 一分  
 右為藥子大之九子。以辰砂為丸。朝夕服十五粒乃至六十粒。  
 ●靈柞木脂 五分  
 鹽沙富拉斯 五分  
 大黃 一分  
 重炭酸曹達 一分  
 甘草末 二分  
 右為藥子大之九子。以辰砂為丸。朝夕服十粒乃至三十粒。

●撥爾沙根

重炭酸曹遜

五錢 二分

茴香

二分

硫黃華

一錢

右爲榮子大之九子。以辰砂爲衣。朝夕服十五粒。乃至五十粒。

●炭酸陳留淫矢亞

大黃末

六分 二分

茴香油糖

四分

撥爾沙根末

一錢

右混和爲散藥。勻作十包。朝夕服用

一包。

●沃度鐵舍利別

五錢

右朝夕服五滴。乃至五十滴。

中國方

●加味五香湯(醫道重寶記)小

兒因胎毒。頭部遍身生疥者。以此治之。

沈香

木香

乳香

丁香

藜香

葛根

連翹

各一錢 木通 五錢

大黃 五分

右十味煎。

●鷓鴣菜湯(名家方選)治小兒

胎毒頭瘡。遍身。腹痛者。

鷓鴣菜

二錢半或三錢

大黃

三分或二分

蒲黃

三分

甘草

二分

右四味。以水二合。煎至一合。空心溫服。一二日而下。或盡及穢物者爲佳。

一方。去蒲黃。加苦楝皮。

●龍葵散(名家方選)治初生惡

毒。

龍葵 一錢

巴豆

輕粉 各三分

右三味爲細末。日三分。白湯送下。

●加減紅花散(中國經驗方)治

胎毒及一切瘡毒。

紅花 二分半

沈香 二分半

藜香 一分半

木香 一分半

升麻

枳殼

丁子 各一分

大黃

薛金

積雪草 各三分

檳榔

右十一味爲末。白湯送下。

●慈苳仁圓(古方丸散方)治小

兒胎毒。

大黃 五錢 土茯苓 二十錢

薏苡仁 十錢

右三味為細末，以蜜煉丸如彈子大。

一日服三回，每回一丸，白湯送下。

●治小兒胎毒方。

薄荷 紅花 各八分  
鮮金 龍胆 各五分

杜仲 三分

右五味，水煎服，或加大黃。

(名家方選)

### 第五章 全身病

衰弱 Imbecillitas 羸瘦 (附) 虛弱

#### 病解

身神困憊，活力漸弱之汎稱。曰

衰弱。彼夫諸重患之發作時，或恢復期，大

皆行之。

滋養療法為佳。故本書特舉一二之強壯

抵起衰弱，即疾病之恢復期，因貧血而前 (虛弱) 有基於先天之不足與發育不完

藥與滋養藥。

面及皮膚蒼白，或枯燥，或於食後發熱，舌

攝生法 選過度之勞動，為適宜之運

帶赤色，生白苔而乾燥，便通不暢，呼吸促

動，於溫泉中入浴，使胃力得稍強健，食物

迫，心悸亢進，發汗甚盛，知覺過敏，稍有尋

宜擇易消化而富於滋養品之物，飲料亦

動或讀書，便恐頭痛，思考力衰耗，睡眠不

以富於滋養性者為佳，例如良好之葡萄酒，麥酒等，普烈之酒類，不可飲用，精神宜

安，脂肪減少，而羸瘦顯甚，四肢震慄而冷

常保安靜，避激怒悲哀等事，開散自處，悠

(衰弱) 真衰弱而行藥物之療法，不若行

避自過。則最相宜。但身神流於放逸。亦必  
有害。要而言之。各事均以中庸適宜爲要。

處方

外國方

●ライビツク氏肉越幾斯

右一日一錢乃至二錢。以熱湯溶解  
服用。

ライビツク氏肉越幾斯者。以除筋  
之牛肉。細切爲百分。於石臼中搗碎  
爲糊狀。加水四百分。於二時間。疑疑  
振蕩冷浸之後。屢攪而布濾之。其發  
滓。復加水二百分。混攪。冷浸二時間。  
再摩搾而濾。合此前後之濾液。於重  
湯煎上蒸發。至蛋白質凝固後。乃濾  
過之。使之冷却。更折出脂肪。再行濾  
過。蒸發於重湯煎上。然後試行振蕩。

若尚有析出物。則再濾過。終則蒸發  
之。使成適宜之稠度。此製造所用之  
器具。斷不可用金屬。依此方法。則可  
得四分之越幾斯。

●ロイベ氏肉越幾斯

右一日服用一錢乃至三錢。

ロイベ氏肉越幾斯者。以除筋之牛  
肉。細切爲百分。於陶器內搗碎爲糊  
狀。加水百分與二十五分。鹽酸二分。  
於陶器內屢攪。約十時間。乃至  
十五時間。然後煮沸。納於陶器乳鉢  
中。研碎爲乳糊狀。再煮沸於有蓋器  
內。約五乃至二十時間。而後加重炭  
酸氫鈉之適量中和之。此越幾斯。易  
於發敗。故欲永久貯藏。若蒸發之爲  
乾燥粉末方可。

●ライビツク氏肉越幾斯

一錢

ロイベ氏肉越幾斯

二錢

水

百錢

右混和溶解爲適宜之稠度用之。

(速成ソップ)

●百弗靈麥芽越幾斯

右一日服用一錢乃至一錢五分。

(胃腸衰弱者)

百弗靈麥芽越幾斯者。以百弗靈一  
錢。鹽酸五分。單舍利別三錢九分。麥  
芽越幾斯九十五錢。溶和爲適宜之  
稠度者是也。

●沃鐵麥芽越幾斯

右一日服一錢。服用三回。

(於瘰癧質之胃弱者)

沃鐵麥芽越幾斯者。以沃鐵舍利別

十錢。麥芽幾致斯九十錢。溶和爲適宜之稠度者也。

●規那皮

二錢

龍膽

五錢

右爲煎藥。二日中作六回服用。

●規那越幾斯

一錢

麥芽越幾斯

百六十錢

右混和。一日服三回。每回服用一錢。

●肉百布頓(ヘントン)

二十錢

右一日三回分服。

肉百布頓 肉百布頓者。於脂肪少

之牛肉。加百布失涅及「パンクレン

アチン」等。而以人工發胃中之肉

類消化作用者也。其形狀不一。坊間

販賣者。爲魚膠樣之塊。呈黃褐色。

其營養力。匹敵精良牛肉之三倍。故

於胃腸之衰弱者。爲良好之滋養料。強壯之種類及應用。回復營養力。減衰之生體。使之旺盛體力。活潑精神者。謂之強壯藥。而強壯藥。有興奮食慾者。(苦味藥) 有增進消化力者。(消化藥) 有形成血液者。(補血藥) 於廣汎之意義。滋養品。亦爲強壯藥之一種。強壯藥中主要之種類及用量。列如左。

(一) 苦味藥

當歸……………用量一分乃至二分

龍腦根……………用量一分乃至二分

活矢腫木……………用量一分乃至二分

昆倍蘭藤皮……………用量三錢乃至八錢

蒲公英根……………用量一錢乃至二錢

格倫僕根……………用量一錢乃至二錢

黃連……………用量一分乃至五分

黃芩……………用量一分乃至五分

橙皮……………用量五分乃至一錢

葛斯加里刺皮……………五分

……………用量五分乃至一錢

葛蒲根……………五分

……………用量五分乃至一錢

忽布羅……………五分

……………用量五分乃至一錢

(二) 消化藥

百布頓……………用量二分乃至七分

パンクレンアチン……………

……………用量一分乃至五分

マルツ、ジャスターゼ……………

……………用量二分乃至三分

タカ、ジヤスターゼ……………  
 ………………用量一分乃至三分  
 パ、ヨチン……………用量一分乃至四分  
 麥芽越越斯……………用量一錢乃至五錢

(三) 補血藥

鐵粉……………用量五厘乃至一分  
 含糖酸化鐵……………用量一分乃至二分  
 次炭酸鐵……………用量一分乃至二分  
 焦性磷酸鐵……………用量一分乃至二分  
 乳酸鐵……………用量一分乃至五分  
 林搗酸鐵……………用量一分乃至三分  
 枸橼酸鐵……………用量一分乃至三分  
 硫酸鐵……………用量八厘乃至二分  
 枸橼酸鐵規尼涅……………  
 ………………用量八厘至一分半

(四) 滋養品

山米多司……………用量十錢至二十錢  
 オイカジン……………用量十錢至十五錢  
 トロポン……………用量十錢至十五錢  
 肉越越斯……………用量適宜  
 レグミノイゼ……………  
 ………………用量三錢至十二錢  
 肉百布頓……………用量適宜  
 アロイロナート……………  
 ………………用量五錢乃至十錢  
 牛乳……………用量適宜  
 肝油……………用量一錢乃至五錢  
 胡麻油……………用量一錢乃至五錢  
 餡……………用量適宜  
 サナトীগエン……………  
 ………………用量二錢乃至五錢  
 白糖……………用量適宜

●規那丁鐵

稀鹽酸

十錢 五分

右混和、每回服十五滴乃至二十滴。  
 一日三回服用。

●トロポン

十二錢

右爲散藥、分作三包、一日服三回。  
 トロポン 爲灰白褐色之粉末狀

物質、從動物性及植物性之蛋白質  
 所製出之滋養品、常服用之、於腸胃  
 亦無害、故爲衰弱患者之食餌大佳。

●アロイロナート

二十錢

右爲散藥六包、一日服三包。

アロイロナート 爲淡黃灰白色  
 之粉狀物質、而由小麥粉所製出之  
 植物性蛋白質、與日本乾燥之豆腐  
 皮、有同價之滋養量、與肉藥汁等併

用。爲滋養食餌。

●レグミノーズ

小麥粉

右爲散藥。分作十五包。一日服三包。  
レグミノーズ 爲淡黃白色之粉

十五錢

十錢

末。而由豆類所製出之植物性蛋白質。與肉羹汁併用。爲滋養食餌。

●山米多司(ソマトーズ)

右爲散藥。分作三包。一日服二包。  
山米多司 爲淡黃白色無味無臭

十二錢

佝僂病 Rachitis 癸吉利病

病解

佝僂病大都起於小兒之齒牙發生期。因攝取石灰質不足之食物而起

或因頑固之下痢。不克吸收石灰質。徒排

出於體外而生。要而言之。視乎各人之體質。其間因遺傳而來者爲最多。

攝生法 小兒之哺乳。宜飲良好之人

乳。總以不用牛乳。穀類爲佳。誕生後之小

兒。用肉羹汁。雞卵等亦可。除食物之外。尤

須呼吸新鮮之空氣。住乾燥之家宅。時以

清淨之水拭其全身。

處方

外國方

●炭酸石灰 一分

磷酸石灰 一分

磷酸石灰 五厘

右研和爲散藥。勻作十包。一日三回。

以水服用。

●炭酸麻個溼矢亞 二分半

二分半

含糖炭酸鹽 五分

白糖 二分半

右研和爲散藥。勻作十包。一日服三

回。每回一包。

●乳酸鹽 五分

磷酸石灰 一錢

右爲丸藥。勻作百丸。一日服三四。每

回服用三丸。

●石灰水

右十滴、和牛乳用之。

右爲藥劑、加白糖、一日二回服用。

右一日二回服用。

●燕麥粗末

十錢

肝油

二錢

### 健麻質斯 Rheumatismus

病解

假麻質斯、古昔以爲基於風濕。近今則謂一種之病毒、因濕冷、冒寒而發起者。本病之八年、臨大抵在十五歲三十歲之間。季節以春秋之候爲多。通第分爲關節假麻質理與肌肉假麻質斯之二種。

諸筋發疼、其發稀或定止於一處、或移動無定、亦有慢性慢性二種。

攝生法 烈熱老朽之房屋、或展屋住

假麻質斯病者之房屋、(所謂健質斯性房屋)不宜住。避過暖之被服。禁犯

風寒之勞働。宜常遊海濱。以呼吸新鮮空氣。每朝以冷水擦擦皮膚。此事宜於夏時養成習慣。則雖三冬凜寒之時、亦無困苦之虞。又肩部假麻質斯之人、當以貓皮

捉該部、夜間在被中、諱背不可露出。腰部

有假麻質斯之人、身體不可屈撻。亦不可

負重物。筋內假麻質斯、行按摩法最爲有

效。關節假麻質斯之候(風濕)足肘及手腕之關節、微有疼痛者、睡眠時宜以食鹽

水之布片、纏於患部。至翌朝而更換。此方

對於關節假麻質斯、其效最著。

處方

外國方

●撒里矢爾酸 一分二厘至二分半

澱粉 二錢

右研和爲散藥、一日服三回、每回服用一包。

(慢性症)

●撒魯兒

一分

葛粉

五厘

右爲散藥一包。每二時間服用。

● 羅里矢尿酸曹達

八分

右以膠囊六個盛之。一日三回。每回用二個。

● 依比知阿兒

一錢

帝列並底油

四錢

右混和。塗布於患部。

● 沃度丁發

一錢

沒食子丁發

四錢

右混和。塗布於患部。

● 奧萊英丁發

一錢

右塗布患部。

● 帝列並底油

一錢

加密列花油

一錢

● 刺納林

一錢

右爲軟膏塗擦。

● 石鹼流動擦劑

一錢

右塗布患部

● 樟腦

一錢

● 刺納林

一錢

右爲軟膏塗擦。

痛風 Gicht 尿酸性關節炎

病解

本症爲血中尿酸之增加。雖輕微之接觸。亦覺熱灼。其甚者往往化食肉類之人。或酒客。往往罹之。通常以四十歲以上之男子爲多。歐洲人罹之頗多。中國人及日本人。罹之者尙少。其症候因血中尿酸之一時或永久蓄積於關節部。而發劇烈之疼痛。該部之皮膚。呈赤黃色。本因之誤爲尿酸質斯之一種。與風濕風

毒等相並稱者不少。

攝生法 痛風常起於遊惰放逸膏粱

文綺之人。食物宜擇淡泊者。飲酒不可過

度。葡萄酒。麥酒不可食。運動勞作當整正

使筋力活潑。宜習釣魚。獵水冰等而趣

宜行之。

處方

外國方

●重碳酸曹達

右爲三包。一回服一包。一日三回。以

多量淨水溶解而服用。

●人工加爾克列斯貝鹽

右以一合之水溶解。一日三回服用。

●安息香酸曹達

糖粉

右爲散藥二十五包。一日二回。於食

前內服。

●磷酸曹達

重碳酸曹達

右爲散藥勻作八包。一日服三回。每

回一包。

●撒魯兒

乳糖

右混和爲散藥。分作三包。一日三回

服用。

●複方大黃丸

右一回五丸乃至十九。朝夕用之。

●依比知阿兒

華特林

右混和。塗擦於患部。

●依比知阿兒

刺納林

右混和。塗布於患部。

●蓋斯木

士茯苓

荊芥

甘草根

右爲煎藥。二日服用。

中國方

●疏經活血湯(醫方大成)這身

走痛如刺。左足之痛尤甚。且甚

難夜重者。以此爲主方。

川芎

芍藥

羌活

蒼朮

牛膝

陳皮

龍腦

防風

右水煎。

●羌活湯(醫道重寶記)酒身骨

節疼痛者。以此爲主方。

羌活 一錢半 蒼朮 一錢半

當歸

地黃

茯苓

桃仁

防已

白芷

威靈

甘草

黃芩 一錢半 當歸 一錢半  
芍藥 一錢半 茯苓 一錢半  
香子 一錢半 半夏 一錢半  
茯苓 三分 陳皮 七分  
木香 七分

●續命湯(醫方大成)治痛風有

神効。

防風 一錢 麻黃  
肉桂 黃芩  
杏仁 芍藥  
川芎 防己 各五分  
附子 三分 牛膝 三分

此方用於婦人產後之腰腿痛。最為  
有効。

●養血湯(醫按方規矩)治腰  
痛、腿痛、筋骨疼痛。

當歸 生地黃  
秦艽 杜仲  
桂枝 茯苓  
防風 牛膝 各一錢  
土茯苓 一錢半 川芎 五分  
甘草 三分

右水煎。

●振痛風方。

羌活 蒼朮  
白朮 牛膝  
乳香 木瓜  
黃芩 當歸  
茯苓 芍藥  
香附子 各二錢 陳皮 一錢半  
唐木香 一錢半 甘草 五錢  
右為末煎服。  
(妙藥秘傳)

●治痛風。

延胡索 當歸  
肉桂

右等分。研為細末。以酒服用。  
(中國經驗方)

●治痛風方

防風 治易症。  
川芎

羌活 各等分

右三味。水煎服。  
(名醫方選)

●治痛風方。

忍冬 木通  
芍藥 川芎 各二錢  
大黃 酒製 牛膝 各一錢半  
甘草 五分 上骨皮 三分  
羌活 二錢九分  
右九味。分為七劑。七日服盡。

(名家方選)

肥胖病 Fettsucht

病解 身體脂肪分過多。以致皮下脂肪組織、骨髓、血液、內臟之諸器官等。脂肪過多。而成疾病者。名曰肥胖病。患者異常肥滿。自覺身體過重。四肢之動作不活潑。發汗甚易而起。種種各種之睡場。呼吸困難。脈搏不正。對於肺勞之抵抗力減少。易罹卒中及腦充血。胃熱病之時。易起心症。脂肪屢屢沈着於心臟。卒因心臟症而斃。本症為蜜味病痛風病之內因。

攝生法 肥胖病患者。嗜食脂肪類。必因之而病勢增劇。故脂肪類之物。不可過食。粥類中之麥酒。不可飲用。當整便通。含糖分之物不可食。少脂肪之肉類與麵包類。每日服鹽類下劑。浴銀泉。或棲居於空氣稀薄之高山。

處方 外國方 人工加爾爾斯藥 四錢 右為散藥四包。朝夕服用一包。

硫酸加里 一錢

カスカラ、サグラダ 越提斯 一錢

重碳酸曹達 一錢

右為散藥十包。一日服二回。每回一包。

フランツ、シヨセフ 水

右每服四錢乃至十五錢。一日服用

一回乃至二回。

●硫酸曹達 八錢

重碳酸曹達 二錢

食鹽 五分

カスカラ、サグラダ 流動越提斯 三分

水 三百錢

右為飲料。一日服三回。於四日乃至五日間服用之。

脹滿 Ascites 膨腫 腹水病

病解

脹滿，爲滲漏液積於腹腔之疾。

病，患者容貌憔悴，腹部漸漸膨大，伴全身

之水腫而來者，係心臟、肺臟、腎臟及血管

之疾病，或因惡液質而有血液之障礙，其

他由肝臟病、腹膜炎、腎萎縮而來者，亦有

之，其滲液之量甚多，漏液振盪而生泡沫，

其泡沫不透明而帶黃色，通常服水，則呼

吸困難，食思缺乏，消化不良，便秘，尿利減

少，而妨睡眠，本症之劇烈者，除施穿腹傷

外無他法。

攝生法 脹滿症，無格守之攝生法，但

全身之血液變調，營養缺損者，其食物以

滋養多而水分少者爲佳。

處方

外國方

膀胱藥

硝砂

龍膽

蒲公英根

杜松子

甘草

大黃

右爲振出藥，一日服三回，於二日間

服用之。

海葱

膀胱藥

杜松子

二錢

一分半

五分

五分

三錢

五分

五分

右爲振出藥，一日服三回，於二日間

服用之。

二分

二分

五分

右爲煎藥，一日三回服用。

膀胱藥末

生姜根

芒硝末

右以白糖水煉和，每一二時間服用

一二錢。

杜松子

生薑

酒精

右於五日間，於冷處浸出爲了，一

回服五十滴，一日服三回。

酒石英

葛粉

右爲散藥，分作六包，一日服三回，每

四錢

五分

五分

一二錢

十錢

二錢

三十五錢

一

二

二分半

二錢

二

同一包。

中國方

分酒湯(醫道日用類目) 治水

肺脹滿。

香朮 白朮

茯苓 陳皮

厚朴 枳實 各一錢

香附子 諸茶

澤瀉 大腹皮 各八分

砂仁 七分 木香 三分

右十二味。入生姜、燈心煎之。

●補中消脹湯(醫按手引草) 治

脹滿。

香附子 陳皮

白朮 茯苓

鹽麥 扁毒

右六味水煎。右煮湯之間。以補藥

為丸藥用之。

●香砂和中湯(醫源藥方規矩)

治鼓脹初起(食積)

香一錢二分 縮砂一錢二分

白朮一錢半 蒼朮一錢半

厚朴 陳皮

半夏 茯苓

枳殼 青皮

神曲 山查子 各一錢

甘草三分 生姜

右水煎。

蜜尿病 Diabetes mellitus 糖尿病 三消消渴

病解 此症為久於尿中排澱粉分之

痰等因除澱之疾患延瀆之疾患腦之振

動精神之過勞感冒梅毒痲瘋等而發時

甘味而好食藥物者往往至此症初起時

身神疲勞。尿量增加。便道不暢。惡心嘔吐。

而陷於不眠症。并起頭痛。頭重。症勞增進。

其末期常生大咽。皮膚乾燥。感覺罹肌肉

羸瘦。白內障。肺勞。終止昏睡。其時病者散

出菓實狀芳香性之氣息。健體者亦有時

於尿中含糖分者。此種可得自然治愈者

也。

攝生法 本症當尿中之糖分減少。價

爲治愈之象。食糖分之物。決不可食。非糖  
 分物。而如澱粉及澱粉性之食物。亦不可  
 食。故忌米飯。麥飯。麵包。菓子。馬鈴薯。甘薯。  
 百合等。所食之物。以雞肉。鵝肉。火腿。鰻魚。  
 酪。海苔。小芥菜。三葉葱。味噌。醬油。海草類  
 爲宜。葡萄酒。日本酒。炭酸泉。茶等。均可飲  
 之。精神不可過勞。皮膚宜清潔。尤當爲適  
 宜之運動。

處方  
 外國方

●安賢歌脫林

一分半

右每回四十滴。和水服用。一日三回。

萎黃病 *Chlorosis* 患女病 白血病 黃肝 疳黃

病解 萎黃病。非因人體血減少而多起。於妙齡之女子。男子發之者甚少。其  
 發。實因紅色於血液之色素。及赤血球  
 之減少而發。與貧血相異之處。即此點也。者爲多。而虛弱家較少。而面微有浮腫之

狀。呈蒼白色。稍帶黃色。粘膜常無色澤。心  
 悸亢進。呼吸不利。亦有發熱者。行有  
 多少之障礙。便通多秘結。精神甚興奮。藥

桂皮末

一錢

右爲散藥三包。一日三回服用。

●安知必林

二分半

甘草末

一錢

右爲散藥三包。一日三回服用。

●撒里失爾酸曹達

五錢

桂皮丁殼

二錢

樟皮丁殼

二錢

薄荷油

十滴

酒精

十錢

●單尼寧

二分

●聯

一錢

丁香

五分

右爲二十九。每食後用五九。

●沒藥

二錢

丁香

五分

桂皮

一錢

吉納

五分

右爲二百四十九。一回服三十五九。

一日三四。

微少之刺激。往往皮膚形蒼白色。或發赤色或發頭痛。

攝生法。食物以富於滋養者為佳。宜

食肉。住所當擇高燥之地。避濕潤陰暗之

居宅。身體精悍。均不可使之過勞。醉臥不

息。惡情。惡業。殺戮。喇替等。均當除去。於月

經過多之女子。須保精神之安養。飲料宜

禁茶。咖啡等。其他宜恪守貧血病條下所

舉之攝生法。

處方  
外國方  
●含鐵麥芽越幾斯  
右朝夕二回。每回用五分乃至一錢五分。

含鐵麥芽越幾斯者。以枸橼酸安母  
紐漢焦性磷酸鐵五分。溶解於僱里

斯林一錢二分半中。於此混和溫熱

之粥狀麥芽越幾斯二十三錢而製

成之。或以枸橼酸安母紐漢焦性磷

酸經五分。溶解於單舍利別中。於此

加溫熱之麥芽越幾斯混攪而製之。

●含糖炭酸鐵  
一錢

右為九藥。分作百二十九。一日服二

回乃至三回。每回五九。

●硫酸鐵  
四錢

炭酸加里  
四錢

亞拉比亞護謨  
一錢二分半

右為九藥。分作四百八十九。桂皮末

為九衣。每食時服用十五九。

於此配合硫酸與鐵炭酸加里時。則

起化學的複分解。而生炭酸與鐵

鐵加里。故此方劑。與用炭酸鐵之合

劑相同。

●水素還元鐵  
二錢半

甘草末  
一錢

右為九藥。造三百九。桂皮末為衣。每

食後與以九九。

●枸橼酸鐵規尼涅  
一錢

右為九藥。分作百二十九。每朝夕服

一九。

●酒石酸鐵  
五分

丁香末  
一分

糖質亞那末  
二分

甘草末  
適宜

右為九藥。分作七十五九。五日間分

服。

●含糖炭酸鐵  
一錢

柯柯阿酪  
十錢

右爲錠劑。分作四十個。一日服三回。每回二個。

● 乳酸鐵

一分

荷香油糖

一錢

右爲散藥。分作十包。朝夕服一包。

● 焦性磷酸鐵

二分

白糖

一錢

右爲散藥。分作四包。朝夕服一包。

● 林檎酸鐵丁幾

右每服十滴。

(小兒之貧血有効)

鐵之對於生體及疾病之作用 鐵

於生體。爲血液之主要成分。其對於疾

病。爲補血之最良藥。其生理的作用

及腎臟上應用之概觀。茲舉之如左。

鐵與血液之關係 生體中血液之

血色素。以鐵爲主成分。於中等體重

之男子。其總量含八分許。(三、〇七

七瓦) 故人若因其原因而缺乏血

液。或損耗血色素之時。則成貧血及

萎黃病。而供給生體之鐵分之路。全

由於許多之動物性滋養品及飲料

本等者也。

鐵之醫藥上應用 鐵劑對於血液

之赤血球及血色素減少之功能。極

爲著明。而於萎黃病。尤有特殊之効

果。如於種種原因(子宮出血。白帶

下。營養不良。過勞。月經不調。神經痛

腹痛。熱病)之衰弱症之貧血症內

用之。則有良効。又如過勞得見鐵。酸

鐵等。常爲收斂藥。而供外用者也。

內服之鐵之吸收及排洩 鐵內服

之時。因胃中之酸分。成爲可液性之

蛋白質物。而爲胃腸所吸收。其一分

於腸中爲硫化鐵。而排泄黑色之糞

尿。

中國方

● 消黃丸(名家方選)治黃脾胃、

胸中有毒胸助。

瓜松脂 一錢 大黃

鐵粉 各五分 黃栢 三分

鐵粉 三分 甘草 八分

右六味。以蕎麥糊丸。用酒或味噌汁

或白湯送下。

● 黃脾胃(名家方選)治黃脾胃、上

滿。動氣。下血。眩暈。不能行步者。

硫黃 八錢 枯礬 二錢

右四味爲末，糊丸如梧子大，一日服一錢或二錢半，以酒送下。

●鐵粉散（各家方定）治黃肝病，氣上衝於咽，短息，小便不利者。

鐵粉 五錢 葛 麥 小麥

右二味爲散，每服五錢，日三次，白湯。

送下。

●治黃肝。

綠 礬 二十四錢 大棗 糖 二十四錢

厚 朴 十四錢 陳 皮 十錢

右爲末，日三次，共服三度，食前服。

●治黃肝方。

黃膽 Icterus 肝臟膨脹充血症 卽黃疸

病解 此症爲肝臟內之膽汁移行于血液中之（胆汁黃膽）或血中之血素變爲

膽色素（血黃黃膽）者，其原因大都係腸

室狹窄，腸失調，或胃加窄兒，十二指腸

加窄兒，毒蛇之咬傷，或依的兒，嗜睡仿誤

安眠尼，呼吸入等，亦有奇精神急竭之候

數點鐘間，而猝起黃膽者，若由急性而來，

則猝然於白眼膜生黃色，經一二日瀰漫

指爪，顏面，四肢，漸及於全身，甚至襪衣被

其染色者亦多，尿呈渾色，如黑麥酒，振盪

之生黃色之泡沫，婦人甚至乳汁亦染淡

黃色者有之，口內常有帶苦味之感，四肢

倦怠，體力衰弱，神經質之人，因之而發狂

者不少，往往易罹夜盲症及晝盲症。

攝生法 黃膽，妨害腸之消化作用甚

牛肉，雞肉，牡蠣等頗佳，酒精性之飲料宜

避，食澱粉性或脂肪性之食物亦有害。

處方

●重碳酸曹達 二錢

●重碳酸曹達 二錢

●重碳酸曹達 二錢

●重碳酸曹達 二錢

犀角 葛粉

薄荷 磁砂

甘草 右水煎。

右水煎。

● 同。

● 重碳酸曹達

一錢

茴香油

五錢

右混和爲散藥。分作六包。一日服三回。

● 大黃末

二分

茴香油

一箇

白糖

一錢

右混和爲散藥。分作六包。一日服三回。

● 人工加爾爾斯泉鹽

四錢

右爲二包。每早朝以溫水作一次服。

● 稀硝酸

一錢

大黃丁酸

四錢

右混和。一日服三回。每回服用十滴。

● 蘆薈越幾斯

五錢

重碳酸曹達

一錢

右以龍膽越幾斯爲丸藥。製八十九。朝夕服用二九乃至三九。

● 複方大黃丸

右每回服五九乃至十九。朝夕各服一回。

複方大黃丸

據日本藥局方。複方大黃丸者。以蘆薈越幾斯二錢。大黃越幾斯六錢。桑聯巴膠一錢。藥用石鹼四錢。用常水研和。至成適宜之丸。兩塊。乃製二層五毛重之九子。以大黃末爲衣者也。

中國方

● 黃陳五茶散(醫方大成) 濕熱內蓄。小便不利者。以此爲主方。

茵陳 猪苓

茵陳

猪苓

茯苓

澤瀉

白朮 各等分 肉桂 少

右水煎。

● 梔子藥皮湯(醫方大成) 傷寒身黃而發熱者用之。

梔子 十五箇 甘草 一兩

黃藥 二兩

右水煎。

● 大黃散(上池秘錄) 瘰癧瘰癧之身。面而目皆黃者。

大黃 黃連 各四兩

右研末。

● 茵陳丸(上池秘錄) 瘰癧瘰癧之身。面而目悉黃。小便如梔子汁者。

茵陳丸

右研末。

茵陳湯 四兩 黃芩 三兩  
枳實 二兩 大黃 三兩

右為散。蜜丸。

●茵陳散(藥方選)治濕熱發黃。

茵陳 山梔子

茯苓 猪苓

澤瀉 蒼朮

枳殼 黃連

厚朴 滑石 各等分

右為散。白湯送下。

●茵陳附子乾姜湯(藥方選)治

陰黃。脈沉數者。

茵陳 澤瀉

陳皮 茯苓 各小

附子 大 乾姜

白朮 各中 白芷

枳殼 半夏 各小

右入姜水煎。

●退黃散(藥方選)治傷寒發黃。

小便澀者。

柴胡 升麻

茵陳 黃連

黃芩 山梔子

枳子仁 通草

滑石 甘草

龍胆 煨心草

右為散。

●一清飲子(藥方選)治黃疸、發

熱。

茯苓 二錢 柴胡 三錢

川芎 桑白皮 各一錢

甘草 五分

右入姜棗水煎。

●茯苓山梔子茵陳湯(藥方選)

治黃疸發熱。日暮則止者。

茵陳 一錢 茯苓 五分

山梔子 蒼朮

白朮 各三分 黃芩 六分

黃連 枳殼

豬苓 澤瀉

陳皮 防己 各三分

青皮 一分

右為煎藥。

●大黃硝石湯(醫務藥方類聚)

治黃疸。脈澀者。

大黃 硝石

黃芩 各四兩 山梔子 十五枚

右為煎藥。

●茵陳蒿湯(醫錄方規矩)治身黃二便不利腹微滿者。

茵陳 六兩 大黃 二兩

山梔子 十四個

右水煎。

●茵陳梔子三物湯(醫錄方)

規矩) 治黃病大便自利者。

茵陳 大 山梔子  
黃連 各小

右水煎。

●治黃膽方。

茵陳 芍藥

蒲公英 各一錢 孕禁酒石三分

甘草 一分

### 貧血症 Anemia 白枯血虛

**病解** 人類之身體中。以血液為最要。其全量於成人約有身體之十二分之一。初生兒約十九分之一。女子較男子為多。壯者較老人為多。若此血液。因他種之原因而反其常量之時。先於眼目。口唇。爪頭等之皮膚粘膜。呈蒼白色。唇驗失其紅色。甚至全身如蠟細工者有之。偷力亦衰弱。

出於困難而覺倦怠。思考力。記憶力。均減退。復起甚早。因火耳鳴。嘔吐。暖氣。吃進欠停等。且發劇烈之頭痛者有之。此病大抵起於產後。吐血。外傷。放血及重瀉之後。  
**攝生法** 服後列之藥劑。而得營養。固無論矣。但貧血症。除服藥外。若不行他之攝生法。雖卓絕之妙藥。奏效甚難。若面色

蒼白。有貧血之症候者。遊避山間海濱。日光清而空氣爽之處。面貌便得漸呈紅色。此人皆知之者也。若因生計困難。不克至離家遠處之地。為山水之遊避。則當棲居田舍。日夜於疎林畦町之間。寫適意之職務。(摘草。焚木。燒柴刈草等)食物擇易消化而滋養品多者食之。脂肪類。於貧血

右水煎。  
(藥寶明集)  
●煎腳木服用。  
(外臺秘要)

●梅樹根為粉末。以酒服用。(食療本草)

●龜鶴實為粉末。以白湯服用。

(古今醫統)

者功效甚著。其他如餵、牛脂、肝油、牛乳等。有非患者禁忌之物。均為最上之需要品也。酒類隨患者之量而飲用。然不可過度。麥酒為最瘦者之好飲料也。

處方

外國方

●芳香酒丁幾  
龍胆丁幾

一錢  
五錢

吃逆 *Singultus*

病解 本症為橫膈膜之運動。大抵起於食後。屬生理上之作用。實非疾病。然因肺炎、靈秩斯、胸氣等而發者。頗危險。其他如數私的思、腸胃疾患亦起吃逆。

攝生法

吃逆大都由生理上之作用而發。雖不足畏。然自神經性疾患而起者。

右為丸藥。均作百二十九。一日服三次。每回用一丸。

白粉

●枸橼酸鐵規尼涅  
設利酒  
鼠梨イヌセンツ

右為酒料。一回一勺乃至二勺。

●鹽酸規尼涅  
焦性磷酸鐵

一錢  
一錢

●鹽酸聖古尼涅  
鹽酸規尼涅  
枸橼酸鐵

右為丸藥。分作二百四十九。每回服二丸。朝夕二回服用。

●樟腦精

右為散藥。分作十包。一日服三包。

●依的兒性鋼草丁幾  
薄荷油

右混和為水精。一回服二十滴。一日

以速治為要。即於心窩部塗布酒精。或冰塊或冷水。胃部貼以芥子泥。

處方

外國方

●臭菜加里  
茯苓末

二錢  
一錢

●依的兒性鋼草丁幾  
薄荷油

右混和為水精。一回服二十滴。一日

三回。  
 耶位蘭日葉  
 一錢  
 種砂  
 右爲煎藥。一日三回服用。  
 三分

### 第六章 皮膚病

#### 贅疣 Yerrua 皮膚乳癆瘡

病解 贅疣爲突出之小疣。呈扁平或半球形。較豌豆大而較大豆小。數個集

合之時。有巨大之隆起物。呈半淨之長面

或分裂之上層者有之。手指上發生最多

而面上甚少。雖無疼痛其他種之障害。而

外觀則極形醜惡。故必須除去之。若其厚

薄化時。則自行潰裂。表皮脫落。除內服藥

外。同時當用外用藥。

攝生法 無飲食物及他種之攝生法。

僅當用藥之後。覺有起痒。宜稍行爬搔。不

處方

外國方

●薩聖那越幾斯

單軟膏

右貼布患部。

●乳酸那爲倫護

單軟膏

散粉

一錢

十錢

一錢二分五厘

五分

四錢

亞鉛華

華攝林

右煉和爲軟膏。一日三回塗布。

中國方

●薏苡仁末

白糖

右混和爲散藥。分作三包。一日三回服用。連服一月。(宜以報紙包之)

●治疣方。

薏苡 三錢

甘草 一分

四錢

十錢

二錢

一錢

右二味水煎。或以二味煎患處。

去疣方。

(名家方選)

蓋兵仁

木賊 各等分

右水煎。

(中國日用方物畧)

### 天泡瘡 Pomphlyxus

病解

天泡瘡。於皮膚面。形成水泡。其

(初生兒天泡瘡)初生兒天泡瘡。大都發

至破裂。或誘起肺炎或腸胃加答兒。因之

大如桃實。或手掌。內容透明之漿液。漸漸

於生後第一週之後半期。於健全之皮膚

致密。

瀰漫而呈乳膏狀膿狀。則其泡自潰。後露

上生細小水泡。或如小豆大之平坦水泡。

(慢性天泡瘡)此症連續甚久。自數月以

漸紅濕潤之與皮面。縱使全愈。必生瘰癧

其內容物。初若水狀。後為膿狀。增大甚速。

至數年。其症候並非始終緩慢。或全愈。或

有初呈紅色後變褐色之皮面者。或該泡

而至如五厘之銅幣。水泡破裂剝脫後。則

復發極小之水泡。皮膚弛緩。周緣無赤色。

並不破潰。其面乾涸成薄脆之黃色。黑色

稍濕潤。或呈不濕潤之赤色圓形。全身之

亦無疼痛。其大如豆粒或豌豆。有時如手

或褐色之痂皮而剝脫者。或不覆以表皮

容體。大抵無極害。經過頗善良。

無表皮包裹而糜爛。肌熱充進。瘰之甚久

者。本症不特發生於皮膚面。口唇。頰。咽喉

(急性天泡瘡)此症極之者少。將發此症

患者或因脫力而至於死。

鼻孔。氣管支。陰門等之粘膜上。往往發生

之前。以倦怠。消化不良。惡寒。發熱為前驅。

攝生法 擇宜於滋養品之食物。以強

於眼險。以致頭部亦有發生者。其症候有

三四週以上。當熱之發生時。病勢增劇發

壯身體。皮疹劇痒之時。行溫浴或水浴而

種種。本書只述初生兒之天泡瘡。與急性

生皮疹。先於皮膚起紅色之斑點。復隆起

洗滌之。不可爬搔。宜防觀衣之固着於瘡

慢性之天泡瘡。

而成水泡。其內容物透明而漸次膨滿。終

爛面。通常天泡疔。屬於傳染病。健全者不可與接觸。流行此病之家屋。病院。校舍等。不可出入。

處方

外國方

●硫維華

一錢

炭酸加里

五分

安息香脂

五錢

刺納林

三錢

右研和爲軟膏塗布。

●硼酸

一錢

胡麻油

二錢

右混和爲塗布藥。

●滑石末

一錢

亞鉛華

一錢

右研和。搗布於水泡破潰面。

●亞鉛華

一錢

硼酸

五分

刺納林

五錢

右爲軟膏。

●澱粉

一錢

石松子末

一錢

右研和。搗布於水泡破潰面。

●撒里失腐酸

二分

澱粉

五錢

右研和。搗布於水泡破潰面。

●硫黃華

二錢半

加里石鹼

七錢半

ベルガモット油

六滴

右混和塗擦。

●石炭酸

一滴

華搗林

一錢半

右混和。塗布於糜爛部。

●沃度仿讓

五分

滑石

一錢

右搗布於水泡破潰面。

中國方

●搜風解毒湯(醫道重寶記)治

頭疔。

土茯苓 七錢

薏苡仁

防風

木瓜

木通

白蘞皮 各五分

皂角子 四分

右八味煎。

●反魚散(上池秘錄)治楊梅疔。

頭疔。

反鼻

川芎

獨活

連翹

穿山甲 各一錢

右水煎服。

○硫黃散 治頭風。

硫黃 硝石 各二兩

右研末。

●沉香丸(中國經驗方)治久年

出痔瘡頭風。

牛膝 茵陳 炒

薔實 黃蘗

更系子 藜蘆根

款冬根 各一錢

細粉 八分炒熟至六分

右研細末爲丸。如梧子大。茶末爲衣。一日服三度。以茶送下。七日服盡。

④治頭瘡方。

合歡皮 大 乳香 中

沉香 小 丁香 中

木香 中 藜蘷 大

木通 中 柴胡 中

連翹 中

右水煎。(中國經驗方)

●瘰癧頭瘡方。

丁子 肉桂

續斷

右各等分。研爲細末。先以豆腐湯洗。然後以麻油煉和此藥敷之。

(中國經驗方)

⑤瘰癧頭瘡方。

小粉之脂與輕粉各等分。以油煉和敷之。

(中國經驗方)

●治大人小兒頭瘡方。

天花粉 四錢 輕粉 二錢

地龍 霜一錢

右三味爲細末。和麻油壓傅之。

(名家方選)

贅毛症 Hypertrichosis

病解

除頭髮。陰毛。眉毛。鬚毛。腋毛等。至症發生於一部分者。生黑色。或紫黑色之外。於全身或一部分發生贅毛者。曰贅之癍點。因之而發生贅毛。本症雖無生命

之憂。然癍之者。外貌極醜。故不可不廣適當之處。置其療法。用機械之方。皆當

其毛髮或除脫毛藥。其外無良策也。其處一掃生法。本症無特殊之攝生法。惟刺則尤甚。方將硫化加爾曼液溶解水內。塗布於毛。一載毛極剛之時。往往發毛發育。極爲繁發之部。

### 寄生性匍行疹 Herpes parasiticus

**病解** 本症爲發生於一部分之皮膚。片乾燥之皮層。其周圍生水泡。此水泡結時。中央褪色。有微細之鱗屑。此謂之斑狀。漸漸匍匐蔓延。通稱自植物之寄生性而始後。現生新水泡。如此新陳代謝。而漸漸來者。曰寄生性匍行疹。爲一千八百四十四年所發見之植物的微菌蔓延症。此症發生時。初生小水泡。小水泡有渣滓與濕濁二者化膿者亦多。水泡之發生。先有一黃紅色。或得紅色之小斑。微有隆起。蔓延

### 白禿風 Tinea 頭部蟬蟻

**病解** 白禿風因黴菌之繁殖而生。頭一至或蟬石。運積甚久。若無全愈之狀。則黃髮部生錢圓形之結痂。其色如蜂蜜或如色變爲白色或汚灰白色。又取之而擦壓。碎黃。表面之中央陷沒。周圍隆起。其狀如於指間。則放出類似臭尿之一種臭氣。攝生法 頭部厚痂先塗以油類。以弱毛刷摩擦之。至少須十五分鐘。或滴油類於指間。用毛絨包裹之。經二十四點鐘。俟

搗皮軟化。而以石鹼洗之。

處方

外國方

●百露拔(靈藥)

右塗布患部。

●依比知阿兒

靈藥失附酸

虞里斯林

酒精

右為塗布料。

●石油

百露拔(靈藥)

右混和為塗布料。

●撒爾失附酸

阿列布油

右混和為塗布料。

五錢

一錢

五分

十錢

十錢

十錢

十錢

一錢

一分

一錢

●刺納林

皮里斯林

蓋薇油

蒸餾水

右煉和為軟膏用之。

●安息香丁幾

硫黃花

零豬脂

刺納林

右煉和為軟膏用之。

●那布答林軟膏

右為塗擦料。

●苦利沙羅並軟膏

右為塗擦料。

中國方

●白雲膏(妙藥秘蘊)

五錢

二分半

一錢

二分半

七分半

一分半

一錢二分半

六錢二分半

十倍者

十倍者

十倍者

阿仙藥

雄黃

雲粉 三分

右以胡麻油溶解。塗擦患部。

●白雲膏(藥寶明集)

茵陳蒿

右燒黑。以香油溶解塗擦。

●治白瘡方

以錫魚重三兩者去腸。取髮之落毛。恣

魚燒黑。為細末。入雄黃一分。以麻油調

敷。

●又方

將雄鼠糞燒黑。以麻油調和貼之

●又方

搗馬齒莧貼之。或燒鼠面以猪油調和

貼之亦可。

(中國經驗方)

燒黃柏

大黃 各一分

●以藥草煎水塗之。或以買衆根燒黑。按  
 油溶解塗之。  
 (本草綱目) ●藥種開花之頃。取其採燒黑。以胡麻油  
 溶解敷之。  
 ●五八筭。以胡麻油煉敷。(陸家至寶記)

手足汗 Hands sweats Insecht'ss 手心汗 足心汗

病解 罹本症者。自手掌。足底。之汗鹽

有如露滴之汗液滴出。患者因不快之狀  
 應。不與他人交通。其把握之物體。均因汗  
 液而生汚點。故不克從事於手工等之職

業。足汗因足袋靴鞋。妨礙汗液之蒸發。以  
 致皮膚常濕。上皮的膨脹。及發軟。足趾近  
 傍呈白色表皮。糜爛離裂。發不快之疼痛。

附着於足袋等之汗液。分解而放臭氣。以  
 起傍人之厭惡。但發此症者。以月經不調  
 之貧血性婦人爲多。

處方

外國方

●酒石酸 一分  
 醋酸 一錢

右混和。敷布於鞋香。足袋。

●坎脫拉氏散膏

右貼布局部。

●撒里失爾散

小麥粉

滑石末

占研細。敷布於患部。

●那布管林

コロン香水

酒精

右混溶。爲塗布料。

●單寧酸

酒精

右溶解。爲塗布料。

中國方

●蓮香(藥方記)

白檫末 二十錢 丁子 三錢

三奈 三錢 甘松 二錢

甜 臨 五分

右爲細末。塗於手掌。

●以滑石末塗手。足。(雜言藥方集)

四十三錢

酒皰鼻 Acne rosacea

病解 本症者以酒客或野蠻人爲多。其鼻端或鼻附近之皮膚如兩頰、前額、上唇等。起慢性之疾患。其局部之血管擴張。而面生如小粒之皮疹。其初只於飲食時。或冷暖無定之時。於患部顯紅腫。有時發即消。發潮熱時。日平素呈赤紅色者。進而生鮮紅之小疹。其次則皮脂腺擴張。皮膚肥大。其狀如石榴之實。增劇後。甚至分泌液汁而放臭。即行化膿。然患者成病苦甚少。原覺輕微之癢痒。與灼熱而已。有時稍感疼痛。大部因酒飲酒而起。其他如月經之過與不及。腸胃之慢性加害兒等。亦爲其誘因也。顏面若顯發寒氣甚久。發本症者有之。彼夫漁父也。舟子。牧童。等之易罹此症者。或是故也。

攝生法 鼻端及頰面不可感受寒氣。其久飲酒宜慎。酒之害尙少。葡萄酒之害甚多。腸胃宜強健。月經宜整。

處方

外國方

●沈降性硫黃(硫黃乳)

依比知阿兒

一錢

右混和塗擦於局部。

●依比知阿兒

一錢

硫黃乳

一分

刺納林

十錢

右塗擦患部。

●依比知阿兒

一錢

黃色蘇攝林

八錢

右爲軟行塗擦。

●刺納兒聖

一錢

刺納林

二錢

右爲塗藥料

●亞鉛華

五錢

刺納兒聖

一錢

刺納林

十錢

右塗擦局部。

中國方

●靈酒鹽鼻。面赤如天刑病者。

黃連

地黃

大黃

梔子

葛根

芍藥 各一錢

紅 荊 一 錢 甘 草 少

右八味以水四合。煮取二合。去滓。再煎。取一合半。日二服。(名家方選)

●治酒腫鼻方

紫葳花 梔子

子 黃 各 等 分

右為末。

上進粉散

毛 虱 Pediculus nitidus 陰毛虱

病解 毛虱。扁平而呈淡褐色。多棲於

陰毛中。漸蔓延而至腋毛。肩毛。胸毛。寄生

於陰毛者。大都藉交媾而傳播者也。毛虱

穿頭部於毛囊中。以六脚把握毛髮。腹部

露出於皮膚之面。除之甚不易。因而起不

快之癢癢。且有因爬搔而起濕疹者。

攝生法 毛虱。多由交媾而傳染。交媾

後如有疑。即塗以水銀軟膏。而行溫浴

治之。又陰毛稍有搔癢。即檢查該部有毛

虱否。苟有毛虱發見。便施治療。若失於注

意。則蔓延於全身。而受不堪想像之苦矣。

處方

外國方

●水銀軟膏

右於寄生之毛髮部擦入之。二三時

後。當再行溫浴。

●百密拔除撒謨

右塗擦。

●石 油

河列布油

百密拔除撒謨

右混和。為塗擦料。

●石 油

右洗滌毛髮。

中國方

●治陰虱方

鉛 粉

輕 粉

藍 苔

右五味。以石炭油搗汁。擦撒。當用

苦參。威靈仙。蛇床子。石膏。枯礬等六

味。為洗藥。

●治陰虱方

以銀朱塗之。

皸裂 Rhagadia

病解 皸裂之時。貧瘠。丁於手拳或足趾之皮膚上。生皸裂。呈腺狀或溝狀是也。皸裂大都生於手指及足趾之屈側。或手拳。足趾。口角。鼻角。上脛等。有多少之疼痛與癢。

攝生法 寒時不與水等之液體接觸。固可無皸裂之患矣。然當不得已之時。或如婢僕之勞賃事者。或為水夫之職業者。既濕潤之皮膚。不可使直接與寒氣相觸。此不可不注意也。若非以布片拭乾。決不可就火取暖。皮膚之不潔。亦為皸裂之一大原因。故入浴不可愈忽也。

處方

又方

外國方

●華福林

クマリン

龍 腦

右三味煉和。為塗布料。

●廣里斯林

善滋水

右混和。為塗布料。

●華福林

硼 酸

龍 腦

人造麝香

右煉和。為塗布料。

一錢

一分

五厘

二錢

五錢

一錢

二分

二厘

二厘

●硼 酸

廣里斯林

白檀油

水

右混和。為塗布料。

●魚 膠

廣里斯林

水

善滋精(十倍者)

右以魚膠浸水。使之柔軟。於此加十倍之水與二倍之廣里斯林等。於重湯煎上溶解混和。冷後將凝結時則加善滋精。

二分

二錢

二滴

十錢

一錢

二錢

十錢

一滴

以煙草煎汁洗之。(中國經驗方)

右塗布劑。

● 威里斯林

一錢

游性加里

酒精

二分

水

右混和，為塗布料。

四錢

### 火傷 Combustio

病解

火傷，因接觸於熱性物而起。例

如錫瓦斯、烈火、沸湯、蒸氣等。或與腐蝕性

物相接觸。（例如硝酸、醋酸、硫酸及苛

性加里、苛性曹達等）而皮肉發疼痛。微

有腫起及紅色。并有起熱灼性之疹。而

剝離表皮者。（第一期）或發生水疱。中合

帶黃包或帶血之漿液。此泡破裂或切開

之時。底面呈赤色。現知覺過敏之真皮。（

第二期）其甚者。則潰爛而浮面呈白色。

其色亮若已煮之狀。或為褐色而呈枯燥

之面。發生痂皮。其脫痂。因化膿而剝離者

也。（第三期）

攝生法

在第一期內。可以冰水或冰

等冷却所患之部分。在第二期內。可糜其

泡而使漿液滲出。在第三期內。陷於虛脫

者。含葡萄酒、茄汁、茶、肉湯汁。因接觸酸類

而起者。以極稀釋之白堊、石鹼、灰汁、乳汁

等調和而敷之。因接觸鹼基類而發生者

用醋或多量之水稀釋之。

處方

外國方

● 亞麻仁油

石灰水

右混和，為塗布料。

十錢

十錢

● 薄荷腦

胡椒油

石灰水

右混和，為塗布料。

● 鹽基性沒食酸香鉛

刺楸林

華楸林

右混和，為軟膏。塗布患處。

● 的列並辰油

加耶布底油

薄荷油

胡麻油

一錢

五分

一分

二錢

石鹼油

右爲塗布料。

二錢

石炭酸

華攝林

右混和爲塗布料。

一錢

百錢

撒魯兒

胡椒油

右爲塗布料。

一錢

十錢

(第一度)

阿列布油

石灰水

右混和塗布患部。

五錢

八錢

(第二度)

硼酸

巴拉賓

白蠟

一錢二分

二錢四分

一錢二分

甘馬桃油

右爲軟膏。塗布於患部。

二錢四分

(第二度)

硼酸

華攝林

右煉和塗布於患部。

一錢

三錢

(第二度)

阿列布油

右塗布患部。

一錢

亞鉛華

右研和。攪布患部。

二錢

葛粉

中國方

理火傷湯燭方。

黑砂糖 十兩 辰砂 一錢

右二味。調煉塗患處。(上池油錄)

理火傷湯燭方。

海膽

右一味塗患處。其痛立止。

(上池秘錄)

理火傷湯燭方。

蛤蜊殼

右一味。不均多少。灸焦爲黃色。研成細末。用生香油調膏敷之。一方以蜜調敷之。其痛立止。

(上池秘錄)

治湯火傷方。

烏賊骨

五倍子

黃蘗末

右和勻。油調傳。

治湯火傷方。

天童草 十錢

山梔子 三錢

葛粉

柿核

(上池秘錄)

右以白蜜煉合。(藥寶明集)

●治湯傷。

人中白

右一味，以水煉服。(中國經驗方)

●治湯火傷及諸惡瘡方。

巴豆

代磁石

寒水石 各八錢

右三味爲末，糊丸，右丹爲衣，丸如梧

子大，隨症增減丸數。

●治湯火傷。

鼠糞爲細末，以水溶解貼之。

●治湯傷。

好茶末 輕粉 等分

右以鹽汁溶解敷之。

●治火傷。

入飯於土器中燒黑，加入白粉，以藥

藥汁溶解，敷於油紙，用貼傷處。

●治湯火傷。

○以梔子溶於髮油敷之。

○以醬油塗之。

○鷄卵中加米少許敷之。

○石膏之末，以酢溶解敷之。

○以西瓜汁塗之。

○於青菜中加黑粉，搗爲泥汁敷之。

●牡蠣、黃柏二味爲末，以椰子油調付。

●白粉以鷄卵煉和敷之。(農家至寶記)

●以蛤之生汁，煉薄黃末敷之。

●以胡麻拌細厚敷之。

●藥灰入湯，待冷，急敷於痛處。

●以蜂蜜塗傷處。(廣惠濟急方)

●煎青木菜爲膏，用之。(妙藥手引草)

●以丹底土塗之。(龍類本草)

●以醋洗之。(北夢遺言)

●火傷之輕者，以飯米攤於紙上貼之。

●敷鐵漿液。(俚言藥方集)

### 癩風 *Trichinosis vorisicem*

病解

本症乃因蠶而之繁殖而發。此所發見稱之曰「ミクソスポーロン」屈曲間、胸部、腹部、均爲衣服所覆之部分。發於顏面手掌上者甚少。其大如針頭或

粉質。達於手掌大而呈黃褐色。或暗褐色者頗少。初期微呈黃色。有含光澤之面。或有無光澤而脫屑者。蔓延如蝨狀。中央雖消褪。而周緣依然保存。本症僅有輕微之癢痒。無他之障礙。經過非常緩慢。十數年而不可治愈者有之。

白癜風。因歐毒之白斑。或因痲病而皮膚之色素消滅。或因激昂之精神感動而發。與本症不同。且無完全之療法。

癬生法 患部有微痒。不可爬搔。易發汗之人。體之較易。如肺勞患者之罹本症者特多。破是故也。又健全之人。不可與患癬區者相接觸。

處方

外國方

●加里石鹼

右塗布患部。

●苦利沙羅並

華搽林

右混和。塗布於患部。

●加里石鹼精

右塗布患部。

●加里石鹼精者。係歐羅拉氏之所創製。以加里石鹼十五錢。溶於酒精五十錢。於此混和。精質。揮兒油及倍卡莫德油各五分者也。

●苦利沙羅並

右混和。貼布於患部。

●水楊酸

右混和。貼布於患部。

●水楊酸

右混和。貼布於患部。

●水楊酸

右混和。貼布於患部。

●水楊酸

右混和。貼布於患部。

五錢

十五錢

一錢

五分

右混和。塗布於患部。

●萎兒

硫黃華

加里石鹼

酒精

右混和。塗布於臨臥時。翌朝以溫湯洗滌之。

●水銀軟膏

右塗布患部。

中國方

●搽白靈風方。

硫黃

麝香

麝香

麝香

麝香

麝香

麝香

麝香

麝香

一錢

五分

●搽赤白靈風方。

(名家方選)

苦參 大黃  
川芎 硫黃 各等分

右四味爲末和醋以茄蒂擦之。

(名家方選)

●治赤白瘰癧年難愈者。

豬麥草 酸漿草 各二錢

硫黃 一錢 輕粉 五分

右四味先搗豬麥酸漿次研輕粉碎

黃爲細末合搗盛於絹袋以搽痒處

日三度頗有奇驗。(名家方選)

●治瘰癧風方。

樟腦 半兩 龍腦 少

雄黃 半兩

右爲末包於綿布浸酢中復曬於火

上用擦瘰癧風。(中國經驗方)

●治星癩風方。

丹 硫黃 各等分

右研細末以米醋煉和貼之。

(中國經驗方)

●治白癩風方。

密陀僧 大 輕粉 小

右爲末和豬麥草汁貼之。

(中國經驗方)

●治瘰癧風方。

硫黃 丹 各一錢

丁子 貝母

天南星 蛇退皮 各五錢

右爲細末以茄子大棗之切口蘸而

擦之。(妙藥抄術集)

●治白癩風方。

稀莖草 胡桃葉

硫黃花

右三味炙散。

●治白癩風方。

以蕎麥葉水煎洗患處次以硫黃及山

梔子末敷之暫時以後即行洗滌。

●治白癩風方。

浸硫黃於生姜汁以搽患處。

●治白癩風方。

硫黃 丹 各等分

右爲細末和茄子汁擦之。

●瘰癧風方。

豬麥草 酸漿草 各等分

硫黃 一錢

右四味先搗豬麥酸漿次以硫黃末

合搗盛絹袋中以搽痒處日三度。

(上海雜誌)

●撥白瘡風方。

礬石 硫黃 各等分

右二味研末和酥傅之。(上池秘錄)

●治白癩風方。

黃連 石灰

右爲細末和醋塗之。(上池秘錄)

●撥癩風方。

面胡粉 湯花 各二錢

丹雜 光明丹 各六分

右爲細末和生薑汁塗患部。(妙蓮秘錄)

面癩 (omelo)

病解 面癩與粉刺均因皮膚腺之分泌物停滯而生黑點大如錢頭而稍呈長形。派出髮蟻蟲類之牛酪狀質。其黑點因空氣中之塵埃汚染而生者也。若多致孳生則形成圓板之隆起物者有之。大都起於皮脂腺飽多之地。(即前額、鼻尖、口唇、胸部、背部等處) 春心發動期之男子。易發此症者。因此時期內皮脂之官能發生最盛故也。

不可意忽。多血質之人。不可食富脂肪質之物。油製造所之職工。身體之浸浴不可

處方

外國方

●加里石鹼精

右塗布患部。

●炭酸加里

右溶解。以羽筆塗布於患部。

水 一錢二分半 二錢半

●次硝酸杏仁

滑石

橙花木

右爲塗布藥。

●硫黃乳

樟腦

強刺比亞羅漢

石灰水

薔薇水

右混溶。爲洗顏料。

二分

一錢半

三十錢

三分

二分半

五分

四十錢

四十錢

四十錢

四十錢

攝生法 脂肪飽多之人。以石鹼洗面。



腋臭 Foehor axillae 胡臭

病解 腋窩分泌汗液甚多。因分解作用。而放可厭之惡臭。致傍人嫌感不堪者。曰腋臭。然腋窩之分泌汗。腋諸手足爲多。故易放臭。且此汗液分泌甚多之時。於接觸面之皮膚。往往浸濕糜爛。或發炎症。起刺戟性之疼痛者不少。本症大抵女子多而男子少。小兒老人甚少。壯年甚多。滋法應用手足汗條下所列之處方。

攝生法 清潔該部。不可使之濕潤。宜設法乾燥之。

處方

外國方

●撒里矢爾酸

亞粉

三分  
三分

●燒明礬

滑石

●撒里矢爾酸

亞鉍華

●加里石鹼精

那布答林

酒精

●香水(不拘何種皆佳)

●單寧酸

右研和。撒布於腋窩。

五分  
五分  
一錢  
一錢  
一錢  
二十錢  
一錢半  
一分半

酒精

●軟殼拉氏軟膏

●清腋散(藥寶明參)

●除腋散(特種秘派)

●燒明礬

●丁子

●枯礬

●丁子

右研和爲細末。塗擦患處。

二錢半

五滴

右久時貼布患部。

中國方

●燒明礬 十八錢 光明丹 一錢半

●丁子 一錢半

●枯礬 十錢 煨甘石 三錢

●丁子 三錢

●腋臭擦藥(古方九散方)

輕粉 五分 爐甘石

礬石 各一錢

右三味先以礬石搗甘石爲末乃合

輕粉擦腋下

●治腋下狐臭方

當歸 一兩 明礬

輕粉 各一錢 古茶 二錢

右四味爲末白湯飲下(名家方選)

●發腋臭方

發好礬石

右一味爲末粉礬盛之以擦腋下

(上池秘錄)

●發腋臭方

好礬 巴豆 各等分

右二味以麻油煉之粘貼腋下

(上池秘錄)

●治腋臭方

輕粉 一錢 石綠 三錢

右二味爲粉末以酢液解洗之

(妙藥抄術集)

●治腋臭方

丹礬 五分 輕粉 一錢

右二味爲末每三日塗一次

(妙藥抄術集)

●治腋臭

丹礬 枯礬 各一錢

輕粉 百藥霜 各五分

右爲細末投湯中洗患部一日五度

雀斑 Lentigo

病解

本症爲皮膚之色素增多症。其

大如粟粒。過麻子。大者甚少。發生時。決非

一粒。必叢列甚多。大都發於不覆衣服之

部分。如顏面掌背等處。陰莖臀部甚少。其

形狀無定。呈褐色或茶褐色。六七歲之小

兒。易罹之。夏季較冬季爲多。若不受光線

決不發生。

搨生法

本症無一定之搨生法。惟

天出外。須被日步直射之處。

處方

外國方

●加里石鹼

五錢

香發油

一滴

右混和塗擦。

●那布答林

二分

●廣里斯林

二分

石鹼精

十錢

右混和為塗擦劑。

●沃度丁幾

十錢

右塗擦至表皮剝脫而止。

●加里石鹼精

十錢

右塗布患部。

●治雀斑

冬瓜之實酒煮傅之。

肝臟 Callositas

病解

肝臟因皮膚硬結或一部分受

久時壓迫而生。骨下之菲薄肌肉發之。極

易。通常呈黃色或茶褐色。汚白色。疼痛極

微。時或於該部生腐爛。甚異常劇痛。此時

基底化膿而破潰。疼痛增劇。雖五尺之壯

男。必慄轉而不堪其苦。

攝生法 肝臟非僅為疼痛及其他之

顯著障害也。有時能反為皮膚之保護物。

故除因疼痛而須轉藥之外。無須治。尋

覈為本症原因之職業。則自然就治。

處方

外國方

●撒里矢爾酸

一錢

酒精

十錢

右塗布於局部。

●水銀硬膏

右攤布於布片或厚紙。貼於局部。

●加里石鹼

右因軟解局部。宜用溫湯屢洗。

●硼酸

一錢

單軟膏

右煉和貼布於患部。

●治肝臟方（起於基底潰膿而痛者）

以阿膠濃液塗之。而以紙貼其上。

●又方

以番椒燒墨敷之。

●又方

以癩草脂溶解於水而敷之。

（中國經驗方）

魚疣 Clavus 疣目 雞眼子 魚目

病解

本服為胼胝之一種。大都生於

攝生法

於飲食物。無攝生法。能除去

●水銀軟膏

骨之突起部之皮膚上。小趾之外側及足

其發生之原因便可。即胼胝條下所論之

右除去魚疣之後貼用之。

底。最易發生。係呈黃色或茶褐色之表皮

各項。例如磨不適當之靴。香草鞋。等是也。

●木醋

之厚大症也。自其內面之中央角質。呈凹

處方

右塗布患部。

鐘狀而穿入真皮內。類似於魚眼。亦有如

外國方

●水銀硬膏

穿釘於皮膚者。故受外壓。則刺破圓錐狀

●撒里矢爾散

右攤於布片貼用之。

突起之真皮而發劇痛。如在足趾者。妨害

古昔胃藥

一錢

步行。在指掌者。不克作工。與胼胝同。

右混和。塗布於患部。

凍瘡 Congelatio 凍傷 霜傷

病解

凍瘡不關於遇寒氣而人人所

病。例如酒店之小僕。魚肆之商。常取持

水或雪。摩擦其皮膚為宜。其預防之法。於

共生者。生凍瘡之低溫度。人人各異。有人

寒冷或刺激性之液類者。往往不能免之。

夏時或為水浴。或水浴。養成皮膚耐冷之

遇劇寒而不生凍瘡。有人遇零點以上之

攝生法 寒冷時手擦足趾耳鼻等似

習慣。冬季則保持身體各部之溫暖。不可

溫度。已覺困苦。小兒及貧血家。常易罹此

覺微痒者。係有輕微之凍瘡也。此時即以

意忽。

處方

外國方

●稀鹽酸

水

右混和塗布於患部。

四錢

●ボンス橙實汁

右用法同前。

●沃度丁幾

酒精

右於患部之未成潰瘍者塗布之。

●石油

樟腦

右混和為塗布料。用於未潰爛者。

●硼酸

刺納林

右為軟膏。塗布於局部。

●流動巴刺資

樟腦

右用法同前。

●巴刺資軟膏

樟腦

右為塗擦藥。

●凍膿油

刺納林

右為軟膏塗擦。

●亞鉛華

單軟膏

右為軟膏。塗布於潰瘍之患部。

●百濟拔毒散

鉛硬膏

右為硬膏。貼於布片使固着於患部。

中國方

十錢

一錢

五分

五分

五分

五分

二分

五分

五分

五分

五分

五分

五分

五分

●治凍瘡方

以芋燒黑。用胡麻油調貼之。

●又方

益母草一味燒黑。和燕脂塗擦。

●又方

鼠生髮藥洗之。

●又方

稻蟲燒黑。入米少許。以水調敷。又瓜皮陰乾為粉塗之。

●社蠟末以胡麻油溶和塗之。

●生薑搾汁。溫之。塗敷患部。

●冬瓜根。乾茄根。水煎。以其溫液洗之。

●搗梨樹之寄生蟲。塗布患部。

(假日說)

(發藥單方)

(俚俗藥方集)

(中國醫藥方)

● 碎魚入沸湯中煎出。以其冷液洗之。或  
以脂水、羊脂、樟腦、白蠟、橄欖油六味混

和煮沸。每夜於寢前塗敷之。

### 頭虱 Pediculus capitis 髮內生虱

病解 頭虱不寄生於衣服或陰毛。只  
寄居於頭部之毛髮間。因欲擇持毛髮。統  
有六脚。其翅有幼。分雌雄兩種。其卵不易  
附著於毛髮上。善殖力甚大。一雌虱於八  
週間能生五千之子孫。其體色因寄生之  
人隨面各異。帶黃褐色者(中國人)其虱  
亦帶黃褐色。淡灰白色者(歐美人)其虱  
亦淡灰白色。黑色人其虱亦黑。白色人其  
虱亦白。頭虱寄生之時。髮內甚痒。往往因  
爬搔而起溫疹。結疔癩集毛髮。而梳理極  
爲困難。

攝生法 將殺蟲藥漸次散布於頭部。

處方

外國方

● 石油

阿列布油

百露拔爾撒謨

右混和爲塗布料。

● 百露拔爾撒謨

華攝林

ベルガモット油

右混和爲塗布料。

● 帝列並底油

加耶布底油

右混和爲塗布料。

● 酒精

右爲香水。每日塗布之。

中國方

● 於毛虱。以輕粉塗髮根。則虱自然死亡。  
(救急撮要)

● 以烏頭浸水中半日。取此水塗毛髮。  
(拾玉智惠海)

五錢

五分

一百七十七

●以苦辛之煎汁洗頭髮。(妙藥秘傳)

禿髮症 Tinea Fossurans

病解 禿髮症者何。即如髮鬚眉陰毛。眉毛等之一部分或全部脫落。而生禿處。或毛髮稀少之謂也。例如屬於原因不明之禿斑。寄生性。即行疹之禿斑。屬於急性。急染病。或梅毒。火傷等之毛髮。荒蕪之症。慢性禿髮。屬於頭部皮膚類之糠批疹性。禿髮等是也。因其原因不同。而有治不治之種種之別。即於前述之諸症中。禿斑中之惡性者。如糠批疹性之禿髮症。屬於火傷等之毛髮。破潰之禿髮症。等。皆決無再能生髮之望。(其禿斑治法詳述於旬行症條下)

攝生法 禿髮症因原因而攝生法各異。凡關於傳染性(禿斑。禿髮)者。患者所用之櫛膏。剃刀等。均須消毒。而後用。或不與此等物相接觸亦可。其惡性疹性者。初以加里石鹼洗滌該部。塗以稀薄之醋酸。而梳毛髮時。更宜以胡麻油。樟油等之類。溫潤毛髮根部。基於全身之衰弱者。務令身體之營養健全。

- |           |     |
|-----------|-----|
| 掛皮油       | 五分  |
| 酒精        | 八錢  |
| ● 檉里矢爾酸   | 一分  |
| 右塗布患部     |     |
| ● 安息香丁酸   | 五分  |
| 肉苳蔻油      | 二分  |
| ● 檉里矢爾酸   | 二分  |
| 蕃椒丁酸      | 五分  |
| 酒精        | 二十錢 |
| 右混和。為塗布料。 |     |
| ● 刈曹兒聖    | 一錢  |
| 丁子油       | 二分  |
| 真麻子油      | 八錢  |

處方

外國法

- 檉里矢爾酸 一分
- 肉苳蔻(メリスチカ)油 二分
- 胡麻油或樟油 四錢
- 右塗布於禿髮部。

安息香丁 錢

酒 精

二十五錢

右以柔軟毛布，按擦局部。

●牛 蠟

三錢乃至十錢

衣虱 Pediculus vestimentum 體虱 衣被生虱

病解

衣虱為寄生於人類體衣之一種寄生蟲。其形較頭虱大而大。箱帶暗色。

中有黑斑。衣虱之咬刺。自上皮吸引血液。

患者感劇烈之痛癢。其以爪頭搔破皮膚之時。爪痕呈暗色。永久不能消盡。此種之

寄生蟲。大都生於下等社會中之人。如乞

丐之徒。有終身不離之疾苦。若上流社會

則於旅行及病中或發生之。遇戰爭事則

蔓延而至軍人。其處方如下。

攝生法

衣虱因身體衣服不潔而生。

蓖麻子油

五錢乃至十錢

蘆菜花油

五滴

撒里矢爾酸

一分乃至五分

右牛蠟與蓖麻子油。先適宜融合。乃

故須令衣服常保清潔。或一生此虱。即將

衣服浸沸湯中煎之。為殺蟲法。時時更換

襯衣。襯衣以白色者為佳。此因其污點易

見。不致有不潔之惡習慣也。

處 方

外國方

●百部根 五錢

大樞子 三錢

水 銀 一錢

胡椒油 三錢

右煉和。包於布中用之。

●水 銀 六錢

炭酸石灰五錢

加撒里矢爾酸。滴入蘆菜花油。為固

形髮油(發附透油之類)之稠度。塗

布於局部。

苦 辛 四錢

百部根 二錢

驅蟲菊 三錢

右研和炭酸石灰於水銀中。研至不

見星球。乃加粉泥。煉和他之三味。塗

於布片用之。

●烟草葉

十錢

驅蟲菊

五錢

樟 腦

五分

撒爾矢兒酸

一分

虞利新林

一錢

右先細製烟草葉，露過荷二品，然後

加入樟腦，攪得矢兒酸，除與奧利

斯林相混合，使爲適宜溫潤之製劑。

全量分爲五包，一包爲一回之量，使

薰於文火上，被衣服於其上面驅

除之。

●那布答林

五分

ガウテリヤ油

十滴

●石油依的兒

二十錢

右溶解混和，以香散器使之霧散。

●那布答林

五分

シマロン

石油依的兒

百錢

右溶解混和，塗布於綿布，使蒸散石

油依的兒，殘布爲所謂虱絨而使用

之。

●除衣虱

中國方

草烏頭

白芷

各四兩

右以水五升，煎爲二升，用木綿一塊

五分

十錢

五分

●除衣虱

水

六錢

苦辛

四錢

烏頭

二錢

百部根

二錢

右以木綿二尺五寸，切爲十六筋，

塗以上之藥汁，使之乾燥。

●疳毒爲粉末，散布於席間及布圍中

(衛生簡易方)

汗疹 Sudamina 拂瘡

病解 汗疹爲發於衣服之纏絡部，或胸腹腋窩下肢之散在性水泡，類似透明而發，或起於急性剝蝕傷痕質斯，腸室扶疎，繞以紅環，亦有呈乳狀或膿狀者。大斯，肺勞等，然發疹絕不劇烈。

攝生法 皮膚常保持潔，衣帶纏絡之處，須十分乾燥，不可有濕氣。小兒最易罹此症，親母及乳母須注意，不可怠忽。尤當

屢屢令其沐浴。

處方

外國方

● 亞鉛華

一錢

● 亞鉛華

一錢

● 亞鉛華

一錢

右研和以紗袋盛之。撒布於患部。

● 亞鉛華

五分

● 亞鉛華

二分

● 亞鉛華

一錢

● 亞鉛華

一錢

中國方

● 以雄土為粉敷之。或以升麻煎湯洗之。

(妙藥妙術集)

● 紅花 二錢 芍粉 二錢

● 右為粉末。以麩垂汗混溶敷之。

(妙藥方)

● 以天瓜粉散布之。

(俚言藥方集)

乾癬 Psoriasis 鱗屑疹

病解

乾癬一名鱗屑疹。呈銀白色。而

為相重疊之表皮小鱗片。剝脫甚易。聚於

一部分者有之。蔓延於全體者有之。脫落

鱗片之皮屑面赤腫。而出血甚易。治癩極

困難。僅有微瘳。無他種之障礙。發於手掌

面者斑小而鱗屑頗薄。

攝生法

乾癬發生部分。雖發瘳。決不

可搔爬。不得已。只可以溫湯濕潤該部。食

物無所禁忌。常用割合鹽分之湯或炭酸

曹達之湯而入浴。或浴於硫黃泉亦可。

處方

外國方

● 撒爾沙根

一錢

● 薄荷葉

五分

右爲搗出藥或煎藥分三日服用。但此藥須服用一二月。

疥油

右塗布患部。以亞麻紙被包之。

亞麻紙者以菲薄之洋紙瀉清亞麻仁油。乾燥以後。成爲半透明之油紙也。

●石炭萘兒  
石油

右溶解。塗布於患部。

●石鹼擦劑  
黃酸油

右塗布於患部。

一錢  
二錢

一錢  
二滴

中國方

●胎水蟲方。

胎仙藥 二錢 赤小豆

黃栢 大黃 各一錢

程粉 三錢

右以香油煉和塗擦之。(妙藥秘傳)

疥癬 Scabies 疥蚤 肥前煎

病解

於腹之腫側處及男子之陰莖女子之乳房等。覺有癢痒之刺感。因劇痒而爬搔之。則生粒狀之水泡。該部分仔細觀察之。則有小孔。再爬搔之。遂見極微之小蟲。此謂之疥蟲。在動物學上屬於蜘蛛族疥蟲類。有雌雄兩種。雌蟲較雄蟲多。且大。疥癬因各人之職業而所患者不同。靴工。鍛工及製造煙草者。罹之甚少。

平獄等處。蔓延最甚。夏季較多。冬季較少。男子較女子罹之者多。

攝生法

中國及哥羅牙島之風俗所通行者。以針刺殺蟲體。或以食鹽。砂粒摩擦其患部。然此法之奏效不甚確實。雖確黃泉之入滯。功效頗著。若無確黃泉。則以他黃乳(湯花)自製含硫黃之湯而入浴。

豫防法不可與疥癬患者相接觸。患者使

用之衣服。手巾及被衾。宜均以高熱消除其毒。

處方

外國方

●百露拔留撒讓  
薄荷油  
右混和。塗布於患部。

流動蘇合香

五錢  
十滴  
二錢

阿列布油

二錢

右溶和塗布於患部。

●流瀉蘇合香

二錢半

破黃華

二錢半

生石灰

二錢半

石鹼流動藥劑

五錢

華想林

五錢

右混和爲軟膏之稠度。一日二回塗布。

●硫黃華

一錢半

單軟膏

十五錢

右混和爲軟膏。夜間塗布於患部。

●硫黃華

二十四錢

刺質唾兒油

三分半

丁香油

三分半

遠刺倪篤薩

一錢二分

水楊酸

二錢半

華想林

適宜

右爲軟膏之稠度。塗布患部。

中國方

●升麻和氣飲(醫道日用綱目)

疥癬生於手足而痛痒者。以此

治之。

升麻

葛根

白芷

陳皮

蒼朮

桔梗

當歸

半夏

茯苓

乾姜

枳殼

大黃

芍藥

甘草

右十四味。入生姜煎之。

●一切血毒疥癬不已者。

楊梅皮

一錢

右二條。水煎服。日二劑或三劑。

(各家方選)

●治疥癬方。

大楓子

二錢

椰子油

二錢

右三味。綿裏。微火烘炙。稍稍煎之。

(上池秘錄)

●治疥癬。

忍冬

艾葉

桑白

青木葉

石菖蒲根共用 菊花各五十錢

生 姜黃葉共用

右煎爲藥酒。(中國經驗方)

●治疥癬。

大楓子

四十錢

樟腦

一錢

輕粉 蛇骨

烏賊骨 各二分

右研細末，絹包，擦之。

(中國經驗方)

●治疥瘡。

雷丸 二兩 輕粉 一兩

樟腦 二錢

右為細末，包於麻布擦之。

(中國經驗方)

●治疥瘡。

雷丸 五兩 木香

沈香 各三分 龍腦 五分

大黃 三分 胆礬 五分半

硫黃 三分

右七味為細末，包於麻布，為擦藥。

(中國經驗方)

●治疥癬。

丹 樟腦

輕粉 蟾

胡麻油

右為碎藥，夜分塗布之。

●治疥癬藥湯方。

忍冬 三十錢 荆芥 三十錢

枳殼 三十錢 防風 三十錢

苦辛 三十錢 湯花 二十錢

枯礬 黃柏 各二錢

(藥寶明集)

●治疥癬藥方。

萎朮 硫黃

湯花 各一錢

右三味，以香油溶和塗擦。

(藥寶明集)

●治疥癬藥方。

硫黃 黃柏

蕎麥粉 小豆粉 各一錢

輕粉 五錢

右以胡麻油煉和塗布。(妙藥秘藏)

●疥癬打藥方。

黃陸 樟腦

雄黃 枯礬

和大黃 各三錢 輕粉 五分

大楓子 五錢

右七味為末，以胡麻油溶解，布包。

打付患部。(長家至寶記)

●治疥癬方。

大楓子油 水銀

樟腦 各一錢 枯礬 六錢

胡椒 六個 山椒 二十粒

右六味爲末。煉爲膏。以水銀不見星爲度。乃取六如大豆之麩。摩擦掌中。一劑十二日用盡。一日數次。頻摩擦掌中。以熱爲度。

●以生赤小豆與炒熟者各等分。用胡麻油溶解敷之。

●或搗劉寄奴草敷其汁。

秃瘡 *Tinea tonsurans* 秃髮倒行疹 鬚疔

病解 秃瘡及鬚疔。爲有毛部之倒行疹。發於頭部者曰秃疔。發於鬚髻部者曰鬚疔。生於頭髮部者。呈圓形或橢圓形。有星赤色之鱗屑。該部毛髮。或全脫落。或自毛根部而碎折。其狀宛若刈草之殘株。未碎折之毛髮。失光澤有一種固有之灰白色。如塵埃之附着於毛髮者然。病勢增進。

(農家至寶記)

●角 石 二錢 甘草 三分  
 輕粉 三分 牡蠣 二錢

右四味爲細末。以胡麻油調敷之。  
 (妙藥妙術集)

●疥癬之內攻法。煮伊勢蝦食之。  
 (智惠庫)

蔓延至髮之全部。因發炎症。而有赤腫結疔。皮毛癢部。有無數之膿點。屢屢澀出膿汁。其時寄生菌入於毛深中。以致毛發潰破。而毛即脫落。若毛根荒蕪。妨毛髮之再生。起於鬚髻部者。多發炎症。生膿胞。有呈圓形而劇烈之腫脹。且濕潤而澀出液汁。與健全之皮膚境界。比較甚明。患者全失

●竹葉霜與蛋白混和塗敷患部。  
 (楊氏產乳方)

●何首烏。芫葉各等分。水煎洗之。  
 (本草綱目)

●以鹽摩擦局部。  
 (千金方)

●搗苦楝根。以醋混和塗布局部。  
 (衛生易簡方)

平素之容貌。疼痛甚劇。然苟能全治。則毛髮復舊。顏貌亦能復於故態也。

攝生法 此症當發痒劇烈之時。不可把抓。不然。則病勢因之增大。并傳染於爪甲。常有汗液等滲出。濕潤之皮膚面。宜清潔之。秃瘡發疔。均須注意理髮。犬。牛。馬。貓等之糞本症者。不可與之相接觸。本症以

春秋冷濕之交。傳染最易。

處方

外國方

●加里石鹼

二錢

刺納林

二錢

那布答林

二錢

右混和為軟膏。塗於患部。

●石炭酸

五錢

阿列布油

十錢

薄荷油

一兩

右混和以毛布蘸之。貼布於患部。

●木萆兒

二錢

加里石鹼

二錢

丁香油

五滴

得奇油

二滴

加那布底油

十滴

樟腦

五分

酒精

十錢

右混和為塗布藥。

●亞鉛華

一錢

撒里矢爾酸

五分

丁香油

五滴

刺納林

五錢

右混和為軟膏塗布之。

●撒里矢爾酸

一錢

安息香丁幾

五錢

加那布底油

二分

酒精

錢

右混和為塗布藥。

●刺曹兒聖

一錢

樟腦丁幾

五錢

丁香油

三十滴

右混和為塗布藥。

●安息香丁幾

五錢

酒精

二十錢

右混和為塗布料。

●苦利沙羅並

一錢

華攝林

五錢

右混和塗布之。

●木萆兒

一錢

薩黃華

一錢

加里石鹼

二錢

華攝林

五錢

右混和塗布之。

那布答林

一錢

華攝林

二十錢

右混和塗布於患部。

●撒里矢爾酸

一錢

酒精	十錢	刺賢埤兒精	二錢半	虞里設林	一錢
龍腦	二分	虞里設林	五分	酒精	七錢
右混和塗布於患部。		右混和塗布於患部。		右混和一日二回塗布患部。	
●苦利沙羅並	一錢	●稀硫酸		●刺賢兒毒	一錢
醋	一錢	右塗布於毛髮部之旬行疹。		阿列布油	一錢
華髮林	五錢	●アントラロビン	二錢半	刺納林	十錢
右混和塗布於患部。		阿列布油	八錢	右混和一日一回塗布患部。	
●樟油	四錢	葛納林	十六錢	中國方	
石鹼糖	六錢	右混和塗布於患部。		●龍正散(妙藥秘靈)瘰癧瘡之類。	
硫黃華	二錢	●依比知阿兒	二錢	天瓜粉	四錢
刺賢埤兒精	十錢	慶麻子油	四錢	丹礬	
百露拔爾撒謨	五分	拔的兒精	一錢	枯礬 各五分	土龍 二分
那布答林	一分	撒里矢爾酸	五分	輕粉	五分
右混和塗布於患部。		右混和塗布於患部。		右以香油溶解塗布患處。	
●硫黃華	二錢	●撒里矢爾酸	一錢	●治秃瘡方。	
石鹼精	二錢半	安息香丁幾	一錢	川島頭	湯花

大黃 硫黃 各等分

右四味爲末。以地酒煉之。以紙封固。一夜取出。以醋調和。敷患處。此方又

治疥癬。 (名家方選)

●又方。

蓖麻子 少 胡椒

黃連 各等分

右三味爲末。和醋敷患處。

(名家方選)

大黃 烏頭 等分

右二味爲末。和蠶屎處。(名家方選)

●治頑癬方。

輕粉 一錢 綠豆

白附子 硫黃

牡蠣 各一錢

右爲末。以唾調傅患處。(上池秘錄)

●治陰囊濕痒方。

麻黃根 牡蠣

乾姜 蛇床子 各等分

右四味爲末。擦患處。(名家方選)

●治腫來疔。

藥霜 一錢 輕粉 二分

右以紫委汁調敷。疹痛則以胡麻油

調敷。

頑癬 *Psoralea marginatum* 塚狀疹 田蟲

病解 頑癬屬於無毛部之寄生性何

行疹。最初於該部之皮膚面呈赤色。稍着

隆起而落屑。漸漸蔓延。及於周圍。而隆起

最著之處。呈紅色。有鱗屑。小痂皮。小水泡。

與健全皮膚之界限甚明。其中央部雖發

疹增大。尙留溼潤與紅色。起鱗屑或小水

泡。蔓延甚緩慢。數個合併之時。其大如手

掌。或顏面漸漸增大。而失初生時之圓形。

蔓延時無定形。大都不克自行痊癒。往往

有五年至二十年之久。發頑固之癢痒患

者甚苦之。本症大抵發於皮膚之濕潤部。

健全部分。決不發生。均生於皮膚兩面相

接觸之部。如肛門之周圍。陰部。腋窩。乳房

下部。膝關節之反側等。男子較女子罹之

者多。陰囊及大腿間之皮膚。最易發生。

# 狼瘡 Lupus

病解

狼瘡、爲侵結核毒之皮膚或粘物療法。

攝生法

狼瘡傳染於結核桿菌之皮膚、宜恪守服藥及其他結核性諸症之攝生法與預防法與結核患者同居之時、最

真正之結節、其結節相合而生圓形或不正形之浸潤。然狼瘡之結節、經時既久即漸漸吸收、全隨消滅。有僅留極少之殘痕者、與結節崩壞而成潰瘍、除你使他其周圍、爲延而至軟骨、以致破壞骨膜者之二種。本症多發於四肢顏面、其中手及足邊、鼻側、最易罹之。完全之治療、小部分固則

須注意汚染唾液等、手巾不可接觸。

處方

外國方

●焦性沒食子酸軟膏

(十倍者)

右置於布片、貼布於局部、以繃帶固定、每二十四時交換之。

●焦性沒食子酸

焦性沒食子酸者、爲從沒食子及烏華烏爾失葉所製之液

食酸、熱三百二十度而成者也。本品爲狼瘡之特效藥。

●撒里矢爾酸

一分

●石鹼硬膏

三錢

●刺納林

二錢

●的列並底油

二錢

●右法和爲塗布料

●肝油

一錢乃至四錢

●右朝夕二回分服

●刺曹甲、聖刺納林

(三倍者)

右貼用於局部

## 紅斑性狼瘡 Lupus erythematosus

病解

除由結核毒侵襲而發之尋常之痕瘡。大抵常帶黃色。或赤褐色。而不發紅外。尚有一種狼瘡。鼻及兩頰。最易發生。但以顯現於全身之赤色鱗片。疥疹為始。漸次泛濫廣大。與圓銀幣相彷彿。中央有痘痕（圓板狀瘡）或巨大之皮疹。為數甚多。（播種症）具此等徵候之一種狼瘡。罹之者尙少。其名曰紅斑性狼瘡。

本症與尋常狼瘡不同之點。一為不含結核桿菌。一為皮疹之色澤呈赤紅色（尋常者尙少。命者尙少。）

攝生法 本症無特殊之攝生法。其皮疹自然消退之時。痕瘡易留下。故勝起痕瘡。極易之藥品不可用。

處方

外國方

●石鹼精  
無刺戟芳香性露水  
右塗布患部。  
一錢  
十錢

●加里石鹼

右洗滌患部。久時連續之。

●依比知阿兒軟膏（五倍乃至十倍者）

右攤於布片貼布之。

●列費兒聖刺繡林  
右攤於布片貼布之。  
（二倍者）

第七章 泌尿器生殖器病

血尿 Haematuria

病解

血尿為尿中含有血液之疾患。器之外傷。膀胱炎。腎炎等。為其原因。尿液呈鮮紅色。或黃褐色。大抵因膀胱。腎臟。尿道等之出血。而發急性之淋疾。泌尿道等之出血。而發急性之淋疾。泌尿道等之出血。而發急性之淋疾。泌尿道等之出血。而發急性之淋疾。

事等。宜避。  
處方

外國方

●過格得兒鐵

一錢

●明礬

五分

●單尼寧

二厘

薄荷水

十錢

澱粉

一錢

桂皮末

五錢

右一回三十滴。一日三四分服。

右爲五包。一日三次分服。

右爲十包。一日三四分服。

陰痿 Impotentia 萎蕤勃起欠乏陽精無力

病解

陰痿者何。當交媾時陰莖不克勃起。以致不能營完全生殖機能之謂也。通常有左之四種。

萎蕤勃起。而交媾未遠。已射精而陰莖痿縮之謂也。此等病症。大都由於結婚前未曾行過交媾者。或手淫等淫行極甚之人。起果能行完全交媾與否之懸懼。以致痿縮。

(一)感應性陰痿 與全身衰弱。器械的障礙等無關。且並非交媾機體缺如。祇因精神上之感動。妨一時陰莖之勃起。即如老人與少女交媾。自必淫行之羞污。雖具春情。而陰莖萎縮。又新結婚者合營之夕。陰莖不克勃起。而不能行交媾者有之。此謂之感應性陰痿。

(二)刺戟性陰痿 刺戟性陰痿者何。陰莖有。二。一爲陰莖異常細小或短。一爲基於陰莖之畸形。急性傳染病。神經衰

(三)麻痺性陰痿 麻痺性陰痿。大都由房事過度及手淫等而起。陰部雖絕無障礙。而交媾時早已枯竭。

(四)器械的陰痿 因器械障礙的而起。陰痿者有。二。一爲陰莖異常細小或短。一爲基於陰莖之畸形。急性傳染病。神經衰

弱症。惡液質。糖尿病等之全身衰弱。攝生法 食滋養之食料。行規律之運動。常保精神之安靜。與體力之強健。全身行冷水浴。或陰部及腰間。以冷水灌溉之。杜絕淫猥之言行。除藥物療法外。電氣療法亦佳。

處方 外國方

●焦性磷酸鈣

五分

龍腦末

一錢

右爲丸藥。分作六十粒。一日服二回

乃至三回、每回二九。

●吳素加里

五分

●瀉草末

一錢

右爲丸藥、分作四十五丸、一回服十

五丸、一日三回、以「ラック」爲丸衣、

貯於玻璃瓶內。

●林檎酸鐵丁錠

一錢

●龍眼丁錠

二錢

右爲水藥、每回服五滴乃至十滴。

●ターヒツク氏肉越幾斯

八錢

●設利酒

百錢

右爲酒劑、一回服二錢乃至五錢、一

日三回。

●過泥子

一分 丁香 一分

●蕪草根

三分 設利酒 三十錢

右爲酒劑、一日服二回(朝夕服用)

●含鐵麥芽越幾斯

五錢

右一日三四分服。

●單寧酸

三分

右以柯柯阿爾、製適當於尿道之程

狀七個、每日挿入一個於尿道、

中國方

●獨活寄生湯(萬病方組)治腎

氣虛者、或半身不遂者。

獨活

桑寄生

獨活

杜仲

牛膝

細辛

肉桂

川芎

芍藥

茯苓

參人

熟地黃

當歸

防風 各等分

甘草 少

右十五味、入姜鹿茸、空心服用。

●八味丸(萬病方組)治腎虛及

脾胃虛寒者。

熟地黃 八十錢 山茱萸 四十錢

山藥 四十錢 茯苓 三十錢

牡丹皮 三十錢 澤瀉 三十錢

陽子 肉桂 各十錢

右爲極細末、蜂蜜爲丸、以白湯、煎湯、

或酒送下。

●濟續丸 專滋腎水、秘精、壯陽、

益筋、治腰膝痛。

故紙 四兩 胡桃 八兩

杜仲 四兩

右槲丸、或蜜丸。

●滋腎丸(上池秘錄)

黃柏 三兩 知母 一兩

桂皮 一錢

以上以蜜爲丸。

◎六味丸(上池秘錄)

熟地黃 山藥

山茱萸 各四兩 牡丹皮

白茯苓 澤瀉 各三兩

以上六味以蜜煉之。

●人參養營湯(醫燈手引草)治

男婦諸虛。止汗。補心。血虛。弱熱。

芍藥 三兩 當歸

肉桂 甘草

橘皮 人參

白朮 黃耆

熟地黃 五味子

茯苓 遠志 各一兩

右入姜棗水煎。

◎明生散(藥方書)

熟砂 人參

茴香 山藥

干姜 厚朴

甘草 少

以上七味爲末。以蜜煉之。

### 遺精 Polutio 失精

病解

睡眠中之漏精液。頗不隨意。或

於自覺覺醒時亦有之。此種症候曰遺精。

通常分爲生理的遺精與病理的遺精二

種。

(一)生理的遺精 生理的遺精。一日健

體遺精。強壯之男子。不克行房。規之交媾。

以致睡眠中由夢想而遺精之謂也。遺精之同致。各人不同。例如每夜數回遺精。而心身俱健全。毫無衰弱之感者。不得目之爲病症也。

(二)病理的遺精 病理的遺精。陰莖並

不勃起。以催春。遂致遺精。往往於破曉

之時漏洩。漏洩後便覺。悟有不快之感。此種症狀之劇者。往往於自覺亦有之。初於陰部稍覺刺感。遂爾遺精。至病勢漸進

行。則由想覺或瞥見婦人以致遺精者有之。此病的遺精。令交媾之快。除日漸減少。陰莖之勃起作用愈衰。而回數愈增加。其

結果陷於依下昆埋里症。因消化作用之障礙。起暗腫鼓脹。便秘。或於背部生疹痛。下腹之知覺脫失。或頭重頭眩眩暈。因不眠而發血症者不少。

**攝生法** 健體而起遺精症者。行正整之交。健體。病的遺精。六抵由房事過度妄行。手淫房致。欲慎戒此等。不悶。狠。變。苦之外。宜修養精神。日常執務。準格之規律。而養成習慣。夜臥時。牀上。衣被宜輕。每朝醒覺即起。陰莖勃起。而難於萎縮之際。則澆以冷水。溼居海濱。或山間。而施。蒸。浴。溫泉。或冷水。其效果頗佳。

**處方**  
外國方  
● 臭素加里 二錢  
右為散藥。分作八包。一日服三回。每

● 稗布林 一回一包  
● 糖 一分  
● 乳糖 二厘  
● 乳糖 一錢  
右為散藥。分作十二包。一日服三回。每回一包。  
● 稗布林 稗布林者。為屬於蕓草之。蕓草。從其忽布果本中採取之。顯也。帶黃白色。而為不均等之粗粉。其新鮮者。有粘着之性。存一種之芳香。反苦味。有健胃之効。然制為淫藥。有効於生殖器之亢進及淋疾者之勃起者。不甚確實。唯為神經衰弱。稍有効力。用。一。回。一。分。至。二。分。半。

● 琥珀 五分  
● 葛粉 一錢  
右為散藥。分作十五包。一日三四服

用。  
● 麥角 三分  
● 澱粉 三錢  
右為散。分作十包。一日三服用。  
● 枸橼酸鈣 五厘  
● 枸橼酸錫 二厘  
右為丸藥。分作十二丸。一日服三回。每回二丸。  
中國方  
● 妙香散(上池秘錄)治夢遺。失精。對性。帶結。  
山藥 二兩 人參  
黃耆 遠志  
茯苓 茯神 各一兩  
桔槎 甘草 各二錢  
木香 二錢半 麝香  
辰砂 各一錢

● 稗布林 一回一包  
● 糖 一分  
● 乳糖 二厘  
● 乳糖 一錢  
右為散藥。分作十二包。一日服三回。每回一包。  
● 稗布林 稗布林者。為屬於蕓草之。蕓草。從其忽布果本中採取之。顯也。帶黃白色。而為不均等之粗粉。其新鮮者。有粘着之性。存一種之芳香。反苦味。有健胃之効。然制為淫藥。有効於生殖器之亢進及淋疾者之勃起者。不甚確實。唯為神經衰弱。稍有効力。用。一。回。一。分。至。二。分。半。

右爲末。每服二錢。以酒送下。

●朗明湯(名家方選)治遺精久不止。盜汗。心煩身熱等症。

枳實 厚朴 各一分  
牡蠣 白朮 各七分  
梔子 黃連  
竹茹 石膏 各三分

甘草 二分  
右九味。水煎。一次服下。

●精水湯(醫道重寶記)

黃連 生地黃  
當歸 人參  
遠志 茯神  
酸棗仁 蓮肉

甘草 少

以上九味爲煎藥。

●垂黃二錢。粳米。爲粉末。於食前。以酒飲下。  
(太平聖惠方)

●山藥一錢。葱白五分。鹽適宜。炒。以上三味。入酒中溫飲之。  
(赤水玄珠)

遺尿 Incontinentia nocturna 膀胱知覺脫失 遺溺尿尿

病解 成人則因衰弱。膀胱弛緩。或寄

生於腸之蠅蟲而生。小兒因營養之缺乏。損與尙僂病。貧血症。麻病等而發。又頑冥懶惰。亦爲遺尿症之誘因。或因惡習而成。遺尿之癖者亦有之。然通常之遺尿。大抵在寢後二三點鐘。或在醒覺之前。其中以熟眠時因夢想放尿而遺者爲多。

攝生法 患本症者。夜間嚴絕飲料。就

寢之時。被物宜嚴。晚寢須在就寢之三點鐘前。小兒須由親母或乳母養成其一二點鐘間排尿一次之習慣。又夜間之放尿。耐忍稍久。使尿得保存於膀胱中。因惡習而起之遺尿者。宜養成其厭不潔之習慣。

處方

外國方

●安息香酸

桂皮水

右溶和。一日服三回。每回四錢。

●釋布林

乳糖

右爲散筭。分作十包。每日與二包。

二錢

四十八錢

一分半

一錢半

●硫磺 五分

一分

含糖炭酸鐵

一分

白糖

二分半

右爲散藥，分作十五包，一日與二包。

●麥角

三分

茯苓末

五分

右爲散藥，分作十包，一日與三包。

●硫酸鐵

一錢半

右以龍膽越葉斯爲丸藥，分作五十粒，一日服一回，每回服五九乃至八九，小兒則與二九乃至四九。

中間方

●參芪湯（醫道日用綱目）治氣虛而遺精者。

人參 黃芪

茯苓 茯苓

陳皮

當歸

熟地黄

白朮

益智

升麻

肉桂

甘草

各五分

右入姜棗煎之。

●滋養養衛湯（醫道方規炮）治身弱虛瘦，夜常遺精。

白朮

山藥

芍藥

山藥

人參

益智

山藥

甘草

酸棗仁

各七分

●益智二伏丸（小兒療治調法）治小兒之遺尿，或尿白濁。

益智 白茯苓

茯苓

茯神 各等分

右爲末，空心時以糯米湯送下。

●治小便遺尿（上池秘錄）

阿膠

牡蠣

鹿茸

桑螵蛸 各等分

右爲末，糯米糊丸。

●治遺尿

烏賊骨

鷄糞

甘草

干姜 各等分

右爲末，白湯送下。

●五倍子五分，皮草五分，爲霜，製爲丸，食後服之。（益童百問）

●芎藭一味爲粉末，以茶湯服用。（無題問答）

●以小豆之葉，絞汁飲之。（萬世秘事）

膀胱加答兒 *Cystitis catarrhalis* 白濁便溺

病解

膀胱亦為一器官。自腎膀上檢

如芥子、胡椒、胡椒、山當菜等。不可食也。又

安息香酸

適宜

尿管瀉下之尿。受納而蓄積於中者。若尿

因忍尿甚久而起此症者亦不少。須極注

廣里斯林

右為丸劑。分作二十九。一日服五九

道之炎性苦劇。則侵害此器官。名曰膀胱

意。女子尤要。

方

乃至十九。

二二分半

加答兒。本症男子少而女子多。亦有慢性

外國方

烏華烏兒矢藥

安息香酸

一錢

與急性之別。急性症大抵自尿道炎波及。

(急性症)

橙皮

茴香油糖

二錢

有時起於感冒。又因用劇烈之藥品而起

者頗多。初則惡寒戰慄。次則發熱。下腹部

獨藥根

右為散藥。分作十包。每二時服一包。

一錢

覺腰重疼痛。尿通雖常有之。然排洩頗困

難。尿中混膿汁血液膀胱上皮等。此種症

右為丸劑。一日三四乃至五回服用。

(慢性症)

右以水一合溶解。為注射藥。

一錢

候經過十日。至十五六日而不克全愈者。

則陷於慢性症。其病徵除發熱疼痛外。與

急性症無異。

右以水二合溶解。為注射藥。

二錢

攝生法

擇安靜之位置。宜令患者仰

臥其中。食牛乳及肉藥汁。背烈性之食物。

右以水二合溶解。為注射藥。

二錢

擇安靜之位置。宜令患者仰

臥其中。食牛乳及肉藥汁。背烈性之食物。

右以水二合溶解。為注射藥。

右以水二合溶解。為注射藥。

二錢

擇安靜之位置。宜令患者仰

臥其中。食牛乳及肉藥汁。背烈性之食物。

右以水二合溶解。為注射藥。

右以水二合溶解。為注射藥。

二錢

擇安靜之位置。宜令患者仰

臥其中。食牛乳及肉藥汁。背烈性之食物。

右以水二合溶解。為注射藥。

右以水二合溶解。為注射藥。

二錢

(慢性症)

●硫酸麻痺遲矢亞

一錢

右以水五勺溶解。爲注射藥。

(慢性症)

●暗 翳

五分

右以水二合溶解。爲注射藥。

中國方

●草薺分清飲(醫方大成)治小

使白濁。

石 苒

烏 藥

益 智

草 薺

茯苓 各一錢 甘草 五分

●遠志丸(醫方大成)治小便赤

濁。

遠志 八兩 茯苓 各二兩

右爲末。以酒麩之糊爲丸。每服五十丸。臥時服之。

●治便濁。於六味丸加草薺及麥門冬用

之。(張氏醫通要)

●炒冬瓜實爲粉。空腹時以白湯服用之。

(道藏經方)

### 第八章 目病耳病

星翳 *Macula corneae* 角膜翳

病解

此症由附着於角膜上之三種菲膜而成。其三種菲膜。一爲半透明者。一爲透明者。一爲白色不透明之厚斑翳。通常爲角膜炎之遺殘物。本症以少年中爲

多。因之而成近視、斜視、弱視等處方

外國方

●沃度仿謨

華振林

右爲軟膏。一日一回點眼。

●沃度加倫謨

炭酸曹達

一錢

二厘

五厘

一分

水

右溶解，為點眼藥，促其吸收。

四錢

中國方

●光明散(眼目精要)治目翳障。

消石 二分 辰砂 二分

寒水石 三末 石葑

丁子 光明丹 各一分

樟腦 一末

右點眼藥。

●諸真湯(各家方選)治眼中有

血或生翳或失明者。

車前子 二錢 黃連

黃芩 大黃

甘草 各六分 茯苓 三分

右七味煎，一次服下。

●謝道人大黃湯(眼科錦囊)治

眼目赤腫，卒痛，或生翳者。

大黃 細辛

甘草 各六分 芍藥

黃芩 各中

右五藥水煎，若小便利者，加茯苓

車前子，眼珠赤痛，小便澀頭痛者，加

滑石。

●四物龍膽湯(眼科錦囊)治目

暴赤，起三雲翳，疼痛不可忍者。

當歸 川芎

芍藥 地黃 各大

防風 中 龍膽

防已 各小

右七味水煎，若雲翳固著者，加大黃。

石葑。

●神靈丸(眼科錦囊)治角膜星

翳。

蜀椒(青者黃柏為衣)

右禁噉破，隨風時白湯送下，生一星

者，服一丸，二星者，服二丸，隨其星之

數而服用，夕用則翳消，實奇方也。

●治翳障方

牡蠣 一錢 海螵蛸 一錢

白礬 五分

右為極細末，以蜜煉和為餅藥。

(眼目精要)

雀目 Hemerokopia 雀盲

病解

眼此症者。眼底並不失常。但於夜間或暗室內。不能辨咫尺。與昏者無異。若近燈火。則頭昏作字如常。於烈日中。轉執柔之人。或身體覺不足之人。及婦人之產前產後等。均易罹此症。

攝生法

以上所列之眼病攝生法。雖各各不同。大抵其性甚而有昏者。行尋法。并投鹽類之下劑。流行性者。注意手指。布帛。手巾。洗水等。而務於清潔。食物以富於滋養料而易消化者為佳。如鰵。牛。魚。肉。鵝。卵。肉。瘦。汁。牛。乳。等。是也。其苛烈性之物。如芥子。胡椒。蕃椒。生薑等。不宜食。食富於脂肪者。亦有害。飲料忌含酒精性之物。飲橙汁。炭酸泉等。頗適宜。其為急性性結膜炎者。宜食淡治之物。火燒場或塵埃。請自之地宜遠避。不可直視強剛之電光或日光。

等。夜盲症用淡黝色黃褐色等之眼鏡。戴之。流行性之眼疾。其預防法。不可出入校舍。監獄。育兒院。貧賤院之流行場。

眼藥法 眼藥法。有冰冷藥法。冷藥法。溫藥法。水冷藥法。重藥清潔之布片敷。敷。並列冰塊。而冷却眼臉。布片屢屢更換。溫藥法。將硼酸水（硼酸三錢。溶解於水二合半內。）蒸熱。吸入布片而覆眼臉上。時時更換。將巴布盛於布片。而置眼臉上亦可。其時火柱亦可應用。冷藥法。以硼酸水或明礬水。（明礬五分。溶解於水一合半內。）吸入於布片而覆於其上。一日數回。大抵於二十分間行藥法一次。然溫藥法之後。反覺清潔。冷藥法之後。反覺灼熱。至其效果無甚差別也。

處方

外國方

肝油

二錢乃至三錢

右一日服用二回乃至一回。當暫時持長之。

鹽酸退尼涅

一分

右為九氣。分作十二丸。二日服用四回。

中國方

● 鐵鑪藥（中國鐵鑪方）治諸症。於查目尤妙。

川棟肉

山茱萸

茯苓

山藥

鵝地黃

使君子 各等分

右為細末。製成目大之丸。朝服十粒。夜服十粒。一日服三十粒。白湯送下。

●鷄肝丸(眼科鷄蕓)治小兒疳  
眼、雀目。

鷄肝 一具 真珠

黃連 各一錢 蓮肉 三錢

夜明砂 五分

右五味為丸。如椒月次。每服十粒。日

服三次。白湯送下。

●明玉散(眼科方抄)治雀目。

爐甘石

辰砂

滑石 三分

白丁

生眼 各二分

蓮砂 二分

十六味為細末。以蜜煉合。

●乾漆丸(眼科鷄蕓)治雀目。

乾漆

右二味糊丸。每服二錢。白湯送下。

●治雀目方。

石

礪砂

貝石

爐甘石

貝子

右為極細末。和菴盆汁用之。

(眼目精要)

●治小兒雀目方。

### 局所性睫毛腺炎 Blepharadenitis 麥粒腫 眼丹

病解

也。症為春情發動期所發之睫

毛脂腺之炎症。其發甚急劇。且極疼痛。

除腫之一部。呈赤色之硬結。炎症劇烈則

四方均腫。此後炎症或自行消散。或化膿

而全愈。

處方

於五苓散加石決明煎服之。

(農家至寶記)

●治雀目方。

於五苓散加蒼朮服用之。

(妙藥手引草)

●於雀目。食八目鏡。或蒸鹽之油腸食之。

皆能有効。

(妙藥抄術集)

●飲鐵原。或以膽汁煎服。皆作。

(救急撮要)

外國方

(不化膿者)

●硼酸

二百一

右以水二合溶解。以行溫毒法。

(化膿後)

●單索酸

二錢

右以水一合溶解。以行收斂搥法。

●虞里斯林

十錢

水

五錢

右混和。塗布於患部。一日數回。

眼險緣 *Blepharitis marginalis* 爛弦風

病解

此症為濕疹之侵入眼險者。後

於眼病質之小兒為多。成人者因淚液之

刺激而起。於險緣發赤而糜爛。濕潤。或於

睫毛有痂皮纏結於其上。或生眼膿黃痂。

痂下生潰瘍。因而成膿瘍者亦有之。睫毛

脫落者亦有之。本症縱使治愈亦易復發。

處方

中國方

●明眼散(中國經驗方)治眼目

風疹。上氣。頭痛。

芍藥

防已

獨活

防風

當歸

荆芥

甘草

菊花

外國方

●硼酸

一分

●鞣酸

一分

●明礬

一分

●薄荷油

百分之一滴

●振華林

十錢

右水煎服。

●治疫眼方

薄荷葉

益母草

黃柏

胡黃連

生地黃

青黛

右水煎。洗病眼

(抄經手引草)

右混和。塗布於眼睫。

中國方

●開明膏(眼科錦囊)治爛弦風

鹽甘石 燒

石羔燒各八十錢

滑石 生九錢

銀朱 八十錢

片 腦 八十錢

梅花片 二錢

右研末。調蜜應用。

●艾葉洗(眼科錦囊)治爛弦風  
枯眇風痒等之症。

艾葉 黃栢 各大  
車前子 各中 枯礬 小

右五味包絹以水煎煮乘溫洗蒸一日三次。

●秋香洗(眼科錦囊)

菊花 燈心草

艾葉 黃栢 各等分

右四味用法如艾葉洗。

●大背龍湯(眼科錦囊)治上衝

咳嗽內腎赤腫及爛弦風。

麻黃 石膏 各大

桂枝 杏仁

甘草 各中 大棗 小

右六味加生薑水煎。

●鹽石散(眼科方抄)治爛弦風

滑石 丹

鹽 石香 各一錢

朱 龍腦

生腦 各少

右研細末以蜜煉合。

●仙眼散(中國經驗方)治爛目。

當歸 菊花

蔓荊子 各大 防風

砂仁 大黃 中

甘草 少

右水煎服。

●洗目藥(中國經驗方)

蓖麻子 二十粒

桃葉 三個取向東者

梅干 三個 古銅 二十錢

右四味浸入水二合五勺中以七色  
髮背爲度乃取用之。

●治爛目。

礬砂 白礬

右二味相合塗腫上。(眼目精要)

●爛眼洗藥。

當歸 芍藥

黃連 石菖

車前葉 枸杞葉

蓮葉 甘草 各一錢

右水煎洗病眼。(眼目精要)

●於爛目以鹽置古錢上燒炙將燒炙之

錢投入酢中少時取出以綿爲絲蘸錢

汁點目皆。(世寶傳受藥)

乾性結膜炎 Conjunctivitis sicca

病解 此症為結膜血管之充血。疹帶

甚劇。如灼如刺。如有異物觸於結膜。淚液

大抵粗大。數日即散者有之。或連綿數月

而不克就治者亦有之。大都因塵埃風烟

或因眼之過勞而發。

處方

外下

●時發

蒸餾水

右溶解。一日一回乃至二回點眼。

●枯發

蒸餾水

右溶解。一日一回乃至二回點眼。

單性結膜炎 Conjunctivitis simplex

病解 此症有急性與慢性二種。急性

症大抵流行於春秋之候。一家全罹之者。

往往有之。亦有發於鼻塞之際。懼氣管支

加答兒鼻加替兒之時。麻疹與痘瘡。常與

此症同時發生。於眼險結膜充血。其穹窿

部最烈者。起浮腫。眼險呈潮紅而疼痛。盡

轉甚難。眼線糜爛。如受熱灼。或如逢異物

面形艱轉不堪之狀。眼險覺重。畏光線之

刺戟。夜間則諸症候增劇。至翌朝則上下

之眼險膠膜。開張甚難。有粘質之細花漂

者。若於角膜上。因之見燈火時。往往於周圍

有圓圈如虹霓者現出。慢性症之充血。其

菊花水

蒸餾菊花油或菊花而得之露水。二錢

蒸餾水

右混和。一日二回乃至三回點眼。八錢

一分

處方

外國方

分泌均較急性症輕。險線往往有泡。此症

大都由急性症所轉成。或基於風塵烟砂

等。近時電氣之應用甚熾。亦有因而罹之

●時 暴

苗香木

蒸榴水

右溶解朝夕點眼。

●硼 酸

華攝林

右爲軟膏。夜間沿臉緣塗布少許用

防朝旦之睫毛膠着。

中國方

一厘

五分

七錢半

一分

二便空

◎目暗之妙藥。

檢 桑 十三枚 燒明礬 一分

右入水二杯。煎爲一杯半。吊洗患處。

●洗目藥。

杏 仁

黃 連

茨 苓 各 大

右水煎爲洗藥。

五 味 子

赤 芍 藥

荆 芥 少

乾 薑 脂 一 錢 磁 漿 水 六 錢

右 二 味 和 勻。

●治 病 目 疫 日。

黃 芩

大 黃

薄 荷

右 五 味 水 煎 爲 洗 藥。

黃 連

羌 活

各 一 錢

### 顆粒結膜炎 Conjunctivitis Granulosa 險生風粟

病解

此症於日本名「トラホム」結

膜上在半透明灰白色之顆粒。有急性與

慢性二種。急性症眼臉極腫而起潮紅。

眼珠結膜亦發赤。分泌液甚多。粘稠而濃。

覺灼熱而流淚。眼中如有異物者然。痊愈

遇而顆粒腫落。漸漸成瘡。不問男女老幼。

均易感染。往往流行於不潔之校舍或登

獄等。遂劇烈之傳染症也。慢性症由急性

症所轉成。或由手指。洗水。赤帛等而傳染。

校舍。醫院。貧賤社會等流行最著。高地較

低地少。女子較男子罹之者多。自十歲至

十五歲之間。罹之最易。極難癒與急性症

同。而經過極緩慢。患者於未覺罹症候

之內。往往起他症。視力缺乏。甚至陷於失

明之悲境者有之。

處方

外國方

(慢性症)

●硫酸銅

華攝林

右爲軟膏。一日一回點眼。

(慢性症)

一分

十錢

●硫酸銅

虞里斯林

蒸餾水

右溶解爲點眼藥。一日一回點眼。

(急性症)

一分

五分

五錢

●硼酸

撒爾矢兒酸

右爲錠劑作十六個。用時取三個溶解於淨水一合。爲冷藥液料。

二錢

六厘

耳漏 Otorrhoea 耳道加答兒 聾耳

病解

本症爲耳間之慢性膿炎。大抵因鼻及咽喉加答兒所發之間耳性急性炎治後不適當。或體質不良而發。臨時起猩紅熱。霍扶斯。麻疹等。自聞耳之粘膜炎。滲膿狀之分泌物。與空氣相接觸。因體溫而得分解。故惡臭。傍人異常厭惡之。患者亦苦其臭氣與味感。且分泌物自咽膜而

降於食道。起消化器之障害。所施之療法。若不適當。或不幸而起膿毒症。腰膜膿炎。腦膜炎等。則或因之致斃。

處方

外國方

●食鹽

右以水百錢溶解。洗滌耳道。

一錢

●石炭酸

虞里斯林

右以水百五十錢溶解。爲洗滌料。

一錢

●撒里矢兒酸

右以水百錢溶解。爲洗滌料。

一錢

●硼酸

右以水百錢溶解。爲洗滌料。

一錢

沃度仿談末

一錢

礬酸

一錢

右研和。先洗滌耳道。而後撒布之。

沃度仿談

一錢

華攝林

五錢

右煉和。塗布於脫脂綿花。插入耳道內。

礬酸

一錢

華攝林

一錢

右煉和。洗滌耳道之後。塗布於脫脂綿花而插入之。

礬酸末

一錢

右吹入耳間。

明礬末

一錢

右吹入耳間。

明礬與礬酸。於耳疾患爲卓效藥。由

礬酸之應用甚盛。而耳病治療之效果亦多。蓋此藥品。實耳病所不可少之物也。

石炭酸

一分

康里斯林

十錢

右滴入十滴乃至二十滴於耳內。中國方

治賢湯(醫藥方規矩)治小兒耳熱。出汁作...

防風

天花粉

貝母

栝子仁

茯苓

玄參

白芷

蔓荊子

天麻

半夏

甘草

生姜

右水煎。

紅棉散(上池秘錄)治聾耳出膿水者。

白礬 一錢

麝香 少許

脂 一錢

脂 一字

右入腦脂一匙。研勻。用綿杖子搗去耳中膿水。即用別綿杖子送藥入耳。治聾耳出膿汁方。

礬石 黃連

烏賊骨 赤石脂 各等分

右爲末。以綿裹如棗核大。內耳中。一日三次。(上池秘錄)

包伏龍肝於綿。入耳孔中。一日三回更易之。(太平聖惠方)

以五倍子末納耳孔內。(普濟方)

以蟬退煎油。附於紙摺。插入耳內。(便言藥方集)

耳痛 Otitis 耳神經痛

痛解 本症為神經性之疼痛症。顯無他種之徵候。亦發疼痛。或連續。或間斷。大部甚於腦髓。喉頭及頸頭之潰瘍。或瘡疾。及他種之不明症狀。

攝生法 耳之攝生法。最為緊要。而人往往怠之。故起重大之疾患。其最要之攝生法。如當寒風或烈風之日而欲外出者。須以綿之小片。嵌於耳道。小兒。則以毛巾。覆其耳朶。遇遊泳潔淨。及開發砲。或鍛治。水車等之激音時。亦必覆之。可見社會中。有因治齒痛。而以藥液灌入耳中。因之而誘起耳之疾患者不少。此世界上通行之惡習慣也。耳中叮嚀。須掃除之。然不可用尖頭極銳之耳挖。或插入甚深。又剝除耳

道內之軟毛。為害甚大。凡遇耳病。當輕快之時。即行醫治。不可使之陷於慢性痛疾也。

(耳之洗滌法) 耳之疾病。非先除去其耳內之不潔物。則不能行醫治之法。故洗滌法。為耳之治療上所不可缺者。其法用橡皮球。以等於體溫之微溫湯。徐徐洗滌之。冷水決不可用。因易催起患者之眩暈與嘔吐故也。叮嚀之固着者。滴入百倍之曹達水於耳內。待其軟化。然後行洗滌法。欲令其中已洗水之乾燥。則傾斜頭部。用軟棉花拭之。

之。其時頭部不可俯仰。如用軟膏類。即用傘狀或桿狀之綿製物之端。擦之而塗布於該部。散藥。則令患者之頭部傾斜。耳孔向上。以適當之圓管吹入之。

處方

外國方

●鹽酸規尼連 一分

右為丸藥。分作六粒。一次服之。

●撒里矢爾酸 二分半

乳糖 二分半

右研和為散藥。分作二包。朝夕二回

分服。

●撒費爾 二分半

乳糖 二分半

(藥物送入法) 送入藥物於耳內。所入之數多。則注入之。(用橡皮球) 液少。則滴入

右研和爲散藥。勻分二包。朝夕二回分服。

中國方

●以枯子湯(醫療藥方規矩)治

耳痛生疔。

昆布

蘇木

龍膽

蒲黃

黃連

連翹

牛蒡

生地黃

當歸

黃柏

生甘草

炙甘草

黃芩

柴胡

桔梗

一錢半

桃仁

紅花

各少

右水煎。

●取麝香。以水溶解。納於耳內。

(赤水玄珠)

●取椎菌。以湯浸出。其汁少許。納於耳內。採菜蔬之葉。取其汁。納於耳中。

(廣惠濟急方)

### 第九章 外科各病

咬傷 *Vulnere morsu*

病解

爲毒蛇及犬、狼等之獸所咬。嚼者曰咬傷。爲蜂、蟻、蛇等之昆蟲所螫刺者。曰刺傷。

(毒蛇之咬傷) 蟻、蜂及水蛇等之咬傷。於毒牙上有小孔。自耳下腺分泌之毒液。即

白此孔射出。而入人體。因此咬傷而致死者甚少。患者僅起苦悶、失氣、惡心、嘔吐。而身體起如梭之感覺而已。

攝生法 被毒蛇咬嚼之時。其創面之上部。結束甚深。吸收創口便可。然其時口

內有微傷。則其病毒便分布於全身。不可不注意也。

(獸類之咬傷) 爲犬、貓、鼠等無病之獸所嚼。與普通之外傷無異。苟有惡水病之動物(犬、狐、狼等爲多)所咬嚼。則極爲

上部。結束甚深。吸收創口便可。然其時口

內有微傷。則其病毒便分布於全身。不可不注意也。

可懼。(此等動物之唾液或粘液即毒物也)初覺身體倦怠。創傷變形。而腫液減少。創面之緣呈赤色。心意大變。生恐怖之念。遂至食思缺乏。復由咽痰之痕癢。流下唾液。呈痲呆狀。時發吠聲。有咆哮之聲。由是身體之倦怠愈甚。屢展嘔吐。卒以致斃。

**攝生法** 罹大毒之時。藥物無完全之療法。患者終不免於死。然而咬傷之初。即極力療治。則其清毒所受之區尙少。當咬嚼後速洗其創面。不得已而以自身之尿液洗之。亦無妨。其後以烙鐵熱灼其面。飲料用橙汁。

(昆蟲之刺傷) 爲昆蟲所刺。毒液自創孔注入。發劇烈之炎症者有之。其中以受蜂(土蜂蜜蜂) 虻。毒蜂等之刺。起劇烈之疼痛時。或留刺於創內。蜂之刺。極

多。故致危險者不少。易與炎性劇烈之物相比。危險較少。

**攝生法** 無一定之攝生法。炎性甚者。以水或冰冷却之。若有刺留於創內。即以針頭除去之。

處方

外國方

●安母尼亞水

右洗滌局部。

●強醋酸

右塗布局部。

中國方

●青黛雄黃散(上池秘錄) 治中

毒及蛇蟲咬傷。

青黛 雄黃 各等分

●建珠散(小石元俊傳) 爲蟻蛇咬傷。

胡椒 十五錢 牡蠣 五錢  
甘草 一錢半

右三味爲末。木葉匕許爲一服。以酒送下。

●蟻蛇咬傷者。以蠶與屋梁之煤煉泥。貼於咬口。  
(農家至寶肥)

●蛇咬者。擠出創口之血。以煙草脂塗之。  
(救急撮要)

●於蟻蛇之咬傷。割乾柿肉。以醋煎煮塗之。  
(廣惠濟急方)

●於毒蛇之咬傷。生姜絞汁洗之。  
(本草綱目)

●蟻蜂所咬者。  
煎強煙草洗之。

○煎枇杷核服之。

處方

外國方

●水銀軟膏

右爲塗擦劑。用於患部。

●薄荷腦

酒精

右塗布患部。

中國方

●四足丸(抄藥秘錄)獸類所咬

者。

土茯苓

甘草 少

右三味爲煎藥或丸藥。

●雄雞丸 治蟲毒及蝮蛇毒獸

等毒。

黃蠟 二兩 明礬 各四兩

溶化待溫。入雄黃末和勻。於午日爲

丸。

●治狗咬傷方。

杏仁 甘草 各等分

右二味。口嚼。搗傷處。(上池秘錄)

●治病犬咬傷方。

人蔘傳患處。少間洗之。燻灸其部。

(上池秘錄)

●治狂犬咬傷毒方。

辟香 虎骨

辰砂 各五分

右三味爲細末。先以韭菜自然汁洗

咬處。而傅藥末於其上。且頻洗之。

(名家方選)

●治犬鼠咬傷。

松脂 十錢 硫黃 三錢

百草霜 二錢半

右三味爲末。糊丸。

●治鼠犬貓咬方。

甘草 一錢半 胡椒

牡蠣 各五錢 硝石

右酒服。

●治鼠咬。

○白罌粟花陰乾爲末貼之。

○擦糯米敷之。

○擦生粉。貼於患處。

●病犬咬者。以黃連木賊燒黑。各爲等分。

用黑砂帶煉付。(農家至寶記)

搗梅仁和醋敷之。或以醋肉。厚擦亦佳。

(抄藥抄術集)

●貓所咬者。以薄荷塗之。(救急撮要)

●鼠所咬者。燒桐木爲細末。調和於葡萄酒之。又人所咬者。以牡蠣石灰。黃栢三味爲等分。與藥糖汁混和而塗之。

(廣惠濟急方)

處方

外國方

●芳香硝砂精。或二十倍單燒硝砂精。

右塗布於刺蝟部。

芳香硝砂精之製法及應用

芳香硝砂精者。用炭酸銻母。經四十分。

諸護尼亞水百分。枸橼油八分。丁香

油一分。刺質堊兒油一分。酒精六百

五十分。蒸餾水二百分。先於蒸餾水

創傷 Vulnere

挫傷 Vulnere confusa

中。如安母尼亞水。另溶解揮發油類於酒精中。以此兩液相混和。濾過而製成者也。其外用主塗布於毒蟲之刺。於內用。則一日五分乃至七分五厘。於慢性胃加答兒。慢性氣管支加答兒等。以祛痰。衝動之目的而用之。

●安母尼亞藥劑

右塗擦於刺蝟部。

安母尼亞藥劑之製法及應用

安母尼亞藥劑者。以安母尼亞水一分。

胡麻油四分相混和。至成白色均等

之濃稠液。乃加振盪使全混和而製

成者。此藥主用於毒蟲之刺及爲皮膚刺蝟性擦劑。

中國方

●蜂所螫者。切生手便作束。強摩擦之。或以小便洗患部。而後塗以齒垢亦佳。

(救急撮要)

●毒蟲所螫者。絞去其血。以水洗滌。而後

瀉以蠶蠟液。

(救急撮要)

●爲毒蟲所刺而痛者。

○以蛇床子爲末貼之。

○五寸以上之百足。取油。取其溶化之油塗敷之。

**病解** 創傷之單種者。爲刀創、打創、刺創、裂創等。連傷亦可歸於創傷之中。大抵因銳利之器物。或有連力之鈍器。傷身體一部之連續。或因鈍體之衝突。車輪之轉轉。馬蹄蹴傷。打撲而皮膚破損致熱。創傷起疼痛與出血等。有接者而癒合者。有化膿後而癒合者。接者癒合。於生活機能旺盛之創面。當極密接之時。創傷之周圍。微發腫脹。皮膚微呈紅色。并稍有結核。與知覺過敏。其次則腫痛消散。創緣固若密合而全愈。此癒者在受傷後之一、二、三日後。若受傷之組織。不克接者之時。則其創傷化膿後始愈。此時創面潤滑。該面之組織不明。滲出之液呈黃色。遂化膿。因新生成肉芽。而填充其創面。漸漸長大。覆以上皮而全愈。但終有痕痕留下。

創傷之重大者。全身敗害頗甚。起發熱、虛脫、諸器。并誘起極傷與敗血等症。  
**攝生法** 創傷時之最要者。局部之清潔法。苟不注意。則創面化膿。誘起如破傷風之全身病者有之。出血以速止爲要。因創傷而死者。大都因出血過度。陷於虛脫所致。動靜脈之管線截斷之時。血迸裂而出。瞬息間因之而死亡者不少。於飲食物亦宜注意。不可飲酒。及食脂肪過多之物。身體宜安靜。接觸於患部之繃帶布片等。須擇清潔而已。十分消毒者。身體發熱時。用解熱藥。并服下痢。

- 處方**
- 石炭酸 一錢
  - 亞里斯林 一錢
  - 水 二十四錢
  - 右溶和藥染於繃帶而用之。
  - 沃度仿誤 二錢
  - 石炭酸 一分
- 右爲軟膏塗布之。  
 薄荷油 十滴  
 刺納林 五錢  
 華樹林 十錢  
 右爲軟膏塗布之。  
 (同上)  
 石炭酸 一錢  
 亞麻仁油 四錢  
 沈降炭酸石灰 適宜  
 右爲糊劑。置創傷上與布片開而貼布之。

薄荷油

十二滴

右撒布於患部。

(防腐)

● 硼酸

二錢

黃蠟

二錢

阿列布油

六錢

右熔和。攤布於布片而貼布之。

(化膿後)

(化膿後)

● 亞鉛華

一錢

單軟膏

五錢

右混和。攤布於布片而貼用之。

(疼痛甚者)

● 石炭酸

一錢

刺納林

二十四錢

右混和。攤布於布片而貼用之。

(防腐)

● 石炭酸

八錢

盧里斯林

一錢

右以水七合溶解。洗滌其患部。

(防腐)

● 沃度仿讓末

右洗滌局部之後撒布之。

(防腐)

● 沃度爾

右先洗滌局部之後撒布之。

沃度爾因較沃度仿讓之臭臭少而實用之。

(防腐)

● 撒里矢爾酸

二分半

硼酸

一錢半

右以水五合溶解。為洗滌料。

● 沃度仿讓

二分

格魯胃讓

二分

右塗於絆創膏。貼布於小創面。

● 石炭酸綿紗

右洗滌患部之後。使附着於創面以繃帶纏絡之。

石炭酸綿紗之製法

綿紗之脫脂者一斤。浸於左溶液中。取出。乾燥之後用之。

酒精

二百四十錢

醫藥仿讓

四十八錢

罌瓜子油

五錢

石炭酸

十二錢五分

沃度仿讓綿紗

右洗滌患部之後。使附着於創面。以繃帶纏絡之。

沃度仿讓綿紗之製法

綿紗之脫脂

者一斤。浸於左之混和液中。

甲 沃度仿謨

十二錢五分

依的兒

六十錢

酒 精

百八十錢

乙 沃度仿謨

十二錢五分

嚼囉仿謨

五錢

康皇斯林

一錢二分

酒 精

二百四十錢

尙宜撒布沃度仿謨末。至全布呈黃

色而止。

● 枯 礬

一錢

右以水三勺溶解。懸染於脫脂棉花。

壓於側面使之止血。

(止血)

● 單寧酸

右撒布於血面。

(止血)

● 明 礬

二錢

阿仙藥

二錢

右撒布於出血面。

中國方

● 和血湯(上池秘錄)金瘡皆可服之。

服之。

人 參

大 黃 腫者倍用

地 黃

桔 梗

鬱金 腫者倍用

白芷 生肌倍用

黃 芩

茯 苓

川 芎 各等分 甘草 少

右水煎服。或加沉香。痛者加青木香。

● 麒麟膏(上池秘錄)金瘡止痛。

上肉 麝 玳。

蜜 蠟 九錢

(或保留登瓦兒油 二十錢)

松 脂 八錢

血 竭 細末八錢

沒 藥

乳 香 各十錢

右煉油脂。以慢火煎至溶化。然後去滓。入三味和勻。

● 順血湯(妙藥秘傳)治金瘡不

凝。

凝。

黃 芩

川 芎

黃 連

黃 芩

生 地 黃

白 朮

桂 枝

檳 榔 子

黃 耆 各等分 人 參 少

右為振出藥。

● 金龍膏 治金瘡。

黃 丹 四十八錢 土 白 粉 十六錢

樟 腦 五錢 輕 粉 一錢

鷄卵十個 椰子油 五錢

右以黑胡麻油煉為膏藥。

●於金瘡以烏賊骨、龍骨、石灰、麒麟血、蒲黃等之粉末摻之。 (廣惠濟急方)

●於擦壞者。煮膠於水。使之溶解。塗於傷所。 (廣惠濟急方)

●於生石灰粉末。加鷄子白煉合。為乾粉末。臨用時貼之。 (救急撮要)

瘰癧 Panarium 急性指尖炎

病解 瘰癧症以發於手指者為多。通

常係急性有劇烈之疼痛。但手指之皮膚。

較他部分厚固。不易破損。故不可不除去

其化膿之組織。又所發者小而緩慢。以小

刀刺破其患部。經四五日後。疼痛便減。

攝生法 瘰癧大都猝然發生。病症輕

微之物。施療甚難。但既經發病。則手指

宜休養。不可施用。

處方

外國方

●沃度仿讓軟膏 (十倍者)

右以綿貼布貼患部。

●石炭酸 二滴

單軟膏 五錢

右為軟膏。以綿貼布於局部。

中國方 ●五物大黃湯 (古方九散方) 治

世俗所謂瘰癧者。

大黃 芍藥

桂枝 乾地黄

甘草 各六分

右五味。以水二合。煮取一合。半服之。

半以浸指。

●治瘰癧方。

藍花 陳皮

芒硝 各等分

右為末。以梅干煉和用之。 (妙藥秘藏)

●治瘰癧方。

乾柿 白砂糖

味 吩 各 等 分

右三味爲搗細末和水敷患處。

(名家方選)

●癩疽之疼痛輕者以金銀花小茴香各

打撲 Conusio 挫傷 癩接

等分。旋溫之後加胡麻油白蠟及片腦煉和貼之。  
(救急撮要)

●塗黑燒而有効者有左之數品。  
夏白茄子蒂(真燒) 鱈魚(真燒)

病解 打撲爲皮膚無損傷之挫傷。由

鈍器之相衝突。揉捻。壓迫。打擊等而發。因

受傷之強弱種類而有疼痛及腫起。或皮

下血液之滲漏等。而呈暗藍色。有時炎性

經久時而化膿者有之。

攝生法 患部宜安靜。疼痛劇烈。則將

冰或水洒於布片而冷卻該部。或用冰糝

亦可。有時行按摩。確克奏卓效。

●吳茱萸

五枚

十五錢

五錢

黃柏

右以酒精一合浸漬。放於冷處。時時

振盪。經一週乃至十日以後。濾過之。

以其濾液塗布患部。

●獨活兒丁幾

無水格魯兒

右溶解爲塗布劑。

中國方

●患滯毒(醫道重寶記)治打撲

後瘀血在內面腫脹者。

二錢

熟地黃 二錢 赤芍 二錢

黃芩 一錢半 檳榔子 一錢半

牡丹皮 一錢半 當歸尾 一錢

桃仁 八錢 紅花 三分

右八味煎。加酒蒸之大黃一錢。尤効。

●沒藥乳香散(上池秘錄)治打

打傷損痛不可忍者。

白朮 沒藥 當歸

肉桂 甘草

乾白梅去核。燒黑。加鹽爲等分。

(農家至寶記)

乳香 各一兩

右爲末。溫酒調下。

●續骨丸(上池秘錄)治打撲身痛。

海螵蛸 三年以上者可用

石灰 葛粉 各等分

右爲細末。糊爲丸。如大豆大。溫酒送下。

●損傷當歸湯(中國經驗方)治打撲、墜傷、腎臟打傷。

澤蘭 一分 附子 炮一分

當歸 焙 川椒 炒

甘草 炙 肉桂 各三分

川芎 炒六分

右爲細末。每服二錢。溫酒送下。○禁忌海藻、急野豬。

●雞鳴散(名家方選)治打撲、折傷。

大黃 一錢 杏仁 二錢

右二味。以水二合。煮取一合。臨臥服之。服後飲醇酒。醉臥。至雞鳴之時即死。血盡下。

●搥打撲方。

芫麻葉

右一味。搥之敷患處。(上池秘錄)

●治打撲。

川芎 一錢 當歸 一錢

香附子 一錢

右爲細末。以酒或水服用。

(藥寶明集)

●治打撲。

桂枝 大黃

桃仁 牡丹皮

芍藥 牛膝

紅花 仁等分

右七味爲末。水煎服用。(農家至寶記)

●治打撲方。

川芎 白角豆

苦瓠蘆 各中 百草霜 大

甘草 少

右五味爲細末。取一錢半。以酒服用。

(抄藥手引草)

●打撲不遺新久悉治方。

大黃 四分 鱖魚 二觔

常歸 青麪 各五分

右四味。以水二合。煮取一合服之。(名家方選)

●治一切打身。(道翽一家之秘

藥)

人參 川芎

沉香 當歸

生地黃 赤芍藥

大黃 各等分 甘草 少

右八味振出用之。或為散藥用之。

(中國經驗方)

●治打身方。

取溫飽粉於酒和服。或以酒煉付。

●又方。

炙水仙根散之。

●又方。

桐葉陰乾燒黑。以白湯或酒服之。

癰疽 Carbunkel

●治打身折損方。

(中國經驗方)

燒酒 一升 樟腦

紅花 茴香

金銀花 艾藥 各一握

右五味以燒耐煎煮為七合。塗於痛處。

●治打疵。

取立枯草於口中嚼爛。敷於痛處。

●於打身折損者。以石萬田藥車前葉三味。綜合用之。

(妙藥妙術集)

●於打撲。加樟腦少許於醋中。溫蒸之。

(救急撮要)

●於打身。黃柏五錢。和大黃六錢為細末。

加燒酒之糟及雪白二味。搗合於鉢中。

破散痛處。藥為氣所蒸乾。則幾度換貼之。

(農家三寶記)

●於打撲。以楊梅皮紅花經節各等分為細末。用紺屋糊煉和。塗布於患部。

(妙藥手引草)

●以朝菴或接骨木之煎汁。薰洗痛處。

(廣惠濟急方)

●胡桃肉以酒濕潤。碎而用之。(醫統)

●伏龍肝之粉末。以油煉和用之。

(千金方)

●五倍子。以醋煉和用之。(衛生易簡方)

病解

俗間所稱之疔瘡。大抵指癰疽而言。為弱之多數集合者。初呈赤色而腫起。知覺過敏而硬固。稍遲時日。則疼痛頑劇。發高熱。該部之皮膚呈青赤色。生細小之膿疹。其膿疹若破開。則有小孔。皮膚如篩狀。由篩狀面溢出膿液。其大小通常有一尺餘直徑。較手掌大。生於脊背肩胛附近及頂背。生於顏面手足者較少。本症大抵由皮膚之刺戟而來。察扶斯。蜜尿病。膿毒症為其原因。發劇熱及炎性之蔓延於內臟。則難免於死。

攝生法

食物擇富滋養品而品消化之物。酒精性之飲料宜避。其預防法。避衣服之纏絡刺戟。因其為本症之絕大原因故也。

外國方

●水銀軟膏

右於化膿前。以消殺之目的而貼布。其已化膿者。則除裁開以外無方策。

●沃度丁炭

酒精

右於化膿前。塗布於局部。

●人工加爾爾斯泉鹽

右為誘導法。用於下列之目的。本劑以水一合溶解。一日三回服之。

●撒爾矢兒酸曹達

當藥末 五錢

右混和為散藥。作一包。為一回量。

中國方

●千金內托散(醫道重寶記)類

道或癰疽之類。尚未開口者。或

已潰膿者。皆能治之。

人參 黃耆

當歸 各二錢 川芎

防風 桔梗

厚朴 白芷

肉桂 各一錢 甘草 五錢

右「三味煎服。或加酒煎服。取為散藥用之。

●清熱消毒散(醫道重寶記)

治癰疽陽證時痛

金銀花 二錢 芍藥 一錢半

川芎 一錢半 生地黃 一錢半

當歸 黃連

山梔子 甘草 各一錢

連翹 少

右水煎。

●白英散(名家方選)治癰疔及諸熱毒腫

白英 一錢根莖葉並燒爲霜

胡椒 三分燒爲霜

丁子 三分燒爲霜

右三味各等分。溫酒飲下。每服六分。

●癰疔風毒腫之妙方。

射干 連翹

山梔子 各大 木通 炙少

黃芩 酒浸炙少 白朮 少

豕忍冬 少

右水煎服。

(中國經驗方)

●治癰疔方。

淨香 反鼻

津蟹

右三味燒黑。各等分。以酒服用。

癰瘍 Abscessus 膿腫 腫毒

病解

本症爲俗間所稱之腫毒。係大如豌豆或如棗實之結節。之局部性皮膚炎。初起時起疼痛及硬結。經片時後。腫起灼熱。其尖端發黃點。在皮膚之深層者。經數日尙不克認證之。久之呈帶青紅色之腫脹疼痛。連綿頗久。因衣服之接觸及運動。而益形痛楚。其中央已化膿。則與膿液一小痘狀之膿疽組織。(曰腫物之根)同

時排出。而生小孔。孔內肉芽之發育者速。則疼痛減而化膿止。腫起赤色均消褪。全愈之後。稍有痕痕。本症大都發於臀部。下腹。上腿。肛門之周圍等。

攝生法 粉刺(即皮膚表面之微小顆粒也。面上最多)往往誘起本症。故罹之者宜速行治療。因疼痛而發熱劇烈之時。服解熱藥。兼服下劑。擇脂肪少而淡泊

之食物。濃厚而含脂肪質之食物不可食。因其往往能增加疼痛故也。若久不化膿。用加密列花湯蒸之。或用溫氈布亦可。凡遇癰瘍多數發生之時。易變爲癰。故宜注意以速行治療爲要。避皮膚之刺激。衣服之摩擦。不可爬搔。凡皮膚。蜜尿病。老衰慢性消化器病。營養不良等之患者。每易起瘡。亦不可搔也。

處方

外國方

(化膿前)

●沃度丁幾

右塗布。

(化膿前)

●水銀軟膏

右攤布於布片而貼布之。

(化膿前)

●水銀硬膏

右攤布於布片而貼布之。

●松脂軟膏

右化膿後。塗於布片而貼布之。

●銅綠軟膏

右化膿後。塗於布片而貼布之。

●沃度仿讓

刺納林

右化膿後。攤布於布片而貼用之。

●石炭酸

單軟膏

右化膿後。攤布於布片而貼用之。

中風方

●乳香止痛散(上油秘錄)治癆

癰痛。

乳香

枳實

右水煎用之。

●清熱解毒湯(張氏醫通卷之)

治瘡瘍、癰疽、赤形病俱實

黃連 酒炒 山梔子 炒黑

連翹 一錢半 當歸 一錢半

芍藥 生地黃 各一錢

金銀花 二錢 甘草 一錢

右水煎。熱服。

第十章 婦科各病

臃加答兒 *Cocarrhus vaginosa* 陰腫白帶下

病解

腫加答兒者。俗間所謂白帶下也。起始時發熱。同時起惡寒戰慄。自陰孔

流出粘液。子宮疼痛。尿意頻繁。交纏困難。痲症愈增進。則分泌之液愈多。有腐蝕之

● 聖麻子油  
右作一次服。促其通利。

三錢

感。粘液稠者於取毛。因分解而放可厭之

可食。以富於滋養分者為宜。酸性及亞爾

● 單寧酸  
柯柯阿酪

二錢

臭氣。交纏因疼痛而不克行。開排尿之障

加里性之飲料。宜全除之。溫浴甚佳。

● 椰阿酪  
右為坐墊六個。一日一劑。送入於局

五錢

口。發熱灼之感。且甚劇烈。如此種情狀。約

速續一二週間。則病勢減退。或陷於慢性

● 眼藥末  
右撒布於綿球。五時乃至十時間內

三錢

症。分泌增加而漸弱衰弱。皮膚蒼白。便秘

● 肝油  
右為十個。以膠囊包之。一日用三四

● 林檎酸鹽丁酸  
薩丁酸

二錢半

頗甚。交纏雖無疼痛而覺不快。因之受治

● 含糖炭酸糖  
大黃末

● 林檎酸鹽丁酸  
薩丁酸

二錢半

頗為困難。

● 磷酸曹達  
右為散藥。分作四十五包。一日服三

● 薩丁酸  
右混和。以五滴乃至十五滴。加糖水

二錢半

攝生法

月經時最宜注意。須檢查起

● 薩丁酸  
右混和。以五滴乃至十五滴。加糖水

二錢半

血之果強度與否。出血前果疼痛與否。宜

嚴禁舞蹈及交纏。便通宜整理。而不可秘

● 薩丁酸  
右混和。以五滴乃至十五滴。加糖水

二錢半

結。當婚嫁時之處女。便通尤宜注意。不可

息忽。強烈之感冒後。亦宜注意。父母患淋

● 薩丁酸  
右混和。以五滴乃至十五滴。加糖水

二錢半

疾之時。注意女兒之看護。蓋幼稚女兒之

● 薩丁酸  
右混和。以五滴乃至十五滴。加糖水

● 薩丁酸  
右混和。以五滴乃至十五滴。加糖水

二錢半

聖加答兒。大都基於兩親或乳母之淋疾

● 薩丁酸  
右混和。以五滴乃至十五滴。加糖水

● 薩丁酸  
右混和。以五滴乃至十五滴。加糖水

二錢半

毒之接觸故也。食物中之有苛烈性者。不

● 薩丁酸  
右混和。以五滴乃至十五滴。加糖水

● 薩丁酸  
右混和。以五滴乃至十五滴。加糖水

二錢半

可食。以富於滋養分者為宜。酸性及亞爾

● 薩丁酸  
右混和。以五滴乃至十五滴。加糖水

● 薩丁酸  
右混和。以五滴乃至十五滴。加糖水

二錢半

加里性之飲料。宜全除之。溫浴甚佳。

● 薩丁酸  
右混和。以五滴乃至十五滴。加糖水

● 薩丁酸  
右混和。以五滴乃至十五滴。加糖水

二錢半

處方

● 薩丁酸  
右混和。以五滴乃至十五滴。加糖水

● 薩丁酸  
右混和。以五滴乃至十五滴。加糖水

二錢半

外國方

● 薩丁酸  
右混和。以五滴乃至十五滴。加糖水

● 薩丁酸  
右混和。以五滴乃至十五滴。加糖水

二錢半

(誘導法)

● 薩丁酸  
右混和。以五滴乃至十五滴。加糖水

● 薩丁酸  
右混和。以五滴乃至十五滴。加糖水

二錢半

●明 藥

右以水一合溶解。洗滌其患部。

一錢

●單寧酸

右以水一合溶解。洗滌其患部。

二錢

●單寧酸

莫里斯林

右混和外用。

八錢

●明 藥

華攝林

刺納林

右爲軟膏。塗於綿球。(綿之脫脂肪

一錢

五錢

五錢

分面爲球形者) 插入腔內。

●明 藥

華攝林

右爲軟膏。塗於綿球。插入腔內。

一錢

八錢

中國方

●松寄生散(名家方選)治白帶

下妙劑。

松寄生

黃 槓

生地黃

甘草

山 藥

右十味水煎。作一次服。

●茅根湯(名家方選)治帶下諸

藥不効心。

茅 根 四錢 丁 子

肉 桂 各一錢

右三味水煎。頻蒸前陰最効。

●琥珀丸(名家方選)治赤白帶

下日久者。

琥 珀

木 香

沒 藥

辟 香 各一分 乳 香 一錢

辰 砂 二分

右七味。水丸如彈丸大。白湯送下。

●腰游二妙湯(名家方選)治赤

白帶下。或產後腰弱不能步者。

毛 茛 根

桑 白

肉 桂 少

右五味。二錢半爲一劑。以水三合。蒸

取二合。去滓。再以水二合。煮取一合。

●腎陽附子湯(醫方大成)治赤

下冷痛赤白帶下。

柴 胡 七分 良 姜

乾 姜 附 子 各一錢

升 麻 蟬 稍 各五分

甘草 六分 當歸 二錢  
黃柏 二分 炒鹽 三分

右爲煎藥。

●種血脈指散(中國經驗方)長

血及白血之妙藥。

老麻 霜 葛粉 少

右二味混合以白湯服用。

●固下丸(上池秘錄)治赤白帶

下。

糯米 二錢 白芍藥 五錢

良姜 煨黑三錢 黃柏 煨黑三錢

右粥丸。

●四仙散(醫藥方規矩)治婦

人白帶。

蒼朮 酒炒二兩 白芷

川芎 附子 各五錢

右爲末以酒送下。

●清王散(醫藥方規矩)治赤

白帶下。

當歸 川芎

芍藥 生地黃

陳皮 半夏

茯苓 蒼朮

香附子 黃連

黃芩 柴胡

升麻 牡丹皮

甘草 生薑

●血歸湯(醫寶明集)治白帶下。

香附子 霜一錢 香生附子一錢

桂心 五分 干姜 五分

右五味煎服。

●治白帶下。

半夏 一錢 陳皮

茯苓 升麻

白鷄頭 各五分

右五味水煎。

●治帶下方。

牡蠣 一錢 芫子

芍藥 各五分 甘草 三分

右四味水煎服。(名家方選)

●又方。

乾姜 煨炒 芍藥

儋金 各五分 桂枝 三分

右四味水煎服。(名家方選)

●治赤白帶下。

棕桐毛爲霜茶一服。加四物湯。以艾

葉和辛黃理煎湯服之。

(中國經驗方)

●治赤白帶下。

白鷄冠花一味爲末。以白湯服用。

中國經驗方

惡阻 *Emesis gravidarum* 子病 惡食 嘔吐

病解 本症係婦人妊娠三四月後無

他種之原因而起者起時屢欲嘔氣發頑

固之嘔吐飲食物之嘔出固無益矣雖所

服之藥物亦往往嘔出患婦營養缺乏日

漸羸瘦疲勞之極卒以致斃然苟時見嘔

下嘔吐便停止。輕症不過嘔嘔吐酸等之

際害而已。

攝生法 妊娠之食物最宜注意。食輕

淡而有滋養之肉類、牛乳、肉羹汁、柔軟之

培肉等爲最宜。發時尤宜靜臥。若成患者

之嗜好。而多食醃製之物。則爲害甚大。

處方

外國方

●重炭酸曹達 一錢

右爲三包。每發作時用一包。

(嘔嘔、酸敗)

●礮性味個頭失靈 五錢

右爲三包。每發作時用一包。

(頑固之嘔吐)

●次階酸若翰 一錢

白糖 一錢

右製錠劑四十個。每回服用一個。乃

至二個。

中國方

●獨龍散(上池秘錄)治惡阻嘔

伏龍肝

通不已者。產後嘔逆亦治。

右一味爲散。白湯送下。

●茯苓圓(上池秘錄)治妊娠惡

阻。停飲。惡聞食氣。

茯苓 八錢

肉桂 乾姜

半夏 陳皮 各一兩

檳榔 白朮

葛根 甘草 各二兩

麥 炒黃小

右爲末。煉蜜爲丸。

●旋覆花散(醫藥方規矩)治

孕婦六七月間胎動惡阻嘔  
逆。

旋覆花 甘草 各三兩  
代赭石 一兩 人參 二兩

月經 遺常 Menozenia

半夏 半斤 生薑 五兩  
大棗 十枚  
右水煎。

●治惡阻嘔吐不止者。

伏龍肝 五錢 白朮  
豬苓 各二錢半  
右三味爲末每服二分至五分日  
服三次白湯送下。(名家方選)

病解

健全女子自十二三歲至四十  
八九歲之間每於二十七日至三十日間

必自子宮粘膜出血其出血約連續三日

至八日之久此謂之月經爲婦人之生理

的作用也或因其原因而失其順序時則

已受病的變化此謂之月經不順或謂之

月經違常有月經閉止月經過多月經困

難之三種。

(月經閉止)其原因爲生來生殖器官之

不完全者或由生殖器之疾病或由肺勞

萎黃病等之全身衰弱而起又精神之疲

動與月經之關係甚大因恐怖悲哀等而

經通突然閉止者有之或雖少女及婦人

往往有忌畏妊娠而月經閉止者有時以

經血略血痔疾創面等之出血爲準一定

時而來以代月經者曰代價出血。

(月經過多)月經過多者謂用血液過多

之謂也當月經時自外而來之出血曰子

宮出血與本症不同凡月經時漏出血液

之食各人不同其差異甚大因出血過厚

而身體起障礙者不得謂之月經過多其

原因爲有出血素質之人如血友病癆瘵

缺乏之婦女(例如授乳甚久)往往育之

其他如脂肪過多症之人月經或閉止或

過多有時於月經閉止後其來時之多有

非平常所可比者。

(月經困難)月經困難者經通時發疼痛

身體緩和之謂也其疼痛有劇烈者有輕

微者或起嘔氣嘔吐偏頭痛以發於子宮

頸管之障礙子宮粘膜炎之脫離便麻

質斯子宮纖維瘤、痛風等者為多。

**攝生法** 攝滋養分多之食物食之。避

奇辛辣之食物。慎於飲酒。少許之葡萄酒麥酒飲之尚可。房事宜慎。行淫浴為適當之運動。月經過多症。下腹脹以水囊亦可。醫內以清水洗滌之。有時因斷其出血。而須栓寒壓孔者有之。

處方

外國方

(多血家之月經閉止)

● 鹿茸丁幾

沒藥丁幾

右混和。每服二十滴乃至三十滴。一日三回服用。

(同上)

● 泊美蘭

一錢

大黃 四錢  
益母草 一錢

右三味。煎藥酒精四十錢。於其濾液中加稀鹽酸四錢。每服十滴。一日三回服用。

(貧血症之月經閉止)

● 過格魯兒錠丁幾

沒藥丁幾

右混和。每服十滴。一日三回服用。

(同上)

● 格魯兒錠丁幾

右每次用六滴乃至八滴。

(多血家之月經閉止)

● 龍腦

沒藥

乳糖

一錢

五分

二分

右為散藥。分作二十包。一日三回服用。

● 羅布林

白糖

右研和。為散藥十五包。每二時服用一包。

(同上)

● 蔗苔

沒藥

過泥子

沙里那葉

右為丸藥。分作三十九。每回服三九乃至六九。一日二回服用。

(同上)

● 阿魏

蔗苔

一錢

一錢

一錢

石 檢

香附子

一錢  
五分

右爲丸藥。分作二百四十九。每服二

九。乃至四九。一日三回服用。

(貧血症之月經閉止)

● 硫 酸 鐵

三分

蘆 苳 末

六分

丁子末

一分

的列並底油

十滴

右以黃蠟爲丸藥。分作三十九。每回

服十九。一日三回服用。

(多血症之月經閉止)

● 蘆 苳 越 幾 斯

二分半

消 美 蘭 末

一錢

沒 藥 越 幾 斯

一錢二分

右爲丸藥。分作百六十九。每回服五

丸。朝夕服用。

(月經過多)

● 硫 酸 鐵 安 母 尼 亞

一錢

右爲丸藥。分作八十九。每回服五九。

(一日二回服用)

(同上)

● 單 實 酸

五分

右爲丸藥。分作四十九。每回服五九。

(一日數回服用)

(同上)

● 明 礬

五分

桂 皮

一錢

薄 荷 葉

一錢

牡 丹 皮

五分

右爲煎藥。分三日服用。

中國方

● 簡 易 當 歸 散 (醫方大成) 經行

不調。三四月不行。或一月再至。

或天癸已過期而經脈不調者。

以此爲主方。

川 芎

當 歸

芍 藥

黃 芩

白 朮

各半兩 山 藥 寬

右爲末。空腹時以溫酒服用。

● 綱 經 散 (醫方大成) 經水過多

少月而不至者。用此方。

當 歸

麥 門 冬

吳 茱 萸

肉 桂

人 參

半 夏

芍 藥

川 芎

牡 丹 皮

阿 膠

甘 草

●紅花露散(良方大成)瘀血經不行而腹痛者以此為主方。

芍藥 當歸

牛膝 甘草

陵苕花 紅花

莢朮 肉桂

白芷 劉寄奴

右為末以熱酒調下。

●通滯散(名家方選)治經閉帶下或崩後腹中生塊手足痿弱

者。

香附子 半炒半生 阿膠 炒

反鼻 大黃 各等分

右四味為末每服一錢日取二次溫酒送下。

●延胡索湯(名家方選)治婦人

經閉時腹痛久者。

延胡索 一錢 當歸

桂枝 各七分 乾姜 六分

右四味水煎日二服長服益佳。

●升麻瀉濕湯(醫道日用綱目)

治濕水不調白赤帶下。

當歸 川芎

芍藥 生地黃

白朮 茯苓

蒼朮 陳皮

香附子 砂仁

半夏 各一錢 干姜 七分

黃柏 知母

柴胡 升麻 各五分

甘草 三分

右十七味入姜棗水煎。

●滋陰至寶湯(醫務手引草)治婦人經水不調因衛生勞潮熱

顏咳嗽兼有盜汗者。

當歸 白朮

芍藥 茯苓

鹽皮 貝母

知母 香附子

地骨皮 麥門冬 各八分

柴胡 甘草 各二分

右生薑薄荷水煎或諸藥等分。

●桃軍圓(妙藥秘製)用於月水不順。

大黃 二千錢 桃仁 十錢

桂枝 十錢 甘草 十錢

芒硝 十二錢 麝香 五錢

右以蜜為丹白湯送下。

●桃仁散(醫藥方規矩)治月水不調、淋瀝或腹痛。

桃仁 甘草  
半夏 澤瀉  
乾漆 當歸  
桂枝 牡丹皮  
人參 薄黃  
川芎 各五分 芍藥  
生地黃 各一錢 生薑

●通經調氣湯(醫藥方規矩)  
治婦人經閉虛弱者。

當歸 芍藥  
生地黃 川芎  
香附子 各一兩 梧子仁  
黃芩 柴胡 各六錢  
牡丹皮 知母

牛膝 各八錢 桃仁  
紅花 各少

●通養湯(醫藥方規矩)治婦人經閉、半虛半實者。

當歸 川芎  
芍藥 生地黃  
大黃 桂枝  
厚朴 枳殼  
松實 黃芩  
蘇木 紅花  
烏梅 大棗  
生薑

●烏藥湯(醫藥方規矩)治婦人經行不調。

烏藥 一錢半 香附子 二錢  
當歸 一錢 木香

甘草 各五分  
●治經水長不止。

牡蠣 阿膠

右二味等分爲末服之即止。其後去四物湯內之川芎加黃連黃芩山梔子爲散藥用之。(中國經驗方)

●治血塊虛寒經水不行者。

當歸 肉桂  
牡丹皮 芍藥  
莢 各一錢半 茯苓 三錢  
甘草 一錢 牛膝 一錢  
右八味水煎服。

●月經不順腹脹方。

鼠尾草 石菖蒲  
紅花 各等分  
右三味水煎服。

●月水二三月不行者。或血塊下。

延胡索 一兩 香附子 二兩半

牛膝 一兩

右三味水煎服。

●月水不行者。

茜根 一兩

右六煎服。

### 乳閉 *Asthenia* 乳少

病解

分發後。母體之乳質。雖必分泌。然有時則或閉止或全無。此由於母體之營養缺乏。或受精神疲弱之劇烈刺激。而然。其他尚有種種原因。誘起本症者不少。

攝生法 產婦當分發後。負哺乳胎兒之責任。若產兒後乳汁之分泌缺乏。或停止。實為生兒之不幸也。故產婦宜常保精神及身體之健康。使之無病。以希望分泌健全之乳汁。

處方

外國方

●暹羅子末

茴香末

磷酸加爾卑誤

白糖末

右極和。每二時六錢。加溫湯或牛乳服用之。(乳母量秘藥類笈拔萊)

●孕藥酒石

右為六包。一日分服。

中國方

●湧泉散。

川芎 一錢 茯苓 三錢

十二錢半

十二錢半

五錢

二十五錢

四錢

蒼朮 二錢

大黃 二分

甘草 八分

右七味水煎服用。

●乳泉湯。

茴香根 十六錢

水楊梅葉 十二錢

茴香子 十六錢

右為煎藥。三日分九回服用。

●滴乳湯(醫方大成)乳汁不通者。用此方。

者。用此方。

茴香葉 十二錢

薔薇葉 十二錢

木通 天花粉  
當歸 川芎  
生地黃 芍藥  
王不留行

●釀乳丸(名家方選)發產後百  
日間乳汁不通者服此方神驗。

木通藥 六錢 牡蠣 四錢  
麥門冬 二錢

右三味爲細末。糊丸如大豆大。酒黃  
爲衣。白湯送下。胎前中亦可服。禁五  
辛青菜類。又嫌他藥并用。

●生乳散(妙藥秘藏)治乳閉方。  
穿山甲 龍骨  
覆麥子 麥門冬 各等分  
右爲末。溫酒送下。

●瓜蒌湯 治乳汁不通者。

紫蘇 藜香  
木通 天花粉  
甘草 各等分

右藥一貼。干薑一錢。水煎。

●當歸補血湯(醫方大成)產後  
無乳者。以此爲主方。

當歸 黃芪 酒製  
右爲煎藥。

●治乳不出者。  
括樓根 九錢 青蘇 六錢  
右爲末。白湯送下。(上池秘錄)

●治乳無汁方。  
石鐘乳 瓦草  
滿應 穿山甲 各二錢  
右四味爲末。以粥飲送下。一日服三  
度。(農家至寶記)

●出乳汁秘藥。  
當歸 桔梗  
白芍藥 白茯苓  
川芎 木通  
天瓜粉 穿山甲

台八味煎服。(妙藥妙術集)

●治乳閉方。  
乳香 沒藥  
右二味爲末。和酒服用。微醉爲度。  
而忽白煎汁。可盡乳房。

●乳汁不通用之。  
木香 茴香  
當歸 川芎  
生地黃 王不留行  
右爲煎藥。(醫方大成)

●王瓜根末一錢。和酒服用。(本草綱目)

●穿山甲混土炒焦。去土。與天花粉。王不留行。三味為細末。等分混和。取三錢。和溫酒服用。  
(價值最易方)

●杜仲。大鹽之頭。各等分為霜。(煨燒)溫甘酒調和。於一度中用二錢。  
(妙藥手引草)

●天瓜粉一錢。乳香一錢。為細末。以溫酒服用。  
(藥方選)

乳多 Polysalacia 乳質過溢

病解 乳多者何。產後乳汁分泌過多。乳兒之哺乳雖止。尚有多量之乳質。進出(甲)或分泌如水狀而透明之乳質(乙)之謂也。

片鹽其乳房亦可。或以吸乳器之器。吸收其乳汁。亦可。苟乳房覺疼痛。即塗以家豬脂。或華樹林製劑。

●舍利別 四錢  
●右濕溶。朝夕用一杯。 二十錢  
●硫酸銅。備濕失亞 三錢  
右以水溶解。分二日服用。一日服二回。乃至三回。

攝生法 乳汁多出之症。除用後列之方劑外。宜少食構成乳汁之食物。或以布

外國方 二分半  
●沃度加里

乳腺炎 Mastitis 乳房炎

病解 乳腺炎大都起於分娩後之二三週間。有劇烈之惡寒戰慄。同時發熱。乳

房之皮膚呈赤色。輕壓之。便覺疼痛。約二三日其熱始解。有治愈之象。苟當化膿之

時。則用外科手術。截開外無他法。然本症之病源。或由乳頭之裂傷。以致傳入而發

生者。

攝生法

乳頭炎為傳染病之一種。既如前述。所當謹守之預防法。最為緊要。即哺乳後宜清拭其乳頭。及其裂傷處。小兒之口腔。亦須清拭之。於本症之發過中。宜嚴禁哺乳。

處方

外國方

● 魯發水

五錢

盧里斯林

五錢

單寧酸

六分

右混和。塗布於患部。

● 沒食子酸

五分

橙花油

一滴

華攝林

十錢

右混和。為塗擦料。

● 單寧酸

五錢

華攝林

十錢

右混和。為塗擦料。

中國方

● 治乳頭方。

艾葉霜

赤辛蝶 各等分

右二味。以蒜煉和貼布之。

(妙製稻蒸)

● 治乳頭。并增乳液稠者。

秋後茄子 十個 桑葉 三十枚

右為霜。和酢貼布之。

● 治乳頭方。

取萬年青汁塗患處。神效。(名家方選)

● 乳風妙藥。

瓜葉仁 一錢 貝母 一錢

右水煎服。

(中國經驗方)

● 乳風奇方。

貝母 一錢

天花粉

柴胡

芍藥

穿山甲 各五分

右五味。水煎。溫服。

(名家方選)

● 治乳痛。

蒲公英根

忍冬

右二味煎洗。

● 以水仙之球根生搗。貼布患部。

(僅檢藥方集)

● 乳之腫凝者。以里芋。山葵之粘汁塗付

之。(農家至寶記)

中西醫方會通終













宣統二年五月初版  
中華民國十四年七月五版

每部大洋二元

(中西醫方會通)

編纂者 無錫丁福保

總發行所 上海英界梅白格路宏昌里第一百廿一號 醫學書局

分售處 上海棋盤街 商務印書館

上海棋盤街 掃葉山房

上海棋盤街 會文堂

各省分售處

各埠商務印書館  
各埠中華書局  
各大書局

版權所有

