

第八册

外科佩籍集

外科方外奇方

傷科方譜

產寶

產孕集

胎產新書

女科百問

兒科題

麻疹圖註

裘吉生主編

珍本醫書集成

馬培之纂

外科傳薪集

世界書局印行

序

余素不習外科。壬辰歲初。就鄧羹和先生讀內科書。知其胞姪星伯。從子河馬培之徵君。徵君擅長外科。有方書備載外科諸方。卽傳薪集也。許柘氏會從星伯君學。故得是書。余向之假錄一過。什襲藏之。會丁酉。家慈苦患搭手。重如負數千錢。因家境艱難。未延專科治。自外敷出毒收口止。均將此書檢方用藥。化重爲輕。幸而獲痊。故將得書緣由。識之如右。

無錫周鎮小農別署伯華識

外科傳薪集目錄

冰梅丸	二味拔毒散	平安散	化腐丹
陽和丸	四虎散	代刀散	九一丹
西黃丸	鐵箍散	礪砂散	赤靈丹
琥珀蠟丸	推車散	五龍散	三黃丹
三黃丸	移毒消腫散	聖金散	金素丹
通聖丸	追瘡散	中白散	黑龍丹
蛇蛟解毒丸	勝金散	清陽散	蛭蟾丹
金龍丸	螺蛳散	清涎散	蟾酥散
五龍丸	退管散	平安散	補脬丹
自製疔瘰丸	平瘡散	清涼散	八寶丹
琥珀射星丸	截瘡散	涼血散	四寶丹
回陽散	枯礬散	生肌散	黑虎丹
拔疔散	吹喉散	清陽柳華散	八將丹
黑虎散	柳青散	牛黃冰連散	十寶丹
金黃散	金烏散	丁桂散	消疔丹
麝香散	天瘡散	薑芷散	三星丹
雄麝散	吹耳散	清涼膏	文星丹
		陽和解凝膏	輒馬丹
		背疽夾膏	斂疔丹

金丹	一四	青黛散	一七	太乙丹	一〇	胡連閉管丸	一三
金不換	一五	參耒散	一七	截瘧丸	一〇	七香丸	一三
大金丹	一五	定痛丸	一七	陽和丸	一〇	保童肥兒丸	一三
家寶丹	一五	又方	一八	治目多眩淚藥	一〇	祛風換肌丸	一四
五寶丹	一五	馮氏八將散	一八	治螳螂子方	一〇	神效種子丸	一四
九轉丹	一五	秘製白龍丹	一八	仿西洋眼藥	一〇	蠟攀丸	一五
去解丹	一五	止嗽散	一八	傷丸	一一	青龍丸	一五
去腐丹	一五	解毒散	一八	哮喘神效丸	一一	雀斑丸	一五
海浮散	一六	和中丸	一八	五痛丸	一一	蠟膏丸	一五
二仙丹	一六	收痔散	一八	五香丸	一一	通音丸	一五
青敷藥	一六	三黃丸	一九	王九峯治吐血丸	一一	消管丸	一六
黃敷藥	一六	蛇咬洗方	一九	兌金丸	一二	鯉鱗丸	一六
黑敷藥	一六	牙痛散	一九	哮喘丸	一二	寶犀丸	一六
八寶丹	一六	移花散	一九	蟾酥丸	一二	仙桃丸	一七
五寶丹	一七	燥溼丹	一九	醒消丸	一二	治老人不寐丸	一七
東坡方	一七	定痛丹	一九	貴金丸	一二	致和丸	一七
秘藥加料	一七	截瘧丹	一九	平安丸	二三	戒烟丸	一七
小兒頭瘡	一七	白靈丹	一九	琥珀多寐丸	二三	痧丸	一八
定心化痰丸	一七	止血丹	二〇	胡連追毒丸	二三	衛生丸	一八

胃靈丹	二八	紅膏藥	三一	一掃光	三五	林文忠公靈丹	四〇
白眼藥	二八	黑瘡藥	三一	紅銅片	三六	長肉商紅膏	四〇
水眼藥	二八	白瘡藥	三一	貼散膏方	三六	生地膏	四〇
眼藥	二八	膿瘡膏	三一	爛喉痧方	三七	百部膏	四〇
止嗽散	二八	黃連膏	三一	五效丸	三七	厲瘋膏	四〇
桃花散	二九	夾紙膏	三一	頭耳諸瘡方	三七	消瘤散	四一
八寶丹	二九	又方	三一	鬍鬚頭瘡方	三七	英夷戒烟丸	四一
吹藥	二九	烏金膏	三一	小兒頭瘡方	三七	法製半夏	四一
吹藥	二九	清涼膏	三一	狼毒膏	三八	硯農氏 選錄中 小蟾酥丸	四二
解毒丹	二九	又方	三一	治囊漏	三八	清涼散	四二
翠雲散	二九	玉仁膏	三一	專治腎囊風	三八	八寶丹	四二
珍珠散	二九	北庭丹	三一	敷藥方	三八	藥兜肚方	四二
梅花丹	二九	蛇咬解毒丹	三一	藥絲線	三八	紅膏藥	四三
虛痰丸	三〇	又洗方	三四	耳出臭膿	三九	附許恆君傳用	四四
化毒丹	三〇	人參胎產金丹	三四	耳中膿水不乾方	三九		
枳藥	三〇	秘藥餅	三五	專治頭項怪症丸	三九		
眼癬用	三〇	神燈照	三五	摻舌黑虎散	三九		
蛇牀子散	三〇	專治頸項瘰癧痰核馬刀	三五	癬藥	三九		
提泡藥	三一	失榮等症方	三五	活絡丹	三九		

外科傳薪集

孟河馬培之纂 後學許恆鈔傳 浙杭桂良溥校訂

冰梅丸 治咽喉風痰緊閉。不能言語。紅腫核痛。用之立效。

大青時梅 二十個 大梅片 一錢 川雅連 一錢 西瓜霜 二錢 硼砂 半錢

水飛青黛 一錢 細薄荷 半錢 苦甘草 一錢 荊芥穗 二錢 象貝 去心 四錢

製殭蠶 四錢 淡黃芩 鹽水炒 一錢半 上雄精 三錢 製半夏 三錢

右十三味。各研細末。將大青梅去核。內以明礬。放瓦上煨至礬枯。去礬。將梅肉搗爛。和上藥末為丸。如龍眼核大。以磁瓶收貯。臨症用一丸。放舌上化下為度。

陽和丸

上桂心 一兩 麻黃 五錢 炮薑炭 五錢 共為細末。灑水為丸。 新增白芥子三錢。鹿角霜五錢。

西黃丸 治乳癰瘰癧。痰核流注。肺癰。小兒疳毒等。每服三錢。陳酒送下。上部臨臥服。下部空心服。

炙淨乳香沒藥 各一兩 麝香 半錢 西牛黃 三分 雄精 五錢

右藥共研末。取飯一兩。打爛。入末藥。再打為丸。如蘿蔔子大。晒乾已忌烘。每服三錢。熱陳酒送下。醉蓋取汗。酒醒。癰消痛息。

琥珀蠟丸 治癰疽發背。已或未膿之際。恐毒氣不能外出。必致內攻。預煎此丸。護膜護心。散血解毒。功效甚大。每服在日晚卅丸。白湯送。甚者日二次。

白明礬一兩 五錢 黃蠟一兩 雄黃二錢 琥珀一錢另研極細 硃砂一錢 二分 蜂蜜二錢

先將礬、雄、珀、砂、四味先研細末，再將蜜蠟入銅杓內溶化，離火片時，四邊稍凝，入上藥未攪勻，共成一塊，以一人將藥火上微烘，眾人急丸，如小菜豆子大，用硃砂為衣，磁罐收貯。

三黃丸治懸癰紅腫。熱毒速煎。大雞湯梅。
廣病結毒等症。涼服十次。其餘全愈。

熟大黃三兩 乳香沒藥去浮油 各二兩 雄精五錢 麝香一錢 五分 西黃三錢

新增雅連三錢 淡芩酒拌晒 乾一兩 先將熟大黃酒浸透，入碗隔湯蒸軟，搗爛，然後

以乳香、沒藥、雄、麝、犀、五味末和入，再打千捶為丸，如梧子大，每服五錢。

通聖丸治一切隔毒。小兒疳積。

防風 桔梗 麻黃去節 甘草各一兩 當歸 川芎酒炒

滑石各一兩 白芍酒炒 石膏煨 白朮土炒 芒硝酒釀 焙坤 連翹

黃芩酒炒 黑梔 薄荷 荆芥各二錢 五分 共為細末，水泛為丸，如菉豆大。

蛇咬解毒丸甚效。

白礬一兩 甘草五錢 雄黃一兩 三七一兩 白芷一兩 青木香五錢

川貝一兩 五靈脂一兩 硃砂一錢 共為細末，飯糊為丸，硃砂為衣。

金龍丸治一切疔腫。并跌仆損傷。癆瘵。貼骨癰疽兼治男婦大小頭項瘰癧。及乳串流核。痰氣熱癧。痘後發癧。

番木鱉四兩。以米泔水浸三日。刮去毛皮。切晒。麻油炒透。 甲片一兩五錢 炒透 共為末，以黃米飯搗勻為

丸。桐子大。每服五分。量入酌減。按部位用引經藥煎湯送下。宜煖睡。勿冒風。如冒風覺週身麻木。或發抖。不必驚慌。過片時即安。初起一二服即消。已成膿者。服此自能出毒。不必咬頭開刀。誠外科家第一妙方也。引經

頭面 川芎五分 羌活五分 腰間 杜仲五分 足膝 牛膝五分 木瓜五分 肩背 角針五分 兩臂 桂枝五分 兩脇 柴胡五分

咽頭 桔梗五分 甘草五分 跌仆 紅花五分 歸身五分 年老氣血衰。止服 四分。新產半月內。止服 四分。

滿月服 五分。男婦瘰癧痰毒。或酒送。夏枯草湯服。小兒週歲以內。服 九粒。週歲以外。服 十一粒。二三歲服 十五粒。四五歲服 十九粒。六七歲服 廿一粒。八九歲服 卅一粒。十歲服 三十分。十五歲服 四十分。一二十歲照大人服法。小兒不能吞服。以開水送。或甜酒調化送下。

五龍丸 (即散流注丸) 治牛癰、牛隔及眼癰、魚口、便毒、鰓腫瘋症。

甲片 土炒 全蠍 酒炒 槐末 炒 殭蠶 炙 土貝母 研各一兩

麪糊爲丸。每服三錢。陳酒送下。

自製霹靂丸 專治一切吐瀉。冷麻痧。

桂枝 二兩 川椒 二兩 五錢 良薑 五錢 乾薑 半兩 苡仁 二兩 五錢

小茴香 二兩 公丁香 二兩 防己 一兩 五錢 降香 二兩 五錢 附子 一兩 五錢

葱白頭 二兩 檳榔 二兩 烏藥 一兩 五錢 木香 二兩 萹澄茄 二兩

草菓 一兩 吳萸 一兩 菖蒲 一兩 細辛 一兩 生晒研末。水泛爲丸。

每服三錢開水送下。小兒減半。孕婦忌服。

琥珀射星丸 治痰迷心竅。

辰砂

琥珀

射干

眞陳膽星

各一錢。研細末。用猪心血和丸。金箔爲衣。如小椗桐子大。

回陽散

治癱疽陰瘡。皮色不變。漫腫無頭。堅硬疼痛。風痺脚氣。手足麻木。筋骨不舒。寒熱所注。鶴膝風等。一概敷之。

煨薑

三兩

肉桂

五錢

赤芍

炒三兩

南星

一兩

草烏

炒三兩

白芷

一兩

共爲細末。以熱酒調敷。

拔疔散

治一切疔毒。以膏蓋之。未膿即散。或用荔枝肉打爛敷之。亦效。

月石

一錢

雄精

二錢

千金霜

一錢

巴散

二錢

鐵鑪

二錢

活磁石

炒五錢

麝香

三分

梅片

二分

硃砂

五分

蟾酥

三分

研極細。以磁瓶收貯。

黑虎散 治一切無名腫毒。以膏蓋之。

麝香

五分

梅片

五分

公母丁香

各二錢

蜈蚣

七條

大全蠟

七個

穿山甲

七片

大蜘蛛

七個以瓦焙

加礞砂

三分

更妙。共爲細末。用磁石器收貯。

金黃散

治癰疽發背。諸般疔瘡。跌仆。濕痰流注。大頭時痛。漆瘡火丹。風熱天泡。肌膚赤腫。乾濕脚氣。婦人乳癰。小兒丹毒等。

天花粉

一兩

黃柏

五兩

薑黃

錢

大黃

各五錢

白芷

五錢

紫川槿

一兩

陳皮

甘草

錢

蒼朮

各二兩

天南星

二兩

晒乾爲末。以磁器收貯。凡遇紅腫。及夏月火令時。用茶湯同蜜水調敷。如

微熱。欲作膿者。以葱湯同蜜水調敷。如漫腫無頭。皮色不變。附骨癰疽。鶴膝等。俱以葱酒並調。如天泡火赤遊丹。黃水瘡。俱以板藍根葉。搗汁調和。傷傷麻油調。其次諸引。又在臨用之際。順合天時調。窺病勢也。

麝香散

川草烏 各二錢

細辛 二錢

肉桂 二錢

麝香 五分

乳香 五分

沒藥 五分

丁香 二錢

附子 二錢

雄麝散 治一切癰疽發背。初潰時用之。化腐定痛之要藥也。楊梅初方。

頂字麝香 三錢

真雄精 五錢

淨巴霜 三錢

右研細末。將磁器收貯。勿令出氣。

二味拔毒散 治風濕諸腫。痛癢疥瘡。

雄精

明白礬 各等分。為細末。用茶調。以鷄翎蘸掃患上。

四虎散 治癰疽硬腫。厚如牛領之皮。不作膿腐。用此甚效。

天南星

草烏

半夏

狼毒 各等分。細研。用猪膽子同搗敷。留頂出氣。

鐵箍散 治發背。將潰已潰時。根脚走散。不收透者用此。

銅綠 五錢

明礬 四錢

膽礬 三錢

五倍子 微炒 一兩

白芨 五錢

輕粉

鬱金 各二錢

麝香 三分

研細末。用陳米醋一碗。杓內慢火

熱至一小杯。候起金色為度。待溫。用上藥末攪入膏內。每用燉溫。用新筆

塗以棉紙蓋上。根自全收不散。

推車散

去多骨。又治瘡出血。香油調。

蝮螂蟲

煨存性為末。搗於骨上。骨自出。

移毒消腫散

生於骨際及膝上。不急治。難以收功。以此藥移之。

紫椹皮

炒五兩

赤芍

炒一兩

香白芷

一兩酒燉不可炒

石菖蒲

一兩晒不可炒

獨活

炒一兩五錢

共為細末。以好酒和葱白五莖煎滾調搽。不必留頂。一日一換。以消為度。

追瘡散 用治一切瘡癩疥癬。

大黃

石膏

黃柏

蛇牀子

各五錢

硫黃

七分

明礬 二錢

樟冰 八分

金爐底 三分

椒目 二分

共為細末。用桐油調

搽。新増苦參人中黃。

勝金散

好醋塗。痛與消。又治刀傷吐衄。調服。

台參

野山膝 各一兩

研極細末。

鰲蛸散 治破爛諸瘡。

海螵蛸

人中白 煨各一兩

共為細末。搽之神效。

退管散

豬肺管

乙類。不可為。管管上油膜去淨。以瓦焙乾。

鵝管石 一錢

白砒 四分

鎗硝 三分

共為

細末。以白掃葱水。麪漿為藥條插入管內。如此三次。其管退出。

平瘡散 專治白泡瘡。膿窠肥瘡。痛痒立效。

寒水石 二兩

東丹 一兩

掃盆 一錢

硫黃 五錢

明礬 七錢

川椒 一錢

黃柏 五錢

牛烟膠 五錢

人中黃 二錢

為細末。以板猪油。

鷄脚。大黃根同打爛。擦立效。

截瘡散 治一切疥癩膿窠諸瘡。

嫩松香 一兩

雄精 一錢

共為細末。入竹瀝紙捲成條。浸菜油一宿。取出。

倒掛火燒。滴油塗之即愈。

枯礬散 治一切風火。開痰閉。吹之立效。加麝香少許更妙。

枯礬 一錢

製蠶 一錢

硼砂 三分

薄荷 三分

大梅片 一分

雄精 一錢

加膽礬 一分

山豆根 二分

苦甘草 一分

研。

吹喉散 治纏喉風痺。乳蛾。喉痺。重舌等。吹之神效。

殭蠶

薄荷

青黛

朴硝

白礬

火硝

黃連

硼砂 各五錢

共為細末。以猪膽七個袋之。埋於土下。久之取出。搗爛。乾為末。

柳青散 治口舌破碎。先用荔枝根湯漱口。後吹之。

薄荷 五分

兒茶 八分

黃連 四分

青黛 三分

冰片 一分

共為

細末。

金烏散 治頭目眉癢。燕窩瘡。

皂莢炭 一兩 枯白礬 一錢 共為細末。香油調敷。

天瘡散 治天泡瘡。

滑石 一兩 粉草 五錢

枯礬 三錢

菘豆粉 五錢

共為細末。

吹耳散 治耳疳膿水不止。

水龍骨 煨一錢 海螵蛸 一錢

飛青黛 一錢

枯礬 三分

五倍子 炒黃一錢

黃魚齒 煨五分 細薄荷 五分

梅片 三分

川雅連 三分

蛙竹屑 三分

石榴花瓣 炙脆一錢 為末。 (必細末)

平安散 (即烏龍散) 去贅肉。

烏梅 一兩 煨存性。為末。摻之。又方。膽礬燒敷上。

代刀散 去頑肉。亦可代開刀。

金頂砒 五分 潮腦 一錢

螺螄肉 晒乾二兩

輕粉 三錢

巴豆仁 去油五錢 為末。

用麻油調搽。

礪砂散 治鼻痔耳挺及齒。

礪砂 一錢 輕粉 三分

冰片 五分

雄黃 三分

共為細末。每日點

五六次。漸漸化水為愈。

五龍散 治癰疽。疔毒。瘰癧初起。調塗。火感以芙蓉汁調。寒重用薑汁調。

生南星 一兩 生半夏 五錢

全當歸 五錢

生大黃 五錢

陳小粉 一斤四兩 炒黑 共

爲細末。

聖金散 治咽喉紅腫痛，微碎。痰涎喉痺等。吹之。

淡秋石 三錢 淡黃芩 一錢

川雅連 五分

真西黃 一分

燈心炭 五釐 薄荷頭 三分

大梅片 三分

共爲細末吹之。

中白散 治喉中腐爛。

人中白 一兩 兒茶 五錢

黃柏 三錢

薄荷 一錢

青黛 三分

大梅片 二分 研爲末。

清陽散 治咽喉腫痛。脹痛紅腫。

月石 飛青砂 各二分

大梅片 一分

右藥研爲末。

清涎散 專治牙痛。

月石 一兩 元明粉 三錢

大梅片 三分

平安散 與前劑散膏用。專消火症痰核。

牛黃 二分 火硝 三錢

煨月石 三錢

雄黃 三錢

原寸香 三分

大梅片 二分

清涼散 (此藥未注) 大約用火症。

熟石膏 一兩 黃柏 二錢

爲末。

涼血散 專長肉收功。

熟石膏 一兩 黃丹 二錢

為末。

生肌散

滑石 一兩 冰片 二分

硃砂 一錢

為末。

清陽柳華散 治咽喉一切紅腫。

黃柏 一兩 青黛 一兩

月石 一兩

人中白 煨一兩

為末。

牛黃冰連散 專治（未注）大約亦咽喉藥也。

牛黃 一分 黃連 二錢

冰片 一分

為末。

丁桂散 治頭痛，在傷膏內用之神效也。

丁香 三錢 肉桂 一兩

為末。

薑芷散 專治火瘡毒。

薑黃 一斤 白芷 各一斤

為末。

清涼膏

桐油 一斤 菜油 一斤

鉛粉 一兩

頭髮 （散，血）四兩

熬至髮盡，入丹收。

膏。先髮油燒。燒至化後，鉛粉和入，再用丹收。

陽和解凝膏 專治寒症。

附子

桂枝

官桂

大黃

歸身

川烏

草烏

地龍

殭蠶

赤芍

白芷

白斂

白芨

續斷

防風

荊芥

五靈脂

木香

陳皮

鮮牛蒡草

活白鳳仙花梗

麻油

先將牛蒡鳳仙二味入油煎枯去

渣。再將上藥入煎。至枯瀝渣。隔宿油冷。見過斤兩。每斤油加炒黃丹七兩。攪勻。文火熬。至滴水成珠為度。以油鍋移陽處。再以乳香。沒藥。各二兩。細研。蘇合香四兩。麝香一兩。入膏攪勻。半月後攤貼。

背疽夾青

炙乳香

炙沒藥

銀硃

黃丹

血竭

兒茶

銅綠

共為細末。

化腐丹

紅升藥

銅綠

石膏

炙乳沒

降藥

上為

細末。以磁器藏。

九一丹

尿浸石膏

三仙丹

共為細末摻之。

赤靈丹

上血竭

月石

為末。

二黃丹 治風毒黃水瘡。

大黃 三兩 黃柏 一兩

黃連 三錢

石膏 煨二兩

爐底 少許

共研。

川連水調敷。

金素丹 治背疽。腐肉黑黯。死肌。臭氣難聞。以此搽之。

生明礬 六錢

枯礬 三錢

腰黃 一錢

共為細末。如霜。

黑龍丹 去突卮肉。治陰虛或脫肛。以此搽之。

先用防風升麻 各一錢

煎湯調搽。立收入熟地 炒炭一兩

烏梅 炙三錢

為末搽。

蛭蟾丹 治偏管。

蠟蝗 十條。以泥封罐。納入炭火煨之。

蟾酥 一錢

熊膽 八分

麝香 五分

冰片 二分 共為細末。飯糊為條。插入。其管退後。用生肌藥。

蟾酥散

蟾酥 一錢

沒藥 炒四錢

乳香 炙二錢

甲片 一錢

蜈蚣 二錢

雄黃 二錢

麝香 五分

川草烏 各二錢

藤黃 二錢

為末。

補脬丹 治產後尿胞傷損。

白牡丹根 一錢

黃絹 一尺

白芨 一錢

煎濃半碗。徐服之後。忌言語。

入寶丹 一切不收口可搽。

大濂珠 同豆腐煮過三錢

真青龍骨 一兩

上血竭

嫩兒茶 各一兩

石膏 童便浸百日後二兩

西血珀 五錢

上浮甘石 兩煨二

鷄內金 兩炙一

共為細末如霜。磁瓶藏貯。

四寶丹 治瘰癧。

川黃柏

赤石脂

大貝母 去心

青黛 飛

共為細末摻之。

黑虎丹

治一切無名腫毒。同膏貼。

麝香 五分

頂梅片 五分

公母丁香 各一錢

蜈蚣 七條(大)

靈磁石 錢半煨一

大全蠍 七個

炙甲片 七片

大蜘蛛 七個煨七

製蠶 七條

紅礬砂 三分

研

細如霜瓶貯。不可泄氣。

入將丹

治疽毒不起。疔毒不透。腐肉不脫。用此提毒。

西黃 三分

火泥 三分

蟬衣 烘一錢

大蜈蚣 七條

炙甲片 三錢

麝香 三分

大全蠍 條炙七

五倍子 焙三錢

共為細末摻之。以膏蓋貼。

十寶丹 治久不收口。

花龍骨 一兩

童便浸石膏 二兩

血竭 五錢

製蘆甘石 一兩

龍眼核 煨五錢

水龍骨 煨五錢

炙乳沒 各三錢

鷄內金 錢炙三

人中白 煨三錢

大梅片 一錢

共為細末。磁瓶盛之。

消疳丹

治一切牙疳。臭爛不止。吹之立效。

胡連 五分

膽礬 三分

兒茶 五分

銅綠 五分

麝香 一分

綠礬 一錢

滑石 一錢

杏仁霜 五分

西黃 五分

青黛 一錢

鷄內金 五分

冰片 一錢

乾蟾炭 三分

上蘆薈 五分

皂礬 五分

人中白 一錢

葶藶子 五分

雄黃 一錢

共為細末。

三星丹 治走馬牙疳。黑腐不去。近腮穿腫。危險不堪。吹之。

北棗 三個

白砒 二分

雄黃 五分

膽礬 三分

將棗去核。三味研。入

棗內。濕紙包。於炭火煨脆。冷定。研細。加梅片二分。為末收貯。

文星丹 治走馬牙疳。

五倍子 一個

入烏梅肉 一個

白礬 一錢

南星 一個

雄黃 一塊

皆用

麝裹。煨內入大梅片三分。麝香五釐。研。

輒馬丹 治牙疳作痒。

胡連 二錢

川柏 二錢

硼砂 一分

雄精 一錢

川連 一錢

兒茶 五分

薄荷 一錢

人中白 一錢

冰片 八分

共為細末。

(附法)

此症熱瀰而起者。當以綠豆飲濃汁頻用。

歛疳丹 治腐肉不脫。吹之生肌。

真西黃 一錢

血珀 二錢

大廉珠 一錢

青龍骨 三錢

鷄內金 一錢

梅片 八分

研。

金丹 治走馬牙疳腐爛。吹之立效。

黃牛糞 煨

黃柏

人中白 鹽泥固封。煨各一兩。

大梅片 一錢

研。

金不換 治痘疔。牙疔。喉蛾。喉間潰爛。吹入神效。

西瓜霜 六錢 青黛 六錢

人中白 煨五分

川黃柏 三錢

硼砂 三錢

元明粉 一錢 大梅片 五分

共為細末。

大金丹 治咽喉聖藥。虛火上升。吹之神效。

硃砂 三錢 雄精 一錢

硼砂 一錢

川連 三錢

西黃 一分

甘草 一錢 枯礬 三分

黃精 三錢

淡秋石 一錢

製熟附片 一錢

共為

細末。

家寶丹 治咽喉。風喉。吹之神效。

薄荷頭 二錢 鎗硝 二錢

燈心灰 二分

雄精 五分

大梅片 三分

五寶丹 治諸瘡腐爛。定痛。又治疔毒腐爛。搽。

靈磁石 二兩 飛硃砂 六錢

上雄精 三錢

梅片 三分

麝香 三分 共為細末。

九轉丹 出膿後用。

紅升 一兩 熟石膏 四兩 共為細末。

去解丹 拔毒去膿。

熟石膏 一兩 黃升 一錢 青黛 三錢

去腐丹 頑腐不脫。不可常用。

黃丹 一兩

熟石膏 一兩

海浮散 長肉。止血定痛。傷科亦用却效。

多淨乳沒各等分。研極細末。

二仙丹 (馬氏) 療久不斂。四圍顏色多好肉。孔中無管用之。

明礬 一兩

銀珠 一兩

研極細末。

青敷藥 (馬氏方)

大黃 八兩

薑黃 四兩

黃柏 四兩

白芷 二兩

青黛 二兩

白芨 二兩

花粉 一兩

陳皮 二兩

甘草 一兩

黃敷藥

大黃 四兩

薑黃 四兩

花粉 半觔

黃柏 四兩

蒼朮 二兩

陳皮 二兩

白芷 四兩

甘草 二兩

黑敷藥

大黃 四兩

陳小粉 炒黑 一斤

毛菇 二兩

白芨 二兩

陳皮 二兩

南星 二兩

花粉 四兩

白芷 三兩

厚樸 四兩

甘草 一兩

血竭 二兩

芙蓉葉 四兩

五倍子 炒半斤

八寶丹 (馬氏方)

煨龍骨 六錢

檳榔 二錢

水飛甘石 六錢

白占 六錢

煨石膏 八錢

寒水石 六錢

東丹 二錢

鉛粉 二錢

五寶丹 (又馬氏方)

熟石膏 一兩

上白占 二兩

赤石脂 二錢

黃丹 二錢

冰片 二分

東坡方 癰瘡蔓延。

草決明子 一兩

研末。入水銀輕粉少許研。擦破塗之。

祕藥加料 治爛喉。及喉痛實火。

上犀黃 一分

滴水石 五分

硼砂 三分

川雅連 二分

淡芩 二分

大梅片 一分

小兒頭瘡 胎毒及頭瘡等。

川黃柏 五錢

烏金散 五錢

人中白 三錢

以研細後。菜油調。

定心化痰丸

明礬 四兩

鬱金 九兩

共為細末。飯粒丸。

青黛散 專治耳腫痛。初起用之吹耳。

青黛

薄荷

木鼈子 煨去皮

冰片

等分。

參末散

苦參 一斤 研。

定痛丸 (馬氏方) 立止諸痛。

炙沒藥

炙乳香 各二錢

甘草 一錢

真綠豆 一兩

共為細末。硃砂為衣。

又方

加洋烟灰少許更靈。(許云。星伯常用此藥。) 一方無甘豆二物。有洋烟。和棗肉爲丸。如桐子大。每服二丸。硃砂爲衣。

馬氏入將散

五倍子 四錢

雄黃 二錢

乳香 三錢

角針 二錢

全蠟 三錢

蜈蚣 二條

麝香 一分

冰片 一分

秘製白龍丹 專治肺癆。

真川貝母 一斤

淡蜜水爲丸。又方。

真川貝母 一錢

柿霜 五分

止嗽散 (馬氏) 專治咳嗽。

宋半夏 研五錢

白冰糖 搗碎三錢

解毒散

熟石膏 一兩

青黛 二錢

和中丸

木瓜 一兩

人參 三兩

白朮 三兩

炙草 一兩

陳皮 一兩

乾薑 一兩

清水泛丸。

收痔散

五倍子 研細

用麻油調敷。

三黃丸

川雅連 五錢

黃芩 一兩

製大黃 三兩

白蜜為丸

蛇咬洗方

白凡榆

莧菜松花

川椒

蒲公英

青藤皮葉

荷葉

豆葉

葱白

牙痛散

葶撥

石膏

研末摻

移花散

(馬氏方) 小兒痘出眼中。左眼吹右耳。右眼吹左耳。

東丹

輕粉

猪牙皂 各一錢

大梅片 五分

為細末

燥濕丹

蛇牀子

研末

定痛丹

三七末

截瘡丹

威靈仙

研末貼臍

白靈丹

石膏 一錢

白占 二錢

冰片 二分

止血丹

生蒲黃炒黑 研。

太乙丹

大戟一兩五錢 五倍子一兩 毛菇二兩

麝香五錢 千金子一兩 雄黃三錢

截瘡丸

巴霜六分 冰片一分 雄黃六分

麝香一分 硃砂六分 輕粉六分

陽和丸

麻黃 肉桂 炮薑各等分

治目多眵淚藥

鯽魚膽一個 人乳一盞 和勻。飯上蒸一二二次。點眼。淚自收也。

治螻螂子方(即妬乳)

青黛一錢 元明粉三錢 硼砂一錢 薄荷四分 冰片一分 同研

細末。擦口內。一日三五次。

仿西洋眼藥

猪苦膽取出。東丹拌勻。加冰片青黛少許。搓成條於盤中。(大約磨碎)賣者如此

傷丸

淮牛膝 一兩

參山七 三錢

當歸 一兩

落得打 一兩

杜仲 一兩

骨碎補 一兩

山羊血 二錢

白芨 五錢

自然銅 二錢

兒茶 一錢

甜瓜子 二兩

紅花 五錢

厚樸 三錢

乳香 三錢

木瓜 五錢

川續斷 二兩

肉桂 二錢

硃砂 三錢

原寸香 八分

研細末。稀粥為丸。

硃砂為衣。彈子大。每服一丸。陳酒送下。

哮喘神效丸

青皮一枚去穰。入巴豆一粒去壳。煨仁。研末服。亦可泛丸。

五癩丸

魚線膠 一兩

飛硃砂 三錢

明礬 一兩

鉛粉 一兩

明雄黃 三錢

煨皂礬 五錢

用皂角水泛為丸。每服一錢。

五香丸

廣木香 一兩

沉香 二兩

降香 二兩

肉桂 六錢

檀香 一兩

王九峯治吐血丸

大生地 八兩

犀角 一兩

懷山藥 四兩

丹皮 三兩

當歸 二兩

大白芍 三兩

雲茯苓 二兩

女貞 二兩

豬肺 一個

童便浸洗。煨化。再用

藕汁一碗熬膠。加粳米粉八合。糯粉四合。和前藥搗丸。每服五錢。開水下。

兌金丸

黑丑 二錢

大黃 二錢

雄黃 三分

黃連 三分

神麩 五分

膽星 五分

青黛

熟石膏 各二兩

飛滑石 一兩

胡黃連 三分

黑大蝦蟆一個。泥包蝦蟆。煨存性。為丸。

哮喘丸

杏仁 三錢

馬兜鈴 三錢

蟬衣 二錢

桑皮 二錢五分

白果肉 二錢五分

白礬 五分

白信 三分

上藥為末。紅棗肉為丸。如棗豆大。食後冷茶送下。

男七丸。女六丸為止。即刻吐痰。神效無比。

蟾酥丸

蟾酥 二錢

膽礬 一錢

銅綠 一錢

寒水石 一錢

掃盆 五分

雄黃 一錢

硃砂 二錢

枯礬 一錢

乳香 一錢

沒藥 一錢

麝香 一錢

蝸牛 廿六個

加白芨 一錢

蜈蚣 一條

(即飛仙奪命丹)

醒消丸

乳香沒藥末 各一兩

麝香 一錢五分

雄精 五錢

共研和。取黃米飯一兩搗爛。

入末再搗為丸。如蘿蔔子大。晒乾。忌烘。每服三錢。熱陳酒送。酒醒痛息。

貴金丸

大黃 一斤

白芷 一兩

平安丸

黃沉香 二錢

丁香 一錢

寸香 三分

蟾酥 一錢

牛黃 五分

硃砂 一錢

木香 五分

月石 一錢

冰片 三分

蒼朮 一錢

雄黃 一錢

明礬 一錢

共研細末。粽尖為丸。

琥珀多寐丸

治健忘恍惚。神虛不寐。

琥珀

鈴羊角

扶神

人參

白朮

遠志

甘草

胡連追毒丸

猬皮 灸去刺一兩

胡連 薑汁炒一兩

原寸香 二分

爛飯為丸。每服一錢。酒下。

胡連閉管丸 遍身諸漏皆妙。

石決明 五錢

槐米 五錢

炙甲片 麻油炒五錢

胡連 淨末一兩

蜜丸。每服空心米湯下。

早晚兩服。如漏之四邊有硬肉突出者。加蠶繭二十個炒末。和入藥中。

七香丸

香附 三兩

麥芽 一兩

甘松 一兩

甘草 二兩

烏藥 二兩

藿香 三兩

木香 二兩

上藥為末。水疊為丸。如彈子大。

保童肥兒丸

參葉 五錢

金櫻子 去核一兩

山查肉 二兩

麥芽 一兩

建蓮 四兩

五穀蟲 二兩

茯苓 一兩

芡實 一兩

薄橘紅 一兩

白朮 二兩

使君子 五錢 肥知母 一兩 鷄內金 一兩 砂仁 五錢 青皮 一兩

地骨皮 一兩 共為細末。蓮子粉搗爛為丸。彈子大。米湯化服。腸風下血。

石榴皮燒灰調服。

祛風換肌丸

馬齒莧 二兩 熟軍 一兩 蔓荊子 四兩 連翹 六兩 浮萍草 一錢

防風 八兩 淡芩 四兩 荊芥 八兩 苦參 一錢 白蒺藜 半錢

大胡麻 一錢 黃柏 八兩 川膝 四兩 薜皮 八兩 粉皮 三兩

白芷 三兩

神效種子丸 此方云寒婦服下。且有孕。神驗方也。

大熟地 二兩 肉苁蓉 二兩 萆薢 四錢 燈草 五尺 木香 二兩

山萸肉 二兩 澄茄 二兩 大茴香 二兩 馬蘭實 陰乾研八分 乾漆 二兩

巴戟肉 二兩 蛇牀子 一兩 龍骨 二兩 全當歸 一兩 牡蠣粉 二兩

母丁香 二兩 桑螵蛸 二兩 全蠍 去毛五錢 扶苓 半兩 蜘蛛 十四個

威靈仙 二兩 兔絲子 二兩 沉香 二錢 車前子 二兩 木通 二兩

遠志肉 二兩

右各味。研細末。煉蜜丸。如菉豆大。每日清晨服一二錢。開水下。

又煎藥 每於經期時。服一劑。煎方如下。 桂枝 三分 白芍 二錢 甘草 二錢 薑皮 三錢

再加玉盆二錢棗二枚

蠟礬丸

白占 一兩
二錢

黃占 一兩

雄黃 一錢
三分

琥珀 一錢

硃砂 一錢
二分

白蜜 一錢

煉之為丸

青龍丸 治疔腫。內傷貼骨疽。癰
癧。乳串。痰氣硬塊。

番木鱉 去皮切
片四兩

炙甲片 一兩
五錢

殭蠶 一兩
五錢

研末。飯糊為丸。桐子大。每服

五分。勿冒風。臨臥時服。

頭面 羌活川
芎五分

肩背 角針
五分

兩臂 桂枝
五分

胸腹 枳壳
五分

腰 杜仲
五分

足 牛膝四分
木瓜四分

咽喉 甘草四分
桔梗四分

跌仆攣筋 當歸五分
紅花五分

酒製為引。婦人新產。服五

分。一日服五。瘰癧。桑枝炒。酒送服。

小兒一歲九丸。三歲十九丸。

四五歲十九丸。五六歲廿一丸。八九歲廿三丸。十四歲以上

四分。

雀斑丸

玉蘭花瓣

肥皂

皮硝

上藥搗爛為丸。日日洗面時搽。

龜背丸

兒茶 一錢

阿魏 二錢

乳香 五分

沒藥 五分

肉桂 二分

冰片 一分

各研細末。用猪尿和丸。貼突處亦可。

通音丸

川貝母 一兩 款冬花 二兩

炒桃肉 二兩 去皮十

白蜜

上藥研末打丸如龍

眼大飯上蒸用水冲服

消管丸

苦參 四錢

川連 二兩 酒炒

當歸

槐花

葶澄茄 各一兩

五倍子 五錢

各為細末用小籠二個(大約八九斤)真柿餅四錢二味

共煮以日搗爛入前藥末搗丸每日空心服四錢開水送下其管自出

鯉魚鱗丸 治無名腫毒

歸尾 五錢

大黃

荆芥 去梗

乳香

沒藥 各二錢

黃芩

連翹 各三錢

防風

羌活 各三錢

全蠍 一錢

蟬衣 廿個

僵蚕 廿四條

牛皮膠 一兩

雄精 七分 土炒

金頭蜈蚣 四條 去頭足

一條 用其汁塗焙乾

一條 用酥炙

一條 用香油

一條 用醋

穿山甲 四兩

一兩用細紅花

五錢煎湯土炒焙乾一兩用皂角五錢煎湯煮一兩用蘇木五錢煎湯煮

一兩用當歸入分煎湯煮焙乾為末米醋打糊為丸珠砂為衣貯瓶麝香

五分養之每服一丸滾酒下未成內消已成出膿神效

蜜犀丸 治牛身不遂言語不利小兒驚風夢搐

槐花 四兩

當歸

元參

川烏 各二兩

炒麻黃

茯苓 乳拌

防風

薄荷

甘草 各一兩

牙皂 去皮淨子炒五錢

冰片 五分 蜜丸如櫻桃大。每服一丸。小兒半丸。茶下。

仙桃丸 治手足麻痺。癱瘓。痿痛。跌仆損傷。腰膝痺痛。甚效。

川烏 四兩 五靈脂 四兩 威靈仙 五錢

七丸。或十九丸。鹽湯下。忌藥。

洗晒為末。酒糊丸。如梧子大。或

治老人不寐丸

六味地黃丸 一料 加麥冬 四兩 黃連 三錢 炒棗仁 五兩 肉桂 五兩

當歸 三兩 甘菊花 三兩 要家種者 白芥子 三兩 共為細末。蜜丸。每日白滾

水送下五錢。服後用飯。此丸老人可服至百歲云。

致和丸

熟地 五兩 厚樸 二兩 胡桃肉 十一兩 茅朮 二兩 川椒 一兩

當歸 二兩 甘草 二兩 烏附 四兩 砂仁 一兩 廣皮 黑薑煮丸一兩

戒烟丸

黨參 三錢 玉竹 二錢 粟壳 二錢 橘紅 二分 沉香 五分

黃芪 錢二 茯苓 二錢 炮薑 二錢 杜仲 二分 肉桂 五分

棗仁 一分 製半夏 一分 益智仁 二分 覆花 二分 紅棗 二兩 同煎。用

布瀝汁。再入烟灰三錢。赤砂糖二兩。同煎。薑汁和在一處。熬五日為丸。此

平淡之方。看體質用。烟癮重者。加烟。

痧丸

茅朮 五錢

天麻 六錢

硃砂 五錢

麻黃 六錢

麝香 六分

甘草 四錢

雄黃 六錢

丁香 一錢

大黃 一兩

蟾酥 一錢五分

醋泛丸

衛生丸 (廣東陳利濟出)

熟地

川芎

炙黃芪

砂仁

香附

橘紅

歸身

野於朮

條芩

元胡索

茯苓

肉桂

白芍

木香

人參

麻黃

益母草

炙甘草

胃靈丹

木香

延胡

白眼藥

月石 一兩

薺粉 三錢

冰片 五分

麝香 五分

研令極細不

細則痛。

水眼藥

甘石 一兩

月石 五錢

鰓蛸 一錢

冰片 四分

硃砂 一錢

眼藥

珊瑚 三分

硃砂 三分

薺粉 二分

珠子 四分

琥珀 四分

原寸香 三分

止嗽散 (本氏)

法半夏 八兩

冰糖 六兩

鹽 一兩

井水煎服

桃花散

熟石膏 四兩

黃丹 四錢

治火燙爛腿瘡。用菜油調。又能長肉生肌。

八寶丹

熟石膏 一兩

冰片 一分

西黃 七分

血竭 三錢

拔肉長肉。

吹藥

上西黃 二分

大梅片 三分

西月石 二兩

吹藥

西月石 一兩

冰片 二分

青黛 五分

解毒丹

青黛 三錢

熟石膏 四兩

(治同桃花散)

翠雲散

熟石膏 五錢

牛黃 一錢

銅綠 一錢

治小兒耳中漏膿。用葱管一根。

(約一寸半長) 一頭置菜油中。然後再蘸此藥置耳中。每日換二次。

珍珠散

濂珠 五錢

石膏 錢五

西黃 一分

冰片 二分

生肌長肉。

梅花丹 治一切癰腫。

每服一分半。多至三分。丸黃豆大。研末。又能敷對口瘡。

麝香 三分

冰片 三分

乳香 去油七錢

蜈蚣 五條

寒水石 三錢

同燒酒浸爛。打膩

如漿丸。

輕粉 一錢

腰黃 一兩

炙沒藥 七錢

血竭 三錢

杜蟾酥 二錢

金箔十張為衣。

虛痰方

蝙蝠 瓦上炙為末二錢

冰片 二分

摻膏上貼。

化毒丹

金銀花 二兩

夏枯草 四兩

共研細末。白蜜為丸。解熱毒如神。

柎藥 治一切火毒。

熟石膏 四兩

大黃 生晒不可炙。則無力。二兩。

天花粉 一兩

右方治一切熱毒。或用馬棊根汁調。或絲瓜葉汁。或側柏葉汁調。隨時揀

擇。又治疔溫火等症。菊花葉打汁調。

眼癬用

乾眼藥三十五文。熬鷄子油調搽。

蛇牀子散 治濕毒癩瘡疥瘡。

蛇牀子 二斤

川黃柏 二斤

生石膏 四斤

濕毒瘡。小青油調。膿滾疥瘡。麻

油調。

提泡藥 治瘡穴發。膏藥上貼去毒二點鐘。即起泡。然後用針挑之。其拔即休。

斑蝥一物 研細，搽膏藥上貼之。

紅膏藥

蓖麻子 去壳 二斤 老松香 一斤 緯丹 五錢

加麝香二錢，再打。看老嫩，老者加蓖麻子，嫩者加松香。

黑瘡藥

皂莢子 煨極透，研末調搽。

白瘡藥

蛇牀子 石膏 對半研細，用麻油調敷。比黑瘡藥靈。

膿瘡膏

膽礬 二錢 輕粉 三錢 蘆甘石 二錢 黃白占 各四兩 板猪油 一兩 以上三

味為細末。先將猪油熬炸，又入黃白占化透，再入末藥，然後調攤於油紙

黃連膏 治多年膿瘡，濕毒，血毒，結毒等症。治之神效。

黃連 五錢 黃柏 五錢 薑黃 三錢 歸尾 三錢 白芷 三錢

丹皮 三錢 赤芍 三錢 生地 一兩 合歡皮 一兩 大黃 一錢

黃芩 三錢 秦艽 三錢 紫草 一兩 白蘚皮 五錢

右藥用麻油二十兩，煤枯撈去渣。下黃白蠟各二兩，溶化收膏，入磁瓶內。

以油紙攤貼患處。

夾紙膏 治多年新起
膿瘡並效

紫草

歸身

細生地

黃柏

白芷

冬青桑

川椒 各一兩

黃白占

飛丹

蜜陀僧

血竭 各二兩

輕粉 三錢

銀粉 一兩

銅綠 五錢

乳沒藥 各五錢

冰片 二錢

用麻油一斤。入前七味煎枯。去渣。入二占溶化。再將後藥研細

和勻。攤紙上貼之。如乾加公猪油調亦可。

又方

煨石膏 一兩

蘆甘石 一兩童便煨

龍骨 醋煨三次

輕粉

寒水石 煨各五錢

嫩松香 五錢

放銅杓內。熬至黑色起烟。倒在水內候冷。用葱白煮滾。右味

以公猪油調勻。作夾膏。以葱湯洗淨貼之。將裏腳緊緊縛定。開看黑色即換。

烏金膏

治足三陰濕熱。腿脚紅腫。皮破脂膿。類乎血風瘡。浸淫不止。痛痒非常者。

先用桐油一斤。入鍋熬起白星為度。加黃蠟一兩五錢溶化。入研細炒大

黃末一斤。攪勻。再入冰片二分。攤貼。

清涼膏

專治一切熱毒瘡癤。此方是正。其前抄是又方。

長頭髮 一斤

菜油 四斤

煎枯去渣。再以活牛蒡

甘菊

金銀籐

馬鞭草

蒼耳草

仙人對坐草 各一斤

入菜油十斤煎枯瀝出。再加

白芷 甘草 五靈脂 當歸各八兩 煎枯去渣。再將煎熬髮油併入。共見斤兩。每一斤油。入桃丹七兩。熬膏攤貼。熬嫩膏再添丹四兩。煮和。

又方 (即已抄清涼膏) 日前已抄一方又得後方。就以備應用。甚好。熬法。先將油髮用文火漸漸熬至髮化為水。約要大半日功夫。次得鉛粉和入。後用丹收膏。師曰。頭髮滑滋止血。生肌長肉甚妙。若熬膏。無用別藥雜入。

玉仁膏

當歸 一兩 白芷 五錢 紫草 二錢 甘草 一兩 用真麻油一斤。將

前藥浸五日。煎至藥枯。去渣。將油再熬至滴水成珠。下血竭細末四錢。攪勻。再下白蠟二兩溶化。離火微冷。再下輕粉四錢。研細攪和成膏。

北庭丹

人中白 番礪各五分 溏鷄糞 瓦上青苔 瓦松各一錢 用傾

銀罐子二只。將藥裝內。將口封用鹽泥固濟。炭火燒三炷香為度。候冷。用罐取出。入冰片麝香各一分。共研細末。用針破舌菌。以丹少許點上。以蒲黃末蓋之。

蛇咬解毒丹 潰爛搽之神效。

野三七 一兩 膽礬 一錢 麝香 三分 白芷 五錢 五靈脂 五錢

雄黃 五錢 雄鼠糞 三錢 千金霜 二錢 小茴 一錢 白枯礬 二錢

川貝母 一兩 上味共為細末。

又洗方 (即抄在牙痛散上者)

人參胎產金丹 (馮氏方)

人參 一兩 全當歸 一兩 丹皮 一兩 川芎 一兩 元胡索 一兩

白芷 一兩 野於朮 一兩 生甘草 一兩 藁本 一兩 上桂心 一兩

白薇 一兩 赤石脂 一兩 懷山藥 一兩 沒藥 一兩 女貞子 一兩

白蒺藜 一兩 春砂仁 一兩 白茯苓 一兩 白芍 一兩 杜仲 一兩

右藥為末。白蜜為丸。如龍眼核大。硃砂為衣。以蠟固封。

一、臨產。參湯化服。一、產後。童便陳酒化服。一、經後。當歸湯化服。一、

懷孕後。每日白朮條芩化服三五丸。一、胎動不安。白蓮花湯化服。一、

屢經小產不受孕。當歸熟地湯化服。永無墮胎之患。一、勞役虛弱。中氣

不足。人參湯化服。一、勞役虛損。小黃米湯化服。一、胎漏下血。藕節棕

灰湯化服。一、姓孕。腹痛脹滿。木香磨水化服。一、姓孕赤帶。紅鷄冠花

湯化服。如白帶。白鷄冠花湯化服。一、姓孕。腰腿痠痛。桑寄生湯化服。

一、產後兒枕痛。山查煎陳酒。黑糖化服。一、橫生逆產。並子死腹中。當歸

川芎湯化服。一、胞衣不下。紅花益母草湯化服。一、頭胎交骨不開。龜

板湯化服。一、產後乳汁不得。以好酒當歸山甲煎湯化服。一、姓孕轉

胞小便不通。琥珀磨水化服。一、妊孕四肢浮腫。桑皮湯化服。一、妊孕子脹。香附腹皮湯化服。一、妊孕子癩抽搐。鈎鈎湯化服。一、經脈不調。月事參差。有餘不足。諸虛百損。癥瘕積聚。乾血勞傷。子宮虛冷。血海枯涸。一切婦人女子百病。俱用煮陳酒化服。

秘藥餅

秘藥餅六枚三錢。臨用時研極細末。每二分加後藥七味。大梅片四分。珍珠四分。西黃二分。麝香六分。輕粉一厘。礪砂二分。共為細末。和勻收貯。吹之。此餅誠不可解。七味又只六味。而云臨用再加。則似尚有上藥數味也。

神燈照

上雄精 礪砂 血竭 沒藥各二兩 麝香四分 共為細末。

專治頸項癩癧痰核馬刀失榮等症方

蛇牀子草五兩 燒酒五斤 先將瓶酒曬熱。然後入草浸之。每日早晚照

量大小服之。若症勢年數未久。服之一年。即可全愈。

一掃光小兒頭瘡等。治一切瘡疥。破皮者不用。

烟膠二斤 苦參二斤 明生礬半斤 川椒炒半斤 升藥底半斤

硫黃半斤 樟冰四兩 枯礬半斤 紅砒一兩 蛇牀子炒半斤

大楓子肉八百粒

紅銅片專治油腫

硫黃四兩

明礬二錢

紅砒五分

土硫一錢

共為細末。將藥入鍋

溶化。傾出。做成錠子。每用以毛鉢。用香油磨下。塗瘡上。

貼散膏方

升麻三錢

甘遂三錢

貫衆三錢

斑蝥廿隻

白芷三錢

苦參三錢

昆布三錢

羌活三錢

全蠍三錢

蜂房三錢

商陸三錢

海藻三錢

白芨三錢

赤芍三錢

瞿麥三錢

竹筴三錢

白斂三錢

大薊三錢

蛇蛻三錢

花粉三錢

蒼朮三錢

防風三錢

荆芥三錢

白附子三錢

薑黃三錢

細辛三錢

澤蘭三錢

稜菴各三錢

香附三錢

川草烏各三錢

遠志三錢

官桂三錢

延胡三錢

河車三錢

蓖麻子三錢

水仙根七錢

生首烏五錢

金星草三錢

野薔薇根七錢

蒲公英三錢

地丁草三錢

角針三錢

穿山甲五錢

牛蒡三錢

皂莢二塊

夏枯草三錢

忍冬藤七分

芙蓉花廿朵

巴豆肉三錢

野菊花三錢

蒼耳子三錢

血見愁三錢

防己三錢

川椒三錢

歸尾三錢

寄生三錢

王不留行三錢

草大戟三錢

木鼈子一兩

白蘚皮三錢

威靈仙 三錢

五靈脂 三錢

紫草 三錢

殭蠶 三錢

童子髮 三錢

透骨草 三錢

生薑 三錢

用大麻油十五斤。浸七日。下鍋內。熬至藥渣枯。

濾去渣再熬。滴水成珠。然後投下炒黃丹六斤收膏。

爛喉痧方

斑蝥 去足翅

麝香 三分

白芨 三分

全蠍 三分

玄參 三分

冰片 四分

京川貝 一兩

白蜜 五錢

此方斑蝥不開分兩。又用白蜜。

不知如何用法。

五效丸 治帶下弱風 尿血等症。

豆腐鍋疤 晒乾或焙新瓦上炙焦研細每兩加黃連一錢共研細末加

飯共搗為丸。每服五錢。赤帶蜜湯下。白帶砂糖湯下。

頭耳諸瘡方 眉癬及 燕窩瘡。

用肥皂煨存性一錢。枯礬一錢研細。香油調塗。

鬚髮頭瘡方 不拘大人 小兒。

獨核肥皂。去核。填入砂糖及巴豆二枚。以泥包煨存性。入檳榔輕粉五六

分。研細。香油調塗。

小兒頭瘡方

皂角煨黑為末。去痂敷之。不三次即愈。白禿肥瘡皆效。(即筆峰衛
生雜典)

狼毒膏

狼毒

川椒

硫黃

檳榔

文蛤

蛇牀子

大楓子

枯白礬

各三錢

共研細末。用茶鍾取香油一鍾煎滾。下公猪胆汁

一枚和勻。調前藥。搽患處。

治囊漏

皮厚而出水。竇方。

蒼朮

川芎

吳茱萸

歸身

官桂

木通

各八分

青木香

一錢半

黃耆

白朮

花粉

蛇盤菓

二錢

(如無甘草代之)

龍膽草

白酒煎服。

專治腎囊風

去風消癢除濕。

威靈仙

五錢

蛇膽子

五錢

當歸尾

縮砂壳

土大黃

苦參

五錢

老葱頭

七個

用水五盃煎數滾。傾入盆內。先薰候溫。浸洗。

敷藥方

炙乳沒

海螵蛸

赤石脂

各等分研末。和黃蠟化開。作餅敷之。

紮好。

藥絲線

芫花

五錢

壁錢

草烏

白扣線

水一盃。磁罐內慢

火煮乾。不晒。陰乾。遇症將絲線紮繫。每日收緊。其患自然枯黑。

耳出臭膿

龍骨煨

五倍子炒

乳香去油

枯礬

血餘炭各等分

共研細末。捲盡膿水。

摻之。

耳中膿水不乾方

膩脂

蛀竹屑

石榴花瓣炭

冰片共研細末。摻之。

專治頸項怪症丸

花椒一錢

熟礬二錢

火硝一錢

雄黃一錢

麝香六分

共研

細末爲丸。

摻舌黑虎散(泰梅初秘方)

麝香一錢

大蜘蛛七個

大蜈蚣七個

大梅片一錢

公母丁香各一錢

穿山甲七個

天蠶七條

全蠍七隻

靈磁石一錢半

火症加犀黃五分。

大濂珠五分。

癬藥

槿末

參末

薑芷散

和勻。摻之神效。

活絡丹

製川烏各六兩

膽星大兩

地龍二兩

乳香三兩

沒藥三兩

酒化日

心爲丸。每重五分。(且心疑似膽星)

林文忠公戒烟靈丹

明黨參 二錢
玉竹 二錢

茯苓 二錢
粟壳 二錢

棗仁 半錢
橘紅 半錢

心五分。薑棗砂糖湯為丸。

長肉商紅膏

老松香 四錢
潮腦 二錢

冰片 一分
麝香 一分

生地膏

細生地 四兩
白占 半兩

百部膏

百部
白蘚皮

黃栢
當歸 各一兩

厲瘋膏

大楓子肉 五錢
木鱉子 五錢

紫草 五錢
黃栢 五錢

麻油 八兩

半夏 二錢

杞子 二錢

沉香 一錢

輕粉 八分

蓖麻仁 二錢

麻油 八兩

鶴虱

麻油 半斤

各藥熬枯去渣入黃占。

生地黃

黃耆 二錢

益智 半錢

炙草 半錢

銅綠 一分

銀珠 七分

杜仲 半錢

炮薑 二錢

覆花 二錢

加上桂

黃耆 二錢

益智 半錢

炙草 半錢

銅綠 一分

銀珠 七分

黃耆 二錢

益智 半錢

炙草 半錢

銅綠 一分

銀珠 七分

黃耆 二錢

消癰散

南星

英夷戒烟丸

高麗參

西洋參

東洋參

北沙參

路黨參

菹菜子

淮牛膝

粉草各五錢

右藥用陳酒四斤浸服。癯到時服三四杯。即不知所苦。初服七日。忌猪肉。後忌醋、鴨子、蝦蟹、生冷麪食。斷癯方可食。

法製半夏（蘇州戈氏）

大半夏十斤

用陳石灰十斤

滾水泡化。待溫投半夏。日晒夜露。頻攪之。

七日取出。換清水浸三日。取出晒乾。再明礬五斤

皮硝二斤。用滾水泡化。

待溫投半夏。如前製法。晒乾。

甘草 薄荷 茯苓各一兩 陳皮三兩

白薏仁 枳實 大砂仁 木香 青皮 川芎 五味子

上桂心各五兩 丁香 沉香各三兩 生薑十斤

右藥用滾水泡。待溫投半夏。浸十四日。日晒夜露。頻攪之。至期滿後。揀出

半夏。將餘藥煎濃汁。去渣澄清。即將藥汁煮半夏。收乾為度。或為丸。或為

塊。收貯聽用。

一、凡有痰飲者。開水送服。痰從大便出。如魚鱗即愈。 一、凡有老年積痰。

陳皮茯苓湯服。一、凡中風痰厥。羌活前胡湯服。一、凡寒痰嘔噎。生薑

陳皮湯服。一、冷哮痰飲。蘇子陳皮湯服。一、肝胃厥氣。青蒿陳皮湯服。

一、三陰久瘧。生薑湯服。一、小兒寒閉。前胡陳皮湯服。一、酒濕。砂仁湯

服。一、痰迷癡癩。石菖蒲葉沖湯服。一、寒濕疝氣。荔枝核炙灰沖湯服。

小蟾酥丸 (抄硯農
選錄中)

蟾酥 一分 明雄 三分

蜈蚣 一條

研細。酒糊丸。桐子大。每服五丸。葱

湯下。

清涼散 (抄白
紅紙)

煨石膏 九錢 陳黃升 一錢

八寶丹

煨龍骨 六錢 輕粉 二錢

藥兜肚方 (抄靜香
樓案下)

乾薑 八分 官桂 一錢

白芥子 半錢

枳實 一錢

阿魏 四分

半夏 一錢 水仙子 半錢

麝香 五分

上藥共為粗末。用艾綿拌勻。大紅

沙布作夾兜肚一個。將藥置於中。

鐵箍散

三年陳小粉四兩。炒黑至烟出。取出研細。篩去粗頭。用好醋調。如薄漿樣。

然後敷之。善治一切紅白腫毒。其效如神。無膿卽散。有膿卽潰。使其不致蔓延。故名鐵箍。此方云係坊前倪氏祕方。不可以小粉輕賤之物。置而勿信。惜之惜之。

紅膏藥

卽外科至寶千提膏。倪氏家藏之方。

老松香

半斤

東丹

三錢

銀硃

一錢

用蓖麻子去壳。打成膠。

許恆君傳用法(附)

外科要用

銅春筒

鐵碾

(鐵研器) 皂角等必碾。

石白

小篩子

藥線木

大

黃切片

晒曬。然後放鐵船中研篩。篩後再放研盃中研。餘可類推。

石膏

火爐一隻。將石膏放煨。其色雪白。然後置船中研。

又石膏必須煨至極熱透。熱透要雪白。研時要去頭脚粗碎。

白。研時要去頭脚粗碎。

炒藥鏟刀

煉膏用。

鐵丫杓

絞渣藥布

煉膏火煎。急蓋之。否則藥枯。

瓶

元。末藥五十個。大丸瓶葫蘆三四個。小丸者五個。

煉膏者。必須場上用行灶鐵鍋。先配料。東丹宜用

真。叫藥店人值事。大約數百文。

藥是蘇辦。

九一丹

即清涼藥加青黛。名生解。且又賤又靈。

用石膏十成。黃升一成。長肉甚良。研要細。

有。無毒。長。

馬氏八寶丹

發背長肉。必須用。甚靈。

陳小粉

炒至黑如漆。用醋調搽陰症合宜。如痰塊立小。手掌大者。可收至手心樣。

症候好時。如發毒背症。上半有膿。下半無膿。半長半拔。白腐者。毒也。紅鱗者。新肉也。拔毒長肉之藥。要研至無聲為度。不然。非但痛。且不靈。舌

齒出血。炒蒲黃末吹之靈。

大櫺架一隻

下木架之。硬木為之。高與人高。如方方各式。臨地作抽屜。架心陷以放鉢。架左右立兩木。上橫木架之中鑲。圓空柄杆承之。

圓藥鉢

小帚三把。研藥線木

秤二根

針一只

匾一對

晒丸者。霉潮及僵腐等用。

做攤膏

藥布

先買青紅之布。大約三四十一尺。以洋皮紙糊。榆白皮麪帚掃揩

之。以二層為度。厚者一層。背後貼向牆壁上。待乾用。

攤膏藥法

鐵鍋一隻

下放爐。在中底。放鐵蓋。一點。燃燈草熏。洋鐵針卷攤。

剪油紙刀一把

薄油紙

小大裁。照白

紙五十張。包藥用。

膏藥用法

傷風頭痛等用紅。除毒流注用青。

白銅匙

大四把。小二把。

藥竹店做結實者。

敷藥 多攪則粘滯。搗軟而不烈。去敷。藥看去。汗孔有汗乃藥氣散。

毒門不看。

藥瓶塞頭

凡貼傷膏 用生薑擦再貼。則藥氣速。無他慮。

除毒貼膏

亦宜如上。外食鹽噴炒。散在膏上。摩運及薑片艾灸等。

熬膏先備

柳木棍。俟藥須攪時。入攪之。以膏黑如漆為度。其亮如鏡矣。攪勻。傾於水

內。要用扯一塊用之。

大蓋缸 綠者。敷藥。貯三只。

小蓋缸 四只。碗店取。則貯去解涼血。

毛缸盆

置長肉膏。

頭風膏

以肉桂。丁香攪膏貼。熱痛薄。荷末。白芷末入之。烘熟用。

陽和膏

另編。

疳腐小膏用油

紙 貼敷膏場。面用布。

灸法

方磚小座。新瓦仰如盂。瓦下注火。磚需用七八塊。

煉蜜 蜜注銅杓。下放薑片燻之。

牙片

一根。壓去看喉。及調

敷藥

代刀藥

闊則口大。厚則口深矣。

敷藥

似成留頂。未成編敷。瘡痒之瘡已開者。不宜用。

摻藥筆

舊筆去頭。染著摻。

大

毒未盡。不可生肌。生肌逼毒內攻。或別生瘍矣。半腐半肌。即去腐生肌。

凡腫高赤痛。

敷涼藥。

漫腫不紅不痛。似有頭。

敷溫散。

生管者忌。

走動下。

疔。以銀針刺頭。然後

以拔疔散用之。

燒膏藥。桐油一斤。鉛粉頭髮。五日可做。先武火。後文火。不熱要燒焦。宜丫

又擊鍋蓋上。防燒成焦塊。空地上防失慎。

有油之巴豆。穉仁。宜紙包。石

壓去油。

外症如乳。內疽。發背。對口。宜三復詳看。然後用藥。勢大躋。求功效。聽

別就。瘍先發散。後託補。虛則用之助膿。

膿未成宜消者。按之堅。不熱

多紅。

用膏藥法。瘍堅而屢塗難陷。突者不用。如深而膿左右注乃用。

瘍潰。膏藥不可嫩。宜老而薄。庶易於貼耳。惟貼傷要嫩。

瘍虛漫輕。實高腫。熱腫紅堅。寒瘍木黯。濕腫按如爛棉。破則流黃水。風

腫皮皺紅微熱。痰腫軟如棉。硬如縵。不紅不熱。氣腫按之皮緊肉軟。遇喜則軟。怒則長。

不紅不熱。跌仆瘀血腫。不熱不紅。暴腫已成。如潰。其色必紫。

瘍屬陽。十四日熟。屬陰。念一日熟。無膿不軟。膿熟方軟。未成按之即起。

已成深按速起。則有黃水。深按緩起。內有污膿。

按之實痛。是血。按之實而不疼。是氣。輕按即疼。是膿成。

重按方痛。膿深。胖人膿宜多。瘦人膿宜少。膿出後。切忌用寒涼。屬火者。

去膿後。宜平性藥。近筋處。凡症起痒者。宜灸之。

癭瘤結核。不宜開刀。近毛髮之瘡。須剪去毛髮。貼膏。以免粘疼。

諸瘡及跌打。一經室房。立時作痛。婦人刀傷。遇經來。瘡必痛。四物柴胡

湯。打傷皮不破。必內有瘀。宜攻之通之。痛十日。好期二十日。

毒氣攻心。護心散不及。急服白沙糖三四兩亦可。

王洪緒有言。惟疔用刺。禁用升降二丹。以防腐爛。

癰疽遺精者。須看好而治。痔病亦然。大癰須戒污穢。如行經婦人近前。

腫痛更甚。難以收功。如婦人自想。適經來。醫治鮮效。經後始能見功。亦忌

房。長肉藥少許。卽結靨。若多蓋就硬。反要攻膿。症未輒者。不可敷寒涼。若半腫半黯。宜帶辛熱。

其症腫痛起。渴大便祕。或是陽。專治寒涼藥。焮腫作痛。寒熱頭痛者。皆在表也。發散之。焮痛作痛甚者。邪在經絡也。和解之。漫腫痛而不潰者。血氣虛弱也。急托補之。色黯而不潰。或潰或不斂。陽氣衰也。溫補之。

若大便結。邪在內也。疎利之。薛立齋謂。形傷痛。氣傷腫。皆因厚味炙博。食毒所致。無問何部。但赤腫者必消。若煩躁飲冷。赤痛發熱。二便不通。火熱內熾也。四味清涼飲。或活命飲加大黃。微

腫紅腫痛。陽氣虛弱也。參耆內托散。微黯惡寒。不作膿。或熟而不潰。陽虛寒也。千金托裏散。如此則未成立消。

潰瘍若膿潰後。二便仍閉者。毒未解也。清熱消毒湯。熱退而渴不退。津液不足也。

八珍加麥冬。熱不止。腫痛反甚。虛熱內作也。保元湯清心淨血之品。熱退而渴不退。津液不足也。

熱退。肌肉不生。十全大補。瘡白下陷。寒氣烈也。五味異功。手足並冷。六君子加薑桂等。

〔骨槽風〕清胃散 牛蒡解肌湯 (又方) 鮮石斛 元參 鈴羊角
〔牙漏〕 玉女煎 (牙散牙宣牙疳) 清胃散 玉女煎 犀角地黃湯 涼膈飲

牛蒡解肌湯 蘆薈消毒飲 (又方) 鮮石斛 炒山梔 元參 桑葉
杏仁 花粉 連翹 薄荷 麥冬 雪梨汁 荆芥 鈴羊角 淡

芩 淡豆豉 瓜蒌 忍冬藤 鮮薄荷根(牙岩) 犀角地黃湯 甘露飲

玉女煎 瀉黃散 清胃散加石決明 〔走馬牙疳〕犀角地黃湯 〔又方〕鮮石斛

荆芥 元參 前胡 忍冬藤 牛蒡 連翹 葛根 豆豉 薄荷

六一散 香薷 蟬衣 青蒿 黑梔 丹皮 白薇 茅根

〔肺癰腸癰方〕 竹燈臺一隻 燒紅時 閃息之 研為細末 陳酒送下。

〔癰疽煎方〕 金銀花六兩 甘草二兩 皂角刺五錢 水酒煎 一劑立消。

〔乳癰方〕 白芷 貝母八兩 為末 酒服之。

〔疔瘡初起〕 白芷 生薑一兩 搗酒一盞 溫服。

〔喉症方〕 鮮竹葉一把 煎湯常服。重症鮮石斛五錢 醋少許 冷飲。

〔口舌瘡方〕 黃栢一錢 殭蠶一錢 枳殼灰五分 炙草末五分

薄荷末五分 冰片三釐 山豆根五分 各為末 一日拌三次 明日愈。

〔中焦統治方〕 金銀花 元參 生草 白芍 炒梔子 荆芥

連翹 桑寄生 如屬陰 去梔子 加桂末。

〔下焦統治方〕 天花粉三錢 生草二錢 銀花三錢 蒲公英五錢

〔上下統治方〕 生甘草二錢 蒲公英二兩 黃芩一錢 銀花三錢

煎乳香沒藥各一錢調服。

〔上消癰毒散〕 金銀花一兩 當歸一兩 川芎五錢 蒲公英三錢

生甘草 五錢

桔梗 三錢

黃芩 一錢

荊芥 一錢

連翹 二錢

牛蒡 一錢

芙蓉葉 一片

〔上中下皆治方〕

金銀花 四兩

蒲公英 一兩

當歸 三兩

元參 一兩

〔疹痧方〕

草麻 三錢

元參 一兩

乾葛 二兩

青蒿 二兩

黃耆 三兩

〔喉痛方〕

生地 一兩

粉丹皮 四錢

白芍 二錢

麥冬 六錢

川貝 三錢

甘草 三錢

元參 五錢

薄荷 二錢

青菓 五個

〔乳岳方〕

青皮

石膏 (行活)

生甘草節 (消腫 導毒)

瓜蒌

橘絡 (行經 絡)

皂角刺 銀花

(此症不可用刀) 因寒痰結凝當用陽和湯外敷宜留意不可寒涼。

〔乳癰方〕

金銀花 五錢

白芍 二錢

青皮 一錢

蜜耆 三錢

柴胡 一錢

連翹 一錢

當歸 三錢

蒲公英 五錢

生草 一錢

鮮橘葉 十片

砂仁末 四分

〔又方〕加浙貝 白芷

靈仙

夏枯草

天冬

〔肺癰方〕

元參 八錢

麥冬 八錢

生草 一錢

銀花 一兩

〔女人羞隱治方〕

白芍 三錢

川芎 一錢

熟地 五錢

當歸 三錢

甘草 一錢

柴胡 一錢

白芥 四錢

黃芩 三分

炮薑 三分

症熱加梔子 三錢

〔又方〕痛痒兼治

當歸 五錢

梔子 三錢

白芍 五錢

柴胡 一錢

茯苓 五錢

棟樹根 五分

有火加黃芩 一錢 有寒加桂 一錢

痢之能愈也。此皆治熱痢之法。而沉寒者亦有。不可泥定是熱。平日元氣虛弱。口食生冷涼物。以致胃寒下痢。脈來沉細無力。四肢厥冷。可爲辨也。宜用理中化滯湯。不但冷痢如此。卽熱症變冷者亦往往有之。李東垣云。久痢不止。著眼久痢二字各症不減。或反加重。竟作虛治。用補中湯。加炮姜一升。一補。虛回而痢自止。如小腹重墜。切痛奔豚。加肉桂破故紙。誠確論也。痢家雖不禁食。只宜清淡柔爛。少吃爲妥。生冷麪食俱不相宜。厚味尤當禁之。至于五色兼下者。如魚腦髓者。或下烟塵屋漏水者。大孔如竹筒。唇似硃塗者。皆難治之症也。

又有熱毒痢者。水穀傾囊而出。一晝夜間八九十行。此則腸胃爲熱毒所撓。宜從裏治。裏急後重者。宜用大黃黃連甘草大劑下之。若無裏急後重。宜用芩芍調中湯。加黃連肉桂。蓋暑邪據於腸胃。涼藥入口。隔拒而不納。少加肉桂。引涼藥直達熱所。有如嚮導之兵。人所不知者也。若脈來沉細無力。八九十行者。又爲氣虛下陷。非前法所可治也。

下痢噤口者。胃中濕熱之毒。薰蒸清道而上。以致胃口閉塞。不欲飲食。古方倉廩湯。散其內中熱毒。非散表也。後以倉連人參湯。頻頻與之。服之不應者。多主于死。初起胸中不寬。不欲飲食者。胃中有痰有食。非噤口也。又有血痢者。純紅散血。不與糞雜。故爲血痢。若有血又有糞者。謂之便血。非血痢也。此因飲食傷脾。中州鬱結。不能攝血。所以血從大孔而下。亦用芩芍調中湯。若脈來細數。胸中如故者。宜用柴胡四物湯。加地榆烏梅之

類勿以血痢為拘耳。

丹溪云。先水瀉而後便膿血者。脾傳腎也。為賊邪治之難愈。先膿血而後水瀉者。腎傳脾也。為微邪治之易痊。論雖如此。又當看其輕重。先瀉後痢。固為難治。若下痢不甚。豈難治乎。先痢後瀉。固為易治。若瀉多不止。豈易痊乎。

世有痢兼瘧者。當以治痢為主。不必治瘧。若瘧後變痢發泄已盡。必無暑熱之毒。宜以資生丸調理。其有恣意飲食。釀成痢疾者。又不拘于此例也。柴胡化滯湯

柴胡

黃芩

甘草

丹參

當歸

枳殼

厚朴

山查

木香

檳榔

柴芩甘草。用之以治暑也。枳朴山查。用之以消食也。河間曰。行血則便膿自愈。故用丹參當歸。調氣則後重自除。故用木香檳榔。此方不但初病宜用。即久痢身熱者。亦宜用之。金匱云。下痢脈反弦。身熱汗出者自愈。夫久痢之脈。深入陰分。沉細微弱矣。忽然而轉弦脈。全是少陽生發之氣。用此逆流挽舟。邪從外散。寧不愈乎。若脈沉細滑。表裏無熱者。脾氣鬱結。加藿香一錢。更有殊功。

朴黃丸

大黃四兩

厚朴二兩

酒煮 汁妙

芩均調中湯

枳殼 厚朴 山查 黃芩 白芍

丹參 桔梗 檳榔 澤瀉

熱盛加酒炒黃連

芍藥健脾湯

山藥 扁豆 石斛 萎蕤

沙參 白芍 陳皮 白茯苓

山查 神麴 花粉

連芍補中湯

人參 白朮 甘草 黃芪 陳皮

升麻 柴胡 白芍 黃連

久痢宜忌當歸。以其潤下故也。去升柴加阿膠地榆尤妙。

資生丸

人參 三兩 白朮 二兩 甘草 一兩 白茯苓 兩半 山查 二兩

神麴 二兩 麥芽 兩半 陳皮 兩半 桔梗 五錢 山藥 兩半

扁豆 三兩 苡仁 三兩 藿香 五錢 芡實 兩半 澤瀉 五錢

黃連 三錢 五分 白蔻 三錢 五分

蜜丸彈子大

理中化滯湯

人參 白朮 炮姜 甘草

砂仁 厚朴 藿香 陳皮

寒甚加肉桂

倉廩湯

人參 白茯苓 甘草 羌活

獨活 柴胡 前胡 川芎

枳殼 桔梗 陳倉米 石蓮肉

本方不用人參。服之無效。脈沉者。宜加藿香。

倉連人參湯

黃連 七錢 陳倉米 三錢 人參 五錢

脈洪實者。去人參名倉連煎。

外治法

用大田螺一枚。搗爛如泥。入射一釐。納入臍中。引熱下行。胃即開矣。

此法曾經試之效捷

香連丸

木香 一兩 黃連 二兩

泄瀉

泄瀉者。胃與大腸之病也。此因飲食不調。脾胃不能運化。小水併於大腸。故令作瀉。脈來沉滑。腹中作痛。宜用胃苓湯加減。以其積滯在胃。氣不宣通。稀糞旁流故也。若久瀉不止。脈沉細緩。按之無力者。是為脾虛。宜用健

脾丸參苓白朮散之類。甚則用八味地黃丸。補命門火以生脾土。此不易之法也。但泄瀉之病。虛寒者固有。而虛熱者亦多。如下多亡陰。津液不足。脈來細數無力。甘溫毫不可投。宜用脾腎雙補湯。此外又有數症。條分縷析。治之方不誤耳。

積瀉者。腹痛而瀉。瀉後痛減。瀉去稍寬。偶然而起者。謂之食瀉。法當消食分利。若不時舉發。定因脾土虛弱。不能運化。以致食停作瀉。初起必先消食。方可用補用溫。世人概言脾瀉。驟用溫補者非也。大約脈實有力。宜用胃苓湯。脈細無力。宜用半消半補。脈之有力為實。無力為虛。

痰瀉者。或多或少。或瀉或不瀉。中焦有痰。飲食入胃。裹結不化。所以作瀉。脈滑有熱者。宜用枳朴柴陳湯。脈來弦細無力。宜用香砂六君子湯。火瀉者。腹中痛一陣。瀉一陣。後去如湯。後重如滯。此因濕在腸胃之中。火在腸胃之外。宜用清熱柴苓湯。甚則完穀不化者。火性急速。不及傳化故也。

冷瀉者。鼻吸風寒之氣。口食生冷之物。皆能作瀉。此暴病也。宜用香砂理中湯。若久瀉之後。脈細皮寒。病涉大虛。宜于前方更加桂附。若加之不以食。危篤難醫。至于完穀不化。初起猶為胃寒。治之可愈。久則胃氣已絕。斷主于死。

濕瀉者。腹中不痛。所瀉皆水。辨證精詳或遍身發腫。身熱脈數者。病屬于陽。分別陰陽初起宜用分消飲。久以柴苓湯主之。若肢冷脈細。元氣大虛。宜用消腫

健脾湯。即金匱腎氣丸。亦宜服也。

又有肺燥作瀉者。人所不知。秋傷于燥。內熱咳嗽。肺中之火無處可宣。傳于大腸。故令作瀉。宜用清金潤燥湯。潤肺兼潤其腸。則泄瀉自止。若誤認脾虛。而用溫補。非徒無益。又害其肺也。治者詳之。

又有脫瀉者。水穀皆下。日有百次。不但糟粕瀉盡。並腸中所蓄之黃水。俱已竭盡而無餘。所以平人時泄黃水。即是脾壞之候。皆主于死。不易治也。加減胃苓湯。

蒼朮

厚朴

陳皮

甘草

赤茯苓

豬苓

澤瀉

山查

桔梗

平胃而用蒼朮。取其雄壯上行。發越脾氣。脾氣一行。則鬱結自開。若單用沉降之藥。胃反不能開也。但脈來沉緩者可用。滑數者勿與。以其燥能助火故也。至于豬苓。雖能滲濕。脾濕不甚者。服之必傷腎水。不可輕用。若兩肋作脹。因于氣鬱者。宜加香附青皮之類。

人參 二兩

白朮 三兩

白茯苓 二兩

甘草 一兩

山藥 二兩

篇豆 三兩

芡實 三兩

蓮肉 二兩

澤瀉 一兩

陳皮 一兩

山查 三兩

參苓白朮散

人參

白朮

白茯苓

甘草

山藥

脾腎雙補湯

菟仁

桔梗

砂仁

蓮肉

人參

山藥

菟豆

車前子

兔絲子

枳朴柴陳湯

山萸

白蔻

石斛

陳皮

柴胡

黃芩

半夏

甘草

陳皮

香砂六君子湯

枳殼

厚朴

赤芍

陳皮

人參

白朮

白朮

甘草

陳皮

清熱柴苓湯

半夏

藿香

香附

陳皮

柴胡

黃芩

半夏

甘草

赤芍

香砂理中湯

豬苓

山梔

赤芍

赤芍

人參

白朮

炮姜

甘草

香附

砂仁

藿香

分消飲

滯多加厚朴

羌活

白芷

柴胡

川芎

枳殼

山查

陳皮

猪苓

澤瀉

熱盛加山梔黃芩。

消腫健脾湯

人參

白朮

白茯苓

甘草

車前子

澤瀉

厚朴

苡仁

炮姜

附子

陳皮

山藥

凡久瀉脾虛以及發腫俱宜用此。

清金潤燥湯

沙參

萎蕤

苡仁

山藥

石斛

黃芩

白芍

桔梗

甘草

地骨皮

陳皮

芡實

八仙糕病後調理
脾胃長方

白朮四兩

白茯苓四兩

山藥八兩

蘆豆八兩

芡實八兩

蓮肉八兩

苡仁四兩

老米粉二斤

白糖二斤

四神丸

肉蓯二兩煨
熟去油

補骨脂四兩

五味一兩

吳茱萸水浸炒
一兩

姜煮紅棗為丸補命火益
脾胃要劑

疝氣

夫疝者痛也。重墜如山。故名曰疝。皆厥陰肝經之病。與腎經絕無干涉。自素問而下。皆以爲寒。東垣丹溪以爲先有濕熱。又被風寒外束。所以作痛。然疝有多端。不可以濕熱盡也。卽以濕熱言之。初起舉丸腫大。惡寒發熱。脈來弦數。不時舉發者。奔走勞碌。飲食鬱結。水穀之氣。陷于至陰。卽爲濕熱。非水穀之外。又有濕熱也。諸書泛言濕熱。而水穀之氣。毫未言及。所以治之不應。予從金匱論中。見其言疝言脚氣。以及腿縫生核。疝腫不消。皆言水穀之氣下注。則疝氣之由食積明矣。其寒熱脈數。全是勞倦傷脾。氣道錯亂。失其運行常度。鬱生寒熱諸症。豈盡感于風寒乎。予用柴葛二妙湯。散其勞倦之火。繼以柴胡化滯湯。消其食積。不但目前立愈。併疝氣之根永除不復作矣。此古人隱而不發之義。經予一言道破。治疝之法。了無疑義也。又有微寒微熱。脈雖洪弦。按之無力者。氣虛下陷。與前症迥不相同。宜用橘練補中湯。其腫自消。以上二症。卵皮雖腫。其色如故。若紅腫大痛者。謂之囊癰。熱多濕少。血熱下注。日久血化爲膿。最難調治。初用清肝滲濕湯。七八日後。腫而不潰者。宜用滋陰內托散。已潰之後。全要舉丸懸掛。毒從外散。可保無虞。若囊皮脫落。連及舉丸。法在不治。此皆疝家常見之症。而亦有不恒見者。條分于左。以備採用。

七疝症治

寒疝者。囊冷如冰。堅硬如石。陰莖不舉。或控舉丸而痛。此因坐臥石地。寒月涉水。外感寒濕而然。脈沉細緩者。宜用補中湯。加桂枝細辛之類。若脈

來滑大有力。標寒束其本熱也。亦用柴葛二妙湯。若原有疝氣反縮入內。聚于小腹。疼痛異常者。陰寒夾食積聚不通。宜用蟠葱散。

水疝者。皮色光亮。狀如水晶。脈來弦數者。病爲陽水。宜用龍膽瀉肝湯。恐其腫痛不消。必致作膿。脈沉細緩者。又爲陰水。宜用五苓散。

筋疝者。陰莖腫脹。挺縱不收。或有白物如精。隨溺而下。得之春方。邪淫所使。龍膽瀉肝湯。清肝滲濕湯。俱可量用。日久病深。宜用滋陰地黃丸。

血疝者。狀如黃瓜。居陰毛之上。俗名便癰者是也。若在腿縫之上。左爲魚口。右爲便毒。非血疝也。治之之法。亦照囊癰調理。

氣疝者。不痛不癢。但覺腫墜。此因氣怒鬱于下焦。宜用柴胡平肝湯。日久氣虛。亦用橘練補中湯。其在小兒名爲偏墜。得之父精怯弱。強力入房。因而有子。胎中病也。亦用橘練補中湯。

狐疝者。晝則腫墜。夜則入腹。按之有聲。如狐之晝出而夜歸也。故名狐疝。治之難愈。橘練補中湯。入味地黃丸。審而用之。

癩疝者。陰囊脹大如升如斗。俗名沙疝是也。每見身死之後。疝氣全消。可見陰囊之大。全是氣虛下陷。苟于未大之前。常服橘練補中丸。亦可免其

漸長。不可誤認水腫。妄用針刺。景岳以疝病屬氣不疎治宜舒氣爲主是創言也若遇七疝皆屬氣凝治以舒氣則凝者散而疝自愈矣

柴葛二妙湯

柴胡

黃芩

半夏

甘草

乾葛

赤芍

蒼朮

黃柏

枳殼
橘練補中湯

厚朴

川芎

香附

人參

黃芪

白朮

甘草

當歸

陳皮

升麻

柴胡

橘核

川練子

白芍

小茴香

此方雖能升提下陷。氣虛甚者。無參則不效。

清肝滲濕湯

當歸

川芎

白芍

熟地

柴胡

黃芩

山梔

龍膽草

花粉

甘草

澤瀉

木通

熱盛加黃連。治疝氣偏墜腫不可忍附方。楸子一錢炒黑色為末入鹽三分空心黃酒調服。

黃酒調服

滋陰內托散

當歸

川芎

白芍

熟地

黃芪

澤瀉

皂角刺

穿山甲

又方杏仁去皮尖

茴香各一兩

葱白焙乾五錢

共為末。每服五錢。黃酒調服。嚼核桃肉嚥下。

蟠葱散散寒利氣之主方

蒼朮

三稜

砂仁

丁香

肉桂

八角茴香丸

玄胡

白茯苓

甘草

葱白

山查

枳實

大茴

吳萸

荔枝核

龍膽瀉肝湯

龍膽草

連翹

生地

黃芩

黃連

山梔

歸尾

甘草

澤瀉

車前子

木通

大黃

柴胡平肝湯

柴胡

黃芩

半夏

甘草

白芍

川芎

香附

脚氣

脚氣者。腿足腫痛也。腿足之下。乃肝脾腎三陰所主。三陰之脈。起于足之中指。若當風洗足。或汗出風吹。風邪客之。上動于氣。故名脚氣。初起不覺。因他病乃成。即如腿足紅腫。惡寒發熱。脈浮弦數者。素有風濕。又遇奔走勞役。飲食鬱結。水穀之氣。陷于至陰。故成此症。宜用柴葛二妙湯。散去表邪。再用寬中化滯之劑。自無不痊。大便不通者。法當下之。至于白腫不紅者。其候有寒濕風濕濕痰之分。寒濕脈沉細緩。多因坐臥濕地。寒月涉水。濕邪在表。未鬱為熱。宜用補中湯加桂枝獨活之類。日久寒鬱為熱。不可以寒濕論也。風濕脈浮弦細。微微帶數。風傷氣分。未入于榮。所以白而不

紅。治以發散爲主。不宜大涼。常用疎風勝濕湯。若夫脈來弦數。白腫不紅者。此屬濕痰。宜用柴陳四妙之類。不可以濕治也。

又有乾脚氣者。不腫不紅。但骨內酸痛。其候有輕重之殊。輕者痛而不甚。脈浮弦細。微微帶數。亦用疎風勝濕湯。重者惡寒發熱。脈浮弦急。痛而難忍。亦因水穀之氣下陷。宜用柴葛二妙湯。餘邪不解。可用除濕養榮之劑。外有脚丫出水。雖由濕熱所使。亦必有風。當以養血除濕爲主。少佐以防風獨活。方爲盡致。至若足跟作痛。多屬陰虛。用六味丸。加苡仁木瓜杜仲五加皮之類。斯得之矣。

柴葛二妙湯

柴胡 黃芩 半夏 甘草

赤芍 乾葛 蒼朮 黃柏

厚朴 山查 木瓜 檳榔

此卽疝氣門去川芎香附。加木瓜檳榔是也。

疎風勝濕湯

紫蘇 乾葛 柴胡 川芎 陳皮

半夏 前胡 苡仁 木瓜 續斷

枳殼 香附 黃芩

柴陳四妙湯

柴胡 黃芩 半夏 甘草 陳皮

白朮

蒼朮

黃柏

防風

金銀花

貝母

花粉

山梔

除濕養榮湯

當歸

川芎

白芍

熟地

黃芩

知母

木瓜

苡仁

續斷

五加皮

牛膝

杜仲

車前子

獨活

防風

秦艽

痿症

痿者足痛不能行也。凡人壯歲之時。氣血未衰。或年及五旬。形體不甚瘦弱。多因濕熱傷脾。不能束骨。未可即以痿論也。蓋熱傷其血。則大筋為之軟短。熱傷其筋。則小筋為之弛長。所以機關不利。宜用滋筋養榮湯。脈沉細緩者。宜用獨活寄生湯。至于年過五十。形體怯弱者。此屬痿症無疑。內經曰。肺熱葉焦。五臟因而受之。發為痿躄。又謂治痿必主陽明。蓋言陽明胃土。為諸筋之宗。腎水不足。不能上制心火。火來刑金。無以平木。肝邪得以尅賊脾土。而痿症作矣。治當補腎水之虛。瀉心火之亢。使肺金清而肝木有制。脾土不傷也。大凡初起身熱。脈來洪數。腿痛甚而難忍者。心火流于下焦。內經所謂陽精所降。其人死者是也。宜用六味地黃湯。加犀角牛膝木瓜麥冬之類。若脈來細數。痛而不甚者。宜用加味地黃湯。肥甘厚味。辛熱煙酒。槩不可嘗。恐助肺家之火。痛愈甚也。然痿症固屬肺熱。若陽

明氣虛。宗筋失養。亦令足痿。宜用加味人物湯。至于先天命門火衰。又宜大造地黃丸之類。不可拘於一法也。

當歸	川芎	白芍	熟地	續斷
杜仲	牛膝	木瓜	苡仁	車前
五加皮	麥冬	石斛	獨活	秦皮
獨活寄生湯				
獨活	細辛	當歸	防風	杜仲
桑寄生	川芎	熟地	桂枝	甘草
秦朮	牛膝	白朮	人參	
加味人物湯				
人參	白朮	白朮	甘草	
當歸	川芎	白芍	熟地	
阿膠	續斷	天冬	杜仲	
山黃	枸杞	五味	黃芪	

序

今之論醫者曰。中醫善治內證。西醫長於外科。詢其何以知其然也。則曰。西醫精解剖。斷截。滌洗。目爲常事耳。是言也。謂目下之中醫則可。謂古昔之中醫則不可。蓋古之醫師類多解此。扁鵲華佗。尤其著者。試讀山西醫學雜誌。（纂輯中西解剖病理）一通。當知吾言之非妄。然斯妙法神技。何爲不傳。至今日而與西人頡頏耶。曰守祕而已。

余謂中醫之日漸陵替。西醫之月異日新。其因雖有種種。而守祕與公開。實爲至大之原。蓋學理以研究而愈明。方劑以試用而的知。設有新理良方。惟知自祕。不肯公佈。微特不能更有發明。卽此一端。亦必終歸湮沒。吾國醫界。不明乎此。以致古醫麻醉。剝割之術。失傳於後世。反使西醫後進。矜炫其法。撫今思昔。能毋慨歎。爲今之計。亟宜開誠佈公。相互研求。一掃向日守祕之惡習。則中華醫學。庶有豸乎。

凌師曉五。有清吳郡之名醫也。學問淵博。精驗宏富。家藏醫書。奚啻萬卷。胥熟讀精思。舍短取長。故爲人治病。輒多奇效。惜冗於診務。乏暇著述。所作僅數種耳。『醫學薪傳。』『飼鶴亭集方。』已由哲嗣合刊流傳。尙有『方外奇方。』『凌臨靈方。』『本草害利』等書。未付剞劂。今歲裘公有三三醫書之創刊。圭思中醫外科之見拙於人。良由外科佳籍鮮於流通所致。爰將凌師方外奇方一書。商諸裘公。編入印行。并綴數語。以告世。

醫。至本書所列各方。實凌氏一生經驗之所萃。用者自知其妙。無待不佞之喋喋也。

民國十三祀四月。沈仲圭謹序。

重刻序

世人對於中西醫學之評判。輒謂西醫擅外科。中醫精內病。按之實際。西醫診療內病。固多特過中醫之處。中醫對於外科。詎無捷效良方。以內外科疾患衡量中西醫學之高下。實至無據之談也。今就簡冊所載。撮述數事。以明中醫確有愈外症之經驗效方焉。冷廬醫話卷五云。同邑鄭拙言學博。性喜單方。言其經驗最靈者有四。道光壬寅年。館樂平汪軍門家。糞門前。腎囊後。起一堅塊。漸覺疼痛。虛寒虛熱時作。案頭有同壽錄。檢一方云。一跨馬癰初起。用甘草五錢。酒水各一盃煎服。一如方服之。塊漸軟。次日略出清水。不數日全愈。一（圭按跨馬癰卽懸癰。喜多春香城亦認粉甘草膏爲此症良藥。）毛達可便易經驗集纏喉風祕方條下云。一常熟趙氏祖傳纏喉風藥甚效。而方極祕惜。一日趙氏子與友章某飲。詢其方不答。酒次趙喉間痛不可忍。乃大聲曰。爲求豬牙皂角來。一來則細搗。以醋調入喉。五匙。嗽痰大吐。痛立止。餘藥塗頸上。乾則易之。其乳蛾卽破而愈。後章傳人頗衆。（圭按皂角治喉風。李氏綱目亦極言其效。）梅氏驗方新編天虛我生弁言云。一先慈每年必以芙蓉花浸鹽鹵中。明年

夏日小兒有患瘡癰者。數之立愈。又以初生之鼠。漬菜油中。患湯火傷者。得此立止其痛。又於梅雨時捕集蜈蚣。與梅子同醃。遇喉症輒應。手而愈。予皆親身所曾實驗者也。『南京醫學報第五期包蘅村曰。』咸豐十一年及同治二年。先父行醫香港。是時港埠未闢。居民猶鮮。風俗強悍。不受法律。且好食禾蟲。以故下流社會之人。每患疔毒。一患疔毒。又不肯忌葷。故走黃之症。獨多。先父每以芭蕉根搗汁。令冷飲之。雖徧體走黃者。無不愈。『上舉四例。雖病之輕重不同。而收效之速則一。且余所述。僅四事耳。若博稽方書。類夫此項之紀載。與良方。正難屈指而計。詎醫籍所記。盡皆子虛烏有耶。故余以爲中醫外科之治療。除器械消毒。手術外。其餘方藥。正不讓泰西醫術也。仲圭少習內科。於王香巖夫子。讀書之暇。錄有方外奇方。凌臨靈方。醫學體用等書。業由吉生先生采入三三醫書行世。廼者。上海世界書局輯印珍本醫書集成。宣揚國粹。良足欽佩。仲圭寢饋此道。垂二十年。深信中醫之效。方妙藥。不至廢棄。故於本書重版之日。再抒其管見。以就正世之賢達焉。

民國廿五年四月下浣。杭州沈仲圭敘於糧道山。

弁言

溯此藁之藍本。由一雲游戒德僧。雅慕我湖城南道場山碧痕湖。天然山青水綠。鍾靈毓秀。文筆峯高。生成一幅好圖畫。爰駐錫於飯雲禪院。此僧

深知醫理。外科尤精。出其技以濟世活人。遠近聞名。求治者衆。日無暇晷。道場浜以費姓爲大族。卽明末刺虎費官娥之母族也。子若弟從僧爲師。襄事之。僧因佛家以慈悲爲本。方便爲門。經年不辭勞苦。遂致一病圓寂。彌留時。將渠經驗祕藏。修煉昇降膏丹方藥抄本書。傳授費氏子弟。繼續施送。故名其書曰方外奇方。緣我師曉五胞伯。昔從下昂村吳古年太夫子門下時。與五湖散人大錢口外科名醫費大鰲先生同學。彼此友愛。莫逆。得獲此稿。照方修施合治。頗有效驗。什襲珍藏。旋以避難新市之東。新開河時。蘇州僞忠王李。湖州僞慕王楊。聞名延治。鎗林彈雨中。嘗以活雞皮及桑根白皮。縫補刀傷頭頸。用麻醉藥。剖挖中鎗子彈。皆得此書膏丹之力爲多。詠成童舞勺時。侍診於傍。親眼目覩也。湖郡克復。歸返里門。日夕應診勤勞。我師致構環跳癱。附骨疽。盧醫不自醫。呻吟床褥。痛苦異常。乃央妻弟李蓉青。表母舅宗蓮。延請伊外舅菱湖鎮外科名醫費杏林先生至郡醫治。伊知凌氏有費氏抄本方外奇方。諸藥齊備。故不攜藥箱而來。惟帶有止痛仙丹兩小粒。質黑外粘金箔爲衣。囑卽囑圖嚥下。不可嚼碎。吞下一時許。抽痛頓除。家人喜出望外。何其技矣神乎。學生等環求請益再三。方知此仙丹。卽雅片烟泡云。悉此間勿有。我故帶來。此物本西醫治痛症之要藥。非我之神技耳。一笑置之。當將凌氏抄本方外奇方。寓目一過。爲糾正之。損益之。先有曉五公門下士。我湖長超山奚家坎外科世醫朱寶綸先生長子。朱皆春師兄受業時。曾將此稿方外奇方。與朱氏習

用外科方藥膏丹。悉心研究。去蕪存菁。增益除害。一派正宗。是以醫林知之者。尤覺寶貴也。詠自離師門後。曾經利藪名場。五十年中。不彈此調者久矣。記有師承心得。習外科醫學者。應宜留心焉。蓋開刀如劈柴。須看縷理。宜直縷開刀。擠出膿血。卽合。若不辨明。誤開橫縷。截斷縷絲。一時翻口難合。收功不易。至於男子龜頭。婦女乳房。頭面手指。間生瘡毒。勿得率爾。奏刀。重待自潰。取膿。斂口。幸勿妄用昇降藥品。戒之慎之。又凡攤膏手技。夏天攤膏宜薄。謂如銅鑼邊菊花心者。有圈邊膠粘易貼。冬天宜厚好貼。不致有犯破傷風病。亦應留意者焉。此書拔毒門中。有名十面埋伏散者。其中所用全蠍。宜將滾開水泡捏多次。嘗之味淡勿鹹。方能用有效力。又有蟬蛻。微焙研極細末。不嫌其勞。方中麝香。切勿可嫌價貴減用。不生效力。有此二項經驗。勿得勿表而出之。以竟全功也。此稿茲由同門四明王香巖師兄之執經弟子沈君仲圭抄錄。郵致古越裘君吉生社中。今於三三醫書一集中。排印行世。公諸同好。不自祕藏。勿致湮沒不彰。亦保存國粹之一端。先得我心。同一闡揚先哲遺書。庶幾知其內容之原旨緣起。屢經專科名醫研究而成。此本得之者。自能心領神會。不難明瞭。若將徐洄溪批陳寶功外科正宗寶漢脚瘡瘍經驗全書。及近刊華亭高文晉外科圖說併斯方外奇方。簡練揣摩。循途而進。不啻習外科醫學之導師也。己酉誕生。兩次重逢。甲子年歲朝春。吳興永言醫叟凌詠。識於上海寓居尙素軒內。

清故資政大夫二品封典凌公曉五行狀

公凌氏諱奐原。名維正。字曉五。一字曉郎。晚號折肱老人。元祕書監吳興郡侯吉川公之後。由安吉遷居歸安之苕濠。至公會祖漢飛。又由苕濠遷郡橫塘。遂世爲歸安人。明史方伎傳。有字漢章而以鍼灸名者。公十一世祖也。以醫傳世。代有聞人。公生而體弱善病。遂棄舉子業。習岐黃家言。資性警敏異常人。廣蒐漢唐以來名醫方書。昕夕研求。必究其原而窮其理。吾湖織里多書賈。有以烏鎮僧逸林舊藏祕籍求售者。公愛不忍釋。時近歲暮。罄囊不足。至典新裘以易之。前後弄藏萬餘卷。多海內未見之本。著飼鶴亭藏書志三卷。攷覈精密。弱冠後。名稍稍出閭巷。郡南下昂村。吳瘦生明經芹儒醫也。見公方案。贊歎不去口。公遂從而受業焉。歸而學益進。名益起。男婦大小方脈。以至瘡瘍損傷諸科。無不精求。診者趾錯於戶。治病多奇效。生死一言可決。婦豎無所不知。皆稱凌僊人。遠近幣聘爭迎。寒暑靡間。不言勞。不責酬。貧而病者。兼施以珍藥。無少惜。五十年如一日。當世名公卿。如侯官郭遠堂制軍。番禺楊黼香太守。咸旌其廬。四方執籍來學者。數十輩中。多知名士。苕中七子。俞勁叔剛其一也。亦間有鄉曲之子。素眇讀書。公有教無類。一以內經靈素爲根柢。更取古今專家著述。口講指畫。聽者忘疲。並時舉古人名醫無後之。言相誥誡。及門諸子沾溉餘緒。學成以去。各本所得師承。出而問世。率多運用不竭。醫名藉甚。以余所知。

長超朱皆春。鎮海王香巖。烏程李季青。及公胞姪永言表兄。其尤著者也。公既於醫有心得。不自珍秘。臨證課徒之暇。手訂本草害利八卷。及醫學薪傳一卷。飼鶴亭集方二卷。族子霞序而行之。其六科良方集要一書。則就錢塘周氏舊本。重爲校補刊印者也。爲人任俠好義。勇於赴事。浙省錢糧耗羨。程安二縣爲最重。民不能堪。公先世隱於吏。有田文焚券盛德。故田間疾苦。知之獨詳。咸豐戊午歲大疫。官督漕急。奸民吳士勤與葉邦傑。沈元虎等爭雄長。聚羣不逞之徒。鬪於市。毀及公祖屋。當事以抗糧誣揭大府。株連百餘村。公有田在苕濠。又痛覆巢之禍。義忿所激。奮不顧身。時粵寇已偪郡西之泗安。問道犇控臺省。復謁段廉使光清行營。下其事於縣。又自扭士勤解案。縱弗治。慮益滋後患。不得已倉皇走京師。申理得直。會省城陷。事遂寢。而公之出入賊中。備歷艱險。瀕死者數矣。因繪脫難圖。自識事之顛末。以示子孫。凡患難中。一飯之恩。一錢之惠。無不縷載。直道在人。卒以挽回天心。隱弭鉅案。生還故里。骨肉重圓。未始非公先人公門積德所致。庚申湖防告急。重關不啓。時公昆弟六人已析產。獨先奉二親。避兵於新市東五里之新開河村。而懸壺於新市。日出暮入。以博菽水之資。烽烟彌眼。晨昏無恙。同治壬戌。郡城不守。諸族姓及親故往投者。不絕於道。公一一款留。推食解衣。有從者如歸之樂。卽平居不相通問。而但能識公姓名者。皆就食焉。其時斗米千錢。食指累百。醫之所入。僅堪一飽。嘗因天雨斷炊。徒跣泥淖中。走十里外。乞貸以舉火。有知其窮而他去者。更

質衣物以資其行。二親相繼歿於鄉。公獨行殯葬。悉如禮。鄉居三年。盜不入其閭。人以爲好善之報。諸戚族避地者。亦受芘焉。甲子官軍復郡城。公攜家歸。首命長君初平。收葬戰骨以萬計。又合諸難裔。於五月初三城陷紀念日。就郡縣城隍祠。延僧道作道場。薦度殉難官民。歲以爲常。亦安不忘危之意。並請地方有司。禁屠宰一日。願屠沽仍有違禁私宰者。公勸之不可。則投其肉於河。公歿後。遂無有能阻之者。今則世變境遷。弁難日紀。念而已成告朔矣。爰切遺黎。繼之疫癘。復與姚公守梅諸善董。創立仁濟善堂。拯荒救生。諸事皆隸焉。而尤以施送醫藥爲急務。貧民持善堂聯單求醫者。公一律待遇。無少歧視。改革後公私掃地。舊時地方。慈善事業。半多中輟。惟善堂施醫。歷久不廢。推原本始。實公提倡之力爲多。鄉里有不平事。力爲排解。有魯仲連之遺風。光緒甲申。各鄉被水成災。歲收不及二成。安邑宰譚公恩。勸格於吏議。徵如額。民情洶洶。相率停斛。要挾糧艘。麇集城內外。數以千計。聚衆鳴鼓。勢將搗毀官署。幾重釀戊午之變。事機危迫。聞不容髮。公道經便民倉外。鄉民遮輿羅拜。共慶得生。公慨然引爲己任。遂偕姚公守梅。入謁譚公。爲民請命。得照八折減收。人心大定。官民咸受其賜。急人之難。常恐不及。出死入生。一言足重。公弟子有妙喜朱竹士者。憤族叔某橫行無狀。手刃之而自首於官。直承不諱。將論重辟。公乘程邑宰周公銳延診之便。從容陳竹士母老子幼。宜在矜原之例。竹士得減等律擬。遇赦出獄。去公歿時。甫踰年耳。公雖醫道大行。不事居積。終歲所

得。隨手散盡。產不及中人。而樂善之誠。根於天性。未嘗爲有無計。嘗有華樓橋下。舟居一江北。苦力。浼公往診。病不治。且無以爲殮。公犇走喘汗。旣爲募得樂壽善會施棺。復晨叩月河王氏門。乞舊縣衣一襲。以爲裹屍之具。二十年後。王氏諸孫旅滬者。追懷軼事。猶爲公後人津津道之。其他好義力行多類此。敬宗收族。倡修茗儂支祠。以聯城鄉。同宗睦誼。春秋饗祀。至今子孫率行不替。平時禮遇族人。尤重名節。族嫂氏潘忠介嫡裔也。貧無依賴。恃紡績爲生活。公以其矢志苦節。無忝宗風。謀諸族人。使守祠宇。以終老。並爲列狀請旌節孝。懸額祠旁。與忠介同傳不朽。用意深遠。足資觀感。堂姪紹曾。少孤貧。不能自立。公旣爲綢繆家室。復令繼承小莊。公分遺莊書舊業。願性謹愿。拙於催科。歲計恆不及額。公必爲彌縫匡救。公私賴以兩全。族兄鹿樵。出亡於外。死未歸骨。嫂氏史先會留養公家。子象會幼遭離散。公多方物色。卒使母子完聚。象會雖不善治生業。而事母能盡孝養。公始終周卹之。誼篤宗親。昭昭在人耳目。公雖專精一藝。而能背誦經史大義。旁及佛書道藏。經咒符籙之屬。無所不通。龍虎天師張真人。遣法官至湖。授公天醫院治病僊官。並頒經籙。公嚮道素篤。奉金蓋山龍門正派。爲費撥雲衣鉢弟子。道號壺隱。劫後宗壇香火不絕如綫。歸安孝子程抱雲處士符。棄官尋親。先寄居郡城天后宮。公重其爲人。遂合諸同宗。延主梅觀講席。以正誼表率後學。遠近嚮慕。宗風爲之一振。含山汎詹子戎掄元。嚴於治盜。偵得者十九就擒。公勸之濟以寬。遂指引入雲山問道。

師事公。其後詹君卒爲盜黨所報復。論者謂公有前知焉。又嘗受正乙五雷法於章法師元敬。師常住郡城之玉皇殿。年老有足疾。殿爲茅山道衆所據。將逐章。公力爲之爭。遂分雷祖殿一區。俾收香火。資以終老。先是有郡城東關外某廟住僧發心者。一苦行頭陀也。能結善信緣。他寺僧中以蜚語憤而自宮。公聞之。飛輿往救。始復蘇。並給葠藥。以善其後。得終主其廟者十餘年。郡城武聖宮。俗名大關帝廟。古刹也。遭兵久圯。發心既慶更生。沿街誦佛募資。重新廟貌。安邑宰沈公寶清。從公之請。撥留茶捐公款。以成其志。古天醫廟。在郡南橫塘。去公祖居不遠。自經兵火。廢爲桑園。代遠年湮。幾不可攷。爲他業所侵佔。將於其地改建軒轅公所。公聯合醫林同志。按圖定界。至今賴以保存。公之扶翼正教。德及方外。遠近名山福地。黃冠緇流。皆依爲護法善神焉。應世餘閒。不廢翰墨。書法米襄陽。兼工篆隸。亦善繪事。寫水墨魚龍。尤饒生致。然皆爲醫名所掩。少解音律。通元人詞曲。老而豪氣不減。歲時逢吉。賓朋滿座。興至則引吭高唱。大江東去。一闋以爲笑樂。余少時。猶數聞之。至其善拳術。不自矜膂力。嘗於燕齊道中。爲人捍衛。則更無有知之者矣。教子弟以讀書爲樂。擇名師課之。未嘗加以督責。而謝庭羣彥。卒皆學成名立。光大門閭。爲善者後必興。不其宜歟。公年五十一。時創發甚劇。長君初平。剗股療父。復延菱湖瘍科世醫先外祖杏林費公。施以刀圭而愈。病中慮有不諱。伏枕手書遺訓數千言。處分身後家事甚悉。無一字不從。血性忠告。讀之令人油然而生孝友之心。天相

吉人卒獲大壽。於光緒癸巳四月八日浴佛節考終里第。春秋七十有二。元配李太夫人。余長姑母也。聖善宜家。四德純備。天奪賢母。先公四十五年卒。生子二。女一。長子紱會。卽初平徵君。誥經精舍高才生。少有文名。並承家學。精醫術。清光緒間。兩膺特召。爲醇賢親王治疾。疊蒙兩宮召見五次。獨對二次。溫語褒嘉。有醫學頗有根柢等語。歷官粵魯牧宰。體先世積德之訓。所至多惠政。案無留獄。暇輒爲民診治。公庭出入無禁。活國活人。民愛之如慈母。並分鶴俸。購求古籍。有鴻術堂藏書二萬餘卷。中多宋明精刻。讀書讀律。日手一編。時以經術潤色文治。自署安靜之吏。有兩漢儒生臨民氣象。次汝會。字穎士。以知縣官閩省。值臺疆多故。迭著勞勩。亦以能吏聞於時。長女適同邑諸生沈家駿。公高足弟子也。世居新市之西句城。新市爲公舊游地。沈氏接踵而起。淵源有自。尤精婦人科。至今子孫猶世其業。三子可會。字定孚。附貢生。四子綬會。字爽泉。皆能醫。得公真傳。無時醫習氣。綬會於侍診時。輯有公臨證醫案四卷。五步會。字頌武。六企會。字謙六。七景會。字仰止。先後入邑庠。各能與時變通。不沾沾於章句。步會先經桐廬袁忠節公招往蕪湖。任以校刊志乘詩文之役。後遂轉入仕途。企會棄書就賈。歷辦營口蘇滬繭絲實業。景會與余共几席。相契尤厚。次女適德清胡安瀾。亦諸生。自可會以下子女六人。徐太夫人出。紱會步會皆李出。嗣孫十三。紱會生長孫祖壽。字銘之。以附生貢成均。奉諱後。僑寓滬濱。娛親養志。不樂仕進。續修支祠宗譜。並獨力捐立正記公堂。克成祖

若父未竟之志。光緒甲辰。捐助直隸善後賑款。獎給祖父母父母樂善好施字樣。仍准自行建坊。又遵母命。捐資興學。同鄉公推爲湖州旅滬公學校長。兼南洋女子師範學校校長。樂育多才。成績久著。得獎勵學功宏匾額。加一等金質嘉祥章。又以故父遺書。捐入吳興地方圖書館。以公衆覽。汝曾生人壽。之壽。昶壽。可曾生頤壽。恆壽。升壽。綬會生金壽。步會生南壽。磻壽。堯壽。企會生曼壽。景會生牟壽。孫女四人。已嫁者二。皆適士族。曾孫八。華雋。華儔。華仁。華倫。華侗。華信。華侃。華伸。曾孫女五。玄孫三。尙賢。齊賢。希賢。先以次子汝曾階封公。夫婦四品。繼以長子紱會。山東濰縣任內。遇覃恩加級。捐請二品封典。凌氏世有隱德。積久流光。生榮死哀。鄉鄰稱羨。自公高會祖父。以至伯叔兄弟。率登壽考。公以少時孱弱之軀。又更多難。蒙犯風雪。致成喘哮之疾。善自攝衛。中年氣體。轉益彊固。食量兼人。處境亦漸亨。終其身無不如意事。捐館迄今三十年。七子二女。半尙生存。而冢婦沈夫人。且已壽開八秩。賢孝特著。例得褒揚。一門禮教無虧。人才輩出。各以所學。涉歷政商學界。轍跡徧長江上下。遠及東瀛。德澤之久。長枝葉之蕃衍。求諸並世親知中。殆無倫比。蓋清門世胄。其所留貽者遠矣。會今歲辛酉。距公與先長姑道光壬午始降之年。適同屆百齡偃壽。將循世俗成例。先後舉行追慶禮。藉申報本之忱。百世令名。表彰宜亟。中表諸昆季。以同時至戚後進。知公之詳。與相關之切。未有如余者。屬爲文以狀其事。余生也晚。幸免於洪揚之難。願蚤歲過庭。側聞先大夫暨諸父老輩。述亂

離相依情況。歷歷在目。心識之不敢忘。長而與竹林諸阮。馳騁名場。以學行相砥礪。且衡門咫尺。朝夕趨陪。杖履者十餘年。又嘗橐筆入初平表兄海陽縣幕。於公一生學術道德大節。與夫遺言往行。訪求有素。欽折亦最深。故不敢以不文辭。乃即今昔見聞所得。證以孝子賢孫之所陳述者。略本編年紀事之例。以次類敘。條繫時地。並參物論。以諗來者。事必徵實。語不憚煩。庶備修志乘者採擇焉。謹狀。

中華民國紀元十年夏正辛酉五月。內姪李毓璠頓首拜謹。

外科方外奇方目錄

卷一

升降部 一

圍藥部 八

內消部 一三

內護部 一七

卷二

化毒部 一九

點頭部 二一

拔毒部 二二

去腐部 二三

止痛部 二三

生肌收口部 二四

去管部 二八

膏藥部 三一

卷三

疔瘡部 四一

喉症部 四三

諸瘡部.....四七

卷四

賺瘡部.....五五

癬瘡部.....五八

痔瘡部.....六〇

口牙部.....六三

鼻耳部.....六六

脚部.....六七

補遺.....六八

外科方外奇方卷一

清浙湖凌曉五先生遺著 後學

杭州沈仲圭錄存
杭州蔡燮陽校刊

升降部

大紅昇。辰州大劈砂五錢。明雄黃五錢。水銀一兩。火硝四兩。

白礬一兩。皂礬六錢。先將二礬火硝研碎。入大銅杓內。加火酒一

杯炖化。一乾卽起研細。另將汞硃雄研細至不見星爲度。再入硝礬末

研勻。先將陽城罐用紙筋泥。搥指厚陰乾。常輕輕撲之。不使生裂紋。搥

泥罐子泥亦可用。如有裂紋。以罐子泥補之極乾。再晒無裂紋。方入前

藥在內。罐口以鐵油盞蓋定。加鐵梁盞上下用鐵鑿鐵絲扎緊。用綿紙

撚條護密周圍塞罐口縫間。外用熟石羔細末。醋調封固盞上。加炭火

二塊。使盞熱罐口封固易乾也。用大釘三根。釘放地下。將罐下放釘上。

罐底下置壑大炭火一塊。外砌百眼爐。升三炷香。第一炷香。惟用底火。

如火大則汞先飛上。二炷香用大半罐火。以筆蘸水擦盞。三炷香火平

罐口。用扇搨之。頻用水擦盞。弗令乾。乾則汞先飛上。三炷香完去火。冷

定開看。方氣足盞上。約六七錢。刮下研細。磁罐盛用。再預以鹽滷汁調

罐子稀泥。用筆蘸泥水。掃罐口周圍勿令泄氣。蓋恐有綠煙起。汞走也。

綠煙一走。卽無用矣。此丹治一切瘡瘍潰後。拔毒去腐。生肌長肉。瘡口

堅硬肉黯紫黑。用丹少許。鷄翎埽上。立刻紅活。瘍醫若無紅白二丹。決難立刻取效。

大白昇 水銀 枯皂礬 焰硝 食鹽各一兩 共研至水銀不見星

爲度。入陽城罐內。口上一鐵油盞蓋之。鐵絲扎緊。鐵盞四圍用白綿絲條箝緊。外用鹽五兩。光粉和泥搗勻擦罐。入百眼爐內。初用文火一炷香。盞上常以微水潤之。至三炷香。用武火完爲度。俟冷定打開。取昇在盞上色白者。刮下研細盛用。此丹可服可敷。如瘡口有黃水用此。無水用紅粉霜。

一方加礪砂、黃丹、硃砂、膽礬、雄黃。

附封罐口神膠方。破砂罐末 草鞋灰 黃泥 傾銀藥末 燒鹽粽子各一兩 共研細末。用鹽鹵調和膠丹。入乳鉢搗細。用抵子挑封罐口。

小紅昇 眞水銀二兩 淨明礬二兩 提淨火硝二兩 右三味搗和

研勻。安鐵耳鍋內。蓋以高深宮碗。居中平穩。用煨石羔研細。撇滿碗。用圍平鍋口封好。放於風爐上。以先文後武之火。煉三炷香爲度。過夜待冷。以刀刮去封口石羔。輕輕捫抹碗。將碗揭起。用小刀刮下昇丹。或綠或黃或紅。各自貯開。磁瓶盛之。聽用。顏色雖殊。功效則一。陳一年者。出盡火氣。愈陳愈佳。此藥治一切瘡瘍疔腫癰各毒。初起出膿時。用此摻瘡口。自能呼膿拔毒。外用膏藥蓋之。如膿腐去淨者。另用生肌長

肉粉霜如男子腎囊女子乳頭及眼珠上下兩角或生瘡毒切勿用此丹恐受水銀之氣受患莫測慎之。

六仙昇丹 水銀三兩 火硝三兩 明礬五兩 東丹四兩 輕粉六錢 皂礬一兩五錢 如紅昇法。

白降丹（卽夏冰對配丹） 水銀 淨火硝 白礬 皂礬 炒白鹽

各九錢 右五味共研至不見水銀星爲度盛於新大傾銀罐內以微火鎔化火急則水銀上升走爐須用焠炭爲妙熬至罐上無白煙起再以竹木枝撥之無藥屑撥起爲度則藥吸於罐底謂之結胎胎成用大木盆一個盛水水內置淨鐵火盆一個以水盆內水及鐵盆之半腰爲度然後將前結就之胎連罐覆於鐵盆內之居中以鹽鹵和黃土封固罐口勿令出氣出氣卽走爐再用淨灰鋪於鐵盆內灰及罐腰將灰按平不可搖動藥罐恐傷封口卽要走爐鋪灰畢取燒紅栗炭攢圍罐底用扇微搨煉一炷香謂之文火再略重搨煉一炷香謂之武火炭隨少隨添勿令間斷而見罐底再煉一炷香卽退火待次日盆炭冷定用帚掃去盆灰并將封口上去淨開罐鐵盆內所有白霜卽謂之丹將磁瓶收貯待用愈陳愈佳其罐內原胎研摻癰瘡神效若恐胎結不老罐覆盆內一遇火煉胎落鐵盆便無丹降亦爲走爐一法用鐵絲扎作三脚小架頂爐內撐住丹胎最爲穩妥此丹如遇癰疽發背毒一切惡毒用一釐許以津唾調點毒頂上以膏藥蓋之次日毒根盡拔於毒頂上頂

上結成黑肉一塊三四日卽脫落。再用昇藥敷此卽收功。此丹用蒸粉糝以水少潤。共和極勻爲細條。晒乾收竹筒內。各爲錠子。凡毒成管卽約量管之深淺。插入錠子。上蓋膏藥。次日擠膿。如此一二次。其管卽化爲膿。管盡再上昇藥數次。卽收功。此丹比昇丹功速十倍。但性最烈。點毒甚痛。法用生半夏對攪。再加冰片少許。一方加辰砂二錢。雄黃二錢。硼砂五錢。水銀用一兩。餘四味。各用一兩五錢。

大白降。水銀一兩。青鹽二兩。皂礬二兩。火硝二兩五錢。滷砂

三錢。雄黃三錢。辰砂三錢。白砒五分。明礬二兩。右藥共研

勻。放陽城罐內。微火煨乾後。如前法降三炷香。候冷取藥。不可被生人鷄犬冲破。此丹凡腫毒未成名件者。用醋調點患處頭上。看毒大小。如桐子大炮起。毒卽消。苦已成不肯穿者。亦用此丸。將膏藥貼頭上。半日卽穿。

小白降。水銀。火硝。生礬各五分。食鹽二分。右共研末。入傾銀

罐內。放炭火上。文火煎滾。滾至邊上起焦黃色。候至滿面俱焦黃米色爲度。將罐離火候冷。再用圓正播盆一個。裏面須揀光細者。將銀罐連藥輕輕倒合在播盆內。罐口與播盆縫間。須用綿紙條墨水潤溼。加鹽泥封固。然後將播盆坐於大水盆中。罐底先加文火。用扇搨之。先文後武。煨至五寸線香爲度。退去炭火候冷。先掃去罐口外鹽泥。然後開罐。取降於播盆底內之藥。藥色以潔白如霜者爲上。若青黃黑色。不可用。

或以銀簪腳。與磨亮刀頭。略沾微唾。蘸藥在上。卽刻起鏽者爲佳。用時用新綿花蘸藥。敲些許於膏藥上。比昇藥更要少些。貼後兩杯熱茶時。卽發痛。半日卽止。毒重者。每日一換膏。毒輕者。貼兩三日亦不妨。若貼大腫毒上膏。先放些麝香。阿魏。然後上此藥少許貼之。若要做咬頭膏。藥代針丸。將麪糊以竹片拌和。做成細條。切作芝麻粒大小。放膏心中。對腫頭貼之。此藥不可沾在指頭上。沾則要疼痛發炮退皮。此藥陳久者。少癢。性和緩。卻要多用些。如第一次降完。藥色不白。可將罐內之藥刮淨。此藥無所用處。只將降於搗盆底內之藥刮出。另將水銀。火硝。生礬各五分。食鹽二分。并將搗盆內降不透之藥。與四味一併研和。從新再入銀罐。照依前法降之。此藥若一次降不如法。不妨兩次三次連降。卽降至十數次方能降好。計算已有水銀五錢在內矣。每次只將銀罐刷淨。或另換新罐。每次只要用水銀。火硝。生礬各五分。食鹽二分。直降到好方止。初起煎時。須要火候得法。若火候不及。則罐中結胎尙嫩。水銀尙活。倒合轉來。非連胎墜入搗盆底內。卽活水銀先流入搗盆底中。若火候太過。結胎太老。非水銀先已飛去。卽有降不下之病。總以結胎不嫩不老爲度。用煨炭火最得法。凡瘡毒已穿破。用水煉降藥法。新煉出白降丹研細。用元色緞五寸。將降藥篩勻緞上。捲緊以麻線捆紮極緊。放瓦銚內。清水煮約一伏時內。換水三次。將緞先取起掛風處陰乾。然後打開以鷄翎埽下。收貯磁瓶用之。並不痛楚。

一降。水銀六錢。硃砂二錢。雄黃二錢。硼砂二錢。甘草水煮硝

一兩。菘豆煮白砒一錢。青鹽三錢。製明礬一兩。食鹽一兩。

共研末。用陽城罐裝藥在內。用火鎔化結硬。再將新茶杯合在罐口上。

四圍泥固。用銅杓一個。邊上畫後天八卦圖。內放水六七分。將茶杯放

在水內。陽城罐底朝上。四面以瓦合好。上放梗炭文武火煉三炷香爲

度。去火候冷開看。茶杯內藥有七八錢重。刮下研末。同二降再煉。

二降。水銀一錢。硃砂一錢。雄黃一錢五分。硼砂二錢五分。火

硝一兩二錢。明礬二兩。皂礬二兩。食鹽一兩二錢。同前煉過

藥。共和爲末。同前煉法。煉完再同後煉。

三降。硼砂二錢。青黛四錢。白砒一錢五分。水銀六錢。明礬六

錢。同前煉過丹藥共研極細。同前丹煉三降。靈丹俱已煉成。其色雪

白。勿見鐵器研細。加冰片五釐。蟾酥五釐。共研極細。磁罐收貯。勿

令出氣。凡遇痔漏癰塊。將成藥線插在毒內。治一切腫毒。及發背癰疽

癰塊痔漏等毒。以去腐生新。立刻見效。

五色靈藥。食鹽五錢。黑鉛六錢。枯皂礬。枯白礬。水銀。火硝

各二兩。先將鹽鉛二味鎔化。入水銀結成砂子。再入二礬。火硝同炒

乾研細。入鉛汞再研。以不見星爲度。入罐內鹽泥固濟封口。打三炷香。

不可太過。又及一宿。取出視之。其白如雪。約有二兩。爲火候得中之靈

藥。如要色紫者。加硫黃五錢。要黃者。加明雄黃五錢。要紅者。用黑

鉛九錢。水銀一兩。枯白礬二兩。火硝三兩。辰砂四錢。明雄黃三錢。升煉火候。俱如前法。凡升打靈藥。硝要炒燥。礬要煨枯。一方用燒酒煮乾炒燥。方研入罐。一法凡打出靈藥。倍加石羔和勻。復入新罐內。打一炷香。用之不痛。此五色靈藥。治癰疽諸瘡已潰。餘腐不盡。新肉不生。撒之最妙。

升打靈藥固罐法。用陽城罐。將罐熯熱。搗大蒜於罐外。徧擦之。再熯再擦。如是三四次。再以薑醋入罐內。盪之煮之。以乾爲度。次用黃土二分。煤炭二分。以馬毛與鹽水。合之固罐。一指厚。陰乾。裂縫再固。必要完固聽用。

升打靈藥封口法。入藥畢。蓋鐵盞。用鐵絲鐮畢。用石羔。無名異等分。食鹽減半。俱煨過爲極細末。醋調成膏。次加炭火二三塊於盞內。外熱以筆蘸藥。周圍搽之。隨乾隨搽。以口平爲率。一用石羔。生白礬。食鹽等分爲末。水調搽之。如前。

金蟾化管丸。水銀三錢。明雄黃一兩。以二斤火酒漸煮添。酒盡爲度。共乳細。用紙包好。取大蝦蟆。將藥包入於肚內。去腸只留肝肺。以線縫好。再用銀硝一兩。白礬一兩。研勻。入陽城罐內。加水半茶鍾。放火上熬令枯乾。罐底取放地上。再納蝦蟆於內。鐵盞蓋好。將鹽泥固濟。升文火二炷香。中火一炷香。武火一炷香。冷定開看盞上靈藥。刮下研細。用蟾酥乳化爲丸。如芥子大。陰乾。凡一切諸漏有管者。雖彎曲之處。

用一丸放膏藥上對管口自入到底方回。嫩管自化。老管自退。七日見效。如未全退。再用一丸。無不除根。

圍藥部

離宮錠。 眞蟾酥三錢。 血竭三錢。 膽礬三錢。 硃砂三錢。 陳金墨

一兩。 麝香一錢五分。 各研爲細末和勻。火酒化蟾酥糊成錠。如筋

粗寸長。晒乾清茶研敷。治一切無名腫毒。

坎宮錠。 陳金墨三錢。 熊膽三錢。 胡連三錢。 牛黃三錢。 冰片一

錢。 麝香五分。 或加木香少許。 京墨一兩。 胡連二錢。 牛黃五

分。 冰片七分。 麝香五分。 共研細末。用猪膽汁。加生薑大黃水浸

取汁。釀醋水少許和成錠。冷水磨搽。治陽毒紅腫赤遊丹。

蟾酥錠。 蟾酥二錢。 火酒化。 金腳蜈蚣一條。 膽礬一錢。 乳香一錢。

雄黃二錢。 麝香一錢。 沒藥一錢。 銅青一錢。 冰片五分。 寒水

石二錢。 血竭一錢。 大蝸牛廿一個。 共製末。蝸牛搗作錠。每用米

醋磨搽。或用辰砂。金箔爲衣更妙。治陰症疔瘡。

紫金錠。 當門子三錢。 一方五錢四分。 川五倍一兩。 一方六錢。 塊辰

砂四錢。 一方六錢。 紅芽大戟一兩五錢。 一方六兩。 千金子霜一兩。

一方五兩。 山茨菇二兩。 一方六兩。 雄精三錢。 一方一兩。 右藥共

爲細末。糯米飲搗成錠。每重一錢。用冷水腐化內服外敷。能治陰陽諸

症。無不見效。一方加草河車六兩。

驅毒散 白芨一兩六錢 紫花地丁八錢 烏骨鷄骨一兩煨 硃砂

一錢 雄黃末一錢 輕粉一錢 五倍子二錢炒黃 大黃二錢

牙皂八分 右藥共爲末以醋調敷凡毒生於骨節之間能使移上移下無殘症之患

銀箍散 草烏 生南星 乳香 生半夏 五倍子 沒藥 陳菴豆

粉 共爲末酒調搽能治陰症

金箍散 赤小豆一兩 番木鱉二兩 白芨五錢 芙蓉葉二兩 白

蘘五錢 生大黃五錢 黃柏五錢 共爲末葱蜜調塗治陽症

又方 鳳仙花子 大黃 五倍子各十兩 人中白一兩五錢如無用

皮硝代 陳小粉十三兩炒黃 爲末醋調

鐵箍散 乾芙蓉葉五錢 薑黃五錢 白芨五錢 五倍子五錢 白

蘘五錢 生大黃一兩 蟹殼五斤 陳小粉一兩炒黃 共爲細末

米醋和成錠臨用醋磨搽治一切毒未潰者

白圍藥 天花粉三兩 生南星四兩 生半夏四兩 一法又白蘘一

兩 白芨一兩 白芥子二兩 爲細末用酸醋調塗治一切瘡毒最

効驗

抑陰散 川五倍五錢 肉桂三錢 麝香三分 川鬱金一錢五分

生南星一錢五分 共爲末薑葱搗汁調敷治陽毒

如意金黃散 天花粉十兩 川黃柏五兩 薑黃五兩 白芷五兩

廣陳皮二兩。甘草二兩。蒼朮二兩。南星二兩。厚朴二兩。石菖蒲二兩。川鬱金二兩。生半夏二兩。共爲細末。或醋。或蜜。或水。或葱汁水調敷。治癰疽發背。諸般疔腫。跌打損傷。濕痰流注。大頭時腫。漆瘡火丹。濕熱天庖。肌膚赤腫。乾濕脚氣。婦女乳癰。小兒丹毒。外科一切頑惡腫毒。無不應驗。

一筆消。雄黃二兩。麝香三兩。眞藤黃一兩。人中白五錢。辰砂

二錢。蟾酥一兩。白芨二錢。白蘞二錢。共爲細末。用廣膠三錢。熟化和成錠。治癰疽發背。五疔毒瘡。對口搭手。諸般惡瘡。及一切無名腫毒初起者。用醋磨搽患處。立消如神。

陰症癰瘍圍藥。紅藥子四兩。如無用黃藥子代。白芨一兩五錢。黑

狗下頰一個。煨存性。白蘞一兩五錢。豌豆粉三錢。冰片三錢。

乳香六錢去油。硃砂三錢。雄黃三錢。各爲細末。和勻醋蜜調敷。

四圍用極滾熱醋蘸調。並可服。治外勢平而不起。色黑黯其痛在肉裏者。

如意散。生南星。生大黃。生半夏。朴硝。共爲末。薑汁調治痰毒。

鹵水圍藥。麝香一錢。沒藥。雄黃。血竭各三錢。蟾酥一錢。五

倍子一兩。麻黃五錢。右多用蕎麥幹灰。淋濃汁七八碗。文武火煎

至二二三碗之數。以前藥研極細末。候冷下之。復煎二二三沸。磁罐藏之。若遇瘡毒。用新筆蘸汁周圍塗之。則一切惡瘡腫痛自消。

一筆消。大黃二兩。藤黃一兩。明礬五錢。蟾酥五錢。酒炒。麝香二錢。乳香。沒藥各二錢。右用蝸牛搗成錠。醋磨圈圍。

又方。用雄黃一兩。膽礬一兩。月石一兩。銅青一兩。皮硝一兩。草烏一兩。去大黃明礬。乳香沒藥。

蝮蚪拔毒散。寒水石。淨皮硝。川大黃等分。研極細末。蝮蚪不拘多少。裝鬃內埋入地中三月。自化成水。每蝮蚪水一大碗。入前藥末各二兩。陰乾。再研勻收磁罐內。用時水調敷。治一切無名大毒。火毒瘟毒神效。

一筆鈎。天南星一兩。生半夏一兩。白芨一兩。生大黃四兩。冰片一錢。共爲末。用雄豬膽汁和成錠子。

北京鹽水錠。馬牙硝一斤。入鐵鍋內烈火燒成水。次下皂礬末一兩。次下黃丹一兩。硃砂七錢。雄黃一錢。共攪極勻。傾光平石上凝硬收用。

一一切腫毒疥癬。蛇蝎蜘蛛蜈蚣咬傷。夏月毒蚊虱咬傷。腫瘍疼痛。用醋磨或水磨。

一口舌生瘡。乳蛾喉風咽痛。用一粒。口內噙化。

一九種心痛。點眼角三次即愈。牙痛含於患處。

一暴發風眼。火眼。及老年眼沿赤爛。以滾水化入杯內。洗之皆良。

一牛馬有病。以點眼角。

大鐵箍散 生大黃二錢 蒼朮一錢 芙蓉葉二錢 薑黃二錢 天

花粉 川栝各二錢 白芷一錢 川羌活二錢 毛茛菪二錢 川

烏一錢 乳香一錢去油 陳皮一錢 沒藥一錢去油 南星一錢

雄黃一錢 厚朴一錢 冰片一分 麝香一分 共爲極細末 凡遇

皮無二色者 是爲陰毒 葱汁和蜜調敷 漫腫無頭 用陳黃酒米醋和敷

紅赤腫痛發熱 用清茶調敷

金不換仙方 枳殼三錢六分 白丑 黑丑各一兩 甘遂三錢 麝

香一錢 甘草五分 共爲極細末 摻少許於膏藥上貼之 治百種無

名腫毒 立刻止痛 未成卽消 已成卽潰

立消散 雄黃一兩五錢 炒甲片三兩 生軍五兩 芙蓉葉五錢

炒五倍子五兩 共爲細末 醋調塗患處

立馬消 川斑蝥去翅足米粉炒 全蝎尾各十個漂淡 蜈蚣三條

乳香 沒藥各四分 蟾酥三分 火酒浸化 再研成膏 用冰片二分

麝香二分 爲極細末 麻黃四錢 熬膏爲丸 如桐子大 辰砂爲衣 晒乾

密貯 治發背癰疽腫毒 每用一丸 勢大者 用二三丸 研細摻於膏藥上

貼之 如瘡未破 以熱手摸百餘下 次日卽消 如瘡已破 先以薄綿紙蓋

上 再將膏藥貼之 神效

家秘金箍散 當門子一兩 大梅片一兩 飛黃丹一兩 紅銀硃一

兩 共研極細極勻 收貯玻璃瓶中 切勿泄氣 臨用 用淨羊毛筆蘸灑

膏上貼之。治一切結腫成餅成核。卽刻消散。

內消部

梅花點舌丹。西黃一錢。月石一錢。熊膽三分。血竭一錢去油。

乳香一錢五分去油。沒藥一錢五分。珍珠四分。蟾酥一錢。葶

麝一錢。麝香三分。冰片五分。沉香五錢。雄黃一錢。右共爲

細末。以人乳將酥化開和丸。再加辰砂一錢。金箔爲衣。每重三分。或

三四釐。晒三日收貯磁罇聽用。每臨臥時。溫酒送服一二丸。可消一切

無名腫毒。疔瘡初起。一方中加白花一錢二分。

飛龍奪命丹。眞蟾酥一錢。去油乳香一錢。銅綠一錢。輕粉一錢。

膽礬一錢。血竭一錢。辰砂一錢。明礬一錢。雄黃一錢。冰片

三分。麝香三分。共研細末。同大蝸牛廿個。搗勻和丸如菉豆大。

每服七丸。或九丸。或十一丸。用葱白三五寸。病人自嚼吐於手心。包藥

在內。用溫酒和葱送下。如人行五里汗出爲度。無汗再用葱研爛。裹藥

服之。治一切疔腫惡瘡。癰疽初起時。黑陷不痛。或麻木不仁。毒氣內攻。

嘔吐昏憤之症。一方蟾酥丸。加蜈蚣兩條。一方前方加蜈蚣一錢。

川山甲一錢。寒水石三錢。殭蠶一錢。全蝸一錢。角刺三分。

紅信二分。一粒珠。金川山甲。一只重廿四兩。分四足。一足用米醋炙。一足用松

花湯炙。一足用麻油炙。一足用眞蘇合油炙。黃用。眞西黃三錢。

鏡劈砂四錢。真廉珠三錢水飛。麝香四錢。大梅片四錢。明雄黃四錢。杜蟾酥一錢二分火酒化。右藥擇吉日法製和研極細末。以蟾酥化入再加蘇合油拌搗千遍至光亮爲度。爲丸每重五分。晒乾用臘殼護。崇治一切無名腫毒癰疽發背等症。每服一丸。將人乳化開。陳黃酒沖服。煖臥避風。兼治小兒驚風。每丸均分二次。用純鉤橘紅煎湯送下。

五香追毒丸。老君鬚。母丁香不見火。苦丁香卽香瓜蒂。去油乳香。去油沒藥。巴豆霜。廣木香。炒黑牛蒡子。上沉香。血竭。辰砂。蟾酥火酒另化。右各等分。共爲細末。將所化蟾酥。加陳蜜和丸如芡實大。辰砂爲衣。每服一丸或二丸。空心食前紹酒化服。瀉二三次後。用冷粥補之。毒卽消。治癰疽一切無名腫毒。初起壯實者宜之。兼去疔瘡毒定痛如神。

寸金丹。麝香一分。乳香。烏金石卽石炭。輕分。雄黃。狗寶。沒藥各一錢。蟾酥二錢。粉霜。黃蠟各三錢。硼砂五錢。鯉魚膽。狗膽各二個陰乾。金頭蜈蚣七條。全用焙用。頭生男兒乳一合。右爲細末。以黃蠟乳汁。熬膏和丸如菉豆大。小兒丸如芥子大。每服一丸。重者加至三丸。以白丁香七粒研爛。新汲水調送。煖蓋得汗爲度。三次卽愈。治極重腫毒癰疽疔瘡。四肢壯熱。沉重者。卽噤口不開。搗開化三丸灌下神效。

皂礬丸。 牙皂三錢。切碎炒研細末。 白礬三錢生研。 真乾蟾酥一兩。

切片火酒化和丸如菉豆大。 麝香三分和入。 每服一丸。以葱白裹

藥。黃酒送服。勢重者。每日服二次。此藥每次止可服一粒。如服二粒。恐

致嘔吐。慎之慎之。治大毒初起。疔瘡走黃。黑陷昏憤。嘔惡之症。

青龍丸。 番木鱉四兩。米泔浸三日。刮去皮毛。切片晒燥。麻油炒透。炒

甲片一兩二錢。 白殭蠶一兩二錢。炒斷絲。 共爲細末。黃米飯搗和。

爲丸如桐子大。每服五分。 量人虛實酌減。臨臥時按部位。用引經藥。

煎湯送下。蓋煖睡勿冒風。如冒覺周身麻木。抽掣發抖。不必驚慌。過片

刻卽安。治一切疔瘡腫毒。并跌仆閃胸。傷筋攣痛。貼骨癰疽。男婦大小

頸項癩癧。及乳串結核。痰凝氣滯。硬塊成毒。小兒痘後癰疽初起者。一

二服卽消。已成膿者。服之自能出毒。不必咬頭開刀。誠外科第一妙方

也。頭面。用羌活五分。 川芎五分。 煎湯送下。肩背。用角刺尖五分。

兩臂。用桂枝五分。 胸腹。用枳殼五分。 兩肋。用柴胡五分。 腰間。用

杜仲五分。 兩足膝。用牛膝五分。 木瓜五分。 咽喉。用桔梗五分。

甘草五分。 跌仆攣筋。用紅花五分。 當歸五分。 黃酒煎湯送下。

紫霞丹。 犀黃四分。 雄黃二錢。 大黃四錢。 天竺黃四錢。 藤黃二

錢。九晒去酸味。 冰片四分。 兒茶二錢。 參三七四錢。 血竭二錢。

乳香四錢去油。 沒藥四錢去油。 麝香四分。 阿魏一錢用蜜化。夏

布收去渣。 除乳香。沒藥。藤黃。阿魏外。餘皆忌火。秤準各末和勻。再研

極細。以阿魏蒸好。和蜜搗極勻爲丸。每服重四分。專治癰疽發背。破傷風。疔瘡無名腫毒。跌打損傷。小兒驚風等症。用紹酒調服。忌生冷。孕婦戒投。

七釐散。大赤練蛇一條。燒灰存性。研極細末。勿犯鐵器。米糊爲丸。如芥子大。治一切無名腫毒。諸藥不效者。每服七粒。重者加十四粒。若平陷不痛楚者。加薑黃。藤黃。研細醋調搽之。卽能奏效。孕婦忌投。

九龍丹。木香。乳香。沒藥。兒茶。血竭。去油巴豆各等分。共爲極細末。生蜜調成一塊。磁盒收貯。用時旋丸如豌豆大。治癰毒。魚口。便毒。橫痃。初起未成膿者。每服九丸。空心熱酒送。瀉四五次後。服薄粥一碗。其瀉卽止。如腫甚者。間日再送一服。其毒自消。

龜蠟丹。血龜板一大個。用下半升。烘熱。用白蠟漸漸摻上。板自炙枯。放泥地上出火氣。研細黃酒調服至醉。煖蓋取汗卽愈。治一切無名腫毒。對口。發背。流注。癰疽。疔瘡等症。

八聖散。天蟲二錢。蜈蚣八錢。斑貓去翅足。穿山甲炒。巴豆霜各四錢。乳香一錢五分。沒藥一錢五分。共爲末。凡魚口。便毒重者。每服一錢。輕者每服六分。酒下二服自效。

五虎下西川。炙鼈甲一兩。蜈蚣廿條瓦上焙。全蝎一兩。土炒天蟲一兩。生軍二兩。共爲末。凡無名腫毒痰症。每服一錢。小兒每服黃酒送下。無不應效。

內護部

護膜蠟礬丸。

白明礬四兩研細。

黃蠟二兩。

辰砂六錢水飛。

或加

穗花四兩更炒。先將黃蠟鎔化。待稍冷。入礬末辰砂不住手攪勻。加煉白蜜七八錢和勻。衆手丸如梧子。如蠟凝不能丸。以滾水燉之。凡護膜防毒內攻。如未破即消。已破即合。每服三四十九。白湯送下。或酒送亦可。一日之中。服一百粒方有功。始終如一。服過半斤。必萬全矣。病已愈。服之亦佳。

琥珀礬丸。

黃蠟一兩。

明礬一兩二錢。

雄黃二錢二分。

琥珀一

錢。辰砂一錢。

一方加白蜜。

先將葡萄肉十枚。同蠟打如泥。加諸

藥末搗和爲丸。珀末辰砂爲衣。凡護膜化毒。每服一錢。食後白湯下。

護心散。

生萊豆衣一兩五錢。

甘草節一兩。

琥珀同燈芯研。

乳香。

辰砂。

雄黃各一錢。

共爲末。凡預防毒氣內陷。每服一錢。空心酒下。

外科方外奇方卷二

清浙湖凌曉五先生遺著 後學

杭州沈仲圭錄存
杭州蔡燮陽校刊

化毒部

無敵丹。桑柴灰汁 茄桿灰汁 礮灰汁各一斗。三汁熬調和勻。名

三仙膏。亦可點癰疽之稍輕者。再用碱水熬膏一兩。加入後開各藥末。

則成全方。每三仙丹五兩。配蟾酥三錢五分。酒化。明礬。火硝各三

錢。牛黃。麝香各一錢。冰片。珍珠。硼砂。雄黃。輕粉。乳

香各一錢。人乳浸銅綠。硃砂各一錢五分。各研極細末和勻。再

碾數千下。將前膏加入攪得極勻。收磁罐內。罐須小口。以烏金紙塞口。

封以黃蠟。勿令一毫泄氣。遇毒取少許。搽其頂。乾則以米醋和蜜少許

潤之。其血黑色。或毒水爆出。即時鬆解。切不可着好肉上。或用蕎麥麪

調。若遇疔瘡加鐵鏞一分。研如飛塵和入。多搽其正頂。過宿其根爛

出。內服紫金錠。若是癰疽。再服蠟礬丸。及托裏解毒之劑。此藥癰疽對

口。疔瘡發背。一切無名腫毒。有奪命之功。難以盡述。

惡瘡錠子。白砒一錢。麝香五分。歸尾五分。五味五分。蟾酥一

錢。草烏一錢。輕粉二錢。川烏一錢。月石五分。血竭一錢。

全蝎二只。硼砂一錢。銅綠五分。銀硃五分。雄黃五分。共爲

極細末。用人乳化蟾酥拌成錠子。如大麥冬樣。一分錠作兩段。治二人。將瘡用鍼刺破見血。納入藥粒。用紙貼上。內成膿去藥。洗淨爲度。

萬應針頭丸。麝香二錢。血竭三錢。輕粉三錢。蟾酥三錢。礪砂

三錢。大梅片一錢。金頭赤足蜈蚣一條。共爲末煉蜜丸。凡一切

癰疽。生於胸背。毒大欲死。向其頭上用針撬破去血。以藥一黍米大。放瘡口內。用紙花吐津周圍濕之。貼瘡審定。頃刻可愈。

化腐紫霞膏。輕粉三錢。葶苈仁三錢。血竭二錢。巴豆霜五錢。

金頂砒五錢。螺螄肉水二錢。潮腦一錢。共研勻罐貯。凡發背已

成。瘀肉不腐。及不作膿者。又諸瘡內有膿。外不穿者。俱用此膏。不腐爛者自腐。不潰者自潰。其功甚於烏金膏。及碧霞錠子。臨用以麻油調搽。頑硬肉上。以綿紙蓋之。或以膏藥貼之亦可。

元珠膏。本鱉子肉十四個。斑蝥八十個。柳枝四十九寸。驢蹄甲

片三錢。草烏一錢。麻油二兩。右藥浸油內七日。用文火燂枯去

渣。入巴豆仁三個。煎至黑。傾於鉢內。研如泥。加麝香一分。攪勻。入

罐內。凡腫瘍將潰。搽之膿從毛孔吸出。已開刀者。用指護送孔內。膿腐立刻能化。

隔皮取膿法。驢蹄皮一兩。炒爲末。砂炒蕎麥麪一兩。草烏四錢。刮

去皮。研末。食鹽五錢。共研細。水糊作薄餅丸。上炙微黃。再研細。以

醋攤白紙上貼患處。其膿水從毛孔而出。蓋以粗紙。溻濕再換。水盡紙

燥腫卽消。或患毒深遠。刀難直取。並患者懼開刀。候膿熟時。用此法最宜。如不從毛竅出者。其擦藥之處。剩一洞。自爲出膿。

點頭部

代刀丸。白丁香一錢。蓖麻仁一錢。生白砒三分。共研爲丸。如黍

米大。凡一切腫毒。內腫已成。懼開刀者。用一粒放患頂。外以膏封之。次日卽能破頭。

又方。斑蝥二十個。巴豆四十粒。共爲末和丸。如胡椒大。每用一丸放患頂上膏封。

萬應代針膏。硼砂一錢五分。血竭一錢五分。輕粉一錢五分。蟾

酥五分。連頭蜈蚣一條炙。麝香一分。冰片少許。雄黃一錢。

共爲末。用好蜜和成膏。凡一切惡疽生於胸背。毒大欲死者。用小針將頭撥破。以藥搽上一粒。膏封過夜。次早卽破膿。

咬頭膏。銅青。松香。乳香。沒藥。杏仁。生木鱉粉。萆薢仁各

等分。巴豆不去油加倍。搗成膏。每兩膏內加白砒一分。搗勻。臨用。取菘豆大一粒。放患頂。用膏藥蓋之。潰後卽搗下洗淨。換貼另藥。凡

胎前產後忌用。

替針丸。川烏。草烏。五靈脂各二錢。輕粉一分。粉霜一分。斑

蝥二十個去翅足。巴豆二十個去皮。右先將二烏。靈脂爲末研勻。

次入輕粉。粉霜研勻後。入巴豆。斑蝥。以水調和爲錠子。

拔毒部

十面埋伏散。麝香一錢。蜈蚣十條。炙甲片五錢。乳香。沒藥各

六錢。去油。蟬衣六錢。銀硃四錢。殭蠶八錢。炒斷絲。全蝎五錢。

漂淡。帶子蜂房六錢。焙燥。一切癰毒用之。自能拔毒收功。

九龍丹。斑蝥五分。去頭足糯米炒黃。乳香。沒藥各三分。去油。雄

黃二分。血竭一分。麝香一分五釐。冰片七釐。元胡五釐。元

參五釐。共爲極細末。摻之。拔毒生肌化腐。

附弔藥。眞蟾酥。火酒化。雄黃。明礬。紫石英。硫黃各等分。共

爲末。用好酒調一日。次日作條。

八仙丹。蜈蚣五條。全用。全蝎五只。全用。漂淡。阿魏三錢。殭蠶二

錢。炒斷絲。炙甲片二錢。血餘炭二錢。乳香。沒藥各二錢。去油。

血竭二錢。輕粉二錢。大梅片三分。兒茶二錢。麝香三分。浮

肉不去。加巴豆霜一錢。如生肌拔毒。則以原方用。

八將擒王散。蜈蚣去頭足。炒甲片。漂全蝎。蟬衣去頭足各四錢。

炒殭蠶。炒蛇脫各二錢。生五倍子一兩。另研極細末。麝香一錢。

雄黃五錢。水飛。共爲細末。疔毒忌用。

太白丸。轉運元丹。南星。白芷。半夏。花粉。川烏酒浸去皮。川

貝母各三錢。草烏三錢。去皮尖。麝香一錢。山茨菇五錢。去毛。

眞磁石五錢。右俱生晒爲末。摻。勿令出氣。治一切癰毒。未成卽消。已

成卽潰。已潰卽收功。

入將丹。川文蛤一兩六錢去毛。乳香。沒藥各三錢去油。雄黃三

錢。蜈蚣七條酒洗瓦上焙。全蝎七個漂勿焙。炙蟬衣七只。炙

甲片七錢。共研末摻。治一切癰疽。惟疔毒不宜用。

犀黃拔毒散。眞正頂犀黃五分。明乳香一錢。淨沒藥一錢。豆瓣

斑蝥一錢。原麝五分。共製細末摻。治癰疽發背。腐肉難化。勢垂危

者。立刻見效。此包氏之家藏方也。

去腐部

黑靈丹。大巴豆十六兩。蓖麻子五錢。俱不可去殼。安石臼內搥勻。

候天晴之日。將風爐放露天。上用鐵鍋以檜炭火。用長柄剷刀炒焦黑。

無白油可未爲度。研極細末。凡一切頑惡毒。升丹所不能提出者。用此

丹摻之神効。

黃靈丹。生白礬六錢。枯白礬三錢。腰黃一錢。共爲極細末。罐貯。

勿使有塵雜內。凡一切毒臭腐死肉不去。摻之自能生新肉。若新肉上

摻之。要片刻。一見膿水濕氣。其痛卽止。如肉腐作痛。先將金花散摻好

肉上。再用此丹摻腐上。自不疼痛。或用粉作條子亦可。

止痛部

醉仙丹。川烏。草烏。乳香。沒藥去油。木鱉子仁。法用豆腐一塊。

將鱉入其中。瓦上煨至腐枯。取出去皮毛。白酒藥。鴉片各一錢。

木香五分。共爲細末。火酒法丸。如彈子大。每重七分。凡癰疽瘡毒。值內托藥化毒之時。痛不可當。酒送一丸。卽能止痛。

動刀針外敷麻藥。川烏。草烏。細辛。南星。半夏。蟾酥各等分。

共爲細末。用好酒燉熟調搽。待麻木不知痛痒時。方可下手。

內服大麻藥。香白芷。川芎。製半夏。木鱉肉。紫金皮。大茴香。

牙皂。台烏藥。當歸各二兩。木香五分不見火。生川烏。生草

烏各一兩。共爲末。每服一錢。好酒調下。待麻木不知疼痛。方可下手。若

人昏沈。用鹽水灌之。

生肌收口部

十寶散。白龍骨三錢。眞象皮三錢。漂海螵蛸一錢五分。赤石脂

五錢。乳香二錢五分去油。沒藥二錢五分去油。血竭三錢。兒

茶一錢五分。麝香二分。冰片二分五釐。共研細末。用以收口生

肌。

又方。赤石脂一兩煨。冰片三錢。煨龍骨三錢。血竭。兒茶各二

錢。琥珀一錢。燈芯同研。乳香。沒藥各一錢去油。眞象皮三錢。

廉珠一錢。

白雲丹。輕白蘆甘石一兩。將傾銀罐內。煨至通紅。傾好醋內淬七次爲

度。輕粉一錢。白蠟二錢。冰片一分。

赤雲丹。輕白蘆甘石一兩。黃連汁煨淬七次。大梅片三錢。水飛

辰砂八錢。

又方。木香三錢不見火。水飛黃丹五錢。枯礬五錢。輕粉二錢。

共為細末。用豬膽汁拌勻晒乾。再研細搽之神效。

生肌散。辰砂二錢。血竭二錢。海螵蛸三錢。川貝三錢。輕粉二

錢。冰片五分。龍骨三錢。寒水石五錢煨。研細末。可代大昇。

又方。煨嫩石羔二兩。飛滑石二兩。白龍骨二兩。枯礬五錢。海

螵蛸二兩。鉛粉五錢。乾胭脂五錢。密陀僧五錢。研細末用。如

無膿水。摻之微作疼。

又方。赤石脂六兩。輕白蘆。甘石三兩。二味用防風。荆芥。黃芩。黃連。

黃柏。連翹。銀花。羌活。甘草等分煎濃湯。煨紅淬汁內九次。嫩石羔三

兩。冬煨。夏生為末。甘草水飛浸。白龍骨二兩煨。用童便淬七次用。

冰片一錢。粉口兒茶一兩。輕粉三兩。川連一錢五分。共為細

末。又方。川文蛤二錢炒。乳香去油。沒藥各一錢。枯礬五分。

又方。黃靈藥四錢。乳香。沒藥。兒茶各二錢。珍珠一錢同腐製。

共為細末。

又方。煨龍骨。海螵蛸。乳香。沒藥。象皮。剉末或炙。血竭。

輕粉各一錢。赤石脂二錢。冰片三分。珍珠六分。同腐製。研至無

聲。麝香少許。共為細末用。

又方。兒茶。白龍骨各一錢。輕粉。滑石各五分。冰片五釐。共爲細末用神效。

入寶丹。乳香。沒藥。血竭。輕粉各二錢。兒茶。白龍骨。鉛粉

各一錢。大梅片五分。或加白占二錢。赤石脂三錢。兒脂骨一錢。用之更妙。

生肌五寶丹。製甘石一兩。珍珠五錢。輕粉三錢。琥珀二錢。冰片二分。

生肌七寶丹。沒藥。乳香各五分。鉛粉三錢。桃丹三錢。辰砂三分。六仙紅昇五分。川貝三錢去心。用於乳癰最妙。

入寶丹。人參。犀黃各五錢。輕粉。白龍骨各一兩。廉珠。眞象皮各入錢炙。上冰片二錢。

又方。珍珠乳細。犀黃各五錢。象皮劉末。琥珀同燈芯研。煨龍骨。輕粉各一兩五錢。輕白蘆甘石三兩。用童便、米醋、黃連汁煨碎

各三次。冰片三錢。生肌定痛散。生石羔一兩爲末。甘草水飛。辰砂三錢飛。冰片二分。

月石五錢。一方。去辰砂。入輕粉五錢。共研末。用以化腐生肌定痛。

神效生肌散。煨石羔四錢。赤石脂。乳香。沒藥。輕粉。煨龍骨各二錢。血竭一錢。兒茶一錢五分。冰片五分。紅昇丹五錢。

神妙生肌散 乳香 沒藥各二錢 二味燈芯同研 兒茶 血竭 海

螵蛸 赤石脂各一錢 輕粉三分 龜板 鱉甲各一錢炒 月石

二錢 水銀一錢 黑鉛一錢 先將鉛水銀同煎化 另將前藥研末

入鉛汞於其中 再研極細末 凡癰疽發背 諸般瘡毒 潰爛疼痛者 搽之

神效 初起者 加黃桐一錢 作痒者 加白芷一錢

九一丹 紅昇丹一錢 煨石羔九錢 研勻搽之 能生肌收口 然須浮肉去

淨 方可用此

珍珠散 又名奇效入寶丹 珍珠母即大蚌殼 須露天之左顧者半升

刮去背後黑衣 火上煨研細 入後藥研 蘆甘石三兩 黃連二錢煎

汁煨淬七次用 血竭三錢 兒茶一兩 煨石羔三兩 赤石脂三

兩煨 陳年絲吐渣一兩煨存性 大梅片臨用時 每五錢用一分

珍珠十寶散 蘆甘石 黃連 當歸煎濃汁煨淨九次 用淨末八兩 珍

珠母一錢煨淨 琥珀淨末七分 龍骨煨水飛淨四分 血竭二分

赤石脂煨水飛淨四分 辰砂水飛淨五分 鍾乳石甘草湯製一伏

時 水飛淨六分 象皮焙乳爲末五分 冰片每藥一錢 加入二分

研細摻生肌長肉

生肌紅玉丹 炒黃丹二錢 煨龍骨二錢 煨石羔三錢 共研細摻

鱈魚散 一尾 不落水去腸用之 羯羊糞傾滿魚腹爲度 將炭火烘

焦存性 凡背疽大潰 藏府僅隔一膜 候膿少欲收時 爲細末 大有神效

兼治一切潰瘍生肌收功。

又方。川連二錢。 陀僧五錢。 胭脂二錢。 葦豆粉二錢。 雄黃。 輕

粉各一錢。

十寶丹。 去油乳香粉一錢五分。 去油沒藥一錢五分。 血竭一錢五

分。 辰砂一錢五分。 粉口兒茶一錢五分。 製甘石二兩。 赤石脂

二兩。 小梅片一分五釐。 煨石羔二兩。 共研極細末摻之。能生肌

長肉收功神效。

去管部

上品錠子。 紅礬一兩五錢。 乳香。 沒藥。 辰砂飛各三錢。 牛黃五

分五釐。 硼砂一錢四分。 生熟各半。 白信一兩。 煨淨黑煙爲度。 治

漏管大症。

中品錠子。 白礬一兩八錢五分。 沒藥。 乳香各五錢五分。 辰砂五

錢。 牛黃四分五釐。 硼砂一錢。 生熟對品。 金信一兩五錢。 煨淨黑

煙爲度。 治翻花癭癰等症。

下品錠子。 治疔瘡發背等症。 再礬三兩二錢。 乳香六錢。 沒藥五

錢。 辰砂三錢飛。 牛黃四分五釐。 硼砂一錢。 生熟各半。 白信三

兩。 煨淨黑煙。 半月取起可用。 上各依法製用。 麪糊和勻。 搥成錠子。 看

痔漏大小深淺插入錠。 如肉內黑色。 勿上生肌散。 只待黑肉落盡。 方可

上。 若瘡無頭。 太乙膏一個。 加用後各藥粘一粒貼之。 白礬二兩。 乳

香三錢二分。沒藥三錢七分。辰砂四分。牛黃五分。薑黃二錢五分。須酌用。白丁香一錢五分。巴豆三錢二分去淨油。共爲末。或吐沫調瘡。一日三次。瘡破插上前錠子。

三品一條鎗。明礬二兩。白信一兩五錢。二味共研極細。入小罐內。炭火煨紅。青煙已淨。旋起白煙片時。待上下紅微。住火取罐。傾地上。宿一夜取出。約其末一兩。配入雄黃二錢四分。乳香一錢二分。共研極細。厚糊調稠。搓成線香式。陰乾。凡以上三品之症。遇有孔者。插入孔內。無孔者。先用針放孔竅。早晚插藥二條。插至三日後孔大。每插十餘條。插至七日。患孔藥條滿足。住後所患四邊。自盡裂開大縫。候至十四日前後。疔核瘰癧。痔漏諸管。自然落下。隨用湯洗膏貼用藥。

拔管方。紫硃砂四分。蛻螂五分。紅昇丹四分。冰片四分。共研細末吹入。

消漏管方。大蛻螂一個陰乾。冰片三釐。共研細。以紙燃蘸末入孔內。漸漸生肌肉。藥自退出即愈。並治多骨疽。多骨退出即愈。去瘡疽中多骨法。烏骨雞腳脛骨一對。白砒研細實骨內。鹽泥固。

濟。火煨通紅。去泥研末摻之。或以飯丸如粟米大納入。

蛻龍丸。葦菜地上地龍一斤。以酒洗去泥。瓦上炙乾爲末。蛻螂蟲八個。炙乾爲末。刺猬皮連刺五錢。炙爲末。眞象牙屑一兩。另爲細末。川山甲一兩。麻油炒黃細末用。右共和勻再研。煉蜜爲丸。如桐子大。

凡一切遠年瘡毒成管膿水時流不收口者大人每服八分小兒每服五分。開水送下。服藥未完其管自能逐節推出以剪去敗管藥畢管自退盡即可收功。忌口百日。

入將擒王丸。帶子蜂房三錢。象牙屑五錢。殭蠶三錢。蟬蛻三錢。

全蠍一對。木香三錢。乳香三前。沒藥二錢。右共爲細末以黃

占八兩滾化熬過入藥末攪勻傾水中取出爲丸如棗仁大。凡一切癰疽發背瘡痔成漏每服一丸空心滾酒送下。連服三日待其藥從滿口透出隔一日再服一丸至第五日再服一丸神效。

漏管內消丸。刺猬皮炙。眞象皮各五錢。甘草節鱉血拌炒燥一兩。

小赤豆晒二兩。赤芍炒一兩。松花焙一兩。炙甲片二錢。象牙

屑晒二兩。黃明膠蛤粉炒二兩。金銀花炒七錢。共爲細末以米

仁磨粉水煎漿糊丸如桐子大每錢半滾水送下。

退管神方。陳年廢琉璃底廟內者三錢。麩炒透研細末。辰砂一錢。水

飛另研。人指甲一錢。麩炒研。蟬衣一錢五分炒研。去油乳香八

分。去油沒藥八分。象牙末一錢另研。枯礬八分研末。共和勻

用黃占三錢滾化入藥攪勻乘熱爲丸如菉豆大無論遠近成管初服

十粒逐日漸加一粒加至十六粒爲止以無灰酒送下如患上身者加

川芎六分。下身者加入牛膝六分。遠年者一料必愈。近年者半

服收功。忌葱百日。

拔管丸。炒生地四兩。炒槐米二兩。炙獾皮二張。象牙屑四兩。

酒歸身二兩。炒黃芪二兩。廣膠二兩。土炒成膠。川山甲一兩二錢。土炒。共為末。沙糖煇為丸。如梧子大。每服三錢。晨起燈心湯下。

此方驗過。年久生數管者。服兩料必愈。服藥時。須善節養。愈後檢制。好

飲火酒尤宜戒之。

化管萬應條子。砂虱三分。大升弔七分。共研極細末。米糕搗勻。搓

條如線香式。

收管黑龍丹。大熟地切片烘乾炒枯研細一兩。烏梅肉三錢炒炭為

末。凡惡瘡疽毒。生於筋窠之間。擠膿太重。齧肉突出。久不收縮。此乃

傷氣脈使然。不可用降蝕腐化。用此藥不過三五收功。

拔管神方。白信一兩。鵝管石一兩。生明白礬一兩。飛淨明雄黃

一兩。薄荷水三錢。法先將雄黃一半鋪底。次將四味放中。再用雄

黃蓋頂。煉如昇丹法。煉成後約六七錢。再加冰片三分。薄荷六分。

沒藥三錢去油。和勻。臨用以猪棕粘白茹果成線。晒乾入納患處。每

日一次。三四次後。自能拔出。再用收功神效。

膏藥部

三妙膏。紫荊皮二兩。獨活二兩。白芷二兩。赤芍二兩。石菖蒲

二兩。紅花。羌活。烏梅。川黃柏。大黃。麻黃。真貝母。肉

桂。細辛。黃芪。片芩。當歸。防風。半夏。連翹。桃仁。續

隨子。荆芥。牙皂。柴胡。苦參。全蝎。牛膝。漢防己。真川
 連。天蟲。猬皮。大戟。天花粉。良薑。鱉甲。草烏。牛蒡子
 各五錢。血餘。甲片。白附子。海風藤各五錢。蛇蛻一條。蜈
 蚣三條。共藥四十四味。咀切片。用香麻油二百兩。入大鍋內。浸七
 日夜。再入桃柳槐葉枝各二兩。每段一寸。慢火熬至藥黑枯。濾去渣。
 將鍋拭淨。以密絹仍濾。入鍋務要清潔為美。再用文火熬油至滴水成
 珠。拱起不散。大約淨油一斤。配上好漂黃丹入兩炒。以一手持柳
 木棍攪不住手。一手下丹。待勻自然成膏。入預製研細末。乳香。
 沒藥各去油入錢。血竭。雄黃各五錢。四味另研。先入攪勻。再入
 香珍十味。木香。沉香。降香。楓香。藿香。麝香。母丁香。
 真珠。冰片各一錢。共研極細末。徐徐添入攪勻。再入潮腦五錢。
 成膏收用。凡毒貼之。未成即消。已成即潰。已潰即斂。故名。
 萬應清涼膏。木鱉。葶蔴子。當歸。生地。苦參。蒼耳子各二兩。
 生大黃。黃芩。黃栢。赤芍。元參。天花粉。桃仁。白芷。角
 刺各一兩。川山甲。直僵蠶。全蝎。黃蜂房各五錢。甘草八錢。
 槐枝二兩。蝦蟆十四只。用麻油七斤。入前藥浸。春夏三。秋七
 冬十日。入鍋熬藥枯之。去渣濾淨。復入鍋內。武火熬至滴水成珠為度。
 秤淨油一斤。入炒黃鉛粉八兩。研細。徐徐攪入。俟白煙起。傾井水
 內七日。出火氣。攤貼。治外科一切大小疽毒。能提毒生肌長肉。其效如

神。

治一切無名腫毒膏藥。川栢三兩。白芷二兩四錢。當歸二兩四錢。

草薢子一兩二錢。去油乳香三兩。去油沒藥三兩。生地二兩四

錢。全蝎九十只。馬錢子切片四十二個。蟬衣一兩八錢。蛇蛻

六條。男子髮一大團。用赤芍四斤。另研細收膏。不老不嫩。浸水

內出火氣攤貼。無論紅腫已成未成。俱效。此方自京都得來。

神效千槌膏。土木鱉子五個去殼。白嫩松香四兩揀淨。銅綠一錢

研細。明乳香二錢。沒藥二錢。草薢子肉七錢。巴豆肉五粒。

白杏仁一錢。安石曰內。搗三十餘下。即收膏。浸涼水中。臨時隨瘡大

小。用手捻成薄片貼上。瘡用絹蓋之。治瘡瘍疔毒。初起即消。並治瘰癧

連根拔出。大人臙瘡。小兒善貢頭俱妙。

會通靈應膏。元參一兩。馬錢子二兩。草薢子五錢去殼。五倍子

五錢。杏仁二兩。蛇蛻三錢。帶子蜂房五錢。男子髮一團。麻

油一斤四兩。如法熬膏。

千槌綠雲膏。麻油三兩。以草薢子仁四十九粒。安麻油內燻枯揀去

渣。用麻油。葱製松香八兩。大猪膽汁三個。銅綠二兩研末。先

將松脂放銅杓內。爐火上滾化。乃下麻油。銅綠。猪膽汁熬勻。搗千餘下。

再烘煇傾入水。用手扯拔百餘遍。愈拔其色愈綠。貯瓦罐內。蓋好聽用。

以油紙攤貼瘡。能吸膿拔毒。消腫定痛。如遇善貢頭。用細布攤貼一次。

其膿自能拔淨不必再換。

生肌玉紅膏 當歸二兩 白芷五錢 紫草二錢 甘草一兩二錢

白占二兩研細 輕粉四錢研細 用麻油一斤 將前藥浸七日煎

至藥枯濾去渣將藥再熬至滴水成珠下白占攪勻次下血竭待冷再下輕粉待成膏蓋好凡一切癰疽發背對口大毒腐去孔深見隔膜者

此膏填塞瘡口自能生肌長肉收口爲外科聖藥

拔疔紅膏 上血標水飛一錢 葶麻子仁二錢 松香五錢 黃丹一

錢 輕粉五分 共搗成膏凡一切無名腫毒將疔頭用銀針挑破用

膏一小團安膏藥上居中貼之疔卽拔出或畏疼不挑破亦可

拔疔黑膏 松香二兩先用桑柴灰汁入鍋內同煮爛取出納冷水中少

時再同灰湯煮煮後再納水中至松香色如玉爲度 白占一兩研末

乳香三錢去油研末 黃占一兩研末 沒藥三錢去油研 銅綠五

錢研 眞百草霜五錢研細須要野山人家將鍋底刮後專燒茅草柴

取爛煤灰 麻油六錢 擇吉淨室修合忌婦人鷄犬及孝服人見用

桑柴火煎先將麻油入鍋滾次下松香末候稍滾三下白占末候稍滾

四下黃占末候稍滾五下乳香末候稍滾六下沒藥末候稍滾七下銅

綠末候稍滾八下百草霜末滾過數次於鍋冷透搓成條子磁器內蠟

封口臨用時以龍眼核大一粒呵軟貼患處如疔毒一貼卽咬住不放

若非疔毒則屢貼屢落此能立刻止疔毒痛次日卽愈貼後忌腥辣沸

湯熱食豆腐生冷煎炒茄子黃瓜酒麵發物葱蒜飲酒行房又忌冷水洗及大麻花已走黃者一服必愈真妙方也。

又方。松香六兩。以白布一方包浸童便中。每五六日一換。浸至一月取出。用葱湯於石罐內。將松香煮之極透而軟。放冷水如掛粉狀。細細握捏。仍令其硬。再還原湯中煮軟。煮後再捏如前法。令其色白如粉者。用葶麻子肉二兩去油。千金霜二兩去油淨。乳香。沒藥。各去油七錢。桃仁。一兩五錢去皮尖。銅青。靈磁石。各一兩五錢。火煨通紅。醋淬七次。以上各揀道地。多辦分兩。如法製好。秤準分兩。先將葶麻子肉桃仁搗爛如泥。次將五味入搗成膏。後入松香等搗成團。盛磁器內。上口封好放在地。每用不可見火。以津液潤軟攤藍布上貼。先將銀針挑破疔頭。患痛不挑亦可。以一丸可治二三人。

發背膏。

去油乳香。

去油沒藥。

血竭。

兒茶。

鉛粉。

黃丹。九炒九

淘。紅銀硃漂各四兩。

銅綠三錢。

共研至無聲爲度。用時隨症大

小。取夾油連史紙一塊。以針多刺小孔。每張準秤藥末五錢。真麻油調攤紙上。再用油紙一塊蓋之。周圍用線縫好。貼患處。用軟絹扎緊。過三日將膏揭開。濃煎葱湯洗淨。軟絹拭乾。將膏翻過。再用針如前刺小孔貼之。至重者用兩張。

鯽魚膏。

大蝦蟆七個。

活烏背鯽魚十二兩。

麻油二斤。

文武火熬

枯去藥渣。再熬至滴水成珠離火。再入輕粉四兩。鉛粉十二兩。攪

成膏收藏。臨用攤貼。

白膏藥。淨巴豆油十三兩。淨葶蔴肉十二兩。香油三斤。蝦蟆五只。口內各啣男子髮一團。活鯽魚十尾。先將巴豆葶蔴肉浸油內三日。再入蝦蟆浸一宿。臨熬入鯽魚共燂枯瀘去渣。再熬至滴水成珠離火。傾淨鍋內。加鉛粉二斤半炒黃研細。乳香五錢研末。攪成膏。凡諸瘡腫毒潰破流膿攤貼。

京都硃砂膏。鮮桃柳桑槐枝各五尺。紅山梔八十個。頭髮一兩二錢。炙甲片六錢。象皮六錢。以麻油四斤。燂枯去渣。再熬至滴水成珠。加入飛黃丹一斤半。攪成膏。再入真硃砂三錢。血竭一錢。兒茶二錢。三味另研末。共攪極勻出火氣。凡除疔瘡外一切惡瘡癰疽發背。攤貼能去腐消堅。並諸般瘡癩痰核硬塊。其勢成者。亦能大化爲小。

九香膏。白芨一兩。丁香五錢。白芷一兩。乳香。沒藥各一兩。去油。辰砂三錢。麝香五分。冰片一錢。爲極細末。用前清涼膏油一斤四兩。滾化和勻。凡一切癰疽發背瘡毒。量毒大小。以包柿漆銀粉紙攤貼。未成卽消。已成卽潰。已潰卽拔毒收功。

巴鯽膏。巴豆肉五錢。鬧羊花二兩。番木鱉五錢切碎。川烏五錢切片。草烏五錢切片。葶蔴肉三兩。川山甲二兩。商陸一兩切。漏蘆一兩。蒼耳子四兩。全當歸二兩。元參二兩。白芨五錢。

白蘇二兩。 大黃三兩。 黃牛爪一兩。 兩頭尖三兩。 猪甲爪一兩。
 蝦蟆乾二兩挂死者。 大半角三只。 大鯽魚一對。 用麻油五斤。
 浸。 春夏三秋七冬十日。 候日數畢。 入鍋內。 桑柴火熬至藥枯。 用絹
 濾淨渣。 將油再入鍋內。 慢火熬沸。 漸入飛淨血丹廿四兩。 以槐柳條
 不住手攪。 待滴水成珠。 將鍋撥下。 取水盆相穩。 攪至煙淨。 再入上安桂
 四錢。 乳香末四錢。 沒藥末四錢。 輕粉末。 好芸香末各四錢。
 各漸入攪勻。 傾入水內。 以柳棍攪成塊。 再換冷水。 將膏作數十團。 用礬
 水浸埋地下退火毒。 凡小瘡大癰。 用細紙攤貼。
 大土膏。 大黃二兩。 香附七錢。 生地一兩。 葶蔴子二兩。 木鱉子
 一兩。 五倍子七錢。 大戟八錢。 甘遂七錢。 芫花七錢。 肉桂八
 錢。 川連五錢。 麻黃八錢。 三稜一兩。 杏仁七錢。 蓬莪朮八錢。
 檳榔。 全蠍。 川山甲。 草烏。 獨活。 細辛。 防風。 厚朴。 元參。
 天花粉。 桃仁。 皂角。 川烏。 巴豆。 羌活。 白芷各八錢。 當歸
 一兩五錢。 川柏八錢。 枳實八錢。 蛇蛻五錢。 蜈蚣五錢。 用真
 香油六斤。 浸五日。 熬去渣。 至滴水成珠。 加蜜陀僧四兩。 飛黃丹二
 斤四兩。 熬至不老不嫩。 收貯埋地下三日。 出火毒。 凡一切外症。 并肝
 胃氣。 隨時攤貼。 治法另有引單。 熬膏時。 須要虔誠。 切忌污穢。 及婦人鷄
 犬之類。

白膏藥。 蘆甘石一兩。 先用黃芩、黃連、黃柏。 以童便濾汁。 將甘石傾銀罐

內。煨通紅碎九次。水龍骨一兩。去油乳香。去油沒藥各五錢。

川連五錢。煨龍骨五錢。宮粉一兩。麝香五分。冰片一錢。真

輕粉三錢。黃占三兩。白占一兩。共為細末。用公猪油四兩。先

熬去渣。入二占滾化略冷。然後入藥末攪成膏。若硬加香油些些。凡一

切夏月瘡毒不收口。并傷筋。手瘡。腫瘡。攤貼神效。

陽和解凝膏。香油十斤生用。入鮮大力子根葉梗全用三斤。活白

鳳仙梗四兩。同煎枯去渣。次日入當歸。肉桂。附子。桂枝。大

黃。官桂。川烏。地龍。殭蠶。赤芍。白芷。白朮。白芨各二

兩。川芎四錢。防風。荆芥。木香。陳皮。香櫞。川斷。五靈

脂各一兩。候煎枯濾去渣。隔一宿油冷後。見過斤兩。每油一斤。入炒

透淘丹七兩。攪勻以文武火熬至滴水成珠。不粘指為度。離火取乳

香末二兩去油。沒藥末二兩去油。蘇合油四兩。麝香一兩研細。

入膏內。攪勻。半月後。即可攤貼。凡一切腐爛陰疽凍瘡。貼一夜全消。潰

者三張全愈。如瘡疾貼背亦妙。

烏龍膏。當歸。白芨。連翹。蟬衣。大紅各二兩。羌活。獨活。

川烏。草烏各一兩。細生地。血餘。大黃。淨銀花。番木鱉各

四兩。麻黃一兩五錢。澤蘭五錢。全蝎二兩。炒甲片二兩。蝦

蟆五十只。瞎地鱉蛇兩條。大蜈蚣百條。三毒俱要活。藤油五斤。

桐油八兩。桃柳桑枝各三十段。每長三寸。薑八兩。葱八兩。法

先將枝熬枯取出。令丐者將瞎地驚蛇。活放入鍋。急將鍋蓋撒住。至蛇不動時。再入蝦蟆。後將前藥。川山甲。蜈蚣。全蝎等熬至藥枯黑。濾去渣。將鍋抹淨。再以密絹濾油入鍋。用文武火熬至滴水成珠。離火。再入上好洋丹三斤。一手下丹。一手揚硬木棍。不住手攪勻成膏。再入乳香。沒藥。各三錢去油。麝香。冰片。各五錢。四味預另研和勻。徐徐摻入。攪極勻成膏。收貯出火毒。凡癰疽發背。對口搭手。一切無名腫毒。惡瘡。貼之未成。卽消。已成。卽潰。可以不假升丹之力。而能去腐止痛。拔毒收功。

不二膏。金石斛。十六兩去根。乳香四兩入錢去油。川貝十六兩去

心。沒藥四兩入錢去油。明天麻六兩入錢。粉草六兩四錢。巴

豆肉五兩四錢去油。用大麻油十二斤。浸數日。煎時下以活雄鯽

魚兩尾。煎枯去渣存油。另用鉛粉炒黃研細二斤。篩下收膏。凡痰

症癰串乳癰。一切無名腫毒。貼之神效。如乳癰未潰者。少加潮腦於膏

上。

仙授神效藥紙。端午蘄艾四五斤。煎濃汁去渣。入粒子紅花四兩。煎

一炷香。再入去油乳香。去油沒藥各八兩。研細末。煎一炷香。再入

眞象皮末四兩。煎一炷香。加入牛皮膠二斤。煎至膠化汁粘爲度。

用半毫排筆蘸藥汁。搽刷大紅紙上陰乾。凡狗咬蟲蝨蛇傷。並跌打破

皮。及一切爛膀癰。用津唾潤軟貼之。速能奏效。眞神方也。

巴豆油膏。巴豆三兩。用麻油煎片時。勿令枯。再用綿料紙滾盡外面

油。以搗盆打自然油。用夏布絞出。加入輕粉三分。拌勻。磁瓶收貯。勿令出氣。凡發背癰疽疔瘡等症。看患大小。以油照樣塗抹膏藥上貼之。日換三次。

加味太乙膏。肉桂。白芷。當歸。元參。赤芍。大黃各二兩。土

木鱉子二兩。血餘一兩。真阿魏二錢。切片滾化。去油乳香末。

沒藥末各五錢。槐枝。柳枝各百段。東丹四兩。真麻油十斤。

如法熬煉後。加輕粉四錢研細。收膏。凡癰疽發背。一切惡瘡濕痰流注。筋骨疼痛。跌仆損傷。遺精白帶等症。貼之神效。

簡易玉紅膏。真香油廿兩。火上熬滾。下淨頭髮五錢。渣令淨。鷄子

十個。打破黃白攪勻。徐入油內。熬枯去渣。下黃占五兩。化開離火。

再入飛丹五兩。攪勻之。用能生肌收功。止痛拔毒。

爛腿夾紙膏。梅片四分。煨甘石一兩二錢。輕粉五錢。白占三兩

五錢。菜油一斤。夏天用。先將菜油煎滾。再入白占化開。再將藥三

味同煎。

外科方外奇方卷三

清浙湖凌曉五先生遺著 後學

杭州沈仲圭錄存
杭州蔡燮陽校刊

疔瘡部

立馬回疔丹。

金脚信五分。

蟾酥。

血竭。

辰砂。

沒藥各五分。

輕

粉。冰片。

麝香各二分半。

共爲極細末。用草烏頭煎汁和勻作細

條。能治一切疔瘡疔毒。走黃險症。

又方。去血竭。沒藥。冰片。加礪砂。白丁香。蜈蚣。乳香末。雄黃末。

拔疔毒方。礪砂。白礬。硃砂。食鹽各三錢。擇丁日午時。先將礬

鹽二味。放鐵鑪刀頭上煨乾。共研極細。罐貯聽用。

散疔丸。蟾酥。明礬各三錢。殭蠶。辰砂各一錢半。牛黃。冰片

各一錢。麝香七分。共爲極細末。用煉白黃占。滾化稍冷定。入前藥

末。和丸如麻子大。每服七分。葱頭白酒送下。取微汗爲度。

拔疔丹。蜈蚣一個去頭翅。礪砂五分。白信五分。共搗爲丸如椒

子大。先以三稜針刺瘡約深幾許。將此丹納入。以頂針捺下。須臾大痛。

皆變黃水而出。然後以野菊花。不拘根葉搗汁一盞。和酒服之。連進三

服。盡醉爲度。再以人中黃爲丸。日日服。用好酒送下全愈。

疔瘡走黃丸。雄黃。生軍。巴豆肉。去心皮各等分。共搗如泥。以飛

麵陳醋煮糊爲丸。如鳳仙子大。重者每服二十三丸。輕者每服二十一丸。放舌上。熱水服送下。服後打噎爲愈。如瀉更妙。三五次後。米湯水下止之。如不省人事。以二十三丸。水化灌之。此方去雄黃。加川鬱金少許。治纏喉急痺。並濕痰流注。楊梅初起。

疔毒秘丸。人指甲不拘多少炒黃研細。麝香一分。便壺底一匙。

共研勻。和丸如米大。

又方。加耳垢、齒垢、腳爪更妙。

保生錠子。巴豆肉四十九粒。連壳文武火炒研。硼砂二錢。輕粉半

大匣。金頂砒二錢。雄黃二錢。麝香一錢。共爲極細末。用黃占

五錢。鎔開。將藥和成錠子。冷水浸少時取出。旋丸捏作餅子。如錢眼

大。將瘡頭撥開。安一餅于頂上。膏蓋。能治疔瘡背疽癰癩。一切惡瘡。

回疔散。土蜂窠帶子一兩。蛇蛻一條。泥固火煨存性。研極細末。能

治走黃危症。白湯送服二錢。或酒送亦可。少刻大痛。痛則許救。毒化黃

水。痛止令活。

五香散。丁香四分。木香。乳香。沉香各四分。麝香五釐。腰黃

六分。共研。好醋調。須於端午日午時合之。或天德吉日亦可。用針挑

破瘡頭。將醋一點。用藥少許。安膏藥上貼之。能治疔瘡赤黃危急。二三

日即愈。

人龍散。蛔蟲燻燥一錢。如無用五谷蟲代。白礬三分。蟾酥三分。火

酒化。共調勻搽之。治翻唇疔毒。少刻疔破。流毒水即愈。

拔疔散。硃砂。白丁香。輕粉。蜈蚣各一錢。全蠍。麝香各二錢。

金頂砒六分。共爲極細末。取蟾酥一錢。火酒化。同搗和丸。如芥子

大。帶長。以便插入疔孔。

又方。麝香。血竭。乳香。沒藥。靈磁石。冰片。蒼耳子。瓦上

炙淨油。各等分。研細末貼。

急治疔瘡神效方。乳香。沒藥各六分。赤芍二錢。元參一錢。冰

片。麝香各六分。龍虎鬪五錢。即青小蛇。與壁虎。鬪死者。如無。以斑

貓六錢。糯米同炒黃去米研。全蠍六個去頭足。立馬回疔丹代之。

共研極細末。收貯勿泄氣。臨用摻膏藥上貼之。自能穿破。候擠出血根

即愈。真神方也。

喉症部

金餘散。此方凌府備用。照分不可增減。人指甲五分。煨。鵝管石三

分。煨。真腰黃二分。硼砂三分。漂。大梅片一分。殭蠶二分。炒斷

絲。共研至無聲爲度。吹之。能治爛喉痧。及緊喉風。

冰硼散。龍腦。薄荷一錢。乾燥爲末。硼砂一錢。漂。人中白八分。川

連生末八分。青黛五分。元明粉五分。九製陳膽星五分。山豆

根八分。大梅片二分。共研極細末。吹之。能治一切咽喉各症。

冰硼散金鑰匙方。火硝一錢五分。白月石五分。冰片三釐。研細

吹之。能治咽喉諸症。雙單乳蛾。

又方。冰片五分。月石五錢。元明粉五錢。辰砂六分。

七寶散。西牛黃五分。真廉珠三錢。大梅片二分。真象牙屑三錢。

焙黃。淨真青黛六錢。人指甲五分。男用女。女用男。壁喜窠四五

個。多多益善。板上不用。共乳無聲爲度。吹之。能治喉痧。一切喉風急

症。

珠黃散。珍珠。犀牛黃各一分。青魚膽一錢。真者陰乾。大冰片。

麝香各一分。共研無聲。不可泄氣。吹之。能治咽喉十八症。

吹喉散。青黛。龍腦薄荷各八分。飛淨雄黃三分。粉口兒茶五分。

大梅片一分。月石三分。珍珠三分。犀黃一分五釐。研極細末。

罐貯勿泄氣。吹之。能治咽喉十八症。

吹喉散。珍珠末二錢。青黛三錢。犀黃一錢。月石三錢。麝香二

分五釐。兒茶二錢。梅片三錢。血竭三錢。熊膽三錢。山豆根

八錢。去油乳香三錢。沒藥三錢。共爲細末吹。

小清涼散。犀黃四分。粉口兒茶一錢。龍腦薄荷尖四分。青黛五

錢。月石二錢。元明粉一錢。人中白三錢。煨。生珠一錢。乳細。

大梅片一錢。共爲極細末吹之。能治咽喉十八症。

清涼散。宋半夏末一錢。龍腦薄荷尖末一錢。桔梗末一錢。生大

黃末一錢。漂芒硝一錢。漂月石一錢。珠母粉二錢。青黛一錢。

冰片三分。雄精。炒天蟲末。射干末各一錢。山豆根末一錢。元參末一錢。粉草末一錢。枯礬一錢。青蘘核十個煨存性。威靈仙末一錢。九製膽星一錢。共研勻吹之。能治咽喉十八症。寶珠丹。白礬砂二錢。川連一錢二分。番木鱉去壳麻油燂鬆。黃柏。青黛水飛。薄荷尖。水飛雄黃。人中白煨。兒茶。膽礬。血竭。冰片各五分。燈心灰三分。共爲細末。收貯勿泄氣。吹之能治咽喉及口疳。

人中白散。此方凌府備用。應驗如神。眞青黛。月石各一錢。龍腦薄荷末五分。人中白一錢。梅片二分。粉口兒茶一錢。元明粉五分。馬屁勃五分。研吹能治咽喉口舌諸症。或加犀黃三分。珍珠五分。其效更速。

咽喉急症異功散。斑蝥去翅足。同米炒黃去米。取淨末四錢。血竭六分。沒藥六分。全蠍。元參各六分。麝香三分。冰片三分。共爲細末。收貯勿令出氣。不論爛喉痧。喉風。喉痺。雙單乳蛾。用膏藥一張。取藥如黃豆大。貼項間。左貼左。右貼右。中貼中。至三四時卽起。用針挑破卽愈。險症起。跑更速也。

玉鑰匙。月片五錢。牙硝一兩五錢。炒天蟲一錢。冰片三分。共爲末吹之。能治風熱喉痺。及纏喉風症。

紫袍散。眞石青。青黛。辰砂。月石各一兩。膽礬煨。人中白。

元明粉各五錢。山豆根二錢。共爲末。能治咽喉十八症。

冰梅丸。南星生用二十五個切片子。鮮大半夏十五個切片。皂角

去弦四兩。白礬。食鹽。防風。朴硝各四兩。桔梗二兩。大半

熟青梅百個。先將硝、鹽水浸一周時。然後將各藥研碎入水拌。再將梅

子置水中。其水過梅子爲度。浸七日取出晒乾。再入水中浸透。再晒乾。

如是以水乾爲度。收貯磁器中。起霜爲妙。每含口中。嚙其汁而痰自出。

能治咽喉十八症。一梅可治三人。不可輕棄。

霹靂錠。牙皂一百四十個火煨。延胡索二兩生晒研。飛青黛六分。

麝香一錢。共爲細末。水和成錠。每重二三分。日乾收貯。勿令泄氣。不

論喉風喉痺風。雙單乳蛾。斑痧。小兒驚風諸險症。立即奏效。如遇牙關

緊閉。卽從鼻孔灌入。藥下卽開。每服一錠。重者加服。小錠磨汁冲服。真

神方也。

仙露梅。大青梅子三斤。青鹽四兩。食鹽二兩。活蝸牛四十個杵

爛。共拌勻隔一夜。以後日晒夜收。鹽盡爲度。磁器收貯。每取肉少許

含嚙。能治咽喉大症垂危者立愈。

喉風弔痰方。紫苑。牙硝。等分爲末含之。

又方。用七葉一枝梅。陰乾研細吹。如新鮮搗乾用根磨汁塗。能消無名

腫毒。

喉癰吹藥方。哺胎雞蛋殼一錢。連衣燒灰存性。兒茶五分。橄欖核

五分。犀牛黃五分。廉珠五分。人乳粉五分。銀瓢製。明雄黃五分。真梅片三分。樟冰片不可誤用切囑。共研極細末吹患處。

諸瘡部

一抹光。上白豬板油一斤去膜。麻黃四兩去根節。木鱉肉四個。

全斑蝥四只。明礬三錢。大楓子肉四十個。先將豬油放瓦罐內。

文武火鎔化。宜先入水半杯於罐中。恐罐燒破。以夏布作袋。將麻黃

袋於其中。以線紮口。放油內。先要蘆根數條放罐底。煎半枝香爲度。

取出。再將斑蝥木鱉袋入原袋中紮口。仍煎半枝香取出。瀝乾。將大楓

子敲碎。同明礬入油內略煎。撥放地上一夜。取油搽擦。

又方。麻黃三兩去根。小磨麻油二兩。同入銅鍋內熬黑。撈去渣。將

油瀝清後。入鍋內熬熱。投入白蠟二兩研末。黃蠟二兩切碎。攪勻

離火。再入研細硫黃一兩二錢。炒花椒六錢。生明礬六錢。枯白

礬八錢。炒甘草四錢。調成膏。隔宿取出搽擦。

又方。熱豬油一碗。麻油一兩。川椒二錢。同熬去渣。再投研細之

硫黃五錢。樟腦三錢。血竭三錢。輕粉一錢。明礬二錢。攪成

膏擦。

膿窠痒瘡方。枯礬一兩。川椒三錢。硫黃三錢。豬毛灰二錢。共

研細末。豬油調搽。一方加丁香一錢。

又方。大楓肉五錢。油核桃肉五錢。信五分。水銀一錢。榆油燭。

三文一枝。先將楓、桃二肉搗如泥。次入水銀、燭，研至不見星。再入信末和勻。分作六丸。每日臥時用一丸。將絹包裹在心窩。搗焯爲度。手不可摸穢物。搗至五日。停一日。至第七日再搗藥一次。次早胸前必發細瘰。以手摩之微痛。當日卽愈。甚者用一料。七日全愈。永不再發。

又方。煙膠。蛇床子。血竭。黃丹。輕粉。大楓子。硫黃。樟腦。水銀。如膿窠瘡不用。蜈蚣。

一切瘡疥方。樟腦一錢。蜈蚣兩條。冰片五分。大楓肉二錢。豬板油一兩。白礬二錢。雄黃二錢。白砒二錢。共搗勻搽。

陸定圃先生方。廚房倒掛灰塵三錢。煨伏地氣。松香。茴香。花椒。枯礬。煨硫黃。癩蝦蟆。蒼朮。白芷。硃砂各一錢。共研細末。用雞子一個。中挖小孔。灌藥其中。紙封口。置幽火中燉熟。輕去其殼存衣。再用生豬油和藥搗爛。葛布包。時擦痒處。其效如神。

疥瘡剪草散。蛇床子三錢。寒水石二兩。蕪荑二錢。剪草一錢。吳茱萸。枯礬。黃柏各一錢。蒼朮五分。厚朴五分。明雄黃五分。輕粉一錢。共爲末。香油調敷。專治癬疥等症。

一掃光。輕粉五錢。樟腦五錢。大楓肉一錢三分。雄黃一錢三分。蛇床子二錢五分。苦參二錢五分。蕪荑二錢五分。硫黃一錢三分。

又方。胡椒一錢。雄黃二錢。枯礬二錢。生礬一錢。硫黃二錢。

樟腦一錢 共爲末。用大楓子油。或猪板油調搽。能治痛痒膿窠肥瘡。
 又方。苦參一兩六錢。雄黃末一兩六錢。煙膠三兩。枯礬。木鱉
 子。川椒。大楓子。蛇床子。樟腦。硫黃。明礬。水銀。輕粉
 各二兩。白信五錢。熱猪油調搽。能治一切多痒少疹。乾濕諸瘡。
 又方。水銀。輕粉。潮腦各一錢。大楓子肉十個。杏仁一粒去皮
 尖。蛇床子一錢。共研末。用桐燭油調勻搽擦。乾疥腫痒神效。
 又方。白胡椒殼。枯礬。猪油同搗擦。
 又方。大楓油。水銀。明礬。燭油共搗勻搽。名殺痒散。
 又方。用白茅藤汁。擦之。
 又方。鍾萹菜。煎湯浴之。
 又方。山芥菜。煎湯浴之。
 又方。用千里馬更妙。
 又方。雞子黃七個。人髮一團。蒸油調赤石脂末搽之。
 三仙丹。雄黃一錢。胡椒八分。硫黃一錢。共研細末。香油調過一
 夜。取油調擦。能治膿窠瘡疥。
 又方。加昇底。名四仙丹。治同。
 疥瘡搽藥方。白薇三錢。白芷二錢。炒花椒二錢。細茶葉二錢。
 寒水石二錢。大黃五錢。明礬五錢。蛇床子一錢。雄黃一錢。
 百部二錢。潮腦一錢。共爲細末。用生臘猪油。和勻搗爛擦。

仙拈散。寒水石三兩。飛滑石三兩。二味同研。蛇床子四兩。炙鱉

甲五兩。地膚子四兩。東白薇四兩。香白芷三兩。大黃五兩。

白蘚皮三錢。百部三兩。樟腦二兩。研極細末。麻油調搽。能治男

女遠年風濕。皮膚瘡。寒濕浸淫。流水發痒。搔之疼痛。兩腿肌膚黑腫。似潰

非潰。時或烘熱麻木等症。

膿窠瘡方。黃柏片二錢。硫黃一錢五分。雄黃。煨石膏。海螵蛸

各二錢。輕粉五分。共爲細末。麻油調搽。

膿窠瘡疥。蜈蚣。全蠍。雄黃。明礬。綠柳樹根。真潮腦。白砒。

花椒。猪油。共搗勻。以火紙捲成筒。燒取油。搽之神效。

痒瘡初起方。五倍子大者一斤。逐個鑽一小孔。綠礬不拘多少。裝五

倍子滿爲度。二味用粗紙包好。火灰中煨存性。研細。每藥二兩。配

入大楓子肉一兩。小昇底一兩。共研極細。以猪板油搗擦。或用麻

油亦可。

瘡疥方。大楓子肉三錢。蛇床子一錢。花椒一錢。雄黃三錢。樟

腦一分。硫黃五錢。明礬一錢。水銀四錢。醃猪油七錢。研和

搽之。

捲瘡散。松香一錢。水銀二錢。硫黃二錢。枯礬二錢。樟腦一錢。

松香水銀先研。再同餘三味。用麻油和成丸。每取此丸。在脈上滾搽。凡

一切痛痒諸瘡。自能痊愈。

又方。用大楓子油二兩。蛇床子二兩。淡底。川椒。雄黃。枯礬。樟腦各一兩。狗油搗成丸。

一切瘡疥膿窠痛痒諸瘡方。大赤練蛇頭一個。瓦上煨存性。蜈蚣三條。枯礬一錢五分。砒一錢。大楓子十個。川椒一錢五分。雄黃一錢五分。白蠟一錢。以上先研細和勻。醃猪油三兩。肚上全網油二張。燭油不拘多少。用法用銀封紙一張。將藥末同醃猪油燭油共搗勻在內。再將猪網油包在外。如作筒式。鐵箝夾好。火上燒着。下置磁瓶。承其油待凝取擦。

又方。蜈蚣二十條。全蠍十個。大楓子七個。蛇床子五個。輕粉

一錢。水銀一錢。斑貓五個。麻黃二錢。雄黃三錢。明礬二錢。花椒一錢。茶葉一撮。共研極細末。生猪油調擦。

痒瘡神墨。土硫黃一斤。東丹。水銀。白信。白礬各一兩。共爲末。鍋內同鎔化勻。傾淨青石上。結成罐片。香油磨搽。揚州妙積寺僧。做成錠如鼠屎。計重一錢。每價紋銀五分。卽此方也。

一上散。蛇床子一兩炒。貫衆一兩。白膠香一兩。寒水石一兩。

枯礬五錢。川黃連五錢。雄黃三錢五分。硫黃三錢。吳茱萸三

錢。斑貓十四個去足翅。共爲末。臘猪油。或香油調擦。先以蒼耳煎湯洗去痂。掌中擦藥令熱。鼻中嗅二三次。擦之能治疥癬痛痒瘡。

寶金黃。硫黃四兩五錢。白砒一兩。火硝二兩。明礬五錢。雄黃

一錢五分。樟腦一錢五分。共研爲細末。入銅杓內慢火鎔化攪勻。以醋噴地。然後傾藥於地。如澆湯狀。結成一片收貯。膿窠痒痛瘡。用香油或豬油磨搽。癬瘡先以土大黃打爛擦破。用火酒搽擦。能效。

水銀膏。大楓子肉一兩。杏仁一兩去尖皮。輕粉二錢。水銀二錢。枯礬五錢。共爲末。用柚油三兩。調搽。凡芥癬爛風等瘡。三日卽愈。如加雄黃更妙。

一擦無蹤。上血竭一錢。硫黃五分。腰黃五分。明礬五分。共爲細末。用青布捲藥作筒。浸眞菜油內令透。箝火上燒着。磁盆盛油待凝。取擦。能治疥癬肥瘡。

合掌散。硫黃一兩。鐵鏽一錢。紅砒六分。共研極細如麪。取葱汁調和之。搽入大碗內。勿使厚薄。以碗覆瓦上爲度。取艾置碗下熏藥至乾。敲碗內與碗同聲爲度。取藥研細。能治癩疥陰囊痒。藥一錢。敷數次全愈。

椒礬散。白占一錢。柚油燭一對。明礬一錢。川椒一錢。水銀一錢。共研搽擦。能治諸瘡。

掃盡曹家百萬兵。大楓子肉二兩。枯礬四兩。樟腦三錢。蛇蛻五分。燒存性。蜂房五個燒存性。共爲末。入柚油四兩。水銀五錢。

同搗成膏。能治膿窠黃水痒痛疥癬諸瘡。

疥靈丹。硫黃。水銀各一錢。油核桃肉一兩。生豬板油一兩。共

搗如泥。聞臭及擦患處。能治疥瘡。

二妙丹。吳茱萸焙。硫黃等分。研末。凡膿疥間雜者。人手心合掌摩擦。每日二次。三四日全愈。

五虎下西川。大楓肉末。蛇床子末各五錢。枯礬末一錢。水銀二

錢。白鍋一錢。先將鍋化開。次入水銀。再入三味。柏油或桐油。搗極

勻。搽瘡宜乾些。臘猪油搗亦可。能治血風癬蟲。坐板疥癩諸瘡。

不傳妙方。綠柳樹根皮。川椒。二味等分炒燥。取淨末四兩。枯礬一

兩。全蠍五只焙。共爲細末。猪板油調搽。

松黃散。專治腿上濕瘡。雄黃六錢。川柏一兩五錢。炒蛇床子一

兩。炒川椒。輕粉。水銀各二錢共末。密陀僧四兩。硫黃三錢。

明礬一錢二分。煙膠九錢。松香一兩三錢。研末。法用葱三兩搗汁

拌。熬烱入陰水內取起。再拌入水取起。三次爲度。共研極細。專治腿

上濕瘡。紅紫流水奇痒。久不得愈。並治一切疥癬諸瘡。濕瘡用桐油調

敷。諸瘡用木鱉子煎菜油調搽。如膿窠瘡。方中去水銀。

又方。黃丹一兩水飛炒紫。鉛粉一兩。白龍骨一兩煨。松香一兩

二錢。如前法製。共爲細末。麻油調敷。專治肥瘡生髮中。黃水瘡生

周身。坐板瘡生臀上等症。

二妙散。茅山蒼朮一斤。川黃柏一斤。共炒存性研末。麻油調。治濕

風爛瘡。

清涼散。輕粉。杭粉。蛤粉。各一錢。青黛五分。煨石膏三錢。六

一散三錢。共研細末。天皰瘡。用絲瓜汁調搽。或葉亦可。發火丹。用火

丹草搗汁調搽。餘濕火瘡等。俱用麻油調搽。

附慢驚吊心窩法。胡椒七粒。生梔子七個。葱白頭七個。白散麵一撮。右各研和勻。用雞蛋白半個調攤青布上。貼小孩心窩。日夜取去。有青布黑色即愈。如不愈。再照前法貼之。

外科方外奇方卷四

清浙湖凌曉五先生遺著 後學

杭州沈仲圭錄存
杭州蔡燮陽校刊

臙瘡部

- 夾紙膏。冰片二分。麝香一分。銅綠五分。輕粉五分。水銀二分。共研至不見水銀星爲度。再用黃占五錢。雄黃猪板油一兩。共熬勻。入前藥搗成膏。隔紙攤貼好。多刺針孔貼之。
- 又方。龍骨四錢。銅青八錢。製甘石六錢。黃連汁淬。黃柏六錢。製茅朮六錢。左牡蠣二兩煨。鉛粉八錢。黃丹八錢。冰片二分。生猪板油搗成膏。
- 又方。龍骨五錢。沒藥二錢。去油。明礬一錢。象皮河泥炒。如無可不用。冰片一錢。石膏五錢。男人不用。製甘石三錢。共爲細末。用猪油熬熱搗成膏。隔紙攤貼。用布綁緊。
- 又方。去油乳香三錢。銅青八錢。冰片一分。黃占三錢。白占三錢。各爲細末。先將菜油四兩。雞蛋四枚。同熬枯去渣。將二占鎔入。次入乳青二味。後入冰片。傾候冷。攪成膏。罐貯勿令泄氣。隔紙攤貼。膏藥之外。須綿花裹脚。布包好。亦不可泄氣。兩週時一換。如不收口。用生飢散摻之。凡一切遠年近時爛腿。十日之內。包好。永不再發。

又方。雞子黃廿個。同男子髮熬取油。約半杯。麻油一酒杯同髮熬。

白占 黃占各一兩五錢。血餘炭一錢爲末。輕粉一錢爲末。先

將麻油熬清。投入黃白二占離火攪不住手。加入雞子油再攪待稍冷。

下餘三味和成膏。

又方。桐油二兩。白占四兩。兒茶。輕粉。松香各二錢。銅青一

錢。冰片三分。先將桐油白占略熬。不可太老。再下餘藥調成膏。舊

傘紙做夾紙膏貼。多刺鍼孔。三日一換。須先用當歸蒼朮煎湯洗淨患

處。然後貼膏。所貼過之膏。不可棄露天。

又方。海螵蛸。頭髮灰。水龍骨。卽舊船底石灰。輕粉等分。桐油

調做夾紙膏貼之。

又方。兒茶。黃丹。胡粉。水龍骨。粉霜。龍骨。白蠟。黃柏。

豬膽汁多。共爲末。豬油搗成膏。

隔紙膏。明礬。胡椒。川椒。皮硝。淮鹽磚用火煨透。白占等分。

共爲細末。用青油燭調油紙上貼之。須令忍痛。

又方。先將麻油三兩。煉川山甲一錢煨末。再下白占五錢五分。

化勻。又下煨陀僧末五分。飛黃丹一錢。和勻取起。臨用以油紙

攤上。夾紙一層。多刺針孔。先用棟樹根煎湯洗淨患處。然後貼上。外用

薄絹一層扎緊。十日卽愈。如爛脚亦可將前法洗淨。貼之數日卽愈。

又方。龜板炙研。醋煨蘆甘石各三錢。輕粉二錢。冰片三分。共

研細末。用麻油半酒杯。銅杓內熬滾。再入黃占二錢。鎔化。離火待凝。入前藥末攪勻。先以葱椒甘草湯洗淨患處。油紙做夾紙攤貼。

白玉膏。白龍骨。煨石膏。製甘石。鉛粉等分。猪油成膏。

又方。人中白一錢五分。寒水石一錢。冰片五釐。枯礬八分。赤

石脂一錢。白者更妙另煨。海螵蛸一錢。白占三分。麻油五錢。

先將麻油熬清。次下占鎔化。後下餘藥攪成膏。

又方。蘆甘石一兩火煨。猪膽汁淬七日。海螵蛸一錢。白占五錢。

枯礬一錢或五六分。多則作痛。用猪板油搗成膏。

又方。乳香。沒藥各去油。象皮各五錢爲末。白占五錢。鉛粉研

細。黃占。密陀僧各二兩爲末。輕粉四錢。上上真桐油一斤。

入銅鍋內熬至無沫澄清。先入陀僧末攪勻取起。入二占濃化攪勻。俟

油溫放入五種藥末攪勻。以大綿紙攤上陰乾。隨瘡大小剪貼。遠年定

效。

金華散。煨石膏八兩。生石膏八兩。飛血丹一兩。共爲細末。乾者

香油調敷。濕者乾摻。專治男女新久爛腿。臙瘡。及一切癰癤。瘡毒用之。

且能去腐生肌。

臙瘡拔毒方。瀝青四兩。礬紅二兩。共爲細末。香油調搽。須忍痛則

瘡內出其毒。可拔毒水盡。再用收口藥。並治坐板流膿瘡。

琥珀末一錢。寒水石三錢煨。乳香一錢去油。黃柏末五錢。共

爲細末。如痒甚者。加飛礬五分。凡毒盡後瘡不起。邊肉有紅色。先將

溫苦茶洗一次。敷藥一次。不數日收口。並治諸毒瘡不斂。

臙瘡疔張膏。香油四飯碗。亂頭髮四兩。杉木皮三兩燒灰研末。

白占二兩。麝香五分研細。先將香油熬將熟。入髮熬化。次下杉木

灰白占鎔化。後將餘藥投入滾化攪勻。以疔張紙入油內收盡爲度。貼

三日翻一面。七日全愈。無論遠近爛見骨者。半月收功。

臙瘡收口方。象皮七錢。血竭二錢。龍骨五錢。冰片一錢。乳香

二錢。沒藥二錢。海螵蛸一錢。共爲細末摻。

爛腿臙瘡方。象皮。八寶丹。冰片。蘆甘石各等分。共研細。先以

葱湯洗淨患處。然後摻藥。

誓不傳方。荆芥一兩。防風一兩。川柏一兩。陀僧五錢。銅綠五

錢。共爲細末。先用水銀三錢。葶蔴子十粒。同研至不見星爲度。用桐

油煎數沸。入前藥。用油紙看瘡大小攤膏摺好刺孔千下。用米泔洗淨

患處貼之。一日換一轉。收膏擦淨。不拘遠近爛腿。數次卽效。

獨聖散。水龍骨炒乾爲末。麻油調敷。治臙瘡。並治婦人裙鞭瘡急。

癬瘡部

秘製癬瘡藥靈丹。鮮白槿皮一兩二錢。土槿皮六錢。白芨四兩。

冬朮六錢。斑蝥一錢。檳榔四錢。大楓子油四錢。川椒三錢。

番木鱉四錢。共爲粗末。好滴花燒酒浸一月。取酒搽擦。專治風濕內鬱陽分。變生癬癩汗斑。並治脚縫濕痒。一切風濕。遠年坐板痒瘡等症。其効如神。

又方。生大黃。皮硝。荔枝核。等分爲末。米醋調搽。牛皮頑癬。加舊

牛皮灰。銅錢癬。加古錢灰。荷葉癬。加荷葉灰。

又方。土槿皮二錢。雄黃。檳榔各一錢。斑蝥四只。輕粉一分五

釐。樟冰一分。各研細。火酒浸搽。

偏身頑癬。川槿皮一兩。牙皂五錢。大楓子肉三錢。米醋一碗。

共煎至半碗。去渣澄清。入明礬五錢研細。皮硝五錢研細。又煎至

一小杯。和入土大黃根自然汁一小杯。先以川山甲刮微破。將筆蘸

搽。數日即愈。

癬藥酒。海風藤。土大黃根。白果肉各五錢。白芷。白芨各三錢。

檳榔五錢。斑貓七只。鮮金錢松根皮一兩。雄黃三錢。滴花燒

酒半斤。浸藥七日後。凡遠年牛皮蛇皮。一切頑陰癬。以酒搽患處。五

七遍自愈。

又方。槿樹皮一錢。生南星五錢。檳榔一錢。樟腦五分。番木鱉

五分。蟾酥三分。斑貓三只。用火酒浸擦。

治癬神効方。硫黃五兩。紅礬四兩。火酒四兩。先將硫黃入銅杓

內化開。用酒煮乾。與紅礬同研細末。米醋調搽。或先用川山甲刮微破。

一楊梅癬。前藥加粉霜四分。如前法擦。一狗疥癬。前藥加入木鱉

三分。一牛皮癬。前藥加白砒四分。一頑癬。前藥加輕粉二錢。

一乳癬。前藥加松香二錢。一荷葉癬。前藥加枯礬二錢。一

雞皮癬。前藥加輕粉二錢。同大黃搗爛。以麻布包之。蘸前藥擦之。

一白風癬。前藥加藥皮硝二錢。

又方。白芨。白蘇。檳榔。土槿皮各二錢。輕粉一錢。火酒浸擦。

又方。松樹根皮四兩。海桐皮。白蘚皮。白檳榔。雷丸各三兩。

斑貓四十九。下身加倍。共爲末。醋水對調。隔一夜用筆蘸擦。一日三

次。七日全愈。

又方。土大黃根三錢。蚯蚓糞三錢。雷公藤五分。大楓子肉一錢

五分。防風一錢五分。山槿皮三錢。共爲末。陳醋調搽。

痔瘡部

外痔搽藥。頂大五倍子十個鑽孔去子。金頭蜈蚣三條碎。兒茶研

一兩五錢。將二味裝入倍子內。用銀紙封固。瓦上煨以青煙盡。取起

研末。配熊膽一錢。冰片五分。再研極細。先用皮硝泡湯洗痔後。以

豬汁調搽。

追管丸。薑汁炒胡黃連一兩。炙刺猬皮一兩。當門子二分。共爲

末。飯和丸如麻子大。每服一錢。食前酒下。專治痔漏不拘遠近。服後

管內膿水反多。是藥力到也。膿水追盡。服後消管丸自能奏效。不必疑

忌

消管丸。胡黃連二兩炒。炒甲片一兩。石決明一兩煨。炒槐米一

兩。各取淨末秤準和勻。煉蜜丸如麻子大。每服一錢。早晚二次米

湯下。至重者四十日全愈。再服完善丸。如四邊瘡口有硬肉突出。可加

蠶繭廿個。炒研和入藥內。

閉管丸。(即完善丸) 夏枯草十兩。連翹殼五兩。甘草節五錢。

金銀花四兩。共炒為末。淨銀花一斤。煎濃汁和丸。如菘豆大。每服

三錢。空心淡鹽湯下。若起漏三五年。兩服全愈。一二年者。一料即愈。

外痔搽藥。寒水石四兩。研極細末。大蜈蚣百個。同搗極爛陰乾。再

搗千餘下如香灰樣收貯。臨用。每末二錢。配冰片一分。和勻以蚌

水調搽。或豬膽汁攪入真麻油亦可。初起者。半月愈。年久者。一月斷根。

若痔內出血。配入蒲黃三四分。外洗用瓦花枳殼煎湯。

治痔神棗散。頂大南棗一枚去核。真銅綠須銅上刮下者。不拘多少。

鰲頭一個。煮取淨骨打碎。將銅綠鰲骨填滿棗內。將棗合緊線紮。煨

存性為末。先將秋海棠根葉煎湯洗瘡。後用清水調敷。

洗痔極效方。葱白十個。瓦花一兩。馬牙莧五錢。皮硝五錢。五

倍子五錢。爛石榴三只。五倍子五錢。烏梅七個。槐米五錢。地骨皮

五錢。煎湯。

痔漏插藥。百草霜。黃連各二錢五分。冰片五分。麝香五分。早

蓮草頭炒。蜈蚣蟲各五錢。螞蝗五條。瓦上炒焦。研細為末。丸如

粟米大。納入管內。三日後。管即化出。用輕粉。乳香。麝香。韶粉。

東丹。血竭末。摻之收功。

痔瘡化管方。田鷄皮炙灰。血餘炭。黃明膠牡蠣拌炒。研末。每朝

三錢沖服。

痔漏插藥。小茴香一兩。白芷三兩。白礬一兩。研細。銅杓內鎔成

餅。再入炭火上煨令煙盡。取出。出火毒。為細末。用麵糊成條。插入漏內。

直透至痛處為止。每日三次。七日為止。十餘日結痂而愈。如結只一孔。

十日全愈。

洗痔瘡方。徧地香。過冬青。鳳尾草。各一種俱要鮮。煎湯薰洗二

三次。即好。如無鮮者。乾者亦可。

痔漏精方。烏梅肉半斤。葦菜地蚯蚓七條。瓦上焙燥。陳倉老米八

合。研細。飲和丸。夜露早收。每晨開水下。每服三錢。不論久遠。一料

除根。

枯痔散。明礬一兩。白砒三錢。共研細。入陽城罐內。外圍炭火煉至

煙起。煙即砒毒。人不可聞。俟煙盡。礬枯去炭。次日取研至無聲為度。四

圍搽之。不可使藥流入中孔。致令大痛。

神散元珍丹。明礬煨熟。存性不碎。如菘豆大。以桂圓肉包之。日服一

粒雖重症服之百日斷根。治痔以手搓之。

又方。透明白礬一斤。搗如豆大。入罐內。如前法煉至礬笑。罐外而枯。其頂如痔形者。卽靈藥成也。出火毒。研極細。或頂大雪梅片一二釐。取津吐調於手心。搽痔上。不可多搽。再取竹白衣作膏藥式糊痔上。數次卽愈。其靈藥底可合一切藥。

又方。紅砒不拘多少。瓦上煨至白煙盡爲度。飛白礬各一錢。烏梅肉二錢。燒存性。共研極細。用時以津吐濕手。指蘸藥於痔頭痔身。搓擦。一日二次。初敷不腫。五六日出臭。如出盡。其痔乾枯。此藥不用。一方加白靈丹五分。

靈秘丹藥。片腦一分。朴硝五分。熊膽二分。蝸牛一兩。螺肉一兩。橄欖炭五錢。搗爛水浸一夜。取水并藥敷痔上。

胎元七味丸。頭胎男子臍帶三個。瓦上焙存性。陳棕炭七錢。京牛黃三分。槐米二錢。刺猬皮三錢。象皮四錢。地榆三錢。共研酥油糯米糊丸。如蠶豆大。每服七丸。空心白滾湯下。專治痔漏。三日化管。七日平滿。血清膿止。十日除根。

口牙部

牙疳方。川柏三錢。寒水石三錢。黃丹一錢。千層蚌殼一錢。人中白三錢。梅冰片一分。共研細末。

牙疳回疳散。真人中白五分煨。陳蠶繭二錢五分煨存性。五倍子

一錢打碎去蠱。製明礬法用整五倍子一錢內裝明礬一錢煨枯研

細末用。川連末五分。蘆薈末五分。犀牛黃三分。青黛五分。

冰片四分。蟾子窠十七個煨存性。共爲細末。先用河蚌煎湯漱口。

用少許吹之。

砒棗散。紅棗三枚。法每個去核。入紅砒黃豆大一粒。紮好炭火上煨盡

白煙爲度。出火氣。共爲細末。再入之以人中白煨五分。冰片五釐。

蘆薈三分。共爲細末擦之。專治走馬牙疳。

人龍散。戊腹糧卽狗屎中骨頭。瓦上煨存性。爲末。每一錢加冰片少

許敷之。能治牙疳之疾。

又方。人龍瓦上焙。爲研極細末。加青黛冰片少許和搽。治同。

龍虎止痛散。屋上白貓屎。煨石膏等分。研末加入蛔蟲一條炙灰。

冰片少許。共研極細吹之。專治痘後牙疳。極凶危者。及走馬牙疳。

吹之神效。再服清火解毒之劑。

又方。綠礬一錢炒紅。煨石膏三錢。兒茶一錢。月石一錢。人中

白一錢。冰片二分。人中黃一錢。研細吹之立效。

牙痛方。薄荷尖五分。尊撥五分。月石三分。黃丹五分。梅片三

分。樟腦五分。青鹽五分。骨碎補去毛皮晒乾五分。麝香一分。

共爲細末擦。

又方。生石膏一錢。細辛一錢。兒茶五分。川連一錢。冰片二分。共爲極細末。擦之。無論實火虛火。蟲蛀疼痛。俱可以治。如虛疼加入參末三分。蟲蛆加樟腦五分。

牙痛方。蟾酥一錢。陳酒化透。五靈脂一錢。麝香一錢。研和爲丸。

均丸二百粒。新零綢包。絲線紮固。裝磁瓶內。每遇風火蟲疼牙痛。取一丸咬於患處。丸化自愈。

牙痛方。葶撥一錢。川椒五分。石膏五分。青鹽四分。共爲細末。

點於痛處立止。

一笑散。初平方去火硝。加葶撥等分。青鹽。火硝。硼砂。樟腦。各

等分。研細擦之。立止牙痛。

牙痛一笑散。火硝一錢。元明粉。生石膏。黃柏各五分。全蠍茶

洗炙研。青鹽。月石。雄黃各三分。眞蟾酥五分。冰片二分。

共研細末搽擦。

玉帶膏。煨白龍骨五錢。用生梔子仁三錢。生川柏五錢。生黃芩

五錢。銅鍋內熬汁。煮乾龍骨爲度。取出爲末。再用鉛粉五錢。麝香

三分。並煮好龍骨。同研細入碗內。加黃占一兩。坐滾湯中熟化拌

勻。用重連史紙鋪火爐蓋上。將藥刷在紙上。剪成碎條。臥時貼在患處。

次早起時取出。有黑色可驗。專治牙痛。

哭來笑去方。潮腦。川椒去目各五錢。用粗碗一只。椒鋪碗底。樟腦

蓋面上覆一碗。鹽泥固濟。火上升二炷香。取出為末。每用一二釐擦之。專治牙痛。至重者二次即效。

去牙痛方。雄活鯽魚一尾。約四五兩重。破開去腸不落水。用白信六

錢為末。填入魚腹。待其肉爛。去砒不用肉。用淨魚骨晒乾為末。每用此

些。安於患牙齦上。膏蓋一時許自落。

柳華散。川柏末。真青黛。人中白。蒲黃等分。為細末摻之。此方

能治口舌爛久不愈。如去人中白。蒲黃。名華雲散。加枯礬。五倍子炒等

分。治牙痛。

赴筵散。北細辛。黃芩。黃柏。黃連。乾薑。山梔子等分。共研

細末。或加冰片少許。擦之。專治口瘡。

牙痛方。濂珠一分。硃砂一分。斑貓二錢。去羽頭尾。右三味研細

末。用少許放膏上。貼痛牙外面。切勿貼口內。

鼻耳部
鼻淵方。(即腦漏) 蟾酥。龍骨。石首魚腦煨。共為細末吹之。或

加辛夷。冰片。各少許。

又方。上血珀。真廣藿香葉等分。研細吹之。

又方。白石灰一味。研細吹之。內服補中益氣湯。或六味丸。

又方。攪珠漆綿兜一兩。白鴿子翎。去硬管。捲入綿內一兩。同煨存

性。每灰一錢。加片腦七釐。共研末吹之。

鼻衄方。眞石膏。藜蘆。膽礬等分。共研細末。少許吹之。

赤鼻方。硫黃入布袋內。用豆腐泔製三次。淨重一兩。輕粉。陀僧。

白芷各一錢。白礬五分。共研末。唾搽。晚則搽。日則洗。自能奏功。

疔耳方。橘皮燒存性。血餘炭。龍骨。江魚牙等分。加冰片少許。

研細吹之。

紅綿散。煨龍骨。枯礬各三錢。海螵蛸。胭脂各一錢。燒灰。飛丹

二錢。冰片三分。共爲細末。先以綿紙攪去膿。後吹之。專治疔耳出

膿。斷傷腦衣方。用南棗核仁。焙燥研末吹之。

腦漏鼻涕方。用五穀蟲焙。赤石脂等分。研細嗅之。

附混元一氣丹方。荆芥穗一錢。鬼箭羽一錢。香白芷一錢。公丁

香一錢。川鬱金三錢。北細辛一錢五分。蘇合香一錢。寒食麵

二錢。西香薷一錢五分。廣藿香三錢。降眞香三錢。紅靈丹三

分。右各研細。將寒食麵煎湯泛丸。如粟米大。將紅靈丹三分爲衣。每

服五分。

治牙蟲風牙疼痛方。此方屢試神效。大梅片五分。飛辰砂五分。

馬牙疔二錢。月石二錢。共研細末。擦痛甚效。

脚部

青螺散。眞銅青。六一散等分。共爲細末。搽。專治脚痔脚注。

陰濕脚瘡久爛方。銅青。膽礬各五分。飛黃丹二錢。密陀僧。輕

粉。煨石膏各一錢。共爲末。臨臥摻上。痛一夕卽結痂。或有痒處。毒

水不乾。又摻上。痒極摻之。

爛脚丫方。月石。滑石各三錢。龍骨。川柏各二錢。百部二錢。

陳茶葉六錢。共爲末。臨用加冰片一分敷之。

又方。用陳茶葉。陳黃泥磚。共末摻之。

爛腿方。輕粉一錢漂淨。銅綠一錢漂淨。海螵蛸四錢。赤石脂一

兩。滑石四錢。東丹一錢漂。右藥研細過篩。麻油敷患處。

補遺

小兒肺風痰喘方。雪裏青。卽過冬青草。搗取汁調天竹黃一二錢服之。

又方。用白茄子磨水服之。

小兒胎瘡方。苦參一兩研細。用母髮一團。雞子黃十個。熬出油。

調入候凝抹之。

小兒頭上諸瘡方。(名一抹全。)藜蘆。蛇床。飛黃丹各一錢六分。

硫黃。白礬。赤石脂。五倍子。川柏各一錢五分。輕粉五分。

共研末。猪油調敷。或清油亦可。

小兒胎癩方。明礬五錢。松香五錢。葱頭七枝。飯鍋上同燉熱。待

冷研細。加入東丹三錢。冰片三分。用麻油調敷。

小兒白顏方。用炮長藥油調。先以米泔腐泔洗後。敷一二次卽愈。

又方。用鱖魚骨煨研敷。

又方。用豬腳爪殼煨研油調搽。

栢葉散。石栢末一錢五分。輕粉一錢。雄黃一錢。青黛二錢。滑

石一錢。寒水石二錢煨。銀硃一錢五分。辰砂五分。鉛粉二錢。

側栢葉末一錢。共爲細末。絲瓜葉汁調搽。治天皰瘡。

天皰瘡方。明雄黃五分。川栢三分研末。陀僧六分。女人撲面粉

五分。石膏八分。共爲末。絲瓜汁麻油調搽。二三次卽愈。

妙靈丹。白芷四兩。炒黑研末。圓眼核四兩。炒黑存性。研末和勻。乾者

香油調搽。濕者乾搽。專治濕爛蛇瘡。

一擦無踪。臭硫黃三錢。鷄子兩個。用真香油一酒鍾入鍋內。將鷄

子放鍋內。同熬取油。以鷄子兩面焦黃色爲度。取出食之。將硫黃末放

鍋內。令熬數滾。隨手攪勻。候冷取起。調搽瘡上甚效。已經試過。三五日。

卽全愈。永無再發之理。

不二散。密陀僧三錢。硫黃一兩。草烏三錢。紅砒一錢。共爲細

末。米醋調搽。專治汗斑。

又方。硫黃。明礬。雄黃。白附子。海金沙。密陀僧。共研末。薑

汁調搽。或用醋亦可。一年者。去皮一次。十年者。去皮十次。擦後勿當風。

勿行房。搨扇。

湯火瘡方。生大黃。川栢。當歸等分。好酒炒炭研末。麻油調搽。或

加之以地榆炭。

又方。赤石脂。寒水石。大黃。川栝等各一兩。蒲黃二兩。紅丹

五錢。爲末。麻油調敷。

又方。猪毛炭。輕粉少許。硼砂少許。研勻。麻油調敷。且無疤痕。

又方。地榆炭研末。麻油調敷。

又方。無毛胎鼠。菜油浸之。愈久愈佳。取油搽之。

鰥蝮散。海鰥蝮五錢。五倍子炒焦。枯礬。兒茶。黃丹。赤石脂。

密陀僧。鉛粉各二錢。共爲末。濕者乾摻。乾者栝油調搽。專治黃水

流膿瘡。陸定圃先生方。膿窠類屢久不痊。此方甚效。

又方。麝香一釐半。硫黃二釐半。白蘘五分。白芨五分。密陀僧

一錢。腰黃二分半。白芷五分。生附子一錢五分。各生爲末。和

勻。以生白附。生薑汁。搗成餅擦之。專治白點風汗斑等症。

紫蘇散。六一散四錢。紫蘇葉一錢五分。兒茶一錢。赤石脂二錢。

共爲細末。先以紫蘇紫背浮萍煎湯重洗。然後敷之。專治陰囊爛。名繡

毬風。

又方。用鉛粉研細。生桐油調搽。

珠母散。陳蚌殼煨。兒茶。輕粉。飛滑石。人中白各二錢煨。煨

龍骨。枯礬各一錢。冰片三分。共研末。專治婦人陰痒。甚者令人

發熱如勞。先以雞肝。或猪肝切作長條。蒸熟。插入陰戶。過一夜。次早取

出。如此二三次。痒減蟲淨。然後用麻油調搽。

坐板瘡。飛滑石。生大黃。人中白。密陀僧等分。共研細摻患處。

肺風瘡。蜈蚣一條焙。雄黃一錢。硫黃一錢。共爲細末。夏月用白

茄子搗汁調搽。冬月用柚油杵膏搽之。臨臥搽上。次早洗去。半月全愈。

纏腰火丹方。挑瞎蛇頭上眼。用坑缸上舊籬炙炭爲末。麻油調搽。

又方。蛇蛻燒存性。坑廁上浮泥同研。用童便調敷。

金甲散。川山甲一只全者。生漆一斤。每日將山甲漆數次。漆完用

瓦器將山甲炙灰。如病人要頭身先好。卽服川山甲頭身起一錢。足

先好。卽服川山甲足四只起。對陳酒服完卽愈。如山甲有一不全。病人

亦缺一不全。爲專治大麻風仙方。

地耳散。地踏菜晒乾爲末。猪油調敷。治湯泡傷。

又方。泡過爛茶葉藏鬘內。取抹並治火傷。

又方。秋葵花手未捏過。浸麻油。如遇湯火傷者。取油搽之。

黃水禿瘡方。嫩松黃葱製過二兩。黃丹一兩。無名異一錢。炒鉛

粉一錢。輕粉三分。共研末。先以米泔洗淨患處。用香油調敷。

瘡癩頭方。用化銅舊罐研細末。加輕粉。冰片少許。香油調搽神效。

手足雞眼方。用大蜈蚣乾一對炙。研細摻膏藥上貼之。一周時卽化

黃水。

又方。蜈蚣一錢。硃砂一錢。白礬少許。用麻油浸埋地下一日。取

出點之。

凍瘃方。白芨研末。用蘿蔔一個挖空。入桐油於內蒸透。取油調搽。

又方。舊泥盒燒灰。研細。油調搽。

凍瘡湯火瘡方。用煨瓦楞子研極細末。加冰片少許。麻油調敷。

天蛇頭方。用豬膽一枚。入全蜈蚣一條研末。雄黃少許。套上卽瘡。

羊鬚瘡方。旋覆花一錢焙。舊綿絮胎一兩燒存性。共研末。麻油調

搽。

損傷方。當歸二錢。丁香五分。枳殼二錢。川芎二錢。辰砂五分。

沉香一錢。乳香二錢。木香二錢。蘇木二錢。川烏五分。桂枝

二錢。牛膝二錢。血竭一錢五分。肉桂一錢。杜仲二錢。麝香

三分。參三七一錢。草烏五分。共研細末和勻。用好酒沖服。

懸梁死急救法。弔死者切不可剪斷繩帶。先用軟泥將人糞門封好。若

女子封好陰戶糞門兩處。將人慢慢放下落地。用細辛一分。牙皂一

分。共研極細末。用葱管吹入鼻中。候其喉中有聲。此藥吹完。再用九

死還魂草三錢。飛淨真辰砂一錢。將水煎濃。吹耳鼻候其面紅。再

用生薑汁一杯。飲下。蓋被出汗。再服米泔水一杯卽愈。

九龍神咒丹。專治跌打瘋氣。立效神方。累試累愈。川烏三錢。草烏

三錢。硃砂二錢。硼砂六分。梅片二分。原香二分。丁香二分。

硫黃六分。以上八味。各研極細末。用黃表紙硃筆書九龍字符九張。

用銅鍋一只洗淨。用新布三塊揩乾。又備新竹板一片炒藥用的。先將爐炭加好聽用。將鍋先焚龍字符一張。再燒龍字符一張亦焚在鍋內。將川烏放下。再燒龍字符一張。將草烏放下炒。餘皆倣此。次第龍字符藥味均炒。至硫黃入鍋溶化。卽倒乾磁盆內。薄薄攤開。均分作三四盆候冷。冰成片塊。磁瓶收貯。切勿泄氣。如遇患病。用篋一只頻點。點至痛處。用老薑一薄片。薑上置藥一塊。如黃豆大。用明火燒藥。燃着忍痛。候藥性燒盡爲度。再點仍燒。以不痛爲止卽愈。試驗無算。用硃筆書龍字樣。一口氣書一張。不可二口氣。爲要爲要。

附符式例左。

龍龍龍龍龍

照此符式。寫九龍字。及製藥之日。務要齋戒沐浴。虔心靜室。

至要至要。

桃花散。(卽刀傷藥。)

千年石灰二兩。

生大黃六錢。

共炒黃同研極

細末。敷患處卽效。

瘋氣藥酒方。鑽地風。

宣木瓜。

漢防己。

秦艽。

野桑梗。

川羌活。

粒紅花。

千年健。

當歸。

以上九味各四錢。加南棗廿枚。

冰糖二

兩。陳酒四斤。

外用大瓦瓶一只。將藥連酒浸入瓶內。封口隔水煮

滾。點一炷香。緩緩再滾。香盡藥好。每日清晨。隨量飲之。再滾二次。如不

見效。再服一劑卽愈。

下疳方。橄欖灰四錢。

大梅片二分。

紅小昇四錢。

如自生用菜油

調敷。斷喪用麻油調。無論乾濕。先須乾撒一次。再調塗如法。

武定侯府方。治楊梅結毒瘡。輕粉一錢。杏仁三十粒去皮。雄黃

一錢半。冰片少許。共爲末。先以甘草湯洗淨。用雄豬膽汁。調藥

搽上。二三日卽愈。百發百中。

赤白瀉痢神方。乾桑椹三兩。雄精一兩五錢。赤白沙糖各三兩。

砂仁三兩。右藥研細。用圓圖葶薺三斤。原燒酒三斤。浸入大沙

鍋內。蓋好不泄氣。用菜油燈心文火煎滾收貯。臨服葶薺一枚卽愈。卽

此藥渣藥酒服之。亦無不愈。其效如神。

廣瘡方。輕粉三錢。大黑棗廿枚。法將大棗去核。輕粉研細。同河泥

少許。嵌入棗內。用厚麵糊裹。勿可泄氣。炭火炙成炭。每服兩棗。分三日。

用黃酒化送。

神驗化毒五虎丹。炙牛角。炙羊角。炙甲片各二錢。角刺三錢。

生大黃十二兩。法以牛羊甲片三味。濕紙包煨焦。取淨末。同角刺大

黃淨末研勻。每服五錢。弱者三錢。紹酒送下。候瀉。宜於空地上。利

完將土掩之。恐惡氣害人。間二日再一服。甚者不過三服神效。後服珠

黃十寶丹以愈爲度。結毒亦效。

珠黃十寶丹。滴乳石人乳煨。真琥珀。乳香去油。沒藥去油。辰

砂水飛。山茨菇各三錢。敗龜板炙。雄黃各四錢。犀角。珍珠

各一錢。真正人中黃五錢。當門子五分。各取淨末秤準。共爲極

細末。山藥打糊爲丸。如桐子大。辰砂爲衣。專治一切廣瘡。楊梅結毒。下疳潰爛。小兒胎毒。分一月服完。卽愈。甚者再服一料。必愈。功勝五寶丹。以上三方。卽治楊梅瘡方。

玉樞丹方。毛慈菇二兩晒。紅芽大戟一兩五錢炒。千金子霜一兩。

冰片三錢。文蛤二兩去垢晒。雄黃三錢。飛辰砂三錢。麝香三

錢。草河車一兩五錢晒。山荳根一兩炒。丁香三兩晒。燈草炭

一錢。以上藥各研末和勻。糯米飯打成錠晒乾。收貯重出。

絕癩丹。治顛仆眼直。口吐痰沫。或作羊鳴。不省人事。此因驚恐得之。

硝煨礞石五錢。天竹黃六錢。當門子二分。煨明天麻三錢。辰

州硃砂三錢。蛇含石五錢醋煨。陳膽星四錢。法半夏八錢。等

分爲末。以薑汁五錢。竹瀝二兩。和於蜜中。煉熟杵丸。如龍眼大。童

便磨服半丸立止。服三一丸全愈。蛇蛻四分煨淨。綠礬二分。犀

黃四分。石膏三錢煨。紫草二錢。川連一錢。蜂窠一錢煨淨。

紫荊皮一錢五分。上味同研細末。用馬蘭汁調藥塗於患處。

傷科方書目錄

斷死證祕訣·····	一
祕受不治方法·····	一
受傷治法·····	二
通用方·····	八
祕傳方·····	一一
附錄驗方四則·····	一九

傷科方書

江考卿先生著

休寧金履升錄存
杭州李錦章校刊

斷死證祕訣

金傷身損眼皮青。定主身亡難救命。若是氣喘與咆噎。且在一七內中亡。人中晝滿唇又青。三日須知命必傾。神仙留下真祕訣。不說凡人不知音。

祕受不治法

- 凡矢柱骨折。不治。
- 凡兩目損傷。不治。
- 凡口開氣出不收。不治。
- 凡口如魚口。不治。
- 凡傷食喉。不治。
- 凡打破頭鼻流黃白水。不治。
- 凡脊骨折斷。不治。
- 凡心胸緊痛。紅色高腫。不治。
- 凡心口青色。不治。
- 凡小腹陰陽不分。不治。
- 凡小腹傷吐糞。不治。

凡跌打大小腹痛。不治。

凡腎子傷入小腹。不治。

凡孕婦傷犯胎。不治。

凡女人傷乳。不治。

凡男人兩乳堂傷。不治。

凡腰傷自笑。不治。

凡兩臂墮下。盡力叫喚。汗出如油者。不治。

凡人手骨出一脛可治。兩股齊出。不可治。

受傷治法

凡腦受傷。使人輕輕扶正。皮未破。用二十號黑龍散。已破。用十四號桃花

散。填破口避風。禁口自愈。

凡頂門受傷。用二十四號止血散。擦服俱用此藥。

凡氣喉受傷。令人扶頭托湊喉管。不使出氣。用銀針連好。外用十八號貼

膏。內服上部藥方。

凡眉甲骨出。用椅圈將軟衣墊好。令傷人坐圈中。使一人捉定。以絹縛之。

外用十八號貼膏。內服上部藥方。

凡肩胛骨折。必先使骨平正。用十八號貼膏。以油紙扎好。內服六號接骨

丹。

凡金井骨在脇下。若損傷。不宜夾縛。扶平。用二十六號黑龍散。

凡兩脇骨折。如金井骨治法。

凡肩臂脫出。令人抵住。以抱著手臂。輕輕送入故位。內服六號接骨丹。外貼十八號膏。

凡人膝蓋。乃另生者。跌出不治。跌破者。用篾箍以帶縛定。外用二十四號止血散。

凡傷破腹。大腸跌出。被風吹其腸乾。不能收口。用麻油搽上。使腸潤澤。用一人托腸。一人默含冷水。噴潑傷人身上。其人必然一驚。托腸人即隨驚送入。再用銀針連好。先敷二十四號止血散。後用十八號膏貼。傷破目難看見。用好酒一杯。令傷者飲下。即使人喫傷。如若酒氣。其腸已破。難已救治。

凡人骨跌出。內外折肉中。用二十號寶麻藥一服。再將肉破開。取膏整換。用二十四號止血散。十八號貼膏。外以筍箬包好。內服六號接骨丹。凡打傷跌腫。肉中之骨。不知碎而不碎。醫人以手輕輕摸腫處。若有聲者。其骨已破。先用二十號寶麻藥一服。然後割開。如血來不止。用二十四號止血丹。又用二十號寶麻藥一服。再取骨出。若骨碎甚。即以別骨填接。外貼十八號膏藥。內服六號接骨丹。

凡平直處。跌打骨傷。皮不破。先用二十號黑龍散敷好。再用板夾縛平正。如曲折之處。只宜敷藥。不宜挾縛。免愈後不能伸屈。

凡服跌打藥。要忌冷水冷物。其藥必要熱服。

凡跌打傷重。必先用二十七號藥水洗過。然後敷藥。輕傷不必如此。凡跌打血來不止。用二十五號桃花散。或二十四號止血丹。再不止。用三七山羊血。外用桃花散圈上。

凡骨未碎有輕者。外用十八號貼膏。內服上中下三部之藥。照傷何部。即用何部藥方。

凡山谷鄉村無藥舖之處。若遇跌打。暫用糯米水。酒。薑。葱。同搗包熨。不使血凝。內服老酒。再治可也。

凡跌打藥。宜磁瓶收貯。不使出氣。

凡人週身一百另八穴。小穴七十二處。大穴三十六處。打中小穴。重亦無妨。打中大穴。雖輕亦死。今將三十六個大穴。道明受傷治法。

頭頂心名爲元宮穴。打中者。二日死。輕者。耳聾頭眩。六十四日死。先用加減湯。加羌活一錢。蒼耳子一錢五分。次用奪命丹二三服。再加藥酒常服。

前胸名華蓋穴。打中者。人事不省。血迷心竅。三日而死。先用加減湯。加枳實一錢。良薑一錢。次用七厘散二分。後用奪命丹二三服。

後背心名肺底穴。打中者。兩鼻出血。九日而死。先用加減湯。加百部八分。桑皮一錢。次用七厘散二分。後用奪命丹二三服。再用紫金丹。

右乳上一寸三分。名上氣穴。打中者。發寒熱三十二日而死。先用加減湯。加沉香五分。肉桂一錢五分。次用七厘散二分。後用奪命丹二三服。

左乳下一分。名中氣穴。打中者十二日而死。先用加減湯。加青皮一錢。乳香一錢。次用七厘散二分。後用奪命丹二三服。

左乳下一寸四分。名下氣穴。打中者七日而死。先用加減湯。加枳實一錢五分。石菖蒲一錢。次用七厘散二分。後用奪命丹二三服。

右乳上一寸三分。名上血海。打中者。口中吐血。十六日死。先用加減湯。加鬱金一錢二分。沉香一錢。次用七厘散二分。再用奪命丹二三服。

右乳下一分。名正血穴。打中者。口中吐血。十八日死。先用加減湯。加鬱金一錢五分。寄奴一錢五分。次用七厘散二分。再用奪命丹一二服。

右乳下一寸四分。名下血海。打中者。三十六日。吐血而死。先用加減湯。加五靈脂一錢二分。蒲黃一錢。炒黑。次用七厘散二分。再用奪命丹二三服。

心中名黑虎偷心穴。打中者。立刻眼目昏花。人事不省。拳回氣絕。速宜治之。先用加減湯。加官桂一錢。丁香六分。次用七厘散二分。再用奪命丹二三服。再用紫金丹三四服。

心下一分。名霍肺穴。又下半分。名肺底穴。打中者。劈面一把。卽醒。然後用藥。先用加減湯。加桂枝一錢二分。貝母一錢。次用七厘散二分。再用奪命丹二三服。又服加減湯。後用紫金丹。

心下一寸三分。偏左一分。名翻肚穴。打中者。比日而死。先用加減湯。加紅花一錢五分。木香一錢。次用七厘散二分。仍用加減湯。二三服。再用

奪命丹二三服。又用紫金丹三四服。或吊藥一數。

臍下一寸五分。名氣海穴。打中者。二十八日而死。先用加減湯。加杏仁

一錢。玄胡索一錢。次用七厘散二分。再用奪命丹二三服。

臍下三寸。名丹田穴。打中者。十九日而死。先用加減湯。加木通一錢五

分。三稜一錢五分。次用七厘散三分。

臍下四寸五分。名分水穴。打中者。二便不通。十三日而死。先用加減湯。

加三稜一錢五分。莪朮一錢。生軍三錢。次用七厘散二分。再用紫金丹

二三服。

臍下六寸。名關元穴。打中者。五日而死。先用加減湯。加車前子一錢。青

皮一錢。次用七厘散二三分。再用奪命丹二三服。

左邊脇臍毛中。名氣海穴。打中者。六個月而死。先用加減湯。加五加皮

一錢。羌活一錢。次用七厘散二三分。再用奪命丹三四服。

右邊脇臍毛中。名血海門。打中者。五個月死。先用加減湯。加柴胡一錢

二分。當歸一錢。次用七厘散二分。再用奪命丹二三服。或用藥酒常服。

左邊脇梢軟骨。名章門穴。打中者。一百五十四日死。先用加減湯。加歸

尾一錢。蘇木一錢。次用紫金丹三四服。

右邊脇梢軟骨。名地門穴。打中者。六十日而死。先用加減湯。加丹皮一

錢。紅花一錢五分。次用奪命丹二三服。仍服加減湯。加蒲黃一錢。葶菜

下一分。名血囊穴。打中者。四十日而死。先用加減湯。加蒲黃一錢。葶菜

子一錢。次用奪命丹二三服。再服藥酒。

兩耳下半分空處。名聽耳穴。打中者。二十四日死。先用加減湯。加川芎一錢。細辛五分。次用奪命丹一二服。再服藥酒。

背心第七個節兩邊下一分。名石骨穴。打中者。吐痰吐血。十個月而死。先用加減湯。加杜仲一錢。骨碎補一錢。次服奪命丹三四服。

下一寸一分。名後氣穴。打中者。一季而死。先用加減湯。加補骨脂一錢。烏藥一錢。次用紫金丹三服。再用藥酒。

兩腰眼中左邊。名腎經穴。打中者。三日大哭而死。先用加減湯。加桃仁一錢五分。紅花一錢。次用奪命丹二三服。

右邊名命門穴。打中者。日事而死。先用加減湯。加桃仁一錢五分。前胡一錢。次用奪命丹三服。

尾梢盡下一分。名海底穴。打中者。七日而死。先用加減湯。加生軍一錢。朴硝一錢。次用奪命丹二三服。再用紫金丹三四服。

兩腿中。同名鶴口穴。打中者。一季而死。先用加減湯。加牛膝一錢。苡仁一錢。次用紫金丹二三服。

左右脚脈中。同名涌泉穴。打中者。十四個月死。先用加減湯。加牛膝一錢。宣木瓜一錢。次用奪命丹二三服。

以上三十六大穴。指明受傷之法。然用藥雖無久異。不過加減湯。及七厘散。奪命紫金等藥。惟加減方中。所加二味零藥。不可錯誤。切宜緊記。

大凡人於既跌之後。或相打受傷之後。感冒經風。發寒發熱。頭身皆痛。先用解肌湯。或小柴胡湯治之。然後再服跌打之藥。

通用方

解肌湯 廣皮一錢。防風一錢。葛根一錢。木通一錢。羌活一錢。二分。荆芥一錢。五分。前胡一錢。桔梗一錢。蘇葉一錢。五分。加葱白三根。薑三片。水煎服。

小柴胡湯 柴胡一錢。桔梗八分。連翹一錢。二分。花粉一錢。五分。葛根一錢。黃芩一錢。廣皮一錢。木通一錢。五分。加燈心十根。砂仁末五分。水煎服。十三味加減湯 五加皮一錢。五分。枳殼一錢。劉寄奴一錢。肉桂一錢。杜仲一錢。五靈脂一錢。蒲黃一錢。歸尾一錢。五分。廣皮一錢。二分。紅花八分。玄胡索一錢。香附一錢。五分。青皮一錢。加砂仁五分。用陳酒煎服。

金瘡藥方 生南星五錢。生半夏五錢。共研細末。搽之。

吊藥方 專治接骨入髓。打傷骨頭。止痛去傷。

赤芍二錢。麝香五分。乳香二錢。沒藥二錢。

各研細末。臨用糯米飯。燒酒調塗。

七厘散 專治跌打。昏迷心竅。人事不省。服之可行。用冷粥卽止。

礞砂入錢。硃砂四錢。血竭八錢。土狗六錢。地鱉八錢。歸尾五錢。紅花五錢。蘇木四錢。加皮四錢。枳實五錢。木香五錢。大黃六錢。巴霜三錢。蒲黃三錢。青皮三錢。廣皮四錢。烏藥三錢。靈脂五錢。三棱五錢。莪朮五錢。寸香一錢。

肉桂三錢。猴骨三錢。

以上共研細末。重者二分。半輕者一分。再輕七厘。陳酒下。

飛龍奪命丹 專治跌打接骨。皆可服之。

當歸五錢。赤芍二錢。三棱四錢。寸香二錢。土狗三錢。土鱉八錢。菽朮四錢。青皮三錢。蒲黃二錢。碎補三錢。加皮八錢。廣皮二錢。礪砂八錢。然銅八錢。木香六錢。烏藥三錢。硃砂二錢。胡索四錢。桂心三錢。香附四錢。寄奴三錢。桂枝三錢。血竭八錢。羌活三錢。前胡三錢。貝母二錢。葛根三錢。秦朮三錢。桃仁五錢。蘇木四錢。杜仲二錢。猴骨二錢。葦菜子二錢。古錢四個。醋酒浸。共研細末。重服三分。輕分半。再輕一分。酒下。

地鱉紫金丹 專治遠近跌打內傷。面黃肌瘦。四肢無力。并腰痛皆服之。青皮三錢。黃芩三錢。赤苓三錢。烏藥三錢。紅花三錢。赤芍三錢。血竭八錢。硃砂二錢。然銅八錢。土狗五錢。土鱉三錢。猴骨三錢。虎骨八錢。牛膝三錢。靈仙三錢。靈脂五錢。木香二錢。寸香三錢。香附四錢。肉桂三錢。枳殼二錢。丹皮四錢。桃仁五錢。貝母三錢。寄奴三錢。廣皮三錢。蘇木三錢。遠志二錢。歸尾五錢。桂枝三錢。木通三錢。三棱四錢。菽朮四錢。秦朮三錢。加皮五錢。續斷三錢。杜仲三錢。骨脂四錢。碎補三錢。羌活三錢。葛根三錢。蒲黃四錢。澤瀉三錢。松節五錢。枸杞三錢。葦菜子三錢。礪砂八錢。

共研細末。重服三分。輕二分。再輕一分。酒下。

萬應回生膏 專治遠近跌打。接骨。風氣。週身大穴受傷。貼即效。

生地五錢。熟地五錢。當歸二錢五分。川烏二錢五分。草烏五錢。紅花五錢。靈仙二錢五分。寄奴二錢五分。杜仲一錢五分。木瓜一錢五分。牛膝二錢五分。胡索三錢。桂枝二錢五分。防風二錢五分。骨脂二錢五分。荆芥二錢五分。獨活二錢。赤芍一錢五分。碎補五錢。香附三錢。桃仁三十粒。升麻三錢。丹皮二錢五分。蘇木二錢五分。青皮二錢五分。烏藥二錢五分。葶子二錢五分。松節二錢五分。秦艽二錢五分。續斷二錢五分。元參二錢。麻黃二錢。蒲黃二錢五分。虎骨五錢。猴骨三錢。

共研細末。將麻油一斤。血餘四兩。煎好共熬成膏。

臨用加膏上末藥 寸香七分。丁香一錢。血竭一錢。木香一錢。桂心一錢。乳香一錢。沒藥一錢。香附一錢。東母一錢。蘇合油一錢。

勞傷藥酒方 (女人加益母草。油髮灰。阿膠。各四錢。) 紅花一錢。黃芩五錢。烏藥五錢。白茯苓五錢。生地五錢。當歸六錢。加皮五錢。骨脂三錢。杜仲五錢。牛膝五錢。枳殼三錢。桃仁四錢。遠志五錢。續斷三錢。麥冬五錢。秦艽五錢。丹皮五錢。枸節五錢。桂枝三錢。香附三錢。澤瀉五錢。胡索五錢。虎骨八錢。枸杞子六錢。白胡根三兩。胡桃肉四兩。大棗頭三兩。

以上等藥。共置入好酒中隨飲。

勞傷丸藥方 生地。熟地。加皮。當歸。丹皮。黃芩。杜仲。黃芪。麥冬。天冬。遠志。川牛膝。補骨脂。柏子仁。白茯苓。各等分。以上共研細末。白蜜和丸。白湯送下。

體仁子曰。跌打損傷之症。皆從血論。損有重輕之不同。傷有淺深之各異。豈能一概而治乎。蓋皮未破。多用串皮破血之劑。皮既已破。多用通利兼補之方。此乃跌打中之大要也。學者用心詳焉。今將祕方開列於后。

祕傳方

君臣散（第一） 肉桂童便浸一兩。紅花酒洗五錢。歸尾五錢。生地五錢。甘草梢五錢。赤芍五錢。烏藥五錢。牛膝五錢。玄胡索五錢。杜仲三錢。桃仁去油五錢。碎補去毛五錢。續斷二錢。花粉二錢。川芎三錢。羌活二錢。牡丹皮五錢。加皮二錢。防風二錢。共研細末。臨用加薑末少許。

紫金散（第二） 紫金皮。酒浸一宿。瓦上焙乾。爲末用。

黑神散（第三） 黃金子。麻油拌炒黑。爲末。

桃花散（第四） 乳香炙。沒藥炙。血竭炙。各等分。共研細末。

玉龍散（第五） 人中白。醋炙七次。研末。

乳香散（第六） 乳香炙。沒藥炙。碎補去毛。當歸酒浸。礞砂煨。血竭。土

鱉去頭足。醋炙。各等分。酒醉瓦焙。爲末。

一粒金丹（第七） 半夏二錢。醋炙。土鱉炙兩半。瓜蒌仁去油三錢。

共研細末。以飯丸粟米大。上部一錢。下部一錢五分。酒下。

八仙丹（第八） 乳香二錢。沒藥二錢。巴霜二錢。碎補二錢。半夏二錢。

歸尾酒洗五錢。礞砂三錢。大黃五錢。血竭三錢。自然銅醋炒三錢。無名異

醋炙二錢。

以上共研細末。每服八釐酒下。

川芎散（第九） 上部頭傷痛用 川芎一錢。白芷一錢。防風一錢。赤

芍一錢。生地一錢。當歸一錢二分。羌活一錢二分。花粉一錢二分。陳皮一

錢。桔梗一錢。黃金子一錢二分。加薑三片。水酒煎服。

桂枝湯（第十） 上部手臂傷痛用 桂枝。枳殼。陳皮。紅花。香附。生地。

防風。當歸。赤芍。獨活。玄胡索。各等分。加童便煎服。

蔓荊散（第十一） 上部眼目傷用 白芍一錢。生地一錢二分。紅花

一錢二分。白朮一錢二分。川芎一錢二分。當歸一錢二分。蔓荊子一錢。

水酒煎服。

杜仲散（第十二） 中部腰痛傷用 肉桂一錢。烏藥一錢。杜仲一錢

二分。赤芍一錢。當歸一錢。丹皮一錢。桃仁一錢。續斷一錢。玄胡索一錢。

童便煎服。

杏仁湯（第十三） 中部肚痛傷用 甘草三錢。歸尾一錢。生軍三錢。

杏仁去皮三錢。桃仁去皮三錢。童便煎服。

桔梗湯（第十四） 下部二便閉用 紅花。蘇木。芒硝。各五錢。煨大軍

七錢。桔梗二錢。桃仁二十五粒。猪苓。澤瀉。各三錢。加薑三片。童便一盞。

酒半斤。煎服。

車前散（第十五） 下部二便閉用 當歸。枳殼。赤芍。車前子。木通。桔

梗。大黃。芒硝。以上各等分。童便水酒煎服。

海桐散（第十六） 手足傷亦可用 獨活、牛膝、秦朮、桂心、生地、陳皮、赤芍、續斷、當歸、防風、丹皮、加皮、薑黃、海桐皮。以上各等分。童便水酒煎服。

麝香膏（第十七） 紅花五錢、歸尾一兩、蘇木三錢、加皮五錢、肉桂五錢、地黃五錢、白芷五錢、紫金皮五錢、防風五錢、荆芥五錢、牛膝五錢、續斷五錢、靈仙三錢、獨活五錢、麻黃五錢、黃柏五錢、丹皮五錢、桃仁五錢、苦參五錢、血餘五錢、大黃一兩。以上用麻油斤半。將上等藥浸下。夏二日、冬四日。爲度。用銅鍋熬至枯色。入薑少許再熬。去渣又熬。入片黃霜三味。又熬數沸取起。收拾聽用時加麝香、乳香、沒藥、三味藥末於膏上。

象皮膏（第十八） 凡跌打骨斷皮破皆用 大黃一兩、川歸一兩、肉桂三錢、生地一兩、紅花三錢、川連三錢、甘草五錢、荆芥三錢、白芨五錢、白斂五錢。以上肉桂、白芨、白斂、黃占共研細末。餘藥油浸。照前熬法成膏。收用時加膏上末藥。土鱉、血竭、龍骨、象皮、礞硝、珍珠、乳香、沒藥、入味再帖。

藥酒方（第十九） 凡打傷跌損可用 當歸、生地、烏藥、三七、肉桂、乳香、沒藥、牛膝、丹皮、紅花、胡索、防風、獨活、杜仲、加皮、落得草、川芎、虎骨、乾薑、薑黃、紫荊皮、海桐皮。各五錢。米酒浸煮。早晚服。

八釐寶麻藥（第二十） 川烏、草烏、蟾酥、半夏、南星、黃麻花、鬧楊花。共等分。研末。苧葉汁。拌末晒乾。再研末收好。每服八厘酒下。

楊花散（第二十一） 鬧楊花二錢、南星二錢、草烏一錢、半夏二錢。

共研末用麻黃根、葶麻根、葶麻葉、三味絞汁，拌上末藥，再研末，開割肉用者，搽上。

續筋骨（第二十二） 土鱉、血竭、龍骨。 共等分，研細末，唾調塗。

又方（第二十三） 旋覆花，取汁調塗。

止血散（第二十四） 血見愁、馬蘭頭、川三七、旱蓮草。 共研細末，取

好便用。

桃花散（第二十五） 陳平石灰一斤，用牛膽浸七次，取出同大黃炒，

如桃花色，去大黃用。

黑龍散（第二十六） 川山甲、丁皮六兩，川芎二兩，枇杷葉去毛五錢，

百草霜五錢，當歸二兩。 共研細末用。

洗傷藥方（第二十七） 艾、葱、桂枝、荆芥、歸尾、槐花、蒼朮、防風、玄胡索，

以上各五錢，水酒童便煎服。

陰江湯（第二十八） 婦人損傷用 阿膠、沒藥、油髮灰。 水酒煎服。

血竭湯（第二十九） 跌打血從口出用 髮灰、茅根、血竭、葶菜根。

水酒童便煎服。

跌打既好筋不伸方（第三十） 黃荆子一兩，續斷八錢，海桐皮八錢，

虎骨八錢，鷄骨八錢，犬骨八錢，秦艽七錢，獨活七錢。 共研細末，每服一

錢五分，合下寬筋湯服。

寬筋湯（第三十一） 肉桂、牛膝、薑黃、黃芪、川芎、地黃、獨活、續斷、白朮。

芩、海桐皮。各等分。用水酒煎空。心服。

人參散（第三十二） 凡接骨之後。無力不能行動用。人參。白朮。肉桂。續斷。黃芪。當歸。烏藥。各等分。用水煎服。

桂枝湯（第三十三） 凡治一切跌打通用。陳皮。芍藥。枳殼。丹皮。香附。生地。桂枝。歸尾。桃仁。乳香。沒藥。川芎。牛膝。藿香葉。水煎服。

薑黃湯（第三十四） 凡一切跌打通用。桃仁。蘭葉。丹皮。薑黃。蘇木。當歸。陳皮。牛膝。川芎。生地。肉桂。乳香。沒藥。水酒童便煎服。

消風散（第三十五） 凡跌打損傷牙關緊閉。赤芍一錢二分。川芎一錢二分。當歸五分。升麻一錢。羌活一錢。陳皮一錢二分。半夏一錢二分。防風七分。南星五分。甘草三分。老薑三片煎服。

麻黃湯（第三十六） 凡破傷風發寒用。肉桂三分。乾薑五分。半夏一錢二分。厚朴七分。桔梗七分。枳殼七分。麻黃去節二錢。蘇木五分。川芎七分。陳皮薑汁製一錢。煎濃熱服。

升麻湯（第三十七） 凡損傷頭用。白朮。附子。升麻。麻黃。紅花。川芎。乾薑。肉桂。甘草。各等分。用加老薑三片。蔥頭三節。水煎服。

杏仁湯（第三十八） 肉桂。麻黃。桑皮。杏仁。桔梗。細茶。甘草。各等分。加燈心煎服。

治破風（第三十九） 蒼草一兩。水酒煎服。

金瘡方（第四十） 上三七三錢。水粉炒黃五分。片香製三兩。共研

細未用。

又方（第四十一） 舊氈帽邊三兩。燒灰存性用香油調塗。

刑杖方（第四十二） 歌云。既救諸傷又救刑。乳香沒藥合無名。土鱉

再加真猴骨。然銅宜以醋來烹。六味一同研細末。煉蜜合成打彈丸。臨用

須飲三杯酒。那怕黃昏打到明。乳香沒藥。土鱉無名異。猴骨自然銅。

又方（第四十三） 治刑杖 白芷三錢。赤芍三錢。乳香多一兩。沒藥

多一兩。黃金子一兩。陳年尿坑瓦。童便酒煨。一兩。共研細末。未杖之前。

酒調服之。若既杖傷甚。只宜用下藥。

紅花散（第四十四） 治刑杖 酒醉土鱉醋煨。古錢多。乳香多。沒藥。

蘇木節。巴霜。各等分。研末。一板一厘。水酒調服。

刑傷夾櫻方（第四十五） 大黃四兩。半夏二兩。白芷二兩。官桂四兩。

甘草二兩。共研末。酒調扶傷處。內服上桃花散。

治足骨挾碎（第四十六） 土鱉二個。生蟹一個。共搗敷患處。內服

六號乳香散。

治打足拐（第四十七） 牛膝二錢。土鱉二錢。共搗敷患處。

被人咬傷方（第四十八） 栗子一撮。口中嚼碎。敷患處。

抓破臉皮方（第四十九） 用薑汁調輕粉一錢。敷患處。

打傷接氣方（第五十） 參鬚一錢。硃砂三錢。乳香一錢。川烏一錢。北

細辛三錢。寸香一分。共研細末。每服五七厘。童便下。

開關吹鼻散（第五十一） 細辛二錢 牙皂二錢 三奈一錢 良薑二錢 寸香一分 共研細末 吹鼻即甦。

擊開吹喉散（第五十二） 治牙關緊閉 牙皂二錢 細辛二錢 巴霜二錢 共研末 入喉即甦。

擊開灌下方（第五十三） 蟬退三錢 硃砂一錢一分 共研末 酒或童便下。

急救灌轉方（第五十四） 乳香去油四錢 沒藥去油四錢 名異煨四錢 枳殼麵炒三錢 寸香二分 木鱉便炒三錢 土鱉火煨四錢 土狗麵炒四錢 川銅醋煨四錢 血竭五錢 鬧楊花酒蒸去心五錢 共研細末 重服七厘 或酒或童便下。

欲吐痰方（第五十五） 膽礬三分 銅綠三分 以上共研細末 用神仙醋調服 卽吐痰。

雞鳴散（第五十六） 治跌打瘀血攻心 脈欲死服 生地二錢 大黃三錢 杏仁去衣一錢 當歸酒洗一錢五分 用生水酒煎服。

腦頭引 藁本 川芎 白芷 白芍 蘇葉 升麻 木香 羌活 咽喉引 玄胡 碎補 乾薑 防風 桔梗 薄荷 桔根 連喬 胸前引 枳殼 厚朴 乾薑 鬱金 陳皮 烏藥 木香 甘草 腰上引 杜仲 小茴 兔絲 木香 故紙 枸杞 玄胡 加皮 手上引 桂枝 當歸 透骨草 甘草 羌活 防風 神仙劍（卽千年健十指全

傷用)

脚上引 川膝。獨活。木瓜。苡仁。淮膝。蒼朮。加皮。木香。

脚脊引 淮膝。南藤。棕根。木瓜。苡仁。螺螄。骨透。骨草。

潮熱引 柴胡。羌活。黃芩。陳皮。厚朴。甘草。人中白。

浮腫引 生地。防己。漏蘆。防風。烏藥。甘草。

氣急引 沉香。枳實。陳皮。木香。鬱金。烏藥。

腹內痛引 玄胡。吳萸。石菖。白芍。木香。祈艾。

二便閉引 大黃。車前。澤瀉。木通。枳殼。猪苓。

血聚引 紅花。桃仁。生地。蘇木。血竭。當歸。

氣聚引 沉香。小茴。三棱。莪朮。靈脂。乳香。

遍身引 乳香。碎補。木香。沒藥。吳萸。寄奴。

消風引 荆芥。白芷。犀角。薄荷。葛根。草烏。

止嘔引 炮薑。砂仁。藿香。白朮。酸車草。取自然汁。

失氣引 金鳳花葉。佛指甲花。寸香。三味共研細末。薑汁服。

接骨引 然銅。虎骨。小茴。當歸。土鱉。猴骨。枸杞。

體之虛者 加附子。肉桂。洋參。黃芪。

體之健者 加黃連。黃芩。紫蘇。薄荷。

接骨膏 (第五十七) 當歸酒炒一兩五錢。羌活五錢。骨碎補去皮五

錢。牛膝酒洗炒一兩。木香五錢。威靈仙一兩五錢。桂枝一兩。川芎五錢。川

烏去皮淨五錢。加皮酒炒去皮一兩。杜仲五錢。北細辛五錢。防風五錢。要鮮揀淨香附五錢。滴乳香去油後放五錢。沒藥去油後放五錢。桃丹後放收膏二兩五錢。燉松香二兩後放。

以上共藥十八味。外加四葉對三錢。土茯苓三錢。海風藤五錢。將真正菜油數斤熬滾。將藥十四味先入鍋內。再將草藥三味。共浸油內。春天浸五日。夏三。秋七。冬十天。期滿入鍋內。漫火熬根浮起。濾渣再入乳香。沒藥。松香。三味。又熬數沸。滴水成珠。再下黃丹收膏。俟退火三日再用。此膏專治骨跌打傷者。皮未破者。將此膏貼之。其骨陸續如初。并一切跌打損傷。貼患處。傷骨自好。其腫自消。散血通氣效驗。

凡跌打不能言語。人不知打壞何處。急用不滿尺叢樹。連根拔來。洗淨去泥。搗汁量入酒量若干。如飲約一壺者。即用一壺。和叢樹內攪汁。令傷人飲之。免其血瘀衝心。再請先生醫治可也。

又十直路口。尿桶底磚瓦片取來。炒乾研末。亦醫跌打。按江先生乳名祥。號瑞屏。住婺源北鄉清華街。雙河頭。道光庚子年已七旬。善於跌打。此書珍之寶之。

附錄驗方四則

三合濟生丸。專治四時不正之氣。頭疼身熱。腹痛脹悶。霍亂轉筋。嘔吐泄瀉。四肢厥冷。絞腸痧氣。傷寒傷暑。傷食瘧痢諸症。每服一錢。重症加倍。舌苔白者。用薑香湯。下黃者。用荷葉湯。下寒重用薑湯下。

吐瀉轉筋。用丸四服。加生薑。竈心土煎服。忌食米粒。此方歷年合藥。施送。活人甚多。而需費甚少。務望諸方善士。或合藥。或刻方。廣爲施送。則費小而功極大矣。方列於左。

川厚朴六兩五錢。薑汁炒烏藥二兩。枳殼三兩五錢。羌活四兩。廣藿香七兩。木瓜一兩三錢。紫豆蔻二兩。茅朮三兩。半夏四兩五錢。蘇葉七兩。香菇二兩。草菓二兩。赤苓六兩。香附三兩。桔梗二兩五錢。甘草三兩。茯苓二兩。川芎三兩。白朮一兩五錢。檀香一兩。陳皮六兩五錢。防風三兩。木香三兩。六錢。柴胡八錢。白芷五兩。神麩五兩。砂仁三兩。以上藥料。須揀選明淨。同研爲細末。用薄荷。茶葉。大腹皮。熬汁米湯一碗。法丸。硃砂爲衣。每丸重七分。曬乾。收入小口磁瓶。不可洩氣爲要。

跌打損傷膏驗方 生地。薄荷。獨活。赤芍。川芎。川羌。連翹。以上每味各一兩。香附。荆芥。當歸。防風。桃仁。米仁。青皮。加皮。丹皮。杜仲。川柏。元胡。白芍。白芷。牛膝。紅花。鮮皮。木通。蘇木。木瓜。甘草。厚朴。蘇梗。枳實。枳殼。秦艽。川斷。黃芪。甘松。三棱。山奈。元參。劉寄奴。骨碎補。去毛。以上每味各六錢。外加鉛粉七十二兩。炒黃色。

用上等好麻油十斤。以上各藥。先浸兩三日。後入鍋煎熬。去渣。再入鉛粉。用桑枝攪勻。扇至烟盡候冷。浸水中愈陳愈妙。

又未藥方 攤膏時臨用。加入每油一斤。加放藥末一兩。肉桂一兩。製乳香二兩。製沒藥二兩。血竭一兩。龍骨一兩。丁香一兩。以上共研極細。

末。收藏磁瓶內聽用。升每遇瘋氣。貼以此膏。較市上所售之萬應膏。功效尤捷。

秘製硃砂膏 專治疔瘡。癰疽。對口發背。頸項一切無名惡毒均效。松香一斤。葱水煮麝香五分。如嫌麝香貴。可另改加入入將散。冰片五分。製乳香五錢。製沒藥五錢。樟腦三兩五錢。銀硃一兩。漂硃砂二錢。研漂蓖麻子肉五兩。杏仁一伯五十粒。去皮尖。明雄黃二錢。全蝎二錢五分。葱水洗。各爲細末。打數千槌爲膏。磁罐收貯。臨用時隔水燉軟。入平常油紙膏藥上。貼之。當看瘡形之大小。酌量用之。

入將散古方 治癰疽大毒。拔膿去腐。生肌等症。川五倍一兩六錢。焙研川雄黃三錢。水飛冰片五分。蜈蚣七條。去鉗足。多淨一錢二分。全蝎十個。漂淨去尾。炙末淨七分。麝香五分。山甲十片。炙淨二錢。蟬蛻二十個。去頭足。焙研淨七分。各研細末。和勻再研細末。磁瓶收貯。

按附錄驗方。乃做典施送方藥。垂已念餘年。頗爲靈驗。特附於末。以望諸善士。廣傳爲幸。升寄居餘杭同和典錄。

中華民國十三年歲次甲子孟秋月

產寶序

人之所以生。氣血而已。血之所以生。氣而已。氣。火也。血。水也。貯水於釜。厝火而烹之。其蒸蒸然浮動者。水也。其所以然者。非水也。氣也。火之用也。故治血必先理氣。氣行血行。氣滯血滯。行則生。滯則死。見血之滯而攻之。使下。是猶見水之滯而激之。使行也。今之業產科者。操此術以殺人。蓋不知其幾矣。嘉慶癸酉。余室人衛氏。產後患瘀滯。醫曰。是非逐以莪朮。荆三稜不可。一劑而神昏譫語。則云。藥輕不勝病。益以大劑而氣上逆暴脫矣。余是時初未知醫。以爲證固不治。但有悼痛。厥後稍稍習岐黃家言。得浦江倪氏所著產寶讀之。遇戚鄰中有患此者。照是書於生化湯中加生芪一二兩。恒獲十全。他證按方取治。靡不愈。然後知前此爲醫所誤。凡莪朮荆三稜之屬。破血而因以蝕氣。氣蝕則血無以生。雖神奇亦化爲臭腐。而生化湯於行血中理氣。增以生芪。氣壯而血以行以生。故能奏效若此也。余既悼逝者之不可作。復閱醫之庸。頃承乏平度。聽斷之暇。因取是書略加刪潤。鏤板傳布。俾業產科者有所據依。毋徒以破血蝕氣之藥殺人。也。嗟乎。是豈獨產後然哉。四明高鼓峯論治血證。以固元湯先回其氣。湯中重用參芪。而今世蠱工。惟知用寒涼。直折重遏其心肺之陽。馴致生生之氣絕而不可復救。豈不悲哉。附著弁言。爲世之治血而不知理氣者告焉。倪氏名枝維。字佩玉。號鳳賓。雍正六年成是書。向無刊本。余友趙文學魏寄

脈寫本。棄之篋。衍二十五年矣。生平所見治產諸書。未有出此上者。洵可寶也。道光壬寅春仲。海昌許樵序於平度州署之行吾素齋。

序

治產方書夥矣。類皆見證治證。不審本原。間有一二善本。而博引繁徵。紛然雜出。讀其書者。奚所折衷也。夫產後勞倦異常。腠理不密。脾胃恆弱。氣血多虧。急宜滋補。以回其元。而他證概從未治。其需補而不遽補者。特以惡露未淨。收固升提之品。礙難驟進耳。若痛塊既除。調理失當。則正氣久衰。變證百出。害將不可勝言。世醫不明此旨。或因煩熱而妄用清涼。或因瘀滯而誤施攻下。或因外感而謬加表散。或因內結而專主消耗。治其標而舍其本。究之。本愈虧而標亦不可治。其不危者幾希矣。道光丙午。家君光祿公。宦京師。得許珊林刺史所刊倪氏產寶讀之。竊歎爲濟人寶筏。欲付梓以公於世久矣。歸里後。值楮寇滋擾。練兵籌餉。昕夕不遑。致稽壽棗。今先君棄養三年矣。偶理遺篋。覩是書。重爲黯然。爰悉心校正。付劂。嗣氏以承先志。吾知流傳日廣。必有同志之士。什襲珍藏。相繼刊佈者。由此家置一編。俾宇內共慶達生。是則予之厚望也夫。同治辛未秋仲。石陽黃祖經序於三餘家塾。

序

余家得是書。曾鐫印萬數千本。以廣其傳。數十年來。戚友鄉里中。按方施治。靡不奏效。年遠者不能記憶。若近事之奇驗者。可略舉一二焉。余宦浙。姪寶芝宦金陵。光緒甲午。寶芝以同知權鹽城縣篆。遣眷屬來杭。其側室楊氏。體質素強。夏月生子極速。綳兒甫畢。卽出房料理他務。僉止之。入室後。又以冷水浣手。推窗揮扇。當風而坐。復止之。日晡忽發寒熱眩暈。僉云。強壯如此。冒風貪涼如此。是因產後腠理不密。護衛失宜。致受外感也。余竊疑之。診其脈有虛象。進以養正通幽湯。一服而證減。再服則全瘳矣。甲辰秋。余孫媳生子。產後三日。患痰閉搐搦之證。此血虛生風也。以滋榮活絡湯。加半夏竹瀝薑汁進之。應手而愈。蓋產婦當忍痛用力之時。出汗多則亡陽。陽虛故畏寒。失血多則傷陰。陰虛故發熱。氣血兩虧。則神散而有眩暈。甚至痰閉搐搦。狀類中風。自應用扶正之品。以調和營衛。設使目爲客邪。任意表散。鮮有不由虛弱而成危殆者也。丙午夏。偶談及此。笏堂太守。欣然以石印是編爲任。囑余補記於簡端。因振筆書之。黃子畚謹識。

序

慨自仲景越人而後。祕典弗著。至道無聞。流遷以迄於今。風氣日趨於下。醫學之不明也久矣。黃子畚觀察宦浙三十年。公餘之暇。博覽羣書。於靈樞素問之奧旨。千金肘後之奇方。尤爲研究靡遺。深有心得。每聆其論說。覺疑義與晰不煩言而自解。今歲夏與二三知己談及產科。極稱賞倪氏

產寶一書。並述其神效。歷歷如繪。余索書讀之。言近而旨遠。詞簡而義賅。蓋融貫諸家之說。崇正以闢謬。由博而求精。惟能握要探原。是以泛應曲當也。趙忠獻謂。半部論語。可治天下。良以得其綱領。斯事無不治耳。政術有然。醫術亦何嘗不然。方今醫道失傳。流品日雜。庸手誤人。滔滔皆是。於此而欲治產者。合乎準繩。生產者安於衽席。非以是編救正之。不爲功。爰借原本手錄成帙。用西法石印。公諸同好。至於論證立方。各有妙義。前序已闡發其蘊。無俟鄙人贅述也。光緒丙午夏。高尚縉序於拳石山房。

產寶目錄

產後總論

生化湯

胞衣不下

塊痛

血崩血暈

生化奪命湯

滋榮益氣湯

延胡索散

手足厥冷

生脈散

類傷寒

生化湯量加法

養正通幽湯

類中風

滋榮活絡湯

類瘧

人參養胃湯

參朮膏

妄言妄見

生化安神湯

生化補元湯

氣短

生化益氣湯

發喘

咳嗽

自汗.....二二

調胃參芪湯

盜汗.....二二

牡蠣散

大便不通.....二三

小便不通.....二三

益氣生脈湯

嘔吐不納穀.....一三

安胃行血湯

傷食.....一四

膨脹.....一四

養生化滯湯

泄瀉.....一五

訶皮生化湯

痢疾.....一六

香連生化湯

煩悶.....一七

產後調護法.....一七

產寶

浦江倪枝維鳳賓著 紹興裘吟五句讀

產後總論

凡病皆起於氣血之衰，脾胃之弱，而產後爲尤甚。是以丹溪論產，必當大補氣血爲先。雖有他症，以未治之。此言已盡醫產大旨。若能擴充立方，則治產思過半矣。夫產後症變百出，不可以常病之藥。一概論治。如有氣勿專疎散，有食勿專消導，熱不可妄用芩連，寒不可多用桂附。至若虛中外感，見三陽表症之多，似可汗也。在產後而用麻黃，則重竭其陽。見三陰裏症之多，似可下也。在產後而用承氣，則重亡其陰。耳聾脇痛，乃腎虛惡露之停。休用柴胡，讖語汗出，乃元弱似邪之症。毋同胃寶，厥由陽氣之衰。難分寒熱，非大補不能回陽而起弱。瘕由陰血之虧，毋論剛柔，非滋榮不能舒筋而活絡。又如乍寒乍熱，發作有期，症類瘧也。若以瘧治，遷延難愈。神不守舍，言語無倫，病似邪也。若同邪論，危殆可虞。去血多而大便燥結，菴蓉加於生化，非潤腸承氣之能通。患汗多而小便短澀，生脈倍用參芪，必生津助液之可利。加參生化，頗服救產後之危。六和調胃並行，甦絕穀之厄。類產脫肛，多是氣虛下陷，宜補中益氣之方。拳擊口噤，乃是血燥類風。當加參生化之劑。產戶入風而痛甚，宜服羌活養榮湯。玉門傷冷而不閉，洗用某疏合蛇兔。

與某黃疏黃蛇床子兔絲子各五錢煎湯薰洗。

怔忡驚悸，生化加以遠志，似邪恍惚。

安神佐以歸脾。因氣而滿悶虛煩。生化加木香爲佐。因食而嘔酸惡食。六君加神麩爲良。蘇木稜蓬。最能破血。用之必殆。青皮枳實。大能耗氣。服之非宜。凡一應破血耗氣之品。汗吐宣下之劑。只可施於少壯。豈宜用於產危。大抵生產之後。先問惡露如何。塊痛未除。不可遽加參朮。腹中痛止。補中益氣爲良。至若亡陽脫汗。氣虛喘促。頻灌生化加參。是從權也。亡陰大熱。血崩昏厥。速煎生化原方。乃救急也。凡此治法。先爲提綱。庶使開卷了然。不至茫無頭緒。則未必無小補云。

生化湯

川芎 一分

當歸 五錢

乾薑 後黑五分

甘草 炙三分

桃仁 去皮尖研十一粒

右藥用水一盞。陳酒半盞。煎作一盞。稍熱服。

生化者。因藥性功用而立名也。夫產後宿血當消。新血當生。若專消則新血不生。專生則宿血反滯。考諸藥性。川芎當歸。桃仁。三品善治宿血。專生新血。佐以黑薑。甘草。引三品入於肝脾。生血理氣。莫善於此。所謂行中有補。化中有生。實產後聖藥也。凡懷孕至八九月。預備二三劑。至胞衣破時。速煎一劑。俟兒分身。卽速服之。不問正產半產。雖少壯產婦。平安無恙者。亦宜服二三劑。則惡自消而新自生。第須初產一二時辰之內。未進飲食之先。相繼煎服。以惡露在下焦。故服多而頻。使惡易化而新易生。庶免血暈之惡。若胎前素弱。及產後勞倦。又當多服二劑。以防昏倦。若照常每日一服。豈能救將危絕之氣血乎。至虛人見危症及熱疾墮胎。或勞甚身熱。

頭痛服藥四五劑。雖覺稍安。塊痛未除。仍當服之。

胞衣不下

有由產母纔送兒出。無力送衣者。有歷時既久。或乘冷氣。則血道凝澀。而衣不下者。有胎前素弱。至血枯而衣停者。凡此當急進生化湯一二劑。兼服益母膏。次服鹿角灰。則血旺腹和。而衣自下。世每以濟坤丹。又名回生丹。專攻血塊落胞胎。雖見速效。而其元氣未免受傷。慎之慎之。製益母膏法。端午後。小暑前。取鮮益母草。用銅鍋熬膏。貯瓷瓶內。勿令泄氣。臨用以生化湯調服神效。

凡兒下而衣不下。產婦不可睡倒。必須先斷臍帶。用草鞋墜之。如寒月扶產婦至床。倚人坐。蓋被以火籠置被中。再以綿衣烘熱。替換煖腹。胞下後防虛。必須連服生化湯二三劑。不可厭藥之煩。自有大效。

塊痛

產後腹有血塊。是胎前餘血之所積也。夫婦人以經脈為主。二七而天癸至。三旬一見。以象月盈則虧。行之有常。名之曰經。有孕則經不行。其餘血注於胞中。以護元。一月曰始胚。二月曰始膏。三月成形。而名胎。方受母血之蔭。胎形尙小。食母血故有留餘。併前兩月之血積於胞中。久而成塊。至產時。隨兒當下。亦有因產婦送兒勞倦。調護欠溫。以致塊痛不散者。慎勿輕用攻血峻藥。宜飲薑艾酒。多服生化湯。加以熱衣煖腹。自然漸散。俗師有用紅花生地以行之。蘇木牛膝以攻之。鮮有不至危亡者。

小腹有塊作痛。名曰兒枕。世多專先消散。然後議補。或消補兼施。更爲夾

雜。殊不知舊血須當消化。新血尤當滋生。若專主攻舊。新亦不能生矣。產後血氣暴虛。理當大補。當惡露未淨。用補須知無滯血。攻塊不致損元氣。行中兼補。方是萬全。世以四物湯理產。誤人多矣。地黃性寒滯血。芍藥酸寒伐肝。治產者察之。

產後七日內。未會服生化湯。塊痛未除。仍以生化湯治之。

暑月產後。內服生化湯以除塊痛。外用熱衣煖腹。方能消惡止痛。若失於蓋煖。亦難取效。

產後一、二日內。塊痛未止。忽脫暈。汗多而厥。口氣漸冷。卽於生化湯中加用人參、黃芪。以扶危急。日夜頻服三、四劑必效。

產後七日內。因食冷物。血塊凝結痛甚。宜於生化湯內加肉桂五、七分。

產後三、四日內。服生化湯三、四劑。塊痛未減。得按揉而稍安者。虛也。可加參二、三錢。

產後三日內。血塊痛。人參當緩。如遇危症。從權加參救急可也。病勢一轉。則當減參。只服本方。自能取效。

血崩血暈

血崩宜審血色之紅紫。形色之虛實。如血紫有塊。宜去其敗血。若留之反作痛。不可以崩論。如鮮紅之血大來。乃是心因驚傷不能生血。肝因怒傷不能藏血。脾因勞傷不能統血。當以崩治之。宜於生化湯中加荆芥穗五分。連服幾劑。則行中有補而血安矣。若形脫氣促。或有汗暈厥。牙關緊閉。

昏亂將絕。先用韭菜數十莖。細切放酒壺內。以滾醋一碗泡入。將大口塞住。以小口對鼻孔熏之。速煎生化奪命湯灌救。如氣欲絕。藥不能入。即將鵝毛管插口內。用酒盃盛三四分灌之。如灌下腹漸溫煖。連服數劑可活。再用綿衣烘熱。替換揉腹。方無他患。如產後半月崩來。又宜滋榮益氣湯以升舉之。世醫治崩。每以櫻灰止之。此治末之法。卽有偶效。禍不旋踵。慎之。

生化奪命湯。

川芎 二錢

當歸 四錢

乾薑 炙黑 五分

甘草 炙三 分

桃仁 十一粒

去皮尖研

肉桂 三分

服二劑去此味

右藥加黑棗一枚。用水一盞半煎七分。稍熱服。

汗多加人參二錢。生黃芪二錢。兩手脈伏。或右手脈絕。加麥冬一錢。五味子十粒。如灌藥得甦。其塊痛未除。當減去參芪。只服生化湯。除塊定痛。若塊痛已除。仍加參芪。口渴加麥冬。腹瀉加茯苓。有痰加竹瀝一匙。薑汁半匙。若胃中久不納食。聞藥氣卽嘔。先用人參一二錢煎湯。調飯鍋焦末服之。以通胃氣。此等危症。一日內須服二三劑。方保無虞。

滋榮益氣湯。

川芎 一錢

當歸 二錢

人參 二錢

黃芪 生用 二錢

生地 二錢

於朮 二錢

麥冬 一錢

陳皮 五分

升麻 四分

防風 三分

白芷 四分

甘草 炙四 分

荆芥穗 四分

右藥加黑棗一枚。用水一盞半煎七分。稍熱服。

汗多加麻黃根。

麻黃發汗。根止汗。宜用根。

五分。浮小麥一撮。大便不通加肉苳蓉二

錢。氣不舒展加木香一錢。有痰加竹瀝一匙。薑汁半匙。咳嗽加苦杏仁

二錢。驚悸加炒酸棗仁一錢。柏子仁一錢。傷食加神麩一錢。炒麥芽一

錢。傷肉食加炒山查一錢。砂仁八分。

眼黑頭眩。昏迷不省人事。卽是血暈。其因有三。一因勞倦甚而氣竭神昏。

二因血大脫而氣欲絕。三因痰火乘虛泛上而神不清。患此三者。急服生

化湯。以行塊定痛。化舊生新。斯血遂生而氣轉清。頻服數劑。治其昏亂。氣

血卽定矣。外用前韭醋熏鼻之法治之。切勿認爲惡血上沖。昏迷心竅。以

致輕用散血之劑。亦勿認爲痰火。而用消耗之品。庶無貽患。

血暈形色俱脫。服生化奪命湯。倍加人參。萬勿疑爲太補。以致遷延不救。

如痰火乘虛泛上而暈。於生化湯中加橘紅四分。甚虛亦加人參二錢。肥

人多痰加竹瀝一匙。薑汁半匙。

暈症切勿用蘇木破血等藥。若血塊痛甚。以生化湯調益母膏。或送鹿角

灰。或送延胡索散俱效。

延胡索散。

延胡索 一錢 肉桂 六分

右藥用生化湯調服。

兒已產下。燒鐵稱錘。令紅投醋盆中。使產婦聞醋氣。可免血暈之患。

手足厥冷

產時用力過多。勞倦傷脾。孤臟不能自主。故手足逆冷而厥氣上行。經云。陽氣衰於下。則爲寒厥是也。非大補不能回陽。豈是芎歸數錢。照常一日一服。而能扶將絕之氣血耶。必於生化湯中倍加人參。一晝夜服二三次。使藥氣接續不斷。則氣血旺而精神復。厥症自止矣。若服藥而口渴。另用生脈散以代茶助津。以救臟燥也。或四肢逆冷瀉痢。有類傷寒陰症。仍服生化湯倍加人參。酌加附子四五分。生黃芪二錢。則可回陽止逆。經云。厥氣上行。滿脈去形。謂逆氣上行滿於經絡。則神氣漸散矣。大抵手足厥冷。由於氣血並竭。神將離而機欲息。僅此呼吸一綫之留。設非大劑參芪。斷難倚仗。此數十年經驗之論。非敢憑虛臆造。以誤人也。

生脈散

人參 一錢

麥冬 一錢

五味子 十粒

右藥用水七分盞。煎四分熱服。

類傷寒

產後發熱。惡寒頭痛。勿誤爲太陽症。寒熱往來。胸滿脇痛。勿誤爲少陽症。凡此皆因氣血兩虛。陰陽不和。有類外感而實非外感也。卽或偶冒風寒。亦當以未治之。夫以脫血之後。而有發熱惡寒。頭疼脇痛等症。設投以散劑。重發其汗。則病未消。而元氣已消。其害可勝言哉。仲景云。亡血家慎勿發汗。丹溪云。產後萬不可表。斯言盡之矣。况生化湯有芎薑二味。亦寓發

散之義。就本方照後量加之法。速服數劑。諸症自除。
生化湯量加法。

感冒風寒加防風四分。不應加連鬚葱頭兩箇。嘔吐加藿香三分。生薑二錢。汗多氣短加人參二錢。汗出微喘亦加人參二錢。煩渴加麥冬一錢。五味子十粒。有痰加橘紅四分。傷食加神麩一錢。傷肉食加山查一錢。砂仁末六分。

潮熱自汗。謔語便閉。勿認為陽明症。口燥舌乾咽痛。勿認為少陰症。夫產後潮熱自汗謔語。悉屬陽虛。與陽明症之熱邪入腑迥異。口燥舌乾咽痛。多由血竭。與少陰症之熱邪燦腎懸殊。至於便閉。並非熱邪結聚胃中。致有燥屎。豈可妄議攻下。蓋產後勞倦傷脾。運化為難。兼之津液內竭。十九患此。並宜服養正通幽湯以潤之。保無他患。
養正通幽湯。

川芎 二錢

當歸 六錢

甘草 五分

人參 一錢

黃芪 生二錢

陳皮 一錢

桃仁 去皮尖研 十一粒

黑芝麻 炒研 二錢

肉蓯蓉 酒洗 一錢

右藥用水二盞。煎七分稍熱服。

汗多加麻黃根。麻黃發汗。根止汗。宜用根。五分。口燥加麥冬一錢。腹滿咽乾便結加

枳殼六分。汗多謔語便實加扶神二錢。炒酸棗仁一錢。柏子仁一錢。生

白朮二錢。

類中風

氣血暴竭。肢體無以濡養。忽然牙關緊閉。筋脈拘攣。兩手搐攣。有類中風。或虛火上泛。有痰。切勿誤用治風消痰之劑。以重其虛。當以滋榮活絡湯治之。

滋榮活絡湯。

川芎 二錢 當歸 三錢 甘草 炙五分 人參 一錢

黃芪 生二錢 麥冬 一錢 茯苓 二錢 天麻 一錢

荆芥 四分 防風 五分 橘紅 五分

右藥用水二盞。煎七分稍熱服。

汗多加麻黃根。麻黃發汗。根止汗。宜用根。五分。驚悸加炒酸棗仁二錢。大便不通加

肉苁蓉二錢。有痰加薑製半夏一錢。竹瀝一匙。薑汁半匙。傷食加神麩

一錢。

類瘧

產後半月內外。寒熱往來。其發有期。有類瘧症。此由氣血兩竭。陽虛寒作。而陰虛發熱也。惟調其氣。補其血。則寒熱自除。慎勿用柴胡以發表。芩連梔柏以退熱。多致危殆不救。當以人參養胃湯。參朮膏。日夜間服。

人參養胃湯。

人參 一錢 黃芪 生二錢 白朮 生二錢 當歸 二錢 半夏 薑製一錢

青皮 四分 茯苓 五分 藿香 五分 烏梅 一枚

右藥用水一盞半。煎七分熱服。

參朮膏。

人參 五錢

白朮 生剉兩

右藥用沙鍋盛水煎三次取汁熬膏。每日早晚以一小鍾開水調服。

妄言妄見

心藏神。肝藏魂。心有血而神存。肝得血而能視。產後氣血暴虛。神魂無所依倚。以致言語無倫。而目多妄見。萬弗認爲鬼邪。信用符水。往往不救。如塊痛未除。先服安神湯。塊痛已除。急須服補元湯。以培養氣血。自獲全效。此一定法也。

生化安神湯。

川芎 二錢

當歸 四錢

乾薑 炙黑五分

甘草 炙三分

扶神 二錢

棗仁 炒一錢

桃仁 去皮尖研十一粒

右藥加黑棗二枚。用水二盞煎七分熱服。

生化補元湯。

川芎 一錢

當歸 三錢

乾薑 炙黑四分

甘草 炙四分

人參 二錢

黃芪 生二錢

於朮 生二錢

扶神 二錢

棗仁 炒一錢

橘紅 三分

桃仁 去皮尖研七粒

右藥加蓮子十粒。黑棗二枚。用水二盞煎七分食遠熱服。

汗多加麻黃根。麻黃發汗。根止汗。宜用根。五分。有痰加竹瀝一匙。薑汁半匙。大便不通

加肉蓯蓉二錢。

氣短

似喘非喘。氣不相續。有兼痰兼熱之分。亦或頭痛發熱惡寒。有似外感。切勿作外感治。以生化益氣湯主之。

生化益氣湯

川芎 一錢

當歸 二錢

乾薑 三分炙黑

人參 二錢

黃芪 二錢生二

棗仁 二錢炒二

甘草 四分炙四

麻黃根 五分麻黃發汗根止汗宜用根五分

桃仁 九粒去皮尖研

浮小麥 二錢

右藥用水一盞半。煎七分熱服。

有痰加竹瀝一匙。薑汁半匙。咳嗽加苦杏仁十一粒。薑製半夏八分。口渴加麥冬一錢。五味子七粒。

發喘

發喘乃產後第一危症。蓋肺受脾稟。此時血亡氣脫。肺不能運氣。生脈以順呼吸而喘作矣。若不速治。多致不救。如氣血猶未大竭。塊痛未除。補劑稍緩。先服生化湯一二劑。以行塊定痛。然後加參。若血崩喘甚。形色大脫。則危極矣。難論塊痛。宜從權於生化湯內加入參四錢。以救危急。須於一二時辰之內。連進二劑。俟其稍定。即服生化益氣湯。除去黑薑。麻黃根二味。間有得生者。

生化益氣湯。方見前

咳嗽

產後七日內。偶感風寒。鼻塞咳嗽聲重者。於生化湯中加杏仁。蘇子。陳皮。以順氣化痰。切勿發表。兼忌涼藥。

自汗

經云。搖體勞苦。汗出於脾。驚而奪精。汗出於心。有所恐懼。汗出於肝。產後因勞傷脾。因驚傷心。因恐傷肝。每多心慌。自汗之症。惟塊痛未除。參朮未可遽用。於生化湯中加炒棗仁二錢。設心慌無主。澀澀汗出。形色又脫。此是汗多亡陽。又當從權於生化湯中。倍用人參。以救危急。服後汗仍不止。以調胃參芪湯治之。冀可活十之四五。

調胃參芪湯。

人參 三錢

黃芪 生二錢

當歸 二錢

桂枝 四分

防風 三分

麻黃根

麻黃發汗根止
汗宜用根五分

右藥加黑棗一枚。用水一盞半。煎七分。食遠熱服。

口渴加麥冬一錢五分。五味子九粒。有痰加橘紅四分。虛脫手足冷加

熟附子五分。黑薑四分。牡蠣一錢。

盜汗

睡中汗出。覺則止。此為盜汗。屬陰虛。然不可偏用陰藥。宜兼服參芪。俾氣旺則能生陰。效如影響。生化湯調牡蠣散服。

牡蠣散。

牡蠣 煨二錢

人參 二錢

黃芪 生二錢

當歸 三錢

熟地 三錢

麻黃根

麻黃發汗根止汗宜用根一錢

小麥麩皮

炒黃二錢

右藥研末和勻每服三錢

大便不通

產後血少腸燥傳化為難大便恆多秘結經云臟得血而能液當補血為主加以益氣之品服養正通幽湯數劑而安設妄用下利峻藥愈通愈秘卒至不救慎之

養正通幽湯

方見類傷寒

小便不通

產後脾胃氣虛不能通調水道下輸膀胱往往小便短澀切忌分利當補以提之益氣生脈湯極驗

益氣生脈湯

人參 二錢

黃芪 生二錢

五味子 九粒

麥冬 二錢

當歸 三錢

茯苓 一錢

升麻 四分

葛根 一錢

甘草 炙四分

右藥用水一盞半煎七分熱服

嘔吐不納穀

嘔者聲與物俱出吐者有物無聲此由脾胃虛弱或寒氣所客或飲食所傷以致氣逆而食不得下在七日內塊痛未除宜服安胃行血湯塊痛已除而嘔不止穀氣不納服加減六和湯服前二方胃和嘔止服補中調胃湯惟嘔吐而見呃逆者是謂土敗木賊大率難治

自汗 盜汗

大便不通

小便不通

嘔吐不納穀

安胃行血湯。

川芎 二錢

當歸 四錢

乾薑 五分

人參 一錢

砂仁 四分

藿香 四分

甘草 三分

桃仁 十四粒
去皮尖研

加減六和湯。

川芎 一錢

當歸 三錢

乾薑 四分

人參 一錢

茯苓 二錢

陳皮 五分

扁豆 二錢

山藥 四分

藿香 三分

白豆蔻 四分
止減去

補中調胃湯。

人參 二錢

於朮 二錢

當歸 二錢

乾薑 四分

陳皮 八分

茯苓 一錢

扁豆 二錢

山藥 二錢

甘草 四分

傷食

傷食必於補氣血藥中審所傷何物。以消導藥佐之。如傷穀食宜神麩穀芽。傷肉食宜麥芽山查。傷果食腹內痛甚宜吳茱萸砂仁。世醫每遇此症。專消無補。反傷胃氣。不應又誤認為原傷。食物未消。倍加寬胸耗氣之品。甚至絕穀數日以垂危者。此際已無藥可用。惟煎獨參湯二三錢。調飯鍋焦末。漸漸與之。或可十救四五。

膨脹

產婦素弱。臨產又勞。中氣不足。胸膈空滯。胃雖納穀。傳化艱難。醫者誤認傷食。而擅用消導之劑。或因氣鬱。而專事疎散。或因大便秘結。而妄議攻下。此膨脹所由來也。治法當大補氣血為主。所謂塞因塞用。其效甚捷。先

服獨參湯。調飯鍋焦末。以通胃氣。次服養生化滯湯。則脾運而脹消矣。
養生化滯湯。

川芎 二錢

當歸 三錢

人參 一錢

於朮 生二錢

陳皮 八分

香附 製五分

茯苓 二錢

甘草 炙三分

大腹皮 四錢

桃仁 去皮尖研十一粒

右藥用水一盞半。加黃酒一小鍾。煎七分。熱服。

大便秘結。加肉苳蓉二錢。誤服大黃。加生黃芪四錢。倍用人參。脹甚人

參。可加至四五錢。丹溪先生治產後膨脹。參芪服至半斤以上。大便方

通。腫脹方退。

泄瀉

產後泄瀉。悉屬脾虛。亦有因寒因食之殊。惟熱瀉甚少。治法與雜症諸瀉不同。誠以惡露未消。難以遽補。元氣暴竭。難以議消。太溫恐新血流崩。驟寒慮血凝變症。大抵產後患此。先宜服生化湯。加茯苓一錢五分。俟二三次。劑後塊痛已除。方能補脾。消食溫中。隨症施治。產畢卽瀉。服訶皮生化湯。胎前久瀉。至產後不止。服參苓生化湯。從權以濟甚危。塊痛已除。服加味生化湯。因寒因食。分別調治。惟審係實在熱瀉。去黑薑肉果二味。切勿加以涼藥。免致血寒。貽患不可不慎。

川芎 二錢

當歸 三錢

訶子皮 八分

乾薑 炙五分

茯苓 一錢五分

肉果霜 五分

蓮子 十粒

桃仁 去皮尖研十四粒

甘草 炙五分

兩服後不止。加入參一錢五分。口渴加麥冬一錢。五味子九粒。人參一錢。

參苓生化湯。

川芎 二錢

當歸 三錢

訶子皮 八分

人參 一錢

乾薑 炙黑五分

肉果霜 五分

茯苓 五分

山藥 炒二錢

甘草 炙五分

蓮子 九粒

糯米 炒黃三錢

塊痛未除。去肉果。塊痛已除。加生於朮二錢。陳皮三分。

加味生化湯。

川芎 一錢

當歸 炒二錢

乾薑 炙黑四分

人參 二錢

於朮 生二錢

茯苓 五分

陳皮 五分

澤瀉 八分

肉果霜 五分

甘草 炙五分

蓮子 九粒

因寒作瀉。倍用黑薑。腹痛泄水。飲食不化。加砂仁八分。炒山查二錢。炒麥芽二錢。久瀉不止。加升麻一錢。

痢疾。

七日內外。患赤白痢後。重便膿。最為難治。夫痢以通利為主。然產後而欲推蕩穢邪。慮元氣之虛弱。欲滋補氣血。恐積滯之留連。余於此症。斟酌數四。只有服生化湯。去黑薑。加木香四分。方能並行不悖。服二三劑。不應。接服香連生化湯。應手可愈。惟產婦體氣素厚。已及一月。可用推蕩之法。若體氣素弱。雖產月餘。難議攻下。如檳榔。枳實。厚樸。大黃之屬。用之。產後鮮

有不成敗症者。可不謹歟。

香蓮生化湯。

川芎 一錢五分

當歸 三錢

赤芍 酒炒 一錢

茯苓 一錢

木香 三分

黃連 薑汁炒 四分

甘草 炙 四分

枳殼 五分

陳皮 三分

右藥用水一盞煎五分空心服。

煩悶

煩為虛煩。悶為滿悶。虛煩者血液耗散。心神不守。宜猛進獨參湯。滿悶者胸膈鬱滯。惡露攻心。宜生化湯。用水磨木香二分沖服。虛甚加參。此二症設誤用枳殼香附烏藥峻烈之品。則元氣蝕損。而病轉加劇。

產後調護法

產畢須閉目稍坐。然後上牀。以被褥靠之。暑月以席捲數枕靠之。若自己把持不住。令老練女人靠之。不可即時睡倒。常以手從心至臍。隨意按摩。俾惡露下行。房中安放醋盆。以燒紅烈炭焯之。以防血暈。腹上用小衣烘熱。替換溫之。雖暑月不可僅蓋單被。毋令腹寒而血塊作痛。

冬末春初。天氣嚴寒。宜閉密產室。緊塞隙孔。四圍置火。常令暖氣和融。以免他患。但不宜熏香。走泄真氣。

纔產不宜食物。即服生化湯二三劑。飢甚先服白米湯一盞。次食白粥。十日內食物宜淡。切忌飲冷。半月後方可食雞子。亦須打開煮之。以防脾虛。

難化。滿月食豬羊肉。亦須撙節。酒雖活血。然氣性慄悍。亦不宜多。

七日內不宜梳洗。尤忌濯足。惟恐招風受溼。疾病蠱起。晝夜令人陪侍。毋致虛驚。變症百出。

言語宜慎。勿以多言。耗散元氣。勿以愛憎。輒生惱悶。以中氣餒弱。二者均能致病。

產孕集序

粵稽古來產書。惟產寶諸方及產育寶慶方。見於永樂大典。藏於我朝四庫。世間多不傳。所傳者胎產心法達生篇諸書。擇焉不精。語焉不詳。皆不得爲善本。陽湖張仲遠先生有產孕集一書。推原人生受命之始。因時調護之力。變故挽回之法。無乎不備。而其措詞雅馴。推本陰陽王化之原。關雎之亂。尤以隱維世道。默挽人心。所以端本於閨門。立極於椎輅。其用心深矣。至矣。其濟世廣矣。久矣。是書向有刻本。風行海內。先生自序。剴切詳明。行篋擦損。無可仿寫。梓人重刊。聊敘顛末。

光緒二十四年歲在戊戌冬十月長白濟世謹序

產孕集目次

上篇

辨孕第一	一
養孕第二	三
孕宜第三	一〇
孕忌第四	一二
孕疾第五	一三
下篇	
辨產第六	二五
產戒第七	二六
用藥第八	二八
應變第九	三〇
調攝第十	三四
懷嬰第十一	三七
拯危第十二	四一
去疾第十三	四六

產孕集上篇

陽湖張曜孫箬

武進徐星鉞校

紹興裘吉生重校

辨孕第一

二氣相感。合而生神。兩精相搏。聚而成形。陽奇而施。陰偶而承。陽施而靜。陰承而動。靜則陽凝。動則陰攝。動靜互根。形神交倚。而孕以成。易曰。天地絪縕。萬物化醇。男女構精。萬物化生。故乾坤消息而變萬類。日月運行而生寒暑。鳥獸草木昆蟲鱗介之屬。莫不附陰化陽。因氣成質。其生雖不同。而所以生者一也。人爲萬物之靈。得天地之正。具五德之全。經緯蕃變。與上下參。男稟陽。得乾道。女稟陰。得坤道。乾主動而生靜。坤主靜而生動。乾動則陽施。坤靜則陰承。陽生靜則氣化而神生。陰生動則精融而形成。神裕其始。而形要其終。故孕者始于神而終于形。生于陽而成於陰也。凡物生易而成難。未孕之先。兩氣相感。如磁引鍼。如珀黏芥。適然而合。其動以天。非陰陽離決。氣懣精涸者。鮮不凝合。自然生化。絕無人功。既孕之後。積氣成形。分別百體。營建藏府。條理絡脈。灌漑筋骨。閱三百餘日。乃成爲人。日滋月遂。盡取給于母氣。苟失其道。或生而不育。形體不具。氣血薄弱。壽命夭折。譬之果實之屬。風雪侵之。非立見萎落。卽不適于口。故未孕之先。

無俟人力。既孕之後。半由人功。攝養以安之。藥物以助之。調其陰陽以煦之。絕其賊害以固之。祛其疾痛以衛之。皆人力之所爲也。古者婦人別立治法。以有月事產孕之異。而產孕尤重。蓋產孕者。生人之始。而保護又產孕之始也。愚者不察。或誤孕爲疾。而肆其攻擊。或誤疾爲孕。而養虎貽患。小則傷體。大則傷生。深可憫焉。辨孕之法。素問曰。陰搏陽別。謂之有子。又曰。足少陰脈動甚者。妊子也。脈經曰。脈滑疾而重。按之散者。胎已三月。脈重按之不散。但疾不滑者。五月也。又曰。三部浮沉正等。按之無絕者。妊也。千金方論曰。脈平而虛者。乳子法也。手少陰脈動甚者。妊子也。尺中之脈。按之不絕者。法妊娠也。諸家論脈。其說不一。要不外滑利和平。不偏不弊。所謂身有病而無病脈。身無病而有病脈。爲簡而易明。經閉吐逆。體怠惡食。而脈反平和。是有病而無病脈也。外無吐逆諸病。體旺如昔。而脈反滑利動疾。是無病而有病脈也。脈象微妙。驟不易知。差之毫釐。謬以千里。善診者。心領神會。毋事固執。斯爲善也。懷妊之候。必病惡阻。苦沈重憤悶。不欲飲食。又不知患所在。頭重眩暈。四支惰懈。不欲執作。喜噉酸鹹果實。多臥少起。氣逆嘔吐。蓋由經血既閉。水漬於藏。藏氣不宣。血脈不行。故有此候。察其候。合其脈。孕之是非。無所遁矣。若兼有表裏諸疾。脈不可辨。則別有驗之之法。以雀腦芎藭一兩。當歸七錢爲末。分二服。煮艾湯。或醇酒下之。二二三時間。覺腹中臍間微動。卽爲有孕。或以醋煮艾湯半盞服之。有孕必大痛。無孕則否。妊娠四月。男女可分。脈法。左疾爲男。右疾爲女。左右俱

疾。爲產二子。左手沈實爲男。右手浮大爲女。左右俱沈實。生二男。左右俱浮大。生二女。左尺偏大爲男。右尺偏大爲女。左右尺俱大爲產二子。又法。左尺中浮大者男。右尺中沈細者女。若脈不可知。則有辨法。令人按其腹。如覆盃者。男也。如肘項參差起者。女也。左乳房有核者。男也。右乳房有核者。女也。孕婦行坐。自後急呼之。左迴首者男。右迴首者女。蓋左右者。陰陽之道路也。陽親其左。陰親其右。自然投託。各就其所。氣血因之。故脈象應之。盛於左。則左疾而大。盛於右。則右疾而大。其有異孕。無所歸屬。則兩者皆見。尺中者。腎部也。腎主胞門。孕之所在。陽具於左。故浮大。陰具於右。故沈細也。男形常伏。女形常仰。故揣腹可知。乳爲陰府。下通胞門。陰盛則結。各就其位。氣血偏盛。則身有偏重。視其迴首可知者。必慎護其重也。千金方又言。男子左乳房結核者生男。右乳房結核者生女。婦有孕而驗其夫。原其所始。理亦可通。而所以結核之故。終不可解矣。

養孕第二

妊娠一月。名始胚。足厥陰脈養之。其經內屬於肝。肝主筋及血。是時血行否澁。毋爲力事。必令安靜。嗜酸鹹。食宜麥。毋食腥辛。若曾孕一月而墮者。宜預服補胎湯以養之。

補胎湯

乾地黃 一兩

白

朮 一兩

生

薑 一兩

防

風 六錢

大 麥 二合

烏 梅 三合

細

辛 三錢

吳茱萸 一合

入味。以水三升。煮一升。分三服。熱而渴者。去吳茱萸細辛。加栝藹根三

錢見千金方。

二月名始膏。足少陽脈養之。其經內屬於膽。主精。是時精成於胞裏。若會孕。二月而墮者。宜預服黃連湯以養之。

黃連湯

黃連二錢 人參三錢

吳茱萸一合

生薑一兩 生地黃一兩

共五味。以水三升。煮一升。分四服。日一。若覺不安。加烏梅三合。見千金方。

三月名始胞。未有定儀。見物而化。手心主脈養之。其經內屬於心。當靜謐以定心氣。食穀宜稻。羹宜魚。若會孕三月而墮者。宜預服扶神湯以養之。

扶神湯

扶神丹 龍骨各三錢 阿膠

當歸

甘草 人參各一兩 大棗二十一枚 赤小豆二十一枚

九味。水三升。煮一升。分四服。七日後。更作。腰痛者。加桑寄生六錢。見千金方。

四月始受水精。以成血脈。手少陽脈養之。其經內輸於三焦。是時形體已具。當盛其血氣。以通耳目而行經絡。若會孕四月而墮者。宜預服菊花湯以養之。

菊花湯

菊花如雞子大一把 麥門冬三合 大棗十二枚 人參五錢

當歸

甘草各六錢 阿膠一兩 生薑一兩 薑六錢

入味。以水三升。煮半。內清酒一升。并膠煎取一升。分二服。若受寒者。加

麻黃 見千金方。

五月始受火精。以成其氣。足太陰脈養之。其經內屬於脾。是時四支皆成。宜適飢飽。其食宜甘。羹宜牛羊。和以菜蕒。養氣以定五藏。若會孕五月而墮者。宜預服安中湯以養之。

安中湯

黃芩 三錢

當歸

芍藥

乾地黄

人參 各六錢

甘草

芍藥

各一兩

生薑 二兩

麥門冬 三合

五味子 一合

大棗

三十枚

十二味。以水二升三合。清酒一升五合。煮取一升。分四服。日三夜一。七

日後更作。見千金方。

六月始受金精。以成其筋。足陽明脈養之。其經內屬於胃。主口目。是時口目皆成。身欲微勞。以變腠理。紉筋以養其力。以堅背脊。若會孕六月而墮者。宜預服麥門冬湯以養之。

麥門冬湯

麥門冬 三合

人參

甘草

黃芩

各六錢

乾地黄 一兩

阿膠 一兩

生薑

大棗

十五枚

八味。以水二升三合。煮減半。內清酒六合。并膠煎一升。分三服。中間進

糜粥。見千金方。

七月始受木精。以成其骨。手太陰脈養之。其經內屬於肺。主皮毛。是時皮毛已成。宜勞身動作。以運血氣。食穀宜粳稻。避寒就燥。以密腠理。以養骨而堅齒。若會孕七月而墮者。宜預服葱白湯以養之。

葱白湯

葱

白

長二寸
十四莖

麥

冬

三合

旋覆花

六勺

黃

芩 三錢

人

參

五錢

甘

草

當 歸

黃

耆 各一兩

阿

膠

一兩
三錢

生

薑

二兩
六錢

十味。水二升六合。煮減半。內清酒一升。及膠。煎一升餘。分四服。日一服。溫進。見千金方。

八月。始受土精。以成膚革。手陽明脈養之。其經內屬於大腸。主九竅。是時九竅皆成。無使氣極。以密腠理而澤顏色。若會孕八月而墮者。宜預服芍藥湯以養之。

芍藥湯

芍

藥

一兩
三錢

生

薑

一兩
三錢

厚

朴

六錢

甘 草

當 歸

白

朮

人

參

各一兩

薤

白

三合

八味。以水一升六合。酒一升。煮一升。分三服。日一。見千金方。

九月。始受石精。六府百節。莫不畢具。足少陰脈養之。其經內屬於腎。腎主續縷。是時經脈續縷皆成。穀氣入胃。毋犯冷濕。飲宜醴。食宜黍。緩帶自持。以養毛髮。致才力。若會孕九月而墮者。宜預服猪腎湯以養之。

猪腎湯

猪

腎

一具

扶

苓

桑寄生

乾 薑

乾地黃

芎

藟

各一兩

白

朮

一兩
三錢

附 子 三錢

大 豆 一合

麥門冬 三合

十味。以水三升。煮腎令熟。去腎。納諸藥。煎取一升。分三服。日一。見千金方。

十月。足太陽脈養之。其經內屬於膀胱。五藏完備。六腑齊通。納天地氣於丹田。使關節人神皆備。待時而出。宜服滑藥以速其生。以上本徐之才說若會孕十月而不產者。宜預服入物湯。

入物湯

人參 三錢

白朮 三錢

茯苓 三錢

甘草 一錢

陳皮 一錢

芎藭 一錢

當歸 三錢

熟地黃 三錢

白芍 一錢

共作一服。以水一升。煮四合。日一服。

見萬病回春。

凡孕十月。三陰三陽各養三十日。內輸五精。外受五氣。惟手少陰太陽不養。心爲君主。統攝百脈。下主月水。上爲乳汁。手太陽合之。故不專養。天氣盛於東南。地氣盛於西北。故萬物之生。始於東南。而成於西北。養孕之脈。始於足厥陰。東方木。生氣之原也。繼之以手心主。南方火。長氣育之也。繼之以足太陰陽明。中央土。化氣宣之也。繼之以手太陰陽明。西方金。收氣堅之也。繼之以足少陰太陽。北方水。藏氣成之也。天一生水。故始受水精。土載萬物。故終受土精。氣以順養。精以逆受。相生無不及。相尅無太過。猶之四時遞嬗。自春而夏而長夏而秋而冬。而一歲成。五氣互生。自木而火而土而金而水而一人成。其理一也。孕之生也。陰陽相合。氣含陰陽。則有清濁。清者浮升而善動。濁者沈濁而善靜。動靜相交。陽中之陰沈而下降。陰中之陽浮而上升。陽之升也。自東而南。陰之降也。自西而北。陽升於東。則魂具而化神。陰降於西。則魄藏而凝精。神化則氣生精。凝則質結。故孕一月如露珠。太極也。陰陽之未判者也。二月如花蕊。太極生兩儀也。陽升

陰降。陰陽之已分者也。三月至五月。形體具而四支成。陽自東而南。陰自西而北。五神既宅。四維乃張。兩儀生四象也。六月以後。筋骨皮毛。九竅百節。無不畢具。陰陽交育。精氣旋生。四象生八卦也。八卦生而天道備。十月盡而人道具。所謂萬物一太極。一物一太極也。知孕之所以生。則知所以養之之道矣。凡孕三月。體虛者宜常服滋生湯。

滋生湯

熟地黃 三錢

白 芍

甘 草

芍 藥

當 歸

阿 膠 各一錢

黃 芩 六分

砂 仁 一錢

糯 米 百粒

或參朮養胎飲。

參朮養胎飲

人 參 一錢

白 朮 三錢

扶 苓 二錢

炙甘草 八分

歸 身

白 芍 各一錢五分

阿 膠 二錢

陳 皮 八分

體過實者。宜金匱當歸散。

金匱當歸散

當 歸

川 芎 藭

黃 芩

白 朮

白 芍 各一兩

治為末。每服一錢。百沸湯調下。見丹溪心法。

挾寒者。宜減味保胎丸。

減味保胎丸

白 朮

熟 地

阿 膠 各二兩

當 歸

杜 仲 各一兩

川 斷

川 芎 藭 各一兩

艾 葉 五錢

八味。搗末。杵棗為丸。每服五十丸。

挾熱者。宜黃芩散。

黃芩散 黃芩一錢

搗末。濃煎白朮湯調下。日一。見丹溪心法。

或芩朮湯。

芩朮湯 黃芩三錢 白朮一錢五分

二味作一服。見丹溪心法。

或白朮丸。

即前方十倍為丸。如桐子大。日三十丸。見丹溪心法。

將產體實而旺者。宜達生散以速之。

達生散 大腹皮二錢 甘草一錢五分 當歸

白朮 白芍各一錢 人參 陳皮

紫蘇 枳殼 砂仁各五分 青葱五寸

十一味作一劑。孕九月後服之。日一服。體旺者。至產而止。見丹溪心法。

凡孕無論虛實。皆宜服便產方。三四月後。三十日服一劑。八九月。二十日

服一劑。將產之月。日一服之。是方制合精良。無可增減。俗傳謂宮中十二

味。係明嘉靖間太醫所作。如法服之。絕無難產之患。真良方也。

便產方 當歸一錢 芍藥一錢 厚朴七分 薑一錢 枳殼六分

免絲子二錢 艾葉 羌活各五分 貝母一錢 荆芥八分

黃芪七分 白芍一錢 甘草五分 草五分

水煎隨宜服之。見保產輯要。

孕宜第三

人有清濁厚薄之異。智愚善惡之殊。揆其所始。皆由祖氣。祖氣者。先天之氣也。氣清則善。氣濁則惡。清則聖哲。濁則昏愚。然而凶頑之質。亦生聖人。賢哲之嗣。或多昏昧。何也。是豈祖氣之有所變易乎。蓋生成有消息之理。長養寓補救之方也。凡物陽生而陰成。生人之初。稟氣於父。兩氣既合。胚胎以凝。自此以往。日滋月遂。至於成人。皆由母氣。蘊爲五神。發爲五氣。育爲五精。結爲五藏。開爲五官。氣以煦之。血以濡之。得其道則氣厚而神清。失其道則氣濁而神昏。清則可以反濁。濁則可以害清。自然之理也。譬之稼穡。良莠不同。由於種之美惡。然使土瘠氣薄。暘雨不時。灌溉失度。則雖美種不如蕪稗。上沃氣厚。燥濕均平。種雖不良。亦必大熟。故祖氣者。稼穡之種也。母氣者。土氣也。氣煦血濡者。暘雨也。攝養之道。灌溉之力也。稼穡不能專恃天時。因有灌溉之法。生人不能專恃父氣。必有補救之方。調之使均。攝之使平。反味爲哲。易濁爲清。精微之道也。子居母腹。以母氣爲氣。以母血爲血。母呼亦呼。母吸亦吸。善心生。則氣血清和。而子性醇。惡心生。則氣血渾濁。而子性劣。而母氣之清濁善惡。又隨時而遷。觸物而變。非有一成不易之常。氣主於心。心之神。主內而應外。外有所接。則神動而氣隨之。所接善。則陽氣動而爲清。所接惡。則陰氣動而爲濁。故生子之時。必慎所感。人生而肖萬物者。皆母之感而肖化也。古者。婦人妊子。寢不側。坐不

邊立不蹕。不食邪味。割不正不食。席不正不坐。目不視邪色。耳不聽淫聲。則生子端正。才德過人。昔大任有身。能以胎教。乃生文王之聖。君子美之。以上本列女傳故舊說謂受孕三月。逐物變化。使妊母常觀犀象珠玉寶玩之物。禮

樂鐘磬俎豆之事。誦詩書箴誡琴瑟詠歌。欲得賢人長者。論述古今忠孝

之事。盛德大業之人。則生子多男。氣正而質純。賢良而壽考。亦不過欲和

其心志。絕其嗜欲。使心靜於內。慮謚於中。清氣充滿。濁氣自消。卽胎教之

道也。夫草木之生。其形色臭味。皆秉天理自然之化。而何以遷地則形色

皆殊。而技者又有栽種灌溉之法。可以轉白爲赤。易苦爲甘。草木尙然。况

人之至靈者乎。至男女之分。定於祖氣。非人力所能轉移。舊有轉女爲男

之法。如繫弓弩弦。千金方。取弓弩弦一枚。絳囊盛帶左臂。或繫腰下。百日後。乃去之。佩雄黃。千金方。雄黃一兩。絳囊盛帶之。置斧

牀下。千金方。以斧一柄。置妊母牀下。或驗或否。會其適然。然亦可以祛邪辟惡。以

衛陽氣。無損於事。若欲服藥物以改之。無是理也。妊母常食松子。令子堅

實。常食砂仁。可令速產。達生編云。常以麻子油和腐皮食。可令滑胎。又云。

始覺有妊。以布一幅。橫束之。上緊下寬。至臨產始去。可令易生。蓋使腹中

偏窄。胎不上長。乍去則驟寬。產時便利故也。大凡攝養之道。在善調其心

氣。此非醫者所能爲。夫生子不善。人之所惡。人之不善。雖由習欲。實本性

生。孔子曰。惟上知與下愚不移。推原其故。皆由未生以前。理微而顯。事小

而大。在智者心知其意。而變通之。教於已生之後。莫若教於未生之時。以

可爲者責之人。以不可爲者聽之。天是亦爲人父母者。所當究也。

孕忌第四

生人誕育。天理自然。陰陽滋化。本無災害。而每有孕而不固。固而不育。育而輒夭者。豈生化之理有所異哉。攝養有乖。逆其滋生之道也。古者婦人有孕。卽退居別室。謹持胎教。故彌月而生。無災無害。今人不然。或有孕而不知。不事養護。其知者又不知所忌。不慎起居。勞役失宜。舉止違理。欲其無患。不亦難乎。夫人有富貴貧賤之異。而誕育則皆同。而產孕之變。多起於富貴之家。人與禽獸。各稟氣血以生。而禽獸之生。初無墮落難產之患。豈非嗜欲有多寡之異。生理有順逆之分乎。

懷孕之後。首忌交合。蓋陰氣動而外泄。則分其養孕之力。而擾其固孕之權。且火動於內。營血不安。神魂不密。形體勞乏。筋脈震驚。動而漏下。半產難產。生子多疾。而夭。淫濁而鈍。甚至孕猶未固。輒動而墮之。一再墮後。胞室寒滑。隨孕隨墮。終身無子而不自知。亦可慨矣。居處動作。最易損傷。起於細微。人所不覺。體候虛羸者。尤宜慎之。毋登高。毋作力。毋疾行。毋側坐。毋曲腰。毋跛倚。毋高處取物。毋向非常處大小便。毋久立。毋久坐。毋久臥。毋犯寒熱。毋冒霜雪。露霧暴雨。酷日烈風疾雷。毋視日月薄蝕虹霓星變。毋觀土木工作。及怪獸異鳥奇詭之物。毋入神廟寺院。睹淨穢險惡之狀。一舉一動。必謹飭之。五志之發。鮮能和平。而產孕最宜調抑。孕藉母氣以生。呼吸相通。喜怒相應。一有偏倚。卽致子疾。宜和其心志。毋暴喜。毋過思。毋怒。毋恐。毋悲。毋憂慮。毋鬱結。顏無忤色。口無惡聲。心無雜念。使血氣和。

平。德性凝定，不特孕安，且生子英賢，無疾而壽矣。其飲食，則以沖和澹泊爲正。節厚味，禁腥濁，毋飲醇酒，毋食異味。千金方云：食山芋，令子多疾。食兔，令子缺唇。食犬肉，令子無聲。食桑椹鴨卵，令子側出。心寒，食雀。令子性淫。食鼈，令子項短。食薑芽，令子多指。鷄合糯米食，令子生寸白蟲。鷄及乾鯉魚食，令子生瘡。食鮮菌，令子驚風。食冰漿，令胎絕。食騾馬驢肉，無鱗魚，螃蟹，皆令難產。食薏苡、莧菜、蒜、葱、麥芽，皆令墮胎。其藥味，則宜和平調攝，毋犯金石，毋近毒藥。大熱、大燥、大攻、大表、大寒、大涼、走竄、迅疾、泄利之品，咸宜禁止。卽需施用，宜詳酌而慎處之。凡妊娠，起居飲食，惟以和平爲上，不可太逸，逸則氣滯，不可太勞，勞則氣衰。五月以前宜逸，五月以後宜勞。冬毋太溫，夏毋太涼，食毋過飽，飲毋過多。養孕之經，不可灸刺，無故不宜服藥，調之抑之，務使無偏，則得之矣。

孕疾第五

妊娠諸疾，與常人殊，故治法亦異。子居母腹，藉母氣固之，母氣不順，子不得安，必有墮落之患。子氣既損，母氣亦傷，治之者，或僅護胎孕，不敢攻疾，或亟於治疾，不顧子氣，致子母交損，大小殞亡，慘烈之禍，於此爲甚。素問曰：婦人重身，毒之何如？曰：有故無殞，亦無殞也。大積大聚，可犯之也。衰其大半而止。夫大積大聚，病之重者，苟不亟治，立見危迫，故必毒之，使邪去而孕安。然恐藥勢太過，正氣易傷，故衰其大半，卽止不治。古人立法，動出萬全，不可不究也。

懷妊之後。必患惡阻。惡阻者。謂惡心阻其飲食也。由於經脈既閉。藏氣不宣。津液停滯。水濕為患。故其候。四肢沉重。惡食嘔吐。偏嗜一物。頭痛眩暈。多臥少起。若面色如故。脈象和平。此不須醫。但調其飲食。適其寒溫。緩緩可愈。其甚者。大吐嘔血。食飲不下。寒熱往來。心中憤悶。惡聞食臭。肢節疼痛。疲怠自汗。色萎肢瘦。勢若危殆。或施治不善。逆其胎氣。致暴作吐下。困頓欲絕。則宜橘皮茯苓湯。

橘皮茯苓湯

橘

皮 一錢

茯

苓 二錢

蘇

梗 八分

歸

身 一錢五分

白

芍 一錢五分

砂

仁 五分

生

薑 搗去汁 三錢

青竹茹 八分

炙甘草 五分

作一服。

三四服不愈。宜半夏茯苓湯。三五服必愈。

半夏茯苓湯

半

夏

茯

苓 各三錢

乾地黄

生

薑 各二錢二分

橘

皮

旋覆花

細

辛

人參

芍

藥

芍

藟

桔

梗

甘

草 各一錢七分

十二味。以水三升。煮取一升。分三服。若客熱煩渴。去細辛。加前胡知母各一錢七分。若冷痢者。去乾地黄。加桂心一錢五分。熬服後。忌生冷醋滑油膩等物。見千金方。

妊娠傷寒。以安胎為主。無犯胃氣。不可妄汗吐下。泄利小便。其候輕者。頭痛。煩熱。宜芍蘇飲。

芍蘇飲

芍

藟

紫蘇葉

白芍藥

白朮 麥門冬 陳皮 乾葛各一

甘草五分 生薑三片 葱白三莖

十味作一服。見東醫寶鑑。

甚者壯熱不解欲汗之宜葱白湯。

葱白湯 葱白十莖 生薑六錢

二味以水一升煮五合作二服。見千金方。

不解宜拭身法。

拭身法 麻黃二兩 竹葉三合 石膏一升

三味以水二升六合煮取一升去滓冷拭身體以故布掩頭額心胃燥

則易之。見千金方。

熱病者宜豆豉湯。

豆豉湯 豆豉三合 葱白一兩

二味以水二升煮一升分三服取汗。見千金方。

大煩熱宜葛根汁飲解之。

葛根汁飲 葛根汁六合

分三服間四刻許進一服。見千金方。

皆須用固孕法以安其孕。

固孕法取竈中黃土水和塗臍乾復塗之。見千金方。

又方萍朴硝大黃蛤粉藍根等分貼臍上。見得效方。

妊娠煩懣悶瞽。謂之子煩。此由痰濕埋鬱熱氣薰蒸。上焦之氣。不得流暢。熱鬱過甚。則胎動漏下。宜竹瀝湯。

竹瀝湯 竹 瀝三合 麥門冬一

防 風 黃 芩 茯苓 苓各一兩

五味。以水一升。煮六合。分三服。日一。見千金方。

中風口噤。項背強直。筋脈拘攣。發搐不止。痰盛昏迷。或時作時止。名曰子癇。宜四物湯。量加驅風逐飲之藥。甚則宜鉛羊角湯。

鉛羊角湯 鉛羊角鎊 棗 仁 獨 活 五加皮各一錢二分

防 風 薏苡仁 當 歸 芎 藭 茯 神

杏 仁各七分 甘 草 木 香各五分 薑三片

作一服。見醫學正傳。

水腫脹滿。謂之子腫。其候或遍身浮壯。或手足攣腫。或肚腹壅大。高過心胷。氣逆喘急。甚則損胎。此因水氣過甚。正氣不化。溢於皮肉。輕者產後即愈。不必施治。甚者宜鯉魚湯。

鯉魚湯 鯉魚一頭重十兩 白 朮 生 薑各一兩六錢

芍 藥 當 歸各一兩 茯 苓一兩 苓三錢

六味。以水四升。煮魚熟。澄清取二升六合。內藥煎取一升。分三服。見

千金方。

或苓朮湯。

苓朮湯 扶苓 杏 仁各一兩 白朮各一兩

黃芩 杏 仁各一兩 旋覆花三錢

五味。以水二升。煮八合。分三服。見千金方。

小水淋痛。謂之子淋。此由下焦氣化。壅閉不行。故水道不利。鬱而為痛。宜

葵子散解之。

葵子散 冬葵子 赤茯苓

各等分。為末。每服二錢。米飲調下。見金匱要略。

若便閉不通者。謂之轉胞。乃胎氣陷下。壅遏過甚。氣道梗阻。故水不得通。

虛人多有之。宜參朮飲。

參朮飲 人參 白朮 半夏

陳皮 芫薺 當歸 芍藥

乾地黄各一錢 甘草五分 生薑三片

作一劑。服後。探吐之。見丹溪心法。

甚者宜腎氣丸。

腎氣丸 熟地八兩 山茱萸四兩 山藥四兩 丹皮三兩

扶苓三兩 澤瀉三兩 附子一兩 肉桂一兩

丸如桐子大。每服十五丸。米飲下。見金匱要略。

若遺溺者白薇方主之。

白薇方 白薇 芍藥

各等分。爲末。酒服一錢。見千金方。

久嗽不止。謂之子嗽。此外感風寒也。甚則動胎。宜百合湯。

百合湯 百 合 三錢 紫 苑 一錢 貝 母 一錢 白 芍 一錢

當 歸 一錢五分 前 胡 五分 茯 苓 二錢 桔 梗 一錢五分 蘇 葉 五分

九味。作一服。

下痢赤白。謂之子痢。其候腹中疼痛。裏急後重。不得以尋常治法施之。宜

薤白飲。

薤白飲 薤 白 三合 石 榴 皮

黃 連 各六錢 阿 膠 一兩 地 榆 一兩

以水二升。煮六合。分三服。見千金方。

若注下不止。宜膠艾湯。

膠艾湯 阿 膠 艾 葉 石 榴 皮 各六錢五分

以水二升。煮六合。分三服。見千金方。

若下膿血。宜白朮湯。

白朮湯 白 朮 當 歸 黃 芩 各三錢

作一服。見醫學正傳。

寒熱往來。一日一作。或間日一作。若有定期。謂之子瘧。發當夏秋。宜香薷

保安湯。

香薷保安湯 香 薷 八分 柴 胡 羌 活 各五分

陳皮 六分 白朮 二錢 黃芩 一錢 炙甘草 四分

當歸 一錢五分 生薑 一片 棗 二枚

作一服。

在冬春宜驅邪湯。

驅邪湯 白朮 藿香 砂仁 茯苓 各一錢

橘紅 草果 各八分 甘草 五分 薑 三片

作一服。見丹溪心法。

胃滿腹脹。氣逆上干。謂之子懸。此由中焦氣結之故。多得之。憤鬱驚惶。宜

紫蘇飲。

紫蘇葉 一錢五分 人參 大腹皮

芎藭 陳皮 白芍 當歸 各一錢

甘草 五分 薑 三片 葱 三莖

作一服。

或葱白湯。葱白 二十莖

以水一升五合。于銀石器內。煮取半升。頓服。并食葱。見婦人良方。

若心痛者。宜竹皮湯。

竹皮湯 青竹皮 三合

以酒六合。煮三兩沸。頓服。見千金方。

腹痛者。宜芩朮湯。

芩朮湯

黃

芩 一兩

朮

藥 一兩

白

朮 六兩

以水二升。煮取一升。分三服。

見千金方。

腰痛者。大豆酒主之。

大豆酒

大

豆 三合

以酒一升。煮取六合。頓服。見千金方。

妊娠下血。謂之漏胞。甚則崩決不止。陰氣不固。熱動於內。傷其脈絡。故營

血內溢。血盡則死。宜地黃飲。

地黃飲

生地黃 二兩
六錢

清酒一升。煮三沸。去滓。頓服之。或入鷄血少許。見千金方。

或地黃散。

地黃散

乾地黃

搗末。酒服。三指撮許。三服。瘥。見千金方。

若胎動不安。腹痛。繞臍。腰背皆痛。卒有所下。或叫號口噤。四支厥冷者。宜

艾葉湯。

艾葉湯

艾

葉

阿

膠

芎 藭

當

歸 各一兩

甘

草 六錢

以水二升六合。煮一升。分三服。見千金方。

若因交合而動胎者。宜入物膠艾湯。

人物膠艾湯

人參

白朮

茯苓

各二錢

芎藭

各一錢

當歸一錢五分

白芍二錢

乾地黄三錢

阿膠

膠二錢

艾葉

八分

見醫學入門。

因飲酒而傷者宜黃芩湯。

黃芩湯

黃芩

白朮

當歸

歸

砂

仁各一錢

作一服日二。見得效方。

因喜怒而傷者宜佛手散。

佛手散

當歸五錢

川芎三錢

作一服。見丹溪心法。

因鬱悶而傷者宜葱白湯。見前子懸下

因勞役而傷者宜安脈湯。

安脈湯

人參

白朮

各二錢

當歸

歸一錢五分

阿膠三錢

炙甘草

陳皮

各五分

芎藭

藭一錢

兔絲子

黃芪各一錢五分

杜仲

仲二錢

因跌墜而傷者宜續杜丸。

續杜丸

續斷

杜仲

各二兩

棗肉搗為丸。如梧桐子大。每服五十丸。米飲下。

若腰痛損傷下血不止。宜馬通湯。

馬通湯

馬通汁三合

乾地黄

見醫學入門。

阿膠各一兩 當歸 艾葉各一兩

以水一升六合。煮取八合。內馬通汁。及膠令烱。分三服。見千金方。

若胎奔上搶心。危急之候。宜艾葉地黃湯。

艾葉地黃湯 艾葉一兩 阿膠 芎藭

芍藥 甘草 當歸各六錢 乾地黃一兩三錢

以水一升六合。煮取一升。內好酒一升。內膠。令消。分三服。見千金方。

甚者。血從口出。逆不得息。宜蟹爪湯。

蟹爪湯 蟹爪三合 甘草 桂心各三錢 阿膠六錢

以東流水三升。煮一升。內膠。分二服。口噤不能服者。扶口灌之。藥下便

活也。生胎即安。死胎即下。見千金方。

若因毒藥攻胎。胎動欲墮。血逆衝心。悶亂喘促。大汗不止者。宜白扁豆散。

以解其毒。

白扁豆散 白扁豆

為末。新汲水調下二三錢。口噤者。斡開灌之。見得效方。

若因高取物。胞系有傷。兒啼腹中。則令妊母曲身。向地拾物。須臾即止。

若腹中作鐘鳴聲者。取鼠穴中土噙之。

入九月。瘖不能言者。不須治之。產後即愈。

凡胎動。無故而動。及體素羸弱者。乃衝任脈虛。不得固攝。當大補之。腹痛

者。宜行其氣。損傷者。宜行其血。餘各因其所由治之。

未及期而產。謂之半產。即墮胎也。損氣耗血。甚於正產。二三月猶輕。六七月爲最重。譬之果未熟而強摘之。其根蒂必傷也。故凡半產。當與正產同其調養。而尤加意焉。宜因其所傷而補益之。以善其後。前列諸法。皆可參用。若輕易視之。則一次半產。後遂習以爲常。不得謂非失治之過也。半產後。治疾之法。與正產稍異。蓋正產惡露多。半產惡露少也。若有腹痛等疾。宜溫補之。逐瘀破血之藥。用宜審察。若數日後大熱而渴。面紅眼赤。欲飲凉水。晝夜不息。此大虛也。寒涼下咽。即死不治。宜當歸補血湯。

當歸補血湯 黃 芪 一兩 當 歸 二錢

水煎。作一服。見內外傷辨。

若血崩不止者。宜攝陰湯。

攝陰湯 黃 芪 五錢 阿 膠 三錢 歸 身 二錢 白 朮 二錢

甘 草 五分 粳 糲 皮 一錢 烏 賊 骨 一錢 芥 炒 一錢

其他諸症。並詳正產。相時度勢。消息用之。未可拘泥爲也。

產孕集下篇

陽湖張曜孫箬

武進徐星鉞校

紹興裘吉生重校

辨產第六

孕滿十月待時而生。自然之道。無所勉強。而世俗不察。或未產而強速之。致有橫逆之變。推其故。由於未明其理。不辨其候而然。故初覺腹痛。遂謂欲生。稍事遲延。遂謂難產。方藥以攻之。非法以擾之。使氣瞽神亂。子母俱死。富室巨家。其弊尤多。本安也而自危之。本生也而自殺之。可憫也已。辨產之法。脈經曰。妊婦月滿。則脈離經。離經者。難經所謂一呼三至曰離經。一呼一至亦曰離經也。又曰。尺脈轉急。如切繩轉珠者。欲產也。千金方論曰。將產者離經。離經者其脈浮。朱彥修曰。離經六至。沈細而滑。按切繩轉珠。動疾之象。卽一呼三至之義。一呼三至。一吸三至。呼吸定息。脈七至。閏以太息。脈入至。疾之甚也。朱說與千金方不同。當以難經脈經爲正。要之胎動欲產。無論浮沈遲速。皆有動象。無動象者。非正產也。

正產腹痛。必連腰及臍。或牽引脊背。胎氣陷下。或目中生火。穀道挺迸。漿血下後。腹痛愈緊。乃爲欲生。若漸痛漸緩。或乍緊乍慢。卽漿血交下。皆非正生。達生編言。試痛正產之辨。誤以試痛爲正產之害。推勘極精。多可采

者。達生編云。初覺腹痛。第一以忍痛爲主。無論爲正產。爲試痛。痛久自生。更宜養神惜力。以安睡爲妙。不可輕易臨盆。蓋子居母腹。端坐不動。至生時。轉身向下。姪母安臥。腹中不至逼窄。易於轉身。若未及轉身。遂使坐草。則嬰兒難於轉運。復用力以注之。則是先出而成逆產。轉身未定。用力逼之。則手先出而爲橫生。或首骨偏礙。而爲偏產。種種弊端。皆基於欲速之故。故臨盆以緩爲正。卽使過遲。亦無妨礙也。又曰。孕至八九月。或姪母有火。起居不時。令孕不安。因而作痛。所謂試痛也。但須照常眠食。甚則服安胎藥一二劑卽止。若誤作欲產。遽令坐草。卽使勉強能生。母氣必損。子亦多天。猶之剖卵出雛。裂繭取蛹。安望生耶。又曰。腹痛有感寒傷食之候。亦宜辨別。傷食者。當臍而痛。手按轉加。或臍旁如有臍起者。不連腰及脊。寒痛多在臍下。綿綿延延。無所增減。得煖稍安也。凡此皆極言欲速之害。而歸於辨產未明。蓋姪母多畏難產。而欲速產者。在主者察脈晰理。明辨而調抑之。事常而易變。苟不慎察。戕害生命。亦非俯育之道。慎毋謂闈房瑣屑之事。非丈夫所宜知。而忽略視之也。

產戒第七

產育順事。而俗人多擾亂之。致反順爲逆。此雖習俗使然。亦不知之過也。輯產時所當戒者。著於篇。使覽者凜焉。

姪母將產。率多疑懼。腹痛緊急。氣血下注。神不能安。易於驚惶。初次產育。尤爲易擾。而不知者。稍有不順。輒恐懼無主。大事張皇。致姪母心亂神散。

氣憊而逆。氣逆則血湧。氣憊則力衰。嬰兒之生。雖自能轉動。亦藉母氣助之。氣逆力衰。何以能下。唯宜溫慰。使勿驚疑。即有不順。勿使知覺。俾心定氣凝。神安力旺。無論本屬順生。即遇惡候。亦可反逆爲順也。

千金方論云。產事雖係穢惡。然不得令死喪污穢之人視之。犯者多致難產。又忌多人瞻視。惟得一二人在室。產後乃可告人。亦以人衆則易於驚擾。致妊母心神不定故也。

室中宜適溫涼。夏暑過甚。勿掩門戶。以器貯新汲水石許。置室中以辟熱氣。免致昏暈。天寒宜置火暖之。毋得太熾。令火氣熏灼。室中人毋大聲。毋多語。毋嗟咨太息。毋訝駭。毋叱咤。毋祈神問卜。宜安靜如常。

妊母宜惜力。宜安臥。臥宜正。不可左右。毋摩腹。毋按腰。毋妄動。毋輕坐草。初產及天寒尤忌。美其飲食。頻頻與之。若虛羸者。不能多食。以糜粥雜入。參未飲之。毋亂服方藥。毋輕試異術。必辨明正產。胞水已下。交骨不開。或交骨已開。而子久不下。擇平和之藥。稍稍助之。要之產前調攝既善。亦無須此。

接兒老嫗。俗謂穩婆。宜豫擇妥善者用之。蓋隱曲之事。非此輩不能爲。而愚蠢奸狡之輩。或妄爲動作。故事恐嚇。戕人性命。以炫己之術。不可不慎。大率以年老爲佳。蓋年老則歷事多。而性稍醇也。

產後勿問男女。須收拾既定。然後告人。世有急於求嗣者。墮地得男。而產母暴喜。遂致昏暈。得女。則產母不悅。家人又從旁懊惱之。致有鬱厥血逆。

之患宜豫防也。

大凡產厄。誤於張皇者半。誤於怠忽者亦半。產育固生人常事。然苟主者不察。而漫然聽之。則產母無主而驚疑。爲害亦大。往見拘迂者。矯張皇之弊。謂嬰兒可以自出。無藉乎人。因閉門安臥。勿令人知。而產母體素羸弱。氣血虛少。又性本嬌怯。不能忍痛。曲腰護之。偏倚妨之。輾轉敲仄。致嬰兒不得轉動。交骨不得開張。氣血下注。久無泄路。勢必逆而上行。一日之間。而子母俱死。如此者。何啻無故而自殺之哉。此皆不明其理。不究其道。愚而自用。殘賊人倫。夫產孕者。生生之本。天理之原。似續攸關。斷宜詳慎也。

用藥第八

產時用藥。有二弊焉。方伎之士。多取速效。肆用峻利之藥。以炫己之術。其效者。藥甫入口。而難產卽下。衆人駭服。推爲神奇。而不知一時便利。子母大傷。至產後發疾。遂至不起。嬰兒或墜地不舉。或舉而輒夭。而又委之天命。歸咎後醫。日殺生命。而人莫之知。深可痛惜。古方如兔腦。鼠腎。蛇蛻。回生諸藥。只堪備至急之用。安可妄試。尤有甚者。挾不經之術。無稽之方。展轉傳布。謬爲仙授。乘人之急。以脅人之利。功則歸己。過則歸人。世俗憤憤。多爲所愚。不可譬曉。此一弊也。而矯其弊者。遂謂產孕本無須用藥。常變順逆。悉靜而聽之於天。斯言誠善。然必自懷妊至臨產。攝養無乖。然後可也。苟或不善。卽可反順爲逆。而仍執勿藥之說。以自愚。是何異未能辟穀。而謂人可勿食耶。此二弊也。且天下亦或有生而難產者。或未孕之先。卽

有宿疾。或氣血羸弱。骨格緊密。脈絡堅緻。皆令難產。亦藉臨時藥力以扶助之。但宜斟酌盡善。擇平和之品。醇正之法。相不得不用之時。而後用之。如加味芎歸湯。佛手散。味和而力厚。氣平而效速。斯爲善也。

加味芎歸湯 當歸一兩 川芎七錢

龜板 手大一片 婦人髮如雞卵大一枚 醋炙研 瓦上焙存性

水一升。煎四合服之。見醫學入門。

佛手散 見前孕疾篇。

富貴之家。產後必服人參。而致死者多。矯其弊者。并倡產後無補益之說。而致死者亦多。蓋不明其理。左右皆誤。夫產後諸疾。多出於虛。人參非不可用。而用之亦自有法。得其法。益身而卻疾。不得其法。致疾而促生。不可不辨。服參之法。在子方墜地。參已入口。一刻之間。過此一刻。便不可服。蓋產時氣血下注。上中二焦。盡屬虛寒。產後氣復上行。下焦惡血填湊。血道梗塞。氣道亦滯。驟加補中之藥。血道未開。氣道益阻。遂有惡露不行。然血上逆之患。若當兒甫墜地。一刻之間。氣血猶未上行。藏府空虛。脈絡困乏。人參入腹。甘溫之性。宅中土而揮脾精。輔正氣而逐惡血。灑播精微。灌漑經脈。氣強則行速。脈潤則道通。惡露順下。乳汁通流。焉有他患。且新產之後。百脈皆動而下。行自下而上。然濁者去。精華者留。有更新之象。婦人宿疾。多在血分。平時所不能除者。此時可以除之。卻病益身。非妄說也。凡欲服參者。將產時。即宜製就。汁宜濃厚。可以一飲而盡。或以人參一二錢。研爲末。另以錢餘煮汁。

調服。令一人司之。俟兒首既出。卽與服之。參盡而兒適墮地。乃爲合法。苟失其法。爲害非小。而復歸咎於參之不可用。豈不謬哉。產時應變。皆倉猝之際。所有藥物。亦宜豫籌有備無患。不可渴而掘井。鬪而鑄兵也。

應變第九

產育本順事。不幸而至於逆。變起倉卒。安危係於片時。亦人生至急之事。極難之治也。應變之術。宜切究焉。凡產之變有五。曰橫產。曰逆產。曰偏產。曰礙產。曰盤腸產。

橫產者。兒橫腹中。手臂先出。治法。令產母仰臥。囑收生嫗。徐徐推兒下身。令直上。以手中指摩其肩推上而正之。又以手摩其耳。令頭正自生。或以小鍼刺兒手。入一半分。徐徐送入。不入。以鹽塗之。

逆產者。兒未轉身。兩足先出。以鹽塗兒足心。鍼刺如上法。或以爪搔之。并以鹽摩母腹。兒得痛痒。驚縮而轉。自當迴順。

偏產者。產時。兒首偏拄一傍。雖近產門。只露頰角。終不得下。治法。令收生嫗。以手徐徐正其頭。若因腦骨偏拄穀道。當以綿衣炙火令熱。裹手於穀道外。徐徐推之。俟正。然後坐草。若產時。兒不向產門。直趨穀道者。宜熬鹽令熱。以紬裹于穀道外熨之。

礙產者。兒首正抵產門。久而不下。此必轉身時。臍帶攀掛兒項。或肩當急令安臥。令收生嫗。推兒近上。徐徐通手以中指按兒兩肩。理脫之。然後坐

草。蓋此候最爲險惡。慎毋輕易用力。若纏繞於項。復用力以注之。則其纏愈緊。致子死腹中。不可不慎。凡橫逆諸產。如法拯救。皆宜內服。加味芎歸湯。佛手散。加味芎歸湯。見用藥篇。佛手散。見孕疾篇。以助之。若不能用法。但令靜心安臥。服前藥

一二劑亦效。

盤腸產。子腸先出。兒卽隨下。或腸隨兒下。此由下焦素虛。不得收攝。氣血下注。無以固之。或用力太過。一次如此。凡產皆然。宜以溫湯潤之。溫諭產母勿令驚慌。以好醋半盞。新汲水加醋十之七。調和。驟噴產母面。或背。三噴則收。或以磨刀水。微潤腸。煎磁石湯一盞飲之。或以葶蔴子搗敷產母頂心。視收入。速洗去。遲則爲害。內宜服補益升提之藥。慎護其腸。勿令見風。若遭風侵。多有不能收入者。

產時交骨不開。最爲惡候。此由陰氣大虛。血液衰少。宜加味芎歸湯。方見前甚者。加桂少許。

子死腹中。其候心腹脹悶。重墜異常。產母面赤舌青。指甲皆青。或口出惡臭者。是也。若面舌唇口俱青。口沫出者。子母俱死。面青舌赤者。母死子生。宜佛手散。方見前或平胃散。

平胃散 蒼朮 厚朴薑汁炒 陳皮各三錢 甘草一錢二分

水煎。加朴硝二錢。化服。其效頗速。見局方。

或蟹爪湯。

蟹爪湯 蟹爪一升 甘草一尺 阿膠一兩

以東流水三升。煮蟹爪甘草。得一升。去滓。內膠。令烊。分二服。見千金方。

若雙胎。一死一生者。服之。能令生者安而死者出。若乾燥著脊不能下者。宜葵子湯脂蜜酒。以滑之。

葵子湯

葵子三合

阿膠一兩六錢

以水一升六合。煮六合。頓服未效。再作一服。見千金方。

脂蜜酒

猪脂

白

蜜各三合

醇

酒六合

合煎取六合。分二服。見婦人良方。按無猪脂。以麻子油易之亦可。

產時用力太過。水衣早破。漿水盡下。產戶乾澁。或坐草日久。為風所吹。因而腫脹。多致難產。或產時子忽不動。是妊母力乏之故。勿誤為死。肆用攻逐。皆宜加味芎歸湯。方見前

產時。妊母忽猝然。氣痿暈絕。目翻口噤。面黑唇青。口沫流出。子母俱殞。若兩顴微見紅色。子死母生。此至危之候。宜霹靂丹救之。

霹靂丹 蛇蛻一條。蠶退紙並燒存性。各用二錢。男子頭髮燒灰。路旁

左足草鞋。燒存性。各用一錢。乳香五分。黑鉛二錢五分。水銀七分五厘

以鉛和水銀。入鍋中。火上鎔化。結如砂子。研治為末。和諸藥以攢猪心血和丸。如梧桐子大。金箔為衣。每用三丸。流水下。或煎化灌之。見醫

學入門。

嬰兒既生。胞衣不下。亦多危險。達生編云。用力太早。交骨強開。兒甫出而骨卽隨閉。以致不下。宜急斷臍帶。以麻線將臍帶繫緊。又雙折之。再繫一道。勿令風入。以輕物墮之。但令產母安心定氣。稍遲當痿而下。慎勿令收生。嫗妄用手取。致損及臟腑。因成惡疾。若血流入衣中。爲血所脹。致不得下。腹中脹滿。上衝心胃。疼痛喘急者。宜佛手散。方見前

益母湯

益母草 一兩

酒煎。加童便一杯服之。見達生編。

若危者。宜牛膝湯。

牛膝湯

滑石 二錢

木通

當歸

牛膝

瞿麥

各一錢五分

冬葵子 二錢

共作一服。見局方。

若急上搶心者。或死胎上搶心者。宜用熨法。

熨法。取蟻垤土一升。熬熱囊盛熨心下。令不得上。見千金方。

若輕者。以草紙燒烟。熏產母之鼻。令納氣卽下。或以髮入口作嘔。亦佳。

千金方。載產時襪法。雖未明其理。而頗有效驗。并附著以備用。凡欲產宜脫尋常所著衣。籠竈頭。及竈口。令至密。卽易生。若逆生者。以手中指取釜底墨。畫兒足下。作义形。卽順生。或書父名於足心。或以車轄脂如上法書畫。若胞衣不下。取夫內衣蓋井上。卽出。本草載臨產取赤馬皮鋪身下。又

以海馬石燕兩手持之。皆令速產云。

凡應變。皆以凝神息慮爲主。毋得張皇。以擾產母。心欲細而定。智欲敏而速。法欲簡而捷。藥欲峻而安。毋取劫功。毋貽後患。凡遇危急。無不皆然。不特產孕之一端也。

調攝第十

產後調攝。最宜詳慎。蓋產後氣血虛少。絡脈空乏。肢節懈怠。腠理開張。皮毛不寔。營衛不固。血道易塞。氣道易滯。故致疾之易。而去疾之難。莫甚於此。產後致疾。皆起於纖細易忽之間。其源甚微。其發至鉅。闈房瑣屑之事。主者所不及檢。醫書所不能詳。不識避忌。不知防範。或致疾而終身不愈。或疾作而危在片時。往見一婦。產時至速。不及告人。遂產於地。產後人知。始扶臥於榻。三日後。大熱不止。醫以爲血淤也。而以桃仁承氣投之。數日而死。一時不謹。爲害如此。況其大焉者乎。故善調攝者。不使致疾。并可去宿患之疾。不可不知也。

凡產後產母勿令安臥。宜以高枕倚之。膝宜豎起。勿得伸直。須閉目靜神。勿令熟睡。歷十二時乃可安臥。少須八九時若倦怠者。宜頻頻呼之。常令欲醒。亦

毋高聲急語。致使驚恐。蓋產後氣血上行。若遽令安睡。則氣逆而血壅。多致昏暈。必豫防之。膝宜豎者。膝伸則筋骨內掩。恐礙惡露也。

嬰兒墜地。卽取鐵秤錘。或石子入火燒紅。以醋向產母焯之。使氣入鼻。不特可以辟穢。且能收斂神氣。散解惡血。以杜血暈。或日焯一二次。三日後

止更佳。

室中宜避風。絲毫罅隙。必掩塞之。宜適溫涼。毋犯寒暑。將寒即衣。驟煖毋易。夏雖大暑。勿得解衣。毋浴。毋以扇招風。寧失過煖。毋失過寒。

產後宜益母草煮汁。和童便服之。或和清酒。日三五服。三日而止。自產之次日始。日服生化湯一劑。

生化湯

川芎 一錢

當歸

歸 五錢

甘草

五分

乾薑

五分

桃仁

十粒去皮尖

以水二盞煎一盞。入清酒一合。溫服。

五日而止。然未盡者。七日止。大虛者。可加入參少許服之。二三日後。或寒熱交作。此骨合也。虛人多有之。但診無他患。如法服。生化湯。勿妄用他藥。十二日後。惡露將盡。氣血更新。體虛者。宜服補虛湯。

補虛湯

人參

白朮

各三錢

當歸

歸

川芎

黃芪

各二錢

炙甘草

陳皮

各八分

乾薑

五分炒

八味作一劑。日一服。見醫學入門。

十數服。有宿疾者。宜服永安湯。

永安湯

人參

一錢

熟地

三錢

當歸

歸

三錢

芍藥

二錢

阿膠

一錢五分

白朮

二錢

續斷

一錢五分

桃仁

烏賊骨

各一錢

吳茱萸

四分

十味。作一服。食前溫進。日一。

或澤蘭湯。

澤蘭湯

澤

蘭 二錢

香

附 二錢

當

歸

芍

藥 各一錢五分

芍藥

烏

藥 各一錢

人

參 一錢

阿

膠

黃

芪

白朮 各三錢

紅

花 五分

生

薑 二錢

作一服。食前溫進。

羊肉湯。

羊肉湯

羊

肉 十兩

黃

耆 一兩

大

棗 三十枚

扶苓

甘

草

當

歸

麥

冬

地黃

芍

藥 各六錢

肉

桂心 三錢

以水六升。煮羊肉。取三升。內藥。煎取一升。分三服。溫進。見千金方。

相疾之輕重。體之偏寒偏熱。而用之。或十餘服。或數十服。可使宿疾盡去。

體弱反強。

飲食宜澹泊。毋食鹽。犯之令無乳。毋食生冷堅硬。一切異物。毋食多燂煎

炒。毋過於肥膩。皆令致疾。十日內毋食猪肉。一月內毋食猪脂。犯之令經

絡壅塞。凡食肥甘之物。皆宜去油脂。以清淡為上。清本乎陽。可以益神而

育精。濁本乎陰。足以致滯而成積。而酸鹹之味。凝血阻脈。尤為切忌也。

產後一月。俗謂之滿月。二月謂之大滿月。此二月內。不宜力役動作。不宜

交合。心志宜和。思慮宜絕。悲恐憂鬱。大喜大怒。皆不可犯。七情傷人。甚於

六氣。世有產後羸瘠。謂之蓐勞。多至不治。皆不知調攝之故也。

懷嬰第十一

千金方論曰。嬰兒初生。當卽舉之。舉之稍晚。則令中寒。先浴之。然後斷臍。斷臍不得以刃。令人隔衣咬斷之。以煖氣呵之。然後纏結。所留臍帶須令至小兒足趺。短則兒腹中不調。常下痢。若先斷臍。然後浴者。則臍中水。令常腹痛。其臍斷訖。連臍帶中多有蟲。宜急撥去之。不爾。則入兒腹成疾。裹兒臍法。椎治白練。令柔軟。方四寸。新綿厚半寸。與帛等合之。調其緩急。急則令兒吐。若十許日。兒怒啼。似衣中有刺者。此或臍燥。還刺其腹。當解之。易衣更裹時。閉戶下帷。燃火令溫煖。仍以溫粉粉之。若臍不愈。燒絳帛末粉之。若臍中水。當炙粉絮以熨之。不時治護。

浴兒法。湯須調冷熱。冷熱失宜。令兒驚。凡兒冬不可久浴。久則傷寒。夏不可久浴。久則傷熱。浴兒者。以豬膽汁一枚。取汁投湯中。以浴之。終身不患瘡疥。兒生三日。宜用桃根湯浴之良。

桃根湯

桃梅李根各三兩

以水三升。煮二十沸。去滓。無根枝亦可。

生男。宜用父故衣裹之。生女。宜用母故衣裹之。皆勿用新帛衣。不可過厚。令傷兒皮膚。害血脈。嬰兒始生。宜時見風日。凡天氣和煖無風。宜令乳母將兒於日中嬉戲。則血凝氣剛。肌肉牢密。堪耐風寒。不致有疾病。

達生編云。兒生三日。浴之。俗謂之洗三。如冬寒切不可洗。然千金方謂小兒不浴。令毛落。則不浴。亦非良法。宜如上法蔽風。燃火下帷而浴之。又云。

斷臍必以艾蘸油爲燃。燎斷之。令煖氣入腹。常視之。勿令濕。較千金法爲佳。南中收生。嫗斷臍。多於連胞衣處斷之。并留胞衣少許。先繫緊。然後斷之。雖臍帶稍長。易於妨礙。然可免入風泄氣之患。亦可用也。

嬰兒甫生。氣欲絕不能啼。以煖水灌之。不啼以綿絮包裹之。勿斷臍。以紙熬蘸油。燃火於臍帶下薰之。令煖氣入腹。更以熱醋湯盪洗臍帶。令氣回啼哭如常。方可斷臍。

若面青身冷口噤者。乃胎寒也。宜殭蠶散急救之。

殭蠶散

白殭蠶

木

香

肉

桂

陳皮

炙甘草

檳

榔

各五分

水煎取汁。以帛蘸入兒口中。見醫學入門。

若因臍纏喉管礙產者。急去其所纏之臍。輕按其背俞。及胃口。徐摩其喉管。卽氣復而啼。

初生有卽死者。急看兒口中懸雍。前腭上有泡。如石榴子。以指摘破出血。以帛拭去。以髮灰糝之。若令惡血入口中卽死。初生撮口不飲乳。名曰馬牙。不治則死。馬牙之候。兒齒齦有小泡。如粟米狀。急以鍼挑出血。用墨磨薄荷汁。斷母髮裹手指。蘸擦口中令遍。勿飲乳。一時許卽痊。

初生穀道無孔。不得大便。急用金玉簪。揣其是孔處。刺通之。以蘇合香少許。作小錠。納孔中。或以油紙紙之。勿令復合。

若非無孔。而大小便不通者。氣脹欲絕。令婦人以溫湯漱口。吸唾前後心。

并臍下。手足心。共七處。每唾三五次。漱口更唾。取紅色爲度。須臾自通。不爾則死。或以葱汁乳汁各半。調勻抹兒口中。與乳吮下。亦通。

若小便不通。不欲飲乳者。以葱白一寸。四破之。以乳汁入銀石器內煎灌之。

若生鵝口瘡者。其候口內白屑遍生。舌上鼻上皆有之。不能吮乳。急以亂髮纏指。蘸薄荷汁。或井華水。拭之。三日當脫。若不脫。可煮茯苓汁。令濃。以帛纏筋頭。拭之。無茯苓。粟木亦可。或以白楊枝燒漚塗之。

初生遍體無皮者。以白早米粉撲之。候生皮乃止。若如魚泡。如水晶。碎則水流者。以密陀僧爲末糝之。

初生患連舌。以爪摘斷之。微有血出。無害。若血出不止。以髮灰傅之。連舌者。舌下有膜。如榴子中隔。連接舌下。令兒言語不轉也。

生六七日後。氣血收斂成肉。則口舌喉頰清淨。若喉裏舌上。有物如蘆管中盛水狀者。或如脹起者。可以綿纏長鍼。留刃如粟米大。刺決之。令氣泄。去青黃汁。日一刺之。不過三刺即愈。著舌下者。名曰重舌。著上腭者。名曰重腭。治如前法。

初生感風。鼻塞不通者。取皂角草烏。等分爲末。薑汁調敷顙門。或以薑汁調天南星末敷之。

外腎縮入。不得出者。以硫黃茱萸各五錢。爲末。以蒜汁調塗臍腹。仍以蛇牀子燒烟熏之。

初生遍體發丹毒。赤腫遊走。若入腹即死。名曰赤游。乃胎熱也。宜以細鍼。隨赤暈周匝。刺出惡血。仍以芭蕉汁。或蟻螬汁塗之。或以赤小豆末。和雞卵白塗之。亦良。

初生二三日。面目繞鼻。左右皆黃。閉目撮口而啼。口中乾燥。四肢不得伸縮者。乃血脈不斂也。血氣沮敗。不成肌肉。故有此候。宜龍膽湯。
龍膽湯 龍膽草 鈎藤皮 柴胡 黃芩

桔梗 枳 芍藥 茯苓 荅 甘草 各八分

以水三合。煮二合。兒生一日至七日。以三勺。分三服。八日至十五日。以四勺。分三服。十六日至二十日。以六勺。分三服。二十日至三十日。以一合。分三服。三十日以外。以二合。分三服。凡寒熱驚掣。變蒸。不解。客忤。驚癇。食積。皆可服之。見千金方。

凡嬰兒甫出。先以綿裹指拭口中。及舌上惡血。若啼聲發。便入腹中。以成百病。斷臍後宜與甘草湯。

甘草湯 以甘草如手中指一節。打碎。以水六勺。煮取三勺。見千金方。以綿裹沾取。與兒吮之。計得一蠅殼許入腹止。兒胃中有惡物者。當快吐之。若不吐。須臾更與。盡之若不吐。是無惡物。勿更與也。

凡母乳兒不欲太飽。飽則嘔吐。如太飽。則以空乳乳之。自消。夏不去熱乳。令兒嘔。冬不去寒乳。令兒咳。且痢。甫交合即乳。令兒羸瘠。交脛不能行。將乳。當先去宿乳。又用力極揆之。勿令乳急出。令兒噎。若急出。以指按夾之。

嗜則奪之。令得息。然後乳之。兒若臥。乳母當以臂枕之。令乳與兒平。令兒不嗜。欲寐。則奪其乳。恐填塞口鼻。且或致過飽。母臥。母以口鼻向兒。恐氣吹其巔頂。母有熱。勿乳。犯之。令兒變黃。母怒。勿乳。犯之。令生驚。發疔。上氣。顛狂。母醉。勿乳。犯之。令身熱。腹痛。母新吐下。勿乳。犯之。令兒虛羸。皆所當慎。

富貴家。多置乳婦。而愚蠢之輩。不知慎護。不識避忌。寒煖失候。饑飽違理。因而致疾者最多。故善懷嬰者。當自乳爲善。必欲置乳婦。宜擇氣血清和。肥白壯盛之婦。毋犯胡臭。癭瘻。癘疥。癩癧。白禿。癩瘍。耳聾。齶鼻。瘰癧之疾。夫乳者。血氣之所爲也。兒之性情未定。藉血氣以涵養之。苟飲以惡濁之乳。則氣血日昏。性情日劣。變清明而爲愚蠢。爲患寔深。又不特致疾之一端也。

大凡嬰兒氣血薄弱。施治難于常人。小有不慎。卽生重疾。愚醫不察。拘執謬說。肆用毒藥。往往而殤。夫疾作而治之。於後。曷若未疾而慎之。於先。未生則調之。於母。既生則適其饑飽。量其寒溫。疾從何生。而煩廣施謬方。遍倡邪說耶。集懷嬰一篇。有心保赤者。所當覽也。

拯危第十二

產後諸疾。危迫者多。頃刻生變。有延醫治藥所不及者。孫子所謂發於秋毫。廣於蒿岱也。而世俗治此。恒昧其道。稍有不順。輒謂不治。治之不善。又不啻下石而殺之。蓋能起死而定亂者鮮矣。著拯危一篇。以政惑焉。產後

血暈最爲危急。其候兒甫墮地。母卽昏絕。不省人事。急令婦女。以膝裹綿。軟舊衣。曲抵產戶。勿令氣泄。一人以一手挽頭髮。一手掩口鼻。俟稍轉動。乃可用藥。若不醒。以韭菜一把。細切。瓶盛之。灌以熱醋。以瓶口向產母鼻。管熏之。仍以鐵石器。火燒。焯醋。令室中常得醋氣。或以醋噴其面。或以漆器燒之。用藥宜辨虛實。虛者其候昏悶煩亂。卒然暈倒。口張。手撒遺尿。鼾聲。四支厥冷。寸口脈微細散亂。或伏匿不至。此正氣大虛。微陽欲脫。陰離陽決。危在俄頃。救之稍遲。則氣不復返。宜清魂散。

清魂散

人參 澤蘭各一錢二分 炙甘草 一錢

當歸

芎藭各二錢 荆芥穗 一錢

作一服。水煎。加清酒引。見婦人良方。

定氣飲

定氣飲

人參 白朮 阿膠各三錢

炮薑

薑 熟附子各一錢 大棗五枚 炒粳米 一撮

濃煎。分二服。溫進。

獨參湯

獨參湯

人參四五錢

長流水濃煎厚汁灌之。

見醫說。或加炒米一撮。炮薑一錢尤妙。

六味回陽飲

熟地黃五錢

當歸三錢

炮薑二錢

六味回陽飲

熟地黃五錢

當歸三錢

炮薑二錢

熟附子二錢 肉桂二錢 人參三錢

見幼幼集成。

相度用之實者。心下滿急。神昏口噤。腹脹氣粗。兩手拳握。脈無虛象。乃下血過多。惡露上逆。當破其惡血。宜黑神散。

黑神散 肉桂 當歸 白芍

炮薑各二錢 乾地黄 炒黑大豆各五錢

見幼幼集成。

奪命散救之。

奪命散 沒藥血竭各等分。治為末。每用三錢。童便清酒各半。煎數沸服。

神效。見丹溪心法。

若舌強不語者。敗血壅其脈絡也。宜四味散。

四味散 當歸 延胡索 血竭 沒藥各一錢

每用二錢。童便或清酒調下。或并煎作湯亦可。見丹溪心法。

若見鬼譫妄。言語顛倒。眼見黑花者。宜辨虛實。誤者即死。體素虛弱。下血過多。昏迷不省。瞑目無所知。甚則循衣撮空。錯語失神者。虛也。又謂之鬱冒。暴亡其血。陽神無所依附。宜安神飲治之。

安神飲 人參 柏子仁 黃芪 阿膠

當歸 茯苓 神各一錢 肉桂 炙甘草各一錢

共作一服。

體素壯實。下血未多。發狂見鬼。面青口噤。角弓反張者。實也。敗血干心。亂其神明。宜蘇合香丸一錢。童便調服。或奪命散四味散皆宜。方俱見上

血崩不止。是謂重傷。其候血暴下如注。急若山崩。故名曰崩。唇青肉冷。汗出目暝。此由陽氣大虛。不得收攝。故直下無制。潰決而不可止。宜朝宗湯。

朝宗湯

- 歸身一兩
- 芎藭
- 乾地黃各五錢
- 芍藥三錢

人參

- 黃芪
- 肉桂
- 炙甘草各二錢

分二服。

補氣養血湯

- 人參
- 黃芪
- 當歸
- 白朮

均藥

- 阿膠
- 芎藭各二錢
- 艾葉
- 青皮

香附

- 甘草各五分
- 熟附子一錢
- 縮砂仁一錢

共作一服。見萬病回春。

或攝陰湯治之。若少腹滿痛。肝藏已壞。不可治矣。

攝陰湯

- 熟地黃五錢
- 人參三錢
- 黃芪二錢
- 當歸一錢五分

荆芥穗炙

- 櫻櫚皮炙
- 甘草各一錢
- 熟附子一錢五分

作一服。

衄血者。口鼻血出不止。口鼻起黑色如煙煤。是胃絕也。氣血散亂。多不可治。急以緋線一條。并產母頂心髮一二莖。合繫產母手中指節。令極緊。仍用荆芥散治之。

荆芥散。荆芥穗爲末，每服二錢，童便調下，口噤開灌之。見婦人良方。

產後大喘，乃死候也。此由陽氣素衰，所下過多，血竭於下，氣留於上，無所

依附，獨聚肺中，孤陽絕陰，命在呼吸，宜獨參湯。方見上。炮薑。六

味回陽飲。方見上。輕者。小參蘇飲。

小參蘇飲。濃煎蘇木汁，調人參末二錢，或三錢，作一服。見東醫寶鑑。

若血下少而作喘者，其喘不甚，由於瘀血入肺，窒礙氣道，宜桃仁湯治之。

桃仁湯。桃仁二錢，杏仁二錢，當歸各五錢。

貝母各二錢，茯苓二錢，乾薑二錢，人參各五分。

若咳逆不止欲死者，以肉桂五錢，薑汁三合，同熬，稍服半合許，以手摩肺

俞令熱，以餘汁塗之，時摩時塗，汁盡即愈。見婦人良方。

陰脫者，子宮脫出，或脫出如脫肛者，蓋產時努力所致，宜當歸黃芪飲。

當歸黃芪飲。黃芪三錢，人參三錢，甘草五分，麻草八分。

右作一服，水煎，日二。見丹溪心法。

若脫出如線，長三四尺，手觸之則痛甚者，宜慎護之，不可令斷，斷則死，以

薑三斤，連皮搗之，清油二斤，和炒，以油乾爲度，以熟絹五尺許，疊數層，承

其線，屈曲作圓形，納戶口，以絹袋盛薑，溫熨之，冷即易，一日夜當入其半。

二日當愈，仍內服失笑散助之。

失笑散。五靈脂、蒲黃等分爲末，每服二錢，童便或酒調下。見局方。

凡產後危症。皆屬虛寒。惡血爲患。僅十之三四。而昧者。多以去瘀破血。該之。肆用攻伐。復雜寒涼。邪說盛行。古法晦昧。夫血已亡。而復破之。陽已衰。而復泄之。危如轉燭。主救猶恐不及。而尙妄謬爲之耶。有識者尙其慎之。毋爲邪說所惑也。

去疾第十三

產後治疾。當以溫補爲主。去瘀次之。千金方論曰。婦人產訖。五藏虛羸。惟得將補。不可轉瀉。若其有病。不須駛藥。若行駛藥。轉更增虛。就中更虛。向生路遠。朱彥修曰。胎前毋滯。產後毋虛。亮哉斯言。不易之法也。而方今醫者。用法多殊。陽虛發熱。妄用滋降。氣逆作喘。謂之痰火。豈未見千金諸說耶。朱氏爲滋陰降火之祖。而於產後大熱。亦用乾薑。雖說理未明。而用法則合。而宗其說者。弁此而背之。可異也已。

脈經曰。產後之脈。洪實不調者死。沈微附骨者生。又曰。沈小者生。實大堅強者死。蓋產後當虛。沈小而微。虛寒之象也。當虛反實。則陰陽相弁。氣血瞽亂。素問所謂。氣弁則無血。故脈象反盛。猶之真藏之脈。多屬堅強。絕無生意者也。知脈理則知治法。知治法則知病情矣。

大凡產後諸疾。虛寒者十之六七。瘀滯半之。內傷外感又半之。而總不外溫補二法。常有之候。曰惡露不行。曰發熱。曰尿血。曰無乳汁。曰頭腦心腹腰脇痛。曰嘔吐。曰淋瀝。曰遺溺。曰泄痢。曰便秘。曰陰腫痛癢。曰交骨不合。其甚者。曰傷寒。曰中風。曰浮腫。曰虛勞。凡此數者。世俗犯之。有終身不愈。

者。至中風虛勞。多歸不治。由古法久廢。下士多愚。非必死之症也。

惡露之候。產後下血過少。腹滿而脹。痛引少腹。牽掣腰背。宜加味生化湯。

生化湯 加澤蘭二錢 延胡一錢五分 益母草三錢

甚者。逆搶心胃。手足厥冷。唇乾腹大。短氣促喘。宜甘草湯。

甘草湯 甘草 芍藥

桂心 阿膠各一兩 黃一兩

以東流水三升。煮一升。內膠。令烊。分三服。見千金方。

若敗血不下。成塊作痛。俗謂之兒枕痛。乃血瘕也。宜失笑散。方見極危篇 立效散。

立效散。五靈脂為末。每服二錢。溫酒調下。見局方。

古鐵酒。

古鐵酒。古鐵五錢。火燒令赤。以酒三合。入焯之。溫服。見千金方。

烏賊骨湯治之。

烏賊骨湯 烏賊骨三錢 桃仁二錢 當歸 芍藥

芍藥 阿膠各一錢五分 肉桂五分 五靈脂一錢

作一服。

產後發熱。其候大熱煩躁。晝輕夜重。或譫語神昏。脈虛大者虛也。宜當歸

補血湯。方見草疾篇 腹內痛。有塊者。瘀也。宜生化湯。方見調攝篇 感冒者。宜補虛加乾薑

湯。

補虛湯 加乾薑一錢。作一服。見丹溪心法。

四物炮薑湯。

四物炮薑湯

芍

藥一錢五分

芍

藥二錢

乾地黄三錢

炮

薑二錢

當

歸三錢

若因蒸乳而熱者。乳必脹痛。去乳汁即愈。若往來寒熱者。宜柴胡湯主之。

柴胡湯

柴

胡八錢

黃

芩

人

參

甘草各一兩

生

薑六錢

大

棗十二枚

半

夏三合

以水三升。煮一升五合。分三服。見千金方。

新產無乳。其故有二。陽虛陰盛。無以化之。營血不得溫升。故不能生乳。體

素羸弱者。多有之。舊說所謂血虛無乳者。即此候也。宜益陽以化陰。溫經

以通絡。宣營湯主之。

宣營湯

當

歸

黃

芪

阿

膠各三錢

人參五錢

芍

藥各二錢

芍

藥各二錢

川貝母一錢

炮薑一錢

紅

花

甘

草各五分

十味作一服。

氣滯血阻。脈絡不通。乳道壅閉。亦無乳。宜猪蹄湯。

猪蹄湯

猪

蹄二枚

通

草二兩

以清酒三升。浸之。加水一升。煮一升。飲之。見千金方。達生編無通草。加

生黃芪一兩

當歸五錢

白芷五錢

名通脈湯。

或貝母湯主之。

貝母湯

貝母一錢五分

連翹二錢

當歸

川芎各二錢

桔梗

白芷各一錢

赤芍

川續斷各一錢

紅花五分

頭痛者。血虛也。其候痛連巔項。掣引腦項緊急欲死。厥陰少陽陽明之脈。會於巔。絡於額。貫於腦。驟亡其血。脈絡不安。故震動而痛。宜小補血湯。

小補血湯

川芎三錢

黨參一兩

阿膠五錢

生薑二錢

即少挾風邪。不可發散。宜一奇散主之。

一奇散

川芎一錢

當歸各二錢

荆芥穗一錢

作一服。見東醫寶鑑。

心腹疼痛。多由血瘀氣結。挾寒而起。宜芎歸理中湯。

芎歸理中湯

芎藭一錢五分

當歸

黨參

白朮各三錢

炮薑

枳實各一錢

桃仁一錢五分

若虛羸而腹痛。少氣不得息。少腹拘急。牽引腰背。不能飲食者。宜內補當歸建中湯。

歸建中湯

內補當歸建中湯

當歸一兩

芍藥

藥一兩六錢

甘草三錢

生薑二兩

桂心六錢

大棗

棗十八枚

以水三升。煮一升。分三服。見千金方。

腰痛者。下焦虛寒。血滯不行也。宜續斷飲。

續斷飲

續斷三錢

當歸

阿膠

膠各二錢

杜仲三錢

桃仁

延胡各一錢五分

肉桂

桂五分

脅痛者。肝虛也。宜四物乾薑湯。

四物乾薑湯 當歸 乾地黄 芍藥各三錢

川芎 薑各一錢 棗五分 五枚

冬月產後臍下痛者。宜羊肉湯。

羊肉湯 羊肉四兩 當歸 陳皮各二兩 生薑一兩

水一升。酒五合。煮八合。分三服。見醫學正傳。

嘔逆之候。腹脹懣悶。食入即吐。此敗血瘀阻。胃氣不降也。宜抵勝湯。

抵勝湯 芍藥 半夏 澤蘭

人參 陳皮各一錢 五分 甘草五分 薑七片

作一服。見醫學正傳。

淋瀝遺溺。由於下焦虛寒。或產理不順。妄用謬法。損傷府絡。宜桑螵蛸散。

桑螵蛸散 桑螵蛸十五枚 鹿茸 黃芪各一兩 五錢

牡蠣 人參 赤石脂 厚朴各一兩

治為末。每服一錢。米飲調下。見東醫寶鑑。

鹿角霜飲

鹿角霜 鹿角霜五錢 熟地黄八錢 黨參

黃芪各三錢 韭子一錢 肉桂一錢 兔絲子二錢

損者。宜參朮膏。

參朮膏 人參 白朮 黃芪各二斤

熬膏。每服二錢。米飲下。見丹溪心法。

或參朮飲。然宜速治。緩則無及矣。

參朮飲 人參二錢五分 白朮二錢 黃芪一錢五分

陳皮 桃仁 茯苓各一錢 甘草五分

以猪羊脬一個煮湯。入藥再煎去滓。作一服。見丹溪心法。

尿血者。血隨溺下。滲瀝不已。甚則溺孔作痛。宜竹茹湯。

竹茹湯 竹茹六合 人參 芍藥 桔梗

芎藭 當歸 甘草 桂心各三錢 熟地黃一兩三錢

以水三升。煮取一升。分三服。見千金方。

若渴。或淋而渴者。宜竹葉湯。

竹葉湯 竹葉一升 生薑 半夏各一兩 大棗十四枚

小麥二合 甘草 茯苓 人參各三兩 麥門冬一兩六錢

以水三升。煮竹葉小麥取二升。內藥。煮取九合。分三服。見千金方。

產後泄痢。多因脾虛感寒。其候雜下五色。或赤白膿血。日十數行。腹痛困頓。宜芍藥湯。

芍藥湯 芍藥 乾地黃各一兩六錢 甘草

阿膠 艾葉 當歸各六錢

以水二升。煮八合。內膠。分三服。見千金方。

甚者。桂蜜湯。

桂蜜湯

桂 心

甘 草

各六錢

乾 薑

六錢

附 子 三錢

蜜 三合

當 歸

一兩

赤石脂

三兩

以水六升。煮一升。內蜜煮數沸。分三服。日一。見千金方。

禹餘糧湯。

禹餘糧湯

禹餘糧 五錢

白 朮

乾 薑

各二錢

黨 參

一兩

扶 苓 三錢

陳 皮

川芎 薺

各一錢

炙甘草

木 香

各一錢

分二服。

久不已者。宜豆麥飲。

豆麥飲

大 豆 微熬

小 麥

蒲 黃

各三錢

吳茱萸 一合

以水三升。煮一升。分三服。見千金方。

泄瀉者。宜安中湯。

安中湯

白 朮 三錢

當 歸

黨 參

各二錢

炙甘草

大 棗 五枚

陳 皮

砂 仁

麥 芽

各一錢

生 薑

七片

或補中益氣湯。

補中益氣湯

黃 芪 一錢

人 參

白 朮

各二錢

當 歸

各五分

甘 草 三分

陳 皮

升 麻

各四分

柴 胡

五分

薑 三片

棗 三枚

作一服。見脾胃論。

便秘不通。多由津虧之故。或誤發其汗。陽泄於外。胃氣不降。宜澤府湯。

澤府湯 阿膠 當歸各三錢 桃仁

降胃湯 麻仁各二錢 黨參三錢 紅花五分

降胃湯 人參 陳皮各一錢

作一服。

陰腫痒痛。木鬱下陷也。宜溫肝湯。

溫肝湯 柴胡 白芍 川芎各一錢 當歸

首烏 白朮 苡仁各三錢 葱 白七枚

外以蛇牀子煮湯薰洗之。

交骨不合。陽氣大虛也。宜十全大補湯。

十全大補湯 人參 茯苓 白朮各二錢

乾地黄 黃芪 當歸各三錢 白芍

川芎各一錢五分 肉桂一錢 甘草五分

或加味芎歸湯。方見前

產後傷寒。治法與產前同。產前宜安胎。產後宜補血。小柴胡湯主之。

小柴胡湯 柴胡三錢 黃芩一錢 人參

半夏各一錢 甘草五分 薑三片 棗二枚

作一服。見醫學入門。

若因傷寒時疾。熱入血室者。宜小柴胡加桃仁五靈脂湯。

小柴胡湯加桃仁五靈脂各一錢

或柴胡地黃湯。

柴胡地黃湯 柴 胡 地 黃 各三錢 人 參 半 夏

黃 芩 各二錢 甘 草 五錢 薑 三片 棗 二枚

作一服。見得效方。

熱渴者。熟地黃湯。

熟地黃湯 枯 萆 根 三錢 人 參 麥 門 冬 各一錢

熟地黃 一錢 甘 草 五錢 糯 米 百粒 薑 三片

見得效方。

人參當歸飲治之。

人參當歸飲 人 參 熟地黃 當 歸

白 芍 藥 麥 門 冬 各一錢 桂 皮 五錢 青 竹 葉 十片

粳 米 一合 薑 三片 棗 二枚

見醫學入門。

中風之候。舌寒唇急。手指振動。甚則牙關緊急。手足痠癢。背項強直。一身皆重。或痛或癢。嘔逆直視。角弓反張。名曰尊風。此因虛風冷濕。及勞傷所為。千金方論曰。凡產後諸風。不得用毒藥。不得發汗。特忌吐利。犯之必死。蓋陽虛陰憊之候。中氣未定。乙木不得溫升。鬱而生風。播煽藏府。外則風冷襲之。束其皮腠。表氣壅遏。激烈愈增。內外交煽。津液消亡。筋脈攣縮。故

手足痠癢。牙關緊急。項背強直。角弓反張。諸症作焉。較之尋常中風之候。其甚十倍。治亦如之。非可忽略爲也。千金大豆紫湯。

大豆紫湯 大豆二升 清酒三升

以鐵鑊猛火炒豆焦。令煙出。以酒沃之。去豆。服三合。一日盡之。見千金方。

獨活湯。

獨活 活五兩 大 豆二升 舊酒三升

以漬獨活再宿。若急用。微火煮令減一升。另炒大豆焦。以此沃之。去豆。分五服。日三夜二。見千金方。

華陀愈風散。

華陀愈風散 荆芥炒爲末。每服三錢。豆淋酒調下。見得效方。按豆淋

酒。卽上大豆紫湯。每服一合。

海藏防風當歸散。

防風當歸散 防風 當歸 芎藭 熟地黃各二錢五分

作一服。見東醫寶鑑。

皆精當可用。若中柔風者。舉體疼痛。自汗出。宜獨活當歸湯。

獨活當歸湯 獨活二兩 當歸一兩

以酒二升六合。煮取一升三合。分四服。見千金方。

若夏秋。宜用浴法。

浴法

鹽一升
六合

雞 毛 一 把

燒作灰。以水三斗三升。煮鹽作湯。內雞毛灰浴之。見千金方。

產後浮腫。乃大虛也。脾恃中氣。以運陰陽。中氣者。陽氣也。產後亡血。陽氣大虛。脾無所持。失轉運之正。水氣停蓄。津液阻梗。木鬱於左。無升達之力。金逆於右。無下行之路。氣位於上。水位於下。肺不降。則水上逆。肝不升。則氣下陷。上逆則腫頭目。下陷則腫肚腹。四支者。諸陽之本。脾之所屬也。血亡陽散。失所依附。漁於四末。而水濕隨之。無所泄越。故壅阻而為腫。前人論此。謂惡血流入四支。夫惡血淤滯。能為痿痺。而不為浮腫。淺小之見。無足深辨。前人諸方。精者絕少。宜馭中湯。

馭中湯

黃 芪 人 參 白 朮 各五錢

扶 苓 當 歸 各三錢 炙甘草 一錢

陳 皮 一錢

苡 仁 一兩 肉 桂 一錢 生 薑 三錢 大 棗 十二枚

作一服。

小腎氣湯

熟地黃 當 歸 人 參 各三錢 澤 瀉 一錢

白 朮 五錢 熟附子 二錢 肉 桂 一錢 扶 苓 三錢

作一服。

若因中風而腫者。宜大豆酒治之。

大豆酒 大豆 一升 以水六升。煮取一升半。去豆更煎。減半升。內 白朮

二兩
六錢

附子 一兩

獨活 一兩

生薑 二兩
六錢

添水 二升。煮 一升。內 好

酒 一升
六合

再煎。取 一升五合。分 五服。見 千金方。

產後虛勞，名曰蓐勞。其候乍起乍臥，飲食不化，時作嗽咳，目昏頭痛，口渴盜汗，寒熱往來，喘乏自汗，少氣驚悸。此由攝養不善，內傷七情，陽陷陰逆，升降倒置，藏府交病，表裏均虧，誤用寒涼，即死不治。宜羊肉湯。

羊肉湯

羊肉 一斤
去脂

當歸

桂心

甘草 各六錢

芎藭 一兩

芍藥

生薑

乾地黄 一兩
六錢

以水五升。先煮羊肉。取 二升三合。內藥。煮取 一升。分 三服。見 千金方。

豬腎湯

豬腎湯

豬腎 一具
去脂四破之。

香豉 用綿裹

白粳米

葱白 各三錢

以水一斗。煮取 二升。任意服之。見 千金方。或加當歸人參各六錢。

見廣濟方。

羊肉黃耆湯

羊肉黃耆湯

羊肉 十兩

黃耆 一兩

大棗 三十枚

茯苓

甘草

當歸

桂心

麥門冬

乾地黄

芍藥 各六錢

以水六升。煮羊肉。取 三升。內諸藥。共煮 六合。分 三服。一日盡。見 千金方。

鹿肉湯。

鹿肉湯。

鹿肉一斤

乾地黃

甘草

芎藭

黃芪

芍藥

麥門冬

茯苓各六錢

人參

當歸

生薑各三錢

半夏三合

大棗二十枚

以水八升。煮肉取四升。內藥。取一升六合。分四服。

見千金方。

當歸芍藥湯。消息治之。

當歸芍藥湯

當歸一兩

芍藥

人參

桂心

生薑

乾地黃

甘草各三錢

大棗二十枚

以水二升。煮取一升。分三服。見千金方。

若流汗不止者。宜鯉魚湯。

鯉魚湯

鯉魚十兩

豉葱各三合

乾薑

桂心各六錢

以水二升。煮魚取二升。內藥。煎六合。去滓。分二服。

見千金方。

虛煩者。人參湯。

人參湯

人參

當歸

麥冬

乾地黃

桂心各三錢

大棗二十枚

粳米三合

芍藥一兩

淡竹葉一升

以水四升。先煎竹葉及米。取二升六合。內藥。煮一升。分三服。見千金方。

方。

甘竹茹湯。

甘竹茹湯 甘竹茹 三合 人參 三錢

茯苓 甘草 各六錢 黃芩 一兩

水二升。煮六合。分三服。見千金方。

兼見大熱者。宜知母湯。

知母湯 知母 一兩 芍藥

黃芩 各六錢 桂心 甘草 各三錢

水二升。煮八合。分三服。見千金方。

胃中逆氣者。宜薤白湯主之。

薤白湯 薤白 半夏 甘草 人參

知母 各六錢 石膏 一兩六錢 栝蔞根 一兩 麥門冬 一合五勺

以水四升。煮取一升三合。分五服。見千金方。

若因交合過早。勞損下血者。宜熟地黃湯。

熟地黃湯 熟地黃 一錢五分 當歸 蟹爪

鹿角膠 男子濕襠 燒存性 各一錢 伏龍肝 七分

白茯苓 芍藥 各五錢 桂心 甘草 各二分半

作一服。見醫學正傳。

凡此諸候。皆常見之疾。達其理。通其法。無有不瘳。外此則有跌仆損傷。一切非常異候。皆不具著。明其大旨。推廣而貫通之。亦可無所窒滯矣。

跋

聖賢中庸工夫。全講平易近人。醫小術耳。而理亦不能外。是編豹人弟向仲遠借讀。赴蜀時留在案頭。偶閱一過。覺天地進化之理。已了了在人心目。理雖至精。而愚夫愚婦無不可知。始嘆近世醫家好讀奇僻。皆醉人嚙語耳。仲遠家學淵源。抱負不淺。乃讀書數十年而無所試。祇此偏長薄技。見重於時。亦可哀也。然而已足千古矣。道光丁酉十月維揚史丙榮

跋

二五綱縵。妙合而凝。誕彌厥月。瓜熟蒂落。此天地自然之道。不必以人事計之者也。然姪子之婦。調護識別。自有法度。七情交戰。六氣橫攻。一有不慎。不得不藉藥餌爲補救之術。是書陽湖張子所手集。會刻於吳中三松堂。潘氏法多經驗。世推善本。潘子子宜隨侍閩省。篋中攜有是編。鋟之版以廣其傳。夫僻壤窮鄉。胎教不明。藥石誤投。號呼莫救者多矣。拯閨闈之呻吟。杜嬰孩之夭枉。婦子熙熙。咸登仁壽。安知非是書之一助也。小道云乎哉。同治辛未秋八月平江吳大彬跋

跋

產孕集十三篇。陽湖張子所箸。濟世利人。實非淺鮮。道光乙巳家補之叔

祖爲之校訂。刊於吳門。一時風行。不脛而走。嗣燬於兵火。同治戊辰。重付
剞劂。志厚隨侍十閩。篋中攜有是編。見之者咸以爲善。接踵向索。而版存
里中。猝無以應。因復爲鋟版。以廣流傳。并識其緣起於此。同治辛未秋八
月。潘志厚謹跋。

敘

東坡云。藥雖進於醫手。方多傳於古人。旨哉是言。談歧黃者。詎得昧所自來乎。胎產之係人禍福大矣。而竹林寺獨聞名於天下。聞渠有祕方一帙。遞相師承。久而弗替。惜世莫得而見之也。予友陳子秉元。自言其祖昔寄居竹林。與寺僧最厚。嘗乘閒取其祕本數卷。以歸。予曾向陳子借錄。而陳子未之許也。今年春。陳子館於郡城之清道橋。予往候之。陳子他適。啟其笥。曩所謂胎產祕本在焉。亟攜回抄錄數日。而還其原本。陳子猶未知也。嗟乎。竹林不肯以傳之人者。陳子之祖計而得之。陳子不欲以授之。乃祖者示好友。而予錄而歸之。於以知物苟有濟於人。不容終祕。大抵如斯矣。顧予不知醫。且所錄係陳氏家藏。眞贗尙未可定。又其間方症恐猶未備。行將詣善於女科者。別白而校正之。如果係良方。當設法傳流。表予濟世之微衷云。爰志其自來於右。

敘

余孩提時。聞嫂氏數小產。而不能成孕。諸藥罔效。家大兄往竹林寺取藥數服。而後有孕。竟得十月滿足而生男。其時因心知竹林寺女科之名。後又聞張姓戴姓之女。婦得奇疾。皆往竹林取藥而愈。始知竹林寺女科。師弟相承。其來已久。祕方不傳之世。其視病或說病原。彼不立方。但包藥以應。是以人亦不知其方。今年秋暮。余偶至襟丈樊元圃家。元圃知余能視

藥書。謂余曰。兄亦知竹林寺之女科乎。我有抄錄祕本。曷爲我校訂之。余聞之色喜。卽閱其書。見條分縷晰。立案用方。與世不同。雖用藥或有過不及之處。然望之令人了了。眞女科之祕要。因袖歸而抄錄之。抄竟。並志余欣幸之意。乾隆癸丑孟冬。望後二日。茶垞吳煜書於清暉書屋。

胎產新書目次

女科祕要卷一

脈法	一
辨男女脈法	一
調經	一
經閉	二
崩漏	二
赤白帶	三
安胎	三
漏胎	四
胎痛	五
惡阻	五
胎腫	六
子煩	七
子癩	七
子懸	八
子淋	八
胎死上喘	九

難產橫生……………九

胎衣不下……………九

產後寒熱……………〇

產後血暈……………一

產後中風……………一

宿血腫脹……………二

產後腹痛……………二

半產……………三

陰戶脫……………三

惡血入心……………三

惡血入脾……………四

惡血入肺……………四

惡血入肝……………四

女科祕要卷二

胎前惡阻……………一五

胎前潮熱氣痛……………一五

胎前寒熱……………一五

孩兒攻心……………一六

胎前氣急不得臥……………一六

胎前咳嗽……………一六

胎前衄血……………一七

胎前泄痢……………一七

胎前漏紅……………一七

胎前赤帶……………一八

胎前白帶……………一八

胎前氣緊咳嗽動紅……………一八

胎前動紅……………一八

胎前小便不通……………一九

胎前大便不通……………一九

胎前半產……………一九

胎前怔忡……………一九

胎前浮腫……………一九

胎前陰門腫……………二〇

胎前遍身痠懶……………二〇

胎前下血……………一一〇

死胎不下……………二二五

經來不止……………三三〇

胎前脚痛……………一一〇

胎衣不下……………二二五

經來如黃泥水……………三三〇

胎前中風……………一一〇

產後血氣痛……………二二五

經來如銅綠水……………三三〇

胎前癱瘓……………一一一

產後血盡作痛……………二二五

經來全白色……………三三一

胎前腰痛……………一一一

產後惡露發熱……………二二五

經來成塊如葱白色……………三三一

胎前頭痛……………一一一

產後咳嗽……………二二六

經來臭如夏月腐……………三三一

胎前泄瀉……………一一一

產後子宮突出……………二二六

經來如魚髓……………三三一

胎前心痛……………一一一

產後癩疽突出……………二二六

經來如牛膜片……………三三一

胎前昏迷……………一一一

產後一月惡露重來……………二二六

經來下肉胞……………三三一

胎前大便虛急……………一一二

產後氣急……………二二六

經來弔陰痛不可忍……………三三一

胎前偏體痿癢……………一一二

產後舌黑……………二二六

經來小便痛如刀割……………三三一

胎前陰門痒……………一一三

產後謔語……………二二六

經來未盡潮熱氣痛……………三三一

胎前濕熱不化陰門痒……………一一三

女科秘要卷二

經來盡作痛……………三三四

胎前乳腫……………一一三

月經前期……………二二七

經來脇氣痛……………三三四

胎前咽痛……………一一三

月經後期……………二二七

經來小腹有血塊痛……………三三四

胎前消渴……………一一三

月經或前或後……………二二八

經來偏身疼痛……………三三四

胎前耳鳴……………一一四

血虛發熱……………二二八

觸經傷寒……………三三五

胎前潮熱不退……………一一四

血閉發熱……………二二九

逆經……………三三五

臨產胎不降生……………一一四

行經氣痛……………二二九

經從口鼻出咳嗽氣急……………三三五

每月經來二三次	三六
經來狂言如見鬼神	三六
經來嘔吐	三七
經來飲食後即吐	三七
經來偏身浮腫	三八
經來泄瀉	三八
經前經後痢疾	三八
經來大小便俱出	三八
經來常咳嗽	三九
經阻腹大如鼓	三九
經來小便出白蟲	三九
經來吐蚘蟲	四〇
經來潮熱旬日不思飲食	四〇
室女經閉	四〇
血山崩	四〇

女科秘要卷四

原經水不調	四三
經水不調症	四三
過期經行症	四四

一月經再行症	四五
數月行經症	四五
經期或前或後症	四六
行經腰腹作痛症	四六
經後腹痛症	四七
經水多少症	四七
驗經色症	四七
浮腫症	四八
原經水不行	四九
經閉不行症	四九
石痕症	五一
腸覃症	五一
治崩漏次第	五一
崩漏症	五二
原赤白帶	五三
赤白帶症	五四
白淫症	五五
白濁症	五五

女科秘要卷五

保胎法	五七
保胎撮要	五九
竹林寺真傳生化湯論	六一
胞衣不下	六三
產後調護法	六四

女科秘要卷六

產後便覽	六七
產後厥	六八
產後氣短汗喘痰嗽聲重	六九
產後頭痛發熱氣急喘汗	七〇
血虛極產暈即汗	七一
產後氣血竭汗多形色脫	七一
產後氣短似喘	七二
產後汗多口噤筋搐頰傷	七二
寒	七二
產後崩脫暈厥	七三
產後崩泄	七四
產後瀉	七四
產後赤白痢	七五

產後嘔不納數……………七七

女科秘要卷七

產後傷食服消食藥致滿

悶……………七九

產後類外感……………七九

產後服消耗藥增滿悶積

久成脹……………八〇

產後感風寒嗽鼻塞聲重

惡寒……………八一

產後類瘧……………八二

產後惡露凝結成塊虛症

百出……………八三

產後大便不通……………八四

產後妄言妄見……………八四

產後少乳……………八五

產後乳癰……………八六

女科秘要卷八

方症補遺……………八九

女科秘旨卷一

安胎論……………九七

辨胎歌……………九八

養胎……………九九

安胎……………一〇〇

小產……………一〇三

女科秘旨卷二

惡阻……………一〇五

胎痛……………一〇七

胎漏……………一〇七

跌撲傷胎……………一〇九

毒藥傷胎……………一一〇

胎動……………一一〇

滿悶……………一一一

子腫……………一一二

子氣……………一一三

女科秘旨卷三

子懸……………一一五

子煩……………一一六

子癇……………一一七

子淋……………一二八

淋閉……………一二八

溺血……………一二九

遺尿……………一二九

轉胞……………一二〇

中風……………一二二

中惡……………一二三

瘕……………一二三

眩暈……………一二四

女科秘旨卷四

心痛……………一二五

心腹痛……………一二五

小腹痛……………一二六

腰腹背痛……………一二六

子鳴……………一二七

積聚……………一二七

咳嗽……………一二七

霍亂……………一二九

不語……………一三〇

泄瀉	一三〇
痢	一三〇
瘧疾	一三一
煩渴	一三一
熱病	一三二
胎蒸	一三三
吐衄	一三三
爽期	一三五
女科秘旨卷五	
有孕婦家預知修合	一三七
臨產須知	一三七
論產後調護	一三七
論治血塊	一三七
產後血暈	一三八
產後厥	一三九
產後血崩	一四一
產後短氣似喘	一四二
女科秘旨卷六	
產後妄言妄見	一四五

產後傷食	一四七
產後忿怒	一四八
產後類瘧	一四九
產後類傷寒二陽症	一五〇
產後發熱頭疼	一五一
產後類傷寒陽明及三陰症	一五一
產後類三陰傷寒症	一五一
產後大便不通	一五二
女科秘旨卷七	
產後類中風	一五三
產後汗	一五四
產後虛汗不止	一五四
產後盜汗	一五五
產後口渴渴或兼小便不利	一五五
產後遺尿	一五六
產後類瘧	一五七
產後泄瀉	一五七

產後完穀不化	一五九
產後痢	一六〇
附產後積滯	一六〇
女科秘旨卷八	
產後霍亂	一六三
產後嘔逆不食	一六四
產後口渴	一六四
產後水腫	一六五
產後怔忡驚悸	一六五
產後骨蒸	一六六
產後心痛	一六七
產後腹痛	一六八
產後小腹痛	一六八
產後指節頭痛	一六九
產後偏身痛	一六九
產後腰痛	一七〇
產後淋	一七〇
產後小便數	一七一
產後流注	一七一

陰蝕五疳	一七二
女科旨要卷一	
婦女逐年經症	一七五
女科旨要卷二	
診婦人有孕論	一八三
按月受胎形症	一八四
女科旨要卷三	
診產後證論	一八九
女科旨要卷四	
治十八般難產論	一九七
附兒科問候	二〇二

女科祕要卷一

靜光輪應禪師考定

仁和吳煜茶垞校訂
杭州徐志源句讀

脈法

左手寸脈洪。主胸中之怒氣。關脈洪。主胸中之冷。尺脈洪。主腎虛。左三指脈一般大。主孕。有孕在內。尺脈細如絲髮。主作脹。女人血室病。月水或前或後。右手寸脈洪。主上焦熱。咳嗽有痰。身發潮熱。關脈洪。主冷氣作痛。尺脈洪。主孕。尺脈小。主子宮冷。兩手六脈。一般洪緩而清利。主壽高。六脈俱小。如線大。主脾胃弱。不能飲食。腰痛頭痛。頭暈敗血。六脈俱洪大浮弦。主有瘋氣。女人除此并產後。餘與男子同。男子左手脈洪。右手弱。主大利。女人右手脈洪。左手弱。主大利。

辨男女脈法

左手實大是男胎。右手弦洪女孕來。兩尺偏大分男女。命門滑實主懷胎。

調經

攢前爲熱。退後爲虛。血滯宜破。血枯宜補。時常經前作痛爲血積。經後作痛爲血虛。當時發熱爲血虛有積。經後發熱爲血虛有熱。

主意

婦人坤道血如期。氣血調和體最宜。血盛氣衰應可治。血衰氣旺漸乖違。

血熱先期風熱紫。寒痰黃淡濕違期。作痛行經氣血滯。行過作痛氣血虛。經血欲調宗四物。溫膽枳朮二陳推。脈數黃芩荆芥穗。氣虛力弱用參芪。沈遲氣滯檳榔佐。作痛滿悶入青皮。虛熱逍遙補心類。清其經血自如期。

經閉

夫經閉不通。或墮胎及多產傷血。或久患潮熱消血。或久發盜汗耗血。或脾胃不和。食少而不生血。或痢疾腸風失血。或七情傷心。氣結鬱結。致血閉而不行也。治宜生血。補血。調血。

主意

經凝氣滯不流通。啓閉將來紫淡紅。病後汗多思損血。或因濕熱冷兼風。氣鬱沉微當利氣。緊寒積血又疎通。四物檳榔附菝朮。桃仁牛膝桂蟲。弦濡氣虛參白朮。黃芪甘草牡丹芎。其間胃火乾枯涸。酒佐將軍大有功。

崩漏

皆由勞傷氣血。損任衝二脈。氣血俱虛。不能約制其經血。故血漏下。或漸成淋漓。蓋婦人多由心事不足。或伏事人少。或故貴勢衰。先富後貧。致心火上炎。治當勸諭。而行鎮壓心火之藥。

主意

崩漏皆由氣血傷。脈來弦細大而長。東垣下陷不言熱。學者須知要付量。丹溪要論虛濕熱。陽搏陰弱病之詳。脈弦而數當清熱。荆芥黃芩未服良。百草霜研宗四物。痛入元胡炒黑姜。脈濡氣弱參白朮。續斷防芪功效強。

久崩下陷宜升舉。養血調脾瀉一陽。

赤白帶

赤屬血。白屬氣。濕熱為病漏為帶。俱是胃中痰積下流。滲入膀胱。稠粘者是。又有如白湯者。名曰白濁。主燥濕為先。法當升之。甚用吐法以提其氣。宜斷厚味。

主意

白帶根因濕熱多。赤由營衛不調和。來時骨膝皆酸痛。漏若多時真水磨。脈弦而緩傷風火。炒姜梔子絕其疴。伏龍肝散多靈驗。脈數樗根效如何。

伏龍肝散

伏龍肝

艾葉

川芎

各一錢五分

赤石脂

麥冬

各四分

乾姜 五分

川歸 三錢

肉桂

一錢

甘草

熟地

各二錢

棗 二枚

煎服。或為末米湯送。或酒送。

安胎

胎氣宜清不宜熱。宜靜不宜動。有因胎病而母不安者。有因母病而胎氣不安者。宜詳察之。

主意

妊婦全憑氣血。傷情冷熱便為災。傷血脈濡宜四物。四君脈大漸安排。挫氣縮砂為末服。芎歸苓朮不傷胎。

安胎散

當歸

川芎

白芍

熟地各二錢

白朮

茯苓

黃芪炙

甘草

阿膠蛤粉炒

地榆各錢半

半夏一錢

艾葉三分

姜三片

研末米湯調送

〔吳按〕半夏礙胎宜少用為妥。

脾氣虛弱者。六君子湯加枳殼。一錢

紫蘇六分

姜二片

棗五枚

胎氣鬱滯者。參

蘇飲。

參蘇飲

人參二錢

蘇葉五分

煎服

鬱結傷脾者。歸脾湯

歸脾湯

人參

黃芪

茯苓

炙草各二錢

木香八分

白朮

棗仁

元眼肉各二錢

加柴胡砂仁各等分姜一片

煎服

鬱怒肝脾傷者。四七湯

四七湯

姜炒厚樸

茯苓

蘇葉各一錢

姜夏一錢五分

加川芎川歸各二錢

姜二片

棗二枚

煎服

怒動肝火者。四七湯加柴胡六分

五味子四分

同煎。

漏胎

妊娠月水時下。皆因衝任脈虛。不能約制經血。血漏盡則胎斃矣。亦有勞後喜怒不節。或飲食觸冒風寒。或母有宿疾。爲風冷所乘者。或氣失度。而漏下者。

主意

漏胎血少氣偏虛。不能衛護熱傷之。脈數黃芩加白朮。安胎聖藥善扶持。弱脈血虛全四物。艾膠製炒要知宜。下陷升提分濕熱。氣虛應可用參芪。

胎痛

夫胎痛皆妊娠不知禁忌。或因生冷。或觸風寒。邪正相擊。隨氣上下。衝於心則心痛。攻於腹則腹痛。傷於胎則胎痛也。

主意

胎痛分明胎氣傷。致令妊娠痛聲長。脈來細緊寒食氣。硝砂四七最爲良。脈瀋脈虛宜四物。紫蘇香附服安祥。尺數熱痛黃連炒。診脈須分陰與陽。

惡阻

由婦人稟氣怯弱。或有風疾。或有痰飲。凡妊娠便是有痰。其婦顏色如故。脈息和順。但覺肢體沉重。頭目昏眩。擇食惡聞氣味。好食酸醜。甚者作寒熱。嘔吐痰水。輕者不必服藥。重者以半夏湯。茯苓丸可也。

主意

血奪胃中嘔吐下。一云痰火自相搏。飲食下咽隨口出。致令惡阻食難吞。半夏茯苓湯要藥。二陳藿香亦爲尊。脈分冷熱間虛實。順氣和平胎自甯。

半夏湯

姜半夏

茯苓各二錢

煨姜六分

白朮

杏仁

陳皮

白芍各錢

竹葉二十片

大棗五枚

煎服

茯苓丸

赤茯苓一兩

人參五錢

桂心三錢

乾姜八分

半夏

陳皮

白朮

甘草各四錢

甘草二錢

枳殼二錢

爲末。蜜丸。每日三服。每服二十九丸。

半夏茯苓湯

半夏

茯苓各八分

砂仁

陳皮

甘草各四分

加烏梅一枚

姜二片棗五枚煎服

回春方

茯苓

半夏

厚樸

蒼朮各一錢

陳皮

砂仁各五分

炙甘草

乾姜各三分

藿香八分

烏梅一個

姜三片

煎服

胎腫

凡娠婦有通身腫者。有脚腫者。俗呼爲胎腫。又曰胎水。有脾虛不能制水。血散四肢而腫者。有胎挾水。水血相搏者。有脾胃虛濕者。有乘風冷者。有痢疾後而腫者。有飲食太過者。有腹脹而腫者。治宜詳察。

主意

腫脹皆因濕熱多。山梔萊菔炒宜過。研末米稠調服下。管教虛腫盡消磨。

子煩

夫娠婦而子煩者。是肺臟虛而熱乘於心。則心煩。停痰積飲在心胸之間。或衝於心。則亦煩也。若熱煩者。但熱而已。如有痰而煩者。口吐涎沫。惡聞食氣。則煩躁也。

主意

娠婦心驚悶子煩。病因二火在其間。竹葉湯除虛燥病。門冬飲子似仙丹。

犀角散

生犀角 六分

地骨皮

麥冬

赤茯苓

甘草 各二錢

研末水送。

竹葉湯

白茯苓 二錢

防風 一錢

麥冬

黃芩 各一錢五分

竹葉 二十片

煎服

門冬飲子

麥冬

人參

知母 各一錢

五味子

瓜蒌

葛根 各五分

生地 八分

伏神 七分

甘草 三分

竹葉 二十片

煎服

子癇

孕婦忽然冒悶。不省人事。角弓反張。須臾則甦。狀如中風。名曰子癇。亦謂之風症。又名子冒。治宜四物養血。加芩連降火。姜夏湯破逆。

主意

娠婦筋強語塞痰。或時發搐故名癇。脈浮弦滑鈴羊角。煎服除風漸漸寬。

鈴羊角散

鈴羊角

棗仁

獨活

五加皮

各八分

防風

川芎

川歸

伏神

杏仁

各四分

木香

甘草

各三分

加姜三片研末酒送。

子懸

胎氣不和。懷胎逆上。脹滿疼痛。謂之子懸。恐難產。

主意

胎氣湊上胸膈間。滿悶脹痛曰子懸。紫蘇散子安胎氣。頓教一服遂安然。

紫蘇散

蘇葉

人參

橘紅

歸尾

川芎

各二錢

粉草

白芍

大腹皮

各錢半
酒洗淨

姜

五片

葱白

五寸

胎前諸症。俱用此方加減。如腹痛加木香香附。嗽加枳殼桑白皮。熱加條芩。嘔加砂仁。瀉加白朮。扶芩。均研末米湯調送。

子淋

妊婦腎虛。膀胱熱也。腎虛不能制水。則小便數也。膀胱熱則小便濇而不宣。懷孕之婦。胞系於腎。腎間虛熱而成淋症。甚者心煩悶亂。名曰子淋。

主意

子淋水聚在胞中。熱結便難氣不通。安榮散子殊多效。服之寬快有奇功。

安樂散

麥冬

通草

滑石

當歸

人參

甘草

各八分

細辛

燈心

研末米湯水送

胎死上喘

因母患熱症。至六七月。以致臟腑極熱。薰蒸其胎。而至胎死。不能自出。故作此喘。胎死母舌青者是。

主意

脈沉病喘死胎中。動熱傷胎氣上衝。桂麝和勻酒調下。黑神散子自然通。

黑神散

熟地

當歸

白芍

桂心

蒲黃

乾姜

炙甘草

炒黑豆

為末。每服一二錢。童便和酒服。

難產橫生

妊婦失忌。或氣逆而然。

主意

婦人氣逆胎遂橫。益母童便酒下行。但將神應催生散。服之不久兒即生。

如聖散

黃蜀葵花

焙

為末。熱湯調服二錢。若漏血胎胞乾澹難產。速進二帖。

即產。若無花。用子合半為末。酒服催生如神。

胎衣不下

產時用力，惡血逆上，胎衣亦隨氣上，而悶迷，須臾不下即死。

主意

胎衣不下為如何。疲倦皆因用力過，停風衣冷，或血入胞脹，令人無奈。何急服奪命丹行血。牛膝湯煎效亦多。益母童便酒調下。胎衣下利便清和。

奪命丹

附子炮五錢

丹皮

大黃各一兩

乾漆炒烟盡為度

為末。大黃成膏丸。

桐子大酒下五十丸。

牛膝湯

牛膝

川芎

朴硝

蒲黃各三兩

川歸一兩五錢

桂心五錢

為末和勻。每服五錢。姜三片生地三錢煎湯送。

又方

牛膝

瞿麥

歸尾

木通

枳殼各一錢

冬葵子酒洗一錢五分

滑石二錢

水煎熱服。

凡生產不順。用此方滑利水道。令兒易生。

產後寒熱

凡發熱乃氣虛甚。非有實熱也。有內傷發熱者。有外感發熱。惡寒者。乃氣血虛甚。又有瘀血停滯者。

主意

產後發熱又憎寒。傷感須知有幾般。外邪身熱脈浮緊。五積交加疾自安。

右寸脈大頭必痛。發熱皆因宿食存。香砂二陳加麥用。內傷莫作外傷看。小腹滿痛有惡血。憎寒壯熱掌心溫。弦急脈宜五積散。元胡葱白散爲尊。日晡潮熱宜入物。脈虛弦大補中論。醫臨脈藥如臨陣。虛實分明仔細尋。

產後血暈

有去血多而暈者。宜大補血。有氣虛而暈者。宜大補氣。有痰火泛上者。宜清痰降火。有瘀血不行者。宜清瘀血。

主意

血暈皆由去血多。血虛痰動耳鳴鑼。脈體沉微如冷厥。若然不治染沉疴。

產後中風

中風不語。或胎前先染風邪未發。致產後失於調理而然。或兼產難感冒。轉成此症。

主意

產後乘風口眼歪。血虛氣弱故招來。脈浮愈風湯有效。懦弱弦微續命裁。

愈風湯

荆芥穗炒 爲末。每服三錢。以炒黑豆淋酒調服。童便亦可。

又方

上方加當歸等分。酒少許煎服卽甦。此方加當歸七分。名交加散。

續命湯

人參 麻黃 黃芩 白朮 防己

川芎

防風 一錢

杏仁 五片

甘草

肉桂 各一錢五分

附子 一錢

宿血腫脹

產婦脾胃虛弱。血氣衰敗。亦有傷風邪而腫者。

主意

敗血歸脾腫脹。胎前宿食濕招來。致令餘血遊經絡。遂使平胸氣滿懷。脈沉解散調還易。宿食須當琥珀開。叮嚀後學宜切記。莫作脾傷水氣猜。

琥珀散

真琥珀 二錢 滑石 三錢

粉甘草 一錢五分

為末。每服三錢。燈心湯送。

產後腹痛

若腹滿者。當去惡血。腹不滿者。此虛痛也。

主意

惡血不盡痛憂疑。脈來細緊與沉遲。聚寶丹磨隨引子。童便和酒最相宜。脈弦而緊黑神散。血滯元胡桂與歸。心滿腹痛并兒枕。蒲黃宜入五靈脂。

聚寶丹

沒藥

琥珀 另研

當歸 酒洗焙乾

木香 各一兩

滴乳 五錢

辰砂

麝香 各一錢

為末酒糊丸。每服二三十丸。童便送下。

失笑散

五靈脂

蒲黃 各一錢

醋酒煎服。

半產

月數不足。勞傷血氣而致。

主意

半產多因是嗽生。內傷寒熱暴而行。東垣升舉全生劑。活命湯方妙莫名。

全生活命湯

柴胡

川歸

升麻

白芍

生地

熟地

川芎

藁本

防風

羌活

獨活

葛根

炙草

細辛

蔓荊子

紅花三分

水煎熱服。

陰戶脫

氣血虛甚。所以脫下。但宜養氣和血。腰肚常宜煖之。治宜補中益氣湯。或

十全大補湯。

主意

戶物形如帕下垂。俗名呼作產門頽。治宜補氣兼升法。濁氣清時物自回。

惡血入心

悶亂欲絕者是。

主意

產後昏迷血入心。令人顛倒失精神。脈浮而滑宜續命。弦脈須當用七珍。

七珍散

人參

川芎

石菖蒲

生地各二兩

防風

辰砂各五錢

細辛一錢

為末。每用一錢。薄荷湯下。

惡血入脾

產後嘔吐不食者是。

主意

產後因虛血入脾。令人嘔吐食還希。脈來弦緩多微細。抵聖湯煎功效奇。

抵聖湯

赤芍

半夏

澤瀉

人參

陳皮

炙甘草各二錢

生姜焙乾一錢

酒水煎服。

惡血入肺

產後惡血。遊入經絡。氣喘咳嗽。胸膈不利。

主意

肺喘多因惡血侵。故令氣促作痰聲。寸口脈來浮兼滑。參蘇霹靂遂安寧。

惡血入肝

產後手足筋脈抽搐。血暈似風狀。

主意

弦脈筋抽血入肝。面瘡發怒病多般。或時血暈如風狀。丹皮散服遂平安。

丹皮散

丹皮

防風等分

為末。每服一錢。溫酒或鹽湯調服。

女科祕要卷二

靜光輪應禪師考定

仁和吳煜茶垞校訂
杭州徐志源句讀

胎前惡阻

胎前吐逆。不思飲食。腹中作痛。此胎氣不和。因而惡阻。宜用和氣散。去丁香木香。一帖可愈。

和氣散

陳皮

桔梗

厚朴

小茴

益智

藿香

砂仁

蒼朮

甘草 三分

丁香 三分

木香 五分

胎前潮熱氣痛

此症乃受熱毒而致。宜服五苓散。去肉桂。二三帖可愈。

五苓散

猪苓 二錢

澤瀉 錢半

茯苓

白朮 各三錢

肉桂 三分

水煎溫服。

胎前寒熱

胎前發瘧後。小腹作痛。口燥咽乾。乃受熱也。多吃生冷。陰陽不分。故成此症。

草果飲

草果 一個

青皮

柴胡

黃芩 各八分

甘草 三分

空心煎服。

孩兒攻心

胎前孩兒攻心。不知人事。此過食椒、姜、雞、熱毒物。積在胎中。譬如六月。人蓋絮被。受熱難過。手足亂動。攻上心胞。母不能安也。宜用調中和氣散。同勝紅丸。通利二三次。母子俱安。

調中和氣散

大黃

石膏 各一錢

檳榔

枳殼

黃芩

知母 各六分

黃連 六分

柴胡 三分

黃柏 五分

空心服

勝紅丸

紅花子 去油十粒

百草霜 一錢

為末。早米糊丸。葱湯下七丸。

胎前氣急不得臥

此乃過食生冷。兼有風寒中胃肺經。因而生痰氣急。

紫蘇安胎散

紫蘇

枳實

桔梗

大腹皮

貝母

知母

當歸 各八分

五味子

甘草

石膏 各三分

桑白皮 八分

研末沖服。

胎前咳嗽

此食生冷。又食椒、姜。衝損胎氣。胃火勝。方作此嗽。

五虎湯

蘇子

陳皮

知母

桔梗各八分

杏仁

石膏

枳實各一錢

麻黃四分

五味子

甘草各三分

煎服。

胎前衄血

胎前衄血。常從口鼻中來。此因母傷熱物。血熱則亂行。衝傷胞絡。只有涼胎之法。

衄血丸

丹皮

白芍

黃芩各一兩

蒲黃炒

側柏葉各一兩

為末。早米糊丸。白湯下百丸。

胎前泄痢

此因母傷椒、姜。熱毒入脾。大腸火燥。變成痢也。初起一二日。用甘連湯。三帖立安。如瀉日久。妊婦形瘦。精神短少者。產後母子兩亡。

胎前漏紅

有孕紅來如行經。應期每月一至。此是漏也。

小烏金丸

海金沙煨

殭蠶

小茴

側柏葉

百草霜

川芎各五錢

防風

川歸各八錢

蒼朮四錢

厚朴六錢

為末。早米糊丸。白湯下百丸。

胎前赤帶

胎前漏赤帶。來如猪肝水。日夜不止。精神不寧。急服下方。

側柏丸

側柏葉

黃芩各四兩

為末。蜜丸。空心白湯下百丸。

胎前白帶

此胎氣虛。先服梨花酒。後用閉白丸。

梨花酒

梨頭花妙

為末。酒送下。

閉白丸

龍骨

海螵蛸

牡蠣

赤石脂各五錢

為末。早米糊丸。空心酒送下百丸。

胎前氣緊咳嗽動紅

胎前氣緊動紅。夜多咳嗽不止。其經每月應期而至。日午心熱。氣急咳嗽。人皆作癆症治。不效。宜先服逍遙散。熱退。用紫苑湯以止咳而安。

胎前動紅

此因失跌動傷。惡血破來。如水流不止。急用膠艾湯。以止其血。再服安胎散。以護其胎。然此症如孕婦形盛。而在三五日內可治。若弱而久者難治。

安胎散

阿膠

人參

茯苓

川歸

生地各一錢

川芎

甘草各五分

小茴

八角茴各八分

空心服

胎前小便不通

此症名曰轉胞。醫者多用車前。入珍湯。不效。宜服入味丸。空心下。

胎前大便不通

此乃大腸熱結。胎氣虛弱閉塞。忌用芒硝等藥。大能傷胎。只服大黃湯。

大黃湯

熟大黃二錢 枳殼一錢

水煎溫服。

胎前半產

有孕三五月。或七月而小產。若不調治。再孕復然。服益母丸有奇功。

益母丸

益母草一斤 川歸四兩

爲末。蜜丸。彈子大。空心白湯化三丸。

胎前怔忡

有孕常心中恍惚。偏身煩熱。此血衰受孕不適而致。

硃砂湯

猪心一個 水一碗 煎半碗 調硃砂一錢 服。

胎前浮腫

此氣血俱虛衰而致。切忌通泄之藥。恐傷胎也。

大腹皮湯

大腹皮

五加皮各二錢 青皮

陳皮各一錢

姜皮五分

空心服。

胎前陰門腫

此胎氣不能遊動而致。

安胎順血散

訶子製

水煎溫服。

胎前偏身痠懶

其症面色青黃。飲食不思。精神困倦。形容憔悴。此因血少不養胎元之故。宜服四物湯。

胎前下血

胎前下血動胎。有孕婦形盛而在三五日者。急投安胎散可愈。如形瘦弱者。冷汗大出。面色如灰。四肢無力。此日久病也。因而神色失去不治。

胎前腳痛

此下元氣血虛弱。又兼風邪。宜行氣行血。服烏藥順氣散。

胎前中風

其症牙關緊閉。痰氣壅滿。不知人事。皆因食生冷。兼在風前坐臥而致。先用黃蠟丸擦牙。再進排風散一二帖。

黃蠟丸

枯礬一錢

麻油

黃蠟

共鎔化。調擦牙關上。

排風散

麻黃 三分 白朮 二錢 防風 八分 甘草 六分 杏仁

川芎 各二錢 白蘚皮 八分 當歸 茯苓 各三錢 獨活 一錢

姜 三片 棗 一枚 煎熱服。

胎前癱瘓

其症手足不能動。乃胃中痰閉氣血而致。服烏藥順氣散。取汗見效。

胎前腰痛

此血去蔭胎。不能養腎。故腎水枯。以致腰痛難忍。

豬腎丸

豬腰子 一對 青鹽 二錢 曬乾為末。蜜丸空心酒下三四十九。

胎前頭痛

此風邪入腦。陽氣衰也。投芎芷湯一二帖。即安。若原有頭風者。不效。

芎芷湯

川芎 白芷 菊花 甘草

白芍 茯苓 各一錢 藁本 石膏 各六分

加姜 三片 煎服。若不效。加細辛。

胎前泄瀉

此症有四治。春用一二苓湯。夏用三和湯。秋用藿香正氣散。冬用理中湯。

藿香正氣散

藿香 二錢 紫蘇 陳皮 厚朴 半夏 大腹皮

白朮 茯苓 桔梗 白芷 甘草 各一錢

加姜 三片 棗 三枚 研末沖服。

胎前心痛

胎前心痛不可忍。胎氣不順之故。

順氣手拈散

五靈脂 一錢 草果 一個 元胡索 沒藥 各八分 酒煎服。

又方

烏梅 一個 紅棗 三枚 杏仁 去皮尖七粒 用搗成膏服。

胎前昏迷

胎前昏迷。忽然倒地。乃血去養胎。母無精神。承兒不住。故眼花頭暈。此症無藥方。只以補為主。

胎前大便虛急

此因脾土燥。大腸經澀。只宜理脾通大腸。不可用芒硝峻劑。

一枳湯

枳實 三錢 水煎。不拘時服。

胎前偏體瘙癢

胎前偏體瘙癢。出風疹。此皮中有風。不可服藥。宜用樟腦調燒酒。擦之即安。

胎前陰門牽

有孕房事不節。陽精留蓄。因而作牽。用川椒白芷散二帖。

川椒白芷散

川椒 一兩

白芷 一兩
五錢

水煎服。頭煎。以二煎日洗患處數次。

胎前濕熱不化。陰門牽。

酒炒條芩 八分

酒炒歸身 一錢
五分

酒炒白芍 一錢
五分

老蘇梗 一錢
五分

酒炒川斷肉 三錢

酒炒川黃柏 六分

川葶藶 三錢

蜜橘紅 一錢

炙甘草 四分 煎服。

胎前乳腫

胎前兩乳腫。生寒作熱。名內吹乳。

皂角散

皂角 一條
燒灰

酒調服。

胎前咽痛

此內傷寒攻上咽中。胃有痰涎。宜攻寒化痰為先。

升麻桔梗湯

升麻 三分

甘草

桔梗 各八分

防風 一錢

加元參 一錢 服二帖。

胎前消渴

此乃血少。三焦火勝而然。

加味四物湯。

川芎

當歸

熟地

白芍各三錢

生地八分

黃柏

麥冬各五分

姜二片

棗五枚

煎服。或六味地黃湯亦效。

胎前耳鳴

此腎虛。宜服猪腎丸。空心酒下。七日立安。

胎前潮熱不退

胎前大渴。潮熱不退。腹中痛。孩兒十月滿足無妨。若在七八月孕時潮熱起。恐母子兩亡。

臨產胎不降生

臨產先有水。水乾孩兒不下。可用益母散生其水。水泛舟行。孩兒方下。若不生則閉死。

益母散

益母草三錢

麝香一分

白芷

川歸

川芎

滑石各一錢

肉桂八分

水煎服。

秘傳難產方

牆上或高處。蛇退殼一條。要頭向下而完全者。瓦上焙乾為末。每一錢加麝香二分。用乳調膏藥。貼產母臍上即生。生畢即去此膏藥。遲則腸出。萬勿誤事。如已至誤者。即將此膏藥。貼產母頂門。腸即收。收

盡速去此膏藥。斷不可再誤事。

死胎不下

妊婦面赤口舌焦。指甲黑。此子死也。用斬爛散打下死胎。急救其母。若面不青黑。指甲猶紅。其子尙未死。不可輕用此方。

斬爛散

肉桂 一錢

白芷 錢半

斑貓 五個

滑石 三錢

水煎服。若能連渣服更效。

胎衣不下

此症當審其婦。如胞在胃膈難治。其婦必死。若在小腹可治。

破靈丹

紅花 一兩

蘇木 五錢

生酒煎服。

產後血氣痛

產後餘血未盡。腹中疼痛。徧身潮熱。此惡血在腹故也。去其餘血。潮熱自退矣。宜服紅花當歸散。

產後血盡作痛

此腹中虛痛。若有潮熱。亦屬虛潮。不可認作惡露未盡。宜以四物湯。加小茴。烏藥。乳香。沒藥。五靈脂。元胡索。

產後惡露發熱

此內傷外感症。宜用五積散。去麻黃。加草果。柴胡。黃芩。服一二帖後加減。

產後咳嗽

此風寒傷肺變為咳嗽。

小青龍湯

甘草 乾姜各五分

五味子二分

半夏一錢

杏仁一錢五分

姜三片

水煎溫服。

產後子宮突出

此症不必服藥。用鯉魚灰。活鯉魚一個燒灰。調青油搽患處。

產後瘕疽突出

此症先服連翹散。後用黃蠟膏貼之。

連翹散

連翹 黃芪各

花粉

防風

梔子各一錢

甘草五分

產後一月惡露重來

此症來如流水不止。昏迷倒地。不省人事。此乃未滿一月。夫婦交姤房事。

搖動筋骨。血不歸絡。以致血崩不止。急服金狗散。

產後氣急

產後泄瀉。氣緊不止。大煩大熱。口渴不止。此內虛外熱之症。不治。

產後舌黑

產後舌黑如塵。口乾無津液。此腎經已絕之症。不治。

產後譫語

產後泄瀉。譫語亂言。此惡血攻心。上盛下虛之症。不治。

女科秘要卷三

靜光輪應禪師考定

仁和吳煜茶垞校訂
杭州徐志源句讀

月經前期

其症血來如猪肝水。五心作熱。腰痛小腹痛。面色痿黃。不思飲食。此乃血氣皆虛。先服黃芩散退其煩熱。後用調經丸。次月血勝人安。

黃芩散

黃芩 六分

川歸 一錢

川芎 八分

白芍

蒼朮

知母

花粉 各七分

水煎溫服。

一方無蒼朮。白芍。有甘草七分。

調經丸

三稜

蓬朮

川歸

白芍

生地

熟地

元胡

白茯苓 各一兩

川芎

砂仁

烏藥 各八錢

香附 二錢

大小茴 各二兩

共爲末。米糊丸。桐子大。早每服

百丸。溫酒下。

月經後期

其症經來如屋漏水。頭昏目眩。小腹作痛。更兼白帶咽中如魚腥。惡心吐逆。先用理經四物湯。次服內補當歸丸。次月卽愈。

理經四物湯

川芎

川歸

白芍

生地

白朮

柴胡

香附

元胡索

各一錢

黃芩

三稜

水煎臨臥服。

各八分

內補當歸丸

川斷

阿膠

白芷

茯苓

蒲黃

炒黑

厚朴

吳茱萸

附子

當歸

茯苓

各一兩

川芎

白芍

甘草

乾姜

熟地

各八錢

爲末。蜜丸。桐子大。空心白湯下。八十九丸。

月經或前或後

此症因脾土不勝。不思飲食。由此血衰。月水往後。或次月飲食多進。月水又往前矣。用藥只宜理脾。脾土勝旺。血勻氣順。自然應期。

紫金丸

青皮

陳皮

蒼朮

檳榔

砂仁

紅豆

良姜

枳殼

烏藥

香附

各八錢

三稜

蓬朮

爲末。米糊丸。食後米湯下百丸。

一方無蓬朮。蒼朮。香附。

血虛發熱

其症因婦人性急。或當行經時。房事觸傷。腹中結塊。如雞子大。左右而動。月水不行。變作五心煩熱。頭昏目眩。咳嗽生痰。先用逍遙散止其五心之熱。次用紫苑湯止其嗽。若半年失醫。肉瘦泄瀉必死。

逍遙散

白朮

元胡各八分

薄荷各四分

紫苑湯

紫苑

五味子五分

杏仁去皮尖一錢二分

川歸

地骨皮

龍膽草五分

阿膠蛤粉炒研末

款冬花六分

陳皮一錢

白芍

石蓮子各一錢

為散服。或煎服。一方無黃芩。

川貝去心

桑白皮蜜炙

水煎臨臥服。一方無陳皮。

花粉

黃芩

桔梗

知母蜜炙

蘇子各八分

枳殼各一錢

其症因行經時及產後。過食生冷。并水果。血見水則滯故也。初起一二月。生寒作熱。五心煩躁。口苦舌乾。面色青黃。易治。先用逍遙散。退其寒熱。後用紫金丸。漸納穀氣。脾土一勝。自然經血流通。若年久不治。變成骨蒸。子午而發。肌肉消瘦。骨露泄瀉不止者。百死無生。若患家照前治之。倘病更急。或用鴉片三釐。調甘草湯服之。屢試屢驗。

行經氣痛

經來一半。餘血未盡。腹中作痛。變作潮熱。或無熱。當用紅花當歸散。破其餘血。則痛止人安。

紅花當歸散

紅花炒

川歸

牛膝

蘇木各一錢

川芎 五分

枳殼 六分

赤芍

三稜

莪朮

芫花 各八分

臨臥煎服。

經來不止

經來十日半月不止。乃血妄行。當審其婦。曾吃椒、姜、熱物過度。此熱症易治。可用金狗散。

〔吳按〕亦有因虛弱滲滯。淋漓不斷。非僅屬熱症也。又當審其脈症而治之。

金狗散

金毛狗脊

川斷

阿膠

地榆

川芎

川歸

白芷 各一錢

白芍

黃芩 各八分

熟地 二錢

空心服。

經來如黃泥水

此大虛症。忌用涼藥。宜服加味四物湯。以煖其經。并和其血。次月血勝而止。

加味四物湯

川芎

川歸

元胡索 各一錢

烏藥 一錢

白芍

小茴 各八分

熟地 二錢

姜 二片

空心服。

經來如銅綠水

其症經來全無紅色。此乃大虛大冷。亦忌涼劑。當服烏雞丸半月。非特病愈。且因有孕。

烏雞丸

烏雞肉去皮油淨肉
三兩酒蒸

蒲黃炒黑 川歸

大附子三錢 川芎五錢

經來全白色

山藥

山黃

鹿茸一錢

肉桂

白芍各一兩

為末。米糊丸。空心酒下百丸。

茯苓

熟地一兩五錢

此症五心煩熱。小便作痛。面色青黃。乃血氣虛也。不宜涼藥。亦宜服烏雞丸。半月。次月定有孕。

經來成塊如葱白色

經來成塊。又如葱白色。或如死猪血黑色。頭昏目眩。口唇麻木。此虛冷。忌用涼藥。急服內補當歸丸。可愈。

經來臭如夏月腐

此乃血弱。更傷熱物而致。譬如溝渠水乾。天氣無雨。久則臭也。婦人身衰。舊血少。新血不接。則亦臭如夏月腐也。宜服龍骨丸。兼湯藥。

龍骨丸

龍骨

海螵蛸

生地各一錢

牡蠣

川歸

白芍

川芎

黃芩

白茯苓各八分

為末。蜜丸。空心酒服百丸。

湯藥方

當歸

三稜

莪朮

赤芍

丹皮

白朮

香附

猪苓

陳皮

木通各八分

姜一片煎服。

經來如魚髓

每月經來如魚髓。雙腳疼痛。不能移動。此乃下元虛冷。更兼風邪所致。行血行氣為宜。

颯風止痛散

天麻

殭蠶

烏藥

牛膝各錢

獨活

川芎

紫金皮

川歸

乳香

南藤

骨碎補各一錢

姜二片

葱白二根

酒煎空心服。

經來如牛膜片

經來不止。兼下牛膜一椽片色。昏迷倒地。乃血氣結聚。變成此症。症雖驚人。卻無事。服殊雄丸立安。

殊雄丸

殊砂

雄黃各一錢

白茯苓二兩

為末。水丸。姜湯下五十丸。

經來下肉胞

經來不止。忽然下肉胞三五個。如雞子大。其軟如絮。用刀割開。肉似石榴子。其婦昏迷。不省人事。症亦驚人。亦不妨。用十全大補湯。五帖即安。

十全大補湯

人參

白朮

茯苓

炙甘草各三錢

黃芪三錢

肉桂 六分

川芎

川歸

白芍 各錢

熟地 四錢

姜 三片

棗 二枚

空心煎服。

經來弔陰痛不可忍

此症有兩條筋從陰弔至兩乳疼痛身上發熱服川棟湯二帖即安。

川棟湯

川棟子

猪苓

澤瀉

白朮

小茴

八角茴 各一錢

木香 五分

麻黃 三分

烏藥

檳榔

乳香

元胡索 各八分

姜 三片

葱 一根

煎服發汗。

經來小便痛如刀割

此乃血門不通人多用八珍散不效急用牛膝湯一帖見功。

牛膝湯

土牛膝 三兩

麝香 半分

乳香 三錢

水一杯半煎牛膝至一杯磨二香

入內空心服。

經來未盡潮熱氣痛

經來一半覺口渴小便痛遍身潮熱頭痛此傷食生冷故血滯不行有餘

血在內不宜用補只服莪朮散熱去經盡痛止潮安。

莪朮散

莪朮

三稜 各錢

紅花 五分

蘇木

牛膝 各二錢

空心煎服。

經來盡作痛

此症手足麻痺。乃腹中虛冷。血氣衰弱。

四物湯

川芎

當歸

白芍

各三錢

熟地

四錢

姜 三片

棗 七枚

煎服。

經來脇氣痛

經來脇肉一塊如杯。其色淡黑。宜治氣為先。

四物元胡湯加入前方

元胡索 四兩

沉香 五錢

酒煎服。或為末。酒調服。

經來小腹有血塊痛

經來小腹結成塊。或如皂角一條橫過。痛不可忍。不思飲食。面色青黃。服

元胡散半月。其塊自消。

元胡散

元胡索 四兩

頭髮灰 四錢

為末。酒調送。

經來偏身疼痛

經來二三日。偏身痛。此寒邪入骨。或熱或不熱。俱宜解表。

烏藥順氣散

烏藥

殭蠶

川芎

白芷

陳皮

枳殼 各八分

乾姜

甘草 各五分

麻黃四分 姜三片 葱一根 水煎溫服。

觸經傷寒

經來忽然作渴。誤食生冷。偏身潮熱。痰氣急滿。惡寒四肢厥冷。名觸經傷寒。急投五積散可安。

五積散

厚朴 陳皮 桔梗 蒼朮 川芎 白芷

白茯苓 香附 半夏 當歸 枳殼各二錢 肉桂五分

甘草八分 白芍一錢 麻黃三分 青皮一錢

加姜三片 葱一根 水煎熱服。

附五積交加散照上方加

羌活各一錢 獨活各一錢 柴胡五分 人參邪勝者人參不可用。

逆經

經從口鼻中出。此因過食椒姜熱毒之物。以致物傷其血。熱則亂行。服犀角地黃湯數帖。

犀角地黃湯

犀角 白芍 丹皮

生地二錢 黃芩 桔梗 枳殼各一錢 百草霜各八分

甘草三分 陳皮七分 空心服。

經從口鼻出咳嗽氣急

經不往下。五心發熱。咳嗽氣緊。治宜推血下行。先服紅花散七帖。再服冬
花散。止嗽下氣。不須五七帖即安。

紅花散

紅花

黃芩

蘇木各八分

花粉六分

空心服。

冬花散

款冬花

桔梗

枳殼

蘇子

紫苑

知母

粟殼蜜炙各八分

石膏

桑白皮蜜炙

杏仁各一錢

蘇梗八分

水煎溫服。

每月經來一二次

經來幾點而止。過五六日。或旬日。又來幾點。一月常行一二次。面色青黃。
先用膠艾湯一二帖。次服紫金丸。

膠艾湯

阿膠

白芍

熟地各一錢

艾葉三錢

川芎八分

棗三枚

空心服。

經來狂言如見鬼神

經來或家事怒氣觸阻。逆血攻心。不知人事。狂言謬語。先服麝香散定其
心志。後用扶神丸。以除病根。

麝香散

麝香

甘草

辰砂各三分

木香五分

人參

扶神 桔梗 柴胡各八分 遠志一錢

扶神丸

扶神 扶苓 遠志各八錢 硃砂三錢 猪心一個

爲末。早米糊丸。如豆大。金銀湯送五十九丸。

經來嘔吐

經來時常嘔吐。不思飲食。宜服丁香散。半月方愈。

丁香散

丁香 乾姜各五分 白朮一錢 爲末。每晨米湯調送三匙。

經來飲食後卽吐

此因痰在胃膈。有阻米穀。不能下胃。急服烏梅丸。化其痰涎。後服九仙奪命丹。

烏梅丸

硃砂 雄黃 木香各五錢 硼砂 乳香

沒藥各一錢 草果一個 胡椒 萊豆各三十粒

爲末。烏梅肉丸。如楊梅大。每服噙化一丸。嚥下。

九仙奪命丹

豆豉 木香 陳皮 山查各一錢

枳殼三錢 草果一個 厚朴 扶苓

蒼朮各二錢 爲末。姜湯調下。

經來偏身浮腫

此乃脾土不能剋化。水變為腫。

木香調胃散

木香

陳皮

甘草各錢半

三稜

莪朮

車前子

大腹皮

紅豆

砂仁

蒼朮

木通

山查

萆薢各一錢

姜皮五分

空心服。

經來泄瀉

經動之時。五更泄瀉。如乳兒尿。此乃腎虛。不必治脾。服理中湯七帖即安。

理中湯

人參

白朮各八分

五味子

甘草各三分

乾姜五分

空心服。

經前經後痢疾

月水將臨。傷食椒、姜、雞、熱毒物。毒攻五臟。變作痢疾。諸藥無效。惟服甘連

湯二三帖可安。

甘連湯

甘草五分

黃連二錢

水煎服。

經來大小便俱出

此症名曰差經。因食熱物過多。積久而成。宜解其熱毒。順其陰陽。

分利五苓散

猪苓

澤瀉

白朮

赤芍各一錢

阿膠

當歸

川芎各八分

空心服。

經來常咳嗽

此症因血虛。咳乃肺燥金枯。急用扶苓補心湯。止其嗽。再服雞蘇丸。除其根。

扶苓補心湯

扶苓

川芎

當歸

白芍各錢半

生地三錢

蘇葉

人參

前胡

陳皮

甘葛

甘草

半夏

桑皮

桔梗各一錢

枳實八分

姜三片

空心服。

雞蘇丸

川貝四兩

蘿蔔子一升

爲末。蜜丸。空心白湯下五十丸。

經阻腹大如鼓

月水不來二三月。腹大如鼓。人疑是孕。一日崩來。其血內有物。如蝦蟆子。其婦昏迷不知。體盛者急投十全大補湯可愈。體弱形瘦者死。

經來小便出白蟲

經來血內有白蟲。形如雞腸。滿肚疼痛。先用迫蟲丸。通其蟲於大便而出。後用建中散補之。

迫蟲丸

麝香 五分

續隨子

檳榔

牽牛

大戟 各五分

芫花 一錢

大黃 一兩

為末。麵糊丸如元眼核大。每服一丸酒下。

建中散

黃芪

肉桂

甘草 各五錢

白芍 一兩

為末。白酒調下。

經來吐蛇蟲

經來寒熱。四體厥冷。大汗。嘔吐蛇蟲。痰氣緊滿。百死無生。不治。

經來潮熱旬日不思飲食

經來胃氣不開。不思飲食。此症以開胃為先。服鴨血酒即安。

鴨血酒

白鴨 一隻用銅刀取血。 乘熱調陳熟酒服。

室女經閉

室女月水初出血海。不識保養。將衣服用冷水洗之。水浸手足。血見冷而凝。不出血海。面色青黃。遍身浮腫。人多作水腫治。不效。宜通經丸。通其血則腫自消。

通經丸

三稜

莪朮 各五錢

川歸

川芎

赤芍 各一兩

穿山甲 六錢

芫花 四錢

劉寄奴 三錢

為末。米糊丸酒下。

血山崩

此症若初起。宜服十灰散。若久崩者。宜服雞子湯。如小腹痛。則用加味四

物湯

十灰散 宜研極細末。連灰服下。

阿膠

側柏葉 各二錢

艾

綿

絹 各一錢

胎髮 三分

苧根 一錢

百草霜 三分

白茅花根 一錢俱燒灰存性。

爲末。白湯調下。

〔吳按〕若無胎髮可用無油頭髮。

雞子湯

雞子 或云落袋子五個

葱 三根

姜 一兩 共搗爛如泥。入麻油鍋內炒。酒

碎去渣熱服。

女科秘要卷四

靜光輪應禪師考定

仁和吳煜茶垞校訂
杭州徐志源句讀

原經水不調

一由脾胃虛損。經曰二陽之病。發於心脾。夫二陽者。陽明胃經也。主納水穀。長養氣血。灌溉腑臟。流行經絡。乃水穀之海。氣血之升。唯憂愁思慮傷心。心氣受傷。脾氣失養。鬱而不通。腐化不行。胃雖能受。而謂長養灌溉者。安在哉。故脾胃虛弱。飲食少思。血氣耗衰。斯有血枯經閉之症。蓋血少色必淡。或過期始行。或數月一行矣。

一由衝任損傷。氣以順之。血以濡之。故氣行則血行。氣滯則血逆。大抵婦人情多執拗。偏僻忿怒妬忌。多傷肝氣。肝爲血海。衝任之脈。衝任失守。血氣妄行。或女子未及二七天癸之期。而男強與之合。或月事適未盡。而男與合。縱慾不已。皆致衝任內損。血氣不固。或爲崩。或爲漏。有一月再行。有未及期先行諸症。

一由脂痰凝滯。肥盛之婦。腸胃多痰。壅滯經絡。或閉經帶下。以上三症。皆不能孕育。

經水不調症

形瘦多痰多鬱。血虛氣熱。宜四物湯合開鬱二陳湯。加赤芍。黃芩。黃連。姜

爲引。

開鬱二陳湯

蒼朮

香附

川芎各一錢

青皮

莪朮

檳榔各七

木香五分

姜引

形瘦多痰且熱。此衝任受傷。宜四物湯。加人參。知母。麥冬。甘草。姜棗引。并服地黃丸空心白湯下。

衝任傷損。腎虛血少。枯閉。誤服辛熱。煖子宮藥。致經不調。衝任伏火。宜四物湯。加赤芍。知母。木通。黃柏。甘草。食前服。兼服三補丸。

三補丸

黃芩

黃柏各等分 俱酒炒

蜜丸白湯下。

性急多怒而妬。氣血俱熱。必有鬱症。宜四物湯。加柴胡。酒炒黃芩。黃連。酒炒香附。童便製空心服。

肥盛腸胃多痰。壅滯經絡。閉血帶下。

地骨皮湯

地骨皮

當歸

川芎

知母

麥冬各一錢

甘草五分

空心服。

形瘦經不調。素無他症。此血熱也。宜四物湯加黃芩。黃連。知母。酒炒黃柏。各等分甘草五分空心服。兼三補丸。

過期經行症

情性溫和。有痰。此氣血兩虛。宜入物湯。合青皮湯。加香附。兼服蒼莎丸。

蒼莎丸 香附亦名莎草根。

蒼朮 米泔浸炒二兩 香附 童便浸炒三兩 條芩 酒炒一兩 為末。神麩糊丸。白湯下。

形瘦素無他症。此血氣不足。宜十全大補湯。

形瘦食少。此脾胃虛弱。血氣衰少。宜異功散。合芎歸湯。加人參。白朮。茯苓。

甘草。陳皮。姜棗引。食前服。兼地黃丸。

芎歸湯

川芎 歸身 香附 枳殼 炒各一錢五分

滑石 二錢 姜引。

肥胖飲食過多。此濕痰壅滯。軀脂逼迫。宜六君子湯。合芎歸湯。加香附。姜

棗引。空心服。

一月經再行症

性躁多氣。傷肝而動衝任之脈。宜四物湯。加人參。柴胡。黃芩。黃連。甘草。空

心服。兼用知母。黃柏。為丸。滾湯下。

性躁多氣。傷肝而動衝任之脈。誤服辛熱藥。致經再行。可照上服藥。更服

三補丸。

數月行經症

形盛多痰氣虛。宜六君子湯。合蒼莎丸。加川芎。當歸。枳殼。食前服。蒼莎導

痰丸。亦在食前兼服。

蒼朮導痰丸

蒼朮 香附 枳殼各二兩 陳皮 茯苓各一兩五錢

膽星 甘草各一兩 爲末。姜汁和神麩爲丸。淡姜湯下。

形瘦脾胃弱。氣血虛。宜十全大補湯。

經期或前或後症

脾胃虛弱。氣血不足。宜從虛治。服加減人物湯。兼烏雞丸。

加減人物湯

人參三錢 白朮 茯苓 炙草各五錢 白芍

歸身 陳皮 香附 丹皮各一錢 食前服。

烏雞丸 專治脾胃虛弱。衝任傷損。氣血不足。經候不調。凡無子者。服之神效。

白毛烏骨雞 未嫩雄雞者一只。約重一斤。以粳米喂養。七日勿令食蟲蟻。以繩縊死。於雞肚內。以好鱈魚。酒十碗。酒洗淨。內雞不用。納生地。熟地。天冬。麥冬。各二兩。火連骨焙乾。仍以前生地等藥酒。又浸又焙。至雞骨肉枯爲末。

〔吳按〕此酒不知出處。只用無灰陳米酒亦可。

人參五錢 茯苓酒洗 故紙炒 砂仁 歸身

白朮 川芎 丹參 茯苓 杜仲鹽水炒

炙甘草各一兩 香附醋浸四兩 爲末。入上雞骨肉末。和勻。酒麵糊丸。空心酒下。

或米湯下五十丸。

行經腰腹作痛症

氣滯血實。人瘦有火。宜桃仁四物湯。加條芩。黃連。

桃仁四物湯

歸尾

赤芍

川芎

生地

香附各二錢

丹皮

紅花

元胡各一錢

桃仁十一粒。臨服研入。空心服。

氣滯血實人肥多痰。宜桃仁四物湯。加枳殼。蒼朮。半夏。

經後腹痛症

此虛中有滯。宜入物湯加木香。香附。青皮。姜棗引。食前服。

經水多少症

形瘦經少。此氣血弱。宜四物湯。加入參。香附。甘草。姜棗引。

肥胖經少。此痰凝經隧。宜二陳湯合芎歸湯。姜棗引。

經來多。不問肥瘦。皆屬熱。宜四物湯加黃芩。黃連。知母。黃柏。甘草。姜為引。

兼服三補丸。

〔吳按〕此條不盡然。宜以脈症為憑。

驗經色症

經水色紫者。熱也。宜四物連附湯。

四物連附湯

歸尾

赤芍

香附各二錢

丹皮

甘草各一錢

食前服。

黃連

經水色淡者。血虛也。宜入物湯。加黃芪。香附。姜為引。兼服地黃丸。

浮腫症

因經閉敗血停積五臟。流入四肢。作浮腫者。不可誤認水氣。宜調其經。經調則腫消矣。然煎藥必須十餘服。則下次無愆期之患。至丸藥更宜久服。庶疾無反覆。

調經湯

川芎 七分

當歸

生地

益母草 各一錢

白芍

香附

丹皮

茯苓 各八分

甘草 三分

姜 三片

棗 一枚

空心溫服。如血熱先期。及血熱過期。紫黑成塊等症。加黃

連 七分

血寒過期。加煨姜。肉桂。各三分。臨期正行作痛。加元胡。青皮。各八分。

酒炒

臨行續斷不來。積塊刺痛。加紅花。蘇木。桃仁。各五分。經水過多。加黃芩。

一錢

蒲黃。炒。八分。經來飲食不思。加白朮。八分。陳皮。砂仁。各五分。肥人多

痰。赤白帶下。加南星。蒼朮。各八分。氣虛血弱。四肢虛軟。面無顏色。加人

參。黃芪。各五分。此方調理之大概。如有兼症。可照方隨機加減用之。

金匱丸

香附 童便製酒醋鹽水 各分製共四兩

沒藥 六錢

棗皮 焙去油

當歸 童便製

茯苓

白朮 米泔水浸

白薇 洗去蘆

阿膠 蛤粉炒

白芍 各四兩

生地 酒浸洗。用益智仁二兩。以酒

同炒。去益智仁淨。八兩。

黃芩 酒浸洗

人參 二兩

川斷 酒洗。五椀子炒淨六兩。

砂仁 炒去衣

右藥法製為細末。用山藥十二兩為末。水

打丸。空心白湯下五十九丸。

〔吳按〕棗皮即山茱萸。

原經水不行

脾胃傷損。飲食減少。氣耗血枯而不行。宜補脾胃。養氣血。氣充血生。經自調矣。切忌用通經藥。恐傷中氣。陰血已乾。誤成癆瘵。則不治矣。思慮惱怒。怨恨氣鬱。血滯而不行。宜開鬱行滯。苟以為虛而用補。則氣得補而益結。血益凝。至成癥瘕腫痛者。有之矣。

經閉不行症
脾胃傷損。氣血不行。

加減補中益氣湯

人參 三錢

黃芪 錢

白朮 土炒

白芍 酒炒

歸身

川芎

陳皮 各一錢

柴胡 七分

炙草 五分

加神麩麥芽 各五錢

姜棗為引。兼服烏雞丸。

氣鬱血閉不行。宜服開鬱二陳湯。兼四製烏附丸。

四製烏附丸

香附 一斤。

分四。主醋酒童便鹽水各浸三日。三夜。以砂罐煮乾所浸之水研細末。

天台烏藥 半斤。

同附製研細末。

和勻醋糊丸。

軀脂迫塞。痰涎壅盛。滯經不行。宜服蒼朮導痰丸。兼開鬱二陳湯。去莪朮加枳殼。

偏房寵妾寡婦。并愆期未嫁室女。慾動不得遂。恨積不得伸。亦有經閉之症。害羞難對人言。致成癆瘵。宜服四製烏附丸。及參朮大補之劑。攻補兼行。可療七情變症。經閉骨蒸作熱。而脈虛難治。

加減八物柴胡湯

人參 三錢

茯苓

白芍

地黃

知母

麥冬

柴胡 各一錢

炙甘草 五分

食遠服。如有汗。加丹皮。淡竹葉。

如熱甚。此方不平。加炒黑乾姜 一錢

經閉發熱。咽燥脣乾。而脈實。

四物涼膈散

歸身

川芎

赤芍

生地 各二錢

黃芩 酒炒

黃連 酒炒

連翹

桔梗 各一錢

薄荷

甘草

竹葉 各七分

煎服。此方凡血實形盛。脈有力者。及有熱者宜服。

陰虛血弱。火甚水虧。而經閉。忌用毒藥。

柏子仁丸

柏子仁 炒另研

牛膝

薄荷 各五錢

澤蘭葉

川斷 各二兩

地黃 三兩

爲末。蜜丸。空心米湯下。兼服澤蘭湯。

澤蘭湯

澤蘭葉 五錢

當歸 一錢

甘草 五分

空心服。

按靈樞經婦人有石痕腸覃一症。俗醫不識。故特表而出之。

石瘕症

石瘕症。因行經之後。寒氣自陰戶入。客於胞門。以致血凝。月經不行。而腹漸大。如懷胎狀。其婦壯盛。或半年之後。小水長自消。若虛弱婦。必成腫症。

溫經湯

歸尾

川芎

赤芍

肉桂

桂枝

莪朮 醋炙

故紙 鹽水炒

小茴

牛膝 各二錢

甘草 三分

姜引。兼服四製烏附丸。

腸覃症

腸覃症。亦行經時。寒氣入陰戶。客於大腸。以致血凝。經雖行而血少。其腹漸大。亦如孕狀。俗呼漏胎。如壯盛婦。半年自消。若弱虛婦。人必成脹滿。

桂枝桃仁湯

桂枝

檳榔

白芍

生地

枳殼 炒各一錢五分

炙甘草 五分

桃仁 二十粒研泥

姜棗為引。空心服。

治崩漏次第

凡治崩漏。先止血以塞其流。次清熱涼血以清其源。後補氣血以復其舊。如不清源。則滔天之勢不可遏。清源而不復舊。則孤子之陽無以久立。必本未兼舉。前後不紊。乃可治之。要之崩疾皆因中氣虛。不能收斂其血。加以積熱在裏。迫血妄行。故血暴下為崩。崩久不止。遂成爲漏。脈訣云。崩中日久。爲白帶漏下。時多骨髓枯是也。

崩漏症

崩漏初起。宜先止血。所謂急則治其標也。

加味四物湯

歸尾

生地

川芎

赤芍各二錢

白芷

荆芥炒

甘草各一錢

空心服。兼服十灰散。

十灰散

藕節

艾葉

柏葉

棕櫚

大小薊

丹皮

山梔

胎髮

乾姜俱燒灰存性去火毒

合勻為末。每服一二錢。用上加味四物湯調送。以血止為度。

〔吳按〕胎髮難覓。即用無油髮亦可。

崩漏止後。宜服清涼之劑。以除熱清源。

地黃湯

生地

歸身

川芎各二錢

黃芩

黃連

知母

黃柏

蘘本

柴胡

羌活

防風

荆芥各一錢

細辛

蔓荊

升麻

紅花各六分

甘草八分

姜引。空心服。或を下加味四物湯亦可。

加味四物湯

生地

川芎

當歸

白芍各二錢

阿膠炒

艾葉

條芩各一錢

姜引。如血未盡。再兼服十灰散。

崩漏止後。裏熱已除。宜補氣血。以復其舊。宜服補中益氣湯。加白芷。茯苓。黃柏。知母。生地。姜汁少許。大棗引。

補中益氣湯

人參 三錢

炙黃芪

炒白朮

酒芍

歸身

川芎

陳皮 各一錢

柴胡 七分

炙草 三分

煎服。如氣滯作痛。加青皮。香附。木香 各等分。或用五靈脂 炒烟盡。為末。溫酒送。亦能止滯氣痛。

久崩成漏。遠年不休。此中氣虛下陷。下元不固。宜服補中益氣湯。兼鹿角霜丸。

鹿角霜丸

鹿角霜

歸身

扶神

龍骨 煨

阿膠 蛤粉炒

柏子仁 炒

香附 酒炒

山藥 各二兩

川芎

川斷 各一兩

炙草 五錢

為末。醋糊丸。空心服。

又崩有係衝任之氣。虛損不能約制。經血者。宜大補氣血。養其脾胃。少加鎮墜心火之藥。以治其心。補陰洩陽。崩自止矣。若經妄行。或吐血腥者。用四物。涼膈。入生韭汁服。然必先服五積散一二帖。次服五苓散。及各順氣去舊生新藥。自然愈矣。蓋崩乃經脈錯亂妄行。若先用急斂之方。恐有積聚凝滯之患。

原赤白帶

婦人患帶者最多。赤者屬熱。虛而兼火。白者屬濕。虛而兼痰。治法總以補脾為主。又兼升提。然大抵瘦人多火。患赤帶。肥人多痰。患白帶。醫人於此亦宜詳審。不可執一而混施也。

赤白帶症

形瘦多火。因虛兼熱。患赤帶。宜四物芩連湯。加升麻。丹皮。兼服三補丸。

〔異按〕帶有五色。乃因人之寒熱而變化。

形肥多痰。因虛兼濕。患白帶。宜六君子湯。加升麻。柴胡。蒼朮。姜引。兼服蒼朮導痰丸。

附孕婦白帶

芩連芷柏丸。

蒼朮

條芩各一兩

黃連

黃柏各五錢

白芍

白芷

椿白皮

山茱萸各四錢

為末。酒丸開水送。

帶久不止。以補為主。宜十全大補湯。去地黃。加陳皮。半夏。煨姜。更服參朮大補之劑。以補脾胃之虛。又服補宮丸。以固下元之脫。

補宮丸

鹿角霜

茯苓

白芍各一兩

白芷

山藥各六錢

龍骨煨

赤石脂各四錢 童便煨碎

煨姜二錢

為末。醋糊丸。空心米湯下。

按婦人又有白淫白濁一二症。與帶症似是而實非者。

白淫症

白淫者。時常隨小便而來。渾濁如米泔。此胃中濁氣滲入膀胱而成。加味二陳湯

陳皮

茯苓

白朮

甘草

蒼朮

製各一錢

升麻

柴胡

各四分

益智仁

鹽水炒一錢

姜引一方有香附

一錢

木香

二分

白濁症

白濁症。時常流出清冷稠粘。或於小便後。來亦不多。此乃下元虛損。精不能攝。因滑而出。

分清飲

川萆薢

益智仁

去殼鹽水炒

烏藥

茯苓 各二錢

石菖蒲

去毛炒

枳殼

生草

各一錢

水煎。乘熱入鹽少許服。

女科祕要卷五

靜光輪應禪師考定

仁和吳煜茶垞校訂
杭州徐志源句讀

保胎法

保胎第一宜絕慾爲主。其次寡慾。然絕慾者難。苟能寡慾則心清。胎氣寧謐。胎安而產易。雖嬰兒亦可少病而多壽。

宜小勞。勞則氣血流通。筋骨堅固。胎在腹中。習以爲常。雖微閃挫。不至壞事。然非孕後方勞。正云平日不宜逸耳。

宜以布纏腰。當婦人孕已知覺。用布一幅。闊六七寸。長可橫束腰間兩轉者。常束腰間。直至臨盆方解。蓋胎當未長成。得此腰脅有力。偶或仆跌。不至損胎。及臨盆解開。腹中乍寬。胎兒轉身亦易。

宜謹飲食。苟忽略不知避忌。傷胎甚易。大約宜淡薄。不宜肥濃。宜輕清。不宜重濁。宜甘平。不宜辛熱。宜溫補。不宜耗散。食物不能備述。總在臨時酌其物情而已。

宜忌諸事。凡七情六慾。運磚弄石。勞神用力。嚴寒酷暑。上高下低。換房移床。並勿入產婦房。勿到喪服家。勿進鬧熱場。勿早起晚寢。勿用婦人良方。勿飲古人成方。勿服過路醫生方藥。

宜常服藥。蓋婦人懷孕。則脾不運化者多。脾不運化。則生濕。濕乃生熱。故

補脾燥濕之藥不可少。况胎賴氣血以養。孕婦恆氣血不足。則必又補血順氣以安胎。至若胎動漏紅。以及素有半產者。服藥更不可緩。今撮要方列服。

孕後月月數帖

安胎散

人參

川芎各五分

黃芩

當歸頭各七分

白芍

黃芪各六分

白朮

熟地

蛤粉炒阿膠各一分

炙甘草三分

食遠服。如腹痛。加杜仲。

去粗皮炒斷絲

砂仁各五分

有憂怒鬱結。加紫

蘇香附各五分

以安胎氣。

孕後可常服。

金匱當歸丸

川芎

當歸

白芍

黃芩各四分

白朮

阿膠各二兩

人參一兩五錢

砂仁一兩

為末。麵糊丸。每服六十丸。空心

米湯下。此方養血清熱。補脾燥濕。補血安胎。順氣止痛。且去胎毒。服

之臨產易生。胎兒易育。

胎至九月後。服十餘帖。

達生湯

全當歸酒洗一分

川芎

牛膝酒浸一宿各六分

益母草不犯鐵器

冬葵子炒研

白朮米泔水浸炒各一錢

車前子炒研細

枳殼麵炒各五分

大腹皮酒淨四分 炙甘草三 廣木香忌火。研末。和服三分。

姜一片

食遠服。如腹痛加白芷各五分 沉香各五分

將產催生神效。

催生益母丸

益母草五月五日採莖陰乾。不令見日。忌鐵器。研末半斤。

車前子一兩 研

冬葵子

枳殼

牛膝各五錢

為末。蜜丸。彈子大。每服一丸。臨產以酒和童便化送。米湯亦可。如體

氣不順。腰痛陣痛。血先行太多。欲產未產。加川芎當歸生地各二錢 煎

湯磨木香二錢 入藥。如虛暈加人參五分 夏月熱產加滑石一錢五分 甘草三錢 煎送。冬

月冷產加官桂三分 煎送。

當漿水頻下時服。

施氏催生丹

人參

乳香焙去油 各一錢

辰砂五釐

為末。白酒送。白湯亦可。

保產撮要

產婦房中。宜老成安靜者二三人。坐守。夏月更不宜多。恐熱氣壅盛。能令產母發暈。宜輕言緩步。不可大驚小怪。宜勸安睡待時。不可交頭接耳。致令憂疑。水溫再易涼者。宜預燒紅秤錘。置醋瓶。以防產畢血暈。宜預煎生化湯。以候兒下地。即服。

產婦第一宜慢臨盆。蓋早必採腰擦肚。若係試痛。則生採強取而出。即或

正生。恐兒身未轉。逼之則有橫逆之異。惟忍痛以待。產母手中指節或本節跳動。此時渾身骨節疎解。胸前陷下。腰腹重墜。大小便齊急。目中金花爆濺。此乃瓜熟蒂落之候。臨盆用力得其時矣。

產婦切忌聽穩婆言。蓋此輩惟利自圖。不顧他人性命。一進門來。卽令坐草。或適當其時。則誇自己手段高強。如非其時。欲了此適彼。則生採活剝。甚有逼死胎兒在腹。用碎割之法。以見己功。借此尙欲居奇射利。以至母則受傷。子則慘死。禍不勝言。

〔吳按〕既有此輩。在我用他。不可他用我。

臨產全賴養精神。惜氣力。夫欲惜力。莫如安睡。欲養精神。全賴藥食。故產婦能上床安睡。務令閉目靜養。卽或時至。何妨產下褲中。能進飲食。凡無大礙。適意之物。不妨隨意食之。以壯神力。如不欲飲食。亦當將雞鴨肉清汁湯。或補藥食。勉強飲之。以接神力。

臨產催生藥。切忌兔腦鼠腎二丸。并回生丹。蓋兔腦二丸。例用香竄之味。產時百脈解散。氣血虧虛。服此散氣之藥。至兒出而香味未消。其損多矣。且令毛竅開張。招風入內。禍不可言。若回生丹。以大黃紅花爲君。其餘亦多消導。夫產婦血已耗。而又破多。致產後發熱等症。夫此二方。古今稱爲靈寶者。尙如此。外此更無論矣。如必須用藥。莫若加味芎歸湯。佛手散。二方頓去宿血。驟生新血。有益無損。可稱易得而利產者也。慎勿以熟方忽之。

加味芎歸湯 專治交骨不開。子死腹中。

當歸 一兩 川芎 七錢

頭髮 婦人油髮雞子大一丸。瓦上焙存性。

佛手散 治一切難產等症

當歸 五錢 川芎 三錢

中。加黑馬料豆 一合炒黑

一服。無不效。

竹林寺真傳生化湯論

產後血氣大虛。理應大補。但惡露未盡。用補須知無滯血。能化又能生。攻塊無損元氣。行中又得補。方謂萬全無失。世以四物湯理產後。誤人多矣。因地黃性寒滯血。芍藥酸斂滯血。無補故也。產後惡露作塊痛。名曰兒枕。世多專用逍遙散。然後議補。又有消補混施。終無成效。不知舊血雖急當消化。新血亦宜生養。若專攻舊血。則新血亦不甯矣。世以濟坤丸又名回生丹。用以攻塊下胎落胎。雖見速效。其元氣未免虧損。即幸平安。究非良劑。不得已。而用以下胞下胎。只可一丸。決不宜多服。蓋生化湯因藥性功用而立名者也。夫產後血塊宜消。新血宜生。若專消則新血不甯。專生則舊血反滯。考藥性川芎當歸桃仁三品。善破惡血。驟生新血。佐以炙黑乾姜甘草。引三品入於脾肝。生血理氣。五味共方。則行中有補。化中有生。實產後之要藥也。故名曰生化湯。凡病起於氣血之衰。脾胃之虛。而產後則

龜板 手掌大一片。醋炙研細末。

水煎服。

水七分酒三分。煎服。如橫生倒產。子死腹

乘熱入水中。加童便一半。煎上藥服。少刻再進

血氣脾胃之衰尤甚。是以丹溪先生論產後曰。必當大補氣血以爲先。雖兼他症。以未治之。此三言已盡醫產之大旨。若能擴充其意。用藥立方。則治產可以無大過矣。夫產後驚憂勞倦。血氣暴虛。諸症乘虛易入。如有氣無專耗散。或有食勿輕消導。熱不可用芩連。寒不可用桂附。寒則血塊凝滯。熱則新血崩流。至若中虛外感。見三陽表症之多。似可汗也。在產後而用麻黃。則重竭其陽。見三陰裏症之多。似可下也。在產後而用承氣。則重亡其陰。耳聾脇痛。乃肝腎虛。惡血之停。休用柴胡。謔語汗出。乃元氣虛弱。似邪之症。勿同胃實。厥有陽氣之衰。難分寒熱。非大補不能回陽而起弱。因血虛之虧。不論剛柔。非滋榮不能舒筋而活絡。又如乍寒乍熱。發作有期。症似瘧也。若以瘧治。則遷延難愈。神不守舍。言語無倫。病似邪也。若以邪治。危亡可待。去血多而大便結燥。茯苓加於生化。非潤燥承氣之能通。患汗多而小便短澀。六君子倍用參芪茯苓。必生液助津之可利。加參生化頻服。救產後之危。長生生活命屢用。麩絕穀之症。額散脫肛。多是氣血下陷。補中益氣之湯堪用。口噤拳攣。乃因血燥類風。加參生化之湯宜服。若產戶入風而痛甚。宜用羌活養榮湯。玉門寒冷而不閉。洗宜蛇床黃硫磺。怔忡驚悸。生化遠志安神之藥。似邪恍惚。安神丸助歸脾。因氣而滿悶虛煩。生化湯加木香爲佐。因食而酸噯惡食。六君子加神麩麥芽爲良。蘇木稜蓬。能破惡血。青皮枳殼。最消脹滿。一應耗血散氣之劑。發汗吐下之方。只可施於少壯。豈宜用於產中。大抵新產之後。先問惡露如何。塊痛未除。

未可遽加芪朮。腹中痛止。補中益氣湯無疑。至若亡陽脫汗。氣虛喘促。速服生化加參。是用權也。又以陰亡大熱。血崩厥暈。速服生化原方。乃救急也。王太僕曰。治下補下。制以緩急。緩則道路遠而力微。急則氣味厚而力重。故治產當遵丹溪而固本。服藥法宜效太僕以加頻。凡任生死之奇術。須着意以救危。欲俯仰之無愧。用存心於愛物。此雖未盡產中之詳。然所聞之症。皆緣近鄉治驗為據。未必無小補云。

凡有孕婦之家。照生化湯方於孕至七八月。預製二三帖。至產婦胞衣一破。連煎一帖。候兒下地。於未進食之先。即服其餘二帖。亦相從而進。不論正生小產。年紀少壯。服此方以消血塊。生新血。能保產後一切危症。且長精神。

生化湯

全當歸 酒洗 八錢 川芎 二錢 姜炭 五分 夏 令四分 炙甘草 五分 桃仁 十粒 去皮尖

水煎熟。加陳酒六七匙於藥內服。渣另貯。俟三帖煎完。頭煎服後。合三帖渣於一處。再煎服。此方產後至寶。如虛人見危症。及熱症墮胎。或產後勞甚。身熱頭痛。雖服過二三帖。痛稍安而塊痛未除。又當再製服之。蓋產婦不厭藥頻。况產後諸症。俱以生化湯為君。其餘不過隨症加減而已。

〔吳按〕飲熱童便最妙。

胞衣不下

凡產母纔送孩兒。無力送胞。或因臨盆停久。外乘冷氣。故血道凝澁。及胎前素弱。血氣洞泄。皆能停胞不下。治法惟速服大料生化湯二三帖。使血旺腹和。或兼服益母丸。及鹿角灰。外帖如神膏而已。至如濟坤丸。萬不得已而用之。只可一丸。若朴硝等藥。產後腹內空虛。服之有大害。斷不可用。益母丸

益母草紫花者。不拘多少。端午日收掛。當風陰乾。

石臼內杵末。蜜丸彈子大。臨服生化湯送。

如神膏

草麻仁二兩 雄黃二錢

研成膏。塗產母兩足心。立下胞。下後速去

此膏。遲則腸出。如至誤事。速披開產母頂髮。將此膏敷上頂門。腸即收。收後亦須速去頂上之膏。斷不可至再誤。

產後調護法

凡兒下胞不下。務要坐守。不可睡倒。先剪斷臍帶。用輕物墜住胞帶頭。如寒月。扶產母上床。倚人擁被。置火籠於被內烘之。又頻用熱衣煖腹。但不可使陰戶進風。并頻服大料生化湯。

胞下後須防虛。恐血暈。將預燒紅秤錘投醋瓶中。將瓶口包緊。以瓶嘴向產母鼻孔。遠遠薰之。使收斂神氣。解去穢氣。且免暈厥。

產畢上床。宜高枕靠墊。倚人而坐。切勿睡倒。兩膝宜豎。勿令伸直。令一人以熱手。從心口輕輕揉按至腹間數百次。即飲熱童便一盞。使閉目靜養。但勿睡熟。恐倦極血氣上壅。能致暈厥。

產婦腹中。時用小衣烘熱溫之。雖暑月下體亦不宜蓋單被。至若寒月。長用火烘被內。否則腹寒。血塊不行。且要作痛。

產婦惡血冲心。不知人事。速用韭菜切碎。冬月用根。放有嘴壺內。以熱醋灌入。密札壺口。扶產婦起。以壺嘴向其鼻薰之。卽甦。

產婦七日內。毋洗下部。毋梳頭。以勞神力。毋起早。以冒風寒。毋行走。以動筋骨。至七日後。可用溫水。坐洗下部。但須緊防產門入風。月內毋多言。并勞女工。毋用涼水。以洗手足。卽溫水亦宜少洗。毋要驚恐。毋動怒氣。毋多飲食。切忌房事。動慾火。卽百二十日內。不可勞神過度。產後飲食。較胎前尤宜知忌。毋食重濁。蓋以脾胃大虛。必難消化。卽壅滯經絡。使氣血不通。毋食熱物。使新血不甯。毋食水菓。涼茶。冷水。冷物。使血塊凝結。毋食消導。耗散物。以損氣。毋多飲醇酒。多食鹽味。以燒乾乳汁。

產後藥不厭煩。如無怪症。只服生化湯方足矣。若有他症。則於對症之藥。加數味於生化湯之內。或按集中對症服方。切勿用產室百問方。勿用婦人良方。毋用古人成方。毋用過路醫生丹方。

女科祕要卷六

靜光輪應禪師考定

仁和吳煜茶垞校訂
杭州徐志源句讀

產後便覽

產後七日內。未服生化湯。塊痛未除。可用生化湯以清塊痛。卽三日內已服生化湯二三帖。塊痛猶未除。仍可再服幾帖。其塊痛自除。

產後七日內。未可輕用參朮黃芪。恐塊痛不止。若氣血虛脫。或暈厥。或汗多而厥。或形色脫。口氣漸冷。或煩渴不止。或氣喘急脈脫。皆危急之症。亦須從權多用參芪生化湯以救之。如服後病有生機。又當減去參芪。只服生化湯。以消其塊痛。俟塊痛已止。再用參芪。

暑月產婦服生化湯。本以消塊痛。若腹失蓋護。雖服生化湯。塊痛終不消止。

產婦大便八九日不通。此血少腸燥也。宜用生化湯。加麻仁以通潤之。服歸芎以斤數。自然通順矣。若虛甚。并加入參一二錢。慎勿用大黃等藥以下之。

產後一二日內。已服生化湯二三帖。腹仍痛。然可揉按而止者。此虛也。宜生化湯加入參一二三錢。

〔吳按〕若拒按者實也。宜用加味生化湯。

又產後七日內。感寒冷物。血凝作痛。宜生化湯加肉桂四五分。及至半月外。或一月以上。則服四消丸。及補中益氣湯。

產後危症。從權用參以救也。若係肥人多痰。或暴怒卒中。只宜生化湯。加竹瀝薑汁。

產畢血暈。速服大料生化湯神效。若實由稟弱。或胎前虛症所致。故產後倦厥。服生化湯一帖後。即宜加人參一二錢。連進兩帖可救。至或身熱汗出。氣促咽塞。神昏不舒。及胎前瀉。產後不止。昏昏等症。可於生化湯二帖。加入人參一錢以救急。

產後血崩。暈倦厥去。如身心溫煖。即挖開產婦口。灌加參生化湯。如不下咽。用鵝毛插入喉中。漸漸灌之。灌下腹漸熱。藥不拘數帖。方可活。

產後血崩氣脫。煩躁不甯。目暝似邪。語言不正。速服生化湯。頭煎後。即服定志養榮湯。毋信邪以驚之。此所謂挾血如見鬼也。

產後手足冷厥。或口燥大渴。乃大虛危症。須大補以回生。如服加參生化湯後。猶渴。必用人參麥冬散作茶服。產後日久不食。服藥即吐。用人參一二錢。加薑二三片。陳米一撮。另用新罐煎服。以安胃氣。凡產後諸危症。一日夜內。連服藥三四帖。乃可。若照常法服藥。豈能接將絕之氣。救已急之危耶。

〔吳按〕生穀芽鹽心土煎代茶亦效。

產後厥

產後手足冷厥。發由陰氣虛。陽氣亦虛故也。經曰陽氣衰於下則爲寒厥。厥氣上行。滿脈去形。蓋逆氣上滿於經絡。則神氣浮越。去身而散也。

加參生化理中湯

川芎 一錢

當歸

人參 各三錢

姜炭

炙甘草 各五分

黃芪 一錢

水煎服。服後厥回。痛塊未除。暫減參芪。俟塊痛已除。仍

用參芪加桃仁 粒十五

姜水煎服。如渴加人參 一錢

麥冬 一錢

五味子

十粒

手足微冷。加熟附子 五分

痰加橘紅 五分

竹瀝 半杯

姜汁 二匙

汗多加黃芪 一錢

血塊痛加肉桂 五分

虛甚加人參 錢一二

大便不通。

加麻仁 一錢五分

再服五仁丸。慎勿用承氣湯。至如熱厥。不可用白虎湯。

寒厥不可用四逆湯。蓋產後厥症。氣血兩虛。多脈脫。用藥必須大補。

少佐姜附以回陽也。

產後諸症。俱用生化湯加減。如前條兼症。藥味附載者。後有兼症。可

做而用之。下不備載。

產後氣短汗喘痰嗽聲重

產後氣短。似喘非喘。氣不接續。或兼熱。或兼痰。或痰熱俱兼。皆危急症也。

治當大補血氣。雖有風寒之邪。而兼頭痛發熱之症。惟當重產。專門治傷

寒者。慎勿發散。丹溪云產後切不可發表是也。

加味生化湯

川芎

棗仁 各一錢

當歸 五分

姜炭 四分

炙草 五分

桃仁十五粒 人參二錢

如虛脫厥去。再加入人參錢一二 棗湯煎服。如脈

與形脫將絕。加入人參三四錢

頻灌救。如汗不止。加入人參錢各一 汗多

痰甚。加入人參三錢

竹瀝半杯

姜汁三匙

杏仁十粒

汗多。喘嗽。聲重。加

桔梗。杏仁各五分

無汗喘嗽。加半夏一錢

杏仁十粒

桔梗五分

汗不止。

三四帖後。加黃芪一錢

如產後。汗出氣短。

加參生化湯

川芎 當歸

人參各三錢

桃仁十粒

棗仁炒一錢

浮麥一撮

麻黃根五分

煎服。

胎後氣短。痰嗽。聲重。汗出。

二加生化湯

川芎一錢

當歸三錢

炙甘草四分

杏仁十粒

棗仁炒一錢

桔梗四分

人參二錢

半夏一錢

水煎服。凡產後汗多。氣喘氣短。

出言懶倦之甚。是氣血虛脫。速服上方外。須用醋炭。以防暈。

加味補中益氣湯此方須服生化湯三帖之後。血塊不痛者用。

人參二錢

當歸三錢

炙草五分

川芎一錢

陳皮三分

黃芪八分

山藥

麥冬各一錢

如小便不行。加茯苓八分

切忌

用豬苓。澤瀉。木通等藥。

產後頭痛發熱氣急喘汗

產後頭痛發熱氣急喘汗或喘甚者是氣暴竭或坐起久勞所致宜生化湯加入參治之勿視爲氣實發喘誤投降降氣順氣之藥

加參生化萬安湯

川芎 二錢

當歸 三錢

人參 二三錢

炙甘草 五分

廣皮 三分

杏仁 七粒

如在七日內加黃芪 三錢 棗仁 二錢 麥冬 一錢

夫產後汗喘危症也人皆以參爲助喘而不敢用致莫救者不少今加於芎歸湯內萬安無失又有一等庸醫卽或用參而多加陳皮枳殼以監制之反從耗散切不可信甯獨參湯可保萬全

血虛極產畢卽汗

產後血虛之極產畢卽汗宜服生化湯二三帖消塊痛後服下方

調衛止汗湯

黃芪

麻黃根 各一錢
當歸 二錢

炙草 五分

防風 三分

人參 一錢
五分

虛甚加桂枝 四分

七日外減桂枝勿用如汗多而渴當回

液生脈加麥冬 一錢
五味子 十粒

汗多小便不通津液不足毋用利

水藥有痰毋用半夏生薑只可用橘紅 四分

產後氣血竭汗多形色脫

產後氣暴竭虛汗濺濺然出形色俱脫此危急症難拘常法先定塊痛從權速服調衛參芪湯二三帖救之待產婦少有精神如塊痛未除減去參芪

調衛參芪湯

黃芪一錢五分

人參三四錢

麻黃根

當歸各一錢

甘草炙五分

防風二分

桂枝五分

汗少去桂枝。多加人參。如塊不痛。加棗二枚

口渴禁用半夏。生薑寒熱往來。毋用柴胡等藥。頭痛發熱。毋用麻黃。黃芩。黃連。黃柏等藥。蓋產後汗多。當作亡陰論。陰亡則陽隨而亡。急服上方。或可保全。

產後氣短似喘

產後氣短似喘。氣血猶未竭。補劑可少緩。速服生化湯一二帖。以行血定痛。然後加參。若產時甚勞。及血大崩。形色又脫。而喘急。不特急服加參。生化湯。并且於一時速服兩帖。如遲而照常一帖。死亡立至。若醫者作痰火症治。而誤用枳殼。青皮。貝母。香附。黃柏。黃連等藥。不知誤死多少矣。

加味生化補中益氣湯

川芎一錢

當歸三錢

乾姜四分

炙草五分

人參三錢

桃仁十二粒

茯苓一錢

如汗多不用茯苓。加黃芪一錢。五味子十粒。若

日久食少。聞藥即吐。及誤用寒藥。食寒物以致嘔不納穀者。急用人參二三錢。姜三片。倉米一大撮。用新罐煎服。如汗多氣短。氣喘不受補者。此虛甚之極。不治。

產後汗多口噤筋搐類傷寒

產後汗多。項強。口噤。牙緊。筋搐。類傷寒症。慎勿作傷寒治。難經云。汗多亡

陰。陰亡則陽隨而亡。故曰。汗多無陽。產後血脫。多汗亡陰陽。此危症也。

三加生化湯

川芎 六分

當歸 二錢

黃芪

麻黃根

天麻

棗仁 各一錢

人參 二錢

甘草

荆芥 各四分

防風 三分

棗 三枚

煎服。如脈脫再加人參 二錢

附子 四分

忌食姜葱煎炒。生

冷。如身熱毋用風藥。并勿用芩連梔柏。小便不通。因汗多亡液。毋用利水藥。并毋用小續命湯。愈風湯。即半夏南星亦宜少用。毋信用邪術。法尺符水等事。

產後崩脫暈厥

產後血崩。氣急氣脫。昏亂將絕。或暈厥牙緊。速煎清神返魂湯灌之。如氣將絕。灌藥不下。用鵝毛管插入喉中。以酒杯盛二三分灌之。灌下腹漸溫。不拘帖數。可活。又須另用一人。以熱手從產婦單衣上。由心採按至腹下數百次。

清神返魂湯

川芎 二錢

當歸 四錢

炙甘草 五分

人參 一錢

荆芥

乾姜 各四分

桃仁 十粒

肉桂 五分

棗 二枚

水煎服。如兩手脈

伏。右手脈絕。加麥冬 一錢

五味子 十粒

灌醒後。塊痛未除。減去參等。仍

服生化湯。俟塊痛已除。再加入參黃芪。若血塊已消。減去桃仁肉桂

若瀉加茯苓 三錢

此危症。須一日一夜內。服二三帖。可保終吉。

產後崩泄

產婦日久血崩不止。或如雞子大。或成片。治宜大補脾胃。升舉氣血。消平心火之藥。

升舉大補湯 并治老壯婦人血淋。

白朮 三錢

人參

熟地 各二錢

當歸 二錢五分

黃芪 一錢

炙甘草 五分

升麻

荆芥

白芷

陳皮

黃連 炒

黃柏 炒

羌活 各四分

防風 三分

如泄瀉加澤瀉 五分

蓮子 十粒

減去黃柏。如白帶加半夏。蒼朮 各一錢

產後脾泄不止。

參芪蓮子湯 并治日久不止脾泄症。

人參 二錢

白朮 八分 酒炒

白朮 二錢

當歸 一錢五分

蓮子 十二粒 去心

姜 二片

煎好取藥內蓮子送藥。大忌房勞火動。年久脾泄者。須百餘帖。甚者肚痛。加姜炭 五分。虛甚加人參 二三錢。血崩脾泄症服此方。

活人多矣。但雖有熱。忌用梔柏。芩連。

產後瀉

產後脾胃虛。產畢即瀉。必先服生化湯一帖。第二帖內加扶苓 一錢。肉果

一個。麵包脹。熟。去麩用。

訶子皮 一錢 去油

蓮子 十粒

姜 一片

煎服兩帖後。不止。加入人參 一二錢。

小便不通。因瀉亡津液。切勿用利水藥。

產前久瀉。產後不止。產婦虛脫。從權服下方。以扶其虛。若塊痛不止。俟脫

稍減。去人參、肉果。以除塊痛。

加味參苓生化湯

川芎 一錢 當歸 二錢 乾姜

甘草 各五分

茯苓 一錢五分

山藥 一錢 肉果 一個麵煨

訶子皮 一錢去油 蓮子 七粒

人參 二錢

糯米 一大撮

虛甚多加人參。產後七日外。血塊尚痛。亦服此方。血塊

不痛加白朮 二錢

陳皮 三分

瀉兼熱。毋用梔柏。芩連。有痰。毋用半夏。

瓜蔓瀉兼渴。用生脈散。以回津液。

產後赤白痢

產後七日內。患赤白痢。後重頻仍。最為難治。欲調氣行血。推蕩痢邪。猶慮產後之元氣虛弱。欲滋榮益氣。大補產虛。又恐助邪痢之初盛。其行不損元氣。補不助邪。惟生化湯。去炮姜。加木香順氣。則並治而不悖。再服加味香連丸。以候一二日。視病勢加減。可保無虞。若患褐色後重頻仍。丹溪纂要內。有方論。若產婦素厚產。及一月。可用驅蕩之方。及芩連性寒之藥。若產婦素弱。雖產後月餘。未可峻劑。以行積。再禁口痢。摘刊奇方中。自有治法。慎毋按古方用厚朴。枳殼。以治產痢。宜用香連丸代之。香連丸方在續集。

四加生化湯

川芎 二錢

當歸 四錢

甘草 四分

桃仁 十粒

茯苓 一錢

陳皮 五分

木香 三分

水煎熟。去渣。送香連丸三十粒。如產後已服

生化湯二三帖。產婦精神甚好。可服芩連芍藥之類。若大黃等藥。決

不可用。

產後半月。患痢後重。

加連生化湯

川芎 二錢

當歸 三錢

白芍 酒炒 一錢

黃連 薑汁炒 六分

枳殼 五分

甘草 四分

茯苓 一錢

木香 三分

加紅糖煎服。

產後患血痢久不愈。屬陰虛。宜四物湯加人參。

產後瀉痢。已論立方。大率因初產氣血暴竭。必用生化湯加減。未曾論產

後瀉痢。多由飲食傷脾而得。故重出治法方症。然必先服生化湯。行塊止

痛後。可用後方耳。產痢黃色。乃脾土真氣虛。宜補中益氣湯。加木香。肉果。

久痢元氣下陷。大便不禁。肛門如脫。宜六君子湯。加木香。肉果。乾姜。

傷麵食。宜六君子湯。加麥芽。

停穀。宜六君子湯。加神袖。

停肉食。宜六君子湯。加山查 四個 砂仁 四分 神袖 一錢 胃氣虛弱瀉痢。完

穀不化。宜溫助胃氣。六君子湯。加肉果 一個 木香 四分

胃氣虛。脾氣弱。四肢浮腫。宜補中益氣湯。合五皮飲。

五皮飲

陳皮

桑白皮

大腹皮

茯苓皮

姜皮 各一錢

〔吳按〕亦有以五加易桑白者更妥。

諸症兼嘔吐。加藿香。兼疲加半夏 八分 兼小便短澀。加茯苓 一錢 澤瀉 五分

燈心支三十 瀉久不止。加蓮子十粒 赤痢血多。加姜、砂、木香之類。然不可多用。恐熱則愈行。久痢不止。加人參一錢 黃連一錢 同煎服。

產後嘔不納穀

產後胃氣不和。嘔吐不止。全不納穀。在七日內。血塊未除。當重消塊。佐以溫胃。

安胃行血湯

川芎 人參各一錢 當歸二錢 乾姜 砂仁

藿香各四分 炙甘草五分 桃仁十粒 姜一片 如有汗。不用姜。

七日內外。已服生化湯三四帖。血塊不痛。嘔吐不納穀。

加味六和湯

川芎一錢 當歸 扁豆各二錢 乾姜 荳蔻各四分

甘草三分 人參 茯苓各一錢 藿香三分 山藥一錢五分

陳皮三分 姜一片 煎服。嘔止後。減去二豆蔻。

〔吳按〕扁豆宜用壳。

產後嘔吐。服前一二方。而胃和嘔止痛止。但氣血不行。食少。

調中和胃湯

人參 白朮 當歸 扁豆各一錢 茯苓二錢

甘草 陳皮 乾姜各四分 山藥一錢五分 煎服。

女科祕要卷七

靜光輪應禪師考定

仁和吳煜茶垞校訂
杭州徐志源句讀

產後傷食服消食藥致滿悶

產後形體勞倦。雖少食亦運化羈遲。胸腹欠舒。故無噯酸氣味。不可卽投消導。縱傷食而噯酸惡心惡食飽悶。當於生化湯內佐消導。若血塊消盡。宜以參朮爲主。消導爲佐。若夫因傷諸食。服消食開胃藥多。反損胃氣。必增虛飽滿悶。多不思穀。醫者又誤認原傷食物未消。不敢用補助胃氣之藥。多致不救。予治此症。用長生活命丹。活人多矣。

長生活命丹

人參三四錢

水煎。調鍋底飯焦末服。

〔吳按〕鍋底飯焦卽俗名鍋粬。

產後類外感

產後發熱惡寒頭痛。毋認爲傷寒太陽症。發熱頭痛。乍寒乍冷。或兼腹痛。毋認爲少陽症。皆由氣血兩虛。陰陽不和。而類外感。切不可用麻黃柴胡等發汗。重亡陰血。卽明知虛中真感風寒。口傷冷物。若用藥能調和營衛。諸症自退矣。

加味生化湯

當歸 四錢

川芎 二錢

姜皮 四分

桃仁 十粒

棗 二枚

煎溫服。速服二帖。若諸症未退。加羌活。防風 各四分。服之後。病又不減。

加連根葱 四根

如嘔吐。加藿香 三分。姜 一片。

產後服消耗藥。增滿悶積久成脹。

凡產婦素弱。臨產又勞。氣血不足。胸膈不舒。胃雖納穀。脾難轉舒。若產後即服生化湯。助脾強胃。自無虛中之滿。其產後或中滿膨脹者。大率因傷食而誤用消導。因氣鬱而誤用順散。又因多食冷物而停惡露。又因血虛大便燥結。誤下而愈脹。殊不知產後血氣兩虛。血塊消後。便當大補氣血。以補中虛。治者但知傷食當消。氣鬱當順。惡露當攻。便秘當下。投藥一帖不效。又投一帖。病者醫者。不知新產婦服消耗藥多。滿悶益增。氣不升降。溫熱助邪。積鬱之久。遂成膨脹。醫工以為盡技。病家咎於時氣。又有喜食橘餅。橙丁。中滿助成。豈知消導佐於補中湯。則脾強而所傷之物自消。則氣亦散。助瀉兼行。大便自通。而惡露即行矣。每見誤用消導。耗氣攻下之藥。以致絕穀食久者。用長生生活命丹而更生者。百試百驗。又誤用而致膨脹者。仍用大補益氣之劑。而不至夭折者。十救八九。治者毋以予言為過。予蓋先用人參送鍋焦粉。試引加之。以救絕穀。再遵丹溪醫案。以救絕穀。產後中氣不足。中滿。或噯氣虛飽。及誤用耗氣順氣藥。致膨脹危症。

救誤益氣湯

人參 二錢 虛加二錢

白朮 三錢

白芍

神柚 妙各一錢

大腹皮 洗

陳皮 各四分

當歸 三錢

茯苓 一錢五分

甘草 三分

川芎 七分

如腹脅痛或塊痛加砂仁 五分

腹大痛加吳茱萸 一錢

產後大便不通誤服大黃等藥致成膨脹或腹中痛塊不止

養生化滯湯

川芎

人參

茯苓

酒芍 各一錢

當歸 四錢

陳皮 四分

甘草

香附 各三分

桃仁 十粒

大腹皮 五分

荜蓉 酒洗去甲一錢五分

如脹甚加入人參 二錢

如血塊痛將藥送三消丸以上

三方大率相同可通用俱遵丹溪方加減屢治屢驗然治誤服大黃

必須服歸參至半斤以上大方便通腫脹漸消也

丹溪三消丸

治婦人死血。食積。痰飲等症。

黃連 一兩五錢。內一兩用吳茱萸四錢煎汁炒。五錢用益智仁炒黃色。淨用黃連。

〔吳按〕淨用者去同炒之藥也。

蘿蔔子 一兩五錢炒

川芎

山梔 炒

青皮

山稜 醋炙

莪朮 醋炙各五錢

桃仁 去皮尖十粒

香附 童便浸炒一兩

查肉 一兩

爲末和勻蒸餅爲丸用上煎藥送每服五六十九丸

產後感風寒嗽鼻塞聲重惡寒

產後七日內外感風寒嗽鼻塞聲重惡寒宜服養生化湯加杏仁桔梗如有痰加花粉勿用麻黃以動汗如嗽而血塊不痛用小柴胡湯若患火嗽而聲重痰少面赤毋用涼藥大凡產婦有火并痰嗽必調理產過半月後方

可用寒涼之劑。若半月前。還當重產。丹溪云產後不可發表。蓋因其虛也。產後七日內外。感風寒嗽。鼻塞聲重。

加味生化湯

川芎 一錢

當歸 二錢五分

桃仁 十粒

甘草

桔梗 各四分

知母 八分

有痰加花粉。姜煎服。虛弱有汗嗽。加入參一二錢。

產後半月內外。患嗽。有聲痰少。

加味生化湯

川芎

當歸

白芍 各三錢

訶子皮

瓜蒌仁

知母 各一錢

甘草

兜鈴

桔梗 各四分

款冬花 六分

姜水煎服。

產後虛弱。百日內患風寒嗽。聲重有痰。或身熱頭痛。無汗。

加參甯肺止咳生化湯

川芎

知母

訶子皮

瓜蒌仁

生地 各一錢

當歸 三錢

兜鈴

桔梗

甘草 各四分

款冬花 六分

煎服。

產後類瘧

產後半月內外。感寒熱往來。或午。或日晡。或夜間。發寒熱。其發有期。其症類瘧。此由血氣並弱。陽虛寒作。而陰虛發熱也。慎勿以瘧治。雖柴胡亦不可用。惟調補氣血。而寒熱自除矣。毋用芩。連。梔。柏。以退熱。毋用草果。檳榔。

常山。以絕瘧。如汗。氣短。加人參。黃芪。熱加當歸。人參。若產已及一月。其人尙虛。有患瘧症。則用人參養胃湯。加減調理。再煎參朮膏服。仲景云。傷寒寒熱往來。一日二三度發者。陰陽俱虛。不可更發汗。更下。更吐。與此意同。產後半月內外類瘧。

加味生化湯

川芎

人參

白朮各一錢

當歸

青皮各二錢

甘草三分

茯苓

藿香各八分

烏梅一個

汗多加黃芪。棗仁各一錢

產後已及一月類瘧。

參朮湯

人參二錢五分

白朮

當歸

茯苓

半夏各一錢

草果三分

甘草

青皮各四分

藿香五分

烏梅三個

水煎服。再服參朮膏。

參朮膏

白朮洗淨焙乾

人參各四兩

用水六碗。煎汁碗半。再將渣如法煎三次。共

取汁六碗。每日服半酒盃。以上藥調服。或白湯下亦可。

產後惡露凝結成塊虛症百出

產後兒下地時。惡露隨下。則腹無塊痛。而自舒暢。若腹失蓋被。或傷寒涼物。則惡露凝結成塊。虛症百出。腹脹。身熱。骨蒸。五心煩熱。食少羸瘦。或似

瘧。或月水不行。或塊在兩脅作痛。腸作雷鳴。嘈雜眩暈。身熱時作時止等症。治法當遵丹溪所云。欲泄其邪。先補其虛。用補中益氣湯。送三消丸。使塊消而人不弱。若消塊無補。非惟塊不可消盡。將食日減。甚至絕穀。

加減補中益氣湯

人參

白芍

黃芪各一錢

白朮二錢

當歸二錢

陳皮

甘草各四分

姜三片

水煎。送三消丸五六十九。

產後大便不通

產後大便不通。因血少腸燥。在虛弱產婦。若多服生化湯。則氣旺血盛。自無便澁之症。治者切勿用芒硝。大黃等藥下之。使重亡津液。便閉愈甚。致成脹滿。或致瀉不止者。惟當以生化湯加減治之。

助血調腸湯

川芎八錢

當歸四錢

桃仁十粒

炙甘草五分

陳皮四分

麻仁炒研一錢五分

如血塊痛。加肉桂。元胡索各五分

水煎。食前稍熱服。氣虛

汗。加人參黃芪各一錢

汗多而渴。加人參。麥冬各一錢五分。五味子八粒

如大

便燥結。十日以上。肛門必有燥糞。用蜜棗納入肛門。其糞自化。或用

麻油。竹管吹入肛門。或用豬膽汁亦可。

煎蜜棗法

以白蜜煎褐色成膏。入水成棗。

產後妄言妄見

產後妄言妄見。由氣血大虛。精奪神昏。妄有所見。而妄言也。輕則夢中呢喃。重則不睡亦語。又有痰乘虛客於中焦。以致五官失其職。視聽言動。俱有虛妄。毋認邪鬼。誤用符水。以致不效。朱丹溪云。虛症有似邪祟是也。屢治此症。服藥多。方能見效。

〔吳按〕痰火逆傳心胞。為虛中實症。急治不任攻伐。緩恐成痼疾。况值產後。尤以扶正驅邪。消息而醫之。產後三日內。血塊未除。患妄言妄見症。服下方三四帖後加減。

加味安神生化湯

川芎 二錢

當歸 四錢

茯苓 一錢

甘草 四分

乾姜 四分

桃仁 十粒

棗仁 一錢

棗 二枚

水煎。食遠服。

產後三日內外。血塊不痛。妄言妄見。心極之症。服下方。但見平穩。雖未見大效。候藥力充足。諸症方除。蓋除症二十帖外。方見全效。

益榮安神湯

川芎 一錢

當歸 三錢

茯苓

人參

柏子仁

棗仁 各一錢

甘草 五分

龍眼肉 八個

陳皮 去白

竹茹 四分

如汗。加黃芪。麻黃

根 各一錢

瀉加白朮 一錢

大便不

忌大下發汗。

產後少乳

產後乳汁不通。或乳少。

通脈湯

生黃芪 一兩

當歸

白芷 共五錢

孔豬蹄 一對

將豬蹄煮湯。吹

去浮油煎藥一大碗服。服後被覆面睡一覺。即有乳。或未效。再一服。無不通矣。若新產無乳。不用豬蹄。只以藥料用水和酒各半煎服。體壯者加好紅花三四分。以消惡露。

〔吳按〕黃芪當歸補血湯也。再加王不留行。通草葉。饅頭。臥時煎服。乳即湧出。屢經試驗。

產後育子乳少。無錢僱乳母。勉強乳子。以至母子俱疲。日食減少。急斷兒乳。連服下方。

參朮地黃湯

川芎

當歸

黃芪

茯苓

麥冬

各一錢

炙草

五分

五味子

十粒

人參

熟地

白朮

各二錢

陳皮

四分

棗

二箇

如發熱兼作骨蒸。兼服紫河車丸。驚悸有汗。加

棗仁

五錢

產後乳癰

產後生乳癰未成膿。

瓜蒞乳沒散

瓜蒞

一個連皮搗碎

當歸

銀花

白芷

各一錢

青皮

乳香

沒藥

甘草

各五分

水煎服

此方并治胎前乳癰。

〔吳按〕未潰時用蒲公英一兩。酒煮搗爛。先飲酒。將渣敷患處。屢效。

產後乳生癰膿出後虛弱甚。

十全大補銀花湯

人參 白朮 熟地 黃芪各二錢
 當歸 銀花各三錢 茯苓 川芎各八分
 甘草五分 如泄瀉加蓮子十粒 肉果一個
 產後乳生癰已破出膿寒熱往來如瘧一日一發或二三日一發不可作
 瘧治不可全用攻毒消癰藥亦不可用絕瘧等藥當補氣血少佐去毒之
 劑數品以除餘邪。

補中去毒散

- 黃芪
- 生地各二錢
- 白芷五分
- 銀花
- 甘草
- 烏梅一個
- 茯苓各一錢
- 連翹各四分
- 棗一枚
- 人參
- 當歸二錢
- 白朮
- 青皮三分

女科祕要卷八

靜光輪應禪師考定

仁和吳煜茶垞校訂
杭州徐志源句讀

方症補遺

婦人以氣血為主。心主血。肝藏血。若血弱氣盛。由心虛不能生血。心火又不能制肺金。使肝虧虛。則血不藏。以致血枯涸。不榮經絡。月信不調。治宜補心源。以抑肺金之氣。和營養衛。血脈自然調和。

補心湯

茯苓

川芎

地黃

當歸各二錢

陳皮

半夏

桔梗

枳殼各錢半

前胡

甘草

甘葛

蘇葉

木香

人參各一錢

姜二片

棗五枚

煎服

月信攢前為熱。宜用涼藥以退熱。退後為虛。宜用溫藥以補虛。分而為二。皆審而用之。然能服養血益血補脾胃諸藥。而經自生矣。

正經養血湯

白芍酒炒

當歸酒洗

茯苓

白朮土炒

阿膠蛤粉炒各二錢

炙草

川椒炒

五味子各一錢

姜半夏

人參各七分

柴胡八分

姜三片

水煎稍熱。食前服。如五心煩熱。日晡潮熱。加

胡連五分。不思飲食。加神朮。麥芽炒各五分。頭痛加川芎七分。煎服。

婦女經水不行。時作脹痛。

行經紅花湯

歸尾 赤芍 牛膝 元胡 紅花

蘇木 桃仁泥 紫葳花 劉寄奴各一錢

青皮 香附各八分 桂枝五分 水煎空心服。

婦女月經不通。或積瘀血。時作腹痛。攻刺小腹。堅硬有塊。

通經散

劉寄奴二錢 歸尾 赤芍 紅花 川山甲炒

元胡 莪朮醋炒 烏藥 丹皮酒炒 川牛膝酒洗

山稜醋炒各一兩 辰砂三錢另研 官桂三錢 共為末。每服二錢。空心熱酒下。

或薄荷湯和醋送。此方大能通經。用之於血滯者則可。若對症者畏而不。服。此養病自害也。然後能服之。尙未有誤。

婦人血熱。經水先期。氣旺痰火者。服下方易孕。

加味調經丸

香附五斤。分五分。一斤用鹽水浸。一斤用醋浸。一斤用童便浸。一斤用無灰酒浸。一斤用葱五斤。取白切細。拌香附焙乾。以葱白黃香誘度。

當歸 白芍 生地各四兩

黃連 黃芩各三兩 川芎 杏仁

柴胡各二兩 白芷二兩 滑石水飛淨五兩 荊芥五兩 為末。醋麵糊丸。空

心白湯下八十丸。

婦人羸弱。血虛有熱。經水不調。赤白帶下。不能成胎。及骨蒸等症。服下方有孕。

烏雞丸

白毛烏骨雞一隻

要肥重者。閉死。去毛腸洗淨。同京酒。和水。并雞。放砂罐內。煨獨雞二寸。以文武火煮極熟。拆去骨。搗爛作餅。瓦上焙乾。為細末。

熟地

當歸各三兩

白芍酒炒

生地

川芎

白朮

黃芪

人參

杜仲菘炒

知母酒炒

茯苓

砂仁

續斷酒炒

鹿角膠各二兩

川牛膝酒浸一兩五錢

為末。先將鹿角膠用酒鎔化。入藥內搗勻。再以山藥半斤為末。酒糊丸。每早晨溫酒送六十九丸。漸加至八九十九丸。或米湯送亦可。忌煎炒。辛辣物。并菹菜。

論婦人崩漏。失血過多。由氣血俱虛。損傷子宮血海也。血氣之行。外循經絡。內榮臟腑。重則為崩。輕則為漏。而衝任之氣虛。不能約制其經血。故脾不能統血。肝不能藏血。忽然血崩暴下。此等症候。皆由氣血虛。脾胃先損。能受補者可治。若醫者誤用止澁寒涼之劑。復傷脾胃生氣。使血反不歸經矣。

〔吳按〕不受補者。將成癆症難治。

補中養胃湯

人參

白朮

當歸頭

側柏葉炒

生地各一錢

炙甘草 五分

茯苓

川芎

紫蘇 各八分

水煎服。如血暈加

荆芥 澤蘭葉 各八分

虛汗

加炙黃芪 一錢

棗仁 八分

崩中日久。白帶不

止。加龍骨 牡蠣 煨各一錢

血來不止

加舊棕 燒灰

綿灰 各三分

經血得熱。崩

漏不止。口苦咽乾。小便短。大便燥結。加黃連。黃芩。山梔 各五分

紫黑如泥。凝塊者。亦常用之。

俱酒炒

血多而

婦人血崩不止。由胃弱陰虛。不能鎖胞絡相火。故血走成崩。

涼血湯

當歸

黃柏

地黃 各一錢

黃芩

黃連

細辛 二分

知母

防風

荆芥 各八分

甘草

蔓荊

羌活 各六分

藁本 四分

升麻 各三分

水煎食前服。

水煎食前服。

婦人大怒後。經血暴下。

養血平肝散

當歸

香附 各二錢

川芎

白芍

青皮 醋炒

柴胡 各一錢

甘草 三分

水煎食前服。

婦人胎前產後。崩漏。虛損諸症。

加味四物丸

川芎

當歸 酒洗

酒芍

人參

黃芩 蜜炙

陳皮 各一錢

熟地 酒蒸

白朮 炒

鹿角膠 各一兩

黃芩 蜜炙

砂仁 五錢

為末，蜜丸，每服八十九丸，空心白湯下。

婦人月經不斷，崩漏帶下。

九霄丸

艾葉 酒浸一宿，煮乾為度 牡蠣 鹽泥包煨

龍骨 煨各一兩

赤石脂 醋煨七次，一兩五錢

吳茱萸 酒蒸各七錢 當歸 酒蒸各七錢

為末，酒丸，每服三四十九丸，酒送，或淡鹽湯

亦可

論婦人赤白帶症，皆榮衛滯氣之所成也。赤者屬榮，白者屬衛，乃病之常。然其症皆因喜、怒、憂、思，素有濕熱，傷於榮衛胞絡，使濁氣滲入膀胱，故流帶下，輕則來而不來，重則來而無度，使腰膝酸痛，飲食減常，精神短少。法當清上竇下，清濁自分，理脾養氣，濕熱自解，更能薄滋味，然後溫補下元，則帶症自除矣。

帶症經驗方

當歸

生地

酒芍

川芎

白朮

蓮肉

白雞冠花子 各一錢

炙甘草 七分

扁豆花 炒七分，白者

治赤帶

水煎，食遠微熱服，如瘦人熱多加黃連、黃柏、香附 各五分，肥人多

濕痰加蒼朮、天南星、半夏 各六分，椿根皮 一錢，久下加熟地 一錢，山某

黃 八分，氣虛加人參、黃芪 各七分，赤帶加黃芩 一錢，酒炒，荆芥 六分，腹痛加

煨姜 一片，或云加葵花 五朵，更煨，白者治白，赤者治赤。

〔吳按〕以紅白鮮木槿花，同海螵蛸煨湯飲之，甚效。

赤白帶有時腹痛

丹溪經驗方

龜板酒炙一兩

黃柏

枳殼各五錢

乾姜三錢炒

為末醋糊丸日二

服白湯下。

又方

人參 黃芩酒炒

黃柏酒炒

柴胡

陳皮各一錢 炙甘草

乾姜各六分

郁李仁酒蒸一錢

葵花子一錢赤用赤白用白

水煎服。

婦人骨蒸勞熱咳嗽或汗或無汗。

清金養血湯

當歸一錢 白芍

香附

麥冬

生地 丹皮

地骨皮

川芎各六分

甘草三分 五味子九粒

水煎服。

婦人瘦怯不孕。以子宮血少故也。養血滋陰。自然血足而孕。

養榮丸

川芎 歸身

酒芍

茯苓

山藥炒

黃肉 知母炒各二兩

熟地酒蒸

丹皮酒洗

澤瀉一兩五錢

黃柏酒炒四兩

為末。蜜丸。每服八九十九丸。空心鹽湯下。如冬月酒下。

求嗣經驗育孕方

紫河車 一具要頭產男胎懸胎帶

丹雄雞腎 八對要赤尾童雞候合藥日煮

乾益母草 細末三兩

熟地 六兩

茯苓 三兩

黃肉 三兩

上藥共為末揀壬子日脩合蜜

丸龍眼大待經事盡空心服一二丸用臘酒化送連服三日又候下月經盡如前服之以受孕為度已孕不可再服服時忌煎炒姜椒葱蒜辛熱等物。

〔單按〕胎衣有毒而難覓亦未見真實效驗古無此藥不必用為是。

婦人氣虛血弱子宮寒不孕宜服下種子奇方。

加味濟坤大造丸

紫河車 一具須壯婦人頭產男胎連帶者洗淨用砂罐內隔竹片三五根剪蒲包一塊架住放河車蒲包上不用白酒不可令胞粘著取酒氣蒸極熱。

人參 一兩五錢

當歸

生地 酒洗蒸熟各二兩

山藥

天冬 去心

牛膝 酒浸各一兩

黃柏 炒

杜仲 薑汁酒炒斷絲各八錢

麥冬 去心一兩五錢

五味子 五錢

如虛弱多汗潮熱加黃芪地骨皮知母 各一兩 脾胃弱久

瀉加白朮蓮肉 各一兩

血虛驚悸少睡加棗仁 炒一兩

元眼肉 二兩

共為

末搗河車於內使極勻空心每服六七十丸

女科祕旨卷一

輪應禪師纂

仁和吳煜茶垞校訂
杭州徐志源句讀

安胎論

凡孕婦脾胃旺。氣血充足。則胎安產正。子亦多壽。何用安胎。若氣血衰。脾胃弱而飲食少。則虛症百出。或孕成數墜。而子不壽。是必資藥力以助母胎。並壽子也。夫精血會凝而成孕。精氣蒸胃而遂嘔。血少肝虛。加愛醋物。胃氣受傷。厭阻飲食。若人素弱。嘔阻。橘半量加。稟孕而然。竹瀝。姜汁。胎痛宜緩。少加帶殼砂仁。胎漏宜涼。須用地黃生熟。至若傾撲動胎下血。膠艾宜加。怒氣胎遂上衝。木香爲使。小便短濇成淋瀝。安榮不應。用升提。若還滯血流於脬。逍遙。梔子宜加入。子腫面目虛浮。而肢體水氣。全生白朮。堪醫子煩心驚膽怯。而時見悶煩。竹葉安胎可療。天仙藤治子氣。腳縫水出。人虛多用朮參。鈴羊角理子癇。項強筋搐。應用人參竹瀝。脾氣虛而胎壓尿胞。則臍腹痛而小便淋閉。安胎飲雖宜。法當升提探吐。脾氣弱而轉運淹遲。則飲食停而胃家脹嘔。安胎飲力緩加參。平胃調和。又若胃滿腹脹。便閉偏身浮腫。鯉魚湯治胎水攸宜。恐脾胃氣虛。四君。五皮爲佐。胎氣上攻。心腹脹痛。紫蘇飲療子懸甚當。若食少晡熱。逍遙加味相兼。柴前梅連爲丸。骨蒸勞熱可退。當歸六黃作引。盜汗晡熱堪除。孕成屢墮。因母血弱。

不能分陰其胎。媿子無氣。由母氣虛。僅可滋榮於己。老夫得其少婦。須寡慾以候經期。壯陽若遇衰陰。必宜頻藥以全胎力。參朮條芩。為安胎之聖藥。芎歸懷熟。實補血之良規。佐以蘇葉陳皮。可為常服之方。孕成六月之前。其胎尚未轉運。扶芩性降。不宜多用。黃芪肥胎。豈可常加。香附雖胎喘宜加。久服虛人有害。砂仁可止嘔定痛。多用動血行胎。歷考丹溪之論。不過數言。安胎之方。止於三四。若能加減治病。可以十全八九矣。

辨胎歌

肝為血令肺為氣。血為榮令氣為衛。榮衛和諧胎必成。血衰氣盛未有體。寸微關滑尺帶數。流利往來如雀啄。孕婦之脈已見形。數月懷胎休認錯。三部浮沈平正等。尺按不絕胎其確。無止方是滑而且散三月胎。散者。心脈三月。心胞養胎故爾。

但滑不散五月母。

經云。婦人手少陰脈動甚者。姙也。動如豆。厥厥動搖也。心主血。胎成則血聚護胎。故心脈動。或亦有不動而胎者。乃作足少陰非也。蓋動者壯婦血盛也。不動者弱婦血少也。陰搏陽別。謂之有子。左陰右陽。尺陰寸陽。沈陰浮陽。搏者欲動於手也。胎必熱。故脈搏。陰者胎之所居也。婦人時時脈血而轉筋者。輒輒時動而動者。非輒。婦人寸口脈衝浮而大。榮反弱。浮大氣強。反弱血少。孤陽獨呼。陰不能吸。二氣不停。衝強榮弱。積為陰寒。陽為聚熱。陽盛不潤。經絡不足。陰虛陽旺。故令少血。時發喘澀。咽燥汗出。或復稠數。多吐涎沫。乃是重虛津液。漏泄經也。

一男一
女。
左手帶縱兩個兒。右手帶橫一雙女。夫乘妻為縱。妻乘夫為橫。左手脈逆生三男。右手脈盛生三女。子乘母為逆氣。母乘子為順氣。

又男胎居左。女胎居右。胎之所居。氣血聚焉。其脈滑利而盛。故左盛則男。右盛則女。嘗觀癰癤發上。則寸脈盛。發下。則尺脈盛。發左。則左脈盛。發右。則右脈盛。此所以悟胎居之理也。

驗胎散

真雀腦芎一兩

當歸全用七錢

為細末。作兩股。濃煎膠湯一盞。酒調服。服

後二二三時覺臍腹作動。此有胎也。動罷即愈。安穩無虞。如不是。胎不動。所滯惡物自行。如一服不覺。再煎紅花湯調下。一服必效。

探胎散

皂角去皮

炙甘草各一錢

黃連五分

為末。溫酒調服。有胎則吐。無胎

不吐。

一法經水三月不行。用川芎三錢

為末。煎艾湯調服。服後一時腹內

微動。非胎不動。大約尺脈調而不月水者。孕也。如經閉。脈必不正。或不

養胎

婦人童幼。天癸未行之先屬少陰。天癸既行屬厥陰。天癸既絕屬太陰。或妊娠養胎。始於厥陰者。是祖氣生化之原也。陰陽配合。故次及少陽膽經。五行相生。正是肝膽之木。次及胞絡。三焦之火。歷脾、腎、肺、大腸、胃、膀胱而終。十月之期焉。惟手少陰、太陽、二經。無專養者。君主之官。無為而已。

一月肝足厥陰經。

二月膽足少陽經。

三月胞絡手厥陰經。

四月三焦手少陽經。

五月脾足太陰經。

六月胃足陽明經。

七月肺手太陰經。

八月大腸手陽明經。

九月腎足少陰經。

十月膀胱足太陽經。

按回回國譯天文書。七曜相照所屬與前不同。今併載以備參考。

時初

胎宮極熱。將外膚蒸乾後為胞衣。

一月土星照。

二月木星照。色變紅。

三月火星照。心肝腦成。

四月太陽照。身體全成。

五月金星照。毛髮成。

六月水星照。舌動。口開。

七月太陰照。此月胎中有力。若是月生。養得長成。

八月又土星照。土星性燥。胎氣動。兒皆沈。是月生。養不長成。

九月又水星照。熱潤。有力轉動。

十月既足。炁全力生。

安胎

安胎之法。以養血氣。理脾胃爲主。白朮益脾。以培萬物之母。條芩固中。瀉火氣。能滋子戶之陰。使火不妄動。所以爲安胎聖藥。砂仁安胎。以其止痛行氣。故耳。勞神動怒。情慾之火。俱能墮胎。推原其本。皆因於熱。火能消物。造化自然。古方謂風冷傷於子宮。而墮。未達病情者也。如慣墮胎之婦。或中氣不調。食少。且不必養血。先理脾胃。次服補中益氣湯。使氣血自生。因母病而動胎者。但治母病。其胎自安。因胎病而致母病者。但安胎則母病自愈。胎多在三月分而墮者。爾時手厥陰心胞絡。主養胎元。勞心多慮。心胞絡虛。不能養胎。則墮。治宜兼制火。用四物湯加黃柏。元參。白朮。條芩。左脈微弱。身痛。夜熱。腰痛。胎不安。屬血虛。用四物湯加杜仲。黃芩。白朮。秦

朮。右脈寸關大而無力。似滑。且不流利。倦怠懶於言動。屬氣虛。用補中益氣湯。加山藥。杜仲。條芩。

兩手脈俱弱。胎常墜。屬氣血兩虛。用八珍湯。加山梔。杜仲。續斷。條芩。白朮。孕婦忽然下黃汁如膠。或如豆汁。胎動腹痛。是氣虛也。用佛手散。加黃芪。糯米。濃煎汁服。如腹不痛。單用芪。糯米。佛手散方見秘要。

孕婦下赤汁。屬血虛有火。正方用子芩。當歸。川芎。煎服。若奇兵則用銀芩酒。

銀芩酒

芩根 去黑皮研碎五錢 白銀 一兩

以水酒各半煎服。

治胎動不安。一法取苧根。如足指大者一尺煎服。即愈。丹溪云。以苧根能補血行滯也。

懷胎宜養血。益氣。健脾。清火。當常服固胎飲。

固胎飲

川芎 一錢

當歸

白芍

熟地 各二錢

人參

白朮

陳皮

甘草 各一錢

少佐黃連。黃柏。桑上上羊兒藤。要七葉完全者

糯米 一錢

如見血不安。加阿膠。痛而氣滯。加縮砂仁。

胎至七月後宜服方。

東胎丸

黃芩 酒炒夏月一兩 秋七錢冬五錢

茯苓 七錢五分

白朮 二兩

陳皮 三兩

為末。粥丸。每服錢五分。

胎至臨月。服東胎散易產。

東胎散 即達生散。

人參 陳皮 各五分

白朮

白芍

全當歸 各一錢

炙甘草 二分 蘇葉 五分

大腹皮 二錢

難產之婦。多氣血虛弱。榮衛滯滯使然。是方用人參。白朮。甘草。以益氣。當歸。芍藥。以益血。紫蘇。腹皮。陳皮。以疏滯氣。則其生易矣。如腹脹或痛。加砂仁。枳殼。青葱 五葉。黃楊腦 七個。有火加黃芩。頭目眩悶。加川芎。如氣虛。倍參。朮。氣實加香附。倍陳皮。血虛倍當歸。加地黃。形實倍

紫蘇性急加黃連熱極加黃芩濕痰加海石半夏食積加山查食後
易飢加黃楊腦腹痛加木香官桂黃芩冬月不可用桂
臨產當服補血順氣藥使胎易產

保生無憂散兼治小產
瘀血腹痛。

南木香

當歸

川芎

白芍

枳殼

乳香

血餘即頭髮洗淨
煨灰各等分

水煎日二服均用
五分

小產

半產多在三個月及五七月除跌撲損傷外若前次懷胎三個月而墮者
下次有孕如期復然蓋先於此時受傷故後期必應乘其虛也必須預服
健脾益氣養榮藥於一有孕之日日日不可缺乃可
胎元不足倦怠或胎動不安或身微熱減食

單氏安胎散

人參

當歸

懷熟地各二錢

白朮二錢五分

條芩八分

陳皮

蘇葉各四分

砂仁三分

如煩渴加麥冬一錢

棗五枚

水煎

服如腰疼脾腿痛必一日夜服三帖可安

嘔吐痰水心煩悶頭重目眩惡聞食氣胎動腰腹痛下血等症用四物湯
加黃芪白朮甘草黃芩阿膠人參桑寄生如無真寄生以結斷代之

女科秘旨卷二

輪應禪師纂

仁和吳煜茶垞校訂
杭州徐志源句讀

惡阻

懷孕三月。惡心而阻隔飲食是也。亦有六七個月。尙病嘔者。治同。然肥人責之痰。瘦人責之火。俱宜二陳湯。加白朮。黃芩。或加香附。砂仁。姜汁。竹茹。與吐家同。如或因氣者。脈必沈。治兼舒鬱。加撫芎。香附不可過用辛藥。妊娠稟受怯弱。便有阻病。狀如病酒。顏色如故。脈息和順。但覺肢體沉重。頭目昏眩。擇食惡食。好酸鹹物。若甚者。則作寒熱。心下憤悶。嘔吐痰水。恍惚不支。古名惡阻。治先脾胃而清火。化痰。如吐甚者。愈止愈吐。仲景云。停藥月餘自安。

孕婦飲食失宜。停滯作嘔。宜和平消導。不可作惡阻治。如脾胃弱者。加入參。白朮。治惡阻必用大半夏湯。加減如頭眩痰多。加旋覆花。有火加姜汁。炒黃連。竹茹。

大半夏湯

半夏

陳皮

茯苓

各二錢五分

生姜

一錢

水煎服。

日久津液損。胃燥乾嘔。不納湯水。用二陳湯合四物湯。加竹瀝。姜汁。潤以降之。此症右脈必弦數。左脈必微弱。味者謂半夏犯胎地黃膩膈。乃知常

而不達變也。

吐多脈弱。體倦不納穀。用六君子湯。加麥蘖。生薑。

左脈弦急。心下脹悶。惡心不止者。挾肝氣上衝也。宜扶苓湯下抑青丸。

抑青丸

黃連 一兩

為末。丸如麻子大。每服白湯下二三十丸。

左脈弱而嘔。當服理血歸脾藥。蓋以無陰而作嘔也。

脇脹或寒熱往來。面色青黃。此木剋土也。宜六君子湯加柴胡。桔梗。枳殼。

兼腰痛胎欲墮。宜二陳湯合四物湯。加白朮。黃芪。黃芩。阿膠。

如脹悶。加縮砂仁。

吐而心煩。用竹茹。麥冬。前胡。橘紅。蘆根。煎湯徐服。

因食冷物。及涼藥。吐不止。以丁香。炮姜。加半夏湯溫之。惡阻漸退。則徐服

後方。

歸苓參附湯

當歸 三錢

川芎 一錢

茯苓

人參

生地

香附子 各二錢

白朮 一錢

黃芩 七分

麥冬 一錢

姜棗引。

吐雖定。每食粥則口酸。此肝火盛。宜用川芎。陳皮。梔子。炒。扶苓。生薑。煎湯

下抑青丸。

吐定之後。須用大補。宜人參。白朮。當歸。黃芪。陳皮。茯苓。煎服。如有火加條

芩。腰痛加杜仲。川斷。每日一服。

暈眩倦怠

單氏參橘飲

人參 一錢

橘紅

藿香

甘草 各四分

白朮

當歸 各二錢

半夏 八分

砂仁 三分

竹茹 四分

如肥人加竹瀝

仲仁治惡阻方

人參

陳皮

竹茹 各一錢

麥冬

木瓜 各三錢

藿香 五分

枇杷葉 三大片無則
蔗根代之

一法妊娠惡食。以所思食任意食之必愈。

胎痛

孕婦腹中不時作痛。或小腹重墜。名曰胎痛。宜地黃當歸湯主之。如不應。加入參。白朮。陳皮。如因血氣。加砂仁。因中氣虛下墜而作痛。則服補中益氣湯。

地黃當歸湯

熟地 三錢

當歸 一錢

煎服

腹作痛升動。先將砂仁二錢炒。研末。白湯調服。即時痛止。或入前方煎服。其效如神。

胎漏

壯實婦人。兩手脈平和。飲食如故。無所苦。而經暗下。此血氣旺。養胎之

餘血也。兒大能飲自不來矣。不必治。然亦不可使之多下。當和血涼血。健脾為主。用佛手散加黃芪。白朮。如不已。加阿膠。去血多。用八珍湯。加膠。艾。一說壯盛婦胎漏。腰腿不酸痛。過於小心。只服安胎飲。孕婦經水蓄於胎。若下漏則本於氣衰。而不能循於經也。胎乾則子損矣。若因熱。用逍遙散。因肝火。用柴胡山梔散。因脾火。用加味歸脾湯。因脾氣虛不能攝血。用補中益氣湯。

胎漏有母因宿疾。子臟為風冷所乘。血氣失度。使胎不安而下血者。有榮經風勝。經血喜動。而時下者。此二症。若作漏胎治。胎必墮。若以一藥治風可止。即不治風亦無害。又有衝任脈虛。不能制經血。則月水時下。若不早治。使血盡則人斃矣。更有氣血虛。血熱風熱。肝火脾火。脾胃虛陷。濕熱鬱怒等而致。治者宜詳察之。

胎損能下也。
胎漏經血妄行。淋漓不已。

桑寄生散

當歸 酒炒

阿膠 蛤粉炒

姜 一片

桑寄生

川芎

煎服 桑寄生安胎妙品。若他樹寄生。有毒不用。

川斷

人參

白朮

白茯苓 各一錢

香附 醋炙

甘草 五分

白芍 炒。蓋以佛手散胎動能安。

胎漏下血

陸氏胎漏方

當歸

川芎 各二錢

人參 七分

白朮 五錢

茯苓 一錢

黃芪 五錢

升麻 五分

香附 三錢

加姜棗引。若胎不轉動。去白朮加蘇梗 五分

二黃散

生地

熟地 各等分

為末。煎白朮。枳殼湯。食前服。每服二錢。

跌撲傷胎

胎為跌撲所傷。以逐汚生新為主。服佛手散神效。如腹動加益母子。服下痛止。母子俱安。若胎已損。則汚血頻下。再加香附 童便製。益母草。陳皮。煎濃汁服。係從高墜下。腹痛。下血。煩悶。加生地。黃芪。補以安之。若腹內大痛。下血。加人參。白朮。茯苓。炙甘草。陳皮。砂仁 研。服。痛甚。加五靈脂 一錢。搗犯胎不安。腰腹痛。或下漿水。血水。或上搶心氣。促用四物湯。加阿膠。黃芪。棗姜引。

損傷胎。腰腹痛。經血淋漓。胎下墜。

陸氏傷胎方

當歸 三錢

川芎

香附

黃芩 各二錢

升麻 一錢

砂仁 一錢五分

姜 三片

棗 二個

單氏治傷胎腹痛。先服安胎散。日一二帖。如不止。再服膠艾安胎飲。

膠艾安胎飲

人參

條芩

阿膠

蛤粉炒

熟地

各一錢

白朮

當歸

各二錢

川芎

八分

紫蘇

陳皮

甘草

各四分

艾葉

八片

加姜棗引。

如感寒頭痛。

加連鬚。

葱頭

四個

腹痛減去艾葉。加帶殼砂

仁四分

胎偶有所傷動。痛不可忍。

救急方

硝砂

連殼炒黑

爲末。熱酒調服二錢。或米飲亦可。服後腹中覺熱。胎即安。

屢試驗。

毒藥傷胎

誤服毒藥。傷胎欲墮。

甘荳竹葉湯

甘草

黑豆

淡竹葉

各等分

煎濃汁服。

服毒藥草藥。下血胎動。

奪命丹

并治小產。子死腹中。

丹皮

茯苓

桂枝

桃仁

赤芍

各等分

爲末丸。淡醋湯嚼下。

胎動

下血而腹重胎動。此胎欲墮也。治宜行氣安胎。急服佛手散。加砂仁。如脈大有火。加黃芩。白朮。腹痛下黃汁。加黃芪。川芎各一兩。糯米一合。水一升。煮

至半升服。

孕婦脈弦急。憎寒壯熱。脣爪俱青。面黃黑色。是胎氣損也。當問胎動否。若不動。反覺上攻。搶心悶絕。或下血。當作死胎治之。

滿悶

有外感風寒。內傷飲食者。用藿香正氣散。有食傷脾胃者。用六君子湯。有陽氣壅滯者。用紫蘇飲。又有常多怒氣。胃腹滿悶。服順氣藥而甚者。宜參歸芩朮湯。

參歸芩朮湯

當歸

人參各二錢

川芎

黃芩各八分

白朮二錢

甘草

紫蘇

陳皮各四分

木香二分

心腹脹滿。氣衝心膈煩悶。并腹脹滿兩脅妨悶。不下飲食。四肢無力。

倉公下氣湯

羌活

赤芍

赤苓

甘草

半夏

檳榔各八分

桂心四分

蘇梗六分

青皮

陳皮

大腹皮

桑白皮各一錢

和勻。每服三錢。姜三片。棗一個。煎服。

心腹脹滿。氣衝心膈煩悶。四肢無力。不思飲食。

訶黎勒散

訶黎勒

赤苓

前胡各一錢

陳皮

大腹皮

桑白皮各七分

枳殼

川芎

白朮各五分 研末。每服四錢。姜棗引。

孕六七月時。脈弦發熱。其胎愈脹。腹痛惡寒。小腹如扇。此子臟虛寒也。

附子湯

附子八分

人參

白朮

茯苓各一錢

芍藥一錢

水煎服。

子腫

面目虛浮。四肢作腫。如水。此皆脾虛不運。清濁不分所致。以補脾分利爲主。當多用參朮。單氏云。或水瀉所致。當服全生白朮散。

全生白朮散

陳皮

白朮

姜皮

大腹皮

茯苓皮各五分

如大便不實。加澤瀉。山藥。扁豆。秦朮。有火加子芩爲末。每服米湯下。

一二錢。

胎水。尋常脾虛腫滿。

五皮飲

大腹皮

桑皮

茯苓皮

陳皮

姜皮各等分

加木香。濃煎汁。半盞服。

〔吳按〕或有以五加易桑皮者。亦妥。

妊娠腹大。胎間有水氣。

三因鯉魚湯

白朮 五兩

茯苓 四兩

當歸

川芎 各二兩

劉片。以鯉魚一尾

洗淨。煮汁。將藥和勻。每服四錢。用魚汁盞半。姜三片。陳皮少許。煎藥空心服。

治子腫

單氏全生白朮散

白朮

當歸 各二錢

人參 一錢

川芎 八分

甘草 三分

陳皮 四分

大腹皮

茯苓皮 各七分

研末服。

大約胃腹脹。小水不通。偏身浮腫。宜三因鯉魚湯。若虛弱以四君子湯。治面目虛浮。肢體如水氣。宜全生白朮散。如不應。用六君子湯。治脾胃虛。濕熱。下部作腫。宜補中益氣湯。加茯苓。治腿足腫。喘悶。或指縫出水。宜天仙藤散。治脾肺氣滯。宜加味歸脾湯。佐以加味逍遙散。治脾氣虛。宜補中益氣湯。

子氣

懷胎三月以後。兩足浮腫。行步艱難。食不甘味。且喘狀如水氣。名曰子氣。古方一主於濕。大率浮腫。因脾虛者多。若喘則因肺腎。蓋以脾主四肢。脾氣虛弱。不能制水。而發腫。肺腎少母氣滋賴。則氣促滿悶。治宜補兼分利。與子腫互考。日腫夜消。如血虛更健脾兼養其血。用川芎。當歸。茯苓。白朮。白芍。陳皮。秦朮。如心下脹。是濁氣礙於上焦。加厚朴。貝母。香附。前胡。大腹皮。蘇葉等。一二味。若喘加杏仁。甚者加炒蘇子。

按此症始自兩足漸至喘悶似水足趾出水謂之子氣乃婦人素有風氣或衝任有血風不可作水妄投湯藥當以天仙藤散主之。

天仙藤散

天仙藤即青木香
洗略炒

香附炒

陳皮

甘草

烏藥各等分

和勻爲末每服三錢姜三片蘇葉三片木瓜三片同煎空

心服三服後腫消此方單氏作煎湯加紫蘇四分如虛加入參白朮

當歸如不效兼服補中健脾之藥

〔吳按〕以後三味另煎水送前藥末。

女科秘旨卷二

輪應禪師纂

仁和吳煜茶垞校訂
杭州徐志源句讀

子懸

胎氣不和，獨氣舉胎而上，湊胃腹脹滿，謂之子懸。然必面不赤，目不青者，方之不然，則胎壞矣。

紫蘇飲

蘇葉 八分

人參

大腹皮

川芎

白芍

陳皮 去白

甘草 各一錢

當歸 酒浸二錢

姜 三片

葱白 一根

空心服。此症挾氣者多，非紫蘇、腹皮、陳皮、川芎，無以疏其氣，非當歸、白芍，無以利其血。氣利血流而胎自下矣。邪之所湊，其氣必虛，故用人參、甘草補之，一補一瀉，推陳而致新也。

單氏子懸方

人參 一錢

白朮

當歸 各二錢

黃芩

川芎 各八分

紫蘇

陳皮

砂仁

甘草 各四分

如有氣加木香 三分 姜水煎

子懸症，雖以紫蘇飲主之。若飲食不甘，兼以四君子。若內熱晡熱，兼以逍遙散。若胃火所致，則用四君子湯加黃芩、枳殼、柴胡、梔子。若脾鬱所致，則

用歸脾湯。加柴胡。枳殼。

子煩

心中煩懣不甯者是也。責之心虛有火。簡易方以竹葉湯主之。若左手寸脈微弱。則服柏子養心丸。或調補心丹。臨臥服。

竹葉湯

白茯苓 二錢 防風 八分

麥冬 二

黃芩 各一錢

竹葉 九片

心驚膽怯。煩悶不安。

單氏竹葉安胎散

人參 棗仁 各一錢

白朮

當歸 各二錢

黃芩

遠志 各八分 川芎 七分

懷生地 一錢五分

竹葉 十片

陳皮 三分

麥冬 一錢 甘草 四分

姜棗引。如煩渴加竹茹一丸。有痰加竹瀝。

姜汁。虛多人參。脾常瀉。減去生地。麥冬。棗仁。

夫人肺臟寒而熱乘於心。則令心煩。停痰積飲。在心胃之間。或冲於心。亦令心煩。若熱而煩者。但熱而已。若有痰飲而煩者。嘔吐涎沫。惡聞食氣。煩躁不安也。治內熱用竹葉湯。痰滯用二陳湯。加白朮。黃芩。枳殼。氣滯用紫蘇飲。氣鬱用分氣飲。加川芎。脾胃虛用六君子湯。加紫蘇。山梔。再人足太陰。脾經之氣。通於口。手少陰。心經之氣。通於舌。若孕婦臟腑氣虛。榮衛不理。陰陽隔絕。熱乘於心脾。津液枯少。故心煩而口乾也。若係胃經實火。竹葉石膏湯。係胃經虛火。人參黃芪散。係胃經虛。補中益氣湯。係脾氣鬱結。

加味歸脾湯。係肺經虛熱。紫蘇飲。係肝經火動。加味逍遙散。係腎經火動。加味地黃丸。

〔吳按〕煩輕躁重。躁為陰虛。陽無所附。虛陽外越。孤陰失守。久則暴脫。經云陰虛無驟補法。計在潛陽。此至精微之旨也。

子癇

孕婦痰涎壅盛阻塞。或時發搐。不省人事。名曰子癇。治宜清氣化痰為主。蓋此症因於氣者多。治法與癇症同。惟劑稍小耳。若惡心甚者。煎二陳湯探吐。吐定則理氣化痰。兼用黃芩。白朮。保胎。古方羚羊角散。葛根湯。藥味偏於辛散。治者當因時制宜可也。

〔吳按〕癇者。俗名羊顛瘋。皆痰火凝聚。心胸男女皆有。最難除根。孕婦子癇。又當別論。

羚羊角散

羚羊角 一錢 當歸 二錢

獨活

五加皮

茯神 各八分

棗仁

米仁 各一錢

防風 五分

川芎

杏仁 各七分

木香 二分

甘草 四分

如虛加入參。若痰氣盛緩。而人參姜引。如

痰多。加竹瀝。姜汁。脾胃弱。加白朮 二錢 五分 研末服。

治臨月因發風疹。悶憤不識人。吐逆眩倒。

〔吳按〕疹必兼咳。以咳止為毒盡。總當辛涼托散。使其外達。而免內陷。不可輕忽。

葛根湯

葛根

貝母

丹皮 各一錢

木防己 六分

防風 八分

當歸

川芎

茯苓

桂枝

澤瀉

甘草

獨活

石膏

人參

水煎服。忌海藻、蔞

菜、酢物。

孕婦無故忽然僵撲。左脈微數。而右脈滑大者。是血虛。陰火炎上。鼓動其痰。四物湯養血。加芩連降火。兼用二陳湯化痰下氣。或加竹瀝姜汁。

子淋

此症以茯苓、燈心、條芩為主。若痰閉上焦。寸關必滑。宜探吐以提之。然必胃膈迷悶乃可。

〔異按〕不可過於通利。亦不宜急用升提。只用葶藶分清飲最妥。

日久倦怠。右脈微弱。屬氣虛。用人參、黃芪、白朮、麥冬、茯苓、加梔子、知母、條芩等。清火藥。

左脈細數。形羸。每便則痛。屬血虛。用四物湯。加黃柏、知母、條芩。濟生方中。治子淋症。用安榮散。煎麥冬湯下。但滑石、細辛二味稍峻。人之虛實。氣血各有不同。達士變而通之可也。安榮散方具秘要中。

單氏子淋方

人參

茯苓

通草

白朮

當歸

麥冬

甘草

燈心

如有痰。宜清肺金。加黃芩

淋閉

臍腹作脹。小便淋閉。蓋孕婦胎繫於腎之間。虛熱而成斯疾。若項強筋攣。

語瀋痰盛。用羚羊角。小便淋痛瀋少。用安樂散。肝經風熱。用加味逍遙散。腿足轉筋。而小便不利。急服入味丸。遲則不救。服燥藥而小便頻數。或不。利。用生地。茯苓。牛膝。黃柏。知母。川芎。當歸。甘草。煎湯。頻數而黃。用四物湯。加黃柏。知母。五味。麥冬。元參。肺氣虛而短少。用補中益氣湯。加山藥。麥冬。陰挺痿痺。而頻數。用地黃丸。熱結膀胱而不利。用五苓散。脾肺燥不能小便。用生黃芩。清肺熱。膀胱陽虛。陰無所化。用腎氣丸。膀胱陰虛。陽無所生。用滋腎丸。

滋腎丸

肉桂 一兩
五錢

黃柏 三兩

知母 二兩

共研末爲丸。

濁血

形體勞苦。或過食炒炙等物。小便中帶血。宜清膀胱。

〔吳按〕小水帶血。頻數而痛。爲血淋。小水清長。帶血不痛。爲虛火。

加味逍遙散

當歸 二錢

白芍

柴胡 各一錢

茯苓

丹皮

山梔 各七
分

白朮 一錢
五分

炙草 四分

遺尿

孕婦遺尿。有虛與熱之分。醫者當審其因。如係脬中有熱。用加味逍遙散。係脾肺氣虛。用補中益氣湯。加益智。係肝腎陰虛。宜六味丸。如孕遺尿。

白薇散

白薇

白芍等分

為末。米飲送下。空心服。

遺尿不知而出。

桑螵蛸散

桑螵蛸七個

炒黃。研為細末。空心米飲下一錢。

轉胞

孕婦六個月以後。覺胎墜。一邊小水不通。其症有因火。有氣虛。有痰滯。有血虛。

兩寸脈弦急。或兩尺絃急有力。兼口乾心煩等火症者。屬熱。宜用冬葵子。滑石。梔子。木通。條芩。白朮。以清之。外以冬葵子。滑石。梔子為末。以田螺研成膏。或生葱搗膏貼臍上。立通。

〔吳按〕譬如水壺。若貯水太滿。則傾之不出。去其上蓋。其嘴即通。亦此理也。

右三部微弱無力。或氣口虛大。兼倦怠不食者。屬氣虛。以補中益氣湯。服下探吐。以提其氣。

左脈不足。或瀉而數。兼夜熱心煩。或大腸閉者。屬血虛。宜四物湯。加黃芩。知母。黃柏。調益元散服。

益元散

滑石六錢

生甘草一錢

共為末。加入前藥服。

〔吳按〕此係六一散。而益元散尚有硃砂也。

肥盛婦人。右寸脈沉滑。症兼惡心。心脹。小水不利。屬痰滯。以二陳湯加青皮。升麻。柴胡。煎服探吐。使藥汁與痰同出。然後用參芪大補之。

大抵有孕。小水不利。月分淺者。當清之。兼保胎。月分多而虛者。當補之。兼升提。治分兩途。

丹溪云。轉胞之症。胎婦之稟賦弱者。憂悶多食厚味者。庸有之。法用四物。二陳。四君子湯。去茯苓。煎服探吐。上竅通。下竅自利。此症彙載甚詳。須當合看。

陸氏謂轉胞係脾氣下陷。塞住胞戶。以致小水不利。非熱閉之故。宜用二陳湯加芎。歸。參。朮。煎服探吐。如不通。再服再探吐。以小水已利爲度。然後用上藥。加升麻十餘帖。如倦怠乏力。則服補中益氣湯。兼六味丸。若急切無丸。以丸藥料合補中益氣湯。煎服。若見效。六味丸宜日服三次。每見治此症。服利小便。或通大便藥。以致胎墮而殞婦命者。豈不惜哉。

〔吳按〕升麻可暫用以升提。不可多服而受害。

單氏云。轉胞由脾胃氣虛。以致胎壓尿胞。

單氏轉胞方

白朮

生地

各一錢五分

陳皮

去白

甘草

柴胡

升麻

各四分

人參

半夏

各一錢

川芎

八分

當歸

二錢

姜

一片

一方

白蘿蔔子

炒香

白湯吞下立通。

一法

空心屢飲鹽湯探吐。則氣上升。使下通行。亦一治法。

中風

孕婦口噤項強。手足縮攣。言語蹇澀。痰涎壅盛。不省人事。可作中風治。用鈴羊角散。若無痰言語如常。但見似中風症。多是血燥類風。切不可用風治。誤人性命。

有毒藥傷胎。狀類中風。牙關緊閉。口不能言。兩手強直握拳。頭低自汗。身微熱。其脈浮而軟。若作中風治。必死。宜用白扁豆二兩。生去皮為末。取新汲水調下。立愈。

中風症中腑者。多著四肢。脈浮惡寒。拘急不仁。宜汗之。中臟者。多著七竅。脣緩失音。耳聾鼻塞。宜下之。表裏皆和。宜治在經。以大藥養之。而佐以安胎。

〔吳按〕中風有真類之分。中臟者多不治。若中腑。血脈經絡為真中。而中皮毛偏枯。為類中。肥人居多。又有瘦人血虛火燥。木旺生風。為內風。虛風。尤難調理。更有偏身關節走痛。為歷節風。蓋風為百病之長。變態最多。當尋源施治。況胎產遇此危症。尤當立方周到。庶可保全母子性命也。

孕婦中風

防風散

防風

當歸 三錢

茯苓 三錢

合溫服。

葛根 各二錢

菊花 一錢五分

甘草 一錢

桑寄生

漢防己 錢半

和勻。每服八錢。加姜五片煎好。入竹瀝半

鈴羊角 各三錢

秦朮 錢半

桂心 六分

細辛 四分

〔垣按〕以硃砂雄黃末酒沖服。外以艾灸手足大指尖上。

中惡

孕婦忽然心腹刺急絞痛。如鬼擊之狀。不可按摩。悶絕欲死。或衄或吐血。以調補正氣為主。治用金銀藤煎湯飲神效。或用熟艾拳大一圓。煮汁頻服。

中惡心腹疼痛

當歸散

當歸

川芎各二兩

丁香六錢

青皮一兩

吳茱萸

五錢用桔槔湯炮炒黑

共和勻為末。溫酒調。每服五錢。

木香散

生地二錢

枳殼

木香各七錢五分

和勻為末。溫酒下二錢。

苦梗散

苦梗一兩炒

生姜五錢

水煎服。

又方

男子汗衣燒灰存性

百沸湯調服。

一法 用鹽水探吐。或用灶心土為末。井水調服。二錢

瘕

心主脈屬火。肝主筋屬氣。氣火相熾。則為瘕。治法平脈降火。兼養氣血。用鈎藤湯加柴胡。山梔。黃芩。白朮。若風痰上湧。加竹瀝。南星。半夏。如風邪急搐。加全蝎。殭蠶。若虧損氣血。宜入珍湯。加鈎藤。山梔。若無力抽搐。角弓反

張。汗出如珠等症。此肝經絕也不治。

〔吳按〕瘦者即剛柔二瘕。如類中風。乃傷寒之變症也。

鈎藤湯

鈎藤

當歸

茯苓

人參各一錢

桔梗

桑寄生各五分

水煎服。忌豬肉。炒煎。若煩熱加石膏一錢五分。臨產加

桂心四分

眩暈

肝熱上攻太陽穴。胃膈涎壅。頭旋。目眩暈。或腮項腫核。

〔吳按〕兩腮腫核為炸腮。以靛花。柿油調塗。即消。柿油乃補傘人所用。

消風散

煨石膏

防風

羌活

甘菊

川芎

羚羊角

當歸

白芷

荆芥穗

大頭黃芩各一錢

炙甘草

芽茶各五分

水煎食遠服。

治諸風熱困倦。時發昏眩。

犀角散

犀角

揀參各錢半

山梔仁

羌活

黃連

青黛各八分

川芎

茯苓

白芷

甘草各一錢

生薑三片

研食遠服二錢。

女科秘旨卷四

輪應禪師纂

仁和吳煜茶垞校訂
杭州徐志源句讀

心痛

風寒邪氣痰飲交結而傷心支結則乍寒乍止者是當審其因而治如飲食所傷用平胃散加枳殼山查。

火龍散

川棟子

小茴香

炒各三錢

艾葉末

鹽炒一錢五分

水煎服。

卒然心痛欲死不可忍。

白朮湯

白朮

白芍

各二兩

黃芩

一兩五錢

分三帖煎服。○或沉香降氣湯。

或茯苓補心湯。或四七湯。或紫蘇飲。或延胡爲末調服。皆可治。

治臨產卒然心痛。

歸苓散

當歸

川芎

茯苓

各三錢

厚朴

一錢五分

水煎服。

心腹痛

多由風寒濕熱痰飲與臟氣相擊上沖於心則心痛下攻於腹則腹痛攻痛不已則胎動矣宜用金沸草湯若胎氣鬱結加香附川芎如飲食傷滯。

用六君子湯。加紫蘇。枳殼。如怒氣傷肝。加柴胡。山梔。若鬱結傷脾。用歸脾湯。加枳殼。山梔。

孕婦腹中不時作痛。小腹重墜。多由血虛氣陷。間有兼寒熱者。單氏加味安胎散。

人參一錢五分

白朮

熟地各二錢

川芎八分

紫蘇

當歸

甘草

陳皮各四分

姜引。如兼寒。加吳茱萸。或乾姜五分。砂仁一錢五分。研末服。

孕婦腹中絞痛。

當歸芍藥散

芍藥半斤

當歸

茯苓

白朮各四兩

澤瀉

川芎各二兩

共研末。每服二兩。用姜三片。棗一枚。煎水送。

小腹痛

此症如因風寒所搏。用紫蘇飲。加生薑。係氣血虛。加入珍湯。係中氣虛。用補中益氣湯。如脹痛。用安胎飲。加升麻。白朮。服之不應。兼服補中益氣湯。

腰腹背痛

風冷乘虛入滯。則痛。若使腰痛甚。則墮胎矣。如因外邪所傷。用獨活寄生湯。因氣血滯鬱。用紫蘇飲。加枳殼。因勞傷元氣。用八珍湯。加杜仲。砂仁。阿膠。艾葉。因脾腎陰虛。加白朮。補骨脂。因肝火所傷。用小柴胡湯。加白朮。枳殼。山梔。因肝脾鬱結。用歸脾湯。加柴胡。枳殼。

治腰痛不可忍。

神效通氣散

破故紙瓦上焙五錢熟為末

子鳴

胡桃一個

空心溫酒嚼下三錢。

此症或云兒口含臍帶上疔瘡。因母高舉臂脫出。故啼。令母曲腰就地。如拾物狀。仍令入兒口即止。

子鳴散

空房鼠窟前後土為細末。研麝香一二釐入內。酒下二錢。

又方

黃連煎汁呷。上三方罈香開竅。黃連性寒。俱宜酌用。

積聚

岐伯云。大積大聚其可犯也。衰其大半而止。過者死。故重身毒之。有故無損。亦無殞也。

丹溪曰。血塊如盤。有難服峻藥者。以後方主之。

香附海粉丸

醋煮香附四兩

桃仁去皮尖

蛤粉醋煮

白朮各一兩

為末。麵糊丸服。

咳嗽

嗽有風寒。痰熱。虛損。氣喘之異。咳有心肝脾腎肺之分。治當知其因。審所

屬。則咳嗽止而胎自安矣。

肺咳則喘息有聲。甚者唾血。肺藏氣而應息。故喘息有聲。肝絡逆。故吐血。小腸

心咳心痛。喉中介介如梗狀。甚者咽腫喉痺。失氣。

肝咳則兩脇下痛。甚至不可轉。轉則兩脇下滿。胆水。嘔水。

脾咳右脅下痛。隱隱引肩。甚則不可動。動則咳劇。胃嘔而食匙出。

腎咳則腰背引痛。甚則咳涎。膀胱遺溺。三焦腹滿。不欲飲食。

治嗽因風寒

寧肺止咳飲

天冬 二錢

桔梗

紫蘇

甘草 各四分

知母 一錢

杏仁 十粒

桑皮 八分

因痰嗽加橘紅 四分

竹瀝。姜汁。因熱嗽去杏

仁。加黃芩 八分

因虛嗽加紫苑。款冬 各五分

因喘夜嗽加麻黃 蜜炙三分 虛

損嗽加瓜萸 一個

竹瀝。姜汁。若心胃不舒。加貝母。百合 各一錢

治嗽不止。胎不安。

止嗽紫苑湯

杏仁 二錢

甘草 八分

紫苑

桑皮 各二錢

桔梗

天冬 各一錢

水煎服。

治嗽帶血。

止咳涼血飲

紫苑

知母

白朮

麥冬

當歸各一錢

陳皮

甘草各四分

黃芩

犀角各八分

天冬二錢

如喘加瓜蒌一錢

治肺癰咳嗽喘急。

苦梗散

桔梗

紫蘇

桑枝

貝母

人參

甘草各五分

天冬

赤苓各一兩

麻黃二錢五分

共研末每服四錢加姜引。

治胎氣壅滯咳嗽喘急。

馬兜鈴散

馬兜鈴

桔梗

人參

甘草

貝母各五錢

橘紅

大腹皮

桑皮

紫蘇各二兩

五味子二錢

共研末。每服四錢。加姜二片。如不嗽而喘。當求別治。

霍亂

吐瀉頻腹痛。服六和湯。次用丹溪安胎飲。

丹溪安胎飲

白朮

當歸

熟地各二錢

川芎

條芩各八分

人參一錢

紫蘇

陳皮

甘草各四分

砂仁三分

姜棗引。

治內傷飲食。外感風寒。用藿香正氣散。若因食滯。用平胃散。如果係脾胃

損傷。陽氣虛寒。手足厥冷。必須溫補。然後詳審。毋使胎動。

不語

重身九月而瘖。不必服藥。月足當復。蓋少陰之脈貫腎絡舌本。胞系了戾。故不能言。

泄瀉

此症以六君子湯為君。如因米飯傷。加穀芽。麵食傷。加麥芽。肉食傷。加山查。兼寒熱作嘔。肝木侮脾土。加柴胡。生姜兼嘔腹痛。手足逆冷。乃寒侮土。加姜桂。如不應。再服錢氏益黃散。若瀉黃色。乃脾土之真色。加木香。姜。桂。若瀉在五更清晨。飲食少思。乃脾腎虛弱。五更服四神丸。日閒服白朮散。如不應。或愈而復作。飲食少思。用八味丸。補命門火。以生脾土。至如元氣下陷。發熱作渴。肢體倦怠。則用補中益氣湯。

痢

痢下黃水。乃土色。此脾氣下陷。當升補中氣。兼青黃色。乃木尅土。泄肝補脾。黃兼白。此子令母虛。宜補脾胃。黃兼黑。此水侮土。必溫補脾胃。黃兼赤。當補母益子。宜補中益氣。至於腸胃虛弱。風寒客之。須胃風湯。或胎不安。急補胃自安。凡安胎之藥。臨病制宜。不拘膠艾之類。

歸芍湯

當歸

白芍 各二錢

黃芩 八分

白朮 三錢

川芎 三錢

澤瀉 一分

水煎服。

凡胎前痢。宜用黃芩。黃連。白芍。炙草。橘紅。紅麴。枳殼。蓮肉。略用升麻。未滿七月。勿用滑石。如症急。必須用者。不拘此例。

瘧疾

妊娠患瘧。多傷乎胎。宜早治。若係飲食停滯。宜用六君子湯。加桔梗。蒼朮。藿香。外邪多而飲食少。用藿香正氣散。外邪少而飲食多。用人參養胃湯。勞傷元氣。用補中益氣湯。鬱怒所傷。用小柴胡兼歸脾湯。若木旺侮於土。久而不愈。用六君子湯。佐以安胎藥。仍參三陽三陰而治之。

單氏治胎前患瘧方。

半夏 七分

草果

青皮 各五分

烏梅 一個

人參

黃芩 各一錢

白朮

當歸 各二錢

紫蘇

甘草 各四分

藿香 五分

姜引。

煩渴

心脾二經。氣行口舌。孕婦臟腑氣虛。榮衛不理。陰陽隔絕。熱乘於心脾。津液枯少。故令煩躁而口乾也。若胃經實火。竹葉石膏湯。胃經虛熱。人參黃芪散。胃經氣虛。補中益氣湯。肺經虛熱。紫蘇飲。肝經火動。加味逍遙散。腎經火動。加味地黃丸。孕婦煩熱。兼咽間作痛。用知母散。加山梔。

知母散

黃芪

赤茯苓

子芩 各七錢五分

門冬

知母

甘草 各五錢

共研末。每服四錢。竹瀝引。

熱病

孕婦口乾。不得臥。用丹溪安胎飲。加麥冬。甘葛。

壅熱。心神煩躁。口乾渴。

參芩犀角湯

人參

知母

麥冬

梔子仁各一錢

甘草

條芩各五分

瓜蒌根

犀角各八分

如夏令加竹瀝五匙

姜汁二匙沖服。

熱病嘔吐不食。胸中煩躁。

蘆根湯

蘆根

葛根各一錢五分

人參

麥冬

知母各一錢

竹茹一團

梔子一錢

葱白三寸。

斑出赤黑色。小便如血。氣急欲絕。此胎落矣。

青黛豆豉湯

梔子

黃芩

升麻各一錢

青黛七分

生地二錢

杏仁十粒

石膏一錢五分

葱白七寸。

熱病。骨節疼痛。不急治。則胎落。

葛根湯

葛根

石膏各二錢

升麻三分

前胡八分

青黛八分

如有痰。加竹瀝。姜汁。

淡豆豉四十粒

胎蒸

面腫赤色。口苦咽乾。日晡寒熱。日漸羸瘦。胎氣不見升動。用銀柴胡。胡黃連。各一錢。煎服。治從氣血虛。加味。

治胎不轉動。

芎歸蘇苓湯

當歸 二錢

川芎

枳殼

茯苓

砂仁 各一錢

蘇葉 五分

吐衄

凡憂思驚怒。傷其臟腑。氣升於上。血隨而溢。心悶胃滿。久而不已。至墮胎。則不治矣。若係肝經怒火。先用小柴胡湯。加山梔。生地。次用前藥。合四物湯。後用加味逍遙散。係肝經風熱。用防風。子芩丸。係心經有熱。用硃砂安神丸。係心氣不足。用補心湯。係思慮傷心。用妙香散。係胃經有火。犀角地黃湯。係膏梁積熱。加味清胃散。係鬱結傷脾。用加味歸脾湯。係肺經有火。黃芩清肺飲。係子氣不攝血。補中益氣湯。係腎經虛火。加味六味丸。

加味逍遙散

當歸

芍藥 各二錢

黃芩 八分

白朮

柴胡

甘草 各一錢

薄荷

加山梔 各四分

丹皮 六分

防風子芩丸

條芩 炒焦

防風 等分

爲末。酒糊丸。米飲下。或溫酒亦可。

硃砂安神丸

黃連酒炒六分

當歸各三分五分

補心湯

人參

麥冬二錢

妙香散

甘草二錢

黃芪各一兩

木香二錢五分

犀角地黃湯

犀角八分

加味清胃散

升麻四分

加味歸脾湯

人參

炙甘草

加丹皮山梔各一錢 姜棗引

清肺飲

硃砂五錢

炙甘草五分

生地

爲末。糊丸。每服十五丸。

茯苓各二錢

甘草一錢

桂心五分

紫石英煨

赤小豆各一錢

大棗七枚

遠志

山藥

茯苓

扶神

人參

桔梗各五分

辰砂三錢

麝香二錢

爲末。溫酒下一錢。

丹皮一錢五分

生地

白芍各二錢

黃連三分

丹皮五分

生地

當歸各二錢

白朮

扶神

黃芪

棗仁各一錢五分

木香各五分

當歸

遠志各一錢

龍眼肉二錢五分

五味

黃芪各二錢

歸身

麥冬

生地

人參各一錢

治男婦諸血逆上。

必勝散

熟地

小薊并根用

人參

蒲黃炒

川芎

當歸各五錢

烏梅肉五錢

煎不拘時服。

治吐衄或破傷失血。羸患口噤。項強背直。類中風症。此皆由失血而然。

單氏吐衄方

人參

當歸

白朮各二錢

生地

條芩

天麻各二錢

陳皮

防風

荆芥各四分

麥冬一錢

爽期

婦人懷胎有七月八月而似欲生者。宜涼血安胎。有過一年二年數年而

不生者。宜補血行氣。

治月分未足。痛甚欲產。

知母丸兼治難產子煩。

知母為末

蜜丸。溫酒下。或米飲亦可。每服二十九丸。日三服。

槐子丸

槐子

蒲黃等分

為末。蜜丸。溫酒下二十九丸。以痛止為度。

又方

梁上塵

灶突煤

同為末。空心溫酒下。一三錢。

〔吳按〕灶突煤。即百草霜。燒草者佳。

治過期不產

加味四物湯

川芎

當歸

熟地

白芍

香附

桃仁

枳殼

縮砂

紫蘇

錢半

各七分

各二錢

女科秘旨卷五

輪應禪師纂

仁和吳煜茶垞校訂
杭州徐志源句讀

有孕婦家預知修合

益母丸。催生丸散。鹿角灰。大料參歸湯。生化湯。

臨產須知

痛陣未緊。交骨未開。雖胞水來。不可臨盆。若胞水來久。交骨猶未開。宜服大料參歸湯。并補助氣血飲食。產戶開。兒頭未正。不可服催生丸散。服催生藥。不可用敗血。耗氣。香竈等劑。兒下胞停。不可臥倒。宜頻服生化湯。胞下後。不可令寒氣入腹。更緊防賊風入產戶。產畢。將燒紅秤錘入醋瓶。以瓶嘴向產母鼻孔薰之。可免血暈。并解穢氣。產後月內。宜戒怒氣。勿受驚恐。勿勞神力。謹慎飲食。

論產後調護

婦人病倍男子。以胎產之症偏多也。在胎前雖宜慎謹。然時日尙寬。苟非危急症。猶可漸漸挽回。且不至終身受累。若夫產後。少有不謹。或醫治失宜。禍同反掌。卽幸不至損命。目前受苦非小。終身得病恆多。故特列章首。曾告產婦。并事產者。鄭重自持。庶幾彼此不至後悔也。

論治血塊

產後血塊。產科所當首重。毋視爲輕症而忽之。蓋因孕成餘血。若產婦壯旺而產易。則兒下後。亦隨而俱下。必不至久停作痛。多由產母送兒送胞。勞倦之甚。或調護失宜。或腹欠溫煖所致。若不加意調理。變症百出。論治此症。在古方偏用蘇木。稜朮。以迅攻之。在時俗多用生地。紅花。以急行之。或用蘇木。牛膝。以大破之。此三者重虛產婦。非徒無益。并致產後危急大症。無異操刀殺人。蓋產後血塊。雖宜消。新血亦宜生。必須行中帶補。化中有生者。方稱善治。是則生化湯一方。能使塊消而痛止。神清而氣復。實新產之至寶也。卽世用山查。砂糖消塊。姜椒。艾。酒定痛。亦能致淋。崩。昏。暈等症。皆非良劑。又如氣脹用烏藥。香附。以順之。枳殼。厚朴。以舒之。甚有用青皮。枳實。蘇子。以下氣定喘。芩。連。梔。柏。以退熱除煩。若夫血枯便實。反用承氣湯下之。而愈結。汗多小便濇短。反用五苓散通之。而愈秘。此則更無足論。蓋產後諸症。總以生化湯爲君。其餘不過隨症加減。治產後者。慎毋執偏門。遵古方。予於此條下。分症立方。可考而用也。

產後血暈

分娩後。眼見黑花。頭眩昏暈。不知人事。謂之血暈。其因有三。一由勞倦甚。而氣竭神昏。二由血大脫。而氣絕暈厥。三由痰火乘虛泛上。而神氣不清。此三者。皆魂不隨神往來。而機運幾息也。醫者若偏信古方。認暈爲惡血。搶心。而輕用散血之劑。或偏認爲痰火。而無補。專一消降之方。此誤人之命者也。當急服大料生化湯。先行塊定痛。如實係形色脫。或汗多而暈脫。

皆急服生化湯一帖後，卽加入參二三錢。如係勞倦甚而暈，及血崩氣脫而暈，並連灌兩帖後，加入參二三錢，斷不可疑參爲補而緩用。如或真係痰火乘虛泛上而暈，可於生化湯內，加橘紅四分。若虛甚亦加入參。如係肥人多痰，再加竹瀝七分。生薑汁少許。以上三等暈症，並不可用破血等方。如塊痛甚，將藥煎送益母丸，或鹿角灰，或元胡散，或獨行散。

產後形色脫暈，或汗多脫暈。

川芎

當歸各四錢

姜炭

炙甘草各四分

桃仁十粒

人參三錢

荆芥四分

棗一枚

煎服。如脈脫形脫將絕之症，可加入參三四錢。頻灌救。汗多亦然。若無汗不脫，只服大料生化湯，不必加參。如左手足脈脫，亦係危症，必須加參。如血塊痛甚，加肉桂七分。渴加麥冬一錢。五味子十粒。汗多加麻黃根一錢。如塊不痛，可參芪並用以止汗。

凡治產後諸危急症，必一日一夜，頻服三四帖，方可扶危變吉。否則若照常則不及矣。

產後厥

產時用力過多，勞倦傷脾。經曰脾中臟也。脾乃中臟，不能注於四旁。四旁心肝肺腎也。故逆厥而氣上行。經曰厥氣上行，滿脈去形。經云：陽氣衰於上，則爲寒厥。神氣浮越，去身而將散。非大補不能回陽而復神。豈數錢芎歸而能扶救將絕之氣血耶。必用加

參生化湯。倍人參。連服二三帖。則氣血旺而神氣生。厥自止矣。若服藥反渴。另用多參。生脈散代茶。以助救臟燥。此經驗之確論。毋得有議。如四肢逆冷。泄痢類傷寒陰症。又難用四逆湯。則用人參生化湯。加附子一片。以回陽止逆。又可行參歸之功。下立二方。分先後用。

加參生化湯

- 川芎 各二錢
- 人參 各二錢
- 當歸 四錢
- 炙草 五分
- 姜炭 四分
- 桃仁 十二粒
- 棗 二枚
- 連服二帖。

產後發厥。塊痛已除方。

滋榮益氣復神湯

- 人參
- 當歸 各二錢
- 黃芪
- 白朮
- 麥冬
- 川芎 各一錢
- 炙草
- 陳皮 各四分
- 五味子 十粒
- 熟地 二錢
- 附子 五分
- 如汗多加麻黃根。棗仁 各一錢
- 大便不通。加肉蓯蓉 二錢

大抵產後暈厥二症相類。皆由氣血並竭。神將去而機運幾息。僅有一絲之生意耳。若非重方急服。豈能挽回將絕之元神耶。但暈在臨盆症急。雖甚於厥。然能頻灌生化湯幾帖。先補血分之虧。即時塊化血旺。而神清暈止。產婦精神復矣。若夫汗多氣促。形脫症見。則參芪必須加也。至厥在分娩之後。氣血兩竭。宜用倍參生化湯。並補氣血之虧。止厥以復神。又非偏補血分之可愈也。要之暈有塊痛。芪朮未可遂加。厥無塊痛。芪朮地黃並

用無疑也。

產後血崩

產後血大來。當審血之紅紫。視形色之虛實。如血紫有塊。乃當去之。敗血止留反作痛。不可論崩。如鮮紅之血大來。乃是驚傷心不能主血。怒傷肝不能藏血。勞傷脾不能統血。歸經耳。當以崩治。先宜頻服生化湯幾帖。則行中有補。血甯生旺矣。若形脫或多汗氣促。宜服倍參生化湯以益氣。斯陽生而陰長矣。此非棕灰等之可止者。再如產已半月外。患崩。又宜升舉大補湯治之。

分挽後血崩

生血止崩湯

川芎 一錢

當歸 去尾 四錢

姜炭 四分

炙甘草

荆芥

烏梅 煨灰

蒲黃 炒各 五分

桃仁 十粒

棗 二枚

煎服。忌姜。椒。熱物。并生冷。如鮮

血大來。加白芷 五分

血竭形脫。并汗多氣促。俱加入參 三四錢。若無汗

不脫不促。只服生化湯多幾帖。則血自甯。世有言芎歸但能活血。不可治崩。此誤人之論。

塊痛已除。血崩。

滋榮益氣止崩湯

黃芪

白朮

人參

當歸

生地

麥冬

川芎 各一錢

陳皮

炙草

升麻

白芷

荆芥穗各四分

黃連四分

如汗多加麻黃根一錢

浮麥一撮

大便不通加肉苳蓉一錢

禁用大黃

如有氣磨木香一錢

痰加貝母六分

竹瀝。姜汁。寒嗽加杏仁。桔梗。知

母各一錢

驚悸加棗仁。柏子仁各一錢

傷麵食加麥芽一錢

傷米食加神麩

一錢

傷肉食加山查。砂仁各八分

身熱不可用芩。連。黃柏。傷食及怒氣

均不可專用耗散無補之方。宜上方加減。藥引俱用棗煎服。

產後短氣似喘

凡產血脫勞倦之甚。氣無倚恃而呼吸止息。違其常度。世有妄論痰火。反用散氣化痰之方。誤人夭折多矣。夫肺受脾稟。運氣生脈。通水道。順呼吸。清肅上下。調和榮衛。而為平人之常候也。值產血氣脫。呼吸短。言語不相接續。似喘危症。當大補氣血為主。如有塊痛。不可加芩朮。若無塊痛。可用生化湯。加熟地二錢。附子一片。去桃仁。如足冷加熟附子一錢。黃芪。白朮

各一錢。陳皮四分

分晚後即患氣短。有塊痛。

加參生化湯

川芎二錢

當歸四錢

炙甘草五分

姜炭四分

桃仁十粒

人參一錢

棗二枚

服二三帖後。加減。

產後氣短促。無塊痛。

續氣養榮湯

黃芪

人參 三錢

熟地 二錢

白朮

陳皮

如足冷加熟附子 五分

川芎 各一錢

炙甘草

當歸 四錢

姜炭 各四分

女科祕旨卷六

輪應禪師纂

仁和吳煜茶垞校訂
杭州徐志源句讀

產後妄言妄見

產後妄言妄見。由氣血兩虛。而神魂無依也。夫心藏神主血。而言乃心之聲也。心有血而神存。則言不妄發。又肝藏血。而目乃肝之竅也。目得血而司視。則瞳矇而視正。若夫產後血氣暴竭。則心神失守。故言語無倫。肝魂無依。則瞳眊無見。况心爲一身之主。目乃百脈之形。虛症見於心目。則十二官失其職。可知矣。是以視聽言動。皆有虛妄。專治法當論塊痛有無。症候緩急。若塊痛未除。連服生化湯二三帖。化塊定痛。繼服加參生化湯。或補中益氣湯。加以安神定志之藥。調治之。若產日久。形氣血氣俱虛。卽當大補爲主。使生養氣血。甯神定志。服至藥力充足。其症可愈。病家毋求速效。醫者毋論邪祟。若噴以法水。驚以法尺。多致不救。屢治此症。服藥至十餘帖。方見效。朱丹溪云。病虛有似邪祟是也。又云。欲泄其邪。先補其虛。調其氣。次論諸疾。此古人治產後虛症。及年老虛喘。弱人妄言妄見症。用心也。

產後塊痛未除。患妄言妄見。

甯神生化湯

川芎

扶神

柏子仁各一錢

當歸三錢

薑炭

炙草各四分

桃仁十二粒

人參二錢

益智炒八分

陳皮三分

棗二枚

產後塊痛已止。患妄言妄見。

滋榮養氣復神湯。

黃芪

白朮

人參

麥冬

川芎

棗仁

扶神

柏子仁

益智炒

當歸

熟地各二錢

炙草

陳皮三分

蓮子八粒

五味子七粒

元眼肉八個 棗二個

大凡產後患崩血脫。短氣似喘氣脫。妄言妄見神脫。三症雖有血陰氣陽之分。其精散神去無異。比前暈症。治可少緩。然亦危症也。若非厚藥妥方。頻服。失之者多矣。若醫者誤論氣實痰火。皆誤人也。如新產有血塊痛三症。並用加參生化湯。此行中有補。斯免滯血虛暈之失也。其塊痛既止。宜用升舉大補藥。少佐黃連清火。以治崩脫。攝氣歸源也。宜用滋榮益氣復神湯。少佐痰藥。以清心火。甯君主之官也。每見人妄論氣脫妄言之症。誤用氣實痰火方藥。屢夭人命。故重復錄告。倘執論痰氣而致病愈重者。或能試以補劑。救之猶可活也。毋害人。以受天殃。

〔吳按〕治病先分虛實。尤以脈為憑。經云。血脫有生血之機。尤須補氣。而氣脫亦應加入補血藥。所謂陰陽互相為根。不可偏重也。

產後傷食

凡產形體勞倦。脾胃俱傷。是以新產之後。禁膏粱遠厚味。食粥茹蔬。乃切務也。不善調治之家。唯慮產婦之虛。以多食為有益。以厚味為補本。產婦不思而強與。致饜食則有傷。胃雖納受。脾難轉輸。食停痞塞。酸噯惡食。治宜保元為主。溫補氣血。健脾助胃。審傷何物。佐以消導。使脾氣復而轉輸散積。則滯物行而胃始思食。夫飲食。脾虛之滋味。在產後未嘗不藉此為補助。但勞倦傷食。不勝甘飶。薄味漸進。運化易速。乃事產者不知此意。業已受傷。須知服生化湯。佐神麴。麥芽。以消麵食。山查。砂仁。以消肉食。吳茱萸。肉桂。以消冷物。如此則補消並濟。無有不安。屢見治產者不重產虛人弱。唯知速消傷物。反損其氣。益增滿悶。一帖不效。又加峻藥。一醫無功。又更一醫。先後方類。輕症加重。致使少食之人反虛。而絕不思食者。十常八九。病家自歸數命。醫家以為盡技。惜哉。

加味生化湯

川芎 二錢

當歸 五錢

姜炭 五分

炙甘草 五分

桃仁 十粒

傷麵飯加神麴麥芽

妙用各一錢

傷肉食加山查砂仁

各五分

傷寒冷物作痛

加吳茱萸肉桂

五分

如虛甚加人參

一二錢

塊痛已止服下方以消食。

健脾消食生化湯

川芎

神麴各一錢

當歸

人參各二錢

炙草

麥芽各五分

白朮一錢五分

傷肉食加山查砂仁。

傷寒冷物。加吳茱萸。肉桂。如停寒物日久。脾胃虛弱。恐藥不能運用。

可用炒神麴研末。乘熱以紬帕包。揉按胃腹間。冷則熨斗熨之。

傷食誤服消導藥。致絕粥幾日。并雜症誤服消耗。以致絕食者。俱用長生

活命丹可救。如係服寒藥傷者。加姜二大片。長生活命丹具秘要。

產後忿怒

凡產後因忿怒氣逆。胃膈不舒。血塊又痛。宜用生化湯去桃仁。臨服時磨

木香二分入藥服之。則血塊自化。怒氣自散。並治而不悖也。若輕產重氣。

偏用香附。烏藥。枳殼。香砂之類。以散氣行塊。則元氣反損。而滿悶益增。非

善治產者也。又如怒後即食。胃弱停悶。當審所傷何物。於對症之藥。加一

二味於生化湯中。無有不治。慎毋用剋削消積丸。瀉氣之方。以散氣化食。

否則虛弱產婦。重傷元氣。害不可勝言者矣。

木香生化湯

川芎 二錢

當歸 六錢

姜炭 四分

木香臨服磨

陳皮 二分

產後無塊痛。受氣傷食。服下方。

健脾化食散氣湯

白朮 二錢

當歸 二錢

川芎 一錢

姜炭

炙草各四分

人參 二錢

陳皮 三分

如傷肉食。加山查。砂仁。傷飯食。加神麴。傷麵

食加麥芽。傷寒冷物。脇下作痛。加肉桂。

大抵產婦弱。受氣停食。愈消則愈增。滿悶。必攻補並行。方可化滯進食。但時醫所見。只知消耗。而疑人參爲補。而不敢用。誤人多矣。故屢治。誤服散氣消導藥。致使少食思食之人。反絕食。日久者。皆用長生活命丹而活者甚多。

產後忿怒氣逆。及產後停食二症。善治者。重產而輕怒。治以補氣血爲主。佐以順氣調氣。則怒鬱散而元不損。非徒恃用消導。則停滯行而胃思穀。此治產後忿怒傷食之良法也。若專一理氣消食。非惟氣脹不散。停食不消。則正氣尤減。食甚至絕。穀不救。

產後類瘧

產後寒熱往來。每日應期而發。其症類瘧。切不可用瘧疾方藥治之。夫氣血虛。而寒熱更作。元氣弱。而外邪或侵。雖寒來股慄。湯火不能溫。熱如燔炙。水冰不能寒。或晝輕夜重。或日晡寒熱。雖所見症與瘧同。其治法必當滋榮益氣。以退寒熱。有汗急當止汗。只頭有汗。不及於足。此乃孤陽絕陰之症。須當加當歸地黃之劑。如陽明惡寒。頭痛。無汗。宜於生化湯加羌活。防風。蓮鬚。葱白。以散之。慎不可作瘧治。而用柴胡清肺飲等方。至常山。草果等藥。更害人不可用。

產後寒熱有汗。每午後應期而發。類瘧。

滋榮益氣扶正湯

人參

熟地各二錢

黃芪

白朮

川芎

麥冬

麻黃根各一錢

當歸三錢

陳皮四分

炙甘草五分

日間煎服。夜間兼服六味地黃丸。清湯下。

〔吳按〕麻黃根雖散中有收。又能止汗。究係猛藥。不宜重用。以他藥代之便妥。

產後寒熱往來。頭痛無汗。類瘧。

加減養胃湯

冬白朮

甘草

藿香各四分

白茯苓

川芎

陳皮各一錢

半夏八分

當歸三錢

人參五分

姜一片

如有疲加竹瀝。姜汁。半夏麩。如質弱兼服河車丸。若久瘧無汗不愈。

兼服參朮膏。

產後類傷寒二陽症

產後七日內。發熱。頭痛。惡寒。毋專論為傷寒太陽症。發熱。頭疼。脅痛。毋專論為傷寒少陽症。二者皆由氣血兩虛。陰陽不和。而類外感。治者慎勿輕產後。執偏門。而用麻黃湯。以治類太陽症。又勿用柴胡湯。以治類少陽症。且產婦血脫之後。而重發汗。則虛虛之禍。有不可勝言者。昔仲景云。亡血家不可發汗。丹溪云。產後切不可發表。二先生非謂產婦真無傷寒之病也。非謂麻黃。柴胡。方之不對症也。誠恐後學業偏門。而輕產後。執成方。以發表耳。雖明知產後真感風寒。其生化湯內芎姜亦能散之。又內經云。西北之氣散而發之。東南之氣收而溫之。所謂病同而治異也。其經意謂東

南人柔弱。而西北之人強盛。患病有異也。惟產後虛勞。治法不分南北。概用甘溫以大補。少佐散劑。雖有他症。以未治之。又不可拘執以誤人。

〔吳按〕經云二陽之病發心脾。乃指內傷。亦有發熱惡寒。不可混入外感。況產後耶。學者當細心講究。

產後發熱頭疼。

加味生化湯。

川芎 一錢五分

當歸 三錢

甘草

姜炭

羌活

防風 各四分

桃仁 十粒

服二帖。如無塊痛。去桃仁。若二帖後。頭疼。身

熱不除。加白芷 八分

細辛 二分

若發熱不止。頭疼如破。加薑鬚。葱頭

五個 若虛甚。加入人參 二錢

產後類傷寒陽明及三陰症。

產後潮熱。有汗。大便不通。毋專論為傷寒陽明症。口燥咽乾而渴。毋專論為傷寒少陰症。腹滿咽乾。大便實。毋專論為傷寒太陰症。又汗出。譫語。便閉。毋專論為胃中燥屎宜下。此數症多由勞倦傷脾。運化稽遲。氣血枯竭。腸腑燥涸。乃虛症類實。當補之症。治者毋執偏門。輕產後妄議三承氣湯。以治類三陰症。聞有少壯產婦。患此症而誤下。幸而無妨。若虛弱產婦。亦復誤下。多致不救者。或因氣血虛脹。誤下反結。又有血少數日。大便不通。誤服攻下。而泄不止者。危哉。

〔吳按〕六經病症。當查究傷寒論。則表裏分明。所以學者博覽羣書。一以貫之。

產後類三陰傷寒症。

養正通幽湯

人參 二錢五分 當歸 六錢 炙草 五分 桃仁 十五粒 茯苓 酒洗去甲

麻仁 炒各一錢 陳皮 四分

如汗多便實。加黃芪。麻黃根。人參。各一錢。口燥渴。加麥冬。人參。各一錢。

滿。噎乾。便實。加麥冬。一錢。枳殼。六分。人參。二錢。汗出。謔語。便實。乃氣血

並竭。精神失守。宜養榮安神。加茯苓。棗仁。遠志。各一錢。人參。白朮。各二錢。

黃芪。柏子仁。各一錢。以上大便秘結症。非用芎歸。人參至數斤。難見全

效。

大抵產後。虛中傷寒。口傷寒物。外症雖見。頭痛。發熱。或脅痛。腰疼。是外感。宜汗。猶宜重產。亡血。禁汗。仲景傷寒論。亡血家。禁汗。禁下。豈產後而可汗。下乎。惟宜生化湯量為加減。調理方謂無失。又如大便秘結。猶當重產。亡血。禁下。長沙論傷寒之不可汗。不可下者。非謂不當汗不當下。無奈脫血後。萬萬不敢耳。

產後大便不通。

潤腸粥

蘇子 一合去麩 新米 二合 煮粥食。潤腸即通。

女科秘旨卷七

輪應禪師纂

仁和吳煜茶垞校訂

杭州徐志源句讀

產後類中風

產後血氣暴虛。百骸少血濡養。率爾口噤牙緊。手足筋脈攣搐。症類中風。類瘧癩。脈雖虛大。虛火泛上。有痰皆當以未治之。毋執偏門而用治風消痰之方。以重虛產婦。治法先當服生化湯。以生旺新血。如見危症。三帖後。加參益氣。以救血脫也。如有痰有火。少佐橘紅炒黃芩之劑。竹瀝姜汁亦可。切忌黃連黃柏並用。

滋榮活絡湯

川芎一錢五分

當歸三錢

熟地

人參各二錢

甘草

陳皮

羌活各四分

黃芪

扶神

天麻

麥冬各一錢

荊芥

防風各四分

黃連薑汁炒八分

有痰加半夏麩竹

瀝姜汁。渴加麥冬。葛根。

產後中風。恍惚語澁。四肢不利。

天麻丸

天麻

防風各五錢

扶神

棗仁

人參

遠志

山藥

柏子仁

門冬各一兩

川芎

羌活各七錢

細辛四錢

南星麩

半夏麩

石菖蒲各八錢

當歸二兩

共為末。蜜丸。硃砂為衣。清湯每服六七十丸。

產後汗

凡分娩時汗出。由勞傷脾。驚傷心。恐傷肝也。內經云。搖體勞苦。汗出於脾。驚而奪精。汗出於心。有所恐懼。汗出於肝。產婦多兼此三者而汗出。不須即加斂汗之劑。能甯神而汗自止。若血塊作痛。芪朮未可遽加。宜服生化湯二三帖。以消痛。隨服加參生化湯。以止虛汗。若分娩後倦甚。澌澌然汗出。形色又脫。此亡陽脫汗也。又當從權速灌加參生化湯。倍用人參。以救危急。毋拘塊痛。夫汗乃心之液。榮於內為血。發於外為汗。值產婦亡血之後。又多汗。由勞驚恐懼所傷。神虛而不能鎮守其液也。治當健脾而斂水液之精歸脾。益榮衛以噓血歸源。灌漑四肢。不使其妄行而為外汗。在雜症雖有自汗盜汗之分。其當歸六黃湯不可以治產後之自汗。並宜服加參生化湯。又加味補中益氣湯。若服參芪而汗不止。及頭出汗而不至腰足。乃危惡之症。必難療。

產後虛汗不止

麻黃根湯

人參

當歸各二錢

黃芪一錢五分

白朮

麻黃根

牡蠣各一錢

桂枝

炙甘草各五分

浮小麥一撮

如虛脫汗多。手足冷。加熟附子一片。姜棗四分。渴加麥冬。五味子各六分。

肥白人產後多汗。加竹瀝。薑汁以清痰火。若惡風寒。加防風五分。血

塊不痛。加熟地三錢。暮服入味丸六味加五味子夜黃芪。

凡產後汗不止。由產亡陰血。而陽氣偏盛故也。內經云。陽加於陰則發汗。因而遇風。變為痲癢者有之矣。其治尤難。是以產後多汗之家。更宜謹避風寒也。

產後盜汗

產後睡夢中汗多。醒來即止。猶盜賊人睡而出盜。謂之盜汗。此非自汗之比。在雜症論云。自汗陽虧。盜汗陰虧。然當歸六黃湯。又非產後盜汗方也。治當兼血分藥品調理之。乃稱善耳。

止汗散

人參二錢 當歸三錢 熟地一錢五分 麻黃根

黃連酒炒各五分 浮小麥一大撮

又方

牡蠣煨研五分 小麥麵炒黃研

產後口渴或兼小便不利

凡產後口渴咽乾而渴。或兼小便不利。由產時失血。或汗多所致。是無水也。夫水穀入胃。脾肺散精。清氣為津液。其氣通心。受火色變為血。下行膀胱為小便。值產亡血而又汗多。且勞倦傷脾。不能為胃行其津液。生化之

氣不運。滲泄之令不行。是以上無津液。而有嗌乾燥渴之症。下氣不升。而有胃腎閉關之候。治法必當助脾益肺。升舉氣血。則氣化流行。陽升陰降。水入經而為血。為液。穀入胃而氣長脈行。自然津液充而便利調矣。若認咽乾口燥為火。而用芩連。梔柏以降之。認小便閉澀為水滯。而用五苓散以通之。皆非也。必因其勞損而溫之。益之。因其渴燥而濡之。行之。量度病情。而施治無失也。

生津止渴益水散

人參

麥冬

生地

當歸各三錢

五味十粒

黃芪一錢五分

茯苓八分

甘草

升麻各四分

葛根一錢

汗多加浮麥。麻黃根。棗仁各一錢

如渴甚加生脈散代茶。不可疑而不用。

產後遺尿

凡產後遺尿。由氣血大虛。不能約束。宜用八珍湯。加升麻。柴胡。甚者加熟附子一片

〔吳按〕曾有接生者以手入內。探扶小兒。損傷尿胞。以致終身滲漏。可不慎哉。

又有生理不順。誤損尿胞膀胱者。用參。芪為君。歸。芎為臣。桃仁。茯苓。陳皮為佐。以豬羊尿胞煎湯煎藥。須百服漸安。

薛氏補脬飲

黃絲絹一尺

白牡丹根皮為末

白芨末各一錢

水煎。至絹爛如飴。服之

靜臥不可作聲。如作聲則不效。

產後類瘧

產後汗出多而變瘧症。口噤不開。背強而直。身反。氣息如絕。宜速服下方。

加減生化湯

川芎

麻黃根各一錢

當歸四錢

桂枝

防風

甘草

羌活各五分

人參二錢

附子一片

羚羊角

天麻各八分

產後中風。無汗類瘧。

芎歸活風湯

川芎

當歸各三錢

防風

羌活各五分

棗仁一錢

產後泄瀉

產後泄瀉非雜症。有食泄。洞泄。濡泄。濕泄。各如註下之論。大率屬氣虛。食積。與濕也。氣虛宜補。食積宜消。濕則宜燥。然惡露未淨。遽難驟補。驟消。驟燥。當先服生化湯二三帖。以化舊生新。內加茯苓以利水道。俟血化生。然後補氣。消食。燥濕。以分水道。始無漩滯。虛虛之失。若產經旬日。外方論雜症。猶量人虛實而施治也。如痛下清水。腹鳴米飲不化者。以寒泄治。如糞黃色。赤色。肛門作痛。以熱泄治。有因飲食過多。傷脾成瀉。噫氣臭如敗卵者。以食積泄治。又有脾氣久虛少食。食下腸鳴腹急。盡下所食之物。方寬快者。以虛寒泄治。治法寒則溫之。熱則清之。脾傷食積。分利健脾。兼消補。

虛。方謂善於調治。而可無失也。

產後虛泄。眼昏不識人。弱甚形脫。必用下方。

丹溪回生方即附子理中湯。

白朮 扶苓 各二錢
人參 三錢
附子 一錢

產後血塊未消。患瀉。

健脾利水生化湯

川芎 扶苓 各二錢
當歸 四錢
姜炭

炙甘草 各五分
桃仁 十粒
蓮子 八粒

產後血塊已消。患瀉。

加減生化湯

川芎 一錢
當歸 各二錢
白朮 各二錢

扶苓 一錢
人參 三錢
肉果 一個
陳皮 五分
姜炭

如寒泄痛加砂仁 二錢
熱泄加黃連 炒一錢
瀉水腹痛。米飲不化。加砂

仁。山查。麥芽。各二錢
瀉有噯酸臭氣。加神糶。砂仁。山查。麥芽。各一錢
脾氣

久虛。瀉出所食之物方寬快者。以虛寒論。加山查。砂仁。神糶。麥芽。各二錢
脾氣

瀉水者。加蒼朮 一錢
脾氣弱。元氣虛。必須大補。佐消食。或清熱。

或祛寒。治宜詳察加減之。再弱甚形氣脫。必用丹溪回生方。始可回

生。若脈浮弦。按之不鼓。即為中寒。此蓋陰先亡而陽欲去也。速宜以

大補氣血藥中。加附子。炮姜。以回元氣。勿泛以尋常比也。以上諸症。

俱加升麻酒炒三分 蓮子十粒

產後完穀不化

產後完穀不化。由勞倦傷脾。而輸化稽遲也。內經曰。飲食入胃。游溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸於肺。通調水道。下輸於膀胱。精氣四布。五經并行。是脾主為胃行其精液者也。今產後勞倦傷脾。失輸轉之職。致清和之氣不能化。而令完物出焉。名曰殮泄。又有飲食太過。腸胃受傷。亦致完穀不化。俗呼為水穀痢也。然產方三日內。血塊未消。患此脾衰胃弱之症。未可遽加參。芪。白朮。且服生化湯。加益智。香砂。少溫胃氣。候塊消散。可加參。芪。白朮。以補氣。肉果。木香。砂仁。益智。以溫胃。柴胡。升麻。以升胃中清氣。澤瀉。茯苓。陳皮。以利水。此上策焉。

產後三日內完穀不化血塊未消

加味生化湯

益智各一錢

當歸四錢

炙甘草

川芎

桃仁十二粒

茯苓一錢五分

炙甘草

產後三日外。血塊已消。完穀不化。此胎前素弱。故患此症。

參芪生化湯

川芎

茯苓

白芍

益智各一錢

當歸

人參

白朮各二錢

炙甘草

炙姜各五分

蓮子八粒

肉果一個製

如瀉水多加澤瀉。木通各一錢

腹痛加砂仁八分

渴加五味。麥冬。各七分

寒瀉加乾姜。一錢

木香。四分

產後瀉痢日久。胃氣虛弱。完穀不化。宜溫補助胃氣。用六君子湯。加木香

四分 肉果。一個

產後痢

產後七日內外。患赤白痢。後重腹痛。前集祕要載治法。此集不再入。所遺方一症四。茲補附焉。

產痢無後重。但日久不止。宜六君子湯。加木香。肉果。

產後赤白痢。臍下痛。宜用當歸。厚朴。黃連。肉果。甘草。桃仁。川芎。煎服。

產後痢。久色白。屬血氣。宜四物湯。加荊芥。人參。痢久。面形色。屬白。故屬血虛。

產後痢。形體羸困。心腹絞痛。宜用薤白。石榴皮。當歸。黃連。地榆。煎服。如腹

痛不止。用溫湯布蘸煖。腹則緩。

噤口痢

香連丸

黃連。為末

蓮肉。研粉

各半。和勻。或酒丸。或酒調送。每服四錢。

〔異按〕古香連丸。乃黃連。木香。與此不同。

附產後積滯

產後滯下。積滯。雖腹痛至極。不可用大黃等藥下之。致傷胃氣。遂不可救。

宜服下方。

補血消滯湯

人參

芍藥

當歸各二錢

紅柚一錢

升麻四分

益母草二錢

加炙甘草一錢

滑石二三錢

足矣。若惡露未淨兼用乳香沒

藥各二錢五分

砂仁末一錢

血虛加阿膠蛤粉炒二錢

久之自愈。

女科秘旨卷八

輪應禪師纂

仁和吳煜茶垞校訂
杭州徐志源句讀

產後霍亂

產後霍亂。由勞傷氣血。臟腑虛損。不能運化食物。乃感風冷所致。凡陰陽升降不順。清濁亂於腸胃。冷熱不調。正邪相搏。上吐下瀉。名曰霍亂。產後塊痛未除。患霍亂。

〔吳按〕此病多發於夏秋之間。若吐瀉一齊俱作。為真霍亂。必用附子理中湯。或轉筋加木瓜。緩治則無救。

生化六和湯

川芎 二錢

當歸 四錢

乾姜

甘草

陳皮

藿香 各四分

砂仁 六分

茯苓 一錢

姜 三片

煎服。

產後霍亂吐瀉。手足逆冷。無塊痛。

附子散

白朮

人參 各一錢

當歸 二錢

陳皮

炮姜

丁香

甘草 各四分

附子 五分

為末。粥飲調。每服一二錢。

產後霍亂吐瀉不止。無塊痛。

溫中湯

人參

白朮

當歸

厚朴 各二錢

乾姜 八分

扶苓 三錢 草豆蔻 一錢 姜 三片 煎服。

產後嘔逆不食

人之胃腑為水穀之海。水穀化精。以為氣血。榮潤臟腑。產後勞傷臟腑。寒邪易乘於腸胃。則氣逆嘔吐。而不下食也。又有瘀血未淨而嘔者。亦有瘀氣入胃。胃口不清而嘔作。醫者能隨症調治。斯無失矣。

產後嘔逆不食

加減生化湯

川芎 一錢五分 當歸 三錢 炮姜 炙草 各五分

砂仁 五分 淡竹葉 七片 姜汁 二匙

產後七日外。患嘔逆不食。

溫胃丁香散

當歸 白朮 各二錢 丁香

陳皮 炙姜 人參 一錢 前胡

藿香 各四分 姜 三片 煎服。

產後咳逆嘔吐。心忡目眩。

石蓮散

石蓮子 去殼一兩五分 扶苓 一兩 丁香 五錢 為末。米飲下二錢

產後口渴

產婦虛弱。口渴氣少。由產後血少。汗多。內煩。不生津液。

生津益液湯

人參

麥冬

茯苓

大棗

小麥

竹葉各六分

瓜蒌根

甘草

如大渴不止。加蘆根。

產後水腫

產後水氣。手足浮腫。皮膚閒光熒色。乃脾虛不能制水。腎虛不能行水故也。治必大補氣血為主。佐以蒼朮。白朮。茯苓。補脾。如壅滿用半夏。陳皮。香附。監之。虛加人參。木通。有熱加麥冬。黃芩。以清肺金。

〔吳按〕按之窩而不起者氣也。按之無窩。隨手起者水也。以此分別。乃要訣耳。

產後七日外水腫

健脾利水補中益氣湯

人參二錢

白朮三錢

茯苓

白芍

陳皮

木瓜八分

紫蘇

木通

大腹皮

蒼朮

厚朴各四分

如大便不通。加郁李仁。麻仁。各一錢

寒邪濕熱氣傷表。無汗。腫。宜補氣血方中。加姜皮。半夏。紫蘇。以表汗。產後風濕。客傷脾經。氣血凝滯。以致面目虛浮。四肢腫脹氣喘。宜服五皮飲。

產後怔忡驚悸

此由產中憂驚勞倦。去血過多。則心中躁動不甯。謂之怔忡。若惕惕然而驚。中心怯怯。如人將捕之之狀。謂之驚悸。治此二症。惟調和脾胃。補養心

血使志定氣甯。氣舒心安而病愈矣。然在分娩後。血塊未消。宜服生化湯。且大補以行血塊。血旺則怔定驚平。不必加定志安神之藥。如塊痛消止後。患此症。宜服下方。

加減養榮湯

川芎

當歸各二錢

扶神

棗仁

人參

麥冬

遠志肉

黃芪

白朮各一錢

元眼肉八個

陳皮

炙草各四分

如虛煩。加竹茹一團。痰加竹瀝。姜汁。

產後心血不寧。驚悸不安。

養心湯

黃芪

麥冬

棗仁

柏子仁各一錢

扶神

川芎

遠志肉各八分

當歸二錢

五味十粒

人參一錢五分

炙草四分

姜二片

煎服。兼服安神丸。

安神丸

黃連酒炒

生地

歸身各三錢

炙草五分

爲末。蒸餅糊丸。如

菘豆大。硃砂二錢

爲衣。每服四十丸。

產後骨蒸

產後骨蒸。先用清骨散作湯藥服。後以保真丸作湯藥服。

清骨散

柴胡

前胡

黃連

烏梅去核各二錢

豬脊髓 一條 豬苦膽 一個 韭菜白寸許 各

右藥四味為末，將髓膽韭同搗成泥，入童便一盞，熬稀糊，入藥末，搗為丸，如菉豆大，名清骨丸。每服三四十丸，清湯下。如上膈熱多食後服。凡男女骨蒸，俱可服。惟上症須作湯藥服，效更速耳。

保真丸

黃芪 川芎 地骨皮各六分 人參 白朮

當歸 天冬 麥冬 白芍 枸杞

知母 生地各二錢 茯苓 黃柏炒各八分 甘草 五分

五味十粒 此丸方，上症加棗三個，作煎藥服。

骨蒸勞熱，服清骨散作湯藥，不應再服下方。

加味大造丸

人參 當歸 山藥 枸杞各一兩 麥冬

石斛酒蒸各八錢 銀柴胡六分 生地二兩 胡黃連五錢 黃柏酒炒七錢

另將門冬、地黃先搗如泥，加紫河車一具，如係蒸熟者亦另搗，然後

入諸藥末，和勻搗勻為丸。若焙乾河車則為末入藥，搗勻蜜丸。

產後心痛

產後心痛，即胃脘疼，以胃脘在心之下，因傷寒氣及冷物而作痛。且氣近於心，故俗呼為心痛。殊不知心為君主之官，主血行氣，統馭臟腑，血氣盛則泰然安，血不足則怔忡驚悸而不安，心豈可痛乎？若真心痛，手足青黑

色。日發夕死。夕發日死。昔已論之詳矣。治法當散胃中之寒氣。消胃中之冷物。必用生化湯為主。而以散寒消食佐之。無有不安。若綿綿而痛。可按而止。又無塊痛在腹。則當論虛而加補也。其產後心痛腹痛二症。因寒食與氣上攻於心。則心痛。下攻於腹。則腹痛。二症治法。大約相同。均當用生化湯加肉桂。吳茱萸等熱藥。以溫散之可也。

〔吳按〕心者君主之官。痛則無救。凡俗名心痛。皆胃脘氣痛也。婦女最多。甚至嘔逆發厥。用胡索。五靈脂。丹參。當歸。名加味拈痛散。屢效。

加減生化湯

川芎 一錢

當歸 三錢

炙姜 五分

肉桂

吳茱萸

砂仁 各八分

如傷食作痛。可照上傷食症條加減。下腹痛亦做此。

產後腹痛

凡產後腹痛。先問血塊有無。若無塊痛。因遇風冷。乘虛入腹作痛。宜服加味生化湯。若有血塊痛。只服生化湯調元胡索末一錢。塊痛消止。產後遇風寒。乘虛入腹作痛。

加味生化湯

川芎 二錢

當歸 四錢

炙甘草

炙姜 各四分

桂枝 七分痛止煎去

防風 七分

吳茱萸 六分

白豆蔻 五分

如服之塊未消。再煎一服。送失

笑散 一錢

產後小腹痛

產後虛中感寒飲冷寒氣下攻則小腹作痛又有血塊作痛者亦有產後血虛臍下痛者並宜加減生化湯治之。

加減生化湯

川芎 二錢

當歸 三錢

乾姜

甘草 各四分

桃仁 十粒

有血塊痛本湯送元胡索散 一錢

亦治寒氣痛無血塊痛但小腹痛。

又可按而少止者屬血虛上方加熟地 三錢

元胡索散

延胡索

肉桂 各一錢

爲末。

產後指節頭痛

凡產後虛勞指節疼頭痛汗不止。

豬腎參芪湯

人參

黃芪 各二錢

生姜 一錢

淡豉 一錢

韭白 一錢

當歸 三錢

用豬腎 二個

先將腎煮熟取汁二碗煎藥入分盞溫服。

產後偏身痛

由產後百節開張血脈流散氣弱則經絡閒血多阻滯累日不散故筋骨急引諸節不利至腰背不能轉側手足不能動履或身熱頭痛若誤作傷寒發表使汗出則筋脈動惕手足厥冷變症百出矣。

通痛散

當歸 三錢

甘草 三分

黃芪

白朮

牛膝

獨活

肉桂各八分

韭白五根

姜三片

產後腰痛

凡婦人腎位繫胞。腰為腎府。至產勞傷腎氣。損動胞絡。或虛未平復。而風寒乘之。二者皆至腰痛也。

產後感風寒。腰痛不可轉側。

養榮壯腎湯

當歸二錢

獨活

桂心

川芎

杜仲

川斷各八分

防風四分

桑寄生二錢

生姜三片

兩帖後痛未止。屬

腎虛。加熟地三錢

產後日久氣虛。腰疼腎弱。服加味大造丸。

產後淋

由產後氣弱。熱客於脬中。內虛則小便頻數。熱則小便淋澀作痛。名曰淋。產後冷熱膏。石諸淋。

茅根湯

白茅根一兩

瞿麥

茯苓各五錢

葵子

桃膠

人參各一錢五分

滑石一錢

紫貝二個

石首魚頭四個

燈心一團

先將石首魚頭研末。藥熟入魚首末。空心服。

產後淋。小便痛。及血淋。

白茅湯

白茅根

瞿麥

車前子

冬葵子

通草

鯉魚齒一百個

先將魚齒研末。藥熟入末。空心服。

產後小便數

由脬內宿有冷氣。因產發動。冷氣入脬。致小便數也。

小便數及遺尿

益智散

益智大者二十個

為末。每服二錢。米湯下。

桑螵蛸散

桑螵蛸炒三十個

人參

黃芪各三錢

鹿茸

牡蠣

赤石脂各一兩

為末。每服二錢。空心下。

產後流注

產後惡露流於腰臂腿足關節之處。或漫腫。或結塊。久則腫起作痛。肢體

倦怠。治法急用葱熨方。以治外腫。內服參歸生化湯。以散滯血。毋緩也。

治流注已成。自潰未成。自消。

參歸生化湯

川芎一錢五分

當歸三錢

炙甘草五分

人參二錢

黃芪一錢五分

肉桂四分

馬蹄香二錢

葱熨法

生葱一握

搗爛。炙熟作餅敷腫處。用厚布二三層蓋上。以熨斗微火

熨之。

流注漫腫微痛。屬形氣病。氣俱不足。最難治。若已成膿。或未成膿。或不潰。此氣血虛也。宜服人參湯。如憎寒惡寒氣虛也。宜十全大補湯。如日晡內熱。宜四物湯。加入參。白朮。丹皮。如嘔逆胃氣虛。宜六君子湯。加炮姜。如食少體倦。脾氣虛也。宜補中益氣湯。加倍升麻。如四肢逆冷。小便頻數。腎氣虛也。宜補中益氣湯。加益智仁。

陰蝕五疳

婦人陰戶中生瘡。名曰蠶瘡。或痛。或癢。如蟲行狀。濃汁淋漓。陰蝕幾盡者。心腎煩鬱。腎氣虛弱。致血氣留滯。經云。諸痛瘡瘍皆屬於心。治當補心養胃。外以藥薰洗。

千金陰蝕散

當歸

川芎

芍藥

地榆

甘草

各等分

用水五升。煎至二升。去渣薰洗。日三次。夜一次。

又方

豬油十斤

水一桶

煮極熟。以汁浸瘡。冷再易熱者。不過三五次。

可愈。

又方

蝦蟆

兔屎等分

為末。傅瘡亦良。

〔吳按〕兔屎別名望月砂。為洗眼要藥。

女科後序

余岳丈陳貞甫太守。乃閩中脩園先生後裔。素以醫名。自幼受其指教。粗得皮毛。但醫書汗牛充棟。惟擇其最善者而從之。嘗考岐黃治病專精針灸。伊尹始傳湯液。漢自仲景後。初分門類。而婦幼乃有專科。然皆醫國壽民。存心利濟。非如近世射利之徒。私秘良方。行同市儈。所以人多輕視而醫學埽地矣。光緒乙酉冬。吳君幼筠。以家藏竹林寺婦科秘本。擬將鋟板。以廣流傳。由翁君式如見示。屬爲校訂。詳細讀之。胎產諸症。備舉無遺。其方亦屬王道。並非離奇。但非一手所著。不敢斷鶴續鳧。強爲連貫。况抄本譌誤。句讀難明。湯丸顛倒。分兩參差。所關非細。千里毫釐。因稍加修飾。補短截長。酌添分兩。配合君臣。庶祕方可稱全璧。苟居家者。既獲此書。再益以達生福幼等編。則窮僻之鄉。審症用藥。較以性命付諸庸醫之手。得失奚如。吾知書成後。胎前諸治法。產後多良方。久祕之本。竟得廣傳。豈非生民之慶幸也哉。校竣。序其緣起而歸之。

光緒丙戌年春正月。仁和禮堂曹秉綱。序於鄂匏齋。

女科旨要卷一

雪巖禪師增廣

仁和吳煜茶垞校訂
杭州徐志源句讀

婦女逐年經症

室女十三四歲行經。或行或痛。或發熱。身體不甯。口苦面紅。寒熱不定。頭目暈花。

人物湯

白芷 一錢五分

羌活 上部身體不痛不用 砂仁

桂枝 無寒不用

白朮 各二錢

香附 二錢五分

分二帖。加姜 三片 葱 三根

空心熱服。如有血氣攻心痛。加

乾漆。元胡索。 各三分

嗽痰氣急。加半夏。桔梗。杏仁。五味。 各三分

和氣散

厚朴 五分

陳皮

藿香 六分

白朮

延胡

枳殼 各三錢

香附 炒五錢

草果 熱不用

甘草

砂仁

小茴 各二錢

木香 二錢

爲末。或丸。或散。每服 二錢 空心下。

室女十五六歲。經水不通。日夜寒熱。手足麻痺。頭痛。惡心。嘔吐。腹中忽然結塊。沖痛。此因誤食生冷所致。

四物調經湯

當歸

川芎

柴胡

黃芩

白芍 各三錢五分

香附 五錢

青皮

砂仁

甘草 各一錢五分

熟地

白朮

陳皮

枳殼

小茴 炒

三稜

莪朮 各一錢

紅花 五分

白芷 二錢五分

肉桂 一錢

分四帖加姜 三片 葱 三根

空心煎服如上部痛加羌活 二錢 下部痛加獨

活 二錢 咳嗽加半夏 三錢

延胡乾漆 各二錢五分

寒熱瘧疾加常山草果香

附 各三錢 泄瀉吐心悶加豆蔻粟鼓木香 各三錢

婦女十七八歲經脈不通或阻半月或阻百日半年顏色青黃飲食不思寒熱頭痛目暈肚中結塊煩悶嘔吐膨脹此因脾胃虛弱氣血不行而致

和氣入物湯

人參

茯苓

熟地

小茴 各三錢

白朮

川芎 各四錢

甘草

黃芩

柴胡

枳殼 各一錢

當歸

白芍

香附 各六錢

分四帖加姜 三片 燈心 一團

空心熱服如肚痛加延胡乾漆 各三錢

嘔吐惡心加良姜砂仁 各三錢

足麻痺加肉桂 一分錢

咳嗽加杏仁五味款冬花 各二錢

柴胡湯

當歸 五錢

白芍

柴胡

黃芩 各三錢

熟地

甘草 各一錢

半夏

川芎 各二錢

人參

麥冬 各二錢

分四帖加姜 三片

空心熱服如少睡加棗仁嘔吐加砂仁 三錢

白朮

香附 三錢

嗽加杏仁 五分

五味 一錢

蘇葉桔梗 各三錢

調經丸

當歸 二兩

白朮

厚朴

赤芍

熟地

小茴

枳殼 各一兩
二錢

陳皮

砂仁

三稜

乾漆

甘草

白芷 各一兩

青皮

陳艾 各二錢

粉草 五錢

香附 醋製
五兩

川芎 一兩
五錢

爲末。米醋糊丸。空心米湯下。三

四十九

婦人十九二十嫁出時。但遇經脈動時。徧身疼痛。手足麻痺。或寒熱頭目昏眩。或由感冒而致。當急用烏金散。多二貼。少一貼可愈。

烏金散

厚朴

蒼朮

川芎

茯苓

當歸

半夏

白芍

羌活

獨活

牛膝 各三錢

陳皮

桔梗

白芷

枳殼 各一錢
五分

麻黃 四分

甘草 五分

桂枝 一錢
五分

分四帖。加姜 三片 葱白 二個

空心熱服。嗽加杏

仁。五味 各二錢

泄瀉。加枳殼。豆蔻。粟殼 各一錢
五分

婦人二十一。二。經脈不調。赤白帶。或如梅汁。或片。或二三月不行。潮熱咳嗽。飲食不思。四肢困倦。若此症日久不治。則成骨蒸癆。急服人物溫經湯。若帶如魚腦者。冷極須繼用烏金散。

人物溫經湯

當歸

香附

鹿茸 醋炙如
熱少用

川芎

熟地

白朮

山黃

小茴各二錢

甘草一錢

分四帖。加姜三片。空

心服。如盜汗。加棗仁。黃芪各二錢

嗽。加杏仁。五味子各二錢

潮熱。加黃芩。

柴胡各二錢

婦人二十三。四。腹心脹滿。氣升上隔。飲食不思。腹結塊成瘕。此因經後潮熱。誤食生冷。聚成痰飲。若不早治。復成大患。

君子湯

陳皮

茯苓

枳實

川芎

赤芍

蘇葉

檳榔

桔梗

白朮

半夏各二錢

當歸

香附

厚朴各三錢

甘草一錢

紅花

黃連酒炒

柴胡各一錢

砂仁一錢五分

分八帖。加姜三片

空心服。如嗽。

加五味子。杏仁各二錢

口渴潮熱。加竹瀝二匙

酒水各半煎。

婦人二十五。六。血海虛冷。經脈不調。或時腹下疼痛。或白帶。或魚腦髓。或米汁。信期不定。每日淋漓不止。面色青黃。四肢無力。頭暈眼花。此氣血兩虛之症。

加味四物湯

當歸

鹿茸

白芍

香附各三錢

川芎

熟地各二錢五分

黃芪

白朮

茯苓

黃芩

陳皮去白

砂仁

人參

阿膠

小茴

山黃各二錢

沉香

粉草各一錢

延胡二錢

分四帖。加姜三片

煎空心服。如熬嫩潮熱加五味子、杏仁各五分、竹瀝少許。

烏雞丸此方等調經如
有熱者忌用。

人參 砂仁各五錢 白朮 川芎 熟地

當歸 厚朴 香附各一兩 海金砂 銀蟲砂

柏葉各二兩 殭蠶 防風各五錢 粉草二錢五分 共為末。外用烏骨

雄雞一隻 三年陳者。用竹刀殺之。去毛血頭足肚雜。洗淨。用陳酒一

大升。將藥末分三分。以一分納雞肚內。一分入湯內。一分留下。聽用。

文武火煮熟。將雞骨拆開。熬乾原汁。取雞骨肉藥末。晒乾為細末。同

留下一分藥末和勻。以米飯為丸。每日空心酒下五十丸。

〔吳按〕前卷烏雞丸藥味純和。與廣東白鳳丸同功。乃婦科良劑。此丸重用金石。豈可常服。若刪去二砂。為八珍加減。亦可用也。

婦人二十七入。身體困倦。少食。經水時時淋瀝不止。或塊或片。或流赤白黃水。面色青黃。眼花。四肢酸痛。將成崩漏。

止經湯

當歸五錢 白芍各四錢 阿膠炒 黃芩

蒲黃炒 柏葉鹽水炒 白朮各三錢 砂仁二錢 香附

熟地各四錢 炙甘草一錢 分四帖。加姜三片 如嗽。加五味子、杏仁各三錢

氣急。加半夏、蘇葉各二錢 泄瀉。加豆蔻、粟殼各二錢 肚痛。加枳殼、延胡乾

漆各三錢 若虛冷。可服前補經湯。或烏雞丸。以補心血。若口乾潮熱。不

可用烏雞丸。可服八珍散。以扶脾胃。切忌亂服藥。若已半年不調。用調經散可治。

婦人二十九三十。連年生育。氣散血虛。經脈不和。或二三月不行。不時腹痛。結成血塊。日倦夜熱。飲食少思。此血虛胃熱。抑或勞倦而致。先服紅花當歸散。後服八物湯。

紅花當歸散

當歸 六錢

川芎

赤芍

熟地

黃芩

香附

延胡

厚朴 各四錢

小茴

柴胡

陳皮

莪朮

牛膝 各二錢

三稜 先服二錢後少用

甘草 五分

紅花 一錢

先服分八帖。少加姜。水煎。空心服。如惡心嘔吐。加砂仁。

一錢 良姜 一錢

五分 泄瀉。加豆蔻。粟殼。各三錢

偏身痛。加羌活。獨活。各二錢。嗽。

氣急。加杏仁。五味。桔梗。蘇葉。各一錢

婦人三十四五。血氣脾胃俱虛。或經水動時。當風坐臥失避。身入虛邪。偏身麻痺。經脈受風。咳嗽有痰。用減味五積交加散。兼八物湯治之。

減味五積交加散

羌活 五分

當歸

川芎

獨活 二錢

白芷

厚朴

蒼朮

枳殼

防風

陳皮

半夏

柴胡

桔梗

茯苓 各二錢

麻黃

桂枝

甘草 各五分

分四帖。加姜 三片

連根葱白 五個

空心熱服。如

不能行動去柴胡。加殭蠶烏梅各五。酒煎嗽加五味杏仁各三。
婦人三十六七。若行經太多。此因血氣虛甚。胃氣不足。故血妄行。宜補調
氣血。養脾胃。庶年老可無血崩之患。

八珍散

人參

茯苓

川芎

熟地

白芍

香附各三錢

白朮

當歸各四錢

甘草一錢

分四劑。姜水煎服。

如肚痛。加延胡三錢

潮熱。加黃芩。柴胡各三錢

婦人三十八九。經水斷絕。腹中有塊疼痛。頭暈眼花。飲食不思。此氣血虛
惡血不散。急當散其瘀血。溫調血脈。以除後患。

加減莪朮散

當歸

莪朮

延胡

熟地

枳殼

青皮

白朮

黃芩各二錢

川芎

三稜

小茴

砂仁各三錢

乾漆

紅花各一錢

香附五錢

甘草二錢

共爲末。每日空心酒下三錢。

婦人四十二三。經水斷絕。五十一二。其經不定。常常淋瀝。或塊或條。或漏
不止。陰陽相反。血氣妄行。失其調理。最難得痊。百中三五可治。急服和經
湯兼四物湯。補經湯或烏雞丸。

和經湯

當歸

山藥

茯苓

黃芩

香附

白朮各一兩

白芍一兩五錢

棗仁

炒蒲黃

炒阿膠

白芷

陳皮

小茴各六錢

甘草三錢

和勻。一兩三錢一

帖。加姜三片

空心熱服。若一二帖後不止。即去香附。陳皮。小茴一半。

女科旨要卷二

雪巖禪師增廣

仁和吳煜茶垞校訂
杭州徐志源句讀

診婦人有孕論

夫肝爲血。今肺爲氣。血爲榮。今氣爲衛。陰陽配偶不參差。兩臟通知。兩類例。血衰氣旺。定無孕。血旺氣急。應有體。左疾爲男。右疾爲女。流利相通。定來去。兩指關脈大相應。已形雙孕。分男女。左手帶縱。兩個兒。右手帶橫。一雙女。左手脈逆生三男。右手脈順生三女。一關風部皆相應。一男一女。分形證。有將兒死。母身存。或卽母亡。存子命。往來三部通流利。滑數相參。皆勿替。陽實陰虛。脈得明。遍滿胸堂。皆逆氣。左手太陽浮大。男。右手太陰沉細。女。指下分明。長記取。三部沉正等無絕。尺內不止。眞胎矣。夫乘妻。令縱氣露。妻乘夫。令橫氣助。子乘母。令逆氣參。母乘子。令順氣護。小兒日足。胎成聚。身熱脈亂。無所苦。汗出不食。吐逆時。精神結備。其中住。滑疾不散。胎三月。但疾不散。五月母。洪緊牢強。滑各安。沉細而微。歸泉路。

〔吳按〕亦有虛弱孕婦。三月之前。不現於脈者。然細診兩尺。必有流利不絕之象。若五月之後。則洪滑等脈。爲有餘。沈細微等脈。爲不足。所以未產。預分其吉凶也。

按月受胎形症

初月胎形。一點精華。如草上露珠。未有宮室。在牝戶之處。未入腹內。其形

或聚或散。

初月胎症。少婦初次懷胎。一月滿足。害羞不對人言。時醫不識。誤作阻經治。致有頭暈。惡心。飲食少思。腹內作痛。六脈浮緊。并婦人稟氣薄。及病後受胎。俱須用罩胎方保之。若只氣不和。可服安胎和氣散。

罩胎方

當歸

白芍各四錢

枳殼三錢

砂仁二錢

甘草六分

分二帖。空心溫服。

安胎和氣散

藿香

陳皮

蒼朮

砂仁

黃芩

桔梗

益智仁各二錢

厚朴

枳殼各一錢

甘草

紫蘇各二錢

小茴一錢五分

空心溫服。

分二帖。加燈心一團

二月胎形似花綻。以受胎一月滿足。已受血近陽。形如桃花。分枝葉在母陰戶內六七寸。其胎入腹。未入衣裏。二月胎症。貧寒之婦。挑磚弄瓦。移床運物。傷觸胎氣。致有頭暈。目花。惡心。嘔吐。不思飲食。并虛弱婦。胎氣不安。俱宜安胎和氣散治之。若慣墮胎者。當一月內。兩服安胎和氣散。保過五個月。身孕而止。

〔吳按〕凡受孕一月之後。不勞動者。亦有惡阻。輕者不必治。重者只服藥數劑而已。倘虛弱慣墮胎者。必須大補氣血。庶根深蒂固。若和氣散。只可治惡阻耳。

三月胎形似蠶繭。漸漸長形。一頭大一頭小。其頭尖圓。未入宮室。已至臍下。漸有裹其形。薄衣胞之。

三月胎症。虛弱之婦。胎氣不和。惡心嘔吐。或觸動胎氣。或秋天極寒。極熱相蒸。所染各症。俱用前安胎和氣散加減。如患瘧。加青皮二錢。草果三錢切忌。潮熱。加黃芩柴胡各三錢。嗽。加杏仁。五味子各二錢。氣急。加沉香五分。用常山磨沖

〔吳按〕沉香重墜不宜用。

四月胎形。已入子宮之室。衣裹已至丹田之所。忌食兔獐諸毒之物。

四月胎症。胎至四月。能令孕婦身體困倦。氣急發熱。飲食無味。貪眠。頭暈。四肢酸軟。宜用活胎和氣散治之。

活胎和氣散

枳殼

厚朴

香附

砂仁

蒼朮

陳皮去白各二錢

蘇葉一錢

甘草八分

小茴一錢

分三帖溫服。

五月胎形。男女分定。令胎母前行。使女於後呼之。左回頭是男。右回頭是女。思酸男。思淡女。此時已入宮室。其胎穩安也。

五月胎症。胎至是月。若胎妊困弱。能令胎母腹重。貪眠。飲食無味。肚中膨脹。胎有些動。可服瘦胎飲一二三帖。能養聚胎氣。而精神安好也。

〔吳按〕亦有至六七月而半產。小兒雖啼。而不育。均因氣虛。不能繫胎。血弱不敷養胎。宜預為調補。倘係跌損。又當別論。

瘦胎飲

當歸 三錢

澤瀉

白芍

益母草

枳殼

茯苓 各四錢

砂仁

香附

益智仁 各三錢

白朮 二錢

甘草

柴胡 各一錢五分

分三帖。空心服。

六月胎形。男左動。女右動。常在臍中。漸漸浮如魚食水一般。

六月胎症。胎至六月。其婦瘦弱。可服瘦胎飲二三帖。護胎母之苦。使臨產

時。脈調和。且易生而無憂慮之患。若壯健婦。不必服藥。

七月胎形。男向左脅動。女向右脅動。七月已足。亦有降生成人。所以胎母

至此。行步艱難。

七月胎症。至七八月足。其胎重如石。行走甚艱。脾胃虛弱。或時氣急衝心

胸。前脹滿。咳嗽。若誤食熱毒物。能令胎動不安。名曰子懸。俱用知母補胎

飲治之。

知母補胎飲

知母

蘇葉 各二錢

枳殼 四錢

益母草

黃芩

滑石

香附 各三錢

甘草 五分

分二帖。空心服。

八月胎形。毛髮俱齊。蓋以胎至是月。而始生毛髮也。

八月胎症。胎兒長髮。令母心煩悶躁。多致思食而不知味。四肢無力。脾胃

虛弱而不和。溫熱相攻。臟腑欠安。或變痢疾。或傷胎氣。宜服和氣平胃散

以安胎利氣。

和氣平胃散

厚朴 黃連 豬苓 澤瀉 地榆

蒼朮 白朮 白芍各二錢 柴胡 升麻各四分

豆蔻 一錢 陳皮 三錢 甘草 一錢 分三帖。空心溫服。

〔吳按〕此方宜去升柴。則平穩可用。

九月胎形。七情開竅。眼有光。鼻有氣。耳有聞。口有味。各道俱全。方能左右轉身大動。胎母覺知。憂悶煩也。

九月胎症。胎至九月。如胎欲產。急然肚痛。先行漿水。嬰兒不降。此胎前誤食熱毒之物。傷胎。使胎不順。故嬰兒不降。速服保生如聖散。

保生如聖散

柴胡 二錢 益母草 二兩 枳殼 一兩 當歸 四錢質弱者可用 砂仁

陳皮 益智仁 二錢去殼各 白芍 四錢 甘草 一錢

蘇葉 五錢 分二帖。煎服之後。胎猶未降。用活鯉魚 一尾 加醋 一匙 同

上藥煎服外。再服烏金丸 一粒 無不降矣。烏金丸具下條。

其十月胎形。受胎滿足。必待胎母四肢交骨罅縫俱開。方許降生。既生。莫令嬰赤之兒下地。恐賊風吹。須人抱接包裹。至產母務謹慎調護。庶母子兩保平安也。

其十月胎症。十月滿足。臨產有橫逆之厄。皆因恣情內傷。或潮熱所致。或胎前任用熱毒之物。瘀血相搏。或七情怒氣所傷。當此倉忙。又不加謹。輒使穩婆生生取出。必至觸死。胎兒在腹。不能醫治。今備妙方防之。以濟此

急。惟服活命無憂散一二帖。加烏金丸二枚。可救。

活命無憂散

益母草二兩 急性子三錢 當歸三兩 枳殼一兩 生地

蘇葉 白芍各三錢 肉桂 川芎 陳皮

艾各一兩 甘草五分 小鯉魚一尾 分二帖水煎。臨服加醋一匙 入

藥服。再服烏金丸一類。倘死胎不能碎下。急取無根水再煎一服。并

送烏金丸一類。無不效。

烏金丸

蛤粉炒阿膠四兩 熟艾一斤五月五日收 穀芽 麥芽

敗筆即蘇木各二兩 龍衣即蛇說一條要完全者 凡修煉此藥。須擇天月一二德。天醫吉日。晝

太極圖。分兩儀。定九宮。而生八卦。忌婦人雞犬聲。至夜間寂靜。齋戒

至誠。念淨心淨口淨身淨。天地咒。咒畢。發火煉藥。口念咒曰。天精地

精。精精靈靈。左朝北斗。右拱北辰。人逢此藥。各保安甯。急急如律令。

煉成包好。候五月五日。五家角黍米。同搗勻為丸。如桐子大。硃砂為

衣。此藥產後胎前。催生護生。無不立效。

〔異按〕所謂煉者。炒研各藥成末。候午節角黍為丸。非煉丹之比。

女科旨要卷三

雪巖禪師增廣

仁 and 吳煜茶垞校訂
杭州徐志源句讀

診產後證論

產後三四五日。或半月之間。忽然狂言亂語。目見鬼神者何也。因產後敗血虛弱。邪氣乘虛入於臟腑。血痰攻心所致。

烏金散

川芎

當歸

遠志

杏仁

棗仁

白朮

赤芍

香附

砂仁

羌活

熟地

防風

扶神

半夏

全蝎

麥冬

人參

牛膝

天麻

分二帖。姜

三片

葱

三根

水煎磨金銀汁。和入藥內。不時服。產後發熱。口

乾作渴。脣裂生瘡者何也。因產後好食姜、椒、蒜、生雞、嫩鴨、犬肉、熱物過多。血熱積於脾胃。氣攻上焦。煩渴。皆因此致。

逍遙散

當歸

白芍

甘葛

生地

川芎

人參

麥冬

柴胡

烏梅

甘草

分二帖。空心服。

產後發熱惡寒。瘧者何也。敗血虛弱。感冒風寒。四肢酸痛。頭暈目眩。莫作時瘧治。此虛弱而致。

烏金湯

厚朴

柴胡

黃芩各二錢

麻黃六分

陳皮

當歸

川芎

桔梗

茯苓各一錢五分

桂枝

蒼朮

白芷

枳殼

羌活各一錢

草蓂

半夏各二錢

甘草九分

白芍

熟地各一錢五分

分二帖。加姜葱引。

如有汗。倍用當歸。川芎。桂枝。白芍。熟地。脹。倍用厚朴。陳皮。寒。倍用半夏。蒼朮。草蓂。桂枝。熱。倍用柴胡。黃芩。痰。倍半夏。扶芩。痢。倍當歸。去枳殼。甘草。頭痛。倍川芎。白芷。羌活。餘血在腹。成塊作痛。加三稜。莪朮。元胡。大茴。遍身痛。加獨活。倍羌活。浮腫。氣急。泄瀉。九死一生。若單氣急。加枳殼。枳實。木香。杏仁。單泄瀉。去枳殼。加粟殼。訶子。豆蔻。膈氣急。加杏仁。蘇葉。倍用桔梗。枳實。汗去麻黃。加黃芪。嗽加杏仁。渴加烏梅。乾姜。脹加砂仁。香附。

加味八物湯

產後遍身浮腫。氣虛潮熱。蓋因脾胃虛弱。血氣衰敗。傷風在裏。若脈浮強。大。用藥可治。如兼泄瀉。氣急。脈細者。難治。

人參

茯苓

熟地

小茴各三錢

白朮

川芎各四錢

當歸

白芍

香附各五錢

甘草

黃芩 錢 柴胡 各三錢

分六帖。姜 三片

水煎服。服盡。又用調經丸治

之。如肚痛。加延胡。乾漆。枳殼 各三錢

嗽加五味。麥冬。款冬花 各三錢

手足

麻痺。加肉桂 五分

調經丸

當歸 二錢

白朮

厚朴 各七分

赤芍

熟地 各五分

小茴

枳殼 各七分

陳皮

砂仁

牛膝

元胡 各五分

莪朮 醋炙

白芷 各五分

艾綿 一兩

粉草 三分

青皮 六分

川芎 七分

香附 醋炙 二兩

為末。米糊丸。

產後語言恍惚。顛倒錯亂。此血耗氣散。本原不足。腹內空虛。睡臥不安。或邪不退之故。

四物補心湯

當歸 五錢

川芎

生地

白朮

白芍

扶神

半夏

桔梗 各四錢

陳皮 三錢

防風 五分

甘草 一錢

分五帖。姜 三片

溫服。如熱加黃連 酒炒 三錢

產後失音。言不出口。因心肺二經被瘀血所侵。孔竅皆閉。或傷風所致。宜逐血補心。不可誤服他藥。

逐血補心湯

紅花

赤芍

生地

桔梗

蘇葉

前胡

膽星

黃連

茯苓

防風

粉草一錢 分三帖。姜三片 空心服。

產後痢疾。裏急後重。因食熱毒太過。後食生冷之物。冷熱不和。能成此症。

加減和胃湯

厚朴 五錢

陳皮

豬苓

澤瀉

歸尾

黃連

白芍

黃芩 各三錢

地榆

豆蔻 各二錢

升麻 五分

甘草 二錢

分五帖。

產後四肢骨節。遍身疼痛。蓋產育之時。周身二百六十骨節開張。氣血俱虛。勞傷。坐臥又出房。冒風所致。用烏金散治之。

產後小便緊澁不通。因血熱積於小腸經。水道不利。誤將熱毒物食之。卽成淋瀝。

通苓散

赤苓

澤瀉

木通

黃連

豬苓 各三錢

白朮

瞿麥

杞子

滑石

車前 各二錢

分四帖。加姜三片。燈心十根。空心溫服。

產後忽然下血成片。相似血崩。此因血氣大虛。脾胃又弱。以致榮衛衰敗。

正經四物湯

當歸

白雞冠花 各五錢

白芍

白朮

香附 妙各四錢

熟地

川芎

人參

阿膠 妙

茯苓

側柏葉 妙

棗仁

陳皮 去白

炒蒲黃 各二錢

炙甘草 一錢 分六帖。加姜 三片

產後嗽。氣急痰涎多者。因秋冬生產。失於調理。胎腹虛損。肺經欠安。所受風寒。能致此症。宜消風去痰。

青龍湯

白茯苓

白芍

杏仁

半夏 各二錢

當歸

桔梗 各二錢五分

桂枝

川芎

五味

乾姜

陳皮 各二錢

麻黃 一錢

細辛 七分

甘草 一錢

分四帖。加燈心 一團

空心服。如虛腫加大腹皮。瞿麥 各一錢

嗽加蘇葉。枳殼 各三錢

四肢怕冷。

加川芎。南星。木香 各一錢

氣急加蘇葉。枳殼 各二錢

產後嘔吐。飲食不下。腹脹。因產後敗血。血氣攻於脾胃之間。氣不順而致。日久不療。必成翻胃。

香砂養胃湯

半夏 四錢

白朮

陳皮

茯苓

厚朴

香附

藿香 各三錢

砂仁

檳榔

草菓

甘草 各一錢

分四帖。加烏梅 一個。乾姜 一錢。溫服。

產後忽然中風不語。因胎前先染風邪未發。以致產後中風。或兼產難。失於調理。感冒。轉成此症。

續命湯

當歸

半夏 各五錢

川芎

麻黃 各四錢

防風

防己

白芍

杏仁

羌活

陳皮

茯苓

桂枝各三錢

天麻

人參

全蝎

殭蠶各二錢

甘草一錢

分四帖。加姜三片

同金銀器煎服。如化蘇合

丸同服尤效。若不能下藥。用鵝毛管插喉中。漸漸灌之自甦。甦後再服四物排風散。日二服。如藥灌不下而脣青者必死。

四物排風散

南星

半夏各一錢

防風

人參

羌活

防己

牛膝

杏仁

五味

當歸各五錢

川芎

白芍各八分

茯苓

棗仁

白朮

瞿麥各六分

枳實

白芷

天麻各四分

甘草二錢

熟地七錢

分三帖。姜三片

空心服。如泄瀉。去枳實。加豆蔻。栗殼。各三錢

熱加黃芩。柴胡。各五錢

怕寒有汗。加黃芪。桂枝。各四錢

氣急。加沉香。五分 腹

脹。不思飲食。加砂仁。香附。各四錢

產後取重物。忽然膀胱下垂不收者。因產後勞傷太過。拘重物用力太多。又傷臟血。氣弱血冷。因而不收。甚至有二五月不能還原者。

收胎散

當歸

川芎

白芍各四錢

升麻一錢

熟地

白朮

枳殼各三錢

人參

陳皮各二錢

沉香五分

肉桂

吳萸各一錢

甘草九分

分四帖。加姜三片

空心熱服。服

後夜臥。產母原冷。將臍下四寸。艾灸七壯。產後心氣攻痛。因產後心血虛弱。不順七情。怒氣。諸風衝心。疼痛不可忍者。宜和心臍之藥。若使結久不散。則難治矣。

七氣手拈散

元胡

小茴

白芍

乾姜各二錢

黃連

石菖蒲

香附

蘇葉各一錢五分

枳實

枳殼各三錢

乳香

沒藥各一錢

甘草六分

分二帖。加姜三片

空心服。

產後百日外。面青浮腫。脣白氣急。此乃大虛之症。有汗當服下方。

大補湯

瞿麥

大腹皮

當歸頭

川芎

白朮

茯苓

白芍各三錢

人參二錢

黃芪

厚朴

五味子各二錢

熟地錢

甘草各一錢

分二帖。加燈心一團

煎服。服後

症不退。加川烏各五分。木香各五分。

如瀉。加訶子肉各二錢。豆蔻各二錢。粟殼錢。

女科旨要卷四

雪巖禪師增廣

仁和吳煜茶垞校訂
杭州徐志源句讀

治十八般難產論

子死腹中。因妊婦熱旺不治。過六七日。經傳臟腑。熱及其胎。故死腹中。墜在臍下。宜保母命。急服烏金散。或烏金丸。用車前子七分。酒煎化服。胎氣轉熱即下。

難產者。因胎氣成全。子食母血。前一二月時。胎形小而餘血多。久而成塊。俗呼兒枕。產時兒枕雖破。尙有裹其子者。故難產耳。用烏金丸。將紅花。枳殼。益母草。各三分。酒煎磨服。何懼橫逆難產之症。

胞衣不下。因分娩時。母受其寒。血入其中。因寒寒則作脹。脹則胞衣不下。令人脹悶。湯水不欲到口。服烏金丸。用葱頭三個。當歸三錢。酒煎化服。胞衣遂下。敗血淨盡。

產後血暈。起止不同。眼目昏花。凡總理一身者。血氣。血氣未定。環走五臟。奔尅於肝。故有此症。俗呼暗風。服烏金散。或烏金丸。用白芍。菊花。各三分。酒煎化。

產後口乾心悶。因經絡未淨。胃氣未正。如食寒冷物。應有此症。蓋敗血犯心。包絡經。故爲煩爲渴。又呼胸膈壅悶之至。服烏金散。或烏金丸。用酒化。

服。

產後乍寒乍熱如瘧者。蓋寒熱虛瘧。只是敗血入於心肺。邪熱又入於脾胃。故有寒熱而渴。此非瘧也。服烏金散。或酒化烏金丸。

產後虛弱。四肢浮腫。因敗血走五臟。轉注四肢。停留不行。化作浮腫。若水腫者。氣閉小便澀也。血腫者。氣竭四肢冷也。治血腫當服烏金散。兼服硃砂丸。以茯苓末三錢。酒煎磨服。可消。另用煎藥治之。

硃砂丸

益母草

沉香

小茴

白芍

香附

防風

五味子

各等分

白朮

倍用

棗肉為丸。硃砂為衣。

產後眼花。口言鬼神。顛狂。因敗血熱極衝心。非風邪所侵。服烏金丸。用燈

心湯煎黃連

三分

磨服。或烏金散。

產後月內失音不語。蓋心有七孔三毛。散血走迷孔口。竅不能通。竅者音

也。故不言。非脫陰陽之症。服烏金散。或烏金丸。用甘菊。枳殼。桔梗。各三分。煎

湯化服。

產後腹內疼痛兼瀉。因胎母月內食酸冷堅硬之物。血氣不及。不能剋化。

流入大腸。作此瀉痢。服烏金散。兼用止瀉調氣湯。或烏金丸。用神糶。白豆

蔻。各三分

煎湯化服。

產後百節酸痛。因產時百骨開張。百筋用力。新血未生。敗血停經。聚滯不行。故作此症。亦非風邪所致。服烏金散。或烏金丸。用白芍。當歸。各三分。酒煎

化

產後血來成片塊。頻下不淨。因飲食前後惱怒。食中鬱怒之氣。觸血。敗血成聚而不淨。服烏金丸。用木通。香附。各三分。酒煎化服。

產後血崩。如產後三不節者。應有此症。調理飲食不節。寒熱不忌。房事不謹。此三者。必崩漏。身則潮熱。筋則急拘。胸則煩悶。服烏金散。或烏金丸。用

川斷。三分。酒煎化服。

產後膈滿氣逆。血氣不通。咳嗽嘔吐。此血入胃中。脾氣相沖。遇食沖食。遇氣上逆。故作嘔脹而吐血。服烏金散。或烏金丸。用烏藥。枳殼。各三分。煎湯化

服。

產後心痛。寒熱不常。此飲食不節。食痰相結。令人榮衛不宣。寒熱不常。四肢冷熱。心煩口燥。睡夢多驚。精神不爽。面常赤色。若此者。後必爲骨蒸之症。不治。用烏金散。或烏金丸。以柴胡。半夏。各二分。煎湯化服。

產後口鼻黑氣。及鼻衄。并一身斑點。頂。此敗血流入於臟腑。溢滿肌膚。一身四肢不能回走。故作熱結之症。其人面黃便結。用烏金丸。以羌活。升

麻。各五分

酒煎化服三丸。或可回生。然此症十能救一。

產後喉中沙作蟬聲。此敗血走入孔竅。轉入於臟腑。肺生氣。氣生血。氣血走臟竅。敗血沖遇。成塊入喉。故作此症。急服烏金丸。用山豆根。歸尾。各三分。煎湯化服。庶可回生。

產後中風。或眼目昏花。腰骨疼甚。如角弓形。蓋產後未滿百日。俱要調養

身體若多勞房事。及當風坐臥。應有此症。其人身重不能轉側。服烏金散。或烏金丸。用羌活。五靈脂各三分。大生地一錢。酒煎化服。

方症補遺

婦人月經不通。

通經散

川牛膝

當歸

劉寄奴

紅花

蘇木

肉桂

白芷

急性子

白芍

甘草各等分

爲末。每服四錢酒下。

婦人經水重來

五靈丹

蓮房

人髮

棕櫚

柏葉各燒灰存性

黃芩各等分

研末。每服二錢。米飲湯下。一日一服。五六服即愈。

婦人經水過多。

固經丸

黃柏炒三錢

黃芩

龜板各一兩

白芍四錢

樗根皮七錢

香附童便浸一宿二錢五分

共爲末。酒丸清湯下。

婦人月經不調。

調經散

三稜

小茴

白芍

香附

澤瀉

當歸各一兩

蘇葉

紅花

青皮

生地各五錢

枳殼

丹皮各一兩

先用煎服。分四帖。後為末。每服三錢。酒下六

七服見效。若要溫經。加人參、麥冬、阿膠。各三錢

婦人漏下不止。其色鮮紅。先由勞役。脾胃虛損。氣短氣逆。自汗不止。身體發熱。大便泄瀉。四肢無力。不思飲食。

歸芍二黃湯

黃芪一錢五分

白朮

蒼朮

當歸

白芍

陳皮各一錢

熟地五錢

生地

炙甘草各三錢

柴胡二錢

水煎服。

婦人帶下。脈數。虛而兼熱。

千金散

杞子一兩

生地五兩

酒一升

煎至三合服。

婦人氣血俱損。

加減八物湯

人參

當歸

黃芪

熟地各三錢

白芍

川芎

白朮

茯苓各二錢

肉桂

甘草各六分

大棗三枚

水煎溫服。

婦人怯損

十全大補湯

沉香 三分

生地

熟地

當歸 各三錢

白芍

牛膝

藿香

川芎 各一錢

人參 五分

杞子 二錢

壯鴨 一隻

將上藥納鴨肚煮極熟去藥食鴨飲湯連服數隻則身

壯力健。

婦人新產血氣俱傷五臟暴虛肢體羸瘦乏氣多汗。

理中丸

白朮

人參

乾姜 各五錢

甘草 二兩

為末蜜丸空心米

湯下三錢自新產可服至百日。

婦人暑月產乳因取涼太多得風冷腹中積聚百病竟起迄至將死百藥不效惟服桃仁煎。

桃仁煎

桃仁 一千二百粒

去皮尖共炒黃色研細末加好酒 一斗

入桃仁研末分

三四次入瓦瓶中密封口以麵封固放熱湯中煮一日以瓶口有熱湯氣出為度收藏不時溫服。

附兒科問候

新產小兒遍體如金色此乃母受熱而纏胎之故兒身熱便閉口不吃乳啼叫不止用生地當歸白芍川芎花粉 各等分 母子同服。

小兒面色青白不常此乃胎中受寒生下感風四肢厥冷大便青黑腹作盤腸之症用炒當歸炙黃芪細辛黃芩龍骨桂心白芍共為末每服二錢。

以乳調服三服後加減

小兒上唇白點者病與傷寒相似此變症之故用麻黃去節燒灰存性為末以滾湯調服服後有微汗則身涼而愈

大黃杏仁各一錢

〔吳按〕初生小兒牙床上下唇有白點即用銀針挑破取出白米拭淨惡血再用百草霜擦之俗名馬牙臍米若日久則挑之不破則臍米切不可吞下倘落肚即難救矣

小兒急慢驚風用大蠶蛾一對

大葱一條

將蛾雌雄各一納入葱管兩頭

縛住令陰乾燒灰清湯調服

小兒鵝掌瘋用鵝掌黃皮不拘多少

棉花子花椒共搗用火籠於被下將上藥

入火內烘薰三五次愈

女科百問目次

第一問精血以分男女之本源	一	第十八問婦人身體疼痛流注不定	一九
第二問古法男三十而娶女二十而嫁	一	第十九問朝食暮吐	二〇
第三問婦人感病倍於男子	二	第二十問婦人之病多因氣生	二一
第四問何以謂之天癸	二	第二十一問猝然而死少間復甦	二二
第五問何以謂之經候	二	第二十二問病非瘧之邪四時多病寒熱	二三
第六問經候或前或後多寡不定	三	第二十三問因咳嗽經候不行	二四
第七問月水依時來不快利	五	第二十四問咳嗽有紅痰	二五
第八問經水欲行先身體痛或腹痛	六	第二十五問吐血衄血齒衄舌上出血汗血	二六
第九問月水閉絕不通	八	第二十六問婦人偏喜酸物或嗜冷	二七
第十問虛勞之病何以別之	九	第二十七問婦人喜少怒多悲泣不止	二八
第十一問婦人卦數已盡經水當止而復行	一二	第二十八問咽中狀如梅核或如炙肉	二八
第十二問何謂避年	一三	第二十九問婦人足十指痛如油煎覆之則熱	二八
第十三問室女經候當行不行	一三	痛風吹則冷痛	二九
第十四問未出閨門女有三病	一四	第三十問婦人少年髮少	三〇
第十五問婦人多驚	一五	第三十一問四肢如故但腹脹者	三一
第十六問婦人多因風冷而生諸疾	一六	第三十二問病有血分有水分何以別之	三一
第十七問婦人多頭眩而冒	一七	第三十三問心腹痛或又有小腹痛	三一

第三十四問下利經水反斷……………三四 第五十二問何以謂之有娠……………五三

第三十五問婦人晝則明了暮則譫語如見鬼……………三五 第五十三問何以謂之居經……………五四

狀……………三五 第五十四問婦人居經之後心中憤悶不欲執……………五四

第三十六問癲狂之病……………三六 作惡聞食氣……………五五

第三十七問病有一臂痛有兩臂俱痛……………三八 第五十五問居經之後或復有漏下……………五七

第三十八問婦人渴病與三消之病同異……………三九 第五十六問胎在腹中時時撞動不安……………五九

第三十九問腰痛如折……………四〇 第五十七問何謂子滿……………六〇

第四十問婦人面多生黑肝與黑子……………四一 第五十八問妊娠三月曾經墮胎至其月日復……………六二

第四十一問身目黃……………四一 墮……………六二

第四十二問陰崩陽崩何以別之……………四二 第五十九問大小二便秘結不通……………六三

第四十三問眠臥多汗……………四三 第六十問妊娠傷寒與常人傷寒治法同異……………六五

第四十四問左脇痛如刀刺不得喘息……………四四 第六十一問妊娠傷寒差後復發熱……………六六

第四十五問積聚之病何以別之……………四五 第六十二問時氣溫病皆能損胎……………六七

第四十六問身體常瘙痒……………四七 第六十三問妊娠寒熱或因暑氣有不因暑氣……………六八

第四十七問夜與鬼交……………四七 而得之……………六八

第四十八問大小便不通……………四八 第六十四問下痢與滯痢何以別之……………七〇

第四十九問帶下三十六疾……………五〇 第六十五問喘病何以得之……………七二

第五十問婦人有帶下或淋漓不斷何以別之……………五一 第六十六問妊娠多疲者緣何而生……………七三

第五十一問男女受形之始何以別之……………五三 第六十七問妊娠霍亂……………七三

第六十八問何謂子煩	七五	第八十七問產後乍見鬼神	一〇二
第六十九問何謂子嗽	七六	第八十八問產後不語	一〇三
第七十問何謂胸痺	七七	第八十九問產後腹痛又瀉痢	一〇三
第七十一問何謂子癰	七八	第九十問產後遍身疼痛	一〇四
第七十二問胎痿過年不產又兩胎一死一生	七九	第九十一問產後大便祕澀	一〇五
第七十三問妊娠墮胎或血出不止或血不出	八〇	第九十二問產後血崩	一〇六
第七十四問何以謂之子淋	八一	第九十三問產後腹脹悶滿嘔吐不定	一〇六
第七十五問小便或有利或有不通	八二	第九十四問產後口鼻黑氣起及鼻衄	一〇七
第七十六問大便或利或祕	八三	第九十五問產後喉中氣急喘	一〇七
第七十七問妊娠至八九箇月兩脚俱腫	八五	第九十六問產後中風	一〇八
第七十八問妊娠十月將養之法	八六	第九十七問產後心痛	一〇八
第七十九問橫生逆產	九四	第九十八問產後熱悶氣上轉爲脚氣	一〇九
第八十問熱疾胎死腹中	九五	第九十九問產後汗出多而變瘧風	一一〇
第八十一問胎衣不下	九七	第一百問產後所下過多虛極生風	一一〇
第八十二問難生	九七		
第八十三問產後血暈	九八		
第八十四問產後口乾痞悶	九九		
第八十五問產後乍寒乍熱	一〇〇		
第八十六問產後四肢虛腫	一〇一		

女科百問卷上

步軍司醫官兼太醫局教授齊仲甫撰 紹興裘詩福吟五校

○第一問。精血以分男女之本源者。何也。

答曰。男子以精爲本。女子以血爲源。男子爲陽。陽中必有陰。陰中之數八。故一八而陽精降。二八而陽精盜。女子爲陰。陰中必有陽。陽中之數七。故一七而陰血升。二七而陰血盜。陽精陰血。皆飲食五味之實秀。爲男女之本源也。方其升也。智慮開明。齒牙更始。髮黃者黑。筋弱者強。暨其盜也。凡充身肢體。手足耳目之餘。雖針芥之處。無有不至。凡子形肖父母者。蓋其精血。嘗於父母之身。無所不歷也。是以父一肢廢。則子一肢不肖其父母。一目虧。則子一目不肖其父母。然雌雞牝獸。無天癸而成胎。何也。鳥獸精血往來尾間也。精未通而遇女子。通其精。則五體有不滿之處。異日有難狀之疾。陰已痿而思色。以降其精。則精不出而內敗。小便道澀而爲淋。精已耗而復竭也。女人天癸既至。踰十年無男子合。則不調。未踰十年男子合。亦不調。不調則舊血不出。新血誤行。或漬而入骨。或變而爲腫。或雖合而難子。合男子多。則瀝枯虛人。產乳衆。則血枯殺人。觀其精血。思過半矣。

○第二問。古法男子三十而娶。女子二十而嫁者。何也。

答曰。天以剛陽爲尊。地以柔陰爲卑。則乾坤之體定矣。若天不剛陽。地不柔陰。是乾坤之體不定矣。夫乾道成男。男自子位左旋。積三十歲而至巳。

所以男及三十而娶。當是之時。天陽已剛也。坤道成女。自子子位右旋。積二十歲而至巳。所以女二十而嫁。至斯之際。地陰以順也。故及其時得子皆強。所謂乾坤之體定矣。不及其時而嫁娶者。則剛陽柔陰。必有所虧也。

○第三問。婦人感病。倍於男子者。何也。

答曰。夫婦人者。衆陰之所集。常與濕居。十四以上。陰氣浮溢。百想經心。內傷腑臟。外損姿容。月水去留。前來交互。瘀血停凝。中道絕斷。其中傷墮。不可具論。冷熱臟腑。虛實交錯。惡血內滿。氣脈耗竭。或飲食無度。損傷非一。或胎瘡未愈。合其陰陽。或行步風來。便利於懸厠之上。風從下入。便成十二痼疾。一作三痼之疾所以婦人別立其科也。若是四時節氣。虛實冷熱爲患者。故與丈夫治法同也。惟妊娠而挾病者。避毒藥。恐或傷胎耳。大抵婦人以其慈戀憎愛。疾妬憂恚。染着堅牢。情不自制。所以爲病根深。療之難差。故倍於男子之病者此也。

○第四問。何以謂之天癸。

答曰。謂壬癸北方水干也。壬爲陽水。配丁而化木。癸爲陰水。合戊而化火。經云。水火者。陰陽之證兆也。且婦人者。衆陰之所集。以陰類陰。故得水之癸干也。女至二七。腎氣全盛。衝任流通。經血漸盈。應時而下。天真之氣。殊降與之從事。故云天癸也。內經云。二七而癸至。任脈通。太衝脈盛。月事以時下。故有子。然衝爲血海。任主胞胎。陰靜海滿。二者相資。故令有子。

○第五問。何以謂之經候。

答曰。夫女子十四天癸至。腎氣全盛。衝流任通。血漸盈。應時而下。常以三旬一見。愆期者病。故謂之經候。然經者。常也。候者。謂候一身之陰陽也。經常之氣。伺候而至。若潮候之應乎時也。天真之氣。與之流通。故一月一次行。平和則不失乎期。所以謂之經候。又名月水也。

○第六問。經候或前或後。多寡不定者。何也。

答曰。夫婦人病。多是月經乍多乍少。或前或後。時發疼痛。醫者一例呼爲經病。不會說得是陰勝陽。是陽勝陰。所以服藥少得有效。蓋陰氣盛乘陽。則胞寒氣冷。血不運行。經所謂天寒地凍。水凝成冰。故令乍少而在月後。若陽氣盛乘陰。則血流散溢。經所謂天暑地熱。經水沸溢。故令乍多而在月前。當和其陰陽。調其氣血。以平爲福。

陽氣勝陰。月假多者。當歸飲。抑陽助陰。調理經脈。

當歸 去蘆
微炒

熟地 淨洗酒
蒸焙乾

川芎

白芍

黃芩 小半

白朮 各等分

右爲麤末。每服三錢。水盞半煎至八分。食前熱服。

沉香降氣湯。順氣道。通氣脈。

烏藥

沉香

香附

甘草

砂仁 各等分

右爲細末。每服一錢。空心鹽湯調下。

陰氣勝陽。月假少者。七物湯。治婦人營衛氣虛。經水愆期。或多或少而腹痛。

當歸

芎藭

白芍

蓬朮

川薑

熟地酒蒸焙乾

木香各等分

右為麤末。每服四錢。水一盞煎八分。溫服不拘時。

紫石英圓。治婦人病多是月經乍少。或在月後。時發疼痛。

紫石英水研飛

禹餘糧燒醋淬

人參

龍骨

川烏頭淘去皮

桂心不見火

杜仲去皮薑製炒黑

桑寄生

五味子

遠志去心

澤瀉

當歸去蘆

石斛去根酒炒

茯苓酒浸洗

乾薑炮各一兩

甘草炙牛兩

川椒去目并合口炒地上出汗

牡蠣固濟火燒遍紅各半兩

右為細末。煉蜜為丸。梧桐子大。空心米飲下二十九丸。至五六十丸。

已上無求子方

金華散。治婦人經血後熱。崩漏不止。口苦舌乾。經候不通。並宜服之。

玄胡索

瞿麥

當歸

牡丹皮

石膏二兩

乾葛各一兩

蒲黃半兩

桂心

葳靈仙各三分凡方中云一分者二錢五分也

右為麤末。每服二錢。水一盞。薑三片。煎至六分。空心服。

已上養生席判官方

通經丸。治婦人室女月候不通。疼痛。或成血痕。

桂心不見火

青皮去白

大黃炮

乾薑

川椒炒去目

蓬朮

川烏炮去皮尖

乾漆炒去烟出

當歸

桃仁炒去皮尖已上各等分

右為細末。將四分用米醋熬成膏。和餘六分末。成劑。白中治之。丸如

桐子大，陰乾，每服二十九。空心食前米飲湯下。加至三十九。溫酒亦得。

五靈脂散。治經候不止。拯濟方。

五靈脂為末。炒令過熟出盡烟。每服二錢。當歸二片。酒一中盞。煎至六分。去滓熱服。連三服立效。如血室有乾血。用醋一盞煎七分。和滓空心熱服。

溫經湯

治衝任虛損。月候不調。或來多不斷。或過期不來。或崩中去血過多。不止。又治會經損孕。瘀血停留。少腹急痛。發熱下利。手掌煩熱。唇乾口燥。及少腹有寒。久不受胎。

丹皮

阿膠 碎炒

當歸 去蘆

人參 去蘆

川芎

甘草 炒

肉桂 去粗皮

芍藥 各二兩

半夏 各湯洗七次。兩半

吳茱萸 三兩

麥門冬 去心五兩半

右為麤末。每服三錢。水一盞半。生薑五片。煎八分。去滓。空心食前熱服。

○第七問。月水依時。來不快利者。何也。

答曰。婦人月水。有四經之所主。一者衝任二脈。二者手太陽少陰二經。然衝為血海。任為主胞胎。二者相資。故令有子。手太陽者。小腸之經。為腑而主表。表屬陽。手少陰者。心之經。為臟而主裏。裏屬陰。此二經。在上為乳汁。

在下為月水。或勞傷氣血。致令體虛而受乎風冷。風冷客於經絡。搏於血氣。血得冷則壅滯。故令月水不宣利也。

養榮湯。治婦人血海虛弱。心忪恍惚。時多驚悸。或發虛熱。經候不調。

白芍

川芎

當歸

熟地

青皮

薑黃

川薑

丹皮

海桐皮

五加皮

白芷

右為咬咀。每服五錢。水盞半。薑五片。烏梅一個。煎至一盞。去滓溫服。

不拘時候。將此藥送下紫桂丸七十粒。紫桂丸方見四十九問

○第八問。經水欲行。先身體痛。或腹痛者。何也。

答曰。經脈者。行血氣。通陰陽。以營衛周身者也。血氣盛。陰陽和。則形體適平。或外虧衛氣之充。養內乏營血之灌溉。血氣不足。經候欲行。身體先痛也。或風冷之氣。客於胞絡。損傷衝任之脈。及手太陽手太陰之經。故月水將下之際。血氣與風冷相擊。所以經欲行而腰痛也。

此痛飲子。治經脈虛寒。身體疼痛。

虎骨五銖

茯苓

甘草

藁本

防風

白芷各二銖

當歸

白芍

續斷

吳朮

附子各二銖

右為麤末。每服五錢。水二盞。薑五片。棗二枚。煎至一盞。去滓溫服。不

拘時。

溫經湯治風寒客搏經絡。小腹作痛。

當歸

川芎

白芍

官桂

丹皮

蓬朮各半兩

人參

甘草

牛膝各一兩

右為麤末。每服五錢。水二盞煎八分。食前服。

沒藥除痛散。逐寒邪。療腹痛。

蓬朮茂兩

當歸炮一兩

玄胡索

五靈脂

肉桂

良薑炒兩

蒲黃炒各七錢半

甘草

沒藥各半兩

右為細末。每服三錢。溫酒調下。

楊氏謂婦人每經欲行必先腹痛。令服撞氣阿魏圓。酒調大聖散。下數服愈。經行不復痛矣。

撞氣阿魏圓

大聖散

見宋局方婦人門

茴香炒香

陳皮去白

青皮去白

川芎

丁香皮炒

蓬朮炮

甘草

縮砂仁

肉桂去粗皮

白芷炮各半兩

生薑四兩切鹽半兩

胡椒二錢

阿魏二錢半醋浸一宿以麵同為糊

右末阿魏糊為圓。雞豆大。每藥一觔。硃砂七錢為衣。常服一粒。嚼爛

醋湯茶酒任下。

滋血湯。治血風虛。經候澁滯。經脈不通。四肢麻木。肌體渾身疼痛。倦怠

將成癆瘵。

馬鞭草

荆芥穗各四兩

丹皮一兩

赤芍

枳殼 肉桂 當歸 川芎各二兩

右為麤末。每服四錢。烏梅一個。水煎食前服。

琥珀散。治月經擁滯。心腹疼痛。及治產後惡露不快。血上搶心。迷悶不省。氣絕欲死。

京三稜煮 蓬朮煮 赤芍藥煮 劉寄奴煮 牡丹皮煮

官桂 菊花 蒲黃 熟地 當歸各一兩

右將前五味。用烏豆半升。生薑半觔切片。米醋四升同煮。豆腐爛為度。焙乾入後五味同為末。每服二錢。溫酒調下。

○第九問。月水閉絕不通者。何也。

答曰。夫月水不通。因風冷客於胞絡。或醉後入房。或為血枯血痕血癥。或因墮墜驚恐。皆令月水不通也。病源云。血性得溫宣流。得寒則澁閉。既為冷所結搏。則月水不得通行。若腸中鳴者。則月事不來。不來因冷干於胃腑。或醉入房者。則內氣耗損。勞傷於肝經。或吐血唾血下血。謂之脫血。使血枯於中。為積塊血痕血癥。名曰血聚。使榮結於內。心主行血。墮墜驚恐。神無所倚而血散。亦令月水不通也。

順榮湯。治婦人血積血塊。痕癥。腹大內有塊形。築築作痛。久無寒熱。

大黃一兩酒浸 當歸 一兩 萹荑 半兩 鬼腰帶各一兩

枳殼一兩去穢 赤芍藥 半兩 猪牙皂角半兩火

右為咬咀。每服一兩。純酒二盞。煎至一盞。去滓食前溫服。

滋血湯。治勞過度。致傷腑臟。衝任氣虛。不能約制其經。血忽暴下。謂之崩中。或下鮮血。或下瘀血。或下血片。或下五色。連日不止。淋瀝不斷。形氣羸劣。倦怠困乏。或月水閉絕。氣不升降。

馬鞭草

牛膝

荆芥穗各四兩

丹皮

赤芍

枳殼

肉桂

當歸

川芎各二兩

每服四錢。烏梅一個。水煎空心服。至半月或一月。經脈自通。

桃仁煎丸。治血痕血積。經候不通。

桃仁去尖

大黃同

川朴各一兩

蟲半兩

右為末。以醇醋二升半。銀石器中慢火煎取一升半。下大黃桃仁蟲

蟲等。不住手攪。欲圓圓下朴硝。更不住手攪。良久出之。圓如桐子大。

前一日不用吃晚食。五更初。用溫酒吞下五粒。日午取下如赤豆汁。

雞肝蝦麻衣。未下再服。血鮮紅即止。續以調氣血藥補之。此千金方

出。

萬病丸見六問中

○第十問虛勞之病。何以得之。

答曰。夫有勞役之勞。有勞傷之勞。役之勞。所用太過。臟腑之氣失其常度。所以致疾。虛則已有所虧。勞則因有所損。其積之有漸。成之有日。豈一朝一夕而驟致哉。巢氏云。五勞六極七傷。謂之虛勞也。今尋原指要而論之。若腹脇有塊。大小成形。按之不動。推之不移。久久令人寒熱如瘧。咳嗽。面

目浮腫。動輒微喘。日就羸瘦。此繇暴怒驚恐。氣上而不下。動傷於肝。氣聚而不散。結而成形。結久而變勞。又有日頓羸瘦。氣短乏力。腰背牽急。膝脛酸痠。小便或赤。或白而濁。帶下不禁。夢與鬼交。翁翁如熱。骨肉煩疼。此繇房勞過度。精耗氣竭。得之於腎。為勞尤速也。

柏子仁圓。治婦人血閉不通。漸成癆瘵。

柏子仁 別研

當歸 洗

熟地

白茯苓

丹皮

卷柏

白芍藥

石斛

巴戟 去心

肉蓯蓉 酒浸

山藥

杜仲

白薇

蒲黃

枳殼

肉桂

京三稜 煨

蓬朮 煨

覆盆子

枸杞子 各一兩

附子 炮去皮 臍半兩

右為細末。煉蜜丸。梧桐子大。每服五十九丸。溫酒或米飲下。空心食前。

人參劉散。去熱解勞。調順經水。滋養新血。藥性中和。退熱。無大寒極冷之劑。

黃耆 三分

黃芩

赤茯苓

白朮

熟地

赤芍藥

麥冬 各一兩

柴胡 半兩

人參

知母

當歸

甘草 炙各三錢五分

右並生劉。如麻豆大。焙乾入磁器中收。每服四錢。水一盞半。竹葉。燈心三寸長。各七莖。同煎七分。去滓溫服。不拘時候。日三服。如病退。不

必服。

沉香煎。治暴怒驚恐。氣逆上而不下。動傷於肝。氣聚而不散。結而成形。

石斛 五兩

川椒 炒去目

附子 炮去皮

秦朮 去土

柴胡 去苗

沉香

木香

鱉甲 醋煮刮去筋膜

黃耆

檳榔 各二兩

右爲細末。先用新枸杞十觔。洗略槌碎。法酒二斗。煮取七升。取枸杞根。別用法酒三升。洗拍令淨。與酒一處。更入蜜四兩。煮成膏。和前件

藥末。丸如桐子大。米飲下三十丸。食前日二服。一方加柴胡二兩。楊

氏方。婦人患脾血病。時覺腹痛惡心。五心煩熱。如勞之狀。或進或退。

經候行而食驚恐所致。令服局方四物湯加吳茱萸同煎。溫服病愈。

逍遙散

四物湯加柴胡

又正方

白茯苓

白朮

白芍

柴胡

當歸

甘草

人參

每服用煨薑一塊。薄荷少許。不拘時煎服。

膠艾湯。治勞傷氣血。衝任虛損。月水過多。淋瀝漏下。連日不斷。腹臍疼

痛。及妊娠將攝失宜。胎動不安。腹痛下墜。勞傷胞絡。胎損漏血。腰痛悶

亂。因損動胎上搶心。奔衝短氣。因產衝任氣虛。不能約制經血。淋瀝不

斷。延引日久。漸成羸瘦。

熟地

白芍

當歸

艾葉 微炒

阿膠 炒黃

芎藭

甘草 炙各二兩

右爲咀咀。每服四錢。水一盞。酒六分。煎八分去滓。食前熱服。甚者連

服內補當歸丸。見五十三問

○第十一問。婦人卦數已盡。經水當止。而復行者。何也。

答曰。經云。男子生於寅。寅為木。陽也。女生於申。申為金。陰也。寅屬木。陽中有陰。男子得八數。故八歲齒更髮長。骨之餘生齒。男子以氣為本。八八則卦數已盡。盡則陰精痿。申屬金。陰中有陽。女子得七數。七歲齒更髮長。血之餘生髮。女以血為主。七七則卦數以終。終則經水絕止。內經云。七七任脈虛。太衝脈衰少。天癸竭。地道不通。故形壞而無子也。或勞傷過度。喜怒不時。經脈虛衰之餘。又為邪氣攻衝。所以當止而不止也。

茸附養真湯。補衝任。調血氣。

乾薑 四兩

肉桂

當歸

附子 炮各二兩

鹿茸 三兩酒炙

牡蠣 煅二兩

防風 二兩

龍骨 生二兩

右為呶咀。每服半兩。水二大盞。煎至八分。去滓。不拘時溫服。

補中芎藭湯。治風虛冷熱。勞損衝任。月水不調。崩中暴下。產後失血過多。虛羸腹痛。或妊娠胎幻不安。血下。

當歸

乾薑 炮各三兩

川芎

黃芪 蜜炙

茱萸 湯洗七次

白芍

甘草 炙

熟地

杜仲 炒令絲斷

人參 各一兩

右為呶咀。每服三錢。水盞半。煎一盞。去滓熱服。空心食前。

當歸散。天癸已過期。經脈不勻。或三四月不行。或一月再至。問云。七損七益。謂女子七數盡。是經候不依時者。血有餘也。不可止之。但令依時。

不腰痛爲善。

當歸

川芎

白芍藥

各一兩

白朮

山茱萸

炮一兩半

黃芩

各剉碎炒各一兩如冷去芩加官桂

右爲細末。每服二錢。酒調下。空心服。一日三服。

○第十二問。何謂避年。

答曰。王氏云。有一婦人。女年十五歲。來診。言女年十四時。經水自下。今經反斷。其母言恐怖。師曰。此女爲是夫人親女非耶。若親者當相爲說之。婦人因答言是自女耳。師曰。所以問者無他。夫人年十四。亦以經水下。所以女至此而斷。是謂避年。勿恠。後當自下。

拱辰丹。夫方當壯年。而真氣猶怯。此乃賦稟素弱。非虛衰而然也。僭燥之藥。尤宜速戒。勿謂手足厥逆。便云陰多。如斯治之。不惟不能愈疾。大病自此生矣。滋益之方。羣品稍衆。藥方微細。難見功效。但固天元一氣。使水升火降。則五臟自和。百病自去。此方主之。行在孫琳郎中方。葛丞相夫人少時服之。極效。

鹿茸

酥炙去皮

山茱萸

新好紅者四兩

當歸

四兩

麝香

牛兩別研

右三件爲末。入麝拌和。酒煮麵糊爲丸。如桐子大。每服一百粒。或五十粒。溫酒或鹽湯下。

○第十三問。室女經候。當行不行者。何也。

答曰。室女者。乃未出閨門之女也。不以妍醜。至十四五歲。容貌皆紅嫩者。

謂之質朴未散。莊子云。綽約如處子者是也。當此之際。經脈來時。俗呼爲紅脈。或因驚恐。或冷氣擊掉。所以當行而不行也。

通經圓。治婦人室女月候不通。疼痛或成血痕。嚴氏方內加玄胡索赤芍。滅川烏。

桂心不見火

青皮去白

大黃炮

乾薑炮

蓬朮

川烏炮去皮臍

乾漆炒

當歸

桃仁去皮炒

川椒去目炒出汗各等分

右爲細末。將四分用米醋煮成膏。和餘六分末劑。臼中治之。如梧桐子大。陰乾。每服二十九丸。用淡醋湯下。加至三十九丸。溫酒亦得。食前服。

桃仁散。治婦人室女血閉不通。五心煩熱。

紅花

當歸

杜牛膝

桃仁別研

右四味各等分爲細末。每服三錢。溫酒調下。空心食前。

○第十四問。未出閨門女。有三病者。何也。

答曰。未出閨門女。卽室女也。一病者。經水初下。陰中熱。或有當風。或有扇風者。二病者。太衝脈盛。氣則內熱。以寒水洗之。三病者。或見血下驚怖。若三病者。有一之所受。後必生帶下之疾也。

神仙聚寶丹。治婦人血海虛寒。外乘風冷。搏結不散。積聚成塊。或成堅瘦。及血氣攻注。腹脇疼痛。小腹急脹。或時虛鳴。嘔吐痰沫。頭旋眼花。腿膝重痛。面色痿黃。肢體浮腫。經候欲行。先若重病。或多或少。帶下赤白。崩漏不止。驚悸健忘。小便頻數。或下白水。時發虛熱盜汗羸瘦。此藥不

論胎前產後室女。並宜服之。常服安心神。去邪氣。逐敗血。養新血。令有子。亦能除諸病。

木香

研令末

琥珀

別研

當歸

沒藥

別研各一兩

滴乳

別研一分

麝香

別研一錢

辰砂

別研一錢

右研令細。和滴冷熟水搗爲丸。每一兩作一十五丸。每服一丸。溫酒

磨下。胎息不順。腹內疼痛。一切難產。溫酒和童便磨下。不拘時候

產後血暈。敗血奔心。口禁舌強。或惡露未盡。發渴面浮。煎烏梅湯

和童便磨下。產後氣力虛羸。諸藥不效。和童便磨下。室女經候

不調。每半丸溫酒磨下。

○第十五問。婦人多驚者。何也。

答曰。婦人者衆陰之所集。而以血爲之主。夫心主行血。脾主裹血。肝主藏血。因產蓐過傷。或因喜怒攻損。是致營血虧耗。內經云。血氣者人之神。血既不足。神亦不定。所以驚怖。巢氏有風驚悸候云。心藏神。爲諸臟之主。若血氣調和。則心神安定。若虧損。則心神怯弱。故風邪乘虛干之。防以驚悸。若久不止。則變爲恍惚也。

經濟丹。治婦人血氣不足。營衛俱虛。心氣不定。夜臥驚怖。夢寐不祥。心虛自汗。乏力倦怠。飲食減少。咳嗽痰實。常服補心養血安神定志。令人血壯氣實。極有神効。

白茯苓

白茯神

白芍藥

各一兩

遠志

去心一兩

乳香

半兩別研

當歸一兩 酒浸

酸棗仁去殼 炒

人參一兩

沒藥一兩 研

硃砂別研 半兩

石菖蒲一兩 真者

只用棗仁丸亦得。

右十味為末。煉蜜為丸。桐子大。將硃砂為衣。每服二十九。加至五十丸。棗湯參湯食前任下。飲後亦可。

坎離丹。既濟水火。補心滋腎。白濁夢遺。

辰砂一兩 另研

酸棗仁酒浸去殼 研一兩淨

附子一箇去 皮臍

乳香半兩 令隔水 乳鉢細研入

右先用附子碾細羅末。次入三味和勻。煉蜜丸如雞頭大。每服一粒。

溫酒下。空心一服。須是臘月合。磁器盛之。

石斛散。治虛勞羸瘦。乏力少食。倦怠多驚畏。

石斛四錢 去根淨 洗剉酒炒

牛膝酒浸

栝子仁去皮 研

五味子

遠志炒

杏仁去皮 尖炒

木香

肉苳蓉酒浸 焙乾

訶子肉炮

青橘皮

柴胡

人參

熟地蒸各 三錢

白茯苓四錢

甘草二錢 炙

乾薑一錢 牛炮

神麴研炒

麥蘖各六 錢

右為細末。每服二錢。米飲調下。食前日二三服。

○第十六問。婦人多因風冷而生諸疾者。何也。

答曰。風乃陽邪也。冷乃寒氣也。風隨虛入。冷繇勞傷。夫人將攝順理。則血

氣調和。風寒暑濕不能為害。若勞傷血氣。便致虛損。則風冷乘虛而干之。

或客於經絡。則氣血凝澁。不能溫養於肌膚。或入於腹內。則冲氣虧虛。不

能消化於飲食。大腸虛則多利。子臟寒則不生。或為斷絕。或為不通者。隨

所傷而成病。皆不逃乎風冷之氣也。

補陰丸。治婦人百疾。或經不調。或崩中漏不止。腰腿沉重。臍腹作痛。潮熱往來。虛煩自汗。中滿氣短。嘔噦不時。肢體煩疼。不思飲食。日漸瘦弱。此藥順肌體。悅顏色。調營衛。逐風寒。進飲食。化痰涎。

熟地 各七 生地 各七 白朮 五兩 蒼朮 五兩半 附 一宿 藁本 去土

牡丹皮 當歸 秦艽 四味各 十兩 細辛 七兩 肉桂 去皮 八兩

甘草 炙六兩半 蠶退布 燒存性 七兩 大豆黃卷 炒烟去 六兩半 白芷 六兩

枳殼 六兩 麸炒 陳皮 六兩 去白 乾薑 炮 羌活 各五 白芷 六兩

白茯苓 六兩 糯米 三升 炒黑 色火烟出 白朮 五兩

丹鈔丹。治一切虛寒冷病。右件細末。蜜丸。每一兩作十丸。每服一丸。溫酒化下。醋湯亦得。食前。

鹿茸 靈砂 白龍骨 川椒 陽起石

牡蠣粉 肉桂 肉蓯蓉 石斛 川巴戟

木賊 澤瀉 天雄 酒浸 炮 沉香 兔絲子 酒浸

臘臍 各一兩 磁石 醋淬 麝香 各半兩

○第十七問。婦人多頭眩而冒者。何也。右為細末。煉蜜為丸。梧桐子大。每服一百丸。溫酒或鹽湯下。

答曰。眩者。暈也。謂轉運之運。世之為頭運者是也。冒者。冒蒙之冒。世為昏冒者是也。明理論曰。眊非毛而見其毛。眩非玄而見其玄。眊謂眼花也。眩

謂眼黑也。鍼經云。上虛則眩。下虛則厥。眩雖為虛。蓋風家亦有之者。風主運動故也。婦人頭暈。挾痰多嘔吐者。狀若醉頭風也。

芎藭散。治婦人患頭風者。十居其半。每發必掉眩。如在車上。蓋因血虛。肝有風邪。襲之耳。素問云。徇蒙眙尤。目暝耳聾。下實上虛。過在足少陽厥陰。甚則入肝。蓋謂此也。方比他藥。捷而效速。

川芎 一兩

當歸 三錢

羌活

旋覆花

細辛

蔓荊子

石膏 生

藁本

荆芥穗

半夏

防風

熟地

甘草 後各半兩

右為麤末。每服二錢。水一大盞。薑五片。煎至七分。去滓溫服。不拘時候。氣虛者。此藥送養正丹五七十粒。

玉真圓。治腎氣不足。氣逆上行。頭痛不可忍。謂之腎厥。其脈舉之弦。按之石堅。一本作不堅

硫黃 二兩

石膏 硬者不煅研

半夏 湯洗七次

硝石 一分研

右為細末。研和生薑汁糊為丸。如桐子大。陰乾。每服三十九。生薑湯米飲湯下。更灸關元穴百壯。良方中。硫黃丸亦佳。

醉頭風餅兒

殭蠶 去絲

天南星

右件各等分細末。生薑自然汁和作餅。如折二錢大。厚五分。陰乾。每服一餅。同平胃散四味者。三錢重。水三大盞。薑五片。棗二個。先煎平

胃散一沸。次下餅子。槌碎入。同煎一二沸。通口服。

桃紅散。治男子婦人氣虛。攻注頭目昏眩。偏正頭疼。夾腦風。兩太陽穴疼。眉稜骨痛。及治風痰惡心。頭運欲倒。小兒傷風鼻塞。痰涎咳嗽。並宜服之。

川烏 一兩

草烏 八錢

天南星

半兩以上三味水洗三次

麝香

腦子

各一錢

硃砂

半兩別研細

右為細末。每服半錢。薄荷茶調下。溫酒亦得。

○第十八問。身體疼痛。流注不定者。何也。

答曰。身體疼者。其證不一。太陽證表未解。法當身體疼痛。太陽中濕。一身盡痛。若脈沉。身體自利。痛者陰也。身重背強。腹中絞痛。咽喉不利。身如被杖者。陰毒證也。若風邪乘虛在於皮膚之間。淫淫躍躍。若刺一身盡痛。傷侵血氣。動作如蟲毒之狀者。巢氏謂之風蠱也。

虎骨散。治婦人血風攻注。身體疼痛。

虎脛骨 一兩

桂心

芎藭

海桐皮

當歸

牛膝

天麻

附子

骨碎補

各一兩

羌活

半兩

右為細末。每服一錢。空心溫酒調下。

透經湯。治身體疼痛。

五積散

半兩

生附子

二錢

右件用水二盞。薑七片。棗二枚。煎至八分。去滓。入麝少許。再煎三四

沸。通口服。不拘時候。

麝香丸。治白虎歷節。諸風疼痛。遊走無定。狀如蟲嚙。晝靜夜劇。及一切手足不測疼痛。

川烏

大八角者三箇生

全蠍

二十一箇生

黑豆

二十一粒生

地龍

半兩

右為細末。入麝半字。同研。和糯米糊為丸。如菘豆大。每服七丸。甚者十丸。夜令隔空。溫酒下。微出冷汗。一身便差。予得此方。凡是歷節。及不測疼痛。一二服便差。在歙川日。有一貴家婦人。遍身走注疼痛。至暮則發。如蟲嚙其肌。多作鬼邪治之。予曰。此正歷節病也。三服愈。凡一字者。一分半也。

○第十九問。朝食暮吐者。何也。

答曰。嘔吐之病。皆緣三焦不調。脾胃不和。清濁相干之所致也。大抵嘔吐本二證。嘔者。嘔而有聲。俗所謂嘔是也。吐者。吐而有物。胃中虛冷則吐。若心下牢大如盃。或時寒熱。朝食暮吐。脈如弦緊。則為虛寒相搏。胃氣日虧。所以不能停留水穀。名曰胃反。

紫金丹。治嘔吐。心腹疼。

丁香

木香

萹澄茄

胡椒

五靈脂

西者

肉豆蔻

煨

乾薑

炮

半夏末

半兩

附子

炮

硫黃水

銀砂子

二件細研。銀砂法妙。青金。角一兩。

右為細末。半夏末薑汁打糊丸。如桐子大。每服七十九。空心米飲下。

薑合圓。療中脘停寒。胸膈結痞。嘔吐惡心。不思飲食。

木香

肉桂

附子

礞砂

紙上飛 各一兩

陳皮

丁香

沉香

華澄茄

青皮

去白各 一兩

茴香

炒一分

右為細末。次入礞砂研。酒煮麵糊為丸。每一兩作二十九丸。每服一丸。以生薑一塊。剉如盒子。安藥在內。濕紙裹煨。令香。去紙放溫。細嚼鹽湯送下。

○第二十問。婦人之病。多因氣生者。何也。

答曰。氣以形載。形以氣充。惟氣與形。兩者相待。氣和則生。氣戾則病。結為積聚。氣不舒也。逆為狂厥。氣不降也。宜通而塞則為痛。氣不達也。宜消而息則為瘕。嬰之為癭。留之為瘤。亦氣之凝耳。內經曰。怒則氣上。喜則氣緩。悲則氣消。恐則氣下。寒則氣收。熱則氣泄。勞則氣耗。思則氣結。驚則氣亂。九氣不同。故婦人之病。多因氣之所生也。

大七氣湯。治驚恐。恚怒相搏而痛。

京三稜

蓬朮

青橘皮

陳皮

藿香葉

桔梗

官桂

益智

各一兩

香附子

去毛 二兩

甘草

半兩

右為麤末散。每服五錢。水一盞。薑三片。棗一枚。煎至一盞。去滓溫服。

木香順氣散。理衛氣。順三焦。

烏藥

木香

香附子

薑黃

砂仁

甘草

右為咬咀。每服半兩。水二鍾。薑五片。棗二枚。煎至八分。去滓溫服。不拘時。

紫金丹。治氣癖。氣瘕。蠱脹病。天台陳秀山傳到不係產方

針砂 十兩 餘糧石 硫黃 各二兩

右先用藥二件同好醋入鐵鍋內煮乾。碾為末。

平胃散 十兩 蓬朮 二兩 縮砂仁 丁香 木香

獨活 黃芪 枳殼 各一兩 白茯苓 大黃

黃連 黑牽牛 甘草 茱萸 檳榔

破故紙 各三兩 乾漆 一兩須好者生漆二兩亦得

右件為細末。同前藥末用酒糊為丸。桐子大。每日三五服。不拘數。如病重則多服。忌鹽醬油麵生冷等物。

○第二十一問。猝然而死。少間復甦者。何也。

答曰。世言氣中者。雖不見於方書。然暴喜傷陽。暴怒傷陰。亦氣中之源也。况憂愁不意。氣多厥逆。往往多得此疾。便覺涎潮昏塞。牙關緊急。若概作中風。候用藥。非止不相當。多致殺人。經云。無故而瘖。脈不至。不治自已。謂氣暴逆也。氣復則已。故猝然而死。少間復甦者。正謂此也。

蘇合香丸。療傳屍骨蒸。殞殍肺痿。疰忤。鬼猝心痛。霍亂吐利時氣。鬼魅瘴癘。赤白暴利。瘀血月閉。痲痺下腫。驚癇鬼忤中人。小兒吐利乳。大人狐狸等病。

蘇合香油 一兩入安
以香膏內

白朮 二兩

丁香 二兩

硃砂 二兩水
飛研

安息香 二兩另為末用無
灰好酒一升熬膏

木香 二兩

白檀香 二兩

薰陸香 另研
一兩

沉香 二兩

烏犀屑 二兩

萹荑 二兩

香附子 二兩
炒

訶梨勒 煨去核取
皮二兩

麝香 另研
二兩

龍腦 研一
兩

右為細末研藥和用安息膏并煉白蜜和劑每服旋圓如梧桐子大
早朝取井華水溫冷任意化服四丸

○第二十二問病非瘧之邪四時多病寒熱者何也

答曰風者陽之氣也寒者陰之邪也陰氣上升入陽中則發寒陽氣下陷入陰中則發熱陰陽偏勝寒熱互作經曰夏傷於暑秋必病瘧者是也婦人之病證見寒熱邪非暑氣者皆錄營衛之非作也且衛者氣也氣為陽陽微則惡寒營者血也血為陰陰弱則發熱故婦人寒熱多因氣血之所使也或勞傷而體弱或經閉而寒熱若此之類久而不已則成虛損之疾也

必應散治久寒熱如瘧狀

熟地

檳榔

陳皮

草果 去皮

當歸

砂仁

甘草 炙

柴胡 以上各
等分

右為麤末每服三錢水二盞薑五片煎八分去滓無時溫服合藥時

忌雞犬婦人見

神健飲子治婦人寒熱

赤芍

白朮各二兩

赤茯苓

當歸

肉桂

鱉甲

川芎

枳殼

柴胡

黃芪

秦艽

桔梗

橘紅

甘草各一兩

木香

右爲呶咀。每服三錢。水二盞。薑五片。棗一枚。煎至八分。去滓溫服。不拘時。

○第二十三問。因咳嗽。經候不行者。何也。

答曰。咳嗽之說。古書有咳而無嗽。後人兼言之。大抵皆從肺出。其聲響亮。不因痰涎而發者。謂之咳。言其聲音聞於人。痰涎上下隨聲而發者。謂之嗽。如水之嗽蕩。能蕩其真氣也。况肺主乎氣。經云。營氣之行。常與衛氣相隨。久嗽損氣。則血亦不足。遂致經閉不行。時發寒熱。久久成勞者。氣血俱損之故也。

六神散。治婦人熱勞咳嗽。月水不通。

柴胡去苗

白朮

青皮去白

當歸

牛膝

牡丹皮各一兩

右爲麤末。每用六兩。入蜜四兩。炒令焦。入酒并童便各一碗。煎八九沸。去滓。分作六服。空心食前。

紫苑圓。治肺氣咳嗽。

紫苑

防風

桑白皮炙

木香

貝母

人參

款冬花

葶藶隔紙炒

檳榔各一兩

杏仁炒

天門冬去心 甘草

右為細末。蜜丸。桐子大。每服三十丸。清米飲送下。食後服。

○第二十四問。咳嗽有紅痰者。何也。

答曰。經稱五臟六腑皆令人咳。原其至理。雖因寒邪之為患。當分內外所傷。難經云。形寒飲冷則傷肺。肺主皮毛。自皮毛而入中者。謂之形寒。胃脈絡肺。食寒而為嗽者。謂之飲冷。水飲停積於胸膈。所以為痰。痰中有血者。乃心肺之相剋也。肺屬金而主氣。心屬火而行血。以五臟而言之。心肺皆居膈上。以五行論之。金火應乎相制。故痰中有血者。此火剋乎金。心勝乎肺。久而不已。亦變成勞。難經所謂七傳者死。亦此之類也。褚氏遺書云。喉有竅。則咳血殺人。腸有竅。則便血羸人。便血猶可止。咳血不易醫。所以咳嗽有紅痰者。多成虛勞之疾也。

平肺湯。定喘治嗽。

五味子 紫苑洗去土 陳皮去白 甘草炙

杏仁泡去皮尖 半夏湯浸七次 紫蘇子 桑白皮

右為末。每服二錢。水一盞。薑四片。煎至七分。去滓。溫服。食後。

立驗丸。治肺熱而咳。上氣喘急。不得坐臥。身面浮腫。不下飲食。消腫下

氣。止嗽。

葶藶十分研炒為末 貝母三分 杏仁一兩半。炒去皮尖 赤茯苓

紫苑 五味子各三分 人參一兩 桑白皮一兩

右為細末。蜜丸。梧桐子大。每服十丸。日二服。甚者夜一服。加至三十丸。棗湯下。腫盛者食後服。

止紅散。治心肺客熱。咳嗽吐血。

柴胡去苗一兩

胡黃連

宣連各半兩

右為末。入硃砂少許研和。每服二錢。水一盞。煎半盞。通口服。

○第二十五問。吐血。衄血。齒衄。舌上出血。汗血者。何也。

答曰。氣屬乎陽。血屬乎陰。陰盛則陽虧。陽盛則陰虧。經所謂陽勝則陰病。陰勝則陽病。諸吐血。衄血。絲陽氣勝。陰之氣被傷。血失常道。或從口出。或從鼻出。皆謂之妄行。其脈洪數者。逆微細者。順。陽明之經。行絡於頤頰。陽明受邪。熱血從齒出也。脾氣通於口。心氣通於舌。心脾二經被傷。血故從舌出也。營血內通於臟腑。外繫於經絡。藏則舍於肝。經行則出於心臟。又心之液為汗。令肝心二臟俱虛。血隨汗液出也。

內補芎歸湯。治婦人血氣羸弱。或崩傷過多。少氣傷絕。腹中拘急。四肢煩熱。面目無色。及唾血吐血。

芎藭

熟地各四兩

白芍五兩

桂心二兩

甘草

乾薑各三兩

大棗四十枚

當歸二兩

右為麤末。每服五錢。水一盞半。煎至八分。去滓溫服。不拘時。

柔脾湯。治吐血下血衄血。

白芍

黃芪

甘草各一兩

熟地三兩

右爲呖咀。每服三錢。水酒各一盞。煎八分。去滓通口服。不拘時。
琥珀散。治小便出血。

琥珀

猪苓 去皮

茯苓

澤瀉

滑石 各一兩

阿膠 炒三兩

車前子 一兩

右爲麤末。每服五錢。水二盞。煎一盞。去渣溫服。

○第二十六問。婦人偏喜酸物。或嗜冷者。何也。

答曰。天食人以五氣。地食人以五味者。酸苦甘辛鹹是也。五味各有所入。酸入肝。辛入肺。苦入心。甘入脾。鹹入腎。是謂五入也。肝藏血。婦人以血爲主。所以偏喜酸物食者。酸入肝而養血。血得其酸物。所以捨藏也。血虛多熱。邪熱蓄於上焦。煩躁內生。婦人虛煩。往往多嗜冷物也。

茯苓半夏湯。治妊娠惡阻。心中憤悶。嘔吐惡心。好噉鹹酸物。

旋覆花

陳皮

桔梗

白芍

人參

甘草 炙

芎藭 各半兩

赤茯苓 三分

乾熟地

半夏 湯洗十遍 一兩一分

右爲麤末。每服二錢。水盞半。薑四片。煎八分。去滓。食前稍熱服。

清平湯。治血虛口燥。咽乾喜飲。

人參

半夏

麥門冬

芍藥

白朮

甘草

當歸

茯苓

柴胡 各等分

右呖咀。每服二錢。水盞半。燒生薑一塊。切破。薄荷少許。同煎七分。去滓熱服。不拘時。

○第二十七問。婦人喜少怒多。悲泣不止者。何也。

答曰。婦人無故悲泣不止。象如神靈。或以崇祈禱。終不應。金匱謂之燥臟是也。爲所欲不稱其意。大棗湯主之。

大棗湯。治婦人臟燥。

甘草 一兩

小麥 三合

右呔咀。每服三錢。水盞半。棗五枚。煎八分。去渣。溫服。

○第二十八問。咽中狀如梅核。或如炙肉者。何也。

答曰。有喉嚨。有咽門。二者各有所司。喉嚨者。空虛也。肺之系。氣之道路也。肺應天。故屬天氣所生。有九節以通九竅之氣。咽者。嚙也。言可嚙物。爲胃之系。胃屬土。地氣所生。謂之隘也。或陰陽之氣痞結。咽膈噎塞。狀若梅核。妨礙飲食。久而不愈。卽成翻胃。或胸膈痰結。與氣相搏。上逆。咽喉之間。結聚。狀如炙肉之變也。

四七湯。治喜怒悲思憂恐驚之氣。結成痰涎。狀如破絮。或如梅核在咽喉。咯不出。嚙不下。此七氣所爲。或中脘痞滿。氣不舒快。或痰涎壅盛。上氣喘急。或因痰飲節注。嘔吐惡心。

半夏 五兩

茯苓 四兩

厚朴 三兩

紫蘇葉 二兩

右爲呔咀。每服四錢。水盞半。薑七片。棗一枚。煎六分。去滓。熱服。不拘時。

二氣散。治陰陽痞結。咽膈噎塞。狀若梅核。妨礙飲食。久而不愈。卽成翻

胃。

山梔子炒

乾薑炮各一兩

右為麤末。每服二錢。水一盞。煎五分。去滓。熱服。食遠。

○第二十九問。婦人足十指痛如油煎。覆之則熱痛。風吹則冷痛者。何也。答曰。孫真人云。有脚氣之人。先從脚起。或先緩弱。起行忽倒。或兩脛腫滿。或胸滿氣急。或心中忪悸。或小腹不仁。或舉動轉筋。或見食嘔逆。惡聞食氣。或風滿氣急。或遍體酸痛。皆脚氣候也。黃帝所謂緩氣濕痺是也。頑弱名緩風。疼痛為濕痺。寒中三陽所患必冷。暑中三陰所患必熱。婦人足十指如熱油煎者。此繇營衛氣虛。濕毒之氣。留滯經絡。上攻心則心痛。下攻脚則脚疼。其脚指如熱油所煎。亦氣之類。經云熱厥是也。

換腿丸。治一切脚氣。即石楠丸。

石楠葉

天南星炮

金釵石斛

葶藶

牛膝酒浸一宿

薏苡仁

羌活不蛀者

川續斷

天麻剉

防風去蘆

當歸

黃芪

甘草各一兩

檳榔半兩

乾木瓜四兩

右為細末。酒糊為丸。桐子大。每服五十九丸。漸加至一百丸。溫酒或木

瓜湯下。空心食前。

萬靈散。治婦人脚氣。

當歸

赤芍

烏藥

青皮各一兩

白朮

肉桂各半兩

黑牽牛二兩

右爲躡末。每服三錢。水盞半。酒少許。煎八分。去滓溫服。食前。

活血丹。治婦人脾血久冷。諸般風邪濕毒之氣。留滯經絡。流注脚手。筋脈拳攣。或發赤腫。行步艱辛。腰腿沉重。脚心吊痛。及上衝脇腹膨脹。胸膈痞悶。不思飲食。衝心悶亂。及一切痛風走注。渾身疼痛。

川烏 一兩

乳香 一錢半

草烏 一兩

地龍 一兩

天南星 一兩

沒藥 三錢半

牛膝 一兩

木瓜 一兩

右爲細末。入研藥酒糊丸。梧子大。每服二十九。空心日午冷酒下。或荆芥湯清茶亦得。

○第三十問。婦人少年髮少者。何也。

答曰。足少陽膽之經。其榮在髮。足少陰腎之經。其華在髮。衝任之脈爲十二經之海。謂之血海。其脈絡上唇口。若血盛。則榮於頭。鬢髮美。若血海弱。則經脈虛竭。不能榮潤。故髮少而禿。或有純赤黃者。

生髮藥

蔓荊子

青葙子

蓮子草 各一兩

附子 二字

頭髮灰 一匙

右爲末。以酒漬納瓷器中。封閉經二七日。藥成。以烏雞脂和塗之。先以米泔洗髮。然後敷之。數月生長一尺也。

生眉毛

七月七日烏麻。陰乾爲末。烏麻油和塗。眉卽生妙。

滋陰養血丸。治勞虛血弱。肌肉枯燥。手足多煩。肢節酸疼。鬢髮脫落。面

少顏色。腹拘急。痛引腰背。去血過多。崩傷內竭。胸中短氣。晝夜不能眠。情思不樂。怔忡多汗。

熟地

當歸各一兩

鹿茸二兩 酥炙

右為細末。蜜丸桐子大。每服五十丸。米飲湯任下。不拘時。

○第三十一問。四肢如故。但腹脹者。何也。

答曰。身腫及四肢者。本起於水。手足瘦削腹大者。本起於脾。或脹滿或散者。氣也。然腹脹之狀。上下膨亨。或鼓之有聲。喘息不便。絲上者不降。下者不升。氣痞於中。無所歸息。三焦渾亂。若猝然脹滿。餘無所苦。此絲脾胃不調。冷氣暴折。客乘於中寒之。則氣收聚。壅遏不通。是以脹滿。內經云。臟寒生滿病是也。若臍凸者難治。大便利者為逆。

沉香等氣丸。順氣消腫。

黑白牽牛

各一兩 炒共 取末一兩

青皮去白同 巴豆

陳皮去白同 巴豆

沉香

檳榔

半兩 剉碎用巴豆五十粒去皮 膜將三味炒黃色去巴豆不用

全蠍炒

華澄茄

丁香

胡椒各半兩

續隨子一錢 研

蘿蔔子三兩 炒

甘遂半兩 剉 炒黃色

右為細末。用葱白研如膏和丸。桐子大。每服二十丸。炒酒醇煎湯下。

醋湯亦得。

神助丸。治四肢瘦。肚大。

三稜

草果子仁

川棟子

各一兩 醋一 碗煮乾焙燥

茴香

蘿蔔子

栗子內皮各一兩

右為末。醋糊丸。桐子大。蘿蔔湯送下五十九丸。虛者二十九丸。

○第三十二問。病有血分。有水。何以別之。

答曰。婦人月經通流。流則水。血消化。若風寒搏於經脈。血結不通。血積為水。故曰血分。若先病。於後經水或斷。名曰水分。其病易治。去其水。經自下也。若病人覺腹內脹。外視如常。大便黑。小便赤。是其證也。

椒仁丸。治因經水斷絕。後致四肢面目浮腫。小便不通。名曰血分水化。為血。血不通則為水矣。

五靈脂

吳茱萸湯洗七次
醋浸炒

椒仁

甘遂炒黃

續隨子

玄胡索各半兩

芫花醋浸一宿
炒焦一分

信砒一錢
研

石膏煨通赤研
細一分

附子炮熟
半兩

郁李仁去皮
研

牽牛炒熟各
半兩

右為細末。麵糊為丸。如菉豆大。橘皮湯下一丸。臨臥未通空心加一丸。腹未通日午再一服。

丸。腹未通日午再一服。

葶藶丸。治因小便不利後。身面浮腫。致經水不通。名曰水分。其餘逆順。並同水氣。

葶藶炒

續隨子去皮研
各半兩

乾漆一兩

右為末。棗肉和丸。桐子大。煎扁竹湯下七丸。如大便利者。減葶藶續

隨子各一分。加白朮半兩。

○第三十三問。心腹痛。或又有小腹痛者。何也。

答曰。經云。五臟猝痛。何氣使然。岐伯對曰。寒氣稽留於脈外。故猝然而痛。

也。舉痛論中所載痛病，共有一十七證，皆繇寒氣之所致也。巢氏云：痛是臟虛受風冷，邪氣乘心也。其痛發有死者，有不死成疹者，心為諸臟主而藏神，其正經不可傷，傷之而痛者，名為真心痛。朝發夕死，夕發朝死。若腑臟虛弱，風邪客於其間，痛隨氣之上下，或上攻於心則心痛，下攻於腹則腹痛。上下相攻則心腹俱痛，或宿有風冷搏於血，血氣停結，小腹痛也。

醋煎散，治婦人血氣腹脇刺痛，及產後敗血兒枕急痛。

高良薑 一兩

當歸

肉桂

白芍

橘紅

烏藥 各半

右為細末，每服三錢，水醋各半盞，煎七分，通口服，不拘時。

木香通氣圓，治氣刺疼痛。

京三稜

蓬朮 各四兩

芫花

木香

檳榔

大腹子 各一兩

右將米醋三飭同煮，令醋盡，獨去芫花，炒令乾，餘五味切片子，焙為末，白麵糊和丸，如豌豆大，橘皮湯下三十九丸，以止為度。

玉抱肚，治停寒痼冷疾，心腹刺痛，常繫於臍腹間甚妙。鄭主簿傳一方。

用針砂如上法炒訖，止入硃砂半兩，並不用餘藥。

針砂

一兩，鑊內炒用柳條或小竹，不住手攪，出為度，放冷。

白礬

粉霜 各一錢

硃砂 半兩

右件白礬等三味同研為細末，與針砂拌和作一服，以水數點灑，用匙拌攤令厚，皮紙為貼，闊二寸以上，長四五寸，貼之，外以帕子繫疼

處。或常繫臍下。如覺太熱。即以衣襯之。若藥力過。再灑水如前拌用。其熱如初。可用四五次。藥力退。則將針砂再炒過。別入餘藥。仍可用。五香拈痛丸

木香

官桂

丁香

乳香

藿香葉

沉香各半兩

斑蝥七枚

巴豆三粒去油

右八味為細末。白麵糊丸。梧桐子大。每服五十九丸。薑湯送下。

○第三十四問。下利。經水反斷者。何也。

答曰。穀入於胃。脈道乃行。水入於經。其血乃成。胃。水穀之海也。腸胃虛弱。為風邪冷熱之氣所乘。不能腐化穀食。先泄後變成利也。受熱則赤。虛寒則白。穀氣內虧。津液耗減。所以下利而經水反斷也。經云。利止經當自下。故宜先治利也。

大斷下丸。治下利不止。

附子二兩

細辛去蘆一兩半

乾薑三兩

高良薑五兩

肉豆蔻

訶子皮各二兩

龍骨

赤石脂各三兩

牡蠣醋紙泥固濟火煨二兩

酸石榴皮去穢醋炙黑心存性二兩

白礬二兩火飛

陽起石火燒赤醋淬別研三兩

右為細末。麵糊丸。梧桐子大。每服五十九丸。米飲空心下。

滲濕湯。治濕勝濡泄。

白朮一兩半

蒼朮半兩炒

厚朴

肉桂

丁香

乾薑各一兩

陳皮

細辛

白茯苓各一兩

肉豆蔻半兩

砂仁 二兩

附子

二隻八錢者可薑炒令赤去薑先炮切片

右為麤末。每服四錢。水盞半。薑五片。棗二枚。煎一盞。食前熱服。

○第三十五問。婦人晝則明了。暮則譫語。如見鬼狀者。何也。

答曰。此婦人因傷寒之病。熱入於血室也。何以明之。室者。屋室也。謂可以停止之處。人身之血室者。營血停止之所。經脈留會之處。即衝脈也。衝為血海。王冰云。陰靜海滿而去血。內經云。任脈通。太衝脈盛。月事以時下者。是也。若經水適來。感其寒邪之所搏。則熱入血室。其證晝則明了。暮則譫語。如見鬼狀者。此為熱入血室也。若施治其病者。當無犯胃氣。及上二焦。必自愈。

地黃湯。治熱入血室。

生地 三兩

柴胡 八兩

人參

黃芩

甘草 炙各二兩

半夏 湯炮七次二兩半

右為麤末。每服五錢。水二盞。薑五片。棗一枚。煎一盞。去滓溫服。

龍齒琥珀散。治產前產後血虛。心神恍惚。語言失度。睡臥不安。

扶神 一兩

人參

龍齒

琥珀

赤芍

黃芪

牛膝 去蘆各三分

麥門冬 去心

生地 各一兩半

當歸 半兩

右為麤末。每服三錢。水盞半。煎六分。去滓溫服。不拘時。

小柴胡加地黃湯。治傷寒發熱。或發寒熱。經水適來。或適斷。晝則明了。夜則譫語。如見鬼神。亦治產後惡露方來。忽然斷絕。

柴胡一兩一分

人參

半夏

黃芩

甘草

生地黄各半兩

右咀片。每服五錢。水二盞。薑三片。棗二枚。煎八分。去滓溫服。

來復丹亦名正一丹。此藥配類二氣。均調陰陽。奪天地冲和之氣。乃水火既濟之方。可冷可熱。可緩可急。善治營衛不交。養心腎不升降。上實下虛。氣閉痰厥。心腹冷痛。臟腑虛滑。但有胃氣。無不獲安。

硫黃船上透明者一兩

硝石

一兩同硫黃並為細末入定鍋內微火炒用木篋子不住手攪令陰陽氣相入不可火太過恐藥力竭再研細名二氣末

太陰玄精石研水飛二兩

五靈脂須五靈山者水澄去砂日乾研

陳皮去白

青皮去白各二兩

右用五靈脂二橘皮為細末。次入玄精石末及前二藥末拌勻。好醋打糊為丸。豌豆大。每服三十粒。鹽湯下。甚者五十粒。

○第三十六問。顛狂之病。何以別之。

答曰。入弁於陰則為顛。入弁於陽則為狂。皆繇風邪之所致也。顛者。猝然仆地。嘔吐涎沫。口喎目急。手足撩戾。無所覺知。良久乃甦。狂者。或言語不避親疏。或因自高賢。或棄衣踰走。亦有自定之時。又在有胎之時。其母猝大驚。亦令子氣發癇。其顛有五。一曰陽顛。二曰陰顛。三曰風顛。四曰濕顛。五曰勞顛。此皆隨其感病之繇而命名也。又有牛馬猪狗顛。以其顛發之時。聲形狀似於牛馬等。故以為名也。俗云。病顛之人。忌食六畜肉。顛發之狀。悉皆象之。

大聖一粒金丹。治諸風驚癇。

大川烏頭 黑附子

白附子各二兩

白蒺藜炒去刺

五靈脂各一兩 沒藥半兩

白礬枯半兩

白殭蠶一兩去絲炒

麝香半兩

細香墨半兩

硃砂半兩

金箔二百片

右將前六味同為細末。後四味研細合和。用井華水一盞。研墨盡為度。將墨汁搜和。杵臼內搗五百下。丸如彈子大。金箔為衣。陰乾。每服一粒。食後臨臥。生薑自然汁磨化。入熱酒服。再以熱酒隨意多少飲之。就無風。煖處臥。衣被蓋覆。汗出即差。病小者。每粒分作二服。忌發風物。孕婦不可服。

黃牛丸。治風狂。喜怒不常。或欲狂走。

白龍骨燒

鐵粉研

茯神

人參

黃連

鉛霜

犀角屑

防風

硃砂各一兩

牛黃一錢

遠志一兩

龍腦一錢

甘草半兩

麥門冬一兩半

右為細末。如桐子大。每服二十九丸。熱水送下。不拘時服。

祛邪散。治顛邪惡候。

白礬三兩

黃丹半兩

右為研細。用桑柴於瓦中燒一伏時。服半錢。以乳香湯下。不拘時。

小柴胡加地黃湯。方見三十五問。每服五錢。水二盞。薑五片。棗二枚。煎入分。去滓溫服。

來復丹。治產後熱入血室。如見鬼神狂語者。方見三十五問。以醋湯下十來服。

○第三十七問。病有一臂痛。有兩臂俱痛。何也。

答曰。臂痛有數證。有因寒而得之者。或因伏痰者。有形寒飲冷傷肺者。有汗出傷阻者。夫肝主諸筋。肝經虛弱。風寒入傷。與氣血相搏。筋寒則急。上連兩臂俱痛。宜服醒風湯。理氣湯主之。若或左或右。痛不能舉臂者。此繇伏痰在內。中腕停滯。脾氣不能流行。止與氣搏。流伏於左則左痛。在右則右痛。若右臂痛深連於骨。如斧槌。其氣自隘已下至臍。左右氣不相通。徹其痛發時。氣上奔急。令人悶絕。肌肉日消。漿粥不下。心中煩悶。此繇形寒飲冷。肺被寒結。留滯於右邊。若無故一臂無力。痛不能舉。襲襲似汗。偏阻一邊。肌肉時復掣痛。或有不仁。手不能近頭。久成偏枯。宜服百風湯主之。

百風湯。治四肢垂曳。骨節疼痛。又名省風湯

獨活 三錢

防風

當歸

桂心 各二兩

茯苓

附子

細辛

天麻 一兩

乾蠍 炒

甘草 一兩

右為咀咀。每服三錢。水一盞半。薑五片。煎七分。去滓。食前稍熱服。

茯苓丸。治伏痰臂痛。

茯苓 一兩

半夏 二兩

枳殼 去穢。炒半兩

風化朴硝 一分

右為細末。薑汁煮糊為丸。如桐子大。每服三十丸。食前薑湯下。

理氣湯。治痰飲臂痛。

半夏湯洗 二兩

桔梗一兩

官桂二兩

人參一兩

橘皮洗乾 二兩

甘草半兩

右為麤末。每服五錢。水一盞。薑五片。煎一盞。去滓。食前服。

○第三十八問。婦人渴病。與三消之病同異。

答曰。夫渴之為病一也。推其受病之源。所得各異。指迷方論消渴之病。自來有二。多緣嗜慾太甚。自為虛寒。服五石湯丸。猛烈燥藥。積之在臟。遂至精血枯涸。又久飲酒者。酒性酷熱。薰蒸於臟肺。是致津液耗竭。渴乃生焉。婦人之渴。多因損血。血虛則熱。熱則能消飲。所以多渴。故與男子之病有異也。

栢子仁湯。滋養營衛。調心順氣。亦治上焦虛熱。煩燥口苦。四肢倦怠。津液內燥。服之効。

新蘿參

黃芪

扶神

瓜蒌根

天門冬去心

麥門冬去心

甘草各一兩

北五味半兩

栢子仁半兩

熟地二兩

右為麤末。每服五錢。水一盞半。薑二片。棗三枚。煎七分。去滓。溫服。不拘時。

拘時。

辰砂聚寶丹。治心肺積蘊虛熱。口苦舌乾。面赤。大便滲泄。肌肉瘦瘁。四肢少力。精神恍惚。又治消渴。消中。消腎。三焦留熱。

鐵粉三錢

牡蠣二錢

辰砂半兩

瓜蒌根半兩

黃連二錢

金銀箔各五十片為衣

知母三錢半

新羅參半兩

白扁豆錫浸去皮取末半兩

右件瓜萆根末等五味。同前藥末。用生瓜萆根去皮。取汁一盞。白沙蜜一小盞。同銀器中煉七八沸。候冷。和藥為丸。如梧桐子大。每服三十丸。煎麥門冬湯。放冷送下。食後。一日之間。三服。

○第三十九問。腰痛如折者。何也。

答曰。腰者。腎之外候。足太陽經之所流注。若痛連小腹。不得俛仰。憒憒短氣。此繇腎氣虛弱。勞傷過度。風冷乘之。有所不榮。故腰痛也。內經云。腰者。腎之腑。轉搖不能。腎將憊矣。若妊娠腰痛者。其胎必墮也。

杜仲散

杜仲去皮榨爛酒浸一宿焙一兩

官桂

牡丹皮各一兩

右為細末。溫酒調二錢。不拘時服。

當歸丸

當歸切洗三兩

水蛭炒三枚

桃仁去皮研三十粒

右為細末。酒煮糊丸。如桐子大。溫酒下十丸。未愈。加至三十丸。

腎着湯。治身體重。腰冷痺。如坐水中狀。反不渴。小便自利。飲食如故。病屬下焦。從身勞汗出。衣裏冷濕。久而得之。腰以下冷痛。腰重如帶。五貫錢重者。

甘草

乾薑各二兩

茯苓

白朮各四兩

右為麤末。每服五錢。水二盞。去滓溫服。不拘時。

○第四十問。婦人面多生黑疔與黑子者。何也。

答曰。黑疔黑子者。皆生於面上。本是二證也。五臟六腑之經。血華充於面。或疲飲漬臟。或腠理受風。致血氣不和。或澁或渴。不能榮於皮膚。故變生黑疔。若黑點凝聚。謂之黑子。若生而有之者。非藥可治也。

洗風散。治面上遊風。或癢疹。或風刺。或黑疔。

芫蔚草 晚蠶沙 赤小豆 黑牽牛

白芷 藁本 殭蠶 白附子

草烏頭 白欬 蔓荊子

右件等分爲末。每一錢。澡面用之。

○第四十一問。身目黃者。何也。

答曰。黃疸之病。皆屬於脾。脾屬土而色黃。濕勝則土氣不流。瘀熱鬱發。則真色見矣。大抵黃疸本得之於濕。濕熱相搏。身必發黃。若先有流熱。後有濕氣者。先治其熱。梔子蘘皮湯。茵陳五苓散主之。或先感其濕。後加其熱者。先去其濕。五苓散。瓜蒂散主之。亦有因冷氣痞結於脾陰。濕鬱而爲黃。先瀉其痞。半夏瀉心湯。枳實理中湯主之。然後利其小便。若病人一身面目悉黃。四肢微腫。胸滿不得臥。汗出如黃蘘汁者。此繇大汗出。猝入水中所致。謂之黃汗。宜苦酒湯。若非濕熱所鬱。婦人面萎黃者。亡血之過也。宜服地黃散。滋陰養血丸。方見第 三十問

苦酒湯。

黃芪五兩 芍藥三兩 官桂三兩

右為呶咀。每服五錢。水盞半。苦酒半盞。煎一盞。去滓溫服。不拘時。
地黃散。治婦人血少。氣多寒。面色青白。

地黃 乾薑各一兩

右為細末。每服二錢。溫酒調下。不拘時。

茵陳五苓散。

豬苓去皮 茯苓 澤瀉 白朮各一兩 官桂去皮五錢

右為細末。以茵陳一分。水一盞。煎七分。去滓調服。加鹽點妙。

瓜蒂散

瓜蒂 赤小豆 秫米各一兩

右為細末。粥飲調下半錢。以吐為度。

藥皮湯

藥皮三兩 梔子二兩 甘草一兩

右為麤末。每服五錢。水二盞。煎八分。去渣溫服。

○第四十二問。陰崩陽崩。何以別之。

答曰。夫血氣之行。外行經絡。內榮腑臟。皆衝任二脈之所主也。倘若勞傷

過度。致腑臟俱傷。衝任經虛。不能約制其血。故忽然暴下。謂之崩下。經云。

三焦絕經。名曰血崩。受熱而赤者。謂之陽崩。受冷而白者。謂之陰崩。其白

者形如涕。赤者形如絳。黃者形如爛瓜。青者形如藍色。黑者形如衄血。是

謂五崩也。當與第六問兼看

陽崩膠艾湯。治婦勞傷血氣。衝任虛損。月水過多。淋漓漏下。連夕不斷。臍腹疼痛。

阿膠炒

川芎

甘草各二兩

艾葉

當歸各三兩

白芍

熟地各四兩

右為飲子。每服三錢。水一盞。煎六分。去滓熱服。空心食前。甚者連夜並服之。

黃芩散。治崩中下血。

黃芩為末。每服一錢。燒秤鎚酒調下。崩中多是止血藥。此法治乘陰。經所謂天暑地熱。經水沸溢者也。

陰崩固經丸。治婦人衝任虛弱。月候不調。來多不斷。淋漓不止。

艾葉醋炒

鹿角霜

伏龍肝各等分

乾薑

右為末。溶鹿角膠和藥。乘熱丸。梧桐子大。食前淡醋湯下五十九。赤龍丹。治崩漏不止。餘血作痛。

禹餘糧煨

烏賊骨

鹿茸酒炙

龍骨

乾薑

當歸

石燕子煨

阿膠炒

右等分為末。酒醋糊丸。桐子大。每服五十九。溫酒下。艾醋湯亦得。
○第四十三問。眠臥多汗者。何也。

答曰。盜汗者因眠臥而身體流汗也。此緣陽虛所致。久不已令人羸瘦。心

虛不足。亡津液故也。診其脈虛弱細微。皆盜汗脈也。

大建中湯。治熱自腹中。或從背脊。漸漸蒸熱。或寐而汗。日漸羸瘦。

白芍 六兩

黃芪

遠志

當歸

澤瀉 各三兩

龍骨

人參

甘草 炙各二兩

吳朮 一分

右為麤末。每服五錢。水二盞。薑三片。棗一枚。擘破。入飴少許。煎一盞。

食前溫服。

黃芪飲子。治婦人血氣不足。夜間虛乏。有汗倦怠者。

黃芪

五味子

當歸

白茯苓 各半兩

白芍

遠志

麥子 一方用麥門冬

人參

吳朮 各一分

甘草 三錢

右咬咀。每服三錢。水盞半。薑三片。煎七分。去滓溫服。不拘時。神驗。

加味理建湯。治男子婦人夜多盜汗。并便濁者。此方昌國州方順齋傳

到。經驗。

乾薑

吳朮

人參

黃芪

白芍

肉桂

甘草

牡蠣

浮麥

當歸

右件咬咀。每服水二盞。薑五片。棗一枚。煎八分。食前熱服。渣再煎。

○第四十四問。左脇痛如刀刺。不得喘息者。何也。

答曰。肝居脇之左。以藏血。鍼經云。邪在肝。兩脇痛。巢氏云。左脇偏痛者。緣

經絡偏邪。客於傍之故也。人之經絡。旋環於身。左右表裏皆周遍。若血氣

調和。不生虛實痛證。或偏者邪傷之也。其左脇痛如刀刺者。則知其邪偏

客於左也。甚者不得喘息也。

醋煎散。治婦人血氣腹脇刺痛。

良薑 一兩

當歸

肉桂

白芍

陳皮

烏藥 各半兩

右為細末。每服三錢。水醋各半盞。煎七分。通口服。

趁痛散。治血氣刺痛。起於一邊。或左或右。行環上下。或在肌肉之間。如

錐刀所刺。其氣不得息。

蓬朮

官桂 各一兩

檳榔 半兩

芫花 醋炙

附子 各一兩

細辛 半兩

右為飲子。每服三錢。水盞半。煎七分。去滓溫服。薑棗同煎。

○第四十五問。積聚之病。何以別之。

答曰。積聚者。繇陰陽不和。腑臟虛弱。受其風邪。搏於腑臟之氣所為也。積者。五臟所生。聚者。六腑所生。然陽化氣。氣屬於六腑。陰成形。形主於五臟。陽則動而不息。故聚者。始發無根本。上下無所留止。其痛無常處。故謂之聚也。陰則定而守住。故積者。始發有常處。其痛不離其部。上下有所終始。左右有所窮處。乃謂之積也。積脈陰沉而伏。象陰體之沉靜。聚脈陽浮而動。法陽性之浮高。然積病有五。隨其五臟相傳而生焉。經云。在肝則曰肥氣。在心則曰伏梁。在脾則曰痞氣。在肺則曰息賁。在腎則曰奔豚。故曰積聚之病。此可別也。

驚甲丸治小腹中積聚大如七八寸盤面上下周旋痛不可忍

驚甲 官桂各一兩半 蜂房半兩 川椒 細辛

人參 苦參 丹參 沙參 吳茱萸各十

蠶蟲 乾薑 牡丹皮 附子 水蛭

皂角一本半 白角膠 當歸 赤芍 甘草 防葵各一兩

鱗蝟二十枚 大黃 蜜蟲 玄參十八銖

右為細末蜜丸桐子大每服七丸溫酒下日三服加之以効為度

沒藥散治婦人一切血氣臍腹撮痛

血竭別研 肉桂 當歸 蒲黃 紅花

木香 沒藥 玄胡索 乾漆妙令烟出盡 赤芍各等分

右為細末每服二錢熱酒調下食前

紫金散治婦人血氣不和血塊疼痛常服煖子宮通經絡

橘紅 枳殼 肉桂 玄胡索 甘草各一兩

紫金牛五兩一本 紫金皮 當歸酒浸一宿 焙乾剉 香附妙去毛 各三兩 南木香半兩 生

右為末婦人室女月水不調久閉羸瘦蘇木煎湯調下白雞冠花末煎酒調下亦得每服一匙常服安胎養氣臨產橫逆葱白煎酒下血

氣脹滿催生下死胎煎枳殼酒下地榆末煎酒下亦得產後血暈頭

旋中風口禁惡證發動虛腫豆淋酒下產後惡血不止血海衰敗赤

白帶下胞漏棕櫚灰酒下綿灰亦得胎氣絞刺肋脇腹肚疼痛炒薑

酒下。心氣不足。陳皮湯下。產後敗血停積。攻刺腰痛。無灰酒下。日午
臨睡三服。忌生冷淹藏毒魚。

○第四十六問。身體常瘙痒者。何也。

答曰。身瘙痒者。是體虛受風。風入腠理。與血氣相搏。而俱往來。在皮膚之
間。邪氣散而不能衝擊爲痛也。故但瘙痒也。仲景云。痒者名泄氣風。久久
成痂癩。亦絲體虛受風邪之所致也。

胡麻散治脾肺風毒。攻衝遍身。皮膚瘙痒。或生瘡疥。或生癢疹。用手搔
時。浸淫成瘡。久而不差。愈而復作。面上遊風。或如蟲行。紫癩白癩。頑麻
等風。或腎臟風。攻注脚膝生瘡。並宜服之。

胡麻 三兩

苦參 二兩

何首烏 二兩

甘草 多半兩

荆芥 三兩

葳靈仙 一兩

右爲細末。每服二錢。薄荷湯茶點。食後服。或酒調蜜湯點亦得。服此
後頻頻洗浴。得出汗而立効。

苦參丸。治心肺積熱。腎臟風毒。攻於皮膚。時生疥癩。瘙痒難忍。時出黃
水。及大風手足爛壞。眉毛脫落。一切風疾。並皆治之。

參苦 四兩

荆芥 去梗

右爲細末。水糊丸。如桐子大。每服二十九丸。好茶吞下。或荆芥湯。食後。

○第四十七問。夜與鬼交者。何也。

答曰。人有五臟。臟有七神。臟氣盛則神強。外邪鬼魅不能干犯。若攝養失

節而血氣虛衰。鬼邪侵損。故婦人夢中多與鬼魅交通。其狀不欲見人。如有對忤。并獨言獨笑。或時悲泣者。是也。其脈來遲。或如鳥啄。顏色不變。皆邪物病也。說今宮中人。尼師。寡婦。會夢中與鬼魅交通。邪氣懷感。久作癩痕。或成鬼胎。往往有之。

扶神散。治婦人風虛鬼神交通。妄有所見聞。語言雜亂。

扶神半兩

扶苓

人參

菖蒲各一兩

赤小豆

半兩

右咬咀。每服三錢。水一盞半。煎六分。去滓溫服。食前。

治女人與鬼神交通。獨言獨笑。或悲或思。或謳謠恍惚。

松脂三兩

雄黃一兩

研末

右二味。用虎爪攪勻。丸如彈大。夜內籠中燒之。令女裸坐籠上。彼急

自蒙。唯出頭耳。過三薰即斷。

秦丞相灸法。狐魅神邪。及癩狂病。諸般醫治不差者。以併兩手大拇指。用綠絲繩急縛之。灸三壯。艾著四處。半在甲上。半在肉上。四處盡燒。一處不燒。其疾不愈。神効不可量也。小兒胎癩驚癩。一依此法灸之。一壯炷如小麥。妊癩亦妙。黃帝灸法。治療神邪鬼魅。及癩狂病。言語不擇尊卑。灸上唇裏。面中央肉弦上一壯。炷如小麥子大。用鋼刀決斷更佳也。

○第四十八問。大小便不通者。何也。

答曰。大腸者。傳導之官。變化出焉。傳者。傳其不潔之物也。上與肺合。膀胱者。州都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。化者。化其澁便之泄注也。內與腎

合。或臟腑不和，營衛不調，使陰陽二氣失升降之道，致大小二腸為祕結之患。巢氏云：熱則祕結，寒則鴨澹。熱搏於大腸，則大便不通；熱結於小腸，則小便不通。令大小便不通者，是大小二腸受客熱所結也。小腸受熱，化物不出，是致膀胱不能使洩也。故便血、尿血者，皆繇熱之所使也。

枳杏丸。治臟腑堅祕澀少。

杏仁一兩湯炮去皮尖別研

枳殼二兩先研為末

右為細末，神麩為丸，桐子大。每服四十或五十丸，食前米飲薑湯下。

麻仁丸。治津液虧少，大便結秘。

麻仁二兩去皮

枳實四兩去白麩炒 芍藥四兩

大黃兩炮四兩

厚朴二兩 杏仁二兩

右為末，蜜丸，桐子大。米飲下二十丸，未通加至三十丸。

石葦飲子。治氣淋，小遺澀痛。

石葦煨剝皮一兩

瞿麥 木通各一兩

陳皮 茯苓

芍藥 桑白皮

人參 黃芩各三分

右為細末，每服二錢，水一盞半，薑五片，煎七分，去滓溫服。哎咀亦得。眞珠丸常觀血之流行，起自於心，聚之於脾，藏之於肝，此三經者，皆心血所係之處也。若三經守節，則血濡養而安和；苟一臟有傷，則血散溢而為咎。指迷方云：小便赤色，不痛不澀者，非熱非淋，繇經氣乘心，心氣散溢，血無所歸，滲入下經，故治之多用心藥。宜服眞珠丸。

眞珠母 三分研如粉

柏子仁 研

當歸 各一兩

人參

沉香 半兩

酸棗仁 炒去皮研

犀角 鎊

熟地 酒浸洗蒸乾一兩半

扶神 去木

龍齒 各半兩

右爲細末。蜜丸桐子大。辰砂爲衣。每服四十九丸。加至五十丸。金銀薄荷湯下。日午臨臥時各一服。

○第四十九問。帶下三十六疾者。何也。

答曰。帶下者。繇勞傷過度。損動經血。致令體虛受冷。風冷入於胞絡。搏其血之所成也。諸方說帶下三十六疾者。是十二癥。九痛。七害。五傷。三因。謂之三十六疾也。十二癥者。是所下之物。一者如膏。二者如青。三者如紫。四者如赤皮。五者如膿痂。六者如豆汁。七者如葵羹。八者如凝血。九者如青血。血似水。十者如米汁。十一者如月浣。十二者經度不應期也。九痛者。一者陰中痛傷。二者陰中淋痛。三者小便刺痛。四者寒冷痛。五者月水來腹痛。六者氣滿並痛。七者汗出。陰中如蟲嚙痛。八者脇下皮膚痛。九者腰痛。七害者。一者害食。二者害冷。三者害氣。四者害勞。五者害房。六者害妊。七者害睡。五傷者。一者腹吼痛。二者陰中寒熱痛。三者小便急牢痛。四者藏不仁。五者子門不正引背痛。三因 因字一本或作固 一者月水閉塞不通。其餘二固者。文闕不載。三因方論云。三固者。形羸不生肌肉。斷緒不產。經水閉塞。名品雖殊。無非血病。多因經絡失於調理。產蓐不善調護。內作七情。外感六淫。陰陽勞逸。飲生冷。遂致營衛不和。新陳相干。隨經敗濁。淋露凝爲癥瘕。

流盜穢惡。痛害傷癰。犯時微若秋毫。作病重如山岳。古人所謂婦人病比男子十倍難治。而張仲景所說三十六種疾。皆錄子臟冷熱勞損。而夾帶起於陰內也。條目混混。與諸方不同。但仲景義最玄深。非愚淺者能解。恐其文雖異而義同也。

養氣活血丹。治勞傷衝任。帶下異色。

大艾葉 炒焦取細末五兩 乾薑 炮細末二兩

右二件。用好醋二升半。無灰好酒二升。生薑自然汁一升。艾葉末同調。於銀器內慢火熬成膏。方入後藥末。

附子 白芍 白朮 椒紅 各三兩半 川芎

當歸 人參 五味子 紫巴戟 去心糯米炒各二兩

右爲細末。入前藥膏子。并炒熟白麵二兩半。同和勻爲劑。入杵臼內搗千下。丸如桐子大。每服五十九丸。溫酒或米飲。食前任下。

紫桂丸。補益血海。治衝任氣虛。經脈不調。或多或少。腰疼腹冷。帶下崩漏。

禹餘糧 火煨醋淬七次三兩 龍骨 艾葉 醋炒 牡蠣

赤石脂 地榆 各二兩 厚朴 牡丹皮 阿膠 蛤粉炒

當歸 白芷 吳茱萸 湯洗七次 肉桂 各一兩 附子 半兩

○第五十問。婦人有帶下。或淋漓不斷。何以別之。
右爲細末。麵糊丸。桐子大。每服三十九丸。濃煎艾醋湯空心下。常服。

答曰。產戶有三門。一曰胞門。二曰龍門。三曰玉門。衝任二脈行於中。已產者屬胞門。未產者屬龍門。未嫁者屬玉門。病源云。陰陽過度。勞傷經絡。故風冷乘虛而入胞門。損衝任之經。傷太陽少陰之氣。致令胞絡之間。穢液與血相稱兼帶而下。冷則多白。熱則多赤。久而則為淋瀝之病也。

大補益當歸丸。治婦人諸虛不足。

當歸

續斷

乾薑

阿膠

甘草

川芎各一兩

吳朮

吳茱萸

附子

白芷

芍藥

官桂

地黃各一兩半

右為細末。麵糊丸如桐子大。每服五十丸。溫酒或鹽湯下。食前。

女科百問卷下

步軍司醫官兼太醫局教授齊仲甫撰

紹興裘詩福吟五校

○第五十一問。男女受形之始何以別之。

答曰。男女之合。二情交暢。陰血先至。陽精後衝。血開裹精。精入爲骨。而男形成矣。陽精先入。陰血後滲。精開裹血。血入居本。而女形成矣。陽氣聚面。故男子面重。溺死者必伏。陰氣聚背。故女子背重。溺死者必仰。鳥獸溺死者伏背皆然。陰陽均至。非男非女之身。精血散分。駢胎品胎之兆。父少母老。產女必羸。母壯父衰。生男必弱。古之良士也者。首察乎此。氣受偏疾。與之補之。補羸女。則養血壯脾。補弱男。則壯脾節色。羸女宜及時而嫁。弱男宜待壯而婚。此疾外所務之本。不可不察也。

○第五十二問。何以謂之有娠。

答曰。經云。經候一月日後。覺不通。診其脈理平和。婦無他疾。欲作胎也。脈經云。有一婦人來診。自道經斷不來。師言一月爲胚。二月爲始膏。三月爲居經。今既居經。正是爲作胎也。

人參丸。養陰生血補虛。

人參

鹿角膠

熟地

川芎

白芍

當歸

白朮

各一兩

右爲細末。蜜丸。桐子大。每服三十丸。空心米飲下。

○第五十三問。何以謂之居經。

答曰。陽施則別。陽者氣也。陰化則搏。陰者血也。二情交暢。血氣和調。故令有子也。經云。肝主藏血。故一月謂之血凝。陰氣方始凝結。足厥陰肝經養之。肝與膽合。二月為之胚。兆未成器。猶之胚也。足少陰膽經養之。三月陽神為魂。手心主胞經絡養之。且經者常也。天真之氣。與之流通。故三旬一見。今既三月不行。所以謂之居經也。

白朮散。調補衝任。扶養胎氣。治妊娠宿有風冷。胎痿不長。或失於調理。動傷胎氣。多致損墮。懷妊常服。壯氣益血。保護胎藏。

牡蠣 三分

白朮 四分

芎藭 四分

蜀椒 去目及閉口者
炒出汗三分

右為細末。每服二錢。溫酒空心調服。

內補當歸丸

熟地 酒浸洗九蒸九晒焙乾二兩

當歸 去蘆洗切焙微炒一兩

右為細末。蜜丸桐子大。每服五十丸。溫酒下。予嘗觀許學士論枳殼散四物湯。內補當歸丸。此三方皆載之。在人用之何如耳。大率妊娠。惟在抑陽助陰。素問云。陰搏陽別。為之有子。蓋關前為陽。關後為陰。尺中之脈。按之搏手而不絕者。妊子也。婦人平居。陽氣微盛無害。及其妊子。則方閉經。遂以養胎。若陽盛搏之。則經脈妄行。胎乃不固。素問所謂陰虛陽搏謂之崩也。抑陽助陰之方甚多。然胎前藥唯惡羣隊。若陰陽交雜。別生他病。惟是枳殼散所以抑陽。四物湯所以助陰。

故爾。枳殼散差寒。若單服之。恐有胎寒腹痛之病。以內補丸佐之。則陽不致強。陰不致弱。陰陽調和。有益胎嗣。此前人未嘗論及也。

四物湯

當歸 熟地 白芍 川芎 各等分

右咬咀每服四錢。水二盞。煎八分。去滓溫服。不拘時。

枳殼散

枳殼 二兩 甘草 一兩

右為細末。每服二錢。百沸湯點服。空心食前三服。

○第五十四問。婦人居經之後。心中憤悶。不欲執作。惡聞食氣者。何也。答曰。妊娠心中憤悶。頭暈。四肢煩痛。懈墮不欲執作。惡聞食氣。欲噉鹹酸果實。多睡少起者。世云惡食。又云惡字。是也。乃至三四月以上。大劇者。不能自勝舉也。此繇婦人元本虛羸。血氣不足。腎氣又弱。兼當風飲冷太過。心下有痰水。水漬於臟。故心煩憤悶。氣挾而嘔吐也。挾風則頭目暈。此名惡阻。所謂阻者。經血既閉。痰水積於中。阻其臟氣。不得宣通也。

竹茹湯。治初有妊。擇食嘔逆。頭痛顛倒。寒熱煩悶。

陳皮 人參 白朮 麥門冬 各一兩 甘草 後一錢

厚朴 茯苓 各半兩 淡竹茹 先刮下臨煎旋入 一本有淡竹一錢

右咬咀。每服四錢。水盞半。入薑竹茹各一塊如粟大。拍破。同煎八分。

頻服。去滓溫服。

扶苓丸。治妊娠阻病。心中煩憤。頭目眩重。惡聞食氣。嘔逆吐悶。

葛根

枳殼

白朮

甘草

炙各二兩

赤茯苓

人參

乾薑

肉桂

陳皮

半夏各一兩

右為細末。蜜丸桐子大。每服五十九丸。溫米飲空心送下。

小地黃丸。治妊娠酸心吐清水。腹痛不能飲食。

人參

乾薑炮各等分

右為末。用生地黄汁丸。桐子大。每服五十九丸。食前服。

半夏扶苓湯。治妊娠惡阻。心中憤悶。頭目眩暈。四肢怠惰。百節煩疼。痰

逆嘔吐。嫌聞食氣。好噉酸鹹。多臥少起。不進飲食。

半夏

白茯苓

熟地酒浸各一兩八錢

陳皮

細辛

人參

芍藥

川芎

紫蘇

桔梗

甘草以上各一兩二錢

右每服四錢。水二盞。薑七片。煎七分。空腹服。有熱煩渴。口生瘡者。去

陳皮。細辛。加前胡。知母。腹冷下痢者。去地黃。入桂心。胃中虛熱。大小

便秘澁者。加大黃一兩八錢。去地黃。加黃芩。

四七湯。治同前方。見二十八問中。

二陳湯。治妊娠惡阻。產後飲食不進。

半夏

陳皮各五兩

白茯苓三兩

甘草二兩

右以咀。每服四錢。水盞半。薑七片。烏梅一枚。煎六分。去滓熱服。不拘

時。

白朮散。治妊婦宿風冷。胎痿不長。或失於腠理。動傷胎氣。多致損胎等疾。

牡蠣 二錢

蜀椒

去目炒出
斤三分

白朮

芎藭

各四錢

右爲細末。每二錢溫酒空心服。腹痛加白芍藥。心毒痛加川芎。心煩嘔吐加細辛一兩。半夏五十粒。消渴者以大麥汁調服。兼治室女帶下諸疾。常服則保護胎藏。

人參散。治初妊惡食。嘔吐痰逆。

人參 一兩

枳殼

炒三錢

厚朴

半兩

甘草

半兩

右爲細末。每服二錢。百沸湯調下。空心食前日三服。

嚴氏第十三問。妊娠頭目眩。視物不見。腮項結核者。何也。曰。蓋因胎氣有傷。肝臟毒熱上攻。太陽穴痛。嘔逆。背項拘急。致令頭暈生花。若加涎壅。危在片時。宜急服消風散主之。

消風散。

石膏

煨

甘菊花

防風

荆芥穗

羌活

鈴羊角

川芎

大豆黃卷

當歸

酒浸

白芷

各一兩

甘草

炙半兩

右咬咀。每服四錢。水盞半。入好茶半錢。煎八分。通口服。食前。

○第五十五問。居經之後。或復有漏下者。何也。

答曰。衝任二脈。為經血之海。皆起於胞中。手太陽小腸。手少陰心經。互為表裏。作胞之際。壅之以養胎。既產之後。積之為乳汁。或衝任氣虛。不能制其經血。故妊娠數月。經水不調。時下者。此名漏胞。漏不止則斃也。

止漏散。療妊娠漏胞。

熟地 四兩 乾薑 二兩

右為細末。每服二錢。空心米飲調下。

又方。益智。不拘多少。為細末。米飲下。次用香附甘草為末。醋糊丸。用四物湯去地黃。理中湯去乾薑。煎吞下。二三十丸甚妙。

阿膠散。治胎動不安。及漏胎腹中痛。

阿膠 一兩 蛤粉 兩 熟地 一兩 桑寄生 各一兩半 龍骨 三分

甘草 一兩 炙 白茯苓 三錢 白朮 一兩 芎藭 三錢 乾薑 半兩 炮製

右咬咀。每服四錢。水盞半。棗三枚。煎六分。去滓熱服。不拘時。

佛手散。治婦人妊娠五七月。因事築磕着胎。或子死腹中。惡漏下。疼痛不已。口噤欲絕。用此藥探之。若不損則疼止。子母俱安。若胎損。立便逐

下。安胎者不用酒

當歸 六兩 川芎 三兩

右為麤末。每服三錢。水一盞。煎令泣。欲乾。投酒一盞半。止一沸。去滓溫服。口噤灌之。如人行五七里再進。不過兩三服。服之便生。

膠艾湯。妊娠不問深淺。月數。因頓仆胎動不安。腰腹中急。逼血。或從口

出，或有所下，或胎奔上，刺心短氣，安胎。

熟地 二兩

白艾 炒

當歸

甘草 炙

芍藥

川芎

阿膠 炒各一兩

右咬咀，每服水一盞半，煎七分，去滓，熱服。胸中逆冷，加生薑五片，棗

三枚，煎服。食前。若虛人，加黃芪一兩。

桂枝茯苓湯。治宿有癥瘕，妊娠經斷，未及三月即動，此瘕也。經斷三月

而漏下不止，胎動在臍上者，為癥瘕害。當去其癥。又論云：妊娠六月胎

動者，前三月經水利時，胎下血者，後斷三月脈也。所以下血不止，癥不

去故也。

桂心

白茯苓

牡丹皮

桃仁 炒

白芍藥

右為細末，煉蜜丸如彈子大，每服一丸，溫酒或米飲湯，食前細嚼下。

嚴氏第三問：胎漏經血妄行者，何也？答曰：妊娠或成形，胎息未定，或因房

室驚觸，勞力過度，動傷胎胞，或食毒物，致令子宮虛滑，經血淋瀝，若不急

治，敗血湊心，子母難保。月漸胎乾，危亡不久。

桑寄生散。治妊娠胎動不安，下血不止。

桑寄生

當歸 酒浸

川續斷 酒浸

茯神 去木

芎藭

香附

阿膠 蛤粉炒

白朮 各一兩

人參

甘草 炙各半兩

右咬咀，每服四錢，水盞半，薑五片，煎七分，熱服不拘時。

○第五十六問：胎在腹中，時時撞動不安者，何也？

答曰。懷則以身依也。娠則以時動也。若腹中不時撞動者。謂之胎動也。多因勞役氣力。觸冒冷熱。飲食不適。居處失宜。輕者止轉動不安。重者便致損墜。若母有疾。以疾動胎者。治母則胎安。若胎不固。動致母病者。治胎則母安。若胎不牢固。其胎必致損也。

保安散。治妊娠胎氣不安。心腹疼痛胎動。安胎。

當歸半兩

人參一兩

阿膠牛兩蛤粉炒成珠

甘草牛兩

右咬咀。每服三錢。水盞半。葱白一莖拍破。煎八分。去滓溫服。食前。未定再服。

安胎飲。治妊娠偶因所觸。或從高墮下。致胎動不安。腰中疼痛。服此藥後。覺胎動處熱。即胎已安。

縮砂

不拘多少慢火炒令熱透後去皮取仁用

右爲細末。每服三錢。熱酒調下。不飲酒者煎鹽艾湯調下。食前。

嚴氏第一問。妊娠兩三月。胎動不安者何也。曰。男女陰陽會通。血氣調勻。乃成其孕。設若下血腹痛。蓋繇子宮久虛。致令胎墮。其危甚於正產。若妊娠會受此苦。可預服杜仲丸。

杜仲

去皮剉薑汁浸炒去絲

川續斷酒浸各三兩

右爲細末。棗肉丸。桐子大。每服七十丸。空心米飲下。一日三服。

〇第五十七問。何謂子滿。

答曰。妊娠之人。經血擁閉。以養其胎。或掩水氣。血水相搏。以致體腫。皆繇

脾胃虛弱。臟腑之間宿有停水之所掩也。謂之子滿。若水停不去。浸漬於胎。則令胎壞。診其脈浮。腹滿兼喘者。其胎必墮也。

澤瀉散。治妊娠氣壅。身體腹脇浮腫。喘息促急。大小便秘澁。

澤瀉 桑白皮 枳殼麸炒

檳榔 赤茯苓 木通各一兩

右咬咀。每服四錢。水盞半。薑五片。煎八分。去滓溫服。食前。稍利為度效。

木通散。治妊娠身體浮腫。心腹脹滿。小水不通。

木通 一兩 訶梨勒皮 木香各三分 香薷 一兩 枳殼半兩 麩炒

檳榔 半兩 桑根皮 一兩 赤茯苓 三分 雞蘇 一兩

右咬咀。每服四錢。水盞半。薑五片。煎六分。去滓溫服。食前。

商陸赤小豆湯

赤小豆 乾商陸各等分

右咬咀。每服一兩。水一盞。煎七分。去滓溫服。

嚴氏第五問。論胎冷腹脹虛痛。兩脇虛鳴。臍下冷痛欲泄。小便頻數。大便虛滑者。何也。曰。胎氣既全。子形成質。或食瓜果甘甜。飲冷不時之物。當風取涼。受不時之氣。則令胎冷。子身不能安處。皮毛疼痛。筋骨拘急。手足攣拳。致使母有危證。急宜服安胎和氣散。

訶子 煨 白朮 各一兩 陳皮 良薑 炒

木香煨

白芍藥

陳米炒

甘草炙各半兩

右咬咀。每四錢。水盞半。薑五片。煎七分。去滓溫服。不拘時。忌生冷。○第五十八問。妊娠三月。會經墮胎。至其月日復墮者。何也。

答曰。陽施陰化。則有胎也。若血氣和調。胎氣乃成。若血氣虛損。子藏為風冷所乘。致虧營衛。不能蔭養其胎。故數墮也。假令妊娠三月。當手心主包絡經養之。不善攝生。傷經。則胎墮。後雖再有妊。至其月日。仍前犯之。所以復墮也。又有因墜。墮驚恐。或吐血。下血者。皆能損胎。若妊娠常腰疼者。喜墮胎也。蓋腰為腎府。女子以繫胎也。

地榆散。治妊娠損動胎胞。下血不止。

地榆三錢

乾薑三分

當歸三錢

龍骨三錢

芎藭三錢

艾葉半兩

阿膠三錢

蒲黃半兩

熟地一兩

黃牛骨一兩
燒灰

烏鰂骨二錢
燒灰

白朮半兩

右為細末。每服二錢。以粥飲調下。不拘時。

卷柏丸。治妊娠數墮胎。皆因血氣虛損。子臟受風冷。致令胎不堅固。故

頻有傷。

卷柏

鍾乳粉

鹿角膠搗碎炒
合黃燥

紫石英火煨研細
水飛過

陽起石火煨
研細

桑螵蛸炒

熟地

禹餘糧燒醋碎七
次各一兩

杜仲

芎藭

當歸剉炒

桂心

牛膝

桑寄生

五味子

蛇牀子

牡丹皮各三分

玄及

右爲細末。煉蜜丸。桐子大。每服五十九丸。空心溫酒送下。

嚴氏第二問。胎動腹痛者。何也。曰。胎動腹痛。其理蓋緣飲食冷熱。動風毒物。或因再交。搖動骨節。傷犯胞胎。其候多嘔。氣不調勻。或服熱藥太過。血氣相干。急服順氣藥安胎。不然變成漏胎。則難療矣。

如聖湯。

鯉魚皮 當歸 熟地 阿膠

白芍藥 川芎 續斷酒浸 甘草炙各等分

右咬咀。每服四錢。水盞半。入苧根少許。薑五片。煎七分。去滓空心服。

○第五十九問。大小二便秘結不通者。何也。答曰。陽虛不能運陰。故氣無陰以清其陽。則陽獨治而爲厥。是以二氣和。則氣道平。二便順。陽故氣無陽以和其陰。則陰獨治而爲厥。是以二氣和。則氣道平。二便順。則氣道通。今二便秘結。明陰氣之獨治也。夫人有腑臟氣實而生熱者。隨其停積之處而成病也。若熱結大腸。則大便不通。熱結小腸。則小便不通。若大小便俱爲熱所結。故煩滿而二便秘閉。熱盛則腸胃氣逆。冷則變爲嘔也。

檳榔散。治產後大小便秘。心腹脹滿氣促。

檳榔一兩 車前子三分 冬瓜子三分 川大黃一兩 微炒 木通一兩

桂心半兩 甘草炙半兩 當歸炒半兩 滑石一兩 川朴硝者入硝

右咬咀。每服三錢。水盞半。煎半盞。去滓溫服。不拘時。

木通散。治產後大小便秘澀。

木通

大麻仁

葵子一本冬瓜子

滑石

檳榔各一兩

枳實半兩 蘇炒

甘草一兩 炙

右咬咀。每服三錢。水盞半。煎八分。去滓。溫服。不拘時。

嚴氏第四問。妊娠面赤。口苦舌乾。心煩腹脹者。何。曰。蓋緣恣情飲酒。因食
桃梨羊肉雞麵魚腥。羶毒物等。致令百節痠疼。大小便結秘。可服歸涼節
命散。

命散。

川芎

苧根

白芍藥

麥門冬去心

當歸

白朮各一兩

糯米半合

甘草炙半兩

右咬咀。每服四錢。水盞半。煎九分。去滓。溫服。不拘時。

大腹皮散。治妊娠大小便不通。

枳殼

大腹皮

甘草炙各一兩

赤茯苓去皮 三錢

右為細末。每服一二錢。濃煎葱白湯調下。不拘時服。

冬葵子散。治妊娠小便不利。身惡重寒。起則眩暈。及水腫。

冬葵三錢

赤茯苓一錢

右為細末。每服三錢。米飲調下。不拘時。若利則歇。服不通。恐是轉胞。

加髮灰少許。神效。曾有妊婦腹脹。小便不利。吐逆。諸醫雜進溫脾胃。

寬氣去脹等藥。服之反吐。藥食不內。轉加脹滿。捺心。驗之胎死腹中。

又服諸下胎藥不能解。舉家驚惶。因得鯉魚湯論曰。腳腫俗呼為皺。

脚亦有通身腫滿。心胸急脹。名曰胎水。遂去妊婦心前衣服看之。胸肚不分。急以鯉魚湯四五服。大小便皆下惡水。腫消脹去。方得分娩死胎。可謂生之幸也。此證蓋緣懷身腹大。妊婦不自知覺。人人皆以爲身娠如此。終不以爲胎水病。醫人何以得知。故書此論。病家當自覺察。

鯉魚湯

當歸

白芍藥去皮各四錢

白朮半兩

右咬咀。每服四錢。用鯉魚一尾。不拘大小。破洗去鱗腸。白水煮熟去魚。每服魚汁一盞半。薑五片。橘皮少許。煎一盞。空心服。如胎水去未盡絕。再服。

○第六十問。妊娠傷寒。與常人治法同異。何如。

答曰。四時有不正之氣。如春夏亦有寒溫時。秋冬亦有暄暑時。是故一歲之中。病無長幼。率相似者。此則時行之氣。俗謂之天行。若春溫煖而清氣折之。則責邪在肝。夏應暑而寒氣折之。則責邪在心。秋應涼而反大熱折之。則責邪在肺。冬應寒而反大溫折之。則責邪在腎。仲景云。冬溫之毒。與傷寒大異。蓋傷寒者。因冒寒而作也。其候發熱惡寒。頭疼腰痛。其脈浮緊。無汗者可發汗。宜服麻黃湯。脈浮緩而有汗者。可解肌。宜服桂枝湯。切詳麻黃桂枝皆能墮胎。以此言之。則妊娠傷寒。常人之治法大不相侔也。

十全散。卽敗毒散。又名人參羌活散。治傷寒瘟疫。

人參

白茯苓

羌活

獨活

甘草炙

川芎

枳殼

柴胡

白朮

桔梗各等分

右咬咀。每服三錢。水盞半。薑五片。薄荷七葉。煎七分。熱服。如頭疼發熱連二服。汗出即愈。

阿膠散。治妊娠婦傷寒安胎。

阿膠

桑寄生

吳白朮

人參各等分

右為細末。每服二錢。煎糯米飲調下。不拘時。

單胎散

捲荷葉一兩 焙乾 蚌粉花

右為細末。每服二錢。入蜜少許。新汲水調下。食前服。

嚴氏第十問。妊娠婦外感風寒。渾身壯熱。眼暈頭眩者。何。曰。蓋因風寒客於皮膚。傷於營衛。或洗項背。或當風取涼。致令頭目昏痛。憎寒發熱。甚致心胸煩悶。大抵產前一二命。所以不可輕易妄投湯劑。感冒之初。止宜進芎蘇飲以發散表邪。其病自愈。

芎蘇飲

川芎

紫蘇葉

白芍藥

白朮

麥門冬

陳皮

乾薑各一兩

甘草炙半兩

右咬咀。每服四錢。水盞半。薑二片。葱白一寸。煎八分。溫服。不拘時。

○第六十一問。妊娠傷寒。差後復發熱者。何也。

答曰。傷寒差後發熱者何。此名勞食復也。內經云。多食則復。食肉則復。緣病差後。氣尚虛。津液未復。因勞動生熱。氣既還復。入經絡。名曰勞復。仲景云。傷寒差後更發熱者。枳實梔子湯主之。脈浮者。以汗解。脈沉者。以下解。又傷寒差後勞復者。枳實梔子湯主之。千金方勞復起死。人參麥門冬湯。又有食復者。大病新差。脾胃尚弱。穀氣未復。漢王字泰本作谷強食過多。停積不化。因爾發熱。名曰食復。仲景於枳實梔子湯證云。若有宿食。內加大黃如博棊子大五六枚。服之愈。

枳實梔子湯

枳實一枚去穢 梔子三枚半肥者

枳實一枚去穢

梔子三枚半肥者

豉一兩半

右以清漿水二盞半。煎九分。下豉再煎五六沸。去滓溫服。覆令汗出。若有宿食。加大黃如博棊子大五六枚服之。日煎服之。

○第六十二問。時氣溫病。皆能損胎者。何也。

答曰。陰陽大論云。春氣溫和。夏氣暑熱。秋氣清涼。冬氣凜冽。此則四時正氣之序也。冬時嚴寒。萬類深藏。君子固密。則不傷於寒。若傷於寒者。凡名傷寒耳。其一歲之中。長幼之病多相似者。故名時行之氣也。其傷於四時之氣。皆能為病。以傷寒為毒者。以其最盛殺厲之氣。中而即病者。名曰傷寒。不即病。寒毒藏於肌膚。至春變而為溫病。至夏變而為暑病。暑病者。熱極重於溫也。詳此三證。皆因寒氣而受邪。寒極生熱。熱氣薰煮其胎。故損也。

單胎散見六十問中

人參羌活湯。治妊娠感冒。發熱頭疼。身體痛。

白茯苓

羌活

獨活

前胡

芎藭

枳殼炒

桔梗

人參各一兩

甘草炙半兩

乾葛

陳皮各一兩

右為細末。每服三錢。水一盞。薑五片。棗一枚。煎七分。去滓溫服。

黃龍湯。治妊娠瘟疫。寒熱頭痛。嘔嘔不欲飲食。脇下痛。嘔逆痰氣。及產

後傷風。熱入胞宮。寒熱如瘧。

柴胡

黃芩

甘草

人參各一兩

右劉如麻豆大。每服五錢。水盞半。煎八分。去滓溫服。不拘時。

治妊娠患時疾。

黃芩尖者。出錐鬱金。

右為細末。每服一錢。板藍根地黃水調下。汗出效。未愈。再服即愈。

治妊娠患時疾。

雞子

鹽井底泥上隔宿取出吞之必無慮矣

○第六十三問。妊娠寒熱。或因暑氣者。有不因傷暑而得之者。何也。

答曰。瘧者。寒熱之疾。皆絲風寒入中也。夫風為陽邪。陽化氣而為熱。寒為陰邪。陰化氣而為寒。陰陽上下交爭。虛實邪正更作。或陰併於陽。則陰實而陽虛。若陽併於陰。則陽實而陰虛。或先傷於寒而後傷於風。其為候也。

則先寒而後熱。或先傷於風而後傷於寒。其爲證也。則先熱而後寒。休作有時。與傷寒頗異者。故名爲瘧也。經曰。夏傷於暑。秋必病瘧者。此因暑氣之所傷也。若妊娠寒熱者。皆繇血氣虛損。風邪乘之。致陰陽關隔。寒熱互見也。經云。陽微惡寒。陰弱發熱。若此之類。皆繇虛之所致。此不因暑氣之作也。若熱極不已。則傷胎。

大安散。治脾寒如瘧。發熱無時。

草豆蔻 七個和皮細切

厚朴 半兩

烏梅 十個去核仁

甘草

人參 各一分

大棗 十枚

肥薑 一分連皮

陳皮 七個全者洗淨切

良薑 一分

左共剉拌勻。分作五裹。先以鹽水蘸紙濕。裹煨香熟。第一服一裹。水一盃。煎一盃。溫服。第二服用二裹。并煎滓。以水二盃。煎一盃。溫服。第三服用三裹。并煎滓。以水三盃。煎一盃。作兩服。並空心食前溫服。妊娠患瘧熱者可服。

常山

竹葉 各半兩

人參

石膏 各一兩研

糯米 一百粒

右爲呶咀。每服三錢。水盞半。煎八分。去滓。通口服。不拘時。

地黃丸。治寒熱類瘧。久之爲勞。

生地 二兩

柴胡 洗

秦朮

黃芩 各半兩

赤芍

右爲細末。蜜丸桐子大。每服三十丸。烏梅湯下。不拘時。

清肌湯。治頭目昏重不悅。頰赤口燥咽乾。發熱盜汗。飲食減少。

甘草 炙半兩

草果仁 五錢

當歸 微炒

白朮 一兩

白茯苓

芍藥

柴胡各一兩

川芎半兩

右咬咀。每服三錢。水一盞半。煨薑一塊切碎。薄荷少許。煎七分。去滓熱服。不拘時。

○第六十四問。下利與滯利。何以別之。

答曰。春傷於風。邪氣運留。遇腸胃虛弱。風邪因時傷之。腸虛則泄。故為水穀之痢也。或腸虛受熱氣者。下痢則赤。受冷氣者。下痢則白。冷熱相交。其痢如魚腦鼻涕。相雜連滯不已者。謂之滯痢也。

香連丸。治泄痢不止。

木香

黃連

吳茱萸

白芍各等分

右為細末。麵糊丸。桐子大。每服二十九丸。濃煎米飲湯下。空心日三服。妊娠下痢不止。

黃蘗

乾薑

赤石脂各二兩

酸榴皮一具

右為麤末。每服五錢。水盞半。煎六分。去滓。食前溫服。

赤石脂散。治腸胃虛弱。水穀不化。冷熱不調。下痢赤白。腸滑腹痛。肢體困倦。飲食減少。

赤石脂

甘草各二兩

肉豆蔻仁十兩

砂仁五兩

右為細末。每服二錢。溫粟米飲湯下。食前。

歸連丸。治一切下痢。無以新久。及冷熱膿血。腸滑裏急。日夜無度。臍腹絞痛不可忍。

阿膠 搗碎炒如珠三兩
以醋四升煮成膏

黃連

當歸 各二兩

乾薑 二兩

木香 一兩
五錢

右共為末。用阿膠膏丸。桐子大。每服三十丸。食前米飲下。

當歸芍藥散。治妊娠腹中絞痛。心下急脹。及產血暈。內虛氣乏。崩中久痢。常服通暢血脈。不生癰瘍。消痰養胃。明目益津。

白芍 八兩

當歸

白茯苓

白朮 各二兩

澤瀉

川芎 各四兩

右為細末。每服二錢。溫酒調下。食前。元和紀用。經云。本六氣經緯。能補虛勞。養真陽。退邪熱。緩中和神志。潤澤顏色。散邪寒。溫瘴時疫。安期先生賜君少久餌之藥。後仲景增減為婦人懷妊腹痛本方。用芍藥四兩。澤瀉茯苓川芎一兩。當歸白朮二兩。亦可以蜜丸服。又方等分。每服三錢。溫酒米飲任下。

雞黃散。治懷妊下痢。赤白絞刺疼痛。

雞子

一個烏者為妙。就頭作一發。傾出清留黃。以黃丹一錢入。前雞子內打令黃。勻以厚紙裹。鹽泥固濟。煨取出焙乾。

右為末。每服二錢。米飲調下。一服愈者是男。二服愈者是女。

嚴氏第九問。妊娠下痢赤白者何。曰。蓋因冷物停脾。辛酸損胃。冷熱不調。胎氣不安。凝滯下痢頻頻。時有時無。或赤或白。腸鳴後重。穀道疼痛。急服黃連丸。不問冷熱二證。皆可服之。

蒙薑黃連丸

乾薑炮

黃連

川芎

砂仁微炒

阿膠蛤粉炒 各一兩

白朮一兩

乳香三錢 另研

枳殼半兩

右為細末。同鹽梅三箇取肉。入少醋糊用杵勻。丸如桐子大。每服四十丸。白痢乾薑湯下。赤痢甘草湯。赤白痢乾薑甘草湯下。

○第六十五問。喘病何以得之。

答曰。喘急之病。皆繇營衛之氣。流行失度。氣經於臟而臟不能受。諸氣上併於肺。肺管隘而氣爭。故令喘急。其始得之。或因墜墮恐懼。則精神法怯。上焦閉而氣不行。氣不行則流於肝。肝氣乘肺。此喘出於肝。或因驚恐。驚則心無所倚。神無所歸。氣亂於中。心乘於肺。此喘出於心。或因渡水跌仆。腎氣暴傷而不通行。氣流於腎。腎氣上乘於脾。此喘出於脾。或因飲食過傷。動作用力。穀氣不行。脾氣逆而凝肺。此喘出於肺。凡諸臟相乘而喘。其證各不同也。

神祕湯。治夜不得臥。臥則喘。此繇水氣逆行。上乘於肺。肺得水則浮而開。使氣不得通流。其脈沉大。

陳橘皮湯洗

生薑

紫蘇葉

人參

桑白皮各半兩

右為呖咀。每服三錢。水盞半。煎八分。去滓溫服。

平肺湯。治喘急。

天門冬去心 一兩

馬兜鈴

百部各半兩

右為麤末。每服五錢。水盞半。煎八分。去滓溫服。

○第六十六問。妊娠多痰者。緣何而生。

答曰。痰因飲生也。氣道壅滯。津液不通。水飲氣滯。停在胸膈。結而成痰。人皆有之。少則不能為害。多則成病。乃至嘔吐。妊娠嘔吐甚者。多傷胎也。

細辛五味子湯。治痰飲壅滯。

細辛 一兩

五味子 二兩

白茯苓

人參

白朮

甘草 炙各一兩

乾薑 一兩 炮

右為飲子。每服三錢。水盞半。煎八分。去滓溫服。食後。

赤茯苓湯。治妊娠嘔噦。心下滿。胸膈間宿有停水。停水心悸。

赤茯苓

人參

陳皮 各一兩

芎藭

白朮

半夏 各半兩

右為飲子。每服四錢。水盞半。薑五片。煎七分。去滓溫服。不拘時。

○第六十七問。妊娠霍亂者。何也。

答曰。陰陽不順。清濁相干。氣射中焦。名曰霍亂。本因飽食豚膾。復啖生冷。或飲寒漿。眠臥冷席。風冷之氣。傷於脾胃。諸食結而不消。陰陽二氣壅而不散。交錯於中。變成吐痢。邪在於上者。先心痛而吐。邪在於下者。先腹痛而痢。心腹俱痛。吐痢並發。挾風者身熱頭痛。冒暑者吐痢冷飲。若不巳。則百脈昏亂。營衛俱虛。冷搏於筋。令人轉筋。邪干於胎。其胎必損。揮霍之間。便成繚亂。故名霍亂也。

白朮散。治產後霍亂。吐痢腹痛煩渴。手足逆冷。

白朮

麥門冬

陳皮

乾薑炮

人參各一兩

甘草炙半兩

右為麤散。每服四錢。水盞半。薑五片。煎六分。去滓溫服。不拘時。

寒者。理中湯。治裏寒外熱。霍亂吐痢。手足厥冷。胸脾心痛。逆氣結氣。

丁香一兩

人參

甘草

白朮

乾薑炮各三兩

右為飲子。每服三錢。水盞半。煎八分。去滓。空心稍熱服。

丁香散。治霍亂吐痢不止。

丁香

桂心

白朮各半兩

訶梨勒

厚朴

高良薑

附子各三分

木瓜乾者

陳皮各一兩

右為細末。每服一錢。米飲調下。不拘時。

渴者。五苓散。治霍亂吐痢。躁渴引飲。

澤瀉五兩

白朮

猪苓各三兩

肉桂二兩

赤茯苓三兩

右為細末。每服一錢。熱湯調下。不拘時。服訖多飲熱湯。有汗即愈。

參苓白朮散。治胃氣不順。吐痢止後。躁渴不解。

乾薑二兩

人參

白茯苓各一兩

木香一分

甘草炙一分

藿香葉

右為麤末。每服一錢。水盞半。煎七分。去滓溫服。不拘時。

香薷飲。治清濁相干。霍亂吐痢。

香薷一兩

厚朴

黃連各二兩

右爲飲子。每服三錢。水盞半。煎七分。去滓。用新汲水頻頓極冷服之。藥冷則効速也。

○第六十八問。何謂子煩。

答曰。煩有四證。有心中煩。有胸中煩。有虛煩。有子煩。諸如此者。皆熱也。若藏虛而熱氣乘心。則令心煩。但煩熱而已。別無他證者。名曰虛煩。若積痰飲而嘔吐涎沫者。謂之胸中煩。或血飲停積。虛熱相搏。以其妊娠而煩。故謂之子煩也。

犀角散。治妊娠心煩熱悶。

犀角屑

地骨皮

黃芩

麥門冬

赤茯苓

各一兩

甘草

炙半兩

右爲飲子。每服四錢。水盞半。煎八分。去滓。入竹瀝一合。更煎數沸。溫服不拘時。

當歸飲子。治妊娠胎動。心煩熱悶。

當歸

芎藭

阿膠

豆豉

桑寄生

各半兩

葱白

七莖

右爲飲子。每服三錢。水二盞。煎八分。去滓。溫服。不拘時。
竹瀝湯。療妊娠常苦煩悶。此子煩也。

竹瀝

二合

防風

三兩

黃芩

三兩

茯苓

四兩

麥門冬

三兩

右爲飲子。水四升。合竹瀝煮取二升半。分三服。不差重作。

○第六十九問。何謂子嗽。

答曰。肺主氣。外合皮毛。風寒外感。入射於肺。故為咳也。有涎者。謂之嗽。無痰者。名曰咳。夫五臟六腑。俱受氣於肺。各以其時。感於寒而為病也。秋則肺受之。冬則腎受之。春則肝受之。夏則心受之。長夏則脾受之。長夏者。夏未秋初也。諸藏不已。各傳於腑也。妊娠而嗽者。謂之子嗽。久而不已。則傷胎。

天門冬湯。治惡熱咽燥。脈數咳嗽。甚則咯血。

天門冬半兩

紫苑

知母各一兩

桑白皮

五味子

桔梗

右為飲子。每服五錢。水二盞。煎一盞。去滓溫服。有血者。加阿膠半兩。大便澁而喘者。加葶藶半兩。

百合散。治妊娠咳嗽。心胸不利。煩悶不欲飲食。

百合

紫苑

麥門冬二兩

桔梗

桑白皮各一兩

甘草炙半兩

右為呖咀。每服四錢。水盞半。入竹茹一分。煎八分。去滓。入蜜半匙。更煎三四沸。方可。不拘時候溫服。

緩息丹。治肺氣不調。痰壅咳嗽。上氣喘滿。咳嗽唾痰沫。日夕不安止。

半夏麩

二兩半。夏湯洗七次。研成末。薑汁和候乾。再為末。薑汁再和。共七八次。取喫之。不辣為度。

橘紅五錢

天門冬半兩

杏仁一兩。去皮尖。別研成糝。

右三味爲末。次拌研細杏仁霜。煉蜜和。每兩分十五丸。每服一丸。隨
律調之。食後服。

○第七十問。何謂胸痺。

答曰。胸痺者。繇寒氣客於臟腑。氣上衝心。胸下幅幅如滿。噎塞習習痺痛。
飲食不下。謂之胸痺也。脾胃漸弱。乃至斃人。妊婦爲患。亦損傷胎也。

枳實理中湯丸。治結胸欲絕。心膈高起。手不可近。

白茯苓

人參各二兩

枳實十六片

乾薑炮

白朮各二兩

甘草炙二兩

右爲細末。蜜丸如雞子黃大。每服一丸。熱湯化下。連進二三服。胸中
豁然而開。渴者加栝蔞根二兩。下痢者加牡蠣二兩。

桔梗枳殼湯。治痞氣胸滿欲絕。

枳殼

桔梗湯洗去穢各一兩

右劉麻豆大。分二服。水二盞。煎一盞。去滓溫服。不拘時。

沈香理氣湯。治氣滯不和。胸膈虛痞。

丁香

檀香

木香各半兩

藿香二兩

甘草二兩

砂仁半兩

白豆蔻二兩用仁

沉香

烏藥

人參各一兩

右爲末。每服一錢。入鹽一字。沸湯點服。不拘時。

調氣丸。治氣道不順。胸膈壅塞。

青皮炒

陳皮炒

木香各一兩不見火

右各剉碎。用牽牛末四兩炒。牽牛末焦黃。篩去不用。以三味為細末。蜜丸。桐子大。每服五十丸。空心薑湯送下。

○第七十一問。何謂子癰。

答曰。風是四時八方之氣。常以冬至日候之。風從其方來者。長養萬物。不從其方來者。乃名虛邪賊風。體虛之人中之者。隨其虛而為病也。夫五臟六腑之俞。皆在於背。臟腑既虛。則邪乘虛而入。傷隨其臟腑所感而發。時能言者可治。不能言者難治。若傷太陽之經。復遇寒濕相搏。口噤背強。名之曰瘧。故妊娠而發者。悶冒不識人。須臾則醒。醒而復發。名曰子癰。又名子冒。久則成變瘧。妊娠忽悶。眼直不識人。須臾醒。醒復發。似不醒者。名曰瘧病。亦號子癰。亦號子冒。以葛根湯。若有竹近可速辦。當先作竹瀝湯。其竹遠不可即辦者。當先辦葛湯。此二物偏療諸瘧。絕可以起死也。小兒忽瘧。與金瘡療之亦驗。作竹瀝法于後。

取新伐青淡竹斷之。除兩頭節。作片。以磚並側。令竹兩頭虛。布列其上。燒中央兩頭汁出。以器盛之取服。

葛根湯。療妊娠臨月。因發風瘧。忽悶憤不識人。吐逆睡少醒復發。名為子癰。

貝母

葛根

牡丹皮去心

防己

防風

當歸

芎藭

肉桂取肉

白茯苓

澤瀉

甘草炙各二兩

獨活

石膏

人參

右件以水六升。煮取三升。分三服。其貝母令人易產。若未臨月者。以升麻代之。忌海藻菘菜鮓物。

○第七十二問。胎痿過年不產。又兩胎一死。一生者。何也。

答曰。陽施陰化。精盛有餘者。則成二胎。脈經云。左右脈俱疾。爲二子。又云。俱沉實。猥生二男。俱浮大。猥生二女。且胎之在胞。以氣血滋養。若寒溫節適。血氣強盛。則無傷。若冷熱失宜。氣血損弱。則胎痿燥而不育。或過年久而不產。若雙胎遇寒。經養不周。故偏夭傷。候其胎上冷。是胎已死。如雞乳子。熱者爲祿。寒者多渴。正謂此也。

乾地黃丸。治妊娠氣血虛弱。胎氣不長。

熟地黃一兩 芎藭 白茯苓 人參 當歸各五分

柴胡半兩 刺薊 桑寄生各半兩 厚朴一兩 龍骨

阿膠各三分 白石脂三分 黃芪半兩 甘草一分

右爲細末。蜜和搗二三百杵。丸如桐子大。每服三十丸。清粥飲湯送下。不拘時。

雄黃丸。治妊娠是鬼胎。致腹中黑血數下。腹痛。

雄黃細研 累白去毛一本 莽草 丹砂細研

巴豆去皮心油 獺肝炙黃各半兩 蜈蚣一枚 蜥蜴一枚

右爲細末。煉蜜和搗三百杵。丸如桐子大。空腹溫酒下二丸。日進二服。服後當下痢。如不痢。加至三丸。初下清水。次下蟲如馬尾狀無數。

病極者下蛇蟲。或如蝦卵雞子。或如白膏。或如豆汁。其病悉愈。

白朮散。調補衝任。扶養胎氣。治妊娠宿有風冷。胎痿不長。或失於將理。動傷胎氣。多致損墮。懷妊常服。壯氣益血。保和胎臟。

牡蠣 三分 白朮 四分 芎藭 四分 川椒 去目炒 三分

療妊娠兩兒。腹中一死一活。令死者出。生者安。此方神驗萬不失一。

蟹爪 一升 甘草 二尺 炙 阿膠 三兩

右以東流水一斗。先煮二味。取三升。內阿膠令烱。頓服。不能頓服分再服。若人困。拗開口下。藥入即活。煎藥宜向東。以茅葦薪煮之。

○第七十三問。妊娠墮胎。或血出不止。或血不出者。何也。

答曰。血寒則凝。溫則散。墮胎損經。血出不止有二。一則因熱而流散。二則血氣虛而不斂。瀉血多者。必煩悶而死。或因風冷墮胎者。血冷相搏。氣虛逆上。則血結不出。搶上攻心。則煩悶。亦多致死。當溫經逐寒。其血自行也。膠艾湯。治勞傷血氣。衝任虛損。月水過多。淋瀝漏下。連日不斷。臍腹疼痛。及妊娠將攝失宜。胎動不安。腹痛下墜。或勞傷胞絡。胞阻漏血。腰痛悶亂。或因損動。胎上搶心。奔衝短氣。及因產乳。衝任氣虛。不能約制經血。淋瀝不斷。延引日月。漸成羸瘦。

阿膠 芎藭 甘草 各二兩 炙 當歸

艾葉 微炒 各三兩 熟地 白芍 各四兩 炙

右咬咀。每服三錢。水一盞。酒六分。煎八分。去滓稍熱服。空心日服三

次甚者連夜併服。

伏龍肝散治血氣勞傷。衝任脈虛。經血非時。忽然崩下。或成豆汁。或成片。或五色相雜。或赤白相兼。臍腹冷痛。經久未止。令人黃瘦口乾。飲食減少。四肢無力。虛煩驚悸。

伏龍肝一兩 竈

熟地二兩

甘草炙牛

芎藭二兩

肉桂半兩

當歸炒三

乾薑炮三

艾葉微炒

赤石脂一兩

麥門冬二兩

右為麤散。每服四錢。水盞半。棗三枚。煎八分。去渣溫服。食前。

當歸散治妊娠猝驚奔走。或從高墜下。腹痛下血不止。

當歸一兩 牛炒

阿膠二兩 搗碎 令黃色

艾葉炒一

芎藭一兩

右為飲子。每服四錢。水盞半。煎至六分。次入生薑汁一匙。地黃汁半

合。馬通汁半合。更煎三兩沸。去渣溫服。不拘時。

○第七十四問。何以謂之子淋。

答曰。腎者作疆之官。伎巧出焉。與膀胱為合。男子以藏精。女子以繫胞。啓玄子云。疆於作用。故曰作疆。造化形容。故曰伎巧。在女則當伎巧。在男則正當作疆。夫淋者。腎虛膀胱熱也。腎虛不能制水。則小便數也。客熱乘膀胱。則水行澀澀而且數。淋瀝不宣。妊娠之人。繫胞於腎。腎患虛熱成淋。故謂子淋也。

治療妊娠患子淋。小便數而少。或熱痛酸疼。

地膚草 三兩以水四升煮取二升半分三次服

療妊娠患子淋宜地膚湯

地膚草 車前子 各三兩 知母

黃芩

赤茯苓

赤芍 枳實 各 升麻

通草

甘草 各二兩

右呶咀每服四錢水盞半煎八分去滓空心溫服或無地膚葵根汁

亦妙

石葦散治產後小便淋瀝瀉血

石葦 去毛 榆白皮 木通 各一兩

黃芩 三錢 赤芍 葵子 各半兩

○第七十五問小便或有利者或有不通者何也

答曰小腸為盛受之府膀胱乃州都之官啓玄子云位當孤府故謂都官

居下內空故藏津液若得氣海之氣則能泄注也或受熱滲於脬脬屈拗

而系轉故使小便不通利也或腎胞有冷不能溫制於水道故小便日夜

十數行甚者至於亂夢恍惚寒者宜大建中湯菴蓉丸熱者琥珀散方見

指迷方

菴蓉丸益腎固氣小便頻數

菴蓉 青鹽三銖水半盞煮熟秤取半兩 金毛狗脊 炮三分 益智子 搗碎鹽炒半兩

肉苁蓉 切焙 兔絲子 半兩酒浸 巴戟 半兩

杜仲新妙
牛兩

黃芪一錢

右為細末。酒糊丸。如桐子大。每服四十九丸。空心淡鹽湯米湯下。

冬葵子散。治妊娠胎不安。小便淋瀝。小肚疼痛。

冬葵子炒

柴胡

桑白皮

赤茯苓

赤芍

當歸各等分

右為咬咀。每服四錢。水盞半。薑五片。葱白七寸。煎七分。去滓溫服。

車前子散。除下焦留熱。小便不通。淋瀝作痛。

車前子

檳榔

木通

陳皮

赤芍

赤茯苓

當歸

滑石

石葦炙去毛
各一兩

右咬咀。每服五錢。水二盞。煎一盞。溫服。以利為度。未利者再服。食前。

忘憂散。治心經蓄熱。小便赤澀不通。淋瀝作痛。

琥珀不拘
多少

右為細末。每服五分。濃煎萱草根湯調下。食前。

○第七十六問。大便或利或秘者。何也。

答曰。大腸者傳導之官。變化出焉。獨受陰陽之濁。化其糟粕。傳不潔之道。

若三焦不調。臟腑不和。受熱則津液竭燥。腸胃否澀。大便不通。有寒則腹

痛腸鳴。水穀併下。故熱則宜清而通之。寒則宜溫而固之。

建中散。治脾胃不和。中脘氣滯。宿寒留飲。停積不消。心腹刺痛。脇肋膨

脹。嘔吐痰涎。逆噫氣。吞酸。腸鳴泄痢。水穀不化。肢體倦怠。不思飲食。

青皮一本無 棗子一觔 厚朴一觔 甘草

半夏湯泡洗 陳皮八兩 乾薑炮五兩

已上六味。用水三斗煮。令水盡焙乾。

人參去蘆 藿香一兩 訶子炮取

白朮一兩 白茯苓一兩 草豆蔻去皮

右為飲子。每服二錢。水二盞薑三片。煎六分。去渣溫服。食前。

四味換腸丸。治便下覺臍腹痛。泄痢飲食不美。因多思所致。或寒氣

積。遂成其痢。一名白朮止痢丸

白朮三分 訶子炮去核取 肉豆蔻三分 鍾乳粉一兩

右為細末。入鍾乳粉拌麪糊為丸。桐子大。每服五十九。空心熟水送

下。止進三兩服便効。

熱者。服四順飲子。治大便不通。面赤身熱。

大黃 白芍 甘草 當歸各等分

右為麤散。每服五錢。水盞半。煎一盞。去滓溫服。不拘時。

麻仁丸。治腸中受風。津液燥少。往往大便秘。

麻仁去皮研 枳實四兩 白芍四兩

大黃四兩 厚朴二兩 杏仁二兩

右為細末。蜜丸梧桐子大。米飲下二十九。未通。加至三十九。

寒者。理中湯。治腸胃冷熱濕。泄瀉注下。水穀不分。腹中雷鳴。及傷時氣。

裏寒外熱。霍亂吐痢。手足厥冷。胸脾心疼。逆氣結氣。並皆治之。

人參

甘草

白朮

乾薑 炮各二兩

肉豆蔻

砂仁 各二兩

右為飲子。每服三錢。水盞半。煎一盞。去滓熱服。食前。

煮朴丸。治臟寒泄痢。

北棗 半觔

川芎 四兩

生薑 切片四兩

已上三味。水三碗。煎乾。將生薑厚杵爛。入棗肉一處。再杵令細。以

麻油塗手。担如小錢。慢火焙乾。入後藥。

蒼朮 米泔浸

茴香 炒

甘草 炙

官桂 去皮新者

神麴

麥蘖 炒淨

蓬朮 煨各四兩

砂仁

良薑 炒各二兩

肉豆蔻 煨二兩

丁香 一兩

川薑 二兩

右為細末。水煮薄糊為丸。梧桐子大。每服百丸。米飲湯下。不拘時。

豆蔻橘紅散。溫脾養胃。消穀嗜食。

丁香

木香 一兩

白豆蔻仁

人參

白朮

厚朴

神麴

乾薑 炮

半夏麴 炒

陳皮 去白

藿香葉 去土

甘草 炙各半兩

右為細末。每服三錢。水一盞。薑二片。棗一個。煎七分。去滓空心溫服。

○第七十七問。妊娠至八九箇月。兩脚俱腫。何也。

答曰。妊娠至八九月。腿脚腫者。不可為水病治之。恐導其真氣。見此狀者。

則知其易產也。蓋胞藏水血俱多。不致胎燥。故云易產也。當服順氣滑胎之藥。若初妊而腫者。是水氣過多。兒未成體。恐壞胎也。

枳殼散。養胎氣。安和子臟。治胎中一切惡疾。能令胎滑易產。

枳殼 去穢炒 四兩 甘草 炙 一兩

右為細末。每服二錢。沸湯調服。空心。入月日進三服。

榆白皮湯。滑胎易產。治妊娠會因漏胎去血。臨產驚動太早。產未至。穢露先下。致胎胞乾燥。臨產艱難。

冬葵子 一兩 木通 牛兩 榆白皮 一兩

瞿麥 一兩 牛膝 去苗酒 浸焙 大麻仁 去殼各 三分

右為麤末。每服三錢。水盞半。煎八分。去滓溫服。不拘時。

救生散。安胎益氣易產。

人參 訶子 濕紙裏煨 熟去核 陳皮 炒

白朮 炒 大麥肉 炒 神麩 炒各 牛兩

右為細末。每服二錢。水一盞。煎六分。去滓。入月加一倍。用水二盞。煎一盞。空心溫服。服之能令兒緊小。乳母無患。

○第七十八問。妊娠十月將養之法。何如。

答曰。陰搏陽別。謂之有子。此是血氣和調。陽施陰化也。診其手少陰脈動

甚者。妊子也。所謂妊者。陽既授始。陰妊之也。娠則以時而動。故曰妊娠也。

妊娠一月。名始胚。飲食精熟。酸美受御。宜食大麥。無食腥辛。是謂正才。

妊娠一月。足厥陰脈養。不可鍼灸其經。足厥陰內屬於肝。肝主於筋。及血。一月之時。血行否澁。不爲力事。寢心安靜。無令恐畏。

妊娠一月。陰陽新合爲胎。寒多爲痛。熱多猝驚。舉重腰疼。腹滿飽急。猝有所下。當預安之。宜服烏雌雞湯。

烏雌雞一隻炙如常法食

茯苓二兩

吳茱萸一升 芍藥

人參

白朮各三兩

麥門冬五合

阿膠二兩

甘草一兩

右九味。㕮咀。水一斗二升。煮雞。取汁六升。去雞下藥。煎取三升。內酒三升。并膠烱盡。取三升。放溫。每服一升。日三服。

妊娠會於第一個月墮胎者。入月。預服此藥。治之。補胎湯。

人參

防風

細辛

烏梅肉

白朮各一兩

大麥一合

熟地一兩

吳茱萸半兩洗七次

右爲飲子。每服三錢。水盞半。薑三片。煎七分。去滓。空心服。寒多者倍細辛。茱萸。渴者去細辛。加栝蔞根。若有所思。去大麥。加栝子仁三合。

服之。

妊娠二月。名始膏。無食腥辛之物。居心靜處。男子勿勞。百節皆痛。是謂胎藏也。少陽者。膽之脈也。主於精。二月之時。兒精成於胞裏。故足少陽養之。足少陽在足小指間。本節後。附骨上一寸。陷中者是。妊娠二月。陰陽居經。若有寒。多壞不成。有熱。則萎萃怯弱。中風寒有所動搖。心滿。臍下脹急。腰背強痛。猝有所下。乍寒乍熱。服艾葉湯。

人參

當歸

艾葉

甘草

麻黃去根

丹參各一兩

阿膠炒二兩

右為咬咀。每用一兩。水盞半。棗三枚。薑五片。好酒一盞。煎半盞。去滓分為二服。食前。

妊娠會於第二個月墮胎者。入月。預當養其胎藏。服黃芩湯。

黃芩

人參

阿膠各一兩

當歸半兩

吳茱萸一分洗七次

右為咬咀。每服三錢。水盞半。薑三片。煎八分。去滓。食前。如覺大段不安。加烏梅一兩。

妊娠三月始胎。當此之時。血不流通。形像始化。未有定儀。見物而變。欲令見貴盛王公好人。端正莊嚴。不欲令見偃僕侏儒。醜惡形人。及猿猴之類。無食薑兔。無懷刀繩。欲得見男者。操弓矢。射雄雞。乘肥馬於田野。觀虎豹及走犬。其欲得女者。則箸簪珂環。弄珠璣。欲令子美好端正者。數視白壁美玉。看孔雀。食鯉魚。欲令兒多智有力。則噉牛肉心。食大麥。欲令子賢良盛德。端心正坐。清和虛一。坐無邪席。立無偏倚。行無邪徑。目無邪視。口無邪言。心無邪念。無妄喜怒。無得思慮。食無到嚮。無邪臥。無橫足。思欲瓜果。噉味酸菹。好芬芳。惡見穢臭。是謂外像而變者也。手心主養之。手心主者。脈中精神。內屬於心。能混神。故手心主養之。手心主穴在掌後橫文者是。診其妊娠脈滑疾。重以手按之散者。胎已三月也。妊娠三月為定形。有寒則大便青。有熱則小便赤。不赤則黃。若猝驚恐懼。憂愁嗔恚。傷動於筋脈。

繞臍痛或腰背痛碎有所下服雄雞湯。

人參

麥門冬

白茯苓

當歸

白朮

甘草

川芎

白芍各一兩

阿膠二兩

右為咬咀每服用一兩入煮烏雞汁一盞半棗二枚好酒一盞煎至

一盞半去滓分作二服食前。

妊娠曾於第三個月墮胎者入月宜服扶神飲子。

茯苓

丹參

龍骨各一兩

人參

阿膠炒

當歸

甘草各二兩

赤小豆炒一合

右為咬咀每服三錢水盞半棗一枚煎八分去滓溫服腰痛者加寄

生二兩空心服。

妊娠四月之時始受水精以成血脈其食宜麥稬其羹宜魚鴈是謂盛榮以通耳目而行經絡洗浴遠避寒暑是手少陽者三焦之脈也內屬於腑四月之時兒六腑順成故手少陽養之手少陽穴在手小指間本節後二寸是也診其妊娠四月欲知男女左脈疾為男右脈疾為女俱疾為生二男當此之時慎勿瀉之必致產後之殃何謂也是手少陽三焦之脈內屬於三焦靜形體和心志節飲食妊娠四月若有寒心中欲嘔胸滿不食有熱則小便頻數如淋狀臍下若急卒風寒項頸強痛寒熱驚惕腰背及腹痛往來不定或胎上急迫心頭煩悶不安卒有所下宜服菊花湯。

當歸

人參

麥門冬

甘草

麻黃

去節

半夏

湯洗七次

阿膠

炒二兩

菊花

半兩

右爲咬咀。每服四錢。水盞半。薑三片。棗一枚。煎八分。去滓空心溫服。非風寒項強者。當去麻黃半夏。緣二藥能損胎。

調中湯

白芍

白朮

柴胡

甘草

炙

烏梅肉

續斷

當歸

川芎

枳實

厚朴

甘李根皮

羸人去之各等分

右爲咬咀。每服三錢。水盞半。薑四片。煎八分。去滓溫服。空心。

妊娠五月。始受火精。以成其氣。臥必晏起。洗浣衣服淨室。必厚其裳。朝吸天光。以避寒殃。其食宜稻麥。其羹宜牛羊。和以芣苢。調以五味。是謂養氣。以定五臟者也。一本云。宜食魚鱉。足太陰養之。足太陰脾之脈。主四季。五月之時。兒四肢皆成。故足太陰養之。足太陰之穴。在足內踝上三寸也。診其妊娠之脈。重手按之不散。但疾不滑者。五月也。又其脈數者。以向懷。脈緊者。必胞阻。脈遲者。心腹滿喘。脈浮者。必水懷爲腫。妊娠五月。若有熱。頭眩。心亂。欲嘔者。有寒。則腹痛。小便便難。猝悸恐。四肢疼。痛。寒熱胎動無常。或損仆腹痛。有所不安。服旋覆花湯。

旋覆花

當歸

人參

黃芪

一本黃芩

麥門冬

赤芍

吳茱萸

洗七次各一兩

阿膠

炒二兩

甘草

炙半兩

右爲咬咀。每服四錢。水盞半。薑三片。好酒三分。煎八分。空心溫服。

妊娠六月。始受金精以成其筋。身欲微勞。無得靜處。出遊於野。數觀走犬及視走馬。宜食鷲鳥猛獸之肉。是謂變腠膂筋。以養其爪。以牢其背膂。足陽明養之。足陽明胃之脈。主其口目。六月之時。兒口目皆成。故足陽明養之。足陽明穴在太衝上二寸是也。

妊娠六月。粹胎動不安。寒熱往來。腹痛滿身腫。驚怖血下。腹痛狀如欲產。手足煩熱。竝宜服麥門冬湯。

麥門冬

人參

甘草

炙

黃芩

各一兩

熟地

阿膠

蛤粉炒各二兩

右爲咬咀。每服四錢。水盞半。入酒五分。薑五片。棗二枚。煎八分。去滓溫服。食前。

妊娠會於六個月損墮者。入月預服柴胡散。

柴胡

去苗

白芍

麥門冬

熟地

茯苓

酒浸焙

川芎

白朮

各一兩

甘草

炙半兩

右爲咬咀。每服四錢。水盞半。棗三枚。煎八分。去滓溫服。空心。

妊娠七月。始受木精以成骨。勞躬搖肢。無使身安。動作屈伸。居處必燥。飲食避寒。常宜食秬稻以密腠理。是謂養骨牢齒者也。手太陰養之。手太陰者肺。肺主皮毛。七月之時。兒皮已成。故手太陰養之。手太陰穴。在手大指本節後白肉際陷中是。診其妊娠七月脈。實大牢強者生。沉細者死。懷軀七月。暴下斗餘水。其胎必傷而墮。此非時孤漿預下故也。喘促。頸項腰背

強服葱白湯。

半夏洗七次

黃芪

人參

當歸

黃芩各一兩

阿膠炒二兩

旋覆花

甘草炙

麥門冬去心各等分

右為呶咀。每服四錢。水盞半。薑三片。葱白二寸。好酒半盞。煎至八分。去滓溫服。空心。

妊娠會於第七個月傷墮者。宜預服杏仁湯。

杏仁炮去皮尖

鍾乳粉

紫苑

吳茱萸

甘草炙

乾薑炮

五味子

麥門冬

粳米各等分

右為呶咀。每服四錢。水盞半。煎八分。去滓空心服。

妊娠八月。始受土以成膚革。和心靜息。無使氣極。是謂密腠理而光澤顏色。手陽明養之。手陽明者。大腸之脈。大腸主九竅。八月之時。兒九竅皆成。故手陽明養之。手陽明穴在大指本節後宛宛中是。診其妊娠八月脈。實大牢強弦緊者生。沉細者死。妊娠八月。忽中風寒。有所犯觸。身體疼痛。乍寒乍熱。胎動不安。常若頭眩。繞臍疼痛。有寒。小便白濁。或復漏下。顏色無定。腰背冷痛。目視茫茫。悉宜服芍藥湯。

厚朴二兩

甘草

當歸

白朮各三兩

人參

白芍各一兩

右為呶咀。每服四錢。水一盞。酒半盞。薑五片。薤白七寸。煎八分。溫服。

妊娠會於八個月傷墮胎者。宜服葵子湯。

厚朴 二兩

甘草

當歸

白朮 各二兩

人參

白芍 各一兩

柴胡 三兩

葵子

右為呶咀。每服四錢。水盞半。薑五片。棗一枚。煎八分。空心溫服。

妊娠九月。始受石精。以成皮毛。六腑百節。莫不畢備。飲醴食甘。緩帶自持。而待之。時為養毛髮。多才力。足少陰養之。足少陰者腎之脈。腎主續縷。九月之時。兒脈續縷皆成。故足少陰養之。足少陰穴在足內踝後。微近下前動脈是也。妊娠九月。若粹得下痢。腹滿脹急。胎上衝心。腰背不可轉側。短氣滿悶。並宜服半夏湯。

半夏 湯洗七次

麥門冬

吳茱萸

當歸

阿膠 炒各三兩

乾薑 一兩

大棗 十二枚

右為呶咀。每服五錢。水盞半。煎六分。去滓。入蜜少許。空心服。一方用

烏雌雞煮汁煎藥。

妊娠會於第九個月墮胎者。宜先服茯苓豬腎湯。

白茯苓

桑寄生

熟地

白朮

川芎

麥門冬 去心

人參 各一兩

乾薑 炮半兩

右為呶咀。先以豬腎一對。切去脂膜。用水一碗。入黑豆一合同煮。取

汁一盞半。入藥八味五錢。煎至一盞。去滓。食前溫服。分為二服。

妊娠十月。五臟俱備。六腑齊通。納天地氣於丹田。故使關節人神咸備。然可預備滑胎方法也。

妊娠十月滿足。入月。預修正順產理。滑胎易產。甘草散。

甘草炙

黑豆炒

大麻仁別研

糯米各一

乾薑炮半

白茯苓半兩

吳茱萸半兩洗

七次

右為細末。入麻仁末同拌。每服二錢。溫酒調下。未入月不可調服。

○第七十九問。橫生逆產者。何也。

答曰。將產坐臥。須順四時方面。并避五行禁忌。若有觸犯。多令產難。或因漏胎去血。臟燥。或子臟宿挾疹病。并觸禁忌。或覺腹痛。產時未到。便即驚動。穢露下早。致子道乾澀。產婦力疲。又有橫逆不順者。皆難產也。或有子上逼心者。皆繇妊娠之人。失於將養也。大抵臨產之際。腹痛而腰不痛者。未產也。若腹痛連腰甚者。即產。所以然者。腎候於腰。胞繫於腎。故也。診其尺脈轉大。如切繩轉珠者。謂之離經。日中覺夜半生。若腰痛甚者。即產也。愚謂橫生逆產者。皆因少母未經生育。將產之時。不肯忍痛。務欲逼下。為妙。殊不知時候未到。胎氣未至。其子未能翻身。受逼不過。只得一任離胎。逕下。以至倒生。其有橫生者。其子離胎。將欲翻身投下。半中之間。被母逼緊。轉身不及。以至橫下。古人云。瓜熟蒂落。粟熟自出。自然之理。凡有橫逆。皆繇母不能忍痛也。

烏金散。治橫生難產。及催生。此方救子母於頃刻

百草霜 香白芷

右等分為細末。每服二錢。以童便醋各少許調。更以熱湯化下。未愈

再服。

乳香丸。治難產。

乳香 一兩研為細末

右用猪心血和作十丸。每服一丸。煎乳香湯化下。

出衣法。治妊娠胎死腹中。衣不出。及產後粹有別病。欲至狼狽。

若胎衣未下腹滿。宜水一盞半。煮猪脂一兩。煎五七沸。和脂服下之。

寤生丸。治難產。

枳實 六兩一本枳殼 桑白皮 乾六兩

已上二味。入大鑊內。以長河水煮半日許。候枳實透軟。去桑白皮。

不用。取枳實去穰。薄切作小片子。焙乾。再入後藥。

木香 半兩 甘草 炙半兩

右四件和為細末。煉蜜丸。桐子大。晒乾。每日空心日午臨臥。各用溫

米飲送下三十丸。加至五七十丸。日三服。懷七個月後服。

○第八十問。熱疾胎死腹中者。何也。

答曰。因母患熱疾。至六日以後。臟腑極熱。熏煮其胎。是以致死。緣兒身死

冷。不能自出。但服黑神散。煖其胎。須臾。胎氣溫煖。即自出。何以知其胎之

已死。但看產婦舌青色者。是其驗。

黑神散
官桂 當歸 芍藥 甘草

乾薑炮

生地各一兩

黑豆炒焦去皮二兩

附子炮半兩一本作蘆黃

右為細末每服一錢空心溫酒調下。

烏金散治產後血迷血暈敗血不止淋瀝不斷臍腹疼痛頭目昏眩無力多汗及治崩中下血過多不止宜服。

麒麟竭

亂髮

松墨燬醋

百草霜

當歸頭

肉桂

赤芍

玄胡索

鯉魚鱗燒

右等分為細末每服二錢溫酒調服下。

黑龍丹治產後一切血疾垂死者但灌藥無有不效。

五靈脂

生地

當歸

川芎

高良薑

已上各等分入沙合內赤石脂泯縫紙筋鹽泥固濟封合炭火十

飭煨通紅去火候冷開取合子看成黑糟乃取出細研入後藥。

硫黃研一分半

花乳石煨一分

乳香別研一分半

琥珀研一分

百草霜別研五兩

右同為細末醋煮糊丸彈子大每服一丸炭火燒通紅投生薑自然

汁與無灰好酒各一小合小便半盞內研開頓服立效。

芎藭湯治產後去血過多暈悶不省及傷治去血多崩中去血多金瘡去血多拔牙齒去血多不止緣虛心煩眩暈頭目暗耳聾滿塞舉頭欲倒並皆治之。

當歸

芎藭各等分

右為飲子每服三錢水盞半煎一盞去滓稍熱服不拘時。

○第八十一問。胎衣不下者。何也。

答曰。母生子訖。血流入衣中。衣為血所脹。故不得下。治之稍緩。脹滿腹中。以次上衝心胸。疼痛喘息。急者難治。但服奪命丹。以速去衣中之血。血散脹消。胎衣自下而無所患。

奪命丹

附子 半兩

牡丹皮 一兩

乾漆 碎炒烟盡二分半

右為末。醋一升。大黃末一兩。同熬成膏。和藥丸如桐子大。溫酒送下。每服五十九。不拘時。

牛膝湯。治產兒已出。胞衣不下。臍腹堅滿。脹急疼痛。及子死腹中不得出者。宜服。

滑石 八兩

當歸

木通 各六兩

冬葵子 五兩

牛膝 去苗酒浸焙

瞿麥 各四兩

右為咬咀。每服三錢。水二盞。煎八分。去滓稍熱服。不以時候。○第八十二問。難生者。何也。

答曰。胎側有成形塊。別呼為兒枕。子欲生時。枕破與敗血裹其子。故難生。但服勝金散。逐其敗血。即自生。逆生橫生。並皆治之。

勝金散

麝香 一錢

鹽鼓 一兩。舊青衣裏燒令通紅。急以乳鉢研為細末。

右為細末。取秤錐燒紅。以酒淬之。調藥一錢七服。

琥珀黑散。治產婦一切疾病。產前胎死。產難逆橫生。產後胎衣不下。衣帶先斷。遍身疼痛。口乾心悶。非時不語。如血暈眼花。誤以為暗風。乍寒乍熱。誤以為瘧疾。四肢浮腫。誤以為水氣。言語顛倒。見鬼見神。誤以為邪祟。腹脇脹滿。嘔逆不定。誤以為反胃。大便祕澁。小便出血。誤以為五淋。及惡露未盡。經候未還。起居飲食。便不戒忌。血氣之疾。聚即成塊。散即上衝。氣急心痛。咳嗽多睡。四肢虛熱。睡驚盜汗。崩中敗癥。繞臍刺痛。或頭面赤。因變骨蒸。皆宜多服。若產後鼻衄。口鼻黑色。氣起喉中喘急。中風口噤。皆為難治。須急服之。凡產前宜進一二服。皆能安神順胎。產後雖無疾。七日內亦進一二服。能散諸疾。或因驚恐。變生他證。當連服取效。

琥珀 別研

硃砂 別研

松墨

百草霜

新羅白附子

白殭蠶 炒去絲

當歸 去蘆

黑衣 竈屋塵各半
兩一作突烟

麝香 別研

血苗灰 鯉魚鱗 各二分

右為細末。每二錢炒薑溫酒。和童便調下。食前。

○第八十三問。產後血運者。何也。

答曰。產後氣血暴虛。未得安靜。血隨氣上。迷亂心神。故眼花。甚者令人迷絕。口噤神昏氣冷。醫者不識。呼為暗風。若作此治。病必難愈。但服清魂散。

澤蘭葉 二分 人參 二分

荆芥穗 一兩 川芎 半兩

甘草 一分

右為細末。每服一錢。熱湯溫酒各半盞調下。咽喉即開。眼氣定。人事

雀

七寶散。初產後調血和氣。補虛。壓驚悸。治虛運。

硃砂研

桂心

乾薑炮

當歸

羚羊角

川芎

人參

茯苓各半

右為細末。若產婦平和。三日以前。直至滿月。每日各取一字。以羌活。豆淋酒調下。空心服。若覺心胸煩熱。即減桂薑。冷即加之。腹痛加當歸。心悶加羚羊角。心胸氣短加桂。不下食或惡心。加入人參。虛顫加茯苓。以意斟酌。日二服。夜一服。不飲酒者。童便酒少許調下。

○第八十四問。產後口乾痞悶者。何也。

答曰。產後宮胃太虛。血氣未定。食麵太早。胃不能消化。麵毒結聚於胃脘。上熏胸中。是以口乾煩渴。心下痞悶。醫者不識。認為胸膈壅滯。此宜服見現丸。

薑黃

京三稜

萹澄茄

人參

青皮

高良薑

蓬朮各等分

右為末。用細蘿蔔慢火煮令爛。研細。將汁煮糊為丸。桐子大。蘿蔔湯下。不拘時。

木香丸。治婦人有妊傷食。

京三稜

此藥能落胎。不可用。前胡五分代之。產後用之無礙。

木香

人參

茯苓去皮各二錢

右為細末。麵糊丸。如菉豆大。每服三十九。熟水送下。

白朮散治氣不調和飲食許學士云妊婦傷食難得藥惟此二方穩捷。

白朮炒一兩

乾紫蘇一兩

白芷微炒三錢

人參七錢半

川芎

訶子皮一本

青皮各半兩

甘草二錢半

右為麤末每服二錢水一盞薑三片煎七分溫服不拘時候。

六君子湯治胸膈痞塞脾寒不嗜食燥藥不得服。

枳殼炒

陳皮

人參

白朮

白茯苓

半夏洗各等分

右為咬咀每服五錢水二盞薑五片煎一盞去滓溫服無時。

○第八十五問產後乍寒乍熱者何也。

答曰陰陽不和敗血不散皆令乍寒乍熱產後血氣虛損陰陽不和陰勝則乍寒陽勝則乍熱陰陽相勝則或寒或熱若因產勞傷臟腑血弱不得宣越故令敗血不散入於肺則熱入於脾則寒醫人誤作瘧疾治謬矣陰陽不和宜增損四物湯敗血不散宜奪命丹又問二者何以別之答曰時有刺痛者敗血也但寒熱無他證者陰陽不和也。

增損四物湯

當歸

芍藥

人參

川芎

乾薑各一兩

甘草炙四分

右為咬咀每服二錢水一盞薑五片煎六分去滓熱服。

增損柴胡湯治婦人產後虛羸發寒飲食少腹脹。

柴胡 三錢

人參

甘草

半夏

白芍

陳皮

川芎

右爲咬咀。每服四錢。水盞半。薑三片。棗一枚。煎七分。溫服。食後。日三服。

猪腎湯。治產後日淺。久坐。視聽言語多。或運動勞力。遂覺頭項及肢節皮肉疼痛。乍寒乍熱。此是蓐勞。

猪腎 一對去脂膜

當歸

芍藥

生薑 各三兩

桂心

葱白 二合

右以水八升。緩火煮腎汁六升。澄清內入諸藥。煮取二升。分三次溫服。

加減八珍湯

當歸 一錢半

川芎 一錢

熟地 薑汁炒五錢

白朮 一錢

白茯苓 一錢

人參 三分

益母草 一錢

陳皮 五分

砂仁 五分

右爲咬咀。水一鍾半。煎七分。食前溫服。二劑後。與益母丸間服。服益母丸用芎歸湯送下。

○第八十六問。產後四肢虛腫者。何也。

答曰。產後敗血乘虛。停積於五臟。不行經絡。流入於四肢。留滯日深。却還不得。腐壞如水。故令四肢面目浮腫。醫人不識。便作水氣治。凡治水氣。多用導水藥。極虛。夫產後既虛。是謂重虛。往往因致夭枉。但服調經散。自然

血行腫消。

調經散 此方百發百中

沒藥 研

琥珀 研各一分

官桂

赤芍

當歸 各一兩

細辛

麝香 研各半分

甘草 炙二錢嚴氏方中多此一味藥

右爲細末。每服五分七。生薑汁溫酒各少許調服。

正脾散。治大病之後。脾氣虛弱。中滿腹脹。四肢虛浮。狀若水氣。此藥治之。及產後四肢浮腫。

蓬朮

香附

茴香 炒

甘草 炙

陳皮 各等分

右爲細末。每服二錢。煎燈心木瓜湯調下。

○第八十七問。產後乍見鬼神者。何也。

答曰。心主身之血脈。因產傷耗血脈。心氣則虛。敗血停積。上干於心。心不受觸。遂致心中煩躁。臥起不安。乍見鬼神。言語顛倒。醫人不識。呼爲風邪。如此治之。必不得愈。但服調經散。加生龍齒一捻。得睡即安。

調經散 方見八十六問

右件藥如前。每服加龍齒一捻。

柏子仁散。治產後謊言亂語。繇內虛少血邪氣攻心。

柏子仁

遠志

人參

桑寄生

防風

琥珀 細研

當歸

熟地

甘草 各半兩

右爲咬咀。每服以水二盞。入白羊心一個。切碎先煎七分。去心滓。須

下藥五錢。更煎四分。去滓溫服。不拘時。
琥珀散。治產後血邪攻心。迷悶。言語錯亂。

琥珀研

鐵粉各一兩

人參

茯苓

乾生地

阿膠各七分半
炒令黃色

硃砂研半兩

遠志七錢半
去心

甘草

麝香研各二錢半

右爲細末。入研了藥。同和極細。每服一錢。金銀湯調下。無時。

○第八十八問。產後不語者。何也。

答曰。人心有七孔三毛。產後血氣多端。致停積敗血。閉於心竅。神志不能明了。又心氣通於舌。心氣閉塞。則舌亦強矣。故令不語如此。但服七珍散。

人參

石菖蒲

熟地

川芎各一兩

細辛一錢半

防風半兩

硃砂半兩
研

右爲細末。每服一錢。金銀薄荷湯調下。不拘時。

交感地黃丸。治婦人產前產後。眼見黑色。或卽發狂。如見鬼狀。胞衣不下。失音不語。心腹脹滿。水穀不化。

生地洗淨研以布絞汁留滓以澆汁炒地黃
黃梓地黃汁炒生黃梓一至乾爲度

生薑洗刮淨研以布絞
取汁留滓各二觔

常歸一兩

琥珀一兩
研

玄胡索糯米炒令
赤去米

蒲黃炒

小茴香四兩

右爲細末。蜜丸彈子大。常歸湯化下一丸。食前。

○第八十九問。產後腹痛。又瀉痢者。何也。

答曰。產後腸胃虛怯。寒邪易侵。若未滿月。飲冷當風。乘虛進襲。留於胸膈。

散於腹肋。故腹痛作陣。如錐刀所刺。流入大腸。水穀不化。洞洩腸鳴。或下赤白。脇肋膨脹。或走痛不定。急服調中湯立愈。若醫者以為積滯取之。則禍不旋踵。

調中湯

高良薑

當歸

官桂

白芍

附子

川芎

甘草

人參

右為呔咀。每服三錢。水二盞。煎一盞。去滓熱服。空心食前。定痛散。治產後惡血不止。腹內熱痛不可忍。及兒未定。

當歸

芍藥

桂心

右為呔咀。每服二錢。各盞半。生口子大拍破。煎至六分。去滓溫服。如洞泄腸鳴者。加附子乾薑下服。

又方。治產後瘀血。怯痛不已。

生料五積散。加乾薑良薑丁香官桂。用煮酒童便各一盞。熱服立效。又方。獨用肉桂末調好酒服之。立效。

○第九十問。產後遍身疼痛者。何也。

答曰。產後百節開張。血脈流走。遇氣弱。則經絡肉分之間。血多留滯。累日不散。則骨節不利。筋脈引急。故腰背不得轉側。手足不能動搖。身熱頭痛也。若醫以傷寒治之。則汗出而筋脈傷。手足厥冷。變生他病。但服趁痛散以嚙除之。

趁痛散

牛膝 酒浸

當歸

官桂

白朮

黃芪 各半兩

薤白 二錢半

生薑 半兩

甘草 二錢半

獨活 半兩

右為麤末。每服二錢。水一盞半。煎七分。去滓溫服。本方每服半兩。水五盞。煎二盞。分作二次溫服。

透經湯 方見十問中

○第九十一問。產後大便祕澁者。何也。

答曰。產臥水血俱下。腸胃虛弱。津液不足。是以大便祕澁不通也。若五六日腹中悶脹者。有燥糞在臟腑。以其乾澁未能出耳。宜服麻仁丸。以津潤之。若誤以為有熱而投之以寒藥。則陽消陰長。變動百出。性命危矣。此是小柴胡湯之證。誤不可不謹。

麻仁丸 三因方云。去血過多。臟燥大便祕澁。則因當潤之。大黃似難輕用。候葱涎調醋蒸為丸。次以葱茶下之。必通。異按此言大黃不可輕用者是。

麻仁 研 枳殼 炒 人參 大黃 各半兩

右為細末。蜜丸桐子大。空心溫酒下。未通加丸數服。

滋腸五仁丸。治血氣不足。大腸閉滯。傳送艱難。

桃仁 杏仁 各一兩炒 柏子仁 半兩

松子仁 一錢三字 郁李仁 炒 陳皮 別為末四兩

右五仁別研為膏。合橘皮同研。煉蜜為丸。桐子大。每服三十九至五十丸。食前米飲下。更看虛實加減。

○第九十二問。產後血崩者。何也。

答曰。產臥傷耗經絡。脈未平復。勞役損動。致血暴崩。淋瀝不止。或因鹹酸不節。傷蠹營衛。亦變崩中。若小腹滿痛。肝經已壞。為難治。當急服固經丸。

艾葉

赤石脂煨

補骨脂炒

木賊各半

附子一隻炮去皮臍

右為末。陳米糊和。丸桐子大。食前溫酒下二十九丸。米飲亦得。

熟乾地黃散。治崩中下血不止。心神煩悶。頭目昏重。

熟地一兩

甘草

蒲黃各半

蟹爪微炒

白茯苓

伏龍肝七錢

桂心

白芍

當歸微炒各三錢

阿膠炒黃一兩

熟布燒灰三兩一本昆布

右為麤末。每服四錢。水盞半。入竹茹一分。煎六分。去滓溫服。不拘時。

○第九十三問。產後腹脹悶滿。嘔吐不定者。何也。

答曰。敗血散於脾胃。脾受之。不能運化精微。而致脹滿。胃受之。不得受納。水穀不化。而生嘔逆。醫者不識。若以尋常服止吐藥療之。病與藥不相干。轉更傷動正氣。疾愈難治。

匠勝湯三因方名抵勝湯

赤芍

半夏泡

澤蘭葉

人參

陳皮各一錢

甘草一錢

生薑半兩

右為麤末。每服三錢。水盞半。煎七分。去滓熱服。食前。

入順理中丸。治新產血氣俱傷。五臟暴虛。肢體羸乏。少氣多汗。纔產直

百晬日。每日常服。壯氣補虛。止嘔吐。

甘草

人參

白茯苓

神麩

炒各半兩

乾薑

炮一兩

砂仁

二兩

麥蘖

二兩

白朮

四兩

右為未蜜丸。每服三十九丸。食前薑湯下。或加半夏麩一兩。入鹽點服。

○第九十四問。產後口鼻黑氣起。及鼻衄者。何也。

答曰。陽明者。經脈之海。起於鼻。交額中。入上齒。還出俠口。交人中。左之右

右之左。產後氣消血散。營衛不理。散亂入於諸經。却還不得。故令口鼻黑

氣起。及變鼻衄。此緣產後虛熱。變生此疾。其疾不可治。名曰胃絕肺敗。詳

此一證。保慶府無方。可急服琥珀黑散。視其病人鼻黑退。衄止者。活。方見第八十二

中問

○第九十五問。產後喉中氣急喘者。何也。

答曰。營者血也。衛者氣也。營行脈中。衛行脈外。相隨上下。謂之營衛。因產

所下過多。營血暴竭。衛氣無主。獨聚於肺中。故令喘也。此名孤陽絕陰。難

治。若產後惡露不快。敗血停凝。上熏於肺。亦令喘急。如此但服奪命丹。血

去。喘急自止。奪命丹方見八十一問

旋覆花湯。治產後傷風。或風寒暑濕。咳嗽喘滿。痰涎壅塞。如服奪命丹

喘不定。可服此藥。

前胡

麻黃

杏仁

五味子

茯苓

甘草

赤芍

旋覆花

半夏麴

人參

玄及各等分

右爲飲子。每服四錢。水盞半。薑五片。棗一枚。煎七分。溫服。食前。

○第九十六問。產後中風者。何也。
答曰。產後五七日內。強力下牀。或月內。傷於房室。或憂怒。擾蕩冲和。或灼炙。傷動臟腑。初眼澁口噤。肌肉攣搐。以漸腰脊筋急。強直者不治。此乃人作。非偶爾中風所得。本集無方。三因方評之。頗詳。

入風湯。治迷惑如醉。狂言驚悸。恍惚見鬼。

天雄

當歸

人參各五兩

附子

防風

天門冬

蜀椒

獨活各四兩

烏頭

秦艽

細辛

白朮

乾薑各三錢

山茱萸

五味子

桔梗

香白芷

柴胡

莽草各半兩

右爲末。每服二錢。溫酒調下。日三服。以身中覺如鍼刺者。藥行也。

獨活散。治產後中風口噤。肩項強直。四肢拘急。

獨活

桂心

甘草炙

當歸炒一本作川芎

麻黃

附子炮

細辛半兩

防風八味

每服四錢。水酒各半盞。煎七分。拗開口灌之。

○第九十七問。產後心痛者。何也。

答曰。心者血之主也。有伏宿寒氣。因產大虛。寒搏於血。血凝不得消散。其氣逆冲擊於心之經脈。故心痛。但以大岩蜜湯治之。寒去則血脈溫而經

絡通。心痛自止。若誤以爲所傷療之。則虛極寒益甚矣。心絡寒甚。傳之正經。則變真心痛。朝發夕死。夕發朝死。不可輕用藥如此。

大岩蜜湯

熟地

當歸

獨活

吳茱萸洗

官桂

芍藥

乾薑

甘草各二兩

細辛

小草漢志苗也各一兩

右爲麤末。每服五錢。水三盞。煎一盞。去滓溫服。不拘時。

四神散。治產後留血不消。積聚作塊。急切疼痛。及心腹酸痛下痢。

當歸

乾薑炮

川芎

赤芍

右爲末。每服三錢。溫酒調下。不拘時。

○第九十八問。產後熱悶氣上。轉爲脚氣者。何也。

答曰。產臥血虛生熱。復因春秋取涼過多。地之蒸濕。因足履之所着而爲脚氣。其狀熱悶掣癢。驚悸心煩。嘔吐氣上。皆其候也。但服小續命湯。三兩劑必愈。若醫者誤用逐敗血藥攻之。則血去而疾增益劇。

小續命湯 此藥不論胎前產後。或入風邪虛極。獨身疼痛。或疾喘不定者宜服之。加麝香半夏入。每服水二盞。候煎熟傾藥汁後。另以膠入于內。再煎一二沸。食前服。一二

服神效。

人參

黃芩

官桂

麻黃

防己各一兩

生薑五兩

芍藥

芍藥

甘草

白朮各一兩

附子一隻去皮

防風一兩半

右爲咬咀。每服三錢。水二盞。煎八分。去滓溫服。不拘時。

大驅風散。治猝中欲死。風攻身體及五臟。言語蹇澁。神思冒昧。或履濕氣。變為脚氣。此方尤妙。

麻黃 二兩

芎藭 一兩

石膏 煨一兩半

肉桂

白芷

甘草

乾薑 炮

當歸

黃芩

杏仁 去皮尖炒 各二分

右為咬咀。每服四錢。水盞半。煎六分。去滓。不以時候稍熱服。汗出為度。一方入荆瀝五合同煎。大驗。如脚氣加白朮一兩。乾木瓜一兩。去乾薑。

○第九十九問。產後汗出多而變痊風者。何也。

答曰。產後血虛。內理不腠密。故多汗。因遇風邪。搏變痊風。痊者。口噤不開。背強而直。如風發癩狀。搖頭。馬鳴。身反折。須臾十發。氣息如絕。宜速斡口。灌之。小續命湯。稍緩即汗出如雨。手拭不及者。不可治。三因方云。既汗多。如何更服麻黃桂等。不若大局方大聖散。亦良藥。

小續命湯 方見九十八問

防風湯。治產後中。如角弓時時反張。口噤。

防風 一兩

葛根 一兩

芎藭

生地

藁本

杏仁 去皮尖 各一兩

獨活 二兩

甘草

桂心

防己

蔓荊子 各七錢半

麻黃 一兩

右為咬咀。每服四錢。水盞半。煎六分。去滓。溫服。不拘時。

○第一百問。產後所下過多。虛極生風者。何也。

答曰。婦人以營血爲主。因產血下太多。氣無所主。唇青肉冷。汗出目瞑。神昏命在須臾。此但虛極生風也。如此急服濟危上丹良。以風藥治之。則誤矣。

乳香

五靈脂

硫黃

太陰玄精石研

桑寄生

眞阿膠

卷柏生

陳皮各等分

右將上四味同研。石器內微火炒動。勿令焦。炒了再研極細。後入餘藥末。用地黃汁和糊。丸如桐子大。溫酒下二十九丸。當歸酒下尤妙。神授散。治產後一切疼痛。不論大小。以致危篤者皆可服。

百合水浸洗

乾薑炮

甘草

當歸

川芎各二兩

青皮

桂心

牡丹皮

白芍

陳皮各五兩

神麴炒

麥肉一本麥冬王宇泰書作麥芽

人參各三兩

紅花半兩

右爲咀咀。每服二錢。水一盞。薑三片。棗一枚。煎七分。空心去滓溫服。妊婦不可服。虛者去牡丹皮紅花。加附子三兩。

序

且言之無關於民生。不足以傳於後世。與無補於當時者。雖言如弗言也。是故役神做精。立言著書。而無所用於天下者。君子不爲焉。醫之爲道也。聖人所以前民用而傳後世者也。夫豈小道云爾哉。粵自黃帝三代而下。賢哲吐辭爲經。浪浪炳炳。其泐爲成書也。已彰彰矣。而吾徒尙何言哉。尙何言哉。雖然。言今之醫而吾心戚矣。言今之兒醫而吾心益大戚矣。何則。人有所欲喻於當世者。而當世先有所執持而莫能明。有所欲白於斯人者。而斯人亦有所膠固而不能解。則予愈不得不憬然而心惻矣。嗟乎。嗟乎。古今來因陋就簡。錮蔽沈溺。與夫抱憤懣而不能明。就危亡而不知悟。若是者。豈少哉。予弟子芝嶼。受予意爲兒科書。蓋憫童稚之無辜。而挽當時之陋習也。其言綜前賢之奧旨。發金匱之英華。別徑分門。瞭若觀火。精純泮渙。法簡而該。此誠可以大補當時傳後世以衛民生者矣。夫豈役神做精而無所用於天下哉。且夫人之惑溺而莫能破其懵懂者。誠以成書龐雜。靡所適從。簡陋苟安。訛傳沿習。衢談巷說。比比而然。苟得乎婦人女子之情。通乎閩閩閩之見。則其所挾持而噪爲良醫者。正其惑溺於己而厚誣於人者也。悲夫。晚近之人。師心立說。妄意著書。蔑古成法。爭鳴新奇。揆之於古人折臂折肱之義。不已大謬不然乎。無怪乎惑溺者而終莫之破已。吾于是益不禁怦然心動矣。苟以局中之見。參一局外之觀。則以

己之赤子。爲人之赤子。以己之輕意肆志。爲人之輕意肆志。則固未有不涕泣而嫚罵者。則吾知是編之出。必有始則戚然悲。慨然嘆者。而繼則可知其飄然喜。翻然笑也。吾安得默默而不言乎。是可見信于天下。是可大白于天下。華陽山人序。

題辭

這段功非小。憫孩提惺惺救世。許多頭腦。藥當通神原有據。此意須人探討。壽羣生幾行梨棗。石室蘭臺開奧義。只一編可把羣言掃。授兒醫。傳家寶。世情可笑都顛倒。論而今。頭眼底。誰人分曉。痘疹痧疹。童稚劫。只是沈寃不少。是書成。金針度了。斯世斯人如夢覺。便晨鐘那抵斯編好。保赤子。長生道。（調寄金縷曲）

賜福謹題。

凡例

一 幼科古稱啞科。以其言語不通。病情難測。故諺云。寧治十男子。不治一婦人。寧治十婦人。不治一小兒。蓋甚言其難也。如此。然果能扼其要領。則亦何難之有。是書所列。雖似限於篇幅。然深得提綱之妙。讀者幸毋忽焉。

一 小兒醫自仲陽而下。代不乏人。然可傳可守者。僅數家而已。是書所集。頗多採錄。誠以理之所在。有不容另措一詞者。讀者慎毋以剽襲陳言見誚。

一 治病莫要於辨寒熱虛實。而小兒之病。亦只惟表裏二症而已。果能於表裏症中。辨出寒熱虛實。則自是高手。學者熟翫此書。自有會悟處。

一 驚風一症。前人鑿空而談。遂成千古疑城。千篇一律。比比皆然。雖間有關之者。又未足以大破其惑。故遺禍至今。無有底止。是書辨列。實具苦心。閱者慎毋漠視。

一 近世謂有病宜餓。傳訛襲謬。大率皆出自庸醫婦人之口。自此說行。因餓而死者。不知凡幾。予甚傷之。因述不可餓論。然所援引。悉本聖經賢論。非予臆見。宜為醫所共知。世有賢者。果能同予矯得此偏。則積德不淺矣。予尤於此有厚望焉。

一 痘瘡果能不事寒涼攻下。則失手處自少。自痘疹正宗出。而死者更多。

非至愚者。必不宗其說。予於論內。尤殷殷致意焉。

一種痘。誠爲避危就安。萬全良法。有力之家。固知早種。而單寒之子。欲種弗能。今春博愛堂舉行此法。廣爲貧家兒女種痘。悉奏全功。良堪嘉尚。

一切章程。載在論中。吾願有力仁人。在在行之。則造福不小矣。

一是書旁稽遠覈。言簡意該。化出成書。參以心得。故能出深入淺。法密方純。雖多引陳言。然發前人所未發者。正復不少。讀者其亦細心而體翫之。

兒科醒引用方目

易簡參蘇飲

惺惺散

右見表論

調胃承氣湯

四順清涼飲

右見裏論

五君子煎

理中湯

乾薑理中湯

用

即理中湯
乾薑加重

益黃散 又名補脾散

六君子湯

附子理陰煎

六味回陽飲

胃關煎

仲和飲

當歸散

勻氣散

參苓白朮散

白芍藥湯

調中丸

右見寒論

瀉心散 又名瀉心湯

秘旨安神丸

柴胡清肝散

地黃丸

參蘇飲

瀉白散

黃芩清肺飲

五味異功散

瀉黃散

五苓散

人參安胃散

四苓散

白朮散

四君子湯

右見熱論

四物湯

八珍湯

當歸補血湯

補中益氣湯

加味四物湯

六神散

右見虛論

羌活沖和湯

四柴胡飲

五柴胡飲

柴胡飲子

消乳丸

香橘餅

大安丸

瀉青丸

抑肝散

導赤散

右見寶論

獨參湯

扶神湯

辰砂抱龍丸

東垣黃芪湯

金液丹

大青膏

人參羌活散

釣藤飲

消食丸

柴芍參苓散

柴歸飲

辰砂六一散

犀角地黃湯

七福飲

養心湯

六氣煎

三柴胡飲

參附湯

參歸湯

一名圓參散
一名人參湯

人參建中湯

丹溪人參竹瀝之法

五福飲

大營煎

大補元煎

十全大補湯

雙金散

逍遙散

加味歸脾湯

妙香散

補肺散

紫河車丸

消風丸

右見辨驚風之誤

論

柴葛桂枝湯

溫中益氣湯

參芪內托散

十宣散

寶表解毒湯

保元湯

養衛化毒湯

人參敗毒散

升麻葛根湯

搜毒煎

四味消毒飲

鼠粘子湯

芎歸湯

六物煎

羌活散鬱湯

涼血養營煎

犀角散

柴草快癩湯

參薑飲

人參理中湯即理中湯人參

加重用

當歸丸

退火丹

九味異功煎

十二味異功散

木香散

黃芪建中湯

元參地黃湯

大分清飲

調元湯

葛根解毒湯

黃芩湯

甘桔湯

人參麥門冬散

雙解散

右見治痘論

辟穢香方

稀痘消毒救苦湯

右附見種痘說

透邪煎

加味金沸草散

麻黃湯

檉葉散

胡荽酒

七物升麻丸

消毒散

人參白虎湯

黃連湯

茅花湯

香連丸

射干鼠粘子湯

養血化癍湯

大青湯

柴胡麥門冬散

柴胡四物湯

安神丸

門冬清肺湯

右見治疹論

兒科醒目錄

總論第一	一
診治法論第二	二
表論第三	三
裏論第四	五
寒論第五	六
熱論第六	一
虛論第七	一五
實論第八	一七
辨驚風之誤論第九	二二
不可餓論第十	四〇
治痘論第十一 <small>附種痘說</small>	四一
治疹論第十二	六三

兒科醒

華陽山人閱定

芝嶼樵客著

紹興裘吉生校

總論第一

易曰。天地絪縕。萬物化醇。男女構精。萬物化生。蓋人之生也。必稟天地之正氣以成形。藉陰陽之化育而賦命。而上古元氣渾龐。太和洋溢。八風正而寒暑調。六氣和而雨暘若。人情樸實。風俗貞純。是以上古之民。恆多壽而少病。卽內經所謂上古之人。和於陰陽。明於術數。起居有度。不妄作勞。春秋皆度百歲而去者是也。迨於後世。元氣漸薄。風俗頹偷。人情穿鑿。名利有不時之擾。嗜欲多無厭之求。是以近日之民。恆多病而少壽。卽內經所謂中古之人。以酒爲漿。以妄爲常。醉以入房。以欲竭其精。以耗散其真。不知持滿。不時御神。未至半百而衰者是也。夫以黃帝之時。卽稱中古。迄今復數千年來。權其氣化。不更薄耶。是凡習兒醫者。須知今昔氣運不同。稟賦根芽愈薄。凡於小兒之病。更宜加意培植。保護元氣。不可妄用攻伐之劑。以貽人夭札之禍也。乃近日幼科。不明此理。動輒攻伐。而又絕其乳食。其呱呱者。口不能言。任醫冤殺。束手待斃。底於死亡。悲夫。此等惡習。不知始自何人。遂至相習成風。流禍無已。愚夫愚婦。溺於其說。至死不悟。爲嬰兒之大患。而惟揚屬爲尤甚。吁可恨也。至若書稱若藥弗瞑眩。厥疾弗

瘳。此蓋當時因事取譬之辭。非教人服藥務宜瞑眩也。其如愚人引爲口實。乃一概投之以瞑眩。殊不思小兒向稱芽兒之義。夫所謂芽兒者。如草木之萌芽。其一點方生之氣甚微。栽培護養。惟恐不及。而堪加之。以剝削之。撓施之。以斧斤之利乎。此誠不可也。原夫易无妄九五爻辭云。无妄之疾。勿藥有喜。象曰。无妄之藥。不可試也。觀此則知聖人或亦有以鑒夫瞑眩之非。故特示勿藥有喜之戒。而我夫子亦有未達不敢嘗之語。又張仲景先生傷寒論內。亦有勿藥爲中工之訓。又張子和著儒門事親書。其中有語友人陳敬之云。小兒有病。不如勿用庸醫。但恐妻妾怪其不醫。宜用湯浸蒸餅令軟。丸作白丸。給其妻妾。以爲眞藥。服之以聽天命。最爲上藥。後丙戌歲。羣兒病泄瀉。用藥者皆死。惟敬之守子和之戒。其兒雖病。得以無恙。以上所引。一爲聖人之至訓。一爲名醫之精論。載在簡冊。昭於日月。人第習而不察耳。夫以傷寒劇病。抑且可以勿藥。而况小兒氣血幾何。豈可委之以庸醫之手。試之以无妄之藥乎。此子和之所以教敬之之不服藥爲愈也。僕承師訓。久憫於此。欲效忠告之良謀。用救方今之惡習。爰列若干門於後。以貽夫世之貴小兒而好服藥者。奉爲金鑑云。

診治法論第二

凡診小兒之法。諸書皆以面部及手紋爲識病之資。其所援引。率皆渺昧難憑。煩瑣無要。其於諸大家所謂望聞問切四者之診。置聞問切三者於不講。可得謂之爲良醫乎。夫小兒言語不通。病情難識。則尤當以望聞問

切爲診治之要。蓋望其形色。則有以知其邪正之盛衰。審其聲音。則有以別其稟賦之強弱。詢其向背。則有以識其性情之好惡。察其脈息。則有以明其表裏之寒熱。苟能細心求之。則表裏寒熱虛實。皆得其真。用藥自無不當。奈何近日幼科。學術更淺。一遇小兒有病。不是從事於表。便是攻伐其裏。迨至眞陽外越。虛熱日增。則清涼并進。一味胡猜。不獨望聞問切四者不知。抑且置虛寒二症於不問。嗟乎。會不知邇來氣化日薄。今人稟賦更虛。加以嬰兒氣血未堅。臟腑柔脆。些小病痛。其元氣已不能支。而堪庸劣之徒。寒熱不分。虛實莫辨。妄意揣摩。任情剝削者乎。茲則掀翻底蘊。直指精微。專以望聞問切四者爲綱。以揭明表裏寒熱虛實六者之要。俾學者有所依據。庶幾不致顛倒混施。誅伐無過。或於嬰兒有厚幸矣。至於用藥之法。寧勿藥。毋過劑。寧輕。毋重。毋偏寒。毋偏熱。毋過散。毋過攻。須遵內經邪之所湊。其氣必虛之訓。時以保護元氣爲主。知乎此。於嬰兒診治之道。思過半矣。至於虛寒敗症。則非峻用溫補。不可挽回。毋得稍涉因循。致令不救。此又不可不知也。

表論第三

小兒表症。謂外感風寒。其見證必先發熱。然發熱之證有三。最宜詳辨。不可一概混同施治也。其在冬月感於寒者。頭痛。身痛。項背強。惡寒。壯熱。無汗。脈浮而緊。此太陽表證。用藥得法。一汗卽解。詳見實論。其感於風者。頭痛。鼻塞。流涕。發熱。或有汗惡風。或無汗惡寒。或咳嗽乾嘔。脈浮而數。或緊。

此四時之感冒是也。治法不可大發散。微表之卽已。如易簡參蘇飲。惺惺散之類主之。大抵近日人情。愛護小兒者衆。富貴之家。重衣厚褥。貧賤之子。亦皆衣絮。以致汗液不斷。腠理疎泄。偶觸微風。卽成感冒。是以邇來小兒。冬月感寒之症。百無一二。而傷風發熱之症。恆多也。至若內因於虛。發熱之症。極多。最爲疑似。人殊不知。更宜詳辨。如陽虛生寒。陰虛發熱。血虛發躁而熱。氣虛自汗不能食而熱。氣虛注夏而熱。暑濕合病而熱。汗後陰虛。陽無所附而熱。汗後陽虛。陰無所附而熱。陽氣下入陰中。晝安靜。夜煩躁而熱。重陽無陰。夜安靜。晝煩躁而熱。以上諸症。同一發熱也。若誤表之必死。其次則又有變蒸之熱。將發痘疹之熱。亦同一發熱也。而援守各異。每見庸醫。一遇發熱。動皆表散。殊不知病有微甚。熱有虛實。雖同一發熱。而治法殊途。攻補迥別。業幼科者。於臨症之際。務宜細心體認。必先問其病之新久。會未服藥。以及一切愛惡情狀。然後再察其熱之溫壯。形之強弱。脈之虛實。色之夭澤。合四者以決之。庶無誤人於夭札也。蓋外感爲暴病。其發熱也驟。必手背熱。脈浮。身熱無汗。仍須分別虛實以治之。詳見虛實門。若無手背熱。脈浮。身熱無汗等症。或發熱已久。則非外感證矣。治者審焉。

附方

易簡參蘇飲 治感冒發熱頭痛。與因痰飲凝積。發而爲熱。並宜服之。亦治中脘痞悶。嘔逆惡心。小兒室女。尤宜服之。

前胡

人參如無以好黨參代之紫蘇

乾葛

半夏

茯苓各三分

枳殼

陳皮

甘草

桔梗

木香各二分

右咬咀。每服四錢。水一盞。生薑七片。棗一枚。煎至六分。去渣服。

惺惺散 治小兒傷寒時氣。風熱頭痛。目眇多睡。痰壅咳嗽喘急。或痘疹

已出未出疑似之間。

人參

白朮炒

茯苓

甘草

北細辛

川芎

桔梗炒各等分

右為末。每服二錢。入薄荷五葉。水煎服。一方有防風。天花粉。

裏論第四

凡治小兒裏症。亦惟宜忌二字而已。要在辨之明而見之確耳。夫小兒元氣無多。臟腑脆嫩。若夫當下而不下。則津液消燼。所謂急下以救胃中津液是也。不當下而下。則裏氣受傷。邪反乘虛內陷。其禍更甚。今將宜忌諸形症。辨晰於左。如稟氣素實。汗不解。發熱譫語。舌胎黃厚。渴而引飲。大便秘。小便赤。腹滿拒按。手足心熱。脈沈而實。此為陽邪入裏。宜下之。雖二三日。若見上項諸症。亦宜下之。如調胃承氣湯。四順清涼飲之類。少少與之。貴在與病相值。恐多下亡陰也。不可拘於庸醫下不厭遲之說。謬稱穩當。必待至七日之後始下也。如太陽證。表未罷。脈浮大惡寒者。此邪在表。雖十餘日。亦不宜下。嘔多者不可下。太陽陽明合病。喘而胸滿者。不可下。惡水者。不可下。稟賦虛者。不可下。逆厥者。不可下。仲景先生云。日數雖多。但

有表證而脈浮者。猶宜發汗。日數雖少。若有裏證而脈沈者。即宜下之。此不可不知也。此外有因氣虛陽脫而譫語者。乃大虛之症。當用參附之劑。不得認爲實症。而誤下之也。慎之慎之。至於傷食停積。小兒雖間亦有之。然皆必由脾虛不運而致。經所謂邪之所湊。其氣必虛者是矣。每見庸醫肆行剋伐。或遇表證。亦云有裏。以致小兒外邪未解。裏氣已傷。往往變症蜂起而不可救。受此害者。不知凡幾。殊堪痛恨。曾不知下者。下其邪耳。非飲食積滯之謂也。世人陰受此害者比比矣。故特表而出之。兼詳實論。

附方

調胃承氣湯 治太陽陽明。不惡寒。反惡熱。大便秘結。日晡潮熱。凡陽明病有二證。

在經者當解肌。入腑者當攻下。

大黃

芒硝

甘草

各等分

右咬咀。每用一二錢。量兒大小。水煎消息服之。

四順清涼飲 治大人小兒血脈壅實。臟腑生熱。面赤煩渴。睡臥不寧。大便秘結。

便秘結。

大黃

當歸

芍藥

甘草

各等分

右咬咀。量兒大小。每服一二錢。水煎服。

寒論第五

小兒屬寒之症。有外感。有內傷。有症變虛寒。三者不同。治法各異。假如內傷。必由脾土虛寒。或稟賦不足。或將護失宜。或乳哺不節。以致食不運化。

而見清冷吐瀉者。但察其面色萎黃。肢涼神倦。脈沈無力。安靜不渴。此屬陽虛生寒。宜五君子煎。理中湯主之。抑或能食之兒。過餐生冷。而見上項諸症者。亦理中湯主之。至若症變虛寒。則由元氣素虛。五臟虧損。或因寒涼剋伐。陽氣受傷。而見面青唇黯。吐瀉手足并冷者。此屬脾土虛寒。乾薑理中湯主之。若面色既白。吐瀉腹痛。口鼻氣冷者。屬寒水侮土。益黃散主之。若更兼吃逆。手足指冷。用六君子湯加炮薑肉桂。如不應。急加附子。其次或以病後。或以吐瀉。或以誤用藥餌。或受風寒。而致氣微神緩。昏睡露睛。痰鳴氣促。驚跳搖擻。如俗所謂慢驚者。此屬脾腎虛寒之候。宜溫補之。詳見辨驚風之誤論。再其次。則脾腎虛寒之甚。以致吐瀉不止者。宜附子理陰煎。或六味回陽飲。量兒大小與之。若但泄瀉不止者。宜胃關煎主之。第吐瀉之症。亦間有屬熱者。但當以手足寒溫脈象遲數。面色青赤。渴與不渴爲辨。至如外感寒邪。則其病在表。宜詳表論。茲不復贅。此外則又有初生小兒。百日之內。覺口冷腹痛。身起寒粟。時發戰慄。曲足握拳。晝夜啼哭不已。或口禁不開者。名曰胎寒。亦或生後昏昏多睡。間或現乳瀉白。若不早治。必變虛寒敗症。宜以沖和飲。當歸散。合和水煨薑煎服之。使之微泄。泄行。進勻氣散。調補。泄止。氣勻。神安。痛定。手足舒伸。次用參苓白朮散。以養胃氣。白芍藥湯。去其寒濕。乳母宜節生冷飲食。庶易痊也。又手足稍冷。脣面微青。額上汗出。不顧乳食。至夜多啼。夜重日輕。腹痛腸鳴。泄瀉清水。間有不泄。頗似前症。但無口冷寒戰者。名曰臟寒。亦在百日之內有之。

皆因臨產在地稍久。冷氣侵逼。或以涼水攪湯洗兒。或斷臍帶短而又結縛不緊。為寒氣所傷。如此宜以白芍藥湯及沖和飲。加鹽炒茴香萊萸水薑煎。乳母同服。又胃中虛冷。面色既白。腹痛不思食者。益黃散主之。若不下利。調中丸主之。大都小兒病。症虛寒者多。凡一見面色青白。肢冷神疲。脈沈無力。蹇曲而臥。食少不渴。聲音遲緩者。皆是虛寒之候。急宜溫補。業幼科者。毋得狃於俗見。謬謂小兒陽體多熱。不敢溫補。致多害事。宜深戒之。

附方

五君子煎 治脾胃虛寒。嘔吐泄瀉而兼濕者。

人參 白朮炒 茯苓 乾薑各等分 炙甘草減半

右咬咀。水煎服。

理中湯 治太陰病。自利不渴。陰寒腹痛。短氣咳嗽。霍亂嘔吐。飲食難化。

胸膈噎塞。或瘧疾瘴氣。瘟疫。中氣虛損。久不能愈。或中虛生寒等證。

人參 白朮炒 乾薑炒 炙甘草各三兩

右為末。每服二三錢。水煎溫服。

益黃散 治脾胃虛寒。又名補脾散

陳橘皮一兩 青橘皮 訶子肉 甘草各半兩 丁香二錢

右為細末。每服二錢。水一盞。煎至六分。食前溫服。東垣先生云。閱孝忠

編集錢氏方。以益黃散補土。又言風旺必剋脾土。當先實其脾味者不

審脾中寒熱。一例用補脾藥。又不審藥中有丁香青皮。辛熱大瀉肺金。脾虛之症。豈可反瀉其子。惟寒水反來侮土。中寒嘔吐。腹痛瀉痢青白。口鼻中氣冷。益黃散神治之藥也。如因服熱藥。巴豆之類。過劑損其脾胃。或因暑天傷熱。積熱損其脾胃。而成吐瀉。口鼻中氣熱。而成慢驚者。不可服之。

六君子湯 治脾胃虛弱。飲食少思。或久患瘧痢。或食飲難化。或嘔吐吞酸。或咳嗽喘促。若虛火等證。須加炮薑。其功尤速。

人參 白朮 炒 茯苓 各二錢 炙甘草

製半夏 陳皮 各一錢

右薑棗水煎。

附子理陰煎 治真陰虛弱。脹滿嘔噦。有物無聲曰吐。有聲無物曰噦。有物有聲曰嘔。痰飲惡心。吐

瀉腹痛。及命門火衰。陰中無陽等證。

熟地 三五七錢 或一二兩 當歸 二二三錢 或五七錢 製附子 一二二錢 炙甘草 一二二錢

乾薑 炒黃一錢 或加肉桂 一錢

水二鍾煎七八分熱服。此方係理陰煎加附子。故名附子理陰煎。其理陰煎功用甚宏。詳見本書。茲未細錄。

六味回陽飲 治陰陽將脫等症。

人參 一二兩 或數錢 製附子 二二三錢 炮乾薑 二二三錢 炙甘草 一錢

熟地 五錢 或一二兩 當歸身 二錢 如泄瀉者或血動者 以冬朮易之 多多益善

水二鍾武火煎七八分溫服。如肉振汗多者加炙黃芪四五錢。或一兩。

或冬白朮三五錢。如泄瀉者。加烏梅二枚。或北五味二十粒。亦可。如陽虛上浮者。加茯苓二錢。如肝經鬱滯者。加肉桂二三錢。

胃關煎 治脾腎虛寒作瀉。或甚至久瀉腹痛不止。冷痢等症。

熟地 三五錢 或一兩

山藥 炒二錢

白扁豆 炒二錢

炙甘草 一二錢

焦乾薑 一二錢 三錢

吳茱萸 製五分 七分

白朮 炒一二錢 三錢

水二鍾。煎七分。食遠溫服。瀉甚者。加肉豆蔻一二錢。麵炒用。或破故紙亦可。氣虛勢甚者。加人參。隨宜用。陽虛下脫不固者。加製附子一二三錢。腹痛甚者。加木香七八分。或加厚朴八分。滯痛不通者。加當歸二三錢。滑脫不禁者。加烏梅二箇。或北五味子二十粒。若肝邪侮脾者。加肉桂一二錢。

桂一二錢

沖和飲 治感冒風寒。頭疼發熱。肩背拘急。惡心嘔吐。腹痛膨脹。兼寒濕相搏。四肢拘急。冷氣侵襲。腰足疼痛。

蒼朮 米泔水浸一宿去粗皮剉 片炒微黃色一兩二錢

人參 去蘆

前胡 去蘆

桔梗 炒各五錢

枳殼 去穢辣炒 微黃色 去節

陳皮 去白各三錢

川芎

白芷

半夏 湯洗七次薑汁浸曬乾炒

當歸 酒洗

薄桂 去粗皮

赤茯苓 去皮

白芍藥 各一錢半

厚朴 去粗皮薑汁浸一宿 慢火炒乾各二錢

甘草 炙七錢半

右剉。每服二錢。水一盞。薑二斤。葱白一根。煎七分。無時溫服。傷冷惡心嘔吐。煨薑同煎。開胃進食。加棗子煎。空心溫投。寒疝痛。入鹽炒。茱萸蘘香同煎。

香同煎

當歸散 順調氣血和解表裏。爽利心腹。疎理百病。及治溫熱停積自痢。煩躁不寧。

當歸 去蘆酒洗

赤芍藥 各二兩

甘草 半生半炙一兩

大黃 半生半炮一兩二錢

川芎

麻黃 製各半兩

熱論第六

小兒屬熱之症。脈必洪數而實。色赤作渴。煩躁飲冷。聲音雄壯。二便祕結。然其中有屬虛者。最宜明辨。不可不慎也。假如心熱。則額間色赤。煩躁驚悸。若飲水。或叫哭者。屬心經實熱。宜瀉心散以清心火。若色微赤。因臥驚悸。熱渴飲湯。則屬心經虛熱。宜祕旨安神丸以生心血。肝熱。則左臉青赤。項強頓悶。目劓癩癧。此屬肝經風熱。宜柴胡清肝散主之。若色微赤。條熱齧牙。則屬肝經虛熱。宜地黃丸主之。肺熱。則右臉赤。或主風邪。氣羸咳嗽發熱。宜參蘇飲。或惺惺散主之。若飲水者。屬肺經實熱。宜瀉白散主之。若色微赤。小便不利。乃脾肺燥熱。不能化生腎水。宜黃芩清肺飲主之。若啞氣出氣。脣白氣短。則屬肺經虛熱。宜五味異功散主之。脾熱。則鼻赤身熱。飲水。乳食如常。屬脾胃實熱。宜瀉黃散清熱理脾。若色微赤。身涼飲湯。乳食少思。則屬脾經虛熱。宜五味異功散補中健脾。腎熱。則頰間色赤。足不欲覆。若腎與膀胱。氣滯熱結而小便不通者。宜五苓散主之。若色微赤。則屬膀胱陽虛。陰無所化。宜六味地黃丸主之。至若吐瀉二症。間有因於熱者。亦宜詳辨。假如吐乳色黃。不能受納。此屬胃經有熱。宜先用瀉黃散。次

用人參安胃散。然當驗其手指熱。則屬胃熱。若手指冷。則屬胃寒矣。宜兼詳寒論。至如因熱而瀉者。則必大便黃赤有沫。小便赤少。口乾煩躁。宜四苓散主之。如更兼右頰色赤。飲冷者。屬胃經實熱。宜瀉黃散主之。若右頰微赤。喜熱惡冷。則屬胃經虛熱矣。宜白朮散主之。若右頰及額間俱赤。屬心脾翕熱。宜瀉黃散加炒黑黃連。若左頰右頰俱赤。屬肝火乘脾。宜四君子湯加柴胡。大抵瀉症最傷元氣。若熱瀉過甚。必變虛寒。宜兼參寒論。蓋始病而熱者。邪氣勝則實也。終變為寒者。真氣奪則虛也。久病而熱者。內真寒而外假熱也。久瀉元氣虛寒。急宜溫補。不得誤執熱論。再如陽虛發躁。內實真寒。而外似熱症者。如日赤作渴。身熱惡衣。揚手擲足。欲投于水。但診其脈。洪數無倫。重按無力。是為假熱。宜急投參附之劑。引火歸元。若誤進清涼。入口必死。症之疑似。有如此者。醫者可不慎歟。此外。如胎毒火丹。口瘡重舌。衄血便血。以及疳熱等症。雖亦云屬熱。然皆各有虛實之不同。是亦不可不明察之也。

附方

瀉心散 治心經實熱。

黃連

右為末。每服五分。臨臥溫水調下。

秘旨安神丸 治心血虛而睡中驚悸。或受驚嚇而作。

人參

半夏製

酸棗仁炒

茯神各一錢

當歸酒洗

橘紅

赤芍藥炒各七分

五味子粒

甘草後三分

右爲末。薑汁糊丸。芡實大。每服一丸。生薑湯下。

柴胡清肝散 治肝膽三焦風熱。怒火。或乍寒乍熱。往來寒熱發熱。或頭

發瘡毒等症。

柴胡牛錢

黃芩炒一錢

人參一錢

川芎一錢

山梔炒一錢半

連翹五分

甘草五分

桔梗八分

右水煎服。

地黃丸 治腎肝血虛。燥熱作渴。小便淋瀝。痰氣上壅。或風客淫氣。患瘰

癧結核。或四肢發搐。眼目睜動。或咳嗽吐血。頭目眩暈。或咽喉燥痛。口

舌瘡裂。或自汗盜汗。便血諸血。或稟賦不足。肢體瘦弱。解顛失音。或畏

明下窺。五遲五軟。腎疝肝疝。或早近女色。精血虧耗。五臟齊損。凡屬腎

肝諸虛不足之症。宜用此以滋化源。其功不可盡述。

熟地黃八錢

山茱萸肉

乾山藥各四錢

澤瀉

牡丹皮

白茯苓各三錢

右爲末。入地黃膏。量加米糊丸。桐子大。每服數錢。量兒大小。溫水空心

化下。行遲鶴膝。加鹿茸牛膝五加皮。

參蘇飲 治感冒發熱。頭痛。傷風咳嗽。傷寒嘔吐。胸膈不快。痰飲凝結。

紫蘇

前胡

陳皮

製半夏

乾葛

茯苓

枳殼炒

桔梗

人參各三分

甘草一分

右爲末。每用一二錢。薑棗水煎服。

瀉白散

地骨皮 桑白皮炒各一兩 甘草炙一錢

右爲末。每服一二錢。入粳米百粒。水煎。

黃芩清肺飲 治肺熱。小便不利。宜用此清之。

梔子 黃芩減半

右爲末。每服一二錢。水煎。如不利。加鹽豉二十粒。

五味異功散 治脾胃虛寒。飲食少思。嘔吐。或久患咳嗽。虛浮氣逆。腹滿

等症。

人參 白朮炒 茯苓各等分 甘草炙 陳皮減半

右加薑棗。水煎服。

瀉黃散 治脾熱吐舌。

藿香葉 甘草各七分半 山梔一錢 石膏五分 防風二錢

右用蜜酒微炒爲末。每服一二錢。水煎。

五苓散 治暑熱煩躁。霍亂泄瀉。小便不利而渴。淋瀝作痛。下部濕熱。

白朮 猪苓 茯苓各七分半 肉桂五分 澤瀉一錢二分

右爲細末。每服一二錢。水煎。

人參安胃散 治脾胃虛弱。傷熱乳食嘔吐。瀉痢。

人參一錢 黃芪二錢 生甘草 炙甘草各五分

白芍藥

酒炒七分

白茯苓

四分

陳皮

三分

黃連

炒二分

右每服一二三錢水煎

四苓散 即前五苓散去肉桂

白朮散

治脾胃氣虛。作渴飲湯。或因吐瀉。津液虧損。煩渴引飲。或脾胃

虛弱。腹脹瀉渴。弄舌流涎。手足指冷。宜服之。和胃氣生津液。

人參

白朮 炒 藿香葉

木香

甘草

白茯苓 各一兩 乾葛 二兩

右爲末。每服二錢。水煎。

四君子湯

治脾胃虛弱。飲食少思。或大便不實。體瘦面黃。或胸膈虛痞。吞酸痰嗽。或脾胃虛弱。善患瘧痢等症。

人參

白朮 炒

茯苓 各二錢

甘草 炙一錢

右加薑棗水煎服。或加粳米百粒。

惺惺散 方見表論

虛論第七

小兒虛症。無論病之新久。邪之有無。但見面色青白。恍惚神疲。口鼻虛冷。噓氣拂鬱。肢體倦怠軟弱。喜熱惡涼。泄瀉多尿。或乍冷乍溫。嘔惡驚惕。上盛下泄。夜則虛汗。睡而露睛。屈體而臥。手足指冷。聲音短怯。脈象緩弱。虛細。是皆屬虛之症。急宜溫補脾胃爲要。仍須分別以治之。如氣虛者。四君子湯。血虛者。四物湯。氣血俱虛者。八珍湯。氣虛自汗者。四君子湯。血虛發

躁者。當歸補血湯。表虛者。宜固其氣。裏虛者。宜實其中。陽虛惡寒者。宜溫分肉。陰虛發熱者。宜滋腎肝。脾肺氣虛者。四君子湯。五味異功散。補中益氣湯。肝腎血虛者。六味丸。加味四物湯。汗後陰虛。陽無所附而熱者。四物加參芪。汗後陽虛。陰無所附而熱者。四君加芎歸。久事表散。而身熱不退者。陽氣虛也。補中益氣湯。過用攻下。而滑泄不禁者。脾腎虛也。六神散。胃關煎。又虛必生寒。宜詳寒論。至於虛熱。亦詳見熱論。此外虛症尙多。詳見各條。宜並翫之。

附方

四物湯 治血虛營弱。一切血病。當以此爲主。

熟地黄

當歸各三錢

川芎一錢

白芍藥二錢

水二鍾煎服。

八珍湯 治氣血兩虛。調和陰陽。

人參

白朮

茯苓等分

炙甘草減半

熟地

當歸等分

白芍減半

川芎倍減

水煎。或加薑棗粳米同煎。

當歸補血湯 治血氣損傷。或因誤攻致虛。肌熱口渴。目赤面紅。脈大而

虛。重按全無。及病因飢飽勞役者。

黃芪

炙一兩

當歸三錢

水一鍾半。煎八分服。

補中益氣湯 治勞倦傷脾。中氣不足。清陽不升。外感不解。體倦食少。寒

熱瘧痢。氣虛不能攝血等症。

人參

黃芪炙

白朮炒

甘草炙各一錢五分

當歸一錢

陳皮五分

升麻

柴胡各三分

右加薑棗。水煎。空心午前服。

加味四物湯即前四物湯。加山梔柴胡丹皮。

六神散 治面青啼哭。口出氣冷。或泄瀉不乳。腹痛曲腰。四肢厥冷。

人參

白朮炒

山藥炒各五錢

白茯苓

白扁豆炒各一兩

甘草炙二錢

右爲末。每服二三錢。薑棗水煎。

四君子湯方見熱論

五味異功散方見熱論

六味丸方見熱論

胃關煎方見寒論

實論第八

小兒屬實之症。惟表裏食積三者而已。蓋表邪實者。必頭項體痛。腰痛背強。壯熱無汗。脈象浮緊有力。宜從表散。如在冬月。宜羌活沖和湯主之。若在春夏秋三時。則宜易簡參蘇飲。或惺惺散之類主之。若兼倦怠昏睡。則屬正不勝邪。宜四柴胡飲。或五柴胡飲之類主之。裏邪實者。必舌胎黃厚。

口燥唇瘡。作渴喜飲。大小便秘。腹痛拒按。聲音洪壯。伸體而臥。睡不露睛。手足指熱。脈象沈數有力。宜從攻下。如調胃承氣湯。或四順清涼飲之類。主之。若汗後身熱不退。脈象弦洪數實。大便堅秘者。柴胡飲子。夫所謂實者。邪氣實耳。非元氣有餘之謂也。醫者臨症之際。果屬實邪。於應表應下之藥。皆當作小劑。少少與之。要在中病即止。不可過劑。務宜顧定元氣。斯無孟浪債事之非。至於飲食停積。必寸口脈浮大。按之反澀。腹皮熱。大便酸臭。然必由脾虛不運而致。於消導藥中。慎毋損及中氣。宜多溫中健脾之品。俾得自彊不息之妙。如消乳丸。香橘餅。理中湯之類。主之。若傷食甚而或兼厚味積熱者。宜大安丸。少少與之。俟食積稍消。仍當以五味異功散調補之。此外如目直大叫。項急煩悶。肝之實也。瀉青丸。抑肝散。主之。若筋急血燥。抽搐勁強。斜視目瞪。則屬肝之虛矣。地黃丸。主之。叫哭發熱。飲水而搐。心之實也。導赤散。瀉心湯。主之。若驚惕不安。則屬心之虛矣。秘旨安神丸。主之。困睡身熱。飲水。脾之實也。瀉黃散。主之。若嘔吐泄瀉。不食痞滿。倦臥。牙緊流涎。手足牽動。則屬脾之虛矣。益黃散。或六君子加炮薑木香。主之。悶亂喘促。飲水。肺之實也。瀉白散。主之。若氣促多汗。則屬肺之虛矣。四君子湯。或五味異功散。主之。腎無實。惟痘瘡黑陷。爲邪氣實而腎則虛也。地黃丸。主之。若二便不禁。津液枯槁。聲喑目戴。肢體厥逆。腎虛極也。補中益氣湯。兼六味地黃丸。主之。大抵小兒實症無多。若稟賦素虛。或病患已久。或過服剋伐之劑。皆當作虛症施治。不得概以爲實也。慎之慎之。

附方

羌活沖和湯 治四時不正之氣。感冒風寒。憎寒壯熱。頭痛身痛。口渴。人相似者。此方主之。薛氏云。治太陽無汗。發熱頭痛。惡寒脊強。脈浮緊。又治非時暴寒。人中之。頭痛惡寒發熱。宜此方治之。以代麻黃湯用。太陽經之神藥也。

羌活 防風 蒼朮 白芷 川芎

生地 黃芩 甘草 細辛 減半

右加薑棗。水煎。熱服取汗。

四柴胡飲 治元氣不足。或忍飢勞倦。而外感風寒。或六脈緊數微細。正不勝邪等症。必須培助元氣。兼之解散。庶可保全。宜此主之。若但知散邪。不顧根本。未有不元氣先敗者。慎之慎之。

柴胡 一二錢 甘草 炙一錢 生薑 三五片 當歸 二三錢 瀉者少用 人參 二三錢 或五七錢 酌而用之

水二鍾煎七八分。溫服。如胸膈滯悶。加陳皮一錢。

五柴胡飲 脾土為五臟之本。凡中氣不足。而外邪有不散者。非此不可。此與四柴胡飲相表裏。但四柴胡飲止調氣分。此則兼培血氣。以逐寒邪。尤切於時用者也。凡傷寒瘧疾痘瘡。皆所宜用。

柴胡 一二錢 當歸 二三錢 熟地 三五錢 白朮 二三錢

白芍 炒用一錢五分 甘草 炙三錢 陳皮 酌用或不

水一鍾半。煎七分。食遠熱服。寒勝無火者。減芍藥。加生薑三五七片。或

炮乾薑一二錢。或再加桂枝一二錢。則更妙。脾滯者。減白朮。氣虛者。加人參。隨宜。腰痛者。加杜仲。頭痛者。加川芎。勞倦傷脾陽虛者。加升麻一錢。

柴胡飲子 解肌熱蒸熱積熱。或汗後餘熱。脈洪實弦數。大便堅實者。

柴胡

人參各五分

黃芩

白芍各七分

當歸一錢

甘草四分

大黃八分

右每服一二錢。水煎。按此方用藥頗善。但大便如常者。勿得輕用大黃。

消乳丸 治嘔吐。消乳食。脈沈者。傷食不化也。

香附炒

砂仁

陳皮

神麴炒

甘草炙

麥芽炒等分

右為末。米糊丸。黍米大。每服二十九。薑湯下。

香橘餅 治傷冷積瀉。

木香

青皮各一錢

陳皮二錢半

厚朴

神麴炒

麥芽炒各半兩

右為末。蜜和為餅。每服一枚。米飲調下。病久及元氣虛者勿用。

大安丸 治飲食酒積停滯。胸膈痞滿腹脹。

神麴炒

陳皮

半夏製

茯苓各一兩

山查肉蒸曬三兩

連翹

蘿蔔子炒各五錢

白朮二兩

右為末。粥丸。菉豆大。量大小。每服一二十粒。米飲下。一方尚有炒麥芽一兩。黃芪五錢。

瀉青丸 治肝膽火。並小兒急驚發搐。眼赤睛疼。

龍膽草 當歸 川芎 防風

羌活 山梔 大黃等分

右爲末。煉蜜丸。桐子大。量大小。每服十丸。

抑肝散 治肝經虛熱發搐。或發熱齧牙。或驚悸寒熱。或木乘土而嘔吐。

疲涎。腹脹少食。睡不安。

軟柴胡 甘草各五分 川芎八分 當歸

白朮炒 茯苓 鈞藤各一錢

右水煎。子母同服。以蜜丸。名抑青丸。

導赤散 治心火。及小腸熱證。小便赤澀而渴。

生地 木通 生甘草各等分

右加竹葉二十片。水煎服。一方加入麥門冬。

易簡參蘇飲方見表論

惺惺散方見表論

調胃承氣湯方見裏論

四順清涼飲方見裏論

理中湯方見寒論

五味異功散方見熱論

地黃丸方見熱論

瀉心湯即瀉心散方見熱論

秘旨安神丸方見熱論

瀉黃散方見熱論

益黃散方見寒論

六君子湯方見寒論

瀉白散方見熱論

四君子湯方見熱論

補中益氣湯方見虛論

辨驚風之誤論第九

小兒急慢驚風之說。古書不載。後人妄立名目。概用金石腦麝之品。貽害至今。殺人不知凡幾。雖代有名哲。因世俗膠結既久。粹難更正。故著作之家。不得不仍以驚風二字目之矣。夫小兒形氣未充。易生恐怖。又何嘗無驚嚇之症。是凡驟聞異聲。驟見異形。或跌撲叫呼。雷聲鼓樂。雞鳴犬吠。一切聞所未聞。見所未見。皆能致病。治法急宜收復神氣爲要。此卽內經所謂大驚猝恐之症是也。但當以驚嚇二字立名。不當以驚風二字目之矣。此立名之妄。其誤一也。其次。亦有因驚嚇而致肝心二臟。木火俱病者。用藥但宜瀉心平肝。其病自已。亦非金石腦麝所宜投。其誤二也。至於慢驚。或因吐瀉。或因病後。或因過服剋伐之劑。或脾胃素虛。以致臟腑虛損已極。全屬虛寒敗症。急宜溫補。無風可逐。無驚可療。而名之曰慢驚。更屬謬

妄。其誤三也。此外。如傷風發搐。傷食發搐。潮熱發搐。將見痘疹發搐。太陽病變瘧。以及天鈞。內鈞。癘症之類。皆有搐掣。反張強直之狀。世人不知。昧於分別。往往亦混作驚風施治。且或委之於無知婦人之手。致令無辜赤子。橫遭夭折。其誤四也。今將以上各條。辨症論治之法。彙列於後。俾臨症者有所指歸。一洗從前陋習。庶幾登赤子於壽域矣乎。

大驚猝恐

小兒氣怯神弱。猝見異形。猝聞異聲。最傷心膽之氣。內經云。大驚猝恐。則氣血分離。陰陽破散。經絡厥絕。脈道不通。陰陽相逆。經脈空虛。血氣不次。乃失其常。又驚則氣散。又恐傷腎。驚傷膽。其候則面青糞青。多煩多哭。睡臥驚惕。振動不寧。治法急宜收復神氣爲要。宜祕旨安神丸。或獨參湯。扶神湯之類主之。若妄進金石腦麝之品。是猶落井而又下之以石矣。

因驚嚇而致肝心二臟木火俱病者

乳兒之母。嗜食肥甘。或酒後乳兒。或將護失宜。衣衾太暖。致令小兒邪熱鬱蒸。積於心而傳於肝。蓋心藏神而肝藏魂。猝被驚觸。神魂恐怖。心肝之氣亦傷。心虛則邪熱得以乘之。肝虛則內風旋繞。以致夜臥不穩。或笑或哭。忽爾悶絕。目直上視。牙關緊急。口噤不開。手足搐掣。身熱面赤。脈數引飲。口中氣熱。二便黃赤。或秘。搐而有力。爲邪氣實。宜導赤散。更加乾地黃。防風竹葉。連進三服。或兼辰砂抱龍丸。少少與之。用以導心經之邪熱。息肝臟之虛風。其病卽愈。倘肆用香散走竄。或寒涼攻伐之劑。必變爲虛寒。

敗症。不治者多矣。宜兼詳虛實二論。

虛寒敗症

凡小兒病後。或吐後瀉後。或脾胃素虛。或誤服藥餌。或過服剋伐之劑。或感受風寒。而致氣微神緩。昏睡露睛。手足厥冷。身體或冷或熱。或吐或瀉。涎鳴氣促。口鼻氣冷。驚跳瘵癩。搐而無力。乍發乍靜。面色淡白。或眉脣青赤。脈象沈遲散緩。或細數無神。此蓋舉世共詫爲慢驚風者是也。殊不知病本於虛。臟腑虧損已極。無風可逐。無驚可療。全屬虛寒敗症。不必盡由驚嚇而致。蓋脾虛不能攝涎。故津液妄泛而似痰。火虛則身寒。口中氣冷。木虛故搐而無力。每見世醫狂於陋習。輒作驚風施治。致令百無一救。此無他。良由前人立名之不慎。以致此耳。若更乞靈於無知婦人。則其死更速。蓋斯時一點真氣。已屆半續半離之際。一經動搖。鮮有不隨手而脫者。吁可哀也。主治之法。急宜溫補脾胃爲要。如四君子湯。五味異功散。加當歸酸棗仁。東垣黃芪湯。若脾土虛寒甚者。六君子加炮薑木香。不應者。急加附子。脾腎虛寒之甚。或吐瀉不止者。附子理陰煎。或六味回陽飲。若但泄瀉不止者。胃關煎。若元氣虧損已極。而至昏憤者。急灸百會穴。百會在頭頂正中。取之之法。用線量前後髮際及兩耳尖。折中乃是穴也。兼服金液丹。凡此貴在辨之於早。而急爲溫補之。始克有濟。倘稍涉遲疑。則必致不救。慎之慎之。宜兼詳虛論。

傷風發搐

凡小兒身熱脈浮。口中氣熱。呵欠頓悶。手足搐搦者。此因傷風而得之。宜

大青膏。或人參羌活散之類。主之。若搐而肢體倦怠。口氣不熱。則屬虛矣。宜異功散以補脾。釣藤飲以制肝。則搐自止矣。若月內小兒。搐而鼻塞。亦屬風邪所傷。宜用葱白七莖。生薑一片。細搗攤紙上。合置大人掌中。令熱急貼額門。秦方書。頂中央旋毛中爲百會。百會前一寸爲前頂。百會前三寸即額門。少頃即搐止而鼻亦利矣。尋常小兒傷風。亦可用之。愈後取去。仍當以綿胭脂一片。週圍以熱麵糊護之。以蔽大人口鼻之氣爲善。

傷食發搐

凡小兒飲食過度。致傷脾胃。嘔吐多睡。不思乳食。忽然而搐者。此因傷食得之。宜消食丸。若食既消而前症仍作。或見虛象者。此脾土傷而肝木乘之也。宜六君子加釣籐勾以健脾平肝。慎勿肆用消導。而致變壞症也。

潮熱發搐

小兒潮熱發搐。謂因潮熱不已。血虛筋急而發搐也。所謂潮熱者。謂時間發熱。過時即退。來日依時而發。如江海之潮汐。而罔或愆期也。原其所自。由於因熱而致搐。不由驚嚇而致病。若妄作荒誕之驚風施治。則大誤矣。主治之法。要不外乎虛實寒熱四者而已。假如病因於肝。其候則身體壯熱。目上視。手足動搖。口生熱涎。頸項強急。當用地黃丸以補腎。瀉青丸以治肝。若兼作渴飲冷便結。屬肝膽經虛熱。用柴芍參苓散。若更兼自汗盜汗。屬肝膽經血虛。用地黃丸。若口吻流涎。屬肝木剋脾土。用六君子湯主之。假如病因於心。其候則心湯。目上視。白睛赤。牙關緊急。口內涎生。或渴

而飲水。手足動搖。當用導赤散以治心。地黃丸以補肝。若渴而飲湯。體倦不乳。屬土虛木旺。用六君子地黃丸主之。假如病因於肺。其候則不甚搐而喘。目微斜視。身熱如火。睡露睛。手足冷。大便淡黃水。當用益黃散以補脾。瀉青丸以治肝。導赤散以治心。若身體微熱。屬脾肺虛熱。用異功散。若喘瀉不食。手足逆冷。屬脾肺虛寒。用六君子加炮薑木香。若久病而元氣虛者。用六君子地黃丸主之。假如病因於腎。其候則不甚搐而臥不穩。身體溫壯。目睛緊斜。喉中有痰。大便銀褐色。乳食不消。多睡不省。當用益黃散以補脾。導赤散以治心。若吐瀉不乳。厥冷多睡。屬寒水侮土。用益黃散不應者。用六君子加薑桂主之。大都治搐之法。皆當以固脾肺之氣爲先。蓋土旺金生。則肝木有制。不來乘脾。其搐自止。治者審焉。宜兼詳虛實二論。

將見痘疹發搐

凡小兒於將見痘疹之時。必先發熱。熱甚則陰分受傷。或心移熱於肝。以致風火相搏。而見手足搐搦。口眼歪斜者。亦常有之。經云。諸風掉眩。皆屬于肝。又云。諸痛痒瘡。皆屬于心。蓋心主熱。熱甚則肺經受剋。不能制伏肝木。熱則生風。風火相搏。神氣不安。故驚惕而發搐也。苟或妄以驚藥治之。則心寒而肌斂。毒必內陷。害可勝言哉。主治之法。當察其所屬而調劑之。如發熱無汗。表邪甚而搐者。柴歸飲。或惺惺散之類主之。煩渴飲冷。裏熱甚而搐者。導赤散。或辰砂六一散之類主之。肝膽熱甚。大便秘結。煩躁而

搐者。瀉青丸主之。熱甚見血而搐者。犀角地黃湯主之。風熱既退。則痘隨出而搐自止矣。然此皆治實之法。此外有因稟賦素虛。心脾不足而搐者。但當以面色青白。神氣怯弱爲辨。宜七福飲。或養心湯。或六氣煎。加棗仁主之。

太陽病變瘧

仲景先生云。身熱足寒。頭項強急。惡寒時頭熱。面赤。目脈赤。獨頭面搖。卒口噤。背反張者。瘧病也。發熱無汗。反惡寒者。名剛瘧。發熱汗出。不惡寒者。名柔瘧。又曰。太陽病。發汗過多。因致瘧。小兒肌膚嫩薄。腠理不密。血液未充。易於感冒。往往初傳太陽。一經便覺身強多汗。筋脈牽動。人事昏沈。是卽變瘧症也。良由熱甚傷陰。汗多傷液。血氣內虛。筋失所養。以致此耳。主治之法。若初病便瘧。表邪未解。陰虛無汗身熱者。宜人參羌活散。或三柴胡飲。或四柴胡飲之類主之。若因汗出太多。或過事表散。陽氣虛甚者。宜參附湯。參歸湯。人參建中湯之類主之。若汗出兼火。脈見洪滑。證見煩躁。或痰熱甚者。用丹溪人參竹瀝之法主之。若身微熱。脈不緊數。此表邪已隨汗解。不必再用發散。只宜專顧正氣爲要。宜五福飲之類主之。若大虛而脈見沈細陰勝者。宜大營煎。大補元煎。十全大補湯之類主之。其次有以誤下。傷陰。或泄瀉過度。或濕症誤汗。或瘡家誤汗。或亡血過多。或婦人產後。或傷暑。或中風之類。種種不一。皆能致瘧。奈何世醫不明此理。以小兒太陽初病變瘧。而謬名之曰急驚風。以汗下過度。神氣微弱。口開眼張。

而名之曰慢驚風。以婦人產後血虛發瘵。而名之曰產後驚風。以損傷亡血過多變瘵。而名之曰破傷風。以暑傷正氣。汗多厥逆。而名之曰暑驚風。以及體虛非風之類。不知皆屬極虛之症。動以驚風為名。輒投開關鎮墜之品。致使真氣益虛。邪反內陷。死亡相繼。何生民之不幸。若此其甚也。業幼科者。毋得以頭搖口噤。反張搐搦。便妄作驚風施治。以致誤人不救也。

天鈞內鈞

天鈞之狀。發時頭目仰視。驚悸壯熱。兩目反張。淚出不流。手足搐掣。不時悲笑。如鬼祟所附。甚者爪甲皆青。由乳母厚味積熱。胎兒為患。或外感風邪所致。宜內服鈞籐飲。外用雙金散吹鼻。至於內鈞。其狀則腹痛多喘。脣黑囊腫。偃僕反張。眼尾赤色。或內臟抽掣。作痛狂叫。或泄瀉縮脚。亦由乳母起居不慎。或為寒氣所乘。而致。宜鈞籐飲。五味異功散。加乾薑木香。甚者宜加肉桂。進乳食者可治。若因乳母鬱怒傷肝。宜兼治其母。宜用逍遙散加熟地。或加味歸脾湯。俱加漏蘆。子母同服。

癇症

小兒癇症。多因稟受先天不足。或因妊母七情所傷。傳兒為患。發之之狀。其候則神氣怫鬱。眼瞪面目牽引。口噤涎流。肚腹膨脹。手足搐掣。或項背反張。或腰脊強直。或仆地作聲。醒時吐沫。但當以四體柔弱。發而時醒者。是即癇症也。第五臟不同。治法各異。陰陽有別。難易殊途。宜詳言之。假如面赤目瞪。吐舌齧脣。心煩氣短。其聲如羊者。此心癇也。宜養心湯。妙香散。

主之。假如面青脣青。兩眼上竄。手足攣掣反折。其聲如犬者。此肝癰也。宜地黃丸主之。若搐而有力。宜柴胡清肝散主之。假如面黑目振。口吐涎沫。形體如尸。其聲如猪者。此腎癰也。宜地黃丸大劑煎湯主之。假如面如枯骨。目白反視。驚跳反折。搖頭吐沫。其聲如雞者。此肺癰也。宜補肺散主之。若面色萎黃。土不生金也。宜異功散主之。若面赤色。陰火上衝於肺也。宜地黃丸主之。假如面色萎黃。目直腹滿。四肢不收。其聲如牛者。此脾癰也。宜異功散主之。若面青瀉利。飲食少思。木來乘土也。宜六君子加木香柴胡主之。以上五臟所屬。主治之大法也。至若陰陽難易。則以發熱。抽掣仰臥。面色光澤。脈浮者爲陽。易治。若身冷。不搐。覆臥。面色黯黑。脈沈者爲陰。難治。要皆元氣不足之症也。通宜用紫河車研膏。加入參當歸末。糯米粥糊丸。多服取愈。若妄用祛風化痰劑伐之劑。或初發時。誤作驚風施治者。必死。大凡小兒平日。宜察其耳後高骨間。若有青脈紋者。宜卽抓破出血。可免斯患。此外又有因汗出當風。或脫換衣服。風邪乘虛暗襲。致見目青面紅。迷悶搐掣。涎潮屈指。如計數者。名曰風癰。宜先用消風丸。少少與之。繼卽用補中益氣湯。兼六味地黃丸。或八珍湯之類主之。兼宜服紫河車丸。又有因傷食過甚。以致嘔吐酸氣。發搐。大便酸臭者。名曰食癰。卽俗所謂食厥者是也。宜詳傷食發搐條。茲不再贅。

右凡十條。其候雖各有不同。而其搐掣之狀。似與世之所謂驚風者相仿佛。其實病各不同。主治亦互異。真不啻有霄壤之別。冰炭之分焉。究

其相沿。概謂驚風之說。由於不細心探討前人之書。但概謂之驚風。則其法為較通俗而易耳。殊不知此門一開。遂令天下業幼科者。只抱數方。便為神術。或更獨標其名曰驚科。大可歎也。吾今而立是說。非發前人所未發。實啓後來之大覺耳。吾於操縵者有厚望焉。

附方

獨參湯 治諸氣虛氣脫。及反胃嘔吐喘促。粥湯入胃即吐。凡諸虛症垂

危者。

人參 二兩如無力之家
以上好黨參代之

用水一升煎取四合。乘熱頓服。日再進之。兼以人參煮粥食之。尤妙。

扶神湯 治膽氣虛寒。頭痛目眩。心神恐懼。或是驚癇。

人參 黃芪炒 棗仁炒 熟地 白芍炒

柏子仁炒 五味子 扶神各一兩 桂心 甘草炒各五錢

右為末。每服二三錢。水煎。

辰砂抱龍丸 此藥利驚疎風。豁痰清熱。并治傷寒傷風。咳嗽生痰。喘急

昏沈發熱。鼻流清涕。或風暑熱症。睡中驚掣。痧疹癩瘡。胎風胎驚胎熱等症。邪氣實者。

天竺黃四錢須要嫩白者 牛膽星一兩 硃砂四錢一牛為衣 天麻五錢

雄黃秋冬三錢春夏二錢減半 麝香二分痘疹中不用 防風三錢 甘草三錢

右為細末。蜜丸芡實大。雪水糊丸尤佳。薑湯或薄荷湯磨服。痘疹時行。

加天花粉四錢同藥糊丸。

東垣黃芪湯 治驚論。外物驚宜鎮心。以黃連安神丸。若氣動所驚。宜寒水石安神丸。大忌防風丸。治風辛溫之藥。必殺人。何也。辛散浮溫熱者。火也。能令母實。助風之氣盛。皆殺人也。因驚而泄青色。先鎮肝以硃砂之類。勿用寒涼之氣。大禁涼驚丸。風木旺。必克脾胃。當先實其土。後瀉其木。閻孝忠編集錢氏方。以益黃補土。誤矣。其藥有丁香辛熱助火。火旺土愈虛矣。青橘皮瀉肺金。丁香辛熱。大瀉肺與大腸。脾實當瀉子。今脾胃虛。反更瀉子而助火。重虛其土。殺人無疑矣。其風木旺證。右關脈洪大。掌中熱。腹皮熱。豈可以助火瀉金。如寒水來乘脾土。其病嘔吐腹痛。瀉痢青白。益黃散聖藥也。今立一方。先瀉火補金。大補其土。是爲神治之法。

黃芪 二錢

人參 一錢

甘草 五分

右咬咀作一服水一大盞。煎至半盞。去渣。食遠服。加白芍藥尤妙。此三味皆甘溫能補元氣。甘能瀉火。內經云。熱淫於內。以甘瀉之。以酸收之。白芍藥酸寒。寒能瀉火。酸味能瀉肝。而大補肺金。所補得金土之位。大旺。火虛風木何由而來。剋土。然後瀉風之邪。

金液丹 舊方主病甚多。大抵治氣羸。凡久疾虛困。久吐利不差。老人臟秘。傷寒脈微陰厥之類。皆氣羸所致。服此多差。大人數十丸。至百丸。小兒以意裁度多少。皆粥飲下。羸甚者化灌下。小兒久吐利垂困。藥乳皆

不入。委頓待盡者。併與數十丸。往往自死得生。少與即無益。嘗親見小兒吐利已極。已氣絕棄諸地。知其不救。試謾與服之。復活者數人。

硫黃 十兩

右取精瑩者。研碎入罐子。及八分爲度。不可滿。外用益母草。同井泥搗固。濟罐外。約厚半寸。置平地。以瓦片覆罐口。四面炭五斤。擁定。以熟火一斤。自上燃之。候罐子九分赤。口縫有碧烟。急退火。以潤灰三斗。覆至冷。剖罐取藥。削去沈底滓濁。准前再煨。通五煨爲足。急用可三煨止。藥如熟雞卵氣。取并罐埋潤地一夜。又以水煮半日。取藥。柳木槌研細。滴水候揚之無滓。更研令乾。每藥一兩。用蒸餅一兩湯釋化。同搗丸之。暴乾密貯聽用。

大青膏 治傷風痰熱發搐。

天麻

青黛 各一錢

白附子 服

烏蛇 酒浸取肉焙

蝎尾 各五分

天竺黃

麝香 各一字。案古法用一字者。以藥堆滿錢上之一字也。用二字者同。亦有只用半字者。

右爲末。生蜜丸。豆大。每用半粒。薄荷湯化下。

人參羌活散 治傷風驚熱。

人參

羌活

川芎

白茯苓

柴胡

前胡

獨活

桔梗

枳殼

地骨皮

天麻 等分

甘草 炙減半

右用生薑薄荷水煎。治驚熱加蟬退。

釣籐飲 治天釣潮熱。

釣籐 人參 犀角屑 各半 全蝎

天麻 各二分 甘草 半分

右爲末。每服一錢。水煎。

消食丸 治乳食過多。胃氣不能消化。

砂仁 陳皮 神麩 炒 麥芽 炒

三稜 蓬朮 各半 香附 炒一

右爲末。神麩糊丸。麻子大。量兒大小。每服數分。白湯送下。

柴芍參苓散 治肝膽經分。患天泡等瘡。或熱毒凜癩之類。

柴胡 白芍 人參 白朮 炒 茯苓

陳皮 當歸 各五分 丹皮 山梔 炒 甘草 各三分

右每服二錢。水煎。

柴歸飲 治痘瘡初起。發熱未退。無論是痘是邪。疑似之間。均宜用此平

和養營之劑。以爲先著。有毒者可托。有邪者可散。實者不致助邪。虛者

不致損氣。凡陽明實熱邪盛者。宜升麻葛根湯。如無實邪。則悉宜用此。

增減主之。

當歸 二三錢 白芍 或生或炒 柴胡 一錢或 荊芥穗 一錢 甘草 各七分

水一鍾半煎服。或加生薑三片。血熱者加生地。陰虛者加熟地。氣虛脈

弱者加入參。虛寒者加炮薑肉桂。火盛者加黃芩。熱渴者加。乾葛腹痛

者加木香砂仁。嘔惡者加炮薑陳皮。若治麻疹。或以荆芥易乾葛。陰寒盛而邪不能解者。加麻黃桂枝。

辰砂六一散 解煩熱。止渴。利小水。

粉甘草 一兩 桂府滑石 飛六兩

硃砂 三錢

右為極細末。量兒大小每服一二三錢。開水調下。

犀角地黃湯 治勞心動火。熱入血室。吐血衄血。發狂發黃。及小兒瘡痘

血熱等症。

生地 四錢 白芍 丹皮

犀角 鎊各一錢五分如欲取汗退熱必用尖生磨攪入和服方妙

右水一鍾半。煎八分服。或入桃仁去皮尖七粒同煎。以治血症。

七福飲 治氣血俱虛而心脾為甚者。

人參 隨宜 熟地 隨宜 當歸 二二三錢 白朮 炒一錢五分

甘草 炙一錢 棗仁 二錢 遠志 製三五分

右水二鍾。煎七分。食遠溫服。或加生薑三五片。

養心湯 治心血虛怯。驚癇或驚悸怔忡。盜汗無寐。發熱煩躁。

人參 黃芪 遠志 當歸 川芎

棗仁 五味子 肉桂 柏子仁 白茯苓

茯神 半夏 各三錢 甘草 炙四錢

右每服一二三錢。薑棗水煎。

六氣煎 治痘瘡氣虛。癢癩倒陷。寒戰咬牙。並治男婦陽氣虛寒等症。

黃芪 炙

肉桂

人參

白朮 炒

當歸

甘草 炙

右分量隨宜。水煎。加減照大物煎法。詳見痘論大物煎下。

三柴胡飲。凡素稟陰分不足。或肝經血少。而偶感風寒者。或感邪不深。

可兼補而散者。或病後產後感冒。有不得不從解散。而血氣虛弱。不能

外達者。宜此主之。

柴胡 二三錢

白芍 一錢

甘草 炙一錢

陳皮 一錢

生薑 三五片

當歸 二錢

右水一鍾半。煎七分。溫服。如微寒咳嘔者。加半夏一二錢。糖泄者。以當

歸易熟地。

參附湯。治真陽不足。上氣喘急。呃逆自利。臍腹疼痛。手足厥冷。嘔惡不

食。自汗盜汗。氣短頭暈等症。

人參

製附子

須參倍於附。或等分。不拘五錢。或一兩。酌宜。

薑水煎服。

參歸湯。治心虛血熱。自汗盜汗。一名國參散。一名人參湯。

人參

當歸 等分

右爲末。每服二錢。用雄猪心一箇。切三片。以一片煎湯調服。

人參建中湯。治虛勞自汗。

甘草 炙

桂枝

生薑 各三兩

大棗 十二枚

白芍

六兩

膠飴

一升即麥芽糖

人參

二兩

右水七升。煮取三升去渣。入膠飴。更上微火消解。溫服一升。日三服。

此漢

時分量。糖量與今時不同。酌宜用之可也。嘔家不可用建中湯。以甜故也。

丹溪人參竹瀝之法

丹溪云。瘕比癩為虛。宜帶補。多是氣虛有火兼痰。

用人參竹瀝治之。不用兼風藥。

人參

竹瀝

右將人參煎湯。入竹瀝和服。

五福飲

凡五臟氣血虧損者。此能兼治之。足稱王道之最。

一人參

主心

熟地

主腎俱隨宜用

當歸

主肝二錢

白朮

主肺炒一錢半

甘草

主脾炙一錢

水二鍾。煎七分溫服。或加生薑三五片。凡治氣血俱虛等證。以此為主。

或宜溫者加薑附。宜散者加升麻柴葛。左右逢源。無不可也。

大營煎

治真陰精血虧損。及婦人經遲血少。腰膝筋骨疼痛。或氣血虛

寒。心腹疼痛等症。

當歸

二三錢或五錢

熟地

三五錢

枸杞

二錢

甘草

炙一錢

杜仲

二錢

牛膝

一錢五分

肉桂

一二錢

水二鍾。煎七分。食遠溫服。如寒滯在經。氣血不能流通。筋骨疼痛之甚

者。必加製附子一二錢方效。如帶濁腹痛者。加破故紙一錢炒用。如氣

虛者。加人參白朮。中氣虛寒嘔惡者。加炒焦乾薑一二錢。

大補元煎 治男婦氣血大壞。精神失守。危劇等症。此回天贊化。救本培

元第一要方。

人參 補氣補陽以此為主少則用一二錢多則用一二兩

山藥 炒二錢 杜仲 二錢

枸杞 二三錢 甘草 炙一錢

熟地 補精補陰以此為主少則用二三錢多則用一二三兩

當歸 二二三錢若池瀉者去之 山黃 一錢如畏酸吞酸者去之

水二鍾煎七分。食遠溫服。如元陽不足多寒者。加附子肉桂炮薑之類。

隨宜用之。如氣分偏虛者。加黃芪白朮。如胃口多滯者不必加。如血滯

者加川芎。去山黃。如滑泄者加五味破故紙之屬。

十全大補湯 治氣血俱虛。惡寒發熱。自汗盜汗。肢體困倦。眩暈驚悸。嘔

熱作渴。遺精白濁。二便見血。小便短少。便泄閉結。喘咳下墜等症。

人參 白朮 炒 茯苓 甘草 炙減 熟地黃

當歸 白芍藥 減半 川芎 照芍藥更減一半 黃芪 炙 肉桂 錢許

右水煎溫服。

雙金散 治天釣。日久不下。

蜈蚣 一箇。去頭足尾。用真酥塗抹。慢火炙黃。置砧子上。面南立。用竹刀子當脊縫中亭。

錯即大誤矣。麝香 別用乳鉢。將右邊字者。入麝香同研極細。却入右字貼內收。不得相犯。

每有病者。眼睛釣上。止見白睛。兼角弓反張。更不能出聲者。用細葦筒

子。取左字貼內藥少許。吹在左邊鼻裏。右亦如之。用藥不可多。若眼未

逍遙散 治肝脾血虛。及鬱怒傷肝。少血目暗。發熱脇痛等症。

當歸 白芍 白朮 茯苓

甘草 炙 柴胡 各等分

右加煨薑薄荷少許。水煎。

加味歸脾湯 治脾經血虛發熱等症。

人參 黃芪 炙 白朮 炒 茯苓

棗仁 各二錢 遠志 當歸 各一錢 木香

甘草 炙 各五分 柴胡 山梔 各一錢

水二鍾。加圓眼肉七枚。煎七分溫服。

妙香散 治心氣不足。驚癇。或精神恍惚。虛煩少寐。盜汗等症。

辰砂 三錢 麝香 一錢 木香 煨 二錢 茯苓

山藥 扶神 遠志 黃芪 各一兩

桔梗 甘草 人參 各五錢

右為極細末。每服一錢。溫酒或白湯調服。

補肺散 治肺虛。惡心喘急。久患咳嗽有痰。

阿膠 一兩五錢 炒 鼠粘子 炒 馬兜鈴 各五錢 杏仁 七粒

糯米 一兩 甘草 三錢

右每服二三錢。水煎。

紫河車丸 治癩癩。

紫河車 肥大者 一具

人參

當歸 二味酌用為末

右將河車生研爛。入二藥。加糯米粥少許搗丸。桐子大。每服五七十丸。日進三服。人乳化下。凡先天不足。後天虧敗者。俱可隨宜增用藥物。照此製服。無不可也。或將河車用酒頓熟亦佳。

消風丸 治風癩。先宜此藥。

膽星 二錢 羌活 獨活 防風 天麻

人參 荆芥 川芎 細辛 各一錢

右爲末。蜜丸。桐子大。每服二丸。薄荷紫蘇湯調化下。

秘旨安神丸 方見熱論

導赤散 方見實論

四君子湯 方見熱論

五味異功散 方見熱論

六君子湯 方見寒論

附子理陰煎 方見寒論

六味回陽飲 方見寒論

胃關煎 方見寒論

異功散 即五味異功散方見熱論

地黃丸 方見熱論

瀉青丸 方見實論

益黃散 方見寒論

惺惺散 方見表論

四柴胡飲 方見實論

柴胡清肝散 方見熱論

補中益氣湯 方見虛論

八珍湯 方見虛論

不可餓論第十

內經云。人之所受氣者。穀也。穀之所注者。胃也。胃者。水穀氣血之海也。又曰。人以水穀爲本。故人絕水穀則死。又曰。人受氣于穀。穀入于胃。以傳于肺。五臟六腑。皆以受氣。又曰。眞氣者。所受于天。與穀氣并而充身也。又曰。穀不入。半日則氣衰。一日則氣少矣。又曰。營氣之道。納穀爲寶。又曰。脾者。倉廩之官。胃者。水穀之海。六腑之大源也。又曰。五臟皆稟氣于胃。胃者。五臟之本也。又曰。有胃氣則生。無胃氣則死。李士材曰。嬰兒既生。一日不再食。則飢。七日不食。則腸胃個絕而死。經云。安穀則昌。絕穀則亡。猶兵家之餉道也。餉道一絕。萬衆立散。胃氣一敗。百藥難施。一有此身。必資穀氣。顧飲食之於人。不綦重歟。豈知近日醫流。毋論大人小兒。凡遇發熱。不分表裏虛實。便一概禁絕其飲食。而惟揚屬爲尤甚。至有餓不死。傷寒之說。愚夫愚婦。習焉不察。至死不悟。嗟乎。胃氣者。元氣也。飲食者。人之所賴以生者也。人非飲食。何以生乎。且夫風寒外感。未會傳裏之時。其邪在表。裏本無病。其人自能食。若表不解。邪傳入裏。其人自不能食。方其在表能食之。

時。醫者妄絕其飲食。是先絕其胃氣也。胃氣一傷。則諸臟無所稟氣而皆傷矣。諸臟之氣皆傷。則正不勝邪。正不勝邪。則無以捍禦外侮。勢必邪氣乘虛內陷。而直入堂奧矣。若曰風寒宜餓。試問仲景先生傷寒論第一條。風傷衛。服桂枝湯後。令人歡熱稀粥一升餘。以助藥力。穀氣內充。則邪不能入。且俾胃中陽氣鼓動。邪自作汗而解者。爲何說也。况汗生於陰。非飲食無以生陰。長陽所宜禁者。生冷粘滑肉麪之物。醫者不免有勿多食之戒。愚因從前病家。不耐甘淡。仍食粘滑肉麪之物。醫者不免有勿多食之戒。愚者聞之。錯會其說。遂至承譌襲謬。貽害至今。殺人無已。在大人或可自知。飢甚難支。猶可追呼索食。在小兒則口不能言。任人佈置。勢必輕病變重。輾轉呻吟。不至餓死不止。傷心慘目。莫此爲甚。間有愈者。亦必羸弱不堪。致使壯者怯而弱者夭。孫真人云。小兒有病。宜單乳不哺。足可證今人清餓之謬。歷覽名家所著之書。亦從未有餓之一字。蓋人之既長。全資穀氣以爲生。嬰孺之時。必賴乳飲以爲命。吾今與醫家病家約。凡於外感之症。毋論大人小兒。若其能食者。不必禁其食。不能食者。當思所以食之。要之能食之病。其病必不死。雖弗藥可也。不能食之病。除傷食惡食外。醫者務求其所以而治之。俾其能食。則其病亦自愈。有志於生命者。慎毋以習俗相沿。亦蹈餓人之弊也。吾特於此諄諄而詳戒之。

治痘論第十一

痘瘡一證。由先天伏毒。觸後天時行之氣而後發。在上古民物貞淳。並無

所謂痘瘡之說。至于後世。乃至人人不免。爲嬰兒生死一大關頭。雖曰天地之氣運使然。要亦人事之不古耳。其候有三。曰順險逆。辨之有四。曰寒熱虛實。蓋順症可不必治自愈。逆症難治難愈。所宜治者。惟險症而已。所謂險症者。或由天時不正。或因稟賦素虛。或兼外感。或挾內傷。或將護失宜。或服藥謬妄。率皆人事之不齊。非痘瘡之自爲險逆也。嘗見近日幼科。動稱火毒。大黃石膏之屬。率意輕投。致使脾腎生氣大傷。勢必毒氣乘虛內陷。冤乎冤乎。此非醫爲之乎。且夫痘瘡見點之後。毒氣悉已發越在表。最忌攻裏。前人戒妄汗妄下。已不勝諄切詳盡。何後人之懵懵也。主治之法。辨列於後。宜詳觀之。然欲無險逆而求萬全。莫如種痘。附種痘說。

表虛見證主治之法

表虛之狀。初發熱時。其熱必微。或惡寒。身振振搖動。如瘧之狀。宜柴葛桂枝湯。加黃芪主之。或寒熱往來。四肢厥冷。面色青白。或多汗惡風。或怠惰嗜臥。脈必浮細而弱。宜溫中益氣湯。參芪內托散。或十宣散之類主之。若初見點便作癢者。宜六氣煎。加川芎白芷防風荆芥。或十宣散之類主之。若表虛不能約束毒氣。以致一齊湧出。顆粒細碎者。實表解毒湯主之。若表虛無力托送。以致痘出不快者。實表解毒湯。十宣散。保元湯之類主之。若已見齊。而痘色灰白。頂陷。或伏陷。或不起發。不光澤。或色嫩皮薄。或癢瀉。或如水泡。或摸不礙手。或根窠不紅。或倒靨。或不能結痂者。脈必細數無力。悉是表虛之候。宜保元湯。十全大補湯。六氣煎之類主之。若已成漿。

不因吐瀉。而忽見寒戰者。表虛甚也。養衛化毒湯主之。

表實見證主治之法

表實之狀。初熱之時。壯熱無汗。惡寒頭疼身痛。脈浮緊數。如在冬月寒勝之時。宜人參敗毒散主之。如時令暄熱。宜升麻葛根湯主之。如不寒不熱。天氣溫和之時。宜柴歸飲主之。然此皆爲表實者宜之。設或稟賦素虛。或表邪不甚。或肢體潮潤。或已見點。雖升麻葛根湯亦不宜用。矧敗毒散乎。倘誤表之。必致潰爛之變。其次若面赤脣紫。眼紅鼻塞。皮焦膚赤。手足熱甚者。宜搜毒煎。或加柴胡。或柴歸飲主之。若已見點。而痘色紅紫。焮腫疼痛。或皮厚而硬。或癰腫癩疔。脈見浮洪滑實。裏氣亦實者。四味消毒飲。鼠粘子湯之類主之。若已見點。而身熱不退者。宜滋營氣。芎歸湯主之。不得肆用表散。蓋妄汗能致癍爛也。慎之慎之。若已見點。而偶爲風寒所感。痘出不快。身熱加增者。此又宜微表之也。柴歸飲主之。

表寒見證主治之法

表寒之狀。不起發。不紅活。根窠淡白。宜保元湯。六物煎。參芪內托散之類。少加酒同煎主之。若已起發。而身涼癢痛。倒陷乾枯者。宜保元湯。六氣煎。十全大補湯之類作大劑。亦少加酒煎主之。不應者。加鹿茸附子。

表熱見證主治之法

表熱之狀。肌膚大熱。氣羸喘滿。煩躁狂言。宜羌活散鬱湯。柴歸飲之類主之。若身外熱甚。而脣潤不渴。目無赤脈。大小便調。身雖大熱。但熇熇然。柴

歸飲主之。若已出而根窠紅紫。宜四物湯。涼血養營煎之類主之。若已見點。而頂赤發癩。涼血養營煎。犀角散之類主之。若頭面紅腫。紫黑焦枯。紫草快癩湯。涼血養營煎。六味地黃湯之類主之。若夾癩夾疹。眼紅脣裂。涼血養營煎主之。

裏虛見證主治之法

裏虛之狀。或因先病吐瀉。或因誤服寒涼之劑。或痘瘡已出未出之間。而爲吐瀉嘔惡。精神倦怠。喜熱飲食者。宜六君子湯。五君子煎。理中湯。參薑飲之類主之。若少食。或不思食。或食亦不化。此脾胃之氣虛也。宜五味異功散。四君子湯之類主之。若二便清利。或溏泄不渴。或氣促聲微。或神昏多睡。或腹膨噯氣。吞酸。脈見弱而無力者。宜人參理中湯。保元湯。六氣煎之類主之。若痘未出。發熱之初。而見吐瀉。一二次即止者。其痘出必輕。不必治之。此又不可不知也。要之。痘瘡全賴裏氣完固。若裏氣虛損。則生機息矣。喜用石膏大黃者。吾誠不知其爲何心也。

裏實見證主治之法

裏實之狀。二便秘結。胸膈脹滿。作渴喜冷。或脣燥咽乾。口瘡舌黑。脈見沈數有力。痘形未見之時。宜微下之。四順清涼飲。當歸丸之類。少少與之。若肢體熱甚。柴胡飲子。若煩躁驚狂。聲高譫語。脈見洪滑者。辰砂六一散。退火丹。導赤散之類主之。若痘已隱隱見於皮膚之間。此痘已發越在表。若裏症果急。宜微通其二便。斷不可過用攻裏之劑也。若妄下之。必致裏虛。

而變內陷矣。慎之慎之。要之近日屬實之症不多。若妄用之。則大誤矣。且痘瘡最喜裏氣完實。自必能食。雖兼他症。以未治之可也。

裏寒見證主治之法

裏寒之狀。大小便利。面青目白。或因臟腑素虛。或因誤服涼藥。而見瘡白神倦。吐瀉嘔惡。氣促肢冷。或腹脹腹痛。以致痘出不快。或已出而陷伏倒靨者。宜六氣煎。九味異功煎。十二味異功散之類主之。若已見齊。或行漿之際。爲涼藥所誤。以致吐瀉寒戰齧牙者。木香散。十二味異功散之類主之。然此二方。溫則有餘。補則不足。不若用九味異功煎爲最妙。若因誤食生冷。而致腹脹腹痛。或吐瀉者。理中湯。加肉桂木香。或四君子。加乾薑木香之類主之。若胃氣虛寒。腹痛喜按者。黃芪建中湯主之。若脾腎虛寒。小腹作痛。瀉利不止者。胃關煎主之。大抵裏寒之症。必由誤服寒涼攻伐之劑所致。奈何近日幼科。胸中毫無的確明見。羸淺浮躁。肆用寒涼。致令小兒陽氣受傷。裏虛變逆。死者多矣。深堪哀憫。有人心者。其亦知所以自省矣。

裏熱見證主治之法

裏熱之狀。煩躁狂言。口乾大渴。內熱自汗。小便赤澀。大便秘結。脈見沈數有力。宜退火丹。四順清涼飲之類主之。若衄血。元參地黃湯。加陳墨汁主之。溺血。大分清飲主之。若已出未出之際。衄血或溺血者。並宜犀角地黃湯主之。血止後。卽宜用調元湯主之。或少加木通。若初見發熱。便覺大渴。

脣焦舌燥者。宜葛根解毒湯主之。若火迫庚金而協熱作瀉者。必其脈見洪數。身有大熱。口有大渴。喜冷惡熱。煩躁多汗。中滿氣壅。痘色嫩腫紅紫。口鼻熱赤。小水澀痛。稟賦素實者。宜黃芩湯主之。然此症不多。斷不可以此湯誤治虛寒泄瀉也。慎之慎之。又或已未見點之時。咽腫喉痛者。甘桔湯。加牛蒡主之。若已見齊。起脹灌漿之時。而見喉痛者。此因喉內有痘作痛。收靨時自愈。不必治之。若痘已出齊。而脾肺有熱。作渴喜冷者。宜人參麥門冬散主之。若痘出而夾癍夾疹。煩躁大渴。妄言妄見。雙解散主之。以上皆當與各條參看。果屬裏熱。始無貽誤。倘稍涉疑似。則害人不淺矣。慎之慎之。

順逆

身無大熱。痘脚稀疏。根窠紅綻。不瀉不渴。乳食不減。四肢溫和。聲音清亮。精神如常。脈象和緩。此屬順症。不須服藥自愈。至若逆症。咳嗽聲啞。飲食挫喉。一惡也。腹脹氣促。悶亂不寧。二惡也。渴瀉不止。齧牙寒戰。三惡也。瘡嫩易破。癢痛不止。四惡也。紫黑灰色。頂陷喘渴。五惡也。若按上法急爲救療。十中尙可全活。八九慎勿以其惡。遂棄而不治也。此外尙有輕變爲重。所犯者七。一不忌口味。生冷滑膩。致令脾胃受傷。二先會泄瀉。裏虛不能托毒外出。三過服表藥。或不避風寒。致損表氣。四餌涼藥。及妄用攻裏之劑。致令裏氣虛寒。毒氣不能發出。五穢氣所觸。詳見種痘說內。蓋血氣聞香則順。聞臭則逆。順則易出易靨。逆則難愈。六生人輒至。及僧尼孝服。七

犯房屋。又重變爲輕。返凶爲吉。所慎者五。一謹避風寒。二身常和暖。寒則添衣。熱則減去。務得中和。毋令太過不及。三節飲食。大忌西瓜。柿。橘。菱。角。水蜜等冷物。恐內傷胃氣。及肥肉。油膩。滑腸作瀉。酸鹹作渴。酒葱蒜魚羊腥物作痒。務使脾胃充實。則痘瘡易出。易靨也。四大便稠。飲食調和。不致泄瀉。一日二日一次爲調。日行二三次爲利。宜急用甘溫補脾藥。若值灌漿之時。雖三四日不行。不得誤以爲祕。五按法調理。補氣血。顧脾胃。避風寒。節飲食。毋妄汗。毋妄下。斯皆可以轉重就輕。返逆爲順。庶幾不致變輕爲重矣。

戒妄汗妄下

人之一身。本乎氣血。氣爲衛。血爲榮。氣陽而血陰也。陽主動。所以沖暢陰道。運動樞機者也。陰主靜。所以充溢臟腑。灌溉週身者也。然其所重。則又在乎脾胃。是故脾胃者。五臟六腑。生化之大源也。經云。人之所受氣者。穀也。穀之所注者。胃也。胃者水穀氣血之海也。至於痘瘡。則全資氣血。但得氣血充暢。則易出易收。氣血不足。則變症百出。故始出之際。賴氣血以載毒外出。繼則因氣血以起脹灌漿。終之以結靨落痂。莫非氣血爲之運化。倘氣血稍虛。脾胃一損。則生機息而化源絕矣。奈何宋麟祥之痘疹正宗。誤用寒涼攻伐。致令愚盲幼科。避諸大家之煩。貪痘疹正宗。歸宗湯一方之易。遂至一時翕然用之。不分虛實寒熱。妄行攻下。以致陰陽脾胃之氣俱傷。變症因之蜂起。因而死者多矣。蓋妄汗傷陽。則凡起發灌漿收靨之

力皆失所賴。勢必變爲癩爛音啞。皮薄癢痛。外剝而死。故前人於痘瘡見點之後。便禁用升麻葛根湯。恐發得表虛也。妄下傷陰。則凡臟腑化源。精神鎖鑰。飲食倉廩。皆爲所敗。是必變爲陷伏。不起發。不灌漿。灰白倒靨。手足逆冷。吐利不食。寒戰齧牙。腹痛虛脹。內攻而死。故前人禁用大黃石膏枳殼生地鼠粘紫草芩連梔子之屬。恐攻得裏虛也。故錢氏曰。瘡疹惟用溫平藥治之。不可妄下及妄攻伐。良有以也。陳氏云。痘以太陰脾肺二經爲主。肺宜溫而脾宜燥。萬氏云。痘瘡始終以脾胃爲主。胃當養而脾當補。馬氏云。痘以少陰心經爲主。火不可太清。血不可太涼。三說皆是也。蓋脾爲孤臟。能灌四傍。則四臟皆賴一臟以養之。况脾屬土而主肌肉。若能化水穀成津液。灌溉諸經。令肌肉不枯。氣血得其助。痘何難成。但寒土不能生物。必有陽氣薰蒸於下。而後能成發育也。如草木之根在土。而冬月何以不生。以真陽之氣息也。可見脾受水穀。化生津液。必藉火氣。始能成腐化之功。所謂火能生土。火乃土之母也。心爲君火。能役相火。主乎血脈。若心火不息。血不寒凝。自能與脾之津液相爲流通。痘自紅潤而鮮豔。所謂血主濡之。氣主煦之。氣無血不走。血無氣不行。氣乃血之帥也。氣行血亦行。肺統一身之氣。主乎皮毛。若肺氣充盈。自能與心之血脈相爲週運。痘自尖圓而肥潤。是血氣充足。交會於前。脾生津液。助養於後。痘之成功。三臟缺一不可。若肝臟則無與焉。至於腎臟。如攻伐太過。或經泄瀉。腎氣損傷。則痘瘡變黑。歸腎而死矣。薛氏曰。凡痘瘡在四五日之間死者。毒氣盛。

真氣虛而不能起發也。六七日之間死者。元氣虛而不能灌膿也。旬日之外死者。邪氣去。脾胃敗。而元氣內脫也。治者但能決其死。而不知其死。必本於氣血虧損。苟能逆推其因。而豫爲調補。豈斷無生理哉。蓋起發灌膿結痂。三者皆由脾胃榮養。不可妄投表下攻伐之劑。庶不誤人於天札也。業幼科者。可不戒哉。請更言之。試問痘疹正宗。專以歸宗湯一方。肆用寒涼攻伐。欲以應無窮之痘。有是理乎。不待明智之士。自能覺其非矣。何幼科昧心喪良。故蹈其轍也。有力仁人。若能火其書燬其板。使邪說息而正道行。則於嬰兒造福不淺矣。

痘後

痘瘡收靨落痂之後。其嬰兒氣血必虛。蓋自初熱傷陰。以至出齊起發灌漿結靨落痂。莫非氣血之所爲。且或體虛痘密。遍體不留餘隙。果能一一衝托成實。則是週身氣血。皆爲痘用。週身氣血皆爲痘用。則未有不耗傷者。氣血既皆爲痘耗傷。則凡於落痂之後。必宜加意培補。縱有他症。皆當以未治之。務令氣血得以充足復原。不致遺後日多疾之患。譬如以人搏虎。虎雖斃而人之氣力傷矣。人之氣力既傷。未有不需飲食酒肉以將息者。奈何近日俗習。不知此理。每於痘瘡。皆喜進清涼之劑。於落痂之後。亦妄用黃連梔子苦寒之屬。謬曰敗毒。致使脾胃生氣大傷。飲食減少。尪羸孱弱。卒難復原。或卽變生他症。仍歸夭亡。可勝浩歎。嗟乎。痘不成漿。由氣血不能運化。痘既成漿。毒氣已解。果使漿稠痂厚。則毒氣全解。痂落之後。

尙何餘毒之可清。在稟賦壯實。血熱癥紫者。或堪其謬。若癥色紅淡。或雪白者。服之必死。婦人無知。庸醫謬習。沈迷痼結。禍世已深。僕思挽救。是以不惜諄復其詞。用以代鐸。以振世之聾聵云。

附種痘說

粵稽上古之世。民物貞淳。人心恬淡。並無所謂痘瘡一症者。迨至有唐以後。風俗澆漓。人情穿鑿。淫佚嗜好。醞酒膏粱。六淫外干。七情內擾。臟腑鬱蒸。氣精滓濁。及至分形受質。兩情相感。一氣渾融。錯雜之邪。交相施瀉。胚胎之始。毒卽伏焉。既生之後。必待天地時行疫癘之氣。或挾外感內傷之邪。觸之斯發。乃至遞爲傳染。比戶皆然。爲嬰兒所必不能免。此父母遺毒之爲害也。如此。加以近日醫無善術。用藥乖離。遂至險逆相尋。死亡略半。此庸醫之爲害也。又如此。嗟乎。父母愛子之心。何所不至。劬勞鞠育。惟疾之憂。一旦爲庸醫所誤。呼救何從。甚且宗祀攸關。賴此一綫。抑或貞釐忘死。守此藐孤。一遇差遲。含冤更慘。眞令人言之痛心。聞之墮淚者也。幸至有宋。有神人出。而立種痘一法。乘兒無病之時而種之。其種出之痘。少者不過數粒。多者不過數十粒而已。且不需服藥。誠挽回造化。避危就安。萬舉萬全之良法也。

本朝高宗純皇帝。仁被萬方。德逾千古。憫茲良法。方書未載。恐日久湮沒失傳。特於御纂醫宗金鑑書內。編輯種痘心法要旨。仰見仁慈。恩深保赤者矣。第邇來能種之子。皆有力之家。單寒之兒。猶然自出。豈不大負國家

及在昔神人之初念乎。原其所以屈於力有所不能耳。今喜博愛堂諸君子。發心擇請種師。並依助衣食。廣爲貧家兒女種痘。洵慈幼之盛舉也。予甚樂焉。用是特綴數語。並冀廣爲勸導。使人人皆能效法諸君子。於以修福而廣皇仁。端在是矣。功德豈有量哉。

一種痘原所以去險履平。避危就安而設。務宜用種出之痘。所落之痂作苗。其氣純正。無天行時毒外感內傷之邪。夾雜於中。種出自然稀疎順吉。應時成功。決無愆忒。若夫時痂。則斷不可用。至於種法。宜以水苗爲上。

一下苗之後。調攝禁忌。不可不慎。自始至終。不可稍忽。如避寒熱。慎飲食。是也。假令天氣嚴寒。蓋覆宜溫煖。勿使受寒。恐被寒氣所觸。則痘不得出。亦不可過於重棉。疊褥。火器薰靠衣被。致熱氣壅滯。使痘不得宣發。天氣和暖。蓋覆宜適中。恐客熱與毒相併。致增煩熱。亦不可輕易著單露體。致風寒外侵。阻遏生發之氣。此寒熱所以貴得其平也。臥處常要無風。夜靜不斷燈火。不離親人看守。一切食飲。宜豫爲現成。以備不時之需。如時有迅雷烈風之變。宜謹帷帳。添蓋覆。多燒辟穢香。以辟一時不正之氣。至於飲食。人之氣血。藉以生化。痘之始終。全賴乎此。若飲食虧少。氣血何所資助乎。但不可過甚。若過飲。則飲停不化。津液過食。則食滯壅遏。氣機大凡吮乳之兒。不多乳。不闕乳。能食之兒。勿餐生冷黏硬。勿啖辛熱炙煇。勿恣意茶水。勿飲涼漿。食不過飽。亦不令飢。此飲食

所以貴得其平也。寒熱飲食而外。則凡舉止動作。既不可任意驕縱。亦不可過於拂逆。惟在調攝之人。耐其性情。兢兢業業。善爲保護。不但慎於既種之後。且當慎於未種之先。不但慎於見苗之初。猶當慎於落痂之後。種師宜諄諄告誡。務期詳細。使彼知關係匪輕。心存謹慎。如法調攝。可保萬全。至於禁忌。亦最緊要。凡種痘之家。房中最要潔淨。切忌沖犯。宜明亮。不宜幽暗。勿詈罵呼怒。勿言語驚慌。勿對梳頭。勿對搔癢。勿嗜酒。勿歌唱。凡房中淫洩氣。婦人經候氣。腋下狐臭氣。行遠勞汗氣。誤燒頭髮氣。誤燒魚骨氣。吹滅燈燭氣。硫黃蚊烟柴烟氣。煎炒炙燻氣。葱蒜醉酒氣。溝渠污濁氣。黴爛蒸濕氣。溷圍廁桶氣。病人穢惡氣。新喪殮穢氣。以上務宜謹慎遵守。毋稍懈怠。倘自不經心。致令觸犯。咎難他諉也。仍宜謹伺房門。勿令生人及僧尼孝服人輒入。宜將此刷印。人給一張。俾各自慎。

辟穢香方

蒼朮

大黃

減半

右二味共爲細末。紅棗煮湯。連肉和成條曬乾。宜豫製給人。

一凡房屋寬深者。自宜聽其在家。謹慎將護。倘室廬狹隘。或不足以蔽風雨者。果能籌屋以備暫居。則更妙矣。並且隨時酌借帳被。

一每一小兒。宜給紅興布紫頭一條。紅稀布小褂一件。取其新潔而又和軟也。若極貧之兒。於冬令嚴寒之時。則當改給絮襖矣。此宜隨時斟酌。

在於發熱之時與之。以杜冒濫。既見點後。給燈油魚鰾錢三百六十文。倘不守禁忌。將護失宜。致生他症。設有不測者。亦宜量給小費。此雖萬中之一。然不得不豫爲之籌也。

一歲之內。四時宜否。要在活人。非富貴之家。自種可比。但於五六月間。借以深邃房屋。少少種之。以爲接苗之計。其餘各月。不妨隨到隨種。多多益善也。下苗日期。宜避破閉。及四立二分二至之前一日。並年命刑冲破害。及歲煞災煞切煞。天剋地冲比冲之日。

一凡驗看小兒。以耳後筋紋爲主。紅而紋少者爲上。紋多而色不紫赤者次之。若紋多而色兼青紫。此雖不可與種。然聽其自出。則更難矣。宜贈以稀痘藥。數服後。令其再詣師驗看。若轉爲紅色。則又宜亟爲之種矣。此外如病後。或現有病。或未及週歲。皆當緩種。必俟其氣血和平。始與之種。除此以往。無不可種之兒也。稀痘藥方附後。

消毒救苦湯

羌活 防風 連翹 生地 酒黃蘗

升麻 麻黃根各五分 川芎 藁本 柴胡

葛根 生黃芩 酒黃芩 蒼朮各二分 細辛

生甘草 白朮 陳皮 紅花 蘇木各一分

當歸身 黃連各三分 吳茱萸半分

共爲粗末。週歲之兒。每用三錢。兩三歲者用五錢。於四立前一日。東流

水煎調製硃砂服。

製硃砂法

用當歸

川芎

升麻

甘草各六兩

東流水六大碗。新砂鍋。桑柴文火煎減半。傾出。濾去渣。用好硃砂四兩。絹包線紮。懸胎離砂鍋底寸許。掛定。將前所濾之湯。陸續入於鍋內。桑柴火緩煮。俟湯將乾。取起研極細末。一歲一分。

下苗後。必以七日。五臟傳遍而後發熱為則。然亦有六日而即熱者。亦有九日十一日而始熱者。此其常也。若發熱於五日以前。此際苗氣尚未傳遍。熱何由作。必因將護不慎。致犯外感內傷。或已染時行之氣。而欲出天花也。與種痘無涉。種師宜豫申明其說焉。若踰十一日不熱。宜更為補種。

附方

柴葛桂枝湯

主表散痘熱。

柴胡

乾葛

桂枝

防風

白芍

甘草

人參

水一盞。加生薑三片。煎七分。溫服。表虛加黃芪。

溫中益氣湯

氣血雙補。疏通隧道。並達四肢。

人參

白朮炒各五分

生黃芪八分 歸身

白茯苓各六分

甘草炙

川芎各四分

白芷

防風各四分

木香

官桂去粗皮各二分

山查肉六分

生薑一片。棗一枚去核。水一大鍾煎四分溫服。

參芪內托散 痘虛發癢或不化膿或為倒靨。

人參 黃芪蜜炙 當歸 川芎

厚朴薑製 防風 桔梗炒 白芷

紫草 官桂去粗皮 木香 甘草各等分

糯米一撮。水煎。色淡白者。去防風紫草白芷。宜多加糯米。一方有芍藥。

十宣散 調氣補血。內托瘡毒。五日後必用之方也。亦治癰疽。

人參 黃芪 當歸各二錢 川芎

防風 桔梗 白芷 炙草

厚朴各一錢 桂心三分

右為細末。每服一錢。或二錢。木香湯調下。

寶表解毒湯

人參 黃芪 當歸 生地

甘草 白芍 柴胡 升麻

片芩酒炒 元參 地骨皮

右入薄荷葉少許。淡竹葉十片。水煎。

保元湯 治痘瘡氣虛瀉陷者。

人參二三錢 甘草錢一 肉桂五分 黃芪二三錢 瀉時時蜜炙

水一鍾半。加糯米一撮。煎服。此藥煎熟。加入乳好酒各半盞。和服更妙。

酌宜用之。頭額不起。加川芎三五分。面上。加升麻三四分。胃腹。加桔梗三四分。

腰膝。加牛膝四分。四肢不起。加桂枝二三分。嘔惡。加丁香三四分。元氣虛寒。

加大附子製七八分。或一錢。

養衛化毒湯

人參 黃芪炙 桂枝 甘草 當歸

右水煎服。

人參敗毒散 治時疫癘疹。

人參 茯苓 枳殼 甘草 川芎

羌活 獨活 前胡 柴胡 桔梗各等分

水一鍾半。薑三片。煎服。

升麻葛根湯 解發痘毒。

升麻 葛根 白芍 甘草各等分

水一鍾。煎七分。溫服。

搜毒煎 解痘疹熱毒熾盛。紫黑乾枯。煩熱便結。純陽等症。

紫草 地骨皮 牛蒡子研 黃芩

木通 連翹 蟬退 芍藥各等分

水一鍾半。煎服。表熱者加柴胡。

四味消毒飲 治痘瘡熱盛。毒氣壅遏。無問前後皆可服。

人參 甘草炙 黃連 牛蒡子各等分

右爲粗末。每服一錢。加薑一片。水一盞。煎四分去滓。溫服不拘時。

鼠粘子湯 治痘稠身熱毒盛。服此以防青乾黑陷。并治癍疹稠密。

牛蒡子 炒研 歸身 黃芪 甘草 炙
柴胡 黃芩 酒炒 連翹 地骨皮

水煎服。熱退則止。

芎歸湯 養營起痘。

當歸 川芎 減半

右爲細末。每服一錢。紅花湯調服。

六物煎 治痘疹血氣不充。隨症加減用之。神效不可盡述。

甘草 炙 當歸 熟地 或用地 川芎 三四分 不宜多

白芍 俱隨宜 加減 人參 或有或無隨虛實用 之氣不虛者不必用

水煎服。如發熱不解。或痘未出之先。宜加柴胡以疎表。或加防風佐之。如見點後。痘不起發。或起而不灌。或灌而漿薄。均宜單用此湯。或加糯米人乳好酒肉桂。以助營氣。如氣虛癢癩不起。加川山甲炒用。如紅紫血熱不起。宜加紫草。或犀角。如脾氣稍滯。宜加陳皮山查。如胃氣虛寒多嘔者。加乾薑炒用。或加丁香。如腹痛兼滯者。加木香陳皮。表虛氣陷不起。或多汗者。加黃芪。氣血俱虛。未起未灌而先癢者。加肉桂白芷。如元氣大虛。寒戰咬牙泄瀉。宜去芍藥。加黃芪。大附子乾薑肉桂。如羌活散鬱湯 治實熱壅盛鬱遏。不得達表。氣壘喘滿。腹脹煩躁。狂言譫

語。睡臥不寧。大小便秘。毛豎面浮。眼張若怒。並有神效。并為風寒外搏。出不快者同治。

防風 羌活 白芷 荊芥

桔梗 地骨皮 川芎 連翹

甘草 紫草 大腹皮 鼠粘子

右為粗末。水一鍾。燈心十四根。煎六分。溫服。

涼血養營煎 治痘瘡血虛血熱。地紅熱渴。或色燥不起。及便結溺赤。凡

陽盛陰虛等症。悉宜用此。

生地 常歸 白芍 生甘草

地骨皮 紫草 黃芩 紅花

水一鍾半。煎服。量兒大小加減用之。渴加天花粉。肌熱無汗。加柴胡。熱

毒盛者。加牛蒡子。木通。連翹之屬。血熱毒不透者。加犀角。

犀角散 治痘瘡癰毒時毒。熱盛煩躁多渴。小便赤澀。或赤癍。

犀角 鎊 甘草 炙各五分 防風 黃芩 各一錢

右為粗末。每服二錢。水一小盞。煎五分。溫服。無時。

紫草快癍湯 治痘疹血氣不足。或血熱不能起發。灌膿。色不紅活。

紫草 人參 白朮 炒 當歸 川芎

白芍 茯苓 甘草 木通 等分

右加糯米。每服三五錢。水煎。

參薑飲 治脾胃氣虛寒。嘔吐咳嗽氣短。小兒吐乳等症。

人參 三五錢 或倍之 甘草 後三 五分 乾薑 炮五分或一二錢 或用煨生薑三五片

水一鍾半煎七八分徐徐服之。

當歸丸 治便堅三五日不通。裏氣實而稟賦強者。

當歸 五錢 紫草 二錢 黃連 一錢五分 分炒 甘草 後一 錢 大黃 二錢 五分

右以當歸紫草熬成膏。下三味研為細末。以膏和為丸。如胡椒大。三歲

以下兒服十九。七八歲兒。二十九。食前清米飲下。漸加之以和為度。

退火丹 治痘中狂妄神方。

滑石 硃砂 飛各 一錢 冰片 三厘

共為細末。冷水調一分服。得睡少時。神安氣寧。痘轉紅活矣。

九味異功煎 治痘瘡寒戰齧牙。倒陷嘔吐泄瀉腹痛。虛寒等症。用代陳

氏十二味異功散等方。

人參 二三 錢 黃芪 後一 二錢 附子 製一 二錢 熟地 二三 錢 甘草 後七 或一錢

當歸 二三 錢 肉桂 一錢 乾薑 炮一 二錢 丁香 或二 或一錢 五分

右量兒大小加減用。水一鍾半煎七分。徐徐與服。泄瀉腹痛。可再加肉

豆蔻 麵炒 一錢 或白朮 一二 錢

十二味異功散 治元氣虛寒。痘瘡色白。寒戰齧牙。泄瀉喘嗽等症。

人參 丁香 木香 肉豆蔻

陳皮 厚朴 各二 五分 白朮 炒 茯苓

官桂

去粗皮 各二錢

當歸

三錢 五分

半夏

製

附子

製各一錢五分

右為粗末。每服一二三錢。薑棗水煎。去渣服。

木香散 治痘瘡虛寒多滯者。

木香

丁香

大腹皮

人參

桂心

甘草

半夏

訶黎勒

赤茯苓

青皮

前胡

各等分

右為粗末。每服二三錢。薑水煎。去渣服。薛立齋先生曰。前方治痘瘡已出未愈之間。其瘡不光澤。不起發。不紅活。五七日內。泄瀉作渴。或肚腹作脹。氣促作喘。或身雖熱而腹脹。足指冷。或驚悸。或汗出。或寒戰。齧牙。或欲醫不醫。瘡不結痂。或醫後腹脹。泄瀉作渴。此皆脾胃虛寒。津液衰少。急用此藥治之。若誤認為實熱。用寒涼之劑。及飲蜜水。生冷瓜果之類。必不救。張景岳先生云。以上二方。溫性有餘。補性不足。用治寒症則可用。治虛症則不及也。

黃芪建中湯 治諸虛羸瘠百病。

甘草

桂枝

生薑

白芍

大棗

膠飴

黃芪

等分

右水煎減半去渣。入膠飴。更上微火消解。溫服。

元參地黃湯 治痘疹衄血。

元參

生地黃

丹皮

梔子仁

甘草

升麻各五分

白芍一錢

蒲黃炒五分

水一鍾。煎七分。溫服。本方宜減去升麻。惡其上升也。加陳墨汁和服。黑色象水。能制火也。

大分清飲。治積熱閉結。小水不利。或溺血畜血。腹痛淋閉等症。

茯苓

澤瀉

木通

豬苓

梔子

枳殼

車前子

水一鍾半。煎八分。食遠溫服。如內熱甚者。加黃芩黃柏龍膽草之屬。如大便堅。鞭脹滿者。加大黃。

調元湯

人參

黃芪炙

甘草炙

右水煎服。按此即保元湯無肉桂者。名爲調元湯。即東垣先生之黃芪湯也。東垣用爲小兒治驚之劑。魏桂巖用以治痘多效。因美之。名調元湯也。蓋小兒元氣未充。最易傷殘。用此保全。誠幼科王道之妙方。但能因此擴充。則凡氣分血分。虛寒虛陷等症。皆可隨症增減。無不可奏神效也。

葛根解毒湯 治痘毒止渴良方。

葛根

升麻減半

生地

麥冬

天花粉等分

甘草減半

右取糯米泔水一盞。煎七分。入茅根自然汁一杯服之。

黃芩湯 治太陽與少陽合病自下發汗。

黃芩 甘草炙 白芍 大棗

右水煎溫服。若嘔者加半夏生薑。按此方係治泄瀉。第此症不多。不可以此方誤治虛寒泄瀉也。宜詳前熱論。

甘桔湯 治一切風熱上壅。咽喉腫痛。

甘草二錢 桔梗一錢

水煎。食後服。喉中有痘。初見點時痛甚者。加牛蒡子。

人參麥門冬散 治痘瘡微渴。

麥門冬一錢 人參 甘草炙 白朮炒

陳皮 厚朴薑製各五分

水煎溫服。量兒增減。薛氏曰。此方治痘瘡熱毒。氣虛宜用之。若因氣虛

作渴。宜人參白朮散。

雙解散 治痘疹表裏俱實者。

防風 川芎 當歸 連翹 白芍

薄荷 大黃各五分 石膏 桔梗 黃芩各八分

荆芥穗 白朮炒 桂枝各二分 滑石二錢四分 甘草二錢

水二鍾。加生薑三片。煎一鍾。溫服無時。

六氣煎 方見辨驚風之誤論

十全大補湯 方見辨驚風之誤論

柴歸飲方見辨驚風之誤論

四物湯方見虛論

六味地黃湯即地黃丸作煎劑方見熱論

六君子湯方見寒論

五君子湯方見寒論

理中湯方見寒論

五味異功散方見熱論

四君子湯方見熱論

人參理中湯即理中湯人參分量加重用方見寒論

四順清涼飲方見寒論

柴胡飲子方見實論

辰砂六一散方見辨驚風之誤論

導赤散方見實論

胃關煎方見寒論

犀角地黃湯方見辨驚風之誤論

治疹論第十二

疹。天行時毒之氣也。亦稟受胎毒之氣也。出於痘前者。名爛疹子。出於痘後者。名正疹子。要亦生人必不能免之數也。初發熱時。咳嗽噴嚏。鼻流清涕。面浮顯赤。兩目胞腫。眼淚汪汪。有如醉狀。或嘔惡。或泄利。或手搯眉目。

鼻面。是卽出疹之候也。然必發熱五七日。或多至十一二日。始見疹子者。宜徐徐升托表邪。俾疹毒出盡。則兒無事矣。切忌妄汗妄下。若妄汗。則增其熱。爲鼻衄。爲咳血。爲口瘡咽痛。爲目赤痛。爲煩躁。爲大小便不通。妄下。則虛其裏。爲滑泄。爲下痢赤白。爲隱伏。爲喘逆。多至不救。慎之慎之。主治之法。輕者。宜升麻葛根湯。透邪煎。柴歸飲之類主之。重者。宜金沸草散主之。兼泄利者。合升麻葛根湯。去葛根。加白芷主之。若發熱至六七日。明是疹子。却不見出。此皮膚堅厚。腠理閉密。又或爲風寒外襲。或會有吐利。乃伏也。宜急用麻黃湯。調檉葉散發之。外用胡荽酒。蘸蘸戛之。如一向未更衣者。此毒甚於裏也。以七物升麻丸解之。若咳嗽不止。上氣喘急。面浮目胞腫者。宜甘桔湯。消毒散。瀉白散。三方合用。若更兼熱盛煩渴。加石膏知母黃芩天花粉之類主之。若自汗出。或鼻衄者。不須止之。但不可太過。如汗太多。人參白虎湯。或黃連湯之類主之。若衄太多。元參地黃湯。或茅花湯之類主之。若吐甚者。黃芩湯。加茅根蘆根枇杷葉主之。若利甚者。黃芩湯。吞香連丸主之。若咽喉腫痛者。甘桔湯。加元參牛蒡連翹。或射干鼠粘子湯之類主之。既見疹後。色貴通紅。必以三日週身普遍。而漸沒者爲輕。若色淡白者。此心血不足也。養血化癍湯主之。若色太殷紅。或微紫者。此血分有熱也。大青湯主之。疹收之後。清涕復來。始爲正候。若疹既收後。身有微熱。不須施治。若身熱太甚。或日久不減者。柴胡麥門冬散主之。若髮枯毛豎。肉消骨立。漸見羸瘦者。柴胡四物湯主之。若疹後發熱不除。忽作

搔者，導赤散加入參麥門冬，兼安神丸主之。若疹後咳嗽者，瀉白散合消
毒散主之。若咳甚氣喘，甚至飲食湯水俱噎出者，門冬清肺湯。加枇杷葉。
見血，加茅根汁。阿膠珠主之。若疹後下痢赤白，裏急後重，日夜無度者，黃
芩湯兼香連丸主之。虛者，加入參、滑者，加椿根白皮。俱於丸藥內加之。大
抵疹屬陽邪，用藥最宜養陰。然亦有屬虛寒者，但當合色脈形證以治之。
始無貽誤。若果熱甚氣壘，渴而飲冷，便秘溺澀，脈象洪數，即宜用歸芍養陰，略
加法治之。若神氣怠惰，渴而飲湯，二便調和，脈象虛數，即宜用歸芍養陰。略
加表托之品，矧瀉痢氣喘，尤多虛症乎？斷不可泥為疹毒，而不敢用補劑
也。慎之慎之。

附方

透邪煎 凡麻疹初熱未出之時，惟恐誤藥，故云未出之先，不宜用藥。然
解利得宜，則毒必易散，而勢自輕減，欲求妥當，當先用此方為主。

當歸 二三錢

白芍 酒炒一錢

防風 七分

荆芥 一錢

甘草 分

升麻 三分

水一鍾半，煎服。如熱甚脈洪滑者，加柴胡一錢。此外凡有雜症，俱可隨
宜加減。

加味金沸草散

旋覆花 去梗

麻黃 去節水煮

前胡 去蘆各七錢

荆芥穗 一兩

甘草 分

半夏 湯泡七次

赤芍 各五分

鼠粘子 炒

浮萍 各七錢

右為末。每服三錢。生薑二片。薄荷葉三五片。煎。

麻黃湯

麻黃 去根節水煮
去沫曬乾

升麻

牛蒡子 炒

蟬退 洗淨去翅足 甘草 各一錢

右加臘茶葉一錢。為細末。每服二三錢。水一盞。煎七分。去渣服。煩渴加

石膏末四錢。

檉葉散

檉。亦名西河柳。亦名垂絲柳。青茂時。採葉曬乾。為末。每服一二錢。茅根

煎湯調下。

胡荽酒 辟穢氣。使痘疹出快。

胡荽 一把 好酒 二盞

右煎一兩沸。令乳母每含一兩口。噴兒遍身。或噴頭面。房中須燒胡荽

香。以辟除穢氣。能使痘疹出快。煎過胡荽懸房門上。更妙。按此酒惟未

出之前。及初報之時。宜用之。若起脹之後。則宜避酒氣。亦忌發散。皆不

可用也。

七物升麻丸

升麻 犀角 黃芩 朴硝

梔子仁 大黃 各二兩 淡豉 二升 微炒

右共為末。蜜丸如黍米大。凡覺四肢大熱。大便秘者。少服十餘粒。取微

利爲止

消毒散 治痘瘡六七日間。身壯熱不大便。其脈緊盛者。用此藥微利之。

荆芥穗

甘草 各一兩

牛蒡子 四兩 杵炒

右共爲粗散。每用二三錢。水一盞煎七分服。

人參白虎湯

人參

甘草 各一錢

知母 三錢

石膏 五錢

粳米 一合

右量兒大小。水煎待米熟。去渣溫服。

黃連湯

黃連

麥冬 去心

當歸

黃蘗

黃芩

生地

黃芪

右分量隨宜。水煎去渣。調敗蒲扇灰服之。

茅花湯

茅花

眞鬱金

生地黃

梔子仁

黃芩

右水煎。調百草霜服。

香連丸 治熱瀉痢疾。赤白膿血。濕熱侵脾。裏急後重。

黃連

淨十兩切 如豆大 吳茱萸 淨五兩

右二味。用熱水拌和一處。入磁罐內。置熱湯中。頓一日。取起同炒。至黃

連紫黃色爲度。去茱萸不用。每製淨黃連一兩。加木香二錢五分。共爲

細末。醋糊丸。桐子大。每服一二十粒。量大小增減。空心米飲下。

射干鼠粘子湯 治痘疹後癰疽瘡毒。

鼠粘子二錢 升麻 甘草 射干各五分

右剉散。水一盞。煎六分。量大小服。忌魚腥葱蒜。

養血化痰湯

當歸 生地黃 紅花 蟬退 人參各等分

右剉細。水一盞。生薑一片。煎六分去渣。溫服無時。

大青湯

大青 元參 生地黃 石膏 知母

木通 甘草 地骨皮 荆芥穗各等分

右剉細。水一盞。淡竹葉十二片。煎七分去渣。量大小溫服。

柴胡麥門冬散

柴胡五分 龍膽草三分 麥門冬八分 甘草二分

人參各五分 元參各五分

右剉細。水煎服。

柴胡四物湯

柴胡 人參 當歸身 黃芩

川芎 生地黃 白芍 地骨皮

知母 麥門冬 淡竹葉

右剉細。水一盞。煎七分去渣。量大小溫服。

安神丸

黃連

當歸身

麥門冬

白茯苓

甘草各五錢

硃砂一兩

龍腦二分半

右爲極細末。湯浸蒸餅。和獾豬心血搗勻。丸和黍米大。每服十九丸。燈心湯下。

門冬清肺湯

天門冬去心

麥門冬去心

知母

貝母

桔梗

款冬花

甘草

牛蒡子

杏仁去皮尖研

馬兜鈴

桑白皮

地骨皮各等分

右剉細水一盞。煎七分。去渣。量大小食後溫服。

升麻葛根湯方見痘論

柴歸飲方見辨驚風之誤論

甘桔湯方見痘論

瀉白散方見熱論

元參地黃湯方見痘論

黃芩湯方見痘論

導赤散方見實論

刻麻疹闡註序

張子霞谿先生諱廉。字通源。爲我邑名貢士。天資高邁而性耽經史。旁及藝術。屢不得志於名場。因以素所蘊蓄者筆於書。大抵有關於世道人心。而麻疹闡註。則先生之緒餘而經效於世者也。夫麻疹莫醇於金鑑。趙氏既集爲彙補。而謝氏又有七十二症之書。則金鑑之闡註。似可不作。顧乃以簡約煩瑣變易之故。而必疏解而融貫之。并先示以讀書之法。先生蓋有深意焉。鄉里鰥生。以醫師自命。凡疾病之臨門者。無論症之平險。每不肯以不知辭。而平日於岐黃家言。或未盡見。卽見之而簡約者不能擴充。煩瑣者不能審擇。變易者不能條貫。則仍卽其平生耳食之謬說。鹵莽滅裂而治之。而民命遂等于草芥。闡註之作。所以教人讀醫書。固不第爲麻科者言也。而麻科之精且詳。卒非他書所能及。顧是書向無硬板。腳子非葦先生會爲校訂。擬刻不果。往歲春夏。麻症多危。其姪孫蕙坡在越。以霞谿先生族姪。輯園語及途從家郵致。與其尊甫紫庭叔耶谿從弟重臯分參而登諸梨棗。囑予一言以誌其巔末云。

道光二十有八年歲次戊申孟夏之月後學煦齋徐漸達書于蠡城試寓

麻疹闡註敘

張子。諸暨老宿也。博通經史。工舉業。善古文詞。一時經其口授指畫者。皆

有名於時。掇巍科而去者。歲有之。所著書積高至三四尺許。皆明理學。辨是非。論治亂。有關身心性命天下國家之言。旁及藝術小數。無不曲通其旨。浦陽戴太史東珊先生。題其孝感里志。曰。非張子之積學有素。精心果力。其孰能是。趙子耀緒題其章氏季漢書評曰。張子惟熟於庸常。郝經謝少連之書。故知章氏之書爲獨善。然非有才學識三長。雖熟於三子之書。不能知其善。何能言其所以善。朱子得章氏而其義益彰。章氏得張子而其意始顯。趙子思恭題其春秋說曰。六通四闢之論。如萬斛源泉。自天而下。飛沫濺衣。令人不敢逼視。文十年次於厥貉以後。多右楚左晉。是先生獨具手眼處。孝廉蔣子錦川題其文集曰。張子學宗新建。文學老蘇。皆能升堂而入其室。故其所言多可爲世用。是數子皆知張子之深者。世人謂張子不幸而窮。故著書。不知不窮不足以著書。張子之不幸。後人之幸也。近年吾暨麻疹大劇。諸醫束手。謝不治者。問之張子。應手而愈。人咸神之。請其祕方。張子曰。方無祕。方有祕。方之所以窮也。出其闡註御定醫宗金鑑麻疹。授之曰。讀其書。得其意。忘其言。庶幾有豸乎。人珍爲拱璧。恐積久殘毀不傳。卽傳鈔錄不廣。爲惠有限。以余頗明岐黃。又爲張子老友。矚言其本末。付梓以公諸世。余覽之廢卷而嘆曰。此張子之緒餘也。烏足珍。雖然。緒餘驗則其諸書之足爲世用也。益信。張子謂誰。水霞廉通源霞溪也。

道光二年十月

同學弟壽椿懷玉書

麻疹闡註自敘

麻疹一科。古無專書。惟於痘症後略見之。痘重而麻輕也。近數十年。麻多劇症。較重於痘。於是有心濟世者。各著書以傳之。然猶少刊本。往往私相傳抄。矜爲祕方。其實瑕瑜不掩。醇駁雜出。甚至有以蜈蚣全蟲五虎散治麻疹。誇爲神方。筆之於書。而互相傳授者。是可哀也。余所見麻科。自萬氏而後。以謝氏七十二症。趙氏麻瘡彙補。最爲平穩。然謝氏未免煩瑣。愈煩瑣則愈掛漏。蓋言其常。風痰食火四者可該。窮其變。則千變萬化。非七十二症所能盡也。趙氏彙補。悉本御定醫宗金鑑。故較謝氏尤醇。但變易其方藥詞句。使若不出於金鑑者。以神爲心得。又條款倒置。線索不清。未爲善本。總不若金鑑之醇而又醇也。但金鑑言簡而該。非得其言外之意。必疑其略而不詳。余所闡發。未必得其奧旨。然悉本前賢。未敢杜撰。而所採之說。趙氏尤多。不註姓名者。以便文勢耳。非敢掠美也。歲在旃蒙大淵獻月。惟臯諸暨張廉敘。

御定醫宗金鑑麻疹

讀書之法。當逐字讀。逐句讀。逐節讀。復舉全篇融會貫通而讀。斯能得其言外之意。而爲善讀書者矣。醫門之書。如我朝御定醫宗金鑑。言簡而意該。義近而旨遠。非易讀也。卽其麻疹一科。凡言某方主之者。言主之必有

輔之者矣。所謂逐字讀也。於見形條云。有不透徹。須察所因。言因則因之者廣。不可枚舉。因之者粹。不可預揣。故下第列因風。因火。因虛。可知之。三項。以見舉一反三之意。所謂逐句讀也。於收沒條。言當散不散。內有虛熱。不可純用寒涼之劑。以柴胡四物湯治之。於身熱不退條。言麻既出透。身仍大熱。此毒盛壅遏。宜化毒清表湯治之。疹已沒落而身熱者。此餘熱留於肌表。宜柴胡清熱飲治之。何言之相反。乃爾。蓋分觀則偏。合觀則全。所謂逐節讀也。詳於正症。略於變症。正症可言。變症不勝言也。詳於麻前。略於麻後。麻前得法。麻後自無患也。祇言實症。不言虛症。麻爲陽毒。絕少虛症。麻後之虛。不言可知也。所謂統舉全篇。融會貫通而讀也。故於主治條曰。此首尾主治之大法。至於臨時權變。惟神而明之而已。富哉言乎。一篇微旨。已揭於此。讀是書者。當無不領略而會悟之。而余復爲之闡發者。爲淺學通其旨也。然而高明之家。已竊笑其蛇足矣。乙亥仲夏。霞溪張廉書於白磴湖旂山之指川書塾。

麻疹闡註目錄

卷一

疹原	一
輕重	一
麻疹主治大法	三
麻疹未出證治	三
麻疹見形證治	五
麻疹收沒證治	九
卷二	
身熱不退	三
煩渴	三
譫妄	四
喘急	四
欬嗽	六
喉痛	七
失音	七
牙疳	〇
嘔吐	五
瀉泄	六
痢疾	六

腹痛.....二八

衄血.....二九

瘙疹.....三二

蓋痘疹.....三二

癩疹.....三二

卷三

麻後龜胸.....三五

麻後肺痿肺癰.....三五

麻後疳瘵.....三七

麻後發搐.....三八

麻後急慢驚風.....三八

麻後眼病.....三九

麻後脫肛.....四一

麻疹達權.....四二

卷四

謝心陽瘡子家傳.....四五

辨瘡訣.....四六

致五液法.....四六

瘡子初發表主方.....四六

瘡子消後方.....四八

麻疹闡註卷一

諸暨張霞谿闡註 杭州徐志源校訂

疹原

疹非一類。有癢疹。癰疹。溫疹。蓋痘疹皆非正疹也。惟麻疹則爲正疹。亦胎元之毒。伏於六腑。感天地邪陽火旺之氣。自肺脾而出。故多咳嗽噴嚏。鼻流清涕。眼淚汪汪。兩胞浮腫。身熱二三日。或四五日。始見點於皮膚之上。形如麻粒。色若桃花。間有類於痘大者。此麻疹初發之狀也。形尖疎稀。漸次稠密。有顆粒而無根暈。微起泛而不生漿。此麻疹見形之後。大異於痘也。須留神調治。始終不可一毫疎忽。較之於痘雖稍輕。而變化之速。則在頃刻也。

廉按身熱一二日。疹點一齊湧出者重。三四日出者輕。五日後出者重。至六七日隱隱皮膚之間而不見點者尤重。

輕重

麻症出時。有輕重之分。臨時須要詳察。若氣血平和。素無他病者。雖感時氣。而正能制邪。故發熱和緩。微微汗出。神氣清爽。二便調勻。見點則透徹。散沒不疾不徐。爲輕而易治者也。若素有風寒食滯。表裏交雜。一觸邪陽火旺之氣。內外合發。而正不能制邪。必大熱無汗。煩躁口渴。神氣不清。便閉尿澀。見點不能透徹。收散或太緊速。則爲重而難治者也。

麻按風甚者。宜疎風爲主。寒鬱者。宜用麻黃。食滯者。宜用消導。痰甚者。宜化痰。火盛者。宜清火。無汗。風寒閉也。煩躁。毒閉於內。發不出也。口渴。火盛也。便閉。大腸火鬱而兼食滯也。尿澀。膀胱與心火相煽也。喘急。毒鬱於肺而兼痰壅也。神氣不清。毒盛也。又疹脈。以浮大滑數。有神者爲吉。細軟微弱無神者爲凶。尤以肺脾脈洪大有神。雖有別症。亦不爲害。若細軟無神。則陽症得陰脈矣。脈症不相合。恐有變卦。必先察其虛實。庶乎無誤。至於收完熱退。雖細軟微弱無害也。形色。桃紅潤澤者輕。其毒輕微也。深紅者重。火毒盛也。紫黑灰黯隱伏不明者重極。火毒伏於臟也。陽部多者輕。陰部多者重。頭爲諸陽之首。面爲陽中之陽。背爲太陽。四肢外向爲陽。胸爲陰中之陰。四肢內向爲陰。腰亦爲陰。陽部多而陰部少者順。陰部多而陽部少者逆。必有後患。二部俱少。火毒輕。二部俱多。火毒重。頭面胸腹手足不出。惟背上有紅塊者不治。熱極。喘促。胷高。肩脅。狂言。衄血。搦手。搖頭。尋衣。摸牀。噦惡。便閉。口出屍氣者不治。黑暗乾枯如灰煤者不治。鼻煽。口張。眼胞陷。目無神者不治。痰聲在喉內。氣喘。胸高者不治。鼻面俱青。糞色青黑如爛魚腸者不治。瘡後牙疳臭爛。齒落無血者不治。兩頰浮腫。環口青黑。頰漏。齒脫。唇崩。鼻壞者不治。口如魚嘴。氣急作鴉聲者不治。瘡後大便不通。氣喘。皮肉漸烏者不治。瘡後餘熱內攻。謔言妄語。神昏喪志者不治。瘡後陰虛血燥。疔癆肉脫者不治。

麻疹主治大法

凡麻疹出貴透徹。宜先用表發。使毒盡達于肌表。若過用寒涼。冰伏毒熱。則必不能出透。多致毒氣內攻。喘悶而斃。至若已出透者。又當用清利之品。使內無餘熱。以免疹後諸證。且麻疹屬陽。熱甚則陰分受傷。血爲所耗。故沒後須以養血爲主。可保萬全。此首尾治疹之大法。至於臨時權變。惟神而明之而已。

廉按主治大法。以表發清利養血三項該之。此真的確不磨之論。仲景復起。不能易斯言也。誠能依此用藥。何有危症。然此其大法也。表發固忌清利。亦有火閉而宜兼用清涼者。食閉而宜兼用消導者。痰閉而宜兼用化痰者。沒後固宜養血。亦有匿表而宜兼用疎散者。火鬱而宜兼用清涼者。食積而宜兼用消導者。痰壅而宜兼用化痰者。且有元氣本虛。初發而即宜兼補氣血。沒後而即用溫補者。亦有初發而兼補氣血。沒後而反用清涼者。麻疹千變萬化。醫者亦當以千變萬化應之。初非謝氏七十二症所能盡也。故又曰臨時權變。惟神而明之而已。旨哉言乎。此在讀其書者。明其意而推廣之耳。

麻疹未出證治

麻疹一證。非熱不出。故欲出時。身先熱也。表裏無邪者。熱必和緩。毒氣鬆動。則易出而易透。若兼風寒食熱諸證。其熱必壯盛。毒氣鬱閉。則難出而難透。治以宣毒發表湯。其間或有交雜之症。亦照本方隨證加減治之。

宣毒發表湯 治麻疹將出未出。

升麻 葛根 前胡 桔梗 枳殼

荆芥 防風 薄荷 木通 連翹

粘子 淡竹葉 甘草

引加芫荽。水煎服。感寒邪者加麻黃。夏月勿用。食滯加南山查。內熱加黃芩。氣急去升麻。加蘇葉葱白。甚者并去桔梗。孕婦依前法。再去木通。

廉按風閉者。面色微青。舌胎微白。灑淅惡寒。毛竅豎起。鼻塞氣粗。喘悶不寧。甚至角弓反張。手足拘攣。眼白足冷。大便清利。重用荆芥。防風。薄荷。升麻。粉葛。前胡。桔梗。杏仁。蟬退。葱白。以發之。冬月用麻黃。火閉者。面紅目赤。肌膚焦熱。舌燥唇裂。大便或閉或瀉。甚至氣喘狂叫。神昏錯語。揚手擲足。喜就冷處。宜於表藥中重用石羔。黃芩。知母。或犀角。川連。梔子。等藥。重甚者加大黃。食閉者。面色微黃。四肢倦怠。吞酸噎腐。身熱口燥。舌上黃白厚胎。胸膈痞滿。甚至肚腹堅實。昏睡氣急。大便不通。宜于表散藥中用枳殼。厚朴。山查。麥芽。以消其食。藟子。大黃。以通其閉。若食火衝心。時發譫語。四肢厥冷。名爲食厥。急用芩。連。石羔。藟仁。大黃。仍佐以發散之藥。又有痰閉者。滿口痰涎。喉間有聲。氣急發喘。咯痰不出。宜重用桔梗。杏仁。桑皮。膽星。藟仁。白芥子。竹瀝等藥。仍佐以疎散之劑。以上四症。已甚者俱謂悶瘖。宜審其所重。

而用藥。或四症俱全。宜用三黃石羔湯。再加風藥。痰藥。消食藥。又悶痞多痰喘。一法用明亮雄黃。盛以竹筒。于飯中蒸七次爲末。酒漿調服。痰喘卽止。悶痞之症。有熱六七日而不出者。有一出而卽隱者。有頭面微出而身上俱無者。有身上微影而頭面胸背俱無者。有影跡在內而外不見形者。有皮膚隱隱紫赤者。有紅紫遍身紫黑成塊者。此皆九死一生之症。然能審其受病之的。而大劑治之。亦可挽救。切勿棄而不治也。凡遇悶痞。分其頂心細看。有紅筋紅癩。挑破卽出。或頭面手足有瘡疔。用銀針挑破方出。或頂心中有髮。比衆髮更粗。其色黃赤者。拔去髮根。見血卽出。又曰有交雜之症。宜隨症加減治之。固不止此四症已也。學者當推廣之。

三黃石羔湯 治風寒毒熱鬱滯悶症。

麻黃

石膏

淡竹葉

黃柏

黃連

梔子

黃芩

麻疹見形證治

麻疹見形。貴乎透徹。出後細密紅潤。則爲佳美。有不透徹者。須察所因。如風寒閉塞。必有身熱無汗。頭痛。嘔惡。疹色淡紅而黯之證。宜用升麻葛根湯。加蘇葉。川芎。牛蒡子。因毒熱壅滯者。必面赤身熱。謔語煩渴。疹色赤紫滯黯。宜用三黃石羔湯。又有正氣虛弱。不能送毒外出者。必面色皸白。身微熱。精神倦怠。疹色白而不紅。以人參敗毒散主之。

升麻葛根湯 治風寒閉塞

升麻 粉葛 甘草

三黃石羔湯 治毒熱壅滯

麻黃 石羔 淡豆豉 黃柏

黃連 梔子 黃芩

人參敗毒散 治氣虛白麻

人參 川芎 羌活 獨活 前胡

枳殼 桔梗 柴胡 甘草 赤苓

引用生薑

廉按此亦大略也。云有不透徹者。須察所因。則所因者廣。不可枚舉。下列三項。亦舉一反三之意。如食重。則宜消食。痰重。則宜化痰之類。觸類而旁通之。斯為善讀書者矣。或因身體手足厥冷而不透。經曰。厥深熱亦深。厥微熱亦微。此乃陽氣鬱遏。熱極反寒之象。宜重用升葛。荆防。甘桔。粘子。蟬退之類。甚者加麻杏石甘湯。便閉。加荀子。大黃。使上升下洩。鬱熱達外。自然出透。或因咬牙而不透。咬牙者。胃火盛也。宜用石羔。或因呃逆而不透。呃逆者。火毒上攻也。疹未出透。於升陽透發中。重加石羔。一二三兩以救之。疹已出透。或白虎湯涼膈散。隨症加減治之。疹後氣虛而呃逆者。用人參。扁豆。柿蒂。薑棗之類。或因沉睡而不透。沉睡者。火鬱於內。未得發揚於外也。宜用升陽散火。

之劑。余治一姪孫。年未滿週。一見形而卽隱。既隱而沉睡。重用升。葛荆。防前胡。桔梗。杏仁。粘子。蟬退。胡荽。角針。以表之。麻疹略現而又隱。沉睡如故。次日加黃芩。石羔。知母。枳殼。山查。服之。亦略現而又隱。隱而變黑。三日服原方如故。至第四日。用三黃石羔湯。一瀉而汗出。神氣清爽。麻終不見而愈。蓋毒從瀉出。不必復現也。疹後沉睡多屬虛。或因吐蛔解蛔而不透。吐蛔解蛔者。熱毒壅迫而出也。胃熱則吐蛔。腸熱則解蛔。此熱極之症。解者稍輕。吐者尤重。疹未出而吐蛔者。宜於升葛。荆防散中。重用石羔。及梔子。史君子。蘆根之類。疹已透而吐蛔者。宜用白虎湯。加連芩等藥。便閉用大黃。又有麻後胃中空虛。聞飲食香氣上行而嘔出者。宜用山藥。扁豆。茯苓。廣皮。史君子。半夏。麩薑炒黃連之類。凡吐蛔不可用甘草及甜物。余見一人年方八九歲。疹未見點。隱隱在皮膚之間。一日吐蛔十一條。一醫治之。用升。葛。荆。防。前胡。桔梗。杏仁。粘子。石羔。四錢。知母一錢。服之如故。此由方是而分兩太輕。杯水不能救車薪之火也。一醫於表藥中用肉桂三分。其疹一湧而出。數日而死。可不痛哉。或因夾斑而不透。發斑者。胃熱也。疹色稀而紅綻。斑則大而乾塌。色赤如錦紋。宜石羔。托裏清熱。紫黑者熱極也。宜升麻白虎湯。化斑解毒湯。兼以表發之藥。青藍者胃爛也。十不一生。余三弟染疫發藍斑。治以十四味延中湯而愈。此亦萬死一生之症。若在麻疹。原由陽毒逼致胃爛。恐難用此。余所見麻疹

發青藍斑者。惟馬舒之女。有大如錢者。如圍棋子者。滿身青藍而腫。此亦不救。有疹出已透。而根地顆粒。混成一塊。形色紅紫者。用白虎湯之類。有疹出時。遍身凹限而黑者。內有伏毒。外有風邪。內服犀角地黃湯加減。外以羊鬚荳煎湯。時時洗之。紅荳亦可。須要避風為主。又白麻有血虛而色白者。宜於疎散中加當歸。赤芍。丹皮。紅花。等藥。有見點三四日而轉紅者。有不紅而漸次收沒者。有沒後而翻出火症者。隨症治之可也。切勿拘於初為白麻。而作虛熱論。

麻杏石甘湯 治風熱厥冷。

麻黃蜜炙

杏仁

石羔

甘草

白虎湯 治咬牙呃逆。

石羔

知母

甘草

加粳米數十粒

涼膈散 治呃逆。

梔子

連翹

黃芩

薄荷

桔梗

甘草

淡竹葉

本方加大黃。名加減涼膈散。加黃連。黃柏。大黃。芒硝。名涼膈散。合解毒湯。

三黃石羔湯 見第六頁。

升麻白虎湯 治斑。

石膏

知母

甘草

升麻

化斑解毒湯

治斑

石膏

升麻

知母

粘子

甘草

元參

淡竹葉

大便閉加大黃

麻疹收沒證治

麻疹見形三日之後。當漸次沒落。不疾不徐。始為無病。若一二日疹即收沒。此為太速。因調攝不謹。或為風寒所襲。或為邪穢所觸。以致毒反內攻。輕則煩渴譫狂。重則神昏悶亂。急宜內服荆防解毒湯。外用胡荽酒薰其衣被。使疹透出。方保無虞。當散不散者。內有虛熱留滯於肌表也。其證潮熱。煩渴。口燥。咽乾。切不可純用寒涼之劑。以柴胡四物湯治之。使血分和暢。餘熱悉除。疹即沒矣。

荆防解毒湯

治麻毒內攻

薄荷

連翹

荆芥

防風

黃芩

黃連

粘子

大青葉

犀角

人中黃

引用燈心蘆根水煎服

柴胡四物湯

治虛熱留滯當沒不沒

白芍

當歸

川芎

生地

人參

柴胡

淡竹葉

地骨皮

知母

黃芩

麥冬

引加生薑紅棗。

廉按荆防解毒湯治麻毒內攻。此誠萬金良方。余用之屢試屢效。從此可悟其未言者矣。如冬月風寒甚而內隱者。可再加麻黃杏仁。或竟用三拗湯。加粘子。蟬退。荆防等藥。或因傷食而內伏者。可於荆防解毒湯內。加枳殼。菖子。神麩等藥。或遍身青紫熱腫。腹脹喘促。溺瀝臍凸者。此毒滯血凝。半匿肌表。急投涼膈散。加麻黃石膏。亭歷子。大黃。庶或可救。若內夾痰熱。火毒亢極。伏匿煩躁。或腹脹喘急。不省人事者。白虎湯加元參。淡竹葉。此二說本於醫通。余意後說夾痰者。宜加杏仁。膽星。腹脹者。宜加枳殼。大黃。并不可離荆芥。前胡。斟酌用之可也。云當散不散。內有虛熱。留滯於肌表。不可純用寒涼之劑。此亦經常之大法。言不可純用寒涼。則有宜寒涼者矣。張玉璐曰。西北水土剛勁。稟質亦厚。麻必五七日乃收。東南風氣柔弱。麻出不過二三日。卽化。邇來地運變遷。未有不綿延數日者。當非難沒之比。此說是也。又麻疹難沒。多屬於熱。亦有表裏未淨而遷延五七日不沒者。風則表之。食則消之。下之。痰則化之。火則涼之。毒則解之。又宜兼用鮮生地。丹皮等藥。涼血養血以顧其本耳。又張玉璐曰。麻見點三四日後。點燥色白。隱隱於肌肉而難沒者。此必衛氣素弱。不能煖發。或衣被單薄。身貪涼快。阻其發越之機。以致綿延多日。法當辛散透達。不

可據用寒涼。蔽塞開洩之路也。

三拗湯

治風寒外襲。麻毒內攻。

麻黃

石膏

杏仁

涼膈散 見第八頁。

麻疹闡註卷二

諸暨張霞谿闡註 杭州徐志源校訂

身熱不退

麻疹非熱不出。若既出透。其熱當減。倘仍大熱者。此毒盛壅遏也。宜用化毒清表湯治之。疹已沒落而身熱者。此餘熱留於肌表也。宜柴胡清熱飲治之。

化毒清表湯 治麻既出透而身猶大熱者。

粉葛

薄荷

地骨皮

粘子炒研

連翹去心

防風

黃芩

黃連

元參

知母

木通

甘草

桔梗

加燈心

柴胡清熱飲 治沒後身熱。

柴胡

黃芩

赤芍

生地

麥冬

地骨皮

知母

甘草

加燈心

廉按此亦言其大略也。身熱而兼他症者。宜隨症加減治之。合下並看自見。且益見前收沒條所云當散不散為虛熱之止言常法也。然而此條亦當合前條觀之。倘有虛症。不至過於寒涼矣。

煩渴

凡出麻疹煩渴者。乃毒熱壅盛也。蓋心為熱擾則煩。胃為熱鬱則渴。當未

出時宜升麻葛根湯加麥冬花粉已出者宜白虎湯沒後煩渴者用竹葉石膏湯。

升麻葛根湯 見第六頁。

白虎湯 見第八頁。

竹葉石膏湯

人參

麥冬

石膏

知母

淡竹葉

甘草

廉按煩渴而兼他症當隨症加減治之。或他症重於煩渴當以他症為主煩渴為兼。此當統前後而觀也。亦有火毒內蘊而不煩渴者。

譫妄

譫妄一證乃毒火太盛熱昏心神而然也。疹未出而譫妄者宜三黃石膏湯主之。疹已出而譫妄者黃連解毒湯主之。

三黃石膏湯 見第五頁。

黃連解毒湯

黃連

黃芩

黃柏

梔子炒

加燈心

廉按云主之者必有輔之者也。病至譫妄必不止譫妄一疹矣。如風寒痰食以及諸變症各宜隨症用藥輔之。故金鑑下一字宜細細揣摩。不同他書之一條止一事。所謂言簡而該也。

喘急

喘爲惡候。麻疹尤忌之。如初出未透。無汗喘急者。此表實拂鬱其毒也。宜用麻杏石甘湯發之。疹已出。胸滿喘急。此毒氣內攻。肺金受尅。宜用清氣化毒飲清之。若遲延失治。以致肺葉焦枯。則難救矣。

麻杏石甘湯 見第八頁。

清氣化毒飲

前胡

桔梗

括蕞仁

連翹去心

桑皮

杏仁

黃芩

黃連

元參

甘草

麥冬

重用蘆根

廉按此二方。余屢用之而屢效。誠萬金良方也。然前云臨時權變。神而明之。此語直貫全部。讀是書者。疑其太簡。由不能融會貫通耳。如此二方。誠爲治喘之良方。然人各異症。症各異治。風火痰食。自宜隨症加減。余治出未透而喘急者。於麻杏石甘湯內加荊防。桔梗。桑皮。粘子。知母。亭歷子等藥。治已透而喘急。及隱伏而喘急者。於清氣化毒湯內加石膏。枳殼。膽星。大黃等藥。皆應手而效。故麻瘖彙補云。風痰食火四者。皆能氣喘。治宜祛風化痰消食清火是也。但不宜用蘇合香丸。抱龍。牛黃等丸。亦不可純用降氣之藥。初發而喘者。三拗湯加淡竹葉。石膏。已出而喘。鼻乾口燥者。用白虎湯加疎表藥。或羚羊瀉白散。便閉者。加前胡。蕞仁。杏仁。大黃。粘子。西河柳。火喘。羚羊。蕞仁。石膏。最妙。花粉。海石。次之。此亦脫胎於金鑑二方。但少爲加減耳。故

備載之。以供採用。至於麻後喘急。有虛實之分。樓全善曰。喘而有汗。須扶正氣。喘而無汗。須散邪火。虛者氣乏。身涼。冷痰如冰。實者氣壯。胸滿。身熱。便閉。麻瘡彙補曰。虛者宜用補肺化痰之藥。如人參。阿膠。熟地。蛤蚧。核桃肉。納氣歸元。實者宜用白虎湯。減羚羊瀉白散。加減治之。活人書曰。時醫每見喘急。不將麻毒外出。發表清火。而徒用蘇子。順氣等藥。不反耗其血氣。而致變。曰有瘡毒痰喘甚者。宜用瓜蒌仁。桔梗。花粉。海石。金沸草等藥。消痰清火。如痰逆壅盛者。可用牛黃珍珠散。氣虛者。加入人參。立應。樓全善曰。鼻孔掀開。黑如烟煤。或鼻尖連人中。生瘡枯焦。或鼻乾胸高者。皆肺絕也。急則三日。緩則十二日。死於丙丁日。火尅金也。至於髮直如麻。頭汗如油。鼻煽如爐。腹脹如鼓。面青唇黑者。死更速。

三拗湯 見第十一頁。

羚羊瀉白散

生桑皮

地骨皮

甘草

羚羊角

珠黃散

珍珠

牛黃

等分爲末。燈心湯沖服。

欬嗽

麻疹發自脾肺。故多欬嗽。若欬嗽太甚者。當分初沒治之。初起欬嗽。此爲

風邪所鬱。以升麻葛根湯加前胡桔梗蘇葉杏仁治之。已出效嗽。乃肺爲

火灼。以清金寧嗽湯主之。
廉按云治之。不必加減也。云主之。當隨症加減也。

升麻葛根湯 見第六頁。

清金寧嗽湯

橘紅

前胡

甘草

杏仁

桑皮

川連

萸仁

桔梗

浙貝

喉痛

疹毒熱盛。上攻咽喉。輕則腫痛。甚則湯水難下。最爲可慮。表邪鬱遏。疹毒不能發舒於外。致咽喉作痛者。元參升麻湯主之。裏熱壅盛。或疹已發於外。而咽喉作痛。以涼膈消毒飲主之。元參升麻湯 治表鬱喉痛。

荆芥

防風

升麻

粘子

元參

甘草

涼膈消毒飲

荆芥

防風

連翹

薄荷

黃芩

梔子生

甘草

粘子

芒硝

大黃生

加燈心

失音

失音者。乃熱毒閉塞肺竅而然也。疹初失音者。元參升麻湯主之。疹已發而失音者。加減涼膈散主之。疹沒後聲啞者。兒茶散主之。

元參升麻湯 見上頁喉痛。

加減涼膈散

薄荷

梔子生

元參

連翹

甘草

桔梗

麥冬

粘子

黃芩

兒茶散

硼砂二錢

孩兒茶五錢

共爲細末。涼水一盞調藥一匙服之。

廉按喉痛。可於元參升麻湯內再加射干。山荳根。其餘隨症加減。疹後失音而至不能出聲者。名瘧瘡。多不治。宜用甘桔。元參。粘子。蟬退。射干。黃芩。花粉。杏仁。荀子。沙參。麥冬。川貝。竹肉。山荳根之類。或以竹瀝入匙。薑汁二匙沖服。再用丹參。扶神。石菖蒲。麥冬。花粉。桔梗。陳皮。甘草。訶子肉之類。痰盛加川連。薑仁。羚羊。或牛黃散吹入。終不開聲者。不救。若但聲音低微不清。與此不同。養陰潤肺自愈。又有其聲啞。默睡不食。上唇有瘡。則蟲蝕其肺。下唇有瘡。則蟲蝕其肛。上下不定。名爲狐惑。此由內熱生蟲。水穀久虛。蟲無所食。故內食臟腑及肛。而外見唇口也。此候最惡。治宜黃連化蠶丸主之。便結。桃仁承氣湯加減服之。先用苦參煎湯洗之。後用末藥敷治。京山郭某有子患此。

疹。向係金炒三天醫治。病既大危。令其生邀余看視。其聲啞。噴。噎。飲。上。下唇內。及舌上。舌根。喉間。俱有瘡。其脈軟微。余決為不治。果死。

牛黃散

牛黃

青黛

硼砂

雄黃

冰片

共為末。先用薄荷湯。漱咽。後次入神效。

黃連化蠱丸

治狐惑瘡。

黃連 二錢

蘆薈 二錢

乾蟬 一錢

蕪荑 一錢

川棟子肉 一錢

使君子肉 二錢

五分

可加檳榔。雄黃。青黛。黃芩。胡連。

共為末。用烏梅洗淨去核。搗膏和丸。米湯下。或杏仁湯下。

清熱黃連犀角湯

治狐惑。

犀角 二錢

黃連 一錢

木香 三分

烏梅 四個

桃仁湯

治狐惑。蠱唇口生瘡。聲啞不出。

桃仁

椒子

蘄艾 各三錢

棗十箇。水二鍾。煎至一鍾。分二次服。

狐惑瘡末藥

川連

黃柏

青黛

檳榔 各一錢

雄黃

杏仁

使君子肉 各一錢

五分

石膏 五錢

蕪荑

松花 各七分

枯礬 五分

共研細末。先用香油調成塊。次用涼水調薄塗瘡。上數次自愈。亦可加蘭香葉燒存性研末。共調。此方再加胡連。蘆薈化蟲丸。可治鼻疳。

牙疳

廉按。牙疳爲麻後之大症。此編不見者。見於外科牙部也。口臭生瘡。爲牙疳之兆。白虎湯。清胃散。主之。戴元禮用甘桔湯。黃連解毒湯。涼膈散。若兼泄瀉。脾虛有濕者。加味連理湯。外以薑柏散抹之。陰虛者。甘露飲主之。經曰。上牙疼陽明受熱。下牙疼腎虛不能制火。大抵胃熱卽血熱。治宜涼血清胃。各依經絡加引經藥。上正四牙屬心。加川連。麥冬。下正四牙屬腎。加黃柏。知母。上邊四牙屬胃。加葛根。川芎。下邊四牙屬脾。加升麻。白芍。上左盡牙屬膽。加連翹。膽草。下左盡牙屬肝。加柴胡。梔子。上右盡牙屬大腸。加枳殼。大黃。下右盡牙屬肺。加黃芩。桔梗。上下牙牀腫。涼膈散。加石膏。知母。升麻。內床曰齒。外板曰牙。牙齒腎之標。若齒縫疎豁。動搖脫落。六味地黃丸主之。口糜者。口中糜爛。或時出血。宜清心脾胃。三經之火。兼潤大腸。用金花消毒飲爲主。化毒湯。清胃散。俱可用。陰虛有火者。犀角地黃湯。加麥冬。元參。或甘露飲主之。至若脈弱熱微。唇白形寒。口中不臭。下利。不思飲食。此由脾虛火炎。宜用理中湯。外以上桂末吹之。牙宣者。口臭齩腫。牙縫出血。欲成牙疳也。宜清胃化毒等方。加側柏葉。或白虎湯。加升麻。青黛。梔子。連翹。元參。丹皮。或用益元散。冷水調服。如陰虛火旺。用甘露

飲。牙疳者。上下齒腐爛也。此由陽明火毒。其症最危。十死七八。必須內外兼治。內服犀角地黃湯。加葛根。川連。石膏。大黃。外以玉阿散。黃龍散調治。至於身體大熱。面目浮腫。環口青黑。今日方見黑點。明日卽至穿腮。落齒。鼻崩。唇脫。不能飲食而死。名曰走馬。喻其速也。外面患處用猪肉貼之。吹口丹調治。或灸唇下陷中承漿穴。岐伯曰。口臭可治。鼻臭不醫。鼻梁上發紅點如珠不治。上唇龍門牙落者死。蒂中紅腫。難於飲食者死。總之。此症皆當以石膏重劑治之。必胃強能食。堪勝重劑。否則難治也。切忌冰磨。余有女學生金某之女。年二十餘。見疹六七日。俱已收沒。惟鼻梁上一點未收。其色如珠。上唇龍門牙微痛。身亦微微潮熱。前醫以參麥六味湯治之。歷五六日。漸甚。其弟至。余齋中乞方。余曰。此症甚危。非數日可愈。余至其家。按脈。右寸關獨強弦。餘亦有餘。余飲以白虎承氣湯。兼生地。白芍。丹皮。黃芩。麥冬等藥。連服十六大劑。其初所下者。如泄瀉。或紅或黑。至是始吐紫血數碗。鼻梁紅點隨散。齒痛亦愈。其人困倦已甚。奄奄若無生氣。舉家旁皇。余曰。無畏。其病已愈。但補其元氣可也。余飲以六味地黃湯。加人參。麥冬。歸身。白芍數劑。元氣稍復。去人參。麥冬。服歸芍六味湯五十劑而愈。此症若非用如此重劑。則必不救。然非余之學生。及其家之相信。余亦不敢擔擡甚矣。醫之難也。然而認症不的。而誤藥之。則又爲殺人之刃矣。馮楚瞻曰。脈微無力脾虛。口不臭者。宜用理中湯。

之類。陰虛胃熱。宜甘露飲加石膏。羸瘦陰虛者。六味地黃丸加犀角。總宜憑脈用藥。勿執定麻為陽毒。蓋諸病皆有始中終之殊也。牙牀腐爛無膿血者不治。口臭涎穢穿腮破唇者不治。通口色白者不治。黑腐不脫牙落無血者不治。吹藥涎從外出者生。涎毒內收者死。

清胃散 治牙痛牙宣。口臭口瘡。

黃連

石膏

升麻

生地

丹皮

連翹

元參

甘草

梗米

出血加側柏葉

白虎湯 統治牙症。見第八頁。

甘桔湯

甘草

桔梗

黃連解毒湯 見第十四頁。

涼膈散 見第八頁。

加味連理湯 治麻後口臭。脾虛泄瀉。

黃連

乾薑

人參

茯苓

白朮炒

薑柏散

乾薑

黃柏

等分為末。乾搽口內。溫水漱口。

甘露飲

生地

熟地

天冬

麥冬

黃芩

甘草

釵斛

茵陳

枳殼

枇杷葉

金花消毒飲

治口糜。

黃連

黃芩

黃柏

大黃

清胃化毒湯

治麻後熱極口疳。

石膏

連翹

元參

銀花

丹皮

芥穗

防風

花粉

廣皮

山查

甘草

地骨皮

犀角地黃湯

犀角

生地

丹皮

白芍

一方加黃連。黃芩。大黃。

理中湯

人參

白朮炒

炮薑

甘草

益元散 卽六一散加辰砂五分。

玉阿散 治走馬牙疳。

貓屎

在屋上日晒雨濯風吹白色者。煨存性。不拘多少。配冰片青黛少許。研爲細末。敷上神效。如無真青黛。用靛青花水飛淨代之。又一方。用蝸牛連殼煨存性。研末吹患處立愈。

繆氏黃龍散 治走馬牙疳。

黃牛糞尖 雄者佳

煨存性研末。每錢加冰片一分。搗勻。吹入牙根自愈。

猪肉貼法 先用黃連煎濃汁。將生精肉切薄片。投入黃連汁內片時。以

猪肉貼患上。拔出積毒。猪肉乾黑再易。換過數次。即效。

吹口丹 治穿腮落齒。鼻崩唇爛。神效。

醋薺草 搗汁 靑草鷺脩 調汁

將二汁。同放於麻蜋殼內。於炭火上煨過數次。研末。加冰片。梔子。尤

妙。

生耆湯 治穿腮落齒。唇脫鼻壞。

黃耆 三錢生 粘子 三錢 殭蠶 一錢五分

蟬退 一錢 滑石 三錢 甘草 五分

不拘貼數。神效。

六一散

滑石 六錢 甘草 一錢

共研細末。冷水調服。不拘數目。

搽牙散 治餘毒攻牙。腐爛欲死者。

木鱉子 煨存性為若 川貝 為臣 月石 為佐 白砒 少許製

共研細末。用米湯拭淨患處。搽上。製砒法。用白砒入枳殼內。用線

纏住。入好酒一盞。煮去砒毒。

嘔吐

麻疹嘔吐。由於火邪內迫。胃氣衝逆也。須以竹茹石膏湯和中清熱。其吐自止。

竹茹石膏湯

法夏

赤苓

廣皮

竹茹

甘草

石膏煨

加薑

廉按劉河澗曰。胃膈熱盛則為嘔。火氣炎上之象。忌用升麻。服之必喘。須以竹茹。葛根。西河柳。陳皮。石膏。甘草。薑炒黃連之類。若痰吐如絲。或成塊。吐清涎而有白沫者。俱宜清肺消痰降火為主。朱丹溪曰。嘔吐藥。忌瓜蒌仁。杏仁。山梔。蘿蔔子。又按初時固宜疎表。但不可過用升提藥。至于麻後嘔吐。有實有虛。經云。胃虛則吐是也。胃實宜消食清火。胃虛用七味白朮散。理中湯。

七味白朮散

人參

白朮炒

茯苓

炙甘

木香

藿香

葛根

理中湯

人參

焦朮

炮薑

炙草

甚者加附子。

瀉泄

麻疹瀉泄。乃毒熱移入腸胃。使傳化失常也。治者切不可用溫熱諸劑。疹初作瀉者。以升麻葛根湯加赤苓猪苓澤瀉主之。疹已出作瀉者。以黃連解毒湯加赤苓木通主之。

升麻葛根湯 見第六頁

黃連解毒湯 見第十四頁

痢疾

麻疹作痢。謂之夾疹痢。因毒熱未解。移於大腸所致也。有腹痛欲解。或赤或白。與赤白相兼者。悉用清熱導滯湯主之。不可輕投瀉劑。清熱導滯湯

山查

厚朴

甘草

枳殼

檳榔

當歸

酒芍

條芩 酒炙

連翹

粘子

青皮

黃連 吳黃炒

引用生薑

廉按。泄瀉則云切不用溫熱諸劑。痢疾則云不可輕投瀉劑。其丁寧懲戒之意深矣。余看麻疹數十年矣。泄瀉痢疾從不見有虛症。但竊意麻後日久。或有脾虛而作瀉痢者。必其脈弱唇白。舌胎滑白。統舌不見紫紅。不口渴而精神倦怠者。方可作脾虛論。或四苓散。或四君子湯。或補中益氣湯。謹慎審擇用之。張玉潞曰。麻瘖瀉痢。屬熱者多。但不可令其瀉久。瀉久則中氣下陷。或成腫滿。宜枳殼理中之類。以

理脾胃爲主。又有下痢如直腸者。所食何物。卽瀉何物。此火盛也。次性急速。故下如直腸。用山梔二十枚。煎湯頻服自愈。總之痢疾惟宜升散。初起可用大黃。火盛再加芩連。或犀角丸。俱可用。如積毒已除。下多亡陰者。六味亦可。

四苓散

白朮炒

茯苓

猪苓

澤瀉

四君子湯

人參

焦朮

茯苓

炙草

補中益氣湯

人參

黃耆

焦朮

當歸

柴胡

升麻

炙草

廣皮

理中湯 見第廿三頁

犀角丸 準繩云。但是痢服之無不瘥者。

犀角屑

黃連

苦參

黃柏

當歸

各搗研細末。等分和勻。空腹煮糯米飯調方寸大服之。日再服。忌油膩。生冷。

膩。生冷。

黃連丸

黃連

鈴羊角

黃柏

赤苓

各一兩
五錢

共爲細末。蜜丸如桐子大。每服二十九。薑蜜湯下。

六味丸

生地

茯苓

淮藥

黃肉

丹皮

澤瀉

腹痛

麻疹腹痛者。由食滯凝結。毒氣不得宣發于外。故不時曲腰啼叫。兩眉頻蹙。須以加味平胃散治之。滯消毒解。而痛自除矣。

加味平胃散

防風

升麻

枳殼

葛根

蒼朮

陳皮

厚朴

山查

麥芽

甘草

廉按。袁某之女。年十四。出疹即沒。喉痛腹脹。接余看視。面色黧黯。鼻黑。唇裂口渴。舌赤如硃。並無點胎。喉痛難咽。心如火燒。腹脹而冷。手足亦厥。此熱極反寒之象。觀其前方。川連。黃芩。射干。元參。石膏。升麻。大黃。蘊子。知母。犀角等藥。已服三四劑矣。且重用石膏。大黃。每藥下咽。則脹滿愈甚。四圍匍匐而走。略下清水。則口渴。喉痛。胸滿。益甚。晝夜不安。眼不合縫。諸醫無策。坐以待斃。余按其脈。脾脈獨宏大堅實。腹中拒按更甚。此由食積于中。胃火上衝。以致喉痛諸症也。時醫拘定枳殼。山查。厚朴。酸澀。麥芽消疹之論。不敢用以消食。而惟用涼藥以清其火。大黃以硬通之。不知愈涼則愈滯。大黃直走。不能消化。所以腹中冰冷。火毒聚於上焦。每服藥而脹滿欲死也。余用枳殼。厚朴。

山查。麥芽。神麩。粉葛。檳榔。七味。諸醫以爲人已乾燥。用此燥烈之藥。當無不死。且枳殼。山查等酸收之性。麻隱何能復發。其父謂女已垂危。死生惟命。排衆議而服之。藥方下咽。卽已睡去。酣眠半日而醒。諸症頓減。舌胎極厚而黃。余復以前方飲之。酣睡一夜。次日原方加大黃六錢而愈。又有毒盛作痛者。余用蟬退二兩。桔梗三錢。一劑而愈。

衄血

肺開竅於鼻。毒熱上衝。肺氣載血妄行。則衄作矣。然衄中有發散之義。以毒從衄解。不須止之。但不可太過。過則血脫而陰亡也。如衄甚者。宜外用髮灰散吹入鼻中。內服犀角地黄湯。其血可止。

研末用。

犀角地黄湯 見第廿三頁

廉按。麻疹初起衄血。宜用黑荆芥。黑梔子。黃芩。元參。連翹。生地。丹皮。麥冬之類。甚者加犀角。茅草根。如用犀角地黄湯。宜去白芍。如口中出血。惟用發散毒清而血自止。沒後衄血。四物湯加茅草根。麥冬等藥。又無論初中後衄血。用黃酒湯溫以足浸之。神效。歎血嗽血出于肺。吐血咯血出于腎。先痰後血是積熱。治宜清肺。先血後痰乃陰虛。法宜滋補。清肺者。二冬。芩。連。川貝。紫苑。元參。百合之類。滋補者。沙參。麥冬。六味。地黄丸之類。最佳者童便。衄血吐血俱可用。如婦人出疹。

適遇經行。則毒隨經解。乃吉兆也。宜于治疹藥中。加生地。丹皮。赤芍。紅花之類。如孕婦出疹。竟可照常治法。總以涼表清火解毒爲主。切勿用香砂及補胎之藥。用之其胎必墮。余堂弟媳。懷孕六七月而出疹。用宣毒發表湯。去升麻木通。加芩連石膏。上身已透。色紫。而下身絕無半點。以胎橫亘於中故也。忽然譫妄。目直視而冥。余用白虎湯。合承氣湯。石膏二兩。大黃一兩。再加芩連灌下。片刻而蘇。二劑而腰腹兩足俱已出透。故孕婦出疹。以大黃爲安胎之聖藥。如因出疹落胎。當以養陰爲主。然後隨症用藥。斷斷不可溫補。至於麻黃。川連。羚羊。犀角。大黃等藥。亦不可用。若石膏儘有用之者。仲景治產後。白虎湯。亦所不廢也。然有素向陰虛。一經落胎而汗出。心煩。口燥。潮熱。咳嗽。氣促。不眠。四肢麻木。是謂陰脫之候。當重用大劑陰藥。如熟地。生地。丹參。沙參。麥冬。川貝。丹皮。元參。棗仁。阿膠。人參。知母。地骨皮之類。皆當選用。又有孕婦元氣不足。一經分娩。氣血兩脫。手足厥冷。自汗不止。當以溫補爲主。又當看其疹色。紅活者吉。如產後出疹。半月之前。重產。半月之後。重疹。重產。則以當歸。川芎。桃仁。紅花爲主。發表用荊防。前胡。桔梗。葛根之類。清涼用黃芩。連翹。花粉。知母之類。活血用生地。元參。丹皮。丹參之類。酌量輕重用之。若黃連。犀角。大黃。麻黃。桂附。乾薑等藥。亦不可用。如真陰已竭。當重用補陰之藥。與小產參看。重疹。則于治疹藥中。加養陰活血之藥可也。又有水畜之症。孫一奎

赤水元珠曰。發熱之時。恣飲冷水。恐生水畜之症。故水入于肺。爲喘。爲嗽。宜用桑皮。葶藶子。以洩肺中之水。水入於脾。爲腫。爲脹。爲自利。水入於胃。爲嘔。爲利。宜用猪苓。澤瀉。茯苓。以瀉脾胃之水。水入於心。爲驚。爲悸。宜赤白茯苓。燈心湯。以洩心胸之水。水入於肝。爲脅痛。用芫花。以洩之。水入于腎。與膀胱。爲小便不利。爲陰囊腫。宜車前。木通。以洩之。皆當隨症而治。又婦人有經水適來適斷。寒熱往來。神昏語亂。此謂熱入血室。宜用小柴胡湯。去人參半夏。加當歸紅花。赤芍丹皮之類。亦有火盛而宜加犀角地黃湯者。酌量用之。小腹急痛。而小便自利。大便黑色。與畜血之症。同治。亦有宜用桃仁承氣湯者。又有麻後浮腫者。有身熱不熱之分。身熱者。水氣在表。宜用荆防。蘇葉。桑皮。茯苓。米仁。廣皮。蒺藜。大腹皮。銀花之類。身不熱者。宜用茵陳。梔子。滑石。猪苓。澤瀉。赤苓。杏仁。枳殼之類。如係脾虛發腫。加人參。茯苓。扁豆。山藥等藥。或用金棗兒湯。蔣春圃之弟。麻後腹脹而硬。四肢亦浮腫。其脈沉遲。舌胎滑白。不思飲食。余用附子理中湯。加大腹皮。茯苓。數劑而愈。同時趙聖元之孫。亦患此病。外症皆同。其脈洪數有力。舌胎黃厚。余用承氣湯一劑而愈。旨哉金鑑之言曰。臨事權變。惟神而明之而已。

承氣湯

大黃

枳殼

甘草

金棗兒湯 治腫脹仙方。

紅牙大戟 四兩

紅棗 十二兩

水煮一日。去戟。取棗。晒乾。食之立消。

癩疹

癩疹者。兒在胎中。受母血熱之氣。所蒸已久。及生後外遇涼風。以致遍身紅點。如粟米之狀。月內見者。名爲爛衣瘡。百日內見者。又名百日瘡。未出痘瘡之先見者。即名爲癩疹。調攝謹慎。不治自愈。

蓋痘疹

蓋痘疹者。謂痘方愈而疹隨發也。因痘後餘毒未盡。更兼恣意飲食。外感風寒。以致遍身出疹。色赤作癢。始如粟米。漸成雲片。宜加味消毒散。疎風清熱。疹即愈矣。

加味消毒散

荊芥

防風

粘子

升麻

甘草

赤芍

山查

連翹

癩疹

癩疹者。乃心火灼於肺金。又兼外受風濕而成也。發必多癢。色則紅赤。隱隱於皮膚之中。故名曰癩疹。先用加味羌活散。疎風散濕。繼以加味消毒散。飲清熱解毒。表裏清而疹愈矣。

加味羌活散

羌活

川芎

連翹

加味消毒飲

前胡

枳殼

甘草

見前蓋痘疹。

薄荷

桔梗

赤苓

防風

蟬退

麻疹闡註卷二

諸暨張霞谿闡註 杭州徐志源校訂

(附採諸家麻後證治)

麻後龜胸

龜胸者。麻後餘毒留於肺經。陽火熏灼而致也。治宜清肺化痰降火。先用清氣化毒飲。或涼膈散。再加蘇子。枳殼。橘紅。麥冬。羚羊。地骨皮。葶藶子。枇杷葉等藥。以開導其氣。繼用九味平胸丸治之。

清氣化毒飲 見第十五頁

涼膈散 見第八頁

九味平胸丸

百合

天冬

杏仁

桑皮

石膏

大黃

葶藶

木通

枳殼

共為末。蜜丸如菉豆大。清湯送下。

麻後肺痿肺癰

麻後久嗽不止。時吐白沫如米糊者。名肺痿。火盛而金消也。宜養血補氣。保肺清火。初用加味二冬湯。後用門冬清肺飲。久嗽痛引胸脅。或吐膿血。或吐如米粥者。此肺內生毒也。名肺癰。宜瀉熱豁痰。開提升散。解毒排膿。寧肺桔梗湯主之。痿為正虛。癰為外邪。不可誤治。脈訣云。寸數而實。肺癰。

已成寸數虛瀼。肺痿之形。

加味二冬湯

天冬

麥冬

熟地

生地

桔梗

款冬花

貝母

米仁

萹仁

沙參

紫苑

甘草

門冬清肺飲

麥冬

天冬

知母

貝母

桔梗

粘子

杏仁

冬花

桑皮

地骨皮

馬兜鈴

甘草

加晚米百粒

寧肺桔梗湯

桔梗

貝母

枳殼

杏仁

栝萸根

生耆

防風

桑皮

米仁

知母

地骨皮

甘草節

葶蘆子

五味子

加薑引

初起加防風。去黃耆。五味子。咳甚加百合。身熱加柴胡。黃芩。小水不利。加木通。燈心。大便不利。加製軍。煩躁痰血加茅草根。胸痛甚。加入

參。白芷。

白芨末 治肺葉爛去。用白芨淨末一兩。分作三服。白湯送下一服止痛。

一二服全長。三服完後。用猪肺一箇。加花椒一兩在內。煮食之。忌鐵器。

如痰火欬嗽。每猪肺一個。加白芨二兩。煮食三箇。自愈。

皂莢丸 治肺癰百藥無效者。括去皮弦酥炙爲末。蜜丸。以棗膏和湯服
三九。

麻後疔瘰

麻後夜熱。有汗即退。髮枯膚痒。漸成疔瘰。此症極危。治以柴胡四物湯主之。或清骨散。或五疔保童丸。俱可用。氣虛宜加參耆。若舊有疔病。當參五疔門治之。

柴胡四物湯 見卷一第九頁 有火加黃芩。知母。胡連。麥冬。陰虛加鱉

子。甲。地骨皮。丹皮。有食加山查。麥芽。有蟲加五穀蟲。蘆薈。川楝子。使君

清骨散

柴胡

秦艽

知母各一錢五分

鱉甲童便炙三錢

地骨皮二錢五分

胡連一錢

青蒿子五分

炙草五分

本方可加丹參。丹皮。麥冬。銀花。

五疔保童丸 治五疔神方。

柴胡

青皮

蘆薈

丹皮

白芍

鱉甲

檳榔

炙草

香附

枳殼

使君子

青蒿子各五錢

白朮

丹參

當歸

茯苓

山查

神麩各一兩

胡連

蕪荑

雷丸

鶴蝨

五穀蟲各三錢

共為細末。神麩糊為丸。空心米湯送下。

麻後發搐

麻後忽然發熱而搐者。血虛生風也。忌天麻。南星。燥血之藥。宜導赤散。加丹參。丹皮。沙參。麥冬。竹葉之類。或安神丸。牛黃鎮驚丸。俱可用。

導赤散

生地

木通

甘草梢

淡竹葉

安神丸 治麻後壯熱搐掣。

黃連

當歸

茯神

石菖蒲各一錢

全蝎七隻 酒洗

共為末。搗猪心血為丸。硃砂為衣。燈心湯下。

牛黃鎮驚丸 治驚神效。

天竺黃 一兩

膽星 一兩

雄黃

琥珀

薑蠶各五錢

全蝎三十隻

牛黃 一錢五分

珍珠 一錢五分

麝香 三分

冰片 三分

各研細末聽用。再用麻黃。蟬退。天花粉。各三錢。防風。麥冬。銀花。甘草。款冬花。鈎藤鈎。各五錢。共煎濃汁。去渣。加蜜再煎。百沸成膏。和前藥末。搗勻為丸。硃砂水飛。三錢。金箔三十張為衣。

藥末。搗勻為丸。硃砂水飛。三錢。金箔三十張為衣。

麻後急慢驚風

麻後急慢驚風

急驚者。內熱痰壅。腹脹便閉。脈數有力。法當驅風豁痰清火為主。宜用荆芥。防風。薄荷。前胡。桔梗。杏仁。粘子。殭蠶。蝎梢。黃芩。知母。梔子。木通之類。慢驚者。脾胃損傷。中氣不足。其脈沉遲無力。宜用醒脾飲加減。或六君子湯。

加全蝎。薑蚤之類。牛黃鎮驚丸亦可用。虛寒甚者。附子理中湯。醒脾飲。治慢脾神效。

人參

白朮炒

茯苓

廣皮

半夏

木香

天麻

膽星

藿香

加薑棗陳米

六君子湯

人參

焦朮

茯苓

廣皮

炙草

法夏

附子理中湯

見第廿五頁

麻後眼病

麻後眼如紅腫赤脹。是風火上攻。宜用防風。荆芥。桔梗。黃芩。桑皮。地骨皮。生地。丹皮。甘菊。梔子。連翹。甘草。蟬退。決明等藥。如有星障。加木賊。蒺藜。杏仁。鈴羊。青葙子。蔓荊子。穀精草。蜜蒙花之類。紅腫突出者。用川連。石膏。大黃以瀉之。目生翳障者。宜用清熱退翳湯。或鈴羊角散。或通神散。蜜蒙散。加減治之。如雙目畏明。由水虧也。宜用六味地黃丸。加甘菊。當歸。石決明之類。若小兒兼面青骨瘦者。宜服健脾肥兒丸。如眼皮外翻。以瀉黃散加蒼草。服之即愈。

清熱退翳湯

梔子

胡連

木賊

赤芍

生地

鈴羊

膽草

柴胡

蟬退

甘草

甘菊

蒺藜生

燈心

鈴羊角散

鈴羊

黃芩

草決明

車前子

升麻

防風

黃耆

大黃

通神散

白菊花

菴荳皮

穀精草各一兩
去根梗

加蒙花甘草。亦名菊花散。共爲末。每服一二錢。

蜜蒙散

蒙花

青箱子

決明子

車前子各一錢

共爲末。羊肝一片。破開。摻藥在內。合好。濕紙裹煨熟食之。

瀉黃散

石膏煨五錢

梔子仁生一兩

生甘草三兩

防風二兩酒
微和炒

枳殼三錢
炒

稀莖草四兩酒
蒸晒

共研細末。壯人每服三錢。弱人一錢。小兒七八分。白滾湯下。

肥兒丸

人參二錢
五分

焦朮五錢

茯苓三錢

黃連二錢
五分

胡連五錢

使君子肉四錢

神麴

麥芽

查肉各三錢
五分

炙草一錢
五分

蘆薈二錢
五分

共爲末。黃米糊丸。如黍米大。每服二三十粒。米湯下。

麻後脫肛

麻後脫肛。有實有虛。一由大腸積熱。下攻脫肛。腫硬疼痛。或時下血。或糞細小。唇赤齒燥。其腹堅實。其脈洪數有力。宜甘桔升麻湯。加枳殼。萸仁。黃芩。山查。白芍。滑石。元參。丹皮。黑荆芥之類。一由氣血兩虛。不能內守。遂致脫肛。面青唇淡。指梢或冷。精神倦怠。其脈沉細無力。宜補中益氣湯。加羌活。白芍。煨薑主之。或四君加黃耆升麻。或四物加黃耆升麻。或血熱腸風。加黃柏。荆芥。槐花。斟酌用之。虛甚者。十全大補。加升提藥。

甘桔升麻湯

元明粉 三錢

杏仁

當歸 各二錢

桔梗 一錢

甘草 五分

升麻 七分

或加萸仁。

補中益氣湯

人參

黃耆

白朮

當歸

柴胡

升麻

炙草

廣皮

加薑棗

四君子湯

人參

白朮

茯苓

炙草

四物湯

見第九頁

二靈散

龍骨煨五錢

木賊燒存性二錢五分

共為細末。敷肛自斂。乾燥者清油調塗。

洗法

五倍子八個

川椒二十粒

葱五根

泔水煎洗

麻疹達權

萬密齋曰。凡出瘡自起至收。但看右手寸關脈。洪大有力。雖有別症。亦不為害。此即陽症得陽脈之義。張景岳云。若細軟無力。則陽症得陰脈矣。脈症不相合。當知變通。速救元神。宜用溫補托法。參酌用之。若執麻瘡為陽毒。而概用清涼。則死必不免矣。馮楚瞻曰。病之實者邪氣實。非真實也。病一退而正氣必虛。乃真實也。今醫徒守古人疹多實熱之論。以有形有餘之藥。攻無形多變之虛。不知陽毒之有餘。實由陰血之不足。捨其實在之虛。攻其無形之毒。勢必愈熱煩躁。而增泄瀉喘促。甚至不起者多矣。

全真益氣湯

人參一錢

白朮三錢炒

附子三錢澹

五味八分研

熟地八錢

麥冬三錢

牛膝二錢

馮氏立此方。治麻瘡見點之後。壯熱昏沈。喘嗽煩躁。口渴不食。泄瀉吐衄。或頭面先沒。額熱身烙。足冷等症。無一不效。

更有向患陰虛久嗽。寸強尺弱。麻疹隱伏。但脈宜于地黃湯。而不宜于疎表者。馮氏竟照脈立方。用六味地黃湯。

康熙乙亥年間。斑疹大發。甚危。諸醫或用表托。或用清解。俱莫能療。有身體俱見。而面上隱隱退縮。有身面俱見。面赤壯熱。喘嗽煩躁。不食泄瀉者。要知皆陽外越。而陰內竭。中氣弱。而肺氣傷。其火之有餘。乃由水之不足。昧者概云麻瘡餘毒。不知實係氣血大傷也。其脈寸強尺弱。或細數無力者。並以全真益氣湯去人參。一二劑而愈。

薛氏發熱作渴。用人參麥冬湯。倦怠發搐。用和肝補脾湯。喻嘉言以人參敗毒散治斑症。吳鶴臯以參耆桂附治斑。皆法之變也。醫不達權。安足語此。惟脈洪大有力。人強氣壯者。方用正治。

張景岳曰。十喘九虛。若本非火症。又非外邪。或以大瀉大汗而致者。必皆氣脫之候。宜補其元氣。使以氣促作氣喘。則大誤也。蓋喘者。邪阻清道也。促者。真氣不足也。故曰促者斷之機。切勿以瘡家之促。悉認爲實火。而不知虛火之爲害也。

徐東臯曰。瘡家有胃氣原弱。因瀉痢而發者。發或未透。隨現隨隱。因之邪氣漸入于胃。泄瀉不已。出而復沒。加之喘促。則必危矣。急宜先補脾胃也。

麻疹闡註卷四

諸暨張霞谿闡註 杭州徐志源校訂

謝心陽瘡子家傳

心陽曰。痘之發也。因天行時氣。由父母胎毒。本乎五臟先天之症也。至于瘡子之發。亦因天行時氣。與傷寒相似。卽所謂發斑傷寒也。自人受形而後。肥甘炙煖。薰灼於胃腑。胃腑清潔。其發也輕。胃腑垢膩。其發也重。此後天之症也。當發時。身熱面赤。咳嗽耳後筋紅。若青紫者重。眼睛水淋淋。總以表發升散爲主。夫瘡本乎胃腑。傳於肺家。與肝腎無涉。亦有用黃連而得效者。諸火皆統于心故也。其起初發散之藥。必用升麻。乾葛。前胡。桔梗。薄荷。防風。荆芥。蟬退。粘子。連翹。蘇葉。亦可用。消食用穀芽。出不快。點子模糊。要用麻黃。切不可用羌活。以其性燥。切不可用柴胡。以其爲少陽膽經藥。瘡子自肺胃兩經。與肝膽經無涉。若用柴胡。將胃火引入少陽。瘡後不無目疾。所謂引邪入門也。至山查。枳殼。麥芽三味。瘡中必用之藥。然枳殼山查。治小兒乳疔。見點一二日。不驟用者。以其味酸。酸則斂。瘡子以表發出透爲主。若出到脚脛。則二味在所必用也。書云。寒涼過盛。未免有冰伏之患。故黃芩一味。不用於見點之初。而用於將齊之際。經云。胃火不清。不用石膏之故。則發而爲牙疔。口爛。目痛。目赤。肺火不清。不用大黃之故。則熱入大腸。流而爲泄瀉下痢。此瘡後之症。皆由瘡前治不得法耳。

辨瘡訣

凡瘡。五液兼見者順。二三液不見者逆。一液不見者死。汗爲心液。泄爲腎液。涕爲肺液。吐爲脾液。淚爲肝液。蓋瘡發于陽。火毒炎灼。五液屬水。水能制火。所以輕也。如大便閉結。腎液枯也。遍身乾燥。心液竭也。鼻扇無涕。肺液虧也。目無眵淚。肝液少也。乾嘔無物。脾液燥也。五液不足。瘡後必成餘毒。腎無液者小痢。心無液者發熱。肺無液者咳嗽。肝無液者目翳。脾無液者牙疳。

致五液法

心主汗。凡瘡已出未出。鼻扇。面青。氣喘。此邪毒犯肺。肺葉張也。急服麻黃取汗。水柳煎湯熏洗最妙。又生葱一握。芫荽一握。煎湯五七沸。住火。稍溫。洗兒頭額太陽面頰。次洗手足畢。卽將渣傳貼。熱者互換。兒髮不可太熱。恐傷兒肌。又胡荽四兩。好酒糟八兩。煎法擦法同前。又綿紗不拘多少。煎湯乘熱。先熏後洗。次則刮之。如刮痧之法。額角。天庭。頭項。腰膂。皆可。刮紅再洗。仍頻飲此湯以取汗。

肝主淚。皂角搗鼻取淚。令兒哭。

脾主吐。鮮蝦湯生葱湯發吐。

肺主涕。皂角末搗鼻取嚏。

腎主泄。蝦湯笋湯發瀉。

瘡子初發表主方

防風。荆芥。蘇葉。薄荷。前胡。桔梗。乾葛。蟬退。連翹。穀芽。甘草。葱白。七個。燈心
一丸。

見點一日方

升麻。葛根。荆芥。防風。前胡。薄荷。桔梗。甘草。蟬退。粘子。連翹。穀芽。燈心。一丸。
見點之日。瘡子隱于皮膚之際。當用麻黃。舌胎白。有口氣。斷用生石膏。以
清胃火。則瘡子自然透出。切不可因石膏寒胃而不用。若見舌胎白。反以
爲寒胃而不能放膽用石膏。胃火不能清。不但瘡子出不快。當時就有鼻
扇。胸滿。氣粗之患。日後又有牙疳。口爛。目痛。目赤之害。總以胃火不清。上
熾於口牙。牙爲胃所屬也。又上熾于目。胃脈起於目內眥。故胃火尋到本
經來也。夫富貴之家。多食肥甘。一見舌胎白。有口氣。須重用石膏。若貧賤
之家。不吃甘甜之物。胃火到牙。牙不受。到目。目不受。胃火無從發泄。直上
至于頭頂。紅腫高起寸許。或醫月餘不效。仍宜大用石膏。合荆芥。防風。清
火敗毒藥。再加鹿角屑。蓋鹿之所運者在角。直至巔頂。故用之而效。

見點一二日方

乾葛。前胡。荆芥。防風。薄荷。桔梗。蟬退。粘子。連翹。甘草。穀芽。燈心。一丸。點子
不透。仍用升麻。隱于皮膚。可用麻黃。點子焦紫乾枯。當用黃連。鈴羊角。葶
藶子。馬兜鈴。有痰火。用花粉。杏仁。

見點二三日方

乾葛。荆芥。防風。前胡。桔梗。蟬退。粘子。元參。知母。山查。枳殼。黃芩。麥芽。嗽加

枇杷葉。去毛蜜炙。舌白有口氣。用生石膏。加炒糯米。蓋石膏寒胃。糯米溫胃。用以相救。又有用石膏兼用升麻。取其升陽以發散之。舌尖紅。用黃連。梔子。有食。用枳實。蘿蔔子。有痰。用川貝。花粉。杏仁。氣粗用蘇子。

見點三四日方

前胡。荆芥。防風。根生。元參。知母。石斛。山查。枳殼。黃芩。麥冬。桑皮。杏仁。見症加減如前法。

見點五六七日方

昔人出瘡子。一日子午兩潮。三日已消。不必服藥。近今或五六七日不消。身壯熱。竟似發斑傷寒。一火毒未淨。一表裏未清。用荆芥。防風。薄荷。黃連。知母。元參。生地。連翹。山查。枳殼。梔子。見症加減如前法。

瘡子消後方

瘡前以發散出透為主。消後以滋陰清胃為主。

生地。骨皮。甘草。麥冬。桑皮。杏仁。荆芥。山查。枳殼。川貝。知母。石膏。米仁。元參。有痰。用北沙參。白芥子。有食。用蘿蔔子。見症加減如前法。瘡前不易。瘡後更難。一因瘡前胃火不清。以致牙疳臭爛。一因肺火不清。移熱大腸。變成泄痢。泄痢初起。急用大黃以瀉其毒。若大黃難用。用黃芩。黃連。以清其火。牙疳者。急用石膏。目紅赤者。須用大黃以瀉之。目痛者。須用石膏。黃連。瘡後重感風寒者。仍用表散。瘡後陰虛發熱者。仍用滋陰養血藥。當歸。白芍。可用。瘡後食積不清。仍用消導藥。瘡後小兒乳疳難治。只有五穀蟲一法。可救萬中之一。瘡後餘毒。仍用清涼化毒藥。瘡後痰壅。

氣喘。仍用化痰清肺藥。瘖後忽然心胸絞痛。還是元氣虛弱。曾受疫癘之氣。謂之中惡。宜用蟬退四兩。檳榔二錢。升麻八分。煎服。又瘖無補法。故人參白朮不用。然真虛者用之而效。瘖子以養陰爲主。故肉桂不用。然真寒者亦可用之。麻黃一味。服之過多。肺中燥極。渴不可止。惟用梨汁。斂之可止。凡眼中有星。以三白草根掩之。或掩後枕司。或縛手臂。其星自落。凡出痘而瘖又出者。最難治也。用青大麥草襯於蓆下。以陰其瘖子。然後治痘。內經云。漆得蟹而解。麻得麥而消也。若無青大麥草。大麥亦可代。

