

達生圖說
上

ヤ 9
1103
1



全
79
1103
1

若州近藤先生著

達生圖說

全部
三冊

京都書林

松栢堂
文華堂
橘枝堂

合梓



【原典】

子玄子贊媿乳之元。獨步古今。得缺
和淳。使天下後世。勿此厄。其可謂其功
大矣。然而所細意。從鐵鉤。恠入。是以
每遇。肱。彭。頰。首。等。之。症。未必。不。極
鐵。鉤。也。是。豈。所。安。而。為。哉。抑。又。子

達生圖說

序

所見解未可乎。將出於其不得已耶。
以有州侍醫。色孫苗山有深懷于
此。單心篤志。皓若數年。終能昇
一層之天。斥鐵鉤而救之。曰。吾子
高全。總乳之術。正此大成為。為某山


氏之切。亦不淺鮮也。在口英達生
圖說。將公于世。不子請序。承而
見之。文字之於不能詳。要之在圖。有
以不之。殘意無遺。如牆中窺日。可
謂盡矣。予曰。凡事多古粗而今

精也。死古人拙而今人巧也。譬言於
如古之陶瓦及洞穴而七瓦不洞。譬
古人竭心力以創之。後人盡結巧以
成之。蓋一人之心力。未易於善
美也。今此書出。能使子玄子之陶

及洞也。變為瓦。危博壁也。子
之力也。猶念子玄子復生。必當呼
梓稱善也。安政戊午夏四月

七十二行秋事其識





達生圖說叙

賀川子玄先生著產論。有大裨於生民。天下所知。濟世之績。可謂盛且偉矣。然臨其艱產也。非用鈎具。則不能挽之。至其尤艱者。截斷剖解以理之。其術雖固出於不得已。亦君子者之所不忍也。先師修齋先生有憾乎此。自幼繼父祖之志。刻意於其道。鍛鍊百磨。殆入精微之域。而其術之難。十百之一。尚或不能不用鈎具也。直義夙及其門。親受其術。多年刻苦。頗似有所得者。夫艱產之難。橫逆死活。千態萬狀。不可豫知。然以予所得之術救之。庶幾乎無鈎斷之慘。而可挽之矣。今茲癸丑春。與友人某言及于此。某慙

憑筆之以公於世。乃述先師之遺教。附以直義之所得。以授梓云。希初學輩熟讀玩味。以資講究。則此術不無小補云爾。

嘉永七年甲寅七月

若狹侍醫近藤直義書於越前敦賀之僑居

達生圖說凡例

一 救産ノ術ハ子玄先生發明シテヨリ末流次第ニ
 闢^{ヒラ}ケ近時其書年ヲ追テイデ其器械モ亦隨テ夥
 シ然レドモ此ヲ療術ニ施用スルニ至テハ迂^ウ遠^{エン}
 ニ屬スルモノ半ニ過グ此編ハ先師ノ定論ト予
 ガ平生活物ニ就テ究^{キウ}理^リ發明セシトヲ兼子合セ
 テ之ヲ載ス初學ニ授テ實事ニ益アラントヲ欲
 ス
 一 記スルニ國字ヲ以テスルモノハ讀ムニ便ナラ
 シメンカ爲ナリ尚會得シガタカラントヲ恐レ

テ雜ユルニ俗語ヲ以テス讀者鄙俚ヲ厭イハク了ナカ

一他書ニハ至要ノ術ニ至レバ必辭コトバヲ設テ之ヲ秘

ス此編ハ他ノ秘カシコクスル處ニ於テハ更ニ子細シヤクニ之

ヲ記スタゞ盡サザラン了ヲ恐ル、ノミ

一此編妊婦天資アメノソキ虚弱ナルカ或疾病アルカ胎兒虛

弱ナルカ病トコロアルカニ因テ臨月ヲマタズ

シテ産スルヲ半産ト稱シ又陰門ヨリ草木ヲ刺

テ産スルヲ傷産ト稱シ又毒藥ヲ服テ産スルヲ

多主タシ墮胎ダタイト稱ス是語例ナリ

一月經多少ヲ論ゼズ毎月アルヲ順ト稱シ又間斷トギレ

アルモノヲ不順ト稱ス是又語例ナリ

一諸條ノ下ニ治方ヲ出モアリ不出モアリ其大槩

ヲ示スノミ讀者其不同ヲ疑了ナカレ

達生圖說卷之上目錄

產前

陰門

子宮

經行

辨胎

按腹

妊體曲痛

水腫 附 鍼術


子癰

附辨水腫中妊否術 胎動術

附屈伸 泛胎

探領器


惣長廿三尺




惣長サニ寸五分
指シ越シ五分
穴ノ間四分ツ、
穴指シ越シ一分

A large rectangular area on the right page, divided into vertical columns by thin lines, resembling a table or a ledger. The columns are empty.


包頭器



包頭器ヲ開タル圖



陰門子宮尿道圖



達生圖說卷之上

產前

若狹侍醫

近藤直義退藏述

陰門 此條示大意 下二條倣此

陰門中ノ上邊ニ襞アリ無用ノ如ナレトモ出產ニ至
 要ナリ此襞ト下ノ會陰トガ廣ガル故ニ磨リ破レ損
 フ患ナシ挺孔モ無用ナル物ニ似タレトモ小水通ル
 トキ散ザル爲ニ尿道ノ上ニ覆ヒ在ナリ尿道ハ陰門
 上ノ溝挺孔ノ下ニアリ出產ノ時陰門ノ大小ハ格別
 ナレ平日ニ大小アル様ニ覺ハ肉ノ厚薄ト縮リノ強



弱ニ因ナリ陰門ハ子宮ノ外郭ニシテ其實ハ一體ナ
リ子宮門ニ詳ニス

子宮

子宮ハ平常ニハ縮リテ半掌ノ大サニテ内ニ蠶豆ニ
粒ヲ入ル程ノ物ナレトモ妊娠スル寸ハ雙胎品胎ヲ
モ育スル位ニ伸ルハ自然ノ妙ナリ子宮ハ男子ノ辜
丸ト同理ナレトモ女子ニハ精ナシ粘液ノ薄キモノ
ノミニテ男子ノ如ク稠厚ノ滑物ニ非ズ男子ノ精ト
女子ノ經水ト同義ナリ交感シテ子宮口ノ開トコロ
ヘ男子ノ精走り入ヲ經水是ヲ包トキハ則孕ナリ亦

陰門ト子宮トハ常ニハ別ノ如ナレトモ其元ハ一體
ナリ難産ノ時手ヲ陰門ヨリ進レバ子宮開テ一體ニ
成タル状チ分明ナリ或子宮全ク脱スレハ陰門ノ形
ナシ譬バ丸袋ノ裏ヲ反シタルガ如クニシテ口ナシ
子宮脱門ニ詳ナリ

經行

經行ハ孕育スベキ精血ナレトモ孕ヲ不受トキハ不用
ニナリテ出ルナリ十四五歳ニシテ通ベキ者ナレトモ
體質虚弱ノ者ハ晚シ或ハ生涯ナキ人モ稀ニアレトモ
長壽スル者少シ又アル月稀ニシテナキ月多キ人ア

リ多クハ妊娠セ又者ナリ或多或少ニ拘ラス經行ゴトニ必腰腹ノ痛ム者モアリ

孕ヲ受テ三百日ノ間ハ血ヲ以テ育ヒ出產スレバ經血乳ニ化テ兒ヲ育フ故ニ經行アル様ニナレバ乳汁色コク次第ニ少クナリテ又孕スベキノ基元ヲナスナリ詳ナル丁ハ乳門ニ載ス

辨胎 附辨水腫中妊否術 胎動術

經行終リテ後四五日ノ内ニ少シク經行アル丁アリ則孕ヲ受ノ兆ナリ俗ニシラセト云其日ヨリ九十白ヲ經テ其形漸ク雞卵ノ如キモノナリ

古ハ脉ヲ以テ論シ或乳頭ノ色或ハ乳汁ノ出ヲ以テ論シ或ハ妊娠二三月惡阻病嘔吐不食上氣頭痛四肢怠惰多卧少起好酸菓ナドヲ以テ論ズレドモ經閉シテ右ノ諸症ヲ見ス者アリ必目的トセス惡阻病ハ手早ク治スルガヨシ六味半夏乾薑湯或ハ背ノ二行通五推ヨリ八九推迄毎日灸スルモヨシ輕症ハ捨置テモ可ナリ五六ヶ月ニ至レバ自ラ止モノナリ
孕ト雖モ毎月少宛經行アル人アリ宜シカラズ俗ニ之ヲ畜生孕ト云多産ニ至レバ何レ血暈甚シテ危ニ

至ル丁アリ妊娠中ヨリ七味黄芩湯ノ類ヲ用ベシ
産後經行ナク其中ニ孕ヲ受クレバ月數辨シ難シ手
術ヲ以テ兒胎ヲ動シ察テ月數ヲ定ル術アリ按腹門
ノ下泛胎術ニ詳ニ辨ス

血塊便塊水塊此三塊ハ妊ニ疑似スレ氏血塊ハ小腹
ノ左ニ在テ其形ハ尖稜ナリ右ノ方へ押バ胸下へ上
衝スル氣味アリ便塊ハ小腹ノ右ニ在テ累累トシテ
左ノ方へ押バ胸下へ上衝スル氣味アリ水塊ハ任脉
ニ當テ大サ抽ノ如ク圓クシテ月ヲ經ルニ隨テ形大
ニナリテ柔ナルモノナリ多クハ四五ヶ月ヨリ七八

ヶ月迄ニ本産ノ催ト同様ニ成テ下盡スモノナリ月
ヲ經サル内ニ按腹術ヲ施セバ水下テ消散スル丁モ
アリ妊ニ成ラントシテ不成者ニテモアルカ或ハ薄
絹ノ如モノ或ハ胞衣ニ似タル者アリ俗ニ葡萄兒或
ハハラ、兒トモ云是其形ヲ以テ名クルナラン月ヲ
經ザル内ハ血塊ノ如モノ下ルナリ之ヲ破リ見レバ
中ハ雞ノ子宮中ニ卵塊ノアルガ如クニシテ色白キ
者ニテ其氣アヲ臭クシテ男子ノ精ニ似タリ
妊ハ臍下ト横骨ノ際ニ在テ何トナク温潤ナル物ニ
テ左右上下へ推テモ痛ナシ強ク推テ見レバ何クへ

カ隠ル、者ナリ按腹術ヲ手練スレバ辨チ易シ妊否
ヲ診スルハ右ノ三塊ヲ能分辨シ然後妊娠ヲ辨知ス
初學ノ輩能ク三塊ノ部位形狀ヲ了得スベシ然ラザ
レハ妊否ヲ決定スルコトカタシ

妊娠中ニ腹脹スル者アリ鼓脹中ニ妊娠スル者モ稀
ニアリ何レモ脹滿スル故按腹シテモ妊娠分チ難シ
七八ヶ月ニ至迄モ不辨アリ則水腫中妊娠ヲ分ツ手
術ニ胎動術ヲ取マゼ施テ熟察スベシ或水腫ノ病因
ニシテ腹ノミニ溜リ鼓脹ノ如キモアリ是腹水ナリ
輕症ハ治スベシ或手足頭面ハ頓ニ瘦テ枯燥シ腹ノ

ミ大滿ニナルハ難治ナリ

妊ニ能ク疑似シテ小腹ニ塊起リ追々其塊堅大ニナ
リ八九ヶ月ノ形ニナルモノアリ是ヲ能ク按スルニ
塊ニツ三ツ或四ツ五ツモ寄り塊リタル如モアリ妊
胎ノ手力足カ頭カ肱等ノ如キ様ニモ覺ヘテ初心ニ
テハ大ニ疑シキ者アリ其塊ダケ脹テ塊ナキ處ハ柔
ナル者ナリ龜腹トモ云或鼓脹胸下自然ニ張り切レ
テ膿水ノ涌出モアリ一二日モ出レバ咳等モ止テ快
ク見ユレ氏遠カラズシテ死ス故ニ針シテ水ヲ出ト
モ又不治ナリ何レモ經閉スル者ナリ鼓脹ト成リテ

肺藏諸病 肺氣腫 肺藏不全 肺充血
肺出 肺組織内出血 肺藏破裂出血
肺萎 枯曹布性 加答流性 肥厚性
肺壞疽

ハ草根木皮ノ及フ處ニアラズ

附録

世有穿腹術治腹水者水盡人斃死者過半或一旦得治不久必復未見收全功者越前敦賀中橋街有醫橋本某者構思製細管漏針以去腹水收功者十八九且能使不復有志之人宜就而學

風塊ト名ルモノアリ初心ニテハ妊ニ疑似スト云氏腹一面ニ脹テ空虚ナル者ニシテ塊ト云ベキ者ニ非ズ經閉ヨリ來ルモノカ或其中ニ妊娠スル者モアリ診スル毎ニヨク察ベシ

附録

吾州小濱松本街某妻年二十餘經閉腹滿殆似妊娠余診之如鼓脹與三和散順氣劑之類後過半年再診之妊也由手術定為六月至臨月媿孳胎媿後腹滿漸減諸症隨愈蓋自經閉至臨月經十六七月人ノ資質ハ各各不同シテ妊シテ二三ヶ月モ經行仍アルモノアリ或經止テ七八ヶ月ニテ滿月ノ兒ヲ出生スルアリ故ニ平日妊胎ノ大サヲ察シ且胎動術ヲ施シ胎動ヲ參考シテ幾ヶ月ト決定スベシ
總シテ塊ハ初心ノ者ハ妊ト辨チ難シタゞ塊ハ手ザ

ワリ何トナク角ノアル如ニ覺テ堅シ前ニモ云如ク
ニ水塊ニ限リテ妊ニ似テ柔ニ其形ハ圓ク大サ抽ノ
如シ妊ハ水塊ニ似タレ氏稍攢圓ノ狀アリテ雞卵ノ
形ニ似タリ
宿塊アル婦人多クハ身ヲ終ル迄其塊ハ解ケサル者
ナリ又孕育スル丁甚稀ナリ

附録

吾邑西津北鹽舖街某妻年三十餘經產多病腹中
有血塊大如妊娠六七月胎妊則匿探索不可得至
晚後復如故後產雙胎而其塊減半

處女孕ヲ受テ診ヲ乞トキ孕ヲ問ノ意アラバ其
意ヲ以テ妊否ヲ告ベシ問ハザレバ敢テ告ベカ
ラズ藩士ノ女ノゴトキ尤コ、ニ意ヲ用ユベキ
ナリ


術云婦ヲ仰卧セシメ兩足ヲ直クニ伸サセ帶ハ勿
論細帶湯具マデモ解カセ心下ヨリ横骨迄手ヲ下
スニ指先ニ衣類ノ掛ラザル様ニシテ婦ノ左ニ坐
シ右手ノ次指ヲ一本上ヘハ子テ四指ヲ廣ゲ大指
ト三指ヲ互ヒ違ヒニ心下ヨリ横骨迄輕ク推シ下
シ横骨ニ至テ腹皮ヲ少シ上ヘ推上ゲテ少シ底ヲ

圖一診腹胎辨



窺フ氣味ニテ下へ按テ戻シ横骨ノ裏へ少シ指頭
 ヲ入ル位ニシテ診察スレバ任脉ノ少バカリ右ノ
 方へ依テ雞卵ノ如モノ手中ニ應ズ則是妊ナリ
 水腫アリテ妊娠シテモ分チ難キヲ數々アリ或ハ水
 腫ノミニテ妊娠ニ似タルモアリ手術ヲ以テ決定ス
 ベシ尤水氣ハ産前ニ十分利水スルガヨシ然ラザル
 トキハ出産ニ臨テ衝心ノ氣有テ六ヶ敷丁アリ産後
 惡症ヲ出ス丁モアリ治方水腫門ニ詳ナリ
 術云婦ヲ仰卧サセ醫ハ左ニ坐シ右手ヲ婦ノ右脇
 腹ニ當テ置キ左手ヲ婦ノ左脇腹へ當テ右手ノ掌


圖ノ腹打胎辨



中ニテ其當タル處ヲヒタヒタ打テバ婦ノ左ニ當
 置タル掌中ヘダブダブ波ノウツ如ク應ズルハ水
 ノミナリ姪在レバ何ホド打トモ應ゼザルナリ
 胎動術ハ經行終リテ六ヶ月ニモ至レトモ姪娘カ血
 塊カ水塊カ水氣カ分チ難キ者或ハ俗ニ畜生孕ト云
 モノ等ニ此術ヲ施シテ胎ノ動クニ因リテ決定スベ
 シ五ヶ月ニテハ未動カズ六ヶ月ニ至テ術ヲ施セバ
 胎乃チ蠢動スルナリ以テ姪否ヲ決スベシ然レ氏六
 ケ月ニテハ動フ仍微ナル者ナリ其蠢動ト胎ノ大小
 トヲ以テ參考シテ幾ヶ月ナルト決定スベシ診スル

了百餘人ニ及べバ孕ヲ受タル何月何日頃ト云了ヲ
 知ルベキナリ

術云婦ヲ仰卧サセ醫ソノ左ニ坐シテ左手ヲ覆セ
 テ上ニ向ケ大指ヲ婦ノ左脇下兒胎ノ尻脚邊ニ當
 テ右手ヲフセテ下ニ向ケ次中無名小ノ四指ヲ婦
 ノ右脇下へ當テ左手ノ大指ト同シ位ニ當テ左右
 兩方ヨリシツカリト押テシメル寸ハ兒ノ兩膝或
 兩肱ヲスベラル、故ビクビクト蠢動スルナリシ
 カレ氏須臾ノ間ニテハ分チ難シ隨分氣ヲ鎮テ候
 フベシ



辨胎脈ヲシ
 ナメシノ圖

卷上
 辨胎脈ヲシノ圖

按腹 附屈伸術 泛胎術

妊娠中按腹セザル寸ハ出產ニ到テマ、輕キ顛仆閃墜等ヨリ遂ニ横産ニ成リ易キ者ナリ或ハ平日ニ背へ着キ沈ミ居テ出產ニ手間トリ産婦タイクツシ兒モ亦死胎ニナリ易シ或ハ兒頭ヲ婦ノ右股ノ付根へサシ込モ屈伸シガタク或腰痛或腹痛或寢レ氏安眠シ難ク晝夜共總身グアヒ惡シキ者ナリ此術ヲ施シ胎ヲ正直ニスレバ胎氣ノビ腹部和シテ暫ク妊ヲ忘却スル位ニ快ク成者ナリ手練セザルトキハ効ナシ常ニ平人ノ按腹術ニテ手練スベシ

術云妊婦ヲ仰卧セシメ足ヲ伸シ兩手ヲ下ニ伸バシ袂ヲ手ニ添テ下へ引キテ醫ソノ左ニ坐シ足ハ大指ヲ左右重子合セ膝ヲ割テ右膝ハ婦ノ乳ト對シ左膝ハ婦ノ臍ト對スル位ニ身體ヲ定メ心氣ヲ鎮メテ臍下ヲ張り左右兩手ヲ以テ婦ノ襟ヲ左右へ廣ゲ置ベシ

第一左手ノ大指ヲ胸下鳩尾ヨリ肋骨ノ下ヲ右脇下章門迄押シ進メ離サズニトゞメ置キ右手次中ノ二指ヲ婦ノ心下ヨリ前ノトゞメ置タル大指迄輕ク押進丁六七度ニメ左ノ大指ト右ノ二指ト取


替置テ左手ノ五指ニテ婦ノ右京門ヨリ彼ノ止メ
置タル二指迄カキ舉テ勢ニ從テ引離ス丁六七度
ニシテ左手ノ次中指ニテ心下ヨリ左脇下章門迄
撫引テ其二指ヲ止メ置キ右手ノ次中指ヲ前ノ如
ク心下ヨリ脇下迄按テ引下ス丁六七度ニノ前ノ
如ク取カヘ左ノ五指ヲ以テ婦ノ左ノ京門ヨリカ
キ舉ル丁前ニ同ジ

此の書は合し難く、
此の書は合し難く、
此の書は合し難く、
此の書は合し難く、
此の書は合し難く、




押進ルノ圖
左ノ六指ヲ右
章門ニ止メ右
次中ノ指ヲ心
下ヨリ章門迄


按腹第一



其二
右ノ大指
次中ノ二指
ト章門ニテ
取替テ左ノ
五指ニテ京
門ヨリカキ
舉ルノ圖



其三
左ノ次中ノ二指ヲ左章
門ニ止メ右ノ次中指ヲ
心下ヨリ章門ニテ接引
ノ圖




其四
右次中二指上左次中
二指上尊門ニテ取
替テ京門ヨリカキ舉
レノ圖

西村正齋圖書


第二左手ノ五指ヲ婦ノ右脇下ヨリ上ニ向ケ少シ
下モ不容ノ下迄引置右手ノ五指ヲ下ニ向ケ左手
ノ指頭ニ少シカサ子合セ兒胎ヲ總テ左ノ方へ少
引寄ヒ右手ヲ放チ直グニ左手ノ掌中ヨリ進メテ
右ノ股ノ付根ノ方ニ在ル兒頭ヲ五指ニ拘ケ左ノ
指ニテカヲ添テ左ノ方へ引ケバ兒頭グツト任脈
へ出ルヲ左掌ニテ元へ戻ラ又様ニ留メ置テ右掌
ニテ婦ノ左脇ヨリ兒尻ヲ右へ推セバ整胎スルナ
リ



第二
左右ノ手ニテ兒
胎ヲ一體ニ左ノ
方へ引彼セリ



其二
兒頭ヲ右ノ五指ニ
掛ケ左手ニテカヲ
添テ任脈へ引出
スノ圖




其三
 兒頭ヲ任脈ニ止メテ
 右掌ニテ兒尻ヲ右
 へ推スノ圖

第三其マ、坐シナガラ兩ノ踵ヲ立テ右手ハ婦
 右ニ左手ハ婦ノ左ノ脇下ヨリ左右一同ニ背へ手
 ヲ回シ十四五推邊ニテ脊推ノ左右ヲ次中無名ノ
 三指ニテ揉ムベシ指節ニテポキポキト聲アラシ
 ムベシ肘ニカヲ入テ小腹ヲ張り左右共ニ拘舉ル
 ナリ其時ハ醫ノ腰ヲグツト伸シ切テ引クベシ脇
 ヨリ左右五指共ニ掌ノ浮ザル様ニグルリト回シ
 下ニ向ヒテ小腹へ推シ下ゲ臍下ニ至テ指先ヨリ
 左右共ニ放スベシ右ノ如クスル丁六七度ニシテ
 八度メニハ左右共ニ背ヨリ其マ、直グニ腹へ向

ケ引キ右ノ大指ヲ放テ左ノ五指ト取替テ下ニ向
 ヒ握持チ左手ハ取替テ上ニ向ヒ握持ベシ其握ル
 トキハ十分ニ手ヲ大キクツカフベシ婦ノ右ヨリ
 左右ノ次中無名ノ六指ニテ左へ柔ニ押シ左ヨリ
 ハ左右ノ二大指ニテ右へ柔ニ押スナリ如此スル
 丁六七度ニシテ整胎スレバ心下ヨリ臍下迄兩三
 度撫テ畢リテ止ム

總テ按腹スルニ狭小ナル處ヲ寛大ニ手ヲツカフ
 丁肝要ナリ不然バ少モ不應モノナリ




第三
 左右同ニ背へ回
 シ大椎、左右ヲモ
 ミナカラテ左右
 共ニ引舉ルノ圖


引舉于掌ノ浮ナシ様ニ
下向ニ回シ小腹ノ推下ル
ノ圖



其三
引舉ノ右ノ大指ヲ離テ
左ノ五指ト取替テ下
向ニ握ルノ圖



其四
 左手ハ上向ニ握リ
 テ婦ノ左右ニ柔ニ
 推スノ圖



其五
 兒胎胎二十ニ下
 ノヨリ臍下ニテ撫テ
 ノ圖

屈伸術ハ按腹シテ後ニ腰腕強直シテ屈伸ナリ難ク
直グニ起坐スルコトアタハズシテ困コトアリ婦人ノ尻
ハ出タル故ニ仰卧スレバ腰ハ疊ヨリ浮モノナリ按
腹スル内ニ其腰ガ疊ヘ付テ腰筋引付ル故ニ起ガタ
キナリ此症折々有コトナリ能ク心得テ静ニ術ヲ施セ
バ速ニ治シ快ク起居スル者ナリ

術云醫婦ノ左ヘ回リ左膝ヲ立テ婦ト雙ビ右手ヲ
婦ノ腰ト疊トノ間ヨリ進メ指頭ヲ揃ヘ十六七推
ノ處ニ掛テ左右ヘユリ揺スベシ指節ニテホキホ
キ聲アラシムルモヨシ其手掌ヲ其マ、椎骨ニヒ

夕ト着ケ置キ婦ノ兩膝ヲ立サセテ尻ト踵トノ間
ヨリ醫左手ヲ進メ婦ノ右髀外股ヲシカト押ヘ
テ前ヘ引キ先ニ腰推ニ添置タル右手ヲ其マ、向
ヘグツト推シ送ル勢ニテ一同ニ婦ヲ右ヘ横ニ反
スベシ如此スレバ速ニ屈伸自由ニナリテ起居甘
ハリナク歩行スルモノナリ




逆胎術ハ妊娠中兎角ニ胎沈ミ背部ニ付テ腰背痛ミ
甚シキモノハ脇腹攣急^{レシキ}シ屈伸ナリガタシ臨産ニ至
レバ尤惡シ七八ヶ月頃ヨリ按腹整胎術ニ逆胎術ヲ
兼用ザルトキハ縦ヒ胎直ニナルトモ忽チ故ノ如ク
成易シ故ニ必此術ヲ兼用ベシ

凡テ諸病腹診スルニ逆胎術ヲ施セバ腹中緩和シテ
腹部ノ症候診シ易シ或妊娠中餘リ攣急ノ強キ人ニ
ハ按腹諸術ヲ施テモ反テ攣急ノ支リニ成リ應ジ難
キモノアリ先ヅ藥ヲ與テ後ニ術ヲ施ベシ

治方 當歸芍藥散加桂枝 當歸建中湯或加附子

當歸四逆湯或加附子等ノ類ヲ用ベシ

術云婦ヲ仰卧セシメ醫其左ニ坐ン右手ヲ婦ノ右
脇腹ニアテ五指ヲ開ケ大指ヲ少輕浮シ掌モヒタ
ト當テ指先ヲ背ヘ向ケ左手ハ婦ノ左ノ脇腹ニ當
テ右手ト同様ニシテ左右ヘ暫クノ間ユスリ動シ
漸漸ニ手先ヲ下ヘ向テ亦暫クユスリテ左右一同
ニ指先ヨリ臍下小腹ヘ回シ撫テ離ル、ナリ初心
ノ内ハ數度ナスベシ



左右ノ手虎ノ背
ノ向ケルノ圖




其二
左右一同三指先
ヨリ臍下小腹
回之撫テルノ圖

妊體曲痛

妊娠中ニ躓キ轉ロビ腰ヲ打テ右股付根ヘ兒頭ヲ指
 シ込テ胎斜ニナリ腰腹疼痛ニ夕ヘ難フシテ其マハ
 屈曲シ一身伸フアタワサル者アリ手術ヲ施ベシセ
 ケ月ヨリ臨月迄ニアル者ナリ又強ク腰ヲ打タルハ
 破水シテ半産スル者アリ

術云右手ニテ婦ノ左手ヲ持チ左膝ヲ婦ノ左膝ト
 雙ベ右ノ足ヲ婦ノ尻ヘ回シ婦ノ左手ハ醫ノ腋下
 ニ放シ置婦ノ左ヘ依リ添テ少シウツ伏ニナリ右
 手五指ヲ婦ノ右股付根ヘ指込ミ兒頭ヘ掛ケ左手



婦ノ左ヘ依リテ右手ヲ兒頭ヘ掛ケ
 左手ヲ右手ニ添ヘテ往脈ヘ兒頭ヲ
 出スノ圖

ヲ右手ニ加掛ケカヲ添へ兒頭ヲ引出シ任脉ヨリ
少バカリ左へ依ル位ニシテ左手ヲ拔取り今一段
五體ヲサゲテ亦左手ニテ婦ノ右ノ手首ヲ持テ醫
ノ右ノ肩ニ掛ケ置其右ノ肱ヲ婦ノ腋下へヒタト
當テ醫ノ左手ヲ再ビ右手ニ重テ右膝ヲ婦ノ腰ニ
當テ右ノ腋ヲ婦ノ左ノ腋下へ當三ヶ處一同ニカ
ヲ入五體ヲ定テ後へ反リナガラシカト腰ヲ立テ
婦ノ腰モ共ニ舉レバ醫ノ左膝ヲ少披ヒキキ其踵モ成
丈ケ披ケテ其披ケタル足ノ間ニ醫ノ尻ヲ靜ニ回
シ置ベシ其時右股ニ婦ヲシメナガラ膝ノ倒レザ



其二

右ノ腋ト肱ト掌ト一同ニナカラ
ヲ入テ後へソリ宛腰ヲ伸スノ圖

其三
右膝ヲ立ナカニ婦ノ足ヲ
伸スノ圖



ル様ニ一回テ後左手ト取替テ右手ニテ婦ノ
足ヲ弓ナリニ伸シ枕ノ都合次第其右手ニテ婦ノ
首ヲ抱キ醫ノ右足ヲ回シ取枕ヲ指込ベシ初ヨリ
終マデ醫ノ手ハ兒頭ヲ押へ居テ放ツベカラズ尚
又能ク按腹術ヲ施シ胎ヲ直ニスベシ

水腫 附鍼術

水腫ハ兎角養生第一ナリ飲食ハ勿論氣急促迫ノ氣
味アル者ハ必横卧セザルガ宜シ前ニモタレ物ヲ置
テ坐ルガヨシ不然バ短氣治セズ鎮帶ヲモ取去ベシ
水氣ガ下へ降ル様ニスルガ專要ナリ安産スレバ水

氣モ自ラ去ナリシカシ其腫氣甚シキトキハ臨月迄
ハ夕モ夕ズ半産スルモノナリ産後ニ至テ上部大腫
スルモアリ越婢加苓朮附ノ類或赤小豆湯ノ小豆一
合ニ巴豆八九勺皮ヲ去リ共ニ炙炙シテ巴豆ヲ去リ
用ベシ奇効アリ急ニ上部ヲ踈スベシ不然バ咽咽迄モ
窒ル位ニ至リ衝心スル衝心アリ或ジキタリス目方五
六厘宛細末ニシテ毎日一度白湯ニテ頓服スベシ或
ハ實腫ニ一介バカリ煎服スレバ卒ニ利水ストモ云
シカシ妄ニ與ル勿レ

産婦水腫衝心スル位ニ劇劇ハ反テ治シ易シ劇劇ク來テ

上衝シテ短氣スルニハ初メ下劑ヲ用ユル凡今一度
下劑ヲ與モヨシ格別ノ大腫ニモナラズ難儀モセ又
ハ後ニハ次第ニ不食スル者多シ假令難治ノ症ニテ
モ出産シテ其兒養育スレバ母モ治スル者多シ尤減
食ガ治方ノ主ナリ或卒然水腫スルアリ必半産ス又
水腫産後ニ残り難治トナリテ死スルモアリ
小便卒卒ニ通シ腫モ追追減少スレ凡半産スルモアリ
多クハ産後無事ニ治ス

總テ病ノ為ニ半産スルハ其病勢極リテ出産スル故
ニ多クハ母モ死ニ至ル者ナリ

水腫ノ爲ニ短氣シ衝心セントスル寸ハ必坐セシメ
テ兩手ニテ背ヲ肩ヨリ撫テ下ス丁數度ニ及バ、ヤ
ガテ呼吸穩ニナルベシ其手ノ狂ワヌ様ニスベシ倉
卒ニ爲丁ナカレ水腫ハ兎角卧セザルガヨシ若卧ヲ
好メバ設蓐ノ法ニ循テ餘ホド上ミヲ高クシ卧サシ
ムベシ水氣自然ニ降ルナリ
水腫ノ産ニハ血暈ナシ妊中ニ血ガ皆水ニ化スルト
見ヘテ水腫ノ産ニハ必惡露少シ脫血スル者モ夕ヘ
テナシ

治方 七味降氣湯 五苓散 越婢加附子湯 木防

已湯 導水茯苓湯 茯苓四逆湯 玄武湯 赤豆劑

鯉魚湯 ジキタリス 撰ミ與ベシ

鍼術ヲ施スベキ症ハ水腫甚ダシク陰門腫痛スル者
アリ陰門腫脹ノ状大サ大人ノ膝ヲ曲テ内面ヲ見ル
ニヒトシク紙袋ニ水ヲ入ガ如シ色白シテツヤアリ
水晶ノ如シ挺孔モ腫起リテ矮雞卵チヤホノタビ或半矮雞卵ノ大
サニ至ルモアリ陰毛多キ者モ腫脹甚シキ故皮膚伸
テ彼コ此ニ稀毛ヲ見ル者ナリ毛孔モ錢ノ穴ノ大サ
ノ如シ常ノ形ハ更ニナシ水氣スキ通リテ玻璃ノ如
シ如此症ニハ鍼スベシ聊タリトモ赤色アルニハ必

遠年醫書 卷十
鍼ヲ禁ス但シ産前ノ術ナレモ萬一産後同症ニシテ
實腫ノ者ハ鍼スベシ初産ニテ陰門腫痛スルアリ是
ハ自然ニ水去テ紫黑色ニナル者ナリ誤テ鍼スル
ナカレ

術云襠褌或小蒲團ヲ澤山ニ敷妊婦ヲ仰卧サセ鍼
スベシ必シモ拘ル丁勿レ臨機應變ニスベシ披鍼
ヲ中指ニ當テ大指ニテ押へ鍼先ヲ中指ノ先ヨリ
聊バカリ内へ入ル氣味ニ持ベシ陰門ノ内面隨分
下邊ヨリ段々上邊へ輕ク刺ベシ真直ニチヨキト
刺テ鍼ノマサ目ニハ子ルナリ必鍼ノ平目へハ子

披鍼ヲ中指ニ當テ
大指ニテ押へ持チ
タルノ圖



ル丁勿レ鍼口廣クナリ痛ミ出テ惡シ折々水ヲ拭
ヒ取テ鍼ノ行届カ又處アルカ見ルベシ水晶ノ如
ニ見ヘテモ鍼スレバ血ノニジム丁アリ紙ニテ拭
ヘバ直グニ水バカリ汗ノ如ク出者ナリ其鍼スベ
キ處ハ上ハ陰門割メヲ限リ下ハ會陰ノ割メヲ限
ルベシ鍼孔ヘハ膏油ヲ用ニ不及スグニ愈ル者ナ
リ
臨月ニ不至トモ十二七八迄ハ鍼術ヲ施セバ四五六
時ノ間ニハ催シ來テ出産スルナリ多分死胎ニテ必
安産スルナリ

附録

本藩某妻經産多病年三十餘復姙全腹腫滿呼吸
促迫不能食但欲飲水與之將衝心晝夜不得眠醫
與導水茯苓及茯苓四逆之類無効余診之不治之
症也陰門腫滿狀如水晶以鍼刺之移時死胎也
六七日後陰門腐爛臭氣衝人外科某截斷其腐肉
後十餘日而死適見陰唇有癰痕意此病或由于此
亦未可知也姑記以備參考云

子癰

子癰ノ名ハ姑ク舊ニ依ノミ胎兒ニ由テ癰ヲ發スル

ノ理十シ是レ平日積氣アリテ隱伏スレ^イ氏兒胎次第
ニ長スルニ因テ其積氣ノ隱伏スベキ處ナク俄ニ震
ヒ發ル者カ審ナラズ十二七八ハ初産ニアリ姪娠七
ハケ月以後ニ多シ其發スル形狀ハ手足ヲ震ヒ目上
竄シ沫ヲ噴シテ身ヲ右ヘ引付反張スルナリ或其中
ニ面色赤シテカ息ノ氣味アルハ催産ノ兆ナリ設^{セツ}蓐
シ探宮熟察スベシ出産スレバ復スル者ナリ若誤テ
兒胎ヲ出セバ愈ルト思ヒ手術ヲ施シテ命ヲ促ス^{ウケ}丁
勿レ^レ施術テ發スルヲ押ヘ救ヒ風茄兒^{一名ハ}一味ヲ
細末ニ^{サユ}白湯ニ攪^{カキ}タテ曲頭管ヲ以テ送下スベシ新

者ハ四分或ハ五六分陳者ハ七分或ハ一分ニテ能ク
應スル寸ハ食頃ノ間ニ^イ瞑眩ノ二夜三日モ熟睡シ眠
リ覺ルニ隨ヒ次第ニ快治スル者ナリ

治方 風茄兒 大柴胡湯 參連加吳茱萸湯


虚證ナル者アリ顔色慘淡鼻ニ白沫ヲ流シ弄舌冷汗
等ノ虚候ヲ見ハスニ至テ緩症ニ似ルトイヘ^レ其實
ハ危篤ナリ忽視スル^{コソ}丁勿レ

治方 風茄兒加附子 或尾參黃芪乾薑之類

灸背面二行六七八九推 徹腹 撰ベシ

先師云古人ハ子癇子痲ノ名ヲ立ツ兒ノ腹中ニ存

ル寸ノ名ナレ氏産後ニモ亦稀ニ發ル丁アリト誠
 ニ然リ故ニ兒胎ニ拘テ治ヲ施ス丁ナカレ
 術云婦ヲ仰卧サセ左ヘ回リ婦ノ左手ヲ垂レ掌ヲ
 ヒタト薦ヘ着サセ其手首ノ處ニテ袖口ヲシメ醫
 ノ右膝頭ニテ腕ト動力又搦ニ押ヘテ醫腰ヲ起シ
 テ婦ノ右足ヲ上ニシ左足ヲ下ニシモジラセテ其
 モジリノ下ヘ醫ノ左足ヲ入テ醫右手ヲ柔ニ握リ
 左手ヲ添テ圖ノ如ク婦ノ心下ヲシツカト抑ヘ鎮
 定スベシ此時醫臍下ヲ張り五體ヲ整ノヘ静ニ力
 ヲ入ルヲ要トス



右膝ニ婦ノ袖口ヲ押
 右手ヲ握リ心下ヲ押
 手ニテ力ヲ添ヘシメ
 圖

産後前症アルハ痙病ナリ妊アルヲ以テ子癇ト云拘
泥ノ治ヲ誤ル丁勿レ只惡露ノ下リ盡ルカ盡ザルカ
ヲ見計リ劑ヲ處スベシ

治方 破血劑 清血劑 補血劑 撰用ベシ

達生圖說卷之上 終



