

謝筠壽醫師編著

淋病真相

又名淋病常識

民國二十三年九月初版

病後調補請服

上海二十一位名醫 提倡之 康福多



一月裝瓶售特價廉

醫師

黃余尤刁利康福
 雲彭信權福
 鐘融熙德
 蔡沈宋汪難汪
 禹樹國企得係
 門寶賓張也優
 謝周邱吳爰可
 君仁憶樂靠之
 壽常高初為國
 蘇陳俞姜紹產
 記方松振如良
 之之筠助上藥
 盧湯徐陳卓
 京彝乃禮人
 周舟禮人
 劃以顯顧
 為姓壽毓
 序氏壽白
 筆琦

啓同

康福多 (GODDELL'S) 乃以軋局爾 (GADUOL) 爲主要成分，而兼含麥芽
 齊野櫻飴及錳鈣鉀規常次亞磷鹽等之一種製劑，爲壯補療咳之有效成
 藥。康福多分純淨 (PLAIN) 及含錳 (COMPOUND) 二種。
 純淨康福多用於各種衰弱、食慾不振、貧血瘦削、神經衰弱、兒童發育不
 良、支氣管炎、感冒咳嗽、肺癆後遺症、虛弱等症，含錳康福多則用於
 各種核性疾、等症，如肺結核、良效。同產等良藥，且以低廉之價格發售，
 各處均有代售。凡欲購者，請認明商標，以免誤購。
 提久咳多痰、氣管炎、感冒咳嗽、肺結核、良效。同產等良藥，且以低廉之價格發售，
 家，復挽利權，誠難得也。良效。同產等良藥，且以低廉之價格發售，

上海英租界正德大藥廠發行 各埠藥房均售

淋病真相又名淋病常識目次

編者近影

曹記

男子尿道及附屬器官

之縱斷面

男子尿道之縱斷面

引言

第一編 編首

第一節 什麼叫做淋病

第二節 淋菌是什麼呢

淋病真相 目次

第三節 淋菌怎樣可以證明呢

第四節 舊醫五淋白濁的解說

第五節 濁和精的分別

第六節 體虛可以發生白濁嗎

第七節 淋病自己診斷法

第八節 是否淋病第一次診斷的重

要……和淋病相似的病症

第二編 淋病的症狀

第一章 男子的淋病



第九節 急性前尿道淋的症狀

第一〇節 急性後尿道淋的症狀

第一一節 前後尿道淋的分別

第一二節 前尿道淋變成後尿道淋

的原因

第一三節 後尿道淋的危險

第一四節 慢性前尿道淋的症狀

第一五節 慢性後尿道淋的症狀

第一六節 急性淋變成慢性淋的原

因

第一七節 慢性淋病有怎樣的危險

第一八節 淋絲是什麼

第二章 男子淋病的

合併症

第一九節 龜頭炎、包皮灸、和包

皮嵌頓

第二〇節 副尿管的炎症

第二一節 淋菌性淋巴管炎和橫痃

第二二節 淋菌性急性攝護腺炎

第二三節 淋菌性慢性攝護腺炎

第二四節 攝護腺神經症或叫做情

慾性神經衰弱症

第二五節 淋菌性急性精囊炎

第二六節 淋菌性慢性精囊炎

第二七節 淋菌性副睪丸炎

第二八節 淋菌性膀胱炎

第二九節 淋菌性腎盂炎和腎臟炎

第三〇節 男子尿道狹窄

第三章 女子的淋病

第三一節 男女淋病的異點

第三二節 女子急性淋菌性尿道炎

第四章 女子尿道淋病的合併症

第三三節 巴氏腺炎

第三四節 女子急性淋菌性膀胱炎

第三五節 外陰部炎

第三六節 淋菌性膣炎

第三七節 急性淋菌性子宮內膜炎

第三八節 慢性淋菌性子宮內膜炎

第三九節 淋菌性喇叭管炎

第四〇節 淋菌性卵巢炎

第四一節 直腸淋病

第五章 小兒的淋病

第四二節 小兒淋菌性陰門膣炎和

尿道炎

第六章 淋菌性全身傳染

第四三節 淋菌性關節炎

第四四節 淋菌性腱鞘炎

第四五節 淋菌性粘液囊炎

第四六節 淋菌性筋炎

第四七節 淋菌性骨髓炎和骨髓炎

第四八節 心臟的淋菌性疾患

第四九節 淋菌性眼結膜炎

第三編 淋病的治療

第一章 寫在淋病的治療前

療前

第五〇節 淋病有特效藥嗎

第五一節 淋病是否一種不治的疾病

病

第五二節 淋病可以祕密自己醫治嗎

嗎

第五三節 淋病爲什麼難以治愈

第五四節 淋病何以有輕重的不同

第五五節 夫妻同時醫治的重要

第五六節 淋病的單方

第五七節 淋病病人的攝生和注意

第五八節 淋病的預防

第二章 淋病治療方法

的種種觀

第五九節 內服藥

第六〇節 疫苗療法

第六一節 血清療法

第六二節 化學療法

第六三節 電氣療法

第六四節 瘡疾療法

第六五節 局部療法

淋病真相 目次

第六六節 男子尿道淋自己注入的

注意

第六七節 手術療法

第三章 各部淋病的攝

生和治療的情

形

第六八節 男子急性尿道炎淋的攝生

和治療

第六九節 男子慢性尿道炎淋的攝生

和治療

第七〇節 龜頭炎、包皮、和包

淋病真相 目次

皮軟疔的攝生和治療

第七一節 副尿管的治療

第七二節 淋菌性淋巴管炎和淋巴

腺炎(橫痃)的攝生和治

療

第七三節 淋菌性攝護腺炎的攝生

和治療

第七四節 淋菌性副睪丸炎的攝生

和治療

第七五節 淋菌性膀胱炎的攝生和

治療

第七六節 淋菌性腎臟炎的攝生和

治療

第七七節 尿道狹窄的攝生和治療

第七八節 女子淋疾的攝生和治療

第七九節 女子急性尿道炎的攝生

和治療

第八〇節 巴氏腺炎的攝生和治療

第八一節 外陰部膿炎的攝生和治

療

第八二節 淋菌性子宮頸和子宮內

膜炎的攝生和治療

第八三節 淋菌性喇叭管炎和卵巢

炎的攝生和治療

第八四節 淋菌性關節炎的攝生和

治療

第八五節 直腸淋病的攝生和治療

第八六節 淋菌性眼結膜炎的攝生

和治療

第八七節 小兒淋病的攝生和治療

第四章 寫在淋病的治

療後

第八八節 淋病怎樣的作爲斷根

淋病真相 目次

第八九節 淋病後的尿道炎

第九〇節 淋病和結婚

第九一節 患淋病的人能夠生育嗎

第九二節 有淋病的孕婦莫忘了產

時嬰兒的眼睛

第四編 編尾

第九三節 答客問

第九四節 結論

謝筠壽醫師譯

肺病豫防療養教則

二十三開本 道林紙印 附圖九幅
上集一元二角 下集一元二角 寄費掛號加一

本書爲日本原榮博士所著將肺病之豫防及療養原理明確解說復說明結核自然治之癰理由打破歷來對於結核之恐怖觀念對於精神療養尤再三致意可稱肺病書籍中之翹楚患肺病而已購其他肺病書籍者讀此當另有一番之感想也

又每逢星期日上午八時至九時半謝醫師在上海華興電台（一二六〇週皮）播音講演本書
上集 說明豫防及種種療養方法如營養空氣安靜強練氣候等又說明難治肺病之療養結核治癒後之再發豫防等等

下集 說明肺結核各症狀之治療法營養療法恢復期療養法各部結核之療養法冬季及夏季療養法病室設備等等

總發行所 上海愛文義路派克路口平和里十九號謝醫師診所

代售處

上海四馬路作者書社 大東書局 新華藥房
老大沽路新馬安里三十四號社會醫藥報館

性病 指迷

本書爲日本東京帝國大學醫科皮膚花柳專科卒業之謝篤壽醫師所編本寸餘年來之臨症經驗發懇切實効之言論初版以後再版至五次之多可以想見其價值全書七萬言節目一百三十六節附三色版圖等六幅用上等道林紙精印茲摘錄要目於後（關於淋病者不再贅述）請垂察焉 每冊特價六角 謝醫師診所發售

本書要目

梅毒歷史。性病發生的動機。梅毒第一期的狀態（硬性下疳—橫痃）。梅毒第二期的狀態。梅毒第三期的狀態。惡性梅毒的狀態。遺傳梅毒的狀態。軟性下疳的狀態。性病公衆的預防法。梅毒不是一種局部的疾病。梅毒到底有怎樣的可怕。六〇六・九一四・究竟是怎麼樣的東西。六〇六是否一次足以斷根。治療梅毒是否單用六〇六可以斷根。六〇六對於生育的談話。陰部外下疳。種痘發生下疳。陰部上有發疹不一定是梅毒。陰部上沒有病變不一定是梅毒。梅毒性丘疹有誤作痔瘡的事情。咽喉的梅毒有和白喉誤會的地方。關節筋肉的梅毒有和風濕病誤會的地方。怎樣可以知道你有梅毒。梅毒的有無應當早期去檢查。驗血的

意義和取血的方法。驗血對於梅毒診斷上的價值如何。梅毒怎樣的才可斷根呢——就是淨芽療法。有梅毒的乳母對於愛子的危險。有先天梅毒的子女也不應當僱用健康的乳母。梅毒恐怖症。六〇六注射時應當注意的事項。六〇六注射後的副作用。軟性下疳不要誤認硬性下疳。混合下疳的談話。橫痃便毒魚口的解說。花柳病藥品昇提的談話。性病預防的法律。性病病人對於結婚的談話。同一惹花沾草不染性病的理由。打破民衆對於花柳病羞耻的觀念。病人的決心和環境對於性病的醫治有莫大的關係。吾國目下性病的狀況。怎樣的叫做性神經衰弱症。性神經衰弱症的原因，症候。性神經衰弱症和精神病的關係。性神經衰弱症的治療法。房事過度。男子手淫的原因，結果，預防，療法。女子手淫的結果，治療。非病的遺精和病的遺精。遺精的結果，原因，攝生法。怎樣的叫做陰萎。器質的陰萎，精神的陰萎，神經的陰萎，麻痺的陰萎。陰萎的治療法。女子的交接不能症。臃腫。女子性的麻痺。性的不感症。怎樣的可以受孕。不妊症的原因。精液缺乏症。無精虫症。女子不妊症的原因。不妊症的治療法。陰莖渺小的談話。包莖。包皮贅頓。陰風。陰部疱疹。炎圭濕疣。婦女赤白帶的談話等共一百三十六節。

影近師醫壽筠謝者編



記謝筠壽醫師

皖江曹痴公

謝筠壽醫師浙之餘姚人幼卽穎悟嘗以謂濟世壽人之事莫善於歧黃肄業同濟醫科大學繼轉入浙江公立醫藥專門學校畢業後卽應上海中國紅十字會之聘任南市醫院醫務未幾時疫流行應旅滬甬紳之請主任鎮海東管鄉防疫醫院醫務活人無算稱頌一鄉謝君素性好學雖已出而問世終覺學無止境鎮海院務結束後又束裝往東瀛以研求其最新學術旋卒業於東京帝國醫科大學選科復在泉橋三井病院實習各科學民國十年歸國後主任中國濟生會濟生醫院及江灣模範工廠救濟婦孺會上海特別市黨部淞滬教養院等醫務旋因求治者日衆公家團體醫務不克兼顧乃一辭退自立診所求者多而聲譽雀起謝君不特以醫壽人且以所學掖後進故上海南洋醫科大學中德產科女醫學校人和產科醫學校上海女子醫學專門學校同德醫學專門學校東南醫科大學爭聘爲教授循循善誘不遺餘力對於公共事業又復熟誠如共同創辦社會醫報醫藥評論任醫師公會委員及紹興餘姚同鄉會董事謝君性慈祥遇人接物和藹可親余家人輩偶逢疾苦多延君診治無不投劑立愈誠今之國手也爰記其事以告世之同病者

引言

現在性病蔓延的廣汎。是任何人所承認的。但是性病的中間。患著淋病的。尤占著性病中的大多數。自從世界大戰以後。有人調查美國紐約二十歲到三十歲的獨身男子。百人中有八十五人患著淋病。德國的大學學生。有百分之八十到九十。都曾經傳染著淋病。我國雖然沒有這樣的調查和統計。只要看到報紙上淋病藥的應時蜂起。那就可以知道一般了。鄙人曾經編有「性病指迷」一書。關於性病的。譬如梅毒呀，淋病呀，下疳呀，遺精呀，陰萎呀。都已一一的說明。可是讀者還要來函詢問。我把詢問的函件統計起來。屬於淋病的。幾有百分之八十以上。淋病的廣播。這還是各種的證據的人。顯然其發淋病的人。億萬未患淋病的人。也是其證據。然則淋

淋病真相 引言

患淋病的人。既然是這樣的多。就是未患淋病的。也是耳熟能詳。然則淋病的問題。當然可以大白特白。毋庸鄙人一再嘵舌。可是事實上完全相反。未患淋病的人。固然不知道其中的究竟。就是已患著淋病的。對於淋病的原因症候和治療方面。又多是恍忽迷離。絲毫沒有淋病的智識。以致鬧成種種的不幸。所以鄙人就不揣簡陋。想把淋病人應當知道的地方。逐條解說。並將在日報上所發表關於淋病的談話。彙集成編。名曰「淋病常識」。逐期刊載在時報衛生特刊。茲又更明爲「淋病真相」。卑讀者顧名思義。能把本編細讀一遍。便可以明瞭淋病的究竟。或者不致再蹈從前種種的覆轍。那就是編者的私願了。

淋病真相 又名淋病常識



醫師謝筠壽著述

第一編 編首

第一節 什麼叫做淋病

淋病究竟是一種什麼樣的疾病。這是因為傳染著淋菌而發生的一種尿道疾病（症狀請參觀第二編）。為什麼要傳染著淋菌呢。這是不消說得。是由於男女的不潔交接而傳染。如果是正式的夫妻。從來兩性間都沒有淋菌傳染的時候。是決不會發生淋病的。世人所講的熱體、冷體、濁精、敗精、膿膜、腎虧等種種。都是一種憑空的憶說。決不足靠。頭腦明白的讀者。

淋病真相

淋病真相

也須承認鄙人的一句話嗎。

第二節 淋菌是什麼呢

既然講傳染著淋菌可以發生淋病。那末淋菌又是什麼呢。這是在十八世紀以前。世人原不知有淋菌的一回事。在歐洲也以淋病的發生。是由於男女交接濁精停流的緣故。正和我國的思想一樣。可是到一八七九年有一位奈衣賽氏 (Neisser)。從淋病病人的分泌物裏面。發見一種球樣的細菌。他的形狀。是一對一對的排列著。很容易和其他的細菌識別。醫學上定名叫做淋菌。倘使把這種淋菌。移植到健康人的尿道裏面。被移植的人。就可以發生淋病。百試百應。方才證明淋病的病原。就是這細小的玄微體淋菌了。於是從前種種的憶說。也自然消滅。

第三節 淋菌怎樣可以證明呢

淋菌是一種細小的玄微體。人類的目力。是萬萬看不到的。醫師要用一種顏色去染色。再放在顯微鏡底下。方才可以明白看到。鄙人往往把淋菌染色後給病人看。看了已後。自然明白。倘有用顯微鏡不能證明的時候。還可以把分泌物去做培養。或者施行血清診斷法。都可以證明他。但這是醫師的事情。病人所難以辦到的。

第四節 舊醫五淋白濁的解說

幾千年來被舊醫勢力籠罩下的國民。對於舊醫所說的虛呀，勞呀，熱呀。真是聲聲入耳。絲絲入叩。毫不會懷疑著的。但是從現在科學的眼光看起來。各種疾病的真相。大多已逐漸地明瞭。這樣玄虛的病名。實在沒有存在的餘地。我現在想把關於本文的就是舊醫所講的「五淋白濁」。來解說一下。

淋病真相

淋病真相

舊醫把淋病分做五種。就是勞淋、氣淋、熱淋、血淋、和石淋。他們以勞淋氣淋屬虛。熱淋屬熱。血淋有熱有虛。石淋或因熱或因虛。長久了便成功砂石。勞淋的症狀。是因勞傷虛損。變成小便不出。小腹急痛。尿出白汗。一點一滴的樣子。氣淋小腹急滿。小便要解不出。解後常有點滴的樣子。熱淋小便熱而赤。短而澀。臍下急痛。血淋小便內有血滴或血條。石淋還叫做砂淋。小腹急漲。莖內痛如刀割。苦楚萬狀。尿如砂石。

以上都是舊醫關於五淋的病理和症狀。從吾們新醫的立場講起來。他所說五淋的範圍。實在是太廣義了。凡是從尿道口有分泌物或固形物出來的疾病。都可以叫做淋。原來淋字有淋漓的意思。淋漓是一種病的症狀。那裏是一種病的名稱。定病名應當以解剖上的地位和病原的種類來分別。所以五淋的一種病。在舊醫以為分得很出透了。從新醫的眼光看來。還是模糊

莫辨。推測他的病狀。實在包含着泌尿器系統上種種的疾病。他的勞呀、氣呀、熱呀等的名稱。是不對的。究竟舊醫五淋的病名底下。包含着幾多的新醫疾病呢。詳細的自然難以針鋒相對的一一列舉起來。現在把最相近的幾種新醫疾病提出來討論一下。

第一種就是淋病。淋病的原因。是因為淋病的病原菌就叫做雙球菌的傳染而起。他的主要病狀。是小便刺痛。尿意頻數。尿道有白色或是黃色的分泌物流出。這是急性的時候。好似舊醫所講的熱淋。倘是病勢凶惡。症候劇烈。尿道粘膜破碎的時候。竟有血液一同流出。那時候舊醫就叫做血淋了。但是淋病一樣還是淋病。不過淋病的程度上有差別。還有有淋病的人。倘使變成了慢性。在平時分泌物很少。或竟然不覺得。遇着了勞動的時候。分泌物就多加起來。那時舊醫就叫做勞淋。其實他的病還是淋病。不

淋病真相

淋病真相

過因勞動而發的罷了。倘使你沒有淋病的種子在你身上。斷斷不會發生淋病的。所以勞淋的病名。是不成立。倘使淋病菌波及到膀胱。就覺到小腹急滿。小便欲解不出。好似醫書所講的氣淋。其實何常是氣。實在是一種淋菌性膀胱炎的緣故。解剖起來。他的膀胱粘膜上。確確實實是有病變的。

第二種是屬於膀胱的疾病。膀胱受着各種細菌（結核菌，淋菌等）的傳染。或是外傷，感冒，中毒，急性傳染病的時候。膀胱發生炎症。或是膀胱發生腫瘍和潰瘍的時候。他的症候。就是尿意頻數、和放尿時候的疼痛。膀胱部（下腹部）的壓痛。小便瀾濁。好似舊醫氣淋一樣。有時往往混著血液。那就變成舊醫的血淋。倘是慢性的膀胱炎。安靜的時候。沒有多大病狀。勞動了或是身體不健全的時候。病狀就凶要起來。那時候豈不是也

可以叫他勞淋嗎。

第三種是屬於腎臟的疾病。有幾種腎臟病的時候。也有尿意頻數、血尿、小便溷濁等樣的症候。

第四種是尿結石症。正和舊醫的石淋或是砂淋相似。結石的成功。是因為尿中的成分。譬如尿酸、磷酸鹽類、碳酸鹽類等沈澱後所結成。他的大小。很不一定。有的小如砂粒。有的大如雞卵。他發生的地位。也有在腎臟內的。也有在輸尿管、膀胱或尿道內的。他的症狀。隨着結石的大小、形狀、地位。有種種的不同。譬如在腎臟或輸尿管的時候。發生腎石疝痛。就是腰部的劇痛。有時波及到膀胱、睪丸、上脛、背部、和肩胛。還有發熱、尿意頻數、血尿等等。倘是在膀胱或尿道。發生着奇異性的尿閉。就是有時候可任意小便。有時候不可小便。還有小便時候的劇痛和小便出血

淋病真相

等症候。

此外還有「乳糜血尿」。尿中混有血液。這是因爲一種住血絲狀蟲的寄生到腎臟內而發生的疾病。以及下面第六節所講尿道內種種的疾病。所以五淋白濁的名稱。實在很廣汎。凡是泌尿器系統上。譬如腎臟、輸尿管、膀胱、尿道上。受着一切的外傷、細菌的傳染、中毒等的時候。都可以發生尿意頻數、小便疼痛、分泌物流出、小便有血等病狀。所以科學醫的診病。醫師應當一一診斷他的地位和原因。方才可以叫做看病。否則因勞而發。叫做勞淋。小便熱赤。叫做熱淋。小腹急滿。叫做氣淋。有血叫做血淋。生石叫做石淋。那未免太容易看病了。

第五節 濁和精的分別

淋病也有人叫做淋濁。世俗對於濁和精。往往混爲一談。此混談的結果。

一方面增加病人的恐懼心。以爲精這樣的流。壽命一定不長。一方面因誤以爲精。不當淋病去醫治。耽誤了醫治的機會。臨症上替他解說。很是費時。現在特地把精和濁的分別。說明一下。讀者從此可以明瞭吧。

淋病的原因。是因淋病的病原菌竄入到尿道裏。尿道就因此發炎。除了紅腫、疼痛、灼熱之外。還流出一種白色或黃色的分泌物。俗就叫做濁。實在就是膿。他的內容。在顯微鏡底下檢查起來。是一種膿球、粘液、淋菌、上皮等的混合物。講到精液是什麼東西呢。是一種粘稠乳白色不透明的液體。有特別的精液臭味。他主要成分。有從辜丸製成的精虫、和各種的上皮細胞，特別的結晶體。還混有從精囊，攝護腺、輸精管、可氏腺和尿道粘液腺等所分泌的分泌液。所以兩者的成分。是絕對不相同的。那裏可以混談在一起。猜他所以誤解的理由。因爲一般患有淋病的人。十九因交

淋病真相

接而來的。交接的時候。往往有忍精不出的事情。又以精液的顏色和濁初起時的顏色差不多。遂誤以爲當時精液的停滯。隨時流出來的。還有一種要顧全面子的人。不願意人家說他是流濁淋。偏要官面些。自己強說是遺精。實在一個人那裏有這樣多的精可以流呢。

第六節 體虛可以發生白濁嗎

世人常常因羞耻的關係。又因爲諱疾的關係。不肯把疾病宣佈。明明是生了白濁。偏偏說是身體虛虧。濕熱下注。(舊醫就利用這兩句話。得到病人的信任。新醫用顯微鏡檢出淋菌給他看。有時還不信。這也是國民智識幼稚的表示嗎。)到了醫師的面前。還要諱莫如深。或曰余每身體疲乏。作事過多之後。往往即發生白濁。豈非是體虛白濁嗎。著者應之曰。上面不是已經講過淋病的原因是淋菌。好似種稻時候的稻秧。沒有稻秧。斷然

不會發生出稻來的。你第一次必定有了不正當的交接。傳染了白濁的病毒。就是淋菌。經過了不完全的治療。雖已經把顯明的痛苦消滅。但是他的病毒。還是隱伏著。遇著了你身體虛虧的時候。他就急性地發作起來。所以講你的病。還是淋病。還是有毒。身體的虛虧。不過是一種誘因。把你潛伏的淋菌。引發起來罷了。倘使你從來不曾傳染過淋病的病毒。任你身體虛弱到怎樣地步。斷然不會流白濁的。

第七節 淋病自己診斷法

患淋病的人。十九毋須經過醫師的診斷。自己知道經過了不潔的交接以後。覺到小便刺痛。尿意頻數。有白色牛乳樣的分泌物流出。病人多已經自己覺得有淋病了。再進一步講。把尿撒到玻璃杯中。見有許多的線條。在尿中浮游着。這就叫做淋絲。(參觀十八節)也就是有淋病的證據。

淋病真相

第八節 是否淋病第一次診斷的重要……和淋病相
似的病症

上面不是已經講過了。淋病的診斷。似乎很容易。但是吾人要知道尿道裏面發生的疾病。並不是一種。倘然第一次。醫師和病人兩方面。都不加詳細的診察。馬馬虎虎的診斷是淋病。不但病人受着無謂的痛苦。耗費金錢。損害身體。還要耽誤其他疾病的治療時期。在敷診所中。鄙人往往遇到這樣的事情。所以現在把可以引起尿道疾病的原因。一一記載在下面。要請讀者注意呢。

- (一) 沒有淋菌。因為有其他的細菌。例如化膿菌、重球菌侵入的時候。
- (二) 軟性下疳面發生到尿道裏面的時候。(軟性下疳是什麼。請參觀拙

著性病指迷)

(三) 泡疹發生到尿道裏面的時候。

(四) 硬性下疳發生到尿道裏面的時候。(參觀性病指述)

(五) 爲預防淋病。把藥液注入到尿道裏面。因藥液刺戟尿道粘膜的時候。

(六) 因勞働、外傷、長期交接、房事過度、手淫、乘馬。尿道受着損傷的時候。

(七) 因尿中的尿酸鹽、磷酸鹽、尿酸鹽等刺戟尿道的時候。

(八) 食物(香料、酒類)藥物(松節油、碘)等刺戟尿道的時候。

(九) 此外身體他部的疾病。同時發到尿道裏面的時候。譬如天泡瘡、紅色苔癬、麻疹、結核等。

凡是有上面種種的原因。都可以引起尿道發炎。有發生和淋病一樣的症候。如果諸君一有了尿道炎的現象。千萬不要急速地馬虎地自己診斷是淋

淋病真相

淋病真相

病。把身體來嘗試。應當請醫師診斷一下。方才不致誤了你的前途呢。鄙人診所裏。往往有一種憂心忡忡的患者。自承淋病。經鄙人詳細地診察。證明並非淋病。很歡喜地而去的不少。

上面所講的。是並非淋病。誤以爲淋病的情形。還有一種實在是非淋病。因爲他的症狀輕微。遂誤以爲非淋病。遺下禍根。釀成大患的也不少。所以尿道上面。一有了變化的情形。還是請醫師詳細地診察一下。不但可以診斷確實。還可以免去禍害。就是精神上。因爲有了真確的診斷。也安慰不少呢。

第二編 淋病的症狀

第一章 男子的淋病

第九節 急性前尿道淋的症狀

經過了不潔的交接以後。受着淋菌的傳染。並非立即發生淋病。須經過一定的潛伏期。（潛伏期就是從傳染着淋菌到病症發現的時間）大約二天乃至七天。最遠也有達一個月的。經過了潛伏期以後。病人覺到尿道口有輕微的痒感。繼而放尿的時候。有熱感。排泄些白色的粘液出來。在這個時候。病人大多不以爲意。後來放尿時的熱感。變成了疼痛。尿道口也發赤腫脹起來。並且有牛乳樣黃白色的膿流出。於是病人才覺到是淋病。而且每次的放尿。都是覺到疼痛異常。尿道內好似有沸水的注入。病人真有難堪的痛苦。這樣的經過了七天。因爲炎症的急劇。尿道的腫脹加甚。放尿的時候。有十分的疼痛和灼熱。尿線很細。甚至變成點滴狀。如果是舉起

淋病真相

淋病 真相

的時候。竟然不能放尿。倘使病勢再進行。包皮浮腫。發生橫痃。同時還有全身的症狀。就是發熱怠倦。食慾不振。甚至精神憂鬱、不眠。夜間陰莖往往勃起。疼痛異常。炎症劇烈的時候。甚至流出血液。那就是世人所稱的血淋了。

從發病以後。經過了二三週。症狀已經達到極點了。此後漸漸地有消散的傾向。疼痛緩和。排膿也減少。經過了三四週。尿也逐漸地清明。不過尿中還是混有線條狀的分泌物。醫學上就叫他做淋絲（參觀十八節）。

以上為急性的發作。但是也有緩徐的發作。起初時並不覺到什麼疼痛。僅僅朝晨尿道口有膿汁膠着。因為膿汁污染了衣服。方才引起病人的注意。去請求醫師。如果是一個大意的病人。竟不去就醫。隨後可以變成急性的發作。或者變成頑固不治的慢性淋病。世上不乏其例。

以上所講的。一種是急性發作的現象。一種是緩徐發作的現象。還有一種叫做亞急性的。譬如初起的時候。症候很輕。後來忽然變成急劇的急性症狀。總之淋病發生的現象。是千種千樣。萬種萬樣。各各不同。並非有一定的程式呢。

第十節 急性後尿道淋的症狀

急性前尿道淋病。到了第二週極期的時候。淋菌往往侵及後尿道。但是也有第一週或第二週侵及到後尿道的。如果到了後尿道。他的病狀。雖然有強弱種種的不同。但是有一種特別的症候。就是尿意的瀕數。病者須半小時或十五分間。排尿一次。尿量很少。因為瀕回的排尿。引起終夜的失眠。一方面不但尿意瀕數。而且每次排尿的時候。疼痛極甚。病人因此恐懼排尿。甚至排尿的時候。發痙攣狀。竟有不能放尿。而呈尿閉的症狀。還

淋病真相

淋病真相

有後尿道炎症劇烈的時候。往往有終末血尿。就是排尿完結的時候。有血液流出。此外還有夜間的遺精。遺精的時候。疼痛也很甚。所以有一種患前尿道淋的病人。忽然夜間發生尿意頻數或數次的遺精。雖沒有其他的病狀。也可以證明他的淋病。已經達到後尿道了。

後尿道炎除了上述的尿意頻數、尿閉、終末血尿、遺精之外。還有全身的病狀。就是夜間的發熱。會陰部的癢感。和疼痛性壓迫感。這是隨著各人身體的狀況。環境的不同。大有差異。

第十一節 前後尿道淋的分別

醫師除了上面的症狀。可以知道你發生前尿道淋和後尿道淋以外。同時還可以用兩杯試驗法。就是叫你排尿到兩只玻璃杯中。如果是前尿道淋的時候。第一杯的尿呈潤濁。第二杯是清明。如果是後尿道淋。那兩只玻璃杯

中的小便。都呈瀰濁。這是一個有力的證據。也叫做湯姆松氏兩杯試驗法。但是這樣的試驗法。當然以早晨爲真確。此外詳細的診斷。是屬於醫師的責任。此地不再細講了。

第十二節 前尿道淋變成後尿道淋的原因

前尿道和後尿道。雖然是有外括約筋來分界着。但是在急性症。病勢達到極期的時候。和下面所講種種的誘因。淋菌容易通過外括的筋。侵入到後尿道。但是也有沒有甚麼的誘因。發生後尿道炎的。現在把容易引起後尿道炎的種種理由。寫在下面。

- (一) 飲酒。無論什麼酒類。都是有刺戟性的。
- (二) 食香辣的和有刺戟性的食料。
- (三) 脂肪過多的食物。

淋病真相

淋病真相

(四) 性交 是最不衛生。還有一種迷信的人們。自己有了淋病。去和人交接。謂可以棄除淋病。這不但事實上沒有這一回事。而且一方面。固然傳染給人家。在自己一方面講起來。也往往把急性前尿道淋。因此變成後尿道淋。害人自害。這真是顯著的一例呢。

(五) 勞動 病人往往對醫師要求藥物的幫助。自己不知道安靜。去跳舞、體操、運動、激烈工作等等。都是有害的。

(六) 不適當的自己治療。病人自己往往因為經濟，時間和祕密等種種關係。自己去治療。把淋菌送入到後尿道。

(七) 不熟練的器械插入洗滌。也可以引起後尿道炎。

(八) 身體薄弱。如腺病質、結核、梅毒、貧血等病人。他尿道的粘膜。十分薄弱。雖沒有十分明白的原因。也可以侵入後尿道。

第十二節 後尿道淋的危險

淋病侵及到後尿道。好似外寇衝破國防要隘一樣的危險。因為淋菌在前尿道。受着損傷的。僅僅前尿道粘膜為止。倘使侵及到後尿道。不但後尿道局部受着影響。凡是屬於泌尿器系統上的各種器官。譬如膀胱、攝護腺、精囊、睪丸、腎臟等。都可以引起淋菌性的炎症。發生重大的危險。並且波及到後尿道以後。因後尿道有着豐富神經的關係。引起神經症候。（參觀二十四節）他的治療。就很不容易呢。

第十四節 慢性前尿道淋的症狀

急性淋的經過。大約四週到八週。如果還不全治。於是淋病的經過延長。漸漸變成慢性。慢性前尿道淋的時候。自覺的症狀很輕。僅僅早晨尿道外口。有白色乃至黃色的一小滴分泌物。或者因分泌物的乾燥。把尿道口膠

淋病真相

著。尿道裏面。往往有輕微的痒感或灼熱感。大意的病人。就自己以為治愈了。但是他尿道的粘膜。形成癩痕的時候。可以發生放尿時候的疼痛、放尿困難、尿線分離或不正、尿淋漓等現象。至於全身的症狀。往往有腰骨薦骨部的放散痛。如果是神經質的病人。往往變成神經衰弱症。醫師用湯姆松氏二杯試驗法。可以見到第一杯的尿有淋絲。

第十五節 慢性後尿道炎淋的症狀

世上最多的老白濁。就是這個慢性後尿道炎淋。患着慢性後尿道炎淋的人。大多沒有十分著明的苦痛。分泌物的量也很少。僅僅勞動。交接。飲酒等時候。稍有些分泌物流出。不過三天後。就可以恢復原狀。所以病人盡有以自己為健康。毫不介意的。如果用二杯試驗法。可以檢查出第一杯和第二杯的尿。都有細小約淋絲。有時候也有尿意的頻數。大便的時候或交

接的時候。這樣的感覺更強。尿道內往往有疼痛、搔痒、灼熱、壓迫等感覺。還有精液漏，攝護腺漏，遺精。和性交時候的缺乏快覺。早洩。射精時的疼痛等。

此外有慢性尿道炎的病人。有一種十分著明的痛苦。就是發生種種的神經障礙症候。（請參觀二十四節）累得病人十分受苦。還有當時雖沒有十分苦痛。經過數年或是十數年以後。引起尿道的狹窄。發生尿閉等症候。（參觀三十節）

第十六節 急性淋變成慢性淋的原因

急性的淋病。如果受着合理的治療。經過四週乃至八週。是可以全治的。但是往往因種種的原因。使急性變成慢性。現在把他的原因記載在下面。還請大家注意呢。

淋病真相

淋病真相

(一)怠慢和不攝生。有一種人。患著淋病。好似不算一回事。任淋病遷延潛伏。或是治療到沒有痛苦的時候。就放任他。或者因為不攝生（請參觀五十七節淋病人人的攝生和注意。）致急性變成了慢性。

(二)錯誤的治療或是不完全的治療。譬如僅僅購服賣藥。吞服丹方。或是僅僅服藥和注射。沒有局部的治療等等。

(三)身體的關係。有梅毒，結核，糖尿病等的人。容易變成慢性。

(四)尿道粘膜的特異性。尿道的粘膜。也隨着人而不同。有一種人有容易變成慢性的傾向。

(五)尿道解剖上的關係。如果有副尿道管，大的嗎氏竇，長大的腺管，或尿道口的狹窄。都能夠把炎症遷延下去。

第十七節 慢性淋病有怎樣的危險

世人雖大多知道慢性淋的難治。但是沒有知道慢性淋病有怎樣的危險。往往放任着不加醫治。如果知道了有下面的危險。吾想大家必定早去醫治了。

(一)急性再發 世人以爲淋病的急性症候經過了。從此可以太平無事。就沒有危險。這是一種很錯誤的觀念。原來不把淋病醫治斷根之後。就是你永遠不去尋花問柳。可是潛伏的淋菌。仍舊可以發作起來。變成急性淋的狀態。這就叫做再發。

(二)急性合併症的出現 尿道裏有了潛伏的淋菌。不但損害尿道。還可以隨時作祟。侵及鄰近和遠隔的臟器。譬如侵及到睪丸。發急性睪丸炎。轉移到關節和心臟。發生急性關節炎和心臟炎。都是有很大的痛苦和危險。

淋病真相

(三) 狹窄的形成 尿道受着淋菌的侵及。柔軟的粘膜。就結成了硬固的癭痕。因癭痕的收縮。引起尿道的狹窄。尿道狹窄的結果。使病人不能排尿。有因此引起尿中毒、膀胱破裂、腹膜炎等等的危險病症。

(四) 有傳染於對手方的危險 歡樂健康的家庭。因為一方受着淋菌的侵及。已經受着很大的痛苦了。一方面又要傳染給一個無辜的愛妻。也使他受着很大的痛苦。(參看後面所講女子的淋病) 歡樂健康的家庭。就此打破。充滿了愁雲慘淡的空氣。吾知道受過了這樣痛苦的人。方才明白吾的話呢。

第十八節 淋絲是什麼

上面講過了許多的「淋絲」。讀者當未明瞭淋絲是什麼東西。就是懂得了淋絲的名稱。或者還未能澈底明瞭淋絲的意義。所以編者特地在此再申述

一下。

淋絲究竟是怎麼樣的東西呢。倘使由顯微鏡去檢查。可以見到粘液、上皮、和膿球。膿球裏面還包含着許多的淋菌。倘使用肉眼檢查。可以見到淋絲有三種的狀態。第一種叫粘液絲。是細長粘液樣透明的狀態。浮游到尿中。並不沉澱。用顯微鏡檢查。只見有粘液和上皮。第二種叫做粘液膿樣絲。比較第一種稍稍不透明。尿排泄出來的時候。雖是浮游在尿中。後來漸漸地沉降下去。用顯微鏡去檢查。可以看到粘液，上皮，和少量膿球。第三種叫做膿絲。是短小白色較大的淋絲。常常沉澱到玻璃杯底下。用顯微鏡去檢查。是從膿球而成。不過僅有少數的粘液罷了。

淋病病人的尿中。除了淋絲之外。還有一種微小點狀的浮游物。呈雲絮狀。這是尿道腺的分泌物。

淋病真相

淋病真相

講到淋絲和淋病。有怎樣的關係呢。就是患有淋病的人。他的尿道粘膜發着炎症。就有粘液膿汁和剝脫的上皮。停留到粘膜上面。排尿的時候。被尿沖洗出來。就變成絲的狀態。在急性的時候。雖不檢查小便。也可以一望而知。但是慢性淋病的時候。病人雖然自覺的沒有痛苦。和他覺的也沒有分泌物流出。倘是檢查尿的時候。就可以發見淋絲。所以講有淋絲。就可以說他有淋病。淋絲的裏面。是有淋菌潛伏着。遇到了各種的誘因。譬如交接，飲酒，過勞等的時候。淋病就可以再急性的發作起來。所以有過淋病的人。應當注意他的小便。有沒有淋絲。最好用早晨第一次的小便。見到了淋絲。應當就去請醫師診斷和治療。上面已經講過了。淋絲是淋病病人的表記。淋病人見到了淋絲。當然是煩悶的。但是有一種淋病病人。雖然經過醫師合理的治療。他的尿中。還是有著第一種粘液性的淋絲。

和點狀的浮游物。如果是醫師已經用過種種檢查的方法。證明尿道上和其他的附屬器。都沒有淋菌。病人儘可放心。用不着擔憂。如果終日戚戚地。反因此引起了神經衰弱的病症。然則這樣的粘液和點狀的雲絮物。從那裏來的呢。是因為淋病後的單純性尿道炎的緣故。好似兵燹後的遺跡一樣。（參觀八十九節淋病後的尿道炎）

第二章 男子淋病的合併症

怎樣叫做淋病的合併症呢。就是尿道因為染著淋菌。發生炎症以外。同時再引起尿道鄰近臟器疾病的意思。在淋病的各個時期。都可以發生。倘以前後尿道淋論起來。在後尿道淋的時候。更容易發生。發生合併症的原因。最多的是不攝生和運動。但是也有沒有顯著的原因。發生合併症的。現在先把男子淋病的合併症。擇他緊要的。一一的記載在下面。

淋病真相

第十九節 龜頭炎、包皮病、和包皮嵌頓

尿道淋病的時候。如果是包皮長而且狹隘的病人。因為膿蓄積到包皮裏面。受著刺戟。包皮的內葉和龜頭。就發生炎症。在這個時候的炎症。大多不很劇烈。僅不過外面的包皮稍稍腫脹。不容易翻上去。倘把包皮翻轉。將膿拭去以後。就可以看到包皮的內面和龜頭。發赤腫脹。有時竟有一部分發生糜爛。大多呈圓形的斑點狀。如果是龜頭炎症劇烈的時候。那包皮發赤浮腫也很甚。當注射藥水的時候。或因勃起包皮翻上的時候。包皮再也不容易翻轉下來。這樣的狀態。醫學上叫做「炎症性包莖」。也叫做「包皮嵌頓」。倘不急速把他醫好來。這樣的緊匝。龜頭就有壞死的危險。也有因包皮浮腫和膿停留非常強烈的時候。發生血液循環的障礙。包皮內葉和龜頭一部分。陷於腐敗和壞疽。倘使放任不去醫治。包皮穿孔。龜頭

脫出。水久殘留穿孔的癢痕。

第二十節 副尿管的炎症

男子除了正常的一條尿道之外。往往在外尿道口唇、冠狀溝、繫帶的側方、陰莖皮膚的縫線、尿道內面等地方。有點狀的小孔。倘使從此等小孔。送入探針。就可以發見一個管子。這就叫做副尿管。也叫做側管。

副尿管可以傳染淋病。普通大多因尿道先有淋病。然後傳染到副尿管的。也有當不潔交接的時候。副尿管先傳染着淋病的。

副尿管既然傳染着淋菌。在淋菌一方面講起來。好似得到一個安全隱藏的地方。也就是他的巢窟。在醫師一方面講起來。藥液的洗滌。往往不容易達到。所以不注意副尿管的淋病。尿道淋病的不容易治癒和治癒後的再發。都是這個副尿管中的淋菌作祟呢。

淋病真相

第二十一節 淋菌性淋巴管炎和橫痃

急性淋病的時候。陰莖的淋巴管。往往發生炎症。就在陰莖的背部。有線香樣的條索。皮膚也有發赤的。這樣的淋巴管炎症。往往波及到鼠蹊淋巴腺（就是大腿和下腹交界的部位）。發生着淋菌性橫痃。這樣發生的橫痃。雖然沒有軟性下疳橫痃樣的痛苦劇烈。但是比較梅毒性橫痃痛苦來得利害，往往有發生化膿的傾向。非手術不可的。

第二十二節 淋菌性急性攝護腺炎

要談論攝護腺炎之前。不可不先明瞭攝護腺的解剖地位和生理作用。原來攝護腺是一種栗子形狀的腺體。含有豐富的血管和神經。位置在膀胱的下面。基底向後方。尖端向前方。前面和恥骨軟骨相接觸。後方和直腸相接觸。前部和尿道相通。所以要檢查攝護腺。要從肛門內診察。方才可以觸

到。

講到他生理上的作用有二種。一種是外分泌的作用。一種是內分泌的作用。什麼叫做外分泌的作用呢。就是攝護腺分泌一種牛乳樣稀薄的液體。有一種特異的臭氣。就叫做攝護腺液。他能夠使精蟲的活動旺盛。對於生殖上是很重要的。所以攝護腺有病的人。往往成功不妊的原因。什麼叫做內分泌的作用呢。就是攝護腺產生著一種叫做攝護腺「賀爾蒙」的。能夠催促男性生殖器的發育。尤其對於舉丸。更有功效。

吾人明白了上面所講的攝護腺的解剖地位和生理作用以後。那攝護腺炎所發生的種種症狀。自然也明白了。現在先講急性攝護腺炎的症候。

急性攝護腺炎大多跟着後尿發炎而發生。往往因飲酒、房事過度、感冒或不適當的手術療法。惹起攝護腺的炎症。隨着病的輕重。可以分做三種。

淋病真相

淋病真相

第一種叫做加答兒性攝護腺炎。炎症僅僅波及到攝護腺排泄管。是一種最輕的病症。病人僅不過覺到尿意頻數和放尿時的疼痛。好似後尿道炎一樣。排尿到玻璃杯中。可以見到第二杯尿中有膿球和腺分泌物所做成的棉化樣物質。沒有其他痛苦。第二種叫做濾胞性攝護腺炎。那時候的膿性分泌物。蓄積到排泄管和腺管裏面。也有排泄管閉塞。做成小小的膿瘍。這個時候的病人。除尿意頻數之外。還有放尿和放尿終了時的疼痛。尿的溷濁。也和加答性攝護腺炎相同。不過從直腸去診察的時候。覺到有一個圓形有痛的結節。病人雖則因排尿疼痛和尿意頻數。發生苦惱。但是大多無熱。所以還可以從事工作。這樣的攝護腺炎。慢慢地病勢進行。侵犯腺的實質。第三種叫做實質性攝護腺炎。就是腺的全部或是一部。發生炎症。攝護腺肥大腫脹。病人自覺肛門和會陰部有壓重的感覺。尤以在直腸裏面。

好似有異物存在的感覺。放尿疼痛。稍有發熱。倘使變成膿瘍的時候。苦痛更甚。舌苔乾燥。食慾不振。肛門和會陰部有緊張感和壓痛。有時發生劇痛。甚至不能排尿。發生尿閉。好似發生重篤的疾病一樣。等到膿瘍破潰。症狀自然消退。或則再變成膿瘍。再形破潰。變成慢性攝護腺炎。急性攝護腺炎的結果。往往發生生殖不能。一種是因爲攝護腺分泌作用的停止。一種是因爲癥痕的收縮。腺管閉塞或牽引的緣故。

急性攝護腺炎最危險的情形。是發生腺周圍的結締組織炎、血塞生成、靜脈炎、膿毒症等。也可以發生生命的危險呢。

第二十二節 淋菌性慢性攝護腺炎

上面所講的急性攝護腺炎。如果不加醫治。或醫治不徹底。外觀上雖似乎沒有痛苦一樣。實則已漸漸移行到慢性。講到慢性攝護腺炎的原因。除了

淋病異相

淋病真相

淋疾以外。就是尿道狹窄、膀胱疾患、房事過度、外傷等。也可以發生的。
慢性攝護腺炎。也可以分做二種來講。第一種是輕度的。病人不覺得有什麼痛苦。不過覺到淋病治愈以後。尿中的淋絲還有。醫師檢查他的攝護腺。所取得的分泌物。用顯微鏡檢查起來。方才可以診斷他患着慢性的攝護腺炎呢。

第二種病人覺到中等度的尿意頻數。放尿的時候。尤以末期疼痛。會陰及直腸部的知覺異常。此外排使、交接、或是遺精的時候。有壓迫、膨滿、痒感、疼痛等感覺。並且還有種種的神經症狀。譬如性慾的減退、交接沒有快感、交接不能、早洩、遺精、背痛、頭重、憂鬱等等。好似舊醫所講的腎水虧耗一樣的症狀。實際上講起來。並不是腎臟的疾病。是因為攝護

腺生理上發生變化。引起內外分泌的障礙。和攝護腺含有豐富神經的緣故。此外慢性攝護腺炎的一個主要症狀。叫做「攝護腺漏」的。原來攝護腺的分泌物。是稀薄溷濁乳汁樣的顏色。倘是慢性炎症的時候。常常有濃厚溷濁粘液樣或膿樣的分泌物流出。尤以大便小便的時候。排泄出來的更多。世俗所稱的滑精或是精關不固等。就是這個「攝護腺漏」。有時也混有精虫。那就叫做「精液漏」。兩種的檢別。自然是需要顯微鏡的檢查呢。慢性攝護腺炎除了上述的症候以外。還有一種叫做殘留尿的。就是排尿完結了以後。還有小便淋漓的意思。也有小便終了。有砂樣物質的排泄。以上所講攝護腺炎的診斷。醫師除了病人所報告的症狀以外。應當從肛門診察攝護腺的狀態。和顯微鏡的檢查攝護腺分泌物。方才可以確實診斷。並且還可以斷定疾病的輕重呢。

淋病真相

第二十四節 攝護腺神經症或叫做情慾性神經衰弱症

上面把攝護腺發炎時候的神經症候。大約已經講過了。但是這樣的攝護腺神經症。臨床上是常常遇到的。所以想再另立一節。仔細一些的告訴大家罷。

一個人患了淋病以後。往往發生遺精、腰酸、容易舉陽等種種的症狀。在舊醫講起來。不說是腎虧體虛。便說是相火旺盛。或是精關不固。在新醫上講起來。大多是淋病後的攝護腺神經症。也叫做情慾性神經衰弱症。原來後尿道攝護腺部陰阜的地方。便是神經最多的地方。倘使淋病不知不覺地從前尿道蔓延到後尿道。並且蔓延到攝護腺。等到急性症狀經過後。就會遺留著情慾性神經衰弱症。他的症狀是很多。吾現在把他分做二種來講

。一種是局部的症狀。一種是全身的症狀。

(甲)局部的症狀。講到局部的症狀。譬如患者往往覺到會陰部（就是肛門和陰莖的中間、吾國叫做海底的、）有重感。或是鈍性的壓迫感。或是尿道，睪丸、直腸內有痒感。此等的異常感覺。或永久存在。或有時發作。患者頗為苦痛。有時不但有這樣異常的感覺。而且有劇烈的疼痛。此疼痛不但僅僅發生在後尿道和攝護腺。而且放散到肛門、鼠蹊部、（就是下腹和大腿的交界部）睪丸、大腿、薦骨等部位。發作性的出現。常常因運動、坐椅不適、或是放尿射精時而發生。或使疼痛加甚。病人竟有坐立不安的狀態。還有一種重要的症狀。就是攝護腺漏。在大便之後。或是放尿完結。在尿道口有精液樣物的流出。患者因此頗為恐懼。誤以為流出的是精。惶恐的去就醫。其實何嘗是精液。不過是一種攝護腺的液體。但是也有

淋病真相

淋病真相

一種真正的精液漏。這是因為淋菌侵犯到精囊的時候所發生的。兩者的區別。是要醫師用顯微鏡去檢查。就可以明白知道了。

放尿障礙。也是常見的現象。大多是尿意瀕數。或是放尿疼痛。這樣的尿意瀕數。有在夜間劇烈。也有在一日中一定的時候劇烈。譬如早起或黃昏的時候。排尿時候的尿線。因括約筋痙攣。忽然半途絕。或尿線時大時小。或是放尿終了。尿道裏面。還有若干的尿。未曾排盡。滴瀝而來。濕潤衣服。因之患者當排尿終了後。往往故意擺動陰莖。或是壓迫尿道。想排除這殘餘的尿。利害的往往因這樣的尿淋漓。引起了包皮和陰囊的濕疹。關於生殖方面。也有着種種的障礙。患者陰莖往往容易勃起或遺精。射精後尿道內常有灼熱的感覺。劇烈時竟永久持續。他的疼痛放散到直腸。此外還有交接時缺乏快感。和勃起力的衰弱。成功了早泄和陰萎。

(乙)全身的症狀 有了慢性攝護腺炎以後。患者的全身症狀也受着很大的影響。除了上面所講的局所症狀以外。往往有放散性的知覺異常、薦骨痛、背部痛、頭痛、眩暈、心悸、便秘、怠倦、不眠、容易疲勞、和恐怖觀念等。患者的性質。因此陰鬱起來。對自己的命運。常常悲觀。感觀自己的疾病。過於重篤。肉體的和精神力的活動力減退。結果竟懷着一種厭世的觀念。此等總稱之曰情慾性神經衰弱症。

上面所講的情慾性神經衰弱症。最多的原因。便是淋病。此外手淫、乘車、乘馬、房事過度、交接中絕等。也都可以發生本症。但是發生本病的人。大多有神經質的素因。加以一種的動機。譬如冷水灌腸、冷水浴、坐於石上、直腸部的刺戟、後尿道部的不適當治療等。都可以引起本症。

第二十五節 淋菌性急性精囊炎

淋病 真相

淋病真相

淋病波及到後尿道。侵犯着精阜。精阜就是攝護腺和輸精管的開口部。淋菌就可以從精阜達到攝護腺。引起攝護腺炎。達到輸精管。引起精囊炎。攝護腺炎上節已經講過了。現在來講精囊炎。

講到精囊炎發生的原因。除了淋菌傳染以外。就是手淫、房事過度、交接中絕、不規則的生殖作用等。也可以引起急性精囊炎。講到他發生的誘因。譬如乘馬、疾走、體操、荒淫、不合理的治療、不適當的器械療法。都可以把淋菌或其他的細菌轉移過去。

急性精囊炎的症候。沒有一定的定型。現在也可以分做三部分來講。

第一 局部的症狀 病人所感覺到的局部症狀。有種種的不同。譬如下腹部的膨脹感覺。從精囊部發生、向周圍放散的疼痛感覺。會陰和肛門部的不快感覺。放散到陰莖部的刺咬樣和痒樣的疼痛感覺。發生於薦骨部、放

散到睪丸和鼠蹊部的壓迫感和疼痛感覺等種種。此外還有膀胱腎臟部的疼痛和壓迫感。又當排便的時候。精囊受着劇烈的刺戟。疼痛尤甚。有時還有裏急後重的意思。關於小便方面。有尿意頻數，放尿時候的壓迫和疼痛，尿道痒感。甚至發生膀胱痙攣、完全尿閉等等。

第二 生殖器神經症狀 此爲重要的症狀。輕度的時候。僅不過覺到知覺異常。也有患者發生極度苦悶的。就是生殖性刺戟。極爲高度。常常發生疼痛性的色慾亢進。頻繁的遺精和勃起障礙。或反而時時勃起。病人因連夜的疼痛性勃起。引起睡眠不足。陷於精神不安。甚至每次勃起。發生遺精。流出混有膿或血液的精液。病人因此引起極度的恐慌。又患者往往患早洩。或交接之終。有痲痛樣的疼痛。有時勃起力減弱。或竟至完全陰萎。又因精囊輸送管栓塞的結果。發生精液減少或精蟲缺乏。以上的症狀。

淋病真相

對病人的精神上。影響甚大。變成憂鬱。更因疼痛性勃起和遺精。令病人益加恐懼不安。

第三 全身的症狀 輕度的時候。病人覺到沈鬱憊倦。但是還可以勉強工作。倘使病勢進行。變成膿瘍的時候。就要發生三十九乃至四十度的高熱了。也有不數天而和平下去的。也有膿瘍破潰。侵及到鄰近的重要臟器。發生腹膜炎而致命的。

第二十六節 淋菌性慢性精囊炎

慢性精囊炎的發生。大多從急性期漸次達到慢性期的。講到他的症狀。也沒有特別的現象。差不多和慢性攝護腺炎或後尿道炎相似。僅僅醫師診察時和檢查分泌物時。方才知道精囊發生異常。但是慢性時期的神經症狀。和生殖神經衰弱症狀。大多比較急性時期為強。病人常常覺到疼痛性勃起

、色慾亢進、夜間遺精等。而且遺精時候流出的粘液。混有血液。這是一種特點。倘使患病時間長久的慢性精囊炎。對生殖方面。變成性慾缺乏、或陰萎。勃起力減退或不全。以及早洩，精液缺乏，不妊症等不快症候。病人遂陷於憂鬱的狀態。

慢性精囊炎時。還有一種常見的症候。叫做精液漏。就是大便或小便之後。有乳糜樣的精液漏出。和慢性攝護腺炎時候的攝護腺漏一樣。俗就叫做滑精。或也叫做精關不固。

精囊炎對於生育的關係 男子的精囊。好似女子的喇叭管。女子的喇叭管閉塞。卵子不能達到子宮。就沒有受孕的希望。男子的精囊。因發炎的關係。往往發生兩側精管的閉鎖，狹窄，或屈曲。引起精虫缺乏，或精液缺乏如症。變成了男性的不妊症。

淋病 真相

第二十七節 淋菌性副睪丸炎

淋菌性副睪丸炎。俗叫做小腸氣。也叫做疝氣。是淋病合併症中最多的病症。有發生於一側的。也有發生於兩側的。不過發生於兩側的。屬於少數。他發生的原因。就是淋菌侵犯到後尿道。達到精阜。再從輸精管達到副睪丸。便引起了副睪丸的炎症。最多發生在急性淋病第二週乃至第三週。講牠的原因。固然是淋菌。但是也需要一種誘因。譬如暴飲，房事過度，身體劇動，乘長途長汽車及腳踏車，以及急性淋病時之尿道內器械插入和洗滌療法等等。都可以引起本症。

急性副睪丸炎發作的時候。一見很健康的人。在鼠蹊部（就是大腿和下腹的交界部）和睪丸部。突然發生劇烈的疼痛。同時有發熱和全身症狀。也有先發生全身違和，胃口不開，尿意頻數等前驅症狀。然後發生睪丸炎的

。這樣的經過一二天之後。副睪丸就變成胡桃大的腫脹。有壓痛。倘使炎性腫脹加甚。則疼痛劇烈。腫脹也益甚。二三天以後。睪丸達到著明的腫大。同時陰囊也浮腫。全部分竟達到手拳的大小。而且表面發赤緊張。病人因此疼痛性的腫脹。身體不能運動。難以直立、倘使步行的時候。非把兩大腿張開或以手去支持睪丸不可。僅僅仰臥的時候。苦痛最少。於是病人只好終日仰臥著。而且非把病側的大腿。向腹部屈曲不可。

當副睪丸發炎的時候。同時精系也發生炎症。就是輸精管變成鉛筆樣大小有疼痛的條索。同時圍繞血管索的結締組織。也發生炎症。這叫做淋菌性精系炎。此外還有一種不快症狀。就是遺精。精液爲黃綠色。混有膿汁。又當副睪丸發炎的時候。本來急性尿道炎的炎症症狀。譬如尿道的疼痛和漏膿。一時有減退的傾向。等到急性期經過。漏膿和疼痛。依然如故。這

淋病真相

淋病真相

是因為副睪丸炎發生高熱的緣故。所以世俗往往有誤會把尿道的淋病頓挫治愈。變成副睪丸炎的解說。

上面所講的炎症現象。到第四至第五天。是病勢已經達到頂點了。更經過二三天。能夠保持靜止的狀態。則發熱逐漸減少。局所的症狀。也逐漸消退。但是副睪丸的腫脹。還長時間保留著。有達到數週或是數個月的。此後雖也有完全吸收。不留痕跡。但是大多數往往殘留一小部分的硬結。倘或遇到了外界的刺戟。仍舊照前一樣的急性再發的也很多。普通副睪丸炎以後。往往發生睪丸的神經痛。

以上所講的是一般的經過。倘使炎症極其劇烈。當病勢極盛期的時候。副睪丸有發生化膿的傾向。就是高熱不退和持續性的副睪丸劇痛。變成膿瘍。結果向外方破潰。睪丸就殘廢。或竟遺留著屢孔。最不幸的。因精系的

炎症。發生腹膜炎而致命的。也不乏其例呢。

第二十八節 淋菌性膀胱炎

淋菌容易從前尿道達到後尿道。再從後尿道達到膀胱。發生膀胱炎。普通大約發生在傳染後第三週或是第四週。也有因為器械的插入，亂暴的注入，乘馬和種種的不攝生。在尿道傳染淋菌一二週的時候。就發生淋菌性膀胱炎起來了。

淋菌性膀胱炎的時候。後尿道炎也同時存在。所以這個時候的症狀。就是後尿道炎和膀胱炎共同發生的症狀。譬如尿意頻數，放尿時候的疼痛、尿溷濁、發熱，食慾不振，全身遠和等等。倘是純粹的急性膀胱炎。病人晝夜間只少要每二小時小便一次。重症的時候。小便的時間。更加短縮。幾有時刻非小便不可的狀態。疼痛在膀胱炎的時候。也很激烈。尤以小便的

淋病真相

淋病真相

時候和小便終了的時候。疼痛更甚。痛的部位。大多在下腹部、會陰部。倘使後尿道炎和膀胱炎並存的時候。全部尿道都覺疼痛。並且有時放散到肛門。此外還有尿的淋漓和小便完結後的排泄血液出來。此不但在膀胱炎的時候。倘同時並發急性後尿道炎的時候。尤為一種特殊的症候。

上面所講的膀胱炎。醫師用兩杯法檢查小便的時候。不但第一杯的小便溷濁。第二杯也混有多量的膿汁呢。

這樣的膀胱炎。如果醫治得宜。八天乃至十天。他的急性症狀。可以消散。但還不能完全治愈。病人排尿的回數。比較普通稍多。而且排尿的時候。有不快感。尿也溷濁。須經過長時日以後。方才漸漸治愈。但是往往有急性再發作的傾向。逐漸變成慢性膀胱炎的也不少。還有病人的抵抗力不強。或是蔓延程度加甚。也有死亡的例。倘是淋菌從膀胱達到輸尿管。再

從輸尿管達到腎臟。那時候危險的程度。也很難預測呢。

第二十九節 淋菌性腎盂炎和腎臟炎

急性或是慢性尿道淋病的時候。淋菌往往有達到腎盂或是腎臟的事情。就引起淋菌性腎盂炎和腎臟炎。但是除了淋菌以外。往往有混合傳染。譬如葡萄狀球菌、連鎖狀球菌和大腸菌。

腎盂腎臟發炎的時候。病人大多先覺到惡寒戰慄。發三十九乃至四十度的高熱。倘使不幸腎臟形成膿瘍。那末惡寒戰慄。長久持續。發生消耗熱。還有往往變成重症的尿敗血症。就是脈搏微弱、嘔吐、嗜眠狀態等種種。同時還有腎臟部的疼痛。大多發生在單面。兩面同時發生的很少。尿意頻數。雖不是腎臟炎特有的症狀。但是因為同時大多有膀胱炎併發。所以尿意的頻數。也往往發生。此外還有胃腸的障礙。譬如舌被厚苔，食慾不振

淋病真相

、嘔吐，便秘，下痢等。

腎臟炎時候。客觀上最重要的症狀。就是尿的變化，尿量減少，溷濁，尿中混有膿汁，血液、粘液，淋菌、和其他種種的細菌。如果侵及腎臟實質的時候。尿中還有蛋白質。

上面所講急性淋菌性腎臟炎的預後。雖則有經過迅速良好的。倘是伴有重症化膿性膀胱炎，或腎盂炎。和經過慢性的時候。往往容易變成重篤的疾患。而且他的經過也很長呢。

第三十節 男子尿道狹窄

尿道狹窄。不能講是淋病的合併症。實在是慢性淋病後的續發現象。原來健康的尿道。有彈力。就是能夠有擴張的意思。倘使發生了淋病。尿道的深部組織。變成硬固。硬固的部份。就變成狹窄。凡是當時炎症最利害的

部份。硬固也愈甚。硬固愈甚的部位。狹窄也愈甚。極度的時候。竟至肉眼不能見到尿道的通路。

講到尿道狹窄症狀的發見時日。是很久久的。大概在急性淋病經過後。半年乃至一年。倘使病人不注意。等到放尿困難發現。方才覺到的話。那末大概已經有四年或是六年的經過了。尿道狹窄症狀的發現。既然是這樣的遲緩。所以疾病不急劇進行的話。病人多不覺到自已已有尿道狹窄的病。最多告訴醫師的。是尿線的變化。就是尿線比較以前細小。射出力也減弱。倘使狹窄的程度愈甚。尿線也愈細。甚至點滴而下。病人非用力努責或作種種的姿勢。不能排尿。所以每次排尿的時候。往往非數分鐘不可。倘使病勢進行。病人雖怎樣的努力。終不能把膀胱裏邊的小便排泄盡淨。因之膀胱裏邊。終殘留幾何的小便。膀胱漸次失其彈力和收縮力。發生尿的淋

淋病真相

滴。還有狂飲、荒淫、心身過勞、感冒等的時候。僅僅有一線可通的狹窄部。因上述的原因。狹窄部發生充血。於是一滴的小便。也不能流出。變成急性的完全尿閉。此時如果不能從尿道導尿的話。非用膀胱穿刺術不可。否則就有膀胱破裂的危險。

患尿道狹窄的病人。除了上述尿線異常之外。小便的時候。在窄狹部有輕度的疼痛、熱感、燒灼感。射精的時候。發生疼痛。也有精液因狹窄部不能向外流出。逆流到膀胱。就成爲不妊症的原因。

這樣尿道狹窄的結果。更形成種種的續發症。譬如尿道形成膿瘍。膿瘍破裂。變成瘻管。甚至膿瘍的毒。轉展的達到腹膜。引起腹膜炎。或發生敗血症。病人就傷失他可寶貴的生命。此外還有波及到膀胱。引起膀胱炎。波及到輸尿管和腎臟。發生輸尿管水腫、腎水腫和腎盂炎等等。

以上是尿道狹窄的大概情形。所以曾經患過淋病的人。經過了相當的時期。應當請求醫師檢查自己的尿道。有否異常。免之將來種種危險的發生。實在是一件很重要的事情呢。

第三章 女子的淋病

第三十一節 男女淋病的異點

女子的生殖器。和男子一樣容易傳染淋菌。所以他的症狀。雖是大同小異。可是男女生殖器的構造。完全不同。所以傳染淋菌後的經過。也完全異趣。現在把男女傳染淋病不同的地方。記載在下面。第一男子的淋病。大多先限局的在尿道粘膜上發生炎症。引起著明的症狀。侵犯到其他的生殖器部份。比較的遲。女子傳染淋病後。容易擴大蔓延。所以發生全身傳染。也比較男子為早。而且是很強烈的。第二男子的淋病。容易認知。女

淋病真相

子有淋病的時候。臨床上往往不容易認識。所以女子有自以爲很清淨的。實是在是有淋菌潛伏著。第三因爲女子的生殖器構造複雜。一次傳染淋菌以後。難以施行適當的治療。所以比較男子容易變成慢性。第四女子發生的淋病合併症。比較男子的淋病合併症。頑固難治。第五女子因爲重篤的生殖器疾患。發生不妊症的很多。男子就比較的少。

以上把男女發生淋病後的差異點。已大約述過了。現在要講女子傳染淋病的原因。這也和男子相同。就是十九由交接而起。此外因爲洗浴、寢衣、手拭、浴巾、游泳等等。也都可以傳染。

女子傳染淋病後最初發生的部位。大多爲尿道和膀胱。次之爲輸尿管、腎盂、巴氏腺、外陰部、膻、子宮頸部、子宮體部、喇叭管、卵巢、和圍繞此等臟器的組織。現在逐一的記載在下面。

第三十二節 女子急性淋菌性尿道炎

要講女子急性淋菌性尿道炎之前。不可不先明瞭女子尿道解剖上的特點。就是女子的尿道短而直。不如男子的尿道長而彎曲。女子的尿道。構造簡單。沒有大的腺。男子的尿道。構造複雜。而且有很多的腺。所以女子尿道的淋病。比較男子爲輕。就是這個道理。

女子不幸傳染淋菌的時候。淋菌就占居尿道內或外尿道口附近。經過二三日或數日的潛伏期以後。發生輕度的惡寒發熱。尿道的粘膜。發生炎症。有白色或是黃綠色的膿汁樣液。從尿道口流出。其中含着許多的淋菌。當時尿道外口。也和男子急性淋病時一樣。發赤腫脹。尿道粘膜。稍稍翻出。病人自覺的在尿道口有輕度的灼熱和痒感。此後炎症症狀。漸逐增加。熱感和痒感。變成疼痛。尤以小便的時候。更加利害。而且同時有尿意頻

淋病真相

淋病真相

數。可是女子急性尿道炎淋的經過。因為上面所講女子尿道解剖上的特點。沒有男子那樣的症狀劇烈。大多經過三週。可以治愈。但是往往變成慢性。慢性的時候。壓榨尿道。有稀薄乳汁樣的粘液樣膿汁流下。尿還溷濁。並且含有淋絲。女子尿道炎淋。除了上述症狀以外。還有在尿道周圍作成膿瘍的事情。

檢查女子尿道淋的淋菌。在急性的時候。固然是容易。在亞急性或是慢性的時候。就不容易檢查出來。因為往往有其他的細菌被覆着。還有女子尿道的發炎。不一定是由於淋菌。常常有因為其他的細菌。例如大腸菌，普通的膿菌。往往也可以發生同樣的尿道炎。又據福氏(Frohne)的經驗。在春機發動期的女子或是好色的婦人。也容易發生非淋菌性的尿道炎呢。

第四章 女子尿道淋病的合併症

女子傳染淋病以後。和男子一樣的可以發生種種的合併症。譬如巴氏腺炎、膀胱炎、外陰部炎、子宮頸和子宮體炎、喇叭管炎、卵巢炎、腹膜和骨盤結締組織炎。惹起不妊症和生命的危險。而且女子的淋病合併症。往往比較男子的合併症。來得頑固難治。此一則因為女子生殖器構造複雜。二則因為女子怕羞。大多不肯醫治的關係。現在把女子淋病的合併症。逐一的寫在下面。

第三十二節 巴氏腺炎

女子的小陰唇上面。有一種腺叫做巴氏腺的。他能夠分泌透明牽縷性的粘液。有使脰前庭滑澤的作用。倘使女子有尿道淋病的時候。淋菌就可以從

淋病 真相

巴氏腺開口部竄入腺的裏面。發生着巴氏腺炎。這樣炎症的發生。大都在淋疾傳染後經過數週或是數月。在急性淋疾的時候。發生的很少。娼妓最多發生本症。是女子淋病合併症中最多的疾病。

巴氏腺炎的發作。往往兩側同時發生。至於病人自覺的症狀。就是巴氏腺部分的壓迫性劇痛和會陰部的重感。腺口發赤腫脹。壓迫腺的開口部。有膿流出。其中含着多數的淋菌。倘使炎症腫脹劇烈。腺的開口部閉塞。那就形成腺的膿瘍。陰唇呈特別的變形。就是病側的陰唇。向左右擴張。呈一梨子狀的腫瘍。緊張硬固。病人有發熱、倦怠、疼痛。因之不能步行或起坐。這樣腫脹硬固的腫瘍。不幾時成熟化膿。向外方破潰。流出黃綠色或帶褐黃色有惡臭的膿汁。病人的痛苦。就此減輕。也有炎症劇烈。膿瘍蔓延到陰和直腸方面。穿孔了以後。永遠遺留痿管的。

這樣的巴氏腺炎。初起的時候。如果炎症不劇烈。而且即刻就醫的話。也可以吸收消退。但是大都移行到慢性。數個月或是年餘間潛伏着。遇到了交接或是月經等的時候。就再發作起來。臨床上是常常遭遇的。

第二十四節 女子急性淋菌性膀胱炎

女子的尿道。比較男子的短而廣。而且女子的膀胱括約筋。也比較男子的收縮力弱。所以女子尿道淋病的時候。很容易竄入到膀胱。引起淋菌性膀胱炎。他發生的症狀。也和男子差不多。有劇烈的膀胱部疼痛和尿意頻數。倘使用兩杯試驗法。不但第一杯的小便溷濁。而且第二杯的溷濁更甚。含有膿、淋菌、和膀胱上皮。這樣發生膀胱炎的婦人。大多營養不良、貧血、和妊娠的人。容易發生。

第二十五節 外陰部炎

淋病真相

淋病 異相

女子發生淋菌性尿道炎的時候。往往併發外陰部炎。這並不一定由於淋菌。是由於粘膜的糜爛，外陰部蓄積分泌物的分解，和續發傳染的緣故而發生的。這時候大小陰唇，處女膜，陰核，擊帶等部。發赤，腫脹，糜爛。或則竟變成淺表的潰瘍。同時發生頑固的濕疹。蔓延到鼠蹊溝（就是股和下腹的交界部）。病人白覺的外陰部有瘙癢和灼熱等異常感覺。小便的時候。外陰部受着尿的刺戟。發生痛感。鼠蹊部的淋巴腺。也多少腫脹。有輕度的壓痛。俗叫做橫痃。

上面所講外陰部炎症的原因。除了淋菌性尿道炎以外。就是陰部匍行疹，間擦濕疹、房事過度、軟性下疳等。也都可以發生外陰部炎的。

第二十六節 淋菌性脛炎

女子發生了尿道淋病以後。因為膿的滯留和分解。引起膿粘膜的急性炎症

。但女子的膾粘膜（是扁平上皮）。比較男子尿道的粘膜（是圓柱上皮）。淋菌不容易侵入。尤以交接習慣的女子。或從前發生淋病的女子。因膾粘膜的表層肥厚。淋菌的附着。竟不可能。所以久操淫業的女子。發生淋菌性膾炎的是很少。但是在內生殖器（譬如子宮頸，子宮體，喇叭管等）保留着淋菌的娼妓。遂自以爲無毒。不幸男子受他的誘惑。就會把淋菌轉送過來。你去責問他。他還自以爲清潔呢。

淋菌性膾炎的經過。大多是急性的。少有變成慢性。病人自覺的症狀。譬如灼熱感、重感、小便時候的疼痛。一方面流出混有淋菌和其他雜菌的紅綠色的膿。倘使疾病蔓延增加的時候。疼痛更甚。發生牽引性疼痛。向直腸、骨盤和大腿等部分放散著。並且運動、排便、或起坐的時候。更加利害。同時還有發熱。全身怠倦等現象。

淋病真相

淋病真相

醫師檢查的時候。見到處女膜痕，尿道結節，和腫的露出部。發赤腫脹。有大量的膿樣分泌物流出。倘使把手指插入腔內。可以引起非常劇烈的疼痛。甚至發生腫癰。等到急性症狀經過以後。用子宮鏡檢查。還可以發見腔粘膜發赤。有赤色的小結節排列。摩擦他很容易出血。而且還有濃厚乳脂樣的膿汁。這樣的腔炎。倘使子宮頸管不發生淋病時。通常四五週可以治愈。

第三十七節 急性淋菌性子宮內膜炎

女子因為交接的關係。新傳染淋菌。或已有淋菌性外陰部炎和尿道淋的時候。淋菌都可以竄入子宮頸。發生急性淋菌性子宮內膜炎。病人高熱，惡寒，頭痛，惡心，嘔吐。下腹部有澎滿的感覺。子宮和子宮的周圍。都覺疼痛。有時往往有劇烈的腰痛和腹痛。一方面有少量的白色血清樣分泌物。

流出。等到急性症狀稍稍減退。從子宮所流出的分泌物。就增加起來。變成膿樣。而且多混有血液。俗就叫做赤白帶。倘使遇到月經的時候。有時月經停止。有時反來多量的出血。

這樣的急性子宮內膜炎。施以適當的治療。大約三四週可以治愈。但是大多變成慢性。時時流出分泌物。倘使炎症劇烈。還可以波及到喇叭管、卵巢、和腹膜。發生急性化膿性腹膜炎。把生命送條的也不少呢。

第二十八節 慢性淋菌性子宮內膜炎

患上面所講急性淋菌性子宮內膜炎的婦女。倘使醫治不適當。就可以變成慢性。慢性的時候。急性時期的種種痛苦。譬如發熱呀，疼痛呀。雖則是消滅了。但是赤白帶的流下。終是不間斷的。就是有多量的粘液和膿汁流出。有時候為點滴狀流出。有時候竟成陣痛樣的噴出。這樣的分泌物。粘

淋病真相

着陰部。引起陰部的痒感和灼熱感。因之再續發的引起陰門的濕疹和大腿表皮的糜爛。有時小便的時候。也有疼痛。薦骨部和骨盤內有鈍痛樣的感覺。此外興奮、運動、交接、或大便的時候。覺到子宮有沉降和脫出樣的感覺。

醫師用子宮鏡檢查起來。可以看到子宮頸部的粘膜發赤腫脹。有粘液樣的分泌物。內診子宮。覺到子宮有輕度的肥大和疼痛。

這種慢性子宮內膜炎。因為子宮的肥大。常常壓迫膀胱。引起尿意的頻數。壓迫直腸。引起大便時候的疼痛。此外劇烈勞動、房事過度、月經、分娩、產褥等時候。原來已經不感覺到痛苦的人。忽然又照上面所講的急性症狀。再發作起來。因此反復的發作。病人就變成營養不良、身體衰弱。而且月經也變調。就是經前二三天有痙攣樣的劇痛。月經的最多。而且

時間很長。有延長到八天乃至十四天的。

本病的治療很困難。有時因交接或外傷。發生出血。此時引起急性炎症。波及到喇叭管、卵巢、腹膜。招來不側的危險。

第三十九節 淋菌性喇叭管炎

喇叭管是子宮的一種附屬器。最容易發生淋菌性炎症。因為淋菌侵入到子宮頸。達到子宮腔。再達到喇叭管。這種合併症的發生。大約在生殖器傳染後數週間。也有到傳染後一三年而發作的。發作的時候。症狀很凶惡。就是下腹的一側（僅僅侵犯一側的卵巢）或兩側（同時侵犯兩側的卵巢）發生陣痛樣痙攣性的疼痛。尤以運動的時候。更加利害。病人非臥床不可。而且同時發生三十九度乃至四十度的高熱。有時還有惡寒。醫師診觸的時候。因為子宮部的疼痛和腹壁的反射性緊張。大多不容易觸著喇叭管

淋病真相

喇叭管發生淋疾。也有很輕易的經過的。保存他的受胎力。但一般多成功不妊症的原因。還有因喇叭管兩口的閉鎖。膿汁蓄積。形成喇叭管膿腫。過了相當的時日以後。向子宮腔或腹腔破潰。形成子宮腹膜的炎症。

第四十節 淋菌性卵巢炎

喇叭管患了淋病以後。淋病的分泌物。可以波及到卵巢。他的症狀。因為同時發生的子宮周圍炎的症狀所隱蔽。所以不十分著明。他主要的症候。就是卵巢部（左右腹角）限局性的疼痛。普通大多發生在左側。接觸他有壓痛。月經的時候。疼痛持續不止。而且放散到薦骨部、臀部、和大腿部。運動、交接、和大便的時候。疼痛更加利害起來。

淋菌性卵巢炎的預後。並非不良。但往往引起臟躁病。就是俗話所講的容

易動肝火。不妊娠的發生。這也是一個很大的原因。

第四十一節 直腸淋病

直腸的淋病。女子比較男子多。因為女子會陰部短縮。陰道的分泌物。容易傳染到肛門。此外不自然的交接。也是一種的原因。

直腸淋病的症狀。肛門部的粘膜和肛門周圍。發赤糜爛。壓迫肛門。或是大便和他努責的時候。有污穢膿樣或是血液樣的分泌物流出。病人自覺的症狀。大多很輕。倘使發生肛門糜爛和裂創的時候。那就覺到大便時候的疼痛，瘙癢、灼熱和裏急後重等等。

本病的經過。輕症的偶有自然治愈。倘使是重症的時候。則形成潰瘍。發生瘻管。日後形成癭痕。就發生肛門的狹窄。

第五章 小兒的淋病

所謂小兒的淋病。大概是指著女孩子的淋病而講。男孩子的淋病。是很少遇到的。講到女孩子生殖器傳染淋菌的部位。最多的是陰門和膻。因此發生淋菌性陰門膻炎。再從膻部傳染到子宮頸部的。據某醫師的報告。自三歲達十一歲的少女。六十八例中僅有八例。所以少女淋病傳染到內生殖器的。沒有成年婦女那樣的。所以少女子宮附屬器合併症的危險。也就少了。但是他侵犯直腸的是很多。九十四例中有九十二例發生直腸淋病。

第四十二節 小兒淋菌性陰門膻炎和尿道炎

少女淋菌性陰門膻炎發生的原因有種種。例如胎兒出產的時候。如果他母親有淋病。當通過母體生殖器的時候。初生兒的外陰部和膻。就可以傳染

著淋菌。此外家族中有患淋病的人。從不潔的毛巾、衣服、器具等。也可以傳染過去。最多的就是共浴。鄙人遇到了一個女小兒的淋病。推究他傳染的原因。是因爲他的母親有淋病。共同應用一條浴巾而傳染著的。還有一個例子。就是上海的風氣。有一般人往往歡喜遺尿到痰盂中。有某君他傳染了淋病。習慣了上海的風俗。就遺尿到痰盂中。他殘餘的尿。流在痰盂的邊沿上。他有一個女兒。等到他父親小便之後。也就去坐在痰盂上小便。不幸的女孩。就從此傳染着淋病。吾想上海類似於此的。恐不乏其例。還要請有淋病的人注意這一點才好呢。

少女陰門腫炎的症候。初起的時候。外陰部有純膿樣或粘液膿樣的分分泌物。外陰部和膈粘膜。強度發赤。小陰唇和大陰唇呈浮腫樣腫脹。膈口有分泌物輕輕地膠著。

淋病相眞

這樣發生陰門腫炎的時候。同時還併發急性淋菌性尿道炎。所以從尿道方面。也有含有淋菌的黃綠色濃厚的膿排泄出來。據懷氏 (Tyalaia) 的經驗。小兒的急性淋病。同時侵犯尿道的。有百分之百。患本病的小兒。他自覺的症狀。就是局部的搔痒和灼熱。尤以放尿的時候。感覺疼痛。因之啼哭不安。妨礙睡眠。同時有多少發熱的症狀。病人面色蒼白。現衰弱的樣子。本病的經過。非常長久。治療也很頑固。有時經過種種的治療以後。好似治愈的狀態。但是醫治停止了二三天之後。分泌物依然如故。所以遇到了小兒的陰門腫炎。醫師和病家兩方。都非忍耐不可呢。

第六章 淋菌性全身傳染

有人發生了淋菌性尿道炎以後。往往遠隔的臟器。譬如關節呀、心臟呀、

筋骨呀等等。也有發生着病變的。以前對於本病發生的原因。醫學家雖有種種的臆測。自從在這等病變臟器中。發見了淋菌以後。方才知道淋菌不僅僅寄生在粘膜。而且還可以從淋巴和血液。侵入全身循環系統。轉移到身體的各部位。這就叫做「淋菌性全身傳染」。也叫做「淋疾轉移」。但是淋菌雖然達到血液裏面。不一定發生轉移的疾病。因為淋菌大多在血液裏面。迅速地消失。吾人要說明淋菌向血行傳播的原因。實在難以充分。但是使病人衰弱的全身疾患，直接的外傷，不合理的器械療法，病人的不攝生，譬如身體過勞、感冒、狂飲、房事過度、以及婦人的月經妊娠等。都是促進淋菌的傳播和增加的。淋菌可以轉移的部位很多。譬如關節、韌韜、粘液囊、筋、骨、神經、心臟、血管、肋膜、肺臟、中耳、耳下腺、皮膚、眼等等。現在把重要的分說在下面。

淋病真相

第四十二節 淋菌性關節炎

急性淋疾的時候。大約經過三週間。忽然發熱。大關節迅速地腫脹疼痛。關節的外皮。有發赤的。也有不發赤的。但是關節的疼痛。大多是很劇烈。因此病人不能動作。關節只好保存屈曲的狀態。至於全身症狀。病人大多有倦怠、頭痛、食慾不振等。最多發生的關節。是膝關節。俗就叫做鶴膝瘋。此外是腕、肘、肩胛、指趾等關節。也有發生的。這樣腫脹的關節裏面。有多量的滲出物。有膿性的。也有漿液性的。所以熱雖然逐漸地退去。疼痛也逐漸和緩。但是關節的緊張。還是依然不退。難以屈曲。這樣的須經過二三週以後。方才把滲出物吸收。但是往往容易再發。也有發生化膿的。那時候關節就要發生強直。永遠保持不能活動的狀態。本病特有的地方。就是常常侵犯一個的關節。少有二三個同時發生的。已發生淋病

的。倘然繼續的數次傳染。最容易發生本病。甚至有每次傳染淋病的時候。有每次發生關節炎的傾向。

以上急性發作的淋菌性關節炎，是關節炎中最的一種。還有一種。叫做關節水腫。就是病人毫無自覺的症狀。因為關節中滲出物的逐漸增加。關節腫脹。壓迫他或是運動的時候。也不覺疼痛。以後腫脹加甚。病人就此不能工作。他的結果。有迅速地吸收消退的。也有漸漸變成關節強直不能動作的。以上二種。都是發生到一個關節的。但是也有發生到多數關節的。這就叫做多發性關節瘋痺。他發作的症狀。和瘋痺很相似。譬如發熱、關節酸痛、腫脹等。但兩者不同的地方。就是本病用瘋痺的藥劑是無效的。

第四十四節 淋菌性腱鞘炎

淋病真相

淋病真相

本病往往獨立發生。也有和關節炎一同發生的。最多侵犯的。是手和足的蹠鞘，總指伸筋，拇指（趾）屈筋，足趾，背屈筋等。他發作的時候。大多先有全身症狀。就是發熱。隨後發生關節和筋的疼痛。於是最多使用的蹠鞘。就發生炎性腫脹。他上面的皮膚。也發赤浮腫。蹠所經過的部份。為軟泥狀有痛的腫脹。這樣的經過二三週以後。滲出物吸收。腫脹減退。恢復從前的情形。倘使延及附近的關節。該部的關節。就難以運動。將來就難有全愈的希望。往往有發生運動障礙的事情。

第四十五節 淋菌性粘液囊炎

吾人的關節裏面。有一種叫做粘液囊的。他能夠分泌粘液。令關節滑澤。可以運動自如。好似機器上的加油一樣。倘使發生淋病的時候。淋菌也可以從原發的地方。轉移過來。最多發作的。就是跟骨粘液囊。大多兩腳突然

的發作起來。跟骨部疼痛。俗就叫做脚跟痛。並且足跟腫脹。難以行動。經過了相當的時日。也有恢復到普通一樣的。也有殘留着癭痕肥厚而治癒的。本病在再新傳染淋病。或是淋病增惡的時期。常常一再的反復發作。

第四十六節 淋菌性筋炎

因為淋菌轉移發生筋炎的例。到不很多。據報告上有大腿筋腕、股直筋、胸鎖乳頭筋、脛骨筋等。都是從筋組織中可以發現淋菌。

淋菌性筋炎的症候。就是患部筋肉的劇痛。硬化肥厚。輕度的發赤。患部運動的障礙。同時病人覺到全身的不舒適。他的經過呢。大多逐漸地減輕治愈。至於化膿的。是很少遇到的。

第四十七節 淋菌性骨膜炎和骨髓炎

淋菌性骨膜炎的發作。大多是和關節炎一同發生的。也有單獨發生的。他

淋病真相

侵犯的骨膜。譬如脛骨、鎖骨、肩胛骨、指趾骨等。骨膜發生疼痛性腫脹。上面的皮膚。也有沒有變化的。也有輕度發赤浮腫的。等到急性症狀過去後。往往殘留骨膜性和骨性的肥厚。

至於化膿性淋菌性骨髓炎。據烏那氏 (Una) 的報告。有一個患淋病的病人。他當淋病第三週的時候。發生惡寒戰慄。上膊骨的下端腫脹。把骨鑽開以後。漏出多量的膿汁。在這個膿汁裏面。就發見淋菌。所以烏那氏請十八歲到三十歲的男子。發見骨髓炎的時候。往往有淋病的可疑。

第四十八節 心臟的淋菌性疾患

當發生尿道淋的時候。或患淋菌性關節炎的時候。因為淋菌的轉移。有發生心臟內膜炎和心囊炎的。請到淋菌性心臟內膜炎。可以分做兩種。一種是良性的。一種是惡性的。良性的心臟內膜炎。病人多不發熱。僅不過有

輕度的心跳和輕度的心絞窄感。往往幾天內就消滅。倘使是惡性的心臟內膜炎。就發現很重的症狀。發生惡寒戰慄、發熱心悸、絞心感、呼吸感難。甚至意識溷濁和腸傷寒一樣。結果至於死亡。

淋菌性心囊炎。有和上面所講的心臟內膜炎一同發生的、也有單獨發生的。他的症狀很輕。僅不過心臟部覺到輕度的疼痛。經過大多良好。病人仍舊可以從事於他的職業。

第四十九節 淋菌性眼結膜炎

有尿道淋病的人。淋菌不但可以從自己的手指和所使用的手帕等傳染到眼裏面。發生著淋菌性眼炎。還有人證明可以因淋菌的轉移。引起角膜炎，虹彩炎，虹彩脈絡膜炎，網膜炎，視神經炎等。現在把最多見的淋菌性結膜炎申述一下。

淋病真相

淋病真相

淋菌性結膜炎。又叫做膿漏眼。他的經過。當很激烈。大約傳染後二三天。眼結膜發赤。眼臉腫脹。難以張開。有肉羹樣的分泌物流出。同時眼和眼周圍的皮膚腫脹。有壓痛。而且耳前的淋巴腺也腫脹疼痛。病人自覺的有怕光之外。還有前額部疼痛、不眠、怠倦、發熱、疲勞等。這樣的大約經過二三天以後。從眼瞼中流出多量的膿汁。裏面包含著多量的淋菌。往往為噴出樣流到頰部。結痂後有發生頰部的表皮剝脫。此後結膜的腫脹。漸次減退。經過了四或五週以後。也有恢復的。也有變成慢性膿漏眼的。上面所講的症狀。隨著病的輕重和醫治的情形。他的經過有不同。如果症狀輕微。醫治得法。也有恢復到健康的。倘使症狀沉重。或是失卻醫治和醫治的不適當。可以發生盲目的危險。就是本病的經過中。往往侵犯角膜。變成潰瘍。俗就叫做「生星」。倘使潰瘍加大。或病人的不注意。可以

引起虹彩脫出、全眼球炎等等。那就要招終身失明的痛苦呢。

第三編 淋病的治療

第一章 寫在淋病的治療前

第五十節 淋病有特效藥嗎？

什麼叫做特效藥呢。就是用了某種藥去醫治某病。十九是有效的。這就叫做特效藥。譬如六〇六對於梅毒。金雞納霜對於瘧疾。白喉血清對於白喉。可是世上這樣的特效藥還很少呢。

可憐呀、世上一般被淋菌纏繞的淋病患者。有的叩醫師之門。希望有一特效的手術。有的看著藥房的廣告。希望有一種名符其實的藥劑。不幸兩種的希望。都成泡影。講到吾們做醫師的。對於淋病的治療。雖則是有種種

的方法。譬如洗滌法呀、注射法呀、電氣法呀。但都不能算作一種特效的方法。希望賣藥的有特效。那更難了。所以吾講倘使有一個人說他有特效藥或特效方法。可以根治淋病。那就是謊話。就是欺人。千萬不要上他的當。

第五十一節 淋病是否一種不治的疾病

讀者既然知道了淋病沒有特效藥。就連想到淋病是一種不治的疾病。那也未免誤想了。吾們既然知道世界上除了幾種疾病有特效藥以外。其餘都沒有特效藥。譬如腸傷寒、麻疹等等。但是大都能夠醫治全愈的。淋病何嘗不是這樣呢。淋病現在能夠斷根的理由。是要靠賴醫師用敏銳的眼光。純熟的手腕。豐富的經驗。來除去淋菌的巢窟。同時把淋菌的生活條件減少。就是使淋菌不適於生存。好似戰爭時候的包圍法。把盜賊飢餓起來一樣。

。積而久之。淋菌自然消滅了。所以全愈的時間。比較的長久。最早一個月。遲則六個月。平均已需要三個月。但是病人往往因不耐這樣的長期治療。或者因爲受了廣告上不正當醫藥的迷。錯過醫治的時候。以致不能根治的。實在多得很。

歐洲有句話道。「在初期能夠得到熟練醫師的治療。乃花柳病人的幸福。」從這樣看起來。只要求一有熟練技術和高尙人格的醫師。淋病是確實可以治愈的疾病。

第五十二節 淋病可以秘密自己醫治嗎

淋病好似一種不名譽的疾病。病人往往歡喜秘密地自己醫治。不給人家知道。或者因爲經濟的關係。沒有能力去求醫。最好希望有一個簡單的方法。可以醫治。這是淋病患者最多的心理。可惜事實上沒有這樣簡單的方法。

淋病真相

。爲什麼呢。因爲吾們已經知道淋病沒有特效藥。須要用下面所講的幾種醫治方法。還要隨著病的時期、病的部位、各人的體質。有種種的變動。就是同樣名稱的藥劑。也有濃淡的差異。沒有醫學知識的人。那裏能夠應付自如。倘使自作聰明。日後釀成慢性的淋病和發生不測的危險合併症。還不是這種人嗎。

第五十節 淋病爲什麼難以治愈

報紙上醫藥廣告中最多的。要算是淋病了。電氣療法、注射療法，內服斷根藥、白濁秘方、白濁草等等。真是五花八門。千奇百怪。但是既然有了這許多治療的方法。何以還不能把淋病醫治斷根呢。這也是大家的一個疑問。吾現在先把淋病難以治愈的理由。簡單的寫在下面。

(一) 淋菌的性質 淋菌最喜歡生存在尿道內裏面。有永久生存的性質。

所以淋菌不滅。淋病不治。於是吾人要想殺滅淋菌。非用殺菌的方法不可。譬如藥物的療法。或是理學的療法。但是用峻烈的方法。雖則能夠把淋菌完全殺滅。不料尿道組織。反受著一種的破潰。如果是用溫和的方法。則又難以見効。

(二) 尿道組織的關係 尿道粘膜內。本有上皮細胞的被覆。防止外界毒的侵入。淋菌侵入尿道內的時候。繁殖發育。尿道粘膜受着淋菌的襲擊和他毒素的作用。粘膜就發生炎症。上皮細胞被剝脫。這個時候。病人就覺到排尿疼痛。流出黃白色的膿汁。也就是急性淋病的時候了。但是淋菌不僅侵及到粘膜的表面。還要侵入到粘膜下面的組織。這樣侵及深部的淋菌。雖一時發生劇烈的炎症。但是不久。尿道組織因炎症的關係。發生變質。更因自己毒素的蓄積。淋菌繁殖力著明減弱。所以尿道上的症候減輕。

淋病真相

淋病真相

。恰如治愈一樣。實則此時即移行於慢性淋病。治療反更加困難。並且在慢性淋病的時候。淋菌往往潛伏在尿道上面的尿道側管，馬氏竇，立氏腺等處。用藥液來洗滌的時候。只能把尿道表面的淋菌殺滅。潛伏的淋菌。遇著了機會。還是要出來作祟的。古人詠野草詩云。「野火燒不盡。東風吹又生。」堪爲此寫照。

(三) 沒有理想的治療方法 因爲淋病的難以治愈。雖則有了種種醫治方法。但是沒有理想的良法。就是不能用一種的方法。可以把淋病醫治斷根。現在把所有的療法。先約略的記述在下面。

A 內服藥 淋病時候應用的內服藥劑頗多。但是沒有一種的特效藥。這是現在世界醫藥界所共同承認的。最多用的是一種檀香油劑，古巴香劑，烏羅透品，美趣藍等一切的尿道消毒劑。和止痛劑，鎮靜劑，消炎劑，止血

劑等。雖則都可以應用。但是都不能叫做特效藥。並且有人服了檀香油劑。發生胃口不開，惡心，嘔吐，下痢、腎炎等。服了古巴香劑。有發生皮膚疹等的事情。所以藥劑是可以應用。惜乎沒有特效藥。

B 透熱電。淋菌遇着了高熱。可以死滅。但是尿道內要得到這樣的高熱。淋菌還未死滅。尿道的粘膜。已經不堪受這樣的高熱了。所以創始三十年來的透熱電療法。還是失敗。

C 光線和電氣。有人講光線（如紫光燈），電氣。可以殺滅淋菌。但是實際上經過了種種的試驗。還未得到學界的公認。

D 苗漿的注入。淋菌苗漿的注射。能夠增高身體上對淋菌的免疫力。對於淋病時候的合併症。是很有功效。

E 黃色素的治療。此係一種「阿克利定」色素劑。有消毒的作用。對於急

淋病真相

淋病真相

性淋病。有時很有功效。

F局部治療 淋病並不是世俗所講的虛症腎虧、和濕熱下注。實是尿道內受着淋菌傳染的關係。既然是局部的疾病。用局部的治療。自然是最重要的。就是應用尿道的洗滌、藥液的點滴。但是往往有用了藥劑。反去刺戟尿道。使尿溷濁。炎症加甚的也極多。這時候應當選擇藥劑的種類、用法、和濃度等一切了。

(四) 其他的一切 這也很多。第一病人等待淋病的急性候經過了。變成慢牲。因為沒有痛苦。不肯再繼續醫治斷根。第二因為病人不懂得攝生的道理(參觀第五十七節)。第三是經濟的問題。不能長期就醫。第四是職業的關係。不便就醫。第五是夫婦二人不能同時就醫。致成互相傳染的境地。第六是信任一切不正當醫藥的緣故。以致延長治癒的時日。

第五十四節 淋病何以有輕重的不同

同是一樣患着淋病的人。他的症狀。很有差異。有的很輕。有的很重。這是什麼緣故呢。除了尿道組織，醫治方法、環境關係、攝生情形等以外。最有關係的。要算是病人的體質了。譬如患有結核、梅毒、或是腺病質的患者。他的粘膜很是虛弱。那時候他的淋病。不但頑固難治。而且容易變成重症。

第五十五節 夫婦同時醫治的重要

一個男子有了淋病。當急性的時候。固然是知道禁止房事。等到急性症狀經過了。因為性慾衝動的關係。就不顧一切。去行性交。把危險的種子。就是淋菌。送給了對手的妻子。於是純潔的妻子。也遭著不白之冤。做成一個淋菌的保存者。隨時可以把淋菌回送丈夫。在這樣情形之下。他的

丈夫。雖然如何醫治。希望全愈。如果不把他的妻子。同時醫治。就是丈夫完全治愈。只要因一次的房事。仍舊可以再發。所以第一不要把淋菌送給妻子。既然送給了。還要趕快一同醫治。可是事實上往往有種種的困難。一則因為丈夫的尋花問柳。是瞞着妻子的。就是他妻子。已經傳染著淋病。也不便說明。二則因為女子大多是怕難為情。不願意醫治。因此男的方面。諱莫如深。女的方面。諱疾忌醫。於是夫傳之妻。妻又染之夫。循環不息。結果是終於「不治」。所以吾講夫妻之間。為謀日後的幸福起見。應當開誠布公。丈夫明白告訴妻子。妻子也要既往不咎。趕速醫治才行呢。

第五十六節 淋病的單方

俗語有句話講。「單方一味。氣煞名醫。」究竟單方有沒有功效呢。醫師用藥物可以醫治疾病。藥物又不是限定那一種事物。方才可以稱為藥物。

那末牛溲馬勃。草根樹皮。何嘗不是藥物呢。單方去醫病。自然也是藥物療法的一種。因爲他的方法簡單。有時也略有點功效。所以得到一般世人的歡迎。但是病的變化繁多。各有各的病症。就是一樣的病症。也隨着病的時期和病人的身體環境。常有變更的。斷然不能用一定的方式去醫治。所以一種的藥劑。對於甲患者確實有效。乙患者絲毫沒功。就是這個道理。淋病的難以醫治。已經在上面講過。因其難治。所以單方也很多很多。就叫做「癩子多藥方」。聽聽人家談話。某人吃了那張單方。化不了幾個銅元。他的淋病早已好了。還有一種人說。某人吃什麼單方。不但當時痛苦就減。而且永不復發。也有人說道。吾聽人家的單方如何高妙。吾吃了一點也不奏効。而且污穢不堪。惡臭難吃。後來還是請醫生看好的。這樣的談話。是常常傳到醫生的耳鼓裏來。在醫生聽起來。一點也沒有希奇。

淋病真相

淋病真相

在世人聽起來。便覺到很矛盾。這是什麼緣故呢。迨吾來告訴諸君罷。淋病怎樣的叫做斷根。不懂得醫學的人。能夠自己知道麼。他所講的醫治好了。就是沒有痛苦和大量分泌物的流出。或者病人的自覺症狀減輕些。要知道這樣的結果。就是不去醫治。如果沒有合併症。也是可以得到的。或者他吃的藥。有點止痛利尿的功效。遇到了急性症狀經過的時候。他的痛苦。也自然減輕。沒有先前那樣的難受。便以為好了。倘請醫師研究他的淋病。實在還沒有治愈。再簡單的講一句。如果有這樣高妙的單方。世上就沒有「老白濁」那樣的稱呼了。還有一種人。乘着婦人月經的時候。和他同房。說能醫治淋病。這樣在自己增加病勢。在人家傳染淋病。不但沒有道德。也表示你沒有常識。

第五十七節 淋病病人的攝生和注意

俗話講「爲醫不如爲養」。養就是攝生、倘使攝生得宜。不但可以預防種種的合併症、不妊症以及不測的危險。而且醫治的功效。更加顯著。現在把淋病病人的攝生法和注意。寫在下面。還請有淋病的人注意才好呢。

(一) 應當安靜避去各種的運動 病人往往有一種思想。以爲有了病。只要藥。藥以外的事情。用不着去注意。所以有淋病的人。到醫生的地方來。第一就是要藥。藥固然是可以醫病。不過藥的醫病。是一種消極的醫治。倘使積極的能夠預防疾病的增惡。或是預防其他的危險。豈非較醫治已病爲要緊的事情嗎。淋病的時候。醫生告訴病人安靜。就是使他的病狀不利害。容易醫治。併且還可以免脫合併症的危險。是一種積極的醫治。世人往往因職業的關係。或是自己性情的關係。不肯安靜。情願多打幾次針。多吃幾天藥。在醫生的眼光看起來。還是得不償失。所以有淋病的時候

淋病真相

。第一要安安靜靜的睡在床上。避去各種運動。譬如跳舞，騎馬，乘腳踏車、游泳、長時散步等等。不但容易把疾病治愈。還可以免掉橫痃、睪丸炎、後尿道炎等危險的病症。不要以為無關緊要的話。而不注意才好。

(二)飲食的注意 世上往往以為新醫用不着忌口的。又以為新醫可以亂吃飲食物的。這實在是錯誤的事情。譬如在腎臟炎時候的忌食。糖尿病時候的忌食。含水炭素食物。腸傷寒時候的忌食。固形食物等。不過隨着主要病症的不同。或須忌。或不須忌。淋病的時候。應當忌酒類，汽水，香味和辛辣等有刺激性的食物。倘使吃了之後。往往使淋病增惡。應當吃些牛乳、粥、麥茶等、但是食物繁多。不能一一的列舉出來。總之淋病病人的食物。應當選擇無刺激性的。淋病時候多喫些開水。雖是有益的事情。能夠沖洗尿道。減輕疼痛。倘使放尿極疼痛的時候。那就應當節制飲料了。

(三) 禁止交接 交接的禁止。在初期有急性症狀的時候。病人自然不能交接。可是急性症狀經過後。又因為尿道發炎的緣故。陰莖容易勃起。常常有催發情慾的事情。病人一經過了交接之後。本將就治的淋病。忽又凶惡起來。並且還可以發生副睪丸炎、後尿道炎等危險症狀。所以交接應當絕對禁止。就是以人道上而論。也要傳染給無辜的妻子。所以要極力節慾才好。萬一陰莖容易勃起的時候。最好晚餐減量。夜間被褥宜薄。一面請醫生給你一點鎮靜藥。令他不勃起才好呢。

(四) 應當施用提睪帶 淋病時最多的合併症。要算是副睪丸炎。有了副睪丸炎症。不但當時受著痛苦。而且還和不妊症有關係。所以要預防副睪丸炎的發生。豈不是最要緊的一件事情嗎。預防的方法。就是患淋病的病人。應當用一種提睪帶（可以向藥房購買）。把陰囊提起。使陰莖和腹壁

淋病真相

相接觸。爲垂直的狀態。不但可以預防種種的合併症。還可以使尿道淋疾。容易治愈。因爲尿道屈曲部伸展的緣故。

(五) 注意清潔 病人有漏膿的時候。身體和衣服。常有膿汁附著。應當嚴重的洗滌。煮沸日曬。就可以間接的預防膿漏性眼炎。(就是淋菌性眼結膜炎)。

(六) 通便 大便應當通順。因爲大便的閉結。也容易使淋病增惡。所以淋病病人的大便。應當每日通順。

(七) 時時洗手 淋病病人的手指。因爲去接觸陰部的緣故。手指上常常傳染著淋菌。直接的進入自己的眼中。間接的從手巾等有傳染到他人眼中的危險。所以時時要拿肥皂洗手。

(八) 預防後遺病 患淋菌性關節炎的時候。病人因爲疼痛的關係。往往

把關節屈曲著。將來發生強直。有不能運動的危險。這強直就叫做後遺病。所以不要把關節屈曲才好。

(九)淫書淫畫和淫戲。此等都能挑撥性慾。引起尿道的充血。發生勃起。對於疾病的經過。是很有惡影響的。

第五十八節 淋病的預防

世俗有句話講。「醫病不如防病」。與其想盡種種的方法去醫治。何如防範於事先。不使他發生的妙呢。所以現在的醫學。就注意到這一點。各國的性病預防會。也是注意到這一點。爲父兄師長的。也應當注意這一點。就是不要把性病傳染開來。不但沒有患病的痛苦。保衛人生的健康。省卻無謂的耗費。總計上對於國家。也有莫大的利益。目下吾國科學上的正當事業。實在沒有進步。可是性病。實有長足進步的情形。加以民衆知識的

淋病真相

淋病真相

幼稚。性病的猖獗。真是一發難收。所以要把性病預防智識普遍起來。實在是一件刻不容緩的事情。性病預防的方法。大約可以分公衆和個人的兩種。現在先把淋病預防法來說明一下。

(甲)公衆的預防 公衆的預防法。是需要國家和公衆機關的力量。方能辦得到。他的性質。是有一種強制的意義和警告的意思。他的方法也很多。

(一)娼妓檢查 娼妓爲性病的一大源泉。關於娼妓問題的研究。自然是很緊要。有主張以法律的能力。絕對禁止的。也有主張任他存在的。但是任他存在。固然要使性病猖獗。如果是絕對禁絕。或反而無異提倡私娼。有廢止公娼的各國。他性病的蔓延。反而十分猖獗。因爲公娼可以用法律上的手段去檢查。或是停止營業等手段來救濟。可是私娼就沒有這樣的方法。

法。可以救濟了。所以現在對於娼妓的辦法。是主張公娼而用檢查制。但有以爲檢查娼妓。往往因娼妓故意隱蔽他的疾病。不肯說出。或是檢查的醫師。因娼妓的衆多。往往不周密。結果使有毒的娼妓。有了一塊「平安無毒」的商標。引誘嫖客。屠門大嚼。豈不是更糟了嗎。予以娼妓的故意隱蔽。和檢查的不周密。並不是法之不善。是奉行不力。所以檢查公娼。固然不是一個預防性病的徹底辦法。總是聊勝於無。所以私娼取締和公娼檢查。對於公衆性病預防上。爲一件最要緊的事情。目下吾國的通商大埠。檢查所雖間有設立。但未見有多大的功效呢。

(二) 檢舉和強迫的醫治 醫師遇着花柳病人。應當舉實報告官廳。未婚的禁止他結婚。倘使醫師醫治未斷根的病人。也可以報告官廳。強制的執行。叫他繼續醫治。使他斷根。瑞士在一八一七年。已採用強制治療。其

淋病真相

他各國。也均頒布花柳病預防法。可惜吾國還未有所聞。

(三) 取締不適當的廣告 賣藥的商人和不道德沒智識的醫生。用廣告的手段。不說是服了吾的藥。包可斷根。便說是只要吾打一針。永不再發。這樣的廣告。最容易使一般沒頭腦的世人上當。都是應當取締。

(四) 設立展覽館 凡是人們沒有把事情映入眼內的時候。雖聽到人家怎樣講。好似過耳的風。終沒有去注意他。必定要映入眼內的時候。方如身臨其境。不知不覺的便觸目驚心起來了。所以患性病的人。來求醫的時候。總是說「吃了這樣的苦。下次再也不要去了」。難道一個成年的人。他事前沒有聽到過花柳病的危險嗎。吾想聽是一定聽到過的。既然聽到過了。爲什麼還是要去。固然是性慾的衝動。恐怕還是不識利害的緣故。所以最好在都市繁華的地方。在通衢大道上。設立永久的性病展覽館。放置種種

關於性病的蠟製標本和圖畫。加以簡單的說明。任人觀覽。則觀者恍如身歷其境。觸目驚心起來。當性慾衝動的時候。回想起來。豈不是一勺的冷水嗎。

(五)獎勵結婚 上面所講性病發生的動機。是因為到了結婚年齡。沒有相當的發洩。從醫學上講起來。因為生殖腺到了春機發動的時候。生了一種叫做「賀爾蒙」的內分泌物。能夠催發人們的性慾。所以有錢的。就用金錢去買笑。如果是沒有金錢的。只好幹強姦樣的事情去了。你看報上所載着強姦的案情。大多是老年和壯年的鰥夫。而且被姦的。多是未成年的幼女。難道這樣大的年齡。還不知道男女年齡不合。是不能交接的嗎。和強姦是犯法的嗎。實在是爲了性慾的衝動。壯年人沒有結婚的能力。和老年人沒有女性垂愛的緣故。所以急不暇擇的。就幹出這樣犯法的勾當。吾

淋病真相

人為預防起見。應當獎勵結婚。使曠夫怨女。早得其所。一方面也要顧慮他的經濟。所以歐美各國的薪俸。結婚的和未婚的有高低。就是這個道理。

(六) 禁酒 酒是最容易把性慾衝動的一物。所以可說酒是性病的肥料。要不傳染性病。第一要禁酒。因為酒的第二步。就是蹈入性病的區域當中。不要把酒和性病分作兩起。以為僅僅吃吃酒。是不妨事的。

(七) 禁止淫書淫畫淫戲 這幾種本來是性病的媒介物。在當然禁止之列。可是獸性的人們。還是千方百計的去想求。不知道淫的末幕。便是苦了。

(八) 教育 性慾為男女的天賦。所以做了人。斷不能說沒有性慾。既然有了性慾。自然不能阻止他的發生。如果是正式的男女慾。乃是人類繁殖的要素。倘然不適當和出乎軌道的性慾。就叫做淫慾。淫慾應當絕對禁止的。所以要普及教育。由學校和家庭二方面把倫理和性衛生的智識隨時輸

入。淫慾的性慾衝動時。要有一種克己心和制慾心。想着先聖先賢的嚴正。有柳下惠坐懷不亂的態度。積而久之。自然有非禮勿聽。非禮勿言。非禮勿視。非禮勿行的操守了。

(九) 娼妓性智識的擴充 吾國的娼妓。大多是沒有性知識的。所以對於自己的危險和嫖客的危害。都是漫不注意。如果有一個嫖客用橡皮袋去同他交接的時候。他反而顯著不愉快的顏色。以爲你疑心他有性病。這是多大的錯誤呀。所以娼妓能夠知道性病的危險。同時知道預防的方法。拒絕性病嫖客的交接。要比吾人的宣傳。好過十倍呢。

(十) 設立免費的醫療所 一個人既然因一時的誤犯。發生了性病。又因經濟的關係。不能繼續醫治。或則不能達到完全合理的醫治。受着無理智醫家的愚弄。做成一誤再誤的境地。所以政府應當設立一個有組織的免費

淋病真相

醫治機關。來救濟才好。

(乙)個人的預防法。沒有一種的方法。可以絕對的預防性病。這是應該預先聲明的。讀者切勿看了後面的預防法。去嘗試嘗試。否則本篇之作。便是誨淫。然則何以有這樣的一篇。無非爲火燭不小心的人家。告訴他一個方法。怎樣可以少損失一點罷了。能夠不去接近火種。這是一個最妥當的方法。俗話講「將軍難免陣上亡」。讀者要深思這句話。便達到預防的目的了。

淋病的病原菌。是專從尿道內竄入的。所以長期間的交接。交接的反復。和交接後久留陰莖在腔內。這都可使淋菌得着侵入的機會。還有間斷的交接。因爲精液不能強力射出。把尿道口的不潔物沖個乾淨。所以也可使含有淋菌的陰戶分泌物。停留在男子的尿道中。交接後的放尿。可以預防淋

病。就是這個道理。橡皮袋（俗叫做如意袋）的施用。當然適用於淋病的預防。可是不良的橡皮袋。往往容易破裂。破裂了一樣可以發生危險的。交接後把有力的殺菌藥。譬如百分之二到十的蛋白銀液。百分之二的硝酸銀液。注入尿道。因為淋菌在這個時候。還在尿道的前部。容易把他殺滅。也是預防的一法。所以歐美各國要去尋花問柳的人。必定先預備好預防的藥劑。或則交接的翌日。立即跑到醫師那裏。請求預防的方法。

有先天包莖的人和淋病女子交接的時候。那末淋病的傳染。是百發百中的。所以這種人最好將包莖除去。除去了不但是可以預防性病。就是對於人體發育上。有時也有關係的（參觀性病指迷包莖項）。以上是男子的預防法。講到女子的預防法。往往是困難。因為女子生殖器複雜的關係。據來賽而氏的方法。就是將要交接的時候。先用過錳酸鉀液、或鹽化亞鉛液

淋病真相

淋病真相

等消毒液。行腔洗滌。再把生殖器裏面塗布脂肪。用消毒紗布插入腔內。保護子宮的頸部。既行交接以後。即刻放尿。行腔洗滌。同時行外陰部的洗滌。並且用小的注射器。注入消毒藥液到尿道裏面。可以預防淋病的發生。此外兩親有了淋病的時候。還要注意到他的子女。就是從浴巾、浴盆、面盆、面布等間接的把淋病傳染到兒女身上。發生小兒淋病。還有手須勤洗。不但可免自己的淋菌性眼疾。還可預防他人受着無辜的慘禍。以及有淋病產婦對於嬰孩的注意。這都是在上面各節中已經講過了。

第一章 淋病醫治方法的種種觀

俗話講「癩子多藥方」。因為癩子的種類多。而且不容易好。所以他的藥方就很多。淋病也和癩子一樣。醫治的方法真多著呢。吾現在把關於淋病的醫治方法。簡單的寫在下面。也使淋病病人得到一種常識。並不是來指

導病人自己應用。因為病人到底是外行。不明白醫藥的究竟。倘使濫用醫藥。有因此釀成大禍。這還是要請讀者注意才好呢。

第五十九節 內服藥

上面已經講過。淋病沒有特效的藥劑。所以內服藥對於淋病治療上的價值。讀者想已明瞭。但是講他完全沒有功效嗎。那也未必。就是他能夠減輕淋病的症狀。或者服了淋病的內服藥。竟可以治愈淋病的大部分。減輕痛苦。緩和刺戟症狀。使注入療法等尿道的局部療法。可以施行。這就是內服藥有間接的作用。

講到淋病的內服藥很多。大別之不外乎兩種。第一種譬如「檀香油」、
「古巴香」、「松節油」、「卜華卡華」等。內服了以後。他溶解到尿裏面。有消炎、鎮痛、減少分泌和局部麻醉等功用。但是並沒有完全殺滅淋菌

淋病真相

的能力。第二種譬如「薩羅」，「優羅託品」、「熊果葉」、「美趣籃」、「阿克利定」色素劑等。有殺菌和防腐的能力。但是此等內服藥劑。無論那一種。都不能把淋病醫治斷根。已一再說明。報章上所宣傳的淋病內服藥。大都不外乎此。有否斷根的能力。讀者也可以明瞭了。

還有有淋病的人去購服淋病的藥劑。似乎並沒有錯誤。可是一種藥劑。除了他正常的作用以外。還有一種叫做副作用的。就是醫治作用以外。還有一種妨害人體的作用。譬如第一類檀香油等藥劑。有刺戟腎臟。發生腎臟炎。和刺戟胃腸。發生嘔氣、胃口不開、以及皮膚上發生皮疹等副作用之類。讀者也要注意才好。

淋病除了上述的內服藥以外。還有因為陰莖的容易勃起。用鎮靜劑。疼痛用止痛劑。出血用止血劑。便閉用通便劑。這是要隨着病的情形、各人的

體質。隨時變化。沒有一定。所以講僅僅用一種藥物。可以根治淋病的話。是萬萬不成立的。

第六十節 疫苗療法

什麼叫做疫苗呢。就是把某種的病毒。加熱殺死以後。再加一種的防腐劑。注射到人體裏面。被注射人的血液裏面。能夠發生一種物質。叫做「抗體」。來抵抗某種的病毒。得到免疫。這樣的免疫。醫學上叫做自動的免疫。淋菌疫苗。就是用淋菌來製造的。注射到病人的身體裏面。能夠發生一種對淋菌的抗體。來幫助淋病的治療。可惜還不能十分達到理想的目的。但是對於淋病的合併症。譬如副睪丸炎、攝護腺炎、關節炎、女子的卵巢炎、喇叭管炎等。效果顯著。就是在急性尿道淋病的時候。為預防淋菌的續發症起見。也是很有功效的。

淋病真相

淋病真相

淋菌疫苗。除了增進病人對淋菌的抵抗力和襲擊藥液不能達到的局部。譬如關節、卵巢、舉丸、等部的病原體以外。還有一種作用。就是可以診斷淋病的有否治愈。因為潛伏不動的淋菌。經疫苗的注射。能夠變成可動的。在分泌物中。就可以檢出淋菌了。

講到淋菌疫苗的種類很多。有僅僅用一種淋菌屬製造的。這叫做「單價疫苗」。如從多數病人的身體上。得到多種的淋菌屬所製造的。這叫做「多價疫苗」。也有淋菌以外。再加入其他的細菌。這叫做「混合疫苗」。也有疫苗以外。再加免疫血清的。這叫做「感作疫苗」。也有人叫做「混合血清」。也有在疫苗裏面。加入銀、或「優羅託品」、鈣素等藥劑的。便有他特別的名稱。譬如「愛其萬克醒共」、「阿爾梯共」等等。總之疫苗的種類很多。無非想增加他的作用。還有一種叫做「自家疫苗的」。就是用本人自家的淋菌去製造

出來的疫苗。是最合於理想的治療。但是手續麻煩。臨症的醫生。很不便當。疫苗注入的方法有三種。就是皮下，筋內，和血管的注入。注入方法的選擇和分量的多少。這是要醫師隨着病的情況。有不同的。

疫苗注射後。往往有發熱、頭痛、倦怠、全身遠和等副作用。但是並非必發的症狀。並且他的症狀。也不激烈。所以也沒有多大的危險。還有在注射的部位。有發赤和腫脹。也大多二三天便可以消退。

第六十一節 血清療法

淋菌的血清療法。現在還沒有達到成功的地步。有許多人認對於尿道淋是完全沒有功效的。也有報告對於全身傳染。譬如關節炎、攝護腺炎、膀胱炎、喇叭管炎等的時候。可以有効。此外就是用他種的血清。譬如連鎖狀球菌血清、腦膜炎血清和白喉血清。也可以注射。這並非一種特殊的療法

。不過是一種蛋白質療法。也就是刺戟療法。除了血清以外。譬如牛乳，「藥特靈」(Yarden)，「卡卡奧生」(Cacaoan)，「奧倫」等等。都是屬於此類。

第六十二節 化學的療法

這是一種銀的製劑，色素劑，或是鈣製劑等等。但種類很多。用法各異。詳細是屬於醫師的事情。恕不一一列舉起來。現在吾把最流行的一種色素劑。稍稍說明一下。色素劑中有一種叫做黃色素的。是一種「阿克利定」色素。注射到人體裏面。有殺滅細菌的作用。但是注射了以後。倘使受日光的照射。容易發生日光性皮炎。所以注射黃色素以後。應當避去日光的照射。此外還有一種叫做紅色素的。是一種水銀的製劑。為楊氏(Yonge)所首創。他的殺菌力很大。可以局部洗滌。也可以靜脈注射。還有一種叫做藍色

素。是一種美趣藍的製劑。也可以殺菌。這幾種都是現在所應用的色素劑。

第六十二節 電氣療法

淋病時候所用的一種透熱電。他的原理。是用一種高週波電流。通過全身或是一局部的時候。因組織的抵抗力所消耗的電氣。變成了溫熱。所以用透熱電。就是供給溫熱的能力到身體裏面。從前的理論。是想把熱來殺滅淋菌。可是事實上。難以達到目的。所以現在的理論。是這樣的了。就是利用透熱電的溫熱。可以使血液流動和淋巴液的循環旺盛。同時白血球也加多。對於病的組織。有良好的影響。此外還有殺菌和鎮痛的作用。對於淋病上。很有人應用。對於急性淋疾。雖然沒有大的功效。但是對於慢性淋疾。有促進吸收的功效。尤其對於淋病的合併症。譬如淋菌性攝護腺炎、副睪丸炎、尿道狹窄等。很有功效。可以說是一種有效的補助療法。

第六十四節 瘧疾療法

這是利用患瘧疾病人血液裏邊的瘧疾原虫。把有瘧疾原虫的血液。注入到淋病病人的體內。故意的使他發生瘧疾。幾回發生高熱以後。淋菌消失。淋病治愈。然後再用金鷄納來治療瘧疾。但是這個方法。施用的時間。還不長久。各家的成績報告也不同。他所以能見效的理由。有人講是利用體溫的上昇。去減弱淋菌的抵抗力。也有人講同時有異種蛋白體的作用在內呢。

第六十五節 局部療法

淋菌性尿道炎。是一種尿道局部的疾病。所以局部的治療。不用說是很重要的了。所謂局部的治療。就是用一種藥物。直接接觸病部。藥物有做成液體的。有做成軟膏樣的。也有做成棒狀的。此外溫熱光線的治療。機械的插入。都是屬於局部的治療。但是最重要的。要算藥液的治療了。

講到藥液的治療。有多種方法。一種是注入的。就是用普通的尿道注入器。注入藥液到尿道裏面。一種是用大量的藥液。灌注尿道或是膀胱。還有一種。是用硬或軟的管子。通到後尿道。把藥液送到後尿道或膀胱。他的目的。不外乎兩種。第一是殺菌的目的。第二是收斂的目的。講到第一個目的。就是要想殺滅尿道裏面的淋菌。等到淋菌消滅以後。尿道粘膜上面還有炎症殘留的時候。就要用收斂劑。這是第二個目的。

講到淋病上可用的藥劑。種類很多。譬如蛋白銀、硝酸銀、青酸酸化汞、過錳酸鉀、膽汁銀、魚石脂、硫酸亞鉛、雷鎊辛、單甯等等。但是他的目的。仍不外乎殺菌和收斂。

淋病雖然有了這許多藥劑。但是終難得到理想的效果。爲什麼呢。就是藥液太濃了。尿道的粘膜。過受刺戟。太淡了對於組織深部和側管內的淋菌

。難以奏效。所以醫師要隨各個病人的體質、淋病的時期、炎症和自覺症候的強弱，淋菌繁殖或是減少的狀況。去選擇藥劑的種類。藥液的濃淡。時間的長短。使用的方法。這全靠醫師的經驗和學識。來仔細判斷一下才行。所以有一種淋病的病人。往往詢問醫師。某種藥可以用嗎。我的病應當最好是用那一種藥。這幾句話。實在很難回答。也就是這個道理。

第六十六節 男子尿道淋自己注射的注意

淋病是一種慢性的疾病。病人往往因為經濟和時間的關係。不能天天請醫師繼續治療。但是局部洗滌。又是很重要的事情。所以病人常常請求醫師要自己注入。或是醫師因為病人難以繼續求醫的關係。也有叫病人自己去注入的。但是自己注入。倘使沒有相當的注意。不但沒有功效。而且容易引起種種不良的影響。現在吾把自己注入應當注意的地方。逐條的解說在

下面。

1. 淋病最急性的時期。尿道口腫脹。包皮浮腫。在這個時候。最好不要注入。常有因此使病勢增惡。或者竟發生急性後尿道炎和睪丸炎等的危險。所以最好等到急性症候經過些。開始注入。

2. 注入的時候。先要放尿。就是想把尿道裏面的分泌物充分洗滌清淨。然後方才可以把藥液注入進去。否則有把前尿道的污物。送入到後尿道的危險。

3. 注入的時候。應當緩徐進入。萬不可迅速地注入進去。這是應當嚴禁的。

4. 注入的分量。開始注入的時候。應當從少量起首。普通的尿道容積。大約十至十二公分。所以普通的尿道注入器。是十至十五公分。但是

淋病彙相

淋病真相

尿道發炎的時候。尿道腫脹狹小。難容留這許多的溶液。並且因爲各人的尿道。大小不同。所以注入量在起初的時候。大約是五六公分。照第三條所講。緩徐地注入進去。倘使炎症候減退。尿道容積增大。那時候就可以逐漸增加了。

5. 注入的方法。先把尿道注入器吸入藥液。將頭部壓抵尿道。防藥液流出。注入器和尿道須成垂直的方向。否則藥液就不容易進去。藥液既然進去以後。暫時把外尿道口捺住。再把藥液放去。第二次照樣的再注入進去。這樣的約施行二三次。最後一次。要把藥液停留尿道內五分或十分間。短些也不妨。用手捺住。或用特製之尿道挾子挾住。

6. 藥液的温度。普通多用室溫。但是能夠稍稍加溫。則不但因溫熱對局部有好影響。而且藥液的殺菌力也加高。最好的温度。是二五至三十

度。

7. 注入器和消毒。尿道注入時所用的注入器。應當選擇適當的注入器。最合用的。就是筒用玻璃製造、嘴管用硬橡皮製造的。不但內容容易透視。而且消毒也容易。嘴管以圓錐狀的。尤為便利。

尿道注入器應用的時候。先宜消毒。普通大多用5%來沙而水消毒。就是將尿道注入器浸在5%的來沙而水內。等到用過以後。用水洗淨。依舊放在來沙而水裏面。能夠把來沙而水每天交換一次最好。

8. 注入的回數。一日中應當幾回。這個問題。有許多學說。有主張愈多愈妙的。也有以為過多有刺戟的。大概急性的時候。每日一二回就夠了。等到急性症候經過了以後。一日中可以注入四次至六次。

9. 注入的藥液。應當請醫師處方。吾把他的理由。分述在下面。

淋病真相

淋病真相

A. 藥劑的不同。淋病注入時候所用的藥劑。照上面所講過的。不外乎兩種。一種是殺菌劑。一種是收斂劑。大約有淋菌的時候用殺菌劑。淋菌減少炎症高度的時候用收斂劑。也有兩種兼用的。但是病人淋菌的多少。非醫師用顯微鏡檢查不可。就是同一的殺菌劑。性質也有強弱的不同。所以要醫師處方。才可應用。

B. 疾病時期的不同。淋病初期的時候。淋菌繁多。大多是用殺菌劑。等到慢性期。就要殺菌和收斂兼有的藥劑。淋病後的尿道炎。應當用強力的收斂劑。這時候的斷定。也非醫師不可。

C. 各人體質的不同。同一樣的藥劑。甲用了以後。甚為適當。乙用了以後。就覺不適。所以醫師要隨病人各個的個性。加以鑑別後。方才可以用處方。

D. 藥液濃度的不同。同一樣的藥劑。濃度應當變化。譬如百分之〇·二五、〇·五、〇·七五、一·〇和一十倍、二十倍、五十倍等等。這是要隨各人的體質。淋病的時期。隨時變動。

E. 藥液的變換。照上面所講。有淋菌的時候用殺菌藥。淋菌消滅的時候用收斂藥。這也是很簡單。但是長時間用同一的藥劑。他的功效就要減少。必定要變換藥劑。方才可以達到目的。

F. 淋病所用的殺菌藥。大多是銀的製劑。應當施用新鮮的。陳舊的就沒有功效。市上所售的淋病注入藥。從製造的時期上講起來。很可研究。10. 以上所講的。僅僅是前尿道淋病的一種療法。如果用這個方法無效的時候。還要施用其他的灌注法。倘使後尿道淋病的時候。更要施行後尿道注入法。僅僅靠這個前尿道注入法。是一定沒有功效的。

淋病真相

第六十七節 手術的療法

淋病除上述各種方法以外。還有各種的手術療法。譬如尿道狹窄。用器械的擴張法。尿道裏面有側管。用側管切開法。或則對於病灶。用電氣燒灼法、腐蝕法。以及尿道內切開法、膀胱穿刺法、攝護腺按摩法等等。這都是屬於醫師的事情。恕不一一詳述。

第二章 各部淋病的攝生和治療的情形

讀者已經明白上面所講種種的淋病醫治方法了。但是這不過是一個大概的情形。要讀者得到一種的常識。倘然拿來自己施用。當然是不能的。但是醫師的對手方是病人。倘使病人對自己所患的病症。一些沒有常識。那對於醫治的結果上。也就不能滿足。現在吾把患各部淋病的病人。應當攝生的地方和治療的情形。簡單的說明一下。

第六十八節 男子急性尿道炎淋的攝生和治療

男子急性尿道炎淋的時候。第一要照著上面五十七節所講的「淋病病人的攝生和注意」。仔細的參觀一下。實行起來。這並不是醫師故意叫人爲難。實在是過許多的顯明例子。出了危險。所以才有這樣的禁令。千萬不要大意。一面趕緊請醫師醫治。用消炎退腫的藥。把陰莖包裹起來。初起的時候。尿道局部不可用藥液洗滌。因爲往往有因此引起後尿道炎和其他各種合併症的危險。還是一面內服些藥劑。一面用化學或是疫苗等療法。等到急性症狀經過後。徐徐施行尿道洗滌爲妥。此外大便的通順。飲食的注意。那是不消再說了。

第六十九節 男子慢性尿道炎淋的攝生和治療

慢性淋病時。應當一樣的遵守上面所講的淋病攝生和注意。內服藥沒有急

性期的需要。應當注重局部的治療。譬如尿道的洗滌或注入。（如果是慢性後尿道炎。應當洗滌後尿道。）這樣的洗滌。時期很長。並不是一週二週的事情。有時要三四個月。也不一定。此外化學療法、和疫苗療法。也應當施用。電氣治療隨着病情的如何。也可並用。此外上面所講的器械療法、手術療法等。要隨情形的不同。或用或不用。是不能一例的斷定。總之慢性淋病是十分頑固的疾病。他的結果如何。全視醫師的技術和病人的耐力了。

第七十節 龜頭炎包皮炎和包皮嵌頓的攝生和治療

因爲淋病發生龜頭炎和包皮炎的時候。如果是輕的。只要局部的清洗和散布些乾燥的粉末劑。每日幾次。是容易治愈的。如果有包莖的時候。應當用藥液把裏面洗清。夜間用些浸有藥液的棉花。嵌入包皮和龜頭的中間。

同時又用濕布裹包法。裹包浮腫的部分。倘使腫脹極甚的時候。或是包皮嵌頓。恐防懷疽起見。有行背部切開手術的必要。身體的安靜和陰莖的高舉。那是不消再說了。

第七十一節 副尿道管淋病的治療

上面已經講過了。副尿道管是慢性淋病難以治愈和淋病再發的一個大原因。所以吾人要發見他和醫治他。實在是一件很要緊的事情。就是要淋病除根。非注意副尿道不可。倘使在尿道外口或是容易發見的地方。那時候診斷和醫治。也自然容易。倘使在尿道深部或不容易發見的地方。非依賴尿道鏡的檢查不可。檢查著了。然後可以醫治。醫治的方法有種種。譬如藥液的塗布。手術的切開。電氣的分解等等。能夠把副尿道管除去。也就是把淋菌的巢窟除去。巢窟除去。淋病的全治。就有希望。

淋病真相

第七十二節 淋菌性淋巴管炎和淋巴腺炎（橫痃）

的攝生和治療

淋巴管炎的時候。只要局部用醋酸礬士水的罨包。大多幾天。可以消退。淋菌性的淋巴腺炎。就是橫痃。在初期應當安靜身體。一面用罨包法，疫苗注入療法，和蛋白體注入療法。同時對於尿道局部的治療。應當停止。大多數是能夠消退。倘使不幸化膿的時候。那只好切開了。

第七十三節 淋菌性攝護腺炎的攝生和治療

淋菌性攝護腺炎急性的時候。應當禁止尿道的局部治療。就是洗滌注入等。應當停止。一面臥床安靜。使大便通暢。行溫水坐浴。吃些容易消化的淡泊食物。一面請醫師治療。用鎮痛坐藥以及肛門和會陰部的冷卻法。希望炎症的消退。倘使化膿的時候。那只好開刀了。

等到急性症候經過。達到慢性的時候。可以用按摩法、電氣療法、冷卻法，肛門坐藥、內服藥和消炎劑等的注射。這是要請醫師施行才好。

第七十四節 淋菌性副睪丸炎的攝生和治療

副睪丸炎發生的時候。有最重要的兩個注意。一個是尿道局部的治療。應當停止。一個是把副睪丸應當絕對的安靜。所以遇到了發生副睪丸炎的時候。所有的尿道洗滌和注射。就應當禁止。一面臥床安靜。絕對避去種種的運動。把睪丸高舉起來。可以用一條五寸闊的布片。纏住兩側的大腿。作成一個橋狀。把睪丸放在上面。或者在陰囊的下面。放一個枕头也可。睪丸上面。還可以用罌包法。初起疼痛劇烈的時候。用冷罌法。也有人用冰罌包的。但是用冰罌包有種種的不利。能夠早期改用溫濕罌包法。不但是經過良好。治愈迅速。而且後遺的睪丸硬結也少。大便的通利。鎮痛藥

淋病真相

的內服。自然也不可少。

等到急性症候經過。病人能夠少許行動的時候。可以用提舉帶把舉丸提舉起來。此外還有鬱血療法、電氣療法、穿刺法、局所藥劑塗布法、注射療法等種種。內中疫苗的注射。確有效果。是一種不可缺的療法。

第七十五節 淋菌性膀胱炎的攝生和治療

淋菌傳染到膀胱的時候。第一須身體安靜。下腹部保持溫暖。可用溫熱毛巾或熱水袋等。一面停止淋病的局所治療。避去刺戟性的食物。通利大便。一面請醫師治療。用內服藥，注射療法，以及膀胱洗滌法等等。

第七十六節 淋菌性腎臟炎的攝生和治療

淋菌性腎臟炎的時候。就宜絕對的安靜。吃些淡泊沒有刺戟性的食物。通利大便。腰部用熱罨法。內服多量的水或茶劑以利小便。排去腎盂內的細

菌。一面請醫服藥。同時施行注射療法 and 電氣療法。

第七十七節 尿道狹窄的攝生和治療

有了尿道狹窄的病人。在初期的時候。大多不十分注意。遇到了房事、飲酒、勞働、或會陰部受着壓迫的時候。尿道粘膜腫脹。就會覺到排尿困難。或竟然發生尿閉。所以對於上面所講的各種原因。應當避去。一方面請醫師用「步具」擴張法。或者有時候須行尿道切開術。倘使完全尿閉。因小便的蓄積。恐膀胱破裂。爲急救起見。只好用膀胱穿刺術。把尿排去。所以有過淋病的人。最好到醫師那裏去試試尿道有否狹窄。免之日後吃大大的痛苦呢。

第七十八節 女子淋疾的攝生和治療

女子患急性淋疾的時候。第一應當注意安靜。對於生殖器和身體的休養。

至少須三四星期。禁止勞働和房事。通利大便。避去刺戟性食物。一面因女子的怕羞。往往不肯就醫醫治。對於這一點。應當明白有二種的危險。一種是有急性變成慢性的危險。一種是有從尿道、陰門、上升到子宮、輸卵管等的危險。

第七十九節 女子急性尿道淋的攝生和治療

安靜身體。內服殺菌藥。等到急性症候經過後。施行局部的治療。也和男子差不多。此外藥桿的插入尿道，和注入療法等。要請醫師施行了。

第八十節 巴氏腺炎的攝生和治療

初起的時候。應當用保守的療法。就是安靜身體。用冷濕布或溫濕布的罨包。此外用疫苗或蛋白體療法。萬一不能消退的時候。那只好手術了。

第八十一節 外陰部腺炎的攝生和治療

外陰部發生炎症的時候。應當局部清洗。用微溫的坐浴或卷包。一面請醫醫治。用粉劑散布。急性膿炎的時候。應當安靜。通順大便。用冷水浴或溫卷包。一面請醫醫治。

第八十二節 淋菌性子宮頸和子宮內膜炎的攝生和治療

急性的時候。應當嚴禁局部的治療。恐淋菌有再向上蔓延的危險。圖身體精神的安靜。嚴禁性交。那是無庸再說了。其他飲食物和大便的注意。也和其他一樣。一面請醫醫治。用注射療法內服藥等等。但是子宮內膜炎的疾病。並非短時間所能奏效。還要有忍耐心才好。

第八十二節 淋菌性喇叭管炎和卵巢炎的攝生和治療

淋病真相

這兩種病的發生。是因為子宮和腔內的淋菌。沒有消滅。常常有侵犯這等臟器的危險。所以子宮內淋病的治療。就可以知道重要了。當急性的時候。一般的注意。譬如安靜通便等。也和其他一樣。此時最有效的治療。就是疫苗療法、蛋白體療法、電氣療法等等。

第八十四節 淋菌性關節炎的治療

患了淋菌性關節炎的時候。第一要安靜。所以用副木等把關節安靜。一面請醫師用內服藥、罌包法、鬱血療法。這時候的透熱電療法和疫苗療法。是很有功效的。

有了關節炎。等到急性症候經過了。第一應當注意關節的運動或按摩。否則往往有因此釀成強直的危險。這是要十分注意才行。

第八十五節 直腸淋病的攝生和治療

應當安靜。行全身浴。用藥液洗滌。或用坐藥。但是容易再發。

第八十六節 淋菌性眼結膜炎的攝生和治療

這是一種最危險的疾病。第一應當預防。凡是有淋病的人。覺得眼睛上有變化的時候。還是趕進請醫師診察一下。可免了盲目的危險。倘使既然有了本病的時候。還要預備從病眼傳染到健眼。一方面還要當心傳染給人家。至於醫治的方法。用冰碇法以及用蛋白銀，硝酸銀等點眼。這是應當託眼科專門醫爲妥。

第八十七節 小兒淋病的攝生和治療

小兒不幸傳染淋病的時候。也和成人一樣。須安臥床上。保守安靜。倘使局部炎症劇烈的時候。應當用卷包法。以減退炎症。他的治療。是很費時日的。有時竟然要數個月或是半年以上。因爲只要停止治療二三天。他的

淋病真相

分泌物就加多起來。所以這一點。是要患兒的家族和醫師兩方面。應當忍耐的地方。還有小兒淋病的時候。除了局部清潔以外。再應當注意他手的清潔。因為小兒沒有智識。容易把手上沾染的淋菌。傳染到眼睛上去。變成一個盲子。你想這是何等的危險吓。

第四章 寫在淋病的治療後

第八十八節 淋病怎樣的作為斷根

世人往往以淋病的急性症狀經過。疼痛減輕。分泌物減少。便算淋病已經治愈了。這固然是大大的錯誤。就是進一步講。有人拿了一大杯的小便。到衛生局裏去檢查。找不到淋菌。即作為淋病已經治愈的證據。其實也是一樣的錯誤。原來慢性淋病的時候。淋菌往往潛伏到尿道粘膜下組織、尿道腺、攝護腺等病灶裏面（病灶就是細菌潛伏的地方）。不一定常出現到

小便裏。所以僅僅用一大杯的小便去檢查。不容易找出淋菌。是當然的事情。倘然馬馬虎虎的作爲治愈。不但使病人耽誤了醫治的時期。而且還有傳染給他人的危險。所以吾人應當求一適當的標準。有所遵循。方才可以免了上述的危險。茲有德國醫學博士耶大松氏所選擇的三個方法。就是怎樣的決定生體裏面沒有淋菌的方法。說明一下。但是對於專門的地方。恕不詳述。茲不過令大眾知道淋病治愈與否的決定。是這樣的罷了。

第一 淋菌誘發刺戟法

第二 淋菌培養法

第三 補體結合法

第一 淋菌誘發刺戟法 怎樣叫做淋菌誘發刺戟法呢。就是淋病到了慢性的時候。照上面所講。淋菌往往潛伏在病灶裏面。如果不用方法去刺戟他

淋病真相

淋病真相

。他是不會發現出來的。現在用一種叫做刺戟法的刺戟一下。他就出來。容易給吾人找到。好似「撥草驚蛇」的意思。刺戟的方法很多。再分段的述在下面。

(一)機械的刺戟法 就是用一種金屬「步其」或擴張器插入尿道的方法。

(二)化學的刺戟法 是用一種藥液注入尿道的方法。

(三)特異性的刺戟法 是用一種淋菌疫苗注入的方法。

(四)非特異性刺戟法 是用自家血清或牛乳製劑注射的方法。

(五)酒精飲法 令病人飲用酒類的方法。

(六)勞働 令病人乘馬、跳舞等勞働的方法。

第二 淋菌培養法 就是用分泌物去做培養。但是淋菌培養的手續很麻煩

。又需要一定的設備。

第三 補體結合法 本法現在還未到十分可靠的地步。尙在研究。

施用上面所講的淋菌誘發法。所得到的尿道分泌物。用顯微鏡精密地去檢查。找不到淋菌。就是陰性的時候。總可作為淋病的治愈。但是斷不能以一次為滿足。須反覆檢查多次。至於上面所講的各種方法。也有一種的。也有併用二種、三種、四種的。這是要隨醫師的意思去決定。還有一句很重要的談話。就是淋病到如何的情形。方才可以刺戟法。這對於病人的利害。關係很大。如果誤用刺戟法以後。就可以得到很危險的結果。這是要請特別注意的。

第八十九節 淋病後的尿道炎

怎樣叫做淋病後的尿道炎呢。就是淋病經過了長時期治療之後。而且經過

淋病真相

淋病真相

上面所講的種種誘發法。小便中還有淋絲。但是用顯微鏡精細檢查起來。淋菌早已絕跡。就是白血球也找不到。在顯微鏡底下所見到的。僅僅不過是尿道上皮和粘液。尿道上皮的來源。就是尿道粘膜炎癒時候所剝脫而來的。粘液是因爲藥液所刺戟而來的。如果一個病人。長時間保守這樣的狀態。醫學上就叫做淋病後的尿道炎。換一句話講。就是淋病已經治癒。尿道炎還留着。有時候停止治療。反而不發見淋絲。但是否應當停止。要靠醫師的經驗了。

第九十節 淋病和結婚

「洞房花燭夜。金榜掛名時。」這兩句話。寫盡人間的樂事。可是後一句。隨着時代的演進（雖則現在也有考試院）。沒有從前的那樣有聲有色。頭一句呢。雖則是也隨着時代的演進。儀式改變。可是愉快還是一樣。郎

才女貌。在親友道賀聲中。已經舉行着結婚儀式了。此後甜蜜的光陰。真令人羨煞。不幸甜蜜的光陰。還未過了幾時。無情的惡魔。好似和陪嫁娘一樣的跟着來了。

什麼是惡魔呢。就是新娘受著新郎淋菌的傳染。發生淋病一切的痛苦。眼見得新娘愁眉蹙額不歡的過着生活。復因着新婚燕爾。羞於啓齒。後來因疾病的嚴重化。只好去就醫。如果醫治得當。還可以過着快活的生活。否則蔓延到子宮、喇叭管，卵巢等的時候。變成了慢性。反復的發作。令潔白無瑕天真活潑的新娘。成了一個厭厭一息的病婦。美滿的家庭。充滿了不快的景象。你想這是何等樣痛苦的事情呢。

所以有了淋病的人。到什麼地步。才有結婚的資格。這個問題。實在是現代社會上很重要的一個問題。所以男女當未曾結婚之前。除結婚應行注意

淋病真相

淋病真相

的條件以外。還有一個很重要的條件。就是須要醫師證明。沒有花柳病。（本文但及淋病）。方才有結婚的資格。現在把國外專家所許可的結婚條件介紹一下。

（一）勞辯氏所提倡的結婚許可條件如下。

一．尿道分泌物和淋絲。用多次的顯微鏡檢查。僅有上皮細胞。沒有淋菌的時候。

二．機械的刺戟粘膜。復用稍強烈的藥劑洗滌尿道。沒有淋菌的時候。

三．行上述檢查法。在二至四週以內。每日施行。都沒有淋菌的時候。

四．沒有尿道狹窄、攝護腺漏等局所的疾患。

(二)全納氏對於尿中混有膿球、淋絲、有淋病可疑的患者。用長時日正規的治療。在一定時間治療終了後。再將尿道分泌物，攝護腺液，精液等。用顯微鏡檢查。復行淋菌的培養。不發見淋菌。再施行種種的淋菌誘發刺戟法。反復的搜查。均不見有淋菌的時候。方才可以結婚。但是全納氏還有一個條件。就是男子的尿道裏面。往往有續發性細菌感染。例如葡萄狀球菌、假性白喉菌等。不幸傳染到新婚少年婦人的子宮裏面。也可以發生和感染淋菌時同樣的害毒。據全納氏的經驗。和有上述細菌的男子結婚後的新娘。當新婚大約二十天到一個月間。發生子宮實質炎。流著粘液膿性的分泌物。繼續發生卵巢炎者不少。所以全納氏的結婚嚴禁條件有三種。

一．淋菌的存在

二．僅僅一回的檢查。雖沒有淋菌。但常常有再發的既往症者。且用

淋病真相

淋病真相

各種的淋菌誘發刺戟法。均確實證明有淋菌者。

三·雖沒有淋菌。有續發性細菌感染者。

上面兩氏所講的條件。對於結婚問題。是一個很好的指針。性病潮流澎湃的時候。要保持美滿的家庭幸福。不可不注意這個問題。

第九十一節 患淋病的人能夠生育嗎

國人對於生育的觀念。隨著年齡的不同。可以分做兩途來講。第一種就是年紀輕的人。只要醫師把他淋病的痛苦醫治好來。繼續可以施行他的性工作就好了。對於生育問題。似乎不甚注意。第二種是年齡大一點的。他一方面固然想把淋病醫好。一方面還急急地對於醫師有「吾的淋病好了。將來對於生育有否影響」的請問。好似自己的淋病還是小事。不能生育。到是大事。這是吾人臨床上常常聽到的。但是也有一種的青年人。覺到父尚

無孫。已尙無子。因一時的失足。以無子而恐懼的也不少。所以鄙人對於生育問題。特地另立一節來貢獻給諸位。

生育是男女兩方面的事情。就是男的和女的。都有生殖的能力。方才可以受孕。（詳細請參觀拙著性病指迷不孕章）吾現在先把男子患淋病以後。所以不能生育的種種理由。申述一下

男子生育的要素是精虫。精虫的製造廠是睪丸。所以患淋菌性睪丸炎的病人。就可有不孕的資格。倘使兩側的睪丸都發過炎。那時候生殖的能力。更加降低。但是經驗上只要睪丸發炎不是十分利害。幾個月以後。產生精虫的能力。依舊可以恢復。或者利用一側健全的睪丸來代表。所以有過睪丸炎的病人。不是一定不能夠生育。但是對於生育。受著無上的影響。第二是精虫輸送經路的障礙。就是既然從睪丸製造出來的精虫。必定要經過

淋病真相

淋病真相

輸精管、尿道。射出到外面。倘使因爲輸精管狹窄。或是尿道狹窄。精液不能射出的時候。也是一樣不能受孕。第三是攝護腺炎。原來攝護腺在生理上分泌一種叫做攝護腺液的。當射精的時候。和精虫一齊出來。可以使精虫運動活潑。生存長久。就是多有受孕的機會。現在因淋病的關係。攝護腺的分泌液減少。就是所有的攝護腺分泌液中。也混和著膿汁和淋菌。使精虫的生活力和活潑力減弱。也是一種不孕的原因。

以上所講的。爲男子因淋病不能夠受孕的理由。現在要講女子因淋病不能受孕的理由了。原來女子對於生育上最重要的是卵子。卵子的製造廠在卵巢。倘使因爲淋病引起卵巢炎的時候。卵子的生產地障礙。那就根本不能受孕。第二爲輸卵管的閉塞。原來卵子從卵巢製造出來以後。從輸卵管剪線輸送到輸卵管子宮端。倘使因爲淋病。輸卵管閉塞起來。就是有活潑的

精虫進來。因為沒有卵子。也沒有用了。女子因淋病不孕的原因中。輸卵管的閉塞。實在是最多的。第三是子宮內膜炎。因為卵子既然和精虫會合以後。終算已經受孕了。但是必定要附着在子宮上面。方才可以發育起來。倘使子宮的內膜。因為淋病發炎的時候。受胎的卵子。就難以附着發育。也是一種不孕的原因。就是勉強附着了。也不能安安隱隱的在子宮內膜上發育長大。沒有多時。就要流產。第四是子宮頸管炎和膾炎的時候。流著粘液性，膿性、或是血性的分泌物。就是有健全的精虫竄入進去。也是因為不適當的生活。精虫死亡。就沒有受孕的希望了。

以上把男女因淋病不能受孕的理由。大約已經解說過了。因為原因的不同。有絕對不受孕的。也有可以受孕的。所以講淋病不是不受孕的絕對原因。是不孕的重大原因。

淋病真相

讀者如果患著淋病。同時要想受孕的時候。請先把兩性的淋病醫治好來。那時就有受孕的希望了。

第九十二節 有淋病的孕婦莫忘了產時嬰兒的眼睛

吾已在上面第四十九節中把淋菌傳染到眼內的危險。已經說明過了。可是還有一件很重要的事情。就是有淋病的婦人。當他生產的時候。夫妻兩方面。都注意大人方面的健康。沒有留心到他初生的嬰兒。因為有淋病的婦人。淋菌常常潛伏到陰道的裏面。嬰兒的頭部。通過他母親陰道的時候。眼結膜就沾著了淋菌。引起了初生兒膿漏眼。在當初的時候。如果兩親有知識。急速醫治。當然有治癒的可能。如果遇到了沒有智識的父母。以為小兒火氣太大。給他吃些犀黃呀、丹方呀。坐失醫治的機會。結果使人生最要緊的一雙眼睛。從此失明。變成盲子。給盲啞學校裏多添了一個未來

的學生。你想慘也不慘。所以嬰兒產下的時候。不論產婦的淋病有否治愈。就應當用〇·五%或二%硝酸銀水、或一〇%蛋白銀水點眼一次。(產科醫師和助產女士都有預備。舊式隱婆當然沒有這些智識。產家應當自己注意。)自從行了這個方法以後。百分之十一的初生兒膿漏眼。就減少到千分之一和二。又據美國四百個盲目學校的統計。百分之四十四的盲子。是由於淋病而來的。吾國雖然沒有這樣的統計。但在智識幼稚的吾國。想起來他的百分比。或者還不止此呢。

第四編 編尾

第九十二節 答客問

吾現在把淋病的真相。不知不覺地已經寫了不少。所要講的話。也大約已

淋病真相

淋病真相

經講過了。但是第一編是編首。末了少不了一篇編尾。編尾講些什麼呢。到是一個難題。如果寫些某君的淋病。如何如何難治。經吾醫不上幾何時日就好了。在讀者聽了似乎沒有甚麼興趣。並且也沒有甚麼益處。醫師給人家醫病。醫好了也是當然之事。無所用其張揚。況且經過吾所醫治的淋病人。也不是個個斷根。（理由請參觀五十三節淋病爲什麼難以治愈和八十八節淋病怎樣作爲斷根）如果寫些傳染淋病當時的風流韻事。以驚告來者。則未來者。因沒有本編的需要。還未寓目。已傳染者。早已受到了深切的痛苦。回思當時的風流韻事。不但是過眼浮雲。或者還當他十八層地獄看呢。如果寫些淋病傳染後的痛苦。譬如自己個人的痛苦。室人受累的痛苦。名譽損失的痛苦。經濟壓迫的痛苦。情場失和的痛苦。生意辭歇的痛苦。患本病的人。已身親受之。也用不着鄙人再來描寫。反有畫蛇添

足之嫌。於是前思後想。覺到實在無編尾一篇的必要。就要把編尾一篇放棄了。可是偶然觸動了編『性病指述』的經驗。因為性病指述出版了以後。有不少的讀者。來函詢問。而且所問的。往往在編中已經談論過了。鄙人恐本編出版以後。或者有同樣的事情。所以另立一節。叫做『答客問』。就是把淋病病人所要問的話。預先擬定幾條。答復要問的各位。免之將來的麻煩。並且再加上了了一節結論。就作為編尾。

(一問)鄙人從未涉足花叢。尿道口有粘稠樣的分泌物流出。有云淋者。有云非淋者。究竟如何。

(答)尿道口有分泌物流出。不一定是淋病。詳細請參觀第八節是否淋病第一次診斷的重要……和淋病相似的病症。最好請醫師用顯微鏡。把你的分泌物檢查一次。有無淋菌。便可決定。

淋病真相

淋病真相

(二問)鄙人偶因酒後失足。傳染淋病。已經治愈。但一遇身體勞苦過度。尿道口仍舊有分泌物流出。是否淋病未愈。抑體虛所致。

(答)應當將分泌物用顯微鏡仔細檢查。有無淋菌。如關於體虛的話。請參觀第六節體虛可以發生白濁嗎。

(三問)鄙人曾患淋病。尿中有線條樣的物質浮游。聞叫做淋絲。有云淋絲有毒者。有云無毒者。究竟如何。

(答)淋絲中大多含有淋菌。但也有無淋菌而僅有粘液上皮者。詳細請參觀第十八節淋絲是什麼。並請參觀第八九節淋病後的尿道炎。

(四問)鄙人曾患淋病。現在覺大小便的時候。往往有白色鼻涕樣的物質流出。甚為恐懼。請問這是何物。有否危險。

(答)這叫做攝護腺漏或精液漏。因便時怒責壓迫而來。發生這樣病狀的

病很多。譬如慢性尿道淋、慢性攝護腺炎、攝護腺神經症、精囊炎等等。都可以發生本症。詳細請參閱本編十五節、廿三節、廿四節、廿六節等。

(五問)鄙人傳染淋病。雖與室人交接。但並無症狀。究竟有被傳染否。

(答)女子傳染淋病的時候。往往症狀不著明。竟有平時傳染淋菌。毫無異狀。等到月經之後或產後。發生嚴重的淋病症象。最好在經來後。請醫師檢查數次爲妥。一面請參觀第三一節男女淋病的異點。

(六問)鄙人前曾患淋病。現在室人白帶淫淫。究竟淋病和白帶有關係否。

(答)婦人的白帶。並非一種病名。實在是一種病狀。凡是生殖器和尿道有病的時候。都可以有白帶。詳細請參觀性病指迷一三六節婦女赤白帶的談話及本編第三十七八節子宮內膜炎。但是婦女因淋病發生

淋病真相

白帶的。實在很多。最好請醫師檢查。病在何處。原因何在。方可醫治。否則就有男女互相傳染的危險。請參觀五十五節夫妻同時醫治的重要。

(七問) 室人前有淋病。近日忽然下腹側面疼痛發熱。未審何故。

(答) 此恐因淋病從子宮竄入到喇叭管和卵巢。發生淋菌性喇叭管炎或卵巢炎。最宜留意。恐有變成腹膜炎致命的危險。詳細請參閱本編三九節及四十節。

(八問) 鄙人染淋。因困於經濟。可以自己醫治嗎。

(答) 自己醫治的能否和利弊。請參觀五十二節淋病可以秘密自己醫治嗎和第六十六節男子尿道淋自己注入的注意。

(九問) 淋病以局部洗滌為最有効。請問用何藥為最上。

(答)請參閱六十五節局部療法及六十六節男子尿道淋自己注入的注意。

(十問)報上所登之淋病內服藥。究是以何者為最宜。

(答)淋病沒有內服特效的藥劑。已在五十九節內服藥中說明。

(十一問)鄙人傳染淋病以後。常常覺腰酸、背痛、遺精。舊醫謂為腎虧。

確否。

(答)凡是攝護腺、後尿道、精囊患淋病以後。常有此等現象。詳細請參

觀十五節、二三節、二四節、二六節。腎虧的話。是沒有根據。切

不可信。

(十二問)鄙人雖患過淋病。但早已治愈。近日忽然寒熱。發生小腸氣。未

知何故。

(答)小腸氣原來是小腸向陰囊脫出的病症。醫學上叫做「脫腸症」。關

淋病真相

淋病真相

下所發生的。未必是脫腸症。恐因淋病未愈。淋菌竄入後尿道。進達睪丸。發生淋菌性睪丸炎的緣故。詳細請參觀二七節淋菌性副睪丸炎和性病指迷二五節淋菌性副睪丸炎(俗叫做小腸氣)。

(十三問)鄙人日來忽然寒熱。右膝關節腫脹。疼痛異常。不良於行。醫叫做鶴膝瘋。未知此與花柳有關否。

(答)關節發炎的疾病很多。譬如梅毒、結核、淋病等等。貴恙既然發生如是迅速。腫脹疼痛。如是之甚。且所發生的。僅為一個關節。恐與淋病有關。未知患過淋病否。詳細請參觀四十三節淋菌性關節炎和性病指迷二十六節淋菌性關節炎(俗叫做鶴膝瘋)。

(十四問)淋病有預防的方法嗎。

(答)淋病雖有預防的方法。請參觀五十八節淋病的預防。但是百密難免

一疎。俗語講「刀傷藥雖好。不用爲妙。」還請不要嘗試爲妥。

(十五問)淋病到底能夠斷根麼。

(答)淋病不治的呼聲雖高。但並非不治的疾病。其所以未能斷根者。自有其未斷的理由。(理由請參觀五十三節淋病爲什麼難以治愈)能夠免去難治的理由。加以適當的醫治。淋病就可以斷根。(理由請參觀五十一節淋病是否不治的疾病)

(十六問)報上所宣傳的淋病短期斷根。是否可靠。

(答)此恐未必。因爲現在的醫學。對於淋病。還沒有特效方法。(請參觀五十節淋病有特效藥嗎)他所講的斷根。恐還未合於斷根的標準。請參觀八十八節淋病怎樣的作爲斷根。

(十七問)鄙人染淋。因環境所迫。不能繼續醫治。只好放任。有危險麼。

淋病真相

淋病真相

(答)當然有危險。請參觀十七節慢性淋病有怎樣的危險。

(十八問)鄙人傳染淋病後。已合法醫治多時。迄未見效。未審何故。

(答)閣下如果合法醫治。而未全愈者。恐係閣下身體虛弱所致。請參觀五十四節。淋病何以有輕重的不同。或尊夫人未同時治療。致成互相傳染。亦未可知。請參觀五十五節夫妻同時醫治的重要。

(十九問)淋病後可以發生陰萎麼。

(答)淋病後發生陰萎的頗多。尤以後尿道炎、攝護腺炎以後。發生者最多。詳細請參觀二十四節情慾性神經衰弱症。

(二十問)鄙人從未涉足花叢。但小便溷濁異常。友人云係淋症。究竟如何。

(答)小便溷濁。不一定是淋病。竟有健康的人。因為小便中含有多量鹽類的緣故。發生溷濁。但有時小便甚清。有時溷濁。如有懷疑。請

醫師檢查診斷一次可也。

答客問不知不覺的已經寫了二十條。雖則還可以寫下去。但是沒有多大的意味。讀者如果還有要問的地方。請先把本編的目錄。仔細讀一遍。或者所要問的話。已經在裏面了。

第九十四節 結論

吾把淋病常識貢獻給讀者的地方。已經完了。讀者讀到此地。對於淋病的常識。大概已經有一點了。換一句話講。就是對於淋病的真相。也可以明白了。於是吾就推想傳染淋病的讀者。讀了本編以後的批評是怎樣。吾想可以分做兩途來講。一種是失望的。就是新傳染淋病的讀者。以為讀了淋病真相。必定有什麼秘方妙術。使吾脫離苦海。那知道讀完以後。不但沒有秘方。倒反把從前認為對淋病有奇效的種種方法看穿。並且明白了淋病的

淋病真相

淋病真相

斷根。並非簡單的一回事。於是就大爲失望。一種是有希望的。就是老傳染淋病的讀者。從前對於淋病的真相。真是莫明其妙。受了廣告上的迷惑。損失了不少的金錢、精神和時間。還是一個不斷根。現在呢、淋病的真相明白了。從此可以有計劃有目標的把淋病醫治斷根。好似受了一個新刺戟。就發生了一個新希望。所以鄙人根據上述的推想。知道第二種讀者。得到了本編。多少有點好處。可是第一種讀者。雖則初時難免失望。但是既然有了這些常識。日後自然有用得到的地方。俗話講「事非經過不知難」。吾以爲對於淋病尤然。話也說得太多了。想就此擱筆。不過還有一個吾個人的希望。就是本編是一種通俗的文字。說得太深了。對於沒有醫學修養的讀者。弄得莫名其妙。說得太簡單了。往往辭不達意。所以希望。對於本編如認爲有錯誤的地方。還請不吝賜教。真是榮幸之至。



醫藥書報介紹

名 稱	編 譯 者	發 行 所	定 價
醫學革命論集	余雲岫	上海海甯路北山西路一三八〇號余醫師診所	上集七角下集六角 寄費一角一分
實用調劑及處方	劉步青	上海英租界交通路新華大藥行	三元五角寄費一角五分
最新花柳病診斷及治療法	姚百麟	上海望志路北永吉里十六號	十二元
時報衛生特刊	時 報	上海時報館	每逢星期一 登時報夜報
保健週刊	陳 衍	上海大日報館	每逢星期一 登大日報
新藥大成	梁 心	廣州市泰康路光華醫科大學出版部	首集大洋八元 二集二元五角
診療醫報	汪企張夏愷初 周夢白	上海霞飛路一〇四號	全年十二册大洋一元
廣西衛生旬刊	廣西梧州醫院	梧州小校場	全年卅二册一元五角
社會醫藥報	諸民誼鄧人讓 曹志功	上海老大沽路新馬安里三十四號	全年廿四册大洋二元

醫藥學雜誌	黃鳴龍 黃鳴騷	上海北京路九十六號五定公司轉	全年二元五角 半年一元三角
醫藥評論	醫藥評論社	上海亞爾培路四〇八號醫藥評論社	全年十二冊一元 國外二元五角
醫事彙刊	全國醫師聯合會	上海池浜路中華醫學會樓上全國醫師聯合會	每冊二角
衛生學要義	李 棻	上海四川路十二號	每冊六角
新醫藥刊	趙燭黃	上海新開路一〇九三弄三號新醫藥刊社	全年大洋六角
醫學與藥學	杭州市醫藥師公會	杭州市醫藥師公會	全年一元
各科診療大全	楊元吉	南京路六二〇號楊醫師診所	實洋三元半 預約二元八
申報醫藥週刊	申 報	上海申報館	每逢星期一登載
新醫與社會	上海市醫師公會	上海新開路池浜路	每逢星期五登 上海時事新報
民衆醫藥	民衆醫藥社	上海小沙渡路勞工醫院	每逢星期四 登上海晨報
民衆醫學	民衆醫學社	上海四川路十二號	每逢星期一登 上海新聞報日報
醫藥週刊	汪企張	上海新聞報館	每逢星期日 登新聞夜報

民國二十三年九月初版

版權所有
翻印必究

淋病真相

全一冊

定價實洋四角

掛號

著述者

謝銘

發行所

謝銘

上海

電

寄售處

四馬

印刷者

謝筠壽醫師診例

上海愛文義路派克路口和平里內九十號

電話三五二四四

科目

內科 外科
皮膚花柳科

門診時間

上午十時至十二時
星期日上午照常門診

門診金

一元六角 過時按號加

出診

下午一時至三時 七元四角

急診

隨請隨到 診金十四元八角

手術費 注射費 透熱電 太陽燈
等均外加另有章程

附告

凡以醫藥事見詢者每函一元空函不覆如須掛號另加