

痘证宝筏

痘證寶筏卷四月錄

七暈條辨

逆證條辨

賊痘辨

痘疔辨

紫浮萍辨

痛癢虛實辨

伏陷分別論

五陷條辨

倒陷倒齧辨

空倉論

水泡論

潰瘍論

漏漿論

瘡瘍論

痘爛生蛆論

擦破乾焦論

封倉論

寒戰咬牙論

譖妄論

聲啞失音論

水滯論

口唇論

舌色論

口瘡臭爛論

咽喉疼痛論

驚搐論

夾斑論

夾疹論

失血論

吐瀉論

痢疾論

似痢非痢論

腹痛論

腰痛論

痰論

喘論

渴論

汗論

大小便論

目錄終

痘證寶筏卷四

上海強健纂著

同里朱增甫春坪氏校刊

七暈條辨

朱氏痘出而根腳有暈其名有七辨之不可不蚤痘位尖圓者氣充也實也痘粒平塌者氣弱也虛也若以暈言之老紅也紅紫也紅紫乾枯也淡紅也焦紅也鋪紅也淡白也此七暈之分別其中有順逆險之驗焉

老紅者暈色紅而老不妖嬈也不閃爍也不乍紅而乍淡也亦不帶赤紫也此老紅之暈必發熱三日而始見痘苗身體必和不甚熱也必能飲食也二便必調精神必清爽也此順證也痘出必稀卽多有百十粒亦順證也

健按凡看痘用沙紅紙拈蘸菜油點火照之燈光之下其色如新大紅紗不深不淺是爲老紅乃氣血充足之痘正好做漿淡

則血不足而漿薄須預補氣血以成漿赤則熱盛紫則毒深應

涼血清火以圖之。總歸至老紅色方有厚膿而無後患。不可過  
清亦不可過補。全在看暈腳準作於四五朝上消息之勿使太  
過不及以致失期遲。漿之禍始爲能手。

紅紫者痘色深紅而帶紫也。必發熱二日。卽見痘苗也。身必熱微  
煩躁也。當敗毒和中散主之。看其出齊。卽用清毒活血湯。催其  
長漿。漿足亦歸於順。健按紅紫之色。陰逆之象也。若根頂尖圓。用藥得法。仍可轉順成功。若兼散漫。此氣  
虛火盛。難治矣。

紅紫乾枯者。初見點。卽如此暈腳。其證多係逆象。必發熱一日。卽  
見痘苗。報痘必稠密。必大熱。蒸蒸煩躁昏沉。不省人事。唇焦口  
渴。此危證也。其證多不可救。若大便燥結。二三日不解。小水短  
澀。又黃。此毒火內盛。急宜下之。以清毒火。用敗毒和中散。加熟  
大黃。以利之。毒火必從此而少減。看其出齊。卽以清毒活血湯  
催其長漿。向之所謂紅紫乾枯者。今見根腳紅活漿勢泛泛欲

起此尙可救。若仍復乾枯不見起長。不見泛漿。加之身熱蒸蒸。  
煩躁顛悶。譖語昏沉。不知人。不思食。痘平塌中有黑臍。此必不  
可救也。

淡紅者暈腳四圍淡紅有妖嬈之色。以紙燈照之若有紅色。若紅  
色不定將來必變淡白。此氣血俱虛。若初見痘苗之時。此淡紅  
暈腳寒涼之藥切不可用。倘身不退。熱微有煩躁。宜用升麻葛  
根湯。加人參。當歸。以托其苗。俟其出齊。以千金內托散。催其漿  
漿足。仍歸於順。若先誤服寒涼。暈轉淡白。急用參歸鹿茸湯以  
救之。緩則必成灰陷。此淡紅暈之易於變白。不可不知。健接淡  
初發之劑須兼補養氣  
紅之暈  
血之藥庶無中途變逆

焦紅者。初見痘苗。頂乃先焦。根腳紅紫有芒角。不滋潤。暈腳不圓。  
且又帶紅紫乾枯。此乃毒火內盛。若初見痘苗。急用敗毒和中。

散倍芩連紫草以托之俟其出齊熱不減不能食兼神昏不省人事煩躁頓悶水漿不入者不救倘熱少減神氣稍清能食不甚煩躁急以清毒活血湯催其漿長若漿得足仍可歸順此在神而明之

鋪紅者痘無紅暈痘粒淡白通身皮肉盡紅故名鋪紅良由毒火內盛元氣不能統血散漫於皮膚之間也若神清能食痘稀者可治若人事昏沉則不可救矣

淡白者痘之根腳四圍無一線紅色止見淡白之痘而不見其有量也蓋因氣血兩虛或因久病之後或因吐瀉初愈或因生母有病失乳或因內有積患或生大毒膿血出多元氣傷損故出此淡白痘色初見苗時宜用加味參蘇飲以托之俟其出齊即用千金內托散催其漿長如漿不足遂以參歸鹿茸湯助之今

日不足來日再催余治此等氣血兩虛之證不計日子峻補以使漿足而收全功者夥矣萬不可以八九朝空殼無漿不知溫補之法委而棄之非慈幼之心矣此等七暈前輩未能詳辨余特表而出之若得沉潛參悟自必得心應手出幼稚於險途豈非仁人君子之所當曉也健曰量腳七等非玉堂誰能講得透澈眞啟玄贊化之秘笈也

逆證條辨

蒙頭一也面部身上及手足俱稀獨頭上至髮際形如蠶種此逆證也若稠密而有地界又當別論

蓋面二也他處俱稀獨面上形若蠶種無絲毫空處此逆證也如稠密有地界又當別論

托腮三也他處俱稀獨兩腮頰及地閣相連一片形如蠶種此逆證也若稠密有地界又當別論

鎖項四也。他處稀疎。獨項間若蠶種。無絲毫空處。此逆證也。若稠密有地界。又當別論。

雲錦鋪胸五也。他處俱稀疎。獨胸前一處上及咽喉下連兩乳。形如蠶種。此逆證也。若稠密有地界。又當別論。

雲錦鋪肩六也。他處稀疎。獨兩肩及後頸窩形。若蠶種。此逆證也。如稠密有地界。又當別論。

前後補服七也。他處俱稀疎。獨心窩之下。肚臍之上。脊背鳳翅骨之下。脊後腰之上。前後如職官補服樣。或方或圓一片。形若蠶種。此逆證也。若稠密有地界。又當別論。

斷橋八也。他處俱稠密。不分地界。獨脊背腰之上下及臍之上下。前後不見痘粒。此逆證也。猶橋之有梁而中斷。若上下別處。所出之痘。有地界。猶可望生。又當別論。

蝦蟆瘡九也。遍身上下痘出稠密不分地界。惟肚腹之間不見痘粒形似蝦蟆故名此逆證也。若遍身稀疎又當別論。

無根十也。通身上下痘俱稠密不分地界。獨兩手心兩足心無痘。蓋以手足爲諸陽之本。陽絕則兩手足心皆不出痘此逆證也。若通身稀疎又當別論不必拘泥。

枯樹挂蛇十一也。有單挂有雙挂有挂在手肱者有挂在腿股者。他處俱稀疎獨挂處如蛇形而纏繞之密如蠶種此逆證也。倘稀疎有地界又當別論。

玉帶圍腰十二也。他處俱稀疎獨後腰及腰四圍如玉帶形密如蠶種濶不過寸此逆證也。倘或稀疎又當別論。

形如瓜瓠十三也。痘初見標尚未出齊及將出齊之際未見起發而面部腮頰及兩目俱皆腫脹形如瓜瓠此毒氣內盛先攻脾

胃陽氣不能統攝而上衝。此逆證也。煩躁顛悶，不省人事者，決不可救。健按逆證形色何止一十三條。此特指其有名有象者而言。則此外不越乎是矣。何必如他書之圖形繪像，多設異名，括爲歌謠？而後生小子，視爲嬉戲。附會穿鑿，開口便俗無深沉靜修之學，最可醜也。所謂玄酒味淡，大音希聲，書貴清真，學貴切實，不失黃農大旨。書之於人，誠兩貴焉。然而不易得也。豈細人之所能知哉？

### 賊痘辨

賊痘者，較之衆痘獨大，先微含水漿，中臍有黑色，後必帶累衆痘，不能依期長漿。名之爲賊，以其能害事也。痘疔根腳微腫，外形獨大，賊痘外形雖大，根腳不腫，以此分別。若見此，卽以燈心點火，當頂猝之，其毒卽解，不爲害矣。若一二顆，則依此法，倘賊痘出多，燈猝恐其難受用，拔毒散擦之，日擦三四次，亦能解毒。如不退，則通身之痘不能成漿，而難救矣。又有用銀鍼挑破點四聖散良。

痘疔辨

痘之有疔毒氣凝結而成也。順證無疔險逆者生疔初見外形獨異根腳獨大硬而不軟亦以燈火淬之再用拔毒散擦之不消則以銀鍼挑抉其頂擠去紫血用四聖膏填入化之爛去疔腳又法用獨頭蒜一片放疔上以艾圓灸三壯疔將自消若疔少而痘有漿者可治如疔多而痘色不好不成漿者不救健按疔硬頭帶青灰紫色不一黑者更毒見此痘必險根大而逆如見一二顆不在致命之處者挑去以圖之

紫浮萍辨

痘名紫浮萍因其形色如萍之叢聚而名之也或成廿或成百攢簇一塊四邊正痘粒大其萍痘細密粘連根頂紫色起長之際不能分顆或身有三五處或七八處十幾處者此毒氣凝結之淺深也當用清毒活血湯以托之倍生黃芪以長其漿倘受補

卽用人參外用雄黃末滾水泡綿臘脂汁調搽萍上日搽三次  
則拔盡其毒正痘長漿彼亦長漿但易於破損用松花或熟石  
膏末川貝末繆之最良若清毒活血湯不能足漿急用參歸鹿  
茸湯加薑棗陳酒服外用拔毒散臘脂汁調搽必使膿漿灌滿  
爲主或問曰紫浮萍屬熱者多子何以溫補成功余曰用藥相  
時制宜元氣虛弱亦有浮萍其色淡紅或淡白當用千金肉托  
散以催漿其紫者前因寒涼太過色亦轉淡故皆可溫補若不  
溫補何以成功總歸形色之應與否耳健按浮萍卽攢聚也乃  
散故毒氣凝結一處須審寒熱其元氣不足不能運毒分  
色分補瀉而治俱可化毒成漿

痈癰虛實辨

諸痛爲實諸癰屬虛內經言之詳矣然此云痛者非頭痛腹痛腰  
痛口舌咽喉等痛也乃膿漿充滿痘粒高聳內實而痛此吉兆

也用生白芍末錢酒調服之立止。

痘漿將行及膿漿不充并回水之際作癢異常皆屬內虛急宜大補氣血助其足漿暈若紅紫卽用清毒活血湯倍參芪若暈腳淡紅以及淡白卽用千金內托散倍參芪或參歸鹿茸湯助其足漿漿足而癢自止外治用荆芥穗末以綿紙卷緊成筒點火悶滅隔一二層紙於癢處猝之其癢亦止如有穢氣觸犯而癢者急燒蒼朮紅棗黃茶葉以解之再服平和散使芳芬藥味達於營衛自然癢止。

### 伏陷分別論

朱氏隱而不不出謂之伏出而復塌謂之陷夫所謂伏者如敵兵埋伏於幽僻之處險隘之地尋之不見其蹤聽之不聞其聲爲將者倘失其探聽之機輕忽以進未有不敗者矣如遇此等伏而不出之

證先審察其報痘的確或已見痘粒始是出痘否則止有身熱或爲雜病不可不明也如雜病則以雜病藥治若出痘則以托痘藥治余曾治一伏而不出之證用敗毒和中散去芩連紫草加羌活蘇葉煎服本日卽出三五十顆來日又服通身俱出至齊看虛實寒熱用藥催漿向之所謂伏者今乃盡出而長漿矣倘不明宣托之法則伏者何能應時而出勢必鬱遏於內而頃刻告變矣

有足下先報痘苗此痘中之罕見者次於手指見一二顆又臂上見一二顆此名倒裝證猶舟之載貨先載前倉爲順若先裝後倉爲倒裝今出痘理宜面部先報次身上次手足此順報順出也茲從腳上手梢臂上先出亦比舟之倒裝也余曾治此用敗毒和中散去芩連紫草加升麻以提之上部卽出又服出齊因其淡紅隨用千金內托散托漿充滿而收全效因此痘面部不

先報苗亦有伏象故并言之

陷乃痘已出齊頂不高聳盡皆平塌蓋緣毒盛氣虛當細辨暈腳  
別七暈之中屬何暈腳則虛實寒熱一目了然按暈用藥起死回  
生實熱者清毒活血湯主之虛寒者千金托散主之萬一漿不能  
灌倍加參芪以攻之又不見滿急用參歸鹿茸湯以催之余遇此  
等入委之不治者接手治之先與痘家旨明險逆大劑濃煎疊進  
十中常救五六若痘出齊後當治不治則漿不行而五陷之證作  
矣五陷者白陷灰陷紫陷黑陷血陷也健曰復宣五陷根由立法救治實爲痘家功臣

### 五陷條辨

痘出稠密暈紅紫身必大熱呼吸氣麤而頂陷下者紫陷也甚則  
轉而暈腳乾枯中有黑臍乃成黑陷也此毒火內盛欺侮其元  
氣焦燥其營血而陷也宜用清毒活血湯倍加生黃芪芩連紫

草以治之當其紫陷時不過一二劑而痘立起若紫陷失治或誤服溫補變成黑陷則毒火亢極內攻已深雖用此方加減所活少矣

痘出稠密其色淡白根無紅暈而頂陷者白陷也甚則遲延二三日轉而爲灰陷矣皆因氣血虛寒不能化毒以成漿故陷也當自陷之時應大補氣血用千金內托散或參歸鹿茸湯一二服卽成大漿矣失此時日雖與溫補變成灰陷乃氣血虛寒之極也急倍加參茸再添隨證藥味連進之猶可望生若以參茸價貴客費是自棄其兒也余治此等屢用屢效敢以告諸來者復居於下化毒而成膿矣

血泡失治則元氣愈虛而成血陷宜用參芪四味湯服一二劑卽化成漿矣血陷與紫陷若不細心體認多致混淆不可不辨血陷雖紅不帶紫色血陷屬虛氣平身涼紫陷屬熱氣蠶身熱已上五陷之證辨別詳悉後學反覆參玩則初起泛漿長漿催漿足漿之法層次工夫不可或緩再劑三劑必以漿足爲主不致犯此五陷若能依此調治則回春於頃刻間也。健曰諸陷精詳如同犀照

### 倒陷倒齧辨

在內不出爲伏出而復入爲陷前論辨之詳矣今言倒陷倒齧豈無所分別乎夫倒陷者從上倒下之義痘頂本來尖聳而當行漿之際忽然中臍下陷此謂之倒陷看痘色之紅淡辨虛實寒熱分別五陷而用滻漿之藥攻其充滿膿成則毒解矣向之倒陷者今乃及時用藥以成功也。

倒醫者其證有二當長漿之時不能及時用藥及至回水結痂之際漿既不能充足於中醫必平塌於外此爲倒醫證亦危矣宜急用攻漿之劑使其復充若不能充則難救也。健按倒陷須辨其虛實則寒熱自判矣。虛者倒陷必根腳無暈而痘色灰白精神困倦飲食少思實者倒陷必根腳乾赤煩熱引飲或大小便閉澀所謂火能消物皆無漿而頂自陷也。故倒陷乃於正欲行漿之時過期不上而致也。倒醫乃於將欲收疤之際漿薄不充回水不及虛寒者則漿冷而凍爲灰醫實熱者則火迫漿乾而爲焦醫用藥雖寒熱不同然其本虛則一也。法當升補爲主空倉亦同此治。今人往往寒涼太過而犯此者十之七八不知大刺參芪以救之。醫家昧此而莫醒病家見疑而不信彼此無從別白道之淪替至矣。

盡矣孰能爲之挽歟

### 空倉論

朱氏空倉者痘內無漿止有外面一層空殼如倉無藏粟非空倉乎宜詳看虛實寒熱用藥攻漿如實熱而兼火毒盛者急以清毒活血湯攻之如屬虛寒急以千金內托散或參歸鹿茸湯以攻之雖

至日數之多猶可望生若不及時救治則變證蜂起矣臨此當以  
手指按其痘頂其中空與不空不辨自明如疑惑未決再以銀鍼  
挑破其空可知矣

### 水泡論

秦氏水泡有火有溼有肺熱有脾虛有氣不足或氣有餘或紫黑泡  
之別其溼者或向曾感溼或飲食過多脾家受損流溼皮膚繆入  
肌表而發水泡是也宜保元湯多加車前木通茯苓之類

有火者痘四五朝之前煩躁不寧頭面乾紅色滯乃毒盛火熾火  
不能炎上水不得潤下搏激於皮膚之間而爲水泡譬之沸釜  
之中竈下火盛必爲之發泡也宜清火解毒以紫草犀角金汁  
之類選而用之

有肺熱者蓋皮毛者肺之合也熱毒在肺皮毛受損并其膚間之

津液俱發爲水泡也。宜托漿中加貝母門冬。

有脾虛胃弱不能制水以致水溢皮膚之間而爲水泡者。防其發瀉其候必腸鳴或作瀉並宜保元湯及參苓白朮散。

氣有餘者乃氣分毒盛以致津液上蒸隨毒所出而發爲水泡。宜升發劑中佐以陳皮青皮之類氣不足者其色必白而無清水宜倍用參芪加桂主之若發黑紫紅泡者乃血熱之極其毒未出而賊邪先爲之病也宜涼血解毒大劑投之擗紫黑者剔破而諸痘灌漿亦能望生若反加痰喎煩躁而痘色焦枯則不治者多矣。

已上之證縱使飲食如常身無所苦往往日後多有變證。若起發而殼中出水者此氣至而血不隨也或窠囊浮脹中含清水如水泡之狀此血氣俱虛不能制毒反爲毒逼漸變癰瘍也。治

此諸證最要察其起居飲食隨證調治慎勿恃其無虞反取誘  
怨也痘中間有水泡幾粒者因邪不能勝正亦無大害然托漿  
之中謹防發癢之藥爲要大抵水泡多者後必發癢漸成倒陷  
而致不救也

### 癢瘍論

秦氏癢瘍之患痘家最忌因氣虛則癢癢甚則瘍此不易之論所謂  
氣失其衛痘自作癢然血虛亦有致癢者不可不知丹谿曰血不  
榮於腠理所以癢也柳真虛曰血不滋灌痘癢難釋則氣血之虛  
俱能作癢余見癢瘍之痘稠密者多四五朝雖見起發至七八朝  
殼薄漿清燈光水泡痘形雖綻而血不歸附純白不榮手足揉動  
而作癢不已破瘍乾焦而無血咽啞泄瀉之證互至形綻者氣不  
虧也純白不榮者血不足也於此可見血虛亦有癢瘍之患先賢

所謂毒者譬之貨也血者譬之船也貨盛船窄何以能載耶蓋血虛必致癰虛甚則不能載毒而癰塌法當於未癰之前用保元湯加殼蠶芍桔速進數服尚可保全或曰血虛何不以四物湯補血而乃用保元湯氣家藥乎庸知血虛益氣先聖之良法也所以甘溫之劑舉世皆泥爲補氣而不知甘能養血此陽生陰長之妙理若用四物爲補歸地能滑腸芍藥能酸歛求其速效豈不難哉間有擦破者宜赤石脂蝦石膏末參之蓋作癰而悶亂煩躁語言不聽禁之不止搖頭扭頸手足舞亂者毒已內攻不可救矣健按此言癰塌之微而血虛補氣陽生陰長之旨非參大易混元之妙用曷克臻此

### 漏漿論

朱氏痘已成漿而漿自漏者元氣虛弱而肺氣不固也其漏在痘頂上微有小孔而漿從此出急用松花參之堵其孔結其疮亦外治

之要也亦當看其虛實寒熱用藥以助其回水結痂

### 潰爛論

膿漿充滿而潰爛臭穢多因痘出稠密藥力攻其長漿漿足而潰  
爛流膿可喜也宜松花粉之此膿成而毒解不必妄加調治也若  
身熱不結痂清表敗毒湯主之若身不熱不渴唇淡食少手足冷  
不能依時結痂須大補氣血助其收結宜用溫表調中湯健按潰  
爛流膿原虛方藥誤而潰流稀水浮腫醃酪臭僥諸盤慘瀉而不收斂者  
雖參芪峻補畱連多日終致食不進而泄瀉至死矣又有單潰爛  
不流膿不甚臭者乃因脾虛溼勝當用參苓白朮散健脾利溼外  
塗赤石脂熟石膏末以斂之可愈

### 痘爛生蛆論

痘出稠密時值夏令炎熱痘已潰爛臭穢貧窘之家無帳遮蔽蠅  
蚋遂臭而至凡膿瘍穿處蛆乃生焉有拖尾蛆藏於爛痘之內若

毒火內盛者用清表解毒湯元氣內虛者用溫表調中湯。催其回水結痂外用蛆藥擦之其蛆自出而死但蛆藥原無定名余家居濱湖每年夏秋鮮魚廣出漁者捕來醃之不過三五日蠅蚋叢集生蛆土人往山採此生葉以押之其蛆卽死咸呼爲蛆藥不知其名未知他處亦有否其苗葉有似菜豆苗樣若他處見之先將魚內生蛆試之卽是培爲未能治痘蛆有識者覓而用之健按痘若殺蟲之藥皆不可用惟杏仁研爛茶油調塗可以殺蛆

### 擦破乾焦論

痘之行漿必期充滿若不充滿則燥癢擦破血出隨卽乾焦如鍋犧異常擦破乾焦形如蛇蛻必死之候也健按漿本血化血虛則漿不足挾火而燥故癢須參芪歸芍紅花殼蠶丹冬花粉進之使漿滿灌遂可生矣健曾擦焦破如物之遇火而漢若以清火爲事則津液內伏不救者多

治通身空殼如卵頭面焦枯者以黃柏歸紅三  
臭流膿又三劑而癥結收脫此雖藥力所勝然亦能飲食而咽喉  
清亮大便實也如內證不和者百中難愈一二

### 封倉論

痘出稀疎何必封倉若稠密者卽順候亦須封閉兩目元氣內固  
名曰封倉若兩目爛然決難成漿如五陷之證照治五陷之藥極  
力攻漿兩目自然封固倉不期封而自封矣健按痘密而眼不封者俗名開眼痘乃元氣虛而痘必無漿急用保元湯助漿而眼自封者爲吉

### 寒戰咬牙論

秦寒戰咬牙之證諸書立論各執一偏如博愛心鑒則曰表裏氣  
血兩虛以七日前寒戰爲表虛七日後寒戰爲氣虛以咬牙爲血  
虛而陳文中不論前後概以異攻散木香散加官桂丁香治之此  
其一偏之見也而金鏡錄又分七日以前爲熱七日以後爲虛諸

論雖確然未盡其善。蓋寒者有之而熱者不少。虛者屢見而邪實者亦或有之。此機不在於我。全在活法變通而後可也。然則如何治之必也。審冬夏之節令。看嬰兒之厚薄。驗痘色之紅白。察二便之秘利。診脈象之遲數。觀起居之靜躁。外表裏判然明白。於胷中如此。則安得有遁情耶。若痘色淡白。或皮薄頂塌。身涼而靜。惡寒不渴。大便利。小便清長。脈來沉遲者。此屬寒也。肺氣虛寒。則爲寒戰。胃血虛寒。則爲咬牙。並宜倍用保元湯加內桂煨薑或木香甚者加附子泄瀉者加訶子肉果以佐之。如痘色紅赤。或紫黑齊湧。掀發身熱。煩躁惡熱。作渴大便秘。小便澀赤。脈來洪數。此屬熱也。故陽明胃熱。則爲咬牙。太陰肺熱。則爲寒戰。治宜四物湯。黃連解毒湯。加連翹石膏。元參紫草犀角麥冬。甚者加酒製大黃。以利之。三上二證。見於七日之前者。其治易。見於七日之後者。其治難。

然亦不必拘執。余見七日後寒戰咬牙晝夜不止。此大虛之證。然能睡能食者。急須大劑保元湯。佐以薑桂。便瀉者。速用止瀉之藥。使其長漿灌滿。縱有前證。百保無虞。慎勿以七日後爲危證棄而勿治也。

朱氏痘已出齊而咬牙者不必治。只用攻漿藥。漿足而咬牙不作矣。若漿已充滿。手足雖有動意。非寒戰也。此乃漿滿脹痛。手足舉動爲難。而然吉兆也。凡八九日漿不足。則寒戰咬牙之證作矣。蓋肺寒。則寒戰。胃寒。則咬牙。建中湯主之。今人謂有熱鬱。而咬牙寒戰者。此間有之證。古人命名取義。既謂之寒戰。豈又有熱戰者乎。故久吾不爲熱證立方。余昔治一痘。漿已足。而第八日忽然咬牙。因思漿既充滿。而咬牙定非寒也。不敢用清涼之藥。將一雪梨切開。與食。則不咬牙矣。此胃熱咬牙之一驗也。故聶氏云。七八日間有

屬熱者若八九日後則屬熱者寡矣特表而出之。

健按秦氏分戰而咬牙屬寒者痘必白色神氣慘淡宜溫劑以和之內火鬱伏咬牙而戰者屬熱痘必乾赤口渴脈數宜涼劑以解之前輩立論莫如秦氏之當全憑體察的確一寒熱間毫釐千里也然更有細辨寒戰咬牙須分開論治有戰而不咬牙有但咬牙而不寒有似戰而實是慄者夫戰則有振掉之勢而慄但畏寒怕冷心噤鼓領皮膚粟起而已故戰乃肝木搖動風從火熾之象卽熱伏色赤之驗也如兼咬牙明係涼解之候矣若是寒慄不振動者乃氣虛表寒皮毛悚立之象卽空漿淡白之驗也如兼咬牙明係溫補之候矣若不戰不慄獨咬牙不定而齒心乾唇必赤乃陽明胃虛挾熱齒悶而常自齦也與人參白虎湯一劑可愈如此別之更易明了內經云諸噤鼓慄如喪神守皆屬於火聶氏謂無熱證而朱氏又有雪梨之治可見此證寒熱杜半無論前後總合形色脈象治之始當

### 譖妄論

秦譖多言也妄虛妄也乃妄有見而語言無倫也由邪氣熾盛毒氏氣內攻神識不清所致夫言爲心之聲心熱則多言睡中呢喃者熱之徵也寤而語言差謬熱則甚矣亦有胃熱而譖語者此心大

便久未能去是也。其妄有見聞而譖語者爲難治。夫腎主志開竅於耳在目爲瞳子。毒邪則喪志。志喪則耳目妄有見聞也。並宜解毒火。諸書以辰砂鎮神之劑。恐未妥當。又有成漿之時。乃昏昏而睡。呼之不醒。或口中喃喃妄見妄語。如被邪之狀。時人不知。多生驚恐。殊不知此由膿血出多。心舍空虛。神無所依。此名鄭聲。經曰。實則譖語。虛則鄭聲。法當養血安神。其病自愈。以寧神化毒湯。及安神丸。加減療之。如服藥不醒。及加悶亂者。不治。健按譖妄之旨。發明精確。然譖多起於發痘之初。由熱而致。或染時氣夾斑之徵。宜升麻葛根湯。加石膏以解化之痘。發足自己也。若在灌漿回水。而穿破塌陷。不身熱。而睡中呢喃。覺來妄語。此本虛而毒邪內陷。必須補劑攻漿爲主。若服之漿不起。妄不退。而昏沉者。不治。

### 聲啞失音論

痘之前後聲音最宜清朗。然其有聲啞。有失音之別。有痘初出客冒風寒。痰壅而聲啞者。宜疎利爲主。有漿足而聲啞者。乃氣道不

清也。宜甘桔湯主之。有痘出咽喉初小而不覺。及至成漿壅塞。以致氣道不利而聲啞者。痘收疤自愈。有胃實聲啞者。必口渴熱盛。大便秘結。其瘡欠起發宜三黃湯主之。有心火刑肺而失音者。肺屬金主聲。金空則鳴。實則啞。乃火氣上熏於肺。肺脹鬱故竅塞而無音也。若七日前失音不治。若七日後失音者。乃因瘡先熟先醫。則咽喉漸寬。毒氣漸消。聲音自亮也。或由本無瘡。因食辛熱或誤服熱藥而致失音者。急用甘桔牛蒡子湯加元參連翹石膏輩治之。有歸腎而失音者。其痘必黑陷不起。乃毒攻於內。會厭不能開闔。不治之證也。有喉舌潰爛而失音者。乃初出時失於調治。以致咽喉腫塞。毒聚於內。呼吸不能。飲食不進而成壞證也。亦不治。  
朱氏痘當長漿之時。及膿漿充滿之際。忽然失聲。緣痘漿起長顆粒。飽滿阻礙呼吸。故聲不響。或因多於啼哭。以失其聲。俱未可定。總

以漿足爲吉若漿不足又失其聲形色改變非吉兆也。健按或因初發痘時用藥不能發清致痘生於喉間者有之或因本虛而毒火迫肺者有之或漿不充足脾胃虛弱毒邪內陷而聲啞者爲凶故治痘無論初終必用

甘桔預保咽喉

### 水喰論

秦水入則喰者乃毒壅咽門也蓋咽門司飲食通於口入於胃今咽門爲痘所傷則水不得咽溢入會厭會厭掩而不納故氣逆噴出而嗆然遇飲水或藥則喰若穀食有渣自能咽下非若水溢以犯氣道也然七日後見者不必治之外結痂而喰自愈也若七日前見者乃熱毒壅遏漿不能行於肌表最爲逆證故先輩預以甘桔湯加牛蒡元參川貝之類安有此患哉一兒痘後作喰不止餘無所苦飲食亦進唯鬱鬱不樂聲音不甚清楚父母以爲飲食如故不與藥服至三十朝後徑以潮熱痰喘而不治乃知痘後發喰

亦要細心調治慎勿望其自愈而貽後悔也。

朱氏痘當長漿之際飲水而噙不必治其噙水惟有催漿一法若漿足則不噙水矣至於回水結痂之際漿又不足變證自然噙水若形色改變必不可救

### 口唇論

秦口唇爲脾之竅經曰六脈之華在唇故痘瘡始終以唇口紅潤爲吉若唇口腫硬或瘡燥烈乃毒火乘脾毒聚於中則熱熑於外宜升解以化其毒次補益以培其本若痘出稠密唇口之瘡相黏乾黑諸瘡未起而唇口已黃熟而成腫硬諸瘡未收而唇口先已焦枯剝落一層層者口中臭氣者口中涎如膠黏者魚口者皆凶證也健按唇口喜其紅潤若淡白則本原虛寒若乾赤則內火偏盛若紫黑燥烈則毒熱壅於脾胃若腫硬魚口則毒盛傷胃垂鑒之候也

舌色論

秦氏舌乃心之苗一爲脾之脈凡痘之始終以舌紅潤爲吉若燥黑有芒刺爲凶若氣虛火盛津液不能上行而舌乾口燥者補益爲主若毒火盛而舌乾口燥者解利爲主若陰虛火炎無制而舌乾口燥者治宜壯水爲主舒舌者脾之熱弄舌者心之熱有因唇燥而舒舌餒唇者亦脾之熱也若舌上純見白胎遇飲食則嗰嘔者此毒入於胃爲胃爛之證若內熱甚而白胎此又不在危證之例宜朝暮以絹裏指攬其口舌則飲食有味而兒自能進食健按舌病之標的蓋五臟之脈皆現於舌而虛實寒熱之驗全憑舌胎斷則所投皆應也互於痘證尤當審之紅赤胎黃應行清利淡白無胎即當溫補若焦黑芒刺譖妄神昏乃毒陷內灼雖寒涼解之恐無益矣

口瘡臭爛論

朱痘出稠密口舌必多臭爛但不宜臭穢氣若在長漿之際極力

攻漿不必憂其口舌之破爛。倘毒火內盛，以清毒活血湯加石膏量服，而穢氣自除。如回水之候，急用大連翹飲去木通，車前滑石加酒炒黃連，熟石膏、薄荷、麥冬、花粉、桔梗，連進二三劑，庶免牙疳之患。若漿不足，服此臭穢不除，愈見破爛，并開兩目，牙疳已成，再加胡黃連將蘆薈、蝦過取末一分，入前方調服。向曾治此，其效迅速。健按：口瘡臭爛多因溼火上攻，不明根本，孰敢用補攻漿？知此位妙，始能取法。而漿足，毒化無牙疳之患矣。回水結痂之後，而有此證，則當清利溼，可愈。

### 咽喉疼痛論

痘出稠密，毒火上炎，咽喉必然疼痛。初見痘標之時，不必專治，惟

托清其痘，倍甘桔以開之。若當長漿之際，咽喉腫痛，則以利咽解

毒湯同提漿藥相間服之。自然腫消痛止，外用玉銷匙吹入，奏效

健按：咽喉乃要害之地，治痘始終必須保護，不離甘桔二味。是咽喉聖藥。若發熱之初，痘未見點，而咽喉先痛者，此必感時氣，即於

升麻葛根湯中加大力子薄荷  
喉瘻方內并加石膏橘紅木通蟬退急解其喉兼發其痘至長漿  
而痛者或因火盛或因喉中有痘起長故痛也至外痘結痂喉亦  
不痛矣若痘後咽痛總因毒火未清亦以前法加元參川貝山豆  
根良

### 驚搐論

秦素問云諸痛瘡瘍皆屬於心驚亦由於心錢仲陽云肝風心火  
二臟交爭而致乃知心移熱於肝人風相搏發爲驚搐痘將發而  
目忽上竄者乃俗呼驚痘不妨大體然久搐不止恐火毒甚而不  
得發越亦稱危證宜平肝木利小便平肝木則風去利小便則熱  
退而痘自出也用升麻葛根湯兼消毒飲及導赤散治之或痘已  
出而有此證由熱毒未解耳搐而痘起者生搐而痘沒者凶亦宜  
消毒飲合導赤散治之如痘瘡收癧之後而又發驚搐此真氣虛  
弱火毒內鬱心神不無不定則含空而邪氣客之最爲不治之證。

以牛黃清心丸主之然寒涼亦不宜輕進也亦有風寒所激而發者有大便秘燥屎不行而致者有傷食不化而作者有脾氣虛弱而成者但能發搐不可不辨

聶氏身熱至二三日痘欲出未出或初見報痘一二顆忽然驚搐大作不可驚惶失措唯審虛實寒熱而用藥有毒氣壅盛於內不能驟發於外而驚搐狂躁者宜用清解散以宣之痘出而驚搐自定有內毒本盛外爲風寒所束鬱滯而不得出以致驚搐者

宜用疎解以發散之

有氣血虛弱不能送毒出外而驚搐狂躁者宜用溫中益

氣湯以托之

健按虛弱不能送毒外出自然頓悶而生驚搐固宜溫中氣兼疎解以托之但狂躁二字內必毒火

抑遏溫中之藥恐非所宜須兼清熱以宣發之乃爲切當

辨此驚狂諸證最宜細心體認觀形察色聽聲問證又參之以脈

然後可以分別看其痘暈紅紫而赤唇紫聲音亮口氣麤身熱手足亦熱脈洪數此毒氣壅盛者也。

或形色同前但聲重鼻塞或鼻流清涕脈浮緊而數此毒盛而爲風寒所束也然此證多在寒涼之月或不謹避風寒者有之

健

此宜用三胡湯加木通杏仁蟬退鉤簾

殭蠶橘紅甘桔葱白疎解痘出自定

看其痘形淡白在皮膚之間不見紅活唇淡面白或帶青色脈又

遲緩雖煩躁驚搐有似於熱其實因氣血虛弱送痘不出故也

健按此亦當用前方提之毋損其原氣  
曾遇此而投一二劑痘出而驚搐即解

朱氏前證分別明白用藥合宜一劑之後痘出而驚狂立止昔人有

云痘未出之前驚搐爲順可不必治豈其然乎然毒氣壅盛不能

發出痘苗鬱遏於內而驚搐抽掣眼目斜弔口鼻歪扯曾用敗毒

和中散加熟大黃一錢羌活五分蘇葉五分表裏兼治使毒火不能凝滯

而爲患則痘出而驚搐自定此已試之明驗也切不可用驅痰峻攻之藥世人不明毒火驚搐之用不極力托苗而專作急驚治誤人多矣若煩躁頓悶昏沉不省人事者則不可救總用清解散蘇解散溫中益氣湯三方分門別證而治亦可謂詳矣若毒火壅盛

於內大便結燥又用加味敗毒和中散以下之如此用藥方可保全然怪證多端未可以一途定也倘或元氣虛弱又兼大吐大瀉或專大瀉不止瀉又淡白又有酸餒氣不惟元氣虛弱而脾氣又下陷矣必宜溫中益氣湯倍加參芪芩朮以壯脾元痘出而驚搐自定健按發痘之際忽然驚搐迷悶俗云發痘候也常人見之駭異醫者遇之張惶若無成見烏能治之凡臨此證必先視指紋面色如無青紫非驚候也若左近有出痘之家或曾到痘家沾染痘氣或身中已現形迹既得其情則是驚是痘心目了然便以開提爲主不可擅用風藥風藥辛溫且非太陽經表證恐反張其火勢耳只須升麻柴葛根湯加鉤藤僵蠶橘紅甘桔蟬退木通如熱勢盛加黃芩杏仁疎其肺氣而肝風息心火降痘漸出搐自定矣若惑時氣欲發痧疹熱毒壅鬱亦有驚搐之象者更加牛蒡

子西河極但疹發不出而驚  
搐昏悶者反危於發痘也。

### 夾斑論

秦氏夫斑者形似蛋斑有點無頭又有形似雲頭色赤成片而膚上浮起無頭粒者乃謂之丹總乃血之形也因火毒壅遏煎熬陰血熱相搏與痘相夾而發急用涼血解毒輕而小者加以涼解可化至如紫青黑者乃毒氣壅結之甚面腫唇裂十無一生予曾間治而獲效者因諸色之斑雖現而痘自起發且能安睡進食多服紫草犀角石膏及一切涼血解毒等方此亦僥倖中之萬一不宜一概施治反取謗於人也。

董氏痘有夾斑而出者初見痘苗一二顆其空處及遍身出小紅點而無頭粒不見高聳者是也又有夾丹而出者初見痘苗一二顆遍身紅赤成片如雲頭突起凡遇此夾斑夾丹之證俱用元參升

麻湯散其遊火斑丹自退痘色順者可治。健按斑之來由多因侵染時氣邪毒壅於陽明爲先天正氣之毒斑乃後天時氣之邪感之輕者班紅點小而少感之重者斑赤紫或藍黑點大而多輕者升麻葛根湯加石膏豆豉蟬退以托之兼連翹花粉以化之重而紫赤者更加犀角黃連大青紫草若藍黑則毒盛胃爛卽倍用清涼亦無及矣。如止有兩三點而痘色順神氣清尚可治療前輩未詳時氣之由特表而出之蓋痘之善惡雖具於先天然因時氣觸之而發故曰時痘所謂時氣者一時之氣遞相傳染也。一歲之中分四時四時之內分六節而六節之氣相更變則有善有惡乃從寒暑晦明所致人在氣交之中感其善氣則痘雖重而無夾帶感其惡氣則痘雖輕而雜斑疹若痘本惡而又值惡令則斑毒異色不但現於肢體且先見於唇舌邪盛正憊不終朝而死矣。此時氣之傳變每以逐節更張健常經歷灼見最應沿鄙比戶一時遇此惡氣無可措手須從避之之法庶可免禍世人未知其故盡委於先天蘊毒而失察乎時痘之義將二字分究之各有吉凶之秘存焉至於夾丹乃本兒平素胎毒或血熱風溼相搏趁此兼發是遊行之火聚於皮毛而無毒黑之色與斑爲輕也。前方中加檉柳蘆根茅根浮萍冬梨汁俱可化之痘自起發矣敢以告諸來者。

### 夾疹論

秦氏夫痘已出而有稠密細小如麻子者此夾疹也心鑑云痘毒之

發板風閉塞腠理。熱毒擊動腑毒。故與痘併出。此亦無妨於痘也。蓋痘出於六腑。痘出五臟。臟屬於陰。乃爲積受之地。其毒深。腑屬於陽。而爲傳道之所。其毒淺。故痘之始終。每以二旬爲限。而疹之消散。一時而已。可不從其急。而先治之乎。經曰。急者先治。治宜先散其疹。而後治其痘。疹不散。則痘不起。若疹散。痘起。綻凸。勻調紅潤。其勢吉。若疹散。而痘稠密。平塌。灰白紫滯者。其勢亦險也。故曰。痘夾疹者。吉凶相半也。又有出痘之時。或冒風寒。不能自汗。發而爲疹。亦與外感發疹者同。先散其疹。而痘得起也。

毒痘有夾麻疹而出者。初見痘苗時。遍身通紅。紛碎如麻子。其實大痘夾疹而出。是痘爲正出。而疹不過肺脾之遊火。亦隨痘夾而出矣。遇此用元參升麻湯加桔梗酒芩一二劑。宣托其疹盡出。而消散。正痘自然依期出透。而起發。

健按疹有赤白二種赤者屬風熱白者屬暑溼無論四時皆因外感而發痘出夾疹亦從時氣所感發熱之初必先見嘔惡咳嗽噴嚏而皮膚隱隱如麻根散而有頭粒者爲疹須先托透清解以化之則痘易起不比斑之甚也若壯熱昏沉色赤而卽發頓悶者痘色雖善時氣毒深亦有凶候未可信爲夾疹之痘多吉也前輩拘於痘屬臟疹屬腑又云疹系先天之陽毒又云斑屬三焦無根之火疹屬心火諸說皆似是而實非也又謂爲脾胃遊火是與外感時氣更相悖矣究其實在皆外邪所中傳入於胃熱鬱成斑客於肺則結而爲疹俱在經之證而諸說盡屬穿鑿之言明矣。內經曰風爲陽邪其傷在表皮毛者肺之合也皮毛先受邪氣邪氣以從其合也故發疹必兼咳嚏等證皮毛屬表之表故疹出沒無時喜溫暖而惡寒冷故覆蓋宜謹也因其生長於輕清之地可一汙而化之非臟腑之病而拖時日者矣只須升麻葛根湯加牛蒡杏仁蟬退木通甘桔前胡石膏檉柳托化兼施疹必退而痘自起○諸家證論各採其精者集之獨論疹一段未當然不可缺此但取秦氏所謂發痘時感冒一句斯爲大旨更加詳辨以破疑團使後人不墮迷津而當於用也然又不可認殺風寒在表擅投羌防荆芥枳殼赤芍等藥發散破氣損血反致風從火熾疹不化而痘難起無漿中變往往因之誤事。

## 夾血論

秦氣爲陽血爲陰陰陽不可偏勝偏勝則致病此曰然之珪況痘

全賴氣血滋養今痘中有諸項失血何也蓋因熱毒之氣汎濫無歸則血亦隨之而走乃氣盛傷血毒載血行諸書鼻出無忌謂斬關而出不犯其內然去之太多營氣日損後必癢瘍故涼血和氣之劑亦當急用至於口中吐出者經中咸斷爲不治之證而秦子隨證調治屢屢奏績此無他惟詢驗其平日飲食起居及臨時風寒暑溼之感能因時制宜而已故凡失血之證痘色自然慘淡少神而欠起發如初起時佐以生發之劑候有起意便速進參芪較平時用藥須當預爲地步不可照常五六朝始進保元湯也此素所經驗若大小便俱出血痘瘡內不動而自出血此皆毒火內攻臟腑敗壞俱成不治惟從大便出者間或可治然亦有因向時瘀血停留今爲火毒逼迫而出且爲其元氣足以勝之故雖見腰痛而痘自起發雖見煩躁而躁後能食安臥若煩躁呻吟不止或不

能睡臥或痘不起或有紫黑斑點則雖無血證仍係不救治之何  
益痘前五日宜用犀角地黃湯若血出不止加炒蒲黃藕節炒黑  
側柏葉初吐時加童便溺血加滑石小薊茜根便血加炒槐花黑  
地榆陳櫻灰血餘灰之類

聶出痘鼻衄毒氣上衝於肺以致鼻血涌出而毒氣亦隨之以解  
氏宜飲清肺飲解之將來痘出必稀健按未出痘而鼻衄者或因外感熱甚挾表而爲紅汗者有之如身已涼而衄出乃火迫肺金若痘已出而衄不止此毒火上竄熱傷陽絡且屬泄氣要如傷寒法看其成流点滴之分以清熱涼血順氣爲治氣順則火降而血不上溢也

痘初放苗及出齊後如遇吐血或大小便下血俱不可救健按出血便血皆毒火內攻迫血妄行然當分血之多少痘色之鮮滯而酌治之保其本原清其毒火涼其血而止之或可挽回一二若服藥不止神魂失據大吐大下者不治

初發熱而嘔血嘔血之後神清氣爽報痘少圓紅潤此乃毒氣同

血而去也。此時不必用藥姑少待之。健按嘔血在初發痘時屬毒熱上衝卽止而痘色順爲無礙若不止而在起長上漿之時亦毒火內攻必變不救。

### 吐瀉論

秦氏報痘前後吐瀉各有不同不可一概施治。凡發熱初出時有單吐者有單瀉者有吐瀉兼行者雖不可久吐久瀉然亦不可驟行止法令毒氣上下分洩也。但於發痘之中稍加利水止吐不可執痘書而妄用理中湯五苓散之類亦有感冒風邪寒熱相搏而或吐或瀉者量加和解之類如傷食則從傷食治如三焦之火熱甚而然者當用清涼解毒之法然亦從出後可施若成漿之後而犯吐瀉者爲大忌若乾嘔者更不宜乃衝任之火上冲於胃係毒氣內攻直犯清道而上也八九朝作瀉者屬虛全仗參朮溫補瀉久不止加以訶子肉果甚則加龍骨赤石脂手足冷者附子亦可才

有不時作瀉而手足和暖飲食如常者治之雖不能止日後亦無大害此余素所歷驗又曾遇一痘用百般補脾止瀉藥不效後用升提又不效一日夜數十次此藥傷其胃喜其能食竟不藥而愈乃知全仗胃氣爲本信哉健按百病全憑脾胃何況痘乎無論初十用藥切忌無故誅伐脾胃

終

朱氏發熱之際或初見痘苗之時有泄瀉者有吐瀉交作者全要辨

虛實寒熱而用藥有毒作泄瀉者其瀉必色黃臭穢肚腹多不痛亦有毒氣作吐瀉者其吐必酸刺而有聲神氣不甚困倦雖吐瀉交作肚腹多不痛此則毒氣由吐瀉而發洩所謂吐瀉爲順候而不必止者惟此一證耳健按吐瀉在初發痘三四朝猶可若五六七朝行漿之時大不宜也醫者當速止之以使上漿如不止別分必不充而多中變矣

有吐瀉交作而胸腹痛甚者吐則有酸餽氣瀉則有淡白色亦有酸餽氣此感寒而停食也應升消平胃散加羌活五分一服立

效

有胃氣弱而中有寒嘔吐之後不思飲食或食下卽吐其吐多順快而無聲面青白唇淡精神倦怠宜用參砂和胃散主之

有脾氣虛弱飲食不化而泄瀉者其瀉清利而色帶白且不變化如糟粕亦有酸餽氣味痘見點之後不甚爽快且又腹痛此停食作痛吐出有酸餽氣味痘見點之後不甚爽快且又腹痛此停食作痛而嘔吐也其痛多連綿不已幼兒啼叫必甚多在臍上痛而必清白口唇必淡手足俱冷此停食作痛也

健按此證宜進消導若無停食而誤與消庸工之作也殊不思方貴清真一有夾雜必不耑力如無停食何用此等是爲誅伐無故反傷正氣阻遏膿漿變證因之而起而見價事者多矣姑以一言譬之處方之要如織綾緞花樣清爽而無浮絲落縫者方爲名機價必珍貴否則不中人眼醫能悟此卽屬名手矣

朱氏痘家癆疾前哲方書未言及此意者天地氣化陰陽變幻隨時  
更改因地發生上古所未有而後世有之者痘也痘後癆證心法  
亦未之及而余曾經見有赤癆有紅白相兼之癆二者俱生有一  
純乎白癆裏急後重時刻更衣所便不多如魚凍晝夜無度飲食  
不思精神倦怠元氣之虛寒甚矣脾胃之真土敗矣初治利之清  
之而裏急後重不減繼溫之補之而胃氣不復終致不救健按痘後癆疾須察有毒無毒有滯無滯隨證處方不得耑事清熱導滯既知原氣虛寒脾土憊壞而所下東膠何可清利已犯虛虛之誠矣轉卽溫補亦難挽拔凡癆疾要辨痛與不痛滯與不滯痛而滯積厚者爲實不痛不滯積薄者爲虛若不痛而便時滯下後重者此元氣下陷宜補中益氣湯提之若裏急後重積下膿血者此毒熱內盛宜黃連解毒湯並消積涼血之藥若下豆汁魚腦屋漏凍膠魚滷蛋清純血雞肝塵腐等色而又有滑脫不禁卽稍進飲食亦皆難救況於痘後正虛邪實之候危險可知總以健脾扶胃爲主所謂脾運而積自化又曰和血則便膿自愈理氣則後重自除此治癆之大法

白癆屬氣分紅癆屬血分疹後熱毒甚寒涼用之得當痘後要固

元調其脾胃能食者可治

健按倘因食傷積滯惡食者亦當助脾消積查尤湯爲妙劑

### 似痢非痢論

朱氏痢之爲證。險惡異常。若辨之不明。用藥多有錯誤。有痘後便膿血。腹中間或作痛。但不作裏急。後重。以此迥異。如所便之膿血。或以清水試之。攬動浮起痘痂樣。此因腸胃有痘收結脫下。可用大連翹飲清解之。此證肚腹不痛。爲不同耳。健按此必痘密者。門有之。或瀉而下者多。

有痘後腸癰。必先腹痛。癰熟內消膿血兼下。知其是癰內破。不過二三日。腹痛自止。仍用大連翹飲以清解之一劑。卽止不可多服。切不可用大黃下行之藥。痘毒既潰。固元爲要。健按膿與積膿不韌。積亮膿不亮。以此決之。便可處治。

### 腹痛論

秦氏原病式云。熱鬱於內。則腹滿便結而痛。今痘未出。而腹生痛者。

何也由熱鬱積毒與外邪相干稽遲不行欲出而不得出故卒然而痛宜陳皮山楂乾葛甘草防風枳殼甚則發厥者隨加蟬退使毒氣得泄四肢溫暖腹痛自止矣有實痛腹滿大便秘者熱毒火盛氣不得伸也輕則蜜煎或膽導急則大黃以通利之不可執首尾不宜下之句反遲誤其證有腸鳴自利而痛此冒寒邪或誤食生冷也宜加煨薑以溫之有收鑿之後忽然腹痛或嘔或利不飲食者此傷食證也量加消導如無傷食而腹痛煩悶欠安者此毒氣內攻急加解毒和氣不爾則手足逆冷氣促而成不治之證矣又有平時饑成食積臨大便時則痛便後痛減者縱有虛證山楂麥芽白芍之類不可缺也已上等證宜察脈以辨虛實寒熱如六脈至數平而無力謂之虛平而有力謂之實數而有力謂之表熱裏寒不可用涼藥宜溫而無力謂之寒又有數而無力謂之虛平而有力謂之表熱裏寒不可用涼藥宜溫

熱之劑又遲而有力謂之表寒裏熱不可用熱藥宜寒涼之劑不獨治腹痛諸病脈之不誤也。

朱氏若毒氣作腹痛者痛稍延緩而有作有止多在臍以下痛或逆

腰而痛面必紅唇必紫手足不冷此腹痛之分別也。毒氣作痛

者敗毒和中散主之大便燥結兩三日不解加熱大黃微利之

停食嘔吐腹痛升消平胃散主之

健按腹痛虛實當辨有形無形論治若毒氣作痛勢

必卒聚卒散作止有時正虛而痘不起發者須補正以托其毒氣外達痘起而腹自不痛若面紅紫毒氣盛而正氣不虛者當

清火解毒爲要如大便燥結必按之碍手或積聚畜滯不論朝數宜熟大黃利之則邪退而痘起如痛處喜按者此屬虛寒須

溫補以攻毒外出諸宜詳審庶幾無誤

## 腰痛論

秦氏腰乃腎之府一身之大關節也痘瘡發於四臟而腎無留邪則血氣流通而無此患若發熱之時腰痛不絕見點一二日則青乾

黑陷或反關不出此毒氣流於腎而不發越十無生理之證若情竇開後覺腎虛而痛者速於扶元氣中加杜仲龜板枸杞之類治之不愈者凶若婦女正值經期來而腰痛者雖稱凶證亦無大害多服芎歸自愈但要升發痘子而已又有六氣承虛而感有感寒而痛者感溼而痛者有挫閃而痛者有瘀血畜而不行作痛者但要醫者慎加細察對證投治可也近治一女十四歲形體肥大發熱一日卽見痘標煩躁作悶不食面赤腰痛如折天癸未通余曰果爾則腰痛諸證乃火逼經行之兆非真腰痛也純用解毒升發之劑天癸通而痘亦無恙此等腰痛又屬火毒壅滯非前證可例也健按痘家最忌腰痛痛微痘起無惡色者小心治之猶可獲全痛甚而痘發不出色惡者十難救一

### 痰論

秦內經云諸氣憤鬱皆屬於肺肺氣鬱則生熱熱盛則生痰痰者

津液之所生也。今痘出而有痰者，由毒火太盛，營衛閉塞，氣血濁敗，凝滯而成。故爲痰爲嗽，而喉中作聲也。有風痰客肺，肺氣不通，邪鬱爲熱，而生者宜散。風順氣爲主，有漿水不足，反生痰者，乃毒氣倒陷於內，氣逆而成爲難治。須補托爲主，不受補而痰仍舊者，有過能飲食，損其脾胃，失健運之常，不能致化精微，而肺生痰者，治宜調脾爲主，有氣實而誤投補益，有氣虛而過用參芪，氣滯而生痰者，俱宜順氣爲主。或有紅爐煖閣，蒸發而生痰者，或衣被太厚，畜熱而生痰者，或啖厚味，醞釀而成痰者，俱察其緩急輕重，標本而酌治之可也。健按痘證發痰最爲關係，若起於發熱之始，或見點之際，乃因熱甚而生，或挾風邪所致，宜利肺化痰，消風清熱爲治。若發於長漿時，而漿不足，穿破塌陷，乃氣虛毒甚者，陷而生急，宜補本托毒，漿得灌而痰自化。若補托不起，痰加危也。

喘論

秦諸喘雖曰皆屬於火，然虛實之辨迥然不同，不可不知。蓋肺爲

五臟之長爲心之華蓋心火一炎則肺葉焦舉氣卽不利而成喘  
况兼毒邪以相干乎此痘必乾紅色滯腹脹便利而爲邪實之證  
大都治法當清火解毒利氣以前胡枳殼湯服之庶或可生亦有  
初出痘噴嚏流水而喘者此風寒客於肺家而然和解自愈亦有  
因食而傷穀氣蒸而爲熱上乘於脾者消導則減有瀉後而喘者  
乃元氣下陷虛火上壅下氣不續此脾氣不足而致宜四君子湯  
加實脾等劑以佐之升麻柴胡以提之有吐而後喘者乃胃虛不  
能制伏相火火逆上衝而然也治宜六君子湯主之有過用補劑  
而生痰喘者宜加破氣之劑以消參芪之滯有痘太密以致鼻塞  
而口中氣促似乎喘而非喘也不可一概而治健按喘惡候也百病不宜有虛實之證乎大抵痘前端者乃毒氣內壅上迫於肺或爲風寒外束或元氣虛弱不能送痘發出而氣喘者但當開腠理瀉肺實用前胡杏仁甘桔木通橘紅蟬蛻蘇子之屬熱盛者加黃芩定喘發痘

爲治若灌漿不足氣虛陽陷而生喘促者急當以參朮等培土生  
金助其漿滿庶幾可生若在病後無力脫落或穿破潰爛食少腹  
脹而生喘者乃內虛毒火不化而鬱滯溝道勢必反陷也速進補元攻毒亦難愈者多矣

### 渴論

秦氏渴有數條不可不辨心鑑云三焦者水穀之道路津液者氣之  
精化而流通三焦以制火者也今舌乾而渴者乃火盛而津液枯  
渴耳然此亦總其大綱之論詳細如左

有發熱時便大渴者此毒氣萃於陽明乃熱淫於內而毒未能宣  
發於外也宜葛根湯解毒湯主之

如痘已出或起發收斂一向久渴不止者倍加人參麥冬之類主  
之

有泄瀉而渴者乃津液下陷而然也宜四君子湯加訶子肉果以  
實脾土甚者佐升麻以提下陷之氣

如不能食而渴者此脾虛也叔和云口乾饑飲水多食亦肌虛由  
脾胃素弱不能爲胃行其津液故渴也治在上焦以參苓白朮  
散主之

如能食而渴者肺熱也經曰心移熱於肺傳爲膈消由心火上炎  
乘於肺金熏蒸焦膈搏耗津液故渴也治在下焦古人雖以人  
參白虎湯加黃連療治然不如麥冬黃連人參之爲尤妙也如  
陰火動作渴者諸論中俱稱不治爲其血屬陰血虛不能峻補  
難取效於一時耳宜四君子湯加當歸黃芩少加肉桂以補不足之陰

有痘後身熱大渴夜多呻吟或腹脹痛者此餘毒未盡乃氣凝毒  
滯謹防其痘毒之發宜連翹牛蒡銀花及人參貝母少加橘紅  
木通甘結山甲之類大抵痘中諸渴悉宜隨證加減不可擅食

水果及水漿生冷致寒中傷胃便有變證不測之禍。健按詳言總因元氣虛火熱燥其津液故清火齊中必以添津潤燥爲主然藥宜甘寒不宜苦寒是石膏之妙於黃連也。況專主陽明胃太陰肺爲渴家之良品若黃連則味苦性燥舌無乾黃胎者不宜用也。百病當如此看不獨痘證更宜慎重。

### 汗論


秦氏汗乃心之液發熱初出之時由心火上炎熱氣內蒸腠理疎通毒氣發越而無停滯丹谿曰自汗不妨蓋溼熱熏蒸而然若汗多而久則營衛虧損痘難成功故禁用羌防荆芥諸表藥發散之劑宜用當歸六黃湯加白芍麥冬之類若收醫之後而汗出者皆因衛氣弱不能斂束立府宜多服參芪以實腠理有熱者六黃湯中加地骨皮主之大都痘後汗出屬虛者多補劑中加炒棗仁炒浮麥爲妥如天氣炎熱而汗多者不必用藥但禁扇避風可也。健按盜汗自汗發汗之分陰虛睡中出者爲盜汗邪熱不解用藥表之而出者爲發汗表虛腠理不固而出者爲自汗又有傷風自汗火

鬱自汗邪。正虛實之不同，當分別隨證而治。在於痘證，凡諸汗洩皆不宜也。所謂汗則虛其表而難起發，以致殼薄漿空，穿破癢塌之患。若見盜汗，當以養心血，倍歸身棗仁、茯神、桂圓、浮麥之屬。如心經有熱，跳動者，加川連、麥冬、燈心、補中帶瀉，以止之。如表虛，自汗則倍人參、生芪、五味、白芍以斂之。若誤服表藥，而汗出不止者，亦兼前方以實其表。傷風自汗者，桂枝湯以和營衛；火鬱自汗者，加味逍遙散以微和之；或升麻葛根湯加柴薄芩連以清解之。而托其痘，若暑月汗多，亦虛元氣，須生脈散以收之。總之痘證始終不宜汗洩。汗則津液耗氣血，虛而漿不足矣。惟夾斑疹者，乃可微微汗以化之，則邪退而痘易長也。須詳慎之。

### 大小便論

秦氏凡痘瘡五日間，小水欲其流而長，大便欲其潤而實，則邪氣不伏，正氣不病，故經曰：小便數者，大便必鞭；雖二三日不更衣，無所苦也。如小水少，病必進矣。故大便閉，由毒火內乘，耗損津液，以致腸胃乾燥，宜涼血清火以潤之，用猪膽導亦可。若痘白而少神，不食，嘔清水者，虛秘也。專補氣血爲主，亦有過利，小水以致津液乾涸而秘者，宜生脈散加當歸以益之。又有氣血化而爲漿，致四五

日不大便者漿足自利不必治之小便赤澀者由毒火盛膀胱受  
熱而不利也必心火移熱於小腸小腸移熱於膀胱津液內涸而  
溺赤澀也宜清金解毒以泄其熱而小便自利又有毒流於肺積  
痰塞其氣道以致上竅閉而下竅不通也宜清肺而弱自利又有  
元氣虛弱不能清理傳道則清氣不升濁氣不降而溺澀者宜補  
中益氣湯加知母麥冬主之全在因時制宜至若灌漿時大便不  
來小便僅有者乃一身之津液盡醞釀於漿不必與治漿足而溺  
自利也健按小便短數赤澀乃心肺之熱下移火爲元氣之賊小便清利則火降而元氣無害痘得安全至於大便宜出之及時喜實不喜瀉喜通不喜閉實而自通及時者則出納無滯如燥結失期恐有脹悶之患若或瀉或痢或誤下之則脾氣虛津液耗常有內陷之虞治痘者於二便之通塞須加謹焉



痘證寶筏卷五月錄

痘後發癰論

異常發癰論

痘毒論

痘後身腫陰囊腫論

痘頂疙瘩論

解毒疹論

子來救母論

濁處流清中出濁論

痘後毒火攻目論

水痘赤痘論

附麻疹論

四方疹名各別

出疹有四忌

看疹醫有三忌

目錄

痘證寶筏卷五

上海強健纂著

同里朱增惠春坪氏校刊

痘後發癰論

朱氏痘當起長灌漿之際醫者不能及時攻漿以致膿漿不足亦有  
僻處山澤地之明醫不能依時足漿及至回水結痂之時遍身發  
熱蒸蒸毒氣凝聚於一二處紅腫堅硬此爲餘毒未淨而發癰也  
亦有誤服補劑熱藥助其毒火熏蒸而攻於脾肺之間脾肺壯實  
不受其毒發出而凝結於肌肉皮毛之內蓋脾爲土臟主肌肉肺  
爲金臟主皮毛若癰從此發則不內攻而反爲吉兆亦有發癰而  
死者何也其中有陰陽之分焉紅腫一二處或頭或手足初起紅  
腫高聳有頂宜外敷三豆丹內服大連翹飲可消則消之不消則  
攻破出膿膿盡用生肌散貼萬應膏則可愈矣所謂發癰而死者

痘之漿不充滿且兼毒火內盛回水之際發熱蒸蒸頭項手足平  
坡漫腫不分地界不見高聳毒無頭腳病苦十分亦無紅色與肉  
一般此陰毒死證也宜用生黃芷炒白芷菝葜當歸川芎赤芍生  
地連翹牛蒡角刺銀花穿山甲陳皮攻其成形服此之後頂漸高  
聳腳漸收束毒內作膿膿成而毒亦解庶可望生若連服此劑不  
見頂高腳束則陰結之極不能從陽卽加人參以補元氣如春志  
食又作嘔吐二便不調昏沉不省人事淹延時日膿既不成毒無  
出處必死之候矣健按癰毒之發皆因灌漿不足毒氣凝滯攻於  
肌肉者輕攻於肢節者重潰爛於筋骨者危緣  
法就其虛實寒熱攻漿充滿必無餘蘊癰毒何由而生耶能知此  
矣而治卽  
爲良醫矣。

### 異常發癰論

痘當回水之際忽然通身發熱獨於腮頰處紅腫按之疼痛此異

常發癰也。蓋因出痘本稀不用意，催漿漿來清薄，初轉褐色，卽有一兩顆結痂，而於發癰之處，痘頂內陷，膿漿內縮，不比餘毒發癰也。此時令不正之氣使然，其年時證俱腫腮頰，傳染其氣，以致痘變發癰。余曾治之外敷三豆漿不退，內服大連翹飲不消，後合黃連黃芩大黃等分爲末，用蜂蜜調敷空頂，箍毒仍服前方加銀花數劑出膿，貼萬應膏而愈。健按此因時氣傳染而致非痘密毒盛，餘毒攻發之比故曰異常發癰。

### 痘毒論

秦氏痘毒之發，皆由餘毒太盛，更兼營衛大虛，不能運行，鬱而不散，致成癰腫。當其未成時，便宜服金銀花、甘草連翹，當歸生地之類，其脾胃不實者，當歸生地宜禁。但以實脾爲主，如毒盛而勢必發不宜卽用寒涼及一切敷藥，宜縱之使發，內用參芪甘草芎歸銀花助之，如氣血弱者，倍參芪，加桂主之。發癰焮腫能食，身熱大便

堅而元氣實者稍用生黃芪加芎歸芍地連翹銀花甘草荆芥羌活主之外用土南星爲末清水調微火上煮一滾候其汁濃乘溫將鴛翎不時拂敷腫處以腫消爲主

痘後身腫陰囊腫論

秦氏凡痘癰之後面目虛浮四肢腫滿者此屬於肺因表虛而受風溼之氣致傷脾土土虛不能制水水溢上行而腫也宜加味五皮飲暫用之或腹脹如鼓目胞浮腫者此屬於脾因脾胃素虛飲水太多以致水畜於中滿而不去又或傷食脾不能消溼熱停滯厚朴湯主之若虛脹者不可妄攻宜補中行濕利小便與諸書治法同至若陰囊腫亮如瓢者乃膀胱熱甚毒氣流於小腸而然也急宜清利用車前茯苓牛膝木通瞿麥燈心甘草之類仍佐實脾等

# 痘項疙瘩論

朱氏痘當起漿之時或漿飽滿之際痘項皮內有微白疙瘩此乃氣分有熱上衝痘項初不可用辛熱補劑惟清毒活血藥一劑疙瘩自然化開成膿矣健按此證雖僅見然不可不知

## 解毒疹論

朱氏痘漿飽滿初轉褐色此回水之候也忽然通身大熱當先看臍之四旁及腰間如有小紅顆粒此乃解毒疹也又名蓋痘疹宜用宣毒透疹湯托之盡出後用大連翹飲一劑全愈健按此卽俗云紅點如赤疹者少亦有如白疹者多曾治本虛火毒險證形如噴鈍色屬乾紅第二朝卽有白頭焦項之粒兼喉癰少食盜汗平塌卽於升麻葛根湯中加石膏紫草以發之俟齊第四朝遂投參芪黃連當歸紅花紫草石膏全蝎山甲等補其本清熱攻毒並舉三劑而漿已灌但未蒼蠅至七朝而額上先癥八朝通身皆鱗而成焦斑是夜覺微熱腹悶不寧因思追迫之漿火性急速雖癥而一如焦鬚必有畜毒未盡故身熱腹悶也卽以升葛牛蒡膏連銀花山甲甘桔蟬退等復托之九朝發出餘毒如白疹連托六劑至十

六朝而發清。其中有大粒百顆復灌厚膿除四肢頭面外身中毫  
無微不到漸枯脫皮而愈此證若非早服補托則八九朝必無  
癆而不救何能結痂而發餘毒若不識其故而不如此復托則毒  
伏火鬱必悶亂腹脹而死安得轉凶爲吉於此見前賢名論之不  
謬也可不細心以求之者乎

### 子來救母論

朱痘有先出至長漿之際俱皆平塌內無膿漿復又身熱平塌之  
空處復出細小痘粒比先之平塌者較勝此子來救母吉兆也先  
出者爲母後出者爲子子之行漿不須三日充滿隨出隨灌子漿  
充足毒化大半母漿亦漸次成膿矣先凶後吉非子來救母乎按健  
此卽所謂贈痘必因初發未足清削本原毒留於內至攻托用補元氣稍充而餘蘊外達出此贈痘乃爲轉吉

### 濁虛流清清中出濁論

濁處者何一家之中或有三五男女或同居前後左右有先出痘  
者或稠密而險或伏而難出或犯名色或塌陷而灌漿不易極力

救之得生而痘腳之惡因感天地陰陽濁氣所致故多出之不順甚至其中有不收功者是濁氣之中又有邪氣夾之陰陽乖違暗操必死之權氣化流行顯定無生之案所謂濁處者以此若謂濁處流清天地之氣化五日換一候十五日換一氣濁氣聚散不常按候移換南風吹則望北行北風起則向南行東西亦然若其人家有世德天必佑之向之所謂濁氣者今得時令轉移氣候更換遇清氣當臨而出稀疎之痘可不藥而愈故同處一方而有先後善惡之不同所謂濁處流清者以此若夫清中出濁多因其家保護懈怠因從前所出之痘稀疎灌漿充滿結痂依期不避風寒安然無事亦不用明醫調理視若泛常及至後出之痘彼不知時令之轉移氣候之更換又不知報痘部位稀密不同更不知伏而出之難陷而不起之逆彼仍視為輕易頃刻告變是謂清中出濁

者以此健接此論發前未發今人烏能探此元關必閱懶深而畱邪深致有夾疹夾斑之證是爲凶中藏吉時氣得清先天毒盛常有漿空塌陷之虞是爲吉裏藏凶若先天毒淺時氣又清痘出必順爲吉中之吉先天毒盛時氣又清痘出必甚速故於時氣變遷清濁之分其應如嚮學者當心領而神會之

### 痘後毒火攻目論

朱氏人之有兩目猶天之有日月也風雨晦冥朔望薄蝕日月遭其障蔽亦有時而無光氣爽天清光明仍在觀此可以悟毒火攻目之由乃可以參聶氏清毒撥翳之精微矣夫男女之失明其證不一有因修造興工動土其年值本命之辰而眼患者名曰犯眼有因感冒風寒火熱交併而爲眼患者名曰火眼有因內有積熱熱久成疳而眼患者或兩目或一目名曰疳蝕眼已上證候有調治耳唯痘後壞眼最送前哲立說俱言目中生痘獨聶氏曰此非有

形之痘乃無形之痘也。痘毒攻眼皆因長漿之際。醫不能及時用藥。催漿致漿不充滿。及致回水之際。外現身熱頭疼。并眼胞紅腫。不能開視。而毒火攻目之證。俱見此時用清毒保目湯服一二劑。尚可解。上攻之毒火委而去之。且曰眼中有痘。傷壞兩目。痘結成翳。非人力之所能爲也。嗟嗟。庸醫誤人。莫此爲甚。余特表而出之。以救天下後世。蓋有形之痘。發於咽喉者有之。發於口舌者有之。然外痘起長內痘亦起長外痘。收醫內痘亦收醫。非入眼之毒。必作於收醫之時。與咽喉口舌之痘迥異。以此知其非有形之痘。乃無形之毒也。明矣。聶氏歸重於無形之毒火。眞發前人之所未發。并附見聞。擴充其理。眼有陰陽之別。左陽而右陰也。眼有五臟之分。黑珠屬肝。大小皆屬心。白珠屬肺。黑珠中之一點。眞水屬腎。腎乃天一所生之水。澄清如鏡。萬物畢照。而爲瞳人也。眼上下胞屬

脾也痘後壞眼翳膜獨遍瞳人黑珠別處無翳。豈心與脾肺不受邪耶。緣以痘出稠密先藉五臟之真氣送毒出外以成漿而氣血已屬兩虛。毒火內盛則不能送毒成漿。漿若不充至收鑿之時。毒火上炎攻於兩目始焉外證身熱頭更熱而疼。兩太陽更疼。當細看形證。眼胞若腫緊閉不開。熱淚長出。眥膜粘滯。此壞目之由也。急以清毒保目湯連服以解之。庶可免患失此不治。毒火愈炎。攻脾則眼胞紅腫。攻心則太小眥紅腫大痛。攻肺則白珠紅絲障蔽。日夜啼叫痛苦異常。夫然後欲開不開。欲視不能。內動肝氣惱怒。不寧。肝家之相火與痘家之毒火內外夾攻。烏有不焚燎肝木。爍乾腎水者乎。且肝乃腎之子。肝既受毒火與相火交攻。子能今母實腎中之真水。有限焉能制伏毒火而可保肝之不能害耶。肝既不能保。而腎亦受困。故肝部黑珠之膜翳漸侵瞳神矣。或從上而

陵下或從下而犯上或從左而入右或從右而入左甚至毒火亢極當頂遮蔽瞳人種種不一雖性命苟延兩目喪明成一廢人真可哀也學者當於膿漿未成及未滿之時必細心究治或氣血兩虛不能及期充滿急用參歸鹿茸湯以攻之使其漿足若毒火內盛氣血爲毒火所燬因而凝滯不能及時足漿急用清毒活血湯以攻之攻之不滿處於無奈卽於劑中加角刺分<sup>七</sup>黃土炒山甲五分煎服此攻毒救命之要藥也如能及時用藥未有不應手足漿決無毒火攻目之證此端本澄源之論也

○亦有不寒而服桂附不虛而用溫補至收斂之時火熱上攻兩目此司痘者當悔從前之錯勿蓋已往之愆急用清毒保目湯以解上攻之毒火倘或紅腫太甚翳膜遮蔽於肺肝之位急用清毒撥翳湯連進一二劑自然翳膜退去若夫氣血兩虛又兼

毒火內盛當值收醫之時外既不能足漿勢必餘毒上攻兩目夫兩目五臟之精華所聚既受毒火之攻爲病甚深始宜清毒保目湯急解上攻之毒看目中如有翳膜則用清毒撥翳湯調治不可過用寒涼從容責效毋事欲速并不可聽仕眼科擅用點磨致壞難救○一法用蟬蛻豬肝散每日清晨服之兩月之久可消翳一半若性情不躁暴不惱怒百日自可全退戒食煎炒辛熱之物無不應也

或問痘後患眼翳膜遮睛百中不能開一子何言之易耶余曰治有緩急藥有次序不怠玩不急遽不憚煩不計利不潦草了事不計日成功當起長長漿之時着力催其漿足則無害眼之患若失時不能足漿當收醫之際身熱頭更熱頭疼兩太陽更疼須急用清毒保目湯連劑以解上攻之毒倘怠玩於旬日半月

之外翳膜根腳固結則不能清毒撥翳矣若收翳之際發熱頭  
疼急須前湯及蚤用之看有翳膜卽以清毒撥翳湯治之雖三  
四月之久亦能奏效若初患之時不能如是用藥因循日久欲  
開其瞽難矣所謂治有緩急者何也若漿不足急以攻之若毒  
火上攻急以清毒保目湯解之宜急若目中有翳膜宜清毒撥  
翳湯或隔日一劑或隔兩日一劑分兩宜輕此治宜緩也藥有  
次序者何也先以清毒保目湯用之於前清毒撥翳湯治之於  
後此藥之有次序也若漿不足急於攻翳毒火攻目急於清解  
此不急玩也用清毒撥翳湯必見目中有翳然後用之此不急  
遽也辨證檢方從二方中加減必須貼切此不潦草了事也應  
酬頗多該用之藥當細心思索不可聊且塞責此不憚煩也貧  
乏之家不能爲禮不可較量推諉更宜精思以使速愈亦屬陰

功此不計利也兩目障翳逐日退消不宜欲速暴驟以用峻藥

此不計曰成功也如此救人非余言之易未有不奏效者也

按健

救目之法反覆詳論  
前輩成書所罕及也

### 水痘赤痘論

朱氏水痘赤痘形色與正痘相似其實非正痘也正痘之根源發於命門自發熱造端以至報苗及出齊灌漿足漿收鑿刻時限曰疮生係之故諄諄詳悉以開示後學若不以水痘赤痘之形色辨別明白誠恐有以紫奪硃之誤也夫水痘灌漿全是水泡毫無膿漿赤痘初出形色紅而微帶赤也是水痘之一類也灌漿仍是清水名雖爲二實屬一種水痘者以漿之清水而名赤痘者以初出之形色而後人巧立其名也蓋因肺脾兩家素有溼熱外感風寒風溼相搏寒熱交併而肺脾之濕熱盡發於肌肉皮毛之間初出亦

發熱頭疼嘔吐既出卽上漿漿滿卽結薄痂矣健按古書麻痘卽水痘也與正痘大相懸絕正痘先天蘊毒爲人只出一次水痘乃後天邪氣偶感卽出無關性命但以柴葛解肌湯加減可愈避風忌葷六七日隨脫矣更不比於痘疹之支離也

### 附麻疹論

秦氏麻疹乃時行不正氣候暄熱非其時而有其氣傳染而成也稱之爲胎毒誤矣。內經有曰少陰所致爲瘍疹。夫少陰所致者乃君火有餘熱令行戊子戊午之歲也在太則心火主之心火太過則制其所勝而燒爍肺金肺主皮毛故色紅如錦見於皮膚之間實心火侮而乘之之色也。又曰麻屬於脾熱留於心乃心脾俱受邪而發者其欲出之時腮紅眼赤壯熱憎寒身體疼痛嘔吐泄瀉咳嗽煩渴是其候也宜服開豁腠理湯使之易出如頭面愈多而精神夾健鮮明勻朗氣息和平吉兆也若紫黑燥暗或未出透身熱

煩悶聲啞喘急隱隱難出出而復隱此危急之兆也速將前方加  
麻黃石膏檉柳以發之如不出透或喘更甚此爲不治之候其大  
便堅燥不可輕用下藥或用豬膽導蜜煎法則自來矣其或微瀉  
者不必治之正假此發洩熱毒也若麻後瀉痢不止此熱毒下陷  
之故當以五苓散去桂加芍藥芩連木通之類毒解熱退則瀉自  
止不可用燥溼溫補之劑古人云可汗不可下可表不可補是矣  
其壯熱氣促不止者此餘毒畱連未盡也用瀉熱清金之劑以竹  
葉石膏湯加芩連元參桔梗橘紅半夢花粉蟬蛻之類咳嗽不止  
者一陳加蔓仁桔梗元參黃芩象貝治之渴則花粉知母喘則芩  
歷蘇子桑白皮杏仁可也若出過三日後而疹不化者此內有實  
熱也加清利之藥則自解矣乃治麻疹之大概也初出之時最忌  
米穀葷腥風寒暑溼之氣苟有不禁最爲深患間有犯之或愈者

此因內稟之氣實外感之邪輕耳不可執此以望僥倖

健按前人稱麻疹即

今人稱瘡疹也但各處之名不同有單稱麻子者因形似麻而名也有稱瘡子者亦疹之別名皆外感時氣所致主乎肺病因心火上刑於金而發必兼咳嗽赤疹屬風熱白疹屬暑溼聶氏朱氏稱疹亦屬先天以痘爲命門之陰毒疹爲命門之陽毒又云痘出之後更要出疹則陰陽之毒兩解終身無出疹之句此千古所未聞誤天下蒼生之謬論秦氏曰前人稱之胎毒誤矣此不易之明斷也恐後學爲聶氏所惑故盡刪其說不畱弊竇以絕譌傳無人不知疹爲外感時氣豈但小兒常出卽壯者老者亦常患之安可與痘並論乎既不可並論并不得並名更不該並稱其書目矣凡書以痘疹合稱者皆失其大旨也茲特剖別其義彰其標本不與痘合論不與痘合名而獨以痘證爲書附此疹論以備考辨耳學者須詳味之

朱氏疹形似麻而頭粒稀密不一色紅潤神清氣爽者順若初出不分顆粒色赤紫者臉色黑者逆不可視為泛常用藥失序不可過於攻表不可驟用寒涼避風寒忌葷穢惟宣發其毒以盡出之雖紅腫之甚狀如漆瘡斯無足慮以其出之透卽不致內攻若調治失宜則殺人亦如反掌可不慎哉

初發熱必發表見點之後發表而兼清涼通身上下通紅成片爲出透可用清涼解毒之劑一解即愈

又有一種疹初出眼胞腫白夾赤色聲啞唇腫鼻乾鼻煽氣喘口燥煩渴腰疼腹脹人事昏沉口鼻出血煩亂狂叫二便下血此毒氣鬱遏於內名曰閉證最爲難治用宣毒發表湯加黃芩麻黃服藥漸出者或可望生若悶而不出則無救矣凡疹證鼻出血者毒重口出血者毒尤重二便出血者毒更重且危矣初起手足心火熱者毒重初起腳冷如冰者毒更重

初見疹未出透失於清解誤用辛熱之劑以致毒蘊於胃口鼻出氣腥臭必生牙疳宜用化毒清表湯加石膏若已出透速收速散身熱不除餘毒流注大腸裏急後重紅白相兼而成痢疾宜用清熱導滯湯

若素稟虛弱當出疹之際過於發散出透之後過於寒涼解毒以致虛弱之極骨瘦神疲面無紅色且又不能多飲食食卽吐出急用香砂六君子湯補之健按若非脾胃虛弱少食吐食而但立者俗名痧癆恐補脾本原虛朝涼暮熱咳嗽痰多將成骨癆肺香砂惟恐不宜

若甫生小兒值天氣炎熱或出痧疹痧疹風疹癰疹乃皮膚小疾風溼相感所致卽有身熱出沒無常無關利害微用疎風清熱之劑一服卽愈健按朱氏論疹亦從聶氏而言先天可謂一誤然辨證治法有當於用再誤其說概不收錄恐仍貽誤於天下後世耳者仍摘存之以備參考

#### 四方疹名各別

京師內外呼爲溫疹河南呼爲粹瘡山陝西呼爲糠瘡山左呼爲疹子江浙呼爲痧疹湖廣江西呼爲麻疹又呼船子福建兩廣雲貴四川俱呼爲疹子四方之土語不同其實皆疹也調治之

法俱同避忌無二

出疹有四忌

一忌葷腥煎炒疹初出至出淨後俱忌葷腥不宜煎炒恐食之能助胃火昔人有云葷痘素疹誠哉是言

二忌恣食生冷糖果疹初出時以至出透未免口渴煩躁想飲冷水不妨少與些須以解煩渴然不可多飲若欲再飲仍飲些須荸薺甘蔗好梨柿餅柿霜與食無妨切不可喫糕餅糖飴麵食枝圓蜜餈之類食之恐助熱毒饑則大麥粉調飲爲宜

三忌風寒當出疹之時必謹避風寒若不避則風寒外束疹即收隱欲其再出甚爲難矣

四忌房幃穢氣人家兒女出疹之時須加意潔淨內外勿使污穢之氣觸之痘當更加防備

看疹醫有三忌

一忌驟用寒涼疹初出時雖有身熱煩渴等證卽以宣毒發表湯少加酒芩以清之切不可投黃連黃柏梔子等苦寒之藥恐冰凝其毒伏而難出變危隨至

二忌誤用辛熱疹初出時必有嘔吐手足逆冷之證不比他病而擅投蒼朮平胃丁香砂仁豆蔻乾薑暖胃桂枝肉桂溫其手足要知嘔吐者火熱蒸於胃也手足指梢冷者熱極於胃中氣鬱而不能行於四肢也若以辛熱投之是抱薪而救火矣宜辛涼以解俟疹出透則嘔吐自止手足卽和不明此理而妄以溫經陷人性命

三忌誤用補澀疹初出時多泄瀉者其風邪傷肺犯胃火性急速肺與大腸爲表裏移熱下行毒氣因瀉而減疹發反輕倘或瀉

之過甚則用加味四苓散一服立愈切不可用參朮訶子肉蔻  
木香補澀之劑若濫用之必致變證腹脹喘滿而不可救輕則  
休息痢積綿延不已不可不慎若麻疹出淨之後瀉黃紅色  
乃內有伏熱仍宜四苓散加芩連熟石膏清利自止

痘證寶筏卷六總方目錄

宣發之劑

升麻葛根湯

小柴胡湯

柴胡升麻湯

參蘇飲

柴葛解肌湯

羌活散

起痘神方

導赤散

葛根解毒湯

牛黃清心丸

薑附湯

救命散

髮灰散

甘桔湯

攻托之劑

敗毒和中散

犀角地黃湯

黃連解毒湯

升消平胃散

清毒活血湯

三黃石膏湯

溫膽湯

四聖膏

拔毒散

白虎湯

元參升麻湯

調元化毒湯

清肺飲

清上飲

承氣湯

催漿之劑

參麥清補湯

參芪實表湯

養胃開痰湯

參歸大補湯

溫表調中湯

補中益氣湯

四君子湯

保元湯

異攻散

參芪湯

氣湯

木香散

中和湯

理中湯

參朮散

當歸六黃湯

三黃熟艾湯

收脫之劑

金蟬散

人牙散

安神丸

敗草散

玳瑁散

牛黃散

清表敗毒散

五皮飲

三豆漿

當歸散

土鎖匙

奪命五毒丹

生犀散

地黃散

又方去翳

錢氏異攻散

參芩白朮散

千金內托散

七味豆蔻丸

歸脾湯

加味建中湯

參歸鹿茸湯

溫表調中湯

補中益氣湯

參芪湯

異攻散攻散

桑蟲膏

豬尾膏

五福化毒丹

大連翹飲

綿繭散

移痘毒法

清毒保目湯

羊肝散

又方痘瘡入眼

蟬蛻散

調肝散

利咽解毒湯

生蠅方

消毒散血湯

大通丸

又方痘瘡入眼

清毒撥翳湯

又方痘瘡入眼

蟬蛻散

清毒撥翳湯

又方痘瘡入眼

利咽解毒湯

生蠅方

又方痘瘡入眼

清毒撥翳湯

又方痘瘡入眼

利咽解毒湯

又方痘瘡入眼

清毒撥翳湯

又方痘瘡入眼

利咽解毒湯

又方痘瘡入眼

清毒撥翳湯

又方痘瘡入眼

秦皮散

更甦丹

塞耳丹

清執導帶湯

過積丹

養胃和中湯

加味四芩散

附人參定喘湯

加減三拗湯

塞耳丹

## 水痘麻疹宣發湯化之劑

宣毒發表湯

化毒清表湯

清胃敗毒湯

救苦散

解毒化瘀丸

健脾肥兒丸

清寧湯

還元湯

聰耳出膿方

金華散

仙露膏

小麥湯

二聖散

荆防發表湯

快然膏

生肌散

痘證寶筏總論終

痘證寶筏卷六

上海強健纂著

同里朱增惠春坪氏重刊

治痘古今經驗方

宣發之劑

健按痘雖發於五臟然必因時氣觸之而達於肌肉透於皮膚無不由脾肺兩經而出初發熱及發痘三朝出齊須用脾肺家藥解鬆肌表使之易出故歷來前輩發痘必以升麻葛根湯或柴胡升麻湯或柴葛解肌湯三方爲主今人不察根由不明至理妄以太陽經表劑混施濫用荆防羌活蘇葉麻黃以發散之致令汗洩表虛并以少陽厥陰之川芎香附赤芍山楂等破其陰血又以太陰陽明之枳殼白芷麴朴腹皮傷其元氣致痘發而殼薄空大根顆散漫初發之始氣血已兩耗矣及其起長皮必薄而漿必清穿破塌陷因之而來皆緣誤服他經表藥皮毛氣洩而漿難包裹肌肉空虛而漿難滿足中變之禍可勝道哉譬諸小康之家未爲富厚輕聽匠作妄造大房工未竣而力已竭裝修不能完備狂風猝起遂有坍塌之虞舉今醫痘之習類是能得古人心印必須預顧本原察虛實而酌劑呢防務使灌漿充足不使竭蹶張惶始爲能事豈可偏於鄉風俗習一概板方任其證來湊我卽百中一遇亦偶然耳試思痘屬臟發與太陽經之表分何涉痘賴氣血以鎔漿何先破其氣血以希效難

矣。如或果有感冒，只須一二味耑經之藥以疎解之，邪退即止。總以起痘爲急，旋乾轉坤，在乎發軔之初，若擅破其氣血，而更以大黃黃連起手者，苦寒下陷，痘反隱伏，殺之於旦夕之間，偏地悲號猿聞，腸斷而彼醫恬不爲怪，終不自返，最可歎也。且有仁心者勿踵此習，勉勵於前賢之正法，可以濟人而能自濟，今兼宣發之劑於左，加減出入隨證制宜，自有繩墨可循也。

升麻葛根湯

仲陽

治初發熱或腹痛頭疼咳嗽，嘔惡痘疹欲發之時，俱宜用此加減解肌宣發，最爲工穩。

升麻一錢

葛根半錢

白芍

酒炒一錢，此味在可否之間，不用者多

甘草炙四分

加蔥白一個

生薑二片

河水煎

加減法

發痘應加牛蒡子

炒研二三錢

杏仁

一二錢去皮尖

蟬蛻一錢

木通錢

廣橘紅錢

桔梗半錢

天寒難發

加蘇葉七分

或

麻黃五分

感冒風寒亦宜

天熱身熱盛而咳者加黃芩

酒炒一錢

石膏三五錢

傷風痰嗽者加前胡一錢

防風七分

感寒惡寒脈沉遲或吐乳瀉白者加乾薑三分

引用羌荌筍尖分

分兩須看

兒之大小以增減之無刻畫也。如遇病後久虛無力透痘出

透可加人參

三五分

當歸

錢半

以助其發出此亦順痘治法也。

若遇血熱險逆難發者卽加紫草

酒拌或炒二三錢

地龍

鹽水洗淨

酒浸瓦上炙脆研五七條

穿山甲

酒炙脆研錢許

涼血攻毒以發之血熱而挾虛

者并加入參膏連清補兼攻以發之若遇喉痺乳蛾加射干錢

僵蠶

炒研一錢

山豆根

錢

若挾驚搐加鉤藤

錢

天麻

若遇肺風痰喘加葶藶

焙炒八分

全蝎

去尾鉤酒洗瓦上炙脆研五枚

僵蠶蟬退地龍甘桔等均爲驚痰聖藥所必用也初發之期不宜過表不宜妄下黃連苦寒不宜驟用恐冰凝其毒而痘發不清反致後患耳發痘三朝用藥加減之法畧具再以後方合參施治便有效而無失矣。

柴胡升麻湯

局方

和解肌表痘易透發托化斑疹之主劑

柴胡

錢一

升麻

錢一

葛根

錢半

前胡

錢一

石膏

三四錢熟重

者七八錢

淡豆豉

錢一

桑白皮

荆芥

赤芍

散破血之癥

之礙不可擅用

此初起寒熱並發之劑或夾疹者加牛蒡子

炒研三錢

杏仁

去尖研  
二錢

蟬蛻

錢一

木通

錢一

榧榔

錢二三

生甘草

三分五

桔梗

錢二三

梗半錢

橘紅

錢一

夾斑者加連翹

錢半

天花粉

二錢

石膏

六七

斑色赤者更加紫草

酒拌二

茅根

酒拌二

三錢

如斑青灰黑色者竝

許

加大青

七八

川連

酒拌不

拘用

元參

三分二

蘆根爲引

如大

便久結不通可加酒浸大黃量行之乃使痘出

柴葛解肌湯

陶氏

解肌發痘兼治頭目痛鼻乾不眠

柴胡

錢一

葛根

錢半

黃芩

錢半

桔梗

錢半

甘草

四分

石膏

五分

錢

錢

錢

錢

錢

芍藥

白芷

羌活

此三味不宜

濫用應去之

生薑天棗爲引

此方取

用治痘而兼太陽頭痛陽明目眶痛者若無二證何用白芷羌

活其性辛散有礙於痘也去此則與上二方相佐發痘大法不離乎此矣

小柴胡湯

仲景

痘前痘後寒熱往來以此和解

柴胡一錢

製半夏半錢

人參一錢

甘草炙四分

黃芩一錢

薑半

薑

棗水煎 此方和解妙劑挾虛者連參用實者除參服痘中偶有寒熱或痘後餘熱潮熱或變瘡疾或婦女經虛熱入血室或血滯脇痛驚悸皆可主之

參蘇飲

元戎

本虛感風頭痛鼻塞身熱不減痘難出者

人參三分

蘇葉七分

陳皮五分

半夏七分

前胡五分

乾葛七分

桔梗七分

炙甘草三分

杏仁五分

去尖研

木通四五分

枳殼破氣木香

用以扶元散風和表微汗則邪解而痘自發矣

健按此方中有

枳殼破氣木香

辛溫與風何涉於痘有癰既已用參豈可仍破其氣理應除此二味乃酌劑之大法也古人立方恒多未盡善處故宜取舍以

致清直庶幾服之得  
力亦變通之要也

羌活散

秦氏

痘發肝經色赤稠密顆不整熱盛難出風觸身强者

暫服此以發之

羌活

川芎

防風

膽草

山梔

當歸

各等分

甘草

薄

荷減

牛半水煎一方加人參

少許

○健按此方卽錢氏直訣湯

錢氏直訣若非肝家風火交作之證

他經不

丸之餘意

宜用也

起痘神方

秦氏

初隱隱於皮膚難起發者用之易出

人中黃

一錢七分

麻黃

一錢

蟬蛻

一錢

紫草

酒拌二錢

紅花

酒拌五分

山

豆根

一分

連翹

一錢

牛夢子

炒二錢

穿山甲

酒炒脆一錢

共爲末

酒蜜爲丸如芡實大辰砂爲衣薄荷煎湯送下或作煎劑服

葛根解毒湯

秦氏

痘將發渴熱不退而作渴或血熱者

葛根

一錢

天花粉

幾

麥冬

一錢

生地

半錢

升麻

八分

甘草

三分

甘草

三

分 加引根汁酒盃溫服

薑附湯朱氏 痘出傳風眼直斜視牙關緊閉此時不可用驅風之藥應服此以解之

白附子麴裹煨二錢 老薑一錢水煎徐服

導赤散秦氏 發痘之際心經熱而發搐服之良

生地酒浸二錢

木通八分

生甘草三分

防風五分

黃連三分

加竹

葉片七水煎

一方加入參麥冬

目直視煩躁叫哭加梔子

曰健此可加蟬蛻桔梗橘紅鈎藤僵蠶薄荷尤良

牛黃清心丸 痘將發或發後心熱神昏

牛黃二分五釐

辰砂一分五錢

川連五錢

真鬱金二錢

山梔

黃芩

各三錢

爲末用臘雪水調麪糊丸如黍米大每服七八丸燈心湯

下

甘桔湯秦氏 一切咽喉和中開結痘證始終必兼而用。

甘草一錢 桔梗一錢 水煎

救命散秦氏 治紫黑斑疔一切難起者用之。

穿山甲

四兩酒洗

同紫草防風荆芥牛蒡子蟬退連翹

錢各五分

水煮軟

去藥渣取山甲入罐內鹽泥封固打火半炷香取出

驥用

每甲

一兩入麝香一分

人牙假研共爲末

三箇五六日

不起者用核桃

去殼連核煎

好陳酒調下幼者

三分大者一錢

未起再服

斑疔退而正痘可起效

髮灰散朱氏 治痘出未齊鼻衄不止。

血餘灰

研極細每服一錢

用童便七分酒三分調服立止。

攻托之劑

健按痘順者三日夜發足第四朝應行攻托使之起長須先有形色之虛實察火候之輕重如形圓頭聳根腳鈍束色紅潤者政養氣血助其上漿爲主無事寒涼反遏其勢也如形歪炳碎平塌皮薄色乾紅赤紫卽屬險候若氣虛血熱毒盛難起者須

清涼解毒帶元氣以托之使其頂起根收。月地清潔色轉紅潤方可行漿以圖收效。若應托之期而寒涼太過，遂致根淡無漿，毒必內陷，至入九朝而告變至矣。亦不可過補以壅塞其毒。熱則漿燥，急於結醫必有餘毒內攻之患。若氣血兩虛形塌，根散色淡殼薄必然無漿。四五朝內卽應溫補以使長漿爲主。如色白灰塌者更宜加桂附參芪鹿茸以急攻之庶可望生。若踵時習誤信坊本執四五六朝必當清火之法是爲刻舟求劍。豈能免於死亾。卽或回頭進補而漿以愆期，決難成功。而變幻不測終致不救深可惜也。於此應托之期全在看準暈腳分別寒熱虛實而用藥不致太過不及正好做漿滿足始無日後變遷。方爲名手。因類攻托之方於左。

敗毒和中散朱氏 發齊之後應托之時其火毒盛而色赤者宜此清解以待上漿。

連翹七分 川連三分 牛蒡子一錢炒研桔梗七分 前胡五分 升麻

木通五分 分

蟬蛻五分 分

生甘草三分 分

紫草一錢酒拌

一分

○健按方中有防風荆芥二味不宜用而前胡升麻牛蒡在第四朝或有發之未盡者暫可用之至五六朝亦不宜用矣。當隨證酌之如大便秘而腹脹氣悶者加酒浸大黃七分下之而痘可起。胃火盛而睡臥不寧膚色赤腫或警語或夾斑疹未化者

重加石膏以化之氣虛毒伏不起長者加人參山甲以攻之血虛根漫不起者加歸身紅花黃芪以助之血熱色赤或鼻衄牙宣便溺見血者加犀角地黃茅根以涼之總使速於起長爲主不致抑遏愆期自貽伊戚○條中清解散蘇解散與此方相上下故不重錄恐滋冗雜耳清利之劑就此加減出入亦可濟於用矣

黃連解毒湯

公倉

秦氏用解毒火治痘中血泡之證。

黃連 黃芩 黃柏 黑山梔量其分數用之上三味治赤泡用酒炒解火毒生用。

清毒活血湯

朱氏

治熱毒盛根枯紫赤者

紫草

酒拌一錢

當歸

酒拌七分

牛蒡子

炒研七分

木通

五分

桔梗

五分

甘草

三分

生地

酒洗一錢

連翹

六分

人参

二三分

白芍

酒炒五分

黃

芩

酒炒五分

黃連

酒拌三分四分

生黃芪

七八分

水煎

煩渴者去參

芪加麥冬

七八分

花粉

七八分

便結者酒浸大黃

五六分

犀角地黃湯

生濟

痘發時見諸血者宜此加減

犀角

一錢

生地

酒浸三  
四錢

赤芍

許

丹皮

二錢

酒拌  
如血多不

止加紫草童便黑山梔黃連石膏麥門冬橘紅燈心血餘灰以

瀉熱止血。

升消平胃散

朱氏

發痘時爲食所傷壅滯中氣不能起長以此消

之痘得起發。

蒼朮

炒四  
五分

厚朴

炒七  
八分

紫蘇

連梗四  
五分

陳皮

五  
分

查肉

一  
錢

麥芽

炒焦研  
一二錢

炙甘草

二  
分

加生薑

一二  
片

健按方中有杏燥之藥概不宜用故不全錄如食不易消而舌  
現灰焦脣胃拒按者又當用小陷胸酌之瓜蔓枳實黃連皆可  
參用使其知餓爲當如非食滯應清應補方中切不可夾雜枳  
朴楂麌等藥以誅伐無故暗損氣血痘漿必然虛歇而有後患  
餘波此世俗之通弊最易犯也明理作手切不可微此。

三黃湯

秦氏

大便閉結脹悶痘發不齊并不起長形色赤紫用以

通之則痘易起而色轉順

大黃

酒浸

黃連

酒拌

黃芩

酒炒

等分水煎

三黃石膏湯

倉公

治痘瘍斑毒形色紫赤焦頭破碎不能起長大

便秘小便赤口渴煩躁順悶純平火證宜用。

黃連 黃芩 黃柏 桔子 石膏 麻黃 豆豉

或加大黃名梔子金花丸亦可用分數酌量。

四聖膏

聶氏

治痘疔聖藥

珍珠

生研

豌豆

煅存性研

血餘灰

冰片

名等分研

用油胭脂和入

諸末研成膏收磁瓶內用銀鍼挑破痘疔將膏填入少許卽轉紅活賊痘亦挑破點之卽化。

白虎湯

仲景

痘已發未發或胃火偏盛面紅齒燥口臭脣乾煩渴

齦齒咬牙夾斑夾疹或獨用兼用均宜。

石膏

或煅或生五六錢

知母

酒炒錢半

生甘草

五分

粳米

撮一

水煮米

熟爲度 加人參名參白虎湯 加竹葉麥冬花粉名竹葉石膏湯治胃熱嘔吐

溫膽湯

局方

痘有脾虛則生痰飲嘔惡心悸少睡者用之

陳皮

六分

熟半夏

錢

枳實

炒六分

茯苓

錢

甘草

二分

竹茹

五分

生薑

二分

大棗

二枚水煎

若痰滯昏沉恍惚者可加陳膽

三分

星

二分

棗仁

炒研五分

遠志

四分

石菖蒲

汁一二匙

火鬱者加

薑炒黃連

四五分

燈心同煎爲嘔吐吞酸作酸之妙劑

拔毒散

朱氏

治痘疔及賊痘紫浮萍大效

明雄黃

不拘多少研細末用滚水泡綿胭脂捏取濃汁調勻擦敷患

處日三五次其毒漸退

承氣湯

仲景

痘色赤紫形塌頂焦齒燥脣烈腹脹悶拒按舌刺譖語睡臥不穩不能起長皆因燥屎閉結用此去之則毒火泄而

痘自起色轉紅活但須認清實熱不可妄用誤投下虛元氣反致內陷禍如反掌

大黃酒拌 枳實炒 巴硝沖 厚朴炒 量其本體年之大小證之輕重而酌分數以用之

元參升麻湯活人 痘夾斑疹或兼咽喉以此化之

元參一二錢 升麻一錢水煎 疹不透而難化加牛蒡子蟬退木通石膏連翹花粉梗棟 斑不起不化加豆豉紫草石膏花青蘆根 若咽喉痛者加射干甘桔半夢子僵蠶薄荷山豆根橘紅川貝母用之捷效

清肺飲朱氏 痘起長時或痘後咳嗽或鼻衄者皆宜

天花粉一錢 麥門冬一錢 天門冬一錢 桔梗一錢 甘草四分 黃芩七分 知母酒炒七分 牡丹皮酒拌八分 燈心段十水煎 如帶血

虛者加當歸

酒拌一錢

生地

酒浸二錢

鼻衄血熱者加紫草

酒拌一石錢

膏

三錢或山梔

錢許

痰中帶血者加紫苑

錢許蜜水拌

廣橘紅

七分川

貝母

去心研服一錢

調均可

清上飲

朱氏

起長行漿時或結痂痘後口舌生瘡疳蝕癰爛俱熱

毒畜於脾胃上攻其竅以此清解

薄荷葉

七分

半夢子

炒研一錢

乾葛

錢一錢

桔梗

分

甘草

四分

僵

蠶

炒研一錢

連翹

八分

黃連

酒炒三分

黃芩

酒炒七分

石膏

三分

花

粉錢

或加青黛

五六分

木通

五分

川貝母

去心研一錢

服之更效

調元化毒湯

朱氏

治氣虛血熱血虛火鬱痘發不足難於起長表

熱未清用此內外兼托清中帶補酌用可也

生黃芪

錢一錢

歸身

酒拌一錢

紅花

酒拌三分

牛夢子

炒研七分

人參

三分

白芍

酒炒七分

連翹

七分

木通

七分

黃芩

酒炒五分

黃連

酒炒三分

防

風七分

荆芥七分

桔梗七分

前胡七分

蟬蛻七分

紫草一錢酒抄

生地七分

酒洗一錢

甘草三分

生薑二片

河水煎

健曰如無身熱頭

痛者則荆防牛蒡

煎

健曰如無身熱頭

痛者則荆防牛蒡

前胡不  
必用之。

### 催漿之劑

健按七八九朝灌漿之期順證則六七朝已灌足八九朝則蒼蠅而次第收疤矣此本原充足毒氣盡透無餘蘊也如氣血虛弱者必須投補扶助長漿若虛而毒伏難灌者當補本而兼攻毒庶漿得灌毒化爲膿乃無後患火盛者帶清涼以托之虛寒者必溫補以助之無使過期不足則變證隨至遂難救矣今集扶原催漿足漿之方於左可隨證選用

參多清補湯

朱氏

治夾疹之痘疹化應托之時微帶咳嗽而氣血

屬虛不得不補助以行漿者宜此加減

人參五分

麥冬一錢去心

花粉一錢

前胡五分

生黃芪一錢

牛蒡

桔梗七分子七分

炒研

炙甘草三分

白芍一錢酒炒

歸身一錢酒拌

紅花四分

桔梗七分

生地酒洗一錢

川貝母七分去心研

生薑一錢水煎

養胃開痰湯

朱氏

催漿時胃虛食少咳逆痰多者宜此

人參

五六分

白朮

土炒焦一錢

桔梗

七分

陳皮

五分

熟半夏

八分

炙甘草

三分

建蓮

炒七粒

淮山藥

炒七分

山楂

錢一錢

生薑

一片

水煎

渴者去半夏加麥冬

錢一錢

五味子

五粒

吐逆者加廣藿香

錢一錢

桔梗

七分

熟半夏

八分

分川連

酒炒三分

以黃土湯煎服

溫表調中湯

朱氏

表虛中寒痘不起發漿勢難上宜此

黃芪

蜜炙一錢

人參

一錢

茯苓

一錢

白朮

土炒焦一錢

官桂

三分

防風

五分

桔梗

三分

風分

川芎

五分

丁香

三分

歸身

酒拌一錢

乾薑

五分

熟附子

三分

防風

三分

炙甘草

三分

生薑

一片

水煎

參芪實表湯

朱氏

治氣虛色白作癟將致穿破洩氣

人參

五分

生黃芪

一錢

炙甘草

三分

官桂

三分

防風

五分

桔梗

三分

歸身

酒拌

一錢

僵蠶

炒研七分

木香

三分

桔梗

三分

生薑

一片

大棗

一枚

水煎

參歸大補湯

朱氏

痘不起長面目頸項腫如瓜瓠及頂平根淡氣

血兩虛之證非此則不起難成

人參五分

歸身一錢

黃芪蜜炙

桔梗六分

炙甘草三分

紫

草酒拌七分

南木香三分

川芎五分

生薑二片

急以此湯連進

二三劑以望腫消痘起始有生機

補中益氣湯

東垣

痘無火毒但氣血兩虛不能起長而漿難灌者

均以此爲主

人參五分

黃芪蜜炙一錢

白朮土炒焦八分

歸身酒拌八分

陳皮五分

炙甘草三分

柴胡三分

升麻三分

生薑二分

大棗三分

水煎

虛

渴加麥冬一錢

五味子七粒

寒熱似瘡加白芍酒炒七分

製半夏分

此

痘家保本扶漿之宗主量證加減而用

四君子湯

局痘以胃氣爲本若漿不起而食少便溏者須此助

胃行漿

八參錢

白朮土炒焦  
錢半

茯苓  
半錢

炙甘草  
五分

薑片  
二片

棗一枚

水煎

加陳皮半夏各六君子再加木香砂仁各香砂六君子

俱脾胃虛弱之要劑

四物湯

局方

養血涼血之劑痘如氣分實而血熱血虛者宜之

當歸

酒拌一  
二錢

川芎  
五六分

白芍藥  
酒炒一  
錢

生地  
酒洗一  
三錢

同

四君子用名入珍湯則氣血兼補加肉桂名十全大補湯虛寒而色灰白者必用

參芪湯

朱氏

痘漿清薄不能濃厚充滿血泡灰塌者用之爲主所

謂補氣則生血而毒自外達若用陰藥血愈消矣

人參一

黃芪蜜炙  
三錢

官桂  
五分

炙甘草  
五分

生薑  
二片

同煎

溫中益氣湯

朱氏

痘起殼薄色白根淡當與溫補助漿

人參

五分

白朮

土炒焦一錢

生黃芪

一二錢

歸身

酒拌一錢

茯苓

錢

南木香

三分

官桂

二三分

炙甘草

三分

生薑

二片

大棗

三枚

保元湯

秦氏

此扶漿之主劑量氣血虛實寒熱加減而用

人參

陳氏

黃芪 炙甘草 加薑煎

異攻散

陳氏

虛寒腹瀉灰陷無漿急須服此

木香

三分

歸身

酒拌土炒一錢

茯苓

錢半

肉桂

三分

人參

五七分

陳皮

五分

熟半夏

七八分

肉果

麪裹煨三分

丁香

三分

熟附子

三分

白朮

土炒焦一錢

生薑

三分

黑棗

三分

木香散

陳氏

行漿結痂之際腹脹泄瀉有內陷之虞用之

人參

五分

肉桂

三分

木香

三四分

大腹皮

水洗淨炒七八分

青

皮

炒三分四分

前胡

三五分

訶子

麴裹煨四五分

赤茯苓

錢一錢

丁香

三分

炙甘草分

薑棗同煎

錢氏異攻散 峩補脾胃痘無火毒惟食少便溏者宜之卽四君

子加陳皮薑棗煎

歸脾湯

濟生

行漿之時睡臥驚悸氣血兩虛而漿不充及婦女出

痘起長行漿時經水來多或崩漏不止宜此

人參 白朮 黃芪 棗仁 歸身 茯神 遠志 炙甘草

木香 龍眼肉 生薑 大棗水煎

中和湯

秦氏

痘起長行漿結痂時穢氣觸犯色黯不能起發并覺

腹滿少食服此卽愈

人參

三分

厚朴

炒五七分

桔梗

七分

當歸

酒拌六分

白芍

五分

紫蘇

黃芪

六分

防風

七分

白芷

四分

官桂

二分

沉香

二分

檀香

藿香

三分

乳香

燈心研二分

川芎

三分

甘草

二分

生薑

一水片水

煎

健按此方藥冗襍如挾虛帶火者應去桂朴芎芷沉檀乳香  
反動燥熱耳凡臭穢之氣必溫如用此方須去上諸藥而加

黃連三

分爲良

參苓白朮散

錢氏

起長行漿結痂時脾胃虛而飲食不消或吐或瀉以此主之

人參 茯苓 白朮

土炒焦

炙甘草

陳皮

山藥

炒白扁

豆炒 建蓮

去心炒

薏仁

廣藿香

桔梗

薑棗同煎

或去藿香入砂仁

加味建中湯朱 行漿之際咬牙寒戰此氣血虛而漿不起也用

此以攻漿

人參錢

黃芪

蜜炙三錢

乾薑

炮分

肉桂

五分

白朮

土炒蕉錢半

歸身酒拌一錢

川芎

五分

公丁香

五分

熟附子

五分

炙甘草

三分

生薑

一片水煎

理中湯仲景寒客中焦或腹痛而嘔臘沉無力或冒寒吐衄便泄

痘難起長上漿根淡頂白將有灰陷之虞

人参 白朮 炮薑 炙甘草 外加附子名附子理中湯爲

中氣虛寒主劑

千金內托散 氣血虛而頂塗根淡脾胃不實者及痘後癰毒攻發不出用此起之

人参 歸身酒拌 黃芪 川芎 官桂 木香 白芍 炙甘

草 生薑

龍眼肉

水煎入酒和服

健按方中有查肉防風白芷厚朴等散丸之藥

既云內托何以用爲朱氏論中每稱其妙與前溫補之劑相同若用此攻托須加酒拌紅花山甲全蝎木通起化兼行乃爲得法

參歸鹿茸湯氏輯

起長時殼空根淡癰塗破爛食少神倦氣血虛

寒無漿可行服此有起死回生之效

人參

二三錢

歸身酒拌三錢

鹿茸

酒炙或酥

黃芪

蜜炙五錢

炙

甘草

錢五六

生薑

龍眼肉

枚

水煎陳酒少許溫服

如困

頓手足冷食少加木香

三四分

公丁香

三四分

官桂

三四錢

白朮

土炒

一錢

錢如八九十朝間或寒戰咬牙再加官桂二錢熟附子三分大便泄瀉腹脹難成去當歸加重白朮白芍酒炒七分茯苓一錢木香

煨三

丁香

二三分

肉桂

二三分

肉果

麵裹煨五分

訶子

麵裹煨二分

倘瀉不

止另用參朮散兼七味豆蔻丸

參朮散

砒石

灌漿回水之時泄瀉脾虛不能充滿結痂

白朮

土炒

蕉一兩

人參

五錢

砂仁

去殼焙二錢

建蓮

去心炒五錢

白朮

芩

五錢

炙甘草

三錢

南木香

二錢

陳皮

三錢

查肉

炒五錢

肉果

炒五錢

麴裏煨紙包打去油四錢

訶子內

錢

神麵

炒蕉四錢

薏苡仁

炒五錢

共爲末

每二錢清米飲調服

兒不肯服入

稀粥與食

行漿回水或痘後脾虛泄瀉滑脫不禁

七味豆蔻丸

行漿回水

或痘後脾虛

泄瀉滑脫不禁

肉豆蔻  
油五錢  
煨去

訂子肉  
五錢  
麪裹煨去

白龍骨  
煅研細  
末五錢

煅五次  
細

木香

錢  
赤石脂  
研七錢  
煨五次  
細

砂仁  
五錢  
焙去衣

共爲末  
麪糊爲丸

如  
大每服二三十丸清米飲送下量兒大小與之有不能吞  
者研碎和入稀粥食之

當歸六黃湯

丹  
粉

婦女經後出痘或淋瀝不斷血虛挾熱色赤不起不能行漿者宜此加減

當歸 生地 熟地 黃芩 黃連 黃柏 或加黃芪人參  
阿膠紫草地榆  
炒黑血餘灰陳櫻灰補澀其元氣涼血清火以止  
之而血病愈痘自起而漿可灌

三黃熟艾湯

丹  
粉

婦女出痘經水應至不至腹痛血滯痘不起長

用此清其熱結則經通毒洩痘始起發隨卽氣血兼補以助灌

漿

黃芩

黃柏

黃連

熟艾

水煎冲陳酒少許服。

健按此方可加當歸紅花丹參以活其血則經自至書云經前爲實經後爲虛虛實之間於痘必有阻遏故用藥須審的確庶無過不及之弊

### 收脫之劑

健按十朝十一十二朝乃收鑿脫痂之期本原實者痂已脫光本原虛者預爲補托至此亦當回水結痂而漸脫矣若此際而漿未足不能蒼蠅結痂者非本虛失補卽寒涼太過無火鎔漿或毒火鬱伏消樂津液不能成漿須察虛實寒熱急攻使足始無壅遏之患如漿不足卽勉強收結痂脫不清終有後變故十二朝限期生長收藏如天地四時之司令不可失時也寧使預期取效毋致落後生波當結痂時如禾稻秋成必燥其田而可刈蕩痘有溼熱盛者膿水淋漓難結法當清熱利溼燥其中土則溼氣去而痂自結更宜養血以潤之則痂易脫不致黏滯乾枯而有難脫翻痂之累皆當詳悉也今特設收脫方法於左以

補前人之未備

蟬散從補  
秋令司成金蟬欲化之候取其善蛻以名方焉痘至結痂欲其快脫先天所蘊之毒既釀爲膿倘有未盡此時藉

茲藥力歸結於瘀從今脫去內外肅清始謂脫皮換骨也

蟬蛻

錢

生地

酒浸一兩

丹皮

酒洗六錢

當歸

酒拌六錢

黃芪

生用五錢

茯苓

錢

橘紅

錢

生甘草節

三錢

桔梗

四錢

金銀花

六錢

僵

蠶

炒二錢

連翹

四錢

川貝母

去心六錢

右如法製咬咀每三錢水

煎去滓服或爲細末燈心湯調下一錢量大小服之難收者易

收難脫者易脫有餘不盡之毒氣俱去矣若溼氣勝而大便

不實足腫者去生地用白朮

土炒焦六錢爲君

火毒尙盛者加川連

錢

腎熱小便混赤者加黃柏

鹽水炒一二三錢

知母

鹽水炒二三錢

肺熱

帶咳兼疹後者加黃芩

酒炒三錢花粉三四錢

午後潮熱者加入參

分石膏

錢三四錢煎湯調服

骨節間熱及骨蒸或五心煩熱者

地骨皮

錢四錢

麥冬去心四錢

北沙參五錢

燈心湯調服

此皆素所經驗者也

歸芪湯

朱氏

漿足身涼而汗不止者用此

歸身

酒拌  
三錢

生黃芪

二錢

棗仁

炒研  
三錢

水煎

大安神丸

易氏

灌漿時血虛不睡者用之。

生地

酒浸  
一兩

歸身

酒拌  
八錢

生甘草

二錢

川連

酒拌  
二錢

共爲細末，煑

餅爲丸如黍米大

辰砂爲衣每服十五丸

健按此方內可加棗

人參一二三錢橘

紅二錢燈心湯服

炒研五錢白茯神

安神丸

痘有毒盛漿不能結痂者

辰砂

二錢研極細

冰片

一錢研極細

牛黃

一分研末雄豬心血研和爲丸

豬尾膏 痘有過服寒熱表藥以致痘爛無漿不痂者用雄豬尾

熱血入冰片少許同研爲膏，麥冬湯化服。

百祥丸

錢氏

漿空不灌將變黑陷歸腎二便閉者用此。

大戟

去骨鹽水炒一兩

青州棗

三十枚去核

用水一盞煮水乾爲度去

大戟將棗焙乾作劑以利爲度。

仲陽原方無棗以大戟爲末

水泛爲丸用赤芝麻湯下

棗係後人加之

人身散 黑陷將歸腎用此起之

人身

煅爲末

每箇作一服酒調入獐豬尾血三五滴加麝香少許

獐豬卽雄豬

桑蟲散 治灰白黑陷難起無漿者

真桑蟲

不拘條數  
焙乾爲末

每服五分虛寒者酒下實熱者筍尖湯酒調

又法將大桑蟲揉熟銀鍼剔破取其汁冲陳年酒漿少許

溫服

斂肌散 漏漿破爛不能收斂者用之

地骨皮

黃連酒  
焙

黃柏酒  
炒

五倍子

生甘草等分爲細末

糝之

敗草散

治同上

陳年草屋茅瓦上炙存性研細末繆之。

五福化毒丹錢氏 痘瘍餘毒上攻口齒煩躁咽乾口舌生瘡及治  
毒蘊熱積驚惕狂躁

生地 熟地各五兩 元參 天門冬 麥門冬去心各三兩 炙甘

草 甜硝各二兩研 青黛半兩 右八味共爲細末煉蜜爲丸如雞

豆大每一丸食後水化服兒小者半丸

救生散董氏 痘瘍膿泡惡候危困陷下黑色

猪豬血臘月取納新瓦罐挂東壁山上陰乾取末一兩 馬牙硝一兩研 破砂研 辰

砂水 飛牛黃研 龍腦研 腻香研各一錢同研和每二歲兒取末

一錢新汲水調下大便下惡物痘泡轉色爲度不可過服神驗

無比

玳瑁散董氏

痘瘍熟毒內攻紫黑色血泡無漿及出不快生玳瑁

水磨濃汁一合，犧豬心血一皂核大同研以紫草茸濃煎調服。

牛黃散

董氏

痘瘡陽毒入胃便血日夜無度腹痛啼哭。

川鬱金

研末一兩

西黃

研一錢

和勻每二歲兒服

五分

以水半盞煎

至三分和滓溫服大小以此增減日二服

若便血黑糞毒併

大腸

丹用犀角地黃湯或小柴胡加地黃

### 瘥後之劑

健按痘順者如期而發如期而起如期而漿如期而收脫其本原虛或毒火盛者醫治得法亦可如期而瘥至十二朝期滿後若未全愈及有變幻者爲瘥後之證因從前治之不當太過不及所致也今集瘥後方劑於左以備辨證採用。

當歸散

秦氏

痘後一切壅腫將發癰毒服之使消。

當歸

酒拌錢半

赤芍

一錢

大黃

酒浸一錢

甘草

六分

牛蒡子

炒研二錢

連翹

錢半

荆芥

一錢水煎

健曰

方中可加酒炒穿山甲一錢

清表敗毒散

朱氏

痘後肌肉紅腫而熱欲發毒者

地骨皮

錢半

麥冬

錢半

花粉

錢半

牛蒡子

炒研二錢

連翹

錢半

當

歸

酒拌一錢

豬苓

錢一

澤瀉

錢一

黃芩

酒炒一錢

生甘草

分五水煎

柴胡

方中可加穿山甲

酒炒研一錢

土貝母

去心研一錢

金銀花

錢二

消毒散血湯

治同上

牛蒡子

炒研二錢

生白芍

酒洗七分研三

桃仁

去皮尖炒一錢

大黃

酒炒一錢

乳香

五分燈心同研

沒藥

研三分

紅花

酒拌五分水煎

五皮飲

治痘後脾虛溼滯遍體浮腫

桑白皮

蜜水炒

地骨皮

大腹皮

水洗三次

茯苓皮

生薑皮

分等分

加燈心急流水煎

大連翹飲

朱氏痘後餘毒壅盛流於肌肉骨節紅腫火熱尙未成

癰或已成膿出之不止大便祕結者

連翹一錢

半荳子炒研

一錢

梔子酒炒

五分

柴胡八分

當歸酒拌

入分

赤芍七分

分

防風七分

分

木通八分

分

荆芥分

七分

黃芩酒炒

八分

滑石五分

蟬退十三隻

分

車前子八分

分

炒研

四分

甘草節四分

分

大便秘加酒炒大黃

錢一微利之

大通丸健增

痘漿不足餘毒內畱本原虛而轉化不及以致壅腫發癰治須助其氣血以攻之必使外出無論肌肉骨節已成未成製此丸以消散之皆王道之藥毋慮其猛利而釀毒勢致成癰疾醫家病家兩自悞矣

大黃酒浸

二錢

木通錢半

黃芪蜜炙二錢

當歸酒拌三錢

紅花酒拌一錢

乳香研七分

烘去油分

全蝎酒洗炙脆去尾

鈎研十箇

穿山甲酒炙脆

錢半

蟬退錢一錢

僵蠶炒研

大戟鹽水炒

錢半

生甘

僵蠶錢半

分

大戟鹽水炒

錢半

山慈姑炒二錢

分

川貝母去心一錢

廣橘梗錢一錢

分

紫草酒拌二錢

分

生甘

皮錢一川連酒拌一錢

分

黃芩酒炒一錢

分

桔梗酒拌二錢

分

生甘

分

生甘

分

生甘

分

草節錢一

柴胡錢一

升麻錢一

蘇葉錢一

川芎分

硼砂研一  
錢半

雄黃五分

麝香三分

地龍鹽酒洗去泥瓦上炙脆一錢

煎湯化服亦可消可起其效

烘去油研七分

如神

法製爲細末煉蜜爲丸如黃豆大每服一丸兒大者二丸水酒各半化服未成者兩三服卽退已成者亦易收功若本虛而陰毒不紅不高者用人參二分桂枝三分煎湯化服亦可消可起其效

如神

三豆漿朱氏

敷痘毒聖藥

黑豆 菜豆 赤小豆各一合水浸開入陳年醋研濃漿時以鴉翎拂腫處退甚速

絲繭散朱氏

治餘毒流注各處出清水者

出蛾蠶繭不拘多少用明礬末填入繭內瓦上煅令汁盡灰爲末乾收患處妙

痘爛生蛆 用嫩柳葉鋪席上臥之蛆盡出

奪命五毒丹 治痘黑陷倒斃乾枯不起者

牛黃二分 雄黃三分 冰片二分 珠砂錢 蟾酥少許 右五味

研細末用獐豬尾血和丸如麻子大每服一丸薄荷湯下立刻紅活神效

移痘毒法秦氏 痘毒生於傷命之處宜速移之凡痘後頭頂有毒

初起一綫紅青氣直貫於鼻有膿則不可移不可治矣若初起則可移於兩旁不致傷命用大蝦墓一隻珠砂一錢雄黃二錢爲細

末入於蝦墓腹內紮住足再用牛糞新下地者取近地連泥一層同搗和包蝦墓微火焙乾以大火煅令煙少爲度取出爲末再加文蛤三錢好醋調敷圍處留一去路引至不致命處敷

處其毒自然收斂漸消如痛甚加朴硝乳香沒藥如意消不盡或

成膿用鐵砂五分入藥中敷移一邊手捏活慈石暗引其毒漸

漸過來將藥移進毒處毒過爲止仍服解毒藥漸可收功。

利咽解毒湯朱氏

痘後毒火未清上衝於咽或痛或失音或喉痺

乳蛾不論前後發作俱可服之。

牛蒡子炒研一錢

元參錢一錢

桔梗錢一錢

生甘草五分

山豆根五分

防風七分

水煎健按此方應去防風加薄荷射干木通各五分如舌乾而渴加石膏三四錢花粉一錢金銀花一錢

尤良

玉鎖匙朱氏

治同上

硼砂錢一錢

牙硝五分

僵蠶三大條炒

片腦一分共研細末以管吹之

咽喉通用健按此方可加薄荷二分花青一分雄黃一分川連

二分燈草灰一分牛黃珍珠各一分俱研極細入磁

瓶勿洩氣咽喉腐爛

牙疳俱可吹之奇效

清毒保目湯朱氏

痘後毒火攻目赤痛腫閉壅塞不開將生翳膜

必致壞眼急服此解散其毒。

柴胡一錢連翹分

桃仁三分炒

黃芩酒炒五分

荆芥穗分七分

防

風分七

赤芍分七

牛蒡子七分炒研

蟬退十二隻去頭足加有閏月加一隻

當

歸酒拌六分

甘草分二

川芎分五

升麻分五

薄荷分五

桔梗分八

燈心寸五十

水煎服

清毒撥翳湯

痘毒攻目已生翳膜服此漸退

生地

酒浸錢半

當歸酒洗一錢

川芎分七

防風分七

羌活分五

薄荷

桔梗分七

花粉分七

柴胡分七

半芍子七分炒研

草決明分七

炒研

甘菊分七

蜜蒙花分七

蒺藜子七分研

穀精草分七

炒研

木賊草分五

乾葛分七

梔子分研酒炒五

黃連酒炒三分

生薑片水煎

食後服

錢接此方品物太多酌用可也

生犀散

錢

痘後自淡紅多膿心虛肺熱宜此

犀角尖錢

地骨皮

柴胡

乾葛

各一錢

炙甘草

五分水煎服方中可加生地二錢

牛肝散錢

氏

治痘瘡入眼成翳

蟬退

研末

水煎羊肝湯調服一二錢青羊者佳

蟬退散

氏

治痘瘡入眼生翳半年以內者服一月取效

蟬退

去土研末

豬懸蹄甲

二兩罐子內鹽泥封固燒存性研末

羚羊角

細末十分之一

和勻每服

一匙百日外兒

五分二歲以上一錢

溫水或新汲水調

下日三四夜一二

食後服一年以外不退者難治

地黃散

錢

痘後心肝壅熱目赤腫痛赤脈或白膜遮睛

生地

熟地

當歸

俱酒洗各三錢

黃連

酒拌一錢

水通

錢

元參

錢半

炙甘草

五分

防風

七分

羌活

七分

犀角

錢一錢

蟬退

去土

木賊草

半錢

穀精草

一錢

白蒺藜

炒去刺半錢

沙苑蒺藜

炒研錢半

大黃去皮酒培一錢

右爲細末每服一錢或半錢量兒大小加減煎

羊肝湯食後調下日三夜一忌日將息漸次愈

肝散錢氏痘瘡毒盛令不入眼

犀角

鎊懷中窩燥研細末一錢

龍膽草

酒炒五分

黃芪

生錢一錢

大黃

酒拌五分

桑白皮

蜜水炒一錢

鉤簾勾

錢

麻節

分

括囊根

去皮一錢

炙甘

草五分

右爲粗末每二錢水一盞煎半盞食後時時溫服

又方錢氏治痘瘡入眼

馬勃

五錢

皂角子

十四箇

蛇蛻

五錢同入小罐子內鹽泥固濟燒

存性研細溫酒調下一錢幼者五分食後服

又方錢氏痘毒攻目成翳

括囊根

五錢

蛇蛻

二錢同爲細末用羊肝一箇批開入藥末二

錢麻絲纏定米泔煮熟頻與食之未能食者與乳母食之

蟬殼散丹

痘後冒風眼腫翳膜餘毒上攻俱可服

蟬殼去土

地骨皮水洗

牡丹皮酒洗

黃連酒拌

白朮土炒

甘

菊花去蒂

蒼朮炒各一兩

龍膽草酒炒五錢

甜瓜子炒半盞

共爲末每

一錢半荆芥湯下食後臨臥各一服忌油麵煎炒醬醋

羚虎丸丹

痘後肝腎兩虛視物不精

羚羊角銑細研

虎脰骨酥炙

生地酒浸

棗仁炒各五錢

肉桂去粗皮鹽

水拌

防風當歸酒拌

黃芪蜜炙各五分

其爲末蜜丸如皂子大每

一丸溫水化下

秦皮散丹

痘後風痛腫毒癢澀眵目昏暗羞明

秦皮

滑石

黃連

酒拌等分

水煎乘熱洗之

又方受風流淚者

用田中豆莢搗汁滴入眼中 又方腫閉不開用黃連爲末雞子清調塗兩太陽穴及兩足心

寒耳丹古方

痘後已成膜翳者。

水銀一錢

黃丹五錢

搗勻作六丸入砂鍋內圓瓦蓋定溼紙封固

以香爐盛炭火燒一日取出以薄綿裹之自左有翳塞左耳在

右塞右耳立見逐去一方用輕粉黃丹等分爲末以管吹耳左目

翳吹右耳右目翳吹左耳卽退。

避穢丹丹藥

治汚穢觸痘防變之方。

蒼朮 細辛 甘松 川芎 乳香 降香等分爲末焚之散

穢或芫荽湯噴帳幃或燒芫荽子熏帳幃

再甦丹丹藥

治穢毒入內黑陷者

白礬

地龍鹽酒洗瓦上炙等分研末

每五分用小雄豬尾血一二匙調

新汲水服良

清熱導滯湯朱氏

治痘後痢疾有毒氣積滯者宜之。

當歸

酒拌七分

白芍

生五分

陳皮

七分

連翹

三分

黃芩

酒炒三分

黃

連

酒炒三分

牛蒡子

炒研三分

查肉

炒焦一錢

麥芽

炒焦一錢

楂榔

三分

木香

磨冲二分

甘草

二分

方中可加熟大黃

五分

生薑

二分

如紅

痢加紫草

酒拌七分

若純白色去芩連

養胃和中湯

朱氏

痘後脾虛不運而痢或痢久而虛

白朮

土炒一錢

人參

三分

茯苓

八分

陳皮

五分

砂仁

焙研三分

木香

二分

查肉

炒焦八分

麥芽

炒焦一錢

炙甘草

二分

腹痛者加白芍

酒炒七分

黃芩

酒炒五分

白痢虛寒加桂枝

二三分

煨薑

二三分水煎

水煎

加味四芩散

朱氏

痘後及行漿收斂之際毒氣內伏作癰

豬苓

七分

澤瀉

七分

赤茯苓

一錢

蒼朮

炒三分

黃連

酒炒三分

車

前子

炒研七分

加陳倉米黃土湯煎

加減二拗湯

健增

痘後癰不易脫餘毒挾風迫肺喘急或行漿不

及肺虛痰上而喘宜此加減

麻黃

三分蜜水炒黑用

杏仁

去皮尖研七粒

甜葶苈

隔紙焙研三分

石膏

研三錢

虛喘去麻黃加人參

二三分

卽人參定喘湯

水痘麻疹宣發清化之劑

健按水痘麻疹皆時行傳染多肺家之候必兼咳嗽喘息須發得透化得清始無後患大法以風熱暑溼爲治藥貴輕清不事辛溫香燥忌發散風藥益風藥勝反動其火耳

宣毒發表湯

朱氏

麻痘初發熱欲出未出時通用加減

升麻

五分

葛根

七分

薄荷

五分

前胡

五分

牛蒡子

炒研七分

蟬退

五分

木通

四分

桔梗

五分

甘草

二分

橘紅

五分

稜柳

一錢

如熟

盛身中紅點密而難發者

加石膏

二分

錢所謂得涼而外洩因其

能解肌發汗爲發斑發疹之聖藥

手太陰足陽明之要劑

一分

頭痛鼻塞壯熱風盛者加防風荆芥

各五分

天寒腠理秘密加

頭痛鼻塞壯熱風盛者加防風荆芥

各五分

天寒腠理秘密加

麻黃二三

大熟挾暑溼，見白疹者加黃芩

五分滑石八分鮮藿香

葉通加杏仁去尖皮七粒研

化毒清表湯朱氏 麻疹已出紅腫太甚用此解化

前胡五分

乾葛七分

杏仁去尖皮研七粒

元參七分

橘紅五分

桔梗

僵蠶七分

木通四分

蟬脫四分

牛蒡子七分炒研

石膏三錢研二

連翹五分

花粉七分

薄荷三分

象貝去心研七分

若帶喉痛加

僵蠶七分

射干五分

山豆根四分

若有鼻衄牙宣疹色赤者加紫草一錢

酒拌

黃芩酒炒

五分

俱加檉柳一錢

小麥湯丹 水痘灌漿破爛服之卽脫

滑石八分

甘草三分

地骨皮六分

人參二三分

麻黃二三分

知

母酒炒

羌活三分

草薢三分

焙研

小麥七分

水煎

清胃敗毒湯朱氏

水痘後口瘡牙疳等證用此加減

僵蠶七分

丹皮

酒炒七分

生地

酒洗錢半

桑白皮

蜜水炒一錢

銀花

錢一

黃柏

酒炒七分

連翹

七分

甘草

三分

加燈心

健曰此方可加青黛三分

石膏

尤良

氏

救苦散

朱

口瘡牙疳搽藥

人中白

研五錢

寒水石

水飛三錢

青黛

五分

僵蠶

炒研錢半

黃柏

錢半

冰片

五分

西黃

二分共研極細用

繖瘡處

健口方中可加橄欖灰三分

燈草灰

錢半

硼砂五分

珍珠

黃連五分妙

二聖散

朱氏

出疹咽喉腫痛不拘初起回時皆可吹之

苦參

研三錢

僵蠶

炒研

二錢其爲細末

吹之卽消

解毒化痰清火丸

朱氏

疹後咳嗽氣喘唇焦結熱在內煩躁不安

或口鼻出血不拘前後宜之腮後發毒俱

可用犀角

銛研末

歸尾

酒拌八錢

牛蒡子

沙蟍去油五錢

牡丹皮

酒拌一兩

薄荷葉

一兩

杏

芍六錢

川貝母去心一兩

生地酒浸打爛入藥

酒浸打爛入藥

花粉一兩

紫草

尖酒拌

甘草稍六錢

川連酒拌

三錢

黃芩酒炒

六錢

共爲細末、煉蜜爲丸。如彈子大。每一丸。淡竹葉或燈心湯化服。

健脾肥兒丸朱氏

疹後失調體瘦氣弱。或又泄瀉。將成疳疾。足腫

庵羸宜之。

人參五錢

黃芪蜜炙一兩

白朮土炒焦一兩

歸身酒拌八錢

白芍酒炒六錢

川連酒炒三錢

胡炙甘草

茯苓一兩

陳皮五錢

杏肉炒焦二兩

麥芽炒焦二兩

川連酒炒三錢

地骨皮六錢

胡炙甘草

黃連三錢

山藥炒兩

牡丹皮酒拌六錢

川連酒炒三錢

地骨皮六錢

地骨皮六錢

炙甘草

黃連三錢

其爲末。煉蜜爲丸。如彈子大。每服一丸。老米湯化服。

荆防發表湯朱氏

初發熱未見外證。或連熱三四日始現疹點。不

甚煩躁。或色赤疹癰疼。風熱客於肺脾所致。

荆芥分五分

防風分五分

前胡分五分

乾葛分八分

薄荷分五分

橘紅分五分

桔梗

杏仁

去尖研七分

枳殼

炒三分

當歸

酒拌五分

紅花

酒小分

清寧湯

增健

疹後餘熱未清咳嗽多痰作渴

橘紅

五分

桔梗

七分

生甘草

三分

花粉

七分

元參

七分

石膏

三分

象貝母

去心研一錢

木通

四分

枯芩

酒炒五分

知母

酒炒五分

加燈

心水煎

還元湯

增健

疹後不忌葷腥不避風寒疹化不清餘毒在繼至涼暮熱咳嗽少食溺赤便燥釀成瘦怯俗名痧癆生地酒洗一錢

柴胡

七分

地骨皮

七分

牡丹皮

酒拌七分

橘紅

五分

麥冬

去心七分

象貝母

去心研一錢

黃芩

酒炒五分

黃柏

鹽水炒三分

知母

鹽水炒五分

秦艽

酒拌七分

澤瀉

五分

加燈心

若五心煩熱加胡黃

三分

酒拌三分

酒拌三分

酒拌三分

睡中盜汗加炒浮麥撮 牡蠣一錢 煎研

無嗽而多盪熱者加人參

三 分北沙參一錢 归身酒拌白芍酒炒  
七 分歸身酒炒 鱷甲酒炙

快然膏健增 痘後不禁變成瘍瘍騷癢皮膚如銹甚至終身不愈  
此藥搽之漸自脫化殊覺快然因是名方

牛蒡子錢五 大風子錢五 蛇牀子錢三

大黃錢一 黃芩錢一

黃芩錢一 黃連錢一

元

柏錢一

紫草錢三

當歸錢三

紅花錢一

赤芍錢一

黃連錢一

杏

參錢二

苦參錢二

僵蠶錢三

蟬退錢二

蛇蛻錢一

桃仁錢一

杏

仁錢二

防風錢二

荆芥錢二

蒼朮錢一

白蒺藜錢三

木通錢一

俱

用塊藥以麻油四

兩銅杓內將藥逐件熬至枯燎去火候

燒青研

入黃蠅錢八

離火溫水研膏

黃明礬枯礬末各

七分

入黃蠅錢八

離火溫水研膏

黃明礬枯礬末各

七分

末一錢雄黃五分

另取冰片一錢

黃明礬枯礬末各

七分

冰片一錢

木通一錢

俱

冰漸退搽杏仁油

止癰發物薑蛋半個

冰片一錢

黃明礬枯礬末各

七分

冰片一錢

俱

冰漸退搽杏仁油

止癰發物薑蛋半個

冰片一錢

黃明礬枯礬末各

七分

冰片一錢

俱