

三消

三錫曰津液三焦枯涸火邪獨盛水弱不能灌溉隨臟腑之虛而變多生于厚味酒色之徒藜藿山林庸或有之方書云能食者必傳發背脢疽卽膏梁之變飲食之毒聚于腸胃消耗善饑久久毒發殆莫能救可見皆真水消耗之所致人之津液氣血精髓自有限量醇酒炙煢情慾無涯寧不消耗積耗成枯死期迫矣譬之燬鐵家以壹盂水早晚淬鐵水豈能久縱口恣慾有

甚淬鍼、重生者、試思之、

凡平人不時口乾作渴、久之必變疽毒、須預服八味丸、慎口節、慾可勉此患乃屢驗者、其說詳具外科心法、三消已愈、防發癰疽、須兼服忍冬丸、黃芪六一湯。

渴家心煩悵忡不眠、補心丹佳、乃勞神所致、上消者、肺也、多飲水而少食、小便如常、

下消者、腎也、小便數淋、如膏之狀、

中消者、胃也、善食而瘦、小便赤黃、

丹溪曰養氣降火生血爲主

王錫曰渴家悞作火治涼藥亂投促人生命必  
多服生脉散爲佳

又曰三消均屬血虛不能生津液俱宜四物湯  
爲主治上消者加人參五味二冬花粉煎成加  
生藕汁生地人乳飲酒人加生葛汁

中消者本方加知母石膏滑石寒水石以降胃  
火壹貳服而止

下消者本方加黃柏知母五味子之類以滋腎

陰又當間飲繅絲湯爲上、心移熱于肺則爲膈  
消卽上消也、肺爲火鬱、津液不通則渴、宜辛以  
潤之

古方用蜜煎生薑湯、冷定時時呷之、辛散其緩  
津液流通、火得下降、其渴乃除

一法用麥冬治肺中伏火止渴爲君、天花粉知  
母鴻熱爲臣、甘草五味子、生地葛根、人參生津  
益氣爲佐、然心火炎上于肺者、必由心有事焉  
不得其正、以致虛火上攻、用焚神安心定智、分

葉清火麥冬以安其宅則火有歸息矣

胃中熱則消穀善饑卽中消也當用甘辛降火  
瀉古方用黃連末生地白蘿各取自然汁牛乳  
各壹升熬成膏和黃連末丸桐子大每服參伍  
拾丸白湯下日參猪肚丸亦可

腎陰血虛足膝痿弱小便數而稠濁如膏名腎  
消卽下消也古方用六味地黃丸猶當斟酌加  
減如下集元陽虛損無陽則陰無以生津液不  
足者又當兼補相火古方八味腎氣丸最妙譬

之金中有水下以火暖之暖氣上騰則覆蓋潤  
若無火力則水不能上升蓋終不潤又如地氣  
不得上升則不能爲雲爲雨理可見矣妙在桂  
附

仲景曰消腎飲一洩二者从八味地黃丸救之  
或作湯服又法腎氣丸去附加五味兩半

三消俱宜戒厚味酒麴房勞不禁忌雖藥無功  
小便不利而渴是內濕不能宣達也當利之如

胃苓湯是也  
熟作瀉頑渴用

小便自利而渴是內燥無陰以化也當潤之  
脾胃虛弱食少不能生津液而渴者當理脾補  
中益氣加貳門伍味能食而渴者白虎加人  
參湯不能食而渴者錢氏白朮散倍葛根  
乃潔古法也

火盛大抵治湏分新久虛實如膏梁之家醉飽  
濃鮮脉滑實口乾作渴是痰火盛也宜滚痰  
丸先蕩滌之勢盛調胃承氣湯當從實火治  
脈實而堅大者从細而浮短者从俱無胃

氣也

陰虛如勞碌失意軀體薄弱之人有此悉屬陰虛養血滋水爲主

脈洪大無力形氣不足而渴悉屬陰虛

天花粉渴家聖藥亦是潤劑大便燥者宜之若脾弱作瀉者恐非所宜

渴家禁半夏及不可發汗

素病渴雖有外邪當汗當下者當從輕治以津液之原竭也

氣血兩虛、身倦色白而渴、兩手俱無力、右寸或虛大、瓊玉膏撮捷大病後、以津液而渴者、補養爲主、生脉散加知母、花粉、甘草、茯神、竹葉或加葛根、以開發胃氣、上消脉虛者、亦妙、卽河間麥門冬飲子。

癰疽潰後渴、悉屬虛黃芪、陸壹湯時時代茶佳、或加生脉散、黃芪、陸兩、甘草、壹兩。

脈虛數口乾燥兼火症者、降火藥中兼生津液便祕兼潤劑、如東垣生津甘露飲用石膏

芩連梔柏升柴、又有人參麥門當歸知母加  
減在人不必拘泥也。

勞役饑飽失時、中氣受虧、虛火炎上、口燥舌  
乾、有似于渴、悞用涼劑漸危、宜補中益氣湯、  
戴氏曰、無病而渴、與病後瘡疽產後同、悉屬氣  
虛津少、四君子及參芩白朮散、縮脾湯加葛根  
開提清氣引津上潮或七珍散、如少食而瘦、八  
味丸兼黃芪湯、果積水在腹、小便不利而渴者、  
明知是水阻、真水不潮者、乃可用春澤湯、卽五

苓加入參也

戴院使曰、三消不宜用燥劑峻補之、惟當滋養  
除消脾外、心腎二消用黃芪六一湯或參湯吞  
入味丸、或玄菟丹、小菟絲丸、又用竹龍散、六神  
飲皆可用、惟脾消加當歸去黃芪、三消小便既  
多大便多秘、宜常服四物湯以潤大腸、加入參  
木瓜更妙、仍煮四皓粥及糯米折二泮飲之、口  
燥烟乾不可謬指爲火、

診心脉微小爲消痺、滑甚爲善渴、肺肝脾腎

微小皆爲消渴。心脉更而散者，當消渴自己。  
脉實大病久可治，懸小堅病久不可治。數大  
者生，細小者死。消渴多洪數無力，洪數者虛  
火盛也，無力者氣血不足也。

渴欲飲水不止，仲景以文蛤一味，搘爲散，沸湯  
和服方寸匕，經驗方用大牡蠣于臘月，或年日  
黃泥裹煅通赤，放冷，取出爲末，鯽魚湯下七、石  
蓋二藥性收澀回津故也。綱目以爲鹹軟者非  
三因方用糯米旋炒作爆，桑根白皮厚者切片

每一兩水一碗煮半碗渴即飲之夫水火之氣  
上蒸于肺而化爲津以溉一身此金能生水之  
意二藥固肺藥也而又淡滲故助之保命集密  
煎生薑湯大器貯時時呷之法曰心肺之病不  
厭頻而少又曰辛以潤之開腠理致津液肺氣  
下流故火降而燥衰矣有食葷苗而渴愈者亦  
辛潤之義

消腎爲病比諸爲重古方謂之強中又謂之內  
消多因恣意色慾或餌金石腎氣既衰石氣獨

在精水無所養故常發虛陽不交精出小便無  
度唇口乾焦黃芪飲吞玄兎丹八味丸鹿茸丸  
加減腎氣丸小兎絲子丸靈砂丹皆可選用未  
效黃芪飲加蕤蓉五味山茱萸各肆分霽庵湯  
蕤蓉丸

猪肚丸

黃連

五兩

麥門冬

知母

枯萎根

各一兩

右爲細末入雄猪肚內縫煮極爛于臼中搗  
爛或加煉蜜丸桐子大每服壹百丸食後水

飲下清心止渴妙一方有梁米濟生方加入  
參熟地

藏器方石燕和水牛鼻煮汁飲治消渴  
噙化丹生津止渴遠行不可少

金百藥煎 烏梅肉 紫蘇葉 人參

至麥門冬 茱草

共爲末、煉蜜丸、彈子大噙化壹丸

百藥煎治口乾大獲奇驗

古方冬瓜飲 治中消善食而飲水多小便脂

麸片、日夜無度用冬瓜壹枚、黃連拾兩爲細  
末將冬瓜破開去穰摻連末在內仍縛緊于  
炭灰中煨熟去皮切碎爛研取汁每服壹盞  
至貳盞日參夜壹按冬瓜性急而走久病與  
陰虛者忌之此方惟用之實火與酒渴妙用  
螺浸水飲治渴亦是解熱利小便有餘火症  
胎前渴屬火宜清火潤燥養血

產後渴悉屬虛八物加麥門知母花粉  
諸失血及產後渴名血渴宜補血

卷之三

忍冬草壹味不拘數花莖葉全用入瓶罐

內用無灰酒浸以糠火煨壹宿取出晒乾  
入甘草少許碾爲細末以所浸酒打麵糊  
丸桐子大每服壹百丸不拘時米飲白湯

下

無病忽大渴少頃又定飲蜜湯佳及縮脾湯或  
折二淮涼飲數口酒渴乾葛湯調五苓散佳  
又果木渴多食菓子所致藥中宜加麝少許

五豆飲能解酒渴及諸消小兒痘疹不出並解

黑豆

黃豆

菉豆

青豆

赤小豆

各五升

乾葛

壹斤

甘草

壹斤

貫衆

半斤

右壹處用水伍升臘八日用大鍋熬至熟濾去楂將汁入磁罐中箬葉封固春夏遇渴症取飲之隨意小兒痘疹不出俱效

錢氏白朮散 治消中清穀善饑

人參

白朮

白茯苓

甘草

炙火

藿香葉

半兩

枳殼

炒

乾葛

貳兩

從容

酒浸

磁石

碎熟地

山茱萸

酒浸

桂心

酒浸

山藥

炒去毛

牛膝

酒浸

茯苓

鹽酒浸

澤瀉

鹿茸

醋炙去毛切

遠志

去心炒

石斛

心炒

草薢

覆盆子

五味子

破故紙

炒

巴戟

酒浸

龍骨

兔絲子

酒浸

杜仲

去皮剉薑汁製

巴戟

酒浸

附子

壹個炮去皮

烏藥

陸錢者

飲送下

右爲末蜜丸如桐子大每服伍拾丸空心米

玄菟丹 治三消渴利神藥常服禁遺精止白

濁延年

兔絲子

酒浸通軟乘濕研  
焙乾別取末拾兩

白茯苓

五味子

酒浸別爲末  
秤柒兩

乾蓮肉

各叁兩

右爲末、別碾乾山藥末、陸兩將所浸酒餘者、  
添酒煮糊搜和得所、搗數千杵、丸如桐子大、  
每服伍拾丸、空心食前米飲下。

補心丹

見虛損門

生脉散

見暑門

補中益氣湯

見內傷門

六味地黃丸

見虛損門

八味丸

見虛損門

鹿茸丸

見虛損門

加減腎氣丸卽六味丸加北五味子  
歸身

小兒絲子丸

見便濁門  
六味丸加北五味子

白虎加人參湯

見傷寒門  
歸身

靈砂丹

見嘔門

滾痰丸

見痰厥門

黃芪飲

卽黃芪六一湯  
見汗門

調胃承氣湯

見傷寒門  
歸身

瓊玉膏

見燥門

四君子湯

見虛損門  
歸身

參苓白朮散

見內傷門  
歸身

宿罪易

見暑門  
歸身

七珍散

見虛損門  
歸身

五苓湯

見瀉門  
歸身

四皓粥

見泄瀉門  
歸身

六神飲

竹籠散

治消渴

五靈脂

另研

生黑豆

去皮各等分

右爲末每服二錢不拘時冬瓜煎湯調服冬瓜子皆可一日兩服少渴者只一服渴止後宜八味丸仍以五味子代附子此方沈存中載於靈苑方得効者甚多

黃疸

五疸均屬濕熱傷脾所致宜分虛實

大法宜利小便除濕熱

脈浮腹中和宜汗脈浮心中熱腹滿欲吐者宜

吐 脉沉心中懊懨或熱痛腹滿小便不利而

赤自汗出宜下 脉不浮不沉微弦腹痛而嘔

宜和解 脉沉細無力自汗泄利小便清白爲

虛身目黃大便自利宜補 饑飽勞役內傷中

州非外感宜補

痛飲人二便不利、目先睛黃久變爲疸、初起脉有力能食、不大便者、茵陳大黃湯微利之、次用茵陳五苓散以滲熱解熱、稍久宜固脾胃、本方倍白朮氣虛脈緩弱體倦加人參

酒疸小便赤澀、用田螺洗淨浸水煎湯或用煮螺蛳湯亦可

酒疸心中懊憹、或熱痛、梔子大黃湯主之

多鬱悶人、身痛脉沉伏不因于酒、身目俱黃、胸膈不快是穀疸、乃穀氣因鬱不能四達、遏久脾

傷色見于外也、宜舒鬱利膈、兼消導運脾、二陳  
二术、香附、撫芎、梔子、茵陳、枳實、麥芽增減、

久病痿黃、倦怠不食、脉緩無力、屬脾虛、非疽也、  
大補脾氣、從內傷治、黃不退、加秦艽、薏苡

乾黃燥也、小便自利、四肢不沉重、渴而引飲、梔  
子、檗皮湯、

濕黃脾也、小便不利、四肢沉重、似渴不欲飲者、

大菌陳湯、

黃如橘而明者、熱多、脉必數、解熱爲主、

黃如薰黃而暗濕多脉必沉緩滲濕爲主

丹溪曰不必分五同是濕熱如會麴相似輕者小溫中丸重者大溫中丸熟多加薑連濕多加菌陳、五苓散加食積藥

戴氏曰食積發黃量其虛實而下之其餘但利小便小便清利則黃自退

或曰黃疸宜用倒倉法又曰黃疸倦怠脾胃不和食少胃苓湯加減小便赤澀加滑石

小便赤澀爲濕熱盛清熱滲濕若小便清白是

虛症

一方治黃疸

芩連

梔子

茵陳

猪苓

澤鴻

蒼朮

青皮

龍膽

各五分

穀疸加三稜

莪术

宿砂

陳皮

神麃

氣不通作脹或喘

加苦草莖

蘿蔔

蘿蔔

氣實人濕熱盛於上焦惡心飽脹宜吐之

撫芎

梔子

桔梗

各二錢

薑煎入藥汁服探吐酒疸心中懊惱欲吐吐

之愈

濕熱盛於上焦、懊憹身目黃、用瓜蒂散、蓄鼻中  
黃水從鼻流出佳。

瓜蒂

二錢

母丁香

一錢

黍米

四十粒

亦小豆拌

右爲末、每晚噙水一口、於兩鼻孔吹上半匙  
便睡至明日、取下黃水、便服黃連散、五六服  
効、若目黃不退、瓜蒂散搐鼻、取黃水出愈。

黃連散治二便秘澁

黃連

大黃

醋炙各二兩

黃芩

炙甘草

各一兩

共末、每服三錢、食後溫水調下、日三服。

一方用苦葫蘆瓢切棗大以童便浸二食頃內  
鼻中黃水出妙

桃枝東引煎湯亦可

水濕傷脾、脾寒色見于外、爲陰黃、脉沉身冷是  
久雨體弱有之、四苓散加炮薑、茵陳、重者加附  
子、從陰症治

酒疸因於酒者、葛根、山梔、豆豉、枳實煎服、發汗  
利小便、從傷酒治、久則固脾

疽久不愈。胃強者。柴金丹。

膽礬

黃蠟

二兩

大棗五十

右以砂鍋或銀石器內用好醋三碗先下礬  
棗漫火熒半日取出棗去皮核次下蠟再熒  
一二時如膏入蠟茶二兩同和丸桐子大每  
服三十丸茶酒任下酒人下血色黃目黃色  
有餘者亦效

大溫中丸

黃病久者名食勞黃俗名黃脾此

丸妙

香附

一斤春夏二宿秋冬二宿

甘草

二兩

針砂

炒紅一兩

麝

厚朴

姜皮六兩

山楂

五兩

蒼术

酒浸兩

白术

各七次一兩

葛根

青皮六兩

黃連

三稜

蓬木

苦參

各五兩

右爲細末，醋丸桐子大，蒼黑筋骨露氣實者，米飲下。五六十九丸，肥白氣虛者，白术湯下。三四十丸，忌一切油膩生冷肉，麪鵝羊，糍粃難化之物，服七日後便覺手掌心熱涼，口唇內有紅暈，半月愈。

小溫中丸

治黃胖

宜草野人，以內無食積，厚味，但燥濕而已。

台去

卷六

十一

七

針砂

一斤以  
炒爲末

苦參

山楂

茱萸

白术

蒼朮

川芎

神麃

香附

一斤

右末，醋糊丸。桐子大。每服四五十丸。米飲下。  
忌口。輕者不過五六兩量者七兩愈。

濕熱盛而口苦作渴。面黃氣實者。白术。連翹

羌活

通草

煎湯下

穀疸丸。保和丸各四十粒。阿魏丸五粒。

棗榔丸。食勞黃目黃。

皂莢  
不拘多少置砂鍋內燒赤末。醋點之。

右爲末，棗肉爛爲丸，每服三十粒，食後服。

太陽下

黃疸寒熱嘔吐，煩渴引飲，小便不利，茯苓滲潔湯加梔子、青皮、陳皮、枳實水煎服。

戴氏曰：飲酒卽睡，酒毒薰肺，散於皮膚，則黃。宜合脾肺治，宜藿甘飲，葛根煎湯，或梔子煎湯，調五苓末，或葛花解醒湯。

酒疸心胸堅滿，不進飲食，小便黃赤，其脉弦濶者，是脾陰受傷也。當歸白朮湯。

酒疸久之變中滿，面足腫，理脾爲急，兼分利。從  
腫脹治。

秦艽退黃極妙，以性能逐陽明經濕熱邪氣也。  
喜食茶葉久之面黃，宜從茶癖治。

濕熱盛小水不利，茵陳五苓散主之。卽五苓散  
加茵陳。

酒積面黃，腹脹不消，勢盛脉實人強者，用甘遂  
末以猪臚頭肉、細切和末作一丸，紙裹煨令香  
熟，取出臨臥細嚼嚥下，取出病根。

治疸須分新久虛實。初起脉實有力，卽當消導。  
分滲如茵陳、胃苓、茯苓、滲濕之類。

然脾胃爲濕熱所傷，久之氣血漸弱，必兼補養。  
如參术、健脾、當歸、秦艽散，使正氣盛，邪自退。庶  
可收功。

有瘀血發黃，大便必黑。腹脇有塊或脹，脈濇或  
芤，用歸尾、桃仁、丹皮、消之。大便不利，脉稍實而  
不堪弱者，桃仁承氣湯下，盡黑物則退。  
失血後、崩後一切病後，脾胃肺元氣大傷，面色

廢黃或淡白色悉屬虛從內傷治不可誤認作

虛

木影

丈

外皮

多不鮮黑當綠秦氏錯寫五角蟲取自其魚

頭目鱗鱗如鱗久之成血漬頭後有青綠

色如菌刺目甚者甚多參照文獻

此即真水沫入頭實脉弱視其本大根當首見

淋秘

淋者小便澁滯、玉莖痛、多滑白物、出于莖端、是也。悉屬火熱、但分新久虛實、在氣在血、解熱利小便、

丹溪曰：淋雖有五、無出于熱。山梔子之類、解熱利小便。

兩尺脈弦數、或三部俱弦、小便赤澁、小腹脹悶、或目赤、兩脇脹、屬肝火、龍膽鴻肝湯加減、不應龍蒼丸佳、

色慾過度、或體瘦之人、日久不愈、屬虛火、坎離  
丸主之。色白氣虛、小水不通、宜吐、病在下、取之  
上也。清心蓮子欵主之。

瘦白人、脉緩弱、曾經解熱利小便不減者、補中  
益氣湯倍升柴、五味子、甘草、桂枝、白芍、白朮、

不渴而小便不利者、熱在下、焦血分、腎與膀胱  
主之。滋腎丸、

渴而小便不利者、熱在下、焦氣分、肺氣主之、清  
肺湯、以清水之源、

二便俱秘 脉實者八正散倍大黃形弱及老人  
產後病後有此悉從虛秘治當潤燥養陰爲主  
下用導引法若作實秘治轉耗精津禍立見  
古方二便俱秘用倒換散甚捷

老人氣虛不能施化淋閉用補中益氣湯加淡  
滌茯苓知母車前之類

死血作淋出血條點牛膝膏小腹有塊作痛婦  
女多有此桃仁煎最妙但太峻須認真乃可  
牛膝一味煎湯名地髓湯治漏血殊妙砂淋痛

者亦妙。煎濃湯，加麝香、乳香各少許。

一法治熱淋，梔子木通湯，調益元散効。夏月用  
茴香湯調。又法用車前草搗汁露一宿，清辰稍  
溫，調益元散。

又法車前子爲末，用草搗汁調服，治溺血奇驗。  
痰滯中焦，淋澁不通，一陳湯，煎大碗頓服，探吐  
以提清氣。

淋澁有血，因火燥下焦無血，氣不得化而滲泄  
之，今不行，宜滋陰降火，四物加知柏牛膝。

稍或四物湯、吞滋腎丸、脉左大而虛、右澁化氣  
湯佳。

陰莖痛乃厥陰氣滯兼熱用耳草稍益欲緩其  
氣耳。

初起淋痛宜解熱久之當分氣血氣虛六君血  
虛四物各加黃柏知母滑石石菖、琥珀。

小便因熱鬱成淋不通用赤茯苓芩、車前、麥冬  
滑石木通、肉桂、甘草稍氣虛加參芪木香

脈緩  
体倦

者是

陰虛淋痛加黃柏、生地。夏月煎調益元散。

丹溪曰老人氣虛、小便不通。四物加參芪、吞滋腎丸。下焦血氣乾者，灰。

小便黃用生黃柏，如澁而數加澤鴻若。濕熱流注下焦，而小便黃亦澁。用生梔子澤鴻切，當濕多者宜滑石利之。

下焦血少、脈濇皮膚枯藁，小便黃且澁數者，坎離加牛膝、甘草稍。傷寒脫陽，小便不通。用生薑汁調茴香末敷熨小腹上，仍服益智茴香丸。調

益元散、暴感寒、小腹痛、小水不通、并氣秘、用葱  
熨法妙、加生薑亦可。

小便不通、炒鹽熨小腹妙、或以炒鹽放溫填臍  
中、用艾炷灸七壯立通。

病後產後、小水不通、悉屬虛、血虛脉必濇、當有  
口乾腸秘等燥症、四物、麥冬、知母、黃柏爲主、  
氣虛脉必緩弱、或氣口虛大、當有倦怠色白、自  
汗等虛症、補中益氣加減。

小便不利有三、若津液偏滲于大腸、瀉而小便

澁少、一也、必分利、瀉止自愈、

中風及諸病、出汗多、渴家小便不利者、忌分利、  
汗止、津液回、自便也、悞利之、重亡津液、煩熱益甚、慎之慎之、

熱結下焦、津液不行、二也、必解熱分利、

脾胃氣虛、不能通調水道、下輸膀胱、三也、當補  
以提之、

小水不通、百藥不應、其遂末上、調付臍下、內飲  
其草節湯、覺至臍下、二氣相合、立通、

因忍小便久之不通、取自己爪甲燒灰、米飲下立通。

小便數

有熱有虛、

數而少、爲實熱、宜滲之、

數而多、色黃、亦爲虛、宜滋陰、

數而多、色白、體羸、爲真陽虛升者少而降者多、

一方用酒鹽葱煮山藥空心食妙、

水芝丸 治下焦真陽虛弱、小便頻數、日夜無

度、

蓮肉去皮、不以多少用好酒浸一兩宿、猪  
肚一箇將酒蓮肉入肚中、水煮熟、取蓮肉  
焙乾爲末、酒糊丸、芡實大、每服五十丸、空  
心飲湯下。

下焦元陽虛、而小便頻數、色白耳鳴、體倦、須補  
右尺相火、破故紙柱附、參芪、鹿茸之類。

有人小便日數十次、如稠泔色、心神恍惚、憔悴  
食減、令服桑螵蛸散、未終一料而安、能安神魂

定心志治健忘小便數補心氣用桑螵蛸桑樹  
上者無則用他樹者同桑皮炒及遠志菖蒲龍  
骨人參茯苓當歸龜甲醋炙巴上各一兩爲末  
以參湯調下二錢

一人病風狂、井遂等利藥太過、小水不禁、服此  
頓愈

朴硝雪白者治痛淋殊効每服二錢血淋用冷  
水下氣淋木通湯下石淋先隔紙炒紙集爲度  
再研細溫水下

丹溪曰、小便不通屬氣虛、血虛、有實熱、痰氣閉塞、皆宜吐之、以提其氣、氣升則水自降、蓋氣承載其水也、氣虛用參术、升麻等先服後吐、或就參芪藥中、調理吐之、血虛用四物湯、先服後吐、或就芎歸湯探之、痰多二陳湯探吐、痰氣閉塞、二陳加香附、木通探吐之、實熱利之、當用八正散、蓋大便利小便自通矣、所以探吐者、病在下上取之、

琥珀丸 治諸淋澁痛小便有血出症

琥珀

沒藥

海金砂

蒲黃

各一

右末空心煎甘草湯下

又琥珀一味爲末葱白湯下二錢治沙淋大效  
丹溪云琥珀性淡滲若陰虛血少者服之反增  
其病本草云琥珀消瘀血極驗

清肺飲

治渴而小便不利熱在上焦氣分

燈心

一分

通草

二分

澤瀉

瞿麥

琥珀

各一分

扁蓄

五錢

木通

各七分

車前

研

炒另

茯苓

猪苓

各一錢

白水煎服

海金沙散 治小便淋澁及下焦濕熱氣不施

化五種淋疾癃閉不通

海金沙

研

木通

瞿麥穗

滑石

通草

各半兩

杏仁

去皮尖炒一兩

右爲末燈心煎空心服

滋腎丸

一名通關丸

治不渴而小便不利熟在下焦

血分

黃柏

酒洗焙乾知母各一兩

肉桂

五分

熟水丸桐子大每服一百丸空心白湯下服

後須頓兩足令藥易下也。

葵花散 治小便淋澁及下焦濕熱氣不施化

五種淋疾癃閉不通

葵花根一味水煎服、

腎疸湯 治腎疸目黃甚至渾身黃小便亦澁

用風以勝濕也、

羌活 防風 藜本 獨活 柴胡

各五分

升麻 白芍

二分

澤瀉

二分

豬苓

四分

甘草

五分

白术

五分

蒼朮

一錢

黃柏

三分

人參

三分

葛根

五分

神曲分六空心服

小薊湯 治下焦熱結血淋

生地 小薊根 通草 滑石 桔子

蒲黃 炒淡竹葉 歸尾 藕節 草稍

各五分

長流水煎服

八正散 治二便俱秘或淋疾初起勢盛者

大黃 麥門冬 滑石 薄荷

車前 栀子 茵草稍

各等分水煎服

腎着湯 治寒濕客于胞中小水不通、有似淋

疾

赤茯 白术 乾薑 甘草

水煎服

丹溪曰：淋痛屬虛熱，余每用滋腎丸百丸煎四物湯加甘草稍杜牛夕、木通、桃仁、滑石、木香、煎湯空心吞服，甚者兼炙三陰交，如鼓應桴，累試屢驗。

牛膝膏以牛膝一味合許細切，新汲水五碗煎

耗其四入麝香少許

倒換散

治二便阻塞、小腹急痛、肛門腫痛

大黃

小便不通  
甚者減半

荆芥穗

大便不通  
減半

各等分右各另細末、每服二錢空心溫水下

鐵粉丸

治二便不通

大皂角燒存性右一味爲末、不拘多寡、煉

蜜丸桐子大、每服六七十丸、白湯下

石蓆散

治小便不通、莖中痛

石蓆

去毛  
二兩

瞿麥

一兩

滑石

五兩

車前

三兩

冬葵子二兩

右細末每服方寸匕日三

眩膏 治諸淋痛不可忍及沙石淋大蘿蔔  
切一指厚四五片好蜜淹少時安淨缺罐  
上慢火炙乾又蘸又炙盡蜜二兩番復炙  
令香軟不可焦細嚼以鹽湯送下

沐方莖中有砂作痛者是

石首魚腦骨五對火煅剉火毒卽黃魚牙  
乃腦中骨滑石拌

共爲末煎水通湯調下、

瘀血作淋牛膝膏妙但虛人能損胃不宜用出  
千金方治小便不利莖中痛欲效及婦人血結  
堅痛如神蓋牛膝乃治淋之聖藥也但虛人監  
以補劑爲佳、

血淋方

側柏葉 蘭節 車前草 各取汁調益  
元散服妙

集効方

地膚草自然汁空心飲俗名白地草

桃仁煎治下焦瘀血作淋

桃仁 大黃 朴硝各一兩 盲虫半兩

右四味爲末、以醇醋二升半、砂器中慢火煎  
取一升五合、下藥末不佳手攬良久冷定丸  
桐子大、先日晚不飯、五更初溫酒下五丸、日  
午取下如雞肝蝦蟆衣狀末下再服、如見鮮  
血卽止續以調血氣藥補之、

妊娠淋、乃腎與膀胱虛熱不能制水、然妊娠胞

繫于腎腎間虛熱而成斯疾甚者心煩悶亂名曰子淋也若頸項筋攣語濇痰盛用羚羊角散若小便澀少淋痛用安榮散若肝經濕熱用龍膽瀉肝湯若肝經虛熱加味逍遙散若腿足轉筋而小便不利急用八味丸緩則不救若服燥劑而小便頻數或不利用生地茯苓牛膝黃柏知母菖歸甘草若頻數而黃用四物加黃柏知母五味麥冬玄參若肺氣虛而短少用補中益氣加山藥麥冬若陰挺痿痺而

頻數用地黃丸。若熱結膀胱而不利用五淋散。若肺脾燥不能小便生黃芩清肺飲。若膀胱陰虛陽無所生用滋腎丸。若膀胱陽虛陰無所化用腎氣丸。

產後小便不通屬虛者舊方用陳皮去白爲末空心酒調下二錢外用鹽填脐中却以葱白剥去麤皮十餘根作一縛切一指厚安鹽上用大艾炷滿葱上以火炙之覺熱氣入腹卽通按此法唯氣壅不得通者宜之若氣虛源涸與

夫熱結者不可泥也

子淋

月分淺而小水不通或作痛者是用冬葵子散  
梔子木通草稍麥門燈心以解熱利小便虛者  
加參术實者加滑石但滑石瞿麥能墮胎虛者  
去之

經驗法

小便不通諸藥不効或轉胞至虛危困用猪尿  
胞一箇底頭出一小眼子翎筒通過放在眼內

根底以細線繫定翎筒子口、細竹子堵定上用  
黃蠟封尿胞口吹滿氣七分繫定了再用手捻  
定翎筒根頭放了黃蠟塞其翎筒在小便出頭  
裏頭放翎筒根頭手捻其氣透于裏小便卽出  
神妙。

### 小便赤澁

汗多而小便赤澁夏月多此證、盛暑所飲既多、  
膀胱澀閉則水不運下、五苓散一名導逆、內有  
木桂收汗、猪苓澤瀉茯苓分水道收其在外者、

使之內又從而利道焉。發者歟之壅者通之義。  
取于此有虛勞汗多而赤澀者，却是五內枯燥  
滋脾既去，不能生津故漏澀而赤，不宜用利藥  
以竭腎水，惟當溫養潤肺，十全大補養榮湯之  
類，自足選用。汗者心液心主血，血榮則心得所  
養，汗止津生，不待通而漏自清矣。諸失血及患  
癰毒人，產後大病後，小便赤澀，悉是枯竭不潤  
之病，並宜前法。

小水

內經曰、膀胱者、州都之官、津液藏焉、氣化則能  
出矣、故小便由氣施化而出、至于熱結不通、乃  
一時有餘暴病、故八正五淋散爲對症藥、若久  
久必責之虛、但有氣血之分爾、肥白人脉虛大  
或沉弱、責之氣虛、黑瘦人脉弦數大便燥、小便  
澀責之血虛、又有肺脾氣虛、不能通調水道、下  
輸膀胱者、補中益氣爲主、陰虛用滋腎丸、下焦  
命門火衰、小便不通、兩腿及陰囊腫、喘促者、不  
問男婦有孕、急用八味料煎服、遲則不救、若老

年陰痿思色精不出而內敗小便道澀痛如淋  
用八味丸料加車前牛膝若老人精已竭而復  
耗之大小便道牽痛愈痛則愈便愈便則愈痛  
亦治以前藥不應倍附子

有人小便赤短體倦食少缺益痛諸藥不應余  
以爲倦怠少食責之脾肺虛小便短赤而澀責  
之腎弱當滋化源用補中益氣六味丸加五味  
子而安

病後小便短少胸腹脹滿兩足浮腫悉屬脾虛

補中益氣湯加附子

已經分利或病後有虛屬脾肺氣虛而不能施化也。補中益氣加麥門五味。

尺脉數大陰火上炎而小便亦少者六味地黃丸加麥門五味。腎經陰水虧不能滑滲者六味地黃及滋腎丸。

下焦元陽虛陰無以化八味丸補中益氣湯。

若悞用分滲泄藥分利復傷陽氣陰無所生而小水不通目睛凸出腹脹如鼓或腿膝腫硬兩

腿皮裂流臭水用滋腎丸益氣丸每見元氣虛而復用豬苓澤瀉及五子五皮之類而症益甚者急用金匱腎氣丸多有復生者若妄泄水立危。

遺溺

勞役太過色白倦怠氣口緊大無力屬上焦肺氣虛補中益氣倍參芪有火加黃柏生地因先病淋服利藥太多致溺不禁者參芪大補爲主少佐熟附子

內經曰水泉不止者膀胱不藏也仲景曰下焦竭則遺溺年老真陽弱補藥中加桂附及牡蠣乃澁可去脫也

丹溪方治遺溺桑螵蛸酒炒爲末薑湯下二錢

大無方雞內金散治溺床失禁用雞肫內黃及  
研爲末每服二錢酒飲調下

大人遺溺不知薈薇根細研酒下

鹿茸丸 治脈沉遺溺下元虛冷小便白濁滑

數不禁

鹿茸 椒紅 肉桂 附子 牡蠣 煅

石斛 補石脂 肉蓯蓉 雞腔脰 即肫

沉香 各一桑螵蛸 千飼

已上皆溫而溫補之劑故加沉香以行其藥

恐大滯也

酒糊丸 桐子大空心三十丸

有所傷損、汚血蓄于胞中、亦令遺失、鹿角屑灸  
黃爲末、調下二錢。

有熱鬱于下焦而遺者、脉必洪滋陰清火。

夜遺少壯責之火、中年責之虛、熟則清之、梔子  
木通、茯苓等虛則補之、大兎絲子丸、猪胞炙碎

煎湯下。

咳而遺溺屬膀胱

孕婦遺尿當審虛與熱

本草白薇散主之

薛氏曰前症若脬中有熱宜加味逍遙散若脾肺氣虛補中益氣湯加益智仁若肝腎陰虛兼燥症者六味丸

遺溺用燕巢中草燒黑水下方寸之

產後遺用桑螵蛸散佳若因穩婆不慎致損胞而小便淋瀝者八珍湯以補氣血兼進補脬飲難產傷胞遺尿失禁丹溪猪羊胞煎補藥法妙

見症

門

一方桑螵蛸

三十箇炒

牡蠣

殼

人參

黃芪

爲末、米飲調三錢、或以桑螵蛸炒、龍骨煅爲末、煎參芪湯調亦可。

小便黃赤皆屬下焦熱、但有虛實之分爾、虛則補中益氣湯、

陰虛有火用黃蘖知母實宜分滲、

幼齡精未通而慾竇早開老年精已竭而復耗俱致精不出而內損、二陰枯澀大小便道牽痛、

愈疼則愈便、愈便則愈疼。治湏補養、治同勞麻。  
若再攻下、立危。

小便數

謂頻數也

數而少、熟也。茯苓琥珀湯利之。

數而多、虛也。薯蕷、蓮肉、益智仁之屬收之。

生薯蕷半斤、刮去皮、以刀切碎、于鑄中煮酒沸  
下薯蕷、不得攪、待熟加鹽、慾白更添酒空腹服。

二、三盞。

蓮肉去皮、不以多少、用好酒浸一宿、猪肚一箇、

將蓮肉入肚中煮爛，將蓮肉焙乾爲末，酒煮糊丸。芡實大，每服五十丸，食前少飲下。名水芝丸。老人及中年人夜多小便，悉屬腎虛，益智子二十箇，鹽五分，水一盞，煎八分，臨睡溫服。

衛真湯并丸

桑螵蛸散

良見翁

戴氏曰：小便多者，乃下焦虛不能攝水，宜菟絲子丸、八味丸、玄鬼丹、生料鹿茸丸。余按腎氣不能攝水，降多升少，非大補莫能參。芪佐桂也。附可

小便常急，遍數雖多，而所出少，放了復急，不澀。

痛却非淋、多因縱慾、或忍尿行房而然、宜生料  
五苓散減澤瀉之半、加阿膠一錢、吞八味丸、此  
丸湏五味子者、

若頻頻欲去、而溺不多、但不痛、而此腎與膀胱  
俱虛、容熱乘之虛、則不能制水、宜補腎丸、六味  
地黃丸、

大便硬小便數、名脾約、仲景用脾約丸、不若養  
血潤燥之爲愈也、

秘結

老人產婦病後、汗下吐瀉後、大便難、悉屬血虛津液不足、虛秘、須用潤劑、切不可用牽牛、巴豆、大黃等瞑眩藥、以反耗津液也、雖獲效目前久之必變他症、慎之慎之、經曰、臟得血而能液、當補血爲主、微加辛以潤之。

一切秘結、胃強能食者、通幽湯、間服古方潤腸丸、微利之、今人急於獲効、一味大黃、或加巴霜、云潤腸丸、屢秘屢投、卒至夭折、終莫之悞、悲哉。

丹溪曰有虛有風有濕有熱有津液不足者有  
寒者有氣結者切不可例用芒硝大黃等利藥、  
血虛津液枯竭而秘結者脉必小澀而無精光、  
大便雖軟努瀆不出大劑四物湯加陳皮甘草、  
紅花通幽湯

血少兼有熱者脈洪數口乾小便赤少大便秘  
硬潤燥湯活血潤腸丸四物加酒芩佐桃仁紅  
花、

虛秘腸濇枯藁面不澤當歸潤燥湯投滋腸五

仁丸佳

脾虛不能運化，倦怠懶于言動，補中益氣湯，倍升麻，當歸，清氣一升，濁氣自降。

**熱秘**面赤身熱，腸胃脹悶，時喜冷，口舌生瘡，此由大腸熱結，宜四順清涼飲，吞潤腸丸，實者承氣。

年高虛人，大便秘者，脈浮在氣，杏仁陳皮主之，脈沉在血，桃仁陳皮主之，所以俱用陳皮者，以手太陰與手陽明爲表裏也。

膏梁輩、二便澁滯、或欲便不輒、搜風順氣丸妙。  
吐瀉後、忘津液、便秘者、消導加花粉、當歸、蘇子、  
等潤利、仍以麻子仁、擂水煎藥妙。

氣結者、脉必沉伏、上下攻走、脹悶或痛、由氣不  
升降、穀氣不行、其人多噫、宜蘇子降氣湯、加枳  
殼、吞養正丹、或半碗丸來復丹、未効木香檳榔  
丸、少壯氣實、用牽牛丸、一服無碍。

脈沉實、體健、神旺、二便俱秘者、升柴二錢、二陳  
湯先服、後吐、以提之。

久病胃中實熱、脈弦滑有虛數日不大便  
腸丸甚者承氣湯

過食寒冷之物停滯不便、腹痛脈沉伏屬寒結  
從食陰治、腹痛甚不通俗急丸

方書云、由冷氣橫于腸、凝陰固冷、用藿香正氣  
散、加官桂、枳殼、呑半硫丸、熟藥多秘、推硫丸、更暖  
而通、冷藥多泄、惟黃連肥腸而止、

風秘者、脈必浮數乃熱症也、風或遍身虛羸、參  
血藥中、加防風、羌活、秦艽、豆角等、活血潤燥丸

搜風順氣丸俱對症藥

方書謂風傳大豐用小續金湯去附倍芍加竹瀝、大恐不必、  
潤腸

老人氣血弱、大便秘、蘇子、白芍妙用蘇子仁淘淨、不拘多少研爛瀝汁、煮粥。

產後有三病、鬱冒則多汗、

血氣多汗則大

難、故難用藥、惟此粥佳、

注夏大便難、黃芪人參湯、加生地、歸身、桃仁、通潤之、潤之久不快利者、少加煨大黃微利之、

服大黃不應此非血秘是熱生風也黃芪人全  
湯加羌活防風

古方潤腸方

麻仁

兩半水過一指許大口

沸湯中連袋泡  
爆乾礪之粒粒皆完

枳實

炒去黃色

厚朴

薑汁炒

芍藥

各三兩

大黃

四兩酒煮

杏仁

去皮尖方研一兩二錢

右爲末煉蜜丸桐子大每服三十丸空心白

湯下

滋陽五仁丸 治津液枯竭傳化艱難

柏子仁

半錢

桃仁

杏仁各一兩

炒去皮尖

松子仁

一分

陳皮

四兩另爲末

郁李仁

炒二錢

右將五仁另研爲膏入陳皮末研匀煉蜜丸  
桐子大空心下五六十九丸

通幽湯

治大便難上衝吸門不開噎塞不便

燥結不得下治在幽門以辛潤之

甘草

炙紅花

各三分

生地

熟地各五分

升麻

桃仁泥

歸身

各一錢

麻仁

三分

臨服加檳榔末半錢加大黃麻仁爲潤腸湯

治秘而有火者、大黃酒煎者、二仁俱後加

活血潤腸丸

治大便風秘、血秘、常常燥結、

歸稍

錢五

防風

錢三

大黃

酒煨

羌活

各一兩

皂角仁

燒存性

桃仁

二兩去皮尖

麻仁

二兩另研

半升

研肉另

右除二仁另研外、共爲細末、煉蜜丸、桐子大、  
每服五十丸、白湯下、余丸封固、不可見風、一  
通之後、卽以麻仁煮粥、每日早晚用、庶不再

結

枳殼丸 治濁氣閉塞三焦二便不通水穀不

得下

枳殼

二兩

陳皮

二兩

檳榔

半兩

木香

二錢半

黑丑

四兩半生一  
半炒取頭末

右細末、煉蜜丸、桐子大、每服十五丸、薑湯下。  
枳實導滯丸 治傷濕熱之物、不得施化、胸膈

作痛

方見傷食門

丹溪治一人胃虛有滯、不通不納藥用黃蠅色  
備急丸、穿一孔、令服三丸、取其不犯胃氣故得

遲化達幽門而出也。次日下結屎升許，繼以物湯加減作湯、吞潤腸丸，調理而安。

又一兒痘後秘結，百藥不効，令使婢口含香油，以小筒一箇，套入肛門，將油吹入，少時病者自覺油入肛門，如蚯蚓漸漸上行，再過片時許，下黑屎二升，困眠而安。

仲景脾約丸，治胃強脾弱，約束津液，不能行于大腸，因而秘結，方用煨大黃六錢、杏仁、麻仁各五錢、枳實、厚朴、芍藥各八錢，蜜丸下二十丸，丹

溪曰既曰脾約必陰血枯槁內火燔灼熱傷元氣脾失轉輸肺失傳化宜乎大便秘而難小便數而無蓄藏也理宜滋養陰血使陽火不熾金行化令脾土健旺使津液復入於胃大小便潤而通矣此丸止宜熟甚而氣實者與壯盛酒客

註

金匱真言論曰北方黑色大通于腎開竅於二陰故腎陰虛則大小便難宜以地黃、從蓉、車前茯苓之屬補真陰利水道少佐辛藥開腠理致

津液而潤其燥施之於老人尤宜若大小便燥  
結之甚求通不得登廁時用力太過便仍不通  
而氣被掙脫下注肛門有時泄出清水裏急後  
重不可忍者胸膈間梗梗作惡乾嘔有聲渴而  
索水飲食不進呻吟不絕欲利之則氣已下脫  
命在須臾再下卽絕欲固之則溺與燥屎膨滿  
腸間恐反增劇欲升之使氣自舉而穢物不爲  
氣所結自然通利則嘔惡不堪宜如何處惟益  
血潤腸丸多服自愈俗以便秘爲後牢固壽考

之徵而一時難堪此方不犯大黃可以久服  
丹溪曰余觀古方通大便皆用降氣品劑蓋肺  
氣不降則大便難傳送用枳殼沉香調子杏仁  
等是也又老弱津液少者宜胡麻仁阿膠潤之  
妄用峻藥旋通旋秘必變肺痿吐血

益血潤腸丸

熟地

六兩

杏仁

炒去皮尖各三兩以上

麻仁

各三兩以上

阿膠

炒

末俱搗膏

枳殼

橘紅

各二兩半

阿膠

炒

肉蓯蓉

各四半

蘇子

荆芥

各二兩

當歸

三兩

共末和前三味杵千餘下加煉蜜丸梧子大  
每服五六十丸空心白湯下

導引法

先以皂角末加老蜜作小梃或加鹽以鹹能軟  
堅也、納肛門中、如不動乃燥結甚也、以猪膽七八  
箇取汁、加米醋半盃、盪溫入雞嗉中、以小繩  
管接入肛門、將嗉捏上少時通必轉屎氣覺已  
在肛不得出、熱結乃可。

冷秘用醬生薑導、或於蜜煎中、加烏頭末、以做

寒消結

烏梅湯浸去核丸如棗大亦可導  
醬瓜削如棗亦可導

一儒者大便素結服搜風順氣丸後胸膈不利飲食善消而帶陽色左關尺脉洪而虛余曰此足三陰虛也彼恃知醫不信服潤腸丸大便不實體倦與補中益氣六味地黃月餘而驗年許而安

若脾肺氣虛者用補中益氣湯若脾經鬱結者

用加味歸脾湯。若氣血虛者，八珍湯加肉蓴草。  
若脾經津液涸者，用六味丸。若發熱作渴者，用  
竹葉黃芪湯。若燥屎直腸，用猪膽汁導之。若肝  
膽邪侮脾者，脉必弦數，兩脇脹，小柴胡加山梔  
郁李枳殼。

若膏梁厚味積熟者，用加味清胃散，亦有熱燥  
風燥、陽結、陰結者，當審其因而治之。苟一既安，  
下復傷胃氣，多成敗症。

一法，皂角燒烟于馬桶中薰之。

一法皂角末加皮硝一撮水丸煉蜜和成梃子  
入肛中佳

勢甚者用麻油一盞熟水一盞入猪尿胞內潰  
入肛中立通

二便不通燒鹽鋪臍內切蒜一片於鹽上用艾

灸二三壯

東流飲 治大便熱結

細茶

散

生芝麻 生桃仁

大黃

一錢或二錢

用長流水生搗服

倒換散治二便不通

方見淋門

陰症二便不通，及諸雜病、陰症急危者，用壯蠶  
陳粉、乾薑、炮各一兩，右爲末。男病用女唾調，于  
內擦熱，緊搯二卵上，得汗出愈。女用男唾，搯二  
乳上，蓋卵與乳乃男女之根蒂，坎離之分屬也。  
非急不可用。

治二便不通

六七月間，取大蟻娘糞中者，不拘多少，線  
穿懸風處，陰乾，以刀從中切斷，如大便秘。

用上截小便秘、下截各爲末、新汲水調下  
二便俱秘則全用之。

養生論一法用細灰於患人臍上及丹田作一  
泥塘徑如碗大一指厚四圍高起以新汲水調  
朴硝一兩傾入灰塘中勿令走須臾迸出

大小便俱秘

脈盛皮熱腹脹前後不通瞀悶此謂五竇  
脾胃氣滯不能轉輸加以痰飲食積阻礙濁道  
大小便秘澀不快升柴二朮二陳湯數服能令

凡遇此病、吐逆而小便不利、急先灸氣海、天  
等穴、各三七壯、其吐必止、後以益元散等藥、以  
利小便。  
散金匱厚朴大黃湯

一法治吐逆瀉塞、用藿六平胃散合五苓散加  
薑棗煎服。  
上焦二陳丸

二尼體厚、病吐逆忽小便不利、頭汗出、立斃、  
既濟丸車前子治關格脉沉細手足冷者、此陽虛之  
爲極用製附子人參各二錢麝少許共末糊丸。  
連桐子大燈心湯下二丸

列用燭州千人參谷二廻覆少者表未附武

列齊武帝開郡縣承暉年吳會出蜀之

一与蠶草赤也並以小野不休更不出立

舊棗頭鬼

火灭唐中

一去能出無爾塞用囊六平冒婧合丘苓婧吸

麻小野

復張前後不直

率穴谷三小非其也必五蓋以益示婧妾樂以

直愚山泉出無而小野不休禁求炎底藏火

而小便長

涼熱煥火結滯、脉洪盛、大小秘赤、肢節煩疼、涼  
膈散通聖散、金匱厚朴大黃湯選用

丹溪治一婦人、脾疼後患二便不通、此是痰鳴  
中焦氣聚上焦、二陳加木通先服後吐、查再前  
燒皂角灰爲末、粥清調下

一法推車客七箇土狗七箇、二物新瓦上焙乾  
爲末、以虎杖向東南者取皮煎濃湯服之  
連根葱一二莖、帶土生薑一塊淡豆豉二十一

粒鹽二匙同研爛作餅，烘熱揜臍中，以帛紮定，良久氣自透，不通再換一餅。

### 關格

關無出格無入，關則不得小便，格則吐逆。寒在胸中，則格而吐，熱結下焦，則不得小便。丹溪曰：寒在上而熱在下，故多亥法，當取吐以提其氣之橫格，不必在出痰也。吐中便有降，久病氣不運者，補氣兼升降，補中益氣湯加橘梗，使清升濁降也。

凡遇此病、吐逆而小便不利、急先灸氣海、天樞等穴各三七壯、其吐必止、後以益元散等藥以利小便。

一法治吐逆瀉塞、用藿六平胃散合五苓散加薑棗煎服。

一尼體厚、病吐逆、忽小便不利、頭汗出、立斃、既濟丸。治關格脉沉細、手足冷者、此陽虛之

極、用製附子人參各二錢、麝少許共末糊丸

桐子大燈心湯下七丸

杜隱子疑金少卿乃子并

於南歸中以自榮

良多歎服連酒千人達斧三巡禮父情其末聞此

想效武格台闈詒祖武略于弘公者如是而之

予鄙原麻生雖小弱不厭直出趙魏

蓄穀煩則格而吐糲結下焦則不得小便

一去欲知其無罪用葛衣平眉遺谷正身錯

麻小功之黃各不必在出處也中更有一名

誓於谷三小并其生及五餐以益元始半乘以

丁豐引麻巾蔽面小更不休矣其參拜感天孔

癆

附陽癆

癆者、筋骨無力、足不任地、手不能舉、俗名癰癆、是也有氣虛、有血虛、有痰、有濕熱、有食積、有瘀血。○黑瘦人、脈濇弱、或左脈雖大、按之無力、行步艱難、或兼盜汗、等陰虛症者、是血虛有火、宜四物倍知柏蒼朮下補陰丸。○肥白人、脈沉軟、或滑、兼惡心、胸膈不利、屬氣虛有痰、宜四君子二陳加蒼朮黃柏竹瀝薑汁。○脈沉滑、兼腰膝麻木、或腫者、屬痰、宜二朮二陳羌獨、芩柏入竹

瀝薑汁。○脉沉濡而数症兼小木亦澁或作腫  
痛者屬濕熱宜清燥湯加減或二妙丸東垣健  
步丸。○氣口洪弦帶滑症兼腹脹痛或惡食者  
是食積妨礙脾氣不得運于四肢而然宜導痰  
運脾加山楂神曲木瓜防已不應米香枳榔丸  
從食積治積去補脾。○脉澁或芤或因產後惡  
血流于腰膝或因跌撲損傷後但以此者方可作  
瘀血治四物加桃仁紅花牛膝肉桂徐徐取效  
東垣取黃柏爲君通治諸癰無一定之法有難

痰積者有濕多者有熱多者有濕熱相半者有  
挾氣者有挾寒者臨病之際宜加兩審○大抵  
起于濕熱者多斷不可作風治而用風藥  
病痰須戒厚味酒麴食淡乃佳

一蒼瘦人每坐輒不能起左脈微弱右關寸獨  
弦急亦無力因酒色太過所致用丹溪加味四  
物湯不二十劑愈後服鹿角膠調理

一人體厚二足行履不便時作暈運以大劑二  
陳加南星二术黃柏黃芩入竹瀝薑汁數劑頃

愈。○一人自覺兩足熱如火炙，自足踝下上衝  
腿膝，且廢弱軟痛，脉濡而數，乃濕熱挾虛也。以  
蒼朮黃柏爲君，四兩；牛膝二兩；龜板虎胫骨、漢  
防已各一兩，歸二兩；人參二兩；山藥糊丸、桐子  
大每服一百丸，空心鹽湯下。古方加附子。

一人兩足沉重，不能舉，六脉沉數，詢之平居痛  
飲，遂作濕熱治，乃以四苓二妙加牛膝、木通、防  
己，數服漸減，用健步丸調理而安。

一老人痿厥，用虎潛丸不應，後于虎潛丸加附

子遂愈蓋附反佐之功也

加味四物湯 治諸瘦四肢軟弱不能舉動

歸身

一錢

熟地

三錢

白芍

川芎各七分半

人參

五分

黃柏

一錢

黃連

五分

知母

三分

杜仲

七分半

蒼朮

一錢

麥門冬

一錢

五味子

九枚

牛膝

三分足不

軟者減

水二盞煎一盞空心服酒糊爲丸亦可

健步丸 治膝中無力屈伸不便腿脚沉重行

步艱難

羌活

柴胡

滑石

炒

甘草

炙

瓜蔓根

洗酒

肉桂各五分

川烏炮

防風

澤鴻錢

防已

酒洗一兩

苦參

酒浸各三錢

三錢

酒浸各三錢

右爲細末湯煮麪糊丸桐子大每七十丸煎  
愈風湯下卽荆芥湯

經驗方

治兩足痿弱軟痛或如火焙從足踝

下上衝腿膝等症因濕熱所成者

蒼朮

米泔水浸

一二宿

黃柏

酒浸日曬

各四兩

牛膝

去蘆二兩

龜板

酥炙

虎脰骨

上防已

各四兩

歸尾

二兩

右爲末麪糊丸桐子大每服七十丸或一百

丸空心薑鹽湯下

鹿角膠丸 治氣血兩虛、足軟不能行動、久臥

床縕痙症

鹿角膠一斤 鹿角霜 熟地 各半 川牛膝

白茯 兔絲子 人參 各一  
杜仲 各二 彌身 四

白术 杜仲 各二 虎脰骨 酥炙  
兩

灸 龜板 各二  
兩

右爲細末、先將鹿膠無灰酒鎔化、和丸桐子  
大、每服一百丸、空心薑鹽湯下。

大法腎主骨、肝主筋、足三陰虛則痿弱無力、如

長夏多倦怠是也必須大補兼滋陰

清燥湯 治濕熱成痿以燥金受濕熱之邪是  
絕寒水之化源源絕則腎虧痿厥之病大作  
腰以下痿弱癱瘓不能動

黃芪

人參

補氣

二木

燥升麻  
濕葛根

黃芩

柴胡  
歸身

澤瀉

滲濕

酒柏

酒連

清熱

生地

甘草

和諸  
藥

麥冬

潤肺  
和中

行化令利氣

五味子

收耗散  
之氣

又治長夏濕熱太盛脾虛之人久之面目四  
肢浮腫自汗急墮氣高而喘身熱而煩乃中

氣受病也、用補中益氣加二术四芩連柏  
佐五味、麥冬、清肅燥金得行化令、兼治標  
本也、

張三錫曰、真氣所受于天、與穀氣併而充身者  
也、故穀入于胃、其氣脾爲之行于三陽、又復行  
之于三陰、是五臟六腑皆稟氣于胃、而四肢筋  
骨肌肉皆賴以榮養也、陽明胃氣既虛、臟腑無  
所稟、四肢無所榮、機關不利而瘦、治瘦獨取陽  
明、有旨哉、

按丹溪以難經鴻南補北之法，摘爲治痿之方，亦是舉其例爾。若胃口不開，飲食少進者，當以芳香辛溫之劑進之，不可拘于此。宜藿香養胃湯，况依內經當分五臟。

大烏藥順氣散 治癱瘓脉實氣壯者

歸芍地黃芩

烏藥陳皮龍

香附硝砂枳

芩半與防風

蘇桔并甘草

乳沒沉香停

薑棗均煎服

諸風氣立通

當歸

芍藥

生地

川芎

烏藥

陳皮

地龍

香附

砂仁

枳殼

黃芩

半夏

防風

紫蘇

桔梗

甘草

各半兩

乳香

沒藥

沉香

各二錢五分

分此三味爲末煎成加薑內調服

薑棗煎服

換骨丹

我有換骨丹

傳之極幽秘

槐皮芎朮芷

僊人防首蔓

十件各停勻

味苦香減半

龍麝卽少許

朱砂作衣纏

麻黃煎膏丸

大小如指彈

夜臥服一粒

通身汗漫漫

麻黃

膏煎

仙木

槐角子

桑白皮

川芎

白芷

人參

威靈僊

何首烏

防風

荆子

各一兩

五味子

麝許

苦參

廣木香

各半兩

龍腦

研少許

朱砂

研爲衣

右除桑皮草末外共末。麻黃膏和丸。每兩作十丸。每服一丸。擊碎酒浸臨臥服。溫覆當有汗出。汗多勿用。

續命丹 治有餘癱瘓

天南星

朱湘水浸七日

切晒各加二日

水六兩

每日換水削去皮

水六兩

皮

川烏頭

浸七日加清水

草烏頭同上

去皮臍

地龍同上

去

晒乾四兩

五靈脂

清木漬

去砂石酒

乾用薑汁

浸十日每月添薑汁直候其

色轉黑

乾六兩

晒

滴乳石

研乳香

沒藥

羌活

白僵蚕

鐵鑄炒絲斷去嘴

天麻各二兩

全蝎

去毒酒

乾生用

白附子

生辰砂研

輕粉研

雄黃

研各一兩片腦

研一錢半

右爲末薑汁煮糯米飯搜和石臼中杵五千  
下作錠重一錢以磁罐收貯每服一錠生  
薑自然汁和好酒一處磨化臨臥通口熱

服溫覆出汗爲效

神効活絡丹 治諸風濕諸痺肩背四肢腰膝

有餘實痰一主發泄、

白花蛇

二兩浸  
焙乾

烏梢蛇

半兩酒  
浸培乾

麻黃

二兩  
去節

細辛

去土  
一兩

全蝎

一兩  
去毒

兩頭尖

二兩酒  
浸

赤芍

一兩管衆  
另研

一方云是  
貫芍祀考

一兩

防風

二兩半  
另研

葛根

半兩

沒藥

一兩  
另研

血竭

七錢半  
另研

硃砂

另研

地龍

半兩

烏犀角

半兩

甘草

二兩去皮尖  
另研

丁香

一兩去梗  
另研

麝

半兩

白僵蚕

一兩炒  
另研

乳香

一兩  
另研

片腦

錢半  
另研

玄參

一兩  
另研

官桂

二兩去  
粗皮

草豆蔻

二兩

川羌活

兩去

天麻

兩

虎脰骨

一兩半  
酒浸

牛黃

二錢半  
半

人參

一兩

天竺黃

兩

威靈僊

兩半  
酒浸

藿香

二兩去  
土

何首烏

二兩半  
白芷

兩

敗龜板

一兩  
酥炙

烏藥

兩半  
安息香

兩骨碎補

一兩

黃連

二兩  
兩

茯苓

一兩  
兩

黃芩

二兩  
半

白朮

一兩

黑附子

一兩  
皮

大黃

二兩  
當歸

兩半  
木香

二兩

香附

一兩  
兩

沉香

二兩  
白朮

豆蔻

一兩熟地

黃

兩松香

脂

半

右爲細末，煉蜜丸，彈子大金箔爲衣，每服一

丸溫酒茶清隨病下

虎脰骨酒 治風痰偏枯，一切擊拳、

石斛

去根

石楠葉

防風

虎脰骨

炙

當歸

牛膝

茵芋葉

續斷

杜仲

去粗皮

炒斷

巴戟

芎藭

金毛狗脊

火去

川巴戟

右剉如豆大以絹袋盛用無灰酒一斗浸之  
十日後每服一盞量大二三盞妙

筋筋保安酒 治同上

木瓜

五兩

草薢

牛膝

酒浸

續斷

五靈脂

松節

烏藥

天麻

黃芩

白殭蚕

當歸

防風

威靈慄

虎骨

酒炙各一兩

白芍藥

一兩

右用無灰酒一斗、浸上藥緊封扎蟬口、待二  
七日、取藥焙乾、搗爲末、每服二錢、用藥酒  
半盞調下、如酒浸用米飲下、一方用金毛  
狗脊一兩、却將乳香、白膠香各一兩同研  
入乾末內、

又方

防風

草薢

當歸

桔梗

敗龜板

枸杞

秦艽

羌活

乾茄根

飯上  
蒸過

虎脛骨

川牛膝

晚蚕沙

炒黃  
蒼耳子

蒼朮

炒七  
次

五加皮

各二  
兩

右判碎絹袋盛浸酒十斤封固一七服如前  
法

三酒除風散濕功力與史國公萬病無憂藥酒  
同要皆治有餘之風痰濕氣耳氣血虛而痰火  
盛四肢痿痺不遂者大補尚未奏功何況此酒

○四肢既病、非烏附及酒性不能達、須佐于  
補藥中、丹溪謂肥人多濕少加附子行經、正是  
此意明哲、當斟酌時宜、隨其氣而加減、補益之  
藥于酒中乃佳、人參浸酒飲治風軟脚弱可  
逐奔馬、故曰駕草曾用有效、安若桂附、瑣陽

容徒取和火煎熬真陰卒至毒發中風暴亡莫  
之能誤、宋子曰有子後一點不宜虧泄、誠保命  
良方也、人惟知慾而不知重命、鞭馬于危途、良  
可太息、倘無子而有此須大補氣血滋陰助精

防風 草薢 當歸 桔梗 贊瘤板

枸杞

秦艽

羌活

乾茄根

飯上  
蒸過

虎胫骨

川牛膝

晚蚕沙

炒黃  
蒼耳子

蒼朮

炒七  
次

五加皮

名二  
兩

參鹿苑草曾用本炒封固一七服如前

藥午時中八角人參氣血虛者風燄脚癩可

止意頭昏當搏酒熱量頭風寒而氣虛益火

蘇藥中丹氣喘促及久嗽無益火

盛○四娘謂神非易制卦不驗每取卦于

陽痿

方書云、男子精盛而思室、內經曰、男子二八精氣盛、陰陽溢泄、若夫鑿喪太過、精液枯竭、則陽道痿弱不舉、中年人雖舉亦不得似壯者、皆精力乏所致、昧者悉指爲陽虛、妄投桂附、墮陽從蓉、徒助邪火、煎熬真陰、卒至毒發、中風暴亡、莫之能誤、朱子曰、有子後一點不宜虧泄、誠保命良方也、人惟知慾而不知重命、鞭馬于危途、良可太息、倘無子而有此、須大補氣血、滋陰助精。

佐以鹿茸鹿角膠、蕤蓉、瑣陽、二二味以兼補命門相火、鼓舞元陽、又須審氣血孰虛、肥人大補氣集靈膏、瘦人大滋陰八味丸爲主、

王節齋曰、男子陰痿不起、古方多云命門火衰精氣虛、固有之矣、然亦有鬱火甚而致痿者、經云、壯火食氣、譬如人在夏暑而倦怠、遇冬寒而堅強、予常親見腎經鬱火而有此症、令服黃柏知母清火堅腎之藥而效故須審察、不可徧認爲火衰也、○節齋長于補陰故所見乃爾、

枸杞子

二兩

地黃

四兩

砂仁

五兩

蘇子酒

五次

瑣陽

人參

二兩

歸身

一兩

鹿角膠

半兩

天門冬

二兩

麥門冬

各一兩

山藥

二兩

五味子

半兩

山茱萸

二兩

澤鴻

兩半

共爲末蜜丸桐子大每服一百九空心白湯

下

瘦人六味地黃丸加枸杞、菟絲、五味、鹿角膠、大

効

東人六味黃味吸肺止氣絲年和氣角大  
集不

骨瘦人

陰

火爲王

王節爲末察脉于大趾頭一百此空心白髮

精氣

山藥

兩

正和子

半

山茱萸

兩

舉頭

兩

半

云狀

龍泉

兩

東角

半

天門冬

半

麥門冬

兩

半

堅強

兩

半

親見

半

白芥

兩

夾絲子

兩

半

知母

兩

半

肺

半

止渴

半

止渴

半

半

知母

兩

半

肺

半

止渴

半

止渴

半

半

知母

兩

半

肺

半

止渴

半

止渴

半

半

知母

兩

半

肺

半

止渴

半

止渴

半

半

知母

兩

半

肺

半

止渴

半

止渴

半

半

經濁氣平肝破氣爲主。與疝同治外以枳實切碎炒熟帛包熨之。冷再易但是陰痛俱妙。

陰莖痛是厥陰經氣滯兼熱用甘草稍蓋欲緩其氣爾若病淋而痛似難一槩治必用清肺氣而清濁自分氣虛六君血虛四物各加黃柏知母滑石石葦琥珀。

新室嫁孔痛宜舒鬱和血四物加香附紅花千金方有人陰冷漸漸入陰囊腫滿晝夜疼痛不已用上好川椒爲末帛包裹囊如不覺熱烘

熱更妙以知爲度內煎大薦湯汁服妙陰冷兩丸如水出汙兩脚痿弱宜補肝湯

陰囊丹溪治濕痒方先以吳茱萸煎湯洗後用吳茱半兩寒水石三錢黃柏二錢半樟腦蛇床子各五錢輕粉一錢白礬三錢硫黃二錢檳榔白芷各三錢爲末摻之陰痒亦妙病後動淫陰卵痛大傷氣血而然八珍加肉桂附子

仲景治陰吹用髮膏散

病後陰腫連小腹及腿屬脾腎兩虛少食大便

不實責之脾、補脾爲先。小水短少責之腎、腎氣丸主之妙在桂附。

陰縮、陰縱。陰縮謂前陰受寒，入腹內也。陰縱謂前陰受熱，挺長不收也。經曰：足厥陰之筋，傷于寒，則縮入；傷于熱，則挺縱不收。

丹溪治鮑子二十餘歲，玉莖挺長，腫而痿，皮塌常潤，磨股不能行，兩脇氣上，手足倦弱。先以小柴胡加黃連、大劑行其濕熱，略加黃柏，降其逆氣，其挺腫漸收，及半，但莖中有堅塊未消，遂以

青皮爲君佐以散風藥末服外以絲瓜汁調五  
倍子末傅而愈 又一人挺長腫痛脉弦而數  
用朴硝荆芥煎湯洗投三乙承氣湯大下而愈  
腎氣丸 見濕門

龍膽瀉肝湯 見脇痛門

青娥丸 見腰痛門

補肝湯

髮膏散 見潤散

三乙承氣湯 見傷寒門