




107 D2 / 67-8-13

67







W. Baillie

S Y N O P S I S
NOSOLOGIÆ METHODICÆ,

EXHIBENS

CLARISS. VIRO RUM
SAUVAGESII, LINNÆI, VOGELII, SAGARI, ET
MACBRIDII,

SYSTEMATA NOSOLOGICA,

EDIDIT

SUUMQUE PROPRIUM SYSTEMA NOSOLOGICUM

ADJECIT

GULIELMUS CULLEN, M.D.

ET NUPER IN ACAD. EDINB. MED. PRACT. PROF. ET
MEDICUS REGIUS APUD SCOTOS PRIMARIUS,
&c. &c.

EDITIO QUINTA,

EMENDATA ET PLURIMUM AUCTA,

DUOBUS TOMIS.

T O M. II.

EDINBURGI:

Prostant venales apud GULIELMUM CREECH,

M, DCC, XCII,

ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS LIBRARY	
CLASS	61
ACCN.	13743
SOURCE	
DATE	

ROYAL COLLEGE
OF
PHYSICIANS
OF
LONDON

P A R S S E X T A .

G E N E R A

M O R B O R U M

P R Æ C I P U A

D E F I N I T A ,

A D D I T I S S P E C I E B U S

C U M H A R U M E X S A U V A G E S I O S Y N O N Y M I S ,

A

G U L I E L M O C U L L E N ,

E d i n b u r g i 1 7 9 2 .

PROLEGOMENA.

RES est inter medicos fatis nota, morbos quosdam natura five causa proxima diversos, externa tamen facie, five symptomatis, adeo similes esse, ut alii ab aliis difficillime internoscantur. Cum autem morbi natura diversi remedia diversa, quandoque etiam contraria, postulent, summi est momenti ut medicinam facientes morbum quemque, a quovis alio, certo dignoscant.

DUM medici vero, in ipso artis usu versati, de morbis distinguendis saepe incerti sint, merito queruntur, in scriptis de re medica, non semper inveniri quae hanc ambiguitatem solvere valeant. Saepe quidem observatum est, descriptiones, five historias,

quas vocant, morborum, in scriptis medicorum reperiundas, plerumque mancas et imperfectas esse; et nemo est, ut opinor, qui non facile agnoscat, historias morborum pleniores, magis exactas, et characteribus melius distinctas, quam quas adhuc habuimus, desideratas esse.

PUTARUNT quidem multi, medicos veteres Graecos et Romanos, in observandis et notandis morborum phaenomenis, diligentes et solertes fuisse, atque in horum scriptis historias morborum complures quae nobis utiles esse possint exstare. Mihi vero videtur vel ineptam et superstitiosam antiquitatis venerationem, vel quandam eruditionis ostentationem, scriptis medicorum veterum in hac re aestimationem nimiam conciliaffe. Minime quidem dissimulandum, in scriptis illis quaedam quae morborum characteres vere delineant subinde reperiri. Quae autem ejusmodi ibi occurrunt, quantumcunque a recentioribus aestimata, parum profecto nos docuissent,

docuissent, et attentionem nostram penitus fortassis effugissent, nisi res eadem nobis ex propria observatione prius innotuissent. Revera, neoterici libros veterum raro, ad primam rerum notitiam comparandam, evolvunt, sed plerumque, ut propria tantum inventa et observationes horum autoritate suffulciant, perscrutantur. Mihi quidem persuasum est, vel historias morborum plerasque, quae in scriptis veterum jam inveniuntur, ad morbos regionis a nostra plurimum diversae pertinere, ideoque nobis parum utiles esse; vel scripta eorum adeo mutilata et corrupta ad nos pervenisse, ut ad usus nostros parum conferre queant. Fatendum saltem, notitiam morborum ex scriptis veterum hauriendam multo minorem esse, quam qua opus est ad illam, de qua diximus, ambiguitatem eximendam.

NEC nisi fero admodum et lente ad hanc rem expediendam progressi sunt recentiores. Seculo enim decimo sexto, Galeni sequaces,
in

in instauratione veterum doctrina, tanta cum laude versati, in horum scriptis explicandis et illustrandis fere solum occupati; parum omnino ad emendandam vel amplificandam morborum historiam contulerunt.

NEC ejusdem aevi medici chemici Galenicorum adversarii acerrimi, in illa re plus fecerunt. Medicamentis enim inveniendis, et promiscue adhibendis, solum intenti, a morborum studio hominum animos profus avertebant.

HINC quidem factum est quod ab instauratis literis seculo decimo quinto, usque ad tempora Sydenhami, nullae fere morborum historiae plenae vel accurate conscriptae sint. Sydenhamus vero, sagacitate et judicio quibus maxime pollebat, majorem in notandis et describendis morborum phaenomenis diligentiam adhibendam esse protinus sensit, et in hunc finem ad sedulam observationem se accinxit, qua plures tandem
et

et meliores, quam antea quisquam, morborum descriptiones protulit.

AD hujus exemplum, et ad normam methodi, per observationes et experimenta, philosophandi, tunc temporis invalescentis, evenit, ut ab eo tempore plures medici, in historiis morborum augendis et accuratius reddendis, operam collocaverint.

A tempore igitur Sydenhami in hac re multum laboris nec frustra impensum est; rem tamen minime adhuc absolutam esse censeo. Multa parum accurata, multa erronea, multa denique prorsus falsa, historiis morborum, quas jam habemus, inesse, novit quisque in his aliquantulum versatus; et novit etiam ex variis causis haec vitia subrepisse. Scriptores enim, alii ad theorias sibi placentes stabiliendas, alii ad fidem remediis ab ipsis sive inventis sive multum laudatis conciliandam; vel veritatem, praeconceptis occaecati, non percipiebant, vel etiam fictis

et

et falsis corrumpebant. Plures, re omniquovis modo mirabili capti, quod ipsi facile crediderunt, alios credere cupientes, rem omnem praeter modum amplificarunt. Plures denique, ut observationibus, hodie adeo expetitis, famam sibi compararent, historias in museo fictas pro veris tradiderunt. Haec omnia, si specialius indigitarem, de imperfecta haecenus morborum historia satis clare constaret; sed haec omnia impraesentiarum praetermitto, et unum solummodo, in historiis morborum conscribendis, vitium, ad rem nostram maxime pertinens, indicatum volo.

MULTI optimae etiam fidei medici, in morbis observandis diligenter versati, in historiis eorum conscribendis saepe nimium, fecerunt. Non solum enim symptomata morbi cujusvis semper praesentia et inseparabilia, sed plura etiam, et cuncta quidem quovis tempore morbum comitantia, recensuerunt. Ita symptomata rarius, nec necessario cum morbo conjuncta, et plura omnino adventitia

ventitia et fortuita, notarunt; dum simul illa inusitata et fortuita ab usitatoribus et inseparabilibus distinguere penitus neglexerunt. Hinc, historiam morborum plenissimam reddere conantes, quae ad distinctionem cujusque ab alio quovis conferre possent, omiserunt, immo difficiliorem reddiderunt.

DE hacce in historiis morborum redundantia saepe conquesti medicinam facientes, pathognomonica quae dicuntur desiderarunt; hoc est, ut notentur symptomata illa pauca, quae cuique morbo adeo propria sunt, ut ab illis solis quisque morbus ab alio quovis illico et certo dignoscatur. Hujusmodi autem pathognomonica in scriptis medicis nondum data, neque unicuique morbo assignata sunt; nec quantum video nisi per Nosologiam Methodicam, rite institutam, assignari queunt.

DUDUM quidem Sydenhamus et solers Baglivius, quo facilius et certius morbi distinguere-

stinguerentur, morbos omnes, per normam methodi botanicae, ad genera et species, appositis characteribus idoneis, referri voverunt: Id est, ut institueretur Nosologia Methodica. Hoc etiam consilium alii summae famae medici comprobarunt, et quisque, ni fallor, in artis usui occupatus factum fuisse vehementer optaret. Nihil tamen hujusmodi protinus tentatum fuit; an quidem ex fructu inde capiendo parum perspecto, an vero ex difficultate operis praevisa, non constat; sed revera nihil omnino tentatum fuit, donec celeberrimus Franciscus Boissier de Sauvages, circa annum 1732, rem aggressus sit.

QUÆ quidem, exeunte seculo decimo sexto, Felix Platerus in morbis secundum symptomata ordinandis conatus est quodammodo huc referri possunt; conatus autem isti inconditi adeo et imperfecti erant, ut quenquam eosdem profecuturum esse vix expectandum fuit; et revera ante Sauvagesium

fiſum nemo, quantum novimus, ulla ex parte profecutus eſt. Haud diſſimulandum quidem, Platerum Sauvageſio quaedam ſuggeſſiſſe; pauca tamen, nec fauſta admodum, et quae nemini uſui fuiſſent, niſi Sauvageſius, cum meliore ſpe, opus multo longius provexiſſet.

IPSE quidem Sauvageſius primum lente et titubanter progrediebatur; et, re iterum atque iterum tentata, non niſi poſt multam lectionem, et aſſiduam per triginta annos meditationem, Noſologiam methodicam ſuam, anno 1762 editam, protulit.

INTEREA, duo alia, in Noſologia methodica, tentamina facta ſunt; alterum a celeberrimo viro, et in diſtributione rerum methodica plurimum exercitato, Carolo a Linne; alterum ab erudito Professore Gottingenſi, Rudolpho Auguſto Vogel. A neutro tamen, utpote veſtigiis Sauvageſii preſſe nimis inſiſtente, opus multum promotum fuiſſe videtur.

CUM de utilitate hujusmodi tentaminum, jamdudum mihi persuasum sit, simulac ad medicinae praxin docendam in hac alma Academia admotus fui, mei officii esse putavi alumnos nostros ad Nosologiae methodicae studium allicere; et, quo facilius hoc efficerem, libellos quotquot ad id conferre possent, hic edendos, et in discipulorum manus tradendos, curavi.

Ex opere Sauvagesii, aliis rebus non admodum utilibus referto, ea tantum quae ad genera et species morborum distinguendas pertinerent excerpti, et cum his Linnæi et Vogelii libellos integros conjunctos edidi.

AUCTORES hi aliquid laudis sine dubio merentur; quanquam enim eorum opera, rem ex toto confecisse minime videantur, nec multum utilitatis tyronibus inexpertis afferre queant; in arte tamen versatis, et in dignoscendis morbis aliquatenus exercitatis, nonnihil commodi exinde oriri possit.

DIEFIGILE

DIFFICILE quidem erit, hanc rem precipue perfectam reddere, nec, ut opinor, nisi tentaminibus repetitis fieri potest. Non solum igitur mihi licitum, sed mei muneris esse, opus hoc Nosologicum, quantum possem, promovere arbitratus sum; eoque consilio methodum quodammodo novam tentavi, et una cum supra dictis edidi. Hanc, etsi nequaquam omnibus numeris absolutam, prioribus tamen in quibusdam magis accuratam inventam fore spero.

QUI ante nos huic studio operam dederunt, minus consulto, ut mihi videtur, rem aggressi sunt; morborum enim species parum perspectas habentes, ad suprema classium et ordinum genera constituenda illico se accinxerunt. A natura vero, species solum datae sunt; et generum constitutio est mentis humanae excogitatio, quae, donec species omnes bene notae et perspectae fuerint, fallax et incerta erit; et in generibus quidem constituendis, nisi ad species semper

per respiciamus, labor noster vanus et futillis evadet.

CONSTITUTIO generum supremorum, in quovis rerum systemate, neuiquam adhuc absoluta est. Classes enim vel etiam ordines, omnino naturales, vel in systemate vegetabili, vel in animali, nondum ubique constitutæ sunt. De fossilibus methodus etiam difficilior, et de morbis fortassis omnium difficillima erit. Videamus igitur quomodo hanc rem quam optime tractare possimus.

CUM res distinguendæ, numero quam plurimæ sint, tum ad investigationem, tum ad reminiscentiam, utilissimum et necessarium esse videtur, ut ad genera quaedam suprema referantur; cum vero species rerum non admodum numerosæ sint, et quarum sigillatim recensitarum reminisci, memoriae in plerisque hominibus vires non excedat, eas, summa sollicitudine, ad classes et ordines referre vix opus esse videtur.

ITA

ITA Illustris De Buffon quadrupedia, quorum species numero paucae sunt, ad classes et ordines referre haud necessarium esse censuit, et quae in hunc finem alii tentarunt, frivola esse, et ad denominationem studiosos plurimum turbantem duxisse, putavit.

ILLUSTRI tamen et egregio viro prorsus assentire nequeo. Etiam si enim institutio classium et ordinum morborum, neque pro investigatione eorum satis perfecta reddi queat, neque pro numero valde necessaria sit; quodammodo tamen tentandam, et ad majorem accuratorem diligenter perducendam esse, puto.

ENIMVERO, si ab illusione quae ex characteribus classium et ordinum oriri queat, cavemus, et, ni fallor, cavere plerumque licet, etiam classium et ordinum institutionem, in multis ad plenioram et magis exactam specierum distinctionem conferre posse contendo. Etsi enim ejusmodi institutionem,

tutionem, ubique certam et accuratam semper assequi haud liceat, ipsos tamen conatus ad illam assequendam magnopere ex re fore putarem, quippe qui ad disquisitiones utiles, tum in pathologia, tum in morborum historia, saepe obvenientes, subinde ducant. Certe, cum de natura morborum disquirere velimus, distinguendi sunt, tum per symptomata cuique propria, tum per illa cum aliis quibusdam communia, quod nihil aliud est, quam morbos, uti alia quaecunque in rerum natura distingui debent, per genera et species distinguere, et huiusmodi distinctio generum, tum supremorum tum proximorum, notationem necessario exigit.

QUANTACUNQUE tamen ex instituendis morborum classibus et ordinibus utilitas provenire possit, certe fatendum est, Nosologos, huic rei praecipue intentos, successus optatos nondum obtinuisse; et ex huius studii adeo imperfecti conspectu, ni fallor, accidit, quod totam rem Nosologicam alii despexerint, alii vero impossibilem judicaverint.

Qui

Qui impossibilem putant, certe falluntur. Distinctionem morborum aliquando difficilem esse, fatentur omnes; possibilem autem in plerisque esse, fateri etiam oportet; nam, si quis hoc negaverit, idem fecerit, ac si nullam esse artem medicam dixisset. Si revera tamen medici morbos a se invicem dignoscere possint, certe quibus indiciis id faciant, etiam dicere queunt. Haec autem indicia nulla alia esse possunt, quam quae morbum quemque per genus et speciem definiant, quae rursus per methodum Nosologicam, rite institutam, solummodo exponi queant.

DISTINCTIONEM itaque morborum, hactenus saepe dubiam, per Nosologiam methodicam magis certam fieri posse, affirmare nullus dubito. Porro observandum, quoties hujusmodi distinctionem morborum exponere conati fuerimus, id commodi oriturum, quod hujus distinctionis vel defectus, vel errores, facillime percipientur, et cum percepti, vel ad observationes jam factas accuratius

curatius considerandas, vel ad obfervationes poſtea diligentius faciendas, ducent; quin et plurimum valebunt, tum ad Noſologiam methodicam, tum ad diſtinctionem morborum, tandem perfectiorem reddendam.

QUAMVIS morborum characteres haecenus propoſiti ſaepe erronei, ſaepe deficientes ſunt; tentamina tamen omnia jam facta exhibere cupiens, in tertia Synopſis editione ex ſyſtemate ſymptomatico Cl. Michaelis Sagar, quae ad genera morborum definienda pertineant, excerpſi, et in hac quarta editione, Ingenioſi Davidis Macbride, Tabulas Noſologicas addidi, et caeteris ſupra memoratis ſubjunxi. Haec autem tentamina omnia ſimul edita ſunt, ut juxta poſita facilius conferri poſſint, et ut collata vel optimos et maxime idoneos characteres indicent, vel ad erroneos corrigendos, et ad diſtinctiones magis exactas obtinendas, lectores ducant.

HUJUSMODI

HUJUSMODI studium plurimis medicis necessarium fore facile credo ; nam morborum titulis inhaerentes, notiones parum accuratas et determinatas habent ; et, quantum video, ad magis exactas, nisi nosologiae methodicae studio, duci vix possunt.

Ex iis quae jam diximus, tum utilitatem tum necessitatem Nosologiae Methodicae manifestam fore spero ; et simul patebit, quare antehac, et nunc etiam, eandem colere allaboravi. Proximum est, ut in hisce prolegomenis, quas in hoc studio regulas ipse observavi, et ab aliis observandas vellem, nunc exponam.

PRIMA et praecipua nostra cura fuit, ut morborum species in ipsis aegris praesentes detegerentur et dignoscerentur. Cum vero species nisi simul genus indicaretur, vix recte definiiri possint ; et cum genera plurima a Nosologis indicata unius tantum speciei sint, inde factum est, quod nostri etiam labores, in generibus praesertim distinguen-

dis, impensè videantur. Ad species tamen semper respeximus; et ad eas dignoscendas, characteres generum a nobis datos ubique utiles fore speramus.

In generibus morborum recensendis, pauciora, quam in aliis systematibus dicta sunt, recensui; quod si recte feci, id studiosis, multitudine rerum contemplanda facile turbatis, imprimis commodum esse puto. Etiam si enim numerum generum minuens aliquando erraverim, id tamen tuto tentatum fuisse censeo; cum enim discipuli nostri genera facile et satis certo distinguenda recte perspexerint, illos genera forte omissa facile postea agnituros esse, credo.

GENERA morborum vero apud nos, quam apud alios Nosologos, necessario pauciora sunt; quia plura, pro diversis ab aliis habita et recensita, a nobis, utpote nulla, quantum nobis videtur, re diversa, sub uno titulo comprehensa sunt; et hujus rationes postea locis idoneis tradendae venient. In-
terea

terea notandum, plura genera, quae primo intuitu omiffa videantur, nequaquam ex oculis studioforum sublata effe, cum generis illius, ad quod pertinere nobis videntur, uti fynonyma recenseantur, et locum suum in indice adhuc retineant.

DEINDE, genera morborum a nobis, quam ab aliis enumerata et definita, pauciora sunt; quia nulla, nisi idiopathica et primaria notanda effe duximus; dum plura ab aliis memorata, fympathica tantum sunt, sive fympptomata nusquam per se existentia; et neutiquam igitur pro morbis primariis agnoscenda. Ita *Carphologia*, *Pandiculatio*, *Rigor*, *Sternutatio*, *Oscedo*, *Singultus*, *Stertor*, *Anxietas*, *Lassitudo*, *Stupor*, *Pruritus*, *Algor*, et *Ardor*, a SAUVAGESIO, et alia ab aliis, pro generibus recensita, a nobis penitus omittuntur; et recte, ni fallor, nisi quot fympptomata, totidem genera morborum, ponere velimus.

DENIQUE, genera morborum apud nos pauciora sunt; quia, ex classibus VITIORUM
et

et DEFORMITATUM, plura a nobis omittuntur; vel quod morbi adeo leves sint, ut medicorum attentionem et curam non mereantur; vel quod congeniti et immutabiles medicorum artem penitus eludant. Ita *Lentigo, Leuce, Cyasma, Seline, et Cicatrix*, ex classe VITIORUM; et *Phoxos, Gibber, Rhyssemata, Canities, Coloboma, Naevus, Monstrositas, Rhicnosis, Varus, Valgus, Leio-pedes, Saniodes, Cripforchis, Hermaphroditus, Dionysiscus, Galiancon, Galbulus*, et alia ex classe DEFORMITATUM apud VOGELIUM recensita, recte a nobis omissa putamus. Eiusmodi vitia et deformitates, fortassis in pathologia, sive historia generali, mutationum quas, quavis occasione, subit corpus humanum notari possent; Nosologiam autem methodicam iis adeo frivolis onerare, vel eandem tam multis novis et inutilibus appellationibus turbare, minime idoneum videtur. Judicet itaque lector, quam merito gloriatur Cl. SAGAR, se generum numerum auxisse.

QUOD,

QUOD, modo memorata omiserim, venia forsitan mihi facile dabitur. Sunt autem alii morbi, memoratu quidem digni, quos omissos non adeo facile condonabit studiosus. Hujusmodi omissiones agnosco, et quidem doleo; sed variae rationes, ut quidam morbi hic omitterentur, effecerunt. Primo, fieri potest, ut quidam observationem nostram penitus effugerint; deinde, sunt alii fatis noti, quibus, in nostro systemate, locus idoneus nusquam inventus est; denique, sunt alii quorum historia apud medicos adeo sit imperfecta, ut nec locus nec character idoneus iis assignari queat. Ne tamen ejusmodi genera penitus omitterentur, ad calcem operis, omissorum, quotquot noverim, catalogum subjunxi, ut posteri perspicaciores, ea diligentius perpendentes, characteres et locum iis assignent.

EODEM consilio, ne scilicet tyronibus contemplanda praeter necessitatem multiplicarentur, non genera solum, sed species morborum etiam ad minorem numerum redegimus.

redeggi. Hoc magis periculosum videri potest, cum nullam speciem, quae revera existat, recte omittere liceat. Ne quidem ad recensitionem specierum ipse accederem, difficultas operis me dubium, et timidum antehac diu cohibuit; et id tantum tentare ausus sum, ut species, a SAUVAGESIO recensitas, serie paulo luculentiore et emendatiore traderem: Re autem amplius et curatius perpensa, species jam recensurus, numerum eorum, apud SAUVAGESIUM recensitarum, multum minuendum esse, arbitratus sum.

SOLUS quidem SAUVAGESIUS, nam SAGARUM nihil moror, in recensitione specierum quicquid praestitit; et licet egregius vir, plurimis observationibus undique collectis, multum de re medica meritus sit; haud tamen diffimulandum, illum in multis graviter errasse, dum species revera easdem, sub diversa appellatione repititas, pro diversis ponebat; et praesertim dum species sympathicas, tam saepe idiopathicis immiscebat, qua ratione earum numerum totum

tum praeter modum auxit. Hos ut tolle-
rem errores, quod potui feci, numerosis
nempe apud SAUVAGESIUM speciebus, recte,
quantum ego judico, ad pauciores redactis.

QUOD ut efficerem, primo species plures,
ut diversas a SAUVAGESIO recensitas, pro
una eademque habui, et sub uno titulo po-
sui; atque hujus rei rationes locis suis ido-
neis posthac tradendae sunt.

DEINDE, cum species idiopathicas solum
pro veris et genuinis enumerare velim, quot-
quot pro symptomaticis habere potui, toti-
dem ex numero specierum apud SAUVAGE-
SIUM sustuli. Cum autem, in recensione
specierum symptomaticarum aliquis usus sit,
earum recensionein, seorsum tamen, denuo
apposui.

DENIQUE, alia et praecipua ratio, qua
specierum, a SAUVAGESIO recensitarum,
numerum minuendum esse censui, ea est,
qua plures ab eo pro diversis positas, pro
specierum

specierum varietatibus, tantum habui et enumeravi.

Hoc autem est, quod in Nosologia Methodica maxime difficile videtur, dicere nimirum, quid pro ipsa specie morbi, quid pro ejusdem speciei varietate, tantum habendum sit. Cum autem criteria illa, quae in Zoologia et Phytologia, ad species a varietatibus certius distinguendas adhiberi possint, in Nosologia Methodica nequaquam invenienda sint; varietates morborum a speciebus distinguere ubique difficilius erit. Quamobrem varietates plures recensere, tutissimum et fere necessarium esse duxi. Ejusmodi vero distinctionem, in artis usu utilissimam fore ratus, illam adhiberi ubique annifus sum; quod si non in omnibus, cum aequae certa cognitione, cum aliqua saltem verisimilitudine, diligenter quae sequuntur pensitatis, saepe fecisse videor.

CUM morbus aliquis, quo plures homines laborant, symptomata cujusdam speciei characteristica

raſteristica omnia et ſolo, in unoquoque
 oſtendit; quantumvis haec in alio minus,
 in alio magis vehementia ſint, hoc ſpeciem
 diverſam exhibere non putamus; et, in u-
 niuerſum, morbos gradu ſolum differentes,
 non niſi ejuſdem ſpeciei varietates praebere
 cenſemus.

Tunc igitur de varietate a ſpecie diſtin-
 guenda quaefſioni tantum locus eſt, cum in
 diverſorum hominum morbis, vel ex ſolitis
 cujuſvis ſpeciei ſymptomatis, quaedam ab-
 ſint, vel iſdem quaedam addita ſint.

Cum ex ſymptomatis ſolitis quaedam ab-
 ſint, quoties inter ſymptomata, quae magis,
 et ea quae minus, eſſentialia ſunt diſtingue-
 re liceat, ex horum abſentia non niſi varie-
 tatem aſſeſſe concludimus.

Cum vero ſymptomatis characteriſticis
 alia quaedam addita ſint, ſi addita pro ſymp-
 tomatis ſymptomatum, potius quam pro
 D ſymptomatis

ſymptomatis cauſae haberi queant, varietatem tantum conſtituunt.

DENUO, cum ſymptomata addita, in ſpecie data, prorfus inſolita ſint, et ſimul conditiones morbi praecipuas parum vel nihil mutari videantur, haec quoque varietatem tantum praebere cenſenda.

CUM morbi genus quoddam, ex principiis diverſis oriri queat, idem, ex diverſitate principii, ſpecie diverſum evadere poteſt, nec ſemper tamen; nam, quotieſcunque diverſitas illa parva fuerit, et ſimul ſymptomata parum ab ea fuerint mutata, hoc etiam non niſi varietatem exhibere, putamus.

MORBI genus itidem, pro diverſa ejus ſede, diverſae ſpeciei fieri poteſt; quotieſcunque vero ſedes diverſa, neque partis ſtructurae, neque functiones ratione differat, hujusmodi ſedis diverſitas etiam pro varietate tantum habenda eſt.

PORRO,

PORRO, cum de morbis invicem distinguendis hic agatur, observari vellem, res duas esse, quae ad similitudinem et affinitatem morborum, in diversis hominibus indicandam, plurimum facere possint.

ALTERA est, quod principii quaedam similitudo, morborum inde in diversis hominibus genitorum similitudinem arguit; ita, quando morbi diversorum hominum, ex uno eodemque principio oriuntur; quando, etiam principium illud, ad morbum gignendum, in unoquoque necessarium fit; denique, quando idem principium, ubique fere ejusdem qualitatis et vis esse videatur, tum demum morbos, ex ejusmodi principio genitos, ejusdem vel simillimae naturae esse, judicare licet.

Hoc de morbis contagiosis plerisque valere mihi videtur. Ex his enim sunt, qui in pluribus hominibus ab eadem specifica contagione oriuntur; nec, in eorum aliquo morbus, nisi ab illa contagione applicata, oriri

oriri unquam observatur; et simul illius contagionis vires et qualitates, ubique fere, eadem esse videntur. Quod ad proxime dictum spectat, id quibusdam dubium videri potest; sed cum ejusdem contagionis effectus, per secula plura jam observati, semper et ubique admodum similes sint, eam qualitate et viribus eandem esse, merito concludimus; et, ob hoc praesertim, quod effectus isti, quatenus diversi videantur, plerumque hominis infecti conditioni cuidam, potius quam contagioni, qualitate vel viribus diversae, tribui possunt.

MORBOS, itaque, eadem contagione specifica ortos, simillimae naturae esse credendum; ejusmodi morbos etiam vix, nisi unicam ejusdem generis speciem, praebere; immo, earum diversitatem quandam aliquando observatam, non nisi ejusdem speciei varietatem indicare, suspicandum est.

HÆC omnia, non solum de exanthematibus contagiosis, sed etiam de plerisque febribus epidemicis, dicta velim. Hanc autem opinionem, de similitudine febrium epidemicarum proferens, a gravis auctoritatis viro SYDENHAMO, hujusmodi febres specierum plurium esse statuente, dissentire cogor. Recte quidem, an secus, multum dubito; et posteris litem dirimendam relinquo, hoc simul praemonito, plurimum medicinam facientibus inter futurum, de alterutrius sententiae veritate sibi satisfacere, vel potius quos limites utrique sint ponendi, statuere.

ALTERA res, quae similitudinem morborum, in diversis hominibus, ostendere possit, est similitudo remediorum quibus sanantur. Similitudo quidem morborum in similitudine causae eorum proximae, qualiscunque sit, revera consistit; cum remedia vero morbis medeantur, tantum quatenus causas eorum proximas tollant, morbos, qui
iisdem

iisdem omnino remediis sanantur, ejusdem naturae esse oportet.

HUJUSMODI ratiocinatio, tum ad phlegmasiarum missione sanguinis, tum ad februm intermittentium cortice Peruviano sanatarum, similem naturam indicandam, plurimum certe facere potest. Hanc autem doctrinam, utcumque in praxi medica aliquando utilem, fallacem tamen, neque in praxi, neque in Nosologia methodica, nisi caute admodum, adhibendam esse censeo. Apud vulgus medentium quidem, remedia eadem quibusque fere ejusdem generis, speciebus, et harum varietatibus adhiberi, et hinc genera plura nullo modo specie differre, videantur. Sed peritiores norunt, morbos, aliquo modo diversos, rarius quam putatur, ab iisdem prorsus remediis sanari: Bene etiam norunt, ex promiscua remediorum adhibitione fieri, quod eadem remedia adeo saepe frustranea, sanationes saltem minus perfectae sint. Porro, norunt expertissimi, ad recte medendum, omnino o-

pus esse, ut remedia, non solum generi sed speciei cuique, et saepe etiam varietatibus quibusdam, apprime sint accommodata.

AD artem medicam breviorē, et exinde faciliorem, reddendam, species morborum quasucunque, a varietatibus suis distinguendas esse, arbitratus sum. Hanc tamen distinctionem in pluribus quodammodo incertam esse fateor, et, in Nosologia methodica, tutissimum fore puto, varietates morborum plerasque notare et recensere. Hoc itaque praestare ubique annifus sum, aliis sapientioribus, qui posthac huic opere se immiscere velint, relinquens, discriminationem magis certam statuere.

EXPOSITA jam qua ratione morborum, tum generum, tum specierum, numerum minuere laboravi; superest, ut quo modo eorum, quae admisi, characteres constituendi sunt, nunc exponam.

IMPRIMIS,

IMPRIMIS igitur, notas externas, sensibus nostris facile obvias, ubique selegi, neglectis, vel potius rejectis, de statu corporis interno conjecturis quibuscunque. Porro, ex notis quae sensibus sunt obviae, illas medici potius quam aegri sensibus percipiendas, semper praetuli; quum tamen has, utcunque fallaces, penitus negligere vel omittere non liceat.

SECUNDO, ea symptomata pro notis characteristicis praecipue seligenda putavi, quae perpetuo cum morbo praesentia sunt, et hoc quidem semper annitendum esse puto. Cum vero plurimi morbi sub eorum decursu, aliam atque aliam omnino formam capiant, in his, ex serie rerum, et symptomatum sibi invicem succedentium, character saepe necessario petendus est.

IN hac re autem tractanda, duplex quaestio exoritur. Prima est, An ex morbi principio characteris partem desumere liceat?

AD hanc responderi possit, quod, etiam si de principiis morborum apud medicos iudicium saepe fallax, et prorsus falsum sit, nec temere idcirco ad morbos distinguendos adhibendum; cum eadem tamen aliquando satis certe nota sint, et facile observanda, huiusmodi principia in Nosologia, pro notis characteristicis recte adhiberi posse censeo.

ALTERA quaestio hic exoriens est, quatenus ex serie symptomatum, sub decursu morbi occurrentium, characterem ejus petere liceat? Ad hanc etiam possit responderi, quod, cum plures morbi, uti exanthemata et febres intermittentes, nisi post decursum aliquot dierum, ex serie symptomatum sibi invicem succedentium, nullo modo dignosci queant; ut huiusmodi morbi distinguantur, ex serie illa character necessario sumendus est. Characteres autem, non nisi post longum morbi decursum, fortassis non nisi post morbum finitum, statuendi, nequaquam in Nosologia usurpari debent. Ita apud Ill. LINNÆUM *Febrium*

E cont.

continentium, quas vocat, characteres a diurnitate totius morbi desumpti prorsus inepti sunt.

IN constituendis morborum characteribus, regula tertia est, quod, cum quisque fere morbus, ex plurium symptomatum concursu solum dignoscatur, ex iis pro notis characteristicis quot sufficiant; nec plura tamen adhibenda sunt. Priores Nosologi mihi videntur, in characteribus quos dederint, plerumque nimis breves et deficientes fuisse; et forsitan mihi vitio verti potest, quod aliquando sim in iisdem nimis longus et redundans. Nusquam quidem volens fui redundans; ut vero essem copiosus ubique me conatum fateor, prudentissimum fore ratus etiam ad redundantiam appropinquare, quippe posteris multo facilius erit, quod nimium est tollere, quam quod deficiat supplere.

IN characteribus denique morborum constituendis, quaeritur etiam, an ex defectu
functionis

functionis cujuscunque, quae in sano unquam exercetur, vel ex absentia symptomatum, in aliis generibus vel speciebus apparentium, notas quasdam desumere liceat? SAUVAGESIUS quidem defectus functionum, utpote nihil positivum indicantes, pro morbis noluit admittere; plures igitur, qui a LINNÆO sub ordine *constrictiorum*, et a VOGELIO sub classe *episcesium*, recensentur, penitus omisit.

SED, pace tanti viri, dixerim, quanquam defectus, si strictius loqui velimus, nihil positivum indicet; defectum tamen functionis, quam exercet quisque sanus, statum corporis humani exhibere, quem ut distinguamus utilissimum est, atque etiam necessarium, et ejusmodi status pro morbo recte haberi potest. Porro, etiamsi in quibusdam defectus isti aliquando sine molestia vel morbi symptomate observentur; in plerisque tamen magnam molestiam, et symptomata plurima pariunt. In his igitur, defectum functionum, saepe symptomatum causam manifestam,

manifestam, pro morbo haberi licet, et ex ejusmodi defectu, in plurimis morbis horum notas characteristicas petere licet, et oportet. SAUVAGESIUS ipse in hac re parum sibi constare videtur, *Debilitatum* classem instituens, et *Amnesiam*, *Agrypniam*, *Ischuriam*, et alia etiam tanquam genera recensens.

QUOD notas ex absentia symptomatum, in aliis congeneribus apparentium, spectat; eas nequaquam bonas, et, ubicunque fieri potest, evitandas censeo. In pluribus vero vitari, quantum video, non possunt; nec a quovis Nosologo adhuc fuerunt vitatae.

CUM, secundum has regulas, characteres morborum constituendi sint, plurimum refert, eosdem sermone accurato et luculento exprimere; nec minus, morbum quemque apto nomine insignire.

NORŪNT eruditi, III. LINNÆUM methodum plantarum perfectiorem reddidisse, eo, quod

quod botanices linguam, usurpatis ubique vocibus maxime idoneis et definitis, magis accuratam effecit ; nec quidem dubito quin delineatio morbi, ad instar delineationis plantae, a LINNÆO exhibitae, in Nosologia multum profutura sit. In Nosologia autem, ac in botanice, non aequè necessarium esse videtur ; tum quod tam multae rerum circumstantiae, in Nosologia, ac in botanice, notandae non veniunt ; tum quod symptomatologia, in quibuscunque fere Pathologiae generalis systematibus exhibitae, plurimum in hac re jam praestitit. Fatendum quidem, symptomatologias vulgo prolatas, nec adeo plenas esse, nec adeo exactas, ac optandum esset ; et, si pleniores fierent, atque ubique voces magis idoneae et accurate definitae usurpatae essent, ad Nosologiam perficiendam certe plurimum conferre posset. In hujusmodi vero tentamine cavendum est, ne distinctiones nimium subtiles et dubiae adhibeantur, uti ab auctore *Observationem Clinicarum*, quae Warsaviae annis 1767 et 1768 prodierunt, factum fuisse opinor.

opinor. Ipse quidem hujusmodi nihil tentavi, tum quod plus exegisset, quam per longum tempus mihi suppetivit otii, tum quod mihi minus necessarium videtur, qui voces apud medicos usitatissimas, et in sensu vulgo recepto, ubique fere usurpandas curaverim.

QUOD ad denominationem morborum attinet, in Classium, Ordinum, et Generum nominatione, eas, quantum potui, regulas observavi, quae in LINNÆI *Criticis Botanicis*, et in ejusdem *Philosophia Botanica*, ab ill. auctore traduntur.

QUANDO notiones novae sunt proferendae, etiam nova nomina imponenda sunt, et ejusmodi aliquando, parcius licet, adhibuimus. Cum vero nomenclaturam medicam, diuturno usu confirmatam, sine gravi causa mutare non liceat; ne factum esset ubique curavimus: quod tamen Ill. LINNÆUM saepe, nulla urgente necessitate, fecisse, et VOGELIUM appellationibus novis, frivolis, ineptisque, Nosologiam deturpasse, observavimus.

UT clarior et certior habeatur morborum notitia, appellationibus selectis, synonyma, tum aliorum Nosologorum, tum auctorum maxime celebrium, ubique apposuimus. Hoc diligentius feci, ut inde norint studiosi, ex quibus praecipue scriptis, morborum scientia optime obtineri possit.

IN recensendis specierum synonymis, appellationes, quibus SAGARUS usus sit, omisi, tum quod ipse aliorum auctorum synonyma ubique omittens, nos de speciebus, quas indicare voluit incertos, saepe reliquit; tum quod, in recensione specierum, illum profecto minus peritum fuisse, et regulas Nosologiae methodicae optimas quasque neglexisse, nobis videtur.

SYNONYMA veterum medicorum adhuc omisi, non quod eorum scripta prorsus negligenda esse putaverim, sed quod ego, neque fatis certo, neque cum fructu, synonyma eorum indicare potuerim.

S E R I E S

CLASSIUM et ORDINUM*.

CLASSIS I. PYREXIÆ.

- ORDO I. FEBRES.
II. PHLEGMASIÆ.
III. EXANTHEMATA.
IV. HÆMORRHAGIÆ.
V. PROFLUVIA.

CL. II. NEUROSES.

- O. I. COMATA.
II. ADÝNAMIÆ.
III. SPASMI.
IV. VESANIÆ.

* Classium institutionem primo a SAUVAGESIO datam, LINNÆUS, VOGELIUS, et SAGARUS, et omnibus fere, secuti sunt. Cum vero ex eorum classibus plures sint, uti VITIORUM, ANHELATIONUM, DOLORUM, et FLUXUUM, neque naturales, nec quovis modo idoneae, ejusmodi institutionem sequi non potui. Aliam itaque simpliciore, et in universum,

ut

CL. III. CACHEXIÆ.

- O. I. MARCORES.
- II. INTUMESCENTIÆ.
- III. IMPETIGINES.

CL. IV. LOCALES.

- O. I. DYSÆSTHESIÆ.
- II. DYSOREXIÆ.
- III. DYSCINESIÆ.
- IV. APOCENOSES.
- V. EPISCHESES.
- VI. TUMORES.
- VII. ECTOPIÆ.
- VIII. DIALYSES.

ut mihi videtur, aptiorem, hic protuli. Hæc fortasse etiam minus absoluta videri possit, quod inter morbos totius systematis, in primis tribus classibus recensitos, et illos partis singularis, sive LOCALES, in classe quarta collocatos, distinctio non ubique facilis erit. Hoc quidem, rarius licet, aliquando fieri posse concedimus. Sed nihil præstantius nobis nunc suppetit; et, ob rationes in Trolegominis, pag. xii. allatas, de perfecta classium institutione non admodum solliciti sumus.

CL. I. PYREXIÆ.

CHARACTER. Post horrorem pulsus frequens, calor major, plures functiones laesae, viribus praesertim artuum immunitis*.

SYNONYMA. Morbi febriles *Autorum.*

* Quod hic, et pluribus quae sequuntur locis, nobis forsitan vitio verti possit, quodammodo hic obiter excusare liceat. Ita, dici potest, pyrexias aliquando videri, quas nullus praecesserat horror, et pyrexias in quibus neque pulsus frequentior, neque calor major, quam in sanis esse solet; characterem ideo datum neque verum, neque ubique adhibendum. Istiusmodi pyrexias, rarissime licet, aliquando videri negare nolo; sed, in characteribus classium, ad species dignoscendas adhibendis, ut singulae classis notae in unaquaque specie conspiciantur, haud necessarium videtur, et sufficit, si earum pleraeque in specie quavis adsint.

Character idoneus quisque, plurium notarum sive symptomatum concursum notare debet, et male quidem

ORDO I. FEBRES.

Praegressis languore, lassitudine, et aliis debilitatis signis, pyrexia sine morbo locali primario.

Febres *Auctorum* S. Cl. II. V. Cl. I. *Sag.* Cl. XII.

Morbi febriles critici L. Cl. II.

dem cum veteribus VOGELIUS calorem auctum solum, et recentiores SYLVIUS et Cel. BOERHAAVIUS pulsum velocitatem solum, pro caractere pyrexiae, sive febris ut vocant, posuerunt. Certe, qui dicunt febrem adesse, etsi pulsus nihilo naturali frequentior sit, ex aliis quam velocitate pulsum signis febrem adesse judicant; quod etiam plurimum symptomatum notationem, in quovis caractere necessariam esse, ostendit.

Porro, hic obiter observari velim, pulsum velocitatem solum, pyrexiam vel febrem adesse nequaquam semper indicare; cum a causis externis plurimis pulsus fit naturalii velocior, sine morbo, sive quavis functionum laesione. Hisce de pyrexiae caractere quaestionibus, in caractere a nobis hic dato, quantum potuimus, prospectum est. Sed, in aliis classium et ordinum caracterebus adeo felicem esse vix licet; et in caracterebus plerisque, si ad species plerasque character recte adhiberi possit, paucas exceptiones non moror. Utilem plerumque fuisse mihi sufficit, ubique perfectum fore non spero.

SECT. I. INTERMITTENTES,

Febres, miasmate paludum ortae, paroxyf-
 mis pluribus, apyrexia, saltem remissione
 evidente interposita, cum exacerbatione
 notabili, et plerumque cum horrore re-
 deuntibus, constantes: Paroxyfmo quo-
 vis die unico tantum*.

Intermittentes *Auctorum* S. Cl. II. O. III. L. Cl. II.
 O. II. V. Cl. I. O. I. *Sag.* Cl. XII. O. III.

Remittentes *Auctorum* S. Cl. II. O. II. *Sag.* Cl. XII,
 O. II. †.

* Qui perpenderit quae de febribus *remittentibus*,
 quae videntur continuae, a *continuis*, strictius dictis
 distinguendis, mox dicenda sunt, facile videbit quam-
 obrem, tum intermittentium tum continuarum charac-
 terem antea datum, hic mutare necessarium habui.

† Februm *remittentium*, quasi a febribus *inter-*
mittentibus exquisitis prorsus differentium, ordinem
 separatum instituerunt Nosologi SAUVAGESIUS,

LIN.

Exacerbantes L. Cl. II. O. III.

Continuae V. Cl. I. O. II. *.

Continuae periodicae *Sennert* de febr. Lib. II. cap.
13.

Continuae remittentes, *Boerb.* Aph. 727.

Compositae ex acuta periodo, *Junk.* Tab. 82.

Continuae remittentes, proportionatae, *Torti.* The-
rap. Spec. L. V. cap. I.

Continentes *Mortoni,* Exerc. II.

LINNÆUS, et SAGARUS; minus recte tamen, si mihi
judicare fas sit. *Remittentes* enim, quae dicuntur, ex
eodem principio, miasmate nempe paludum, ac *in-*
termittentes, oriuntur, iisdem in locis, et eodem anni
tempore, utraque simul epidemice grassatur; utraque
iisdem prorsus remediis sanatur; et saepissime in eo-
dem homine idem, qui videtur, morbus nunc inter-
mittentis nunc remittentis typum exhibet. Morbi
idcirco, causis, sanatione, et typo simillimi, nec ad
ordinem, nec ad sectionem diversam distrahendi
erant.

* Magis inconsulto adhuc VOGELIUS *remittentes*
omnes cum *continuis* sociavit. *Continuae*, quas voca-
mus, omnes quidem remissiones et exacerbationes
ostendunt; sed a *remittentibus* ad *intermittentes* meri-
to referendis, plurimum aliis multis differunt, ut mox
dicetur.

GENUS I. TERTIANA.

Paroxyfmi fimiles intervallo quadraginta octo circiter horarum : Accessionibus meridianis.

Tertiana *Auctorum*, S. G. 88. L. 16. V. 2. *Sag.* p. 704. *Hoffm.* Tom. II. pag. 11. *Stabl.* de tertiana febris genium univcrfum manifestante, Halae 1706. *Ejusd.* *Casual.* magn. Caf. 21. *Casual.* min. Caf. 96. *Cleghorn's* diseases of Minorca, cap. III. *Senac*, de recond. febr. natura. Edinb. Med. Eff. vol. iv. art. 24.

TERTIANA est vel

I. Interposita apyrexia, quae

1. Variat paroxyfmi duratione.

A. Tertiana paroxyfms haud ultra horas duodecim extenfis.

Tertiana legitima, S. fp. 1. *Sennert.* de febr. L. II. cap. 18. *Hoffm.* Tom. II. p. 12.

Tertiana vera, *Clegh.* Min. p. 140.

B. Tertiana paroxyfms ultra horas duodecim extenfis.

48 GENERA MORBORUM

Tertiana notha five spuria, S. sp. 2. *Sennert.* de febr. L. II. c. 18. *Clegh.* Min. p. 140. *Hoffm.* Tom. II. p. 12.

2. Variat paroxysmorum recurfu.

C. Tertiana quotidie revertens, paroxysmis inaequalibus, alternis similibus.

Tertiana duplex, S. sp. 13. *Sennert.* de febr. L. II. c. 21. V. G. 12. *Clegh.* Min. p. 141.
Duplicana L. 18.

D. Tertiana alternis diebus revertens, paroxysmis eodem die binis.

Tertiana duplicata, S. sp. 14. *Jones,* de febr. interm. P. II. cap. 6. *River.* Cent. IV. obs. 16.

E. Tertiana quotidie revertens, paroxysmis altero die binis, altero unico tantum.

Tertiana triplex, S. sp. 15. *Clegh.* Min. p. 142. Semitertiana *Hoffm.* II. p. 40.

Semitertiana primi ordinis *Galen* *Spig.* de semitertiana, L. II. cap. 4.

F. Tertianæ quotidiæ revertens, interposita remissione inter diem imparẽ et parẽ magis, inter parẽ et imparẽ minus, notabili.

Hemitritæus, *Celsi* L. III. cap. 3.

Semitertiana, *Clegh.* Minorc. p. 143. *.

Semitertiana secundi ordinis, *Galen.* *Spig.* L. II. c. 5.

Amphimerina hemitritæus, S. sp. 8.

Amphimerina pseudo-hemitritæus, S. sp. 9. *.

3. Variat symptomatibus.

G. Tertianæ affectibus soporosis stipata.

Tertianæ carotica, S. sp. 10. *Werlbof.* de febribus, et auctores ab eo allegati, p. 6.

Tertianæ hemiplegica, S. sp. 20. *Werlbof.* ibid.

Quotidiana soporosa, S. sp. 8. *Car. Pif.* obs. 175. 176.

Febris caput impetens, *Sydenh.* Ep. ad R. Brady.

H. Tertianæ spasmodicis et motibus convulsivis stipata.

* Fortassis hemitritæa quævis ad remittentes relegari possit; et, licet affines separare nolui, limites non satis certe ponendos esse fateor.

50 GENERA MORBORUM

- Tertiana asthmaica, S. sp. 6. *Bonet*, Polyalth. Vol. I, p. 250.
- Tertiana hysterica, S. sp. 8. *Wedelli* A. N. C. Dec. I. A. II, ob. 193.
- Hysteria febricosa, S. G. 135. sp. 8. A. N. C. Dec. I. Ann. II. obf. 193.
- Tertiana epileptica, S. sp. 16. *Calderae* Trib. med. p. 225. *Lautter*. Histor. med. bienn. Cap. II. caf. 2.
- Quotid. epileptica, S. sp. 3. *Edinb. Essays*, Vol. V. P. II. art. 49.
- Ecclampsia febricola, S. G. 133. sp. 17.
- Epilepsia febricosa, S. G. 134. sp. 9.
- Tertiana tetanodes *Medici* Beobacht, I. Band. p. 24.
- Tetanus febricosus, S. G. 122. sp. 10. *Stork*, Ann. Med. II. p. 163.

I. Tertiana efflorescentia cutis stipata.

- Tertiana petechialis, S. sp. 3. *M. Donati*, L. III. cap. 14. *Lautter*. Hist. Med. cap. II. caf. 10.
- Tertiana scorbutica, *Wedel*. A. N. C. Dec. I. A. II. Obf. 193.
- Tertiana urticata, S. sp. 22. *Planckon*. Journ. de med. 1765. *Clegb*. Minorc. p. 157.
- Tertiana miliaris, S. sp. 21. *Walthieri* de med. German. apud *Roncalli* Europ. med. p. 151.

K. Tertianæ phlegmasia stipata.

Tertianæ pleuritica, S. sp. 4. *Valesii* in epid. L. 1.

Seçt. 3. *Lautt.* hist. med. cap. II. cas. 5. 9.

Pleuritis periodica, S. G. 103. sp. 14.

Tertianæ arthritica, S. sp. 5. *Morton* Exerc. I. cap.

IX. hist. 22. *Lautt.* loc. cit. cas. 19.

4. Variat aliis morbis complicata.

Tertianæ scorbutica, S. sp. 9. *Etmuller*, prax. L. 1.

Seçt. XVI. cap. 2. *Timæi* L. VIII. cas. 15.

Tertianæ syphilitica, S. sp. 17. *Deidier* de morb.

vener. Seçt. IV.

Tertianæ verminosa, S. sp. 18. *Stiffer*. in act. Helm-

stad. *Lancis* de noxis palud. L. II. cap. 5. et 6.

Illust. *Pringle* Diseases of the army, p. 98. *Rä-*

mazzini const. epidem. rural. ann. 1690. Seçt.

XI. *Van den Bosch*. Const. epid. verminos. ann.

1760, &c.

5. Variat ratione principii*.

* Nullum quidem febrium intermittentium prin-
cipium sufficiens præter miasma paludum agnosci-
mus; sed, cum miasma hoc non semper validum sit ad
morbum arcessendum, nisi aliae potestates excitantes
simul

Tertiana accidentalis, S. sp. 12. *Sydenham*, cap. 5.

Tertiana a scabie, S. sp. 11. *Juncker*, tab. 80. *Hoffm.*

II. p. 12.

II. Interposita remissione tantum*.

Tritaeophya, S. G. 85. *Sag.* p. 695.

Tritaeus, L. 21.

Hemitritaea, L. 23.

Tertianae remittentes et continuae *Auctorum*.

Tertianae subintrantes, proportionatae, subcontinuae

Torti Therap. Special. Lib. III. cap. 1.

simul agere concurrant; has potestates excitantes pro parte principii hic admittimus, licet neutiquam morbum excitassent, si miasma paludum non antea applicatum fuisset.

* Tertianae Remittentes variant adeo, tum typi tum symptomatum ratione, et formae earum diversae adeo saepe in eodem homine inter se commutantur, ut in iis denominandis nihil fere quod perpetuum sit efferi possit. Tertianas autem, quas comitatas dixit *TORTI*, eas scilicet quae symptomate quodam peculiari et gravi comitantur, recensui; dein, ut caetera ad hanc rem pertinentia intelligantur, auctores plures qui de tertianis remittentibus optime scripserunt, et exempla earum praecipua exhibuerunt, enumeravi.

- Tertiana subcontinua, S. fp. 19.
 Quotidiana deceptiva, S. fp. 2.
 Amphimerina femiquintana, S. fp. 24.
 Tritaeophya deceptiva, S. fp. 10.

Ex tertianis comitatis *Torti* loc. cit. praecipuae sunt :

- A. Tertiana cholERICA sive dysenterica, *Tort.* *ibid.*
Lautter, Hist. med. cas. 6. 16. 17. 20. *Morton*,
 App. ad Exerc. II.
 B. Tertiana subcruenta sive atrabilaris *Tort.* *ibid.*
 Haec a *Cleghornio* nunquam visa est.
 C. Tertiana cardiaca *Tort.* *ibid.* *Lautter*, Hist. med.
 cas. 15. 18. 23.
 Amphimerina cardiaca, S. fp. 5. *.
 Tritaeophya affodes, S. fp. 6.
 Febris continua affodes, V. 27.

* Amphimerinas inter et Tritaeophyas, uti inter quotidianas et tertianas duplices, distinctio saepe difficilis. Sed quotidianas tertianis multo rariores, et oeconomiam animale[m] in febres typi tertiani maxime proclivem esse norunt experti; hinc plures amphimerinas ad tertianas remittentes retuli. Judicent autem autoptae,

- D. Tertianā diaphoreticā, *Tort. ibid.*
 Tritaeophya typhodes, S. sp. 4.
 Tritaeophya elodes, S. sp. 5. *.
 Febris continua elodes, V. 21.
- E. Tertianā syncopalis *Tort. ibid. Lautter, cas. 11.*
 12. 13. 15. 16.
 Tritaeophya syncopalis, S. sp. 1.
 Amphimerina syncopalis, S. sp. 4.
 Amphimerina humorosa, S. sp. 6.
 Febris continua syncopalis, V. 29.
- F. Tertianā algidā, *Tort. ibid. Lautter, cas. 13.*
 Amphimerina epiala, S. sp. 3.
 Amphimerina phricodes, S. sp. 7.
 Tritaeophya leipyria, S. sp. 9.
 Tertianā leipyria, S. sp. 23. *Valcarenghi Med.*
Ration. p. 18.
 Febris continua epiala et leipyria, V. 19. et 24.
- G. Tertianā lethargicā, *Tort. ibid.*
 Tritaeophya carotica, S. sp. 7. *Lautter, 1. 7. 14.*
 Tertianā apoplectica *Morton. Exerc. 1. cap. IX.*
Hist. 25.
 Tertianā soporosa *Werlhof. de febr. p. 6.*
 Febris epidemica Urbeveta *Lancif. de noxis pal.*
effluv. I. II. c. 3.

* De typo febris sudatoriae *Boyeri Meth. a suivre dans les malad. epidem.* quam huc retulit Sauvagesius, ex ipsius Boyeri descriptione mihi non liquet, et ad typhum referri mallet.

Tertianarum remittentium exempla praecipua, nobis nota, sunt sequentia.

Causos *Hippocratis*. De Morb. Vulg. L. III. sect. 3.

Tritaeophya caufus, S. sp. 2.

Febris ardens *Boerhaavii*, Aph. 738 ?

Remittens ardens sive caulis, *Macbride*, p. 360.

Tertiana perniciofa, quae simulata tertiani circuitus effigie lethalis, et mille accidentibus periculossimis implicata, existit. *Lud. Mercatus* de febribus, Lib. VI.

Tertiana pestilens, *P. Sal. Diverfus* de febre pestilent. cap. X.

Tertiana maligna pestilens *Riverii*, L. XVII. Sect. II. c. 1. et Sect. III. c. 3.

Morbus Hungaricus *Lang. Lemb.* L. I. Ep. 4. *Sennert.* de febr. L. IV. cap. 14. *Jordan.* de pestis phaen. cap. 19.

Languor Pannonicus *Cober.* obs. castr. Hung. 1. obs. 6. &c.

Amphimerina Hungarica, S. sp. 10.

Vide postea, notas ad Typhum.

Hemitriteus pestilens, *Schenck* obs. L. VI. ex *Corn. Gemma.*

Febres pestilentes Ægyptiorum, *Alpin.* de med. Ægypt. L. 1. cap. 14.

Febris tertiana epidemia, *Bartholin.* Hist. anat. cent. II. 56.

Febres epidemicae Autumni ann. 1657 et 1658, *Willis* de febr. cap. 16.

56 GENERA MORBORUM

Febres syneches epidemica ab ann. 1658 ad 1664,
et postea ab ann. 1673 ad 1691. *Morton*. App. ad
Exerc. II.

Febres Autumnales incipientes, *Sydenh.* de morb. acut.
ad ann. 1661—1664, et in epist. ad *H. Paman* ad
1678, et seq.

Affectus epidemicus Leidensis, *Fr. Sylvii* Prax. med.
app. tract. X. et oratio de affectus epidem. causis.

Morbus epidemicus Leidensis 1669, *Fanois*, Diff. apud
Haller. Disp. tom. V.

Tertianae perniciosae et pestilentes et febres castren-
ses epidemicae *Lancisi* de nox. palud. effluv.

Febres intermittentes anomalae et mali moris, *Hoffm.*
II. p. 38.

Febris cholericus minus acuta, *Hoffm.* II. p. 112.

Febris epidemica Leidens. ann. 1719. *Koker* apud
Haller, Disp. tom. V.

Amphimerina paludosa, S. sp. 19.

Febris paludum Illustr. *Pringle* Diseases of the army,
Ed. 4ta, 8vo, p. 179.

Bononiensis constitutio hiemalis 1729, *Beccari* in *A.*
N. C. Vol. III. Obs. 48.

Amphimerina biliosa, S. sp. 22.

Remittens biliosa *Macbride*, p. 360.

Febris Castrensis, Illustr. *Pringle* loc. cit. p. 174.

Febris putrida epidemica, *Huxham* de aere ad ann.
1729.

Febris biliosa Lausanensis, *Cl. Tissot*. de febr. bilios.

Tritaeophya Wratiflaviensis, S. sp. 3. *Hahn* Epidemia verna Wratiflav. in app. ad A. N. C. vol. X.

Tritaeophya Americana, S. sp. 12.

Febris anomala Batav. *Grainger* de febr. anomala.

Morbus Naronianus *Pujati* de Morb. Naron.

Febris continua remittens, *Hillary's* Dis. of Barbadoes, variis annis, Lond. Med. Obs. IV. 24. V. 2.

Febris A. 1772. et seq. ad urbem novam Avenionensem, Soc. Royale de Medicine I. Histoire, p. 213.

Febris intermittens irregularis Tolosae 1772. Soc. Royale I. Mem. p. 14.

Febris intermittens et remittens a l'Isle Jourdain, A. 1777. Soc. Royale II. Hist. p. 145.

Febris remittens Indiae Orientalis, *Lind* Med. Edin. Diff. Inaug. 1768. Lond. Med. Obs. Vol. IV. art. 12.

Febris critica et febr. biliosa aestatis, *Roupe* de morb. navig.

Febris remittens regionum calidarum, Cl. *Lind* Med. Haflar. Essay on the diseases of hot climates.

Tertiana remittens symptomatica est.

Tritaeophya lactea, S. sp. 8.

Febris lactea, *Etmulleri* Coll. consult. cas. 57.

G. II. QUARTANA.

Paroxyfmi fimiles intervallo feptuaginta duarum circiter horarum: Accessionibus pomeridianis.

58 GENERA MORBORUM

Quartana *Auctorum* S. G. 89. L. 17. V. 3. *Sag.* 711.
Hoffm. II. p. 23. *Junck.* tab. 81.

Est vel,

I. Interposita apyrexia.

1. Variat typo.

A. Quartana paroxyfmis quarto quoque die singulis; aliis diebus nullis.

Quartana legitima, S. sp. 1. *Sydenham* de morb. acut. cap. V.

B. Quartana paroxyfmis quarto quoque die binis; aliis diebus nullis.

Quartana duplicata, S. sp. 4. *Bonet.*

C. Quartana paroxyfmis quarto quoque die tribus; intermediis diebus nullis.

Quartana triplicata, S. sp. 16.

D. Quartana quae ex quatuor diebus tertium tantum a febre vacuum habet,

paroxyfmis quarto quoque die fimilibus.

Quartana duplex, S. fp. 3. V. 13.

E. Quartana quotidie accedens, paroxyfmis quarto quoque die fimilibus.

Quartana triplex, S. fp. 5. V. 14. *Barthol. H. anat. c. 1. 95.*

2. Variat fymptomatibus.

Quartana cataleptica, S. fp. 7. *Bonet. Polyalth. vol. 1. p. 805.*

Quartana comatofa, S. fp. 15. *Werlhof. de febr. C. Pifonis Observ. de morbis a colluvie ferof. obf. 166. 167. 168. 169. 171. 172. 173. 174.*

Quartana epileptica, S. fp. 8. *Scholzii Conf. 379. 380.*

Quartana hystERICA, S. fp. 10. *Morton. Pyret. Exerc. I. cap. IX. H. 10. 11.*

Quartana nephralgica, S. fp. 9.

Quartana metastatica, S. fp. 17.

Quartana amens, S. fp. 12. *Sydenham de morb. acut. cap. V.*

Quartana fplenetica, S. fp. 2. *Etmuller. Cell. confult. caf. 25.*

Quartana hepatica, *Macb. p. 354.*

60 GENERA MORBORUM

3. Variat aliis morbis complicata.

Quartana syphilitica, S. sp. 6. *Plateri* obs. L. III.
p. 676. *Edinb. Eff.* art. XLVII. obs. 8.

Quartana arthritica, S. sp. 11. *Musgr.* de arthr.
synopt. cap. IX. H. 4. et 5.

Arthritis febrilequa, S. sp. 10.

Arthritis febricosa, S. sp. 10. *Werlhof.* de febr.

Cockburn de morbis navigantium, obs. 19.

Quartana scorbutica, S. sp. 14. *Barthol.* de med.
Dan. diff. IV. *Tim.* L. VIII. cas. 18.

II. Interposita remissione tantum.

Tetartophya, S. G. 85. *Sag.* 323. L. 22.

Quartana remittens *Auctorum.*

Varietates sunt,

Tetartophya simplex, S. sp. 1. *

* Quartanam continuam morbum rarissimum esse, testantur scriptores medici omnes; sed illius exemplum ex *Franc. Joelis* operum tomo 3. citat SAUV. In loco autem citato, nihil ad rem pertinens inveni; sed tomi quinti pag. 63. haec verba proferruntur.

Amphimerina femiquartana, S. sp. 23.

Tetartophya femitertiana, S. sp. 5.

Tetartophya maligna, S. sp. 6. *Lautter. Hist. med. cas. 21. M. Donat. L. III. cap. 14. ex M. Gatenaria. Horst. L. 1. obs. 15.*

Tetartophya carotica, S. sp. 4. *Werlhof. de febr. Bianchi Hist. hep. pars III. const. ann. 1718. p. 751.*

Tetartophya splenalgica, S. sp. 2. *.

runtur. Febris quartanae “Species veteres duas constituunt. *Quartanam continuam*, (quae mihi septuagenario nunquam visa est, et ideo eam aut rarissimam aut nullam esse judico) et *Interpolatam*, quae frequentissima est.”

* Huc febrem Fernelianam *Raym. Fortis* refert SAUV. et vult febrem ita a *Forte* dictam fuisse, quod ea mortuus sit ipse Fernellius: Sed quodammodo hic errasse SAUVAGESIUS mihi videtur. Nam febres quaedam Fernelianas vocat Fortis, Tom. II. cent. II. obs. 35. et 36. non quod e genere remittentium fuerint, sed quod visceris cujusdam, hepatis praesertim, labe comitatae sint; et mortuus quidem est Fernellius ex inflammatione lienis. Sed quod hic morbus quartanae typum unquam exhibuit, non dicitur a *Plantio*, qui in vita Fernellii, operibus ejus praefixa, de eo morbo narrat.

62 G E N E R A M O R B O R U M

Tetartophya hepatalgica, S. sp. 3. *Car. Pif.* in præfat. p. 33.

Amphimerina spasmodica, S. sp. 16.

E R R A T I C Æ.

Ad Tertianam vel Quartanam ERRATICAS
S. pertinere putamus* ; et hic ideo earum
varietates subjunximus.

Erratica quintana, S. sp. 1. *Tulp.* L. III. 52. *Foresti*:
L. III. obs. 43. ex quartana ill. *Van Swieten*,
Cómtn. p. 505.

Erratica septana, S. sp. 2. *Boerb.* apud ill. *Van*
Swieten ibid. *M. Dóni.* L. 3. 14.

Hebdomadaria *Schenkii* ex *Gibalto*.

Septimana, ill. *Morgagni* XLIX. 36.

Erratica octana, S. sp. 3. *Etmuller* prax. L. I.
Secti XV. cap. 2. *Cyrilli* in *Etmuller*, p. 187. 188.
365. *Valles* Controv. L. V. c. 25. *P. Sal. Div.*
in not. ad D. A. de *Altomari*, cap. XII. *Zacuti*
Luf. P. M. L. III. obs. 34. *Schultzius* in E. N.
C. D. I. ann. IV. et V. ob. 70. *Arnold.* de febr.
Stomach. epid. § IV. apud *Haller.* Diff. Practi:
Vol. V. *De Haen* de divis. febr: div. iv. p. 9.

* Vide Senacum de recondita febrium natura;
L. I. Cap. 16

Hemicrania lunatica, S. sp. 10.

Erratica nonana, S. sp. 4. *Zac. Luf. ibid.*

Erratica decimana, S. sp. 5. *Zac. Luf. ibid.*

Ephemera dichomene, S. sp. 11. *M. Don. L. III.*

14. ex *Gentili.*

Erratica vaga, S. sp. 6. *River. cent. III. obs. 32.*

Etmuller, L. I. S. XV. c. 2.

G. III. QUOTIDIANA.

Paroxyfmi fimiles intervallo viginti quatuor circiter horarum: Paroxyfmis matutinis.

Quotidiana *Auctorum*, S. G. 87. L. 15. V. 1.

Hoffm. II. 33. Junck. tab. 79.

I. Interposita apyrexia.

1. Variat solitaria.

A. Universalis.

Quotidiana eadem hora matutina rediens.

Quotidiana simplex, S. sp. 1.

Quotidiana legitima, *Sennert de febr. cap. 18.*

B. Partialis.

Quotidiana partialis, S. sp. 10. *Cnoffel. E. N. C.*
D. I. A. III. obf. 205. *Edinb. Med. Eff.* vol. I.
art. 31. vol. II. art. 19.

Quotidiana cephalgica, S. sp. 6. *Morton Pyret.*
exerc. 1. Hist. 27 *Van Swieten in Boerh.* p.
534. Soc. Royale, II. Mem. p. 38.

Cephalgia intermittens, S. sp. 7.

Cephalaea febricosa, S. sp. 4.

Quotidiana ophthalmica, *Morton*, *ibid.* hist. 17.
Van Swiet. *ibid.*

Ophthalmia febricosa, S. sp. 23.

2. Variat comitata.

Quotidiana ischiadica, S. sp. 5. *Edinb. Eff.* vol. V.
art. 49.

Ifchias intermittens, S. sp. 1.

Quotidiana nephralgica, S. sp. 7. *Morton*, *ibid.*
hist. 28.

Nephralgia febricosa, S. sp. 13.

Quotidiana uretico-sputatoria, *B. Scharf. E. N. C.*
D. II. A. II. obf. 104.

Quotidiana epileptica, S. sp. 4. *Edinb. Eff.* loc.
c.t.

Hysteralgia febricosa, S. sp. 9.

Vespertinae vel symptomaticae videntur frequentes.

Quotidiana hysterica, S. sp. 3.

Quotidiana catarrhalis, S. sp. 9.

Quotidiana stranguriosa, S. sp. 11.

II. Interposita remissione tantum.

Amphimerina, S. G. 84. L. 20. Sag. G. 321.

Quotidiana continua, V. 15.

Quotidianæ remittentes et continuæ *Auctorum.*

Amphimerina latica, S. sp. 1.

Febris continua lymphatica, *Etmuller Coll. conf. cas. 32. River. obs. cent. I. ob. 57.*

Amphimerina singultuosa, S. sp. 14.

Febris continua Lyngodes, V. 26.

Amphimerinae S. caeterae vel ad tertianas pertinere, quorsum plures supra retuli, vel symptomaticae et vespertinae esse videntur. Hujusmodi sunt,

Amphimerina catarrhalis, S. sp. 2.

Amphimerina anginosa, S. sp. 12.

Amphimerina tussiculosa, S. sp. 13.

Amphimerina peripneumonica, S. sp. 15.

VOL. II.

I

Amphimerina variolosa, S. sp. 20.

Amphimerina miliaris, S. sp. 11.

Amphimerina arthritica, S. sp. 21.

De Amphimerina mimosa *Bontii* et phrenitica ejusdem, S. sp. 17. 18. non liquet.

SECT. II. CONTINUÆ*.

Febres, sine intermissione, nec miasmate

* *Quae sine exacerbatione partiali, et sine accessu, non pluries quam semel vel bis in mense revertens, ad usque finem aegritudinis perseverat, Febrem Continuum esse, dixit SAUVAGESIUS; et hujusmodi febres, cum scholis medicis plerisque, Continentes vocat LINNÆUS. Hujusmodi autem febrem in quadraginta annorum praxi satis frequenti, vix unquam certo vidi, et fere semper in febribus, maximæ continuas, exacerbationes et remissiones, etiam quotidie, satis manifestas observavi. Mecum quidem sentire videtur VOGELIUS, uti ex ejus continuarum caractere satis patebit; nec dissentit expertissimus DE HAEN, uti videre est in libro ejus de divisione februm, Divis. IV. Schol. I. 5. et apprimè sententiam nostram confirmat BRENDILLIUS, verbis sequentibus: “ Omnes namque febres nostrae, acutae, et inflammatoriae, et exanthematicae, et malignae, reliquaeve hujus generis, sunt continuæ remittentes.*

paludum ortae, sed cum remissionibus et exacerbationibus, parum licet notabilibus, perstantes: Paroxyfmis quovis die binis*.

tentes, et luculenta intensio- rum remissionumque spatia integrant." Brendel. Opuscul. P. II. Diff. XI. sect. 5.

Porro, etsi in febribus quibusdam exacerbationes et remissiones parum notabiles, et perinde observatu difficiles sint, easdem tamen revera fieri censeo; et ob hoc praefertim, quod in febribus quibuscunque, ex paroxyfmis pluribus manifesto constantibus, paroxyfmus quisque, inter nycthemerae spatium, cursum suum, ex exacerbatione et remissione constantem, semper absolvat, ita ut in his rebus oeconomiam animale circuitus diurni legi cuidam subjici videatur. Huic etiam in sanitate parere solet, et huic in febribus hecticis quibusque ad amissim subjicitur. Verisimillimum itaque videtur, eundem circuitum, quem toties observavimus, in febribus quibuscunque locum habere; nec febrem quamcunque continen- tem revera in rerum natura dari.

* Cum continuam quamque ex paroxyfmis repetitis consistere ponimus, saepe ambiguum fieri possit,

Continuae, S. Cl. II. O. I. V. Cl. I. O. II. *Sag.*
666. *Mach.* p. 303. *Boerb.* 727.

Continentes, L. Cl. II. O. I. *Stabl. Caf. magn.* 35.
Caf. min. 87. *Junck.* 58. *Sennert.* de febr. I.
II. cap. 2. et 10.

possit, utrum febris data ex continuarum sit, an ex remittentium ordine, et ut rite determinetur, tum intermittentium, ad quas omnes auctorum remittentes pertinere putamus, tum continuarum, definitionem aliam quam antea nunc dedi. In plerisque casibus, ut opinor, definitiones nunc datae satis facile et certo adhiberi possint. Sed sagacioribus quibusvis examinandum relinquo, an vel definitiones nostrae recte dentur, vel si quid rectius dari queat. Febrem quamque continuam ex paroxysmis quovis die binis constare credimus; cum autem in quibusdam, tum intermittentibus tum remittentibus, itidem paroxysmi duplicati videantur, ex illa nota sola febres continuae dignosci non possunt. Ex illa nota sola quidem ut dignoscantur nequaquam volui; nam in casu quovis ambiguo, vel a principio, vel a typo, vel ortu ab intermittentibus, remittentem quamvis cognosci posse puto. Videant porro in his rebus versati, annon a principio, saepe manifesto et maxime frequenti, contagione nimirum humana, febres continuae saepe certe cognosci possint.

G. IV. S Y N O C H A *.

Calor plurimum auctus; pulsus frequens, validus, et durus; urina rubra; sensorii functiones parum turbatae.

* Februm continuarum divisio, a GALENI temporibus, in hunc usque diem, eadem fere usitata est, et vel ex putredinis gradu parum accurate definito, vel ex duratione morbi, desumpta fuit; utraque tamen nota, posterior praesertim, quae praecipue usi sunt Nosologi SAUVAGESIUS, LINNÆUS, et SAGARUS, manifesto inepta est. Vide *Prolegomena*, pag. XXV. et pag. XXXIII. et XXXIV. Aliam itaque divisionem a differentia symptomatum, et a natura morborum, quantum de ea judicare liceat, desumptam, institui; secutus simul illam apud Britannos nunc maxime usitatum divisionem februm continuarum in *Inflammatorias* et *Nervosas*. Has autem appellationes, utpote quodammodo theoreticas, vitavi. Nomina quibus usus sum apud medicos dudum recepta sunt; et si forsitan sensu vulgo recepto, in quo medici ipsi parum constantes fuerunt, ii non usus sum, parum curo, dum definitiones subjunctae ab errore quovis praecavere possint.

70 GENERA MORBORUM

Synocha, S. G. 80. L. 12. *Junck.* 58.

Synocha, five febris acuta fanguinea, *Hoffm.* II.
105.

Synochus, V. 16.

Continua non putris, *Boerb.* 729.

Ephemera, S. G. 79. *Boerb.* 728. *Junck.* 57.

Diaria, L. 11.

Febris inflammatoria *Auſtorum.*

Varietates ſunt,

Synocha plethorica, S. ſp. 1.

Synocha fanguinea, *Sennert.* de febr. L. II.
cap. 11.

Ephemera plethorica, S. ſp. 1.

Ephemera a frigore, S. ſp. 3.

Ephemera a calore, S. ſp. 4.

Synochus pleuritica, S. ſp. 5.

Febris pleuritica Ann. 1765. *Sydenh.* ſect. V.
c. 1. 5.

Synochus rheumatifans, S. ſp. 7. *Sydenh.* ſect. V.
c. 2.

Synochus hiemalis, S. ſp. 8. *Sydenh.* in P. S. ad
tractat. de hydrope.

Symptomaticae ſunt,

Ephemera nauſeativa, S. ſp. 2.

Ephemera a phlogofi, &c. S. ſp. 6.

Synocha dolorum, S. sp. 7. M. Tab. O. I. G. 1.
Sp. 1. Var. D.

Ephemera lactea, S. sp. 5.

Ephemera menstrua, S. sp. 8.

Synocha catarrhalis, S. sp. 5. M. Tab. O. I. G. 1.
Sp. 1. V. E.

Synocha scorbutica, S. sp. 6.

Synochus scorbutica, S. sp. 13.

Synocha cephalalgica, S. sp. 8. M. Tab. O. I. G. 1.
Sp. 2. V. A.

G. V. T Y P H U S.

Morbus contagiosus; calor parum auctus;
pulsus parvus, debilis, plerumque fre-
quens; urina parum mutata; sensorii
functiones plurimum turbatae; vires
multum imminutae.

Typhus, S. G. 82. Sag. 677.

Species sunt,

1. Typhus (*petechialis*) plerumque cum
petechiis.

Variat gradu*.

* Morbos gradu solum differentes nominibus di-
versis insignire nequaquam convenit; cum autem
nuperis

1. Typhus mitior.

Febris maligna hectica five lues *νευραδης* convulsiva,
Willis de morb. convulsiv. cap. 8. *

nuperis temporibus apud medicos usitatum fit, febrem quandam, quasi ab aliis quibusvis differentiam, nomine Febris *Nervosae* appellare; huic opinioni quodammodo morem gerens, sub titulo *Typhi mitioris*, variorum auctorum febres ad recentiorum nervosae aliquomodo referendas recensui. In hac re autem, cum limites neutiquam accurate ponendi sunt, me accuratum fuisse non dixerim.

Minus adhuc placuit, ad mentem vel veterum vel recentiorum inter febrium genera aliquod sub nomine Febris *Putridae* recensere. In omni *typho* humorum in putredinem proclivitatem adesse puto; sed vario tantum gradu adest, ita ut major minorve putredo speciem variare, nequaquam mutare, potest. Sufficiat sub titulo *Typhi gravioris* eas, quae praefertim putridae adpellatae sunt, febres indigitasse, uti ex appositis variorum auctorum appellationibus satis patebit.

* Hoc est exemplum, ni fallor, primum appellationis *νευραδης*, vel nervosae, febribus quibusvis datae; quam

- Febris pestilens *Fracastor.* de morb. contag. L. II.
cap. 4.
- Febris pestilens sine charactere veneni *Forest.* L. VI.
obl. 26.
- Febris hectica pestilens *Forest* L. VI. obl. 32.
- Febris nova ann. 1685. *Sydenham* Sched. monitor.
- Febris putrida nervosa *Wintringh.* Comm. Nosolog.
ad ann. 1720, 1721.
- Febris lenta nervosa. *Huxham* on fevers, chap. 8.
Ed. Med. Ess. II. 18. IV. 23. V. 48. *Macb.* p. 304.
Soc. Royale I. Mem. p. 23.
- Febris contagiosa. *Lind* on fevers and infection
passim.
- Typhus nervosus, S. sp. 2.
- Typhus comatosus, S. sp. 3.
- Tritaeophya typhodes *Mangeti*, S. sp. 11. *Raym.*
Fort. de febribus, p. 24. M. 304.

2. Typhus gravior.

- Febris pestilens, *P. Sal. Divers.* de febre pestilenti.
- Febris pestilens Ægyptiorum *Alpin.* de med. Ægypt.
L. 1. cap. 14.

quam protinus Angli, non tamen nisi nuper admo-
dum aliarum regionum medici, usurpati sunt.

Typhus Ægyptiacus, S. sp. 6.

Cephalitis Epidemica, ann. 1510. S. sp. 6.

Febris pestilens maligna *Sennert.* de febribus, L. IV, cap. 10.

Febris maligna pestilens *River.* L. XVII. sect. III, cap. 1.

Febris pestilens maligna, ann. 1643. *Willis,* de febribus, cap. 14.

Febris Senegallensis, Lond, Med. Obs. II. 21.

Typhus carcerum, S. sp. 1.

Febris nautica pestilentialis *Huxham* de aëre ad ann. 1740.

Miliaris nautica, S. sp. g.

Febris putrida contagiosa in carceribus genita, *Huxham* de aëre ad ann. 1742.

Miliaris purpurata, S. sp. h.

Febris carcerum et nosocomiorum. Ill. *Pringle,* Diseases of the army, p. 294. Ill. *Van Swieten,* Maladies des armées, p. 136. Soc. Royale II. Mem. p. 53. Ibid. III. Mem. p. 45. and 55.

Typhus castrensis, S. sp. 5.

Febris castrensis, quam vulgo cephalalgiam epidemicam vocant *Henr. Maii* et *A. Pb. Koph.* Dif. apud *Hallerum,* tom. V.

Febris Hungarica five castrensis *Juncker.* 74. et plurimum *Auctorum* *.

* Morbum five febrem Hungaricam ad tertianae remittentes, cum SAUVAGESIO et Ill. PRINGLE, supra

Febris castrensis Gallorum in Bohemia, ann. 1742.

Scrinci. Diff. apud *Haller*. tom. V.

Febris petechialis, *Sennert*. L. IV cap. 13. *River*.

prax. L. XVII. sect. III. cap. I. *Hoffm* II. p. 84.

Juncker. 73. *Huxham* on fevers, chap. 8. *Lud-*

wig. Inst. med. clin. No. 146. *Schreiber* von

erkenntness, und cur der Krank heiten, p. 126.

Monro, Diseases of military hospitals, p. 1.

Febris catarrhalis maligna petechizans, *Juncker*. 72.

Hoffm. II. 75. *Eller* de cogn. et cur. morb. Sect. VI.

Febris putrida, *Macb*. p. 305.

Febris catarrhalis putrida 1768. *De Mertens* Obs.

cap. 1.

Febris putrida biliosa 1769. *De Martens*, cap. 2.

Febris putrida nervosa 1770. *De Martens*, cap. 3.

Exempla febrium petechialium sunt se-
quentia.

Febris quae lenticulas, puncticula, aut peticulas vo-

cant, *Fracastorius* de morb. contag. L. II. cap. 6.

supra retuli; nec dubium est quin morbus Hunga-

ricus dictus saepius sub forma remittentis apparuerit;

sed simul constat febrem in castris Hungaricis primo

ortam, et per milites inde redeuntes per totam fere

Germaniam dispersam, ex genere continuarum fuisse

(*Vide Ruland. de morbo Hungarico, cap. VIII. quaest.*

39.), et plerumque eandem esse quam nunc in Noso-

comiis quibusvis saepe exorientem bene novimus. Ad

hunc locum igitur etiam apponendam esse putavi.

76 GENERA MORBORUM

- Febris peticularis Tridenti, ann. 1591. *Roboretus*, de febr. peticul.
- Febris petechialis epidemica Coloniae ann. 1672. *Donckers*, Idea febris petechialis.
- Febris petechialis epidemica, Pofonii 1683, *C. F. Loeu* in App. ad A. N. C. Vol. II.
- Febris petechialis epidemica Mutinae, 1692. *Ramazzini*. Const. Mutinensis, Oper. p. 187.
- Febris maligna petechizans, ann. 1698. *Hoffm.* II. p. 80.
- Febris petechialis Wratiflaviae, ann. 1699. *Helwicks*, Ephem. Germ. D. III. A. VII. et VIII. obs. 132. p. 616.
- Febris epidemia Lipsiae 1718. *M. Adolph.* A. N. C. III. Obs. 131. p. 296.
- Febris endemica et epidemica Cercagiensis, ann. 1708, 1718, et seq. *Rogers*, Essay on epidemic diseases.
- Febris continua epidemica Cercagiensis ann. 1719. et seq. *M. o Connel* Observ. de morbis.
- Febris petechialis epidemica, Cremonae 1734. *Valcharenghi* Med. ration. Sect. III.
- Febris petechizans Petropoli 1735, *Weitbrecht*. Diss. apud Haller. tom. V.
- Febris petechialis, ann. 1740, 1741, in Hassia, *Ritter*. A. N. C. vol. VII. obs. 4.
- Febris petechialis epidemica Vigorniae et aliis Angliae locis. *Wall's Works*, p. 337.

Febris maligna petechialis Rintelii 1741. *Furstenau*.

A. N. C. vol. VII. obf. 5.

Febris petechialis epidemica Silesiae 1741 et seq.

Brandhorst. Diff. apud *Haller*. tom. V.

Febris petechialis epidemica Viennae 1757, *Hafenobrl*. Hist. med. cap. 2.

Febris petechialis epidemica Lipsiae 1757. *Ludwig*.

Adversar. tom. I. pars 1.

Febris petechialis epidemica variis Germaniae locis ab ann. 1755 ad 1761. *Strack* de morbo cum petechiis.

Febris epidemica maligna a Coutances 1772 et 1773. Soc. Royale I. Mem. p. 23.

Febris petechialis nervosa a Dijon 1760 et 1761.

Mem. par *Maret*. 1775.

II. Typhus (*icterodes*) cum flavedine cutis.

Typhus icterodes, S. sp. 7.

Febris flava Indiae Occidentalis *Warren*, Malignant Fever of Barbadoes. *Hillary's* Diseases of Barbadoes. *Linning* on the Yellow Fever of South Carolina. *Edinb. Phys. Litter. Essays*, Vol. II. *Mackitrick* de febre flava Indiae Occidentalis, *Edinb.* 1766.

Typhi etiam species esse videtur.

Ephemera sudatoria, S. sp. 7.

Ephemera Britannica, *Caius* de ephem. Brit.

78 GENERA MORBORUM

Sudor Anglicus, *Sennert.* L. IV. cap. 15.

Hydronofus, *Forest.* L. VI. obs. 8.

An eodem pertinet,

Miliaris sudatoria, S. sp. e.

Febris sudatoria, *Le Suette Gallorum, Meyserey*

Meth. aisé, &c. Ejusd. Maladies des Armées 250.

Boyer Methode à fuivre dans les maladies epi-
demiques? *Teffier, Soc. Royale II. Mem. p. 46.*

De typho hysterico verminoso, S. sp. 4.

Typho exhaustorum, S. sp. 8.

Typho a manipuera, S. sp. 9.

Nobis non liquet.

G. VI. S Y N O C H U S *.

Morbus contagiosus. Febris ex synocha
et typho composita, initio synocha, pro-
gressu et versus finem typhus.

Synochus, S. G. 81. L. 13.

Lenta, L. 14.

Phrenitis, V. 18.

Febris continua putrida, *Boerb.* 730.

* Cum plures febres nec inflammatoriae nec
nervosae ex omni parte sint, neque idcirco vel ad

Sy-

Varietates ex Sauvagesio sunt.

Synochus fanguinea, S. sp. 1.

Febris depuratoria, ann. 1661 ad 1664. *Sydenh.*
de morb. acut.

Synochus fudatoria, S. sp. 2.

Febris continua epidemica, ann. 1665 ad 1667.
Sydenh ibid.

Synochus foporofa, S. sp. 12.

Febris continua epidemica, ann. 1673. *Sydenh.*
ibid.

Febris continua putrida annor. variorum. *Win-*
tringham Com. Nofolog.

Synochus ardens, S. sp. 6.

Synochus miliaris, S. sp. 14.

Synocha miliaris, S. sp. 6.

Synocham vel ad *Typhum* facile referendae; genus *Synochi*, cujus typus hisce regionibus frequens conspicitur, hic inferui. Inter *Typhum* tamen et *Synochum* limites accuratos ponere non possum; et an revera pro diversis generibus habenda, vel positis diversis, utri eorum *Synonyma* auctorum referenda, sunt, dubito. Quae vero hic subjunguntur, a SAUVAGESIO species dictae, ad *Synochum* satis recte, ut mihi videtur, referri possunt.

80 GENERA MORBORUM

De synocho variolode, S. sp. 3. et
Synocha dysenteriode, S. sp. 4.

Nobis non fatis liquet, et minus adhuc de

Synocho anniversaria, S. sp. 9.

Synocho spermatica, S. sp. 10.

Synocho tarantata, S. sp. 11.

Complicata est

Synochus scorbutica, S. sp. 13.

Et symptomatica est

Synochus a scabie, S. sp. 15.

H E C T I C A.

Febris quotidie revertens ; accessionibus
meridianis et vespertinis ; remissione, ra-
rius apyrexia, matutina ; plerumque fu-
doribus nocturnis, et urina sedimentum
furfuraceo-lateritium deponente *.

Hectica, S. G. 83. L. 24. V. 80. Sag. 684.

Med. Transf. II. 1.

* Cum febrium in numerum, hecticam receperint,
Nosologi omnes, eam etiam cum caractere hic ap-
ponendam duxi. Ejusmodi autem febrem, cum
nun-

Ex Sauvagesio species sunt,

Hæctica chlorotica, S. sp. 3.

Hæctica syphilitica, S. sp. 4.

Hæctica scrophulosa, S. sp. 5.

Hæctica a calculis, S. sp. 6.

Hæctica hydropum, S. sp. 7.

Hæctica verminosa, S. sp. 9.

Hæctica cachectarum, S. sp. 10.

Hæctica fluxuum, S. sp. 11.

Hæctica infantilis, S. sp. 1. Charactere caret, et nobis vel rachitica, vel scrophulosa, vel verminosa videtur.

Hæctica vespertina, S. sp. 2. vix pro morbo haberi potest:

De hæctica lymphatica, *Bagliivi* S. sp. 12. et

Hæctica nervea, *Cl. Lorry* S. sp. 13.

Nobis non liquet.

nunquam nisi symptomaticam observaverim, in numerum idiopathicarum, quas solas enumerare licet, admittere nolui. In plerisque exemplis, hæcticam revera symptomaticam esse, ex SAUVAGESII speciebus, quas vocat, hic recensitis, satis manifestum fiet. Vide ipsius SAUVAGESII Scholium. Tom. I. pag. 319.

VOL. II.

L

O. II. PHLEGMASIÆ.

Febris fynocha; phlogosis; vel dolor topicus; simul laesa partis internae functione; sanguis missus, et jam concretus, superficiem coriaceam albam ostendens.

Phlegmasiae membranosae et parenchymatosae;
S. Cl. III. O. I. II. *Sag.* 605*.

* Haec phlegmasiarum in membranosas et parenchymatosas diviso prorsus inepta est; primo enim, quod de statu partium internarum statuit, de quo in Nosologia statuere non licet; dein, quod partes membranosae et parenchymatosae non satis certo distinguuntur; et hinc Metritis, quam inter membranosas recenset SAUVAGESIUS, a LINNÆO et SAGARO inter parenchymatosas collocatur; denique, quod phlegmasiae quaedam, ut hepatitis, vel membranosae vel parenchymatosae esse possunt.

Nec magis idonea est ordinis phlegmasiarum musculosarum apud LINNÆUM et SAGARUM institutio;

Morbi febriles phlogistici, L. Cl. III.

Febres continuæ compositæ inflammatoriae, V.

Morbi acuti febriles, *Boerb.* 770.

Febres inflammatoriae, *Hoffm.* II. 105. *Junck.* 61.

G. VII. PHLOGOSIS*.

Pyrexia, partis externæ rubor, calor, et
tensio dolens.

Species sunt,

I. Phlogosis (*Phlegmone*) rubore vivido;
tumore circumscripto, in fastigium ple-
rumque elevato, sæpe in apostema abe-
unte; dolore sæpe pulsatili.

Phlegmone Auctorum, S. G. 15. L 39. V. 351.

Sag. 299. *Macb.* p. 418.

tutio, in qua neuter quidem satis accuratus est. Ma-
le enim phlegmone a LINNÆO musculosa dicitur,
nec bene Cynanche plerumque membranosa, rarius
musculosa, a SAGARO ad musculosas in universum
refertur.

* Pro nomine generis cuius species est Erythema,
minus recte in priore editione usurpatum fuit phleg-
mone. Novum nomen necessarium nobis videbatur,
et nihil aptius quam Phlogosis suppetebat.

84 GENERA MORBORUM

Inflammatiō, L. 231. *Boerb.* 370. *Junck.* 20.

1. Variat forma.

Furunculus, S. G. 18. V. 352. *Sag.* 23. *Mach.*

p. 422.

Terminthus, V. 381.

Papula, L. 275. S. p. 6.

Varus, V. 436. L. 269. S. p. 7.

Bacchia, L. 270.

Gutta rosea, S. G. 4.

Gutta rosacea, V. 437.

2. Variat sede *.

Hordeolum, S. G. 27. L. 276. V. 434.

Otalgia, S. G. 197. L. 44. V. 148.

Dolor otalgicus, *Hoffm.* II. 336.

Parulis, V. 362.

Mastodynia, S. G. 210. V. 153.

Paronychia, S. G. 21. L. 258. V. 345.

Arthroace, S. G. 78. L. 256.

Paedarthroace, V. 419.

Spina ventosa, *Boerb.* 526.

Phimosis, S. G. 22. L. 297. V. 348.

Paraphimosis, V. 349.

* An sequentes pro totidem speciebus recenseri possint, judicent peritiores.

Proctitis, L. 30.

Proctalgia, S. G. 214.

Clunefia, V. 167.

II. Phlogosis (*Erythema*) colore rubicundo, pressione evanescente; ambitu inaequali, serpente; tumore vix evidente, in cuticulae squamulas, in phlyctænas vel vesiculas abeunte; dolore urente.

Erythema, S. G. 11. Sag. 16.

Erysipelas *Auctorum*, V. 343. *Macb.* 421.

Hieropyr, V. 344.

2. Variat vehementia.

Anthrax, S. G. 19. L. 272. V. 353. Sag. 24.

Carbo et carbunculus *Auctorum Macb.* p. 423.

Erythema gangraenosum, S. sp. 7.

2. Variat causa remota.

Erythema a frigore.

Erythema pernio, S. sp. 4.

Pernio, L. 259. V. 350.

Erythema ambustio, S. sp. 2.

Erysipelas ambustio, S. sp. 4.

86 GENERA MORBORUM

Combustura, L. 245.

Combustio, *Boerb.* 476.

Encaufis, V. 347.

Erythema ab acri alieno applicato,

Erysipelas Chinense, S. sp. 7.

Erythema ab acri inquilino,

Erythema intertrigo, S. sp. 5.

Intertrigo, L. 247. V. 502.

Erythema a compressione,

Erythema paratrima, S. sp. 6.

Erythema a punctura, S. sp. 9.

Erysipelas a vespis, S. sp. 19.

Phydracia a vespis, S. sp. 2.

3. Variat complicata.

Erythema cum phlegmone,

Erysipelas phlegmonodes *Auctorum*,

Erythema cum oedemate,

Erysipelas symptomaticum, S. sp. 6.

Phlogosis sequelae sunt,

A P O S T E M A.

Post phlogosin, remittentibus dolore et

C U L L E N I.

pulsatione, tumor albescens, mollis, fluctuans, pruriens.

Apostema, S. G. 39. *Sag.* 55.

Abcessus, L. 132. V. 354. *Boerb.* 387. 402.

Macb. p. 414.

Fistula, L. 274.

G A N G R Æ N Æ.

Post phlogosin, pars livens, mollis, parum sensibilis, saepe cum vesiculis ichorosis.

Gangraena, S. G. 314. L. 233. V. 327. *Sag.* 203.

Boerb. 388. 419. *Macb.* p. 415.

S P H A C E L U S.

Post gangraenam pars nigricans, flaccida, facile lacerabilis, sine sensu vel calore, et cum foetore carnis putridae; vitio celeriter serpente.

Sphacelus, L. 234. V. 328. *Boerb.* 419. 457.

68 GENERA MORBORUM

G. VIII. OPTHALMIA.

Rubor et dolor oculi; lucis intolerantia;
plerumque cum lachrymatione.

Ophthalmia, S. G. 196. L. 43. V. 341. Sag. 231.

Junck. 24. *Macb.* p. 423.

Chemosis, V. 46.

Ophthalmites, V. 47.

Inflammati oculorum, *Hoffm.* II. 165.

Ophthalmiae species et varietates sunt;

I. Idiopathicae.

1. Ophthalmia (*membranarum*) in tunica
adnata, et ei subjacentibus membranis,
sive tunicis oculi.

A. Variat gradu phlogosis externae.

Ophthalmia Taraxis, S. sp. 1.

Ophthalmia humida, S. sp. 8.

Ophthalmia chemosis, S. sp. 12.

Ophthalmia Erysipelatosa, S. sp. 7.

Ophthalmia pustulosa, S. sp. 6.

Ophthalmia phlyctænodes, S. sp. 21.

B. Variat affectis tunicis internis.

Ophthalmia choroideae, S. sp. 13.

Ophthalmia tenebricosa, S. sp. 19.

2. Ophthalmia (*Tarfi*) cum tumore, erosione, et exudatione glutinosa tarfi palpebrarum.

Ophthalmia trachoma, S. sp. 4.

Ophthalmia sicca, S. sp. 5.

II. Symptomaticae.

1. A morbo ipsius oculi.

Ophthalmia angularis, S. sp. 14.

Ophthalmia tuberculosa, S. sp. 3.

Ophthalmia trichiasis, S. sp. 2.

Ophthalmia cancrofa, S. sp. 15.

Ophthalmia a synechia, S. sp. 16.

Ophthalmia a lagophthalmo, S. sp. 17.

Ophthalmia ab elcomate, S. sp. 18.

Ophthalmia ab ungue, S. sp. 19.

Ophthalmia a corneae fistula, S. sp. 20.

Ophthalmia uvulae, S. sp. 22.

2. A morbis aliarum partium vel totius corporis.

Ophthalmia metastatica, S. sp. 24.

Ophthalmia scrophulosa, S. sp. 9.

Ophthalmia syphilitica, S. sp. 11.

Ophthalmia febricosa, S. sp. 23.

G. IX. PHRENITIS.

Pyrexia vehemens; dolor capitis; rubor faciei et oculorum; lucis et soni intolerantia; pervigilium; delirium ferox vel typhomania.

Phrenitis, S. C. 101. L. 25. *Sag. G. 301. Boerb.*

771. *Hoffm. II. 131. Junck. 63. Macb. p. 432.*

Phrenismus, V. 45.

Cephalitis, S. G. 109. *Sag. G. 310. **

* Cum symptomata nulla dentur quæ semper phlegmasiam cerebri a phlegmasia membranarum ejus, sive meningum, certo distinguere possint; neque sectiones cadaverum distinctiones a SAUVAGESIO, LINNÆO, et SAGARO, adhibitæ confirmant,

Cepha-

Sphacelismus, L. 32.

Siriafis, V. 34.

Phrenitidis idiopathicae speciem unicam hic ponere licet, et cujus synonyma frequentia esse putamus.

Phrenitis vera, S. sp. 1. *Boerb.* 771.

Phrenitis idiopathica, *Junck.* 63.

Cephalalgia inflammatoria, S. sp. 9.

Cephalitis spontanea, S. sp. 3.

Cephalitis siriafis, S. sp. 4.

Siriafis, V. 34.

Cephalitis Littriana, S. sp. 5.

II. Phrenitides Symptomaticae sunt,

Phrenitis fynochi pleuriticae, S. sp. 2.

Phrenitis fynochi fanguineae, S. sp. 4.

Cephalitidem, S. G. 109. *Sag. G.* 310. et *Sphacelismum*, L. 32. pro generibus a *phrenitide* diversis admittere nolui, et ea hic ideo, uti synonyma, sub titulo Phrenitidis, posui.

Recte monet VOGELIUS signa phrenitidis, vel ut vocat phrenismi, hoc est, inflammationis cerebri aut membranarum ejus, admodum ambigua esse.

92. GENERA MORBORUM

Phrenitis calentura, S. sp. 11.

Phrenitis Indica, sp. 12.

Cephalitis Ægyptiaca, S. sp. 1.

Cephalitis epidemica, ann. 1510, S. sp. 6.

Cephalitis verminosa, S. sp. 7.

Cephalitis cerebelli, S. sp. 8.

Phrenitis miliaris, S. sp. 3.

Phrenitis variolosa, S. sp. 5.

Phrenitis morbillosa, S. sp. 6.

Phrenitis a plica, S. sp. 8.

Phrenitis aphrodisiaca, S. sp. 9.

Phrenitis a tarantismo, S. sp. 14.

Phrenitis hydrophobica, S. sp. 15.

Phrenitis a dolore, S. sp. 13.

Cephalitis traumatica, S. sp. 2.

G. X. CYNANCHE.

Pyrexia aliquando typhodes ; rubor et dolor faucium ; deglutitio et spiratio difficiles, cum angustiae in faucibus sensu.

Cynanche S. G. 110. L. 33. Sag. G. 300.

Angina, V. 49. Hoffm. II. 125. Junck. 30.
 Angina inflammatoria, Boerb. 798.

Species sunt,

I. Cynanche (*tonsillaris*) membranam faucium mucosam, et praecipue tonsillas, tumore et rubore afficiens, cum febre fynocha.

Cynanche tonsillaris, S. sp. 1.
 Anginae inflammatoriae, sp. 5. Boerb. 805.

II. Cynanche (*maligna*) tonsillas et membranam faucium mucosam afficiens tumore, rubore, et crustis mucosis coloris albescentis vel cineritii, serpentinibus, et ulcera tegentibus; cum febre typhode et exanthematis.

Cynanche maligna, S. sp. 3.
 Cynanche ulcerosa, S. Var. a Journ. de Med. 1758.
 Cynanche gangraenosa, S. Var. b. Journ. de Med. 1756.

Ulcera faucium et gutturis anginosa et lethalia.
 Hispanis Garotillo, Lud. Mercat. consult. 24.

94 GENERA MORBORUM

Angina ulcerosa, Cl. *Fothergill*, Account of the ulcerous fore throat Edit. 1751, *Huxham* on the malignant ulcerous fore throat, from 1751 to 1753.

Febris epidemica cum angina ulcusculosa, *Douglas* Practical History, Boston 1736. Lond. Med. Obs. I. 20.

Angina epidemica, *Ruffel* Oecon. natur. p. 105.

Angina gangraenosa, *Withering's* Diff. Inaug. Edinb. 1766.

Angina suffocativa, *Bard's* Inquiry, New-York, 1771.

Angina maligna, *Johnstone* on the malignant angina, &c. Worcester 1779. Wall's Works, p. 58.

III. Cynanche (*trachealis*) respiracione difficili, inspiratione strepente, voce rauca, tussi clangosa, tumore ferè nullo in faucibus apparente, deglutitione parum difficili, et febre synocha.

Cynanche trachealis, S. sp. 5.

Cynanche laryngea *Auكتورum*, *Eller.* de cogn. et curand. morb. feët. 7.

Anginae inflammatoriae, sp. 1. *Boerb.* 801.

Angina latens et difficilis, *Dodon.* obs. 18.

Angina interna, *Tulp.* L. 1. obs. 51.

Angina pernicioſa, *Greg. Horſt. Obſerv. L. II.*
obf. 1.

N. An haec Sauvageſii ſynonyma et ſequentia ad eundem morbum pertinent, videant experti; ſequentia autem ad morbum characteris dati manifeſto pertinere videntur.

Suffocatio ſtridula, *Scotis the CROUP. Cl. Home on the Croup.*

Aſthma infantum, *Millar on the aſthma and chin-cough.*

Aſthma infantum ſpaſmodicum, *Ruſh, Diſſertation, London 1770.*

Cynanche ſtridula, *Crawford, Diſſ. Inaug. Edinb. 1771.*

Angina epidemica, ann. 1743. *Molloy apud Rutty's hiſtory of the weather.*

Morbus ſtrangulatorius, *Starr, Phil. Tranſ. No. 495.*.*

* An hic morbus ad cynanchem malignam, an ad trachealem pertinet, mihi non certo conſtat, et ſaepe de eorundem morborum apud plures auctores deſcriptionibus itidem incertus ſum.

Morbus truculentus infantum, *Francof.* ad Viadrum et in vicinia grassans, ann. 1758. C. 2
Bergen. A. nova. N. C. tom. II. p. 157.

Angina inflammatoria infantum, *Ruffel*, *Oecon.*
nat. p. 70.

Catarrhus suffocativus Barbadenfis, ann. 1758.
Hilary's Barbadoes, p. 134.

Angina polypofa, five membranacea *Michaelis*,
Argentorati 1778, et *Auctores* ab ingeniofo et
erudito *Michaele* allegati.

Morbus anginae polypofae analogus, *Soc. Royale* II.
Hift. p. 206.

IV. Cynanche (*pharyngea*) cum rubore in
imis praesertim faucibus ; degluti-
tione maxime difficili, dolentissima ;
respiratione satis commoda, et febre
synocha.

Cynanche pharyngea, S. sp. 6. *Eller de cogn. et*
cur. sect. 7.

Anginae inflammatoriae, sp. 4ta, *Boerb.* 804.

V. Cynanche (*parotidea*) cum tumore ex-
terno parotidum et maxillarum glan-
dularum magno ; respiratione et de-
glutitione parum laesis ; febre syno-
cha plerumque leni.

Cynanche parotidæa, S. sp. 14. Gallis OREIL-
LONS et OURLES, *Tiffot Avis au peuple*, No.
116. *Encyclopedie*, au mot OREILLONS.

Angina externa, ANGLIS the MUMPS, *Ruffel*,
Oecon. natur. p. 114. SCOTIS the BRANKS.

Catarrhus Bellinfulanus, S. sp. 4.

Osservazioni di *Girol. Gaspari*, Venez. 1731.

Osservazioni di *Targ. Tozzetti*, Raccolta ima,
p. 176.

Cynanche purpuro-parotidæa, S. sp. 15.
vel ad malignam, S. sp. 3. vel ad Scar-
latinam pertinere videtur.

Cynanchæ symptomaticæ sunt,

a. A causis internis.

Cynanche epidemica, S. sp. 2.

Amphimerina anginosa, S. sp. 12.

Febris anginosa, *Huxham* de aëre.

Cynanche prunella, S. sp. 12.

Cynanche exanthematica, S. sp. 4.

Cynanche arthritica, S. sp. 10.

Cynanche hepatica, S. sp. 8.

Cynanche a dysenteria, S. sp. 13.

b. A causis externis.

Cynanche a deglutitis, S. sp. 9.

Cynanche mercurialis, S. sp. 11.

Cynanche thymica, S. sp. 7. raro inflammatoria est, et vix hujus loci.

G. XI. PNEUMONIA*.

Pyrexia; dolor in quadam thoracis parte; respiratio difficilis; tussis.

Febris pneumonica, *Hoffm.* II. 136. *Macb.* p. 435.

* Ab omni aevo, in hunc fere diem, scriptores medici, et eos secuti Nosologi omnes, phlegmasiarum pectoris interni duo esse genera, peripneumoniam scilicet et pleuritidem, statuerunt. Recentiores autem ex sectione cadaverum didicerunt, veteres de sede, ideoque de differentia horum morborum saepe falso statuisse, et quem in pleura costali sedem habere veteres putabant, saepius in pleura pulmonem investiente situm fuisse invenerunt anatomici recentiores. Novimus, porro, quod si quidem morbi illi diversam aliquando sedem habuerint, id tamen per symptomata vix certo cognosci posse; et, utcumque sit, morbos illos quatenus, quovis modo distinctos, revera maxime esse affines, plerumque simul conjunctos, et eosdem distinxisse ad usus medi-

Spécies sunt,

- I. Pneumonia (*peripneumonia*) pulsu non semper duro, aliquando molli; dolore thoracis obtuso; respiratione perpetuo difficili, saepe non nisi trunco corporis erecto exercenda; faciei tumidae colore purpureo; tussi plerumque humida, saepe cruenta.

cinae parum omnino contulisse. Hisce igitur perpensis, phlegmasias pectoris interni non nisi genus unicum constituere, cum HOFFMANNO expertissimo putamus; quamobrem hujusmodi genus hic sub nomine Pneumoniae posuimus. Symptomata, quae pro characteristicis adhibuimus, cum quae in omni phlegmasia pectoris interni semper adsint, et in quolibet praecipua sint, ea recte characterem genericum constituere videntur.

An species diversae vere statuendae sint, anceps haereo. Sed, opinionibus et consuetudini medicorum aliquid concedere volens, peripneumoniae et pleuritis quatenus, vel ex opinione medicorum vel ex propria observatione, eas distinguere liceat, characteres specificas dedi. Interim tamen observari velim, inter illos morbos, utcunque aliquando distinctos, limites accuratos plerumque non ponendos esse.

Peripneumonia, S. G. 112. L. 34. V. 51. *Sag.*
G. 311. *Boerb.* 820. *Juncker*, 67.

I. Peripneumoniae idiopathicae simplices,

Peripneumonia pura sive vera *Auſtorum*, S. sp. 1.

Peripneumonia gastrica, S. sp. 11. *Morgagn.* de
cauf. et fed. Epist. XX, art. 30. 31. *.

Variat gradu.

Peripneumonia catarrhalis, S. sp. 6.

Peripneumonia notha †, *Sydenh.* sect. 6. cap. 4.

Boerb. 867. *Morgagni* de cauf. et fed. Epist.
XXI. 11.—15.

* Ad peripneumoniam, an ad pleuritidem, potius
pertinet haec varietas, mihi non certo constat.

† Peripneumoniam *notham* a *vera* gradu tantum
differre opinor; ideoque uti varietas hic apposui. In
eo quidem differre puto, quod in peripneumonia
notha inflammatio sit lenior, et affluxus humorum in
pulmones copiosior, quam in *vera*. Cum autem in
notha symptomata pyrexiae, doloris, dyspnoeae, et
tussis, vario gradu et varia ratione conjuncta, adesse
possint, minime mirandum si hujus morbi apud di-
versos auctores descriptiones parum uniformes sint,
et necne morbus sub titulo peripneumoniae nothae

2. Peripneumoniae idiopathicae complicatae febre*.

Peripneumonia putrida, S. sp. 2. †.

Peripneumonia ardens, S. sp. 3.

Peripneumonia maligna, S. sp. 4.

a diversis auctoribus descriptus idem revera fit, dubia quaedam moverit doctissimus MORGAGNI. Peripneumoniae tamen omnibus de hac re dictis, et cum observationibus pluribus apud ipsos aegros factis collatis, nihil dubito quin morbus a SYDENHAMO et BOERHAAVIO, sub titulo *peripneumoniae nothae* descriptus, unus idemque sit, nec ab eo morbum a VALSALVA in FRANCISCO CORALIO, vel morbum in celebri ANTONIO VALISNERIO, ab ipso MORGAGNI observatum, re ipsa diversum fuisse puto. Vide First Lines of the Practice of Physic, edit. 1784. § CCCLXXVI.

* Cum morbi diversi simul complicati sint, saepe, quis illorum pro morbo primario habendus sit dubitari potest; nec in hac re me ubique recte judicatum iri spondeo. In quibusdam mei ipsius iudicio usus sum; in plerisque vero SAUVAGESIUM secutus sum. Sufficere plerumque ratus ob oculos studiosorum complicationes istas quomodocunque ponere.

† SAUVAGESIUM, ut soleo, secutus, hanc et tres sequentes species quasi diversas recensui, cum tamen pro una eademque habere vellem.

Peripneumonia typhodes, S. sp. 5.

Amphimerina peripneumonica, S. sp. 15.

3. Peripneumoniae symptomatae.

Peripneumonia arthritica, S. sp. 7.

Peripneumonia exanthematica, S. sp. 9.

Peripneumonia phthificorum, S. sp. 8.

Peripneumonia hydrophobica, S. sp. 10.

Peripneumonia rachialgica, S. sp. 12.

II. Pneumonia (*pleuritis*) pulso duro; dolore, plerumque lateris, pungente, sub inspiratione praefertim aucto; decubitu in latus molesto; tussi dolen-
tissima, initio sicca, postea humida, saepe cruenta.

Pleuritis, S. G. 103. L. 27. V. 50. Sag. G. 303.

Boerb. 875. Junck. 67.

Paraphrenesis, S. G. 102. L. 26. *

* In morbo qui vulgo *paraphrenesis* vel *paraphrenitis*, et rectius a SAGARO *diaphragmatis*, appellatur, pleurae super diaphragma extensae inflammationem adesse, et in ea morbum consistere agnoscunt medici omnes;

Paraphrenitis, V. 55. *Boerb.* 907.

Diaphragmitis, *Sag.* G. 304.

I. Pleuritides idiopathicae simplices.

Pleuritis vera, S. sp. 1. *Boerb.* 875. *Verna* princeps morb. acut. pleuritis, L. 1. cap. 2. 3. *Zeviani* della parapleuritide, cap. 3. *Morgag.* de sed. et caus. morb. Ep. XX. art. 56. XXI. 45. *Wendt.* de pleuritide, apud *Sandifort.* Thes. II.

Pleuritis pulmonis, S. sp. 2. *Zevian.* dell. parapleur. III. 28. &c.

Pleuripneumonia, pleuro-peripneumonia, peripneumo-pleuritis *Auctorum.* *Baronius* de pleuripneumonia.

omnes; non recte igitur uti genus a pneumonia diversum recensuerunt Nosologi.

Nec quidem pro diversa a pleuritide specie recenseri potest; cum plerumque nulla alia praeter illa pleuritidis symptomata ostendit. Quae a plurimis huic morbo tributa sunt, risus nempe sardonicus, et delirium phreniticum, certe non semper adfunt. Primum quod nunquam vidi, certe rarissimum est; et posterius, alias etiam pneumoniae species saepe comitatur, nec tantum a parte pleurae inflammata, quantum a gradu pyrexiac, vel diathesis phlogisticae, pendere videtur.

Ill. *Halleri* opuscul. patholog. ob. 13. *Morgagn.*
de fed. et cauf. Epist. XX. et XXI. passim. *Ciegborn* Minorca, p. 247. *Triller* de pleuritide,
aph. 1. 2. 3. cap. I. 8. *Huxham* Dif. on pleu-
rities, &c. chap. I. Ill. *Pringle* Dif. of the
army, p. 147.

Pleuritis convulsiva, S. sp. 13. *Bianch.* Hist. hep.
vol. I. p. 234.

Pleuritis hydrothoracica, S. sp. 15. *Morgagn.* de
cauf. et fed. XX. 34.

Pleuritis dorsalis, S. sp. 3. *Verna*, P. III. cap. 8.

Pleuritis mediastini, S. sp. 4. *P. Sal. Div.* de
affect. part. cap. 6. *Friend*, Hist. Med. de
Avenzoare.

Mediafina, V. 52.

Pleuritis pericardii, S. sp. 5. *Verna*, P. III. cap. 9.

Parapleuritis *Zeviani* della parapleuritide.

Pleurodyne, parapleuritis, S. sp. 19.

Paraphrenesis diaphragmatica, S. sp. 1. *De Haen*
Rat. Med. I. 7. III. pag. 31.

Paraphrenesis pleuritica, S. sp. 2.

Paraphrenesis hepatica, S. sp. 3.

De inflammatione mediastini, pericardii, et
diaphragmatis Vide *Morgagn.* de cauf.
et fed. VIII. 13. XXI. 35. 36. 46. XLV.
16. *Van Swieten* ad *Boerb.* 913.

II. Pleuritides complicatae.

1. Febre.

Pleuritis biliosa, S. sp. 7.

Pleuritis erysipelatoſa, S. sp. 11.

Pleuritis bilioſa, *Bianch.* Hiſt. hep. vol. 1. p.
236.

Pleuritis putrida, S. sp. 9.

Synochus pleuritica, S. sp. 5.

Pleuritis peſtilens, S. sp. 16.

Pleuritis miliaris, S. sp. 20.

2. Catarrho.

Pleuritis catarrhalis, S. sp. 10.

Pleuritis lymphatica, *Bianch.* Hiſt. hep. I. p.
233.

III. Pleuritides ſymptomaticae.

Pleuritis traumatica, S. sp. 6.

Pleuritis verminofa, S. sp. 8. *Verna* pleur. p. I.
cap. 1. P III. cap. 11. *Morgagn.* de ſed. et
cauſ. XXI 43. 44.

Pleuritis ſtomachalis, *Bianch.* Hiſt. hep. I. p. 232.

Pleurodyne verminosa, S. sp. 2.

Pleuritis lactea, S. sp. 17.

Pleuritis Polonica, S. sp. 18.

IV. Pleuritides falsae.

Pleuritis hepatica, S. sp. 12. *Panarol.* Pentac. II
obf. 37.

Pleuritis splenica, S. sp. 19.

Pneumoniae sequelae sunt.

V O M I C A.

Post pneumoniam, resolutione quadam non terminatam, dyspnoea et tussis perstantes, cum decubitu in latus sanum difficili, et febre hectica.

Vomica *Boerb.* 835. *Junck.* 35.*.

Pleurodyne vomica, S. sp. 21.

* Vomicam vocamus quam vomicam clausam appellant medici, et inde character noster. Characteres autem vomicae apud LINNÆUM et VOGELIUM vomicam apertam tantum respiciunt; ideoque ad illos auctores hic non referimus.

E M P Y E M A.

Post pneumoniam suppuratione terminatam, saepe post vomitam, remissio doloris, dum perstant dyspnoea, tussis, decubitus difficilis, et febris hectica, saepe cum sensu liquoris in pectore fluctuantis, et signis hydrothoracis.

Varietates ex SAUVAGESIO, licet non semper distinguendas, hic subjungimus.

Empyema a peripneumonia, S. sp. 1.

Empyema a vomica, S. sp. 2.

Empyema pleurae, S. sp. 3.

Empyema mediaſtini, S. sp. 4.

Empyema diaphragmatis, S. sp. 5.

Empyema intercostale, S. sp. 6.

G. XIII. C A R D I T I S *.

Pyrexia; dolor in regione cordis; anxietas;

* Recte omnino dixit VOGELIUS, *Carditidis symptomata fere eadem esse ut in peripneumonia, sed graviora;* et ita etiam sensisse videtur LINNÆUS, cum apud illum

spiritus difficilis; tussis; pulsus inaequalis; palpitatio; syncope.

Carditis, S. G. 111. V. 54.

Pericarditis, V. 53.

I. Idiopathica.

Carditis spontanea, S. sp. 1. *Senac. Traité de coeur. L. IV. chap. 7. Meckel, Mem. de Berlin, 1756.*

Erysipelas pulmonis, *Lomm. Observ. Lib. II.*

II. Symptomatica.

Carditis traumatica, S. sp. 2. *Senac. ibid. chap. 6.*

G. XIV. PERITONITIS.

Pyrexia; dolor abdominis, corpore erecto auctus; absque propriis aliarum phlegmasiarum abdominalium signis.

illum neque *Carditis*, neque *Pericarditis*, inter morbos phlogisticos recensetur. Certe novimus, pericardium saepe inflammatum fuisse sine aliis praeter peripneumoniae signis.

Si signa darentur quibus dignosci queant, sequentes pro speciebus peritonitis recenserentur possent.

I. Peritonitis (*propria*) in peritoneo strictius dicto, sive in peritoneo, abdomini intus in cingente.

Peritonitis, V. 62. *Lienhard.* Hist. anat. med. L. 1. obs. 3. *Roggerus* apud eund. L. 1. obs. 341. *Morgagn de sed.* LVII. 20.

II. Peritonitis (*omentalis*) in peritoneo, per omentum extenso.

Epiplöitis, S. G. 106. *Sag. G.* 308 *.

Omentitis, V. 61.

Omenti inflammatio, *Boerb.* 958. et III. *Van Swieten* Comm. *Stork.* Ann. med. I. 132. *Hulme* on the puerperal fever.

* Tum epiplöitis, tum Mesenteritis, ut Peritonitidis species hic recensetur, non quam quod ejusdem continuae membranae sint affectiones, quam quod nulla sine signa dari possunt, quibus a peritonitide, strictius dicta, dignosci queant.

110 GENERA MORBORUM

III. Peritonitis (*mesenterica*) in peritonaco,
per mesenterium extenso.

Mesenteritis, V. 60.

Enteritis mesenterica, S. sp. 4.

G. XV. GASTRITIS.

Pyrexia typhodes; anxietas; in epigastrio
ardor et dolor, ingestis quibuslibet auc-
tus; vomendi cupiditas, et ingesta pro-
tinus rejecta; singultus.

Gastritis, S. G. 104. L. 28. V. 56. *Sag.* G. 306.

Ventriculi inflammatio, *Boerb.* 951.

Febris stomachica inflammatoria, *Hoffm.* II. 120.

I. Idiopathicae.

1. A causis internis.

A Gastritis (*phlegmonodea*) dolore acuto,
pyrexia vehementi *.

* Tum gastritis, tum enteritis duarum esse spe-
cierum, quarum una phlegmonodea, altera erysipela-
tosa

Gastritis legitima, S. sp. 1. *Eller*, de cogn. et cur. morb. Sect. XI. *Haller*. obs. 14. hist. 3. *Lieut.* Hist. anat. med. L. 1. 74.

Gastritis erysipelatoſa, S. sp. 4 *

Cardialgia inflammatoria, S. sp. 13. *Fralles de* opio, ſect. II. p. 231.

2. A cauſis externis.

Gastritis a veneno, S. sp. 3.

B. Gastritis (*erythematica*) dolore, et pyrexia lenioribus, rubore eryſipelatoſo in faucibus apparente.

toſa dici poteſt, mihi ex pluribus obſervationibus fa-
tis certo conſtat; et ejuſmodi ſpecies itaque hic re-
cenſui, etſi fatendum ſit, gaſtritidis eryſipelatoſae, et
magis adhuc enteritidis eryſipelatoſae, ſigna ſaepe ob-
ſcura et incerta eſſe. De his vero monere volui ut
diligentius inquirent poſteri.

* Quam hic gaſtritidem eryſipelatoſam dixit
SAUVAGESIUS, omnino phlegmonodecam eſſe mihi
videtur.

II. Symptomaticae.

Gastritis exanthematica, S. sp. 5.

Gastritis herniosa, S. sp. 7.

De gastritide sternocostali, S. sp. 6. non liquet.

G. XVI. ENTERITIS.

Pyrexia typhodes; dolor abdominis pun-
gens, tendens, circa umbilicum tor-
quens; vomitus; alvus pertinaciter ad-
stricta.

Enteritis, S. G. 105. L. 29. V. 57. Sag. G. 307.

Intestinorum inflammatio, Boerb. 959.

Febris intestinorum inflammatoria ex mesenterio,
Hoffm. II. 170.

I. Idiopathicae.

Species sunt,

1. Enteritis (*phlegmonodaea*) dolore acuto,
pyrexia vehementi, vomitu et alvo a-
stricta.

Enteritis iliaca, S. sp. 1.

Enteritis colica, S. sp. 2. *Boerb.* 963.

2. Enteritis (*erythematica*) dolore et pyrexia lenioribus, sine vomitu, et cum diarrhoea.

Species symptomatice.

Enteritis flatulenta, S. sp. 3.

Enteritis enterocelica, S. sp. 5.

G. XVII. HEPATITIS.

Pyrexia; hypochondrii dextri tensio et dolor, saepe pungens pleuritici instar, saepius obtusus; dolor ad claviculam et summum humeri dextri; decubitus in sinistrum latus difficilis; dyspnoea; tussis sicca; vomitus; singultus*.

Hepatitis, S. G. 113. L. 35. V. 58. *Sag.* G. 312. *Boerb.* 914. *Hoffm.* II. 14. *Junck.* 66. *Macb.* p. 446.

* Inter symptomata hepatitis, *colorem faciei flavescentem*, posuit tum SAUVAGESIUS, tum SAGARUS, et hic etiam addit, *urinas icteritias, biliosas, et serum*

Variat,

I. Acuta signis in caractere dictis dignoscenda.

II. Chronica. Haec saepe nulla quibus dignoscatur signa praebet; aliquando tamen eandem adesse suspicari potest, ex hepatitidis causis quibusdam praegressis, ex sensu quodam plenitudinis et gravitatis in hypochondrio dextro, ex doloribus plus minusve pungentibus in eadem parte subinde perceptis, ex dolore quodam a presso hypochondrio dextro vel a decubitu in latus finistrum sentito, et denique ex pyrexia leviori cum dictis signis subinde infestante.

Sauvagesii species sunt,

serum sanguinis missi et crusta subflava; sed haec symptomata bilis regurgitantis vel resorptae rectius a LINNEO et VOGELIO omissa fuisse censeo; nam ejusmodi symptomata non tantum non perpetua, sed etiam rarissima sunt.

Hepatitis erysipelatoſa, S. ſp. 1. *

Hepatitis pleuritica, S. ſp. 2. *Bianch. Hiſt. hep.*
tom. I. p. 388.

Pleuritis hepatica, S. ſp. 12.

Hepatitis cypſica, S. ſp. 4. †.

Hepatitis obſcura, S. ſp. 5.

Pro ſpecie male recenſetur morbus ſecundarius.

* De erythemate vel eryſipelate, quod vocant, viſcerum, minus recte ſenſiſſe medicos cenſeo; nam, me ſaltem iudice, erythema non niſi ſuperficies illas internas quas tegit epithelion et tunica villoſa, epidermidi externae continua et analoga, afficere poſteſt. Nullum igitur eryſipelas pulmonis, de quo ſcripſit LOMMIUS, Obſerv. lib. 2. agnoſco; nec hepatitisdem quandam a SAUVAGESIO hic eryſipelatoſam recte dictam eſſe puto, et hepatitisdem quidem ex AMATO hic deſcriptam revera phlegmonodeam fuiſſe credo.

† Quin ex contuſione vel aliis cauſis oriri poſſit inflammatio cypſidis felleae, vel ductus choledochi, nullus dubito; ſed quibus ſignis cognoſci queat, niſi in uno caſu, non novi. In ictero, ſcilicet, cum dolore in regione epigaſtrica acuto, a calculo, ut videtur, in ductu choledochi haerente, inflammationem ductus cypſici ſaepe ortam fuiſſe, omnino cenſendum, et ne oriatur ſemper cavendum.

116 GENERA MORBORUM

Hepatitis suppurans, S. sp. 6. *Cheston's Pathol. Inq.*

Chap. III. Sect. 2. et app. Case 12.

Hepatalgia apostematosa, S. sp. 7.

G. XVIII. SPLENITIS.

Pyrexia; hypochondrii sinistri tensio, calor, tumor, et dolor pressu auctus; absque signis nephritidis.

Splenitis, § G. 114. L. 36. V. 59. *Juncb. 67. Sag.*

G. 313 *Magb.* p. 448.

Lienis inflammatio, *Boerb. 958.* et ill. *Van Swieten.* Comm.

Una tantum species recensetur.

Splenitis phlegmonodea, S. sp. 1. *Forest, L. XX.*

Obs. 5. 6. *De Haen,* apud *Van Swieten,* p. 958.

Pleuritis splenica, S. sp. 19.

Splenalgia suppuratoria, S. sp. 3.

G. XIX. NEPHRITIS.

Pyrexia; dolor in regione renis, saepe ureteris iter sequens; mictio frequens urinae, vel tenuis decoloris, vel ruberrimae; vomitus; cruris stupor; testiculi ejusdem lateris retractio aut dolor.

Nephritis, S. G. 115. L. 37. V. 65. *Sag. G.* 314.

Species

I. Idiopathica. Spontanea.

Nephritis vera, S. sp. 1.

II. Symptomaticae.

Nephritis calculosa, S. sp. 2.

Nephralgia calculosa, S. sp. 1.

Nephralgia arenosa, S. sp. 2.

Nephralgia purulenta, S. sp. 7. *Cheston's Inq.*
Chap. II.

Nephralgia arthritica, S. sp. 3.

G. XX. C Y S T I T I S.

Pyrexia ; hypogastrii tumor et dolor ; mic-
tio frequens dolorifica, vel ischuria ; te-
nesmus.

Cystitis, S. G. 108. L. 31. V. 66. *Sag. G.* 309,
Inflammatio vesicae, *Hoffm.* II. 157.

Species sunt,

I. A causis internis.

Cystitis spontanea, S. sp. 1.

118 GENERA MORBORUM

II. A causis externis.

Cystitis a cantharidibus, S. sp. 2.

Cystitis traumatica, S. sp. 3.

G. XXI. H Y S T E R I T I S.

Pyrexia ; hypogastrii calor, tensio, tumor, et dolor ; os uteri tactu dolens ; vomitus.

Hysteritis, L. 38. V. 63.

Metritis, S. G. 107. Sag. G. 315.

Inflammatiō et febris uterina, Hoffm. II. 156.

Species sunt,

Metritis puerperarum, S. sp. 1.

Metritis typhodes, S. sp. 2.

Metritis lactea, S. sp. 3.

G. XXII. R H E U M A T I S M U S.

Morbus ab externa, et plerumque evidente causa ; pyrexia ; dolor circa articulos, musculorum tractum sequens, genua et reliquos majores, potius quam pedum vel manuum articulos, infestans, calore externo auctus.

Rheumatismus, S. G. 185. L. 62. V. 138. *Boerb.*
1490. *Junck.* 19.

Dolores rheumatici et arthritici, *Hoffm.* II. 317.

Myositis, *Sag.* G. 301.

Lumbago, S. G. 212. V. 138. *Sag.* 169.

Ischias, S. G. 213. V. 138. *Sag.* 170.

Pleurodyne, S. G. 148. V. 138. *Sag.* 254. *Mach.*
p. 511.

Species idiopathica,

Rheumatismus acutus, S. sp. 1.

Rheumatismus vulgaris, S. sp. 2.

Variat sede.

A. In musculis lumborum.

Lumbago rheumatica, S. G. 212. sp. 1.

Nephralgia rheumatica, S. sp. 4.

B. In musculis coxendicis.

Ischias rheumaticum, S. G. 213. sp. 10.

C. In musculis thoracis.

Pleurodyne rheumatica, S. G. 148. sp. 3.

Pleuritis spuria, *Boerb.* 878.

Species symptomaticae.

Lumbago plethorica, S. sp. 3.

Ischias fanguineum, S. sp. 2.

Pleurodyne plethorica, S. sp. 1.

Rheumatismus hystericus, S. sp. 7.

Ischias hystericum, S. sp. 3.

Pleurodyne hysterica, S. sp. 6.

Rheumatismus saltatorius, S. sp. 8.

Pleurodyne flatulenta, S. sp. 4.

Pleurodyne a spasmate, S. sp. 9.

Rheumatismus scorbuticus, S. sp. 4.

Lumbago scorbutica, S. sp. 5.

Pleurodyne scorbutica, S. sp. 11.

Ischias syphiliticum, S. sp. 7.

Pleurodyne venerea, S. sp. 5.

Lumbago sympathica, S. sp. 13.

a mesenterii glandulis induratis,

a pancreate tumido, purulento, schirroso, putri,

ab induratis pyloro, vena cava, pancreate,

a rene schirroso, putrefacto,

ab abscessu circa venae cavae bifurcationem,

a vermibus intra renes.

Lumbago a faburra, S. sp. 8.

Pleurodyne a cacochylia, S. sp. 7.

Rheumatismus faltatorius verminofus, S. sp. 8.

Ifchias verminofum, S. sp. 8.

Pleurodyne verminofa, S. sp. 2.

Rheumatismus metallicus, S. sp. 10.

Lumbago a hydrothorace, S. sp. 14.

Lumbago pseudoifchuria, S. sp. 16.

Lumbago ex aneurifmate, S. sp. 11.

Pleurodyne ex aneurifmate, S. sp. 10.

Pleurodyne a rupto oefophago, S. sp. 20.

Pleurodyne rachitica, S. sp. 13.

Ifchias a fparganofi, S. sp. 5.

Pleurodyne catarrhalis, S. sp. 14.

Pleurodyne phthifica, S. sp. 8.

Rheumatismus necrofeos, S. sp. 14.

Rheumatismus convulfivus, S. sp. 15.

Ifchias gravidarum, S. sp. 4.

Lumbago partus, S. sp. 7.

Lumbago a nifu, S. sp. 10.

Ifchias a fubluxatione, S. sp. 9.

VOL. II.

Q

Rheumatismus dorsalis, S. sp. 11.

Lumbago a satyriasi, S. sp. 15.

Rheumatismus febricosus, S. sp. 9.

Lumbago febrilis, S. sp. 4.

Pleurodyne febricosa, S. sp. 15.

Rheumatismus miliaris, S. sp. 12.

Lumbago miliaris, S. sp. 9.

Pleurodyne miliaris, S. sp. 16.

Rheumatismi sequela est,

ARTHRODYNIA*.

Post rheumatismum, nisum violentum, vel
subluxationem; dolores artuum vel

* Si, ut quidam statuunt, rheumatismus chronicus ab acuto, genere omnino diversus fit, nomen simplex, uti genus omne, habere oportet, et hujusmodi nec ineptum, ut puto, imposui. Porro, cum pro sequela rheumatismi acuti vel rheumatismi simpliciter dicendi, rheumatismum chronicum dictum semper habeo, et cum inter utrumque morbum saepe limi-

musculorum, sub motu praesertim, aucti, plus minusve fugaces, calore lecti vel alio externo levati; artus debiles, rigidi, facile, et saepe sponte frigescentes; pyrexia nulla; tumor plerumque nullus.

Rheumatismus chronicus *Auctorum*.

Lumbago et ischias aliquando morbi acuti, sed cum saepius chronici sint, plerumque ad hunc locum pertinent.

Lond. Med. Obs. IV. 5.

G. XXIII. ODONTALGIA*.

tes vix statuendi sint, ideoque pro diverso genere rheumatismum chronicum recensere vix potui; rheumatismus tamen chronicus exquisitus ab acuto natura adeo diversus evadit, et medelam adeo diversam exposcit, ut merito nomine prorsus diverso insigniri possit; et si quis pro genere etiam diverso ponere velit, per me profecto licet.

* In priori Nosologiae methodicae nostrae editione, Odontalgiam pro rheumatismi specie habui, ac recensui; sed, cum eam a rheumatismo alio quovis causam prorsus diversam, acre, scilicet, membranas sensibiles irritans, habere observaverim, pro genere, a
rheu-

Rheumatismus vel arthrodynia maxillarum
a carie dentium.

Odontalgia, S. G. 198. L. 45. V. 145. Sag. G.
157. Junck. 25. Macb. 509.

Odontalgia, five rheumatismus odontalgicus, Hoffm.
II. 330.

Varietates ex Sauvagesio sunt,

Odontalgia cariota, S. sp. 1.

rheumatismo diverso, etiam habere vellem, et hic
itaque uti genus diversum posui.

Etiamfi odontalgiam a frigore et aliis irritamen-
tis aliquando suscitari videtur, cariem dentium, dia-
thesin phlogisticam inducentem, semper subesse puto.
Sunt fortassis alii morbi, ab acri irritante orti, qui
rheumatismum exacte satis referunt; sed de iis nobis
non constat. Si tamen revera existeret, ad mentem
Clariff. D. COTTUNNII, *Ischias nervosa*, rheuma-
tismi ab acri nervos irritante orti exemplum aliud
haberemus; sed neque phaenomena a Cottunnio re-
lata, neque ratio medendi, neque sectiones cadave-
rum, ejusmodi morbum unquam existisse mihi pro-
bant; ideoque neque hic, neque alibi, *Ischiadem ner-
vosam Cottunnii* inter rheumatismi species recensui.

- Odontalgia scorbutica, S. sp. 4.
 Odontalgia catarrhalis, S. sp. 3.
 Odontalgia arthritica, S. sp. 6.
 Odontalgia gravidarum, S. sp. 2.
 Odontalgia hysterica, S. sp. 3.
 Odontalgia stomachica, S. sp. 9.

G. XXIV. P O D A G R A *.

Morbus haereditarius, oriens sine causa externa evidente, sed praecedente plerumque ventriculi affectione insolita; pyrexia; dolor ad articulum, et plerumque pedis pollicis, certe pedum et manuum juncturis, potissimum infestus; per intervalla revertens, et saepe cum ventriculi, vel aliarum internarum partium, affectionibus alternans.

Podagra, V. 175. *Boerh.* 1254.

Febris podagrica, V. 69.

* *Arthritis* nomen, utpote apud medicos ambiguum, rejeci, et *podagra* nomine, utpote typum morbi praecipuum notante, cum celebri BOERHAAVIO usus sum.

Arthritis, S. G. 183. L. 60. V. 139. Sag. G. 142.

Macb. p. 487. Lond. Med. Obs. VI. 20.

Dolor podagricus et arthriticus verus, *Hoffm.* II.

339.

Dolores arthritici, *Hoffm.* II. 317.

Affectus spastico arthritici, *Junck.* 46.

Recte forsitan SAUVAGESIUS, more sibi insolito, hujus morbi non nisi unicam esse speciem affirmavit; sed varietates sequentes notari possunt.

I. Podagra (*regularis*) cum inflammatione artuum satis vehementi, per aliquot dies persistente, et paulatim cum tumore, pruritu, et desquamatione partis, recedente.

Arthritis podagra, S. sp. 1.

Arthritis rachialgica, S. sp. 11. *

Arthritis aestiva, S. sp. 4.

* Ut solitus sum, SAUVAGESII varietates, five species quas vocat, hic appono; sed tum quod species ejus non semper bene definitae sint, tum quod podagra

II. Podagra (*atonica*) cum ventriculi vel alius partis internae atonia, et vel sine expectata aut solita artuum inflammatione, vel cum doloribus artuum lenibus tantum et fugacibus, et cum dyspepsia vel aliis atoniae symptomatis, subito saepe alternantibus.

Arthritis melancholica, S. sp. 6.

Arthritis hiemalis, S. sp. 2.

Arthritis chlorotica, S. sp. 5.

Arthritis asthmatica, S. sp. 9.

III. Podagra (*retrograda*) cum inflammatione artuum subito recedente, et ventriculi vel alius partis internae atonia mox infecta.

IV. Podagra (*aberrans*) cum partis internae inflammatione, vel non praegressa, vel praegressa, et subito recedente, inflammatione artuum.

Podagra regularis et atonica a se invicem non semper prorsus disjungantur, in apponendis loco idoneo SAUVAGESII speciebus, me ubique accuratum fore non spondeo.

Conjungitur aliquando aliis morbis podagra.

Arthritis rheumatica, S. sp. 3.

Arthritis scorbutica, S. sp. 7.

Arthritis syphilitica, S. sp. 8.

Ad podagram nequaquam pertinere videntur sequentes.

Arthritis rachitica, S. sp. 13.

Arthritis Americana, S. sp. 14.

Arthritis Bahamensis, S. sp. 15.

G. XXV. ARTHROPUOSIS*.

Dolores artuum vel partium musculofarum, saepe post contusionem, profundi, obtusi, diuturni; tumor vel nullus, vel

* Cum neque rheumatismum neque podagram in apostema unquam abire credo, est hic morbus ab utroque certe diversus, ideoque pro genere peculiari recensendus. Utinam character ad eum a rheumatismo, arthrodynia, arthrocace, et phlogosi, distinguendum, ubique fatis certo adhibendus, dari possit.

modicus, et diffusus; phlogosis nulla;
pyrexia primum lenis, tandem hectica,
et simul partis apostema.

Lumbago psoadica, S. sp. 6. *Fordyce*, Practice of
Physic, P. II. pag. 70: *Cheston*, App. Case 4.
et 5.

Lumbago apostematosa, S: sp. 12.

Lumbago ab arthrocace, S. sp. 17:

Ischias ex abscessu, S: sp. 6.

Morbus coxarius, *De Haen*, Rat. Med. Vol. I.
C. xxxii.

O. III. EXANTHEMATA.

Morbi contagiosi, semel tantum in decursu vitae aliquem afficientes; cum febre incipientes; definito tempore apparent phlogoses, saepe plures, exiguae per cutem sparsae*.

Exanthemata, *Sag.* Cl. X.

* Quo caractere recte definiri, et quibus limitibus circumscribi debeat hic ordo, admodum incertum est. Si eruptiones enim a contagione specifica ortae, solae pro exanthematis, et morbis hujus ordinis, habendae sint; certe eruptiones a nulla contagione specifica, sed a quodam febris statu solum; pendentes, inter exanthemata genuina nequaquam recensendae sunt. Ita *petechia* a nobis omittitur, et forsitan tum *miliaria* tum *aphtha* omittenda esset. Dein, cum exanthemata pleraque contagiosa sint, et non nisi semel in decursu vitae aliquem afficiant, omnino idoneum videtur ut haec ab eruptionibus non contagiosis, quae saepe in decursu vitae aliquem afficiant
vel

Phlegmasiae exanthematicae, S. Cl. III. O. I.

Morbi exanthematici, L. Cl. I. O. II.

Febres exanthematicae, V. Cl. I. O. II.

G. XXVI. V A R I O L A.

Synocha contagiosa cum vomitu, et, ex epigastrio pressio, dolore.

vel afficere possint, rite distinguantur. Variola igitur et erysipelas minus recte sub eodem ordine collocantur. Denique, cum eruptiones in morbo quodam non semper ejusdem sint formae, nec temper, nec certo quovis morbi die, in illo morbo compareant, an ejusmodi morbus inter exanthemata recensendus sit, merito dubitari potest; ideoque an pestis ad exanthematum, an ad febrium ordinem, referri debeat, dubito.

De hisce omnibus utiliter fortassis disputari potest; de iisdem vero certo statuere vix auctim; quod mihi tamen in Nosologia maxime idoneum esse videtur id ex caractere quem dedi satis patebit.

Cum autem ad caracteres generum et specierum, ordinis character non omnino necessarius sit, hunc quodammodo neglexi, et hic morbos a Nosologis pro exanthematis habitos plerosque recensui.

Tertio die incipit, et quinto finitur eruptio papularum phlegmonodearum, quae, spatio octo dierum, in suppurationem, et in crustas demum abeunt, saepe cicatrices depressas, sive foveolas in cute, relinquentes.

Variola, S. G. 92. L. 3. Sag. G. 290.

Febris variolosa, V. 35. Hoffm. II. 49.

Variolae, Boerb. 1371. Funck. 76.

Species sunt,

I. Variola (*discreta*) pustulis paucis, discretis, circumscriptione circularibus, turgidis; febre, eruptione facta, protinus cessante.

Variola discreta benigna, S. sp. 1.

Variolae regulares discretæ, Sydenh. Sect. III. cap. 2.

Variolae discretæ simplices, Helvet. obs. sp. 1.

Variola discreta complicata, S. sp. 2. Helv. sp. 2.

Variolae anomalæ, Sydenh. Sect. IV. cap. 6.

Variola discreta dysenteriodes, S. sp. 4. *Sydenh.*
Sect. IV. cap. 1.

Variola discreta vesicularis, S. sp. 5.

Variola discreta crystallina, *Mead* de variol. cap. 2.

Variola discreta verrucosa, S. sp. 6. *Mead* ibid.

Variola discreta filiquosa, S. sp. 7. *Friend* Oper.
p. 358.

Variola discreta miliaris, S. sp. 8. *Helvet.* obs.
sp. 3.

II. Variola (*confluens*) pustulis numerosis,
confluentibus, circumscriptione irregu-
laribus, flaccidis, parum elevatis; febre
post eruptionem persistente.

Variola confluens, S. sp. 9.

Variolae regulares confluentes, ann. 1667. *Sy-*
denh. Sect. III. cap. 2.

Variolae confluentes simplices, *Helvet.* obs.
sp. 1.

Variola confluens crystallina, S. sp. 10.

Variola Japonica, *Kempfer.*

Vesiculae Divae Barbarae, *C. Pif.* obs. 149. *.

* Pro specie variolae, has vesiculas hic posuit
SAUVAGESIUS. Sed vesiculae a Pifone descriptae
potius ad pemphigum pertinere mihi videntur.

Variola confluens maligna, *Helvet.* obs. sp. 1.

Variola confluens cohaerens, S. sp. 11.

Variola confluens maligna, *Helvet.* sp. 2.

Variola confluens nigra, S. sp. 12 *Sydenh. Sect.*

V. cap. 4.

Variola confluens maligna, *Helvet.* sp. 3.

Variola fanguinea, *Mead de variolis*, cap. 2.

Variola confluens corymbosa, S. sp. 13.

Variola confluens maligna, *Helvet.* sp. 4.

G. XXVII. V A R I C E L L A.

Synocha.

Papulae post brevem febriculam erumpentes, in pustulas variolae similes, sed vix in suppurationem euntes; post paucos dies in squamulas, nulla cicatrice relicta, desinentes.

Varicella, V. 42.

Varicella lymphatica, S. sp. 1.

ANGUS, the CHICKEN-POX, *Edinb. Med. Essays*,

Vol. II. Art. 2. near the end. *Heberden*, *Med.*

Transact. Art. 17.

G. XXVIII. RUBEOLA.

Synocha contagiosa cum sternutatione, epiphora, et tussi sicca, rauca.

Quarto die, vel paulo ferius, erumpunt papulae exiguae, confertae, vix eminentes, et post tres dies in squamulas furfuraceas minimas abeuntes.

Rubeola, S. G. 94. L. 4. *Sag.* 293.

Febris morbillosa, V. 36. *Hoffm.* II. 62.

Morbilli, *Junck.* 76.

I. Rubeola (*vulgaris*) papulis minimis, confluentibus, corymbosis, vix eminentibus.

Rubeola vulgaris, S. sp. 1.

Morbilli regulares, *Sydenh.* Sect. IV. cap. 5.

Lond. Med. Obs. IV. 19. 20.

Variat

1. Symptomatis gravioribus, et decursu minus regulari.

Rubeola anomala. S. sp. 2.

136 GENERA MORBORUM

Morbilli anomali, *Sydenb. Sect. V. cap. 3.*

2. Comitante Cynanche.

Rubeola anginosa, S. sp. 4. *Edinb. Essays, Vol. V. art. 2.*

3. Comitante diathesi putrida, *Clar. Watson, Lond. Med. Observ. Vol. IV. Art. XI.*

II. Rubeola (*variolodes*) papulis discretis eminentibus.

Rubeola variolodes, S. sp. 3*.

Scotis the NIRLES.

G. XXIX. SCARLATINA.

Synocha contagiosa.

* SAUVAGESIUM secutus, hunc morbum hic indicavi, etsi multum dubito an recte ad rubeolam referendus sit. Non solum enim forma papularum plurimum differt, sed, quod majoris momenti esse videtur, est plerumque absque symptomatis catarrhalibus, rubeolae adeo propriis.

Quarto morbi die, facies aliquantum tumens; simul in cute passim rubor floridus, maculis amplis, tandem coalescentibus, post tres dies in squamulas furfuraceas abiens; superveniente dein saepe anasarca.

Scarlatina, S. G. 98. V. 39. Sag. G. 294. Junck.
75.

Species sunt,

I. Scarlatina (*simplex*) nulla comitante cynanche.

Scarlatina febris, S. sp. 1. Sydenh. sect. VI. cap. 2.
Soc. Royale I. Mem. p. 10. Macb. p. 380.

II. Scarlatina (*cynanchica*) cum cynanche ulcerosa*.

* Spatio quadraginta annorum Scarlatinam febrilem vel septies in Scotia epidemicam observavi, et in unoquoque exemplo morbus illius speciei erat quam Scarlatinam anginosam vocat SAUVAGESIUS. Nos Cynanchicam

Scarlatina anginosa, S. sp. 6. *Withering on the scarlet fever.*

Cynanchicam appellavimus, ex eo quod ulceribus faucium internarum fere semper comitata fuit. Cum in plerisque aegris morbus cynanchem malignam plurimum, aliquando satis exacte referebat, nec unquam scarlatinam epidemicam in omnibus aegris simplicem esse viderim, saepe dubitavi annon scarlatina omnis sit cynanchica, et semper idem fere morbus ac cynanche maligna, supra inter Pnlegmasias relata. Plures autem rationes in hanc sententiam ire non sinunt. Certe enim, testibus SYDENHAMO perspicacissimo et aliis, scarlatina simplex, sive nulla comitante cynanche, aliquando observata fuit, et datur, itaque contagio quaedam specifica efflorescentiam cutis scarlatinam, et hanc absque affectione quadam cynanchica, gignens. Quid, si aliquando etiam contagio sit, fauces afficiens, quae plerumque etiam scarlatinam gignat, hoc nihil praeterea mihi probare videtur, quam quod sit contagionum quarundam natura, ejusmodi ut simul tum fauces, tum cutem, afficere valeat. Cum tamen contagiones istae ita differre possint, ut altera cutem, altera fauces magis et primario afficere proclivis sit, hanc differentiam inter scarlatinae et cynanchis malignae contagionem semper inesse puto.

In

De scarlatina porriginosa, S. sp. 3. Sydenh.
 Sect. VI. Cap. 6. et Scarlatina variolode,
 S. sp. 5. nobis non liquet.

G. XXX: P E S T I S:

Typhus maxime contagiosa, cum summa
 debilitate *.

In morbo epidemico, quem pro Scarlatina habui, aliquot aegrotantium sine cynanche quacunque erant; et in iis fere omnibus, quibus adfuit cynanche, haec benigna admodum, ulcera tonsillarum, parva tantum nec serpentina, et plerumque pus bonum fundentia, exhibuit, et morbus raro funestus fuit. In cynanche vero maligna aegrotantes omnes in ipso morbi ingressu, cynanche correpti sunt, et haec fere semper ulcera maligna foeda, serpentina, gangraenosa, ostendebat. Morbus porro, putredinis et debilitatis indicia plurima prodens, plerumque exitialis evasit.

* De charactere pestis, lites inter medicos saepe ortae sunt, nec facili dirimendae, ita ut character quibuscunque pestis casibus adhibendus dari possit; sed sufficiat characterem dedisse qui in plerisque adhiberi queat.

Incerto morbi die, eruptio bubonum vel anthracum.

Pestis, S. G. 91. L. 2. *Junc.* 78.

Febris pestilentialis, V. 33. *Hoffm.* II. 93.

Variat gradu.

Pestis benigna, S. sp. 2. Pestis Massiliensis *Class.* 3. *Traité de la peste*, pag. 41. *Ejusdem pestis*, Cl. 5ta, *Traité*, p. 228.

Pestis remittens, S. sp. 9.

Pestis vulgaris, S. sp. 1. Pestis Massil. Cl. 2. *Traité*, p. 38. *Ejusd.* Cl. 2. 3. et 4ta, *Traité*, p. 225. &c. *Walischmidt.* de peste Holsatica, apud *Halleri*, *Diff. pract.* tom. V. *Chenot* de peste Transylvanica 1755, 1759. *De Haen.* *Rat. med.* pars xiv. *Car de Murrens* de peste Moscouense 1771. *Samoilowitz* *Memoire* sur la peste de Molcou 1771. *Ejusd.* lettre sur l'experience des frictions glaciales pour la guerison de la peste. *Ejusd.* mem. sur l'inoculation de la peste. *Unterricht vörs voik gegen die pest.* Dantzig 1770. *Muratoris* *Del Governo dellà peste.* Breicia 1721.

Pestis Ægyptiaca, S. sp. 11. *Alpin.* de med. Ægypt.

Pestis interna, S. sp. 3. Pest. Maffil. Cl. 1. Traité,
 P. 37. 224.

Species dubiae sunt,

Pestis sporadica, S. sp. 4.

Pestis carbunculosa, S. sp. 5.

Pestis Siamaea, S. sp. 8.

Pestis scorbutica, S. sp. 10.

G. XXXI. ERYSIPELAS*.

Synocha duorum vel trium dierum, plerumque cum somnolentia, saepe cum delirio.

* Vox Erysipelas tum pro phlogosi erythemate, tum pro febre erysipelacea, a scriptoribus medicis usurpatur, sed recte SAUVAGESIUS vitium cutaneum; quod nullam febrem, nisi symptomaticam, sibi junctam habeat, erythema appellari, et erysipelas, tantum febris illa exanthematica, quam erythema sequitur, vocari velit.

Minus recte forsitan Ill. LINNÆUS erysipelas prototypo exanthematicorum habuit; inter exanthemata enim, an recte, recensetur ipsum erysipelas dubitari potest.

In aliqua cutis parte, saepius in facie, phlogosis *erythema*, G. VII. sp. 2.

Erysipelas, S. G. 97. L. 10. *Sag* G. 296.

Febris erysipelacea, V. 68. *Hoffm.* 11. 98:

Febris erysipelatoſa, *Macb.* p. 382.

Species ſunt,

I. Erysipelas (*vesiculofum*) erythemate, ruſſedine ſerpente, latum ſpatium occupante, et locis ejus quibuſdam in veſiculas magnas abeunte.

Erysipelas roſa, S. ſp. 1. *Sennert.* de febr. L. II. c. 15.

Febris eryſipelatoſa, *Sydenhami*, ſect. VI. cap. 5.

Erysipelas typhodes, S. ſp. 2. *.

Erysipelas peſtilens, S. ſp. 5. †.

* Haec non niſi varietas eryſipelatis veſiculofii gradu ſolum differens, eſſe videtur.

† Haec et ſequens non niſi febres cum erythemate ſymptomatico videntur. Hic tamen notandum eſt, eryſipelas ſaepe aliquid putridae et gangraenofae indolis praͅ ſe ferre; nec dubito quin eryſipelas, quod
in

Erysipelas contagiosum, S. sp. 9.

II. Erysipelas (*phlyctænodes* *) erythematæ ex papulis pluribus, trunci corporis partes præcipue occupantibus, et proinus in phlyctænas, sive vesiculas parvas, abeuntibus.

Erysipelas Zoster, S. sp. 8.

Zona, Anglis, The SHINGLES, *Russel de tabe gland.* p. 124. *Hist.* 35.

Zona ignea, *Hoffm. app. tom. III.* p. 426.

Herpes Zoster, S. sp. 9.

Symptomaticum.

Erysipelas a veneno, S. sp. 3.

in hac regione, plerumque diathesi phlogistica comitatur, aliquando, præsertim in regionibus calidioribus, cum diathesi putrida adfit; et forsitan duas erysipelatis species, inflammatoriam nempe et putridam, indicare potuissimus; sed de posteriori nobis non satis constat

* An hæc species ad idem cum erysipelate vesiculososo genus recte referatur, dubito; sed iudicent periti.

Caeterae SAUVAGESII species ad erythema pertinent.

G. XXXII. MILIARIA*.

* Inter medicos, speciatim Viennenses, de indole morbi miliaris nuper acriter disputatum est; et imprimis an unquam idiopathicus, an vero semper symptomaticus sit, certatim quaeritur. Quod nunquam idiopathicus sit, praeter opinionem medicorum, a medio seculi decimi septimi in hunc fere diem, omnium, et contra sententiam medicorum hujus aevi quorundam spectabilium, affirmare non ausim; sed cum experientiam in hac re saepe fallacem, et medicos plerosque imitatorum servum pecus fuisse noverim, dubitare cogor; et, utcunque sit, morbum miliarem plerumque symptomaticum fuisse, ex observatione propria, per multos annos frequenti, certo novi. Nunquam contagiosum, nec manifesto epidemicum, quibusdam licet temporibus solito frequentiore, vidi. Morbis febrilibus quibuscunque, tum inflammatoriis tum puridis, aliquando adjungitur; in nullis tamen, nisi regimine calido et sudoribus praeuentibus, ortum, et in pluribus, regimine temperato, et sudoribus vitatis, morbum, alias expectandum, prorsus vitatum observavi. In quibusdam corporis partibus quasi arte excitatum aliquoties novi. Denique, cum contagio-

num

Synochus cum anxietate, frequenti suspirio, sudore olido, et punctiōibus cutis.

Incerto morbi die erumpunt papulae rubrae, exiguae, discretae, per totam cutem, praeter faciem, crebrae, quarum apices, post unum vel alterum diem, pustulas minimas, albas, brevi manentes, ostendunt.

num specificarum plerarumque indolem materia, si qua datur, miliaris nequaquam imitetur, tum quod certo morbi die eruptionem non efficiat, tum quod non semel tantum, sed saepius in vitae decursu, hominem afficiat. De hujus igitur materiae natura specifica, vel ad morbum quemvis idiopathicum gignendum apta, valde dubito. In hac re mecum tententem experientissimum et peritissimum CAROLUM WHITE habere mihi gratulor. Vide *White on the Management of Lying-in Women*.

Cum autem in hac re me falli potuisse, facile agnosco, ne tamen alios simul fallerem, miliariam inter exanthemata hic recensui, et characterem ejus, quem quivis, hunc morbum pro idiopathico habens, dare voluerit, exhibui; peritis quibusvis hanc rem certius dijudicandam relinquens.

Miliaria, L. 7.

Miliaris, S. G. 95. Sag. G. 295.

Febris miliaris, V. 37.

Febris purpurata rubra et alba miliaris, *Hoffm.*
II. 68.

Febris purpurea seu miliaris, *Junck.* 75.

Germannis der FRIESEL. *God. Welfsch. Hist.*
med. de novo puerperarum morbo, qui der
FRIESEL dicitur, *Lips.* 1655.

De hoc morbo scriptores praecipui sunt.

Hamilton, de febr. miliar. 1710. *Fontanus*, de febr.
mil. 1747. *Allioni* de miliar. 1758. *Fordyce*, de
febr. mil. 1748. *Fischer* de febr. mil. 1767.
De Haen, de divif. febr. 1760. et in *Ratio med.*
passim. *Matt. Collin* ad *Baldinger* de miliar. 1764.
Baraillon sur la fievre miliaire, *Soc. Royale I.*
Mem. p. 193. *ibid.* II. *Hist.* p. 198.

Gastellier sur la fievre miliaire des femmes en
couche *Montargis* 1779. *Varnier* sur la fievre
miliaire de Normandie, *Soc. Royale III. Mem.*
p. 281.

Ad idiopathicam, si qua datur, pertinent,

Miliaris benigna, S. sp. 1.

Miliaris maligna, S. sp. 2.

Miliaris recidivans, S. sp. 3.

Miliaris Germanica, S. sp. 5.

Symptomaticae manifesto sunt,

Miliaris Boia, S. sp. a.

Miliaris Britannica, S. sp. i.

Miliaris nova febris, *Sydenh.* Sched. monit. S. sp. d.

Miliaris sudatoria, S. sp. e.

Miliaris nautica, S. sp. g.

Miliaris purpurata, S. sp. b.

Miliaris lactea, S. sp. c.

Miliaris puerperarum, S. sp. k.

Miliaris scorbutica, S. sp. l.

Miliaris critica, S. sp. b.

G. XXXIII. URTICARIA*.

Febris amphimerina †.

* Est morbus ab Anglis, *The Nettle Rash* dictus, qui quibusdam Urticaria audit; sed morbus ille, *The Nettle Rash*, ut ab eruditissimo viro G. HEBERDEN, in Coll. Reg. Med. Lond. Actis describitur, et qualem saepius ipsi vidimus, est ab urticaria nosologorum omnino diversus, utpote sine febre chronicus, et ad Impetigines fortassis referendus.

† Hanc in priori editione contagiosam dixi; sed ex propria experientia contagiosam fuisse non novi, et quo auctore contagiosam antea dixi, nunc non invenio.

Die secundo rubores maculosi, urticarum puncturas referentes, interdium fere evanescentes, vespere cum febre redeunt, et post paucos dies in squamulas minutissimas penitus abeunt*.

Febris urticata, V. 40.

Uredo, L. 8.

Purpura urticata, *Juncb.* 75.

Scarlatina urticata, S. sp. 2:

Erysipelatis species altera, *Sydenb.* Sect. VI cap. 6.

Febris scarlatina, et febris urticata, *Meysercy,*

Mal. des armées, 291. et seq.

G. XXXIV. PEMPHIGUS.

Typhus contagiosa.

Primo, secundo, aut tertio morbi die, in variis partibus vesiculæ, avellanae magnitudine, per plures dies manentes, tandem ichorem tenuem effundentes.

* Ad aliorum potius quam meipsum mentem hic character conscriptus est; nam hunc morbum raro vidi, et nunquam epidemicum, vel regulariter, ut hic describitur, decurrentem, observavi.

Pemphigus, S. G. 93. *Sag.* 291.

Morta, L. I.

Febris bullosa, V. 41.

Species ex SAUVAGESIO sunt *;

Pemphigus major, S. sp. 1.

Exanthemata ferola, C. *Piscn.* obs. 150.

* Cum pemphigum, quem pro exanthemate habere possim, nondum ipse viderim, et in scriptis medicorum de ejusmodi morbo paucissima tantum inveni-
nerim; quae in Nosologia nostra de eo dicenda es-
sent, omnia fere ex SAUVAGESIO necessario depro-
menda erant. Eum itaque secutus sum; sed hunc
morbum lubenter ipse prorsus omissem, cum omnia
fere de eo dicta, dubia, obscura, et ambigua mihi vi-
dentur. Quae ex sui ipsius aut CAROLI PISONIS
observatione habet SAUVAGESIUS, omnino credere
fas est; quae autem ex CHRISTOPHORI SELIGERI,
tenuis certe judicii hominis, observatione duxit, pa-
rum attentione digna mihi videntur. Quae porro ex
D. THIERRY relatione adducuntur meam fidem om-
nino superant: Nimirum, quod in morbo admodum exi-
tiali acetum bezoarticum, a medico quodam datum, omnes
salvos fecit, interea dum vix unus, aliis medicis com-
missus, mortem evadebat. Denique, de morbo admo-
dum ambiguo a D. LANGHANS, in Actis Helveticis
descripto,

150 GENERA MORBORUM

Febris pemphygodes, Ephem. Germ. D. I. A. VIII.
 obs. 56.

Pemphigus castrensis, S. sp. 2.

Febris syneches, cum vesiculis per pectus et col-
 lum sparsis, *Morton.* app. ad exerc. II.

Pemphigus Helveticus, S. sp. 3. *Langbans* in Act:
 Helvet. vol. 2. p. 260. et in *Beschreibung* des Sie-
 menthals, Zurich 1753.

Febris Vesicatoria, *Macb.* p. 389.

De Pemphigo Indico, S. sp. 4. et

Pemphigo Brasiliensi, S. sp. 5. non liquet.

G. XXXV. A P H T H A.

descripto, donec aliae observationes rem elucidaverint,
 nihil concludere vellem. Nihil aliud, fortassis, quam
 cynanche maligna fuit ille morbus, et, ad summum,
 quod pemphigus omnis morbus symptomaticus fit,
 satis verisimile videtur. Paulo postquam haec impres-
 sa sunt, Collega noster eximius Franciscus Home
 mihi hominem leviter febricitantem ostendit, cui pri-
 mum in brachiis. et successive demum in toto corpore,
 vesiculae magnitudinis avellanae abortae sunt, et post
 duos tresve dies effuso humoris serosi paxillo col-
 lapsae sunt. Haec febris autem nullam indolem vel
 typum peculiarem monstrabat et cito disparuit nequa-
 quam contagiosa.

Synochus*.

Lingua tumidiuscula; linguae et faucium color purpurascens; escharae in faucibus et ad linguae margines primum comparentes, os internum totum demum occupantes, albidae, aliquando discretae, saepe coalescentes, abrasae cito renascentes, et incerto tempore manentes.

Aphtha, S. G. 100. L. 9. *Sag.* 298. *Boerb.* 978.

Hoffm. II. 478. *Junck.* 137.

Febris aphthosa, V. 44.

Speciem idiopathicam unicam tantum novi,

Aphtha infantum.

* An aphtha inter exanthemata recensenda sit, dubito. Aphtha enim quaeque fere quam ego vidi sine febre fuit; et si quando cum aphtha infantum febris adfuit, haec fere semper aphthae supervenerat. Aphtha adultorum quidem saepe febre supervenit. Sed, febribus diversarum specierum plerumque sub earum finem jungitur, nec, quantum novi, febris quaevis aphthae propria, a medicis nota, vel quidem dicta fuit.

Aphtha lactucimen, S. sp. 1.

Symptomata videntur,

Aphtha febrilis, S. sp. 2.

Aphtha maligna, S. sp. 3.

Manifesto symptomatae sunt

Aphtha sy. hilitica, S. sp. 4.

Aphtha icorbutica, S. sp. 5.

Exanthema symptomaticum est,

PURPURA, S. G. 96. Sag. G. 292. *.

Petechia, L. 5.

* Cum in quibusvis febribus, vel intermittentibus vel continuis, in quibusvis etiam exanthematis et profluviis, modo in iis morbis sit quaedam ad putredinem proclivitas, appareant petechiae; has pro efflorescentia symptomatica, potius quam pro exanthemate idiopathico, habere volui.

O. IV. HÆMORRHAGIÆ*.

Pyrexia cum profusione sanguinis absque vi externa; sanguis missus ut in phlegmasiis apparet.

Haemorrhagiae, V. Cl. II. O. I. *Hoffm.* II. 194.
Junck. 5.

Sanguifluxus, S. Cl. IX. O. I. *Sag.* Cl. V. O. I.

* Classẽ Fluxuum apud SAUVAGESIUM et SAGARUM, vel Profluviorum apud VOGELIUM, vel morborum evacuatoriorum apud LINNÆUM, cum illa morbos, tum facie, tum natura, omnino dissimiles conjunxerit minime naturalem esse, nec proinde idoneam putavi. In nostram, igitur, Nosologiam ejusmodi classẽ admittere nolui, et morbos in ea recensitos aliorum referendos esse censui. Illi quos pyrexia quaedam semper comitatur, sub classẽ Pyrexiarum certe recensendi sunt; et hic igitur hæmorrhagiæ

G. XXXVI. EPISTAXIS*.

Capitis dolor vel gravitas; faciei rubor;
profusio sanguinis e naribus.

Epistaxis, V. 82.

morrhagias *activas* quas vocant posui. HOFFMAN-
NUM sequor, qui mox post febres de ejusmodi hae-
morrhagiis tractavit, et in praefatione rationem red-
didit; quod, scilicet, “*probe consideratis phaenomenis,
et paulo pensculatius subductis rationibus, sanguinis erup-
tiones iisdem propemodum. utut, non satis completis mo-
tibus quibus febres oriuntur, progignuntur.*”

* Recte tum in Criticis Botanicis, tum in Philo-
sophia Botanica, No. 233. monuit LINNÆUS, “*No-
mina generica, cum classium et ordinum naturalium no-
menclaturis communis, omittenda esse.*” Contra hanc
regulam tamen ipse peccat, cum vocabulo haemor-
rhagia, classis vel ordinis naturalis appellatione satis
frequenter usitata, pro nomine generico utatur. Nec
quidem, cum erraverit, ipse HIPPOCRATES imitan-
dus sit. Hujus generis itaque nomen mutandum e-
rat, et a VOGELIO quod hic usurpatum est de-
sumpsi.

Haemorrhagia, S. G. 239. L. 173. Sag. G. 174.

Haemorrhagia narium, Hoffm. II. 196. Junck. 6.

I. Idiopathica.

Haemorrhagia plethorica, S. sp. 2. Hoffm. II. 198.

Variat ratione aetatis,

Epistaxis (*juniorum*) cum signis plethorae
arteriosae.

Epistaxis (*senum*) cum signis plethorae
venosae.

II. Symptomaticae.

1. A causis internis.

Haemorrhagia febrilis, S. sp. 3.

Haemorrhagia critica, S. sp. 4. Hoffm. II. 198.

Haemorrhagia infalubris, S. sp. 5. Hoffm. ibid.

Haemorrhagia in chronicis, S. sp. 6.

2. A causis externis.

356 GENERA MORBORUM

Haemorrhagia passiva, S. sp. 1.

Haemorrhagia a hirudine, S. sp. 7.

G. XXXVII. HÆMOPTYSIS.

Genarum rubor; molestiae aut doloris, et aliquando caloris, in pectore sensus; dyspnoea; titillatio faucium; tussis aut tussicula sanguinem floridum, saepe spumofum, rejiciens.

Haemoptysis, S. G. 240. L. 179. V. 84. Sag.

G. 175. Janck. 8.

Haemoptoe, Boerb. 1198.

Sanguinis fluxus ex pulmonibus, Hoffm. II. 202.

Species idiopathicae sunt,

1. Haemoptysis (*plethorica*) nulla vi externa applicata, neque praegressa tussis aut evacuationis solitae suppressione.
2. Haemoptysis (*violenta*) a vi externa applicata.

Haemoptysis accidentalis, S. sp. 1.

Haemoptysis habitualis, S. sp. 2.

Haemoptysis traumatica, S. sp. 12.

3. Haemoptysis (*phthistica*) post tussim cum macie et debilitate diuturnam.

Haemoptysis phthistica, S. sp. 9.

Haemoptysis ex tuberculo pulmonum, S. sp. 10.

Haemoptoe, Lond. Med. Obs. IV. 16. 18.

4. Haemoptysis (*calculosa*) rejectis simul moleculis calculosis plerumque calculis.

Haemoptysis calculosa, S. sp. 14.

5. Haemoptysis (*vicaria*) post evacuationis solitae suppressionem.

Haemoptysis catamenialis, S. sp. 4.

Haemoptysis periodica, S. sp. 5.

Symptomaticae sunt,

Haemoptysis *pneumonica*.

Haemoptysis catarrhalis, S. sp. 8.

Haemoptysis peripneumonica, *Laelii a fonte*.

Haemoptysis *exanthematica*.

158 GENERA MORBORUM

Haemoptysis variolosa, S. sp. 7.

Haemoptysis rubeolosa.

Haemoptysis *hydropica*,

Haemoptysis *alcitica*, S. sp. 15.

Haemoptysis *hydrothoracica*

Haemoptysis *cachectica*.

Haemoptysis *splenetica*, S. sp. 16.

Ineptae et spuriae sunt,

Haemoptysis a *diapedesi*, S. sp. 3.

Haemoptysis a *sphacelo pulmonum*, S. sp. 11.

Haemoptysis *scorbutica*, S. sp. 6.

Haemoptysis *Helvigiana*, S. sp. 17.

Haemoptysis a *hirudine*, S. sp. 13.

Haemoptys eos sequela est

P H T H I S I S.

Corporis emaciatio et debilitas, cum tussi,
febre hectica, et plerumque expectora-
tione purulenta.

Phthisis, S. G. 276. L. 208. V. 319. *Sag.* 101.

Junck. 33.

Phthisis pulmonalis, *Boerb.* 1196.

Affectio phthifica, five tabes pulmonalis, *Hoffm.*

III 284. Lond. Med. Obs. IV. 18. 23. V. 33.

Simmons on consumptions 1780.

Species sunt,

I. Phthisis (*incipiens*) sine expectoratione puris.

Phthisis incipiens, *Morton.* Physiolog. L. II. cap. 3.

Phthisis sicca, S. sp. 1.

II. Phthisis (*confirmata*) cum expectoratione puris.

Phthisis confirmata *Auctorum.*

Phthisis humida, S. sp. 2.

Variat utraque species,

Ratione causae remotae.

Phthisis haemoptoica, S. sp. 6.

Phthisis a peripneumonia, S. sp. 11.

Phthisis asthmatica, S. sp. 5.

Phthisis calculosa, S. sp. 7.

Phthisis exanthematica, S. sp. 14.

Phthisis a febris, S. sp. 13.

Phthisis rheumatico arthritica, S. sp. 12.

Phthisis chlorotica, S. sp. 10.

Phthisis icteritia, S. sp. 15. *Schacht. de phthisi icterit. 1724.*

Phthisis hypochondriaca, S. sp. 16.

Phthisis scrophulosa, S. sp. 3.

Phthisis chylosa, S. sp. 17.

Phthisis scorbutica, S. sp. 4.

Phthisis syphilitica, S. sp. 8.

Phthisis a plica, S. sp. 19.

Phthisis a metastasi puris, S. sp. 9.

Variat ratione fontis purulentae.

Phthisis a vomica, S. sp. 18.

Phthisis cellularis, S. sp. 20. *De Haen, Rat. medendi, vol. I. cap. 7. 11, Ed. Leid. **

G. XXXVIII. HÆMORRHOIS.

Capitis gravitas vel dolor; vertigo; lum-

* Utrum, de hoc fonte puris, recte an fecus judicaverit HÆNUS, hujusmodi species vix in Nosologia locum habere potest, cum a signis quibusvis externis dignosci non queat.

borum dolor; dolor ani; circa anum tubercula livida dolentia, e quibus plerumque profluit sanguis, qui aliquando etiam, nullo tumore apparente, ex ano stillat.

Haemorrhoids, S. G. 217. L. 192. *Sag. G.* 182.

Macb. p. 481.

Haemorrhoidalis fluxus, *Hoffm.* 219.

Haemorrhoides, *Junck.* 11. et 12.

Leucorrhoids, V. 112.

Proctalgia haemorrhoidalis, *Macb.* p. 540.

Species sunt,

1. Haemorrhoids (*tumens*) externa a mariscis.

Marisca, S. G. 35. *Sag. G.* 37.

Variat,

A. Cruenta.

Haemorrhoids moderata, S. sp. 1.

Haemorrhoides ordinatae, *Junck.* 11.

Haemorrhoides nimiae, *Junck.* 11.

Haemorrhoids immodica, S. sp. 2.

VOL. II,

X

Haemorrhoides excedentes, *Alberti* de haemorrhoid. pag. 179.

Haemorrhoidis polyposa, *S.* sp. 3.

B. Mucosa.

Haemorrhoides decoloratae, albae, et mucidae, *Junck.* 13. *Alberti*, pag. 248.

Proctalgia intertriginosa, *Macb.* p. 541.

2. Haemorrhoidis (*procidens*) externa a procidentia ani.

Haemorrhoidis ab exania, *S.* sp. 4. *Med. Ess. Liter. et Phys.* II. 27. *Morg.* de caus. Ep. XXXIII.

3. Haemorrhoidis (*fluens*) interna absque tumore externo, vel procidentia ani*.

* STAHLIUS, et ejus sequaces, distinxerunt haemorrhoides in internas, quae sanguinem ex ramis venae portarum, et externas, quae sanguinem ex ramis venae cavae profundunt; sed, quantum video, scaturigo sanguinis profusi nullo modo dignosci queat. Huic itaque distinctioni nullus locus esse videtur, nec, si esset, quicquid ad distinguendam morbi naturam, vel effectum, conferre posset; nam arteriae et venae, ad inferiorem intestini recti partem
pertinentes,

4. Haemorrhoids (*caeca*) cum dolore et tumore ani, sine profusione sanguinis.

Haemorrhoides caecae, *Junck.* 12. *Alberti*, pag. 274. *.

Proctalgia inflammatoria, *Macb.* p. 540.

G. XXXIX. MENORRHAGIA.

Dorsi, lumborum, ventris, parturientium instar, dolores; menstruorum copiosior,

pertinentes, ortu utcunque diversae, tam frequenter inter se invicem communicantur et conjungantur, ut uniuscujusvis affectio ad alteram statim communicari, et utriusvis effectus fere idem semper esse oporteat. Non ideo haemorrhoidem internam et externam ad mentem Stahlianorum distinxi, sed prout scaturigo sanguinis profluentis magis intra vel extra anum fuerit.

* Haemorrhoids saepe corporis universi morbus est, sive a quodam universi corporis statu pendens; sed saepe etiam morbus est mere localis. Non tamen hujusmodi species ad morbos locales referre volui; quoniam haemorrhoids quaevis, etiam si initio mere localis sit, si saepius, ut solet, redierit, tandem, sicut haemorrhagia alia quaevis saepe rediens, necessario fit universi corporis morbus. Affines itaque separare nolui, et haemorrhoidem quidem omnem hic inter morbos universales recensendam esse censui.

vel sanguinis e vagina praeter ordinem
fluxus.

Menorrhagia, S. G. 244. L. 202. V. 96.

Metrorrhagia; *Sag. G.* 179.

Uteri haemorrhagia, *Hoffm.* II. 224.

Haemorrhagia uterina, *Junck.* 14.

Leucorrhoea, S. G. 267. L. 201. V. 119. *Sag.*

G. 202.

Cachexia uterina, sive fluor albus, *Hoffm.* III.

348.

Fluor albus, *Junck.* 133. *.

Abortus, S. G. 245. L. 204. *Sag. G.* 180. *Junck.* 92.

Abortio, V. 97.

Fluor uterini sanguinis, *Boerb.* 1303.

Convulsio uteri, sive abortus, *Hoffm.* III. 176.

* Leucorrhoeam, sive fluorem album, *auctorum*
hic ad menorrhagiae genus retuli, et leucorrhoeam
sine vitio locali omnem huc omnino referendam esse
censeo. Plerumque enim, et fere semper, leucor-
rhoea vel cum menorrhagia conjuncta est, vel eam
mox secuta, et a temporibus quando apparet leucor-
rhoea serim sub hac effusum ab iisdem vasis, quae
menses profundunt, provenire, et saepe leucorrhoeam
ab

Species sunt,

1. Menorrhagia (*rubra*) cruenta in non gravidis nec puerperis.

Menorrhagia immodica, S. sp. 3. a *Pasta*. Diff. sopra i mestru.

Menorrhagia stillatitia, S. sp. 2.

2. Menorrhagia (*abortus*) cruenta in gravidis.

Menorrhagia gravidarum, S. sp. 6. *Pasta* intor- no al flusso di sangue dall utero nelle gravide.

Abortus effluxio, S. sp. 1.

a. Abortus subtrimestris.

b. Abortus subfemestris.

c. Abortus octimestris.

Abortus ab uteri laxitate, S. sp. 2.

3. Menorrhagia (*lochialis*) cruenta in puerperis.

ab iisdem causis ac menorrhagiam rubram oriri, fatis- verisimile est.

Menorrhagia lochialis, S. sp. 8. *Pasta* diff. supra
 citat.

4. Menorrhagia (*vitiorum*) cruenta ex
 vitio locali.

Menorrhagia ex hysteroptosi, S. sp. 5.

Menorrhagia ulcerosa, S. sp. 9.

5. Menorrhagia (*alba*) serosa sine vitio
 locali in non gravidis*.

Leucorrhoea, G. ut supra.

Menorrhagia decolor, S. sp. 7.

Leucorrhoea Americana, S. sp. 5.

Leucorrhoea Indica, S. sp. 6.

6. Menorrhagia (*Nabothi*) serosa in gra-
 vidis.

Leucorrhoea Nabothi, S. sp. 9.

Leucorrhoea gravidarum, S. sp. 8.

* Hic fortassis lector eruditus mirari possit, quod
 ad clariss. medici Parisiensis RAULIN, de fluore albo
 librum,

Menorrhagiam ferofam, five leucorrhoeam ex vitio locali. ad morbos locales referendam effe cenfeo.

Haemorrhagiae fequentes plerumque, fi non femper, fympomaticae funt.

STOMACACE, S. G. 241. L. 175. V. 85. *Sag.*
G. 176.

Vel fcorbuti, vel vitii oris, vel injuriæ externae, fympotoma eft. Cum autem

librum, *Traité des fleurs blanches*, neque ftudiofos relegaverim, neque fpecies fluoris albi varias ab illuftri auctore indicatas ipfe recensuerim. Recte an fecus fecerim, peritis dijudicandum relinquo; fed quod non fecerim haec caufa fuit. Plura in libro illo ingeniofo fubtilius, quam verius dicta, mihi videntur; et vel quomodo fluor albus, ab aliarum praeter uteri partium affectione oriri poffit, non intelligo, vel quod revera oriantur, ex meis faltem obfervationibus, forfan paucioribus, mihi nequaquam conftat. Lectores itaque noftros potius ad auctorem ipfum relegare, quam doctrinam ejus male intellectam, et forfan minus recte traditam, hic exhibere velim.

species SAUVAGESII fere omnes recensere idoneum duco nunc sequenti serie recensitas velim.

Haematemefis plethorica, S. sp. 1.
 catamenialis, S. sp. 5.
 haemorrhoidalis,
 ex splene, S. sp. 7.
 ex hepate, S. sp. 13.
 ex pancreate, S. sp. 6.

Haematemefis atra, S. sp. 12.
 scorbutica, S. sp. 8.

ex aneurismate, S. sp. 2.
 carnosis cruenta, S. sp. 11.

traumatica, S. sp. 3.
 ab hirudine, S. sp. 4.
 cholericæ, S. sp. 9.
 a veneno, S. sp. 14.

Simulata, S. sp. 10.

Apud SAUVAGESIUM species sunt,

1. Stomacace scorbutica.
2. Stomacace universalis.

3. Stomacace ab haemorrhoo.
4. Stomacace purulenta.

HÆMATEMESIS, S. G. 242. L. 184. V. 89. G.

177.

Plerumque haemorrhagiae solitae vicaria est, vel vitii ventriculi localis, vel morbi nigri, vel denique vis externae, symptoma est,

1. Haematemesis plethorica.
2. Haematemesis ex aneurismate.
3. Haematemesis traumatica.
4. Haematemesis ab hirudine.
5. Haematemesis catamenialis.
6. Haematemesis ex pancreate.
7. Haematemesis ex splene.
8. Haematemesis scorbutica.
9. Haematemesis cholericæ.
10. Haematemesis simulata.
11. Haematemesis carnosæ cruentæ.
12. Haematemesis atra.
13. Haematemesis ab hepate.
14. Haematemesis a veneno.

170. GENERA MORBORUM

HÆMATURIA, S. G. 243. L. 198. V. 92. *Sag.*
G. 178.

Edinb. Eff. V. 72.

Plerumque calculi renalis, aliquando fe-
brium putridarum symptomata est.

Species secundum SAUVAGESIUM sunt.

Haematuria spontanea, S. sp. 1.
catamenialis, S. sp. 12.

calculosa, S. sp. 5.
nigra, S. sp. 11.
purulenta, S. sp. 4.

violenta, S. sp. 2.
traumatica, S. sp. 14.
haemorrhoidalis, S. sp. 9.
ejaculatoria, S. sp. 7.

Haematuria stillatitia, S. sp. 8.

in exanthematicis, S. sp. 6.

Spuria, S. sp. 10.

deceptiva, S. sp. 3.

a transfusione, S. sp. 13.

a verme, S. sp. 15.

CYSTIRRHAGIA, V. 93.

Plerumque calculi vesicalis, rarius alius mor-
bi vesicae, fymptoma.

O. V. PROFLUVIA*.

Pyrexia cum excretionē aucta, naturaliter non fanguinea.

Profluvia, V. Cl II.

G. XL. CATARRHUS.

Pyrexia faepe contagiosa; mucī, ex glandulis membranae narium, faucium, vel bronchiorum, excretio aucta; saltem hujus excretionis molimina.

Catarrhus, S. G. 186. V. 98. *Sag. G.* 145.

Coryza, L. 174. V. 100. *Sag. G.* 196.

* Ob eandem rationem qua haemorrhagias, profluvia etiam febrilia quaedam hic in classe pyrexiarum collocavi. Catarrhus quidem, pyrexia et diathesi phlogistica, phlegmasiis maxime affinis est; et dysenteria non solum pyrexia semper comitatur, sed in multis etiam a fluxibus aliis quibusvis differt,

Rheuma, S. G. 149. *Sag.* G. 255.

Tuffis, S. G. 142. L. 155. V. 205. *Sag.* G. 249.

Junck. 30.

Tuffis catarrhalis et rheumatica, *Hoffm.* III, 109.

Genera sequentia ad hunc titulum referenda, plerumque symptomatica sunt.

Anacatharsis, S. G. 262. *Sag.* 198.

Expectoratio, L. 178.

Raucedo, L. 146.

Raucitas, V. 252.

Gravedo, L. 42.

Sp. 1. Catarrhus a frigore.

Catarrhus benignus, S. sp. 1.

Catarrhus pectoris, S. sp. 6.

Coryza catarrhalis, S. sp. 1.

Coryza phlegmatorrhagia, S. sp. 2. *Salmuth.* obs. cent. 1. 37. *Junck.* 28. *Morgagn.* de fed. XIV: 21.

Coryza febricosa, S. sp. 6.

Tuffis catarrhalis, S. sp. 1. *N. Rosen* Diff. apud *Haller*, disput. pract. tom. II.

Rheuma catarrhale, S. sp. 1.

Amphimerina catarrhalis, S. sp. 2.

Febris remittens catarrhalis, *Mach*, p. 359.

Amphimerina tufficulosa, S. sp. 13.?

Cephalalgia catarrhalis, S. sp. 10.

Sp. 2. Catarrhus a contagio.

Catarrhus epidemicus, S. sp. 3.

Rheuma epidemicum, S. sp. 2.

Synocha catarrhalis, S. sp. 5.

Hujus exempla sunt.

Anno 1323. Cronica meteorologica della Toscana,
apud *Targioni Tozzetti* Osservaz.
Med. Raccolta I. pag. 175.

1328. Ibid.

1358. Ibid.

1387. Ibid.

Valescus de Taranta apud *Morgagn.*
de fedibus XIII. 4.

Marchesi ibid.

1510. *Valleriola* append. ad loc. com. cap. 2.

1575. *Valleriola*, ibid.

Riverii Obs. in biblioth. vet. repert.
obs. IX.

Foresti, L. VI. obs. 1.

1580. *Haenischius* in *Arctaeum*, pag. 315.
396.

Wieri, Obs. L. II.

Anno 1580. *P. Sal. Diversus*, de febre pestilenti,
cap. XI.

Forestus, L. VI. obs. 3.

Riverii Obs. in biblioth. vet. repert.
obs. X.

Sennertus de febre, L. IV. cap. 17.

1591. *Sennertus*, ibid.

Pechlin, L. II. Obs. 17.

1658. *Willis* de febribus, cap. 16.

1675 *Sydenham*, Sect. V. cap. 5.

Raygerus in *Ephem. Germ. D. I. A.*

VI. et VII. obs. 213.

P. de Sorbait.

1679. *Sydenham*, Ep. resp. ad *R. Brady*.

Zod. med. Gall. A. I. Decemb. obs. 6.

1708. *Schroeckius* in *Ephem. Germ. Cent. I.*

et II. in append. pag. 14.

1709. *Hoffm.* II. 47.

1712. *Camerarius* in *Ephem. Germ. Cent.*

III. et IV. obs. 58.

Schroeckius, ibid. in append. pag. 26.

1729. et 1730. *Hoffm.* II. 109.

C. Fr. Loew. in append. ad *A. N. C.*
vol. III.

Scheuchzer, Obs. meteorol. in app. ad
A. N. C. vol. IV.

Morgagni de sed. et caus. XIII. 3. 4.

176 GENERA MORBORUM

Anno 1729 et 1730. *Beccarius*, A. N. C. III. obs.
48. pag. 142.

Hillary on weather and diseases, pag.
35.

Winteringham, Comm. Nofolog. pag.
319.

Rutty's hist. of weather, pag. 17.

Perkin's Soc. Royale I. Hist. p. 209.

1732 et 1733. *Commerc. lit. Norimb.* 1733.
pag. 6. 52. 108. 267.

Detharding de febr. Eyderostad. apud
Halleri disputat. pract. vol. V.

Edin. Med. Eff. vol. II. art. 2.

Hillary of weather, &c. pag. 47.

Winteringham, Comm. Nofolog. p. 354.

Huxham de aëre, &c. 1733. M. Febr.

Rutty's hist. of weather, pag. 30.

1737. Jan. *Rutty*, *ibid.* pag. 60.

Octob. *Rutty* *ibid.* pag. 60.

Julio. *Com. lit. Norimb.* 1737, pag.
347.

1742. 1743. *Comm. lit. Norimb.* 1743, pag.
106. 188. 313. 336.

Juch et *Zuberbuchler* de febre catar-
rhali, apud *Haller.* Disp. pract. tom.
V.

Huxham de aëre, 1743. M. April.

Rutty, hist. of weather, p. 99.

- Anno 1742. 1743. *Targioni Tozzetti*. Racolt. I. di
 offervaz. Med. pag. 176.
1748. *Clegborn*, Minorca, pag. 132.
Perkin's Soc. Royale I. Hist. p. 210.
 et suivans.
1758. *Rutty*, hist. of weather, pag. 211.
Whytt, Lond. Med. Obs. vol. II. art. 13.
1762. *Baker* de catarrho, Lond. 1764.
Monro, Dis. of mil. hosp. pag. 137.
Macb. p. 333.
1767. *Heberden*, Med. transact. I. art. 18.
Macb. p. 334.
1775. Lond. Med. Obs. VI. 30.
1779. et 1780. Soc. Royale III. Mem.
 p. 16.
 Saillant Tableau des Epidemies ca-
 tarrhales 1780.

Inter catarrhi, coryzac, et tussis species apud
 SAUVAGESIUM, symptomaticae sunt,

- Catarrhus rubeolofus, S. sp. 5.
 Tussis exanthematica, S. sp. 20.
 Coryza variolosa, S. sp. 4.
 Coryza virulenta, S. sp. 3.
 Coryza purulenta, S. sp. 5.

Tuffis accidentalis, S. fp. 4.

Tuffis gutturalis, S. fp. 8.

Tuffis xerolaryngea, S. fp. 23.

Tuffis verminosa, S. fp. 21.

Tuffis ficca, S. fp. 3.

Tuffis calculofa, S. fp. 22.

Tuffis phthifica, S. fp. 17.

Tuffis haemoptoica, S. fp. 15.

Tuffis a polypo, S. fp. 16.

Tuffis a dentitione, S. fp. 12.

Tuffis ftomachalis humida, S. fp. 6.

Tuffis ftomachalis ficca, S. fp. 7.

Tuffis hystérica, S. fp. 2.

Tuffis gravidarum, S. fp. 14.

Tuffis hepatica, S. fp. 9.

Tuffis rheumatica, S. fp. 18.

Tuffis arthritica, S. fp. 19.

Tuffis metallicolarum, S. fp. 4.

XLI. DYSENTERIA.

Pyrexia contagiofa; dejectiones frequen-
tes, mucofae, vel fanguinolentae, re-
tentis plerumque faecibus alvinis; tor-
mina; tenefmus.

Dysenteria, S. G. 248. L. 191. V. 107. *Sag.* 183.
Hoffm. III. 151: *Junck.* 76.

Non nisi speciem unicam novi cujus nomina apud SAUVAGESIUM sunt,

Dysenteria epidemica, S. sp. 6. *Sydenham*, sect. IV. cap. 3. *Helwich.* in hist. morb. Wratislav. ann. 1699. *Degner.* de Dysenteria Neomagensi 1736. *Huxham*, de aëre, &c. ad ann. 1743. *Cleghorn's* Minorca, chap. 5. *Grimm.* hist. dysenteriae malign. 1759, &c. in append. ad A. Nov. N. C. vol. III. *Baker* de catarrho et dysenteria, Lond. 1762. *Akenfide* de dysenteria, Lond. 1762. *Stark*, Hist. et sectiones dysenteric. diff. inaug. L. B. 1766. *Zimmerman* von der Ruhr. *Zurich.* 1767. Soc. Royale III. Mem. p. 32.

Dysenteria castrensis, S. sp. 7. *Ramazzini* de morb. artific. cap. 40. Illust. *Pringle*, Dis. of the army, pag. 224. Cl. *Monro*, Dis. of mil. hospitals, pag. 57.

Dysenteria aequinoctialis, S. sp. 14. *Bont.* de med. Ind. cap. 3.

Variat,

1. Vermibus comitata.

180 GENERA MORBORUM

Dysenteria verminosa, S. sp. 15. *Huxham* de aëre,
&c. ad ann. 1743. M. Maio. Ill. *Pringle*, pag.
225. *Monro*, pag. 62.

2. Rejeētis moleculis carnofis, vel febaceis.

Dysenteria carnofa, S. sp. 16.

Diarrhoea carnofa, S. sp. 5. *Wedelius* Ephem.
Germ. D. II. A. II. obf. 182. *Wagner*, ibid.
D. II. A. III. obf. 187. cum fcholio *Schroeckii*,
Morgagn. de fed. Ep. XXXI. 17—24. Ill.
Pringle, pag. 237. *Monro*, pag. 62.

3. Febre intermittente comitata.

Dysenteria intermittens, S. sp. 17. *Morton* in
append. ad Exerc. II. *Cleghorn's* Minorca, pag.
236. *Lautter.* hift. med. bienn. caf. 17. 20.

4. Sine fanguine.

Dysenteria alba, S. sp. 10. *Willis*, Pharm. rat.
P. I. Sect. III. cap. 3. *Sydenham*, Ed. Leid.
pag. 179. *Morgagn.* de fed. Ep. XXXI. 11.
Ill. *Pringle*, pag. 225. Cl. *Monro*, pag. 61.
Roederer de morbo mucofo, Gotting. 1762.

5. Miliaria comitata.

Dysenteria miliaris Gruberi, S. sp. 2. Febris exanthematico-dysenterica Tiguri epidemica, 1747.

Symptomaticae sunt,

Dysenteria benigna spontanea, S. sp. 1.

Dysenteria catamentialis, S. sp. 2.

Dysenteria gravidarum, S. sp. 4.

Dysenteria atrabiliaria, S. sp. 5.

Dysenteria typhilitica, S. sp. 13.

Dysenteria scorbutica, S. sp. 18.

Dysenteria Polonica, S. sp. 19.

Dysenteria mesenterii vomica, S. sp. 11.

Ad diarrhoeam pertinent,

Dysenteria Parisiaca, S. sp. 3.

Dysenteria a catharticis, S. sp. 12.

CL. II. NEUROSES*.

Sensus et motus laesi, sine pyrexia idiopathica, et sine morbo locali.

* A tempore celebris quondam apud Anglos medici THOMÆ WILLIS, morbos quosdam ab aliis quibusvis, sub nomine Nervosorum, distinxerunt Britanni; sed, ni fallor, parum accurate; dum affectiones hystericas et hypochondriacas fere solas sub nomine Nervosarum indigitarunt. Quantum ego quidem video, motus morbofi fere omnes a motibus in systemate nervorum ita pendent, ut morbi fere omnes quodammodo Nervosi dici queant. Inter eos tamen distinctionem satis commode adhibere licet, et morbi isti qui nervorum systema fere solum, vel saltem primario, neque simul vel sanguinis circuitum, vel humorum naturam, nisi secundario afficiunt, Nervosi a nobis dicendi sunt. Classẽ itaque tam a classe pyrexiarum, quam a classe cachexiarum diversam, sub nomine Neurosiũ recte instituisse mihi videtur.

O. I. C O M A T A.

Motus voluntarii imminuti cum sopore five sensuum feriatiōe.

Comata, S. Cl. VI. O. II. *Sag.* Cl. IX. O. V,

Soporosi, L. Cl. VI. O. II.

Adynamiae, V. Cl. VI.

Nervorum resolutiones, *Hoffm.* III. 194.

Affectus soporosi, *Hoffm.* III. 209.

Motuum vitalium defectus, *Junck.* 114.

G. XLII. A P O P L E X I A.

Motus voluntarii fere omnes imminuti, cum sopore*, plus minus profundo, superstite motu cordis et arteriarum.

Apoplexia, S. G. 182. L. 101. V. 229. *Boerb.*

1007. *Junck.* 117. *Sag.* G. 228. *Wepfer.* hist.

apoplecticorum.

* Apud LINNÆUM vocabulum Sopor, tam pro motuum, quam pro sensuum feriatiōe ponitur; sed sensu vulgari, tantum pro somno, vel pro statu somno simili, eodem utimur.

184 GENERA MORBORUM

Carus, S. G. 181. L. 100. V. 231. *Boerb.* 1045.

Sag. G. 287. *Macb.* p. 561. *.

Cataphora, S. G. 180. L. 99. V. 232. *Boerb.*

1048. *Sag.* G. 286.

Coma, V. 232. *Boerb.* 1048.

Haemorrhagia cerebri, *Hoffm.* II. 240.

Ad hoc genus pertinere mihi videntur,

Catalepsis, S. G. 176. L. 129. V. 230. *Sag.* G.

281. *Boerb.* 1036. *Junck.* 44.

Affectus cerebri spalinodico-ecstaticus, *Hoffm.* III,

44.

Ecstasis, S. G. 177. V. 333. *Sag.* G. 283.

Symptomata esse videntur,

Typhomania, S. G. 178. L. 97. V. 23. *Sag.* G.

284.

Lethargus, S. G. 179. L. 98. V. 22. *Sag.* G.

285.

* Cum genera *carus*, &c. hic subjuncta non nisi a poplexiae leviores esse videntur, nec vel respiratione vel excitatione satis accurate distinguenda sint, ad unum genus omnia referenda esse censui.

Apoplexiae idiopathicae species sunt,

1. Apoplexia (*sanguinea*) cum signis plethorae universalis, et praecipue capitis.

Apoplexia fanguinea, S. sp. 1. *Morgagn.* de causis, &c. II. III. LX. *Preysinger*, sp. 1.

Carus spontaneus, S. sp. 2. *Boerb.* 1045.

Asphyxia * spinalis, *Du Hamel*, Hist. Acad. ann. 1688. cap. 2. *Boerb.* Praelect. ad Instit. 401.

Morgagn. de caus. &c. III. 3.

Cataphora coma, S. sp. 2.

* Genus *asphyxiae* ad *syncopen* olim retuli, et ejusdem species quaedam non nisi gradu a *syncope* differre, adhuc cenfeo. Plures vero *asphyxiae* species ad *apoplexiae* genus pertinere olim et nunc etiam persuasum habeo; ideoque eas hic recensui. *Asphyxia* spinalis quidem hic apposita, utpote signis nullis externis dignoscenda, male inter species recensetur; si vero ad causas internas unquam respicere liceret, certe inter *apoplexiae* species recensenda esset. Cum autem ad causas externas et evidentes omnino respicere liceat, ab his satis perspectis plures *asphyxiae* species a SAUVAGESIO recensitas inter *apoplexiae* species

2. Apoplexia (*serosa*) in corpore plerumque fenum, leucophlegmatico.

Apoplexia pituitosa, S. sp. 7. Apoplexia serosa, *Preysinger*, Sp. 4. *Morg.* de causis, &c. IV, LX.

Carus a hydrocephalo, S. sp. 16.

Cataphora hydrocephalica, S. sp. 6.

Cataphora somnolenta, S. sp. 1.

Lethargus literatorum, S. sp. 7. *Van Swieten in aph.* 1010. 2 γ. et 3 α.

species enumeravi; nec huic obstare velim quod, in quibusdam asphyxiae speciebus, tum pulsus arteriarum tum respiratio, vita etiam superstita, tandem penitus cessant; nam in harum plerisque sub initio, cum motus et sensus fere penitus abolentur, superest adhuc motus quidam tum cordis tum pulmonum; et si tandem omnino cessant, idem aliquando apoplecticis ante mortem accidit. In apoplexia porro, cerebrum, in syncope autem cor, primario affectum esse opinor; et asphyxiae species itaque, prout cerebrum vel cor primario afficiant, quatenus id fieri, ex causis earum externis, conijcere liceat, ad apoplexiae vel syncopes genus refero.

3. Apoplexia (*hydrocephalica* *) paulatim adoriens; infantes et impuberes, primum lassitudine, febricula, et dolore capitis, dein pulsu tardiore, pupillae dilatatione, et somnolentia afficiens.

Hydrocephalus interior, S. sp. 1.

Hydrocephalus internus, *Whytt's Works*, pag. 725.

Lond Med. Observ. Vol. IV. art. 3. 6. and 25.

VI. 6. 7. 8. *Gaudelius* de hydrocephalo, apud

Sandifort Thesaur. Vol. II. Ed. Med. Eff. II. 18.

III. 23. *Soc. Royale III. Mem.* p. 194.

Hydrocephalus acutus, *Quin*, *Diff. de hydrocephalo*,

Edinb. 1779.

Asthenia a hydrocephalo, S. sp. 3.

* In opere nosologico, morbos qui sub suo decursu variam induunt formam, rite collocare, ideoque apoplexiae hydrocephalicae locum maxime idoneum assignare, difficile est. Hunc morbum autem sub apoplexiae potius quam hydrocephali titulo ponere vellem; primo, quia hydrocephalus, qui hic subest, nequaquam sensibus evidens est; dein quia hic morbus symptomatis ab hydrocephalo evidente plurimum differt; denique, quia causa proxima et tandem symptomatis, apoplexiae quam maxime affinis est.

4. Apoplexia (*atrabiliaria*) in corpore melancholico.

Apoplexia atrabiliaria, S. fp. 12. *Preysinger*, fp. 6.
Carus traumaticus, S. fp. 5.

5. Apoplexia (*traumatica*) a vi externa mechanica, capiti illata.

Apoplexia traumatica, S. fp. 2. Ed. Eff. V. 52.

6. Apoplexia (*venenata*) a potentiis fe-
dantibus interne vel externe adhibitis.

Apoplexia temulenta, S. fp. 3.

Carus a narcoticis, S. fp. 14.

Lethargus a narcoticis, S. fp. 3.

Carus a plumbagine, S. fp. 10.

Apoplexia mephitica, S. fp. 14. Ed. Eff. V. 55.

Asphyxia a mephitide, S. fp. 9.

Asphyxia a musto, S. fp. 3.

Catalepsis a fumo, S. fp. 3.

Asphyxia a fumis, S. fp. 2.

Asphyxia a carbone, S. fp. 16.

Asphyxia foricariorum, S. fp. 11.

Asphyxia sideratorum, S. sp. 10.

Carus ab infolatione, S. sp. 12.

Carus a frigore, S. sp. 14.

Lethargus a frigore, S. sp. 6.

Asphyxia congelatorum, S. sp. 5.

7. Apoplexia (*mentalis*) a pathemate mentis.

Carus a pathemate, S. sp. 11.

Asphyxia a pathemate, S. sp. 7.

Ecstasis catoche, S. sp. 1.

Ecstasis resoluta, S. sp. 2.

8. Apoplexia (*cataleptica* *) musculis, sub artuum a vi externa motu, contractilibus.

* Catalepsin nisi simulatam ipse nunquam vidi, et ab aliis visam frequenter simulatam fuisse credo. De morbo itaque rarius viso, varie descripto, et saepe profus simulato, pro certo statuere mihi vix liceret; sed genere ab apoplexia neutiquam diversum esse, bene persuasus sum; ideoque hic inter apoplexiae species collocavi.

Catalepfis, S. G. 176. L. 129. V. 230. Sag. G.
281. Boerb. 1036. Junck. 44.

Species apud SAUVAGESIUM sunt,

- Catalepfis hysterica, S. sp. 1.
- verminosa, S. sp. 2.
- a fumo, S. sp. 3.
- a menostasia, S. sp. 4.
- melancholica, S. sp. 5.
- delirans, S. sp. 6.

9. Apoplexia (*suffocata*) a potentia externa suffocante.

Asphyxia suspensorum, S. sp. 4.

Asphyxia immerforum, S. sp. 1. *M. Donel* de submersis, Edin. 1784.

Asphyxia flatulenta, S. sp. 12. ad apoplexiae genus pertinet, si a signis externis dignosci possit.

Apoplexia saepe symptomatologica est,

1. Febris intermittens.

Apoplexia febricosa, S. sp. 9.

Carus febricitus, S. sp. 3.

Cataphora timor, S. fp. 8.
 Typhomania febricosa, S. fp. 1.
 Catalepfis quartanaria, S. fp. 7.

2. Febris continuæ.

Carus febrilis, S. fp. 2.
 Typhomania continua, S. fp. 2.
 Typhomania agrypnocoma, S. fp. 3.
 Lethargus a febre, S. fp. 1.

3. Phlegmasiæ.

Apoplexia inflammatoria, S. fp. 13.
 Lethargus cephaliticus, S. fp. 4.
 Lethargus pulmonicus, S. fp. 2.

4. Exanthematis.

Carus variolosus, S. fp. 8.
 Apoplexia metastatica, S. fp. 6.
 Carus exanthematicus, S. fp. 18.
 Cataphora exanthematica, S. fp. 5.

5. Hysteriæ.

Apoplexia hysterica, S. fp. 4.

Carus hystericus, S. sp. 9.

Asphyxia hysterica, S. sp. 8.

Carus myftagmus, S. sp. 17.

Carus hypochondriacus, S. sp. 13.

6. Epilepsiae.

Apoplexia epileptica, S. sp. 8.

Apoplexia fufpiriofa, S. sp. 10.

7. Podagrae.

Apoplexia arthritica, S. sp. 5.

Carus arthriticus, S. sp. 6.

Cataphora arthritica, S. sp. 4.

Lethargus arthriticus, S. sp. 5.

8. Vermium.

Apoplexia verminofa, S. sp. 15.

Carus verminofus, S. sp. 7.

Typhomania verminofa, S. sp. 4.

9. Ifchuriae.

Carus Ifchuriofus, S. sp. 4.

10. Scorbuti.

Cataphora scorbutica, S. sp. 3.

G. XLIII. P A R A L Y S I S.

Motus voluntarii nonnulli tantum immi-
nuti, saepe cum sopore.

Paralyfis, *Boerb.* 1057.

Hemiplegia, S. G. 170. L. 103. V. 228.

Paraplexia, S. G. 171.

Paraplegia, L. 102. V. 227.

Paralyfis, S. G. 169. L. 104. V. 226. *Junck.* 115.

Atonia, L. 120.

I. Species idiopathicae sunt,

1. Paralyfis (*partialis*) quorundam muscu-
lorum tantum.

Paralyfis, S. G. 169. L. 104. V. 226. *Junck.* 115.

Paralyfis plethorica, S. sp. 1.

Paralyfis serofa, S. sp. 12.

Paralyfis nervea, S. sp. 11.

194 G E N E R A M O R B O R U M

Mutitas a glossolyfi, S. sp. 1.

Aphonia paralytica, S. sp. 8.

2. Paralyfis (*hemiplegica*) alterius corporis lateris.

Hemiplegia, S. G. 170. L. 103. V. 228. *Sag.*
G. 276.

Variat ratione habitus corporis.

a. Hemiplegia in habitu plethorico.

Hemiplegia ex apoplexia, S. sp. 7.

Hemiplegia spasmodica, S. sp. 2.

b. Hemiplegia in habitu leucophlegmatico.

Hemiplegia serosa, S. sp. 10.

Male recensetur

Hemiplegia apostematodes, S. sp. 11.

Quae signis externis dignosci non potest, et

Hemiplegia ex epilepsia, S. sp. 12.

Recenseri vix meretur.

3. Paralyſis (*paraplegica*) dimidii corporis tranſverſim ſumpti.

Paraplexia, S. G. 171. Sag. G. 277.

Paraplegia, L. 102. V. 227.

Paraplexia ſanguinea, S. ſp. 2.

Paraplexia a ſpina bifida, S. ſp. 3.

Paraplexia rheumatica, S. ſp. 1.

4. Paralyſis (*venenata*) a potentiis ſedantibus externe vel interne adhibitis.

Paralyſis metallariorum, S. ſp. 22.

Hemiplegia faturnina, S. ſp. 14.

II. Species ſymptomaticae ſunt,

Hemiplegia intermittens, S. ſp. 8.

Paraplegia intermittens, S. ſp. 6.

Paralyſis febrilis, S. ſp. 8.

Hemiplegia exanthematica, S. ſp. 6.

Paralyſis rheumatica, S. ſp. 3.

Hemiplegia arthritica, S. ſp. 5.

Paralyſis rachialgica, S. ſp. 2.

Paraplegia rachialgica, S. ſp. 5.

Paralyſis bilioſa, S. ſp. 9.

- Hemiplegia tranſverſa, S. ſp. 1.
 Paralyſis ſcorbutica, S. ſp. 6.
 Paralyſis ſcrophuloſa, S. ſp. 5.
 Hemiplegia ſcrophuloſa, S. ſp. 4.
 Hemiplegia ſyphilitica, S. ſp. 3.
 Paraplegia ſyphilitica, S. ſp. 7.
 Paralyſis Polonica, S. ſp. 7.

 Paralyſis a vomica, S. ſp. 10.

 Paralyſis traumatica, S. ſp. 4.
 Hemiplegia traumatica, S. ſp. 9.
 Paraplegia traumatica, S. ſp. 4.

Tremorem, utpote ſemper ſymptomaticum,
 in numerum generum recipere nollem ;
 ſpecies autem a SAUVAGESIO recensitas,
 prout mihi vel Aſtheniae vel Paralyſios,
 vel convulſionis ſymptomata eſſe viden-
 tur, hic ſubjungam.

T R E M O R.

Artus alterna per itus et reſitus frequentes
 motitatio.

Tremor, S. G. 129. L. 139. V. 184. *Sag.* 236.

1. Species athenicae,

- Tremor a debilitate, S. sp. 1.
- Tremor fenilis, S. sp. 2.
- Tremor a coffea, S. sp. 4.
- Tremor a pathemate, metu, ira, gaudio, libidine,
S. sp. 14.
- Tremor typhodes, S. sp. 19.

2. Species paralyticae.

- Tremor paralytodes, S. sp. 11.
- Tremor vertiginosus, S. sp. 7.
- Tremor a plethora, S. sp. 13.
- Tremor a faburra, S. sp. 12.
- Tremor a hydrocephalo, S. sp. 8.
- Tremor scorbuticus, S. sp. 10.
- Tremor rheumatifinalis, S. sp. 18.
- Tremor temulentus, S. sp. 3.
- Tremor metallurgorum, S. sp. 5.
- Tremor traumaticus, S. sp. 17.

3. Species convulsivae.

- Tremor coactus, S. sp. 6.
- Tremor tendinum, S. sp. 9.
- Tremor palpitans, S. sp. 16.

O. II. ADYNAMIÆ.

Motus involuntarii, five vitales five naturales, imminuti.

Adynamiae, V. Cl. VI.

Defectivi, L. Cl. VI. O. I.

Leipopsychiae, S. Cl. VI: O. IV. *Sag.* Cl. IX:
O. IV:

G. XLIV. S Y N C O P E.

Motus cordis imminutus, vel aliquamdiu quiescens:

Syncope, S. G. 174. S. 94. V. 274. *Sag.* 280:
Junck. 119.

Leipothymia, S. G. 173. L. 93. V. 273: *Sag.*
279.

Asphyxia, S. G. 175. L. 95. V. 275. *Sag.* 281.

Virium lapsus et animi deliquia, *Hoffm.* III: 267.

I. Idiopathicae.

1. Syncope (*cardiaca*) sine causa manifesta
 saepe rediens, cum palpitatione cordis
 vehementi in intervallis: *Ex vitio cor-*
dis vel vasorum vicinorum.

Syncope plethorica, S. sp. 5. *Senac*, Tr. de coeur,
 p. 540.

Syncope a cardiogmo, S. sp. 7. *Senac*, de coeur,
 414. *Morgagn.* de fed. XXV. 2. 3. 10.

Syncope a polypo, S. sp. 8. *Senac*, p. 471.

Syncope ab hydrocardia, S. sp. 12. *Senac*, 533;
Schreiber Almag. L. III. § 196.

Syncope *Lanzoni*, S. sp. 18. *Lanzon.* Op. II. p.
 462.

Asphyxia Valsalviana, S. sp. 13.

2. Syncope (*occasionalis*) a causa manifesta
 oriens: *Ex affectione totius systematis.*

Leipothymia a pathemate, S. sp. 1. *Senac*, p. 544.

Syncope pathetica, S. sp. 21.

Asphyxiae a pathemate, S. sp. 7.

Syncope ab antipathia, S. sp. 9. *Senac*, p. 554.

Syncope a veneno, S. sp. 10. *Senac*, p. 546.

Syncope ab apostematis, S. sp. 11. *Senac*, p. 554.

Syncope a sphacelo, S. sp. 14. *Senac*, p. 553.

Syncope ab inanitione, S. sp. 1. *Senac*, p. 536.

Syncope a phlebotomia, S. sp. 4.

Syncope a dolore, S. sp. 2. *Senac*, p. 583.

Asphyxia traumatica, S. sp. 14.

Asphyxia neophytorum, S. sp. 17.

II. Symptomatae, five symptomata morborum vel totius systematis, vel aliarum praeter cor partium.

Syncope febrilis, S. sp. 3. *Senac*, p. 548.

Syncope febricosa, S. sp. 17. *Torti Therap. spec.*

L. III. cap. 1.

Syncope exanthematica, S. sp. 19.

Syncope metastatica, S. sp. 20.

Leipothymia stomachica, S. sp. 2.

Syncope stomachica, S. sp. 13. *Senac*, p. 545.

Syncope hysterica, S. sp. 6. *Senac*, p. 547.

Syncope arthritica, S. sp. 16. *Musgrave de arthr. anomala*, cap. 8.

Syncope scorbutica, S. sp. 15. *Lind Treat. on scurvey*.

P. II. chap. 11. *Senac*, p. 552.

G. XLV. DYSPEPSIA.

Anorexia, nausea, vomitus, inflatio, ructus, ruminatio, cardialgia, gastrodynia, pauciora saltem vel plura horum simul concurrentia, plerumque cum alvo adstricta, et sine alio vel ventriculi ipsius, vel aliarum partium, morbo.

Dyspepsia, V. 277: Lond. Med: Obs. VI. 11.

Apepsia, V. 276.

Diaphora, V. 278.

Anorexia, S. G. 162. L. 116. Sag. G. 268.

Cardialgia, S. G. 202. L. 48. V. 157. Sag. G. 160.

Gastrodynia, S. G. 203. Sag. G. 161.

Soda, L. 47. V. 161.

Nausea, S. G. 250. L. 182. V. 159. Sag. G. 185.

Vomitus, S. G. 251. L. 183. V. 214. Sag. G. 186.

Flatulentia, S. G. 271. L. 165. V. 127. Sag. G. 207.

I. Idiopathicae.

Anorexia pituitosa, S. sp. 2.

Anorexia a saburra, S. sp. 9.

VOL. II.

C c

Anorexia exhaustorum, S. sp. 8.

Anorexia paralytica, S. sp. 1.

Nausea ex cacochylia, S. sp. 11.

Vomitus pituitosus, S. sp. 26.

Vomitus ruminatio, S. sp. 6.

Vomitus a faburra, S. sp. 2.

Vomitus a crapula, S. sp. 1.

Vomitus lacteus, S. sp. 3.

Flatulentia infantilis, S. sp. 5.

Flatulentia acida, S. sp. 1.

Flatulentia nidorosa, S. sp. 2.

Cardialgia bradypepta, S. sp. 9.

Cardialgia a faburra, S. sp. 2.

Cardialgia lactantium, S. sp. 11.

Cardialgia flatulenta, S. sp. 3.

Cardialgia paralytica, S. sp. 7.

Gastrodynia faburralis, S. sp. 1.

Gastrodynia flatulenta, S. sp. 2.

Gastrodynia periodynia, S. sp. 7.

Gastrodynia astringens, S. sp. 9.

Gastrodynia atterens, S. sp. 10.

Gastrodynia a frigore, S. sp. 18.

II. Symptomaticae,

I. A morbo ipsius ventriculi.

Cardialgia schirrosa, S. sp. 6.

Vomitus a pyloro calloso, S. sp. 8.

Vomitus a steatomate ventriculi, S. sp. 11.

Nausea ab apostemate circa cardiam, S. sp. 9.

Gastrodynia ulcerosa, S. sp. 5.

Vomitus ab ulcere ventriculi, S. sp. 10.

Cardialgia a veneno, S. sp. 2.

Gastrodynia a veneno, S. sp. 4.

Vomitus a veneno, S. sp. 7.

Flatulentia accidentalis, S. sp. 4.

Gastrodynia a peregrinis, S. sp. 11.

Anorexia biliosa, S. sp. 6.

Nausea biliosa, S. sp. 6.

Gastrodynia biliosa, S. sp. 3.

Vomitus urinosus, S. sp. 27.

Gastrodynia calculosa, S. sp. 8.

Vomitus bezoarticus, S. sp. 13.

Cardialgia verminosa, S. sp. 10.

Nausea a taenia, S. sp. 1.

Vomitus verminofus, S. fp. 5.

Gastrodynia a xiphoide, S. fp. 12.

Gastrodynia Americana, S. fp. 6.

Nausea ex compresso ventriculo, S. fp. 5.

Vomitus a cartilagine xiphoidea, S. fp. 22.

Vomitus ab oesophago obstructo, S. fp. 21.

Gastrodynia gastrocelica, S. fp. 20.

Nausea ex gastrocele, S. fp. 4.

Vomitus gastrocelicus, S. fp. 18.

Cardialgia sputatoria, S. fp. 5.

Cardialgia inflammatoria, S. fp. 13.

Nausea ex gastritide, S. fp. 10.

Vomitus gastriticus, S. fp. 19.

2. A morbo aliarum partium vel totius corporis.

Vomitus cephalalgicus, S. fp. 23.

Vomitus a dentitione, S. fp. 4.

Vomitus iliacus, S. fp. 24.

Nausea ex pancreatis schirro, S. fp. 3.

Vomitus a pancreate, S. fp. 17.

Vomitus ab hepate obstructo, S. fp. 16.

Anorexia melancholica, S. fp. 5.

Gastrodynia hypochondriaca, S. fp. 16.

Flatulentia hypochondriaca, S. fp. 3.

- Flatulentia convulsiva, S. sp. 7.
 Vomitus hypochondriacus, S. sp. 6.
 Vomitus atrabiliaris, S. sp. 15.
 Anorexia mirabilis, S. sp. 10.
 Gastrodynia hysterica, S. sp. 14.
 Gastrodynia pulsatilis, S. sp. 13.
 Gastrodynia chlorotica, S. sp. 15.
 Nausea a semine corrupto, S. sp. 8.
 Nausea gravidarum, S. sp. 2.
 Vomitus gravidarum, S. sp. 12.
 Flatulentia lochialis, S. sp. 6.
 Anorexia arthritica, S. sp. 12.
 Cardialgia arthritica, S. sp. 8.
 Nausea nephritica, S. sp. 7.
 Vomitus nephriticus, S. sp. 20.
 Anorexia Stewartiana, S. sp. 13.
 Cardialgia a cardiogmo, S. sp. 12.
 Anorexia plethorica, S. sp. 3.
 Anorexia cachectarum, S. sp. 7.
 Anorexia febrilis, S. sp. 4.
 Cardialgia febricosa, S. sp. 4.
 Gastrodynia febricosa, S. sp. 17.
 Vomitus febricosus, S. sp. 29.
 Vomitus rabiosus, S. sp. 14.
 Vomitus haemorrhagicus, S. sp. 28.
 Gastrodynia metastatica, S. sp. 19.
 Nausea marina, S. sp. 12.

Vomitus marinus, S. sp. 25.

Anorexia neophytorum, S. sp. 11.

G. XLVI. HYPOCHONDRIASIS.

Dyspepsia cum languore, moestitia, et metu,
ex causis non aequis, in temperamento
melancholico.

Hypochondriasis, S. G. 220. L. 76. V. 218. *Sag.*

332.

Morbus hypochondriacus, *Boerb.* 1098.

Malum hypochondriacum, *Hoffm.* III. 64. *Junc.*

36.

Speciem idiopathicam unicam tantum novi.

Hypochondriasis melancholica, S. sp. 3.

De Hypochondriasi algida, S. sp. 10. mihi
non liquet.

Species sequentes ex FRÆCASSINO, ex
theoria parum certa confictae, mihi
videntur.

Hypochondriasis biliosa, S. sp. 1.

Hypochondriasis fanguinea, S. sp. 2.

Hypochondriasis pituitosa, S. sp. 4.

Symptomaticae sunt,

Hypochondriasis hysterica, S. sp. 5.

Hypochondriasis phthifica, S. sp. 6.

Hypochondriasis asthmatica, S. sp. 7.

Hypochondriasis calculosa, S. sp. 8.

Hypochondriasis tympanitica, S. sp. 9.

G. XLVII. CHLOROSIS.

Dyspepsia, vel rei non esculentae desiderium ; cutis pallor vel decoloratio ; venae minus plene, corporis tumor mollis ; asthenia ; palpitatio ; menstruorum * retentio.

Chlorosis, S. G. 309. L. 222. V. 305. Sag. G. 135.

Boerb. 1285. *Hoffm.* III. 311. *Junck.* 86.

* In hoc caractere antea dixi menstruorum saepe retentio ; quasi species chlorosis esset in qua
menses

Chloroseos unicam speciem veram agnosci-
mus, scilicet,

Chlorosis virginea, S. sp. 1.

a. Chlorosis amatoria.

Caeterae SAUVAGESII species spuriae, sive
decolorationes, symptomatae sunt:

Chlorosis a menorrhagia, S. sp. 2.

Chlorosis gravidarum, S. sp. 3.

Chlorosis infantum, S. sp. 4.

Chlorosis verminosa, S. sp. 5.

Chlorosis viridis, S. sp. 6.

menses rite fluxerunt, et cogitavi de specie quadam
cachexiae huc referenda. Sed nunc dubito an spe-
cies cachexiae quaevis sub titulo Chlorosis, vel sub
charactere hic dato, recte poni possit; et nullam
chlorosis speciem veram, praeter illam quae retentio-
nem menstruorum comitatur, agnoscere vellem. Hinc
vocabulum *saepe* in charactere nunc omissum est; sed
simul fateri cogor, chlorosin ideo hic minus recte pro
genere recensitam esse, cum pro symptomate amenor-
rhoeae semper haberi possit.

Chlorosis ab hydrothorace, S. sp. 7.

Chlorosis maculosa, S. sp. 8.

Chlorosis Carthagenica, S. sp. 10.

Chlorosis Bengalensis, S. sp. 11.

Chlorosis rachialgica, S. sp. 12.

VOL. II.

D d

O. III. SPASMI.

Musculorum vel fibrarum muscularium motus abnormes*.

Spasmi, S. Cl. IV. V. Cl. V. *Sag.* Cl. VII.

Motorii, L. Cl. VII.

Morbi spasmodici et convulsivi, *Hoffm.* III. 9.

Spasmi et convulsiones, *Junck.* 45. 54.

Epilepsia, *Boerb.* 1071. 1088.

SECT. I. In functionibus animalibus.

G. XLVIII. TETANUS.

Plurium musculorum rigiditas spastica.

Variat gradu.

1. Tetanus.

Dimidium vel totum corpus spasmis affectum.

Tetanus, S. G. 122. L. 127. V. 180. *Sag.* G. 228.

* Motus abnormes sunt qui ex causa praeternaturali oriuntur, et qui violentia, frequentia, vel diuturnitate

Catochus *, S. G. 123. L. 128. V. 183. *Sag.* G.
229.

Opisthotonos, V. 181.

Episthotonos, V. 182.

Hujus species, ut solet, plures recensuit
SAUVAGESIUS; sed omnes, quae idio-
pathicae dici queunt, ad unam, ni fal-
lor, referri possunt, et cujus forma prae-
cipua apud SAUVAGESIUM appellatur.

Tetanus Indicus, S. sp. 5. de quo plura haberi
possunt apud *Hillary*, Barbadoes, p. 219. *Cal-*
mers, Lond. Med. Obs. Vol. I. Art. 12. *D*
Monro,

tate contractionis praeter modum fiunt; et nullus
subito quin hujusmodi motus, in morbis omnibus
sub hoc ordine a nobis collocatis, revera fiunt; plu-
res licet morbi sint, quam sub eodem ordine ab aliis
nosologis recensiti fuerunt.

* Catochus apud SAUVAGESIUM genus est mi-
nime naturale, cum genus illud conjunxerit species
natura prorsus diversas; ideoque ejusmodi genus o-
mnium, sed species sub eo recensitas, quae a rigiditate
spastica pendeant, ad tetani genus huc retuli.

Monro, Edinb. *Phyf. et Liter. Effays*, Vol. III.
 Art. 30. *A. Monro*, Art. 31. et sub nomine *fpafmi*
 apud *Bontium* de med. Ind. meth. med. cap. 2.

Nec alius morbus est,

Convulſio Indica, S. ſp. 9.

Variat autem Tetanus ratione cauſae re-
 motae, quatenus nimirum vel a cauſa
 interna, vel a frigore, vel a vulnere
 oriatur. A vulnere, varietas frequen-
 tiſſima apud SAUVAGESIUM appellatur

Tetanus traumaticus, S. ſp. 11.

Variat etiam quavis cauſa ortus Tetanus
 ratione partis corporis affectae; hinc

Tetanus tonicus, S. ſp. 1.

Tetanus holotonicus, S. ſp. 4.

Catochus holotonicus, S. ſp. 1. *M. Febr.* in E-
 phem. German. D. II. A. I. Obf. 1.

Catochus cervinus, S. ſp. 2. *Stork.* Ann. Med.
 1758. *M. Julio.*

Tetanus opisthotonicus, S. sp. 3.

Tetanus emprosthotonicus, S. sp. 2.

Tetani species symptomaticae sunt,

Tetanus febricosus, S. sp. 10. *Stork. Ann. Med.*

759. p. 166.

Tetanus hemiplegicus, S. sp. 9.

Tetanus lateralis *, S. sp. 6. *Morgagn. de caus. et sed. X. 2. et 3.*

Pleurosthotonos Strack.

Tetanus syphiliticus, S. sp. 7.

Tetanus verminosus, S. sp. 8.

Tetanus hystericus, S. sp. 12.

Tetanus mirandus, S. sp. 13.

Catochus diurnus, S. sp. 6.

* In exemplo Tetani lateralis quod profert SAUVAGESIUS, adfuit in eodem aegro alterius lateris paralyfis; ideoque hic mox post Tetanum hemiplegicum posui; sed si Tetani lateralis exemplum a MORGAGNIO allatum, sine alterius lateris paralyfi fuit, de quo tamen mihi non constat, idem inter varietates idiopathicas recenseretur potuisset. Interim, donec haec res certius determinaretur, post Tetanum lateralem posui Pleurosthoton Strackii.

2. Trismus. Praecipue maxillae inferioris
Spastica rigiditas.

Trismus, S. G. 117. L. 124. Sag. G. 223.
Capistrum, V. 208.

I. Species verae sunt,

1. Trismus (*nascentium*) infantes intra
duas primas a nativitate septimanas
corripiens.

Trismus nascentium, S. sp. 1. Gallis Americanis
mal de machoire. *Heister*, Comp. med. pract.
cap. XV. § 10. *Cleghorn's* Minorca, Introd. p.
33. *Hofer*. in Act. Helvet. tom. I. p. 65. *Macqb.*
P. 459.

2. Trismus (*traumaticus*) omnium aetatum,
a vulnere vel frigore.

Trismus traumaticus, S. sp. 2. *Lond. Med. Obs.*
Vol. I. Art. 1 7. Vol. II. 8. 34. Vol. III. 31.
Vol. IV. 7. VI. 13. *Med. Transf.* II. 4.

Angina spasmodica, S. sp. 18. *Zwingeri* act. Helvet.
tom. III. p. 319.

Convulsio a nervi punctura, S. sp. 2.

Trismus catarrhalis, S. sp. 15. *Hillary's* Barbadoes,
221. Lond. Med. Obs. Vol. IV. 7.

II. Sequentes apud SAUVAGESIUM Trismi
species, spurias, vel falsas dicimus; vel
quod non a spasmo, sed ab alio mus-
culorum vitio pendeant, vel quod con-
vulsivae potius quam spasmodicae sint,
vel, denique, quod faciei potius quam
maxillae inferioris, musculorum affec-
tiones sint.

Trismus inflammatorius, S. sp. 3.

Trismus scorbuticus, S. sp. 4.

Trismus capistratus, S. sp. 11.

Trismus arthriticus, S. sp. 9.

Trismus verminosus, S. sp. 5.

Trismus hypochondriacus, S. sp. 8.

Trismus febrilis, S. sp. 10.

Trismus crepitans, S. sp. 7.

Trismus occipitalis, S. sp. 12.

Trismus maxillaris, S. sp. 13.

Trismus dolorificus, S. sp. 14.

216 GENERA MORBORUM

- Trismus cynicus, S. sp. 16.
- Trismus cynogelos, S. sp. 17.
- Trismus fardonicus, S. sp. 18.
- Trifinus diastrophe, S. sp. 19.

G. L. CONVULSIO.

Musculorum contractio clonica, abnormis,
citra soporem.

Convulsio, S. G. 128. L. 142. V. 191. *Sag. G.* 235.

I. Idiopathicae.

- Convulsio universalis, S. sp. 11.
- Hieranosos, L. 144. V. 190.
- Convulsio habitualis, S. sp. 12.
- Convulsio intermittens, S. sp. 16.
- Convulsio hemitotonos, S. sp. 15.
- Convulsio abdominis, S. sp. 10.
- Convulsio ab inanitione, S. sp. 1.
- Convulsio ab onanismo, S. sp. 13.
- Scelotyrbe festinans, S. sp. 2.

II. Symptomaticae.

- Convulsio a capitis ictu, S. sp. 4.
- Convulsio nephralgica, S. sp. 6.
- Convulsio gravidarum, S. sp. 14.
- Scelotyrbe verminosa, S. sp. 5.
- Convulsio febrilis, S. sp. 3.

G. LI. CHOREA*.

Impuberes utriusque sexus, ut plurimum intra decimum et decimum quartum aetatis annum adorientes, motus convulsivi ex parte voluntarii, plerumque alterius lateris, in brachiorum et manuum motu, histrionum gestulationes referentes; in gressu, pedem alterum saepius trahentes quam attollentes.

Scelotyrbe, S. G. 136. *Sag. G.* 243.

Chorea, L. 139.

Speciem unam tantum videre mihi contigit, quae apud SAUVAGESIUM audit

Scelotyrbe chorea Viti, S. sp. 1.

Chorea St Viti *Sydenham. Sched. monitoria.*

* In priore hujus libri editione, Choream pro convulsionis specie habui; cum autem ratione tum aetatis quam adoritur, tum motuum quos exhibet, a quavis alia convulsionis specie plurimum differat, hic pro genere diverso posui.

Nec alia est,

Scelotyrbe instabilis, S. sp. 3. et fortassis,

Scelotyrbe intermittens, S. sp. 4.

Hicaronosis *Macb.* 558.

G. LII. RAPHANIA.

Articulorum contractio spastica, cum agitatione convulsiva, dolore violentissimo, periodico.

Raphania, L. 145. V. 193. *Lin.* *Amoen. acad.*
Vol. VI.

Convulsivo raphania, S. sp. 7.

Germanis DER KRIEBEL KRANKHEIT.

Eclampsia typhodes, S. sp. 1. *Sennert.* de febr.
L. IV. cap. 16. *Gregor. Horst.* oper. tom. II.
L. VIII. Obs. 22. *Willis* de morb. convuls.
Muller apud *Haller*, disp. tom. I. *Waltzschmied*
apud *Haller*, disp. tom. VII. *Wedel*, ibid. *Hoffm.*
tom. I. 231. *Kannigieffer*, A. N. C. tom. VII.
Brunner in *Ephem. Germ. D. III. A. II.* obs.
224. *Willisch.* ibid. Cent. VII. obs. 13. *Wepfer*
de affect. cap. obs. 120. *Breslawer* Sammlung
1717. Julio, Septembri, et Decembr. Ibid.
1723. Januar. A. N. C. Vol. VII. Obs. 41.
Bruckmann. *Comm. Norimb.* 1743, pag. 50.

Soc. Royale, I. Mem. p. 303. II. Mem. p. 587.

Convulsio ab ustilagine, S. sp. 8.

An *Convulsio Soloniensis* vel *Necrosis ustilaginea* sit idem morbus?

Vide *Salerne* in *Memoires présentés a l'acad. des sciences*, tom. II.

G. LIII. EPILEPSIA.

Musculorum convulsio cum sopore.

Epilepsia, S. G. 134. L. 143. V. 188. *Sag. G.* 24. *Boerb.* 1771. *Hoffm.* III. 9. *Junck.* 54. Lond. Med. Obs. VI. 9.

Eclampsia *, S. G. 133. V. 189. *Sag. G.* 240.

* Eclampsiam quasi morbum acutum, ab epilepsia, quam pro chronico habent, distinguere, et pro diverso genere ponere, voluerunt SAUVAGESIUS et VOGELIUS; sed, cum inter morbos acutos et chronicos limites accuratos ponere ubique difficile sit, et cum eclampsia SAUVAGESII, tum causis tum phaenomenis plerumque cum epilepsia exacte congruat, illam genere ab epilepsia diversam esse nequaquam habere possum.

Species idiopathicae sunt,

1. Epilepsia (*cerebralis*) sine causa manifesta subito adoriens; praegressa nulla sensatione molesta, nisi fortassis vertiginis vel Scotomiae alicujus.

Epilepsia plethorica, S. sp. 1.

Eclampsia plethorica, S. sp. 7.

Epilepsia cachectica *, S. sp. 2 ?

Epilepsia a terrore, *Macb.* p. 556.

2. Epilepsia (*Sympathica*) sine causa ma-

possum. Ejusmodi genus prorsus omisit LINNÆUS, et quae plura ad eclampsiam ab epilepsia distinguendam protulit SAGARUS, speciem tantum non genus distinguere possunt.

* Epilepsia, apud SAUVAGESIUM *cachectica* dicta, revera duarum specierum esse videtur. Primo enim hanc *cachecticam* cum *serosa* HOFFMANNI et PISONIS eandem esse auctor statuit; deinceps, utpote acri repulso orta, eadem esse cum specie sua undecima, nimirum *exanthematica*, statui potest. Hinc est quod hanc epilepsiam cachecticam utroque loco posui, sed dubius; et aliis dijudicandum relinquens.

nifesta ; sed praegressa sensatione aurae cujusdam a parte corporis quadam versus caput affurgentis.

Epilepsia sympathica, S. fp. 8.

Epilepsia pedisymptomata, S. fp. 6.

3. Epilepsia (*occasionalis*) ab irritatione manifesta oriens, et ablata irritatione cessans.

Variat pro diversitate irritamenti, et hinc

Ab injuria capiti illata.

Epilepsia traumatica, S. fp. 13.

Eclampsia traumatica, S. fp. 9.

A dolore.

Epilepsia a dolore, S. fp. 10. Ed. Eff. V. 61.

Epilepsia rachialgica, S. fp. 14.

Eclampsia a doloribus, S. fp. 4.

a. Rachialgica.

b. Ab otalgia.

c. A dentitione.

Eclampsia parturientium, S. fp. 3.

A vermibus.

Eclampsia verminosa, S. sp. 2.

A veneno.

Eclampsia ab atropa, S. sp. 11.

Eclampsia ab oenante, S. sp. 12.

Eclampsia a cicuta, S. sp. 13.

Eclampsia a coriaria, S. sp. 14.

A scabie, vel alia acris humoris effusione,
retropulsa.

Epilepsia exanthematica, S. sp. 11.

Epilepsia cachectica, S. sp. 2.

A cruditate ventriculi.

Epilepsia stomachica, S. sp. 3.

Eclampsia a saburra, S. sp. 5.

A pathemate mentis.

Epilepsia a pathemate, S. sp. 7.

Ab haemorrhagia nimia.

Eclampsia ab inanitione, S. sp. 8.

A debilitate.

Eclampsia neophytorum, S. sp. 15.

Epilepsiae symptomaticae sunt,

Epilepsia febricosa, S. sp. 9.

Eclampsia febricosa, S. sp. 17.

Eclampsia exanthematica, S. sp. 10.

Epilepsia uterina, S. sp. 4.

Epilepsia syphilitica, S. sp. 12.

Eclampsia ab hydrocephalo, S. sp. 16.

Eclampsia ab ischuria, S. sp. 6.

SECT. II. In functionibus vitalibus,

A. In actione cordis.

G. LIV. PALPITATIO.

Motus cordis vehemens, abnormis.

Palpitatio, S. G. 130. L. 132. V. 213. *Sag.*
257. *Hoffm.* III. 83. *Junck.* 33. *Macb.* 569.

Si palpitationis causae variae externis signis dignosci possent, plures ejus species cum SAUVAGESIO pro diversitate cau-

fae ftatuere potuiffemus; fed, cum caufae diverfae nullo modo, quantum novimus, diftingui queant, non nifi fpeciem unicam idiopathicam ftatuere poffum, et quam caractere fequenti infigniri vellem.

Palpitatio (*cardiaca*) fere conftans, faltem faepe rediens, fine alio morbo evidente.

Pro fynonymis fequentes SAUVAGESII fpecies recenfere placet.

Palpitatio ab aneurysmate cordis, S. fp. 1. *Senac*,
Mal. de coeur. p. 284. *Lancisi* de aneurysin.

Palpitatio tremula, S. fp. 4. *Senac* de coeur, p.
504.

Palpitatio apoftematofa, S. fp. 7. *Lancisi* de a-
neurysmate, lib. 1. prop. 5. *Senac* de coeur,
485.

Palpitatio a corde officato, S. fp. 2. *Senac* de
coeur, pag. 484. *Morgagn.* de Sed. Ep. XXIV.
17.

Palpitatio calculofa, S. fp. 3.

Palpitatio a polypo, S. sp. 5. *Senac* de coeur;
lib. IV. cap. 16. p. 484.

Palpitatio polypofa, S. sp. 6.

Palpitatio ex aortae aneurysmate, S. sp. 8.

Palpitatio ex aortae angustia, S. sp. 9. *Lancisi* de
aneurysf. prop. 53. *Senac*, 484.

Palpitationis species symptomaticae sunt,

Palpitatio a pancreate, S. sp. 10. *Storck*, *Annis-*
med. I. p. 245.

Palpitatio arthritica, S. sp. 11.

Palpitatio chlorotica, S. sp. 12.

Palpitatio hysterica, S. sp. 13.

Palpitatio melancholica, S. sp. 14. *Lancisi* de a-
neurysf. prop. 44.

Palpitatio febricosa, S. sp. 15. *Storck*, *Ann. med.*
I. p. 75.

B. In actione pulmonum.

G. LV. A S T H M A.

Spirandi difficultas per intervalla subiens ;
cum angustiae in pectore sensu, et re-
spiratione cum sibilo strepente ; tussis

sub initio paroxysmi difficilis, vel nulla,
versus finem libera, cum sputo mucii
saepe copioso.

Asthma, S. G. 145. L. 161. V. 268. *Sag.* G.
252.

Asthma convulsivum et spasmodico-flatulentum,
Hoffm. III. 94.

Asthma spasticum, *Junck.* tab. 51.

Species idiopathicae sunt,

1. Asthma (*spontaneum*) sine causa mani-
festa, vel alio morbo comitante.

Asthma humidum, S. sp. 1. flatulentum, *Floyer*
on the asthma, chap. 1.

Asthma convulsivum, S. sp. 2. *Willis*, Pharm.
rat. p. 2. Sect. 1. cap. 12. Med. Tr. I. 7.

Asthma hysterium, S. sp. 3. *Floyer* on the asth-
ma, chap. 1.

Asthma stomachicum, S. sp. 8. *Floyer*, Scheme of
the species of asthma. Periodic asthma, 6.

Orthopnoea spasmodica, S. sp. 3.

Orthopnoea hysterica, S. sp. 4.

2. Asthma (*exanthematicum*) a scabie vel alia acris effusione retropulsa.

Asthma exanthematicum, S. sp. 11.

Asthma cachecticum, S. sp. 13.

3. Asthma (*plethoricum*) a suppressa evacuatione sanguinis antea solita, vel a plethora spontanea.

Asthma plethoricum, S. sp. 15.

Species asthmatis symptomaticee sunt,

Asthma hypochondriacum, S. sp. 4.

Asthma arthriticum, S. sp. 5.

Asthma venereum, S. sp. 14. *Junck.* tab. 32.

G. LVI. D Y S P N Œ A.

Spirandi difficultas perpetua, sine angustiae, et potius cum repletionis et infarctus in pectore, sensu. Tussis per totum morbi decursum frequens.

Dyspnoea, S. G. 144. L. 160. V. 267. *Sag.* 251.
Junck. 32.

Orthopnoea, S. G. 146. L. 162. V. 269. *Sag.* G.
253. M. 574.

Species idiopathicae sunt,

1. Dyspnoea (*catarrhalis*) cum tussi frequente, mucum viscidum copiosum eji-
ciente.

Asthma catarrhale, S. sp. 16.

Asthma pneumonicum, *Willis*, Pharm. rat. P.
II. sect. I. cap. 12.

Asthma pituitosum, *Hoffm.* III. sect. II. cap. II.
§ 3.

Asthma pneumodes, S. sp. 17. Ed. Eff. III. 25.

2. Dyspnoea (*sicca*) cum tussi plerumque
sicca.

Hujus causae variae haud facile dignoscen-
dae sunt; sequentes autem SAUVAGE-
SII species huc referri possunt.

Dyspnoea a tuberculis, S. sp. 2.

Dyspnoea a steatomatis, S. sp. 5.

Orthopnoea a lipomate, S. sp. 18.

Dyspnoea a hydatidibus, S. sp. 4.

Dyspnoea polyposa, S. sp. 20.

3. Dyspnoea (*aërea*) a minima quavis tem-
pestatum mutatione aucta.

Dyspnoea a pneumtaia, S. sp. 12.

4. Dyſpnoea (*terrea*) cum tuſſi materiem terream vel calculoſam ejiciente.

Dyſpnoea calculoſa, M. 574.

5. Dyſpnoea (*aquofa*) cum urina parca et oedemate pedum, ſine fluctuatione in pectore, vel aliis characteriſticis hydrothoracis ſignis.

Dyſpnoea pituitoſa, S. ſp. 1.

Orthopnoea ab hydropneumonia, S. ſp. 12.

6. Dyſpnoea (*pinguedinoſa*) in hominibus valde obefis.

Orthopnoea a pinguedine, S. ſp. 6.

7. Dyſpnoea (*thoracica*) a partibus thoracem cingentibus laeſis, vel male conformatis.

Dyſpnoea traumatica, S. ſp. 15.

Orthopnoea traumatica, S. ſp. 14.

Dyſpnoea Galenica, S. ſp. 16.

Dyſpnoea rachitica, S. ſp. 10.

Aſthma a gibbo, S. ſp. 9.

8. Dyspnoea (*extrinseca*) a causis externis manifestis.

Asthma pulverulentorum, S. sp. 7.

Asthma metallicum, S. sp. 12.

Orthopnoea a vaporibus, S. sp. 16.

Orthopnoea a deglutitis, S. sp. 9.

Orthopnoea a fungis, S. sp. 25.

Orthopnoea ab antipathia, S. sp. 15.

Orthopnoea a bronchocele, S. sp. 10.

Dyspnoeae species symptomaticae sunt symptomata,

1. Morborum cordis, vel vasorum majorum,

Dyspnoea a corde, S. sp. 11.

Asthma a polypo cordis, S. sp. 6.

Orthopnoea polyposa, S. sp. 26.

Orthopnoea cardiaca, S. sp. 2.

Dyspnoea aneurysmatica, S. sp. 19.

Orthopnoea ab aneurysmate, S. sp. 8.

Dyspnoea ab aortae angustia, S. sp. 22.

2. Tumoris abdominalis,

Dyspnoea a physconia, S. sp. 7.

- Dyspnoea a graviditate, S. fp. 8.
 Dyspnoea tympanitica, S. fp. 9.
 Dyspnoea a liene, S. fp. 14.
 Dyspnoea a stomacho, S. fp. 13.
 Dyspnoea a gastrocele, S. fp. 17.
 Orthopnoea a gastrocele, S. fp. 11.

3. Variorum morborum.

- Asthma febricofum, S. fp. 18.
 Orthopnoea febricofa, S. fp. 20.
 Orthopnoea peripneumonica, S. fp. 1.
 Orthopnoea pseudo-peripneumonica, S. fp. 21.
 Orthopnoea variolofa, S. fp. 24.

- Dyspnoea fcorbutica, S. fp. 18.
 Orthopnoea fcorbutica, S. fp. 22.

- Orthopnoea a hydrothorace, S. fp. 5.
 Orthopnoea ab empyemate, S. fp. 13.
 Orthopnoea a vomica, S. fp. 7.
 Dyspnoea a vomica, S. fp. 6.

- Orthopnoea a hydrocephalo, S. fp. 23.
 Orthopnoea a vermibus, S. fp. 17.

G. LVII. PERTUSSIS.

Morbus contagiosus; tussis convulsiva, strangulans, cum inspiratione sonora, iterata; saepe vomitus.

Pertussis Sydenham. Ed. Leid. p. 200. 311. 312.

Huxham de aëre, ad ann 1732. Lond. Med.

Obs. III. 27. 30. Soc. Royale III. Hist. p. 268.

Tussis convulsiva, sive ferina, *Hoffm.* III. 111.

Tussis ferina, S. sp. 10. *Sag.* sp. 10.

Tussis convulsiva, S. sp. 11. *Sag.* sp. 11.

Amphimerina tussiculosa, S. sp. 13.

III. In functionibus naturalibus.

G. LVIII. PYROSIS.

Epigastrii dolor urens, cum copia humoris aquei, plerumque insipidi, aliquando acris eructata.

Pyrosis, S. G. 200. *Sag.* G. 158.

Soda, L. 47. V. 154.

SCOTIS, the WATER-BRASH.

Species unica vera,

Pyrosis Suecica, S. sp. 4.

Cardialgia sputatoria, S. sp. 5. *Macb.* p. 515.

Caeterae SAUVAGESII species symptomaticae sunt,

Pyrosis vulgaris S. sp. 1.

Pyrosis a conceptione, S. sp. 6.

Pyrosis biliosa, S. sp. 2.

Pyrosis a phlogosi, S. sp. 3.

Pyrosis ulcerosa, S. sp. 5.

G. LIX. C O L I C A.

Dolor abdominis, praecipue circa umbilicum torquens; vomitus; alvus adstricta.

Colica, S. G. 204. L. 50. V. 160. *Sag.* G. 162.

Junck. 106.

Colica spasmodica et flatulenta, *Hoffm.* II. 284.

Macb. p. 519.

Rachialgia, S. G. 211. *Sag.* G. 168.

Ileus, S. G. 252. V. 162. *Sag.* G. 187.

Iliaca, L. 185.

Dolor et spasmus iliacus, *Hoffm.* II. 263.

Passio iliaca, *Junck.* 107.

VOL. II.

G g

Species idiopathicae sunt,

1. Colica (*spasmodica*) cum retractione umbilici et spasms musculorum abdominalium.

Colica spasmodica, S. sp. 7.

Colica flatulenta, S. sp. 1.

Ileus phytodes S. sp. 9.

Colica biliola, S. sp. 5*. Ed'n. Med. Eff. III. 27.

Colica pituitosa, S. sp. 2†.

Ileus a colo pituita infarcto, S. sp. 5.

Ileus Indicus, S. sp. 8.

Variat symptomatis superadditis; hinc,

* Cum vomitus quivis vehemens et saepe repetitus bilem plerumque eliciat, *colicam* quam, ex vomitu bilis solo, *biliosam* appellarunt medici, omnino *spasmodicam* esse censeo.

† Pituita in parte quadam intestinorum congesta non nisi a spasmu obstruente fieri videtur; ideoque tum *colicam pituitosam*, tum *ileum, a colo pituita infarcto*, hic apposui.

a. Colica cum vomitu stercoris, vel rerum per anum injectarum.

Ileus spasmodicus, S. sp. 3 *. Lond. Med. Obs. IV: 17. Edinb. Phys. Ess. II. 27. 28.

Ileus volvulus, S: sp. 7.

b. Colica cum inflammatione superveniente:

Ileus inflammatorius, S. sp. 1.

Colica phlogistica, S. sp. 6.

2. Colica (*pictonum*) praecunte ponderis vel molestiae in abdomine, praecipue

* *Ileus* gradu tantum, nequaquam natura, a *colica* differre mihi videtur; ideoque *ileum* pro varietate *colicae* tantum hic recensui. Multi quidem medici *ileum* omnem inflammatorium esse putarunt. Dolorem autem abdominis, sive colicam, cum vomitu stercoris sine inflammatione adesse, ipse aliquoties vidi. Sin autem inflammatio aliquando adsit, si eadem *colicae* supervenerit, *colicam phlogisticam* dari recte monuit SAUVAGESIUS; nec ideo epigenomeno genus mutari; et si quidem cum dolore abdominis et vomitu ab initio adfuerit inflammatio, morbum pro *enteritide* habere vellem. Denique, quovis modo dari *ileum* genus a *colica* diversum concedere non possum:

circa umbilicum, sensu ; accedente dolore colico, primum levi, non continuo, et praecipue post pastum aucto ; tandem graviore et fere perpetuo ; cum dolore brachiorum, et dorsi, in paralyfin demum abeunte.

Rachialgia pictonum, S. sp. 1*.

Colica pictonum, *Citessii* et succedentium *Auctorum*.

Med. Transf. I. 12. 13. 14. 15. 20. Edinb.

Phys. Ess. I. 22. *Chalmers's* Carolina, p. 187.

Colica nervosa, *Macb.* p. 524.

Variat ratione causae remotae ; et hinc

a. A veneno metallico,

Rachialgia metallica, S. sp. 3.

* *Rachialgiam a colica genere diversam esse nequam video. Symptomata enim colicae essentialia in utroque morbo semper adsunt ; et si forte alteri quaedam superaddita sint, haec speciem non genus diversum constituere possunt. Ut medici igitur nuperi fere omnes, ita ego quam rachialgiam appellarunt ASTRUCIUS et SAUVAGESIUS, pro specie colicae habui ac recensui.*

Colica pictonum *Tronchin*. Sp. five a causa remota 2da.

b. Ab acidis ingestis.

Rachialgia pictonum, S. sp. 1. *Tronchin*. sp. 3.

c. A frigore.

Rachialgia ab adiapneustia, *Tronchin*. sp. 5.

d. A contusione dorfi.

Rachialgia traumatica, S. sp. 7.

3. Colica (*stercorea*) in hominibus alvi tardae, post diuturnam alvi obstipationem.

Colica stercorea, S. sp. 3.

Ileus a faecibus induratis, S. sp. 2.

4. Colica (*accidentalis*) a materie acri ingesta.

Colica accidentalis, S. sp. 18.

238 GENERA MORBORUM

Colica Japonica, S. sp. 10.

Colica lactentium, S. sp. 20.

Ileus a veneno, S. sp. 14.

Cholera sicca auriginosa a fungis venenatis, S. sp. 23.

5. Colica (*meconialis*) neophytorum a meconio retento.

Colica meconialis, S. sp. 19.

6. Colica (*callosa*) cum sensu in quadam intestinorum parte strictione, et saepe ante eam collecti flatus cum aliquo dolore, qui flatus etiam per eandem paulatim transiens evanescit; alvo tarda, et tandem non nisi faeces paucas liquidas egerente.

Ileus a callosa coli strictione, S. sp. 11. Edin. Med.

Eff. IV. 31.

7. Colica (*calculosa*) cum duritie in quadam parte abdominis fixa; calculis quondam per anum dejectis.

Colica calculosa, S. sp. 15. Edinb. Med. Eff. I. 32.

Edinb. Phys. Eff. II. 26.

Ileus calculosus, S. sp. 10.

Colicae symptomaticae sunt,

Colica febricosa, S. sp. 21.

Rachialgia febricosa, S. sp. 2. *Tronchin.* sp. 1.

Colica hysterica, S. sp. 17.

Colica gravidarum, S. sp. 16.

Colica verminosa, S. sp. 4.

Ileus verminosus, S. sp. 13.

Colica Lapponica, S. sp. 9.

Rachialgia arthritica, S. sp. 4. *Tronchin.* sp.

Rachialgia scorbutica, S. sp. 6.

Ileus herniosus, S. sp. 6.

Colica enterocelica, S. sp. 22.

Ileus ab intestino compresso, S. sp. 4.

Colica schirrofa, S. sp. 12.

Colica pancreatica, S. sp. 13.

Colica mesenterica, S. sp. 11.

Rachialgia ab osteosarcosi, S. sp. 3.

Colica plethorica, S. sp. 8.

a. Haemorrhoidalis,

b. Catamenialis.

Colica pulsatilis, S. sp. 14.

Ileus imperforatorum, S. sp. 12.

G. LX. CHOLERA.

Humoris biliosi vomitus, ejusdem simul
dejectio frequens; anxietas; tormina;
surarum spasinata.

Cholera, S. 253. L. 186. V. 110. Sag. G. 188.

Hoffm. II. 165.

Diarrhoea cholericæ, *Junck.* 112.

Species idiopathicae sunt,

1. Cholera (*spontanea*) tempestate calida,
sine causa manifesta oboriens.

Cholera spontanea, S. sp. 1. *Sydenh.* sect. IV. cap.

2. *Gleghorn's Diseases of Minorca.*

Cholera Indica, S. sp. 7.

2. Cholera (*accidentalis*) a rebus acerbis
ingestis.

Cholera crapulosa, S. sp. 11.

Cholera a venenis fossilibus, S. sp. 4.

Cholera a veneno animali, S. sp. 5.

Cholerae symptomatice sunt,

Cholera intermittens, S. sp. 6.

Cholera inflammatoria, S. sp. 8.

Cholera arthritica, S. sp. 10.

Cholera verminosa, S. sp. 9.

G. LXI. DIARRHŒA.

Dejectio frequens; morbus non contagio-
sus; pyrexia nulla primaria.

Diarrhoea, S. G. 253. L. 187. V. 105. *Sag. G.*
189. *Junck.* 112.

Hepaticorrhoea, S. G. 246.

Cholerica, L. 190.

Coeliaca, S. G. 255. L. 189. V. 109. *Sag. G.*
199.

Lienteria, S. G. 256. L. 188. V. 108. *Sag. G.*
191.

Pituitaria, V. 111.

Leucorrhœis, V. 112.

Lambina ventris fluxus multiplex. *Amst.* 1756.

Species idiopathice sunt;

VOL. II.

H h

1. Diarrhoea (*crapulosa*) qua stercora naturalibus liquidiora et majori copia dejiciuntur.

Diarrhoea stercorosa, S. sp. 1.

Diarrhoea vulgaris, S. sp. 2.

2. Diarrhoea (*biliofa*) qua faeces flavae magna copia dejiciuntur.

Diarrhoea biliofa, S. sp. 8.

3. Diarrhoea (*mucosa*) qua vel ab acribus ingestis, vel a frigore, praecipue pedibus applicato, mucus copiosus dejicitur.

Diarrhoea lactentium, S. sp. 19.

Dysenteria Parisiaca, S. sp. 3.

Diarrhoea ab hypercatharsi, S. sp. 16.

Dysenteria cathartica, S. sp. 12.

Pituitaria, V. 111.

Leucorrhoeis, V. 112.

Diarrhoea pituitosa, S. sp. 4.

Coeliaca mucoſa, S. ſp. 3.

Diarrhoea ſeroſa, S. ſp. 10.

2. Diarrhoea urinoſa.

4. Diarrhoea (*coeliaca*) qua humor lacteus ſpecie chyli dejicitur.

Coeliaca chyloſa, S. ſp. 1.

Coeliaca lactea, S. ſp. 4.

5. Diarrhoea (*lienteria*) qua ingeſta parum mutata celeriter dejiciuntur.

Lienteria ſpontanea, S. ſp. 2.

6. Diarrhoea (*hepatirrhoea*) qua materies ſeroſo-cruenta, ſine dolore dejicitur.

Hepatirrhoea inteſtinalis, S. ſp. 2.

II. Symptomaticae.

Diarrhoea febrilis, S. ſp. 3.

Diarrhoea febricoſa, S. ſp. 20.

Hepatirrhoea intermittens, S. ſp. 7.

Diarrhoea varioloſa, S. ſp. 6.

Diarrhoea pleuriticorum, S. ſp. 21.

- Diarrhoea arthritica, S. sp. 9.
 Diarrhoea colliquativa, S. sp. 13.
 Diarrhoea choleriodes, S. sp. 17.
 Hepatirrhoea vera, S. sp. 1.
 Hepatirrhoea a vulnere, S. sp. 3.
 Hepatirrhoea mesenterica, S. sp. 4.
 Dysenteria a mesenterii vomica, S. sp. 11.
 Diarrhoea purulenta, S. sp. 11.
 Coeliaca purulenta, S. sp. 2.
 Hepatirrhoea scorbutica, S. sp. 5.
 Dysenteria scorbutica, S. sp. 18.
 Lienteria scorbutica, S. sp. 3.
 Lienteria ex ulcere ventriculi, S. sp. 1.
 Lienteria aphthosa, S. sp. 4.
 Lienteria secundaria, S. sp. 5.
 Diarrhoea verminosa, S. sp. 14.
 Diarrhoea a dentitione, S. sp. 15.
 Diarrhoea chiliensis, S. sp. 12.
 Diarrhoea acrafia, S. sp. 7.

G. LXII. DIABETES.

Urinae plerumque praeternaturalis, copia immodica, profusio chronica.

- Diabetes, S. G. 263. L. 197. V. 115. *Sag. G.*
 199. *Junck.* 99. *Dobson*, Lond. Med. Observa-
 tions, Vol. V. Art. 27. *Home's Clinical Experi-*
 ments, sect. xvi.
 Diurefis, V. 114.

Species idiopathicae sunt,

I. Diabetes (*mellitus*) cum urina odoris, coloris, et saporis mellei.

Diabetes Anglicus, S. sp. 2. *Mead* on poisons. Essay 1. *Ejusdem* Monita Med. Cap. IX. sect. 2. Lond. Med. Obs. III. 26. *Dobson*, in Lond. Med. Obs. Vol. V. Art. 27. *Myers*, Diff. inaug. de Diabete, Edinb. 1779.

Diabetes febricosus, S. sp. 7. *Sydenh.* Epist. resp. ad *R. Brady* *.

* Quæri potest, an diabetes febricosus SYDENHAMI ad diabetem mellitum, an ad inspidum referri debeat? Et simul quæri potest, an urina in diabete hysterico vel arthritico sit mellita, an insipida, cum SYDENHAMUS ipse nullibi de sapore urinae, in diabete quovis, quicquid dixerit? Ad posterius respondere possum, quod, ex propria observatione, novi, urinam in diabete hysterico et arthritico nequaquam dulcem, et fere prorsus inspidam, esse, et diabetem febricosum SYDENHAMI ad diabetem mellitum ideo retuli; quod in simili senis, post diuturnam febrem, diabete, urinam omnino dulcem inveni.

II. Diabetes (*insipidus*) cum urina limpida non dulci *.

M. Lister Exerc. medicin. II. de Diabete.

* An hujusmodi diabetis species sit frequens, incertum est. In omnibus exemplis, illius non paucis, quae viderat WILLISIUS, urinam mellitam semper invenit; et observationes nuperae frequentes fere omnes ejusmodi urinam exhibuerunt; ita ut dubium sit, an alia diabetis idiopathicae et permanentis species revera detur. Affirmat autem LISTERUS; et ego ipse inter plures mellitas unicum inspidam observavi. Ejusmodi itaque speciem dari concedo, ideoque recensui; sed, an recte legitima dici queat, vel an diabetes ARETÆI et plurium auctorum ejusmodi fuissent, multum dubito. Ante WILLISIUM quidem, vel prioris aevi, vel extra Angliam, medicorum nemo urinam dulcem annotaverat; sed ejusmodi urinam temporibus WILLISII primo et in Anglia tantum comparuisse, minus verisimile est; omnesque ante WILLISIUM de urina in diabete dulci prorsus siluisse, potius observationi perfunctoriae, vel omnino neglectae, imputarem. Quod observatores, quibus diabetis exempla antea occurrebant, vel negligentes vel malae fidei

Diabetes legitimus, S. sp. 1. *Aretaeus* de Morb.
diuturn. L. II. cap. 2.

Diabetes ex vino, S. sp. 5. *Ephem. Germ. D. I.*
A. II. Obf. 122.

Symptomatae sunt,

Diabetes hystericus, S. sp. 3. *Sydenh. diff. epist.*
ad *G. Cole.*

Diabetes arthriticus, S. sp. 6. *Sydenh. de podagra.*

Diabetes artificialis, S. sp. 4. *Malpigh. de liene.*

G. LXIII. H Y S T E R I A.

Ventris murmura ; sensus globi in abdomine se volventis, ad ventriculum et

fidei fuissent suspicor ; cum plurimi eorum tam incredibilia, de potu in diabeticis per renes transeunte prorsus immutato, narrant. SYDENHAMUM autem ipsum, adeo perspicacem et diligentem, de statu urinae nihil monuisse, mirum videtur ; sed, cum scripta WILLISII, SYDENHAMO satis nota, urinam semper esse dulcem asseruerint, si diversam inuenisset SYDENHAMUS, quin id indicasset, nullus dubito.

fauces ascendentis, ibique strangulantis;
 sopor; convulsiones; urinae limpidae
 copia profusa; animus, nec sponte, va-
 rius et mutabilis*.

Hysteria, S. G. 135. L. 126. V. 219. *Sag. G.*
 242.

Malum hystericum, *Hoffm.* III. 50. *Junck.* 36.

Affectio hysterica, *Willis* de morb. convulsiv. cap.
 5. 10. 11. *Sydenh.* diff. epist. ad *G. Cole.* *Whytt*
 on nervous disorders.

Quatenus specie differat hysteria idiopathi-
 ca, dicere non possum, nec, ut opinor,

* Novit quisque, in Nosologia et in Medicina
 facienda quadantenus exercitatus, quam difficile sit
 inter dyspepsiam, hypochondriam, et hysteriam sem-
 per accurate distinguere. Genera autem vera, et fa-
 tis a se invicem distincta, indicasse mihi videor:
 Recte autem, an fecus, fecerim, aliis dijudicandum
 relinquo. Morbos affines facile inter se misceri
 probe novi; et, in quocunque casu, quisnam eorum
 pro primario sit habendus, per characteres nosologi-
 cos indicare, mihi difficillimum fore agnosco. Poste-
 ri, ut spero, hanc rem luculentius expositam dabunt.

recte dixit SAUVAGESIUS. Species enim ab eo recensitae non, nisi ratione causae remotae, varietates esse mihi videntur. Ita habet,

A. Ab emanatione mensium,

Hysteria chlorotica, S. sp. 2. *Raulin*, cap. 13.

B. A menorrhagia cruenta.

Hysteria a menorrhagia, S. sp. 3. *Raulin*. *Sydenham*,
Diff. epist. ad *G. Cole*.

C. A menorrhagia serosa, five fluore albo.

Hysteria a leucorrhoea, S. sp. 4. *Raulin*, cap. 14.

D. A viscerum obstructione.

Hysteria emphrastica, S. sp. 5. *Raulin*, cap. 5.

E. A vitio stomachi.

Hysteria stomachica, S. sp. 7. *Raulin*, cap. 4.

F. A falacitate nimia.

Hysteria libidinosa, S: sp. 6 *.

Manifesto symptomatice sunt,

Hysteria verminosa, S. sp. 1. *Delii* Amoenit. A-
cadem.

Hysteria febricosa, S. sp. 8. *Wedel.* in Ephem.
German. D. I. A. II. Obf. 193.

G. LXIV. HYDROPHOBIA.

Potionis cujuslibet, utpote convulsionem

* In speciebus hysterie recensendis, egregius SAUVAGESIUS RAULINUM, theorie subtili et fallaci, potius quam observationi, innitentem, secutus fuisse videtur. Nec quidem inter caeteras hysterie species iudicasse videtur SAUVAGESIUS, illam quam maxime exquisitam et frequentissimam, censeo, illam, scilicet, quae foeminas adultas, laute viventes, fanguineas, plethoricas, valentiores, et a morbo alio quovis immunes, saepe ex pathemate mentis solo adoritur.

pharyngis dolentem cientis, fastidium et horror; plerumque e morfu animalis rabidi.

Hydrophobia, S. G. 231. L. 86. V. 30. *Sag. G.* 343. *Boerb.* 1138. *Junck.* 124. *Mead* on poisons. *Default* sur la rage. *Sauvages* diff. sur la rage. *James* on canine madness. *Dalby*, Virtues of cinnaber and musk against the bite of a mad dog. *Nugent* on the hydrophobia. *Choisel*, Nouvelle methode pour le traitement de la rage. *Journal de Medecine*, passim. *Lond. Med. Obs. and Inquir.* Vol. III. Art. 34. Vol. V. Art. 19. 26. and App. *Lond. Med. Transf.* Vol. II. Art. 5. 12. and 15. *Edinb. Med. Eff.* V. Art. 51. *Heysham*, Diff. inaug. de rab. canin. *Edinb.* 1777. *Parry*, Diff. inaug. de rab. contagiosive canin. *Edinb.* 1778. *Soc. Royale I.* Mem. p. 105. 146. *Andry*, Recherches sur la rage, 1780. *Soc. Royale II.* Hist. p. 229. 230. 456. *III.* Hist. p. 167. *Vaughan*, Cases of hydrophobia, second edit. 1778.

Species sunt,

I. Hydrophobia (*rabiosa*) cum morden-

di cupiditate ex morfu animalis rabidi.

Hydrophobia vulgaris, S. sp. 1.

II. Hydrophobia (*simplex*) sine rabie, vel mordendi cupiditate.

Hydrophobia spontanea, S. sp. 2. Edinb. Med. Eff. I. 29.

O. IV. VESANIÆ*.

* *Vesaniarum* ordinem hic instituere velim, quae cum classe VOGELII nona, *Paranoiae* inscripta, eadem omnino sit; sed a classe *Vesaniarum* SAUVAGESII et SAGARI in eo diversa, quod horum auctorum ordines *Hallucinationum* et *Morositatum* prorsus excludat; itidemque a classe *Mentalium* apud LINNÆUM diversa, quod hujus auctoris ordines *Imaginariorum* et *Patheticorum* etiam omittat.

A classe *Vesaniarum* autem tum *Hallucinationes* tum *Morositates* exclusas esse velim; quia neque causis, neque symptomatis cum *Vesaniis* strictè dictis ullo modo congruant. Quis enim Syrigmum vel Bulimiam, vel aliam *Hallucinationem* sive *Morositatem*, quae a mentis judicio non pendeat Vesaniam appellare vellet? Verum quidem est, tum hallucinationes, tum morositates, cum vesaniis aliquando conjunctas esse, sed simul adfunt alia vesaniae indicia, quae ejusmodi hallucinationes et morositates affectionis magis generalis symptomata tantum esse ostendunt. Ob has rationes, hallucinationes SAUVAGESII et imaginarios LINNÆI ad morbos

Mentis * judicantis functiones laesae sine
pyrexia vel comate.

Paranoiae, V. Cl. IX.

Deliria, S. Cl. VIII. O. III. *Sag.* Cl. XI. O. III.

Ideales, L. Cl. V. O. I.

G. LXV. A M E N T I A.

Mentis judicantis imbecillitas, qua homines
rerum relationes, vel non percipiunt,
vel non reminiscuntur.

Amentia, S. G. 233. V. 337. *Sag.* G. 346.

Morosis, L. 106.

morbos locales olim detuli; et nunc morositates SAUVAGENSII et patheticos LINNÆI, antea a nobis omnino omisso, ad locales etiam deferendos esse censui.

* In priore Nosologiae nostrae editione, has functiones simpliciter mentis esse dixi, minus autem recte; nam perceptio falsa sive *hallucinaçio*, et appetitus erroneus sive *morositas*, quodammodo ad mentis functiones pertinent; cum vero utraque ab hac classe exclusas esse velim, oportebat classis characterem nunç mutare, et mentis judicantis functiones dicere.

Stupiditas, morosis, fatuitas, V. 336.

Amnesia *, S. G. 237. Sag. G. 347.

Oblivio, L. 107. V. 338.

Memoriae debilitas, *Junck.* 120.

Species sunt,

I. Amentia (*congenita*) a nativitate constans.

Amentia morosis, S. sp. 8.

Amentia microcephala, S. sp. 6.

II. Amentia *fenilis* ex perceptione et memoria, ingravescente aetate, immunitis.

Amentia fenilis, S. sp. 1.

Amnesia fenilis, S. sp. 2.

III. Amentia *acquisita* a causis externis,

* Amnesiam cum amentia ad unum genus retuli, tum quia plerumque conjungantur, tum quia ab iisdem causis plerumque oriuntur, et amnesia ingravescens ad amentiam semper ducat.

evidentidus in hominibus sanae mentis
superveniens.

Amnesia febrifera, S. sp. 8.

Amentia a quartana, S. sp. 11.

Amnesia cephalalgica, S. sp. 6.

Amnesia plethorica, S. sp. 4.

Amentia rachialgica, S. sp. 10.

Amnesia a venere, S. sp. 1.

Amnesia a pathemate, S. sp. 5.

Amentia a venenis, S. sp. 3.

Amentia a temulentia, S. sp. 7.

Amentia ab ictu, S. sp. 9.

Amnesia traumatica, S. sp. 3.

Sequentes SAUVAGESII species in Nōsologia methodica nequaquam recenferi debent, cum causae internae a quibus characteres desumuntur, per signa externa nequaquam dignosci possint.

Amentia ferofa, S. sp. 2.

Amentia a tumore, S. sp. 4.

Amentia a hydatidibus, S. fp. 5.

Amentia a siccitate, S. fp. 7.

Amentia calculosa, S. fp. 12.

G. LXVI. MELANCHOLIA.

Infania * partialis sine dyspepsia †.

Melancholia, S. G. 234. L. 71. V. 332. *Sag:*

G. 347. *Boerb.* 1089. *Junck.* 121.

Daemonomania, S. G. 236. *Sag.* 348:

Daemonia, L. 69.

Vesania, L. 70.

Panophobia, L. 75.

Athymia, V. 329.

Delirium melancholicum, *Hoffm.* III. 251:

* Infaniam adesse dicimus, quando rerum relationes omnino falsae mente concipiuntur, ita ut hominis vel pathemata vel actiones praeter rationem excitentur.

† Hypochondriasis et melancholia non semper distingui possunt: Si quando autem possint, nullo alio signo quam per dyspepsiam in hypochondriasi semper praesentem, in melancholia saepe absentem rite, quantum video, distinguendi sunt.

258 GENERA MORBORUM

Erotomania, L. 82.

Nostralgia, S. G. 226. L. 83. *Sag. G. 338. Junck.*
125.

Melancholia nervea, Cl. *Lorry de melancholia,*
P. I.

Variat pro varietate rerum de quibus homo delirat. Ita est

1. Cum hallucinatione de statu corporis sui a levibus causis periculoso ; vel de statu rerum suarum tristi metuendo.

Melancholia vulgaris, S. sp. 1.

Melancholia argantis, S. sp. 4.

Panophobia phrontis, S. sp. 3.

2. Cum hallucinatione de statu rerum suarum jucundo.

Melancholia moria, S. sp. 5.

Melancholia enthusiastica, S. sp. 13.

Melancholia saltans, S. sp. 8.

3. Cum amore vehementi sine fatyriasi vel nymphomania.

Melancholia amatoria, S. fp. 2.
 Erotomania, L. 82.

4. Cum ſuperſtitioſo futurorum metu.

Melancholia religioſa, S. fp. 3.

5. Cum averſatione motus et omnium vi-
 tae officiorum.

Melancholia atonita, S. fp. 6.

6. Cum inquietudine et ſtatuſ cujuſvis im-
 patientia.

Melancholia errabunda, S. fp. 7.

7. Cum taedio vitae.

Melancholia Anglica *, S. fp. 11.
 Melancholia phrontis, S. fp. 14.

6. Cum hallucinatione de ſua ſpeciei na-
 tura.

* Apud Anglos fortaffis taedium vitae non ſem-
 per a morbo pendet.

Melancholia zoantropica, S. sp. 12.

Melancholia hippantropica, S. sp. 9.

Melancholia scytharum, S. sp. 10.

DÆMONOMANIAM nullam veram esse cen-
seo *, et nostra sententia species sub hoc
titulo a SAUVAGESIO recensitae sunt,
vel,

I. Species melancholiae sive maniae, uti

Daemonomania fanatica, S. sp. 5.

Daemonomania Indica, S. sp. 7.

Vel, 2do, Morbi ab adstantibus ad daemo-
num potentiam falso relati, uti

Daemonomania a vermibus, S. sp. 4.

Daemonomania Polonica, S. sp. 8.

Daemonomania a cardiogmo, S. sp. 9.

Vel, 3tio, Morbi omnino simulati, uti

Daemonomania fagarum, S. sp. 1.

* Ita cenfeo, quia daemonum in nostra corpora,
vel hisce temporibus in mentes nostras, potentiam
ullam esse pauci jam credunt.

Daemonomania vampirismus, S. sp. 2.

Daemonomania simulata, S. sp. 3.

Vel, 4to, Morbi partim veri, ut No. 2.
partim simulati, ut 3tio, recensiti, uti

Daemonomania hysterica, S. sp. 6.

G. LXVII. M A N I A.

Infania universalis.

Mania, S. G. 235. L. 68. V. 331. *Sag.* G. 349.

Boerb. 1118. *Junck.* 122. *Battie* on madness.

Paraphrosyne, L. 66.

Amentia, L. 67.

Delirium maniacum, *Hoffm.* III. 251.

I. Mania (*mentalis*) omnino a pathemate
mentis.

Mania a pathemate, S. sp. 1. Exempla inveniuntur ex melancholia apud *Preysingerum* de diagnosi morborum capitis; ex terrore, apud *Locherum* de mania; ex amore apud *Ephem.* Nat. Cur. Dec. II. A. X. Obs. 126.; ex ira apud *Hoffman.* III. p. 263.

2. Mania (*corporea*) a vitio corporis evidente.

Variat pro varietate vitii corporis ; hinc

Mania metastatica, S. sp. 4.

ab ulcere ficcato *Amat. Lusitan.* Cent. II. cur. 67.

a resecta plica, *Hoffm.* tom. III. p. 263. *Ephem.*

N. Cur. Cent. I. *Obs.* 35.

a represso herpete, *Locher* de mania.

a menstruis retentis, *Schenck.* *Obs.* p. 142.

a femine retento, *Schenck.* *ibid.*

a repressa scabie, *Lorry* de melancholia, tom. II.

P. II. cap. 3.

a graviditate, *Lorry*, P. I. cap. 7.

a parciore lactis et lochiorum fluxu, *Puzos*, 3.

Mem.

Mania lactea, S. sp. 2.

Mania hysteralgica, S. sp. 8.

Mania ab hemicrania, S. sp. 3.

Mania a venenis, S. sp. 5.

Phrenitis inanitorum, S. sp. 16.

3. Mania (*obscura*) praegresso nullo vel pathemate mentis, vel vitio corporis evidente.

Mania vulgaris, S. sp. 7.

Phrenitis apyreta, S. fp. 10.

Mania periodica, S. fp. 6.

Maniae species fymptomaticae funt,

PARAPHROSYNE, S. G. 232. *Sag.* G. 345.

1. Paraphrofyne a venenis,

Paraphrofyne temulenta, S. fp. 1.

Paraphrofyne a datura, S. fp. 2.

Paraphrofyne ab opio, S. fp. 3.

Paraphrofyne a conio, S. fp. 4.

Paraphrofyne magica, S. fp. 5.

2. Paraphrofyne a pathemate, S. fp. 7.

Paraphrofyne hystERICA, S. fp. 12.

3. Paraphrofyne febrilis.

Delirium, L. 65. V. 330.

Paraphrofyne febricosa, S. fp. 10.

Paraphrofyne critica, S. fp. 11.

Paraphrofyne calentura, S. fp. 9.

Paraphrofyne puerperarum, S. fp. 8.

G. LXVIII. ONEIRODYNIA.

In fomno imaginatio vehementior vel molesta.

Somnium, V. 339.

Somnambulismus, S. G. 221. L. 77. Sag. G. 333.

Hypnobatafis, V. 340.

Noctambulatio, *Junck.* 124.

Ephialtes, S. G. 138. L. 163. Sag. 245.

Incubus, V. 211. *Junck.* 50.

1. Oneirodynia (*activa*) excitans ad ambulationem, et motus varios.

Somnambulismus vulgaris, S. sp. 1.

Somnambulismus catalepticus, S. sp. 2.

2. Oneirodynia (*gravans*) ex sensu ponderis alicujus incumbentis, et pectus praecipue comprimentis.

Ephialtes plethorica, S. sp. 1.

Ephialtes stomachica, S. sp. 2.

Ephialtes hypochondriaca, S. sp. 6.

Ephialtes tertianaria, S. sp. 5.

Ephialtes verminosa, S. sp. 4.

Ephialtes ex hydrocephalo *, S. sp. 3.

* Cum hydrocephalus per signa externa non semper dignosci possit, haec species minus apte recensetur; sed ideo apposui, quod ephialtes in iis qui simul anasarca crurum, et hydrothorace vel ascite laborant, ad hydrocephalum utcunque referri possit.

CL. III. CACHEXIÆ.

Totius vel magnae partis corporis habitus depravatus; sine pyrexia primaria vel neurosi.

Cachexiae, S. Cl. X. V. Cl. VIII. *Sag.* Cl. III.
Deformes, L. Cl. X.

O. I. MARCORES.

Corporis totius macies.

Macies, S. Cl. X. O. I. *Sag.* Cl. III. O. I.
Emaciantes, L. Cl. X. O. I.

G. LXIX. TABES.

Marcor; asthenia; pyrexia hectica.

Tabes, S. G. 275. L. 209. V. 309. *Sag.* G. 100.

Species sunt,

1. Tabes (*purulenta*) ex ulcere externo vel interno, vel ex vomica,

Tabes a vomica, S. sp. 15.

Tabes ulcerosa, S. sp. 12.

Tabes apoftematodes, S. sp. 3.

Variat sede ; hinc

Tabes renalis, S. sp. 2.

Tabes hepatica, S. sp. 8.

Tabes a stomacho, S. sp. 14.

Tabes a pericardio, S. sp. 7.

Tabes catarrhalis *, S. sp. 13.

2. Tabes (*scrophulosa*) in corporibus scrophulosis.

Tabes glandularis, S. sp. 10.

Tabes mesenterica, S. sp. 9.

Scrophula mesenterica, S. sp. 4.

* Si cum catarrho diuturno adfuerit tabes, cum pyrexia hectica, nihil dubitarem ejusmodi tabem catarrhalem ad purulentam referre.

Atrophia infantilis, S. sp. 13.

Atrophia rachitica, S. sp. 8.

Tabes rachialgica, S. sp. 16.

3. Tabes (*venenata*) a veneno ingesto.

Tabes a veneno, S. sp. 17.

Atrophia *febrisequa*, S. sp. 16. ad tabem purulentam, vel ad genus atrophiae pertinet.

G. LXX. A T R O P H I A.

Marcor et asthenia, sine pyrexia * hectica.

Atrophia, S. G. 277. L. 210. V. 308. *Sag.* G. 102. *Junc.* 41.

Marafinus, L. 211.

Species sunt,

* Atrophia fortassis nunquam sine pyrexia, faltem sine pulsu solito frequentiori, adest; sed absentia pyrexiae hecticae, (pag. 80.) fere semper atrophiam a tabe distinguit.

1. Atrophia (*inanitorum*) ex evacuatione nimia.

Atrophia a ptyalismo, S. fp. 7.

Atrophia a vomitu, S. fp. 9.

Atrophia ab alvi fluxu, S. fp. 6.

Tabes nutricum, S. fp. 4.

Atrophia nutricum, S. fp. 5.

Atrophia a leucorrhoea, S. fp. 4.

Tabes dorsalis *, S. fp. 1.

Tabes sudatoria, S. fp. 6.

Tabes a sanguifluxu, S. fp. 2.

Sanguinis inopia Ill. Lieutaud. synopsis. univ.
med. vol. I. pag. 52.

2. Atrophia (*famelicorum*) a nutrimento deficiente.

Atrophia lactentium, S. fp. 3.

* An ad atrophiam inanitorum, an ad atrophiam debiliam, pertinet tabes dorsalis, dubium mihi videtur, et ad posteriorem referre mallet.

3. Atrophia (*cacochymica*) a nutrimento corrupto.

Atrophia scorbutica, 12.

Tabes syphilitica, S. sp. 11.

Tabes a hydrope, S. sp. 5.

4. Atrophia (*debilium*) a nutritionis functione depravata, praegressa nulla vel evacuatione nimia; vel cacochymia.

Atrophia nervea, S. sp. 1.

Atrophia lateralis, S. sp. 15.

Atrophia senilis, S. sp. 11.

O. II. INTUMESCENTIÆ.

Totum vel magna corporis pars extrorsum
tumens.

Intumescentiæ, S. Cl. X. O. II. *Sag.* Cl. III. O. II.
Tumidofî, L. Cl. X. O. II.

Seçt. I. *A D I P O S Æ.*

G. LXXI. POLYSARCIA.

Corporis pinguedinosa intumescencia mo-
lesta.

Polyfarcia, S. G. 279. L. 213. V. 540. *Sag.* G.
106.

Steatites, V. 390.

Species unica,

Polyfarcia adiposa, S. fp. 1. Lond. Med. Obs. III.
9. V. 21. 22. Med. Transf. II. 18.

Sect. II. FLATUOSÆ.

G. LXXII. PNEUMATOSIS.

Corporis intumescencia tenfa, elastica, sub
manu crepitans.

Pneumatosis, S. G. 280. V. 391. Sag. G. 107.

Emphysema, S. G. 13. L. 288. V. 392.

Leucophlegmatia, L. 214.

Combaluser de flatulentis corporis humani affec-
tibus.

Species sunt,

1. Pneumatosis (*spontanea*) sine causa ma-
nifesta.

Emphysema spontaneum, S. sp. 1.

Pneumatosis febrilis, S. species aliquot. Lond. Med.

Obs. VI. 19.

2. Pneumatosis (*traumatica*) a vulnere tho-
racis.

Pneumatosis a vulnere, S. sp. 2. Lond. Med. Obs.

II. 2. III. 4. 35. 36. *Cheston*, chap. 1.

Pneumatosis febrilis, S. species aliquot.

3. Pneumatosis (*venenata*) a veneno injecto vel applicato.

Pneumatosis a veneno, S. sp. i.

4. Pneumatosis (*hysterica*) cum hysteria.

Pneumatosis hysterica, S. sp. 3.

G. LXXIII. TYMPANITES:

Abdominis intumescencia tensa, elastica, sonora; alvus adstricta; caeterarum partium macies.

Tympanites, S. G. 291. L. 219. V. 316. Sag. G. 118. Boerb. 226. Junck. 87.

Affectio tympanitica, Hoffm. III. 339.

Meteorismus, S. G. 292.

Species sunt;

1. Tympanites (*intestinalis*) cum tumore abdominis saepe inaequali, et cum reiectione aëris frequenti, tensionem et dolorem levante.

Tympanites intestinalis, S. sp. 1. Edinb. Med. Ess.
I. 31.

Tympanites enterophyodes, S. sp. 3.

Tympanites verminosus, S. sp. 7.

Tympanites spasmodicus, S. sp. 5.

Meteorismus ventriculi, S. sp. 1.

Meteorismus abdominis, S. sp. 2.

Meteorismus hyffericus, S. sp. 3.

Meteorismus a manzanilla, S. sp. 4.

2. Tympanites *abdominalis* cum resonitu
evidentiore, tumore magis acquabili, et
emissione flatuum rariori et minus le-
vante.

Tympanites abdominalis, S. sp. 2.

Tympanites asciticus, S. sp. 4.

Ascites flatulento-peritoneus, S. sp. 28.

Tympanites Stewartii, S. sp. 6.

G. LXXIV. PHYSOMETRA.

Tumor levis, elasticus, in hypogastrio figu-
ram et sedem uteri referens.

Physometra, S. G. 290. Sag. G. 117.

Hylietrophyse, V. 317.

Species sunt,

Phyſometra ſicca, S. ſp. 1.

Tympanites uteri ſicca, *Aſruc*, ſur les malad.
des femmes, L. II. cap. 9.

Phyſometra humida, S. ſp. 2.

Tympanites uteri humida, *Aſruc*, loc. cit.

Sect. III. *AQUOSÆ SIVE HYDROPEs.*

G. LXXV. ANASARCA.

Corporis totius. vel partis ejus intumescen-
tia mollis, inelaſtica.

Anaſarca, S. G. 281. L. 215. V. 313. *Sag.* G.
108. *Boerb.* 1225. *Hoffm.* III. 322. *Junck.* 87.

Monro on the dropſy, 1765. *Milman*, Animad-
verſiones de hydrope, 1779.

Phlegmatia, S. G. 282.

Angina aquoſa, *Boerb.* 791.

Species ſunt,

1. Anaſarca (*ſeroſa*) a retento ſero ob eva-
cuationes ſolitas ſuppreſſas, vel ab aucto
ſero ob ingeſtam aquam nimiam.

Anaſarca metaſtatica, S. ſp. 1.

a. Anaſarca periodica.

b. Anasarca ab adiapneustia.

Phlegmatia lactea, S. sp. 3.

Phlegmatia a menostasia, S. sp. 5.

Anasarca urinosa, S. sp. 11.

Anasarca hydropotarum, S. sp. 10.

2. Anasarca (*oppilata*) a compressione venarum.

Anasarca gravidarum, S. sp. 5.

Phlegmatia gravidarum, S. sp. 4.

Phlegmatia cruralis, S. sp. 9.

Angina Loweriana, S. sp. 2.

Angina oedematosa, Boerb. 791.

3. Anasarca (*exanthematica*) post exanthemata, et praecipue post erysipelas, suborta.

Anasarca exanthematica, S. sp. 3.

Phlegmatia exanthematica, S. sp. 10.

Phlegmatia ulcerosa, S. sp. 6.

Phlegmatia Malabarica, S. sp. 7.

Phlegmatia elephantina, S. sp. 8.

Anasarca Americana, S. sp. 7.

4. Anafarca (*anaemia*) a tenuitate sanguinis per haemorrhagiam producta.

Anafarca a fluxu, S. sp. 2.

5. Anafarca (*debilium*) in debilibus a morbis longis, vel ab aliis causis.

Phlegmatia vulgaris, S. sp. 1.

Anafarca a febribus, S. sp. 4.

Anafarca hysterica, S. sp. 2.

Phlegmatia hysterica, S. sp. 2.

Anafarca rachialgica, S. sp. 8.

Phlegmatia Deliensis, S. sp. 11.

Anafarca purulenta, S. sp. 9. vix ad anafarcam referri potest.

G. LXXVI. HYDROCEPHALUS.

Capitis intumescencia mollis, inelastica, hiantibus cranii futuris.

Hydrocephalus, S. G. 285. L. 216. *Boerb.* 1217.

Hydrocephalum, V. 384.

278 GENERA MORBORUM

Species unica,

Hydrocephalus exterior, S. sp. 2*. Lond. Med.
Obs. V. 13. Med. Transf. II. 18. Edinb. Med.
Ess. III. 22.

G. LXXVII. HYDRORACHITIS.

Tumor supra vertebrae lumborum, mollis,
exiguus, hiantibus vertebrae.

Hydrorachitis, S. G. 287. *Morgagn.* de sed. XII.
9. et seq.

Spinola, L. 289.

Spina bitida, V. 386.

G. LXXVIII. HYDROTHORAX.

Dyspnoea; faciei pallor; pedum oedemata;
urina parca; decubitus difficilis; subita
et spontanea ex somno cum palpitatione
excitatio; aqua in pectore fluctuans.

Hydrothorax, S. 150. V. 311. *Boerb.* 1212.

Species sunt,

Hydrothorax vulgaris, S. sp. 3.

* Hydrocephalum internum, antea hic recensitum,
ad Apoplexiam, sub nomine Apoplexiae hydrocephali-
cae, jam supra retuli.

Hydrothorax febrifequens, S. sp. 4.

Hydrothorax a scabie, S. sp. 9.

Sequentes minus recte recensentur, cum li-
quidi intrus contenti neque natura, ne-
que fons, neque sedes, per signa exter-
na dignosci queat.

Hydrothorax chylofus, S. sp. 1. *Willis*, Pharm.
rat. P. I. sect. I. Cap. 13.

Hydrothorax hydatidosus, S. sp. 5. *Morg.* de sed.
XVI. 33.

Hydrothorax mediastini, S. sp. 6.

Hydrothorax pleurae, S. sp. 7. *Hoffm.* III. p. 337.
Bergeron, diff. de hydrope pectoris.

Hydrothorax pericardii, S. sp. 8. *Morg.* de sed.
XVI. 34. 36. *Senac* de coeur, tom. II. p. 349.
Edinb. Med. Eff. V. 56. 58. 59.

Minus recte a SAUVAGESIO hic recensetur

Hydrothorax ab omento, S. sp. 2.

G. LXXIX. A S C I T E S.

Abdominis intumescencia tensa, vix elastica,
sed fluctuosa.

280 GENERA MORBORUM

Afcites, S: G. 288. L. 217. V. 314: *Sag. G.* 115:
Boerb. 1226. *Hoffm.* III. p. 322. *Junck.* 87:
D. Monro on the dropsy, 1765. *Med. Transf.*
II. 17: *Milman*, *Animadversiones de hydrope*,
1779.

Species sunt;

- I. Afcites (*abdominalis*) cum tumore totius abdominis aequali, et cum fluctuatione fatis evidente.

Afcites vulgatior, S. sp. 1:

Variat ratione causae.

A. Ab oppilatione viscerum.

Afcites ab oppilatione, S. sp. 2:

Afcites ab hepate, S. sp. 3.

Afcites a liene, S. sp. 4.

Afcites scrophulofus, S. sp. 5.

Afcites artificialis, S. sp. 10.

B. A debilitate.

Afcites ab exanthematis, S. sp. 8:

Afcites arthriticus, S. sp. 9.

Afcites febrilis, S. fp. 12.

Afcites ex quartana, *Werlhof.*

Afcites fcorbuticus, S. fp. 11.

C. A tenuitate fanguinis.

Afcites a fanguifluxibus, S. fp. 7.

Variat etiam ratione liquidi effufi.

Afcites purulentus, S. fp. 21 *.

Afcites urinosus, S. fp. 22.

Afcites chylofus, S. fp. 23.

Afcites oleofus, S. fp. 24.

2. Afcites (*faccatus*) cum tumore abdominis, faltem initio, partiali et cum fluctuatione minus evidente.

Afcites ab ovariis, S. fp. 6.

Afcites ovarii, S. fp. 19.

a. Afcites faccatus.

Hydrometra ovarii, S. fp. 6.

Afcites cruentus, S. fp. 20. Edinb. Med. Eff. V. 63.

* De hisce et pluribus aliis afcitis fpeciebus recentis idem notandum est, ac in pag. 279.

Afcites stomachi, S. fp. 16.

Afcites omentalis, S. fp. 18.

Afcites intercus, S. fp. 14.

Afcites fanguineo-intercus, S. fp. 26.

Afcites fanguineo-peritonaeus, S. fp. 27.

Afcites purulento-peritonaeus, S. fp. 29.

G. LXXX. HYDROMETRA.

Hypogastrii in mulieribus paulatim crescens tumor, uteri figuram referens, pressui cedens fluctuansve; citra ischuriam et graviditatem.

Hydrometra, S. G. 289. *Sag.* G. 116. *Boerb.*
1224.

Species per externa signa distinguendae vix dari possunt; sed sequentes ex SAUVAGESIO recensentur.

Hydrometra ascitica, S. fp. 1.

Hydrometra gravidarum, S. fp. 2.

- Hydrometra hydatica, S. sp. 4.
 Ascites uterinus, S. sp. 15.
 Hydrometra fanguinea, S. sp. 3.
 Ascites fanguineo-uterinus, S. sp. 25.
 Hydrometra puriformis, S. sp. 5.

G. LXXXI. HYDROCELE.

Tumor scroti non dolens, paulatim crescens, mollis, fluctuans, pellucidus.

- Oscheocele, S. G. 41. V. 388.
 Oscheophyma, *Sag.* G. 44.
 Hydrops scroti, V. 389.
 Hydrops testium, *Bserb.* 1227.

Species sunt,

- Oscheocele aquosa, S. sp. 2. *Monro* in *Edinb. Med. Ess.* Vol. V. Art. 21. *Sharp's* Operations and critical inquiry. *Douglas* on the hydrocele. *Pott's* remarks on the hydrocele. *Le Dran*, Operations de Chirurgie. *Bertrandi* in Mem. de l'Acad. de chirurgie, Vol. III.
 Oscheocele hydatidosa, S. sp. 3.
 Oscheocele Malabarica, S. sp. 4. *Kempfer*, *A-moen*, exot. fasc. III. obs. 7.

Sect. IV. SOLIDÆ.

G. LXXXII. PHYSCONIA.

Tumor quandam abdominis partem potissimum occupans, paulatim crescens, nec sonora, nec fluctuans.

Physonia, S. G. 283. V. 325. Sag. G. 110.

Hypofarca, L. 218.

Species sunt *,

Physonia hepatica, S. sp. 1.

Cl. *Cuffon. Bonet. Sepulchr. de graviditate falsa*,
obf. 3. n. 8. 9. 10. *Verduc Patholog. du rachitis*.

a. *Schirrhodca. G. Segeri M. Nat. Cur. D. I.*
Ann. IV. obf. 142.

* Species sequentes nequaquam ad normam Nomenclologiae methodicae recensentur, sed accuratius physconiae species indicare difficile foret, saltem plus exegisset, quam quo nunc fruor otii. Interim *Cuffoni* doctissimi opus summae ad pathologiam utilitatis repetere hic placuit.

- b. *Calculosa Bonet*. Sepulchr. de hypochondrii tumore, obs. 5.
- c. *Hydatidosa Winckerii* Disp. de hydatidibus apud *Bonet*. Med. Septent. T. II. pag. 313.

Physconia splenica, S. sp. 2.

- a. *Empbractica Haller*. Disp. pathol. T. IV. Disp. 109. *Tulp*. Obs. med. lib. II. cap. 30.
- b. *Schirrhodea Bonet*. Sepulchr. de ventris tumore, obs. 34. n. 3.

Physconia renalis, S. sp. 3.

- Bonet*. Sepulchr. de gravid. falsa, obs. 3. n. 7.
- a. *Calculosa Plater*. Obs. L. II. p. 449. *River*, cent. IV. obs. 34.
 - b. *Sarcomatico cystica Haller*. Disp. pathol. Disp. 114.

Physconia uterina, S. sp. 4.

- Bonet*. Sepulchret. de gravid. falsa, obs. 2. n. 5.
6, 7.

Phyſconia ab ovario, S. ſp. 5.

Monro, Edinb. Med. Eff. tom. VI. Art. 74. obf. 1.

Phyſconia meſenterica, S. ſp. 6.

- a. *Hydatidofa Greg. Horſtii*, Lib. 5. obf. 33.
Tulp. obf. Lib. II. c. 34.
- b. *Strumofa Bonet.* ex Rudnicio de ventr. tumore, obf. X. n. 15. *Ambr. Pare*, L. VII. c. 21. *Scultet.* *Arman.* chirurg. obf. 38.
- c. *Schirrhodea Marc. Donat.* Hiſt. med. mir. lib. VII. c. 15. *Claudin* conſult. Sect. II. conſult. 134. *Trincavell*, lib. III. conſ. 22. *Riolan.* Anthropogr. lib. II. c. 26. *Morgagni* de fedib. ep. 39. n. 2.
- d. *Sarcomatica Bonet.* Sepulchr. de falſa gravid. obf. 3. n. 1.
- e. *Steatomatoſa, Barth. Cabrol.* Obf. 33. et 35. *Tulp.* Obf. Lib. II. c. 32. et 33. *J. Lechellii* apud *Bonet.* Med. ſept. T. II. p. 486. Idem *Collect. acad.* tom. III. p. 585. *Hierne* *Collect.* Acad. tom. III. p. 226. Obf. 166.
- f. *Fungofa, Bonet.* Sepulchr. de gravid. falſa, obf. 3.

Physconia intestinalis, S. sp. 7.

- a. *Concreto-glomerata*, Morgagn. de fedib. epist. 39. n. 21. 25.
- b. *Sarcomatica*, Fontan. Obs. med. selectiores, obs. 11.

Physconia omentalis, S. sp. 8.

Frid. Reebman Diff. de omento.

Physconia polysplachna, S. sp. 9.

- a. *Schirrhodea*, Fabr. Hildani cent. II. obs. 45.
- b. *Schirrhodea et sarcomatica*, Hildenreich, Misc. Nat. C. D. I. ann. VI. et VII. p. 321.
- c. *Schirrhodea et adiposa*, T. Bartholin. cent. III. obs. 6.
- d. *Hydatidosa*, Volch. Coiter. Obs. anat. p. 117. Maur. Cordaei comm. 5. ad lib. priorem, Hippocr. de muliebr.
- e. *Hydatidosa et schirrhodea*, Halleri Disp. pathol. Tom. V. p. 256.

Phyſconia viſceralis, S. ſp. 10.

Bonet. Sepulchr. de gravid. falſa, obſ. 3. Mega-
loſplachnos *Hippocrat. Marc. Donat.* Hiſt. med.
mir. lib. VI. c. 2. *Schenck.* ex *Garnero* de lie-
ne, Lib. III. Obſ. 9. *Salmuth:* cent. 1. obſ. 21.
Bonet. Med. ſept. Lib. VII. p. 487. *Bianchi* Hiſt.
hepat. T. I. p. 130.

Phyſconia externa lupialis, S. ſp. 11.

Graham Tranſ. philoſ. compend. V. IX. cap. 4.
p. 187.

Phyſconia externa ſchirrhouea, S. ſp. 12.

Ger. Blaf. Obſ. med. VI.

Phyſconia externa hydatidofa, S. ſp. 13.

Bonet. Sepulchr. de gravid. falſa, obſ. 3. § 2. 3. 4.
11. &c. *Achotzii* apud *Schenckium*, Lib. III. de
hydropo, obſ. 4. et apud *Scholtzium* conf. 339.
Solenandri conf. 15. Sect. V. *Riverii* Obſ. com-
municat. ultim.

Phyſconia ab adipe ſubcutaneo, S. ſp. 14.

- a *Simplex*, Cl. *Lieutaud.* Comp. med. 7. *Mich.*
Febr. apud *Bonet.* Med. ſept. T. I. p. 636.
 b. *Syphilitica*, obſervante celeb. *Fizes.*

Phyſconia ab excrescentia, S. ſp. 15.

G. LXXXIII. RACHITIS.

Caput magnum anterius maxime tumens ;
 genicula tumida ; coſtae depreſſae ; ab-
 domen tumidum ; caetera marceſcen-
 tia.

Rachitis, S. G. 294. L. 212. V. 312. *Sag.* G.
 120. *Boerb.* 1480. *Hoffm.* III. 487. *Zeviani*
 della rachitide.

Variat,

1. *Simplex* ſine alio morbo.

Rachitis nodofa, S. ſp. 1.

Rachitis Britannica *, S. sp. 2. *Gliffon* de rachitide.

2. Aliis morbis conjuncta.

Rachitis strumosa, S. sp. 3.

Rachitis Polonica, S. sp. 5.

Rachitis elephantiaca, S. sp. 6.

Neque rachitis *calmucana*, S. sp. 4. neque
rachitis *a castratione*, S. sp. 7. pro morbo
haberi potest.

* Minus recte pro diversis speciebus ponuntur rachitis *nodosa* et *Britannica*, cum non differant aliter quam morbus incipiens et confirmatus.

O. III. IMPETIGINES.

Cachexiae, cutem et externum corpus praecipue deformantes.

Impetigines, S. Cl. X. O. V. *Sag.* Cl. III. O. V.

G. LXXXIV. SCROPHULA.

Glandularum conglobatarum, praesertim in collo, tumores; labium superius et columna nasi tumida; facies florida, cutis levis; tumidum abdomen.

Scrophula, S. G. 285. V. 367. *Sag.* G. 121.

Struma, L. 284.

Species sunt,

1. Scrophula (*vulgaris*) simplex, externa, permanens.

Scrophula vulgaris, S. sp: 1.

2. Scrophula (*mesenterica*) simplex interna, cum pallore faciei, inappetentia, tumore abdominis, et foetore foecum infolito.

Scrophula mesenterica, S. sp. 4.

3. Scrophula (*fugax*, simplicissima, et tantum circa collum, plerumque a resorptione ex ulceribus capitis proveniens.

Scrophula fugax, S. sp. 2.

4. Scrophula (*Americana*) cum framboesia conjuncta.

Scrophula Americana, S. sp. 5.

Neque scrophula *periodica*, S. sp. 6. neque scrophula *Moluccana*, S. sp. 8. ad genus scrophulae pertinere mihi videtur.

G. LXXXV. SYPHILIS.

Morbus contagiosus, post concubitum impurum et genitalium morbum, ulcera tonsillarum; cutis, praesertim ad marginem capillitii, papulae corymbosae, in crustas et in ulcera crustosa abeuntes; dolores ostocopi; exostoses.

Syphilis, S. G. 3086. L. 6. V. 319. Sag. G. 126.

Lues venerea, Boerb. 1440. Hoffm. III. 413. Junck.

96. Astruc de lue venerea.

Species unica,

Syphilis venerea, S. sp. 6.

Syphilis *Polonica*, S. sp. 2. nequaquam ad hoc genus pertinet, et de Syphilide *Indica*, S. sp. 3. nobis non satis constat, ut pro diversa specie ponatur.

G. LXXXVI. SCORBUTUS.

In regione frigida post victum putrescentem, salitum, ex animalibus confectum, deficiente simul materia vegetabili recente; asthma; stomacace; in cute maculae diversicolores, plerumque livescentes, praesertim ad pilorum radices.

Scorbutus, S. G. 391. L. 223. V. 318. *Sag. G.* 127. *Boerb.* 1148. *Hoffm.* III. 369. *Junck.* 91. *Lind* on the scurvy. *Hulme* de scorbuto. *Roupe* de morbis navigantium, *Med. Transf.* II. 18. 21. *Milman* on the Scurvy. *Ferris* de sanguinis per corpus vivum circulantis putredine, Ed. 1784.

Variat gradu.

- a. Scorbutus incipiens.
- b. Scorbutus crescens.
- c. Scorbutus inveteratus

Variat etiam symptomatibus.

- d. Scorbutus lividus, *Nitzsch*, *Theoret. pract. ab Handl, des Scharbockes, &c.*

- e. Scorbutus petechialis, *Nitzsch*, *ibid.*
- f. Scorbutus pallidus, *Nitzsch*, *ibid.*
- g. Scorbutus ruber, *Nitzsch*, *ibid.*
- h. Scorbutus calidus, *Nitzsch*, *ibid.*

G. LXXXVII. ELEPHANTIASIS.

Morbus contagiosus; cutis crassa, rugosa, aspera, unctuosa, pilis destituta; in extremis artubus anaesthesia; facies tuberculibus deformis; vox rauca et nasalis.

Elephantiasis, S. G. 302. V. 321. *Sag.* G. 128.
Elephantia Arabum, V. 322.

Varietates sunt,

- Elephantiasis Orientalis, S. sp. 1.
- Elephantiasis legitima, S. sp. 2. *Lond. Med. Obs.*
Vol. I. Art. 19. Soc. Royale I. mem. p. 161.
- Elephantiasis leonina, S. sp. 3.
- Elephantiasis Tyria, S. sp. 4.
- Elephantiasis Alopecia, S. sp. 5.
- Elephantiasis syphilitica, S. sp. 6.
- Elephantiasis Javanensis, S. sp. 7.

Fungi, mori, vel rubi idaei fructus referentes, in variis cutis partibus enati.

Elephantiasis Indica, S. sp. 9*.

G. LXXXVIII. LEPROSA.

Cutis escharis albis, furfuraceis, rimosis, aspera, aliquando subtus humida, pruriginosa.

Lepra, S. G. 303. L. 262. Sag. G. 129.

Lepra Graecorum, V. 320.

Varietates sunt,

Lepra Graecorum, S. sp. 1.

Lepra ichthyosis, S. sp. 2.

Lepra Indica, S. sp. 3.

Lepra Asturiensis, S. sp. 4.

Lepra herpetica, S. sp. 5.

Lepra malum mortuum, S. sp. 6.

G. LXXXIX. FRAMBŒSIA.

* De Elephantiasi, Lepra, Framboesia, et Trichomate, utpote morbis a meipso nunquam visis, amplius statuere non ausus sum.

Framboesia, S. G. 229. *Sag.* G. 125.

Varietates sunt,

Framboesia Guineensis, S. sp. 1. *Edinb. Essays*,
Vol. VI. Art. 71.

Framboesia Americana, S. sp. 2.

G. XC. TRICHOMA.

Morbus contagiosus, capilli solito crassiores,
in cirrhos et funiculos inextricabiles
implicati.

Trichoma, S. G. 311. *Sag.* G. 137.

Plica, L. 313.

Plica five Rhopalosis, V. 323.

Species sunt,

Trichoma cirrosum, S. sp. 1.

Trichoma villosum, S. sp. 2.

VOL. II.

P p

G. XCI. ICTERUS.

Flavedo cutis et oculorum ; faeces albae ;
urina obscure rubra, immixta colore lu-
teo tingens.

Icterus, L. 224. V. 306. *Boerb.* 918. *Junck.* 90.

Aurigo, S. G. 306. *Sag. G.* 132.

Cachexia icterica, *Hoffm.* III. 301.

Species idiopathicae sunt,

1. Icterus (*calculosus*) cum dolore in regi-
one epigastrica acuto, post partum auc-
to, et cum dejectione concretionum bi-
liofarum.

Aurigo calculosa, S. sp. 9. *Edinb. Med. Eff.* I.
33. II. 28. 29. *Med. Transf.* II. 10.

2. Icterus (*spasmodicus*) sine dolore, post
morbos spasmodicos et pathemata men-
tis.

Aurigo hysterica, S. sp. 13.

Species quaedam, quae a SAUVAGESIO sub titulo
Auriginis a venenis, recensentur:

3. Icterus (*hepaticus*) sine dolore, post morbos hepatis.

Aurigo hepatica, S. sp. 11.

Aurigo ab obstructione, S. sp. 6.

Aurigo purulenta, S. sp. 7.

4. Icterus (*gravidarum*) sub graviditate oriens, et post partum abiens. *Van Swiet.* ad *Boerb.* Aph. 950.

Aurigo plethorica, S. sp. 5.

5. Icterus (*infantum*) in infantibus haud diu post natales oriens.

Aurigo neophytorum, S. sp. 12.

Icteri sequentes, siquidem recte icteri dicantur *, symptomatae sunt,

Aurigo febrilis, S. sp. 1.

* Flavedo cutis oriri potest, vel a bile non, ut solet, excreta, sed in vasa sanguifera excepta, et inde subter cuticulam

Aurigo febricosa, S. sp. 8.

Aurigo accidentalis, S. sp. 2.

Aurigo typhodes, S. sp. 10.

Aurigo rachialgica, S. sp. 14.

Aurigo a venenis, S. sp. 4.

Aurigo Indica, S. sp. 3. five quarundam
gentium color naturalis, nequaquam
pro morbo haberi potest.

cuticulam effusa; vel a sero sanguinis faepe flavescente, subter cuticulam, ut in ecchymosi, effuso. In quibusdam casibus, an flavedo cutis ab una vel altera illarum causarum oriatur, apud medicos non semper constat; sed tantum ex prima icterum genuinum, et ab altera morbum diversum, quique, quantum fieri possit, distingui debet, oriri censemus.

CL. IV. LOCALES*.

Partis, non totius corporis, affectio.

Vitia †, S. Cl. I. L. Cl. XI. V. Cl. X. *Sag.* Cl. I.

Plagae, S. Cl. I. O. VII. *Sag.* Cl. II.

Morbi organici *Auctorum.*

* Fortassis aliquando ambiguum esse potest, utrum ad universales, vel ad locales, morbi quidam referri debent; de plerisque vero, utri classi referendi sint, satis obvium erit; et ex institutione hujus *Localium* classis, quamplurimos morbos rectius et facilius, quam in aliorum nosologorum systematibus, disponi posse contendimus.

† *Vitia* hic dixi, utpote sub hac classe *Localium* comprehensa; morbos vero multo plures comprehendit hic classis, ita ut vox *vitia* pro hujus synonymo nequaquam haberi potest, et idem de *Plagis SAGARI* dictum velim.

O. I. DYSÆSTHESIÆ.

Sensus depravati aut deleti, ex organorum
externorum vitio *.

Dysæsthesiæ, S. Cl. VI. O. I. *Sag.* Cl. IX. O. I.

Hallucinationes, S. Cl. VIII. O. i. *Sag.* Cl. XIII.

O. I.

Privativi, L. Cl. VI. O. III.

G. XCII. CALIGO.

Visus imminutus, vel prorsus abolitus, ob
repagulum opacum, inter objecta et re-
tinam, oculo ipso vel palpebris inhae-
rens.

Caligo, S. G. 153. V. 288. S. G. 259.

Cataracta, L. 109.

* Vereor ne in sequentibus aliquando species re-
censuerim quæ characteri ordinis non prorsus respon-
deant, quasdam, scilicet, dysæsthesias quæ ex orga-
norum externorum vitio non pendeant. Hujusmodi
species quidem aliquando recensui; sed paucae om-
nino sunt, et feci. quia species affines, et hic loci ex-
pectandas, separare nolui.

Species sunt,

1. Caligo (*lentis*) ob maculam opacam pone pupillam.

Cataracta *, S. G. 152. L. 109. V. 239. Sag. G. 26.

Apud SAUVAGESIUM species sunt, verae vel spuriae :

Verae varietates sunt,

Cataracta vera, S. sp. 1.

Glaucoma Woolhouffii.

Cataracta antiglaucoma, S. sp. 2.

Cataracta glaucoma, S. sp. 3.

Glaucoma *Maitre Jan et St Ives*.

Spuriae varietates sunt,

Cataracta membranacea, S. sp. 4.

Cataracta secundaria, S. sp. 5.

* Non video quod, cum SAUVAGESIO, *Cataracta* pro diverso a *Caligine* genere haberi possit; et judicent petiti, annon ideo recte *Caliginis* characterem mutaverim, et *cataraclam* pro ejus specie posuerim.

304 GENERA MORBORUM

2. Caligo (*corneae*) ob corneam opacam.

Achlys, V. 242.

Variat pro varietate morbi opacitatem facientis.

Caligo a nephelio, S. sp. 5.

Caligo a leucomate, S. sp. 6.

Caligo ceratocele, S. sp. 10.

Caligo a staphylomate, S. sp. 11.

Caligo a pterygio, S. sp. 12.

Caligo hyposphagma, S. sp. 13.

3. Caligo (*pupillae*) ob obstructam pupillam.

Variat pro varietate causae.

Caligo ab ectasi, S. sp. 18.

Amaurosis a synchysi, S. sp. 6.

Amaurosis a myosi, S. sp. 7.

Caligo a synizefi, S. sp. 19.

Synizefis, V. 240.

4. Caligo (*humorum*) ob vitium vel defectum humoris aquei.

Glaucoma, V. 241.

Variat pro diverso humoris statu.

Caligo hypoaemia, S. sp. 15.

Caligo lactea, S. sp. 16.

Caligo a rhytidosi, S. sp. 17.

Amylophia hydrophthalmica, S. sp. 7.

5. Caligo (*palpebrarum*) ob vitium palpebris inhaerens.

Variat pro varietate vitii palpebrarum.

Caligo a symblepharosi, S. sp. 1.

Caligo ab ancyoblepharo, S. sp. 2.

Caligo a blepharoptosi, S. sp. 3.

Caligo a pacheablepharosi, S. sp. 4.

Caligo a lupia, S. sp. 7.

Caligo a farcomate, S. sp. 8.

Caligo a cancro, S. sp. 9.

G. XCIII. A M A U R O S I S.

Vifus imminutus vel prorsus abolitus, sine vitio oculi evidente; plerumque cum pupilla dilatata et immobili.

Amaurosis, S. G. 155. L. 110. V. 238. *Sag. G.*
261.

Mydriasis, V. 237.

Amblyopia, L. 108. V. 236.

Species sunt,

1. Amaurosis (*compressionis*) post causas et cum signis congestionis in cerebro.

Variat pro varietate causae remotae.

Amaurosis pituitosa, S. sp. 2.

Amaurosis scrophulosa, S. sp. 3.

Amaurosis plethorica, S. sp. 4.

Amaurosis intermittens, S. sp. 13.

Amaurosis exanthematica, S. sp. 11.

Amaurosis venerea, S. sp. 10.

Amaurosis traumatica, S. sp. 1.

2. Amaurosis (*atonica*) post causas et cum signis debilitatis.

Amaurosis congenita, S. sp. 5.

Amaurosis exhaustorum, S. sp. 16.

Amaurosis rachialgia, S. sp. 14.

Amaurosis arthritica, S. sp. 17.

Amblyopia absoluta, S. sp. 6.

3. Amaurosis (*spasmodica*) post causas et cum signis spasmi.

Amaurosis a spasmo, S. fp. 8.

Amaurosis hysterica, S. fp. 15.

4. Amaurosis (*venenata*) a veneno ingesto vel applicato.

Amaurosis a narcoticis, S. fp. 12.

Amaurosis foricariorum, S. fp. 9.

G. XCIV. D Y S O P I A *.

Visus depravatus, ita ut non nisi certa luce, vel ad certam distantiam, vel in certa positura, objecta clare videantur.

Amblyopia, S. G. 154. Sag. G. 258.

* Verbum *Amblyopia*, quo pro hujus generis nomine utitur SAUVAGESIUS, alio sensu intelligunt veteres, tuq̄ LINNÆUS et VOGELIUS; ideoque hujus generis nomen mutare necessarium duxi.

Species sunt,

1. Dyfopia (*tenebrarum*) in qua non nisi in magna luce objecta videntur.

Amblyopia crepuscularis, S. sp. 1.

2. Dyfopia (*luminis*) in qua non nisi in obscura luce objecta videntur.

Amblyopia meridiana, S. sp. 2.

3. Dyfopia (*diffitorum*) in qua longe distantia non videntur.

Amblyopia diffitorum, S. sp. 3.

Myopia, L. 309.

Myopiafis, V. 515.

4. Dyfopia (*proximorum*) in qua proxima non videntur.

Amblyopia proximorum, S. sp. 4.

Presbytia, L. 308.

5. Dyfopia (*lateralis*) in qua non nifi oblique pofita videntur.

Amblyopia lufcorum, S. fp. 5.

G. XCV. PSEUDOBLEPSIS.

Vifus depravatus, ita ut quae non exiftant homo fe videre imaginatur, vel quae exiftunt aliter videt ac revera fe habeant.

Suffufio, S. G. 217. Sag. G. 329.

Phantafma, L. 73. V. 289.

Species funt,

1. Pseudoblepsis (*imaginaria*) in qua quae non exiftunt confpici videntur.

Variat pro varietate phantafmatis.

- a. Suffufio myodes, S. fp. 1.
 - b. Suffufio reticularis, S. fp. 2.
 - c. Suffufio fcintillans, S. fp. 3.
- Marmaryge, V. 290.

d. Suffusio coloris, S. sp. 4.

Haemalopia, V. 239.

2. Pseudoblepsis (*mutans*) in qua objecta re-
vera existentia aliquomodo mutata ap-
parent.

Variat pro varia objectorum mutatione.

a. Suffusio metamorphosis, S. sp. 5.

b. Suffusio nutans, S. sp. 7.

c. Suffusio dimidians objecta, S. sp. 6.

d. Suffusio multiplicans.

Diplopia, S. G. 218. *Sag. G.* 330.

Dysopia, V. 291.

Diplopia iterum variat pro varietate causae
remotae.

α. Diplopia pyrectica, S. varietas 1.

β. Diplopia a spasmo, S. Var. 2.

γ. Diplopia a paralyfi, S. Var. 3.

δ. Diplopia ab ancyloblepharo, S. Var. 4.

ε. Diplopia a catarrho, S. Var. 5.

ζ. Diplopia a debilitate, S. Var. 6.

- γ. Diplopia a contusione, S. Var. 8.
- δ. Diplopia a terrore, S. Var. 9.
- ε. Diplopia a temulentia, S. Var. 10.
- ζ. Diplopia remotorum, S. Var. 7.

G. XCVI. DYSECOEA.

Auditus imminutus vel abolitus.

Dysecoea, S. G. 158. V. 246. Sag. G. 264.
 Cophosis, S. G. 160. L. 112. Sag. G. 266.
 Surditas, V. 247.

Species sunt;

- i. Dysecoea (*organica*) ob vitium in organis fonos ad internam aurem transmittentibus.

Variat pro varietate vitii et partis affectae.

- a. Dysecoea monotonon seu malcorum, S. sp. 1.
- b. Dysecoea a meatu obstructo, S. sp. 2.
 Cophosis a meatu, S. sp. 1.

- c. Dysecocia a myringae atonia, S. sp. 3.
Cophosis a tympano, S. sp. 4.
- d. Dysecocia a myringae duritie, S. sp. 4.
- e. Dysecocia a myringa perforata, S. sp. 5.
- f. Dysecocia a tympani fistula, S. sp. 6.
- g. Dysecocia a hydrotympano, S. sp. 7.
- h. Dysecocia a tuba obstructa, S. sp. 8.
Cophosis a tuba, S. sp. 3.
- i. Dysecocia syphilitica.
Cophosis syphilitica.

Cophosis congenita, S. sp. 8.

- 2. Dysecocia (*atonica*) sine organorum fo-
nos transmittentium vitio evidente.

Variat pro varietate causae.

- a. Cophosis critica, S. sp. 2.
Dysecocia febrilis.
- b. Cophosis a comate, S. sp. 7.
- c. Cophosis serosa, S. sp. 6.
- d. Cophosis a steatmate, S. sp. 9.

G. XCVII. PARACUSIS.

Auditus depravatus.

Paracusis, S. G. 159. Sag. G. 265.

Syrigmus, S. G. 219. Sag. G. 231.

Species sunt,

- i. Paracusis (*imperfecta*) in qua soni ab externis venientes percipiuntur, non autem accurate vel cum solitis conditionibus.

Variat,

- a. Cum auditu gravi.

Paracusis barycoea, S. sp. 1.

- b. Cum auditu nimis sensibili.

Paracusis oxycœa, S. sp. 2.

- c. Cum sono unico externo a causis internis duplicato.

Paracusis duplicata, S. sp. 3.

d. Soni quos homo audire velit, nisi sono alio vehementi simul excitato non audiuntur.

Paracusis Willifiana, S. sp. 4.

2. Paracusis (*imaginaria*) in qua soni extrinsecus non existentes ab internis causis excitantur.

Syrigmus, S. G. 219. *Sag.* G. 231.

Syringmos, L. 72.

Sufurrus, V. 292.

Variat pro varietate soni percepti.

a. Syrigmus fibilus, S. sp. 4.

b. Syrigmus sufurrus, S. sp. 5.

c. Syrigmus bombus, S. sp. 11.

Variat etiam pro varietate causae remotae.

d. Syrigmus a debilitate, S. sp. 1.

e. Syrigmus criticus, S. sp. 2.

f. Syrigmus plethoricus, S. sp. 3.

g. Syrigmus vertiginosus, S. sp. 10.

- h. Syrigmus cephalalgicus, S. fp. 6.
- i. Syrigmus a ventriculo, S. fp. 7.
- k. Syrigmus catarrhalis, S. fp. 8.
- l. Syrigmus ab oxycocæ, S. fp. 9.

G. XCVIII. A N O S M I A.

Olfactus imminutus vel abolitus.

Anosmia, S. G. 156. L. 113. V. 248. Sag. 262.

Species sunt,

1. Anosmia (*organica*) ob vitium in membrana nares internas investiente.

Variat pro varietate vitii.

- Anosmia catarrhalis, S. fp. 1.
- Anosmia a siccitate, S. fp. 6.
- Anosmia a polypo, S. fp. 3.
- Anosmia ab ozaena, S. fp. 2.
- Anosmia syphilitica, S. fp. 4.
- Anosmia verminosa, S. fp. 5.

2. Anosmia (*atonica*) sine vitio membranae
narium evidente.

Anosmia paralytica, S. sp. 7.

G. XCIX. AGHEUSTIA.

Gustus imminutus vel abolitus.

Agheustia, S. G. 157. Sag. G. 263.

Agheustia, L. 114.

Apogeufis, V. 449.

Species sunt,

1. Agheustia (*organica*) ob vitium in mem-
brana linguae, a nervis sapida arcens.

Agheustia febrilis, S. sp. 1.

2. Agheustia (*atonica*) sine vitio linguae e-
vidente.

Agheustia paralytica, S. sp. 2.

G. C. ANÆSTHESIA.

Tactus imminutus vel abolitus.

Anaesthesia, S. G. 161. L. 118. *Sag.* G. 267.

Anodynia, V. 274.

Sequentes species a SAUVAGESIO recensentur, et, cum de iis mihi non fatis liqueat, nihil mutare volui.

Anaesthesia a spina bifida, S. sp. 1.

Anaesthesia plethorica, S. sp. 2.

Anaesthesia nascentium, S. sp. 3

Anaesthesia melancholica, S. sp. 4.

O. II. DYSOREXIÆ*.

Appetitus erroneus vel deficiens.

Sect. I. APPETITUS ERRONEI.

Morositates, S. G. VIII. O. II. *Sag.* Cl. XIII,

O. II.

Pathetici, L. Cl. V. O. II.

Hyperaestheses, V. Cl. VII.

G. Cl. BULIMIA.

Appetitus esculentorum majori copia quam
quae digeri possit.

* *Morositates SAUVAGESII* minus recte ad *Vesaniarum* classem referri, supra dixi, et nunc ad locales detuli. Recte, nō fallor, cum dyforexiae fere omnes manifesto partis singularis, potius quam totius corporis, affectiones sint. Nostalgia sola, si quidem vera morbus fit, minime pro locali haberi potest; sed morbum incertum a caeteris dyforexiis separare non bene potui.

Bulimia, S. G. 223. L. 79. *Sag.* 335.

Bulimus, V. 296.

Addephagia, V. 297.

Cynorexia, V. 298.

Species idiopathicae sunt,

1. Bulimia (*belluonum*), sine morbo ventriculi, cibi majorem solita copiam appetens.

Bulimia esurigio, S. sp. 4.

Addephagia, V. 297.

2. Bulimia (*syncopalis*) cibum frequenter appetens, ob sensum famis syncopen minitantis.

Bulimia cardialgica, S. sp. 2.

Bulimus, V. 296.

3. Bulimia (*emetica*) cibum magna copia appetens, et mox per vomitum rejiciens.

Bulimia canina, S. sp. 1.

Cynorexia, V. 298.

Species symptomaticae sunt,

Bulimia verminosa, S. sp. 3.

Bulimia addephagia, S. sp. 5.

Bulimia convulforum, S. sp. 6.

Bulimia ab acidis, S. sp. 7.

G. CII. POLYDIPSIA.

Appetitus majoris solitae copiae potulentorum.

Polydipsia, S. G. 224. L. 80. V. 275. Sag. G. 336.

Polydipsia fere semper symptomatica est, et variat tantum pro varietate morborum quos comitatur; hinc

Polydipsia febrilis, S. Var. a.

Polydipsia hydripica, S. Var. b.

Polydipsia fluxuum, S. Var. c.

Polydipsia a venenis, S. Var. d.

G. CIII. P I C A.

Desiderium non esculenti ingerendi.

Pica, S. G. 222. Sag. G. 334.

Citta, L. 78.

Allotriophagia, V. 299.

Malacia, V. 300.

Cum de speciebus *picae* mihi non satis liqueat, sequentes ex SAUVAGESIO recenseo.

Pica infantilis, S. sp. 1.

Pica chlorosiantium, S. sp. 2.

Pica malacia, S. sp. 3.

Pica abscorbutorum, S. sp. 4.

Pica voluntaria, S. sp. 5.

G. CIV. S A T Y R I A S I S.

In maribus effraenis veneris cupiditas.

Satyriasis, S. G. 228. L. 81. Sag. G. 340.

Satyriasm pro specie maniac habet VOGELIUS.

VOL. II.

S I

Species sunt,

Satyriasis (*juvenilis*) cum veneris cupiditate praeter modum vehementi, corpore simul parum perturbato.

Satyriasis neogamorum, S. sp. 5.

2. Satyriasis (*furens*) cum veneris cupiditate effraeni, corpore simul multum perturbato.

Satyriasis acuta, S. sp. 1. *Aretaei Cappad. Acut.*
Lib. II. cap. 12.

Satyriasis chronica, S. sp. 2. ad priapismum pertinet; et Satyriasis venerea, S. sp. 3. necnon satyriasis hydrophobica, S. sp. 4. manifesto symptomata est,

G. CV. NYMPHOMANIA.

In foeminis effraene veneris desiderium.

Nymphomania, S. G. 229. Sag. G. 341.

Satyriasis, L. 81.

Furorem uterinum pro specie maniae habet VOGELIUS.

Nymphomaniae species unica est, et gradu tantum varians, hinc

Nymphomania falacitas, S. sp. 1.

Nymphomania furibunda, S. sp. 2.

Nymphomania fervor uteri, S. sp. 3.

Nymphomania pruriginosa, S. sp. 4.

G. CVI. NOSTALGIA.

In absentibus a patria, vehemens eandem revivendi desiderium.

Noftalgia, S. G. 226. L. 83. Sag. G. 338.

Noftalgiam pro specie melancholiae habet VOGELIUS.

Species sunt,

1. Noftalgia (*simplex*) sine alio morbo.

Noftalgia simplex, S. sp. 1.

2. Nostalgia (*complicata*) aliis morbis comitata.

Nostalgia complicata, S. sp. 2.

Seçt. II. *APPETITUS DEFICIENTES.*

Anepithymiae, S. Cl. VI. O. II. *Sag.* IX. O. II.

Privativi, L. Cl. VI. O. III.

Adynamiae, V. Cl. VI.

G. CVII. *A N O R E X I A.*

Appetitus esculentorum deficiens.

Anorexia, S. G. 162. L. 116. V. 279. *Sag. G.* 268.

Omnis anorexia mihi symptomatica esse videtur, et variat tantum pro varietate morbi quem comitatur. Species quidem omnes, quotquot a SAUVAGESIO fuerant recensitae, ad genus dyspepsiae supra retuli; sed fortassis utile hic erit easdem seorsum, et rectius ordinatas, iterum recensere.

Species sunt,

1. Anorexia (*humoralis*) ab humore ventriculorum gravante.

Anorexia pituitosa, S. sp. 2.

Anorexia biliosa, S. sp. 6.

Anorexia a faburra, S. sp. 9.

2. Anorexia (*atonica*) ob tonum fibrarum ventriculi amissum.

Anorexia paralytica, S. sp. 1.

Anorexia exhaustorum, S. sp. 8.

Anorexia melancholica, S. sp. 5.

Anorexia cachectarum, S. sp. 7.

Anorexia arthritica, S. sp. 12.

Anorexia febrilis, S. sp. 4.

Incertae naturae sunt,

Anorexia plethorica, S. sp. 3.

Anorexia mirabilis, S. sp. 10.

Anorexia neophytorum, S. sp. 11.

Anorexia Stewartiana, S. sp. 13.

G. CVIII. ADIPSIA.

Appetitus potulentorum suppressio, five sitis
feriatio.

Adipsia, S. G. 163. L. 117. V. 281. *Sag.* G. 269.

Adipsiam sine alio morbo, qualis est

Adipsia primaria, S. sp. 1.

Pro morbo habere nollem; omnemque a-
dipsiam pro sympathica, five symptoma-
te morbi cujusdam, sensorium commune
afficientis, habeo; ideoque non ad lo-
cales referendi.

G. CIX. ANAPHRODISIA.

Libidinis defectus, vel veneris impotentia.

Anaphrodisia, S. G. 164. *Sag.* G. 270.

Atechnia, L. 119.

Agenesia, V. 283.

Species verae sunt,

Anaphrodifia paralytica, S. fp. 1.

Anaphrodifia gonorrhoeica, S. fp. 2.

Species spuriae, five veneris rite exercendae
impedimenta, funt,

Anaphrodifia a marifcis, S. fp. 4.

Anaphrodifia ab urethrae vitio, S. fp. 5*.

Pro ficta et falſa habenda eſt

Anaphrodifia magica, S. fp. 3.

* Ad dyſpermatifmi genus pertinet,

O. III. D Y S C I N E S I Æ.

Motus impediti vel depravati ex organo-
rum vitio.

Dyscinesiac, S. Cl. VI. O. III. Sag. Cl. IX. O. III,

G. CX. A P H O N I A.

Vocis plena suppressio, citra coma aut syn-
copen.

Aphonia, S. G. 166. L. 115. V. 253. Sag. G. 272.

Species sunt,

1. Aphonia (*gutturalis*) a tumefactis fau-
cibus et glottide.

Aphonia catarrhalis, S. sp. 4. Anginosa *Mor-*
gagni.

2. Aponia (*trachealis*) a compressa trachea.

Aponia aneurismatica, S. fp. 5.

Aponia pulmonica, S. fp. 9.

3. Aponia (*atonica*) a nervis laryngis resectis.

Aponia traumatica, S. fp. 6.

Sequentes symptomaticae esse videntur,

Aponia melancholica, S. fp. 1.

Aponia paralytica, S. fp. 8.

Aponia temulentorum, S. fp. 3.

Aponia hysterica, S. fp. 7.

Aponia ab antipathia, S. fp. 2.

G. CXI. M U T I T A S.

Verba articulandi impotentia.

Mutitas, S. G. 165. V. 257. Sag. G. 271.

330 GENERA MORBORUM

Species sunt,

1. Mutitas (*organica*) ex lingua ablata vel vitiata.

Mutitas elinguium, S. fp. 4.

Mutitas a ficcitate, S. fp. 5.

2. Mutitas (*atonica*) ex nervis linguae laesis.

Mutitas traumatica, S. fp. 2.

3. Mutitas (*furdorum*) ex furditate congenita, vel puerilibus annis aborta.

Mutitas furdorum, S. fp. 8.

Sequentes symptomatae sunt,

Mutitas a glossocele, S. fp. 1.

Mutitas a narcoticis, S. fp. 3.

Mutitas spasmodica, S. fp. 6.

Mutitas proaeretica, S. fp. 7.

G. CXII. PARAPHONIA.

Vocis fonus depravatus.

Paraphonia, S. G. 168.

Cacaphonia, *Sag.* G. 274.

Raucedo, L. 146.

Raucitas, V. 252.

Afaphia, V. 250.

Clangor, V. 251.

Leptophonia, V. 254.

Oxyphonia, V. 255.

Rhenophonia, V. 256.

Species sunt,

1. Paraphonia (*puberum*) in qua, circa pubertatis tempus, vox ab acutiori et suavi in graviolem et ingratham mutatur.

Paraphonia puberum, S. sp. 1.

2. Paraphonia (*rauca*) in qua, ob ficcitatcm vel tumorem faucium flaccidum, vox fit rauca et scabra.

Paraphonia catarrhalis, S. sp. 3.

Raucedo, L. 146.

Raucitas, V. 250.

3. Paraphonia (*resonans*) in qua, ob obstructas nares, vox fit rauca, cum fonitu per nares sibilante.

Paraphonia nasalis, S. sp. 2.

Paraphonia a polypo, S. sp. 8.

Rhenophonia, V. 256.

4. Paraphonia (*palatina*) in qua, ob deficientem vel divisam uvulam, plerumque cum labio leporino, vox fit rauca, obscura, et ingrata.

Paraphonia gutturalis, S. sp. 5.

Afaphia, V. 250.

5. Paraphonia (*clangens*) in qua vox in acutam, clangentem, et exilem mutatur.

Paraphonia ulcerosa, S. sp. 4.

Paraphonia sibilans, S. sp. 7.

Clangor, V. 251.

Leptophonia, V. 254.

Oxyphonia, V. 255.

6. Paraphonia (*comatosa*) in qua, ob laxatum velum palati et glottidem, sonus inter inspirandum editur.

Paraphonia stertens, S. sp. 6.

G. CXIII. PSELLISMUS.

Verba articulandi vitium.

Psellismus, S. G. 167. L. 138. Sag. G. 273.

Pfellotis, V. 259.

Traulotis, V. 258.

Ifchnophonia, V. 260.

Battarismus, V. 261.

Species sunt,

1. Psellismus (*haesitans*) in quo sermonis verba, praesertim prima, non facile pro-

feruntur, et non nisi prima syllaba saepius repetita.

Pfellismus ischnophonia, S. sp. 1.

Ischnophonia, V. 201.

Battarismus, V. 261.

2. Pfellismus (*ringens*) in quo sonus literae R semper aspiratur, et quasi geminatur,

Pfellismus rottacismus, S. sp. 2.

Traulotis sive blaefitas, V. 258.

3. Pfellismus (*lallans*) in quo sonus literae L fit liquidior, vel loco literae R pronuntiatur.

Pfellismus lamdacismus, S. sp. 3.

4. Pfellismus (*emolliens*) in quo literae durae in molliores mutantur, et litera S multum usurpatur.

Pfellismus traulotes, S. sp. 4.

5. Pfellismus (*balbutiens*) in quo, ob linguam magnam vel tumefactam, literae labiales magis audiuntur, et saepe loco aliarum proferuntur.

Pfellismus balbuties, S. sp. 5.

Pfellismus a ranula, S. sp. 11.

6. Pfellismus (*acheilos*) in quo literae labiales vix vel non omnino pronunciari possunt.

Pfellismus mogilalia, S. sp. 6.

7. Pfellismus (*lagostomatium*) in quo, ob divisum palatum, literae gutturales minus recte pronunciantur.

Pfellismus lagostomatium, S. sp. 10.

Pfellismus cotacismus, S. sp. 8.

G. CXIV. STRABISMUS.

Oculorum axes optici non convergentes.

Strabismus, S. G. 116. L. 304. V. 514. Sag. G.
222.

Species sunt,

1. Strabismus (*habitualis*) a consuetudine prava oculo tantum uno utendi.

Strabismus vulgaris, S. sp. 2.

2. Strabismus (*commodus*) ab unius oculi, prae altero, debilitate vel mobilitate majori, adeo ut uterque oculus non commode adhibeatur.

Strabismus Buffonii, S. sp. 3.

Strabismus spasmodicus, S. sp. 4.

Strabismus paralyticus, S. sp. 5.

Strabismus catarrhalis, S. sp. 6.

3. Strabismus (*necessarius*) ob mutatum situm vel figuram partium oculi.

Strabismus a luscitate, S. sp. 1.

Strabismus caligantium, S. sp. 11.

Strabismus a crystallino, S. sp. 12.

Strabismus myopum, S. sp. 9.

De Strabismo aequinoctiali mihi non liquet.

Minus recte, ut mihi videtur, ad Strabismum referuntur sequentes.

Strabismus symptomaticus, S. sp. 7.

Strabismus lagophthalmos, S. sp. 8.

G. CXV. D Y S P H A G I A.

Molestia deglutionem impediens sine respirationis laesione vel phlegmasia.

Dysphagia, S. G. 199. Sag. G. 216.

Acataposis, V. 149.

Species a SAUVAGESIO recensitae sunt,

1. Dyſphagia ſpaſmodica.
2. ——— hysterica.
3. ——— paralytica.
4. ——— pharyngea.
5. ——— oefophagea.
6. ——— lactentium.
7. ——— tuſſiculofa.
8. ——— hydrophobica.
9. ——— naufeofa.
10. ——— a deglutitis.
11. ——— a datura.
12. ——— a farcomate.
13. ——— ab ſchirro.
14. ——— canina.
15. ——— valſalviana.
16. ——— aneurifmatica.
17. ——— a labario.
18. ——— a ficcitate.
19. ——— ab hypoftaphyle.

G. CXVI. CONTRACTURA.

Artus unius vel plurium contractio diuturna, rigida.

Contractura, S. G. 119. L. 299. Sag. G. 225.

Obstipitas, S. G. 11.

Caput obstipum, V. 513.

Digitium, V. 221.

Species sunt,

1. Contractura (*primaria*) a musculis contractis, rigidis.

a. A musculis ab inflammatione rigidis.

Contractura dolorifica, S. sp. 2.

Contractura arthritica, S. sp. 7.

Contractura catarrhalis, S. sp. 8.

Obstipitas catarrhalis, S. sp. 3.

b. A musculis a spasmø rigidis.

Contractura spasmmodica, S. sp. 11.

Obstipitas spasmmodica, S. sp. 6.

Obstipitas renuens, S. sp. 1.

Obstipitas lateralis, S. sp. 5.

Contractura hypochondriaca, S. sp. 1.

c. A musculis, ob antagonistas paralyticos, contractis.

Contractura paralytica, S. fp. 4.

Contractura rachialgica, S. fp. 5.

Contractura Bohemica, S. fp. 6.

Obstipitas annuens, S. fp. 2.

d. A musculis ab acrimonia irritante contractis.

Contractura scorbutica, S. fp. 3.

2. Contractura (*articularis*) ob artus rigidos.

Contractura anchylosis, S. fp. 9.

Contractura syphilitica, S. fp. 10.

Obstipitas gibbosa, S. fp. 4.

O. IV. APOCENOSES,

Fluxus sive fanguis, aut humores alii, solito uberius profluens, sine pyrexia impetuve fluidorum aucto.

Apocenosés, V. Cl. II. O. II.

Fluxus, S. Cl. IX. *Sag.* Cl. V.

Morbi evacuatorii, L. Cl. IX.

G. CXVII. PROFUSIO,

Fluxus sanguinis.

Profusio, L. 239.

Haemorrhagia, V. 81. *Boerb.* 218.

Ex sanguifluxibus, a SAUVAGESIO recensitis, sequentes, ad hunc locum pertinere videntur.

Haemorrhagia passiva, S. sp. 1.

Haemoptysis traumatica, S. sp. 12.

Haematemesis traumatica, S. sp. 3.

Haematuria traumatica, S. sp. 14.

Haematuria violenta, S. sp. 2.

Haemorrhagia ab hirudine, S. sp. 7.

Haemoptysis ab hirudine, S. sp. 13.

Haematemesis ab hirudine, S. sp. 4.

G. CXVIII. EPHIDROSIS*.

Sudoris praeter naturam evacuatio.

Ephidrosis, S. G. 258. *Sag.* G. 194.

Sudor, L. 208.

Hydropedesis, V. 121.

Species idiopathicae unica est,

Ephidrosis spontanea, S. sp. 1.

* Ephidrosin minus recte ad morbos locales relatum esse agnosco; cum autem huic morbo nullum in systemate nostro locum idoneum invenerim, ne prorsus omitteretur, hic cum aliis quodammodo affinibus morbis evacuatoriis recensui.

Ephidroses symptomaticae variant, pro varietate morbi quem comitantur, et simul pro varietate sudoris elicit, et quodammodo pro varietate partis maxime sudantis. Hinc

Ephidrosis febrilis, S. sp. 3.

Ephidrosis febricosa, S. sp. 7.

Ephidrosis hectica, S. sp. 5.

Ephidrosis exanthematum, S. sp. 6.

Ephidrosis syncoptica, S. sp. 4.

Ephidrosis scorbutica, S. sp. 2.

Ephidrosis a faburra, S. sp. 18.

Ephidrosis lactea, S. sp. 9.

Ephidrosis mellea, S. sp. 10.

Ephidrosis vinosa, S. sp. 11.

Ephidrosis viridis, S. sp. 12.

Ephidrosis nigra, S. sp. 13.

Ephidrosis lutea, S. sp. 14.

Ephidrosis urinosa, S. sp. 15.

Ephidrosis cruenta, S. sp. 16.

Ephidrosis caerulea, S. sp. 17.

Ephidrosis acida, S. sp. 19.

Ephidrosis arenosa, S. sp. 20.

Ephidrosis lateralis, S. sp. 8.

G. CXIX. EPIPHORA.

Fluxus humoris lachrymalis.

Epiphora, S. G. 259. L. 172. V. 99. *Sag. G.*
195.

Ex speciebus a SAUVAGESIO recensitis, nulla pro idiopathica haberi potest, nisi

Epiphora frigida, S. sp. 8.

Caeterae omnes symptomaticae sunt,

Epiphora a pathemate, S. sp. 1.

Epiphora ophthalmica, S. sp. 3.

Epiphora calida, S. sp. 9.

Epiphora ex variolis, S. sp. 4.

Epiphora arthritica, S. sp. 12.

Epiphora cruenta, S. sp. 10.

Epiphora ex rhyade, S. sp. 2.

Epiphora ex aegilope, S. sp. 5.

Epiphora ab ectropio, S. sp. 6.

Epiphora ab anchylope, S. sp. 7.

Epiphora sebacea, S. sp. 11.

Epiphora lactea, S. sp. 13.

G. CXX. PTYALISMUS:

Fluxus falivae.

Ptyalifimus, S. G. 261. L. 176. V. 103. *Sag. G.*
197.

Si quis ptyalifimus idiopathicus fit, pro eo
habere vellem

Ptyalifimum a laxitate, S. fp. 4.

Sequentes omnes fympomaticae sunt,

Ptyalifimus nauseofus, S. fp. 1.

Ptyalifimus hypochondriacus, S. fp. 8.

Ptyalifimus gravidorum, S. fp. 14.

Ptyalifimus a pyrofi, S. fp. 2.

Ptyalifimus Lapponicus, S. fp. 3.

Ptyalifimus febrilis, S. fp. 18.

Ptyalifimus variolofus, S. fp. 6.

Ptyalifimus arthriticus, S. fp. 9.

Ptyalifimus phthificus, S. fp. 10.

Ptyalifimus fcorbuticus, S. fp. 7.

Ptyalifimus catarrhalis, S. fp. 15.

Ptyalifimus apthofus, S. fp. 13.

VOL. II.

X x

346 GENERA MORBORUM

- Ptyalifmus a carie, S. sp. 16.
Ptyalifmus purulentus, S. sp. 12.
Ptyalifmus a calculo, S. sp. 17.
Ptyalifmus syphiliticus, S. sp. 19.
Ptyalifmus viridis, S. sp. 11.
Ptyalifmus urinosus, S. sp. 20.
Ptyalifmus mercurialis, S. sp. 5.

G. CXXI. ENURESIS.

Urinae e vesica fluxus involuntarius non dolens.

Enuresis, S. G. 264. L. 195. V. 113. *Sag. G.*
200.

Species sunt,

1. Enuresis (*atonica*) post morbos sphincterem vesicae laedentes.

- Enuresis hernioforum, S. sp. 3.
Enuresis puerperarum, S. sp. 5.
Enuresis calculosa, S. sp. 7.

Enuresis a fistula, S. sp. 8.

2. Enuresis (*irritata*) a compressione vel irritatione vesicae.

Enuresis gravidarum, S. sp. 4.

Enuresis catamenialis, S. sp. 6.

Enuresis a sparganosi, S. sp. 9.

Symptomatica est,

Enuresis paralytica, S. sp. 2.

Pro morbo non haberi potest

Enuresis infantum, S. sp. 1.

G. CXXII. G O N O R R H Œ A.

Humoris ex urethra, in maribus, cum vel absque libidine, praeter naturam fluxus.

Gonorrhœa, S. G. 268. L. 200. V. 118. Sag. G. 204.

Species sunt,

1. Gonorrhoea (*pura*) in qua, praegresso concubitu impuro nullo, humor puriformis, sine dysuria vel libidine, ex urethra subinde fluit.

Gonorrhoea pura, S. sp. 1.

Gonorrhoea benigna *Auctorum*.

2. Gonorrhoea (*impura*) in qua, post concubitum impurum, humor puriformis cum dysuria ex urethra fluit.

Gonorrhoea syphilitica, S. sp. 4.

Gonorrhoea maligna *Auctorum*.

Hujus sequela est,

Gonorrhoea (*mucosa*) in qua, post gonorrhoeam impuram, humor mucosus, cum minima vel nulla dysuria, ex urethra subinde fluit.

Anglis, a GLEET,

3. Gonorrhoea (*laxorum*) in qua, humor plerumque pellucidus, sine penis erectione, sed cum libidine, in vigilante, ex urethra subinde fluit.

Gonorrhoea libidinosa, S. sp. 2.

4. Gonorrhoea (*dormientium*) in qua liquor feminalis cum erectione et libidine, in dormientibus, ex somnio libidinoso, ejicitur.

Gonorrhoea oneirogónos, S. sp. 3.

Species spuriae, utpote in quibus ex urethra fluxus non fit.

Gonorrhoea spuria, S. sp. 5. *Astruc*, lib. 3. cap. 3. § 2.

Gonorrhoea balani, S. sp. 6.

O. V. EPISCHESES.

Excernendorum suppressiones.

Epifcheses, V. Cl. III.

Suppressorii, L. Cl. VIII. O. II.

Suppressiones, Sag. Cl. VI.

G. CXXIII. OBSTIPATIO.

Dejectio faecum nulla vel solito rarior.

Obstipatio, L. 166. V. 128. Sag. G. 221.

Species sunt,

1. Obstipatio (*debilium*) in hominibus laxis, debilibus, et plerumque dyspepticis.
2. Obstipatio (*rigidorum*) in hominibus fibrae rigidae saepe hypochondriacis.
3. Obstipatio (*obstructorum*) cum symptomatis Colicae 1^{mae}, 2^{dae}, 4^{tae}, vel 7^{mae} supra dictae.

G. CXXIV. ISCHURIA.

Urinae suppressio absoluta.

Ischuria, S. G. 293. L. 167. V. 129. *Sag. G.*
212. *Home's Clinical Experiments*, sect. XV.
Lond. Med. Obs. V. Append.

Species sunt,

1. Ischuria (*renalis*) praegresso renum morbo, cum dolore vel molesto gravitatis sensu in regione renum, et sine hypogastrii tumore, vel ad mingendum stimulo.

Variat pro varietate causae ; hinc *

* Doctissimi CUSSONI Collectanea egregia de ischuria, licet ad leges nosologiae methodicae minus confecta, non prorsus omittenda putavi. Simul autem metuens, ne iis in hoc secundo tomo locus commodus esset, in tomo primo cum systemate SAUVAGESIANO inferui. Cum vero hic specierum ischuriae characteres nosologicos dare volui, ut tota res sub uno conspectu appareret, species CUSSONI summam hic repetere placuit. Loca autem auctorum, in quibus ischuriae varia exempla inveniri possunt, ex primo tomo adhuc petenda sunt.

- a. *Nephritica*, a renum inflammatione, S. sp. 1.
 - b. *Nephrolithica*, a renum calculo, S. sp. 2. Edinb. Med. Eff. II. 31.
 - c. *Nephroplethorica*, a plethora, S. sp. 3.
 - d. *Lunatica, periodica*, S. sp. 4.
 - e. *Nephrospastica*, spasmotica, S. sp. 5.
 - f. *Nephrelmintica*, verminosa, S. sp. 6.
 - g. *Nephrothromboides*, a sanguine congrumato, S. sp. 7.
 - h. *Nephropyica*, a renum purulentia, S. sp. 8.
 - i. *Nephroplegmatica*, pituitosa, seu mucosa, S. sp. 9.
 - k. *Nephroplegica*, paralytodaea, S. sp. 10.
 - l. *Suppleta*, ab alia evacuatione suppleta, S. sp. 11.
2. Ischuria (*ureterica*) praegresso renum morbo, cum doloris vel molestiae sensu in quadam ureteris parte, et sine hypogastrii tumore, vel ad mingendum stimulo.

Variat pro varietate causae ; hinc

- a. *Ureteritica*, inflammatoria, S. sp. 12.
- b. *Ureterolithica*, calculosa, S. sp. 13.
- c. *Ureterothromboides*, a sanguinis grumo, S. sp. 14.

- d. *Ureterophlegmatica*, a pituita, S. sp. 15.
- e. *Ureteropyica*, purulenta, S. sp. 16.
- f. *Ureterostomatica*, ab orificii ureterum inferioris clausura, S. sp. 17.

3. *Ischuria (vesicalis)* cum tumore hypogastrii, dolore ad cervicem vesicae, et frequenti ad mingendum stimulo.

Variat pro varietate causae ; hinc

- a. *Cystitica*, a vesicae inflammatione, S. sp. 18.
- b. *Cystolithica*, a vesicae calculo, S. sp. 19.
- c. *Cystospasmodica*, a sphincteris vesicae spasmo, S. sp. 20.
- d. *Cystoplegica*, a vesicae paralyfi, S. sp. 21.
- e. *Polyurica*, a vesica distenta lotio diutius cohibita, S. sp. 22.
- f. *Cystopyica*, purulenta, S. sp. 23.
- g. *Cystothromboides*, a sanguinis grumo, S. sp. 24.
- h. *Cystophlegmatica*, a muco, S. sp. 25.
- i. *Ectopocystica*, a vesicae ectopia, S. sp. 26.
- k. *Cystoproctica*, ab intestino recto scybalis, calculo, flatibus, inflammatione, abscessu, haemorrhoidibus, turgente, S. sp. 27.

- l. *Hystero cystica*, ab utero, S. fp. 28.
 - m. *Atretarum*, a menstuis in vagina retentis, S. fp. 29.
 - n. *Paradoxa*, S. fp. 30.
4. *Ischuria (urethralis)* cum tumore hypogastrii, frequenti ad mingendum stimulo, et dolore in aliqua parte urethrae.

Variat pro varietate causae ; hinc

- a. *Perinaealis*, a perinaei tumore, S. fp. 31.
- b. *Urethrolithica*, a calculo urethrae impacto, S. fp. 32.
- c. *Urethrophlegmatica*, a muco urethram infarciente, S. fp. 33.
- d. *Urethrothromboides*, a sanguinis grumo urethram opplente, S. fp. 34.
- e. *Urethropyica*, a pure urethram obstruente, S. fp. 36.
- f. *Urethrobymenodes*, a membrana in urethram impacta, S. fp. 36.
- g. *Urethrelmintica* verminosa, S. fp. 37.
- h. *Urethritica*, ab urethrae inflammatione, S. fp. 38.
- i. *Carunculosa*, a morbis ut vocant urethrae, S. fp. 39.

- k. *Hydrocelodes*, ab urethrae ruptura in scrotum
hiante, S. sp. 40.
l. *Cryptopyica*, a penis intra corpus retractione, S.
sp. 41.
m. *Peridesmicà*, a vinculo strictiori peni injecto, S.
sp. 42.
n. *Phimosica*, a phimosi, S. sp. 42.
o. *Aspadiasis*, ab urethrae clausura, S. sp. 44.

G. CXXIV. D Y S U R I A.

Dolorifica et quodammodo impedita urinae
emissio.

Dysuria, S. G. 265. L. 57. V. 164. Sag. G. 213.
Stranguria *Auſtorum*.

Species sunt,

1. Dysuria (*ardens*) cum ardore urinae fi-
ne morbo vesicae evidente.

Dysuria primaria, S. sp. 5.

Dysuria a cantharidibus ingestis vel applicatis.

Dysuria arfura, S. sp. 7.

Dysuria neonympharum, S. sp. 14.

2. Dysuria (*spasmodica*) a spasmo ex aliis partibus cum vesica communicato.

Dysuria hysterica, S. sp. 1.

Dysuria rachialgica, S. sp. 11.

Dysuria diabetica, S. sp. 17.

Dysuria nephralgica, S. sp. 3.

3. Dysuria (*compressionis*) a vicinis partibus vesicam prementibus.

Dysuria gravidarum, S. sp. 13.

Dysuria a cystoccele, S. sp. 8.

Dysuria ab hysteroloxia, S. sp. 10.

Dysuria atretarum, S. sp. 16.

4. Dysuria (*phlogistica*) a vicinis partibus inflammatis.

Dysuria ab hysteritide, S. sp. 9.

Dysuria haemorrhoidalis, S. sp. 6.

Dysuria venerea, S. sp. 4.

Dysuria a caruncula, S. sp. 5.

5. Dysuria (*irritata*) cum signis calculi vesicalis.

Dysuria calculosa, S. sp. 12.

6. Dysuria (*mucosa*) cum excretionemucosae copiosa.

Glus, L. 200.

Pyuria mucosa, S. sp. 6.

Pyuria viscida, S. sp. 5.

Rarus vesicae morbus, *Hoffm.* T. IV. Consult.

Med. Centur. II. cas. XCIII.

Catarrhus vesicae *Lieutaud.* Syn. p. 272.

Pyuria arthritica, S. sp. 9.

De dysuria ab infectis, S. sp. 15. mihi non satis liquet.

G. CXXV. DYSPERMATISMUS.

Seminis in actu venereo tarda, impedita, et ad generationem insufficientis emissio.

Dyspermatismus, S. G. 260.

Sterilitas, L. 171. *Sag.* G. 211.

Agenesia, V. 283.

Species sunt,

1. Dyspermatismus (*urethralis*) a morbis urethrae, S. sp. 1.
2. Dyspermatismus (*nodosus*) a nodis corporum cavernosorum, S. sp. 2.
3. Dyspermatismus (*praeputialis*) ab angustiori praeputii orificio, S. sp. 3.
4. Dyspermatismus (*mucosus*) a mucositate urethrae infarciente, S. sp. 4.
5. Dyspermatismus (*hypertonicus*) a validiori penis erectione, S. sp. 5. Edinb. Eff. I. 35.
6. Dyspermatismus (*epilepticus*) ab epilepsia spasmodica in coitu adveniente, S. sp. 6.
7. Dyspermatismus (*apraetodes*) a genitalium ignavia, S. sp. 7.

8. Dyspermatismus (*refluus*) in qua nulla feminis in coitu emissio, ob refluxum ejusdem ex urethra in vesicam, S. sp. 9.

De dyspermatismo seroso, S. sp. 8. mihi non fatis constat.

G. CXXVI. AMENORRHŒA.

Menses tempore quo fluere solent, vel solita parciore, vel non omnino fluentes, citra graviditatem.

Amenorrhœa, V. 130.

Dysmenorrhœa, L. 168. *Sag. G.* 218.

Species sunt,

1. Amenorrhœa (*emanfionis*) in puberibus quibus post fluxus tempus solitum, menses non jam prodierint, et cum simul variae affectiones morbidæ adsint.

360 GENERA MORBORUM

2. Amenorrhoea (*suppressionis*) in adultis, quibus menses, quae jam fluere solebant, suppressae sunt.
3. Amenorrhoea (*difficilis*) in qua menses parcius et cum dolore fluunt.

Menorrhagia difficilis, S. sp. 1.

O. VI. TUMORES.

Partis magnitudo aucta sine phlogosi.

Tumores protuberantes, L. Cl. X. O. V.

G. CXXVIII. ANEURISMA.

Tumor mollis, pulsans, supra arteriam.

Aneurisma, S. G. 32. L. 282. V. 408. *Sag.* G. 35.

G. CXXIX. VARIX.

Tumor mollis, non pulsans, supra venam.

Varix, S. G. 33. L. 282. V. 407. *Sag.* G. 36.

G. CXXX. ECCHYMOOMA.

Tumor diffusus, parum eminens, livescens.

VOL. II. Z z

362 GENERA MORBORUM

Ecchymoma, S. G. 6. V. 451. *Sag. G.* 5.
Sugillatio, L. 230.

G. CXXXI. SCHIRRUS.

Partis, plerumque glandulae, tumor durus,
non dolens, aegre suppurans.

Schirrus, S. G. 14. L. 283. V. 374. *Sag. G.* 19.
Boerb. 392.

G. CXXXII. CANCER.

Tumor schirrodeus dolens, in ulcus mali
moris abiens.

Cancer, S. G. 20. V. 375. *Boerb.* 492. *Sag. G.*
25.

G. CXXXIII. BUBO.

Glandulae conglobatae tumor suppurans.

Bubo, L. 271.

Bubo, S. G. 16. V. 368. *Sag. G.* 21.

Parotis, S. G. 17. V. 370. *Sag. G.* 22.

G. CXXXIV. S A R C O M A.

Extuberatio mollis, non dolens.

Sarcoma, S. G. 23. L. 294. V. 376. *Sag.* G. 28.

Polypus, V. 377.

Porrus, V. 427.

G. CXXXV. V E R R U C A.

Extuberatio durior, scabra.

Verruca, S. G. 25. L. 277. V. 426. *Sag.* G. 30.

G. CXXXVI. C L A V U S.

Cuticulae crassities dura, lamellata.

Clavus, L. 278. V. 428.

Callus five Tylloma, V. 429.

G. CXXXVII. L U P I A.

Extuberatio subter cutem mobilis, mollis,
non dolens.

Lupia, S. G. 37. *Sag.* G. 40.

Atheroma, L. 285.

Encystis, V. 420.

G. CXXXVIII. G A N G L I O N .

Extuberatio durior, mobilis, tendini insi-
dens.

Ganglion, L. 287. V. 379.

G. CXXXIX. H Y D A T I S .

Vesicula cuticularis humore aqueo plena.

Hydatis, S. G. 34. *Sag.* G. 38.

Phlyctaena, L. 273. V. 442.

G. CXL. H Y D A R T H R U S .

Articulorum, genu potissimum, tumor, pa-
rum primo eminens, cuti concolor, do-
lentissimus, et mobilitatem imminuens.

Hydarthrus, S. G. 38.

Anglis, a WHITE SWELLING.

Reimarus de fungo articularum, Leid 1757.

Cheston Path. Inq. Chap. V.

Edinb. Eff. IV. 18. 19. 20.

G. CXLI. EXOSTOSIS.

Tumor durus offi infidens.

Exostosis, S. G. 29. L. 290. V. 417. *Sag.* G. 34.

Hyperostosis, V. 418.

O. VII. ECTOPIÆ*.

Pars ex sua fede dimota tumorem faciens.

Ectopiac, S. Cl. I. O. VI. *Sag.* Cl. I. O. VI.

G. CXLII. HERNIA.

Partis mollis ectopia, cute et aliis integumentis adhuc tecta.

Hernia, L. 291. *Gaub.* Pathol.

G. CXLIII. PROLAPSUS.

Partis mollis ectopia nuda.

Prolapsus, L. 292.

Prolapsus et procidentia, *Gaub.* Pathol.

* Ectopiarum genera et species, quantum ad pathologiam pertinent, opera solertissimi CUSSONI, enumerata in primo hujus synopsis tomo, pag. 15. et seq. inveniri, et summo cum fructu perlegi possunt.

G. CXLIV. LUXATIO.

Os ex sua in juncturis fede dimotum.

Luxatio, *Gaub.* 226. V. 472.

Exarthrema, S. 60. *Sag.* G. 67.

Diastasis, S. 61. *Sag.* G. 68.

Luxatura, L. 237.

O. VIII. DIALYSES.

Solutio continui visu tactuque manifesta.

Plagae, S. Cl. I. O. VII. *Sag.* Cl. II.

Viria dialytica et solutiones continui, L. Cl. XI.

O. II.

Exulcerationes, L. Cl. XI. O. III.

Diffolutiones, V. Cl. X. O. VI.

G. CXLV. VULNUS.

Soluta unio recens, cruenta, partis mollis, a corpore duro moto.

Vulnus, S. G. 63. L. 240. V. 465. *Sag.* G. 78.

Boerb. 145.

Punctura, S. G. 64. L. 243. *Sag.* G. 79.

Laceratura, L. 242.

Amputatura, S. G. 70. L. 243. *Sag.* G. 86.

G. CXLVI. ULCUS.

Partis mollis solutio purulenta vel ichorosa.

- Ulcus, S. G. 71. L. 249. *Sag.* G. 89.
 Exulceratio, S. G. 72. *Sag.* G. 90.
 Sinus, S. G. 73. V. 492. *Sag.* G. 92.
 Fistula, S. G. 74. L. 254. V. 491. *Sag.* G. 91.
Boerb. 413.
 Cacoethes, L. 250. V. 485.
 Phagedaena, V. 488.
 Moma, L. 251. V. 489.
 Carcinoma, L. 252. V. 487.
 Ozaena, L. 253. V. 500.
 Achor, L. 265. V. 494.
 Crusta, V. 494.
 Therioma, V. 486.
 Sycofis, V. 390.

G. CXLVII. H E R P E S.

Phlyctænae vel ulcuscula plurima, gregalia, serpentina, dysepuleta.

Herpes, S. G. 7. L. 268. V. 443. *Sag.* G. 11.

G. CXLVIII. T I N E A.

In cute capillata ad radices capillorum ulcuscula, humorem, in crustam albam friabilem abeuntem, fundentia.

Tinea, L. 263. V. 497. *Sag.* G. 131.

G. CXLIX. P S O R A.

Pustulae et ulcuscula pruriginosa, contagio-
sa, manus male habens.

Pfora, L. 265.

Scabies, S. G. 304. V. 444. *Sag.* G. 130.

G. CL. F R A C T U R A.

Offis partes a cohaesione in magna frag-
menta vi solutae.

Fractura, S. G. 67. L. 235. V. 468. *Sag.* G. 98:
Boerb. 339.

G. CLI. C A R I E S.

Offis exulceratio.

Caries, S. G. 77. L. 255. V. 493. *Sag.* G. 94.

I N D E X

CLASSIUM ET ORDINUM.

*Numeri post literas S. L. V. Sag. et M.
paginas tomi primi ; post C. paginas tomi
secundi, indicant.*

A DYNAMIÆ, V. 183. M. 364. C. 198.
et 324.

Aerifluxus, S. 63. Sag. 293.

Agitatorii, L. 110.

Alvi fluxus, S. 59. Sag. 291.

Alvi fluxus non sanguinolenti, S. 60. Sag.
288.

Alvi fluxus sanguinolenti, S. 59. Sag. 287.

Anepithymiae, S. 43. Sag. 312. C. 324.

Anhelationes, S. 39. Sag. 306. M. 365.

Anhelationes oppressivae, S. 40.

Anhelationes suppreffivae, Sag. 307.

Apocenosfes, V. 166. C. 340.

Cachexiae, S. 65. V. 194. Sag. 267. M.
367. C. 266.

Cachexiae anomalae, S. 81. Sag. 276.

Clonici generales, S. 37. Sag. 303.

Clonici partiales, S. 35. Sag. 301.

Comata, S. 46. Sag. 315. C. 183.

Concretiones, V. 224.

Continentes, L. 90. C. 68.

Continuae, S. 26. V. 151. Sag. 333. C. 66.

Constrictorii, L. 116.

Critici, L. 90. C. 44.

Cyftides, S. 13. Sag. 250.

Debilitates, S. 42. Sag. 310.

Decolores, L. 124.

Defectivi, L. 105. C. 198.

Deformationes, L. 136.

Deformes, L. 122. C. 266.

Deformitates, V. 226. Sag. 259.

- Deliria, S. 56. Sag. 343. C. 254.
Dialyses, C. 367.
Dialytica, L. 126.
Diffolutiones, V. 218. C. 367.
Dolores, S. 48. V. 171. Sag. 279. M.
358.
Dolorosi, L. 79.
Dolorosi extrinseci, L. 97.
Dysaesthesiae, S. 42. Sag. 310. C. 302.
Dyscinetiae, S. 44. Sag. 312. C. 328.
Dyforexiae, C. 318.
- Ectopiae, S. 14. Sag. 252. C. 365.
Efflorescentiae, S. 8. Sag. 244.
Emaciantes, L. 122. C. 266.
Epischeses, V. 170. C. 349.
Evacuatorii, L. 117. C. 340.
Exacerbantes, L. 91. C. 46.
Exanthemata, Sag. 318. C. 130.
Exanthematicae, S. 29. V. 154. C. 131.
Exanthematici, L. 87. C. 131.
Excrefcentiae, S. 11. Sag. 248.

Extuberantiae, V. 212.

Exulcerationes, L. 128. C. 367.

Febres, S. 26. V. 149. Sag. 333. M. 349,
C. 44.

Fluxus, S. 58. Sag. 286. M. 356. C,
340.

Haemorrhagiae, V. 164. C. 153.

Hallucinationes, S. 54. Sag. 338.

Humoralia, L. 125.

Hydropes, C. 275.

Hydropes partiales, S. 66. Sag. 270.

Hyperaesthesiae, V. 191. C. 318.

Icteriae, S. 80. Sag. 275.

Ideales, L. 101. C. 254.

Imaginarii, L. 102.

Impetigines, S. 79. Sag. 273. C. 291.

Inflammationes, V. 201. M. 354.

Intermittentes, S. 28. V. 149. L. 90. Sag.
336. C. 45.

- Intumescenciae, S. 65. Sag. 268. C. 271.
- Leipopsychiae, S. 45. Sag. 314. C. 198.
Locales, C. 301.
- Macies, S. 65. Sag. 267. C. 266.
- Maculae, S. 7. L. 138. V. 216. Sag. 247:
Marcores, C. 266.
- Mentales, L. 101. M. 366.
- Morositates, S. 55. Sag. 340. C. 318:
Motorii, L. 109. C. 210.
- Neuroses, C. 182.
- Paranoiae, V. 199. C. 254.
- Pathetici, L. 102. C. 318.
- Phlegmasiae, S. 29. Sag. 325. C. 82.
- Phlogistici, L. 93. C. 83.
- Phymata, S. 9. Sag. 246.
- Plagae, S. 23. Sag. 261. C. 301. et 367.
- Privativi, L. 107. C. 302. et 324.
- Procidentiae, L. 135.
- Profluvia, V. 164. C. 172.

Pustulae et Papulae, V. 214.

Pyrexiae, C. 43.

Quietales, L. 105.

Remittentes, S. 27. Sag. 335. C. 45.

Sanguifluxus, S. 58. Sag. 286. C. 153.

Scabies, L. 130.

Serifluxus, S. 61. Sag. 291.

Solutiones, Sag. 261.

Soporosi, L. 106. C. 183.

Spasmi, S. 34. V. 177. Sag. 399. M. 363.

C. 210.

Spastici, L. 109.

Suffocatorii, L. 113.

Suppressiones, Sag. 295.

Suppressorii, L. 113.

Tonici generales, S. 35. Sag. 300.

Tonici partiales, S. 34. Sag. 399.

Tubera, S. 78. Sag. 272.

Tumidofii, L. 123. C. 271.

Tumores, V. 202. C. 362.

Vefaniae, S. 54. Sag. 338. C. 251.

Vitia, S. 7. L. 125. V. 201. Sag. 243.

C. 301.

VOL. II.

B b b

INDEX GENERUM.

- A** BORTIO, V. 97 C. 39
 Abortus, S. 245 L. 205 *Sag.* 180 C. 39
 Abcessus, L. 233 V. 354 C. 7.
 Acatapofis, V. 149
 Achlys, V. 242 C. 92
 Achor, L. 265 V. 494 C. 145
 Acrochordon, V. 426
 Acyefis, V. 282
 Addephagia, V. 297 C. 101
 Adiapneustia, *Sag.* 210
 Adipfia, S. 163 L. 117 V. 281 *Sag.* 269 C. 198
 Adynamia, V. 225
 Aedopofopia, S. 273 *Sag.* 208
 Aegilops, V. 499
 Aeftus volaticus, V. 220
 Agalaxis, V. 133
 Agenefia, V. 283 C. 109 125
 Ageuffia, L. 114 C. 99
 Agheuffia, S. 157 *Sag.* 263 C. 99
 Aglaftatio, L. 170 *Sag.* 214
 Aglutitio, L. 164
 Agomphyafis, V. 482
 Agrypnia, S. 238 L. 130 V. 286 *Sag.* 351
 Algor, S. 191 *Sag.* 150
 Allotriophagia, V. 299 C. 103
 Allopecia, S. 312 L. 315 V. 525 *Sag.* 138
 Alvi fluxus, M. 356 *

* Numeri post literam M. paginas tomi primi indicant.

- Amatoria, V. 17
Amaurosis, S. 155 L. 110 V. 238 *Sag.* 261 C. 93
Amblyopia, S. 154 L. 108 V. 236 *Sag.* 258 C. 93, 94
Ambustio, *Sag.* 97
Amenorrhoea, V. 130 C. 126
Amentia, S. 233 L. 67 V. 337 *Sag.* 346 C. 65, 67
Annesia, S. 237 *Sag.* 349 C. 65
Amphemerina, S. 84 L. 20 *Sag.* 321 C. 3
Amputatio, *Sag.* 86
Amputatura, S. 70 L. 242 C. 144
Anacatharsis, S. 262 *Sag.* 198 C. 40
Anaesthesia, S. 161 L. 118 *Sag.* 267 C. 100
Anaphrodisia, S. 164 *Sag.* 270 C. 109
Anapleufis, V. 478
Anasarca, S. 281 L. 216 V. 313 *Sag.* 108 C. 75
Anatropé, V. 280
Anchyloblepharon, V. 504
Anchyloglossum, V. 507
Anchylomerisma, *Sag.* 76
Anchylops, V. 364
Anchylofis, L. 287 V. 508
Aneurisma, S. 32 L. 282 V. 408 *Sag.* 35 C. 127
Angina, S. 147 L. 46 V. 49 *Sag.* 217 C. 10
—— convulsiva, V. 196
Angone, V. 196
Anhelatio, L. 157
Anoia, V. 337
Anodynia, V. 284 C. 100
Anorexia, S. 162 L. 116 V. 279 *Sag.* 268 C. 107, 43

- Anosmia, S. 156 L. 113 V. 248 *Sag.* 262 C. 98
 Anthrax, S. 19 L. 273 V. 353 *Sag.* 24 C. 7
 Antipathia, S. 225 L. 88 V. 285 *Sag.* 337
 Anxietas, S. 187 L. 89 V. 134 *Sag.* 146
 Apella, L. 312 V. 546 *Sag.* 73
 Apepsia, V. 276 C. 45
 Aphonia, S. 166 L. 115 V. 253 *Sag.* 272 C. 110
 Aphtha, S. 100 L. 9 V. 501 *Sag.* 298 C. 35.
 Aphthosa, V. 44 C. 35
 Apnoea, V. 265
 Apogeusis, V. 249. C. 99
 Apogeusia, V. 294
 Apomyttosis, S. 127 *Sag.* 234
 Apoplexia, S. 182 L. 101 V. 229 *Sag.* 288 C. 42
 Apoplectica, V. 72
 Apoptema, S. 39 *Sag.* 42 C. pag. 86
 Apofyrma, V. 477
 Aquula, V. 445
 Archoptoma, V. 395
 Arctura, L. 262
 Ardor, S. 192 *Sag.* 151
 Argemon, V. 498
 Aridura, S. 278 L. 227 *Sag.* 104
 Artetiscus, V. 554
 Arthritis, S. 183 L. 60 V. 139 *Sag.* 142 M. 358 C. 24
 Arthrocase, S. 78 L. 257 *Sag.* 95 C. 7
 Arthrodynia, C. p. 122
 Arthropuosis, C. 25
 Afaphia, V. 250 C. 112

- Afcites, S. 288 L. 218 V. 314 *Sag.* 114. C. 79
Aphyxia, S. 175 L. 95 V. 275 *Sag.* 281 C. 44
Affodes, V. 27
Affhenia, S. 172 L. 92 V. 223 *Sag.* 278
Affhma, S. 145 L. 161 V. 268 *Sag.* 252 M. 365 C. 55
Atecnia, L. 119 C. 109
Atheroma, L. 286 V. 420 C. 137
Athymia, V. 329 C. 66
Atochia, V. 172
Atonia, L. 120 C. 43
Atreta, L. 313 V. 549
Atrophia, S. 277 L. 211 V. 308 *Sag.* 102 M. 367 C. 79
Attritio, V. 475
Aurigo, S. 306 *Sag.* 132 C. 91

B

- Bacchia, L. 271 *Sag.* 9 C. 7.
Balbuties, V. 259
Batrachus, V. 80
Battarismus, V. 261 C. 113
Beriberia, S. 137 L. 140 *Sag.* 244
Blaefitas, V. 258
Blepharoptosis, S. 43 *Sag.* 46
Blepharotis, V. 342
Blestrismus, V. 135
Boa, V. 446
Bombus, V. 302
Borborismus, L. 123

- Bronchocele, S. 28 V. 369
 Bubo, S. 16 L. 272 V. 368 *Sag.* 21 C. 132
 Bubonocele, V. 396 *Sag.* 58
 Bulimia, S. 223 L. 79 *Sag.* 335 C. 101
 Bulimus, V. 296 C. 101
 Bullofa, V. 41 C. 34

C

- Cachexia, L. 221 V. 304
 Cacoethes, L. 251 V. 485 C. 146
 Cacophonia, *Sag.* 274 C. 112
 Cacofitia, L. 87
 Caligo, S. 153 V. 288 *Sag.* 259 C. 92
 Callus, V. 429 C. 136
 Calvities, V. 529
 Cancer, S. 20 V. 375 *Sag.* 25 M. 368 C. 132
 Canities, V. 525
 Capistrum, V. 208. C. 49
 Caput obstipum, V. 513 C. 116
 Carcinoma, S. 296 L. 253 V. 487 *Sag.* 122 C. 145
 Cardialgia, S. 202 L. 48 V. 157 *Sag.* 160 C. 45
 Cardiogmus, S. 201 V. 152 *Sag.* 159
 Carditis, S. 111 V. 54 *Sag.* 302 C. 13
 Carebaria, V. 144
 Caries, S. 77 L. 256 V. 493 *Sag.* 94 C. 151
 Carphologia, S. 125 L. 135 V. 330 *Sag.* 231
 Carus, S. 181 L. 100 V. 231 *Sag.* 287 C. 42
 Cataclasis, V. 202
 Catalepsis, S. 176 L. 129 V. 230 *Sag.* 282 C. 42

- Cataphora, S. 180 L. 99 V. 232 *Sag.* 286 C. 42
 Catapfyxis, V. 137
 Cataracta, S. 152 L. 109 V. 239 *Sag.* 260 C. 92
 Catarrhalis, V. 73
 Catarrhexis, V. 91
 Catarrhus, S. 186 V. 98 *Sag.* 145 C. 40
 ——— suffocativus, V. 270
 Catoche, V. 230
 Catochus, S. 123 L. 128 V. 183 *Sag.* 229 M. 363 C. 48
 Caufos, V. 20
 Cedma, V. 168
 Celsa, V. 303
 Cephalaea, S. 194 V. 141 *Sag.* 153
 Cephalalgia, S. 193 L. 40 V. 140 *Sag.* 152
 Cephalitis, S. 109 *Sag.* 310 C. 9
 Cercofis, V. 535
 Cerion, V. 496
 Chemofis, V. 46 C. 8
 Chilon, V. 366
 Chiragra, V. 139
 Chlorofis, S. 309 L. 223 V. 305 *Sag.* 135 C. 47
 Cholera, S. 253 L. 187 V. 110 *Sag.* 188 C. 60
 Cholericæ, L. 191 V. 28 C. 61
 Cholofis, V. 536
 Choreæ, L. 139 V. 193 C. 51
 Chylaria, V. 117
 Cicatrix, L. 318 V. 509
 Cillofis, V. 203
 Cinclefis, V. 201

- Cionis, V. 150
 Circocele, V. 409
 Citta, L. 78 C. 103
 Clamor, V. 206
 Clangor, V. 251 C. 112
 Claudicatio, S. 131 *Sag.* 238
 Clavus, L. 279 V. 142, 428 C. 136
 Clitorismus, L. 299
 Clunefia, V. 167 C. 7
 Cocyta, L. 258
 Coeliaca, S. 255 L. 190 V. 109 *Sag.* 190 C. 61
 Coilima, V. 373
 Colica, S. 204 L. 50 V. 160 *Sag.* 162 M. 361 C. 59
 Coloboma, V. 534
 Colpecele, *Sag.* 61
 Colpoptosis, *Sag.* 53
 Coma, V. 232 M. 364 C. 42
 Combustura, L. 246 C. 7
 Condyloma, S. 24 L. 294 V. 378 *Sag.* 29
 Contractura, S. 119 L. 300 *Sag.* 225. C. 116
 Contusio, S. 66 V. 480 *Sag.* 83
 Contufura, L. 239
 Convulsio, S. 128 L. 142 V. 191 *Sag.* 235 M. 363
 C. 50
 Cophosis, S. 160 L. 112 *Sag.* 266 C. 96
 Coryza, S. 260 L. 175 V. 100 *Sag.* 196 C. 40
 Crampus, S. 120 V. 194 *Sag.* 226
 Crepitus, L. 195
 Cripforchis, V. 551

- Cripforchis, V. 551
 Crithe, V. 434
 Cruſta lactea, V. 495 C. 145
 Cyafma, V. 461
 Cynanche, S. 110 L. 33 *Sag.* 300 C. 10
 Cynorexia, V. 298 C. 101
 Cyphofis, V. 512
 Cyrtoma, V. 405
 Cyftotis, V. 71
 Cyftirrhagia, V. 93 C. 39
 Cyftitis, S. 108 L. 31 V. 66 *Sag.* 309 C. 20
 Cyftocele, S. 56 V. 404
 Cyftoptofis, V. 394

D

- Dacryoma, V. 506
 Daçtylion, V. 510
 Daemonia, L. 69 C. 66
 Daemonomania, S. 236 *Sag.* 348 C. 66
 Decimana, V. 9. C. 2
 Deliquium, M. 364
 Delirium, V. 330 L. 65
 Deuteria, V. 132
 Diabetes, S. 263 L. 198 V. 115 *Sag.* 199 C. 62
 Diabroſis, V. 481
 Diachalafis, V. 474
 Diaphthora, V. 278 C. 45
 Diaphragmatis, *Sag.* 304 C. 11
 Diaria, L. 11 C. 4

- Diarrhoea, S. 254 L. 188 V. 105 *Sag.* 189 C. 61
 Diastasis, S. 61 *Sag.* 68 C. 144
 Digitium, L. 228 V. 221 *Sag.* 173 C. 116
 Dionysifcus, V. 553
 Diploia, S. 218 *Sag.* 330 C. 95
 Distortio, L. 303
 Distrix, V. 526
 Diuresis, V. 114 C. 62
 Dolor capitis, M. 359
 ——— ventriculi, M. 360
 Duplicana, L. 18 C. 1, 2
 Dyscoeca, S. 158 V. 246 *Sag.* 264 C. 96
 Dysenteria, S. 248 L. 192 V. 107 *Sag.* 183 C. 41
 Dyflochia, L. 169 V. 131 *Sag.* 215
 Dyshaemorrhoids, *Sag.* 220
 Dysmenorrhoea, L. 168 V. 170 *Sag.* 218 C. 126
 Dyfodia, S. 274 V. 125 *Sag.* 109
 Dyfopia, V. 291 C. 94
 Dyspepsia, V. 277 C. 45
 Dyspermatismus, S. 269 C. 125
 Dysphagia, S. 199 *Sag.* 216 C. 115
 Dyspnoea, S. 144 L. 160 V. 267 *Sag.* 251 M. 365
 C. 56
 Dystocia, S. 208 V. 171 *Sag.* 219
 Dysuria, S. 265 L. 57 V. 164 *Sag.* 213 C. 124
- E
- Ecchymoma, S. 6 V. 451 *Sag.* 5 C. 130
 Eclampsia, S. 133 V. 189 *Sag.* 240 M. 363 C. 53

- Ecphyse, V. 124
 Ecplexis, V. 334
 Ecstasis, S. 177 V. 333 *Sag.* 283 C. 42
 Ecthlymma, V. 475
 Ecthymata, V. 360
 Ectropium, L. 297 V. 518
 Eilema, V. 161
 Elcosis, S. 313 *Sag.* 139
 Elephantia Arabum, V. 322 C. 87
 Elephantiasis, S. 302 V. 321 *Sag.* 128 C. 87
 Elodes, V. 21
 Elytrocele, V. 402
 Emphysema, S. 13 L. 229 V. 392 *Sag.* 18 M. 367
 C. 72
 Empyema, S. 151 L. 159 V. 358 *Sag.* 257 M. 365 C.
 p. 107
 Encanthis, V. 430
 Encauna, V. 450
 Encausis, V. 158, 347 C. 7
 Encephalocèle, S. 57 V. 383 *Sag.* 64
 Encystis, V. 420 C. 137
 Enteritis, S. 105 L. 29 V. 57 *Sag.* 307 C. 16
 Enterocele, S. 50
 ———— ovularis, V. 400
 Enthusiasmus, V. 335
 Entropium, V. 519
 Enuresis, S. 264 L. 196 V. 113 *Sag.* 200 C. 121
 Ephelis, S. 3. L. 326 V. 438 *Sag.* 3
 Ephemera, S. 79 C. 4

- Epialtes, S. 138 L. 163 *Sag.* 245 C. 68
 Epihidrosis, S. 258 *Sag.* 194 C. 118
 Epiala, V. 19
 Epidofis, *Sag.* 75
 Epilepsia, S. 134 L. 143 V. 188 *Sag.* 241 M. 363 C. 53
 Epinyctis, S. 8 V. 441 *Sag.* 12
 Epiphlogisma, V. 179
 Epiphora, S. 259 L. 173 V. 99 *Sag.* 195 C. 119
 Epiplocele, S. 51
 Epiploitis, S. 106 *Sag.* 308 C. 14
 Epistaxis, V. 82 C. 36
 Episthotonos, V. 182 C. 48
 Epulis, V. 363
 Erotomania, L. 82 C. 66
 Errana, L. 19 C. 2
 Erratica, S. 90 C. 2 *Sag.* 327
 Erysipelacea, V. 68 C. 26
 Erysipelas, S. 97 L. 10 V. 343 *Sag.* 296 C. 26, 7
 Erythema, S. 11 *Sag.* 16 C. 7
 Eschara, S. 76 L. 281 V. 483 *Sag.* 93
 Esoche, V. 439
 Eflera, S. 99 *Sag.* 297
 Exania, S. 47 *Sag.* 50
 Exarthrema, S. 60 *Sag.* 67 C. 144
 Excoriatio, S. 65 *Sag.* 82
 Excoriatura, L. 247
 Exsche, V. 440
 Exocyste, S. 48
 Exocytis, *Sag.* 58

- Exomphalus, S. 40 *Sag.* 43
 Exoneirofis, V. 120
 Exophthalmia, S. 42 *Sag.* 45
 Exoftofis, S. 29 L. 291 V. 417 *Sag.* 34 C. 141
 Expectoratio, L. 179 C. 40
 Exulceratio, S. 72 *Sag.* 90 C. 146

F

- Fatuitas, V. 336 C. 65
 Favus, V. 496
 Febris continua, M. 349
 ———intermittens, M. 350
 ———remittens, M. 351
 ———exanthematica, M. 352
 ———Hectica, M. 353
 Fiffura, S. 68 V. 469 *Sag.* 99
 Fiffula, S. 74 L. 255 V. 491 *Sag.* 91 C. 146
 Flauiencia, S. 272. L. 165 V. 127 *Sag.* 207 C. 45
 Flemen, V. 425
 Fletus, L. 149
 Fluxus humoralis, M. 357
 Fractura, S. 67 L. 236 V. 468 *Sag.* 98 C. 150
 Framboesia, S. 299 *Sag.* 125 C. 89
 Frigeraria, *Sag.* 318
 Frigus, V. 185
 Fungus, V. 423
 Furor uterinus, V. 331
 Furunculus, S. 18 V. 352 *Sag.* 23 C. 7

G

- Galactia, L. 207 V. 122
 Galactirrhoea, S. 270 *Sag.* 205
 Galbulus, V. 559
 Galiancon, V. 558
 Ganglion, L. 288 V. 379 C. 138
 Gangraena, S. 314 L. 234 V. 327 *Sag.* 140 C. p. 87
 Gastrica, L. 49
 Gastritis, S. 104 L. 28 V. 56 *Sag.* 306 C. 15
 Gastrocele, S. 52 V. 410 *Sag.* 54
 Gastrodynia, S. 203 *Sag.* 161 C. 45
 Gelasmus, V. 210
 Gibber, L. 301 V. 512
 Gibbositas, S. 30 *Sag.* 70
 Glaucoma, V. 241 C. 92
 Glossagra, V. 138
 Glossocela, V. 197
 Glossocoma, V. 198
 Glus, L. 200 V. 117 C. 124
 Gonagra, V. 139
 Gongrona, V. 371
 Gonorrhoea, S. 268 L. 201 V. 118 *Sag.* 204 C. 122
 Grando, V. 435
 Gravedo, L. 42 V. 126 C. 40
 Graviditas, S. 284 L. 221 *Sag.* 111
 Gryposis, V. 537
 Gutta rosea, S. 4 C. 7
 — rosea, V. 437 C. 7

H

- Haemalopia, V. 289 C. 95
 Haemataporia, *Sag.* 103
 Haematemefis, S. 242 L. 185 V. 89 *Sag.* 177 C. 39
 Haematopedefis, V. 95
 Haematuria, S. 243 L. 199 V. 92 *Sag.* 178 C. 39
 Haemeropathos, *Sag.* 13
 Haemodia, V. 146
 Haemoptoe, V. 83 C. 37
 Haemoptysis, S. 240 L. 180 V. 84 *Sag.* 175 C. 37
 Haemorrhagia, S. 239 L. 174 V. 81 *Sag.* 174 M. 356
 C. 36, 116
 Haemorrhoidalis, V. 75
 Haemorrhois, S. 247 L. 193 *Sag.* 182 C. 38
 Hæctica, S. 83 L. 24 V. 80 *Sag.* 320 C. p. 80
 Haemalopia, V. 245
 Hemerologia, V. 244
 Hemicrania, S. 195 L. 41 V. 143 *Sag.* 154
 Hemiplegia, S. 170 L. 103 V. 228 *Sag.* 276 C. 43
 Hemitritæa, L. 23 C. 1
 Hepatalagia, S. 205 *Sag.* 163
 Hepatica, L. 51
 Hepatirrhoea, S. 246 V. 90 *Sag.* 181 C. 61
 Hepatitis, S. 113 L. 35 V. 58 *Sag.* 312 C. 17
 Hepatizon, L. 324
 Hepatocele, S. 53 V. 411
 Hermaphroditus, V. 552
 Hernia, L. 292 C. 142
 Herpes, S. 7 L. 269 V. 443 *Sag.* 11 C. 147

- Hidroa, S. 10 V. 446
 Hieranofos, L. 144. V. 190 M. 363 C. 50
 Hieropyr, V. 344 C. 7
 Himantofis, V. 151
 Hippos, L. 137 V. 199
 Hirsuties, L. 315 V. 524 *Sag.* 77
 Hordeolum, S. 27 L. 277 V. 434 *Sag.* 32 C. 7
 Horror, V. 186
 Humoraria, *Sag.* 317
 Hydarthrus, S. 38 *Sag.* 41 C. 140
 Hydatis, S. 34 *Sag.* 38 C. 139
 Hydrenterocele, V. 406
 Hydroa, *Sag.* 15
 Hydrocele, V. 388 C. 81
 Hydrocephalum, V. 384 C. 76
 Hydrocephalus, S. 285 L. 217 V. 384 *Sag.* 112 C. 76
 Hydrociftis, V. 315
 Hydrometra, S. 289 *Sag.* 116 C. 80
 Hydromphalos, V. 387
 Hydropedefis, V. 121 C. 118
 Hydrophobia, S. 231 L. 86 V. 30 *Sag.* 343 M. 363
 C. 64
 Hydrophthalmia, V. 385
 Hydrops, M. 367
 Hydrops scroti, V. 389 C. 81
 Hydrorachitis, S. 287 *Sag.* 114 C. 77
 Hydrothorax, S. 150 V. 311 *Sag.* 256 M. 365 C. 78
 Hygrofirfocele, V. 414
 Hypercatharfis, V. 123

- Hyperartetificus, V. 557
 Hyperostofis, V. 418 C. 141
 Hypnobatafis, V. 340 C. 68
 Hypochondriafis, S. 220 L. 76 V. 218 *Sag.* 332
 C. 46
 Hypogastrocele, V. 403
 Hypophafis, V. 234
 Hypopyon, V. 356
 Hypofarca, L. 219 C. 82
 Hypofpydiaeos, V. 547
 Hypoftaphyle, S. 44 *Sag.* 47
 Hysteralgia, S. 209 L. 55 V. 169 *Sag.* 166
 Hysteria, S. 135 L. 126 V. 219 *Sag.* 242 C. 63
 Hysteritis, L. 38 V. 67 C. 21
 Hysteroccele, S. 55 V. 413
 Hysteroloxia, S. 58 *Sag.* 65
 Hysterophyse, V. 317 C. 74
 Hysteroptofis, S. 49 V. 393 *Sag.* 52

I

- Ictericodes, V. 32
 Icterus, L. 225 V. 306 M. 367 C. 91
 Ileus, S. 252 V. 162 *Sag.* 187 C. 59
 Iliaca, L. 186 C. 59
 Illofis, V. 200
 Impetigo, V. 462
 Incubus, V. 211 C. 68
 Inflammatio, L. 232 *Sag.* 20 M. 354 C. 7

- Intertrigo, L. 248 V. 502 C. 7
 Ionthos, V. 436
 Ischias, S. 213 V. 138 *Sag.* 170 C. 22
 Ischiatocele, V. 401
 Ischiocele, *Sag.* 60
 Ischnophonia, V. 260 C. 113
 Ischnotis, V. 541
 Ischuria, S. 293 L. 167 V. 129 *Sag.* 212 M. 361 C.
 124
 Judicatoria, *Sag.* 316

L

- Labarium, L. 310
 Labium leporinum, V. 522
 Laceratura, L. 243 C. 145
 Lactea, V. 76
 Lagocheilos, V. 552
 Lagophthalmia, L. 306 V. 516
 Lagophthalmus, V. 516
 Lagostoma, L. 311 *Sag.* 72
 Languor, L. 91
 Laparocele, *Sag.* 56
 Lassitudo, S. 188 L. 90 V. 222 *Sag.* 147
 Leiopodes, V. 545
 Leipothymia, S. 173 L. 93 V. 273 C. 44
 Leipyria, V. 24
 Lenta, L. 14 V. 79 C. 6
 Lentigo, L. 325 V. 455

- Leontiasis, S. 296 *Sag.* 123
 Lepra, S. 303 L. 263 *Sag.* 129 C. 88
 ——Arabum, V. 321
 ——Graecorum, V. 320 C. 88
 Leptophonia, V. 254 C. 112
 Lethargus, S. 179 L. 98 V. 22 *Sag.* 285 C. 42
 Leuce, V. 460
 Leucoma, S. 1 *Sag.* 1
 Leucophlegmatia, L. 215 C. 72
 Leucorrhoea, S. 267 L. 202 V. 119 *Sag.* 202 C. 39
 Leucorrhoeis, V. 112 C. 38, 61
 Lichen, V. 462
 Lienteria, S. 256 L. 189 V. 108 *Sag.* 191 C. 61
 Lipothymia, *Sag.* 279 L. 93
 Lippitudo, L. 267
 Lithiasis, V. 165 M. 361
 Lochiorrhoea, *Sag.* 203
 Lordosis, S. 31 L. 302 V. 512 *Sag.* 71
 Loxarthrus, S. 62 *Sag.* 69
 Lues Venerea, M. 368
 Lumbago, S. 212 V. 138 *Sag.* 169 C. 22
 Lupia, S. 37 *Sag.* 40 C. 137
 Luxatio, V. 472 C. 144
 Luxatura, L. 237 C. 144
 Lyngodes, V. 26

M

- Macropnoea, V. 266
 Madarosis, V. 530

- Malacia, V. 300 C. 103
 Malacosteon, V. 523
 Malis, S. 298 *Sag.* 124
 Mania, S. 235 L. 68 V. 331 *Sag.* 349 C. 67
 Marasmus, L. 212 C. 70
 Marisca, S. 35 *Sag.* 37 C. 38
 Marmaryge, V. 290 C. 95
 Mastodynia, S. 210 V. 153 *Sag.* 167 C. 7
 Mediastina, V. 52 C. 11
 Melaena, S. 249 *Sag.* 184
 Melanchlorus, V. 307
 Melancholia, S. 234 L. 71 V. 332 *Sag.* 347 C. 66
 Melaficterus, S. 307 *Sag.* 133
 Melasma, L. 323 V. 451
 Meliceris, V. 420
 Menorrhagia, S. 244 L. 203 V. 96 C. 39
 Menstrua, V. 11
 Merocele, V. 399 *Sag.* 57
 Mesenteritis, V. 60 C. 14
 Meteorismus, S. 292 *Sag.* 119 C. 73
 Metritis, S. 107 *Sag.* 315 C. 21
 Metrorrhagia, *Sag.* 179 C. 39
 Miliaria, C. 32
 Miliaris, S. 95 L. 7 V. 37 *Sag.* 295 C. 32
 Mola, L. 206 V. 560
 Monstrositas, V. 539
 Morbilli, V. 453 C. 28
 Morbillofa, V. 36 C. 30
 Morosis, L. 106 V. 336 C. 65

- Morphoea, L. 320
Morfura, L. 245
Morfus, *Sag.* 81
Morta, L. 1 C. 34
Mortificatio, M. 367
Mutitas, S. 165 V. 257 *Sag.* 271 C. 111
Mydriasis, V. 237 C. 93
Myocoilitis, V. 63
Myopia, L. 309 C. 94
Myopiasis, V. 515 C. 94
Myofitis, *Sag.* 301 C. 22
Myrmaecium, L. 280 V. 426

N

- Naevus, S. 5 L. 319 V. 538 *Sag.* 4
Natta, L. 289
Nausea, S. 250 L. 183 V. 159 *Sag.* 185 C. 45
Nebula, V. 464
Necrosis, S. 315 *Sag.* 141
Nefrendis, V. 555
Nephralgia, S. 207 *Sag.* 165
Nephritica, L. 56
Nephritis, S. 115 L. 37 V. 65 *Sag.* 314 C. 19
Noma, L. 252 V. 489 C. 146
Nonana, V. 8 C. 2
Nostalgia, S. 226 L. 83 V. 332 *Sag.* 338 C. 106, 66
Nyctalopia, L. 307 V. 243
Nymphomania, S. 229 *Sag.* 341 C. 105

Nyctagmus, S. 124 *Sag.* 230

O

Oblivio, L. 107 V. 338 C. 65

Obstipatio, L. 166 V. 128 *Sag.* 221 C. 123

Obstipitas, S. 118 *Sag.* 224 C. 115

Octana, V. 7 C. 2

Odaxismus, V. 147

Odontalgia, S. 198 L. 45 V. 145 *Sag.* 157 M. 359
C. 23

Odontorrhoea, V. 86

Oedema, S. 12 L. 230 V. 382 *Sag.* 17

Oesophagismus, V. 217

Omentitis, V. 61 C. 14

Omphalocele, V. 398 *Sag.* 55

Oneirodynia, C. 68

Onychia, V. 346

Onyx, V. 355

Operatio, *Sag.* 85

Ophiafis, V. 529

Ophthalmia, S. 196 L. 43 V. 341 *Sag.* 155 C. 8

Ophthalmites, V. 47 C. 8

Ophthalmorrhagia, V. 88

Opisthotonos, V. 181 C. 48

Opodeocele, *Sag.* 59

Orgasmus, L. 133

Orthopnoea, S. 146 L. 162 V. 269 *Sag.* 253 M. 365
C. 56

- Ofcedo, S. 140 V. 263 *Sag.* 247
 Ofcheocele, S. 41 V. 397 C. 81
 Ofcheophyma, *Sag.* 44 C. 81
 Ofcitans, V. 31
 Ofcitatio, L. 151
 Ofteocopus, V. 176
 Ofteofarcofis, M. 367
 Ofteocopus, S. 184 L. 61 *Sag.* 143 M. 359
 Otalgia, S. 197 L. 44 V. 148 *Sag.* 156 M. 359 C. 7
 Otitis, V. 48
 Otoplatos, V. 102
 Otopuofis, V. 101
 Otorrhoea, S. 271 L. 172 V. 87 *Sag.* 206
 Oxyphonia, V. 255 C. 112
 Ozaena, L. 254 V. 500 C. 145

P

- Paedarthrocace, V. 419 C. 7
 Palpitatio, S. 130 L. 132 V. 213 *Sag.* 237 C. 54
 Panarititia, V. 70
 Pancreatica, V. 64
 Pandiculatio, S. 126 L. 152 V. 264 *Sag.* 233
 Panophobia, S. 227 L. 75 *Sag.* 339 C. 66
 Papula, S. pag. 8 L. 276 *Sag.* 7 C. 7
 Paracentefis, *Sag.* 88
 Paracufis, S. 159 *Sag.* 265 C. 97
 Paracyifis, V. 326
 Paragloffia, S. 45 V. 365 *Sag.* 48

- Paralyfis, S. 169 L. 104 V. 226 *Sag.* 275 M. 364
 C. 43
 Paraphymosis, V. 349 C. 7
 Paraphonia, S. 168 C. 112
 Paraphrenesis, S. 102 L. 26 C. 11
 Paraphrenitis, V. 55 C. 11
 Paraphrofyne, S. 232 L. 66 V. 330 *Sag.* 345 C. 67
 Paraplegia, L. 102 V. 227 C. 43
 Paraplexia, S. 171 *Sag.* 277 C. 43
 Paronychia, S. 21 L. 259 V. 345 *Sag.* 26 C. 7
 Parorchidium, S. 59 *Sag.* 66
 Parotis, S. 17 V. 370 *Sag.* 22 C. 133
 Parturitio, L. 204
 Parulis, V. 362 C. 7
 Pavor, V. 339
 Pelada, V. 529
 Pelioma, V. 451
 Pemphigus, S. 93 *Sag.* 291 C. 34
 Pemphingodes, V. 43
 Periadynia, V. 155
 Pericarditis, V. 53 C. 13
 Perinaeocele, *Sag.* 62
 Peripneumonia, S. 112 L. 34 V. 51 *Sag.* 311 C. 11
 Peritonitis, V. 62 C. 14
 Peritonocorixis, *Sag.* 64
 Pernio, L. 259 V. 350 C. 7
 Pertuffis, C. 57
 Pestilentialis, V. 33 C. 27
 Pestis, S. 91 L. 2 *Sag.* 289 C. 30

- Petechia, L. 5 V. 452 C. 35
 Petechialis, V. 38
 Phagedaena, V. 488 C. 146
 Phalacrotis, V. 528
 Phalangofis, V. 533
 Phantafina, L. 73 V. 287 C. 95
 Phimofis, S. 22 L. 298 V. 348 *Sag.* 27 C. 7
 Phlegmatia, S. 282 *Sag.* 109 C. 75
 Phlegmone, S. 15 L. 39 V. 351 *Sag.* 299 C. 7
 Phlogofis, V. 220 C. 7
 Phlyctaena, S. pag. 9 L. 274 V. 442 *Sag.* 8 C. 139
 Phlyxacion, V. 450
 Phoenigmus, S. 308 *Sag.* 134
 Phoxos, V. 511
 Phrenismus, V. 45 C. 9
 Phrenitis, S. 101 L. 25 V. 18 *Sag.* 303 C. 9, 6
 Phricasmus, *Sag.* 239,
 Phricodes, V. 25
 Phthiriasis, S. 310 V. 324 *Sag.* 136
 Phthifis, S. 276 L. 209 V. 310 *Sag.* 101 C. p. 158
 Phygethlon, V. 357
 Phyma, V. 359
 Phyfconia, S. 283 V. 325 *Sag.* 110 M. 367 C. 82
 Phyfocele, V. 416
 Phyfocephalus, S. 286 *Sag.* 113
 Phyfometra, S. 290 *Sag.* 117 C. 74
 Pica, S. 222 V. 301 *Sag.* 334 C. 103
 Pinnula, V. 432
 Piptonychia, V. 484

- Pituitaria, V. 111 C. 61
 Pityriasis, V. 476
 Pladarotis, V. 431
 Plancus, V. 545
 Plautus, V. 545¹
 Plethora, L. 226 *Sag.* 105
 Pleuritica, L. 53
 Pleuritis, S. 103 L. 27 V. 50 *Sag.* 305 C. 11
 Pleurodyne, S. 148 V. 138 *Sag.* 254 M. 360 C. 22
 Plica, L. 314 V. 323 C. 90
 Plicatio, V. 470
 Pneumatofis, S. 280 V. 391, 156 *Sag.* 107 C. 72
 Pneumonia, C. 11
 Pneumonica, L. 54
 Pnigma, V. 270.
 Podagra, V. 175 C. 24
 Podagrica, V. 69 C. 24.
 Polydipsia, S. 224 L. 80 V. 295 *Sag.* 336 C. 102
 Polymerisma, *Sag.* 74
 Polypus, V. 377 C. 134
 Polyfarcia, S. 279 L. 214 V. 540 *Sag.* 106 M. 367
 C. 71.
 Porrigo, V. 476
 Porrus, V. 427 C. 134
 Presbytia, L. 308 C. 94.
 Pressura, L. 261
 Priapismus, S. 121 L. 122 V. 173 *Sag.* 227
 Proctalgia, S. 214 *Sag.* 171 M. 362 C. 7
 Proctica, L. 59 V. 167

- Proctitis, L. 30 C. 7
 Proctorrhoea, *Sag.* 193
 Profusio, L. 240 C. 117
 Prolapsus, L. 293 C. 143
 Proptoma, S. 46 *Sag.* 49
 Pruritus, S. 190 L. 64 V. 136 *Sag.* 149
 Psellismus, S. 167 L. 138 *Sag.* 273 C. 113
 Ptellotis, V. 259 C. 113
 Pseudoblephs, C. 95
 Psophos, V. 177
 Psora, L. 266 V. 320 C. 149
 Psoriasis, V. 174.
 Psyracia, S. 9. V. 442 *Sag.* 14
 Pterygium, S. 26 L. 296 V. 433 *Sag.* 31
 Ptilosis, V. 531
 Ptofis, V. 235
 Ptyalismus, S. 261 L. 177 V. 103 *Sag.* 197 C. 120
 Pudendagra, S. 215 L. 58 V. 168 *Sag.* 172
 Punctura, S. 64 L. 244 *Sag.* 79 C. 145
 Puorrhoea, V. 106
 Puoturia, V. 116
 Purpura, S. 96 V. 449 *Sag.* 292 C. 35
 ——— scorbatica, V. 443
 Pustula, S. pag 8 L. 275 *Sag.* 6 C. 7
 Pyrosis, S. 200 *Sag.* 158 C. 58
 Pyuria, S. 266 *Sag.* 201

Q

Quartana, S. 89 L. 17 V. 3 *Sag.* 326 C. 2

———— duplex, V. 13

———— triplex, V. 14

Quintana, V. 4 C 2

Quotidiana, S 87 L. 15 V. 1 *Sag.* 324 C. 3

———— continua, V. 15

R

Rabies, L 85 *Sag.* 344

Rachialgia, S. 211 *Sag.* 168 C. 59

Rachitis, S. 294 L. 213 V. 312 *Sag.* 120 C. 83

Rachosis, V. 503

Ranula, V. 380

Raphania, L. 135 V. 192 C. 52.

Raucedo, L. 146 C. 40, 112

Raucitas, V. 252 C. 40, 112

Renchus V. 271

Rhagas, L. 249 S. 75 V. 467 *Sag.* 96

Rhenophonia, V. 256. C. 112

Rheuma, S 149 *Sag.* 255 C. 40

Rheumatica, V. 74

Rheumatismus, S. 185 L. 62 V. 138 *Sag.* 144 M. 358

C 22

Rhcnosis, V. 542

Rochmos, V. 272

Rhoeas, V. 520

Rhopalosis, V. 323 C. 90

Rhyffemata, V. 521

Rigo, S. 132 L. 141 V. 187.

- Rifus, L. 148
 — fardonicus, V. 210
 Rodatio, V. 532
 Ronchus, V. 272
 Rubeola, S. 94 L. 4 *Sag.* 293 C. 28
 Ruftus, L. 182 V. 215
 Ruminatio, V. 216
 Ruptura, S. 69 L. 238 V. 466 *Sag.* 84

S

- Saniodes, V. 550
 Sarcocele, V. 415
 Sarcoma, S. 23 L. 295 V. 376 *Sag.* 28 C. 134
 Sarcoftofis, M. 367
 Sardiatis, L. 125 V. 209
 Satyriasis, S. 228 L. 81 V. 331 *Sag.* 340 C. 104, 105
 Scabies, S. 304 V. 444 *Sag.* 130 C. 149
 Scarlatae, V. 454
 Scarlatina, S. 98 V. 39 *Sag.* 294 C. 29
 Scelotyrbæ, S. 136 V. 195 *Sag.* 243 C. 51
 Schirrus, S. 14 L. 284 V. 374 *Sag.* 19 C. 131
 Sclopetoplaga, *Sag.* 80
 Scoliosis, V. 512
 Scorbutus, S. 301 L. 224 V. 318 *Sag.* 127 M. 368
 C. 86
 Scotomia, L. 111
 Sreatus, L. 178
 Scrophula, S. 295 V. 367 *Sag.* 121 M. 368 C. 84

- Seifis, V. 512
 Seline, 463
 Septana, V. 6 C. 2
 Serpigo, L. 268 V. 443
 Sextana, V. 5 C. 2
 Singultus, S. 141 L. 153 V. 212 *Sag.* 248
 Sinus, S. 73 V. 492 *Sag.* 92 C. 146
 Sirlafis, V. 34 C. 9
 Soda, L. 47 V. 154 C. 45, 58
 Somnambulifinus, S. 221 L. 77 *Sag.* 333 C. 68
 Somnium, V. 329 C. 68
 Somnolentia, L. 96 V. 233
 Spargopogon, V. 556
 Spargonofis, V. 372
 Spafina, V. 479
 Spalmus, L. 121
 ——— oesophagi, V. 217
 ——— cynicus, V. 209
 ——— maxillae inferioris, V. 208
 Sphacelismus, L. 32 C. 9
 Sphacelus L. 235 V. 328 C. p. 87
 Spina bifida, V. 386 C. 77
 Spinola, L. 290 C. 77
 Splenalgia, S. 206 *Sag.* 164
 Splenica, L. 53
 Splenitis, S. 114 L. 36 V. 59 *Sag.* 313 C. 18
 Splenocele, S. 54 V. 412
 Staphyloma, S. 36 V. 421 *Sag.* 39
 Staphylofis, V. 422

- Steatites, V. 390 C. 71
 Steatoma, V. 420
 Sterilitas, L. p. 104. *Sag.* 211 C. 125
 Sternutatio, S. 139 L. 154 V. 204 *Sag.* 246
 Stertor, S. 143 L. 156 V. 271 *Sag.* 250
 Stigma, V. 457
 Stomacace, S. 241 L. 176 V. 85 *Sag.* 176 C. 39
 Strabismus S. 116 L. 305 V. 514 *Sag.* 222 C. 114
 Stranguria, L. 197 V. 163
 Stridor, L. 136
 Struma, L. 285 C. 84
 Stupiditas, V. 336 C. 65
 Stupor, S. 189 L. 105 *Sag.* 148
 Stymatosis, V. 94
 Subluxatio, V. 473
 Subfultus, L. 134 *Sag.* 232
 Sudamen, L. 322
 Sudamina, V. 446
 Sudor, L. 208 C. 118
 Suffocatio, L. 158
 ——— hysterica, V. 196
 Suffusio, S. 217 *Sag.* 329 C. 95
 Sugillatio, L. 231 C. 130
 Suppuratoria, V. 78
 Surditas, V. 247 C. 96
 Suspirium, L. 150 V. 262
 Sufurrus, V. 292
 Sutura, *Sag.* 87
 Sycofis, V. 490 C. 145

Syncopalis, V. 29

Syncope, S. 174 L. 94 V. 274 *Sag.* 280 C. 44

Synizesis, V. 240 C. 92

Synocha S. 80 L. 12 C. 4

Synochus, S. 81 L. 13 V. 16 C. 4 et 6

Syphilis, S. 300 L. 6 V. 319 *Sag.* 126 C. 85

Syrigmos, S. 219 *Sag.* 331 C. 97

Syringmos, L. 72

T

Tabes, S. 275 L. 210 V. 309 *Sag.* 100 C. 69

Talpa, V. 420

Tarantismus, S. 230 L. 84 V. 193 *Sag.* 342

Tenefmus, S. 257 L. 194 V. 166 *Sag.* 192

Terminthus, V. 381 C. 7

Tertiana, S. 88 L. 16 V. 2 *Sag.* 325 C. 1

———— duplex, V. 12

Testudo, V. 420

Tetanus, S. 122 L. 127 V. 180 *Sag.* 228 M. 363

C. 48

Tetartophya, S. 86 L. 22 *Sag.* 323 C. 2

Therioma, V. 486 C. 145

Thlasis, V. 471

Tinea, S. 305 L. 264 V. 497 *Sag.* 131 C. 147

Tofus V. 424

Torpor, V. 224

Tortura, L. 304

Trachelophyma, *Sag.* 33

- Traulotis, V. 258 C. 113
 Tremor, S. 129 L. 131 V. 184 *Sag.* 236 C. p. 196
 Trichiasis, L. 317 V. 517
 Trichoma, S. 311 *Sag.* 137 C. 90
 Trismus, S. 117 L. 124 V. 207 *Sag.* 223 M. 363 C. 48
 Tritaeophya, S. 85 *Sag.* 322 C. 1
 Tritaeus, L. 21 C. 1
 Tuffis, S. 142 L. 155 V. 205 *Sag.* 249 C. 40
 Tylloma, V. 429 C. 136
 Tympanites, S. 291 L. 220 V. 316 *Sag.* 118 M. 367
 C. 73
 Typhomania, S. 178 L. 97 V. 23 *Sag.* 284 C. 42
 Typhus, S. 82 *Sag.* 319 C. 5

V

- Vaga, V. 10 C. 2
 Valgus, V. 544
 Varicella, V. 42, 448 C. 27
 Variola, S. 92 L. 3 V. 447 *Sag.* 290 C. 26
 Variolofa, V. 35 C. 26
 Varix, S. 33 L. 283 V. 407 *Sag.* 36 C. 129
 Varus, S. p. 9 L. 270 V. 436 et 543 *Sag.* 10 C. 7
 Verruca, S. 25 L. 278 V. 426 *Sag.* 30 C. 135
 Vertigo, S. 216 L. 74 V. 293 *Sag.* 328
 Vefania, L. 70 C. 66
 Vibex, L. 321 V. 458
 Vitiligo, S. 2 V. 459 *Sag.* 2
 Ulcus, S. 71 L. 250 C. 146 *Sag.* 89

- Vociferatio, L. 147
 Volatica, L. 63 V. 178 C. 22
 Vomica, L. 181 V. 104 C. p. 106
 Vomitus, S. 251 L. 184 V. 214 *Sag.* 186 C. 45
 Uredo, L. 8 C. 33
 Urorrhoeas, V. 548
 Urticaria, V. 361, 456 C. 33
 Urticata, V. 40 C. 33
 Vulneraria, V. 77
 Vulnus, S. 63 L. 241 V. 465 *Sag.* 78 C. 145

X

Xirafia, V. 527

Z

Zoster, V. 344

C A T A L O G U S

Morborum a nobis omifforum, quos omiffiffe fortaffis non oportebat. *Vide Prolegomina, pag. xxi.*

Aglactatio, L.

Agalaxis, V.

Alopecia

Anchylops

Ægilops

Anchylofis, L.

Anchylofis, V.

Angina, S. et L.

Angina pectoris

Antipathia

Beriberia

Cardiogmus

Cephalaea

Cephalalgia

Distortio

Aglutitio

Acatapofis

Oefophagifmus

Dyftocia

Parturitio et alii gravidarum et parturientium morbi

Elcofis

Effera

Hemicrania

Leucorrhoea ex vitio locali

Lithiasis in organis uropoeticis, et in aliis corporis
partibus

Malis

Coccyta, L.

Melaena

Melaficterus

Melanchlorus, V.

Myocoilites

Necrosis

Odaxifinus

Dentitio et alii infantum morbi

Paralysis partis singularis ex vitio musculorum

Physocephalus

Pnigma

Catarrhus suffocativus *Auct.*

Pyuria

Puoturia

Sterilitas utriusque sexus

Acyifis, V.

Stymatosis

Tarantifinus

Venena

Vermes

I N D E X

Specierum Sauvagesii, quae in systemate nostro sub nominibus genericis non inveniuntur.

Numeri indicant paginam.

- Amaurosis a myosi, 304.
- Amaurosis a synchyfi, 304.
- Amblyopia hydrophthalmica, 305.
- Amphimerina anginosa, 97.
- Amphimerina biliosa, 56.
- Amphimerina cardiaca, 53.
- Amphimerina catarrhalis, 173.
- Amphimerina epiala, 54.
- Amphimerina hemitritaeus, 49.
- Amphimerina humorosa, 54.
- Amphimerina hungarica, 55.
- Amphimerina paludosa, 56.
- Amphimerina peripneumonica, 102.
- Amphimerina phricodes, 54.
- Amphimerina pseudoheimitritaeus, 49.
- Amphimerina femiquartana, 61.
- Amphimerina femiquintana, 53.
- Amphimerina spasmodica, 62.
- Amphimerina syncopalis, 54.
- Amphimerina tufficulosa, 174. et 232.
- Angina spasmodica, 215.
- Aphonia paralytica, 194.

- Arthritis rheumatica, 128.
 Ascites flatulento-peritonaeus, 274.
 Ascites fanguineo-uterinus, 283.
 Ascites uterinus, 283.
 Asphyxia a carbone, 188.
 Asphyxia congelatorum, 189.
 Asphyxia flatulenta, 190.
 Asphyxia foricariorum, 188.
 Asphyxia a fumis, 188.
 Asphyxia hysterica, 192.
 Asphyxia immerforum, 190.
 Asphyxia a nephitide, 188.
 Asphyxia a niusto, 188.
 Asphyxia a pathemate, 189.
 Asphyxia sideratorum, 189.
 Asphyxia spinalis, 185.
 Asphyxia suspenforum, 190.
 Asthenia a hydrocephalo, 187.
 Asthma catarrhale, 228.
 Asthma febricosum, 231.
 Asthma a gibbo, 229.
 Asthma metallicum, 230.
 Asthma pneumodes, 228.
 Asthma a polypo cordis, 230.
 Asthma pulverulentorum, 230.
 Atrophia febrisequa, 268.
 Atrophia infantilis, 268.
 Atrophia rachitica, 268.

C

- Cardialgia inflammatoria, 111.
Cardialgia sputatoria, 233.
Catarrhus Bellinfulanus, 97.
Cephalaea febricosa, 64.
Cephalalgia catarrhalis, 174.
Cephalalgia inflammatoria, 91.
Cephalalgia intermittens, 64.
Cholera ficca auriginosa, 237.
Convulsio Indica, 212.
Convulsio a nervi punctura, 215.
Convulsio raphania, 218.
Convulsio ab ustilagine, 219.

D

- Diarrhoea carnosa, 180.
Dysenteria a cathartics, 181.
Dysenteria a mesenterii vomica, 244.
Dysenteria Parisiaca, 181.

E

- Eclampsia febricosa, 50.
Eclampsia typhodes, 217.
Enteritis mesenterica, 110.
Ephemera Britannica, 77.

- Ephemera dichomene, 63
 Ephemera sudatoria, 77.
 Epilepsia febricosa, 50
 Erysipelas ambustio, 85.
 Erysipelas symptomaticum, 86.
 Erysipelas a vespis, 86.

H

- Hepatalgia apostematosa, 116.
 Herpes Zoster, 143.
 Hydrometra ovarii, 281.
 Hysteralgia febricosa, 64.
 Hysteria febricosa, 50.

I

- Ischias ex abscessu, 129.
 Ischias intermittens, 64.

L

- Lumbago apostematosa, 129.
 Lumbago ab arthrocaee, 129.
 Lumbago psoadica, 129.

M

- Menorrhagia difficilis, 360.

- Miliaris nautica, 74.
Miliaris purpurata, 74.
Miliaris sudatoria, 78.
Mutitas a glossolyfi, 194.

N

- Nephralgia arenosa, 117.
Nephralgia arthritica, 117.
Nephralgia calculosa, 117.
Nephralgia febricosa, 64.
Nephralgia purulenta, 117.
Nephralgia rheumatica, 119.

O

- Ophthalmia febricosa, 64.
Orthopnoea hysterica, 226.
Orthopnoea spasmodica, 226.

P

- Phrenitis apyreta, 263.
Phrenitis inanitorum, 262.
Pleuritis hepatica, 115.
Pleuritis periodica, 51.
Pleuritis splenica, 116.
Pleurodyne parapleuritis, 104.
Pleurodyne verminosa, 106.

G g g

- Pleurodyne vomica, 106.
 Pfydracia a vespis, 86.
 Pyuria arthritica, 357.
 Pyuria mucosa, 357.
 Pyuria viscida, 357.

Q

- Quotidiana deceptiva, 53.
 Quotidiana epileptica, 50.
 Quotidiana foporosa, 49.

S

- Scarlatina anginosa, 138.
 Scelotyrbe festinans, 216.
 Scelotyrbe verminosa, 216.
 Scrophula mesenterica, 267.
 Splenalgia suppuratoria, 116.
 Synocha catarrhalis, 174.
 Synocha miliaris, 79.
 Synocha dysenteriodes, 80.
 Synochus hiemalis, 70.
 Synochus pleuritica, 70. et 105.
 Synochus rheumatizans, 70.
 Synochus scorbutica, 71.

T

- Tabes dorsalis, 269.
Tabes a hydrope, 270.
Tabes nutricum, 269.
Tabes a sanguifluxu, 269.
Tabes fudatoria, 269.
Tabes syphilitica, 270.
Tetanus febricosus, 50.

V

- Variola lymphatica, 134.

F I N I S.



Preced 6/83

$\frac{20}{6}$
 $\frac{14}{77}$

$\frac{16}{12}$
 $\frac{4}{67}$

