

3 2044 106 366 586

F 1
42
H 83
1762

Library
Arnold Arboretum



of
Harvard University

Rebound February 1966



Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
BHL-SIL-FEDLINK

GULIELMI HUDSONI
Regiae Societatis Socii et Pharmacopæi Londinensis.

4300
11

Flora Anglica,

E X H I B E N S

P L A N T A S

P E R

Regnum Angliæ sponte crescentes,

D I S T R I B U T A S

Secundum Systema Sexuale :

C U M

DIFFERENTIIS SPECIERUM,
SYNONYMIS AUTORUM,
NOMINIBUS INCOLARUM,
SOLO LOCORUM,
TEMPORE FLORENDI,
OFFICIALIBUS PHARMACOPÆORUM.

L O N D I N I :

Impensis AUCTORIS : Prostant venales apud J.
NOURSE in the Strand, et C. MORAN in Co-
vent-Garden.

M.DCC.LXII.

திருவாறை நாயகர்கள்
முனியால் தோன்றுவதே

திருவாறை நாயகர்

திருவாறை நாயகர்
காட்டில் வாழி

ஏது என?

திருவாறை நாயகர் என்று
ஏது என்று என்று

திருவாறை நாயகர் என்று என்று

திருவாறை நாயகர் என்று
ஏது என்று என்று
திருவாறை நாயகர் என்று
ஏது என்று என்று
திருவாறை நாயகர் என்று
ஏது என்று என்று

திருவாறை நாயகர்

திருவாறை நாயகர் என்று என்று
ஏது என்று என்று என்று
ஏது என்று என்று

NOBILISSIMO VIRO

HUGONI COMITI

NORTHUMBRIAE,

ORDINIS PERISCELIDIS EQUITI, &c.

ARTIUM TUM UTILIUM,

TUM ELEGANTIORUM,

JUDICI ET PATRONO,

HOC OPUS HUMILLIME DEDICAT

Gul. Hudson.

DISCUSSION

BY J. H. DODD, M.A., F.R.S.

IN THE UNIVERSITY OF LIVERPOOL.

WITH A HISTORY OF THE DISCUSSIONS.

BY J. H. DODD, M.A., F.R.S.

IN THE UNIVERSITY OF LIVERPOOL.

WITH A HISTORY OF THE DISCUSSIONS.



PRÆFATIO.



AUCIS lectorem præfari nècessarium duxi, tum ut eum admonerem quid in hac Flora expectare debeat, tum ut notasquasdam compendii gratiâ usurpatas explicarem.

Fundamentum hujus operis quoad *Catalogum* plantarum Raji synopsis agnoscitur, et agnosci debet; quantulum enim intactum reliquit vir ille diligentissimus, accuratissimus, et addere licet, sagacissimus, confitentibus tum popularibus suis, tum exteris; qui floram ejus inter optimas et perfectissimas uno ore numerant? si nullum igitur post ejus tempora augmentum accepisset ipsa scientia botanica nihil pene pro plantis anglicanis dignoscendis ulterius desideraretur, quam nova

A 3 synop-

P R A E F A T I O.

synopseos editio, cuius exemplaria hodie a-pud bibliopolas omnino non inveniuntur. At exortum est his diebus novum fidus, quod orbi botanico lucem affudit ne in somnis qui-dem antea visam ; magnus scilicet ille Lin-næus, qui partes plantarum minutissimas, vel prius neglectas, vel non omnino obser-vatas in conspectum producendo, plene illus-trando, et rite nominando fundamentum je-cit novæ methodo simplici, compendiosæ, cerfæ; quam et constantiâ plane admirandâ toti regno vegetabili adhuc cognito feliciter applicuit.

Hunc igitur virum egregium quoad *me-thodum* per omnia, quatenus licuit, secutus sum.

Essentiales characteres ex Systemate natu-ræ edit. ultim. adduxi ; quando autem no-vum genus occurrebat, characterem natura-lem ad ejus exemplar, prout in *Genera plan-tarum* exhibetur adjunxi.

Quoad Synonyma, ut vocantur, sive Cha-racteres Specificos, primo loco eos adhibui quos idem author in *Species plántarum* dedit ; quotiescumque certum fuit eum plantam de-scripsisse ; aliter novum characterem, ejus vestigiis infistens construxi ; postea synony-ma adjeci ex Bauhini pinace, Raio, Gerardo, Parkinsono et variis authoribus hodier-nis deprompta.

Nomina plerumque Anglica ex Raio, Ge-rardo, &c. apposui ; quædam mutavi exemplo et

et hortatu Domini Stillingfleet motus, ut genericā obtinerem, quod optandum esset per omnia, ut confusione quæ hodie regnat finis aliquando imponatur; quando autem nulla occurrerant meo jure, ut opinor, imposui.

Quoad loca natalia plantarum satis duxi indicasse solum, quo maxime vulgares sponte proveniunt; locum vero rariorum semper notavi ex Raii Synopsi ultima Editione et ex observationibus sive propriis, sive amicorum.

Plantarum naturam quoad durationem indicavi Signis sequentibus; viz. ☉ annuam, ♂ biennem, ♀ perennem innuit.

Hoc signum ♂ fruticem vel arborem designat.

Numeri I, II, III, &c. tempus florendi indicant, viz. Januarium, Februarium, Martium, &c.

Plantas cultas non autem indigenas omnino omisi, ut Avenam sativam, Triticum sativum, Solanum tuberosum, &c.

Plantæ quæ sine culturâ non raro inveniuntur extra hortorum pomæria, sed quæ ab origine propagationem eorum reiectamentis debeat asterisco * distinguuntur.

Hanc occasionem lubens amplector gratias agendi amicis, qui mihi plantas pro eorum benevolentia suppeditarunt inter quos nominandi sunt Domini Alchorne, Bolton, Collinson, Lyons, Miller, Watson, M. D. Wilmer, M. D. præcipue vero D. Stillingfleet, qui et hoc et aliis amicitiae officiis privatim et publice functus est.

Cæterum quamvis nihil sciens prætermisſi quod confere potuit elucidando rem subjec-tam, non labori pepercit, nullam occasionem neglexi libros consulendi, herbaria ſicca e-volvendi et plantas vivas examinandi et deſ-ſecandi, ut opus omnibus numeris abſolu-tum prodiret; conſcius ſum tamen me nul-lo modo ſcopum attigiffe, præſertim quoad claſſem cryptogamium, quæ ad hæc uſque tempora quantum ſcio, obſcura manet, et mihi plurimum moleſtiæ creavit. In uno iſtiuſ claſſis ordine, viz. Fungorum me mul-tum deficere agnoſco; nec ſine aliis Dilleni-is, aliis Micheliiſ extricare ſe quisquam po-terit, cum hunc ordinem experientia edoctus affirmare poſſum, ut Linnæi verbiſ utar, eti-amnum Chaos eſſe, neſcientibus Botanicis in hiſ, quid ſit Species, quid Varietas.





Nomina Auctorum Explicata.

Act. paris. Memoires de l'Academie Royale des Sciences. Paris. 4to.

Act. Lond. Acta Philosophica Regiae Societatis Londonensis. Lond. 4to.

Act. upf. Acta Regiae Societatis Upsaliensis. Holmiae. 4to.

Amm. St. rar. ruth. Joannis Ammani Stirpium rariorū in Imperio Ruthenico, &c. Petrop. 1739. 4to.

Barr. Icon. Jacobi Barrelieri Icones Plantarum per Galliam, Hispaniam et Italiam observatarum. Paris. 1714. fol.

Blackf. spec. bot. J. Blackstone Specimen Botanicum. Lond. 1746. 8vo.

Blackf. cat. pl. ejusdem Catalogus Plantarum circa Harefield. Lond. 1737.

Bauh. pin. et pr. Caspari Bauhini Pinax et Prodromus Theatri Botanici. Basil. 1671. 4to.

Bauh.

NOMINA AUCTORUM EXPLICATA.

Baub. tb. Ejusdem Theatrum Botanicum. ibid.
1658.

Baub. bijf. Joannis Bauhini Historia Plantarum universalis. 3. Ebrod. 1650. fol.

Bocc. pl. rar. Pauli Boccone Plantarum rariorū Siciliæ Icones et Descriptiones. Oxon. 1674. 4to.

Bocc. mus. Ejusdem musæum Plantarum Rariorum. Venet. 1697. 4to.

Boerb. ind. Hermanni Boerhaave Index alter Plantarum. Lugdb. 1720. 4to.

Breyn. cent. Jacobi Breynii Centuria Plantarum Gedani. 1678. fol.

Breyn. cent. pr. Ejusdem Prodromus Fasciculus Plantarum. ibid. 1689. 4to.

Buddl. hort. sicc. Adami Buddleii Hortus Siccus Plantarum Angliæ.

Buxb. en. pl. hal. Joannis Christiani Buxbaum Enumeratio Plantarum in Agro Hallensi. Halæ Magdeb. 1721. 8vo.

Buxb. cent. Ejusdem Plantarum minus cognitarum Centuriæ quatuor. I. et II. 1728. III. 1729. IV. 1733. 4to. Petrop.

Cæsalp. Andreas Cæsalpinus de Plantis. Florent. 1583. 4to.

Cat. giss. Joannis Jacobi Dillenii Catalogus Plantarum circa gislam. Gissæ. 1719. 8vo.

Cat

NOMINA AUCTORUM EXPLICATA.

Cat. nott. Car. Deering Catalogus Plantarum circa Nottinghamiam. Nottingh. 1738. 8vo.

Cat. pl. angl. Joannis Raii Catalogus Plantarum Angliae. Lond. 1688. 12mo.

Cat. cant. Ejusdem Catalogus Plantarum circa Cantabrigiam. Cant. 1633. 12mo.

Cluf. Caroli Clusii Rariorum Stirpium per Hispaniam observatarum. Antw. 1601. fol.

Col. ecph. Fabii Columnæ Ecphrasis I. et II. minus cognitarum rariorumque Stirpium. Romæ. 1616. 4to.

Comm. cat. Joannis Commelini Catalogus Plantarum Hollandiæ. Amstel. 1685. 12mo.

Dalib. paris. M. Dalibardi Floræ Parisinæ prodromus. Paris. 1750. 8vo.

Dill. musc. Joannis Jacobi Dillenii Historia Muscorum. Oxon. 1741. 4to.

Dalech. lugd. Jacobi Dalechampii Historia generalis Plantarum. Lugd. 1584. fol.

Dod. pempt. Remberti Dodonæi Stirpium Historiæ Pemptades Sex. Antw. 1616.

Fl. jen. Henrici Bernhardi Ruppii Flora Jenensis. Francofurt. 1726. 8vo.

Fl. sibir. Joannis Georg. Gmelini Flora Siberica. 2. Petrop. 1750. 4to.

Fl. suec. Caroli Linnæi Flora Suecica. Ed. I. Lugdb. 1745. II. Stockh. 1755. 8vo.

NOMINA AUCTORUM EXPLICATA.

Fl. lapp. Ejusdem Flora Lapponica. Amst. 1737.
8vo.

Fl. pruss. Joannis Loefelii Flora Prussica. Regimont.
1703. 4to.

Fuchs. Leonardi Fuchsii Historia Plantarum. Basil.
1542. fol.

Ger. Em. Joannis Gerardi Historia Plantarum a Thoma Johnson Emaculata. Lond. 1633. et 1636. fol.

Gron. virg. Joannis Fred. Gronovii Flora Virginica. 2.
Leid. 1739. 8vo.

Gled. fung. Joan. Gottlieb. Gleditchii Methodus Fun-
gorum. Berol. 1753. 8vo.

Guett. stamp. D. Guettardus Observations sur les Plan-
tes. 2. Paris. 1747. 12mo.

Hist. ox. Roberti Morisoni et Jacobi Bobartii Historia
Plantarum Oxonensis. 3. Oxon. 1680.

Hall. helv. Alberti Halleri Enumeratio Stirpium Helve-
ticarum. Gotting. 1742. fol.

Hort reg. monspel. Petri Magnol. Hortus Regius Mons-
peliensis. Monsp. 1697. 8vo.

Johns. Thomae Johnsoni Itinera Botanica. Lond. 1632.
1634. 8vo.

Lin. gen. pl. Caroli Linnæi Genera Plantarum. Lugdb.
1752. 8vo.

Lin. phil. bot. Ejusdem Philosophia Botanica. Holmiæ.
1751. 8vo.

Lin.

NOMINA AUCTORUM EXPLICATA.

Lin. hort. upf. Ejusdem Hortus Upsaliensis. Holmiæ.
1748. 8vo.

Lin. hort. cliff. Ejusd. Hortus Cliffortianus. Amstel.
1737. fol.

Lin. virid. cliff. Ejusd. Viridiarum Cliffortianum. Am-
stel. 1737. 8vo.

Lin. mat. med. Ejusd. Materia Medica. Holmiæ. 1749.
8vo.

Lin. it. oeland. Ejusd. Iter Oelandicum. Holmiæ. 1745.
8vo.

Lin. it. W-goth. Ejusd. Iter Westrogothicum. Holmiæ.
1745. 8vo.

Lin. it. scan. Ejusd. Iter Scanicum. Holmiæ. 1751. 8vo.

Lin. amoen. acad. Ejusd. Amoenitates Academicæ. I.
Lipsiæ. 1749. II. Holmiæ. 1751. III. Amstel. 1756.
IV. et V. Lugdb. 1760. 8vo.

Lin. spec. pl. Ejusd. Species Plantarum. Holmiæ. 1753.

Lob. ic. Matthiæ Lobelii Icones Plantarum. Antw.
1581. 4to.

Lob. ob. et adv. Ejusdem Observationes et Adversaria.
Lond. 1605. fol.

Magn. bot. monsp. Petri Magnol Botanicum Monspeli-
ense. Monspel. 1686. 8vo.

Mart. cent. Joannis Martyn Centuria Plantarum. Lond.

Mart. tourn. Ejusd. Tournefort's History of Plants. 2.
Lond. 1732.

Mentz. pug. ic. Christiañi Mentzelii Index Plantarum et
Pugillus. Berol. 1696. fol.

Merr.

NOMINA AUCTORUM EXPLICATA.

Merr. pin. Christophori Merret Pinax Rerum Naturalium Britannicarum. Lond. 1667. 8vo.

Mich. nov. gen. Petri Antonii Michelii Nova Plantarum Genera. Florent. 1729. 4to.

Park. Joannis Parkinsoni Theatrum Botanicum. Lond. 1640. fol.

Park. par. Ejusd. Paradisus Terrestris. Lond. 1656. fol.

Phyt. Brit. Phytologia Britannica. Lond. 1650.

Pet. herb. br. Jacobi Petiveri Herbarium Britannicum. Lond. fol.

Pet. Gaz. Ejusd. Gazophylaceum. 2. vols. fol. Lond. 1711.

Pet. conc. gr. Ejusd. Concordia Graminum. Lond. fol.

Pet. mus. Ejusd. Musaeum. Lond. 1703. 8vo.

Pluk. alm et phyt. Leonardi Pluknetii Almagestum Botanicum et Phytographia. Lond. fol. diverso tempore edita.

Pont. Julii Pontideræ Compendium Tabularum Botanicarum. Patavii. 1720. 4to.

R. Syn. Joannis Raii Synopsis Methodica Stirpium Britannicarum. Ed. I. 1690. II. 1696. III. Lond. 1724. 8vo.

R. hist. Ejusd. Historia Plantarum. 3. Lond. 1686. et 1704. fol.

R. meth. Ejusd. Methodus Plantarum emendata et aucta. ibid. 1703. 8vo.

Riv. irr. mon. ic. Augusti Quirini Rivini Ordines Plantarum Flore Irregulari Monopetalio, Tetrapetalio et Pentapetalio. Lipsiae 1691. et 1699. fol.

Rox.

NOMINA AUCTORUM EXPLICATA.

Roy. lugdb. Adriani Van Royen Floræ Leidensis Prodromus. Lugdb. 1740. 8vo.

Sauv. monsp. Fr. Sauvages Flora Monspeliensis. Hagæ. 1751. 8vo.

Sch. agr. Joannis Jacobi Scheuchzeri Agrostographia, sive Graminum Juncorum Cyperorum Cyperoidum iisque affinium Historia, Tigurii. 1719. 4to.

Sibb. scot. il. Roberti Sibbaldi Scotia Illustrata. Edinb. 1684 fol.

Spig. Isag. Andreæ Spigelii Isagoge in Rem Herbariam. Lugdb. 1633.

Tab. Jacobi Théodori Tabernæmontani Icones Plantarum. Franc. 1690. 4to.

Trag. Hieronymi Tragi Stirpium Historia. Argentor. 1552. 4to.

Turn. Gulielmi Turneri Historia Plantarum. Lond. 1551.

Tourn. Josephi Pitton Tournefort Institutiones Rei Herbariae. Paris. 1700. 4to.

Vaill. paris. Sebastiani Vaillant Botanicon Parisiense. Lugdb. et Amstel. 1727. fol.



ERRATA.

PAG. 5. l. 30. pro calycbus lege calycibus. p. 19. l. 4. palustre. p. 22. l. 6. muticis. p. 29. l. 30. aristate. p. 32. l. 13. pratinus. p. 38. l. 26. nemoralis. p. 39. l. 6. paniculato. p. 44. l. 21. et in pratis. p. 47. l. 30. prato. p. 48. l. 7. salinas et antiquas. ib. cis. p. 52. l. 4. subovata. p. 62. l. 14. Gras. p. 69. l. 12. pinguibus. p. 75. l. 21. ne una. p. 78. l. 6. deciduus. p. 79. l. 12. Belladonna. p. 90. l. 1. petiolis. p. 95. l. 19. capitales. p. 96. l. 9. umbella. p. 97. l. 2. Involucra umbellis. p. 98. l. 5. radiatæ. ib. l. 6. suborbicularis. p. 104. l. 10. subhumidas. p. 105. l. 28. addé, Anglis; Hemlock Dropwott. p. 109. l. 1. cerefolium. p. 123. l. 13. flores. p. 136. l. 2. Eboracensis, Westmorlandicis, Cumberlandicis. p. 410. l. 26. terminali. p. 144. l. 2. filamenta. p. 145. l. 34. chamælea. p. 156. l. 5. coloratus. p. 161. l. 16. unifloro. p. 167. l. 9. polysperma. p. 168. l. 1. paniculato. ib. 40. Triplo. p. 169. l. 3. murum. ib. 26. culiculatis. p. 170. l. 33. minimum. p. 179. l. 20. Lythrum. p. 186. l. 6. prominentibus. p. 188. l. 4. beam. p. 189. l. 24. pomis basi. p. 195. l. 37. præsertim ubi &c. p. 210. l. 2. unguis. p. 220. l. 16. Nep. p. 225. l. 26. floralibus. p. 226. l. 31. lateribus. p. 229. l. 24. bilabiati. p. 242. l. 19. brevior. p. 250. l. 29. Iris. p. 255. l. 13. codded. p. 256. l. 28. fugacissimus. p. 259. l. 22. Apulus. p. 268. l. 1. in littoribus. p. 287. l. 6. lupulinum. ib. 19. deflecteus. p. 309. l. 14. aristis. ib. 17. flosculosis. p. 318. l. 10. folii. p. 332. l. 17. dele ad. p. 342. l. 26. linearis. p. 344. l. 23. petiolatis. p. 354. l. 22. Betula. p. 361. l. 7. dele *. ib. 14. adde *. ib. 21. adde *. p. 370. l. 19. Germina. p. 372. l. 13. tria. p. 384. l. 16. Pteris. p. 399. l. 14. individuo. ib. 21. incubitu. p. 404. l. 39. aggeres. p. 406. l. 15. scoparium. p. 410. l. 10. adde short Bryum. p. 437. l. 2. foliolo. p. 440. l. 5. Anthera. p. 448. l. 26. ater. p. 490. l. 13. fluvialis. p. 495. l. 32. truncis.

MONANDRIA MONOGYNIA.

Classis I.

MONANDRIA

MONOGYNIA.

SALICORNIA *Lin. Gen. plant.* 10.

Calyx ventriculosus, integer. *Petala nulla, Semen unicum.*

SALICORNIA articulis apice crassioribus obtusis. *europaea.*
Lin. mat. med. 8. *Sp. plant.* 3.

Salicornia geniculata annua. *Tourn.* 51. *R. Syn.* 136.

Kali geniculatum annum. *Baub. pin.* 289. *Ger. Em.* 535. *Park.* 280.

β Kali geniculatum perenne fruticosius procumbens. *R. Syn.* 136.

γ Salicornia myosuroides procumbens, surculis longissimis. *R. Syn.* 137.

δ Salicornia ramosior procumbens, foliis brevibus purpurascens. *R. Syn.* 137.

ε Salicornia erecta, foliis brevibus cupressiformibus. *R. Syn.* 137.

Anglis, Marsh Sampire, Jointed Glasswort, or Saltwort.

Habitat in littoribus maritimis frequens. ☽ VIII. IX.

HIPPURIS *Lin. Gen. pl.* 11.

Calyx nullus, *Petala nulla, Stigma simplex. Semen unicum.*

HIPPURIS. *Fl. lapp. 1. Fl. suec. 2. Sp. Pl. 4.* *vulgaris.*

Limnopeuce. *Cord. hist.* 150. *R. Syn.* 136.

Equisetum palustre, brevioribus foliis, polyspermum.
Baub. pin. 15.

Cauda equina fæmina. *Ger. Em.* 1114.

Equisetum palustre alterum brevioribus setis. *Park.* 1200.

MONANDRIA DIGYNIA.

Anglis Mare's-tail.

*Habitat in fontibus, paludibus, solo profundo limoso,
in stagnis prope Hornsey. 24. V.*

D I G Y N I A.

CALLITRICHE *Lin. Gen. pl. 13.*

Calyx nullus. Petala duo. Semen unicum ovale, nudum.

verna.

I. CALLITRICHE foliis superioribus ovalibus, floribus androgynis. *Lin. Syst. Nat. 844.*

Stellaria. Cat. Giff. app. 119. t. 6. R. Syn. 289.

Stellaria aquatica. Baub. pin. 141. Park. 1282.

Alfinae palustris serpyllifolia. Ger. Em. 614.

β *Stellaria minor et repens. Cat. Giff. 120. R. Syn. 289.*

Anglis, vernal Starwort, Star-headed Water Chickweed.

Habitat in fossis et aquis quietis ubique. ⊖. IV.---VIII.

Autumnalis.

2. CALLITRICHE foliis omnibus linearibus apice bifidis, floribus hermaphroditis. *Lin. Syst. Nat. 844.*

*Stellaria aquatica longifolia. Pet. H. br. t. 6. f. 4.
R. Syn. 290.*

Lenticula aquatica angustifolia, folio in apice dissecto.

Fl. pr. 140. t. 38.

Anglis, Autumnal Starwort.

Habitat cum priore frequens. ⊖. IX.

Classis

Classis II.

D I A N D R I A

M O N O G Y N I A.

* *Flores inferi, monopetalii, regulares.*

LIGUSTRUM. 18.

Corolla quadrifida. Bacca tetrasperma.

LIGUSTRUM. *Hort. cliff. 6. Fl. suec. 5. Sp. pl. vulgare.*
76. *J. Bauh. hist. I. 528. Ger. Em. 714. Park.*
1446. *R. Syn. 465.*

Ligustrum germanicum. Bauh. pin. 475.

Anglis, Privet, or Prím.

Habitat in sylvis et sepibus. h. V.

** *Flores inferi, monopetalii, irregulares. Fructus capsulares.*

VERONICA. 25.

Cor. quadrifida rotata : lacinia infima angustiore. Capsula bilocularis.

* *Spicatæ.*

I. VERONICA spica terminali, foliis oppositis crenatis obtusis ; caule adscendente simplicissimo. *Sp. pl. 10. Fl. suec. 10.*

Veronica spicata minor. Bauh. pin. 247. R. Syn. 279.

Veronica recta minima. Ger. Em. 527.

Veronica erecta angustifolia. Park. 550.

Anglis, Upright spiked male Speedwell, or Fluellin.

Habitat in pratis et pascuis. In several Closes adjoining to Newmarket Heath, beyond Botleham. R. Syn. in pascuis circa Horseheath Hall, in comitatu Cantabrigiensi. D. Miller. 2 VI.

DIANDRIA MONOGYNIA.

- hybrida.* 2. VERONICA spica terminali, foliis oppositis obtuse ferratis, caule erecto. *Sp. pl.* II.
Veronica spicata Cambrobritanica, bugulæ subhirsuto folio. *R. Syn.* 278. t. II.
Anglis, Welsh Speedwell.
Habitat ad latera montis cuiusdam, Craig Wreidhin diæti in comitatu Montis Gomerici Walliae, D. Lhwyd invenit 4. VII.
- officinalis.* 3. VERONICA spicis lateralibus pedunculatis, foliis oppositis, caule procumbente. *Sp. pl.* II.
Veronica mas supina et vulgarissima. *Bauh. pin.* 246. *R. Syn.* 281.
Veronica vera et major. *Ger. Em.* 626.
Veronica mas vulgaris et supina. *Park.* 550.
Anglis, male Speedwell.
Habitat in pascuis sterilibus et ericetis. 4. V.
Pharm. *Veronicaæ Herba.*
 ** *Corymboſo-racemosæ.*
- serpyllifo-* 4. VERONICA racemo terminali subspicato, foliis ovatis glabris crenatis. *Sp. pl.* 12.
Veronica pratensis serpyllifolia. *Bauh. pin.* 247.
Veronica pratensis minor. *Park.* 551. *R. Syn.* 279.
Veronica minor. *Ger. Em.* 627.
Veronica fæmina quibusdam, aliis Betonica Pauli serpyllifolia. *Bauh. hist.* III. 366.
Anglis, Paul's Betony, little or smooth Speedwell.
Habitat in pratis et pascuis passim. 4. V.
- Becabun-* 5. VERONICA racemis lateralibus, foliis ovatis planis, caule repente. *Fl. suec.* 14. *Sp. pl.* 12.
Veronica aquatica rotundifolia, Becabunga dicta minor. *R. Syn.* 280.
Anagallis aquatica minor, folio subrotundo. *Bauh. pin.* 252.
Anagallis aquatica vulgaris, sive Becabunga. *Park.* 1236.
Anagallis, sive Becabunga. *Ger. Em.* 620.
Anglis, common Brooklime.
Habitat in fossis et rivulis. 4. VI.
Pharm. *Becabungæ Herba.*

DIANDRIA MONOGYNYA.

5

6. VERONICA racemis lateralibus, foliis lanceolatis *Anagallis ferratis*, caule erecto. *Sp. pl. 12. Fl. suec. 13.* lis. Δ.
Veronica aquatica longifolia media. *R. Syn. 280.*
Anagallis aquatica minor folio oblongo. *Baugh. pin.*
- 252.
- Anagallis aquatica folio oblongo crenato.* *Park. 1237.*
Anagallis aquatica minor. *Ger. Em. 620.*
Anglis, long-leaved Water-speedwell.
Habitat in fossis et palustribus. 24. VII.
7. VERONICA racemis lateralibus, pedicellis pendulis, *scutellata*.
foliis linearibus integerimis. *Sp. pl. 12. Fl. suec. 17.*
Veronica aquatica angustifolia minor. *R. Syn. 280.*
Anagallis aquatica angustifolia scutellata. *Baub. pin.*
- 252.
- Anglis, narrow-leaved Water-speedwell.*
Habitat in palustribus, in ericeto Hampstediano et Putnejano, 24. VI.
8. VERONICA floribus racemosis lateralibus, foliis *chamaedryoides*, ovatis rugosis dentatis sessilibus, caule debili. *Sp. drys. pl. 13.*
Veronica foliis oppositis plicatis dentatis, scapis ex alis inferioribus laxe spicatis. *Hort. Cliff. 8.*
Chamædrys sylvestris. *Ger. Em. 657. R. Syn. 281.*
Chamædrys spuria minor rotundifolia. *Baub. pin.*
- 249.
- Chamædrys spuria sylvestris.* *Park. 107.*
Anglis, wild Germander.
Habitat in pratis et pascuis. 24. V.
9. VERONICA racemis lateralibus paucifloris calycbus *montana*, hirsutis, foliis ovatis rugosis crenatis petiolatis, caule debili. *Cent. 1. Syst. N. 849.*
Veronica chamædryoides foliis pediculis oblongis insidentibus. *R. Syn. 281.*
Chamædrys spuriae affinis, rotundifolia scutellata. *Baub. pin. 249.*
Anglis, stalked Speedwell. *Pet. H. Br. t. 51. f. 4.*
Habitat in sylvis humidis et ad sepes, in Charlton Wood, the lower part, plentifully. Mr. J. Sherard. *R. Syn. 24. V.* *** Pe-

DIANDRIA MONOGYNIA.

*** *Pedunculis unifloris.*

arvensis. 10. VERONICA floribus solitariis, foliis cordatis incisis sessilibus.

Veronica floribus solitariis, foliis cordatis incisis pedunculo longioribus. *Sp. pl. 13. Fl. suec. 20.*

Veronica flosculis singularibus, caulinis adhaerentibus. *R. Syn. 279.*

Al sine veronicæ foliis, flosculis caulinis adhaerentibus. *Baub. pin. 250.*

Al sine foliis veronicæ. *Ger. Em. 613.*

Al sine foliis subrotundis veronicæ. *Park. 762.*

Anglis, Speedwell or Chickweed.

Habitat in agris et muris antiquis. ☐. V.

agrestis. 11. VERONICA floribus solitariis, foliis cordatis incisis petiolatis.

Veronica floribus solitariis, foliis cordatis incisis pedunculo brevioribus. *Sp. pl. 13. Fl. suec. 16.*

Veronica floribus singularibus, in oblongis pediculis, Chamædryfolia. *R. Syn. 279.*

Al sine foliis Triflaginis. *Ger. Em. 616. Park. 764.*

Al sine chamædryfolia, flosculis pediculis oblongis indentibus. *Baub. pin. 250.*

Anglis, Germaner-speedwell, or Chickweed.

Habitat in arvis ruderatis, cultis frequens. ☐ V.

hederifolia. 12. VERONICA floribus solitariis, foliis cordatis planis quinquelobis. *Sp. pl. 13. Fl. suec. 21.*

Veronica flosculis singularibus, Hederulæ folio, Morus gallinæ minor dicta. *R. Syn. 280.*

Al sine Hederulæ folio. *Baub. pin. 250.*

Al sine Hederulæ folio minor. *Park. 760. 762.*

Al sine hederacea. *Ger. Em. 616.*

Anglis, Ivy-leaved Speedwell, or small Henbit.

Habitat in agris ruderatis, cultis frequens. ☐ IV. V.

triphylos. 13. VERONICA floribus solitariis, foliis digitato-partitis pedunculo brevioribus. *Sp. pl. 14. Fl. suec. 22.*

Veronica foliis alternis: inferioribus quinque partitis, superioribus tripartitis, floribus solitariis. *Hort. cliff. 9.*

Veronica

Veronica flosculis singularibus, foliis laciniatis, erecta.

R. Syn. 280.

Al sine triphyllos cœrulea. *Bauh. pin. 250.*

Al sine triphyllos sive laciniata. *Park. 760.*

Al sine recta. *Ger. Em. 612.*

Anglis, Trifid Speedwell.

Habitat in arvis arenosis, at Rowton in Norfolk, betwixt the town and the highway, twelve miles before you come to Norwich; and at Methwold in Suffolk, between the two windmills and the warren lodge, &c.

J. Willisel. *R. Syn. Θ. V. VI.*

PINGUICULA. 28.

Cor. ringens, calcarata. *Cal. bilabiatus, quinquefidus.* *Capf. unilocularis.*

1. PINGUICULA nectario cylindraceo longitudine petali. *Fl. lapp. 11. Fl. suec. 21. Sp. pl. 17. Roy. lugdb. 304.*

Pinguicula Gesneri. *Bauh. Hist. III. 546. R. Syn. 281.*

Pinguicula sive sanicula Eboracensis. *Park. 532. Ger. Em. 788.*

Sanicula montana flore calcari donato. *Bauh. pin. 243.*

Anglis, Butterwort, or Yorkshire Sanicle.

Habitat in uliginosis in comitatibus Eboracensi, Westmorlandico, Cumberlandico, &c. on Shooter's Hill, and the little bog at Charleton. *R. Syn. 4. V.*

2. PINGUICULA nectarii apice incrassato. *Sp. pl. 17. lusitanica.*

Pinguicula flore minore carneo. *R. Syn. 281. Hist.*

I. 752.

Viola palustris; Pinguicula dicta; lusitanica. *Grif. lusit.*

Anglis, Cornwal Butterwort.

Habitat in Cornubia locis palustribus circa Kilkhampton, et alibi. *R. Syn. 4. V.*

UTRICULARIA. 29.

Corolla ringens, calcarata. *Cal.* diphyllus, æqualis.
Caps. unilocularis.

vulgaris. 1. UTRICULARIA nectario conico. *Fl. lapp.* 14. *Sp.* pl. 18. *Fl. suec.* 24.

Lentibularia. *Riv. mon.* 78. *R. Syn.* 286.

Millefolium aquaticum lenticulatum. *Bauh. pin.* 141.

Millefolium aquaticum flore luteo galericulato. *Bauh. hist. III.* 783. *Park.* 1258.

Millefolium palustre galericulatum. *Ger. Em.* 828.

Anglis, Common-hooded Milfoil.

Habitat in aquis stagnantibus, paludibus et fossis, in stag-
nis prope Hornsey. *4. VI. VII.*

minor. 2. UTRICULARIA nectario carinato. *Fl. suec.* 29.
Sp. pl. 18.

Lentibularia minor. *Pet. H. Br. t.* 36. *f. 12.* *R. Syn.* 286.

Millefolium palustre galericulatum minus, flore mi-
nore. *Pluk. Ph. t.* 99. *f. 6.*

Anglis, lesser-hooded Milfoil.

Habitat in fossis et paludibus limosis. Found by Mr.
Dent on Faversham-moor in Cambridgeshire. Both
sorts observed by Mr. Lawson in the Ditches by the
Causeway over the Moss to the Fell-end, near Wi-
therslack, Westmorland; in the River on Hounslow
Heath, by Mr. Dandridge. *R. Syn.* 4. VI. VII.

*** Flores inferi, monopeiali, irregulares, Fructus
gymnospermi.

LYCOPUS. 31.

Cor. quadrifida: lacinia unica emarginata. *Stam.*
distantia. *Sem.* quatuor, retusa.

europæus. LYCOPUS foliis sinuato-serratis. *Sp. pl.* 21. *Fl.*
suec. 31.

Lycopus palustris glaber. *Tourn.* 191. *R. Syn.* 236.

Marrubium palustre glabrum. *Bauh. pin.* 230.

Marrubium aquaticum. *Ger. Em.* 700. *vulgare Park.*
1230.

Anglis,

DIANDRIA MONOGYNIA.

9

Anglis, Water Horehound.

Habitat ad ripas fluviorum et lacuum, solo sabulojo.

24. VII.

S A L V I A. 36.

Cor. inæqualis. Filamenta transverse pedicello affixa.

1. SALVIA foliis cordato-oblongis crenatis : summis *pratensis* amplexicaulibus, verticillis subnudis, corollis galea glutinosis. Sp. pl. 25. Fl. suec. 32.

Sclarea pratensis foliis ferratis, flore cœruleo. Tourn.

179. R. Syn. 237.

Horminum pratense foliis ferratis. Bauh. pin. 238.

Horminum sylvestre vulgare. Park. 55.

Horminum sylvestre Fuchsi. Ger. Em. 760.

Anglis, Meadow Clary.

Habitat in septo Cobhamiano in Essexia, a D. Watson observatus. 24.

2. SALVIA foliis sinuato-ferratis, corollis calyce angust-verbenacea X tioribus. Sp. pl. 25.

Horminum sylvestre Lavendulæ flore. Bauh. pin.

239. Park. 57. R. Syn. 237.

Horminum sylvestre. Ger. Em. 760.

Anglis, common English wild Clary.

Habitat in pratis et pascuis frequens. 24. V. *

Pharm. Hormini semina.

**** Flores superi.

C I R C Æ A. 24.

Corolla dipetala. Calyx diphyllo superus. Sem. unum biloculare.

1. CIRCÆA caule erecto, racemis pluribus. Sp. pl. 9. *lutetiana*.
Fl. suec. 6.

Circæa lutetiana. Lob. ic. 266. Ger. Em. 351. R.
Syn. 289.

Circæa lutetiana major. Park. 351.

Solanifolia Circæa dicta major. Bauh. pin. 168.

Anglis, Enchanters Nightshade.

Habitat in locis umbrosis humidis et ad sepes passim. 24.
VI, VII.

2. C I R -

* About Sudbury in Suffolk; Andover in Hants.

DIANDRIA MONOGYNIA.

x alpina. 2. CIRCÆA caule adscendente, racemo unico. Sp. pl. 9. Fl. suec. 7.

Circæa calyce colorato. Fl. lapp. 3.

Circæa minima foliis brevioribus dentatis Hall. helv. 456.

Circæa lutetiana minor. Park. 351.

Circæa minima. Column. Ecphr. 2. p. 79. t. 80.

Solanifolia Circæa alpina. Bauh. pin. 168.

Anglis, Mountain Enchanters Nightshade.

Habitat ad radices monium in Comitatibus Westmorlandico, Eboracensi, &c. circa Dallam Tower in agro Westmorlandico. 4. VII. At the foot of Broadway-Hills, before one comes into Broadway the -

D I G Y N I A.

ANTHOXANTHUM. 40.

Cal. Gluma bivalvis, uniflora. Cor. Gluma bivalvis, acuminata. Sem. unicum.

odoratum. 1. ANTHOXANTHUM spica oblonga ovata, flosculis subpedunculatis arista longioribus. Sp. pl. 28. Fl. suec. 33.

Gramen vernum spica brevi laxa. R. Syn. 389. 398.

Gramen pratense spica flavescente. Bauh. pin. 3. Th. 44.

Gramen Anthoxanthon spicatum. Bauh. Hist. II. 466.

Gramen alopecurum vernum pratehse, spica flavescente. Hist. Ox. III. p. 193. f. 8. t. 7. f. 25.

Anglis, vernal, or Spring Grass.

Habitat in pratis et pasuis 4. V.

B U F O N I A. 41.

Cal. Tetraphyllus. Cor. 4petala. Caps. unilocularis bivalvis disperma.

tenuifolia. 1. BUFONIA. Sp. pl. 123.
Alfinoides. R. Syn. 346.

Herniaria

DIANDRIA DIGYNIA.

11

Herniaria angustissimo gramineo folio, erecta. *Magn-Hort.* 97. t. 97.

Alsine polygonoides tenuifolia, flosculis ad longitudinem caulis velut in spicam dispositis. *Pluk. Ph. t. 75. f. 3.*

Anglis, Bastard Chickweed.

Habitat in maritimis circa Bostoniam agri Lincolnensis. On Hounslow-heath. Mr. Doody. *R. Syn. 24. V.*

Classis

Glossis III.

TRIANDRIA

MONOGYNIA.

* *Flores superi.*

VALERIANA. 43.

Cal. nullus. *Cor.* monopetala, basi hinc gibba, supera. *Sem.* unicum.

- officinalis.* 1. VALERIANA floribus triandris, foliis omnibus pinnatis. *Mat. Med.* 21. *Sp. pl.* 31. *Fl. suec.* 34.
Valeriana sylvestris major. *Baub. pin.* 164. *Fl. lapp.* 14. *Ger. Em.* 1075. *Park.* 122. *R. Syn.* 200.
 β *Valeriana sylvestris major montana.* *Baub. pin.* 164.
Anglis, Great wild Valerian.
Habitat in sepibus, sylvis, paludibus, frequens. β *in pascuis montosis.* 24. VI.
Pharm. Valerianæ Radix.
- dioica.* 2. VALERIANA floribus triandris dioicis, foliis radicibus ovatis, caulinis pinnatis.
Valeriana floribus triandris dioicis, foliis pinnatis integrerrimis. *Sp. pl.* 31. *Fl. suec.* 35. *Syst. Nat.* 860.
Valeriana palustris minor. *Baub. pin.* 164.
Valeriana sylvestris minor. *Park.* 122. *Lob.* 715. *R. Syn.* 200.
Valeriana minor. *Ger. Em.* 1075. *Riv. mon.* 3.
 × β *Valeriana sylvestris seu palustris minor altera.* *R. Syn.* 200.
Anglis, small wild or marsh Valerian. *Both varieties in London.*
Habitat in pascuis humidis. 24. VI.
- Locusta.* 3. VALERIANA floribus triandris, caule dichotomo, foliis linearibus. *Sp. pl.* 33. *Fl. suec.* 36.
Valerianella arvensis præcox humilis semine compres-
fo. *Mor. Umb.* *R. Syn.* 201.

Vale-

TRIANDRIA MONOGYNIA.

13

- Valeriana campestris inodora major. *Baub. pin.* 165.
- Lactuca agnina.* *Ger. Em.* 310. *Park.* 812.
- β Valerianellæ vulgaris species major ferotina. *Mor. prælud.* 319.
- γ *Lactuca agnina* seu *Valerianella foliis ferratis.* *R. Syn.* 201.
Anglis, Lambs-lettuce, or Corn-sallet.
Habitat in arvis et agris. ♂. IV. V.

C R O C U S. 63.

- Cor. Sexpartita, æqualis. Stigmata convoluta.*
- *1. CROCUS spatha univalvi radicale, corollæ tubo *sativus.* longissimo. *Sp. pl.* 35.
- Crocus, *Baub. hist. II.* 637. *Ger. Em.* 151. *sativus.* *Baub. pin.* 651.
Anglis, Saffron.
Habitat in agro Cantabrigiensi, et Essexiensi Saffron-walden oppidum colitur. *R. Syn.* 24. VIII.
Pharm. Croci stigma.

I R I S. 57.

- Cor. Sexpartita. Petalis alternis reflexis. Stigmata petaliformia.*
- 1. IRIS corollis imberibus, petalis interioribus stigma-*Pseudacea-* te minoribus, foliis ensiformibus. *Syst. Nat.* 863. *russ.*
Sp. pl. 38. *Fl. suec.* 37.
Iris palustris lutea. *Ger. Em.* 50. *R. Syn.* 374.
Acorus adulterinus. *Bau. pin.* 34.
Acorus palustris, sive Pseudo-iris et Iris lutea palustris.
Park. 1219.
- β Iris palustris pallida. *R. Syn.*
Anglis, yellow water Flower-de-luce.
Habitat in uidis, fluviis, paludosis frequens. 24. VII.
Pharm. Acori palustris Radix.
- 2. IRIS corollis imberibus, petalis interioribus paten-tissimis, caule unangulato, foliis ensiformibus. *Syst. fætidissima.* *Nat.* 863. *Sp. pl.* 39.
Gladiolus fætidus. *Baub. pin.* 30.
Xyris. *Ger. Em.* 60. seu spatula fætida. *Park.* 256.
Anglis, stinking Gladdon, or Gladwyn.
Habitat

TRIANDRIA MONOGYNIA.

Habitat in sylvis et ad sepes, prope Hornsey; in sylva la prope Charleton in Cantio. 4. VI. VII.
Pharm. Iris foetidæ Radix.

*** Flores Graminei valvulis Glumæ calycinæ.

S C H O E N U S. 60.

Glumæ paleaceæ, univalves, congestæ. Cor. o. sem. unicum, subrotundum.

* Culmo tereti.

Mariscus. 1. SCHOENUS culmo tereti, foliis margine dorsoque aculeatis. Fl. suec. 38. Sp. pl. 42.

Cyperus longus inodorus germanicus. Bauh. pin. 14.

Cyperus longus inodorus sylvestris. Ger. Em. 29. Park. 1263. R. Syn. 426.

Pseudo-cyperus palustris foliis et carina ferratis. Sch. agrost. 376.

Anglis, long-rooted bastard Cyperus.

Habitat in paludibus; on Hinton Moor, near Cambridge, plentifully; also in boggy places by the river Thame at Dorsthill, near Tamworth, in Warwickshire; and by the sea side between Pensans and Marketjeu in Cornwall. 4. VII. VIII.

nigricans. 2. SCHOENUS culmo tereti nudo, capitulo ovato, involuci diphylli valvula altera subulata longa. Sp. pl. 43. Fl. suec. 39. Dalib. paris. 113.

Juncus laevis minor, panicula glomerata nigricante. Cat. pl. An. 174. R. Syn. 430. Hist. Ox. III. 243. t. 10. f. 28.

Gramen sparteum nigro capitulo. Merr. pin.

Anglis, round black-headed Bog-rush.

Habitat in paludibus cespitosis, et turfosis. 4. VI.

ferrugine- us. 3. SCHOENUS culmo tereti nudo, spica dupli, involuci valvula majore spicam æquante. Sp. pl. 43. Fl. suec. 40.

Juncello accedens graminifolia plantula capitulis Armeriae proliferæ. Lbwyd. R. Syn. 430.

Gramen Cyperoides minimum Caryophylli proliferæ capitulo simplici squamato. Hist. Ox. III. 246. t. 12. f. 40.

Anglis,

Anglis, brown bastard Cyperus.

Habitat in paludibus turfosis, on the mountains of Wales,
R. Syn. in Westmorlandia frequens. 4. VII.

** *Culmo triquetro.*

4. SCHOENUS culmo subtriquetro nudo, spica disticha, compres-
involutro monophyllo. Sp. pl. 43. sus.

Gramen cyperoides spica simplici compressa disticha.
Pluk. Ph. t. 34. f. 9. Sch. Agrost. 490. Hist. Ox.

III. 245. R. Syn. 425.

Anglis, compressed bastard Cyperus.

Habitat in paludibus cespitosis, in comitatu Westmor-
landico frequens; about Chisselhurst in Kent; and
in the Rill near Dulwich Wells. R. Syn. 4. VII.

5. SCHOENUS culmo subtriquetro folioso, floribus fas- albus.
ciculatis, foliis setaceis. Sp. pl. 44. Fl. suec. 41.

Cyperus minor palustris hirsutus, paniculis albis, pa-
leaceis. Hist. Ox. III. 239. t. 9. f. 39. R. Syn.

427.

Gramen cyperoides albis glumis. Merr. pin.

Gramen junceum leucanthemum. Ger. Em. 30.

Anglis, white flowered Rush-grass.

Habitat in palustribus. Mr. Doody observed it on Bag-
shot Heath; Mr. Petiver in a low bog between
Wickham and Croydon. R. Syn. in comitatibus,
Eboracensi, Lancastriensi ubique. 4. VII.

C Y P E R U S . 61.

Glumæ paleaceæ, distiche imbricatæ. Cor. o. Sem.
unicum nudum.

1. CYPERUS culmo triquetro folioso, umbella foliosa longus.
supera decomposita; pedunculis nudis, spicis al-
ternis. Roy. lugdb. 50. Mat. med. 29. Sp. pl. 45.

Cyperus longus. Ger. Em. 30. odoratus. Park. 145.
R. Syn. 425.

Cyperus odoratus radice longa. s. Cyperus Off. Bauh.
pin. 14.

Anglis, sweet Cyperus, or English Galingale.

Habitat in paludibus. Found by Mr. Newton, in the
isle

isle of Purbeck, Dorsetshire, near a chapel on the side that looks towards Portland island. R. Syn. 24. VII.

Pharmac. *Cyperi longi Radix.*

S C I R P U S. 62.

Glumæ paleaceæ, undique imbricatæ. Cor. o. Sem. unicum imberbe.

* *Spica unica.*

palustris. 1. SCIRPUS culmo tereti nudo, spica subovata imbricata. Sp. pl. 47.

Scirpus equiseti capitulo majori. Tourn. 528. R. Syn. 428. Sch. agr. 360.

Juncus equiseti capitulis, major. Bauh. pin. 12.

Juncus aquaticus capitulis equiseti. Park. 1196.

Juncus minor capitulis equiseti. Ger. Em. 34.

Anglis, Club-rush.

Habitat in fossis, paludibus, fluviis frequens. 24. VII.

cespitosus. 2. SCIRPUS culmo striato nudo, spica bivalvi terminali longitudine calycis, radicibus squamula interstinctis. Fl. suec. 43, Sp. pl. 48.

Scirpus montanus capitulo breviori. Tourn. 528. Sch. agr. 363. t. 7. f. 18. R. Syn. 429.

Juncus parvus palustris, cum parvis capitulis equiseti. Pluk. Ph. t. 406.

Anglis, Dwarf Club-rush.

Habitat in paludibus cespitosis; in pratis uidis et locis palustribus circa Middleton vicum in agro Warvicensi. Mr. Doody observed it in very dry places among Heath, and near a foot high. R. Syn. 24. VII.

acicularis. 3. SCIRPUS culmo tereti nudo setiformi, spica ovata bivalvi, seminibus nudis. Fl. suec. 44. Sp. pl. 48. Dalib. paris. 17.

Scirpus minimus capitulis equiseti. Cat. Giss. 165. R. Syn. 429.

Juncellus omnium minimus capitulis equiseti. Hist. Ox. III. 145. t. 10. f. 37. Pluk. Ph. t. 40. f. 7. *Anglis,* the least upright Club-rush.

Habita

Habitat in *palustribus*; in *ericeto* Hounsflejano *versus*
Hampton, invenit D. Doody. R. syn. 24. VIII.

4. SCIRPUS culmis teretibus nudis alternis caule folioso *fluitans*,
flaccido. Sp. pl. 48.

Scirpus foliis linearibus planis alternatim fasciculatis,
spica terminali. Guett. Stamp. 141.

Scirpus equiseti capitulo minor. Sch. agr. 365. t. 7.
f. 20. R. Syn. 431.

Juncellus, capitulis equiseti, minor fluitans. Bauh.
pin. 12.

Gramen junceum clavatum minimum. R. Hist. 1310.
Hist. Ox. III. 230. t. 10. f. 31. Pluk. Ph. t.
35. f. 1.

Anglis, floating Club-rush.

Habitat in *fossis* et *paludibus*, in the ponds of Wandsworth Common, next the new churchyard in Surrey.
24. VII. VIII.

** *Culmo tereti polystachio*.

5. SCIRPUS culmo tereti nudo, spicis ovatis pluribus *lacustris*,
pedunculatis terminalibus. Fl. suec. 46. Sp. pl. 48.

Scirpus palustris altissimus. Tourn. 528. R. Syn.
428.

Juncus maximus s. *Scirpus major*. Bauh. pin. 12.
theatr. 178.

Juncus laevis maximus. Park. 1191.

Juncus aquaticus maximus. Ger. Em. 35.

β *Juncus* s. *Scirpus medius*. Bauh. pin. 12.

γ *Juncus aquaticus major* caule carinato. Doody. R. Syn.

Anglis, Bull-rush.

Habitat in *stagnis* et *fluviis* frequens. 24. VII. VIII.

6. SCIRPUS culmo tereti nudo, spicis subglobosis glo- *Holoscho-*
meratis pedunculatis, involucro diphylo inæquali *enus*.
mucronato. Sp. pl. 49.

Scirpus maritimus, capitulis rotundioribus glomera-
tis. Tourn. 528. R. Syn. 429.

Juncus acutus maritimus, capitulis rotundis. Bauh.
pin. 11.

Juncus acutis maritimus alter. Park. 1196.

C

Anglis,

TRIANDRIA MONOGYNIA.

Anglis, Round-headed Bull-rush.

Habitat in litoribus maritimis. Found by Mr. Stephens in Brouton Boroughs in Devonshire; in Somersetshire and Hampshire. Pet. conc. gr. R. Syn. 429. 4. VII.

- setaceus*. 7. SCIRPUS culmo nudo setaceo, spicis lateralibus subsolitariis sessilibus. Sp. pl. 49. Fl. suec. 45.
Scirpus foliaceus humilis. C. Giff. 158. R. Syn. 430.
Juncellus omnium minimus. Chamæschænos. Lob. adv. 44. Hist. Ox. III. 232 t. 10. f. 23.
Juncellus inutilis sive Chamæschænos. Baub. pin. 12. pr. 22.
Gramen junceum minimum capitulo squamoso. Baub. pin. 6. pr. 13.
Gramen junceum maritimum exile Plimmostii. Park. 1270. ic. 1271. descr.
Anglis, the least Rush.
Habitat in arenosis humidioribus. ①. VII. VIII.

*** *Culmo triquetro, Panicula nuda.*

- mucronata*. 8. SCIRPUS culmo triquetro nudo acuminato, panicula conglomerata nuda. Sp. pl. 50.
Juncus acutus maritimus caule triangulo. Baub. pin. 11. pr. 22. Fl. 175. Park. 1194. Hist. Ox. 232. t. 10. f. 20.
Juncus acutus maritimus caule triquetro, rigido, mucrone pungente. Pluk. Ph. t. 40. f. 1. R. Syn. 429.
β. *Juncus acutus maritimus, caule triquetro maximo molli, procerior nostras*. Pluk. Ph. t. 40. f. 2.
Anglis, pointed Bull-rush.
Habitat in litoribus maritimis; ad ripam Thamesis fluvii tam infra quam supra Londinum. R. Syn. 4. VII. VIII.

**** *Culmo triquetro, Panicula falacea.*

- maritimus*. 9. SCIRPUS culmo triquetro, panicula congregata foliacea, spicularum squamis trifidis; intermedia subulata. Sp. pl. 51. Fl. suec. 47.

Cyperus

- Cyperus culmo triquetro, panicula foliacea, pedunculis simplissimis spicis confertis. *Roy. lugdb.* 50.
 Gramen cyperoides panicula sparsa majus. *Bauh.*
pin. 6.
 Gramen cyperoides palustris panicula sparsa majus.
Park. 1266. R. Syn. 425.
- 3 Cyperus rotundus inodorus Anglicus. *Bauh. pin. 14.*
Anglis, round rooted bastard Cyperus.
 Habitat in littoribus maritimis, et ad ripas fluviorum
 frequens. *4. VIII.*
10. SCIRPUS culmo triquetro folioso, umbella foliacea, *sylvaticus.*
 pedunculis nudis supra-decompositis, spicis confer-
 tis. *Sp. pl. 51. Fl. suec. 48.*
 Gramen cyperoides miliaceum *Bauh. pin. 6. Th. 90.*
 Pseudo-cyperus miliaceus. *Park. 1171.*
 Cyperus gramineus *Bauh. Hist. II. 504. R. Syn.*
426. miliaceus. Gér. Em. 30.
Anglis, Millet Cyperus-grass.
 Habitat in aquosis, et sylvi: humidis inter Hampstead
 et Highgate, by the Thame side near Tamworth in
 Warwickshire; in a brook near Haverford-west in
 Pembrokeshire. Mr. Dale observed it by the river
 Blackwater, at a Mill below Bocking in Essex. *R.*
Syn. 4. VII.

ERIOPHORUM. 63.

Glumæ paleaceæ, undique imbricatæ. *Cor. o. Sem. 1.*
lana longissima cinctum.

1. ERIOPHORUM culmis teretibus, foliis planis, spi- *polystachia.*
 cis pedunculatis. *Sp. pl. 52. Fl. suec. 49. Dalib. on.*
paris. 18.
 Eriophorum spicis pendulis. *Fl. lapp. 28. Roy.*
Lugdb. 51.
 Gramen pratense tomentosum panicula sparsa. *Bauh.*
pin. 4.
 Gramen tomentarium. *Ger. Em. 29.*
 Gramen juncum lanatum, vel juncus bombycinus
 vulgaris. *Park. 1271.*
 Linagrostis. *Tab. Hist. 599. R. Syn. 435.*
Anglis, Cotton-grass.

TRIANDRIA MONAGYNYIA.

Habitat in pratis humidis, paludibus, cespitosis. 4. VI.
VII.

vagina-
tum. 2. ERIOPHORUM culmis vaginatis teretibus, spica
paleacea. Sp. pl. 52. Fl. suec. 50. Dalib. pa-
rif. 18.

Juncus capitulo lanuginoso. f. Schœnolaguros. Baub.
pin. 12.

Gramen juncoides lanatum alterum Danicum. Park.
1271.

Anglis, Hare's-tail-rush.

Habitat in paludibus alpinis, solo cespitoso, in comitatu
Westmorlandico frequens. On the great bog beyond
Joan Cole's, towards Croydon, Mr. Sherard. R.
Syn. 4. II.—IV.

N A R D U S. 65.

Calyx nullus. Cor. bivalvis.

stricta. 1. NARDUS spica setacea recta. Sp. pl. 53. Fl. suec.
52.

Gramen sparteum juncifolium. Baub. pin. 5. R. Syn.
393.

Spartum parvum Batavicum et Anglicum. Park. 1199.
Spartum nostras parvum lobelio. Ger. Em. 43.

Anglis, Mat-grass.

Habitat in palustribus et ericetis frequens. 4. VI. VII.

D I G Y N I A.

P H A L A R I S. 69.

Cal. bivalvis, carinatus, longitudine æqualis, corol-
lam includens.

canarien-
sis. * 1. PHALARIS panicula subovata spiciformi, glumis
carinatis. Sp. pl. 54.

Phalaris major semine albo. Baub. pin. 28. Hist. Ox.
186. t. 3. f. 1.

Phalaris. Ger. Em. 86.

Anglis, manured Canary grass.

Habitat in ruderatis et ad vias. ①. VI.—IX.

2. PHA-

2. PHALARIS spica ovata; calycis valvulis dorso ciliatis, culmo ramoso. *Phleum spica ovata ciliata, caule ramoso. Sp. pl. 60.*
Gramen typhinum maritimum minus. R. Syn. 398.
Pluk. Ph. t. 33. f. 8.
Gramen typhinum Danicum minus. Park. 1170.
Anglis, Sea Canary-grafs.
Habitat in arena mobili juxta mare. ♂. VII.
3. PHALARIS panicula oblonga ventricosa. *Sp. pl. 55. arundinacea.*
Arundo foliis planis panicula spicata, spiculis con fertis. Hort. cliff. 26.
Gramen arundinaceum acerosa gluma nostras. Park.
1273. Hist. Ox. III. 203. t. 6. f. 14. R. Syn.
400.
Gramen aquaticum paniculatum latifolium. Bauh.
pin. 6.
 β Gramen arundinaceum acerosa gluma Jerseyanum.
D. Sherard.
Anglis, Reed Canary-grafs.
Habitat ad ripas fluviorum. ♀. VII.

P A N I C U M. 70.

Cal. trivalvis; valvula tertia minima.

1. PANICUM spica tereti, involucellis bifloris fasciculatae, lato-pilosae, seminibus nervosae. *Syst. Nat. II. 870.*
Gramen paniceum spica simplici laevi. R. Syn. 393.
Gramen panici effigie spica simplici. Ger. Em. 17.
Gramen paniceum spica simplici ελυμαγεωσις. Bauh.
pin. 8. Park. 1154.
 β Gramen paniceum spica aspera. *Bauh. pin. 8.*
Anglis, Green Panick-grass.
Habitat in arvis prope Battersea copiose. ♂. VII.
VIII.
2. PANICUM spicis alternis conjugatisque, spiculis subdivisis, glumis aristatis hispidis, rachi quinquangulari. *Sp. pl. 56.*
Gramen paniceum spica divisa. Bauh. pin. 8. R.
Syn. 394.

TRIANDRIA DIGYNIA.

Panicum vulgare. Ger. Em. 85.

Panicum sylvestre Herbariorum. Park. 1154.

Anglis, Loose Panick-grass.

Habitat cum priore. ♂. VIII.

sanguina. 3. *PANICUM* spicis digitatis basi interiore nodosis, flosculis geminis nuticis, vaginis foliorum punctatis. *Sp. pl. 57.*

Gramen dactylon latiore folio. Bauh. pin. 8. Th. 114.

Ischæmon sylvestre latiore folio. Park. 1178.

Ischæmon vulgare. Ger. Em. 27.

Anglis, Cock's-foot Panick-grass.

Habitat in arvis inter Battersea et Wandsworth; plentifully in the ploughed fields about Elden in Suffolk. T. Willisell. R. Syn. ♂. VIII.

dactylon. 4. *PANICUM* spicis digitatis patentibus; basi interiore villosis, floribus solitariis, sarmentis repentibus. *Sp. pl. 58.*

Gramen Dactylon, folio arundinaceo, majus aculeatum. Bauh. pin. 7.

Gramen Dactyloides radice repente. Ger. Em. 28.

Gramen canarium ischæmi paniculis. Park. 1179.

Gramen repens cum panicula graminis Mannæ. Bauh. Hist. II. 459.

Anglis, creeping Panick-grass.

Habitat in arenosis. Found by Mr. Newton on the sandy shores between Pensans and Marketjeu in Cornwall plentifully. R. Syn. 4. VII.

P H L E U M. 71.

Cal. bivalvis, linearis truncatus, apice bicuspido. Cor. inclusa.

pratense. 1. *PHLEUM* spica cylindrica longissima; glumis ciliatis.

Pleum spica cylindrica longissima. Fl. lapp. 26. Fl. suec. 50. Sp. pl. 54.

Gramen typhoides maximum spica longissima. Bauh. pin. 4. Th. 49. Hist. Ox. III. 188. t. 4. f. I.

Gramen

Gramen typhinum majus seu primum. *Ger. Em.* 11.

R. Syn. 398.

Gramen typhinum medium s. vulgatissimum. *Park.*

1170.

β Gramen typhinum minus. *Ger. Em.* 11. *Park.* 1170.

Anglis, Meadow Cat's-tail-grass.

Habitat in pratis et pascuis. 4. VII.

2. PHLEUM panicula cylindrica spiciformi, glumis gla-*panicula-*
bris, culmo subramoso. *tum.*

Anglis, branched Cat's-tail-grass.

Habitat in pratis infra King's Weston prope Bristolium. 4. VII.

3. PHLEUM spica ovato-oblonga basi sterili, culmo nodosum,
subrepente, radice bulbosa. *Syst. Nat.* 871.

Gramen nodosum spica parva. *Baub. pin.* 2. *pr.* 3.

Anglis, bulbose Cat's-tail-grass.

Habitat in pascuis et ad vias ubique. 4. VII. VIII.

A L O P E C U R U S. 72.

Calyx bivalvis. *Corolla* univalvis.

1. ALOPECURUS panicula cylindrica spiciformi, culmo *praten-*
sis erecto.

Alopecurus culmo spicato erecto. *Roy. lugdb.* 54. *Fl.*
suec. 59. *Sp. pl.* 60.

Gramen alopecuroides majus. *Ger. Em.* 10.

Gramen phalaroides spica molli sive Germanicum.
Baub. pin. 4.

Gramen phalaroides majus, sive Italicum. *Baub.*
pin. 4. *Park.* 1164.

Anglis, Meadow Fox-tail-grass.

Habitat in pratis et pascuis ubique. 4. V.

2. ALOPECURUS spica cylindrica longissima glumis *myosuroi-*
des; culmo suberecto.

Gramen myosuroides majus, spica longiore, aristis
rectis. *R. Syn.* 397.

Gramen typhoides spica angustiore. *Baub. pin.* 4.
Tb. 53.

TRIANDRIA DIGYNIA.

Gramen alopecuroides spica longa majus et minus.
Park. 1169.

Gramen alopecuroides minus. Ger. Em. 10.

β Gramen myosuroides minus, spica breviore aristis re-curvis. R. Syn. 397.

Anglis, Field Fox-tail-grafts.

Habitat in arvis, et ad vias. 24. VII. VIII.

bulbosus. 3. ALOPECURUS spica cylindrica, culmo erecto, radice bulbosa.

Gramen myosuroides nodosum. R. Syn. 397.

Anglis, bulbose Fox-tail-grafts.

Habitat in pascuis et pratis. In the first field next the road before you go into Northfleet. Dr. Wilmer. 24. VI.

genicula-tus. 4. ALOPECURUS culmo spicato infraecto. Fl. suec. 60. Sp. pl. 60.

Gramen aquaticum geniculatum spicatum. Bauh. pin. 3. Th. 41. R. Syn. 396.

Gramen fluviatile spicatum. Ger. Em. 14.

Gramen aquaticum spicatum. Park. 1275.

β Gramen fluviatile album. Tab. Icon.

Anglis, Flote Fox tail grass.

Habitat in aquosis. 24. VI.—VIII.

S T I P A. 84.

Calyx bivalvis, uniflorus. Cor. valvula exteriore aristata terminali : basi articulata.

pennata. 1. STIPA aristis lanatis. Sp. pl. 78.

Gramen sparteum pennatum. Bauh. pin. 5. Th. 70. R. Syn. 393.

Spartum Austriacum pennatum. Cluf. Hist. 2. p. 221. Ger. Em. 42.

Anglis, Feather-grafts.

Habitat in montosis. Found by Dr. Richardson in company with Thomas Lawson, on the Limestone rocks hanging over a little valley called Longfleadeale, about six miles north of Kendal in Westmoreland. R. Syn. 24. VII. VIII.

D A C T Y L I S. 80.

Cal. bivalvis, acutus; altera valvula majore.

1. DACTYLIS spicis sparsis secundis scabris numerosis. *cynosuroides.*
Lœfl. hisp. 115. *Sp. pl.* 71.

Spartum Essexianum, spica gemina clausa. *Pet. conc.*

gr. 35. *R. Hist. III. App.* 248. *Syn.* 393.

Gramen sparteum serotinum, capite bifido vel gemino.

Merr. pin.

Anglis, Smooth Cock's-foot-grass.

Habitat in paludibus. At Crixey Ferry in Essex. Mr. Buddle found it in the marshes on the river Wallfleet, near Cambridge Ferry in Dengey Hundred, in Essex; and Mr. J. Sherard in the Swail, near the mouth of Feversham Creek, about August and September. *R. Syn.* ⊖.

2. DACTYLIS panicula secunda glomerata. *Sp. pl. glomeratus.*
71. *Fl.* 87.

Poa flosculis confertis uno versu dispositis. *Hort. cliff.*

Gramen spicatum folio aspero. *Baub. pin.* 3. *pr.* 59.
Th. 45.

Gramen pratense spica multiplici rubra. *Park.* 1161.

Gramen panicula torosa pratense asperum. *Hist. Ox.*
III. 202. *t.* 6. *f.* 38.

Calamagrostis torosa panicula. *Park.* 1182.

Anglis, rough Cock's-foot-grass.

Habitat in pratis et pascuis. 4. VI.—VIII.

M I L I U M. 73.

Cal. bivalvis, uniflorus, corollam subexcedens. *Stigmata penicilliformia.*

1. MILIUM floribus paniculatis dispersis muticis. *Sp. pl. effusum.*
61. *Fl. suec.* 61.

Gramen miliaceum. *Lob. ic.* 3. *Ger. Em.* 6. *Baub. hist. II.* 462. *R. Syn.* 402.

Gramen sylvaticum panicula miliacea sparsa. *Baub. pin.* 8.

Gramen miliaceum vulgare. *Park.* 1153.

Anglis,

TRIANDRIA DIGYNIA.

Anglis, Millet-grass.

Habitat in sylvis humidis frequens. ♂. VI. VII.

A G R O S T I S. 74.

Cal. bivalvis, uniflorus, corolla paulo minor. *Stigmata* longitudinaliter hispida.* *Aristate.*

- spicaven-* 1. AGROSTIS petalo exteriore aristा rectа stricta longissima, panicula patula. *Syst. Nat.* 872. *Sp. pl.* 61. *Fl. suec.* 62.

Gramen segetum panicula arundinacea. *Bauh. pin.*3. *Tb.* 35.Gramen agrorum. *Lobelii.* *Bauh. hist.* II. 461.Gramen agrorum venti spica. *Park.* 1158.Gramen arundinaceum. *Ger. Em.* 5.Gramen miliaceum majus, glumis aristatis, spadiceis et pallidis. *Pet. conc. gr.* n. 122. 123. *R. Syn.* 405.*Anglis*, Silky Bent-grass.

Habitat in arvis paucim. ♂. VII.

- canina.* 2. AGROSTIS calycibus coloratis, petalorum aristा dorsali recurva. *Fl. suec.* 65. *Sp. pl.* 62.

Gramen supinum canenum paniculatum, folio varians. *Bauh. pin.* I.Gramen paniculatum supinum, ad infima culmorum genicula, foliorum capillarium fasciculis donatum. *Sch. agr.* 141.*Anglis*, brown Bent-grass.

Habitat in pratis humidis frequens. ♀. VII. VIII.

- rubra.* 3. AGROSTIS panicula lanceolata spiciformi, calyce flosculo triplo longiore, petalorum aristा dorsali recurva.

Agrostis panicula parte florente patentissima, petalo exteriore glabro terminato aristা tortili recurva. *Fl. suec.* 64. *Sp. pl.* 62.Panicum ferotinum arvense spica pyramidata. *Tourn.* 515. *R. Syn.* 394.Gramen ferotinum spica laxa pyramidali. *R. hist.* 1288:

Gramen

Gramen alopecuro accedens, ex culmi geniculis spicas
cum petiolis longiusculis proinens. *Pluk. phyt. t.*
33. f. 6.

Anglis, red Bent-grass.

Habitat in pratis et pascuis. In Insula Shepey copiose.

○. VII.

*** *Muticæ.*

4. AGROSTIS paniculæ ramulis divaricatis muticis, culmo *stolonifera*
repente, calycibus æqualibus. *Fl. suec.* 65.
Sp. pl. 62.
Agrostis culmo repente foliis radicalibus breviore, fo-
lii suprema vagina ventricosa. *Fl. suec. ed. I.* 61.
Gramen montanum miliaceum minus, radice repente.
R. Syn. 402.
Gramen caninum supinum minus. *Bauh. pin. 1. Sch.*
agr. 128.
β Gramen miliaceum folio angustissimo. *Pet. conc. gr.*
116.
γ Gramen miliaceum angustifolium, glumis perexiguis.
Pet. conc. gr. 117.
Anglis, creeping Bent-grass.
Habitat in pratis et pascuis subhumidis sed rarius. 4.
VIII.
5. AGROSTIS panicula coarctata mutica, calycibus æ- *palustris.*
qualibus hispidiusculis coloratis ; culmo repente.
Gramen miliaceum majus, panicula spadicea. *Pet.*
conc. gr. 118. *R. Syn.* 464.
β Gramen miliaceum majus panicula viridi. *Pet. conc.*
gr. 119.
Anglis, Marsh Bent-grass.
Habitat in fossis et locis uliginosis frequens. 4. VII.
6. AGROSTIS panicula capillari patente, calycibus *capillaris.*
subulatis æqualibus hispidiusculis coloratis flosculis
muticis. *Roy. lugdb.* 59. *Dalib. paris.* 23. *Sp.*
pl. 62.
Gramen montanum panicula spadicea delicatiore.
Bauh. pin. 3.
Gramen miliaceum loculis minimis, panicula fere a-
rundinacea. *R. meth. em.* 177. *Syn.* 402.

Gramen

TRIANDRIA DIGYNIA.

Gramen pratense vulgare panicula fere arundinacea.
Baub. hist. II. 461.

Anglis, Fine Bent-grass.

Habitat in pratis et pascuis ubique. 4. VIII.

sylvatica. 7. AGROSTIS panicula coarctata mutica, calycibus æqualibus, corolla ante florescentiam calyce breviore, postea duplo longiore.

Gramen miliaceum sylvestre glumis oblongis. Pet. conc. gr. 121. R. Syn. 404.

Anglis, Wood Bent-grass.

Habitat in sylvis humosis. First discovered by Mr. Buddle in Bishop's-wood, Hampstead. R. Syn. in sylva Hornsey-wood dicta. 4. VIII.

minima. 8. AGROSTIS panicula mutica filiformi. Sp. pl. 63. Nardus panicula spicata, floribus solitariis alternis Guett. stamp. 155. Dalib. paris. 155.

Gramen minimum paniculis elegantissimis. Baub. pin. 2. Sch. agr. 40. Hist. Ox. III. 200. t. 2. f. 10.

Gramen minimum. Baub. hist. II. 465. Dalech. hist. 425.

Gramen minimum anglo-britanicum. Lob. ill. 20. R. Syn. pl. dub.

Anglis, small Bent-grass.

Habitat in Wallia D. Stillingfleet invenit.

** Flores biflori vagi.

A I R A. 75.

Cal. bivalvis, biflorus, flosculi absque interjecto rudimento.

* Muticæ.

cristata. 1. AIRA panicula spicata, floribus muticis pedunculo longioribus glumis acuminatis inæqualibus. Roy. Lugdb. 61. Sp. pl. 63.

Gramen spica cristata subhirsutum. Baub. pin. 2. Hist. Ox. III. 194. t. 4. f. 7.

Gramen pumilum spica purpuro-argentea molli. R. Syn. 396.

Anglis,

Anglis, cristed Hair-grass.

Habitat in pratis montanis sterilibus. On Blackheath.

Pet. conc. gr. 4. VII. VIII.

2. AIRA panicula coarctata, floribus pedunculatis muticis convoluto-subulatis, foliis planis. *Syst. Nat.*

873. *Sp. pl.* 63. *Fl. suec.* 67.

Poa spiculis subulatis, panicula rara contracta. *Fl. lapp.* 29.

Gramen pratense ferotinum panicula longa purpurascente. *R. Syn.* 404. *Hist. Ox.* III. 201. t. 5. f. 22.

Gramen pratense spica Lavendulæ. *Merr. Pin.*

Anglis, Purple Hair-grass.

- Habitat in locis uliginosis, cespitosis, sterilissimis, frequens. 4. VIII.

3. AIRA panicula patente, floribus muticis laevibus calyce longioribus, foliis planis. *Syst. Nat.* 873. *Fl. suec.* 68. *Sp. pl.* 64.

Aira culmo inferiore repente, flosculis muticis calyce longioribus, altero pedunculato. *Roy. lugdb.* 60.

Gramen miliaceum aquaticum. *R. Syn.* 402. *Sch. agr.* 218.

Gramen caninum supinum paniculatum dulce. *Bauh. pin.* 2. *Bauh. hist.* II. 459.

Gramen miliaceum fluitans suavis saporis. *Merr. pin.*

Gramen exile tenuifolium Canario simile. f. Gramen dulce. *Park.* 1174.

Anglis, Water Hair-grass.

Habitat in aquosis et ad ripas fluviorum. 4. VI. VII.

** *Aristate.*

4. AIRA foliis planis, panicula patente, petalis basi villosis aristatisque; arista erecta brevi. *Fl. suec.* 70. *Sp. pl.* 64.

Gramen segetum altissimum panicula sparsa. *Bauh. pin.* 3. *Hist. Ox.* III. 199. t. 5. f. 1.

Gramen segetum panicula speciosa. *Park.* 1158.

Gramen segetale. *Ger. Em.* 5.

Gramen

TRIANDRIA DIGYNIA.

Gramen miliaceum segetale majus. Pet. conc. gr.
114. R. Syn. 403.

Anglis, Turfy Hair-grass.

Habitat in pratis et sylvis humidis frequens. 4. VII.
VIII.

flexuosa. 5. AIRA foliis setaceis, culmis subnudis, panicula divaricata pedunculis flexuosis. Fl. suec. 71. Sp. pl. 65.

Aira panicula rara calycibus fuscis. Fl. lapp. 49.

Gramen paniculatum locustis parvis purpuro-argenteis
majus et perenne. R. Syn. 407.

Gramen avenaceum panicalatum alpinum, foliis capillaceis brevibus, locustis purpuro-argenteis et aristatis Sch. agr. t. 4. f. 4.

Gramen avenaceum capillaceum minoribus glumis.
Baub. pin. 10.

montana. 6. Aira foliis setaceis panicula angustata, flosculis basi pilosis aristatis; arista tortili longiore. Fl. suec. 72.
Sp. pl. 65.

Gramen nemorosum paniculis albis, capillaceo folio.
Baub. pin. 7. pr. 14. tb. 97. Hist. Ox. III. 300. t. 7.
f. 6. R. Syn. 407.

Anglis, Mountain Hair-grass.

Habitat in ericetis et pascuis sterilibus. 4. VII. VIII.

setacea. 6. AIRA foliis setaceis, panicula secunda coarctata, aristis flosculis duplo longioribus recurvis.

Anglis, small leaved Hair-grass.

Habitat in ericeto Strattonensi in comitatu Norfolk. D.
Stillingfleet reperit. 4. VII. VIII.

canescens. 7. AIRA foliis setaceis; summo paniculam inferne obvolvente. Roy. lugdb. 60. Fl. suec. 74. Sp. pl. 65.

Aira foliis setaceis aristis ex basi glumarum calycem æquantibus. Hort. cliff. 495.

Gramen foliis junceis, radice jubata. Bauh. pin. 5.
Th. 72.

Gramen miliaceum maritimum molle. Pet. conc. gr.
126. R. Syn. 405.

Anglis, Grey Hair grass.

Habitat in arenosis maritimis. 4. VII.

8. AIRA foliis setaceis; vaginis angulatis floribus pa- præcox.
niculato-spicatis, flosculis basi aristatis. *Fl. suec.*

75. Sp. pl. 65.

Gramen parvum præcox panicula (potius spica) laxa
canescente. *R. Syn. 407. Pluk. ph. t. 33. f. 9.*

Gramen minimum spica brevi habitiore nostrum. *R.*
Syn. ed. 2. p. 252.

Anglis, early Hair grass.

Habitat in arenosis et sterilibus frequens. ○. V. VI.

9. AIRA foliis setaceis, panicula divaricata, floribus a- caryophyl-
ristatis distantibus. *Sp. pl. 66.* lea.

Aira foliis subulatis, aristis a basi flosculorum tortili-
bus, flosculo altero pedunculato. *Roy. lugdb. 60.*
Dalib. paris. 26.

Gramen paniculatum, locustis purpureo-argenteis an-
num. *R. Syn. 407.*

Gramen paniculatum purpureo-argenteum, locustis
parvis annum. *Hist. Ox. III. 200. t. 5. f. 11.*

Caryophyllum arvensis glaber minimus. *Baub. pin.*
105.

Anglis, Silver Hair-grass.

Habitat in pascuis arenosis ubique. ○. VII.

M E L I C A. 76.

*Calyx bivalvis, biflorus. Rudimentum floris inter
flosculos.*

1. MELICA petalis imberbis, panicula nutante sim- nutans.
plici. *Sp. pl. 66.*

Melica floribus sub culmo pendulis. *Fl. lapp. 36.*

Gramen avenaceum nemorense, glumis rarioribus
exfusco xerampelinis. *R. Syn. 403.*

Gramen avenaceum locustis rarioribus. *Baub. pin. 10.*

Gramen avenaceum spica mutica rariore gluma. *Hist.*
Ox. III. t. 7. f. 49.

Gramen locustis rubris. *Park. 1151. Baub. hist. II.*
434.

β Gramen avenaceum locustis rubris montanum. *Baub.*
pin. 10.

Anglis,

TRIANDRIA DIGYNIA.

Anglis, Melic-grass.

Habitat in sylvis subhumidis frequens. 24. VI. VII.

*** Flores multiflori vagi.

B R I Z A. 7.

Cal. bivalvis, multiflorus. Spicula disticha; valvu-
*lis cordatis.**media.* 1. BRIZA spiculis ovatis, calyce flosculis breviore. *Fl.*
*suec. 86. Sp. pl. 70.*Gramen tremulum. *Bauh. hist. II. 469. majus.*
*Bauh. pin. 2. R. Syn. 412.*Gramen tremulum s. phalaris media *Anglica prima*
*an secunda. Park. 1165.*Phalaris pratense. *Ger. Em. 86.**Anglis*, middle Quaking-grass, Cow-quakes, and La-
dies-hair.

Habitat in pratis et pascuis. 24. VI.

minor. 2. BRIZA spiculis triangulis, calyce flosculis longiore.
*Sp. pl. 70.*Gramen tremulum minus, panicula parva. *Bauh.*
*pin. 2. Hist. Ox. III. 208. t. 6. f. 47.*Gramen tremulum minus, panicula ampla, loculis
parvis triangulis. *R. Syn. 412.**Anglis*, small Quaking-grass.Habitat in pascuis. In Jersey. Dr. Sherard. *R. Syn.*
24. VII.

P O A. 77.

Cal. bivalvis, multiflorus. Spicula ovata: valvulis
*ovato-acuminatis.**aquatica.* 1. POA panicula diffusa, spiculis sexfloris linearibus. *Fl.*
*suec. 81. Sp. pl. 67.*Poa panicula diffusa, spiculis sexfloris linearibus muti-
cis compressis. *Aet. stockh. 1741. p. 185.*Gramen paniculatum aquaticum latifolium. *Bauh.*
*pin. 3. Hist. Ox. III. 201. t. 6 f. 25.*Gramen palustre paniculatum altissimum. *Bauh.*
pin. 3.

Gramen

Gramen aquaticum majus. Ger. Em. 6. 411.

Anglis, Reed Meadow-grass.

*Habitat ad ripas fluviorum, et in paludibus. 4. VII.
VIII.*

2. POA panicula diffusa, spiculis subtrifloris basi pubescentibus, culmo erecto tereti. *Syst. Nat. 874. Sp. pl. 67.*

*Gramen pratense paniculatum medium. Bauh. pin.
2. R. Syn. 409.*

*Gramen pratense minus. Bauh. hist. II. 542. Park.
1156. Ger. Em. 2.*

Anglis, common Meadow-grass.

Habitat in pratis et pascuis ubique. 4. VI.—VIII.

3. POA panicula diffusa, spiculis quinquefloris, glabris *pratensis.*
culmo erecto tereti. *Fl. suec. 82. Sp. pl. 67.*

*Gramen pratense paniculatum majus latiore folio, Poa
Theophrasti. Bauh. pin. 2. th. 28. R. Syn. 409.*

Gramen pratense. Ger. Em. 2. vulgatus. Park. 1156.

Anglis, great Meadow-grass.

*Habitat in pratis et pascuis prope Mary-le-bon. 4. VI.
VII.*

4. POA panicula coarctata secunda, culmo obliquo *compresso.*
presso. Fl. suec. 84. Sp. pl. 68.

*Poa spiculis ovatis compressis muticis, panicula se-
cunda contracta. Act. Stockh. 1741. p. 184.*

*Gramen pratense medium culmo compresso, Bud.
H. S. R. Syn. 409.*

*Gramen murorum, radice repente. Bauh. pin. 2,
pr. 2.*

*Gramen paniculatum, radice repente, culmo com-
presso. Vaill. paris. 91. t. 18. f. 5.*

Anglis, creeping Meadow-grass.

*Habitat in locis siccis, tectis, muris. On the walls a-
bout Eltham, Mr. J. Sherard. R. Syn. in pratis
prope Mary-le-bon. ②. VI.*

TRIANDRIA DIGYNIA.

- angustifolia*. 5. POA panicula diffusa spiculis quadrifloris pubescentibus, culmo erecto tereti. *Fl. suec.* 81. *Sp. pl.* 67.
Poa spiculis ovato-oblongis, foliis subulatis. *Fl. lapp.* 52.
Gramen pratense paniculatum majus angustiore folio.
Bauh. pin. 2. *pr.* 5. *Hist. Ox.* III. 201. *t.* 5. *f.* 19.
Anglis, narrow leaved Meadow-grass.
Habitat in sylvis et sepibus. ♂. VII.
- bulbosa*. 6. POA panicula secunda patentiuscula, spiculis quadrifloris. *Sp. pl.* 70.
Poa culmorum basi tuberosa. *Guet. stamp.* I. 168.
Dalib. paris. 29.
Gramen arvense, panicula crispa. *Bauh. pin.* 3. *Barr. ic.* 703.
Gramen arvense, panicula crispa longiore nostris.
Pluk. alm. 176.
Anglis, bulbous Meadow grass.
Habitat in pratis et pascuis; prope Clapham in comitatu Surriensi. 4. VI.
- setacea*. 7. POA panicula diffusa, spiculis trifloris pubescentibus, foliis radicalibus setaceis.
Anglis, Hair-leaved Meadow-grass.
Habitat in pascuis factis prope Mary-le-bon. ♂. V. VI.
- annua*. 8. POA panicula diffusa angulis rectis, spiculis obtusis culmo obliquo compresso. *Fl. suec.* 85. *Sp. pl.* 68. *Dalib. paris.* 28.
Gramen pratense minus seu vulgatissimum. *R. Syn.* 408.
Graemea pratense minimum album et rubrum. *Park.* 1156. *Ger. Em.* 3.
Gramen pratense paniculatum minus. *Bauh. pin.* 3. *Th.* 31.
Anglis, annual Meadow-grass, or Suffolk grass.
Habitat in pratis et pascuis ubique. ♂. IV.—IX.
- nemoralis*. 9. POA panicula attenuata, spiculis subifloris mucronatis scabris, culmo incurvo. *Sp. pl.* 69.

Gramen

Gramen sylvaticum, panicula tenui e raris locustis composita. *Dill. lat. gif. 57.*

Gramen paniculatum angustifolium alpinum, locustis rarioribus et angustioribus non aristatis. *Sch. agr. 164. t. 2. f.*

Anglis, Wood Meadow-grass.

Habitat in *sylvis et umbrosis*. ☽. VI.

10. POA panicula subspicata, spiculis secundis coarcta- *maritima*.
tis, foliis convolutis.

Gramen paniculatum maritimum vulgatissimum. *R.*
Syn. 409.

β Gramen caninum maritimum paniculatum. *R. Syn.*
410.

Anglis, Sea Meadow-grass.

Habitat in *litoribus maritimis ubique*. ¼. VI. VII.

11. POA panicula lanceolata subramosa, paniculis alter- *rigida*.
nis secundis.

Poa panicula lanceolata subramosa, floribus alternis
secundis. *Roy. lugdb. 62. Guett. stamp. 62.*

Gramen loliaceum murorum duriusculum spica erecta
rigida. *Hist. Ox. III. 182. t. 2. f. 9.*

Gramen panicula multiplici. *Baub. pin. 3. pr. 6.*
Park. 1157.

Gramen exile duriusculum in muris et aridis prove-
niens. *R. Syn. 410.*

Anglis, Hard Meadow-grass.

Habitat in *muris, tectis, et arenosis frequens*. ☽. VII.

12. POA spicata, spiculis alternis sessilibus, subsexfloris. *loliacea*.

Gramen pumilum Loliaceo simile. *R. Syn. 395.*

Gramen exile duriusculum maritimum foliolis circum-
volutis, veluti junceis brevibus. *Pluk. phyt. t. 39.*
f. 7. 32.

Anglis, Spiked Meadow-grass.

Habitat in *arenosis maritimis frequens*. ¼. V. VI.

TRIANDRIA DIGYNIA.

FESTUCA. 82.

Cal. bivalvis, Spicula oblonga, teretiuscula, glumis acuminatis.

* *Panicula secunda.*

ovina. 1. FESTUCA panicula secunda coarctata aristata, culmo tetragono nudiusculo, foliis setaceis. *Fl. suec.* 91. *Sp. pl.* 73.

Poa spiculis ovato angustis aristato-acuminatis. *Fl. lapp.*

Gramen capillaceum, locustellis pennatis non aristatis.

Pluk. Ph. t. 34. f. 2. R. Syn. 410.

Gramen loliaceum, foliis brevibus junceis, minus.

Hist. Ox. III. 182. t. 3. f. 13.

Gramen foliis junceis brevibus majus, radice nigra.

Baub. pin. 5. Sch. agr. 276.

vivipora. 2. Festuca spiculis viviparis. *Fl. suec.* 913.

Gramen sparteum montanum, spica foliacea graminea majus et minus. *R. Syn. 410. t. 22. f. 1.*

Anglis, Sheep's Fescue-grass.

Habitat in pascuis siccioribus, praesertim glareosis; 2 in montibus Eboracensibus, Westmorlandicis, Cambro-britanicis, frequens. 4. VI. VII.

duriuscula 2. FESTUCA panicula nutante inferne ramosa, spicis adscendentibus hispidis, foliis setaceis. *Roy. lugdb.* 68. *Sp. pl.* 74.

Gramen pratense, panicula duriore laxa unam partem spectante. *R. Syn. 413. t. 19. f. 1. Sch. agr. 285.*

Gramen tenue duriusculum et pene junceum. *Baub. hist. II. 463.*

Anglis, hard Fescue-grass.

Habitat in pratis et pascuis siccioribus. 4. VI.

rubra. 3. FESTUCA panicula secunda scabra spiculis sexfloris aristatis; flosculo ultimo mutico, culmo semitereti. *Fl. suec.* 92. *Sp. pl.* 73.

Gramen apinum pratense, panicula duriore laxa spadicea, locustis majoribus. *Sch. agr. 287.*

Anglis, Purple Fescue-grass.

Habitat in pascuis siccis. 4. VI.

4. FESTUCA

4. FESTUCA panicula secunda, spiculis erectis, calycis altera valvula integra, altera acuminata. *Sp. pl.* 75. *bromoides.*
Festuca spicis erectis ad unum latus, palea altera calycina minima, altera acuminata. *Roy. lugdb.* 68.
Gramen paniculatum *bromoides* minus, paniculis aristatis unam partem spectantibus. *R. Syn.* 415.
Hist. 1287. *Pluk. phyt.* t. 33. f. 10.
Anglis, barren Fescue-grass.
Habitat in *pascuis arenosis*. ○. V. VI.

5. FESTUCA panicula spicata nutante, calycibus minutissimis muticis, floribus scabris: aristis longis; *myuros.*
Syft. Nat. 876. *Sp. pl.* 74.
Gramen murorum spica longissima. *Ger. Em.* 31.
Hist. Ox. III. 215. t. 7. f. 43. *R. Syn.* 415.
Gramen spica nutante longissima. *Park.* 1162.
Anglis, Wall Fescue-grass.
Habitat in *muris et locis agrorum sterilioribus et siccioribus.* ○. VI.

6. FESTUCA panicula erecta, spiculis linearibus muticis, foliis planis. *pratenis.*
Gramen paniculatum elatius, spicis longis muticis et squamosis. *R. Syn.* 411.
Anglis, Meadow Fescue-grass.
Habitat in *pratis et pascuis.* 24. VI. VII.

** *Panicula æquali.*

7. FESTUCA panicula secunda ramosa erecta, spiculis *elatiōrē* subaristatis; exterioribus teretibus. *Fl. suec.* 94.
Sp. pl. 75.
Gramen loliaceum, spica divisa, pratense majus. *Hist. Ox.* III. 184. t. 2. f. 15.
Gramen paniculatum nemorosum, latiore folio glabrum, panicula nutante non aristata. *R. Syn.* 411.
 β *Gramen* arundinaceum aquaticum panicula avenacea.
R. Syn. 411.
Anglis, Tall Fescue-grass.
Habitat in *pratis et pascuis sed rarius.* 24. VII.

TRIANDRIA DIGYNIA.

- decumbens* 8. FESTUCA panicula erecta, spiculis subovatis muticis, calyce flosculis majore, caule decumbente. *Fl. suec.* 93. *Sp. pl.* 75.
Gramen avenaceum parvum procumbens, paniculis non aristatis. *R. Syn. 2d. ed.* 262. *3d. ed.* 408.
Pluk. ph. t. 34. *f. 1.*
Gramen triticeum palustre humilius, spica mutica breviore. *Hist. Ox. III.* 177. *e. 1. f. 6.*
Anglis, small Fescue-grass.
Habitat in pascuis sterilibus subhumidis. 4. VIII.
- fluitans.* 9. FESTUCA panicula ramosa erecta, spiculis subsessilibus teretibus muticis. *Fl. suec.* 95. *Sp. pl.* 75.
Gramen aquaticum cum longissima panicula. *Baub. hist. II.* 490. *R. Syn.* 412.
Gramen fluviatile. *Ger. Em.* 14. *Park.* 1275.
Gramen aquaticum fluitans, multiplici spica. *Baub. pin.* 2.
Anglis, Flote Fescue-grass.
Habitat in fossis et aquosis ubique. 4. VI. VII.
- loliacea.* 10. FESTUCA spicata, spiculis alternis sessilibus compressis muticis.
Anglis, spiked Fescue-grass.
Habitat ad vias et in pascuis sed rarius; prope Vauxhall. 4. VI.
- sylvatica.* 11. FESTUCA spicata, spiculis alternis subdistichis sessilibus aristatis.
Festuca culmo alternatim spicato, spicis teretibus. *Fl. lapp.* 29. *Roy. lugdb.* 67.
Festuca graminea nemoratis latifolia mollis. *Baub. pin.* 10.
Gramen avenaceum dumetorum spicatum. *R. Syn.* 394.
Anglii; Wood Fescue-grass.
Habitat in sylvis et sepibus frequens. 4. VII.

B R O M U S. 83.

Cal. bivalvis. Spicula oblonga, teres, disticha; aristata infra apicem.

1. BROMUS panicula patente, spiculis ovatis: aristis *fecalinus*.
rectis. *Fl. suec.* 96. *Sp. pl.* 76.

Festuca culmo paniculata, spicis compressio-ovatis.
Fl. lapp. 28.

β *Bromus panicula erecta coarctata.* *Sp. pl.* 78. *horde-*
Festuca avenacea hirsuta, paniculis minus sparsis. *R. ceus.*
Syn. 413.

Gramen avenaceum pratense, panicula squamata et
villosa. *Hist. Ox.* III. 213. t. 7. f. 18.

γ *Festuca avenacea spicis habitioribus glumis glabris.* *R.*
Syn. 414.

Gramen avenaceum segetale majus gluma turgidiore.
Hist. Ox. III. 212. t. 7. f. 16.

δ *Gramen avenaceum pratense, gluma tenuiore glabra.*
Hist. Ox. III. 213. t. 7. f. 19.

ε *Festuca avenacea spicis strigosioribus, e glumis glabris*
compactis. *R. Syn. 414.*

Anglis, Field Brome-grass.

Habitat in pratis et pascuis. γ. δ. *in arvis.* ☽. V. VI.

2. BROMUS panicula nutante, spiculis ovato oblongis. *arvensis.*

Fl. suec. 97. *Sp. pl.* 77.

Bromus culmo paniculato, spicis compressis. *Fl.*
lapp. 27.

Bromus herba. *Dod. p.* 540.

Festuca graminea effusa juba. *Bauh. pin.* 192.

Festuca elatior paniculis minus sparsis, loculis oblongis strigosis, aristis purpureis splendentibus. *R.*
Syn. 414.

Anglis, Corn Brome-grass.

Habitat inter segetes prope Southamptoniam D. Sherard
invenit. *R. Syn. prope Gravesend copiose.* ♀. VII.

3. BROMUS panicula simplici erecta, spiculis ovato-*erectus.*
oblongis, foliis involutis pilosis.

Anglis, upright Brome-grass

D 4

Habitat

TRIANDRIA DIGYNIA.

Habitat in cretaceis circa Rochester, Dartford, and Gravesend, in Cantio. 4. VI.

- ciliatus.* 4. BROMUS panicula nutante, foliis utrinque vaginisque subpilosis glumis ciliatis. *Sp. pl.* 76.
Festuca avenacea sterilis spicis erectis. *R. Syn.* 413.
Pluk. Ph. t. 299. f. 2.
Festuca avenacea sterilis, pediculis brevioribus et spicis erectis. *Hist. Ox.* III. 212. t. 7. f. 13.
Anglis, Wall Brome-grass.
Habitat in tectis muris et pascuis siccissimis. ①. V.
- sterilis.* 5. BROMUS panicula patula, spiculis oblongis distichis, glumis subulato aristatis. *Sp. pl.* 77.
Festuca avenacea sterilis elatior seu *Bromos* *Dioscoridis*. *Baub. pin.* 9. *Th.* 146. *Hist. Ox.* III. 212. t. 7. f. 11. *R. Syn.* 412.
Bromos herba sive *aena* sterilis. *Park.* 1147.
Bromos sterilis. *Ger. Em.* 16.
Anglis, barren Brome-grass.
Habitat in sylvis, sepibus et ad margines agrorum frequens. ②. VI. VII.
- giganteus.* 6. BROMUS panicula nutante, spiculis quadrifloris aristis brevibus. *Fl. suec.* 99. *Sp. pl.* 77. *It. scan.* 394.
Gramen sylvaticum glabrum panicula recurva. *Vaill. paris.* 93. t. 18. f. 3.
Gramen avenaceum glabrum, panicula e spicis raris strigosis composita, aristis tenuissimis. *R. Syn.* 415.
Gramen bromoides aquaticum latifolium, panicula sparsa tenuissime aristata. *Sch. agr.* 264. t. 5. f. 17.
Anglis, tall Brome-grass.
Habitat in sylvis et sepibus subhumidis. 4. VIII.
- ramosus.* 7. BROMUS panicula ramosa nutante scabra, spiculis linearibus decemfloris arista longioribus, foliis scabris.
Festuca graminea nemoralis latifolia mollis. *Baub. pin.* 9. *th.* 144.

Gramen

TRIANDRIA DYGINIA.

41

Gramen avenaceum dumetorum panicula sparsa. *R.*
Syn. 415.

Gramen avenaceum dumetorum, juba longiore spica
divisa. *Hist. Ox. III.* 213. *t. 7. f. 27.*

Anglis, Wood Brome-grass.

Habitat in sylvis et sepibus frequens. *O.* VII. VIII.

8. BROMUS culmo indiviso, spicis alternis subsestilibus *pinnatus*.
teretibus, flosculis arista longioribus.

Bromus culmo indiviso, spicis alternis subsestilibus te-
retibus. *Fl. suec.* 100. *Sp. pl.* 78.

Gramen spica brizæ majus. *Baub. pin.* 9. *pr.* 19. *th.*
133. *R. Syn.* 392.

Anglis, spiked Brome-grass.

Habitat in pratis siccis. In coppices and hedges about
Oxford. On all the heaths and commons for twenty
miles on this side York. *R. Syn.* Circa Dover, in
Cantio frequens. *U.* VI.

A V E N A. 85.

Cal. bivalvis, multiflorus; arista dorsali contorta.

1. AVENA calycibus trifloris, receptaculo calycem ex- *nuda*.
cedente petalis dorso aristatis. *Amoen. acad.* III.
401.

Avena nuda. *Baub. pin.* 23. *hist.* II. 433. *Ger. Em.*
77. *Park.* 1134. *R. Syn.* 389.

Anglis, naked Oats or Pilcorn.

Habitat in arvis sed rarius. In extrema Cornubia pro-
pe Belerium, promontorium copiose seritur. *R. Syn.*
in Staffordshire, Dr. Plot. *O.* VII.

2. AVENA panicula patente, calycibus trifloris flosculis *fatua*.
basi pilosif. *Fl. suec.* 101. *Sp. pl.* 80.

Avena sylvestris pilosa, aristis recurvis. *Hist. Ox.*
III. 209. *t. 7. f. 5.*

Festuca utriculis lanagine flavescentibus. *Baub. pin.*
10.

Ægilops quibusdam aristis recurvis, s. *Avena pilosa*.
Baub. hist. II. 433. *R. Syn.* 389.

Ægilops bromoides. *Ger. Em.* 77. *Belgarum*. *Park.*
1148.

Anglis,

TRIANDRIA DIGYNIA.

Anglis, bearded Oat-grass.

Habitat in arvis, prope Stockwell in Comitatu Surriensi. *D.* VIII.

praten sis. 3. AVENA calycibus quinquefloris, panicula spicata, foliis involutis.

Avena calycibus quinquefloris, panicula spicata. *Fl. suec.* 104. *Sp. pl.* 80.

Gramen avenaceuni montanum spica simplici, aristis recurvis. *R. Syn.* 405. *t.* 21. *f.* 1.

Anglis, Meadow Oat-grass.

Habitat in ericetis, pratis montosis praesertim solo cretaceo. *4.* VII.

pubescens. 4. AVENA calycibus subtrifloris basi pilosis, foliis planis pubescentibus.

Gramen avenaceum hirsutum, s. glabrum panicula purpuro-argentea splendente. *R. hist.* 1909. *Syn.* 406. *t.* 21. *f.* 2.

Anglis, rough Oat-grass.

Habitat in pratis et pascuis siccioribus. Supra Banstead Downs copiose. *4.* VI.

elatior. 5. AVENA calycibus bifloris, flosculo hermaphrodito mutico, masculo aristato. *Fl. lapp.* 98. *suec.* 102. *Sp. pl.* 79.

Gramen nodosum avenacea panicula. *Baub. pin.* 2. *pr.* 3. *R. Syn.* 406.

Gramen caninum nodosum. *Ger. Em.* 23. s. bulbosum vulgare. *Park.* 1175.

β Gramen avenaceum elatius, juba longa splendente. *R. meth. em.* 179.

Anglis, Tall Oat-grass.

Habitat in pratis et pascuis. *4.* VII. VIII.

flavescens. 6. AVENA panicula laxa, calycibus trifloris brevibus, flosculis omnibus aristatis. *Roy. lugdb.* 66. *Sp. pl.* 80. *Fl. suec.* 103.

Gramen avenaceum pratense elatius, panicula flavescente, loculis parvis. *R. Syn.* 407.

Gramen avenaceum, spica sparsa flavescente, loculis parvis. *Raii. hist. Ox.* III. 215. *t.* 7. *f.* 42.

Anglis,

Anglis, yellow Oat-grass.

Habitat in pratis et pascuis ubique. 4. VII.

A R U N D O. 87.

Cal. bivalvis. Flosculi congesti, lana cincti.

1. ARUNDO calycibus quinquefloris, panicula laxa. *phragmitis.*
Roy. lugdb. 66. Gron. virg. 137. Sp. pl. 81. Fl. suec. 105.

Arundo vulgaris sive phragmites Dioscoridis. Baub.
pin. 17.

Arundo vallatoria. Ger. Em. 36. R. Syn. 401.

Harundo vulgaris sive vallatoria. Park. 1208.

Anglis, common Reed-grass.

Habitat in fluviis, Lacubus, fossis, ubique. 4. VII.

2. ARUNDO calycibus unifloris, culmo ramoso. *Fl. Calamagrostis.*
lapp. 42. suec. 107. Sp. pl. 82.

Gramen arundinaceum panicula molli spadicea majus.

Baub. pin. 7. Sch. agr. pr. t. 5. R. Syn. 401.

Gramen tomentorium arundinaceum. Ger. Em. 9.

Calamagrostis f. Gramen tomentosum. Park. 1182.

Anglis, branched Reed-grass.

Habitat in sylvis et sepibus subhumidis. Inter Newington & Hornsey. 4. VI. VII.

3. ARUNDO calycibus unifloris, panicula erecta, foliis epigejas.
subtus glabris. Sp. pl. 81. Fl. suec. 106.

Arundo panicula coarctata erecta integra, foliis inferne
glabris. Fl. suec. ed. 1. 101.

Gramen arundinaceum paniculatum montanum, pa-
nicula spadiceo viridi, semine papposo. Sch. agr.
124.

Calamagrostis minor glumis rufis et viridibus. Pet.
conc. gr. n. 69.

Anglis, small Reed-grass.

Habitat circa Oundle in comitatu Leicesterensi. R.
Syn. 4. VII.

4. ARUNDO calycibus unifloris, foliis involutis mu- *arenaria.*
cronato-pungentibus. Sp. pl. 82. Fl. suec. 108.

Gramen

TRIANDRIA DIGYNIA.

Gramen sparteum spicatum foliis mucronatis longioribus vel spica secalina. *Baub. pin. 5. th. 67. R. Syn. 393.*
Spartum marinum nostras. Park. 1198.
Spartum anglicanum. Ger. Em. 42.
Anglis, Sea Reed-graſs.
Habitat in littoribus maritimis. 4. VI. VII.
***** Flores multiflori, insidentes Receptaculi elongati dentibus.*

LOLIUM. 90.

Involucrum monophyllum, fixum. Cal. o. Spicula multiflora.

- perenne.* 1. *LOLIUM* spicis muticis, radice perenni. *Hort. cliff. 24. Sp. pl. 83.*
Gramen loliaceum angustiore folio et spica. Baub. pin. 9. R. Syn. 395.
Lolium rubrum. Ger. Em. 78. f. Phoenix Park. 1145.
β Gramen loliaceum paniculatum. R. Syn. 395.
Anglis, perennial Darnel-graſs.
Habitat ad vias et pratis succioribus ubique. 4. VI.
- temulen-* 2. *LOLIUM* spica aristata, radice annua. *Syst. nat. 879. Sp. pl. 83.*
Lolium album. Ger. Em. 78. Park. 1146. R. Syn. 396.
Gramen loliaceum spica longiore. Baub. pin. 9. th. 121.
Anglis, annual Darnel-graſs.
Habitat in arvis. 5. VII. VIII.

ELYMUS. 91.

Involucrum diphyllum. Spiculæ geminæ:

- arenarius.* 1. *ELYMUS* foliis mucronato-pungentibus. *It. scan. 336. Sp. pl. 83.*
Secale spiculis geminatis. Fl. suec. I, 106.
Gramen caninum maritimum spica tritcea nostras. R. Syn. 390. Sch. agr. 6.

Gra-

Gramen caninum maritimum spicatum. *Baub. pin.* I.

Gramen caninum geniculatum maritimum spicatum.

Park. 1277.

Anglis, Sea Lyme-grass.

Habitat in littoribus maritimis frequens. 4. V. VI.

T R I T I C U M. 94.

Cal. bivalvis, subtriflorus, sessilis, obtusiusculus,
acutus.

1. TRITICUM calycibus subulatis trifloris acuminatis. *repens.*
Sp. pl. 86.

Gramen spica triticea repens vulgare, caninum dic-
tum. *R. Syn.* 390.

Gramen caninum. *Ger. Em.* 23. *vulgatius.* *Park.*
1173. *Hist. Ox.* III. 178. t. 1. f. 8.

Gramen caninum arvense f. Gramen *Dioscoridis.*
Baub. pin. I. th. 7.

Anglis, common Wheat-grass, Dog's-grass, Quick-
grass, or Couch-grass.

Habitat in agris ubique. 4. VI.—VIII.

Pharmac. *Graminis canini Radix.*

2. TRITICUM calycibus subulatis quadrifloris aristatis. *caninum.*
Sp. pl. 86.

Elymus spiculis rectis involucro destitutis; infimis ge-
minis. *Fl. suec.* 112. *Syst. Nat.* 879.

Gramen caninum aristatum radice non repente, sylva-
ticum. *R. Syn.* 390.

Gramen caninum non repens elatius, spica aristata.
Hist. Ox. III. 177. t. 1. f. 2.

Anglis, bearded Wheat-grass.

Habitat in sylvis et sepibus. In Stokenchurch woods
plentifully; circa Croydon, D. Doody; near Settle
in Yorkshire, Mr. J. Sherard. *R. Syn. in via*
inter Greenwich & Woolwich. 4. VI. VII.

3. TRITICUM calycibus truncatis quinquefloris, foliis *junceum!*
involutis. *Cent. pl.* 13. *Syst. Nat.* 880.

Gramen maritimum, spica loliacea foliis pungentibus
nostras. *Pluk. Ph.* t. 33. f. 4. a.

Gramen

TRIANDRIA DIGYNIA.

- Gramen phoenicoides foliis convolutis, juncceis ac pungentibus alterum. *Baub. hist. II.* 478.
 β Gramen loliaceum maritimum supinum spica crassiore. *Tourn.* 516. *R. Syn.* 391.
 γ Gramen caninum maritimum spica foliacea. *Baub. pin. 2.*
Anglis, Sea Wheat-grass.
Habitat in littoribus maritimis passim. 24. VI. VII.

H O R D E U M. 93.

Involucrum hexaphyllum, triflorum.

- murinum.* 1. HORDEUM flosculis lateralibus masculis aristatis. *Sp. pl. 85.*
Hordeum spurium vulgare. *Park.* 1147.
 Gramen secalinum et secale sylvestre. *Ger. Em.* 73. *R. Syn.* 391.
 Gramen hordeaceum minus et vulgare. *Baub. pin. 9.*
 β Gramen secalinum. *Ger. Em.* 29.
 γ Gramen secalinum palustre et maritimum. *R. Syn.* 392.
Anglis, Wall Barley-grass, or Way-bennet.
Habitat ad vias et muros, β in pratis humidis, γ in pratis maritimis. 24. IV. ad VIII.

S E C A L E. 92.

Involucrum diphylum, biflorum.

- villosum.* 1. SECALE glumaram ciliis villosis, squamis calycinis cuneiformibus. *Sp. pl. 84.*
 Gramen secalinum majus sylvaticum. *Hist. Ox. III.* 180. *R. Syn.* 393.
 Gramen hordeaceum montanum spica strigosiori brevius aristata. *Sch. agr. pr. t. 1.*
Anglis, Wood Rye-grass.
Habitat in fribus et sepibus. In Stokenchurch woods in Oxfordshire, plentifully, Mr. Bobart. In the woods a mile west from Petersfield, Mer. pin. In the high woods by Hambleton, in the road from Henley

TRIANDRIA DIGYNIA.

47

ley to Great Marlborough, Mr. J. Sherard and Mr. Rand. R. Syn. ♂. VII.

C Y N O S U R U S . 81.

Cal. bivalvis, multiflorus ; Recept. unilaterale.

1. CYNOSURUS bracteis pinnatifidis. Sp. pl. 72. Fl. cristatus.
fuec. 88.
Gramen cristatum. Bauh. hist. II. 468. Ger. Em.
29. R. Syn. 398.
Gramen cristatum anglicum. Park. 1159.
Gramen pratense cristatum, s. Gramen spica cristata
læve. Bauh. pin. 3. tb. 43.
β Gramen cristatum quadratum s. quatuor cristatum
glumarum versibus. R. Syn. 399.
Anglis, crested Dog-tail-grass.
Habitat in pratis et paucis. 24. VIII.
2. CYNOSURUS bracteis pinnato-paleaceis aristatis. echinatus.
Roy. lugdb. 64. Sp. pl. 72.
Gramen alopecuroides spica aspera. Bauh. pin. 4.
Gramen alopecuroides spica alpea brevi. Park. 1168.
R. Syn. 397.
Anglis, rough Dog tail-grass.
Habitat in arenosis. Common on all the sandy grounds
in Jersey; Mr. J. Sherard. ♂. VII.
3. CYNOSURUS bracteis integris. Sp. pl. 72. Fl. cœruleus.
fuec. 89.
Gramen glumis variis. Bauh. pin. 10. pr. 21.
Gramen parvum montanum spica crassiore purpo-
cœrulea brevi. R. Syn. 399.
Anglis, blue Dog-tail-grass.
Habitat in pratis montosis. In prate Hels-fellab,
prope Kendal, et alibi in Westmorlandia. 24. VII.
4. CYNOSURUS panicula subspicata, flosculis sim- paniceus.
plicibus biaristatis. Sp. pl. 73. Fl. fuec. 90.
Panicum floribus conglomerato spicatis lævibus arista
dimidio brevioribus. Fl. fuec. ed. I. 54.
Alopecuros maxima anglica, Park. 1166. R. Syn.
396.

Alope-

TRIANDRIA DIGYNIA.

Alopecuros altera maxima anglica paludosa. Ger.
Em. 88.

Gramen alopecuroides anglobritannum maximum.
Bauh. pin. 4.

Anglis, bearded Dog-tail-grass.

Habitat in riguis herbidis comitatus Southamptoniae proxime salinis et antiquis ædes Drayton vocatas, eis mare, duobus miliaribus Anglicis a Portsmouth ex adverso vectis insulæ plurima; itemque in uidis fossis lacustribus Essexiensis comitatus juxta Thameis amoenissima fluente. At Purfleet in Essex, over against the mill towards Raynam, on the other side of the great ditch; Mr. Newton. R. Syn. 4. VII.

T R I A N D R I A.

M O N T I A. 96.

Cat. diphyllus. *Cor.* monopetala, irregularis. *Cap.* unilocularis, trivalvis.

- fontana.* 1. MONTIA. *Fl. lapp. 30. suec. 115. Sp. pl. 87.*
Montia aquatica minor. Mich. gen. 18. t. 13. f. 2.
Cameraria arvensis minor. Dill. giff. 46.
Alfine parva palustris tricoccos, portulacæ aquaticæ similis. R. Syn. 252.
Portulaca arvensis. Bauh. pin. 288.
Anglis, Water Chickweed.
Habitat ad fontes et scaturagines. ⊖. IV.

Classis

*Classis IV.***TETRANDRIA****MONOGYNIA.**

* *Flores monopetali, monospermi, superi. Aggregati.*

DIPSACUS. 107.

Cal. communis polyphyllus; proprius superus. Re-
cept. paleaceum.

1. DIPSACUS foliis sessilibus ferratis, aristis fructus re- *fullonum,*
curvis.

Dipsacus foliis sessilibus ferratis. *Sp. pl. 97.*

Dipsacus sativus. *J. Baub. bist. III. 73. Bauh. pin.*
385. Ger. Em. 1167. Park. 983. R. Syn. 192.

Carduus fullonum. Lob. ic. 17.

Anglis, manured Teasel.

Habitat ad sepes. ♂. VII.

Pharmac. Dipaci sativi Radix.

2. DIPSACUS foliis sessilibus ferratis, aristis fructus e. *sylvestris*
rectis.

Dipsacus sylvestris aut *Virga pastoris major. Bauh.*
pin. 385.

Dipsacus sylvestris. *Ger. Em. 1167. Park. 984. R.*
Syn. 192.

Anglis, wild Teasel.

Habitat in incultis frequens. ♂. VII.

3. DIPSACUS foliis petiolatis appendiculatis. *Sp. pl. 97. pilosus.*

Dipsacus sylvestris capitulo minore, vel *Virga pastoris*
minor. Bauh. pin. 385.

TETRANDRIA MONOGYNIA.

Dipsacus minor seu virga pastoris. Ger. Em. 1168.

R. Syn. 192.

Virga Pastoris. Park. 984.

Anglis, small wild Teafel.

Habitat in aquosis et ad sepes. 4. VIII.

S C A B I O S A. 108.

Calyx communis polyphyllus ; proprius duplex super-
rus. Receptaculum paleaceum.

* *Corollulis quadrifidis.*

succisa. 1. SCABIOSA corollulis quadrifidis æqualibus, caule simplici, ramis approximatis, foliis lanceolato-ovatis.

Fl. suec. 119. mat. med. 41. Sp. pl. 98.

Scabiosa radice succisa, flore globoſo. R. Syn. 191.

Succisa glabra et hirsuta. Bauh. pin. 269.

Morsus Diaboli. Ger. Em. 726.

Morsus Diaboli vulgaris, flore purpureo. Park. 491.

Anglis, Devil's-bit.

Habitat in pratis et pascuis. 4. VI.—VIII.

arvensis. 2. SCABIOSA corollulis quadrifidis radiantibus, caule hispido foliis pinnatifidis hispidis. Syst. Nat. 889.

Sp. pl. 99.

Scabiosa caule et foliis hirsutis, imis ovatis, superioribus semipinnatis. Hall. helv. 669.

Scabiosa pratensis hirsuta. Bauh. pin. 269.

Scabiosa major vulgaris. Ger. Em. 719.

Scabiosa vulgaris pratensis. Park. 484.

Scabiosa major communior folio laciniato. Bauh. hifl. III. 2.

Anglis, common field Scabious.

Habitat in pratis et arvis. 4. VIII.

Pharmacop. Scabiosæ Herba.

** *Corollulis quinquefidis.*

columba-
ria. 3. SCABIOSA corollulis quinquefidis radiantibus, foliis radicalibus ovatis crenatis, caulinis pinnatis setaceis.

Sp. pl. 99.

Scabiosa capitulo globoſo major et minor. Bauh. pin. 270.

Scabiosa

TETRANDRIA MONOGYNIA.

51

Scabiosa minor campestris. Park. 487.

Scabiosa minor sive Columbaria. Ger. Em. 719.

Anglis, the lesser field Scabious.

Habitat in pascuis montosis, et siccoribus; supra Dupper's hill prope Croydon. 24. VI. VII.

** *Flores monopetalii, monocarpii, inferi.*

CENTUNCULUS 135.

Cal. quadrifidus. Cor. quadrifida patens. Stam. brevia. Caps. unilocularis, circumscissa.

1. CENTUNCULUS. Cat. giss. 161. app. III. t. 5. *minimus.* R. Syn. 1. Fl. suec. 136. Sp. pl. 116.

Anagallis paludosa minima, foliis subrotundis alternis. Vail. Paris. 12. t. 4. f. 2.

Alsine palustris minima, flosculis albis, fructu coriandri exiguo. Mertz. pug. t. 4. f. 5.

Anglis, bastard Pimpernel.

Habitat in agris arenosis subhumidis. On the low marshy ground near the paper-mills on Hounslow-heath; D. Watson. Blackf. spec. bot. in pascuo ante vicum Chisselhurst-loco subudo. R. Syn. ①. VI.

PLANTAGO 133.

Cal. quadrifidus. Cor. quadrifida: limbo reflexo.

Stam. longissima. Caps. bilocularis circumscissa.

1. PLANTAGO foliis ovatis glabris, scapo tereti, spica major, flosculis imbricatis. Sp. pl. 112. Fl. suec. 129.

Plantago latifolia vulgaris. Park. 493.

Plantago latifolia. Ger. Em. 419. sinuata. Bauh. pin. 189.

2. *Plantago latifolia glabra minor.* Bauh. pin. 189.

Anglis, great Plantain, or Waybread.

Habitat in pratis et ad vias ubique. ①. VI. VII.

Pharmac. Plantaginis Herba, Semina.

2. PLANTAGO foliis ovato-lanceolatis pubescentibus, media spica cylindrica, scapo tereti. Sp. pl. 113. Hort. cliff. 36. Fl. suec. 130.

Plantago major incana. Park. 493. R. Syn. 314.

Plantago incana. Ger. Em. 419.

TETRANDRIA MONOGYNIA.

Plantago latifolia incana. Baub. pin. 189.

Anglis, hoary Plantain.

Habitat in pascuis glareosis et ad vias. 4. VII. VIII.

lanceolata. 3. PLANTAGO foliis lanceolatis, spica subovato nulla, scapo angulato. Fl. suec. 131. Sp. pl. 113.

Plantago lanceolata. Baub. hist. III. 505.

Plantago angustifolia major. Baub. pin. 189.

Plantago quinquenervia. Ger. Em. 422. major. Park.

495.

Anglis, Ribwort, or Ribwort-plantain.

Habitat in pratis et pascuis ubique. 4. VI. VIII.

beflingii. 4. PLANTAGO foliis linearibus subdentatis, scapo tereti, spica cylindrica, bracteis carinatis membranaceis.

Plantago foliis linearibus subdentatis, scapo tereti, spica ovata, bracteis carinatis membranaceis. Læfl. bisp. 124. Sp. pl. 115.?

Plantago marina. Ger. Em. 423. R. Syn. 315. vulgaris. Park. 498.

Anglis, Sea-plantain.

Habitat in palustribus maritimis. 4. VII.

mariima. 5. PLANTAGO foliis semicylindraceis integerrimis basi lanatis, scapo tereti. Sp. pl. 114. Fl. suec. 133.

Eaten by the Icelanders. Piantago scapo spicato, foliis linearibus subtus convexis. Fl. lapp. 63.

Plantago maritima major tenuifolia. Tourn. 127. Coronopus, Ger. Em. 425. maritima major. Baub. pin. 190.

Anglis, narrow-leaved Plantain.

Habitat in littoribus maritimis inter Newcastle & Morpeth in Northumbria. 4. VI. VII.

Coronopus. 6. PLANTAGO foliis linearibus pinnato-dentatis, scapo tereti.

Plantago foliis linearibus dentatis, scapo tereti. Sp. pl. 115.

Plantago foliis linearibus pinnato-dentatis. Hort. cliff. 37.

Plantago foliis laciniatis, Coronopus dicta. R. Syn. Coronopus 315.

Coronopus vulgaris sive *Cornu Cervinum*. Park.

502.

Coronopus sylvestris hirsutior. Baub. pin. 190.

Cornu Cervinum. Ger. Em. 427.

3 *Plantago gramineo folio hirsuto minor, capitulo rotundo brevi*. R. Syn. 316.

Anglis, Buckshorn-plantain, Star of the Earth.

Habitat in *glareosis*. O. VII. VIII.

Pharmac. Coronopi Herba.

7. PLANTAGO foliis linear-lanceolatis basi lanatis, *montana*.
spica subrotunda, scapo tereti.

Plantago alpina angustifolia. Baub. hist. III. 506. R.
Syn. 315.

Anglis, Mountain-plantain.

Habitat in *rupibus* Trivylcaugh *supra lacum Lhyn*
Bochlyn Sancti Parisii; D. Lhwyd. R. Syn. 4.
VII.

8. PLANTAGO foliis subulatis, scapo unifloro. Syſt. uniflora.

Nat. 896. Fl. suec. 135. Fl. lapp. 64. Sp. pl. 115.

Plantago palustris gramineo folio, monanthos parifensis. Tourn. 128. R. Syn. 316.

*Plantago floribus feminineis sessilibus ad exortum scapi
uniflori maris*. Juss. act. 1742. p. 131. t. 7.

Gramen junceum sive Holosteum minimum palustre,
capitulis quatuor longissimis staminibus donatis.
Hist. Ox. III. 230. t. 9. f. 30. Pluk. Ph. t. 35.
f. 2.

Anglis, Grass-leaved Plantain.

Habitat in *palustribus, arenosis*. Ad Hoseley Lough in
Northumberland; D. Richardson. R. Syn. in eri-
ceto Hounsflejano prope Witton. 4. VII.

** *Flores monopetali, monocarpi superi*.

S A N G U I S O R B A. 136.

Cal. diphyllus. Germen inter calycem corollamque.

1. SANGUISORBA spicis ovatis. Hort. cliff. 39. Fl. officinalis.
suec. 137. Sp. pl. 116.

E 3

San-

TETRANDRIA MONOGYNIA.

Sanguisorba major flore spadiceo. *Baub. hist. III.* 2.
120. *R. Syn.* 203.

Pimpinella sanguisorba major. *Baub. pin.* 160.

Pimpinella major vulgaris. *Park.* 582.

Pimpinella sylvestris. *Ger. Em.* 1045.

β *Sanguisorba minor.* *Baub. hist. III.* 2. 113.

Anglis, Burnet.

Habitat in pratis et pascuis subhumidis, β in pascuis montosis. 4.

Pharm. Pimpinellæ Herba.

* *Flores monopetalii, dicocci, superi. Stellatae.*

R U B I A. 119.

Cor. monopetala, campanulata. Baccæ duæ, monospermæ.

anglica. I. *RUBIA* foliis quaternis. *Roy. lugdb.* 254. *Sp. pl.* 109.

Rubia quadrifolia asperima lucida peregrina. *Herm. lugdb.* 523.

Rubia sylvestris. *Park.* 274.

Anglis, wild Madder.

Habitat in rupe S. Vincentii, prope Bristolium, & in sepiibus in Devonia frequens. 4. VII. VIII.

S H E R A R D I A. 112.

Cor. monopetala infundibuliformis, Semina bina, tridentata.

arvensis. I. *SHERARDIA* foliis omnibus verticillatis, floribus terminalibus. *Sp. pl.* 102. *Fl. suec.* 120.

Sherardia. *Dill. gen.* 96. *Hort. cliff.* 33.

Rubeola arvensis repens cærulea. *Baub. pin.* 334. *pr.* 145. *R. Syn.* 225.

Rubeola minor pratensis cærulea. *Park.* 276.

Anglis, little Field-madder.

Habitat in arvis. Q. V. VI.

ASPERULA.

ASPERULA. 113.

Cor. monopetala, infundibuliformis. *Sem.* duo globosa.

1. ASPERULA foliis octonis lanceolatis, floribus fasci- odorata.
culatis pedunculatis. *Fl. suec.* 121. *Sp. pl.* 103.

Asperula *Ger. Em.* 1224. *R. Syn.* 224. *odorata. Park.*
563.

Asperula f. Rubeola montana odorata. *Baub. pin.* 334.
Anglis, Woodroot.

Habitat in *sylvis et umbrosis.* 4. V.
Pharm. Asperulæ *odoratæ Herba.*

2. ASPERULA foliis quaternis linearibus, superioribus *cynanchica*
oppositis caule erecto, floribus quadrifidis. *Syst.*
Nat. 891.

Asperula foliis inferioribus senis, intermediis quaternis
subulatis triquetris, floribus quadrifidis. *Sp. pl.* 104.

Rubeola foliis quaternis, seminibus glabris, floribus
umbellatis. *Hall. helv.* 458.

Rubeola vulgaris quadrifolia lœvis, floribus purpuran-
tibus. *Tourn.* 130. *R. Syn.* 225.

Rubia *cynanchica.* *Baub. pin.* 333. *bijt. III.* 723.

Synanchica. *Lugd.* 1185. *Ger. Em.* 1120.

Asperula repens *Gesneri f.* *Saxifraga altera Cæsalpini.*
Park. 453.

Anglis, Squinancy-wort.

Habitat in *montosis siccoribus, præsertim cretaceis.* 4.
VII.

GALIUM. 117.

Cor. monopetala, plana. *Sem.* bina subrotunda.

* *Fruclu glabro.*

1. GALIUM foliis octonis linearibus sulcatis, ramis flo- *verum.*
riferis brevibus. *Hort. cliff.* 34. *Mat. med.* 46.

Sp. pl. 107. *Fl. suec.* 123.

Gallium caule erecto, foliis plurimis verticillatis line-
aribus. *Fl. lapp.* 61.

Gallium luteum. *Baub. pin.* 335. *Ger. Em.* 1126.
Park. 564. *R. Syn.* 224.

TETRANDRIA MONOGYNIA.

Anglis, yellow Ladies Bedstraw, or Cheese-rening.
Habitat in pratis ad viarum agrorumque margines, locis
siccis frequens. 4. VII. VIII.
Pharmacop. Gallii Herba.

- X *Mollugo.* 2. **GALIUM** foliis octonis ovato-linearibus subferratis patentissimis mucronatis, caule flaccido, ramis patentibus. *Sp. pl.* 107.
Mollugo vulgarior. *Park.* 565. *R. Syn.* 223.
Rubia sylvestris lœvis. *Baub. pin.* 333.
Rubia sylvestris. *Ger. Em.* 1118.
Anglis, wild Madder, or great bastard Madder.
Habitat in sepibus et ericetis frequens. 4. VI. VII.
- montanum* 3. **GALIUM** foliis senis obovatis mucronatis glabris, caule prostrato, pedunculis ternatis.
Mollugo montana minor Gallio albo similis. *R. hist.*
I. 482. *Syn.* 224.
Gallium album minus. *Pet. H. Br.* t. 30. f. 6.
Anglis, mountain Ladies Bedstraw.
Habitat in montosis. 4. VII.
- uliginosum.* 4. **GALIUM** foliis senis lanceolatis retrorsum ferrato-aculeatis mucronatis rigidis, corollis fructu majoribus. *Fl. suec.* 127.
Aparine palustris minor Parisiensis, flore albo. *Tourn.*
I 14. *Vaill. parif.* 14. *Fl. lapp.* 58. *R. Syn.* 225.
Rubia quædam minor. *Baub. hist.* III. 2. 716.
Anglis, marsh Goose-grafts.
Habitat in ericetis et pascuis humidioribus frequens, in
ericeto Hampstediano prope Londinum copiose. 4.
 VII. VIII.
- erectum.* 5. **GALIUM** foliis octonis glabris lanceolatis mucronatis, caule suberecto, panicula terminali, pedunculis dichotomis.
Anglis, small mountain bastard Madder.
Habitat in pascuis montosis humidiusculis. 4. VIII.
- pusillum.* 6. **GALIUM** foliis octonis hispidis linearibus acuminatis subimbricatis, pedunculis dichotomis. *Sp. pl.* 106.
Rubeola saxatilis. *Baub. pin.* 334. *pr.* 145.
Anglis,

Anglis, the least Ladies Bedstraw.

Habitat in montibus prope Kendal, in comitatu Westmorlandico, 4. VIII.

7. GALIUM foliis quaternis obovatis inæqualibus, caulis diffusis. *Fl. suec.* 126. *Sp. pl.* 105.

Gallium palustre album. *Baub. pin.* 335.

Gallium album. *Ger. Em.* 1126. *Baub. hist.* III.

721.

Molluginis vulgationis varietas minor. *Park.* 565.

R. Syn. 224.

Anglis, white Ladies Bedstraw.

Habitat ad ripas fluviorum et in pratis humidioribus.

4. VII.

8. GALIUM foliis senis lanceolatis carinatis scabris retrorsum aculeatis, geniculis simplicibus, fructibus glabris. *Sp. pl.* 106.

Aparine semine læviore. *R. Syn.* 225. *hist.* 484.

Aparine lævis. *Park.* 567.

Anglis, Goose-grass with smoother seeds.

Habitat in arvis sed rarius. ④. VI.

** *Fructu hispido*.

9. GALIUM foliis octonis lanceolatis carinatis scabris retrorsum aculeatis, geniculis villosis, fructu hispido. *Aparine.* x *Sp. pl.* 108.

Aparine vulgaris. *Baub. pin.* 334. *Park.* 567.

Aparine. *Ger. Em.* 1122. *Baub. hist.* III. 713. *R. Syn.* 225.

Anglis, Cleavers, or Goose-grass.

Habitat in cultis et ruderatis ubique. ④. V. VIII.

Pharm. Aparines *Herba*.

10. GALIUM foliis verticillatis, pedunculis bifloris fructibus hispidis. *Sp. pl.* 108.

Gallium parisiense tenuifolium, flore atro purpureo. *Tourn.* 664.

Aparine foliis lineari-lanceolatis acuminatis flaccidis, corollis fructu majoribus. *Roy. lugdb.* 255.

Aparine minima. *R. Syn.* 225. t. 9. f. 1.

Anglis,

TETRANDRIA MONOGYNIA.

Anglis, the least Goose-grass.

Habitat in muris et pratis sterilibus subhumidis. 4. VII.

boreale. 11. **GALIUM** foliis quaternis lanceolatis trinerviis glabris, caule suberecto, semenibus hispidis. *Fl. lapp.* 60. *suec.* 124. *Sp. pl.* 108.

Mollugo montana erecta quadrifolia. *R. Syn.* 224.

Rubia erecta quadrifolia. *Bauh. hist.* III. 716.

Rubia pratensis laevis, acuto folio. *Bauh. pin.* 333. *pr.* 145.

Anglis, Crosswort-madder.

Habitat in pratis montosis, in comitatibus Westmorlandico & Eboracensi. 4. VI.—VIII.

Flores tetrapetali superi.

C O R N U S. 139.

Involucrum tetraphyllum saepius. *Petala supera* quatuor. *Drupa* nucleo biloculari.

sanguinea. 1. **CORNUS** arborea, cymis nudis. *it.* *W-goth.* 32. *Sp. pl.* 117.

Cornus umbellis involucro multoties longioribus. *Hort. cliff.* 38. *Roy. lugdb.* 249. *Hall. helv.* 463.

Cornus femina. *Bauh. pin.* 447. *Ger. Em.* 1467. *Park.* 1521. *R. Syn.* 460.

Anglis, the female Cornel, Dog-berry-tree, Gatter-tree, or Prickwood.

Habitat in sepibus et sylvis. 2. VI.

herbacea. 2. **CORNUS** herbacea, ramis binis. *Fl. lapp.* 65. *t.* 5. *f. 3.* *Sp. pl.* 118.

Cornus pumila herbacea, Chamæpericlymenum dicta. *Dill. alth.* 108. *t.* 91.

Chamæpericlymenum. *Park.* 1461. *Ger. Em.* 1296. *R. Syn.* 261.

Periclymenum humile. *Bauh. pin.* 302.

Anglis, dwarf Honeysuckle.

Habitat in Northumbriæ montibus Chevioticis dictis. *R. Syn.* in Pickering moor in comitatu Eboracensi.

4. VI.

Flores

Flores incompleti inferi.

A L C H E M I L L A. 153.

Calyx octofidus. Cor. nulla. Sem. conicum.

1. ALCHEMILLA foliis lobatis. *Fl. suec. 141. Sp. vulgaris.*
pl. 123. Alchemilla foliis simplicibus. Fl. lapp. 66.
Alchemilla. *Ger. Em. 949. R. Syn. 158. vulgaris.*
Bauh. pin. 319.
Alchemilla major vulgaris. *Park. 538.*
Anglis, Ladies Mantle.
Habitat in pratis et pascuis montosis. 4. VI.—VIII.
Pharmac. Alchemillæ Herba.

2. ALCHEMILLA foliis lobatis, plicatis, acute serra- *minor.*
tis, fericeis.
Alchemilla alpina pubescens minor. *Tourn. 508.*
Pluk. Ph. t. 240. f. 1.
Anglis, the least Ladies Mantle.
Habitat in montibus Westmorlandicis. 4. VII.

3. ALCHEMILLA foliis digitatis ferratis. *Fl. suec. alpina.*
142. Sp. pl. 123.
Alchemilla alpina pentaphyllos. *R. Syn. 158.*
Pentaphyllum petrosum, Heptaphyllum Clufii. *Ger.*
Em. 988.
Tormentilla alpina folio fericeo. *Bauh. pin. 326.*
Tormentilla argentea. *Park. 393.*
Anglis, Cinquefoil Ladies Mantle.
Habitat in montosis. *In rupibus juxta stagnum Hul-*
water dictum inveni, non longe a Penrith Cumber-
landiæ oppido; non procul a Kendal in Westmor-
landia, in vallicula umbrosa Longsledale dicta. D.
Richardson. R. Syn. 4. VII.

D I G Y N I A.

A P H A N E S. 154.

Cal. octofidus. *Cor.* o. *Sem.* bina, nuda.

- arvensis.* 1. APHANES. *Hort. cliff.* 39. *Fl. suec.* 143. *Gron.*
virg. 17. *Sp. pl.* 123.
Percepier Anglorum. *Lob.* 727. *Ger. Em.* 1594.
R. Syn. 159.
Polygonum felinoides. *Park.* 449.
Chærophyllo nonnihil similis. *Bauh. pin.* 152.
Alchemilla minima montana. *Col. Ec.* 145. t. 146.
Anglis, Purfley-piert.
Habitat in arvis et pascuis succioribus et glareosis fre-
quens. ♂. V.

T E T R A G Y N I A.

P O T A M O G E T O N. 160.

Cal. o. *Petala* quatuor. *Stylus nullus.* *Sem.* quatuor.

- natans.* 1. POTAMOGETON foliis oblongo-ovatis petiolatis
natantibus. *Sp. pl.* 126.
Potamogiton rotundifolium. *Bauh. pin.* 193. *R. Syn.*
148.
Potamogiton latifolium. *Ger. Em.* 821.
Fontalis major latifolia vulgaris. *Park.* 1254.
Anglis, broad leaved Pondweed.
Habitat in fluviis et stagnis paſſim. 24. VIII.
- perfolia-*
tum. 2. POTAMOGETON foliis cordatis amplexicaulibus.
Sp. pl. 126.
Potamogiton perfoliatum. *R. hist. I.* 188. *Syn.* 149.
Potamogiton foliis latis splendentibus. *Bauh. pin.*
193.
Potaniogiton. 3. *Dodonæi.* *Ger. Em.* 822.

Pota-

β Potamogiton rotundifolium alterum. *Lofæl. fl. pr.*

205. t. 15.

Anglis, perfoliated Pondweed.

Habitat in *flaviis frequens*. 4. VI. VII.

3. POTAMOGETON foliis lanceolatis planis in *pe-lucens*.

tiolos desinenibus. *Hort. cliff.* 40. *Fl. suec.* 147.

Sp. pl. 126.

Potamogiton aquis immersum folio pellucido, lato,
oblongo, acuto. *R. Syn.* 148.

Potamogiton foliis angustis splendentibus. *Bauh. pin.*
193.

Potamogiton longis acutis foliis. *Ger. Em.* 822.

Anglis, long leaved Pondweed.

Habitat in *flaviis et lacubus*. 4. VI.

4. POTAMOGETON foliis lanceolatis alternis undu- *crispum*.

latis serratis. *Roy. lugdb.* 212. *Fl. suec.* 148. *Sp. pl.*

126.

Potamogiton f. *fontinalis crispata*. *Bauh. hist.* III. 778.
R. Syn. 149.

Potamogeton foliis *crispis* f. *Laetula ranarum*. *Bauh.*
pin. 193.

Tribulus aquaticus minor *Quercus floribus*. *Ger. Em.*
824.

Tribulus aquaticus minor prior. *Park.* 1248.

Anglis, the greater Water-caltrops.

Habitat in *flaviis, fossis, stagnis ubique*. 4. V. VI.

5. POTAMOGETON foliis lanceolatis oppositis sub- *serratum*.
undulatis. *Sp. pl.* 126.

Potamogeton f. *Fontalis media lucens*. *Bauh. hist.*
III. 777. *R. Syn.* 149.

Potamogeton longo serrato folio. *Bauh. pin.* 193.

Tribulus aquaticus minor, *Moscatellæ floribus*. *Ger.*
Em. 823.

Tribulus aquaticus minor alter. *Park.* 1248.

β Potamogeton folio angusto pellucido fere gramineo.
Doody. *R. Syn.* 148.

Anglis, the lesser Water-caltrops, or Frog's-lettuce.

Habitat in *flaviis leniter fluentibus*. 4. VI.

- compreſum.* 6. POTAMOGETON foliis linearibus obtusis caule compresso. *Fl. suec.* 149. *Sp. pl.* 127.
Potamogeton caule compresso, folio graminis canini.
R. hift. I. Syn. 149.
Anglis, small branched Pondweed with a flat stalk.
Habitat in fluviis. *In Cambridge and many other ri-*
vers. *R. Syn.* 4. VI. VII.
- gramineum.* 7. POTAMOGETON foliis linear-lanceolatis alternis ſeffilibus ſtipula latioribus. *Fl. suec.* *Sp. pl.* 127.
Potamogiton gramineum latiusculum foliis et ramifi-
cationibus dense stipatis. *Budd. H. Sic. Vol.*
27. R. Syn. 149. t. 4. f. 3.
β Potamogiton gramineum latum. *Pet. b. br. t. 5. f. 10.*
Anglis, glaſs leaved Pondweed.
Habitat in fossis prope Deptford. *R. Syn.* 4.
- pufillum.* 8. POTAMOGETON foliis linearibus oppofitis alter-
 nisque diſtantibus: basi patentibus, caule tereti.
Fl. suec. 153. *Sp. pl.* 127. *Dalib. paris.* 56.
Potamogiton pufillum, gramineo folio, caule tereti.
R. hift. 190. *Syn.* 150.
Potamogeton minimum capillaceo folio. *Baub. pin.*
193. pr. 101.
Potamogeton gramineum angustifolium. *Pet. b. br.*
t. 5. f. 11.
Anglis, small grass-leaved Pondweed.
Habitat in fossis et stagnis. 4. VI. VIII.
- pectinatum.* 9. POTAMOGETON foliis setaceis parallelis aproxi-
 matis diſtichis. *Fl. suec.* 150. *Sp. pl.* 127. *Dalib.*
paris. 55.
Potamogiton millefolium, seu foliis gramineis ramo-
ſum. *R. Syn.* 150.
Potamogeton gramineum ramosum. *Baub. pin.* 193.
Millefolium tenuifolium. *Ger. Em.* 828.
Anglis, Fennel-leaved Pondweed.
Habitat in fluviis. *In fluvio Serpentine river dicto in*
Hyde-park prope Londinum. 4. VI.

10. POTAMOGETON foliis linearibus alternis distinctis inferne vaginantibus. *Fl. suec.* 152. *Sp. pl.* 127.

Potamogiton maritimum ramosissimum, grandiusculis capitulis, capillaceo folio nostras. *Pluk. Ph. t.* 216. *f. 5.* *R. Syn.* 150.

Potamogeton foeniculaceum. *Pet. b. br. t.* 5. *f. 13.*
Anglis, Sea Pondweed.

Habitat in fossis maritimis. In fossis pone Sheerness, abunde. *R. Syn.* 24. VIII.

R U P P I A. 161.

Cal. o. Cor. o. Sem. quatuor pedicellata.

1. RUPPIA. *Hort. cliff.* 436. *It. W-goth.* 186. *Fl. maritima.* *suec.* 154. *Sp. pl.* 54.

Buccaferra maritima foliis acutissimis. *Mich. gen.* 72.
t. 35.

Potamogiton maritimum gramineis longioribus foliis, fructu fere umbellato. *Pluk. Alm.* 305. *R. Syn.* 135.

Potamogiton maritimum pusillum alterum, feminibus singulis longis pediculis insidentibus. *Pluk. Ph. t.* 248. *f. 4.*

Potamogiton maritimum pusillum alterum. *R. hist.* I.
190.

Anglis, Sea-grass.

Habitat in maritimis. In fossis in insula Shepey copiose.
24. VIII.

S A G I N A. 162.

Cal. tetraphyllus. Petala quatuor. Cap. quadrilobularis, quadrivalvis.

1. SAGINA ramis procumbentibus. *Fl. lapp.* 157. *suec.* *procumbens.*
Sp. pl. 128.

Alsinella muscosa flore repens. *Cat. giss.* 81. *R. Syn.* 345.

Saxifraga graminea pusilla, flore parvo tetrapetalia.
R. Syn. 2. 206.

Saxifraga anglica al sine folio. *Ger. Em.* 568.

Saxifraga pusilla graminea, flore parvo herbido et muscosa. *Merr. pin.*

Al sine

TETRANDRIA TETRAGYNIA.

- Alsinē saxifraga peregrina tenuis folia, flore parvo tetrapetalo radice reptatrice. *Pluk. alm.* 23.
- Caryophyllum minimus muscosus nostras. *Park.* 1340.
- β Saxifraga anglica Alsinē folia annua. *Plot. hist. n. ox.* t. 9. f. 7.
- γ Saxifraga graminea pusilla foliis brevioribus, crassioribus et succulentioribus. *R. Syn.* 345.
Anglis, Pearl-wort, or Chickweed Breakstone.
Habitat in muris, tectis, pratis arenosis ubique. ◎. VI.
- erecta.* 2. SAGINA caule erecto subunifloro. *Sp. pl.* 128.
 Alsinella foliis caryophylleis. *Cat. giss.* 47. *R. Syn.* 344. t. 15. f. 4.
 Alsinē tetrapetalos Caryophylloides, quibusdam Holosteum minimum. *R. Syn. ed.* 2. 206.
 Alsinē verna glabra. *Vaill. paris.* 6. t. 3. f. 2.
Anglis, the least Stichwort.
Habitat in pascuis glareosis frequens. ◎. IV. V.

Clavis

Classis V.

PENTANDRIA

MONOGYNIA.

* *Flores monopetali, inferi tetraspermi. Asperifoliæ R.*

M Y O S O T I S. 165.

*Cor. hypocrateriformis, quinquefida, emarginata :
fauce clausa fornicibus,*

MYOSOTIS seminibus nudis : foliorum apicibus *scorpioides*
callosis. *Syst. Nat.* 915. *Fl. suec.* 175. *Sp. pl.*
131.

Myosotis foliis hirsutis. *Hort. cliff.* 45.

Myosotis scorpioides hirsuta. *Park.* 691. *R. Syn.* 229.

Myosotis scorpioides hirsuta. *Ger. Em.* 337.

Echium scorpioides arvense. *Bauh. pin.* 254.

¶ *Myosotis scorpioides latifolia hirsuta.* *Merr. pin.* R.
Syn. 229. t. 9. f. 2.

γ *Myosotis scorpioides hirta minor.* *Merr. pin.* R. *Syn.*
229.

Echium scorpioides minus flosculis luteis. *Bauh. pin.*
254.

♪ *Myosotis scorpioides palustris.* *Ger. Em.* 337. *R. Syn.*
229.

Echium scorpioides palustre. *Bauh. pin.* 254.

Anglis, Mouse-ear Scorpion-graſs.

Habitat in pratis exaridis ubique. β *in fossis, et ad sca-*
turagines et fontes. 4. IV.—VIII.

LITHOSPERMUM. 166.

Cor. infundibuliformis fauce perforata, nuda. Cal.
quinquepartitus.

1. LITHOSPERMUM seminibus lœvibus, corollis vix *officinaliæ*, X
calycem superantibus, foliis lanceolatis. *Syst. Nat.*
913. *Sp. pl.* 133.

Lithospermum majus erectum. *Bauh. pin.* 258.

Lithospermum minus. *Ger. Em.* 609.

Lithospermum vulgare minus. Park. 432.

Lithospermum seu milium solis. Bauh. *hist.* 3. 590.
R. Syn. 228.

Anglis, Gromwell, Gromill or Graymill.

Habitat in locis glareosis et aridis. Circa Bristolium copiose; in sylva Charlton wood dicta in Cantio; Dr. Wilmer. 24. V. VI. Near Hadleigh in Suffolk.
Pharmac. Lathospermi semina.

purpureo
cæruleum. 2. *LITHOSPERMUM* seminibus lœvibus, corollis calycem multoties superantibus. *Hort. cliff.* 46. *Sp. pl.* 132.

Lithospermum minus repens latifolium. Bauh. *pin.* 258.

Lithospermum majus. Ger. *Em.* 609.

Lithospermum vulgare majus. Park. 258.

*Lithospermum majus Dodonæi, flore purpureo, semi-*ne Anchusæ. Bauh. *hist.* III. 572. *R. Syn.* 229.

Anglis, the lesser creeping Gromwell.

Habitat in pascuis montosis. On the top of a bushy hill near Denbigh town in Wales, on the north side of the town; also in Somersetshire, not far from Taunton. *R. Syn.* 24. VI.

X arvense. 3. *LITHOSPERMUM* seminibus rugosis, corollis vix calycem superantibus. Fl suec. 160. *Sp. pl.* 132.
Lithospermum arvense radice rubra. Bauh. *pin.* 258.
Park. 432. *R. Syn.* 227.
Anchusa degener facie Milii solis. Ger. *Em.* 610.
Anglis, bastard Alkanet.
Habitat in arvis frequens. ♂. V. VI.

A N C H U S A. 167.

Cal. infundibuliformis fauce clausa fornicibus.

semperfiri- 1. *ANCHUSA* pedunculis diphyllis capitatis. *Sp. pl.* 134.
Buglossum latifolium sempervirens. Bauh. *pin.* 256.
Borago sempervirens. Ger. *Em.* 797. *R. Syn.* 227.
Anglis, evergreen Alkanet.
Habitat in ruderatis. Near Hornsplace near Rochester in Kent, *R. Syn.* Juxta Vauxhall prope Londonum. 24. V. VI.

CY-

CYNOGLOSSUM. 168.

Cor. infundib. fauce clausa fornicibus. *Semina de-*
pressa, interiore tantum latere stylo affixa.

CYNOGLOSSUM staminibus corolla brevioribus, fo- *officinale.* X
 liis lato-lanceolatis tomentosifessilibus. *Fl. suec.*
 162. *Sp. pl.* 134.

Cynoglossum foliis lanceolato-ovatis, corollis calycem
 æquantibus. *Roy. lugdb.* 406. *Mat. med.* 60.

Cynoglossum majus vulgare. *Baub. pin.* 257. *Ger. Em.*
 804. *Park.* 511.

¶ Cynoglossum folio virenti. *Baub. hist.* III. 600. *R. Syn.*
 226.

Anglis, Hound's-tongue.

Habitat in ruderatis et ad vias. β In the London road,
 between Kelveden and Witham in Essex; but more
 plentifully about Braxted by the way-sides. At South-
 end by Eltham, Mr. J. Sherard. In a hedge facing
 the road on Stamford-hill, between Newington and
 Todenham. *R. Syn.* 4. VI.

Pharmac. Cynoglossi Radix.

PULMONARIA. 169.

Cor. infundib. fauce pervia. *Cal.* prismatico-pen-
 tagonus.

1. PULMONARIA foliis radicalibus ovato-cordatis *officinalis.*
 scabris. *Sp. pl.* 135. *Mat. med.* 62. *Hall. helv.* 516.

Pulmonaria foliis Echii. *Ger. Em.* 808.

Symphytum maculosum s. Pulmonaria latifolia. *Baub.*
 pin. 259.

Pulmonaria latifolia. *Park.* 248.

Anglis, Bugloss-cowslips, or long-leaved Sage of Je-
 rusalem.

Habitat in nemorosis. In a wood by Holbury-house, in
 the new forest, Hampshire. *R. Syn.* 4. V.

2. PULMONARIA calycibus abbreviatis, foliis ovatis, *maritima.*
 caule ramoso procumbente. *Sp. pl.* 136.

Cerinthe foliis ovatis petiolatis. *Hort. cliff.* 48. *Roy.*
 lugdb. 408.

PENTANDRIA MONOGYNIA.

Cerinthe maritima procumbens. Dill. elth. 75. t. 65.
f. 75.

Echium marinum. Phyt. Br. Cat. Engl. R. Syn. 228.

Buglossum marinum. Pet. H. Br. t. 29. f. 3.

Cynoglossum procumbens glaucophyllum maritimum
nostras floribus purpuro-cæruleis seiminibus lævibus.

Pl. ph. t. 172. f. 3.

Buglossum dulce ex Insulis Lancastriæ. Park. 765.
Anglis, Sea Bugloss.

Habitat in maritimis et arena mobili. Near White-haven in Cumberland, and against Bigger in the isle of Walney, in Lancashire, Mr. Lawson. Near Trefarthen in Anglesea, and in abundance by the river Euyfni, in the way from Dinardinlle to Clynnog in Carnarvonshire, Mr. Lhwyd. R. Syn. 4. VII.

SYMPHYTUM. 170.

Corolla limbus tubulato-ventricosus : fauce clausa
radiis subulatis.

X officinale. 1. SYMPHYTUM foliis ovato-lanceolatis decurrentibus. Mat. med. 61. Fl. suec. 165. Sp. pl. 136.

Symphytum majus vulgare. Park. 523.

Symphytum, consolida major. Baub. pin. 259. Ger. Em. 660.

β Symphytum flore purpureo. Merr. pin.

Anglis, Comfrey.

Habitat in aquosis et ad ripas fluviorum. 4.

Pharmacop. Consolidæ majoris Radix.

BORAGO. 172.

Corolla rotata : fauce radiis clausa.

X officinalis. * 1. BORAGO foliis omnibus alternis, calycibus patentibus. Sp. pl. 137.

Borago hortensis. Ger. Em. 797. R. Syn. 228.

Borago floribus cæruleis et albis. Bauh. hist. III.

574.

Buglossum latifolium, Borago. Bauh. pin. 256.

Anglis, Borage.

Habitat in ruderatis viis, muris, frequens. 4. VI. VIII.

Pharm. Boraginis Folia, Flores.

A S P E R U G . O . 173.

*Cal. fructus compressus lamellis plano parallelis,
sinuatis.*

I. ASPERUGO. *Fl. lapp. 76. Fl. suec. 159. Sp. pl. procumbens.*
138. Hall. helv. 522.

*Buglossum sylvestre, caulis procumbentibus. Bauh.
pin. 257. Hist. Ox. III. 439. t. 26. f. 13.*

Borago minor sylvestris. Park. 765.

Aparine major. Plinii Ger. Em. 1122.

*Anglis, small wild Bugloss, great Goose-grass, and
German Madwort.*

*Habitat in ruderatis quinguibus. By Boxley in Sussex,
and in the Holy Island. R. Syn. 228. prope Purfleet
in Essex; D. Alchorne. O. IV. V.*

L Y C O P S I S . 174.

Corollæ tubus incurvatus.

I. LYCOPSIS foliis lanceolatis hispidis, calycibus flo-*arvenfis.*
rescentibus erectis. *Fl. lapp. 77. Fl. suec. 167.*
Sp. pl. 139.

*Buglossum sylvestre minus. Bauh. pin. 256. Park.
765.*

*Buglossa sylvestris minor. Ger. Em. 799. R. Syn.
227.*

Anglis, small wild Bugloss.

Habitat in arvis et ad vias frequens. O. VI.—IX.

E C H I U M . 175.

Corolla irregularis, fauce nuda.

I. ECHIUM caule simplici erecto, foliis caulinis lan.*vulgare.*
ceolatis hispidis, floribus spicatis lateralibus stami-
nibus corollam æquantibus. *Mill. Diet. Hort. edit. 6.*

*Echium caule simplici erecto, foliis caulinis lanceo-
latis hispidis, floribus spicatis lateralibus. Hort.
cliff. 43. Roy. lugdb. 407. Sp. pl. 139.*

*Echium vulgare. Bauh. pin. 254. Bauh. hist. III.
586. Park. 414. Ger. Em. 802. R. Syn. 227.*

Anglis, Vipers Bugloss.

PENTANDRIA MONOGYNIA.

Habitat in arvis et ad vias; in agro Cantiano frequens.
24. VII.

Pharmacop. Echii Herba, Flores.

anglicum. 2. ECHIUM caule simplici erecto, foliis lanceolato-linearibus hispidis, floribus spicatis lateralibus. Staminibus corolla longioribus. *Mill. Dict. hort. edit. 6.* Echium alterum sive *Lycopsis Anglicana*. *Merr. pin. R. Syn. 228.*

Lycopsis Anglicana Lobelii.

Anglis, English Vipers Bugloss.

Habitat in arvis pascuis sterilioribus et ad vias frequens.
24. VIII.

italicum. 3. ECHIUM corollis subæqualibus vix calycem exceedingibus: margine villosis. *Syst. Nat. 916. Sp. pl. 139.*

Lycopsis. *Baub. pin. 255. Park. 519. Ger. Em. 802. R. Syn. 227.*

Anglis, Wall Vipers Bugloss.

Habitat in arenosis. In the isle of Jersey, on the sandy grounds, near S. Hilary, plentifully. 24. VII.

* *Fl. monopetali, inferi, angiospermi.*

PRIMULA. 180.

Involucrum umbellulæ. Corollæ tubus cylindricus: ore patulo.

vulgaris. 1. PRIMULA foliis dentatis rugosis, scapo unifloro.

Primula veris vulgaris. *Park. 536. R. Syn. 284.*

Primula veris minor. *Ger. Em. 781.*

Verbasculum sylvarum majus singulari flore. *Baub. pin. 241.*

Anglis, common Primrose.

Habitat in sylvis sepibus et ericetis ubique. 24. IV. V.

veris.

2. PRIMULA foliis dentatis rugosis, scapo multifloro.

Primula foliis dentatis rugosis. *Sp. pl. 142.*

Primula veris major. *Ger. Em. 781. R. Syn. 284.*

Verbasculum pratense odoratum. *Baub. pin. 241.*
Para-

PENTANDRIA MONOGYNIA.

71

- Paralyfis vulgaris pratensis flore flavo simplici odorato.*
Park. th. 535. Par. 244.
- β *Verbasculum pratense aut sylvaticum inodorum.* *Baub. pin. 241.*
- Primula pratensis inodora lutea.* *Ger. Em. 780. R. Syn. 284.*
- Anglis, a Pagils or Cowslips. β Great Cowslips or Oxslips.*
- Habitat in pratis 4. IV. V.*
- Pharmacop. Paralyfis Flores.*

3. *Primula foliis crenatis glabris, florum limbo plano, farinosa.*
Fl. suec. 172. Sp. pl. 143.
- Primula veris flore rubro.* *Ger. Em. 783.*
- Verbasculum umbellatum alpinum minus.* *Baub. pin. 247. R. Syn. 285.*
- Paralyfis minor flore rubro.* *Park. par. 246.*
- Anglis, Bird's-eye.*
- Habitat in paludibus montosis in comitatibus Westmorlandico et Eboracensi copiose.* *4. V.*

MENYANTHES. 185.

- Corolla hirsuta. Stigma bifidum. Caps. unilocularis.*
1. *MENYANTHES foliis ternatis.* *Fl. suec. 173. lapp. trifolia.*
80. Hall. helv. 487. Sp. pl. 145.
- Menianthe palustre triphyllum latifolium et angustifolium.* *Tourn. 117. R. Syn. 285.*
- Trifolium palustre.* *Baub. hist. II. 389. Baub. pin. 327.*
- Trifolium paludosum.* *Ger. Em. 1194. Park. 1212.*
- Anglis, Marsh Trefoil, or Buck-bean.*
- Habitat in palustribus et aquosis frequens.* *4. VI. VII.*
- Pharmacop. Trifolii paludosii Herba.*
2. *MENYANTHES foliis cordatis integerrimis, corollis ciliatis.* *Sp. pl. 145.*
- Nymphæa lutea minor flore fimbriato.* *Baub. hist. II. 772. Baub. pin. 194. R. Syn. 368.*
- Anglis, fringed Water-lilly.*
- Habitat in fluviis et fossis majoribus.* *4. VI. VII.*

PENTANDRIA MONOGYNIA.

HOTTONIA. 186.

Cor. hypocrateriformis. *Stam.* tubo corollæ imposita.
Cap. unilocularis.

palustris. 1. HOTTONIA pedunculis verticillato-multifloris. *Syst.*

Nat. 919

Hottonia. *Boerb. ind.* alt. 207. *R. Syn.* 285. *Sp. pl.* 145.

Millefolium aquaticum seu Viola aquatica caule nudo.
Baub. pin. 141.

Millefolium aquaticum floridum seu Viola aquatica.
Park. 1256.

Viola palustris. *Ger. Em.* 826.

Anglis, Water-violet.

Habitat in fossis et paludibus frequens. 4. VII. VIII. VI.

LYSIMACHIA. 188.

Cor. rotata. *Cap.* globosa, mucronata, decemvalvis.

* *Pedunculis multifloris.*

x vulgaris. 1. LYSIMACHIA paniculata racemis terminalibus. *Fl.* suec. 175. *Sp. pl.* 146.

Lysimachia foliis lanceolatis, racemo composito terminali. *Virid. cliff.* 415. *Roy. lugdb.* 416.

Lysimachia lutea. *Baub. hist. II.* 901. *Ger. Em.* 474. *R. Syn.* 282.

Lysimachia lutea major. *Baub. pin.* 245. *vulgaris*
Park. 544.

β Lysimachia lutea foliis brevioribus et obtusis, floribus in summitate congestis. *R. Syn.* 282.

Anglis, yellow Willow-herb, or Loosestrife.

Habitat in paludibus nemorosis et ad ripas fluviorum. 4. VI. VII.

Pharmac. Lysimachia Herba.

thysiflora. 2. LYSIMACHIA racemis lateralibus pedunculatis. *Fl.* suec. 176. *Sp. pl.* 147.

Lysimachia ex alis foliorum thrysifera. *Fl. lapp.* 82.

Lysimachia lutea flore globo. *Ger. Em.* 475. *Park.* 544. *R. Syn.* 283.

Lysimachia

Lysimachia bifolia flore globoso luteo. *Baub. pin.* 245.
Anglis, tufted Loosestrife.

Habitat in paludibus et ad ripas fluviorum sed rarius. *Brickhills*
Found by Mr. Dodsworth in the East Riding of Ely
 Yorkshire. In Nynnechytiked, Anglesea, Mr.
 Lhwyd. By Kings-Langley in Hertfordshire. *Pb. Br. R. Syn.* 24. VI.

** *Pedunculis unifloris.*

3. *LYSIMACHIA* foliis ovatis acutis, floribus solitariis, *nemorum.*
 caule procumbente. *Hort. cliff.* 52. *Roy. lugdb.*
 416. *Sp. pl.* 148.

Anagallis lutea, *Ger. Em.* 618. *nemorum.* *Baub. pin.*
 252.

Anagallis flore luteo. *Park.* 558.

Anglis, yellow Pimpernell of the Woods.

Habitat in sylvis et umbrosis humidioribus. 24. V. VI.

4. *LYSIMACHIA* foliis subcordatis, floribus solitariis *Nummu-* x
caule repente. Fl. suec. 177. *Sp. pl.* 148. *Hall. laria.*
Helv. 481.

Nummularia. *Ger. Em.* 630. *vulgaris Park.* 555.

Nummularia major lutea. *Baub. pin.* 309.

Anglis, Moneywort.

Habitat in pratis et pascuis humidis. 24. VI.

5. *LYSIMACHIA* foliis ovatis acutiusculis, pedunculis *tenella.* x
 folio longioribus, caule repente. *Sp. pl.* 148.

Lysimachia foliis orbiculatis planis, floribus solitariis
 rubellis caule repente. *Sauv. monsp.* 135.

Nummularia minor flore purpurascente. *Baub. pin.*

310. *Park.* 555. *Ger. Em.* 630. *R. Syn.* 283.

Anglis, purple Moneywort. *Bagshot heath* ~~XII miles from London.~~
 Habitat in paludibus cespitosis. 24. VII. VIII.

A N A G A L L I S. 189.

Corolla rotata. Caps. circumscissa.

1. *ANAGALLIS* foliis indivisis, caule procumbente. *arvensis.*
Sp. pl. 148. *Fl. suec.* 178.

Ana-

PENTANDRIA MONOGYNIA.

*Anagallis flore phænico. Baub. pin. 252. Park. 558.
R. Syn. 282.*

Anagallis mas. Ger. Em. 617.

β *Anagallis phænica foliis amplioribus ex adverso quaternis. Pluk. alm. 29. R. Syn. 282.*

γ *Anagallis fæminea. Ger. Em. 617. R. Syn. 282. cæruleo flore. Baub. pin. 252.*

δ *Anagallis terrestris flore albo. R. Syn. 282.*

Anglis, male Pimpernel, γ female Pimpernel.

Habitat in arvis, et locis arenosis, γ in arvis inter Camberwell et Stockwell. ⊖. V.—VIII.

CONVOLVULUS. 198.

Cor. campanulata, plicata. Stigm. duo. Capſ. bilocularis : loculis dispermis.

* *Caule volubili.*

arvensis. 1. CONVOLVULUS foliis sagittatis utrinque acutis, pedunculis unifloris. *Fl. suec. 181. Sp. pl. 153. Dalib. paris. 65.*

Convolvulus minor vulgaris. Park. 171. R. Syn. 275.

Convolvulus minor arvensis. Baub. pin. 294.

Smilax laevis minor. Ger. Em. 861.

β *Convolvulus arvensis minimus. D. Dent. R. Syn. 276.*

γ *Convolvulus flore minimo ad unguem fere secto. R. Syn. 276.*

Anglis, small Bindweed.

Habitat in arvis et ad vias ubique. 4. VI. VII.

sepium. 2. CONVOLVULUS foliis sagittatis postice truncatis, pedunculis tetragonis unifloris. *Syst. nat. 922. Sp. pl. 152.*

Convolvulus major album. Baub. pin. 294. Park. 163. R. Syn. 275.

Smilax laevis major. Ger. Em. 861.

Anglis, great Bindweed.

Habitat in sepibus subhumidis. 4. VII. VIII.

** *Caule*

** *Caule prostrato.*

- 3 CONVOLVULUS foliis reniformibus, pedunculis *Soldanella.*
unifloris. *Sp. pl.* 159. *Mat. med.* 81.
Convolvulus maritimus *Soldanella dicta.* *R. Syn.* 276.
Soldanella marina. *Ger. Em.* 861.
Soldanella maritima minor. *Baub. pin.* 295.
Soldanella vulgaris. *Park.* 161.
Anglis, Sea Bindweed. Scottish Scurvy-grass.
Habitat in littoribus maritimis frequens. 4. VII.

POLEMONIUM. 200.

Cor. quinquepartita. *Stam.* squamis basin corollæ
claudentibus inserta. *Stigma trifidum.* *Caps.* tri-
locularis, supera.

1. POLEMONIUM foliis pinnatis floribus terminalibus cæruleum.
erectis calycibus tubo corollæ longioribus. *Syst. Nat.*
925. *Sp. pl.* 162.
Valeriana cærulea. *Baub. pin.* 164.
Valeriana græca. *Ger. Em.* 1076. *Park.* 122.
Anglis, great Valerian, Ladder to Heaven, and Jacob's
Ladder.
Habitat in dumetis infra Malham-cove, eundo ab oppido
ad Malham-cove dextrorum, ad sinistram enim re-
una invenitur planta; Dr. Richardson, *R. Syn.* 280.
4. VI. on the Hills between Morton in marsh & Broadway.

VERBASCUM. 217.

Cor. rotata, subinæqualis. *Caps.* bilocularis, bivalvis.

1. VERBASCUM foliis decurrentibus utrinque tomen- *Thapsus.*
tosis. *Vir. cliff.* 13. *Mat. med.* 90. *Fl. suec.* 195.
Sp. pl. 177.
Verbascum caule simplici superne floribus sessilibus
clavato, foliis utrinque lanigeris. *Hort. cliff.* 55.
Verbascum mas latifolium luteum. *Baub. pin.* 239.
R. Syn. 287.
Verbascum album vulgare, sive *Thapsus barbatus*
communis. *Park.* 60.
Thapsus barbatus. *Ger. Em.* 773.
Anglis,

PENTANDRIA MONOGYNIA.

Anglis, great white Mullein, High-taper, Cow's Lungwort.

Habitat in locis cretaceis, arenosis, sterilissimis passim.
♂. VII.

Pharmac. Verbasci Folia.

Lichnitis. 2. VERBASCUM foliis cuneiformi-oblongis. *Hort.*
ups. 45. *Sp. pl.* 177.

Verbascum foliis ovato-acutis subtus villosis, crenatis,
spicis laxis lateralibus et terminalibus. *Hort. cliff.* 54.

Verbascum flore albo parvo. *Baub. hist.* III. 873.
R. Syn. 287.

Verbascum Lichnitis flore albo parvo. *Baub. pin.* 240.

Verbascum mas foliis longioribus. *Park.* 60.

Verbascum Lichnitis Matthioli. *Ger. Em.* 775.

β Verbascum pulverulentum flore luteo parvo. *Baub.*
hist. III. 872. *R. Syn.* 287.

Anglis, Hoary Mullein, or white flowered Mullein.

Habitat in locis arenosis et cretaceis, in agro Cantiano
frequens. β circa maenia Nordovici urbis; et ad Bu-
riam oppidum. *R. Syn.* ♂. VII.

nigrum. } 3. VERBASCUM foliis cordato-oblongis petiolatis.
Mat. med. 91. *Sp. pl.* 178.

Verbascum foliis ovatis crenatis subtus tomentosis cau-
le angulato. *Vir. cliff.* 13. *Roy. lugdb.* 421. *Da-
lib. paris.* 91.

Verbascum nigrum flore parvo, apicibus purpureis.
Baub. hist. III. 873. *R. Syn.* 288.

Verbascum nigrum flore ex luteo purpurascente. *Baub.*
pin. 240.

Verbascum nigrum. *Ger. Em.* 775. *vulgare Park.* 61.

Verbascum nigrum salvifolium luteo flore. *Lob. adv.*
241. 466.

Anglis, Sage-leaved black Mullein.

Habitat ad vias in agro Cantiano passim. 24. VII.

Blattaria. 4. VERBASCUM foliis amplexicaulibus oblongis gla-
bris, pedunculis solitariis. *Hort. ups.* 46. *Sp. pl.*
178.

Verbascum foliis glabris ferrato-dentatis, radicalibus
sinuatis. *Roy. lugdb.* 421. *Sauv. monsp.* 276.

Blattaria

PENTANDRIA MONOGYNIA.

77

Blattaria lutea. *Baub. hist. III.* 874. *R. Syn.* 288.

Blattaria lutea folio longo laciniato. *Baub. pin.* 240.

Blattaria flore luteo. *Park.* 64.

Blattaria Plinii. *Ger. Em.* 776.

Anglis, yellow Moth Mullein.

Habitat in *pascuis glareofis.* Prope Charlton in Cantio.

◎. VI.

V I N C A. 261.

Cor. contorta Folliculi duo, erecti. *Semina nuda.*

1. VINCA caulis procumbentibus, foliis lanceolato- minor.
ovatis. *Sp. pl.* 209.

Vinca Pervinca minor. *Ger. Em.* 894. *R. Syn.* 268.

Vinca Pervinca vulgaris. *Park.* 380.

Clematis daphnoides minor. *Baub. pin.* 301. *Bauh.*
hist. II. 130.

Anglis, Periwinkle.

Habitat in *sepibus et sylvis sed rarius.* In *sylvula*
prope Hampsteadum. 4. V. *

Pharm. *Vincæ Herba.*

2. VINCA caulis erectis, foliis ovatis. *Sp. pl.* 209. major.
Clematis daphnoides major. *Baub. pin.* 302. *R. Syn.*
268.

Clematis daphnoides latifolia, f. *Vinca Pervinca ma-*
jor. *Park.* 380.

Clematis daphnoides, f. *Pervinca major.* *Ger. Em.*
894.

Anglis, the greater Periwinkle.

Habitat in *sylvis et sepibus passim.* 4. V.

H Y O S C Y A M U S. 219.

Cor. infundibuliformis, obtusa. *Stamina inclinata.*

Cap. operculata, bilocularis.

1. HYOSCYAMUS foliis amplexicaulibus. *Hort. cliff.* niger.

56. *Mat. med.* 86. *Fl. suec.* 199. *Sp. pl.* 179.

Hyoscyamus vulgaris. *Baub. hist. III.* 627. *R. Syn.*
274.

Hyoscyamus niger. *Ger. Em.* 353. f. *vulgaris.* *Baub.*
pin. 169. *Park.* 362.

* *By the road-side, on the left hand, as one ascends*
the hill in going from Enham to Andover; plen-
ticularly. *Anglis,*

PENTANDRIA MONOGYNJA.

Anglis, common Henbane.

Habitat ad Pagos, vias, fossas, ruderata. ⊖. VI.

Pharmac. Hyoscyami Radix, Semina, Herba.

D A T U R A. 218.

Cal. infundibul. plicata. *Cal.* tubulosus, angulatus, desiduus. *Capf.* tetravalvis.

Stramoni- * 1. DATURA pericarpiis spinosis erectis ovatis. Fl. um. suec. 198. Sp. pl. 179.

Stramonium fructu spinoso oblongo, flore albo. Tourn. I19.

Solanum pomo spinoso oblongo, flore calathoide, Stramonium vulgo dictum. R. Syn. 266.

Solanum foetidum, pomo spinoso oblongo, flore albo. Baub. pin. 164.

Stramonium spinosum. Ger. Em. 349.

Anglis, Thorny Apple.

Habitat in ruderatis circa Londinum passim. ⊖. VII.

Pharmac. Stramonii Herba.

S O L A N U M. 224.

Cor. rotata. Antheræ subcoalitæ, apice poro gemino dehiscentes. *Bacca* bilocularis.

nigrum. 1. SOLANUM caule inermi herbaceo, foliis ovatis dentato-angulatis, umbellis nutantibus. Mat. med. 94. Fl. suec. 200. Sp. pl. 186.

Solanum vulgare. Park. 346. R. Syn. 264.

Solanum officinarum. Baub. pin. 166.

Solanum hortense. Ger. Em. 339. f. vulgare baccis nigris. Baub. hist. III. 608.

β Solanum hortense f. vulgare baccis luteis. Baub. hist. III. 608.

Anglis, Garden or common Nightshade.

Habitat in ruderatis. ⊖. VI. VII.

Pharmac. Solani Herba, Fructus.

Dulcama- 2. SOLANUM caule inermi frutescente flexuoso, foliis superioribus hastatis, racemis cymosis. Mat. med. 95. Fl. suec. 201. Sp. pl. 71.

Solanum

Solanum lignosum f. *Dulcamara*. *Park.* 350. *R. Syn.* 265.

Solanum scandens f. *Dulcamara*. *Baub. pin.* 167.

Amara Dulcis. *Ger. Em.* 350.

β *Solanum lignosum* f. *Dulcamara marina*. *R. Syn.* 265.

Anglis, Woody Nightshade, or Bitter-sweet.

Habitat in sepibus humidis passim. 4. VI. VII.

Pharmac. *Dulcamarae*. *Radix, Folia, Cortex*.

A T R O P A. 222.

Cor. campanulata. *Stamina distantia*. *Bacca globo-*
sa, bilocularis.

1. ATROPA caule herbaceo, foliis ovatis integris. *Sp. Balladon-*
na. pl. 181.

Balladonna. *Clus. Pann.* 504. *R. Syn.* 265.

Solanum lethale. *Park.* 346. *Ger. Em.* 340.

Solanum melanocerasus. *Baub. pin.* 166.

Anglis, Deadly Nightshade, or Dwale.

Habitat in sylvis, sepibus, ruderatis. In Chuckstone,
near Rochester, in Kent; about Fulborn in Cam-
bridgeshire, Sutton Cofield in Warwickshire. *R.*
Syn. Among the Box going down to Dorking, Surry.
Dr. Wilmer. By the Road-side, under the Park
Wall, between Temsford-mills and Welwyn, Hert-
fordshire. Dr. Watson. *Bl. spec.* 93. 4. VI. VII.

** *Flores monopetalii superi*.

S A M O L U S. 205.

Cor. rotata. *Stamina munita squamulis corollæ*.
Cap. unilocularis.

1. SAMOLUS. *Hort. cliff.* 51. *Fl. suec.* 192. *Sp. pl. valerandi.*
171.

Samolus Valerandi. *Baub. hist.* III. 791. *R. Syn.* 283.

Anagallis aquatica rotundo folio non crenato. *Baub.*
pin. 283.

Anagallis aquatica rotundifolia. *Ger. Em.* 620.

Anagallis aquatica 3. *Lob.* folio subrotundo non cre-
nato. *Park.* 1237.

Anglis, round-leaved Water-pimpernel.

Habitat

PENTANDRIA MONOGYNIA.

Habitat in palustribus, in pratis humidis inter Greenwich et Woolwich. 4. VI.

LONICERA. 210.

Cor. monopetala, irregularis. Baccæ polysperma, bilocularis.

Periclymenum. 1. LONICERA capitulois ovatis imbricatis terminalibus, foliis omnibus distinctis. *Mat. med.* 68. *It. scan.* 305. *Fl. suec.* 193. *Sp. pl.* 173.

Caprifolium Germanicum. Dod. pempt. 411. *R. Syn.* 458.

Periclymenum. Ger. Em. 891.

Periclymenum s. caprifolium vulgare. Park. 1460.

Periclymenum non perfoliatum Germanicum. Bauh. *pin.* 302.

β *Periclymenum foliis quercinis. Merr. pin.*

Anglis, common Honey-suckle, or Woodbine.

Habitat in sepibus. h. V. VII.

Pharmac. Caprifolii. Folia, Flores.

CAMPANULA. 201.

Cor. campanulata fundo clauso valvis staminiferis. Stigma trifidum. Caps. infera, poris lateralibus dehiscens.

* *Foliis lævioribus angustioribus.*

rotundifo- 1. CAMPANULA foliis radicalibus reniformibus, caulinis linearibus. *Fl. lapp.* 83. *Fl. suec.* 184. *Sp. pl.* 163. *Dalib. paris.* 66.

Campanula rotundifolia. Ger. Em. 452. *R. Syn.* 277.

Campanula minor sylvestris rotundifolia. Park. 651.

Campanula minor rotundifolia vulgaris. Bauh. *pin.* 93.

β *Campanula minor rotundifolia alpina. Bauh.* *pin.* 93.

Anglis, lesser round-leaved Bell-flower.

Habitat in ericetis et pascuis sterilibus frequens. 4. VIII.

patula, 2. CAMPANULA foliis strictis : radicalibus lanceolato-ovalibus, panicula patula. *Sp. pl.* 163.

Campanula esculentæ facie, ramis et floribus patulis.

Dill. elth. 68. *t.* 58. *f.* 68.

Anglis,

Anglis, Field Bell-flower.

Habitat in *sylvis et sepibus*. In Buddon wood, near Loughborough, in Leicestershire; Mr. Pultney. 4. VII. VIII.

3. CAMPANULA caule unifloro. *Fl. lapp.* 85. t. 9. *uniflora*.

f. 5. 6. suec. 185 *Sp. pl.* 163.

Anglis, Mountain Bell-flower.

Habitat in Wallia, D. Stillingfleet invenit. In *montibus supra Grasmere*, in Westmorlandia. 4. VII. VIII.

4. CAMPANULA foliis undulatis: radicalibus lanceo-lato-ovalibus panicula coarctata. *Rapunculus* *lus.* *Hort. upf.* 40. *lus.*

Sp. pl. 164.

Rapunculus esculentus. *Baub. pin.* 92. *R. Syn.* 276.

Rapunculus esculentus vulgaris. *Park.* 648.

Rapuntium parvum. *Ger. Em.* 453.

Anglis, Rampions.

Habitat in *aggeribus fossarum et arvis sed rarius*. Prope Croydon in agro Surriensi. 4. VIII.

** *Foliis scabris latioribus.*

5. CAMPANULA foliis ovato-lanceolatis, caule sim-

latifolia. *plicissimo tereti*, floribus solitariis pedunculatis,

fructibus cernuis. *Vir. Cliff.* 17. *Sp. pl.* 165. *Roy.*

lugdb. 245.

Campanula maxima foliis latissimis. *Baub. pin.* 94. *R. Syn.* 276.

Trachelium majus Belgarum. *Park.* 643. five Ginganteum. *Ger. Em.* 448.

Anglis, Giant Throatwort.

Habitat in *dumetis et sepibus*. In the mountainous part of Derbyshire, Staffordshire, Yorkshire, and elsewhere in the north of England plentifully. *R. Syn.* 4. VII. VIII.

6. CAMPANULA caule angulato, foliis petiolatis, ca-

Trache- *lycibus ciliatis*, pedunculis trifloris. *Fl. suec.* 189. *lium.*

Sp. pl. 166.

PENTANDRIA MONOGYNIA.

Campanula vulgatior foliis Urticæ, vel major et aſperior. *Bauh. pin.* 94. *R. Syn.* 276.

Trachelium majus. *Ger. Em.* 448. flore purpureo. *Park.* 644.

Anglis, great Throatwort, or Canterbury Bells. *Habitat in sylvis et sepibus.* 4. VII. VIII.

- glomerata.* 7. *Campanula caule angulato simplici, floribus sessilibus, capitulo terminali.* *Fl. suec.* 190. *it. gotl.* 196. *it. scan.* 306. *Sp. pl.* 166.
Campanula pratensis flore conglomerato. *Bauh. pin.* 94. *R. Syn.* 277.
Trachelium minus. *Park.* 644. *Ger. Em.* 449.
Anglis, lesser Throatwort, or Canterbury Bells.
Habatit in paſciuis montofis et cretaceis frequens. 4. VII.

*** *Caule subdiviso.*

- hybrida.* 8. **CAMPANULA** caule basi subramoso ſtriecto, foliis oblongis crenatis, calycibus aggregatis corolla longioribus, capsulis prismaticis. *Sp. pl.* 168.
Campanula arvensis erecta, vel Speculum Veneris minus. *Park.* 1331. *Ger. Em.* 439. *R. Syn.* 278.
Campanula arvensis minima erecta. *Hist. Ox.* II. 457. t. 2. f. 22.
Anglis, the lesser Venus Looking-glass, or codded Corn-violet.
Habitat in arvis sed rarius. In arvis inter Northfleet et Stone, in Cantio, copioſe. 5. VI. VII.

- hederacea.* 9. **CAMPANULA** foliis cordatis quinquelobis petiolatis glabris, caule laxo. *Dalib. parif.* 68. *Sp. pl.* 169.
Campanula Cymbalariae foliis. *Ger. Em.* 452. *Park.* 652. *R. Syn.* 277.
Campanula Cymbalariae foliis, vel folio hederaceo. *Bauh. pin.* 93.
Anglis, tender Ivy-leaved Bell-flower.
Habitat in locis umbrosis humidis. On many moist and watery banks in the west of England, especially in Cornwall and Devonshire; I have found it also in the North, as about Sheffield in Yorkshire, Mr. Lawson

Lawson. In Bagley wood, near Oxford. R. Syn.
In Wallia frequens. D. Stillingfleet. 24. V. VIII.

PHYTEUMA. 203.

Cor. rotata laciinis linearibus, quinquepartita. *Stigma*
trifidum. *Caps.* trilocularis.

1. PHYTEUMA capitulo subrotundo, foliis ferratis : *orbicula-*
radicalibus cordatis. *Sp. pl.* 170. *ris.*

Rapunculus corniculatus montanus. *Ger. Em.* 455.
R. Syn. 278.

Rapunculus alopecuroides orbiculatus. *Park.* 648.

Rapunculus folio oblongo, spica orbiculari. *Bauh.*
pin. 92.

Anglis, horned Rampions, with a round head or spike
of flowers.

Habitat in *pascuis siccis.* On the Downs of Sussex and
Hampshire. *R. Syn.* 24. VII.

Flores pentapetali inferi.

RHAMNUS. 235.

Cal. tubulosus : squamis stamina munientibus. *Cor.*
nulla. *Bacca.*

1. RHAMNUS spinis terminalibus, floribus quadrifidis *catharti-*
dioicis. *Fl. suec.* 202. *Sp. pl.* 193. *cusa.*

Rhamnus catharticus. *Bauh. pin.* 478. *bijf. I.* 55.
R. Syn. 466.

Rhamnus solutivus. *Ger. Em.* 1337. f. *spina infec-*
toria vulgaris. *Park.* 243.

Anglis, Buckthorn, or purging Thorn.

Habitat in *sylvis et sepibus.* *h. IV. V.*

Pharmac. Spinæ Cervinæ *Baccæ.*

2. RHAMNUS inermis, floribus monogynis herma- *Frangula.*
phroditis, foliis integerrimis. *Fl. suec.* 203. *Mat.*
med. 73. *Sp. pl.* 193.

Frangula seu Alnus nigra baccifera. *Park.* 240. *R.*
Syn. 465.

Alnus nigra baccifera. *Bauh. pin.* 428. *bijf. I.* 560.

Alnus nigra sive Frangula. *Ger. Em.* 1469.

PENTANDRIA MONOGYNIA.

Anglis, the black berry-bearing Alder.
Habitat in *sylvis et sepibus*. h. IV. V.
Pharmac. Frangulæ Cortex.

EUONYMUS. 240.

- Cor. pentapetala. Caps. pentagona, quinquelocularis, quinquevalvis, colorata. Sem. calyprata.*
- europæus.* 1. EUONYMUS floribus plerisque quadrifidis. *Fl. suec.* 204. *Sp. pl.* 197.
Euonymus foliis oblongo-ovatis. *Hort. cliff.* 38.
Euonymus vulgaris. *Park.* 241. *R. Syn.* 468.
Euonymus vulgaris granis rubentibus. *Bauh. pin.* 428.
Euonymus Theophrasti. *Ger. Em.* 1468.
Anglis, Spindletree, or Prickwood.
Habitat in sepibus et sylvis. h. IV. V.

** *Flores pentapetalii superi.*

RIBES. 247.

Petala quinque et stamina calyci inserta. Stylus bifidus. Bacca polysperma.

- rubrum.* * 1. RIBES inerme, racemis glabris pendulis, floribus planiusculis. *Hort. cliff.* 82. *Mat. med.* 99. *Sp. pl.* 200. *Fl. suec.* 205.
Ribes vulgaris fructu rubro. *Ger. Em.* 1593. *R. Syn.* 456.
Ribes fructu rubro. *Park.* 1561.
Grossularia sylvestris rubra. *Bauh. pin.* 455.
 β *Grossularia vulgaris fructu dulci.* *Bauh. pin.* 455.
 γ *Ribes fructu parvo.* *Merr. pin.*
Anglis, Currants.
Habitat in sylvis et sepibus. In sylvis in septentrionali comitatus Eboracenfis parte, inque Dunelmensi Episcopatu et Westmorlandia, D. Johnson. *R. Syn.* h. V.
Pharmac. Ribium Baccæ.

- alpinum.* 2. RIBES inerme, racemis erectis: bracteis flore longioribus. *Sp. pl.* 200.
Ribes alpinus dulcis. *Bauh. hist.* II. 98.
Anglis,

Anglis, sweet Mountain-currants.

Habitat in sylvis et sepibus. In agro Eboracensi invenit, D. Dodsworth; in sepibus juxta Bradford abundat, D. Richardson. R. Syn. 4. V.

3. RIBES inerme, racemis pilosis floribus oblongis. Sp. *nigrum*.
pl. 201. Fl. suec. 207.

Ribes *nigrum* vulgo dictum folio olente. Baub. hist. II.
98. R. Syn. 456.

Ribes fructu nigro. Park. 1562. Ger. Em. 1593.

Grossularia non spinosa fructu nigro. Baub. pin. 455.

Anglis, black Currants, or Squinancy Berries.

Habitat in sylvis humidis et ad ripas fluviorum. We observed it at Abington in Cambridgeshire, Blunham in Bedfordshire, in Warwickshire, Westmoreland and Cumberland. By the Hoppet-bridge near Braintree. R. Syn. 2. V.

H E D E R A. 249.

Petala quinque, oblonga. Bacca quinquesperma, calyce cincta.

1. HEDERA foliis ovatis lobatisque. Fl. lapp. 91. Sp. *Helix*.
pl. 75.

Hedera communis major et minor. Baub. hist. II.
III.

Hedera arborea. B. pin. item major sterilis. Baub.
pin. 305.

Hedera arborea sive scandens et corymbosa communis.
Park. 678.

Hedera helix. Ger. Em. 858.

Anglis, Ivy.

Habitat in sylvis et sepibus. h. X.

Pharmac. Hederæ Folia, Baccæ, Gummi.

* Flores incompleti superi.

I L L E C E B R U M. 256.

Cal. pentaphyllus, cartilagineus. Cor. o. Stigma simplex. Caps. quinquevalvis, monosperma.

1. ILLCEBRUM floribus verticillatis nudis, caulis verticillatum. Sp. pl. 206.

PETNANDRIA MONOGYNIA.

- Corrigiola.* *Cat. giss. app. suppl.* 169. *R. Syn.* 160.
Polygonum serpillofolium verticillatum. *R. Syn. ed. I.*
 160.
Polygonum parvum flore albo verticillato. *Baub. hist.*
III. 378.
Polygalæ repens. *Park.* 1333. *nivea.* *Baub. pin.* 215.
Anglis, verticillate Knot-graſs.
Habitat in palustribus uidis et humidioribus pascuis circa
Pensans oppidum et alibi versus extreum Cornu-
bis angulum. *R. Syn.* 24. VII.

G L A U X. 257.

- Cal. monophyllus.* *Cor. o.* *Caps. unilocularis;* quinquevalvis, quinquesperma.
maritima. 1. GLAUX. *Hort. cliff.* 43. *Fl. suec.* 210. *Sp. pl.*
 207.
Glaux foliis elliptico-oblongis. *Fl. lapp.* 72.
Glaux maritima. *Baub. pin.* 215. *R. Syn.* 285. mi-
 nor. *Park.* 1283.
Glaux exigua maritima. *Ger. Em.* 562.
Anglis, Sea Milkwort, or black Saltwort.
Habitat in littoribus maritimis. 24. VII.

** *Flores incompleti inferi.*

T H E S I U M. 258.

- Cal. monophyllus,* cui stamina inserta. *Sem. unicum.*
Linophyl. 2. THESIUM panicula foliata; foliis linearibus. *Fl. suec.*
lon. 211. *Sp. pl.* 207.
Linaria adulterina. *Ger. Em.* 555. *R. Syn.* 202.
Linaria montana flosculis albicantibus. *Baub. pin.*
 213.
Pseudo linaria montana alba. *Park.* 459.
Anglis, bastard Toad-flax.
Habitat in pascuis montosis præsertim solo cretaceo. As
 upon Gogmagog hills, and Newmarket heath. *R. Syn.*
 prope Basingstoke in Hampshire. 24. VI. VII.

D I G Y N I A.

* *Flores monopetalii inferi.*

S W E R T I A. 284.

Cor. rotata. Neetariferi pori ad basin laciniarum corollæ. *Caps. unilocularis, bivalvis.*

1. SWERTIA corollis quinquefidis, foliis radicalibus *perenniis. ovalibus. Sp. pl. 226.*

Gentiana palustris latifolia. *Baub. pin. 188.*

Gentiana XII. punctato flore. *Clus. hist. I. 316.*

Gentiana Pennei minor. *Ger. Em. 433.*

Anglis, Marsh Gentian.

Habitat in Wallia, D. Richardson invenit. 24. VIII.

G E N T I A N A. 285.

Cor. monopetala. Caps. bivalvis, unilocularis. Receptaculis duobus longitudinalibus.

* *Corollis quinquefidis subcampaniformibus.*

1. GENTIANA corollis quinquefidis campanulatis oppositis pedunculatis, foliis linearibus. *Sp. pl. 228. nanthe. Fl. suec. 228.*

Gentiana floribus terminalibus raris, corollis erectis plicatis, foliis linearibus. *Hort. cliff. 80.*

Gentiana palustris angustifolia. *Baub. pin. 188. R. Syn.*

274.

Gentiana autumnalis Pneumonanthe dicta. *Park. 406.*

Pneumonanthe. *Ger. Em. 438.*

Anglis, Calathian Violet.

Habitat in pratis humidioribus. In pratis Strattoniensi, D. Stillingfleet invenit; prope Tunbridge, Dr. Wilmer; in palustribus prope Milthrop in comitatu Westmorlandico copiose. 24. VIII.

** *Corollis quinquefidis infundibuliformibus.*

2. GENTIANA corollis quinquefidis hypocrateriformibus fauce barbatis. *Sp. pl. 230. Fl. suec. 229.*

PENTANDRIA DIGYNIA.

Gentianella pratensis flore lanuginoso. *Baub. pin.* 188.

R. Syn. 275.

Gentianella fugax autumnalis elatior, centaurii minoris foliis. *R. Syn.* 275.

Gentianella fugax minor. *Ger. Em.* 437.

Anglis, Autumnal Gentian, or Fellwort.

Habitat in pascuis siccioribus. *O.* VII. VIII.

Centauri. 3. *GENTIANA* corollis quinquefidis infundibuliformibus, caule dichotomo. *Sp. pl.* 229.

Centaury minus. *Baub. pin.* 278. *R. Syn.* 286.

Centaury minus flore purpureo et albo. *Baub. hif.* III. 353.

Centaury minus vulgare. *Park.* 272.

Centaury parvum. *Ger. Em.* 547.

Anglis, lesser Centory.

Habitat in pascuis siccioribus et sterilioribus. *O.* VI. VIII.

Pharm. Centaurii minoris Herba, Flores.

*** *Corollis quadrifidis.*

campes-
tris. 4. *GENTIANA* corollis quadrifidis fauce barbatis. *Sp. pl.* 231. *Fl. suec.* 230.

Gentiana corollo hypocrateriformi, tubo villis clauso, calycis foliis alternis majoribus. *Fl. lapp.* 94.

Gentianella fugax verna seu præcox. *R. Syn.* 275.

Gentianella alpina verna minor. *Baub. pin.* 188.

Gentiana purpurea minima. *Col. ecpb.* I. 232. t. 221.

Anglis, vernal dwarf Gentian.

Habitat in pascuis montosis. Found by Mr. Fitz-Roberts on the back side of Halsfellnab, near Kendal; as also in the parks on the other side of Kendal, and on the back of Birkhag. *R. Syn.* O. VII.

filiformis. 5. *GENTIANA* corollis quadrifidis imberibus, caule dichotomo filiformi. *Sp. pl.* 231.

Gentiana caule dichotomo, foliis linear-lanceolatis, floribus infundibuliformibus quadrifidis longissime pedunculatis. *Guett. stamp.* I. 305. *Dalib. pari.* 82.

Centau-

PENTANDRIA DIGYNIA.

39

Centaurium palustre luteum minimum. R. Syn. 286.

Vaill. parif. 32. t. 6. f. 3.

Anglis, Marsh Centory.

*Habitat in palustribus. I found it towards the end of
Cornwal in rotten marshy ground. R. Syn. ①. VII.*

C U S C U T A. 156.

Cal. quinquefidus. Cor. monopetala quinquefida.

Capſ. bilocularis. Sem. duo.

1. CUSCUTA floribus ſeffilibus. *Sp. pl. 124. Fl. suec. europea.*
144.

*Cuscuta major. Baub. pin. 219. R. Syn. 281. f. Caf-
ſutha. Ger. Em. 577. Park. 10.*

Anglis, Dodder, Hellweed, or Devil's Guts.

Habitat in arvis et ericetis paſſim. ①. VII.

Pharm. Cuscutæ f. Epithymi Herba.

* *Flores incompleti.*

C H E N O P O D I U M. 273.

*Cal. pentaphyllus, pentagonus. Cor. nulla. Sem.
unicum lenticulare, ſuperum.*

* *Foliis angulofidis.*

1. CHENOPODIUM foliis triangulari-sagittatis inte- *Bonus*
gerrimis. *Fl. suec. 214. Sp. pl. 218.* *Henricus.*

*Blitum perenne Bonus Henricus dictum. Hift. Ox. II.
599. t. 30. f. 1. R. Syn. 156.*

Bonus Henricus. Baub. hift. II. 965. Ger. Em. 329.

Lapathum unctuosum. Park. 1225.

*Lapathum sylvestre latifolium l. ſeu unctuosum folio
triangulo. Baub. pin. 115.*

Anglis, common English Mercury, or Allgood.

*Habitat in ruderatis, et ad vias, muros, agros paſſim.
4. VIII.*

Pharmac. Boni Henrici Herba.

2. CHENOPODIUM foliis triangularibus ſubdentatis, *urbiculum.*
racemis confertis strictissimis caule approximatis
longissimis. *Fl. suec. 215. Sp. pl. 218.*

Che-

PENTANDRIA DIGYNIA.

Chenopodium latifolium minus ramosum, petiolatis longissimis exfoliorum alis confertim nascentibus.
Buxb. hall. 69. t. I.

Chenopodium erectum, foliis triangularibus dentatis, spisis e foliorum alis plurimis longis erectis tenuibus.
R. Syn. 155.

Anglis, upright Blite.

Habitat in ruderatis. ○. VIII. IX.

rubrum. 3. *CHENOPODIUM* foliis cordato-triangularibus obtusiusculis dentatis, racemis erectis compositis subfolios caule brevioribus. *Syst. Nat. 948. Fl. suec. 217. Sp. pl. 218.*

Chenopodium erectum, foliis subtriangularibus antice sinuato-dentatis, racemis erectis foliosis lateralibus.
Hort. cliff. 85. Roy. lugdb. 219.

Blitum Pes anserinus acutiore folio. *R. Syn. 154.*

Atriplex sylvestris latifolia acutiore folio. *Baub. pin. 119.*

Atriplex sylvestris latifolia altera. *Ger. Em. 328.*

Anglis, sharp-leaved Goosefoot.

Habitat in fimetiis et ruderatis frequens. ○. VIII.

murale. 4. *CHENOPODIUM* foliis ovatis acutis dentatis, racemis ramosis nudis. *Fl. suec. 216. Sp. pl. 219.*

Blitum Pes anserinus dictum. *R. Syn. 154.*

Atriplex sylvestris latifolia. *Baub. pin. 119.*

Pes anserinus. *Ger. Em. 328. Park. 749.*

β *Blitum Morisono atriplex procumbens folio sinuato lucido crasso dictum.* *Hist. Blæf. R. Syn.*

Anglis, common Goosefoot, or Sowbane.

Habitat in locis cuitis, ruderatis frequens. ○. VIII.

hybridum. 5. *CHENOPODIUM* foliis cordatis angulato-acuminatis, racemis ramosis nudis. *Fl. suec. 220. Sp. pl. 219.*

Chenopodium foliis triangulari-sagittatis : infra medium sinuato-dentatis, racemis longissimis. *Hort. cliff. 84. Roy. lugdb. 219.*

Chenopodium Stramonii folio. *R. Syn. 154. Vaill. parif. 36. t. 7. f. 2.*

Cheno-

Chenopodio affinis, folio lato, laciniate, in longissimum mucronem procurrente, florum ramulis sparsis. *R. hist. III. 123.*

β Blito Pes anserinus dicto similis. *R. Syn. 154.*

Anglis, Maple-leaved Blite.

Habitat in ruderatis, fmetis paffim. \odot . VIII.

6. CHENOPODIUM foliis rhomboideo-triangulis ero. *album*.
sis postice integris: summis oblongis, racemis e-
rectis. *Fl. suec. 218. Sp. pl. 219.*

Chenopodium foliis inferioribus ovatis acutis antror-
sum dentatis: summis lanceolatis. *Hort. cliff. 85.*

Chenopodium sylvestre, opuli folio. *Vaill. paris. 36.*
t. 7. f. I.

Blitum atriplex sylvestre dictum. *R. Syn. 154.*

Atriplex folio sinuato candicante. *Baub. pin. 119.*

Atriplex sylvestris vulgarior sinuata major. *Park. 748.*

Atriplex vulgaris. *Ger. Em. 326.*

β Blitum folio subrotundo. *R. Syn. 155.*

Anglis, common Orache.

Habitat in fmetis, cultis, ruderatis. \odot . VIII.

7. CHENOPODIUM foliis rhomboideis dentato-sinu-*viride*.
atis, racemis ramosis subnudis. *Fl. suec. 219. Sp.*
pl. 219.

Chenopodium folio oblongo integro. *Dill. cat. giff.*
154.

Chenopodium foliis integris racemosum. *D. Dale. R.*
Syn. 155.

β Chenopodium crasso et obtuso oleæ folio. *R. Syn. 156.*

Anglis, green Blite.

Habitat in cultis paffim. \odot .

8. CHENOPODIUM foliis deltoideis sinuato-dentatis *serotinum*.
rugosis glabris uniformibus, racemis terminalibus.
Cent. pl. II. Syst. Nat. 948.

Blitum ficus folio. *Pet. H. Br. t. 8. f. 3. R. Syn.*
155.

Atriplex vulgaris sylvestris folio oblongo angusto magno,
utrinque sinu donato, fructu multo racemoso. *Buddl.*
H. S. IV. 38.

Anglis,

PENTANDRIA DIGYNIA.

Anglis, late flowered Blite.

Habitat in fmetis ruderatis paffim. ☽. VIII. IX.

- glaucum.* 9. CHENPODIUM foliis ovato-oblongis repandis,
racemis nudis simplicibus glomeratis. *Fl. suec.* 221.
Sp. pl. 220.
Chenopodium angustifolium laciniatum minus. *Tourn.*
506. *R. Syn.* 155.
Blitum procumbens folio botryoide subtus incano. *D.*
Rand.
Blitum quercus folio. *Pet. H. Br.* t. 8. f. 1.
Anglis, Oak-leaved Blite.
Habitat in ruderatis frequens. ☽. VIII.

** *Foliis integris.*

- Vulvaria.* 10. CHENOPODIUM foliis rhombeo-ovatis iutegerri-
mis floribus conglomeratis. *Fl. suec.* 222. *Mat.*
med. 108. *Sp. pl.* 220.
Blitum foetidum *Vulvaria* dictum. *R. Syn.* 156.
Atriplex olida. *Ger. Em.* 327. *sive sylvestris foetida.*
Park. 749.
Atriplex foetida. *Baub. pin.* 119. *hist. II.* 974.
Anglis, stinking Orache.
Habitat in ruderatis et ad vias, et muros, frequens.
☽. VIII.

- polysper-*
mum. 11. CHENOPODIUM foliis ovatis integerrimis caule
decumbente cymis dichotomis. *Fl. suec.* 223. *Sp.*
pl. 220.
Chenopodium Betæ folio. *Tourn.* 506. *R. Syn.* 157.
Blytum polyspermum. *Baub. pin.* 118. *Park.* 753.
Anglis, round-leaved Blite, or Allseed.
Habitat in cultis, fmetis ruderatis paffim. ☽.

- mariti-*
mum. 12. CHENOPODIUM foliis subulatis femycilindricis.
Sp. pl. 221.
Blitum Kali minus album dictum. *R. Syn.* 156.
Kali minus. *Ger. Em.* 535. *album Park.* 749.
Kali minus album semine splendente. *Baub. pin.* 289.
Anglis, Sea Blite, or white Glasswort.
Habitat in littoribus maritimis frequens. ☽. VII.

13. CHE-

13. CHENOPODIUM foliis linearibus teretibus car-frutico-nosis, caule fruticoso. *Hort. cliff.* 806. *Sp. pl.* 221. *sum.*
 Blitum fruticosum maritimum, Vermicularis frutex dictum. *R. Syn.* 156.
 Sedum minus fruticosum. *Bauh. pin.* 284.
 Vermicularis frutex minor. *Ger. Em.* 523.
 Vermicularis fruticosa altera. *Park.* 731.
Anglis, Shrub Stonecrop, or Glasswort.
 Habitat in littoribus maritimis Norfolchiæ, Devoniarum, Cornubiarum, &c. h. VIII.

S A L S O L A. 275.

Cal. pentaphyllus. *Cor. o.* *Caps.* monosperma. *Sem.* cochleatum.

1. SALSOLA herbacea decumbens, foliis subulatis spinosis scabris, calycibus marginatis exillaribus. *Kali.* *Syst.* *Nat.* 949.
 Salsola herbacea foliis subulatis mucronatis, calycibus ovatis exillaribus. *Sp. pl.* 222. *Fl. suec.* 225.
 Kali spinosum cochleatum. *Bauh. pin.* 289. *R. Syn.* 159.
Anglis, prickly Glasswort.
 Habitat in littoribus maritimis passim. ⊖. VII. VIII.

B E T A. 274.

Cal. pentaphyllus. *Cor. o.* *Sem.* reniforme, intra substantiam baseos calycis.

1. BETA. *Hort. cliff.* 83. *Mat. med.* 113. *Roy. lugdb.* *vulgaris.* 220. *Sp. pl.* 222.
 Beta sylvestris maritima. *Bauh. pin.* 157. *Park.* 750.
 Beta alba et rubra. *Ger. Em.* 319.
Anglis, Sea Beet.
 Habitat in littoribus maritimis ubique. ♂. VIII.
Pharmac. Betæ rubræ et albæ Radix, Folia.

HERNIARIA, 272.

*Cal. quinquepartitus. Cor. nulla. Stamina quinque
sterilia. Caps. monosperma.*

glabra. 1. HERNIARIA glabra. *Bauh. hist. III. 378. Sp. pl.
218.*

Herniaria. Ger. Em. 569. R. Syn. 160.

*Polygonum minus, seu Millegrana major. Bauh. pin.
281.*

*Millegrana major, seu Herniaria vulgaris. Park. 446.
Anglis, smooth Rupture-wort.*

*Habitat in glareosis. In promontorio Cornubiens, the
Lizard-point dicto Herniarium glabram copiosam in-
veni. ♂. VII.*

hirsuta. 2. HERNIARIA hirsuta. *Bauh. hist. III. 379. R. Syn.
161.*

Anglis, rough Rupture-wort.

*Habitat in pratis glareosis sed rarius in pratis juxta
Colney-hatch prope Barnet. ♂. VII. VIII.*

3. HERNIARIA.

*Polygonum maritimum longius radicatum nostras, ser-
pyllifolio circinato crasso nitente. R. Syn. 161.*

*Polygonum minus lentifolium. Bauh. pin. 282. pr.
131.*

*Polygonum minus monspeliense. Park. 446. Pluk.
ph. t. 53. f. 3.*

*Polygonum folio circinata. Pet. h. br. t. 10. f. 6.
Anglis, Sea Rupture-wort.*

*Habitat in littoribus maritimis. In littore Sabriniano,
non procul a Weston supra mare. D. Pluk. R.
Syn. 4.?*

ULMUS. 281.

*Cal. quinquefidus. Cor. o. Baccæ exsucca com-
presso-membranacea.*

campestris 1. ULMUS foliis ovatis duplicato-serratis basi inæqua-
libus. *Sp. pl. 225.*

*Ulmus vulgatissima folio lato scabro. Ger. Em. 1480.
R. Syn. 468.*

Ulmus

Ulmus campestris et Theophrasti. *Bauh. pin.* 426.

Ulmus vulgaris. *Park.* 1404.

¶ *Ulmus minor folio angusto scabro.* *Ger. Em.* 1480.
R. Syn. 469.

Anglis, common Elm.

Habitat in sepibus. h. IV.

Pharm. *Ulmi Folia, cortex medius.*

2. ULMUS foliis oblongo-ovatis duplicato-serratis basi *glabra.*
inæqualibus, cortice glabro.

Ulmus folio latissimo scabro. *Ger. Em.* 1481. *R.*
Syn. 469.

Ulmus latiore folio. *Park.* 1404.

¶ *Ulmus folio glabro.* *Ger. Em.* 1481. *Park.* 1404.

Anglis, broad-leaved Elm, or Wych-hasel.

Habitat in sepibus. h. IV.

* *Flores pentapetali superi dispermi. Umbellatæ.*

A. *Involucro universali partialique.*

ERYNGIUM. 287.

Flores capitali. Receptaculo paleaceo.

1. ERYNGIUM foliis radicalibus subrotundis plicatis *marit-*
spinosis, capitulis pedunculatis. *It. oel.* 151. *Fl. mun.*
fuec. 233. *Sp. pl.* 233.

Eryngium maritimum. *Bauh. pin.* 386.

Eryngium marinum. *Ger. Em.* 1162. *Park.* 986.

R. Syn. 222.

Anglis, Sea holly, or Eryngo.

Habitat in littoribus maritimis. 4. VII. VIII.

Pharmac. *Eryngii Radix.*

2. ERYNGIUM foliis radicalibus pinnatis tripartitis. *campestre.*
Sp. pl. 233.

Eryngium vulgare. *Bauh. hist.* III. 85. *pin.* 386. *R.*
Syn. 222.

Eryngium mediterraneum. *Ger. Em.* 1162. f. *cam-*
pestre. *Park.* 986.

Anglis, common Eryngo.

Habitat in pascuis maritimis. On a rock which you de-
scend to the ferry from Plymouth over into Cornwall;
it

PENTANDRIA DIGYNIA.

it was also sent me by Mr. Thornton, who observed it not far from Daventry in Northamptonshire, beside the old Roman Way, called Watling street, near a Village called Brookhall; observed by Mr. Lawson on the shore called Friar goose, near Newcastle upon Tyne. R. Syn. Below Melling in Yorkshire plentifully. Blacks. spec. bot. 4. VII. VIII.

HYDROCOTYLE. 288.

Umbellæ simplex: Involucro tetraphyllo. Petala integræ. Sem. semiorbiculato compressa.

vulgaris. 1. HYDROCOTYLE foliis peltatis, umbellis quinquefloris. Sp. pl. 234.

Hydrocotyle foliis peltatis orbiculatis undique emarginatis. Hort. cliff. 88. Fl. suec. 234.

Hydrocotyle vulgaris. Tour. 328. R. Syn. 222.

Cotyledon palustris. Ger. Em. 529. Park. 1214.

Ranunculus aquaticus, Cotyledonis folio. Baub. pin. 180.

Anglis, Marsh Pennywort, or White-rot.

Habitat in palustribus. 4. V.

SANICULA. 289.

Umbellæ confertæ, subcapitatae. Fruetus scaber. Flores disci abortientes.

europæa. 1. SANICULA foliis radicalibus simplicibus, flosculis omnibus sessilibus. Hort. cliff. 90. Fl. suec. 235. Sp. pl. 235.

Sanicula officinarum. Baub. pin. 319.

Sanicula s. Diapensia. Ger. Em. 948. R. Syn. 221.

Sanicula vulgaris sive Diapensia. Park. 532.

Anglis, Sanicle.

Habitat in sylvis et sepibus. Sylva Charlton wood dicta in Cantio. 4. V. VI.

Pharmac. Saniculæ Herba.

B U P L E U R U M. 291.

*Involucrum umbellula majora, pentaphylla. Fructus
subrotundus, compressus, striatus.*

1. BUPLEURUM involucris universalibus nullis, foliis *rotundifo-*
perfoliatis. Hort. upf. 64. Sp. pl. 236. *lum.*

Bupleurum perfoliatum rotundifolium annum. *Tourn.*
310. R. Syn. 221.

Perfoliata vulgaris. *Ger. Em. 536. Park. 580.*

Perfoliata vulgatissima seu arvensis. *Baub. pin. 272.*

Anglis, Thorow-wax.

Habitat in arvis. *Circa Lewisham in Cantio, D. Al-*
chorne reperit. ♂. VII. {in a field near Andover, bordering
Pharmac. Perfoliatæ Herba. Upon long mead & Shepherd's spring.

2. BUPLEURUM umbellis simplicibus alternis penta- *tenuissi-*
phyllis subtrifloris. Sp. pl. 238. *mum.*

Bupleurum foliis linearibus acutis sessilibus. *Hort. cliff.*
104.

Bupleurum minimum. *Col. Ec. I. 247. Park. 587.*
R. Syn. 221.

Bupleurum angustissimo folio. *Baub. pin. 278.*

Anglis, the least Hares-ear.

Habitat in paucis sed rariis. *Near Ellesley, in the*
road from Cambridge to St. Neots ; on a bank by
the northern road, a little beyond Huntington ; at
Malden in Essex, in the marshes by the river side,
plentifully ; at Hastings in Sussex ; and near the ferry
in the isle of Thanet. R. Syn. ♂. VII. VIII.

E C H I N O P H O R A. 292.

Fructus pedunculis immersi. Flores varii abortientes.

1. ECHINOPHORA foliolis subulato-spinosis integer- *spinosa.*
rimis. Sp. pl. 239.

Echinophora maritima spinosa. *Tourn. 656. R. Syn.*
220.

Crithmum maritimum spinosum. *Baub. pin. 288. seu*
Pastinaca marina. Park. 1286.

Crithmum spinosum. *Ger. Em. 533.*

Anglis, prickly Sampire, or Sea Parsnep.

Habitat in littoribus maritimis. *Observed by Mr. Law-*

PENTANDRIA DIGYNIA.

son at Roosebeck in Low-Fournies, Lancashire; on the sea beach, in the way from Faversham to Seal Salter. Blackf. sp. bot. 4. VII.

T O R D Y L I U M . 293.

Corolla radicatae, omnes hermaphroditæ. *Fructus* suborbiculatis, margine crenatus. *Involucra* longa indivisa.

- latifoli-* 1. **TORDYLIUM** umbella conferta nudiuscula, foliis pinnatis; foliolis lanceolatis inciso-ferratis. *Sp. pl.* 240.
um. *Caucalis* umbella universali trifida, partialibus pentaspermis, foliis pinnatis ferratis. *Hort. cliff.* 91.
Roy. lugdb. 95.
Caucalis arvensis echinata latifolia. *Baub. pin.* 152.
R. Syn. 219.
Caucalis apii foliis, flore rubro. *Ger. Em.* 1021.
Echinophora arvensis latifolia purpurea. *Park.* 920.
Anglis, purple flowered great bastard Parsley.
Habitat inter segetes in agro Cantabrigiensi et alibi.
R. Syn. ①. VI. VII.
- nodosum.* 2. **TORDYLIUM** umbellis simplicibus sessilibus, seminibus exterioribus hispidis. *Sp. pl.* 240.
Caucalis nodosa echinato femine. *Baub. pin.* 153.
Ger. Em. 1022. *Park.* 921. *R. Syn.* 220.
Anglis, knotted Parsley.
Habitat ad margines agrorum frequens. ① V.

C A U C A L I S . 294.

Cor. radiatae, disci masculæ. *Fructus* fetis hispidus.
Involucra integra.

- arvensis.* 1. **CAUCALIS** umbella conferta, involucro universali monophyllo, seminibus oblongis, foliolis ovato lanceolatis pinnatifidis.
Caucalis segetum minor, Anthrisco hispido similis. *R. hijt.* I. 468. *syn.* 220.
Caucalis pumila segetum Goodyero. *Ger. Em.* 1022.
Anglis, small corn Parsley.
Habitat in arvis frequens. ① VIII.
2. **CAU-**

2. CAUCALIS umbella conferta, seminibus globosis, *Anthriscus*
foliolis ovatis pinnatifidis.
Tordylium umbella conferta, foliolis ovato-lanceolatis
pinnatifidis. *Sp. pl.* 240. *Fl. suec.* 236.
Caucalis minor flosculis rubentibus. *Ger. Em.* 1022.
R. Syn. 219.
Caucalis minor flore rubente. *Park.* 921.
Caucalis semine aspero, flosculis rubentibus. *Baub.*
pin. 153.
Anglis, hedge Parsley.
Habitat in sepibus. ♂. VIII.
3. CAUCALIS feminum aculeis triglochidibus uncinata - *leptophyl-*
tis : pilis verticillatis hispidis. *Guett. stamp.* 80. *la.*
Dalib. paris. 85. *Sp. pl.* 242.
Caucalis tenuifolia, flosculis subrubentibus. *R. hist.* I.
697. *syn.* 219.
Caucalis arvensis echinata parvo flore et fructu. *Baub.*
pin. 152.
Caucalis tenuifolia purpurea. *Park.* 920.
Anglis, fine-leaved bastard Parsley.
Habitat in arvis circa Kingston in agro Cantabrigiensis.
R. Syn. Q. VII.

DAUCUS. 296.

Corollæ subradiatæ, omnes hermaphroditæ. *Fructus*
pilis hispidis.

1. DAUCUS seminibus hispidis. *Hort. cliff.* 88. *Sp. pl.* *Carota* 242.
Daucus vulgaris. *Clus. hist.* 198. *R. Syn.* 218.
Pastinaca tenuifolia sylvestris. *Baub. pin.* 155. *Ger. Em.* 1028. *Park.* 902.
2 *Daucus sativus* radice lutea et alba. *Tourn.* 307.
3 *Daucus sativus* radice atro-rubente. *Tourn.* 307.
4 *Daucus maritimus* lucidus. *Tourn.* 307.
Anglis, wild Carrot, or Bird's-nest.
Habitat in pratis et pasuis ubique. ♂. VI. VII.
Pharmac. *Dauci sylvestris semina.*

PENTANDRIA DIGYNIA.

CONIUM. 299.

- Fructus* subglobosus, quinquestiatus, utrinque crenatus.
macula-tum. I. CONIUM seminibus striatis. *Hort. upf.* 92. *Roy. lugdb.* 107. *Sp. pl.* 243.
Cicuta major. *Bauh. pin.* 160.
Cicuta. *Lob. ic.* 732. *Ger. Em.* 1061. *Dorfl.* 83.
Fuchs 406. *Dodon. pempt.* 461. *Gesn. Coll.* 68.
Cicuta vera. *Gesn. Hort.* 253.
Cicuta vulgaris major. *Park.* 933. *Clus. hist. II.* 200.
Anglis, Hemlock.
Habitat ad macerias et sepes frequens. ◎. VI. VII.
Pharmac. Cicutæ herba.

ATHAMANTA. 301.

Fructus ovato-oblongus striatus.

- Libano-tis.* I. ATHAMANTA foliis bipinnatis planis, umbella hemispherica, seminibus hirsutis. *Sp. pl.* 244.
Apium petræum seu montanum album. *Bauh. hist. III.* 105. *R. Syn.* 218.
Daucus montanus apii folio albicans. *Bauh. pin.* 157.
Daucus montanus pimpinellæ saxifragæ hircinæ folio nostras Dubriensis. *Pluk. ph. t.* 173. f. 1.
Anglis, mountain stone Parsley.
Habitat in pratis siccis. On Gogmagog hills in Cambridgeshire, inter St. Albans et Stoney-Stratford.
 24. VIII. IX.
- Meum.* 2. ATHAMANTA foliolis capillaribus, seminibus striatis. *Hort. cliff.* 93. *upf.* 60. *Mat. med.* 126. *Sauv. monsp.* 182. *Sp. pl.* 245.
Meum foliis anethi. *Bauh. pin.* 148.
Meum. *Ger. Em.* 1052. *R. Syn.* 207. *vulgatius.* *Park.* 888.
Anglis, common Spignel, Meu, Bald or Bawd-money.
Habitat in pratis montosis in comitatibus Westmorlandico, Eboracensi, Lancastriensi, Cumberlandico, frequens. It is found near Dolgehle in Merionethshire. *R. Syn.* 24. V.
Pharmac. Athamantæ Radix.

P E U-

PEU C E D A N U M . 302.

Fru>ctus ovatus, utrinque striatus, ala cinctus. Involucra brevissima.

1. PEU CEDANUM foliis quinques tripartitis filiformibus linearibus. *Sp. pl. 245.*

Peucedanum foliis quinques tripartitis linearis-subulatis integerrimis. *Hort. cliff. 93. Mat. med. 126.*

Peucedanum. *Ger. Em. 1054. K. Syn. 206. Germanicum. Bauh. pin. 146.*

Peucedanum vulgare. *Park. 880.*

Anglis, Hogs-fennel, Sulphur-wort, Harestrong.

Habitat in palustribus maritimis. Prope Shoreham in Sussexia, Walton non procul ab Harvico in Essexia; about a quarter of a mile below Faversham, by the river side, Mr. J. Sherard. *R. Syn. 4. VI.*

Pharmac. Peucedani Radix.

2. PEU CEDANUM foliis pinnatis, foliolis pinnatifidis: laciniis linearibus oppositis, caule ramosissimo patulo. *minus.*

Peucedanum pumilum. *Ger. Em. 1054.*

Peucedanum minus. *Park. 880. Bauh. pin. 149. R. Syn. 217.*

Selinum montanum pumilum Clusii, foliis Foeniculi aut Peucedani, flore albo, semine Selini. *Bauh. hist. III. 17.*

Anglis, Rock Parsley.

Habitat in pascuis montosis. On St. Vincent's rock near Bristol. *R. Syn. 3. V.*

C R I T H M U M . 303.

Fru>ctus ovalis, compressus.

1. CRITHMUM foliolis lanceolatis carnosis. *Sp. pl. maritimum. 246.*

Crithmum marinum. *Ger. Em. 553. Dod. p. 705. R. Syn. 217.*

Crithmum f. Foeniculum marinum minus. *Bauh. pin. 288.*

Crithmum marinum vulgare. *Park. 1286.*

Anglis, Sampire.

PENTANDRIA DIGYNIA.

Habitat in littoribus maritimis. 4. VIII.
Pharmac. Crithmi Herba.

HERACLEUM. 307.

Fructus ellipticus, emarginatus, compressus, striatus,
Cor. difformis. *Involucrum* caducum.

Sphondylium. 1. HERACLEUM foliolis pinnatifidis. *Hort. cliff.* 103.
Sp. pl. 249.

Sphondylium. *Ger. Em.* 1009. *R. Syn.* 205. *vulgare*
Park. 953.

Sphondylium vulgare hirsutum. *Baub. pin.* 157.
Sphondylium quibusdam vel Branca ursina Germanica.
Baub. hist. III. 2. 160.

β *Sphondylium majus* aliud laciniatis foliis. *Park.* 953.
Anglis, Cow Parsnep. *Cow-mumble quibusdam*
Habitat in sepibus, pratis et pascuis ubique. ♂. VII.
Hog-weed in Sussex. gather'd for Hogs.

LIGUSTICUM. 308.

Fructus oblongus quinquesulcatus utrinque. *Corolla*
æquales.

scoticum. 1. LIGUSTICUM foliis biternatis. *Sp. pl.* 250. *Fl.*
suec. 244.

Ligusticum scoticum apii folio. *Tourn.* 324. *R. Syn.*
214.

Apium scoticum et apium marinum quibusdam. *R.*
Syn. 2d. ed. 109.

Anglis, Scottish Sea Parsley.

Habitat in clivis maritimis sed rarius. ♂. VII.

Cornubiense. 2. LIGUSTICUM foliis decompositis incisis: radicalibus ternatis lanceolatis integerrimis. *Cent. pl.* 137.

Smyrnium tenuifolium nostras. *R. hist.* III. 254.
Syn. 209. t. 8.

Saxifraga Cornubiæ. *Pet. H. Br.* t. 26. f. 9.

Anglis, Cornwal Saxifrage.

Habitat in Cornubia. 4. VII.

ANGELICA. 309.

Fructus subrotundus, angulatus, solidus, fulcis utrinque 3.

I. AN-

1. ANGELICA foliis æqualibus ovato-lanceolatis ferratis. *Hort. cliff.* 97. *Fl. suec.* 246. *Sp. pl.* 251.
Angelica sylvestris. *Ger. Em.* 999. *Park.* 940. *R. Syn.* 208.
Angelica sylvestris major. *Bauh. pin.* 145.
Anglis, wild Angelica.
Habitat in sylvis, sepiibus paludosis. 4. VI. VII.

S I U M. 510.

Fructus subovatus, striatus. Involucrum polyphyllum.
Petala cordata.

1. SIUM foliis pinnatis, umbella terminali. *Hort. cliff. latifolium.*
98. Sp. pl. 251.
Siuum latifolium foliis variis. *Merr. pin.* *R. Syn.* 211.
Siuum latifolium. *Bauh. pin.* 154.
Siuum majus latifolium. *Ger. Em.* 256.
Siuum Dioscoridis f. *Pastinaca aquatica major.* *Park.*
1240.
Anglis, great Water Parsnep.
Habitat in fluviis, paludibus; in pratis paludosis inter Rotherhithe et Deptford. *R. Syn.* 24. VII. VIII.
2. SIUM foliis pinnatis, umbellis axillaribus subfessili nodiflorum. *Sp. pl. 251.*
Siuum umbellatum repens. *Ger. Em.* 256. *R. Syn.* 211.
Siuum aquaticum procumbens, ad alas floridum. *Hist. Ox. III. 283. t. 5. f. 3.*
Anglis, creeping Water Parsnep.
Habitat in fluviis et fossis ubique. 24. VII. VIII.

3. SIUM foliis pinnatis, umbellis axillaribus pedunculatis, involucro universali pinnatifido.
Siuum sive apium palustre foliis oblongis. *Bauh. pin.*
154. R. Syn. 211.
Siuum majus angustifolium. *Ger. Em.* 256.
Siuum minus alterum. *Park.* 1241.
Siuum erectum foliis ferratis, *D. Doody.* *R. Syn.* 211.
Anglis, upright Water Parsnep.
Habitat in fossis, rivulis et ad ripas fluviorum. 24. VII.

PENTANDRIA DIGYNIA.

S I S O N . 311.

Fruetus ovatus, striatus. *Involucrum* subtetraphyllum.

Amomum. 1. SISON foliis pinnatis, umbellis erectis. *Roy. lugdb.*
105. *Sp. pl.* 252.

Sison quod Amomum officinis nostris. *Bauh. pin.* 154.

Sison vulgare, vel Amomum Germanicum. *Park.* 914.

Sium aromaticum Sison off. *Tourn.* 308. *R. Syn.* 211.

Petroselinum Macedonicum Fuchsii. *Ger. Em.* 1016.

Anglis, bastard Stone Parsley.

Habitat in *sylvis* et ad *sepes* *subhumidis*. 4. VIII. IX.

Pharmac. Amomi *semina*.

segetum. 2. SISON foliis pinnatis, umbellis cernuis. *Roy. lugdb.*
105. *Sp. pl.* 252.

Sium terrestre, umbellis rareribus. *Hift. Ox.* III.
283. t. 5. f. 6.

Sium arvense sive segetum. *Tourn.* 308. *R. Syn.* 211.

Selinum Sii foliis. *Ger. Em.* 1018.

Selinum segetale. *Park.* 932.

Anglis, Corn Parsley, or Honewort.

Habitat in *arvis* et ad *sepes* *solo* *humido* aut *luto*.
♂. VII.

inunda-
tum. 3. SISON repens umbellis bifidis. *It. scan.* 397. *Sp. pl.*
252.

Sium foliis submersis capillaris, emersis pinnatis.
Roy lugdb. 105.

Sium minimum, foliis imis ferulaceis. *Hift. Ox.* III.
223. t. 9. f. 5.

Sium pusillum foliis variis N. D. *Pb. Br.* *R. Syn.* 212.
Anglis, the least Water Parsnep.

Habitat in *fossis*, *stagnis* *locis* *inundatis* *passim*. In Eri-
ceto Putnejano et Hounsflejano versus Hampton; in
the ponds on Wandsworth common. *Blacks. spec.*
Bot. inter Newington et Hornsey. ⊙. V. VI.

O E N A N T H E . 314.

Flosculi sessiles, difformes, in disco steriles. *Fruetus*
calyce coronatus.

fistulosa. 1. OENANTHE stolonifera, foliis caulinis pinnatis fi-
liformibus fistulosis. *Sp. pl.* 254. Oenan-

Oenanthe aquatica. *Bauh. pin.* 162. *R. Syn.* 210.

Oenanthe palustris seu aquatica. *Park.* 895.

Filipendula aquatica. *Ger. Em.* 1060.

β Oenanthe aquatica triflora, caulibus fistulosis. *Hist.*
Ox. III. 289. *t. 7. f. 8.*

Anglis, Water Dropwort.

Habitat in fossis et paludibus frequens. 4. VII.

2. OENANTHE foliis radicalibus cuneatis fissis; *pimpinell-*
caulinis integris linearibus longissimis simplicioribus. *loides.*

Syst. Nat. 960. *Sp. pl.* 255.

Oenanthe Apii folio. *Bauh. pin.* 162.

Oenanthe staphylini folio aliquatenus accedens. *Bauh.*
hist. III. 191.

Oenanthe aquatica *Pimpinellæ saxifragæ divisura no-*
stras. *Pluk. ph.* t. 49. f. 4.

Anglis, Pimpernel Dropwort.

Habitat in fluentis pigroribus et palustribus fossis in
parochia Quaplod agri Lincolnensis non procul ab
oppido Spalding; *D. Pluk. R. Syn.* 4. VI.

3. OENANTHE foliis omnibus multifidis obtusis sub-*crocata.*
æqualibus. *Hort. cliff.* 99. *Sp. pl.* 254.

Oenanthe cicutæ facie Lobelii. *Park.* 894. *R. Syn.*
210.

Oenanthe Chærephylly foliis. *Bauh. pin.* 162.

Oenanthe succo viroso cicutæ facie Lobelio. *Bauh. hist.*
III. 193.

Filipendula cicutæ facie. *Ger. Em.* 1059.

Habitat ad ripas fluviorum. In salicetis circa Wind-
foriam, Bathoniam, ad ripas Thamefis alibiique circa
Londinum nascitur. *R. Syn.* 4. VI.

B. *Involucris partialibus;* universali nullo.

B U N I U M. 298.

Corolla uniformis. Umbella conferta. Fruætus ovati.

1. BUNIUM. *Hort. cliff.* 91. *Sp. pl.* 243. *Bulbocaf-*

Bulbocastanum. *Bauh. hist.* III. 30. *R. Syn.* 209. *tanum.*

Bulbocastanum majus folio Apii. *Bauh. pin.* 162.

Bulbocastanum majus et minus. *Ger. Em.* 1065.

Nucula

PENTANDRIA DIGYNIA.

Nucula terrestris major. Park. 893.

Anglis, Earth-nut, Kipper-nut, Pig-nut, or Hawk-nut.

Habitat *in pascuis et pratis.* 24. V. VI.

SESELI. 322.

Umbellæ globosæ. *Involucrum polyphyllum.* *Fructus ovatus, striatus.*

Caruifo- 1. *SESELI* foliis bipinnatis sublinearibus : petiolis basiliis membranaceis, seminibus ovalibus. Sp. pl. 260.

Seseli pratense nostras. Park. 905. R. Syn. 216.

Saxifraga anglica facie seseli pratensis. Ger. Em. 1047. *Saxifraga anglorum,* foliis Foeniculi latioribus, radice nigra, flore candido, semine Foeniculi, similis Silao. Baub. hist. III. 171.

Caruifolia. Baub. hist. III. 171. pin. 158. Vail. parvif. t. 5. f. 2.

Anglis, Meadow Saxifrage.

Habitat *in pratis et pasculis humidiisculis.* 24. VIII.

CICUTA. 316.

Fructus subovatus, sulcatus.

virosa. 1. *CICUTA* umbellis folio oppositis, petiolis marginatis obtusis. Sp. pl. 255.

Cicuta. Hort. cliff. 100. Mat. med. 129. Fl. suec. 253. Roy. lugdb. 109.

Cicuta aquatica. Gejn. Hort. 253. Coll. 68. Fl. lapp. 103.

Sium alterum. Dod. 589. olusatris facie. Lob. ic. 208, Ger. Em. 256. R. Syn. 212.

Sium majus alterum angustifolium. Park. 1241.

Sium Erucæ folio. Baub. pin. 154.

Anglis, long-leaved Water Hemlock.

Habitat *in aquosis.* In a shallow pool of water on Hounslow heath, by the road-side near the town; and in some pools of water at Thistleworth. R. Syn. 24. VII.

PHELLANDRIUM. 315.

Fructus ovatus lœvis, coronatus perianthio et pistillo.

1. PHELLANDRIUM foliorum ramificationibus divaricatis. *Sp. pl.* 255. *aquaticum.*

Phellandrium vel Cicutaria aquatica quorundam.

Baub. hist. III. 183. *R. Syn.* 215.

Cicutaria palustris. *Lob. ic.* 735. *Ger. Em.* 1063.
tenuifolia. *Baub. pin.* 161.

Anglis, Water Hemlock.

Habitat in fluviis et fossis. ♂.

ÆTHUSA. 317.

Involucrum dimidiatum, triphyllum, pendulum. *Fru-*
tus striatus.

1. ÆTHUSA. *Hort. cliff.* 100. *Sp. pl.* 256. *Cynapium.*

Cicutaria tenuifolia. *Ger. Em.* 1063. *R. Syn.* 215.

Cicuta minor seu fatua. *Park.* 933.

Cicuta minor Petroselino similis. *Baub. pin.* 160.

Anglis, Fools Parsley.

Habitat in arvis et inter olera. ☽. VIII. IX.

CORIANDRUM. 318.

Cor. radiata. *Involucrum universale* monophyllum.

Partialia dimidiata. *Fructus* sphæricus.

1. CORIANDRUM fructibus globosis. *Hort. cliff.* 100. *sativum.*

Sp. pl. 256.

Coriandrum. *Baub. hist.* III. 98. *Ger. Em.* 1012.

R. Syn. 221.

Coriandrum majus. *Baub. pin.* 158. *vulgare. Park.*
918.

Anglis, Coriander.

Habitat in fmetis et ad vias. ☽. VI.

Pharmac. *Coriandri semina.*

SCANDIX. 319.

Cor. difformis. *Fructus* subulatus. *Petala* integræ.

Flosculi disci sœpe masculi.

1. SCANDIX seminibus lœvibus rostro longissimo. *Hort. Peissen.* ♀
cliff. 101. *Sp. pl.* 256.

Scandix

PENTANDRIA DIGYNIA.

Scandix semine rostrato vulgaris. *Bauh. pin.* 152. *R.*
Syn. 207.

Scandix vulgaris seu Pecten Veneris. *Park.* 916.

Pecten Veneris seu Scandix. *Ger. Em.* 1040.

Anglis, Shepherd's-needle, or Venus-comb.

Habitat in arvis. *○.* VI. VII.

- Anthris-* 2. *SCANDIX* feminibus ovatis hispidis, corollis uniformibus, caule lævi. *Sp. pl.* 257.
Myrrhis sylvestris feminibus asperis. *Bauh. pin.* 160.
R. Syn. 220.
Myrrhis sylvestris Neapolitana atque etiam Anglicana.
Park. 935.
Cerefolium sive *Myrrhis nova* Equicolorum Columnæ. *Ger. Em.* 1038.
Anglis, small Hemlock Chervil with rough Seeds.
Habitat in aggeribus ruderatis ubique. *○.* V. VI.

CHÆROPHYLLUM. 320.

Involucrum reflexum, concavum. Petala cordata.
Fructus oblongus, lævis.

* *Floribus omnibus hermaphroditis.*

- sylvestre.* 1. *CHÆROPHYLLUM* flosculis omnibus fertilibus, caule æquali. *Sp. pl.* 258.
Chærophyllum feminibus lævibus nitidis, petiolis ramulis æqualibus. *Hort. cliff.* 101. *Roy. lugdb.* 112.
Cicutaria vulgaris. *Bauh. hist.* III. 181. *R. Syn.* 207.
Cicutaria alba Lugdunensis. *Ger. Em.* 1038.
Myrrhis sylvestris. *Park.* 935. feminibus lævibus.
Bauh. pin. 160.
Anglis, wild Cicely, or Cow-weed.
Habitat ad sepes. *○.* V. VI.

** *Floribus disci masculis.*

- temulum.* 2. *CHÆROPHYLLUM* caule scabro: geniculis tumidis, umbellis cernuis. *Sp. pl.* 258. *Fl. suec.* 258.
Chærophyllum caule maculato: geniculis tumidis.
Hort. cliff. 102.
Cherophyllum sylvestre. *Bauh. pin.* 152.
Cherefolium

Cherefolium sylvestre. *Ger. Em.* 1038. *Park.* 915.
R. Syn. 207.

Anglis, wild Chervil.

Habitat *ad sepes ubique.* ♂. VII. VIII.

C. *Involucro nullo;* nec universali, nec Partialibus.

P A S T I N A C A. 324.

Fructus ellipticus, compresso-planus.

1. PASTINACA foliis simpliciter pinnatis. *Hort. cliff.* *sativa.*
 105. *Sp. pl.* 263.

Pastinaca sylvestris latifolia. *Baub. pin.* 155. *R. Syn.*
 206.

Pastinaca latifolia sylvestris. *Ger. Em.* 1025. *Park.*
 944.

Pastinaca Germanica sylvestris quibusdam Elaphoboscum. *Baub. hist.* III. 149.

β *Pastinaca latifolia sativa.* *Ger. Em.* 1025. *Park.* 944.
Baub. pin. 155.

Anglis, wild Parsnep. β Garden Parsnep.

Habitat *in marginibus agrorum.* ♂. VII.

S M Y R N I U M. 325.

Fructus oblongus, striatus. Petala acuminata carinata.

1. SMYRNIUM foliis caulinis ternatis petiolatis ferratis. *Hort. cliff.* 105. *Roy. lugdb.* 114. *Sauv. monsp. trum.*
 262. *Sp. pl.* 262.

Smyrnium. *Matth.* 773. *R. Syn.* 208.

Hippocelinum. *Ger. Em.* 1019. seu *Smyrnium vulgare.* *Park.* 930.

Hippocelinum Theophrasti f. *Smyrnium Dioscoridis.*
Baub. pin. 154.

Anglis, Alexanders.

Habitat *in fossis et rupibus maritimis.* About Scarborough castle; near Deptford, Battersea, and Vauxhall; about Nottingham plentifully, Mr. J. Sherard.
R. Syn. ♂. V. VI.

Pharmac. *Smyrnii Radix, Herba, Semina.*

A N E T H U M. 326.

Fructus subovatus, compressus, striatus.

- Foenicu-* 1. ANETHUM fructibus ovatis. *Hort. cliff.* 106.
lum. *Sp. pl.* 263.
 Foeniculum vulgare. *Park.* 884. *Ger. Em.* 1032.
R. Syn. 217.
 Foeniculum vulgare Germanicum. *Bauh. pin.* 147.
 β Foeniculum dulce. *Bauh. pin.* 147.
Anglis, Finckle, β Fennel.
 Habitat in clivis cretaceis passim. ♂. VIII.
Pharmac. Foeniculi semina.

C A R U M. 327.

Fructus ovato-oblongus, striatus. *Involucrum* mono-
 phyllum. *Petala* carinata, emarginata.

- Carvi.* *1. CARUM. *Dod. pemp.* 299. *Fl. lapp.* 105. *suec.* 260.
Mat. med. 138. *Hall. helv.* 428. *Sp. pl.* 263. *vul-*
garum. *Park.* 910.
 Carum seu Careum. *Ger. Em.* 1034. *R. Syn.* 213.
 Cuminum pratense Carui officinarum. *Bauh. pin.* 158.
Anglis, Caraways.
 Habitat in pratis et pascuis passim. ♂. V. VI.
Pharmac. Carui semina.

P I M P I N E L L A. 328.

Fructus ovato-oblongus. *Corolla* subradiata.

- major.* 1. PIMPINELLA foliis pinnatis: foliolis cordatis, im-
 pari trilobo.
 Pimpinella saxifraga. *Ger. Em.* 1044. *R. Syn.* 213.
 Pimpinella saxifraga hircina major. *Park.* 947.
 Pimpinella saxifraga major umbella candida. *Bauh.*
pin. 159.
 β Pimpinella saxifraga major, degener, seu foliis dissec-
 tis. *Hift. Ox.* III. 289.
Anglis, great Burnet Saxifrage.
 Habitat in sylvis et sepibus. In sylvis agro Cantabri-
 giensi, Bedfordiensi, Leicesteriensi, Cantiano, et ali-
 bi. *R. Syn.* 24. VIII.

2. PIM-

2. PIMPINELLA foliis pinnatis: foliolis radicalibus *saxifraga*.
subrotundis; summis linearibus. *Sp. pl.* 263.
Fl. suec. 261.
Pimpinella *saxifraga* minor, foliis Sanguisorbæ. *R.*
Syn. 213.
Pimpinella major altera. *Bauh. pin.* 159.
Pimpinella *saxifraga* major nostras. *Park.* 946.
Pimpinella seu *saxifraga* minor. *Ger. Em.* 1044.
3 Pimpinella *saxifraga* minor. *Bauh. pin.* 160.
Pimpinella *saxifraga* hircina minor. *Park.* 947.
Anglis, small Burnet Saxifrage.
Habitat in *pascuis* *siccioribus* et *glareosis*. 24. VIII.

A P I U M. 329.

Fructus ovatus-striatus. *Involucrum monophyllum.*
Petala inflexa.

1. APIUM foliis caulinis cuneiformibus. *Hort. cliff.* graveo-
- 107. *Sp. pl.* 264. lens.
Apium palustre et officinarum. *Bauh. pin.* 154. *R.*
Syn. 214.
Apium vulgare seu palustre. *Park.* 926.
Eleoselinum seu Paludapium. *Ger. Em.* 1014.
Anglis, Smallage.
Habitat in *palustribus* et *fossis*. 3. VIII.

Æ G O P O D I U M. 330.

Fructus ovato-oblongus, striatus.

1. ÆGOPODIUM foliis caulinis summis ternatis. *Sp. Podagra-*
pl. 265. *ria.*
Podagraria. *Riv. pent.* 47. *vulgaris*. *Park.* 943.
Angelica sylvestris minor f. erratica. *Bauh. pin.* 155.
R. Syn. 208.
Herba Gerardi. *Ger. Em.* 1001.
Anglis, Herb-gerard, Gout-weed, or Ash-weed.
Habitat ad *sepes* et in *oleraceis*, *hortis*, frequens. 24. V.

TRIGYNIA.

* *Flores superi.*

VIBURNUM. 332.

Cal. quinquepartitus, superus. *Cor.* quinquefida.
Bacca monosperma.

Lantana. 1. VIBURNUM foliis cordatis ferratis venosis subtus tomentosis. *Vir. cliff.* 25. *Hort. upf.* 86. *Sp. pl.* 268. Viburnum. *Park.* 1448. *Baub. pin.* 429. *R. Syn.* 460.

Lantana five Viburnum. *Ger. Em.* 1490.

Anglis, the pliant Mealy-tree. *Park.* The way-faring-tree. *Ger.*

Habitat in sepibus. h. v.

Opulus. 2. VIBURNUM foliis ovatis, petiolatis glandulosis. *Sp. pl.* 268.

Opulus Ruellii 281. *Tourn.* 607. *R. Syn.* 460.

Sambucus aquatica, flore simplici. *Baub. pin.* 456.

Sambucus palustris seu *aquatica.* *Park.* 208.

Sambucus aquatalis seu *palustris.* *Ger. Em.* 1424.

Anglis, Water Elder.

Habitat in sylvis et sepibus humidis. h. v. vi.

SAMBUCUS. 334.

Cal. quinquepartitus. *Cor.* quinquefida. *Bacca* trisperma.

nigra. 1. SAMBUCUS cymis quinquepartitis, caule arboreo.

Sp. pl. 269.

Sambucus caule arboreo ramoso, floribus umbellatis.

Roy. lugdb. 243.

Sambucus. *Ger. Em.* 1422. *vulgaris.* *Park.* 207. *R. Syn.* 461.

Sambucus fructu in umbella nigra. *Baub. pin.* 456.

β Sambucus fructu in umbella viridi. *Baub. pin.* 456.

γ Sambucus laciniato folio. *Baub. pin.* 456.

Anglis, common Elder.

Habitat in sylvis et sepibus humidis. h. iv.

Pharmac. *Sambuci Cortex, Folia, Flores, Baccae.*

2. SAMBUCUS.

PENTANDRIA TRIGYNIA.

113

2. SAMBUCUS cymis tripartitis, stipulis foliaceis. *Sp. Ebulus.*
pl. 269.

Sambucus humilis seu Ebulus. *Baub. pin. 456. R.*
Syn. 461.

Ebulus sive Sambucus humilis. *Ger. Em. 1426.*
Park. 209.

Anglis, dwarf Elder, Walwort, or Danewort.

Habitat *in sepibus et ad vias.* *h. VII.*

Pharmac. Ebuli Radix, Folia, Flores, Baccæ.

** *Flores inferi.*

S T A P H Y L E A. 336.

Cal. quinquepartitus. *Petala quinque.* *Caps. inflatæ,*
connatæ. *Sem. duo globosa cum cicatrice.*

*1. STAPHYLEA foliis pinnatis. *Hort. cliff. 112. pinnata.*
Roy. lugdb. 436. Sp. pl. 270.

Staphylocarpus. *Baub. hist. I. 274. R. Syn. 468.*

Nux vesicaria. *Park. 1417. Ger. Em. 1437.*

Pistacea sylvestris. *Baub. pin. 401.*

Anglis, Bladder Nut-tree.

Habitat *in sepibus circa Pontemfractum comitatus Eboracensis oppidum; in Cantio circa Ashfordiam inventi apud Parkinsonum legitimus.* *R. Syn. h. VI.*

A L. S I N E. 342.

Cal. pentaphyllus. *Petala quinque, bipartita, æqualia.* *Caps. unilocularis, trivalvis.*

I. ALSINE petalis bipartitis, foliis ovato-cordatis. *Fl. media.*
lapp. 186. suec. 267. Sp. pl. 272.

Al sine media. *Baub. pin. 250. seu minor. Ger. Em.*
611.

Al sine vulgaris seu morsus gallinæ. *Baub. hist. III.*
363. R. Syn. 347.

Anglis, common Chickweed.

Habitat *ubique in umbrosis, cultis.* *○. IV.—X.*

TETRAGYNYIA.

PARNASSIA. 345.

Cal. quinquepartitus. *Petala* quinque. *Nectaria* quinque cordata ciliata apicibus globofis. *Caps.* quadrivalvis.

palustris. 1. PARNASSIA. *Fl. lapp.* 108. *suec.* 268. *Sp. pl.* 273. *Hall. helv.* 316.

Parnassia vulgaris et palustris. *Tourn.* 246. *R. Syn.* 355. *Gramen Parnassi minus.* *Ger. Em.* 840.

Gramen Parnassi vulgare. *Park.* 429.

Gramen Parnassi flore albo simplici. *Baub. pin.* 309. *Anglis,* Grass of Parnassus.

Habitat in pratis humidis. 4. VIII.

PENTAGYNYIA.

* Flores inferi.

STATICE. 348.

Cal. monophyllus, integer, plicatus. *Petala* quinque. *Sem.* unicum.

Armeria. 1. STATICE caule nudo simplici capitato. *Sp. pl.* 274. *Fl. suec.* 269.

Statice montana minor. *Tourn.* 341. *R. Syn.* 203.

Limonium majus flore globofso. *Hist. Ox.* III. 601. *f. 15. t. 1. f. 29.*

Caryophyllus montanus minor. *Baub. pin.* 211.

Caryophyllus marinus minimus Lobelii. *Ger. Em.* 602.

Gramen marinum minus. *Park.* 1276.

Anglis, Thrift, Sea Gilly-flower.

Habitat in pratis maritimis. 4. VII. VIII.

Limoni- 2. STATICE caule nudo paniculato tereti foliis lævibus. *Sp. pl.* 274. *Fl. suec.* 270.

Limonium. *Ger. Em.* 411. *R. Syn.* 200. *majus vul-* *gatius.* *Park.* 1234.

Limonium maritimum majus. *Baub. pin.* 192.

β Limo-

β *Limonium minus*. *R. Syn.* 202.

γ *Limonium anglicum minus* caulibus ramosioribus, floribus in spicis rarius fitis. *R. hist.* III. 247.

Anglis, Sea Lavender.

Habitat in littoribus maritimis. 4. VII. VIII.

Pharmac. Limonii Radix.

3. STATICE caule subnudo paniculato prostrato, ramis reticulata, sterilibus retroflexis nudis, foliis cuneiformibus. *Sp. pl.* 275.

Statice foliis obverso-ovatis, ramis nudis humifusis, intricatis. *Sauv. monsp.* 15.

Limonium minus, virgulis retiformiter se invicem implicatis. *Pluk. ph. t.* 42. *f. 4.*

Limonium reticulatum. *R. hist.* 396. *Bocc. sic.* 82. *t. 44.*

Anglis, matted Sea Lavender.

Habitat in littoribus maritimis.

L I N U M. 349.

Cal. pentaphyllus. *Petala quinque. Caps. quinquevalvis*, decemlocularis. *Sem. solitaria*.

* *Foliis alternis*.

1. LINUM calycibus capsulisque mucronatis, petalis *ufitatis*- crenatis, foliis lanceolatis alternis, caule subsolitum. *Sp. pl.* 277.

Linum ramis foliisque alternis, linear-lanceolatis, radice annua. *Hort. cliff.* 114. *Roy. lugdb.* 433.

Linum arvense. *Baub. pin.* 214. *R. hist.* 1073.

Linum sylvestre vulgatus. *Park.* 1334.

β *Linum sativum*. *Baub. pin.* 214. *Ger. Em.* 556. *R. Syn.* 362.

Anglis, Flax.

Habitat in arvis *passim*. ①. VI.

Pharmac. Lini semina.

2. LINUM calycibus capsulisque obtusis, foliis alternis *perenne*, lanceolatis integerrimis. *Sp. pl.* 277. *Mill. fig.* *t. 166. f. 2.*

Linum foliis alternis lanceolatis integerrimis, calycibus apice obtusis, capsulis muticis. *Hort. upf.* 72.

PENTANDRIA PENTAGYNIA.

*Linum sylvestre cæruleum perenne erectius, flore e
capitulo majore. R. Syn. 362.*

*Linum perenne majus cæruleum, capitulo majore.
Hist. Ox. II. 573.*

β *Linum sylvestre cæruleum perenne procumbens, flore
et capitulo minore. R. Syn. 362.*

Anglis, perennial blue Flax.

*Habitat in pascuis et pratis sterilioribus. In agri Can-
tabrigiensis collibus Gogmagog dictis, ad margines sa-
torum copiose; also at Crosby Ravensworth, and be-
tween Shap and Threapland in Westmoreland, Mr.
Lawson; and on the balks of corn-fields about Ber-
nack-heath in Northamptonshire. R. Syn. in insu-
la Shepey copiose. 4. VI. Us'd in Siberia.
found in some fields near Whornell Woods in Hants.*

tenuifoli- um. 3. *LINUM calycibus acuminatis, foliis sparsis linear-
isetaceis retrorsum scabris. Sp. pl. 278.*

*Linum perenne, foliis angustioribus, calyce aristato.
Hall. helv. 371.*

*Linum sylvestre angustifolium, floribus dilute purpu-
rascentibus vel carneis. Bauh. pin. 214. R. Syn.
362.*

*Linum sylvestre VI. angustifolium. Clus. hist. I. 318.
Anglis, narrow-leaved wild Flax.*

*Habitat in pratis maritimis aridis. In the pastures by
the sea-side about St. Ives and Truro in Cornwall,
plentifully. Found by Mr. J. Sherard plentifully in a
field on the left hand of the lane that leads from the
sea to Pett, a small village, four miles from Hastings,
and on Beacon hill in Kent. R. Syn. 4.
VI. VII.*

** *Foliis oppositis.*

✗ *catharti- cum.* 4. *LINUM foliis oppositis ovato-lanceolatis, caule di-
chotomo, corollis acutis. Sp. pl. 281. Mat. med.
157. Fl. suec. 271.*

*Linum sylvestre catharticum. Ger. Em. 560. R. Syn.
362.*

*Linum pratense flosculis exiguis. Bauh. pin. 214.
Chamælinum Clufii flore albo s. Linum sylvestre ca-
tharticum. Park. 1336.*

Anglis, purging Flax.

Habitat

Habitat in pratis et pascuis siccioribus. Ⓛ. V. VI.
Pharm. Lini cathartici Herba.

5. LINUM foliis oppositis, caule dichotomo, floribus *Radiola*.
tetrandris tetragynis. Sp. pl. 281. Fl. suec. 272.
Chamælinum vulgare. Vaill. paris. 33. t. 4. f. 6.
Radiola vulgaris serpyllifolia. R. Syn. 345. t. 15. f. 3.
Millegrana minima. Ger. Em. 569. f. *Herniaria minor*. Park. 447.
Polygonum minimum f. *millegrana minima*. Baub. pin. 282.

Anglis, the least Rupture-wort, or All-seed.

Habitat in *Ericetis glareosis subhumidis*. On Wands-
worth common. Blacks. spec. bot. in ericeto Putne-
jano copiose. Ⓛ. VIII.

D R O S E R A. 352.

Cal. quinquefidus. *Petala* quinque. *Caps.* unilocu-
laris : apice quinquevalvi. *Sem.*

1. DROSERA scapis radicatis, foliis orbiculatis. Fl. rotundi-
lapp. 109. Zeyl. 120. suec. 273. Sp. pl. 281. folia.

Ros solis folio rotundo. Baub. pin. 357. R. Syn. 357.

Ros solis. Baub. hist. III. 761. major. Ger. Em.
1557. Park. 1052.

- β *Rorella rotundifolia* perennis. R. Syn. 356.

Anglis, round-leaved Sun-dew, or Rosa-solis.

Habitat in *paludibus*. 4. VII. VIII.

Pharmac. Rosis solis Herba.

2. DROSERA scapis radicatis, foliis oblongis. Fl. lapp. longifolia. x
110. suec. 358.

Ros solis folio oblongo. Baub. pin. 357. R. Syn. 356.

Ros solis sylvestris longifolius. Park. 1052.

Ros solis minor. Ger. Em. 1557.

- 3 *Rorella longifolia* perennis. R. Syn.

Anglis, long-leaved Rosa-solis, or Sun-dew.

Habitat in *patudosis*. Upon Hinton-moor near Cam-
bridge : on Bagshot heath, Mr. Doody. R. Syn. at
Battle's-well, near Harefield, plentifully. Blacks. sp.
bot. 4. VI. VII. Bagshot Heath near y^eXXI mile
=stone. F 3 S I B-

SIBBALDIA. 354.

- Cal. pentaphyllus decemfidus. Petala quinque, calyci inserta. Styli e latere germinis. Sem. quinque.*
- procumbens.* 1. SIBBALDIA foliolis tridentatis. *Fl. lapp. 111. suec. 216. Sp. pl. 284.*
Pentaphylloides pumila foliis ternis ad extremitates trifidis. R. Syn. 256.
Pentaphylloides fruticosum minimum procumbens, flore luteo, foliis sericeis fragariæ ternis. Pluk. ph. t. 212. f. 3.
Fragariæ sylvestri affinis planta, flore luteo. Sibb. pr. hist. nat. scot. p. II. 25. t. 6. f. 1.
Anglis, bastard Cinquefoil.
*Habitat in sylvis regionis Jernensis Scotiæ sponte pro-
venit. R. Syn. 24. V. 1. VIII.*

POLYGYNIA.

MYOSURUS. 355.

- Cal. pentaphyllus, basi adnatus. Nectaria quinque subulata, petaliformia. Sem. numerosa.*
- minimus.* 1. MYOSURUS foliis integris. *Hort. cliff. 117.*
Myosurus. Bauh. hist. III. 512. R. Syn. 251.
Holosteum affinis, Cauda muris. Bauh. pin. 190.
*Holosteum Lonicerae, Cauda muris vocatum. Park.
500.*
Cauda muris. Ger. Em. 426.
Anglis, Mousetail.
*Habitat in arvis pratis et pasuis solo glareoso. In a
lane that goes from Copenhagen-house to Kentish-
town. Dr. Wilmer. Inter segetes circa Wimbleton,
prope Londinum. O. IV. V.*

Classis

Classis VI.

HEXANDRIA

MONOGYNIA.

* *Flores Caliculati calyce corollaque instructi.*

BERBERIS. 399.

*Cal. hexaphyllus. Petala sex; ad ungues glandulis 2.
Stylus o. Bacca disperma.*

I. BERBERIS pedunculis racemosis. *Mat. med. 290. vulgaris.
Fl. suec. 312. Sp. pl. 330.*

Berberis spinis triplicibus. *Hort. cliff. 122.*

Berberis. *Park. 1559. dumetorum. Bauh. pin. 454.
R. Syn. 465.*

Spina acida sive Oxyacantha. *Ger. Em. 1325.*

Anglis, Barberry or Pipperidge-bush.

Habitat in sylvis et sepibus paſſim. h.

Pharmac. Berberidis, Cortex, Baccæ.

FRANKENIA. 401.

Cal. quinquefidus, infundibuliformis. Petala quinque.

Stigma sexpartitum. Caps. unilocularis, trivalvis.

I. FRANKENIA foliis linearibus basi ciliatis. *Sp. pl. laevis.*

331.

Frankenia foliis aciformibus congestis *Sauv. monsp. 46.*

Franca floribus solitariis sessilibus, foliis prismaticis triangularibus. *Guett stamp. II 459*

Franca maritima supina saxatilis glauca ericooides sem-pervirens, flore purpureo. *Mich gen. 23 t 22 f. I.*

Lychnis supina maritima Ericæ facie. *R. Syn. 338.*

Erica supina maritima Ph br. anglica. *Park. 1484.*

Polygonum maritimum minus, foliolis serpylli. *Bauh. pin. 281.*

HEXANDRIA MONOGYNIA.

Polygonum pusillo vermiculato serpylli folio. Ger. Em.

567.

Anglis, smooth Sea Heath.

Habitat in palustribus maritimis. In Lovingland, just over the water at Yarmouth; in the marshes about Thurrington in Essex; on the sandy ditch-banks by the way-side going from Malden to Goldhanger; in Selsey island plentifully. R. Syn. In insula Shepey copiose. 24. VIII.

pulverula. 2. FRANKENIA foliis obovatis retusis subtus pulverulentis. Sp. pl. 332.

Frankenia foliis ovalibus. Sauv. monsp. 168.

Alpine maritima supina foliis Chamæsicces. Tourn. 665. R. Syn. 352.

Anthyllis maritima Chamæsicæ similis. Baub. pin. 282.

Anglis, broad-leaved Sea Heath.

Habitat in littoribus maritimis. Found on the coast of Sussex, and sent by Mr. Brewer. R. Syn. ①. VII.

* *Flores spathacei.*

ALLIUM. 370.

Cal: sexpartita, patens. Spatha multiflora. Umbella congesta. Caps. supera.

* *Foliis caulinis planis.*

Ampelo-prasum. 1. ALLIUM caule planifolio umbellifero, umbella globosa, staminibus tricuspidatis, petalis carina scabris. Syst. nat. 977.

Allium caule planifolio umbellifero, umbella globosa, staminibus tricuspidatis, radice laterali. Sp. pl.

294.

Allium staminibus alterne trifidis, foliis gramineis, floribus sphærice congestis, radice laterali solida.

Hall. all. 5.

Allium holmense sphærico capite. R. Syn. 370.

Allium sphærico capite, folio latiore s. Scorodo prasum alterum. Baub. pin. 74. Rudb. elys. 2. 151.

Scorodo prasum primum Clufii. Ger. Em. 180.

Anglis, great round-headed Garlick.

Habitat

HEXANDRIA MONOGYNIA.

121

Habitat in parva quadam insula Holms dicta in Sabri-
næ æstuario copiose provenientem observavit. D. New-
ton. R. Syn. 4.

2. **ALLIUM** caule planifolio bulbifero, vaginis tereti- *orenari-*
bus, spatha mutica, staminibus tricuspidatis. It. um.
scan. 227. Sp. pl. 297.

Allium sylvestre amphicarpon, foliis porraceis, flori-
bus et nucleis purpureis. R. Syn. 370.

Anglis, broad-leaved mountain Garlick.

Habitat in montibus Westmorlandicis observavit, D.
Lawson. In Troutbeck-holm by Great Strickland.
R. Syn. 4. VII.

** *Foliis caulinis teretibus.*

3. **ALLIUM** caule teretifolio bulbifero, staminibus tri- *vineale.*
cuspidatis. Sp. pl. 299.

Allium staminibus alterne trifidis, foliis fistulosis, capite
bulbifero, radice multiplici. Hall. all. 4.

Allium sylvestre. Park. 870. Ger. Em. 179. R. Syn.
369.

Allium campestre juncifolium capitatum purpurascens
majus. Bauh. pin. 74.

Allium sylvestre vinearum. Bauh. pin. 72.

Anglis, Crow-garlick.

Habitat in pratis et pascuis. 4. VI,

4. **ALLIUM** caule teretifolio bulbifero, foliis scabris se- *oleraceum.*
miteribus subtus sulcatis. Sp. pl. 299.

Allium umbella bulbifera, vigina bicorni, foliis tere-
tibus. Hall. all. 23. f. 4.

Allium sylvestre bicorne flore exherbaceo albicante,
cum triplici in singulis petalis stria atro-purpurea.
R. Syn. 370.

Allium montanum bicorne, flore exalbido. Bauh.
pin. 75.

β *Allium montanum bicorne purpureum proliferum. R.*
Syn. 396.

Anglis, wild Garlick with an herbaceous striated
flower.

Habitat

HEXANDRIA MONOGYNIA.

Habitat in pratis montosis, et inter segetes. In a Corn-field in Black-Notley in Essex, belonging to the hall called Westfield, adjoining to Leeze-lane, plentifully. R. Syn. in pratis prope Bristolium copiose. α et β in arvis in Westmorlandia frequens. 4. VII.

*** Foliis radicalibus, scapo nudo.

- ursinum.* 5. ALLIUM scapo nudo semicylindrico, foliis lanceolatis petiolatis umbella fastigiata. Sp. pl. 300.
Allium sylvestre latifolium. Bauh. pin. 74. R. Syn. 370.
Allium ursinum. Ger. Em. 180. Park. 871.
Anglis, Ramson.
Habitat in sylvis et setibus frequens. 4. V.

BULBOCODIUM. 368.

Cor. infundibuliformis, hexapetala : unguibus angustis. Caps. supera.

- crotinum.* 1. BULBOCODIUM foliis subulato-linearibus. Roy. lugdb. 41. Sp. pl. 294.
Bulbocodium alpinum juncifolium, flore unico : intus albo extus squalide rubente. R. Syn. 374. t. 17. f. I.
Pseudo-Narcissus gramineo folio. Bauh. pin. 51. pr. 27.
Bulbosa alpina juncifolia, pericarpio unico erecto in summo caulinco dodrantali. R. Syn. 374.
Anglis, mountain Saffron.
Habitat in excelsis rupibus montis Snowdon ; v. g. Trigvylchou y Clogwyn du ymhen y Gluder, Clogwyn yr Ardu Crib y Distlh, &c. D. Lhwyd. R. Syn. 4. VIII.

NARCISSUS. 364.

Petala sex : Neetario infundibuliformi, monophyllo, integro. Stam. intra nectarium.

- poeticus.* *1. NARCISSUS spatha subuniflora, nectarii limbo rotato brevissimo. Hort. upf. 74. Sp. pl. 289.
Narcissus medio luteus. Ger. Em. 124. vulgaris. Park. 74. R. Syn. 371.

Narcissus

Narcissus pallidus circulo luteo. *Bauh. pin.* 51.
Anglis, common pale Daffodil, or Primrose peerless.
Habitat in pratis et pascuis sed rarius. 24. IV.

2. *NARCISSUS spatha uniflora, nectarii limbo campa-* *Pseudo-*
nulato erecto petalis æquali. *Sp. pl.* 289. *Narcissus.*
Narcissus sylvestris pallidus calyce luteo. *Bauh. pin.*

52. *R. Syn.* 371.

Pseudo-Narcissus Anglicus. *Ger. Em.* 138. *vulgaris.*
Park. 74.

Anglis, wild English Daffodil.

Habitat in sylvis et ad sepes. *In sylvis prope Erit in*
agro Cantiano copiose. 24. III. IV.

*** *Flore nudi.*

H Y A C I N T H U S. 385.

Cor. campanulata : pori tres melliferi germinis.

1. *HYACINTHUS corollis campanulatis sexpartitis a- non scrip-*
pice revolutis. *Hort. cliff.* 125. *Roy. lugdb.* 27. *tus.*
Sauv. monsp. 17. *Sp. pl.* 316.

Hyacinthus oblongo flore cæruleus major. *Bauh. pin.*

43.

Hyacinthus anglicus. *Ger. Em.* 110. *R. Syn.* 373.

Hyacinthus Anglicus, Belgicus f. Hispanicus. *Park.*
par. 122.

Anglis, English Hyacinth, or Harebells.

Habitat in sylvis et sepibus. 24. V.

S C I L L A. 378.

Cor. hexapetala, patens, decidua. Filamenta fili-
formia.

1. *SCILLA radice solida, floribus erectiusculis paucio-* *bifolia.*
ribus. *Hort. cliff.* 123. *Sp. pl.* 309.

Hyacinthus stellaris bifolius Germanicus. *Bauh. pin.*

45.

Hyacinthus stellatus Fuchsii. *Ger. Em.* 106. *R. Syn.*
372.

Hyacinthus stellatus vulgaris f. bifolius Fuchsii. *Park.*
par. 126.

Anglis, vernal star Hyacinth.

Habitat

HEXANDRIA MONOGYNIA.

Habitat in insulis quibusdam circa Cambriam copiose, ut v. g. Bradseia, necnon in clivis maritimis ipsius Cambriæ. R. Syn. 4. IV. V.

autumna- 2. SCILLA radice solida, foliis filiformibus linearibus, floribus corymboſis, pedunculis nudis adſcendentibus longitudine floris. Sp. pl. 309.

Scilla radice solida, foliis ſetaceis, floribus fastigiatis, pedunculis arcuatis ex ala tuberculi mamillaris. Guett. ſtamp. 131.

Hyacinthus Autumnalis minor. Ger. Em. 110. Park. par. 132. R. Syn. 373.

Hyacinthus stellaris autumnalis minor. Baub. pin. 47. Anglis, the lesser autumnal star Hyacinth.

Habitat in paſciuis ſiccis. In rupe S. Vincentii prope Bristolium inque promontorio, The Lizard Point dicto, copioſe; eundem in Ericeto nigro in comitatu Cantii invenit, D. Plukenet. On Mouldsworth, over-againſt Hampton-court; near Ditton, and on Kingston-bridge, and going to Hounſlow-heath. Merr. pin. R. Syn. 4. IX.

ORNITHOGALUM. 377.

Cor. hexapetala, erecta, perſiftens, ſupra medium patens. Filamenta alterna baſi dilatata.

* Seminibus omnibus ſubulatis.

luteum. 1. ORNITHOGALUM ſcapo anguloſo diphyllo, pedunculis umbellatis ſimplicibus. Fl. Suec. 285. Sp. pl. 306.

Ornithogalum luteum. Baub. pin. 71. Park. par. 140. R. Syn. 372.

Ornithogalum luteum ſeu Cepe agraria. Ger. Em. 165. Anglis, yellow star of Bethlehem.

Habitat in comitatus Eboracensis Septentrionali parte prope pontem Greta et Bignal vicum in ſylvis ad fluvium Tefam obſervavit. D. Johnson. R. Syn. prope Kendal in Westmorlandia. 4. IV.

*pyrenai-
cum.* 2. ORNITHOGALUM racemo longiſſimo, filamentis lanceolatis, pedunculis proliferis patentibus æqualibus; fructiferis ſcapo approximatis. Sp. pl. 307. Ornithogalum

Ornithogalum angustifolium majus, floribus ex albo virescentibus. Baub. pin. 70. R. Syn. 373.

Asphodelus bulbosus. Ger. Em. 97.

Asphodelus bulbosus Galeni f. Ornithogalum majus flore subvirente. Park. par. 136.

Anglis, spiked star of Bethlehem with a greenish flower.

Habitat in the way between Bath and Bradford, not far from Little Ashley, Ph. br. On the left hand of a farm, half a mile from Chichester, Southgate, in a meadow, plentifully, Mr. Manningham. R. Syn. 4. V.

*3. *ORNITHOGALUM floribus corymbosis, pedunculis scapo altioribus, filamentis emarginatis.* Sp. tum. umbella-pl. 307.

Ornithogalum umbellatum medium angustifolium. Baub. pin. 70.

Ornithogalum vulgare et verius, majus et minus. Baub. hist. II. 630. R. Syn. 372.

Ornithogalum vulgare. Ger. Em. 165. Park. par. 136.

Anglis, common star of Bethlehem.

Habitat in sylvis, pratis et pascuis, in Norfolk. D. Stillingfleet. 4.

F R I T I L L A R I A. 372.

Cor. hexapetala, campanulata, supra unguis cavitate nectarifera. Stam. longitudine corollæ.

*1. *FRITILLARIA foliis omnibus alternis.* Hort. upf. Meleagris. 81. Sp. pl. 305.

Fritillaria præcox purpurea variegata. Baub. pin. 64.

Fritillaria vulgaris. Park. par. 40.

Fritillaria variegata. Ger. Em. 149.

Anglis, common chequered Daffodil, or Fritillary.

Habitat in pratis et pascuis. In Mawde Fields, near Rislip common, Middlesex, plentifully. Blackf. spec. bot. 23. in pratis inter Mortlake et Kew. 4. IV. V.

ASPARAGUS. 382.

Cor. sexpartita, erecta : petalis tribus interioribus apice reflexis. Bacca trilocularis : disperma.

officinalis. 1. ASPARAGUS caule herbaceo erecto, foliis setaceis, stipulis paribus. *Sp. pl.* 313. *Fl. suec.* 291.

Asparagus. *Park.* 454. *Ger. Em.* 1110. *R. Syn.* 267. sativus. *Baub. pin.* 489.

Anglis, Sparagus, or Sperage.

Habitat in pratis maritimis. Ad promontorium diestum
The Lizard Point invenimus ; said also to be found
in the marshes near Bristol ; about Harwich in Essex ;
and by the Thames side near Gravesend. *R. Syn.* 24.
VII. VIII.

Pharmac. Asparagi Radix.

CONVALLARIA. 383.

Cor. sexfida. Bacca maculosa, trilocularis.

majalis. 1. CONVALLARIA scapo nudo. *Fl. lapp.* 112. *suec.* 293. *Sp. pl.* 314.

Lilium convallium. *Ger. Em.* 410. *R. Syn.* 265. album. *Baub. pin.* 304.

Lilium convallium flore albo. *Park. par.* 349.

Anglis, Lily-convally, or May-lily.

Habitat in ericetis frequens. 24. V.

Pharm. Lilii Convallii Flores.

x multiflora. 2. CONVALLARIA foliis alternis amplexicaulibus, caule tereti, pedunculis axillaribus multifloris.

Phil. bot. 218. *Sp. pl.* 315. *Fl. suec.* 295.

Polygonatum. *Ger. Em.* 903. *R. Syn.* 263. vulgare. *Park.* 696.

Polygonatum latifolium vulgare. *Baub. pin.* 303.

β Polygonatum humile anglicum. *R. Syn.* 263.

Anglis, Solomon's Seal.

Habitat in sylvis. In the woods by Bramdean in Hampshire, Mr. Doody ; and on Roehill in Kent, Mr. J. Sherard. *R. Syn.* in the Beechwoods about High Wickham, Buckinghamshire, Mr.

Mr. Hill. *Blacks. spec. bot. in sepibus prope Stockwell in comitatu Surriensi. 4. V. VI. in most of the woods about and over.*
Pharmac. Polygonati Radix.

3. CONVALLARIA foliis alternis amplexicaulibus, *Polygonatum* caule ancipi, pedunculis axillaribus subunifloris. tum.

Mat. med. 168. Fl. suec. 294. Sp. pl. 315.

Polygonatum floribus ex singularibus pediculis. Bauh. hist. III. 529. R. Syn. 263.

Polygonatum latifolium flore majore odoro. Bauh. pin. 303.

Polygonatum majus flore majore. Park. 696.

Polygonatum latifolium 2. Clusii. Ger. Em. 904.

β *Polygonatum Hellebori albi folio caule purpurascente. R. Syn.*

Anglis, sweet-smelling Solomon's Seal.

Habitat in fissuris rupium prope Settle, Skipton, &c; in comitatu Eboracensi. 4. V. VI.

ANTHERICUM. 180.

Corolla hexapetala, patens. Caps. ovata.

1. ANTERICUM foliis ensiformibus, perianthiis tri-calycula-lobis, filamentis glabris. *Fl. suec. 282. Sp. pl. 311. tum.*

Phalangium scoticum palustre minimum, iridis folio.

Tourn. 369. R. Syn. 375.

Pseudo-asphodelus alpinum. Bauh. pin. 29.

Pseudo-asphodelus palustris Scoticus minimus. R. hist.

1195.

Anglis, Scottish Asphodel.

Habitat in palustribus. Juxta rivulum non procul Ber- vico in Scotia. R. Syn. 4. IX.

NARTHECIUM.

CAL. nullus.

COR. hexapetalā, erecta. *Petalis linearī-lanceolatis.*

STAM. *Filamenta sex, pubescentia. Antheræ parvæ* incubentes.

PIST. *Germen trigonum. Stylus nullus. Stigma obtusum.*

PER. *Capsula ovata, acuta, trigona, trilocularis, tri- valvis.*

SEM. numerosa fusiformia.

N A R-

- Ossifragum.* I. NARTHECIUM foliis ensiformibus filamentis lanatis. Narthecium. *Moehring. E. N. C.* 1742. 389. t. 5 f. 1.
Anthericum foliis ensiformibus, filamentis lanatis. *Sp. pl. 311.*
Phalangium Anglicum palustre Iridis folio. *Tourn.* 368. *R. Syn.* 375.
Asphodelus Lancastriæ verus. *Ger. Em.* 97.
Pseudo-Asphodelus palustris anglicus. *Baub. pin.* 29.
Anglis Lancashire Asphodel, or Bastard Asphodel.
Habitat in paludibus cespitosis. 4. VIII. *near the XXI mile stone on Bagshot Heath. Putney common, near the bowling green. P E P L I S.* 402.
Perianthium campanulatum: ore duodecimfido. *Petalæ sex, calyci inserta.* *Caps. bilocularis.*
- Portula ca.* I. PEPLIS. *Fl. lapp.* 328. *suec.* 312. *sp. pl.* 352.
Portulaca. *Dill. cat.* *giss.* 120, 239. *app.* 133. *R. Syn.* 368.
Al sine palustris minor serpyllifolia. *Baub. pin.* 120.
Al sine rotundifolia s. *Portulaca aquatica.* *Ger. Em.* 614.
Al sine aquatica minor folio oblongo, s. *Portulaca aquatica.* *Park* 1260.
Anglis Water Purslane.
Habitat in palustribus et aquosis ubi per hyemem aquæ stagnarunt. 4. IX.
- *** *Flores apetali.*
- A C O R U S. 392.
- Spadix cylindricus, tectus flosculis.* *Cor. hexapetalæ, nudæ.* *Stylus nullus.* *Caps. trilocularis.*
- Calamus.* I. ACORUS. *Roy. lugdb.* 6. *Fl. suec.* 297. *Sp. pl.* 324.
Acorus verus s. *Calamus aromaticus off.* *Baub. pin.* 34.
Acorus verus s. *Calamus officinarum.* *Park.* 140. *R. Syn.* 437.
Acorus verus, Officinis falso Calamus. *Ger. Em.* 62.
Anglis, sweet-smelling Flag, or Calamus.
Habitat in fluviis funda coenosis. *In the River Yare near Norwich, about Hedley in Surry, and in Cheshire.*
R. Syn. in ericeto Hounsflejano. 4. V.
Pharmac. *Calami aromatici Radix.* J U N-

J U N C U S. 396.

*Cal. hexaphyllus. Cor. o. Caps. unilocularis.** *Culmis nudis.*

1. JUNCUS culmo subnudo tereti mucronato, panicula terminali, involucro diphyllo spinoso. *Sp. pl.* acutus.]
325.

Juncus panicula universali culmo breviore infime coarctata, secundariis paululum laxis, capsulis triquetro-subovatis nitentibus. *Guett. stamp. II.* 412.

Juncus acutus capitulis Sorghi. *Baub. pin.* 10. *R. Syn.* 430.

Juncus maritimus capitulis Sorghi. *Park* 1192.

β *Juncus* panicula universali culmo longiore, secundariis laxis longe pedunculatis media præcipue. *Guett. stamp. II.* 412.

Juncus acutus maritimus anglicus. *R. hist.* 1303.
Hist. Ox. III. 232. *f. 8. t. 10. f. 15.*

γ *Juncus parvus* cum pericarpiis rotundis. *Baub. hist.* II. 522. *R. Syn.* 433.

Anglis, Sea hard Rush.

Habitat in maritimis paludosis. 24. VII. VIII.

2. JUNCUS culmo nuduo stricto, capitulo laterali: *conglomeratus.*
Roy. lugdb. 44. *Sp. pl.* 326.

Juncus laevis vulgaris panicula compactiore. *R. Syn.* 432.

Juncus laevis panicula non sparsa. *Baub. pin.* 12.

Juncus laevis glomerato flore. *Lob. ic.* 84. *Park.* 1192.
Anglis, round-headed Rush.

Habitat in pratis et pascuis paludosis. 24. VI. VIII.

3. JUNCUS culmo nudo stricto, panicula laterali. *Roy. effusus.*]
lugdb. 44. *Fl. suec.* 299. *Sp. pl.* 326.

Juncus culmo nudo acuminato ad basin squamato, floribus pedunculatis. *Fl. lapp.* 177.

Juncus laevis vulgaris panicula sparsa nostras. *R. Syn.* 432.

Juncus laevis panicula sparsa major. *Baub. pin.* 12.
Park. 1191.

Juncus laevis. *Ger. Em.* 39.

HEXANDRIA MONOGYNIA.

Anglis, common soft Rush.

Habitat in paludosis. 24, V. VIII.

inflexus. 4. JUNCUS culmo nudo: apice membranaco incurvo,
panicula laterali. Sp. pl. 326.

Juncus culmo nudo, paniculam arcuatam tegente.
Sauv. monsp. 9.

Juncus panicula universali laterali culmo longiore se-
cundariis sparsis. Guett. Stamp. 412.

Juncus acutus panicula sparsa. Baub. pin. 11.

Juncus acutus. Ger. Em. 39. R. Syn. 432. vul-
garis. Park. 1193.

Anglis, hard Rush.

Habitat in pascuis et ad vias. 24. VI.

filiformis. 5. JUNCUS culmo nudo filiformi nutante, panicula la-
terali. Roy. lugdb. 44. Gron. virg. 152. Fl. suec.
300. Sp. pl. 326.

Juncus parvus, calamo supra paniculam longius pro-
ductio. R. Syn. 432. Fl. lapp. 118. Pluk. ph.
t. 40. f. 8.

Juncus lœvis, panicula sparsa, minor. Baub. pin. 12.
Sch. agr. 347. t. 7. f. 1.

Anglis, the least soft Rush.

Habitat in montibus cespitosis. Found by Mr. Newton,
not far from Ambleside in Westmoreland. 24. VIII.

squarro- 6. JUNCUS culmo nudo, foliis fetaceis, capitulis glo-
meratis aphyllois. Sp. pl. 327. Fl. suec. 302.

Juncus alpinus, foliis rigidis sessilibus, caule nudo.
Rupp. jen. 146.

Juncus montanus palustris. R. Syn. 432.

Gramen junceum maritimum. Lob. ic. 18. Ger.
Em. 35. majus. Park. 1270.

Gramen foliis et spica junci. Baub. pin. 5. 10. tb. 78.

Anglis, Moss-rush or Goose-corn.

Habitat in ericetis frequens. 24. VI.

** Culmis foliosis.

articula- 7 JUNCUS foliis nodoso-articulatis. Fl. suec. 305.
tus. Sp. pl. 327.

Juncus

HEXANDRIA MONOGYNIA.

131

Juncus foliis articulosis, panicula inæquali, capitulis sessilibus capsulis subulatis triquetris. Roy. lugdb. 43.

Juncus foliis articulosis floribus umbellatis. Tourn. 247. R. Syn. 433.

Grämen junceum folio articulato aquaticum Baub. pin. 5.

Gramen aquaticum. Tab. ic. 214. Ger. Em. 22.

Gramen junceum aquaticum. Baubini 1270.

¶ *Juncus nemorosus folio articuloso.* Tourn. 247. R. Syn. 433.

Anglis, jointed leaved Rush.

Habitat in sylvis, pratis et pascuis humidis. 24. VII. VIII.

8. *JUNCUS* foliis linearibus canaliculatis capsulis ob- *bulbosus*. tufis. Fl. suec. 304. Sp. pl. 327.

Juncus foliis angulatis, culmo subnudo, panicula terminali prolifera, capsulis ovatis. Roy. lugdb. 43.

Grämen junceum minimum capsulis triangularibus. R. Syn. ed. II. 275. Hist. Ox. III. 227. f. 8. t. 9. f. 3. R. Syn. 434.

Graminis juncei varietas minor. Ger. Em. 4.

Anglis, bulbose Rush.

Habitat in ericetis humidis frequens. 24. VIII.

9. *JUNCUS* culmo dichotomo, foliis angulatis, flori- *bafonius*. bus solitaris sessilibus. Roy. lugdb. 43. Fl. suec. 305. Sp. pl. 328.

Juncus palustris humilior erectior. Tourn. 246. R. Syn. 434.

Gramen junceum. Ger. Em. 4. Parvum, s. Holosteum Matthioli, et Gramen bufonium Flandrum. Park. 1190.

Gramen nemorosum calyculis paleaceis. Baub. pin. 7.

¶ *Gramen juncoides minimum Anglo-Britannicum, Holosteum Matthioli congener, aut bufoniæ gramine Flandrico.* Lob. Ill. 70.

Anglis, Toad-rush.

Habitat in pratis et pascuis arenosis, præcipue ubi aquæ pluviales stagnant. ○. VII. VIII.

pilosus.

10. *JUNCUS* foliis planis pilosis corymbo subramoso.
Fl. suec. 308.
 Gramén nemorosum hirsutum vulgare. *R. Syn.* 416.
 Gramen nemorosum hirsutum. *Ger. Em. Lob.* ic.
 16 majus. *Park.* 1184.
 Gramen nemorosum hirsutum majus latifolium. *Baub.*
pin. 7. *th.* 101. *Hist. Ox.* II. 225. *f.* 8. *t.* 9. *f.* 1.
 Cyparellá nemorensis, capitulis in singulis petiolis sin-
 gulis latifolia. *Rupp.* 116.
Anglis, common hairy Wood-rush, or Grass.
 Habitat in sylvis densis frequens. In sylva Charlton-
 wood dicta in Cantio. 4. IV. V.

sylvaticus.

11. *JUNCUS* foliis planis pilosis, umbella supra decom-
 posita floribus subsessilibus.
 Juncus foliis planis latissimis, panicula sparsa, dupli-
 cato ramoso. *Hall. helv.* 257.
 Juncus foliis planis, panicula diffusa, pedunculis pro-
 liferis, flocculis intermediis sessilibus. *Roy. lugdb.*
 43.
 Gramen nemorosum hirsutum latifolium maximum.
R. Syn. 416.
 Gramen Luzulæ maximum. *Baub. hist.* II. 493.
Anglis, great hairy Wood-rush.
 Habitat in sylvis et sepibus prope Hamstead. 4. V.

*campes-
tris.*

12. *JUNCUS* foliis planis pilosis, spicis sessilibus pe-
 dunculatisque. *Fl. suec.* 309. *Sp. pl.* 329.
 Gramen hirsutum capitulis psyllii. *Baub. pin.* 7. *pr.*
 15.
 Gramen nemorosum hirsutum minus angustifolium.
Park. 1185.
 Gramen exile hirsutum. *Ger. Em.* 16. *R. Syn.* 416.
 β Gramen hirsutum elatius, panicula juncea compacta.
R. Syn. 416.
Anglis, small hairy Wood-rush.
 Habitat in pratis et paucis siccioribus, β in paludibus
 turfosis. 4. IV.

TRIGYNYA.

* *Flores inferi.*

TRIGLOCHIN. 409.

Cal. triphyllus. *Petala tria calyciformia.* *Stylus o.*
Caps. basi dehiscens.

1. TRIGLOCHIN capsulis trilocularibus sublinearibus. *palustre.*

Fl. suec. 321. *Sp. pl.* 338.

Juncajo palustris et vulgaris. *Tourn.* 266. *R. Syn.*
435.

Graimen triglochin. *Baub. hist.* II. 508.

Gramen junceum spicatum seu triglochin. *Baub. pin.* 6.

Gramen marinum spicatum. *Ger. Em.* 18. alterum,
Park. 1279.

Anglis, Arrow-headed Grass.

Habitat in pratis et pascuis uidis passim. 4. VII. VIII.

2. TRIGLOCHIN capsulis sexlocularibus ovatis. *Fl. mariti-*
suec. 322. *Sp. pl.* 339. *mum.*

Gramen marinum spicatum. *Lob. ic.* 16. *Park.* 1279.
R. Syn. 435.

Gramen junceum et spicatum alterum. *Baub. pin.* 6.

Anglis, Sea spiked Grass.

Habitat ubique in pratis maritimis. 4. V. VI.

RUMEX 407.

Cal. triphyllus. *Petala tria, conniventia.* *Sem. uni-*
cum triquetrum.

* *Hermapbroditi : valvulis granulo notatis.*

1. RUMEX floribus hermaphroditis : valvulis integer- *sanguini-*
rimis: unica granifera, foliis cordato lanceolatis. *neus.*
Sp. pl. 334.

Lapathum folio acuto rubente. *Baub. pin.* 115. *R.*
Syn. 142.

Lapathum sativum sanguineum. *Ger. Em.* 390.

Anglis, Bloodwort.

HEXANDRIA TRIGYNIA.

Habitat in *sylvis* prope Hamstedium. ♂. VII.
Pharmac. *Lapathi sanguinei Folia, Semina.*

- acutus.* 2. **RUMEX** floribus hermaphroditis : valvulis dentatis graniferis, foliis cordato-oblongis. *Hort. cliff.* 138. *Fl. suec.* 316. *Sp. pl.* 335. *Mat. med.* 176.
Lapathum acutum. *Ger. Em.* 388. *R. Syn.* 142. *mag. Park.* 1224.
Lapathum folio acuto, plano. *Baub. pin.* 115.
Anglis, sharp-pointed Dock.
Habitat in *incultis, sylvis et aquosis.* ♀. VI.
Pharmac. *Oxylapathi, Radix, Semina.*
- crispus.* 3. **RUMEX** floribus hermaphroditis : valvulis integris graniferis, foliis lanceolatis undulatis acutis. *Sp. pl.* 335.
Lapathum folio acuto crispoo. *Baub. pin.* 115. *R. Syn.* 141.
Lapathum acutum minus. *Park.* 226.
Lapathum acuti varietas folio crispoo. *Ger. Em.* 387.
Anglis, curled Dock.
Habitat in *pratis pastuis et ad vias.* ♀. VI. VII.
- obtusifolium.* 4. **RUMEX** floribus hermaphroditis : valvulis dentatis, foliis cordato-oblongis obtusifolculis crenulatis. *Sp. pl.* 335.
Lapathum vulgare folio obtuso. *Baub. hist.* II. 984. *R. Syn.* 141.
Lapathum sylvestre folio subrotundo. *Baub. pin.* 115.
Lapathum sylvestre vulgatius. *Park.* 1225.
Lapathum sylvestre folio minus acuto. *Ger. Em.* 388.
Anglis, broad-leaved Dock.
Habitat *ad vias et in locis humidis.* ♀. VII. VIII.
- pulcher.* 5. **RUMEX** floribus hermaphroditis : valvulis dentatis graniferis, foliis radicalibus lyratis. *Syst. nat.* 990. *Sp. pl.* 336.
Lapathum pulchrum Bononiense sinuatum. *Baub. hist.* II. 288. *R. Syn.* 142.
Lapathum ramis procumbentibus, seminis involucro dentato, foliis inferioribus instar fidium. *Hist. Ox.* II. 580.
Anglis,

Anglis, Fiddle-dock.

Habitat ad vias et in pratis succis. 4. VI.

6. RUMEX floribus hermaphroditis : valvulis dentatis mariti-
graniferis, foliis linearibus. *Lech. scan.* 26. *Sp. pl. mus.*
335.

Lapathum folio acuto flore aureo. *Baub. pin.* 115.
R. Syn. 142.

Lapathum aquaticum, angustissime acuminato folio.
Bocc. mus. II. 142. t. 104.

Lapathum aureum glomerulis densis. *Pet. h. br.* t.
2. f. 8.

Aithoxanthón. *Baub. hist.* II. 988.

β Lapathum aureum. *Pet. h. br.* t. 2. f. 7.

Anglis, Golden Dock.

Habitat ad vias et in ruderatis passim. 4. VII. VIII.

7. RUMEX floribus hermaphroditis : valvulis integer-*Britani-*
rimis, omnibus graniferis, foliis lanceolatis vaginis ca.
obsoletis. *Mat. med.* 17. *Sp. pl.* 334.

Lapathum maximum aquaticum f. *Hydrolapathum*.
Baub. hist. II. 986. *R. Syn.* 140.

Lapathum aquaticum folio cubitali. *Baub. pin.* 116.

Lapathum longifolium nigrum palustre, f. *Britanica*
antiquorum vera, vel *Hydrolapathum nigrum*. *Mun-*
ting. br. t. 1.

Hydrolapathum magnum. *Ger. Em.* 389.

Hydrolapathum majus. *Park.* 1225.

Anglis, great Water Dock.

Habitat in fossis, palustribus frequens. 4. VII. VIII.

Pharmac. *Hydrolapathi Radix*.

** *Hermaphroditum* : *valvulis granulo destitutis*.

8. RUMEX floribus hermaphroditis digynis. *Hort. digynus*.
cliff. 138. *Fl. suec.* 317. *Sp. pl.* 337.

Rumex foliis orbiculatis emarginatis. *Fl. lapp.* 132.

Acetosa rotundifolia repens Eboracensis, folio in me-
dio deliquiuin paciente. *Hist. Ox.* II. 583. f. 5.
t. 36. f. penult.

Acetosa repens Westmorlandica, cochleariae foliis api-
cibus nonnihil sinuatis. *Pluk. ph.* t. 252. f. 2.

Acetosa Cambro-britanica montana. *Park.* 745.

HEXANDRIA TRIGYNIA.

Anglis, round-leaved mountain Sorrel.

Habitat in montibus Wallicis, Fboracensi, Westmorlandico, Cumberlandico, frequens. 4. VI.

*** *Floribus declinis.*

Acetosa. 9. RUMEX floribus dioicis, foliis oblongis sagittatis.
Fl. lapp. 130. suec. 318. Sp. pl. 337.

Lapathum acetosum vulgare. R. Syn. 143.

Acetosa vulgaris Park. 742.

Acetosa pratensis. Bauh. pin. 114.

Oxalis, seu acetosa. Ger. Em. 396.

β Acetosa montana maxima. Bauh. pin. 114. R. Syn. 143.

Anglis, common Sorrel.

Habitat in pratis et pascuis, β in rupibus maritimis prope Harlech in comitatu Merionethensi collegt. D. Lhwyd. R. Syn.

Pharmac. Acetosæ pratensis et oxalis Radix, Folia, Semina.

Acetosella. 10. RUMEX floribus dioicis, foliis lanceolato-hastatis.
Fl. lapp. 131. suec. 319. Sp. pl. 338.

Lapathum acetosum repens lanceolatum. R. Syn. 143.

Acetosa arvensis lanceolata. Bauh. pin. 114.

Acetosa minor lanceolata. Park. 744.

Oxalis tenuifolia. Ger. Em. 397.

Anglis, Sheep's Sorrel.

Habitat in arvis, pratis, pascuis, arenosis. 4.V. VI.VII.

Pharmac. Acetosæ lanceolatae Folia.

COLCHICUM. 415.

Spatha. Cor. sexpartita; tubo radicato. Caps. tres connexæ, inflatæ.

autum- 1. COLCHICUM foliis planis lanceolatis erectis. Sp. nate. pl. 341.

Colchicum commune. Bauh. pin. 67. R. Syn. 373.

Colchicum Anglicum purpureum et Anglicum album.

Park. 153. Ger. Em. 157.

Anglis, Meadow Saffron.

Habitat

Habitat in pratis tam planis quam montosis, solo pingui,
in Occidentalibus ut et Septentrionalibus Angliae.
R. Syn. 4. IX.

POLYGYNIA.

ALISMA. 418.

Cal. triphyllus. Petala tria. Sem. plura.

1. ALISMA foliis ovatis acutis, fructibus obtusis trigonis. *Sp. pl. 342. Fl. suec.* Plantago aquatica. *Bauh. hist. III. 787. R. Syn. 257. major. Ger. Em. 417. Park. 1245.*

Plantago aquatica latifolia. Bauh. pin. 190. Anglis, great Water Plantain.

Habitat in aquosis et ad ripas fluviorum ubique. 4. VI.—VII.

2. ALISMA foliis linear-lanceolatis, fructibus globo-squarroso-floros. *Sp. pl. 343. Fl. suec. 325. Alisma fructu globofo, undique echinato. Hort. cliff. 141.*

Plantago aquatica minor. Park. 1245. R. Syn. 257. Plantago aquatica humilis. Ger. Em. 417.

Plantago aquatica angustifolia. Bauh. pin. 190. Anglis, lesser Water Plantain.

Habitat in aquosis sed rarius. 4. VI.—VIII.

3. ALISMA foliis ovatis obtusis, pedunculis solitariis. *natans. Sp. pl. 343. Fl. suec. 324.*

Alisma repens, foliis gramineis et subrotundis. Mart. Tourn. 17

Damasonium repens, potamogetonis rotundifolii folio. Vaill. Act. 1719. p. 29. t. 4. f. 8.

Anglis, creeping Water Plantain.

Habitat in the great lake, below the old castle, at Llanberys. Mr. Brewer. *Mart. Tourn. 4. VIII.*

4. ALISMA

- Damafo-* 4. **ALISMA** foliis cordato-oblongis, floribus hexagynis.
nium. *Sp. pl.* 343.
Alisma fructu sexcorni. *Hert. cliff.* 142. *Roy. lugdb.*
46.
Plantago aquatica minor stellata. *Ger. Em.* 417.
Plantago aquatica stellata. *Baub. pin.* 190.
Plantago aquatica minor muricata. *Park.* 1245.
Damasonium stellatum Dalechampii, *Baub. hist.* III.
789. *K. Syn.* 272.
Anglis, Star-headed Water Plantain.
Habitat *in fossis et aquis stagnantibus*. Circa Londi-
num frequens. 24. VI.—VIII.

Clavis

Classis VII.

HEPTANDRIA

MONOGYNIA.

TRIENTALIS. 419.

*Cal. heptaphyllus. Cor. septem-partita, æqualis,
plana. Bacca exsucca.*

1. TRIENTALIS foliis lanceolatis integerrimis. *Kalm. europæa.
canad. II. 263. Fl. suec. 326. Sp. pl. 344.*

*Alsinanthemos. Thal. sylv. 15. Moerb. hort. 8. III.
R. Syn. 286.*

*Pyrola alsines flore europæa. Baub. pin. 191. Park.
509.*

Pyrola alsines flore major. Baub. prod. 100.

Herba trientalis. Baub. hist. III. 506.

Alpine alpina. Schwenk. siles. 17. descr.

β *Pyrola alsines flore Brasiliana. Baub. pin. 191. pr.
100.*

Anglis, Chickweed, Winter-green.

*Habitat in sylvis, et ericetis in comitatibus Eboracensi,
Northumberlandico et Westmorlandico; prope
Bingley in comitatu Eboracensi copiose. 24. VI.*

Classis

Classis VIII.

O C T A N D R I A

M O N O G Y N I A.

* *Flores completi.*

E P I L O B I U M. 426.

Cal. quadrifidus. Petala quatuor. Caps. oblonga, infera. Sem. papposa.

* *Staminibus declinatis.*

X *angustifo-* 1. EPILOBIUM foliis sparsis linear-i-lanceolatis. *Sp. pl. lium.* 347. *Fl. suec.* 327.

Epileobium floribus difformibus, pistillo declinato. *Fl. suec. Ed. I.* 304.

Lysimachia Chamænerion dicta angustifolia. *Baub. pin.* 245.

Lysimachia speciosa, quibusdam Onagra dicta, fili-
quosa. *Baub. hist. II.* 906. *R. Syn.* 310.

Chamænerion flore Delphinii. *Park.* 548.

Anglis, Rosebay Willow-herb.

Habitat in sylvis et sepibus. In the meadows near
Sheffield in Yorkshire, and in several other places
of the north plentifully. *R. Syn.* On Maize-hill be-
yond Greenwich. 4. VII. VIII. in a little ash grove
by the Meadow near Charlton in Andover parish. *Hants.*
** *Staminibus erectis regularibus, petalis bifidis.* Plentifully

hirsutum. 2. EPILOBIUM foliis lanceolatis undulato-serratis de-
currentibus; inferioribus oppositis, caule subsim-
plici, racemo terminalibus.

Epileobium foliis oppositis lanceolatis serratis decur-
renti-amplexicaulibus. *Sp. pl.* 347. *Fl. suec.* 328.

Lysimachia siliquosa hirsuta parvo flore. *Baub. pin.*
245. *pr.* 116. *R. Syn.* 311.

Lysimachia sylvatica. *Ger. Em.* 476.

Lysimachia siliquosa sylvestris hirsuta. *Park.* 549.
Anglis,

Anglis, small flowered hairy Willow-herb.

Habitat in aquosis et ad rivulos. 24. VII.

3. EPILOBIUM foliis lanceolatis ferratis subdecurrens *ramosum*.
tibus inferioribus oppositis, caule ramoso.

Lysimachia siliquosa hirsuta magno flore. Baub. pin.
245. R. Syn. 311.

Lysimachia siliquosa. Ger. Em. 476.

Anglis, great flowered Willow-herb, or Codlings and
Cream.

Habitat in sepibus humidis et ad rivulos passim. 24.
VII.

4. EPILOBIUM foliis oppositis ovatis dentatis. *Fl. lapp. montanum*
147. suec. 329.

Lysimachia campestris. Ger. Em. 478.

Lysimachia siliquosa glabra major. Baub. pin. 245.

Lysimachia siliquosa major. Park. 548.

Anglis, smooth-leaved Willow-herb.

Habitat in pratis humidis glareosis frequens. 24. VI.
VII.

5. EPILOBIUM foliis lanceolato-linearibus denticulatis oppositis, caule tetragono. *Sauv. monsp. 75. num.*

Lysimachia siliquosa glabra media s. minor. Ger. Em.
479. R. Syn. 311.

Lysimachia siliquosa glabra minor. Baub. pin. 245.

Anglis, narrow-leaved Willow-herb.

Habitat ad fossas et rivulos. 24. VII.

6. EPILOBIUM foliis oppositis lanceolatis integer-*palustre*.
rimis, petalis emarginatis caule erecto. Sp. pl.
348. Fl. suec. 330.

Lysimachia siliquosa glabra minor angustifolia. Ger.
Em. 479. R. Syn. 311.

Lysimachia siliquosa glabra angustifolia. Baub. pin.
245.

Anglis, marsh Willow-herb.

Habitat in palustribus. 24. VII.

- alpinum.* 7. EPILOBIUM foliis oppositis ovato-lanceolatis integrerrimis, siliquis sessilibus, caule repente. *Sp. pl.* 348. *Fl. suec.* 331.
Chamænerion alpinum alsines foliis. *Sch. alp.* 132. 332.
Lysimachia siliquosa glabra minor latifolia. *R. Syn.* 311.
Anglis, Mountain Willow-herb.
Habitat ad rivulos. In the rivulet on the sides of Cheviot-Hills in Northumberland. *R. Syn.* 4. VII.

VACCINIUM. 434.

Cal. superus. *Cor. monopetala.* *Filamenta receptaculo inserta.* *Bacca quadrilocularis, polysperma.*
** Foliis annotinis s. deciduis.*

- Myrtillus.* 1. VACCINIUM pedunculis unifloris, foliis serratis ovalis deciduis, caule angulato. *Sp. pl.* 350. *Fl. suec.* 333.
Vitis idæa, foliis oblongis crenatis, fructu nigricante. *Baub. pin.* 470.
Vitis idæa angulosa. *Baub. hist. I.* 520. *R. Syn.* 457.
Vaccinia nigra. *Ger. Em.* 1415. *vulgaria.* *Park.* 1455.
Anglis, Black Whorts, Whortle-Berries, or Bilberries.
Habitat in ericetis et sylvis frequens. h. IV.

- uliginosum.* 2. VACCINIUM pedunculis unifloris, foliis integerrimis ovalibus basi ciliatis. *Sp. pl.* 350. *Fl. suec.* 332.
Vitis idæa foliis subrotundis exalbidis. *Baub. pin.* 470.
Vitis idæa magna quibusdam, s. *Myrtyllus grandis.* *Baub. hist. I.* 518. *R. Syn.* 457.
Vitis idæa foliis subrotundis major. *Ger. Em.* 1416.
Vaccinia nigra fructu majore. *Park.* 1455.
Anglis, the great Bilberry Bush.
Habitat in montosis Cumberlandiæ medio itinere inter Hexham et Pereth oppida; sed copiosius prope vicum Gambleby, ad sextum ab oppido Pereth lapidem, via qua Novum Castellum ducit: utrobique in paucis palustribus, &c. *R. Syn.* h. IV. V.

3. VAC-

3. VACCINIUM racemis nudis, foliis integerrimis re- *cantabri-*
volutis lanceolato-ovatis, subtus tomentosis. *cum.*

Erica cantabrica flore maximo, fo iis myrti subtus in-
canis. *Tourn.* 603. *R. Syn.* 472.

Erica St. Dabeoci Hibernis. *D. Lhwyd. R. Hist.* III.
dendr. 98.

Erica Hibernica foliis myrti pilosis, subtus incanis.
R. Hist. III. *App.* 244. *Pet. gaz. nat.* t. 27. f. 4.

Anglis, Irish Whorts.

Habitat in montibus Mayo *squalido et spongioso solo fre-*
quens, ut et per totum Hair-Connacht in Gallovidia.
R. Syn. h.

** *Foliis sempervirentibus.*

4. VACCINIUM racemis terminalibus nutantibus, fo- *Vitis*
liis ob ovatis revolutis integerrimis subtus punctatis. *idæa.*
Sp. pl. 351.

Vaccinia rubra. *Ger. Em.* 1415. buxeis foliis.
Park. 1458.

Vitis idæa foliis subrotundis non crenatis, baccis ru-
bris. *Baub. pin.* 470.

Vitis idæa semper-virens fructu rubro. *Baub. hist.* I.
522. *R. Syn.* 457.

Anglis, red Whorts, or Whortle-berries.

Habitat in montibus Eboracensis, Derbiensis,
Staffordiensibus inter ericas copiose. *R. Syn.* h.
IV. V.

5. VACCINIUM foliis integerrimis revolutis ovatis, *Oxycoccus.*
caulibus repentibus filiformibus nudis. *Sp. pl.* 351.
Fl. suec. 335.

Vaccinium palustre. *Park.* 1229.

Vaccinia palustria. *Ger. Em.* 1425.

Vitis idæa palustris. *Baub. pin.* 471.

Oxycoccus seu *Vaccinia palustria.* *Baub. hist.* I. 525.
R. Syn. 267.

Anglis, Cran-berries, Moss-berries, or Moor-berries.
Habitat in palustribus turfosis in comitatibus Westmor-
landico, Cumberlandico, Lancastriensi, Eboracensi,
&c. copiose. h. V. VI.

ERICA. 435.

Cal. tetraphyllum. *Cor.* quadrifida. *Filamento receptaculo* inserta. *Antheræ* bifidæ. *Caps.* quadrilocularis.

* *Antheris bicornibus.*

vulgaris.

1. ERICA antheris bicornibus inclusis corollis inæqualibus campanulatis mediocribus, foliis oppositis sagittatis. *Sp. pl.* 352. *Fl. suec.* 336.

Erica foliis quadrifariam imbricatis triquetris glabris erectis, corollis inæqualibus calyce brevioribus. *Hort. cliff.* 146.

Erica vul'garis. *Park.* 1480. *R. Syn.* 470. *f. pulmila.* *Ger. Em.* 1380.

Erica vulgaris glabra. *Baup. pin.* 485.

Anglis, common Heath, or Ling.

Habitat in ericetis. h. VI.—VIII.

cinerea.

2. ERICA antheris bicornibus inclusis, corollis ovatis racemosis, foliis ternis glabris linearibus. *Sp. pl.* 352.

Erica tenuifolia. *Ger. Em.* 1380. *R. Syn.* 471.

Erica humilis, cortice cinereo, Arbuti flore. *Baup. pin.* 486.

Erica virgata f. VI. Clusii. *Park.* 1483.

Anglis, fine-leaved Heath.

Habitat in ericetis et sylvis siccissimis. h. VI. VIII.

Tetralix.

3. ERICA antheris bicornibus inclusis, corollis subglobosis aggregatis calyce longioribus foliis quaternis ciliatis patentibus. *Sp. pl.* 353. *Fl. suec.* 337.

Erica major flore purpureo. *Ger. Em.* 1382.

Erica ex rubro nigricans scoparia. *Baup. pin.* 486.

Erica brabantica folio coridis hirsuto quaterno. *Baup. hist. I.* 358. *R. Syn.* 471.

Anglis, cross-leaved Heath.

Habitat in ericetis humidis. h. VII. VIII.

** *Antheris simplicibus obtusis emarginatis.*

ciliaris.

4. ERICA antheris simplicibus inclusis, corollis ovatis irregularibus, floribus terno-racemosis, foliis ternis ciliatis. *Sp. pl.* 354.

Erica

Erica vulgaris hirsuta. *Ger. Em.* 1382. *R. Syn.* 471.

Erica hirsuta anglica. *Baub. pin.* 602.

Erica vulgaris hirsutior. *Park.* 1480.

Anglis, rough-leaved Heath.

Habitat in ericetis *passim.* h. VI.

5. ERICA antheris bifidis simplicibus exsertis, corollis *multifloras* cylindricis longioribus, foliis quinque linearibus patentibus. *Sp. pl.* 355.

Erica foliis Corios multiflora. *Baub. bist. I.* 356.

R. Syn. 471.

Erica juniperifolia narbonensis dense fruticans. *Lob. bist.* 620. *Sauv. monsp.* 46.

Anglis, Fir-leaved Heath.

Habitat in *incultis.* On Goon hilly downs going from Helston to the Lizard Point in Cornwal. *R. Syn.*

h. VI. VII.

** Flores incompleti.

D A P H N E. 436.

Cal. o. Cor. quadrifida, marcescens, stamina inclu- dens. *Bacca monosperma.*

1. DAPHNE racemis axillaribus, foliis lanceolatis gla- bris, *Hort. cliff.* 147. *Mat. med.* 180. *Sp. pl.* 357.

Laureola. *Ger. Em.* 1405. *Park.* 205. *R. Syn.* 465.

Laureola semper-virens flore viridi, quibusdam Lau- reola mas. *Baub. pin.* 462.

Anglis, Spurge Laurel.

Habitat in *sylvis et sepibus.* In *sepibus* inter Wimble- ton et Martin. h. III. IV.

Pharmac. Laureolæ *Folia, Bacca.*

2. DAPHNE floribus sessilibus ternis caulinis, foliis lan- ceolatis deciduis. *Sp. pl.* 356. *Fl. suec.* 338. um.

Laureola folio deciduo, flore purpureo. *Baub. pin.* 426.

Camælæ Germanica f. *Mezereon.* *Ger. Em.* 1403. vulgo. *Park.* 205.

Anglis, Spurge Olive.

Habitat in *sylvis prope Andover copiose.* *D. Miller.* h. III.

Pharmac. *Mezerei Folia, Bacca, Cortex.*

D I G Y N I A.

BLACKSTONIA.

CAL. *Perianthium octofidum*: *laciniis lanceolatis persistentibus*.

COR. monopetala. *Tubus nullus*. *Limbus octofidus*: *laciniis lanceolatis longitudine calycis*.

STAM. *Filamenta octo*, *subulata*. *Antheræ simplices*.

PIST. *Germen ovato-oblongum*. *Stylus nullus*. *Stigmata duo*.

PER. *Capula oblonga*, *acuminata*, *unilocularis*, *bivalvis*.

SEM. *numerosa*, *parva*.

x perfoliata. 1. BLACKSTONIA.

Gentiana corollis octofidis, *foliis perfoliatis*. *Sp. pl. 232.*

Centaureum luteum perfoliatum. *Baub. pin. 278. bist. III. 355. R. Syn. 287.*

Centaureum parvum luteum Lobelii. *Ger. Em. 547.*

Centaureum minus luteum et perfoliatum non ramosum. *Park. 271.*

Anglis, yellow Century.

Habitat *in pratis et paucis montosis*. ○. VII.

Plentifully about Doverdale in Worcestershire.

TRIGYNTIA.

POLYGONUM. 445.

Cal. o. Cor. quinquepartita, calycina. Sem. unicum angulatum.

* *Bistorta spica unica*.

Bistorta. 1. POLYGONUM caule simplicissimo monostachyo, foliis ovatis in petiolum decurrentibus. *Mat. med. 188. Sp. pl. 360.*

Bistorta major. *Ger. Em. 399. R. Syn. 147. vulgaris*. *Park. 391.*

Bistorta radice minus intorta. *Baub. pin. 192.*

Anglis,

Anglis, the greater Bistort, or Snakeweed.

Habitat in pratis humidis in comitatibus Cumberlandico,
Westmorlandico, Eboracensi, frequens; prope Bat-
tersea. 4. V. VI.

Pharmac. Bistortæ Radix.

2. POLYGONUM caule simplicissimo monostachyo, vivipa-
foliis lanceolatis. Sp. pl. 360. Fl. suec. 340. rum.

Bistorta minor. Ger. Em. 399. R. Syn. 147. nostras.
Park. 392.

Bistorta alpina minor. Baub. pin. 192.

β Bistorta minima alpina, foliis imis subrotundis et mi-
nutissime ferratis. R. Syn. 147.

Anglis, small Bistort, or Snakeweed.

Habitat In pratis montosis. In several places in West-
moreland, and near Settle in Yorkshire. R. Syn.
4. VI.

** Persicariæ pistillo bifido, aut stamina minus 8.

3. POLYGONUM floribus pentandris semidigynis, amphibi-
staminibus corolla longioribus. Sp. pl. 361. Fl. suec. um.
341.

Persicaria salicis folio perennis, Potamogiton angusti-
folium dicta. R. Syn. 145.

Potamogiton angustifolium. Ger. Em. 821.

Potamogiton salicis folio. Baub. pin. 131.

Fontalis major longifolia. Park. 1254.

Anglis, Perennial Arsmart.

Habitat in fossis et paludibus frequens. 4. VI. VII.

4. POLYGONUM floribus hexandris digynis, spicis Persicaria
ovato-oblongis, foliis lanceolatis stipulis ciliatis. Sp.
pl. 361.

Persicaria maculosa. Ger. Em. 445. R. Syn. 145.

Persicaria mitis maculosa et non maculosa. Baub. pin.
101.

Persicaria vulgaris mitis seu maculosa. Park. 856.

β Persicaria angustifolia. Baub. pin. 101. pr. 43. ex
singulis geniculis florens. Merr. pin. R. Syn. 145.

γ Persicaria folio subtus incano. Tourn. 510. R. Syn.
145.

OCTANDRIA TRIGYNIA.

- ♂ *Perficaria foliis falicis albæ vulgaris.* *Buddl. hort. suec.*
Vol. IV. f. 20. R. Syn. 145.
- ♀ *Perficaria latifolia geniculata, caulis maculatis.* *R. Syn. 145.*
- ζ *Perficaria maculosa procumbens foliis subtus incanis.*
R. Syn. 146.
Anglis, dead or spotted Arsmart.
Habitat in pratis pascuis, arvis, ruderatis humidis ubique. γ. ♂. *in arenosis aridis.* ☽. VIII. IX.

- penſylvana-* 5. *POLYGONUM floribus octandris digynis, pedunculis hispidis, foliis lanceolatis, stipulis muticis.* *Sp. pl. 362.*
Perficaria mitis major, foliis pallidioribus. *D. Bobarti.*
R. Syn. 145.
Anglis, pale Arsmart.
Habitat in arvis et ruderatis frequens. ☽. VIII.

- Hydropiper.* 6. *POLYGONUM floribus hexandris semidigynis, foliis lanceolatis, stipulis submuticis.* *Sp. pl. 361.*
Fl. suec. 343.
Perficaria urens seu Hydropiper. *Baub. pin. 101.*
Perficaria vulgaris acris s. Hydropiper. *Baub. hijst. III. 780. R. Syn. 144.*
Perficaria vulgaris acris seu minor. *Park. 856.*
Hydropiper. *Ger. Em. 445.*
Anglis, Water-pepper, or Arsmart.
Habitat in aquosis et ad rivulos et fossas. ☽. VII. VIII.
Pharmac. *Perficariæ non maculatæ Herba.*

- minus.* 7. *POLYGONUM floribus hexandris digynis, foliis lanceolatis, stipulis ciliatis, caule divaricato patulo.*
Perficaria pusilla repens. *Ger. Em. 446. Park. 857.*
R. Syn. 145.
Perficaria minor. *Baub. pin. 101. Hijst. Ox. II. f. 5.*
t. 29. f.
Anglis, small creeping Arsmart.
Habitat in aquosis et ad fossas sed rarius. *In the meadows beyond Peterborough-house, and in Tothil-fields, Westminster.* *Blacks. spec. bot.* ☽. VII.

Polygona foliis indivisis, floribus octandris.

1. POLYGONUM floribus octandris trigynis axillari- *aviculari-* bus, foliis lanceolatis, caule procumbente herbaceo.

Sp. pl. 392. Fl. suec. 339.

Polygonum mas vulgare. Ger. Em. 565. R. Syn. 146. majus. Park. 443.

Polygonum latifolium. Baub. pin. 281.

Polygonum seu Centinodia. Baub. hist. III. 374.

β *Polygonum brevi angustoque folio. Baub. pin. 281.*

γ *Polygonum oblongo angustoque folio. Baub. pin. 281.*

δ *Polygonum folio rotundo. Pet. h. br. t. 10. f. 2.*

Anglis, Knot-grafts.

Habitat in viis, plateis, agris ubique. ⊙. VI. IX.

Pharmac. Polygoni s. Centinodiæ Herba.

9. POLYGONUM floribus octandris trigynis axillari- *mariti-* bus, foliis ovati-lanceolatis, caule suffruticoso sem- *mum.* pervidente. *Sp. pl. 361.*

Polygonum marinum. Baub. hist. III. 376. R. Syn.

147.

Polygonum marinum maximum. Ger. Em. 564.

Polygonum maritimum latifolium. Baub. pin. 281.

Polygonum marinum majus. Park. 444.

Anglis, Sea Knot-grafts.

Habitat in littoribus maritimis. Prope oppidum Pen- fans in Cornubia, between Abermeney and Llhan- dwyn, Mr. Lhwyd; at Brackelsham in Sussex, Dr. Dillenius. R. Syn. 24. VII.

*** *Helxine foliis subcordatis.*

10. POLYGONUM foliis cordatis, caule volubili, flo- *Convol-* ribus planiusculis. *Sp. pl. 364. Fl. suec. 344. vulus.*

Convolvulus minor semine triangulo. Baub. pin. 295.

Convolvulus minor atriplicis folio. Park. 171.

Helxine semine triangulo. Baub. hist. II. 157.

Volubilis nigra. Ger. Em. 863.

Fegopyrum scandens sylvestre. R. Syn. 144.

Anglis, black Bindweed.

Habitat in arvis, hortis, cultis, frequens. ⊙. VI.—IX.

OCTANDRIA TETRAGYNIA.

- Fagopyrum.* *II. *POLYGONUM* foliis cordato-sagittatis, caule erectiusculo inermi, semen angulis æqualibus. *Sp. pl. 364. Fl. suec. 345.*
Fagopyrum. *Dod pempt. 511. R. Syn. 144.*
Fagopyrum. *Ger. Em. 89. Park. 1141.*
Erysimum Theophrasti folio hederaceo. *Bauh. pin. 27.*
Anglis, Buck wheat, or Brank.
Habitat in arvis, cultis, passim. ☉ VII. VIII.

TETRAGYNIA.

ADOXA. 450.

Cal. bifidus, inferus. Cor. 4. f. 5.-fida supera. Baccæ 4 f. 5 -locularis, calyx coalita.

- Moschata.* I. *ADOXA.* *Sp. pl. 367. Fl. suec. 347.*
tellina. *Moschatellina* foliis fumariæ bulbosæ. *Bauh. hist. III. 206. R. Syn. 267.*
Ranunculus nemorosus Moschatella dictus. *Park. 226.*
Ranunculus nemorum moschatellina dictus. *Bauh. pin. 178.*
Radix cava minima viridi flore. *Ger. Em. 1090.*
Anglis, tuberous Moschate.
Habitat in sylvis et umbrosis. 4. III. IV.

PARIS. 449.

Cal. tetraphyllus. Petala quatuor angustiora. Baccæ quadrilocularis.

- quadrifolia.* I. *PARIS.* *Sp. pl. 364. Fl. suec. 346.*
Herba Paris. *Ger. Em. 405. Park. 390. Bauh. hist. III. 316. Tourn. 233. Till. ab. 33. ic. 32. R. Syn. 264.*
Solanum quadrifolium bacciferum. *Bauh. pin. 167.*
Anglis, Herb Paris, True-love, or One-berry.
Habitat in sylvis et umbrosis. *In sylvula non longe ab Hampstedio, C. Miller. 4. V. VI.*
Pharmac. *Herba Paris, Fruetus, Radix.*

ELATINE. 451.

Cal. tetraphyllus. Petala quatuor. Caps. quadrilocularis, quadrivalvis, depressa.

1. ELATINE foliis verticillatis. *Roy. lugdb. 452. Sp. Alsinastrum.*
pl. 368. Fl. suec. 349.

Elatine foliis emersis linearibus, immersis capillaceis.

Sauv. monsp. 1743. p. 50.

Alsinastrum gallii folio. Vail. paris. 6. t. 1. f. 6.

Equisetum palustre linariæ scopariæ folio. Bauh. pin.

15.

Ericoides facie pinastellæ. *Rupp. jen. 99.*

Anglis, Waterwort.

Habitat in fossis. *Found by Mr. J. Sherard on the boggy ground, on the common, just by the road from Eltham to Chisselhurst. R. Syn. 346. 4. VIII.*

L 4

Classis

Classis IX.

E N N E A N D R I A
H E X A G Y N I A.

B U T O M U S. 455.

Cal. o. Petata sex. Caps. sex. polyspermæ.

- umbella- t. BUTOMUS. Cæf. 553. R. Syn. 273. Fl. lapp. 159.
tus. suec. 350. Sp. pl. 372.
Juncus floridus. Baub. hist. II. 524. Park. 1197.
major. Baub. pin. 12.
Gladiolus palustris Cordi. Ger. Em. 29.
Anglis, flowering Rush, or Water Gladiole.
Habitat in fossis limosis, et ad ripas fluviorum et stag-
norum. 4. VI. Near Blackwall.*

*Radix comeditur ab inferioris Lenæ
fluvii partis acolis, prope glaciamem
oceani sitis, Yakoutes dictis.*

Classis

Classis X.

DECANDRIA MONOGYNYA.

* *Flores Polypetali æquales.*

MONOTROPA. 477.

Cal. o. *Petala decem*, horum quinque exteriora basi excavato-mellifera. *Caps.* quinquevalvis. *Quinta pars numeri quibusdam excluditur.*

I. MONOTROPA floribus lateralibus octandris, terminali decandro. *Fl. suec.* 351. *Sp. pl.* 387. *Hypopitys*.

Hypopitys lutea. *Cat. giss.* 99. *app.* 134. *t.* 7. *R.*
Syn. 317.

Orobanche hypopitys. *Bauh. pin.* 88. *pr.* 31.

Orobanche verbasculi odore. *Plot. ox.* 146. *t.* 9. *f.*
6. *Pluk. ph.* *t.* 209. *f.* 5.

Orobanche flore breviore duplici, verbasculi odore.
Hist. Ox. III. 504. *f.* 12. *t.* 16. *f.* 20.

Anglis, Bird's-nest smelling like Primrose-roots.

Habitat in sylvis sed rarius. At the roots of trees in the woods near Stoken-church; in fagetis Sussexiæ, Mr. Manningham; prope Tring in Hertfordshire, Mr. Doody. *R. Syn.* In a wood near Maidstone in Kent, Mr. Jarvis. *Blackf. sp. bot.* 39. 24. VII.

P Y R O L A. 490.

Cal. quinquepartitus. *Petala quinque.* *Caps.* quinquelocularis, angulis dehiscens.

I. PYROLA staminibus adscendentibus, pistillis declinatis. *Fl. suec.* 360. *Sp. pl.* 396. *Mat. med.* 212. *lia.*

Pyrola foliis subrotundis, scapo racemoso. *Hort. cliff.*

162.

Pyrola.

DECANDRIA MONOGYNIA.

Pyrola. *Ger. Em.* 408. *Baub. hist.* III. 535. *R. Syn.* 363.

Pyrola nostras vulgaris. *Park.* 508.

Pyrola rotundifolia major. *Baub. pin.* 191.

Anglis, common Winter-green.

Habitat in sylvis et nemoribus. In Septentrionalibus Angliae locis reperitur; in Meridionalibus rarius occurrit; near Halifax plentifully, and in Stokenchurch woods, Oxfordshire. *R. Syn.* 24. VI. VII.

Pharmac. Pyrolæ Herba.

minor. 2. PYROLA floribus racemosis dispersis, staminibus pistillisque rectis. *It. gotl.* 4. *Fl. suec.* 361. *Sp. pl.* 369.

Pyrola tuba recta minor, folio frequentius serrato, spica breviore et densiore. *Hall. helv.* 7.

Pyrola minor. *Riv. pent.* 149. *R. Syn.* 363.

Pyrola folio minore et duriore. *Baub. pin.* 191.
Anglis, lesser Winter-green.

Habitat in sylvis. In sylvula inter Clapham et Ingleton, in comitatu Eboracensi. 24. VIII.

secunda. 3. PYROLA racemo unilaterali. *Fl. suec.* 362. *Sp. pl.* 396.

Pyrola floribus uno versu sparsis. *Fl. lapp.* 168.

Pyrola folio mucronato ferrato. *Baub. pin.* 181. *R. Syn.* 363.

Pyrola tenerior. *Park.* 509.

Pyrola secunda tenerior. *Clusii hist.* 117. *Ger. Em.* 408.

Anglis, dented-leaved Winter-green.

Habitat in sylvis et nemorosis. In Haslewood, near Sir Walter Vavasor's park in Yorkshire. *R. Syn.* 24. VI.

** Flores monopetalii æquales.

A N D R O M E D A. 485.

Cal. quinquepartitus. *Cor.* ovata; ore quinquefido.
Caps. quinquelocularis.

polifolia. 1. ANDROMEDA pedunculis aggregatis, corollis ovatis,

- tis, foliis alternis lanceolatis revolutis. *Fl. suec.*
 353. *Sp. pl.* 393.
Ledum palustre nostras, arbuti flore. *R. Syn.* 472.
Cistus Ledon palustris Rosmarinini folio, Arbuti flore.
R. Syn. Ed. I. 142. t. I.
Rosmarinum sylvestre minus nostras. *Park.* 76.
Erica humilis Rorismarini foliis, unedonis flore, capsula cistoide. *Pluk. ph. t. 175. f. 1.*
Anglis, marsh Cistus, or wild Rosemary.
Habitat in paludibus turfosis in comitatibus Eboracensi, Lancastriensi, Westmorlandico, Cumberlandico, frequens. 4. III. IV.

A R B U T U S. 488.

- Cal. quinquepartitus. Cor. ovata : ore basi pellucida.*
Bacca quinquelocularis.

1. ARBUTUS caule erecto, foliis glabris ferratis, bac- *Uredo.*
 cis polyspermis. *Sp. pl.* 395. *Roy. lugdb.* 440.
Sauv. monsp. 56.
Arbutus. Ger. Em. 1496. *Park.* 1489 *Cam. epit.*
 168. *R. Syn.* 464.
Arbutus folio ferrato. *Bauh. pin.* 460.
Anglis, common Strawberry-tree.
Habitat in occidentali Hiberniae parte. *R. Syn.* 5.
2. ARBUTUS caulis procumbentibus, foliis rugosis fer- *alpina.*
 ratis. *Fl. lapp.* 161. *suec.* 359. *Hort. cliff.* 163.
Roy. lugdb. 440. *Hall. helv.* 415. *Sp. pl.* 395.
Vaccinia rubra, foliis myrtinis crispis. *D. Merret.*
R. Syn. 457.
Vitis idaea foliis oblongis albentibus. *Bauh. pin.* 470.
Tourn. 608.
Vitis idaea repens, fructu racemoso magno nigerrimo.
Rudb. it. 9. lapp. 100.
Anglis, mountain Strawberry-tree.
Habitat in montibus siccis. Four miles from Hepten-
stal, near Widdop, on a great stone by the river Gorl
in Lancashire ; found also by Mr. Lhwyd plentifully
for some miles together, in that end of Mull next to
Eycolumb-Kill, Scotland. *R. Syn.* 5.

D I G Y N I A.

C H R Y S O S P L E N I U M. 493.

Cal. quadrifidus f. quinquefidus, coloratas. *Cor.* o.
Capf. birostris, unilocularis, polysperma.

oppositifo- 1. C H R Y S O S P L E N I U M foliis oppositis. *Sauv.* monsp.
lum. 128. *Sp. pl.* 398.

Chrysosplenium f. *saxifraga aurea*. *Faborn.* hist. 1224.
Chrysosplenium foliis amplioribus auriculatis. *Tourn.*
146.

Saxifraga aurea. *Ger. Em.* 841. *Park.* 425. *R. Syn.*
158.

Saxifraga rotundifolia aurea. *Baub. pin.* 309.
Anglis, common golden Saxifrage.

Habitat ad scaturigines in sylvis umbrosis. In Charlton
wood. *Blackf. spec. bot.* In ericeto Hampstediano
prope Londinum. 4. IV.

alternifo- 2. C H R Y S O S P L E N I U M foliis alternis. *Fl. suec.* 365.
lum. *Sp. pl.* 398.

Chrysosplenium foliis pediculis oblongis insidentibus.
Tourn. 146.

Saxifraga aurea foliis pediculis oblongis insidentibus.
R. Syn. 158.

Sedum palustre luteum majus, foliis pediculis longis
insidentibus. *Hist. Ox.* III. 477. f. 12. t. 8. f. 8.

Anglis, alternate-leaved golden Saxifrage.

Habitat cum priore sed rarius. Prope Bingley in co-
mitatu Eboracenfi copiose. 4. IV.

S A X I F R A G A. 494.

Cal. quinquepartitus. *Cor.* pentapetala. *Capf.* bi-
rostris unilocularis.

* *Foliis indivisis, caule subnudo.*

stellaris. 1. S A X I F R A G A foliis serratis, caule nudo ramoso, pe-
talis lanceolatis. *Fl. suec.* 367. *Sp. pl.* 400.

Saxifraga caule nudo simplici, foliis lanceolatis denta-
tis petalis acutis. *Fl. lapp.* 175.

Geum

Geum palustre minus, foliis oblongis crenatis. Tourn.

252. *R. Syn.* 354.

Cotyledon aquatica hirsuta. R. hist. 1046.

Sanicula myosotis alpina, floribus albicantibus fere umbellatis. Pluk. ph. t. 58. f. 2. et t. 222. f. 4.

Sedum montanum hirsutum, mucronato et dentato folio, flore albo guttato. Hist. Ox. III. 478. f. 12. t. 9. f. 13.

Anglis, hairy Kidney-wort.

Habitat in petris et rupibus aqua humentibus, et ad rivulos. On the mountains of Wales, as Snowdon, Carnedh-Llewellyn, Caderidis, &c. Also on Hard-knot and Wrenose, by Buckbarrow well in Long-sledale, Westmoreland. R. Syn. 4. VI. VII.

2. SAXIFRAGA foliis obovatis crenatis subsessilibus, *nivalis.*

caule nudo, floribus congestis. Fl. suec. 368. Sp. pl. 401.

Saxifraga caule nudo simplici, foliis elliptico-subrotundis crenatis, floribus capitatis. Fl. lapp. 176. t. 2. f. 5, 6.

Saxifraga foliis oblongo-rotundis dentatis, floribus compactis. R. Syn. 354. t. 16. f. 1.

Anglis, mountain Sengreen.

Habitat in summis alpibus arvoniae, e rupibus Clogwyn y Garnedh Crib y Distilh, Glogwyn du ymhen y Glyder, &c. juxta Lhan-berys. D. Lhwyd. R. Syn. 4. VI.

** *Foliis indivisis, Caule folioso.*

3. SAXIFRAGA foliis ovatis oppositis imbricatis : summis ciliatis. *Fl. suec. 369. Sp. pl. 402.*

Saxifraga foliis ovatis quadrangulo-imbricatis, ramis procumbentibus. Fl. lapp. 179.

Saxifraga alpina ericoides, flore cæruleo. Tourn. 253. R. Syn. 353.

Sedum alpinum ericoides cæruleum. Bauh. pin. 284. pr. 132. hist. III. 694. Hist. Ox. III. 480. f. 12. t. 10. f. 36.

Anglis, mountain heath-like Sengreen.

Habitat

DECANDRIA DIGYNIA.

Habitat *in rupibus et petris*. - *In rupibus montis Ingleborough non ad summitatum, sed ad latus occidentale*, D. Richardson. *On the high rocks of Snowdon, plentifully*, D. Lhwyd. *R. Syn. 4. III. IV.*

aizoides. 4. SAXIFRAGA foliis caulinis linearis-subulatis sparsis nudis inermibus, caulis decumbentibus. *Fl. suec.* 371. *Sp. pl. 403.*

Saxifraga alpina angusto folio, flore luteo guttato. *R. Syn. 353.*

Sedum minus alpinum luteum nostras. *R. Syn. ed. II. 212.*

Sedum alpinum flore pallido. *Baub. pin. 284. Hist. Ox. III. 477. f. 12. t. 6. f. 3.*

Sedum minus IV. seu alpinum I. *Clus. hist. III. 60.*
Anglis, yellow mountain Sengreen.

Habitat *in montibus*. *On the sides of Ingleborough hill plentifully, and in the like places in Westmoreland.* *R. Syn. 4. VIII.*

autumnalis. 5. SAXIFRAGA foliis caulinis linearibus alternis ciliatis: radicalibus aggregatis. *Sp. pl. 402.*

Saxifraga foliorum margine ciliari, floribus luteis masculofisis. *Hall. helv. 399.*

Saxifraga angustifolia autumnalis, flore luteo guttato, foliis florum magis acuminatis. *Breyn. cent. 106. t. 48.*

Geum angustifolium autumnale, flore luteo guttato. *Tourn. 252. R. Syn. 355.*

Anglis, autumnal Sengreen.

Habitat *in palustribus turfosis.* *Found by Dr. Kingstone on Knotsford-moor, Cheshire.* *R. Syn. 4. VII. VIII.*

*** *Foliis lobatis, caule erecto.*

cæspitosa. 6. SAXIFRAGA foliis radicatis aggregatis linearibus integris trifidisque, caule erecto subnudo subbifloro. *Sp. pl. 404.*

Saxifraga foliis simplicibus et trifidis, caule pæne aphylo paucifloro. *Hall. helv. 405.*

Saxifraga foliis partim integris partim trifidis. *Segu. ver. 451. t. 9. f. 4.*

Sedum

Sedum tridactylites alpinum minus. *Bauh. pin.* 284.

pr. 131.

Anglis, small mountain Sengreen.

Habitat in montibus supra Ambleside in comitatu Westmorlandico. 4. VIII.

7. SAXIFRAGA foliis cuneiformibus trifidis alternis, *trydactyli-* caule erecto ramoso. *Fl. suec.* 375. *Sp. pl.* 404. *tes.*

Saxifraga foliis trifidis basi angustis caule erecto. *Roy. lugdb.* 457. *Sauv. monsp.* 208.

Saxifraga verna annua humilior. *Tourn.* 252. *R. Syn.* 354.

Sedum tridactylites tectorum. *Bauh. pin.* 285.

Paronychia rutaceo folio. *Ger. Em.* 624.

Paronychia foliis incisis. *Park.* 556.

Anglis, Rue-leaved Sengreen, or Whitlow-grass.

Habitat in muris, *tectis, ruderatis* *passim.* 0. IV.

Pharmacop. *Paronychiæ Herba.*

8. SAXIFRAGA foliis reniformibus lobatis, caule *ra-* *granulata.* moso, radice granulosa. *Hort. cliff.* 167. *Mat.*

med. 215. *Fl. suec.* 372. *Sp. pl.* 403.

Saxifraga rotundifolia alba. *Bauh. pin.* 309. *R. Syn.* 354.

Saxifraga alba. *Ger. Em.* 841. *vulgaris.* *Park.* 424.

Saxifraga alba radice granulosa. *Bauh. hist.* III. 706.

Anglis, white Sengreen, or Saxifrage.

Habitat in pratis et pascuis siccioribus. Prope Wands-
worth copiose. 4. V.

Pharmac. *Saxifraga albæ Radix, Foliæ, Flores, Semina.*

**** *Foliis lobatis, caulis procumbentibus.*

9. SAXIFRAGA foliis caulinis linearibus iutegris tri- *hypnoides* fidive, stolonibus procumbentibus, caule erecto nudiusculo. *Sp. pl.* 405.

Saxifraga foliis omnibus angustis petiolatis apice tri- dentatis, caule folioso ramoso viscidio. *Hall. helv:* 404.

Saxifraga muscosa trifido folio. *Tourn.* 252. *R. Syn.* 354.

Sedum alpinum trifido folio. *Bauh. pin.* 284.

Sedum

DECANDRIA DIGYNIA.

Sedum alpinum laciniatis Ajugæ foliis. Park. 739.
Anglis, trifid Sengreen.
Habitat in montibus Westmorlandicis, Eboracensibus,
Derbiensisibus, Cambrobritannicis. passim. 4. IV. V.

S C L E R A N T H U S. 497.

Cal. monophyllus. Cor. o. Sem. duo calyce inclusa.

- annuus.* 1. *SCLERANTHUS calycibus fructus patulis.* Fl. suec. 377. Sp. pl. 406.
Knawel. Trag. 393. R. Syn. 159.
Polygonum germanicum vel Knawel Germanorum. Park. 747.
Polygonum felinoides sive Knawel. Ger. 453.
Polygonum gramineo folio majus erectum. Bauh. pin. 281.
Anglis, German Knot-grass, or annual Knawel.
Habitat in arvis et locis arenosis passim. O. VIII.
- perennis.* 2. *SCLERANTHUS calycibus fructus clausis.* Fl. suec. 378. Sp. pl. 406.
Knawel incanum flore majore perenne. R. hist. 213.
Syn. 160. t. 5. f. 1.
Alchimilla gramineo folio majori flore. Tourn. 509.
Vaill. paris. 4. t. 1. f. 5.
Anglis, perennial Knawel.
Habitat in arvis glareosis. In the sandy grounds and
 balks of corn fields about Elden in Suffolk, plentifully.
R. Syn. 4. VIII.

S A P O N A R I A. 499.

Cal. monophyllus nudus. Petala quinque unguiculata. Caps. oblonga unilocularis.

- officinalis.* 1. *SAPONARIA calycibus cylindricis, foliis ovato-lanceolatis.* Hort. cliff. 165. upf. 106. Mat. med. 214. Roy. lugdb. 444. Gron. virg. 106. Gort. gehr. 245. Sp. pl. 408.
Saponaria. Ger. Em. 444. vulgaris. Park. 641.
Bauh. hist. III. 346.
Saponaria major lœvis. Bauh. pin. 206.
Lychnis Saponaria dicta. R. Syn. 339.

β Lychnis

DECANDRIA DIGYNIA.

161

β *Lychnis Saponaria dicta folio convoluto. R. Syn. 339.*
Saponaria concava Anglica. Baub. pin. 206.
Anglis, Sopewort.

Habitat ad sepes, in Ericeto nigro prope Morden Col-
ledge in Cantio. 4. VII. VIII.
Pharmac. Saponaria. Folia Radix.

D I A N T H U S. 500.

Cal. cylindricus monophyllus: basi squamis quatuor.
Petala quinque unguiculata. Caps. cylindrica uni-
locularis.

* *Flores aggregati.*

1. DIANTHUS floribus aggregatis fasciculatis, squa- *Armeria,*
 mis calycinis lanceolatis villosis tubum æquantibus.
Syst. Nat. 1029. Sp. pl. 410.
Caryophyllus latifolius barbatus minor annuus, flore
minore. R. Syn. 337.
Caryophyllus pratensis. Ger. Em. 594. noster ma-
jor et minor. Park. 1338.
Caryophyllus barbatus sylvestris. Baub. pin. 209.
Armeria sylvestris altera. Lob. ic. 448.
Anglis, Deptford Pink.
Habitat in pratis et pascuis glareofisis in Sylva Charleton
Wood dicta, in Cantio; prope Croydon copiose.
○. VII.

2. DIANTHUS floribus aggregatis capitatis squamis prolifer.
 calycinis ovatis obtusis muticis tubum æquantibus.
Sp. pl. 410.
Caryophyllus sylvestris prolifer. Baub. pin. 209. Park.
1338. R. Syn. 337.
Viscaria. Ger. Em. 601.
Anglis, Limewort.
Habitat in glareofisis sed rarius. Found by the Rev. Mr.
Manningham, in Selsey Island, Sussex. R. Syn.
○. VIII.

** *Flores solitarii, plures in eodem caule.*

3. DIANTHUS floribus solitariis squamis calycinis, lan- *deltoides,*
 ceolatis binis, corollis crenatis. *Fl. suec. 382. Sp.*
pl. 411.

M

Caryo-

DECANDRIA DIGYNIA.

- Caryophyllum minor repens nostras.* R. Syn. 335. Dill.
elth. 402.
Caryophyllum sylvestris vulgaris latifolius. Baub.
pin. 209.
Anglis, Maiden Pinks.
Habitat in ericetis pratis et pascuis frequens in ericeto
Hamstediano prope Londinum. 4. VI. VII.

- glaucus.* 4 *DIANTHUS floribus solitariis, squamis calycinis lanceolatis brevibus corollis crenatis.* Sp. pl. 411.
Hort. upf. 104.
Tunica ramosior, flore candido cum corolla purpurea.
Dill. elth. 400. t. 298. f. 348.
Anglis, Mountain Pink.
Habitat in montosis. On Chedder-rocks, in Somerset-
shire. Mr. Brewer. 4. VII.

*** *Caule uniflora herbaceo.*

- arenari-*
us. 5 *DIANTHUS caulis subunifloris, squamis calyci-
nis ovatis, obtusis, petalis multifidis, foliis linear-
ibus.* Sp. pl. 412. Fl. suec. 384.
*Dianthus foliis brevibus, squamis muticis caule uni-
floro.* Sauv. meth. 143.
Armeriae species flore in summo caule singulari. R.
Syn. 336.
Armeria sylvestris humilis flore unico. Baub. pin.
209. rubello. Merr. pin.
*Caryophyllum sylvestris, Alsinæ holosteæ arvensis gla-
bræ foliis flore unico, calyce barbato.* Pluk. ph.
t. 8 f. 3.
Anglis, Stone Pink.
Habitat in pratis siccissimis et muris sed rarius. On Ched-
der-rocks. Mr. Brewer. In the North of England.
Mr. Doody. R. Syn. 4. VII.

T R I G Y N I A.

C U C U B A L U S. 502.

- Calyx.* inflatus. *Petala quinque unguiculata absque
corona ad faucem.* Caps. trilocularis.
I. CU-

1. CUCUBALUS calycibus campanulatis, petalis di- *bacciferus*.
stantibus, pericarpiis coloratis, ramis divaricatis.
Sp. pl. 414.
Cucubalus Plinii. *Lugd.* 1429. *Tourn.* 339. *R. Syn.*
267.
Al sine scandens baccifera. *Bauh. pin.* 250.
Anglis, berry-bearing Chickweed.
Habitat in *sepibus* in *Insula Mona*. D. Richardson.
R. Syn. 4. VII.
2. CUCUBALUS calycibus subglobosis glabris reticu- *Behen*.
lato-venosis capsulis trilocularibus, corollis subnig-
dis. *Fl. suec.* 385. *Sp. pl. 414.*
Lychnis sylvestris quæ Benalbūm vulgo. *Bauh. pin.*
205. *R. Syn.* 337.
Behen album officinarum. *Ger. Em.* 678.
Papaver spumeum fine Benalbūm vulgo. *Park.* 263.
Anglis, bladder Campion, or white corn Campion.
Habitat in *arvis pratis et pascuis* siccoribus frequens.
4. VII.
3. CUCUBALUS floribus lateralibus undique decum- *viscosus*.
bentibus, caule indiviso, foliis basi reflexis. *Sp. pl.*
414. *Fl. suec.* 386.
Lychnis major noctiflora Dubrensis perennis. *R. hist.*
995. *Syn.* 340.
Lychnis montana noctiflora hirsuta latifolia alba, flori-
bus absque appendicibus. *Till. pis.* 105.
Anglis, Dover Campion.
Habitat in *montosis*. Found on Dover Cliffs, by Mr.
Newton. *R. Syn.* 4. VII.
4. CUCUBALUS floribus dioicis, petalis setaceis in- *Otites*.
divisis. *Hort. cliff.* 272. *Roy. lugdb.* 445. *Sp.*
pl. 415.
Lychnis viscosa flore musco. *Bauh. pin.* 266.
Sesamoides Salamanticum magnum. *Ger. Em.* 493.
Muscipula Salamantica major. *Park.* 636.
Anglis, Spanish Campion, or Catchfly.
Habitat in *pascuis glareos*. In and about the gravel-
pits on the north side of Newmarket town: also by
the way-sides all along from Barton Mills to Thet-
ford in Norfolk. *R. Syn.* 4. VII. VIII.

DECANDRIA TRIGYNIA.

- acaulis.* 5. **CUCUBALUS acaulis.** *Fl. lapp.* 104. *suec.* 337.
Sp. pl. 415.
Lychnis alpina minima. *R. hist.* 1004. *Syn.* 341.
Caryophylleus IX Clusii caryophyllus pumilio alpi-
nus. *Ger. Em.* 593.
Lychnis alpina pumila folio gramineo s. muscus alpi-
nus Lychnidis flore. *Bauh. pin.* 206.
Anglis, moss Campion.
Habitat in montibus Arvoniæ, Devonie, frequens. 4.
 VII.

S I L E N E. 503.

- Cal. ventricosus.* *Petala quinque unguiculata: coro-*
nata ad faucem. *Cap. trilocularis.*
 * *Floribus solitariis lateralibus.*
- anglica.* 1. **SILENE hirsuta petalis emarginatis, floribus erec-**
tis, fructibus reflexis pedunculatis alternis. *Syst.*
Nat. 1031. *Sp. pl.* 416.
Viscago cerastrii foliis, vasculis pendulis anglica. *Dill.*
elth. 417. *t.* 309. *f.* 398.
Lychnis sylvestris flore albo minimo. *R. hist.* 996.
Syn. 339.
Anglis, small corn Catchfly or Campion.
Habitat in arvis. *In the corn fields near Colchester,*
Essex. Mr. Newton. *Blackf. Sp. Bot.* among the
corn near the Devil's-ditch in Cambridgeshire. Mr.
 Dent. *R. Syn. C.* VI. VII.
- amoena.* 2. **SILENE petalis bifidis: coronula sub-coadunata,**
floribus secundis, pedunculis oppositis trifloris, ra-
mis alternis. *Syst. Nat.* 1031. *Sp. pl.* 417.
Lychnis marina anglica. *Ger. Em.* 470. *R. Syn.* 337.
Lychnis marina repens alba. *Park.* 638.
 β *Lychnis maritima anglica amplioribus foliis.* *D.*
 Brewer. *Rand. hort. chel.*
Anglis, Sea Campion.
Habitat in littoribus maritimis frequens. 4. VIII.
3. **SILENE**

** *Floribus lateralibus confertis.*

3. SILENE petalis bifidis, floribus lateralibus secundis *nutans*.
cernuis caule incurvato. *Fl. suec.* 388. *Sp. pl.* 417.

Silene foliis lanceolatis, caule paniculato, floribus nu-
tantibus calyce striato corolla involuta. *Hort. cliff.*

171.

Lychnis sylvestris alba IX. *clusii.* *Ger. Em.* 470. *R.*
Syn. 340.

Lychnis montana viscosa alba latifolia. *Baub. pin.*
205.

Lychnis sylvestris alba f. *ocymoides* minus album.
Park. 631.

Polæmonium petræum *Gesneri.* *Baub. hist.* III. 351.
Anglis, Nottingham Catchfly.

Habitat in pratis montosis. On the walls of Notting-
ham-castle, and thereabout. *R. Syn.* 4. VI. VII.

*** *Floribus ex dichotomia caulis.*

4. SILENE calycibus fructus conicis, striis triginta, fo- *conoidea*.
liis mollibus. *Hort. upf.* 110. *Sp. pl.* 418.

Lychnis sylvestris angustifolia caliculis turgidis striatis.
Baub. pin. 205. *R. Syn.* 341.

Lychnis sylvestris altera incana caliculis striatis. *Lob.*
^ *ic.* 338.

Anglis, greater corn Catchfly, or Campion.

Habitat in arvis glareosis. A little to the north of
Sandown-castle, plentifully. *R. Syn.*

5. SILENE calycibus decemangularibus: dentibus tu- *noctiflora*.
bum æquantibus, caule dichotomo. *Sp. pl.* 419.
Fl. suec. 389.

Lychnis noctiflora. *Baub. pin.* 205. *Park.* 632. *R.*
Syn. 340.

Anglis, night-flowering Catchfly.

Habitat in arvis. Found by Mr. Dent among corn, on
the left hand of the road leading from Newmarket
to Canvass-hall, in Wood-ditton. *R. Syn.* 4. VII.

6. SILENE floribus fasciculatis fastigiatis, foliis superi- *Armeria*.
oribus cordatis glabris. *Hort. upf.* 110. *Sp. pl.* 420.

M 3

Lychnis

DECANDRIA TRIGYNIA.

Lychnis viscosa purpurea latifolia lœvis. *Baub. pin.*
205 R. Syn. 341.

Lychnis sylvestris. *I. Clus. hist. 288.*

Armerius flos quartus. *Dod pempt. 176.*

Anglis, broad-leaved Catchfly.

Habitat on the banks of the river half a mile below
Chester, Dr. Richardson. *R. Syn. O. VIII.*

STELLARIA. 504.

Cal. pentaphyllus, patens. *Petala quinque bipartita.*
Cap. unilocularis, polysperma.

Holosteum. 1. *STELLARIA* foliis lanceolatis ferrulatis, petalis bi-
fidis. *Fl. suec.* 392. *Sp. pl.* 422.

Caryophyllus holosteus arvensis glaber flore majore.
Baub. pin. 210. *R. Syn. 346.*

Gramen leucanthemum. *Ger. Em.* 47. *Park.* 1325.

Anglis, greater Stichwort.

Habitat in sylvis et sepibus passim. 4. IV. V.

graminea. 2. *STELLARIA* foliis linearibus integerrimis, floribus
paniculatis. *Fl. suec.* 393. *Sp. pl.* 422.

Caryophyllus holosteus arvensis glaber, flore minore.
Baub. pin. 210. *R. Syn. 346.*

Gramen leucanthemum alterum. *Ger. Em.* 47.

Gramen leucanthemum minus. *Park.* 1325.

β *Caryophyllus holosteus arvensis medius.* *R. Syn.* 347.
 γ *Alpine longifolia uliginosus proveniens locis.* *Baub. hist.*

III. 365. *R. Syn. 347.*

Alpine aquatica media. *Baub. pin.* 251.

Alpine fontana, *Tab. ic.* 712. *Ger. Em.* 613.

Anglis, lesser Stichwort.

Habitat in pratis pascauis, sepibus frequens. $\gamma.$ in palu-
dosis et pratis humidioribus passim. 4. VII.

nemorum. 3. *STELLARIA* foliis cordatis petiolatis, paniculæ pe-
dunculis ramosis. *Sp. pl.* 421. *Fl. suec.* 291.

Alpine montana folio Smilacis instar, flore laciniato.

Hist. Ox. II. 550. *f. 5. t. 23. f. 2.* *R. Syn. 347.*

Alpine montana latifolia, flore laciniato. *Baub. pin.*

251.

Alpine

*Alpine hederacea montana maxima. Col. Ecphr. I.
290. t. 290. Park 761.*

Anglis, broad-leaved Stichwort.

Habitat in sylvis et sepibus, et ad ripas fluviorum in comitatibus Eboracensi, Lancastriensi, Westmorlandico, Cumberlandico, *paffim.* 2. VII. VIII.

A R E N A R I A. 505.

Cal. pentaphyllus, patens. Petala quinque integra.

Caps. unilocularis polyspermæ.

1. ARENARIA foliis ovatis acutis carnosis. *Fl. lapp. peploides.*

Fl. suec. 396. Sp. pl. 423.

Alpine marina foliis portulacæ. Fl. pruss. 12. t. 2. R.

Syn. 351.

Alpine littoralis foliis portulacæ. Bauh. pin. 251.

*Anthyllis maritima lentifolia. Bauh. pin. 282. Park.
282.*

*Anthyllis lentifolia seu alpine cruciata marina. Ger.
Em. 622.*

Anglis, Sea Chickweed.

Habitat in littoribus maritimis frequens. 2. VI. VII.

2. ARENARIA foliis ovatis acutis petiolatis nervosis. *trinervia.*

Fl. suec. 397. Sp. pl. 423.

Alpine plantaginis folio. Bauh. hist. III. 364. R. Syn.

349.

Anglis, Plantain-leaved Chickweed.

Habitat in sylvis et sepibus humidis frequens. ①. V.
VI.

3. ARENARIA foliis subovatis acutis sessilibus, corollis *serpyllifo-*
calyce brevioribus. Fl. suec. 398. Sp. pl. 423. *lia.*

Alpine minor multicaulis. Bauh. pin. 250. R. Syn.

349.

Alpine minima. Ger. Em. 488. Bauh. hist. III. 364.

Alpine aquatica minima. Park. 1259.

Anglis, the least Chickweed.

Habitat in tellis, muris, arenosis, aridis *paffim.* ①. V.
VI.

- saxatilis.* 4. ARENARIA foliis subulatis, caule paniculatis, calycem foliolis ovatis. *Sp. pl.* 424.
Spergula foliis aciformibus densis, ramis ramosis subnudis. *Sauv. monsp.* 45.
Al sine pusilla pulchro flore folio tenuissimo nostras s. *saxifraga* pusilla caryophylloides, flore albo pulchello. *R. Syn.* 351.
Al sine alpina glabra tenuissimis foliis, floribus albis. *Herm. par.* 12. *t.* 12
Al sine caryophylloides tenuifolia, flore albo punctato. *Pluk. ph.* *t.* 7. *f.* 3.
Al sine saxatilis loricis folio minor et minori flore. *Tourn. magn. mosp.* 11. *t.* 11.
Angli, mountain Chickweed.
Habitat in montosis Eboracensisibus circa Settle, ut et Derbiensisibus copiose. On the side of a watery bank, at about three miles from the Land's end. *R. Syn. in montosis Westmorlandicis*, circa Kendal copiose. 4. VIII.
- loricifolia.* 5. ARENARIA foliis setaceis, caule superne nudiusculo, calycibus subhirsutis. *Sp. pl.* 424.
Al sine foliis fasciculatis, petiolis simplicibus, calyce hirsuto. *Hall helv.* 388.
Al sine alpina junceo folio. *Bauh. pin.* 251. *pr.* 118. *R. Syll. 60. hist.* 1031.
Al sine caryophylloides tenuifolia montana lini flore. *R. hist.* 1027.
Auricula muris pulchro flore, folio tenuissimo. *Bauh hist.* III. 360.
Anglis, Larch-leaved Chickweed.
Habitat in montibus Westmorlandicis *paffim.* 4. VIII.
- tenuifolia.* 6. ARENARIA foliis subulatis caule paniculato, pendunculis simplicibus, capsulis erectis petalis calyce brevioribus. *Sp. pl.* 424.
Al sine tenuifolia. *Bauh. hist.* III. 364. *R. Syn.* 350.
Vail. paris. 7. *t.* 3. *f.* 1. *sequ. ver.* 418. *t.* 6. *f.* 2.
Anglis, fine-leaved Chickweed.
Habitat in pratis succis glareosis, sed rarius. In the corn-fields on the borders of Friplow-heath, Gogmagog

gog hills, and other places in Cambridgeshire. R. Syn. 350. In Cornbury quarry near Charlbury, Oxfordshire; Blacks. spec. bot. supra mure in oppido Battersea prope Londinum 24. VI. VII.

7. ARENARIA foliis linearibus stipulis membranaceis *rubra*.
vaginantibus. Sp. pl. 423. Fl. suec. 399.

Spergula purpurea. Bauh. hist. III. 722. R. Syn. 351.

Saginæ Spergula minima. Park. 561.

Alpine, Spergulae facie minor f. Spergula minor sub-cæruleo flore. Bauh. pin. 251. pr. 119.

β Arenaria foliis linearibus longitudine internodiorum. marina.
Hort. cliff. 173. Gron. virg. 161. Sp. pl. 423.

Alpine Spergulae facie media. Bauh. pin. 251. R. Syn. 351.

Spergula marina nostras. Bauh. hist. III. 778.

γ Spergula maritima flore parvo cæruleo, semine vario.
C. giff. 30.

Anglis, purple-flowered Chickweed, or Spurrey. β Sea Spurrey.

Habitat in pratis et arvis glareosis, γ in littoribus mari-
nis frequens. ⊙. VI. VII.

P E N T A G Y N I A.

C O T Y L E D O N. 512.

Cal. quinquefidus. *Cor.* monopetala, *Squamæ* necta-
riferæ quinque ad basin germinis *Caps.* quinque.

1. COTYLEDON foliis cuculatis ferrato-dentatis al- *umbilicus*.
ternis, caule ramoso floribus erectis. Sp. pl. 429. ♀.

Cotyledon foliis peltatis. Vir. cliff. 39. Roy. lugdb.
454.

Cotyledon vera radice tuberosa. Bauh. hist. III. 683.
R. Syn. 271.

Cotyledon major. Bauh. pin. 289.

Umbilicus veneris. Ger. Em. 529. vulgaris. Park.
740.

Anglis, Navel-wort, Kidney-wort, or Wall Penny-
wort.

Habitat

DECANDRIA PENTAGYNYIA.

Habitat in saxis et muris antiquis sed rarius; prope Bristolium copiose; circa Troutbeck in comitatu Westmorlandico. 4. V.—VII.

S E D U M. 513.

Cal. quinquefidus. *Cor.* pentapetala. *Squamæ* nec tariferæ quinque ad basin germanis. *Caps.* quinque.

* *Planifolia.*

Telephi- 1. *SEDUM* foliis planiusculis serratis, corymbo folioso, *um.* caule erecto. *Sp. pl.* 430.

Sedum foliis planiusculis patentibus serratis, corymbo-terminali. *Hort. cliff.* 176. *Roy. lugdb.* 456.

Telephium vulgare. *Baub. pin.* 287.

Telephium f. *Crassula major vulgaris.* *Park.* 726.

Crassula f. *faba inversa.* *Ger. Em.* 519.

Anacampseros, vulgo *Faba crassa.* *Baub. hist.* III. 681. *R. Syn.* 269.

β *Telephium purpureum majus.* *Baub. pin.* 287.

γ *Telephium album.* *Fuchs. hist.* 800.

Anglis, Orpine, or Live-long.

Habitat in tectis, muris, pascuis, et ad sepes. 4. VIII.

Pharmac. *Telephii Herba.*

** *Teretifolia.*

reflexum. 2. *SEDUM* foliis subulatis sparsis, basi membranacea soluta: inferioribus recurvatis, floribus cymosis. *Fl. suec.* 1296.

Sedum minus luteum ramulis reflexis. *Baub. pin.* 283. *R. Syn.* 270.

Aizoon scorpioides. *Ger. Em.* 513.

Vermicularis scorpioides. *Park.* 733.

β *Sedum minus hæmatoides.* *Ger. Em.* 512. *R. Syn.* 269.

Sedum minus luteum folio acuto. *Baub. pin.* 283.

Anglis, yellow Stonecrop, or Prick-madam.

Habitat in muris, tectis, pascuis.

rupestre. 3. *SEDUM* foliis subulatis quinquefariam confertis basi membranacea soluta, floribus cymosis. *Sp. pl.* 431. *Fl. suec.* 401.

Sedum

Sedum rupestre repens foliis compressis. *Dill. elth.*

343. t. 256. f. 333.

Sedum minus e rupe S. Vincentii. R. Syn. 271.

Sedum minus Vincentii. Pet. b. br. t 41. f. 8.

Anglis, St. Vincent's Rock Stonecrop.

Habitat *in rupibus* St. Vincentii *prope Bristolium* : *in rupibus Hisvæ valleculæ Nantphraucon imminentibus.*
R. Syn. 24. VIII.

4. *SEDUM* foliis oblongis obtusis teretiusculis sessilibus *album*,
patentibus, cyma ramosa. *Fl. suec. 402. Sp. pl.*
432.

Sedum minus teretifolium album. Bauh. pin. 283.
R. Syn. 271.

Sedum minus officinarum. Ger. Em. 512.

Vermicularis flore albo. Park. 733.

Vermicularis f. Crassula minor vulgaris. Park. 734.

Anglis, white flowered Stonecrop.

Habitat *in muris, tectis, paßim*. *On a wall just beyond the chapel at Kentish-town. Blacks. Spec. bot. 24.*
VI. VII.

Pharmac. *Vermicularis Herba.*

5. *SEDUM* foliis subovatis adnato-sessilibus gibbis erec-
tiusculis alternis, cyma trifida. *Fl. suec. 403. Sp.*
pl. 432. Mat. med. 218.

Sedum parvum acre flore luteo. Bauh. hist. III. 694.
R. Syn. 270.

Sempervivum minus vermiculatum acre. Bauh. pin.
283.

Vermicularis seu Illecebra minor acris. Ger. Em. 517.

Illecebra minor f. Sedum tertium Dioscoridis. Park.

735.

Anglis, Wall Stonecrop, or Pepper.

Habitat *in muris, tectis, montibus, rupibus, frequens.*
4. VI.

Pharmac. *Sedi minoris Herba.*

6. *SEDUM* foliis subovatis adnato-sessilibus gibbis erec-
tiusculis sexfariam imbricatis, *Fl. suec. 405. Sp. pl.* *sexangu-*
lare.
432.

Semper-

DECANDRIA PENTAGYNIA:

Sempervivum minus vermiculatum insipidum. *Baub.*
pin. 284.

Sempervivum minimum. *Cam. epit.* 856.

Anglis, insipid Stonecrop.

Habitat in pratis siccis. *Prope Sheerness in insula*
Shepey copiose. ♂. VII.

annuum. 7. *SEDUM* caule erecto solitario annuo, foliis ovatis sessilibus gibbis alternis, cyma recurva. *Fl. suec.* 405. *Sp. pl.* 432.

Sedum minimum non acre flore albo. *R. Syn.* 270.

Sedum minimum, flore mixto ex albo et rubro, *Merr.*
pin.

Anglis, Mountain Stonecrop.

*Habitat in sterilioribus Suffolciæ, itinere a Yarmouth ad Donewich plurimum observavimus: item in ru-
pibus Lancastriensibus et Westmorlandicis ad Wi-
nandermere: in teclis et muris Cambriæ præcipue
montosis abunde;* D. Richardson. *In littore marino*
prope Brakelsham copiose. D. Dillenius. *R. Syn.*
circa Rydall in Westmorlandia. ♀. VIII.

*dasyphyll-
lum.* 8. *SEDUM* foliis oppositis ovatis obtusis carnosis, caule infirmo, floribus sparsis. *Sp. pl.* 431.

*Sedum foliis cordato-ovatis compressis sæpius oppositis,
floribus sparsis.* *Sauv. monsp.* 8.

*Sedum foliis semiglobosis subovatis sessilibus quadrifa-
riam imbricatis.* *Wackend. ultr.* 391.

Sedum minus, circinato folio. *Baub. pin.* 283. *Hift.*
Ox. III. 473. *f.* 12. *t.* 7. *f.* 35. *R. Syn.* 271.

Sedum parvum, folio circinato, flore albo. *Baub. hift.*
III. 961.

Aizoon dasyphyllon. *Lugd.* 1133.

Anglis, round-leaved Stonecrop.

Habitat in muris et teclis. *Grows plentifully upon the
house and all the walls at Market-eit, near Market-
street.* Mr. Th. Knowlton. *R. Syn.* ♂. VII.

villosum. 9. *SEDUM* caule erecto, foliis planiusculis, peduncu-
lisque subpilosis. *Sp. pl.* 432.

Sedum purpureum pratense. *Baub. hift.* III. 692.
R. Syn. 270.

Sedum

Sedum palustre subhirsutum purpureum. *Bauh. pin.*
285.

Sedum minus palustre. *Ger. Em.* 515.

Sedum arvense s. palustre flore rubente. *Park.* 734.

Anglis, Marsh Stonecrop.

Habitat in pratis montosis humidis. On the moist rocks
about Ingleborough-hill; on Hartside-hill, near
Gambleby, in the way to Osten in Cumberland.
In et juxta montem Hincklehawk prope Settle. Dr.
Richardson. *R. Syn.* ⊖. VI.

O X A L I S. 515.

Cal. pentaphyllus. *Petala unguibus connexa.* *Caps.*
angulis dehiscens pentagona.

1. *OXALIS* scapo unifloro, foliis ternatis, radice squa- *Acetosella.*
moso-articulata. *Hort. cliff.* 175. *Fl. suec.* 406.
Mat. med. 216. *Sp. pl.* 233.

Oxys alba. *Ger. Em.* 1201. *R. Syn.* 281.

Trifolium acetosum vulgare. *Bauh. pin.* 330. *Park.*
746.

2. *Trifolium acetosum vulgare*, flore purpureo. *Merr.*
pin.

Anglis, Wood Sorrel.

Habitat in sylvis, ericetis, umbrosis. 24. IV.

Pharmac. Lujulæ Folia.

A G R O S T E M M A. 516.

Cal. monophyllus coriaceus. *Petala quinque ungu-
culata;* Limbo obtuso, indiviso. *Caps.* unilocu-
laris.

1. *AGROSTEMMA* hirsuta, calycibus corollam æ- *Githaco.*
quantibus, petalis integris nudis. *Fl. suec.* 407. *Sp.*
pl. 435.

Lychnis segetum major. *Bauh. pin.* 204. *R. Syn.* 338.

Lychnoides segetum five *Nigellastrum.* *Park.* 632.

Pseudo-melanthium. *Dalech. hist.* 438. *Bauh. hist.*
III. 341.

Anglis, Cockle.

Habitat in arvis passim. ⊖. VI.

L Y C H-

LYCHNIS. 517.

Cal. monophyllus, oblongus, lævis. Petala quinque unguiculata. Limbo bifido. Caps. trilocularis.

Flos cucu- 1. LYCHNIS petalis quadrifidis, fructu subrotundo. Sp. li. pl. 436.

Caryophyllus pratensis laciniato flore simplici, five Flos cuculi. Bauh. pin. 210.

Lychnis plumaria sylvestris simplex. Park. par. 253. R. Syn. 338.

Armerius pratensis mas et foemina. Ger. Em. 600.

Anglis, Meadow Pinks, Wild Williams, Cuckow Flower.

Habitat in pratis et pascuis humidioribus. 4. VI.

Viscaria. 2. LYCHNIS petalis integris. Sp. pl. 436. Fl. suec. 409.

Silene floribus pentagynis, capsulis quinquelocularibus. Hort. cliff. 172.

Lychnis sylvestris viscosa rubra angustifolia. Bauh. pin. 205. Park. 636. R. Syn. 340.

Muscipula angustifolia. Ger. Em. 601.

Anglis, red German Catchfly.

Habitat in pratis montosis. Found by Mr. Lhwyd on the sides of Craig Wreidhin-hill, in Montgomeryshire. R. Syn. V. VI.

dioica. 3. LYCHNIS floribus dioicis. Sp. pl. 437. Fl. suec. 411.

foemina. Cucubalus caule composito, calycibus oblongo-ovatis. Fl. lapp. 182.

Lychnis sylvestris albo flore. Ger. Em. 468. Park. 630. R. Syn. 339.

Lychnis sylvestris alba simplex. Bauh. pin. 204.

mas. β *Lychnis sylvestris rubello flore. Ger. Em. 469. R. Syn. 339.*

Lychnis sylvestris flore rubro. Park. 631.

Lychnis sylvestris f. aquatica purpurea simplex. Bauh. pin. 204.

Anglis, α white Campion : β red Campion.

Habitat in sylvis et sepibus ubique. 4. V.—VII.

C E.

CERASTIUM. 518.

*Cal. pentaphyllus. Petala bifida. Caps. unilocularis,
apice dehiscens.*

* *Capsulis oblongis.*

1. CERASTIUM foliis ovatis, petalis calyci æqualibus, *vulgatum*.
caulibus diffusis. *Fl. suec.* 415. *Loefl. bisp.* 143.
Myosotis foliis ex ovatis acuminatis, flore calyci æ-
quali. *Hall. helv.* 384.
Myosotis arvensis hirsuta, parvo flore albo. *Vaill. pa-
ris.* 142. *t.* 30. *f.* 1.
Auricula muris quorundam flore parvo, vasculo tenui
longo. *Baub. bift.* III. 359.
Alfinea hirsuta magno (parvo potius) flore. *Baub. pin.*
251.
Alfinea hirsuta myosotis. *Adv.* 193. *R. Syn.* 349.
Anglis, narrow-leaved Mouse-ear Chickweed.
Habitat in pratis et pascuis passim. ☽. VI.
2. CERASTIUM erectum villoso-viscosum. *Hort. cliff. viscosum.*
173. *ups.* 115. *Roy. lugdb.* 450. *Fl. suec.* 414. *Sp.
pl.* 437.
Alfinea hirsuta myosotis latifolia precocior. *Cat. angl.*
R. Syn. 348.
Alfinea viscosa. *Park.* 768.
Alfinea hirsuta altera viscosa. *Baub. pin.* 251.
Myosotis hirsuta altera viscosa. *Vaill. paris.* 142. *t.*
30. *f.* 1.
Anglis, broad-leaved Mouse-ear Chickweed.
Habitat in pratis et pascuis siccioribus. ☽. IV. V.
3. CERASTIUM floribus pentandris, petalis emarginato-
natis. *Hort. cliff.* 173. *Fl. suec.* 416. *Sp. pl.* 438. *candrum.*
Cerastrum hirsutum minus, parvo flore. *Cat. giff.* 80.
R. Syn. 348. *t.* 15. *f.* 1.
Myosotis arvensis hirsuta minor. *Vaill. paris.* 142.
t. 30. *f.* 1.
Alfinea hirsuta minor. *Baub. pin.* 251.

Anglis,

DECANDRIA PENTAGYNYIA.

Anglis, the least Mouse-ear Chickweed.

Habitat in pratis et pascuis circa Londinum frequens.
○. IV.

- arvense.* 4. CERASTIUM foliis linear-lanceolatis obtusis glabris, corollis calyce majoribus. Sp. pl. 438. Fl. suec. 417.

Myosotis arvensis hirsuta, flore majore. *Vaill. paris.* 141. t. 30. f. 4.

Caryophyllus arvensis hirsutus flore majore. *Baub. pin.* 210. R. Syn. 348.

Caryophyllus holosteus. *Ger. Em.* 477. *arvensis hirsutus*. *Park.* 1339.

Holosteum caryophylleum. *Tabern. ic.* 233.

Anglis, Corn Mouse-ear Chickweed.

Habitat in ericetis, pratis, pascuis, arvis, solo gloeo-so passim, supra Dupper's-hill prope Croydon copiose. 24. V.

- alpinum.* 5. CERASTIUM foliis ovato-lanceolatis, caule diviso, capsulis oblongis. Sp. pl. 438. Fl. suec. 418.

Cerastium foliis ovato lanceolatis, corollis calyce majoribus. Fl. suec. 1. 380.

Alpine myosotis facie, *Lychnis alpina*, flore ample niveo repens. R. Syn. 349. t. 15. f. 2.

Caryophylleus holosteus alpinus latifolius. *Baub. pin.* 210. pr. 104.

Anglis, Mountain Mouse-ear Chickweed.

Habitat in montibus Arvoniæ. Nullibi frequentius quam juxta scaturagines aquarum montis excelsi Widnah boream versus, Dr. Richardson. R. Syn. 24. VI.

** *Capulis subrotundis.*

- tomentosum.* 6. CERASTIUM foliis oblongis tomentosis, pedunculis ramosis, capsulis globosis. Sp. pl. 440.

Cerastium foliis lanceolato-linearibus subhirsutis, colla calycem superante. *Sauv. monsp.* 142.

Caryophyllus holosteus tomentosus latifolius. *Baub. pin.* 210. pr. 104.

Alpine

*Alpine myosotis lanuginosa alpina grandiflora, seu Al-
ricula muris villosa flore ampio membranaceo.* R.

Syn. 349.

Anglis, Wooly Mouse-ear Chickweed.

*Habitat in rupe prope Clogwyn y Garnedh totius Cam-
briæ altissima juxta Llanberrys in Arvonia copiose.*

R. Syn. 4. V.

7. CERASTIUM foliis cordatis sessilibus, floribus soli-
tariis fructibus pendulis. *Sp. pl.* 438. *aquati-
cum.*

Alpine aquatica major. Baub. *pin.* 251.

Alpine major repens perennis. Baub. *hist.* III. 362.

R. Syn. 347.

Alpine major. Ger. *Em.* 611. et maxima. Park. 759.

Anglis, Marsh Mouse-ear Chickweed.

Habitat in aquosis et ad ripas fluviorum. 4. VII.

S P E R G U L A. 519.

*Cal. pentaphyllus. Petala quinque integra. Caps.
ovata, unilocularis, quinquevalvis.*

1. SPERGULA foliis verticillatis, floribus decandris. *arvensis.*
Sp. pl. 440. *Roy. lugdb.* 451.

Alpine Spergula dicta major. Baub. *pin.* 251. *R. Syn.*
351.

Saginæ Spergula. Ger. *Em.* 1125. major. Park.
562.

Anglis, Corn Spurrey.

Habitat in arvis solo glareoso. ⊖. VIII.

2. SPERGULA foliis verticillatis, floribus pentandris. *pentan-*
Loefl. hisp. 143. *Sp. pl.* 440. *dria.*

*Spergula foliis filiformibus verticillatis rarissimis, semini-
bus nigris.* Sauv. *monsp.* 167

*Spergula annua semine foliaceo nigro, circulo mem-
branaceo albo cincto.* Cat. *giff.* 46. Ep. *nat. cur.*
cent. V. 75. t. 4. *R. Syn.* 351. *Hist. Ox.* II. 551.

Alpine Spergula facie minima, seminibus emarginatis.
Tourn. 244. *Vaill. paris.* 8.

Anglis, small Spurrey.

*Habitat in Hibernia locis arenosis observavit D. G. She-
rard.* *R. Syn.* ⊖. VII.

nodosa.

3. SPERGULA foliis oppositis subulatis lævibus, caulis simplicibus. *Sp. pl.* 440. *Fl. suec.* 420.
Alpine palustris foliis tenuissimis, seu *Saxifraga palustris anglica*. *Ger Em.* 567. *R. Syn.* 350.
Alpine palustris, *ericæ* folio, polygonoides, articulis crebrioribus, flore albo pulchello. *Pluk. ph. t.* 7.
f. 4.
Alpine nodosa Germanica. *Bauh. pin.* 251.
Saxifraga palustris anglica. *Park.* 427.
Anglis, knotted Spurrey, or English marsh Saxifrage.
Habitat in pratis humidis. *Ad ripas Thamecis prope Nine-elms; in ericeto Hampstediano.* 24. VII.
VIII.

Classis

Classis XI.

DODECANDRIA
MONOGYNIA.

ASARUM. 522.

*Cal. quadrifidus, germini infidens. Cor. o. Caps. coriacea, coronata.*1. ASARUM foliis reniformibus obtusis binis. *Fl. suec. europæum.*
*Sp. pl. 442.*Asarum foliis subcordatis petiolatis. *Hort. cliff. 178.*
*Mat. med. 219.*Asarum. *Bauh. pin. 197. hist. III. 548. R. Syn. 158.*Asarum vulgare. *Park. 266. Ger. Em. 836.**Anglis, Asarabacca.**Habitat in nemorosis. In a hedge on the left hand as soon as you are in the gate, the first field from Cherrnall's green, going to Sir Tho. Seabright's beachwood, Th. Knowlton; in several woods in Lancashire. R. Syn. 4. V.**Pharmac. Asari Radix, Folia.*

LITHRUM. 532.

*Cal. duodecim-fidus. Petala sex, calyci inserta. Caps. bilocularis polysperma.*1. LITHRUM foliis oppositis cordato-lanceolatis, floribus spicatis dodecandris. *Sp. pl. 446. Fl. suec. 422.*Lithrum foliis oblongis acutis, floribus verticillatis. *Fl. lapp. 197.*Salicaria vulgaris purpurea, foliis oblongis. *Tourn. 253. R. Syn. 367.*Lysimachia purpurea. *Park. 546. Ger. Em. 476.*

DODECANDRIA DIGYNIA.

Lysimachia spicata purpurea. Baub. pin. 246.

β *Lysimachia purpurea trifolia caule hexagono.* Spigel.
I sag.

Anglis, purple-spiked Loosestrife, or Willow-herb.

Habitat in ad ripas fluviorum, et in paludibus. 24. VII.

Hyssopi-folia. 2. *LITHRUM* foliis alternis linearibus, floribus hex-andris. Hort. upf. 118. Sp. pl. 447.

Salicaria hyssopifolio latiore et angustiore. Tourn. 253.
R. Syn. 367.

Hyssopifolia. Baub. pin. 218.

Gratiola angustifolia. Ger. Em. 581. f. minor. Park.
220.

Anglis, Grafs-poly, small Hedge Hyssop.

Habitat in aquosis et ubi aquæ per hyemem stagnarunt,
sed rarius. O. VIII. IX.

D I G Y N I A.

AGRIMONIA. 534.

Cal. quinquedentatus, altero obvallatus. Petala quinque. Sem. duo infundo calycis.

Eupato-ria. 1. *AGRIMONIA* foliis caulinis pinnatis; foliolis undique ferratis; omnibus minutis interstinctis, fructibus hispidis. Syst. nat. 1047.

Agrimonia foliis caulinis pinnatis, fructibus hispidis.
Hort. cliff. 179. Fl. suec. 423. Sp. pl. 448.

Agrimonia. Ger. Em. 712. R. Syn. 202. vulgaris.

Park. 594.

Eupatorium veterum s. *Agrimonia.* Baub. pin. 321.

Anglis, Agrimony.

Habitat in marginibus agrorum et ad sepes. 24. VI.
Pharmac. Agrimonæ Herba.

TRIGYNIA.

RESEDA. 535.

Cal. monophyllus, partitus. *Petala laciniata.* *Caps.*
ore dehiscens unilocularis.

1. RESEDA foliis omnibus trifidis, inferioribus pinna- *lutea.*
tis. *Sp. pl.* 449.

Reseda vulgaris. *Baub. pin.* 100. *R. Syn.* 366.

Reseda minor seu vulgaris. *Park.* 823. *Ger. Em.*
277.

β Reseda crispa gallica. *Bocc. pl. rar.* 76.

Anglis, base Rocket.

Habitat in arvis, pratis et pascuis praesertim solo creta-
ceo. ○. VII.

2. RESEDA foliis lanceolatis integris, calycibus quadri- *Luteola.*
fidis. *Sp. pl.* 448.

Luteola. *Ger. Em.* 494. *R. Syn.* 366. *vulgaris.* *Park.*
602.

Luteola herba salicis folio. *Baub. pin.* 100.

Anglis, wild Woad, Yellow-weed, or Dyers-weed.

Habitat in muris, locis sterilioribus et incultis frequens.
○. VI.

EUPHORBIA. 536.

Cor. tetra seu pentapetala *Cal.* monophyllus. *Caps.*
tricocca.

* *Dichotomæ (umbella trifida aut nulla.)*

1. EUPHORBIA dichotoma, foliis integerrimis semi- *Peplis.*
cordatis, floribus solitariis axillaribus. *Diff. euph.*
21.

Euphorbia foliis subrotundis obtusis, floribus solitariis
in foliorum alis. *Guett. Stamp.* II. 420

Tithymalus maritimus supinus annuus, *Peplis dictus.*
R. Syn. 313.

Peplis. *Baub. hist.* III. 668. *Ger. Em.* 503. *Park.*
194.

DODECANDRIA TRIGYNIA.

Peplis maritima folio obtuso. *Bauh. pin.* 293.

Anglis, small purple Sea Spurge.

Habitat in littore maris arenoso inter Pensantiam et Marketje oppida Cornubiæ copiose. ⓠ. VI.

** *Umbella trifida.*

Peplus. 2. *EUPHORBIA umbella trifida*; dichotoma, involucellis ovatis, foliis integerrimis obovatis petiolatis. *Diff. euph.* 27. *Sp. pl.* 456.

Euphorbia foliis obverse ovatis integerrimis, umbella universali trifida triphylla, partialibus dichotomis diphyllis. *Hort. cliff.* 199. *Roy. lugdb.* 197. *Dalib. paris.* 156.

Tithymalus parvus annuus, foliis subrotundis non crenatis, *Peplus* dictus. *R. Syn.* 313.

Peplus sive *Esula rotunda*. *Bauh. pin.* 292. *Ger. Em.* 503.

Anglis, petty Spurge.

Habitat in cultis oleraceis. ⓠ. VII.

exigua. 3. *EUPHORBIA umbella trifida*: dichotoma, involucellis lanceolatis foliis linearibus. *Diff. euph.* 29. *Sp. pl.* 456.

Tithymalus leptophyllus. *Park.* 193. *R. Syn.* 313.

Tithymalus s. *Esula exigua*. *Bauh. pin.* 291.

Esula exigua *Tragi*. *Ger. Em.* 501.

Anglis, dwarf Spurge.

Habitat in arvis inter Camberwel et Dulwich; circa Shooter's-hill in Cantio copiose. ⓠ. VII.

*** *Umbella quinquefida.*

segetalis. 4. *EUPHORBIA umbella quinquefida*: dichotoma, involucellis cordatis acutis, foliis linear-lanceolatis, ramis floriferis. *Diff. euph.* 34. *Sp. pl.* 458.

Euphorbia inermis, foliis alternis linearibus acutis, partialibus umbellulæ ovato-rhombeis, petalis bicornibus. *Hort. upf.* 142.

Tithymalus segetum longifolius. *Cat. cant. app.* *R. Syn.* 312.

Tithymalus annuus, lunato flore, linariæ folio longiore. *Hist. Ox.* III. 339. *s. 10. t. 2. f. 3.*

Tithymalus

Tithymalus maritimo affinis, linariæ folio. Bauh. pin.

291.

Anglis, Corn Spurge.

*Habitat in arvis, circa Triplow prope Cantabrigiam,
D. Lyons invenit. ☉ VII. VIII.*

5. EUPHORBIA umbella quinquefida : trifida : dichotoma involucellis obovatis, foliis cuneiformibus ser. pia-
ratis. *Diff. euph. 42. Sp. pl. 459.*

*Tithymalus helioscopius. Ger. Em. 498. Park. 189.
Bauh. pin. 291. R. Syn. 313. f. folisequus. Bauh.
bijt. III. 669.*

Anglis, Sun-spurge, or Wart-wort.

Habitat in cultis oleraceis. ☉ VII.

6. EUPHORBIA umbella quinquefida : dichotoma, in- *portlandi-*
volucellis cordatis, foliis linear-lanceolatis obtusi- ca.
usculis acuminatis reflexis. Sp. pl. 458.

*Tithymalus maritimus minor. Portlandicus. R. Syn.
313. t. 24. f. 6.*

Anglis, Portland Spurge.

*Habitat in arenosis maris littoribus. Found by the Rev.
Mr. Stonestreet in the narrow neck of land which
joins Portland to Devonshire. R. Syn. ☉ VIII.*

7. EUPHORBIA umbella subquinquefida : bifida, in- *Paralias,*
*volucellis cordato-reniformibus, foliis sursum im-
bricatis. Diff. euph. 53. Sp. pl. 458.*

Tithymalus maritimus. Bauh. pin. 291.

*Tithymalus paralius. Ger. Em. 499. Bauh. bijt. III.
674. R. Syn. 312.*

Tithymalus paralius f. maritimus. Park. 184.

Anglis, Sea Spurge.

*Habitat in littoribus maritimis frequens. t. VII.
VIII.*

8. EUPHORBIA umbella quinquefida : dichotoma, in- *verrucosa,*
*volucellis cordatis, foliis lanceolatis ferrulatis pubes-
centibus, capsulis verrucosis. Syst. nat. 1049.*

*Tithymalus myrsinites fructu verrucæ simili. Bauh.
pin. 291.*

DODECANDRIA TRIGYNIA.

Tithymalus verrucosus. *Baub. hift. III.* 673. *Park.*

181. *R. Syn.* 312.

Anglis, rough fruited Spurge.

Habitat in arvis. *Founa by Mr. Dale in Essex,* and by Dr. Robinson near York. *R. Syn.* 4. VIII.

platyphyl- los. 9. *EUPHORIA umbella quinquefida :* trifida : dichotoma, involucellis carina pilosis, foliis ferratis lanceolatis sessilibus. *Syst nat.* 1049.

Euphorbia umbella quinquefida : subquadrifida : dichotoma, involucellis primariis tetraphyllis, foliis ferratis lanceolatis sessilibus. *Diff. euph.* 41. *Sp. pl.* 461.

Euphorbia inermis, foliis lanceolatis, umbella universali partialiumque prima quinquefidis : secunda trifida : reliquis bifidis. *Roy. lugdb.* 198. *Dalib. parif.* 156.

Tithymalus platiphyllos. *Fuchs. hift.* 813. *Baub. hift. II.* 670. *R. Syn.* 312.

Tithymalus arvensis latifolius germanicus. *Baub. pin.* 291.

Anglis, broad-leaved Spurge.

Habitat in arvis sed rarius. At Black Notley in Essex. *R. Syn.* In the corn fields between Harefield-Common and Battle's-Well, plentifully. *Blackf. sp. bot.* 4. VII.

**** *Umbella multifida.*

Amygdalo- 10. *EUPHORIA umbella multifida :* dichotoma, involucellis perfoliatis orbiculatis, foliis obtusis. *Diff. euph.* 46. *Sp. pl.* 463.

Tithymalus characias amygdaloides. *Ger. Em.* 500. *Baub. pin.* 290. *R. Syn.* 312.

Tithymalus characias vulgaris. *Park.* 186.

Tithymalus sylvaticus toto anno folia retinens. *Baub. hift.* III. 671.

Anglis, Wood Spurge.

Habitat in sylvis et sepibus passim. 4. IV.

Characi- as. 11. *EUPHORIA umbella multifida :* bifida, involucellis perfoliatis emarginatis foliis integerrimis, caule frutescente. *Diff. euph.* 44. *Sp. pl.* 463.

En.

Euphorbia inermis, foliis lanceolatis, umbella universali multifida, partialibus dichotomis, involucellis, semibifidis perfoliatis. *Hort. cliff.* 199. *upf.* 142. *Roy. lugdb.* 197.

Tithymalus characias rubens peregrinus. *Baub. pin.* 290.

Tithymalus characias monspeliensis. *Ger. Em.* 499. *Park.* 186. *R. Syn.* 312.

Anglis, red Spurge.

Habitat in sylvis et sepibus sed rarius. On the paper-mill pool-dam in Heywood-park, in Staffordshire, Dr. Plot. *R. Syn.* h. VI.

12. EUPHORBIA umbella sexfida: dichotoma, involucellis ovalibus, foliis integerrimis, ramis nullis, capsulis verrucosis. *Diss. eupb.* 50. *Sp. pl.* 462.

Tithymalus hybernicus, vasculis muricatis erectis. *Dill. elth.* 387. t. 290. f. 374.

Tithymalus hybernicus. *Merr. pin.* *R. Syn.* 312.

Tithymalus latifolius hispanicus. *Baub. pin.* 291. *Tabern. hist.* 987.

Anglis, knotty-rooted Spurge.

Habitat in arvis. Amongst the corn near Twittenham-park; against Richmond, and near Otterspool; Mr. Doody. *R. Syn.* 4. VII.

SEMPERVIVUM. 538. *Dodecagynia*.

Cal. duodecim-partitus. *Petala* duodecim. *Caps.* duodecim polyspermæ.

1. SEMPERVIVUM foliis ciliatis, propaginibus patentibus. *Sp. pl.* 464. *Fl. suec.* 428.

Sempervivum foliis radicalibus carnosis, caulinis imbricatis membranaceis, corymbo racemoſo reflexo. *Hort. cliff.* 179.

Sempervivum majus. *Ger. Em.* 508. *R. Syn.* 269.

Sedum majus vulgare. *Baub. pin.* 283. *hist.* III. 687. *Park.* 730.

Anglis, Houseleek.

Habitat in teclis paſſim. 4. VII.

Pharmac. *Sempervivi majoris Herba*.

Classis

Classis XII.

ICOSANDRIA MONOGYNIA.

PRUNUS. 546.

Cal. quinquefida, inferus. Petala quinque. Drupæ nux futuris prominatis.

- infinitia.* 1. PRUNUS spinosa, foliis ovatis subtus villosis, pedunculis geminis. *Cent. pl. 34.*
Prunus sylvestris major. *Bauh. hist. I. 196. R. Syn. 462.*
Pruna sylvestria præcoccia. *Bauh. pin. 444.*
Prunus sylvestris fructu majore nigro. *R. Syn. ed. II. 301.*
 β *Prunus sylvestris fructu rubro, acerbo et ingrato.* *R. Syn. ed. II. 302.*
 γ *Prunus sylvestris fructu majore albo.* *R. Syn. ed. II. 302.*
Anglis, $\alpha.$ $\beta.$ black Bullace-tree. $\gamma.$ white Bullace-tree.
Habitat in sepibus. *h. IV.*
- spinosa.* 2. PRUNUS spinosa, foliis lanceolatis. pedunculis foliariis. *Syst. nat. 1057. Fl. suec. 432. Sp. pl. 275.*
Prunus sylvestris. *Ger. Em. 1497. Park. 1033. Bauh. pin. 444. hist. I. 193. R. Syn. 462.*
Anglis, the Black-thorn, or Sloe-tree.
Habitat in sepibus. *h. III. IV.*
Pharmac. *Pruni sylvestris cortex, Flores, Fructus.*
- Padus.* 3. PRUNUS floribus racemosis, foliis deciduis basi subtus biglandulosis. *Sp. pl. 473. Fl. suec. 431.*
Cerasus avium nigra et racemosa. *Ger. Em. 1504. R. Syn. 463.*

Cerasus

Cerasus racemosa sylvestris fructu non eduli. *Baub.*
pin. 451.

Cerasus avium racemosa. *Park.* 1517.

Anglis, wild Cluster-cherry, or Birds-cherry.

Habitat in *sylvis et sepibus.* In Westmoreland, and the mountainous part of the west-riding of Yorkshire, and in the woods of Derbyshire. *R. Syn.* In the lane going from Temple-mills to Epping-forest, Dr. Wilmer. *h. V.*

*4. PRUNUS umbellis sessilibus; foliis ovato-lanceolatis *Avium.*
subtus pubescentibus. *Fl. suec.* 429.

Cerasus sylvestris, fructu rubro. *Baub. hist. I.* 1220.
R. Syn. 463.

Anglis, common wild Cherry-tree.

Habitat in *sylvis et sepibus passim.* *h. IV.*

*5. PRUNUS umbellis subpedunculatis, foliis ovato-*Cerasus.*
lanceolatis glabris. *Syst. nat.* 1057. *Sp. pl.* 474.

Cerasus sylvestris fructu nigro. *Baub. hist. I.* 220.
R. Syn. 463.

Cerasus sylvestris ac major, fructu subdulci nigro colore inficiente. *Baub. pin.* 450.

Anglis, Black Cherry.

Habitat in *sylvis et sepibus.* *h. IV.*

Pharmac. *Cerasorum nigrorum Fructus.*

D I G Y N I A.

C R A T Æ G U S. 547.

Cal. quinquefidus. *Petala quinque.* *Bacca infera,*
disperma.

1. CRATÆGUS foliis ovatis inæqualiter ferratis subtus *Aria.*
tomentosis. *Fl. suec.* 433. *Sp. pl.* 475.

Cratægus inermis, foliis ellipticis ferratis transversaliter sinuatis subtus villosis. *Fl. lapp.* 199.

Mespilus alni folio subtus incano, *Aria Theophrasti dicta* *R. Syn. 453.*

Aria Theophrasti. *Ger. Em.* 1327.

Sorbus

Sorbus sylvestris Aria Theophrasti dicta. Park. 1421.
 Sorbus alpina. Baub. hist. I. 65.
 Alni effige, lanato folio, major. Baub. pin. 452.
Anglis, the white Bean-tree.
 Habitat in sylvis et sepibus praesertim montosis. h. V.

torminalis. 2. CRATÆGUS foliis cordatis septangulis: lobis infilis divaricatis. Sp. pl. 476.
 Crataegus foliis cordatis acutis: lacinulis acutis serratis. Hort. cliff. 187. Roy. lugdb. 271.
 Mespilus apii folio sylvestris non spinosa, seu Sorbus torminalis. Baub. pin. 454. R. Syn. 453.
 Sorbus torminalis. Cam. epit. 162. Ger. Em. 1471.
 seu vulgaris Park. 1420.
Anglis, common wild Service-tree, or Sorb.
 Habitat in sylvis et sepibus. h. IV.
 Pharmac. Sorbi torminalis Fructus.

Oxyacantha. 3. CRATÆGUS foliis obtusis subtrifidis ferratis. Synt. nat. 1057.
 Crataegus foliis obtusis bitrifidis. Fl. suec. 434. Sp. pl. 477.
 Mespilus apii folio sylvestris spinosa, f. Oxyacantha.
 Bauh. pin. 454. R. Syn. 453.
 Oxyacanthus. Ger. Em. 1325.
 Spina appendix vulgaris. Park. 1025.
 β Mespilus apii folio, sylvestris spinosa, folio et fructu majore. R. Syn. 454.
Anglis, the White-thorn, or Haw-thorn.
 Habitat in sylvis et sepibus ubique. h. V.
 Pharmac. Spinæ albæ f. Oxyacanthæ Flores, Fructus.

TRIGYNI A.

S O R B U S. 548.

Calix quinquefidus. *Petala* quinque. *Bacca* infera, trisperma.

domestica. *1. SORBUS foliis pinnatis subtus tomentosis. Hall. helv. 351. Sp. pl. 477.

Sorbus

1. *Sorbus.* *Bauh. hist. I.* 59. *Ger. Em.* 1471. *R. Syn.*
 452. *sativa.* *Bauh. pin.* 415.
Sorbus legitima. *Park.* 1420.
Anglis, the true Service, or Sorb.
Habitat in montibus nemorosis. In the mountainous parts
 of Cornwall, Walter Moyle, Esq; in the More-
 lands in Staffordshire. *D. Plot.* *R. Syn.* 4. IV. V.
Pharmac. *Sorbi Fructus.*
2. **SORBUS** foliis pinnatis utrinque glabris. *Hall. helv. aucuparia.*
 250. *Sp. pl.* 477. *Fl. suec.* 435.
Sorbus sylvestris foliis domesticæ similis. *Bauh. pin.*
 415. *R. Syn.* 452.
Sorbus sylvestris sive *Fraxinus bubula.* *Ger. Em.* 1473.
Sorbus aucuparia. *Bauh. hist. I.* 62.
Ornus, sive *Fraxinus sylvestris.* *Park* 1419.
Anglis, the Quicken-tree, or Mountain Ash.
Habitat in sylvis et sepibus subhumidis. h. V.

P E N T A G Y N I A.

PYRUS. 550.

1. *Calix* quinquefidus. *Petala* quinque. *Pomum* infe-
 rum, quinqueloculare, polyspermum.
1. PYRUS foliis serratis, floribus corymbosif. *Fl. suec. communis.*
 436. *Sp. pl.* 1200.
Pyrus foliis serratis, promisbas productis. *Hort. cliff.*
 190. *Sp. pl.* 479.
Pyrus sylvestris. *Ger. Em.* 1457. *Park.* 1500. *Bauh.*
pin. 439.
Pyraster seu *Pyrus sylvestris.* *Bauh. hist. I.* 57. *R.*
Syn. 452.
2 *Pyrus* *sativa.* *R. Syn.* 452.
Anglis, the wild Pear-tree.
Habitat in sylvis et sepibus. h. IV.
2. PYRUS foliis serratis umbellis sessilibus. *Fl. suec. Malus.*
 437. *Sp. pl.* 1200.
Pyrus foliis serratis, promisbas concavis. *Hort. cliff.*
 189. *Sp. pl.* 479. *Mat. med.* 237.
Malus

ICOSANDRIA PENTAGYNYIA.

Malus sylvestris. *Ger. Em.* 1461. *Park.* 1502. *R.*
Syn. 452.

Malus sylvestria. *Baub. pin.* 435.

β *Malus sativa.* *R. Syn.* 451.

Anglis, α the Crab-tree, or Wilding, β the Apple-tree.

Habitat in sylvis et sepibus. *H. V.*

Pharmac. *mali sylvestris.* *Fruet.*

M E S P I L U S. 549.

Cal. quinquefidus. *Petala quinque.* *Bacca infera,*
5-sperm.

Germani- *1. *MESPILUS* inermis, foliis lanceolatis integerrimis
ca. subtus tomentosis, floribus terminalibus solitariis ses-
filibus. *Syst. nat.* 1058.

Mespilus inermis, foliis lanceolatis integerrimis subtus
tomentosis, calycibus acuminatis. *Hort. cliff* 189.
upf. 129. *Mat. med.* 236. *Roy. lugdb.* 270.
Boehm. lipf. 174. *Sp. pl.* 478.

Mespilus. *Ger. Em.* 1452. *R. Syn.* 453. *vulgaris*
Park. 1422.

Mespilus Germanica folio laurino non serrato, f. *Mes-*
pilus sylvestris. *Baub. pin.* 453.

Anglis, Medlar.

Habitat in sepibus. In all the hedges about Minehi-
ville. Mr. Du Bois. *R. Syn.* *H. V.*

Pharmac. *Mespili Fruet.*

S P I R Æ A. 554.

Cal quinquefidus. *Petala quinque.* *Caps.* polyspermæ.

Filipen-
dula. 1. *SPIRÆA* foliis pinnatis: foliolis uniformibus ser-
ratis caule herbaceo, floribus cymosis. *Fl. suec.* 439.
Sp. pl. 490.

Filipendula. *Baub. hist.* III. 2. 189. *Ger. Em.* 1058.
Park. 434. *R. Syn.* 259.

Filipendula vulgaris. *Baub. pin.* 163.

Anglis, Drop-wort.

Habitat in pratis et pascuis montosis. Supra Dupper's-
hill, prope Croydon. D. Caute. Juxta Clapham
prope Londonum. 24. VII. *Whornell Woods, Hants.*

Pharmac. *Filipendulæ Radix Folia.*

2. SPIRÆA

2. SPIRÆA foliis pinnatis: impari majore lobato, caule *Ulmaria*.
herbaceo, floribus cymosis. *Fl. suec.* 490. *Sp. pl.*

440.

Ulmaria. *Clus. hist.* II. 198. *Baub. hist.* III. 488.
R. Syn. 259.

Ulmaria vulgaris. *Park.* 592.

Regina prati. *Ger. Em.* 1043.

Barba capri floribus compactis. *Baub. pin.* 164.

Anglis, Meadow-sweet.

Habitat in pratis humidis et ad ripas fluviorum passim.

4. VI. VII.

Pharmac. *Ulmariæ Herba*.

P O L Y G Y N I A.

R O S A. 556.

Petala quinque. *Cal.* urceolatus, quinquefidus, carnosus collo coarctatus. *Sem.* plurima, hispida, calycis interiori lateri affixa.

* *Germinibus subglobosis*.

1. ROSA germinibus globosis pedunculisque glabris, *Eglante-*
caule aculeis sparsis rectis, petiolis scabris, foliolis ria.
acutis. *Syst. nat.* 1062.

Rosa aculeata, foliis odoratis subtus rubiginosis. *Hall.*
helv. 350. *Sp. pl.* 491.

Rosa sylvestris odora. *Ger. Em.* 1272. *R. Syn.* 454.
seu *Eglenteria* flore simplici. *Park. par.* 418.

Rosa sylvestris foliis odoratis. *Baub. pin.* 483.

Anglis, Sweet-briar, or Eglantine.

Habitat in sepibus. h. V. VI.

2. ROSA germinibus globosis glabris pedunculis caule *spinosesti-*
petiolisque aculeatissimis. *Syst. nat.* 1062. *ma.*

Rosa caule petiolisque aculeatis, calycis foliolis indi-
visis. *Fl. suec.* 442. *Sp. pl.* 491.

Rosa pumila, spinosissima, foliis pimpinellæ glabris,
flore albo. *Baub. hist.* II. 40. *R. Syn.* 455.

Rosa sylvestris pomifera minor. *Baub. pin.* 488.

Rosa pimpinella s. pomifera minor. *Park.* 1018.

Rosa

ICOSANDRIA POLYGYNIA.

Rosa pimpinellæ folio. *Ger. Em.* 1270.

β *Rosa Ciphiana* f. *Rosa pimpinellæ foliis minor nostras,*
flore eleganter variegato. *Scot. ill.* 46.

Anglis, Burnet Rose.

Habitat in ericetis et locis arenosis. h. VI.

arvensis. 3. ROSA germinibus globosis pedunculisque glabris,
caule petiolisque aculeatis floribus subcymosis.
Rosa sylvestris altera minor, flore albo nostras. R.
Syn. 455.

Rosa arvensis candida. *Baub. pin.* 484.

Rosa canina humilior fructu rotundiore. D. Plot.

β *Rosa canina sylvestris*, unico flore et fructu. R. *Syn.*
Anglis, white-flowered Dogs-rose.

Habitat in sepibus. h. VII.

villosa. 4 ROSA germinibus globosis aculeatis, pedunculis hispidis caule aculeis sparsis, petiolis aculeatis, foliis tomentosis. *Syst. nat.* 1062.

Rosa foliis utrinque villiosis, fructu spinoso. Hall. helv.
350. *Sp. pl.* 491.

Rosa sylvestris pomifera major nostras. R. *Syn.* 455.

Rosa sylvestris pomifera major. *Baub. pin.* 484.

Rosa pomifera major. Park. par. 418.

β *Rosa sylvestris fructu majore hispido.* R. *Syn.* ed. II.
296.

Anglis, Apple-rose.

Habitat in montefis Cambrobritannicis, septentrionalibus Eboracensis et Westmorlandici agri copiose.
h. VI.

** *Germinibus ovatis.*

canina. 5. ROSA germinibus ovatis pedunculisque glabris, caule petiolisque aculeatis. *Syst. nat.* 1062.

Rosa caule aculeato, petiolis inermibus, calycibus semipinnatis. *Fl. suec.* 441. *Sp. pl.* 491.

Rosa sylvestris inodora seu canina. Park. 1017. R.
Syn. 454.

Rosa canina inodora. *Ger. Em.* 1270.

Rosa sylvestris vulgaris flore odorato incarnato. *Baub.*
pin. 483.

Anglis, red-flowered Dogs-rose, or Hep-tree.

Habitat

Habitat in *sepibus*. h. V. VI.

Pharmac. Rosæ sylvestris Flores, Spongiolæ (*insectorum niduli*) f. *Bedeguar*, *Cynobati*.

R U B U S. 557.

Cal. quinquefidus. *Petala* quinque. *Bacca* compo-
sita acinis monospermis.

* *Frutescentes.*

1. RUBUS foliis quinato-pinnatis ternatisque, caule a- *idæus*.
culeato, petiolis canaliculatis. *Fl. suec.* 446. *Mat.*
med. 242. *Sp. pl.* 493.

Rubus caule erecto hispido, foliis ternatis. *Fl. lapp.*
204.

Rubus *idæus* spinosus. *Baub. pin.* 479.

Rubus *idæus*. *Ger. Em.* 1272. *Park.* 557.

Rubus *idæus* spinosus fructu rubro. *Baub. hist. II.*
59. *R. Syn.* 467.

Anglis, Raspberry-bush, Framboise, or Hindberry.

Habitat in *sylvis*, *sepibus*, *montibus*, *saxosis* et *udis*
Walliæ, et Septentrionalium Angliæ. In Stoken-
church wood plentifully; in Westmorlandia copiosif-
sime. h. V. VI.

2. RUBUS foliis ternatis subnudis: lateralibus bilobis, *cæsius*.
caule aculeato tereti. *Syst. nat.* 1063. *Fl. suec.* 445.
Sp. pl. 493.

Rubus caule aculeato reflexo perenni, foliis ternatis,
Fl. lapp. 205.

Rubus repens fructu *cæsio*. *Baub. pin.* 479. *Ger. Em.*
1271.

Rubus minor fructu cæruleo. *Baub. hist. II.* 59. *R.*
Syn. 467.

Rubus minor, chamærubus sive Humirubus. *Park.*
1013.

Anglis, small Bramble, or Dewberry-bush.

Habitat in *sylvis* et *sepibus* *passim*. h. VI. VII.

3. RUBUS foliis quinato-digitatis ternatisque, caule pe- *fruticosus*.
tiolisque aculeatis. *Fl. suec.* 444. *Sp. pl.* 493.

O Rubus

ICOSANDRIA POLYGYNIA.

- Rubus vulgaris major. Park. 1013. fructu nigro. B.
hifl. II. 57. R. Syn. 467.
Rubus vulgaris f. Rubus fructu nigro. Baub. pin. 479.
β Rubus vulgaris major, fructu albo. R. Syn. 467.
Anglis, common Bramble.
Habitat in sylvis et sepibus ubique. h. V.—IX.

** Herbacei.

- saxatilis.* 4. RUBUS foliis ternatis nudis flagellis reptantibus her-
baceis. Sp. pl. 494. Fl. suec. 447.
Rubus saxatilis. Ger. Em. 1273.
Rubus alpinus saxatilis. Park. 1014.
Chamærubus saxatilis. Baub. pin. 479. R. Syn. 261.
Anglis, Stone Bramble.
Habitat inter lapides ad latera montium in comitatibus E-
boracensi, Westmorlandico, et Cumberlandico.
24. VI.

- Chamæ-
morus.* 5. RUBUS foliis simplicibus lobatis, caule unifloro dio-
ico. Fl. suec. 449. Sp. pl. 494.
Rubus caule bifolio unifloro, foliis simplicibus. Fl.
lapp. 208. t. 5. f. 1.
Chamæmorus. Clus. hifl. I. 118. Ger. Em. 173.
R. Syn. 260.
Chamæmorus anglica. Park. 1014.
Chamæmorus foliis ribes anglica. Baub. pin. 480.
Anglis, Cloud-berries, Knot-berries, or Knout-ber-
ries.
Habitat in paludibus turfosis supra montes Eboracenses,
Westmorlandicos, Cumberlandicos, Arvonicos. 24.
V. VI.

F R A G A R I A. 558.

Cal. decem-fidus. Petala quinque. Receptaculum se-
minum ovatum, baccatum deciduum.

- vesca.* I. FRAGARIA flagellis reptans. Sp. pl. 494. Fl. suec.
450.
Fragaria. Ger. Em. 998. R. Syn. 254. vulgaris.
Park. 758. Baub. pin. 326. Fl. lapp. 209.
Fragaria minor, dulci fructu. Radb. cat. 17. hort. 43.
β Fra-

β *Fragaria fructu hispido.* *Ger. Em.* 998.

Anglis, Strawberry.

Habitat in sylvis et ad sepes frequens. 4. IV. V.

2. FRAGARIA caule decumbente repente. *Roy. lugdb. sterilis.*

274. *Dalib. paris.* 147. *Sauv. monsp.* 177. *Sp. pl.*

495.

Fragaria sterilis. *Bauh. pin.* 327. *R. Syn.* 254.

Fragaria minime vesca. *Park.* 758. *s. steriles Lob. ic.*

696. *Ger. Em.* 998.

Anglis, barren Strawberry.

Habitat in pascuis sterilioribus passim. 4. IV.

P O T E N T I L L A.

Cal. decemfidus. *Petala quinque.* *Sem. subrotunda,*
nuda, receptaculo parvo exsucco affixa.

* *Foliis pinnatis.*

1. [POTENTILLA foliis pinnatis, caule fruticoso. *fruticosa.*

Hort. cliff. 193. *Fl. suec.* 451. *Sp. pl.* 495.

Pentaphylloides rectum fruticosum Eboracense. *Hist.*

Ox. II. 193. *s. 2. t. 23. f. 5.* *Hortul. angl.* 54.

t. 55.

Pentaphylloides fruticosa. *R. Syn.* 256. *Cat. ang.*
228. *ic.*

Anglis, Shrub Cinquefoil.

Habitat ad ripam meredionalem Tesæ fluvii infra vicum
Thorp dictum variis in locis, nec non infra cœnobium
Athelstani, vulgo Eggleston-Abbey, in agro Ebora-
censi. Mr. Lawson observed thousands of these plants
by Mickle-force, in Teasdale. *R. Syn.* 12. VI.

2. POTENTILLA foliis pinnatis ferratis, caule repente. *Argentina*

Fl. lapp. 210. *Fl. suec.* 452. *Sp. pl.* 495.

Potentilla. *Bauh. pin.* 321. *Park.* 593. *Cam. epit.*
758.

Pentaphylloides argentina dicta. *R. Syn.* 256.

Argentina. *Dod. pempt.* 600. *Ger. Em.* 973.

Anglis, Silver-weed, or wild Tansey.

Habitat ad semitas, vias, inque pascuis depresso, ubi aquæ
hyemales præsertim stagnant frequens. 4. VI. VII.

Pharmac. *Argentinæ Herba.*

rupestris. 3. POTENTILLA foliis pinnatis alternis, foliolis quinatis ovatis crenatis, caule erecto. *Sp. pl.* 496. *Fl. suec.* 453.

Pentaphylloides erectum. *Bauh. hist.* II. 398. *Hist. Ox.* II. 193. f. 2. t. 20. f. 1. *R. Syn.* 255.

Pentaphyllum fragiferum. *Ger. Em.* 991. *Park.* 397. *Clus. hist.* II. 107.

Quinquefolium fragiferum. *Bauh. pin.* 326.

Anglis, upright bastard Cinquefoil.

Habitat ad latera montis cuiusdam Craig Wreidhin dicti in comitatu montis Gomerici Walliae, D. Lhwyd. *R. Syn.* 4. VII.

* *Foliis quinatis.*

argentea. 4. POTENTILLA foliis quinatis cuneiformibus incisis subtus tomentosis, caule erecto. *Sp. pl.* 497. *Fl. suec.* 454.

Potentilla foliis digitatis, caule erecto corymboso. *Fl. suec. ed.* I. 417.

Pentaphyllum erectum, foliis profunde falcatis subtus argenteis, flore luteo. *Bauh. hist.* 598. *R. Syn.* 255.

Pentaphyllum rectum minus. *Park.* 400.

Quinquefolium folio argenteo. *Bauh. pin.* 235.

Quinquefolium tormentillae facie. *Ger. Em.* 987.

Anglis, Tormentil Cinquefoil.

Habitat in pratis et pascuis solo glareoso paucim. 4. VI.

opaca.

5. POTENTILLA foliis radicalibus quinatis cuneiformibus ferratis caulinis suboppositis, ramis filiformibus decumbentibus. *Cent. pl.* 35. *Syst. nat.* 1064.

Pentaphyllum parvum hirsutum. *Bauh. hist.* II. 598. *R. Syn.* 255.

Pentaphyllum incanum minus repens. *Ger. Em.* 989.

Quinquefolium minus repens lanuginosum. *Park.* 399.

Quinquefolium minus repens lanuginosum luteum.

Bauh. pin. 225.

Anglis, small rough Cinquefoil.

Habitat circa Kippax in agro Eboracensi. 4. VI.

6. POTENTILLA foliis radicalibus quinatis acute ser- *verna*.
ratis retusis, caulinis ternatis, caule declinato. *Sp.*
pl. 498. *Fl. suec.* 455.

Pentaphyllum seu Quinquefolium minus. *Tabern. ic.*
123.

Pentaphyllum tormentillæ facie. *Rudb. cat.* 32. *hort.*
85. *Till. ab.* 52.

Quinquefolium minus repens luteum. *Bauh. pin.* 325.
R. Syll. 213.

Anglis, Spring Cinquefoil.

Habitat in pascuis sterilioribus prope Giggleswick in co-
mitatu Eboracensi. 4. V. VI.

7. POTENTILLA foliis digitatis, caule repente, pe- *reptans*.
dunculis unifloris. *Fl. suec.* 456. *Sp. pl.* 499.

Potentilla foliis digitatis longitudinaliter patenti-serra-
tis, caule repente. *Hort. cliff.* 194. *Gron. virg.*
163.

Pentaphyllum vulgatissimum. *Park.* 398. *R. Syn.* 255.

Quinquefolium majus. *Ger. Em.* 987. repens. *Bauh.*
pin. 325.

Anglis, common Cinquefoil, or five-leaved Gras.

Habitat ad semitas, vias, &c. ubique. 4. VI.

Pharmac. Pentaphylli Radix.

8. POTENTILLA foliis quinatis apice connivent-i-ser- *alba*.
ratis, caulinis filiformibus procumbentibus, recep-
taculis hirsutis. *Sp. pl.* 498.

Quinquefolium album majus. *Bauh. pin.* 325.

Quinquefolium sylvaticum majus flore albo. *Ger. Em.*
987.

Anglis, white Cinquefoil.

Habitat in Wallia, D. Haviland. 4. VIII.

TORMENTILLA. 560.

Cal. octofidus. *Petala* quatuor. *Sem.* subrotunda,
nuda receptaculo parvo exsucce affixa.

1. TORMENTILLA caule erecto, foliis sessilibus *erecta*.
Tormentilla caule erecto. *Sp. pl.* 500. *Fl. suec.*
459.

An infusion
of this plant is
the usual tea of
the Tartars of
Tomsk, a great
astringent.

Tomentilla. Ger. Em. 992. Bauh. hist. II. 598. Fl.
lapp. 213. Hort. cliff. 194. Mat. med. 249. R. Syn.
257. vulgaris. Park. 394.

Tomentilla sylvestris. Bauh. pin. 326.
Anglis, Tormentil, or Septfoil.

Habitat in pascuis sterilioribus ubique. 4. VI.
Pharmac. Tomentillæ Radix, Folia.

reptans. 2. TORMENTILLA caule repente, foliis petiolatis
Tomentilla caule repente. Sp. pl. 500.

Tomentilla reptans. Pet. h. br. t. 41. f. 10. R. Syn.
257.

Pentaphyllum reptans alatum foliis profundius serratis.
Hist. nat. ox. c. 6. p. 7. t. 9. f. 5.

Pentaphyllum minus viride flore aureo tetrapetalo, ra-
dicularis in terram e geniculis demittens. Hist. ox.
190. 12.

β Pentaphyllum aureum minus, sylvaticum, nostras, fo-
liis tripartito divisis ex cauliculorum geniculis radi-
cescens. Pluk. alm. 285.

Anglis, creeping Tormentil.

Habitat in sylvis et pascuis sterilioribus passim. 4. VII.

G E U M. 561.

Cal. decemfidus. Petala quinque. Sem. cauda pi-
losa.

urbanum. 1. GEUM floribus erectis, fructu globoso : aristis un-
cinatis nudis foliis lyratis. Syst. nat. 1065. Fl. suec.
460. Sp. pl. 501.

Caryophyllata. Ger. Em. 995. R. Syn. 253. vulga-
ris. Bauh. pin. 321. Park. 136. flore parvo luteo.
Bauh. hist II. 398.

β Caryophyllata vulgaris majore flore. Bauh. pin. 321.
Anglis, common Avens, or Herb-bennet.
Habitat in sylvis et sepibus frequens. 4. VI. VIII.
Pharmac. Caryophyllatae Radix.

rivale. 2. GEUM floribus nutantibus, fructu oblongo : aristis
plumosis. Fl. suec. 461. Sp. pl. 501.

Caryophyllata montana purpurea. Ger. Em. 995. R.
Syn. 253.

Caryophyllata montana s. *palustris purpurea*. Park.

136.

Caryophyllata aquatica nutante flore. Baub. pin. 321.
Anglis, Water Avens.

Habitat in montosis Septentrionalibus Angliae circa Settle,
Ingleton, &c. also in Wales, about Snowdon-hill,
&c. R. Syn. 4. VII.

D R Y A S. 562.

Cal. octofidus. *Petala octo*. *Sem. caudata*, *pilosa*.

1. DRYAS pentapetala, foliis pinnatis. *Amoen. acad. pentape-*
ta. II. 353. Sp. pl. 501.

Caryophyllata pentaphyllæa. Baub. hist. II. 398.
Park. 137. R. Syn. 254.

Caryophyllata alpina pentaphyllæa. Ger. Em. 995.

Caryophyllata alpina quinquefolia. Baub. pin. 322.
Anglis, Cinquefoil Avens.

Habitat in the den of Petaick in Scotland, D. Sibbald.
R. Syn. 4.

2. DRYAS octopetala : foliis simplicibus. *Fl. suec. 462. octopetala*.
Sp. pl. 401.

Caryophyllata alpina chamædryos folio. Hist. ox. II.
432. R. Syn. 252.

Chamædrys spuria montana cisti flore. Park. 106.

Chamædrys alpina, cisti flore. Baub. pin. 248.

Chamædrys alpina, flore fragariæ albo. Baub. hist. III.
290.

Teucrium alpinum, cisti flore. Ger. Em. 659.

Anglis, Mountain Avens.

Habitat in montosis. Found by Mr. Heaton in Ireland,
on the mountains between Gort and Galloway. Hujus
plantæ speciminibus meditavit, D. Lhwyd, in monti-
bus Hibernicis juxta Sligo collectis, quæ et in omni-
bus altissimis Scotiæ occidentalis montibus abundat, ut
mibi retulit idem. R. Syn. 4. VII.

COMARUM. 563.

Cal. decemfidus. *Petala* quinque, *calyce* minora.
Receptaculum spongiosum, persistens.

- palustre.* 1. COMARUM. *Fl. lapp.* 214. *suec.* 463. *Sp. pl.* 502.
Pentaphylloides palustre rubrum. *Tourn.* 298. *R. Syn.*
 256.
Pentaphylloides rubrum palustre. *Ger. Em.* 987.
Quinquefolium palustre rubrum. *Bauh. pin.* 326.
 β *Pentaphylloides palustre rubrum crassis et villosis foliis*
Sueicum et Hybernicum. *Pluk. alm.* 284. t. 212.
f. 2.
Anglis, purple marsh Cinquefoil.
Habitat in palustribus putridis et coenosis non infrequens.
R. Syn. 24. VI.

Classis

Classis XIII.

POLYANDRIA
MONOGYNIA.

* *Flores tetrapetalii.*

A C T A E A. 568.

Cál. tetraphyllus. Cor. tetrapetala. Bacca unilocularis. Sem. semiobtusata.

I. ACTAEA racemo ovato, fructibus baccatis. Sp. pl. *spicata.*
509. Fl. suec. 464.

Actaea caule inermi. Fl. lapp. 217.

Christophoriana. Clus. hist. II. 86. Ger. Em. 969.
Till. ic. 148. R. Syn. 262.

Christophoriana vulgaris. Park. 379.

Aconitum racemosum. Bauh. pin. 182.

Anglis, Herb Christopher, or Bane-berries.

Habitat in dumetis infra, Malhamcove, juxta murum aquilonem versus, prope rupes ubi Fraxini juniores crescunt, reperiuntur hujus plantæ nonnullæ, D. Richardson. R. Syn. in *sylvula prope Clapham in agro Eboracensi.* 24. V. VI.

CHELIDONIUM. 572.

Cor. tetrapetala. Cal. diphyllus. Siliqua unilocularis, linearis.

I. CHELIDONIUM pedunculis umbellatis. Sp. pl. *majus.*
505. Mat. med. 252.

Chelidonium majus. Fuchs. hist. 865. Ger. Em. 1069.

Chelidonium majus vulgare. Park. 616. Bauh. pin.

144.

Papaver corniculatum luteum, Chelidonia dictum.
R. Syn. 309.

β Chelidonium majus foliis querulis. Bauh. pin. 144.
Anglis,

Anglis, Celandine.

Habitat in ruderatis. 4. V. VI.

Pharmac. Chelidonii majoris Radix, Herba.

- Glaucium*. 2. **CHELIDONIUM** pedunculis unifloris, foliis amplexicaulibus sinuatis, caule glabro. *Sp. pl.* 506.
Papaver corniculatum luteum. *Park.* 261. *Bauh. pin.*
171. hyst. III. 398. *R. Syn.* 309.
Papaver cornutum flore luteo. *Ger. Em.* 367.
Anglis, yellow horned Poppy.
Habitat in littoribus maritimis; in insula Shepey.
○. VII.

- hybridum*. 3. **CHELIDONIUM** pedunculis unifloris, foliis pinnatifidis linearibus, caule lævi. *Sp. pl.* 506.
Papaver caule ramoso, foliis linearibus pinnatifidis,
capsulis fulcatis. *Hort. upf.* 136.
Papaver corniculatum violaceum. *Bauh. hyst.* III. 393.
pin. 172. *R. Syn.* 309.
Papaver cornutum flore violaceo. *Ger. Em.* 367.
Papaver corniculatum flore violaceo. *Park.* 262.
Anglis, violet-coloured horned Poppy.
Habitat in agro Cantabrigiensi inter segetes inter Swafham et Burwel vicos. *R. Syn.* ○. VIII.

P A P A V E R. 573.

Cor. tetrapetala. *Cal.* diphyllus. *Caps.* unilocularis,
substigmate persistente poris dehiscens.

* *Capsulis hispidis.*

- hybridum*. 1. **PAPAVER** capsulis globosis torosis hispidis, caule
folioso multifloro. *Sp. pl.* 506.
Papaver foliis ternato-pinnatifidis, *capsulis* fulcatis hispidis. *Hort. cliff.* 201.
Papaver laciniato folio, capitulo hispido rotundiore. *R. Syn.* 308.
Argemone capitulo rotundiore. *Park.* 369.
Argemone capitulo breviore. *Bauh. pin.* 172.
Argemone capitulo torulo. *Ger. Em.* 373.
Anglis, round rough-headed Poppy.
Habitat in arvis sed rarius. ○. VI. VII.

2. PAPAVER capsulis clavatis hispidis, caule folioso *Argemone*.
multifloro. *Sp. pl.* 506. *Fl. suec.* 466.

Papaver foliis ternato-pinnatis, fructu angulato. *Hort. cliff.* 201. *Roy. lugdb.* 419. *Sauv. monsp.* 252.

Papaver laciniato folio capitulo hispido longiore. *R. Syn.* 308.

Argemone capitulo longiore. *Ger. Em.* 373. *Baub. pin.* 172. *Park.* 370.

Anglis, long rough-headed Poppy.

Habitat in arvis. ☽. VI.

** *Capsulis glabris.*

3. PAPAVER capsulis glabris globosis, caule piloso *Rhoeas*.
multifloro, foliis pinnatifidis incisis. *Sp. pl.* 507.
Fl. suec. 467.

Papaver laciniato folio, capitulo breviore glabro, annum *Rhoeas* dictum. *R. Syn.* 308.

Papaver *rhoeas*. *Ger. Em.* 401.

Papaver erraticum *rhoeas* sive *sylvestre*. *Park.* 367.

Papaver erraticum majus. *Baub. pin.* 171.

Anglis, red Poppy, or Corn Poppy, or round smooth-headed Poppy.

Habitat inter segetes. ☽. VI. VII.

Pharmac. Papaveris erratici Flores.

4. PAPAVER capsulis oblongis glabris, caule multifloro *dubium*.
rosetis adpressis, foliis pinnatifidis incisis. *Sp. pl.*
1196. *Fl. suec.* 467.

Papaver laciniato folio capitulo longiore glabro. *R. Syn.* 309.

Argemone capitulo longiore glabro. *Hist. ox.* II. 279.
f. 3. t. 14. f. 11.

Anglis, long smooth-headed Poppy.

Habitat in arvis circa Stockwell prope Londinum.
☽. VI.

5. PAPAVER capsulis glabris oblongis, caule multifloro *cambri*-
ro lævi, foliis pinnatis incisis. *Sp. pl.* 508. *cum.*

Papaver cambicum perenne, flore sulphureo. *Dill.*
elth. 300. *t. 223. f. 290.*

Pa-

POLYANDRIA MONOGYNIA.

Papaver luteum perenne, laciniato folio, Cambrobritannicum. R. Syn. 309.

Argemone lutea Cambrobritannica. Park. 369.

Anglis, yellow Poppy.

Habitat in montosis cambrobritannicis frequens; circa Kendal in Westmorelandia copiose. 4. VI.—VIII.

Somniferum. *6. PAPAVER calycibus capsulisque glabris, foliis amplexicaulibus incisis. Sp. pl. 508.

Papaver caule multifloro, foliis simplicibus glabris incisis caulinis. Hort. upsi. 135. Mat. med. 250.

Papaver sylvestre. Ger. Em. 370. R. Syn. 308.

Papaver hortense semine albo. Baub. pin. 170.

Anglis, wild Poppy.

Habitat in incultis paſſim. O. VII.

Pharmac: Papaveris albi Capita, Semina.

** Flores pentapetalii.

T I L I A. 587.

Cor. pentapetala. *Cal. quinquepartitus*. *Bacca* *sicca*, globosa, quinquelocularis, quinquevalvis, basi dehiscens.

europaea. *1. TILIA floribus nectario destitutis. Sp. pl. 514.

Tilia vulgaris platyphyllos. Baub, hist. I. 133. R. Syn. 473.

Tilia foemina. Ger. Em. 1483. major. Park. 1407.

Tilia foemina folio majore. Baub. pin. 426.

β *Tilia foemina* folio minore. Baub. pin. 426.

γ *Tilia* foliis molliter hirsutis, viminibus rubris, fructu tetragono. R. Syn. 473.

δ *Tilia ulmifolia*, semine hexagono. Merr. pin.

Anglis, the Lime, or Linden-tree.

Habitat in sylvis sepibus et areis. h. VII.

C I S T U S. 598.

Cor. pentapetala. *Cal. pentaphyllus*, foliolis duobus minoribus. *Capsula* triquetra trivalvis.

* *Exstipulatae* *herbaceæ*.

guttatus. 1. CISTUS herbaceus exstipulatus, foliis oppositis trinerviis, racemis ebracteatis. Sp. pl. 526.

Cistus

Cistus annuus, foliis radicalibus oppositis lanceolatis trinervis, ramiferis ternatis linearibus. *Sauv. mon/p.*

149.

Cistus flore pallido, punicante macula insignito. *Baub.*

pin. 465. R. Syn. 342.

Cistus annuus flore maculato. *Ger. Em. 1281.*

Cistus annuus flore guttato. *Park. 661.*

Anglis, annual Cistus.

Habitat in pratis arenosis. In the isle of Jersey, on the west side, near Grosnez-castle, Dr. Sherard, *R. Syn.* in Somersetshire, Mr. Brewer. ♂. VI.

** *Stipulatæ suffruticosæ.*

2. *CISTUS suffruticosus procumbens, stipulis lanceolatis, foliis oblongis revolutis subpilosis.* *Sp. pl. 528. themum.*
Cistus stipulis quaternis foliis oblongis utrinque nudis caule procumbente. *Hort. cliff. 206. Roy. lugdb.*

476.

Helianthemum vulgare. *Park. 656. R. Syn. 341.*

Helianthemum anglicum luteum. *Ger. Em. 1282.*

Chamæcistus vulgaris flore luteo. *Baub. pin. 465.*

β *Helianthemum foliis majoribus: flore albo.* *Baub. hist.*
II. 16.

γ *Helianthemum ampliore folio; flore roseo.* *D. Sherard.*

Anglis, dwarf Cistus, or little Sun-flower.

Habitat in montosis siccoribus, præsertim cretaceis.
 4. VII.

3. *CISTUS suffruticosus procumbens stipulatus, foliis surreia-ovato-oblongis subpilosis, petalis lanceolatis.* *Sp. nus.*
pl. 527.

Helianthemum vulgare petalis florum perangustis. *R. Syn. 341. Dill. elth. 177. t. 145. f. 174.*

Anglis, narrow-leaved Cistus.

Habitat in pratis prope Croydon invenit D. Du Bois.
R. Syn. 4. VII.

4. *CISTUS suffruticosus stipulatus procumbens, foliis poliifolius.*
oblongo-ovatis incanis, petalis crenatis.

POLYANDRIA MONOGYNIA.

Chamæcistus montanus polii folio. *D. Pluk. R. Syn.*
342.

Cistus humilis alpinus durior, polii nostratis folio can-
dicante. *Pluk. ph. 23. f. 6.*

Anglis, Mountain dwarf Cistus.

Habitat upon Brent-downs in Somersetshire, near the
Severn Sea, D. Plukenet. *R. Syn.* 4. VII.

*** *Exstipulatæ suffruticæ.*

bifutus. 5. *CISTUS suffruticosus procumbens exstipulatus, foliis
oppositis oblongis revolutis pilosis, floribus racemo-
fisis.*

Helianthemum alpinum folio Pilosellæ minoris Fuchsi.
Bauh. hist. II. 18. R. Syn. 342.

Anglis, hoary dwarf Cistus.

Habitat uno circiter miliari a Kendalia, loco saxoso Be-
tram-Beuke dicto occidentem versus copiose, D. Rich-
ardson. At Buckbarrow-Bank-Scar, betwixt Brig-
steer and Conswick; also on the rocks about Cartmel-
Wells in Lancashire, plentifully, observed by Mr.
Fitz-Roberts. 4. VII.

*** *Flores polypetali.*

N Y M P H Æ A. 579.

*Cor. polypetala. Cal. tetra f. pentaphyllus. Baccæ mul-
tilocularis, truncata.*

lutea. 1. *NYMPHÆA calyce magno pentaphyllo. Fl. lapp.
218. suec. 469. Sp. pl. 510.*
Nymphæa lutea. Ger. Em. 819. R. Syn. 368.
Nymphæa major lutea. Bauh. pin. 131. Park. 1252.
Anglis, yellow Water Lilly.
Habitat in fluviis stagnis, fossis; inter Rotherhithe et
Deptford. 4. VIII.

a!ba. 2. *NYMPHÆA foliis cordatis integerrimis, calyce qua-
drifido. Sp. pl. 510. Fl. suec. 470.*
*Nymphæa calyce tetraphyllo, corolla multiplici. Fl.
lapp. 219.*
Nymphæa alba. Ger. Em. 819. R. Syn. 368. major.
Bauh. pin. 193.

Nymphæa

Nymphaea alba major vulgaris. Park. 1251.

Anglis, white Water Lilly.

Habitat in fluviis et stagnis sed rarius. 4. VII.

TRIGYNI A.

DELPHINIUM. 602.

*Cal. nullus. Petala quinque. Nectarium bifidum,
pone cornutum.*

I. DELPHINIUM nectariis monophyllis caule subdivi- *Consolida.*
so. *Syst. nat. Fl. suec. 475. Sp. pl. 530.*

*Delphinium segetum, flore cœruleo. Tourn. 426. R.
Syn. 273.*

*Consolida regalis arvensis, flore cœruleo. Bauh. pin.
142.*

Consolida regalis sylvestris. Ger. Em. 1083.

Anglis, wild Larkspur.

*Habitat in arvis. Found in great plenty by Mr. J. She-
rard, amongst the corn, in Swafham-field, in Cam-
bridgeshire. R. Syn. O. VI.*

PENTAGYNIA.

AQUILEGIA. 605.

*Cal. o. Petala quinque. Nectaria quinque cornicu-
lata, inter petala. Caps. quinque distinctæ.*

I. AQUILEGIA nectariis incurvis. *Mat. med. 272. vulgaris.
Sp. pl. 533. Fl. suec. 478.*

*Aquilegia. Cœsalp. syst. 589. Fuchf. hist. 102. Hort.
cliff. 215.*

*Aquilegia flore simplici. Bauh. hist. III. 484. R. Syn.
273.*

Aquilegia sylvestris. Bauh. pin. 144.

Aquilegia simplex. Park. 1367.

Aquilegia flore cœruleo. Ger. Em. 1093.

Anglis, common Columbines.

Habitat in sylvis et dumetis. 4. VI.

Pharmac. Aquilegiæ Herba, Semina.

2. AQUI-

- alpina.* 2. **AQUILEGIA** nectariis rectis petalo lanceolato brevioribus. *Sp. pl.* 533.
Aquilegia montana magno flore. *Baub. pin.* 144.
pr. 75. *Burs. VII.* 108. *Baub. hist. III.* 484. *R. hist.* 707.
Anglis, Mountain Columbines.
Habitat in sylvis montosis in comitatu Westmorlandico.
4. VI.

HEXAGYNIA.

STRATIOTES. 607.

Spatha diphylla. *Perianthium trifidum.* *Petala tria.*
Baccæ sexlocularis, infera.

- Aloides.* 1. **STRATIOTES** foliis ensiformi-triangulis ciliato-aculeatis. *Sp. pl. Fl. suec.* 479.
Stratiotes foliis aloes, semine longo. *Gundelsh. ap. Jöhren.* *R. Syn.* 290.
Stratiotes five militaris aizoides. *Park.* 1249.
Militaris aizoides. *Ger. Em.* 826.
Aloe palustris. *Baub. pin.* 286.
Anglis, Water Aloe, or Fresh Water Soldier.
Habitat in fluentis pigrioribus et palustribus fossis in insula Eliensi copiose. *R. Syn.* 4. VI.

POLYGYNIA.

ANEMONE. 614.

Cal. o. *Petala sex-novem.* *Sem. plura.*

- nemorosa.* 1. **ANEMONE** seminibus acutis, foliolis incisis, caule unifloro. *Hort. cliff.* 224. *Fl. suec.* 485. *Sp. pl.* 541.
Anemone nemorosa, flore majore. *Baub. pin.* 176.
Anemone nemorum album. *Ger. Em.* 383. *R. Syn.* 259.
Ranunculus nemorosus albus simplex. *Park.* 325.
Anglis, common Wood Anemone.
Habitat in sylvis et ad sepes. 4. IV.

2. **ANE.**

2. ANEMONE seminibus acutis, foliolis incisis, petalum apenninum.
lis lanceolatis numerosis. Sp. pl. 540.

Anemone Geranii robertiani folio cœrulea. Baub.
pin. 174.

Ranunculus nemorosus, flore purpureo-cœruleo. Park.
325. R. Syn. 259.

Ranunculus nemorosus, flore cœruleo, foliis majori-
bus apennini montis. Mentz. pug. t. 8. Tourn.
285.

Anglis, Mountain Wood Anemone.

Habitat in sylvis. In Wimbledon woods, Mr. Rand;
near Harrow-on-the-hill, Mr. Dubois; in a wood
near Lutton-hoe, in Bedfordshire, Mr. T. Knowl-
ton. R. Syn. 4. IV.

3. ANEMONE pedunculo involucrato, pétalis rectis, Pulsatilla
foliis bipinnatis. Fl. suec. 481. Sp. pl. 539.

Pulsatilla folio crassiore et majore flore. Baub. pin.
177. R. Syn. 260.

Pulsatilla vulgaris. Park. 341. Ger. Em. 385.

Anglis, Pasque-flower.

Habitat in pratis montosis. On Gogmagog-hill's; on
Bernack-heath, near Stamford, in great plenty; in
pascuis montosis et siccis juxta Leadstone-hall, supra
lacum loco the Close dicto abunde prope Pontemfrac-
tum, D. Richardson. R. Syn. in Cornbury park,
near Charlbury, Oxfordshire. Blacks. spec. bot.
4. IV.

A D O N I S. 618.

Cal. pentaphyllus. Petala quinque plura absque nec-
tario. Sem. nuda.

1. ADONIS floribus octopetalis, fructibus subcylindri- annua-
cis. Hort. upf. 156. Sp. pl. 547.

Adonis hortensis flore minore atro-rubente. Baub. pin.
178.

Flos Adonis. Park. par. 293. R. Syn. 251.

Flos adonis flore rubro. Ger. Em. 387.

Anglis, Adonis Flower, Pheasant's Eye, red Maithes,
or red Morocco.

Habitat in arvis. In Cantio frequens; prope Acton,
Dr. Watson. O. VI. VII.

RANUNCULUS. 619.

Cal. pentaphyllus. Petala quinque intra unques poro mellifero. Sem. nuda.

*. *Foliis simplicibus.*

✓ *Lingua.* 1. RANUNCULUS foliis lanceolatis, caule erecto. *Fl. suec.* 493. *Sp. pl.* 549.

Ranunculus flammeus major. *Ger. Em.* 961. *R. Syn.* 250.

Ranunculus palustris flammeus major. *Park.* 1215.

Ranunculus longifolius palustris major. *Baub. pin.* 180.

Anglis, great Spearwort.

Habitat in pascuis uidis. In the bogs on Iver-heath, et near Uxbridge. *Blackf. spec. bot.* Inter Rotherhithe Deptford copiose. 4. V.

✗ Flammula. 2. RANUNCULUS foliis ovato-lanceolatis petiolatis, caule declinato. *Fl. suec.* 494. *Sp. pl.* 549.

Ranunculus flammeus minor. *Ger. Em.* 961. *R. Syn.* 250.

Ranunculus flammeus ferratus. *Ger. Em.* 961. *Park.* 1214.

Ranunculus palustris flammeus minor sive angustifolius. *Park.* 1214.

Ranunculus longifolius palustris minor, item palustris ferratus. *Baub. pin.* 180.

β Ranunculus flammeus, latiori plantaginis folio; marginibus pilosis. *Pluk. aln.* 312;

Anglis, lesser Spearwort.

Habitat in paludosis ubique. 4. VI.—IX.

** *Foliis dissectis et divisisis.*

repens. 3. RANUNCULUS calycibus patulis, pedunculis suctatis, stolonibus repentibus, foliis compositis. *Fl. suec.* 505. *Sp. pl.* 554.

Ranunculus foliis ternatis, foliolis petiolatis trifidis incisis, caule productiore multifloro *Hort. cliff.* 230.

Ranunculus pratensis repens. *Park.* 329. *R. Syn.* 247. hirsutus. *Baub. pin.* 179.

Ranunculus

Ranunculus pratensis. *Ger. Em.* 951.
 ♀ Ranunculus repens major. *Pet. h. br. t.* 38. *f.* 8.
Anglis, creeping Crowfoot, or Butter-cups.
Habitat in pratis et pascuis. 4. V.

4. RANUNCULUS calycibus retroflexis, pedunculis *bulbosus*. X
sulcatis caule erecto, foliis compositis. Fl. suec.
504. Sp. pl. 554.

Ranunculus bulbosus. *Ger. Em.* 953. *Park.* 329.
R. Syn. 247.

Ranunculus pratensis radice verticilli modo rotunda.
Baub. pin. 179.

Ranunculus tuberosus. *Dod. pempt.* 431.

♀ Ranunculus rectus foliis pallidioribus hirsutus. *Baub.*
hist. III. 417. *R. Syn.* 247.

Anglis, bulbose Crowfoot, or Butter-cups.

Habitat in pratis et pascuis. 4. V.

Pharmac. Ranunculi bulbosi *Herba*.

5. RANUNCULUS calycibus patulis pedunculis tereti- *acris*.
bus, foliis tripartito multifidis : summis linearibus.
Fl. suec. 507. *Sp. pl.* 554.

Ranunculus foliis peltatis quinquangularibus, multi-
partitis laciniis linearibus. Hort. cliff. 231. *It. oel.*
104.

Ranunculus pratensis erectus acris. *Baub. pin.* 178.
R. Syn. 248. *vulgaris. Park.* 329.

Ranunculus surrectis caulinis. *Ger. Em.* 951.

Anglis, upright Meadow Crowfoot.

Habitat in pratis et pascuis ubique. 4. VI. VII.

6. RANUNCULUS foliis radicalibus reniformibus cre- *auricomus*.
natis incisis ; caulinis digitatis linearibus, caule
multifloro. Hort. cliff. 229. *Fl. suec.* 498. *Sp. pl.*
551.

Ranunculus auricomus. *Ger. Em.* 954.

Ranunculus nemorosus dulcis, II. *Tragi.* *Park.* 326.
R. Syn. 248.

Ranunculus nemorosus vel sylvaticus folio rotundo.
Baub. pin. 178.

Anglis, sweet Wood Crowfoot, or Goldilocks.

Habitat in sylvis et ad sepes frequens. 4. IV.

- sceleratus.* 7. RANUNCULUS foliis inferioribus palmatis, summis digitatis, fructibus oblongis. *Hort. cliff.* 230. *Fl. suec.* 499. *Sp. pl.* 551.
Ranunculus palustris rotundifolius. *Ger. Em.* 962. *R. Syn.* 249.
Ranunculus palustris sardonius lævis. *Park* 1215.
Ranunculus palustris apii folio lævis. *Bauh. pin.* 180.
Anglis, round-leaved Water Crowfoot.
Habitat in aquosis ubique. ○. V. VI.
Pharmac. *Ranunculi palustri Herba.*
- parviflorus.* 8. RANUNCULUS seminibus muricatis, foliis simpli-cibus laciniatis acutis hirsutis, caule prostrato. *Syst. nat.* 1087.
Ranunculus hirsutus annuus flore minimo. *R. Syn. ed. II.* 135. *Pluk. ph. t.* 55. *f. 1.* *Pet. b. br. t.* 38. *f. 9.* *R. Syn.* 248 *t. 12. f. 1.*
Ranunculus arvensis annuus hirsutus, florum omnium minimo. *Hift. ox. II.* 440. *f. 4. t. 28. f. 21.*
Ranunculus annuus foliis Geranii columbini. *Merr. pin.*
Anglis, small-flowered Crowfoot.
Habitat in pratis, et arvis solo glareoso passim. ○. V.
- arvensis.* 9. RANUNCULUS seminibus aculeatis, foliis superioribus decompositis linearibus. *Sp. pl.* 555. *Fl. suec.* 508.
Ranunculus arorum *Park.* 328. *Ger. Em.* 951. *R. Syn.* 249.
Ranunculus arvensis echinatus. *Bauh. pin.* 179. *hift. III.* 859.
Anglis, Corn Crowfoot.
Habitat in arvis. ○. VI.
- hederaceus.* 10. RANUNCULUS foliis subrotundis trilobis integerimis, caule repente *Hort. cliff.* 231 *Roy. lugdb.* 492. *Dalib. paris.* 167. *Gort. gelr.* 325. *Sp. pl.* 556.
Ranunculus aquatilis hederaceus albus. *R. Syn.* 249.
Ranunculus aquaticus hederaceus luteus. *Bauh. pin.* 180.

Ra-

Ranunculus hederaceus rivulorum se extendens, atra macula notatus. Baub. *bifl.* III. 782.

Ranunculus hederaceus aquaticus. Park. 1216.

Ranunculi aquatilis varietas altera. Ger. Em. 830.

Anglis, Ivy-leaved Water Crowfoot.

Habitat in fossis et rivulis lente fluentibus paſſim. 4. V.

II. RANUNCULUS foliis submersis capillaceis, emer- *aquatilis.* fisis peltatis. Sp pl 556.

Ranunculus aquatilis. Ger. Em. 829. R. Syn. 249.

Ranunculus aquaticus, hepaticæ facie. Park. 1216.

Ranunculus aquaticus, folio rotundo et capillaceo. Baub. pin. 180.

β *Ranunculus foliis capillaceis, circumscriptione vaga brevioribus.* Hall. helv. 328.

Ranunculus aquaticus capillaceus. Baub. pin. 180.

Ranunculus aquaticus omnino tenuifolius. Baub. *bifl.* III. 781.

γ *Ranunculus foliis omnibus capillaceis, circumscriptione oblongis.* Roy lugdb. 492..

Millefolium aquaticum, foliis foeniculi, Ranunculi flore et capitulo. Baub pin. 141.

δ *Ranunculus foliis omnibus capillaceis, circumscriptione rotundis.* Hort. cliff. 231. Roy lugdb. 492.

Ranunculus aquaticus albus, circinatis tenuissime divisus foliis, floribus ex alis longis pediculis innixis.

Pluk ph. t. 55. f. 2.

Anglis, Various leaved Water Crowfoot.

Habitat α. β. δ. in fossis et stagnis. γ. in rivulis. 4. IV. V.

F I C A R I A.

CAL. *Perianthium triphyllum: foliolis ovatis, concavis, deciduis.*

COR. *Petala circiter octo lanceolata nitida. Nectarium fovea in singulo petalo supra unguem squamula emarginata clausum.*

STAM. *Filamenta plurima brevissima. Antheræ rectæ, oblongæ, didymæ.*

PIST. *Germina numerosa, in capitulum collecta. Styli nulli. Stigmata reflexa minima.*

POLYANDRIA POLYGYNIA.

PER. nullum. *Receptaculum* pedunculis minutissimis
semina adnectit.

SEM. plurima, oblonga, apice reflexo.

verna.

I. FICARIA. *Dill. cat. giff.* 39.

Ranunculus solii cordatis angulatis petiolatis. *Fl. suec.* 296. *Sp. pl.* 550.

Chelidonium minus. *Ger. Em.* 816. *Park.* 617. *R.* *Syn.* 246.

Chelidonia rotundifolia minor. *Bauh. pin.* 309.

Anglis, Pilewort, or lesser Celandine.

Habitat in pratis et paucis ubique. *4.* IV.

Pharmac. Chelidonii minoris. *Radix, Herba.*

T R O L L I U S. 620.

Cal. o. *Petala* circiter quatuordecim. *Caps.* pluri-
mæ, ovatæ, monospermæ.

europæus. **I.** TROLLIUS corollis conniventibus, nectariis longi-
tudine staminum. *Fl. suec.* 510. *Sp. pl.* 556.

Helleborus flore clauso erecto petiolato, caule simpli-
cissimo. *Fl. suec.* ed. I. 474.

Pseudo-Helleborus ranunculoides, flore globoso. *Hist.* *ox.* III. 467. *f.* 12. *t.* 2. *f.* 2.

Ranunculus globosus. *Ger. Em.* 955. *Park. par.* 218.
R. *Syn.* 272.

Ranunculus flore globoso, quibusdam Trollius flos.
Bauh. hist. III. 419.

Ranunculus montanus, aconiti folio, flore globoso,
Bauh. pin. 182.

Anglis, the Globe-flower, or Locker-gowlons.

Habitat ad latera montium, inque pratis montosis in sep-
tentriонаibus Angliae et Cambriæ copioſiſſime. *4.*
V. VI.

C A L T H A. 623.

Cal. o. *Petala* quinque. *Nectararia* o. *Caps.* plures,
polyspermæ.

palustris. **I.** CALTHA. *Fl. lapp.* 227. *suec.* 511. *Sp. pl.* 558.

Caltha palustris. *Bauh. hist.* III. 419. flore simplici.
pin. 276.

Caltha palustris vulgaris simplex. *Park.* 1213.

Caltha

Caltha palustris major. *Ger. Em.* 817.

Populago. *Tab. ic.* 750. *R. Syn.* 272.

Anglis, Marsh Marigold.

Habitat in aquosis et ad ripas fluviorum. 4. IV.

H E L L E B O R U S. 622.

Cal. nullus. *Petala quinque seu plura.* *Nectararia bi-labiata tubulata.* *Cap. polyspermæ, erectiusculæ.*

1. HELLEBORUS caule multifloro folioso, foliis pedatis. *Sp. pl.* 558.

Helleborus caule inferne angustato multifolio multifloro, foliis caule brevioribus. *Hort. cliff.* 227. *Roy. lugdb.* 484.

Helleborus niger foetidus. *Bauh. pin.* 185.

Helleboraster maximus. *Ger. Em.* 976. *R. Syn.* 271. *f. confiligo.* *Park.* 212.

Anglis, great bastard black Hellebore, Bearsfoot, or Setterwort.

Habitat in pratis poscuis et ad sepes. Near Cherry-Hinton, Cambridgeshire; in the parish of Brundish in Suffolk, Mr. J. Sherard; upon the downs in Sussex, towards Chichester, D. Dillenius. *R. Syn.* 4. III.

2. HELLEBORUS caule multifloro folioso, foliis digittatis. *Sp. pl.* 558.

Helleborus caule æquali folioso, foliis radicalibus caulem tandem superantibus. *Hort. cliff.* 227. *upf.* 158. *Roy. lugdb.* 484.

Helleborus niger hortensis flore viridi. *Bauh. pin.* 185. *R. Syn.* 271.

Helleboraster minor, flore viridante. *Park.* 212.

Helleborastrum. *Ger. Em.* 976.

Anglis, wild black Hellebore.

Habitat in pratis montosis. In Bigwyn closes near Cambridge; about Arundel-castle in Sussex; in Sir Thos. D'Aeth's woods at Knowlton, in East Kent; in the woods near Stoken-church, Oxfordshire. *R. Syn.* circa Ditton et Whitwell, in comitatu Cantabriensi, D. Lyons. 4. IV.

THALICTRUM. 617.

Cal. o. Petala quinque. Semina nuda.

- flavum.* 1. THALICTRUM caule folioso sulcato, panicula multiplici erecto. *Fl. suec.* 488 *Sp. pl.* 546.
Thalictrum majus vulgare. *Park.* 263.
Thalictrum seu Thalitrum majus. *Ger. Em.* 1251.
R. Syn. 203.
Thalictrum majus siliqua angulosa aut striata. *Bauh.*
pin. 336.
Anglis, Meadow Rue.
Habitat in pratis et pascuis humidis et ad ripas fluviorum. 4. VI.
- minus.* 2. THALICTRUM foliis sexpartitis, floribus cernuis,
Sp. pl. 546. *Fl. suec.* 489.
Thalictrum caule folioso æquali, foliolis caulinis acutis, panicula simplici, floribus nutantibus. *It. goth.*
180.
Thalictrum minus. *Ger. Em.* 1251. *Park.* 264.
Bauh. pin. 337. *R. Syn.* 203.
β *Thalictrum montanum minus, foliis latioribus.* *R.*
Syn. 204.
Anglis, the lesser Meadow rue.
Habitat in pratis montosis humidiusculis. On the chalky grounds about Newmarket, Linton, and elsewhere in Cambridgeshire; in comitatibus Eboracenisi, Westmorlandico, Cumberlandico, frequens. 4. VII.
VIII.
- alpinum.* 3. THALICTRUM caule simplicissimo subnudo racemo-simplici laxo terminali. *Fl. suec.* 491. *Sp. pl.*
545.
Thalictrum minimum montanum atro-rubens foliis splendentibus. *R. Syn.* 204. *Boerh. ind. alt.* 44. *ic.*
Thalictrum montanum minimum præcox, foliis splendentibus. *Hist. ox.* III. 325. *f. 9. t. 20. f. 14.*
Anglis, Mountain Meadow-rue.
Habitat in uidis scopulis et ad rivulos in alpibus in Arvonia planta est vulgatissima, D. Lhwyd. *R. Syn.*
4. VI.

CLE.

CLEMATIS. 616.

Cal. o. Petala quatuor. Sem. caudata.

1. CLEMATIS foliis pinnatis : foliolis cordatis scandentibus. *Vitalba.*
Hort. cliff. 225. Roy. lugdb. 486. Hall helv.
334. Gron. virg. 62. Gort. gelr. 315. Sp. pl. 544.
Clematis sylvestris latifolia. *Bauh. pin. 300. f. Vi-*
orna. Park. 380.
Clematis latifolia seu Atragene quibusdam. *Bauh. hist.*
II. 125. R. Syn. 258.
Viorna. *Ger. Em. 736.*
Anglis, great wild Climber, or Travellers Joy.
Habitat in sepibus. h. VII.

Classis

Classis XIV.

D I D Y N A M I A
G Y M N O S P E R M I A.* *Calyces subquinquefidi.*

T E U C R I U M. 625.

Corollæ labium superius (nullum) ultra basin bipartitum, divaricatum ubi stamina.

Scordium. 1. TEUCRIUM foliis oblongis sessilibus dentato-serratis, floribus geminis axillaribus, caule diffuso. Sp. pl. 565. Fl. suec. 513.

Teucrium foliis ovato-lanceolatis ferrulatis sessilibus, floribus sepius binatis. Hort. cliff. 302. Mat. med. 289.

Scordium. Bauh. pin. 247. hift. III. 292. R. Syn. 246.

Scordium majus et minus. Ger. Em. 661.

Scordium legitimum. Park. 111.

Anglis, Water Germaner.

Habitat in palustribus Eliensis insulæ copiose. R. Syn. 24. VIII.

Pharmac. Scordii Herba.

Chamædrys. *2. TEUCRIUM foliis ovatis inciso-crenatis petiolatis, floribus subverticillatis ternis, caulibus procumbentibus. Syft. nat. 1095. Sp. pl. 565.

Chamædrys minor repens. Bauh. pin. 248.

Chamædrys major latifolia. Ger. Em. 616.

Anglis, Germaner.

Habitat on the ruins of Winchelsea castle. R. Syn. 231. 24. V. VI.

Pharmac. Chamædryos Herba.

3. TEU-

3. TEUCRIUM foliis trifidis linearibus integerrimis, *Chamæ-*
floribus sessilibus lateralibus solitariis, caule diffuso. pitys.
Sp. pl. 562.
Chamæpitys vulgaris. Park. 283. R. Syn. 244.
Chamæpitys lutea vulgaris s. folio trifido. Baub. pin.
 249.
Chamæpitys mas. Ger. Em. 525.
Anglis, Ground-pine.
Habitat in agris restilibus. On the lays about the bor-
ders of Triplow-heath in Cambridgeshire; about
Rochester, Dartford, &c. R. Syn. O. VI. VII.
Pharmac. Chamæpityos Herba.
4. TEUCRIUM foliis cordatis serratis petiolatis, race- *Scorodo-*
mis lateralibus secundis, caule erecto. Sp. pl. 564. nia.
Scorodonia s. Salvia agrestis. Ger. Em. 626. R. Syn.
 245.
Scorodonia s. Scordium alterum quibusdam et Salvia
agrestis. Park. 111.
Scordium alterum seu Salvia agrestis. Baub. pin. 247.
Anglis, Wood Sage.
Habitat in sylvis dumetis et ericetis frequens. 4. VII.
Pharmac. Scorodoniae Herba.

A J U G A. 624.

- Corollæ labium superius minimum. Stamina labio su-*
periore longiora.
1. AJUGA stolonibus reptantibus. *Sp. pl. 561. reptans.*
Ajuga foliis obovatis crenatis, caule simplicissimo,
stolonibus reptatricibus. Gort. gelr. 330.
Bugula. Dod. p. 135. Ger. Em. 631. R. Syn. 245.
Bugula vulgaris. Park. 525.
Consolida media pratensis coerulea. Baub. pin. 260.
Anglis, Bugle.
Habitat in pratis et pascuis humidis. 4. V.
Pharmac. Bugulæ s. consolidæ mediæ Herba.

2. AJUGA tetragono pyramidalis. *Fl. suec. 512. Sp. pyramida-*
lis. pl. 561.

Bugula

Bugula cœrulea alpina. Park. 525. Pluk. ph. t. 18.
f. 3 R. Syn. 245

Confolida media cœrulea alpina. Bauh. pin. 260.
Anglis, Mountain Bugle, or Sicklewort.

Habitat on Carnedd Lhewllyn in Carnarvonshire, Dr.
Johnson. R. Syn. 4. VI.

N E P E T A. 629.

Corollæ labium inferius lacinula intermedia crenata :
faux margine reflexo. *Stamina approximata.*

Cataria. 1. NÉPETA floribus spicatis, verticillis subpedicellatis,
foliis petiolatis cordatis dentato-ferratis. Sp. pl. 570.
Fl. suec. 514.

Nepeta major vulgaris. Park. 38. R. Syn. 237.

Mentha cataria vulgaris et major. Bauh. pin. 228.

Mentha felina f. cataria. Ger. Em. 682.

Anglis, Nap, or Cat-mint.

Habitat in sepiibus. 4. VII.

Pharmac. Nepetæ Herba.

B E T O N I C A. 631.

Cal. aristatus. *Corollæ labium superius adscendens*
planiusculum ; tubus cylindricus.

officinalis. 1. BETONICA spica interupta, corollarum lacinia la-
bii intermedia emarginata. Roy. lugdb. 316. Sp. pl.
573. Fl. suec. 515.

Betonica. Ger. Em. 714. R. Syn. 238. purpurea.
Bauh. pin. 235.

Betonica vulgaris flore purpureo. Park. 614.

Anglis, Wood Betony.

Habitat in ericetis et sylvis. 4. VII. VIII.

Pharmac. Betonicæ Herba, Flores.

Hirta. 2. BETONICA verticillata villosa, calycibus subspino-
fis. Syst. nat. 1097.

Betonica foliis inter verticillos diffitos brevibus in a-
ristam terminatis integris. Hall. helv. 646.

Sideritis arvensis latifolia hirsuta lutea. R. Syn. 242.

Sideritis lutea. Pet. b. br. t. 33. f. 10.

Anglis, yellow Betony.

Habitat

Habitat in arvis. In the west riding of Yorkshire, about Wakefield, Darfield, Sheffield, &c. among the corn plentifully. R. Syn. ⑧. VIII.

MENTHA. 633.

Corolla subæqualis, quadrifida : lacinia latiore emarginata. *Stamina* erecta, distantia.

1. MENTHA spicis solitariis interuptis, foliis lanceolatis serratis sessilibus. Sp. pl. 576. Hort. cliff. 306.

Mentha angustifolia spicata. Baub. pin. 227.

Mentha angustifolia spicata, glabra, folio rugosiore, odore graviore. R. Syn. 233.

♂ Mentha spicata angustifolia, glabra, spica latiore. D. Dale. R. Syn. 233.

γ Mentha spicata glabra, latiore folio. D. Dale. R. Syn. 234.

Anglis, Spear-mint.

Habitat ad ripas fluviorum Found by Mr. Dale, in Essex, by Bocking river side, below the fulling-mill; on the river Medway in Kent, near Maidstone, D. Plukenet. R. Syn. 4. VIII.

Pharm. Mentha vulgaris Herba.

2. MENTHA floribus spicatis consertis, foliis oblongis longifolia. serratis tomentosis sessilibus.

Mentha sylvestris folio longiore. Baub. pin. 227.

Menthastrum spicatum folio longiore candicante. Baub. hift. III. 2. 221. R. Syn. 234.

β Menthastrum aquatici genus hirsutum spica latiore. Baub. hift. III. 2. 222. R. Syn. 234.

Anglis, long-leaved Horse-mint.

Habitat in palustribus et aquosis. 4. VIII.

Pharmac. Menthastrum Herba.

3. MENTHA floribus spicatis, foliis rotundis crenatis rotundifolia. rugosis sessilibus.

Mentha sylvestris rotundiore folio. Baub. pin. 227.

Menthastrum folio rugoso rotundiore spontaneum, flore spicato, odore gravi. Baub. hift. III. 2. 219.

R. Syn. 234.

Menthastrum. Ger. Em. 683.

Anglis,

Anglis, round-leaved Horse-mint.

Habitat in aquosis sed rarius. In Hornsey and Harefield church yards. Blacks. spec. bot. 4. VIII.

piperita. 4. MENTHA floribus capitatis solitariis terminalibus, foliis ovato-oblongis serratis, staminibus corolla brevioribus. *Syst. nat.* 1099.

Mentha floribus capitatis, foliis lanceolatis serratis subpetiolatis. *Sp. pl.* 576.

Mentha spicis brevioribus et habitioribus, foliis Men-thæ fuscæ, sapore fervido piperis. *R. Syn.* 234. t. 10. f. 2.

Mentha piperata acuta. *Pet. h. br. t.* 31. *f.* 10.

β Mentha piperata obtusa. *Pet. h. br. t.* 31. *f.* 11.

Anglis, Pepper-mint.

Habitat in aquosis et rivulos; inter Newington et Hornsey, D. Alchorne. 4. VIII.

Pharmac. Menthæ piperitæ Herba.

gentilis. 5. MENTHA floribus verticillatis, foliis ovatis acutis serratis staminibus corolla brevioribus. *Sp. pl.* 577.

Mentha fusca f. vulgaris. *Park.* 31. *R. Syn.* 232.

Mentha cardiaca. *Ger. Em.* 680.

Mentha hortensis verticillata, ocygni odore. *Bauh. pin.* 227.

β Mentha arvensis verticillata folio rotundiore, odore aromatico. *R. Syn.* 239.

Anglis, Red Mint.

Habitat in aquosis. 4. VIII.

verticilla-ta. 6. MENTHA floribus verticillatis, pedunculis pilosis, foliis ovatis ferratis, staminibus corolla longioribus. *Syst. nat.* 1099.

Mentha verticillata. *Riv. irr. mon. ic.* *R. Syn.* 232.

Mentha crispa. *Park.* 31. *verticillata*. *Bauh. pin.* 227.

Mentha sativa rubra. *Ger. Em.* 680.

Anglis, Curled Mint.

Habitat in palustribus et ad ripas fluviorum. In Peckham fields, and on Hackney river, near the ferry-house. *R. Syn.* 4. VIII.

7. MENTHA floribus verticillatis, foliis ovatis acutis *arvensis*.
 serratis staminibus corollam æquantibus. *Hort. cliff.*
307. Sp. pl. 577. Fl. suec. 516. Dalib. paris. 178.
 Mentha arvensis verticillata. *Baub. pin. 229.*
 Mentha f. *Calamintha aquatica*. *Ger. Em. 684. R.*
Syn. 232.
Anglis, Corn Mint.
Habitat in arvis humidis. 4. VIII. IX.
8. MENTHA floribus verticillatis, foliis lanceolato-*o-**exigua*.
 vatis glabris acutis integerrimis. *Cent. pl. 159. Syst.*
nat. 1099.
 Mentha aquatica exigua. *Trag. lib. i. c. 6. ic. R.*
Syn. 232.
 Mentha arvensis verticillata f. *aquatica Belgarum Lo-*
beliae. Park. 36.
Anglis, smooth Mint.
Habitat ad rivelos. In the hop-ground at Bocking
plentifully, Mr. Dale; by the side of the new-river,
near the upper end of Stoke-Newington, Mr. Buddle.
R. Syn. 4. VIII.
9. MENTHA floribus capitatis, foliis ovatis ferratis pe- *aquatica*.
 tiolatis, staminibus corolla longioribus. *Sp. pl. 576.*
 Mentha aquatica f. *Sisymbrium*. *Ger. Em. 684. Baub.*
bijt. III. 223. R. Syn. 233.
 Mentha aquatica rubra. *Park. 1243.*
 Mentha rotundifolia palustris f. *aquatica major*. *Baub.*
pin. 227.
 ♂ Mentha Sisymbrium dicta hirsuta glomerulis ac foliis
 minoribus ac rotundioribus. *R. Syn. 233 t. 10.*
f. 1.
 ♀ *Sisymbrium hirsutum. R. Syn. 233.*
Anglis, Water Mint.
Habitat in aquosis et ad ripas fluviorum. 4. VII.
VIII.
Pharmac. Menthæ aquatice f. Sisymbrii Herba.
10. MENTHA floribus capitatis globosis, foliis ovatis ser- *hirsuta*.
 ratis, staminibus corolla brevioribus.
Anglis, round-headed Mint.

Habitat

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

Habitat in aquosis prope Marybone copiose; et inter Newington et Hornsey. 4. VIII.

- Pulegium.* 11. **MENTHA** floribus verticillatis, foliis ovatis obtusis subcrenatis, caulis subteretibus repentibus.
Hort. cliff. 307. *Sp. pl.* 577. *Dalib. paris.* 178.
Gort. gelr. 344.
Pulegium. *Baub. hist.* III. 256. *R. Syn.* 235.
Pulegium vulgare. *Park* 29.
Pulegium regium. *Ger. Em.* 671.
Pulegium latifolium. *Baub. pin.* 222.
Anglis, Pennyroyal.
Habitat in inundatis. 4. VIII. IX.
Pharmac. *Pulegii Herba.*

GLECHOMA. 634.

Antherarum singulum par in formam crucis connivens.
Cal. quinquefidus.

- hederacea.* 1. **GLECHOMA** foliis reniformibus crenatis. *Hort. cliff.* 307. *Fl. suec.* 518. *Sp. pl.* 578.
Hedera terrestris. *Ger. Em.* 856. *vulgaris.* *Park.* 676.
Baub. pin. 306.
Calamintha humilior, folio rotundiore. *Tourn.* 197.
R. Syn. 243.
Hedera terrestris montana. *Baub. pin.* 306. *Park.* 677.
Anglis, Ground-Ivy.
Habitat in umbrosis et ad sepes. 4. V.
Pharmac. *Hederæ terrestris Herba.*

- arvensis.* 2. **GLECHOMA** foliis cordatis oblongis crenatis, caule hispido erecto. *Sp. pl.* 578.
Sideritis calycibus subinermibus hispidis. *Fl. suec.* 488.
Sideritis humilis lato obtuso folio. *Ger. Em.* 699.
R. Syn. 242.
Sideritis Hederulæ folio. *Park.* 587.
Sideritis alsines trixaginis folio. *Baub. pin.* 233.
Anglis, upright Ground-Ivy.
Habitat in arvis. ①. VIII.

L A

arvensis. 2. *Glechoma* Ge^a.

Stachys arvensis. Lin.

L A M I U M. 636.

Corollæ labium superius integrum, fornicatum; labium inferius bilobum; faux utrinque margine dentata.

1. LAMIUM foliis cordatis acuminatis ferratis petiola-*album*.
tis. *Hort. cliff.* 314. *Sp. pl.* 579. *Fl. suec.* 520.

Lamium album. *Ger. Em.* 782. *R. Syn.* 240.

Lamium album non foetens, folio oblongo. *B. pin.*
231.

Lamium vulgare album s. Archangelicum flore albo.
Park. 604.

Anglis, white dead Nettle, or Archangel.

Habitat *ad sepes, et in cultis, ruderatis.* ☉ V.

Pharmac. Lamii albi *Herba Flores.*

2. LAMIUM foliis cordatis obtusis petiolatis. *Hort. rubrum.*
cliff. 314. *Fl. suec.* 521. *Sp. pl.* 579.

Lamium rubrum. *Ger. Em.* 703. *R. Syn.* 240.

Lamium vulgare folio subrotundo, flore rubro. *Park.*
604.

Lamium purpureum foetidum, folio subrotundo s.
Galeopsis dioscoridis. *Bauh. pin.* 230.

β Lamium rubrum minus, foliis profunde incisis. *R.*
Syn. 240.

Anglis, red Archangel, or dead Nettle.

Habitat *in ruderatis et arvis.* ☉ V.

Pharmac. Lamii rubri *Folia Flores.*

3. LAMIUM foliis floribus sessilibus amplexicaulibus *amplexicaulis*.
obtusis. *Hort. cliff.* 314. *Sp. pl.* 579. *Fl. suec.* 522. *caule.*

Lamium folio caulem ambiente majus et minus.

Bauh. pin. 231. *R. Syn.* 240.

Alfine hederula altera. *Ger. Em.* 616.

Alfine hederulæ folio major. *Park.* 762.

Anglis, great Henbit.

Habitat *in arvis.* ☉ VI.

G A L E O P S I S. 637.

Corollæ labium superius crenatum, fornicatum; labium inferius supra bidentatum.

1. GALEOPSIS internodiis caulinis æqualibus: verti *Ladanum.*
cillis omnibus remotis. *Sp. pl.* 579. *Fl. suec.* 524.

Q

Sideritis

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

Sideritis arvensis rubra. Park. 587. R. Syn. 242.
 Sideritis VII. Ger. Em. 699.
 Sideritis arvensis angustifolia rubra. Bauh. pin. 233.
Anglis, narrow-leaved Allheal.
 Habitat in arvis. O. VII. VIII.

- Tetrabit. 2. GALEOPSIS internodiis caulinis superne incrassatis,
 verticillis summis subcontiguis. Sp. pl. 579. Fl.
 suec. 523.
 Lamium cannabino folio vulgare. R. Syn. 240.
 Cannabis spuria. Ger. Em. 709. Park. 599.
 Urtica aculeata, foliis ferratis. Bauh. pin. 232.
 β Lamium cannabinum floribus albis, verticillis purpu-
 rascentibus. R. Syn. 241.
 γ Cannabis spuria flore albo magno, eleganti. Merr. pin.
 δ Lamium cannabino folio, flore amplio luteo : labio
 purpureo. R. Syn. 241.
Anglis, Nettle-hemp, or Hemp-leaved dead Nettle.
 Habitat in arvis. δ inter segetes prope Kighley, et per
 totum Cravoniæ tractum ; Dr. Richardson. R. Syn.
 O. VIII.

- Galeobdo- 3. GALEOPSIS verticillis sexfloris : involucro tetra-
 lon. phyllo. Sp. pl. 580. Fl. suec. 525.
 Leonurus foliis ovatis ferratis acutis. Hort. cliff. 313.
 Lamium luteum. Ger. Em. 671. Park. 606. R.
 Syn. 240.
 Lamium folio oblongo, luteum. Bauh. pin. 231.
Anglis, yellow Nettle-hemp.
 Habitat in sylvis sepibus et umbrosis. 4. V.

S T A C H Y S. 638.

Corollæ labium superius fornicatum ; labium inferius
 lateralibus reflexum : intermedia majore emarginata.
 Stamina deflorata versus latera reflexa.

- germani- I. STACHYS verticillis multifloris, foliorum ferraturis
 ea. imbricatis caule lanato. Sp. pl. 581.
 Stachys Fuchii. Bauh. hist III. 319. Ger. Em. 795.
 R. Syn. 239.
 Stachys major germanica. Bauh. pin. 236.
Anglis, base Horehound.

Habita-

arvensis. vide Glechoma arvensis.

Habitat in sepibus. Nigh Witney park in Oxfordshire, and thereabout plentifully. R. Syn. Found by Dr. Richardson four miles south of Grantham, near the London road opposite Easton, the seat of H. Chumley, Esq; 4. VII.

2. STACHYS verticillis sexfloris, foliis cordatis petio- *sylvatica*, latis. Sp. pl. 580. Fl. suec. 526.

Galeopsis legitima Dioscoridis. Park. 608. R. Syn. 237.

Galeopsis vera. Ger. Em. 709.

Lamium maximum sylvaticum foetidum. Bauh. pin. 231.

3. Lamium sylvaticum spicatum foetidum, folio angulosa minus. Pluk. alm. 128.

Anglis, hedge Nettle.

Habitat in sylvis et sepibus. . VII. VIII.

3. STACHYS verticillis sexfloris, foliis linear-lanceo- *palustris*, latis semiamplexicaulibus. Sp. pl. 580. Fl. suec.

528.

Stachys palustris foetida. Bauh. pin. 236.

Sideritis anglica strumosa radice. Park. 587. R. Syn. 242.

Panax coloni. Ger. Em. 1005.

Anglis, Clown's Allheal.

Habitat in aquosis, et ad ripas fluviorum. 4. VIII.

B A L L O T A. 639.

Cal. hypocrateriformis, quinquedentatus, decemstriatus. *Corolla* labium superius crenatum concavum.

1. BALLOTA foliis cordatis indivisis serratis, calycibus *nigra*, acuminatis. Sp. pl. 582. Fl. suec. 529.

Ballota Matth. 825. R. Syn. 244.

Marrubium nigrum. Ger. Em. 701.

Marrubium nigrum foetidum, Ballotte dictum. Park. 1230.

Marrubium nigrum foetidum, Ballotte Dioscordis. Bauh. pin. 230.

3. Ballota foliis cordatis indivisis serratis, calycibus subtruncatis. Fl. suec. 530.

Ballota flore albo. Tourn. 185.

Anglis, stinking Horehound.
Habitat in ruderatis. ♂. VII.
Pharmac. Marrubii nigri Herba.

M A R R U B I U M. 640.

- Cal.* hypocrateriformis, rigidus, decemstriatus. *Corolla* labium superius bifidum, lineare, rectum.
- vulgare.* I. MARRUBIUM dentibus calycinis setaceis uncinatis. *Sp. pl.* 585. *Mat. med.* 305. *Hall. helv.* 648. *Marrubium album.* *Baub. hist.* III. 316. *Ger. Em.* 693. *R. Syn.* 239. *Marrubium album vulgare.* *Baub. pin.* 230. *Park.* 44. *Anglis*, white Horehound. Habitat in ruderatis et ad vias; in ericeto Hampstediano. ♀. VII. *Pharmac.* *Marrubii albi.* f. *Prassii Herba.*

L E O N U R U S. 641.

Antheræ glandulis nitidis adspersæ.

- Cardiaca.* I. LEONURUS foliis caulinis lanceolatis trilobis. *Hort. cliff.* 313. *Fl. suec.* 532. *Sp. pl.* 584. *Cardiaca.* *Baub. hist.* III. 320. *Park.* 41. *R. Syn.* 239. *Marrubium cardiaca dictum.* *Baub. pin.* 230. *Anglis*, Mother wort. Habitat in finetis et ruderatis passim. ♂. VII. *Pharmac.* *Cardiacæ Herba.*

** *Calycis bilabiati.*

C L I N O P O D I U M. 644.

Involucrum multifidum, verticello subiectum.

- vulgare.* I. CLINOPODIUM capitulis subrotundis hispidis, bracteis setaceis. *Sp. pl.* 587. *Clinopodium organo simile.* *Baub. pin.* 224. *R. Syn.* 239. *Acinos.* *Ger. Em.* 675. f. *clinopodium majus.* *Park.* 22. *Anglis*, great wild Basil. Habitat ad sepes et in pratis aridis. ♀. VII.

O R I

ORIGANUM. 645.

Strobilus tetragonus, spicatus, calyces colligens.

1. ORIGANUM spiciis subrotundis paniculatis conglobatis, *vulgare.*
meratis, bracteis calyce longioribus ovatis. *Sp. pl.*

590. *Fl. suec.* 534.

Origanum vulgare spontaneum. *Bauh. hist. III.* 236.
R. Syn. 236.

Origanum anglicum. *Ger. Em.* 666.

Origanum sylvestre. *Bauh. pin.* 223.

Majorana sylvestris. *Park.* 12.

Anglis, wild Marjoram.

Habitat *ad sepes et in dumetis.* 4. VII.

Pharmac. Origani vulgaris *Herba.*

2. ORIGANUM spicis oblongis aggregatis hirsutis, *fo. onites.*

liis cordatis tomentosiflora. *Sp. pl.* 590.

Origanum onites. *Bauh. pin.* 223. *R. Syn.* 236.

Majorana major anglica. *Ger. Em.* 664.

Majorana latifolia, f. major anglica. *Park* 12.

Anglis, Pot-marjoram.

Habitat *in pratis aridis. On the left hand of the road from Braintree to Raine, beyond the bridge.* Mr.

Dale. *R. Syn.* 4. VIII.

THYMUS. 646.

Calycis bilabiate faux villis clausa.

1. THYMUS floribus capitatis caulinibus repentibus *fo. serpyllum.*
liis planis obtusis basi ciliatis. *Mat. med.* 282. *Sp.*

pl. 590. *Fl. suec.* 535.

Serpyllum vulgare. *Ger. Em.* 570. *Bauh. hist. III.*
269. *R. Syn.* 230.

Serpyllum vulgare minus. *Bauh. pin.* 220. *Park.* 8.

β Serpyllum vulgare, flore albo. *Tourn.* 197.

γ Serpyllum vulgare, flore ampio. *R. Syn.* 230.

δ Serpyllum vulgare majus. *Bauh. pin.* 220.

ε Serpyllum citratum. *Ger. Em.* 575.

ζ Serpyllum angustifolium glabrum. *Bauh. pin.* 220.

η Serpyllum vulgare hirsutum. *R. Syn.* 231.

ϟ Serpyllum villosum fruticosius floribus dilute rubenti-
bus. *R. Syn.* 231.

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

Serpyllum hirsutum, minus, repens, inodorum. *Pluk. atm.* 344.
Anglis, Mother of Thyme, & Lemon Thyme, n Hoary Thyme.
Habitat in montosis ubique. 4. VII. VIII.
Pharmac. Serpylli Herba.

- Acinos.* 2. *THYMUS* floribus verticillatis, pedunculis unifloris, caulibus erectis subramosis, foliis acutis serratis. *Sp. pl.* 591. *Fl suec.* 536.
Acinos multis. *Baub. hist.* III. 259. *R. Syn.* 238.
Ocymum sylvestre. *Ger. Em.* 675.
Clinopodium arvense ocymi facie. *Baub. pin.* 225.
Clinopodium minus f. *vulgare.* *Park.* 21.
Anglis, wild Basil.
Habitat in collibus aridis glareosis et cretaceis passim. ①. VII. VIII.

M E L I S S A. 647.

Cal. aridus, supra planiusculus : lab. superiore ~~subfas-~~
~~in Genra. rufico-patens.~~ *tigato.* *Corollæ* lab. superius fornicatum bifidum ;
labii inferioris lobo medio cordato.

- Calamin-* 1. *MELISSA* pedunculis axillaribus dichotomis longitudo-
tha. ne foliorum. *Sp. pl.* 593.
Calamintha vulgaris. *Park.* 36. *R. Syn.* 243. off.
Ger. Em. 687.
Calamintha vulgaris, vel officinarum Germaniæ. *Baub. pin.* 228.
Anglis, common Calamint.
Habitat ad vias et in agrorum marginibus sed rarius.
4. VIII.
Pharmac. Calaminthæ montanæ Herba.

- nepeta.* 2. *MELISSA* pedunculis axillaribus dichotomis folio
longioribus, caule decumbente. *Sp. pl.* 593.
Calamintha odore Pulegii. *Ger. Em.* 687. *R. Syn.*
243.
Calamintha Pulegii odore f. Nepeta. *Baub. pin.* 228.
Calamintha altera odore Pulegii, foliis maculosis.
Park. 36.
Anglis, Field Calamint.

Habitat

Habitat in marginibus viarum, agrorumque. 4. VIII.
Pharmac. Calaminthæ officinalis Herba.

M E L I T T I S. 650.

Cal., tubo corollæ amplior. *Corollæ* labium superius planum; lab. inferius crenatum. *Antheræ* cruciatæ.

- i. MELITTIS. *Hort. cliff.* 390. *Sp. pl.* 597. *meliffo-*
Melissa Fuchsii. Lob. ic. 515. *Ger. Em.* 690. *R. Syn. phyllum.*

242.

Melissophyllum Fuchsii. Park. 41.

Lamium montanum melissæ folio. Baub. pin. 231.

Anglis, bastard Balm.

Habitat in sylvis et sepibus. In several woods in the west of England, as about Totness in Devonshire, and Haverford-west in Pembrokeshire. *R. Syn.* 4. VI.

P R U N E L L A. 654.

Filamenta bifurca, altero apice antherifera.

- i. PRUNELLA foliis ovato-oblongis petiolatis. *Sp. pl. vulgaris.* 600. *Fl. suec.* 540.

Prunella bracteis cordatis. Hort. cliff. 316.

Prunella. Ger. Em. 631. *R. Syn. 238. vulgaris.* Park. 1680.

Prunella major folio non dissecto. Baub. pin. 260.

Anglis, Self-heal.

Habitat in pratis et pascuis. 4. VIII.

Pharmac. Prunellæ Herba.

S C U T E L L A R I A. 653.

Cal. ore integro, post florescentiam clauso, operculato.

- i. SCUTELLARIA foliis cordato-lanceolatis rugosis, galericulatis, crenatis, floribus axillaribus. *Fl. lapp.* 239. *Hort. lata.* cliff. 316. *Sp. pl.* 599.

Cassida palustris vulgatior flore cæruleo. Tourn. 182.
R. Syn. 244.

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

- Lysimachia cærulea galericulata*, seu *gratiola cærulea*. *Bauh. pin.* 246.
Lysimachia galericulata. *Ger. Em.* 477.
Lysimachia cærulea, f. *latifolia major*. *Park.* 221.
Anglis, Hooded Willow-herb.
Habitat in aquosis et ad ripas fluviorum. 4. VIII.

- minor.* 2. *SCUTELLARIA* foliis cordato-ovatis subintegermis floribus axillaribus.
Cassida palustris minima, flore purpurascente. *Tourn.* 182. *R. Syn* 244.
Lysimachia galericulata minor. *R. Syn. II.* 132.
Gratiola latifolia. *Ger. Em.* 581. f. *nostras minor*.
Park. 221.
Anglis, the lesser hooded Willow-herb.
Habitat in palustribus. 4. VII. VIII.

ANGIOSPERMIA.

* *Calyces bifidi*.

OROBANCHE 697.

Cal. bifidus. *Cor.* ringens. *Capula* unilocularis, bivalvis, polysperma. *Glandula* sub basi germinis.

- major.* 1. *OROBANCHE* caule simplicissimo pubescente, staminibus subexsertis. *Syst. nat.* 1119. *Sp. pl.* 632.
Orobanche major *Garyophyllum olens*. *Bauh. pin.* 87. *R. Syn.* 288.
Rapum Genistæ. *Ger. Em.* 1311. *Park.* 229.
β *Orobanche* flore minore. *Bauh. hist. II.* 781.
Anglis, Broom-rape.
Habitat in pratis siccis. 4. V. VI.

- ramosa.* 2. *OROBANCHE* caule ramoso corollis quinquefidis. *Sp. pl.* 633.
Orobanche ramosa. *Bauh. pin.* 88. *Park.* 1363. *R. Syn.* 288.
Anglis, branched Broom-rape.

Habitat

Habitat in arvis. Found near Beccles in Suffolk, by Mr. J. Sherard. R. Syn. VI.

** *Calyces quadrifidi.*

L A T H R Æ A. 661.

Cal. quadrifidus. Glandula depresso, ad basin suturæ germinis. Caps. unilocularis.

1. LATHRÆA caule simplicissimo, corollis pendulis : *squamata*.
labio inferiore trifido. Sp. pl. 606. Fl. suec. 550. ria.

Anblatum cordi s. Aphyllo. Bauh. hist. II. 783.
R. Syn. 288.

Orobanche radice dentata major. Bauh. pin. 88.
Orobanche radice dentata, s. Dentaria major Matthiolo. Ger. Em. 1322.

Anglis, Tooth-wort.

Habitat in umbrosis et ad radices montium sed rarius.

In the woods about Maidstone in Kent, Mr. J. Sherard. R. Syn. in a shady lane leading from Harefield town to the river, plentifully. Blacks. spec. bot. in dumetis infra Conzick-scar, prope Kendal in Westmorlandia. 4. IV. V.

B A R T S I A. 657.

Cal. bilobus, emarginatus, coloratus. Corolla minus ipso calyce colorata; labio superiore longiore.
Caps. bilocularis.

1. BARTSIA foliis superioribus alternis serratis, flori-viscosa.
bus lateralibus. Sp. pl. 602.

Euphrasia major lutea latifolia palustris. R. Syn. 285.
Pluk. ph. t. 27. f. 5. Hist. ox. III. 432.

Anglis, Marsh Eye-bright Cow-wheat,

Habitat in palustribus. In boggy and watery places towards the further end of Cornwal. R. Syn. ①. VIII.

2. BARTSIA foliis oppositis cordatis obtuse serratis. alpina.
Hort. cliff. 325. Sp. pl. 602. Fl. suec. 541.

Clinopodium alpinum hirsutum. Bauh. pin. 225.
Pluk. ph. t. 163. f. 5.

Euphrasia

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA.

Euphrasia rubra Westmorlandica, foliis brevibus obtusis. *R. Syn.* 285.

Anglis, Mountain Eye-bright Cow-wheat.

Habitat ad ripas fluviorum, locis apricis duris. Prope Orton vicum in Westmorlandia, juxta rivulum qui decurrit secus viam qua inde Crosbeiam itur. *R. Syn.* 24. VIII.

R H I N A N T H U S. 658.

Cal. quadrifidus, ventricosus. *Caps.* bilocularis, obtusa, compressa.

Crista galli. 1. *RHINANTHUS* corollum labio superiore compresso breviore. *Fl. lapp.* 248. *Sp. pl.* 603. *Fl. suec.* 542. *Pedicularis* f. *Crista galli lutea*. *Park.* 713. *R. Syn.* 284.

Pedicularis pratensis lutea sive *Crista galli*. *Baub. pin.* 163.

Crista galli. *Ger. Em.* 1071.

β *Pedicularis major angustifolia ramosissima*, flore minore luteo, labello purpureo. *R. Syn.* 284.

Anglis, yellow Rattle, or Cock's-comb.

Habitat in pratis et pascuis. ⊖. VI. VII.

E U P H R A S I A. 659.

Cal. quadrifidus, cylindricus. *Capsula* bilocularis, ovato-oblonga. *Antheræ inferiores altero lobo basi spinosa*.

officinalis. 1. *EUPHRASIA* foliis ovatis argute dentatis. *Sp. pl.* 604. *Fl. suec.* 543.

Euphrasia. *Baub. hist.* III. 432. *Ger. Em.* 563. *R. Syn.* 284.

Euphrasia vulgaris. *Park.* 1329.

Euphrasia officinarum. *Baub. pin.* 233.

Anglis, Eye-bright.

Habitat in pratis et pascuis. ⊖. VIII. IX.

Pharmac. *Euphrasiæ Herba*.

odontites. 2. *EUPHRASIA* foliis linearibus: omnibus ferratis. *Hort. cliff.* 326. *Roy. lugdb.* 299. *Sp. pl.* 604.

Euphrasia

Euphrasia pratensis rubra. *Bauh. pin.* 234. *R. Syn.*
284. *major.* *Park.* 1329.
Crataegonon Euphrasine. *Ger. Em.* 91.
Anglis, red Eye-bright.
Habitat in arvis et pascuis. ☽. VIII. IX.

M E L A M P Y R U M. 660.

Cal. quadrifidus. *Cor.* labium superius compressum,
marginē replicato. *Caps.* bilocularis obliqua, hinc
dehiscens. *Sem.* duo, gibba.

1. MELAMPYRUM spicis quadrangularibus compac- *cristatum.*
tis obtusis imbricatis. *Sp. pl.* 605. *Fl. suec.* 545.
Melampyrum cristatum, flore albo et purpureo. *Bauh.*
hjst. III. 440. *R. Syn.* 286.
Melampyrum luteum angustifolium. *Bauh. pin.* 234.
Anglis, crested Cow-wheat.
Habitat in sylvis Cantabrigiensibus et Bedfordiensibus
copiose. *R. Syn.* ☽. VII.
2. MELAMPYRUM spicis conicis laxis laceris. *Sp. pl. arvense.*
605. *Fl. suec.* 511.
Melampyrum purpurascente coma. *Bauh. pin.* 234.
R. Syn. 286.
Anglis, purple Cow-wheat.
Habitat in arvis. In the corn, on the right hand, just
before you come to Lycham in Norfolk. *R. Syn.* On
a hill at Horsley bath, near Beeston-castle, Cheshire,
Mr. Vernon. *Blackf. spec. bot.* ☽. VII.
3. MELAMPYRUM florū conjugationibus remotis, *pratense.*
corollis clausis. *Fl. suec.* 548. *Sp. pl.* 605.
Melampyrum latifolium flore albo; labio inferiore
duabus maculis luteis distincto. *Hjst. pl. par.* *R.*
Syn. 286.
Anglis, Meadow Cow-wheat.
Habitat in pratis et pascuis. In the wood by Dr. Rich-
ardson's house at North Bierley. *R. Syn.* ☽. VII.
VIII.

4. ME-

- sylvaticum.* 4. MELAMPYRUM corollis hiantibus. *Sp. pl.* 605.
Fl. suec. 549.
 Melampyrum sylvaticum flore luteo, sive Satureja lutea sylvestris. *Baub. hist.* III. 441. *R. Syn.* 286.
 Melampyrum luteum latifolium. *Baub. pin.* 234.
 Cratægonon album. *Ger. Em.* 91.
 Cratægonon vulgare. *Park.* 1326.
Anglis, yellow Cow-wheat.
 Habitat in *sylvis*. ☽. VI. VIII.

*** *Calyses quinquefidi.*

P E D I C U L A R I S. 664.

Cal. quinquefidus. *Caps.* bilocularis, mucronata, obliqua. *Semina* tunicata.

- sylvatica.* 1. PEDICULARIS caule ramoso, calycibus oblongis angulatis lœvibus, corollis labio cordato. *Sp. pl.* 607. *Fl. suec.* 552.
 Pedicularis caule ramoso, floribus solitariis, calycibus quinquefidis crenatis. *Fl. suec.* I. 504.
 Pedicularis. *Ger. Em.* 1071. pratensis purpurea. *Baub. pin.* 163.
 Pedicularis pratensis rubra vulgaris. *Park.* 713. *R. Syn.* 284.
Anglis, common Louse-wort.
 Habitat in *pratis et ericetis uliginosis*. 4. V. VI.

- palustris.* 2. PEDICULARIS caule ramoso, calycibus calloso-punctatis, corollis labio obliquis. *Sp. pl.* 607. *Fl. suec.* 551.
 Pedicularis caule ramoso erecto, calycibus bifidis crenatis. *Hall. helv.* 621.
 Pedicularis palustris rubra elatior. *R. Syn.* 284.
 Pedicularis danica maxima. *Lob. ill.* 147.
Anglis, Marsh Louse-wort.
 Habitat in *pratis et pascuis humidioribus*. VI.

A N T I R R H I N U M. 668.

Cal. pentaphyllus. Corollæ basis deorsum prominens, nectarifera. *Caps.* bilocularis.

* *Foliis*

* *Foliis angulatis.*

* 1. ANTIRRHINUM foliis cordatis quinquelobis al- *Cymba-*
ternis caulis procumbentibus. *Syst. nat. IIII. laria.*
Hort. cliff. 32. upf. 175. Sp. pl. 612.

Linaria hederaceo folio glabro, f. Cymbalaria. Tourn.
169. R. Syn. 282.

Cymbalaria. Baub. pin. 306.
Anglis, Ivy-leaved Toadflax.

Habitat in muris antiquis circa Londinum frequens. 4.
VI. X.

2. ANTIRRHINUM foliis hastatis alternis, caulis *Elatine.*
procumbentibus, corollis calcaratis. Sp. pl. 612.

Linaria Elatine dicta folio acuminato. R. Syn. 282.
Elatine folio acuminato, in basi auriculato, flore lu-
teo. Baub. pin. 253.

Elatine folio acuminato. Park. 553.

Elatine altera. Ger. Em. 623.

Anglis, sharp-pointed Fluellin.

Habitat in arvis. ①. VIII. X.

Pharmac. Elatines Herba.

3. ANTIRRHINUM foliis ovatis alternis, caulis *spurium.*
procumbentibus, corollis calcaratis. Sp. pl. 613.

Linaria Elatine dicta folio subrotundo. R. Syn. 282.

Elatine folio subrotundo. Baub. pin. 252. Park. 553.

Veronica fæmina Fuchsii, f. Elatine. Ger. Em. 625.

Anglis, round-leaved Fluellin.

Habitat in arvis. ①. VIII.

** *Foliis oppositis verticillatis.*

4. ANTIRRHINUM follis sublinearibus : inferioribus *arvense.*
verticillatis, calycibus piloso-viscidis, floribus spi-
catis, caule erecto. Sp. pl. 614.

Antirrhinum foliis linearibus alternis recurvis, ramis
caule brevioribus. Roy. lugdb. 297.

Linaria arvensis cærulea. Baub. pin. 213. Dill. elth.
199. t. 163. f. 198.

Linaria cærulea foliis brevioribus et angustioribus. R.
Syn. 282.

Anglis, Corn blew Toadflax.

Habitat in arvis et pratis aridis. ①. VII. VIII.

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA.

- repens.* 5. ANTIRRHINUM foliis sublinearibus inferne quaternis calycibus capsulæ æqualibus. *Sp. pl.* 614.
Antirrhinum foliis linearibus alternis sæpius oppositis acuminatis floribus laxè spicatis. *Roy. lugdb.* 297.
Linaria angustifolia, flore cinereo striato. *Dill. elth.* 198. *t.* 163. *f.* 197.
Anglis, creeping Toadflax.
Habitat in Cornubia non longe ab oppido Penryn occidentem versus, in sepibus. *R. Syn.* 4. VIII.

*** *Foliis alternis.*

- monspes-
fulanum.* 6. ANTIRRHINUM foliis linearibus confertis, caule nitido paniculato, pedunculis spicatis nudis. *Roy. lugdb.* 297. *Sp. pl.* 616.
Linaria odorata monspesfulana. *Baub. hist.* III. 459.
R. Syn. 282.
Linaria capillaceo folio odora. *Baub. pin.* 213.
Anglis, sweet-smelling Toadflax.
Habitat in arvis prope Gads-hill, in Cantio. 4. VII.
VIII.
- Linaria.* 7. ANTIRRHINUM foliis lanceolato-linearibus confertis, caule erecto, spicis terminalibus sessilibus, floribus imbricatis. *Sp. pl.* 616.
Linaria lutea vulgaris. *Ger. Em.* 550. *Baub. hist.* III. 456. *R. Syn.* 281.
Linaria vulgaris nostras. *Park.* 458.
Linaria vulgaris lutea flore majore. *Baub. pin.* 212.
β *Peloria.* *Amoen. acad.* I. 282. *t.* 3.
Anglis, common yellow Toadflax.
Habitat in pratis et pascuis sterilioribus β in pratis arenosis prope Clapham, in comitatu Surriensi. 4. VII.
Pharmac. Linariæ Herba.

- minus.* 8. ANTIRRHINUM foliis lanceolatis obtusis alternis, caule ramosissimo diffuso. *Sp. pl.* 617.
Antirrhinum arvense minus. *Baub. pin.* 212.
Antirrhinum minimum repens. *Ger. Em.* 549.
Antirrhinum sylvestre minimum. *Park.* 1334.
Linaria antirrhinum dicta. *R. Syn.* 283.
Anglis, the least Toadflax.
Habitat in arvis solo glareoso. ◎. VI. X.

**** *Corollis*

**** *Corollis biantibus aut ecaudatis, foliis alternis integris.*

*9. ANTIRRHINUM corollis ecaudatis, calycibus rotundatis. *Sp. pl.* 617.

Antirrhinum foliis lanceolatis petiolatis, calycibus brevissimis, racemo terminali. *Vir. cliff.* 61. *Roy. lugdb.* 294.

Antirrhinum majus alterum, folio longiore. *Bauh. pin.* 211.

Antirrhinum purpureum. *Ger. Em.* 549.

Anglis, the greater Snapdragon.

Habitat in muris antiquis; in clivis cretaceis inter Northfleet et Gravesend copiose. 4. VI.

10. ANTIRRHINUM corollis ecaudatis, calycibus orontium. corolla longioribus. *Sp. pl.* 617.

Antirrhinum angustifolium sylvestre. *Bauh. hist.* III. 464. *R. Syn.* 283.

Antirrhinum arvense majus. *Bauh. pin.* 212.

Antirrhinum sylvestre medium. *Park.* 1334.

Antirrhinum minus. *Ger. Em.* 549.

Anglis, the least Snapdragon, or Calf's-snout.

Habitat in arvis. ①. VII. VIII.

SCROPHULARIA. 674.

Cal. quinquefidus. *Corolla* subglobosa, resupinata. *Caps.* bilocularis.

1. SCROPHULARIA foliis cordatis basi transversis, nodosa. caule obtusangulo. *Sp. pl.* 619.

Scrophularia major. *Ger. Em.* 715. *R. Syn.* 283.

Scrophularia vulgaris. *Park.* 610.

Scrophularia nodosa foetida. *Bauh. pin.* 235.

Anglis, knobby-rooted Fig-wort.

Habitat in sylvis et sepibus humidis. 4. VII.

Pharmac. *Scrophulariæ Folia, Radix.*

2. SCROPHULARIA foliis cordatis petiolatis decurrentibus, caule membranis angulato, racemis terminalibus. *Sp. pl.* 620.

Scrophularia aquatica major. *Bauh. pin.* 235. *R. Syn.* 283.

*Betonica aquatica. Ger. Em. 715. major. Park. 613.
Anglis, Water Fig-wort, or Betony.*

Habitat in aquosis. 4. VII.

*Pharmac. Scrophulariæ Δ. f. Betonicæ aquaticæ
Folia.*

scorodonia. 3. *SCROPHULARIA* foliis cordatis duplicato-serratis,
racemo composito. *Roy. lugdb. 296. Sp. pl. 620.*

*Srophularia scorodoniae folio. Hort. R. Bl. Hist. ox.
II. 482. Pet. h. br. t. 35. f. 11. R. Syn. 283.*

*Scrophularia melissæ folio. Tourn. 166.
Anglis, Balm-leaved Fig-wort.*

*Habitat ad sepes et rivulos. Found near the sea-shore
about St. Ives in Cornwal by Mr. Ed. Lhwyd. R.
Syn. 4. VIII. Pluk. Alm. 338. t. 59. f. 5.*

vernalis. *4. *SCROPHULARIA* foliis cordatis, pedunculis axil-
laribus solitariis dichotomis. *Sp. pl. 620. Roy.
lugdb. 293.*

*Scrophularia flore luteo. Ger. Em. 717. Bauh. pin.
236. pr. 112. Park. 610.*

Anglis, yellow Fig-wort.

*Habitat ad sepes prope Mitcham, in comitatu Surrien-
si, copiose. 3. IV. V.*

D I G I T A L I S. 676.

*Cal. quinquepartitus. Cor. campanulata, quinquefi-
da, ventricosa. Caps. ovata bilocularis.*

purpurea. 1. *DIGITALIS calycinis foliolis ovatis acutis, corollis
obtusis labio superiore integro. Hort. upf. 178. Sp.
pl. 621.*

*Digitalis purpurea. Bauh. hist. II. 812. Ger. Em.
790. R. Syn. 283.*

Digitalis purpurea, folio aspero. Bauh. pin. 243.

Digitalis purpurea vulgaris. Park. 1653.

β *Digitalis alba, folio aspero. Bauh. pin. 243.
Anglis, purple Fox-glove.*

Habitat ad vias et sepes passim. 3. VII.

Pharmac. Digitalis Folia, Flores.

SIBTHORPIA. 693.

Cal. quinquepartitus. *Corolla* quinquepartita æqualis.

Stam. paribus remotis. *Caps.* compressa, orbicularis, bilocularis : dissepimento-transverso.

- I. SIBTHORPIA foliis reniformi-subpeltatis crenatis. *europæa.*
Sp. pl. 631.

Al sine spuria pusilla repens foliis saxifragæ aureæ. *Cat.*
pl. ang. *Pluk. pb. t. 7. f. 6.* *R. Syn.* 352.

Chrysosplenium cornubiense. *Pet. herb. br. t. 6. f. 11.*
Anglis, bastard Money-wort.

Habitat ad rivulos et scaturagines. In Cornubia et
Devonia frequens. *R. Syn.* circa Longfledale in
Westmorlandia. 4. VIII.

LIMOSELLA. 694.

Cal. quinquefidus. *Cor.* quinquefida, æqualis. *Stamina* per paria approximata. *Caps.* unilocularis,
bivalvis, polyspernia.

- I. LIMOSELLA. *Fl-lapp.* 249. *suec.* 563. *Sp. pl.* 631. *aquatica.*
Plantaginella palustris. *Bauh pin.* 190. *R. Syn.* 278.
Al sine palustris repens, foliis lanceolatis, floribus per-
exiguis. *Pluk. pb. t. 74. f. 4.*
Anglis, bastard Plantain.
Habitat in inundatis et ubi aquæ pluviales stagnant. 4.
VIII. IX.

R

Classis

Classis XV.

TETRADYNAMIA

S I L I C U L O S A.

* *Silicula integra, nec apice emarginata.*

M Y A G R U M. 713.

- Silicula stylo conico terminata, loculo submonospermo.*
- sativum.* *₁ MYAGRUM siliculis ovatis pedunculatis polyspermis. *Sp. pl.* 641. *Fl. suec.* 564.
Myagrum. Ger. Em. 273. *R. Syn. sativum. Bauh. pin.*
109.
Myagrum sylvestre f. Pseudo-myagrum. Park. 868.
Sesamum. Trag. II. 656.
Camelina sive Myagrion. Dod. pempt. 532.
Anglis, Gold of Pleasure.
Habitat in agris inter Linum sæpe copiose, cum quo ab exteriis terris introductum. *O. VI.*

S U B U L A R I A. 716.

Silicula integra, ovata, valvis ovatis, concavis, disse-
pimento contrariis. Stylus silicula breviore.

- aquatica.* 1. SUBULARIA. *Fl. lapp.* 253. *suec.* 566. *Sp. pl.* 642.
Subularia erecta, junci foliis acutis mollibus. R. Syn.
307.
Juncifolia sub aquis nascens, cochleariae capsulis. R.
Syn. ed. II. 281.
Graminifolia aquatica, thlaspeos capitulis rotundis,
septo medio siliculam dirimente. Pluk. ph. t. 188.
f. 5.
Anglis, Awl-wort.
Habitat sub aquis, solo glareos, in lacu Hibernico
Lough Neagh. R. Syn. 24.

VELLA.

VELLA. 714.

Silicula dissepimento valvulis duplo majore, extra ovato.

1. VELLA foliis pinnatifidis, siliculis pendulis. *Sp. pl. annua.* 641.

Nasturtium sylvestre erucæ affine. *Baub. pin.* 105.
R. Syn. 304.

Nasturtium sylvestre valentinum Clusio. *Baub. hist. II.* 920. *Park.* 830.

Eruca nasturtio cognata tenuisolia. *Ger. Em.* 247.

Anglis, Cressle Rocket.

Habitat on Salisbury-plain, not far from Stonehenge,
Mr. Lawson. *R. Syn.* O. VI.

D R A B A. 717.

Silicula integra, ovali-oblonga : valvis planiusculis :
dissepimento parallelis. *Stylus nullus.*

1. DRABA scapis nudis, foliis subferratis. *Syst. nat. verna.* 1227.

Draba caulis nudis, foliis subdentatis, petalis bi-partitis. *Fl. suec.* 567. *Sp. pl.* 642.

Draba vulgaris caule nudo, polygoni folio hirsuto.
Dill. gen. 122. *Cat. giss* 40.

Paronychia vulgaris *Ger. Em.* 624. *R. Syn.* 292.

Paronychia vulgaris alfines folio. *Park.* 556.

Bursa pastoris minor loculo oblongo. *Baub. pin.* 108.

Anglis, common Whitlow-grass.

Habitat ubique fere in fissioribus. O. IV.

2. DRABA caule ramoso, foliis cordatis dentatis am- *muralis*,
plexicaulibus. *Roy. lugdb.* 333. *It. gotl.* 192. *Fl.*
suec. 569. *Sp. pl.* 642.

Bursa pastoris major loculo oblongo. *Baub. pin.* 108.
pr. 50. *R. Syn.* 292.

Thlaspi veronicæ folio. *Park.* 843. *Th. Robins. H.*
of West. 95.

Anglis, Speedwel-leaved Whitlow-grass.

Habitat in fissuris rupium et pratis montosis in comita-tibus Westmorlandico, et Eboracensi *paffim.* O. f.
♂. V.

TETRADYNAMIA SILICULOSA.

- incana.* 3. *DRABA* foliis caulinis numerosis incanis, filiculis oblongis. *Sp. pl.* 643. *Fl. suec.* 568.
Draba caule ramoso folioso foliis dentatis. *Fl. lapp.* 254.
Lunaria contorta major. *Pet. Herb. br. t.* 48. *y. 3.*
R. Syn. 291.
Lunaria vasculo sub longo intorto. *R. Syn. ed. II.* 164.
Pluk. ph. t. 42. *f. 1.*
β *Paronychiæ* similis sed major, perennis alpina repens.
R. Syn. 292.
Anglis, wreathen-poded Whitlow-grass.
Habitat in fissuris rupium et pratis montosis subhumidis,
in comitatibus Eboracensi, Westmorlandico, Cum-
berlandico, passim et in montibus Arvoniæ. ♂. V.

** *Silicula emarginata* apice.

LEPIDIUM. 717.

Silicula emarginata, cordata, polysperma: valvulis ca-

rinati contrariis.

- latifolium.* 1. *LEPIDIUM* foliis ovato-lanceolatis integris ferratis.
Fl. suec. 571. *Sp. pl.* 644.
Lepidium latifolium. *Baub. pin.* 97. *R. Syn.* 304.
Piperitis s. *Lepidium vulgare.* *Park.* 855.
Raphanus sylvestris officinarum. *Ger. Em.* 241.
Anglis, Dittander, or Pepperwort.
Habitat in pratis et pascuis sed rarius. Near the Hythe
 at Colchester, and at Heybridge near Maldon, by
 the water-side, plentifully; plentifully in the corn be-
 twixt Beningborough and Mitton, in the north riding
 of Yorkshire. *R. Syn.* In the marshes near Grays
 in Essex, Dr. Watson. 4. VI. VII.
Pharmac. Lepidii Herba.

- ruderale.* 2. *LEPIDIUM* floribus diandris apetalis, foliis radica-
 libus dentato-pinnatis, ramiferis linearibus integer-
 rimis. *Hort. cliff.* 331. *Fl. suec.* 572. *Sp. pl.* 645.
Nasturtium sylvestre, osyridis folio. *Baub. pin.* 105.
Park. 829. *R. Syn.* 303. capsulis minimis. *Hijst*
ex. II. 301. *f. 3. t. 19. f. 7.*

Nastur

Nasturtium angustifolium. *Fuchſ. hift.* 307. *Dalech. hift.* 1181.

Thlaspi minus. *Ger. Em.* 263.

Anglis, narrow-leaved wild Cress, or Dittander.

Habitat in maritimis. At Maldon in Essex, Lynne in Norfolk, and Truro in Cornwal. *R. Syn.* ♂. VI.

3. *LEPIDIUM* foliis pinnatis integerrimis, petalis emarginatis calyce minoribus. *Syſt. nat.* 1127. *Fl. suec.*

573. *Sp. pl.* 644.

Nasturtiolum montanum annum tenuissime divisum.

D. Bobart. R. Syn. 304.

Nasturtium pumilum vernum. *Baub. pin.* 105.

Nasturtium petræum annum nostras. *Pluk. ph. t.* 204. *f. 5.*

Cardamine pusilla saxatilis montana discoides. *Col. Ec. I.* 275. *t.* 274.

Anglis, Mountain Dittander.

Habitat on S. Vincent's rock. *R. Syn.* ♂. IV. V.

T H L A S P I. 719.

Silicula emarginata, obcordata, polysperma: valvulis navicularibus, marginato-carinatis.

1. *THLASPI* siliculis subrotundis, foliis sagittatis dentatis incanis. *Fl. suec.* 575. *Sp. pl.* 646. *campestre.*

Thlaspi vulgatum. *Baub. hift. II.* 921. *R. Syn.* 305.

Thlaspi arvense, vaccariæ folio, majus. *Baub. pin.* 106.

Thlaspi vulgatum. *Ger. Em.* 262.

Thlaspi mithridaticum f. *vulgatum.* vaccariæ folio. *Park.* 835.

Anglis, Mithridate, Mustard, or Bastard Cress.

Habitat in arvis solo arenoso. ♂. VI. VII.

Pharmac. *Thlaspeos vulgaris semina.*

2. *THLAPSI* siliculis orbiculatis, foliis oblongis dentatis *arvense.* glabris. *Fl. lapp.* 237. *suec.* 574. *Sp. pl.* 646. *Mat. med.* 323.

Thlaspi arvense, filiquis latis. *Baub. pin.* 105.

Thlaspi Dioscoridis. *Ger. Em.* 262. *R. Syn.* 305.

Thlaspi Drabæ folio. Park. 836.

Anglis, Treacle-mustard, or Penny-cress.

Habitat in arvis sed rarius. ♂. VI. VII.

Pharmac. Thlaspeos semina.

persolia-
tum.

3. *THLASPI siliculis subrotundis, foliis amplexicauli-
bus cordatis subferratis.* Sp. pl. 646.

*Thlaspi foliis radicalibus ovatis, caulinis amplexicau-
libus lanceolatis.* Guett. stamp. 142. *Dalib. paris.*
196.

Thlaspi persfoliatum minus. Bauh. pin. 106. Park.
837. R. Syn. 305.

Thlaspi minus Clufii. Ger. Em. 268.

Anglis, perfoliate Treacle-mustard.

Habitat in pratis montosis. Among the stone-pits be-
tween Whitney and Burford, in Oxfordshire On
moist Limestone pastures in Yorkshire, Westmore-
land, and Cumberland. R. Syn. ♂. VI.

hirtum.

4. *THLASPI siliculis subrotundis pilosis, foliis caulinis
sagittatis hirsutis.* Roy. lugdb. 333. Sauv. monsp.
120. Sp. pl. 646.

Thlaspi vaccariæ incano folio perenne. R. Syn. 305.

Thlaspi capsulis hirsutis. Bauh. hist. II. 922.

Thlaspi villosum, capsulis hirsutis. Bauh. pin. 106.
pr. 212.

Anglis, Perennial Mithridate Mustard.

Habitat in montosis, Cambro-britanniae et alibi observa-
vi. R. Syn. 4. VII.

montanum

5. *THLASPI siliculis obcordatis, foliis integerrimis
glabris: radicalibus cuneiformibus; caulinis am-
plexicaulibus.* Syst. nat. 1128.

*Thlaspi siliculis obcordatis, foliis radicalibus cunei-
formibus integerrimis.* Sp. pl. 647.

Thlaspi foliis globulariæ. Bauh. hist. II. 926. R. Syn.
305.

Thlaspi montanum, glasti folio minus. Park. 842.
Bauh. pin. 106.

Thlaspi alpinum, bellidis cœruleæ folio. Bauh. pin.
106.

Thlaspeos albi supini varietas. Ger. Em. 268.

Anglis,

Anglis, Mountain Mithridate Mustard.

Habitat in *pascuis montosif*. In the pastures about the ebbing and flowing well, a mile from Settle in Yorkshire, towards Ingleborough, and between Malham and Settle. R. Syn. 24. VII.

6. THLASPI siliculis obcordatis, foliis radicalibus pin- *Bursa natifidis*. Sp. pl. 647. *pastoris.*
Bursa pastoris. Bauh. hist. II. 936. Ger. Em. 276.
 R. Syn. 306.
Bursa pastoris major vulgaris. Park. 866.
Bursa pastoris major folio sinuato. Bauh. pin. 108.
 3 *Bursa pastoris minor foliis integris*. Cels. upf. 13.
Anglis, Shepherd's-purse.
 Habitat ubique in agris, cultis, ruderatis, muris viis.
 ☉. III. IV.
 Pharmac. *Bursæ pastoris Herba*.

C O C H L E A R I A. 720.

Silicula emarginata, turgida, scabra : valvulis gibbis obtusis.

1. COCHLEARIA foliis radicalibus subrotundis, cauli- *officinalis*.
 nis oblongis subsinuatis. Fl. lapp. 256. suec. 577.
 Mat. med. 320. Sp. pl. 647.
Cochlearia. Bauh. hist. II. 942. R. Syn. 302. rotundifolia. Ger. Em. 401.
Cochlearia rotundifolia s. Batavorum. Park. 285.
Cochlearia folio subrotundo. Bauh. pin. 110.
 3 *Cochlearia minor rotundifolia nostras*. Park. 286.
Anglis, common or Garden Scurvygras.
 Habitat in littoribus maritimis, et in montosis. Near Castleton in the Peak, upon Penigent and Ingleborough hills, and upon Stanemore in Yorkshire, near the Spittle. R. Syn. 3. IV. V.
 Pharmac. *Cochleariæ Herba*.

2. COCHLEARIA foliis reniformibus integris. Hort. cliff. 498 Roy. lugdb. 335. Sp. pl. 647. *groenlan-*
Cochlearia rotundifolia. Merr. pin. R. Syn. 302. *dica.*
Cochlearia minima ex montibus Walliæ. Boerb. ind.
 alt. 10.

D^r. Von Troil in his letters on Iceland says, the food of sheep in that island is grass & herbs; & scurvy-grass (cochlearia) in particular makes them so fat, that they yield more than twenty pounds of fat. Quare, what species?

TETRADYNAMIA SILICULOSA.

Anglis, Groenland Scurvygras.

Habitat in montibus Arvoniciis. ♂. IV. V.

- anglica.* 3. COCHLEARIA foliis ovato-lanceolatis sinuatis.
Cochlearia foliis radicalibus lanceolatis integerrimis,
caulinis subsinuatis. *Mill. Diet. Hort.*
Cochlearia folio sinuato. *Baub. pin.* 110. *R. Syn.* 303.
Cochlearia vulgaris. *Park.* 285.
Cochlearia britannica. *Ger. Em.* 401.
Anglis, English or common Sea Scurvygras.
Habitat in littoribus maritimis. ♂. V.
Pharmac. Cochleariae marinæ s. britannicæ Herba.
- danica.* 4. COCHLEARIA foliis hastatis angulatis. *Fl. suec.*
578. *Sp. pl.* 647.
Cochlearia marina folio angulo parvo. *D. Lawson.*
R. Syn. 303.
Cochlearia aremorica. *Tourn.* 215.
Thlaspi hederaceum. *Lob. ic.* 615.
Anglis, Danish Scurvygras.
Habitat in Walney Lancastriæ insula; near Llanbadrick church, Mr. Lhwyd. *R. Syn.* ♂. V.
- Coronopus* 5. COCHLEARIA foliis pinnatifidis. *Fl. suec.* 579.
Sp. pl. 648.
Coronopus Ruellii. *Ger. Em.* 427.
Coronopus recta vel repens Ruellii. *Park.* 502.
Nasturtium supinum capsulis verrucosis. *R. meth. em.*
98. *syn. 304.*
Ambrosia campestris repens. *Baub. pin.* 138.
Anglis, Swine's Cresles.
Habitat in uliginosis et ad vias. ⊖. VI. VIII.
Pharmac. Coronopi ruellii Herba.
- Armoracia* 6. COCHLEARIA foliis radicalibus lanceolatis crenatis caulinis incisis. *Fl. suec.* 580 *Sp. pl.* 648. *Mat. mea.* 321.
Cochlearia folio cubitali. *Tourn.* 215.
Raphanus rusticanus. *Ger. Em.* 241. *Park.* 860.
Baub. pin. 96. *R. Syn.* 301.
Raphanus sylvestris f. *Armoracia multis.* *Baub. pin.*
851.

Anglis,

Anglis, Horse-radish.

Habitat in ruderatis et ad fossas. Found plentifully about Alnwick, and elsewhere in Northumberland, and Dr. Lister upon the banks of Skiptonbeck, and elsewhere, in Bolland in Craven. R. Syn. 4. V.
Pharmac. Raphani rusticani Radix.

I B E R I S. 721.

Cal. irregularis : petalis duobus exterioribus majoribus. *Silicula* polysperma, emarginata.

*I. IBERIS foliis sinuatis, caule nudo simplici. *Hort. nudicaulis cliff.* 328. *It. oeland.* 139. *Fl. suec.* 581. *Sp. pl.* 650.

Nasturtium petræum. *Tabern. ic.* 451. *Ger. Em.* 251.
R. Syn. 303.

Nasturtium petræum, foliis bursæ pastoris. *Bauh. pin.* 104.

Bursa pastoris minor, foliis incisis. *Bauh. pin.* 108.

Bursa pastoris minor. *Park.* 866.

Anglis, Rock Cress.

Habitat in glareosis. Near Hampton-court, Richmond, and Barnes Commons, Mr. Doody. *R. Syn.* 303. in ericeto Putnejano, D. Ph. Miller. O. V.

S I L I Q U O S A.

* *Calyx clausus : foliolis longitudinaliter conniventibus.*

D E N T A R I A. 726.

Siliqua elastice diffiliens, valvulis revolutis. *Stigma* emarginatum. *Calyx* longitudinaliter connivens

*I. DENTARIA foliis inferioribus pinnatis, summis bulbifera. simplicibus *Fl. suec.* 584 *Sp. pl.* 653.

Dentaria bulbifera *Ger. Em.* 984.

Dentaria heptaphyllum baccifera. *Bauh. pin.* 322.

Anglis, Coral-wort.

Habitat in nemorosis. In Old Park wood, near Harefield, abundantly. *Blacks. fasic.* pl. 23. 4. IV.

CHEIRANTHUS. 730.

Germen utrinque denticulo glandulato. Cal. clausus : foliolis duobus basi gibbis. Semina plana.

Cheiri.

1. CHEIRANTHUS foliis lanceolatis acutis glabris, ramis angulatis. *Syst. nat.* 1133. *Hort. cliff.* 334. *ups.* 187. *Mat. med.* 335. *Sp. pl.* 661. *Roy. lugdb.* 337. *Gort. gelr.* 382. *Guett. stamp.* II. 156.

Leucojum luteum, vulgo Cheiri flore simplici. Baub. hist. II. 872. *R. Syn.* 291. .

Leucojum luteum vulgare. Baub. pin. 202.

Keiri s. Leucojum vulgare luteum. Park. 625.

Viola lutea. Ger. Em. 456.

Anglis, Wall-flower, or wild Cheir.

Habitat in muris antiquis et teetis. 24. IV. V.

Pharmac. Cheiri Flores.

tricuspi-
datus.

2. CHEIRANTHUS filiisque apice tridentatis. *Hort. cliff.* 335. *Sp. pl.* 663.

Leucojum marinum majus. Park. 622. *R. Syn.* 291.

Leucojum maritimum sinuato folio. Baub. pin. 201.

Anglis, Sea Stockgilly-flower.

Habitat in maritimis Cambriæ littoribus arenosis, and on the coast of Cornwal. R. Syn. 24. VI.

ERYSIMUM. 729. ~

Siliqua columnaris, exæcte tetraedra. Cal. clausus.

officinale. 1. ERYSIMUM filiisque spicæ appressis. *Fl. suec.* 598. *Sp. pl.* 660.

Erysimum vulgare. Baub. pin. 298.

Erysimum Diocoridis Lobelio. Ger. Em. 254.

Icio s. Erysimum. Dod. pempt. 714. *Lob. ic.* 206. *vulgare. Park.* 833.

Eruca hirsuta, siliqua caule appressa, Erysimum dicta. R. Syn. 298.

Anglis, Hedge Mustard.

Habitat juxta muros, inque plateis et ruderatis passim. C. V.

Pharmac. Erysimi Herba.

2. ERYSIMUM foliis integris lanceolatis. *Fl. lapp. Cherian-*
suec. 601. Sp. pl. 661. *Myagro affinis planta siliquis longis. Baub. hist. II.*
894. R. Syn. 298. *Myagrum siliqua longa. Baub. pin. 109.*
Camelina. Ger. Em. 273. f. myagrum alterum ama-
rumb. Park. 867. *Anglis, Treacle Wormseed.*
Habitat in insula Elenensi in salicetis prope urbem Ely
copiosam observavimus; item prope Ashburn oppidum
in Pecco Derbiensi dicto. In the corn-fields about
Elden. R. Syn. O. VII.
3. ERYSIMUM foliis lyratis : extimo subrotundo. *Fl. Barbarea.*
suec. 599. Sp. pl. 660. *Erysimum foliis basi pinnato-dentatis apice subrotun-*
dis. Fl. lapp. 264. *Eruca lutea seu Barbarea. Baub. pin. 98. R. Syn. 297.*
Barbarea. Baub. hist. II. 868. Ger. Em. 243. flore
simplici. Park. 819. *β Barbarea foliis minoribus et frequentius sinuatis. R.*
hist. 809. *Anglis, Winter Cresses, or Rocket.*
Habitat in fossis et aquosis frequens. 4. V.
4. ERYSIMUM foliis cordatis. *Hort. cliff. 333. Fl. Alliaria.*
suec. 600. Sp. pl. 660. *Hesperis allium redolens. Hist. ox. II. 252. Tourn.*
222. R. Syn. 293. *Alliaria. Ger. Em. 796. Park. 112. Baub. pin. 110.*
Till. ic. 60. *Anglis, Jack-by-the-hedge, or Sawce-alone.*
Habitat ad sepes passim. 4. V.

H E S P E R I S. 731.

Petala obliqua flexa. Glandula intra stamina brevi-
ora. Siliqua stricta. Stigma basi bifurca apice
connivente. Cal. clausus.

1. HESPERIS caule simplici erecto, foliis ovato lance-*matrona-*
olatis denticulatis, petalis mucrone emarginatis, lis.
Hort.

TETRADYNAMIA SILQUOSA.

- Hort. cliff.* 188. *Roy. lugdb.* 338. *Dalib. paris.*
197. *Sp. pl.* 663.
Hesperis sylvestris inodora. *Bauh. pin.* 202. *R. Syn.*
293.
Hesperis pannonica inodora. *Bauh. hist.* II. 878.
Park. 628.
Anglis, unsavory Dame's-violet.
Habitat on the banks of the rivers about Dalehead and
Graffmire in Westmorland. *R. Syn.* ♂. V.

R A P H A N U S. 736.

- Cal. clausus. Siliqua torosa, subarticulata, teres. Glan-*
dulae melliferæ duo inter stamina breviora et pistil-
lum, totidem inter stamina longiora et calycem.
- Raphani-* 1. **RAPHANUS** siliquis teretibus articulatis lævibus uni-
strum. *Hort. cliff.* 340. *Sp. pl.* 669. *Fl.*
fuec. 612.
Raphanus sylvestris. *Ger. Em.* 240.
Raphanistrum siliqua articulata glabra, majore et mi-
nore. *Hist. Ox.* II. 265. *R. Syn.* 296.
Rapistrum album articulatum. *Park.* 863.
Rapistrum flore albo, siliqua articulata. *Bauh. pin.* 95.
β *Rapistrum* flore luteo, siliqua glabra articulata. *R.*
Syn. 296.
γ *Raphanus maritimus* flore luteo, siliquis articulatis.
R. Syn. 296.
Anglis, α white flowered Charlock, β yellow flower-
ed Charlock.
Habitat in arvis. ◎. VI. VII.

B R A S S I C A. 734.

- Cal. erectus, connivens. Semina. globosa. Glandu-*
la inter flamina breviora et pistillum, interque lon-
giora et calycem.
- orientalis.* 1. **BRASSICA** foliis cordatis amplexicaulibus glabris;
radicalibus scabris integerrimis, siliquis tetragonis.
Sp. pl. 666.
Brassica campestris perfoliata flore albo. *Bauh. pin.*
112. *R. Syn.* 293.
Perfoliata siliquosa. *Ger. Em.* 536. *Bauh. hist.* 335.
Perfo-

Perfoliata siliquosa vulgaris f. *Brassica campestris*.

Park. 580.

Anglis, perfoliate Cabbage.

Habitat in arvis et in clivis maritimis prope Harvicum oppidum in Effexia et in clivis juxta Bardsey prope Orford in Suffolcia a D. Dale. *R. Syn.* ♂. VI.

2. BRASSICA radice caulescente tereti carnosa. *Hort. oleracea.*
cliff. 338. *Fl. suec.* 608.

Brassica maritima arborea f. *procerior ramosa.* *Hift.*
Ox. II. 208. *R. Syn.* 293.

Brassica maritima. *Pet. H. br. t.* 45. *f.* 6.

Anglis, Sea Cabbage.

Habitat in clivis maritimis. *On Dover cliffs, &c.* *R.*
Syn. *prope castellum Harleck in comitatu Mervinia.*
♂. IV.

3. BRASSICA radice caulescente orbiculari depressa *Rapa.*
carnosa. *Hort. cliff.* 339. *upf.* 190. *Roy. lugd.*
344. *Sp. pl.* 666.

Rapa sylvestris. *R. hift.* 800.

Rapa sativa rotunda. *Baub. pin.* 89. *R. Syn.* 294.

Rapum majus. *Ger. Em.* 232.

Rapum sativum rotundum. *Baub. hift.* 838.

β *Rapa sativa oblonga seu foemina.* *Baub. pin.* 90.
Anglis, Turneps.

Habitat in arvis et ad margines agrorum. ♂. IV.

Pharmac. Rapi Radix, semina.

4. BRASSICA radice caulescente fusiformi. *Hort. cliff.* *Napus.*
339. *Fl. suec.* 609. *Sp. pl.* 666.

Napus sylvestris. *Baub. pin.* 95. *hift.* II. 843. *R.*
Syn. 295. *It. goet.* 240. *et W.—goeth.* 132.

Bunias seu Napus sylvestris nostras. *Park.* 865.

Bunias sylvestris Lobelii. *Ger. Em.* 235.

Anglis, wild Navew.

Habitat inter segetes et in aggeribus fossarum. ♂. V.

5. BRASSICA foliis dentato-pinnatifidis, caule hispido, *Eruca-*
siliquis laevibus. *Sp. pl.* 667. *trum.*

Eruca sylvestris. *Ger. Em.* 247. *R. Syn.* 296. *vul-*
gatior. *Park.* 818.

Eruca

TETRADYNAMIA SILIQUOSA.

Eruca major lutea, caule aspero. Baub. pin. 98.
Anglis, wild Rocket.

Habitat in muris antiquis et ruderatis frequens. 24. V.

T U R R I T I S. 733.

Siliqua longissima, angulata. Cal. connivens, erectus. Cor. erecta.

glabra. 1. TURRITIS foliis radicalibus dentatis hispidis, caulinis integerrimis amplexicaulibus glabris. Fl. suec. 606. Sp. pl. 666.

Turritis foliis inferioribus cichoraceis, reliquis perforatiis. Tourn. 224.

Brassica sylvestris foliis circa radicem cichoraceis. Baub. pin. 109.

Brassica sylvestris foliis circa radicem cichoraceis asperis, caulis autem adhaerentibus planis, seu glabris. Hist. Ox. II.

β Brassica sylvestris foliis integris et hispidis. Baub. pin. 112.

Turritis. Ger. Em. 272. R. Syn. 293. vulgatior. Baub. hist. II. 836.

Anglis, great Tower-mustard.

Habitat in pratis glareofis. Frequent in Surry and Kent, in pits and uncultivated places, Dr. Watson. near Colchester, M. Newton, ♂. V.

hirsuta. 2. TURRITIS foliis omnibus hispidis, caulinis amplexicaulibus. Fl. suec. 607. Sp. pl. 666.

Turritis muralis minor. Pet. H. br. t. 47. 12. R. Syn. 294.

Erysimo similis hirsuta, non laciniata, alba. Baub. pin. 101. pr. 42. ic.

Erysimo similis hirsuta planta. Park. 834.

Anglis, hairy Tower-mustard.

Habitat in rupibus et muris antiquis. ♂. VI.

A R A B I S. 732.

Glandulæ nectariferæ quatuor, singulæ intra calycis foliola, squamæ instar reflexæ.

thaliana. 1. ARABIS foliis petiolatis lanceolatis integerrimis. Virid.

rid. cliff. 64. Fl. suec. 985. Roy. lugdb. 339. Da-lib. parif. 200. Sp. pl. 665.

Turritis foliis lanceolatis integris petiolatis, ad exortum ramorum solitariis. Hort. cliff. 339.

Turritis vulgaris ramosa. Tourn. 224. R. Syn. 294.

Brassica spuria minima, foliis hirsutis et glabris. R. Syn. ed. II. 166.

Bursæ pastoris similis siliquosa major et minor. Bauh. pin. 108.

Pilosella siliquosa. Thal. tab. 7.

Paronychia major et altera minor. Park. 556.

β Turritis minor foliosa. Pet. Herb. br. t. 48. f. 2.

Anglis, coded Mouse-ear.

Habitat in muris teetis et pratis aridis. ◎. V.

** *Calyx hians : foliolis superne distantibus.*

C A R D A M I N E. 727.

Siliqua elatice diffiliens valvulis revolutis. Stigma integrum. Cal. subhians.

* *foliis simplicibus.*

1. CARDAMINE foliis simplicibus ovatis integerrimis, bellidif-
petiolis longissimis. *Fl. lapp. 260. t. 9. f. 2. suec. lia.*
590. *Sp. pl. 654.*

Cardamine pumila bellidis folio, alpina. Ger. Em.
260. *R. Syn. 301.*

Plantula cardamines alterius æmula Clusii. Park. 812.

Nasturtium alpinum bellidis folio minus. Bauh pin. 105.
Anglis, Daisie-leaved Ladies-smock.

*Habitat in variis locis juxta Rippon ad monasterium ejus
et in Denbighshire. Merr. pin. Found by Mr. Newton
on S. Vincent's rock near Bristol. R. Syn. 24.
IV. V.*

2. CARDAMINE foliis simplicibus oblongis dentatis, petræa.
Sp. pl. 654. Fl. suec. 591.

Cardamine petræa cambrica, nasturtii facie. Dill.
elth. 70. t. 61. f. 71.

Nasturtium petræum. Merc. bot. Pluk. ph. t. 101.
f. 3. R. Syn. 300.

Anglis, mountain Ladies-smock.

*Habitat in excelsis rupibus Arvoniæ et Merviniæ; in
rupibus udis supra lacum Layn-du copiose. D.
Lhwyd. R. Syn. 24. V.*

** *Foliis*

** *Foliis pinnatis.*

- pratensis.* 3. CARDAMINE foliis pinnatis : foliolis radicalibus subrotundis ; caulinis lanceolatis. *Sp. pl.* 656. *Fl. suec.* 585.
Cardamine. *Ger. Em.* 259 *R. Syn.* 299.
Nasturtium pratense magno flore. *Baub. pin.* 104.
Nasturtium pratense majus f. Cardamine latifolia. *Park.* 825.
Flos cuculi. *Dod. pempt.* 592.
Anglis, common Ladies-smock, or Cuckow-flower.
Habitat in pratis et pascuis subhumidis. 24. IV.
Pharmac. Cardamines Herba.
- amara.* 4. CARDAMINE foliis pinnatis : axillis stoloniferis.
Sp. pl. 656. *Fl. suec.* 586.
Cardamine foliis pinnatis : foliolis subrotundo-angulosis. *Hall. helv.* 558.
Cardamine flore majore elatior. *Tourn.* 224. *R. Syn.* 299.
Nasturtium aquaticum majus et amarum. *Baub. pin.* 104.
Nasturtium aquaticum amarum. *Park.* 1239.
Anglis, bitter Cresses, or Ladies-smock.
Habitat in pratis et pascuis humidis. Circa Lewisham,
D. Alchorne ; by the river-side at Harefield, and about Uxbridge, plentifully. *Blackf. spec. bot.* 24. IV. V.
- impatiens.* 5. CARDAMINE foliis pinnatis : foliolis laciniatis, petalis fugasissimis.
Cardamine foliis pinnatis : floribus apetalis. *Sp. pl.* 655. *Fl. suec.* 588.
Cardamine impatiens, vulgo Sium minus impatiens. *Ger. Em.* 260. *R. Syn.* 299.
Cardamine annua, exiguo flore. *Tourn.* 224.
Sium minimum, Noli me tangere dictum, f. impatiens nasturtii sylvestris folio. *Park.* 1241.
Anglis, impatient Ladies smock.
Habitat in pratis montosis ad rivulos et in rupibus humidis In comitatibus Eboracensi et Westmorlandica passim. 24. IV.

6. CARDAMINE foliis pinnatis exstipulatis, foliolis *parviflora* lanceolatis obtusis floribus corollatis. *Syfl. nat.*

1131.

Cardamine pratensis, parvo flore. *Tourn. 224.*

Cardamine annua glabra, parvo flore, lobis foliorum vix sinuatis. *Hort. chelf. ind.*

Cardamine quarta Dalechampii. *Lugd. hift. 654.*

Anglis, small-flowered Ladies-smock.

Habitat in pratis, pascuis et ad rivulos frequens. ◎.

III. V.

7. CARDAMINE foliis pinnatis floribus pentandris. *hirsuta.*

Sp. pl. 655. Fl. suec. 587.

Cardamine impatiens altera hirsutior. *R. Syn. 300.*

Nasturtium aquaticum minus. *Baub. pin. 104.*

Anglis, hairy Ladies-smock.

Habitat in pratis pascuis et locis umbrosis, passim. ◎.

IV.—VIII.

S I S Y M B R I U M. 728.

Siliqua dehiscens valvulis rectiusculis. *Calyx patens.*
Corolla patens.

* *Siliquis declinatis brevibus.*

1. SISYMBRIUM siliquis declinatis, foliis pinnatis: *Nastur-*
foliolis subcordatis. *Hort. cliff. 336. Fl. suec. 592. tium.*

Mat. med. 331. Sp. pl. 657.

Sisymbrium Cardamine, seu Nasturtium aquaticum.

Baub. hift. II. 884. R. Syn. 300.

Nasturtium aquaticum vulgare. *Park. 1239.*

Nasturtium aquaticum supinum. *Baub. pin. 104.*

Nasturtium aquaticum f. Cratevæ Sium. *Ger. Em.*

257.

β Nasturtium aquaticum foliis minoribus præcocius.
R. Syn. 301.

γ Nasturtium aquaticum pinnulis paucioribus. *Dood.*
R. Syn. 301.

Anglis, Water-cresses.

Habitat in aquosis et rivulis. ♂. 24.

◆ *Pharmac.* Nasturtii aquatici Herba.

S

2. SY.

sylvestre. 2. SISYMBRIUM siliquis declinatis, foliis pinnatis: foliolis lanceolatis ferratis. *Roy. lugdb.* 336. *Dalib. parif.* 204. *Sauv. monsp.* 228. *Boehm. lipf.* 118. *Sp. pl.* 657.

Eruca aquatica. *Ger. Em.* 248. *Park.* 1242. *R. Syn.* 297.

Eruca sylvestris minor, luteo parvoque flore. *Baub.* *pin.* 98.

Anglis, Water Rocket.

Habitat in palustribus et aquosis præsertim solo glareoso. In Tothil-fields, Westminster, plentifully. *Blackf. spec. Bot.* 4. VI.

ampli- bili- 3. SISYMBRIUM siliquis declinatis oblongo-ovatis, foliis pinnatifidis ferratis. *Sp. pl.* 657. *Fl. suec.* 593. *Sisymbrium* foliis simplicibus dentatis ferratis. *Hort. cliff.* 336.

aquaticum Lin. 6 Rhaphanus aquaticus alter. *Baub.* *pr.* 38. *Park.* 1229. *Fulham about the Bishop's Stairs.*

Rhaphanus aquaticus rapistrifolio. *Baub.* *pin.* 97.

Rapistrum aquaticum. *Ger. Em.* 240.

β Sisymbrium foliis pinnatifidis ferratis. *Fl. suec.* 551. Sisymbrium foliis infimis capillaceis, summis pinnatifidis. *Hort. cliff.* 337.

Rhaphanus aquaticus foliis in profundas laciniis divis. *Baub.* *pin.* 97. *pr.* 38. *R. Syn.* 301.

Anglis, Water Radish.

Habitat in aquosis. 4. VI.

** Caule nudo.

murale. 4. SISYMBRIUM foliis ferrato-dentatis laevibus, caule nudo adscendente scabro. *Syst. nat.* 1132. Sisymbrium foliis lyratis denticulatis, siliquis sessilibus. *Sp. pl.* 658.

Eruca monensis laciniata lutea. *R. Syn.* 297.

Eruca sylvestris minor lutea, bursæ pastoris folio. *Baub.* *pin.* 98. *pr.* 39. *Pluk. ph. t.* 86. *f. 7.* *Barr. ic.* 1016.

Anglis, Wall Rocket.

Habitat in arenosis. Found by Mr. Lawson in Sella-fields, Seabank, Cumberland; also between Marsh-grange

grange and the isle of Walney, but not plentifully,
by Mr. Lhwyd, near Abermeney ferry in Angle-
sea. R. Syn. 4. VI.

5. SISYMBRIUM foliis dentato-pinnatis lævibus, caule monense.
nudo adscendente glabro. Syst. nat. 1132.

Sisymbrium foliis pinnatifidis integerrimis, caulibus
subnudis simplicibus procumbentibus. Sp. pl. 658.

Eruca monensis laciniata, flore luteo majore. Dill.
elth. 135. t. 111. f. 135.

Anglis, yellow Rocket.

Habitat in arenosis in Monæ Insula. D. Dillenius. 3.
4. VI.

*** *Foliis bipinnatis.*

6. SISYMBRIUM foliis pinnato-hastatis dentatis nudis, Irio.
caule lævi, filiisque erectis. Sp. pl. 659. Fl. suec.
596.

Erysimum foliis lyrato-pinnatis : extimo hastato. Fl.
suec. ed. I. 556.

Erysimum latifolium Neapolitanum. Park. 834. R.
Syn. 298.

Erysimum latifolium majus glabrum. Baub. pin. 101.
Irio lævis Apulas, erucæ folio. Col. eip. I. 264. t.
265.

Anglis, broad-leaved Rocket, or Hedge Mustard.

Habitat in ruderatis et muris antiquis circa Londinum
frequens. ♂. V.—VIII.

7. SISYMBRIUM petalis calyce minoribus, foliis de- Sophia.
composito pinnatis. Fl. suec. 595. Mat. med.
332. Sp. pl. 659.

Erysimum Sophia dictum. R. Syn. 298.

Sophia Chirurgorum. Ger. Em. 1068. Park. 830.

Nasturtium sylvestre tenuissime divisum. Baub. pin.
105.

Anglis, Flix-weed.

Habitat in maceriis, ruderatis, teclis, frequens. ♂.
VII.

Pharmac. Sophiæ semina.

S I N A P I S. 735.

Cal. patens. Cor. unguis recti, Glandula inter stamina breviora et pistillum, interque longiora et calycem.

- nigra.* 1. SINAPIS filiquis glabris tetragonis. *Hort. cliff.* 338. *Lech. scan.* 51. *Fl. suec.* 611. *Mat. med.* 326. *Sp. pl.* 668.
Sinapi rapi folio. *Baub. pin.* 99.
Sinapi sativum secundum. *Ger. Em.* 243. *R. Syn.* 295.
Sinapi filiqua latiuscula glabra, semine rufo, s. vul-
gare. *Baub. hist. II.* 885.
Anglis, common Mustard.
Habitat in arvis aggeribus fossarum et juxta vias. ⓠ. VI.
Pharmac. Sinapis Semina.
- alba.* 2. SINAPIS filiquis hispidis : rostro obliquo longissimo.
Hort. cliff. 338. *ups.* 191. *Roy. lugdb.* 343. *Dalib. paris.* 200. *Sp. pl.* 668.
Sinapi album filiqua hirsuto, semine albo vel ruffo.
Baub. hist. II. 856. *R. Syn.* 295.
Sinapi album. *Ger. Em.* 244.
Sinapi apii folio. *Baub. pin.* 99.
Anglis, white Mustard.
Habitat in agris et ad vias. ⓠ. VIII.
Pharmac. Sinapis albæ semina.

- arvensis.* 3. SINAPIS filiquis multangulis toroso-turgidis rostro longioribus. *Fl. suec.* 610. *Sp. pl.* 668.
Rapistrum arvorum. *Ger. Em.* 233. *Park.* 862. *R. Syn.* 295.
Rapistrum flore luteo. *Baub. pin.* 95. *hist. II.* 844.
Anglis, Wild-mustard, or Charlock.
Habitat in arvis et marginibus agrorum ubique. ⓠ. V.

C R A M B E. 739.

Filamenta quatuor longiora, apice bifurca : altero antherifero. Bacca sicca globosa decidua.

- maritima.* 1. CRAMBE foliis cauleque glabris. *Fl. suec.* 615. *Sp. pl.* 671.
Crambe foliis cordatis crispis carnosis. *Hort. cliff.* 340.
Crambe

Crambe maritima brassicæ folio. Tourn. 211. R. Syn.

^{307.}

Brassica maritima monospermous. Bauh. pin. 112.

Brassica marina monospermous. Park. 270.

Brassica marina anglica. Ger. Em. 315.

Anglis, Sea Colewort.

Habitat in littoribus arenosis maritimis frequens. 4. V.

B U N I A S. 737.

Silicula decidua, tetraëdra, angulis inæqualibus acuminatis muricatis.

I. BUNIAS siliculis ovatis lævibus ancipitibus. *Fl. suec. Cakile.*
^{613.} *Sp. pl. 670.*

Raphanus filique ovatis angulatis monospermis. Hort. cliff. 340.

Cakile quibusdam, aliis Eruca marina et Raphanus marinus. Bauh. hist. II. 867. R. Syn. 307.

Eruca marina. Ger. Em. 248. anglica. Park. 821.

Eruca maritima Italica, siliqua hastæ cuspidi simili.
Bauh. pin. 99.

Anglis, Sea Rocket.

Habitat in littoribus maritimis passim. ④. VI.

I S A T I S. 738.

Siliqua lanceolata, unilocularis, monosperma, decisa, bivalvis: valvulis navicularibus.

*I. ISATIS foliis radicalibus crenatis, caulinis sagittatis *tinctoria*.
siliculis oblongis. *Fl. suec. 614. Sp. pl. 67.*

Isatis sylvestris, f. angustifolia. Bauh. pin. 113.

β *Isatis sativa f. latifolia. Bauh. pin. 113.*

Glaustum sativum. Ger. Em. 49. Park. 600. R. Syn.

^{307.}

Anglis, Woad.

Habitat in arvis et marginibus agrorum inter Bath et Bristol, copiose. 5. VII.

Classis XVI.

MONADELPHIA DECANDRIA.

GERANIUM. 746.

Monogyna. *Stigma quinque. Caps. rostrata, pentacocca.*

* *Staminibus quinque fertilibus.*

- cicutari-* 1. GERANIUM pedunculis multifloris, calycibus pentaphyllis, floribus pentandris, foliis pinnatis incisis obtusis. *Hort. cliff.* 344. *Fl. suec.* 625. *Sp. pl.* 680.
R. Syn. 357.
Geranium cicutæ folio, minus et supinum. *Baub. pin.* 319.
Geranium moschatum inodorum. *Park.* 708.
 β Geranium inodorum album. *Ger. Em.* 946.
Anglis, Hemlock-leaved Cranesbill.
Habitat in ruderatis, muris, et juxta vias, ubique. ☽ IV.—VI.
- moscha-* 2. GERANIUM pedunculis multifloris, calycibus pentaphyllis, floribus pentandris, foliis pinnatis incisis, cotyledonibus pinnatifidis. *Syst. nat.* 1143.
Geranium moschatum. *Ger. Em.* 941. *Park.* 706.
R. Syn. 358.
Geranium cicutæ folio, moschatum. *Baub. pin.* 319.
 β Geranium pimpinellæ folio. *Cat. giss.* 173.
Anglis, musked Cranesbill, or Muscovy.
Habitat in pratis siccioribus. In comitatibus Westmorlandico et Eboracensi *paxim.* ☽ V.
Parmac. Geranii Moschati Herba.

3. GERANIUM pedunculis subtrifloris, foliis cordatis *maritimum*, crenato-incisis subvillosois, caulis procumbentibus. *mum.*
Synt. nat. 1143.

Geranium pedunculis bifloris, foliis ovatis hirsutis crenato-incisis, caulis procumbentibus. *Roy. lugdb.* 391.

Geranium pusillum supinum maritimum *Althææ aut Betonicæ* folio nostras. *R. Syn.* 357. *Pluk. ph. t.*

31. f. 4.

Geranium minimum anglicum procumbens, foliis betonicæ. *Hist. ox.* II. 512. t. 35.

Anglis, Sea Cranesbill.

Habitat in arenosis et glareosis prope littus occidentale, v. g. in insulis Mona et Prestholma; in Wallia circa Carnarvon; Cornubia circa Pensans et alibi copiosissime. In Suffexiæ ora prope Brackelsham, D. Dillenius. *R. Syn.* 4. VI. VII.

*** Staminibus decem fertilibus.

4. GERANIUM pedunculis bifloris, foliis caulinis tri-nodosum. lobis integris ferratis, summis subsefilibus. *Hort. cliff.* 343. *Roy. lugdb.* 350. *Sp. pl.* 681.

Geranium V. nodosum Plateau. *Clus. hist.* 101. *Ger. Em.* 947. *R. Syn.* 361.

Geranium nodosum. *Bauh. pin.* 318. *Park.* 704.

Geranium magnum folio trifido. *Bauh. hist.* III. 478. *Anglis,* knotty Cranesbill.

Habitat in montosis Cumberlandiæ sponte ortum affer-
mavit. D. Archergen. *R. Syn.* 4. VII. VIII.

5. GERANIUM pedunculis bifloris foliisque alternis, *phænum.* calycibus subaristatis, caule erecto, petalis undula-
tis. *Sp. pl.* 681.

Geranium montanum fuscum. *Bauh. pin.* 318. *R. Syn.* 361.

Geranium maculatum sive fuscum. *Ger. Em.* 942.

Geranium pullo flore. *Park.* 704.

Anglis, spotted Cranesbill.

Habitat in montosis. Found by Mr. Drayton apothecary of Maidstone, at Tovel, in the valley by the old fulling-mill. *R. Syn.* circa Clapham et Ingleton in agro Eboracensi. 4. IV. V.

S 4

6. GE-

G. malacoides. pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis cordatis sublobatis.

Habitat in Anglia maritimis O. Lin.

- sylvaticum* 6. GERANIUM pedunculis bifloris, foliis subpeltatis multifidis inciso-serratis, caule erecto, petalis emarginatis. *Fl. lapp.* 266. *suec.* 617. *Sp. pl.* 684.
Geranium batrachoides montanum nostras. Ger. Em.
942.
Geranium batrachoides minus. Park. 704.
Geranium batrachoides folio aconiti. Bauh. pin. 317.
Anglis, Mountain Cranesbill.
Habitat in pratis montosis et dumetis agri Westmor-
landici et Eboracensis copiose. R. Syn. 4. VII.
VIII.
- pratense.* 7. GERANIUM pedunculis bifloris, foliis subpeltatis multipartitis rugosis pinnato-laciiniatis acutis, petalis integris. *Fl. suec.* 618. *Sp. pl.* 681.
Geranium batrachoides. Ger. Em. 942. *Bauh. hist.*
III. 475. R. Syn. 360.
Geranium batrachoides flore cæruleo. Park. 704.
Geranium batrachoides, Grația Dei Germanorum,
Lobelio. Bauh. pin. 318.
Anglis, Crowfoot Cranesbill.
Habitat in pratis et pascuis subhumidis et ad margines
agrorum. Circa Battersea. R. Syn. 4. VI. VII.
- robertia-* 8. GERANIUM pedunculis bifloris, calycibus pilosis.
num. decemangulatis. *Sp. pl.* 681. *Fl. suec.* 619.
Geranium pedunculis bifloris, foliis quinque-trive-
partitis : lobis pinnatifidis. Hort. cliff. 344. *Mat.*
med. 336.
Geranium robertianum. Ger. Em. 939. *Bauh. pin.*
319. R. Syn. 358.
Geranium robertianum vulgare. Park. 710.
 β *Geranium lucidum saxatile, foliis geranii robertiani.*
R. Syn. 358.
Anglis, Herb Robert.
Habitat in sepibus, muris, ruderatis, frequens, 3. IV.
—VI.
Pharmac. Geranii robertiani Herba.
- lucidum.* 9. GERANIUM pedunculis bifloris, calycibus pyrami-
datis

datis angulatis rugosis, foliis quinquelobis rotundatis. *It. gotl.* 228. *Fl. suec.* 620. *Sp. pl.* 682.

Geranium saxatile. Ger. Em. 938. *Park.* 707. *R. Syn.* 361.

Geranium lucidum saxatile. Bauh. pin. 318.

Anglis, shining Dovesfoot Cranesbill.

Habitat in tectis, muris, et umbrosis. ♂. VI. VII. V.

10. **GERANIUM** pedunculis bifloris, petalis integris *rotundifolium*, longitudine calycis, caule prostrato, foliis reniformibus incisis. *Sp. pl.* 683. *Fl. suec.* 621.

Geranium folio malvae rotundo. Bauh. pin. 318.

Geranium columbinum majus, flore minore cæruleo.

R. Syn. 358.

Pes columbinus. Dod. pempt. 61.

Anglis, round-leaved Cranesbill.

Habitat in muris, tectis et ad sepes circa Bath et Bristol copiose, inter Battersea et Wandsworth. ♂. VII.
Pharmac Geranii columbini Herba.

11. **GERANIUM** pedunculis bifloris, foliis inferioribus quinque-partito-multifidis rotundatis, superioribus trilobis, caule erecto. *perenne.*

Geranium columbinum pyrenaicum perenne, maximum. Tourn. 268.

Anglis, perennial Dovesfoot Cranesbill.

Habitat in pratis montosis. *Ad ripam fluvii inter Bingley et Kighley in agro Eboracensi; prope Enfield, et inter Hyde-Park et Little-Chelsea.* 4. V.—VIII.

12. **GERANIUM** pedunculis bifloris, foliisque floralibus alternis, caule ramoso diffuso, calycibus multicis. *Sp. pl.* 682. *Fl. suec.* 624.

Geranium pedunculis bifloris, foliis quinque-partito-multifidis rotundatis, laciniis obtusiusculis, capsulis hirsutis. Fl. suec. ed. I. 577.

Geranium columbinum villosum, petalis bifidis purpureis. Vaill. paris. 79. t. 15. f. 3.

Geranium columbinum. Ger. Em. 938. *R. Syn.* 359. *vulgare. Park.* 706.

Anglis, common Dovesfoot Cranesbill.

Habitat

Habitat in arvis, pratis, pascuis et ad sepes. ♂. V.
VI.

pufillum. 13. GERANIUM pedunculis bifloris, petalis bifidis, caule prostrato, foliis reniformibus palmatis linearibus acutis. *Syst. nat.* 1144.

Geranium columbinum humile, flore cæruleo minimo. *R. Syn.* 359. *t.* 16. *f.* 2.

Geranium malacoides f. columbinum minimum.
Park. 707.

Anglis, small-flowered Dovesfoot Cranesbill.

Habitat in arvis et ad vias præsertim solo arenoso. ♂. VI.

columbi- 14. GERANIUM pedunculis bifloris, foliis quinque-partito-multifidis angulatis: laciniis acutis, capsulis glabris, calycibus aristatis. *Fl. suec.* 623. *Sp. pl.* 682.

Geranium columbinum dissectis foliis, pediculis florum longissimis. *R. Syn.* 359. *Vaill. paris.* 79. *t.* 15. *f.* 4.

Geranium columbinum annum minus, folio tenuius laciniato, flore pediculo longissimo insistente. *Hist. ox.* II. 512. *f.* 5. *t.* 15. *f.* 3.

Anglis, long-stalked Dovesfoot Cranesbill.

Habitat in arvis et pratis montosis. Circa Charleton in Cantio. ♂. VII.

difsectum. 15. GERANIUM pedunculis bifloris, foliis quinque-partito-multifidis, petalis emarginatis longitudine calycis, capsulis villosis. *Cent. pl.* 61. *Fl. suec.* 622.

Geranium columbinum majus dissectis foliis. *Ger. Em.* 938. *R. Syn.* 359.

Geranium malacoides f. columbinum alterum. *Park.* 706.

Geranium columbinum maximum, foliis difsectis. *PL hist. nat. ox.* 145. *t.* 9. *f.* 3. *R. Syn.* 360.

Geranium columbinum majus foliis imis longe usque ad pediculum divisis. *Hist. ox.* II. 511.

Anglis, jagged-leaved Dovesfoot Cranesbill.

Habitat in pratis et pascuis. ♂. V. VII.

16. GERANIUM pedunculis unifloris, foliis quinquepartitis trifidis orbiculatis. *Fl. suec.* 616. *Sp. um.*
sanguineum. *pl. 685.*
Geranium hæmatodes. *Park.* 705. *R. Syn.* 360.
Geranium sanguineum. *Ger. Em.* 945.
Geranium sanguineum maximo flore. *Bauh. pin.* 318.
 β *Geranium hæmatodes* foliis majoribus, pallidioribus
 et altius incisis. *R. Syn.* 360.
 γ *Geranium hæmatodes Lancastriense* flore eleganter
 striato. *R. hist.* 1061. *syn.* 360.
Anglis, bloody Cranesbill.
Habitat in rupibus, pratis siccoribus et ad sepes. $\gamma.$ *in*
insula Walney. 24. VII. VIII.

P O L Y A N D R I A.

A L T H Æ A. 749.

Cal. duplex : exterior novemfidus. *Capf.* plurimæ,
 monospermæ.

1. ALTHÆA foliis simplicibus tomentosis. *Hort. cliff.* *officinalis.*
 348. *upf.* 204. *Mat. med.* 338. *Gort. gelr.* 410.
Sp. pl. 686.
Althæa vulgaris. *Park.* 303. *R. Syn.* 252.
Althæa Ibiscus. *Ger. Em.* 933.
Althæa Dioscoridis et Plinii. *Bauh. pin.* 315.
 β *Althæa vulgari similis folio retuso brevi.* *R. Syn.* 252.
Anglis, Marshmallow.
Habitat in palustribus maritimis frequens. 24. VIII.
Pharmac. *Althæa Radix, Herba, semina.*

L A V A T E R A. 752.

Cal. duplex : exterior trifidus. *Capf.* plurimæ, mo-
 nospermæ.

1. LAVATERA caule arboreo, foliis septemangulari- *arborea*
 bus tomentosis plicatis, pedunculis confertis uniflo-
 ris axillaribus. *Hort. upf.* 202. *Sp. pl.* 690.
Malva arborea minima nostras. *Merr. pin.* *R. Syn.*
 252.
Anglis, Sca-tree Mallow.

Habitat

Habitat *ad littoribus maritimis. At Hurst-castle, over against the Isle of Wight, in Portland island, on the rocks of Caldey island, and on the Bassie island near Edinburgh.* R. Syn. ♂. VIII.

M A L V A. 751.

Cal. duplex: exterior triphyllus. Caps. plurimæ, monospermæ.

sylvestris. 1. MALVA caule erecto herbaceo, foliis lobatis obtusis, pedunculis petiolisque pilosis. Fl. suec. 627. Sp. pl. 689.

Malva caule erecto, foliis subpalmatis obsolete serratis. Hort. cliff. 347.

Malva sylvestris. Ger. Em. 930. folio sinuato. Baub. pin. 314.

Malva vulgaris. Park. 299. R. Syn. 251.

Anglis, common Mallow.

Habitat *ad sepes et semitas inque locis ruderatis.* ♂. V.—X.

Pharmac. Malvæ vulgaris Herba, Radix, semina.

rotundi-folia. 2. MALVA caule prostrato, foliis cordato-orbiculatis obsolete quinquelobis. Fl. suec. 626. Sp. pl. 688.

Malva sylvestris pumila. Ger. Em. 930.

Malva sylvestris folio rotundo. Baub. pin. 314.

Malva sylvestris minor. Park. 299. R. Syn. 250.

Anglis, Dwarf Mallow.

Habitat *in ruderatis et ad vias.* ♂. VI.—X.

parviflora. 3. MALVA caule patulo, foliis angulatis, floribus axillaribus glomeratis, calycibus glabris patentibus.

Amoen. III. 416.

Malva minor, flore parvo cæruleo. R. Syn. 251.

Malva sylvestris, foliis sinuatis minoribus, flosculis minimis, *Anglica.* Boerh. ind. alt. 268.

Anglis, small-flowered Mallow.

Habitat *in arenosis.* Found by Mr. J. Sherard, in company with Mr. Rand, at Hithe in Kent. R. Syn. ♂. VI.

Alcea. 4. MALVA caule erecto, foliis multipartitis scabriusculis. Fl. suec. 628. Sp. pl. 689.

Alcea

Alcea vulgaris. *Clus. hist. II.* 25. *R. Syn.* 252.

Alcea vulgaris major. *Bauh. pin.* 316.

Alcea volgaris f. Malva verbenacea. *Park.* 301.

Malva verbenacea *Ger. Em.* 930.

Anglis, Vervain Mallow.

Habitat *in sepibus et ad margines agrorum. In comitatibus Warwicensi, Leicestriensi, et Eboracensi,* 24.
VII. IX.

Pharmac. *Alceæ Herba.*

5. *MALVA* foliis radicalibus reniformibus incisis, caulinis quinquepartitis pinnato-multifidis. *Hort. upf.* 202. *Fl. suec.* 629. *Sp. pl.* 690. *moschata.*

Malva montana f. Alcea rotundifolia laciniata. *Col. ecphr.* I. 148. *t.* 147. *f.* 147.

Alcea folio rotundo laciniato. *Bauh. pin.* 316.

Alcea tenuifolia crispa. *Bauh. hist. II. ap.* 1067.

Anglis, jagged-leaved Vervain Mallow.

Habitat *in pratis pascuis sepibus.* 3. VIII.

Classis.

Classis XVII.

DIADELPHIA
HEXANDRIA.

FUMARIA. 760.

Cal. diphyllo. *Cor.* ringens. *Filamenta* duo membranacea singula. *Antheris* tribus.

officinalis. 1. FUMARIA pericarpiis monospermis racemosis, caule diffuso. *Sp. pl.* 700. *Fl. suec.* 630.
Fumaria vulgaris. *Baub. hist.* III. 101. *Park.* 287.
R. Syn. 204.

Fumaria purpurea. *Ger. Em.* 1088.

Fumaria officinarum et Dioscoridis. *Baub. pin.* 143.
Anglis, Fumitory.

Habitat in agris, arvis, satis, aggeribus, frequens. ☽.
IV.—VI.

Pharmac. Fumariæ Herba, Semina.

capreolata 2. FUMARIA pericarpiis monospermis racemosis, foliis scandentibus subcirrhosis. *Sp. pl.* 701.
Fumaria major scandens flore pallidiore. *R. Syn.* 204.
Anglis, ramping Fumitory.
Habitat in sylvis, sepibus, in agro Westmorlandico passim. ☽. VIII.

claviculata. 3. FUMARIA siliquis linearibus, foliis cirriferis. *Sp. pl.* 701.
Fumaria alba latifolia. *Park.* 288. *R. Syn.* 335: claviculata. *Ger. Em.* 1088.
Fumaria claviculis donata. *Baub. pin.* 143. *Hist. Ox.* II. 266. *f. 3. t. 12. f. 3.*
Anglis, climbing Fumitory.
Habitat in sylvis, sepibus, subhumidis, præsertim solo glareoso. ☽. VI.

O C-

O C T A N D R I A.

P O L Y G A L A. 761.

Cal. pentaphyllus : foliolis duobus alæformibus coloratis. *Legumen* obcordatum, biloculare.

1. POLYGALA floribus cristatis racemosis, caulis *vulgaris*.
herbaceis simplicibus procumbentibus, foliis linearilanceolatis. *Amoen. acad. II.* 136. *Sp. pl.* 702.
Fl. suec. 632.
Polygala. *Ger. Em.* 563. *R. Syn.* 287. minor. *Park.*
1332.

Polygala vulgaris. *Baub. pin.* 215.

β Polygala violacea. *Boerb. ind. alt. I.* 236.

γ Polygala carnea. *Boerb. ind. alt. I.* 236.

δ Polygala alba. *Tourn.* 174.

ε Polygala major. *Baub. pin.* 215.

ζ Polygala myrtifolia palustris humilis et ramosior. *R.*
Syn.

Anglis, Milkwort.

Habitat in ericetis. 4. V. VI.

D E C A N D R I A.

S P A R T I U M. 765.

Stigma longitudinale, supra villosum. *Filamenta* carinæ adhærentia. *Cal.* deorsum productus.

1. SPARTIUM foliis ternatis solitariisque, ramis iner-*scoparium*:
mibus angulatis. *Hort. cliff.* 356. *Sp. pl.* 709. *Fl.*
suec. 633.

Genista angulosa et Scoparia. *Baub. pin.* 395.

Genista angulosa trifolia. *Baub. hist. I.* 388. *R. Syn.*
475.

Genista. *Ger. Em.* 1311. *vulgaris* et Scoparia. *Park.*
228.

Anglis, common Broom.

Habitat in pascuis siccioribus. 5. V. VI.

Pharmac. Genistæ Herba, Flores, Semina.

GE.

GENISTA. 766.

Cal. bilabiatus. *Vexillum oblongum* a pistillo staminibusque deorsum reflexum.

* *Inermes.*

tinctoria. 1. GENISTA foliis lanceolatis glabris, ramis striatis teretibus erectis. *Mat. med.* 347. *Sp. pl.* 710. *Fl. suec.* 634.

Genista tinctoria germanica. *Bauh. pin.* 395.

Genista tinctoria vulgaris. *Park.* 228.

Genistella tinctoria. *Ger. Em.* 1316. *R. Syn.* 474.

Anglis, Green-wood, Dyer's-weed, or Wood-waxen.

Habitat in pascuis et ad agrorum margines. h. VII.

** *Spinosa.*

anglica. 2. GENISTA spinis simplicibus, ramis stoloniferis intermisbus foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 355. *Roy. lugdb.* 371. *Sp. pl.* 710.

Genista minor aspalathoides, f. *Genista spinosa anglica.* *Bauh. pin.* 395. *R. Syn.* 475.

Genista aculeata. *Ger. Em.* 1320.

Genistella aculeata. *Park.* 1004.

Anglis, Needle-furze, or Petty-whin.

Habitat in ericetis subhumidis. h. V. VI.

ULEX. 786.

Cal. diphyllus. *Legumen vix calyce longius.*

europaeus. 1. ULEX foliis villosis acutis, spinis sparsis. *Sp. pl.* 741. *Ulex* folio sub singulis spinis subulato plano acuto. *Hort. cliff.* 356. *upf.* 212. *Roy. lugdb.* 372.

Genista spinosa vulgaris. *Ger. Em.* 1319. *R. Syn.* 475.

Genista spinosa vulgaris, f. *Scoparius Theophrasti,* quem *Gaza Nepam* transtulit. *Park.* 1003.

β *Genista spinosa minor.* *Park.* 1003.

Anglis, Furze, Whins, or Gorse.

Habitat in ericetis. h. IV. V.

ONONIS. 772.

Cal. quinquepartitus : laciiniis linearibus. *Vexillum*
striatum. *Legumen* turgidum, sessile.

1. ONONIS floribus racemosis solitariis, foliis ternatis, *spinosa.*
ramis spinosis. *Syst. nat.* 1159.

Ononis floribus racemosis geminatis, foliis ternatis,
ramis spinosis. *Sp. pl.* 716. *Fl. suec.* 637.

Anonis spinosa flore purpureo. *Bauh. pin.* 389. *Park.*
994. *R. Syn.* 332.

Anonis f. Resta bovis. *Ger. Em.* 1323.

Anglis, Restharrow, or Cammock.

Habitat in *pascuis* *sterilioribus.* 4. VI.—VIII.

Pharmac. Anonidis Radix.

2. ONONIS floribus racemosis geminatis, foliis terna- *arvensis.*
tis ramis inermibus. *Syst. nat.* 1159.

Ononis floribus subseffilibus solitarii lateralibus, ra-
mis inermibus. *Hort. cliff.* 359. *Fl. suec.* 637.

Anonis non spinosa purpurea. *Ger. Em.* 1323. *Park.*
993. *R. Syn.* 332.

Anonis spinis carens purpurea. *Bauh. pin.* 389.

Anglis, Corn Restharrow, or Cammock.

Habitat in *pascuis* *sterilioribus.* 4. VII. VIII.

3. ONONIS caulibus diffusis, ramis erectis, foliis cau- *repens.*
linis ternatis, stipulis ovatis. *Syst. nat.* 1159. *Sp.*
pl. 717.

Anonis maritima procumbens, foliis hirsutie pubef-
centibus. *R. Syn.* 332. *Dill. elth.* 29. t. 25. f.
28.

Anglis, creeping Restharrow.

Habitat in *littoribus* *maritimis* *frequens,* in *pratis et*
pascuis *circa* Charleton in Cantio copiose. 4. VI.
VII.

ANTHYLLIS. 773.

Cal. ventricosus. *Legumen* subrotundum, tectum.

2. ANTHYLLIS herbacea, foliis pinnatis inæqualibus, *Vulnera-*
capitulo *duplicato.* *Sp. pl.* 719. *Fl. suec.* 638. *T.* *Anthyllis*
ria.

DIADELPHIA DECANDRIA.

Anthyllis foliis pinnatis: foliolis pluribus, terminatrice majore. *Roy. lugdb.* 389.

Anthyllis leguminosa. *Ger. Em.* 1240. *vulgaris.* *Park.* 1093.

Vulneraria rustica. *Bauh. hist. II.* 362. *R. Syn.* 323.

Loto affinis vulneraria pratensis. *Bauh. pin.* 332.

β *Vulneraria supina flore coccineo.* *R. Syn.* 323.

Anglis, Kidney-vetch, or Ladies Finger.

Habitat in pascuis siccioribus præsertim cretaceis. 24.VII.

P I S U M. 779.

Stylus triangulus, supra carinatus pubescens. Calycis laciniæ superiores duabus breviores.

marinum. 1. *PISUM petiolis supra planiusculis, caule angulato, stipulis sagittatis, pedunculis multifloris.* *It. W—goth.* 190. *Sp. pl.* 727. *Fl. suec.* 639.

Pisum marinum. *Ger. Em.* 1250. *R. Syn.* 319.

Pisum spontaneum maritimum anglicum. *Park.* 1059. *Anglis,* Sea Pease.

Habitat in littoribus maritimis. On the long baick of stones running from Alburgh towards Orford, in Suffolk, on the end next to Orford, abundantly; we found it also near Hastings in Sussex; among the stones on the west side of Dungeness, near Lyd in Kent. *R. Syn.* 24.VII.

O R O B U S. 780.

Stylus linearis. Cal. basi obtusus : laciniis superioribus profundioribus, brevioribus.

tuberosus. 1. *OROBUS foliis pinnatis lanceolatis, stipulis semisagittatis caule simplici.* *Sp. pl.* 728. *Fl. suec.* 642. *Orobus sylvaticus foliis oblongis glabris.* *Tourn.* 393. *R. Syn.* 324.

Astragalus sylvestris foliis oblongis glabris. *Bauh. pin.* 351.

Astragalus sylvaticus. *Ger. Em.* 1237.

Lathyrus sylvestris lignosior. *Park.* 1072.

Anglis, Wood Pease, or Heath Pease.

Habitat in pratis, pascuis, nemoribus et ad sepes. 24.V. 2. *ORO-*

2. OROBUS caulis decumbentibus hirsutis ramosis. *salvaticus.*
Cent. pl. 67.

Orobus sylvaticus nostras. *R. Syn.* 324.

Anglis, English Wood Vetch, or bitter Vetch.

Habitat *in sylvis et sepibus.* At Gamlesby in Cumberland about six miles from Pereth, in the way to Newcastle, in the hedges and pastures, plentifully; observed by Tho. Willisel below Brecknock hills, in the way to Caerdyff, and in Merionethshire, near Bala. *R. Syn.* 4. VII.

L A T H Y R U S. 781.

- Stylus planus, supra villosus, superne latior. Cal.*
laciniæ superiores duabus breviores.

* *Pedunculis unifloris.*

1. LATHYRUS pedunculis unifloris, foliis simplicibus, *Nissolia.*
stipulis subulatis. Sp. pl. 729.

Lathyrus sylvestris minor. Baub. pin. 344.

Vicia folio gramineo, siliqua porrectissima. Merr. pin.

Catanance leguminosa quorundam. Baub. hist. II.
 309. *R. Syn.* 323.

Ervum sylvestre. Ger. Em. 1249. f. *Catanance.*
Park. 1079.

Anglis, Crimson Grass-vetch.

Habitat *in agrorum marginibus non infrequens.* ○. V.

2. LATHYRUS pedunculis unifloris, cirrhis aphyllis, *Aphaca.*
stipulis sagittato-cordatis. Sp. pl. 729.

Aphaca. Ger. Em. 1250. *Park.* 1067. *R. Syn.* 320.

Vicia lutea, foliis convolvuli minoris. Baub. pin.
 345.

Anglis, yellow Vetchling.

Habitat *inter segetes sed rarius.* ○. VI. VII.

** *Pedunculis bifloris.*

3. LATHYRUS pedunculis bifloris, cirrhis diphyllis, *hirsutus.*
foliolis linearī-lanceolatis, leguminibus hirsutis, fe-
minibus scabris. Roy. lugdb. 363. *Dalib. paris.*
 215. *Sp. pl.* 732.

DIADELPHIA DECANDRIA.

Lathyrus siliqua hirsuta. *Bauh. hist.* II. 205. *R. Syn.* 320.

Lathyrus angustifolius siliqua hirsuta. *Bauh. pin.* 344. *Anglis,* rough-codded Chickling-vetch.

Habitat in arvis. In the fields about Hockley and Ralegh, and elsewhere in Rochford hundred in Essex. *R. Syn.* In the border of a field between the road and Munden church; likewise among bushes within the gate leading to Laydon-hall, both in Dengy hundred, Essex, Mr. S. Dale. *Blackf. spec. bot.* 4. VII.

*** *Pedunculus multifloris.*

latifolius. 4. **LATHYRUS** pedunculis multifloris, cirrhis diphyllois, foliolis lanceolatis, internodiis membranaceis. *Fl. suec.* 645. *Sp. pl.* 733.

Lathyrus major latifolius. *Ger. Em.* 1229. *R. Syn.* 319.

Lathyrus latifolius. *Bauh. pin.* 344.

Lathyrus major perennis. *Park.* 1061.

Anglis, broad-leaved Pease-everlasting.

Habitat in sylvis et sepibus. In Madingley and other woods near Cambridge; Mr. Lawson observed it on the rocks by Red-neese by Whitehaven, plentifully. *R. Syn.* 4. VII.

sylvestris. 5. **LATHYRUS** pedunculis multifloris, cirrhis diphyllois; foliolis ensiformibus, internodiis membranaceis. *Sp. pl.* 738. *Fl. suec.* 644.

Lathyrus sylvestris major. *Bauh. pin.* 344.

Lathyrus sylvestris. *Dod. pempt.* 523. *Clus. hist.* II. 129. *Park.* 1061.

Lathyri majoris species flore rubente et albido minore dumetorum, f. *Germanicus.* *Bauh. hist.* II. 302. *R. Syn.* 319.

Anglis, narrow-leaved Pease-everlasting.

Habitat in sylvis et sepibus. Mr. Dale observed it near Castle-Campes, in the hedges by the way that leads thence to Bartlow in Cambridgeshire. *R. Syn.* Circa Rochester in Cantio; inter Bath et Bristol copiose. 4. VII. VIII.

6. LATHYRUS pedunculis multifloris, cirrhis poly- *palustris*.
phyllis stipulis lanceolatis. *Fl. suec.* 648. *Sp. pl.*

733.

Lathyrus peregrinis, foliis viciæ, flore subcæruleo
pallidive purpurascente. *Baub. pin.* 344.

Lathyrus viciæ formis f. *Vicia Lathyroides nostras*.
R. Syn. 320.

Vicia lathyroides f. *Lathyrus viciæ formis*. *R. pluk.*
ph. t. 71. *f. 2.*

Anglis, Marsh Chickling-vetch.

Habitat in pratis et pascuis subhumidis. In a wood
near Abingdon, Berkshire. *Blacks. spec. bot.*; upon
the bogs in Charley forest, near Bardon hill, Leicestershire, Mr. Pultney. *Phil. trans.* 24. VII.
VIII.

7. LATHYRUS pedunculis multifloris, cirrhis di- *pratensis*.
phyllis: foliolis lanceolatis: cirrhis simplicissimis.

Sp. pl. 733. *Fl. suec.* 647.

Lathyrus luteus sylvestris dumetorum. *Baub. hist.* II.
304. *R. Syn.* 320.

Lathyrus sylvestris flore luteo. *Ger. Em.* 1231. *Park.*
1062.

Lathyrus sylvestris luteus, foliis viciæ. *Baub. pin.*
344.

Anglis, Tare-everlasting, or common yellow Vetch-
ling.

Habitat in sylvis, sepibus, pratis, pascuis. 24. VII.
VIII.

V I C I A. 782.

Stigma latere inferiore transverse barbatum.

* *Pedunculis elongatis.*

1. VICIA pedunculis multifloris, floribus imbricatis, *eracea*.
foliolis lanceolatis pubescentibus, stipulis integris.

Sp. pl. 735. *Fl. suec.* 652.

Vicia multiflora. *Baub. pin.* 345. f. *spicata*. *Park.*
1072.

Cracca, *Riv. tetr.* 49. *Rupp. jen.* 212. *R. Syn* 322,

Anglis, tufted Vetch.

Habitat in nemorosis et sepibus. 24. VII. VIII.

- sylvatica*. 2. VICIA pedunculis multifloris, foliolis ovalibus, stipulis denticulatis. Sp. pl. 734 Fl. suec. 650.
Vicia sylvatica multiflora. Ph. br. R. Syn. 322.
Vicia multiflora maxima perennis, tetro odore, floribus albertibus lineis cæruleis striatis. Fluk. ph. t. 71. f. 1.
Anglis, tufted Wood Vetch.
 Habitat in sylvis et sepibus. In a wood near Caerwent in Monmouthshire; in the woods about Greta bridge, Yorkshire, Mr. Johnson; in Smoakhall wood by Bath, and at the Devizes, Wiltshire, Mr. Goodyer; supra pontem Kirby Lonsdale, Westmorlandiæ, Dr. Richardson. 24. VII. VIII.

** *Floribus axillaribus subsessilibus.*

- sepium*. 3. VICIA leguminibus pedicellatis subquaternis erectis, foliis ovatis integerimis: exterioribus decrescentibus. Sp. pl. 737. Fl. suec. 651.
Vicia sepium perennis. Baub. hist. II. 713. R. Syn. 320.
Vicia sepium folio rotundiore acuto. Baub. pin. 345.
Vicia maxima dumetorum. Ger. Em. 1727. Park. 1072.
 β *Vicia folio subrotundo*, brevi, obtuse mucronato, pediculo brevi insidente, flore viciæ sepium seu dumetorum vulgaris. R. Syn.
Anglis, Bush Vetch.
 Habitat in sylvis, sepibus, pratis et pascuis. 24. V.

- fativa*. 4. VICIA leguminibus sessilibus subbinatis erectis, foliis retulatis, stipulis notatis. Sp. pl. 736. Fl. suec. 654.
Vicia leguminibus erectis, petiolis polyphyllis, foliolis acumine emarginatis, stipulis dentatis. Hort. cliff. 368.
Vicia. Ger. Em. 1227. R. Syn. 320. *vulgaris sativa*. Park. 1072.
Vicia sativa vulgaris, semine nigro. Baub. pin. 344.
 β *Vicia sativa* vulgaris, semine albo. Baub. pin. 344.
Anglis, common Vetch, or Tare.

Habit ϖ

Habitat in agris, inter segetes frequens, ⊖. V. VI.
Pharmac. Viciæ semina.

5. VICIA leguminibus sessilibus solitariis erectis glabris *lathyroï-foliolis* fenis: inferioribus obcordatis. *Sp. pl.* 736. *des.*
Vicia sylvestris seu *Cracca major*. *Ger. Em.* 1227.
Vicia semine rotundo nigro. *Baub. pin.* 345.
Vicia lathyroides, purpureo-cæruleis floribus. *Herm. par.* 242. *t.* 242.
Aracus f. *Cracca major*. *Park.* 1070.
β *Vicia sylvestris* flore ruberrimo, siliqua longa nigra.
R. Syn. 321.
Anglis, Strangle Tare, or wild Vetch.
Habitat in arvis pratis et pascuis siccissimis præsertim solo arenoso. ⊖. V.
6. VICIA leguminibus reflexis pilosis solitariis, *lutea*.
pentaspermis, corollæ vexillis glabris. *Sp. pl.* 736.
Vicia foliis subsessilibus obverse ovatis apice emarginatis leguminibus solitariis villosis. *Dalib. paris.* 219.
Vicia sylvestris lutea siliqua hirsuta. *Baub. pin.* 345.
Vicia luteo flore sylvestris. *Baub. hist. II.* 313. *R. Syn.* 321.
Anglis, yellow Vetch.
Habitat in pratis et pascuis. On Glastenbury torne hill. *R. Syn.* ⊖. VI. VII.

ERVUM. 784.

Calyx quinquepartitus longitudine corollæ.

- I. ERVUM pedunculis subbifloris cirrhosis, petiolis a-*soloniense*. cuminatis, foliolis obtusis. *Cent. pl.*
Vicia minima præcox parisiensium. *Tourn.* 397.
R. Syn. 321.
Vicia minima. *Riv. tetr.*
Vicia pratensis verna, f. præcox solonensis semine cubico f. hexahedron referente. *Hist. Ox. II.* 63.
f. 2. t. 4. f. 14.
Anglis, Spring Tare.

Habitat *in pratis et pascuis solo cretaceo. On the chalky banks near Greenhithe, in Kent. R. Syn. O. IV. V.*

tetrasper- 2. ERVUM pedunculis subbifloris, feminis globosis quaternis. *Sp. pl. 738. Fl. suec. 655.*

Vicia segetum singularibus siliquis glabris. *Bauh. pin. 345.*

Cracca minor siliquis singularibus, flosculis cæruleo-centibus. *Hoff. cat. H. alt. R. Syn. 322.*

Anglis, smooth Tare.

Habitat *in arvis et ad marginibus agrorum. O. VI.*

hirsutum. 3. ERVUM pedunculis multifloris, feminis globosis binis. *Sp. pl. 738. Fl. suec. 656.*

Vicia segetum cum siliquis plurimis hirsutis. *Bauh. pin. 345.*

Vicia sylvestris seu Cracca minima. *Ger. Em. 1028.*

Aracus f. Cracca minor. *Park. 1070.*

Cracca minor. *Riv. tetr. ic. R. Syn. 322.*

Anglis, hairy Tare.

Habitat *cum priore. O. VI.*

O R N I T H O P U S. 790.

Legumen articulatum, teres, arcuatum.

perpusil- 1. ORNITHOPUS foliis pinnatis, leguminibus subarcuatis. *Sp. pl. 743.*

Ornithopus foliis pinnatis, articulis leguminum subrotundis lævibus. *Hort. cliff. 364.*

Ornithopodium minus. *Ger. Em. 1241. Bauh. pin. 350.*

Ornithopodium radice nodosa. *Park. 1093.*

Ornithopodium radice tuberculis nodosa. *Bauh. pin. 350.*

Ornithopodium majus. *Bauh. pin. 350. Park. 1093.*

Anglis, Bird's-foot.

Habitat *in glareosis. 4. V.—VIII.*

H I P P O C R E P I S. 791:

Legumen compressum, altera sutura pluries emarginatum, curvum.

- i. HIPPOCREPIS leguminibus pedunculatis confertis : *comosa*.
margin'e exteriore repandis. *Roy. lugd'b.* 384. *Sp.*
pl. 744.

Ferrum equinum germanicum filiquis in summitate.

Bauh. pin. 349. *R. Syn.* 325.

Ferrum equinum *comosum*. *Park.* 1091.

Hedysarum glycyrrhizatum. *Ger. Em.* 1233.

Anglis, tufted Horseshoe-vetch.

Habitat in pratis et pascuis solo cretaceo. On the chalky grounds about Gogmagog hills, and elsewhere in Cambridgeshire ; also on the northern mountains. In collibus cretaceis inter Northfleet et Gravesend. *R. Syn.* ♂. VII.

H E D Y S A R U M. 793.

Cor. carina transverse obtusa. *Legumen articulis monospermis.*

- i. HEDYSARUM foliis pinnatis, leguminibus monospermis aculeatis, corollarum alis brevissimis, caule chis. elongato. *Syst. nat.* 1171. *Sp. pl.* 751.

Onobrychis f. Caput Gallinaceum. *Ger. Em.* 1243.
R. Syn. 327.

Onobrychis vulgaris. *Park.* 1082.

Onobrychis foliis viciæ, fructu echinato major. *Bauh.*
pin. 350.

Polygalon Gesneri. *Bauh. hist. II.* 335.

Anglis, St. Foin, or Cock's-head.

Habitat in pratis et pascuis cretaceis. 4 VII.

A S T R A G A L U S. 799.

Legumen bilocular, gibbum.

- i. ASTRAGALUS caulescens prostratus, leguminibus glycyphyllo subtriquetris arcuatis, foliis ovalibus pedunculo los. longioribus. *Sp. pl.* 758. *Fl. suec.* 658.

Astragalus luteus perennis procumbens, vulgaris f. sylvestris. *Hist. Ox. II.* 107.

Glaux vulgaris f. Glycyrrhiza sylvestris. *Park.* 1098.

Glycyrrhyza sylvestris floribus luteo pallescentibus.
Bauh. pin. 352.

Hedysarum glycyrrhizatum. *Ger. Em.* 1233.

Anglis,

DIADELPHIA DECANDRIA.

Anglis, wild Liquorice, or Liquorice Vetch.

Habitat in pratis, pascuis, et ad sepes. Circa Charlton in Cantio copiose. 4. VI. VII.

arenarius. 2. ASTRAGALUS subcaulescens procumbens, floribus subracemosis erectis, foliis tomentosis. Sp. pl. 759. Fl. suec. 659.

Astragalus pedunculis folia villosa æquantibus, floribus erectis, caulis procumbentibus. It. scan. 108.

Astragalus incanus parvus purpureus nostras. Pluk. alm. 59. R. Syn. 326. t. 12. f. 3.

Glaux exigua montana purpurea nostras. R. Syn. ed. II. 192.

Anglis, Purple Mountain Milkwort.

Habitat in pratis et pascuis arenosiss. On Gogmagog hills, Newmarket heath, Royton heath, &c. About Haselwood, Yorkshire; Nullibi copiosus quam secus viam agrorum Pigburnensium, non procul Doncastria agri Eboracensis, D. Richardson. R. Syn. 4. VI. VII.

TRIFOLIUM. 802.

Flores subcapitati. Legumen vix calyce longius, non dehiscens, deciduum.

* *Meliloti leguminibus nudis polyspermis*.

m. offici- 1. TRIFOLIUM leguminibus racemosis nudis dispersmis, caule erecto. Hort. cliff. 375. Sp. pl. 765. Fl. suec. 663.

Melilotus officinarum germaniae. Bauh. pin. 331.

Melilotus vulgaris. Park. 719. R. Syn. 331.

Melilotus germanica. Ger. Em. 1205.

Anglis, common Melilot.

Habitat in arvis et ad sepes. 3. VI, VII.

Pharmac. Meliloti Herba, Flores.

ornithopo- 2. TRIFOLIUM leguminibus nudis octospermis subternis calyce duplo longioribus, caulis declinatis. Sp. pl. 766.

Medicago leguminibus ternatis erectis recurvis descendenteribus, pedunculo communi. Hort. cliff. 376.

Trifo-

Trifolium siliquis ornithopodii nostras. R. Syn. ed. II.

195.

Trifolium siliquosum loto affine siliquis ornithopodii.

Pluk. ph. t. 68. f. 1.

Fœnumgræcum humile repens, ornithopodii siliquis brevibus erectis. R. Syn. 331.

Anglis, Birdsfoot Trefoil.

Habitat in pratis et pascuis arenosis. Found by Mr. Th.

Willisel among the corn, half a mile on this side Tadcaster, towards Sherborn, as one goeth up the hill; also near Oxford, in the like grounds. Mr. Newton, in our company, found it on the sandy banks by the sea-side, at Tottlesbury in Essex, plentifully. Mr. Doody in Tothil-fields, Westminster. R. Syn. C. VI.

** *Lotoidea leguminibus testis polyspermis.*

3. *TRIFOLIUM capitulis umbellaribus, leguminibus repens. tetraspermis, caule repente. Sp. pl. 767. Fl. suec. 665.*

Trifolium capitulis subrotundis, flosculis pedunculatis, leguminibus tetraspermis, caule procumbente. Hort. cliff. 375.

Trifolium pratense album. Baub. pin. 327. Park. 1110. R. Syn. 327.

Trifolium minus pratense, flore albo. f. 2. Ger. Em. 1185.

β *Trifolium capitulis umbellaribus, leguminibus, tetra- hybridum spermis, caule adscendente. Sp. pl. 766. Fl. suec. 664.*

Anglis, white Trefoil, or Dutch Clover.

Habitat in pratis et pascuis ubique, β in pascuis humidis prope Peckham. 4. V.—IX.

*** *Lagopoda calycibus villosis monospermis.*

4. *TRIFOLIUM spicis globosis, corollis monopetalis, ochroleu- calycum infimo dente longissimo erecto, foliis cau- con. leque hirsutis.*

Trifolium pratense hirsutum majus, flore albo-sul- phureo, seu ἀχρολεύκω. R. Syn. 328.

Trifolium

*Trifolium lagapoides annum hirsutum pallide luteum
feu ochroleucum. Hist. ox. II. 141. f. 2. t. 12.
f. 12.*

Anglis, yellow flowered Trefoil.

*Habitat in pratis et pascuis siccioribus, in comitatibus
Essexiensis, Cantabrigiensis, frequens. 3. V. VI.*

pratense. 5. **TRIFOLIUM** spicis subvillosois cinctis stipulis oppo-
sitis membranaceis, corollis monopetalis. *Sp. pl.* 768. *Fl. suec.* 666.

*Trifolium spicis villosis, caule diffuso, foliolis inte-
gerrimis. Hort. cliff. 375.*

*Trifolium pratense. Ger. Em. 1185. purpureum.
Bauh. pin. 327. R. Syn. 328. vulgare. Park. 1110.*

β *Trifolium pratense purpureum minus, foliis cordatis.
R. Syn. 328. t. 13. f. 1.*

γ *Trifolium purpureum majus sativum, pratense simile.
R. Syn. 328.*

Anglis, purple or Honeysuckle Trefoil, γ Clover.

Habitat in pratis et pascuis. 4. V.—IX.

Pharmac. Trifolii pratensis Herba.

medium. 6. **TRIFOLIUM** spicis villosis globosis terminalibus,
corollis monopetalis foliolis lanceolatis subinteger-
rimis, caule erecto.

*Trifolium purpureum majus, foliis longioribus et an-
gustioribus, floribus saturioribus. R. Syn 328.*

*Trifolium montanum purpureum majus. Bauh. pin.
328.*

Anglis, long-leaved purple Trefoil.

Habitat in pratis et pascuis montofisis. 4. VII.

*mariti-
mum.* 7. **TRIFOLIUM** spicis villosis globosis, calycibus pa-
tulis æqualibus, caule adscendente foliolis cunei-
formibus hirsuis.

*Trifolium stellatum glabrum Ger. Em. 1208. Pluk.
pb. 113 f. 4. R. Syn. 329.*

Anglis, Teasel-headed Trefoil

*Habitat in pratis maritimis. Observed by Dr. John-
son in Dartford salt marsh; I found it by the water-
side at Lighé, and at Little-holland in Essex; at
Tilbury-fort, Mr. Petiver; plentifully about Sheer-
ness,*

ness, Mr. Doody. *R. Syn. prope Bristolium copiose;*
in pratis inter Greenhithe et Northfleet in Cantio.
 4. VII.

8. TRIFOLIUM spicis villosis ovalibus, dentibus *ca-* *arvense.*
lycinis setaceis *æqualibus.* *Sp. pl. 769. Fl. suec.*
 668.

Trifolium arvense humile spicatum s. Lagopus. *Bauh.*
pin. 328. R. Syn. 330.

Lagopus vulgaris. *Park. 1107.*

Lagopodium sive Pes leporis. *Ger. Em. 1192.*

- β Lagopus perpusillus supinus perelegans maritimus.
Ph. br. R. Syn. 330.

Anglis, Hare's-foot Trefoil.

Habitat in pascuis arenosis et arvis. ○. VII. VIII.

9. TRIFOLIUM capitulis sessilibus sublateralibus ova-*striatum-*
tis, calycibus striatis rotundatis. *Sp. pl. 770. Fl.*
suec. 669.

Trifolium parvum hirsutum, floribus parvis dilute pur-
 pureis in glomerulis mollioribus et oblongis, semine
 magno. *R. Syn. 329. t. 12. f. 3.*

Anglis, knotted Trefoil.

Habitat in pascuis siccioribus. ○. VI.

10. TRIFOLIUM capitulis sessilibus globosis, calyci-*glomer-*
bus *striatis* *patulis* *æqualibus.* *Sp. pl. 770. tum.*

Trifolium cum glomerulis ad caulum nodos rotundis.

R. Syn. 329.

Anglis, round-headed Trefoil.

Habitat in pratis et pascuis arenosis. On Blackheath,
 and near Greenhithe in Kent, Mr. Doody. *R. Syn.*
 ○. VI.

11. TRIFOLIUM capitulis sessilibus ovatis, calycibus *scabrum.*
vilosis *inæqualibus.* *Sp. pl. 770.*

Trifolium capitulo oblongo aspero. *Bauh. pin. 329.*
pr. 140.

Trifolium cuius caules ex geniculis glomerulos ob-
 longos proferunt. *Bauh. hist. II. 378.*

Trifolium

DIADELPHIA DECANDRIA.

Trifolium flosculis albis, in glomerulis oblongis asperis,
cauliculis proxime adnatis. R. Syn. 329. Vaill.
paris. 169. t. 33. f. 1.

Anglis, Oval-headed Trefoil.

Habitat in collibus cretaceis juxta Thameſin, inter
Northfleet et Gravesend. R. Syn. in insula Shepey
copioſe. ♂. V. VI.

subterra- 12. TRIFOLIUM capitulis villosis subquinquefloris, in-
neum. Trifolium pumilum supinum flosculis longis albis. Ph.
br. R. Syn. 327.

Trifolium album tricoccum subterraneum reticula-
tum. Hist. ox. II. 138. f. 2. t. 14. f. 5.

Anglis, dwarf Trefoil.

Habitat in pascuis sterilioribus circa Londinum fre-
quens. ♂. V.

***** *Vesicaria calycibus inflatis ventricosis.*

fragife- 13. TRIFOLIUM capitulis subrotundis. calycibus in-
flatis bidentatis reflexis, caulis repentibus. Hort.
cliff. 373. Fl. suec. 670. Sp. pl. 772.

Trifolium fragiferum. Ger. Em. 1208. R. Syn. 329.
frisicum. Bauh. pin. 329. Clus. cur. app. 38. t. 39.
Park. 1109.

β Trifolium fragiferum purpureum folio oblongo. Hist.
ox. II. 144.

Anglis, Strawberry Trefoil.

Habitat in pratis et pascuis humidis. 24. VIII.

***** *Lupulina vexillis corollæ reflexis.*

agrarium. 14. TRIFOLIUM spicis ovalibus imbricatis, vexillis
deflexis persistentibus, calycibus nudis, caule erec-
to. Sp. pl. 772. Fl. suec. 671.

Trifolium pratense luteum, capitulo lupuli, vel agrari-
um. Bauh. pin. 328. R. Syn. 330.

Trifolium luteum minimum. Ger. Em. 1186. Lob.
ii. 29. Park. III.

Anglis,

Anglis, Hop Trefoil.

Habitat in pratis glareofis. O. VI.

15. TRIFOLIUM spicis ovalibus imbricatis, vexillis procum-
deflexis persistentibus, caulis procumbentibus. bens.

Sp. pl. 772. Fl. suec. 673.

Trifolium lupinum alterum minus. *R. Syn. 330. t.*

f. 3.

Anglis, decumbent Trefoil.

Habitat in pascuis et pratis. 4. V.—VIII.

16. TRIFOLIUM spicis subimbricatis, vexillis deflexis *filiforme*.
persistentibus, calycibus pedicellatis. caulis pro-
cumbentibus. *Sp. pl. 773. Fl. suec. 674.*

Trifolium lupulinum minimum. *R. Syn. 331. t. 14.*

f. 4.

Anglis, small Trefoil.

Habitat in pratis arenosis passim. O. V. VI.

M E D I C A G O. 805.

*Legumen compressum cochleatum. Carina corollæ
a vexillo deflexens.*

1. MEDICAGO pedunculis racemosis, leguminibus lu- *falcata*.
natis caule prostrato. *Sp. pl. 779.*

Medicago pedunculis laxe spicatis leguminibus con-
tortis caule erecto glabris. *Hort. cliff. 377.*

Medica sylvestris. *Bauh. hist. II. 383. R. Syn. 333.*

Medica frutescens flavo flore Clusii. *Park. 1114.*

Trifolium luteum siliqua cornuta. *Ger. Em. 1191.*

Trifolium luteum sylvestre, siliqua cornuta et medica
frutescens. *Bauh. pin. 330.*

Anglis, yellow Medick.

Habitat in aggeribus agrorum et ad vias in Norfolcia;
between Bushyhill and Watford, the footway, Mr.
Doody. *R. Syn. 4. VII.*

- *2. MEDICAGO pedunculis racemosis, leguminibus *sativa*.
contortis, caule erecto glabro. *Hort. cliff. 377. Sp.
pl. 778.*

Medica legitima. *Cluf. hist. II. 242.*

Medica sativa. *Hist. ox. II. 150. f. 2. t. 16. f. 2.*

Foenum buigundiacum. Loc. ic. 2. p. 36.

Anglis, Lucern.

Habitat in pratis et pascuis. 24. VI. VII.

- lupulina.* 3. MEDICAGO spicis ovalibus, leguminibus reniformibus monospermis, caule procumbente. Sp. pl. 779. Fl. suec. 678.
Medica polycarpos fructu minore compresso scabro. R. Syn. 333.
Trifolium luteum lupulinum. Ger. Em. 1186. R. Syn. 331.
Trifolium montanum lupulinum. Park. 1105.
Trifolium pratense luteum, capitulo breviore. Baub. pin. 328.
Anglis, Melilot Trefoil.
Habitat in arvis, pratis et pascuis arenosis. ⊖. V.—VIII.

- arabica.* 4. MEDICAGO pedunculis racemosis, leguminibus cochleatis spinosis, caule diffuso. Sp. pl. 780.
Medica Arabica Camerarii, sive *Trifolium cordatum*. Park. 1115.
Trifolium cochleatum folio cordato maculato. Baub. pin. 329. R. Syn. 333.
Trifolium cordatum. Ger. Em. 1190.
 β *Medica echinata* minima. Baub. hist. II. 386.
 γ *Trifolium cochleatum* modiolis spinosis. R. Syn. 333.
 δ *Medica marina* supina nostras, foliis viridibus ad summos ramiulos villosis. Pluk. alm. 245.
Anglis, Heart Trefoil, or Claver.
Habitat in pratis, pascuis, et inter segetes. ⊖. V.

LOTUS. 803.

Legumen cylindricum, strictum. Alœ sursum longitudinaliter conniventes. Cal. tubulosus.

- cornicula-* 1. *LOTUS* capitulis depresso-crenatis, caulis decumbentibus, leguminibus cylindricis patentibus. Sp. pl. 775. Fl. suec. 675.
Lotus corniculata glabra minor. Baub. hist. II. 356.
R. Syn. 334.

Lotus

- Lotus f. melilotus pentaphyllos minor glabra. *Bauh.*
pin 332.
Trifolium filiqueum minus. *Ger. Em.* 1191.
β Lotus pentaphyllos minor angustioribus foliis fruticoflor. *R. Syn.* 334.
γ Lotus pentaphyllos flore majore luteo splendente.
Bauh pin. 332.
δ Lotus corniculata major, minus hirsuta. *R. Syn.* 334.
ε Lotus corniculata minor, foliis subtus incanis. *R. Syn.*
334.
Anglis, Bird's-foot Trefoil.
Habitat *in pratis pascuis et ad sepes.* γ *in sylvis et*
sepibus humidis. 24. VI.—VIII.

U

Classis

Classis XVIII.

POLYADELPHIA

P O L Y A N D R I A.

H Y P E R I C U M . 808.

Cal. quinquepartitus. *Petala* quinque. *Filamenta* multa, in quinque phalanges.

- perforatum.* 1. HYPERICUM floribus trigynis, caule ancipiti, foliis obtusis pellucido-punctatis. *Hort. cliff.* 380. *Sp. pl.* 785. *Mat. med.* 368. *Fl suec.* 681.
Hypericum. *Ger. Em.* 540. *R. Syn.* 342. *vulgare.*
Bauh. pin. 279. *Park.* 572.
Hypericum vulgare s. perforata, caule rotundo, foliis glabris. *Bauh hist.* III. 381.
Anglis, St John's Wort.
Habitat in dumetis et ad sepes. 24. VII.
Pharmac. Hyperici Herba Flores Semina.
- humifusum,* 2. HYPERICUM floribus trigynis axillaribus solitariis, caulis ancipitibus filiformibus, foliis glabris. *Syst. nat.* 1184.
Hypericum floribus trigynis, caulis ancipitibus prostratis. *Sp. pl.* 785. *Fl. suec.* 681.
Hypericum minus supinum. *Park.* 572. *R. Syn.* 343.
Hypericum supinum glabrum. *Ger. Em.* 541. *Bauh. pin.* 279.
Anglis, trailing St. John's Wort.
Habitat in pratis et pascuis glareosis. 24. VII.
- pulchrum.* 3. HYPERICUM floribus trigynis, calycibus ferrato-glandulosis, foliis cordatis glabris, bracteis integerimis, caule tereti. *Syst. nat.* 1184. *Sp. pl.* 786.
Hypericum foliis cordatis connatis, laciinis calycinis ovatis obtusis. *Guett. flamp.* II. 175.

Hypericum

Hypericum foliorum basi latissima, foliis calycis brevioribus obtusis. *Hall. helv.* 361.

Hypericum minus erectum. *Baub. pin.* 279.

Hypericum pulchrum Tragi. *Baub. hist. III.* 383.
R. Syn. 342.

Hypericum quintum s. pulchrum Tragi. *Ger. Em.* 540.
Anglis, upright St. John's Wort.

Habitat in sylvis, sepibus et ericetis. 4. VII.

4. HYPERICUM floribus trigynis, fructibus baccatis, *Androsæmum.*
caule fruticoso ancipi. *Sp. pl.* 785.

Hypericum floribus trigynis, fructu baccato, foliis ovatis pedunculo longioribus. *Hort. cliff.* 380.

Hypericus maximum Androsæmum vulgare dictum.
R. Syn. 343.

Androsæmum vulgare. *Park.* 575.

Androsæmum maximum frutescens. *Baub. pin.* 280.

Clymenum Italorum. *Ger. Em.* 548.

Anglis, Tutsan, or Park-leaves.

Habitat in sylvis et sepibus humidis frequens. 4. VII.

5. HYPERICUM floribus trigynis, calycibus ferrato- *montanum*
glandulosis, caule erecto, foliis ovatis glabris. *Fl.*
suec. 683.

Hypericum elegantissimum non ramosum folio lato.
Baub. hist. III. 383 *R. Syn.* 343.

Androsæmum campoclarense. *Col. ecphr.* I. 73. t. 74.

Afcyon s. Hypericum bifolium glabrum non perforatum. *Baub. pin.* 280.

Anglis, imperforate St. John's Wort.

Habitat in sylvis et dumetis montofisis. In Charleton
wood. *Blacks. spec. bot.* 4. VII.

6. HYPERICUM floribus trigynis, calycibus ferrato- *hirsutum.*
glandulosis, caule erecto, foliis ovatis pubescentibus. *Sp. pl.* 786. *Fl. suec.* 682.

Hypericum majus s. Androsæmum matthioli. *R. hist.*
100.

Androsæmum hirsutum. *Baub. pin.* 280.

Androsæmum Afcyon dictum, caule rotundo hirsuto. *Hist. ox.* II. 271. f. 5. t. 6. f. 11.

Anglis, Tutsan, or hairy St. John's Wort.

Habitat in dumetis et sepibus. 4. VII.

- quadran-* 7. HYPERICUM floribus trigynis, caule quadrato her-
baceo. *Sp. pl.* 785. *Fl. suec.* 679
gulum. Hypericum Ascyon dictum, caule quadrangulo.
Baub. hist. III. 382. *R. Syn.* 344.
Ascyon. *Ger. Em.* 542. *Dod. pent.* 78. *vulgare.*
Park. 575.
Anglis, St. Peter's Wort.
Habitat in sepiibus humidis frequens. 24. VII.
- elodes.* 8. HYPERICUM floribus trigynis, foliis rotundis to-
mentosis, caule repente.
Ascyon supinum villosum palustre. *Baub. pin.* 280.
Park. 574. *R. Syn.* 344.
Ascyon supinum Ελωδες Clusii. *Ger. Em.* 542.
Anglis, Marsh St. Peter's Wort.
Habitat in palustribus solo putrido aut spongioso. In
Sherley common inter Croydon et Wickham copiose.
In ericeto Hamstediano. 24. VII.

Classis

*Classis XIX.***S Y N G E N E S I A :**
POLYGAMIA AEQUALIS.

* *Semiflosculosi* Tournef. *corollis ligulatis omnibus.*

T R A G O P O G O N . 810.

Receptaculum nudum. Cal. simplex, polyphyllus.

Pappus plumosus.

1. TRAGOPOGON calycibus corollæ radium æquans *pratense*:
tibus, foliis integris strictis. Sp. pl. 789. Fl. suec.
685.

Tragopogon luteum. Ger. Em. 735. Park. 412.
R. Syn. 171.

Tragopogon pratense luteum majus. Baub. pin. 274.
Anglis, yellow Goat's-beard.

Habitat in pratis et pascuis. ♂. VI.

2. TRAGOPOGON calycibus corollæ radio longiori- *porrifoli-*
bus, foliis integris nudis, pedunculis superne incrassatis. *Syst. nat.* 1191. Sp. pl. 789.

Tragopogon purpuro-cæruleum, porrifolio, quod Artiffulgo. Baub. pin. 274. Hift. ox. III. 8. f. 1. t.
9. f. 5.

Tragopogon purpureum. Ger. Em. 735. Park. 412.
R. Syn. 172.

Anglis, purple Goat's-beard.

Habitat in pratis et pascuis. In many places of Cornwall, Dr. Gunthorp; In the fields about Carlisle and Rose-Castle, Cumberland. R. Syn. In the marshes near Long-Reach, below Woolwich, Mr. Jarvis. In some meadows near Edmonton, Mr. Hurlock. Blackf. Spec. bot. ♂. VI.

P I C R I S. 812.

Recept. nudum. *Cal.* caliculatus. *Pappus* plumosus. *Sem.* transversim sulcata.

Echioides. 1. PICRIS perianthiis involucro maximo cinctis. *Hort. upf.* 241. *Sp. pl.* 792.

Picris calycibus simplicibus, perianthio maximo obvallatis. *Hort. cliff.* 387. *Roy. lugdb.* 128.

Hieracium echioides, capitulis cardui benedicti. *Baub. pin.* 128. *R. Syn.* 166.

Buglossum luteum. *Ger. Em.* 798. f. *Lingua bovis*. *Park.* 800.

Anglis, Ox's Tongue.

Habitat in marginibus agrorum. ☽. VII. VIII.

Hieraci- 2. PICRIS perianthiis imbricatis. *Hort. cliff.* 387. *cides.* *Lech. scan.* 62. *Sp. pl.* 792. *Fl. suec.* 686.

Hieracium asperum, majore flore, in agrorum limitibus. *Baub. hist. II.* 1029. *R. Syn.* 167.

Hieracium asperum. *Ger Em.* 298.

Cichorium pratense luteum hirsutie asperum. *Baub. pin.* 126.

Cichorium pratense luteum asperum. *Park.* 777.

Anglis, yellow Succory, or rough Hawkweed.

Habitat in agrorum marginibus. ☽. VII.

S O N C H U S. 813.

Recept. nudum. *Cal.* imbricatus, ventricosus. *Pappus* plumosus.

soleraceus. 1. SONCHUS pedunculis tomentosis, calycibus lævibus. *Sp pl.* 794. *Fl. suec.* 688.

Sonchus caule ramosissimo diffuso foliis summis amplexicaulibus, pedunculis inæqualibus. *Roy. lugdb.* 129

α *Sonchus lævis*. *Ger. Em.* 292. *R. Syn.* 162. *vulgaris*. *Park.* 805.

Sonchus lævis laciniatus latifolius. *Baub. pin.* 124.

β *Sonchus lævis minor paucioribus laciniis*. *Baub. pin.* 124.

γ *Sonchus asper laciniatus*. *Baub. pin.* 124. *Park.* 804.

δ *Sonchus alper non laciniatus*. *Baub. pin.* 123.

ε *Sonchus*

1. Sonchus subrotundo folio nostras, lævissimis spinulis circa foliorum oras exasperatus. *Pluk. alm.* 354. *t. 61. f. 5.*

Sonchus ἀρυλλόκαυλος angusto et oblongo folio nostras, per foliorum ambitum creberrimis spinulis asperatus. *Pluk. ph. t. 62. f. 4.*

Sonchus asper dentatus. *Pet. b. br. t. 14. f. 4.*

Sonchus lævis laceratus. *Pet. b. br. t. 14. f. 10.*

Anglis, common Sow-thistle.

Habitat in ruderatis, cultis, arvis. ○. VI.—VIII.

Pharmac. Sonchi Herba.

2. SONCHUS pedunculis calycibusque hispidis subum- *arvensis*. bellatis, foliis basi cordatis. *Sp. pl. 793. Fl. suec.* 687.

Sonchus foliis lanceolato-oblongis dentatis, floribus congestis hispidis. *Hort. cliff. 384.*

Sonchus repens, multis Hieracium majus. *Baub. hist. II. 1070. R. Syn. 163.*

Sonchus arborescens. *Ger. Em. 294.*

Hieracium majus folio Sonchi. *Baub. pin. 126.*

Anglis, Tree Sow-thistle.

Habitat in arvis et ad sepes. 24. VIII.

3. SONCHUS pedunculis calycibusque hispidis subum- *palustris*. bellatis, foliis basi sagittatis. *Sp. pl. 793.*

Sonchus caule eretto, foliis pinnato-hastatis apiceque hastatis, floribus congestis villosis. *Hort. cliff. 385.*

Sonchus tricubitalis, folio cuspidato. *Merr. pin. R. Syn. 163.*

Sonchus arborescens alter. *Ger. Em. 294.*

Sonchus asper arborescens. *Baub. pin. 124.*

Anglis, Marsh Sow-thistle.

Habitat ad ripas Thameſis fluvii non procul Greenvico, et circa Blackwall, *R. Syn. 24. VIII.*

L A C T U C A. 814.

Recept. nudum. *Cal. imbricatus, cylindricus. Pap-*
pus simplex, stipitatus.

1. LACTUCA foliis verticalibus carina aculeatis. *Syst. viroſa.*
nat. 1193.

SYNGENESIA : POLYGAMIA ÆQUALIS.

*Lactuca sylvestris major odore opii. Ger. Em. 309.
R. Syn. 161.*

Lactuca sylvestris odore viroso. Bauh. pin. 123.

Lactuca viroso. Park. 813.

β *Lactuca sylvestris costa spinosa. Bauh. pin. 123.*

γ *Lactuca sylvestris folio non laciniato. R. Syn. 162.*

Anglis, strong-scented wild Lettuce.

Habitat ad sepes et agrorum margines. ♂. VII. VIII.

faligna. 2. *LACTUCA* foliis hastato-linearibus sessilibus carina aculeatis. *Amoen. acad. I. 150. Sp. pl. 796.*

Lactuca foliis imis pinnatifidis, cæteris ensiformibus basi hastatis, dorso ferratis. *Sauv. monsp. 692.*

Lactuca foliis radicalibus linearibus dentato-pinnatis :
Iaciniis sursum dentatis : caulinis alato-lanceolatis,
floribus linearibus sessilibus. *Guet. stamp. 374.*

Lactuca sylvestris minima. R. cat. cant. syn. 162.

*Chondrilla viscosa humilis. Bauh. pin. 130. pr. 68.
Park. 783. Ger. Em. 287.*

Anglis, the least wild Lettuce.

*Habitat in aggeribus fossarum et pascuis solo cretaceo
passim. ○. VIII.*

PRENANTHES. 816.

*Recept. nudum. Cal. calyculatus. Pappus simplex,
subsessilis, Flosculi simplici serie.*

muralis. 1. *PRENANTHES* flosculis quinis, foliis lyrato-hastatis. *Hort. cliff. 383 Fl suec. 692. Sp. pl. 797.*

*Lactuca sylvestris murorum flore luteo. Bauh. bijt. II.
104. R. Syn. 162.*

Sonchus lœvis muralis. Ger. Em. 293.

Sonchus lœvis alter parvis floribus. Park. 805.

*Sonchus lœvis laciniatus muralis parvis floribus. Bauh.
pin. 124.*

Anglis, Ivy-leaved wild Lettuce.

*Habitat in muris et sylvis umbrosis. Prope Hornsey.
2. VII.*

LEONTODON. 817.

*Recept. nudum. Cal. imbricatus, squamis laxiusculis.
Pappus plumosus.*

I. L E.

1. LEONTODON calyce inferne reflexo. *Fl. lapp. Taraxacum*
 280. *Mat. med.* 368. *Sp. pl.* 798. *Fl. suec.* 693. *cum.*
Dens leonis. Ger. Em. 290. *R. Syn.* 171. *vulgaris.*
Park. 780.
Dens leonis latiore folio. Baub. pin. 126.
 β *Dens leonis angustiore folio. Baub. pin.* 126.
 γ *Dens leonis montanus angustifolius. R. Syn.* 171.
Hieracium montanum angustifolium nonnihil incanum.
Baub. pin. 129.
Anglis, Dandelion.
Habitat in pratis et pascuis. 24. IV.—VI.
Pharmac. Taraxaci Radix, Herba.
2. LEONTODON calyce toto erecto hispido, foliis *bispidum.*
hispidis dentatis integrerrimis; setis furcatis. Syt.
nat. 1194. *Fl. suec.* 694. *Sp. pl.* 799.
Dens leonis hirsutus λεπτόκαυλος, Hieracium dictus.
R. Syn. 171.
Hieracium Dentis leonis folio hirsutum. Ger. Em.
303.
Hieracium asperum flore magno Dentis leonis. Baub.
pin. 127.
Hieracium asperum foliis et floribus dentis leonis bul-
bosi. Park. 788.
 β *Crepis foliis lanceolatis dentato-sinuatis hispidis; setis*
subulatis, scapo unifloro. Sp. pl. 805.
Hieracium pumilum saxatile asperum premorsa radice.
Baub. pin. 128. *pr.* 66. *ic.* *R. Syn.* 167.
Anglis, rough Dandelion.
Habitat in pratis et pascuis. 24. V. VI.
3. LEONTODON foliis glabris dentatis integerrmis, *autumnale*
calycibus erectis, pedunculis squamosis. Sp. pl. 798.
Fl. suec. 695.
Crepis foliis longis dentatis linearibus, caule declinato
subnudo. Hort. cliff. 389.
Hieracium minus præmorsa radice. Park. 794. *R. Syn.*
165.
Hieracium minus s. leporinum. Ger. Em. 296.
Hieracium chondrillæ folio glabro, radice succisa,
majus. Baub. pin. 127.

β Hieracium

β Hieracium præmorsum laciniatum. Pet. b. br. t.
12. f. 2.

Anglis, yellow Devil's-bit.

Habitat in pratis et pascuis. 24. VIII.

HIERACIUM. 818.

Recept. nudum. *Cal.* imbricatus, ovatus. *Pappus* simplex, sessilis.

* *Scapo nudo unifloro.*

alpinum. 1. HIERACIUM foliis oblongis integris dentatis, caule subnudo unifloro, calyce piloso. Sp. pl. 800. Fl. suec. 696.

Hieracium alpinum pumilum, folio lanuginoso. Baub. pin. 129.

Hieracium villosum alpinum, flore magno singulari. R. Syn. 169. t. 6. f. 2.

Anglis, Mountain Hawkweed.

Habitat in editoribus Venedotiae et Provisiæ rupibus paßim. D. Lhwyd. R. Syn. 24. VII.

Pilosella. 2. HIERACIUM foliis integerimis ovatis subtus tomentosis, caule repente, scapo unifloro. Sp. pl. 800. Fl. suec. 697.

Pilosella repens. Ger. Em. 638. R. Syn. 170.

Pilosella minor vulgaris repens. Park. 690.

Pilosella major repens hirsuta. Baub. pin. 262.

Anglis, common creeping Mouse-ear.

Habitat in pratis et pascuis siccissimis frequens. ⊖. V.

Pharmac. Pilosellæ s. Auriculæ muris Herba.

** *Scapo nudo multifloro.*

dubium. 3 HIERACIUM. foliis integris ovato-oblongis, stolone repente, scapo nudo multifloro. Sp. pl. 800. Fl. suec. 698.

Hieracium foliis virentibus pilosis ovato-lanceolatis, scapo simplici multifloro. Hall. helv. 743.

Hieracium piloselloides vulgare. Vaill. act. Gal. 1721. p. 238.

Pilosella major repens minus hirsuta. Baub. pin. 262. *Anglis*, Mouse-ear Hawkweed.

Habitat

Habitat in monte Fairfield dicta, prope Rydal in comitatu Westmorlandico. 4. VII. VIII.

4. HIERACIUM foliis integerrimis lanceolatis, scapo *Auricula*. nudo multifloro. *Fl. lapp.* 289. *Sp. pl.* 800. *Fl. suec.* 699

Hieracium foliis integerrimis, caule repente, scapo nudo multifloro. *Hort. cliff.* 388.

Pilosella major erecta altera. *Bauh. pin.* 262.

Pilosella repens minor, caule pedali, polyanthos, foliis angustis oblongis. *Raj. app.* 147.

Anglis, narrow-leaved Hawkweed.

Habitat in pratis montosis supra Dalehead, non longe a Grassmere in Westmorlandia, sed sparsim. 4. VII.

Folia lanceolata, acuta subintegerrima. Scapus eretus nudus, vix semipedalis pilis minimis adspersus, Panicula a 3. ad 6. floribus luteis. Calycis foliola linearia pilosa.

*** *Caule folioso.*

5. HIERACIUM caule ramoso, foliis radicalibus ovatis *muronum*. dentatis, caulino minore. *Hort. cliff.* 388. *Sp. pl.* 802. *Fl. suec.* 701.

Hieracium caule ramoso, foliis dentatis. *Fl. lapp.* 284.

Hieracium murorum foliis pilosissimo. *Bauh. pin.* 129. *R. Syn.* 168.

Hieracium murorum *Bauhini*, quod est *Pulmonaria Gallorum* *Lobelii*. *Park.* 801.

Pulmonaria gallica f. *aurea latifolia*. *Ger. Em.* 304.

β *Hieracium Pulmonarium* dictum *angustifolium*. *R. Syn.* 168.

Pulmonaria gallica f. *aurea angustifolia*. *Ger. Em.* 304.

γ *Hieracium macrocaulon* *hirsutum* folio rotundiore. *R. Syn.* 169.

Hieracium fruticosum folio subrotundo. *Bauh. pin.* 126.

δ *Hieracium λεωτίκαυλον* *hirsutum* folio longiore. *R. Syn.* 169.

ε *Pilosellæ majoris* seu *Pulmonariæ luteæ* species *angustifolia*. *Bauh. hist.* II. 1034.

Anglis,

Anglis, French or golden Lungwort.

Habitat in *sylvis*, *muris antiquis et aggeribus umbrosis*
passim. 24. VII.

paludosum 6. HIERACIUM caule paniculato, foliis amplexicaulibus dentatis glabris, calycibus hispidis. Sp. pl. 803. Fl. suec. 702.

Hieracium foliis amplexicaulibus minute dentatis glabris. Hall. helv. 748.

Hieracium montanum latifolium glabrum minus. Bauh. pin. 129. Hist. ox. III. 69. f. 7. t. 5. f. 47.

Hieracium montanum cichorei folio. R. Syn. 166.

Anglis, Succory-leaved Hawkweed.

Habitat in *pratis humidis et juxta rivulos Cravoniæ montosos abundat*. R. Syn. 8. VII.

sabaudum. 7. HIERACIUM caule erecto multifloro, foliis ovato-lanceolatis dentatis semiamplexicaulibus. Roy. lugdb. 124. Sp. pl. 804. Fl. suec. 703.

Hieracium fruticosum latifolium hirsutum. Bauh. pin. 129. Park. 802. R. Syn. 167.

β Hieracium fruticosum latifolium glabrum. Park. 168.

γ Hieracium s. Pilosellæ majoris species humilis, foliis longioribus rarius dentatis plurimis simul, flore singulari nostras. R. Syn. 170. Pluk. ph. t. 37. f. 3.

Anglis, broad-leaved bushy Hawkweed.

Habitat in *sylvis et sepibus*, β in *sylvis humidis opacis*. 24 VII. VIII.

umbellatum. 8. HIERACIUM foliis linearibus subdenticulatis sparsis, floribus subumbellatis. Sp. pl. 804. Fl. suec. 704.

Hieracium fruticosum angustifolium majus. Bauh. pin. 129. Park. 801. R. Syn. 168.

Hieracium intybaceum. Ger. Em. 298.

β Pulmonaria angustifolia glabra. Pet. b. br. t. 13. f. 12.

γ Pulmonaria graminea. Pet. b. br. t. 13. f. 12.

Anglis, narrow-leaved bushy Hawkweed.

Habitat cum priore. 24. VII. VIII.

C R E P I S. 819.

Recept. nudum. *Cal.* calyculatus : squamis deciduis.
Pappus plumosus, stipitatus.

1. CREPIS foliis lanceolatis sagittatis sessilibus lœvibus, *tectorum.*
 inferioribus dentatis. *Sp. pl.* 807. *Fl. suec.* 705.
Hieracium luteum glabrum sive minus hirsutum. *Baub.*
Hist. II. 1024. *R. Syn.* 165.
Cichoreum pratense luteum lœvius. *Baub. pin.* 126.
Park. 778.
Hieracium aphacoides. *Ger. Em.* 297.
 β *Hieracium aphacoides acutum.* *Pet. b. br. t.* 12. *f.* 7.
 γ *Hieracium folio acuto minus.* *Pet. b. br. t.* 12. *f.* 3.
 δ *Hieracium folio obtuso minus.* *Pet. b. br. t.* 12. *f.* 4.
 ϵ *Hieracium Lactucæ folio.* *Pet. b. br. t.* 12. *f.* 5.
 Dens leonis ramosus glaber. *Pet. b. br. t.* 14. *f.* 12.
Anglis, smooth Succory Hawkweed.
 Habitat in pratis, pascuis, muris, tectis ubique. \odot . VI.
 —IX.
2. CREPIS foliis pinnato hastatis scabris : basi superne *biennis.*
 dentatis, calycibus muricatis. *Sp. pl.* 807. *Fl. suec.*
 706.
Hieracium maximum chondrillæ folio, asperum. *Baub.*
pin. 127. *pr.* 64. *R. Syn.* 166.
Hieracium cichorei folio majus. *Pet. b. br. t.* 12.
f. 10.
Anglis, rough Succory Hawkweed.
 Habitat in pratis pascuis et ad sepes. *In Cantio fre-*
quens. *R. Syn.* 3. VII. VIII.
3. CREPIS foliis pinnatis angulatis, petiolis dentatis. *fœtida.*
Roy. lugdb. 126. *Sp. pl.* 807.
Hieracium luteum cichorei sylvestris folio, amygdalas
 amaras olens. *Hist. ox. III.* 63. *f.* 7. *t.* 4. *f.* 4.
Hieracium castorei odore. *Pet. b. br. t.* 12. *f.* 8.
 monspeliensium. *R. Syn.* 165.
Senesio hirsutus. *Baub. pin.* 131.
Anglis, stinking Hawkweed.
 Habitat in pascuis circa Cantabrigiam et alibi sed rari-
 us. *R. Syn.* On Bansted Downs, by the side of the
 road

road to Dorking in Surry. In Northfleet chalk-pits,
Kent. *Blackf. spec. bot. ♂. VI. VII.*

H Y O S E R I S. 821.

Recept. nudum. Cal. subæqualis. Pappus pilosus
vel obsoletus.

- minima.* 1. HYOSERIS caule diviso nudo. *Sp. pl. 809. Fl. suec. 707.*
Hyoseris angustifolia. Tabern. ic. 180.
Hyoseris mascula. Ger. Em. 288.
Hieracium minimum Clusii, Hyoseris Tabernæmon-
tani et Gerardi. Park. 791. R. Syn. 173.
Hieracium minus folio subrotundo. Bauh. pin. 127.
Anglis, small Swine's Succory.
Habitat in pratis et arvis solo glareoso. Circa Hamp-
ton-court copiose observavavit, D. Doody. R. Syn. in
a sand-pit on the right-hand going to the duke of Ar-
gyle's house at Petersham, Surry, Dr. Wilmer.
In the common corn-field at Walthamstow, Essex,
Dr. Watson. In Tuddington field near Hampton-
court. Blackf. spec. bot. ♂. V. VI.

H Y P O C H Æ R I S. 822.

Recept. paleaceum. Cal. subimbricatus. Pappus
plumosus.

- radicata.* 1. HYPOCHÆRIS foliis dentato-sinuatis scabris, caule
 ramoso nudo, pedunculis squamosis. *It. scan. 225.*
Sp. pl. 811. Fl. suec. 709.
Hieracium, dentis leonis folio obtuso, majus. Bauh.
pin. 127.
Hieracium longius radicatum. Lob. hist. 120. Ger. Em.
298. Park. 790. R. Syn. 165.
Anglis, Long-rooted Hawkweed.
Habitat in pratis et pascuis. 4. V.—VII.

- macculata.* 2. HYPOCHÆRIS caule subnudo, ramo subfolitario,
 foliis ovato-oblongis integris dentatis. *Sp. pl. 810.*
Fl. suec. 708.
Hieracium I. latifolium. Cluf. hist. II. 139. R. Syn.
167.

Hieracium

Hieracium alpinum latifolium hirsutie incanum, flore magno. Baub. pin. 128.

Anglis, spotted Hawkweed.

Habitat in pratis montosis. Found on the banks of the devil's ditch near Reche, not far from Newmarket; also on Bernuk heath in Northamptonshire. R. Syn. 4. VII.

3. HYPOCHÆRIS glabra: calycibus oblongis imbri-*glabra*.

catis, caule nudo foliis dentato-sinuatis. Sp. pl. 811.

Hieracium minus dentis leonis folio oblongo glabro.

Baub. pin. 127.

Hieracium parvum in arenosis nascens, seminum pap-
pis densius radiatis. R. Syn. 166.

Hieracium minimum. Col. ecphr. I. 27.

Anglis, smooth Hawkweed.

Habitat in pratis montosis. Found on the gravelly grounds near Middleton in Warwickshire. R. Syn. circa Bristolium frequens. ♂. VII.

L A P S A N A. 823.

Recept. nudum. *Cal. calyculatus, squamis singulis*
interioribus canaliculatis.

1. LAPSANA calycibus fructus angulatis, pedunculis *communis*.
tenuibus ramosissimis. Sp. pl. 811. Fl. suec. 710.

Lampsana. Ger. Em. 255. R. Syn. 173. *vulgaris.*

Park. 810.

Soncho affinis Lampsana domestica. Baub. pin. 124.

Anglis, Nipplewort.

Habitat in sepibus et ruderatis. ♂. VI. VII.

C I C H O R I U M. 825.

Receptaculum paleaceum. *Cal. calyculatus.* *Pappus*
margo quinquedentatus.

1. CICHORIUM caule simplici ramoso, floribus con- *Intybus*,
fertis; omnibus sessilibus. Syst. nat. 1197.

Cichorium caule simplici, foliis dentato-sinuatis. Sp.
pl. 813. Fl. suec. 711.

Cichoreum sylvestre. Ger. Em. 284. Park. 776. R.
Syn. 172.

Cichoreum sylvestre f. officinarum. Baub. pin. 125.
Anglis,

SYNGENESIA: POLYGAMIA ÆQUALIS.

Anglis, wild Succory.

Habitat ad agrorum margines. ♂. VII. VIII.

Pharmac. Cichorei Herba, Radix.

** Capitali.

A R C T I U M. 830.

Cal. globosus, squamis apice hamis inflexis.

Lappa. 1. ARCTIUM foliis cordatis inermibus petiolatis. Sp. pl. 816. Fl. suec. 712.

Lappa major seu *Arctium dioscoridis*. Baub. pin. 198. R. Syn. 197.

Bardana major. Ger. Em. 809.

Bardana vulgaris major. Park. 1222.

β *Lappa major* capitulo glabro maximo. R. Syn. 196.

γ *Lappa major* capitulis parvis glabris. R. Syn. 197.

δ *Lappa major* montana, capitulis tomentosis s. *Arctium Dioscoridis*. Baub. pin. 198.

ε *Lappa major* montana, capitulis minoribus, rotundioribus et magis tomentosis. Tourn. 450.

ζ *Lappa major* ex omni parte minor, capitulis parvis eleganter reticulatis. Pluk. alm. 205.

Anglis, Burdock, or Clot-burr.

Habitat in viis, ruderatis, cultis. ♂. VII. VIII.

S E R R A T U L A. 831.

Cal. subcylindricus, imbricatus, muticus.

tinctoria. 1. SERRATULA foliis pinnatifidis: lacinia terminali maxima. Sp. pl. 816. Fl. suec. 713.

Serratula. Baub. pin. 225. bist III. 23. R. Syn. 196.

Serratula purpurea. Ger. Em. 713.

Serratula vulgaris flore purpureo. Park. 474.

β *Serratula* flore candido. Boerb. ind. alt. 144.

Anglis, Saw-wort.

Habitat in sylvis et pratis. ♀. VII.

alpina. 2. SERRATULA calycibus hirsutis ovatis. Sp. pl. 816. Fl. suec. 714.

Serratula foliis petiolatis: radicalibus ovato-oblongis dentatis, caulinis integerrimis. Fl. suec. ed. I. 661.

Cirsium

Cirsium foliis triangularibus lunate dentatis, subtus tomentosus, inermibus, in spica congestis. *Hall. helv.* 683. *t. 22.*

Cirsium humile montanum *cynoglossi* folio, polyanthemum. *R. Syn.* 193.

Carduo-cirsium minus britannicum, floribus plurimis summo caule congestis. *Pluk. ph t. 154. f. 3.*

β *Cirsium montanum* polyanthemum *salicis* folio angusto denticulato. *R. Syn.* 193.

Anglis, Mountain Saw-wort.

Habitat in summis rupibus Arvoniae, v. g. Clogwyn y Carnedh yscion duon, &c. On the highest rock of Snowdon, and near Brearcliff, near Brunly, Lancashire. *R. Syn.* 24. VII.

2. SERRATULA foliis dentatis spinosis. *Sp. pl.* 820. *arvensis*: *Fl. suec.* 715.

Carduus radice repente, foliis lanceolatis dentatis margine aculeato. *Fl. lapp.* 293.

Carduus vulgarissimus viarum. *Ger. Em.* 1173. *R. Syn.* 194.

Carduus ceanothos sive viarum et vinearum repens. *Park.* 959.

Carduus vinearum repens folio Sonchi. *Baub. pin.* 377.

Anglis, Corn Saw-wort, or Way-thistle.

Habitat in arvis et ad vias. 24. VII.

C A R D U U S. 832.

Cal. ovatus, imbricatus squamis spinosis. *Recept.*
pilosum.

* *Foliis decurrentibus.*

1. CARDUUS foliis decurrentibus hastato-pinnatis his- *lanceola-*
pidis : laciniis divaricatis, calycibus spinosis villosis, *tus.*
caule piloso. *Sp. pl.* 821. *Fl. suec.* 716.

Carduus lanceatus. *Ger. Em.* 1174. *R. Syn.* 195.

Carduus lanceatus latifolius. *Baub. pin.* 385. f. ma-
jor. *Park.* 982.

β *Carduus lanceatus major.* *R. Syn.* 195.

γ *Carduus lanceatus* flore et capite minoribus. *Merr.*
pin. *R. Syn.* 195.

Anglis, Spear-thistle.

Habitat in viarum marginibus ubique. ♂. VII.

- nutans.* 2. **CARDUUS** foliis spinosis semidecurrentibus, floribus cernuis : squamis calycinis superne patentibus. *Sp. pl. 821. Fl. suec. 717.*
Cirsium majus singulari capitulo magno. Bauh. pin. 377.
Carduus nutans. Bauh. hist. III. 56. R. Syn. 193.
Carduus moschatus. Pet. b. br. t. 21. f. 1.
Anglis, Musk-thistle.
Habitat in pratis et pascuis siccissimis in pratis inter ericetum nigrum et Charleton in Cantio. ♂. VII.
- acanthoi-* des. 3. **CARDUUS** foliis sinuatis decurrentibus : margine spinosis, calycibus pedunculatis solitariis erectis villosis. *Sp. pl. 821. Fl. suec. 718.*
Carduus acanthoides. Bauh. hist. III. 59.
Carduus spinosissimus capitulis minoribus. P. B. R. Syn. 194.
β *Carduus palustris mitior, bardanæ capitulo in summo caule singulari. Pluk. alm. 82.*
Anglis, welted Thistle.
Habitat ad vias et in aggeribus foſſarum. ⊖. VI. VII.
- crispus.* 4. **CARDUUS** foliis sinuatis decurrentibus : margine spinosis, floribus aggregatis terminalibus muticis. *Sp. pl. 821. Fl. suec. 719.*
Carduus caule criso. Bauh. hist. III. 59. R. Syn. 194.
Carduus spinosissimus angustifolius vulgaris. Bauh. pin. 385. Lœſ. pruſſ. 43. t. 5.
Carduus polyanthos. Park. 982. primus. Ger. Em. 1173.
Anglis, Thistle upon Thistle.
Habitat ad vias et in aggeribus foſſarum. ⊖. VI.
- palustris.* 5. **CARDUUS** foliis linearibus dentatis decurrentibus : margine spinosis, floribus racemosis erectis, pedunculis inermibus. *Sp. pl. 822. Fl. suec. 720.*

Carduus palustris. *Baub. pin.* 377. *pr.* 156. *Park.* 983. *Pet. b. br.* t. 21. *R. Syn.* 194.
Anglis, Marsh-thistle.
Habitat in pratis palludosis et umbrosis. 24. VII.

6. **CARDUUS** foliis lanceolatis decurrentibus denticulis *disectus*,
 inermibus, calycibus spinosis. *Sp. pl.* 822.
Cirsium anglicum. *Lob. ic.* 583. *Ger. Em.* 1183.
R. Syn. 193. *primum.* *Park.* 961.
Cirsium majus singulari capitulo magno, s. *incanum*
 varie *disectum.* *Baub. pin.* 377.
Anglis, English soft or gentle Thistle.
Habitat in palustribus passim. 24. VI. VII.

** *Foliis amplexicaulibus.*

7. **CARDUUS** foliis lanceolatis dentatis amplexicauli- *helenioides*
 bus : spinulis inæqualibus ciliatis, caule inermi.
Sp. pl. 825.
Cirsium foliis longe lanceolatis ferratis : subitus to-
 mentosis. *Hall. helv.* 683. t. 21.
Cirsium britannicum Clusii repens. *Baub. hist.* III.
 46. *R. Syn.* 193.
Cirsium aliud *Anglicum.* *Park.* 961.
Cirsium singulari capitulo squamato, vel *incanum* al-
 terum. *Baub. pin.* 377.
Anglis, melancholy Thistle.
Habitat in montosis agri Eboracensis, Westmorlandici,
Cumberlandici et Cambrobritannici frequens. On
Hounslow heath. *R. Syn.* 24. VI. VII.

8. **CARDUUS** foliis amplexicaulibus hastato pinnatifidis spinosis calycibus aphyllis: spinis canaliculatis
 duplicato spinosis. *Sp. pl.* 823.
Carduus squamis calycinis margine apiceque spinosus.
Hort. cliff. 393..
Carduus Mariæ. *Ger. Em.* 989. *R. Syn.* 195. vul-
 garis. *Park.* 979.
Carduus albis macculis notatus vulgaris. *Baub. pin.*
 281.
 β *Carduus Mariæ* hirsutus non macculatus. *R. Syn.*
 194.

SYNGENESIA: POLYGAMIA ÆQUALIS.

Anglis, Milk-thistle.

Habitat ad agrorum margines et in aggeribus foſſarum.
♂. VII.

Pharmac. Cardui mariæ Herba, ſemina.

eriophorus 9. **CARDUUS** foliis ſeffilibus bifariam pinnatifidis : lacinii alternis erectis, calycibus globofis erectis. *Sp. pl.* 823.

Carduus foliis ſinuatis decurrentibus : denticulis ſuperficie que ſpinofis, calycibus lanigeris. *Roy. lugdb.* 133.

Carduus eriocephalus. *Ger. Em.* 1152.

Carduus capite rotundo tomentoſo. *Bauh. pin.* 382.

Carduus tomentoſus corona fratrum dictus. *Park.* 978.

Anglis, Woolly-headed Thistle.

Habitat in pratis montofis. *Circa Bristol copioſe*. ♂. VII.

acaulos. 10. **CARDUUS** acaulis, calyce glabro. *Sp. pl.* 1199.
Fl. suec. 722.

Carduus acaulos, minore purpureo flore. *Bauh. pin.* 380. *Ger. Em.* 1158. *R. Syn.* 195.

Carduus acaulis septentrionalium. *Park.* 969.

Anglis, dwarf Carline-thistle.

Habitat in paſcuis montofis ſiccioribus. In ericeto nigro prope Londonum. 4. VII.

ONOPORDUM. 834.

Recept. nudum. *Cal. squamæ mucronatæ*.

Acanthi- 1. **ONOPORDUM** calycibus ſquareoſis : ſquamis ſubulatis, foliis ovato-oblongis ſinuatis. *Sp. pl.* 827.
Fl. suec. 724.

Onopordum foliis decurrentibus margine ſpinofis. *Hort. cliff.* 393.

Carduus tomentoſus, *Acanthium dictus*, vulgaris. *R. Syn.* 196.

Acanthium album. *Ger. Em.* 1149.

Acanthium vulgare. *Park.* 979.

Spina alba tomentoſa latifolia sylvestris. *Bauh. pin.* 382.

Anglis, Cotton-thistle.

Habitat in ruderatis. ♂. VII.

CAR-

CARLINA. 836.

Cal. radiatus squamis marginalibus longis, coloratis.

1. CARLINA caule multifloro corymboso, floribus terminalibus. *Hort. cliff.* 395. *Sp. pl.* 829. *Fl. suec.*

725.

Carlina sylvestris major. *Ger. Em.* 1159.

Carlina sylvestris quibusdam aliis atractylis. *Bauh. hist.*

III. 81. *R. Syn.* 175.

Cnicus sylvestris spinosior. *Bauh. pin.* 378.

Anglis, wild Carline Thistle.

Habitat in pratis et pascuis siccioribus. ♂. VI.

*** *Discoidei.*

BIDENS. 840.

Recept. paleaceum. *Pappus aristatis* erectis, scabris.

Cal. imbricatus. *Cor.* rarius flosculo uno alterne radiante instruitur.

1. BIDENS foliis trifidis corollis flosculis, calycibus sub-*tripartita*. foliolis, seminibus erectis. *Sp. pl.* 831. *Fl. suec.* 726.

Verbesina f. Cannabina aquatica flore minus pulchro, elatior et magis frequens. *Bauh. hist.* *III.* 1073. *R. Syn.* 187.

Cannabina aquatica folio tripartito diviso. *Bauh. pin.*

321.

Eupatorium cannabinum fæmineum. *Ger. Em.* 711.

Eupatorium aquaticum duorum generum. *Park.* 595.

Anglis, trifid Water-hemp-agrimony.

Habitat in palustribus et aquosis, ubi aquæ stagnant. ☽: VII. VIII.

2. BIDENS foliis lanceolatis amplexicaulibus, floribus cernua, cernuis, seminibus erectis. *Sp. pl.* 832. *Fl. suec.*

727.

Verbesina pulchriore flore luteo. *Bauh. hist.* *II.* 1074.

R. Syn. 187.

Cannabina aquatica folio non diviso. *Bauh. pin.* 321.

Eupatorium cannabinum fæminæ varietas altera. *Ger. Em.* 711.

Eupatorium aquaticum folio integro. *Park.* 596.

SYNGENESIA: POLYGAMIA AEQUALIS.

Anglis, whole-leaved Water-hemp-agrimony.
Habitat in fossis et palustribus frequens. ♂. VII. VIII.

- minima.* 3. **BIDENS** foliis lanceolatis sessilibus, floribus seminibusque erectis
Verbenina minima. *Cat. giss.* 167. *app.* 66. *R. Syn.*
188. *t. 7. f. 2.*
Eupatorium cannabinum palmare et angustifolium.
Merr. pin.
Anglis, the least Water-hemp-agrimony.
Habitat in palustribus. In Surrey near to Somersetbridge, in the fish-pond upon the moor. *R. Syn.* ♂.
VII. VIII.

EUPATORIUM. 842.

Recept. nudum. *Pappus plumosus.* *Cal. imbricatus,*
oblongus. *Stylus semibifidus,* *longus.*

- Cannabi-* 1. **EUPATORIUM** foliis digitatis. *Sp. pl.* 838. *Fl.*
suec. 728.
Eupatorium cannabinum. *Baub. pin.* 320. *Park.* 595.
R. Syn. 179.
Eupatorium cannabinum mas. *Ger. Em.* 711.
Eupatorium cannabinum folio integro, seu non digito. *R. Syn.* 180.
Anglis, Hemp-agrimony, or Dutch-agrimony.
Habitat ad ripas fluvicrum et rivulorum. ♀. VII. VIII.

POLYGAMIA SUPERFLUA.

* *Discoidei.*

TANACETUM. 848.

Recept. nudum. *Pappus submarginatus.* *Cal. imbricatus,* hemisphericus. *Cor. radii obsoleti,* trifidi.

- vulgare.* 1. **TANACETUM** soliis bipinnatis serratis. *Sp. pl.*
848. *Fl. suec.* 730.
Tanacetum. *Ger. Em.* 650. *R. Syn.* 188. *vulgare.*
Park. 81. *luteum* *Baub. pin.* 132.
β *Tanacetum* foliis crispis. *Baub. pin.* 132.
Anglis,

Anglis, common Tansy.

Habitat in pratis montosis. Circa Kendal in Westmorlandia frequens. 24. VIII.

Pharmac. Tanaceti Herba, Flores, Semina.

A R T E M I S I A. 849.

Recept. subvillosum vel nudiusculum. *Pappus* nullus.

Cal. imbricatus: squamis rotundatis, conniventibus. *Cor.* radii nulli.

* *Procumbentes ante florescentiam.*

1. ARTEMISIA foliis multifidis linearibus, caulis *campestris* procumbentibus virgatis. *Sp. pl.* 846. *Fl. suec.* 732.

Artemisia tenuifolia. *Dod. pempt.* 33.

Abrotanum campestre. *Baub. pin.* 136. *Ger. Em.* 1106. *Park.* 94. *R. Syn.* 191.

Anglis, Field Southernwood.

Habitat in campis montosis apricis aridis. Near Elden in Suffolk. *R. Syn.* 24. VIII.

2. ARTEMISIA foliis multipartitis tomentosis, racemis *maritima*. cernuis flosculis fæmineis ternis. *Sp. pl.* 846. *Fl. suec.* 734.

Absinthium marinum album. *Ger. Em.* 1099. *R. Syn.* 188.

Absinthium seriphium belgicum. *Baub. pin.* 139. *bijl.* III. 178.

β *Absinthium maritimum seriphio belgico simile*, latiore folio, odoris grati. *Pluk. R. Syn.* 188.

γ *Absinthium maritimum Gallicum*. *Baub. pin.* 139.

δ *Absinthium seriphium tenuifolium marinum Narbonense*. *Baub. bijl.* III. 177.

ε *Absinthium marinum nostras*. *R. Syn.* 189.

Anglis, Sea Wormwood.

Habitat in littoribus maritimis. 24. VIII.

Pharmac. *Absinthii marini Herba*.

** *Erectæ herbaceæ, foliis compositis.*

3. ARTEMISIA foliis compositis multifidis, floribus *Absinthi-* subglobosis pendulis: receptaculo villoso. *Sp. pl. um.* 848. *Fl. suec.* 735.

- Absinthium vulgare.* Park. 98. R. Syn. 188. majus.
Baub. hist. III. 168.
Absinthium latifolium seu *Ponticum.* Ger. Em. 1096.
Absinthium ponticum s. *romanum officinarum* s. *di-*
scoridis. Baub. pin. 138. Tourn. 457.
Anglis, common Wormwood.
Habitat in ruderatis et ad vias. 4. VIII.
Pharmac. *Absinthii vulgaris Herba.*

- vulgaris.* 4. *ARTEMISIA* foliis pinnatifidis planis incisis : sub-
 -tus tomentosis, racemis simplicibus, floribus ova-
 tis, radio quinquefloro. Sp. pl. 848.
Artemisia vulgaris. Park. 90. R. Syn. 190. Ger. Em.
 1103. Baub. hist. III. 184. major. Baub. pin. 137.
Anglis, Mugwort.
Habitat ad sepes et margines agrorum. 4. VIII.
Pharmac. *Artemesiae Herba.*

G N A P H A L I U M. 850.

Recept. nudum. *Pappus plumosus.* *Cal.* imbricatus:
 squamis marginibus rotundatis, membranaceis, co-
 loratis.

* *Argyrocomæ calycibus albis.*

- dioicum.* 1. *GNAPHALIUM* caule simplicissimo, corymbo sim-
 plici terminali, farmentis procumbentibus. Sp. pl.
 850. Fl. suec. 736.
Gnaphalium montanum album. Ger. Em. 640. R.
 Syn. 181.
Gnaphalium montanum sive *Pes cati.* Park 690.
Gnaphalium montanum flore rotundiore. Baub. pin.
 263.
Anglis, Mountain Cudweed, or Cat's-foot.
Habitat in pratis montosis aridis. On Newmarket
 heath, not far from Bottesham beacon, plentifully;
 also on Bernak heath in Lincolnshire; in comitati-
 bus Eboracensi, Lancastriensi, Westmorlandico,
 frequens. 4. V.
 2. *GNAPHALIUM* foliis linear-lanceolatis acumina-
 tis alternis, caule superne ramoso, corymbis fasti-
 giatis.

giatis. *Hort. cliff.* 401. *Gmel. fib. II.* 107. *Sp. pl.* 850.

Gnaphalium americanum. *Baub. hist. III.* 162. *Ger.*

Em. 641. *R. Syn.* 182. *latifolium.* *Baub. pin.* 263.

Argyrocome f. *Gnaphalium americanum.* *Park.* 690.

Anglis, American Cudweed.

Habitat *in pratis et pascuis.* *In prato prope Bocking,*
wicum agri Essexiensis, D. Dale; *on the banks of*
Rymny river, for the space of at least twelve miles,
Mr. Lhwyd. R. Syn. 4. VIII.

3. *GNAPHALIUM* foliis semiamplexicaulibus ensifor- *luteo-al-*
mibus repandis obtusis utrinque pubescentibus, flo- *bum.*
ribus conglomeratis. Roy. lugdb. 149. *Sp. pl.* 851.

Gnaphalium majus lato oblongo folio. *Baub. pin.* 263.
Pluk. ph. t. 31. f. 6.

Elichrysum sylvestre latifolium capitulis congregatis.
Baub. pin. 264. *R. Syn.* 182.

Anglis, Jersey Cudweed.

Habitat *in the isle of Jersey, on dry banks and walls,*
very common. R. Syn. ①. VII. VIII.

** *Filagines calycibus cinereis.*

4. *GNAPHALIUM* caule simplicissimo, floribus spar- *sylvaticum*
sis. Fl. lapp. 298. *suec.* 739. *Sp. pl.* 856.

Gnaphalium anglicum. Ger. Em. 639. *R. Syn.* 180.
vulgare majus. Park. 685.

Gnaphalium majus, angusto oblongo folio, alterum.
Baub. pin. 263.

Gnaphalium rectum. Baub. hist. III. 160.

Anglis, upright Cudweed.

Habitat *in pascuis et sylvis arenosis. In ericeto Hamp-*
stediano, et prope Charleton in Cantio. ♂. VIII.

5. *GNAPHALIUM* caule ramoso diffuso, floribus con- *uligino-*
fertis terminalibus. Fl. lapp 300. *suec.* 740. *Sp. pl. sum.*
856.

Gnaphalium longifolium humile ramosum capitulis
nigris. R. Syn. 181.

Gnaphalium medium. Baub. pin. 263.

Filago minor. Park. 686.

Anglis,

Anglis, black-headed Cudweed.

Habitat in aquosis præcipue ubi aquæ hyemali tempore stagnarunt. ♂. VIII.

C O N Y Z A. 854.

Recept. nudum. *Pappus simplex.* *Cal.* imbricatus,
subrotundus. *Cor.* radii trifidi.

squarroso. 1. CONYZA foliis lanceolatis acutis, caule annuo corymboso. *Hort. cliff.* 405. *Roy. lugdb.* 157. *Sp. pl.* 861.

Conyza major vulgaris. *Baub. pin.* 265.

Baccharis monspelienium. *Ger. Em.* 792. *Park.* 114.
R. Syn. 179.

Anglis, Plowman's Spikenard.

Habitat in pratis et pascuis montosis et ad vias. ♂. VII.
VIII.

** Radiati.

E R I G E R O N. 855.

Recept. nudum. *Pappus pilosus.* *Cor.* radii lineares,
angustissimi.

acre. 1. ERIGERON pedunculis alternis unifloris. *Sp. pl.* 863. *Fl. suec.* 741.

Conyza cærulea acris. *Ger. Em.* 484. *Baub. pin.* 265.

Conyza odorata cærulea. *Park.* 126.

Aster arvensis cæruleus acris. *Tourn.* 481. *R. Syn.* 175.

Anglis, blew-flowered Fleabane.

Habitat in pratis et pascuis siccissimis. ♀. VII. VIII.

*canadense.** 2. ERIGERON caule floribusque paniculatis. *Sp. pl.* 863.

Conyza canadensis annua, acris, alba, linariæ foliis.
Boc. pl. rar. t. 46. *R. Syn.* 175.

Conyza annua acris alba, elatior, linariæ foliis. *Hist.*
ox. III. 115. *f. 11. t. 20. f. 29.*

Anglis, Canada Fleabane.

Habitat in ruderatis circa Londinum frequens. ♂.
VIII.

TUS.

T U S S I L A G O . 856.

Recept. nudum. Pappus simplex. Cal. squamæ æquales, discum æquantes, submembranaceæ.

1. TUSSILAGO scapo imbricato unifloro, foliis subcordatis angulatis denticulatis. *Mat. med. 391. Sp. pl. 865. Fl. suec. 743.* *Farfara.*

Tussilago. *Ger. Em. 811. Park. 1220. R. Syn. 173.*
vulgaris. Baub. pin. 197.

Anglis, common Coltsfoot.

Habitat *in locis humidis. 4. III.*

Pharmac. Tussilaginis *five Farfaræ Herba, Flores.*

2. TUSSILAGO thyrso oblongo, flosculis femineis nudis plurimis. *Sp. pl. 866. Roy. lugdb. 159.*

Petasites major, floribus pediculis longis insidentibus.
R. Syn. 179. Dill. elth. 309. t. 230. f. 297.

Anglis, long-stalked Butter-bur.

Habitat *in pratis humidis. Near Loughborough in Leicestershire, Mr. Hill. Blackf. spec. bot. 4. III.*

3. TUSSILAGO thyrso ovato, flosculis omnibus hermaphroditis. *Sp. pl. 866. Fl. suec. 746.*

Petasites. *Ger. Em. 814. R. Syn. 179. vulgaris. Park. 419.*

Petasites major et vulgaris. *Baub. pin. 197.*

Anglis, common Butter-bur.

Habitat *in pratis et paucis humidis. 4. III. IV.*

Pharmac. Petasitidis *Radix.*

S E N E C I O . 857.

Recept. nudum. Pappus simplex. Cal. cylindricus, calyculatus : squamis apice sphacelatis.

* *Floribus flosculosis.*

1. SENECIO corollis nudis, foliis pinnato-sinuatis amplexicaulibus, floribus sparsis. *Roy. lugdb. 165.*

Sp. pl. 867. Fl. suec. 747.

Senecio foliis pinnatifidis denticulatis : laciniis æquilibus patentissimis, rachi linearis. *Hort. cliff. 406.*

Senecio vulgaris. *Park. 671. R. Syn. 178.*

Senecio

Senecio minor vulgaris. *Bauh. pin.* 131.

Erigeron. *Ger. Em.* 278.

Anglis, common Groundsel, or Simpson.

Habitat in cultis, ruderatis ubique. ⊖. V.

Pharmac. *senecionis Herba.*

** *Floribus radiatis: radio revoluta.*

sylvaticus. 2. SENEPIO corollis revolutis, foliis pinnatifidis denticulatis, caule corymboso erecto. *Sp. pl.* 868. *Fl. suec.* 748.

Senecio minor, latiore folio sive montanus. *Bauh. pin.* 131. *R. Syn.* 178. *Dill. elth.* 258. *t.* 258. *f.* 337.

Senecium montanum. *Tabern. ic.* 169.

Erigerum. *Ger. Em.* 279.

Jacobaea annua senecionis folio, parvo flore. *Act. gall.* 1720. *p.* 298. *n.* 19.

Anglis, Mountain Groundsel.

Habitat in sylvis, sepibus et cricetis frequens. ⊖. VII.

viscosus. 3. SENEPIO corollis revolutis, foliis pinnatifidis viscidis, squamis calycinis laxis longitudine perianthii. *Sp. pl.* 868. *Fl. suec.* 749.

Senecio foliis pinnatifidis sessilibus: laciniis angulosis: superioribus latioribus, florum radiis disco brevioribus. *Roy. lugdb.* 141.

Senecio incanus pinguis. *Bauh. pin.* 131.

Senecio hirsutus viscidus major odoratus. *Bauh. hist.* II. 1092. *R. Syn.* 178

Senecio foetidus. *Park.* 671.

Senecio hirsutus viscidus graveolens. *Dill. elth.* 347. *t.* 258. *f.* 336.

Anglis, Cotton Groundsel, or stinking Groundsel.

Habitat in arenosis paucim. ⊖. VI.

*** *Floribus radiatis: radio patente, fol. pinnatifidis.*

Jacobea. 4. SENEPIO corollis radiantibus, foliis pinnato-lyratis: laciniis lacinulatis, caule erecto. *Sp. pl.* 870. *Fl. suec.* 751.

Jacobaea vulgaris. *Bauh. hist.* II. 1057. *R. Syn.* 177: major. *Park.* 668.

Jacobaea.

*Jacobæa. Ger. Em. 280. vulgaris laciniata. Bauh.
pin. 131.*

Anglis, common Ragwort.

Habitat in pratis, pascuis, montosis, et ad vias. 24.
VII.

5 SENEPIO corollis radiantibus, foliis dentatis, radi- *aquaticus.*
calibus ovatis, caulinis pinnatifidis ; lacinia extima
majore.

Jacobæa latifolia palustris. R. Syn. 178.

*Jacobæa barbareæ instar laciniata. Fl. prus. 129.
t. 35.*

*Jacobæa latifolia. Bauh. hist. II. 1056. Ger. Em.
280.*

Jacobæa latifolia pannonica prima. Park. 668.

*Jacobæa alpina laciniata flore Buphthalmi. Bauh. pin.
131.*

Anglis, Water Ragwort.

Habitat in aquosis. 24. VII. VIII.

6. SENEPIO corollis radiantibus, foliis pinnatifidis *erucifoli-*
dentatis incanis, caule erecto. Sp. pl. 869. Fl. us.
suec. 750.

*Jacobæa senencionis folio incano perennis. R. Syn.
177.*

*Jacobæa altissima, foliis erucæ artemisiæve similibus
et æmulis. Rupp. jen. 164.*

Anglis, hoary perennial Ragwort.

Habitat in sylvis et ad sepes. 24. VII.

**** *Floribus radiatis: radio patente, fol. indivisis.*

7. SENEPIO corollis radiantibus, foliis ensiformibus *paludosus.*
acute ferratis subtus subvillosis, caule stricto. Sp. pl.
870. Fl. suec. 752.

*Solidago caule simplici, corymbo terminali, foliis sub-
tus tomentosis, flosculis fæmineis sedecim. Lech.
scan. 68.*

*Jacobæa foliis longis integris et mucronatis. Hist. ox.
III. 110. f. 7. t. 7. f. 22.*

*Virgæ aureæ five Solidagini angustifoliæ affinis, Lin-
gua avis Dalechampii. Bauh. hist. II. 1063. R. Syn.
176.*

Conyza

Conyza palustris. Park. 1231. *serratifolia*. Baub. pin. 266.

Anglis, Marsh Ragwort, or Bird's-tongue.

Habitat in fossis palustribus earumque aggeribus in insula Eliensi, near Stretham ferry. R. Syn. 4. VIII.

farraceni- 8. **SENECIO** corollis radiantibus, floribus corymbosif, foliis lanceolatis ferratis glabriusculis. Hort. upf. 266. Sp. pl. 871.

Solidago caule simplici, corymbo terminali; pedunculis partialibus alternis nudis longitudine folio. Hort. cliff. 410.

Solidago farracenica. Fuchf. hist. 728. Dod. pempt. 141.

Virga aurea angustifolia ferrata. Baub. pin. 268.

Virga aurea maxima radice repente. Bobart. R. Syn. 177.

Anglis, broad-leaved Ragwort.

Habitat in pratis, pascuis, nemorosis subhumidis. Found plentifully by the side of a small river between Wells and Glastenbury, by Mr. Bobart. It grows as plentifully in the fields at Salkeld as the vulgaris, Mr. Nicholson. R. Syn. circa Clapham in comitatu Eboracensi. 4. VII. VIII.

S O L I D A G O . 856.

Recept. nudum. *Pappus simplex*. *Cor. radii circiter quinque*. *Cal. squamæ imbricatae, clausæ*.

Virgaurea 1. **SOLIDAGO** caule subflexuoso angulato racemis subpaniculatis erectis confertis. Sp. pl. 880. Fl. suec. 754.

Solidago floribus per caulem simplicem undique sparsis. Fl. lapp. 306.

Virga aurea. Ger. Em. 429. R. Syn. 176. *vulgaris*. Park. 542.

Virga aurea latifolia ferrata. Baub. pin. 268.

Virga aurea vulgaris latifolia Baub. hist. II. 1062.

β *Virga aurea* IV. s. *angustifolia minus ferrata*. Baub. pin. 268.

γ *Virga aurea vulgari humilior*. R. Syn. 176.

Anglis,

Anglis, common Golden Rod.

Habitat in *sylvis*, *sepibus*, *ericetis* *frequens*. γ in *erico* Hampstediano. 4. VIII.

Pharmac. *Virgæ aureæ Herba*.

2. SOLIDAGO foliis linear-lanceolatis subserratis in- *cambrica*.
canis panicula corymbosa terminali.

Virga aurea montana, folio angusto subincano, flo-
culis congregatis. *R. Syn.* 177.

Virga aurea Cambriæ. *Pet. b. br. t.* 16. *f.* 11.

Anglis, Welch Golden Rod.

Habitat in *pratis montosis* in *Wallia*. 4. VI.

A S T E R. 858.

Recept. nudum. *Pappus simplex*. *Cor.* radii plures
decem. *Cal.* imbricati, squamæ inferiores patulæ.

1. ASTER foliis lanceolatis integerrimis carnosis gla- *Tripolium*
bris, ramis inæqualibus, floribus corymbosis. *Roy.*
lugdb. 168. *Sp. pl.* 872. *Fl. suec.* 753.

Aster maritimus cæruleus *Tripolium dictus*. *R. Syn.*
175.

Tripolium vulgare majus et minus. *Ger. Em.* 413.

Tripolium majus cæruleum et minus. *Baub. pin.* 267.

Tripolium majus f. vulgare et minus. *Park.* 673.

Anglis, Sea Starwort.

Habitat in *litoribus maritimis*. 4. VIII.

I N U L A. 860.

Recept. nudum. *Pappus simplex*. *Antheræ basi* in
fetas duas desinentes.

1. INULA foliis ovatis rugosis : subtus tomentosis, ca- *Helenium*
lycum squamis ovatis. *Amœn. acad. I.* 410. *Sp.*
pl. 881. *Fl. suec.* 755.

Helenium. *Ger. Em.* 793. *R. Syn.* 176. *vulgare*.
Baub. pin. 276.

Helenium f. Enula campana. *Park.* 674. *Bauh. hist.*
III. 108.

Anglis, Elecampane.

Habitat in *pratis et pascuis humidis*. In *Essexia* *fre-*
quens. 4. VII. VIII.

Pharmac. *Enulæ campanæ Radix*.

2. INULA

dysenteri. 2. INULA foliis oblongis, caule hirsuto paniculato,
ca. squamis calycinis setaceis. Sp. pl. 882. Fl. suec.

757.

Conyza media. Ger. Em. 482. R. Syn. 174.

Conyza media asteris flore luteo, vel tertia Dioscore-
ridis. Baub. pin. 265.

Herba dysenterica. Hoffm. altd.

Anglis, middle Fleabane.

Habitat in aquosis et ad ripas fluviorum. 4. VIII.

Pulicaria. 3. INULA foliis undulatis amplexicaulibus caule pro-
strato. Sp. pl. 882. Fl. suec. 758.

Conyza minor. Matth. P. II. 223. R. Syn. 174.

Conyza minima. Ger. Em. 482.

Conyza misfor flore globofo. Baub. pin. 266.

Anglis, small Fleabane.Habitat in locis ubi per hyemem aquæ stagnarant. ①.
VIII. IX.

crithmoi- des. 4. INULA foliis linearibus carnosis tricuspidatis. Sp. pl.
883.

Aster flore terminali foliis linearibus tricuspidatis.
Hort. cliff. 409. *Roy. lugdb.* 168. *Guett. stamp. II.*
464.After maritimus flavus, Crithmum chrysanthemum
dictus. R. Syn. 174.Crithmum chrysanthemum. Ger. Em. 533. Park.
1287.Crithmum maritimum flore asteris attici. Baub. pin.
288.*Anglis*, Golden Sampire.

Habitat in pratis mariimis passim. 4. VIII.

B E L L I S. 864.

Recept. nudum, conicum. *Pappus nullus. Cal. he-*
misphæricus: squamis æqualibus. Sem. obovata.

perennis. 1. BELLIS scapo nudo. Sp. pl. 886. Fl. suec. 761.
Bellis sylvestris minor. Baub. pin. 261 R. Syn. 184.
Bellis minor sylvestris. Ger. Em. 635. simplex. Park.
530.

Anglis,

Anglis, common Daisie.

Habitat in pratis et pascuis. 4. III.—IX.

Pharmac. Bellidis minoris, Herba, Flores, Radix.

C H R Y S A N T H È M U M. 866.

Recept. nudum. *Pappus nullus. Cal. hemisphæri-*
cus imbricatus: squamis marginalibus membrana-
ceis.

1. CHRYSANTHEMUM foliis amplexicaulibus: su- *segetum,*
 perne laciniatis; inferne dentato-ferratis. *Sp. pl.*
 889. *Fl. suec.* 762.

Chrysanthemum segetum. Ger. Em. 743. *R. Syn.* 182.
 nostras. *Park.* 1370.

Bellis lutea, foliis profunde incisis major. *Baub. pin.*
 262.

β Chrysanthemum segetum nostras, folio glauco multi-
 sciso majus, flore minore. *R. Syn.* 183.

γ Chrysanthemum segetum nostras, calendulæ folio
 glauco, neque secto, neque ferrato. *Pluk. alm.* 102.
Anglis, Corn Marigold.

Habitat in arvis. ○. VI. VII.

2. CHRYSANTHEMUM follis amplexicaulibus ob- *Leucan-*
 longis: superne ferratis: inferne dentatis. *Sp. pl. themum.*
 188 *Fl. suec.* 763.

Leucanthemum vulgare. Tourn. 492. *R. Syn.* 184.

Bellis major. Ger. Em. 634. *Baub. hist.* III. 114.

Bellis major vulgaris f. sylvestris. Park. 528.

Bellis sylvestris caule folioso major. Baub. pin. 261.

Anglis, The greater Daisie, or Ox-eye.

Habitat in pratis et pascuis siccis. 4. V.

Pharmac. Bellidis majoris Herba, Flores.

M A T R I C A R I A. 867.

Recept. nudum. *Pappus nullus. Cal. hemisphæri-*
cus, imbricatus; marginibus solidis acutiusculis.

1. MATRICARIA foliis compositis planis; foliolis o- *Parthenia-*
 vatis incisis, pedunculis ramosis. *Sp. pl.* 890. *Mat. um.*
 med. 400.

Y

Ma.

Matricaria. *Ger. Em.* 652. *R. Syn.* 187. *vulgaris.*
Park. 83.

Matricaria *vulgaris* s. *sativa.* *Bauh. pin.* 133.
Anglis, Feverfew.

Habitat *in ruderatis et ad sepes.* ♂. f. 24. VI.
Pharmac. Matricariæ *Herba.*

Chamo-
milla.

2. MATRICARIA receptaculis conicis, radiis patentibus, seminibus nudis, squamis calycinis margine æqualibus. *Fl. suec.* 764.

Chamæmelum. *Ger. Em.* 754. *R. Syn.* 184. *vulgare.*
Dod. pempt. 257. *Park.* 85.

Chamæmelum *vulgare,* Leucanthemum *Dioscoridis.*
Bauh. pin. 135.

Anglis, Corn Feverfew.

Habitat *in arvis.* ☽. VI.

Pharmac. Chamomeli *vulgaris Herba, Flores.*

suaveolens 3. MATRICARIA receptaculis conicis, radiis deflexis, seminibus nudis, squamis calycinis margine æquilibus. *Fl. suec.* 766.

Matricaria leucanthemos annua suaveolens, chamæmeli folio, ovariis albicantibus. *Vaill. act.* 556.

Chamæmelum tenue incisum, foliis floris deorsum protensis, umbone extuberante, suavius olens. *Cup. cath. alt.* 17.

Anglis, sweet-scented Feverfew.

Habitat *in arenosis frequens.* ☽. V.

inodora. 4. MATRICARIA receptaculis hemisphæricis, radiis patentibus, seminibus coronato-marginatis, squamis calycinis margine exfoletis. *Fl. suec.* 765.

Chamæmelum inodorum annum humilius, foliis obscure virentibus. *Hist. ox.* III. 36. *R. Syn.* 186.

Chamæmelum inodorum s. *Cotula non foetida.* *Bauh. hist.* III. 120.

Anglis, Field Feverfew.

Habitat *juxta vias, plateas, agros, sed rarius;* observed by Mr. Rand along the way to Chelsea. *R. Syn.* ☽. VIII.

5. MATRICARIA receptaculis hemisphaericis, foliis *maritima*.
bipinnatis subcarnosis; supra convexis, subtus ca-
rinatis. *Sp. pl.* 891.
Chamæmelum maritimum perenne humilius, foliis
brevibus crassis, obscure virentibus. *R. Syn.* 186.
t. 7. f. 1.

Anglis, Sea Feverfew.

Habitat in ora maritima Sufflexiae, ubi loco Cockbush
vocato, septem miliaribus Cicestria distante, satis co-
piose observavit D. Dillenius. *R. Syn.* 4. VII.

A N T H E M I S. 870.

Recept. paleaceum. *Pappus nullus.* *Cal.* hemisphae-
ricus, subæqualis. *Flosculi radii plures quam quin-
que.*

* *Radio discolor f. albo.*

1. ANTHEMIS foliis pinnato-compositis linearibus a- *nobilis*,
cutis subvillosis. *Sp. pl.* 894.

Matricaria receptaculis conicis, radiis deflexis, semi-
nibus nudis, squamis calycinis margine æqualibus.
Mat. med. 401.

Chamæmelum nobile seu Leucanthemum odoratius.
Bauh. pin. 135.

Chamæmelum odoratissimum repens flore simplici.
Bauh. hist. III. 118. *R. Syn.* 185.

Chamæmelum romanum. *Ger. Em.* 755.

Anglis, sweet-scented Camomile.

Habitat in pratis et pascuis apricis. 4. VII. VIII.

Pharmac. Chamæmeli Flores.

2. ANTHEMIS receptaculis conicis; paleis setaceis, *Cotula*,
seminibus nudis. *Fl. suec.* 767. *Sp. pl.* 894.

Anthemis foliis pinnato decompositis; laciinis linea-
ribus caulibus diffusis, radice annua. *Roy. lugdb.*
172.

Chamæmelum foetidum. *Bauh. pin.* 135. *R. Syn.* 185.

Chamæmelum annum præcox foetidum, semine au-
reo. *Hist. ox.* III. 36.

Anglis, stinking May-weed.

Habitat in arvis et ad vias. ①. VI. VII.

- arvensis.* 3. ANTHEMIS receptaculis conicis: paleis setaceis, seminibus coronato-marginatis. *Sp. pl.* 894. *Fl. suec.* 768.
Chamæmelum inodorum. *Baub. pin.* 135. *R. Syn.* 184.
Bupthalmum album. *Pet. h. br. t.* 19. *f.* 8.
Anglis, Corn Camomile.
Habitat in arvis et ad vias. ♂. VII.
- maritima.* 4. ANTHEMIS foliis pinnatis denticulatis carnosis punctatis, caule ramoso prostrato, calycibus tomentosis. *Sp. pl.* 893.
Anthemis maritima perennis, foliis crassis et punctatis. *Mich. gen.* 33.
Chamæmelum maritimum latifolium ramosissimum, flore albo. *Pluk. alm.* 97. *R. Syn.* 186.
Matricaria maritima. *Baub. pin.* 134.
Anglis, Sea Camomile.
Habitat in pratis maritimis. ♀. VIII.

** Radio concolore s. luteo.

- tinctoria.* 5. ANTHEMIS foliis bipinnatis serratis subtus tomentosis, caule corymboso. *Sp. pl.* 896.
Bupthalmum caule ramoso, foliis pinnatifidis: lacinias linearibus dentatis serratis, floribus pedunculatis. *Hort. cliff.* 414.
Bupthalmum tanaceti minoris folio. *Baub. pin.* 134.
Bupthalmum vulgare. *Ger. Em.* 747. *R. Syn.* 182.
Bupthalmum matthioli, f. *vulgare millefolii* foliis. *Park.* 1370.
Anglis, common Ox-eye.
Habitat in pratis apricis, sed rarius. I found this on a bank near the river Tees, not far from Sogburn, in the bishoprick of Durham. *R. Syn.* ♀. VII.

A C H I L L E A. 871.

Recept. paleaceum. *Pappus nullus.* *Cal. ovatus, imbricatus.* *Flosculi radii circiter quinque.*

- Millefoli-* 1. ACHILLEA foliis bipinnatis nudis: lacinias linearibus

ribus dentatis. *Hort. cliff.* 413. *Sp. pl.* 899. *Fl. suec.* 770.

Millefolium vulgare. *Park.* 693. *R. Syn.* 183. *album.*
Baub. pin. 140.

Millefolium terrestre vulgare. *Ger. Em.* 1072.

Anglis, common Yarrow, or Milfoil.

Habitat in pratis et pascuis. 4. V. VII.

Pharmac. *Millefolii Herba.*

2. ACHILLEA foliis lanceolatis acuminatis argute ser- *Ptarmica-*
ratis. *Sp. pl.* 898. *Fl. suec.* 771.

Achillea foliis acutis integris minutissime ferratis. *Vaill.*
aet. 1720. 316.

Ptarmica. *Ger. Em.* 606. *R. Syn.* 183. *vulgaris.*
Park. 859.

Dracunculus pratensis, serrato folio. *Baub. pin.* 98.

Anglis, Sneeze-wort, or Goose-tongue.

Habitat in pratis et sylvis subhumidis. 4. VIII.

Pharmac. *Ptarmicæ Herba.*

POLYGAMIA FRUSTRANEA.

C E N T A U R E A 880.

Recept. setosum. *Pappus simplex.* *Cor.* radii in-
fundibuliformes, longiores, irregulares.

* *Cyani calycibus laevibus inermibus.*

1. CENTAUREA calycibus ferratis, foliis linearibus *Cyanus.*
integerrimis : infimis dentatis. *Mat. med.* 408. *Sp.*
pl. 911. *Fl. suec.* 776.

Cyanus. *Baub. hist.* III. 21. *R. Syn.* 198. *vulgaris.*
Lob. ic. 546. *Ger. Em.* 732. *Park.* 482.

Cyanus segetum. *Baub. pin.* 273.

Anglis, Blue-bottles.

Habitat in arvis. ①. VII

Pharmac. *Cyani Herba, Flores.*

2. CENTAUREA calycibus ciliatis, foliis pinnatisdis : *Scabiv*
laciniis lanceolatis. *Sp. pl.* 913. *Fl. suec.* 713.
Jacea major. *Ger. Em.* 728. *R. Syn.* 198.

Jacea nigra vulgaris laciniata. Park. 470.
Scabiosa major squamatis capitulis. Baub. pin. 269.
Anglis, Great Knapweed, or Matfellon.
Habitat in arvis et ad margines agrorum. 4. VI. VII.

- Jacea.* 3. *CENTAUREA calycibus squamosis, foliis lanceolatis: radicalibus siuato dentatis, ramis angulatis.* Sp. pl. 914. Fl. suec. 774.
Jacea nigra. Ger. Em. 726. R. Syn. 198. *vulgaris.* Park. 468.
Jacea nigra pratensis laeifolia. Baub. pin. 271.
 β *Jacea nigra minor, tomentosa, laciniata.* R. Syn. 199.
Anglis, common Knapweed, or Matfellon.
Habitat in pratis et pascuis. 4. VII. VIII.

** *Calcitrapæ: calycinis spinis compositis.*

- Calcitra-* pa. 4. *CENTAUREA calycibus subduplicato-spinosis, foliis sessilibus lateralibus pinnatifidis linearibus dentatis, caule piloso.* Hort. upf. 237. Sp. pl. 917.
Carduus stellatus. Ger. Em. 1166. R. Syn. 196.
Carduus stellaris seu Calcitrapa vulgaris. Park. 989.
Carduus stellatus foliis papaveris erratici. Baub. pin. 387.
Anglis, Star-thistle.
Habitat in pratis sterilioribus et juxta vias. ①. VII.
Pharmac. *Calcitrapæ Herba, Semina.*

- foltstitialis.* 5. *CENTAUREA calycibus duplicato-spinosis solitariis, foliis rameis decurrentibus inermibus lanceolatis; caulinis lyrato-pinnatifidis.* Sp. pl. 917. Roy. lugdb. 140.
Carduus stellatus luteus foliis cyani. Baub. pin. 387.
R. Syn. 196.
Carduus foltstitialis. Ger. Em. 1166. Park. 989.
Anglis, St. Barnaby's Thistle.
Habitat ad sepes. By the hedges not far from Cirencester in Gloucestershire, D. Bobart. R. Syn. ①. VII.

POLYGAMIA NECESSARIA.

OTHONNA. 888.

Recept. nudum Pappus subnnullus. Cal. monophyl-
lus, multifidus, subcylindricus.

1. OTHONNA foliis lanceolatis dentato-sinuatis. *Sp. palustris.*
pl. 924. Fl. suec. 778.

Solidago foliis inferioribus lanceolatis ferrato-sinuatis,
superioribus integris amplexicaulibus. *Hort. cliff.*
410.

Conyza foliis laciniatis. *Ger. Em. 483. R. Syn. 174.*

Conyza aquatica laciniata. *Baub. pin. 266.*

Conyza helenitis foliis laciniatis. *Park. 126.*

Anglis, Marsh Fleabane.

Habitat in *palustribus*. In the fen-ditches about Marsh
and Chatterells in the isle of Ely; in the way from
Norwich to Yarmouth, a little before you come to
Oaklybridge; in the ditches about Pillin-moss,
Lancashire; and at Aberavon in Merionethshire,
in Wales. *R. Syn. 4. VIII.*

2. OTHONNA foliis lanceolatis subdenticulatis villosis, *integriflo-*
floribus umbellatis. Sp. pl. 925. lia.

Solidago foliis lanceolatis sessilibus integris denticula-
tis floribus umbellatis, involucro setaceo. *Gmel.*
sib. II. 154. t. 71.

*Jacobaea montana lanuginosa angustifolia non lacini-
ata. Baub. pin. 131. Hift. ox. III. 111. f. 7. t. 12.
f. 28.*

Jacobaea pannonica folio non laciniato. *hift. II. 1056.
R. Syn. 178.*

Jacobaea angustifolia, Ger. Em. 280. *pannonica non
laciniata. Park. 668.*

Anglis, Mountain Ragwort.

Habitat in *pratis montosis*. On Gogmagog hills, New-
market heath, &c. *R. Syn. 4. VI.*

F I L A G O. 891.

Recept. nudum. *Pappus nullus.* *Cal.* imbricatus.
Flosculi feminei inter squamas calycis locati.

- maritima.* 1. FILAGO tomentosa, corymbo subramoso, foliis oblongis obtusis crenatis. *Sp. pl.* 927.
Santolina corymbo terminali subdiviso, foliis oblongis integerrimis obtusis. *Hort. cliff.* 398.
Gnaphalium maritimum. *Baub. pin.* 263. *R. Syn.* 180.
Gnaphalium marinum. *Ger. Em.* 640. *f. Colonaria.* *Park.* 687.
Anglis, Sea Cudweed.
Habitat in littoribus maritimis. Near Abermeney ferry, in the isle of Anglesea, and between Pensans and St. Michael's mount in Cornwal. *R. Syn.* ○. VI. VII.
- germanica* 2. FILAGO calycibus pyramidatis pentagonis axillariibus, caule dichotomo erectiusculo. *Syst. nat.* 1235.
Gnaphalium caule erecto dichotomo, capitulis globosis axillaribus terminalibusque. *Sp. pl.* 857.
Gnaphalium vulgare majus. *Baub. pin.* 263.
Gnaphalium minus *f.* Herba impia. *Park.* 685. *R. Syn.* 180.
Filago seu Herba impia. *Ger. Em.* 641.
Anglis, common Cudweed.
Habitat in pratis et pascuis sterilioribus et ad vias publicas. ○. VI. VII.
- montana.* 3. FILAGO floribus conicis terminalibus axillaribusque, caule dichotomo erecto. *Syst. nat.* 1235.
Filago minor. *Ger. Em.* 641.
Gnaphalium caule erecto diviso, floribus pyramidatis lateralibus axillaribusque. *Sp. pl.* 857.
Gnaphalium minimum. *Lob. ic.* 481. *Baub. hist.* III. 159. *R. Syn.* 181.
Gnaphalium miuus repens. *Baub. pin.* 363.
Anglis, the least Cudweed.
Habitat in pratis et pascuis arenosis. ○. VI. VII.

4. FILAGO floribus subulatis axillaribus, caule dichotomo erecto. *Syst. nat.* 1235. *gallica.*
Gnaphalium caule erecto dichotomo, floribus pyramidatis axillaribus. *Sp. pl.* 857.
Gnaphalium parvum ramosissimum foliis angustissimis polyspermon. *R. Syn.* 181.
Gnaphalium minimum alterum nostras, stoechadis citrinæ foliis tenuissimis. *Pluk. ph.* t. 298. f. 2.
Anglis, Corn Cudweed.
Habitat in arvis glareofis. Among corn in sandy ground about Castle-Heveningham in Essex. *R. Syn.* O. VI. VII.

M O N O G A M I A.

J A S I O N E. 896.

- Cal.* communis decemphyllus. *Cor.* pentapetala, regularis. *Caps.* infera bilocularis.
1. JASIONE. *Sp. pl.* 928. *Fl. suec.* 782. *montana.*
Jasione foliis linear-lanceolatis obsolete ferratis. *Hort. cliff.* 426.
Rapunculus scabiosæ capitulo cæruleo. *Baub. pin.* 92.
Park. 646. *R. Syn.* 278.
Scabiosa minima hirsuta. *Ger. Em.* 723.
Anglis, hairy Sheep's Scabious.
Habitat in ericetis, pratis montosis passim. 4. O. VI. VII.

L O B E L I A. 897.

- Col.* quinquefidus. *Corolla* monopetala, irregularis.
Caps. infera, bilocularis.
1. LOBELIA foliis linearibus bilocularibus integerri-mis caule subnudo. *Sp. pl.* 929. *Fl. suec.* 783. *Dortmanniana.*
Dortmanna palustris, floribus sparsis pendulis. *Rudb. act. upf. an.* 1720. p. 97. t. 2.
Gladeolus lacustris *Dortmanni.* *Cluf. cur.* 40. *R. Syn.* 287.
Gladeolus lacustris *Clufii*, s. *Leucojum palustre*, flore subcœruleo. *Park.* 1250.

Leucojum

Leucojum palustre, flore subcœruleo. *Bauh. pin.* 41.
Anglis, Water Gladiole.

Habitat in omnibus Cambriæ montibus Dr. Richardson.
R. Syn. in lacubus Westmorlandiæ copiose. 4. VII.
 VIII.

V I O L A. 898.

Cal. pentaphyllus. *Cor. pentapetala*, irregularis, pone
 cornuta. *Capſ. supera trivalvis*, unilocularis.
 * *Acaules*.

odorata. 1. *VIOLA* acaulis, foliis cordatis, stolonibus reptantibus. *Sp. pl.* 634.. *Fl. suec.* 784.

Viola martia purpurea. *Baub. hift.* II. 542. *R. Syn.* 364. flore simplici. *Baub. pin.* 199.

Viola nigra sive *purpurea*. *Ger. Em.* 850.

Viola simplex martia. *Park.* 755.

β *Viola martia alba*. *Baub. pin.* 199.

Anglis, Purple sweet Violet. β white Violet.

Habitat in *sepibus et aggeribus fossarum*. 4. III.

Pharmac. *Violæ Flores*.

birta. 2. *VIOLA* acaulis, foliis cordatis piloso-hispidis. *Sp. pl.* 934.

Viola martia major hirsuta inodora. *Hift. ox.* II. 475.
 f. 5. t. 35. f. 4. *R. Syn.* 365.

Viola trachelii folio vulgo. *R. hift.* 1051.

Anglis, hairy Violet.

Habitat in *sylvis et sepibus paſſim*. 4. III.

palustris. 3. *VIOLA* acaulis foliis reniformibus. *Hall. helv.* 501.
Sp. pl. 934. *Fl. suec.* 786.

Viola palustris rotundifolia glabra. *Hift. ox.* II. 475.
 f. 5. t. 35. f. 5. *Plot. ox.* 144. t. 9. f. 2. *R. Syn.* 364.

β *Viola rubra striata Eboracensis*. *Park.* 755.

Anglis, Marsh Violet.

Habitat in *pratis humidis, paludibus, cespitosis, turfosis*. On the banks of the river Chervil, between Oxford and Water-Eaton. On Oakenshaw-moor and Roadehall woods. *R. Syn. supra* Sherley common prope Croydon; in ericeto Hampstediano prope Londonum. 4. VI.

** *Cau-*

** *Caulescentes.*

4. VIOLA caule demum adscente foliis oblongo-corda- *canina*.
 tis. *Sp. pl.* 935. *Fl. suec.* 785.
 Viola caulibus adscendentibus floriferis, foliis cordatis. *Hort. cliff.* 427.
 Viola martia inodora sylvestris. *Bauh. pin.* 199. *R. Syn.* 364.
 Viola canina sylvestris. *Ger. Em.* 851.
 Viola sylvestris. *Park.* 755.
 β Viola canina flore albo. *Merr. pin.*
 γ Viola canina minor. *R. Syn.* 364. *t. 24. f. 1.*
Anglis, Dog's Violet.
 Habitat in ericetis. 24. IV.
5. VIOLA caule subtrifloro, foliis cordatis profunde fer- *alpina*.
 ratis.
 Viola martia alpina folio tenello circinato. *R. Syn.* 366.
Anglis, Welch Violet.
 Habitat in rupe Clogwyn y Garnedh, supra lucum Phynonlas; D. Lhwyd. *R. Syn.* 24.
6. VIOLA caule triquetro diffuso, foliis oblongis incisis, *tricolor*.
 stipulis dentato-pinnatis, lacinia suprema oblonga crenata petiolata.
 Viola caule triquetro diffuso, foliis oblongis incisis stipulis dentatis. *Sp. pl.* 935. *Fl. suec.* 791.
 Viola tricolor. *Ger. Em.* 854. *R. Syn.* 365. major et vulgaris. *Park.* 756.
 Viola tricolor hortensis repens. *Bauh. pin.* 199.
 β Viola bicolor arvensis. *Bauh. pin.* 200.
 γ Viola bicolor arvensis, flore cæruleo et candido. *Tourn.* 421.
Anglis, Pansies, or Heart's-ease, vulgo three Faces under a Hood.
 Habitat in arvis. ⊖. V.—IX.
7. VIOLA caule subtriquetro diffuso, foliis subcordatis, *lutea*.
 crenatis, stipulis dentatis radice repente.
 Viola montana lutea grandiflora nostras. *R. Syn.* 365.
 Viola flammea lutea. *Ger. Em.* 851.
 Viola montana lutea grandiflora. *Bauh. pin.* 200.

Anglis,

Anglis, yellow Violet, or Pansies.

Habitat in montosis pascuis tam septentrionalibus, tum Walicis, solo putrido et palustri multoties observavimus. R. Syn. 4. V.—VIII.

I M P A T I E N S. 899.

Cal. diphyllus. *Cor.* pentapetala, irregularis,nectario cuculato. *Capf.* supera, quinquevalvis.

noli me tangere. 1. IMPATIENS pedunculis multifloris solitariis, foliis ovatis, geniculis caulinis tumentibus. Sp. pl. 938.
Fl. suec. 792.

Balsamine lutea, f. *Noli me tangere*. Baub. pin. 306.
R. Syn. 316.

Perficaria filiquosa. Ger. Em. 440.

Mercurialis sylvestris, *Noli me tangere* dicta, sive Perficaria filiquosa. Park. 296.

Anglis, Quick in the Hand. Touch me not.

Habitat ad in umbrosis humidis et ad rivulos. On the banks of Winandermere, near Ambleside. R. Syn. prope Rydall-hall, et alibi in Westmorlandia. O. VIII.

Classis

Classis XX.

G Y N A N D R I A

D I A N D R I A.

O R C H I S. 900.

*Nectarium corniforme pone florem.** *Bulbis indivisis.*

1. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio lanceolato in- *bifolia*.
tegerrimo : cornu longissimo, petalis patentibus.
Sp. pl. 939. Fl. suec. 793.
Orchis radicibus conicis, labello lingulato simplicissi-
mo. *Hall. helv. 266.*
Orchis alba bifolia minor, calcari oblongo. *Baub. pin.*
83. *R. Syn. 380. Vaill. paris. 151. t. 30. f. 7.*
Orchis psychodes. *Ger. Em. 211.*
Orchis sphegodes, s. Testiculus vulpinus primus. *Park.*
1351.
β Orchis hermaphroditica bifolia. *Bauh. hist. II. 772.*
Anglis, Butterfly Orchis.
Habitat in *pascuis et dumetis passim*. 24. V. VI.
2. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio quadrilobo *mascula*.
crenulato : cornu obtuso, petalis dorsalibus reflexis.
Fl. suec. 795.
Orchis morio mas, foliis maculatis. *Baub. pin. 81.*
Park. 1346. Vaill. paris. 151. t. 31. f. 12.
Cynosorchis morio mas. *Ger. Em. 208.*
Anglis, Male Fool-stones.
Habitat in *pratis et pascuis*. 24. V.
Pharmac. Satyrii Radix.
3. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio quadrifido *Morio*.
crenulato : cornu obtuso, petalis omnibus conni-
ventibus. *Sp. pl. 940. Fl. suec. 794.*

Orchis

GYNANDRIA DIANDRIA.

*Orchis radicibus subrotundis, cucullo clauso lineato,
labello ampliter trifido crenulato.* Hall. helv. 266.
Orchis morio fœmina. Baub. pin. 82. Park. 1347.
R. Syn. 377. Vaill. paris. 149. t. 31. f. 13, 14.
Cynosorchis morio fœmina. Ger. Em. 208.
Anglis, Female Fool-stones.
Habitat in pratis et pascuis subhumidis. 4. V. VI.

- * *pyramida-* 4. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio trifido æquali
lis. integerrimo : cornu longo, petalis sub lanceolatis.
Fl. suec. 798.
Orchis purpurea spica congesta pyramidalis. R. Syn. 377. t. 18.
Anglis, Purple late-flowering Orchis.
Habitat in pascuis siccioribus et cretaceis frequens. 4. VI. VII.
- * *ustulata.* 5. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio quadrifido
punctis scabro : cornu obtuso, petalis distinctis. Fl.
suec. 797. Sp. pl. 941.
Orchis pannonica IV. Clus. hist. 268. R. Syn. 377.
Cynosorchis militaris pratensis humilior. Baub. pin. 81.
Cynosorchis militaris pannonica. Park. 1345.
Cynosorchis minor pannonica. Ger. Em. 207.
Anglis, little purple-flowered Orchis.
*Habitat in pascuis siccioribus, et sterilibus, præsertim
cretaceis.* 4. V. VI.
- coriophora-* 6. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio trifido re-
flexo crenato : cornu brevi, petalis conniventibus.
Sp. pl. 940.
Orchis odore hirci minor. Baub. pin. 82. Vaill. paris.
149. t. 30. f. 30, 31, 32. Hall. it. herc. 7.
Orchis barbata fœtida minor flore albo. R. Syn. 376.
Tragorchis minor, flore fuliginoso. R. hist. 1213.
Anglis, the lesser Lizard Flower.
Habitat
- purpurea.* 7. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio barbato quin-
quelobo lateralibus obtusis, crenulatis, medio bre-
vissimo acuto, petalis confluentibus.

Orchis

Orchis magna latis foliis, galea fusca vel nigricante.

Baub. hist. II. 759. R. Syn. 378. t. 19. f. 2.

Anglis, purple Man-Orchis.

Habitat in collibus cretaceis. At Northfleet near Gravesend, Mr. J. Sherard. R. Syn. 24. VI.

8. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio quinquefido *militaris.*
linearis punctis scabro, petalis confluentibus.

*Orchis bulbis indivisis, nectarii labio quinquelobo
punctis scabro: cornu obtuso, petalis confluenti-
bus. Sp. pl. 941. Fl. suec. 796.*

*Orchis galea et alis fere cinereis. Baub. hist. II. 755.
R. Syn. 378.*

*Cynosorchis latifolia hiante cucullo major. Baub. pin.
80.*

Cynosorchis latifolia minor. Park. 1344.

Cynosorchis major altera. Ger. Em. 205.

Anglis, the Man Orchis.

*Habitat in pratis et pascuis solo cretaceo. On Cawsham
hills, by the Thames-side, not far from Reading in
Berkshire. R. Syn. Near the old chalk-pit near the
paper-mill at Harefield, plentifully. Blackf. Spec.
bot. 24. VI.*

** *Bulbis palmatis.*

9. ORCHIS bulbis subpalmatis rectis, nectarii cornu co-
latifolia. x
nico : labio trilobo lateralibus reflexis, bracteis flo-
re longioribus. Sp. pl. 941. Fl. suec. 801.

*Orchis palmata pratensis latifolia, longis calcaribus.
Baub. pin. 85. R. Syn. 380. Vaill. paris. 152. t.
31. f. 1, 2, 3, 4, 5.*

*Orchis palmata mas s. Palma Christi mas. Park.
1356.*

Palma Christi mas. Ger. Em. 220.

Anglis, Male-handed Orchis.

Habitat in pratis et pascuis. 24. V. VI.

10. ORCHIS bulbis palmatis patentibus, nectarii cornu *maculata.* x
germinibus breviore : labio plano, petalis dorsali-
bus erectis. Sp. pl. 942. Fl. suec. 800.

Orchis

GYNANDRIA DIANDRIA.

- Orchis palmata pratensis maculata.* Baub. pin. 85.
R. Syn. 381.
Orchis palmata fœmina s. palma Christi fœmina, foliis maculatis. Park. 1357.
Palma Christi fœmina. Ger. Em. 220.
Anglis, Female-handed Orchis.
Habitat in pratis et pascuis humidioribus. 4. VI.

- * *conopsea.* 11. *ORCHIS* bulbis palmatis, nectarii cornu setaceo germinibus longiore, labio trifido, petalis duobus patentissimis. *Syst. nat.* 1243. *Sp. pl.* 942. *Fl. suec.* 790.
Orchis palmata minor calcaribus oblongis. Baub. pin. 85. *Rudb. elys.* II. 212. *f. 5.* *Vaill. paris.* t. 30. *f. 8, 9, 10.*
Orchis palmata minor flore rubro. Park. 1358.
Serapias minor nitente flore. Ger. Em. 222.
Anglis, red-handed Orchis.
Habitat in pratis et pascuis. 5. VI.

*** *Bulbis fasciculatis.*

- abortiva.* 12. *ORCHIS* bulbis fasciculatis filiformibus, nectarii labio ovato integerrimo. *Sp. pl.* 943. *Dalib. paris.* 275.
Orchis abortiva violacea. Baub. pin. 86.
Limodorum Austriacum. Clus. pann. 242. *R. Syn.* 383.
Nidus avis purpureus. Park. 1362.
Nidus avis flore et caule purpuro-violaceo. Ger. Em. 228.
Anglis, purple Bird's-nest.
Habitat in pratis siccioribus. In Southamptoniae comitatu prope Alton oppidum invenit, D. Goodyer. *R. Syn.* 4. V.

S A T Y R I U M. 901.

Nectarium scrotiforme s. inflato-didymum, pone florem.

- b* *irsinum,* 1. *SATYRIUM* bulbis indivisis, foliis lanceolatis, nectarii labio trifido: intermedia linearis obliqua praemorsa. *Sp. pl.* 944.

Orchis

Orchis barbata odore hirci, breviore latioreque folio. Baub. pin. 82.

Orchis barbata foetida. Baub. hist. II. 756. R. Syn. 376.

Tragorchis maxima, et T. vulgaris. Park. 1348.

Tragorchis maximus et T. mas. Ger. Em. 225.

Anglis, the Lizard Flower, or Goat-stones.

Habitat in cretaceis. Circa Dartford et Crayford in Cantio sed rarius. R. Syn. 4. VI. VII.

2. SATYRIUM bulbis palmatis, foliis oblongis obtusis, *viride*.
nectarii labio linearis trifido intermedia obsoleta. *Sp.*

pl. 944. Fl. suec. 304.

Orchis palmata flore viridi. Baub. pin. 86. pr. 30.

Orchis palmata minor flore luteo-viridi. R. Syn. 381.

Serapias batrachites altera. Ger. Em. 224.

Anglis, Frog Satyrium, or Orchis.

Habitat in paucis siccioribus. 4. V. VI.

3. SATYRIUM bulbis palmatis, foliis oblongis, *necata-fuscum*:
rii labio trifido æquali.

Anglis, brown Satyrium.

Habitat in prato montano Hellse-fellnab dicto prope Kendal in Westmorlandia. 4. VIII.

4. SATYRIUM bulbis fasciculatis, foliis lanceolatis, *albidum*.
nectarii labio trifido acuto : intermedia majore. *Sp.*

pl. 944. Fl. suec. 806.

*Orchis palmata thyrso specioso, longo, dense stipato,
ex viridi albente. R. Syn. 382.*

*Orchis palmata alpina, spica densa albo-viridi. Hall.
herc. 68.*

*Pseudo-orchis alpina, flore herbaceo. Mich. gen. 80.
t. 26.*

Anglis, white Satyrium.

*Habitat in pratis humidis in Cambria, et circa Malham in comitatu Eboracensi, D. Richardson. R. Syn.
4. VI.*

O P H R Y S. 902.

Neclarium subtus subcarinatum.* *Bulbis ramosis.*

- Nidus a-* 1. OPHRYS bulbis fibroso-fasciculatis, caule vaginato,
vis. nectarii labio bifido. *Sp. pl.* 942. *Fl. suec.* 815.
Nidus avis. *Lob. ic.* 195. *Lugd.* 673. *R. Syn.* 382.
Orchis abortiva fusca. *Bauh. pin.* 86.
Orchis abortiva rufa, f. Nidus avis. *Park.* 1362.
Satyrion abortivum f. Nidus avis. *Ger. Em.* 228.
Anglis, Bird's-nest.
Habitat in *sylvis et umbrosis*. In *sylva* Charlton wood
dicta in Cantio. 24. V.
- spiralis.* 2. OPHRYS bulbis aggregatis oblongis, caule subfoli-
oso, floribus secundis, nectarii labio indiviso. *Sp.*
pl. 945.
Orchis spiralis albo odorata. *Bauh. hist.* II. 769. *R.*
Syn. 378.
Triorchis *Ger. Em.* 218. alba odarata minor. *Bauh.*
pin. 87. *Park.* 1354.
Anglis, triple Ladies Traces.
Habitat in *pascuis siccioribus*. 24. VIII.
- ovata.* 3. OPHRYS bulbo fibroso, caule bifolio, foliis ovatis,
nectarii labio bifido. *Sp. pl.* 946. *Fl. suec.* 808.
Ophrys bifolia. *Ger. Em.* 402. *Bauh. pin.* 87.
Bifolium sylvestre vulgare. *Park.* 504. *R. Syn.* 385.
Anglis, common Twayblade.
Habitat in *sylvis et dumetis humidis*. 24. V. VI.
- cordata.* 4. OPHRYS bulbo fibroso, caule bifolio, foliis cordati-
nis, nectarii labio bifido.
Ophrys bulbo fibroso, caule bifolio, foliis cordatis.
Sp. pl. 946. *Fl. suec.* 809.
Ophrys minima. *Bauh. pin.* 87. *pr.* 31.
Bifolium minimum. *Bauh. hist.* III. 534. *R. Syn.*
385.
Anglis, the least Twayblade.
Habitat in *ericetis humidis, praesertim solo turfoso, in*
comita-

GYNANDRIA DIANDRIA.

339

comitatibus Eboracensi, Lancastriensi et Westmorlandico passim. 4. VII.

5. OPHRYS bulbo fibroso, scapo vaginato, nectarii labio integro. *palustris.*

Bifolium palustre. Park. 505. R. Syn. 385.

Orchis bifolia minor palustris. Pluk. ph. t. 247. f. 2.
Anglis, Marsh Twayblade.

Habitat *in paludibus.* Found by Mr. Dent and Mr. Dale, on the boggy and fenny grounds near Gamlingay in Cambridgeshire; by Parkinson on the low wet grounds between Hatfield and St. Albans; and in divers places in Romney marsh. By Mr. Dubois at Hursthill, Tunbridge-wells. R. Syn. 4. VII. VIII.

** *Bulbis rotundis.*

6. OPHRYS bulbo subrotundo, scapo subnudo pentagono, foliorum apicibus scabris. nectarii labio integrum. *paludosa.*

Sp. pl. 947. Fl. suec. 813.

Orchis minima bulbosa. R. Syn. 375.

Anglis, the least Orchis.

Habitat

7. OPHRYS bulbo globoso, scapo nudo, nectarii labio trifido. *Monorchis.* *Monor-*

Sp. pl. 947. Fl. suec. 810.

Orchis odorata moschata, s. Monorchis. Baub. pin. 84. R. Syn. 378.

Orchis pusilla odorata. Park. 1354.

Anglis, yellow or Musk Orchis.

Habitat *in pascuis sterilioribus, sed rarbus.* 4. VII. †

8. OPHRYS bulbo subrotundo, scapo nudo, foliis lanceolatis, nectarii labio integro, petalis dorsalibus linearibus. *lilifolia.* *Sp. pl. 946. Fl. suec. 811.*

Ophrys scapo nudo, foliis radicalibus ovato oblongis dimidiis scapi longitudine. Gron. virg. 185.

Pseudo-orchis bifolia palustris. R. Syn. 382.

Chamæorchis lilifolia. Baub. pin. 84.

Chamæorchis latifolia Zelandica. Park. 1354.

Anglis, Dwarf Orchis.

Z. 2

Ha-

† Ophrys Monorchis. Knight's in his on a bank at the edge of a little coppice lying at the upper side of a field, which is on the river end side of the way from Andover to Newbury, particularly.

GYNANDRIA DIANDRIA.

Habitat in palustribus. On Hinton and Teverham moors near Cambridge. R. Syn. 24. VII.

anthropo- 9. OPHRYS bulbis subrotundis, scapo folioso, nectarii labio linearis tripartito : medio elongato bifido. Sp. pl. 948.

Orchis anthropophora oreades. Col. ec. I. 320. R. Syn. 379. fœmina. Park. 1348.

Orchis flore nudi hominis effigiam repræsentans, fœmina. Bauh. pin. 82.

Anglis, green Man Orchis.

Habitat in cretaceis. Found by Mr. Dale in an old gravel-pit at Dalingon near Sudbury ; at Northfleet and Greenhithe in Kent, plentifully. R. Syn. 24. VI.

muscifera. 10. OPHRYS bulbis subrotundis, scapo folioso, nectarii labio quadrifido.

Orchis myodes galea et alis herbidis. Bauh. hist. II. 767. R. Syn. 379.

Orchis muscæ corpus referens minor, vel galea et alis herbidis. Bauh. pin. 83.

Orchis myodes minor. Park. 1352.

β Orchis myodes major. Park. 1351.

Anglis, Fly Orchis.

Habitat in pratis et pascuis paßim. 24. VI.

* apifera. 11. OPHRYS bulbis subrotundis, scapo folioso, nectarii labio quinquelobo, lobis subtus inflexis.

Orchis fuciflora galea et alis purpurascens. Bauh. hist. II. 766. R. Syn. 379.

Orchis f. Testiculus velinus, 2. Sphegodes. Ger. Em. 212.

Orchis fucum referens major, foliolis superioribus candidis et purpurascens. Bauh. pin. 83.

Orchis sphegodes seu fucum referens. Park. 1350.

β Orchis f. Testiculus sphegodes hirsuto flore. Bauh. hist. II. 767. R. Syn. 380.

Anglis, Bee Orchis.

Habitat in pratis et pascuis siccioribus. 24. VI.

C Y P R I P E D I U M. 906.

Nectarium ventricosum, inflatum, cavum.

1. CYPRIPEDIUM radicibus fibrosis, foliis ovato lan-
- ceolatis caulinis. *Sp. pl.* 951. *Fl. suec.* 820.
Calceolus Mariæ. Ger. Em. 443. *R. Syn.* 385.
Helleborine flore rotundo seu Calceolus. Bauh. pin.
 187.
Elleborine major seu Calceolus Mariæ. Park. 217.
Anglis, Ladies Slipper.
Habitat in sylvis et dumetis, sed rarius. In sylvula
inter Clapham et Ingleborough sed sparsim. 24.
 VII.

S E R A P I A S. 903.

Nectarium ovatum, gibbum : labio ovato.

1. SERAPIAS bulbis fibrosis. nectarii labio obtuso cre-
- latifolia.*
 nato, petalis æquali, fructibus pendulis.
Serapias caule multifolio multifloro. Hort. cliff. 429.
Helleborine latifolia montana. Bauh. pin. 186. *R.*
Syn. 383.
Helleborine. Dod. pempt. 384. *Ger. Em.* 442.
Elleborine flore viridante. Park. 218.
 β *Helleborine altera atro-rubente flore. Bauh. pin.* 186.
R. Syn. 383.
 γ *Helleborine palustris nostras. R. Syn.* 284.
Anglis, broad-leaved Bastard Hellebore.
Habitat in sylvis et sepibus. γ in palustribus. 24. VII.
 VIII.
2. SERAPIAS bulbis fibrosis, ne $\ddot{\text{e}}$ tarii labio obtuso peta-
- longifolia.*
 lis breviore, fructibus erectis.
Serapias radicibus fibrosis, ne $\ddot{\text{e}}$ tarii labio obtuso peta-
lis breviore, foliis ensiformibus. It. oel. 144.
Helleborine flore albo. Ger. Em. 442. *R. Syn.*
 383. vel *Damasonium montanum latifolium. Bauh.*
pin. 187.
Elleborine minor flore albo. Park. 218.
 β *Helleborine latifolia, flore albo clauso. R. Syn.*
 384.

GYNANDRIA POLYANDRIA.

- γ Helleborine foliis prælongis angustis acutis. *R. Syn.*
384.
 δ Helleborine montana angustifolia purpurascens. *Bauh.*
pin. 187.
Anglis, white-flowered Bastard Hellebore.
Habitat in sylvis et dumetis. & in the woods near Stoken-Church, Oxfordshire, R. Syn. β in a Beachwood, just below the duke of Bedford's seat at Cheyneis, Buckinghamshire. Blackf. spec. bot. α, γ, δ, circa Clapham et Ingleton, in comitatu Eboracensi. 4. VIII.

POLYANDRIA.

ARUM. 915.

Spatha monophylla, cucullata. Spadix supra nudus, inferne femineus, medio stamineus.

- macula-* 1. ARUM acaule, foliis hastatis integerrimis, spadice
tum. clavato. *Hort. cliff. 8. Sp. pl. 966. R. Syn. lug. db. 8.*
Arum. Bauh. hist. II. 783. R. Syn. 266. vulgare.
Ger. Em. 834. maculatum et non maculatum.
Park. 373.
Arum vulgare maculatum. Bauh. pin. 195.
Anglis, Wake-Robin, Cuckow-pint.
Habitat in umbrosis et ad sepes. 4. V.
Pharmac. Ari Radix.

ZOSTERA. 919.

Spadix linearibus, altero latere fructifero. Calyx nul-
Ius. Cor. nulla. Stam. alterna. Semina solitaria
alterna.

- marina.* 1. ZOSTERA. *It. IV—goth. 166. t. 4. f. 1. Sp. pl.*
968.
Alga. Ger. Em. 1569 R. Syn. 52. angustifolia vi-
triiorum. Bauh. pin. 364. hist. III. 794. R.
Syn. 53.
Fucus marinus sive alga, marina graminea. Park.
1242.

β Fucus

- β *Fucus s. alga marina graminea angustifolia seminifera ramosior. R. Syn. 52.*
- γ *Fucus marinus seu Alga marina graminea minor. R. Syn. 52.*
- δ *Potamogeton marinum in utriculis epiphylospermon minus. R. Syn. 53.*
Anglis, Grass Wrack.
Habitat *in littoribus maritimis. 24.*

X 4

Classis

Classis XXI.

MONOECIA

MONANDRIA.

ZANNICHELLIA. 920.

Masculi. *Cal.* o. *Cor.* o.Feminei. *Cal.* monophyllus. *Cor.* o. *Germina* citer quatuor. *Sem.* totidem.

palustris. 2. ZANNICHELLIA. *Fl. lapp.* 321. *suec.* 824. *Sp. pl.* 969.

Zannichellia palustris major foliis gramineis acutis.
Mieb. gen. 71. *t.* 34. *f.* 1. 2.

Aponogiton aquaticum graminifolium, staminibus singularibus. *Pont. anib.* 117. *R. Syn.* 135.

Potamogitonon similis Graminifolia ramosa et ad genicula polyceratos. *Pluk. ph. t.* 102. *f.* 7.

Anglis, horned Pondweed.

Habitat in fossis et stagnis frequens. ○. VII.

DIANDRIA.

LEMNA. 923.

Masc. *Cal.* monophyllus. *Cor.* nulla.Fem. *Cal.* monophyllus. *Cor.* nulla. *Stylus* unus.
Cap. unilocularis.

trifolia. 1. LEMNA foliis petiolaris lanceolatis. *Fl. lapp.* 370.
suec. 828. *Sp. pl.* 970.

Lenticula aquatica trifolia *Bauh. pin.* 362. *R. Syn.* 129.

Hederula aquatica. *Ger. Em.* 830.

Ranunculus hederaceus aquaticus. *Park.* 1260.

Anglis,

- Anglis*, Ivy-leaved Duck's-meat.
 Habitat *in fossis et stagnis*. 4. V. VI.
2. LEMNA foliis sessilibus utrinque planiusculis, radicibus solitariis. *Hort. cliff.* 417. *Fl. suec.* 827. *Sp. pl.* 970. *minor.*
Lens palustris. *Ger. Em.* 829. *Baub. hist. III.* 784.
R. Syn. 129. *t. 4. f. 1.*
- Lens palustris vulgaris*. *Baub. pin.* 362.
Lens palustris s. aquatica vulgaris. *Park.* 1262.
Anglis, the least Duck's-meat.
 Habitat *in stagnis*. 4. VI.
3. LEMNA foliis sessilibus, radicibus confertis. *Hort. polyrhiza*.
cliff. 477. *Fl. suec.* 825. *Sp. pl.* 970.
Lenticula palustris major. *Comm. Cat. pl. Holl.* *R. Syn.* 129. *t. 4. f. 2.*
Anglis, greater Duck's-meat.
 Habitat *in fossis*. ①. VI. VII.

T R I A N D R I A.

T Y P H A. 924.

- Masc. *Amentum cylindricum*. *Cal. triphyllus*.
Cor. o.
- Fem. *Amentum cylindricum infra masculos*. *Cal. capillo villoso*. *Cor. o.* *Sem. unicum, infidens pappo capillari*.
1. TYPHA foliis subensiformibus, spica mascula femine- *latifolia*. neaque approximatis. *It. scan.* 168. *Sp. pl.* 971. *Fl. suec.* 831.
Typha. *Ger. Em.* 46. *palustris major*. *Baub. pin.* 20. *hist. II.* 539. *R. Syn.* 436.
- Typha palustris maxima*. *Park.* 1204.
Anglis, great Cat's-tail, or Reed-mace.
 Habitat *ad ripas fluviorum, piscinarum, paladium frequens*. 4. VII.
2. TYPHA foliis semicylindricis, spica mascula femine- *angustifolia*. aque remotis. *It. scan.* 198. *Fl. suec.* 830. *Sp. pl. lia.* 971.

Ty-

MONOECIA TRIANDRIA.

Typha palustris media. *Baub. hist. II.* 540. *R. Syn. 436.*

Typha palustris clava gracili. *Baub. pin. 20.*

Typha minor. *Park. 1204.*

Anglis, narrow-leaved Cat's-tail.

Habitat in fossis, et stagnis. 4. VII.

SPARGANIUM. 925.

MASC. *Amentum subrotundum.* *Cal. triphyllus.*
Cor. o.

FEM. *Amentum subrotundum.* *Cal. triphyllus.* *Cor. o.*
Stigm. bifidum. *Drupa exsucca,* disperma.

erectum. 1. SPARGANIUM foliis triquetris erectis: *Syst. nat.*
1260. *Sp. pl. 971.* *Fl. suec. 831.* *lapp. 345.*

Sparganium ramosum. *Park. 1205.* *Ger. Em. 45.*
Baub. pin. 15. *R. Syn. 437.*

β *Sparganium non ramosum.* *Baub. pin. 15.*

Anglis, great Bur-reed.

Habitat in fossis, paludibus et ad ripas fluviorum:
4. VII.

natans. 2. SPARGANIUM foliis decumbentibus planis. *Sp. pl.*
971. *Fl. suec. 832.*

Sparganium foliis complanatis natantibus, spicis pau-

cissimis. *Hall. helv. 260.*

Sparganium minimum. *R. hist. 1910.* *syn. 437.*

Anglis, the least Bur-reed.

Habitat in stagnis et fluviis leniter fluentibus, sed rari-

us. 4. VII.

CAREX. 928.

MASC. *Amentum imbricatum.* *Cal. monophyllus.*
Cor. o.

FEM. *Amentum imbricatum.* *Cal. monophyllus.*
Cor. o. *Nectarium inflatum,* tridentatum. *Stigm.*
tria. *Sem. triquetrum,* intra nectarium..

* *Spica unica simplici.*

dioica. 1. CAREX spica simplici dioica. *Hort. cliff. 438.* *Fl.*
suec. 833. *Sp. pl. 972.*

Gramen cyperoides minimum spica simplici cassa.
Hist. ex. III. 244. *f 8. t. 12. f. 22.*

Gramen cyperoides minus ranunculi capitulo longiore.
R. Syn. 425. *An-*

Anglis, small Carex.

Habitat in paludibus turfosis. 4. VI.

2. CAREX spica simplici androgyna ovata: superne *capitata*: mascula, capsulis imbricatis patulis. *Syst. nat.* 1261.

Gramen cyperoides minimum ranunculi capitulo rotundo. *Hist. ox.* III. 245. f. 8. t. 12. f. 36. R. *Syn.* 425.

Gramen cyperoides spica echinata simplici. *Mer. pin.*

Anglis, round-headed Carex.

Habitat in paludibus turfosis, in Sherley common, prope Croydon. 4. VI.

3. CAREX spica simplici androgyna: superne mascula, *pulicaris*. capsulis divaricatis retroflexis. *Syst. nat.* 1261. *Sp. pl.* 972.

Gramen cyperoides minimum, seminibus deorsum reflexis puliciformibus. R. *Syn.* 424. *Pluk. phyt.* t. 34. f. 10. *Hist. ox.* III. 244. f. 8. t. 12. f. 21.

Anglis, Flea Carex.

Habitat in paludibus limosif. In ericeto Hampstediano et Sherley common prope Croydon. 4. VI.

** *Spicis androgynis.*

4. CAREX racemo composito, spiculis androgynis. *panicuata* *Cent. pl.* 93. *Syst. nat.* 1262.

Gramen cyperoides palustre elatius, spica longiore laxa. R. *Syn.* 422. *Hist. ox.* III. 244. f. 8. t. 12. f. 23.

Anglis, Paniced Carex.

Habitat in palustribus putridis, et aquofis, in sylvula Hampstead wood dicta prope Hampstedium. 4. VI. VII.

5. CAREX spica compofita subdisticha, spiculis ovatis *disticha*. imbricatis androgynis, foliolo longiori instructis, culmo triquetro.

Gramini cyperoidi ex monte Ballon simile, spica totali e pluribus spicis composita. R. *Syn.* 423. *Pluk. ph.* t. 34. f. 7.

Gramen cyperoides elegans multifera spica. *Park.* 1172. Gramen

β Gramen cyperoides elegans spica composita molli.
Pluk. ph. t. 34. f. 4.
Anglis, soft Carex.
Habitat in palustribus. 4. V. VI.

divisa. 6. CAREX spica composita spiculis rotundis confertis
 androgynis, foliolo longiori instructis, culmo sub-
 tereti.
 Gramen cyperoides palustre majus spica divisa. *Baub.*
pin. 6.
 Gramen cyperoides ex monte Ballon spica divisa.
Baub. hist. II. 498. R. Syn. 423.
 Gramen cyperoides parvum. *Ger. Em. 21.*
 Gramen cyperoides palustre minus. *Park. 1287.*
Anglis, Marsh Carex.
Habitat in palustribus, sed rarius. In the meadows near
the Hithe at Colchester in Essex, Mr. Newton;
by Hithe in Kent, Mr. J. Sherard. R. Syn.
4. VII.

leporina. 7. CAREX spica composita, spiculis ovatis sessilibus
 approximatis androgynis nudis. *Sp. pl. 973. Fl.*
suec. 837.
 Carex spicis ternis sessilibus confertis androgynis. *Fl.*
lapp. 322.
 Gramen cyperoides spica e pluribus spicis brevibus
 mollibus composita. *R. Syn. 422. Sch. agr. 456.*
t. 10. f. 15.
 Gramen cyperoides palustre majus spica divisa. *Baub.*
pin. 6. Hist. ox. III. 244. f. 8. t. 12. f. 29.
Anglis, naked Carex.
Habitat in palustribus et aquosis 4. VI. VII.

arenaria. 8. CAREX spica composita, spiculis androgynis : infe-
 rioribus remotioribus foliolo longiori instructis, cul-
 mo triquetro. *It. oel. 139. Sp. pl. 973. Fl. suec.*
835.
 Gramini cyperoides ex monte Ballon simile humilius.
 in maritimis et arenosis nascens. *R. Syn. 423.*
Pluk. ph. t. 34. f. 7.

Gramen

Gramen cyperoides elegans multifera spica. Park.

1172.

Anglis, Sea Carex.

Habitat in arenosis maritimis passim. 4. VI. VII.

9. CAREX spica composita disticha nuda, spiculis an- *brizoides*. drogynis oblongis contiguis patentibus, culmo nu- do. Cent. pl. 91. Syst. nat. 1262.

Gramen cyperoides palustre elegans spica composita asperiore. R. Syn. 423.

Anglis, rough Carex.

Habitat in palustribus et aquosis sed rarius. 0. VI.

10. CAREX spica supradecomposita inferne laxiore, spi- *vulpina*. culis androgynis glomeratis : superne masculis. Fl. suec. 838. Sp. pl. 973.

Gramen cyperoides palustre majus, spica compacta. Baub. pin. 6. R. Syn. 423. Hist. ox. III. 244. f. 8. t. 12. f. 24.

Gramen palustre cyperoides. Ger. Em. 21.

Gramen cyperoides palustre majus. Park. 1266.

Anglis, great Carex.

Habitat ad ripas fluviorum. 4. VII.

11. CAREX spiculis subrotundis approximatis andro- *spicata*. gynis capsulis ovatis acutis.

Gramen cyperoides parvum. Ger. Em. 18.

Gramen cyperoides spicis minoribus minusque com- pactis. Baub. pin. 6. pr. 13. hist. II. 497.

Gramen cyperoides spicatum minus. R. Syn. 424.

Anglis, spiked Carex.

Habitat in aquosis. 4. V. VI.

12. CAREX spiculis subovatis sessilibus remotis andro- *muricata*. gynis capsulis acutis divergentibus spinosis. Fl. suec. 839. Sp. pl. 974.

Gramen cyperoides spicatum minimum spica divulsa aculeata. R. Syn. 424.

Gramen nemorosum spicis parvis asperis. Baub. pin. 7. th. 100: Hist. ox. III. 344. f. 8. t. 12. f. 26.

Gramen cyperoides echinatum minimum. Park. 1272. *Anglis*,

Anglis, prickly Carex.

Habitat in palustribus et sylvis humidis. 24. VI.

canescens. 13. CAREX spiculis subrotundis remotis sessilibus obtusis androgynis capsulis ovatis obtusiusculis. Fl. suec. 842. Sp. pl. 974.

Gramen cyperoides spicatum minus, spica longa divulsa seu interrupta. R. Syn. 424.

Gramen cyperoides spicis curtis divulsis. Fl. pr. 117. t. 32.

Anglis, grey Carex.

Habitat ad sepes et in sylvis humidis. 24. V.—VIII.

remota. 14. CAREX spicis ovatis subsessilibus remotis androgynis foliis caulinis culmum æquantibus. Cent. pl. 92. Syst. nat. 1262.

Gramen cyperoides angustifolium, spicis parvis sessilibus infoliorum alis. R. Syn. 424. Hist. ox. III. 243. f. 8. t. 12. f. 17. Pluk. ph. t. 34. f. 3.

Anglis, long-leaved Carex.

Habitat in aggeribus fossarum et sylvis humidis. 24. VIII.

*** *Spicis sexu distinctis : femineis sessilibus.*

flava. 15. CAREX spicis confertis subsessilibus subrotundis : mascula linearis, capsulis acutis recurvis. Fl. suec. 843. Sp. pl. 975.

Gramen cyperoides aculeatum germanicum vel minus. Bauh. pin. 7. Hist. ox. III. p. 243. f. 8. t. 12. f. 19.

Gramen palustre echinatum. Bauh. hist. II. 497. Ger. Em. 17. R. Syn. 421.

Gramen aculeatum Germanicum. Park. 1187.

§ Gramen cyperoides echinatum majus. Pet. conc. gr. 169.

Anglis, yellow Carex.

Habitat in palustribus et humidioribus pratis. 24. VI.

pilulifera. 16. CAREX spicis terminalibus confertis subrotundis : masculina oblonga. Roy. lugdb. 75. Sp. pl. 976.

Gramen

Gramen cyperoides tenuifolium spicis ad summum caulem sessilibus globulorum emulis. *Pluk. ph. t. 9. f. 8. R. Syn. 422.*

β Gramen cyperoides spicis brevibus congestis folio molli. *R. Syn. 421.*

Anglis, round-headed Carex.

Habitat in pratis et pascuis humidis paſſim. 4. VI. VII.

17. CAREX spicis tribus ovatis sessilibus alternis; *saxatilis*. mascula oblonga. *Fl. suec. 848. Sp. pl. 976.*

Gramen cyperoides vernum minimum. *R. Syn. 421.*

Gramen cyperoides spicatum. *Ger. Em. 22.*

Gramen caryophyllatae foliis, spica divulsa. *Bauh. pin. 3. th. 46.*

Gramen spicatum foliis Caryophylleis. *Park. 1160.*

Anglis, vernal Carex.

Habitat in pratis montosis. 4. IV. V.

**** Spicis sexu distinctis; femineis pedunculatis.

18. CAREX spicis pedunculatis erectis remotis: semi-*panicea*. neis linearibus, capsulis obtusiusculis inflatis. *Fl. suec. 853. Sp. pl. 977.*

Gramen cyperoides foliis caryophylleis, spicis e rarioribus et tumidioribus granis compositis. *R. Syn. 418. Pluk. ph. t. 91. f. 7.*

Anglis, Pink Carex.

Habitat in paludibus turfosis. 4. VI. VII.

19. CAREX spicis erectis cylindricis ternis subsessili-*cæspitosa*. bus: mascula terminali, culmo triquetro. *Fl. suec. 853. Sp. pl. 978.*

Gramen cyperoides foliis caryophylleis, spicis erectis sessilibus, e seminibus confertis compositis. *R. Syn. 418.*

Gramen cyperoides angustifolium, spica spadiceo-viridi minus. *Bauh. pin. 6. pr. 13.*

Anglis, turfy Carex.

Habitat in pratis, pascuis et sylvis humidis. 4. V. VI.

- palleſcens.* 20. CAREX spicis pendulis : mascula erecta, femineis ovatis imbricatis; capsulis confertis obtusis. *Fl. suec.* 852. *Sp. pl.* 977.
Carex spicis tribus petiolatis erectis remotis, mascula et femineis. *Fl. lapp.* 327.
Gramen cyperoides polyftachyon flavicans, spicis brevibus prope summitatem caulis. *R. Syn.* 419. *Hift. ox.* III. f. 8. t. 12. f. 16. *Pluk. ph.* t. 34. f. 5.
Anglis, pale Carex.
Habitat in pratis et pascuis humidis paſſim. 4. VI.
- diftans.* 21. CAREX spicis remotissimis subpedunculatis, bractea vaginali, capsulis angulatis mucronatis. *Syſt. nat.* 1262.
Gramen cyperoides palustre, spicis tribus subrotundis vix aculeatis, spatio distantibus. *Hift. ox.* III. t. 12. f. 18.
Gramen cyperoides spicis parvis longissime distantibus. *R. Syn.* 420.
Anglis, loose Carex.
Habitat in uidis turfoſis frequens. 4. VI.
- Pseudo-cyperus.* 22. CAREX spicis pendulis, pedunculis geminatis, capsulis biaristatis. *Sp. pl.* 978. *Fl. suec.* 854.
Gramen cyperoides spica pendula breviore. *Bauh. pin.* 6. *tb* 86. *Hift. Ox.* III. 242. f. 8. t. 12. f. 5.
R. Syn. 419.
Cyperus f. *Pseudo-cyperus* spica pendula breviore. *Park.* 1266.
Pseudo-cyperus. *Ger. Em.* 29.
Anglis, bastard Carex.
Habitat ad ripas foſtarum frequens. 4. VII.
- pendula.* 23. CAREX spicis pendulis, mascula erecta, femineis cylindricis pedunculo longioribus, capsulis acuminateis.
Gramen cyperoides spica pendula longiore. *Park.* 1267. *R. Syn.* 420.
Gramen spica pendula longiore et angustiore. *Bauh. pin.* 6. *pr.* 13. *bijt. II.* 497.

Gramen cyperoides polystachyon majuscum latifolium, spicis multis, longis, strigosis. R. Syn. 419.
Anglis, pendulous Carex.

Habitat in sylvis & sepibus humidis; in sepibus inter Hampstead et Highgate copiose. 4. VI. VII.

22. CAREX spicis pendulis, mascula erecta, femineis *sylvatica* filiformibus pedunculo brevioribus, capsulis acutis distantibus.

Gramen cyperoides sylvarum tenuius spicatum. Park. 1171. Hist. Ox. III. 243. f. 8. t. 12. f. 9.

Anglis, Wood Carex.

Habitat in sylvis humidis. 4. V. VI.

***** Spicis sexudistinctis: masculis pluribus.

23. CAREX spicis masculis pluribus, femineis subsessiliibus, capsulis obtusifolculis. Fl. suec. 857. Sp. pl. 978?

Gramen cyperoides. Ger. Em. 12. latifolium spica rufa f. caule triangulo. Bauh. pin. 6.

Gramen cyperoides cum paniculis nigris. Bauh. hist. II. 494. R. Syn. 417.

Gramen cyperoides majus latifolium. Park. 1265.

β Gramen cyperoides majus angustifolium. Park. 1265.

γ Gramen cyperoides minus angustifolium. Park. 1266.
Anglis, brown Carex.

Habitat in aquosis et ad rivulos. 4. V.

24. CAREX spicis masculis pluribus, femineis pedunculatis, capsulis inflatis acuminatis. Fl. suec. 856.
 Sp. pl. 979.

Gramen cyperoides majus præcox, spicis turgidis teretibus flavescentibus. Hist. Ox. III. 242. t. 12. f. 6. R. Syn. 420.

Gramen cyperoides vesicarium majus. Cat. Giff. 63.

β Gramen cyperoides polystachyon majus, spicis teretibus erectis. R. syn. 419.

Anglis, greater Bladder Carex.

Habitat in palustribus et aquosis passim. ⊙ VI.

MONOECIA TRIANDRIA.

- inflata.* 25. CAREX spicis masculis pluribus, femineis sessilibus capsulis ovatis inflatis acuminatis, bracteis duplo longioribus.
Gramen cyperoides palustre, spicis tribus subrotundis vix aculeatis, spatio distantibus. *Hist. Ox.* III. t. 12. f. 18. *R. Syn.* 420.
Gramen cyperoides vesicarium minus. *Cat. giss.* 63.
Anglis, lesser Bladder Carex.
Habitat in palustribus & aquosis in comitatibus Eboracensi & Westmorlandico passim. 4. VI. VII.
- hirta.* 26. CAREX spicis remotis, masculis pluribus, femineis subpedunculatis erectis; capsulis hirtis. *Fl. suec.* 858.
Carex spicis remotis, femineis subsessilibus capsulis hirsutis. *Fl. lapp.* 335. *Sp. pl.* 975.
Gramen cyperoides polyftachyon lanuginosum. *R. Syn.* 418. *Hist. Ox.* III. 243. f. 8. t. 12. f. 10.
Gramen cyperoides Norvegicum parium lanosum. *Park.* 1172.
Anglis, hairy Carex.
Habitat in pratis & pascuis humidis frequens. 4. VI.

T E T R A N D R I A.

B E T U L A.

- Masc. *Cal. monophyllus*, subtrifidus, triflorus. *Cor. quadripartita*.
Fem. *Cal. monophyllus* subtrifidus, biflorus. *Strobilus cylindricus*. *Sem. utrinque membrana alata*.
- alba.* 1. BETULA foliis ovatis acuminatis serratis. *Hort. cliff.* 442. *Fl. suec.* 859. *Sp. pl.* 982.
Betula. *Bauh. hist.* I. 148. pin 427. *R. Syn. Ger. Em.* 1478.
Anglis, the Birch Tree.
Habitat in sylvis & sepibus humidis. 5. VII.

B U X U S. 934.

- Masc. *Cal. tryphillus*. *Petala duo*. *Germinis rudimentum*.
Fem. *Cal. tetraphyllus*. *Petala tria*. *Styli tres*. *Caps. trirostris, trilocularis*, *Sem. duo*.

1. BUXUS.

1. BUXUS. *Baup. hist.* 1. 496. *Ger. Em.* 1410. *R. Syn. sempervirens.*
 445. *Hort. cliff.* 441. *Sp. pl.* 983.
Buxus arborescens. Baup. pin. 471.
Buxus arbor vulgaris. Park. 1428.
Buxus angustifolia. R. Syn. 445.
Anglis, Box-Tree.
Habitat in sylvis & sepibus sed rarius. 4 IV.
Pharmac. Buxi folia lignum.

URTICA. 935.

- Masc. *Cal. tetraphyllus. Cor. nulla. Nectarium centrale cyathiforme.*
 Fem. *Cal. bivalvis. Cor. o. Sem. unicum nitidum.*
1. URTICA foliis oppositis ovatis serratis, amentis *pilulifera*.
 fructiferis globosis. *Hort. cliff.* 440. *upf.* 282.
Roy. lugdb. 209. *Sp. pl.* 983.
Urtica urens pilulas ferens. Baup. pin. 232.
Urtica romana. Ger. Em. 784. *Park.* 440.
Urtica pilulifera folio profundius urticæ majoris in modum ferrato, semine magno lini. R. Syn. 140.
Anglis, Roman Nettle.
Habitat in ruderatis; plentifully at Great Yarmouth in Norfolk; Aldborough in Suffolk; R. Syn. ① VIII.
Pharmac. Urticæ romanæ semina.
2. URTICA foliis oppositis ovalibus. *Sp. pl.* 984. *urens.*
Fl. suec. 862.
Urtica minor. Ger. Em. 704. *R. Syn.* 140.
Urtica urens minor. Baup. pin. 232.
Anglis, lesser Nettle.
Habitat in cultis, ruderatis. ① VIII.
3. URTICA foliis oppositis cordatis, racemis geminis, *dioica*.
Sp. pl. 984. *Fl. suec.* 863.
Urtica urens. Ger. Em. 404. *maxima. Baup. pin.* 232.
Urtica racemifera major perennis. R. Syn. 139.
Anglis, common Nettle.
Habitat in ruderatis & ad sepes. 4. VII.
Pharmac. Urticæ semina, folia, cymæ.

The Balkarian
 a Tartarian nation
 make cloth of this.

MONOECIA PENTANDRIA.

P E N T A N D R I A.

X A N T H I U M . 937.

Masc. *Cal. communis imbricatus. Cor. monopetalæ, quinquefidæ, infundibuliformes. Receptaculum paleaceum.*

Fem. *Cal. involucrum biphyllum, biflorum. Cor. o. Drupa sicca muricata, bifida. Nucleus bilocularis.*

strumari- 1. XANTHIUM caule inermi. *Sp. pl. 987. Fl. suec. um. 864.*

Xanthium seu Lappa minor. *Bauh. hist. III. 572. Park. 1222.*

Lappa minor Xanthium Dioscoridis. *Bauh. pin. 198.*

Bardana minor. *Ger. Em. 800.*

Anglis, lesser Burdock.

Habitat in finetis sed rarius. *Q. VIII. IX.*

Pharmac. *Strumariæ Herba.*

A M A R A N T U S . 941.

Masc. *Cal. triphyllus. Cor. o.*

Fem. *Cal. triphyllus. Cor. o. Styli tres. Caps. unilocularis circumscissa. Sem. unicum.*

Blitum. 1. AMARANTUS spicis triandris erectiusculis, foliis ovatis retusis. *Syst. nat. 1268.*

Amarantus floribus glomeratis lateralibus, foliis ovatis retusis, caule diffuso. *Sp. pl. 990. Fl. suec. 865.*

Amaranthus sylvestris et vulgaris. *Tourn. paris. 385.*

Blitum rubrum minus. *Bauh. pin. 118. Cam. epit. 235. R. Syn. 157.*

β Blitum album minus. *Cam. epit. 236.*

Anglis, the least Blite.

Habitat in ruderatis. *Q. VIII.*

POLYANDRIA.

CERATOPHYLLUM. 944.

Masc. *Cal.* multipartitus. *Cor.* o. *Stam.* sedecim ad viginti.

Fem. *Cal.* multipartitus. *Cor.* o. *Pistil.* unicum. *Stylus* o. *Sem.* unicum, nudum.

1. CERATOPHYLLUM. *Fl.* suec. 866. *Sp. pl.* 992. *demersum.*

Hydroceratophyllum folio aspero, quatuor cornibus armato. *Vaill. act. gal.* 1719. *p.* 16. *t.* 2. *f.* 1. *R.* *Syn.* 135.

Millefolium aquaticum equisetifolium, seu Equisetum ramosum aquis immersum. *Cat. cant. syn. ed. II.* 280.

- β *Hydroceratophyllum folio lævi, octo cornibus armato.*

Vaill. act. gal. 1719. *p.* 16. *t.* 2. *f.* 2.

Anglis, horned Pondweed.

Habitat in aquis pigrioribus et fossis ubique. 24. VII.

MYRIOPHYLLUM. 945.

Masc. *Cal.* tetraphyllus. *Cor.* o. *Stam.* octo.

Fem. *Cal.* tetraphyllus. *Cor.* o. *Pist.* quatuor. *Stylus* o. *Sem.* quatuor nuda.

1. MYRIOPHYLLUM floribus masculis interrupte *spicatum.* spicatis. *Fl.* suec. 867. *Sp. pl.* 992.

Myriophyllum vulgare majus. *Vaill. act. gal.* 1719. *p.* 30.

Potamogiton foliis pennatis. *Tourn.* 233. *R. Syn.* 150.

Millefolium aquaticum pennatum spicatum. *Bauh.* *pin.* 141. *pr.* 73. *Park.* 1257.

- β *Millefolium aquaticum pennatum minus, foliolis singularibus latiusculis flosculis subjectis donatum.*

Hist. ox. III. 622. *s.* 15. *t.* 4. *f.* 7.

Anglis, spiked Water Millfoil.

Habitat in fossis, lacubus et aquis quietis frequens. 24. VI. VII.

2. MYRIOPHYLLUM floribus omnibus verticillatis. *verticillatum.* *Fl.* suec. 868. *Sp. pl.* 992.

MONOECIA PODYANDRIA.

- Myriophyllum aquaticum minus. *Clus. hist. II.* 252.
Ger. Em. I. 616.
 Myriophyllum aquaticum minus. *Vaill. aet. gal.*
^{1719. p. 31.}
 Pentapterophyllum aquaticum flosculis ad foliorum nodos. *Cat. gif. 112. R. Syn.* 316.
 Millefolium aquaticum minus. *Park. 1257. Bauh. hist. II.* 783.
 Millefolium aquaticum flosculis ad foliorum nodos. *Bauh. pin. 141.*
Anglis, verticillated Water Millfoil.
 Habitat in fossis et aquis stagnantibus paßim. 24. VII.

SAGITTARIA. 946.

- Masc. *Cal. triphyllus. Cor. tripetala. Filamenta*
fere viginti quatuor.
 Fem. *Cal. triphyllus. Cor. tripetala. Pist. nulla.*
Sem. multa, nuda.

- sagittifo-* 1. SAGITTARIA foliis sagittatis acutis. *Fl. lapp. 344.*
lia. *suec. 869. Sp. pl. 993.*
 Sagitta. *Bauh. hist III. 789. R. Syn. 258. minor*
latifolia Park. 1247.
 Sagittaria aquatica minor latifolia. *Bauh. pin. 194.*
 β Sagittaria aquatica omnium minima. *D. Pluk. R. Syn.*
^{258.}
Anglis, Arrow-head.
 Habitat in fossis et ad ripas fluviorum. 24. VI.

POTERIUM. 948.

- Masc. *Cal. tetraphyllus. Cor. quadripartita. Stam.*
a triginta ad quinquaginta.
 Fem. *Cal. tetraphyllus. Cor. quadripartita. Pist.*
duo. Bacc. e tubo corollæ indurato.

- sanguisor-* 1. POTERIUM caulis subangulosus. *Hort. cliff. 446.*
ba. *upf. 288. Sp. pl. 994.*
 Poterium inerme, filamentis longissimis. *Roy. lugdb.*
^{129. Dalib. paris. 291.}
 Sanguisorba minor. *Bauh. hist. III. 113. R. Syn. 203.*
 Pimpinella sanguisorba minor hirsuta. *Bauh. pin. 160.*
 Pimpinella vulgaris minor. *Park. 582.*

Pim-

- Pimpinella sylvestris. *Ger. Em.* 1045.
 β Sanguisorba major flore spadiceo. *Bauh. hist.* III. 120.
Anglis, Burnet.
 Habitat in pratis montosis praesertim solo cretaceo, β in
 pratis humidis. 4. VII.
 Pharmac. Pimpinellæ f. *Sanguisorbæ Herba*.

Q U E R C U S. 949.

- Masc. *Cal.* quinquefidus feræ. *Cor.* o. *Stam.* a
 quinque ad decem.
 Fem. *Cal.* monophyllus, integerrimus, scaber. *Cor.*
 o. *Stylus* unus. *Sem.* unicum, ovatum.

- I. QUERCUS foliis deciduis oblongis superne latiori-*Robur*.
 bus : sinibus acutioribus ; angulis obtusis. *Fl. suec.*
 870. *Sp. pl.* 996. *Hall. helv.* 152. *Roy. lugdb.* 80.

Quercus vulgaris. Ger. Em. 1339.

Quercus latifolia. Park. 1385. *R. Syn.* 440.

Quercus cum longo pediculo. Bauh. pin. 420.

- β *Quercus latifolia* mas quæ brevi pediculo est. *Bauh.*
pin. 419.

Anglis, the common Oak.

Habitat in *sylvis et sepibus*. 5. IV.

Pharmac. *Quercus Cortex, Folia, Glandes, Cupulae*.

F A G U S. 951.

- Masc. *Cal.* quinquefidus, campanulatus. *Cor.* o.
Stam. duodecim.

- Fem. *Cal.* quadridentatus. *Cor.* o. *Styli* tres. *Caps.*
muricata quadrivalvis. Sem. duo.

- * I. FAGUS foliis lanceolatis acuminato-ferratis subtus *Castanea*.
 nudis. *Hort. cliff.* 447. *ups.* 287. *Roy. lugdb.* 79.
Sp. pl. 997.

Castanea. Bauh. hist. I. 121. *Ger. Em.* 1442. *R.*
Syn. 440. *vulgaris. Park.* 1400.

Castanea sylvestris. Bauh. pin. 419.

- β *Castanea sativa. Bauh. pin.* 419.

Anglis, Chesnut Tree.

Habitat in *sylvis et sepibus in Cantio frequens*. 5. V.

Pharmac. *Castaneæ Fruetus*.

sylvatica. 2. FAGUS foliis ovatis obsolete serratis. *Fl. suec.* 871.
Sp. pl. 998.

Fagus. *Ger. Em.* 1444. *Bauh. pin.* 419. *Park.* 1403.
R. Syn. 439.

Anglis, Beach Tree.

Habitat in *sylvis et sepibus* in Cantio, Sussexia, Southamptonia *vulgatissima*. *R. Syn.* h. V.

C A R P I N U S. 952.

Masc. *Cal.* monophyllus, squama ciliata. *Cor.* o.
Stam. viginti.

Fem. *Cal.* monophyllus, squama ciliata. *Cor.* o.
Germina duo. *Styli* singulis duo. *Nux* ovata.

Betulus. 1. CARPINUS squamis strobilorum planis. *Hort. cliff.*
447. *Sp. pl.* 998.

Carpinus. *Dod. pempt.* 841.

Ostrya ulmo similis, fructu in umbilicis foliaceis.
Baub. pin. 427. *R. Syn.* 451.

Ostrya five *Ostrya*. *Park.* 1406.

Betulus five *Carpinus*. *Ger. Em.* 1479.

Anglis, the Horn or Hard-beam Tree, Horse or
Horn-beech Tree.

Habitat in *sylvis*. h. V.

C O R Y L U S. 953.

Masc. *Cal.* monophyllus, trifidus, squamæ formis
uniflorus. *Cor.* o. *Stam.* octo.

Fem. *Cal.* diphyllus lacerus. *Cor.* o. *Styli* duo.
Nux ovata.

Avellana. 1. CORYLUS stipulis ovatis obtusis. *Hort. cliff.* 448.
Fl. suec. 873. *Mat. med.* 431. *Sp. pl.* 998.

Corylus sylvestris. *Ger. Em.* 1479. *Bauh. pin.* 418.
R. Syn. 439.

Corylus f. *Nux Avellana sylvestris*. *Park.* 1416.

Anglis, the Hasel-nut Tree.

Habitat in *sylvis et sepibus*. h. III.

Pharmac. *Coryli* f. *Avellanæ Fructus*.

MONADELPHIA.

PINUS. 956.

Masc. *Cal.* tetraphyllus. *Cor.* o. *Stam.* plurima.
Antheræ nudæ.

Fem. *Cal.* strobili: squama biflora. *Cor.* o. *Pist.*
unum. *Nux Ala membranacea excepta.*

*1. PINUS foliis geminis: primordialibus solitariis gla- *sylvestris.*
bris. *Fl. suec.* 874. *Sp. pl.* 1000.

Pinus sylvestris. *Baub. pin.* 491.

Pinus sylvestris foliis brevibus glaucis, conis parvis
albentibus. *R. Syn.* 442.

Anglis, Scotch Firr.

Habitat in alpibus Scoticis. h. V.

2. PINUS foliis solitariis emarginatis. *Sp. pl.* 1001. *Picea.*

Abies. *Ger. Em.* 1363. *Park.* 1539.

Abies conis sursum spectantibus s. mas. *Baub. pin.*
505.

Anglis, the Yew-leaved Firr.

Habitat in alpibus Scoticis?

Pharmac. Abietis Summitates, Resina.

3. PINUS foliis subulatis mucronatis lœvibus bifariam *Abies.*

versus. *Sp. pl.* 1002. *Fl. suec.* 875.

Abies mas Theophrasti. *R. Syn.* 441.

Picea. *Park.* 1538. major. *Ger. Em.* 1354.

Picea major prima, five *Abies rubra.* *Baub. pin.* 493.

Anglis, common Firr, or Pitch Tree.

Habitat in alpibus Scoticis?

Pharmac. Abietis Resina.

Classis

Classis XXII.

D I O E C I A
D I A N D R I A.

S A L I X. 976.

Masc. *Amenti squamæ. Cor. o. Glandula baseos nectarifera.*Fem. *Amenti squamæ. Cor. o. Stylus bifidus. Capſ. unilocularis, bivalvis. Sem. papposa.** *Foliis glabris ferratis.*

herma- 1. *SALIX* foliis ferratis glabris, floribus hermaphroditis diandris. *Sp. pl. 1015. Fl. suec. 878.*
phroditica *Salix latifolia* folio splendente. *R. Syn. 450.*
Anglis, shining Willow.
Habitat in sepibus humidis. About Ashton in Cumberland. *R. Syn. h. III.*

pentandra. 2. *SALIX* foliis ferratis glabris, flosculis pentandris.
Hort. cliff. 454. Fl. suec. 879. Sp. pl. 1016.
Salix folio laureo, seu lato glabro odorato. Ph. br.
R. Syn. 449.
Anglis, sweet Willow.
Habitat in montosis in comitatibus Westmorlandico,
Cumberlandico, Eboracensi, frequens. h. IV.

vitellina. *3. *SALIX* foliis ferratis ovatis acutis glabris : ferraturis cartilagineis, petiolis calloso-punctatis. *Sp. pl. 1016.*
Salix fativa lutea, folio coenato. Bauh. pin. 473.
Anglis, yellow Willow.
Habitat in Salicetis paſſim. h. IV. V.

4. SA-

4. *SALIX* foliis serratis glabris lanceolatis petiolatis, sti- *amygdali-*
pulis trapeziformibus. *Roy. lugdb.* 83. *Fl. suec. na.*
881.
Salix perficæ folio auriculato. *Hall. helv.* 151.
Salix folio auriculato splendente flexilis. *Cat. cantab.*
R. Syn. 448.
Salix folio Amygdalino utrinque virente aurito. *Bauh.*
pin. 473.
Salix viminalis nigra. *Park.* 1431.
Anglis, Almond-leaved Willow.
Habitat in Salicetis et ad ripas fluviorum. *h. V.*
5. *SALIX* foliis serratis glabris ovato-lanceolatis, petio- *fragilis.*
lis dentato-glandulosis. *Fl. lapp.* 359. *t. 8. f. 13.*
suec. 883. *Sp. pl.* 1017.
Salix folio longo latoque splendente fragilis. *R. Syn.*
448.
Salix fragilis. *Bauh. pin.* 474. *Park.* 1431.
Salix spontanea fragilis amygdalino folio auriculata
et non auriculata. *Bauh. hist. I.* 214.
 β *Salix* folio Amygdalino utrinque aurito corticem abji-
ciens. *R. Syn.* 448.
Anglis, Crack Willow.
Habitat in aquosis. *h. V.*
- 6 *SALIX* foliis subferratis glabris lanceolatis : inferio- *purpurea.*
ribus oppositis. *Sp. pl.* 1017.
Salix folio longo subluteo non auriculata viminibus
rubris. *R. Syn.* 450.
Anglis, Purple Willow.
Habitat in salicetis sed rarius, ad ripam Thamesis in-
ter Vauxhall et Nine-Elms, prope Londinum. *h.*
IV. V.
7. *SALIX* foliis serratis glabris lanceolato-linearibus : *Helix.*
superioribus oppositis obliquis. *Roy. lugdb.* 83. *Da-*
lib. paris. 299. *Sp. pl.* 1017.
Salix foliis utrinque lœvibus : inferne glaucis, squamis
et capsulis tomentosis. *Hall. helv.* 153.
Anglis, Rose Willow.
Habitat in aquosis sed rarius. *h. V.*

herbacea. 8. SALIX foliis ferratis glabris orbiculatis. *Fl. lapp.*
355. t. 8. f. N. et t. 7. f. 3, 4. Fl. suec. 887. Sp.
pl. 1018.

Salix alpina alni rotundo folio repens. Bocc. mus. P.
II. E. I. R. Syn. 448.

Salix saxatilis minima. Bauh. pin. 474.

Anglis, herbaceous Willow.

Habitat in ascensu montis Snowdon copiose, D. G.
Sherard. R. Syn. et in montibus Westmorlandicis.
24. VI.

** *Foliis glabris integerrimis.*

reticulata. 9. SALIX foliis integerrimis glabris ovatis obtusis. *Fl.*
suec. 888. Sp. pl. 1018.

Salix foliis integris ovatis subtus reticulatis. Fl. lapp.
359. t. 8. f. L. et t. 7. f. 1, 2.

Salix pumila folio rotundo. Bauh. bijl. I. 12. Sch. it.
alp. 43. 340. R. Syn. 449.

Anglis, round-leaved Willow.

Habitat in montibus Cambrobritanicis, Eboracensisibus,
Westmorlandicis paucim. 24. VI.

rubra. 10. SALIX foliis integris, glabris linear-lanceolatis a-

cutis.

Salix minime fragilis, foliis longissimis, utrinque vi-
ridibus, non ferratis, D. Sherard. R. Syn. 449.

Anglis, red Willow.

Habitat in Salicetis sed rarius. In the Osier-holt be-
tween Maidenhead and Windsor; and near Salis-
bury, by Mr. Sherard and Mr. Rand. R. Syn. 24.
IV. V.

Foliis integerrimis, villosis.

arenaria. 11. SALIX foliis integris ovatis acutis supra subvillosis,
subtus tomentosis. Fl. suec. 894. Sp. pl. 1019.

Salix foliis integris subtus villosis ovatis acutis. Hall.
belv. 155. t. 5. f. 2.

Salix pumila foliis utrinque candidantibus et lanugino-
sis. R. Syn. 447. t. 19. f. 3.

Anglis, Sand Willow.

Habitat

Habitat in *pascuis arenosis*. Observed by Sandown-
castle by Mr. J. Sherard. R. Syn. 4. VI.

12. SALIX foliis integerrimis lanceolatis utrinque sub- *repens*.
pilosis caule repente. Fl. suec. 896. Sp. pl. 1020.

Salix pumila angustifolia inferne lanuginosa. Bauh. *bijst.*
I. 212. R. Syn. 447.

Salix pumila brevi angustoque folio incano. Bauh. *pin.*
474.

Salix humilis angustifolia repens. Park. 1434.

- 3 *Salix alpina pumila rotundifolia repens*, inferne subci-
nerea. Bauh. *pin.* 474. R. Syn. 448.

Anglis, creeping Willow.

Habitat in *paludibus turfosis*. 4. V.

13. SALIX foliis integerrimis ovatis subtus villofis niti- *fusca*.
dis. Fl. lapp. 364. t. 8. f. 13. suec. 897. Sp. pl.
1020.

Salix pumila angustifolia prona parte cinerea. Bauh.
bijst. 213. R. Syn. 447.

Salix pumila linifolia incana. Bauh. *pin.* 474.

Salix pumila angustifolia recta. Park. 1434.

Chamæitea sive Salix pumila. Ger. Em. 1391.

Anglis, brown Willow.

Habitat in *ericetis humidis*. 4. V. VI.

14. SALIX foliis integerrimis lanceolato linearibus *rosmarini*
strictis sessilibus subtus tomentosif. Roy. lugdb. 84. *folio*.
Fl. suec. 898.

Salix pumila Rhamni secundi Clusii folio. R. Syn.
447.

Salix oblongo incano acuto folio. Bauh. *pin.* 159.

Salix humilis repens angustifolia. Lob. ic. P. 2. 137.
Bauh. *bijst.* I. 214.

Anglis, Rosemary-leaved Willow.

Habitat in *montosis uidis*. 4. V.

15. SALIX foliis integerrimis utrinque villofis obovatis *aurita*.
appendiculatis. Fl. lapp. 369. t. 8. f. Y. suec. 891.
Sp. pl. 1019.

Salix folio rotundo minore. Dill. cat. giff. 38. R. Syn.
450.

3 *Salix*

DIOECIA DIANDRIA.

β Salix caprea pumila folio subrotundo, subtus incano.
R. Syn. 450.

Anglis, round-leaved Willow.

Habitat in sylvis et sepibus. 24. V.

***** *Foliis subserratis, villosis.*

caprea. 16. SALIX foliis ovatis rugosis subtus tomentosis undatis superne denticulatis. *Roy. lugdb. 83. Fl. suec. 900. Sp. pl. 1020.*

Salix folio rugoso obiter ferrato subtus lanuginoso, julo crassissimo. *Hall. helv. 155.*

Salix caprea rotundifolia. *Ger. Em. 1319.*

Salix latifolia rotunda. *Baub. pin. 474. Park. 1432. R. Syn. 449.*

β Salix folio ex rotunditate acuminato. *Baub. pin.*

474.

Anglis, common Sallow.

Habitat in sylvis et sepibus. 24. IV. V.

vimenalis. 17. SALIX foliis subintegerrimis lanceolato linearibus longissimis acutis subtus sericeis, ramis virgatis. *Fl. suec. 901. Sp. pl. 1021.*

Salix folio longissimo. *Cat. Cant.*

Salix angustis et longissimis foliis crispis subtus albicanibus. *Baub. hist. I. 212.*

Anglis, the Osier.

Habitat in salicetis. 24. IV.

alba. 18. SALIX foliis lanceolatis acuminatis serratis utrinque pubescentibus : serraturis infimis glandulofisis. *Fl. suec. 903. Sp. pl. 1021.*

Salix. *Ger. Em. 1389. R. Syn. 447.* arborea angustifolia, alba vulgaris. *Park. 1430.*

Salix vulgaris alba arborescens. *Baub. pin. 473.*

Anglis, common or white Willow.

Habitat in sylvis et sepibus. 24. IV.

Pharmac. Salicis Folia, Cortex.

TRIANDRIA.

EMPETRUM. 977.

Masc. *Cal.* tripartitus. *Cor.* tripetala. *Stam.* longa.
 Fem. *Cal.* tripartitus. *Cor.* tripetala. *Styli* novem.
Sem. 9-sperma.

- I. EMPETRUM procumbens. *Fl. suec.* 904. *Sp. pl. nigrum.*
 1022.
Empetrum montanum, fructu nigro. *Tourn.* 579. *R.*
Syn. 444.
Erica baccifera procumbens nigra. *Baub. pin.* 486.
Erica baccifera procumbens. *Ger. Em.* 1383.
Erica baccifera nigra. *Park.* 1485.
Anglis, black-berried Heath, Crow, or Crake-ber-
 ries.
*Habitat in montibus udis Derbiensisbus, Eboracensi-
 bus.* 4. IV. V.

TETRANDRIA.

VIScum. 979.

Masc. *Cal.* quadripartitus. *Cor.* o. *Filamenta* o.
Antheræ calyci adnatæ.
 Fem. *Cal.* tetraphyllus, superus. *Stylus* o. *Cor.* o.
Bacca monosperma.

- I. VIScum foliis lanceolatis obtusis, caule dichotomo, *album.*
spicis axillaribus. *Fl. suec.* 905. *Sp. pl.* 1023.
Viscum. *Ger. Em.* 1315. *R. Syn.* 464. *vulgare. Park.*
 1392.
Viscum baccis albis. *Baub. pin.* 423.
Anglis, white Mistle, or Mistletoe.
Habitat in arboribus, frutex parasiticus. 5. V.
Pharmac. *Visci Folia.*

H I P P O P H A E. 980.

Masc. *Cal. bipartitus.* *Cor. o.*

Fem. *Cal. bifidus.* *Cor. o.* *Stylus unicus.* *Bacca monosperma.*

Rhamnoi- 1. HIPPOPHAE foliis lanceolatis. *Fl. suec.* 906. *Sp. pl.* 1023.

Rhamnoides fructifera, foliis salicis, baccis leviter flavescentibus. *Tourn. Cor.* 53. *R. Syn.* 445.

Rhamnus. 2 *Clus. hist.* 110. *Ger. Em.* 1334.

Rhamnus salicis folio angusto, fructu flavescente. *Bauh. pin.* 477.

Rhamnus primus Dioscoridis Lobelio, sive littoralis. *Park.* 1006.

Anglis, Sallow-thorn, or Sea Buck-thorn.

Habitat in littoribus maritimis. h. IV.

M Y R I C A. 981.

Masc. *Amenti squama lunata.* *Cor. o.*

Fem. *Amenti squama lunata.* *Cor. o.* *Styli duo.*
Bacca monosperma.

Gale. 1. MYRICA foliis lanceolatis subserratis, caule suffructicofo. *Fl. suec.* 907. *Sp. pl.* 1024.

Gale frutex odoratus septentrionalium, Elæagnus Cordi. *Bauh. hist. I.* 223. *R. Syn.* 443.

Rhus myrtifolia Belgica. *Bauh. pin.* 414.

Rhus sylvestris sive Myrtus Brabantica vel Anglicæ. *Park.* 1451.

Myrtus Brabantica f. Elæagnus Cordi. *Ger. Em.* 1414.

Anglis, Goule, Sweet Willow, Dutch Myrtle. *Sweet* *g*
Habitat in paludibus sed rarius. h. V. On

Bagshot Heath near the XXI mile stone, plentifully

P E N-

PENTANDRIA.

HUMULUS. 989.

Masc. *Cal.* pentaphyllus. *Cor.* o.Fem. *Cal.* monophyllus, oblique pateris, integer.*Cor.* o. *Styli* duo. *Sem.* unicum, intra calycem
planum.

1. HUMULUS. *Sp. pl.* 1028. *Fl. suec.* 908. *Lupulus;*
Lupulus mas et fœminia. Bauh. hist. II. 151. *pin.*
 298. *R. Syn.* 137.
Lupulus sylvestris. Park. 176.
Lupus salictarius. Ger. Em. 885.
Anglis, Hops.
Habitat in sepibus. 4. VI.
Pharmac. Lupuli strobili.

HEXANDRIA.

TAMUS. 991.

Masc. *Cal.* sexpartitus. *Cor.* o.Fem. *Cal.* sexpartitus. *Cor.* o. *Stylus trifidus.*
Bacca trilocularis, infera. Sem. duo.

1. TAMUS foliis cordatis indivisis. *Sp. pl.* 1028. *communis;*
Tamnus racemosa, flore minore luteo pallescente.
Tourn. 103. *R. Syn.* 262.
Bryonia nigra. Ger. Em. 869.
Bryonia sylvestris nigra. Park. 178.
Bryonia lœvis f. nigra racemosa. Bauh. *pin.* 297.
Anglis, black Briony.
Habitat ad sepes et in dumetis. 4. VI.
Pharmac. Bryoniæ nigræ Folia, Radix.

O C T A N D R I A.

P O P U L U S. 996.

Masc. *Amenti Cal.* lamina lacera. *Cor.* turbinata, obliqua, integra.

Fem. *Amenti Cal.* et *Cor.* maris. *Stigma* quadrifidum. *Caps.* bilocularis. *Sem.* multa, papposa.

alba.

1. POPULUS foliis subrotundis dentato-angulatis subtus tomentosis. *Fl.* suec. 911. *Sp. pl.* 1034.

Populus alba. *Ger.* Em. 1486. *Park.* 1400. *R. Syn.* 446. majoribus foliis. *Baub.* pin. 429.

Anglis, white Poplar.

Habitat in *sepibus* et ad *rivulos.* h. III.

nigra.

2. POPULUS foliis deltoidibus acuminatis serratis. *Sp. pl.* 1034. *Fl.* suec. 910.

Populus nigra. *Ger.* Em. 1485. *Baub.* pin. 429. *Park.* 1410. *R. Syn.* 446.

Anglis, black Poplar.

Habitat in *umbrosis humidis* et ad *fluvios.* h. III.

Pharmac. *Populi nigri.* *Folia,* *Germinæ.*

tremula.

3. POPULUS foliis subrotundis dentato-angulatis utrinque glabris. *Sp. pl.* 1034. *Fl.* suec. 909.

Populus lybica. *Ger.* Em. 1487. *Park.* 1411. *R. Syn.* 446.

Populus tremula. *Baub.* pin. 429.

Anglis, trembling Poplar, or Asp.

Habitat in *sylvis humidis.* h. III.

R H O D I O L A. 997.

Masc. *Cal.* quadripartitus. *Cor.* tetrapetala.

Fem. *Cal.* quadripartitus. *Cor.* o. *Nectaria* quatuor. *Pist.* quatuor. *Caps.* quatuor *Polyspermæ.*

Rosea.

1. RHODIOLA. *Fl. lapp.* 378. *suec.* 912. *Sp. pl.* 1035.

Anacampseros radice rosam spirante major. *Tourn.* 264. *R. Syn.* 262.

Rhodia

Rhodia radix. *Baub. pin.* 286. *hist. III.* 683. *Ger.*
Em. 532. *Park.* 729.

Anglis, Rosewort.

Habitat in montibus Westmorlandicis, Cumberlandicis Eboracensibus et Cambrobritannicis frequens.
 24. VI. VII.

ENNEANDRIA.

MERCURIALIS. 998.

Masc. *Cal.* tripartitus. *Cor.* o. *Stam.* a novem ad duodecim. *Antheræ* globosæ didymæ.

Fem. *Cal.* tripartitus. *Cor.* o. *Styli* duo. *Caps.* dicocca, bilocularis monosperma.

1. MERCURIALIS caule simplicissimo, foliis scabris. *perenniss.*
Fl. suec. 913. *Sp. pl.* 1035.

Mercurialis perennis repens Cynocrambe dicta. *R.*
Syn. 138.

Mercurialis montana spicata et Mercurialis montana spicata. *Baub. pin.* 122.

Mercurialis sylvestris Cynocrambe dicta vulgaris, mas et foemina. *Park.* 295.

Cynocrambe mas et foemina. *Ger.* *Em.* 333.

Anglis, Dog's Mercury.

Habitat in sylvis et sepibus. 24. IV. V.

2. MERCURIALIS caule brachiatum, foliis glabris. *Sp. annua.*
pl. 1035.

Mercurialis annua glabra vulgaris. *R.* *Syn.* 139.

Mercurialis testiculata f. mas. *Baub. pin.* 121.

Mercurialis spicata f. foemina. *Baub. pin.* 121.

Mercurialis mas foemina. *Ger.* *Em.* 333.

Mercurialis vulgaris mas et foemina. *Park.* 295.

Anglis, French Mercury.

Habitat in ruderatis, cultis, circa Londinum frequens.

○. IX.

HYDROCHARIS. 999.

Masc. *Spatha* diphylla. *Cal.* trifidus. *Cor.* tripetalata. *Filamenta* tria interiora stylifera.

B b 2

Fem.

DIOECIA MONADELPHIA.

Fem. *Cal.* trifidus. *Cor.* tripetala. *Styli* sex.
Caps. sexlocularis polysperma, infera.

- Morsus ranæ.* I. HYDROCHARIS. *Fl. suec.* 914. *Sp. pl.* 1036.
Nymphæa alba minima. *Baub. pin.* 193. f. *Morsus ranæ.* *Park.* 1252.
Morsus ranæ. *Ger. Em.* 818.
Stratiotes foliis aloes, semine rotundo. *R. Syn.* 290.
Anglis, Frog-bit.
Habitat in fossis et aquis leniter fluentibus. 24. VI.

MONADELPHIA.

JUNIPERUS. 1005.

Masc. *Amenti Calyx squamæ.* *Cor.* o. *Stam.* tria.
 Fem. *Cal.* tripartitus. *Petala* tres. *Styli* tres.
Bacca trisperma, tribus tuberculis calycis inæqualis.

- communis.* I. JUNIPERUS foliis ternis patentibus mucronatis, baccæ longioribus. *Syst. nat.* 1297. *Fl. suec.* 915. *Sp. pl.* 1040.
 Juniperus vulgaris baccis parvis purpureis. *Baub. hist.* I. 293. *R. Syn.* 444.
 Juniperus. *Ger. Em.* 1372. *vulgaris.* *Park.* 1028. fruticosa. *Baub. pin.* 488.
 § Juniperus Alpina. *Baub. hist.* I. 301.
Anglis, common Juniper.
Habitat in ericetis et montosis. h. V.
Pharmac. Juniperi Baccæ, Lignum, Resinæ.

TAXUS. 1006.

Masc. *Cal.* triphyllus gemmæ. *Cor.* o. *Stamina* multa. *Antheræ* peltatae octofidæ.
 Fem. *Cal.* triphyllus gemmæ. *Cor.* o. *Stylus* o.
Sem. unicum calyculo baccato, integerrimo.

- baccata.* I. TAXUS foliis approximatis. *Fl. suec.* 916. *Sp. pl.* 1040.
 Taxus. *Ger. Em.* 1370. *Park.* 1412. *Baub. hist.* I. 241. *pin.* 505. *R. Syn.* 445.
Anglis, Yew Tree.

Habitat

Habitat in montibus Westmorlandicis, Cumberlandicis, Herefordiensibus frequens. *H.* III. IV.

SYNGENESIA.

R U S C U S. 1008.

Masc. *Cal.* hexaphyllus. *Cor.* o. *Nectarium centrale*, ovatum, apice perforatum.

Fem. *Calyx*, *Corolla* et *Nectarium Maris*. *Stylus unus*. *Bacca* trilocularis. *Sem. duo*.

I. RUSCUS foliis supra floriferis nudis. *Sp. pl.* 1041. *aculeatus*.

Dalib. paris. 304.

Ruscus. *Bauh. pin.* 470. *hijst. I.* 579. *Park.* 253.
R. Syn. 262.

Ruscus sive Bruscus. *Ger. Em.* 907.

Anglis, Knee Holly, or Butcher's Broom.

Habitat in *sylvis*, *dumetis*, et *ericetis* frequens. *H.*
III. IV.

Pharmac. *Rusci Radix*.

B R Y O N I A.

Masc. *Cal.* quinquedentatus. *Cor.* quinquepartita.
Filamenta tria.

Fem. *Cal.* dentatus. *Cor.* quinquepartita. *Stylus trifidus*. *Bacca* subglobosa, polyperma.

I. BRYONIA foliis palmatis utrinque calloso-scabris. *alba*.

Fl. suec. 876. *Sp. pl.* 1012.

Bryonia alba. *Ger. Em.* 869. *R. Syn.* 261. *vulgaris*. *Park.* 178.

Bryonia aspera f. alba baccis rubris. *Bauh. pin.* 297.

Anglis, white Briony.

Habitat in *sepibus* et *dumetis*. *u.* V.

Pharmac. *Bryoniæ Radix*.

Classis XXIII.

POLYGAMIA
MONOECIA.

HOLCUS 1015.

Hermaphroditus. *Calyx.* Gluma biflora. *Cor.* Gluma aristata. *Stamina tria.* *Styli duo.* *Sem. unicum.*

Masc. *Cal.* Gluma bivalvis. *Cor.* o. *Stam.* tria.

lanatus. 1. HOLCUS glumis bifloris villosis : hermaphrodito mutico masculo arista recurva. *Fl. suec.* 917. *Sp. pl.* 1048.

Aira foliis pubescentibus, panicula contracta : floculo hermaphrodito mutico, masculo arista uncinata calyce breviore. *It. oel.* 122. *Fl. suec. ed. I.* 67.

Gramen pratense paniculatum molle. *Baub. pin.* 2. *pr. 3. th.* 37. *Sch. agr.* 234. *Park.* 1155.

Gramen miliaceum paniculatum molle. *Pet. conc. gr.* 124. *R. Syn.* 404.

Anglis, Meadow Soft-grass.

Habitat in pratis et pascuis. 24. VI.

mollis. 2. HOLCUS glumis bifloris nudiusculis : hermaphrodito mutico masculo arista geniculata. *Syst. nat.* 1305.

Gramen miliaceum aristatum molle. *Pet. conc. gr.* 125. *R. Syn.* 404.

Gramen caninum longius radicatum majus et minus. *Baub. pin.* 1.

Gramen paniculatum molle, radice graminis canini repente. *Hist. ox.* III. 202.

Anglis, creeping Soft-grass.

Habitat in pratis, pascuis et ad sepes. 24. VII.

ÆGILOPS

ÆGILOPS. 1018.

Hermaphrod. *Cal.* *Gluma solitaria*, bipartita. *Cor.*
Gluma calyci contraria. *Stamina tria*. *Styli duo*.
Sem. unicum.

Masc. *Cal.* et *Cor.* *Gluma ut in priore*. *Stam.*
tria.

I. ÆGILOPS spica subulata mutica incurva. *Sp. pl. incurva*.
 1051.

Nardus spica cylindrica articulata. *Sp. pl.* 53.

Germen parvum marinum spica loliacea. *Ger. Em.*
 78. *R. Syn.* 395.

Germen loliaeum maritimum spicis articulatis. *Hift.*
 ox. III. 182. f. 8. t. 2. f. 8.

Germen loliaeum minus spica simplici. *Baub. pin.* 9.
 pr. 19.

Phoenix acerosa aculeata. *Park.* 1145.

Anglis, Sea Hard-graſs.

Habitat in littoribus maritimis. ☽. VII. VIII.

VALANTIA. 1019.

Hermaphrod. *Cal.* o. *Cor.* quadripartita. *Stam.*
 quatuor. *Stylus bifidus*. *Sem. unicum*.

Masc. *Cal.* o. *Cor.* quadripartita. *Stam.* quatuor.
Pist. obsoletum.

I. VALANTIA floribus masculis quadrifidis, peduncu- *cruciata*:
 lis diphyllis. *Hort. upf.* 303. *Sp. pl.* 1052.

Gallium foliis quaternis, flosculis in alis confertis.
Hall. helv. 462.

Cruciata. *Ger. Em.* 1123. *R. Syn.* 223.

Cruciata vulgaris. *Park.* 566.

Cruciata hirsuta. *Baub. pin.* 335.

Anglis, Croſwort, or Mugweed.

Habitat in dumetis et ad ſepes. 4. V. VI.

Pharmac. Cruciatae Herba.

PARIETARIA. 1020.

Hermaphrod. *Cal.* quadrifidus. *Cor.* o. *Stam.* qua-
 tuor. *Stylus unicus*. *Sem. unicum, ſuperum, e-*
longatum.

POLYGAMIA MONECIA.

Fem. *Cal. quadrifidus. Cor. o. Stylus unicus. Sem. unicum, superum, elongatum.*

officinalis. 1. PARIETARIA foliis lanceolato-ovatis, pedunculis dichotomis calycibus diphyllis. *Syst. nat. 1308. Sp. pl. 1052.*

Parietaria. *Ger. Em. 331. Bauh. hist. II. 976. R. Syn. 158.*

Parietaria vulgaris. *Park. 437.*

Parietaria officinarum et Dioscoridis. *Bauh. pin. 121. Anglis, Pellitory of the Wall.*

Habitat *in muris et ruderatis.* 4. V. IX.

Pharmac. Parietariae Herba.

A T R I P L E X. 1021.

Hermaphrod. *Cal. pentaphyllus. Cor. o. Stam. quinque. Stylus bipartitus. Sem. unicum, depresso.*

Fem. *Cal. diphyllus. Cor. o. Stylus bipartitus. Sem. unicum compressum.*

portula- 1. ATRIPLEX caule fruticoso, foliis obovatis. *Fl. suec. 919. Sp. pl. 1035.*

Atriplex maritima fruticosa, Halimus et Portulaca marina dicta, angustifolia. *R. Syn. 153.*

Halimus seu portulaca marina. *Bauh. pin. 120.*

Halimus vulgaris f. Portulaca marina. *Ger. Em. 323.*

Portulaca marina nostras. *Park. 724.*

Anglis, Sea Purslane.

Habitat *in littoribus maritimis.* 1. VIII.

laciniata. 2. ATRIPLEX caule herbaceo, foliis deltoideo-dentatis subtus argenteis. *Sp. pl. 1053. Fl. suec. 920.*

Atriplex maritima. *Bauh. hist. II. 974. R. Syn. 152.*

Atriplex maritima laciniata. *Bauh. pin. 120.*

Atriplex marina. *Ger. Em. 326. repens. Park. 758.*

Anglis, jagged Sea Orache.

Habitat *in littoribus maritimis.* ①. VIII.

erecta. 3. ATRIPLEX caule herbaceo, foliis hastatis dentatis. *Atriplex angustifolia laciniata. R. Syn. 152.*

Anglis, Spear-leaved Orache.

Habitat

Habitat in ruderatis. On the entrance into Battersea meadow from Nine-Elms, Mr. Martin. R. Syn. ⊖. VIII.

4. ATRIPLEX caule herbaceo, valvulis femineis magnis deltoidibus sinuatis. *Fl. suec.* 921. *Sp. pl.* 1053.

Atriplex sylvestris, folio hastato seu deltoide. R. Syn. 151.

Atriplex sylvestris annua, folio deltoide triangulari sinuato et mucronato, hastæ cuspidi simili. *Hist. ox.* II. 607. f. 5. t. 32. f. 14.

- β *Atriplex maritima* perennis folio deltoide seu triangulare minus incano. *Hist. ox.* II. 607. 19.

- γ *Atriplex maritima nostras procerior*, foliis angulosis incanis, admodum sinuatis. *Pluk. alm.* 60.

- ♪ *Atriplex maritima* ad foliorum basin auriculata procumbens et ne vix sinuata. *Pluk. alm.* 61.

Anglis, wild Orache.

Habitat in ruderatis, fimetiis et littoribus maritimis. ⊖. VIII. IX.

5. ATRIPLEX caule herbaceo patulo, foliis subdeltoi-deo-lanceolatis calycibus feminum disco dentatis. *Fl. suec.* 922. *Sp. pl.* 1053.

Atriplex caule herbaceo, foliis superioribus lanceolatis integrerrimis. *Hort. cliff.* 469. *Roy. lugdb.* 218.

Atriplex sylvestris angustifolia. *Ger. Em.* 326. *Park.* 748. R. Syn. 151.

Atriplex angusto oblongo folio. *Bauh. pin.* 119.

Anglis, narrow-leaved Orache.

Habitat in ruderatis et ad sepes. ⊖. VIII.

6. ATRIPLEX caule herbaceo erecto, foliis linearibus serratis.

Atriplex angustifolia maritima dentata. R. Syn. 152.

Atriplex maritima angustifolia. *Bauh. pin.* 152.

Atriplex angustifolia dentata. *Pet. h. br. t.* 7. f. 4.

Anglis, indented Sea Orache.

Habitat in ruderatis et littoribus maritimis. ⊖. VIII.

7. ATRIPLEX caule herbaceo erecto, foliis omnibus litoralis linea-

POLYGAMIA MONOECIA.

linearibus integerrimis. *Roy. lugdb.* 218. *Fl. suec.* 923. *Sp. pl.* 1054.

Atriplex angustissimo et longissimo folio. *H. L. Bat.* 79. *Tourn.* 505. *R. Syn.* 153.

Atriplex graminea maritima. *Pet. h. br. t. 7. f. 6.*

β Atriplex maritima scopariæ folio. *D. Dale.* *R. Syn.* 153.

δ Atriplex maritima angustifolia, obtusiore folio. *R. Syn.* 153.

Anglis, Grass-leaved Orache.

Habitat in ruderatis, finetis et littoribus maritimis.

○. VIII. IX.

peduncu-
lata. 8. ATRIPLEX caule herbaceo divaricato, foliis lanceolatis obtusis integris calycibus foemineis pedunculatis. *Lent. pl.* 101. *Syst. nat.* 1309.

Atriplex marina semine lato. *Ph. br.* *R. Syn.* 153.

Atriplex maritima Halimus dicta, humilis erecta, semine folliculis membranaceis bivalvibus in latitudinem expansis et utrinque recurvis, longo pediculo insidentibus, clauso. *Pluk. ph. t.* 36. *f. 1.*

β Atriplex maritima nostras Ocyti minoris folio. *D. Pluk.* *R. Syn.* 253.

Anglis, Stalked Sea Orache.

Habitat in littoribus maritimis; prope Scirbeck vicum milliare a Bostonia distantem, copiose provenit D. Plukenet. Found in the isle of Thanet, near the ferry-house, in great plenty, by Mr. J. Sherard. *R. Syn.* ○. VIII. IX. - Near Ramsgate on the beach.

A C E R. 1023.

Hermaphrod. *Cal.* quinquefidus. *Cor.* pentapetala. *Stam.* octo. *Pistil.* unicum. *Cap.* duæ s. tres monospermæ, ala terminatæ.

Masc. *Cal.* quinquefidus. *Cor.* pentapetala. *Stam.* octo.

Pseudo
platanus. 1. ACER foliis quinquelobis inæqualiter ferratis floribus racemosis. *Sp. pl.* 1054.

Acer montanum candidum. *Bauh. pin.* 430.

Acer majus. *Dod. pempt.* 840. *Ger. Em.* 1484. *R. Syn.* 470.

Acer

Acer majus latifolium, Sycomorus falso dictum. Park.

1425.

Anglis, the greater Maple, or Sycomore-tree.

Habitat in sepibus et ad domos. h. V. VI.

2. ACER foliis lobatis obtusis emarginatis. *Sp. pl. 1055. campeſtre.*

Fl. suec. 925.

Acer minus. Ger. Em. 1484. R. Syn. 470.

Acer minus et vulgare. Park. 1426.

Acer campeſtre et minus. Bauh. pin. 431.

β Acer campeſtre et minus, fructu rubente. *Vaill. bot.*

paris. R. Syn. 470.

Anglis, common Maple.

Habitat in sepibus et dumetis. h. V. VI.

D I O E C I A.

F R A X I N U S. 1026.

Hermaphrod. *Cal. quadripartitus. Cor. o. Stam.*

duo. Pift. unicum. Sem. unicum lanceolatum.

Fem. Pift. unicum. Sem. unicum lanceolatum.

1. FRAXINUS foliis serratis, floribus apetalis. *Sp. pl. excelsior.*

1057. *Fl. suec. 926.*

Fraxinus. Ger. Em. 1472. R. Syn. 469.

Fraxinus excelsior. Bauh. pin. 416.

Anglis, common Ash-tree.

Habitat in sylvis et sepibus. h. III. IV.

Classis

Classis XXIV.

CRYPTOGAMIA

F I L I C E S.

EQUISETUM. 1033.

Spica fructificationibus peltatis, basi dehiscentibus multivalvi.

- sylvaticum.* 1. EQUISETUM caule spicato, frondibus compositis.
Fl. suec. 927. *Sp. pl.* 1061.
Equisetum sylvaticum. *Tab. ic.* 253. *Ger. Em.* 1114.
R. Syn. 130.
Equisetum sylvaticum tenuissimis setis. *Baub. pin.* 16.
Equisetum omnium minus tenuifolium. *Park.* 1201.
 β *Equisetum sylvaticum, procumbens, setis uno versu dispositis.* *R. Syn.* 131.
 γ *Equisetum palustre tenuissimis et longissimis setis.*
Baub. pin. 16. *pr.* 24.
Anglis, Wood Horse-tail.
Habitat in sylvis et umbrosis humidis. 4. IV. V.
- arvense.* 2. EQUISETUM scapo fructificante nudo; sterili frondoso. *Sp. pl.* 1061. *Fl. suec.* 928.
Equisetum arvense longioribus setis. *Baub. pin.* 16.
Park. 1202. *R. Syn.* 130.
Equisetum segetale. *Ger. Em.* 1114.
 β *Equisetum pratense longissimis setis.* *Baub. pin.* 16.
Anglis, Corn Horse-tail.
Habitat in arvis humidis. 4. III.
- palustre.* 3. EQUISETUM caule angulato, frondibus simplicibus. *Fl. suec.* 929. *Sp. pl.* 1061.
Equisetum palustre brevioribus setis. *Baub. pin.* 16.
Equisetum palustre. *Lob. ic.* 795. *Ger. Em.* 1114. *R. Syn.* 131. *Fl. lapp.* 392. *minus.* *Park.* 1200.
Equisetum

CRYPTOGAMIA FILICES.

381

- β Equisetum palustre minus polystachion. *Bauh. pin.* 16.
pr. 24. R. Syn. 131. t. 5. f. 3.
Anglis, Marsh Horse-tail.
Habitat in aquosis. 4. VI.

4. EQUISETUM caule striato, frondibus subsimplici- *fluviale.*
bus. Fl. suec. 930. Sp. pl. 1062.

Equisetum caule non fulcato latissimo, verticillis den-
sissimis. Hall. helv. 144.

Equisetum majus. *Ger. Em. 1115. R. Syn. 130. pa-*
lustre. Park. 1200.

Equisetum palustre longioribus foliis. *Bauh. pin. 15.*
Anglis, River Horse-tail.

Habitat *in aquosis et ad ripas lacuum et fluviorum fre-*
quens. 4. V.

5. EQUISETUM caule subnudo lævi. *Fl. suec. 931. limosum.*
Sp. pl. 1062.

Equisetum nudum lævius nostras. *R. Syn. 131. t.*
5. f. 2.

Anglis, smooth Horse-tail.

Habitat *in palustribus et aquosis. 4. VI.*

6. EQUISETUM caule nudo scabro basi subramoso. *byemale,*
Fl. suec. 932. Sp. pl. 1062.

Equisetum nudum. *Ger. Em. 1113. R. Syn. 131.*

Equisetum junceum ramosum. *Park. 1207.*

Equisetum foliis nudum ramosum. *Bauh. pin. 16.*

β Equisetum nudum minus variegatum Basiliense. *Bauh.*
pin. 16. pr. 25. hist. III. 730.

γ Equisetum foliis nudum non ramosum s. junceum.
Bauh. pin. 16.

Equisetum junceum s. nudum. *Park. 1201.*

δ Equisetum læve pene nudum. *Pet. conc. gr. 238.*

Anglis, rough Horse-tail, or Shave-grafs.

Habitat *in palustribus et aquosis sed rarius. 4. VII.*
VIII.

O P H I O G L O S S U M: 1035.

*Spica articulata, disticha: articulis transversim dehis-
centibus.*

1. OPHI-

- vulgatum* 1. **OPHIOGLOSSUM** fronde ovata. *Fl. suec.* 932. *Sp. pl.* 1062.
Ophioglossum. *Ger. Em.* 404. *Baub. hist.* III. 708.
R. Syn. 128. f. *Lingua serpentina*. *Park.* 506.
Ophioglossum primum f. *vulgatum*. *Baub. pin.* 354.
Anglis, Adder's Tongue.
Habitat in pratis et pascuis humidis; in ericeto Hamp-
stediano. 4. V.
Pharmac. *Ophioglossi herba.*

O S M U N D A. 1036.

Spica ramosa: fructificationibus globosis.

* *Scapis insidentibus cauli ad basim frondis.*

- Lunaria*. 1. **OSMUNDA** scapo caulino solitario, fronde pinnata solitaria. *Fl. suec.* 934. *Sp. pl.* 1064.
Osmunda fronde pinnata caulina, pinnis lunatis. *Hort. cliff.* 472.
Lunaria minor. *Ger. Em.* *Park.* 507. *R. Syn.* 128.
Lunaria racemosa minor. *Baub. pin.* 354.
 β *Lunaria minor* foliis dissectis. *R. Syn.* 129.
Anglis, Moon-wort.
Habitat in pratis et pascuis montosis. In comitatibus
Westmorlandico, Cumberlandico, Eboracensi, fre-
quens. 4. V.

** *Fronde ipsa fructificationes ferente.*

- regalis*. 2. **OSMUNDA** fronde bipinnata apice racemifera. *Fl. suec.* 933. *Sp. pl.* 1065.
Osmunda regalis f. *Filix florida*. *Park.* 1038.
Filix ramosa non dentata *florida*. *Baub. pin.* 357.
Filix florida f. *Osmunda regalis*. *Ger. Em.* 1131.
Anglis, flowering Fern, or Osmund Royal.
Habitat in aquosis et palustribus putridis passim. 4.
 VII. VIII.

*** *Frondibus aliis foliaceis; aliis fructificantibus.*

- Spicant*. 3. **OSMUNDA** frondibus lanceolatis pinnatifidis: la-
 ciniis conniventibus integerrimis parallelis. *Fl. suec.*
 936. *Sp. pl.* 1066.

Lon-

*Lonchitis aspera. Ger. Em. 1140. R. Syn. 118.
Lonchitis aspera minor. Baub. pin. 359. Park. 1042.
Anglis, rough Spleen-wort.
Habitat in nemorosis et ericetis humidis. 24. VII.*

4. *OSMUNDA frondibus supradecompositis : pinnis al-*crispa*.
ternis subrotundis incisis. Sp. pl. 1067.
Adiantum album *crispum alpinum. Schwenckf. cat. 10.*
R. Syn. 126.
Adiantum album floridum, f. *Filicula petræa crispa*
perelegans. R. syn. ed. II. 51. Pluk. ph. t. 9. f. 3.
*Anglis, Stone Fern.
Habitat in petris et rupibus. In comitatibus Eboracen-
si, et Westmorlandico, frequens. 24. VIII.**

A C R O S T I C H U M. 1037.

Fru&ctificationes discum totum frondis tegentes.

* *Fronde simplici divisa.*

1. *ACROSTICHUM fronde nuda linear-laciniata. septentri-
Fl. lapp. 380. suec. 937. Sp. pl. 1068. onale.
Filix saxatilis corniculata. Baub. pin. 358.
Filix saxatilis Tragi. Baub. hist. III. 755. Park.
1045. R. Syn. 120.
Anglis, forked, or horned Fern.
Habitat in fissuris rupium. Ad cacumen montis Carnedh-Lhewelyn prope Lhan-Lhechyd in agro Arvonenfi invenit, D. Lhwyd. In muris antiquis Lhan-Dethylæ uno circiter milliari a Lhan-Rhoost aquilonem versus, D. Richardson. R. Syn. in montibus supra Ambulside, in comitatu Westmorlandico. 24. VIII.*

** *Fronde sub-bipinnata.*

2. *ACROSTICHUM fronde sub-bipinnata : pinnis op-*ilvensi*.
posito-coadunatis obtusis subtus hirsutis basi inte-
gerrimis. Fl. suec. 938. Sp. pl. 1071..
Filix alpina, pedicularis rubræ foliis subtus villosis.
D. Lhwyd. R. Syn. 118.
Filix pumila, lonchitidis Maranthæ species Cambro-
bri-*

CRYPTGGAMIA FILICES.

britanica; an *Lonchitis aspera ilvensis*. *Pluk. ph. t. 89. f. 8.*

Anglis, Hairy Fern.

Habitat in fissuris rupium. It grows on a moist black rock almost at the top of Clogwyn y Garnedh, facing north-west, directly above the lower lake. D. Richardson. *R. Syn. 24.*

Thelypteris. 3. **ACROSTICHUM** fronde pinnata: pinnis pinnatifidis integerrimis. *Fl. suec. 939. Sp. pl. 1071.*

Filix minor palustris repens. *R. Syn. 122.*

Dryopteris. *Lob. ic. 814. Ger. Em. 1135. f. *Filix querna repens*. Park. 1041.*

Anglis, Marsh Fern.

Habitat in palustribus cespitosis. In Westmorlandia passim. 24. VIII.

PETERIS. 1038.

Fruetificationes in lineis marginalibus.

aquila. 1. **PETERIS** fronde supradecomposita: foliolis pinnatis: pinnis lanceolatis: infimis pinnatifidis; superioribus minoribus. *Hort. cliff. 473. Fl. suec. 940. Sp. pl. 1075.*

Filix foemina. *Ger. Em. 1128. R. Syn. 124. vulgaris. Park. 1037.*

Filix ramosa major pinnulis non dentatis. *Bauh. pin. 357.*

β *Filicula saxatilis ramosa maritima nostras*. *R. Syn. 125. Pluk. ph. t. 182. f. 1.*

Anglis, Female Fern, or Brakes.

Habitat in sylvis et ericetis ubique. 24. VIII.

ASPLENIUM. 1042.

Fruetificationes in lineolis disci frondis, sparsis.

* *Fronde simplici.*

Scolopendrium. 1. **ASPLENIUM** frondibus simplicibus cordato-lingu-latis integerrimis stipitibus hirsutis. *Sp. pl. 1079.*

Asplenium frondibus ensiformibus integris: basi cordatis inflexis, petiolis hirsutis. *Vir. cliff. 103. Hall. belv. 134.*

Phyllitis.

Phyllitis. Ger. Em. 1138. R. Syn. 116. f. Lingua Cervina vulgaris Park. 1046.

Lingua Cervina officinarum. Bauh. pin. 353.

Anglis, Hart's-tongue.

Habitat in umbrosis saxosis, passim. 4.

Pharmac. Phyllitidis Folia.

** *Fronde pinnatifida:*

2. **ASPLENIUM** frondibus pinnatifidis: lobis alternis *Ceterach confluentibus. Hort. cliff. 474. Hall. helv. 135. Dalib. paris. 310.*

Asplenium f. Ceterach. Bauh. hist. III. 749. Ger. Em. 1138. Park. 1046. R. Syn. 118.

Ceterach officinarum. Bauh. pin. 354.

Anglis, Spleenwort.

Habitat in muris antiquis et fissuris rupium humidis passim. Circa Bristolium copiose. 4.

Pharmac. Ceterach f. Asplenii Herba.

*** *Fronde pinnata.*

3. **ASPLENIUM** frondibus pinnatis; pinnis subrotundis crenatis. *Fl. lapp. 388. suec. 942. Sp. pl. 1080. manes.*

Trichomanes. Park. 1051. R. Syn. 119. f. Polytrichum officinarum. Bauh. pin. 356.

Trichomanes mas. Ger. Em. 1146.

Anglis, common Maidenhair.

Habitat in saxosis, muris antiquis, et umbrosis frequens. 4.

Pharmac. Trichomanis Herba.

4. **ASPLENIUM** fronde pinnata: pinnis subrotundis viridi. basi truncatis.

Trichomanes costa viridi. D. Lhwyd.

Trichomanes ramosum. Bauh. hist. III. 755. R. Syn. 119.

Trichomanes foemina. Ger. Em. 1146.

β *Trichomanes ramosum majus et minus. Bauh. pin. 356.*

Anglis, green Maidenhair.

CRYPTOGAMIA FILICES.

Habitat in rupibus humidis in comitatibus Eboracensi et Westmorlandico, passim. 4.

marinum. 5 ASPLENIUM fronde pinnata : pinnis obovatis serratis superne gibbis obtusis bafi cuneatis. *Hort. cliff.* 474. *Hall. helv.* 136. *Sp. pl.* 1081.

Filix marina anglica. *Park.* 1045.

Filicula petraea foemina f. *Chamæfrix marina anglica.* *Ger. Em.* 1143.

Chamæfrix matina anglica. *Baub. hist.* III. 737. *R.* *Syn.* 119. *Hist. ox.* III. 575. t. 3. f. 25.

Anglis, Sea Maidenhair, or Fern.

Habitat in rupibus maritimis. On the rocks about Prestholm island, near Beaumaris, and at Llandwyn in the isle of Anglesea ; about the castle of Hastings in Sussex ; in rupibus maritimis in Cumberlando, 24.

***** *Fronde decomposita.*

Ruta mu- 6. ASPLENIUM frondibus alternatim decompositis : foliolis cuneiformibus crenulatis. *Roy. lugdb.* 498. *Pl. suec.* 943. *Sp. pl.* 1081.

Ruta muraria. *Baub. pin.* 356. *hist.* III. 753. *Ger. Em.* 1144. *R.* *Syn.* 122. f. *Salvia vitæ.* *Park.* 1050.

Adiantum album. *Tab. ic.* 796.

3 *Adiantum* album tenuifolium, Rutæ murariæ accedens. *Baub. hist.* III. 753 *R.* *Syn.* 123. *Pluk. ph.* t. 3. f. 3

Anglis, white Maidenhair.

Habitat in rimis petrarum. 4.

Pharmac. *Adianti albi,* Herba.

Adiantum 7. ASPLENIUM frondibus subtripinnatis : foliolis alternis ; pinnis lanceolatis inciso-serratis. *Sp. pl.* 1081.

Asplenium frondibus duplicato-pinnatis ; foliis inferioribus majoribus : foliolis ovatis superne crenatis. *Roy lugdb.* 498.

Adiantum nigrum officinarum. *Baub. hist.* III. 742. *R.* *Syn.* 126.

Adian-

Adiantum nigrum vulgare. Park. 1046.

Adiantum foliis longioribus, pulverulentis, pediculo nigro. Bauh. pin. 356.

Onopteris mas. Ger. Em. 1137.

β *Filix elegans, adianto nigro accedens, segmentis rotundioribus. R. Syn. 127.*

γ *Filix pumila petræa nostras, adianti nigri foliorum æmula, faxorum interveniis prorumpens. Pluk. akn. 91. R. Syn. 127.*

δ *Filix minor longifolia, tarsis raris, pinnulis longis, tenuissimis et oblongis laciniis fimbriatis. D. Sherrard. R. Syn. 127.*

Anglis, black Maidenhair.

Habitat in umbrosis et muris antiquis frequens. 4.

Pharmac. Adianti nigri, Herba.

P O L Y P O D I U M . 1043.

Fructificationes in punctis subrotundis, sparsis, per discum frondis

* *Fronde pinnatifida lobis coadunatis.*

1. *POLYPODIUM frondibus pinnatifidis : pinnis ob-vulgare. longis subferratis, obtusis, radice squamata. Fl. suec. 944. Sp. pl. 1085.*

Polypodium vulgare. Bauh. pin. 359. Park. 1039.

Polypodium. Ger. Em. 1138. R. Syn. 117.

β *Polypodium murale pinnulis ferratis. Pet. bot. hort. 11. pl. 1. R. Syn. 117.*

Anglis, common Polypody.

Habitat in muris antiquis, umbrosis et ad radices arborum. 4.

Pharmac. Polypodii Herba.

2. *POLYPODIUM frondibus pinnatis, pinnis lanceo-laticero-pinnatifidis ferratis. Sp. pl. 1086. cum. Polypodium Cambrobritannicum, pinnulis ad margines laciniatis. R. Syn. 117.*

Polypodium Cambrobritannicum lobis foliorum profunde dentatis. Hist. ox. III. 565. f. 14. t. 2. f. 8.

Filix amplissima, lobis foliorum laciniatis cambrica.

Pluk. ph. t. 30. f. 1.

CRYPTOGAMIA FILICES.

Anglis, jagged Polypody.

Habitat on a rock in a wood near Dennys Powys Castle,
not far from Caerdiff in Glamorganshire. R. Syn.
4.

** *Fronde pinnata*.

Lonchitis. 3. POLYPODIUM frondibus pinnatis : pinnis lunula-tis ciliato-serratis declinatis, petiolis strigosis. Sp. pl. 1088. Gron. virg. 123.

Lonchitis alpina major. Ger. Em. 1140. R. Syn. 118.

Lonchitis aspera. Baub. pin. 359.

Lonchitis aspera major Matthiolo. Park. 1042.

Anglis, great Polypody, or Spleenwort.

Habitat in fissuris rupium in Wallia, prope Bingley in agro Eboracensi. 4.

phegopteris 4. POLYPODIUM frondibus subbipinnatis : foliolis infimis reflexis : paribus pinnula quadrangulari coadunatis. Fl. suec. 945. Sp. pl. 1089.

Filix minor britannica, pediculo pallidiore, alis inferioribus deorsum spectantibus. Hist. ox. III. 575. f. 14. t. 4. f. 17. R. Syn. 122.

Anglis, Wood Polypody.

Habitat in rimis petrarum humidis et umbrosis in comitatibus Eboracensi et Westmorlandico passim. 4.

fragrans. 5. POLYPODIUM frondibus subbipinnatis lanceolatis : foliolis confertis : lobis obtusis serratis, stipite paleaceo. Sp. pl. 1089.

Dryopteris rubrum idaeum spirans. Amm. euth. 251.

Anglis, sweet Polypody.

Habitat in rimis petrarum humidis ; prope Keswick in comitatu Westmorlandico. 4.

fontanum. 6. POLYPODIUM fronde subpinnata lanceolata : foliolis subrotundis, stipite laevi. Sp. pl. 1089

Polypodium pinnarum pinnis bidentatis et tridentatis brevissimis. Hall helv. 140.

Filicula fontana minor. Baub. pin. 358.

Filix

Filix saxatilis non ramosa minima. R. cat. eur. Pluk. ph. t. 89. f. 2.

3 *Filix saxatilis omnia minima elegantissima.* Hort. reg. paris. Pluk ph. t. 89. f. 3.

Anglis, Rock Polypody.

Habitat in fissuris rupium et muris antiquis. Supra Hammerham church, D. Bradney; in locis saxosis supra Wybourn in Westmorlandia. 4.

7. POLYPODIUM fronde bipinnata pinnulis obtusis *Filix mas.* crenulatis, stipite paleaceo. Hort. cliff. 475. Sp. pl. 1090. Fl. suec. 946.

Filix mas vulgaris. Park. 1036. R. Syn. 120.

Filix mas non ramosa dentata. Bauh. pin. 258.

Filix mas non ramosa, pinnulis latis densis minutim dentatis Ger. Em. 1129.

Anglis, Male Polypody, or Fern.

Habitat in sylvis, ericetis, locis saxosis. 4.

Pharmac. Filicis maris Radix.

8. POLYPODIUM fronde bipinnata: pinnulis lanceo- *F. femina* latis pinnatifidis acutis. Fl. lapp. 386. suec. 947. Sp. pl. 1090.

Filix mas non ramosa, pinnulis angustis rarisch profunde dentatis. Ger. Em. 1130. Pluk. ph. t. 130. f. 4. Hist. ox. III. 579. f. 14. t. 3. f. 8. R. Syn. 121.

Anglis, Female Polypody.

Habitat in palustribus et umbrosis frequens. 4.

9. POLYPODIUM fronde bipinnata: pinnis lanceo- *aculeatum.* lato-ovatis dentato-ciliatis, stipite strigoso.

Polyodium fronde bipinnata: pinnis lanceolatis dentatis, stipite strigoso. Rcy lugdb. 500. Sp. pl. 1090.

Filix mas aculeata major. Bauh pin. 358. pr. 151.

Filix mas non ramosa, pinnulis latis auriculatis spinosis. Ger. Em. 1130. Pluk. ph. t. 179. f. 6. R. Syn. 121.

β *Filix aculeata major,* pinnulis auriculatis crebrioribus, foliis integris angustioribus. R. Syn. 121.

γ *Filix mas aculeata nostras,* alis expansis muscosa lanugine aspersa. Pluk. ph. t. 180. f. 1.

CRYPTOGAMIA FILICES.

Anglis, prickly Polypody.
Habitat in umbrosis. 4.

lobatum. 10. POLYPODIUM fronde bipinnata : pinnis lanceo-lato-ovatis dentato-ciliatis superne basi lobatis, stipe strigoso.

Filix lonchitidis affinis. R. Syn. 121. Pluk. ph. t. 180. f. 3.

Anglis, lobed Polypody.
Habitat in umbrosis. 4.

grifatum. 11. POLYPODIUM frondibus subbipinnatis : foliolis ovato-oblongis ; pinnis obtusiusculis apice acute serratis. Sp. pl. 1090.

Filix mas ramosa, pinnulis dentatis. Ger. Em. 1129. Pluk. ph. 181. f. 2. R. Syn. 124.

β Filix montana ramosa minor argute denticulata. D. Lhwyd. R. Syn. 124.

Anglis, crested Polypody.

Habitat in sylvis et umbrosis humidis. In ericeto Hampsiediano. 4.

rhæticum. 12. POLYPODIUM fronde bipinnata ; foliolis pin-nisque remotis lanceolatis serraturis acuminatis. Sp. pl. 1091.

Filix rhætica tenuissime denticulata. Bauh. hist. III. 740.

Filix fontana major s. Adiantum album filicis folio. Bauh. pin. 351.

Filix pumila saxatilis altera. Clusii 1043. R. Syn. 122.

Anglis, Stone Polypody.

Habitat in montibus saxosis in Westmorlandia paucim. 4.

fragile. 13. POLYPODIUM fronde bipinnata : foliolis remotis pinnis subrotundis incisis. Fl. lapp. 384. suec. 948. Sp. pl. 1091.

Filix saxatilis caule tenui fragile. R. Syn. 125. Pluk. ph. t. 180. f. 5.

β Adiantum nigrum pinnulis cicutariæ divisura. D. Bont. R. Syn. 126.

Anglis,

Anglis, brittle Polypody.
Habitat in aridis lapidosis. 4.

*** *Fronde supradecomposita.*

14. POLYPODIUM fronde supradecomposita : foliolis *Dryopteris* bipinnatis. *Fl. suec.* 949. *Sp. pl.* 1093. *ris.*

Filix saxatilis ramosa nigris maculis punctata. *Bauh.* *pin.* 358.

Filix ramosa minor. *Bauh. hist.* III. 741. *R. Syn.*

125.

Filix pumila saxatilis prima Clusii. *Park.* 1043.

Dryopteris Tragi. *Ger. Em.* 1135.

Anglis, branched Polypody.

Habitat in aridis saxosis in comitatibus Eboracensi, Lancastriensi, Westmorlandico et Cumberlandico frequens. 4.

A D I A N T U M. 1044.

Fruetificationes in maculis terminalibus, sub replicato margine frondis.

* *Fronde decomposita.*

1. ADIANTUM frondibus decompositis : foliolis al- *Capillus* ternis : pinnis cuneiformibus lobatis pedicellatis. *Sp. veneris.* *pl.* 1096.

Adiantum foliis coriandri. *Bauh. pin.* 355.

Adiantum verum, f. Capillus veneris verus. *Park.* 1049.

Capillus veneris verus. *Ger. Em.* 1144. *R. Syn.* 123.

Anglis, true Maidenhair.

Habitat in rupibus. Found by Mr. Lhwyd at Barry island, and Porth Kirig in Glamorganshire. *R. Syn.* 4.

Pharmac. Adianti veri *Herba.*

** *Fronde supra decomposita.*

2. ADIANTUM frondibus supradecompositis : foliolis *trapezi-alternis* : pinnis rhombeis incisis utrinque fructif- forme- cantibus. *Sp. pl.* 1097.

Adiantum majus coriandri folio, adianto vero affine, pediculo pallide rubente. *Sibb. pr. 7.* *R. Syn.* 124.

CRYPTOGAMIA FILICES.

Adianto vero affinis minor *Scotica*, folio obtuso, saturate viridi, &c. *Sibb. pr. 8. R. Syn. 124.*
Adiantum ramosum pediculis lucidis et nigris. *Plum. fil. amer. 78 t. 95.*
Anglis, shining Maidenhair.
Habitat in Scotia. R. Syn.

TRICHOMANES. 1045.

Fruclificationes solitariæ, stylo setaceo terminatæ, margini ipsi frondis insertæ.

- pyxidife- 1. TRICHOMANES* frondibus subbipinnatis : pinnis
rump. alternis lobatis linearibus. *Sp. pl. 1098.*
Filix pyxidifera. Plum. fil. 74 t. 50.
Filix humilis repens, foliis pellucidis et splendentibus
 caule alato. *D. Richardson. R. Syn. 127. t. 3.*
f. 3, 4.
Dareæ tunbrigenis facie. *Pet. fil. 104 t. 13. f. 13.*
Anglis, Cup Trichomanes.
Habitat in petris et rupibus aqua humentibus. Found by
Dr. Richardson at Belbank, scarce half a mile from
Bingley, at the head of a remarkable spring. R.
Syn. 4.
- tunbri- 2. TRICHOMANES* frondibus pinnatis : pinnis loba-
gense. tis oblongis crenulatis. *Sp. pl. 1098.*
Adiantum petræum perpusillum anglicum, foliis bi-
 fidis trifidisque. *R. Syn. 123.*
Adiantum radicosum humis parsum, s. *Filicula pel-*
lucida nostras, coriandri foliis mollicellis, globuli-
 ferum. *Pluk. ph. t. 3. f. 5, 6.*
Darea tunbrigenis minor. Pet. mus. 761.
Anglis, Tunbridge Trichomanes.
Habitat in fissuris rupium humidis. Found upon the
moist rocks in Wales, and near Settle, by Dr. Rich-
ardson; near Tunbridge, by Mr. Dare; at Cock-
bush, six miles from Chichester, by Mr. Rand, and
Mr. Sherard. R. Syn. in montibus Westmorlandicis
passim. 4. VIII;

P I L U L A R I A. 1047.

Flores *Masculi* ad latus frondis.

Fru&tificationes *Feminea* ad radicem, globosa quadri-
locularis.

1. PILULARIA. *Fl. suec.* 950. *Sp. pl.* 1100. *globulifera*
Pilularia palustris juncifolia. *Vaill. paris.* 159. *A. 15. ra.*
f. 6. Dill. musc. 538. *t. 79. f. 1.*

Graminifolia palustris repens, vasculis granorum pi-
peris æmulis. *R. Syn.* 136.

Gramen piperinum. *Merr. pin.*

Anglis, Pepper-grass.

Habitat in inundatis præsertim solo arenoso, prope fon-
tes medicatos Strethamenses, Dr. Wilmer; in ericeto
Hounslowiano, prope Whitton. *R. Syn.* in ericeto
Hampstediano. 4. VI. IX.

I S O E T E S. 1048.

Flores *Masculi* *Anthera* intra basin frondis.

Flores *Feminei* *Capula* bilocularis, intra basin frondis.

1. ISOETIS. *It. scan.* 417. *t. 419.* *Fl. suec.* 951. *Sp. lacustris.*
pl. 1100.

Calamaria folio longiore et graciliore. *Dill. musc.* 541.
t. 80. f. 2.

Subularia vulgaris erecta, folio rigidissimo. *R. Syn.*
306.

β Subularia repens folio minus rigido. *R. Syn.* 306.

δ Subularia fragilis, folio longiore et tenuiore. *R. Syn.*
307.

Anglis, Quillwort.

Habitat in fundo lacus exigui prope summitatem montis
Snowdon Phynon-vrech dicti. *R. Syn.*

M U S C I.

L Y C O P O D I U M. 1049.

Anthera bivalvis, sessilis; *Calyptra* nulla.

1. LYCOPODIUM foliis sparsis filamentosis, spicis clavatum.
teretibus pedunculatis geminis. *Fl. suec.* 952. *Sp.*
pl. 1101. *Ly-*

CRYPTOGAMIA MUSCI.

Lycopodium vulgare pilosum anfragosum et repens.
Dill. musc. 441. t. 58. f. 1.

Lycopodium. Tabern. ic. 814. R. Syn. 107.

Muscus terrestris clavatus. Baub pin. 360.

Muscus clavatus s. Lycopodium. Ger. Em. 1562.
Park. 1307.

Anglis, common Club-moss.

*Habitat in ericetis et mantibus Westmorlandicis, Cum-
 berlandicis, Eboracensisibus, &c. copiose ut et in erice-
 to Hounslowiano. 4. VII.*

Pharmac. Musci clavati Herba Lycopodii semina.

*inunda-
 tum.* 2. *LYCOPODIUM* foliis sparsis integerrimis, spicis
 terminalibus foliosis. *Sp. pl. 1102. Fl. suec. 954.*

*Lycopodium palustre repens, Clava singulari. Vai. l.
 paris. 123. t. 16. f. 11. Dill. musc. 452. t. 62.
 f. 7.*

*Muscus terrestris repens, clavis singularibus foliosis e-
 rectis. Cat. pl. ang. R. Syn. 108.*

Anglis, Marsh Club-moss.

Habitat in ericetis humidis paucim. 4. VII.

*annoti-
 num.* 3. *LYCOPODIUM* foliis sparsis quinquefariis subser-
 ratis surculis annotino-articulatis, spicis terminali-
 bus glabris erectis. *Sp. pl. 1103. Fl. suec. 956.*

*Lycopodium elatius, juniperinum, clavis singularibus
 sine pediculis. Dill. musc. 455. t. 63. f. 9. R. Syn:
 107.*

*Muscus clavatus, juniperipis foliis reflexis, clavis sin-
 gularibus sine pediculis. Hisp. ox. III. 624. f. 15.
 t. 5. f. 3.*

Anglis, Welsh Club-moss.

*Habitat in Alpibus Arvonie sed rarius; copiosum obser-
 vavimus in monte Rhiwr Glyder supra lacum Llyn
 y own, prope ecclesiam S. Perisi, nec rarius in de-
 pressis ejusdem montis y Glyder, qua rupem y Tri-
 van spectat. D. Lhwyd. R. Syn. 4. VII.*

alpinum. 4. *LYCOPODIUM* foliis quadrifariam imbricatis acu-
 tis, surculis erectis dichotomis, spicis sessilibus te-
 retibus. *Sp. pl. 1104. Fl. suec. 957.*

Ly-

Lycopodium sabinæ facie. *Dill. musc.* 445. t. 58.
f. 2. *R. Syn.* 108.

Muscus clavatus cupressiformis. *Park.* 1309.

Muscus clavatus foliis Cupressi. *Baub. pin.* 360.
Ger. Em. 1562.

Anglis, Mountain Club-moss.

*Habitat in montibus; in comitatibus Eboracensi, Cum-
berlandico, Westmorlandico, et in montibus Wal-
licis.* 24. VIII. IX.

5. **LYCOPODIUM** foliis sparsis octifariis, surculo di- *Selago.*
chotomo erecto fastigiato, floribus sparsis. *Sp. pl.*
1102. *Fl. suec.* 955.

Selago vulgaris abietis rubræ facie. *Dill. musc.* 435.
t. 56. f. 1.

Selago foliis et facie abietis. *Fl. jen.* 330. *R. Syn.*
106.

Chamæpeuce. *Turn. part.* I. p. 129.

Muscus erectus ramosus saturate viridis. *Baub. pin.*
360.

Anglis, Firr Club-moss.

Habitat in ericetis montosis. On Snowdon and other
high Mountains in Wales; in comitatibus Eboracensi,
Westmorlandico, Cumberlandico, Lancastriensi,
frequens. 24. VIII.

6. **LYCOPODIUM** foliis sparsis ciliatis lanceolatis *Selaginoid-*
spicis solitariis terminalibus foliosis. *Sp. pl.* 1101. des.
Fl. suec. 953.

Selaginoides foliis spinosis. *R. Syn.* 106. *Dill. musc.*
460. t. 88. f. 1.

Anglis, Prickly Club-moss.

*Habitat in locis turfosis, in comitatibus Eboracensi,
Lancastriensi, Westmorlandico, Cumberlandico,
frequens.* 24. VIII.

S P H A G N U M. 1051.

Anthera operculata: ore lœvi Calyptra nulla.

I. **SPHAGNUM** ramis deflexis. *Fl. lapp.* 415. *suec. palustre.*
959. *Sp. pl.* 1106.

*Sphagnum palustre molle deflexum, squamis cymbi-
formibus.* *Dill. musc.* 240. t. 32. f. 1.

Sphag-

CRYPTOGAMIA MUSCI.

- Sphagnum caulerum et ramosum palustre molle can-dicans, reflexis ramulis, foliolis latioribus. *Cat. gif. 229. R. Syn. 104.*
- Muscus palustris albicans terrestri similis, capitulis erectis brevibus, pediculis etiam brevissimis insidentibus. *R. Syn. ed. II. 37.*
- β Sphagnum palustre molle deflexum, squamis capillaceis. *Dill. musc. 243. t. 32. f. 2.*
- Sphagnum caulerum et ramosum palustre molle can-dicans, reflexis ramulis, foliolis angustioribus. *Cat. gif. 229. R. Syn. 104.*
- Anglis*, Grey Bog-moss.
Habitat in paludibus turfosis. 4. VII. VIII.
- alpinum.* 2. SPHAGNUM subramosum erectum. *Sp. pl. 1106.*
- Sphagnum subulatum viridissimum, capsulis ovatis. *Dill. musc. 245. t. 32. f. 2.*
Anglis, Green Bog-moss
Habitat in paludibus turfosis in montibus Cader Idæris et Snowdon copiose. *Dill. IX. X.*
- arboreum.* 3. SPHAGNUM ramosum repens, antheris lateralibus secundis.
- Sphagnum heteromallum polycephalum. *Dill. musc. 248. t. 32. f. 6.*
- Sphagnum caulerum et ramosum minus hirsutum, capitulis crebris pilosis per rainulorum longitudinem adnascentibus. *R. Syn. 105.*
- Muscus trichoides, capitulis apodibus per longitudinem caulum adnascentibus. *Buddl. hort. sicc. V. I. f. 29.*
Anglis, Creeping Bog-moss.
Habitat in arborum truncis. In Saltu Enfieldensi. *Dill. musc. XI. XII.*

PHASCUM 1052.

Anthera operculata: ore ciliata. *Calyptra nulla.*

- acaule.* 1. PHASCUM acaule, anthera sessili, foliis ovatis im-bricatis.
- Phascum acaule anthera sessili. *Sp. pl. 1106. Fl. suec. 960.*

Sphagnum

Sphagnum acaulon bulbiforme, majus. *Dill. musc.*

251. t. 32. f. 11.

Sphagnum acaulon, foliis in bulbi formam congestis,
majus. *Cat. giss. 230. R. Syn. 105.*

β Sphagnum acaulon bulbiforme, minus. *Dill. musc.*

252. t. 32. f. 12.

Sphagnum acaulon, foliis in bulbi formam congestis,
minus. *Cat. giss. 230. R. Syn. 105.*

Anglis, Oval Phascum.

Habitat in aggeribus foſſarum præſertim ſolo arenof.

○. I. II.

2. PHASCUM acaule, anthera ſeffili, foliis ſubulatis ſubulatum
patentibus.

Sphagnum acaulon trichoides. *Cat. giss. 229. R. Syn.*
105. Dill. musc. 251. t. 32. f. 10.

β Sphagnum acaulon maximum, foliis in centro ciliari-
bus. *Hall. helv. 97. t. 3. f. 3. Dill. musc. 253.*
t. 32. f. 13.

Anglis, ſubulated Phascum.

Habitat in ericetis ſolo arenof., β et in pratis arenofis,
circa Snowdon in Arvonia, Dill. prope Clapham in
comitatu Surriensi. ○. III. IV.

3 PHASCUM acaule, anthera pedunculata.

Bryum ampullaceum, foliis ſerpilli pellucidis collo peduncu-
crassiore. *Dill. musc. 344. t. 44. f. 4.* latum.

Bryum erectis gigartinis capitulis foliis ſerpilli pelli-
cidis obtufis. *R. Syn. 93. t. 3. f. 2.*

Anglis, Upright Phascum.

Habitat in ericetis humidis. In paſcuis Emottmore
dictis, in Lancastriensis comitatus finibus, Dill.
musc. in ericetis montofis Moors dictis in comitatu
Westmorlandico paſſim. V.

4. PHASCUM caulescens repens. *Sp. pl. 1107.* repens.

Sphagnum vermiculare repens, capsulis intra folio-
rum squamosorum alas minimis. *Dill. musc. 550.*
t. 85. f. 16.

Anglis, Creeping Phascum.

Habitat in arborum truncis in comitatu Eboracensi, D.
Richardson. 4. V.

FONTINALIS. 1053.

Anthera operculata. Calyptra sessilis, perichaetio inclusa.

antipyretica. 1. FONTINALIS foliis complicato-carinatis trifariis acutis, antheris lateralibus. *Fl. suec.* 961. *Sp. pl.* 1107.

Fontinalis triangularis major complicata e foliorum alis capsulifera. *Dill. musc.* 254. t. 33. f. 1.

Fontinalis major foliis triangularibus complicatis capitulis in foliorum alis sessilibus. *R. Syn.* 79.

Muscus aquaticus viticulis longis minus ramosis lucidis, foliis acutis triangularibus cinctis. *Hist. ox.* III. 626. *S.* 15. t. 6. f. 32.

Anglis, Greater Water-moss.

Habitat in fluviis leniter fluentibus. 24. V.

minor. 2. FONTINALIS foliis ovatis concavis trifariis acutis, antheris terminalibus. *Sp. pl.* 1107.

Fontinalis triangularis minor carinata, e cymis capsuliferas. *Dill. musc.* 257. t. 33. f. 2.

Fontinalis minor foliis triangularibus minus complicatis, capitulis in summis ramulis sessilibus. *R. Syn.* 79.

Anglis, Lesser Water-moss.

Habitat ad ripam Thamesis circa Londinum frequens. 24. IX. X.

squamosa. 3. FONTINALIS foliis imbricatis subulato-lanceolatis capitulis lateralibus. *Sp. pl.* 1108.

Fontinalis squamosa tenuis sericea atrovirens. *Dill. musc.* 250. t. 33. f. 3.

Fontinalis minor lucens. *Bauh. hist.* III. 778.

Anglis, Scaly Water-moss.

Habitat in rivulis prope Llanberis in Arvonia, et in rivulis montosis in Westmorlandia. 24. VIII. IX.

pennata. 4. FONTINALIS foliis bifariis patentibus, capsulis lateralibus. *Sp. pl.* 1108.

Sphagnuni pennatum undulatum, vagina squamosa. *Dill. musc.* 250. t. 32. f. 9.

Sphagnum

Sphagnum caulerum et ramosum, foliis crispis, crebris per caulem capitulis. *Hall. helv.* 96. t. 3. f. 2.

β *Sphagnum pennatum undulatum, vagina pilosa.* *Dill. musc.* 249. t. 32. f. 8.

Sphagnum pennatum planum. *Dill. musc.* 249. t. 32. f. 7.

Anglis, Feathered Water-moss.

Habitat in arborum truncis in sylvis inter Troutbeck et Ambulside in Westmorlandia. 4. VIII. IX.

S P L A C H N U M. 1054.

Anthera insidens apophysí maximæ colorata. *Calyptra caduca.*

Stella feminea in distincto individus.

I. SPLACHNUM umbraculo ampullaceo clauso. *Sp. ampulla-pl.* 1108. *Amen. acad.* II. 280. *Fl. suec.* 965. *ceum.*

Bryum ampullaceum, foliis thymi pellucidis, collo strictiore. *Dill. musc.* 343. t. 44. f. 3.

Bryum erectis gigartinis capitulis, foliis serpilli pellucidis acutis. *R. Syn.* 93.

Muscus aureus capillaris minor, capitulis geminatis erectis, mutuo incumbitu adnatis. *Hift. ex.* III. p. 629. f. 15. t. 16. f. 10.

Anglis, Common Splachnum.

Habitat in paludibus turfosis. About Hitchin-ferry, near Southampton, and in the Bogs by West-Wickham and Addington, near Croydon, Dr. Sherard. *R. Syn.* III. IV.

P O L Y T R I C H U M. 1055.

Anthera operculata, apophysí minimæ insidens. *Calyptra villosa.*

Stella feminea in distincto individuo.

I. POLYTRICHUM caule simplici, anthera parallelepipedæ. *Sp. pl.* 1109. *Fl. suec.* 966. *commune.*

Polytrichum quadrangulare vulgare, Yuceæ foliis serratis. *Dill. musc.* 420. t. 54. f. 1.

Polytrichum vulgare et majus capsula quadrangulari. *Cat. giff.* *R. Syn.* 90.

Poly-

CRYPTOGAMIA MUSCI.

Polytrichum aureum majus. *Baub. pin.* 359. *Park.* 1052.

Muscus capillaris f. *Adiantum aureum majus.* *Ger.* *Em.* 1559.

β *Polytrichum quadrangulare,* *juniperi foliis brevioribus et rigidioribus.* *Dill. musc.* 424. t. 54. f. 2.

Polytrichum montanum et minus, *capsula quadrangulari.* *Cat. gif.* *R. Syn.* 90.

Polytrichum aureum medium. *Baup. pin.* 356.

γ *Polytrichum quadrangulare majus,* *juniperi foliis pilosis.* *Dill. musc.* 426. t. 54. f. 3.

Anglis, Common *Polytrichum*; or, Great golden Maidenhair.

Habitat *in sylvis ericetis, uliginosis et steriliissimis.* 4. V.

subrotundum. 2. **POLYTRICHUM** caule simplici, anthera subrotunda.

Polytrichum nanum, *capsulis subrotundis galeritis, aloës folio non ferrato.* *Dill. musc.* 428. t. 55. f. 6.

Polytrichum minus, *capsulis subrotundis, calyptra quasi lacera coronatis.* *Cat. gif.* *R. Syn.* 91.

Mnium calyptra villosa. *Sp. pl.* 1112.

Muscus coronatus rigidus minor et humilior capitulis villosis brevioribus. *Hist. ox.* III. 630. f. 15. t. 7. f. 7.

β *Polytrichum parvum,* *aloës folio ferrato, capsulis oblongis.* *Dill. musc.* 429. t. 55. f. 7.

Anglis, dwarf *Polytrichum.*

Habitat *in ericetis.* X—III.

urnigerum. 3. **POLYTRICHUM** caule ramosissimo, pedunculis axillaribus. *Sp. pl.* 1109. *Fl. suec.* 967.

Polytrichum ramosum setis ex alis urnigeris. *Dill. musc.* 427. t. 55. f. 5.

Muscus ramosus erectus, calyptra villosa. *Vaill. paris.* 131. t. 28. f. 13.

β *Polytrichum alpinum ramosum,* *capsulis e summitate ellipticis* *Dill. musc.* 427. t. 55. f. 4.

Anglis, branched *Polytrichum.*

Habitat *ad radicem montis Caderideris prope Dolgelle in Mervinia.* Dill. VI.

4. POLYTRICHUM caule ramoso, antheris subsessili *striatum*, libus terminalibus, calyptis sursum pilosis.
Polytrichum calyptata striata sursumve pilosa. Fl. suec. ed. I. 869. Dalib. paris. 314.
Polytrichum bryi ruralis facie, capsulis sessilibus magis. Dill. musc. 430. t. 55. f. 8.
Polytrichum capsulis subrotundis pediculis brevissimis insidentibus, calyptra striata, arboreum ramosum, majus. Cat. giff. 222. R. Syn. 91.
Muscus apocarpos arboreus ramosus. R. Hist. III. 40. Vaill. paris. 129. t. 25. f. 5, 6.
- β *Polytrichum bryi ruralis facie, capsulis sessilibus minus. Dill. musc. 430. t. 55. f. 9.*
Polytrichum capsulis subrotundis, pediculis brevissimis insidentibus, calyptra striata, arboreum et terrestre minus ramosum et breve. Cat. giff. 222. R. Syn. 91.
- γ *Polytrichum capsulis sessilibus, foliis brevibus, rectis, carinatis. Dill. musc. 432. t. 55. f. 10.*
Polytrichum capillaceum crispum, calyptis acutis pilosissimis. Dill. musc. 433. t. 55. f. 11.
Polytrichum capsulis oblongo-rotundis, calyptis pilosissimis. R. Syn. 91.
Anglis, Tree Polytrichum.
Habitat in arboribus et muris paup. & in sylvis. II. III.

M N I U M. 1056.

*Anthera operculata, Calyptra laevis.**Fem. capitulum nudum, pulverulentum, remotum.*

1. MNIUM foliis distichis integerrimis. Sp. pl. 1114. *trichomanis.*
Fl. suec. 985.

*Mnium trichomanis facie, foliolis integris. R. Syn.**79. Dill. musc. 236. t. 31. f. 5.**Anglis, Fern Mnium.**Habitat in locis uidis et umbrosis circa Eltham, Woolwich, et Hampstead. R. Syn. II. III.*

2. MNIUM foliis distichis bifidis. Sp. pl. 1114. *fissum.*
Mnium trichomanis facie, foliolis bifidis. R. Syn.
79. Dill. musc. 237. t. 31. f. 6.

*D d**An-*

CRYPTOGAMIA MUSCI.

Anglis, Forked Mnium.

Habitat in umbris pessim. III. IV.

junger-
mannia.

3. MNIUM foliis distichis, pinnis subtus auriculatis.

Sp. pl. 1114. Fl. suec 984

Mnium caule procumbente simplici, foliis imbricatis
integerrimis alternis antice appendiculatis. *Fl. succ.
ed. I. 914.*

Lichenastrum alpinum purpureum, foliis auritis et
cochleariformibus. *Dill. musc. 479. t. 69 f. 1.*

Lichenastrum trichomanis facie, praelongum, foliis
concavis unam partem spectantibus. *R. Syn. 112.*

Muscus trichomanoides purpureus, alpinis rivulis in-
natans *R. Syn. ed. I. 18. ed. II. 40.*

Anglis, purple Mnium

Habitat in rivulis et palustribus; in montibus Cambriæ
altissimis, Cader-Idærus, Snowdon et Glyder. Dill.

pelluci-
dum.

4. MNIUM caule simplici, foliis ovatis. *Sp. pl. 1109.
Fl. suec 968.*

Mnium serpilli foliis tenuibus et pellucidis. *Dill.
musc. 232. t. 31. f. 2.*

Mnium minus non ramosum, angustioribus et pelli-
cidis foliis. *R. Syn. 78.*

Muscus coronatus minimus, capillaceis foliis, capitu-
lis oblongis. *Vaill. paris. 130. t. 24. f. 7.*

5. MNIUM minimum non ramosum angustissimum et pelli-
cidis foliis. *R. Syn. 78.*

Anglis, transparent Mnium.

Habitat in umbris uidis; in ericetis juxta Woolwich.
R. Syn. III.

palustre.

5. MNIUM caule dichotomo, foliis subulatis. *Sp. pl.
1110. Fl. suec. 970.*

Mnium majus, ramis longioribus bifurcatis. *R. Syn.
78. Dill. musc. 233. t. 31. f. 3.*

Muscus palustris flagellis erectis luteolis, raro divisus
capitulis oblongis adianti. *Hist. ox. III. 629. f.
15. t. 6. f. 9.*

Anglis, Marsh Mnium.

Habitat

Habitat in paludibus turfosis. In comitatu Westmorlandico copiose, in ericeto Hampstediano. 4. VI, VII.

6. MNIUM caule ramoso erecto, pedunculis femineis *ramosum*. axillaribus.

Mnium majus, minus ramosum, capitulis pulverulentis crebrioribus. R. Syn. 78. Dill. musc. 235. t. 31. f. 4.

Muscus pulverulentis (forsitan variis) capitulis Veron. Buddl. hort. succ. Vol. II. f. 32.

Anglis, branched Mnium.

Habitat in paludibus; in the New-forest, Hampshire, D. Vernon.

7. MNIUM caule ramoso, androgynum. Fl. suec. 971. androgynum. Sp. pl. 1110.

Mnium perangustis et brevibus foliis. Cat. giss. 214. R. Syn. 78. Dill. musc. 230. t. 31. f. 1.

Muscus coronatus humilis minimus, foliolis pediculis et capitulis erectis. Hist. ox. III. 631. f. 15. t. 7. f. 20.

Anglis, upright Mnium.

Habitat in sylvis et umbrosis uidis. In ericeto Hampstediano. III.

B R Y U M. 1057.

Anthera operculata. *Calyptra* laevis. *Filamentum* e tubculo terminali ortum.

Stella feminea in distincto individuo.

* *Antheris* sessilibus.

1. BRYUM antheris sessilibus terminalibus, calyptra *apocar-* minima. Sp. pl. 1115. Fl. suec. 986. *pum.*

Sphagnum nodosum hirsutum incanum. Dill. musc. 246. t. 32. f. 5.

Sphagnum cauliferum et ramosum saxatile hirsutum incanum, capitulis virentibus. Cat. giss. 229. R. Syn. 105.

Anglis, hairy Bryum.

Habitat in saxis et arboribus. In comitatibus Ebora- censi et Westmorlandico, frequens. XII.

D d 2

Antheris

** *Antheris pedunculatis erectis.*

pomiforme 2. BRYUM antheris erectis sphæricis. Fl. suec. 988.
Dilib. paris. 317. Sp. pl. 1115.

Bryum capillaceum, capsulis sphæricis. Dill. musc. 339. t. 44. f. 1. Fl. lapp. 400.

Bryum trichoides virescens, erectis majusculis capitulis maliformibus. Cat. giss. 224. R. Syn. 97.

Muscus trichoides minimus sericeus capillaceus, capitulis sphæricis. Hist. ox. III. 628. f. 15. t. 6. f. 6.

Anglis, Round-headed Bryum.

Habitat in ericetis. On Hampstead Heath, about Woolwich and Shooter's Hill. R. Syn. III.

fontarum. 3. BRYUM antheris obliquis subrotundis, caule simplici geniculis inflexo.

Bryum palustre, scapis teretibus stellatis, capsulis magnis subrotundis. Dill. musc. 340. t. 44. f. 2.

Mnium caule simplici geniculis inflexo. Fl. lapp. 414. suec 969. Sp. pl. 1110.

Muscus palustris adianto aureo affinis scapis tenuibus, foliolis brevibus. R. Syn. ed. I. 19. III. 98.

Muscus trichoides palustris erectus coronatus, capitulis sphæricis amplioribus. Hist. ox. III. 628. f. 15. t. 6. f. 8.

Anglis, Marsh Bryum.

Habitat ad fontes et in paludibus turfos. VII. VIII.

pyriforme. 4. BRYUM antheris erectis ovatis, calyptra subulata, surculis acaulibus, foliis ovatis muticis. Sp. pl. 1116. Fl. suec. 989.

Bryum serpillifolium pellucidum, capsulis pyriformibus. Dill. musc. 345. t. 44. f. 6.

Bryum parvum erectis pyriformibus majusculis capitulis, foliolis terpynlli pellucidis. Cat. giss. 223. R. Syn. 93.

Muscus coronatus humilis stellaris, foliis latiusculis, capitulis pyriformibus erectis turgidiusculis. Hist. ox. III. 631. f. 15. t. 7. f. 16.

Anglis, Pear-headed Bryum.

Habitat in pratis arenosis et ad aggeris. III.

5. BRYUM anthera erecta oblonga minori, calyptis extinctoriæ axis æqualibus. *Fl. suec.* 990. *Dalib. paris.* 325. *rium.*
Sp. pl. 1116.
Bryum calyptra extinctorii forma minus. *Dill. musc.* 349. *t. 45. f. 8.*
Bryum erectis capitulis, calyptra laxa conica, foliis serpilli pellucidis angustioribus. *Cat. giss.* 223. *R.*
Syn. 92.
Muscus capillaceus minimus, calyptra longa conoide nitida. *Vaill. paris.* 137. *t. 26. f. 1.*
β *Bryum calyptra extinctorii figura, majus et ramosum.*
Dill. musc. 350. *t. 45. f. 9.*
Anglis, Conic Bryum.
Habitat in pratis arenosis, sed rarius. II.
6. BRYUM antheris erectis subulatis, surculis acauli- *subulatum*
bus *Sp. pl.* 1116. *Fl. suec.* 991
Bryum capsulis longis subulatis. *Dill. musc.* 350. *t.*
45. f. 10.
Bryum erectis longis et acutis falcatis capitulis, calyptra subfuscæ, foliis serpilli pellucidis. *Cat. giss.* 223.
R. Syn. 92.
Muscus capillaris, corniculis longissimis incurvis. *R.*
Syn. ed II. 29
Anglis, subulated Bryum.
Habitat in aggeribus terrenes humidiusculis et sylvis. III.
7. BRYUM antheris erectiusculis, foliis piliferis recur- *rurale.*
vis. *Fl. suec.* 992. *Sp. pl.* 1116. *Dalib. paris.* 320.
It. scan. 118.
Bryum caule erecto, foliis reflexis seta terminatis, ca-
pitulis falcatis. *Fl. lapp.* 397.
Bryum rurale unguiculatum hirsutum elatius et ramo-
sus. *Dill. musc.* 352. *t. 45. f. 12.*
Bryum majus erectis falcatis capitulis, foliis latiusculis extantibus, in pilum canescemt desinentibus. *R.*
Syn. 94.
Muscus erectus hirsutus capitulis longis acutis, unguiculis avicularum similibus vulgarissimus. *Hist. ox.*
III. 628. f. 15. t. 6. f. 1.

Anglis, Grey Bryum.

Habitat in muris, tectis, et ad arborum truncos. III.

murale. 8. BRYUM antheris erectis, foliis piliferis rectiusculis, surculis simplicibus cespitosis. Sp. pl. 1117. Fl. suec. 993.

Bryum tegulare humile pilosum et incanum. Dill. musc. 355. t. 45. f. 14.

Bryum minus erectis minus falcatis capitulis, foliis latiusculis congestis in pilum canescens definentibus. R. Syn. 94.

β Bryum humile, pilis carens, viride et pellucidum. Dill. musc. 356. t. 45 f. 15.

Anglis, Wall Bryum.

Habitat in muris, tectis et locis arenosis. III.

farium. 9. ERYUM antheris erectiusculis, pedunculis aggregatis, foliis secundis recurvatis, caule declinato. Fl. suec. 995. Sp. pl. 1117.

Bryum reclinatum, foliis falcatis, scoparum effigie. Dill. musc. 357. t. 46. f. 16.

Bryum erectis capitulis angustifolium, caule reclinato. Cat. gif. 222. R. syn. 95.

Muscus coronatus medius, foliis tenuissimis pallidis longioribus, capitulis erectis acutis. Hist. ox. III. 630. f. 15. t. 7. f. 11.

Anglis, Broom Bryum.

Habitat in ericetis. III. IV.

undulatum. 10. BRYUM antheris erectiusculis, pedunculis subsolitariis, foliis lanceolatis carinatis undulatis patentibus ferratis. Sp. pl. 1117. Fl. suec. 996.

Bryum phyllitidis folio rugoso acuto, capsulis incurvis. Dill. musc. 360. t. 46. f. 18.

Bryum capitulis oblongis rubentibus, foliis oblongis angustis pellucidis rugosis. Cat. gif. 222. R. syn. 95.

Anglis, curled Bryum.

Habitat in aggeribus umbrosis et sylvis. XII, I.

11. BRYUM antheris erectiusculis, operculo arcuato, *glaucum*.
foliis erectis, imbricatis, surculis ramosis. *Sp. pl.*
Fl. suec. 994
Bryum albidum et *glaucum* fragile majus, foliis erec-
tis setis brevibus. *Dill. musc.* 362. t. 46. f. 20.
Bryum trichoides erectis capitulis, albidum fragile.
Cat. gif. 225. *R. Syn.* 97.
Muscus trichoides montanus albidus fragilis. *Hist. ox.*
III. 630. *f. 15. t. 6. f. 22.*
Anglis, white Bryum.
Habitat in ericetis montosis. X, XI.
12. BRYUM antheris erectiusculis, foliis recurvis acu- *pelluci-*
tis caule hirsuto. *Sp. pl.* 1118. *Fl. suec.* 997. *dum.*
Bryum palustre pellucidum, capsulis et foliis brevibus
recurvis. *Dill. musc.* 364. t. 46. f. 23.
Bryum erectis capitulis subrotundis fuscis, foliis mi-
noribus pellucidis rugosis. *R. Syn.* 96.
 β Bryum erectis capitulis brevibus, foliis reflexis.
Dill. musc. 365. t. 46. f. 24.
Anglis, pellucid Bryum
Habitat in palustribus et umbrosis humidis.
13. BRYUM antheris erectis, operculo aciformi, foliis *aciculare*.
erectis subsecundis. *Sp. pl.* 1118.
Bryum montanum hemiheterophyllum, operculis a-
cutis. *Dill. musc.* 366. t. 46. f. 25.
Bryum hypnoides erectum montanum, erectis capitu-
lis acutis. *R. Syn.* 94.
Anglis, Mountain Bryum.
Habitat in montosis in Occidentalibus Eboracensis comi-
tatus, D. Richardson; prope Llanberris in Aronia,
D. Dillenius. VIII.
14. BRYUM antheris erectis, foliis setaceis, pedunculis *flexuosum*.
flexuosis. *Sp. pl.* 1118. *Fl. suec.* 998.
Bryum pilosum molle, setis intortis. *Dill. musc.* 373.
t. 47. f. 33.
Bryum trichoides capitulis erectis, pediculis intortis.
tenuis virentibus. *Cat. gif.* 225. *R. Syn.* 97.
Anglis, soft Bryum.
Habitat in rupibus circa Llanberris. Dill.

- heteromallum.* 15. **BRYUM** antheris erectis, foliis setaceis secundis. *Sp. pl. 1118. Fl. suec. 999.*
Bryum heteromallum. Dill. musc. 375. t. 47. f. 37.
Bryum trichoides reclinatis caulinis, capitulis erectis acutis. R. Syn. 96.
- β **Bryum pilosum** interrupte falcatum. *Dill. musc. 376. t. 47. f. 38.*
Anglis, Heath Bryum.
Habitat in ericetis. X.
- retrosum;* 16. **BRYUM** antheris erectis, foliis setaceis imberibus : arefactione retortis. *Sp. pl. 1119. Fl. suec. 1000.*
Bryum alpinum crinum crisporum simile, capsula barbata. Hall. helv. 110 t. 4. f. 2.
Bryum cirratum, setis et capsulis longioribus. Dill. musc. 377. t. 48. f. 40.
Bryum trichoides longisolum crassiusculis caulinis, capitulis erectis aduncis acutis. R. Syn. 98.
Anglis, twisted Bryum.
Habitat in montosis; in comitatu Eboracensi, D. Richardson, in Cambria. Dill. musc. VIII. X.
- truncatus* 17. **BRYUM** antheris erectis subrotundis, operculo mucronato. *Sp. pl. 1119. Fl. suec. 1001.*
Bryum exiguum, creberrimis capsulis rufis. Dill. musc. 347. t. 45 f. 7.
Bryum exiguum erectis parvis subrotundis creberrimis capitulis rufis, foliolis serpilli angustis pellucidis. Cat. giss. 223. R. Syn 94
Muscus coronatus minimus, foliis et capitulis oblongis in pediculis brevissimis. Hist. ox. III. 631. f. 15. t. 7. f. 18.
- β **Bryum parvum** erectis subrotundis majusculis capitulis subfuscis, foliolis serpilli pellucidis. *Cat. giss. 223. R. Syn. 93.*
Anglis, brown Bryum.
Habitat in pratis et paucis. II.
- viridulum.* 18. **BRYUM** antheris erectis ovatis, foliis lanceolatis acuminatis imbricato-patulis. *Fl. suec. 1002. Sp. pl. 1119.*

Bryum

Bryum capillaceum breve, pallide et læte virens, capsulis ovatis. *Dill. musc.* 380. *t.* 48 *f.* 43.

Bryum trichoides exile, erectis capitulis in pediculis brevissimis *Cat. giss.* 224. *R. Syn.* 97.

Anglis, green Bryum.

Habitat in aggeribus fossarum et ad margines sepium arenosos. XII, II.

19. BRYUM antheris erectis, foliis arefactione revolutis *cirratum*.

Bryum cirratum et stellatum, tenuioribus foliis. *Dill. musc.* 379. *t.* 48. *f.* 42.

Bryum trichoides exile, erectis capitulis in pediculis longioribus rubris. *Cat. giss.* 224. *R. Syn.* 97.

Mnium foliis arefactione revolutis. *Sp. pl.* 1111.

Muscus coronatus minimus, capillaceis foliis, capitulis oblongis. *Hist. ox.* III 631. *s.* 15. *t.* 7. *f.* 19.

β Bryum trichoides erectis sublongis capitulis, extremitibus per siccitatem stellatis. *R. Syn.* 98.

Bryum cirratum, setis et capsulis brevioribus et pluribus. *Dill. musc.* 378. *t.* 48. *f.* 41.

γ Bryum perangustis et brevissimis foliis, extremitatibus stellatis. *Cat. giss.* 226. *R. Syn.* 98.

Anglis, starry Bryum.

Habitat in sylvis et ad sepes. III.

20. BRYUM antheris erectis ore non ciliato foliis cari-imberbe. natis patulis.

Bryum tenue imberbe et pallidum, foliis crebrioribus. *Dill. musc.* 382. *t.* 48. *f.* 46.

Bryum perangustis foliis et caulinis, foliis crebrioribus et circa extremitates magis congestis, capitulis erectis, ad summitatem magis egredientibus. *Cat. giss.* 225. *R. Syn.* 99.

Anglis, Beardless Bryum.

Habitat in locis arenosis gramineis et ad sepes. III.

21. BRYUM antheris erectis, operculis filiformibus *setaceum*. longitudine capitulorum.

Bryum stellare nitidum pallidum, capsulis tenuissimis. *Dill. musc.* 381. *t.* 48. *f.* 44.

Bryum

CRYPTOGAMIA MUSCI.

Bryum trichoides exile pallidum, erectis capitulis e
surculis annotinis egredientibus. *R. Syn.* 96

Mnium antheris erectis, operculis filiformibus longi-
tudine capitulorum. *Sp. pl.* 1111. *Fl. suec.* 974.

β *Bryum stellare lacustre*, foliis rubris capillaceis. *Dill.*
musc. 382. *t.* 48. *f.* 45.

Anglis, pale Bryum.

Habitat in aggeribus foſtarum, ſeſibus et muris. III.

*unguicu-
latum.* 22. *BRYUM* antheris erectis oblongis, pedunculis ax-
illaryibus, foliis erectis acutis carinatis.

Bryum unguiculatum et barbatum, surculis in summi-
tate crassioribus. *Dill. musc.* 383. *t.* 48. *f.* 47.

Bryum angustis viridibus foliis, capitulis erectis, bre-
vibus pediculis infidentibus, calyptora falcata vel a-
vium unguiculos referente *R. Syn.* 96

Muscus capillaris, capitulis erectis lageniformibus.
Buxb. cent. II. 9. *t.* 2. *f.* 9.

Anglis,

Habitat in muris et locis arenosiss. III.

Obs. *Caule* erecto subramoso. *Foliis* luteo-viridibus. Pe-
dunculis brevibus ex alis foliorum enascentibus.

paludosum 23. *BRYUM* acaulon, foliolis setaceis, antheris obtu-
fissimis patulis. *Sp. pl.* 1119. *Fl. suec.* 1004.

Bryum trichoides acaulon palustre minimum, setis et
capsulis brevissimis. *Dill. musc.* 387. *t.* 49. *f.* 53.

Anglis, dwarf Bryum.

Habitat in palustribus in comitatu Eboracensi. D. Rich-
ardson. III.

Hypnoides 24. *BRYUM* antheris erectis, caule erectiusculo, ramis
lateralibus brevibus fertilibus. *Fl. lapp.* 396. *suec.*
1003. *Sp. pl.* 1119.

Bryum hypnoides, hirsute canescens, vulgare. *Dill.*
musc. 368. *t.* 47. *f.* 27.

Bryum trichoides erectis capitulis, lanuginosum. *Cat.*
giff. 224. *R. Syn.* 97.

β *Bryum hypnoides*, hirsute virescens fasciculare alpi-
num. *Dill. musc.* 370. *t.* 47. *f.* 28

γ *Bryum hypnoides* alpinum, setis et capsulis exiguis.
Dill. musc. 370. *t.* 47. *f.* 29.

- δ Bryum hypnoides alpinum, operculis obtusis. *Dill. musc.* 271. *t.* 47. *f.* 30.
- ε Bryum hypnoides, ericæ facie, capsulis barbatis alpinum. *Dill. musc.* 371. *t.* 47. *f.* 31.
- Bryum hypnoides capitulis plurimis erectis, non lanuginosum. *R. Syn.* 478.
- ζ Bryum hypnoides polycephalon lanuginosum alpinum. *Dill. musc.* 372. *t.* 47. *f.* 32.
- Bryum hypnoides capitulis plurimis erectis, lanuginosum. *R. Syn.* 97.
- Muscus terrestris vulgari similis lanuginosus. *R. Syn.* ed. I. 18. ed. II. 37. *Hist. ox.* III. 625. *f.* 15. *t.* 5. *f.* 7.
- η Bryum hypnoides aquaticum calyptis nigris acutis. *Dill. musc.* 367. *t.* 46. *f.* 26.
- Bryum hypnoides repens aquaticum, erectis capitulis acutis. *R. Syn.* 94.
- Anglis*, Woolly Bryum.
- Habitat in montosis in comitatibus Eboracensi, Westmorlandico et Cumberlandico frequens, in monte Snowdon dicto in Cambria copiose: *Dill. XII.*
25. BRYUM antheris erectis, pedunculis arefactione verticillata. contortis foliis piliferis, furculis fastigiatis. *Sp. pl. tum.* 1120.
- Bryum pilosum verticillatum. *Dill. musc.* 374. *t.* 47. *f.* 35.
- Brium trichoides brevifolium angustis caulinis, capitulis erectis parvis et minus aduncis. *R. Syn.* 98.
- β Bryum pilosum, sphagni subulati facie. *Dill. musc.* 374. *t.* 47. *f.* 34.
- Anglis*, verticillated Bryum.
- Habitat in montosis in comitatu Eboracensi, D. Richardson. *R. Syn.* in rupibus maritimis prope Bangor. D. Brewer. *Dill.*
26. BRYUM antheris erectis subrotundis, axillaribus, palustre. foliis subulatis distantibus.
- Bryum palustre aestivum, conservæ facie. *Dill. musc.* 375. *t.* 47. *f.* 36.
- Bryum angustissimis foliis crebrioribus, capitulis erectis

CRYPTOGAMIA MUSCI.

tis brevibus, pediculis e surculis novis et longis e-nascentibus. *R. Syn. 99.*

Anglis, Water Bryum.

Habitat in palustribus in comitatu Eboracensi. D. Richardson. III.

purpureum. 27. BRYUM antheris obliquis, caule dichotomo, axillis pedunculiferis, foliis carinatis.

Bryum tenue stellatum, setis purpureis. *Dill. musc. 386. t. 49. f. 51.*

Bryum perangustis foliis et cauliculis, foliis crebrioribus et circa summitates magis congestis, capitulis erectis e surculis annotinis egredientibus. *Cat. giss. 226. R. Syn. 99.*

β Bryum unguiculatum et barbatum, tenuius et stellatum. *Dill. musc. 384. t. 48. f. 48.*

γ Bryum tenue barbatum, foliis angustioribus et rarioribus. *Dill. musc. 385. t. 48. f. 49.*

Bryum perangustis foliis et cauliculis foliis rarioribus cinctis, capitulis erectis, e surculis annotinis egredientibus. *Cat. giss. 225. R. Syn. 99.*

δ Bryum polytrichoides palustre, setis longioribus rubris fericeis. *Dill. musc. 387. t. 49. f. 52.*

Bryum perangustis crebrioribus foliis, capitulis erectis longiusculis, pediculis e surculis annotinis nascentibus. *R. Syn. 99.*

Anglis, purple Bryum.

Habitat in muris ericetis et pascuis glareosis. III. IV.

*** Antheris nutantibus.

aureum. 28. BRYUM antheris pendulis turbinatis, stipite filiformi, foliis ensiformibus nitidis.

Bryum trichoides aureum, capitulis pyriformibus nutantibus Cat. Nottingh. app. *Dill. musc. 391. t. 50 f. 60.*

Minium antheris pendulis turbinatis, stipite filiformi, floribus femineis setiferis. *Sp. pl. 1112.*

Anglis, golden Bryum.

Habitat in rupibus Parci Nottinghamensis. D. Car. Deering. IV. V.

29. BRYUM antheris pendulis, surculis cylindricis im- *argenteum*
bricatis lævibus. *Sp. pl.* 1120. *Fl. suec.* 1008.
Bryum pendulum julaceum argenteum et sericeum.
Dill. musc. 392. *t.* 50. *f.* 62.
Bryum capitulis subrotundis reflexis, caulinis tere-
tibus argenteis. *Cat. giss.* 226. *R. Syn.* 100.
Muscus minimus e viridi argenteus, capitulis oblongis
cernuis. *Hist. ox.* III. 629. *f.* 15 *t.* 6. *f.* 17.
β Bryum pendulum, surculis teretibus viridibus. *Dill.*
musc. 394. *t.* 50. *f.* 63.
Anglis, silver Bryum.
Habitat in tectis, muris et apricis. XII.
30. BRYUM antheris subrotundis, pedunculis reflexis, *pulvina-*
foliis piliferis. *Fl. suec.* 1009. *Sp. pl.* 1121. *Da-tum.*
lib. paris 321.
Bryum orbiculare pulvinatum hirsutie canescens, cap-
fulis immersis. *Dill. musc.* 395. *t.* 50. *f.* 65.
Bryum trichoides hirsutie canescens, capitulis subro-
tundis reflexis, in perbrevibus pediculis. *Cat. giss.*
226. *R. Syn.* 100.
Muscos trichoides hirsutus, capitulis oblongis reflexis,
pediculis brevibus insidentibus. *R. Syn. ed.* I. 243.
Hist. ox. III. 629. *f.* 15. *t.* 6. *f.* 21.
Anglis, grey Bryum.
Habitat in muris et tectis. IV.
31. BRYUM anthera oblonga nutante, foliis subulatis. *rubrum.*
caule simplicissimo, medio pedunculifero.
Bryum trichoides, capsulis rubris cernuis. *Dill. musc.*
390. *t.* 50. *f.* 59.
Anglis, red Bryum.
Habitat in locis gramineis sed rarius.
- 32 BRYUM antheris pendulis, foliis lanceolatis acumi- *cæspitici-*
nato-setaceis, pedunculis longissimis. *Sp. pl.* 1121. *um.*
Fl. suec. 1010.
Bryum pendulum ovatum cæspiticium et pilosum, se-
ta bicolori. *Dill. musc.* 396. *t.* 50. *f.* 66.

Bryum

CRYPTOGAMIA MUSCI.

Bryum trichoides capitulis reflexis, pediculis ima medietate rubris, summa luteo-virentibus. *Cat. giss.* 226. *R. Syn.* 100.

Muscus trichoides capitulo parvo reflexo, pediculo ima medietate rubro, summa luteo-viridi. *Hist. ox. III.* 629. *f. 15. t. 6. f. 15.*

Anglis, matted Bryum.

Habitat in muris antiquis et glareosis. III.

capillare. 33. *BRYUM* antheris pendulis, foliis ovatis setiferis carinatis, pedunculis longissimis. *Sp. pl.* 1121.

Bryum foliis latiusculis congestis, capsulis longis nutantibus. *Dill. musc.* 398. *t. 50. f. 67.*

Bryum capitulis reflexis, foliolis latiusculis congestis. *Cat. giss.* 227. *R. Syn.* 100.

Muscus capillaris foliolis latiusculis congestis, capitulis oblongis reflexis. *Hist. ox. III.* 629. *f. 15. t. 6. f. 19.*

β *Bryum* capitulis reflexis foliis congestis laticoribus et pellucidis. *R. Syn.* 101.

Anglis, capillary Bryum.

Habitat in sylvis et ericetis solo glareoso. III.

annotinum 34. *BRYUM* antheris oblongis nutantibus, foliis ovatis acuminatis pellucidis, pedunculis subradicalibus.

Bryum annotinum lanceolatum pellucidum, capsulis oblongis pendulis. *Dill. musc.* 399. *t. 50. f. 68.*

Mnium foliis ovatis acuminatis pellucidis, pedunculis radicalibus, anthera nutante. *Sp. pl.* 1111.

Anglis, long-leaved Bryum.

Habitat in sylvis et umbrosis humidis. III.

carneum. 35. *BRYUM* antheris pendulis subglobosis, foliis acutis alternis. *Sp. pl.* 1122. *Fl. suec.* 1011.

Bryum lanceolatum pellucidum capsulis rotundis pendulis, carneis. *Dill. musc.* 400. *t. 5. f. 69.*

Bryum nitidum foliis serpilli pellucidis angustioribus reflexis capitulis subrotundis, carni coloris. *R. Syn.* 102.

β *Bryum nitidum* perangustis serpillinis pellucidis foliis, reflexis capitulis subrotundis virentibus. *R. Syn.* 102.

Anglis,

Anglis, shining Bryum.

Habitat in locis uidis; ad fossulas pratorum inter Black-heath et Eltham, et prope Darking in Surriensi comitatu. Dill. musc. III.

36. BRYUM antheris oblongis pendulis, calyptre re-crudum. curvata, foliis ovatis acutis pellucidis.

Bryum pendulum hornum molle, foliis et lanceolatis et gramineis. Dill. musc. 401. t. 50. f. 70.

Mnium antheris pendulis, calyptre recurvata, foliis pellucidis. Sp. pl. 1112.

Anglis, Spear-leaved Bryum.

Habitat in locis uidis in Cambria. Dill. musc. III.

37. BRYUM anthera oblonga pendula: foliis ovatis a-alpinum. cuminatis carinatis, surculis ramosis, axillis pedunculariis.

Bryum hypnoides pendulum sericeum, coma insigni atro-rubente. Dill. musc. 394. t. 50. f. 64.

Anglis, Alpine Bryum.

Habitat prope Castellum quoddam dirutum, non longe a Llanberri, in rupibus tenui terra tectis. Dill. musc.

38. BRYUM antheris oblongis nutantibus, pedunculo hornum. curvato, foliolis ovatis margine scabris.

Bryum stellare hornum sylvarum, capsulis magnis nutantibus. Dill. musc. 402. t. 51. f. 71.

Bryum nitidum capitulis majoribus reflexis, calyptre imum virgente, pediculis oblongis e caulinis novis egredientibus. R. Syn. 102.

Mnium antheris pendulis, pedunculo curvato, surculo simplici, foliolis margine scabris. Sp. pl. 1112. Fl. suec. 977.

β Bryum nitidum foliis serpilli angustioribus, medium. Cat. giss. 228. R. Syn. 103.

Muscus polytrichoides humilior, foliis brevioribus raris, pallide viridantibus et vix pellucidis. Hist. ox. III. 630. f. 15. t. 6. f. 3.

Anglis, rough Bryum.

Habitat in sylvis et ericetis. IV. V.

- trique-trum.* 39. BRYUM antheris oblongis pendulis, foliis trifariis subulato-lanceolatis carinatis, surculis ramosis.
Bryum annotinum palustre, capsulis ventricosis pendulis. *Dill. musc.* 404. *t.* 51. *f.* 72.
Bryum nitidum foliis serpilli angustioribus, majus. *Cat. giss.* 228. *R. Syn.* 102.
Mnium foliis trifariis patulis subulato-lanceolatis carinatis. *Sp. pl.* 1114.
Muscus capillaris major et elatior, capitulis longis et obtusis deorsum reflexis et veluti pendulis præaltis pediculis rubris. *Hist. ox. III.* 629. *f.* 15. *t.* 6. *f.* 20.
 β *Bryum lanceolatum* bimum, setis et capsulis longis pendulis. *Dill. musc.* 405. *t.* 51. *f.* 73.
Bryum nitidum foliis serpilli pellucidis angustis, capitulis tumidis nutantibus, præaltis pediculis e surculis annotinis egredientibus. *R. Syn.* 102.
 γ *Bryum palustre* complicatum rubens, capsulis turbinate pendulis. *Dill. musc.* 406. *t.* 51. *f.* 74.
Bryum nitidum rubens capitulis reflexis, foliis angustis pellucidis, cauliculis proliferis. *R. Syn.* 102.
Anglis, triangular Bryum.
Habitat in paludibus turfosis. IV.
- kygemen-tricum.* 40. BRYUM anthera nutante, calyptra reflexa tetragona.
Bryum bulbiforme aureum, calyptra quadrangulari, capsulis piriformibus nutantibus. *Dill. musc.* 407. *t.* 52. *f.* 75.
Bryum aureum, capitulis reflexis piriformibus, calyptra quadrangulari, foliis in bulbi formam congestis. *R. Syn.* 101.
Muscus capillaris, s. *adiantum aureum minus*. *Ger. Em.* 1559.
Polytrichon aureum minus. *Park.* 1052.
Anglis, yellow Bryum.
Habitat in sylvis, ericetis, hortis et ad semitas. IV.
- serpyllifl- lium.* 41. BRYUM antheris pendulis, pedunculis aggregatis, foliis patentibus pellucidis.

- Mnium pedunculis aggregatis, foliis obovatis integer- puncta-
rimis obtusis punctatis. *Sp. pl.* 1113. tum.
- Bryum pendulum terpillofolio rotundiore pellucido,
capsulis ovatis. *Dill. musc.* 416. t. 53. f. 81.
- Bryum nitidum serpilli rotundis et latioribus foliis pel-
lucidis. *R. Syn.* 103.
- Muscus polytrichoides palustris major, serpilli latiori
folio pellucido. *Hist. ox. III.* 627. f. 15 t. 6. f.
39, 40.
- β Mnium pedunculis aggregatis foliis alternis acutis ser- cuspida-
ratis. *Sp. pl.* 1113. tum.
- Bryum pendulum, fo iis variis pellucidis capsulis ova-
tis. *Dill. musc.* 413. t. 53. f. 79.
- γ Bryum pendulum, serpilli folio longiore pellucido,
capsulis oblongis cuspidatis. *Dill. musc.* 416. t.
53. f. 80.
- δ Mnium pedunculis aggregatis foliis rosaceo-congestis prolife-
lanceolatis acutis. *Sp. pl.* 1113. rum.
- Bryum stellare roseum majus capsulis ovatis pendulis.
Dill. musc. 411. t. 52. f. 77.
- Bryum roseum majus, foliis oblongis. *R. Syn.* 92.
- Muscus coronatus humilis, foliolis latioribus stellatim
nascentibus donatus. *Hist. ox. III.* 630. f. 15. t.
7. f. 9.
- ϵ Bryum stellare roseum pendulum minus, capsulis et
setis longioribus. *Dill. musc.* 412. t. 52. f. 78.
- Bryum roseum minus, foliis subrotundis. *R. Syn.* 92.
- Muscus parvus stellaris. *Baub. pin.* 361. *Ger. Em.*
1563 *Park.* 1308.
- ζ Mnium pedunculis aggregatis, foliis oblongis undula- undula-
tis. *Sp. pl.* 1113 tum.
- Bryum dendroides polycephalon, phylltidis folio un-
dulato pellucido, capsulis ovatis pendulis. *Dill.*
musc. 410. t. 52. f. 76.
- Bryum nitidum foliis oblongis undulatis, capitulis cer-
nuis arbusculam referens. *Cat. giss.* 227. *R. Syn.*
103.
- Muscus ad polytrichoidem accedens ramosus, foliis
longis lucidis et veluti crispis. *Hist. ox. III.* 630.
f. 15 t. 6. f. 1.
- Anglis*, Thyme-leaved Bryum.
- Habitat in sylvis et ericetis humidiusculis. III, IV.

HYPNUM. 1058.

Anthera operculata. Calyptra lavis. Filamentum laterale ortum e perichaetio.

Fem. Pistilli solitarii, ex alis foliorum, nudæ plurimulæ.

* *Frendibus pinnatis.*

bryoides. 1. HYPNUM fronde simplicissima pinnata lanceolata apice pedunculifera. Sp. pl. 1123. Fl. suec. 1012.

Hypnum taxiforme exiguum, versus summitatem capsuliferum. Dill. musc. 262. t. 34. f. 1.

Hypnum repens filicifolium non ramosum, pediculis brevibus versus foliorum summitatem egredientibus. R. Syn. 88.

Muscus polytrichoides exiguus, capitulis in extremis caulinis s. foliis, subrotundis erectis. Hist. ox. III. 629. f. 15. t. 6. f. 11.

Anglis, Fern Hypnum.

Habitat in umbrosis et ad sepes. II.

taxifolium 2. HYPNUM fronde simplicissima pinnata lanceolata basi pedunculitera. Sp. pl. 1122. Fl. suec. 1013.

Hypnum taxiforme minus, basi capsulifera. Dill. musc. 263. t. 34. f. 2.

Hypnum repens filicifolium non ramosum, pediculis brevioribus ad radicem egredientibus. R. Syn. 88.

Muscus pennatus, capitulis adianti. Vail. paris. 136. t. 24. f. 11.

Anglis, Yew-leaved Hypnum.

Habitat in sylvis et umbrosis. II.

denticulatum. 3. HYPNUM fronde pinnata simplici : pinnis duplicatis, basi pedunculifera. Sp. pl. 1122. Fl. suec. 1014.

Hypnum denticulatum pennatum, pinnulis duplicatis recurvis. Dill. musc. 266. t. 34 f. 5.

Hypnum repens filicifolium non ramosum, pediculis et capitulis longioribus ad radicem egredientibus, foliolis utrinque duplicatis. Cat. gif. 218. R. Syn. 88.

Muscus

Muscus pennatus capitulis adianti. *Hist. ox. III.*
626. f. 15. t. 6. f. 36.

Anglis, Feathered Hypnum.

Habitat in sylvis et umbrosis humidis. IV.

4. HYPNUM fronde pinnata ramosa procumbens: fo- *sylvati-*
liolis acutis, medio pedunculifera. *cum.*

Hypnum denticulatum pennatum, pinnulis simplicibus
rectioribus. *Dill. musc. 267. t. 34. f. 6*

Hypnum repens filicifolium ramosum, pedunculis et
capitulis longioribus e foliorum alis egredientibus,
foliolis utrinque simplicibus. *R. Syn. 88.*

Anglis, Wood Hypnum.

Habitat in sylvis ad arborum radices. IV.

5. HYPNUM fronde pinnata ramosa erecta medio pe- *adiantoi-*
dunculifera. *Sp. pl. 1123.* *des.*

Hypnum taxiforme palustre ramosum majus et erec-
tum. *Dill. musc. 264. t. 34. f. 3.*

Hypnum erectum filicifolium ramosum, pinnulis acu-
tis. *R. Syn. 87.*

Muscus taxiformis ramosus. *Vaill. parif. 136. t. 28.*
f. 5.

Anglis, upright Hypnum.

Habitat in paludosis. III.

6. HYPNUM fronde pinnata ramosa: foliolis imbrica- *complanata-*
tis acutis complicatis compressis. *Sp. pl. 1123. Fl. tum.*
fuec. 1015.

Hypnum pennatum compressum et splendens, capsu-
lis ovatis. *Dill. musc. 268. t. 34. f. 7.*

Hypnum repens filicifolium ramosum, ramulis appres-
sis et magis complanatis. *Cat. giff. 218. R. Syn.*
87.

β *Hypnum pennatum trichomanoides splendens ramosum.* *Dill. musc. 269. t. 34. f. 8.*

Hypnum erectum filicifolium ramosum pinnulis obtu-
sis. *R. Syn. 87.*

Anglis, Flat Hypnum.

Habitat ad truncos arborum in sylvula Hampstead
Wood dicta. III. IV.

CRYPTOGAMIA MUSCI.

** *Surculis vagis.*

lucens.

7. HYPNUM surculis ramosis, frondibus subpinnatis foliolis punctatis. *Sp. pl.* 1124.

Hypnum pennatum aquaticum lucens, longis latisque foliis. *Dill. musc.* 270. t. 34 f. 10

Hypnum repens filicifolium ramosum, foliolis majoribus magisque crebris. *R. Syn.* 88.

Anglis, shining Hypnum.

Habitat in umbrosis uidis et ad fossas sed rarius. III.

undula-
tum.

8. HYPNUM surculis ramosis, frondibus subpinnatis, foliolis undulatis complicatis. *Sp. pl.* 1124.

Hypnum pennatum undulatum, lycopodii instar sparsum. *Dill. musc.* 271. t. 36. f. 11.

Hypnum repens crispum, cauliculi compressis, lycopodii in morem per terram sparsis. *R. Syn.* 88.

Anglis, waved Hypnum.

Habitat in sylvis, in Bishop's-Wood, Hampstead, Mr. Buddle. *R. Syn.* V.

crispum.

9. HYPNUM surculis ramosis, frondibus subpinnatis : foliolis undulatis planis. *Sp. pl.* 1124.

Hypnum pennatum undulatum crispum, setis et capsulis brevibus. *Dill. musc.* 273. t. 36. f. 12.

Hypnum repens crispum, ramulis compressis, filicinorum more dispositis. *Cat. giss.* 217. *R. Syn.* 89.

Anglis curled Hypnum.

Habitat ad ripam Thameis prope Gravesend, D. Duddy. *R. Syn.* in rupe S. Vincentii prope Eristolium. *Dill.* III.

triquet-
rum.

10. HYPNUM ramis vagis recurvis, foliis ovatis recurvatis patulis. *Sp. pl.* 1124. *Fl. suec.* 1016.

Hypnum vulgare triangulum maximum et pallidum, *Dill. musc.* 293. t. 38. f. 28.

Hypnum repens triangularibus majoribus et pallidioribus foliis. *Cat. giss.* 219. *R. Syn.* 80.

Anglis, triangular Hypnum.

Habitat in sylvis et jepitus. II.

11. HYPNUM surculis vagis ramosissimis, ramis fili- *fliciforme*.
formibus, antheris obliquis.
Hypnum sericeum ramosius et tenuius capsulis acumi-
natis. *Dill. musc.* 327. *t.* 42. *f.* 62.
Hypnum repens trichoide terrestre, priori viridius et
minus, capitulis cernuis minus tumidis. *Cat. gif.*
216. *R. Syn.* 84.
Usnea seu Muscus crano humano innatus. *Dood.*
R. Syn. ed. II. 36.
Anglis, green Hypnum.
Habitat in truncis arborum. II.
12. HYPNUM ramis vagis subrepentibus, foliolis ova- *rutabu-*
lum.
tis mucronatis imbricatis. *Sp. pl.* 1124.
Hypnum dentatum vulgatissimum, operculis obtusis.
Dill. musc. 295. *t.* 38. *f.* 29.
Hypnum repens triangularibus angustioribus foliis.
R. Syn. 80.
Muscus denticulatus minor sericeus nostras, capitulis
adianti. *Hist. ox.* III. 626. *f.* 15. *t.* 6. *f.* 35.
β Hypnum palustre erectum breve, foliis brevibus an-
gustis tenuibus confertis. *Cat. gif.* 219. *R. Syn.*
83.
γ Hypnum vulgare dentatum, operculis cuspidatis.
Dill. musc. 297. *t.* 38. *f.* 30.
Hypnum repens, triangularibus minoribus foliis pedi-
culis et capitulis brevioribus et tumidioribus, minus.
R. Syn. 80.
Anglis, Toothed Hypnum.
Habitat in ericetis, sylvis et sepibus. XII.
13. HYPNUM surculis vagis procumbentibus, foliis su- *luteosens*.
bulatis, antheris obliquis.
Hypnum sericeum, surculis longioribus et rectioribus,
capsulis incurvis. *Dill. musc.* 325. *t.* 42. *f.* 60.
Anglis, yellow Hypnum.
Habitat in collibus cretaceis inter Northfleet et Grave-
end. *Dill.* I, II.

CRYPTOGAMIA MUSCI.

*** *Surculis pennatis.*

- filicinum.* 14. HYPNUM surculis pennatis: ramulis distantibus, foliis imbricatis incurvis acutis secundis. *Sp. pl. 1125. Fl. suec. 1017.*
Hypnum repens filicinum crispum. R. Syn. 85.
Dill. musc. 282. t. 36. f. 19.
 β *Hypnum repens filicinum, trichoides palustre. R. Syn. 83 Dill. musc. 286. t. 35. f. 21.*
 γ *Hypnum repens trichoides palustre vernum fuscum capitulis oblongis incurvis. R. Syn. 85.*
Anglis, Bog Hypnum.
Habitat in palustribus. III.
- proliferum.* 15. HYPNUM surculis proliferis plano-pinnatis, pendunculis aggregatis. *Sp. pl. 1125. Fl. lapp. 405. suec. 1018.*
Hypnum filicinum, tamarisci foliis minoribus non splendentibus. Dill. musc. 276. t. 35. f. 14.
Hypnum repens filicinum minus, luteo-virens. Cat. giss. 217. R. Syn. 86.
Anglis, Proliferous Hypnum.
Habitat in ericetis et sylvis. II.
- parietinum.* 16. HYPNUM surculis plano-pinnatis continuatis, pendunculis aggregatis *Fl. lapp. 406. suec. 1020. Sp. pl. 1125.*
Hypnum filicinum, tamarisci foliis majoribus splendentibus. Dill. musc. 274. t. 35. f. 13.
Hypnum repens filicinum, veluti spicatum. Cat. giss. 217. R. Syn. 86.
Muscus filicinus major. Ger. Em. 1561. Park. 1309. Bauh. pin. 360.
Anglis, Wall Hypnum.
Habitat in sylvis et umbrosis. III.
- praelongum.* 17. HYPNUM surculis subpinnatis decumbentibus: ramulis remotis, foliis ovatis, antheris cernuis. *Sp. pl. 1125. Fl. suec. 1021.*

Hypnum

Hypnum filicinum, triangularibus parvis foliis, præ-longum. *Cat. giss.* 219. *R. Syn.* 80. *Dill. musc.* 278. *t.* 35. *f.* 15.

Anglis, Trailing Hypnum.

Habitat in arborum truncis, lignis putrescentibus et terris. II, III.

18. HYPNUM surculis pinnatis repentibus, ramis con-plumosum, fertis foliis imbricatis subulatis, antheris erectis.

Hypnum repens filicinum plumosum. *R. Syn.* 86.

Dill. musc. 280. *t.* 35. *f.* 16.

Muscus sericeus quidam, forte arboreus. *Baub. hist.* III. 765.

Anglis, Winged Hypnum.

Habitat in muris lateritiis circa Londinum, et ad arborum truncos et radices in sylva Enfieldensi. II.

19. HYPNUM surculis pinnatis: rami approximatis: apicibus recurvis. *Fl. suec.* 1022. *Sp. pl.* *crista castrif. 1125.*

Hypnum filicinum, cristam castrensem repræsentans.

Dill. musc. 284. *t.* 36. *f.* 20.

Muscus filicifolius luteus, folio crasso et undulato.

D. Richardson. *R. Syn.* 86. *sub num.* 32.

Muscus terrestris repens subflavus, foliolis cristis minoribus, ramulisque densius confertis. *Hist. ox.*

III. 625. f. 15. t. 5. f. 12.

Muscus cristam castrensem repræsentans, flavescens nemorosus ramosus cassubicus. *Hist. ox.* *III. 625.*

f. 15. t. 5. f. 8.

Anglis, crested Hypnum.

Habitat in collibus cretaceis inter Gravesend et Northfleet in Cantio. *Dill.* II.

20. HYPNUM surculis pinnatis compressis: foliis acutis incurvis, antheris erectiusculis ovatis. *compressum.*

Hypnum filicinum sericeum, molle et pallidum mucronibus aduncis. *Dill. musc.* 286. *t.* 36. *f.* 22.

Hypnum arboreum erectum, fruticuli specie ramulis compressis. *Cat. giss.* 220.

Anglis, Shrubby Hypnum.

Habitat in arborum truncis in sylva prope Tottenham non longe a Londino. *Dill.* IV.

abieti- 21. HYPNUM surculis pinnatis teretiusculis remotis in-
num. æqualibus. *Fl. lapp.* 408. *suec.* 1023. *Sp. pl.*
 1126.

Hypnum lutescens, alis subulatis tenacibus. *Dill.*
musc. 280. *t. 35. f. 17.*

Hypnum repens filicinum trichoides montanum, ra-
 mulis teretibus lutescentibus non divisis. *Cat. giss.*
 218. *R. Syn.* 86.

Muscus terrestris surculis filamentosis tenacibus abie-
 tinis, semel tantum divisis. *Hift. ox.* III. 626.
f. 15. t. 5. f. 22.

Anglis, Firr Hypnum.

Habitat in montosis. In comitatu Oxoniensi.

**** *Foliis reflexis*

cupressi- 22. HYPNUM surculo subpinnato, foliis secundis re-
forme. curvis apice subulatis. *Fl. suec.* 1024. *Sp. pl.*
 1126.

Hypnum ciispum cupressiforme, foliis aduncis. *Dill.*
musc. 287. *t. 37. f. 23.*

Hypnum repens crispum cupressiforme. *R. Syn.* 89.
 § *Hypnum repens trichoides terrestre*, foliolis uno versu
 dispositis. *R. Syn.* 85.

Anglis, Cypress Hypnum.

Habitat in sylvis ad radices arborum. II.

aduncum. 23. HYPNUM surculo erectiusculo subramoso, foliis
 secundis recurvis subulatis ramis recurvatis. *Sp.*
pl. 1126. *Fl. suec.* 1025.

Hypnum palustre erectum summitatibus aduncis. *R.*
Syn. 82. *Dill. musc.* 292. *t. 37. f. 26.*

Anglis, hooked Hypnum.

Habitat in palustribus. V.

scorpioides 24. HYPNUM ramis vagis procumbentibus recurvis,
 foliis secundis acuminatis. *Sp. pl.* 1127. *Fl. suec.*
 1026

Hypnum scorpioides palustre magnum, Lycopodii in-
 star sparum. *Dill. musc.* 290. *t. 37. f. 25.*

Anglis, Scorpion hypnum.

Habitat

Habitat in paludibus. Prope Bishop's-Castle in agro Salopiensi, et circa Pentir, tribus milliaribus a monte Glyder in Wallia. Dill.

25. HYPNUM surculis repentibus, ramis vagis tereti *viticulobus*, foliis patulis acuminatis. *Sp. pl.* 1127. *sum.*

Hypnum subhirsutum, *viticulis gracilibus erectis*, *capulis teretibus*. *Dill. musc.* 307. *t. 39. f. 43.*

Hypnum repens trichoides arboreum majus, *capsulis et surculis erectis*, *minus ramosis*. *Cat. giss.* 216. *R. Syn. 85.*

Muscus montanus, *flagellis longis tenuibus cupressinisis*, *ut plurimum indivisis*. *Hist. ox.* III. 624. *f. 15. t. 5. f. 7.*

Anglis, Mountain Hypnum.

Habitat in arborum *stipitibus* et ericetis. In *collibus cretaceis* inter Northfleet et Gravesend in Cantio. *Dill.* III.

26. HYPNUM ramis vagis, foliis ovatis apice sub

- squarro-latis* undique reflexis. *Fl. suec.* 1727. *Sp. pl. sum. 1127.*

Hypnum repens, *triangularibus reflexis foliis*, *majus*. *R. Syn. 82. Dill. musc. 303. t. 39. f. 38.*

Muscus terrestris erectior, *foliis reflexis*. *Hist. ox.* III. 624. *f. 15. t. 5. f. 2.*

β *Hypnum repens*, *triangularibus reflexi foliis*, *minus*. *R. Syn. 82. Dill. musc. 304. t. 39. f. 39.*

Anglis, common Hypnum.

Habitat in pratis humidis. IV.

27. HYPNUM surculis repentibus, ramis vagis *erectis*, *foliis secundis*, *antheris subrotundis*. *Sp. pl. 1127.*

Hypnum lorenii montanum, *capsulis subrotundis*. *Dill. musc. 305. t. 39. f. 40.*

Hypnum repens, *surculis magis erectis*, *foliis reflexis longioribus cinctis*, *operculo capituli magno*. *R. Syn. 82.*

Muscus terrestris vulgaris. *Ger. Em.* 1370. *alter. Park.* 1306.

Muscus

CRYPTOGAMIA MUSCI.

Muscus repens major, foliis et flagellis longis et tenuibus donatus. *Hist. ox. III. 626. f. 15. t. 5. f. 24.*

Anglis, Ground Hypnum.

Habitat in montosis prope Glocestriam. D. Cole. Dill.

***** *Surculis dendroidibus.*

dendroides 28. *HYPNUM surculo erecto, ramis fasciculatis terminalibus simpliciusculis, antheris erectis.* *Fl. suec. 1028. Sp. pl. 1128.*

Hypnum dendroides sericeum, setis et capsulis longioribus erectis. *Dill. musc. 313. t. 40. f. 48.*

Hypnum erectum arbusculam referens, ramulis subrotundis, confertim nascentibus. *R. Syn. 81.*

Muscus dendroides elatior, ramulis crebris minus surculosis capitulis pedunculis brevibus, insidentibus. *Hist. ox. III. 626. f. 15. t. 5. f. 31.*

Anglis, Tree Hypnum.

Habitat in sylvis subhumidis. III.

*alopecu- 29. *HYPNUM surculo erecto, ramis fasciculatis terminalibus subdivisis antheris nutantibus.* Sp. pl. 1128. Fl. suec. 1029.*

Hypnum dendroides obscurius, setis et capsulis brevioribus nutantibus. *Dill. musc. 315. t. 41. f. 49.*

Hypnum palustre erectum arbusculam referens, ramulis subrotundis. *Cat. giss. 220. R. Syn. 81.*

Muscus dendroides sylvarum erectus ramulis kali æmulis, radice repente. *R. Syn. ed. II. 32. Hist. ox. III. 626. f. 15. t. 5. f. 30.*

Anglis, Fox-tail Hypnum.

Habitat in sylvis et nemorosis humidiusculis. IV.

***** *Surculis teretiusculis.*

*curtipen- 30. *HYPNUM surculis vagis teretibus, foliis ovatis acutis patulis, antheris pendulis.* Fl. suec. 1030. dulum. Sp. pl. 1128.*

Hypnum dentatum curtipendulum, viticulis rigidis. *Dill. musc. 333. t. 43. f. 69.*

Hypnum

Hypnum arboreum repens, capsulis reflexis, brevibus pediculis insidentibus. Cat. giss. 220. R. Syn. 89.

Anglis, pendulous Hypnum.

Habitat ad radices arborum et in locis saxosis. II.

31. HYPNUM surculis pinnato-sparsis subulatis, foliis purum.
ovatis obtusis conniventibus. Fl. suec. 1031. Sp.
pl. 1128.

Hypnum ramis inæqualibus sparsis, foliis ovatis imbricatis, capsulis obliquis. Fl. lapp. 410.

Hypnum cupressiforme vulgare, foliis obtusis. Dill.
musc. 309. t. 40. f. 45.

Hypnum terrestre erectum, ramulis teretibus, foliis inter rotunda et acuta medio modo se habentibus.
Cat. giss. 220. R. Syn. 81.

β *Hypnum cupressiforme tenuius et compressius.* Dill.
musc. 312. t. 40. f. 47.

Hypnum longum erectum, foliis angustis caulinibus ap-
pressis. R. Syn. 83.

Anglis, Meadow Hypnum.

Habitat in sylvis et pascuis. II.

32. HYPNUM surculis ramisque vagis teretibus erecti-illecebrum.
usculis obtusis. Sp. pl. 1129. Fl. suec. 1032.

- *Hypnum cupressiforme rotundius vel Illecebræ æmulum.* Dill. musc. 311. t. 40. f. 46.

Hypnum terrestre erectum, ramulis teretibus, foliis subrotundis albo-virentibus cinctis. Cat. giss. 220.
R. Syn. 81.

Muscus terrestris, surculis kali geniculati aut illecebræ æmulis, foliolis subrotundis, squamatim incumbe-
tibus. R. Syn. ed II. 37. Hist. ox. III. 626.

Anglis, geniculated Hypnum.

Habitat in ericetis. III, IV.

33 HYPNUM surculis teretibus ramosis, foliis acutis riparium.
patulis distantibus. Sp. pl. 1129. Fl. suec. 1033.

- *Hypnum aquaticum, flagellis et teretibus et pennatis.*
Dill. musc. 308. t. 40. f. 44.

Hypnum ramosum fluitans pennatum. R. Syn. 81.

Anglis, floating Hypnum.

Habitat

CRYPTOGAMIA MUSCI.

Habitat in fluvio prope Hackney, et ad ripam Thamesis supra Londonum. Dill. XII. I.

- cuspidatum.* 34. HYPNUM surculis vagis: apice foliis convolutis acuminato. Sp. pl. 1129. Fl. suec. 1035.
Hypnum palustre extremitatibus cuspidatis et pungentibus. Dill. musc. 300. t. 39. f. 34.
Hypnum repens palustre, foliis triangularibus per caules expansis extremitatibus convolutis et acuminatis. Cat. giss. 219. R. Syn. 82.
Anglis, pointed Hypnum.
 Habitat in palustribus. III, IV.

***** Surculis confertis.

- sericeum.* 35. HYPNUM surculo repente, ramis confertis erectis, foliis subulatis, antheris erectis. Sp. pl. 1129. Fl. lapp. 412. suec. 1036.
Hypnum vulgare sericeum recurvum, capsulis erectis cuspidatis. Dill. musc. 323. t. 42. f. 59.
Hypnum repens trichoides terrestre, luteo-virens vulgare majus, capitulis erectis. Cat. giss. 215. R. Syn. 84.
Muscus terrestris luteo-viridis, sericeus, repens. R. Syn. ed. II. 38. Hist. ox. III. 626. f. 15. t. 5. f. 25.
Anglis, silky Hypnum.
 Habitat in muris, truncis arborum et pascuis. XII, I.

- velutinum.* 36. HYPNUM surculo repente, ramis confertis erectis, foliis subulatis, antheris subnutantibus. Fl. suec. 1037. Sp. pl. 1129.
Hypnum velutinum, capsulis ovatis cernuis. Dill. musc. 326. t. 42. f. 61.
Hypnum repens trichoides terrestre viridius minus, capitulis tumidioribus cernuis. Cat. giss. 216. R. Syn. 84.
 38 *Hypnum repens trichoides terrestre* minimum et breve, capitulis tumidioribus cernuis. R. Syn. 84.
Anglis, Velvet Hypnum.
 Habitat in umbrosis et ad sepes. II.

37. HYPNUM surculo repente, ramis confertis erectis, *palustre*.
foliis ovatis, antheris erecticulis.

Hypnum heterophyllum aquaticum polycephalum, repens. *Dill. musc.* 293. *t. 37. f. 27.*

Hypnum repens filicifolium ramosum, ramulis surrectis et minus complanatis. *Cat. giss.* 218. *R. Syn. 87.*

Anglis, Marsh Hypnum.

Habitat *ad ripam Thamesis propé Batterseam.* I, II.

38. HYPNUM surculis repentibus, ramis filiformibus, *serpens*.
foliis oblitteratis. *Sp. pl.* 1130.

Hypnum trichoides serpens, setis et capsulis longis erectis. *Dill. musc.* 329 *t. 42. f. 64.*

Hypnum repens trichoides terrestre minimum, capitulis majusculis, oblongis erectis. *Cat. giss.* 216. *R. Syn. 85.*

Muscus terrestris omnium minimus, capitulis majusculis oblongis erectis. *Hist. ox.* III. 626. *f. 15. t. 5 f. 14. 21.*

Anglis, creeping Hypnum.

Habitat *in racemosis et ad radices arborum.* IV.

39. HYPNUM surculis erectis ramosis incurvatis. *Sp. sciuroides.*
pl. 1130.

Hypnum arboreum sciuroides. *Dill. musc.* 319. *t. 41. f. 54.*

Hypnum trichoides erectum, ramulis recurvis, obscuri coloris. *R. Syn. 83.*

Anglis, Squirrel-tail Hypnum.

Habitat *in arborum truncis.* II, IV.

40. HYPNUM surculis ramosissimis : ramis subulatis u-*myosuroides*-
trinque attenuatis teretibus. *Sp. pl.* 1130. *des.*

Hypnum myosuroides tenuius, capsulis nutantibus.

Dill. musc. 317. *t. 41. f. 51.*

Hypnum polyanthon, triangularibus angustis foliis.

R. Syn. 83.

Muscus trichoides humilis ramosus, capitulis oblongis tumidiusculis donatus. *Hist. ox.* III. 628. *f. 15. t. 6. f. 3.*

β Hyp.

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

- β Hypnum myosuroides crassius, capsulis erectis. Dill. musc. 316. t. 41. f. 50.
 Hypnum repens triangularibus angustis foliis, ramulis subrotundis. R. Syn. 83.
 γ Hypnum myosuroides brevius et crassius, capsulis cernuis. Dill. musc. 318. t. 41. f. 52.
 δ Hypnum myosuroides sericeum tenuius, capsulis erectis. Dill. musc. 318. t. 41. f. 53.
Anglis, Mouse-tail Hypnum.
 Habitat in sylvis locis saxosis et muris. II.

- ornithopo-* 41. HYPNUM surculis repentibus, ramis fasciculatis teretibus erectiusculis, antheris erectis ovatis.
ides. Hypnum gracile ornithopoides. Dill. musc. 320. t. 41. f. 55.
Anglis, Bird's-foot Hypnum.
 Habitat in Fagis in saltu Enfieldensi copiose; ad saxa per campas elatos Grey-Weathers dictos. S. Brewer. IV.

- clavella-* 42. HYPNUM repens, ramulis erectis confertissimis, antheris incurvis : operculis inflexis. Sp. pl. 1130.
tum. Hypnum clavellatum parvum repens, setis brevibus. Dill. musc. 551. t. 81. f. 17.
Anglis, Club Hypnum.
 Habitat in arborum truncis et lignis putridis passim. XII.

A L G Æ.

J U N G E R M A N N I A.

Masc. pedunculatus, nudus. *Anthera* quadrivalvis.
Fem. sessilis, nudus, seminibus subrotundis.

* Frondibus pinnatis secundis.

- asplenioi-* 1. JUNGERMANNIA frondibus simpliciter pinna-tis : foliolis ovatis subciliatis. Sp. pl. 1131.
 Lichenastrum asplenii facie, pinnis laxioribus. Dill. musc. 482. t. 69. f. 5.
 β Lichenastrum asplenii facie, pinnis confertioribus. Dill. musc. 483. t. 69. f. 6.

Liche-

Lichenastrum trichomanis facie, capitulis e foliorum summitatæ enascentibus, majus. *R. Syn.* 112.

Muscus trichomanoides, foliis rotundioribus pellucidis, squamatim conjuncte sibi incumbentibus. *Hist. ox.* III. 627. *f. 15. t. 6. f. 42.*

Anglis, Spleenwort Jungermannia.

Habitat in sylvis et umbrosis humidis. II.

2. *JUNGERMANNIA* frondibus simpliciter pinnatis : *viticulosa*.
foliolis subulatis. *Sp. pl.* 1131.

Jungermannia terrestris, viticulis longis, foliis perexiguis densissimis ex rotunditate acuminatis. *Mich. gen.* 8. *t. 5. f. 4.*

Lichenastrum trichomanis facie e basi et medio florens.
Dill. musc. 484. *t. 69. f. 7.*

Lichenastrum capitulis nudis, *trichomanis* facie, foliolis densius congestis majus. *Cat. giss.* 211. *R. Syn.* 111.

Anglis, straggling Jungermannia.

Habitat in sylvis et umbrosis in comitatu Eboracensi,
D. Richardson; circa Slingfoldiam in Sussexia.
Dill. IV.

3. *JUNGERMANNIA* fronde pinnata simplici basi flo- *multiflora*.
rifera, foliolis acutis.

Lichenastrum multiflorum exile, foliis angustissimis.
Dill. musc. 481. *t. 69. f. 4.*

Anglis, Many-flowered Jungermannia.

Habitat in sylvula collis Shooter's-hill dicti prope Londonum. *Dill. musc.* III.

4. *JUNGERMANNIA* frondibus simpliciter pinnatis : *polyanthos*.
foliolis integerrimis imbricatis convexis. *Sp. pl.* 1131.

Jungermannia palustris repens, foliis densissimis ex rotunditate acuminatis. *Mich. gen.* 8. *t. 5. f. 5.*

Lichenastrum trichomanis facie, *polyanthemum* breve et repens. *Dill. musc.* 486. *t. 70. f. 9.*

Anglis, imbricated Jungermannia.

Habitat in palustribus; in Lead-hill in Surreja. IV.

- lanceolata*. 5. JUNGERMANNIA frondibus simpliciter pinnatis lanceolatis apice floriferis, foliolis integerimis. Sp. pl. 1131
Jungermannia palustris minima repens, foliis subrotundis densissimis lâete virentibus. Mich. ged. 8. t. 5. f. 6.
Lichenastrum trichomanis facie minus, ab extremitate florens. Dill. musc. 486. t. 70. f. 10.
Lichenastrum capitulis nudis, *trichomanis facie*, foliolis densius congestis, minus. Cat. giss. 212. R. Syn. 112.
Anglis, Spear-leaved Jungermannia.
Habitat in umbrosis humidis. II.
- bidentata*. 6- JUNGERMANNIA frondibus simpliciter pinnatis apice floriferis, foliolis bidentatis. Sp. pl. 1132.
Jungermannia major repens, foliis bifidis. Mich. gen. 8. t. 5. f. 12.
Lichenastrum pinnulis acutioribus et concavis, bifidis, majus. Dill. musc. 487. t. 70. f. 11.
Lichenastrum trichomanis facie, foliolis bifidis, majus. R. Syn. 113.
Muscus lichenoides, foliis pinnatis bifidis, minor. R. Syn Hist. ox. III. 627. f. 15. t. 6. f. 47.
Anglis, Bifid Jungermannia.
Habitat in sylvis et ericetis humidiusculis. X, XI.
- bicuspidata*. 7. JUNGERMANNIA frondibus simpliciter pinnatis medio floriferis, foliolis bidentatis. Sp. pl. 1132.
Jungermannia minima repens, foliis bifidis, vagina florum cylindracea. Mich. gen. 9. t. 6. f. 17.
Lichenastrum pinnulis acutissime bifidis, minimum. Dill. musc. 488. t. 70. f. 13.
Lichenastrum trichomanis facie, foliolis bifidis. Cat. giss. 213 R. Syn. 113
Anglis, forked Jungermannia.
Habitat in umbrosis humidis. III.

** *Frondibus*

8. JUNGERMANNIA fronde pinnata ramosa apice *quinquedentata*
florifera, foliolis apice *quinquedentatis*.

Lichenastrum multifidum majus, ab extremitate flo-
rens. *Dill. musc.* 494. *t. 71. f. 23.*

Lichenastrum trichomanis facie, foliolis multifidis, ca-
pitulis e summis ramulis nascentibus. *R. Syn.* 113.
Anglis, Toothed Lichenastrum.

Habitat in comitatu Eboracensi. *D. Richardson.* IV.

** *Frondibus pinnatis : pinnulis auriculatis superne
tectis.*

9. JUNGERMANNIA frondibus supra bipinnatis apice *undulatis*
floriferis, foliolis subrotundis integrerimis. *Sp. pl.*
1131.

Lichenastrum pinnulis auriculatis majoribus et non cre-
natis. *Dill. musc.* 490. *t. 71. f. 17.*

Anglis, Eared Jungermannia.

Habitat in umbrosis. III.

10. JUNGERMANNIA frondibus supra bipinnatis a- *nemoreæ*
pice floriferis, foliolis ciliatis. *Sp. pl.* 1132.

Lichenastrum auriculatum; pinnis minoribus crenatis.
Dill. musc. 490. *t. 71. f. 18.*

Anglis, Wood Lichenastrum.

Habitat in sylvis udis in comitatu Westmorlandico.
III.

11. JUNGERMANNIA frondibus supra bipinnatis in- *resupinata*
ferne floriferis: foliolis crenulatis imbricatis rotun-
dis. *Sp. pl.* 1132. *Fl. suec.* 1038.

Jungermannia surculosa resupinata, foliolis pinnat-
imbricatis deflexis rotundis integris: auricula late-
rali. *Fl. suec. ed. I.* 926.

Lichenastrum auriculatum, pinnulis rotundis crisptis.
Dill. musc. 491. *t. 71. f. 19.*

Lichenastrum trichomanis facie, capitulis foliorum
summitate enascentibus, medium. *R. Syn.* 112.

Anglis, curled Jungermannia.

Habitat in fissuris rupium. IV.

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

- albicans.* 12. JUNGERMANNIA frondibus supra bipinnatis apice floriferis: foliolis linearibus recurvatis. *Sp. pl.* 1133. *Fl. suec.* 1039.
Lichenastrum auriculatum, pinnulis angustis, planis, recurvis. *Dill. musc.* 492. *t. 71. f. 20.*
Lichenastrum trichomanis facie, capitulis e foliorum summitate enascentibus minus. *R. Syn.* 112.
Anglis, white Jungermannia.
Habitat in sylvis humidis. III.
- trilobata.* 13. JUNGERMANNIA frondibus subtus bipinnatis, foliolis quadratis obsolete trilobis. *Sp. pl.* 1133. *Fl. suec.* 1040.
Jungermannia foliis latiusculis obtusis undulatis et veluti angulosis. *Mich. gen.* 7. *t. 5. f. 10.*
Lichenastrum pinnulis obtuse trifidis nervo geniculato. *Dill. musc.* 493. *t. 71. f. 22.*
Anglis, Trifid Jungermannia.
Habitat in Cambria. *Dill. musc.*
- reptans.* 14. JUNGERMANNIA frondibus subtus bipinnatis apice reptantibus, foliolis quadridentatis. *Sp. pl.* 1133.
Lichenastrum multifidum exiguum ad basin florens per siccitatem imbricatum. *Dill. musc.* 494. *t. 71. f. 24.*
Lichenastrum trichomanis facie, foliolis multifidis, capitulis ex imis cauliculis nascentibus. *R. Syn.* 113.
Anglis, creeping Jungermannia.
Habitat in umbrosis uidis. IV.
- *** *Frondibus imbricatis.*
- complanata.* 15. JUNGERMANNIA furculis repentibus: foliolis inferne auriculatis duplicato-imbricatis, ramis æ qualibus. *Sp. pl.* 1133. *Fl. suec.* 1041.
Lichenastrum imbricatum majus, squamis compressis et planis. *Dill. musc.* 496. *t. 72. f. 26.*
Lichenastrum imbricatum majus. *R. Syn.* 111.
Anglis, Flat Jungermannia.
Habitat ad arborum truncos frequens. IV.

16. JUNGERMANNIA surculis repentibus, foliolis *dilatata*,
inferne auriculatis duplicato-imbricatis, ramis a-
pice latioribus. *Sp. pl.* 1133. *Fl. suec.* 1042.
Lichenastrum imbricatum minus, squamis convexo-
concavis. *Dill. musc.* 497. *t.* 72. *f.* 27.
Lichenastrum imbricatum, minus. *R. Syn.* III.
Anglis, scaly Jungermannia.
Habitat *ad truncos arborum*. III, IV.
17. JUNGERMANNIA foliis imbricatis serie duplo: *tamarisci*
superioribus subrotundis convexis obtusis quadruplo *folia*,
majoribus. *Sp. pl.* 1134. *Fl. suec.* 1043.
Lichenastrum imbricatum tamarisci narbonensis facie,
Dill. musc. 499. *t.* 72. *f.* 31.
Anglis, Tamarisk Jungermannia.
Habitat *in rupibus et truncis arborum comitatu Ebora-*
censi passim. III.
18. JUNGERMANNIA surculis procumbentibus sub- *platyphylla*,
tus imbricatis, foliolis cordatis acutis. *Sp. pl.* 1134. *la.*
Lichenastrum arboris vitæ facie, foliis minus rotun-
dis. *Dill. musc.* 501. *t.* 72. *f.* 32.
Muscus muralis floridus, foliis subrotundis creberri-
me imbricatum dispositis. *Hist. ox.* III. 627. *f.*
15. *t.* 6. *f.* 44.
Anglis, Wall Jungermannia.
Habitat *ad truncos arborum et muros*. III, IV.
19. JUNGERMANNIA surculis repentibus, foliolis *ciliaris*,
duplicato-imbricatis, inferne auriculatis ciliatis.
Sp. pl. 1134. *Fl. suec.* 1044.
Lichenastrum filicinum pulchrum villosum. *Dill.*
musc. 503. *t.* 73. *f.* 35.
Lichenastrum filicinum crispum. *R. Syn.* III.
Anglis, Fern Jungermannia.
Habitat *in ericetis nolis et ad rivulos; in comitatu E-*
boracensi, D. Richardson. Found by Mr. Dan-
dridge in a small Current of Water, which runs
through a Wood called Old-fall, between Highgate
and Muscle-hill. *R. Syn.* IV.

- varia.* 20. JUNGERMANNIA furculis erectiusculis bifarium imbricatis, foliolis bipartitis. *Sp. pl.* 1135.
Lichenastrum foliis variis. *R. Syn.* 113. *Dill. musc.* 505. *t.* 73. *f.* 36.
Anglis, upright Jungermannia.
Habitat in sylvis et umbrosis humidis. III.
 ***** *Surculis undique imbricatis foliolis sparsis.*
- julacea.* 21. JUNGERMANNIA furculis teretibus, foliolis undique imbricatis, floribus pedunculatis. *Sp. pl.* 1135.
Lichenastrum alpinum *Bryi juliacei* argentei facie, *Dill. musc.* 506. *t.* 73. *f.* 38.
Anglis, round Jungermannia.
Habitat in rupibus uidis, in montibus Snowdon et Glyder. *Dill. IX.*
- rufeflris.* 22. JUNGERMANNIA furculis teretibus, foliolis subulatis secundis. *Sp. pl.* 1135. *Fl. suec.* 1045.
Lichenastrum alpinum *nigricans*, foliis capillaceis reflexis. *Dill. musc.* 507. *t.* 73. *f.* 40.
Anglis, Rock Jungermannia.
Habitat in rupibus humentibus in montibus Snowdon et Glyder in Arvonia. *Dill. IV. V.*
- trichophylla.* 23. JUNGERMANNIA furculis teretibus foliolis capillaceis æqualibus. *Sp. pl.* 1135. *Fl. suec.* 1046.
Lichenastrum trichoides minimum, in extremitate florens. *Dill. musc.* 505. *t.* 73. *f.* 37.
Anglis, hairy Jungermannia.
Habitat in ericetis turfosis prope North Bierly in comitatu Eboracensi, D. Richardson.
- alpina.* 24. JUNGERMANNIA furculis teretibus, foliolis ovatis patentibus, calycibus imbricatis. *Sp. pl.* 1135.
Lichenastrum alpinum atro-rubens teres, calycibus squamosis. *Dill. musc.* 506. *t.* 73. *f.* 39.
Anglis, Mountain Jungermannia.
Habitat in palustribus montosis; in montibus Snowdon Llanberris et Cader Idæris. *Dill. IX. X.*

***** *Acaule*

***** *Acaules frondibus simplicibus.*

25. JUNGERMANNIA acaulis, foliolis frondi innato. *epiphylla.*
Sp. pl. 1135. Fl. suec. 1047.
*Lichenastrum capitulis rotundis, e foliorum medio
 enascentibus. R. Syn. 110. Dill. musc. 508. t.
 74. f. 41.*
Lichen petræus, cauliculo calceato. Bauh. pin. 362.
Lichen alter minor, folio calceato. Park. 1314.
Anglis, broad-leaved Jungermannia.
Habitat in umbrosis uidis et ad rivulos. III.
26. JUNGERMANNIA acaulis, fronde oblonga sinu-*pinguis.*
ata pingui. Sp. pl. 1136. Fl. suec. 1048.
*Lichenastrum capitulis oblongis, juxta foliorum divi-
 suras enascentibus. R. Syn. 110. Dill. musc. 509.
 t. 74. f. 42.*
Anglis, jagged Jungermannia.
Habitat in paludibus. IV.
27. JUNGERMANNIA acaulis, fronde bipinnatifida. *multifida.*
Sp. pl. 1136. Fl. suec. 1049.
*Lichenastrum ambrosiæ divisura. R. Syn. 111. Dill.
 musc 511. t. 74. f. 43.*
Anglis, dwarf Jungermannia.
*Habitat in sylvis et umbrosis humidis. In sylvula Cane-
 wood dicta prope Hampstedum. D. Doody. prope
 Charlton in Cantio. Dill. IV.*
28. JUNGERMANNIA acaulis, fronde linearis *ramo-furcate.*
*fa : extremitatibus furcatis obtusiusculis. Sp. pl.
 1136.*
*Lichenastrum tenuifolium furcatum, thecis globosis
 pilosis. Dill. musc. 512. t. 74. f. 45.*
*Ulva saxatilis furcata, latiusculis et tenerioribus seg-
 mentis. R. Syn. 63.*
Anglis, Globe Jungermannia,
Habitat in sylvis. IV.
29. JUNGERMANNIA acaulis, fronde subpinnatifida-*pusilla.*
*da, lobis imbricatis, perichætio plicato. Sp. pl.
 1136. Fl. suec. 1080.*

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

Lichenastrum exiguum, capitulis nigris lucidis e corynthis parvis nascentibus. *Dill. musc.* 513. *t.* 74. *f.* 46.

Anglis, shining Jungermannia.

Habitat in ericetis; in ericetis prope Woolwich. *Dill.* III, IV.

T A R G I O N I A. 1060.

Cal. bivalvis, includens globum.

hypophylla 1. TARGIONIA. *Sp. pl.* 1136.

Targonia minima et vulgaris. *Mich. gen.* 3. *t.* 3. *Lichen petraeus minimus*, fructu orobi. *Baub. pin.* 362. *Dill. musc.* 532. *t.* 78. *f.* 9.

Lichenastrum capitulo orobeide. *R. Syn.* 110.

Lichen petraeus minimus acaulos. *Park.* 1315.

Anglis, Vetch Targonia.

Habitat in locis muscosis in comitatu Eboracensi. D. Richardson.

M A R C H A N T I A. 1061.

Masc. *Cal.* peltatus, subtus tectus. *Corollis monopetalis*. *Antheræ multifidæ*.

Fem. *Cal.* sessilis, campanulatis, polyspermus.

polymor- 2. *MARCHANTIA* calyce communi decenifido. *Fl.* lapp. 422. suec. 1051. *Sp. pl.* 1137. *Roy. lugdb.* 507.

Marchantia major, capitulo stellato: radiis teretibus. *Mich. gen.* 2. *t.* 1. *f.* 1

Lichen fontanus major stellatus æque ac umbellatus et cyathophorus. *Dill. musc.* 523. *t.* 76. *f.* 6.

Lichen petraeus latifolius, sive *Hepatica fontana*. *Baub. pin.* 362. *R. Syn.* 115.

3 *Marchantia capitulo stellato*, radiis teretibus. *Mich. gen.* 2. *t.* 1. *f.* 2.

Lichen domesticus minor stellatus æque ac umbellatus et cyathophorus. *Dill. musc.* 527. *t.* 77. *f.* 7.

Lichen petraeus stellatus. *Baub. pin.* 362. *R. Syn.* 115.

Anglis, common Marchantia.

Habitat

Habitat *a juxta aquas locis umbrosis et ad fontes; β in umbrosis areis et ambulacris hortorum.* VIII.

2. MARCHANTIA calyce communi quadripartito: *cruciata.*
laciñiis tubulosis. *Hort. cliff.* 477. *Sp. pl.* 1137.

Lichen seminifer lunulatus, florifer pileatus tandem
cruciatus. *Dill. musc.* 521. *t.* 75. *f.* 5.

Lichen pileatus parvus, capitulo crucis instar se expan-
dente. *R. Syn.* 115.

Lunaria vulgaris. *Mich. gen.* 4. *t.* 4.

Anglis, cross-headed Marchantia.

Habitat *in umbrosis.* VII, VIII.

3. MARCHANTIA calyce communi quinquefido he- *hemisphæ-*
misphærico, perichætio nullo. *Fl. suec.* 1052. *rica.*
lapp. 424. *Sp. pl.* 1138.

Lichen pileatus parvus, foliis crenatis. *R. Syn.* 114.
Dill. musc. 519. *t.* 75. *f.* 2.

Hepatica media, capitulo hemisphærico. *Mich. gen.*
3. *t.* 2. *f.* 2.

Anglis, Marsh Marchantia.

Habitat *in paludosis;* *in a small Water-course, near Dulwich-wells,* Mr. Dandridge. *R. Syn.* IV, V.

4. MARCHANTIA calyce communi quinque loculari *conica.*
subovato. *Sp. pl.* 1138.

Lichen vulgaris major pileatus et verrucosus. *Dill.*
musc. 516. *t.* 75. *f.* 1.

Lichen petræus pileatus. *Park.* 1314. *R. Syn.* 114.

Lichen petræus caulicolo pileolum sustinente. *Bauh.*
pin. 362.

Anglis, Wart Marchantia.

Habitat *in umbrosis et ad rivulos.* IV.

B L A S I A. 1062.

Masc. *Cal.* cylindricus granis repletus.

Fem. *Cal.* nudus. *Fructu* subrotundo, foliis immer-
so, polyspermo.

5. BLASIA. *Fl. suec.* 1053. *Sp. pl.* 1138.

Blasia pusilla, lichenis pyxidati facie. *Mich. gen.* 14. *pusilla.*
t. 7.

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

Mnium lichenis facie. *Dill. musc.* 237. *t.* 31. *f.* 7.
Anglis, Dwarf Blasia.
Habitat prope Manchester. *Dill. musc.*

RICCIA. 1063.

Masc. nudus. *Antheræ* subulata truncata.

Fem. nudus. *Caps.* globosa, unilocularis, polysperma.

- minima.* 1. RICCIA frondibus glabris bipartitis acutis. *Fl. succ.* 1054. *Sp. pl.* 1139.
Riccia minima nitida, segmentis angustioribus acutis. *Mich. gen.* 107. *t.* 57. *f.* 6.
Lichen omnium minimus, foliolis fissis super terram expansis. *Cat. giss.* 210. *R. Syn.* 115. *Dill. musc.* 534. *t.* 78. *f.* 11.
Anglis, small Riccia.
Habitat in inundatis; in ericeto Blackheath dicto. *R. Syn.* XI.
- fluitans.* 2. RICCIA frondibus dichotomis lineariformibus. *Sp. pl.* 1139.
Lichenastrum aquaticum fluitans tenuis folium furcatum. *Dill. musc.* 514. *t.* 74. *f.* 47.
Ulva palustris furcata, angustioribus et firmioribus segmentis. *R. Syn.* 63.
Anglis, Floate Riccia.
Habitat in aquis stagnantibus. In a ditch near Deptford Dock, Mr. Petiver. *R. Syn.* & Barnes con-
- natas.* 3. RICCIA frondibus obcordatis ciliatis. *Syst. nat.* 1339.
Lychen parvus vernus cordiformis, ima parte fimbriatus, Lentis palustris modo aquæ innatans. *Buddl. hort. sicc.* Vol. II, 15. *R. Syn.* 116.
Anglis, fringed Riccia.
Habitat in aquis stagnantibus prope Henley. *R. Syn.*
- glauca.* 4. RICCIA frondibus glabris canaliculatis bilobis obtusis. *Sp. pl.* 1139.

Riccia

Riccia minima pinguis, foliis latiusculis ample sulcatis e glauco virescentibus. *Mich. gen.* 107. *t.* 57. *f.* 4.

Lichen minimus, foliis venosis bifariam vel trifariam se dividendo progredientibus. *R. Syn. ed. II.* 41. *Dill. musc.* 533. *t.* 78. *f.* 10.

Lichen s. Hepatica foliis crassis, Rutæ murariae aut Chamædryos foliis laciñiatis quodammodo similibus. *R. Hist.* III 48.

Anglis, Marsh Riccia.

Habitat *in paludibus; in ericeto Woolwicensi.* *Dill. musc.* III.

5. RICCIA frondibus ramosis, laciñiis sinuatis apice dilatatis crenatis. *sinuata.*

Lichenoides gelatinosum, foliis latioribus tuniformibus. *Dill. musc.* 142. *t.* 19. *f.* 29.

Anglis, Rock Riccia.

Habitat *ad rupes prope Wigmore in Herefordiensi comitatu.* L. Brown. *Dill.*

A N T H O C E R O S. 1064.

Masc. *Cal.* sessilis, cylindricus, integer. *Anth.* subulata longissima, trivalvis.

Fem. *Cal* sexpartitus. *Sem.* tria.

1. ANTHOCEROS frondibus indivisis sinuatis punctatissimis. *Sp. pl.* 1139.

Anthoceros foliis minoribus magis laciñiatis. *Dill. musc.* 476. *t.* 68. *f.* 1.

Lichenastrum gramineo pediculo et capitulo, oblongo, bifurco. *R. Syn.* 109.

Anglis, spotted Anthoceros.

Habitat *in umbrosis sed rariis. Prope Farnhurst in Sussexia; in ericeto Woolwicensi, &c.* *Dill. musc.* IV.

L I C H E N. 1065.

Masc. *Receptaculum* subrotundum, planiusculum, nitidum.

Fem. *Farina* foliis adspersa.

* *Leprof.*

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

* *Leprofi tuberculati.*

- scriptus.* 1. LICHEN leprosus albicans, lineolis nigris ramosis characteriformibus. *Fl. suec.* 1057. *Sp. pl.* 1140.
Lichenoides crusta tenuissima, peregrinis velut litteris inscripta. *R. Syn.* 71. *Dill. musc.* 125. *t.* 18. *f.* 1.
Anglis, Lettered Liverwort.
Habitat in corticibus arborum frequens.
- geogra-*
phicus. 2. LICHEN leprosus flavescens lineolis nigris mappam referens. *Fl. suec.* 1058. *Sp. pl.* 1140.
Lichenoides nigro-flavum tabulæ geographicæ instar pictum. *Dill. musc.* 126. *t.* 18. *f.* 5.
Anglis, Mapp Liverwort.
Habitat in rupibus calcaris in comitatibus Lancastriensi, Eboracensi et Cumberlandico.
- rugosus.* 3. LICHEN leprosus albicans, lineolis simplicibus punctisque nigris consertis. *Sp. pl.* 1140. *Fl. suec.* 1059.
Lichenoides punctatum et rugosum nigrum. *Dill. musc.* 125. *t.* 18. *f.* 2.
Anglis, wrinkled Liverwort.
Habitat in corticibus arborum.
- Ianguina-*
rius. 4. LICHEN leprosus cinereo-virescens, tuberculis atris. *Fl. suec.* 1060. *Sp. pl.* 1140.
Lichenoides leprosum, crusta cinereo-virescente, tuberculis nigerrimis. *Cat. gif.* 205. *R. Syn.* 71.
Dill. musc. 126. *t.* 18. *f.* 3.
Anglis, black nobbed Liverwort.
Habitat in rupibus et truncis arborum.
- fusco-ater.* 5. LICHEN leprosus fuscus tuberculis atris. *Sp. pl.* 1140. *Fl. suec.* 1063.
Anglis, Wall Liverwort.
Habitat in muris antiquis passim.
- calcareus.* 6. LICHEN leprosus candidus, tuberculis atris. *Fl. suec.* 1061. *Sp. pl.* 1140.

Lichenoides tartareum tinctorium candidum, tuberculis atris. Dill. *musc.* 128. *t.* 18. *f.* 8.

Anglis, Dyer's Liverwort.

Habitat in rupibus calcareis in comitatu Westmorlandico; in monte Glyder in Arvonia. Dill.

7. LICHEN *leprösus albus, tuberculis albis farinaceis.* *fagineus.* Sp. pl. 1141. Fl. suec. 1066.

Anglis, white Liverwort.

Habitat in carpini et ulmi truncis et ramis.

8. LICHEN *lichen leprosus cinerius tuberculis albidis carpinus.* rugosus. Sp. pl. 1141. Fl. suec. 1067.

Lichen geographicus. It. scan. 48.

Anglis, Horn-beam Liverwort.

Habitat in carpini, corylli et Fraxini, truncis.

9. LICHEN *leprosus candidus, tuberculis incarnatis.* ericetorum. Fl. suec. 1068. Sp. pl. 1141.

Lichenoides fungiforme, crusta leprosa candida, capitulis et pediculis incarnatis. R. Syn. 70.

Coralloides fungiforme carneum, basi leprosa. Dill. *musc.* 76. *t.* 14. *f.* 1.

Anglis, Heath Liverwort.

Habitat in ericetis uidis in comitatu Eboracensi. D. Richardson. X—IV.

10. LICHEN *leprosus fuscus, tuberculis pedunculatis rufus.* planis subfuscis.

Coralloides fungiforme, saxatile, pallide fuscum. Dill. *musc.* 78. *t.* 14. *f.* 4.

Anglis, brown Liverwort.

Habitat in muris antiquis. XII—II.

11. LICHEN *leprosus virescens, tuberculis flavo-rubescens.* flavo-rubescens.

Anglis. Orange Liverwort.

Habitat in truncis arborum inter Hampstead et Highgate.

- ferrugine-* 12. LICHEN leprosus albicans, tuberculis rufis.
s. Lichenoides leprosum, tuberculis fuscis et ferrugineis.
Dill. musc. 126. *t.* 18. *f.* 4. *t.* 55. *f.* 8.
Anglis, rusty Liverwort.
Habitat in corticibus arborum.
- ** *Leprofi scutellati.*
- candela-* 13. LICHEN crustaceus flavus, scutellis luteis. *Sp. pl.*
rius. 1141. *Fl. suec.* 1069.
Eyffus farinacea flava. *It. oel.* 30. *W-goth.* 159.
Anglis, yellow Liverwort.
Habitat in corticibus arborum et muris. XII—VI.
- tartareus.* 14. LICHEN crustaceus albidus, scutellis luteis : mar-
gine albo. *Sp. pl.* 1141. *Fl. suec.* 1070.
Lichenoides crustaceum et leprosum acetabulis majo-
ribus luteis, limbis argenteis. *R. Syn.* 71. *Dill.*
musc 132. *t.* 18. *f.* 13.
Anglis, Welsh Liverwort.
*Habitat in rupibus ; in Arvonia, D. Lhwyd. In ce-
mitatu Eboracensi. D. Richardson.*
- pallefscens.* 15. LICHEN crustaceus albicans, scutellis pallidis. *Fl.*
suec. 1071. *Sp. pl.* 1142.
Lichenoides crustosum orbiculare incanum. *Dill.*
musc 135. *t.* 18. *f.* 17.
Lichenoides cinereum mere crustaceum eleganter ex-
pansum. *R. Syn.* 71.
Lichenoides crustaceum et leprosum, scutellis cinereo-
virescenti. *R. Syn.* 71.
Anglis, pale Liverwort.
Habitat in muris, et arborum truncis.
- subfuscus.* 16. LICHEN crustaceus albicans, scutellis subfuscis :
margini cinereo subcrenato. *Fl. suec.* 1072. *Sp.*
pl. 1142.
Lichenoides crustaceum et leprosum, scutellis subfuscis. *R. Syn.* 71. *Dill. musc.* 134. *t.* 18. *f.* 16.
Anglis, brownish Liverwort.
Habitat in corticibus arborum et muris.

17. LICHEN crustaceus cinereus, scutellis planis albis *albescens*.
farinaceis.

Lichen crustaceus *albescens*, scutis farinaceis. Pet.
Vaill. Parif. 116.

Lichenoides candidum et farinaceum, scutellis fere
planis. *Dill. musc.* 131. t. 18. f. 11.

Lichenoides crusta tenuissima, fulcis cochleæ formi-
bus insignita. *R. Syn.* 71.

Anglis, mealy Liverwort.

Habitat in muris et corticibus arborum.

18. LICHEN crustaceus cinereus, scutellis virescentibus. *veruco-*
Lichenoides *verucosum* et *rugosum*, *cinereum*, *gla-**sus*.

brum. *Dill. musc.* 128. t. 18. f. 9.

Anglis, Warty Liverwort.

Habitat in corticibus arborum et muris.

19. LICHEN crustaceus albicans, scutellis rugosis ni- *ater*.
gris.

Lichenoides crustaceum et leprosum, scutellis nigri-
cantibus majoribus et minoribus. *Cat. giss.* 205.

R. Syn. 71. *Dill. musc.* 133. t. 18. f. 15.

Anglis, black cupped Liverwort.

Habitat in arboribus et muris frequens.

20. LICHEN crustaceus luteo-virescens, scutellis flavis. *flavescens*.

Lichenoides crustosum, orbiculis et scutellis flavis.

Dill. musc. 136. t. 18. f. 18.

Anglis, yellowish Liverwort.

Habitat in muris.

*** *Imbricati*.

21. LICHEN imbricatus, foliolis multifidis obsolete læ- *centrifu-*
vibus albidis centrifugis, scutellis rufo-fuscis. *Sp. gus.*
pl. 1142. *Fl. suec.* 1074.

Lichenoides imbricatum viridans, scutellis badis. *Dill.*
musc. 180. t. 24. f. 75.

Anglis, spreading Liverwort.

Habitat supra jaxis grandioribus prope Dolgelle in
Mervinia et circa Llanberrijs in Arvonia. *Dill.*

- saxatilis.* 22. LICHEN imbricatus, foliolis sinuatis scabris lacunosis, scutellis folio concoloribus. *Sp. pl.* 1142. *Fl. suec.* 1075.
Lichen opere phrygio ornatus. *Vail. paris.* t. 21. f. 5.
Lichenoides vulgatissimum cinereo-glaucum lacunosum et cirrosum. *Dill. musc.* 188. t. 24. f. 83.
Lichenoides crusta foliosa, superne cinereo-glaucâ, inferne nigra et cirrosa, scutellis nigricantibus. *Cat. giss.* 206. *R. Syn.* 72.
 β *Lichenoides arboreum purpurascens tenue et leve, scutellis majoribus.* *R. Syn.* 73.
Anglis, Stone Liverwort.
Habitat in saxis et truncis arborum frequens.
- omphalo-* des. 23. LICHEN imbricatus, foliolis multifidis glabris obtusis incanis, punctis vagis eminentibus. *Sp. pl.* 1143. *Fl. suec.* 1076.
Lichen nigricans omphalodes. *Vail. paris.* t. 20. f. 10.
Lichen petræus purpureus derbienfis. *Park.* 1315.
Lichenoides saxatile tinctorium, foliis pilosis purpureis. *R. Syn.* 74. *Dill. musc.* 185. t. 24. f. 80.
Anglis, purple Liverwort.
Habitat in monte Steiperstone in Salopiensi comitatu et in plerisque rupibus Cambriæ. *Dill.*
- olivaceus.* 24. LICHEN imbricatus, foliolis lobatis nitidis lividis. *Sp. pl.* 1143. *Fl. suec.* 1077.
Lichenoides olivaceum, scutellis amplioribus verrucosis. *Dill. musc.* 184. t. 24. f. 78.
 β *Lichenoides olivaceum, scutellis lœvibus.* *Dill. musc.* t. 24. f. 77.
Lichenoides crusta foliosa scutellata, pullum. *Cat. giss.* 206. *R. Syn.* 72.
 γ *Lichenoides arboreum et saxatile, crusta foliosa tenui, fusco-virente, in segmenta latiora plerumque divisa.* *R. Syn.* 74.
Anglis, Olive Liverwort.
Habitat in rupibus et arboribus; in syvula prope Shooters-Hill, in Cantio. *Dill.*

25. LICHEN imbricatus, dentato-ciliatus, scutellis foliis cristatus.
lio majoribus. Sp. pl. 1143.
Lichenoides gelatinosum, foliis imbricatis et cristatis:
Dill. musc. 140. t. 19. f. 26.
Lichenoides gelatinosum tenerius laciniatum, ex plum-
beo colore cærulescens, scutellis fuscis. R. Syn.
72.
§ Lichenoides foliis pilosis crassioribus, obscure virenti-
bus, scutellis fuscis. R. Syn. 74.
Anglis, crested Liverwort.
Habitat in rupibus et muris; circa Ludloam in Salopia.
Littl. Brown, Dill.
26. LICHEN imbricatus, foliis lobatis truncatis crenatibus crispus.
tis atro-viridibus, scutellis folio concoloribus.
Lichenoides gelatinosum atro-virens, crispum et ru-
gosum Dill. musc. 139. t. 19. f. 23.
Anglis, curled Lichen.
Habitat in locis umbrosis saxosis et ad murorum bases.
27. LICHEN imbricatus, foliolis crispis fulvis, peltis parieti-
.concoloribus fulvis. Sp. pl. 1143. Fl. suec. 1080. nus.
Lichenoides vulgare sinuosum, foliis et scutellis luteis.
Dill. musc. 180. t. 24. f. 76.
Lichenoides crusta foliosa scutellata, flavescens. Cat.
giss. 206. R. Syn. 72.
Anglis, common Liverwort.
Habitat in corticibus arborum et muris.
28. LICHEN imbricatus: laciniis obtusis subinflatis. physodes.
Sp. pl. 1144. Fl. suec. 1081.
Lichen arboreus albescens, segmentis cornigeris, sub-
tus aterrimmus. Pet. Gaz. t. 14. f. 6.
Lichenoides ceratophyllum obtusius et minus ramo-
sum. R. Syn. 76. Dill. musc. 154. t. 20. f. 49.
Anglis, inflated Liverwort.
Habitat in ericetis in comitatibus Eboracensi et West-
morlandico passim.

pellaris. 29. LICHEN imbricatus: foliolis oblongis laciniatis angustis cinereis, scutellis pullis. *Sp. pl.* 1144. *Fl. suec.* 1082.

Lichenoides cinereum, segmentis argutis stellatis, scutellis nigris. *Dill. musc.* 176. t. 24. f. 70.

Lichenoides arboreum, crusta foliosa albo-cinerea tenuiter et eleganter dissecta, scutellis nigris. *R. Syn.* 74.

Anglis, starry Liverwort.

Habitat in corticibus Fraxini, et Pruni sylvestris frequens.

**** Foliacei.

ciliaris. 30. LICHEN foliaceus erectiusculus: lacinias linearibus ciliatis, scutellis pedunculatis crenatis. *Sp. pl.* 1144. *Fl. suec.* 1085.

Lichenoides hispidum majus et rigidius, scutellis nigris. *Dill. musc.* 150. t. 20. f. 45.

Lichenoides arboreum foliosum cinereum, scutellis nigris foliorum extremitatibus hispidis et pilosis. *Cat. gif.* 207. *R. Syn.* 73.

Musco fungus arboreus cinereus scutellatus, marginibus pilosis. *Hist. ox.* III. 634. f. 15. t. 7. f. 6.

Anglis, Hairy Liverwort.

Habitat in arborum truncis frequens.

perlatus. 31. LICHEN foliaceus repens lobatus glaber, subtus atris, scutellis pedunculatis integris.

Lichenoides glaucum perlatum, subtus nigrum et circosum. *Dill. musc.* 147. t. 20. f. 39.

Musco-fungus lichenoides arborum, angustior, foliis superne cinereis, subtus nigricantibus villosis. *Hist. ox* III. 634.

Anglis, Pearl Liverwort.

Habitat in truncis arborum paßim.

islandicus. 32. LICHEN foliaceus adscendens laciniatus; marginibus elevatis ciliati. *Sp. pl.* 1145. *Fl. suec.* 1085.

Lichen terrestris, foliis eryngii, Buxb. cent. II. t. 6. f. 1. 2.

Lichenoides

32. This is used by the Icelanders for food.

Lichenoides rigidum, eryngii folia referens. R. Syn.
77. Dill. musc. 209. t. 28 f. 111.

β Lichenoides Eryngii folia referens, tenuioribus et
crispioribus foliis. Cels. upf. 31. Dill. musc. 212.
t. 28. f. 112.

γ Coralloides tenuissimum nigricans, mundi muliebris
instar textum. Dill. musc. 113. t. 17. f. 32.

Anglis, Eryngo-leaved Liverwort.

Habitat in ericetis et montosis; in montibus Walliae.

Dill; in comitatibus Eboracensi et Westmorlandico;
frequens.

33. LICHEN foliaceus repens lobatus glaber, lobis si- laciniatis.
nuatis, scutellis fulvis.

Lichen pulmonarius arboribus adnascens maximus, in-
ferne obscurus; desuper e glauco-cinereus, recep-
taculis florum rubris, seminibus nigricantibus. Mich.
gen. 88. t. 46.

Lichenoides subglaucum cumatile, foliis tenacibus,
eleganter laciniatis. Dill. musc. 197. t. 26. f. 99.

Anglis, jagged Liverwort.

Habitat secus viam inter Carno et Main-Lloyne in
Mervinia. Dill.

34. LICHEN foliaceus laciniatus obtusus glaber: supra pulmona-
lacunosus; subtus tomentosus. Sp pl. 1145. Fl. rius.
suec. 1087.

Lichen arborum. Ger. Em. 1566.

Lichenoides pulmoneum reticulatum vulgare, margi-
nibus peltiferis. Dill. musc. 212. t. 219. f. 113.

Lichenoides peltatum arboreum maximum. Cat. giss.
208. R. Syn. 76.

Muscus pulmonarius. Bauh. pin. 361. s. Lichen ar-
borum. Park. 1311.

Anglis, Tree Liverwort, or Lungwort.

Habitat in arborum truncis præseritim Querci,
Fraxini.

35. LICHEN foliaceus decumbens; laciniatus, laciniis decum-
apice trifidis, scutellis subsuscis. bens.

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

*Lichenoides gelatinosum fuscum, Jacobææ maritimæ
divisura.* Dill. musc. 140. t. 19. f. 25.

Anglis, transparent Liverwort.

Habitat prope Lucon in Herefordia legit Littl. Brown.

nigrescens. 36. **LICHEN** foliaceus rugosus lobatus atro-virens, scutellis confertis rufis.

Lichenoides gelatinosum membranaceum, tenue, nigricans. Dill. musc. 138. t. 19. f. 20.

Lichenoides saxatile membranaceum gelatinosum tenue nigrescens. Cat. giss. R. Syn. 72.

Muscus licheniformis membranaceus nigricans pellucidus, bracteolis innumeris conglomeratis. Buddle. hort. succ. Vol. II. f. 6.

Anglis, blackish Liverwort.

Habitat in arborum truncis et muris, in sylva Bagley-Wood dicta prope Oxonium, in Cambria copiose ad rupes et arborum truncos. Dill.

furfuracea- 37. **LICHEN** foliaceus decumbens furfuraceus : laciniis cens. acutis : subtus lacunosis atris. Sp. pl. 1146. Fl. suec. 1088.

Lichenoides cornutum amarum : desuper cinereum : inferne nigrum. Dill. musc. 157. t. 21. f. 52.

Muscus amarus absinthii folio. Baub. hist. III. 764.

Anglis, Branny Liverwort.

Habitat in Arvonia et ad palos vivarii Croft-Castle in Herefordia observavit. Littl. Brown. Dill.

ampulla- 38. **LICHEN** foliaceus planiusculus lobatus crenatus, cens. peltis globosis inflatis. Sp. pl. 1146.

Lichen foliis laciniatis, marginibus convolutis in vesiculam abeuntibus. Roy. lugdb. 509.

Lichenoides tinctorium glabrum vesiculosum. Dill. musc. 188. t. 24. f. 82.

Lichenoides saxatile tinctorium, foliis latioribus non pilosis, vesiculos proferens. R. Syn. 74.

Anglis, Bladder Liverwort.

Habitat in pascuis montanis Emmot-Pasture dictis prope Coln, in Lancastriensi comitatu, D. Richardson.

39. LICHEN foliacetus eretus compræssus ramosus farinaceus : lateribus verrucosis. Sp. pl. 1146. Fl. suec. 1089.

Lichen cinereus angustior, scutis in marginibus segmentorum. Vaill. paris. t. 20. f. 13. 14. 15.

Lichenoides segmentis angustioribus ad margines verrucosis et pulverulentis. Dill. musc. 172. t. 23. f. 63.

Lichenoides arboreum ramosum cinereo-candidans, segmentis angustioribus. R. Syn. 76.

β Lichenoides arboreum ramosum, cinereo-virescens segmentis angustioribus, circa margines crispis. R. Syn. 76.

γ Lichenoides non tubulosum $\pi\lambda\alpha\tau\upsilon\delta\alpha\sigma\gamma\psi\lambda\lambda\omega\eta$ tuberculis pulverulentis donatum. R. Syn. 66.

Anglis, mealy Liverwort.

Habitat in arborum truncis.

40. LICHEN foliaceus erectus linearis ramosus lacuno-calicaris, fus convexus mucronatus. Sp. pl. 1146. Fl. suec. 1090.

Lichenoides coralliforme rostratum et canaliculatum. Dill. musc. 170. t. 23. f. 62.

Lichenoides arboreum ramosum angustioribus cinereo-virescentibus. R. Syn. 76.

Musco-fungus arboreus, capitulis rostratis. Hist. ox. III. 634. f. 15. t. 7. f. 5.

Anglis, channeled Liverwort.

Habitat in rupibus et corticibus arborum. In Cambria, D. Lhwyd; circa Slingfoldiam in Suffexia; et copiose ad rupes montis Steipestone in Salopieni comitatu. Dill.

41. LICHEN foliaceus erectus oblongus lanceolatus sub-fraxineus, laeiniatus lacunosus glaber, scutellis subpedunculatis. Sp. pl. 1146. Fl. suec. 1091.

Lichenoides longifolium rugosum rigidum. Dill. musc. 165. t. 22. f. 59.

Lichenoides arboreum ramosum scutellatum majus et rigidius, colore virescente. R. Syn. 75.

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

Musco-fungus quernus latifolius cinereus. *Hift. ox.*
III. 634. s. 15. t. 7. f. 14. 3. 4.

Anglis, Ash Liverwort.
Habitat in arborum truncis præsertim Fraxinis et Querci.

prunastri. 42. LICHEN foliaceus erectiusculus lacunosus : subtus tomentosus albus. *Sp. pl. 1147. Fl. suec. 1092.*

Lichenoides cornutum, bronchiale molle subtus incanum. *Dill. musc. 160. t. 21. f. 55.*

Lichenoides arboreum ramosum majus et mollius, colore candicante. *R. Syn. 75.*

β Lichenoides corniculatum candidum molle, segmentis angustis. *Dill. musc. 159. t. 21. f. 54.*

Anglis, Thorn Liverwort.

Habitat in Fraxinis, Salicibus, præsertim in Prunis spinosis aliisque frequens.

capreatus. 43. LICHEN pallide viridis rugosus margine undulatus. *Sp. pl. 1147.*

Lichenoides capreatum, rosacee expansum, e sulphureo virens. *Dill. musc. 193. t. 25. f. 97.*

Lichenoides crusta foliosa, ex cinereo et luteo virescente, inferne nigra et laevi. *Cat. giss. 207. R. Syn. 73.*

Musco-fungus lichenoides, crustæ modo adnascens major cinereus. *Hift. ox. III. 633. s. 15. t. 7. f. 1.*

Anglis, Rose-leaved Liverwort.

Habitat in saxis et arboribus paßim.

juniperinus. 44. LICHEN foliaceus laciniatus crispus fulvus, peltis lividis. *Sp. pl. 1147. Fl. suec. 1093.*

Lichen fulvus sinubus dædaleis laciniatus. *Fl. lapp. 450. Roy. lugdb. 510.*

Anglis, Juniper Liverwort.

Habitat in ramis et truncis arborum.

Convenit cum L. parietino sed differt colore luteo-viridi; foliis laxis erectiusculis; peltis disco bruneis.

45. LICHEN foliaceus depresso lobatus glaber, marginæ crispo farinaceo. *Sp. pl.* 1148. *Fl. suec.* 1094. *glaucus.*

Lichenoides endiviae foliis crispis splendentibus subtus nigricantibus. *Dill. musc.* 192. *t.* 25. *f.* 96.

Musco-fungus lichenoides arborum crispus cinereus subtus nigricans. *Hist. ox.* III. 633. *f.* 15. *t.* 7. *f.* 4.

Anglis, shining Liverwort.

Habitat in pascuis montosis Emmot-moor *dicitur prope Coln in Lancastria*; in ericeto Banstead-downs *dicto*. Th. Manningham. *Dill. musc.*

***** *Coriacei.*

46. LICHEN foliaceus repens lobatus, peltis marginæ resupinæ libus posticis. *Sp. pl.* 1148. *Fl. suec.* 1096. *tus.*

Lichenoides fuscum, peltis posticis ferrugineis. *Dill. musc.* 206. *t.* 28. *f.* 105.

Lichenoides saxatile fuscum, peltis in aversa foliorum superficie locatis. *R. Syn.* 77.

Anglis, livid Lichenoides.

Habitat ad lapides minores Pebbles vocatos in ora maritima Sussexiæ ad rupes circa Bishops-castle, in Salopia. *Dill. musc.*

47. LICHEN foliaceus repens laciniatus lacunosus, peltis marginalibus adscendentibus. *sylvaticus.*

Lichenoides polyschides villosum et scabrum, peltis parvis. *Dill. musc.* 199. *t.* 27. *f.* 101.

Anglis, rough Liverwort.

Habitat in sylvis paucim.

48. LICHEN foliaceus repens lobatus obtusus glaber, horizontalis peltis marginalibus horizontalibus planis. *talis.*

Lichenoides subfuscum, peltis horizontalibus planis. *Dill. musc.* 205. *t.* 28. *f.* 104.

Anglis, flat Sheild Liverwort.

Habitat in sylvis; in sylva Enfieldensi. *Dill.*

49. LICHEN foliaceus repens subrotundus planus peltis immersus. *immersus.*

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

Lichenoides lichenis facie, petiis acetabulis immersis.
Dill. musc. 221. t. 30. f. 121.

Anglis, round Liverwort.

*Habitat in fauibus rupium, Chedder-rocks dictarum
in Somersetia, et in monte Snowdon in Cambria.*
Dill.

cinereus. 50. **LICHEN** foliaceus repens lobatus obtusus planus :
subtus venosus villosus, pelta marginali adscendente.
Sp. pl. 1149. Fl. suec. 1100.

Lichen terrestris cinereus R. Cat. Ang. 185.

*Lichenoides digitatum cinereum, lactucæ foliis sinu-
osis. Dill. musc. 200. t. 27. f. 102.*

*Lichenoides peltatum terrestre cinereum majus, foliis
divisis, R. Syn. 76.*

Anglis, Ash-coloured Ground Liverwort.

Habitat in ericetis.

Pharmas. Lichenis cinerei terrestris.

***** *Umbilicati, squalentes quasi fuligine.*

minutus. 51. **LICHEN** umbilicatus gibbus punctatus subtus ful-
vus. Sp. pl. 1149.

*Lichen pulmonarius alpinus cinereus punctatus. Hall.
belv. 75. t. 2. f. 2.*

*Lichenoides coriaceum nebulosum cinereum puncta-
tum subtus fulvum. Dill. musc. 223. t. 30. f.
127.*

Anglis, cloudy Liverwort.

*Habitat ad rupes Chedderenses in Somersetia, et in
summis rupibus uidis Hisvaë in Cambria. Dill.*

villosus. 52. **LICHEN** umbilicatus subtus hirsutissimus. Sp. pl.
1150. Fl. suec. 1103.

*Lichenoides coriaceum, latissimo folio umbilicato et
verrucoso. Dill. musc. 545. t. 82. f. 5.*

Anglis, fleecy Liverwort.

*Habitat in rupibus prope Settle in comitatu Eboracensi.
D. Richardson.*

pustulosus. 53. **LICHEN** umbilicatus subtus lacunosus. Sp. pl. 1150.
Fl. suec. 1107.

Lichenoides

*Lichenoides pustulatum - cinereum et velutinum - ambus-
tum.* Dill. musc. 226. t. 30. f. 131.

Anglis, Singed Liverwort.

*Habitat in Cambriæ comitatu Radnorensi primus et so-
lus adhuc observavit Littl. Brown, in rupibus meri-
diem spectantibus, subter arcem Keven Lees Castle,
dictam, copiose.* Dill. musc.

54. LICHEN umbilicatus undique lœvis. Sp. pl. 1150. deuslus.
Fl. suec. 1105.

*Lichenoides coriaceum cinereum, peltis atris com-
pressis.* Dill. musc. 218. t. 29. f. 117.

*Lichenoides saxatile, foliis minus divisis, cinereo-fus-
cis.* R. Syn. 73.

Anglis, Sooty Liverwort.

*Habitat in rupe Sancti Vincentii prope Bristoliam,
D. Dare.*

55. LICHEN umbilicatus polyphyllus undique lœvis polyphyllus
crenatus. Sp. pl. 1150. Fl. suec. 1104.

Lichenoides tenue pullum, foliis utrinque glabris.
Dill. musc. 225. t. 30. f. 129.

Anglis, smooth Liverwort.

*Habitat in monte Snowdon ad rupes Llyn Llydaw dic-
tas.* Dill.

56. LICHEN umbilicatus polyphyllus utrinque lœvis polyrhizos.
polyrhizos. Sp. pl. 1151. Fl. suec. 1108.

*Lichenoides pullum superne et glabrum, inferne ni-
grum et cirrosum.* Dill. musc. 226. t. 30. f. 130.

Anglis, Fibrous Liverwort.

Habitat cum priore.

***** Scyphiferi.

57. LICHEN scyphifer simplex integerrimus, stipite cy- cocciferus.
lindrico, tuberculis coccineis. Sp. pl. 1151. Fl.
suec. 1109. Mat. med. 496.

Coralloides scyphiforme, tuberculis coccineis. Dill.
musc. 82. t. 14. f. 7.

*Lichenoides tubulosum pyxidatum, tuberculis amæne
coccineis.* R. Syn. 69.

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

Anglis, red Liverwort.

Habitat in ericetis et nemorosis. XI, II.

cornucopi- 58. LICHEN scyphifer simplex folio brevior, tuberculis coccineis. Sp. pl. 1151. Fl. suec. 1110.

Coralloides scyphiforme, marginibus radiatis et foliatis. Dill. musc. 85. t. 14. f. 9.

Lichenoides pyxidatum, marginibus eleganter foliatis. R. Syn. 69.

Anglis, radiated Liverwort.

Habitat in ericetis Hampstediensi et nigro prope Londonum. Dill. II.

pyxidatus. 59. LICHEN scyphifer simplex crenulatus, tuberculis fuscis. Sp. pl. 1151. Fl. suec. 1111.

Lichen pyxidatus major. Vail. paris. t. 21. f. 8.

Mich. gen. 82. t. 41. f. 1.

Coralloides scyphiforme, tuberculis fuscis. Dill. musc. 79. t. 14. f. 6.

Muscus pyxoides terrestris. Baub. pin. 361.

Lichenoides tubulosum pyxidatum cinereum. Cat. giss. 204. R. Syn. 68.

β Lichenoides tubulosum pyxidatum proliferum. R. Syn. 69.

γ Lichenoides tubulosum pyxidatum, tuberculis fusco-nigris, proliferum. R. Syn. 69.

Anglis, Cup Liverwort, or Moss.

Habitat in ericetis et sylvis.

fimbriatus 60. LICHEN scyphifer simplex denticulatus, stipite cylindrico. Sp. pl. 1152. Fl. suec. 1112.

Lichen pyxidatus minor. Vail. paris. t. 21. f. 6.

Mich. gen. 83. t. 41. f. 45.

Coralloides scyphiforme gracile, marginibus serratis. Dill. musc. 84. t. 14. f. 8.

Lichenoides tubulosum pyxidatum, marginibus serratis. Cat. giss. 204. R. Syn. 69.

β Lichenoides pyxidatum proliferum, marginibus serratis. R. Syn. 69.

Anglis, indented Cup Liverwort.

Habitat in sylvis et ericetis.

filiformis. 61. LICHEN scyphifer simplex integerrimus filiformis tuberculis fuscis.

Li-

Lichenoides tubulosum pyxidatum exiguum, fusco-virens. *R. Syn.* 70.

Coralloides scyphis gracilibus tubiformibus, pediculatis foliis. *Dill. musc.* 85. *t.* 14. *f.* 10.

Anglis, Trumpet Liverwort.

Habitat in muris et ericetis.

62. LICHEN folijs suberectis laciniatis crispis scyphise-foliaceus. ris, scyphis brevissimis conicis.

Lichenoides cartilaginosum, tubulis et pyxidulis exiguis. *R. Syn.* 70.

Coralloides scyphiforme, foliis alcicorniformibus cartilaginosis. *Dill. musc.* 87. *t.* 14. *f.* 12.

Anglis, Leafy Liverwort.

Habitat in ericetis montosis passim.

63. LICHEN scyphifer ramosus denticulatus filiformis. *gracilis*.

Sp. pl. 1152. *Fl. suec.* 1113.

Coralloides scyphiforme ferratum elatius, caulis græcilibus glabris. *Dill. musc.* 88. *t.* 14. *f.* 13.

Lichenoides pyxidatum cinereum elatius, ramulis pyxidatim desinentibus. *R. Syn.* 69.

Anglis, tall Liverwort.

Habitat in ericetis et locis petrofis.

64. LICHEN scyphifer ramosissimus: ramis cylindricis *digitatus*.

calycibus integris nodosis. *Sp. pl.* 1152. *Fl. suec.*

1114.

Coralloides ramulosum, tuberculis coccineis. *Dill. musc.* 96. *t.* 15. *f.* 19.

Lichenoides coralliforme, apicibus coccineis. *R. Syn.* 68.

Anglis, Fingered Liverwort.

Habitat in ericetis et sylvis. II.

65. LICHEN scyphifer ramosissimus ventricosus, scy-ventricon-

phis dentatis, tuberculis fuscis. sus.

Lichenoides tubulosum cinereum, valde crustaceum, ramulis brevioribus et crebrioribus ex acetabulis enascentibus. *R. Syn.* 68.

Coralloides cornu-copioides incanum, scyphis cristatis. *Dill. musc.* 94. *t.* 15. *f.* 17.

Anglis,

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

Anglis, crusted Liverwort.

Habitat in sylvis.

- cornutus*. 66. LICHEN scyphifer simpliciusculus subyentricosus,
calycibus integris. Sp. pl. 1152. Fl. suec. 1115.
Coralloides vix ramosum, scyphis obscuris. Dill.
musc. 90. t. 15. f. 14.
Lichenoides tubulosum cinereum, non ramosum. R.
Syn. 27.

Anglis, plain Liverwort.

Habitat in ericetis. XI. II.

- difformis*. 67. LICHEN scyphifer simpliciusculus subyentricosus,
calycibus dentatis. Sp. pl. 1152. Fl. suec. 1116.
Lichen pyxoides teres, acetabulis minoribus repandis.
Mich gen. 80. t. 41. f. 1.
Coralloides crassius subincanum, calycibus dentatis.
Dill. musc. 95. t. 15. f. 18.
Lichenoides tubulosum minus ramosum caulinulis
crassioribus difformibus. R. Syn. 68.
Anglis, serrated Liverwort.
Habitat in ericetis.

***** Fruticulosi.

- rangiferi*- 68. LICHEN fruticulosus perforatus ramosissimus, ra-
mulis nutantibus. Sp. pl. 1153. Fl. suec. 1117.
Lichenoides tubulosum ramosissimum, fruticuli specie,
candidans. R. Syn. 66.
Coralloides montanum fruticuli specie, ubique candi-
cans. Dill. musc. 107. t. 16. f. 29.
Musco-fungus coralloides montanus ramosissimus ci-
nereus vulgaris. Hist. ex. III. 633. f. 15. t. 7.
f. 9.
Coralloides fruticuli specie candidans, corniculis ru-
fescens. Dill. musc. 110. t. 16. f. 30.
Lichenoides tubulosum ramosissimum, fruticuli specie,
candidans, corniculis rufescens. R. Syn. 67.
Anglis, Rhendeer Liverwort.
Habitat in sylvis et ericetis frequens.

- furcatus*. 69. LICHEN fruticulosus tubulosus ramosus, ramis e-
rectis furcatis.

Liche-

Lichenoides tubulosum cinereum, ramosius et crustaceum. R. Syn. 67.

Coralloides corniculis brevioribus et crebrioribus.

Dill. musc. 104. t. 16. f. 27.

Musco-fungus montanus corniculatus. Hist. ex. III.

632. s. 15. t. 7. f. 1.

Anglis, forked Liverwort.

Habitat in ericetis et locis montosis.

70. **LICHEN** fruticulosus tubulosus : ramosissimus spinosus. nosus, ramulis tuberculatis subdigitatis.

Lichenoides tubulosum ramosum rigidius, majus et crassius, cinereo fuscum. R. Syn. 16.

Coralloides sparsum, caulis tortuosus et spinosus.

Dill. musc. 101. t. 16. f. 25.

Muscus coralloides saxatilis cervi cornua referens.

Bauh. pin. 36.1.

Anglis, prickly Liverwort.

Habitat in ericetis sed rarius.

71. **LICHEN** fruticulosus perforatus, ramulis brevissimis uncialis. acutis. Sp. pl. 1153. Fl. suec. 1118.

Coralloides perforatum minus, molle et tenue. Dill. musc. 99. t. 16. f. 22.

Lichenoides tubulosum, caulinis mollioribus et crassioribus, minus. R. Syn. 67.

Anglis, short Liverwort.

Habitat in ericeto Woolwicensi in Cantio, et in monte Steiperstone prope Narbury in comitatu Salopiensi.
Dill.

72. **LICHEN** fruticulosus subdichotomus, ramis simpli- subulatus. cibus subulatis. Sp. pl. 1153. Fl. suec. 1119.

Coralloides corniculis longioribus et rarioribus. Dill. musc. 102. t. 16. f. 26.

Lichenoides tubulosum cinereum, minus crustaceum minusque ramosum. R. Syn. 67.

Muscus corniculatus. Tab. ic. 809. Ger. Em. 1560.
B. hist. III. 767. Park. 1308.

Anglis, horned Liverwort.

Habitat in ericetis paucim.

- pascalis.* 73. LICHEN fruticulosus solidus tectus foliolis crustaceis. *Sp. pl.* 1153. *Fl. suec.* 1120.
 Coralloides crispum et botryiforme alpinum. *Dill. musc.* 114. *t. 17. f. 33.*
 Lichenoides non tubulosum cinereum ramosum, totum crustaceum. *R. Syn.* 66.
 Musco-fungus coralloides fruticosior et lignosior. *Hist. ox. III.* 633. *f. 15. t. 7. f. 12.*
Anglis, Woody Liverwort.
 Habitat in montibus Cambriæ altissimis. *Dill.*
- fragilis.* 74. LICHEN fruticosus solidus, ramulis teretibus obtusis. *Sp. pl.* 1154. *Fl. suec.* 1121.
 Coralloides alpinum, corallinæ minoris facie. *Dill. musc.* 116. *t. 17. f. 34.*
 Lichenoides non tubulosum ramosissimum fruticuli specie cinereo fuscum. *R. Syn.* 65.
Anglis, brittle Liverwort.
 Habitat in montibus Cambrorūtanis *Dill.* in ericetis montosis Moors, dictis, in Westmorlandia.
- globosus.* 75. LICHEN fruticulosus solidus ramosissimus ramulis teretibus acutis furcatis tuberculis terminalibus globosis.
 Lichenoides non tubulosum, ramulis scutellis nigris terminatis. *R. Syn.* 66.
 Coralloides cupressiforme, capitulis globosis. *Dill. musc.* 117. *t. 17. f. 35.*
 Muscus coralloides tunbrigensis, bracteolis nigerrimis. *Pet. mus. N.* 437. *R. Hist. III.* 30.
Anglis, Round-headed Liverwort.
 Habitat in rupibus et locis saxosis. In rupibus prope Tunbridge, in monte Snowdon. *Dill.* In montibus Eboracensibus *passim.*
- filiqusus.* 76. LICHEN fruticulosus solidus subramosus, tuberculis lateralibus concavis.
 Coralloides fasciculare verrucosum et veluti filiquosum. *Dill. musc.* 119. *t. 17. f. 38.*
 Musco-fungus petræus, cornibus indivisis et incurvatis. *Hist. ox. III.* 633. *f. 15. t. 7. f. 4.*
Anglis, Podded Liverwort.

Habitat

Habitat in rupibus; in saxa illa grandia, quæ per campos elatos, Grey-Weathers in Wiltoniensi comitatu dictos, dispersa jacent. Dill.

***** Filamentosæ.

77. LICHEN filamentosus pendulus, ramis implexis, plicatus. scutellis radiatis: Sp. pl. 1154. Fl. suec. 1122. Mat. med. 495.

Usnea vulgaris, loris longis implexis. Dill. musc. 56. t. 11. f. 1.

Muscus arboreus, Usnea officinarum. B. pin. 361. R. Syn. 64.

Muscus quernus. Ger. Em. 1558.

Muscus arboreus vulgaris et quercinus. Park. 1311. Anglis, common hairy Liverwort, or Tree Moss.

Habitat in silvis densis sed rarius.

78. LICHEN filamentosus pendulus subarticulatus, ramis barbatus. patentibus. Sp. pl. 1155. Fl. suec. 1123.

Usnea barbata, loris tenuibus fibrosis. Dill. musc. 63. t. 12. f. 6.

Muscus capillaceus longissimus. Bauh. pin. 361.

Anglis, bearded Liverwort.

Habitat in sylva dicta Forrest of Dean in Glocestriensi comitatu, et in sylva prope Bishop's-Castle in Sallovia. Dill.

79. LICHEN filamentosus pendulus: axillis compressis. jubatus. Sp. pl. 1155. Fl. suec. 1124.

Usnea jubata nigricans. Dill. musc. 64. t. 12. f. 7.

Muscus corallinus saxatilis sceniculaceus. R. Syn. 65.

Musco-fungus trichoides e nigridine cinereus, jubæ ad instar e saxis et arboribus dependens. Hist. ox. III. 633.

Anglis, Fennel Liverwort.

Habitat in silvis et rupibus; in Charley Forest, Leicestershire. Petiver. In comitatu Eboracensi pâssim. D. Richardson.

80. LICHEN filamentosus ramosissimus decumbens im- lanatus. plicatus opacus. Sp. pl. 1155. Fl. suec. 1125.

Usnea

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

Usnea lanæ nigræ instar saxis adhærens. *Dill. musc.*
66. t. 13. f. 8.

Muscus coralloides, lanæ nigræ instar saxis adhærens.
R. Syn. 65.

Anglis, Woolly Liverwort.

Habitat in rupibus. In Cornubia D. Stephens in ru-
pibus Cambriæ circa Borth, milliaris distantia a
Bangoria. S. Brewer; in Westmorlandia frequens.

chalybei- 81. *LICHEN filamentosus subramosus decumbens im-*
formis. *plicato-flexuosus.* *Sp. pl. 1155. Fl. suec. 1127.*
Usnea rigida horsum versus extensa. *Dill. musc. 66.*
t. 13. f. 10.

Muscus caule rigido instar fili chalybei. *R. Syn. 65.*

Anglis, Wiry Liverwort.

Habitat in truncis arborum et locis saxosis. In monte Sa-
lopiæ, Steiperstone dicto. Dill.

hirtus. 82. *LICHEN filamentosus ramosissimus erectus, tuber-*
culis farinaceis sparsis. *Fl. lapp. 989. suec. 1128.*
Sp. pl. 1155.
Usnea vulgatissima tenuior et brevior sine orbiculis.
Dill. musc. 67. t. 13. f. 12.
Muscus ramosus. *Ger. 1372. R. Syn. 65.*
Anglis, rough Liverwort.
Habitat in sylvis et sepibus.

vulpinus. 83. *LICHEN filamentosus ramosissimus erectus fastigi-*
atus inæquali-angulosus. *Sp. pl. 1155. Fl. suec.*
1129.
Usnea capillacea citrina, fruticuli specie. *Dill. musc.*
73. t. 13. f. 16.
Muscus aureus tenuissimus. *Mer. pin. R. Syn. 65.*
Anglis, Gold Liverwort.
Habitat in sylvis passim. Prope Totteridge in Hart-
fordia. Dill.

articula- 84. *LICHEN filamentosus articulatus, ramulis tenuissi-*
tus. *mis punctatis.* *Sp. pl. 1156. Roy. lugdb. 513.*

Usnea

Usnea capillacea et nodosa. *Dill. musc.* 60. *t.* 11.
f. 4.

Muscus arboreus nodosus. *Bauh. pin.* 361. *R. Syn.*
65. *f. geniculatus.* *Park.* 1311.

Anglis, Jointed Liverwort.

Habitat in sylvis sed rarius; in sylva ad villam Stoken-Church; prope Burnley in Lancastria. *Dill.*

85. LICHEN filamentosus ramosus erectus, scutellis *floridus.*
radiatis. *Sp. pl.* 1156. *Fl. suec.* 1130.

Usnea vulgatissima tenuior et brevior cum orbiculis.
Dill. musc. 69. *t.* 13. *f.* 13.

Muscus arboreus cum orbiculis. *Bauh. pin.* 361.
R. Syn. 65.

Muscus ramosus floridus. *Tab. ic.* 808. *Ger. Em.*
1560.

Anglis, Flowering Liverwort,
Habitat in sylvis et dumetis.

T R E M E L L A. 1067.

Fruclificationes vix manifestæ, in corpore gelatinoso.

1. TREMELLA plicata undulata. *Sp. pl.* 1157. *Fl. Nostoc.*
suec. 1136.

Tremella terrestris sinuosa pinguis et fugax. *Dill.*
musc. 52. *t.* 10. *f.* 14.

Ulva terrestris pinguis et fugax. *R. Syn.* 64.

Nostoc paracelsi. *Act. paris.* 1708. *p.* 228.

Anglis, Jelly Tremella.

Habitat in pratis post pluvius.

2. TREMELLA sessilis membranacea auriformis cine- *auricula-*
rea. *Sp. pl.* 1157. *Fl. suec.* 1137.

Agaricum auriculæ forma. *Mich. gen.* 124. *t.* 66.
f. 1.

Peziza auriculam referens. *R. Syn.* 18.

Fungus membranaceus auriculam referens, f. sambu-
cinus. *Bauh. pin.* 372.

Fungus sambucinus, f. auricula Judæ. *Ger.* 1385.
Park. 1320.

Anglis,

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

Anglis, Eared Tremella, or Jews-ear.
Habitat in lignis putridis.

Lichenoi- 3. TREMELLA erectis planis : margine criso lacinades. *Sp. pl.* 1157. *Fl. suec.* 1138.

Lichenoides pellucidum, endiviae foliis tenuibus crispi. *Dill. musc.* 143. *t.* 19. *f.* 31.

Lichenoides tenue rufescens. *R. Syn.* 77.

Anglis, transparent Tremella.

Habitat in ericetis et umbrosis.

verrucosa. 4. TREMELLA tuberculosa solida rugosa. *Sp. pl.* 1158. *Fl. suec.*

Tremella fluvialis gelatinosa et uterculosa. *Dill. musc.* 54. *t.* 10. *f.* 16.

Anglis, Warty Tremella.

Habitat supra lapides in rivulis. In rivulis alpinis in Arvonia. Dill. In fluvio Martin River dicto in comitatu Surriensi.

hemisphærica. 5. TREMELLA hemisphærica sparsa. *Sp. pl.* 1158. *Fl. suec.* 1141.

Anglis, Sea Tremella.

Habitat in Confervis et Fucis marinis.

purpurea. 6. TEMELLA subglobosa sessilis solitaria glabra. *Sp. pl.* 1158. *Fl. suec.* 1142.

Tremella palustris, vesiculis sphæricis fungiformibus. *Dill. musc.* 55. *t.* 10. *f.* 17.

Lichenoides fungiforme, capitulis vel vesiculis sphæricis, aqueo humore repletis. *R. Syn.* 70.

Anglis, Purple Tremella.

Habitat ad margines fossarum inque fossis exsiccatis versus Newington et Hackney prope Londinum. Dill.

C H A R A. 1066.

Cal. biphyllus. *Anthera* globosa sessilis. *Stigmata tria.* *Sem.* unicum, subrotundum.

tomentosa. 1. CHARA aculeis caulinis ovatis. *Fl. suec.* 1132. *Sp. pl.* 1156.

Chara

Chara major subcinerea fragilis. *Aet. paris.* 1719 p.

18. *R. Syn.* 132.

Equisetum fragile majus subcinereum aquis immersum. *Hist. ox.* III. 621. t. 4. f. 9.

Equisetum s. Hippuris coraloides. *Ger. Em.* 1115.

Anglis, brittle Chara.

Habitat in fossis et stagnis near Chisselhurst in Kent.

2. **CHARA** caulis lævibus, frondibus interne dentata *vulgaris*.
tis. *Sp. pl.* 1156. *Fl. suec.* 1131.

Chara vulgaris foetida. *Aet. paris.* 1719. p. 17. t. 3.
f. 1. *R. Syn.* 132.

Equisetum foetidum sub aqua repens. *Ger. Em.* 1115.
Baub. pin. 16. *hist.* III. 731. *Park.* 1201.

Anglis, common Chara.

Habitat in fossis et stagnis frequens.

3. **CHARA** aculeis caulinis capillaribus confertis. *Sp. hispida.*
pl. 1156. *Fl. suec.* 1133.

Chara major caulis spinosis. *Aet. paris.* 1719. p.
18. t. 3. f. 3.

Equisetum s. Hippuris muscosus sub aqua repens.
Pluk. ph. t. 193. f. 6.

Anglis, prickly Chara.

Habitat in fossis et stagnis; in fossis turfosis in comitatu
Westmorlandico.

4. **CHARA** caulum articulis inermibus diaphanis superflexilis.
ne latioribus. *Sp. pl.* 1157. *It. gotl.* 215. *Fl. suec.*
1134.

Chara translucens minor flexilis. *R. Syn.* 133.

Anglis, smooth Chara.

Habitat in fossis. In the ponds about Ipswich in Suffolk. Buddl. In a Bog where the stinking Spaw empties itself, nigh Knaishborow. Dr. Richardson.
R. Syn.

F U C U S. 1068.

Masc. *Vesiculæ villis intertextæ.*

Fem. *Vesiculæ adspersæ granis immersis, apice prominenti-*
nulis.

Sem. *solitaria.*

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

* *Dichotomi frondescentes.*

- ferratus.* 1. *FUCUS planus dichotomus ferratus ad apices tuberculatus.* *Sp. pl.* 1158. *Fl. suec.* 1144.
Fucus f. Alga latifolia major dentata. *R. Syn.* 42.
Hist. ox. III. 648. *t. 9. f. 1.*
β Fucus marina humilis, latifoliæ ferratæ similis. *R. Syn.*
42.
Anglis, serrated Fucus, or Sea Wrack.
Habitat in rupibus et saxis marinis frequens.
- vesiculosus* 2. *FUCUS dichotomus integer, caule medium folium transcurrente, vesiculis verrucosis terminalibus.* *Sp. pl.* 1158. *Fl. lapp.* 466. *suec.* 1145. *Roy. lugdb.* 514. *Guett. Stamp.* II. 401.
Fucus f. Alga marina latifolia vulgatissima. *R. Syn.*
40.
Fucus maritimus vel Quercus maritima vesiculosas habens. *Bauh. pin.* 363.
Quercus marina. *Lob. ic. 2. p. 252.* *Ger. Em.* 1116.
Quercus marina herbacea et varietas. *Park.* 1293.
β Fucus maritimus f. Quercus maritima foliorum extremitatis tumidis. *Bauh. pin.* 365.
Anglis, common Fucus, or Sea-Oak.
Habitat in rupibus et saxis marinis ubique.
- ceranoides* 3. *FUCUS dichotomus planus integer : apicibus bifidis vesiculosis.* *Fl. lapp.* 465. *suec.* 1146. *Sp. pl.* 1158.
Fucus humilis dichotomus ceranoides, latioribus foliis ut plurimum verrucosis. *Hist. ox. III.* 646. *t. 8. f. 13.*
Fucus membranaceus ceranoides varie dissectus. *R. Syn.* 44.
β Fucus parvus caulinis teretibus, summitatibus membranaceis dilatatis et laceratis. *Buddl. hort. sicc.* I. 47. *R. Syn.* 44.
γ Fucus membranaceus ceranoides ramosus, per fasciatem obsolete virescens. *Pluk. alm.* 161. *R. Syn.* 44.

δ *Fucus*

δ *Fucus ceranoides albidus, ramulorum apicibus stellatis.* *Pluk. alm.* 161. *R. Syn.* 44.
Anglis, Buckishorn Fucus.
Habitat in littoribus marinis ubique.

4. *FUCUS dichotomus integer caule folium percurrens spiralis.*
te : inferne nudo, vesiculis verrucosis terminalibus.
Fl. lapp. 467. suec. 1147. Sp. pl. 1159.

Fucus spiralis maritimus major. *Tourn.* 568. *R. Syn.*
 41.

β *Fucus spiralis maritimus minor.* *Tourn.* 568. *R. Syn.*
 42.

Anglis, twisted Fucus.

Habitat in littore Cantiano et Sussexiano frequens.

5. *FUCUS membranaceus linearis dichotomus divaricatus integer : ramificationibus vesiculosis.* *Sp. pl. tus.*
 1159.

Fucus bullatus fruticescens, caule nudo, foliis rectis compressis bifidis. *Hist. ox. III. 647. f. 15. t. 8.*

f. 5.

Anglis, shrubby Fucus.

Habitat in littore Insulæ Anglesey. *Hist. ox. prope Sheerness in Insula Sheepy.*

6. *FUCUS dichotomus planus linearis acutus vesiculis linearibus ovatis sparsis.*

Fucus longo angusto crassoque folio. *Baub. pin. 364.*
pr. 155, 5. R. Syn. 43.

Fucus marinus secundus. *Dod. pemp.* 479. *Park.*
 1293.

Quercus marina 2. *Ger. Em.* 1115.

Anglis, narrow-leaved Fucus, or Sea-Thongs.

Habitat in littoribus marinis paissim.

** *Dichotomi caulescentes.*

7. *FUCUS dichotomus teres uniformis fastigiatus, vesiculis terminalibus bifidis.*

Fucus dichotomus teres uniformis fastigiatus. *Sp. pl.*
 1162.

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

Fucus palmaris tenuis in orbem expansus, in segmenta bifida breviora teretia divisus. *Hift. ox.* III. 649.
t. 9. f. 9.

Fucus sⁱ alga exigua dichotomus foliorum segmentis longiusculis, crassis et subrotundis. *R. Syn.* 45.
Anglis, forked Fucus.
Habitat in littoribus marinis frequens.

excisus. 8. *FUCUS* dichotomus linearis excavatus : axillis divaricatis. *Sp. pl.* 1159.

Fucus pumilus dichotomus, segmentis ex una parte gibbosus, ex altera excavatis. *R. Syn.* 43.

Fucus dichotomus ceranoides, angulos rotundiusculos efformans. *Hift. ox.* III. 648. t. 8. f. 11.

Anglis, furrowed Fucus.

Habitat in littoribus marinis.

nodosus. 9. *FUCUS* compressus dichotomus medio ramorum in vesiculam dilatato. *Roy. lugdb.* 514. *Sp. pl.* 1159.
Fl. suec. 1149.

Fucus maritimus nodosus. *Bauh. pin.* 365. *R. Syn.* 48.

Fucus maritimus, vesiculis majoribus singularibus per intervalla dispositis. *Hift. ox.* III. 647. t. 8. f. 2.
Anglis, knotted Fucus.

Habitat in rupibus et saxis marinis passim.

*** *Ramosi* foliis distinctis.

ovatus. 10. *FUCUS* caule teretiusculo compresso, foliis oblongis integerimis.

Anglis, Oval-leaved Fucus.

Habitat in littore Eboracensi.

**** *Ramosi* fronde unita.

filiquosus. 11. *FUCUS* teres ramosissimus, pedunculis alternis vesiculis oblongis acuminatis. *Fl. lapp.* 463. *suec.* 1150. *Sp. pl.* 1160.

Fucus angustifolius vesiculis longis filiquarum æmulis. *R. Syn.* 48.

[*Fucus*

Fucus maritimus alter, tuberculis paucissimis. B. pin.

368.

Quercus marina quarta. Ger. Em. 1569.

Anglis, Podded Fucus.

Habitat in littoribus marinis.

12. **FUCUS vesiculis oblongis pedunculatis: terminatis barbatis.
foliolis linearibus. Sp. pl. 1161.**

Fucus folio tenuissimo diviso siliquatus. R. Syn. 48.

Fucus folliculaceus foliis abrotani. Baub. pin. 365.

*Fucus maritimus foliis tumidis barbatis. Baub. pin.
365.*

Muscus marinus abrotanoides. Park. 1290.

Anglis, Bearded Fucus.

Habitat in littoribus Sussexiano et Cornubiensi.

13. **FUCUS caule tereti ramosissimo, foliis alternis su- tamarisci-
bulatis, vesiculis rotundis imbricatis sessilibus axilla- folius.
ribus.**

Fucus foliis Ericæ s. Tamarisci. R. Syn. 49.

Fucus tamarisco similis maritima. Baub. pin. 365.

Erica marina quibusdam. Baub. hist. III. 799.

Anglis, Tamarisk-leaved Fucus.

*Habitat in littoribus marinis. On the coast of Corn-
wall. R Syn. in littore Eboracensi passim.*

14. **FUCUS vesiculis ovatis alternis pedunculatis, fron- foenicula-
dibus multifidis linearibus. Sp. pl. 1161. ceus.**

Fucus abrotanoides vesiculis parvis rotundis ornatus.

Hist. ox. III. 648. t. 8. f. 17.

Fucus radicibus arborum fibrosis similis. R. Syn. 49.

Fucus folliculaceus: foeniculi folio. B. pin. 365.

Anglis, Fennel-leaved Fucus.

Habitat in littoribus Eboracensi et Lancastriensi.

15. **FUCUS bipinnatus subfiliformis: apicibus vesiculosis abrotani-
dilatatis. Sp. pl. 1161. folius.**

Anglis, Jointed Fucus.

Habitat in rupibus marinis in littore Sussexiano.

16. **FUCUS filiformis teres, ramis geminis ramosissimis, usneoides.
H h 3 fructifi-**

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

fructificationibus innatis concatenatis, foliolis acer-
tosis. *Syst. nat.* 1345?

Fucus angustifolius foliis dentatis. *R. Syn.* 48.

Fucus tenuifolius foliis dentatis. *Hist. ox.* III. 648.
t. 9. f. 4

Anglis, prickly Fucus.

Habitat in littore Cornubiensi copiose. *R. Syn.*

***** *Fructificationibus non vesicariis.*

muscoides. 17. *FUCUS* teretes ramosissimus, ramis sparsis spinis
mollibus alternis. *Sp. pl.* 1161.

Fucus folliculaceus fuscus s. nigricans ex insula cy-
pro. *Pet. mus.* 219. *R. hist.* III. 13.

Anglis, Thorny Fucus.

Habitat in littore Eboracensi sed rarius.

incurvus. 18. *FUCUS* teres ramosus, ramulis imbricatis, laciniis
secundis incurvis.

Pinus maritima s. *Fucus teres*, cujus ramuli setis sur-
sum tendentibus sunt obsiti. *R. Syn.* 50.

Anglis, black Fucus, or Sea Pine.

Habitat in littore Sussexiano copiose.

plicatus. 19. *FUCUS* capillaris uniformis ramosissimus implicatus
subdiaphanus.

Fucus trichoides nostras aurei coloris, ramulorum ap-
picibus furcatis. *Pluk. ph.* t. 184. f. 2. *R. Syn.*
45.

β *Fucus coraloides* erectus. *R. Syn.* 51.

Anglis, Matted Fucus.

Habitat in littoribus marinis.

albus. 20. *FUCUS* filiformis teretiusculus subdichotomus, ge-
niculis tumidiusculis, ramis distantibus acutis.

Fucus teres albus tenuissime divisus. *R. Syn.* 50.

Anglis, white Fucus.

Habitat in littore Sussexiano. *R. Syn.*

verrucosus 21. *FUCUS* filiformis teres ramosus, ramis simplicibus,
vesiculis rotundis lateralibus.

Fucus

*Fucus marinus purpurascens parvus, caule et ramulis
f. foliolis teretibus. R. Syn. 50.*

Anglis, Warty Fucus.

Habitat in littoribus marinis paſſim.

22. *FUCUS filiformis teres ramosissimus, ramis alternis, purpureus.
ramulis confertis fructiferis, fructibus globosis.*

Fucus teres rubens ramosissimus. R. Syn. 51.

β *Fucus teres rubens minus ramosus in longum proten-
sus. R. Syn. 51.*

Anglis, Purple Fucus.

Habitat in saxis et rupibus marinis.

23. *FUCUS caule tereti ramoso, ramis alternis ramo- scorpioides
sissimus apice inflexis.*

*Fucoides erectum fruticuli specie, summitatibus in-
flexis. R. Syn. 38. t. 2. f. 6.*

Anglis, upright Fucus.

*Habitat in littore Sussexiano; at Selsey-Island plenti-
fully. Dr. Dill. R. Syn.*

24. *FUCUS teres subdichotomus uniformis, ramis ob- rotundus.
tusis verrucosis.*

*Fucus kali geniculato ſimilis, non tamen geniculatus.
R. Syn. 43.*

Anglis, round Fucus.

*Habitat in rupibus marinis prope S. Ives in Cornubia.
R. Syn.*

25. *FUCUS teres dichotomus, ramis æqualibus acutis. lumbri-
ca-*

Fucus parvus segmentis prælongis teretibus acutis. R. lis.

Syn. 45. Hist. ox. III. 648. f. 15. t. 9. f. 4.

Fucus forcellata lumbicalis species. B. pin. 366.

Anglis, sharp-pointed Fucus.

Habitat in littoribus marinis paſſim.

26. *FUCUS gelatinosus frondibus teretiusculis ramosis. gelatino-
Fucus spongiosus nodosus. Johnſ. it. cant. 3. f. 3. fus.*

Ger. Em. 1570. R. Syn. 49.

Spongia ramosa altera anglica. Park. 1304.

Anglis, Gelly Fucus.

Habitat in littore maris prope Sheerness copioſe.

filiformis. 27. FUCUS filiformis dichotomus planus.

Anglis, flat Fucus.

Habitat in littore Lancastriensi.

crispus. 28. FUCUS frondibus planis dichotomis, apicibus dilatatis bifidis.

Fucus membranaceus purpureus, variæ ramosus. R.
Syn. 47.

Alga crispa scabiosa rubra et pallida. B. hist. III.
795.

Anglis, curled Fucus.

Habitat in littoribus marinis frequens.

palmatus. 29. FUCUS frondibus planis palmatis. Roy. lugdb.

515. Sp. pl. 1162.

Fucus membranaceus ceranoides. B. pr. 155. R.
Syn. 46.

Fucus foliaceus humilis, palmam humanam referens.
Hist. ox. III. 646. f. 15. t. 8. f. 1.

Anglis, Handed Fucus.

Habitat in littoribus marinis passim.

pavonicus. 30. FUCUS fronde sessili reniformi decussatim striata.

Sp. pl. 1162.

Fucus maritimus gallopavonis pennas referens. Bauh.
pr. 155. Hist. ox. III. 645. t. 8 f. 7. R. Syn.
43.

Anglis, striated Fucus, or Turkey-Feather.

Habitat in rupibus et saxis marinis, ex Insula Anglesea, et littore Cornubiensи accepit Bobartus; prope Harvicum collegit, D. Buddle; et prope Exmouth Devoniæ, oppidum copiose nascentem observavit D. Stevens. R. Syn. in littore Insulae Walney, sed rarius.

ciliatus. 31. FUCUS frondibus planis ramosis ciliatis.

Fucus membranaceus rubens angustifolius, marginibus ligulis armatis. R. Syn. 47.

Fucus humilis membranaceus acaulos elegantissimus ruber, capillis longis fimbriatis. Hist. ox. III.
646. 10.

β Fu-

§ *Fucus membranaceus purpureus latifolius pinnatus.*

R. Syn. 47.

Anglis, ciliated Fucus.

Habitat in littoribus marinis frequens.

32. *FUCUS frondibus planis ramosis, ramis dentato-pinnatifidibus marginibus callosis.*

dus.

Fucus dealensis pedicularis rubræ foliis.

Mus. pet.

405. R. Syn. 48.

Alga cervi cornu divisura. B. hist. III. 797.

Anglis, jagged Fucus.

Habitat in saxis et rupibus marinis. Found about Deal by Mr. Dandridge. R. Syn. in littore Devoniae frequens.

33. *FUCUS frondibus planis subdichotomis, ramis alternatis decurrentibus bifidis.*

Fucus dichotomus parvus costatus et membranaceus.

Buddl. hort. sicc. I. 12. R. Syn. 44.

Fucus purpureus tenuiter divisus non geniculatus.

Hist. ox. III. 646.

Anglis, Winged Fucus.

Habitat in littoribus marinis frequens.

34. *FUCUS cartilagineus compressus ramosissimus, ramulis alternatim secundis, fructibus globosis lateralis.*

Fucoides rubens varie dissectum. R. Syn. 37.

Anglis, Scarlet Fucus.

Habitat in littoribus marinis frequens.

35. *FUCUS caule teretiusculo compresso ramoso, ramis plumosus, duplicato pinnatis coloratis.*

Fucoides purpureum eleganter plumosum. R. Syn.

38. t. 2. f. 5.

Anglis, Feathered Fucus.

Habitat in littoribus marinis passim.

36. *FUCUS cartilagineus compressus, frondibus supra-decompositis pinnatis, laciiniis obtusis.*

Anglis, Fern-leaved Fucus.

Habitat in littore Lancastriensi sed rarius.

pinnatus. 37. FUCUS membranaceus, frondibus triplicato-pinnatis.

Anglis, Pinnated Fucus.

Habitat in littoribus Eboracensi et Sussexiano.

corneus. 38. FUCUS cartilagineus, caule teretiusculo compresso ramosissimo, ramis subpinnatis, laciniis acutis fructiferis.

Fucus flavicans teretifolius, ramulis pennatim enascentibus. R. Syn. 50.

Fruticulus parvus pennatus flavicans, corneus et tenax. Buddl. hort. sicc. II. 2.

Anglis, Horny Fucus.

Habitat in littore Devoniae paſſim.

saccharinus. 39. FUCUS caule tereti brévissimo, fronde ensiformi simplici.

Fucus caule tereti brevissimo, fronde maxima subsimplici. Sp. pl. 1161. Fl. lapp. 460. suec. 1151.

Fucus longissimo latissimo crassoque folio. Baub. pr. 154. R. Syn. 39.

β Fucus folio singulari longissimo, lato, in medio rugoso, qui balteiformis dici potest. R. Syn. 39.

γ Fucus latissimus et longissimus oris crispis. R. Syn. 38.

Anglis, sweet Fucus.

Habitat in rupibus et saxis marinis.

confervoides. 40. FUCUS caule tereti ramosissimo, ramulis alternis fasciculatis brevissimis tuberculatis scabris.

Anglis, rough Fucus.

Habitat in littore Eboracensi.

digitatus. 41. FUCUS caule tereti brevissimo, fronde palmata laciniis ensiformibus.

Fucus arboreus polyschides edulis. B. pin. 364. R. Syn. 46.

Fucus phasganoides et polyschides. Ger. Em. 1570.

Fucus maximus polyschides. Park. 1292.

β Fucus membranaceus polyphyllus major. R. Syn. 46.

γ Fucus

2 Fucus scoticus latissimus edulis dulcis. *Sibb.* pr. 26.
R. Syn. 46.

Fucus alatus s. phasganoides. *Bauh. pin.* 362.

Angli, Fingered Fucus.

Habitat in rupibus marinis.

42. FUCUS caule tereti ramoso, frondibus oblongo-*n. rubens*.
 dulatis sinuatis. *Roy. lugdb.* 514. *Sp. pl.* 1162.

Alga minor suave rubens varie divisa. *Mart. cent.*
t. 32. f. 32.

Anglis, red Fucus.

Habitat in littore Cornubiensi.

43. FUCUS caule tereti ramoso, frondibus oblongo-*sanguineus*
 lanceolatis undulatis integerrimis.

*Fucus s. Alga folio membranaceo purpureo, lapathi
 sanguinei figura et magnitudine. Hist. ox. III. 645.*
t. 8. f. 6. R. Syn. 49.

Anglis, Dock-leaved Fucus.

Habitat in littoribus Eboracensi et Cornubensi fre-
 quens.

44. FUCUS frondibus ramosis membranaceus, ramis *laci-*
natus. dilatatis palmatis.

Anglis, jagged Fucus.

Habitat in littore Eboracensi copiose.

45. FUCUS filiformis simplex subfragilis opacus. *Sp. pl. Filum.*
1162. Fl. suec. 1152.

Fucus chordam referens teres prælongus. R. Syn. 40.

Filum marinum germanicum. B. pr. 155.

Ligula marina alba Sussexiana. Pet. gag. t. 91. f. 5.

Anglis, Thread Fucus.

Habitat in rupibus marinis.

U L V A. 1069.

Fructificationes in membrana diaphana.

1. ULVA tubulosa simplex. *Fl. lapp. 458. suec. 1154. intestina-*
lis. Sp. pl. 1163.

Ulva marina tubuloso, intestinorum figuram referens.

R. Syn. 62.

Fucus

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

Fucus cavus. Baub. pin. 364. hist. III. 803.
Tremella marina tubulosa intestinorum figura. Dill.
 musc. 47. t. 9. f. 7.
Anglis, Gutt Layer.
Habitat in fossis maritimis.

compressa. 2. *ULVA tubulosa ramosa compressa.* It. gotl. 262.
 Fl. suec. 1155. Sp. pl. 1163.
Ulva marina tenuissima et compressa. R. Syn. 63.
Anglis, flat Laver.
Habitat in saxis et rupibus marinis frequens.

articulata. 3. *ULVA tubulosa ramosissima articulata, articulis cylindricis, ramis oppositis.*
Corallina lenta purpurea compressa. R. Syn. 34.
Fucus purpureus humilis tenuiter divisus geniculatus.
 Hist. ox. III. 646. f. 15. t. 8. f. 14.
Anglis, Jointed Laver.
Habitat in littore Cornubiæ. R. Syn. in littore Insulæ Walney *passim.*

ramosa. 4. *ULVA fronde ramosa plana undulata purpurea.*
Anglis, Branched Laver.
Habitat in littore Lancastriensi.

dichotoma. 5. *ULVA fronde dichotoma viridis.*
Fucus membranaceus dichotomus gramineus. R. Syn. 45.
Anglis, Grass-leaved Laver.
*Habitat in littore Insulæ Walney *passim.**

latiflora. 6. *ULVA oblonga plana undulata membranacea viridis.* Sp. pl. 1163.
Fucus longissimo latissimo tenuique folio. Baub. pr. 154. R. Syn. 40.
Anglis, curled Laver.
Habitat in littoribus marinis; in littore Insulæ Sheppey. R. Syn.
Obs. Variat colore purpureo.

7. ULVA palmata prolifera membranacea: ramentis *Lactuca*,
inferne angustatis. *Sp. pl.* 1163.
Ulva marina lactucæ similis. *R. Syn.* 62.
Tremella marina vulgaris, lactucæ similis. *Dill.*
musc. 42. *t.* 8. *f.* 1.
Fucus marinus, lactuca marina dictus. *Park.* 1293.
Muscus marinus lactucæ similis. *Baub. pin.* 364.
Lichen marinus. *Ger. Em.*
- β *Ulva palustris lactucæ marinæ similis, sed multo mi-*
nor et tenerior. *R. Syn.* 63.
Tremella palustris, vulgari marinæ similis, sed minor
et tenerior. *Dill. musc.* 43. *t.* 8. *f.* 2.
Anglis, Green Laver, or Oyster Green.
Habitat in mari β in fossis pone Newington prope Lon-
dinum. *Dill.*
8. ULVA fronde dilatata subfinuata, centro radicata. *umbilica-*
lis. *Sp. pl.* 1163.
Ulva marina umbilicata. *R. Syn.* 62.
Fucus umbilicus marinus dictus. *Baub. pin.* 364.
Tremella marina umbilicata.. *Dill. musc.* 46. *t.* 8.
f. 3.
Anglis, Navel Laver.
Habitat in saxis et rupibus marinis, pone Sheerness
sparsum. *Dill. in littoribus Lancastriensi et Eborac-*
censi passim.
9. ULVA fronde oblonga bullata. *Sp. pl.* 1163. *Linza.*
Ulva marina fasciata. *R. Syn.* 62.
Tremella marina fasciata. *Dill. musc.* 46. *t.* 9. *f.* 6.
Fucus Linza dictus, lactucæ marinæ similis. *B. hist.*
III. 801.
Muscus lactucæ marinæ similis. *Baub. pin.* 364.
Anglis, Ribbin Laver.
Habitat in littore marino pone Sheerness. *R. Syn.*
10. ULVA sphærica aggregata. *Fl. suec.* 1160. *Sp. pl. granulata.*
1164.
Tremella palustris, vesiculis sphæricis fungiformibus.
Dill. musc. 55. *t.* 10. *f.* 17.

Liche-

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

Lichenoides fungiforme, capitulis vel vesiculis sphæricis, aqueo humore repletis. R. Syn. 70.
Anglis, Bladder Laver.

Habitat ad margines fossarum inque fossis exsiccatis inter Newington et Hackney prope Londinum. R. Syn.

C O N F E R V A. 1070.

Tubercula inæqualia, in fibris capillaribus, longissimis.

* *Filamentis simplicibus, æqualibus, geniculis deſtitutis.*

rivularis. 1. CONFERVA filamentis simplicissimis æqualibus longissimis. Fl. suec. 1161. Sp. pl. 1164.

Conferva fluviatilis fericea vulgaris et fluitans. Dill. musc. 12. t. 2. f. 1.

Conferva Plinii. Gesn. Cat. 23. R. Syn. 58.

Conferva palustris fericea, filamentis crassioribus et longioribus. R. Syn. 477.

Conferva palustris fericea, crassior et varie extensa. Dill. musc. 13. t. 2. f. 2.

Anglis, River Conferva.

Habitat in rivulis.

fontinalis. 2. CONFERVA filamentis simplicissimis æqualibus digito brevioribus. Sp. pl. 1164. Fl. suec. 1163.

Conferva minima byſſi facie. Dill. musc. 14. t. 2. f. 3.

Conferva fontalis fusca, omnium minima mollis. R. Syn. 58.

Anglis, Spring Conferva.

Habitat in rivo novo versus Hornsey. Dill.

** *Filamentis ramosis, æqualibus.*

furcata. 3. CONFERVA filamentis æqualibus extremitatibus ramosis, ramis sub-simplicibus.

Conferva capillacea, filamentis bifidis et trifidis. Dill. musc. 16. t. 2. f. 6.

Conferva rivulorum bicornis, filamentis tenuissimis. R. Syn. 58.

β Conferva palustris, filamentis brevioribus et crassioribus. Dill. musc. 17. t. 3. f. 10.

Conferva

Confervæ palustris subhirſuta filamentis brevioribus et crassioribus. R. Syn. 477.

Anglis, forked Conferva.

Habitat in rivulis & in fossis paſſim.

4. CONFERVA filamentis æqualibus ramosissimis, ra- *foenicula-*
mulis ramulisque longissimis sparsis. *cea.*

Confervæ marina foeniculacea. Dill. musc. 16. t. 2.
f. 8.

Anglis, Fennel-leaved Conferva.

Habitat in rupibus maritimis in Mona Insula. Dill.

5. CONFERVA filamentis æqualibus ramosissimis, ra- *rigida.*
mulis brevissimis alternis.

Confervæ fluviatilis fibrillosa, subrigida. Dill. musc.
21. t. 4. f. 16.

Anglis, Rough Conferva.

Habitat in fluvio qui ericetum Hounſlejano percurrit.

Dill. in fluvio Lug. prope Mortimer's Cross in Herefordienſi comitatu. L. Brown.

6. CONFERVA filamentis æqualibus ramosis, exſicca- *amphibia.*
tione coēuntibus in aculeos. Sp. pl. 1164. Fl. ſu-
ec. 1164.

Confervæ amphibia, fibrillosa et spongiosa. Dill. musc.
22. t. 4. f. 17.

Confervæ terrefrīs exilis fibrillosa. R. Syn. 59.

Fungus vel potius spongia viridis doliolis adnascenti fi-
miliſ. R. Syn. 57.

Anglis, amphibious Conferva.

Habitat ad ripam Thameſis frequens.

7. CONFERVA filamentis æqualibus ramosis, bullas *bulloſa.*
aëreas includentibus. Sp. pl. 1164. Fl. ſuec. 1166.

Confervæ palustris bombycinia. R. Syn. 60. Dill.
musc. 18. t. 3. f. 11.

Alga bombycinia. Bauh. pin. 363. pr. 155. Park.
1261.

Anglis, Cotten Conferva.

Habitat in fossis et aquis stagnantibus, paſſim.

canalicu- 8. CONFerva filamentis æqualibus basin versus ramosioribus. *Sp. pl.* 1164. *Fl. suec.* 1162.

Conferva rivulorum capillacea, densissime congestis ramulis. *R. Syn.* 58. *Dill. musc.* 21. t. 4. f. 15.

Alga in tubulis aquam fontanam ducentibus. *B. pin.* 364.

Anglis, Mill Conferva.

Habitat in rivulis purioribus, inque tubulis et afferibus aquas ad molas deduentibus.

tomentosa. 9. CONFerva filamentis æqualibus ramosissimis, ramis simplicibus confertis fuscis.

Conferva marina tomentosa, tenerior et albicans. *R. Syn.* 59. *Dill. musc.* 19. t. 3. f. 12.

Muscus maritimus gossipio similis. *Bauh. pin.* 663. *Hist. ox.* III. 649.

β Conferva marina tomentosa, minus tenera et ferruginea. *Dill. musc.* 19. t. 3. f. 13.

Anglis, Wool Conferva.

Habitat in fossis et littoribus marinis paſſim.

aerugino- fa. 10. CONFerva filamentis ramosis mollibus dito brevioribus viridissimis. *Sp. pl.* 1165.

Conferva marina capillacea brevis, viridissima mollis. *Dill. musc.* 23. t. 4. f. 20.

Anglis, Sea-green Conferva.

Habitat in fucis prope Llanfaethly in Mona insula. *Dill.*

spongiosa. 11. CONFerva filamentis ramosis æqualibus, ramulis simplicibus imbricatis.

Fucus teretifolius spongiosus pilosissimus. *R. Syn.* 46.

Fucus teres villis quaquaversum abductus. *R. Syn. ed.* II. 330.

Muscus marinus hirsutus, flagellis longis ramosis subviridibus. *Hist. ox.* III. 650. f. 15. t. 9. f. 6. 7.

Anglis, Sponge Conferva.

Habitat in littoribus marinis frequens.

12. CONFerva filamentis æqualibus ramosis, ramis nigra.
faciculatis brevissimis.
Anglis, black Conferva.
Habitat in littore Eboracensi copiose.
13. CONFerva filamentis æqualibus dichotomis. Sp. *dichotoma*.
pl. 1165.
Conferva dichotoma, setis porcinis similis. Dill. musc.
17. t. 3. f. 9.
Conferva Plinii setis porcinis similis. Merr. pin. R.
Syn. 58.
Anglis, Bristle Conferva.
Habitat in fossis inter Greenwich et Woolwich. R.
Syn.
14. CONFerva filamentis proliferis fastigiatis hirtis. *scoparia*.
Sp. pl. 1156.
Conferva marina pennata. Dill. musc. 24. t. 4. f. 23.
Anglis, Broom Conferva.
Habitat in littore marino inter Margate et Dover, in
littore Devoniæ frequens.
15. CONFerva filis ramosis : filamentis alternis bre- cancellata,
vibus multipartitis digitatis. Sp. pl. 1165. Fl. suec.
1171.
Conferva marina cancellata. R. Syn. 59. Dill. musc.
24. t. 4. f. 22.
Anglis, Latticed Conferva.
Habitat pone Sheerness in insula Sheepy. R. Syn.
- ** *Filamentis anastomosantibus.*
16. CONFerva filamentis reticulato-coadunatis. Sp. *reticulata*.
pl. 1165. Fl. suec. 1167.
Conferva reticulata. R. Syn. 59. Dill. musc. 20. t.
4. f. 14.
Conferva reticulata crispa. Pluk. ph. t. 24. f. 2.
Hist. ox. III. 644. t. 4. f. 4.
Anglis, Net Conferva.
Habitat in fossis prope Westmonasterium, et rivulis
in ericeto Hounflejano, D. Doody.

*** *Filamentis nodosis.*

fluvialis. 17. CONFerva filis simplicissimis setiformibus rectis : geniculis crassioribus angulatis. Sp. pl. 1165. Fl. suec. 1168.

Conferva fluvialis lubrica setosa, Equiseti facie. Dill. musc. 39. t. 7. f. 47.

Anglis, Horse-tail Conferva.

Habitat prope Bangoriam in rivo aquæ dulcis, dicto Afon Cegin, inter molendinum vocatum Pandu maes y Geirchan et Melun Escob lapidibus dense adnascentem invenit et misit. Sam. Brewer. Dill. musc.

gelatinosa. 18. CONFerva filis ramosis moniliformibus, articulis globosis gelatinosis. Sp. pl. 1166.

Conferva fontana nodosa, spermatis ranarum instar lubrica, major et fusca. R. Syn. 62. Dill. musc. 36. t. 7. f. 42.

β Conferva fontana nodosa, spermatis ranarum instar lubrica, minor et viridis. Dill. musc. 37. t. 7. f. 43.

γ Conferva stagnatilis, globulis virescentibus mucosis. Dill. musc. 38. t. 7. f. 44.

δ Conferva alpina lubrica, filamentis nodosis cæruleis. Dill. musc. 38. t. 7. f. 45.

ε Conferva fontana nodosa lubrica, filamentis tenuissimis nigris. Dill. musc. 39. t. 7. f. 46.

Anglis, Frog-spawn Conferva.

Habitat in fonte ampio et limpido vici Godalmin in Surreia, juxta viam regiam, et in fonte quodam prope Cicestriam in Sussexia ; β. in rivulo in saltu Enfieldensi ; γ. δ. prope Mancunium ; ε. in Mona insula. Dill. in rivulo prope Martin in Surreia.

***** *Filamentis geniculatis.*

capillaris. 19. CONFerva filis geniculatis simplicibus, articulis alternatim compressis. Sp. pl. 1166.

Conferva filamentis longis geniculatis simplicibus. Dill. musc. 25. t. 5. f. 25.

Confervæ palustris, s. filum marinum anglicum. R.

Syn. 60.

Confervæ geniculata minima nostras. Pluk. ph. t.

84. f. 9. Hist. ox. III. 644. t. 4. f. 4.

Anglis, Thread Conferva.

Habitat in fossis et lucubus marinis.

20. CONFERVA filis geniculatis ramosis, articulis al. *tubulosa*,
ternatim compressis.

Confervæ marina fistulosa. Dill. musc. 34. t. 6. f. 39.

*Confervæ marinæ geniculata albicans diaphragmatis
distincta. R. Syn. 60.*

*Confervæ marina nodosa ex albo rubescens mollis, sed
minus lubrica. R. Syn. 51.*

*Tremella filiformis articulata: articulis alternatim
compressis. Sp. pl. 1163.*

Anglis, Hollow Conferva.

Habitat in littore marino passim.

21. CONFERVA filamentis geniculatis ramosissimis, *pellucida*.
articulis cylindricis, ramis oppositis.

Anglis, transparent Conferva.

Habitat in littore insulæ Walney.

22. CONFERVA filamentis geniculatis subdichotomis, *polyntorpha*.
ramis fasciculatis nigris.

*Confervæ filamentis geniculatis, ramis fasciculatis. Sp.
pl. 1167. Fl. suec. 1174.*

*Confervæ marina geniculata nigra palmata. Dill. musc.
32. t. 6. f. 35.*

*Confervæ marina geniculata ramosissima lubrica, bre-
vibus et palmatim congestis ramulis. R. Syn. 61.*

Muscus capillaceus multifidus niger. B. pin. 363.

Anglis, Palmated Conferva.

Habitat in littoribus marinis frequens.

23. CONFERVA filis geniculatis dichotomis, *glomerata*,
tis ramosis, ramulis brevibus fasciculatis scabris.

*Confervæ fontalis ramosissima, glomeratum congesta.
R. Syn. 59. Dill. musc. 28. t. 5. f. 31.*

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

Conferva filamentis geniculatis, ramulis brevioribus multifidis. *Sp. pl.* 1167.

Conferva viridis capillacea, brevioribus setis, ramo-fior, s. *conferva minor ramosa*. *Hist. ox.* III. 644. *f. 15. t. 4. f. 2.*

Anglis, Cluster *Conferva*.

Habitat in fluviis et littoribus marinis.

Confer. *Conferva marina trichoides*, ramosissima, sparsa. *Dill. musc.* 28. *t. 5. f. 30.* *R. Syn.* 60.

corallinoi- 24. **CONFERTVA** filamentis geniculatis dichotomis. *des.* *Sp. pl.* 1166.

Conferva marina gelatinosa, corallinæ instar geniculata tenuior. *Dill. musc.* 33. *t. 6. f. 37.*

Corallina confervoides gelatinosa rubens, ramulis et geniculis peranguitis. *R. Syn.* 34.

Muscus marinus capillaris rubens non ramosus. *Musc.* *Pet.* 274.

β *Conferva marina gelatinosa*, corallinæ instar geniculata crassior. *Dill. musc.* 33. *t. 5. f. 36.*

Corallina confervoides geniculata alba, geniculis crassiusculis pellucidis. *R. Syn.* 34.

Anglis, Coralline *Conferva*.

Habitat in littoribus marinis passim.

elongata. 25. **CONFERTVA** filamentis geniculatis ramosissimis, ramulis longissimis distantibus acutis.

Conferva marina geniculata ramosissima lubrica, longis sparsisve ramulis. *R. Syn.* 61. *Dill. musc.* 35. *t. 6. f. 38.*

Anglis, Pointed *Conferva*.

Habitat in littoribus marinis frequens.

fulva: 26. **CONFERTVA** filamentis geniculatis ramosis, ramulisque brevissimis alternis.

Anglis, short *Conferva*.

Habitat in littore Eboracensi.

plicata. 27. **CONFERTVA** filis geniculatis ramosis, filamentis ramosissimis implexis.

Conferva

Conferva marina capillacea longa ramosissima, mol-
lis. *R. Syn.* 59. *Dill. musc.* 23. t. 6. f. 19.
Anglis, matted Conferva.
Habitat in rupibus et faxis marinis passim.

28. CONFERVA filamentis geniculatis flexuosis, ramis vagabun-
- ramulisque brevioribus. *Sp. pl.* 1167. *Fl. suec.* 1177. da.
Conferva marina trichoides, lanæ instar expansa. *R.*
Syn. 60. *Dill. musc.* 30. t. 5. f. 32.
Anglis, spreading Conferva.
Habitat in paludibus maritimis.

29. CONFERVA filamentis geniculatis ramosis, ramis rupestris.
alternis ramosis viridibus.
Conferva filamentis geniculatis ramosissimis viridibus.
Sp. pl. 1167. *Fl. suec.* 1176.
Conferva marina trichodes ramosior. *Dill. musc.* 28.
t. 5. f. 29.
Conferva marina trichodes, s. muscus marinus virens
tenuifolius. *Pluk. mant.* 53. t. 182. f. 6. *R. Syn.*
60.
Conferva fluviatilis trichodes, extremitatibus ramosis.
Cat. giss. 199.
Anglis, Rock Conferva, or Sea-Beard.
Habitat in rupibus maritimis et in fluviis, passim.

30. CONFERVA filamentis geniculatis ramosis ramis sericea,
fasciculatis confertis viridibus.
Conferva trichodes virgata, sericea. *Dill. musc.* 31.
t. 5. f. 33.
Conferva marina trichodes, ramulis virgatis longiori-
bus glabris. *R. Syn.* 60.
Anglis, Silk Conferva.
Habitat in littore insulæ Shepey; in Rivo Novo prope
Londinum. *Dill.*

31. CONFERVA filamentis geniculatis ramosissimis ra- fucoides.
mulis multifidis fasciculatisque.
Anglis, Branched Conferva.
Habitat in littore Eboracensi.

- fusca.* 32. CONFERTA filamentis geniculatis ramosissimis,
ramulis alternis simplicibus.
Anglis, Brown Conferva.
Habitat in littore Eboracensi.
- rubra.* 33. CONFERTA filamentis geniculatis ramosissimis
compressis, ramis supradecompositis pinnatis co-
loratis.
Fucus cartaligineus, stipite teretiusculo compresso :
frondibus supradecompositis pinnatis : laciniis line-
aribus coloratis. *Roy. lugdb.* 515. *Sp. pl.* 1161.
Muscus marinus folio multifido. *Johns. Merc. bot.*
II. 27.
Muscus pelagicus pennatus rubens, ramulis numero-
sis mollibus latius se spargentibus. *Pluk. ph. t.* 48.
f. 2.
Muscus marinus purpureus parvus, foliis oblongis
millefolii fere divisura. *R. Hist. I.* 79.
Anglis, Red Conferva.
Habitat in littoribus marinis frequens.
- pennata.* 34. CONFERTA filamentis geniculatis ramosis, ramis
duplicato pinnatis fuscis.
Conferva marina pennata. *Pet. hort. sicc.* *R. Syn.* 59.
Anglis, Feathered Conferva.
Habitat in littore marino inter Margate et Dover, *R.*
Syn. In littore insula Walney.
- parasitica.* 35. CONFERTA filis geniculatis pinnatis.
Anglis, Winged Conferva.
Habitat in fucis in littore Eboracensi passim.
- ægagro-
pila.* 36. CONFERTA filamentis geniculatis ramosissimis
e centro consertissimis globum constituentibus. *Sp.*
pl. 1167. *Fl. suec.* 1169.
Conferva globosa. *Aet. Engl. Vol. XLI.* 498.
Anglis, Globe Conferva, or Moor Balls.
Habitat in lacubus montosis, in comitatu Westmor-
landico. In Wallingfen-Moor, Yorkshire. *Mr.*
Tho. Knowlton.

BYSSUS. 1071.

*Lanugo aut Pulvis simplicissimus.** *Filamentosæ.*

1. BYSSUS filamentis plumosis natantibus. *Sp. pl. Flos aquæ*
1168.
Byssus latissima, papyri instar supra aquam expansa.
Dill. musc. I. R. Syn. 57.
Anglis, Paper Byssus.
Habitat in aquis stagnantibus.

2. BYSSUS lanuginosa violacea lignis adnascens. *R. phospho-*
Syn. 56. Dill. musc. 4. t. I. f. 6. Sp. pl. 1168. rea.
Anglis, Violet-coloured Byssus.
Habitat in lignis putrefactibus.

3. BYSSUS filamentosa viridis. *Sp. pl. 1168. velutina.*
Byssus tenerrima viridis velutum referens. R. Syn. 56.
Dill. musc. 7. t. I. f. 14.
Anglis, Velvet Byssus.
Habitat in corticibus arborum et terris umbrosis.

4. BYSSUS capillacea pulverulenta, fructificationibus *aurea.*
sparsis, filamentis simplicibus ramosisque. Gleditsch.
fung. I. Sp. pl. 1168.
Byssus petræa crocea, glomerulis lanuginosis. Dill.
musc. 8. t. I. f. 16.
Byssus aurea derbiensis humifusus. Pet. gaz. I. t. 13.
f. 3.
Anglis, Saffron-coloured Byssus.
Habitat in rupibus Arvoniæ passim. Dill.

5. BYSSUS filamentis ramosis rigidis atris faxis adnascens. *nigra.*
Byssus petræa nigerrima fibrosa. R. Syn. 57.
Anglis, Black Byssus.
Habitat in rupibus calcariis prope Ingleborough et
Settle in comitatu Eboracensi.

6. BYSSUS filamentis ramosis fulvis. *fulva.*
I i 4 *Byssus*

Byffus arborea crocea fibrofa. R. Syn. 57. Dill.
musc. 9. t. 1. f. 17.

Anglis, Brown Byffus.

Habitat in lignis putridis.

barbata. 7. BYSSUS? filamentis erectis, summitatibus ramosis.
Byffus arborea barbata, fulvi coloris. R. Syn. 57.
Dill. musc. 9. t. 1. f. 19.

Pseudo-spongia fungoides fulva lignis adnascens. R.
Syn. ed. II. 334.

Anglis, Bearded Byffus.

Habitat in lignis putrescentibus.

candida. 8. BYSSUS filamentis ramosissimis ramis fasciculatis albidis.

Byffus tenerime villosa et elegantissime ramulosa.
R. Syn. 476. t. 23. Dill. musc. 7. t. 1. f. 15.

Anglis, Grey Byffus.

Habitat in lignis et foliis putrescentibus.

crypto-
rum. 9. BYSSUS capillacea perennis cinerea tenax rupi in-

nata. Fl. lapp. 527. suec. Sp. pl. 1168.

Byffus albida brevis setacea. Dill. musc. 10. t. 1.
f. 20.

Anglis, Bristle Byffus.

Habitat in crypta subteranea in comitatu Herefordiensi.
Dill.

** Pulverulentæ.

antiquita-
tis. 10. BYSSUS pulverulenta atra. It. gotl. 298. Sp. pl.
1168.

Anglis, Black Powder Byffus.

Habitat in muris antiquissimis frequens.

saxatilis. 11. BYSSUS pulverulenta cinerea rupes operiens. Sp.
pl. 1169.

Anglis, Stone Byffus.

Habitat in rupibus calcaris in comitatibus Westmorlan-
dico et Eboracensi.

12. BYSSUS pulverulenta flava lignis adnascens. *R. candelaris.*
Syn. 56. Dill. musc. 3. t. 1. f. 4. Sp. pl. 1169.
Anglis, Yellow Byssus.
Habitat in corticibus arborum.
13. BYSSUS pulverulenta viridis. *Sp. pl. 1169. botryoides.*
Byssus botryoides saturate virens. R. Syn. 56. Dill.
musc. 3. t. 1. f. 5.
Anglis, Green Byssus.
Habitat in cortice arborum et terra humida, umbrosa.
14. BYSSUS pulverulenta incana, farinæ instar strata. *incana.*
R. Syn. 56. Dill. musc. 3. t. 1. f. 3. Sp. pl. 1169.
Anglis, Mealy Byssus.
Habitat in solo glareoso, ad latera fossularum, juxta vias publicas.
15. BYSSUS pulverulenta-crustacea albissima. *Sp. pl. lactea.*
1169.
Byssus candidissima, calcis instar Muscos vestiens.
Dill. musc. 2. t. 1. f. 2.
Anglis, White Byssus.
Habitat in muscis et arborum corticibus.

S P O N G I A. 1072.

*Pili intricati intertexti.** *Tenaces.*

1. SPONGIA tenax ramosissima erecta, ramis teretiusculis obtusis. *Sp. pl. 1170.*
Spongia ramosa. Bauh. pin. 368. R. Syn. 29. Britannica. Park. 1304.
Anglis, Branched Sponge.
Habitat in littoribus marinis paßim.
2. SPONGIA erecta dichotoma compressa. *dichotoma.*
Spongia dichotomos teretifolia viridis. R. Syn. 29.
*Fucus spongiosus teres ramosior viridis erectis. Hisp.
 ox. III. 647. t. 8. f. 7.*

Fucus

CRYPTOGAMIA FUNGI.

Fucus filiformis compressus dichotomus rectus : geniculis tumidiusculis. Sp. pl. 1159.

Anglis, forked Sponge.

Habitat in littoribus marinis. In Cornubia. R. Syn. in littore Eboracensi, sed rarius.

* *Fragiles.*

lacustris. 3. **SPONGIA** repens fragilis, ramis teretibus obtusis. Sp. pl. 1171. Fl. suec. 1190.

Spongia ramosa fluviatilis. R. Syn. 30.

Anglis, creeping sponge.

Habitat in fundo lacuum. In comitatu Westmorlano-dico frequens.

fluviatis. 4. **SPONGIA** erecta fragilis, ramis teretiusculis. Sp. pl. 1171. Fl. suec. 1191.

Spongia fluviatilis ramosa fragilis. R. Syn. 30.

Spongia fluviatilis anfractuosa perfragilis ramosissima. Pluk. ph. t. 112. f. 3.

Anglis, River Sponge.

Habitat in fluviis. In the river Thames by Swythens Wyars, near Oxford. In fluvio Camo inter Cantabrigiam et Chesterton. In the river by Waltham Abby, Essex. R. Syn.

F U N G I.

A G A R I C U S. 1074.

Fungus horizontalis, subtus lamellosum.

* *Stipitati, pileo orbiculato.*

Chanta-rellus. 1. **AGARICUS** stipitatus, lamellis ramosis decurrentibus. Sp. pl. 1171. Fl. suec. 1207.

Fungus angulosus et velut in lacinias sectus. Baub. pin. 371. Vaill. parif. t. 11. f. 14, 15.

Fungus luteus s. pallidus, Chanterelle dictus, se contorquens esculentus. Baub. hist. III. 832. R. Syn. 2.

Fungi lethales. *Ger. Em.* 1385.

Anglis, yellow Agaric, or Champignon.

Habitat in pratis, pascuis et sylvis.

2. AGARICUS stipitatus, lamellis omnibus magnitudi-integer.
ne æqualibus. *Fl. suec.* 1230. *Sp. pl.* 1171.
Agaricus caulescens, pileo plano-concavo purpureo,
lamellis stipiteque albis. *Fl. lapp.* 486.
Fungus major pediculo longo, modice crasso, lamel-
lis albis creberrimis, superne ad margines apparen-
tibus. *R. Syn.* 4.
Anglis, white Agaric.
Habitat in sylvis.
3. AGARICUS stipitatus, lamellis dimidiatis solitariis, *mujarius*.
stipite volvato : apice dilatato, basi ovato. *Fl. suec.*
1236. *Sp. pl.* 1172.
Fungus pileo sanguineo verrucoso, lamellis albis, an-
nulo, fugaci, pediculo bulbose. *Hall. helv.* 39.
Anglis, reddish Agaric.
Habitat in pratis inter Hampstead et Highgate, sed
rarius.
4. AGARICUS stipitatus, pileo plano carneo lactes-*lactifluus*:
cente, lamellis rufis, stipite longo carneo. *Sp. pl.*
1172.
Fungus lactescens non acris. *R. Syn.* 4.
Anglis, Milky Agaric.
Habitat in sylvis. In sylva Charlton Wood dicta.
5. AGARICUS stipitatus, pileo planiusculo lactescente : *piperatus*,
margine deflexo, lamellis incarnato-pallidis. *Sp. pl.*
1173. *Fl. suec.* 1195.
Fungus piperatus albus lacteo succo turgens. *Baub.*
hist. III. 825. *R. Syn.* 4. *Mich. gen.* 141. *Hall.*
helv. 34.
Fungus albus acris. *Baub. pin.* 370.
Anglis, Pepper Agaric.
Habitat in sylvis. In sylva Charlton Wood dicta
copiose.

CRYPTOGAMIA FUNGI.

- campeſ-* 6. AGARICUS stipitatus, pileo convexo squamato albo, lamellis rufis. *Sp. pl.* 1173. *Fl. suec.* 1203.
Fungus campestris albus superne, inferne rubens.
Baub. hist. III. 824. R. Syn. 2. Mich. gen. 174.
Fungus esculentus. Park. 1317.
Anglis, Field Agaric, or common Mushroom.
Habitat in pratis et paſcuis.
- violaceus.* 7. AGARICUS stipitatus, pileo rimoso : margine violaceo tomentoso, stipite cærulescente lana ferruginea. *Sp. pl.* 1173. *Fl. suec.* 1226.
Fungus pileo magno, orbiculari, sublivido, lamellis albis, pediculo brevi bulbiformi violaceo. R. Syn. 3.
Fungus esculentus bulbosus dilute purpureus. Mich. gen. 149 t. 49. f. 1. Hall. helv. 52.
Anglis, Violet Agaric.
Habitat in pratis circa Newington. Dill. R. Syn. XII.
- cinnamo-* 8. AGARICUS stipitatus, pileo sordide flavo, lamellis luteo-ruffis. *Sp. pl.* 1173. *Fl. suec.* 1205.
Fungus ovinus. Sterb. 64 t. 4. D. E. F. R. Syn. 2.
Fungus planus orbiculatus aureus. B. pin. 371.
Anglis, brown Agaric.
Habitat in sylvis paſſim.
- vifcidus.* 9. AGARICUS stipitatus, pileo purpurascente-fusco vificio, lamellis fusco-purpurascensibus. *Sp. pl.* 1173.
Fl. suec. 1229.
Agaricus cauleſcens, pileo convexo purpurascente, lamellis rufis, stipite brevi crassiusculo albo. Fl. lapp. 485.
Amanita dura, ex fusco-rubens quercina. Dill. cat. giff. R. Syn. 5.
Anglis, clammy Agaric.
Habitat in sylvis.
- equeſtris.* 10. AGARICUS stipitatus, pileo pallido : disco ſtellatim luteo, lamellis sulphureis. *Sp. pl.* 1173. *Fl. suec.* 1219.

Agaricu

Agaricus caulescens, pileo convexo sordido: margine infexo, lamellis pallidis: basi remotis, stipite cylindraceo. *Fl. lapp.* 502.

Fungus parvus parvi galeri formam exprimens rufus.
Baub. pin. 373. *R. Syn.* 7.

Anglis, Starry Agaric.

Habitat in ericetis *passim*.

11. AGARICUS stipitatus, pileo convexo acuminato *mammom-*
griseo, lamellis convexis griseis crenatis, stipite nu-*sus*.
do. *Sp. pl.* 1174. *Fl. suec.* 1218.

Fungus minor, capitulo pileum nauticum referente,
pediculo longiore. *Buxb. cent.* IV. 13. t. 21.
f. I.

Fungus sordide fulvus capitulo in conum fastigiato,
pediculo longissimo firmo striato. *R. Syn.* 4.

Anglis, grey Agaric.

Habitat in *sylvis*.

12. AGARICUS stipitatus, pileo hemisphærico viscido *clypeatus*.
acuminato, lamellis albis, stipite longo cylindrico
albo. *Fl. lapp.* 506. *fluec.* 1216. *Sp. pl.* 1174.

Fungus major, pediculo longo, modice crasso, la-
mellis albis creberrimis, superne ad margines a-
parentibus. *R. Syn.* 4.

Anglis, long-stalked Agaric.

Habitat in *sylvis*.

13. AGARICUS stipitatus pileo campaniformi albido *extincto-*
lacero, lamellis niveis, stipite subbulboso sub

- lius

nudo. *Sp. pl.* 1174. *Fl. suec.* 1196.

Anglis, Conic Agaric.

Habitat in *pratis prope Tottenham*.

14. AGARICUS stipitatus, pileo campanulato lacero, *fimetari-*
lamellis nigris lateraliter flexuosis, stipite fistuloso. us.
Sp. pl. 1174. *Fl. suec.* 1215.

Fungus albus ovum referens. *R. Syn.* 5. *Buxb. cent.*
IV. t. 27. f. I.

Anglis, Egg Agaric.

Habitat in *fimetis frequens*.

15. AGA-

CRYPTOGAMIA FUNGI.

- verrucosus* 15. AGARICUS caulescens, pileo convexo cinereo : verrucis lamellisque albis, stipite basi crassissimo : *Fl. lapp. 512. suec. 1236.*
Fungus pileo plano ad oras striato sordido verrucoso,
subtus albus annulatus. Hall. helv. 43.
Fungi albi venenati viscidii. B. hist. III. 826. Sterb.
fung. 206 t. 2. f. K. R. Syn. 7.
Anglis, Warty Agaric.
Habitat in nemorosis.
- campanu-* 16. AGARICUS stipitatus, pileo campanulato striato pellucido, lamellis adscendentibus, stipite nudo. *Sp. pl. 1175. Fl. suec. 1213.*
Fungus perpusillus, pediculo oblongo, pileo tenui utrinque striato, seu flabelli in modum plicatili. R. Syn. 8.
Anglis, Bell Agaric.
Habitat in pratis et pascuis.
- separatus.* 17. AGARICUS stipitatus, pileo laevi livido, lamellis nigricantibus separatis, stipite bulboso volvato. *Sp. pl. 1175. Fl. suec. 1220.*
Fungus parvus pediculo oblongo, galericulatus, striis lividis aut nigris. R. Syn. 8.
Anglis, blackish Agaric.
Habitat in stercoratis.
- fragilis.* 18. AGARICUS stipitatus, pileo convexo viscido pelliculoso lamellisque luteis, stipite nudo. *Sp. pl. 1175.*
Fungus pileo croceo splendoris participe. Vaill. paris. t. 11. f. 16. 17. 18.
Fungus pratensis minor, externe viscidus, capitulo praecædantis, striis subtus fulvis s. croceis. R. Syn. 8.
Anglis, brittle Agaric.
Habitat in ericetis.
- umbellifer-* 19. AGARICUS stipitatus, pileo plicato membranaceo, rus. lamellis basi latioribus. *Sp. pl. 1175. Fl. suec. 1192.*

Fungus

Fungus *párvus candidissimus lamellatus, pediculo longo gracili.* R. Syn. 9.

Anglis, Wood Agaric.

Habitat *inter semiputrida dejecta folia sylvarum.*

20. AGARICUS stiptatus albus, pileo plicato membra- *Androsa-*
naceo, stipite nigro. Sp. pl. 1175. Fl. suec. 1193. ceus.

Fungus minimus adianti aurei capitulis. R. Syn. 9.

Fungus caule nigro capillari, androsaces capitulo.

Bocc. musc. 143. t. 104.

Anglis, Black stalked Agaric.

Habitat *in lignis et foliis putridis. On rotten Sticks in the Bottoms of old Lakes.* R. Syn.

* *Parasiti acaules, dimidiati.*

21. AGARICUS acaulis, lamellis labyrinthiformibus. *quercinus.*
Sp. pl. 1176.

Agaricus quernus lamellatis coriaceus villosus. Cat.

giff. R. Syn. 25.

Anglis, Oak Agaric.

Habitat *in truncis arborum.*

22. AGARICUS acaulis coriaceus, lamellis sinuatis *pectina-*
simplicibus. *tus.*

Agaricus coriaceus longissimus, pectinatum inferne
divisus. R. Syn. 25.

Anglis, Toothing Agaric.

Habitat *in lignis putridis.*

23. AGARICUS acaulis coriaceus villosus : margine *Betulinus.*
obtuso, lamellis ramosis anastomosantibus. Sp. pl.

1176. Fl. suec. 1244.

Agaricus villosus, lamellis sinuosis et invicem im-
plexis. Cat. giff. R. Syn. 24.

Anglis, Birch Agaric.

Habitat *in truncos arborum.*

24. AGARICUS acaulis, lamellis bifidis pulverulentis. *alneus.*
Sp. pl. 1176. Fl. suec. 1242.

Aga-

CRYPTOGAMIA FUNGI.

Agaricus parvus lamellatus pectunculi forma elegans.

Cat. giff. R. Syn. 25.

Anglis, Alder Agaric.

Habitat ad truncos arborum. In the woods near Dulwich. R. Syn.

BOLETUS. 1075.

Fungus horizontalis, subitus porosus.

* *Parasitici acaules.*

suberosus. 1. BOLETUS acaulis pulvinatus albus lævis, poris acutis difformibus. *Sp. pl. 1176. Fl. suec. 1253.*

Agaricus intibaceus. Tourn. 562. R. Syn. 23.

β *Fungus foraminosus arboreus lævis albissimus. R. Syn. ed. II. 340.*

Anglis, Cork Boletus.

Habitat in Fraxinis in comitatu Westmorlandico frequens.

fomentarius. 2. BOLETUS acaulis pulvinatus inæqualis obtusus, poris teretibus æqualibus glaucis. *Sp. pl. 1176. Fl. suec. 1252.*

Agaricus porosus ignarius Carpini. Cat. giff. R. Syn. 24.

Anglis, Spongy Boletus.

Habitat in caudicibus arborum.

versicolor. 3. BOLETUS acaulis, fasciis dicoloribus, poris albis. *Sp. pl. 1176. Fl. suec. 1254.*

Agaricus varii coloris squamosus. Tourn. 562. R. Syn. 24.

Fungus arborum et lignorum putrescentium, coloris varii. R. Syn. ed. II. 18.

Anglis, striped Boletus.

Habitat in truncis arborum.

albus. 4. BOLETUS acaulis pulvinatus lævis, poris oblongis. *Agaricus officinali similis. Cat. giff. R. Syn. 23.*

Fungus arboreus albidus maximus, s. Agaricus spurius. R. Syn. ed. II. 335.

Anglis, white Boletus.

Habitat in salicibus.

5. BOLETUS acaulis pulvinatus laevis, poris tenuissimi-igniarius;
mis. *Fl. lapp.* 582. *suec.* 1256. *Sp. pl.* 1176.
Agaricus pedis equini facie. *Tourn.* 562. *R. Syn.* 22.
Fungus durus sive igniarius. *Park.* 1323.
Anglis, hard Boletus, or Touchwood.
Habitat in arborum truncis.

** *Stipitatis.*

6. BOLETUS stipitatus, pileo glabro pulvinato marginato, poris compositis acutis: porulis angulatis brevioribus. *Sp. pl.* 1177. *Fl. suec.* 1246.
Suillus fulvus inferne ex flavo virescens. *Hall. helv.*
29.
Fungus porosus crassus. *R. Syn.* 11.
Anglis, brown Boletus.
Habitat in sylvis.
7. BOLETUS stipitatus, pileo pulvinato subviscido, poris rotundatis convexis flavissimis, stipite albo. *Sp. pl.* 1177. *Fl. suec.* 1247.
Boletus luteus. *Cat. giss.* *R. Syn.* 10.
Suillus annulatus terreus inferne flavescens. *Hall. helv.* 29.
Anglis, yellow Boletus.
Habitat in sylvis pastim.

H Y D N U M. 1076.

Fungus horizontalis, subtus echinatus.

1. HYDNUM stipitatum, pileo convexo imbricato. *imbricatum.*
Sp. pl. 1178. *Fl. lapp.* 523. *suec.* 1257.
Erinaceus esculentus albus crassus. *Mich. gen.* 132.
t. 72. f. 2. Hall. helv. 31.
Fungus pæne candidus, prona parte erinaceus. *Bauh. hist.* III. 828. *R. Syn.* 11.
Anglis, common Hydnum.
Habitat in sylvis. *In sylva quadam prope Middleton vicum in agro Warwicensi.* *R. Syn.*

PHALLUS. 1077.

Fungus supra reticulatus, subtus lævis.

- esculentus.* 1. PHALLUS pileo ovato, stipite nudo rugoso. *Fl. suec.* 1262. *Sp. pl.* 1178.
Boletus esculentus rugosus. 1. 2. 3. *Mich. gen.* 203. t. 85. f. 1. 2.
Fungus favaginosus. *Park.* 1317. *R. Syn.* 11. *Anglis,* Esculent Morel.
Habitat in sylvis et nemorosis.

- impudicus.* 2. PHALLUS volvatus stipitatus, pileo celluloso. *Sp. pl.* 1179. *Fl. suec.* 1261.
Phallus vulgaris totus albus. *Mich. gen.* 201. t. 83.
Phallus hollandicus. *Park.* 1322.
Fungus Phalloides. *B. hist.* III. 843. *R. Syn.* 12.
Fungus foetidus penis imaginem referens. *Bauh. pin.* 374.
Anglis, Stinking Morel.
Habitat in sylvis et ad sepes sed rarius.

ELVELA. 1079.

Fungus turbinatus, lævis.

- mitra.* 1. ELVELA pileo deflexo adnato lobato difformi. *Fl. suec.* 1265. *Sp. pl.* 1180.
Fungoides fungiforme crispum laciniatum et varie complicatum, pediculo crassio striato rimoso et fistulofo. *Mich. gen.* 204. t. 86. f. 7.
Fungus terrestris pediculo striato et cavernoso, capitello plicatili subtus plano. *R. Syn.* 8.
Anglis, curled Elvela.
Habitat in truncis putridis sed rarius.

PEZIZA. 1080.

Fungus campanulatus, sessilis.

- lentifera.* 1. PEZIZA campanulata lentifera. *Sp. pl.* 1180. *Fl. suec.* 1271.

Fung

Fungi calyciformes semeniferi. *Mentz.* *pug.* t. 6.
R. Syn. 20.

Fungus campaniformis niger parvus, multa semina
 in se continens. *Merr. pin. Pluk. ph.* t. 184. f. 9.
Anglis, black Peziza.

Habitat in lignis, agris, areis hortorum passim.

2. PEZIZA turbinata truncata, disco punctato. *Fl. suec.* punctata.
 1275. *Sp. pl.* 1180.

Fungus minimus infundibuliformis, superne nigra
 punctis notatus. *R. Syn.* 12.

Fungus minimus lignosus, disco punctato. *Bocc. myc.*
 II. t. 107.

Anglis, spotted Peziza.

Habitat in stercore equino.

3. PEZIZA infundibuliformis, disco patente sinuato cornucopiae
 punctato. *Sp. pl.* 1181.

Peziza tubae fallopianae æmula. *Cat. giss.* *R. Syn.*
 20.

Fungoides nigricans majus cornucopiae forma. *Vaill.*
paris. t. 13. f. 2. 3.

Anglis, Cornucopia Peziza.

Habitat in sylvis; in sylva Hornsey Wood diæta co-
 piose.

4. PEZIZA cyathiformis, extus angulata venis ramosis. acetabili-
 Sp. pl. 1181. lum.

Fungoides fuscum acetabuliforme, externe ramifica-
 tum. *Vaill. paris.* t. 13. f. 1.

Peziza subfuscata major. *Cat. giss.* *R. Syn.* 17.

Anglis, Cup Peziza.

Habitat in lignis putridis. Inter Hampstead et High-
 gate.

5. PEZIZA cyathiformis: margine obtuso erecto. *Fl. cyathoides,*
suec. 1274. *Sp. pl.* 1181.

Peziza lutea parva: marginibus levibus. *R. Syn.* 18.
 t. 24. f. 4.

Anglis, Smooth Peziza.

Habitat in sylvis. In Charlton Wood. *R. Syn.*
 XII.

CRYPTOGAMIA FUNGI.

Scutellata. 6. PEZIZA plana: margine convexo piloso. *Sp. pl.* 1181. *Fl. suec.* 1272.

Peziza lutea parva, marginibus pilosis. *R. Syn.* 18. t. 24. f. 3

Anglis, Hairy Peziza.

Habitat in lignis putridis. *In a lane near Chichester, Southgate.* Dill. *R. Syn.*

CLAVARIA. 1081.

Fungus lœvis, oblongus.

* *Indivisæ.*

pistillaris. 1. CLAVARIA clavæformis simplicissima. *Fl. suec.* 1266. *Sp. pl.* 1182.

Clavaria alba pistilli forma. *Vaill. paris.* 39. t. 8. f. 5.

Fungoides clavatum minus. *Cat. giff.* *R. Syn.* 14.

Anglis, simple Clavaria.

Habitat in sylvis et ericetis passim.

ophioglos- 2. CLAVARIA clavata integerima compressa obtusa. *Guett. stamp.* 1. p. 8. *Dalib. paris.* 385. *Sp. pl.* 1182.

Clavaria ophioglossoides nigra. *Vaill. paris.* t. 7. f. 4.

Fungus ophioglossoides. *Pb. br.* *R. Syn.* 14.

Anglis, black Clavaria.

Habitat in sylvis.

** *Ramosæ.*

digitata. 3. CLAVARIA ramosa lignea nigra. *Sp. pl.* 1182.

Fungus piperi æthiopico similis, vel digitatus niger. *Merr. pin.* *R. Syn.* 14.

Lythophyton terrestre digitatum nigrum. *Comm. Ac.* *R. Sc. Ann.* 1711.

Anglis, Fingered Clavaria.

Habitat in lignis semiputridis.

Hypoxy- 4. CLAVARIA ramoso-cornuta compressa. *Sp. pl.* 1182. *Fl. suec.* 1267.

Fungus

CRYPTOGAMIA FUNGI.

501

1. Fungus ramosus, niger, compressus, parvus, apicibus albidis. *R. Syn.* 15.
2. Fungus cornu dorcidis facie. *E. N. C. Dec.* 1. *Ann.* 4. 195.
Agaricus ramosus cornu rangiferi referens. D. Mill.
Blackf. sp. bot. 2. t. 1.
Anglis, Flat Clavaria.
Habitat in lignis putridis.
5. CLAVARIA ramis confertis ramosissimis inæqualibus *coralloides*.
Sp. pl. 1182. Fl. suec. 1268.
Corallo-fungus flavus. Vaill. paris. t. 8. f. 4.
Fungus ramosus flavus et albidus. Baub. hist. III.
837. R. Syn. 16.
Barba caprina. Sterb. fung. 96. 97. t. 11. f. A. B.
C. D.
Anglis, yellow Clavaria
Habitat in ericetis et sylvis.
6. CLAVARIA ramis confertis ramosissimis fastigiatis. *fastigiata.*
Sp. pl. 1183. Fl. suec. 1269.
Fungoides fungiforme luteum foetidum et minus ramosum. R. Syn. 479. t. 24. f. 5.
Anglis, stinking Clavaria.
Habitat in sylvis.
7. CLAVARIA ramis ramosis acuminatis inæqualibus *muscoides*, luteis. *Sp. pl. 1183. Fl. suec. 1270.*
Fungus parvus ramosus luteus. R. Syn. 16. t. 24.
f. 7.
Anglis, Pointed Clavaria.
Habitat in sylvis et ericetis.

L Y C O P E R D O N. 1082.

Fungus subrotundus seminibus farinaceis repletis.

* *Solidia, subterranea absque radice.*

- *1. LYCOPERDON solidum muricatum, radice de- *Tuber.*
stitutum. Sp. pl. 1183. Fl. suec. 1282.
Tuber brumale, pulpa obscura odorata. Mich. gen.
221. t. 164.

K k 3

Tu-

CRYPTOGAMIA FUNGI.

Tubera. *Baub. pin.* 376. *bifl. III.* 849. *R. Syn.* 28,
terræ. *Ger. Em.* 1385. edulia. *Park.* 1319.
Anglis, solid Puff-balls, or Truffles.
Habitat *sub terra*; in Rushton Park, Northamptonshire. *R. Syn.*

- cervinum.* 2. LYCOPERDON solidiusculum centro farinifero,
radice destitutum. *Sp. pl.* 1183. *Fl. suec.* 1276.
Lycoperdastrum tuberosum arrhizone fulvum, cortice
duriore crassio et granulato, medulla ex albo pur-
purascente, semine nigro crassiore. *Mich. gen.* 220,
t. 99. f. 4.
Tubera perniciosa terrestria s. cervina. *Sterb. fung.*
315. *t. 32. f. B. B. B.* *R. Syn.* 28.
Tubera cervina. *Baub. pin.* 376.
Anglis, Branny Puff-ball.
Habitat *in sylvis*. In Canewood, Hampstead, *R.*
Syn.

** *Pulverulenta, radicata supra terram.*

- Borista.* 3. LYCOPERDON subrotundum, lacerato dehiscens.
Sp. pl. 1183. *Fl. lapp.* 525. *suec.* 1280.
Lycoperdon vulgare. *Tourn.* 563.
Fungus maximus rotundus pulverulentus, dictus ger-
manis Bofist. *Baub. bifl. III.* 848.
Anglis, common Puff-ball.
Habitat *in pratis et pascuis.*

- stellatum.* 4. LYCOPERDON volva multifida patente, capitulo
glabro: ore acuminato dentato. *Sp. pl.* 1184. *Fl.*
suec. 1277.
Fungus pulverulentus, crepitus lupi dictus, corona-
tus et inferne stellatus. *R. Syn.* 27. *t. 1. f. 1.*
Anglis, Star Puff-ball.
Habitat *in pratis et pascuis.*

- fornica-*
tum. 5. LYCOPERDON volva quadrifida erecta fornicate,
capitulo glabro; ore obtuso ciliato.
Geaster volvæ radiis et operculo elevatis. *D. Wat.*
son Act. Engl. No. 474. p. 234.

Fungus

Fungus pulverulentus turriculam fornicateam referens.

D. Rand. Blackf. Spec. Bot. 24. t. 2.

Anglis, Turret Puff-ball.

Habitat in pratis et pascuis sed rarius. At Bucklebury, ten miles from Reading, Berkshire, and about Wickham, near Bromley in Kent. Blackf. Spec. Bot.

6. LYCOPERDON stipite longo, capitulo globoso *pedunculo* glabro: ore cylindrico integerrimo. *Sp. pl. 1184. latum.*
Fl. suec. 1276.

Lycoperdon parisiense minimum pediculo donatum.

Tourn. 563. t. 331. f. E. F.

Fungus pulverulentus minimus, pediculo longo insidens. *R. Syn. 27.*

Anglis, Stalked Puff-ball.

Habitat in pascuis frequens.

M U C O R. 1083.

Fungus vesiculis stipitatis.

* *Perennes.*

1. MUCOR perennis, stipite filiformi nigro, capitulo *sphaerocephalo* globoso cinereo. *Fl. suec. 1286. Sp. pl. 1185. phalus.*

Sphaerocephalus niger, villo ochroleuco. *Hall. helv.*

III. t. 1. f. 3.

Fungus pileatus minimus, pediculo tenui capillaceo.

R. Syn. 12.

Anglis, Round-headed Mucor.

Habitat in lignis putridis frequens.

2. MUCOR perennis stipite subulato nigro, capitulo *Lichenoidi*-lenticulari cinereo. *Fl. suec. 1287. Sp. pl. 1185. des.*

*Coralloides fungiforme arboreum nigrum vix crusto-*sum. *Dill. musc. 78. t. 14. f. 3.*

Anglis, Grey-headed Mucor.

Habitat in lignis putridis.

3. MUCOR seta nigra, villo fusco. *Sp. pl. 1185. Fl. Embolus.*
suec. 1288.

CRYPTOGAMIA FUNGI.

Embolus nigerrimus, villo albo adspersus. *Hall. helv.*

8. t. 1. f. 1.

Anglis, black Mucor.

Habitat in lignis putridis.

** *Fugaces.*

Mucedo. 4. *MUCOR stipitatus*, capsula globosa. *Sp. pl. 1185.*
Fl. suec. 1284.

Mucor vulgaris capitulo lucido per maturitatem nigro, pediculo griseo. *Mich. gen. 215. t. 95. f. 1.*
Hall. helv. 7.

Fungus bombycinus murini coloris, e fimo felino,
tenuissimis capillis. *Pluk. alm. 164. R. Syn. 13.*

Anglis, Cotten Mucor.

Habitat in variis putridis; pane, plantis, &c.

leprosus. 5. *MUCOR setaceus*, seminibus radicalibus. *Sp. pl. 1185.*

Aspergillus cespitosus densissimus, initio niveus, deinde aureus, seminibus ovatis. *Mich. gen. 213. t. 91. f. 5.*

Anglis, yellowish Mucor.

Habitat in cellulis fornicatis et cavernis.

glaucus. 6. *MUCOR stipitatus* capitulo subrotundo, aggregato.
Sp. pl. 1186.

Aspergillus capitatus, capitulo glauco, seminibus rotundis. *Mich. gen. 212. t. 91. f. 1.*

Anglis, greenish Mucor.

Habitat in Pomis, Melonibus, aliisque corruptis.

crustaceus. 7. *MUCOR stipitatus*, spicis digitatus. *Sp. pl. 1186.*
Mucor crustaceus albus, capitulo setisque aqueis.

Fl. suec. ed. I. 1118.

Botrytis non ramosa alba, seminibus rotundis. *Mich. gen. 212. t. 91. f. 3.*

Anglis, Fingered Mucor.

Habitat in cibis corruptis.





A P P E N D I X.

O M I S S A.

V E R B E N A.

Cor. infundibuliformis subæqualis, curvæ. *Calycis* unico dente truncato. *Semina* quatuor nuda. *Stamina* quatuor.

- I. VERBENA tetrandra, spicis filiformibus paniculatis, *officinalis*.
foliis multifido-lanceolatis, caule solitario. *Sp. pl.*
20. Fl. suec. 30.

Verbena vulgaris. *Bauh. hist.* III. 443. *R. Syn.* 236.

Verbena mas, s. recta et vulgaris. *Park.* 674.

Verbena communis Ger. *Em.* 664. cæruleo flore.
Bauh. pin. 269.

Anglis, Vervain.

Habitat in areis et ad vias publicas.

Pharmac. Verbenæ Herba.

I L E X.

Hermaph. *Cal.* quadridentatus. *Cor.* quadripartite rotata. *Stam.* quatuor. *Stylus* o. *Stig.* quatuor.
Bacca tetrasperma.

Masc. *Cal.* *Cor.* *Stam.* prioris.

- I. ILEX foliis ovatis acutis spinosis. *Hort. cliff.* 40. *aquifolium.*
Sp. pl. 125.

Ilex aculeata baccifera. *Bauh. pin.* 425.

Agrifolium. *Ger. Em.* 1338. s. Aquifolium. *Park.*
1486. *R. Syn.* 466.

Anglis, Holly-tree.

Habitat in sylvis, ericetis et sepibus. h.

APPENDIX.

- Alnus.* 2. *BETULA* pedunculis ramosis. *Sp. pl.* 983. *Fl. suec.* 861.
Alnus. *Ger. Em.* 1249. *R. Syn.* 442. *vulgaris.* *Park.* 1408.
Alnus rotundifolia glutinosa viridis. *Baub. pin.* 428.
 β *Alnus vulgaris,* sub-conis ligulis membranaceis rubris
donata. *R. Syn.* 442.
Anglis, Common Alder.
Habitat in aquosis. *h: VII.*



INDEX

I N D E X

NOMINUM LATINORUM

Generica nomina Romana Charactere traduntur:

Cursivis Literis Synonyma.

Primus numerus Genus designat; cæteri Synonyma.

A	Page		Page
A B I E S	361	<i>Agrostis</i>	26—28
<i>Abrotanum</i>	311	<i>Aira</i>	28—31, 374
<i>Absinthium</i>	311, 312	<i>Ajuga</i>	219
<i>Acanthium</i>	308	<i>Aizoon</i>	170, 172
<i>Acer</i>	378, 379	<i>Alcea</i>	269
<i>Acetosa</i>	135, 136	<i>Alchemilla</i>	59, 60, 160
<i>Acetosella</i>	136	<i>Alga</i>	342, 473, 475, 479
<i>Achillea</i>	324, 325	<i>Alisma</i>	137, 138
<i>Acinos</i>	228, 230	<i>Alliaria</i>	251
<i>Aconitum</i>	201	<i>Allium</i>	120—122
<i>Acorus</i>	128, 13	<i>Alnus</i>	83, 505
<i>Acrostichum</i>	383, 384	<i>Aloe</i>	208
<i>Aetæa</i>	201	<i>Alopecurus</i>	23, 24, 47
<i>Adiantum</i>	392, 383, 386, 387, 390	<i>Alfinanthemos</i>	139
<i>Adonis</i>	209	<i>Alfinastrum</i>	151
<i>Adoxa</i>	150	<i>Alfine</i>	113, 2, 6, 7, 11, 48, 51, 64, 120, 128, 139, 163, 166—169
<i>Ægilops</i>	41	<i>Alfinella</i>	175—178, 225, 241
<i>Ægopodium</i>	111	<i>Alfinoides</i>	63, 64
<i>Æthusa</i>	107	<i>Althæa</i>	10
<i>Agaricus</i>	490—497	<i>Amanita</i>	267
<i>Agaricum</i>	463	<i>Amara dulcis</i>	492
<i>Agrifolium</i>	505	<i>Amaranthus</i>	79
<i>Agrimonie</i>	180	<i>Ambrosia</i>	356
<i>Agrostemma</i>	173		248
			<i>Ana-</i>

INDEX NOMINUM LATINORUM.

	Page		Page
<i>Anacampseros</i>	170, 370	<i>Asphodelus</i>	125, 128
<i>Anagallis</i>	73, 74, 51, 79	<i>Asplenium</i>	384—386
<i>aquatica</i>	4, 5	<i>Aster</i>	319, 314, 320
<i>Anblatum</i>	233	<i>Astragalus</i>	281, 282, 274
<i>Anchusa</i>	66	<i>Athamanta</i>	100
<i>Andromeda</i>	154	<i>Atriplex</i>	376—378, 90 —92
<i>Androsænum</i>	291		
<i>Anemone</i>	208, 209	<i>Atropa</i>	79
<i>Anethum</i>	110	<i>Avena</i>	41, 42
<i>Angelica</i>	103, 111	<i>Auricula muris</i>	168, 175
<i>Anonis</i>	273		B
<i>Anthemis</i>	323, 324	<i>Baccharis</i>	314
<i>Anthericum</i>	127, 128	<i>Balladonna</i>	79
<i>Anthoceros</i>	441	<i>Ballota</i>	227
<i>Anthoxanthum</i>	10, 135	<i>Balsamine</i>	332
<i>Anthyllis</i>	273, 120, 167	<i>Barba capræ</i>	191
<i>Antirrhinum</i>	236—239	<i>Barbarea</i>	251
<i>Aparine</i>	57—69	<i>Bardana</i>	304, 356
<i>Aphaca</i>	275	<i>Bartsia</i>	233
<i>Aphanes</i>	60	<i>Becabunga</i>	4
<i>Apium</i>	111, 100, 102	<i>Bellis</i>	320, 321
<i>Aponogeton</i>	344	<i>Berberis</i>	119
<i>Aquilegia</i>	207, 208	<i>Beta</i>	93
<i>Arabis</i>	254	<i>Betonica</i>	220, 240
<i>Aracus</i>	279, 280	<i>Betula</i>	354
<i>Arbutus</i>	155	<i>Betulus</i>	360
<i>Arctium</i>	304	<i>Behen album</i>	163
<i>Arenaria</i>	167—169	<i>Bidens</i>	309, 310
<i>Argemone</i>	202, 204	<i>Bifolium</i>	338, 339
<i>Argentina</i>	195	<i>Bistorta</i>	146, 147
<i>Aria</i>	187	<i>Blackstonia</i>	146
<i>Armeria</i>	161, 162, 166	<i>Blasfia</i>	439
<i>Armerius</i>	174	<i>Blattaria</i>	77
<i>Artemisia</i>	311, 312	<i>Blitum</i>	89—93, 356
<i>Arum</i>	342	<i>Boletus</i>	496—498
<i>Arundo</i>	43, 21	<i>Bonus Henricus</i>	89
<i>Asarum</i>	179	<i>Borago</i>	68, 66, 69
<i>Ascyron</i>	291, 292	<i>Botrytis</i>	504
<i>Asparagus</i>	126	<i>Brassica</i>	252—255, 261
<i>Aspergillus</i>	504	<i>Briza</i>	32
<i>Asperugo</i>	69	<i>Bromus</i>	39—41
<i>Asperula</i>	55		Bry-

INDEX NOMINUM LATINORUM.

	Page		Page
Bryonia	373, 369	Carum	110
Bryum	403—417, 397	Caryophyllata	198, 199
Bucca-ferrea	63	Caryophyllus	64, 114, 161, 162, 166, 174, 176
Bufonia	10	Cassida	231, 232
Buglossum	66, 68, 69, 294	Catananche	275
Bugula	219, 220	Castanea	359
Bulbocastanum	105	Caucalis	98, 99
Bulbodium	122	Cauda muris	118
Bulbosia alpina	122	equina	1
Bunium	105	Centaurea	325, 326
Buphthalmum	324	Centaurium	88, 89, 146
Bupleurum	97	Centunculus	51
Bursa pastoris	243, 247, 249	Cerastrum	175—177
Butomus	152	Cerasus	186, 187
Buxus	354, 355	Ceratophyllum	357
Byssus	487—489	Cerefolium	108
C		Cerinthe	67, 68
<i>C</i> akile	261	Ceterach	385
<i>Calamagrostis</i>	25, 43	Chærefolium	109
Calamaria	393	Chærophyllo similis	60
Calamintha	224, 230	Chærophillum	108, 109
Calamus aromaticus	128	Chamæcissus	205, 206
Calceolus	341	Chamædrys	218, 5, 199
Callitricha	2	Chamæfilix	386
Caltha	214, 215	Chamælea	145
Camelina	243, 251	Chamælinum	116, 117
Cameraria	48	Chamæmelum	322—324
Campanula	80—82	Chamænerion	140, 142
Canabina	309	Camæorchis	339
Cannabis	226	Chamæpericlymenum	58
Capillus veneris	391	Chamæpitys	219
Caprifolium	80	Chamæitea	365
Cardamine	255—258, 245	Chara	464, 465
Cardiaca	228	Cheiranthus	250
Carduus	305—308, 49, 326	Chenopodium	89—93
Carex	346—354	Chelidonium	201, 202, 214
Carlina	309	Chondrilla	296
Carpinus	360	Christophoriana	201
Caruifolia	106	Chrysanthemum	321
		Chrysosplenium	156, 241
		Cicho-	

INDEX NOMINUM LATINORUM.

	Page		Page
<i>Cichorium</i>	303, 294, 304	<i>Cuscuta</i>	89
<i>Cicuta</i>	106, 100, 107	<i>Cyanus</i>	325
<i>Cicutaria</i>	107, 108	<i>Cymbalaria</i>	237
<i>Circæa</i>	9, 10	<i>Cynocrambe</i>	371
<i>Cirsium</i>	305—307	<i>Cynoglossum</i>	67, 68
<i>Cistus</i>	204—206, 155	<i>Cynosorchis</i>	333—335
<i>Clavaria</i>	500, 501	<i>Cynosurus</i>	47
<i>Clematis</i>	291	<i>Cyperus</i>	15, 14, 19
<i>Clynopodium</i>	228, 230, 233	<i>Cypripedium</i>	341
<i>Clymenum</i>	291	D	
<i>Cnicus</i>	309	<i>Actylis</i>	25
<i>Cochlearia</i>	247, 248	<i>Damasonium</i>	137, 138
<i>Colchicum</i>	136	<i>Daphne</i>	145
<i>Conferva</i>	478—486	<i>Datura</i>	78
<i>Conium</i>	100	<i>Daucus</i>	99, 100
<i>Consolida</i>	207, 219, 220	<i>Delphinium</i>	207
<i>Convallaria</i>	126, 127	<i>Dens leonis</i>	297, 301
<i>Convolvulus</i>	74, 75, 149	<i>Dentaria</i>	249
<i>Conyza</i>	314, 320, 327	<i>Dianthus</i>	161, 162
<i>Corallina</i>	479	<i>Diapensia</i>	96
<i>Coralloides</i>	443, 449, 455 —460, 503	<i>Digitalis</i>	240
<i>Corallo-fungus</i>	501	<i>Dipsacus</i>	49
<i>Coriandrum</i>	107	<i>Dortmanna</i>	329
<i>Cornu Cervi</i>	53	<i>Draba</i>	243, 244
<i>Coronopus</i>	52, 53, 248	<i>Dracunculus</i>	325
<i>Corrigiola</i>	86	<i>Drosera</i>	117
<i>Corylus</i>	360	<i>Dryas</i>	199
<i>Cotyledon</i>	169, 96, 157	<i>Dryopteris</i>	384, 388, 391
<i>Cracca</i>	277, 280	E	
<i>Crambe</i>	260	<i>Bulus</i>	113
<i>Craffula</i>	170	<i>Echium</i>	69, 70, 65, 68
<i>Crataegus</i>	187, 188	<i>Echinophora</i>	97, 99
<i>Cratægonon</i>	235, 236	<i>Elatine</i>	151, 237
<i>Crepis</i>	301, 297	<i>Elleborine</i>	341
<i>Crithmum</i>	97, 101, 320	<i>Eleoselinum</i>	111
<i>Cristagalli</i>	234	<i>Elichrysum</i>	313
<i>Crocus</i>	13	<i>Elymus</i>	44, 45
<i>Cruciata</i>	89, 375	<i>Embolus</i>	504
<i>Cucubalus</i>	163, 164, 174	<i>Elvela</i>	498
<i>Cuminum</i>	110	<i>Empetrum</i>	367
		<i>Epi-</i>	

INDEX NOMINUM LATINORUM.

	Page		Page
<i>Epilobium</i>	140—142	<i>Frangula</i>	83
<i>Equisetum</i>	380, 381, 1, 151	<i>Frankenia</i>	119, 120
<i>Erica</i>	144, 145, 119, 143, 155, 367, 469	<i>Fraxinus</i>	379, 189
<i>Ericoides</i>	151	<i>Fritillaria</i>	125
<i>Erigeron</i>	314, 316	<i>Fucus</i>	465—477, 342, 343, 465, 480, 486, 490
<i>Erinaceus</i>	497	<i>Fucoides</i>	473
<i>Eriophorum</i>	19, 20	<i>Fumaria</i>	270
<i>Eruca</i>	243, 250, 251, 253, 258, 259, 261	<i>Fungoides</i>	498—501
<i>Ervum</i>	279, 280, 275	<i>Fungus</i>	463, 479, 490— 504
<i>Eryngium</i>	95		
<i>Erysimum</i>	250, 251, 150, 259	G	368
<i>Erysimo similis</i>	254	<i>Galeopsis</i>	225—227
<i>Esula</i>	182	<i>Galium</i>	55—58, 375
<i>Euonymus</i>	84	<i>Geaster</i>	502
<i>Eupatorium</i>	310, 180, 309	<i>Genista</i>	271, 272
<i>Euphorbia</i>	181—185	<i>Gentiana</i>	87, 88, 146
<i>Euphrasia</i>	234, 235, 233	<i>Gentianella</i>	88
		<i>Geranium</i>	262—267
F		<i>Geum</i>	198, 199, 157, 158
<i>Fagus</i>	359, 360	<i>Gladiolus</i>	13, 152, 329
<i>Fegopyrum</i>	149, 150	<i>Glaustum</i>	261
<i>Festuca</i>	36—40	<i>Glaux</i>	86, 281, 282
<i>Ferrum equinum</i>	281	<i>Glecoma</i>	224
<i>Ficaria</i>	213, 214	<i>Glycyrrhiza</i>	281
<i>Filago</i>	328, 329, 313	<i>Gnaphalium</i>	312, 313, 328, 329
<i>Filipendula</i>	105, 190	<i>Gramen</i>	14—48, 114, 130 —133, 166, 346, 354, 371, 374
<i>Filix</i>	382—392	<i>Graminifolia</i>	242, 393
<i>Filicula</i>	384	<i>Grossularia</i>	84, 85
<i>Filum marinum</i>	475	<i>Gratiola</i>	180
<i>Fæniculum</i>	100	<i>Gypsophylla</i>	232
<i>Fontalis</i>	147		
<i>Fontinalis</i>	60, 398		
<i>Flos adonis</i>	209		
<i>cuculi</i>	256		
<i>Fœnumgræcum</i>	283	H	
<i>Fœnum burgundiacum</i>	288	<i>Halimus</i>	376
<i>Fragaria</i>	194, 195	<i>Hedera</i>	85
<i>Francia</i>	119	<i>terrestris</i>	224
		<i>Hederula</i>	344
			He-

INDEX NOMINUM LATINORUM.

	Page		Page
<i>Hedysarum</i>	281	J	
<i>Helenium</i>	319		
<i>Helianthemum</i>	205, 206		
<i>Helleborine</i>	341, 342		
<i>Helleboraster</i>	215	<i>Jasione</i>	329
<i>Helleborus</i>	215, 214	<i>Iberis</i>	249
<i>Helxine</i>	149	<i>Ilex</i>	505
<i>Hepatica</i>	439	<i>Illecebrum</i>	85, 171
<i>Heracleum</i>	102	<i>Impatiens</i>	332
<i>Herba dysenterica</i>	320	<i>Inula</i>	319, 320
<i>Gerardi</i>	111	<i>Irio</i>	259
<i>Paris</i>	150	<i>Iris</i>	13
<tri>ntalis</tri>	139	<i>Isatis</i>	261
<i>Herniaria</i>	94, 11	<i>Ischaemor</i>	22
<i>Hesperis</i>	251	<i>Isoetes</i>	393
<i>Hieracium</i>	297—303, 294	<i>Juncellus</i>	14, 16—18
	295	<i>Juncifolia</i>	242
<i>Hippophaë</i>	368	<i>Juncus</i>	129—132, 14, 16,
<i>Hipposelinum</i>	109		18, 20
<i>Hippocrepis</i>	281	<i>Juncus Floridus</i>	152
<i>Hippuris</i>	1	<i>Jungermannia</i>	430—438
<i>Holcus</i>	374	<i>Juniperus</i>	372
<i>Holosteum</i>	118, 176		
<i>Hordeum</i>	46	K	
<i>Horminum</i>	9	<i>KALI</i>	92, 93
<i>Hottonia</i>	72	<tri>geniculatum</tri>	1
<i>Humulus</i>	369	<i>Keiri</i>	250
<i>Hyacinthus</i>	123, 124	<i>Knawel</i>	160
<i>Hydnum</i>	497		
<i>Hydroceratophyllum</i>	357	L	
<i>Hydrocharis</i>	372	<i>Actuca</i>	295, 296, 13
<i>Hydrocotyle</i>	96	<i>Lagopodium</i>	285
<i>Hydrolypnum</i>	135	<i>Lagopus</i>	285
<i>Hyoscyamus</i>	77	<i>Lamium</i>	225—227, 231
<i>Hyoseris</i>	302	<i>Lampsana</i>	303
<i>Hypericum</i>	290—292	<i>Lantana</i>	112
<i>Hypnum</i>	418—430	<i>Lapathum</i>	89, 133—136
<i>Hypochæris</i>	302, 303	<i>Lappa</i>	304, 356
<i>Hypopitys</i>	153	<i>Lapsana</i>	303
<i>Hyssopifolia</i>	180	<i>Latræa</i>	233
		<i>La-</i>	

INDEX NOMINUM LATINORUM.

	Page		Page
<i>Lathyrus</i>	274—277	<i>Lychnoides</i>	173
<i>Lavatera</i>	267	<i>Lycoperdon</i>	501—503
<i>Laireola</i>	145	<i>Lycopodium</i>	393—395
<i>Ledum</i>	155	<i>Lycopsis</i>	69, 70
<i>Lemma</i>	344, 345	<i>Lycoporus</i>	8
<i>Lens palustris</i>	345	<i>Lysimachia</i>	72, 73, 140—
<i>Lentibularia</i>	8		142, 179, 180, 232
<i>Lenticula</i>	344, 345	<i>Lythrum</i>	179, 180
<i>Leontodon</i>	296, 297	<i>Lythophyton</i>	500
<i>Leonurus</i>	228, 226		
<i>Lepidium</i>	244, 245		
<i>Leucoium</i>	250, 330	M	267—269
<i>Leucanthemum</i>	321	<i>MALVA</i>	Malus
<i>Lichen</i>	437—463, 477		190
<i>Lichenastrum</i>	402, 430—	<i>Marchantia</i>	438, 439
	438	<i>Marjorana</i>	229
<i>Lichenoides</i>	441—460, 464	<i>Marubium</i>	228, 8, 227
<i>Liguisticum</i>	102	<i>Matricaria</i>	321—323
<i>Ligustrum</i>	3	<i>Medica</i>	287
<i>Ligula marina</i>	475	<i>Medicago</i>	287, 288, 282
<i>Lilium convallium</i>	126	<i>Melampyrum</i>	235, 236
<i>Limnopeuce</i>	1	<i>Melica</i>	31
<i>Limodorum</i>	336	<i>Melilotus</i>	282
<i>Limonium</i>	114, 115	<i>Melissa</i>	230, 231
<i>Limosella</i>	241	<i>Melissophyllum</i>	231
<i>Linagrostis</i>	19	<i>Mentha</i>	220—224
<i>Linaria</i>	86, 237, 238	<i>Menthastrum</i>	221
<i>Lingua cervina</i>	385	<i>Menyanthes</i>	71
<i>Linum</i>	115—117	<i>Mercurialis</i>	371, 332
<i>Lithospermum</i>	65, 66	<i>Mezerion</i>	145
<i>Lobelia</i>	329	<i>Mespilus</i>	190, 187, 188
<i>Lolium</i>	44	<i>Meum</i>	100
<i>Lonchitis</i>	383, 388	<i>Milium</i>	25
<i>Lonicera</i>	80	<i>Millesium</i>	8, 62, 72,
<i>Lotus</i>	288, 289		325, 357, 358
<i>Loto affinis</i>	274	<i>Militaris</i>	208
<i>Lunaria</i>	244, 382, 439	<i>Mnium</i>	404—406, 409,
<i>Lupulus</i>	369		414—417, 440
<i>Luteola</i>	181	<i>Mollugo</i>	57, 58
<i>Lychnis</i>	174, 119, 160, 163—166, 173	<i>Monotropa</i>	153
		<i>Montia</i>	48
		<i>Morsus diaboli</i>	50
		L	<i>Mor-</i>

INDEX NOMINUM LATINORUM.

	Page		Page
<i>Morsus ranæ</i>	372	<i>Ophioglossum</i>	382
<i>Moscatellina</i>	150	<i>Ophrys</i>	338—340
<i>Mucor</i>	503	<i>Opulus</i>	112
<i>Mucipula</i>	163, 174	<i>Orchis</i>	333—340
<i>Mucus</i>	394—432, 449, 450, 459, 477, 480, 483, 486	<i>Origanum</i>	229
<i>Musco-fungus</i>	448, 451— 463	<i>Ornithopus</i>	280
<i>Myagrum</i>	241, 251	<i>Ornithopodium</i>	280
<i>Myosotis</i>	65	<i>Ornithogalum</i>	124, 125
<i>Myosurus</i>	118	<i>Ornus</i>	189
<i>Myriophyllum</i>	357, 358	<i>Orobanche</i>	232, 233, 153
<i>Myrrhis</i>	108	<i>Orobus</i>	274, 275
<i>Myrtus</i>	368	<i>Osmunda</i>	282, 283
N.		<i>Ostrya</i>	360
<i>NAPUS</i>	253	<i>Othonna</i>	327
<i>Narcissus</i>	122, 123	<i>Oxalis</i>	173, 136
<i>Nardus</i>	20, 28, 374	<i>Oxyacantha</i>	188
<i>Narthesium</i>	127, 128	<i>Oxycoccus</i>	143
<i>Nasturtium</i>	243—245, 248, 249, 255—257, 259	<i>Ozys</i>	173
<i>Nepeta</i>	220	P.	
<i>Nidus avis</i>	336, 338	<i>PADUS</i>	187
<i>Noli me tangere</i>	256	<i>Palma Christi</i>	335, 336
<i>Noftoc paracelsi</i>	463	<i>Panicum</i>	21, 22, 26, 47
<i>Nucula terrestris</i>	106	<i>Panax coloni</i>	227
<i>Nummularia</i>	73	<i>Papaver</i>	201—204, 163
<i>Nux vesicaria</i>	113	<i>Paralyfis</i>	71
<i>Nymphaea</i>	206, 270, 71, 373	<i>Parietaria</i>	376
O.		<i>Paris</i>	150
<i>Ocymum</i>	230	<i>Parnassia</i>	114
<i>Oenanthe</i>	104, 105	<i>Paronichia</i>	159, 243—245
<i>Onobrychis</i>	281	<i>Peeten veneris</i>	108
<i>Ononis</i>	273	<i>Pedicularis</i>	236, 234
<i>Onopordon</i>	308	<i>Peloria</i>	238
<i>Onopteris</i>	387	<i>Pentaphylloides</i>	118, 195, 196, 200
		<i>Pentaphyllum</i>	59, 195— 198
		<i>Pentapterophyllum</i>	358
		<i>Peplis</i>	128, 181
		<i>Peplus</i>	182
		<i>Percepier</i>	60
			<i>Per-</i>

INDEX NOMINUM LATINORUM.

	Page		Page
<i>Perfoliata</i>	97, 252	<i>Polymonium</i>	165
<i>Periclymenum</i>	58	<i>Polytrichum</i>	399—401, 416
<i>Perficaria</i>	147, 148, 332	<i>Populago</i>	215
<i>Pes anserinus</i>	90	<i>Populus</i>	370
<i>Petasites</i>	315	<i>Portulaca</i>	48, 128, 376
<i>Petroselinum</i>	109	<i>Potamogeton</i>	60—63, 147 357, 358
<i>Peucedanum</i>	101	<i>Potentilla</i>	195—197
<i>Peziza</i>	498—500, 463	<i>Poterium</i>	358
<i>Phalangium</i>	127, 128	<i>Prenanthes</i>	296
<i>Phalaris</i>	20, 21, 32	<i>Primula</i>	70, 71
<i>Phallus</i>	498	<i>Prunella</i>	231
<i>Phascum</i>	396, 397	<i>Prunus</i>	186, 187
<i>Phellandrium</i>	107	<i>Pseudo-asphodelus</i>	127
<i>Phleum</i>	22, 23, 21	<i>Cyperus</i>	352
<i>Phyllitis</i>	385	<i>Helleborus</i>	214
<i>Phyteuma</i>	83	<i>melanthium</i>	173
<i>Picea</i>	361	<i>narcissus</i>	122
<i>Picris</i>	294	<i>orchis</i>	337
<i>Pilularia</i>	393	<i>Ptarmica</i>	325
<i>Pilosella</i>	255, 290, 299	<i>Pteris</i>	384
<i>Pimpinella</i>	110, 111, 54, 358, 359	<i>Pulegium</i>	224
<i>Pinguicula</i>	7	<i>Pulmonaria</i>	67, 299, 300
<i>Pinus</i>	361, 470	<i>Pulsatilla</i>	209
<i>Piperitis</i>	244	<i>Pyrola</i>	153, 154, 139
<i>Pistacea</i>	113	<i>Pyrus</i>	189
<i>Pifum</i>	274	<i>Pyraster</i>	189
<i>Plantaginella</i>	241		
<i>Plantago</i>	51—53, 137, 138		
<i>Pneumonanthe</i>	87		
<i>Poa</i>	32—35, 25, 29, 36	Q	
<i>Podagraria</i>	111	<i>Quercus</i>	358, 466
<i>Polemonium</i>	75	<i>Quinquefolium</i>	196, 197, 200
<i>Polygala</i>	271, 86		
<i>Polygalon</i>	281		
<i>Polygonatum</i>	126, 127		
<i>Polygonum</i>	146—150, 60, 86, 94, 117, 119, 120, 160	R	
		<i>Adiola</i>	117
		<i>Radix cava</i>	150
		<i>Ranunculus</i>	208—214, 150, 344
		<i>Rapa</i>	253
		<i>Lili</i>	<i>Ra-</i>

INDEX NOMINUM LATINORUM.

	Page		Page
<i>Rapum</i>	253	<i>Sanguisorba</i>	53, 54, 358, 359
<i>genitæ</i>	232	<i>Sanicula</i>	96, 7, 157
<i>Raphanus</i>	252, 244, 248, 258, 261	<i>Santolina</i>	328
<i>Raphanistrum</i>	252	<i>Saponaria</i>	160, 161
<i>Rapistrum</i>	252, 258, 260	<i>Satyrium</i>	336—338
<i>Rapunculus</i>	81, 83, 96, 329	<i>Saxifraga</i>	156—159, 55, 63, 64, 102, 106, 178
<i>Rapuntium</i>	81	<i>Scabiosa</i>	50, 51, 326, 329
<i>Regina prati</i>	199	<i>Scandix</i>	107, 108
<i>Reseda</i>	181	<i>Schoenus</i>	14, 15
<i>Rhamnoides</i>	368	<i>Scilla</i>	123, 124
<i>Rhamnus</i>	83, 368	<i>Scirpus</i>	16—19
<i>Rhinanthus</i>	234	<i>Sclarea</i>	9
<i>Rhodia</i>	371	<i>Scleranthus</i>	160
<i>Rhodiola</i>	370	<i>Scordium</i>	120
<i>Rhus</i>	368	<i>Scorodonia</i>	219
<i>Ribes</i>	84, 85	<i>Scorodotrasum</i>	120
<i>Riccia</i>	440, 441	<i>Scrophularia</i>	239, 240
<i>Rorella</i>	117	<i>Scutellaria</i>	231, 232
<i>Ros solis</i>	117	<i>Secale</i>	46, 44
<i>Rosa</i>	191, 192	<i>Sedum</i>	170—173, 93, 156, 160, 185
<i>Rosmarinum</i>	155	<i>Selaginoides</i>	395
<i>Ruehesla</i>	54, 55	<i>Selago</i>	395
<i>Rubus</i>	193, 194	<i>Selinum</i>	100, 104
<i>Rumex</i>	133—136	<i>Sempervivum</i>	185, 171, 172
<i>Ruppia</i>	63	<i>Senecio</i>	315—318, 301
<i>Ruscus</i>	373	<i>Serapis</i>	341, 336, 337
<i>Ruta muraria</i>	386	<i>Serpillum</i>	229, 230
<i>S</i>		<i>Serratula</i>	304, 305
<i>Sagina</i>	63, 169	<i>Sesamoides</i>	163
<i>Sagitta</i>	358	<i>Sesamum</i>	243
<i>Salcuria</i>	17	<i>Sefeli</i>	106
<i>Salicornia</i>	180	<i>Sherardia</i>	54
<i>Salix</i>	362—366	<i>Sibbaldia</i>	118
<i>Salsola</i>	93	<i>Sibthorpia</i>	241
<i>Salvia</i>	9	<i>Sideritis</i>	226, 227, 220, 224
<i>S. mboucus</i>	112, 113		
<i>S. molus</i>	79		
		<i>Silene</i>	

INDEX NOMINUM LATINORUM.

	Page	T		Page
Silene	164, 165, 174			
<i>Sinapi</i>	260			
<i>Sinapis</i>	260	T	A MUS	369
<i>Sifon</i>	104		<i>Tamnus</i>	369
<i>Sisymbrium</i>	257 — 259, 223		<i>Tanacetum</i>	310
<i>Sium</i>	103, 104, 106, 256		<i>Targionia</i>	438
<i>Smilax</i>	74		<i>Taxus</i>	372
<i>Smyrnium</i>	109, 102		<i>Telephium</i>	170
<i>Solanum</i>	78, 79, 150		<i>Teucrium</i>	218, 219, 199
<i>Solanifolia</i>	9, 10		<i>Thalictrum</i>	216
<i>Solidago</i>	317—319, 327		<i>Thapsus</i>	75
<i>Soldanella</i>	75		<i>Theesium</i>	86
<i>Sonchus</i>	294—296		<i>Thlaspi</i>	245—248, 243
<i>Sophia</i>	259		<i>Thymus</i>	229, 230
<i>Sorbus</i>	188, 189		<i>Tilia</i>	204
<i>Sparganium</i>	346		<i>Tithymalus</i>	181—185
<i>Spartium</i>	271		<i>Tordilyum</i>	98, 99
<i>Spartum</i>	20, 24, 25, 44		<i>Tomentilla</i>	197, 198, 59
<i>Spergula</i>	177, 178, 169		<i>Trachelium</i>	81, 82
<i>Sphagnum</i>	395—399, 403		<i>Tragopogon</i>	293
<i>Spherocephalus</i>	503		<i>Tragorchis</i>	334, 337
<i>Spondylium</i>	102		<i>Tremella</i>	463, 464, 476, 477, 483
<i>Spina alba</i>	308		<i>Tribulus</i>	61
<i>acida</i>	119		<i>Trichomanes</i>	385
<i>cervina</i>	83		<i>Trifolium</i>	282—288, 71, 173
<i>Splachnum</i>	399		<i>Triglochin</i>	183,
<i>Spongia</i>	489—490, 471		<i>Triorchis</i>	338
<i>Stachys</i>	226, 227		<i>Tripolium</i>	319
<i>Staphylocdendron</i>	113		<i>Triticum</i>	45
<i>Statice</i>	114, 115		<i>Trollius</i>	214
<i>Staphylæa</i>	113		<i>Tuber</i>	501, 502
<i>Stipa</i>	24		<i>Tunica</i>	162
<i>Stramonium</i>	78		<i>Turritis</i>	254, 255
<i>Stratiotes</i>	208, 372		<i>Tuffilago</i>	315
<i>Subularia</i>	242, 393		<i>Typha</i>	345, 346
<i>Suillus</i>	497			
<i>Swertia</i>	87			V
<i>Symphytum</i>	68, 67			
<i>Synanchica</i>	55			

Stellaria 166

INDEX NOMINUM LATINORUM.

	Page
V	
<i>Vaccinium</i>	142, 143, 155
<i>Valantia</i>	375
<i>Valeriana</i>	12, 13, 75
<i>Valerianella</i>	12, 13
<i>Vella</i>	243
<i>Verbascum</i>	75, 76
<i>Verbasculum</i>	70, 71
<i>Verbena</i>	505
<i>Verbesina</i>	309, 310
<i>Vermicularis</i>	93, 170, 171
<i>Veronica</i>	3—7, 237
<i>Viburnum</i>	112
<i>Vicia</i>	277—280, 275
<i>Vinca</i>	77
<i>Viola</i>	330—332, 7, 72, 250
<i>Virga aurea</i>	317—319
<i>pastoris</i>	5
<i>Viscaria</i>	161
<i>Viscago</i>	164
	U
ULEX	272
<i>Ulmaria</i>	191
<i>Ulmus</i>	94, 95
<i>Ulva</i>	475, 437, 440, 463
<i>Umbiliicus veneris</i>	169
<i>Urtica</i>	355, 226
<i>Usnea</i>	461—463
<i>Utricularia</i>	8
	X
XANTHUM	356
<i>Xyris</i>	13
	Z
ZANICHELLIA	344
<i>Zostera</i>	342



INDEX

I N D E X

NOMINUM ANGLICANORUM.

A

	Page
A Dders tongue	382
Agaric	491—496
A grimony	180
Dutch	310
Hemp	309, 310
A lder, common	505
berry bearing	84
A lexanders	109
A lkanet, bastard	66
A ll-heal	226, 227
feed	117
A loe water	208
A ngelica	103
A nthoceros	441
A nemone	208, 209
A pple-tree	190
thorny	78
A rchangel	225
A rrow-head	358
A rsmart	147, 148
A sarabacca	179
A sh-tree	379
mountain	189
A shweed	111
A sp	370
A spheodel	127, 128
A vens	198, 199
A awl-wort	242

B

	Page
B ALM, bastard	231
Bane-berries	201
Barberry	119
Barley	46
Basil	228
Beam-tree, white	188
Bears-foot	215
Bedstraw	56, 57
Beech-tree	360
Beet	93
Bell-flower	80—82
Betony, Paul's	4
water	240
wood	220
Bill-berries	142, 143
Bind-weed	74, 75
black	149
Birch-tree	354
Birds-cherry	187
eye	71
foot	280
nest	99, 152, 336
tongue	318
Bistort	147
Bitter-sweet	79
Blasia	440
Blite	90—92, 356
Bloodwort	133
Blue-	

INDEX NOMINUM ANGLICANORUM.

	Page		Page
Blue-bottle	325	Caraways	100
Boletus	496, 497	Cat-mint	220
Borage	68	Cats-tail	345, 346
Box-tree	355	Catchfly	163—166, 174
Bramble	193, 194	Celandine, greater	202
Brank	150	lesser	214
Briar, common	193	Centaury	88, 89, 146
sweet	191	Champignon	491
Brooklime	4	Charlock	252, 260
Broom	271	Chara	465
rape	232	Cheese-rening	56
Briony, black	369	Cherry-tree	187
white	372	Chervil, wild	108
Bryum	403—417	Chestnut-tree	359
Buck-bean	71	Chickweed, bastard	11
wheat	150	berry-bearing	163
Bugle	219, 220	breakstone	64
Bugloss	69, 70	common	113, 167
Cowslips	67	—169	
Bullace-tree	186	germander	6
Burdock	304	mouse-ear	176, 177
lesier	345	star-headed	2
Burnet	54, 359	water	48
Bur reed	347	winter-green	139
Butchers-broom	373	Cicely, wild	108
Butter-cups	211	Cinquefoil	195—197
wort	7	bastard	118
Byssus	487—489	marsh	200
C		Cistus, dwarf	205, 206
C abbage	253	marsh	155
Calamint	230	Clary	9
Calamus	128	Clavaria	500, 501
Ca'trops	61	Claver	288
Calves-snout	239	Climber	217
Cammock	273	Clot-bur	304
Camomile	222, 224	Cloud-berry	194
Campion	163, 164, 174	Clover	283, 284
Canterbury-bells	82	Cockle	173
Carex	346—354	Cock's-comb	234
Carrot	99	head	281
		Codlings and Cream	141
		Colewort	

INDEX NOMINUM ANGLICANORUM.

	Page		Page
Colewort	262	Devil's guts	89
Coltsfoot	315	Dew-berry	193
Columbines	207, 208	Dier's-weed	181, 243
Comfrey	68	Dock	134, 135
Conferva	478—486	Dodder	89
Coral-wort	249	Dropwort	190
Coriander	107	water	105
Cows lungwort	46	Ducks meat	345
weed	108	Dwale	79
wheat	233—236		
Cowslips	71		
Crab-tree	190		
Cranberries	143		
Cranesbill	262—267	E	
Cress, bastard	245	ELDER	112, 113
bitter	256	water	113
penny	246	Elecampane	319
rocket	243	Elm	95
rock	249	Elvela	498
swines	248	Eryngo	95
water	257	Eyebright	234, 235
winter	251	cow-wheat	233, 234
Croftwort	58, 374		
Crow-foot	211—213	F	
berries	367	ELLWORT	88
Cudweed	212—214, 328,	Fennel	110
	329	hogs	101
Currants	84, 85	Fern	382—384
Cyperus, bastard	14, 19	Feverfew	322
millet	19	Figwort	239, 240
sweet	15	Finckle	110
		Flag, sweet smelling	128
D		Flax	115—117
Affodil	123	Fleabane	314, 320
chequered	125	Flixweed	259
Daisy	321	Flos adonis	209
Dandelion	297	Flower de luce	13
Danewort	113	Fluellin	3, 237
Deptford pink	161	Fool-stones	333, 334
Devil's bit	50, 298	Fox-glove	240
		Frambose	193
		Fritillary	125
		Frog-bit	372
		M m	
		Fucus	372

INDEX NOMINUM ANGLICANORUM.

	Page		Page
Fucus	466—475	Grass, fescue	36—38
Fumitory	270	five-leaved	197
Furze	272	fox tail	23, 24
		hard	375
		hair	28—31
G		knot	160
G Alingale	15	lyme	45
Garlick	120, 121	meadow	33—35
Gentian	87, 88	melic	32
Germaner	5, 218	mat	20
Gillyflower, stock	250	millet	26
sea	114	oat	41—43
Gladdon, stinking	13	panic	21, 22
Gladiole	152, 330	parnassus	114
Gladwyn	13	poly	180
Glasswort	1, 92, 93	quaking	32
Globe-flower	214	quick	45
Goats-beard	293	rye	46
stones	337	reed	43, 44
Goldilocks	211	soft	374
Gold of Pleasure	242	spring	10
Golden rod	319	sea	63
Goose-corn	130	scurvy	75
foot	90	spiked sea	133
grass	56—59	vernal	10
tongue	325	wheat	45
Gorse	272	Greymill	66
Goule	368	Gromill	66
Gout-weed	111	Gromwell	66
Grass, arrow-headed	133	Ground-ivy	224
barley	46	pine	219
bent	26—28	Groundsel	316
brome	39—41		
canary	20, 21	H	
cats-tail	23	Ard-beam	360
cocks-foot	25	Hare-bells	123
cotton	19	strong	101
couch	45		
darnel	44	Hares-car	97
dogs	45	Harts-tongue	385
tail	47, 48	Hafel-nut-tree	360
feather	24	wych	95
		Hawk.	

INDEX NOMINUM ANGLICANORUM.

	Page			
Hawk-weed	294, 298—	J		
	303			
Hawthorn	188	Jack-by-the-hedge	251	
Hearts-ease	331	Jacob's ladder	75	
Heath	144, 145	Jews-ear	464	
berried	367	Jungermannia	430—438	
sea	120	Juniper	372	
Hedge hyssop	180	Ivy	85	
Hellebore, bastard	215,	K		
	341, 342	Idney-wort	157, 169	
Hellweed	84	vetch	275	
Hemlock	100	Knapweed	326	
water	106, 107	Knawel	160	
Henbane	78	Knot-berries	194	
Henbit	225	grass	149	
Hep-tree	192	German	160	
Herb Christopher	201	verticillate	86	
Gerard	111	Knout-berries	194	
Paris	150	L		
Robert	269	Adies bedstraw	56, 57	
High-taper	76	finger	274	
Hindberry	193	hair	32	
Holly-tree	505	mantle	59	
knee	373	slipper	341	
Honeysuckle	80	smock	255—257	
Hops	369	traces	338	
Horehound, base	226	Lambs lettuce	13	
black	228	Larkspur	207	
stinking	228	Laver	476—478	
water	9	Laurel, spurge	145	
white	228	Lavender, sea	115	
Horn-beam	360	Lettuce	296	
beech	360	frogs	61	
Horse-beech	360	Lilly, of the valley	126	
radish	249	water	71, 206, 207	
tail	380, 381	Lime-tree	204	
Houseteek	185	wort	161	
Hounds-tongue	67	Linden-tree	204	
Hyacinth	123, 124	Livelong	170	
Hydnum	497	M m 2		
Hypnum	428—430	Liver-		

INDEX NOMINUM ANGLICANORUM.

	Page		Page
Liverwort	442, 463	Miffel, or Miffeltoe	367
Lizard flower	337	Mnium	401—403
Locker-gowlons	214	Money-wort	73
Lookinglass, Venus's	82	bastard	272
Loosestrife, spiked	180	baud	100
yellow	72, 73	Moonwort	382
Lousewort	236	Moorberries	143
Lucern	288	Morel	498
Lungwort, cows	76	Moschatal	151
French	300	Moss-berries	143
golden	300	bog	396
tree	449	cup	456
		club	394, 395
		water	358, 359
M		Mother of thyme	230
Adder, bastard	56	wort	228
crosswort	58	Mucor	503, 504
field	54	Mouse-ear, coddled	255
wild	54, 56	creeping	298
Madwort	69	scorpion-grass	65
Maidenhair	285—287	tail	118
golden	400	Mug-wort	312
true	391, 392	weed	375
Maithes	209	Mullein	76
Mallow	267—269	Mushroom	494
Maple	379	Muscovy	262
Marjoram, wild	229	Mustard, common	260
Mares-tail	2	hedge	250—259
Marigold, corn	321	mithridate	245
marsh	215	tower	254
Matfellon	326	treacle	246
Mayweed	323	white	260
Meadowsweet	191	wild	260
Medick	289	Myrtle	368
Medlar	190		
Melilot	282	N	
Mercury	89, 371	NAVEW	253
Milfoil	325	Navelwort	169
water	357, 358	Needie, shepherd's	108
Milkwort	271	Nep mint	225
sea	86	Nettle, common	355
purple	282	Nettle,	*

INDEX NOMINUM ANGLICANORUM.

	Page		Page
Nettle, hemp	226	Pease-heath	274
hedge	227	sea	274
roman	355	Pellitory, wall	373
Nightshade	78, 79	Penny-royal	224
enchanters	9, 10	wort, marsh	95
Nipplewort	303	wall	162
Nut, earth	106	Pepper-grass	391
bladder	113	wall	171
		water	148
		wort	241
O			
OAK	359	Periwinkle	72
sea	466	Peziza	499,
Orach	376—378	Phascum	397
wild	91	Pheasant's eye	209
Orpine	170	Pilcorn	41
Orchis	333—336	Pilewort	214
Osier	366	Pimpernel, bastard	51
Osmund royal	382	male	74
Ox-eye	321	water	79
tongue	294	yellow	73
Oyster-green	477	Pink	161, 162
P		Pine, sea	470
PAGIL	71	Pipperidge-bush	119
Pansies	331	Plantain	51—53
Park-leaves	291	bastard	241
Parsley, bastard	98, 99	water	137, 138
corn	98, 104	Plowman's spikenard	314
fools	107	Polypody	387—389
hedge	99	Polytrichum	400, 401
knotted	98	Pondweed	60—63
piert	60	horned	357
sea	102	Poplai	370
stone	100, 104	Poppy	202—204
Parsnep, cows	102	Prick-madam	170
sea	97	wood	84
water	103, 104	Prim	3
wild	109	Primrose	70
Pasque flower	209	peerless	123
Pearlwort	64	Privet	3
Pear-tree	189	Puff-balls	502, 503
		Purging-thorn	85
		Pur-	

INDEX NOMINUM ANGLICANORUM.

	Page	S		Page
Purflane, water	128			
sea	379			
		Q		
Quick in hand	332			
Quicken-tree	189			
Quill-wort	393			
		R		
R Adish, horse	249			
water	258			
Ragwort	317, 318, 327			
Rampions	81, 83			
Ramsons	122			
Raspberry	193			
Rattle, yellow	234			
Reed	43, 345			
Rest-harrow	273			
Ribwort	52			
Riccia	440, 441			
Rocket, base	181			
wall	258			
sea	201			
water	258			
wild	254			
winter	251			
Ros solis	191, 192			
Rosewort	371			
Rosemary, wild	155			
Rue, meadow	216			
Rupture-wort	94			
least	117			
Rush	129, 132			
bog	14			
bull	17			
club	16—18			
flowering	152			
grafts	15			
hare's-tail	20			
		S		
SAGE of Jerusalem	67			
wood	219			
Saffron	13, 122, 136			
Saintfoin	281			
St. John's wort	290, 291			
St. Peter's wort	292			
Sallow	366			
Saltwort	I			
black	86			
Sampire	1, 97, 101, 320			
Sanicle	96			
		Yorkshire		
Satyrion	337			
Sauce alone	251			
Saw-wort	304, 305			
Saxifrage, burnet	110, 111			
		Cornwall		
		English		
		golden		
		meadow		
		white		
Scabious	50, 51			
sheeps	329			
Scurvygrass	75, 247, 248			
Self-heal	231			
Sea-beard	485			
Sengreen	157			
Septfoil	198			
Service	188			
Setterwort	215			
Shepherd's-purse	247			
Sicklewort	219			
Silverweed	195			
Sloe-tree	186			
Smallage	111			
Snakeweed	147			
Snapdragon	239			
Sneezewort	325			
		Soapwort		

INDEX NOMINUM ANGLICANORUM.

	Page		T		Page
Soapwort	161			T	
Soldier, fresh-water	208				
Solomon's seal	126, 127				311
Sorb	188, 189		TANSEY	wild	195
Sorrel	136				
wood	173		Tare		279, 280
Southernwood	311		Targionia		438
Sow-thistle	295		Teasel		49, 50
bane	90		Thistle	305—309, 326	
Sparagus	126		Thongs, sea		467
Spearwort	210		Thorn, black		186
Speedwell	3—7		buck		83
Sperage	126		sea		368
Spignel	100		sallow		368
Spikenard	314		white		188
Spindle-tree	84		Thorow-wax		97
Splachnum	399		Thrift		114
Spleenwort	383, 385, 388		Throatwort		81, 82
Sponge	489, 490		Thyme		230
Spurge	182—185		Toadflax, bastard		86
laurel	145		common	237, 238,	
olive	145		Toothwort		233
Spurrey	169, 177, 178		Touch me not		332
Squinancy-berries	85		Touchwood		497
wort	55		Tormentil		198
Star of Bethlehem	124, 125		Travellers Joy		217
of the Earth	53		Trefoil	282—289	
wort	2, 319		marsh		71
Stitchwort	64, 166		Tremella		463, 469
Stonecrop	170—173		Trichomanes		392
Strawberry	195		True-love		150
tree	155		Truffles		502
Succory, swines	302		Turneps		253
wild	304		Tutsan		291
yellow	294		Twablade		338, 339
Sun-dew	117			V	
flower	205		Valerian		12, 13
Sycomore	379		greek		75
			Venus's comb		108
				Ver-	

INDEX NOMINUM ANGLICANORUM.

	Page		Page
Vervain	505	Williams, wild	174
Vetch	275—282	Willow	362—366
Violet	330—332	herb podded	141, 142
calathian	87	hooded	232
corn	82	purple	180
dame's	252	rose-bay	140
water	72	yellow	72
		Winter-green	139, 154
		Woad, wild	181
W Ake-robin	342	Wood-binde	80
Wall-flower	250	green	272
wort	113	roof	55
Wartwort	183	waxen	272
Water-wort	151	Worm-feed, treacle	251
Way-bread	51	wood	311, 312
faring-tree	112	Wrack, grass	343
Whin	272	sea	466
White-rot	96		Y
Whitlow-grass	159, 243,	Arrow	325
	244	Yellow-weed	181
Whortle-berries	142, 143	Yew-tree	372
Wilding	190		



F I N I S.





